

百病治療全書



上海新文化書社印行

序

蘇松江瓊竹
綠漪李涵蘊編著

古人有言。病臥於床。委之庸醫。比於不慈不孝。是以爲人父子者。不可以不知醫。雖然。醫豈易知乎哉。夫天下之至變者。病也。天下之至精者。醫也。欲極其精。以窮其變。雖千萬言。不足以闡明其緒。上古聖人。仰觀天之六氣。俯察地之五行。揆草木金石禽獸之性。而合於人之五臟六腑十二經脈。著有靈樞素問。難經。及神農本草經。傷寒金匱等詞。古義深難。于窺測。凡人不願知醫者。以卷帙浩繁。莫不見而生畏。不知從何學起。或初學卽授以靈樞素問。猶開蒙之幼童。而授以周易春秋。莫怪其興趣毫無。欲期其恍然心悟。不亦難乎。或迫於生計。急於問世。潛心利祿。學見痰治痰。見血治血之江湖淺術。以卑鄙管窺之見。而自稱神良。其差誤殆有甚焉。少年時因母親病犯腫脹。呻吟床第之間。始終將及十載。諸醫束手。藥方積疊盈尺。終至不救。自覩其痛苦情狀。中心急迫。爲何如哉。受此激刺。誓讀攻醫。十有餘載。然中間畏難而棄者。經數次。暨聞呻吟哀號之聲。思及人而無恆。不可以作巫醫之句。每自勉勵。重作平心靜氣之求。得有豁然心悟之日。迨至今夏。聞有廢除國醫之議。覺是書之出。更不可緩。蓋醫書雖卷帙浩繁。獨乏指導初學之書。引進後起之路。以致有志醫學者。離欲研究而無所適從。莫怪近代醫家。毫無進步。去古愈遠。其道愈卑。至生廢除之議。余有感于此。不求深奧。以簡馭繁。取淺顯切實。明達易曉者。編成是書。作初步學習之指導。務使人人得簡要之方。易生興趣。苟執此卷而窮究之。對症用藥。去道不遠。醫師庸良。不難鑒別。遇症自可按對病情。密爲何藏。何腑。是陰。是陽。症既洞澈。藥自靈效。誠願有志者。熟玩是編。據爲要領。而再深求古聖先賢之學說。自可一覽了然。斷不至有畏難之嘆。欲求深造。指日可期。發揚光大。同登壽域。固所望也。自爲序。

民國十八年秋江蘇松江李涵蘊自序

例論

我國醫書種類浩繁。而于初學者。獨付缺如。卽有一二。總難免有過與不及之弊。是書專爲初步學者而作。故不求

深與淵繁就簡。旨在讀者易於明達。即可實用。然後再求深造。自能一覽了然。不致見而生畏。有從何學起之感。是書以簡馭繁。取顯善切。實務使讀者易生興趣。有學醫不難之存心。願人人稍知醫理。不為庸醫所誤。若鄉僻間不及延醫者。亦可對症自醫。即有讀書少而閱歷淺之醫家。得此則入門看症。不至茫無頭緒。自有把握矣。

是書本古聖先賢之綱要。採各大家之所長。以及余之臨床。實效驗者。集合而成。凡屬藥性。悉照神農本草經。無偏寒偏熱之弊。病果屬按對症。情審明無誤者。即依法自治。亦其應如響。

是書綱目。由淺入深。使讀者于不知不覺之間。得以層次而進。無越級顛倒先後錯亂之弊。學者苟能執此卷而熟玩之。用一年之功。可以勝過他人學醫三年。其心得必有可觀。讀此一書。較之喜涉獵而學無次序者。讀十卷書。有過無不及。故謂之學醫之指導名之入門之指南。

是書雖簡。然病總由臟腑。總不外虛實寒熱。審知其為何藏何腑之虛症。實症。寒症。熱症。而聯其病類以集之。則藥歸同路。療一病可療千萬病。亦無不可。果能潛心熟玩。以之問世。應付裕如。不在多立病名。多立方書也。是書從內病外現。節起至看症要決。止使看護者讀之。亦可貢獻于醫生。使醫生易于辨別是症之何屬。蓋看護者常在病人左右。病人之一舉一動。知之最詳。苟得略有醫學智識者。為看護。必能在不知不覺之間。見到病人表症。是病何屬之舉動。

今夏衛生部有提議廢除中醫之議。舉世驚寤。醫藥兩界奔走呼號。聯合開會。推舉代表。力請維持。自此亟謀進步。以期戰勝西醫。蓋是中不乏名流。而于初步學醫之書籍。獨不注意。且無完備教授之法。學說紛歧。毫無統系。焉能引起後學。即有一二有志者。常恨入手何從。予有感于此。在民國十年間。從事編著書成。及半因屢招兵燹。中止進行。殆至夕夏。有廢除之議。當是書之出。更不容緩。姑續成此卷。以備世之有志學醫者之指導。醫之為道。不外乎陰陽之義。及五行生剋之理。凡學醫者。亦當自先明白陰陽之道。暨五行生剋之理。次及五臟六腑十二經絡。故是書亦照此例以編之。

是書凡遇切要。及證明病狀之處。悉分門別類。以便喚起讀者之注意。

望聞問切。四診本不可缺一。而四診之中。尤以望與問為最要。予之治病。與望問二字中。常得十之七八。且望之一道。最為切實。有據一言之下。凡為吾人於共見。即可依法證明病狀。故採各大家望色問症要決。及聞聲切脈之法。而為

予用以臨證實施。効驗者。不厭週詳。反覆申論之。
是書重實驗。不重理論。使一讀之下。卽能依法如意實地試驗。明白是病之何屬。凡昔賢證明病狀。有跡可據。有聲可
聞。有形可察。有色可觀。有狀可指。爲吾人所共見共聞者。均採入之。
是書居家旅行。以及山野鄉僻之間。艱於延醫者。更不可不備。蓋一旦犯病。卽可依法識病。對症自醫。醫人備此書一
部。如家庭間常聘一醫生在帶。此書遠行如常。隨一醫生在吾之左右也。

百病療治法目錄

卷上

- 陰陽之義
五行相生子母相應說
命門說
十二經氣血多少詩
十六絡穴表
藥之升降浮沉說
六淫主治說
絕症外現表
望色詩
望鼻色
辨舌要訣
問症說
八脈四言歌七言詩
婦人科診脈四言詩
陰陽表裏虛實寒熱辨
- 五行生克表
五味應五行
五味相克同於五行說
十二經起止及氣血流注表
十二經氣血流注詩
十六絡詩
諸藥入諸經之部份說
五臟補瀉說
望聞問切論
望目色
辨舌要訣一
聞聲說
診脈歌訣
七怪脈四言詩
男女異脈
入門看症要訣
- 人之五臟應五行
氣味陽陰說
十二官說
十二經詩
經絡說
五味之作用
百藥製治說
內病外現說
望色說
望唇口色
辨舌詩
聞聲詩
持脈秘旨
脈有宜忌說
小兒脈法

卷中

治表法(附四時感冒詩)

治實法

內傷外感雜治說

虛勞論治

瘵症論治

補可扶弱

香砂六君子湯

藥性摘要

白朮

陳皮

白豆蔻

四物湯

藥性摘要

白芍

人參養營湯

黃耆

遠志

歌括

山稔

治裏法

治寒法

溫熱條辨

疫症論治

腫症論治

四君子湯

五味異功散

人參

甘草

薑

砂仁

八珍湯

生熟地黃

川芎

歌括

肉桂

六味地黃湯

藥性摘要

丹反

治虛法

治熱法

傷寒論治

痢症論治

列方

六君子湯

歌括

茯苓

半夏

木香

四君子香砂六君子論

歌括

當歸

十全大補湯

藥性摘要

五味子

桂附地黃丸(又名八味地黃丸)

山茱萸

澤瀉

附子

藥性摘要

歸脾湯

茯神

歌括

天門冬

紫菀

桔梗

歌括

歌括

香附

蔓荊子

麝黃湯

麝黃

歌括

藿香正氣散

藿香

大腹皮

五物香薷飲

藥性摘要

黃連

補中益氣湯

柴胡

歌括

棗仁

藥性摘要

地骨皮

知母

小健中湯

輕可去實

藥性摘要

防風

桂枝湯

歌括

杏仁

藥性摘要

歌括

白芷

四味香薷飲

十味香薷食

香薷

木瓜

歌括

升麻

藥性摘要

黃耆蟹甲散

蟹甲

秦艽

桑白皮

黃耆健中湯

香蘇飲

紫蘇

荆芥

歌括

藥性摘要

葛根湯

葛根

藥性摘要

厚朴

黃連香薷飲

歌括

扁豆

散可解鬱

小柴胡湯

歌括

逍遙散

藥性摘要

八味逍遙散

歌括

黃芩芍藥湯

薄荷

山梔

黃芩

歌括

藥性摘要

燥可去濕

六和湯

歌括

歌括

五苓散

四苓散

五皮飲

藥性摘要

豬苓

歌括

歌括

平胃散

歌括

藥性摘要

蒼朮

二陳湯

歌括

草薺分清飲

歌括

藥性摘要

川草薺

黃柏

石菖蒲

車前子

丹參

蓮子

蓮蕊類

蓮房

蓮心

荷葉

柳蒂

茵陳大黃湯

茵陳薏附湯

茵陳五苓散

歌括

藥性摘要

茵陳

大黃

熱可制寒

理中湯

附子理中湯

歌括

四逆湯

歌括

藥性摘要

葱白

三生飲

歌括

藥性摘要

天南星

生烏頭

白通加猪胆汁湯

歌括

猪胆汁

藥性摘要

金匱腎氣丸

牛膝

小承氣湯

歌括

枳殼

調胃承氣湯

獨聖散

蒲黃

風可消散

藥性摘要

消風散

蠶蠶

濕胆湯

竹茹

甘露飲

枇杷叶

瀉白散

導赤散

藥性摘要

厚朴温中湯

肉豆蔻

歌括

泄可去痢

三花湯

藥性摘要

芒硝

歌括

歌括

五靈脂

大秦芫湯

石膏

歌括

蟬蛻

歌括

白虎湯

歌括

麥門冬

歌括

歌括

人尿

歌括

草豆蔻

藥性摘要

大承氣湯

三承氣湯

枳實

羌活

失笑散

藥性摘要

山查

歌括

細辛

藥性摘要

寒可勝熱

藥性摘要

歌括

藥性摘要

石斛

通可行滯

藥性摘要

木通

歌括

麥芽

暑可清散

藥性摘要

橘叶

碧玉散

藥性摘要

丹砂

歌括

側柏叶

藥性摘要

澤蘭

藥性摘要

養心湯

龍眼肉

歌括

沉香

藥性摘要

毒可涼解

藥性摘要

竹叶

藥性摘要

朴黃丸

清暑益氣湯

青皮

六一散

鷄蘇散

青黛

血可調理

藥性摘要

澤蘭湯

柏子仁

犀角地黄湯

犀角

歌括

痰可蕩滌

藥性摘要

清氣化痰丸

括婁

普濟消毒飲

馬勃

越鞠丸

神精

歌括

歌括

橘核

益元散

歌括

滑石

四生丸

艾叶

歌括

荒蔚子

歌括

羚羊角

藥性摘要

滾痰丸

青礞石

歌括

附仁

歌括

元參

連翹

複可兼治

防風通聖散

歌括

貝母

淡豆鼓

龍胆草

牛蒡子

手拈散

牛黃丸

團魚丸

通音煎

治疫清涼散

和中丸

生地黃湯

錫痺湯

黃連解毒湯

大柴胡湯

歌括

藥性摘要

葶根

金銀花

甘菊花

大豆黃卷

神佑丸

消暑丸

月華丸

秘精丸

葛根治痢散

白朮丸

小半夏加茯苓湯

治痢奇方

歌括

歌括

涼膈散

蜂蜜

萊菔子

鈎藤鈎

旋覆花

丸散列方

搐鼻散

止嗽散

百藥煎散

補天大造丸

開喉散

實驗神效方

秦芫天麻湯

上癆丹

卷下

心部

心虛見證

心熱見證

瀉心猛將藥

心實見證

補心猛將藥

瀉心次將藥

心寒見證

補心次將藥

心部列方

肝部

肝寒見症

補肝次將藥

涼肝猛將藥

溫肝次將藥

脾虛見證

脾熱見證

瀉脾猛將藥

涼脾次將藥

脾部列方

肺虛見證

肺熱見證

瀉肺猛將藥

涼肺次將藥

肺部列方

腎寒見證

補腎次將藥

涼腎猛將藥

溫腎次將藥

胃表見證

胃寒見證

肝虛見證

肝熱見證

瀉肝猛將藥

涼肝次將藥

肝部列方

脾實見證

補脾猛將藥

瀉脾次將藥

溫脾猛將藥

肺部

肺實見證

補肺猛將藥

瀉肺次將藥

溫肺猛將藥

腎部

腎熱見證

瀉腎猛將藥

涼腎次將藥

腎部列方

胃虛見證

胃熱見證

肝實見證

補肝猛將藥

瀉肝次將藥

溫肝猛將藥

脾部

脾寒見證

補脾次將藥

涼脾猛將藥

溫脾次將藥

肺表見證

肺寒見證

補肺次將藥

涼肺猛將藥

溫肺次將藥

腎虛見證

補腎猛將藥

瀉腎次將藥

溫腎猛將藥

胃部

胃實見證

補胃猛將藥

瀉胃次將藥

瀉胃猛將藥

瀉胃次將藥

涼胃猛將藥

瀉胃次將藥

瀉胃猛將藥

瀉胃次將藥

胃部列方

膀胱部

膀胱表見證

膀胱虛見證

膀胱實見證

膀胱寒見證

膀胱熱見證

補膀胱藥

瀉膀胱猛將藥

瀉膀胱次將藥

瀉膀胱猛將藥

瀉膀胱次將藥

瀉膀胱猛將藥

瀉膀胱次將藥

膀胱部列方

膽部

膽表見證

膽虛見證

膽實見證

膽寒見證

膽熱見證

補膽猛將藥

補膽次將藥

瀉膽猛將藥

瀉膽次將藥

瀉膽猛將藥

瀉膽次將藥

瀉膽猛將藥

瀉膽次將藥

大腸部

大腸虛見證

大腸實見證

大腸寒見證

大腸熱見證

補大腸猛將藥

補大腸次將藥

瀉大腸猛將藥

瀉大腸次將藥

瀉大腸猛將藥

瀉大腸次將藥

瀉大腸猛將藥

瀉大腸次將藥

大腸部列方

小腸部

小腸虛見證

小腹實見證

小腸寒見證

小腸熱見證

補小腸將藥

瀉小腸猛將藥

瀉小腸次將藥

小腸部列方

三焦部

補三焦猛將藥

瀉三焦猛將藥

瀉三焦次將藥

心胞絡部

婦女科

婦女證論

肝氣

嗣孕

產後諸症

婦人科列方

幼科

非時論

大驚猝恐

口疳

傷酒

盜汗自汗

兒科列方

室女

婦女經產病溫

胎前諸症

初生保養

痰火閉症

身厥

夜啼

食積癆積蟲積痰積水積

咳嗽

月經見證

帶症

臨產將護法

外熱內熱辨

木侮土症

熱疳

吐瀉

疳症

解頭為腐亂青

百病療術法 卷上

曠江劉藩校正

陰陽之義

凡人乃陰精陽氣合而成之者也。病之起也，亦不外乎陰陽二字。和則生，不和則病。故欲研究醫理，當先布置頭目。陰陽之義，何為陰陽？天為陽，地為陰，輕清為陽，重濁為陰，火為陽，水為陰，男為陽，女為陰，左為陽，右為陰，陽精為陽，陰精為陰。為陽裏為陰，實為陽，虛為陰，熱為陽，寒為陰，孤陰不生，獨陽不長，良醫之救人，不過能辨此陰陽而已。庸醫之殺人，不過錯認此陰陽而已。又有陰中之陽，陽中之陰，其間毫釐千里，命在反掌，辨之者安得而不慎。

五行生克表

金克木 木克土 土克水 水克火 火克金 金生水 水生木 木生火 火生土 土生金

人之五臟應五行

凡人心肝脾腎謂之五臟。心屬火，肝屬木，脾屬土，肺屬金，腎屬水。

五色應五行入五臟表

凡葶青屬木入肝，赤屬火入心，黃屬土入脾，白屬金入肺，黑屬水入腎。

五味應五行入五臟表

凡葶酸屬木入肝，苦屬火入心，甘屬土入脾，辛屬金入肺，鹹屬水入腎。

氣味陰陽說

凡葶寒熱濕涼氣也，酸苦甘辛鹹味也。氣為陽，味為陰。氣厚者陽中之陽，薄者陽中之陰，味厚者陰中之陰，薄者陰中之陽。氣薄則發泄而表散，厚則發熱而溫燥，味厚則泄且能降瀉，味薄則通又能利竅。發瀉辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，鹹味潤下為陰，淡味滲泄為陽，輕清升浮為陽，重濁沉降為陰。陽氣出上竅，陰味出下竅。清陽發腠理，濁陰走五臟，清陽入四肢，濁陰歸六腑。此氣味陰陽之義也。

五行相生子母相應說

夫人之五臟應五行。金木水火土子母相生。經曰虛則補其母。實則瀉其子。又曰子能令母實。如腎為肝母。心為肝子。蓋腎屬水。肝屬木。水能生木。故為其母。心火藏木能生火。故為其子。所以藥之入肝木者。併能入腎水。與心火。肝為心母。脾為心子。脾屬土。火能生土。為其子也。故入心火者。併入肝木與脾土。心為脾母。肺為脾子。肺金藏土。土生金。是肺金當為脾土之子。所以入脾者。併入心火與肺金。脾為肺母。則腎又為肺子。因水由金生。故入肺者。併入脾腎二經。肺為腎母。腎子為肝木。從水生為子。固宜入腎水者。所以亦能併入肺金與肝木耳。此五行相生子母相應之義也。

五味相克同與五行說

凡味之辛者能勝酸。辛屬金。酸屬木。金能克木也。味之鹹者能勝苦。鹹屬水。苦屬火。水能克火也。味之酸者能勝甘。甘屬土。木能克土也。味之苦者能勝辛。火能克金也。味之甘者能勝鹹。土能克水也。此五味相克同與五行之義也。

說心 十二官說

心者君主之官。神明出焉。心火藏。故不欲其炎上。蓋心者新也。神明之官。變化而日新也。又心主血脈。血脈日新。新新不停。則為平人。否則病矣。其合脈也。其榮色也。開竅於舌。其位居於肺之下。心包之上。中有系絡上繫於肺。凡脾胃肝膽兩腎膀胱各有一系絡繫於包絡之旁。以通於心。故包絡為心之外衛。心為五臟六腑之君主。屬乎少陰之脈。少血多氣。午時氣血流注於心。

說肝

肝者將軍之官。謀慮出焉。肝木藏。魂所藏也。居於膈膜之下。亦有系絡上繫於心包。其短葉中有膽附焉。蓋肝者幹也。以其體狀有枝幹也。其合筋也。其榮爪也。開竅於目。屬足厥陰之脈。多血少氣。丑時氣血流注於肝。

說肺

肺者相傳之官。治節出焉。肺為金藏。魄所藏也。為五臟之長。心之蓋。生氣之原。上接喉竅。下覆諸臟。主呼吸出入。為人身之管籥。蓋肺者沛也。中有二十四氣分布清濁之孔。以行於諸臟。使沛然莫禦也。其合皮也。其榮毛也。開竅於鼻。其氣血之流注也。在寅時。屬手太陰之脈。少血多氣。

說腎

腎者作強之官。伎巧出焉。腎水臟。藏精與志。爲先天之本。精神之舍。性命之根也。蓋腎者引也。能引氣通於骨髓。又腎者任也。主骨而任周身之事故。強弱係之。其合骨也。其榮髮也。開竅於二陰。屬足少陰之脈。少血多氣。酉時氣血流注於腎。

說胃

胃者倉廩之官。五味出焉。屬土脾之腑也。故從田。田乃五穀所出。以爲五穀之市也。又胃者衛也。水穀入胃。游溢精氣。上出於肺。暢達四肢。布護周身。足以衛外而爲固也。上接咽喉。竅居於膈膜之下。其左右小腸。屬足陽明之脈。多血多氣。辰時氣血流注於胃。

說膽

膽者中正之官。決斷出焉。屬木肝之腑也。爲中清之府。十一經皆取決於膽。人之勇怯邪正。於此管之。故從膽。又膽者擔也。有膽量。方足以擔天下之事。肝主仁。故以膽斷之。膽附於肝之短葉中。仁者必有勇也。屬足少陽之脈。少血多氣。子時氣血流注於膽。

說大腸

大腸者傳道之官。變化出焉。居於小腸之下。回壘積十六曲。上接小腸。下趨肛門。以出滓穢。屬金爲肺之腑。是經多血。多氣。爲手陽明之脈。卯時氣血流注於大腸。

說小腸

小腸者受盛之官。化物出焉。屬火。爲心之腑。居於胃之左。上接於胃。其下卽大腸。膀胱汁之粗者出大腸。清者滲入膀胱。爲手太陽之脈。多血少氣。未時氣血流注於小腸。蓋人納水穀。脾化氣而上升。腸則化而下降。以腸者暢也。所以暢達胃中之氣也。腸通暢則爲平人。否則病矣。

說三焦

三焦者。決瀆之官。水道出焉。屬火。爲心包絡之腑。蓋焦者熱也。三者上中下三焦之氣也。滿腔中熱氣布護。始能通調。

水道。上焦不治則水泛高源。中焦不治則水留中脘。下焦不治則水亂二便。三焦氣治則脈絡通而水道利。故曰決瀆之官。屬手少陽之脈。少血多氣。亥時氣血流注於三焦。

說臆中（卽心包絡一名手心主）

臆中者。臣使之官。喜樂出焉。爲火臟之外衛。故曰相火。代君主而行事。亦有主名。何以繫之以手。蓋以手厥陰之脈。出屬心包。手三陽之脈。叢絡心包。是手與心主合。所以心包絡稱手心主。五臟加此一臟。實六臟也。卽手厥陰是經多血少氣。戌時氣血流注於臆中。


說膀胱


膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出焉。屬水。爲腎之腑。蓋膀胱者。旁也。胱者。光也。言氣血之元氣足。則津液旁達。不窮而肌腠皮毛。皆因以光澤也。爲足太陽之脈。多血少氣。申時氣血流注於膀胱。

命門說

人之強弱壽夭。全係命門。越人指右腎爲命門。諸家非之。命門之俞穴。改之內經。太陽根于至陰。結于命門。命門者。目也。靈樞結根篇。衛氣篇。素問陰陽雜合論。三說俱同。後讀黃庭經。云上有黃庭。下關元。後有幽門。前命門。方悟其處。凡人受生之初。先天精氣聚於臍下。當關元氣海之間。其在女者。可以手捫而得。俗名產門。其在男者。於泄精之時。自有關闈。知覺此北門之鎖鑰。司人之生命處也。又考越人七衝門之說。謂飛門。唇門也。戶門。齒門也。吸門。會厭也。胃門。胃之上口也。幽門。大腸下口也。闈門。小腸下口也。魄門。肛門也。便溺由氣化而出。又增溺竅爲氣門。凡稱之曰門。皆指出入之處也。况身形未生之初。父母交會之際。男之施由此門而出。女之受由此門而入。及胎元既足。復由此門而生。故于八門之外。重之曰命門者。欲養生家。知所專重。醫者若遇元氣虛脫之症。或速灸關元。或速投肉桂附子。以爲起死回生之計。眞命之門也。若夫督脈十四椎中。有命門之穴。是指外論而言。如五臟六腑。一理非謂命門卽在于此也。

十二經起止及氣血流注表





十二經詩

手(三)陰從臟行於手。從手行頭是手(三)陽。足之三陽從頭走。(足)足(三)陰(從足)上腹要參詳。(十二經外又有督脈起自肩髃穴至唇內上齧交穴止任脈起自會陰穴至下齧交穴止合上十二經共十四經)。

十二經氣血多少詩

多血多氣君須記。手經大腸足經胃。少血多氣有六經。三焦膽腎心脾肺。多血少氣分四經。膀胱小腸肝包繫。

十二經氣血流注詩

肺寅大卯胃唇宮。脾巳心午小未中。膀申腎酉心包戌。亥三子膽丑肝通。

經絡說

醫輩於經絡之起止出入部穴等。每苦其難。今約言其概。再按銅人圖經穴。與十二經起止表。十六絡穴表。則得矣。手太陰肺脈起於中焦腋傍中府穴。橫出腋下循臂內。出手大指少商穴。歷次指而交於手陽明之大腸大腸之脈起

於手大指之次指。商陽穴循臂外入缺盆。上面挾鼻孔。鼻傍迎香穴而交於足陽明胃脈。胃脈起於鼻頰中。目下承泣穴至頰頰。循喉嚨下。漏挾臍入膝臍。下足跗。出足大指次指屬兌穴。而交於足太陰之脾脈。脾脈起於足大指陰白穴。上膝股之前入腹。上膈連舌。本注心中。循腋下大包穴。而交於手少陰之心脈。心脈起於心中。出腋下極泉穴。上腋挾咽。出腋下循膈內抵掌骨。注手少指之內少商穴。而交於手太陽之小腸小腸之脈起於手小指少澤穴。出手踝循臍外。交肩。上入耳中聽官穴。至目內眥。而交於足太陽之膀胱膀胱之脈起於目內眥。睛明穴。從頭下項脊。循背脊。下腿後。至足小指外側至陰穴。而交於足少陰之腎脈。腎脈起於足小指循足心湧泉穴。上膈股貫脊。足貫肝膈入肺。挾舌本。注胸中。胸前俞府穴。而交於手厥陰之心包心包之脈起於胸中。出乳後天池穴。循臍出脅入肘。循臂過掌中。注手中指中衝穴。循小指之次指。而交於手少陽之三焦。三焦起於手小指之次指。即無名指之關衝穴。循手臂出臂外。貫肘上肩入耳中。出耳前後上眉尾絲竹空穴。至目銳眥。而交於手小腸之膽脈。膽脈起於目銳眥。童子膠穴。循耳後至肩。合缺盆。下胸中。過季脅。出膝。循足跗。下足四指釵穴。出足而大指。而交於足陰厥之肝脈。肝脈起于足大指叢毛之率。大敦穴。從膈股乳上過陰器。抵小腹。上腹上入乳下。期門陰脈交於手太陽之肺脈。是爲十二經脈之一週。乃頭面胸背手足各有所屬。而爲週身之部位。

十六絡穴表

手太陰絡列缺腕後側一寸五分。別分走陽明。

手陽明絡偏歷在手腕後三寸。別走太陰。

足陽明絡豐隆在外踝上八寸。別走太陰。

胃之大絡虛里在兩乳之下。

足太陰絡公孫在足大指內側。本節指一寸。別走陽明。

脾之大絡大包在腋下六寸。

手少陰絡通里在腕後一寸。別走手太陽。

手太陽絡支正在腕後外廉五寸。別走足少陰。

足太陽絡飛陽在外踝上七寸。別走少陰。

足少陰絡大鐘在足內踝後衝中。別走太陽。

手厥陰絡內關在掌後去腕二寸兩筋間。別走少陽。

手少陽絡外關在腕後二寸與內關相對。別走手心主。

足少陽絡光明在外踝上五寸。別走厥陰。

足厥陰絡蠡溝在足內踝上五寸。別走太陽。

任脈絡屏翳名會陰。在大便前小便後。俠督脈衝脈之會。

督脈絡長強在脊骨端。別走任脈。足少陰所結。

十六絡詩

肺經列缺絡。傷歷屬大腸。胃有豐隆絡。脾則公孫詳。心經絡通里。支正屬小腸。飛陽膀胱絡。腎絡大鐘彰。內關手心主。外關三焦腧。膽絡光明穴。蠡溝肝莫忘。任脈屏翳會。督脈絡長強。更有大包脾。大絡胃之大。絡虛里在左。傍諸經之絡。維二而脾胃之絡各二何也。蓋以脾胃爲臟腑之本。十二絡皆以受氣也。

五味之作用說

凡藥味酸者能瀉能收。苦者能瀉能燥能堅。甘者能補能和能緩。辛者能散潤能橫行。鹹者能下能裏堅。淡者能利竅能滲泄。此五味之用也。酸傷筋。酸能收斂。斂則筋縮。故多食酸則肉胝膈而唇揭。蓋唇爲肉之華。肉則合於脾。脾爲土。藏木能克土。故耳苦傷寒。苦能瀉氣。多食苦則皮槁而毛拔。因皮毛合於肺。肺屬金。火能傷之也。甘傷肉。甘則壅氣而腫。且多食甘又能使骨痛而髮落。蓋骨之華在髮。而骨之合也。又在腎。腎屬水。土能克水。故甘所以傷之也。辛傷皮毛。因辛能疎散。腠理多食之則筋急而爪枯。爪爲筋之餘。筋又與肝合。辛屬金。所以能傷肝木。然肝又喜散。辛味能散。可以補肝。惟多則爲害耳。鹹傷血。鹹能滲泄津液。多食之則脈凝泣而變色。蓋脈卽血也。心合脈。爲臟火。水能克火。而傷之也。酸走筋骨。筋病毋多食酸。筋得酸則拘攣。收引益甚也。苦走骨。骨病毋多食苦。骨得苦則陰益甚。重而難舉也。甘走肉。肉病毋多食甘。肉得甘則壅氣。腫脹益甚也。辛走氣。氣病毋多食辛。氣得辛則散而益虛也。鹹走血。血病毋

多食鹹。血得鹹。則凝滯而口渴也。此五病之所禁也。

準之升降浮沉說

凡藥之輕虛者。浮而升。重實者。沉而降。味薄者。升而生。氣薄者。降而收。氣厚者。浮而長。味厚者。沉而藏。味平者。化而成。氣厚味薄者。浮而升。味厚氣薄者。沉而降。氣味具厚者。能浮。能沉。氣味具薄者。可升。可降。酸鹹無升。辛甘無降。寒無浮。熱無沉。此升降浮沉之義也。

諸藥入諸經之部分說

蓋藥雖一準。而根梢有別用之或差。其害非淺。如藥根之在土中者。半身以上則上升。半身以下則下降。為肢者。達四肢。為皮者。達皮膚。為心者。為幹者。內行臟腑。質之輕者。上入心肺。重者。下入肝腎。中空者。發表。內實者。攻裏。枯燥者。入氣。分潤澤者。入血。分色青味酸。氣燥性屬木者。皆入足厥陰肝。足少陽膽。經色赤味苦。氣焦性屬火者。皆入手少陰心。手太陽小腸。經色黃味甘。氣香性屬土者。皆入足太陰脾。足陽明胃。經色白味辛。氣腥屬金者。皆入手太陰肺。手陽明大腸。經色黃味酸。氣腐性屬水者。皆入足少陰腎。足太陽膀胱。經惟手厥陰心。胞。手少陽三焦。經無所主。其經通於足厥陰。少陽。厥陰。主血。諸藥入肝經。血分者。併入心。胞。少陽主氣。諸藥入膽經。氣分者。併入三焦。命門。屬相火。散行於膽。及三焦。心。胞。絡。故入命門者。併入三焦。此諸藥入諸經之義也。

百藥製治說

凡藥火製。四煨。煨炙炒是也。水製。三浸泡洗是也。水火共製。二蒸煮也。酒製。升提。薑製。溫散。入鹽。走腎而軟堅。用醋。注肝而收斂。童便。製除劣性而降下。米泔。製除燥性而和中。乳。製潤枯生血。蜜。製甘緩益元。陳壁土。製籍土氣以補中州。麵煨。麵製。抑麤性。勿傷上膈。烏頭。甘草湯浸。並解毒。致令平和。羊酥。豬脂。塗燒。咸滲骨。容易脆斷。去穢者。免脹。去心者。除煩。此製治各有所宜也。

六淫主治說

風淫於內。治以辛涼。佐以苦甘。風屬木。辛屬金。金勝木。故治以辛涼。然過辛恐傷真氣。故佐以苦甘。苦勝辛。甘益氣也。且木性又急。故以甘緩之。木喜條達。故以辛散之。熱淫於內。治以鹹寒。佐以苦甘。以酸收之。水能勝火。故治以鹹寒。甘

勝鹹佐之。所以防其過也。必以甘者防鹹之過。瀉熱氣而作實也。故以苦發之。熱淫故以酸收之。濕淫於內。治以苦熱。佐以酸淡。濕爲土氣。苦熱皆能燥濕。故治之。淡能利竅而滲濕。用酸者。木能制土也。故佐之火淫於內。治以鹹冷。佐以苦辛。相火畏水也。故以鹹冷治之。火淫故以酸收之。辛能滋潤。苦能泄熱。又能從其性而升廢之。寒所以佐其也。燥淫於內。治以苦溫。佐以甘辛。燥屬金。火能勝之。故治以苦溫。甘能緩辛。苦能下。故以爲佐也。寒淫於內。治以甘熱。佐以苦辛。以鹹瀉之。以辛潤之。以苦堅之。土能製水。熱能勝寒。故治以甘熱。苦而辛。亦熱品也。傷寒內熱者。以鹹瀉之。內燥者。以辛潤之。苦能瀉熱而堅腎。瀉中有補也。此六淫主治。各有所宜。故率性宜明而施用貴審也。

五臟補瀉法

五臟補瀉。各有不同。如肝苦急。肝主血。血燥則苦急。急食甘以緩之。肝欲散。木喜條達。急食辛以散之。以辛補之。以酸瀉之。是肝則以散爲補。以斂爲瀉也。心苦緩。緩則散逸。急食酸以收之。心欲安。急食鹹以安之。以鹹補之。水能克火。然心以下交於腎。爲補取既濟之義。以甘瀉之。是心以鹹爲補。以甘爲瀉也。脾苦瀉。急食苦以燥之。脾欲緩。脾喜舒和。急食甘以緩之。以甘補之。以苦瀉之。是脾則以甘爲補。以苦爲瀉也。肺苦氣上逆。急食辛以泄之。肺欲收。急食酸以收之。酸補之。以辛泄之。腎苦燥。急食辛以潤之。腎欲堅。急食苦以堅之。以堅補之。以鹹瀉之。此五臟補瀉之義。各有不同也。

內病外現說

夫病人之一舉一動。往往爲吾人所忽。豈知病之作也。必現於外。若能專心事病人。則一望所楚。深達其有已欲言。而未能言矣。死生吉凶。其末事乎。今略舉其切實而易知者論之。假如氣短體弱。面黃連脣。口俱痿白。大便澹泄。小便短縮。手足厥冷等見於外。則其犯病也必虛。否則如氣粗譫語。狂躁不臥。大便堅結。小便黃赤等外現。則其犯病也必實。其他若如類於是者。見於外。苟能息心細審。亦可以意度之矣。故四診之中。惟望爲最要。

附絕症外現表

屍臭肉絕。舌捲囊縮。脾絕。口不合。脾絕。肌腫唇反。胃絕。髮直齒枯。腎絕。毛焦肺絕。面黑直視。目瞑不見陰。絕。目眶陷。目系傾。汗出如珠。腸絕。手撒。戴眼。太陽絕。病後喘瀉。脾絕。目正圓。瘧不治。吐沫面赤。面青黑。唇青人中滿。髮與眉衝起。瓜甲下肉黑。手掌無紋。臍突。足跌腫。聲如鼾。脈沉無根。面青脈伏。目盲。汗出如油。以

上肝絕八日死。眉傾瞻絕。手足爪甲青脫落。呼罵不休。筋絕八日死。眉息回視。心絕立死。髮直如藤。不得屈伸。自汗不止。小腸絕六日死。口冷足腫。腹熱腫脹。泄利無時。肺絕五日死。脊骨疼痛。身重不可轉側。胃絕五日死。耳乾舌腫。溺血大便赤泄。肉絕九日死。口張氣出不反。肺絕二日死。泄利無度。大腸絕齒乾枯。泄黑目黃。腰欲折。自汗腎絕。

望聞問切論望聞問切謂之四診。茲採各家之言。以及臨診實驗者。列于左。

望者。看形色也。聞者。聽聲音也。問者。訪病情也。切者。診六脈也。四事本不可缺一。而唯望與問爲最要。何也。蓋聞聲一。道不過審其音之低響。以定虛實。嗽之悶爽。以定升降。切脈一道。不過辨其浮沉。以定表裏。遲數以定寒熱。強弱以定虛實。其他則胸中了了。指下難明。故醫家謂據脈定症。是欺人之論也。惟細問病情。則先知病之來歷。細問近狀。則又知病之淺深。而望其部位之色。望其唇舌之色。望其大小便之色。病情已得八九分矣。再切其脈。合諸所問。所望。果相符否。稍有疑義。則默思其故。兩兩相形。虛與實相形。寒與熱相形。表與裏相形。其中自有把握之處。即可定斷。慎斯術也。以往其無所失矣。

望色說

凡病之作也。必有現於外者。故部位形色。不可不講求也。部位既知。五色自然可察。今略舉面上之部位論之。夫額與內外背肉。屬心。心則屬火。而赤而舌又爲心苗。鼻與眼包。屬脾。脾則屬土。而黃而口又爲脾竅。左頰與黑眼。屬肝。肝則屬木。而青而兩目又爲肝竅。右頰與白眼。屬肺。肺則屬金。而白而肺又開竅於鼻。兩頰與重神。屬腎。腎則屬水。而黑而耳又爲腎竅。故刺熱論云。色榮顏骨。其熱內連腎也。蓋部位察其相生相克。五色察其有神無神。大抵外感不妨滯濁。久病忌呈鮮妍。見黑色者多死。爲病最重。惟黃色見於面目。既不枯槁。又不浮澤。爲欲愈之後。經云。面黃目青。面黃目赤。面黃目白。面黃目黑者。皆吉。蓋黃屬土。今惡症雖見。土猶未絕。可救也。若面青目赤。面赤目白。面青目黑。面黑目白。面赤目青。皆難治。言無土色。則胃氣已絕也。

望色詩

春夏秋冬長夏時。青黃赤白黑。隨宜左肝右肺形。呈頰心額腎。頭鼻主脾。察位須知生者吉。審時若遇尅堪悲。更於黯澤分新舊。隱隱微黃是愈期。

望目色

目者五臟精華之所注。能照物者也。腎水之精也。熱則昏暗。水足則明察秋毫。如常而瞭然者。邪未傳裏也。若赤若黃。邪已入裏矣。若昏暗不明。乃邪熱在內。消灼腎水。腎水枯竭。故目不能明。照急用大承氣湯下之。蓋寒則目清。未有寒甚而目不見者也。凡開目欲見人者。陽症也。閉目不欲見人者。陰症也。目暈者。將閉血也。目睛黃者。將發黃也。至於目反上視。橫目斜視。瞪目直視。及眼胞忽然陷下者。為五臟已絕之症也。凡雜病忽然隻目不明者。此氣脫也。經云氣脫者。目不明。此氣虛也。丹溪用人參湯主之。又經云脫陰者。目昏。此血脫也。邪熱則下之。血虛則補之。以救腎水也。然此症已為危險之候。

辨鼻色

經曰。五色決于明堂。明堂者鼻也。故鼻頭色青者。腹中痛。微黑者。有疾。飲黃者。為者熱。蒼白色。氣為虛。赤色者。為熱。明亮者。為無病。鼻塞流清涕者。肺有風寒也。若傷寒鼻孔乾燥者。乃邪熱在陽明肌肉之中。久之必將閉血也。病人欲嚏而不能者。寒也。鼻塞濁涕者。風熱也。鼻息鼾睡者。風濕也。鼻孔乾燥黑如烟煤者。陽毒熱深也。鼻孔出冷氣滑而黑者。陰毒冷極也。凡病中鼻黑如烟煤者。乃大凶之兆。若見鼻孔煽張。為肺氣將絕。如危候。如產婦鼻起黑色。或鼻翕者。為胃敗肺絕之症也。古方用二味參蘇飲。加附子以救之。多有得生者。

望唇口色

唇者肌肉之本。脾之華也。故視其唇之色澤。可以知病之淺深。乾而焦者。為邪在肌肉。焦而紅者。吉。焦而黑者。凶。唇口俱赤腫者。肌肉熱甚也。唇口俱青黑者。冷極也。唇熱者。口苦。脾熱者。口甜。內傷者。口不知味。腹中不和。口燥咽乾者。腎熱也。口嗑難言者。或為瀉。或為痰厥。為中寒。不相等也。又狐惑症。上唇有瘡。為狐蟲食其臟。下唇有瘡。為惑蟲食其肛也。若病中見唇舌捲。唇吻反青。環口黧黑。口張氣直。或如魚口。或氣出不反。或口唇顫搖不止。皆難治也。

辨舌要訣一

方書辨舌之法甚多。然愈多愈亂。反失本真。故採其精要。近理而易明者論之。蓋舌為心竅。凡病俱現于舌。辨其顏色。症自顯然。舌尖主心。舌中主脾胃。舌邊主肝膽。舌根主腎。舌上無苔。為在表。鮮紅為火。淡白為寒。津枯而紅。熱證無疑。

色淡而潤。寒證無疑。假如精液如常。口不燒渴。雖或發熱。尚屬表症。若舌苔粗白。爲在半表半裏。黃苔爲在裏。絳色爲熱邪入心胞。黑苔病入少陰。心腎二經多死。舌上無苔。如去油猪腰者。爲亡液。名鏡面舌。不治。惟淡紅中微籠少白苔。苔爲胃氣無病舌也。

辨舌詩

舌上無苔表證輕。白苔半表。半裏古章程。熱紅寒淡參。看其枯。津枯而紅熱。證無疑。否則再辨。潤。色淡而潤。證無疑。否則再辨。陰黑。少陰熱化。舌黑宜黃連雞子湯。大承氣湯。少陰寒化。舌黑宜白通湯。通脈四逆湯。治之。陽黃。陽明症。舌苔黃實者。可下。虛而不實者。不可下。辨死生。全現光瑩。治已脫。名鏡面舌。不治。微籠本色氣之平。淡紅中微籠此。少白胎爲胃氣無病舌。前人傳有三十六。金鏡三十六舌。採摘多歧。語弗精。

辨舌要訣二

夫舌苔薄白。口不燥渴者。尚屬表症。若滿舌雪白。色如粉末。而暗滯者。爲肺絕不治。如舌苔粗白。漸厚而膩。是寒邪入胃。挾濁飲而欲化火也。此時已不辨知味矣。宜用半夏。藿香。迨厚膩而轉黃色。邪已化火。兼有濕熱也。用半夏。黃芩。若熱甚失治。則變黑。胃火甚也。用石膏。半夏。或黑而乾燥。則去半夏。而純用石膏。知母。麥冬。花粉之屬。以潤之。至厚苔漸退。而舌底紅色者。火灼水虧也。用生地。沙參。麥冬。石斛。以養之。此表邪之傳裏者。也。其有脾胃虛寒者。則舌白無苔。而潤甚者。連唇口。面色俱痿白。此或泄瀉。或受濕。是脾無火力。速宜黨參。焦朮。香茯苓。炙草。乾薑。大棗。以振之。虛甚欲脫者。加附子。肉桂。若舌中苔黃而薄者。爲脾熱。宜黃芩。苔厚而黃者。爲胃熱。兼濕也。用石斛。知母。花粉。黃芩。麥冬之類。如厚黃而被裂。乾枯者。胃腑熱甚。有實邪也。宜下之。若舌尖赤甚。或起芒刺者。是心熱。宜柴胡。黑山梔。舌中苔厚而黑燥者。胃大熱也。或並現黃刺。有實邪也。必用石膏。知母等。如連牙牀唇口俱黑。則胃將蒸爛矣。非石膏三四兩。生大黃一兩。加糞金汁。人中黃。鮮生地汁。天冬。麥冬汁。銀花露。大劑投之。不能救也。此唯時疫及傷寒症中。多有之。再有舌黑而潤澤者。此係直中寒症。兼腎虛也。急宜溫之。兼滋腎水。若滿舌紅紫色。而無苔者。名絳舌。亦屬腎虛。兼有熱也。宜生地。熟地。天冬。麥冬等。更有病後絳舌。如鏡發亮而光。或舌底隘乾而不飲。此腎水虧極。大劑六味地黃湯。投之。以救其津液。其他如重舌。急舌。皆熱甚也。舌強舌短。舌捲。舌硬。神亂。舌乾。語言不清者。皆昏危也。

問聲說

蓋聞者聞其聲音也。審其音之低響以定虛實。嗽之悶爽以定升降。如言微言厲。感衰根之。發言壯厲。先重後輕者是外感邪甚也。出言瀟灑。先輕後重者是內傷中氣也。謔語者為實邪。胃有燥屎。錯語而首尾不相顧者為神昏。虛呃痰鳴皆非吉兆。聲音變聲即恐離魂。且肝易怒而聲呼。心則必現喜笑。好思念而發為狂歌者。脾病無疑。多憂慮而善於悲哭者。病入肺。金呻吟多恐。腎病主之。感衰虛實無不遇之。另有喘症。氣促而粗疾。出聲壯者為實邪。氣促而弱緩。出聲細者為元虛。新病聞呃者非火逆。即寒逆。久病聞呃者為胃絕。大抵語言聲音不異平時為吉。反者為凶。此聲之所以不可不察也。

問聲詩

肝怒聲呼心喜笑。脾為思念發為歌。肺金憂慮形為哭。腎主呻吟恐亦多。

問症說

問寒熱。蓋寒為陰。熱為陽。問其寒熱多寡者。所以審其陰陽之偏勝。細辨其真假也。如外感則寒熱齊作而無間。內傷則寒熱間作而不齊。外感惡寒。雖近烈火不能除。內傷惡寒。得就溫煖而必解。如初起頭痛發熱。惡寒者。屬外感。如初起心腹疼痛及瀉痢等。屬內傷。

問汗。問其汗之有無。所以辨其風寒表裏。以別其虛實也。

問頭身。夫頭痛為邪甚。不痛為正虛。暴眩為風火。與疰漸眩為上虛。氣陷問身者。問其身之部位。以審經絡。亦以身重痛為邪甚。軟弱為正虛故耳。

大抵病人身輕自能轉側者為輕。若身體沉重。不能轉側者為重。然中濕風濕感寒。皆主身重疼痛。須以兼症辨之。若陰症身重。必厥冷而踈臥。無熱惡寒。閉目不欲向明。懶見人也。又陰毒身痛。如被杖。身重如山。而不能轉側也。總之熱則流瀉。身輕無痛。寒則凝寒。故身重而痛也。若手足抽擡。角弓反張者也。若頭重視身。此天柱骨倒而元氣敗也。若頭搖而不止。髮直如料。頭上擗皆絕症也。凡病中循衣摸床。兩手撮空。此神去而魂亂也。凡病人皮膚潤澤者生。枯槁者危。如大肉盡脫。九候雖調。尤難治也。

問二便。蓋小便之紅白多寡。大便祕澀清穀清水者。亦因寒熱虛實燥火之不同。而大小便因以變色也。如小便秘黃赤爲熱。清白爲寒。濁如米泔爲濕熱。下陷大便祕爲實。久瀉久痢爲虛。下清白爲寒。下黃赤爲熱。問飲食。蓋腎氣之強弱。可由飲食之多少察之。傷食不思食。雜症思食。爲有胃氣。則生不思食。爲胃氣欲絕。則危。喜甘者。脾弱。喜酸者。肺弱。

問胸腹。問口者。該而則胸言也。濁氣上干。則胸滿痛爲結胸。不痛而脹。連心下爲痞氣。先喘後脹。病在肺。先緊後喘。脾先喘後嘔。爲停水之類。腹者。至陰也。乃裏症之中。可以辨邪之實與不實也。既問胸。前明白次。則以手按其腹。若未痛脹者。知邪未入裏。入裏必脹痛。若邪在表及半表半裏。腹馬得痛脹乎。如腹脹不減。及裏痛不止。此裏症之實。方可攻之。若腹脹時減。痛則綿綿。此裏症猶未實也。但可清之。故腹者。可以知邪實與不實也。若直中腹痛。則不由陽經傳來。此爲冷氣。在內脈。必沉遲急當溫之。

問小腹。小腹者。陰中之陰。裏中之裏。可以知邪之必結實也。既問胸腹。復以手按其小腹。蓋小腹藏糟粕之處。邪至此。必結實。若小腹未硬痛者。知非裏實也。如邪已入裏。小腹硬痛。而小便自利。大便黑色。蓄血症也。宜桃仁承氣湯攻之。如小腹繞臍硬痛。小便數而短者。癰疽症也。當以大承氣攻之。若小腹脹滿。大便如常。恐屬溺澀。而不通。宜利其小便。凡看病。先觀形色。次及耳目口鼻唇舌身體。再次問胸及小腹。

問聲。問聲者。傷寒以辨其在少陽三焦與膽。及厥陰。膈中與肝之雜病。以聲爲重。不聲爲輕也。問渴。夫寒熱虛實。俱有渴。如喜熱內寒。喜冷內熱。口苦爲熱。口鹹爲寒。淡甘脾熱。傷食口酸。索水不欲飲者。爲寒。口中欲引飲不休者。爲熱。火渴謔語不大便者。爲實。時欲飲水。飲亦不多。二便通利者。爲虛。

問舊病。問舊病者。察其病之淺深。以知其有風疾與否耳。問因。問其致病之因。以爲用藥之準。婦人尤必問經期遲速。閉崩有前無後之異。以探病情。且又當察其有孕與否耳。

切脈歌

病人變腕仰。高骨定爲關。依掌後之高骨定爲關脈。寸脈量虎口。尺脈準臂彎。關前距虎口一寸。故曰寸關後距

虎口一尺故曰尺。左寸心胞絡右關膽與肝左尺司何臟膀胱腎係焉右寸胸中胃脾土屬右關要知大腸腎右尺自昭然口鼻一呼吸脈來四五跳此是無病者平和氣血調三至為遲候六至作數教遲則寒之象數則熱之標一二寒愈感七八熱更鏡

輕舉得皮而表邪脈故浮若是病在裏夏取須流求洪長徵實饒細弱識虛柔水濕並痰欲滑利又弦適緊促氣內亂伏瀆氣凝留娠妊中止代失血中穴范(代脈中止范范中空)祇此尚易見其他渺以幽

切脈秘旨

切者切六脈也脈之為道最為微渺而難知也方書論脈愈詳而指下愈亂何苦張大其言以人命為戲乎今探顯然可見者例之如左一曰浮浮者輕手著于皮膚之上而即見為表病也一曰沉沉者重手按于肌肉之下而始見為裏病也浮沉二脈以手輕重得之此顯易見也一曰遲遲者一息脈來二三至或一至為寒病也一曰數數者一息脈來五六至或七八至為熱病也遲數二脈以息之至數辨之亦顯而易見也一曰細細者脈狀細小如線主諸虛之症也一曰大大者脈狀粗大如指主諸實之症也細大二脈以形象之闊窄分之又顯而易見者一曰短短者脈來短縮上不及于寸下不及于尺為素稟之衰也一曰長長者脈來迢長上至魚際下至尺澤為素稟之盛也長短二脈以部位之過與不及驗之又為顯而易見也更有互見之辨浮而數為熱浮而遲為表寒沈而數者為暑熱沈而遲能者表寒又於表裏寒熱四者之中審其為細則屬於虛審其為大則屬於實又須于表裏寒熱虛實六者之中審其為短知為素稟之衰治病須栽培其基址審其為長知為素稟之盛攻邪必務絕其根株凡此均憑脈治病之秘法也

八四回言歌七言詩今取顯然可見之八脈為綱領而以兼見之脈為條目韻以四言之歌七言之詩俾讀詩者有得心應手之妙

浮脈

浮為主表屬陽屬輕手一診形象彰浮而有力洪而火燭(主火)浮而虛甚散脈靡常(主氣)散浮如葱管托脈血殃主失血浮如按鼓革脈外強外強中空較托更甚主陰陽之交浮而柔細瀉脈濕妨主濕浮兼六脈疑似當詳

詩曰

浮爲表脈。陽爲陽。輕手們來指下彰。託似著。慈知血脈。革如按鼓。識陰亡。孤陽越于上。便知眞陰竭于下矣。從浮辨散形。線亂定散。非浮氣敗。傷陰却沈。中牢伏象。請君象外更參詳。浮不沈也。沈中諸脈俱不能兼。

沈脈

沈爲主裏。屬臟屬陰。重手尋按。始了于心。沈而著骨。伏脈邪深。主閉邪沈而硬底。與革脈同。但革浮而牢。沈牢脈寒淫。主寒實。沈而細軟。弱脈虛尋。主血虛。沈兼三脈。須守規箴。

詩曰

沈爲裏脈病爲陰。淺按如無按要深。伏則幽潛推骨認。牢爲勁直尋筋尋。須知諸伏新邪閉。可悟諸牢內實尋。除却浮中。芴革散許多活法。巧從心。沈不浮也。浮中諸脈不能兼見。

遲脈

遲爲主寒。藏病亦是。仲景云。遲爲在臟。脈經云。遲爲寒。三至二至。數目可端。遲而不銜。稍遲而不愆。四至之期。緩脈最美。無病遲而不沉。往來不流利。滯脈血否。主血少。遲而偶停。無定數。結脈鬱實。主氣鬱痰滯。遲止定期。促者數中一止也。結者遲中一止也。皆無定數。若有定數。則爲代脈。大抵代脈在三四至中。其止有定數。代脈多死。主氣絕。惟孕婦見之不妨。遲兼四脈各有條理。

詩曰

遲爲在臟亦爲寒。一息未及四至曠。結以偶停無定數。代因不返卽更端。腸氣絕。其脈往而不能自還。他腸因而更代。之須知此脈止有定數。共傳代主元陽絕。還識結成鬱氣干。除却數中促緊動。諸形互見細心觀。遲不數也。數中諸脈不能兼見。

數脈

數爲主熱。腑病亦同。仲景之數爲在腑。脈經云。數爲熱。五至以上。七至八至入絃。數而流利。滑脈痰盛。主痰。主食。若指下滑。主氣和數而牽轉。緊浮寒攻。主寒。主痛數有而止。促脈熱烘。主陽邪內陷。數見於關。關中如豆。搖動動脈崩。崩中脫。主陰陽相血數兼四脈。休得朦朧。

詩曰

數為腑脈熱居多。一息脈來五六科（七八至者危）緊似縛繩寒甫閉。動如採豆氣違和。數中時止名為促。促畏陽傷。即是慮（陽盛為促）除却遲中兼結代。旁形側出細婆婆（數不遲也。感中諸脈不能兼見）

細脈

細主諸虛。蛛絲其象。脈道屬陰。病情可想。細不顯明。微脈氣殃。主陰陽氣絕。細脈小浮。小而者勢之往來不大也。細小而兼之。浮昔人所謂如絮絮浮面也。濡脈濕長。主濕亦主氣虛。浮脈亦兼之。細而小沉弱者。失養血脈。沉脈亦兼之。細中三脈須辨明也。

詩曰

細來三候按如綿。元氣難支豈偶然。弱在沉中陰已竭。濡居浮分氣之愆。癆成脈隱微難見。劇精乾滿遂傳冷氣蛛。絲成細象短為形。縮甚堪憐。

大脈

大主諸實。形闊易知。陽脈為病邪實。可想大而湧沸。洪脈熱司。主熱虛亦主內虛。浮肺亦大而堅硬。實脈邪持。主實邪。大兼二脈。病審相宜。

詩曰

大脈如洪不是洪。大脈形闊不兼同。絕無舞柳隨風態。却是移兵赴敵雄。新病邪強知正怯。夙疴外實必中空。內經病進真堪佩。總為陽明氣不充。邪氣感則胃氣衰。故敵大而不緩。

短脈

短主素弱。不由病傷。上下相準。縮而不長。諸脈兼此。宜補陰陽。動脈屬短。治法另商。

詩曰

短為素弱並非傷。上下相準縮不長。若現動時非是短。動搖短縮辯富詳。莫陰陰陽兼有此。任他久暫補中商。元氣素虧身體瘦。培基固本有規章。

長脈

長主素強。得之最望。上魚入尺。上魚際下尺。澤迢迢不短。正氣之治。長中帶緩。若是陽邪。指下湧沸。中見實脈。另有條款。

詩曰

脈來有力象悠悠。邪正全憑指下求。脈來有脈力。指下清而不濁。滑長不兼洪。弦之象。正氣實也。如指下濁而不清。但見洪緊。不見滑。是長邪氣實也。流利滑呈陰。素足迢迢。長見病當瘳。洪如湧浪。邪傳熱。弦似張弓。木作仇。毫髮分途。須默領。非人渾不說緣由。

以上八脈顯而可見。取其可見者為提綱。以推其所不易見。則不顯者皆顯矣。八脈相兼。亦非條目所能盡。皆可以此法推之。

七怪脈四言詩

雀啄連止。連而又作。肝絕。屋漏水。流半時一落。胃絕。彈石沈弦。按之指搏。腎絕為重最也。乍密乍疏。亂如解索。脾絕。本息。息不動也。末搖魚翔相若。心絕。蝦遊冉冉。忽然一躍。大腸絕。釜沸空浮。絕無根脚。肺絕。七怪一形。醫休下藥。此言五臟絕脈也。六腑中獨言大腸與胃者。以其屬於陽明。為一身之最。最者也。

脈有宜忌

凡病內虛者。脈弱為宜。洪大則忌。病外感者。陽脈為宜。陰脈則忌。有神者。吉。緩和者。吉。合于時令者。吉。與面上五色中見那一色相生者。吉。反是者。凶。只此而語。可違其餘。皆不經數言。不可信也。

婦人科診脈四言詩

新婦人之脈。尺大于寸。尺脈清微。經行定論。三部如常。經停莫恨。尺或有神。得胎如願。左尺大為男。右尺大為女。婦人有胎。亦取左寸。手少陰。咸為有子。不如神門。神門穴為心脈。所過左大為男。右大為女。占之不遁。月斷病多。六病不病。體弱末形。有胎滑代。二月為率。

婦人有孕。尺肉數弦。肉崩血下。革脈亦然。將產之脈。名曰離經。離時常脈。內動胎氣。外變脈形。新產陰傷。出血不止。

尺不上關。十有九死。尺脈而瀉腸。(小腸也)冷惡寒。年少得之。受孕良難。年大得之。絕產血乾。

男女異脈

男子陽爲主。兩寸常旺於尺。左手旺於右手。女子陰爲主。兩尺常旺於寸。右手旺於左手。乃其常也。反之者病。

小兒脈法

小兒五歲以下。氣血未成。經脈未充。無以別其脈象。故以食指絡脈之象。彭于外者。察之。食指第一節爲寅位。爲風關。次節爲卯位。爲氣關。三節爲辰位。爲命關。以男左女右爲則。凡兒有病。必脈紋外現。如現紋赤紫。曰熱。紅曰傷寒。青曰驚風。白曰疳疾。淡黃隱隱。爲無病。黑色曰危。青紫爲肝木乘脾。在風關爲輕氣關。爲重命關。爲危。脈紋入掌。爲內傷。紋鬱。裏爲風寒。紋管外爲食積。再合之唇舌面色。亦可得其八九矣。及至五歲以上。乃以一指取寸關尺之處。常以六至爲率。加則爲熱。減則爲寒。法與診大人同。

小兒脈亂。身熱汗出不食。食則卽吐者。爲變蒸。小兒四末。獨冷。股栗惡毒。面赤氣阻。涕淚交至。必爲痘疹。一歲以下。於額前眉端髮際之間。以名中食三指候之。食指近髮。爲上指。名指近眉。爲中指。中指爲中三指俱熱。外感於風。鼻寒嗽。效三指俱冷。外感于寒。內傷飲食。發熱吐瀉。冷中二熱。主上熱下冷。名中二指熱。主夾驚。食指食主熱滯。

陰陽表裏虛實寒熱辨

凡人之病。不外乎陰陽。而陰陽之分。總不外乎表裏。虛實寒熱六字盡之。夫裏爲陰。表爲陽。虛爲陰。實爲陽。寒爲陰。熱爲陽。能辨此陰陽。則生錯認。此陰陽。則死醫師之庸良。救人與殺人之別。全在此能辨與否耳。

(一)病之表裏。全在發熱與潮熱。惡寒與惡熱。頭痛與腹痛。鼻塞與口燥。咳嗽與便澀。舌胎之有無。脈之浮沉。以分之。假如發熱惡寒。鼻塞咳嗽。舌上無苔。頭痛脈浮。此病之在表者也。假如潮熱惡熱。腹痛口燥。舌胎黃黑。便澀脈沉。此病之在裏者也。

(二)病之虛實。全在有汗與無汗。胸腹脹痛與否。脹之減與不減。痛之拒按與喜按。病之新久。裏之厚薄。脈之虛實。以分之。假如氣短體弱。多汗驚悸。腹脹時減。復如故。痛而喜按。按之則痛止。病久。稟弱。四肢畏冷。手按心腹。脈來無力。此病之本虛者也。假如病中無汗。腹脹不減。痛而拒按。或狂燥不臥。病新得。人稟厚。脈實有力。此病之有實者也。

(一)病之寒熱全在口渴與不渴。渴而消水與不消水。飲食喜冷與喜熱。煩躁與厥逆。溺之長短赤白。便之澹結。脈之遲數以分之。假如唇舌俱白。口不渴。或假渴而不能消水。喜飲熱湯。手足厥冷。鼻涕瀉瀉。清長便澹。泄脈。此病之犯寒者也。假如口渴而能消水。喜飲冷食。舌赤目紅。或唇燥舌乾。煩躁便結。溺短赤。脈數。此病之患熱者也。凡此皆陰陽之分也。至于陰中之陽。陽中之陰。以及邪感正衰。陰虛火亢等。真陰真陽之別。則又不同。其間毫釐千里。命在反掌。辨之者安得而不慎。寒邪客表。陽中之陰。熱邪入裏。陰中之陽。寒邪入裏。陰中之陰。熱邪達表。陽中之陽。假如脈數無力。虛火時炎。口燥唇焦。內熱便結。氣逆上衝。此真陰不足也。假如脈大無力。四肢倦怠。唇淡口和。肌冷便澹。飲食不化。此真陽不足也。然病中有熱症而喜熱飲者。同氣相求也。有寒症而喜冷飲。却不能飲者。假渴之象也。有熱症而大便澹瀉者。挾熱下利也。有寒症而大便反硬者。名曰陰結也。有熱症而手足厥冷者。所謂熱深厥亦深。熱微厥亦微。是也有寒症而反煩躁欲坐臥泥水中者。名曰陰躁也。有汗而爲實症者。熱邪傳裏也。有無汗而爲虛症者。津液不足也。有惡寒而爲裏症者。直中于寒也。有惡熱口渴而爲表症者。溫熱之病自裏達表也。此乃陰陽變化之理。爲治病之權衡。尤辨之不可不慎。且詳也。

· 入門看症要訣

夫看症之法。先辨內傷外感。次辨表裏寒熱。得其大概。然後切脈問症。與我心中符合否。斯用藥無有不當。口鼻之氣。可以察內傷。外感身體動靜。可以觀表裏寒熱。口鼻者氣之門戶也。外感則爲邪氣有餘。邪有餘則口鼻之氣粗。疾出疾入。內傷則爲正氣虛弱。正氣虛則口鼻之氣微。徐出徐入。外感症顯在鼻。故鼻氣不利而鼻塞。感有力。內傷症顯在口。故口不知味而腹中不和。外感頭痛常常而痛。內傷頭痛時止時作。外感手背熱。手心不熱。內傷手心熱。手背不熱。此決內外之大法也。動靜者表裏之分也。凡發熱靜而默默者。此邪在表也。若動而躁及譫語者。此邪在裏也。而裏症之中。復有陰陽之分。凡人臥須看其向裏向外。睡仰睡覆。睡伸脚。踞脚。睡向裏者陰也。向外者陽也。仰者多熱。覆者多寒。伸脚者爲熱。踞脚者爲寒。又觀其能受衣被與否。視其衣被全覆。手脚不露。身必惡寒。既惡寒非表症。即直中矣。若揭去衣被。揚手露脚。身必惡熱。既惡熱邪必入腑矣。此以身體動靜。並占其表裏寒熱陰陽也。然又有陽極似陰。其人衣被全覆。昏昏而睡。復有陰極似陽。假渴煩躁。欲坐臥泥水中。此乃真假寒熱。真熱假寒之象。尤不可不辨。若夫內

傷外感兼病而相合者。則其脈證並見而難辨。尤宜細心求之。若顯內症多者。則是內傷重而外感輕。宜以補養爲先。若是外症多者。則是外感重而內傷輕。宜以發散和解爲急。凡此皆辨症之要訣也。

百病療術法 卷中

曠江劉藩校正

治表法

表治宜發散也。如初感風寒發熱頭痛。但用蘇梗荆芥各一錢五分生薑二片以散之。頭痛甚加羌活六分。如鼻塞或流清涕。加半夏一錢五分茯苓二錢陳皮一錢。如咳嗽則加結梗七分杏仁三錢。前胡一錢之類。一劑得汗而熱即退。不必再服。但辨風寒。忌油膩。未得汗則再劑而止。蓋病在太陽主表中之表。但得法一解表則無餘事矣。而陽明主肌亦表也。其證身熱頭痛鼻乾而不得臥。用升麻葛根湯。少陽主胸脅亦表也。其症胸脅痛目眩口苦而耳聾。傷寒論用小柴胡湯加減。若寒熱往來欲作瘧狀。宜柴胡酒苓各八分赤芍一錢製半夏一錢五分甘草四分大棗三枚生薑三片以和之。虛者加防黨二錢。此其症在表。切勿妄用枳壳神麩麥芽等消導之藥。引邪入內。

四時感冒其症與傷寒表症同。但輕而不重。以加味香蘇飲之類。取微汗而解。宜列於表症。

四時感冒詩

四時感冒客邪侵。寒熱頭痛嗽不禁。加味香蘇取微汗。須知病淺勿求深。

治裏法

裏治宜歸經也。有虛實。有寒熱。宜辨其病在何臟腑而治之。法詳下臟腑門。如傷寒病陽明經。大渴大熱。法用白虎湯。為表中之裏症。及其傳裏。膽語胸膈滿不大便。為裏中之裏症。宜三承氣湯。擇用。劉河間用三一承氣湯。代上三方法。詳傷寒門。茲不贅述。惟喜怒憂思悲恐驚。謂之七情。此裏症之最難治者。但寬其心而舉始效。否則無益也。然症在於裏。大忌發散。散之則虛者汗脫。熱者煽熾。醫家動輒用表。可不懼哉。

治虛法

虛治宜補也。然有陰虛有陽虛。血虛者為陰虛。宜補其血。輕者用生地四錢。首烏二錢。歸身酒芍各一錢五分。參鬚甲二錢。穆豆衣海參北沙參各三錢之類。重者用熟地五錢。枸杞三錢。五味七分。黃肉兔絲各一錢。以填之。如面色黯口

燥舌乾。乾菽痰稀。氣喘腰膝痠痛。或面色浮紅。晝輕夜重。脈浮數而虛。右尺脈弱者。八味丸。左尺脈弱者。六味丸。二方俱宜加入麥冬阿膠胡桃之類。爲標本同治之法。氣虛者爲陽虛。宜補其氣。輕者用黨參三錢。白朮山藥各二錢。茯苓一錢。五分。炙草六分。紅棗六枚。生薑一片之類。重者用人參一錢。黃耆一錢。五分。以振之。氣分欲脫。則并加附子乾薑以回陽。如羸瘦怠倦。少食痰多。言六脈微細。六君子湯。補中益氣湯。歸脾湯。主之。如乾薑五味細辛阿膠半夏二冬二母紫苑之類。隨宜加入。若氣血兼虛。則陰陽並補。八珍湯十全大補湯。皆聖藥也。

正氣奪則虛。所謂五虛者。虛在心則脈細。虛在肺則皮寒。虛在肝則氣少。虛在腎則泄利前後。虛在脾則飲食不入。皮聚毛落。則帶。虧損肉脫。則皮。虧損脈萎。則心。虧損筋骨。則肝。腎虧損治之。奈何。損其肝者。緩其中。損其心者。和其榮。衛損其脾者。調其飲食。適其寒溫。損其肺者。益其氣。損其腎者。益其精。防其邪念。節嗜欲。溫之以氣。養之以味。皆所以救虧損也。治法詳下臟腑門。不贅。

治實法

實治宜瀉也。心有邪火實于心。則脈盛。肺有風寒實于肺。則皮熱。脾有食積蟲痞濕熱實于脾。則腹脹。腎有閉寒之虞。實于腎。則前後不通。肝有發怒之氣。實于肝。則脅悶。膽胃胞絡膀胱大小腸各能受邪。皆爲實症。治法詳下各臟腑門。傷寒汗吐下諸法。皆所以攻其實也。若防風通全散。兩解表裏之實。方法頗純然。治實以速爲功。苟有遷延日久。病未去。而元氣虛。則難消導矣。

治寒法

寒治宜溫也。有分經治者。有不必分經治者。寒在表則惡風寒。宜蘇葉一錢。霍梗二錢。荊芥防風各一錢。前胡一錢。五分。杏仁三錢。生薑三片之屬。以散其邪。甚則桂枝麻黃各五分。細辛六分。以驅表寒。寒在裏則喜熱湯。宜製夏二錢。藿香焦朮一錢。五分。製朴一錢。吳茱萸八分。焦穀芽三錢。煨薑二片。砂仁二粒之屬。以煖其中。甚則附子肉桂乾薑各六分。溫裏寒。他若羌活獨活祛表之風寒。吳茱萸川烏溫裏之風寒。肉桂去血分之寒。香附佐薑附除氣分之寒。一隅三反可也。凡寒症唇舌必白。脈邊便利腹或冷痛。一投寒涼入口立脫慎之。

治熱法

熱治宜涼也。然熱症有表熱、中熱、裏熱之分。有實火、虛火之別。實火之症，或因外感，或因鬱所致。宜分臟腑治之。詳下。火之微者，黑山梔一錢，五分石斛三錢，地骨皮二錢，青蒿一錢五分，丹皮一錢，連翹一錢五分，麥冬、花粉各二錢，銀花三錢，竹葉三分，燈心一握，之屬。甚如黃連七分，黃芩一錢五分，石膏四錢。知母一錢五分，枳實則用大黃一錢五分，龍膽草七分等。虛火之症，或陽虛外熱，口不渴，唇不紅，脈不數，宜四君子湯以補其陽。若陰虛內熱，舌或絳，頭或痛，目或乾，過午便熱，宜四物湯六味地黃湯以補其陰。

內外傷感雜治說

前言陰陽表裏虛實寒熱八字，病已盡在其中矣。而表裏之中，又有內傷外感之治焉。內傷者裏症也，而有氣血痰鬱四字之分。外感者表症也，而有風寒暑濕燥火六字之別。再詳其治法，醫無餘蘊矣。

內傷一曰氣氣虛者，四君子湯及補中而參以八味，谷氣之原也。若氣實胃滯者，宜香蘇平胃散。

二曰血血虛者，四物湯而參以六味，壯水之主也。若血實而滯者，宜手拈散失笑之類。

三曰痰痰輕者，二陳湯六君子湯。若頑痰膠固，變生怪症，或停飲膈間，自非滾痰丸小半夏加茯苓湯之類，不濟也。

四曰鬱鬱小者，越鞠九道，遠散而五鬱互結，腹膨腫滿，二便不通，自非神佑丸承氣湯之類，不濟也。此內傷之治法也。

外感一曰風真中風是也，非表症中之偶感風寒也。風有中腑、中臟、中血脈之殊。中腑者在表也，與傷寒同。太陽重則用桂子湯，輕則用加味香蘇散之類是也。陽明用葛根湯，少陽用小柴胡湯，中臟者在裏也，眩仆昏冒痰聲如鋸，如不語，中心唇縮，脾真寒中，肺目昏，中腎此乃邪風直入于裏，而又有熱風寒風二種。寒陰邪也，陰主靜，故其中人特為寒中而已矣。風陽邪也，陽主動，善行數變，故其中人或為寒中，或為熱中，初無定體也。然其所以無定體者，亦因乎人之臟腑為轉移耳。何者，其人臟腑素有鬱熱，則風乘火勢，火借風威，熱氣拂鬱，不得宣通，而風為熱風矣。其人臟腑本屬虛寒，則風水相遭，寒氣冷冽，水凍冰凝，真陽衰敗，而風為寒風矣。熱風多見閉症，理宜疎導為先。寒風多見脫症，理宜溫補為急。閉者牙關緊急，兩手握固，舉宜疎通，開竅熱痛，則先用搐鼻散，次以牛黃丸灌之。胸膈便結者，用三化湯以攻之。冷脫者，口張心絕，眼合肝絕，手撒脾絕，聲音如肝，肺絕遺尿，腎絕更有髮直搖頭上，額面赤如粧汗，出如珠，皆為脫絕之症。此際須用附子理中湯加參兩餘，以溫補元氣。若寒痰阻塞，或用三生飲加入參以灌之。

中血脈者。中在半表半裏也。如口眼喎斜。半身不遂之屬是也。舉宜和解。用大秦芩湯。加竹瀝薑汁。勾藤主之。如偏于右者。爲氣虛。佐以四君子湯。偏于左者。爲血虛。倍用四物湯。氣血俱虛。左右并病者。佐以八珍湯。此治中風之大法也。若隨時感冒。頭痛發熱。惡寒自汗。脈浮緩者。傷風也。此爲偶感之疾。與中風不同。

二曰寒寒傷寒。是也。寒在表。則與風之中。腑治同。寒入裏。用附子理中湯。法詳傷寒論。若隨時感冒。脈浮緊而無汗。頭痛發熱而惡寒之傷寒。雖在暑月。亦有之。或納涼飲冷過度。或因避暑太過而得之。臟受寒侵。遂至嘔吐痛瀉。脈沉濕。口鼻氣冷等。乃夏月中寒之候。宜用厚朴溫中湯之類。

三曰暑暑者。乃夏月之正病。然有傷暑中暑閉暑之殊。傷暑者。病之輕者也。其症汗出身熱。而口渴。用益元散之類。

中暑者。病之重者也。其症汗大泄。昏悶不醒。蒸熱齒燥。或煩心喘渴。妄言用消暑丸。灌之。閉暑者。內伏暑氣。而外爲風寒所閉。又名寒包暑。其頭痛身痛發熱。惡寒者。風寒也。口渴煩心者。暑也。用四味香薷飲。加荊芥秦芩之類。若暑天受濕。而霍亂。其有吐瀉。而轉經者。大多因暑停食。伏飲以致之也。藿香正氣散主之。更有乾霍亂症。吐瀉不得。俗名攪腸痧。粥飲入口。卽敗危症也。陳香園煎湯救之法。詳疫症門。

四曰濕。或受潮。或食冷面黃。身重。平胃散治之。若黃疸。則目溺色黃。茵陳大黃湯。茵陳薑附湯。若發腫。五苓散。五皮飲。若滲入筋絡。肩背臂痛。用秦艽天麻湯。獨脾湯之類。

五曰燥。此症惟秋冬時久晴有之。而吃鴉片者。更易犯。其症鼻乾口渴。咽痛舌燥。目火便秘。乾熱。不宜發表。宜用生地。天冬。麥冬。花粉。沙參。元參。歸身。梨藕蔗汁之類。以潤之。

六曰火。治法詳于前。熱治中。更審其臟腑。投涼則得矣。然中寒則暴厥。中胃則猝悶。中濕則痰寒。中火則竅閉。皆能猝然昏倒。非中風而似中風。謂之類中。勿概作中風治。此外感之治法也。

濕熱條辨

前言外感難治。風寒暑濕燥火六字。則病已盡在其內矣。然其中又有風溫濕熱之辨別。假如暑濕相搏。名曰濕熱。風熱相搏。名曰風溫。風溫爲病。春月與冬季居多。少陰不藏。木火同燔。風邪外襲。表裏相應。故病風溫。或惡風。或不惡風。必身熱咳嗽煩渴。此風溫症之提綱也。其症自汗。身重多眠。鼻息紆。語言難出。脈陰陽俱浮。亦爲風溫最多之現象。蓋

風爲燥熱之邪燥則傷陰熱則傷津泄熱和陰爲風濕症一定之治法也是以發表宜辛涼不宜辛熱清裏宜泄熱不宜逐熱

如身熱畏風頭痛咳嗽脈浮舌苔白此風濕之在表者也。在表者當涼解之用薄荷前胡杏仁桔梗桑葉川貝之屬。若見症如上述舌苔易白爲黃煩悶脈數此熱在肺胃也在肺胃者當涼泄裏熱用川貝牛蒡桑皮連翹檉皮竹叶括蕪黃芩之屬涼泄熱。

若見症如前二條而加以譫語乾嘔此熱灼肺胃風火內旋也。治當泄熱和陰用羚羊川貝連翹麥冬石斛青蒿知母花粉梔子竹茹之屬。

若見症同上三條易煩悶爲胸痞而加以下痢此濕邪由肺胃下注大腸治當升泄濕邪用黃芩桔梗檉葛豆卷甘草橘皮黃連桑葉銀花之屬。

又身熱咳嗽口渴渴胸痞頭目脹大面發泡瘡者此風毒上雍陽絡治當清熱散邪用荊芥薄荷連翹元麥牛蒡馬勃青黛銀花之屬。

又身大熱口大渴目赤唇腫氣粗煩燥舌絳齒板痰咳甚至神昏譫語下痢黃水者此風濕熱毒深入陽明營分最爲危險用犀角連翹葛根元參丹皮赤芍麥冬紫草川貝人中黃解毒提班間有生者。

又熱渴煩悶昏愒不知人不語如尸厥脈數者此熱邪內蘊走竄心胞絡治當泄熱通絡用犀角連翹遠志鮮石葛蒲麥冬川貝牛黃至寶丹木通之屬。

又風濕熱毒若得之便身熱口渴目赤咽痛臥起不安手足厥冷泄瀉脈伏者熱毒內蘊絡氣阻遏治當升散熱毒用升麻黃芩犀角銀花甘草豆卷絲瓜絡之屬。

又身熱自汗面赤神迷身重難轉側多眠身軀語言難出者濕邪內偏陽明神液剝奪精機不運治當泄熱救精用石膏齊知母麥冬半夏竹葉甘草西洋參百合竹瀝之屬或手足痠癢狀若驚癩脈數者此熱剝津液金困木旺治當息風

清熱用羚羊川貝青蒿連翹知母麥冬元參梔子絲瓜絡鈎藤之屬（下條濕熱）
濕熱爲病夏月與秋季居多太陰內傷濕飲停聚客邪再至內外相引故病濕熱始惡寒後但熱不寒汗出胸痞舌白

口渴不引飲。此濕熱症之提綱也。其症多四肢倦怠。肌肉煩疼。最易耳聾乾嘔。發溼發厥。濕熱之邪從表傷者。十之一二。由口鼻入者。十之八九。傷寒之邪自表傳裏。濕熱之邪自裏達表。故昔賢忌發表。治以清熱。必兼參化之法。不使濕與熱相搏。分消上下之勢。欲濕邪之淡滲下走。不欲濕邪之鬱熱上蒸耳。

假如濕熱證。惡寒發熱。身重關節疼痛。溼在肌內。不為汗解。宜滑石。大豆黃卷。茯苓皮。蒼朮皮。蒼香叶。鮮荷叶。白通草。桔梗等味。不惡寒者。去蒼朮皮。

濕熱證。寒熱如瘧。濕熱阻遏膜原。在陽明之半表半裏。宜柴胡。草果。藿香。蒼朮皮。乾薑。六一散等味。

濕熱證。古傷白口。渴溼滯陽明。用辛開如厚朴。草果。半夏。乾薑。藿香等味。此時濕邪尚未蘊熱。故重辛開使上焦得通。津液下也。若根白。尖紅。溼漸化熱。餘濕尤滯。宜辛泄佐以清熱。如薏仁。大豆黃卷。連翹。綠豆衣。六一散等。亦可加入。此濕熱參半之證。即佐清熱者。所以存陽明之液也。

濕熱證。四五日。口大渴。胸悶欲絕。乾嘔不止。脈細數。舌光如鏡。胃液受劫。胆火上冲。宜西瓜汁。金汁。鮮生地汁。甘蔗汁。磨服鬱金香。附鳥華等味。此營陰素虧。木火素旺。木乘陽明。耗其津液。幸無飲邪。故一清陽明之熱。一散少陽之邪。不用煎者。取其氣全耳。

若嘔吐清水。或痰多。濕熱內留。木火上逆。宜溫胆湯。加括蕪根。碧玉散等味。此素有痰飲。亦陽明少陽同病。故一以滌飲。一以降逆。同而治異。正當與上條合參也。

濕熱證。嘔惡不止。晝夜不差。欲死者。肺胃不和。胃熱移肺。肺不受邪也。宜用川連。三四分。蘇叶。二三。煎湯呷下。即止。濕熱證。咳嗽晝夜不安。甚至喘不眠者。暑邪入于肺絡。宜葶藶。枇杷叶。六一散等味。若熱傷元氣。氣短倦怠。肺虛而咳者。宜人參。五味子等味。蓋同一肺病。而氣粗與氣短。有分。肺實與肺虛。有異耳。

濕熱證。壯熱。口渴。舌黃。或焦紅。發溼。神昏。譫語。或笑。邪灼心包。營血已耗。當清熱救陰。泄邪平肝為治。宜犀黃。羚羊角。連翹。生地。元參。鈎藤。銀花。鮮薑。薄荷。至寶丹等味。若脈洪數有力。開泄不效者。是濕熱蘊結胸膈。宜微涼膈散。若大便數日不通者。熱邪閉結腸胃。宜微承氣。微下之。例蓋清熱泄邪。至能散絡中流走之熱。而不能除膈中蘊結之熱邪。故也。

濕熱證。壯熱。煩渴。舌焦紅。或縮。斑疹。胸痞。神昏。自利。堅厥。熱邪充斥表裏。三焦宜大劑犀角。羚羊角。生地。元參。銀花。露。

紫草丹皮金汁鮮薑瀉等味。此條乃瀉厥中之最重者。上爲胸悶下挾熱利。斑疹瀉厥。陰陽告困。獨清陽明之熱。救陽明之液爲急務者。恐有液不存其人必自焚而死也。

濕熱證初起壯熱口渴。腕悶。愴愴。眼欲閉。時譫語。濁邪蒙閉上焦。宜涌泄。用枳殼。桔梗。淡豆豉。生山梔等。無汗者加葛根。

濕熱證初起發熱汗出。胸痞。口渴。舌白。濕伏中焦。宜藿香。蔻仁。杏仁。枳殼。桔梗。鬱金。蒼朮。厚朴。半夏。草果。乾薑。薄荷。香佩蘭。六一散。蓋病在中焦。氣分故多開中焦。氣分之藥。若挾食者。其舌根必見黃色。宜加瓜蒌。查肉。萊菔子等味。

濕熱證數日後自痢。溺赤。口渴。濕流下焦。宜滑石。猪苓。茯苓。澤瀉。草薢。通草等味。濕滯下焦。故獨以分利爲治。若兼口渴。胸痞。須佐入杏仁。桔梗。豆卷。開泄中上二焦。源清則流自潔。不可不知也。

濕熱證按法治之數日後。忽吐下一時。並至者。中氣虧損。升降逆。宜生穀芽。蓮心。扁豆。米仁。半夏。甘草。茯苓等味。甚者用理中法。若按法治之。諸恙皆退。惟目瞑。驚悸。夢惕。則餘邪內留。胆氣未舒。宜酒浸郁李仁。猪胆皮。薑汁炒棗仁等。泄邪安神。

濕熱證四五日。忽大汗出。手足冷。脈細如絲。或絕。口渴。莖痛。而起坐自如。神清語亮。乃汗出過多。衛外之陽漸亡。濕熱之邪仍結一時。表裏不通。脈故伏。非真陽外脫也。宜五苓散去朮。加滑石。酒炒川連。生地。耆皮等味。此條脈症全似亡陽之候。獨于舉動神氣間。得其真情。識其非亡陽也。

濕熱證口渴。壯熱。自汗。身重。胸痞。脈洪大而長者。此太陰之濕與陽明之熱相合。宜白虎。加蒼朮湯。以清熱散濕。

濕熱證四肢困倦。精神減少。身熱氣高。心煩。溺黃。口渴。自汗。脈虛者。宜清暑益氣湯主治。

濕熱證上下失血。或汗血。衄血。毒深邪入營分。走竄欲泄。宜大劑犀角。生地。赤芍。丹皮。連翹。紫草。茜根。銀花等。涼血解毒。救陰泄邪而血自止矣。

風溫濕熱之辨。別前已誠言之矣。然又有風溫挾濕。濕熱挾風之治。如風溫證。熱久不愈。脛腫。口渴。胸悶。不知飢。身盡疼痛。發爲白疹。如寒粟狀。自汗。脈數者。此風邪挾太陰脾濕。發爲風疹。宜牛蒡。荊芥。防風。連翹。槿皮。滑石。蘆根。通草。甘草。之屬。溼滲涼解之。如濕熱證三四日。卽口渴。四肢牽引。拘急。甚則角弓反張。此濕熱挾風。侵入經絡。脈隧中。宜鮮地。

龍秦光威靈仙滑石蒼耳子絲瓜絡海風藤酒炒黃連等味用以息風勝濕疎肝宣通脈絡耳總之外解者用香豉葱白連翹之屬升泄者用葛根升麻桔梗之類下走者用黃柏知母硝黃之品挾風則加入牛蒡薄荷之流挾濕則加入滑石蘆根之輩營分受熱血液受虧從風熱陷入者犀角羚羊竹叶等可用也從濕熱陷入者犀角黃芩花露等可加也再參入涼血清熱如生地丹皮阿膠金汁人中黃之屬或透風于熱外或參濕于熱下彼則和解半裏之熱此則分消上下之勢不使甚內外相合上下相搏則其勢孤而爲治易矣凡此皆治濕熱病之要訣也溫熱二症時下犯者最多故詳論之

傷寒論治

傷寒之病與春溫夏熱不同溫熱症頭痛發熱心不惡寒而口渴若傷寒則異是其病由表而入裏初起時邪在太陽膀胱經則頭痛惡寒發熱脈浮宜加味香蘇散甚則桂枝湯麻黃湯葛根湯解肌湯繼傳陽明經則目痛鼻乾唇焦不渴宜葛根湯再傳少陽膽經則目眩耳聾胸滿脇痛口苦寒熱往來頭汗脈弦宜小柴胡湯此三陽傳經之表症也失治則傳入三陰矣其傳入太陽脾經者則腹滿瀉下利脈沉宜大柴胡湯其傳入少陰腎經者口燥咽乾痛利清水目不明危矣宜大小承氣湯至傳入厥陰肝經者小腹滿舌捲囊縮厥逆用大承氣湯或有得生者亦有不傳三陰而傳入太陰脾經者則口渴溺赤宜五苓散傳人陽明胃經者則譫語狂亂燥渴便閉轉失氣自汗不得眠宜白虎湯調胃承氣湯以上謂傳經傷寒因寒化火也其有初起寒邪直中三陰者其症腹痛清沫利完穀踈臥肢冷囊縮吐蛇舌黑而潤脈沉細此寒症也中太陽脾理中湯中少陰腎四逆湯中厥陰肝白通加豬膽汁湯急救勿緩此係醫中第一要症故提出而專論之

虛勞論治

虛勞大症也固由真陰虧損虛火燦金而然其始大半由于外感感邪在肺則作咳嗽感邪在肌肉陽氣不得外泄久則成骨蒸肺熱食少盜汗治失其宜則咳久傷肺熱久傷陰腎水日枯腎火日熾上灼于肺再復嗜好色慾受邪以竭其水而勞虛成矣間有本原不足思慮太過而心血耗心火旺腎水乾肺金痿者其受病不同及其成功則一是症也多見吐血痰湧發熱夢遺經閉以暨肺痿肺疽咽痛音啞諸候唯在屏棄一切不近女色調飲食慎風寒息嗔怒靜養

起早藥始有效自然生機徐轉復其天和非旦夕所能奏功半在人之能自養耳。

是症治之宜早。咳嗽初起。用止嗽散加蘇梗以散之。如或不已。變生虛熱者。佐以團魚丸。形瘦食少。骨蒸盜汗者。用黃耆驚甲散。加麻黃根三四分。以陳酒過下。立效。腹冷者。用小建中湯加減。若病熱漸深。更佐以月華丸。若吐血。先服四生丸。或花蕊石散。花蕊石散以花蕊石炙灰用童便陳酒過下。繼用生地黃湯消遙散之類。元氣虛。五味異功散。如氣血虛而發熱。八珍湯。人參養營湯。均可。咽痛用百華煎。音啞用通音煎。遺精用秘精丸。經閉。澤蘭湯。至五臟虛損。則補天大造丸。用藥之法。不過如斯而已。

疫症論治

時疫之症。有由天時者。有由染人者。由天時則邪從經絡入。為頭痛發熱。咳嗽頸腫。發頤大頭。天行之類。由人染則邪從口鼻入。為增寒壯熱。胸膈滿悶。口吐黃涎之類。夫在天之疫。從經絡入者。宜分寒熱。用辛涼辛溫之藥。以散邪如香蘇散。普濟消毒飲之類。俾其仍從經絡出也。在人之疫。從口鼻入者。宜用芳香之藥。以解穢。如神朮散。霍香正氣散之類。俾其仍從口鼻出也。至兩路之邪。傳臟腑。漸至譫語。腹脹。唇焦。口渴者。宜治疫清涼散。承氣湯治之。總不外乎發散。解穢。清中。攻下。四法而已。若大吐大下。感逆煩燥。手足拘攣者。通脈四逆湯。加豬膽汁。人尿。以急救之。若霍亂吐瀉中。氣虛寒。陰陽雜錯。寒多不欲飲水者。理中湯主之。若頭痛發熱。身疼痛熱。多欲飲水者。以五苓散主之。如表裏之邪俱實。不汗不吐者。用防風通聖散。汗下之法。一劑並行而不悖也。

痢症論治

痢症。伏邪之為病也。有生。死所關。良由夏秋之際。昇熱在中。又為風寒生冷所遏。火不得舒。以致暴瀉。旋而裏急後重。膿血赤白。小腹疼痛。甚則為口噤不食之危症。熱者為赤。寒者為白。熱傷血分者為赤。熱傷氣分者為白。初起不宜妄攻。宜葛根治痢散以解之。餘邪未已。裏急後重。則用治痢奇方。以清之。腹脹痛有堅積。則用檳榔九下之。日久脾虛。五味異功散。加白芍。黃連。木香。清補之。氣虛下陷者。補中益氣湯。升提之。如邪穢塞胃。嘔逆不食者。開噤散。啓之。若寒氣在胃。熱氣在腹。寒氣久伏。而忽發者。用芍藥甘草湯。瀉滌大腸之伏熱。今邪氣一行。正氣自能上顧脾胃。如若未效。即用理中湯。以溫胃中之伏寒。加大黃。以瀉腸中之伏熱。一方面而兩扼其要。紅者可加地榆。白者可加木香。紅白兼見者。

並加之。此一定之治法也。

瘡症論治

瘡疾者。寒熱往來有定候。其邪主少陽之經。少陽在陰陽之界。屬半表半裏。陰勝于陽則發寒。陽勝于陰則發熱。寒多熱少為寒瘡。熱多寒少為熱瘡。單寒無熱為牡瘡。先熱後寒或單熱無寒為瘰癧。又有勞瘡。食瘡。鬼瘡。瘡。瘡等。無非陰陽之造。其偏也。日發者。輕間日者。重。三四日為尤重。初起用香蘇散。逐之。隨用小柴胡湯。和之。三四發後。用止瘡丹。加白蔻仁。醋炒鱗甲。以截之久。瘡元虛。六君子湯。加柴胡。以補之中氣。下陷。補中益氣湯。舉之。此易治也。

腫症論治

腫者。皮膚腫大。古人有氣水之分。其實氣滯則水不行。水不行則氣愈滯。二者相因為病。水脹篇以按其腹窩而不起者為氣腫。按其腹隨手而起如囊裏水者為水腫。景岳反其說。以水症按之窩而不起。此水在內中。如槽如泥之象。未必如水囊之比。按之隨起。惟虛無之氣。其連乃然。余閱歷之久。知二說亦不必拘。大抵腫微則按之隨起。腫甚則按之不起。而脅及轉動之處。按之即起。足面及膝股內側。按之不起。辨症不必以此為憑。當於小便之利與不利。以分陰陽。身之多熱與多寒。脈之洪大與細微。以分寒熱病之起於驟然與成於積漸。及年高多病與少壯無病之人。分其虛實。以先腹而後及四肢。或先四肢而後及于胸分其順逆。景岳云。水氣本為同類。治水者當兼理其氣。益氣則水自化也。治氣者亦當兼行水。以氣行水亦行也。仲景云。水腫脈浮者死。謂腫感皮信甚厚。脂浮於皮毛之外。輕捫之如隔一紙。是死脹。如初車腫病氣喘不臥。以五皮飲為第一方。蓋此方妙在皮治皮。不傷中氣。若腫而兼脹。小水不利。宜胃苓湯。主之。或以四苓散。以半熟蒜湯。丸服。極效。

又目胞與足先腫者。水也。先腹大後四肢腫者。鼓脹也。鼓脹症。用和中丸。虛者白朮丸。

水腫症。四鼓腫而腹不腫者。表也。腹亦腫者。裏也。腰以上腫邪者。表也。宜發汗。五皮飲。加蘇叶。荊芥。秦艽。防風。各一錢。五分。腰以下腫者。邪者裏也。宜利小便。五皮飲。加澤瀉。赤小豆。木通。車前。草薢。各一錢。五分。防己一錢。脈沉數。煩渴。面赤。便閉者。為陽水熱也。五皮飲。加黃柏。黃芩。滑石。木通。車前。麥冬。連翹。之類。脈沉澀。口不渴。便自利。其為陰水寒也。五皮飲。加白朮。蒼朮。附子。乾薑。肉桂。木香。之屬。脈滑實。腹脹脅滿者。加生麻子。白芥子。枳實。半夏之類。婦人經水不調。而

腫鼻血化爲水名水分加紅花桃仁香附之屬經水通斷卽腫是水化爲血名氣分加當歸五靈脂醋炒香附之屬先腫而後喘或但腫而不喘者爲經蓄水也加茯苓蒼朮白朮香附等治之若先喘而後腫者腎經聚水也金匱腎氣丸治之愈後必以六君子湯及加減腎氣丸收功大凡腫症積漸而成及久而不愈氣喘口渴不臥腹脹小便短少大便微溼一切危症求之古法惟腎氣丸加減最爲對症之方也若素稟陽盛三焦多火濕熱相困陰虛之證去桂附加麥冬主之下焦濕熱去桂附加黃柏蛤蚧粉余屢用之無不見效

太凡腫症掌中無紋者死大便清泄水腫不消者死唇黑腫齒焦者死足跗腫膝如斗者死如肚上青筋見瀉後腫者死男從身下腫上女從身上腫下者皆難治

列方 補可扶弱

四君子湯 治面色痿白言語輕微四肢無力脈來虛弱及氣虛脾胃不足之症

人參 茯苓白朮各二錢炙甘草一錢加生薑三片大棗四枚如無力以黨參代之

六君子湯 治脾胃虛弱痞滿痰多

卽四君子湯 加陳皮一錢五分以順氣 製半夏二錢除痰名六君子

香砂六君子湯 治胃寒痞滿飲食難化作酸嘔吐

卽六君子湯 加木香砂仁各八分以行氣消脹名爲香砂六君子

五味異功散 健脾進食爲病後調補之良方

卽四君子湯加陳皮一錢

歌括

苓朮參甘四味同。方名君子取謙沖。增來陳夏痰涎滌。再入香沙痞滿通。水穀精微陰以化。飲食增則津液旺。充血生津以培其真陰之不足。陽和布護氣斯充。食入于陰氣長于陽晝夜循環周于內外。若劑半夏六君內錢氏。書中有異功。

藥性摘要

人參氣味甘微苦無毒氣味俱薄浮而升湯中微陰主補五臟及肺中元氣
茯苓氣平味甘而淡無毒氣味俱薄浮而升陽也能止渴利小便蓋淡能利竅甘以助陽除濕之堅舉入足少陰足太
陽兩經

白朮氣溫味甘陰中陽也可升可降入足太陰陽明手太陰陽明太陽之經能除濕益燥和中益氣利腰臍間血除脾
胃中濕熱

甘草氣平味甘氣薄味厚升而浮陽也入足太陰厥陰經能緩急養陰和百藥解百毒中滿者忌之

半夏氣平味辛有毒生者微寒而吐熟者溫而下氣味俱薄沉而降陰中陽也辛厚苦輕陽中陰也入手陽明太陰少

陰三經治寒痰飲冷和胃止嘔調氣散逆孕婦忌口渴者禁為其燥津液也

陳皮氣味苦辛溫經毒入心肝肺三經主胸中痰熱逆氣利水殺去痰窠脹

薑氣微溫味辛氣味俱厚浮而升陽也溫中無毒入肺而開胃口止嘔而散風寒與棗同用行脾胃之精液而和營衛

也生用則逐寒發散炮則除胃冷而守中多用耗散元氣

木香氣味辛溫無毒主邪氣辟毒疫溫鬼主交感天地之氣

白豆蔻氣味辛溫無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣

砂仁氣味辛溫無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虛痛下氣

四君六君香砂六君子論

胃氣爲生人之本參朮苓草從容和緩補中氣達于上下四旁利五臟六腑皆以受氣故一切虛證皆以此方爲主若
陳皮則有行滯進食之效半夏有除痰寬脹之功木香砂仁則行氣之藥多于補守凡腫滿痰飲結聚等證無不速除
蓋人在氣交之中因氣而生而生氣總以胃氣爲本食入于陰長氣于陽晝夜循環周于內外一息不運便有積聚或
脹滿不食或生痰留飲因而飢內消瘦喘咳嘔噦諸證蜂起而神機化絕矣四君子氣分之總方也人參致沖和之氣
白朮培中宮茯苓清關節甘草潤五臟諸氣既治病從何而來然撥亂反正又不能無爲而治必舉夫行氣之品以輔
之則補品不至泥而不行故加陳皮以利肺金之逆氣半夏以疏脾土之濕氣而痰飲可除也加木香以行三焦之滯

氣砂仁以通脾腎之元氣而積鬱可開也。四君得四輔而力培宣。四輔有四君而元氣大振。相須而益彰者乎。

四物湯 治血虛肝腎不足之症。

大熱地 當歸各三錢 白芍二錢 川芎一錢五分

八珍湯 治氣血並虛

歌括

四物歸地芍川芎。血證諸方括此中。若與四君諸品合。雙療氣血八珍崇。

藥性摘要

生熟地黃氣寒味甘微苦。味厚氣薄。陰中之陽。無毒。入手太陽少陰經。涼血補血。補腎水。真陰不足。蒸熱則寒性稍減。

忌鐵器

當歸氣溫味甘辛。氣味俱輕。陽也。陽中微陰。無毒。入手少陰足太陰厥陰經。和血補血。尾股血。身和血。

白芍藥氣微寒味苦。無毒。氣薄味厚。陰也。降也。陰中之陽。入手足太陰經。主邪氣腹痛。除血痹。攻堅積。寒熱。痼疾。利小便。益氣止痛。

川芎氣味辛溫。無毒。主中風。入腦肝肺。頭痛寒痹。筋攣。緩急。金瘡。婦人血閉。無子。散邪。通經。

十全大補湯 治陰陽並虛而畏冷

即八珍湯加黃耆二錢 肉桂六分

人參養營湯 治脾肺俱虛發熱惡寒肢體疲倦等症

歌括

桂耆加全八珍煎。大補功宏號十全。再加志陳五味子。去芍辛竄養營歸。

藥性摘要

黃耆氣味甘。微溫。無毒。入膾與三焦脾肺。主瘡疽。大風癩疾。排膿止痛。及小兒百病。助中正之氣。補虛達表。肉桂氣熱。味甘辛。陽中之陽。枝入足太陽經。心入少陰經。血分肉入足少陰。太陰經。血分主上氣。咳逆。結氣。吐。吸。利關節。補中益氣。血熱肝不足者。禁用。能宣導百竅。通血脈。止煩出汗。

五味子氣溫。味酸。無毒。味厚。氣輕。陰中微陽。入手太陽經。血分足少陰。經氣分。補肺氣。收逆氣。治喘嗽。有外邪者。不可驟用。

遺志氣味苦溫。無毒。主咳逆傷中。除邪氣。補不足。利九竅。益智慧。入手厥陰心胞。手少陰心。六味地黃湯。主治滋水制火。腎精不足。虛火上炎。失血消渴等症。

大熟地四錢。山茱萸。山藥。各二錢。丹皮。茯苓。澤瀉。各一錢。五分。桂附地黃丸。又名八味地黃丸。治命門火衰。不能生土。以致脾胃虛寒。飲食少思。大便不實。下元衰憊。臍腹疼痛等症。

即六味地黃湯加肉桂 附子。

歌括 六味滋陰益腎肝。茱萸山藥澤地苓。再加桂附共真火。八味功同九轉丹。

藥性摘要

山茱萸氣味酸平。無毒。心主下邪氣。寒熱溫中。逐寒濕。掉去三蟲。補腎固精。

山藥氣味甘平。無毒。補中益氣。長肌肉。強陰。除寒熱。邪氣入肺。脾益血。填精。守中之藥也。

丹皮氣味辛寒。無毒。主寒熱。中風。驚癇。邪氣。除積。堅瘀。血安五臟。入肺。腎平肝。清熱。散結。

澤瀉氣味甘寒。無毒。主風寒濕痺。乳難。養五臟。消水。功能行在下之水。而使之上。啟水氣上行而復下。

附子氣熱味辛。有大毒。大辛大熱。氣厚味薄。可升可降。陽中之陰。浮中沉。無所不至。為諸經引用之藥。其性走而不守。

入手少陰三焦命門之劑。有退陰回陽之力。起死回生之功。病熱者禁用。

補中益氣湯 治陰虛內熱。口渴自汗。中氣下陷。以此升之。

黃芪一錢五分。當歸、炙草各一錢。土炒白朮、人參各一錢。柴胡、升麻各三分。陳皮五分。加生薑一片。大棗三枚。歌括

藥性摘要

柴胡：氣平，味微苦，無毒。氣味俱輕，陽也。升也。少陽厥陰引經之藥。去往來寒熱，除煩熱，解肌熱。尤為婦人產前產後要藥也。

升麻：氣平，味苦甘，無毒。味薄，氣厚。陽中之陰也。陽明經本經藥。主解百毒，辟瘟疫，瘴氣，邪氣。能解肌肉間熱，散風邪，升陽氣上行。

歸脾湯：治思慮傷脾，不能攝血，功能養血安神。

人參、炙黃芪、白朮、當歸、茯神、白芍、棗仁各一錢五分。遠志七分。炙草、木香各五分。

歌括

歸脾湯納朮、神參、志香、甘與棗、仁龍、眼當歸、十味外。若加熱地失其真。

藥性摘要

茯神：氣平，味甘，無毒。主辟不祥，療風眩，風虛，五勞，口乾，止驚悸，開心益智，安魂，養精神。

棗仁：氣味酸平，無毒。主治心腹寒熱，邪結氣聚，四肢酸痛，濕痹。

黃芪：鑿甲散，治虛勞骨蒸，咳嗽，食少，盜汗。

黃芪、鑿甲、天冬各五錢。地骨皮、秦艽、茯苓、柴胡各三錢。紫苑半夏、知母、生地、白芍、桑皮、炙草各一錢。半人參、肉桂、桔梗各錢半。加薑、薑煎。

歌括

黃芪鑿甲地骨皮。芫苑參苓柴半知。地黃芍藥天冬桂。甘桔桑皮勞熱宜。鑿甲天冬知芍。補水養陰。參耆桂苓甘草。固衛助陽。桑枝瀉肺熱。苑夏理痰嗽。芫柴地骨退熱升。陽為表裏氣血交補之劑。

草性摘要

驚甲。氣味酸平無毒。主心腹癢。瘕堅。積寒熱。入肺腎而輒堅。平肝氣。去瘧疾。天門冬。氣味苦平無毒。氣薄味厚。陰也。陽中之陰。入手太陰。足少陰。經氣分之藥。主諸暴風濕。偏痺。強骨髓。殺三蟲。清熱祛濕。上通太陽。保肺氣。治熱妄行。

地骨皮。氣味苦寒。主去骨熱。消渴。

秦艽。氣味苦平無毒。治寒濕風痹。肢節痛。下水。利小便。

紫苑。氣味苦溫無毒。主咳逆。上氣。胸中寒熱。結氣。去蟲毒。

如母。氣味苦寒無毒。主消渴。熱中。除邪氣。肢體浮腫。下水。益氣。氣味俱厚。沉而降。陰也。陰中微陽。腎經本藥。入足陽明。

手太陰氣分。

桑白皮。氣味甘寒無毒。主傷中。五勞。寒粟。水氣入腎。甘以補脾氣。而補不足。清內熱。退火邪。

桔梗。氣味鹹溫。有小毒。主胸膈痛。如刀刺。胸滿。腸鳴。驚恐。悸氣。爲氣分之藥。上中下三焦皆可治也。

小建中湯。治虛勞腹冷。

芍藥六兩。桂枝生薑各三兩。甘草一兩。大棗十二枚。飴糖一升。

黃芪建中湯。治表虛身痛。

卽小建中湯加黃芪一兩五錢。

歌括

小建中湯芍藥多。桂薑甘草大棗和。更加飴糖補中臟。虛勞腹冷服之瘥。增入黃芪名亦爾。表虛身痛效無過。

輕可去實。

香蘇飲。治四時感冒。發表輕劑。

蘇葉。陳皮。香附。各一錢五分。荆芥。秦朮。防風。蔓荊子。各一錢。川芎。炙草。各五分。

歌括

香蘇飲納草陳皮汗顧陰陽用頗奇芫荽防芎藭子入解肌活套亦須知

藥性摘要

紫蘇氣味辛微溫無毒主下氣去邪毒辟惡氣通神明其子下氣尤速其梗寬脹治噎膈反胃
香附氣味甘微寒無毒除胸中熱充皮毛益氣長鬚眉

防風氣味甘溫無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛均能散之

荊芥氣味辛溫無毒主寒熱破積氣除濕疸下瘀血主少陽相火厥陰風木之症

葛荊子氣味苦微寒無毒主治筋骨間寒熱濕痹拘攣明目堅齒利九竅去白蟲

桂枝湯治太陽中風寒有汗以此解肌

桂枝芍藥生薑各一錢五分炙甘草五錢大棗四枚

歌括

桂枝湯治太陽風芍藥甘草薑棗同桂麻相合名各半（湯）太陽如瘧此爲功

麻黃湯治太陽傷寒發熱惡寒無汗頭項痛

麻黃四錢桂枝二錢炙甘草一錢杏仁十二粒

歌括

麻黃湯中用桂枝杏仁甘草四般施發熱惡寒頭項痛傷寒服此汗淋漓

藥性摘要

麻黃氣溫味苦辛無毒氣味俱薄陽也升也手太陽之劑入足太陽經走手少陰陽明經藥發太陰少陰經汗其根能
解肌肉中邪止盜汗

杏仁氣溫味甘苦冷利有小毒氣薄味厚濁而沉降也陰也入手太陰經其用有三潤肺消食積散滯氣除肺中風熱

咳嗽氣喘

葛根湯治中風表實汗不得出

桂子芍藥炙草各二兩生薑三兩大棗十二枚葛根四兩麻黃三兩

歌括

葛根湯內麻黃襄二味加入桂枝湯（卽桂枝湯）（加麻黃葛根湯）輕可去實因無汗有汗加葛無麻黃（名桂枝加葛根湯）

藥性摘要

葛根氣平味甘無毒陽明引經藥足陽明行經的藥治脾胃虛而渴除胃熱解酒毒生葛搗汁解濕病發熱升陽生津若未入陽明而氣喘者忌

藿香正氣散 治外受四時不正之氣內停飲食頭痛寒熱或霍亂或作瘧疾或吐瀉

藿香白芷嬰蘇茯苓各三兩陳皮白朮厚朴半夏枳桔梗各二兩加薑棗煎

歌括

藿香正氣芷陳蘇甘桔朮苓厚朴俱夏袖復皮加薑棗感傷（內傷外感）風障並能驅

藥性摘要

藿香氣味辛甘溫無毒主風水腫毒去惡風止霍亂心腹痛理氣和平

白芷氣味辛溫主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風侵頭目淚出長肌膚潤澤可作面脂

厚朴氣味苦辛溫無毒氣味俱厚體重濁而微降陰中陽也可升可降除腹脹消痞滿下逆氣散寒結所主皆實症

大腹皮辛泄肺溫和脾下氣寬胸行水通大小腸治水腫脚氣痞脹痰膈瘵瘧霍亂

四味香薷飲 治風寒閉暑之症

香薷扁豆厚朴各一分五錢炙草五分

黃連香薷飲 治中暑熱感口渴心煩

卽四味香薷飲

五物香薷飲 治風寒閉暑小便不利

卽四味香薷飲加茯苓。

十味香薷飲 治風寒暑濕內傷勞倦。

卽前方加木瓜橘皮人參黃芪白朮。

歌括

四味香薷豆朴。若云熱感谷黃連。茯苓五物兼溼。瓜橘蔞參白朮全。

藥性摘要

香薷氣味辛微溫無毒。主霍亂腹痛吐下。散水腫。入脾。發越陽氣。以散蒸熱。

扁豆氣味甘微溫無毒。主中和下氣清暑和脾。

黃連氣寒味苦無毒。氣味俱厚。可升可降。陰中陽也。入手少陰經。其用有六一瀉心火。二去中焦濕熱。三去風濕。四赤

眼暴發。五一切疔症。六止中部見血。

木瓜氣味酸溫無毒。主濕痹脚氣霍亂。大吐下。轉筋不止。

散可和楚

小柴胡湯 治寒熱往來。少陽瘧疾。口苦耳聾。胸滿脇痛。

柴胡二錢。半夏甘草各一錢。黃芩錢半。人參六分。生薑二片。大棗三枚。

歌括

小柴胡湯和解俱。半夏人參甘草從。更用黃芩加黃蘗。少陽百病此爲宗。

逍遙散 治肝經血虛木鬱。

茯苓土炒白朮酒拌當歸柴胡酒炒白芍各一錢。甘草五分。加煨薑薄荷煎。

八味逍遙散 主調經散鬱。

卽逍遙散加丹皮黑山梔。

歌括

逍遙散用當歸芍藥苓朮草加薑薄散鬱除蒸功最奇。調經八味丹梔著肝虛則血病。歸芍養血平肝。木威則土衰。朮草和中。補土。柴胡升陽散熱。茯苓利濕寧心。生薑煖胃祛痰。薄荷消風理血。方中柴胡薄荷二味最妙。蓋治木鬱而諸鬱皆解也。

藥性摘要

薄荷氣味辛溫無毒。主賊風傷寒。發寒惡熱。心腹脹滿。霍亂。宿食不消。下氣醒頭目。

山梔氣味苦寒無毒。主五內邪氣。胃中熱氣。能起水陰之氣。上滋復導火熱之氣。下行有調行心腎之功。

黃芩芍藥甘草湯 治太陽少陽合病。下痢脾熱流涎。

黃芩三兩芍藥 甘草各二兩加生薑煎

歌括

黃芩湯用甘芍并。二陽合利薑加薑。此方遂爲治痢祖。後人加味或更名。再加生薑與半夏。前證兼嘔。此能平。單用芍藥與甘草。散逆止痛能和營。單用芍藥與甘草名芍藥甘草湯。

藥性摘要

黃芩氣味寒苦無毒。可升可降。陰也。陰中微陽。入手太陽血分。主諸熱黃疸。逐水。下血閉。解毒。

六和湯 主理氣健脾。能禦風寒暑濕燥火六氣。故名六和。

薑香二錢厚朴一錢杏仁二路半夏一錢砂仁八分木瓜赤茯苓三錢白朮人參六分扁豆二錢甘草五分加薑煎

煎

歌括

六和薑朴杏砂呈。半夏木瓜赤茯苓。朮參扁豆同甘草。薑煎煎之六氣平。或益香薷或蘇葉。傷寒傷暑用須明。

燥可去濕

五苓散 治太陽經熱傳入膀胱。滲瀝利小便。

猪苓一錢五分茯苓三錢炒白朮一錢五分澤瀉一錢桂枝一錢

四苓散。治伏暑。小便不通。

卽五苓散去桂枝。

歌括

五苓散治太陽府。白朮澤瀉猪茯苓。膀胱化氣添官桂。利便消暑煩渴清。除桂名爲四苓散。無寒但渴服之靈。

藥性摘要

猪苓。氣味甘平無毒。主痰瘧。利水道。宣上焦肺氣。中焦脾運。下焦濕滯。

五皮飲。治胃經蓄水發爲水腫。

大腹皮。茯苓皮。陳皮。桑白皮。各一錢五分。生薑皮八分。

歌括

五皮飲用五般皮。陳茯苓桑大腹寄。或用五加易桑白。脾虛膚脹此方司。

平胃散。治脾胃不和。脹滿嘔吐。霍亂停濕等症。

藿香一錢。厚朴一錢。蒼朮五分。陳皮八分。

神朮散。治時行不正之氣。滿悶發熱。傷食傷濕嘔吐。

卽平胃散加砂仁。灸甘草。

歌括

平胃散用朴陳皮。蒼朮藿香四味宜。若加砂仁與炙草。神朮名湯滿悶宣。

藥性摘要

蒼朮。氣味苦濕無毒。主治風寒濕痺。陳熱消食。與白朮同。惟白朮止汗。蒼朮發汗。欲補脾者用白朮。欲理脾者用蒼朮。

二陳湯。治肺胃寒痰。調中去濕。

製半夏。茯苓。陳皮。各一錢五分。炙草七分。

歌括

二陳湯用夏和陳益以茯苓甘草臣理氣調中兼去濕諸凡痰飲此爲珍
草薺分清食 治心移熱膀胱而爲赤濁者并治諸淋

川草薺二錢炒黃柏一錢五分石菖蒲五分茯苓二錢白朮一錢五分蓮子心一錢五分丹參車前子各一錢五分
歌括

草薺分清主石菖。丹參黃柏亦茶俱。再入蓮心車前子。淋濁流連數服驅。

萃性摘要

川草薺氣味甘平無毒主腰脊痛強骨節風寒濕痺能泄厥陰陽明濕熱去濁分清

黃柏氣味苦寒無毒主五臟腸胃中結熱黃疸腸痔女子漏下赤白能清熱之中而兼燥濕之效

石菖蒲氣味辛溫無毒主風寒濕痺欬逆上氣開心孔通九竅明目日出音聲濕腸胃止小便利功略同遠志其性自

下以行于上與遠志自上以行于下者有別

車前子氣味甘寒無毒主氣癢止痛利水道通小便除濕痺宣膀胱散濕和

丹參氣味苦微寒無毒主心腹邪氣寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益君火之氣上下相交則中土自和元參能下交于

上丹參能上交于下

蓮子氣味甘平無毒主補中養神益氣力除百疾

蓮蕊鬚氣味甘瀉溫無毒主清心通腎固精氣烏鬚髮悅顏色益血止血崩吐血

蓮房即殼氣味苦瀉溫無毒主破血活血脹腹痛及產後胎衣不下解野菌毒

蓮心氣味苦寒主活血渴產後渴止霍亂清心去熱

荷葉氣味苦平無毒主血脹腹痛產後胎衣不下酒黃服之治吐血衄血血崩血痢脫肛赤遊火丹徧身風瀉陽水浮

腫痘瘡等其梗通氣發汗括刺用止汗其蒂主安胎去惡血留好血止血痢

茵陳大黃湯 治黃疸熱閉口渴便閉屬于陽黃

茵陳三錢梔子大黃各二錢

蘭陳薑附湯 治寒濕陰黃色暗便塘小便自利者

即前方除大黃梔子加白朮二錢附子乾薑炙草各五分

茵陳五苓散 治陰黃小便不利者

即五苓散除桂子加茵陳二錢薄荷五分

歌括

茵陳蒿湯治疸黃。陰陽寒熱細推詳。陽黃大黃梔子入。陰黃草朮與附薑。又有茵陳五苓散。陰桂加茵薄荷良。

藥性摘要

茵陳蒿氣味苦平微寒無毒。主風濕寒熱邪氣熱結黃疸。

大黃氣味苦寒無毒氣味俱厚沉而降陰也。主下瘀血血閉寒熱。破積滯積聚留飲宿食。瀉滌腸胃。推陳致新。通利水穀。調中化食。

熱可制寒

理中湯 治太陰厥逆自利不渴脈沉無力

人參 白朮各二錢乾薑炙甘草各一錢

附子理中湯 治臟寒將脫之症用以回陽

即理中湯加附子一錢

歌括

理中湯主理中鄉。甘草人參朮黑薑。嘔痢腹痛陰寒感。或加附子總扶陽。

四逆湯 治少陰中寒肢冷厥逆

附子 乾薑各五錢炙草二錢

歌括

四逆湯中薑附草。三陰厥逆太陽沉。或益黃葱芍芩。通陽復脈力能任。

藥性摘要

葱白。氣味辛平。無毒。氣厚味薄。升也。陽也。入手足太陰。足陽明經。專主發散。以通上下陽氣。治中風面目浮腫。能出汗。

三生飲。治寒風中臟。六脈沉細。

生南星。生烏頭。生附子。各一錢五分。生薑三片。生木香五分。若加人參更妙。

歌括

三生飲用烏附星。香入些微是引經。參汁對調宗薛氏。風痰卒倒效神靈。

藥性摘要

天南星。氣味苦溫。有大毒。主治心痛。寒熱結氣。積聚。伏梁。傷筋。痠拘。緩利水道。

生烏頭。氣味辛溫。有毒。主治諸風。風痺。血痺。半身不遂。除寒冷。溫養臟腑。去心下堅痞。感寒痠痛。

白通加猪胆汁湯。治陰盛隔陽熱。不入。

附子。乾薑各五錢。葱白二錢。人尿半杯。猪胆汁五茶匙。

歌括

白通加尿猪胆汁。乾薑附子兼葱白。熱因寒用妙義深。陰盛隔陽厥無脈。

藥性摘要

人尿。氣寒。味鹹。無毒。入胃。隨脾之氣。上歸于肺。下通水道。而入膀胱。引火下行。治諸血病。

猪胆汁。氣寒。味苦。無毒。與人尿同體。補肝而和陰。引真陽不被格拒。能入心而通脈。

厚朴溫中湯。治胸膈虛寒脹滿。

厚朴。陳皮各一錢。甘草。茯苓。草豆蔻。木香各五分。乾薑三分。

歌括

厚朴溫中陳草苓。乾薑草蔻木香停。煎服加薑治腹痛。虛寒脹滿用皆靈。

藥性摘要

肉豆蔻主溫中消風止洩治精冷心腹脹痛霍亂中惡鬼氣冷疰嘔沫冷氣小兒乳疳
草豆蔻氣味辛溫無毒香散煖胃健脾燥濕祛寒霍亂吐酸解口臭
金匱腎氣丸治腎經聚水膚脹腹腫痰如壅

歌括
即六味地黃丸加桂附車前牛膝

六味地黃加桂附車前牛膝合之成。膚脹腹腫痰如壅。腎氣丸來水自行。

藥性摘要

牛膝氣味苦酸平無毒主寒濕癱瘓四肢拘攣膝痛不可屈伸流通血脈墮胎稟金氣能入肺通調水道而行寒濕清
胃熱得火味而入心包泄氣血之凝滯得木味而入肝肝臟血而養筋血脈流通則拘攣可愈膝痛可平伸屈自如矣

泄可去閉

大承氣湯治邪熱閉結或食積堅硬宜下之

大黃三錢枳實一錢五分厚朴一錢芒硝三錢

小承氣湯治症較前方稍緩

即大承氣湯去芒硝

三花湯治中風入臟熱極閉結

即小承氣湯加羌活一錢五分

三承氣湯即大承氣湯加甘草二錢

歌括

大承氣湯用芒硝枳實大黃厚朴鏡救陰瀉熱功偏擅急下陽明有數條
小承氣湯朴實黃譚狂痞硬上焦強益以羌活名三花中風閉實可消洋

藥性摘要

枳實氣微寒。味苦辛。無毒。氣厚味薄。浮而升。微降。陰中陽也。主大風在肌肉中。除寒熱。破結實。止癩消痰。

枳殼。大同小異。性宣發而氣散。功能利氣消痞。芒硝氣大寒。味鹹苦辛。有小毒。氣薄味厚。沉而降。陰也。經云。鹹味下泄爲陰。又云。鹹以軟之。熱淫于內。治以鹹寒。用以

軟堅。去實熱。結不至堅者不可用也。着活氣味苦甘平。無毒。主風寒所擊。金瘡止痛。奔豚癰疽。女子疝瘕。入肺以禦皮手之風寒。入脾以禦肌肉之風寒。入

心助太陽之氣。以禦營衛之風寒。和營衛。制水扶土。調胃承氣湯。治胃熱譫語。便閉。繞臍硬痛。

大黃三錢。芒硝二錢。甘草五分。

歌括 調胃承氣硝黃草。甘緩微和將胃保。不用朴實傷上焦。中焦燥實服之好。

失笑散 治產後心腹疼痛欲死。或血迷心竅。不省人事。或胞衣不下。

蒲黃 五靈脂等分。生研。每服三錢。獨聖散 治心痛血滯。功同失笑散。

山查 二兩。水煎。用童便砂糖調服。歌括 失笑蒲黃及五靈。量平痛止積無停。山查二兩便糖入。獨聖功同更守經。

藥性摘要 蒲黃氣味苦平無毒。主治心腹膀胱寒熱。利小便。止血消瘀血。

五靈脂氣味甘溫無毒。主療心腹冷氣。小兒五疳。辟疫。治腸風。通利血脈。女子月閉。

山查氣味甘微。溫健脾行氣。消食磨積。散瘀化痰。療小腸疝氣。小兒痘疹。行乳食。停留。

風可消散

大秦芫湯 治風中經絡口眼歪斜等症。

片。 秦芫一錢五分。炙草川芎當歸芍藥生地熟地羌活獨活白朮防風白芷黃芩各八分。細辛二分。如陰雨加生薑三

歌括

大秦芫湯羌活防芎芷辛芩二地黃。石膏歸芍苓甘朮。風邪散見可通嘗。

藥性摘要

石膏氣味辛微寒無毒。主中風寒熱。心下逆氣。噎喘口乾舌焦。不能息。腹中堅痛。功在清陽明之熱。

細辛氣味大辛無毒。氣厚于味。陽也。少陰經藥。治少陰頭痛如神。當少用之。獨活為使。溫陰經散水寒。以去內寒。主

咳逆上氣。頭痛腦動。百節拘攣。風濕痺痛。

消風散 治頭痛目昏項背急頑麻癢疹等疾。

人參防風茯苓川芎羌活獨活蠶絲蚬殼藿香各二兩。荆芥薑汁炒厚朴陳皮炙草各五錢。每服三錢。

歌括

消風散內羌防荆芎朴參苓陳草并。蠶絲蚬殼藿香入。為末茶調或酒行。頭痛目昏項背急。頑麻癢疹服之消。

藥性摘要

蠶蠶氣味鹹辛平無毒。主治小兒驚癇夜啼。去三蟲。能平木。制風攻毒。

蠟蛻氣味鹹甘寒無毒。主治小兒驚癇。婦人生子不下。燒灰水服。治久痢。能清熱制風。皮膚癢疹。一切風熱之證。

溫胆湯 治熱嘔吐虛煩驚悸不眠。痰氣上逆。

寒可勝熱 卽二陳湯加竹茹枳實

歌括

溫膽湯方本二陳。竹茹枳實合和勻。不眠驚悸虛煩嘔。日煖風和木氣伸。

藥性摘要

竹茹氣味甘微寒無毒主嘔碗溫氣寒熱吐血崩中通脈絡

白虎湯清肺金而瀉胃火脈洪大有力者用之

石膏四錢知母一錢五分甘草一錢硬火

歌括

白虎湯用石膏煨知母甘草硬米陪亦有加入人參者躁煩熱渴舌生胎

甘露飲治血虛胃中濕熱色黃溺赤吐血衄血

枇杷叶麥冬生地熟地黃芩石斛各一錢枳壳茵陳各八分甘草三分

歌括

甘露二冬二地均枇杷枳斛茵陳合和甘草平虛熱口爛銀糜吐衄珍

藥性摘要

枇杷叶氣味苦平無毒主卒喘不止下氣

麥門冬氣味甘平無毒主心腹結氣傷中傷肌胃脈絕羸瘦短氣

石斛氣味甘平無毒主傷中除痹下氣補五藏虛勞羸瘦強陰益精厚腸胃

瀉白散治肺熱

蜜炙桑白皮二錢地骨皮三錢甘草四分硬米

歌括

瀉白桑皮地骨皮甘草硬米四般宜麥茯知苓皆可入肺炎喘嗽此方施

通可行滯

導赤散治熱閉小便不通淋瀝口糜莖痛等症

麥冬三錢木通一錢生地三錢甘草四分竹叶十片車前子赤茯苓各一錢五分

歌括

導赤原來地與通。草芥竹叶卓前冬。口糜莖痛兼淋瀝。瀉水功歸補水中。

藥性摘要

木通。氣味辛平無毒。主除脾胃寒熱。通利九竅。血脉關節。

竹叶。氣味苦寒無毒。主治咳逆上氣。溢筋急。消惡瘍。殺小蟲。

越鞠丸。治鬱隔痞滿為痛。為嘔為脹為痢者。

香附山查炒神曲炒麥芽川芎蒼朮炒梔子各等分。為末調丸。如桐子大。每服五六十九丸。開水服。

歌括

六鬱宜施越鞠丸。芎蒼附并梔查。食停氣血濕痰火。得此調和頃刻安。

藥性摘要

神糶。氣味甘溫無毒。主化水穀宿食。散結積聚。健脾煖胃。

麥芽。氣味苦溫無毒。主寒中下氣。除熱消穀。疎肝。

朴黃丸。治堅積作痢。腹痛拒按。

陳皮。厚朴各十兩。大黃一片。廣木香三兩。荷葉水為丸。

歌括

朴黃丸內用朴黃。荷葉陳皮與木香。為末作丸水調服。堅積脹痢痛無傷。

醫可清散

清暑益氣湯。治長夏暑濕蒸炎。四肢困倦。精神減少。身熱氣高。便黃心煩。口渴。自汗脈虛者。

人參黃芪。炙甘草。酒炒當歸。麥冬。五味。糶炒青皮。糶炒陳皮。酒炒黃柏。葛根。蒼朮。土炒白朮。升麻。澤瀉。加蓬。棗煎。

歌括

清暑益氣草參芪。麥味青陳柏柏奇。二朮葛根升澤瀉。暑傷元氣棗煎宜。

藥性摘要

青皮。氣味苦辛溫。無毒。主治氣滯下食。破積結。及膈氣。

橘核。氣味苦辛無毒。主治腎疝腰痛。膀胱氣滯。腎冷。

橘叶。氣味苦平無毒。主導胸膈逆氣入厥。陰行肝氣。消腫散毒。乳癰發痛。用之行經。

六一散。清暑濕熱。渴煩燥瀉痢。

滑石六兩。甘草一兩。盪心湯下。

益元散。治同前。有清心火之功。

即六一散加辰砂。

碧玉散。治同前。有瀉肝解鬱之功。

即六一散加青黛。

鷄蘇散。治同前。有散肺之功。

即六一散加薄荷。

歌括

六一滑石同甘草。解肌行水兼清燥。統治表裏及三焦。熱渴暑煩瀉痢保。益元碧玉與鷄蘇。砂黛薄荷加之好。

藥性摘要

青黛。鹹寒色青。瀉肝散五臟鬱火。解中下焦蓄蘊風熱。治傷寒發斑白痢失血。及蛇火毒。

滑石。氣味甘寒無毒。主身熱洩痢。女子乳難。降閉利小便。蕩胃中積聚。功在清熱利水。

丹砂。氣味甘微寒無毒。色赤入心。主身腫五臟百病。養精神安魂魄。益氣明目。殺精魅惡鬼。

血可調理

四生丸。治血熱妄行而為吐衄。

生地黃三錢。生荷叶生側柏叶生艾叶各等分。同搗極爛為丸。如鷄子大。每服一丸。水煎去渣。

歌括

四生丸。用叶三般。艾。白鮮。荷。生地。斑。共搗成團。入水化。血隨火降。一時還。

藥性摘要

艾叶。氣味苦辛。生溫。熟純陽之性。能回垂絕之元陽。通十二經。走三陰。太少厥理氣血。逐寒濕。暖子宮。止諸血。溫中開鬱。調經安胎。

側柏叶。氣味苦。微溫。無毒。主治吐血。衄血。崩血。崩中。赤白。令人耐寒暑。去濕痺。益氣生肌。

澤蘭湯。治經閉。調血脈。

澤蘭貳錢。柏子仁。常歸。白芍。熟地。牛膝。茺蔚子。各一錢五分。

歌括

澤蘭湯。用柏子仁。白芍。茺蔚。熟地。倫。再入當歸和血脈。月經閉塞。可調均。

藥性摘要

柏子仁。氣味甘平。主驚悸。安五臟。益氣。除濕痺。寧心神。欬心氣。而不為邪風遊火所侵。尅菴藟子。氣味辛甘。微溫。無毒。主明目。益精。除水氣。治婦女經脈不調。一切胎產氣血諸病。

澤蘭。氣味微溫。無毒。主金瘡。癰腫。瘡。膿。五運。而治三陰之證。

犀角地黃湯。治血熱妄行及斑疹。

犀冲犀角。丹皮。麥冬。白芍。各一錢五分。生地四錢。

歌括

犀角地黃芍藥丹。血升胃熱火邪干。斑黃陽毒皆堪治。或益藥茶總伐肝。

藥性摘要

犀角。氣味苦酸。鹹寒。無毒。主百毒。蟲。疰。邪。鬼。瘴。氣。解。鈎。吻。鳩。羽。蛇。毒。除。邪。迷。清。濕。熱。毒。羚羊角。氣味鹹寒。無毒。明目。益氣。起陰。去惡。血。注。下。辟。蠱。毒。惡。鬼。清。濕。熱。毒。

養心湯。清心補血寧神。

蜜炙黃耆。茯苓。茯神。川芎。當歸。酒洗半夏。麩各一兩。炙甘草一錢。人參。柏子仁。肉桂。五味子。遠志。棗仁各二錢五分。

歌括

養心湯用草蒼參。二茯芎歸柏子尋。夏麩遠志兼桂味。再加酸棗總寧心。

藥性摘要

龍眼肉。氣味甘平。無毒。主五臟邪氣。安志。厭食。除蠱毒。去三蟲。通神明。

痰可蕩滌

滾痰丸。治老痰變生怪症。

大黃炒黃芩各四兩。青礞石沉香各二錢。辰砂一錢。以水爲丸。神砂爲衣。每服三錢。開水下。

歌括

滾痰丸用青礞石。大黃黃芩辰沉香。百病多因痰作祟。頑痰怪症力能匡。

藥性摘要

青礞石。氣味甘鹹。有毒。體重沉墜。色青入肝。製以消石。能平肝下氣。爲治頑痰癱結之神藥。氣弱血虛者忌。

沉香。氣味辛溫。無毒。療風水腫。去惡風。

清氣化痰丸。治痰湧濕熱氣逆。

葦製半夏。胆星各一兩。半搗紅枳實。杏仁。括婁仁。酒炒黃芩。茯苓各一兩。葶製糊丸。葦湯下。

歌括

清氣化痰星夏橘。杏仁枳實括婁仁。葦汁糊爲丸。氣順火消痰自失。

藥性摘要

括婁。氣寒味甘微苦。酸無毒。消渴身熱。煩滿大熱。補虛安中。通月水。消腫毒瘰癧。及熱狂瘡癩。其仁。氣寒味甘微苦。無毒。治胸痹。能洗滌胸中垢膩。鬱熱爲治消渴之神藥。又能降上焦之火。使痰氣下降。

毒可涼解

普濟消毒飲。治大頭疫症喉風發癰等症。

甘草。桔梗。酒芩。酒黃連各二錢。馬勃。元參。橘紅。柴胡各五分。殭蠶。薄荷六分。升麻二分。連翹。牛蒡子各八分。

歌括

普濟消毒用芩連。元參。甘草。桔梗。牛蒡。升麻。馬勃。連翹。陳。殭蠶。薄荷爲末。咀。或加人參及大黃。大頭天行力能禦。

藥性摘要

馬勃。氣味辛平。輕。虛。清肺熱。散血止血。治喉痹咽痛。鼻衄失音。外用敷諸瘡良。

元參。氣味苦微寒。無毒。主腹中寒熱積聚。女子產乳除痰補腎。令人明目。

連翹。氣味苦平。無毒。主治寒熱。風濕。瘰癧。癰。惡瘡。入手少陰。厥陰。而瀉。兼除三焦。陽明。大腸。俱熱。散諸經。血凝氣聚。利水道。爲十二經。府家聖藥。

黃連解毒湯。治熱毒內熾。狂燥吐衄。班黃等症。

黃連黃柏黃芩梔子各等分。

歌括

黃連解毒湯。四味。黃柏。黃芩。梔子。備。躁。狂。大熱。嘔。不。眠。土。鉅。班。黃。均。可。使。

複可兼治。複者複雜也。言病之內外上下。同時受病。而相反者。如表熱裏寒。下實上虛等複雜之症。可兼治之。

大柴胡湯。治傷寒陽邪入裏。表症未除。裏症又急。攻內而兼解外也。

柴胡一錢五分。半夏八分。黃芩。芍藥各二錢。枳實二錢。大黃二錢。加薑棗煎。

歌括

大柴胡湯用大黃。枳實。芩。夏。白芍。將。煎。加。薑。棗。表。兼。裏。妙。法。內。攻。併。外。攘。

防風通聖散。治風熱壅盛。表裏三焦皆實。是發表攻裏並用法也。

酒蒸大黃。芒硝。防風。荆芥。麻黃。梔子。白芍。連翹。川芎。當歸。薄荷。白朮。各五分。桔梗。黃芩。石膏。各一錢。甘草二錢。滑石。

百病療治法 卷中

三錢。加薑蔥煎。

歌括

防風通聖大黃硝。荆芥薄荷芍藥。甘桔芩歸滑石。薄荷芩朮力偏。製表裏攻陽熱。外科瘍毒總能消。

涼膈散 寓三集六經諸火上以升散下以瀉滌是上下並治之法。

歌括

連翹一錢五分酒浸大黃芒硝甘草各一錢。梔子黃芩薄荷各五分。加竹葉七片生薑一匙。

華性摘要

涼膈諸黃梔子剉黃芩甘草薄荷饒再加竹葉調蜂蜜膈上如焚一服消。

蜂蜜味甘能清熱補中調營衛。通三焦安五臟。和百藥。與甘草同功。止咳。治痢。忘慈。

貝母氣味辛平無毒。主傷寒煩熱。淋瀝邪氣。疝瘕。喉痹。散結清火。潤肺。化燥痰。

蘆根甘和胃寒降火。治噎噎反胃。客熱消渴。傷寒煩熱。止小便數。解魚蟹毒。

萊菔子辛溫。長於利氣。生用能吐風痰。散風寒。發瘡。炒熱能定咳嗽。痰喘。壅下痢後重。止內痛。消食。除膨。虛弱者忌。

淡豆豉苦泄。肺寒勝熱。發汗解肌。調中下氣。治傷寒寒熱。頭痛。煩燥。滿悶。發班。嘔逆。血癩。溫瘧。瘴疫。等氣。

金銀花甘平。陰熱解毒。補虛療風。養血止渴。除痢。寬膨。治瘡。疔等一切惡毒。

鉤藤鈎甘微苦寒。除心熱。平肝風。舒筋除眩。下氣寬中。治大頭。旋目眩。小兒驚啼。瘕癥。

龍胆草大苦大寒。沉陰下行。入肝膽而瀉火。聚入膀胱。腎經。陰下焦之濕熱。與防已同功。

甘菊花甘苦微寒。祛風熱。益肺腎。制心火。肝木。明目。治目淚。頭眩。散濕。鼻游風。

旋覆花苦辛能下氣。行水。賊擊。堅微溫。通血脈。入肺大腸。經消痰。結堅。瘕吐。如膠。漁。

牛蒡子氣味辛平無毒。主明目。補中。除風。傷風。毒腫。諸癩。潤肺。散氣。利咽。膈。去皮膚風。通十二經。消斑疹毒。

大豆黃卷氣味甘平。除胃中積熱。消水病。脹滿。破婦人惡血。療濕痹。筋膝。膝痛。

丸散列方

手拈散。治血滯心腹作痛。

醋炒元胡索。醋炒五靈脂。草果。沒藥。各等分。

神佑丸。治沉積變病。氣血壅滯。濕熱風痰鬱結。

黑丑二兩。大黃一兩。荒花。大戟。甘遂。各五錢。輕粉一錢。

右爲末。用皂角去子煎濃湯糊丸。每服心瀉。勿可輕用。

擗鼻散。治一切悶症。不省人事。吹入鼻中有嚏者生。

皂角一兩。生半夏五錢。細辛一兩。

右爲細末。入磁瓶勿泄氣。

牛黃丸。治中風痰火閉結。或喘嗽痰壅。不省人事。

牛黃射香。龍腦以上各六錢。另研羚羊角。常歸。防風。黃芩。柴胡。白朮。麥冬。白芍各七錢半。桔梗。茯苓。杏仁。川芎。大豆。

黃卷。阿膠各八錢半。蒲黃。人參。神精各一兩二錢五分。雄黃四錢。另研甘草二兩三錢。白斂。肉桂各三錢七分。大棗。

五十枚。金箔一百五十片爲衣。右爲細末。煉蜜同棗膏丸。每兩作十九丸。金箔爲衣。

消暑丸。治中暑昏悶。

製半夏四兩。茯苓。甘草各二兩。共爲末。生薑汁糊丸。

止嗽散。治一切咳嗽。

桔梗。荆芥。紫苑。百部。白前各二斤。甘草炒十二兩。陳皮一斤。共爲末。每服三錢。初感風寒。生薑湯下。

鱖魚丸。治久咳將成勞瘵。

川貝母。知母。前胡。柴胡。杏仁各四錢。大鱖魚一個。重十二兩以上者。右藥與魚同煮。熟取肉。連汁食之。將鱖渣焙乾。

爲末。煮魚骨汁爲丸。如桐子大。麥冬湯下。日三服。

月華丸。滋陰保肺平肝。爲治勞之聖藥。

天冬。麥冬。生地。熟地。山藥。百部。沙參。川貝。真阿膠各一兩。茯苓。獾肝。廣三七各五錢。用菊花二兩。桑葉二兩。熬膏。將。

阿膠化入和棗煉蜜爲丸。日三服。每服一九。

百藥煎散。治咽痛。

百藥煎五錢。礪砂一錢五分。甘草二錢。共爲末米飲調下。

通音煎。治音啞。

白蜜一斤。川貝二斤。款冬花二兩。胡桃肉十二兩。去皮研爛。

右將川貝款冬花爲末。四味和勻飯上蒸熟開水服下。

秘精丸。理脾導濕治瀉固精。

白朮山藥茯苓蓮子肉各二兩。芡實四兩。蓮花類牡蠣各一兩五錢。黃柏五錢。車前子三兩。共爲末金櫻膏爲丸。

補天大造丸。補五藏虛損。

人參二兩。黃芩黃耆蒸白朮各三兩。炒棗當歸山藥茯苓各一兩四錢。枸杞子大熟地各四兩。河車一具。鹿角一斤。

龜板八兩與鹿角共熬膏以龜鹿二膠和棗煉蜜爲丸。

治疫清涼散。治疫邪入裏脹悶譫狂諸症。

秦芎赤芍知母貝母連翹各一錢。荷葉七分。丹參五錢。柴胡錢半。人中黃二錢。

葛根治痢散。治痢初起赤白皆效。

葛根錢半。酒炒苦參八分。陳皮一錢。赤芍。陳松。羅茶。炒麥芽。查肉各一錢二分。

右爲細末煎服有火者加川連五分。

開噤散。治噤口痢。

人參。薑汁炒黃連各五分。石菖蒲七分。丹參三錢。石蓮子。茯苓。陳皮。冬瓜仁去壳各錢五分。陳米一撮。荷葉蒂三個。

和中丸。治腹脹食積。

土炒白朮四兩。炒扁豆三兩。茯苓。砂仁各一兩半。半夏薑汁炒一兩。麩炒枳實。炒神麩。炒麥芽。炒山查。薑汁炒香附。

酒蒸丹參各二兩。陳皮。五穀蟲炒焦黃色各三兩。

右爲、荷叶一枚煎水爲丸。

白朮丸 治氣虛中滿。

白朮茯苓陳皮各二兩。砂仁神柚各一兩五錢。五穀蟲四兩。用荷叶陳米煎水爲丸。

實驗神效方。

生地黃湯 治腎火燥金。

生地三錢。牛膝丹皮黑山梔各一錢。丹參元參麥冬白芍各一錢五分。鬱金廣三七荷叶各七分。加陳黑汁清童便各半杯冲服。

小半夏加茯苓湯 治飲停膈間。

葶製半夏白茯苓各三錢。蒼朮錢半。炙甘草一錢。

秦芫天麻湯 治寒濕入絡肩背痛。

秦芫錢半。天麻羌活陳皮當歸川芎各一錢。炙草五分。生薑三片。炒桑皮三錢。挾寒加桂枝。

錫痹湯 治風寒濕三氣成痹。

羌活獨活各一錢。桂心五分。秦芫一錢。當歸桑枝各三錢。川芎七分。海風藤二錢。炙甘草五分。乳香木香各八分。

治痢奇方 治暑痢。

川連六分。山查三錢。酒芩厚朴歸身白芍各一錢五分。甘草五分。桃仁青皮紅花各八分。枳壳地榆各一錢。柝榔一

錢二分。如白痢加木香六錢。

上瘧丹 治瘧二三發後以此止之。

火酒炒常山草果仁去壳。薑炒半夏稻酒炒香附。醋炒青皮各四兩。薑炒真六神稻二兩。爲末末飲糊丸。清晨面東服。

百病療治法 卷下

驥江劉藩校正

心部

心火熾。屬手少陰之脈。位南方。色現赤。胸下歧骨陷處其部位也。凡額上手足心。皆其所轄。賴血以養之。方能運慧思。用才智。詳前十二官。茲不贅述。

心無表症。皆屬于裏。其爲病也。虛實寒熱。四字盡之。

心虛見證

心之虛。血不足也。脈左寸必弱。其爲症也。有五。或驚悸。或不得臥。或健忘。或怔忡。或遺精。

驚悸者。惕惕然恐。神失守也。七福飲及秘旨安神丸主之。

不得臥者。思慮太過。神不藏也。歸脾湯安神定志丸主之。

健忘者。心腎不交。神明不充也。歸脾湯十補丸主之。

虛痛者。似鑽似肌。似手撫心。喜得手按。洋參麥冬湯主之。

遺精者。或有夢。或無夢。心腎不固也。清心丸十補丸主之。

心實見證

心之實。邪入之也。心不受邪。受邪則爲真心痛。且暮不保矣。凡有痛者。其所受之邪。皆胞絡耳。脈左寸必弦而大。其爲

症也。有九。或氣滯。或血痛。或停飲。或食脹。或痰迷。或暑閉。或蟲嚙。或疔痛。

氣滯者。氣壅攻刺而痛。游行不定也。或怒冲煩悶而痛。沉香降氣散主之。

血痛者。血凝於中。痛有定處。轉側若刀針刺。手拈散主之。

停飲者。乾嘔吐涎。或咳。或噎。而痛甚。則搖之作水聲。小半夏加茯苓湯主之。如有飲蕪。則倍蒼朮。名倒倉法。

食脹者。傷于飲食。心胸脹悶。手不可按。或吞酸。噯腐。而痛。保和湯主之。

痰迷者。頑痰壅閉。不省人事。清腸煎灌之。

暑閉者。汗喘昏悶。先以消暑丸灌之。再用香薷飲。加益元散。

蟲嚙者。飢時作痛。面白唇紅。或唇之上下有斑點。或口吐白沫。飢時更甚。化蟲丸主之。

疰痛者。觸冒邪祟。卒爾心痛。面目青黑。或昏情譫語。脈來乍大乍小。或兩手如出二人。神尤散。葱白酒。生薑湯主之。

心寒見證

心之寒。脈左寸必遲。其為病也。為暴痛。

暴痛者。其痛暴發。四肢厥冷。口鼻氣冷。喜熱畏寒。其痛綿綿不休。薑附湯加肉桂主之。

心熱見證

心之熱。火迫之也。脈左寸必數。舌尖赤唇焦。喜冷畏熱。其為病也。有八。或目痛。或重舌木舌。或煩燥。或不得臥。或癡狂。

或譫語。或赤濁。或尿血。

目痛者。赤腫壅明。導赤散。加連翹。菊花。蟬脫主之。

重舌木舌者。瀉心丸主之。

煩躁者。瀉心丸。加竹捲。心主之。

不得臥者。暑熱乘心也。導赤散。加益元散主之。

癡狂者。棄衣罵詈。生鐵落飲主之。

譫語者。邪熱攻心。瀉心丸主之。

赤濁者。草薢分清飲。加燈心。丹參主之。

尿血者。阿膠散主之。

北五味

補心猛將藥

補心次將藥

棗仁。柏子仁。遠志。丹參。龍眼。麥冬。當歸。白芍。茯神。

瀉心猛將

石菖蒲。苦連木。通礫砂。犀角。

瀉心次將

山梔仁。連翹心。通草。車前子。竹捲心。燈心。蓮子心。

心部列方

七福飲。治心血虛而驚悸者。

人參。熟地。各三錢。當歸。棗仁。各二錢。炒白朮。一錢五分。炙甘草。二錢。遠志。五分。

秘旨安神丸。治驚悸神魂失守者。

人參。棗仁。茯神。製半夏。各二錢。當歸。炒白芍。橘紅。各錢五分。五味子。十粒。炙草。五分。生薑。三片。

安神定志丸。治心惕不臥。

茯苓。蒸。人參。遠志。各一錢。石菖蒲。龍齒。各五錢。蜜爲丸。以辰砂爲衣。每服二錢。

十補丸。治氣血大虧之症。

黃芪。白朮。黃肉。杜仲。續斷。棗仁。各一兩。大熟地。三兩。人參。當歸。白芍。遠志。各一兩。茯苓。山藥。各一兩五錢。北五味。龍

骨。牡蠣。各七錢五分。

洋參麥冬湯。治心經虛熱而痛者。

洋參。麥冬。當歸。各二錢。生地。三錢。白芍。丹參。釵石斛。各錢五分。犀角。甘草。各五分。

保和湯。治傷食心痛。

麥芽。山楂。萊菔子。厚朴。香附。各一錢。甘草。連翹。各五分。陳皮。一錢五分。

清心丸。清心火止夢泄。

生地。四兩。丹參。二兩。黃柏。五錢。牡蠣。山藥。砂棗仁。茯苓。茯神。麥冬。各一兩五錢。北五味。車前子。遠志。各一兩。用金櫻

膠爲丸每服三錢。

沉香降氣散 治心滯氣痛。

沉香三錢。砂仁七錢。炙甘草五錢。鹽水炒香附五兩。酒炒元胡索一兩。煨洗川棟子一兩。共爲末。每服二錢。淡薑湯下。

青膈煎 治痰壅心膈。

製胆星一錢。白芥子二錢。海浮白二錢。陳皮。木通。川貝各一錢。

化蟲丸 治蟲積心腹諸症。

蕪荑。白雷丸各五錢。抵櫛二錢五分。雄黃一錢五分。木香。白朮。陳皮各三錢。炒神油四錢。以百部二兩熬膏糊丸。每服一錢五分。米飲下。

薯附湯 治寒厥心痛。又真心痛。手足青至肘。宜用本方大劑飲之。或救十中之一二。痛而喜按者。加人參。

乾薑。熟附子各二錢。水煎服。

瀉心丸 治心火。

川連五錢爲末。燈草湯下。

生鐵落飲 治心熱。

天冬。麥冬。川貝各三錢。胆星。橘紅各一錢。遠志。石菖蒲。連翹。茯苓。茯神各一錢。元參。鈎藤。丹參各錢五分。辰砂三錢。

用生鐵落煎熬三炷線香時。取此水煎服。

阿膠散 治尿血。

阿膠一錢。丹參。生地各二錢。黑山梔。血餘。丹皮。麥冬。當歸各八分。

手拈散(以下俱見前卷) 小半夏加茯苓湯。消暑丸。香薷飲。益元散。葶藶分清飲。導赤散。歸脾湯。

肝部

肝木臟。屬足厥陰之脈。與膽相附。位東方。其性剛。賴血以養。自兩脅以下。及小腹陰囊之地。皆其部位。最易動氣。其風又能上至顛頂而痛于頭。色屬青。常現於左額。目眇於婦人爲尤甚。詳前十二官。茲不贅述。

肝無表症皆屬于裏其爲病也寒熱虛實四字盡之

肝虛見證

肝之虛。腎水不能涵木。而血少也。脈左寸必弱。或空大。其見證也。有七。或脇痛。或頭眩。或目乾。或眉棱。或骨。或眼眶痛。或心悸。或口渴。或煩躁發熱。

脇痛者。血不營筋也。四物湯主之。

頭眩者。血虛風動也。逍遙散主之。

目乾者。水不養木也。六味地黃丸主之。

眉棱眼骨痛者。肝血虛。見光則痛。逍遙散主之。

心悸者。血少而虛火煽也。七福飲主之。

口渴者。血虛液燥也。甘露飲主之。

煩躁發熱者。虛火元也。六味地黃丸主之。

肝實見證

肝之實。氣與內風充之也。脈左關必弦而洪。其見證也。有十。或左脇痛。或頭痛。或腹痛。或小腹痛。或積聚。或疝氣。或咳嗽。或泄瀉。或嘔吐。或呃逆。

左脇痛者。肝氣不和也。柴胡疎肝散。瓜蒌散。並主之。

頭痛者。風熱也。清空膏主之。或柴胡疎肝散。

腹痛者。肝木乘脾也。芍藥甘草湯主之。

小腹痛者。癥瘕之氣聚也。奔豚丸主之。有熱者去桂附。

積聚者。肝積在左脇下。名曰肥氣。和中丸。加柴胡。鱉甲。青皮。莪朮主之。

疝氣者。氣結聚于下也。橘核丸主之。寒則加吳茱萸。肉桂。

咳嗽者。木火刑金也。止咳散。加柴胡。枳殼。赤芍主之。

泄瀉者木旺尅土也。四君子湯加柴胡。木香主之。
嘔吐者木火凌胃也。二陳湯加炒黃連主之。
呃逆者氣鬱火衝也。瀉皮竹茹湯主之。

肝寒見證

肝之寒。脈左關必沉澀。其見證也。有四。或小腹痛。或疝瘕。或囊縮。或寒熱往來。
小腹痛者。寒結下焦也。燒肝煎。奔豚丸主之。
疝瘕者。寒氣結聚也。楸核丸。加吳茱萸。肉桂主之。
囊縮者。寒主斂。故縮也。奔豚丸。四逆湯主之。
寒熱往來者。欲化癥也。小柴胡湯主之。

肝熱見證

肝之熱。脈左關必弦數。其見證也。有九。或眩暈。或目赤腫痛。或口苦。或消渴。或頭痛。或脇痛。或癢。或臨耳。或筋痿拘攣。或氣上衝心。或傷墜。或舌捲。或縮。或小便不禁。

眩暈者。風熱上升也。消遙散主之。

目赤腫痛者。風火入目也。蠅花無比散主之。

口苦者。膽味苦。肝熱膽亦熱也。小柴胡湯主之。

消渴者。風燥其液也。一柴胡飲主之。

脇痛者。肝火鬱也。柴胡疏肝散。加瓜蒌霜主之。兼服逍遙散。

癢者。血燥筋急而生也。消癩丸主之。兼服逍遙散。

臨耳者。風熱相搏。津液凝聚而癢痛也。逍遙散去白朮。加荷葉。木耳。貝母。香附。菖蒲主之。

氣上衝心者。火逆也。柴芩煎主之。甚則小承氣湯。

偏墜者。熱而暴。九針縱也。柴胡疏肝散主之。

舌捲鼻縮者。火入厥陰。血閉也。大承氣湯主之。
小便不禁者。肝氣鬱陰。挺失職也。消遙散主之。

補肝猛將藥

枸杞北五味烏梅

補肝次將藥

山茱萸。兔絲子。首烏。當歸。白芍。沙苑。蒺藜。鱉甲。龍骨。牡蠣。木瓜。

瀉肝猛將藥

鬱金。桃仁。青皮。莪朮。沉香。

瀉肝次將藥

香附。木香。延胡索。柴胡。山梔。川芎。川楝子。赤芍藥。瓜蒌殼。勾藤。白蒺藜。陳佛手。

涼肝猛將藥

龍胆草。胡黃連。

涼肝次將藥

羚羊角。夏枯草。石決明。青葙。菊花。

濕肝猛將藥

肉桂。桂枝。吳茱萸。細辛。胡椒。骨碎補。

濕肝次將藥

兔絲子。艾叶。山茱萸。茴香。

肝部列方

柴胡疎肝散。治肝氣左脇痛。

柴胡。陳皮。各錢三分。川芎。赤芍。枳殼。醋炒。香附。各一錢。炙草五分。

瓜蒌散。治肝氣燥急而脹痛。

大瓜蒌一枚連皮搗甘草二錢。紅花四分。水煎服。

青空膏。治肝經風熱上升為頭痛。

羌活防風各六分。柴胡五分。黃芩一錢二分。川芎四分。炙草一錢。薄荷三分。酒炒黃連六分。

奔豚丸。治小腹氣結作痛。

川棟子一錢。茯苓。橘核各一兩五錢。肉桂三錢。小茴香。木香各七錢。附子。吳茱萸各五錢。荔枝核八分。

橘核丸。通治七疝。

鹽酒炒橘核二錢。小茴香。川棟子。桃仁。醋炒香附。山查各一兩。木香。紅花各五錢。以神油三兩打糊為丸。

橘皮竹茹湯。治氣鬱火衝呃逆。

陳皮二錢。竹茹一團。半夏。人參。甘草各一錢。

煖肝煎。治肝腎陰寒小腹疼痛疝氣。

當歸。枸杞各三錢。茯苓。小茴香。烏藥各二錢。肉桂。沉香各一錢。生薑三片。

蟬花無比散。治目赤腫痛。

蟬脫二兩。羌活一兩。川芎。石決明。防風。茯苓各一兩五錢。赤芍一兩半。白茯苓八兩。炙甘草。當歸各三兩。米泔浸養。

亦一兩。為末開水服。

一柴胡飲。治外有邪而內有火肝燥胃滯。

生地三錢。白芍二錢。黃芩。錢半。柴胡八分。陳皮八分。甘草五分。

柴杏煎。治內火上衝或為癩瘡頭痛諸症。

柴胡二錢。黃芩。梔子。澤瀉各錢半。木通。枳殼各一錢。

左金丸。治肝氣痛。

川黃連一錢。吳茱萸七分。

消瘰丸。治瘰癧初起即散。久服亦消。

蒸元參。醋煨牡蠣。蒸川貝母各四兩。蜜爲丸。每服三錢。

五癆湯。治五臟受熱而痿。

人參。白朮。茯苓各一錢。炙甘草四分。當歸一錢。半。苡仁三錢。麥冬二錢。黃柏。知母各五分。

甘露飲。以下俱見前卷中。芍藥。甘草湯。二陳湯。四物湯。

逍遙散。六味地黃湯。和中丸。止咳散。四君子湯。

小柴胡湯。四逆湯。大承氣湯。七福飲。見心部方。

脾部

脾土。中央黃色。屬足太陰之脈。後天之本也。下受命門之火。以蒸化穀食。上輸穀食之液。以灌溉臟腑。故人生存活之原。獨脾土之功爲最大。然其性喜燥而惡濕。一受濕清則土力衰。而肝木卽乘以侮之位。中焦眼胞鼻準及四肢。皆其分野。與胃相表裏。故其藥略同。詳前十二官。茲不贅述。脾無表症。皆屬于裏。其爲病也。寒熱虛實四字盡之。

脾虛見證

脾之虛。虛。虛。虛。必細軟。其見證也。十之有六。或嘔吐。或泄瀉。或久痢。或腹痛。或肢軟。或面黃。或發腫。或肌瘦。或鼓脹。或惡寒。或自汗。或喘。或積滯不消。或飲食化痰。或脫肛。或腸血。嘔吐者。中空也。六君子湯主之。

泄瀉者。土不勝濕也。五味異功散。加木香主之。

久痢者。氣虛下陷也。補中益氣湯主之。

腸痛者。肝木乘脾也。芍藥甘草湯。加木香主之。

肢軟者。脾屬四肢也。五味異功散主之。

面黃者。本色虛現也。六君子湯主之。

發腫者。皮不亮。手按成窟。補中益氣湯。去升柴主之。

飢瘦者。脾主肌肉也。十全大補湯主之。

鼓脹者。中空氣虛也。六君子湯主之。

惡寒者。陽虛不達于表也。附子理中湯主之。

自汗者。脾主肌肉。表虛不攝也。五味異功散加黃芪。五味主之。

喘者。土不勝金也。五味異功散加北五味。牛膝主之。

積滯不消者。化穀無力也。六君子湯加穀芽。砂仁。肉桂主之。

飲食化痰者。土不勝濕也。六君子湯主之。

腸血者。脾不統血也。歸芍六君子湯主之。

脾胃見證

脾之實。厥右關必洪實。其見證有九。或氣積。或血積。或食積。或痞積。或蟲積。或痰飲。或蠱脹。或腹痛。或不能食。

氣積者。氣鬱發悶也。沉香降氣丸主之。

血積者。蓄血作痛如刺。有定處也。澤蘭湯主之。

食積者。堅滯脹滿也。大和中飲主之。

痞積者。血滯或痞積。癢癢可按也。大無神功散。和中丸主之。

蟲積者。濕熱所化也。唇內有白點。化蟲丸主之。

痰飲者。或停心下。伏兩腋有聲。咳則痛。小半夏加茯苓湯主之。

蠱脹者。中實有物。非蟲卽血也。和中丸主之。

腹痛者。中有滯也。香砂二陳湯。和查芽厚朴主之。

不能食者。食味消也。保和丸主之。

脾寒見證

脾之寒。脈右關必沉遲。唇舌必白。其見證也有九。或嘔吐。或泄瀉。或白痢。或腹痛。或身痛。或黃疸。或濕腫。或肢冷。或厥。

脫。

嘔吐者食不消而反胃也。平胃散主之。

泄瀉者土失職也。六君子湯加泡薑主之。

白痢者積寒傷氣也。六君子湯加木香主之。

腹痛者綿綿不減香砂理中湯主之。如挾食拒按木香丸。

身痛者拘急為風重墜為濕。風用香蘇散。濕用蒼白二陳湯。

黃疸者土氣濕制有陰寒之象。薰黃色歸陳五苓散主之。

濕腫者不煩渴喜燒五苓散主之。

肢冷者陽氣不管子四末也。附子理中湯主之。

厥脫者氣衰火息也。附子理中湯加入參主之。

脾熱見證

脾之熱厥右關必數舌苔薄而黃唇赤其見證也。有十。或熱吐。或流涎。或洞泄。或瀉痢。或赤痢。或腹痛。或目胞腫痛。或酒疸。或眩暈。或陽黃疸。

熱吐者食不得入也。橘皮竹茹湯加薑汁炒黃連主之。

流涎者睡中出沫脾熱蒸濕黃芩芍藥湯主之。

洞泄者暑濕勝土一泄如注也。四苓散加益元散主之。

瀉痢者暑熱內搏利如蟹溺將變痢也。黃芩芍藥湯主之。

赤痢者暑熱傷血也。治痢奇方主之。或葛根治痢藥。則開雲散。腹痛者乍作乍止。芍藥甘草湯加黃連清之。

目胞腫痛者火上升也。柴芩煎主之。

酒疸者酒濕積而為疸也。加味枳朮湯加茵陳。葛根主之。

眩暈者酒濕生熱上蒸也。葛花清脾湯主之。

陽黃疸。黃如橘皮。有光。目溺皆黃。梔子蘗皮湯主之。如便閉。茵陳大黃湯。

補脾狂將藥

白朮黃精

補脾次將藥

山萸扁豆苡仁大棗炙甘草

瀉脾狂將藥

枳實萊菔子

瀉脾次將藥

神糲麥芽山查枳殼厚朴大腹皮使君子白芷羯內金陳皮檳榔

涼脾狂將藥

大黃黃芩瓜蒌霜

涼脾次將藥

黃柏山梔知母銀花武荊茶

溫脾狂將藥

附子藟菔巴豆肉豆蔻草果蒼朮胡椒

溫脾次將藥

木香煨薑烏藥益智仁藿香砂仁白蔻仁蕪荑焦穀芽川椒

歸芍六君子湯 治脾陰虛弱下血

歸身白芍各二錢人參白朮茯苓各錢五分陳皮半夏各一錢炙草五分

大和中湯 治食積脹悶

枳實一錢厚朴一錢五分麥芽查炭陳皮各一錢砂仁八分澤瀉一錢

大無神功散。治一切瘡積。

地扁蓄、瞿麥、穗麥、葶各五分。神糶二錢半。沉香、木香各錢半。炙草五錢。酒蒸大黃二兩。共爲末。每服二三錢。燈心、竹

葉湯下。女人紅花當歸湯下。

香砂二陳湯。治脾滯腹痛。

木香、砂仁各一錢。製半夏、陳皮、茯苓、炙草各錢五分。加生薑一枚。棗二枚。

蒼白二陳湯。治受濕身痛。

即前方去木香、砂仁。加蒼朮、白朮各一錢。

保和丸。治傷食。

麥芽、山楂、萊菔子、厚朴、香附各一錢。炙甘草、連翹各五分。陳皮一錢半。水煎服亦可。

香砂理中湯。治脾寒腹痛。

木香、砂仁各一錢。人參、白朮各二錢。乾薑、炙草各一錢。

木香丸。治寒積腹痛。拒按。名曰陰結。

木香、丁香各一錢。五分。乾薑三錢。炒麥芽五錢。陳皮三錢。巴豆三十粒。以神糶煮糊爲丸。每服十丸。

加味枳實湯。治酒疸濕熱發黃。

白朮二錢。枳實、陳皮、麥芽、山楂、茯苓、神糶、連翹各一錢。茵陳、荷葉各一錢。五分。澤瀉五分。如傷酒加葛根一錢。

葛花清脾湯。治濕生熱。生痰。頭眩頭痛。

葛花一錢。枳實、白朮各三錢。赤苓三錢。澤瀉、茵陳、酒苓各二錢。山梔、車前子各一錢。半。甘草五分。橘紅、厚朴各一錢。

梔子蘘盧湯。治鬱熱在裏。面發黃。疸名曰陽黃。

梔子三錢。黃柏二錢。炙草一錢。

六君子湯。附子理中湯。補中益氣湯。五味異功散。五苓散。香蘇散。十全大補湯。小半夏加茯苓湯。澤蘭湯。平胃散。茵

陳五苓散。益元散。和中丸。葛根治痢散。治痢奇方。開噤散。沉香降氣丸。化蟲丸。芍藥甘草湯。橘皮竹茹湯。麥煎。

以上諸方俱見前卷

肺部

肺主氣。金臟。位西方。而色白。屬手太陰之脈。其形如華蓋。爲諸陽之首。凡聲之出入。氣之呼吸。自肺司之。其性嬌嫩。故與火爲仇。而畏燥。渴寒亦咳。凡目白及右頰鼻孔。皆其分野。然肺氣之衰旺。關乎壽命之短長。全恃腎水充足。不使虛火鑠金。則長保清寧之體。而壽臻永固。

肺有表症。有表症。肺主皮毛。故也。其爲病也。表裏虛實寒熱六字。盡之。

肺表見證

肺主皮毛。邪在表。脈右寸必浮。其見證也。十之一。或發熱。或噴嚏。或鼻塞。或爲咳。或爲嗽。或畏風。或胸滿痛。或喉癢。或鼻燥。或傳暑風。或中時疫發熱者。膜理閉也。香蘇散主之。

噴嚏鼻塞者。肺受邪也。二陳湯加蘇叶生薑主之。

咳者無痰而有聲。氣爲邪。渴也。桔梗前胡湯主之。

嗽者有聲而有痰。液已化痰也。止咳散主之。

喘者風寒閉塞也。加味甘桔湯主之。

畏風者邪在皮毛也。香蘇散主之。

胸滿痛者氣鬱而脹也。加味甘桔湯主之。

喉痛者邪化火而內烙也。加味甘桔湯主之。

鼻燥者邪化火而液乾也。貝母瓜蒌散主之。

傷暑風者惡寒頭痛而煩渴。香薷散加荆芥薄荷主之。

中時疫者初頭痛發熱。漸嘔嘔胸滿。或脹悶譫狂。唇焦口渴。先用香蘇散。次神亦散。又治疫清涼散。便閉加大黃。

肺虛見證

肺之虛。脈右寸必細。其見證也。有六。或自汗。或咳嗽。或氣急。或咯血。或肺痿。或虛勞。

自汗者氣虛表不固也。八珍湯加黃芪。北五味。麥冬。主之。
咳嗽者肺虛不寧也。五味異功散主之。

氣急者金不生水而虛火上炎也。知柏八味丸主之。

咯血者陰虛火動也。初用四生丸。兼用生地黃湯。

肺痿者火刑金而吐焦也。五痿湯加天冬。百合主之。或紫菀散。人參燕窩百合湯亦可。
虛勞者吐血而成月華丸。歸脾湯。六味地黃湯。主之。

肺實見證

肺之實。脈右寸必有力。其見證也。有九。或氣閉。或痰閉。或暑閉。或水閉。發喘。或風閉。或火閉。或咽痛。或右脇痛。或肺癆。

痰閉者。頑痰。寒。清膈湯主之。

暑閉者。暑邪中肺而煩渴也。清暑丸加香薷。木通。主之。

水閉發喘者。行經蓄水作腫而侵肺也。五皮飲主之。

風閉者。風感于肺而喘脹也。白虎湯加桑皮。葶藶。主之。

咽痛者。諸閉皆能作火也。加味甘桔湯主之。

右脇痛者。肝移邪于肺也。推氣散主之。

肺癆者。隱隱而痛。吐痰腥臭也。桔梗湯主之。

肺寒見證

肺之寒。外感居多。脈右寸必虛。其見證也。有四。或清涕。或咳嗽。或惡寒。或面色痿白。

清涕者。寒搏其液也。二陳湯加蘇梗。主之。

咳嗽者。金畏寒也。止嗽散主之。

惡寒者。陰忌其類也。香蘇散主之。

面色痿白者。寒傷正氣也。六君子湯主之。

肺熱見證

肺之熱。脈右寸必數。其見證也。有九。或目赤。或鼻衄。成咽痛。或吐血。或咳嗽。濃痰。或酒積。或龜胸。或小便利。或便血。

目赤者。火冠金也。瀉白散。加黃芩。菊花。連翹。主之。

鼻衄者。血熱妄行也。會根湯。主之。

咽痛者。火逼咽道也。加味甘桔湯。主之。

吐血者。火動其血也。四生散。犀角地黃湯。主之。

酒積者。鼻赤。鼻瘡。濕熱內蒸也。黃芩清肺飲。加葛花湯。主之。

龜胸者。肺熱而脹也。白虎湯。主之。

小便不利者。火鑠金。而化源窒也。黃芩清肺飲。加鹽豉連之。

便血者。肺與大腸相表裏。火迫血行也。芍藥甘草湯。加黃芩。丹皮。生地。主之。

補肺狂將藥

黃玟人參

補肺次將藥

黨參。沙參。百合。燕窩。阿膠。懷山。寧。訶子。麥冬。冰糖。

瀉肺狂將藥

葶藶。麻黃。白芥子。桔梗。升麻。膽星。

瀉肺次將藥

蘇子。牛蒡。杏仁。前胡。紫苑。桑白皮。驪蠶。竹茹。貝母。

涼肺狂將藥

石膏。黃芩。竹瀝。馬兜鈴。山茹。菇。

涼肺次將藥。

洋參。元參。山椒。花粉。天冬。地骨皮。知母。麥冬。薄荷。海石。

溫肺猛將藥。

麻黃。南天星。北五味。

溫肺次將藥。

蘇梗。款冬花。製半夏。生薑。

肺部列方

桔梗前胡湯。治肺氣閉塞悶咳。

桔梗一錢。前胡。蘇子。赤芍。蜜炙桑白皮。陳皮各一錢半。杏仁三錢。薑汁炒。竹茹一錢。生甘草五分。

加味甘桔湯。治肝鬱哮喘等症。

甘草五分。桔梗。川貝。百部。白前。橘紅。蒴覆花。茯苓各一錢半。

貝母瓜蒌散。治肺熱液乾。

貝母二錢。瓜蒌仁。錢半。膽星。黑山梔各五分。黃芩。橘紅。炒黃連各一錢。

紫苑散。潤肺止咳並治肺癆。

人參一錢。紫苑。知母。川貝。桔梗。湯茯苓。阿膠各一錢。五味子。炙草各三分。

人參燕窩百合。潤肺清金。

人參一錢。如無力以洋參。沙參。二三錢代之。燕窩五錢。百合五分。大棗二枚。

桔梗湯。治肺癰。

桔梗。白芍。橘紅。砂。甜葶。麻各六分。甘草。貝母各一錢半。苡仁。金銀花各五錢。

茜根湯。治衄血神煩。

茜根。黃芩。阿膠。側柏葉。生地各二錢。甘草一錢。

黃芩知母湯 治火嗽煩熱

黃芩知母桑白皮杏仁天花粉山梔川貝桔梗生甘草各一錢

黃芩清肺飲 治肺熱小便不利

梔子二錢黃芩一錢

瀉白散犀角地黃湯香蘇散止嗽散香薷飲神朮散八珍湯治疫清涼散五味異功散

生地黃湯月華丸六味地黃湯消暑丸五皮飲疏黃湯六君子湯四生丸白虎湯歸脾湯清腸煎二陳湯五痿湯芍

藥甘草湯以上諸方俱見前卷

腎部

腎水藏屬足少陰之脈天一之水先天之本也位北方色現黑其體常虛處腰左右介其中者有命門火蒸化穀食名曰真陽腎水充足自多生育享大壽凡宿夜宣勞者而不倦者皆腎氣之固也好色之流先竭腎水喪其本矣瞳神下類兩腰皆其部位望氣者視之

腎無實症無表症皆屬于裏其為病也虛寒熱三字盡之

腎虛見證

腎主虛虛左右尺常細軟其見證也十之有六或頭痛或耳鳴或耳聾或盜汗或夜熱或健忘或咳嗽或喘痛或吐血或腰痛或腿痠足軟或目視無光或大便結或小便不禁或戴陽或久痢久瘧

頭痛者血不能充髓海也六味地黃丸主之

耳者腎血虛火旺也六味地黃丸加牛膝知母主之

耳聾者虛閉也六味地黃丸加枸杞人參石菖蒲遠志主之

盜汗者虛熱也生地黃煎八珍湯加黃耆北五味主之

夜熱者虛火也四物湯加丹皮地骨青蒿主之

健忘者心腎不交也歸脾湯十補丸主之

咳嗽者。虛火燻金也。六味地黃丸。加白蜜。胡桃主之。
喘者。水虧火炎也。知柏八味丸主之。
吐血者。血虛血熱也。生地黃湯主之。
腰痛者。水不足也。六味地黃丸。加杜仲。川續斷主之。
腿痿足軟者。血不營經也。十全大補湯主之。
目視無光者。水不足也。六味地黃丸主之。
大便結者。血虛液枯也。六味地黃丸。加白蜜。胡桃主之。
小便不禁者。腎氣不約也。十補湯主之。
戴陽者。陰上亢。陰燥似濕燥也。金匱腎氣丸主之。
久痢久瘕者。脾腎皆虛也。王母桃主之。

腎寒見證

腎之寒。腎之虛也。脉左右尺必遲沉。其見證也。有六。或命門火衰。或不欲食。或鷄鳴泄瀉。或天柱骨倒。或蹠臥厥冷。或

奔豚。

命門火衰者。虛象百出。左歸飲。右歸飲主之。

不欲食者。火力微也。八味地黃丸主之。

鷄鳴泄瀉者。腎虛也。加味七神丸主之。

天柱骨倒者。督脉空也。右歸飲主之。

蹠臥厥冷者。火衰也。右歸飲理中湯主之。

奔豚者。腎氣上衝也。奔豚丸主之。

腎熱見證

腎之熱。水將涸也。傷寒門有之。而雜症罕見。脉左右尺必沉數。或浮而空。舌黑無液。其見證也。有六。或口燥咽乾。或目

不明。或小便不利。或小便濁。或小便出血。或大便閉。口燥咽乾。青水瀉也。大承氣湯主之。

目不明者。目無血養也。知柏八味丸主之。

小便不利者。水少也。滋腎丸主之。

小便濁者。濕熱結於下焦也。草薢分清飲主之。

小便出血者。腎水熱也。生地黃湯主之。

大便閉者。液涸也。大承氣湯主之。

補腎猛將藥

熟地。枸杞。淫羊藿。北五味。

補腎次將藥

生地。巴戟。天首。烏杜。伸龜。板女。貞。穆。豆。衣。海。參。

瀉腎猛將藥

猪苓。

瀉腎次將藥

澤瀉。知母。赤苓。苡仁。

涼腎猛將藥

朴硝。元明粉。苦參。

涼腎次將藥

生地。丹皮。知母。滑石。

溫腎猛將藥

破故紙。鹿茸。鹿角膠。

溫腎次將轉

山茱萸、兔絲子、大茴香、艾葉。

腎部列方

生地黃煎。治陰火盜汗。

生地當歸、炙黃芩、黃連、浮小麥、炙甘草、黃連、黃芩、黃柏各一錢。水煎服。

王母桃培補腎。

炒冬白朮、大熟地各二兩、何首烏、炒巴戟、枸杞子各一兩。共為細末。煉蜜為丸。如圓服。大每三四丸。飢時服。

左歸飲壯水之煎。

熟地五錢、山藥、枸杞各二錢、茯苓一錢五分、山茱萸、炙甘草各一錢。

右歸飲補命門真火不足。

熟地五錢、山藥、枸杞、杜仲各二錢、山茱萸、肉桂、製附子、炙甘草各一錢。

八味地黃丸。治命門火衰。

製附子、肉桂各一錢、大熟地四錢、山藥、黃肉、茯苓各一錢五分、丹皮、澤瀉各一錢。

加味七神丸。治腎虛鷄鳴泄。

肉豆蔻、吳茱萸、黃廣木、香各一兩、蒸茯苓、鹽酒炒、補骨脂、車前子、蒸各二兩、土炒白朮四兩、大棗煎湯為丸。每服三錢。

滋腎丸。治下焦血熱用此。滋陰化氣。

黃柏、知母各二兩、肉桂一錢、煉蜜為小丸。

六味地黃湯、八珍湯、四物湯、十全大補湯、歸脾湯、生地黃湯、金匱腎氣丸、理中湯、大承氣湯、十補丸、葶藶分清飲、奔豚丸、知柏八味丸（以上諸方具見前卷）。

胃部

胃屬腑。為足陽明之脈。位中土。色現黃。司受化穀食。經云。得穀者昌。失穀則亡。其能受與否。生死係焉。性與脾同。而畏

木侮。舌之中及牙牀環口唇而交人中。皆其分野。詳前十二官。茲不贅述。
胃屬陽明。有經有腑。故有表症。其為病也。表虛實寒熱五字盡之。

胃表見證

邪在胃之表。脉之關必浮。其見證有三。傷寒邪入陽明經。為目痛鼻乾。唇焦。嗽水不欲嚥。若他表症。為面目浮腫而痛。

或癢疹。

目痛鼻乾。唇焦。嗽水不欲嚥者。邪熱作火也。葛根湯主之。
面浮腫而痛者。風也。葛根湯主之。

癢疹者。邪熱所化也。葛根湯加牛蒡子主之。

胃虛見證

胃之虛。其標必白。脉右關必軟弱。其見證也。有八。或吐。或噎膈。或不能食。或胃脘痛。或停滯。或腹脹。為痰。或嘔逆。
吐者。土虛木侮也。香砂六君子湯加柴胡主之。

噎膈者。胃脘乾槁也。上脘槁能飲水而食難進。下脘槁食可久而久復出。噎膈散主之。佐以四君子湯。有痰則消痰散。
不能食者。胃氣虛而難受也。六君子湯主之。

胃脘痛者。心忪怔忡。喜按。歸脾湯。或四君子加柴胡。麝香。
停滯者。土虛不化也。枳朮丸主之。

濕滯者。土不勝其也。香砂六君子湯主之。
痰者。土衰濕化也。六君子湯主之。

嘈雜者。躁擾不寧。得食暫已。氣促食少。中挾痰也。五味異功散主之。

胃實見證

胃之實。脉右關必洪。按胸則痛。其見症也。有十。或結胸。或痞氣。或食積。或痰飲。或水腫。或胸脹悶。或胸脹痛。或胸痛嘔。
或不得臥。或便閉。或譫語發狂。

結胸者。傷寒下早。邪熱結聚也。大小陷胸湯主之。
痞氣者。脾之積在胃脘。腹大如盤。和中丸加厚朴主之。

痰飲者。咳則氣轉。側有聲。小半夏加茯苓湯主之。外臺茯苓飲尤效。

水腫者。先腫脛。或腫而不喘。胃經蓄水也。五皮飲主之。甚則金匱腎氣丸。

胸脹閉者。黃芩湯也。保和丸主之。

胸脹痛者。蓄血也。濕胸湯主之。

胸痛噎膈者。胃脘癰也。不必治而自愈。

不得臥者。胃不和則臥不安也。二陳湯加砂仁主之。

便閉譫語發狂者。胃有燥屎也。大承氣湯主之。

百病見證

胃之寒。唇舌必白。脈右關必沉遲。其見證也。有四。或胃脘痛。或嘔吐。或霍亂。或吞酸。噎膈。

胃脘痛者。肢冷氣。惡寒不食。香附湯加肉桂主之。如吐蛔。加川椒。烏梅。川連。焦朮。川棧。

嘔吐者。食入復出也。半胃散加煨薑砂仁主之。

霍亂者。寒濕傷胃也。和胃飲主之。

吞酸發背者。寒不消食也。香砂二陳湯主之。

胃熱見證

胃之熱。唇舌紅。口鼻脈右關必洪數。其見證也。十之一。或三消。或嘈雜。或吐血。或齒痛。或黃胖面腫。或自汗。或舌黑。

燥渴。或癢疹。或便閉。或呃逆。或頭痛。

三消者。燥熱結聚也。口渴消水為上消。二冬湯主之。消穀易為中消。生地八物湯主之。口渴小便如膏為下消。六味地。

黃湯加生脈散主之。

嘈雜者。煩擾不寧。口燥唇焦。痰火為患也。二陳湯加山梔黃連主之。

吐血者。胃火迫血妄行也。白虎湯主之。

齒痛者。陽明有餘少陰不足也。玉女煎主之。

黃胖面腫者。濕熱也。和中丸主之。

自汗者。熱而蒸薄也。抽薪飲主之。

舌黑燥渴者。胃火熾甚也。白虎湯主之。

發瘧疹者。火鬱而化也。初用葛根湯。加牛蒡子以散之。次用犀角大青湯。加石膏。或三黃解毒湯。甚則白虎湯。調胃承

氣湯。

呃逆不止者。胃火上衝也。安胃飲主之。

頭痛者。頭筋扛起。胃火上衝也。加味生麻湯主之。

補胃壯將藥

白朮黃耆大棗

補胃次將藥

扁豆山藥炙甘草龍眼紅棗

瀉胃狂將藥

石菖蒲枳實雷丸白芥子萊菔子神豬

瀉胃次將藥

蘇梗枳殼蔓荊子麥芽

涼胃狂將藥

石膏犀角

涼胃次將藥

花粉葛根香薷石斛藜蘆知母蘆根竹葉

溫胃狂將舉。

乾薑。高良薑。益智仁。肉豆蔻。草果。丁香。胡椒。辛夷。

溫胃次將舉。

藿香。砂仁。白朮。仁。半夏。烏藥。煨薑。厚朴。川椒。

胃部列方

枳實丸。除脹消食。

炒枳實一兩。炒白朮二兩。

大陷胸湯。服小陷胸湯不效。以此治之。

大黃六錢。芒硝四錢。甘遂二分。五齋研沖。

小陷胸湯。始結胸。小腹痛。滿手不可近。

半夏二錢。黃連一錢五分。瓜蒌仁大者一個。杵。

和胃飲。治霍亂。

厚朴。陳皮。各二錢。乾薑一錢。炙草六分。

二冬湯。治上消。

天冬二錢。麥冬三錢。花粉。黃芩。知母各一錢。人參。甘草各五分。

生地八物湯。治中消。

生地。麥冬。各三錢。山藥。知母。丹皮。各一錢五分。黃連。黃芩。黃柏。各一錢。荷葉二錢。水煎服。

玉女煎。治陽有餘。陰不足。

熟地四錢。石膏。麥冬。各三錢。知母一錢五分。牛漆。鹽水炒。煎一錢五分。

拗薪飲。治一切火感。

黃芩。石斛。木通。梔子。黃柏。各二錢。澤瀉。枳殼。各一錢五分。甘草三分。

犀角大青湯。治胃火發癩大渴大熱或咽痛不利。

犀角尖大青元參甘草升麻黃芩黃連黃柏各二兩人中黃黑山梔各一錢五分或加石膏一錢同煎。

三黃解毒湯。治火毒內感。

黃連二錢黃芩黃柏黑山梔各一錢五分。

安胃飲。治胃火呃逆。

石斛麥芽各三錢黃芩澤瀉山查各一錢陳皮木通。

知味升母湯。治胃火上衝頭甚燥。

升麻葛根赤芍甘草各一錢石膏三錢薄荷五分加燈心二十節。

葛根湯香砂六君子湯四君子湯逍遙散異功散六君子湯和中丸小半夏加茯苓湯五皮飲金匱腎氣丸澤蘭湯。

六味地黃丸大承氣湯平胃散白虎湯調胃承氣湯歸脾湯苳附湯二陳湯保和丸香砂二陳湯。

外臺茯苓飲即異功散加枳實二錢生薑三片用真人參（以上諸方見前卷）。

膀胱部

膀胱屬腑為足太陽之脈。藏津液。司氣化。然腎氣足則化。腎氣不足則不化。入氣不化則水歸大腸而為泄瀉。出氣不

化則閉塞下焦而為癰腫。小便之利。膀胱主之。實腎氣主之也。傷寒傳經之邪。每自膀胱入。一見太陽頭痛等症。即宜

發散不使外邪入裏而為諸經之害。是膀胱為第一關隘矣。詳前十二官茲不贅述。

膀胱為太陽腑。故有表症其為病也。表虛實寒熱五字括之。

膀胱表見證

邪在膀胱之表脈左尺必浮。其見證也有六。或頭痛。或項脊強。或身痛。或四肢拘急。或發熱。或惡寒。無汗。或喘嗽。

頭痛者。頭腦痛而連項脊也。加味香蘇散主之。甚者加羌活蒼白。

項脊強者。太陽經所過之地也。香蘇散主之。

身痛四肢拘急者。風傷衛寒傷營。寒主收引。桂枝湯主之。

發熱者。膝理閉寒也。香蘇散主之。
惡寒無汗者。寒乘表也。麻黃湯主之。

喘嗽者。寒邪客於皮毛。肺氣不得升降也。麻黃湯主之。輕者止嗽散。

膀胱虛見證

膀胱之虛。腎氣不化也。脈左尺必細沉。其見證也有三。或小便不禁。或勞淋。或老淋。小便不禁者。氣虛不能統攝也。十補湯主之。

勞淋者。勞力辛苦。氣虛不化。補中益氣湯主之。

老淋者。老人思色。精不出而內敗。大小便壅痛如淋。宜草薢分清飲。去黃柏。加兔絲。遠志。以去其精。再服六味地黃丸。

膀胱實見證

膀胱之實。脈左尺必洪大。其見證也有四。或氣淋。或血淋。或閏格。或爲膀胱氣。氣淋者。氣滯水道。阻滯於脛下。嚴瀉也。假蘇湯主之。

血淋者。蓄瘀莖中。刺痛難忍也。生地四物湯加紅花。桃仁。花蕊石主之。

關格者。澀閉而吐逆也。假蘇散主之。

膀胱氣者。一名胞解。氣結膀胱。少腹脹滿於小便也。楸核丸主之。

膀胱寒見證

膀胱之寒。脈左尺必沈遲。其見證也。爲冷淋。冷淋者。寒氣堅閉水道。肢冷喜熱也。金匱腎氣丸主之。

膀胱熱見證

膀胱之熱。脈左尺必數。其見證也。有五。或小便不通。或膏淋。或石淋。或便膿血。或發狂。小便不通者。渴則熱在上焦。四苓散。如山梔。黃芩。不渴則熱在下焦。滋腎丸主之。

膏淋者。滴液如膏也。草薢分清飲主之。

石淋者。下如沙石也。益元散。加琥珀主之。

便膿血者。心氣遺熱於膀胱也。阿膠散主之。

發狂者。傷寒熱結膀胱。下焦蓄血。少腹硬滿也。調胃承氣湯主之。

瀉膀胱藥

補膀胱者。謂補腎之藥。腎氣化。則小便自行。

瀉膀胱猛將藥

羌活。麻黃。防己。木通。葶藶。倍苓。

瀉膀胱次將藥

獨活。防風。滑石。黃川。棟子。前胡。葶藶。木澤。瀉葱。

瀉膀胱猛將藥

甘遂。龍膽草。

瀉膀胱次將藥

車前子。茵陳。海金沙。川黃柏。

瀉膀胱猛將藥

吳茱萸。

瀉膀胱次將藥

烏藥。茴香。

瀉膀胱部列方

假蘇散。治氣淋。

荊芥。陳皮。香附。炒麥芽。瞿麥。木通。赤苓。各二錢。

生地四物湯。治血淋。

生地三錢。歸身赤芍各一錢五分。川芎一錢。

香蘇散。桂枝湯。麻黃湯。止嗽散。益元散。補中益氣湯。六味地黃丸。金匱腎氣丸。調胃承氣湯。十補丸。草薢分清飲。阿膠散。極核丸。四苓散。滋腎丸。（以上諸方皆見前卷）

膽部

膽屬腑。爲足少陽之脈。中正之官。清虛之府。居半表半裏之交。與肝爲表裏。氣血足則膽氣壯。氣血虛則膽氣怯。膽受邪即陰陽交戰而寒熱往來。故瘧症之來不一而總不離乎少陽也。詳前十二官。茲不贅述。

膽表見證

膽有表症。脈左關必浮而弦。其見證也。或頭汗。或寒熱往來。頭汗者。邪將化火也。小柴胡湯加丹皮主之。寒熱往來者。陰陽相爭也。小柴胡湯主之。

膽虛見證

膽之虛。脈左關必細軟。其見證也。或驚悸。或太息。驚悸者。心血不足。以壯之也。安神定志丸主之。太息者。氣虛也。四君子湯主之。

膽實見證

膽之實。脈左關必洪。其見證也。或胸滿。或脇痛。或耳聾。胸滿者。邪氣結聚也。小柴胡湯加枳殼。桔梗主之。脇痛者。邪入膽經布之絡下也。小柴胡湯加山梔。枳殼主之。耳聾者。火氣上衝而閉也。道遠散加蔓荊。石菖蒲。香附主之。或小柴胡湯。

膽寒見證

膽之寒。脈左關必遲。其見證也。或精滑。或嘔吐。或舌苔滑。精滑者。脈腫。食少。心虛。煩悶。坐臥不安。溫膽湯主之。嘔吐者。邪正相爭也。小柴胡湯加藿香主之。舌苔滑者。天化火。二陳湯主之。

膽熱見證

膽之熱。脈左關必弦數。其見證也。或口苦。或嘔吐。或盜汗。或目眩。口苦者。熱在膽。胆汁泄也。小柴胡湯主之。

嘔吐者。膽熱於胃也。小柴胡湯加薑炒竹茹主之。

盜汗者。熱開竅理也。小柴胡湯加丹皮主之。

目眩者。熱閉於肝。肝氣在目。熱故眩也。小柴胡湯加山梔主之。

補膽狂將藥

烏梅

補膽次將藥

棗仁

瀉膽狂將藥

桔梗青皮

瀉膽次將藥

柴胡香附秦芫川芎

涼膽狂將藥

龍膽草

涼膽次將藥

青蒿、槐實。

溫膽、猴將藥。

肉桂、細辛。

溫膽、次將藥。

山茶、黃。

膽部列方

溫膽湯。治膽氣虛、夢遺滑精等症。

製半夏一錢五分、枳實八分、陳皮、茯苓各一錢五分、人參一錢、熟地、炒棗仁各三錢、遠志一錢、五味子一錢、甘草五分、生薑三片、大棗一枚。

小柴胡湯、四君子湯、逍遙散、安神定志丸、二陳湯（以上諸方具見前）。

大腸部

大腸為腑、為手陽明之脈、傳道之官、腎陰之竅、受事於脾胃、而與肺、金相表裏、故肺氣虛、則腸若塵、而氣為之陷、腸液少、則肺亦燥、而鼻為之乾、其呼吸甚密、通也、濡腸口、上接小腸、下通穀道、為諸臟滯氣之門、啓閉一失職、而諸臟受困矣、詳前十二官、茲不贅述。

大腸無表症、皆屬於其為病也、虛實寒熱、四字括之。

大腸虛見證

大腸之虛、氣虛也、脈右尺必沉弱、其見證也有二、或久痢、或脫肛、久痢者、氣血不足也、歸脾湯十全大補丸、補中益氣湯、加烏梅、均可。

脫肛者、氣虛下降也、補中益氣湯主之。

大腸實見證

大腸之實、胃實移熱也、脈右尺必洪實、其見證也有五、或便閉、或臌毒、或燥渴、譫語發狂、或腸澀。

便閉者實火閉也。小承氣湯主之。

穢毒者腸胃不清下如魚腸如豆汁也。芍藥甘草湯主之。

燥渴譫語發狂者燥屎不出也。小承氣湯主之。

腸癰者當臍而痛溺數如淋。千金牡丹皮散主之。

大腸寒見證

大腸之寒積冷也。脈右尺必沉遲。其見證也有二。或久痢。或便血。

久痢者腹際際痛寒積在臟也。鴉膽子包粉團吞之。

便血者肢冷喜熱寒在腸也。附子理中湯加歸芍主之。

大腸熱見證

大腸之熱。肺經移熱居多。脈右尺必數。其見證也有三。或便血。或腸風。或脫肛。

便血者口燥唇焦熱在腸也。芍藥甘草湯加黃芩。丹皮生地主之。

腸風者。腸腑有熱風邪乘之。故下血而腹不痛。清血散主之。

脫肛者。腸有火則脫肛難收。腫而痛也。三黃解毒湯加知母。荷葉主之。

補大腸猛將藥

淫羊藿。鹿角。

補大腸次將藥

訶子。肉苁蓉。

瀉大腸猛將藥

大黃。桃仁。雷丸。麻仁。升麻。

瀉大腸次將藥

秦芫。旋覆花。郁李仁。杏仁。大腹皮。白芷。梨汁。

涼大腸猛將藥

黃芩黃柏

涼大腸次將藥

地榆槐實知母連翹

溫大腸猛將藥

胡椒破故紙枸杞

溫大腸次將藥

當歸

大腸部列方

千金牡丹皮散 治腸癰

丹皮苡仁各五錢瓜蒌仁一錢五分桃仁二粒研水煎服如大便閉加大黃錢半當歸三錢

鴉膽子方 治久痢寒積在腸

用鴉膽子一個蒸透將米粉包作團子蒸熟以開水團吞下空心服

清魂散 治腸風下鮮血而腹不痛者

荊芥炒黑三錢當歸五錢

十全大補湯補中益氣湯附子理中湯小承氣湯歸脾湯芍藥甘草湯三黃解毒湯（以上諸方具見前）

小腸部

小腸屬腑為手太陽之脈受感之官化物出焉其上口即胃之下口水穀由此而入其下口即大腸之上口此處分別

清濁俾水液注入膀胱滓穢流入大腸是腑中之有鑿別者與心相表裏脈附於膀胱而在左尺詳前十二官茲不贅

述小腸無表症皆屬於裏其為病也虛實寒熱四字括之

小腸虛見證

小腸之虛。脈左尺必細軟。其見證也有二。或溺赤短。或腰痛。溺赤短者。水不勝火也。生地黃湯主之。腰痛者。水不足也。六味地黃丸主之。

小腸實見證

小腸之實。脈左尺必洪弦。其見證也有二。或小腸氣。或交腸。小腸氣者。氣滯下焦。臍下轉痛。失氣則快也。橘核丸主之。交腸者。陰陽拂逆。大小腸交也。五苓散主之。

小腸寒見證

小腸之寒。脈左尺必澀。其見證也。為咳嗽。失氣。咳嗽失氣者。小腸嗽也。止咳散加芍藥主之。

小腸熱見證

小腸之熱。脈左尺必數。其見證也。為溺瀦溺短。溺瀦溺短者。濕熱壅滯也。導赤散主之。

補小腸將藥

生地

瀉小腸將藥

木通

瀉小腸次將藥

瞿麥。海金沙。川棟子。苡仁。赤芍。赤茯苓。燈心。

小腸部列方

生地黃湯。六味地黃丸。五苓散。止嗽散。導赤散。橘核丸。（以上諸方具見前）

三焦部

三焦屬腑。為手少陰之脈。人生三元之氣。臟腑空處是也。上焦心肺居之。中焦脾胃居之。下焦肝腎膀胱大小腸居之。其氣總領臟腑營衛經絡內外左右上下之氣。三焦通則週體調和。斯其職已詳前十二官。茲不贅述。

三焦之病。屬於臟腑。並無另立病名。

補三焦猛將藥

淫羊藿黃耆

瀉三焦猛將藥

青皮木香

瀉三焦次將藥

柴胡香附

溫三焦次將藥

烏藥白豆蔻胡桃

涼三焦次將藥

山梔麥冬黃柏地骨青蒿連翹

心包絡部

心包絡屬腑。為手厥陰之脈。即膻中。與心相附。居膈上。代君行事。臣使之官。喜樂出焉。詳前十二官。茲不贅述。膻中為心之外衛。其見證也有手中熱。心中大熱。面黃。目赤。心動。諸端。而要之胞絡之病。即心部之病也。言心不必更

言胞絡矣。

婦女科

婦女之症。多與男子同。惟胎前產後。以及經水適來。適斷。與男子異耳。茲特舉其異者。略述於後。以備參考。其同者。照

前法主之。至其脈法。已詳首卷。茲不贅述。

婦女證論

婦女之症。有不肯對人言者。等於小兒之不能自言。其難治一也。而醫家又有未便詳細詢問之處。則便暗中摸索矣。然婦女本地陰。吝奮之性。多心地淺窄。識見拘墟。凡有逆意。卽牢結胸中。且內結多而外出少。不若男子之能散悶於外。鬱久而成病。故其大要不離乎中情鬱結者近是。主治之法。若審無外感。內傷別症。則養血疎肝四字。可以括之。故古人多以四物湯加減治之。或遣遙散之類。可以得其八九矣。蓋胎前產後。乃生死交關之際。務須辨症明析。用法得當。保護胎元。勿使正損邪陷也。

室女

凡天癸未至之室女。有病當從幼科論治。天癸既行。則與婦人同治矣。蓋經者常也。反乎常。則病然。未有神完氣足。而經有愆期者。其有時經閉者。苟非血海乾枯。定必經脈逆轉。血枯則生內熱。而咳嗽勢必慚成。怯症經逆。是血必忘行。而爲吐衄。此皆非經候也。須從運治之。再有心熱煩悶。如槽似飢。懣懣倦怠者。其情賈久。開慾火內熾。所致爲父母者。察知其意。急宜擇配定期。以安其心。若溺愛久留。勢必相火刑金。發熱咳嗽。吐血而變成癆。瘵終至不治。勿謂增過。鄙俚。飲恨以終也。然又經阻水適來。偶溺發而小便不通。腹脹欲死者。急宜用調經飲。通其經。則便自利矣。

月經見證

經者常也。月行有常度。經水有常期。循乎常道。以象月盈則虧也。經不行。其愆乎常者。皆病也。方書以趺前爲熱。退後爲寒。其理近似。然亦未可盡拘也。何則。因有臟腑空虛者。其經水淋漓不絕。頻頻數見。非趺前也。不可便斷爲熱。又有內熱血枯。經脈遲不來者。豈可便斷爲寒。務須察其顏色。並兼證。而以紅爲正。其變爲紫黑者。熱也。黑如米泔者。濕也。淺淡紅白者。虛也。成塊而紫黑色。明者。熱積也。成塊而紫黑色。黯者。寒凝也。既行而腹痛。喜按者。氣虛血少也。將行而腹痛。拒按者。氣滯血凝也。經前發熱者。爲血熱。經後發熱者。爲血虛。腹痛者。爲氣滯。腹痛者。爲血滯。泄瀉者。是脾虛。瀉泄者。是寒濕。其他如脈數。內熱。唇焦。口燥。畏熱。喜冷者。爲有熱。若脈遲。腹冷。唇淡。口和。喜熱。畏寒者。爲有寒。血多色鮮者。血有餘也。血少色淡者。血不足也。凡逆行上溢。而吐衄。錯行下流。而崩漏。皆屬血熱妄行。然亦有脈絡傷損。瘀積肝

旺所致者。或兼赤白帶而下。臭者爲濕熱。腥者爲寒濕。以此定斷。其無所失矣。今以所見各症及治法詳列如下。

血枯與經逆者。並用益母勝金丹。加牛膝。主之。

經阻澀。發者。調經飲。並犀蘭湯。主之。

經水紫黑者。生地四物湯。加丹參。丹皮。益母草。

淡紅者。八珍湯。主之。

黃如米泔者。六君子湯。加苡仁。扁豆。

寒凝成塊者。四物湯。加桂心。牛膝。

熱結成塊者。生地四物湯。加丹參。丹皮。益母草。

氣血凝而作痛脹者。調經飲。或四物湯。加延胡。香附。木香。

氣虛血少而或痛或熱者。四物湯。加人參。白朮。

泄瀉澀利者。六君子湯。主之。

血熱而上下妄行者。四物湯。加丹皮。阿膠。黃芩。黑山梔。

絡脈傷而妄行者。或喜怒或過勞。八珍湯。主之。

瘀血積。則血不歸經。獨聖丸。主之。

肝火旺。不能藏血者。逍遙散。主之。

其兼赤白帶者。五苓散。加減治之。

肝氣

肝氣者。婦女之本病。婦女以血爲主。血足則盈。而木氣感。血虧則熱。而木氣亢。成與亢。皆易生怒。故肝氣。惟婦女爲易動。然怒氣。泄則肝血必大傷。怒氣鬱。則有血。又暗損。怒者。血之賊也。其結氣在本位者。爲左脇痛。移於肺者。右脇亦痛。氣上逆者。頭痛。目痛。胃脘痛。氣旁散而下注者。手足筋脈拘攣。腹痛。小腹痛。瘰癧。乳巖。陰腫。陰癢。陰挺。諸症。其變病不一。今以所見各症及治法詳列於後。

左脇痛者肝氣不和也柴胡疎肝散若七情鬱結用逍遙散解恨煎

右脇痛用推氣散如肝燥而皮泡脹痛者瓜蒌散

頭痛者痛或連肩稜骨眼眶道瑤散主之

目痛者痰藜湯加柴胡山梔

胃脘痛者沉香降氣散柴胡疎肝散並主之

手足筋脈拘攣者肝氣熱也五痿湯加黃芩丹皮

腹痛者木乘土也芍藥甘草湯主之

小腹痛者疝瘕之氣也橘核丸主之

瘰癧者血燥有火也消瘰丸散之氣服逍遙散

乳癰者逍遙散歸脾湯三方間服

陰腫陰痿陰挺痔症逍遙散主之甚則龍胆瀉肝湯

婦女經產病溫

婦人病溫與男子同但多胎前產後以及經適來適斷凡在胎前以護胎爲要勿使熱邪入內以傷胎氣若邪熱適胎急清內熱外用井底泥藍布浸冷濯著腹上總之以清熱解邪勿傷其胎爲主

若在產後是屬虛體最多空竅當從虛怯人病邪同其治法慎用苦寒勿犯下焦恐傷其已亡之陰也

若經水適來因熱邪陷入搏結不行者宜破其血結若經水適斷而邪乃乘血舍之空虛以襲之者宜養營清熱其邪熱傳營逼血妄行致經水未當期而至者宜清熱以安營夫經水滴來適斷而病溫邪將陷血室少陽傷寒言之最詳

仲景立小柴胡湯提出所陷熱邪以參棗扶胃氣如熱邪陷入與血相結者當從陶氏小柴胡湯去參棗加生地桃仁

查肉丹皮或犀角等若本經血結自甚必少腹滿痛經者刺期門重者小柴胡湯去甘草加延胡歸尾桃仁挾寒加桂心氣滯加香附陳皮枳殼等然熱陷血室之證多譫語如狂之象與陽明胃實者相似最須辨別惟血結者身體必重非若陽明之經旋便捷蓋陰主重濁脈絡被阻側旁氣痺連胸背皆拘束不遂故去邪通絡正合其病往往延久則止

逆心胞而爲胸中痛。卽陶氏所謂血結胸是也。王海藏出一桂子紅花湯。加海蛤。桃仁。原爲表裏上下一齊盡解之妙法也。

桂子紅花湯。卽桂子湯。加紅花。

帶症

帶分五色。有青黃赤白黑之別。亦不必分屬五臟總之不外乎脾虛有濕而已。用五味異功散。加扁豆。苡仁。山稔。澤瀉。等。無不愈者。倘挾五色。則加本臟藥一二味。若有熱。加黃柏連心。

青色屬肝。異功散。加柴胡。山梔。

黃色屬脾。加石斛。荷葉。陳米。

赤色屬心。加丹參。當歸。

白色屬肺。倍加苡仁。

黑色屬腎。加杜仲。續斷。

關孕

子嗣者。揆尋常事。而不得者。則極其艱難。皆由男女之際。調攝未得其方也。男子以保精爲主。女子以調經爲主。精氣足。經水調。無有不得子者。至有孕之脈。首卷中已論及。以左寸脈動爲孕子之兆。若兩尺脈旺。與兩寸迥別。亦爲有子。其他如流利雀啄。亦爲孕脈。或兩寸皆浮。大主生二男。兩手皆沉。實主生兩女。如經斷二三月。以川芎末煎艾湯。空心服之。腹內微動者。卽胎也。

真水虛而左尺無力者。六味丸合五子丸。或左歸飲。

真火衰而右尺無力者。六味丸合五子丸。或右歸飲。

兩尺俱無力者。十補丸合五子丸。

精薄不凝者。六味丸合五子丸。加魚鱗。鹽魚膠之屬。

氣虛不能射遠者。贊育丹主之。

調經之法。見於月經篇。

血熱者。益母勝金丹。加生地。丹皮。

血寒者。益母勝金丹。加肉桂。

氣滯腹痛者。四物湯。加延胡。香附。木香。或調經飲。

氣虛者。四物湯。加入參。白朮。黃耆。

氣血並虛者。養麟珠。主之。

胎前諸症

妊娠之月。宜節慾。食淡。勿過勞。亦勿過佚。日常走動。以活其胎。屏絕嗔怒。以靜其性。則生育自易。兒亦聰明多壽矣。然

兒在腹中。爲時又久。一切皆能致病。今備其症。以示治法如下。

惡阻者。瀉氣開塞中脘。停痰眩暈嘔吐滿悶。宜二陳湯。加枳殼。主之。脾虛者。六君子湯。加蘇梗。砂仁。香附。

胎動不安者。起居不慎也。安胎飲。主之。

胎漏者。經水忽下。血瀝蕪則胎不保。四物湯。加黃芩。防風。主之。

如血虛。加茯苓。阿膠。艾葉。氣虛。下陷者。補中益氣湯。

子懸者。胎上逼也。紫飲。加減主之。更有氣逆。而厥暈者。名曰子眩。其症甚危。亦用前藥。如脾虛挾痰。則六君子湯。

胎不長者。產母宿疾所致。五味異功散。或八珍湯。主之。

子煩者。煩心悶亂也。四六二月。居多。火盛而煩。淡竹葉湯。若氣滯而悶。宜二陳湯。加白朮。黃耆。蘇梗。枳殼。

子潮者。血虛受風。忽然口噤。反張。其症最暴。受風者。羊角散。定之。若怒動肝火者。佐以逍遙散。胎氣上逆者。佐以紫蘇

飲。

子鳴者。小兒口中脫出胞乳。腹內哭聲也。須曲腰就地。如拾物狀。一二刻。瘖瘖仍入兒口。卽止。用四物湯。加白朮。茯苓。

以安胎氣。

子瘖者。腎脈繫舌本。爲胎氣壅閉。故不能言。不須服藥。分娩後。自能言矣。小便不通者。小腸有熱也。四物湯。加黃芩。澤

瀉主之。然胞胎墜胞系繚亂點滴不通者。名曰轉胞。其禍最速。茯苓升麻湯主之。或補中益氣湯。隨服而探吐之。胎水腫滿者。名曰子腫。由胞胎壅遏。水飲不流。所至五皮飲。加白朮茯苓主之。脾虛不能制水者。六君子湯。乳自出者。名曰乳泣。生子多不育。八珍湯補之。

熱病損胎者。病熱而胎損腹中也。古方用黑神散下之。或平胃散。加朴硝五錢下之。豆豉。產母面赤舌青。其子已指。若面青舌赤。母亦難全懷之。

小產者。未足月而欲生。總因勞傷所致。急用安胎飲以安之。既產而腹痛拒安者。瘀血也。當歸澤蘭湯主之。小產後血不止。或煩渴。面赤脈微。虛者。氣血大虛也。八珍湯加炮薑補之。

若腹痛嘔瀉。脾胃虛也。香砂六君子湯加薑桂。

臨產將護法

凡將臨產之月。其將護之法有三。一宜善養。勿呆坐。勿多睡。勿過飽。常食米粥。以解飢渴。天熱則預擇涼處。免生火暈。天寒則擇煖室。免致血寒。二宜選擇。忌喧鬧。備須用物件。三服藥。懷孕八月。宜服保產無憂湯。二三劑。臨產時。再服此劑。則撐開道路。兒自易生。或連日不產。用力太早者。宜服八珍湯。以助其力。其有調護失宜。而為逆昏者。則命在呼吸。備列方法。以備參考。

凍產者。天寒氣血凝滯。難以速生。須煖其室。厚其衣服。熱產者。暑月過熱。恐頭目昏眩。而生血暈。宜就涼處。若水閣風雨。更宜謹避。

橫生者。兒方轉身。用力太急也。產母宜安然仰睡。先推兒身。順直。以中指探兒肩。不令臍帶扳轉。然後用脫花煎。推之。倒產者。兒未轉身。努力太早。手脚先出也。令接婆輕手推入。撥轉兒頭。再服脫花煎。

偏產者。兒已轉身。努力太急。或兒頭偏一邊。雖露頂非也。乃額角耳。令接婆輕手扶正其頭。即順下。若兒頂後骨偏注。穀道露額。則輕手於穀道外旁托正。產母努力即生。

礙產者。兒轉身時。臍帶絆其肩。以致不生。宜轉手推其向上。以中指按兒肩。脫去臍帶即生。交骨不開。有鎖骨者。有血虛不能運達者。以蘇油調滑石。塗入產門。或用兩指緩緩撐開。服加味歸芎湯。脫花煎。

盤腸產者。隨產子腸先出。然後生子。腸出時。以潔淨漆器盛之。用葶藶子四十九粒。研爛塗產母頂。腸卽收。急洗去其藥。其腸若乾。以刀磨水。少許溫潤之。又有用麻油指燃點燈吹熄。以煙薰其鼻。腸卽上。

產門不閉。氣血虛也。入珍湯補之。如不應。用十全大補湯。

胞衣不下者。因力乏。不能努力。宜于剪臍時。用物緊定。再用歸芎湯一服。卽下。或血入胞衣。脹大不下。心胸脹痛。喘急。速用清酒送失笑丸三錢。其衣自下。如不應。更佐以花蕊石散牛膝散。

產後諸症

產後最宜將護。其要有四。一曰倚坐。上牀以被褥靠之。暑月以橙靠之。不可遽然睡到。預至十日後。方可平睡。常以手從心窩至臍。下俾瘀露下行。二曰擇食。初生後。宜食粥。半月後。方可食打開鷄蛋。滿月後。可食羊肉猪蹄等物。三曰避風。養神。少言語。大忌梳洗。恐招風寒。四曰服藥。初產畢。卽用生花湯。或歸薑湯。以驅瘀血。自然安吉。或有變生他症者。隨症治之。今以治法列後。

產後血暈者。瘀血上攻也。必胸膈脹痛。拒按。宜歸芎湯下。失笑丸。若去血過多。心慌自汗。用薑歸湯。加人參。甚則加附子。

產後不語者。心腎不交也。氣血虛弱所致。七珍散。歸脾湯並主之。若虛火上炎。六味地黃丸。

產後發熱者。若無風寒表邪之氣。則血虛也。四物湯加黑薑補之。或加重便爲引。更效。如有脾虛傷食。用異功散。加神

糲麥芽。大凡風寒發熱。晝夜不退。若血虛與傷食發熱。則嘔熱晨退。且傷食更必吞酸。噎腐滿悶。以此爲別。更有氣血大虛。陰躁作渴者。乃陽隨陰散之危候。十全大補湯救之。

狂言如見鬼者。是敗血上衝。心胸脹痛。宜擇蘭湯並失笑丸。若血虛神不守舍。則心慌自汗。宜安神定志丸。加人參。歸芎治之。歸脾湯亦得。

心神驚悸者。心血空虛也。七福飲。秘旨安神丸之類。

汗多變溼者。陽氣大虛也。十全大補湯主之。

產後身痛者。如傷身。手按更痛者。瘀血凝滯也。四物湯加黑薑。桃仁。紅花。澤蘭。化之。若身痛喜按者。血虛也。四物湯加

黑薑參朮補之。

若兼風寒必頭痛鼻塞寒宜古拜散加當歸川芎秦芫黑薑以散之。

產後腰痛上連脊背下連腿膝者風也濁活寄生湯主之。若專腰痛者虛也。八珍湯加杜仲續斷肉桂。若惡露不盡痛如錐刺者速用桃仁湯化之。免作癰腫。

產後心腹諸痛受風寒者口鼻氣冷停食者吞酸噯腐俱用二香散。惟瘀血作痛若刀錐之刺失笑丸主之。其中氣虛寒腹中冷痛得熱則止者理中湯加桂心。若小腹痛虛有塊不可手按者此名兒枕痛瘀滯也失笑丸主之。

惡露不絕者因肝氣不和用逍遙散。因脾不統血用歸脾湯。若因瘀滯而新血不得歸經必腹痛拒按歸芎湯下失笑丸。

葶勞者寒熱食少頭痛肢痛者最難調治。八珍湯主之。

喘促者榮血暴竭。衝氣無依最爲難治。六味地黃湯加入參。若脾肺兩虛。四君子湯加黑薑。當歸。若瘀血入肺。口鼻起黑氣及鼻衄者。此肺胃將絕之候。急服參蘇飲。如厥冷自汗。更加附子。間有得生者。

產後乳少由原氣虛弱。八珍湯主之。若乳房嫩脹。是未通也。理宜吮通。服王不留行湯。若爲兒口吹氣。臍腫不痛。不急治。卽成乳癰。速服瓜萋乳香散。敷香附餅。卽消。如已成膜。則以神仙太乙膏貼之。吸盡膿。則愈矣。

乳巖初起。內結小核。不赤不痛。漸大而潰。形如熟榴。內潰深洞。此脾肺鬱結。氣血虧損。最爲難治。初起用加味逍遙散。加味青歸湯。二方間服。亦可內消。及其病勢既成。雖有瘡。亦難爲力。

乳鉅者。乳頭拖下一二尺。此肝經風熱發泄。用小柴胡湯加羌防主之。葶麻子四十粒。麝香一分。研塗頂心。候乳頭收。上卽洗去。

婦人科列方

益母勝金丹調經行血。

砂仁拌熟地酒蒸歸當。酒蒸羌蔚子。土炒白朮。酒炒香附各四兩。酒炒白芍。酒蒸丹參各四兩。酒蒸川芎二兩五錢。以益母八兩。酒水各半。熬膏。蜜丸。開水下。

獨聖丸去瘀積。

五靈脂去土炒烟盡為末醋丸酒送下。

痰蘖湯 治日赤頭痛

白茯苓一錢五分荆芥赤芍各一錢羌活防風冬七分甘草五分加有豨薟白二段

龍胆瀉肝湯 治肝濕熱

龍胆草瀉瀉各一錢車前子木通生地山楡酒炒當歸黃芩甘草各五分

解恨煎 治暴怒傷逆脹滿

陳皮半夏厚朴茯苓各一錢五分蘇叶芍藥各一錢砂仁七分如鴨肋脹痛加白芥子一錢如胸膈氣滯加枳壳香

附香

調經飲 治經阻氣滯而作痛

當歸二錢牛膝山查香附各二錢青皮茯苓各一錢

五子丸此方同六味丸合成為種子之方

枸杞子菟絲子各四兩五味子車前子覆盆子各二兩石斛六兩熬膏蜜丸開水下四錢

贊育丹 治男子精衰陽痿而艱子息

熟地白朮各八兩當歸枸杞各六兩杜仲仙茅韭巴戟肉山茱萸淫羊藿肉蓯蓉各四兩蛇灰附子肉桂各一兩

毓麟珠 治婦人氣血虛而經不調者不孕者

人參白朮茯苓芍藥川芎炙草杜仲鹿角霜川椒各二兩熟地當歸菟絲子各四兩蜜丸空心服

安胎飲

當歸川芎白芍熟地茯苓阿膠各一錢白朮三錢炙草艾叶各三分

紫蘇飲

當歸川芎紫蘇各一錢炙草人參白芍各五分大腹皮八分加薑一片葱白一寸

淡竹叶湯。

淡竹叶七片。黃芩。知母。麥冬各一錢。茯苓二錢。

羚羊角散。

羚羊角獨活。當歸各二錢。川芎。茯神。防風。炙甘草各七分。鈎藤三錢。桑寄生二錢。人參八分。茯苓升麻湯。治產後小便不通。

赤白茯苓各五錢。升母一錢五分。當歸二錢。川芎一錢。葶根三錢。或調琥珀末二錢。服更佳。

黑神散。隆冬寒月及氣虛虛寒者用此。

桂心。當歸。芍藥。炙甘草。乾薑。生地各一兩。黑豆二兩。附子。炮去皮五錢。

當歸澤蘭湯。

當歸澤。酒芍。川芎。熟地各一錢五分。延胡索。紅花。香附。丹皮各五分。桃仁七粒。

保產無憂湯。臨產日先服一二劑。

酒洗當歸一錢五分。川貝一錢。黃芩八分。艾叶七分。酒芍一錢二分。桑絲子一錢四分。薑汁炒厚朴七分。劉芥八分。

枳殼六分。川芎一錢三分。羌活五分。甘草四分。薑三片。

加味八珍湯。

人參。白朮各一錢。茯苓八分。當歸五錢。炙甘草三分。川芎一錢五分。酒芍二錢。熟地一錢五分。乳香五分。酒炒丹參二

錢。益母草二錢。

加味歸芍湯。

當歸五錢。川芎三錢。龜板童便炙三錢。婦人髮一握。燒灰存性。

脫花煎。凡將產先服此藥。催生最佳。胎死腹中。加朴硝三錢。卽下。

當歸八分。肉桂三錢。川芎。牛膝各二錢。車前子一錢五分。紅花一錢。

失笑丸。治瘀血脹胞。並治兒枕痛。

五靈脂去土炒。蒲黃炒。各等分爲末。醋丸。每日三錢酒下。

花蕊石散。服此化瘀血爲水。其人即甦。

花蕊石一斤。土色硫黃四兩。爲末和勻。入瓦罐封固。用炭煨二炷香。取研細末。童便酒下。

牛膝散。治胎衣脹急。緩則下散。

牛膝。川芎。炒蒲黃。丹皮。各一兩。桂心。四錢。當歸。一兩五錢。共爲末。每服五錢。水煎。

生化湯。產後去瘀要藥。

當歸三錢。黑薑五分。川芎一錢五分。益母草一錢。桃仁七粒。

歸薑湯。產後心滯自汗。

當歸三錢。黑薑七分。炒棗仁一錢五分。

七珍散。

人參。石菖蒲。生地。川芎。各一兩。防風。辰砂。各五錢。細辛一錢。爲末。薄荷湯調下。

古拜散。產後受風諸症。

荆芥穗爲末。每服三錢。生薑湯調下。

獨活寄生湯。

獨活。桑寄生。防風。秦艽。威靈仙。牛膝。茯苓。各一錢。桂心五分。細辛。炙草各三分。當歸。金毛狗脊各二錢。

桃仁湯。

桃仁炒十粒。當歸三錢。牛膝二錢。澤蘭三錢。蘇木三錢。

二香散。散寒消食。

砂仁。木香。黑薑。陳皮。炙草各一兩。香附三兩。共爲末。

麥蘇飲。

人參一兩。蘇木二錢。

王不留行煎

王不留行一錢五分。通草一錢。赤芍一錢五分。葱白頭五個。炒麥芽三錢。

瓜蒌乳香散

瓜蒌一個。明乳香二錢。酒煎服。

香附餅

香附一兩。麝香二分。共研勻。以蒲公英二兩。酒調搗敷之。

神仙太乙膏

治一切癰疽

元參。白芷。當歸。肉桂。生地。赤芍。大黃。各一兩。黃丹十三兩。炒篩。用麻油二觔。熬藥。去渣。成珠。入黃丹。再熬。為膏。

四物湯。逍遙散。澤蘭湯。八珍湯。六君子湯。生地。四物湯。即四物湯。去熟地。用生地。五苓散。異功散。六味丸。即六味地。

黃湯。二陳湯。補中益氣湯。五皮飲。平胃散。香砂六君子湯。十全大補湯。理中湯。小柴胡湯。以上諸方。俱見首卷。

柴胡蘇肝散。瓜蒌散。五痿湯。芍藥甘草湯。橘核丸。消瘰丸。以上具見肝部。推氣散。見肺部。沉香降氣丸。歸脾湯。十補丸。安神定志丸。七福飲。秘旨安神丸。以上見心部。左歸丸。八味丸。右歸丸。以上見腎部。

幼科

小兒之病。較方脈為難。因其疾病痾。不能自言。而旁人又不能代言。全恃醫家細心觀察。以意揣之。揣之不合。殺人易如反掌。且小兒純陽之體。易虛易實。即揣得其當。若藥一過分。變幻百出。然揣之之法。亦不過辨其表裏虛實寒熱。與方脈無異。其症亦與方脈相同。故不能兒科者。能治方脈。則有之。不能方脈者。必不能兒科。至切脈之法。首卷中已論及。茲不贅述。

初生保養

初生三朝。即用三黃湯。解其胎毒。連服三四日後。每日投金銀湯。至彌月而止。可保其痘稀而少。瘡疹之患。若遇冬季。或小兒體寒。質薄。善專用金銀花湯。亦可。如彌月之間。聲直發。撮口。臍風。是胎風也。俗名腹裏驚。因其母肝氣素鬱。兒稟受之故也。再有浴時不慎。或在斷臍之時。感受風邪。引動內風。泣不出聲。及泣而無淚者。皆難治。法如痰盛者。

先治痰火感者。先清火。或用益黃散治之。視其牙齦有泡。急以棉裹指擦破之。用青黛冰片略塗口內。若三歲以前形質微弱。無脈可憑。但察其脈之強弱。緩急而已。又須察其食指之紋。其法詳首卷。茲不贅述。

外熱內寒辨

外熱與內寒辨之不可不慎。外熱者。終日發熱。或拘束肢冷。外有清涕。咳嗽頭痛。鼻塞之象。內則脈浮而不渴。此外解之症也。不可用涼藥。宜利防散表之得汗即愈。內熱者。如夜熱朝熱。晝輕夜重。痛最纏綿。或口渴。或腹脹。或盜汗。其症有因傷食停滯。伏燥。伏火。陰虛。陽虛等異。宜分別而治之。此內寒之症。不可用表藥。傷食者。保和丸。加地骨皮。消之。停痰者。和中丸。加蘇甲。牡蠣。消之。伏燥者。貝母。瓜蒌。散潤之。伏火者。黃芩。芍藥。湯加山梔。丹皮。等清之。陰虛者。芍藥。四物湯退之。陽虛者。四君子湯養之。若熱久傷陰。口漸削。瘦成爲疔。勞慎勿忽視。

非驚論

方脈中有中寒中熱諸症。時醫混以爲中風。東垣景岳以非風別之善矣。兒科中有急驚風。慢驚風二症。不惟驚字全無干涉。卽風字亦未可混稱。自有驚風之名。而濫以九子雜投。小兒之謂其劫者。不知萬幾矣。驚者受熱之謂也。熱則神魂失守。心神恍惚。惕悸動。唯心虛者易犯。此在方脈中亦有之。兒科中大驚。猝恐卽此候也。是直驚也。故用人參。五味。棗仁。丹參等安神定魄爲主。斷無有攻痰散風而能治驚病者。且風字亦有二義。在外感則爲風邪。宜用表散。在內病則爲肝風。宜用鎮息。今混言之曰風。究屬是外風乎。抑內風乎。治外風之藥。不可以治肝。治肝風之藥。不可以解表。甚矣哉。其混也。當時俗之所謂急驚者。痰火閉也。小兒受暑熱則生火。乳積則生痰。痰火相搏。則血虛而肝失所養。肝主筋。筋脈乾熱。則抽搐。故外作拘攣。而現青色。是肝燥而風內動。非外風也。是痰火閉其竅。而目窠牙緊。發赤。非驚嚇也。但利其竅。清其火。降其痰。則神醒矣。安得以急驚風名之。世俗所謂慢驚風者。脾虛生風也。小兒或吐或瀉。久則脾虛。肝木乘之。手足微搐。是內風侮土。非外風也。陽衰神怠。氣息短促。是中氣虛脫。非驚嚇也。宜補其脾。回其陽。則土振而靜矣。是症不補必死。而謬以慢驚風名之。可乎。且急驚屬實火之症。慢驚爲虛寒之候。病若水火之不相。膠治急驚。寧不可以治慢驚。治慢驚。寧不可以治急驚。而世俗竟有以一粒丹丸治急慢驚風者。茲特揭之曰。非驚則分爲痰火閉症。木侮土症。而爲實爲虛。各當求其病源而治之。庶幾小兒不至枉死矣。

痰火閉症

痰火之症。卽俗所謂急驚風是也。小兒或感風寒。或積乳食。皆能生痰。痰積則化火。失於清解。則火升而痰亦升。痰火上擁。閉其肺竅。則諸竅皆閉。其見證也。目直氣喘。昏悶不醒。肝燥筋急。爲搯掣顛反。引竅視而入候。生焉。總因痰火鬱結。肝風內動。而成。當其拘攣弓仰之時。但以手扶。勿可用力抱緊。傷其經絡。致成廢疾。初起以通關散。開其壅。得嚏則醒。輕者利火降痰。重者清膈煎加石菖蒲。竹茹。或抱龍丸。醒後用清熱養血湯。

木侮土症

木侮土症。卽俗所謂慢驚風也。小兒受暑寒。或傷乳食。皆能作吐作瀉。或吐瀉交作。久則脾土虛弱。肝木乘之。其瀉漸見青色。面部瘰白帶清。手足微搐無力。神氣懣懣不振。而慢驚成矣。初起卽宜異功散。吐則加藿香煨薑。若已多日。而糞見青色者。卽加木香肉桂。若手足皆冷。脈息微細。唇舌痿白。此將脫之症。宜急用附子理中湯。以溫中回陰。尙有可救。諸藏之症。皆緩獨脾病之變。甚速。儻有吐瀉一晝夜而卽脫者。慎勿緩視也。

大驚猝恐

大驚猝恐。真驚也。小兒氣血未充。心神怯弱。一遇驚嚇。則神魂震怖。舉動失常。夜則跳醒。晝則驚惕。治宜安神魂。斂心氣。七福飲主之。或菘旨安神丸。安神定志丸。皆可。心有驚熱而驚悸者。七味安神丸。神定後。如氣虛者。用四君子湯。以補其陽。如血虛者。用六味地黃丸。以補其陰。若妄投硃砂鎮驚丸之類。耗其心血。則愈驚愈感。肝風乘虛而抗。其勢不可復制矣。慎之。

暑厥

小兒夏令受熱。昏迷若驚。此爲暑厥。卽熱氣閉塞孔竅所致。其邪入絡。與中絡者同治。用牛黃丸。至寶丹等。芳香利竅。可效。神醒已後。用清涼血分之藥。如連翹心竹葉心元參細生地鮮生地。二冬之屬。是症初起。大忌風藥。初病暑熱傷氣。竹葉石膏湯。或清肺輕瀉。大凡熱深厥亦深。四肢逆冷。但看而垢滑燥。二便不通。或瀉不爽。爲是。切勿誤認傷寒也。

熱疳

幼兒斷乳。納食值夏。月脾胃主氣。易於肚膨泄瀉。足心熱。形體日瘦。或煩渴善食。漸成五疳積聚。當審體之強弱。病之

新久。有餘者。疏胃清熱。食入糞色白。或不化。健脾佐消導清熱。若濕熱內鬱。蟲積腹痛。導滯驅蟲微下之。緩調用肥兒丸之屬。

口疳

夏季秋熱。小兒泄瀉。或初愈。或未愈。滿口皆生疳蝕。嘗有阻塞咽喉致危者。此皆在裏傷成生熱。熱氣蒸灼。津液不生。濕熱傷氣。分治在上焦。或佐淡滲。再用西瓜翠衣治之。取其輕揚滲利也。

夜啼

夜啼之症。有二。一曰脾寒。一曰心熱。若僅胃停乳食。則不能安寐而不啼也。脾寒者。溫其脾而啼止。藿香和中湯主之。心熱者。清其心而啼亦止。導赤散加川連主之。或花火膏亦可。切勿亂投消痰破氣之藥。致損真元。

吐瀉

小兒吐瀉之症最多。或專吐。或專瀉。或吐瀉交作。其因傷食而吐瀉者。腹必硬。所吐所瀉必有酸臭氣。保和丸消之。因伏暑而吐瀉者。小水必不利。而兼煩渴。吐則香薷飲。瀉則四苓散。加益元散。或導赤散。加川連清之。因受寒而吐瀉者。唇舌面色必痿白。口不渴。四肢或冷。此症易成慢脾。始則平胃散。二陳湯。加煨薑以溫其中。繼則六君子湯。以補其脾。若虛寒甚。用附子理中湯。其因伏火而吐瀉者。身必熱。唇舌必赤。以消中飲導之火。退後仍以四君子湯。以養其脾。蓋火吐則乳飲不得入。一入即出。寒吐則乳飲受而後出。此其辨也。然吐瀉久則脾胃必虛。肝木必侮。無論因何而起。凡大吐大瀉之後。即有火亦清。有食亦出。速宜培補脾陽。勿使氣脫。

傷暑

小兒性柔純陽。不受火迫。一染邪暑。熱焰沸張。其症肌熱燥煩。口渴唇紅。溺瀉。急宜香薷飲。調服益元散。以解之。且暑中有濕。濕易傷脾。故每作瀉利。甚者必兼吐。若受暑風而清涕頭痛者。用香薷飲加秦艽荊芥主之。若熱動肝風。而發搐厥。宜清熱湯利其暑濕。而風自息。切勿輕用治驚化痰之品。戕其正氣。以致變生他症。

食積蟲痰水諸積

諸積皆屬於脾。脾土果旺。則何物不化。至於成積。脾力之衰弱可之矣。然積病既成。勢不能不用藥以消之。夫欲消困

脾之積。必更傷受困之脾。故治積者。務須時時顧念脾土而後可。食積者。肚腹必硬。膨脹拒按。吞酸噯腐。不思飲食。保和丸。大和中飲。等消之。脾虛者。參用六君子湯。痞積者。或瘧後痰結。或血裏肝氣結於脅下。時痛時止。和中丸。稍之外。貼消痞膏。氣虛者。參用六君子湯。蟲積者。濕熱所化也。蟲有九種。而血鬻最狠。蠶蟲最馴。寸白蟲能上食其肺。葉柳蟲能下食其肝。凡患蟲症。多唇內起白點。若蟲長一尺。貫胃則危。沖心則死。其人日漸消瘦。蟲則吸血自肥。宜以化蟲丸下之。腹痛則服花椒湯。蟲聞椒則伏也。下後仍以異功散。養脾。痰積者。日常飲食。脾不能化。釀而爲痰。其症初起時。兩脈皆弦。腹漸脹大。而軟。急以六君子湯。加厚朴。麥芽。萊服子等。以消之。若遷延日久。則痰積愈多。一旦湧發爲厥。逆而吐之。不能下之。不得無藥可治也。水積者。卽水腫之症。治法詳前首卷。茲不贅述。

疰症

疰症乾也。熱久傷陰。津液乾涸之病也。俗謂之童子勞。其症總因飲食不節。積滯化火。漸或生疔。生蟲。致成骨蒸。內熱。銷灼其陰。腹大筋青。毛焦髮直。飢胃枯燥。唇舌降紅。而疰症成矣。此症陰血既涸。勢已難回。况又有熱未清。積未去乎。善治者。必乘其陰血未涸之時。清其火。消其積。育其陰。調其脾胃。尙克有濟。初治宜清熱導滯湯。有蟲者。間服化蟲丸。若陰分既虛。用理陰和中煎。胃口不開。並用異功散。調其胃。俾得陽生陰長。庶幾有救。惟此症腹軟者。雖虛可治。爲其能補也。腹硬者。難治。爲其不可消也。

盜汗自汗

盜汗爲陰虛。自汗爲陽虛。然亦有秉質如此。終歲蓄以爲常者。此不必治也。若平日並無此症。又非夏秋暑月。而無端盜汗者。宜四物湯。加龍骨。牡蠣。浮小麥。北五味之屬。以養其陰。無端自汗者。宜四君子湯。加北五味。牡蠣。以養其陽。或加玉屏風散亦可。

咳嗽

小兒咳嗽。半由於風。初起以杏蘇煎散之。痰薄者。加半夏。生薑。痰濃者。加川貝。花粉。瓜葉之屬。肺有邪火。則瀉白散。此一定之治法也。若秋冬肺受火刑。則咳而無痰。甚者咳血。宜以貝母。瓜葉散。潤其肺。清肅之氣下行。則咳自止矣。

解頤龜胸龜背

解頤者。腦蓋未滿。頭顱不合。中陷而四角起。如古錢之形。此先天不足所致。在暑月服六味地黃丸。若在冬春之間。用補天大造丸。俟氣血漸充。則自合矣。龜胸者。肺熱作脹。胸骨高起。須白虎湯加瀉白散。以涼肺氣。如喘急者。難治也。龜背者。背骨高突如龜。此亦先天不足。督脈爲病。補天大造丸加金毛狗脊治之。

兒科列方

三黃湯。

黃芩。黃柏。黃連。大黃各一錢。濃煎。將絲棉作乳頭狀。蘸藥。時時令吮。每日五六次。不必盡劑。

益黃散。

陳皮一錢。訶子肉。參草各五分。丁香三分。

荆防散。

荆芥一錢。防風。蘇梗。川芎。陳皮各八分。杏仁一錢。甘草。雞皮各三分。

保和丸。

山楂。炭。茯苓。萊菔子各一錢五分。神糶。半夏。陳病。連翹各一錢。

和中丸。

白朮二兩。扁豆。茯苓。砂仁。半夏各一兩。枳實。神糶。炒麥芽。查炭。香附。丹參各一兩五錢。陳皮。五穀虫各二兩。共爲末。

每服三錢。

貝母瓜蒌散。

川貝二錢。瓜蒌仁一錢五分。山柰。黃芩。橘紅各一錢。甘草五分。熱甚加川連八分。痰多加膽星五分。

黃芩芍藥湯。

黃芩。白芍各二錢。生甘草一錢。

蒿皮四物湯。

生地三錢。北沙參。炙鱉甲各二錢。歸身。白芍。青蒿各一錢。地骨皮一錢五分。丹皮八分。甘草五分。

通關散

細辛、皂角各二錢。生半夏二錢。共研末。吹入鼻孔取嚏。

利火降痰湯

黃連六分、連翹一錢五分、山梔、滑石各一錢、木通、黃芩、枳實、瓜蒌霜、車前子各一錢、勾藤四錢、柴胡六分、甘草三分。

清腸煎

製膽星、木通各二錢、白芥子、川貝各三錢、海石三錢、陳皮一錢五分。

抱龍丸

膽星二錢、天竺黃一錢五分、雄黃、辰砂各一錢、麝香三分。共為末糊丸。燈心湯下。

清熱養血湯

細生地三錢、丹參一錢五分、黑山梔、青蒿、丹皮各一錢、赤芍八分、甘草五分。

七味安神丸

黃連、當歸、麥冬、茯苓、甘草各二錢、硃砂三錢、冰片二分。共研末為丸。燈心湯送下一錢。

藜香和中丸

藜香八分、厚朴、砂仁、陳皮、炙甘草各五分、生薑二片。此方加枳朮、白芷、蘇梗、川芎、香附、楂炭、麥芽。治感寒停食。

花火膏

燈花三顆煎湯

清中飲

川連五分、欒石屑、生穀芽各三錢、赤苓、車前各二錢、酒苓、藜香各八分。加薑汁炒竹茹一錢五分。

清熱湯

勾藤、錢山梔、連翹、青蒿各一錢五分、明礬、赤芍、香薷各一錢、滑石二錢、川連、柴胡各五分。

大和中丸

炒麥芽。查炭各三錢。枳實。砂仁各六分。陳皮。厚朴。澤瀉各一錢。

理陰和中煎。

生地。北沙參。生穀芽各三錢。地骨皮。首烏。青蒿子。炒麥芽。稽豆。度。牡蠣各二錢。白芍。查炭各一錢五分。厚朴。丹皮各

一錢。

清熱導滯湯。

胡黃連五分。地骨皮。查炭各二錢。青蒿。山梔。大腹皮各一錢五分。炒麥芽三錢。檳榔。厚朴。丹皮。生甘草各一錢。加紅

棗五枚。

玉屏風散。

生黃耆二錢。防風八分。

杏蘇煎。

杏仁二錢。蘇梗。前胡。赤芍。荆芥各一錢。陳皮八分。桔梗。甘草各五分。

瀉白散。

桑白皮。蜜炙一錢五分。地骨皮二錢。

竹葉石膏湯。

竹葉二握。生石膏一斤。半夏洗半升。人參三兩。甘草炙二兩。麥門冬一升。陳米半升。水一斗。先煮六味。取六升。去滓。

內梗米。煮米熟湯成。去米。溫服一升。日三。

白虎湯。補天大造丸。牛黃丸。至寶丹。四物湯。化蟲丸。六君子湯。二陳湯。平胃散。益元湯。四苓散。香薷飲。導赤散。六味

地黃湯。安神散。志丸。秘旨安神丸。七福飲。附子理中。需異功散。四君子湯（以上諸方定湯前）。



印翻准不有所權版

書全療治病百

冊卷書全

\$4.00

其師其理則的學外

編者 李涵馥

校者 范叔寒

印刷者 新文化書社

發行者 新文化書社

分發行者 全國各大書局

中華民國三十年九月重版

總發行所

上海四馬路中市

新文化書社

7181

204032-

