

聖濟總錄纂要

413.081
145
14001

中國醫學大成第四集

方劑類

聖濟總錄纂要一

上海大東書局印行



3 0472 8432 2

254626

聖濟總錄纂要提要

宋政和中奉敕編。清程林刪定。林字雲來。休寧人。四庫全書提要云。初徽宗御製聖濟經十卷四十二章。又詔集海內名醫。出御府所藏禁方秘論。纂輯成編。凡二百卷。以其原書繁重難行。且類似方重出者甚多。雲來就經驗所得。撮其概要。精選實驗證方。重爲纂輯。門類悉依其舊。所闕小兒方五卷。則倩其友項睿補之。仍冠以徽宗原序。大德四年。集賢學士焦惠校上序。及校刊諸臣銜名。考晁陳二氏書目。但有徽宗聖濟經。不載是書。觀焦惠序。稱始成於政和。重刊於大定。殆汴京破後。隨內府圖籍北行。南渡諸人。未睹其本歟。清乾隆時。汪瑤圃有大德本校勘重印。惟原闕二卷。無從補刊。日本有元大德刊足本。全二百卷。上海文瑞樓石印本。卽日本之原刻本也。蓋宋代崇尚醫學。搜羅至富。就所採錄。古來專門授受之方。尙可以見其大略。其每類冠論一篇。亦皆詞簡理明。均足以資考訂。原本之末。有神仙服餌三卷。或言烹砂煉石。或言嚼柏咀松。或言吐納清和。或言斬除三尸。蓋是時道教方興。故有是妄語。林病其荒誕。一概汰除。惟約取其尋常頤養之藥。

三十餘方。其別擇具有條例。故所錄諸方。多可通用。與墨守古法者異焉。

吳序

醫者意也。古人多不肯著書。然肘後禁方。又無不神驗者。書果可盡廢乎哉。歷攷載籍以來。藝文所志。軒岐家言。無慮數十百種。要皆通人畸士。卓然有傳世之識。而後發爲文章。按部就班。處方立案。嘉惠來學。其道與六經相表裏。近世學者。狃於所聞。守師承執一之見。其言固陋。而不能以相通。自誤誤人。弊至莫可紀極。無他。讀書不博。見道不真。用心不廣。坐是三者。而醫道或幾於熄。余戚友程雲來氏。鄞山世胄也。少從其叔祖敬通先生。講越人之術。先生道高望重。名滿天壤。雲來與之遊處者十餘年。盡得其真傳祕授。又其先明初有松厓公者。以名進士起家。一代偉人。精星象奇門岐黃術。著有醫案等書。雲來皆宗法之。故於方書。無所不讀。研窮考究。殫精竭思。以與古遇。出而仁民利物。稱國工鉅手焉。歲辛酉。余遊維揚。邂逅雲來於廿四橋頭。蓋方以校訂聖濟總錄一書。留此者幾一載矣。旣而向余曰。是書始末甚異。幸爲我序而傳之。余覽其發凡而觀其用心。雲來之不朽無疑也。夫雲來以名家子。負才倜儻。博奧多奇。間以餘情。溢爲圖篆繪事。得異人授

內養粹穆。顏如渥丹。至生平醫道所入。輒梓所著。諸書不名一種。散布人間。藏之者若寶籙。然挾此才技。安往不足以垂名立教。而顧以是書爲斤斤其立心。誠欲利濟天下。如范文正所云。不爲良相。卽爲良醫。是宜不朽者一。雲來得讀是書。刻本於敬通先生所。又三十餘年之久。始從友人江子郢上。再覩抄本。遂慨然有剞劂之志。而不欲自專其美。推原究極。詳著師友之淵源。是宜不朽者二。且是書自宋徽宗政和年間。詔集海內名醫。出御府所藏禁方秘論。纂輯成編。非人世所恆見。閱年既久。漶漫隨之。雖再刻於金大定。三刻於元大德。重以耶律楚材之論定。頒行終無解於若滅若沒之數。非雲來孰能表章及之者。是宜不朽者三。雲來以三不朽之盛心。又慮卷帙之繁重。於是刪訂收束。以便行笈之可攜。知古今之不一其宜也。於是酌損裁成。以定規條於可守。鴻編鉅典。特有雲來爲之發皇矣。雖然醫者意也。書不可盡廢。而亦不可徒泥陳言。顧用之何如耳。如或守一偏之見。而不知變通。雖日誦是書。復將奚益。又當進求雲來自著之心。傳而後可也。

康熙辛酉年八月既望同邑年家眷弟吳山濤頓首拜題

洪序

醫之道在隱顯。而功侔造化。始於神農黃帝之世。其後學者。相師延其術。無成書。歷唐虞三代二千有餘歲。大和保合。民不殀札。物無姁傷。及乎春秋戰國。王迹寢衰。人與天地正氣隔闕。而風寒暑濕燥熱。相運行於營衛經絡之中。乘情欲食飲。居起罷勞而爲之疾。於是秦越人。倉公扁鵲。淳於意者。各以其術顯。而素問靈樞。甲乙之書。因以出。然其高者。猶爲導引吐納。治之於未始有病之先。蓋人之身。陰陽合象而爲氣。清者曰氣。濁者曰血。血之大隧。謂之經。經之首曰衝。其次曰督。曰任。其次曰躄。皆先天隧。道。知而通之。可以長生。左右手足三陰三陽諸經。皆後天隧。道。知而調之。可以已病。平臍居腰而約束一周者帶也。是爲兼統先後天之隧。道。知而行之。可以出入生死。故帶衝督任躄五經者不病。其病則手足經病。經病乃移注五經。而陰陽十二經。又有系絡之數。三百六十有五。其隧穴六百四十有七。能通其道而治之。則醫之神祕盡矣。宋政和間。有聖濟總錄。彙勘禁方祕論。凡二百卷。再刻於金元。實醫學之河海。爲時方所掩者。迄今湮沒四百餘年矣。吾鄉

程子雲來。從其從祖敬通先生。繙閱是書有年。因思全書浩瀚。有不切於治者。遂纂其精要。得二十六卷。詳在凡例中。刻之廣陵。以行世。而問序於余。乃作而歎曰。是其道在隱見而功侔造化者乎。昔者黃帝與浮丘公鍊丹黃山。其處卽名鍊丹臺。雲來之先。有松厓先生讀書其上。獲遇至人。洞抉道奧。用之醫藥。人皆謂神。丘文莊公嘗以異人稱之。今雲來生長黃山。而僑居武林。又嘗從敬通先生遊。其有得於古今之書。與夫至人之所口授而闕之於世者。無不動見於發用之機。其睟然面背。類有道者。著釋甚多。此其一也。雖然。醫之道有要焉。逆與順是也。升降浮沉則順之。寒熱溫涼則逆之。如操舟者。知江河之險易。與風水之動靜。而順逆其道。不克濟。余故以前人之所著書。如李時珍之本草綱目。王肯堂之證治準繩。張景岳之類經素問。與是書皆有功於天地人物。真醫學之河海也。顧世之能用。變而通其方者。鮮矣。方也者。方舟也。並舟謂之方。所以濟川者也。然則雲來氏之所以纂聖濟總錄之要者。其不亦爲醫學之方舟。以濟人於河海也哉。是爲序。

康熙辛酉孟冬上浣。同里年家眷弟洪琮拜撰。

江序

士君子不能得志於當時。而欲以有用之才。建無窮之業。不得已著書立言。以傳後世。然披藻雕蟲。無關物命。猶之宋人楮葉。終歸無益已耳。范文正公有言。不能作良相濟天下。亦須作良醫濟生民。醫固有相之道哉。雖然投之餌。施之砭。起彼尪羸。厝之康強。而東西朔南。勢難徧及。故活人之術。莫如集古人遺編。公之天下。爲用力勤而施濟溥也。此聖濟總錄一書。余於是不敢棄。且不忍祕也。書故爲先君子鶴誠公增纂。手錄先君子生平著書。不下數十萬言。如纂序四書。說約春秋宗旨。學者咸律逮焉。然負才未遇。齋志長逝。當時亦必以天下爲己任。而因感於范公之言。不作良相。須作良醫。以岐黃術救諸疾痛患。苦於天下。於是殫精畢智。搜微索隱。參考是書。且集近代驗方。以補其所闕。猶謂襁褓提攜。口不能宣。手不能筆。其急切較倍。而醫治尤難。故幼科五卷。葺遺增略。不惜餘力。先君子之志。可謂切矣。豈意棗梨未登。而松楸隕泣也。嗚呼。先君子之志。不亦可悲哉。余因是益不敢棄。且不忍祕也。於今三十餘年矣。鴛湖程雲來先生見而惜之。惜其書久祕。

而恐終於棄置也。乃爲刪繁撮要。得二十六卷。剗刷之工。計一載而成。此先君子志哉。余何幸遇之。粵稽是書。輯於宋政和間。歷金至元。耶律楚材復加纂訂。元以後久無刻本。計元至今已四百年。余因思是書之傳。得先君子而世守之。先君子之志。得程先生而闡發之。由是仲景外感。東垣內傷。河間表熱。丹溪陰虛。諸家之言。莫不咸備。九州千載。按形證以尋病源。察脈候以酌治方。雖人俞跗而家華扁可也。又奚事於隔垣之見。剗腹破臂之詭乎。至原本有鍼灸。有符禁。有乳石發動。有食治。概從刪削。謂素問可以養生。古法不盡掌錄。奇隱之證少。而食性或未宜。勾漏之砂。亦不易得也。然是書傳。亦可以見先君子之志悲且切。而程先生之功。真足與醫國等也。若余什襲有年。保守無斃。實不敢墜先君子遺緒云爾。詎敢貪天之功以爲世業也與。

康熙二十年歲次辛酉長至日古歛江湘郢上氏謹書於貊其堂中

宋徽宗御製聖濟總錄序

生者天地之大德。疾者有生之大患。方術者治病之大法。昔者神農氏、黃帝氏、獨觀太初。旁燭妙有味百藥以辨物。審百疾以全生。其制名其取類。其正君臣。其立佐使。其見於太素玉冊之書。雷公、岐伯之問。蓋皆開神明之蘊。窮陰陽之變。原性命之理。而與天地同其覆載。中古以還。鑱之玉版。藏之金匱。功利及草木。惠澤被牛馬。所以遺天下後世甚厚。歷年既久。流弊滋甚。糟粕具在。而精意不傳。內經有病名而莫之究。有治法而莫之習。極其妙至於通仙而莫之悟。人之生也。其位參於天地。其靈貴於萬物。形不盈仞。而心侔造化。崑崙尺宅。修之可以長生。寸田神牖。闢之可以反照。天關神廬。息之可以召和。去土符。書金格。鍊丹却粒。御氣凌虛。不假於物。而裕然自足。嗟夫。達士可以神解。昧者且不能養其形。而况於了其心乎。內之五臟六腑。外之九竅四關。著之於色。發之於聲。寓之於三部九候。一失其平。則疾病隨。神聖治於未兆。工巧救其已然。非天下之至精。孰能探天下之至蹟。非天下之至粗。孰能祐天下之至神。朕憫大道之鬱滯。流俗之積習。斯民之沈痼。

庸醫之妄作。學非精博。識非悟解。五行之數。六氣之化。莫索其隱。莫擬其遠。曰寒曰熱。曰寒熱之相搏。差之毫釐。失以千里。而有餘者益之。不足者損之。率意用法。草石雜進。夭枉者半。可勝嘆哉。萬幾之餘。著書四十二章。發明內經之妙。曰聖濟經。其意精微。其旨邁遠。其所言在理。所以探天下之至蹟。又詔天下以方術來上。并御府所藏。頒之。爲補遺一卷。治法一卷。卷凡二百。方幾二萬。以病分門。門各有論。而序統附焉。首之以風疾之變動。終之以神仙之服餌。詳至於俞穴。經絡。祝由。符禁。無不悉備。名之曰政和聖濟總錄。其所載在事。所以祐天下之至神。蓋聖人之賦世。本在於上。末在於下。無見於上。則治之道不立。無見於下。則治之具不行。經之所言者道也。醫得之而窮神。總錄之所載者具也。醫用之而已疾。漢張仲景作傷寒論。而雜之以方。唐孫思邈作千金方。而繼之以翼。以謂不如是。則世莫能用其術。然之二人者。游於方術之內者也。彼超然獨見於方術之外。下顧岐伯之流。而與之議。始可謂知道。朕作總錄。於以急世用而救民疾。亦斯道之筌蹄云耳。天下後世。宜致思於忘筌蹄而自得者。俯仰之間。嘖笑之度。御五行之數。運六氣之化。以相天地。以育萬物。至於反營魂而起當生者。豈細事哉。蓋將有來者焉。

焦序

臣聞天地以溥生爲大德。所以曲成萬物而不遺。聖人贊天地之化育。故歛時五福。以數錫於庶民。夫民之爲物也。知者寡。愚者衆。起居失常。食飲無節。外爲寒暑燥濕風。以賊其形。內爲喜怒思憂恐。以亂其氣。形氣乃傷。疾所由作。聖人有憂之。謂祝由不可以盡已也。遂制藥石鍼艾。以攻八風六氣之邪。爲湯液醪醴。以佐四時五行之正。防其未然。救其已病。然後物各遂其生。民不夭其命矣。又謂非立憲言。不可以福萬世也。於是上法天道。下因地宜。究陰陽之本。明生死之由。考於古而驗之。今取諸己而施之人。定爲成書。著之玉版。藏之金匱。宣之於布政之堂。祕之於靈蘭之室。以俟來哲。以施無窮。其爲仁民愛物之心。斯可謂極矣。然其言至簡。其論至要。其理至深。後世學者。雖有上智。非研精覈慮。則亦未易窺其奧也。故曠代之中。能以斯術鳴世者。時固有之。若夫神聖工巧。獨得先世不傳之祕。如和緩越人。亦不過十餘人而已。况去聖已遠。支分派別。析而爲衆科業。而爲專門。所以人各拘其偏。而莫肯究其全。則益不逮於古矣。積習成常。流弊茲甚。懼大道將

遂於湮微。故聖濟總錄。由是而作焉。上下凡二百餘卷。始終幾二百萬言。逐病分門。門各有方。據經立論。論皆有統。蓋將使讀之者。觀論以求病。因方以命藥。則世無不識之病。病無妄投之藥。唯法有逆從。治有先後。在乎智者。擇其所當。從其所宜而已。究而言之。實醫經之會要。學者之指南。生民之司命也。惜其始成於政和。重刊於大定。既綿歷百年之久。不能無三豕之訛。今主上神極御天。修節制度。治具畢張。以謂是書所載。雖先聖之緒餘。其所以康濟斯民。亦致治之一助也。迺詔江浙行省。刊於有司。布之天下。其或繆戾。隨加釐正。復降德音。俾下臣爲之序引。臣誠愚陋。竊不自量。仰惟聖德如天。甄陶萬類。爰自卽位以來。于年七年。恩浹飛沈。仁及草木。然猶夙夜孜孜。廣求民瘼。或一物不得其所。則必爲之惻然。臣謂此書復出。則上可以輔相天地之宜。下可以永底蒸民之生。物無疵癘。咸躋於仁壽之域矣。

大德四年二月一日集賢學士嘉議大夫典瑞少監臣焦養直謹序

方技之書。尙之久矣。聖人治世。亦所不能後者也。若夫黃帝內經。神農本草。秦越人之八十一難經。仲景之三百九十七法。王叔和之脈訣。朱奉議之活人。固在所

勿論其餘千方萬論。歷世所傳。誠不爲不多。然得其全者或寡矣。故近代諸書。獨不若聖濟總錄之詳且備也。聖主以至仁爲心。勤卹民隱。所以首命板行之於天下。非惟重下民今日之命。蓋將有開於先而覺於後也。書曰贊贊襄哉。夫是書之行也。雖本於上意之所注。其所以始而終之者。亦近臣有以贊襄之也。故凡與斯議者。并附於左。

醫愈郎諸路醫學副提舉臣申甫

醫効郎御藥院副使臣王希逸

承直郎太醫院判官臣和思誠

奉訓大夫太醫院判官臣隋有

朝列大夫太醫院副使臣王佐

集賢直學士朝列大夫太醫院副使臣歐陽懋孫

中順大夫太醫院使臣韓公麟

少中大夫同提點太醫院事臣汪斌

嘉議大夫提點太醫院事臣麻惟繇

正議大夫同簽樞密院事左衛親軍都指揮使提點太醫院事臣鄭忙古仄
昭文館大學士正奉大夫提點太醫院事臣李邦寧
榮祿大夫平章政事大都護提點太醫院事臣脫因納

凡例

一、是書宋徽宗政和。詔集海內名醫。併出御府所藏。彙成共二百卷。禁方祕論。人所未聞。按病治療。無不奇驗。厥後再刻於金大定。三刻於元大德。自耶律楚材精較。奉詔頒行天下。越今四百餘年。無有剗削。此書幾幾泯滅矣。余昔從先叔祖敬通。夫子繙閱刻本。今經三十餘年。又從友人江郢上。再觀抄本。撫今追昔。不勝愉快。郢上請余刪繁纂要。以便梓行濟世。因留淮揚一載。纂其精粹。去其繁蕪。共得二十六卷。誠醫家之雲笈瓊函。方藥中之赤文綠字也。博覽者知之。一、大德重較聖濟總錄。元朝奉詔頒行者。大板大字。每卷首篇署元耶律楚材五字。明朝武林高相國家抄本。用綿紙硃格。繕寫精工。亦依內府式大板大字。今刻小板密字。以便行笈可攜。檢方療病也。

一、是書方法深奧。博學究心者。方能領會。如虛勞紫雪方。有追攝義。霍亂青金散。有劫奪義。熱痢黃連湯。有反佐義。用之皆取效如神。至若調七傷。平五志。攻六氣。理三因。方中有參附。而用硝黃者。有桂附。而用芩連者。必須熟諳古人方經。

庶幾領會方法之妙也。

一、書中婦人門。選其胎前產後。帶漏崩中。小兒門。選其急慢諸風。五疳吐瀉。若一切雜症。與大人治法不殊。於大人方中。推類酌量用之。

一、書中運氣集定六十年。每年可按素問稽查。茲不刻。

一、書中鍼灸四卷。符禁三卷。古法不易行。乳石發動二卷。今人罕此患。又食治三卷。藥食不合宜。俱不刻。

一、方中難得藥品。如金牙、銀牙、礬石、莽草之類。不刻。難合之方。廢時日而不能應。倉卒急需者。亦不刻。

一、方中藥名。仍從原本。如天麻爲赤箭。牛旁爲惡實。又爲鼠粘。甜桔梗爲薺芘。山梔爲越桃。柴胡爲茆胡。土茯苓爲菝葜。香附爲莎草根。薄荷爲鷄蘇。砂仁爲縮砂。蜜花粉爲栝樓根。輕粉爲膩粉。如此之類。不能更改。

一、方中分兩。古法難用。今欲更改。又失古人之意。大約方中一兩。今用一錢。方中一分。古法係二錢五分。今用一字。二分。一匕有半錢至五錢者。在人以意消息加減可也。

一、是書成於北宋。其時四大家未生。劉河間李東垣張子和朱丹溪無一切活套。應時方法。補中益氣道遜歸神四君之類。醫家遇沉疴痼疾。疑難奇異等證。用時方而不奏效。良工亦束手者。是書有神方也。

一、聖濟經四十二章。發明靈素精微。鉤玄索隱。補聖經之未備。家有藏本。嗣刻行世。

康熙辛酉桂月靜觀居士程林雲來氏識於淮陰翕順堂中

聖濟總錄禁要 凡例

聖濟總錄纂要目錄

卷一

諸風門	一
諸風統論	一
中風	二
卒中風	五
肝中風	九
心中風	〇
脾中風	二
肺中風	四
腎中風	五
攤緩	七
<small>俗名 癱瘓</small>	

聖濟總錄纂要 目錄

風痺曳	二一
中風四肢拘攣不得屈	
伸	二三
風癱	二五
角弓反張	二六
中風失音	二八
風口噤	三一
風口喎	三三
破傷風	三五
偏風	三八
風偏枯	四一
肉苛	四二

卷二

歷節風	四五
中風百節疼痛	四六
風走注疼痛	四八
白虎風	五〇
風不仁	五二
風瘙癢	五三
風痞癩	五五
風瘙癢癭	五七
諸風門	一
蠱風	一
肌肉瞤動	三
風癩	四

風癩	六
風狂	一〇
腦風	一一
風頭眩	一四
風頭痛	一七
偏頭痛	二〇
漏風	二一
勞風	二二
風頭旋	二四
風痰	二六
胃風	二八
風秘	二九
癱瘍風	三二
白駁	三三

白癩風	三五
紫癩風	三六
惡風	三八
大風眉鬚墮落	四〇
大風出蟲	四二
大風癩病	四三
烏癩	四八
白癩	四九
諸痺門	五一
諸痺統論	五一
痛痺	五二
著痺	五三
行痺	五五
皮痺	五六

肌痺	五八
血痺	五九
脈痺	六〇
筋痺	六一
骨痺	六三
腸痺	六五
周痺	六六
痺氣	六八
熱痺	六九

卷二

傷寒門	一
傷寒統論	一
傷寒可汗	三

傷寒可下	八
傷寒可吐	一一
傷寒可溫	一三
傷寒過經不解	一七
中風傷寒	一九
傷寒濕溫	二二
傷寒時氣	二五
傷寒疫癘	二八
傷寒結胸	二九
傷寒譫語	三二
傷寒潮熱	三五
傷寒煩渴	三七
傷寒煩躁	四〇
傷寒厥逆	四二

卷四

傷寒頭痛	四四
傷寒喘	四七
傷寒上氣	四九
傷寒咳嗽	五〇
傷寒門	一
傷寒乾嘔	一
傷寒嘔噦	三
傷寒心悸	四
傷寒痞滿	六
傷寒霍亂	九
傷寒小便不通	一一
傷寒大便不通	一二

傷寒下利	一四
傷寒陰毒	一七
傷寒陽毒	一九
傷寒發斑	二一
傷寒發黃	二二
傷寒發疏豆瘡	二六
傷寒發狂	二七
傷寒剛瘕	二九
傷寒柔瘕	三〇
傷寒壞病	三二
傷寒狐惑	三三
傷寒百合	三六
傷寒陰陽易	三八
傷寒衄血	四〇

傷寒吐血	四三
傷寒瘀血	四四
傷寒口舌生瘡	四六
傷寒舌腫脹	四七
傷寒咽喉痛	四八
傷寒毒攻手足	四九
傷寒後夾勞	五一
傷寒後勞復	五三
傷寒後骨節煩疼	五四
傷寒後虛煩	五五
傷寒後盜汗	五八
傷寒後驚悸	五九
傷寒後失音不語	六〇
傷寒後咽喉閉塞不通	六二

卷五

傷寒後變成瘧	六四
傷寒後脚氣	六五
傷寒後利下膿血	六七
傷寒後蠱瘡	六八
辟瘟疫令不相傳染	七一
瘧疾門	一
諸瘧統論	一
寒瘧	二
溫瘧	五
寒熱往來瘧	六
痺瘧	七
間日瘧	九

痰瘧	一一
溲瘧	一一
勞瘧	一三
久瘧	一七
鬼瘧	一八
瘧母	一九
瘧疾發熱身黃小便不利	二一
瘧痢	二三
瘧氣	二四
瘧瘧	二七
中暍門	二九
中暍統論	二九
中熱暍	三〇

卷六

中暍悶絕	三二
霍亂門	三四
霍亂統論	三四
霍亂吐利	三五
霍亂嘔吐不止	三七
霍亂四逆	三九
霍亂心腹痛	四〇
乾霍亂	四一
中惡霍亂	四三
霍亂乾嘔	四四
霍亂轉筋	四五
泄痢門	一

泄痢統論	一
水瀉	二
濡瀉	四
飧泄	五
洞泄寒中	六
鶩塘	七
白滯痢	八
冷痢	九
熱痢	一一
赤痢	一二
血痢	一三
膿血痢	一五
赤白痢	一七
氣痢	二一

卷七

休息痢	二四
蠱痢	二六
久痢	二七
下痢裏急後重	二九
痢後脫肛	三〇
疝露	三二
濕露	三三
咳嗽門	一
咳嗽	一
暴嗽	三
久嗽	四
冷嗽	六

熱嗽	八
呷嗽	九
五臟諸咳嗽	一
咳嗽上氣	一四
咳嗽唾膿血	一七
咳嗽失聲	二〇
風冷聲嘶	二二
諸氣門	二三
諸氣統論	二三
上氣	二五
上氣喉中如水雞聲	二六
短氣	二七
陽厥	二八
積聚門	三〇

卷八

吐血門	積聚統論	積聚	肥氣	伏梁	痞氣	息貫	貫豚	諸癥	結癥	疝氣	酒癥
.....
一	三〇	三〇	三三	三五	三六	三八	三九	四二	四三	四四	四六

脚氣門	脚氣統論	風毒脚氣	脚氣痺攣	脚氣門	脚氣統論	大衄	衄不止	鼻衄	汗血	舌上出血	唾血	嘔血	吐血不止	吐血統論
.....
一九	一九	一九	二二	一九	一九	一六	一三	一一	九	八	七	六	四	一

脚氣疼痛不仁……………二五

脚氣上氣……………二七

脚氣腫滿……………二九

脚氣心腹脹滿……………三一

脚氣衝心……………三二

脚氣語言蹇澀……………三七

乾濕脚氣……………三八

脚氣變成水腫……………四〇

脚氣大小便不通……………四二

江東嶺南瘴毒脚氣……………四三

脚氣雜治膏藥淋瀝等……………四五

卷九

膈氣門……………一

膈氣統論……………一

五種膈氣……………二

膈氣嘔逆不下食……………五

膈氣痰結……………六

嘔吐門……………七

嘔吐統論……………七

嘔吐……………八

乾嘔……………一〇

痰飲門……………一

痰飲統論……………二

痰癖……………三

支飲……………四

留飲……………五

冷痰……………七

卷十

聖濟總錄纂要 目錄

熱痰	一九
膈痰積實	二一
膈痰風厥頭痛	二二
消渴門	二四
三消統論	二四
消渴	二五
消渴煩躁	三〇
消渴小便白濁	三一
久渴	三三
消渴後成水	三四
消渴後成癰疽	三五
消中	三七
消腎	三九

水病門

水病統論

水腫

十水

風水

石水

大腹水腫

水腫欬逆上氣

水氣徧身腫滿

水蠱

膜外氣

卷十一

黃疸門

黃疸統論	一
黃疸	二
急黃	五
陰黃	七
酒疸	八
穀疸	一〇
胃疸	一一
黑疸	一二
女勞疸	一三
黃汗	一四
三十六黃	一六
胸痺門	一七
胸痺統論	一七
胸痺	一七

卷十一

胸痛	一一
胸痺心下堅痞急	一九
胸痺噎塞	一九
心痛門	一
心痛統論	一
心痛	二
卒心痛	五
久心痛	七
肝心痛	九
脾心痛	一〇
胃心痛	一一
腎心痛	一二

厥心痛	一三
九種心痛	一四
停飲心痛	一七
蟲心痛	一八
冷氣心痛	二〇
中惡心痛	二一
惡注心痛	二二
心掣	二三
心腹門	二四
心腹痛	二四
腹痛	二五
久腹脹	二八
腹脹腸鳴切痛	二九
腹內結強	三〇

腹脹	三二
臑脹	三三
脅肋痛	三四
息積	三五
腰痛門	三七
腰痛統論	三七
腰痛	三七
卒腰痛	三八
風濕腰痛	三九
腰痛強直不能俛仰	四〇
腰脚冷痺痛	四二
卷十二	
虛勞門	一

虛勞統論	一
肝勞	二
心勞	四
脾勞	六
肺勞	八
腎勞	一〇
冷勞	一一
熱勞	一二
氣勞	一四
急勞	一六
風勞	一七
虛勞咳嗽	一九
虛勞痰飲	二〇
虛勞寒熱	二一

虛勞潮熱	二二
虛勞盜汗	二四
虛勞咳嗽膿血	二五
虛勞嘔吐血	二七
虛勞不得眠	二八
虛勞失精	三〇
虛勞小便白濁	三二
白淫	三四
筋極	三六
氣極	三七
脈極	三七
肉極	三八
骨極	三九
精極	四〇

卷十四

骨蒸傳尸門	一
虛勞五蒸	一
骨蒸肺痿	七
傳尸骨蒸	九
傳尸勞	一三
諸疝門	一四
寒疝	一四
心疝	一六
厥疝	一七
寒疝心腹痛	一八
七疝	二〇
蠱病	二一

卷十五

陰疝門	二二
陰疝統論	二三
陰疝	二三
陰疝腫縮	二六
陰疝卒腫痛	二七
控辜	二八
大小便門	一
大小便統論	一
大小便關格不通	二
小便不通	四
小便不禁	六
小便利多	九

小便出血	一一
大便秘澀	一四
結陰	一八
諸淋門	二〇
諸淋統論	二〇
卒淋	二〇
冷淋	二二
熱淋	二四
氣淋	二五
血淋	二六
膏淋	二八
石淋	二九
勞淋	三一
九蟲門	三二

九蟲統論	三二
九蟲	三三
虻蟲	三四
寸白蟲	三六
蟯蟲	三八
五臟蟲	三九
三蟲	四三
諸尸門	四五
諸尸統論	四五
諸尸	四五
遁尸	四七
飛尸	四七
尸注	四八
諸注門	四九

卷十六

諸注統論	五〇
諸注	五一
風注	五一
走注	五三
鬼注	五三
氣注	五五
卒魘不寤	五六
中惡	五八
卒死	五九
尸厥	六〇
鬼魅	六一
鬼擊	六二

臟腑虛實門	一
肝脹	一
肝氣逆面青多怒	二
膽腑門	四
膽虛	四
膽實	五
膽虛不得眠	六
膽熱多睡	八
膽痺	九
心臟門	〇
心中寒	〇
心健忘	一
善笑	一
小腸腑門	五

小腸虛	一五
小腸實	一六
脾臟門	一七
脾瘰	一七
穀勞	一九
胃腑門	二〇
食飢	二一
胃反	二二
噦	二五
噫醋吞酸	二六
胃寒腸熱	二八
胃熱腸寒	二九
肺臟門	三一
肺消	三一

膈消	三二
肺痿	三三
肺痿咽燥	三五
肺痿小便數	三七
肺癰	三八
肺癰喘急脘滿	四〇
大腸腑門	四一
腸垢	四二
虛癢	四二
腎臟門	四三
腎虛	四三
腎實	四七
腎脹	四八
解飲	四九

卷十七

瘖俳	五〇
腎虛陽痿	五一
腎虛多唾	五三
骨虛實	五四
髓虛實	五五
膀胱腑門	五六
胞痺	五六
胞轉	五七
面體門	一
面黧黯	一
面疔炮	三
面鼓炮	四

面鼓	五
面體疣目	六
狐癩	七
滅癩痕	九
髭髮門	一
眉髭髭髮統論	一
烏髭髮	二
鬚髮黃白	三
白禿	四
赤禿	四
眼目門	六
眼目統論	六
肝虛眼	七
肝實眼	八

目胎赤	二〇
目赤痛	二二
目熱疼痛赤腫	二四
目赤爛	二五
目血灌瞳人	二七
赤脈衝貫黑睛	二八
璧睛	二九
蟹目	三〇
目珠子突出	三二
目見黑花飛蠅	三三
息肉淫膚	三五
目生贅肉	三七
目内生瘡	三九
目膿漏	四〇

卷十八

目生珠管	四一
雀目	四二
目瞼垂緩	四四
目瞼腫靨	四六
倒睫拳攣	四七
眼目門	一
目生膚翳	一
目生花翳	三
目青盲	四
將變內障眼	六
目眇瞶	八
眯目	一〇

鍼眼	一一
耳病門	一三
耳病統論	一三
耳聾	一三
風聾	一七
勞聾	一八
五聾	二〇
耳聾有膿	二〇
耳虛鳴	二二
耳聾	二五
聾耳	二六
百蟲入耳	二七
鼻病門	三〇
鼻病統論	三〇

卷十九

鼻塞氣息不通	三一
鼻塞不聞香臭	三二
艱鼻	三四
鼻中生息肉	三五
鼻淵	三六
鼻流清涕	三七
鼻中生瘡	三九
疳蟲蝕鼻生瘡	四〇
口齒門	一
口齒統論	一
口瘡	二
口糜	五

口吻瘡	六
口舌生瘡	七
口瘻	八
脣瘡	〇
脣生核	一
重舌	三
舌腫強	三
牙齒歷蠹	五
牙齒疼痛	六
齒齲	七
蟲蝕牙齒	九
腎虛齒風痛	一
齒風腫痛	二
齒斷腫風 <small>附</small>	三

風疔	二四
齒間出血	二五
齒齲	二六
牙齒動搖	二七
咽喉門	二八
咽喉統論	二八
喉痺	二九
馬喉痺	三一
咽喉生癰	三二
尸咽喉	三四
咽喉中如有物妨悶	三五
骨鯁	三七
誤吞諸物	四〇
癭瘡門	四一

卷二十一

五癭	四一
諸瘡	四二
癩癧門	四三
癩癧結核	四三
癩癧寒熱	四五
癩癧久不差	四六
癩疽門	一
癩疽統論	一
附骨癩	四
乳癩	五
腸癩	八
胃脘癩	一〇

卷二十一

附骨疽	一一
瘡腫門	一三
諸瘡	一三
諸惡瘡	一六
反花瘡	一七
浸淫瘡	一八
下注瘡	二〇
冷瘡	二二
月蝕瘡	二三
凍爛腫瘡	二四
癩瘡 <small>今之膿瘡</small>	二六
漆瘡	二七
湯火瘡	二九

瘡腫門	一
丁腫	一
諸疥	三
諸癬	六
代指 <small>即天蛇頭</small>	七
諸丹毒	九
癩瘡	一一
肉刺	一二
金瘡門	一三
金瘡血不止	一三
金刃傷中筋骨	一五
金瘡中風水及癰	一六
金瘡腸出	一八
毒箭所傷	一九

箭鏃金刃入肉	二〇
狐尿刺	二二
惡刺	二三
竹木刺傷肌肉不出	二四
痔瘻門	二六
諸痔	二六
牡痔	二七
牝痔	二八
脈痔	二九
血痔	三〇
腸痔	三二
氣痔	三四
痔瘻	三四
腸風下血	三五

傷折門……………三八

傷折統論……………三八

從高墜下傷損腫痛……………三八

傷折惡血不散……………四〇

筋骨傷折疼痛……………四一

傷折風腫……………四四

卷二十一

傷折門……………一

打撲損傷……………一

被傷絕筋……………三

諸骨蹉跌……………四

傷損止痛生肌……………四

傷折貼燻并膏藥……………六

雜療門……………七

中藥毒……………七

食毒……………一〇

食諸菜蕈菌中毒……………一一

飲酒中毒及大醉不解……………一二

食牛馬猪犬魚蟹中毒……………一四

解金銀銅鐵石毒……………一七

蠱毒……………一九

獺犬齧……………二二

蛇螫……………二三

諸蟲齧……………二五

溺水死附胎死……………二七

卷二十二

婦人門	一
氣血統論	一
婦人月水不通	一
婦人月水不斷	二
婦人月水來腹痛	四
室女月水不通	六
帶下	八
漏下	一
經血暴下	一
經血暴下兼帶下	一六
婦人血分	二〇
婦人水分	二一
婦人無子	二二
妊娠門	二四

妊娠惡阻	二四
妊娠漏胎	二六
妊娠胎動下血	二八
妊娠胎萎燥	三〇
妊娠胎不長養	三二
妊娠嘔逆不下食	三三
妊娠咳嗽	三四
妊娠傷寒	三五
妊娠下痢	三七
妊娠子淋	三九
妊娠浮腫	四〇
妊娠小便不通	四二
妊娠大小便不通	四三
妊娠半產	四四

妊娠數墮胎……………四五

卷二十四

產難門……………一

逆產……………一

難產……………四

子死腹中……………七

息胞即胞衣不出……………一

產後門……………一四

產後血暈……………一四

產後語言妄亂……………一五

產後中風……………一七

產後中風口喎……………一九

產後中風角弓反張……………二一

產後暮勞……………二二
產後大便不通……………二四
產後乳汁不下……………二七
產後妬乳……………二九
產後乳結核……………三〇
產後乳結癰……………三一

卷二十五

小兒門……………一

小兒初受氣法……………一

小兒相法……………二

浴兒法……………二

口噤……………二

撮口……………三

鵝口	四
重膈	五
臍風	六
解顛	七
顛陷	八
急驚風	九
慢驚風	一〇
天癩	一一
諸疔	一二
無辜疔	一三
哺露丁奚	一四
嘔吐	一五
噦吐男	一六
泄瀉	一七

卷二十六

洞泄注下	二五
燕口瘡	二七
語遲	二八
齒不生	二九
涎液不收	三〇
神仙服餌門	
神仙服草木藥石	一
補益門	七
平補	七
峻補	一〇
補虛益氣	一一
補虛益精髓	一三

補虛固精	一六
補虛壯元陽	一七
補虛理腰膝	一八

聖濟總錄卷之四 目錄

聖濟總錄纂要

清

新安

程

林雲來纂輯

鄞縣

曹炳章

赤電校點

卷一

諸風門

諸風統論

論曰。易曰。撓萬物者。莫疾乎風。夫以吹噓鼓舞。異而易入。枯者榮者。成物之功。實在於是。然而分四時。位八方。適應其時。則爲正。弗循其方。則爲邪。人惟萬物之靈。能察諸此。觀冬至之日。有從南方來。必曰賊風。其他可類推矣。感之淺者。留於肌膚。感之深者。達於骨髓。而况倉卒頃刻之間。大可畏懼。因有治療所不遑者。蓋禍患之機。藏於細微。非常人所豫見。及其著也。雖智者不能善其後。是以上古聖人

之教下。皆謂之虛邪賊風。避之有時。不然。何以言風者。百病之始。風者百病之長。風者善行而數變。先聖之言。可深思之。

中風

論曰。風邪中人。以春甲乙得之爲肝風。以夏丙丁得之爲心風。以季夏戊己得之爲脾風。以秋庚辛得之爲肺風。以冬壬癸得之爲腎風。若中其五臟六腑之俞。則各隨其證而治之。人生自幼穉至於老耄。率多因風而致疾。或嗜食傷飽。或不食失飢。或渴而失飲。或飲而過量。或因五味之傷。或冒熱衝風。或大寒近火。或暴露寒溼。或刺損肌膚。撲傷肢體。或失節宜。或多嗜慾。緣此風趨諸竅。或留一偏。遂使手足不隨。言語蹇澀。或痛連骨髓。或痺襲皮膚。瘙癢如蟲行。癢痺如錢石。或多痰好睡。或健忘多嘔。血脈不行。肉色乾瘦。久在牀枕。起便須人。語澀面浮。精神困耗。皆其證也。

附子湯方 治中風欲死。身體緩急。目不得開。舌強語澀。

附子破去皮臍 芍藥

藥

甘草

麻

黃去根節先煎
麻去沫焙

白朮各一

防風去叉

防己各半

人參

黃芩去心

桂去皮

獨活去蘆

芎藭各一

天雄炮製去皮

右一十三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生薑半分切。煎至八分去滓。

空心日午夜臥各溫服。如人行五里。以熱生薑粥投之。微汗出。慎外風。

麻黃湯方 治中風肢體弛緩。言語蹇澀。精神昏憤。

麻黃去根節先煎掠

桂去粗皮

獨活去蘆

羚羊角鎊各三分

萎蕤一切焙

葛根剉三分

升麻

防風去叉各半

石膏碎六

甘草炙剉三分

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓溫服。如人行五里。再

服。用熱生薑稀粥投。汗出。慎外風。

薏苡仁湯方 治中風肢體緩縱。精神恍惚。言語蹇澀。

薏苡仁炒五

萎蕤切焙

茯神去木各

犀角鎊二

烏梅七枚

麥門冬去心焙

右六味粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生薑半分切。煎至八分去滓。入竹瀝。白蜜各少許。再煎三五沸。食後日午夜臥各一服。

吐痰白礬散湯。治初中風。失音不語。昏昧不知人。先宜吐風痰。令省覺。次可服

諸湯散。

白礬生脷

生

薑一兩。連皮搗碎。水二升。煎取一升二合。

右二味。先細研白礬如末。入濃煎生薑湯。研濾分三服。旋旋灌。須臾吐出痰毒。眼開風退。方可救治。若氣衰力弱。不宜猛性藥吐之。

防風湯方。治中風不語。兩目不開。手足抽掣。發歇往來。昏塞涎潮。

防風去叉

羚羊角鎊

獨活去蘆

赤

箭即天麻苗之無

當歸切焙

麻黃去根

杏仁湯浸去

桂

去皮各一兩

前胡去蘆

秦艽去苗

甘草各半

右一十一味。粗搗篩。每服四錢匕。以水一大盞。生薑半分切。煎至七分去滓。不

計時溫服。

取涎丸方。治中風不語。喉中如拽鋸。口中沫出。

天南星大者一枚去浮皮剉中作坑入醋令

藜蘆一分

右二味。搗研爲末。用麵糊丸。如桐子大。每服三丸。溫酒下。良久吐出痰涎爲效。

吐不止。用冷葱湯呷卽止。

羚羊角丸方 治中風手足癱痺。行履艱難。

羚羊角屑

桂皮去粗

白檳榔煨剉

五加皮剉

杏仁去皮尖炒黃

人參

丹參

柏子仁

枳殼去瓤炒

附子製炮去皮 茯苓神去木

防風去叉

熟乾地黄焙

麥門冬去心焙 南木香

牛膝酒浸切焙

薏苡仁二兩半

右一十七味。搗羅極細。鍊蜜爲丸。梧桐子大。每服空心溫酒下三十丸。日二服。

卒中風

論曰。內經謂邪風之至。疾如風雨。言邪之迅速如此。卒中風之人。由陰陽不調。腑臟大虛。氣血衰弱。榮衛乏竭。故風之毒邪。尤易乘間。致仆倒悶亂。語言蹇澀。痰涎

壅塞。肢體癱痺。不識人事者此證也。

奪命散方。法中風卒倒。不省人事。口面喎斜。失音不語。但吐涎沫。或口噤不開。

目膜垂死。一切風疾。

黑豆一合

烏鷄糞

馬牙硝研

龍

膽去蘆頭剉碎一分

共四味。先將鷄糞及豆同炒熟。次入龍膽馬牙硝拌勻。以酒三盞煎二盞去滓。

分三服。不拘時候溫服。

救生散方 治卒中風。

白礬

半夏

天南星等分

同為細散。每服以好酒一鍾。藥末二錢匕。生薑三片煎七分。通溫灌之。當吐涎。

扶令正坐。經一復時。不得令臥。如臥則涎難出。良久再依法煎藥一錢。後常服。

只半錢。

篋竹瀝飲方 治卒中風倒悶。口噤不能語。昏不知人。鍼不知痛。

篋竹瀝五合

防風

甘草

桂

各一

防己

麻黃

白朮

人參

各一

黃芩

細辛

茵芋

秦艽去土

附子去皮臍

生薑焙乾

除竹瀝外。剉麻豆。每服五錢匕。水一鍾半。竹瀝一合。同煎至一盞。去滓。溫服。不拘時。

羌活湯方 治卒中風悶亂。語言蹇澀。牙關緊急。

羌活

桑根白皮

麻黃

天雄去皮

當歸各二

桂

旋復花炒

遠志各一

大腹皮

甘草

芎藭

威靈儂

枳殼去瓤

菖蒲各一

杏仁湯浸去皮

剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生薑三片。煎至八分。去滓。溫服。不拘時。

阿膠丸方 治腑臟久虛。氣血衰弱。卒中風邪。及攤緩等疾。

阿膠炙令

蟬殼去土

犀角屑

麝香三錢

白花蛇三分

桂一兩

白鮮皮

白殭蠶炒

天南星

半夏酒浸三日

天麻

桔梗

黃 薑

當 歸

羌 活

虎 頭 骨 酥炙

海 桐 皮

白 芷

白 茯 苓

附 子 去皮

防 風

芎 藭

麻 黃 各一兩

乾 蠍 去尾用糯米炒四十二枚

人 參

沒 藥 各半兩

木 香 一兩

羚羊角屑 半兩

乾 薑 四錢

烏 蛇 骨 浸去皮三分

共細剉。焙乾搗為末。鍊蜜為丸。如彈子大。每服一丸。生薑酒嚼下。中風甚者。拘

開口。或先以嚏化藥。灌下一丸立省。

牛黃丸方 治卒中風仆倒悶亂。語言蹇澀。涎痰壅盛。

牛 黃

盧 會

天 竺 黃

血 竭

沒 藥

丹 砂 俱研

續 隨 子

皂 莢 灰 各半兩

丁 香

木 香

乾 蠍 去土炒

粉 霜

雄 黃

甘 遂 各一分

麝 香 二錢

肉 豆 蔻 二枚

檳 榔 二枚

龍 腦 一字

共搗研為末。每抄藥末四錢。入輕粉三錢。再研勻。麵糊為丸。如黍米大。每服五

丸。金銀薄荷湯下。隨大小加減。一方添天麻一兩。酒浸炙爲末。研勻丸如小彈子大。凡中風用冷水化下一丸立效。些小風寒。每服半丸。小兒驚風一丸。分作六服。並用冷水化下。旗後牛黃丸并局

肝中風

論曰。內經謂以春甲乙中風爲肝風。肝風之狀。多汗惡風。善悲噎乾。善怒。時憎女子者。有頭目暈。兩脅痛。行常僂僂。嗜甘如阻。婦狀者。有但踞坐。不得低頭。兩目連額色微青。唇青面黃者。治法宜灸肝膈。後以藥治之。

排風羌活散方 肝藏中風筋脈拘攣疼痛。

羌活 一兩去蘆頭

天麻 二兩

芎藭 一兩

酸棗仁 兩炒

薏苡仁 一兩

鹿角膠 兩炙

蔓荊實 三分去皮

羚羊角 兩鎊半

桂 一兩

人參 一兩

白附子 兩製

牛膝 兩酒浸焙

烏蛇 三寸酒浸

犀角 鎊三

白鮮皮 兩

地骨皮 兩

柏子仁 錢一兩生用

右一十七味。搗羅爲散。以豆淋酒調下一錢匕。漸加至二錢匕。日三夜一。

升麻湯方

治肝虛中風。頭痛目眩。胸中客熱。氣壅衝心煩悶。

升麻

前

胡

去

蘆

頭

各

羚羊角屑

葛

根

各

二

酸棗仁

一

兩

煎

至

八

分

去

滓

入

竹

瀝

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至八分。去滓。入竹瀝半合。重煎三兩。沸放溫。食後服。如人行五六里。更進一服。

心中風

論曰。心中風之狀。多汗惡風。焦燥善怒。嚇赤色。病甚則言不快。診在口。其色赤。夫心受風。風盛則生熱。熱甚則汗不止。心之液爲汗故也。汗多則腠理疎。疎則真邪相薄。是以惡風。又心惡熱。熱極則脣焦。內燥多怒。心之聲爲言。病甚則言不快。心氣通於舌故也。又其證胸背拘急。不可傾側。面赤頭痛。翕翕發熱。不能安臥。以心主血脈。其風日久。隨榮衛行。內外相搏。蘊積而然也。

辰砂天麻丸方 鎮養心神。擒截諸風。和流榮衛。滋潤筋絡。開通關膈。肥密表腠。

丹 砂半兩

天 麻一兩

半 夏煆乾

天南星各半

蠍 梢一分

白附子半兩

白僵蠶炒

牛 黃研各

蓬 砂一分

麝 香一分

共為末。水煎麵糊為丸。如梧桐子大。每服三十丸。荆芥湯下。不計時候。

烏犀散方 治心中風。精神冒悶。語聲錯誤。恍惚多驚。

烏犀角鑿二

丹 砂研

獨 活去蘆

丹 參

遠 志去心

人 參

蔓荆子

防 風

共搗羅為散。每服二錢匕。食後酒調下。日三服。

人參丹砂丸方 治中風恍惚驚悸。安神志。化痰涎。

人 參

丹 砂研各

紫石英研

白石英

龍 腦

細 辛去枝

赤 箭

天門冬去心

遠 志去心

生乾地黄焙

葛 蒲九節者米泔浸

白茯苓去皮

犀 角鑿

沙 參

防 風去各

麝 香研半

共搗研爲末。鍊蜜丸如小鷄頭大。每服一丸。溫酒嚙下。不拘時候。

脾中風

論曰。脾風之狀。多汗惡風。身體怠惰。四肢不欲舉。色薄微黃。不嗜食。診在鼻上。其色黃。又曰。踞而腹滿。身通黃。吐鹹汁。又曰。翕翕發熱。形如醉人。腹中煩重。皮肉瞤動。短氣。脾裨諸臟。灌四旁者也。所主四肢。故脾中風。則身體怠惰。四肢不欲動。脾者倉廩之官。故病則不嗜食。診在鼻中央之位也。其色黃。黃土之色也。煩重發熱。風之候也。形如醉人者。邪氣之甚也。

獨活湯方 治脾臟中風。肢體緩弱。言語不利。翕翕發熱。

獨活

麻黃去節先煎掠

防風去又各

白茯苓去皮

人參

羚羊角銚

前胡去蘆

沙參去蘆

旋復花

黃芪

半夏湯洗七

附子炮製去皮 甘草炙半

共剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞半。入生薑汁半分切。同煎取七分。去滓溫

服。不拘時。日三服。

秦芫湯方 治脾臟中風。身體拘急。舌強不能語。

秦芫去苗

麻黃去根節 湯洗焙乾

石膏各一

獨活

赤茯苓去皮

山黃

芫蕒

防風

桂

白朮

人參

防己

附子炮製

杏仁去皮尖 乾薑

甘草炙

細辛各半兩

共劉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓溫服。不拘時候。

羚羊角丸方 治脾臟中風。口面偏斜。語言蹇澀。虛煩。手臂腰脚不隨。

羚羊角屑

防己

白芍藥

獨活去蘆

白茯苓去黑皮

防風

酸棗仁微炒

杏仁去皮尖 雙

麥門冬去心 糖

人參

芫蕒

柏子仁炒

檳榔剉

桂去粗皮

當歸切焙各

附子

薏苡仁

熟乾地黄焙各

共搗羅爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服空心溫酒下三十九。

肺中風

論曰。肺中風之狀。多汗惡風。色皎然白。時欬短氣。晝日則差。暮則甚。診在肩上。其色白。又曰燥而喘。身運而重。冒而腫脹。偃臥則胸滿短氣。冒悶汗出。夫熱生風。風盛則熱。腠理開多汗者。熱甚故也。風薄於內。所以惡風。皎然而白。金之色也。在變動爲欬。又肺主氣。故時欬短氣也。風陽也。陽晝則在表。暮在裏。陽裏而風應之。故暮則甚也。診在肩上。其色白。肺之色也。身運而重。風使然也。喘而腫脹。偃臥而胸滿短氣。以肺主氣故也。

羚羊角丸方 治肺中風氣急。背項強。語聲嘶敗。

羚羊角二兩

白鮮皮五錢

升麻

蔓荊實

惡實炒

枳殼一兩

天麻白者

秦艽

共搗羅爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。食後煎桑白皮湯下十五丸。日三服。
薺芎湯方 治肺中風。項強鼻塞。語聲不出。喘鳴肩息。胸滿短氣。

薺 芩二兩 防風 人參各一兩 獨活
 細辛 赤箭 芎藭 羚羊角各五錢
 麻黃二兩 桔梗剉分 前胡去蘆 蔓荊實
 白鮮皮各五錢 甘草 石膏各一兩
 共細搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓溫服。食後臨臥服。

腎中風

論曰。腎風之狀。多汗惡風。脊痛。不能正立。其色黃。隱曲不利。診在肌上。其色黑。夫身之本在腎。受五臟六腑之精氣。以養百骸九竅。腎受風。則諸陽之氣不上。至於頭面。故有面痿然浮腫之證。陽氣虛者。則多汗惡風。腎主骨。骨不強。則脊痛不能立。精神衰弱。則隱曲之事不利。肌上黑如食色。又踞而腰疼。不可俛仰。或為冷痺。或為偏枯。耳鳴聲濁。志意昏沉。善恐多忘。皆腎風證也。

海桐皮散方

治腎中風。踞而腰痛。脚腫疼重。耳鳴面黑。志意不樂。

海桐皮剉

五加皮去粗

草薺炒

薏苡仁各一兩

虎骨真酥炙

枳殼

赤芍藥

牛膝去苗酒浸切

惡實炒半

防風

續斷

杜仲去皮炒

郁李仁湯退去皮炒熟乾地黃一兩

共搗羅為散。每服二錢匕。溫酒調下。漸加至三錢匕。空腹食前各一服。

杜仲丸方 治腎中風。腰脚不隨。骨節痠疼。筋脈拘急。行履艱難。兩脅牽痛。

杜仲去皮切

牛膝去苗酒浸切

薺半兩

酸棗仁一兩

當歸三分

防風一兩

丹參三分

赤芍藥半兩

桂半兩

肉蓯蓉酒浸切

石斛三分

附子五錢

郁李仁湯浸去

檳榔煨一

共搗羅為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服空腹用溫酒下三十丸。

防風湯方 治腎中風。腰脚痠痺不仁。骨髓凌疼。不能久立。漸覺消瘦。

防風五錢

羌活一兩

黃芪五錢

五加皮五錢

牛膝去苗酒浸切

丹參一分

酸棗仁一合

桂五錢

赤芍藥五錢

麻黃去節煎掠 檳榔煨一

當歸一切焙

木通五錢

共粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。至七分去滓。空心服。及晚食前服。

石斛浸酒方。治腎中風注。腰脚痺弱。利關節。堅筋骨。除頭面遊風。補虛勞。益氣

力。

石斛去根廿

黃蘗五錢

丹參二兩

牛膝去苗

人參五錢

杜仲去粗

五加皮

白茯苓二兩

枸杞子炒半

山茱萸

山藥

草薢炒二

防風五錢

天門冬去心焙

生薑三兩

細辛去苗葉輕

薏苡仁半升

共細剉如麻豆。用生絹囊盛。以酒五斗。於淨瓷器中浸七宿。初溫服三合。日三夜一。漸加至六七合一升許。令常有酒氣。不至大醉。

攤緩俗名

論曰。攤緩之辨。攤則懈惰而不能收攝。緩則弛縱而不能制物。故其證四肢不舉。

筋脈關節無力。不可收攝者。謂之攣。其四肢雖能舉動。而肢節緩弱。憑物不能運用者。謂之緩。或以左為攣。右為緩。則非也。但以左得之。病在左。右得之。病在右耳。推其所自。皆由氣血內耗。肝腎經虛。陽陰偏廢而得之。或有始因他病。服吐下之藥過度。亦使真氣內動。榮衛失守。一身無所稟養而致然也。

紫金天麻丸方 治中風攣緩。手足躄曳。

- 天麻 沒藥研 乳香研 牛膝酒浸
- 白朮 當歸各半 牛黃研三 犀角一兩

- 附子去破臍 五靈脂二兩

共十味為末。取三家井華水。丸如櫻桃大。每服一丸。先用生薑汁化開。次用酒調下。如中風攣緩。手足躄曳。寒澀。口眼喎斜。不省人事。口吐涎沫。或手足搐掉。骨筋疼痛。皮肉麻痺。並宜服之。

天麻浸酒方 治攣緩風。不計深淺。久在牀枕。

- 天麻半兩 松節兩一 龍骨 虎骨酒浸
- 骨碎補半兩 敗龜醋炙一兩 烏蛇酒浸去皮骨 白花蛇酒浸去皮骨

惡實根各半

附子去皮臍一枚

羌活

獨活去蘆頭

牛膝酒浸各半

當歸

芎藭各一

大麻仁二兩

熟乾地黄酒浸半

茄子根二兩

原蠶沙炒二

共十九味。咬咀如麻豆。用酒二斗浸。密封。春夏三日。秋冬七日。每服一盞。不拘時候溫服。

虎骨丸方。治攤緩風。手足不隨。口眼喎斜。頭目昏重。腰膝少力。及風氣凝滯。筋

骨疼痛。

虎脛骨碎

當歸一兩

赤箭半兩

安息香酒浸

海桐皮

獨活

牛膝酒浸各一

肉蓯蓉酒浸

金毛狗脊去皮

續斷各半

草薺

烏頭去皮

芎藭各一

甜瓜子

仙靈脾

乳香研各半

防風

天麻

石斛去根各一

酸棗仁研去皮

黃松節酒炒

細辛各半

共二十二味。除別研外。為末。酒煮麵糊丸。如梧桐子大。每服十五丸。酒下。或荆

芥湯不拘時。

天麻丸方 治風氣攤緩等疾。

天麻二兩

玄參

防風

地榆

乾浮萍洗焙者

薄荷

烏頭去皮

牛膝酒浸各

不蛀肥皂莢五挺就地坑內燒成黑及瓷甕合定候冷用半兩細研入諸藥

牛黃

龍腦各一錢

共十一味。除別研外。為細末和勻。鍊蜜和杵百餘下。丸如雞頭大。每服一九。溫酒下。

牛黃丸方 治一切風及攤緩。言語蹇澁。搜風鎮心。

牛黃一分

龍腦一錢

麝香一錢

雄黃一分

丹砂五分

天麻

烏犀

乾蠍去土

羚羊角鎊

羌活

獨活

防風

細辛

白芷

赤茯苓

蟬蛻

麻黃去根

牛膝酒浸

芎藭

五加皮各半

白附子炮一分 烏蛇酒浸去一兩皮

共二十二味。研為末。鍊蜜和杵一千下。丸如雞頭大。每一丸嚼破。溫酒或荊芥茶下。日三服。

沉香煎丸方 治攤緩不收。體重無力。肢節緩弱。運動不能。

沉香 丁香 葫蘆巴炒 附子去皮

牛膝去苗對酒拌炒 補骨脂炒 藶香子 石斛對酒拌炒

芎藭 木香 青橘皮湯白 桂皮去粗

肉蓯蓉酒炒各半兩

共十三味。搗羅為細末。鍊蜜為丸。如梧桐子大。每服二十九丸。生薑鹽湯下。酒亦可。

風譁曳

論曰。人假水穀之精。化為血氣。周流一身。使四肢相隨。筋脈相續。猶挈裘領。無所不從。若脾胃虛弱。水穀不化。筋脈無所稟養。復遇風邪外搏。膚腠流傳。筋脈縱緩。

則肢體痺曳。其痺則偏而不舉。曳則弛而不隨。是皆不能收攝也。

獨活湯方 治中風。手足痺曳。不能言。

獨活 二兩

甘草 炙

桂

生葛根

芍藥

栝樓根 實 各一兩

右六味。剉如麻豆。每服五錢。生薑三片。同煎溫服。日三夜一。

敗龜丸方

治中風。手脚顛掉。痺曳。

敗龜 塗酥炙 五兩

右一味。為細末。研飯為丸。如梧桐子大。每服二十九丸。酒下。

附子湯方

治風痺曳。手足不隨。身體不能俛仰。

附子 去皮

乾薑

甘草 炙

防風

獨活 各半

石膏 碎

白茯苓

白朮

芎藭

柴胡

當歸 酒浸

人參 各一兩

杏仁 去皮尖雙仁 炒研二十枚

細辛 一兩

共十四味。剉如麻豆。每服五錢。水酒共煎。溫服。日三。人羸弱者。只用水煎服。

羚羊角丸方 治中風。手顫。驛曳語澀。

羚羊角 一兩

犀角 三分

羌活

防風 各半

薏苡仁

秦芫 各二兩

右六味為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。服十九。煎竹葉湯下。加炷三。

中風四肢拘攣不得屈伸

論曰。臟真散於肝。肝藏筋。膜之氣。筋為肝所養。筋得所養。則俯仰屈伸。莫或乖戾。若經絡偏虛。風邪乘虛客於機關。則筋脈縮急。干於陽絡。則肩背從而拘攣。此皆邪氣內盛。正氣不能榮養諸筋。故為四肢拘攣。不得屈伸。夜合枝醞酒方 治中風手足不隨。攣縮屈伸艱難。

夜合枝

桑枝

槐枝

柏枝

石榴枝 各生用 五兩

羌活 別碎 二兩

糯米 五升

細麴 七升

防風 五兩 別碎

黑豆 生用 緊小者 五升

共十味。以水五斗。浸五枝。同煎取二斗五升去渣。浸米黑豆二宿。蒸熟。與麴。防

風。羌活二味拌和。造酒依常醞法。封三七日。壓去糟滓。取清酒三合至五合。時飲之。常令有酒氣。勿令過醉。恐至吐。悖亂正氣。

乳香丸方 治中風四肢拘攣筋骨疼痛。

乳香細研

烏頭去皮膚

羌活一兩

雄黃細研水

白附子

羚羊角各一兩

附子去皮膚

原蠶炒

防風

烏蛇酒浸去皮

白僵蠶炒

虎脛骨各一兩

膩粉

麝香各三分

赤箭

牛膝酒浸

沒藥研各

右十七味為末。再同和勻。鍊蜜丸。梧桐子大。每服用豆淋酒下十丸。如人行十里。再服。

地龍餅子方 治中風手足筋急攣疼痛。

地龍炒

海蛤

硫黃研

烏頭去皮膚

鱗鯉甲各一兩

五味同研為末。醋煮麵糊為丸。如雞頭。捏作餅子暴乾。每用一餅以葱白裹。安

手足節上。以手帛繫住。閣在一朽木桶上。用熱湯淋之。候覺骨中熱極。方解去帛子。後看手足未得舒展時。再用熱湯淋之。每一餅可用三次。如用藥畢。且着衣服蓋之。不得透風。

酸棗仁煎方 治筋骨拘急及輭疼痛。行履不得。

酸棗仁三兩半 虎骨酒炙一兩半 海桐皮

仙靈脾 赤箭 萆薢

敗龜酒炙 蕤薺子 石斛

巴戟天 附子去皮 木香

酥各一兩 桑枝尺一握 白蜜四兩

共十九味。搗羅十七味爲末。再研勻。用清酒七升。先煎桑枝令黃色。去桑枝。後

下藥末。更煎一二十沸。次下酥。蜜煎成膏。看香氣得所。用瓷盒盛。每服一匙頭。

溫酒調下。日三服。

風痺

論曰。風痙者。以風傷太陽之經。復遇寒濕故也。其狀口噤不開。腰背強直如發痙。蓋風邪內薄於經。則榮衛凝泣。筋脈緊急。故令口噤不開。卒然倒仆。不知所以。凡發極則復甦。甦則復作。其或耳中策策而痛。身背直而不屈者。不治也。

天麻湯方

治風痙身如板直。徧身鞭強。

白朮

羌活 黃去根節煎掠

桂去粗皮 杏仁炒各一分

附子去皮臍一枚

入味。劉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。生薑一棗大。拍碎同煎。再入酒半盞。煎熟。

服。後以生薑稀粥投之取汗。日三。

甘草湯方

治風痙。口噤不語。肢體強直。神識不明。

甘草炙

羌活一分

人參半兩

防風一兩

附子半兩

每服四錢。入地黃汁一合煎。再入荆瀝。竹瀝各半合。同煎溫服。日夜各一。

角弓反張

論曰。風角弓反張之狀。腰背反折。不能俛也。中風邪客於諸陽之經。邪正相搏。風氣勝則筋脈縮急。腰背反折。如弓之形也。

麻黃飲方 治中風。身如角弓反張。四肢不隨。煩亂口噤。

麻黃去根節

防風

桂

白朮

人參

芎藭

當歸

甘草炙

乾薑各一

附子一兩

杏仁去皮尖雙

每服五錢。水煎溫服。不拘時。

當歸湯方 治中風。身如角弓反張。口噤不開。

當歸

細辛各三分

防風

獨活各半

麻黃去根節一

附子去臍

每服三錢。水酒同煎。溫服。如汗出。慎外風。若口噤。即斡開口灌之。

急風散方

治中風。身如角弓反張狀。

附子一枚去

烏頭二枚去

天南星一枚

藿香去梗

防風

白芷各半

乾蠍土炒去

白附子各一

共八味為散。每服半錢。豆淋溫酒調下。併二服。未愈再服。

中風失音

論曰。喉嚨者。氣之所上下也。會厭者。聲音之門戶。其氣宣通。則聲音無所阻礙。若風邪搏於會厭。則氣道上宣。故令人失音。入臟則不能言語也。

羌活湯方 治中風失音不語。

羌活去蘆頭

甘草炙剉

人參各半

附子去皮臍

荆瀝

竹瀝

生乾地黄

共七味。先將四味剉如麻豆。每服五錢。入三件汁瀝。同煎溫服。日三夜一。

地黄湯方 治中風失音不語。

生地黄汁

淡竹瀝各半

獨活去蘆頭

附子去皮臍

一。四味。將二味剉如麻豆。每服三錢。入竹瀝地黄汁同煎溫服。空心日。午夜臥各

辨羊角湯方 治中風失音。手足不隨。

羚羊角鑿

芎藭

細辛去苗

木香

防風

麻黃

獨活

羌活

當歸酒浸

附子去皮

桂皮去粗

天麻絡一

每服三錢。水煎溫服。不拘時候。

竹瀝湯方。治中風。失音不語。昏沉不識人。

竹瀝

荆瀝

梨汁絡二

陳醬汁半合

四味相和。微煎一二沸。再濾一徧令溫。細細灌入口中。口噤。幹開口灌之。

竹豆湯方。治中風。失音不語。

新青竹四碎如篾子 豆二升

二味。以水八升相和。煮令豆爛去滓。再煎取一升。每服二合灌之。或口噤不明者。即幹口灌。

羌活湯方

治中風。舌強不得語。手足舉動不得。

羌活一兩

羚羊角半兩

麻黃去根節

防風半兩

旋覆花炒一

獨活半兩

龍腦研半

人參

白茯苓

當歸

麥門冬各半

杏仁湯浸去皮尖

每服一兩。水煎溫服。空心日午夜臥各一服。

竹瀝湯方 治中風舌強不得語。心神煩悶。

淡竹瀝五合

人乳汁二合

三年醬汁半合

三味相和調勻。分三服。口噤。幹灌之立差。

陳醋方 治中風不得語。舌根澀。甄。

陳醋二合

三年醬汁

人乳汁各五合

三味相和研。以生絹濾絞取汁。分爲三服。日夜服之。服盡能語。

三聖散方 治中風舌強不語。

沒藥研

琥珀研各一分

乾蠍七枚全炒

三味研爲末。每服三錢。用鵝梨汁半盞。皂莢末半錢。濃煎湯一合。與梨汁相和。

調下。須臾吐出涎毒。便能語。

雄黃丸方 治心脾中風。舌強不語。涎潮昏塞。不省人事。

雄黃研

丹砂研

牛黃研

天南星牛膽內製者

白僵蠶 生用

天

麻半兩生用各

麝

香一分

金箔

銀箔各十五片與

九味。研爲細末。煉蜜丸。如梧桐子大。每服十丸。溫薄荷汁化下。不拘時。

風口噤

論曰。風口噤者。風寒客於三陽之筋。使筋脈拘急。口噤不開。牙關緊急。若不速治。恐致他病。以風者善行而數變也。

開關散方。治中風目瞑口噤。不能下藥者。用此散以中指點散子。揩齒三二十次。在大牙左右其口自開。始得下藥。

天南星

生搗爲末

龍

腦別研

各等分。研細。五月五日午時合。患者共使一字。若不癒。端午
爲梅欽方。治中風不語口噤。吐痰。頸項筋急。

烏

梅并子七枚碎菴

葵碎劉兩半

白

攀生用兩

先以水一升。煎菴葵根取三合。去滓別盛。又別以水一升。煎烏梅至三合。去滓

別盛。又以水五合煎白礬。取三合別盛。以物斡開口。先灌菝葜湯。次下烏梅湯。又次下白礬湯。旋消停。服之良久。久即吐惡疾毒涎。如不吐。以鵝毛攪喉口取吐。

附子散方 治中風牙關緊急。徧身強鞭。

附子一枚一兩者覆
火炮製去皮臍 白附子

共末爲細散。每服一錢匕。溫酒調下。三服效。

海帶散方 治風口噤。牙關不開。

海帶炒半 烏梅肉 天南星生各 麝香研後入

爲細末。入瓷盒內。勿令透氣。如患急。以半錢匕。於顯裏牙關上措。便自開口。立效。

治牙關緊急方

甘草比中指節截作五截於生油內
浸過炭火上炙候油入甘草用

以物斡開牙關。令咬定甘草。可如人行五里時候。又換甘草一截。後灌藥極效。白神散方 治中風或吐瀉。牙關緊急。下藥不能。

白梅末多不少

將揩牙立開。蓋酸能收斂。自然牙骨易開也。

風口喎

論曰。足陽明脈循頰車。手太陽脈循頸上頰。二經俱受風寒。筋急引頰。令人口喎。僻。言語不正。目不能平視。又云。風入耳中。亦令口喎。蓋經絡所繫然也。診其脈浮而遲者可治。

治中風口面喎斜。葛根湯方。

葛根

防風

附子

麻

黃炙兩

獨活三兩

杏

仁四兩。後去皮。

松

實兩。去殼。

共剉如麻豆。每用藥十錢匕。以水二盞。酒一盞。入生薑三片。煎一盞半。去滓。分三服。日二夜一。

防風湯方。治中風口面喎斜。淚出失音。

防風

防己

升麻

桂

麻黃

芎

藜

羚羊角半兩

劉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。煎取六分。去滓。入竹瀝半合。更煎三二沸。熱服。空心日午及臨臥各一服。

治賊風吸著。口眼喎斜。一字散方。

烏

頭生用

青

攀各半兩

共爲散。每用一字。搐入鼻內。取出涕吐涎。

治風口喎方

蓖麻油

巴豆油

二味等分並相和。如右喎卽點左口角。如左喎卽點右口角。仍急覷纔正。當急措去藥。

治中風口面喎斜。青松葉浸酒方。

青松葉一觔

細剉如大豆。木石臼中杵令汁出。用生絹囊貯。以清酒一斗。浸二宿。近火煨一宿。初服半升。加至一升。頭汗出卽正。

治中偏風口面喎斜石灰塗方。

石 灰半升
炒

乘熱以醋調似泥塗於一邊緩處纔正急用溫水洗去。

人參丸方 治中風口眼喎斜手足無事語不審澀止緣坐臥處對耳有竅爲風所中筋牽過一邊連眼皆緊睡著一眼不合者服此藥二十日內眼口皆正矣。

人 參

草 烏生去

牛

膝去苗酒浸焙乾各一兩按牛膝入腦虛人口喎眼斜用之

搗羅爲細末水煎麵糊丸如梧桐子大每服十丸炒黑豆淋酒下一日二服。

治一切風口眼偏邪假蘇丸方。

生假蘇去梗

生薄荷用葉

右二味並沙盆內研生絹絞取汁瓷碟內看厚薄日煎成膏餘滓三分去一分粗滓不用將二分滓晒乾杵爲末將膏和爲丸如梧桐子大每服二十九溫酒下。

破傷風

論曰。破傷風者。因卒暴傷損。風邪襲之。傳播經絡。致使寒熱更作。身體反張。口噤不開。甚者邪氣入臟。則不可治。諸瘡久不差。榮衛虛弱。肌肉不生。瘡眼不合者。風邪亦能外入。為破傷風之候。

羌活湯方 治破傷風身如鐵石。或如角弓反張。口噤不開。宜斡齒灌藥。

羌活

防己

羚羊角

升麻

黃芩

蔓荊實

去皮各一兩半

犀角

茯苓 神去木

葛根

甘草 各一分

防風 三分

麻黃 一兩

粗擣篩。每服三錢匕。水一盞。入地黃汁半合。薤白二寸。煎至八分。去滓空心日午臥溫服。如病急不拘時服。蓋覆出汗即愈。

羚羊角散方 治打擊破瘡。或洗頭挑齒。灸瘡。狗咬等中風。

羚羊角

石斛

芎藭

知母

山黃

薏苡仁

白芷

曲棘鍼 生用

甘草 炙

芍藥

紫苑 去土

天雄

防風

牛膝

枳實 去穢炒

蔓荊實

石南葉酒醋炒

杏仁皮煨去

麻黃

龍骨去土

黃芩

防己

白朮

草薢

乾蔓菁花

葛根

赤茯苓

羌活

蒼耳心

車前子

桑白皮

菊花不開

酸棗仁

當歸

丹參

烏蛇酒浸去皮骨炙各三分

陳橘皮湯白去

共四十味。搗羅為散。每服一錢半至二錢匕。空心午時夜臥溫酒調下。要丸即鍊蜜丸。如梧子大。每服十丸。豆淋酒下。

蘇枋木不拘多少

治破傷風獨聖散方。共為細散。每服三錢匕。酒調服之。立效。一方用鱧膠白色。炙令黃色。為末。熱酒

調六錢。

治破傷風。身腫牙關不開。白殭蠶散方。

白殭蠶直者不拘多少

生研爲末。每用生薑自然汁。調以雞翎於瘡口掃之。勿令乾。斯須腫塌皮皺爲效。仍用生薑汁調半錢匕服。

治破傷風打撲內損。飲銀花散方。

天南星大者半炮

白附子半炮

防風去叉

爲細末。每服二錢匕。重者童子小便調。稍輕熱酒調下。如外傷用此藥貼瘡口。仍依法服之。如破傷風。先以小便溫洗瘡口。次用藥乾貼。追出風毒立愈。勢稍惡口噤者。以童子小便調。幹開口灌之。如鬪打至死。但心頭微煖者。併灌三服。卽活。常須合下。以備急用。白附子無

偏風

論曰。人身所養者。惟血與氣。血氣均等。則無過不及之害。稍至衰微。則所運不周。遂至體有偏復。因風客身一邊者。謂之偏風。其狀半體不知痛癢。或癢痺不仁。或縱緩。或痺痛是也。

荆瀝湯方。治偏風不隨。心中煩悶。言語蹇澀。

荆 瀝五合

竹 瀝五合

生薑汁三合

三味相和煮煖。每服三合。以酒調下。

防己湯方 治偏風半身不隨。口眼喎斜。不能言語。筋脈拘攣。不得轉側。

防己

芎藭

桂

黃芩

芍藥

人參

甘草炙

麻黃節去根

附子去皮

防風各一

杏仁去皮尖

每服十錢。生薑十片。同煎分溫三服。日二夜一。

生地黃湯方 治偏風手足一邊不收。口目喎戾。言語蹇澀。其藥不拘虛人老少。

並可服之。

生地黃汁

竹瀝

荆瀝各一升

三味別作羌活。防風各一兩。去蘆頭并又剉。附子一枚。重半兩者。去皮臍生用。

作八九片。入煎三汁中。慢火煎取一升半。每用醇酒三合。調化藥汁二合。煖服。

之日二夜一。無問冬夏。並得服之。

麻子仁湯方 治偏風手足不隨。口面喎斜。

麻子仁炒二 黑豆炒 鵝糞炒二 垂柳枝半寸握

四味。先以酒七升。煮柳枝及五升。炒鵝糞。麻仁。黑豆等令黃。乘熱便投柳枝酒

內。須臾去滓。令淨。每服旋取。溫服二合至三合。空心臨臥各一服。

續命獨活湯方 治偏風半身不隨。熱悶語澀。

獨活 防風 人參 芍藥各二

防己半兩 桂一兩 羚羊角分三

咬咀如麻豆。每服五錢。入竹瀝半合。同煎溫服。

安息香丸方 治偏風半體不仁。縱緩不收。或時痺痛。

安息香研一兩 乳香研一兩 麻黃去根節二兩 胡桃仁湯浸去皮

乾浮萍草法杜一

右五味。先擣麻黃。浮萍草為末。與研藥拌勻。鍊蜜和丸。如彈子大。每服一丸。溫

酒化下。以汗出為效。

擬金丸方 治偏風半身不隨。不知痛癢。

草烏頭生去皮臍二兩半 骨碎補法毛一兩 狗脊去毛一兩 五靈脂一兩

馬蘭花半一兩

地龍半兩

乳香研一

楓香脂研一

草薺一兩

九味。搗羅爲末。入研者二味和勻。醋煮麵糊和丸。如小豆大。每三九至五九。荆芥湯下。空心臨臥各一服。

風偏枯

論曰。氣血不足。腠理開疎。風溼客於分肉之間。久而不差。真氣去。邪氣獨留。乃爲偏枯之疾。其狀肢體不隨。肌肉偏枯。細小而痛。言語不變。神智不亂。乃可治也。宜溫臥取汗。益不足而損有餘。診其胃脈沉而大。心脈小而牢急。皆偏枯之脈也。當歸湯方。治中風手足偏枯。口面喎斜。疼痛。一目不能合。

當歸

白芷

防風

白鮮皮

白朮

芎藭

杏仁去皮

甘草炙

甘菊花

天雄去皮一兩

人參半兩

每服五錢。生薑半分。同煎溫服。日三夜一。與食相間服之。

磁石湯方 治中風偏枯。骨瘦無力。

磁石燒赤醋淬 七錢三分 防風 三兩 五味子 二兩 甘草 一兩

玄參 二兩 附子去皮臍 一兩 牡蠣去心 二兩

每服五錢。入黑豆三十五粒同煎。空心日午夜臥服。

沒藥丸方 治中風偏枯。手足不隨。言語謇澀。口眼喎斜。

沒藥研半 天麻酒浸一宿 烏頭去皮臍 地龍去土炒

羚羊角鎊一分 犀角鎊一分 丁香 一分 木香 一分

乳香研半 丹砂研半 龍腦研一分 麝香研一分

玄參 一分 人參 半兩

十四味搗研為末。鍊蜜和丸櫻桃大。每服一丸。溫酒下。食前服。重病者服一

月差。初患五七服即愈。

肉苛

論曰。內經謂人之肉苛者。雖近衣絮猶尚苛也。以榮氣虛。衛氣實。夫血為榮。氣為

衛氣血均得通流。則肌肉無不仁之疾。及榮氣虛。衛氣實。則血脈凝澀。肉雖如故。而其證癢重為苛也。

苦參丸方。治榮虛衛實。肌肉不仁。病名肉苛。

苦參取二兩搗粉

丹參炙

沙參皮去粗

人參一兩

五加皮

防風去叉

蒺藜子妙去黃

烏蛇酒浸

蔓荊實去白皮

敗龜炙酥

虎骨炙黃

玄參堅者各

右十二味。搗羅為末。別以不蚰皂莢一觔。以水三升。掇取汁去滓。於無油鐵器內煎成膏。鍊蜜四兩。拌和為丸。如梧桐子大。每食後良久及夜臥。共三服。各用荊芥薄荷酒下十五丸至二十丸。

天麻丸方。治榮虛衛實。肌肉不仁。偏身癢重。

牛膝酒浸切

天麻酒浸切

麝香研

桂各一

乾蠍炒去土

白花蛇肉酒炙各

檳榔剉

獨活各三

防風一兩

共九味。鍊蜜和丸。如桐子大。每服十丸。薄荷酒、荊芥湯下。不拘時。

防風酒方 治榮虛衛實。肌肉不仁。病名肉苛。

防風 去二兩 白朮 半兩 山茱萸 并子用一兩半 山藥 乾者一兩半

附子 去皮臍一兩 天雄 去皮臍一兩半 細辛 去葉鬚輕一兩半 獨活 去蘆頭一兩半

秦艽 去土一兩半 茵芋 去粗莖一兩半 杏仁 去皮尖雙一兩 紫巴戟 去心一兩

桂 二兩 麻黃 去根節煎去沫焙乾二兩 杏仁 炒三兩 生地黃 淨洗細切二兩半

磁石 生澱碎如大豆粒浸去汁半斤 薏苡仁 炒三兩 生地黄 淨洗細切二兩半

共十八味。剉如麻豆。生絹袋盛。以無灰酒三斗。浸六七日。空心溫飲四合至五合。以知為度。

合。以知為度。

五味子酒方 治榮虛衛實。肌肉不仁。病名肉苛。

五味子 防風 牛膝 黃芩

白朮 當歸 澤瀉 知母

白芷 五加皮 枸杞子 用根白皮 牡丹 去心

肉蓯蓉 炒 丹參 炙 甘草 炙 枳殼 炒

厚朴 去粗皮五遍細辛輕炒 桂 各一兩

共十九味。劉如麻豆。生絹囊盛。用好酒二斗。密封浸經七日。每空心日。午夜臥。各溫服五合。久服加至七合及一升。勿令醉吐。

歷節風

論曰。歷節風由氣血衰弱。爲風寒所侵。血氣凝澀。不得流通關節。諸筋無以滋養。真邪相薄。所歷之節。悉皆疼痛。故謂歷節風也。病甚則使人短氣汗出。肢節不可屈伸。

防風湯方。治歷節風。周身百節疼痛。脚痿弱。

防風 二兩

白朮 一兩

白鮮皮 二兩

桂 二分

黃芪 二兩

薏苡仁 炒 二兩

右六味。研篩。每服四錢。生薑三片。同煎溫服。日三夜一。

沒藥散方。治歷節風。百骨節疼痛。晝夜不可忍。

沒藥 研半兩

虎脛骨 酒炙 三兩

二味。搗研爲末。每服二錢。溫酒調下。日三服。

透關散方 治歷節風。四肢攣急。疼痛難忍。短氣汗出。

麻黃根 五兩 天南星 炮 威靈儂 各半

草 薺

當 歸 人 參 天 麻 各一

赤小豆 煨去皮

共八味。搗羅為末。每服半錢。溫酒調下。

獨活散方 治歷節風。

獨 活 去蘆頭 玄 參 一兩 生犀角 兩二 升 麻 三兩

惡實根 半兩 豉 二合 生乾地黃 半兩

共七味。搗羅為散。每服三錢。空腹米飲調下。

乳香大丸方 治血氣衰弱。風毒攻注。歷節疼痛。

乳 香 研 沒 藥 各一兩 五靈脂 去砂石 烏 頭 去皮臍

共四味。搗為末。再和勻。滴水。和丸。如小彈子大。以丹砂為衣。每服一丸。薄荷酒

化下。日三服。

中風百節疼痛

論曰。中風百節疼痛者。由體虛受風。風邪中於關節。故令百節筋脈拘急疼痛。寒熱更作。不可屈伸。此皆真氣怯弱。不勝風邪。真邪相薄。所以痛也。

白花蛇散方 治中風肢節疼痛。言語蹇澀。

白花蛇酒浸去皮 何首烏去黑皮 牛膝三味用酒浸

蔓荆實去白皮 威靈仙 荆芥穗 旋復花各二兩

共七味。搗羅爲末。每服一錢。溫酒調下。空心臨臥服。

羌活散方 治中風百節疼痛。寒熱更作。不可俛仰。

羌活去蘆頭 天麻去蒂生 芎藭半兩 酸棗仁炒三分

鹿角膠炒燥 蔓荆實去肉 羚羊角三分 人參半兩

白附子半兩 牛膝三分 桂半兩 薏苡仁炒一分

烏蛇酒炙用 犀角鎊屑一分 白鮮皮炙半兩 地骨皮

柏子仁生用三分

右十七味。搗羅爲細末。每日空心及夜臥。各以豆淋酒調下一錢。至錢半。

白頭翁酒方 治諸風痛。攻四肢百節。

白頭翁草一握

一味爛研。以醇酒投之頓服。

又方

生惡實根摩酒服。痛止卽住。

又方

黑豆半升去皮

威靈仙二兩

桑根白皮一兩

三味用醇酒一升半煎取入合。去滓頓服之。

又方

杏仁湯浸去皮尖雙

虎骨以酒塗斷炙黃

二味用醇酒一升熱調頓服。

風走注疼痛

論曰。風走注疼痛之病。其痛無常處是也。氣血流通。筋脈和同。則骨肉滑利。一有不調。風邪乘虛與血氣偕行。使榮衛凝澀。隨所注處。悉爲疼痛。故謂走注痛也。

虎骨散方 治風毒走注。疼痛不定。

虎脛骨酥炙 敗龜酥炙各

麒麟竭研碎

赤芍藥

當歸 沒藥研

防風

白附子

桂枝粗 白芷

骨碎補去毛

蒼耳炒

自然銅火煨研碎 牛膝酒浸切

天麻

檳榔

五加皮 羌活各一兩

共十八味。為散。每服二錢。溫酒調下。

芸薑散方 治風毒走注。疼痛如虎嚙。

芸薑子 天南星 草烏頭並生用各一兩

三味為散。五錢量入生麵。以醃醋、生薑汁、生油各少許。調成膏。攤紙上。厚一分。

貼痛處即止。

消毒膏方 治風毒走注疼痛。筋脈拘急。

馬牙硝赤研一兩燒 烏頭大者三枚研

二味同研令勻。每用三錢。白麵三錢。生薑汁一盞。同熬成膏。攤於帛子上。熱貼。

日二換之。

乾地黄丸方 治走注疼痛。

生乾地黄

白芷

當歸

沒藥

烏頭去皮

防風

木香

赤小豆

共八味等分搗研爲末，水浸蒸餅和丸。如梧桐子大。每服五丸冷酒下。空心食前服。日二。

白虎風

論曰。白虎風之狀。或在骨節。或在四肢。其肉色不變。晝靜而夜發。發則痛徹骨髓。或妄言妄有所見者是也。蓋風寒暑溼之毒。乘虛而感。播在經脈。留於血氣。畜聚不散。遇陽氣虛弱。陰氣隆盛。則痛如虎嚙。故以虎名焉。

羌活

防風

秦艽

芎藭

當歸各半

牛膝酒浸

附子去皮膚

大腹連皮用

桃 仁湯浸去皮尖雙仁炒二十一枚

九味。剉如麻豆。每服五錢。入生薑一棗大。同煎溫服。日二夜一。

牛膝散方 治白虎風疼痛難忍。

牛膝酒浸 當歸各一兩 虎骨酥炙令 赤芍藥一兩

芒硝別研半兩 桃仁去皮尖雙 芍藥半兩

七味為散。每服空心用溫酒調下。一錢至二錢。

抵聖散方 治白虎風。骨髓疼痛。至夜轉甚。

虎脛骨不計多少打破酒浸蒸令黃隱為度

一味為散。每服半錢。入薄荷末一錢。人參末半錢。煎乳香酒調下。

一神散方 治白虎風。晝靜夜發。痛徹骨髓。狂言妄見。

防風 羌活 桂皮去粗 地骨皮

芎藭 細辛 虎骨酒浸一宿酥炙黃

共七味。等分為散。每服一錢。溫酒調下。

烏頭散方 治白虎風。走注疼痛。

烏頭去皮

地龍

羌活

虎骨酒炙

延胡索

當歸

沒藥研

防風各一

入味為散。每服二錢。冷酒調下。空心食前日二服。

風不仁

論曰。風不仁之狀。皮膚搔之如隔靴是也。由榮氣虛。衛氣實。寒風入於肌肉。血氣不相與。凝痺結滯。皮膚癢痺。厚無所覺。知內經曰。皮膚不榮。故為不仁。此之謂也。烏鷓丸方。治風虛皮膚不仁。頭目昏痛。利咽膈。解昏倦。

烏鷓為一隻燒

麝香別研

虎骨酥炙

白僵蠶炒

乾蝦去土

防風去叉

白附子

烏蛇酒浸去

藿香葉各半

除別研外。搗羅為末。入研者拌勻。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服十九丸至十五丸。溫

酒下。茶清亦得。

羌活湯方。治風不仁。手足癢麻疼痛。

羌活

獨活俱去頭

防風

蔓荊實

人參

蒺藜子炒去

芍藥

白茯苓

枳殼

芎藭

天蓼木

阿膠炙令

威靈仙去錯土

每服二錢。空心豆淋酒調下。或鍊蜜丸。如梧桐子大豆淋。薄荷酒下十五丸至

二十九。

五參散方 治風不仁。皮膚癢麻繞膝。偏身似蛇皮黑癩。旋生旋沒。通身癢痺。

人參

丹參

沙參

苦參

玄參堅者各一兩

白花蛇酒浸去皮骨一兩半

右六味為細散。每服二錢。食後溫酒調下。加至三錢。

風瘙癢

論曰。風瘙癢者。表虛衛氣不足。風邪乘之。血脈留滯。中外鼓作。變而生熱。熱即瘙癢。久不差。淫邪散溢。搔之則成瘡。

五白散方 治皮膚風瘙。晝夜不止。

白附子

白殭蠶炒

白蒺藜炒

白鮮皮兩

白花蛇酒浸去皮
骨炙三兩

右五味為散。每服一錢。空心臨臥溫酒調下。

枳殼散方 治風皮膚瘙癢麻痺。

枳殼去瓢
炒二兩

苦參

蒺藜子炒去
殼

蔓荊實各一
兩

荆芥穗

麻黃去根
節

羌活去蘆
頭

獨活各等
分

每服二錢。臘茶溫酒調下。食後臨臥各一服。

天麻散方 治熱毒風攻偏體。瘙癢癰癧。皮膚癢痺。肢節疼痛。四肢大腸不利。

天麻

防風

羌活

甘菊花

杏仁去皮尖雙
仁炒黃各二兩

甘草一兩
炙

每服三錢。空心蜜酒調下。日再服。

天門冬丸方 治風熱皮膚癢疹。癢生瘡。如水疥。或如粟粒。

天門冬去心焙
二兩

枳殼去瓢
炒三兩

白朮

人參各一
兩半

獨活

苦 參各一分 兩

爲末。蜜爲丸。如梧桐子大。每食後米飲下三十丸。日二服。

八味散塗傅方 治徧身瘡疥。皮破肉痛。或瘙癢膿水。

蜀椒去目

吳茱萸湯洗炒

青鹽研

石硫黃研

膩粉研

白殭蠶炒

藥皮各一

麝香少許

八味搗研爲散。猪膽汁調塗之。溼則乾傅。

防風湯淋洗方 治瘙癢如蟲行。或癩痺不仁。

防風

益母草

苦參各三分

蒺藜子炒五

荊芥穗

蔓荊實

枳殼去瓤炒

每用三兩。水一斗。煎至八升。乘熱淋洗患處。

風痞癩

論曰。風痞癩者。由腠理不密。三陽氣外泄。發而爲汗。汗出未已。爲風邪所搏。風熱相併。不得流行。故結爲痞癩。狀如麻豆。甚者漸長。搔之成瘡。

獨活丸方 治風癱瘳痞癩腫起時瘳時痛。

獨活去蘆

天門冬

防風

蒺藜子妙去

桔梗各一分

薏苡仁炒

黃連去鬚各

桂半兩

枳實半兩

為細末。鍊密丸。如梧桐子大。每服二十九丸。空心臨臥菊花湯下。

景天花散方 治脾肺風毒。徧身發痞癩。癢癢煩躁。

景天花慢火焙乾一錢

紅麴半兩

同研為細末。每服二錢。食後臨臥服。溫水下。

胡麻散方 治肺脾風毒攻注。皮膚癢癢。手足生瘡。及徧身痞癩。發赤黑鬢子。肌

熱疼痛。

胡麻妙令

枳殼各二

防風

蔓荊實

威靈仙

苦參

何首烏米泔浸透去

芎藭

荆芥穗

甘草炙各

薄荷用葉

為散。每服二錢。溫酒下。或鍊蜜丸如梧桐子大。每服二十九丸。溫酒下。

枳殼酒方 治風瘙癢癩。皮膚生瘡癩。或如蟲行。

枳殼二

秦艸

獨活

肉蓯蓉各四

丹參

蒟蒻各五

松葉切三

剉如麻豆。用生絹袋貯。以清酒二斗。浸六宿。每服半盞。日三夜四。

蒺藜浴湯方 治風毒瘙癢癩。漸成瘡癩。

蒺藜子炒

芫蔚子

羊桃

蒟蒻根苗

漏蘆去蘆頭

苦參各半

鹽四兩

每全料。用水三石。煮取二石五斗。去滓。溫室中淋浴。仍先飽食。即入浴。久浸最

良。可隔夜一浴。乾衣蓋取汗。慎外風。

桃仁塗方 治風毒赤癩。浮腫成瘡癩。

桃仁去尖雙

杏仁去尖雙

麻生研

凝水石研如粉

右四味。各研細。別研芸薹菜絞汁。和以白蜜。入前研藥。攪為稀膏。用塗患處。乾

則易之。

風瘙癢癩

論曰。風痿癱瘓。其狀有二。皆緣肌中有熱。若涼溼之氣折之。熱結不散。則成赤瘓。若因風邪所折。風熱相搏。則成白瘓。赤瘓得熱則劇。得冷則滅。蓋熱氣鬱結於內。故惡熱宜冷。白瘓得陰雨則甚。得晴暄則消。蓋熱氣散釋於外。故惡冷宜熱。冷熱之證異。其為癱瘓則一。蓋身體風瘙而癢。搔之隱隱而起是也。

秦艽丸方 治風痿癱瘓。搔之愈甚。

秦 艽

防 己

松

脂錄成者各兩半

枳

殼

蒺藜子妙去角各二兩半

苦 參

白 朮

芎 藭

乾 薑炮各一兩

防 風

附 子

薤 白

乾 薑

薤 白炮各一兩

共研末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。酒下。加至三十丸。早食前各一服。

蔓荊實散方

治風痿癱瘓。手足麻木。

蔓荊實

何首烏各二兩

羌 活

威靈仙

荊芥穗

防 風各一兩

苦 參

參 一分

為散。每服二錢。溫酒調下。日三。

茵陳蒿散方

治風痿癱瘓。皮膚腫癢。

茵陳蒿一兩 荷葉半兩

為散。每服一錢。蜜水下。食後服。

蒺藜子散方 治風瘙皮膚癢癬癢痛。或有細瘡。

蒺藜子炒去角 枳殼 荊芥穗

防風一兩 蒼朮泔水浸一宿四兩

羌活

共為散。每服一錢。溫酒或茶調下。

石南酒方 治風瘙癢癬經旬不解。

石南葉用三兩去粗莖生

一味搗羅為末。每服半錢至一錢。用酒三合。煎一沸。空心溫服。

白蜜酒方 治風癢癬癢不止。

白蜜一合 酒二合

二味相和煎溫。食前服。斗方用松葉一斤酒一升 費三升 日夜服出汗。

枳實丸方 治風熱頭面身體瘙癢癢癬。

枳實去剝 天門冬 獨活 黃連

防風

蒺藜子觔去

桔梗各一分

薏苡仁一兩

桂一分

共爲末。鍊蜜丸如梧桐子大。每服二十九丸。空腹米飲下。日二。

塗藥方

慎火草

大葉青厚

生

薑和皮不洗

鹽重少

三味。塗摩癢處。如徧身癢。塗發處自消。

芎藭粉摩方 治風癱瘓癢痛難止。

芎藭

白芷

麻黃根各二

藿香一兩

米粉二升

五味。搗羅爲粉。摩病處立效。

枳實熨方 治風白癩。

枳實生用

一味搗碎。以醋浸令啞啞炒熟。用熟帛包裹熨癩上。冷卽易。分作二包子。更相

炒熨尤佳。

聖濟總錄纂要

清

新安

程

林雲來纂輯

鄞縣

曹炳章赤電校點

卷二

諸風門

蠱風

論曰。蠱風之狀。在皮膚間。一身盡痛。若割若刺。淫淫躍躍。如中蠱毒。故名蠱風。皆由體虛受風。侵傷正氣也。

天麻丸方 治蠱風如皮膚刺割。

天麻

躑躅花

獨活

附子

白附子

原蠶蛾炒

防風

蒼耳

蕤藜子

烏頭去皮臍

麻黃去根

烏蛇肉

麝香

除研者外。搗羅為末。入麝香再研勻。煉蜜和搗三二百下。丸如梧桐子大。每服

二十九丸。溫酒下。不拘時候。如有汗出。即宜避風。

石南湯方。治六十四種風。注走皮膚中。如蟲行。痛如刺割。狀似蠱毒。及卒風面

目腫起。手不及頭。口噤不能言。

石南

乾薑

黃芩

細辛

人參各一

桂

麻黃去根

當歸

芎藭各一

乾地黄三分

甘草炙二

食茱萸一分

咬咀如麻大。每服六錢。水酒同煎。溫服。得汗為度。

何首烏散方。治蠱風。

何首烏

威靈仙各一

苦參半兩

麒麟竭一分

並生搗為散。入乳鉢內。研三五百遍。每服一錢。用荊芥湯調下。每日三服。酒服

尤妙。

薄荷丸方 治蠱風皮膚苦盡痛若刀割狀及頭目不利風痰等疾。

薄荷葉 一觔 天 麻 四兩 威靈仙 三兩 羌 活 四兩

山梔子仁 二兩 蔓荊實 三兩 白 芷 桔 梗 炒

防 風 各二 大 黃 溼紙裹煨令 人 參

赤茯苓 各三 龍 腦 研半

搗研爲末再和勻。煉蜜丸如鷄頭實大。每服一丸。食後細嚼。茶酒任下。

肌肉瞤動

論曰。肌肉瞤動。命曰微風。蓋邪搏分肉。衛氣不通。陽氣內鼓。故肌肉瞤動。然風之入脈。善行數變。亦爲口眼瞤動偏喎之病也。

虎骨丸方 治風虛肌肉瞤動手足顫掉。

虎脛骨 酥炙 松 節 剉酒 天 麻 牛 膝 酒浸

赤 箭 海桐皮 獨 活 石 斛 去根

防 風 烏 蛇 酒浸去 酸棗仁 當 歸

仙靈脾

甜瓜子洗焙

乳香研

五加皮各一

一十六味。先以十五味搗羅為細末。入研者乳香再和勻。酒煮麵糊丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。荆芥酒或茶酒任下。不拘時候。

天麻丸方 治循經絡肌肉瞤動。頭目昏眩。手足麻痺。

天麻

芎藭各一

荆芥穗

雞蘇葉各三

白附子

甘草各半

右六味為末。煉蜜丸如櫻桃大。每服一丸。茶酒任下。

荆芥湯方 治風氣肌肉瞤動。頭目昏眩。四肢煩疼。

荆芥穗

旋復花各四

前胡

甘草炙

麻黃去根

芍藥

芎藭

半夏洗七遍

每服三錢。葱白三寸。雞蘇二葉同煎。溫服。

風癩

論曰。風癩之狀。發無常時。每發則仆地吐涎沫。無所覺知。蓋由血氣皆虛。精神離

散。魂魄失守。風邪入於陰經故也。又以胞胎之初。其母卒大驚。精氣併居。能令子發癩。其證與風癩大率相似。

丹砂煎方 治風癩疾。時發時省。涉歷年月。

丹 砂 細研水飛瀉過後 石 膏 五兩 黃 連 去鬚搗

生地黃 研取自然汁二升

共四味。以清水一斗。先煮石膏。黃連取五升。淨去滓。次下生地黃汁。又煎之如稠飴。始下火。取丹砂粉投入。勻攪百餘遍。貯於不津器中。更攪待冷。即住手。每日兩度。以溫水調服。約如半彈丸大。服藥後只吃淡飯。蔓菁菜等。

雄黃丸方 治五癩各有聲。牛癩若牛鳴。馬癩若馬鳴。狗癩若狗鳴。羊癩若羊鳴。

雞癩若鷄鳴。凡此五癩。皆宜服之。

雄 黃 丹 砂 雌 黃 三味各二兩碎同用生絹袋貯

色滴如珠引若線為度取藥囊出河水洗餘陶甌
出暴乾入乳鉢中研如粉為度其蜜即丸藥用
去塵垢者用精者一兩將無油淨器中下水銀及鉛同銷錄攪令勻
寫於熟鐵器內待冷先將前三味石藥乳鉢內研次入鉛同研取勻
水 銀 一 兩

共五味。各如前修製畢。便將前煮丹砂、雄黃、雌黃、餘蜜。再重湯煮散。少少點入藥中。漸漸和勻。為丸如大麻粒。每用桃、柳、柏、桑木嫩條各長七寸。寸剉。以水一升。煎至六合。去滓分溫下丸藥。空心。午時。臨臥下三丸至五丸。小兒一丸至二丸。

羚羊角丸方 治風癩癩。

羚羊角

犀角

遠志

人參

山藥

茯苓

防風

生地黄

金箔研

銀箔研片各一

麥冬

鐵粉研

天冬各三兩

龍齒研二兩

水銀件一分入金銀箔龍齒鐵粉五

共十五味。先將十味搗羅為末。入別研者相拌令勻。鍊蜜和丸。如菉豆大。用桃柳枝湯下二十九丸。日二夜一。或人參茯苓湯亦可。

風癩

論曰。風癩病者。由心氣不足。胸中煩熱。而又風邪乘之。病間作也。其候多驚。目曠。

子大。手足顛掉。夢中叫呼。身熱瘦搖頭。口噤。多吐涎沫。無所覺知是也。然病發於陽者易差。發於陰者難治。故經曰。臍病難治。腑病易治。又曰。大人曰癲。小兒曰癇。靈烏散方。治風癇多驚。手足顛掉。口吐涎沫。

烏

鴉

一隻臘月取於葦瓶內或以鹽泥固濟令

丹

砂

研一

細

辛二兩

乾

蠟四枚炒

共四味。將二味研末。與別研二味同羅。每服半錢匕。午前溫酒調下。

安息香丸方。治男婦暗風癇病。

安息香

通明無砂石者

鉛

丹

二味爲細末。入白羊心中血。研勻。丸如梧桐子大。每服十丸。空心溫水下。

神聖丸方。治風癇涎潮等疾。

雌黃

鉛

丹各一兩

細研。以醋一觔熬稠。丸如梧桐子大。與惡實末同收。每服十丸。臨臥煎惡實末

湯下。

丹砂丸方。治風邪諸癇。狂言妄走。精神恍惚。思慮迷亂。乍歌乍哭。飲食失常。疾

發仆地。口吐白沫。口噤戴眼。魂魄不守。年歲深遠者。

丹

砂一兩 光明者

酸棗仁

研 微炒

乳

香光瑩者 研 各半兩

合研令勻。先令病人盡量飲酒沉醉。次取藥五錢匕。酒一盞調下。於靜室中安睡。勿令驚動。候其自覺則愈。

鐵粉烏鴉散方 治風痲。

烏

鴉一雙 去腸肚及嘴足

丹

黑鉛

鐵粉研各二兩

丹 砂一兩 研先將鐵粉并鉛丹入鐵器內熟炒。次入黑鉛一處結成砂子。秤煨令同。亦取出搗為末。次入丹砂更研如粉。入後七味。

獨活

防風

芎藭

羌活

天南星各二兩

共研為細末。入麝香少許。再研令勻。每服半錢匕。臨臥冷酒調下。

五生丸方 治痲疾。

乾薑

不炮

烏頭生法 去皮臍

半夏生用

附子生法 去皮臍 各一兩

大豆末生用

共五味。除大豆末外。細剉爲末。以豆末煮糊爲丸。如梧桐子大。每服三丸。冷酒下。

半夏丸方 治風癘痰盛瘕瘕。口吐涎沫。

半 夏湯浸去滑生 鉛 丹研各一兩 白 礬生爲末 丹 砂研

同研勻。以粟飯爲丸。如梧桐子大。每服食後生薑湯下二十九。

五枝煎方 治風癘多驚。手足顫掉。身熱瘕瘕。

桃 枝 柳 枝 桑 枝 夜合枝

槐 枝並剉如豆大 豆海一升

共六味。用水一石。慢火煎。候豆爛。及嚼諸枝無味。卽濾汁於銀石器內煎。令得所。不可熬過。以瓷器盛。每服一匙頭許。入蘆薈末少許。溫酒化破。空心徐徐服。

治風癘瘕瘕不省方

虎 糞曝乾 野豬骨并蹄按各少

共研爲散。每日空心以酒調下二錢。忌一切有足之物。

水銀九方 治風癇。

水銀半兩

雄黃研

龍腦研

牛黃研各

丹砂研一

再同研勻。用糯米飲和丸。如菉豆大。每服五丸至七丸。熟水下。空心臨臥日再服。

風狂

論曰。風狂之狀。始發則少臥不飢。自高自賢。自辯自貴。蓋人之榮衛周身循環。晝夜不窮。一失其平。則有血并於陰。而氣并於陽者。有血并於陽。而氣并於陰者。陰陽二氣。虛實不調。風邪乘虛而入。并於陽。則謂之重陽。故其病妄笑好樂。妄行不休。甚則棄衣而走。登高而歌。或至數日不食。故曰狂也。又肝藏魂。魂則隨神往來。悲哀動中。有傷於魂。則爲狂妄。是亦血氣俱虛。風邪乘之。陰陽相并也。

真珠散方

治風狂妄語。心熱狂走不知人。

真珠研

牛黃研

丹砂研各

金箔研

銀箔研各五片

麝香研一分

鐵粉研

天竺黃

人參

龍腦研各三分

黃芩一兩

防風

犀角半兩

茯苓三錢

麥門冬一兩

遠志

白鮮皮

羚羊角半兩

甘草炙

胡黃連

甘菊花

白附子各三分

除研外。搗羅為末。入研藥拌勻。每服一錢。加至二錢。薄荷溫水或梨汁調下。

茯苓神去木

杏仁湯去皮尖雙

龍齒六兩

凝水石一斤

升麻二兩

石膏碎二兩

沙參

白茯苓

白鮮皮各二兩

生麥門冬四兩

劉如麻豆。每服五錢。水煎溫服。如病甚煎成。入竹瀝半合。再煎服。

腦風

論曰。內經謂風氣循風府而上。則為腦寒。夫風生高遠。始自陽經。然督脈陽維之

會。自風府而上至腦戶。腦戶者督脈足太陽之會也。又太陽之脈。起於目內眥。上額交巔。上入絡腦。今風邪客搏其經。稽而不行。則腦髓內弱。故項背怯寒。而腦戶多風冷也。

石膏散方 治腦風邪氣留連。頭痛不已。

石 膏 欬 澀

天南星 炮

白殭蠶 炒

三味等分。搗研為散。每服二錢匕。葱白二寸。臘茶一錢。同連鬚葱煎湯頓服。良久再服。

穀精草散方 治腦風頭痛吹鼻。

穀精草 末

銅 綠 研各一錢

硝 石 研各半錢

共研和勻。每用一匙。吹入鼻內。或偏頭疼。隨病左右吹鼻中。

通關散方 治腦風鼻息不通。不聞香臭。或鼻流清涕多嚏。肩項拘急。頭目昏痛。

風府怯寒。

原蠶蛾 瓦上炒

白附子 炮

苦 參

益 智 去 皮

羨藜子 角 炒 去 虫

乾薄荷 兩 各 一

共爲散。每服一錢匕。溫酒調下。日三服。

點頭散方 治腦風頭痛吹鼻。

細辛

高良薑

瓜蒂各一分

硝

石半兩

共研爲細散。用新水滿含一口。搯藥半匙入鼻中。良久即定。

遠志散方 治腦風頭痛不可忍。

遠志去心不

爲細散。每用半匙。先含水滿口。即搯藥入鼻中。仍揉痛處。

羌活丸方 治腦風氣鼓。或膈痰氣逆。上衝於頭。令頭旋暈。

羌活去蘆頭米泔浸一宿切焙乾二兩半

白蒺藜去

芎藭

乾雞蘇各二兩 白僵蠶去頭角一兩

共爲細末。鍊蜜和丸。如彈子大。荆芥茶嚼下一粒。不拘時候。入龍腦麝香尤妙。

何首烏丸方 治腦風鼻息不通。清涕流出。及諸風疾。

何首烏去黑皮三兩

芍藥一兩

桂去粗

烏頭

芎藭

甘草炙

薑本

甘松

羌活

天麻

陳橘皮湯白

縮沙蜜去皮各二兩

墨一分 服存性

右一十三味。共為末。煉蜜和丸。如櫻桃大。每服一丸。薄荷葱酒嚼下。不計時候。

芎藭湯方 治腦風鼻息不通。或流清涕多嚏。

芎藭二兩

細辛去苗

黃芩去黑心

荆芥穗二兩

甘草炙剉半兩

每服三錢。水一盞。入薄荷七葉。同煎至七分。去滓溫服。

吹鼻散方 治腦壅頭痛。

蘆薈

龍腦研

瓜蒂搗

硝石研

四味等分為末。每用一豆許吹之。

勝金散方 治腦風頭痛。鼻塞不通。或流清涕。多嚏不已。

荆芥穗

薄荷葉各四兩

木賊去節

蛇蛻二條

四味搗羅為散。每服二錢。清茶調下。食後日三服。

風頭眩

論曰。風頭眩之狀。頭與目俱運是也。五臟六腑之精華。皆見於目。上注於頭。風邪鼓於上。腦轉而目系急。使真氣不能上達。故虛則眩。而心悶。甚則眩而倒仆也。枳實湯方。治風頭運倒。眼旋腦項急痛。

枳實去穢炒

防風

麻黃去皮節先煎

芎藭各一兩

杏仁去皮尖雙半

夏和為末生薑汁

細辛各二兩

粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至一盞。去滓。入竹瀝半合。更煎沸。早晚食

前溫服。

人參湯方。治頭風眩。但覺地屋俱轉。目閉不開。

人參

防風

白朮

當歸酒灑切焙

麥門冬去心焙各一兩

獨活

黃芩

桂皮去粗

芍藥各半

粗搗篩。每服五錢。水一盞半。煎至一盞。去滓。食前溫服。日再夜一。

獨活湯方。治風頭眩仆地屋轉。嘔吐痰涎。惡聞人聲。

獨活去頭

茯苓神半酥各

甘草炙

當歸酒洗

牡蠣煨

白朮

附子

肉蓯蓉酒浸切焙

黃蘗兩半

防風一兩

遠志三分

人參二兩

劉如麻豆每服五錢匕。水一盞半。生薑三片。棗一枚去核。煎至一盞。去滓溫服。不拘時。

菊花湯方 治風頭眩悶。起即欲倒。頭痛眼疼。視屋轉動。

甘菊花

細辛去苗葉

防風

前胡

茯苓

白朮

麻黃去根節

芎藭

杏仁湯浸去皮尖

每服五錢。水一盞半。煎至一盞。去滓。入竹瀝半合。更煎沸。食前溫服。

山藥散方 治風頭目眩。眼痛耳聾。

山藥

甘草

五味子

甘菊花半兩

細辛

山茱萸

升麻

蔓荊實各三分

防風一兩

爲細散。每服三錢匕。空心溫酒下。

附子膏方 治風頭眩摩頭。

附子法皮

鹽花各半

爲細末。以麻油和如稀錫。洗頭摩之。日三。

守中丸方 治風頭眩。腦轉目系急。忽然倒仆。

白茯苓法黑皮

麥門冬法心

白朮 人參

甘菊花法

山藥

枸杞子法二

生地黃取汁

共八味。將七味搗羅爲末。先用生地汁於銀器內。入酥三兩。白蜜三兩。同煎。遂旋掠取汁上金花令盡。得五升許。於銀器內。拌炒前七味藥。漸漸令盡。候乾入白蜜同搗數千杵。丸如梧桐子大。每日空心或食後清酒下五十丸。服百日後。五臟充滿。肌膚潤滑。修合須擇四季旺相日。或甲子日。此藥亦名五芝地僊金髓丸。

風頭痛

論曰。風頭痛之病。由風邪客於陽經。循風府而上。至於頭腦。令人頭重疼痛。心膈煩熱。上焦壅滯。頭面虛汗。診其脈。左手寸口浮緊者是也。

石膏散方 治風壅頭痛。眉骨疼。

石膏 研

芎

藭

旋復花 各一

白附子 炮

細 辛 葉 去苗

甘 草 炙 各一 兩

共搗羅爲散。每服半錢匕。臘茶調下。不拘時候。

清氣香芎湯方 治頭痛。

芎 藭 五 兩

細 辛 去 苗 葉 二 兩

人 參 半 兩

甘 草 炙 三 兩

半夏 麴 半 夏 用 生 薑 和 未 作 麴 用

右五味。哎咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生薑三片。薄荷五葉。同煎七分溫

服。不拘時候。

芎藭散方 治風頭痛。

芎 藭

莎草根 炒 去 毛 一 兩

藿香葉

荆芥穗 各 一

石 膏 研 半

共爲散。每服三錢匕。荆芥湯調下。食後服。

丹砂丸方 治諸風頭痛不可忍者。

丹砂水飛

石膏燒通赤地白附子炮爲末

龍腦少許

共同研令勻。粟米飯丸。如菘豆大。更以丹砂爲衣。每服五丸。食後薄荷茶嚼下。

六神散方 治頭痛眼睛痛。

芎藭

馬牙硝研各

石膏研

乳香研各

龍腦研一

共研爲細末。每用一匙。含水搯於鼻中。

吹鼻麝香散方 治頭痛不可忍。

藜蘆和州者

一味。暴乾研爲散。入麝香麻子許。研勻吹鼻中。

通頂散方 治鼻塞及頭痛。

馬牙硝研細

地黃汁一合

二味相和。於銅器內。用慢火煎乾。取出研細。每挑少許入鼻搯上。吐痰卽差。

偏頭痛

論曰。偏頭痛之狀。由風邪客於陽經。其經偏虛者。邪氣湊於一邊。痛連額角。故謂之偏頭痛也。

至靈散方 治偏頭痛。

雄黃研

細辛去苗葉為末等分

二味再同研。每用一匙。左邊痛搯入右邊鼻。右邊痛亦然。

乳香散方 治偏頭痛不可忍。

乳香如皂子大

高良薑如指大

二味於火上燒。迎烟熏鼻。隨痛左右用之。

天南星散方 治偏頭痛。

天南星酸漿水煮透心。硬切曝乾一兩

菊花三分

自然銅燒赤。碎一兩

防風半兩。用水一升。去防風自然銅不用。只單用菊花。

芎藭一兩

五味除二味不用外。搗羅為細散。每服半錢匕。臘茶清少許調。只作一口呷盡。

分作三嚙。每嚙點頭一點。

草撥散方 治偏頭痛。

草撥

一味爲細末。每用一匙。先令病人含滿口溫水。隨病左右搐入鼻中。

漏風

論曰。內經曰。飲酒中風。則爲漏風。漏風之狀。或多汗不可單衣。食則汗出。甚則身寒喘息。惡風。衣裳濡。口乾善渴。不能勞事。又曰。身熱解惰。汗出如浴。惡風少氣。亦名漏風。夫酒以養陽。酒入於胃。與穀氣相薄。熱盛於中。其氣慄悍。與陽氣俱泄。使人腠理虛而中風。故其證多汗。惡風。不可單衣。其喘息而少氣者。熱熏於肺。風客於皮毛也。其口乾善渴者。汗出多而亡津液也。其解惰而不能勞事者。精氣耗不能營其四肢也。謂之漏風。以汗出不止。若器之漏。久而不治。轉爲消渴。澤瀉散方 治漏風身熱解惰。汗出如浴。惡風少氣。

澤瀉

白朮各二兩

麩 銜一兩

為散。每服二錢。沸湯調。食後服。

黃耆湯方 治風虛多汗。夜臥尤甚。牀席衣被並溼。

黃耆

人參各二兩

麻黃根

牡

蠣各三兩

地骨皮二兩

龍骨四兩

每服三錢。大棗二枚。同煎空心服。日二。

防風散方 治風虛多汗惡風。

防風一分兩

澤瀉

牡

蠣各赤

桂各三分

為細散。每服二錢。溫酒調下。空心服。日再。

杜仲散方 治風虛多汗。夜臥尤甚。

杜仲炙炒

黃耆

牡

蠣各三兩

麻黃根五兩

為細散。每服二錢。煎敗扇湯調下。食後服。日二。

勞風

論曰。內經曰。勞風發在肺下。其為病也。使人強上冥視。唾出若涕。惡風振寒。夫勞

風之病。腎勞則根勞於下。經所謂根弱則莖葉枯矣。故目視不明。而背反強。腎之脈入肺中。故因皮毛感風而振慄也。腎主唾。故津液凝結。唾如涎涕。治之以救其俛仰者。戒其勞動也。

麻黃湯方。治勞風胸膈不利。涕唾稠黏。上焦壅滯。喉中不快。

麻黃去根

荊芥穗

杏仁去皮尖

木香

當歸

黃芩去心

羌活

芍藥

苜胡

大黃炮熟各一分

半夏湯洗七遍去滑 一錢 牽牛子半兩

每服二錢。生薑一片。同煎。食後溫服。

芎藭圓方。治勞風強上冥視。

芎藭

藭一兩

枳殼去瓤炒

爲末。鍊蜜丸如梧桐子大。每服十丸。食後溫水下。

萎蕤飲方。治勞風項強急痛。四肢煩熱。

萎蕤三兩

人參

羚羊角二兩各

每半兩。入豆豉三合。葱白一握。以水煎。分溫空腹二服。

風頭旋

論曰。風頭旋者。以氣虛怯。所稟不充。陽氣不能上。至於腦。風邪易入。與氣相鼓。致頭運而旋也。又有膈胸之上。痰水結聚。復犯大寒。陰氣逆上。風痰相結。上衝於頭。亦令頭旋。

松香散方 治風頭旋。

松 實去殼

白 芷

當 歸

芎 藭

甘 草炙各

甜 瓜子洗一

同擣羅爲細散。每服二錢。食後以荆芥、薄荷清茶調下。

荆芥丸方 治風頭旋。目痛眩。肢體拘急。手足少力。

細 辛

芎 藭

白 僵 蠶炒一兩各

天 麻半兩

羌 活

防 風

蒺 藜子炒去角

同爲末。煉蜜丸如鷄頭大。每服一丸。食後細嚼。荆芥湯下。茶酒亦得。

入參丸方 治風頭旋。目眩痰逆惡心。胸膈痞滯。欬嗽痰涎。喘滿嘔逆。不欲飲食。

人參

甘草

白朮

旋復花一炒各

麥門冬

前胡

枳殼各二

木香半兩

同搗羅爲細末。以湯浸炊餅和丸。如梧桐子大。每服二十九。食後生薑湯下。

祛痰丸方 治風頭旋。痰逆惡心。咽膈不利。

天南星生

半夏生

赤茯苓

乾薑炮

陳橘皮湯浸去白

稀麵糊丸。如梧桐子大。每服三十丸。加至四十丸。溫米飲下。

羚羊角湯方 治熱毒風。上攻頭面。目旋暈。耳內虛鳴。身體癢疹癩痺。

羚羊角二兩

菊花三兩

防風去叉

羌活

前胡

藁本

玄參

黃芩

杏仁去皮尖

菖蒲

甘草炙各

每服五錢。水煎。食後溫服。

治頭旋腦悶。鼻塞眼運。貼膏頂方。

蓖麻子去殼

杏仁去皮

食鹽

芎藭搗末

松脂研分

先搗食鹽次下四味杵勻。卽塗於蠟紙上。有病者先灸百會三壯訖。將蠟紙藥於灸處貼之。日一易。得膿血出效。

風痰

論曰。風痰之病。得於氣脈閉塞。水飲積聚。其狀雖有冷熱之異。至於心胸痞隔。飲食不化。則一也。蓋風壅氣滯。三焦不和。則水飲易至停積。風能生熱。壅亦成痰。是故有頭目不利。神思昏濁之候。其或嘔逆不納。飲食者。則因於胃冷而得之。其治固不可一概也。

半夏飲方 治風痰。心腹煩滿。嘔逆不欲飲食。

半夏湯浸

大腹皮

麥冬

赤茯苓

白朮

桔梗

前胡各三分

青橘皮去白

厚朴薑汁

防風

枇杷葉拭去毛

每服三錢。入生薑一棗大同煎。稍熱服。

澤瀉湯方 治風痰壅滯。胸膈不利。頭目昏眩。不思飲食。

澤瀉

前胡

白朮

赤茯苓

甘草

人參

半夏

湯洗七度切作片以生薑汁浸焙乾炒各一兩

檳榔

陳橘皮湯浸去白枳殼炒半兩

每服二錢半。生薑半分。同煎溫服。不拘時候。

鐵刷湯方

治風痰胃中有寒。嘔吐痰涎。胸滿氣逆。

附子

五枚炮令微拆地上以子蓋子覆冷取去皮膚

半夏

湯洗七遍去滑熟炒一兩

木香半兩

剉如麻豆。每服二錢。入生薑一棗大。大棗三枚同煎。空心食前溫服。

天南星丸方

治風痰胸膈煩滿。頭目昏眩。

天南星一筋每枚重一兩者

用湯浸洗刮去浮皮并虛軟處。令淨。用法酒浸一宿。以桑柴蒸。不住添熱湯。令釜滿甑內氣旺。更不住灑酒。常令藥潤。七箇時滿取出。用銅刀切開。揀大者微嚼。看不麻人口即是熟。未熟即便蒸候熟。用銅刀子細切。入石臼內木杵爛搗。

如泥。入丹砂一兩。水飛過者。麝香一兩。細研羅過。丁香末一兩。龍腦一兩。同擣令勻。丸如鷄頭大。又用丹砂末一兩為衣。每服一丸。嚼破用薄荷茶或酒任下。小兒驚風半丸。合時忌鷄犬婦人見。

前胡丸方 治風痰不散。食逆嘔吐。

前胡

白朮

枳

殼去麩

半

夏湯洗七

赤茯苓

人

參各三

白

礬去麩

丁

香一分

為末。棗肉和丸。如梧桐子大。每服二十九丸。煎生薑竹茹湯下。食後服。

逐痰丸方 治風痰壅盛。每日早時多喜嘔吐。

人參

赤茯苓

乾薑

半

夏湯洗七

為末。以粟米飯和丸。如梧桐子大。每服二十九丸。空心生薑湯下。日午再服。

胃風

論曰。胃風之狀。頸多汗。惡風。飲食不下。膈塞不通。腹善滿。失衣則腹脹。食寒則泄注。形瘦而腹大。蓋胃者水穀之海。五臟六腑之大源。因而食寒失衣。則風邪入易。

感。故證頸多汗。惡風者。以人迎胃脈之所動也。食飲不下。膈塞不通。腹善滿者。其
經循腹裏。其病在中焦也。失衣則臍脹者。重感於風邪。傷肌肉也。食寒則泄者。風
寒交傷於胃。故泄注也。形瘦者。精不營也。腹大者。氣不通也。
豆蔻丸方。治胃風。頸項多汗。惡風。飲食不下。膈塞不通。腹善滿。失衣則臍脹。食

寒則泄。形瘦而腹大。

肉豆蔻半兩

羌活

防風

桔梗炒各

陳橘皮湯洗

獨活去蘆

薏苡仁

人參

草豆蔻去皮

芎藭各半

甘草

木香各等

爲細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十九丸至四十九丸。米飲下。日三夜一。

厚朴煨散方。治胃風冷氣攻心。腹脹滿疼痛。飲食不消。四肢羸瘦。

厚朴薑汁

訶梨勒煨去核

木香

蒼朮米泔浸一

枳殼

當歸

桔梗炒各

陳橘皮湯洗

爲散。每服三錢。棗一枚。同煎溫服。

風祕

論曰。風秘之病。以大腸祕澀不通。大腸者。肺之腑。通行水穀。傳導所出。若三焦不和。風熱所搏。則腸胃乾燥。津液虛少。糟粕結聚。傳導不行。令人心煩腹滿。便秘不通也。

前胡丸方 治風氣潤利腸胃。

前胡二兩

大黃

黃芩

木通

麻子仁

芍藥各一分

共爲末。煉蜜爲丸。如豌豆大。每服十五丸。溫水食前下。

調中丸方 治大腸風熱祕澀不通。

大黃

鼈甲醋炙黃去裙爛

朴硝

桃仁楊長去皮尖雙仁炒各四兩

皂莢五挺去皮推碎用水一升投取汁濾過

萊菔一筋推碎絞取汁

共六味。將前四味爲末。以陳醋一升半。同萊菔、皂莢煎五七沸。後入藥末。同熬

得所。丸如梧桐子大。每服二十九。米飲下。

木香丸方 治腸胃風熱。津液燥少。大便秘澀。

木 香半兩

檳榔

大黃煨

麻子仁各二

牽牛子末

郁李仁煨

枳殼去瓢煨

為末。煉蜜丸。如梧桐子大。每服二十丸。溫米飲下。食前服。

威靈仙散方 治老人風氣壅盛。大腸秘澀。五六日方大便一次。頭旋目暗。發作

無時。

威靈仙一兩酒

羌活去蘆

芎藭各半

為散。每服二錢。空心葱湯調下。

香枳散方 治大腸秘。祛風順氣。

枳殼去瓢

防風各一

甘草炙

三味。搗羅為散。每服二錢。沸湯點服。

引飲導秘丸方 治風熱。大腸秘澀不通。心煩腹滿。體熱。

檳榔

木香

芎藭

羌活

桂各二

大黃煨

郁李仁煨去皮尖

為細末。煉蜜丸。如梧桐子大。每服二十丸。漿水下。茶湯亦可。

癰瘍風

論曰。癰瘍風之病。其狀斑駁。點點相連而大圓。概似白駁而稍微也。皆由風邪熱氣搏於脾肺二經。流散肌肉使然也。

烏蛇散方

治癰瘍風頸面斑駁。

烏

蛇酒浸去皮

秦

芎藁各半

桂

羌活

人參

山梔子

枳殼

丹參

沙參

玄參

犀角鎊各

升麻

防風

木通

白鮮皮

黃芩

蒺藜子炒去角

苦參二兩

共爲散。每日溫酒調下三錢。食後臨臥服。

雄黃散塗方 治癰瘍風。面頰頸忽生斑駁。其狀如癬。

雄黃

硫黃

白礬並研如粉

三味合研勻。以鍊成豬脂調和塗上。

附子散塗方 治癰瘍風身體斑駁。

附子一枚大附子 硫磺研半 蒼耳苗乾者

三味搗研為末。以米醋調。先以布巾揩瘍上。即以藥塗之。乾再塗。

巴豆塗方 治癰瘍風。面頰頸項忽生斑駁如癬。

巴豆去皮生 礬醋一合

先以新布揩令赤。於故沙盆內。用醋磨巴豆如稀膏。塗於患上。

白駁

論曰。白駁之病。其狀斑駁如癬。過於癰瘍。但不成瘡爾。皆由風熱搏於膚腠。脾肺二經不和也。

治白駁傳方

雌黃石硫黃各一兩 蛇蛻皮一條大

同研細。用醋調成膏。先以巴豆一粒中截。以平處磨令皮起。然後傳藥三兩遍

即瘥。

治頭項及面上白駮。漸長如癬。但不成瘡。宜用此傳方。

桂去粗皮

研爲末。每用半錢或一錢。以津唾和傅於白駮上。日三。

治面項身體白駮傳方

鮎

魚一頭約重半斤。去腸肚淨洗後。一依鮮法用鹽椒蔥。更用荷葉裏裹。令大臭爛。先以布拭白駮令赤。次炙鮎包熱熨。令汗出。以綿衣

包。無令風冷所傷。

蛇蛻皮方 治周身白駮。漸長似癬。但不成瘡。

蛇蛻皮大者一條

炒熱按摩白駮。時時嚙唾數百遍。棄之田野草中。

鰻鱺魚塗方 治頸項及面上白駮。浸淫漸長如癬狀。但不成瘡。

鰻鱺魚肥者一條

炙令脂出。先將白駮用物揩拭之。令小痛。然後用魚脂塗。

大蛇皮塗方 治面項身體白駮風。

蛇蛻皮作灰者燒 石硫黃研 樹皮燒作灰
 三味令研極細以清熟漆調和勿令稠鞭薄塗白駁處欲塗藥時先以巴豆中
 截用平處摩令皮微起然後傳藥

白癩風

論曰白癩風之狀皮膚皴起生白斑點是也由肺臟壅熱風邪乘之風熱相并傳
 流榮衛壅滯肌肉久不消散故成此疾也
 烏蛇散方 治白癩風身體癢麻

- 烏 蛇酒浸去皮 白僵蠶炒 胡麻子 獨活
- 天 麻各二兩 烏頭去皮 細辛 防風去叉
- 桂 枳實 蟬蛻 白附子炮各

天南星 一分

為散每服溫酒調二錢不計時候

治白癩風方

杏

仁去尖生用

每日早晨爛嚼二七粒於白點處搯。夜臥再用。

治白癩風方

鷄

子二枚和殼以米醋三升浸七日取白

石硫黃研半兩

附

子去皮臍生用一枚重半兩者

粟米二錢

共四味。將後三味搗羅爲末。以前鷄子白調如稀糊。臨用藥。先以葛布搯患處令赤塗之。

苦參膏方 治白癩風。

苦參

鹽各一分

研爲末。先以酒一升煎至四合。入藥二味攪勻。慢火再煎成膏。每用先以生布搯患處令赤塗之。

紫癩風

論曰。紫癩風之狀。皮膚生紫點。搔之皮起。而不癢痛是也。此由風邪挾經。客在腠

理。榮衛壅滯。不得宣流。蘊滲皮膚。致令色紫。故名紫癩風。

烏蛇散方 治癩麻紫癩風。

烏蛇酒浸去皮骨

防風

羌活

人參

玄參

沙參

苦參

丹參

白附子

蒺藜子炒去角

爲散。每服一錢。溫酒調下。

附子硫黃散方 治紫癩風斑點。

附子生用一枚去皮 硫黃半兩 共研

共研爲細散。入胡粉一分。膩粉少許。同繁柳汁和勻。臨臥搽三五遍。早晨溫漿

水洗。不三五夜瘡。

牡蠣散方 治紫癩風。

牡蠣

膽礬各半

二味生用爲散。礬醋調摩患處。

胡桃塗方 治紫癩風并白癩風。

初結青胡桃一穎取外皮

石硫黃一皂子大研如粉

二味。先取胡桃皮切研如膏。入硫黃末和勻塗之。

羊蹄根塗方治紫癩風。

羊蹄根微自然汁半合 生薑微自然汁半合

石硫黃四錢研如粉

三味。將二汁與硫黃末同研令粘。塗患處。一日不得洗。不過兩上瘡。

惡風

論曰。惡風者。皆五風厲氣所致也。風有青白赤黑黃之異。其毒中人五臟。則生蟲。亦有五種蟲。生息滋蔓。入於骨髓。五臟內傷。形貌外應。故食肝則眉睫墮落。食肺則鼻柱倒塌。食脾則語聲變散。食腎則耳鳴如雷鼓之聲。心不受食。食心則為不可治。是故謂之惡風。

人參

沙參

丹參

玄參

苦參

木通

蒺藜子

烏蛇骨炙去

乾 蠟

天 麻

赤 箭

何首烏

陳橘皮雨各一

黃 芩半兩

原蠶蛾一分

並生用爲散。每服三錢。熱茶調下。服及半料。卽減服二錢。初服三日後。先覺頭項脊膏身上疼痛。乃藥力與病相擊也。當安臥兩復時許。卽無事。如或身上有瘡腫。服藥一日後。便覺漸減。

何首烏丸方 治脾肺風并惡風等疾。

何首烏

石菖蒲

荊芥穗

蒼 耳

胡 麻一兩各

玄 參

沙 參

苦 參

白花蛇酒浸去皮骨

烏 蛇酒浸去骨各半兩

共搗研爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服十九丸。茶酒任下。如要作散。每服二錢。

溫酒調下。不計時候。

威靈仙散方 治惡風。

威靈仙二兩

丹 參六兩

羌 活一兩

獨 活一兩

蒼 耳四兩

仙靈脾

玄 參

人 參

沙參各二 紫參一兩 甘草生用 黃芩二
為散。食後臨臥。溫水調下三錢。若身體無瘡。眼瞳人不斷。鼻梁不塌。服之一丹可差。

蔓荊實方 治肺臟風毒。發作如癩。變成惡風證。

蔓荊實用去白皮生 胡椒研為末炒 天麻二兩 菊花生用四兩

天南星 枸杞生用 苦參研取粉

為散。每服溫酒調下二錢。日三夜一。每服宜去食稍遠。恐藥食相犯。

大風眉鬚墮落

論曰。大風眉鬚墮落者。蓋癩病也。皆由惡風染著。榮衛不清。風溼毒氣浸漬肌肉。致淫邪散溢。癢癢成瘡。皮膚瘍潰。鼻柱倒塌。鬚眉墮落。

枳殼散方 治大風癩病。眉鬚墮落。熱毒風入五臟。身體頭面生瘡。

枳殼去麩炒 黃耆 蒼耳 白朮

薊藳 白蒺藜炒 防風生用 升麻生用

梔子仁研三

漏蘆

黃連

人參

天門冬

防己

乾薑

芎藭

丹參

麻黃去根節

白芷

甘草

葛根各半

玄參堅者

烏蛇酒浸去骨

共為末散。每服溫酒調下二錢至三錢。空心夜臥服。

梔子散方

治大風癩疾。眉鬚墮落。偏身癢麻。手攣縮。

山梔子二兩

芎藭半兩

薑本三分

當歸

蔓荊實各一兩

桔梗一分

羌活

白蒺藜

白茯苓

防風各三分

側子

天麻各半

每日空心溫酒調下二錢。加至三錢。夜臥時再服。服至一料。眉鬚再生。

羚羊角飲方

治大風癩身上生瘡。并面部浮腫。眉鬚墮落。四肢癢痺。

羚羊角鎊

甘草炙三分

獨活

山梔子仁各半

防風一兩

枳殼

黃耆

蒺藜子

丹參去苗

玄參

木通各一分

每服五錢。水煎溫服。每日早、食後、及夜臥各一服。

大風出蟲

論曰。蟲、動物也。皆風之所化。風入五臟。化生五蟲。則成五癩。入肝其蟲青。入心其蟲赤。入脾其蟲黃。入肺其蟲白。入腎其蟲黑。四蟲皆可治。惟黑蟲為難療。或所傷未深。專意治之亦差者。

熟艾方 治大風癩。熏出蟲。

艾葉別搗 砒霜 研 水銀與雄黃同研 膩粉

硫黃 丹砂 研 阿魏酒化去砂石

附子 雄黃研細入水銀點 硫黃再研令星子盡始

麝香研半 豬牙皂角研一斤去皮末

共十一味。除艾葉、皂角。別搗為末。外並合細研。用紙四張先布。次艾。糝皂莢末。次糝諸藥末。卷刀切如餅。餡著椀內燒。以小木甌子籠椀。以衣襯四邊坐於上。熏。以衣被遮壅定。不令透出氣。熱悶即俯伏。

獨活散方 治大風癩出五蟲。

獨活 三分

雄黃 研半兩

青黛 研一分

麻黃 去根節 半兩

水銀 研一分 與丹砂雄黃點醋同

阿魏 生研

雷丸

丹砂

滑石 半兩

石膽

牛黃

紫石英 研一分

斑蝥 四十枚 與糯米同炒 去足米不用

羌活 青 四十枚 與糯米同炒 去足米不用

共一十四味。研為散。每服一錢。空心溫酒調下。不得飽食。晚更服。當有蟲從小便中出。或當日。或三四日至十日方出。若瀉出赤蟲如爛櫻桃。或如豆麥。或瀉出黃蟲似黃涕。青蟲似青涕。茶汁。白蟲似馬尾蟲。遇藥氣即死。或隨大便下。唯黑蟲如豆豉汁。此為難治。

大風癩立病

論曰。癩者內經為癘。癘者榮氣熱。其氣不清。故使鼻柱壞而色敗。皮膚瘍潰。其證不同。其始則乍寒乍熱。腠理壅塞。血氣精髓耗竭。久而不治。令人癢痺。汗不流泄。

手足痠疼。面目習習奕奕。胸頸間狀如蟲行。身體偏癢。搔之成瘡。或身體雖刺不痛。青赤黃黑如腐木形。或痛無常處。流移非一。或似繩縛拘急。不可俛仰。眼目浮腫。小便黃赤餘瀝。心神恍惚而善噫也。日月浸久。其風化生毒蟲。蟲既變動。外先食氣血。膚革不澤。其內則食五臟。食肝則眉睫墮落。食肺則鼻柱損壞。食脾則語聲散亂。食腎則耳聞雷鼓之音。食心則死。推是癩病。率皆風與蟲之為害也。

羚羊角鑄

犀角鑄

吳茱萸湯洗焙妙 羌活

獨活各半

麻黃去根

烏蛇酒浸去皮骨 蔓荊實去白

當歸

黃耆

防風 附子

杏仁去皮

蒺藜子炒去角

為散。每服一錢。空心服。食前溫酒調下。

烏蛇丸方。治大風癩疾。若眼脈斷。指節冷落。脚下有瘡。語聲啞。為不可治。如未

有此證。宜服。

烏蛇一條酒浸去皮

檀香 丁香

苦根

紫葛

防風

苦參

獨活

沙參

梔子仁

酸棗仁生用

槐子

白芷

附子

藁本

防己

羚羊角

蒼朮醋炒

犀角

草薺

秦艽

桃膠生用

蕪荑仁炒

栝蘘根

烏藥各三

桑根白皮兩三

木通半兩

共搗羅爲末。鍊蜜爲丸。如赤小豆大。每服空心溫酒下十九至十五丸。日二。如不飲酒。薄荷槐白皮湯下。如要速差。宜用後湯藥下。

桑枝

柳枝

槐枝

枸杞根

黃荊根

羚羊角一銖各

六味並生用。剉如麻豆大。每服用藥五錢。以水一盞半。煎七分。下前丸藥。服一月。必覺四體皮膚癢痛不可忍。但宜飲酒。不得搔抓。仍頻飲食。避外風。如有汗。必腥臭。及有蟲從皮膚中出如麵塵。或如馬尾頭髮尖。或如線絲尖。或如蝨皮。

片頭黑身白。形色不定。但養之後。仔細看之。或從小便中出。或從泄瀉中出者。大效。此疾稍退。終身禁房室。又忌動風物。時以苦參湯洗浴。須換新衣。其舊衣并牀薦等並焚之。

艾蒿醞酒方 治大風癩病。身體面目俱有瘡癢。惡汗自出。

白艾蒿十束。每束如升許。大淨。擇水洗淨。

一味。煮取濃汁。拌麩米。一如常醞法酒熟。去糟。取清稍溫飲之。令常醺醺然。

天門冬丸方 治大風癩病。

天門冬半斤。去心。生用。

一味。內瓷器中密蓋口。以蠟封。勿失藥氣。於淨室中經一年取開。其色赤如沙糖。即入苦沙參粉及乾地黃末。爲丸如梧桐子大。每服十丸。溫水下。食後服。

百花煎方 治大風癩疾。

白蜜二升 石榴七顆。生用。 薑八片。細切。

三味。先研生薑石榴。絞取自然汁。更濾令淨。入蜜盛於瓷瓶。以蠟紙封口。勿令通氣。垂繫於釜中。勿到底。以重湯煎。一復時。成煎。空心酒調二錢。加至三錢。日

二夜一旬日內有惡物隨便而出。是病根散矣。

黃精丸煎方 治大風癩疾。面赤疹起。手足攣急。身發瘡癢。指節落。

黃精生者十斤 白蜜五斤 生地黃肥者五斤

三味。先將黃精。生地黃洗淨。細剉。以木石杵白搗熟。復研爛。入水三斗。絞取汁。置銀銅器中。和蜜攪勻。煎之。成稠爲度。每用溫酒調化。二錢至三錢。日三夜一。久服風癩瘡平。面如童子。延年不老。

婁金丸方 治大風癩病。

金箔五十 牛黃研 麝香研 龍腦研

白附子炮 天竺黃各半 人參 白芷

細辛 芎藭 天南星生用各三分 天麻

白花蛇酒浸炙 防風各半 黃耆 薑本

白僵蠶 羌活 麻黃 白茯苓

犀角鎊 羚羊角鎊 芍藥 甘草炙各兩

甘菊三兩

共研爲細末。別用生地黃汁二升。蜜半觔。酒一觔。酥三分。慢火同煎成。放冷。和藥末勻丸。如鷄頭大。每服三丸。細嚼茶酒任下。

黃耆丸方 治大風癩疾。

黃耆

防風

丹參

白朮

白茯苓

芎藭

山梔子

赤芍藥

枳殼

細辛各半

大腹皮二兩

升麻

秦艽各二

蒺藜子

獨活

苦參各三

共爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。空腹煎枳殼湯下二十九丸。日再服。

烏癩

論曰。烏癩初覺。皮膚變異。肌腠之間。淫淫躍躍。如蟲行動。眼前有物。如系懸布。時發驚恐。言語錯亂。皮肉癩疹。如桃李實。或赤或黑。手足瘡痺。不知痛所。或脚下痛。不可踐地。身體生瘡。兩肘如縛。此名黑癩。皆由惡風日漸傷損。血氣不榮所致也。馬先蒿散方 治烏癩。

馬先蒿不計多少一名馬禾蒿一
爛石草細切焙乾用

搗羅爲散。每服一錢。荆芥薄荷湯下。

治烏癩浸酒方

苦參根白皮五斤

細剉如麻豆。生絹袋貯。好酒三斗。冬浸七日。夏浸四日。每溫飲二合至三合。日

二夜一。漸加五七合。

露蜂房酒方 治烏癩。

露蜂房五兩 苦參四斤

二味剉細。用水三斗。煮取一斗五升。去滓。浸麩四觔半。炊黍米二斗。如常醞法。

酒熟。每服三合至五合。日二夜一。稍增無妨。

雌黃散塗方 治烏癩。

雌黃半兩

以米醋和鷄子清如膏塗瘡上。乾即便塗。

白癩

論曰。白癩之狀。語聲嘶啞。目視不明。四肢癢痺。關節熱痛。如火燔灼。脊背拘急。肉如刀劈。手足緩弱。身體癰疹。鼻生息肉。目生白珠。肉色斑白。故謂之白癩也。

烏蛇散方

治白癩。語聲嘶啞。四肢癢痺。癩癢生瘡。

烏蛇酒浸去皮骨炙

葛根各一分

苦參

紫參

沙參

人參

芎藭

天麻

黃芩

木通

地骨皮

防風

防己

白朮

薤菹

黃連

莽草葉

木蘭皮

附子炮去

烏頭炮去

牛膝

萎蕤

檳榔煨

熟乾地黄

芍藥

桂

玄參

龍骨研

石膏研

升麻

菊花未開者妙

蒺藜子妙去

秦艽

細辛去苗

天雄炮去皮

當歸切焙

甘草

遠志

巴戟天

蒼耳花三分

吳茱萸湯洗

麝香各半研

右四十二味。搗羅爲散。每服二錢。空心溫酒調下。加至三錢。晡時服。
白花蛇散方 治白癩。語聲嘶嘎。目視不明。四肢癢痺。關節熱痛。身體癩疹。鼻生
息肉。

白花蛇酒浸去
皮骨

天麻

槐子

羌活

防風

晚蠶沙炒

蔓荊實

白鮮皮

威靈仙

枳殼各一

甘草炙半

搗羅爲散。每服一錢。溫酒調下。不拘時候。

諸痺門

諸痺統論

論曰。飲天和。食地德。皆陰陽也。然陽爲氣。陰爲血。氣爲衛。血爲榮。氣衛血榮。通貫
一身。週而復會。如環無端。豈鬱閉而不流哉。夫惟動靜居處失其常。邪氣乘間。曾
不知覺。此風寒溼三氣所以雜至。合而爲痺。淺則客於肌膚。深則留於骨髓。陽多
者。行流散徙而靡常。陰多者。凝泣滯礙而有著。雖異狀殊態。然卽三氣以客之。則

所謂痺者。可得而察矣。且痺害於身。其為疾也。初若無足治。至其蔓而難圖。則偏廢弗舉。四體不隨。皆自詒伊戚者也。可不慎哉。

痛痺

論曰。寒氣勝者為痛痺。夫宜通而塞則為痛。痺之有痛。以寒氣入經而稽遲。泣而不行也。痛本于寒氣偏勝。則陽氣少。陰氣多。與病相益。治宜通引榮衛。溫潤經絡。血氣得溫則宣流。自無壅闕矣。

茯苓湯方 治風溼痺四肢痛痺拘攣浮腫。

赤茯苓

桑根白皮各二兩

防己

桂

芍藥

芍藥

麻黃去心

甘草

一

每服五錢。棗一枚去核。水煎溫服。連三服。後以薑粥投之。汗出為度。

天雄丸方 治風溼痺。皮肉不仁。骨髓疼痛。不可忍者。

天雄去皮

附子去皮臍

桂半兩

乾

薑三兩

防風三錢

爲細末。鍊蜜丸如梧桐子大。每服二十九。溫酒下。日三夜一。

當歸摩膏方 治諸風寒溼。骨肉痺痛。

當歸 二兩

細辛 半兩

桂 一兩

生地黃 二斤切研

天雄 十枚去皮

芎藭 半兩

白芷 三分

丹砂 兩研一

乾薑 三分

烏頭 兩三分

松脂 四兩

豬脂 四兩別

共十二味。先將八味剉如大豆粒。以生地汁浸一宿。與豬脂、松脂同慢火煎。候煎白芷黃色。以厚綿濾去滓。瓷盆盛。入丹砂末。不住攪。至凝卽止。每用藥用火炙手。摩病處千徧。

著痺

論曰。內經謂溼氣勝者爲著痺。地之溼氣感。則害人皮肉筋脈。蓋溼土也。土性重。榮衛之與溼俱留。并以溼勝則著而不移也。其證多汗而濡者。以陰氣勝也。治宜除寒溼。通行經絡卽差。

天雄酒方 治寒溼著痺。皮肉不仁。至骨髓疼痛。

天雄

附子去皮

防風

獨活

當歸

白朮

五加皮

芍藥

桂

乾薑各二兩

劉如麻豆。以夾絹囊盛。用無灰清酒一斗浸。秋夏五日。春冬七日。溫飲。任性加減。以醉為度。

茯苓湯方 治風溼痺。自著不去。四肢癢癩。拘攣浮腫。

赤茯苓

桑根白皮各二兩

防己

桂

芎藭各半兩

甘草三兩

芍藥

當歸

麻黃去根節 各一兩半

每服六錢。棗三枚。劈破。同水煎。溫服。如欲出汗。以生薑熱粥投之。汗出慎外風。

治風溼著痺。服藥雖多。肌肉猶癢痺。摩風膏摩之方。

防風

羌活

芍藥

細辛

蜀椒去目并閉口

當歸

白朮

躑躅花各半兩

白芎

丹參

黑參

桂

附子

烏頭

皂莢

莽草各一

杏仁半兩

苦參

細剉如麻豆。以米二升拌勻。浸三宿。熬乾。同臘月豬脂二觔。以文武火煎一日。綿濾去滓。瓷罇貯。每用少許。點摩癩痺處。兼治一切風毒。其膏年歲深久者尤佳。

龍虎膏方 治風溼著痺。肌肉癢痺。不知痛癢。

龍骨二兩

虎骨二兩

當歸

桂各一

皂莢斤肥

共為末。先別用好肥皂。莢十挺。以苦酒三升。掇取汁。去滓。入鐺中煎。減半即入前藥同煎。如稀錫。入瓷盒盛。每用少許。揩摩癩痺處。

行痺

論曰。經謂風寒溼三氣雜至。合而為痺。其風氣勝者為行痺。夫氣之在人。本自流通。所以痺者。風寒溼三氣合而為病。然三氣之中。各有陰陽。風為氣。善行數變。故

風氣勝則為行痺。其證上下左右無所留止。隨其所至。氣血不通是也。治法雖通

行血氣。宜多以治風之劑。

防風湯方

治行痺行走無定。

甘草各一兩

黃芩三分

當歸

赤茯苓各一兩

秦艽

葛根三分

桂去粗皮

杏仁炒各一兩

麻黃去根節煎去沫半兩

每服五錢。棗二枚。生薑五片。酒一鍾。水一鍾。同煎溫服。

山茱萸丸方 治風痺遊走無常處。亦治血痺。

山茱萸炒一分兩

生乾地黄二兩

山藥

牛膝

澤瀉

草薢各一兩

天雄

鱗鱒

車前子

乾漆

狗脊去毛

白朮

地膚子各三分

茵芋半兩

共為細末。鍊蜜丸如梧桐子大。每服溫酒下二十丸。加至三十丸。

皮痺

論曰。風寒溼三氣雜至。合而為痺。以秋遇此者為皮痺。蓋肺主皮毛。於五行為金。於四時為秋。當秋之時。感於三氣。遂為皮痺。蓋正言其時之所感者爾。固有非秋時而得之者。皮膚不營而為不仁。則其證然也。

防風湯方。治肺中風寒溼。項強頭昏。胸滿短氣。噓吸顫掉。盲語聲嘶。四肢緩弱。皮膚痺。

防風

芎藭

麻黃各一

獨活

桂

前胡

五味子

附子

杏仁

人參

茯苓三分

甘菊花

黃耆

甘草各半

每服四錢。生薑五片。水煎溫服。

蔓荊實丸方。治皮痺不仁。

蔓荊實三錢去淨皮

防風

羌活

桔梗

白附子

枳殼

蒺藜子炒去角

皂

英半斤新水浸一宿細濾去滓入麵少許固煎成膏

七味爲末。入膏中和搗。丸梧桐子大。每服二十九。食後熱水下。

天麻丸方 治皮膚癢痺。

天麻 二兩

玄參

沒藥 研

地榆

烏頭 各一兩

麝香 研一

四味爲末。與二味研者和勻。鍊蜜丸如梧桐子大。每服二十九。空心食前溫酒下。

肌痺

論曰。風寒溼三氣雜至。合而爲痺。以至陰遇此者。則爲肌痺。其狀皮膚弗營肌肉。癢痺而不仁是也。

西州續命湯方 治肌痺。津液開泄。時復不仁。或四肢急痛。

麻黃

去根節 煎當

歸 切焙

石膏 研各

芎藭

桂

甘草

黃芩

防風

芍藥 各二

杏仁

湯浸 去皮尖 炒四十枚

每服四錢。生薑一片。棗二枚。水煎溫服。不計時候。

細辛湯方 治肌痺淫淫如蟲行。或腠理開疎。汗出皮膚。肉色不澤。脣鼻黃。

細辛

防風

白朮

附子

桂枝

石膏

黃耆

甘草

麻黃去皮節煎搽去

枳實去蘊

甘草各半

當歸一兩

每服四錢。生薑五片。水煎溫服。

血痺

論曰。血痺之狀。形體肌膚如被微風所吹者是也。蓋血爲陰。邪入於血而痺。故謂之血痺。宜先鍼引陽氣。後以藥之。

芍藥湯方 治風血痺。身體不仁肉冷。

赤芍

側子

桂

麻黃

草薢

當歸

丹參各一

細辛

甘草各半

每服三錢。生薑五片。水煎溫服。

黃耆湯方 治風血痺。陰陽俱微。寸口關上微。或尺中小緊。其狀身體不仁。如賊風所中。

黃耆 芍藥各一 桂三分

每服五錢。棗二枚。生薑三片。水煎。早晨日午晚每各一服。

草薺丸方 治風邪遊走無定處。名曰血痺。

草薺 山藥 牛膝 澤瀉各一

白朮三分 地膚子半兩 山黃一 狗脊三分

茵芋一分 熟乾地黃半兩

共為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。溫酒下。不拘時。稍加至五十丸。

脈痺

論曰。血性得溫則宣流。得寒則凝澀。凝澀不行。則皮毛萎悴。肌肉癢痺。內經謂風

寒溼三氣雜至。合而爲痺。又曰夏遇此者爲脈痺。痺則血凝不流可知也。
人參丸方 治脈痺通行血脈。

人參

麥門冬

茯苓

龍齒

遠志

黃耆

菖蒲

赤石脂酪一

熟乾地黄二兩

爲末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服食後良久。以清粥飲下三十丸。

防風湯方 治脈痺。

防風

當歸

秦艽

赤茯苓

茵芋去莖

甘草炙

桂枝粗

杏仁去皮尖雙

獨活酪一

每服五錢。以酒水各半。生薑半分。同煎服。

筋痺

論曰。經曰風寒溼三氣雜至。合而爲痺。又曰以春遇此者爲筋痺。其狀拘急。屈而

不伸是也。筋痺不已。復感於邪。內舍於肝。是為肝痺。其狀夜臥則驚。飲多小便數。上為引如懷。蓋津氣乏竭。痺聚在肝。治法以筋痺為先。筋痺既平。則邪弗入於肝矣。

天麻丸方 治筋風四肢攣痺。

天麻

細辛

菖蒲

赤箭

地榆

人參各二兩

附子

芍藥

木香各一兩

桂半兩

苦參三兩

牛膝酒浸二兩

陳橘皮湯浸去白 歸切焙

赤芍

酸棗仁

威靈仙

藁本

防風

獨活各二兩

共為細末。鍊蜜和杵為丸。如梧桐子大。每服溫酒下二十九丸至三十九丸。

牛膝湯方 治筋痺。以筋虛為風所傷。故筋攣縮。腰背不伸。強直時痛。

牛膝酒浸

防風

丹參

前胡各二兩

石斛半兩

桂塗

秦艽去苗

續斷各半兩

陳橘皮去白

大麻仁一合

除大麻仁外。搗篩。每服五錢。煎熟。別下麻仁末一錢。再煎。空心服。日二。
防風湯方。治肝痺。頭目昏塞。四肢不利。胸腹虛煩。

防風一兩

芎藭

黃耆

五味子

人參

茯神

獨活

羚羊角 鈔屑

前胡 各三分

細辛

酸棗仁

甘草 各半

每服三錢。大棗三枚。水煎溫服。

骨痺

論曰。經謂人有身寒。湯火不能熱。厚衣不能溫。然不凍慄。是人者。腎氣素勝。以水爲事。太陽氣衰。腎脂枯不長。一水不能勝兩火。而生於骨。腎不榮。則髓不能滿。故寒甚至骨也。所以不能凍慄。肝一陽也。心二陽也。腎孤藏也。一水不能勝二火。故不能凍慄。病名曰骨痺。是人當斡節也。夫骨者。腎之餘。髓者。精之所充也。腎水流行。則髓滿而骨強。迨夫天癸虧而凝澀。則腎脂不長。腎脂不長。則髓涸而氣不行。骨乃痺。而其證內寒也。雖寒不爲凍慄。則以肝心二氣爲陽火。一水不

能勝之。特為骨寒而已。外證當攣節。則以髓少而筋燥。故攣縮而急也。

石斛丸方 治腎虛骨痺。肌體羸瘦。腰脚痠疼。飲食無味。小便滑數。

石 斛 去根

牛 膝 酒浸

續 斷 各三分

兔 絲 子 酒浸

石 龍 芮 炒

桂 各一兩

肉 蓯 蓉 酒浸

鹿 茸 去毛 酥

杜 仲

白 茯 苓

熟 乾 地 黃 各三分

附 子 一兩

巴 戟 天 半兩

防 風 三分

桑 螵 蛸

芎 藭 各半兩

山 茱 萸 三分

覆 盆 子 半兩

補 骨 脂

萹 澄 茄 各三分

五 味 子 半兩

澤 瀉 一兩

沉 香

藿 香 子 各三分

薏 苡 仁 一兩

共為末。鍊蜜和杵數百下。丸如梧桐子大。每服空心以溫酒下三十九。日二服。

熟乾地黄丸方 治腎虛骨痺。面色萎黑。足冷耳鳴。四肢羸瘦。脚膝緩弱。小便滑

數。補腎。

熟 乾 地 黃

肉 蓯 蓉 酒浸

磁 石 煨醋 碎

山 茱 萸 三分

桂 皮 粗

附 子 各半兩

山 藥 三分

牛 膝 酒浸 一兩

石南 白茯苓 澤瀉 黃耆各三分
 鹿茸去毛酥 五味子三分 石斛一兩 覆盆子
 遠志三分 補骨脂炒一兩 草薢 巴戟天各三分
 杜仲一兩 兔絲子二兩酒洗別研 白龍骨一兩
 共爲末。鍊蜜和杵數百下。丸如梧桐子大。每服空心。以溫酒下三十九。日三服。

腸痺

論曰。內經曰。腸痺者。數飲而出不得。中氣喘爭。時發飧泄。夫大腸者。傳導之官。其所以傳導者。皆沖和之氣。今風寒溼三氣。乘虛客於腸間。則邪留而和氣閉矣。故其證數飲而出不得。中氣喘爭。時發飧泄。大小腸氣痺。水道不通。故雖多飲而不得溲便。并氣於大腸。使糟粕不化。故中氣喘爭。時發飧泄也。

草豆蔻散方 治腸虛寒溼內攻腹痛飧泄。

草豆蔻 陳橘皮湯浸去白 木香
 白朮 當歸切焙 白豆蔻仁 丁香

肉豆蔻仁

良薑

各半

為散。每服一錢。生薑棗湯調下。食前服。

訶梨勒丸方 治腸痺飧泄腹脇脹滿。

訶梨勒煨用一兩

乾薑三分

當歸炒一兩

黃連去鬚一兩

白朮一兩

木香三分

厚朴生薑一兩

為末。鍊蜜和杵二三百下。丸如梧桐子大。每服三十九丸。粥飲下。不拘時候。

周痺

論曰。黃帝鍼經謂周痺者。在於血脈之中。隨脈以上。隨脈以下。不能左右。各當其所。夫風溼寒之為痺。本痺而不通。今乃能周身上下者。以其邪中於血脈之間。與脈流通。隨氣上下升降無礙也。

黃芩湯方 治周痺身體不仁。

黃芩

甘草

防風各半

秦艽

葛根

杏仁煖各

桂

當歸

赤茯苓各半

爲散。每服六錢。水酒各半。棗二枚。生薑一片。同煎溫服。日二夜一。

續命湯方 治八風十二痺。

羌活三分 茯苓

神

薏苡仁炒各一兩

每服六錢。別入竹瀝一匙。更煎數沸。溫服。日二夜一。

醍醐方 治寒溼周痺。

醍醐一兩

每日空心以溫酒五合和一匙服之。

大豆蘗方 治周痺。除五臟留滯。胸中結聚。益氣止毒。潤皮毛。補腎。

大豆蘗一升炒令香熟

爲末。每空心溫酒調下半匙。再加至一匙。

野駝脂方 治周痺。

野駝脂鍊了濾過一斤

別入好酥四兩。同鍊攪勻。每服半匙。以熱酒半盞。和化服之。加至一匙。空心食。

前各一服。

痺氣

論曰。內經謂人身非衣寒也。中非有寒氣也。寒從中生者何。是人多痺氣也。陽氣少。陰氣多。故寒如從水中出。夫陽虛生外寒。陰盛生內寒。人身陰陽偏勝。則自然生寒熱。不必外傷於邪氣也。痺氣內寒者。以氣痺而血不能運。陽虛而陰自勝也。血凝泣而脈不通。故其證身寒如從水中出也。

溫補鹿茸丸方 治陽氣虛。陰氣盛。痺氣內寒。如從水中出。

鹿茸四兩

人參

天雄

五加皮

五味子

牛膝酒浸

防風

遠志

石斛

山藥

狗脊各一兩

肉蓯蓉酒浸

熟乾地黄各三兩

草薢

石南

蛇床子

白朮各三兩

巴戟天

天門冬

杜仲各半兩

乾薑

吳茱萸炒

桂

附子去皮

細辛 蜀椒去目并三分 白茯苓 兔絲子酒浸別搗一兩一分

覆盆子 石龍芮各二兩

除兔絲子別搗外。搗羅為末。再拌勻。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服溫酒下二十九。

加至三十九。空心食前日三。

補益黃耆丸方 治陰盛陽虛。痺氣身寒。如水中出。

黃耆 鹿茸 白茯苓 烏頭去皮

乾薑各三分 桂 芎藭 當歸

熟乾地黄各一 白朮 兔絲子酒浸別搗一 五味子

柏子仁 枸杞根各半 大棗去核

共十五味。除兔絲子別搗外。同搗羅。再拌勻。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服空心溫

酒下十五丸。日三。

熱痺

論曰。內經於痺論有云。其熱者陽氣多。陰氣少。陽遭陰。故為熱痺。蓋腑臟壅熱。復

遇風寒溼之雜至。客搏經絡。留而不行。陽遭其陰。故瘧瘧熾熱而悶也。

升麻湯 治熱瘧。

升麻

射干

甘草

芎藭

人參各二兩

赤小豆合炒三

麥門冬

生薑

姜麩各三兩

每服四錢。生地黃汁半合。青竹葉十五片。水同煎。溫服。不拘時候。

犀角升麻湯 治熱瘧。

升麻二兩

茯苓

人參

防風

犀角角鎊

羚羊角

羌活去蘆頭各二兩

桂半兩

每服四錢。生薑一塊。竹瀝少許。水同煎。溫服。



.081

(1)1

聖濟總錄纂要

二

413.081
195
301110

中國醫學大成第四集

方劑類

聖濟總錄纂要二

上海大東書局印行



3 0472 8428 0

254627

聖濟總錄纂要

清

新安

程

林雲來纂輯

鄞縣

曹炳章赤電校點

卷二

傷寒門

傷寒統論

論曰。風寒暑溼。飲食勞倦。皆能爲病。是謂五邪。冬傷於寒者。春必病溫。春傷於風者。夏必飧泄。夏傷於暑者。秋必痲瘧。秋傷於溼者。冬必欬嗽。是乃四時之氣也。然五邪所中。雖不同。本皆外邪。大率同類。唯多。冬時嚴寒。其毒厲尤甚。人或中之。病在冬時。則正名傷寒。若邪毒藏於肌膚。至春之時。乘溫而發者。溫病。若留連日久。至夏之時。乘盛暑而發者。爲暑病。所謂先夏至一日爲病溫。後夏至日爲病暑。是

也。其病之傳次。先客於太陽。其病令人頭項痛。腰脊強。其脈尺寸皆浮。太陽不已。傳於陽明。其病體熱。目疼鼻乾。不得臥。其脈尺寸皆大。陽明不已。傳於少陽。其病胸脇痛而耳聾。其脈尺寸皆弦。少陽不已。太陰受之。其病腹滿體重。其脈尺寸俱微。太陰不已。少陰受之。其病口燥舌乾而渴。或背微惡寒。其脈尺寸俱沉。少陰不已。厥陰受之。其病煩滿。舌卷囊縮。其脈尺寸俱緩。病之所傳。不過三陰三陽而已。其未滿三日者。邪在陽經。未入於裏。其病在表。宜汗之而愈。若經四日者。邪入陰經。其病在裏。宜下之而愈。特其大略爾。蓋有一日而傳之數經者。亦有數日而尚在太陽者。陽病雖宜發汗。陽明之病。反宜下之。陰病雖宜下。少陰之病。或宜溫之。由人之稟受虛盛。其傳有遲速。又有不傳經者。當審其脈證。凡此六經受病。五邪脈證各不同。傷風者。必惡風。其脈浮緩。傷寒者。必惡寒。其脈浮緊。以至傷暑脈虛。傷溼脈濡。人迎緊盛爲傷寒。氣口緊盛爲傷食。診得五邪。知其本也。診得六經。知其標也。有病雖在表而不可汗者。或裏而不可下也。或若汗之太多。則津液燥竭。遂致亡陽。下之太早。則邪氣動膈。乃成結胸。清濁相干。則變爲霍亂。熱毒內瘀。則變爲瘀血。又或爲發黃者。溼熱相蒸也。或爲發斑者。陽毒太盛也。陽盛之人。得之

於熱。乃爲陽毒。陰盛之人。得之於寒。乃爲陰毒。蟲動則爲狐惑。壞病之甚。則爲百合。若勞復。陰陽易之類。雖差後。猶宜節慎。變態多端。不可備舉。當以類求之。皆以適當爲良。唯兩感之病。表裏皆受邪。爲難治。其他或陰證似陽。陽證似陰。或陰盛隔陽。陽盛隔陰者。在診病者。以意詳之。

傷寒可汗

論曰。傷寒病汗之而愈者。以初得病。一日至三日。陽經受邪。未傳諸陰。其邪在表。故當發汗。此大約也。然病數日。脈浮。太陽證不罷者。亦可汗之。當以脈證爲準。凡頭痛發熱。惡風振寒。是爲可汗之證。其脈浮者。是爲可汗之脈。陽虛則惡寒。脈浮爲在表。或浮而弱。或浮而緊。或浮大而數。皆宜汗之。

麻黃湯方。治傷寒太陽病。頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風發熱。無汗而喘者。

麻黃

去根節

桂

去粗皮

甘草

炙一兩

杏

仁七枚

豉如麻豆大。每服五錢。水煎溫服。覆取微汗。不須啜粥。餘如桂枝法將息。

大青龍湯方 治傷寒太陽中風。脈緊發熱。惡寒身痛。不汗出而煩躁。

麻黃去根節 六兩 桂皮去粗 甘草各二兩 杏仁去皮尖雙 四十枚

生薑三兩 棗十枚 石膏一雞子 大碎

咬咀如麻豆大。每服五錢。水煎溫服。脈微汗出惡風者不可服。

桂枝麻黃各半湯方 治傷寒太陽病。得之八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。

其人不嘔。清便。一日二三度發。脈微緩者。為欲愈也。脈微而惡寒者。此陰陽俱

虛。不可更發汗。更下更吐也。面色反有熱色者。未欲解也。以其不能得小汗出。

身必癢。

桂去粗皮 一兩半 芍藥 生薑 甘草

麻黃去根節 各一兩 大棗四枚 杏仁去皮尖雙仁 湯浸

咬咀如麻豆大。每服五錢。水煎溫服。

桂枝湯方 治傷寒太陽病。外證未解。脈浮弱者。當以汗解。

桂皮去粗 芍藥 生薑各三兩 甘草二兩

大棗十二枚

咬咀如麻豆大。每服五錢。水煎溫服。須臾啜熱稀粥。助藥力。取微汗。
麻黃附子甘草湯方。治傷寒少陰病。得之二三日。宜微發汗。以二三日無裏證。

故微發汗。

麻黃去根

甘草各二兩

附子一枚炮製

咬咀如麻豆大。每服五錢。水煎溫服。

葱豉湯方。治傷寒初覺一二日。頭項腰痛。惡寒。

葱白十四莖

豉半合

乾薑一分

麻黃去根

芍藥各半兩

咬咀如麻豆大。每服五錢。水煎溫服。良久投葱豉熱粥。蓋覆出汗。

葱粥方。治傷寒服葱豉湯後未得汗。再服。

葱白十莖并切

豉三合

生薑半兩拍碎

水五盞。煎至二盞半。去滓。入白米。依常法煮粥。入少鹽攪勻。任意食之。衣覆出

汗。未汗再服。

麻黃葛根湯方。治傷寒初得一二日出汗。

麻

黃去根節

葛根

柴

胡去苗各

芍藥三分

每服五錢。水一盞。豉一百粒。開口椒七粒。連鬚葱白三寸。薄荷二十葉。同煎熱

服。服後葱豉湯一盞投之。衣覆取汗。未快再服。

葛根湯方 治傷寒初覺頭痛。惡寒壯熱。腹內熱。脈洪大。一二日宜服。

葛根

黃芩

芷去苗各

葱白五莖

豉一合

吹咀。每服五錢。生薑一棗大。拍碎同煎。溫服。良久。再服得汗即止。

麻黃解肌湯方 治傷寒初患一二日。體熱頭痛。

麻

黃去根節

石膏碎

葛根各半

甘草一分

芍藥

杏仁去皮尖雙仁

桂去粗皮

每服五錢。生薑五片。水煎溫服。

葛根湯方 治傷寒一二日。頭痛壯熱。遍身疼痛。其脈洪數。

葛根

白朮

芍藥

乾薑各半

麻黃去根節

桂去粗皮

甘草一分

每服五錢。水煎熱服。如脈微。即加附子半兩。

石膏人參解肌湯方 治傷寒初得一二日。頭疼壯熱惡寒。脈浮緊。

石膏碎

麻黃各一兩

石膏各一兩

人參各半兩

桂枝去粗

甘草各一兩

葛根二兩

每服三錢。入葱、豉、生薑同煎。熱服。

十味人參湯方 治傷寒頭痛體疼。寒熱不解。

人參

厚朴生薑製

桂

甘草

杏仁去皮尖

白朮

乾薑

白茯苓

陳橘皮湯浸去白

麻

黃去根節湯貴

每服三錢。生薑二片。棗一枚。同煎。熱服。纔覺傷風。併三兩服。汗出立差。

羌活湯方 治傷寒表不解。頭痛體疼發汗。

羌活

獨活

羌胡

前胡

人參

白茯苓

桔梗

芎藭

甘草炙一兩

枳殼去穢炒二兩

每服三錢。生薑二片。薄荷少許。同煎溫服。不拘時。

葱豉湯方 治傷寒一日至三日以前身熱脈大。肢體疼痛。汗不出。

蒼朮米泔浸去皮 黃去根節 甘草灸

桂各一兩

每服三錢。葱白三寸。鹽豉二十粒同煎。熱服。不拘時候。

傷寒可下

論曰。凡傷寒邪入於陰。其病在裏。法當下之。諸腹滿。不大便。或口燥舌乾而渴。或潮熱譫語。皆爲可下之證。諸診得脈沈而實。卽爲可下之脈。但脈證已具。不必拘以日數。急宜攻裏。若病雖過經。而邪證未備者。未可下也。故經曰。陽盛陰虛。下之則愈。其法謂此。

陽明病不吐不下。心煩者。可與調胃承氣湯。太陽病三日發汗不解。蒸蒸發熱者。可與調胃承氣湯。傷寒吐後。腹脹滿者。可與調胃承氣湯。調胃承氣湯方

甘草炙二兩

大黃以清酒洗四兩

咬咀。每服五錢。入芒硝一錢。更煎一二沸。溫服。

陽明病脈遲。雖汗出不惡寒者。其身必重。短氣。腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濇然汗出者。此大便已鞭也。與大承氣湯。若汗多微發熱惡寒者。外未解也。其熱不潮。未可與承氣湯。若腹大滿不通者。可與小承氣湯。微和胃氣。勿令至大泄。下大承氣湯。

大承氣湯方

大黃酒洗四兩

厚朴炙半斤

枳實炙枚

咬咀。每服五錢。入芒硝一錢。同煎溫服。

陽明病其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必鞭。鞭則讞語。小承氣湯主之。若一服讞語止者。勿再服。

小承氣湯方

大黃四兩

厚朴二兩

枳實大者

咬咀。每服五錢。水煎溫服。初服湯。當更衣。不爾者。盡飲之。若更衣者。勿服。

茈胡湯方 治傷寒四日以後。煩熱不解。大小腸澀。

茈胡去苗

黃芩一兩

犀角鎊

芍藥各三兩

山梔子仁半兩

大黃兩半

木通三分

朴硝一兩

每服五錢。入竹葉三片。同煎空腹服。大小腸通為度。如未效再服。

大茈胡湯方 治傷寒十餘日。熱結在裏。往來寒熱者。

茈胡去苗

枳實四兩

黃芩

芍藥各三兩

半夏二兩半

咬咀。每服五錢。入生薑十片。棗三枚。同煎溫服。

調胃承氣加橘皮湯方 治傷寒發汗不解。蒸蒸發熱。

陳橘皮去白

大黃兩

甘草半兩

每服四錢。入芒硝一錢。同煎溫服。

大青散方 治陽盛發狂有斑。大小便閉澀。

大青

知母

黃芩

大黃煨

山梔子仁

升麻

黃連各一兩

甘草半兩

共爲散。每服三錢。入朴硝一錢。蜜水調下。

承氣丸方 治傷寒時氣溫熱病。大便不通。

大黃炒三

郁李仁湯浸去

枳實

朴

硝研各

共研爲末。和勻煉蜜丸。如梧桐子大。每服二十丸。生薑湯下。未利再服。不計時候。

傷寒可吐

論曰。諸病吐之而愈者。邪在胸中也。傷寒大法。謂四日以上。若入陰經。其傳未深。邪氣高而裏實。客於胸膈。下之則動胃。汗之則亡陽。惟宜吐而出之。然亦不必拘此。凡寒邪熱毒。痰實在胸中。及有宿食在胃脘者。皆當吐之。但診其脈。寸口或浮或滑。或數或緊。與諸部不同者。其證心胸痞滿。鬱鬱而痛。不能食。多涎唾。飲食入則吐。欲吐復不能出。或手足厥冷。及心下滿而煩。餓不能食。吐下後心中懊懣者。是也。內經所謂其高者因而越之。卽其法也。

瓜蒂散方 治胸有寒病。如桂枝證。頭不痛。項不強。寸脈微浮。胸中痞鞅。氣上衝。

喉咽不得息。當吐之。

瓜 蒂 熬 赤小豆各一

搗篩再和勻。每服一錢。豉一合。湯七合。先漬之。須臾煮作稀糜。取汁調散。放溫頓服。不吐。少加之。快吐爲度。亡血虛家不可與。

擦膈湯方 治傷寒三四日。胸中痰壅。憎寒壯熱頭痛。

桃 枝一握。東引 柳 枝一握 甘 草生用 烏 梅去核

山梔子仁一分

各細剉。同用漿水一大盞半。煎至一盞。空心分爲三服。相次再服。取吐爲度。

三物湯方 服前擦膈湯吐後頭痛。壯熱未退。卽服此三物湯。

薄 荷一握 人 參半兩 生 薑一分

水煎。空心溫服。晚再服。

苦參散吐方

苦 參

爲細散。每服三錢。溫酒五合。調服之。卽吐。

人參湯吐方 治傷寒出汗後。心胸妨悶。煩熱未退。

人參 半兩

燈心 棗一小

枳殼一分

大腹皮 一枚

茶末 二錢

生甘草

除茶末外。各細剉。用淡漿水二大盞。煎至一盞。下茶末攪勻。分溫二服。以紙撚子於咽喉中。取吐爲度。

傷寒可溫

論曰。傷寒病雖有三陰三陽。然在陽則太陽病多。在陰則少陰病多。以二經爲表裏故也。至於陽明太陰病頗稀少。而少陽厥陰病又少也。然究觀古人治陽明則多下。於少陰則多溫。蓋陽明者胃也。胃受病則不惡寒反惡熱。濇濇汗出。大便秘。譫語潮熱。須下之乃愈。若乃氣弱本虛人。初中病。腠理寒。邪氣更不經三陽。而便見少陰證。蓋少陰者腎也。腎受病。則身冷惡寒。四肢厥逆。脈微細。心煩。但欲寐。或自利而渴。須溫之乃愈。雖然三陰病大約可溫。而古人特於少陰詳言之者。則少陰病尤宜溫故也。

附子湯方 治傷寒少陰病。得之一二日。口中和。其背惡寒者。當灸之。

附子去皮臍 二兩 人參 一兩 白朮 四兩 芍藥

白茯苓 三兩

每服五錢。水煎溫服。日二。

四逆湯方 治傷寒少陰病。脈沉者急溫之。

甘草 二兩 乾薑 兩半 附子 一枚

剉如麻豆。每服五錢。水煎溫服。強壯之人可倍加薑附。

四逆湯方 治傷寒少陰病。下利清穀。裏寒外熱。手足厥冷。脈微欲絕。身反不惡寒。其人面色赤。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止。脈不出者。通脈加減四逆湯。

甘草 二兩 附子 一枚 乾薑 兩二

各剉如麻豆大。每服五錢。水煎溫服。其脈即出者愈。面色赤者。加葱九莖。腹中痛者。去葱。加芍藥二兩。嘔者。加生薑二兩。咽痛者。去芍藥。加桔梗一兩。利止脈不出者。去桔梗。加人參二兩。病皆與方相應者。乃服之。

生薑湯方 治傷寒手足厥冷。脈細欲絕。其人內有久寒者。宜當歸四逆加吳茱

黃生薑湯。

當歸

芍藥

桂去粗皮

細辛各三兩

吳茱萸湯洗炒

甘草

木通各二兩

劉如麻豆。每服五錢。入生薑半分。棗三枚。水酒同煎。溫服。

通關飲方。治厥陰傷寒。脈弦長者生。沉細不足者死。

附子一兩

乾薑

羌活

桔梗

甘草

五加皮各半兩

桂三分

黃耆一分

防風半一分

劉如麻豆。每服五錢。水煎。食前溫服。

迴陽湯方。治傷寒陰盛。手足厥冷。體寒脈微。

延胡索炒

半夏夏汁切炒黃

甘遂各一兩炒

陳橘皮湯洗去白

附子去皮

桂去粗皮

麻黃去根節湯洗各半兩

檳榔一枚

天南星一枚

劉如麻豆。每服二錢。酒煎溫服。服後一次頃。患人頭面暈身覺熱時。便與衣服。

蓋覆令出汗。

溫白丸方 治傷寒面青。心下堅鞭。開口出氣。身體不熱。頭面多汗。四肢厥冷。

半夏湯湯浸

白附子炮

硫黃研各一兩

共研爲末。用粳米飯搗和爲丸。如梧桐子大。每服二十九丸。溫酒下。吐逆炒薑鹽酒下。或艾醋湯下。陰毒併喫二三服。不計時候。

白朮飲方 治傷寒伏陰。胸膈妨悶。吐逆不定。手足厥冷。

白朮

附子去皮

高良薑炮

桂枝粗

人參

乾薑炮各一兩

藿香去根

劉如麻豆。每服三錢。水煎溫服。

吳茱萸散方 治傷寒渾身手足厥冷。面青唇口無色。心中寒慄。

吳茱萸湯浸焙炒

硫黃研

桂枝去粗

附子去皮

芎藭各一分

搗羅爲散。煎艾葉湯調下三錢。陰盛者兼灸氣海數十壯。

黑龍湯方 治傷寒陰盛隔陽。身冷煩躁。脈細沉緊。

附 子性用冷灰燬去火毒

搗研細入臘茶一錢和勻分作二服每服以水一盞蜜半匙同放冷服須臾躁止得睡汗出爲效。

退陰丸方 治傷寒陰盛手足多冷脈沉細助陽消陰。

硫黃

消石

陽起石

太陰玄精石

白礬

石膏各半

研爲末同入銚子內熬成汁爲度放冷細研用水浸炊餅爲丸如梧桐子大煎艾湯下十五丸。

傷寒過經不解

論曰傷寒爲病六經受邪始傳於三陽病在表者可汗其滿三日傳於三陰病入裏者可下其不兩感於寒更不傳經不加異氣者至七日太陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少微九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹滿減如故十一日少陰病衰渴止舌乾已而噤十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病

人精神爽慧也。故傷寒愈者。皆在十二日。若過此經。病猶不解者。為邪熱結于裏。其或謔言妄語。或鬱鬱微煩。或腹滿吐下。皆緣治之失宜。邪氣稽留。故病過經不能解也。當隨其證以治。若更感異氣。變為他疾者。當依壞病法療之。

犀角湯方 治傷寒過經不解。熱解在裏。往來寒熱。煩渴躁悶。

犀角屑一兩 柴胡去苗 吳藍各三分 大青

升麻各一兩 烏梅去核 黃芩各三分 甘草半兩

每服五錢。入竹葉三十片同煎。食後溫服。

木通湯方 治傷寒十三日過經不解。臍腹脹滿。小便淋澀。煩悶燥渴。

木通 葛根 青橘皮湯浸去白鹽炒 檳榔

滑石 瞿麥穗各一兩

每服五錢。入葱白二寸。同煎溫服。不計時候。

柴胡湯方 治傷寒發汗下之後。過經不解。胸脇滿結。渴而不嘔。但頭汗出。往來

寒熱。小便不通。宜服柴胡湯。

柴胡二兩 桂 黃芩各一分 牡蠣生用

甘草各半 栝蔞根半兩 木通一兩
每服五錢。生薑半分。葱白五寸。同煎食後溫服。

中風傷寒

論曰。中風傷寒。三陽三陰。候各不同。太陽中風。其脈陽浮陰弱。其證發熱自汗。蓋陽浮熱自發。陰弱汗自出。嗇嗇惡寒。淅淅惡風。燭燭發熱。鼻鳴乾嘔。又曰。太陽病發熱。汗出脈緩者。名爲中風。不可燔灸。若以火發其汗。邪風爲火熱所劫。血氣流溢。榮衛失常。兩陽熏灼。其身發黃。陽盛卽衄。陰虛卽小便難。陰陽俱虛竭。其身體枯燥。但頭汗出。劑頸而還。腹滿微喘。口乾咽爛。或不大便。久則讖語。甚者至噦。手足躁擾。循衣摸床。其小便利者可治。陽明中風。卽陽明病。能食爲中風。其證口苦咽乾。腹滿微熱惡寒。脈浮而緊。下之則腹滿。小便難。少陽中風。兩耳無聞。目赤胸中滿而煩。不可吐。吐之則悸而驚。太陰中風。四肢煩疼。其脈陽微陰澀而長爲欲愈。少陰中風。其脈陽微陰浮爲欲愈。厥陰中風。其脈微浮爲欲愈。不浮爲未愈。凡此六經之病。其狀雖異。大抵其脈皆浮。經所謂浮爲風是也。

大青龍湯方 治傷寒太陽中風。脈浮緊。發熱惡寒。身痛不汗出。躁煩。

麻黃去根節 桂皮去粗 甘草炙 杏仁去皮尖雙

石膏如鷄子

咬咀如麻豆。服五錢。入生薑一棗大。棗二枚。同煎溫服。取微汗。汗多者。以溫粉

粉之。

桂枝湯方 治中風傷寒。陽浮陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。惡寒發熱。鼻

鳴乾嘔等疾。

桂皮去粗 芍藥各三 甘草炙

每服五錢。入生薑一棗大。棗二枚。同煎溫服。以汗為度。未汗更服。仍作生薑稀

粥投之。以助藥力。

石膏湯方 治中風傷寒頭痛。四肢瘳痛。身體沉重。

石膏 甘草炙 麻黃去根節 桂

芍藥各二

每服五錢。入生薑一塊同煎。空心溫服。

麻黃桂心湯方。治中風傷寒。脈浮緊。發熱惡寒。身體疼痛。汗不出而煩。

麻黃去根節煎掠

桂皮去粗

甘草

乾薑一兩

石膏

乾薄荷葉

杏仁去皮尖雙

每服五錢。入棗二枚同煎。食前溫服。

桂枝湯方。治中風傷寒初得。其外證頭項疼。腰背強。壯熱語澀恍惚。唾涕稠黏。

遍身拘急。

桂枝三分

芍藥

半夏湯洗七遍

附子

黃芩

麻黃去根節

羌活

細辛各半

白芷一分

剉如麻豆。每服三錢。入生薑一塊同煎。食前溫服。蓋覆取汗。

麻黃細辛丸方。治中風傷寒。頭痛惡寒。四肢煩疼。心躁悶。

麻黃去根節

細辛

人參

白茯苓

甘草

白朮各半

栝蒌根三分

共研為末。鍊蜜和搗丸。如雞頭大。每服一丸。薄荷蜜湯研下。

傷寒溼溫

論曰。傷寒有五。其一爲中溼。蓋風溼之氣中人爲病。發熱與寒病相類。故曰溼溫也。此因汗出當風。或因取冷過度。致陰溼氣襲入肌膚。流傳經絡。其證喜汗出。關節疼痛。發熱而煩。小便不利。大便反快。是謂中溼。若風溼相搏。則一身盡疼。日晡卽劇。溼熱相蒸。則身必熏黃。凡治風溼者。欲其微汗。卽風氣解而溼自去。溼甚者。當利其小便。不可大發汗。大汗則風去溼在。其病不去。亦不可下之。下之早則曠。下之而利不止。卽死。診其脈當沉而細。難經曰。溼溫之脈。陽濡而弱。陰小而急是也。

麻黃杏仁薏苡仁甘草湯方 治溼溫病。一身盡疼。發熱。日晡卽劇。此病傷於汗

出當風。或久傷取冷所致。

麻黃去根節 杏仁去皮尖雙仁

甘草一枚

薏苡仁一兩

咬咀。每服五錢。水煎溫服。

桂枝附子湯 治傷寒八九日。風溼相搏。身體疼痛。不能自轉側。不嘔不渴。脈浮

虛而濡者。桂枝附子湯主之。若其人大便堅。小便自利者。亦附子湯主之。

桂枝去粗皮 附子三枚 甘草二兩

咬咀。每服五錢。入生薑五片。棗二枚。同煎熱服。

亦附子湯方

附子炮製去皮 白朮四兩 甘草二兩

劉如麻豆。每服五錢。入生薑五片。棗二枚。同煎溫服。初一服。其人身如痺。半日許復之。三服後。其人如冒狀。勿怪。此以附子亦併走皮中。逐水氣未得除。故使之然耳。法當加桂四兩。此本一方二法。以大便堅。小便自利。故去桂也。以大便不堅。小便不利。當加桂。附子三枚。恐多也。虛弱家及產婦。宜減服之。

甘草附子湯方 治風溼相搏。骨節疼痛。掣痛不得伸屈。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫者。

甘草二兩 附子二枚 白朮三兩 桂枝四兩

咬咀如麻豆。每服五錢。水煎溫服。初服得微汗則解。能食。汗止復煩者。少減服。

之。千金方去身腫者。加防風四兩。悸氣小便不利者。加茯苓三兩。既有附子。今加生薑三兩。

治溼家身煩疼。麻黃湯加朮四兩。發其汗爲宜。慎不可以火攻之方。

麻黃三兩

桂二兩

甘草一

杏仁七枚尖雙

白朮四兩

咬咀如麻豆大。每服五錢。水煎溫服。取微汗則解。

防風黃耆湯方 治風溼脈浮。身腫汗出惡風者。防風黃耆湯主之。

防風四兩

黃耆五兩

甘草二

白朮三兩

咬咀如麻豆大。每服五錢。入生薑半兩。大棗二枚。同煎溫服。日三。喘者加麻黃。胃中不和者。加芍藥。氣上衝者。加桂。下有陳寒者。加細辛。服後當如蟲行皮中。腰以下如冰。後坐被上。又以一被繞腰下。溫令微汗差。

杏仁湯方 治風溼身體疼痛。惡風微腫。

杏仁去皮尖雙仁

桂皮粗

麻黃去根節先煮

芍藥

天門冬去心焙

咬咀如麻豆大。每服五錢。入生薑半分。同煎溫服。

傷寒時氣

論曰。春溫夏熱。秋涼冬寒。是爲四時正氣。非其時有其氣。人或感之。病無分少長。率相似者。謂之時氣。如春應溫而反寒。夏應熱而反冷。秋應涼而反熱。冬應寒而反溫是也。其候與傷寒瘟疫病相類。但可汗可下之證。比傷寒瘟疫病療之宜輕爾。

葛根湯方。治時氣二三日不解。頭痛壯熱惡寒。

葛根一兩

麻

黃去根節二兩

陳橘皮去白

甘草炙

黃芩

知母

杏仁去皮尖雙

每服三錢。入生薑二片。同煎溫服。

七聖湯方。治時氣頭痛壯熱。肢體煩痛。

麻

黃去根節三兩

蒼

朮炒二

橘

皮去白

木

通各一

桔梗半兩

山茵陳一兩

甘

草炙二

每服三錢。生薑三片。同煎溫服。

八神湯方 治時氣一二日。頭痛壯熱。心神煩悶。

麻黃炙一兩

大黃

當歸

甘草

白朮

山梔子仁各半

芍藥

荊芥穗各一

每服三錢。入薄荷三葉。葱白一寸。生薑二片。同煎熱服。

人參乾葛湯方 治時行表不解。壯熱惡寒。

人參

乾葛

白芍藥

桔梗炒各一兩

赤茯苓三分

甘草

木香各半

麻黃依前炙三分

每服三錢。水煎熱服。併三兩服。溫覆出汗。

五苓散方 治時氣解表出汗。

赤茯苓

桂

澤瀉

白朮各一

豬苓去黑皮半兩

為散。每服五錢。以新汲水調頓服訖。以葱豉粥投之。衣蓋取汗。

葱白湯方 治時氣傷寒發汗。

葱白研二

生薑二兩

豉一合

細茶末二錢

先以水二盞煎葱并薑至一盞半。次下豉煎少時。卽入茶末。去滓頓服。厚衣蓋取汗。

解表湯方 治初得傷寒時氣。壯熱頭痛。

甘草兩二 生薑半兩 黑豆二合

咬咀。每服五錢。煎頓服。厚衣蓋覆取汗。

附桂散方 治傷寒時氣。

附子去皮 桂各半

爲散。每服三錢。熱酒調頓服。厚衣蓋。汗出爲度。

萬靈湯方 和養三焦。調順頓服。厚衣蓋。汗出爲度。溫中散寒。煖胃和脾。滋助

氣血。思美飲食。虛寒痼冷。痰癥動氣。心膈疼痛。噎悶嘔逆。一切氣疾。不日全愈。

前胡 柴胡 秦艽 甘草炙各

藿香子炒 木香 桂去粗皮 檳榔十枚

白豆蔻去殼 芍藥半斤 青橘皮半斤 芎藭半斤

甜葶藶半斤 桔梗四兩

每服三錢。大棗二枚。同煎。食前溫服。

傷寒疫癘

論曰。人居天地間。稟氣於陰陽。氣和則安。氣鑿則病。故一歲之內。節氣不和。寒暑乖候。皆爲疫癘之氣。感而爲病。故名疫癘。其狀無間。長少率皆相似。俗又名天行。其病與時氣溫熱等病相類。各隨其證。以方制之。

前胡湯方 治時行疫癘壯熱。效嗽頭痛心悶。

前胡

升麻

麥門冬

貝

母去心

紫苑去苗

杏

仁去皮尖雙仁

甘

草炙一

石膏一分

每服三錢。竹葉二七片。同煎溫服。不拘時。

葛根湯方 治時行疫癘。兼風熱目疼。心中妨悶。

葛根一兩

芍藥三分

蔥白三莖

豉半合

水煎溫服。日再服。

石膏湯方 治時行疫癘病。壯熱頭痛唇乾。

石膏 一兩

葛根 三分

芍藥

貝母

百合

升麻 各半

梔子仁

甘草 炙 各

每服三錢。豆豉五十粒。葱白三寸。同煎服。

柴胡湯方 治時行疫癘一二日。頭痛壯熱。

柴胡 二兩

芍藥 一兩

梔子仁

黃芩 各半

石膏

葛根 各一

每服五錢。葱白三寸。豉三十粒。同煎溫服。不計時候。

傷寒結胸

論曰。傷寒病發於陽。下之早。邪毒之氣結聚於胸膈。故名結胸。其證心下堅鞭。按之則痛。項強如柔痙狀。或從心下至少腹。堅滿而痛。其痛不可近。其脈寸口浮。關上自沈。是其候也。若正在心下。按之即痛。而脈浮滑。亦名結胸。凡此本太陽病。脈浮而動數。醫反下之。胃中空虛。客氣動膈。令人短氣躁煩。心中懊懣。陽氣內陷。心

下堅滿。則爲結胸。又或因得病二三日不能臥。但欲起者。心下必結。若脈微弱者。此素有積寒。而反下之。利止作結胸。但下之而脈浮者。必結胸。皆當下之。脈促者。不爲結胸也。脈若浮。即不可下。下之則死。結胸證悉具。煩躁者亦死。又有水結在胸脇者。又有臟結者。結胸無大熱。爲水結。似結胸狀。飲食如故。時時下利。陽脈浮。關脈小。細沉緊者。爲臟結。舌上白胎滑者。爲難治。若心下痞堅。按之不痛者。非結胸。乃痞也。宜審察而各依其法治之。

陷胸丸方 治傷寒結胸。心下堅實。大便秘利。

大黃 醋炒

葶藶子 隔紙炒

杏仁 炒各

朴硝 一兩研細與杏同研令如膏

共爲末。再同研勻。入少鍊蜜和。更杵三五百下。丸如彈子大。每服一丸。別入甘遂末半錢。蜜一合。水煎溫頓服之。一宿乃下。如不下更服。取下爲效。

大陷胸湯方 治傷寒結胸。頭項強。心下痛。按之實鞕。

大黃 醋炒

甘遂 紙裹

朴硝 另研

各搗研爲末。每服用水一鍾。入大黃末二錢。次下朴硝末一錢。同煎一二沸。次

下甘遂末一匙。攪勻溫服。取快利爲度。

小陷胸湯方 治傷寒小結胸病。正在心下。按之則痛。脈浮滑者。

黃連去積兩 半夏洗七遍 栝蒌實一枚

各細剉。先以水五盞。煎栝蒌實取三盞去滓。入黃連。半夏各一半。煎取一盞。分溫三服。

治傷寒寒實結胸。無熱證者。與三物小陷胸湯。用前方白散亦可服之。

桔梗炒三分 枳實炒三分 厚朴炒三分 枳殼炒三分 枳實炒三分 枳殼炒三分

除巴豆外。擣羅爲散。入巴豆合勻。每服強人半錢。弱羸之人減之。並溫熱水調服。病在膈上必吐。在膈下必利。不利進熱粥一杯。利不止進冷粥一杯。身熱皮粟不解。欲引衣自覆。若以水澀之洗之。益令熱却不得出。當汗而不汗則煩。假令汗出已。腹中痛。與芍藥三兩如上法。

葶藶湯方 治傷寒結胸。心下痛如石堅。小便不利。

葶藶子隔紙炒三分 檳榔半兩 桑根白皮三分 杏仁去皮尖

大黃醋炒各半 枳實炒三分

每服五錢。水煎。食前溫服。

增損理中丸。治傷寒下後。虛氣不理。毒復上攻。毒氣相搏。結於胸中。縱不下者。毒已入胸。胃中不通。毒還攻上。心中結滿。厥逆欲絕。心起高胸。手不可近。當先理其氣。

人參

白朮

甘草

括蕪根

枳實去穢炒

赤茯苓去黑皮

牡蠣煨各二兩

乾薑半兩

搗羅為末。鍊蜜丸如彈子大。每服一丸。熟水化下。不歇再服。不過五六丸。胸中豁然。

陷胸青龍湯方。治傷寒結胸。毒氣內盛。手足逆冷。腹脹喘急。大便不通。

牽牛子微炒

人參三分

陳橘皮浸去白

桂

檳榔各一兩

大黃醋炒

朴硝一兩

每服五錢。入生薑半分。同煎。食前溫服。

傷寒謔語

論曰。傷寒不應發汗而汗之。遂至亡陽。津液內竭。胃中燥實。則令譫語。此病或由津液不和。內有燥屎。或三陽合病。或瘀熱蓄血在裏。或婦人熱入血室。皆使譫語也。然譫語屬胃。胃者足陽明經也。陽明爲病。主身熱。故譫言妄語。則身當有熱。脈當洪大。洪大亦陽脈也。故其病爲煩滿譫語。而手足厥。脈反沈細而微者。爲逆也。然又有鄭聲者。取其鄭重之意。與譫語相類。蓋古人以此分虛實。醫者當以脈症參合別之。不可不慎。故謂虛則鄭聲。實則譫語。

小承氣湯 治傷寒陽明病人。多汗津液外出。胃中燥。大便必硬。硬則譫語。宜此湯。

大黃四兩

紫朴二兩

枳實三枚

水煎五錢。空心溫服。日二。

大承氣湯 治傷寒陽明下血譫語。此爲熱入血室。但頭汗出者。刺期門。隨其實而瀉之。漑然汗出則愈。汗出譫語。以有燥屎在胃中。此爲風也。須下者。過經乃可下之。下之若早。語言必亂。以表虛裏實故也。下之愈。

大黃四兩

紫朴半斤

枳實五枚

水煎五錢去滓。入芒硝末一錢。再沸溫服。日二。

白虎湯。治傷寒三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口不仁而面垢。謔語遺尿。發汗則謔語。下之則額上汗出。手足厥冷。若自汗出者。宜此湯。

知母六兩

石膏一斤

甘草二兩

粳米六合

水煎五錢溫服。

柴胡湯。治傷寒熱實。得汗不解。腹滿脹痛。煩躁謔語。

柴胡一兩

大黃煨

片芩

白芍

半夏三分

枳殼五錢

薑水煎五錢溫服。

犀角湯。治傷寒邪熱在胃。謔語妄言。身體壯熱。

犀角

大青

人參三兩

遠志

升麻兩半

片芩

柴胡一兩

甘草五錢

薑水煎五錢。入蘆根茅根各五寸。溫服。

人參柴胡湯。治傷寒經六七日不解。默默而煩。心腹乾燥。大腸結澀。謔語妄言。

人參三分

柴胡一兩

白芍

知母

片苓

萎蕤

大黃炒

半夏

甘草五錢

薑水煎五錢服。日二。

自愈方。治傷寒病。汗多亡陽。譫言妄語。不可下。與柴胡桂枝湯以和榮衛。以通其津液。

柴胡四兩

白芍

人參

桂心

片苓

半夏

甘草一兩

薑棗水煎五錢。空心溫服。日二。

傷寒潮熱

論曰。傷寒潮熱者。謂潮作有時。由邪氣入裏。故病日晡發潮熱。已而微利者。有微發潮熱而大便溏者。有潮熱而咳逆者。有結胸而潮熱者。大凡潮熱。皆以邪氣內實。制方宜酌其輕重。

小柴胡湯詳論

柴胡加芒硝湯 治傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡潮熱。已而微利。此大柴胡症。下之而不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。非其治也。夫潮熱者實也。先宜服小柴胡以解外。後與此湯。

柴胡

半夏

芒硝二兩

人參

片苓

甘草二兩

薑棗水煎五錢去渣。入芒硝一錢。沸服。

大小承氣湯詳論

柴胡石膏湯 治傷寒十日以上。潮熱不退。

柴胡

石膏

白朮

赤茯苓

山梔

姜 蕤

桑白皮三分

水煎五錢溫服。日二。

驚甲湯 治傷寒過經。潮熱不解。或作寒熱如瘧狀。

驚甲

柴胡

赤茯苓一兩

片苓

甘草

知母五錢

桑白皮三分

薑棗水煎五錢服。

秦艽湯 治潮熱不退。發作無時。

秦艽

鼈甲一兩

甘草五錢

生薑水煎五錢。入豆百粒。葱白三寸。空心溫服。日二。

傷寒煩渴

論曰。腎者水藏。膀胱者。津液之腑。二經相爲表裏。傷寒熱入于臟。流于少陰之經。則腎受病矣。腎水惡燥。熱盛則燥。故渴而引飲。又傷寒邪氣。非發汗吐下則不能除。若發汗吐下。過甚則亡津液。津液耗少。熱氣內生。亦令人煩渴也。白虎加人參湯 治傷寒用桂枝湯。大汗出大煩渴不解。脈洪大者。

知母三兩

人參兩半

石膏八兩

甘草一兩

梗米三合

水煎五錢。至米熟溫服。日二

五苓散 治發熱六七日不解。煩渴引飲。水入則吐。此爲水逆。

猪苓

赤茯苓

白朮

桂心

澤瀉 瀉一兩

共末。熟水下二錢。日二。汗出乃愈。

猪苓湯

治傷寒脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利。水入則吐。

猪苓

赤茯苓

阿膠

滑石

澤瀉 瀉一兩

水煎五錢。空心溫服。以差爲度。

入味知母湯

治傷寒病數日不解。心躁煩亂。小腹脹急。臍下疼痛。大渴喘乏。

知母

白芍

麥冬

柴胡

澤瀉 瀉三分

片苓

甘草五錢

石膏兩半

薑棗竹葉水煎五錢服。

葛根散

治傷寒躁渴。頭痛不得眠。四肢痛。

葛根

片苓

大青

石膏

人參一兩 甘草五錢

水煎三錢溫服。日二。

人參湯 治傷寒下後除熱止煩渴。

人參 麥冬 五味

石膏一兩

甘草五錢

水煎五錢服。日二。

黃芩蘆根湯 治傷寒吐下後內外有熱煩渴。

片芩 蘆根 人參 赤茯苓一兩

桂心五錢

薑棗水煎五錢服。

竹茹湯 治傷寒吐下後煩渴不止。

竹茹一丸 人參五錢 烏梅肉炒二枚

水煎三錢服。日二。

茯苓地黃湯 治傷寒胃熱引飲煩渴不止。

赤 茯苓

生 地

栝 蔞一兩

知 母五錢

麥 冬兩半

水煎五錢。入小麥百粒。竹葉二七片。棗二枚煎服。

知母犀角湯 治傷寒煩渴。飲水無度。日漸消瘦。

知 母

犀 角

升 麻五錢

石 膏三分

水煎五錢。入竹葉三七片。小麥五十粒。土瓜根汁。栝蔞汁各半合服。

傷寒煩躁

論曰。傷寒陽氣多陰氣少。病發于陽經者。故令煩躁。其候身熱而煩。渴引水漿。若胃中乾燥者。必譫語。亦有少陰經煩躁者。當辨之。

大青龍湯 治傷寒太陽中風。脈浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。此湯

主之。若脈微弱。汗出惡風者不可服。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此為逆。

麻 黃

去根節
六兩

甘 草

桂 心二兩

杏 仁

去皮尖炒
四十枚

石 膏三兩

薑棗水煎五錢。溫服。出汗止後服。

五苓散煩躁不得眠

白虎加人參湯。大渴舌乾燥。欲飲水數升。二方俱詳煩渴。

茯苓四逆湯。治汗下後。病仍不解煩燥。

白 茯苓四兩

人 參

附 子一兩

甘 草

乾 薑二兩

水煎五錢服。

吳茱萸湯。治少陰病吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。

吳茱萸洗一升

人 參二兩

大棗生薑水煎五錢服。日二。

蘆根湯。治陽毒五六日以上。胸中煩熱。乾嘔躁悶。

蘆 根一兩

甘 草

知 母

柴 胡

括 蕒根兩半

片 芩兩半

生 薑

水煎三錢溫服。

梔子豉湯 治陽明病脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。汗出不惡寒反惡熱。身重。若發汗則躁。心憤憤而反譫語。若加溫針。必怵惕煩躁不得眠。若下之則胃中空虛。客氣動膈。心中懊懣。舌上胎者。

山

梔肥大者

豉五錢

水煎空心溫服。得吐便止。

桂甘龍牡湯 治火逆汗下之因燒針煩躁。

桂枝一兩

甘草

龍骨

牡蠣二兩

水煎五錢溫服。日二。

傷寒厥逆

論曰。傷寒病手足厥逆。其名曰厥。此因陽氣衰。陰氣盛。陰勝則陽脈逆而不通于四肢。所以逆冷。其症令人惡寒不飲水。下利清穀。或清便自調。或小便數。外症默靜。是其候也。宜溫之灸之。若灸而手足不溫者。爲難治。然厥亦有熱者。先發熱而後厥。熱深厥亦深。熱微厥亦微。脈雖沉伏。按之當滑。若或畏熱飲水。或揚手擲足。

煩躁不得眠。大便秘。小便赤。外症昏憤者。雖厥不可溫也。宜下之。
通脈四逆湯 治手足厥冷微喘。脈不出。

附子五錢

人參

甘草一兩

乾薑兩半

水煎五錢溫服。日二。

當歸四逆湯 治傷寒手足厥冷。脈細欲絕。

川歸

白芍

桂心一兩

細辛一兩

甘草

木通七錢

大棗水煎五錢溫服。日二。

芍藥湯 治下利清穀。內寒外熱。汗出而厥。腹痛兼嘔。

白芍

附子一兩

人參

甘草五錢

薑水煎五錢溫服。日二。

吳茱萸湯 治手足厥冷。脈細欲絕。

吳茱萸

白芍

川歸

桂心一兩

甘草

細辛三分

乾薑五錢

藁水煎五錢服。日二。

葱熨法。治傷寒病後。氣虛陽脫。體冷無脈。氣息欲絕。不省人事。及陰厥服百法不效者。

葱一斤水

以麻縷扎如盞許大。切去根及葉。惟存白二寸許。如大餅。先以火燂一面。令通熱。乃以熱處放在病人臍中。連臍下。其葱上以熨斗滿貯火熨之。令葱餅中熱氣透入肌肉中。須預作三四箇餅子。一餅壞不可熨。又易一餅。良久病人漸醒。手足俱溫。有汗出。更服四逆湯以溫其內。其病即差。

傷寒頭痛

論曰。傷寒頭痛者。邪氣循陽脈上攻于頭也。是以傷寒傷風。溫病熱病。風溫病。皆有頭痛病者。蓋頭痛乃陽症也。故太陽頭痛必發熱惡寒。陽明頭痛不惡寒反惡熱。少陽頭痛脈弦細而發熱。至于三陰脈從足至胸。皆不至頭。惟厥陰脈挾胃屬肝絡膽循喉嚨上頰額連目系。上出額。故仲景止有厥陰頭痛一症。治以吳茱萸

湯是也。

桂枝湯 治太陽病頭痛發熱。汗出惡風。

桂枝 白芍三兩 甘草二兩

生薑大棗水煎五錢。空心溫服。投以熱粥助藥力。

小承氣湯 治傷寒六七日不大便。頭痛有熱。

大黃四兩 紫朴薑汁炒 枳實三枚

水煎五錢溫服。

麻黃湯 治傷寒太陽頭痛發熱。身疼腰痛。一身骨節俱痛。惡風無汗而喘者。

麻黃二兩 桂枝二兩 甘草 杏仁去皮尖

水煎五錢。稍熱服。取汗。

連翹蔥白湯 治傷寒已發汗。或未發汗。頭痛如破。

蔥白連鬚 生薑二兩

分三服。水煎通口熱服。服不差。用葛根蔥白湯。

葛根蔥白湯 治頭痛不止。

葛根

白芍

知母五錢

川芎三分

薑蔥水煎五錢。溫服。

小柴胡湯 治脈弦細。頭疼發熱。屬少陽。少陽不可汗。

柴胡二兩

片苓

人參

甘草三分

半夏六錢

薑棗水煎五錢。空心溫服。日二。

吳茱萸湯 治傷寒厥陰乾嘔吐涎沫。頭痛。

吳茱萸洗三兩

人參兩半

薑棗水煎五錢。空心溫服。

茶調散 治頭痛不止。

石膏研二

羌活

茵陳蒿

蒼朮

甘草

荆芥穗

川芎一兩

桂心五錢

共末。用臘茶末一錢。同葱煎湯下一錢。

石膏湯 治頭痛不可忍。

石膏

麻黃一兩

葛根三分

何首烏五錢

水煎三錢溫服。日二。

瓜蒂散 治頭痛胸滿發熱惡寒脈緊而不大是膈上有涎。

瓜蒂一兩

爲末熱水下一錢吐涎愈。

前胡湯 治頭痛壯熱。

前胡

半夏

桂心

玄參

甘草

桔梗炒

旋復花

片苓

生地一兩

薑水煎五錢服。

四白散 治頭痛身熱百節疼痛。

白芷

白附子

白殭蠶炒

白蒺藜炒各

共末茶酒任下二錢。

傷寒喘

論曰。傷寒喘。其症不一。有邪氣在表。表未解無汗而喘者。有邪氣在裏。汗出不惡寒。腹滿而喘者。有潮熱者。有心下有水氣而喘者。古人亦各求其本。故在表者當汗。在裏者宜下。至于心下有水而喘。又當利其小便。若乃陰症發喘。是爲無陽。非灸之不可。

小青龍加杏仁去麻黃湯 治心下有水氣。咳而發喘。

白芍

甘草

桂心

杏仁

五味

細辛

乾薑三兩

半夏二兩

水煎五錢服。

麻杏草膏湯 治下後不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱。

麻黃

去根節

石膏八兩

甘草三兩

杏仁去尖五

水煎五錢服。

麻黃湯 治太陽與陽明合病。喘而胸滿不可下。

麻黃三兩

桂心二兩

甘草一兩

杏仁七枚

水煎五錢溫服。取微汗。

大承氣湯 治傷寒陽明病。脈遲。雖汗出。不惡寒。其身必重。短氣腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濇然汗出者。此大便已硬也。大承氣主之。若汗多微發熱惡寒者。外未解也。其熱不潮。未可與承氣湯。若腹大滿不通者。可與小承氣湯。微和胃氣。勿令至大泄下。

大承氣湯方詳譚語。

傷寒上氣

論曰。傷寒上氣者。肺主氣。手太陰是其經也。病人肺氣凡有不調。又遇寒熱邪氣。傷于其經。則脹而氣逆不下。故令上氣。

竹茹湯

治上氣喘滿。客氣在臍。乾嘔。口生瘡。不得飲食。

竹茹

葛根一兩

半夏

麥冬三分

甘草

陳皮去白炒五錢

薑水煎五錢溫服。日二。

天門冬丸

治心肺熱上氣喘逆。

天冬

白茯苓

杏仁一兩

生地

貝母

甘草

烏梅肉炒

人參五錢

共末。蜜丸。彈子大。含化一丸。日可三五。

葶藶湯 治上氣喘粗。身面腫。小便澀。

葶 藶隔紙微炒五錢 大棗五枚去核

水煎溫服。日二。

貝母丸 治心肺有熱。咳嗽上氣。喉中作聲。痰涕口乾。

川貝母二兩 杏仁去皮尖炒四兩 天門冬一兩

炙甘草三分

旋復花五錢

共末。蜜丸。彈子大。食後含化一丸。

傷寒咳嗽

論曰。傷寒咳嗽者。寒氣客于肺也。肺受虛寒。微則咳嗽。然又有邪熱客于上焦。其人必欲飲水。水停心下。水氣乘肺而咳嗽者。當熟察之。

麻黃湯 治咳嗽日夜不止。

麻黃去根

赤茯苓

桑白皮一兩

葛根

五味子

紫蘇葉

炙甘草

紫苑五錢

石膏研兩

桂心一兩

葶藶炒一

薑棗水煎五錢。空心溫服。日二。

小青龍湯

治心下有水氣咳而微喘發熱。或利或噎。

麻黃去根節

白芍

半夏薑汁

桂心

細辛

炒乾薑

五味子炒

甘草五錢

水煎五錢服。日二。

五味子飲

治傷寒咳嗽。

五味子炒

麻黃去根

阿膠

陳皮炒一

甘草

杏仁炒去皮尖

薑水煎三錢服。

加減小柴胡湯

治傷寒五六日。往來寒熱。或微熱咳嗽。

柴胡二兩

片苓

半夏

甘草三分

黑乾薑五錢

五味子炒一

薑水煎五錢服。

地黃飲 治熱毒攻肺咳嗽。咽喉生瘡。

生地二兩

大黃

升麻

貝母

麥冬

甘草一兩

水煎三錢。入蜜少許服。

射干湯 治春冬月傷寒。夏秋月中冷。咳嗽喉鳴。聲啞乾噦。咽喉不利。

射干

杏仁

麻黃

桑皮一兩

半夏

甘草

桔梗炒二

陳皮

紫苑五錢

薑棗水煎五錢服。

前胡飲 治肺寒盛。痰嗽不止。心膈煩滿。不能飲食。常多嘔逆。

前胡

桔梗

玄參

人參

生地

半夏

薑水煎五錢服。

甘草

朴各一

旋復花

桂心

聖濟總錄纂要 卷三 傷寒門 傷寒咳嗽

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷四

傷寒門

傷寒乾嘔

論曰。傷寒乾嘔者。嘔而無所出也。此因邪熱在胃。或汗解後胃中不和。尚有蓄熱。氣熏上焦。心中痞結。故令乾嘔。且諸邪氣在胃。胃氣上逆。皆發爲嘔。冷卽寒痰凝結。嘔出涎沫。熱卽津液消燦。獨其氣逆。故乾嘔不已。施治者不可不察。

竹茹湯

治胃氣虛熱。乾嘔不止。

竹茹

半 夏

甘 草五錢

人 參

蘆根一兩 前胡 葛根三分

薑水煎五錢服。

蘆根湯 治心脾虛熱。乾嘔煩熱。不下食。

蘆根二兩 人參 赤茯苓 竹茹一兩

甘草五錢

水煎五錢。入小麥一撮。薑一分。溫服。日二。

枇杷葉湯 治乾嘔煩渴不止。

枇杷葉去毛炙 麥冬 人參 葛根三分

白茯苓五錢 甘草炙一分

薑水煎三錢服。

人參煮散 治胃氣虛冷。乾嘔不止。

人參一兩 白朮 白芍三分

陳皮 枳殼 高良薑 杏仁 甘草

乾薑五錢

薑棗水煎三錢。稍熱服。相繼三服。以熱稀粥投之。以助藥力。汗出乃差。
白朮飲 治邪熱雖退。胃中不和。乾嘔不已。甚則吐逆。

白朮

薑根

紫朴一兩

枇杷葉去毛炙

薑水煎三錢。空心溫服。日二。

傷寒嘔噦

論曰。傷寒嘔噦者。病在足陽明胃經也。足陽明之脈。厥而上行。令人氣逆。氣逆故嘔噦。仲景云。嘔多雖有陽明症。慎不可下。蓋爲此也。又傷寒嘔噦。有因熱壅胸中邪氣之高所致。有因吐下後虛熱在內。及飲水停積所致。症既不同。治亦有異。不可不察。

半夏湯 治胃氣逆冷。食已嘔噦。卽欲吐。

半夏

白茯苓一兩

人參

枳殼五錢

白朮半兩

薑水煎三錢。溫服。日三服。

人參湯 治服冷藥過多。胃寒嘔噦。不下食。

人參

白朮

附子

白茯苓

陳皮一兩

桂心

乾薑五錢

丁香一分

薑水粳米煎五錢服。

藿香人參湯 治嘔噦不止。胸滿煩悶。

藿香三分

人參一兩

甘草

陳皮五錢

薑水煎三錢服。日二。

通正散 治噦逆嘔吐。虛氣妄行。

丁香

乾柿蒂一兩

薑肉五十枚

共末。酒下二錢。

四逆加薑湯 治少陰症嘔噦。

甘草炙一兩

附子

生薑切半

乾薑三分

水煎五錢溫服。

傷寒心悸

論曰。傷寒心下悸者。謂悸動不定也。傷寒飲水過多。水停心下。腎氣乘心。則心虛氣弱。故爲之悸動。皆由發汗後又下之。津液燥少。若內生虛熱。熱則飲水。水氣停積。故必振寒而心下悸也。

茯苓甘草湯 治傷寒厥逆心下悸。先治其水。服此湯却治其厥。不爾水漬入胃。必作利。

赤 茯苓

甘 草

桂 心一兩

薑棗水煎五錢溫服。日二。

桂枝甘草湯 治發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲按者。

桂 枝四兩

甘 草三兩

水煎五錢溫服。日二。

甘草湯 治脈結心悸。

甘 草

麥 冬一兩

生 地四兩

人 參

桂 心五錢

麻 仁一合

薑棗酒水煎五錢去滓。入阿膠一片。令烊盡溫服。日二。

桂枝湯 治水在心下。心悸動欲得人按。

桂枝二兩 赤茯苓半 白朮一兩 甘草

陳皮法白炒五錢

生薑水煎五錢。空心溫服。日二。

傷寒痞滿

論曰。傷寒病發于陰。醫誤下之。邪氣入裏。胃中虛。客氣上逆。心下滿不痛。按之不堅。此爲痞也。法宜瀉心。唯表未解者。未可攻之。當先解表。然後攻痞。若表解而裏未和。或瀉心而痞不解。其人口燥煩渴。皆隨症處治。其眩冒而經脈動惕者。久則成痿。若表裏俱虛之人。有氣痞。陰陽氣并竭。無陽則陰獨。復加火針。因胸煩。面青黃。膚潤者。難治。其脈微浮。而氣上衝咽喉。不能息者。非痞。乃有寒在胸中故也。治屬吐法。

半夏瀉心湯 治心下痞。但滿不痛者。

半夏一兩 乾薑 人參二兩 片苓

川連 甘草五錢

大棗水煎五錢。食後服。日二。

大黃黃連瀉心湯。治傷寒大下之後。復發汗。心下痞。惡寒者。表未解也。不可攻

痞。當先解表。表解乃攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜此湯。

大黃二兩 川連一兩

以麻黃沸湯漬三錢。須臾絞取汁。溫服。一方有片芩一兩。

瀉心湯。治傷寒汗解後。胃中不和。心下痞硬。噯食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴下

利。

人參 甘草三分 川連 乾薑一兩

片芩一兩 半夏二兩洗

薑棗水煎四錢。空心溫服。晚又服。

甘草瀉心湯。治傷寒中風。醫反下之。其人下利。日數十行。完穀不化。腹中雷鳴。

心下痞硬而滿。乾嘔。心煩不得安。醫見心下痞。謂病不盡。復下之。其痞益甚。此

非結熱。但以胃中虛。客氣上逆。故使硬也。

炙甘草四兩

片苓

乾薑三兩

半夏薑汁炒

川連一兩

水煎四錢大棗二枚。溫服。

旋復代赭湯 治發汗若吐下後。心下痞硬。噫氣不除。

旋復花三兩

代赭石一兩

人參

半夏

甘草二兩

薑棗水煎四錢。溫服。日二。

蘇橘湯 治胸中痞滿。心腹氣滯。不思飲食。

紫蘇葉

大腹皮

旋復花一兩

陳皮二兩

赤茯苓半

半夏五錢

薑棗水煎五錢。溫服。

異效丸 治五六日大下後。心中痞滿。氣息喘逆欲絕。

人參

白朮

甘草

枳殼

赤茯苓

括蕪

陳皮炒

木香五錢

乾薑三分

共末。蜜丸。桐子大。空心米飲下二十九。至晚再加至三十九。

草豆蔻湯 治傷寒汗後。胃氣不和。心下結痞。噫氣食臭。脇下虛滿。腸鳴下利。

草蔻

陳皮

枳殼五錢

人參

半夏

甘草

乾薑三分

薑棗水煎五錢溫服。日二。

傷寒霍亂

論曰。嘔吐而利。病名霍亂。此由邪氣在中焦。使陰陽二氣不能升降。則心腹絞痛。而作吐利。其候心先痛則先吐。腹先痛則先利。心腹俱痛。則吐利並作。古人以其病迅暴。揮霍之間。便致撩亂。故名霍亂。傷寒霍亂。亦由中焦陰陽不和所致。故其狀有熱而渴者。有寒而不渴者。有發熱惡寒。汗出厥逆者。有病勢已。而身體疼痛不休者。不可概以一法治。理中湯 治霍亂吐利寒多。不喜飲水。

人參

白朮

甘草

乾薑二兩

共末。蜜丸。彈子大。沸湯化。一丸。溫服。日三夜二。

五苓散 治霍亂頭痛發熱。多欲飲水。

猪苓

白朮三分

桂心五錢

赤茯苓

澤瀉一兩

共末。溫水。空心下二錢。日二。

蘆根人參湯 治霍亂心煩乾嘔。

蘆根二兩

人參

麥冬

赤茯苓一兩

枇杷葉去毛炙一分

水煎五錢。入薤白三寸。溫服。日三。

藿香湯 治霍亂轉筋嘔吐不止。

藿香

人參

附子

木瓜

桂心

川歸二兩

生薑水煎三錢。溫服。日二。

吳茱萸湯 治霍亂吐利。腹脹轉筋。手足冷。飲食不消。

吳茱萸

紫朴一兩

桂心

丁香

木瓜

甘草

藿香五錢

人參三分

薑水煎三錢服。日二。

白朮湯 治霍亂吐利轉筋。

白朮

陳皮一兩

木瓜二兩

薑水煎三錢溫服。日二。

傷寒小便不通

論曰。傷寒小便不通者。或因發汗過多。津液虛少。胃中乾燥。或小腸有伏熱。氣道不宣。皆令小便不通也。方論云。胃中乾則無小便。慎不可利。蓋言汗後亡津液也。若下焦有熱而小便不利。又當隨症利之。

赤茯苓通湯 治下焦有熱。小便不通。

赤茯苓

木通

滑石

車前子一兩

水煎五錢溫服。日二。

猪苓湯 治脈浮發熱渴欲飲水小便不利。

猪苓

赤茯苓

滑石

澤瀉一兩

水煎五錢去渣入阿膠末一錢再沸溫服。日二。

五苓散 治傷寒汗後小便不利微熱消渴。

猪苓

赤茯苓

白朮三兩

桂心五錢

澤瀉一兩

共末水下三錢。

雞蘇湯 治小腹急痛小便不利。

雞蘇一把

木通

滑石

杏仁去皮

冬葵子

石葦去毛

生地二兩

水煎五錢溫服。

傷寒大便不通

論曰。傷寒大便不通者。胃腑實也。因太陽病若汗若下。若利小便。亡其津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣內實大便難。此陽明症也。當下之。然有陽明症不可下者。當問其小便日幾行。若本小便日三四行。今日再行。故知大便不久出。爲小便數少。津液當還胃中。故知不久當大便。如此則傷寒嘔多。雖有陽明症。不可下明矣。凡胃中有燥屎。常以湯水和之。湯入腹中轉失氣者。此所謂有結燥。下之無害。若不轉失氣者。此但初硬後必溏。不可下。下之則脹滿不能食也。

小承氣湯 治陽明病潮熱。若不大便六七日。恐有燥屎。欲知之法。少與小承氣湯。湯入腹中轉失氣者。有燥屎也。乃可攻之。若不轉失氣者。但初頭硬後必溏。不可攻。攻之必腹脹不能食也。欲飲水者。與水則噦。其後發熱者。必大便硬而少也。以小承氣和之。

大 黃酒洗

紫 朴薑汁炒

枳 殼三枚

水煎五錢溫服。當更衣。不爾者再服。更衣者勿服。服後若不轉失氣者。不可攻。大承氣湯 治傷寒病不大便五六日。繞臍痛。煩躁。發作有時。此爲有燥屎。宜此湯。

大黃酒洗 紫朴薑炒 枳實炒 五

水煎五錢去渣。入芒硝一錢。數沸溫服。仲景云。少陰病六七日不大便者。此

湯主之。

麻仁丸 治傷寒跌陽脈浮而瀋。浮則胃氣強。澀則小便數。浮澀相搏。大便則硬。

其脾為約。

麻仁半升 白芍二兩 紫朴薑汁 枳實三分

杏仁二兩 大黃四兩

共末。蜜丸桐子大。飲下十丸。日三。

蜜膽導 治大便秘澀。服藥不通。

白蜜三合 雄豬膽一枚 膩粉研半

先將蜜入銅器中。微火慢熬二十沸。入膽汁。將杵子不住手攪。慢煎成膏。入膩粉。和丸如棗核大。以薄綿包。內下部中。未通再用。

傷寒下利

論曰。傷寒下利者。其種固多端。然皆由表實裏虛。寒熱溼氣乘虛。客搏于腸胃之間。故腸胃隨其所傷而下。若傷寒則下青白。傷熱則下黃赤。寒熱相雜。則赤白俱下。若兼以溼毒。則又下膿血如魚腦。如爛肉也。其候不同。有下利而脈虛者。有下利而脈實者。有濕毒勝而腹痛者。有熱氣盛而煩渴者。有津液搏滯而腸垢者。有尿燥結聚而妄言譫語者。其要在審別虛實以治之。

白頭翁湯

治傷寒下利飲水者。內有熱也。及熱利後重。

川連

川柏

陳皮三分

水煎五錢空心服。日二。

桃花湯

治傷寒少陰病。二三日。至四五日。腹痛。小便不利。下利不止。及便膿血。

赤石脂四兩不用研

糯米二合

乾薑一分

水一升。煎薑米并不研石脂。候米熟。用汁一小鍾。入石脂末一錢。再沸溫服。日三。

四逆湯

治自利不渴者。屬太陰。以其臟有寒故也。當溫之。

炙甘草一兩

附子五錢

乾薑炒三

水煎五錢溫服。

又治傷寒後下利清穀不止。身疼痛急。當救裏。

犀角湯 治熱毒不解。日晡壯熱腹痛。純下鮮血。

犀角

片芩

川連

茜根

地榆一兩

山梔五錢

水煎五錢。入薤白五寸溫服。

黃柏湯 治下痢膿血。

川柏

阿膠五錢

川連一兩

山梔一分

水煎三錢。食前服。日二。

龍骨丸 治臟腑虛冷。下白膿腹痛。

龍骨

乾薑

附子一兩

共末。醋糊丸。桐子大。米飲下三十九丸。日二。

竹茹湯 治利下血不止。

竹茹

白芍

子芩五錢

木通三分

升麻 黑木耳兩燒灰半
水煎三錢去渣。入生地汁一合溫服。

傷寒陰毒

論曰。陰氣獨盛。陽氣暴衰。陽爲陰所勝。內外皆陰。故成陰毒傷寒。有初得病便成陰毒者。有服藥經五六日不差。變成陰毒者。以病本屬陰。因服寒藥過多。或臟腑內外受寒。陰氣轉盛。陽氣不復所致。其候四肢逆冷。臍腹築痛。身如被擊。嘔吐下利。其脈微細而疾。

陰毒甘草湯 治傷寒初病一二日。便結成陰毒。或服藥後自變成陰毒。身重背強。腹中絞痛。咽喉不利。毒氣攻心。心下堅強。短氣不得息。嘔逆。唇青面黑。四肢厥冷。其脈沉細。身如被杖。五六日可治。至七日不可治。

甘草 升麻 桂心 川歸五錢
川椒 雄黃一分 鼈甲炙兩

水煎五錢溫服。日二。

氣壅喘悶方 治陰毒手足厥冷。或生斑點。

附 子二枚 出火燒黑

爲末。用沉香磨水。米飲下二錢。

正陽湯 治傷寒陰毒。唇青面黑。張口出氣。心下硬。身不熱。額上出汗。煩渴不止。

舌黑多睡。四肢逆冷。

附 子

甘 草

乾 薑 一兩

皂 莢子一枚 去皮

麝 香一錢

共末。水煎二錢。稍熱服。

正陽丹 治陰毒手足厥冷。脈沉細。面目青。

硫 黃 硝 石 太陰玄精石 一兩

同研入瓶內。鹽泥封固。陰乾。火煨赤。細研。酒煮糊丸。桐子大。酒下二十九。

附子回陽散 治傷寒陰毒。面青唇黑。四肢逆冷。臍腹痛。身體如冰。并一切卒暴

冷氣。

附 子 二枚

爲末。用生薑自然汁半鍾。冷酒拌勻。下三錢。更以冷酒送下。相次再服。良久臍下如火。徧身和煖爲度。

傷寒陽毒

論曰。陽氣獨盛。陰氣暴衰。陰爲陽所勝。內外皆陽。故名爲陽毒。傷寒有得病便成陽毒者。有服藥經五六日不差。變成陽毒者。蓋以病本屬陽。或以火劫發其汗。或因灸烙。陽氣轉盛。陰氣內消所致。其候面赤發躁。狂走妄言。或發斑如錦紋。或咽喉疼痛。或涕吐膿血。或下痢黃赤。其脈洪實滑促。是其證也。

升麻湯 治傷寒一二日。便成陽毒。或服藥吐下後。變成陽毒。腰背疼痛。煩悶不安。面赤狂言。或見鬼神。或下痢。脈浮大數。面赤斑紋如錦。咽喉痛。吐膿血。五日可治。七日不可治。

升麻

犀角

射干

人參

片芩

甘草一兩

水煎五錢。溫服。少頃又服取汗。未汗再服。

梔子湯 治陽毒壯熱百節疼痛。

梔子

赤芍

大青

知母一兩

石膏

片苓

杏仁炒二

甘草五錢

柴胡兩半

薑棗水煎四錢。入豉百粒服。

黑奴丸 治傷寒時行熱病。六七日未得汗。脈洪大。或面赤目脹。身大熱煩躁。狂

言欲走。渴甚。又五六日以上不解。熱在胸中。口噤不能言。心下尚暖。灌藥下咽

即活。兼治陽毒及發狂。

麥 奴山麥未熟時中有不成者上有

麻黃去根節

大黃二兩

片苓

芒硝

釜底煤

竈突煤

梁上塵各一兩

共末。蜜丸。彈子大。取新汲水。化下一丸。渴者與冷水。盡量飲之。須臾當寒。寒過汗出。即差。若服藥日移五尺不汗。再服一丸。差即止。須微利下。此藥須病人大渴。倍常燥盛者。乃可與之。不爾不可與。

大青湯 治陽毒煩躁不解。或下利危困。

大青二兩 犀角 山梔 甘草

川連五錢 秦艽一兩

水煎五錢。入豉百粒。薤白七寸。空心服。

犀角湯 治傷寒陽毒初得身大熱目赤便黃。心悶頭痛。煩渴不止。四肢疼痛。語

言錯亂。眠臥多驚。

犀角一兩 赤茯苓 陳皮 甘草

麻黃 細辛 茵陳蒿五錢 人參三分

薑棗水煎五錢服。

傷寒發斑

論曰。傷寒發斑者。陽盛故也。其病在表。或未經發汗。或已經發汗未解。或吐下後邪熱不除。毒氣內盛。因表虛。熱毒乘虛出于皮膚。發爲斑疹如錦紋。若色赤。發在五六日內者可治。色黑過七日乃發者難治。甚則身體喉舌皆成瘡也。

黃芩湯 治傷寒熱病。十日內未得汗。表裏有熱。遂發斑點。時或狂言。目色黃。心中煩熱。大便不利。

片芩

大青

大黃

升麻

朴硝

山梔一兩

茵陳蒿一兩

川連

甘草五錢

竹葉三七片。水煎五錢服。

石膏湯

治發黑斑。

石膏二兩

麻黃

葛根一兩

川連三分

故鞋土細切

川椒炒一

桂心五錢

水煎五錢。溫服取汗。

傷寒發黃

論曰。傷寒發黃之狀。身體盡變黑黃。或如橘色是也。凡陽明中風。太陽中溼。皆令人發黃。蓋由得病無汗。小便不利。寒溼不散。則熱結脾胃。腠理閉塞。瘀熱之氣。與

宿穀相搏而鬱蒸。不能消散。故二便結澀不通。令人身體面目皆變黃色。其病腹滿身疼發熱。若其人小腹滿急。眼澀疼。鼻骨痛。兩膊及項強。腰背急者是也。但得下便快利漸愈。仍不用大便秘。即令人心脹。又有急黃者。身體黃甚。卒然而發。心滿氣喘。命在須臾。故名急黃。有初得病便黃者。初不知是黃。死後方變黃者。此病亦因脾胃瘀熱。本天行時氣所作。宜細辨之。但發熱心戰者。乃是發黃之候。茵陳蒿湯。治陽明發熱汗出。此為越熱不得發黃也。但頭汗出。小便不利。渴飲水漿。此為瘀熱在裏。身必發黃。下之宜此湯。又傷寒七八日。身黃如橘皮。小便不利。腹微滿者。宜此湯。

茵陳蒿六兩

梔

子十四枚

大

黃三兩

共為粗末。水煎五錢。三服後小便當利。下如皂莢汁狀。乃愈。

麻黃連翹湯

治瘀熱在裏發黃。

麻黃二兩

去根節

連

翹

生

薑二兩

杏

仁四十枚去

生梓白皮

一兩剉

大

棗十二枚

甘

草一兩

水煎五錢熱服。

梔子柏皮湯 治傷寒身黃發熱。

梔子十枚炒五

黃柏二兩

甘草一兩

水煎三錢。

抵當湯 治傷寒太陽身黃。脈沉細。小腹鞭。小便利者。為無血也。小便自利。其人

如狂者。血證諦也。

水蛭三十枚炒

蟅蟲三十枚炒

桃仁十枚炒去皮

大黃三兩

水煎三錢服。

龍膽湯 治發黃煩熱。皮肉皆黃。小便赤。不利。

龍膽

枳殼

山梔

木通

知母

柴胡

地骨皮

白芍

甘草

麥冬

升麻

羚羊角一兩

水煎五錢。

黃芩湯 治傷寒發黃。或先服利藥未差。宜以內消。以折熱氣。

片芩

茵陳蒿

升麻

犀角一兩

山梔 柴胡

龍膽草 五錢

水煎五錢。入生地汁一合。

茅根湯 治傷寒發黃。通身如金色。

茅根 山梔

甘草

茵陳蒿

地骨皮 一兩

薑水煎五錢。入豉三七粒。熱服。

梔子湯 治傷寒急黃。

山梔 柴胡

朴 硝 另研

茵陳蒿 五錢

水三大鍾。煎二大鍾。去渣入硝。分三服。取利。

茵陳蒿散 治傷寒時氣。急黃疼痛。

茵陳蒿 片 苓 梔子

大 青 一兩

大 黃 朴 硝 三兩

白 蘚 皮

葛 根

升 麻 兩半

共末。新汲水下二錢。得利差。

傷寒發豌豆瘡

論曰。傷寒熱毒內盛。多發胞瘡者。以病人表虛裏實故也。裏實則毒氣不能內消。表虛故乘虛發於肌肉而成瘡。其瘡大小形如豌豆。其色或白或赤。若頭作癩漿。戴白膿者。其毒則輕。若紫黑色作根。隱隱在肌肉裏者。其毒則重。甚者周匝徧身。五內七竅皆有也。

參麻湯 治傷寒熱病生豌豆瘡并胞瘡。煩悶昏迷。

玄參 升麻 乾藍葉一兩 甘草二分

犀角 錢五

水煎五錢。入葱白三寸。豉一撮。熱服。日二。

豌豆瘡四邊赤腫

胡荽一把 生地

二味搗取汁。空心服盞許。

犀角湯 治傷寒熱毒氣盛。瘡如豌豆。

犀角二兩

麻黃

川連兩半

木香一兩

水煎五錢。日二。

內消散 治傷寒熱病。欲生疏瘡。毒未出。令不成。

京

墨燒去烟一分

用酒三合。磨令頓服。

紫草湯 治傷寒斑疹豆瘡。

紫草 惡實

荆芥穗一兩

水煎三錢熱服。日二。

值傷寒發狂

論曰。重陽者狂。謂陽氣獨盛也。傷寒熱毒既盛。內外皆熱。則陽憤噴而發為狂。越使人狂。走妄言。或罵詈不避親疎。或妄見妄聞。棄衣而走。登高而歌。或數日不食。踰垣上屋。蓋四肢諸陽之本。熱盛而四肢實。是為重陽。故所上之處。皆非素所能。而病乃能也。若乃因火為邪。而發為驚狂。及內有瘀血。而外症如狂。其為病雖不

同。然其為陽氣有餘則一也。

犀角湯 治傷寒十數日頭戰掉。大汗出。恍惚狂走。眼見鬼神。

犀角 山 梔五錢 白芍 生地

麥冬 茯 神一兩 茵陳蒿三分

水煎五錢。入竹葉二十一片。食後服。

羚羊角湯 治汗後熱毒未盡。因有所驚。狂言欲走。

羚羊角 犀角 防風 片苓

升麻 玄參 茯 神五錢 龍齒

甘草一兩 人參 竹茹 骨皮三分

水煎五錢。

抵當湯 治太陰病六七日。表症仍在。脈微沉。反不結胸。其人發狂者。以熱在下

焦。少腹當滿。小便自利者。下血乃愈。所以然者。以太陽過經盡。而瘀熱在裏故

也。

水 蛭十枚 蟲 蟲翅十枚去 大黃一兩 桃 仁七枚

水煎五錢服。當下瘀血。不下再服。

絳雪丸 治傷寒發狂眼赤。二便血出。身如金色。兼治六七日狂躁發熱。

硝石一兩 丹砂一分

研細粟米飯丸。彈子大。砂糖冷水下一丸。服藥後便睡。移時汗出爲效。

傷寒剛痊

論曰。傷寒病發汗過多。因致痊。其狀令人搖頭發熱。頸項強急。惡寒。背反張。瘰癧口噤。謂之剛痊者。特以無汗而反惡寒故也。

葛根湯 治傷寒太陽病無汗。小便反少。氣上衝胸。口噤搖頭。欲作剛痊。

葛根四兩

白芍

麻黃去根節

甘草

桂心二兩

薑棗水煎。五錢熱服。取微汗。

大承氣湯 治傷寒剛痊。胸滿口噤。臥不着席。脚攣急。必齧齒。

大黃四兩

枳實一枚

紫朴五錢

水煎五錢去渣。入芒硝五分。二沸服。

羚羊升麻湯 治傷寒剛瘧。仰目壯熱。筋脈不舒。牙關緊急。不欲見食。

羚羊

升麻

白鮮皮

龍齒五錢

木通

百合

防風一分

石膏一兩

水煎五錢。入豉百粒。葱白五寸。

小續命湯 治傷寒剛瘧。無汗惡寒。口噤背強。

麻黃

桂心

甘草五錢

白芍

白朮

人參

川芎

附子

防己

防風半

薑水煎五錢。日三夜二。

傷寒柔木之瘧

論曰。柔瘧之狀。搖頭發熱。頸項強急。腰身反張。或瘦瘵口噤。與剛瘧同。然謂之柔瘧者。以其自汗不惡寒故也。瘧又謂之瘵者。蓋以瘵瘵一類。古人特以強直名之。

桂枝加葛根湯 治傷寒柔瘧。項背強几几。反汗出惡風。

桂枝二兩

葛根四兩

麻黃

白芍三兩

甘草二兩

薑棗水煎五錢。取汗。

桂朮湯 治傷寒柔瘧。手足厥冷筋急。汗不止。

桂心一兩

白朮

人參

附子三分

甘草

防風

乾薑五錢

水煎五錢。日二。

五味子湯 治柔瘧汗出。身體強直。手足多寒。

五味一

木香

附子

檳榔三兩

白朮

甘草

乾薑

桂心五錢

水煎五錢。日二。

柴胡飲 治柔瘧四肢逆。冷汗不止。腹中痛。筋脈急。

柴胡

赤茯苓三分

桂心

夏薑一分

檳榔煨

五味子鈔五

水煎五錢服。

傷寒壞病

論曰。傷寒太陽病三日。已發汗吐下溫針。仍不解者。多變爲壞病。又陽病轉入少陽。已吐下發汗少陽症罷。此爲壞症。知犯何逆。以法治之。此由傷寒病在諸經絡。發汗吐下。而病症不除。又感異氣。有寒暑燥溼風不同。病亦隨變。故謂之壞病。又有傷寒過經。再受邪熱。留蓄臟腑。病候多變者。及傷寒解後。虛羸少氣。餘症未除者。皆謂之壞病。

知母麻黃湯。治傷寒壞病差後。或十日二十日。終不惺惺。精神昏。語言亂。又無寒熱。醫作鬼祟。或作風病。多端治藥弗效。或朝夕潮熱頰赤。或似瘧。由發汗未盡。餘毒在心包絡間所致。

知母兩半

白芍

麻黃

甘草

片苓

桂心五錢

半

水煎五錢。半日內可相次三服取汗。未汗再服。若心煩不眠。欲飲水者。稍稍與之。令胃中和即愈。

黑奴丸 治壞病頭與骨肉俱疼。狂言妄語。醫所不治。

麻黃

片苓

甘草

芒硝

灶突墨一兩

豉炒一合

共末。蜜丸。彈子大。新汲水下一丸。考此丸與陽毒黑奴丸不同。

麥冬湯 治傷寒壞病。經久不差。潮熱不退。身體沉重。昏憤煩悶。

麥冬

赤茯苓

甘草

鼈甲醋炙

水煎三錢。入烏梅肉一枚。小麥五十粒。溫服。日二。

傷寒狐惑

論曰。狐惑之病。初得狀似傷寒。或因傷寒而變。皆蟲症也。蟲蝕其喉爲狐。使人聲啞。蟲蝕其下部爲惑。使人咽乾。其候皆默默。欲眠不得臥。起居不得安。惡飲食。面目乍赤乍白。乍黑是也。由傷寒病腹內熱。飲食少。肺胃空虛。而蟲爲之不安。故隨

食上下部而病。名狐惑也。

赤小豆當歸散 治傷寒變成狐惑。脈數。無熱微煩。默默欲臥。汗出。得之三四日。眼赤。得之七八日。目四眦黑。能食者。膿已成也。

赤小豆長一升

川歸一兩

共末。水煎三錢。溫服。日二。

黃芩湯 治傷寒不發汗。變成狐惑。脈數有熱微煩。二目赤。但欲眠睡。咽乾不能食。

片芩

射干一兩

甘草

竹茹

知母

前胡五錢

川連炒三

水煎五錢。日二。

黃連犀角湯 治病後瘡出下部。

川連五錢

犀角一兩

木香一分

烏梅七枚

水煎三錢。日二。

木通湯 治傷寒陰陽不和。變成狐惑。目赤如鳩。面色斑紋如錦文。

木通一兩

甘草

桂心

細辛五錢

吳茱萸洗兩

薑棗水煎五錢。葱白五寸。

雄黃導氣湯 治傷寒惑狐。下部蠱瘡。

雄黃研

青葙子

川連

苦參五錢

桃仁炒一

共末。生艾汁和如棗大。綿裹導下部。篇蓄汁更好。冬月無艾。蓄用根。

擦膈湯 治傷寒狐惑。病在上焦。

苦參一兩 甘草五錢

作一服。水煎五更服。良久即吐。

熏洗四皮湯 治狐惑攻下部。肛内生瘡。

槐白皮

柳白皮

桑白皮

桃白皮二兩

水煎四兩。熏洗下部。

檳榔丸 治未汗變狐惑。毒蝕肛門。癢不止。下膿血。

檳榔

丹

砂五錢

麝

香一錢

杏

仁四十九

共末。用飴糖和。如棗核大。先用椿根、槐白皮各二兩。水煎洗肛門。將藥內之。

雄黃熏方

治狐惑蟲食下部。肛外如蠶。痛癢不止。

雄

黃研五錢

用瓶一箇。口稍大者。入灰半瓶。灰上放火。將黃末燒之。候煙出。坐瓶口上熏之。夏。

傷寒百合

論曰。傷寒百合者。謂百脈一宗。悉致其病也。其狀欲食復不能食。常默默。欲得臥又不能臥。欲出行又不能行。食欲有時美。亦有時不美。如有寒。又如無寒。如有熱。又如無熱。口苦小便赤黃。得藥則吐利者是也。此由傷寒及大病後。臟腑俱虛。榮衛耗弱。不能平復。變成斯病。然以百脈一宗。悉致其病。又無復經絡。故其病症變異。治之各隨其症。

百合雞子湯 治傷寒病吐之後。

百合七枚 雞子黃一枚

水漬合一宿。更水煎去渣。入子黃攪服。

百合知母湯 治傷寒已經汗後。

百合七枚 知母一兩

水浸百合一宿。更水煎分二服。

百合滑石散 治傷寒變發熱。

百合一兩 滑石兩半

共末。空心飲下二錢。日二。

百合地黃湯 治傷寒不經汗吐下後。病形如初。

百合七枚 生地黃汁一鍾

水煮百合取汁。和生地汁溫服。中病勿更服。大便當如漆。

百合半夏湯 治傷寒病不差。不思食。欲成勞。

百合二錢 半夏 人參 赤茯苓

川連炒 知母一兩 生地兩半

薑水煎五錢。日二。

百合紫苑湯 治傷寒病似勞。形狀如瘧。

百合二兩

紫苑

柴胡

杏仁

白茯苓

半夏

甘草

薑水煎五錢。日二。

傷寒陰陽易

論曰。凡傷寒大病後。氣血未復。若房事太早。不特令病人勞復。因爾樂易。男病傳女。女病傳男。由轉易然。故名陰陽易。其狀身體重少氣。熱上衝胸。頭重不能舉。目昧。四肢拘急。若小腹急痛力弱。著牀不能轉側。舉動憑人。不急治則死。或經歲月漸至羸困亦死。

枳實湯 治傷寒勞復。陰陽易。

枳實

山梔一分

豉炒二

雄鼠糞炒十七

水煎二服。未效又服。

燒褌散 治傷寒陰陽易身腫氣少小腹急陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼目生花膝脛拘急。

女人中褌

取對媵戶者水洗燒灰病取男人者

水服方寸匕日三服小便利陰頭腫愈。

立效湯 治陰陽易身重小腹裏急陰頭微腫。

韭 白一把

雄鼠糞二枚炒

水煎一日服汗出愈。

萎蕤湯 治陰陽易氣衝心胸頭重不舉。

萎 蕤 一兩

木 香

桂 心 三分

荊芥穗 五錢

雄鼠糞 二枚炒

水煎五錢溫服日二。

二灰散 治傷寒陰陽易。

手足指甲 二寸大 片男病 用男病

褌 揩布 水洗一片男病 用水洗女病用男病

燒灰研末分三服酒下。

犀角湯 治病未平。復陰陽易。壯熱頭痛。鼻出血。

犀角

竹茹

丹參

葛根 一兩

石膏 三兩

水煎五錢。日二。

傷寒衄血

論曰。傷寒衄血者。由熱氣蘊甚。血溢妄行。蓋心生血。肝藏之。肺主氣。鼻則通之。心肝爲熱邪所傷。則血隨氣妄行。所以從鼻出也。人謂陽盛則衄者。蓋陽盛則熱盛。熱盛則宜衄。故傷寒太陽症衄血乃解。謂是故也。至於陰病。則不宜衄。蓋陰症自無熱。安得而衄。故少陰病但厥無汗。強發之必動其血。或從口鼻耳目出者。是謂下厥上竭。爲難治。

茅花湯 治傷寒衄血不止。

茅花

水煎濃汁。溫服。如無花。以根代之。

黃連散 治熱病鼻衄不止。或兼吐血。

川連

竹茹

伏龍肝三分

片苓一兩

山梔

甘草錢五

薑棗水煎五錢。入生地汁半合。亂髮灰五分。一沸食後服。

阿膠湯 治衄不止。此陽毒攻肺。

阿膠

片苓一分

葱白五寸

熟艾五錢

豉四升九

作二服。水煎溫服。入生地汁一合。

刺薊湯 治傷寒衄血吐血。心中堅硬。一身疼痛。四肢煩悶。

刺薊

麥冬

生地一兩

竹茹

紫蘇

白茯苓五錢

薑棗水煎五錢服。

黃土湯 治衄血去五臟熱毒。

黃土籠中

白芍

川歸

片苓

甘草 川芎三分 生地兩半 桂心一分

竹茹五錢

水煎五錢服。

髮灰散 血衄不止。

髮灰 麝香

同研極細。新汲水下一錢。又吹鼻中少許。

四生散 治衄血心胸煩悶。

生地汁三合 生藕汁二合 生薑汁半合

生刺薊汁一合

白藥子一分

五共微溫分二服。

化麻湯 治衄血不止。頭痛壯熱。

升麻 紫蘇 白芍一兩 青蒿

犀角 芒硝三分

水煎三錢。入生地汁一合。

地黃飲 治血衄不止。

懷生地黃汁二合

攪勻頓服即愈。

白一蜜三合

生地汁飲 治時疾壯熱頭疼。血衄不止。

生地汁

生藕汁

生薑汁

白生蜜各二

和勻分三服。微煎。食後臥服。

傷寒吐血

論曰。傷寒吐血者。熱在陽經。邪盛於表。應汗而不汗。熱毒入深。結於五臟。遂成瘀熱。熏蒸於上。焦血隨氣妄行。并入胸中。胃得血則滿悶。氣逆故爾吐血也。

麥冬湯 治傷寒頭疼。手足煩熱。吐血不止。

麥冬兩半

生地

片芩

甘草

吳藍

茅根

薺芩一兩

水煎五錢。入豉百粒。

黃連湯 治吐血不止。由心肺積熱。血得熱即妄行。

川連炒兩

荷葉微炒

熟艾葉五錢

側柏葉三分

水煎五錢。入生地汁一合。溫服。

紫河車散 治吐血煩躁。

紫河車三分

朴硝

甘草五錢

蛤粉一分

共末。新汲水和沙糖下二錢。日二夜一。

蜜汁方 治傷寒病後。餘毒不解。心臟熱極。吐血不止。

生藕汁

生地黃

惡實根汁

刺薊根汁各二合

生白蜜一合

和勻。頻頻溫服一二合。

傷寒瘀血

論曰。傷寒病在表。當汗不汗。邪無從出。熱結在裏。皆成瘀血。然太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂者。少腹硬滿。小便自利。下血乃愈。又陽明病。其人喜忘者。本有瘀

血。大便雖硬反易。其色必黑或赤。病人腹不滿。反自言其滿者。亦爲瘀血在裏。皆宜下之。待瘀血得下卽愈。診其脈沉結者。亦瘀血病也。

抵當湯。治傷寒陽明症喜忘者。必有蓄血。所以然者。本有瘀血。故令善忘。大便雖硬反易。其色必黑。

水蛭三枚 虵十枚

去去 桃仁

仁二十枚 黃一

水煎五錢。空心服。不下更服。

桃仁承氣湯。治太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下者愈。其外不解者。尙未可攻。當先解其外。外已解。但少腹急結者。乃可攻之。

桃仁二十枚

大黃一兩

桂枝

甘草

芒硝五錢

水煎五錢。去渣入硝再沸。分三服。

芍藥地黃湯。治傷寒病溫。應發汗而不發。內有蓄血及衄血。吐血不盡。面色黃。大便黑。

白芍三分

地黃

丹皮二兩

犀角一兩

水煎三錢。入生地汁三合。再沸服。日二。如發狂。加黃芩一兩。

傷寒口舌生瘡

論曰。傷寒口舌生瘡。此脾經受熱。熏於口舌。又或因冬時發汗吐利後。重亡津液。

表裏俱虛。熱勢不已。毒氣攻於上焦。致口中糜爛生瘡。

升麻湯 治口舌瘡赤爛。

升麻一兩 麥冬三分 丹皮 甘草五錢

水煎五錢。入竹葉二十一片。大棗二枚。溫服。日二。

苦酒湯 治少陰病咽中生瘡。語聲不出。

半夏十四 鷄子一枚去黃留白

又以半夏入苦酒內。以鷄殼放剪刀環中。安火上煮二沸。少少含咽。

羚羊角湯 治病後餘熱上衝。口舌生瘡。

羚羊 射干 麥冬三兩 白芍

木通 蘆根三兩 升麻兩半

水煎五錢。食後服。

傷寒舌腫脹

論曰。傷寒舌腫脹者。病在三陰也。太陰之脈連舌本。散舌下。少陰之脈循喉嚨。挾舌本。厥陰之脈循喉嚨之後。又手少陰心經。其氣通於舌。凡此經絡爲風熱所乘。隨脈至舌。熱氣留於血。血氣壅澀。故令舌腫脹。診其脈數急者。是其候也。

升麻湯 治熱病喉嚨閉塞。連舌根腫痛。熱氣聚於胸中。

升麻

麥冬

石膏 一兩

竹茹

木通

黃柏 五錢

朴硝 二兩

玄參

前胡 三分

水煎五錢服。

犀角湯 治脾肺虛熱。毒氣壅塞喉咽。連舌根腫痛。

犀角

川歸

白芷 一兩

升麻

甘草

杏仁

射干 五錢

水煎五錢。日二。

治心脾熱舌腫痛。

生地汁半斤

生白蜜八兩

慢水煎稠。舍化半匙。日二三。

傷寒咽喉痛

論曰。傷寒咽喉痛者。少陰受邪。邪毒壅遏於上焦。微則咽喉痛。甚則痛而生瘡。又傷寒過經。邪熱內盛。熏於上焦。亦令人咽喉痛。各隨症治。

甘草湯 治傷寒少陰病二三日咽喉痛。

炙甘草二兩

水煎。空心分作四服。

桔梗湯 前服甘草湯不差者服之。

桔梗鈔五

炙甘草一兩

水煎分二服。

苦酒湯 治少陰咽痛生瘡。不能言語。聲不出。

半夏洗七次 雞子一枚

將雞子去黃用白和苦酒。半夏復入蛋中。安火上令三四沸。少少嚥之。不差再服。

半夏湯 治少陰咽中痛。

半夏 桂心 甘草一兩

水煎放冷。少少咽之。

地黃煎 治時氣肺熱咳嗽咽痛。

地黃汁半斤 白芍 玄參

貝母三分 麥冬 柴胡 升麻

白蜜五兩

水五大鍾煎。去渣。入蜜汁慢煎。日三。

傷寒毒攻手足

論曰。傷寒毒攻手足者。熱勝則腫也。熱毒之氣。客於腑臟。邪結在裏。循經而出。注於四肢。故令人手足煩熱。赤腫疼痛也。

連翹湯 治毒氣攻手足。腫滿疼痛。心神煩悶。

連翹

麥冬

犀角

片苓

枳殼

川歸一兩

大黃炒

木香

防風

羌活

惡實五錢

麝香一錢

共末。水煎服。

又方 治毒氣攻手足。虛腫疼痛欲死。

蒼耳子五把

搗爛絞取汁。漬洗手足。

鉛丹膏 治毒氣攻衝。手足虛腫。

鉛丹五兩

明松香

乳香煨去

黃蠟一兩

麝香一分

先將松香煉化。次入黃蠟。化去渣。入鉛丹乳末。慢煎成膏。入麝香攪勻候冷。用

絹攤貼腫處。凡一切腫毒。并宜貼此膏。

傷寒後夾勞

論曰。傷寒差後。復夾勞者。由病人先有風疹。因汗下之後。榮衛虛弱。氣不充足。形體羸瘦。時有盜汗。寒熱不常。喘嗽痰唾。鼻中臭氣。飲食不消。肢體痠痛。面黃頰赤。不即治之。則致危殆。

人參湯 治夾勞骨節疼痛。渾身壯熱。氣力虛乏。

人參 白茯苓 白芍

桔梗 大茴香 紫苑一兩 柴胡

陳皮 蒼朮 羌活二兩 甘草兩半

秦艽三分

共粗末。薑棗水煎二錢。不拘時溫服。

黃耆鼈甲湯 治傷寒病差後夾勞。形體羸瘠。或寒或熱。病如瘧狀。四肢煩疼等症。

鼈甲

黃耆一兩

白朮

甘草

陳皮三分

知母

桑白皮五錢

葱白薑水煎五錢。食後服。

柴胡湯 治夾勞五心煩熱。背膊痠痛。手足無力。不能飲食。

柴胡

黃耆

鼈甲

赤茯苓一兩

秦艽

枳殼去白

地骨皮

片苓

葛根五錢

人參

甘草三分

薑水煎三錢服。

人參鼈甲湯 治傷寒差後夾勞。寒熱往來。進退不時。頭疼體痛。口苦咽乾。不思飲食。

飲食。

人參

鼈甲

附子

柴胡一兩

白芍

知母

烏梅肉炒

五味

桃仁炒

桂心

陳皮

羌活

秦艽

川歸五錢

薑水煎三錢溫服。

傷寒後勞復

論曰。內經謂熱病少愈。食肉則復。多食則遺。此其禁也。蓋傷寒病新差後。脾胃尙虛。氣血猶弱。穀氣未復。津液未通。若將養失宜。輒嗜肉食。則脾虛不能消釋。或因勞形於事。皆令邪熱乘虛還入經絡。復成大病。故名勞復。當隨其症候。或表或裏。依法治之。

知母湯 治新差後勞動用力。或飢食過傷勞復。

知母

鼈甲

柴胡 兩半

麻黃

葛根 三分

雄鼠糞七枚 炒焦五

水煎五錢。入豉百粒。葱白五寸。食後溫服。喫葱粥取汁。

石膏黃芩散 治食肉勞復如初。壯熱頭痛。心煩欲吐。小便赤黃。

石膏 一兩

片芩

山梔

人參

川連

知母

葛根 五錢

共末。葱白竹葉湯下二錢。空心服。日二。以差爲度。

知母湯 治勞復小腹硬。卵縮疼痛欲死。

知母 柴胡 麥冬 甘草半分

葱 白三莖

水浸一宿。煎至小半。入童便二盞。豉心半合。再煎五六沸。入地黃汁二合。更煎微沸。空心頓服。微利卽差。

傷寒後骨節煩疼

論曰。傷寒後骨節煩疼者。由津液不足。血脈皆虛。餘毒客於經絡。榮衛澀滯於骨節之間。故令骨節煩疼。診三部脈細而遲澀者。乃其候也。

柴胡飲 治傷寒病後。骨節疼痛。咳嗽不能食。口舌乾燥。乍寒乍熱。唇口生瘡。

柴胡 升麻 人參 白芍

茯苓 百合 地骨皮 片苓

麥冬 犀角五錢 鱉甲 石膏一兩

甘草一分

水煎五錢。入竹葉、生薑。食後服。日二。

百合湯 治差後四肢煩熱。骨節疼痛。

百合

知母

鱉甲

柴胡

葛根

桑白皮一兩

水煎五錢。入生地汁一合。食後服。日二。

羌活湯 治傷寒病差後。下焦風虛。骨髓痠痛。腰脚頑痺不仁。不能久立。日漸消

瘦。

羌活

防風

丹參

白芍

棗仁

牛膝

五加皮

玄參

木通

川歸

檳榔

麻黃

獨活五錢

黃耆

桂心三分

薑水煎五錢。空心服。日二。

傷寒後虛煩

論曰。傷寒病後煩躁者。有虛煩。有穀煩。陽氣偏多。謂之虛煩。病差後食穀太早。新虛不勝穀氣。胃內蒸熱。謂之穀煩。若陰陽和調。則虛煩自已。損其穀食。則穀煩者差。

竹葉湯 治傷寒後虛煩。狀似傷寒病。但身不疼痛。不惡寒。內外皆不可攻者。

淡竹葉 半把

石膏 四兩

人參

甘草 五錢

麥冬 二兩

半夏 薑汁製

生薑水煎三錢。入粳米百餘粒。溫服。

梔子豉湯 治傷寒汗後。虛煩不得眠。劇者必反覆顛倒。心中懊懣。又治傷寒

發汗。若下之。虛煩。心中窒痛。又治下利後更煩。按之心下軟。為虛煩。

山梔

封四散

豉 四合

水煎三錢。不拘時服。日二。

五苓散 治傷寒中風。發熱六七日不解。心煩躁悶。有表裏症。具渴欲飲水。水入

內即吐。名曰水逆。

猪苓

赤茯苓

白朮 三分

桂心 五錢

澤瀉一兩

共末。湯下二錢。

猪苓湯 治少陰病。下利六七日。咳而渴。嘔而煩。不得眠。

猪苓

赤茯苓

阿膠

滑石

澤瀉一兩

水煎三錢。溫服。

麥冬湯 治傷寒病後。餘熱不解。或寒或熱。四肢瘦弱。虛乏。飲食不入。胸中煩滿。

悶虛躁等症。

麥冬

赤茯苓

人參

白朮

黃耆

陳皮

地骨皮一兩

甘草

桂心五錢

水煎三錢。溫服。

六神湯 治病後虛煩不安。

人參

黃耆

白茯苓

山藥

百合 防風二兩

薑棗水煎五錢。不拘時服。日二。

傷寒後盜汗

論曰。汗者心之液。傷寒差後。眠寢有汗者。由心氣偏虛。榮衛不足。腠疎表弱。因寢寐之間汗出。故名盜汗。久不已。日漸羸瘦。肢體痿弱。

人參湯 治傷寒病後。體氣虛弱。夜臥汗出不止。頭旋惡心。日漸羸瘦。不思飲食。

人參 半夏

黃耆 麻黃根一兩

牡蠣火煨童便碎

防風三兩

生薑水煎五錢。溫服。

杜仲湯 治病後虛弱。夜多盜汗。

杜仲二兩 人參

甘草三分 白朮

黃耆 白茯苓

白芍藥 茯苓一兩

牡蠣 麻黃根兩半

水煎五錢。溫服。

白朮散 治盜汗不止。

白朮 二兩陳
土炒

為末。芎藭湯下二錢。不計時服。

粉汗方 治病後盜汗。腠理開疎。

牡蠣 燒紅童便
碎入酒

共末。寢寐中有汗。使人傳之。

麻黃根 水洗焙
一兩

傷寒後驚悸

論曰。傷寒後心氣不足。風邪乘之。則令人精神不寧。恍惚驚悸。由於憂念思慮。致心氣虛。邪氣內乘。故神氣不得泰定而生驚悸也。

前胡湯 治伏熱在心。怔忡驚悸。

前胡 茯苓 人參 一兩 遠志 兩半
丹砂 甘草 一分

薑棗水煎服。

人參扶神湯 治心虛驚悸恍惚不寧。

人參

扶神一兩

陳皮三分

杏仁去皮尖

生薑水煎三錢服。

扶神丸 治心力勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸吸短氣補虛。

扶神

麥冬

熟地一兩

人參

丹皮

黃耆三分

澤瀉

甘草

牛膝

桂心五錢

共末蜜丸桐子大。食前酒下二十九。

傷寒後失音不語

論曰。傷寒後失音不語。由風寒客於會厭。會厭爲音聲之戶。邪氣傷之。故卒然無音。又肺主聲而通於氣。人之五臟有五聲。皆稟氣而通之。若邪客於肺。則氣道不調。亦令人語無聲音。當隨其輕重治之。

杏仁煎 治暴嗽失音語不出。

杏仁炒研 百合

木通

五味子

貝母

紫苑

桑白皮一兩

薑汁五錢

白蜜

沙糖四兩

水五大鍾煎六味去渣。下杏仁、薑汁、蜜糖、沙糖微煎。如錫樣收貯。水煎半匙。不拘時服。

豆竹湯 治失音不語。

黑豆半升

青竹去節如算大四寸洗淨

用水五大碗。同豆煮熟為度。溫三服。

羚羊角散 治失音不知人。口眼不正。舌強。

羚羊角一兩

麻黃去根

石膏五錢

片芩

防風

麥冬

升麻

乾葛三分

水煎五錢。溫服。日二。

二瀝湯 治失音不語。

竹 瀝用綠竹去節
火燒取瀝

荆 瀝同上

梨 汁二合

陳醬汁半合

各濾過和勻分四服早晚用。

桂心湯 治邪氣傷肺失音不語。

桂 心二兩 石菖蒲一兩

水煎三錢溫服取微汗未退再服。

芥子酒熨方 治肺中風冷失音不語。

白芥子五合洗
乾研

用白酒三鍾煮令半熟以布帶熱包裹令人熨頭項周遍冷則易之。

傷寒後咽喉閉塞不通

論曰咽喉閉塞不通者脾肺壅滯風毒蘊積內搏經絡上攻咽喉也足太陰之脈上膈夾咽而喉則肺氣之所通故脾肺壅熱則咽喉閉塞凡傷寒後餘毒未盡上攻咽喉故亦令閉塞不通。

黃芩湯 治咽喉瘡痛。口瘡煩躁。頭痛毒氣上攻。

黃芩 大青 山梔 甘草五錢

升麻 麥冬一兩

水煎三錢。入竹葉。食後服。日三。

升麻湯 同治

升麻 木通一兩 白芍 射干

羚羊角五錢 蘆根一握

水煎三錢。食後溫服。

葛根湯 治傷寒後咽喉疼痛。

葛根 竹茹一兩 倉粳米一合

生薑大棗。水煎三錢。食後服。

貼喉膏 治喉痛舌強。邪熱上攻。

白蜜半斤 甘草二兩 猪脂四兩

以脂蜜煉化。入甘草煎赤黑色。濾去渣。收貯。頻取半匙含化。

射干煎 治咽喉疼痛。閉塞不通。

射干研末 猪板脂一斤

先煎脂化盡。下干熬黑色。濾過再熬。成煎收貯。綿裹。彈子大含化。

又方 熱病後咽喉閉塞不通。毒氣上攻腫痛。

黃明膠

如掌大一片。用水煮軟。貼頸外差。

傷寒後變成瘧

論曰。傷寒後變成瘧者。因病差後。外邪未散。其臟尙虛。因爲勞事。致二氣交爭。陰勝則振寒。陽勝則發熱。陰陽更勝。則往來寒熱。休作有時也。一日再發者。得汗必解。若傷寒八九日得之。熱多寒少。其人不嘔。清便自調者。欲自愈也。或陽明症。煩熱汗出。日晡所發熱者。脈浮宜解表。脈實宜攻裏。又婦人熱入血室。發熱而更作寒者。當詳辨之。

升麻前胡湯 治變成瘧。寒熱躁渴。

升麻 前胡兩半 白芍 知母三分
木通 朴硝 烏梅肉 山梔五錢

甘草兩一

生薑、大棗。水煎五錢。去滓。入生地汁二合。煎二三沸。食後服。日二。
黃芩、鼈甲湯。治傷寒後變成勞瘵。久不差。

片芩

柴胡

山梔

烏梅肉錢五

鼈甲醋炙

甘草一分

生薑、大棗、柳枝尖七枚。大豉半合。藥五錢。入童便同浸一宿。次早五更煎。減半去滓。入生地汁一合。沸服。

茯苓飲。治寒熱不退。變成瘧。

赤茯苓

鼈甲

地骨皮二兩

知母

柴胡兩半

枳殼去白炒

水煎五錢。去滓。入生地汁一合。再沸。食後良久服。如人行五六里。再服。

傷寒後腳氣

論曰。傷寒後脚氣者。緣其人腎經本虛。風溼毒氣乘虛客入腎。腎主腰脚。故邪氣沉滯。則脚弱而痛。雖傷寒已差。邪熱未盡。風溼毒氣與熱相搏。上衝於心肺。其狀令人心胸煩滿。上氣息急。甚者致死。診左尺脈洪而數者。脚氣也。服藥後。脈沉而緩者愈。

羚羊角湯 治脚氣上衝。心膈煩悶。

羚羊角

白 茯苓一兩

片 芩

半 夏薑汁

陳皮去白

吳茱萸洗炒

檳榔五錢

生薑水煎五錢。空心服。

紫蘇木香湯 治脚氣衝心。心神煩亂。嘔逆減食。脚膝痠疼。

紫蘇

白芍

沉香

木通一兩

木香

赤茯苓五錢

吳茱萸洗炒

檳榔

陳皮

薑水煎三錢。食前服。

赤小豆湯 治脚膝腫滿氣急。大便秘澀。

赤小豆半合

桑白皮

檳榔五錢

紫蘇一兩

水五鍾。薑一分。煎減半。空心分二服。

吳茱萸散 治脚氣心腹妨悶脹痛。坐臥不安。

吳茱萸洗炒

木香

川歸

檳榔

郁李仁炒

水煎三錢。空心溫服。日二。

傷寒後利下膿血

論曰。傷寒後變成膿血利者。因本病差後。熱毒未散。乘虛客於腸胃之間。與津液相搏。故下利膿血。毒氣盛則臟熱而痛。兼以溼氣加之。則所下如魚腦。或如爛肉雞鴨肝之屬。又傷寒未解。陰病下利便膿血者。亦溼熱相搏故也。

地榆湯 治熱毒不解。日晚壯熱。腹痛下利膿血。

地榆

川連

片苓

犀角

茜根一兩

山梔五錢

水煎三錢。入薤白二寸。不拘時服。

桃花湯 治傷寒少陰病。二三日至四五日。腹痛。小便不利。下利膿血不止。

赤石脂四兩

乾薑炒一分

糯米二合

水煎五錢。溫三服。得愈止。

黃連湯 治熱病差後。下利膿血不止。

川連

阿膠一兩

片苓三分

梔子一分

水煎三錢。空心服。日二。

赤石脂湯 治下利膿血。腹痛不止。

赤石脂

黑乾薑

附子

川歸五錢

白芍一兩

水煎五錢。空心溫服。日二。

傷寒後膿瘡

論曰。傷寒後膿瘡者。因腹中有熱。其人少食。胃中空虛。三蟲須食。或食五臟。或食

下部。隱僻有瘡。故名蠹瘡。其候齒無色。舌上盡白。四肢沉重。忽忽喜眠。甚則脣裏有瘡。其瘡在上脣裏。如粟米。心內懊懣痛者。此蟲食五臟之症。若下脣裏有瘡。其人喜眠者。此蟲食下部之症。若肛爛見五臟者死。故名曰蠹瘡。

桃仁湯 治傷寒後蠹瘡。

桃 仁去皮 槐角子炒 熟艾一兩 大棗十五

水煎分三服。

槐角子丸 治溼蠹蟲食下部。心中煩懊。

槐角子炒 苦參一兩 乾漆炒三 木香

檳榔一兩 桃仁去皮尖 熊膽五錢

共末。蜜丸。桐子大。空心荆芥湯下二三十丸。

羚羊角散 治心中煩躁。脣口生瘡。蟲食下部。

羚羊角 黃耆 玄參 柴胡三分

草龍膽 升麻五錢

共末。用槐角子湯。空心下二錢。日二。

雄黃散 治蠱蟲。

雄黃醋研一分 川連

苦參

青箱子兩半

桃仁去皮尖炒三分

共末。空心飲下一錢五分。蠱在下部。以綿裹少許內之。

桃皮湯 治蟲食下部。

桃白皮 榧實 槐角子一兩

石榴根皮五錢

大棗水煎五錢。空心溫服。日二。以差為度。

天行下部蠱瘡

烏梅肉五錢 獨蒜一枚 屋塵三合

用苦酒一升。於銅器中共煎。候可丸。即丸如棗核大。內下部中少頃。易之差。傷寒不究心仲景。則變證不知。雜證不識。今總錄中變證。備載仲景祖方。一無遺漏。按方療治。神明在人矣。本家藏發明仲景傷寒書。自郭白雲。龐安常。成無己。後約五十餘家。節菴。非仲景衣鉢。不與焉。行將剗剗。傷寒集註。公諸宇內。則學有淵源。方有祖法。為醫家大宗匠。此余之所厚望於來學也。

康熙辛酉花朝靜觀居士程林識於維揚三一齋中

辟瘟疫令不相傳染

論曰。凡時行瘟疫。皆四時不正之氣。感而病者。長少大率相似。此病苟不辟。多致傳染。宜方術預防。

敗龜板湯 治辟時行瘟疫。令不相傳染。

敗龜板五錢

山梔

大青

白芍

羚羊角

馬牙硝

紫苑

前胡一兩

水煎五錢。空心溫服。日二。

蒼耳子散 宜預先服之。辟瘴疫時氣。

蒼耳子半日乾

爲末。空心并華水下二錢。

又方

蕪 青水不拘多少

搗取汁。立春後值庚子日。合家大小宜溫服一二鍾。則永除瘟疫之患。
塗傳方 辟瘟疫時氣。

雄黃一兩

丹砂

鬼白

石菖蒲一兩

共末。井水調和。塗五心及額上鼻中耳門。辟瘟甚驗。

調中丸 治四時疫癘非時之氣。

大黃兩五

麻仁研一

枳殼炒

白茯苓

白芍藥

前胡

片芩一兩

共末。蜜丸。梧桐子大。空心飲下二十九。微利臥服佳。



3.081

6

4(1)2

聖濟總錄纂要

三

403.081
105
10003

中國醫學大成第四集

方劑類

聖濟總錄纂要 三

上海大東書局印行



3 0472 8424 9

254628

聖濟總錄纂要

清

新安

程

林雲來纂輯

鄞縣

曹炳章

赤電校點

卷五

瘧疾門

諸瘧統論

論曰。夏傷於暑。秋成瘧瘧。該於夏而作也。方夏之時。陰居於內。暑雖入之。勢不能動。候得秋氣。陽爲之動。變汗出遇風。乃成此疾。故名曰瘧瘧。皆生於風。蓄作有時。其氣陰陽上下交爭。虛實更作。陰陽相移也。陽併於陰。則陰實而陽虛。陽明虛則寒慄鼓頷。巨陽虛則腰背頭項痛。三陽俱虛。則陰氣勝。陰氣勝則骨寒而痛。寒生於內。故中外皆寒。陽盛則外熱。陰虛則內熱。內外皆熱。則喘而渴。故欲冷飲。因傷

於暑熱氣盛藏於皮膚之內。腸胃之外。此榮氣之所舍也。令人汗空疎腠理開。因得秋氣。汗出遇風。及得之於浴。水氣舍於皮膚之內。與衛氣並居。衛氣者。晝行於陽。夜行於陰。此氣得陽而外出。得陰而內薄。內外相薄。是以日作。日作者。氣之所舍深也。作之早晏者。隨風腑日下一節也。是以或先寒後熱。或先熱後寒。或但熱無寒。或本於痰。或本於瘴癘。或本於鬼神。或本於邪氣。大概外傳經絡。內入五臟。症既不同。治法亦異。凡治瘧者。不辨陰陽虛實。概以吐藥投之。有非痰實而真氣受斃者。固多。其內經論五臟諸經之瘧。本以刺法。補瀉其寒熱先後。與夫正發早晏。又皆不同。明指邪氣所傳。不可一概而論。今備載諸症本末。參以治之輕重。要在隨症而施。庶幾乎無一曲之蔽也。

寒瘧

論曰。寒瘧之狀。內經謂先寒而後熱。病以時作是也。蓋傷暑汗出。腠理開發。因遇夏氣。淒滄之水寒。其氣藏於皮膚腠理之中。秋傷於風。則病成矣。其症先起於毫毛。伸欠乃作。寒慄鼓頷。腰脊俱疼。寒去則內外皆熱。頭痛飲冷是也。

檳榔湯 治寒瘧神效。

檳榔

常山

桂心

陳皮去白

甘草炙一兩

酒水合煎三錢。未發時先服。

鼈甲常山酒 治瘧先寒戰。解即壯熱。

鼈甲醋炙一分

淡竹葉一兩

甘草

常山三分

酒半鍾。浸藥一宿。次早加水煎。未發時溫服。得吐為效。

蜀漆散 治寒瘧。

蜀漆水洗去

雲母火煨一夜

龍骨一兩

共末。未發時漿下五分。

烏梅丸 治寒瘧不止。

烏梅肉炒

桃仁去皮

常山

豉炒三

升麻

肉蓯蓉酒浸

人參

甘草炙

桂心一兩

共末。蜜杵丸。桐子大。空心酒下二十九丸。至三十丸。

虎骨丸 治一切寒瘧。無問遠近。

虎骨酥油

人參

甘草

桂心

烏梅肉錢五

桃仁去皮

肉蓯蓉

常山

升麻三分

附子五錢

麝香研一

豉炒一

共末蜜丸。桐子大。未發時飲下三十丸。

二薑散 治寒瘧不差。

黑乾薑

高良薑一兩

同炒黑為末。空心酒下一錢。日三。

寒瘧塗方

鼈甲醋炙

烏賊魚骨

附子

常山

炙甘草一兩

酒煎五錢。次日以酒塗手足并背上。如不發即止。發時飲此酒一杯。

又方

附 子生肌

爲末。用酒和塗病人背心上佳。

溫瘧

論曰。溫瘧之狀。內經所謂先傷於風。後傷於寒。其症則先熱後寒。病以時作是也。蓋風爲陽氣。寒爲陰氣。風氣大勝。故先熱而後寒。得之冬中。風寒氣藏於腎內。至骨髓。至春陽氣大發。邪氣不能自出。至夏大暑。腦髓燥。肌肉消。腠理發洩。或有所用力。邪氣與汗俱出。故氣從內之外。其法宜先治其陽。後治其陰。則瘧疾自除。

蘆根湯 治初壯熱。後寒戰。骨節痠疼。口乾煩渴。

蘆根

石膏 膏一兩

麥冬

升麻

葛根 三分

山梔 五錢

水煎五錢。入竹葉十片。未發前連三服。

知母湯 治瘧骨節疼痛。時嘔。朝發暮解。暮發朝解。

知母 二分

甘草 一兩

石膏 三兩

桂心 五錢

粳米一合

水煎五錢。入米一撮。候未熟。未發時先服。

常山飲 治溫瘧壯熱微寒。

常山如鷄骨者五錢 淡竹葉一把 小麥一合

水浸一宿。次早煎。未發時空心溫服。老年久病之人。及虛弱者。煎三錢服。

寒熱往來瘧

論曰。陰陽相勝而寒熱互作者。以邪氣相并也。故氣并於陰則爲寒。氣并於陽則爲熱。寒則振慄鼓頷。以陰實陽虛故也。熱則渴而飲冷。以陰衰陽勝故也。

柴胡桂枝湯 治瘧寒熱往來。
柴胡四兩 桂枝 人參 片苓

白芍兩半 甘草 半夏一兩

薑棗水煎六錢溫服。日二。

人參湯 治寒熱瘧時作。面色黃。

人參

常山五錢

甘草

陳皮去白

水煎五錢。入茶末燈心去滓。入酒半鍾。未發得先服。取吐。如未吐再服。以痰盡爲度。

鼈甲大黃丸 治瘧寒熱往來。久不差。

鼈甲

大黃生

附子

人參

甘草

常山

蜀漆

白薇一兩

共末。蜜丸桐子大。竹葉湯平旦服十五丸。良久又服。

瘧瘧

論曰。瘧瘧之狀。內經所謂但熱不寒。陰氣先絕。陽氣獨發。少氣煩冤。手足熱而欲嘔是也。得之邪熱留於身中。厥逆上衝。氣實而不外洩。因有所用力。腠理開疎。風寒客於皮膚之內。分肉之間而發。發則陽氣盛不及於陰。故但熱不寒。氣內藏於心。外舍於分肉之間。令人消燂肌肉。名曰瘧瘧。以單陽無陰故也。

白虎加桂湯 治瘧疾陰氣孤絕。陽氣獨發。脈微少。氣煩冤。手足熱。欲嘔。但熱而

不寒。邪氣內藏於心。外舍於分肉之間。令人消燂肌肉。

石膏研一兩 知母鹽酒炒六錢 甘草蜜炙二兩 粳米炒半

用新汲水一升。煮藥五錢。入粳米一撮。以米爛為度。去滓入桂末三錢。再煎取四合。作一服。稍熱服。取汗。先寒發熱。汗出愈。

豉心湯 治瘧瘧但熱不寒。

豉心一合 雄鼠屎炒二 童便半升 黑山梔三分

柴胡 鼈甲一分 甘草五錢 烏梅肉炒七枚

生地汁二合 生薑汁一分 桃枝心 柳枝心各一

除鼠糞。地薑汁。小便。將藥入小便浸一宿於星月下。次早煎去滓。入鼠屎。地薑汁。煎分三服。一日用。

石膏湯 治瘧瘧熱甚不差。

石膏研二 白粳米五十 常山三分

水煎五錢。入竹葉二十七片。空心欲發與正發時各一服。靜臥勿與人語。俟過發時。再洗手面飲食。七日內禁房事及酒麵熱物。久瘧不過二劑。

車前草湯 治瘰癧壯熱不止。渴欲飲水。

車前草

常山

生甘草

升麻

大豉炒五

粳米半合

水浸五錢。於星月下露一宿。上橫刀一把。次早五更煎。空心溫分二服。良久卽吐。吐定以漿粥止之。

常山飲 治瘰癧但熱不寒。煩渴不止。

常山

生甘草

烏梅肉炒

青蒿五錢

竹葉二片

以童便白酒各一大鍾微煎。露星月下一夜。上橫刀一把。次早空心溫服。及當發時各一服。以差爲度。

間日瘧

論曰。間日瘧者。邪氣著於陰。不得與陽氣俱出也。衛氣晝行於陽。邪氣不得出。故必再會而後發。是以間日乃作。

醇醪湯 治間日瘧。

大黃炒三 常山 甘草炙兩

水煎三錢。未發先服。

常山酒 同治。

常山一兩 蒜獨頭者 糯米 黑豆百粒

共粗搗。以白酒一升。浸上件露星月下一宿。上橫刀一口。次早煎。未發時。三分

飲一分。如未吐。更服一分。得吐差。

糯米煑散 同治。

糯米九粒 常山 淡竹葉 烏梅肉炒

炙甘草五錢 石膏二兩

共末。水煎五錢。未發時先服。

神聖丸 治間日瘧。先寒後熱。

黑豆小者 白朮細研 大棗三枚 飯上蒸去皮核

共研極細。須於五月五日。或七月七日修合。丸如豆大。丹砂為衣。陰乾。冷茶清

下三丸。忌食熱物一伏時。合丸時忌女僧、尼姑、鷄、犬。

痰瘧

論曰。痰瘧之狀。胸中不利。頭痛振寒。怵慄而不能食。食即嘔吐。寒去則內外皆熱。更作心下支滿。痰積胸中。氣逆煩嘔。故謂之痰瘧。

石膏飲 治一切痰瘧。

石 膏 三兩

常 山 二兩

淡竹葉 三兩

生甘草

烏梅肉 二兩

粳 米 半合

水煎五錢。空心溫服。吐痰差。如熱甚。加大黃一兩。

犀角散 治痰瘧嘔吐。

犀 角

升 麻

玄 參

常 山 五錢

細 辛

甘 草 生

松 羅

山 梔 一分

水煎五錢。空心徐徐溫服。取吐痰涎效。

痰瘧

論曰。瘧瘧者。以瘧發該時。或日作。或間日作也。夫衛氣流行。合於晝夜陰陽。邪氣內舍於榮。隨衛氣以出入。而應於風府。其作之早晏。皆以時發。寒溫瘧瘧。動作亥時。故內經統謂之瘧瘧。其狀伸欠。乃作。寒慄鼓頷。腰脊痛。寒去則內外皆熱。頭痛如破。渴欲冷飲。

麻黃丸 瘧瘧發作有時。

麻黃去根節 常山 甘草 知母

大黃生五

共末。蜜杵丸。小豆大。未發前空心飲下五七丸。臨發再下。

鼈甲漬酒 治瘧瘧以時發。

鼈甲丸助者 附子 甘草一兩 常山二兩

烏賊魚骨去甲

酒三鍾。漬藥五錢。明早先以酒塗五心。次溫飲一二鍾。

常山酒 治瘧瘧先寒戰。後壯熱。日發及間日作者。

常山 淡竹葉一兩 鼈甲醋炙一兩 甘草三分

共粗搗。酒浸五錢。於星月下露一宿。次早水煎。未發時先溫服。取吐效。
知母丸 治一切瘧。

知母

烏梅肉 兩半

常山

肉蓯蓉

豉 兩二

炙甘草

人參

桂 心 兩半

共末。蜜丸。桐子大。酒下二十丸。

扼虎膏 治痰瘧。

胭脂

阿 魏 許同大短

入大蒜肉研和爲膏。用大核桃一枚。劈開去仁。取一片。以藥填核內。發時將藥核覆在手虎口上。男左女右。令藥着肉。以帛縛定。過宿乃去。

勞瘧瘧

論曰。勞瘧者。以久瘧不差。氣血俱虛。病雖間歇。勞動即發。故名曰勞瘧。蓋邪氣日深。則氣血愈耗。表裏既虛。故令人食減肌瘦。色悴力劣。而寒熱如故也。治宜補養氣血。

柴胡湯 治勞瘧經久不差。

柴胡一兩 人參 黃耆 片苓

甘草 括蕪根五錢

薑棗水煎五錢。未發時先服。日二。

祛勞湯 治瘧經年不差。寒熱痿瘦。

鼈甲 柴胡 常山 知母

甘草 青蒿 枳殼炒 桂心一兩

木香五錢

薑棗水煎三錢。入柳枝心七段。葱白三寸煎。空心未發先溫服。已發又服。柴胡枳殼湯 治勞瘧經久不差。燼燼發熱。骨節疼痛。不下食。小便赤澀。日漸消

瘦。

柴胡 枳殼 升麻 麥冬

鼈甲 甘草 桃仁一兩

水煎三錢。未發先服。日二。

常山丸 治積勞寒熱。

常山

知母

蜀漆葉

白薇

炙甘草

烏梅肉炒

麥冬

升麻

地骨皮三分

鼈甲

萎蕤玉錢

大豉合炒一

石膏一兩

共末。蜜丸。小豆大。空心飲下十九。未發前再服。加丸數。以差為度。

烏梅丸 治積年瘧不差。顏色羸瘦無力。

烏梅肉炒

人參

桂心

炙甘草

升麻五錢

桃仁去皮炒

肉蓯蓉

常山三分

豉微炒一分

共末。蜜杵丸。桐子大。空心飲下二十九。未發前服三十丸。

牛膝飲 治瘧經久不差。

牛膝生一兩

水煎空心分二服。

常山湯 治瘧經年不差。

常山 知母

鼈甲

甘草

柴胡 青蒿

枳殼炒

桂心一兩

桃枝心 柳枝心各一

水煎五錢。入葱白、薤白各三寸。空心溫服。日二。

烏梅五補丸 治瘧經年不差。狀如勞疾。

烏梅肉 黃耆 桂心

肉蓯蓉一兩

柴胡 桃仁去皮

赤茯苓

人參

升麻 川歸酒洗

常山

懷生地一兩

甘草炙 麝香五錢

共末。蜜杵丸小豆大。空心酒下二十九。加至三十丸。

二物湯 治久瘧。食少肌瘦。

童子小便半升 白蜜一兩

同入磁瓶內煎數沸。分三服。

久瘧

論曰。久瘧者。瘧疾經久不差。發汗吐下過甚。真氣虛耗。邪氣深沉。以內搏。衛氣不應。故積歲月而難治。雖有虛痞不可攻。治當先其發時。用湯液以發汗。蓋浸漬熏蒸表。邪氣方出。出則微汗。令小便利者。表裏俱和。則久瘧自差矣。

黃耆

牡蠣

人參

知母

麻黃根各一兩

共末。未發前小麥湯空心下三錢。未差又服。
車前草湯 治久瘧憎寒壯熱不止。渴欲飲水。

車前草

常山

升麻

甘草五錢

大豉微炒

白糯米鈔半

水浸三錢。露星月下一夜。上橫小刀一口。次早煎。空心溫服。相次又服。良久得吐。吐定卽食稀粥。

梔子湯 治久瘧經年不差。

梔子一兩

常山三分

車前子葉錢半

梗

米半合

水煎五錢。空心溫服。以吐利爲度。

常山湯 治久瘧不止。

常山

烏梅肉兩一

生甘草三分

薑水煎三錢。空心溫服。發時再服。以差爲度。

鬼瘧

論曰。鬼瘧者。外邪之所乘也。凡人真氣內虛。神守不固。則鬼邪投間而入。故恍惚喜怒寒熱更作。若有所持。而屢發屢止。治宜禳解。兼以祛邪安神之劑。卽愈。

獨勝丸

治鬼瘧經久不差。

桃

仁大枚

和皮尖劈二片。一片書奉勅斬鬼四字。一片書奉勅殺鬼四字。合作一枚。以彩線繫定。五更新級水吞下。

三聖丸 治鬼瘧。

雄黃

雌黃

大黃生絡

各研末。用井華水浸。蒸餅丸小豆大。發日清晨取汲水。向東方下二丸。宜五日

午時修合。

阿魏雄黃丸 治鬼瘧經久不差。

阿魏

雄黃五錢

柳枝心

桃枝心取向東者各

丹砂一分外一分

共末。以三家粽角小豆大。丹砂丸為衣。發日用淨器磨一丸。塗中指尖上。男左女右。未退。冷水下一丸。

瘧母

論曰。瘧母者。因病瘧久不差。結為癥瘕是也。邪伏於陰。故久而成形。不治其母。雖或時差。已而復發。其本未除故也。治以破結削瘕之劑。除其病本。則瘧自除。蠶肉煎丸 治瘧久不差。結為癥瘕。名曰瘧母。

生鼈肉

如斤法

片 芩

葶藶子 紙炒

柴胡

蛻

去頭翅足

桃 仁

煬胞去皮

大 黃生

牡丹皮

紫苑

瞿麥穗 去梗

半 夏 湯洗去滑

人參

黑乾薑

大 戟

阿 膠 蛤粉炒

海 藻 水洗去

麤 蟲 炒

鼠 婦 炒去

紫 朴 一分

桑 螵 蛸 炒一

石 韋 脂炒焦黃

桂 心

射 干 取紫色者用

赤芍藥 一分

共末。取竈下灰三升。白酒二升。用竹籬盛灰。以酒淋取灰汁。澄清。用汁煮鼈肉令爛。絞去肉。將汁入藥末。同煎成膏。試可丸。即止。丸如桐子大。未發前空心酒下二十九丸。

雄黃丸 治遠年瘡結成癥瘕。

雄 黃 醋研

丹 砂

麝 香 五錢

鼈 甲 醋浸

白 薇

虎 頭 骨 酥炙

木 香

羚 羊 角

知 母

烏 犀 角

麻 黃 去根

防 風

柴胡

茯神

草龍膽

川歸酒洗

牡蠣童便

赤芍藥

猪苓

升麻

檳榔

龜甲醋炙

玄參

烏梅肉

地骨皮

山梔

川連

安息香

阿魏醋研入麪 萎蕤

桃仁去皮炒

龍齒各三分

共末入蜜杵丸如梧子大。未發時空心飲下二十九。臨發再下。

瘧疾發熱身黃小便不利

論曰。寒熱凌虐於人。名爲瘧病。瘧而發熱。小便不利者。身必發黃。此蓋熱氣下迫。入於小腸。水道既澀。故小便不利。常山飲。治手足苦煩。發熱渴躁。通身悉黃。小便不利。

常山

柴胡

山梔

甘草一兩

石膏

赤茯苓

蜀漆炒

鼈甲二兩

水煎五錢。入竹葉二七片。豉百粒。

知母湯 治發熱煩渴。咽乾口燥。身黃怠惰。小便澀。

知母 升麻 人參 麥冬

柴胡 犀角 地骨皮一兩

鼈甲 石膏二兩 甘草兩半 赤茯苓三兩

水煎四錢。入豉五十粒。

柴胡湯 治大渴煩躁引飲。身黃小便不利。

柴胡二兩 人參 麥冬 知母

杏仁炒一兩 炙甘草五錢

水煎四錢服。以利為度。

赤茯苓湯 治發熱煩躁。身面黃。小便不利。

赤茯苓 片苓 桂心一兩 升麻

甘草 常山 蜀漆炒五

水煎五錢服。以利為度。

赤茯苓湯 同前。

赤茯苓 白芍一 白朮三 木通

瞿麥穗一兩

生薑葱白水煎。五錢溫服。以利為度。

瘧痢

論曰。瘧痢者。瘧久不差。寒熱邪氣內搏腸胃間也。其病寒熱往來。利下膿血。赤白相雜。腸中切痛。隨其陰陽而治之。

黃連犀角丸 治傷寒病瘧兼痢疾。無問下赤白水穀完出及下鮮血。并皆主之。

川連 犀角 豉二 龍骨四兩

牡蠣五錢

共末。蜜丸。桐子大。飲下三十丸。日二。

前胡丸 治傷寒瘧氣急黃并利。

前胡 赤茯苓 片苓 白芍

枳殼五錢 炒 大麻仁半兩 大黃生

共末。蜜丸。小豆大。空心飲下十九。以溏利爲度。又利服十五丸。

瘧氣

論曰。傳言瘧氣乃山川毒厲之氣。又云江山霧氣多瘧。凡以其氣鬱蒸而然也。閱諸方論治瘧氣之法不一。或謂其症與傷寒相類。有在表可汗者。有在裏可下者。有在膈可吐者。或以治瘧法治之者。蓋原廣南山川地形瘧氣所生之因。及春夏之交。又瘧氣所起之時。與夫人染瘧氣。拯治之法。悉著於篇。庶可考焉。且陽生於子。盛于巳。陰生於午。盛於亥。陽不極則陰不萌。陰不極則陽不長。而廣南位當巳午。則陰陽之氣。蘊積於此可知矣。天不滿西北。地不滿東南。西北陰也。土地高厚。東南陽也。土地卑下。而廣南屬東南。則土地之卑下可知矣。以土地卑下。而陰陽二氣所蘊積。是以四圍之山。崇高相環。百川之流。悉皆歸赴。及秋草木不凋。瘧冬令蟄蟲不伏藏。寒熱之毒。蘊積不散。霧露之氣。易以傷人。此岐伯所謂南方地下水土弱。蓋霧露之所聚也。故瘧氣獨盛於廣南。然瘧氣所起。其名有二。孟夏之時。瘧名芳草。而終於秋。孟冬之時。瘧名黃芒。而終於春。四時皆能傷人。而七八月間。

山嵐煙霧。蛇虺鬱毒之氣尤甚。當是時。疾瘴大作。不論老少。或因飢飽過傷。或因榮衛虛弱。或衝煙霧。或涉溪澗。但呼吸斯氣。皆成瘴疾。其狀頭疼體痛。胸膈煩滿。寒熱往來。咳嗽多痰。全不思食。發渴引飲。或身黃腫脹。眉髮脫落。此皆毒厲鬱蒸之氣所致。夫生於凌者。安於凌。其土人宜無所慮矣。後且日食檳榔。蓋檳榔之性破堅毒。除蘊積故耳。治法先以磁石下收其陰。次以丹砂上正其陽。陰陽氣正。中滿自消。然後以檳榔解其餘蘊。毒斯愈矣。

磁石丸

治瘴氣下收其陰。

磁石

石三兩。酒碎七次。

研極細。醋煮糊丸。小豆大。汲水下三十九。日二。

丹砂散

治瘴氣上正其陽。

丹砂

砂三兩。飛。

蜜水下五分。日一服。

秦芄湯

治山嵐瘴氣如瘧狀。

秦芄

柴

胡半份

常

山一分

糯米

一撮

烏梅肉炒三

共作一服。水煎半分。二服取吐利。

元氣十補丸 治傷寒瘴氣。人虛弱。面黃不思食。或困或省。心腹脹滿。痞氣耳鳴。

巴戟天

肉蓯蓉

白朮

石斛

五加皮 一兩

鹿茸去毛鱗

兔絲子酒煮

人參

柏子仁

甘菊三分

共末。蜜丸。桐子大。空心酒下二十九丸。日二。

香椿散 治瘴氣惡心。四肢痛。口吐酸水。不思食。憎寒壯熱。發過引飲。二廣閩中

多山嵐煙霧。蛇虺鬱毒之氣。當秋七八月之間。芒華發時。此疾大作。俗謂之黃

芒瘴。又謂之芳草瘴。是也。蓋人或因飢飽。或因虛怯。或衝煙霧。或涉溪澗。遂得

此疾。謂之黑脚瘴。蝦蟆瘴。啞瘴。其名不一。並皆治之。

香椿嫩葉酒浸

三兩

炙甘草

南壁土取者

臘茶 一兩

共末。酒下二錢。如患久者。加入柴胡。甘遂各五錢。空心臨臥服。

芎藭散 治瘴氣久治不差。

石菖蒲

川芎

白朮炒

蒼朮炒香

荊芥穗

炒山梔一兩

吳茱萸

甘草

硝石

側柏炒黃

荷葉五錢

共末。薄荷湯下二錢。如患瘧疾。薑棗煎服。

煑黑豆丸 治山嵐一切瘴氣。

白朮

蒼朮

甘草

貫衆二兩

共末。蜜丸。彈子大。用黑豆一合。入銚內令平。將藥安豆中。入水高豆一指許。慢

火煑乾。復暴乾。以絹袋盛之。用新汲水吞二十粒。有患處空心一服。如涉遠遇

饑。水下五十粒至百粒。可充饑餒。

烏藥湯 治嵐氣一切瘴氣。

烏藥一斤

半夏一斤

桂心

甘草二兩

馬鞭草半斤

陳皮去白

荊芥四兩

薑水煎三錢服。

瘴瘧

論曰。人與天地流通。萬物一氣。故有感於山川毒厲之氣。而為病者。瘡瘡是也。以其寒熱相似於瘡。故名瘡瘡。傳謂兩山夾水多瘡。蓋陰氣多而陽氣少。則易為寒熱之疾也。

白薇湯 治瘡瘡經百日并一年者。

白薇 知母 升麻 龍膽草

炙甘草 蜀漆葉炒 片苓 苦參五錢

常山 大黃微炒 淡竹葉三兩 鱉甲醋炙

豉一合 獨蒜三枚 石膏 赤茯苓三分

酒水合煎三錢。先時及發時各一服。仍以藥汁塗手心并面。

木香丸 治一切瘡蟲毒等瘡。

木香一分 升麻 玄參 猪苓三分

甘草 檳榔 炙鼈甲 犀角五錢

豉一合

共末。蜜丸小豆大。空心酒下三十九。日二。

砒霜丸 治山嵐瘴氣寒瘧。解邪毒。

白砒一分 煨花二兩 鐵砧上末四兩水

共研入麝香少許。金銀箔各十片。糯米糊丸。芡實大。酒下一丸。吐瀉差。

常山散 治瘴瘧寒熱往來。二三日一發。

常山 厚朴一兩 草豆蔻二枚 檳榔

炙甘草五錢 烏梅肉七枚

水煎三錢。候冷。未發前先服。如熱服即吐。

保安湯 治瘴瘧久不差。

常山 桃仁五錢 知母 青蒿一兩

薑水煎二錢。稍熱服。

中暍門

中暍統論

論曰。盛夏炎熱。人多冒涉路途。熱毒易傷。微者客於陽經。令人嘔逆頭眩。心神懊

悶。汗出惡寒。身熱發渴。即時不治。乃至熱氣伏留經絡。歲久不除。遇熱即發。俗名暑氣。甚者熱毒入內。與五臟相併。客邪熾盛。鬱痧不宣。致陰氣卒絕。陽氣暴亡。經絡不通。故奄然悶絕。謂之中暈。此乃外邪所擊。真臟未壞。若遇藥救。氣通則甦。但治熱暈。不可飲以冷物。冷則熱不流通。若外以冷觸。則熱蘊積於內。反不得宣發故也。

中熱暈

論曰。熱暈之病。由冒犯暑熱邪氣。其脈弦細。乳遲。其狀汗出惡寒。身熱而渴。身重疼痛。小便已。則灑灑然毛聳。四肢逆冷。微勞動則熱。口開齒燥。經所謂脈虛身熱。是爲傷暑。此不可汗下。若汗下之。則惡寒更甚。宜以去熱邪藥治之。則愈。

白虎湯 治中熱暈。頭痛汗出惡寒。發熱而渴。
知母去毛 石膏研一 甘草生二 糯米六合

小香薷飲 治伏暑吐逆中暈。
水煎五錢。空心溫服。一方加人參。

香薷穗二兩

人參一兩

白扁豆炒五錢

水煎三錢。空心溫服。

竹茹湯 治中暍煩渴不止。

竹茹一合

甘草一分

烏梅肉炒二

水煎時時細呷愈。

消暑散 治中暑煩躁。多困乏力。

人參

白麵一兩

共末。空心汲水下二錢。

甘露散 治暑氣。

川連一兩

吳茱萸洗五錢

同炒黃黑色。放地上去火毒。去萸用連為末。食後茶清或汲冷水下五分。

甘露丸 治中暑熱躁悶。

寒水石火煨四兩

天竺黃

馬牙硝二兩

生甘草一兩

冰片研五錢

共末。糯米粥丸黃實大。薑蜜水下一丸。

救生散 治中暑毒煩躁渴悶。

脂新者三兩 麻慢炒黑色

爲末。用新汲水下三錢。以差爲度。凡暑熱外不可以冷物逼之。得冷卽死。

中暈悶絕

論曰。中暈之病。令人悶絕者。乃熱毒傷於臟也。蓋心藏神而惡熱。若冒觸暑毒。蘊蓄於五臟。則陰陽不能升降。經絡不能宣通。故奄然悶絕。然真臟未壞。救療有方。使呼吸之氣宣通卽甦。亦不宜待其自甦。又不可使之犯冷。若外犯冷。則與熱氣相拒。令氣反不通而速斃。宜慎之。

熱暈欲死悶絕方

生地汁一鍾

令旋旅灌之。卽甦。

中暑毒熱暈不省方

上白麵

用熱湯和三錢。令人灌之。卽差。

中熱不省人事方

大蒜去衣搗爛

用新汲水調和灌之差。

又方

以溼泥團中。噉人臍。使二三人溺其中。不可使流去。此路上有湯可用。乃令人溺取溫。有湯不必溺也。仲景不云泥及車缸。蓋此物必冷。噉人忌冷。若得熱湯和泥及火燒平缸可用也。

又方

生薑蒲

搗取汁。微溫一鍾。令人灌之愈。

又方

掘地作小坑子。以蜜半鍾傾坑內。入新汲水二三鍾攪勻。取起放碗內澄清。水

漿一鍾。灌之。差。

中熱暈死方

取路上熱塵土以壅其心。冷復易之。候患人氣通乃止。

陳皮湯

陳皮去白炒

黑乾薑

炙甘草一兩

水煎三錢稍冷噉。勿頓與之。中暈垂死。備急救生。

霍亂門

霍亂統論

論曰。三焦者水穀之道。氣之所終始也。因風冷或飲食傷內。致中焦不和。則正氣不守。而邪得內干。揮霍之間。便至撩亂。故名霍亂。蓋清濁相干於腸胃之間。便至撩亂。腹痛即利。中者中利俱發。其不利。謂之乾霍亂。亦以冷食暴爭於中。而不得出也。然脈必代者。以氣不足也。脈大能言者。為可治。若脈微氣劣。而不欲言。為難治。

霍亂吐利

論曰。霍亂吐利者。以三焦氣不升降。而清濁相干於腸胃。五內悶亂。先心痛則吐。先腹痛則利。心腹並痛。則吐利俱作。治此者。當清中焦爲本。中焦既和。則清濁自分。而吐利止矣。

藿香湯 治吐利不止。

藿香五錢

白芷

砂仁一兩

丁香一分

水煎三錢。稍熱呷。

大豆飲 治吐利不止。

大豆

陳皮

香薷

竹茹

前胡

蘆根

枇杷葉

薑水煎五錢服。以差爲度。

理中湯 治霍亂吐利虛冷。

人參

白朮三兩

甘草

乾薑二兩

水煎五錢溫服。若胸滿腹痛吐下者。加川歸紫朴薑炒各二兩。

四順湯 治吐下虛冷厥逆。腹痛乾嘔。

乾薑

人參

甘草二兩

附子一枚

水煎五錢。空心溫服。一方下甚者。加龍骨二兩。腹痛不止。加川歸二兩。

香薰丸 治冷熱不調。霍亂吐下。

香薰兩半

扁豆

木香一兩

丁香皮二兩

益智仁一分

零陵香

藿香五錢

共末。糊丸。桐子大。蘇葉湯下二十丸。

青金散 治吐逆手足厥冷。面青。諸藥不效者。

硫

黃作汁一兩煨

水

銀幣一兩與硫子

研細。用冷木瓜湯下二錢。米飲下亦可。

和氣煑散 治吐下冷熱不和。

胡椒

萊豆一兩

人參一分

共末。水煎三錢。空心稍熱服。日二。

霍亂嘔吐不止

論曰。霍亂嘔吐不止者。胃氣逆故也。胃氣逆則氣上而不下。故嘔吐不止也。若上下升降。陰陽和平。而吐自止矣。

人參薑香湯 治霍亂。

薑 香

紫 朴二兩

人 參

白 朮

乾 薑

青 皮

枇 杷 葉

半 夏 薑 炒

甘 草一兩

丁 香五錢

草 豆 蔻 六 枚

薑水煎三錢熱服。定嘔逆。止心腹刺痛。進飲食。化痰益氣。

香薷湯 治吐逆不止煩悶。

香 薷陳者 扁 豆

紫 朴薑汁炒

水酒合煎五錢。汲水坐頓冷分二服。未效再服。

紫朴湯 治嘔吐不思食。

紫 朴薑汁炒

人 參

白 朮

半 夏 薑 炒

陳皮一兩

薑棗水煎三錢。空心溫服。日二。

返魂湯 治嘔逆手足厥冷。

食鹽一分 生薑一兩

用童便碗半煎一碗。分三服。

人參湯 治下焦熱氣逆上。嘔吐不止。名曰走哺。

人參 山梔 片苓

菱蕤一兩 白茯苓 陳皮

石膏兩半

薑水煎三錢服。日二。

四汗煎 治吐嘔不止。

生藕汁 生葛汁 木瓜汁一合

用慢火煎如錫。頻服一二匙。含化徐徐津液咽下。

藿香散 治吐逆開胃和氣。

生薑汁半合

薑 香一兩

人參

丁香 香五錢

訶勒皮十枚

石蓮心二百枚

糯米三百粒

共末煨生薑大棗煎濃湯下二錢。

霍亂四逆

論曰。四肢爲諸陽之本。陽氣之所通也。霍亂吐利。陽氣暴厥。故四肢逆冷。而脈微欲絕也。古法治四逆專於通脈。蓋榮衛流行。氣道升降。則手足自和。逆者順矣。理中湯治傷寒霍亂嘔逆。四肢厥冷。煩悶汗出。食不化。心腹虛滿。拘急短氣。

麥冬

乾薑六兩

人參

白朮五兩

附子

白茯苓三兩

甘草四兩

水煎三錢。空心溫服。少頃又服。

龍骨湯 治吐利手足逆冷。

白龍骨

黑附子一兩

黑乾薑

人參

炙甘草一兩半

生薑水煎三錢。空心溫服。以差為度。

霍亂心腹痛

論曰。霍亂心腹痛者。由脾胃虛弱。客風冷之氣。使陰陽不和。致水穀相并。清濁莫分。變亂於腸胃之間。令人心胸煩懊。悶亂不安。故名霍亂。然邪氣上干於陽絡。則心痛而嘔吐。下搏於陰經。則腹痛而瀉利。故謂之霍亂心腹痛也。

桂心湯 治心腹疼痛。煩嘔不止。

桂心三兩

紫朴薑汁炒

枳實燉

薑水煎三錢溫服。日二。

抵聖散 治霍亂宿食不消。心腹疼痛。

紫朴薑汁炒

白朮土炒

人參

白茯苓

高良薑炒

木香

吳茱萸洗炒

草豆蔻

枳殼

甘草

陳皮去白炒

共末。空心沸湯下二錢。日二。

石菖蒲汁湯 治霍亂心腹痛急如中惡。

石菖蒲生者四兩

水洗搗取汁一鍾。分四服。熱湯和汁溫服。

厚朴湯 治霍亂心腹痛煩不止或嘔。

紫朴薑汁炒

桂心

枳殼去白炒二兩

白芍炒

檳榔微煨一兩

生薑水煎三錢。空心溫服。

縮砂散 治心腹冷痛。嘔逆惡心。滑泄不止。

砂仁

陳麩

白朮

赤石脂

黑乾薑

吳茱萸洗炒

川芎

龍骨一兩

共末。熱米飲下二錢。

乾霍亂

論曰。乾霍亂之狀。中氣喘爭。而不吐不利是也。蓋腸胃挾實。與正氣相搏。正氣暴

衰。神志昏冒。上下隔塞。冷汗自出。治之稍緩。則不可救。
鹽便湯 治不吐不利。冷汗自出。氣悶將絕。

食

鹽半匙

童便一鍾

和勻溫服。少頃。吐下即愈。

紫蘇丸 治乾霍亂。

紫蘇

陳皮

人參

桂心

高良薑一兩

共末。蜜丸。梧子大。纔覺食不消。氣滿惡心。欲吐不吐。乾嘔。酒下二十九丸。日二。

人參湯 同上。

人參

白朮

紫朴一兩

桂心

甘草

高良薑炒五

薑水煎三錢溫服。日二。

黍米飲 治乾霍亂。

黍米二合

水研澄清取白汁。呷盡卽差。

不得吐利方

食鹽一合

汲水一升

同煎令鹽消服之。吐出涎沫便愈。如不吐。又如上法飲之。令吐佳。

活命飲 治脾元虛損霍亂不吐利。腹脹如鼓。心胸痰壅。

食鹽一合

生薑

葛根五錢

丁香七枚

炙甘草一分

作一服。用童便煎。溫分二服。未差再服。

中惡霍亂

論曰。中惡霍亂者。由客邪內干。正氣暴亂。使胃中食物不化。氣道否澀。不得宣通。令人心腹卒痛。吐利煩悶。甚則精神冒昧。靡所知識。此得之鬼氣所作也。

麝醋方 治中惡霍亂

麝香一錢

米醋半鍾

共和勻分二服。

白朮湯 治中惡吐利手足痲痺轉筋。

白朮土炒

人參

木瓜一兩

炙甘草

黑乾薑五錢

生薑大棗水煎三錢溫服日二。

霍亂乾嘔

論曰。霍亂乾嘔者。胃氣逆也。本於吐利之後。脾胃俱虛。三焦不理。氣時逆上。但嘔逆而無所出。故名乾嘔。

木瓜湯 治乾嘔。

木瓜一枚去瓢

人參

乾薑一兩

紫朴五錢

水煎五錢溫服日二。

薤白湯 治乾嘔不止。

薤白一把

水煎二服。以知爲度。

厚朴湯 治胃弱嘔吐不止。

紫 朴四兩

白 朮五兩

人 參

白 茯苓三兩

扁豆葉乾二兩

水煎五錢服。

霍亂轉筋

論曰。霍亂轉筋者。緣風冷傷於三焦。傳於脾胃。脾胃得冷。則陽氣不得宣行。致四肢筋絡不得舒緩。此由中氣不足。其候冒悶不安。脛筋攣結。膈肉緊痛。反急於上。蓋足陽明之經虛。膀胱之脈寒也。然足陽明之脈。其支者起胃下口。循腹裏。下至氣衝中而合。以下髀關。抵伏兔。下入膝臚中。下循髀外廉。足太陽之經。其脈循髀外後廉。下合臚中。貫膈內。是動則病。髀不可曲。轉。臚如結。膈如裂。治宜調胃。膀胱溫。則小水得宣。寒冷自下。胃腑溫和。霍亂可愈。轉筋之疾。無由作也。

川椒湯 治轉筋

川椒炒出汗 烏梅肉炒七

水煎入蜜少許頓服。老人亦可。

肉豆蔻湯 治霍亂轉筋。

肉豆蔻麵煨 人參二兩

桂心

吳茱萸洗

薑水煎三錢服。

雞屎白湯 治轉筋悶絕欲死。

雞屎白炒合 胡椒二十

木瓜六兩

白朮

桂心 高良薑一兩

生薑六兩

水煎五錢溫服。日二。

木瓜湯 治轉筋吐利不止。

木瓜一兩 青葉銅錢四枚 烏梅肉炒五

水煎分二服。

藿香子散 治吐利轉筋煩悶。

木香 藿香子炒 人參 陳皮五錢

甘草一兩 石菖蒲一兩

共末。冷米飲下三錢。頃再下。

生薑酒 治轉筋入腹欲死。

生薑五兩 生薑五兩

酒一升。煎入合頓服差。

雞屎白湯 同上。

雞屎白兩 雞屎白兩

水煎二錢頓服。勿令病人知。

附子湯 治轉筋淋足。

附子一枚 葱白半斤 生椒綿裹

水一斗。煎數沸去渣。以鹽漿水解之。淋洗立差。

鹽搨法 同上。

食鹽三合

水五升。煎三升。浸青棉布。搨轉筋上。

苦酒絮裹足法 同上。

苦酒二升

以絮內酒中煮酒。裹患處差。

又方

木瓜二枚

水煎湯。以青棉布漫裹。

神聖香薰飲 治胃氣虛。霍亂吐利。轉筋腹痛。

香薰穗兩半

川連微炒

紫朴薑汁炒

白扁豆兩一

用生薑汁四兩。慢炒連。朴紫黑色。入二味。同搗粗末。酒水合煎五錢。用器盛。入井中浸冷。連進二服。至死者亦可救。

治轉筋方

糯米二兩

人參

生甘草

乾

薑二錢

共爲末。用新汲井水下三錢。以差爲度。

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷六

泄痢門

泄痢統論

論曰。脾與胃合。其象土。外榮肌肉。內熟水穀。風寒水溼襲於外。則留連肌腠。傳於脾胃。若飲食不節。害於內。腸胃乃傷。不化糟粕。皆能爲病。所得之源不一。故立名多端。且久風入中。則爲飧泄。溼勝則爲濡瀉。寒中則爲洞泄。暑勝則爲毒痢。而又或冷或熱。或赤或白。或色雜。或腸垢。或滯下。或休息。或疴或蠱之類。種種不同。悉由養攝失宜。飲食不慎。致腸胃不調。邪氣交攻。施治之法。則有宜調補。宜攻化。宜

收斂。宜滲泄。各隨所宜以治。

水瀉

論曰。內經謂諸厥洞泄。皆屬於寒。暴注下迫。皆屬於熱。蓋為冷熱不調。氣不相濟也。脾胃怯弱。水穀不分。溼飲留滯。水走腸間。禁固不能。故令人腹脹下痢。有如注水之狀。謂之注泄。各為水瀉。

紫朴散 治一切水瀉冷痢。

紫 朴

白 朮

乾 薑 一兩

甘 草 五錢

陳 皮 三分

共末。飲下三錢。日二。霍亂吐瀉。新汲水下。

肉豆蔻散 治水瀉無度。腸鳴腹痛。

肉 蔻 一兩

薑 汁 二合

白 麵 二兩

將蔻為末。用汁和麵。裹末煨熟。飲下二錢。

黃蠟丸 治水瀉不止。傷冷虛極。

硫黃 黃蠟一兩

研硫化蠟和勻。丸梧子大。汲水下五丸。

紫朴散。治暴水瀉不止。

紫朴一兩 白朮

川連

甘草

赤茯苓 乾薑

白豆蔻三分

訶勒一兩

共末。飲下二錢。

訶梨勒丸。治水瀉。腸滑不禁。

訶勒 龍骨

乾薑

赤石脂一兩

共末。糊爲丸。如梧子大。飲下二十九。

正氣散。治水瀉腹痛。日夜不止。

砂仁 附子

白朮

人參

龍骨 石榴皮

甘草

肉蔻

吳萸 地榆

乾薑

赤石脂一兩

共末。飲下三錢。

又方 治水瀉水穀不化。日夜不止。

熟艾半斤

慢炒合熱包裹坐之。冷再炒。

濡瀉

論曰。內經云。溼勝則濡瀉。甲乙經曰。寒客下焦。傳爲濡瀉。夫脾爲五臟之至陰。其性惡寒溼。今寒溼之氣。內客於脾。則不能裨助胃氣。腐熟水穀。致清濁不分。水入腸間。虛莫能制。故洞泄如水。隨氣而下。謂之濡瀉。

肉豆蔻散

治腸胃受溼。濡瀉不止。

肉蔻

川連

訶勒三分

白朮

甘草

赤茯苓

乾薑五錢

紫朴一兩

共末。飲下二錢。

又方 治腸胃受溼。濡瀉不止。

紫朴

甘草一兩

肉豆蔻五枚

共末。飲下二錢。日二。

附桂丸 治濡瀉水痢不止。

桂心

附子一兩

乾薑

赤石脂二兩

共末。蜜丸。梧桐子大。飲下二十九丸。

白朮丸 治脾胃受溼。濡瀉不止。

白朮

人參

乾薑炒黑三分

紫朴用生薑同炒一兩

共末。蜜丸。梧子大。飲下二十九丸。

生薑黃連散 治水瀉久泄瀉。

生薑四兩

川連連片一兩

將薑切片。與連同入鍋。慢炒薑赤色。去薑。用連為末。臘茶下二錢。二服止。

飧泄

論曰。內經云。清氣在下。則生飧泄。又曰。久風為飧泄。夫脾胃土也。其氣沖和。以化為事。今清濁交錯。風邪之氣。得以干胃。故沖氣不能化。而食物完出。夕食謂之飧。

以食難化者。尤在於夕。故食不化而泄出。則謂之飧泄。此俗所謂水穀痢也。

白朮湯 治風冷入中。飧泄不止。脈虛而細。日夜數行。口乾腹痛。

白朮

紫朴

熟艾

龍骨

川歸一兩

薑水煎三錢。溫服。

洞泄寒中

論曰。內經云。謂長夏苦病。洞泄寒中。洞泄者。謂食已即泄。乃飧泄之甚者。此因春傷於風。邪氣留連。至夏發為飧泄。至長夏發為洞泄。蓋當春之時。陽氣在表。為風邪所中。入客於經。未至臟腑。夫風者陽氣也。東方木也。木能勝土。脾胃受之。仲夏則陽盛之時。以陽邪之氣。逢陽盛之時。重陽必陰。病在脾胃。故為飧泄。陰生於午。至未為甚。是長夏之時。脾土當旺。脾為陰中之至陰。故陰氣盛。陰氣既盛。則生內寒。故令人臟腑內洞而泄。是為洞泄寒中之病。

附子丸 治洞泄寒中。注下水穀。或痢赤白。食已即出。食物不消。

附子

烏梅肉一兩炒

川連二兩炒

乾薑半兩

共末。蜜丸。梧子大。飲下二十丸。

溫中丸。治脾胃虛寒。洞泄不止。

附子

乾薑

龍骨

硫黃

肉豆蔻二兩

共末。糊丸。梧子大。食前艾湯下二十丸。

火輪散。治脾胃氣寒。大腸虛滑。日夜不止。

附子一枚

肉蔻五錢

乾薑一分

共末。空心飲下二錢。

鴛鴦瘡

論曰。脾氣衰則鴛鴦瘡。蓋陰中之至陰脾也。為倉廩之官。若脾胃氣虛弱。為風冷所乘。則陰氣盛。陰氣盛則臟寒。致糟粕不化。故大便色黑。狀如鴛鴦瘡也。又大腸有寒。亦令鴛鴦瘡。

吳茱萸丸 治脾氣不足。鶩溏青黑。

吳 萸

乾 薑

陳 麩

川 歸

赤石脂三分

紫 朴一兩

共末。蜜丸梧子大。飲下二十九。

龍骨黃連湯 治脾氣不足。鶩溏青黑。

龍 骨

五色者一兩

川 連三分薑汁炒

川 歸

乾 薑

甘 草炙五錢

薑水煎三錢。空心溫服。日二。

白滯痢

論曰。白滯痢者。冷痢之類。蓋腸虛受冷。留而不去。與津液相搏。結滯如膿。或如凝脂而下。故曰滯痢。

人參湯 治白滯痢及小便色白。

人 參

龍 骨

白 朮

川 歸

甘草

乾薑五錢

紫朴一兩

水煎五錢。溫服。日二。

赤石脂散

治白帶痢。

赤石脂一兩

乾薑三分

共末。飲下一錢。未差再服。

薑附子丸 治臟寒下痢白膿。心腹痛。

乾薑

附子

龍骨

訶勒皮一兩

共末。飲下二錢。

冷痢

論曰。下痢其色或青或白或黑者。皆冷痢也。此因腸胃虛弱。寒氣乘之。故令人大便痢下青黑。若其痢色白而食不消者。寒中也。當診其脈沉則生。浮則死。其人素有積寒。即久冷痢有膿也。

牡蠣湯 治冷痢腹痛。

牡蠣燒紅碎

白朮

川歸

乾薑

龍骨煨三兩

赤石脂一兩

附子炮去

人參

白芍

甘草五錢

水煎三錢。溫服。若下膿加紫朮。嘔逆加陳皮。

肉豆蔻丸 治冷痢青白色黑者。

肉豆蔻 炙甘草二兩

水煎三錢。溫服。日二。

訶勒湯 治脾胃虛冷。下痢滑泄。不思食。及一切冷氣。

訶勒 紫朮 白朮 甘草

陳皮 草豆蔻一兩

生薑、大棗水煎三錢。溫服。日二。

吳茱萸丸 治冷痢下膿血。臍腹痛脹滿。食不化。

吳茱萸 乾薑兩半 紫朮

陳麩 赤石脂一兩

川歸四兩

共末。蜜丸。梧子大。飲下二十丸。

赤石脂丸。治多年冷痢。飲食不化。或青或黃。四肢沉重。起即目眩。手足逆冷。

赤石脂

熟艾一兩

乾薑

川

椒剉半斤

烏梅肉剉五

共末。蜜丸。梧子大。飲下二十丸。

四白散。治一切冷痢。

白龍骨

白石脂

胡粉炒

桔

礬五錢

共研極細。飲下二錢。

熱痢

論曰。凡痢色黃赤並熱也。甚則下血汁。此由腸胃虛弱。邪熱氣乘虛入客於腸間。故其症下痢兼黃赤。或血雜下。腹中熱。小便赤澀。身熱煩渴。故名曰熱痢。

生地黄湯。治熱痢不止。

生地五錢

甘草一分

地榆三分

水煎三錢。空心溫服。日二。

甘草湯 治夏月暴下熱痢。

甘草五錢 生薑一分 白蜜一合

漿水五合煎。分二服。日二。

蒲根湯 治熱痢。

蒲根二兩 粟米二合

水煎三錢。溫服。日二。

黃連湯 治熱痢腹痛。日夜百行。氣欲絕者。

川連一斤 附子一兩 白朮 龍骨

赤石脂 乾薑 阿膠 川歸一兩

水煎五錢。空心溫服。日二。

赤痢

論曰。熱痢之盛者。為赤痢。本由腸虛為風邪所傷。又挾邪熱。血得熱而妄行。乘虛

必湊滲入腸中。與痢相雜。其色純赤。名爲赤痢。若腸虛不復。則又爲久赤痢。變成嘔噦。疳蠱之候矣。

黃柏丸 治痢下黃赤水。或黃赤膿。四肢煩。皮膚冷。

川柏 片 芩一兩 川連二兩 熟艾五錢

共末。蜜三兩。蠟一兩。化丸。梧子大。飲下二三十丸。

六神湯 治赤痢腹痛。或下純血。

川連 車前子二兩 陳皮去白炒 山梔

甘草 地榆五錢

水煎五錢。空心溫服。日二。

血痢

論曰。邪氣客於血脈之中。腸胃虛弱。血隨熱行。流滲腸間。因便血下。故名血痢。其脈見虛小者。生身熱疾數者。難治。苦根湯 治痢下鮮血。

苦根

川連

地榆一兩

山梔二十

犀角剉末

水煎三錢。入薤白三寸。香豉一撮。溫服。

艾葉飲 治血痢不能止。小腹刺痛。

艾葉

川連

川歸

龍骨

訶勒皮二兩

水煎三錢。溫服。

三物散 治一切血痢。

胡黃連

烏梅肉

竈下土一兩

共末。茶下二錢。

葛粉飲 治血痢日夜無度。

葛粉

白蜜一兩

汲水四合和勻服。

地榆湯 治血痢日夜無度。

地榆二兩 甘草五錢

水煎五錢。溫服。日二。

人參散 治一切血痢腹痛。

人參 肉豆蔻

烏魚骨二兩

共末。飲下二錢。

通聖散 治血痢腹痛。日夜無度。

大棗 去核 烏梅肉七枚

甘草一尺

乾薑三錢

共末。薑棗水煎三錢服。

膿血痢

論曰。春傷於風。邪氣留連。夏爲洞泄。若遇熱氣乘之。則血隨熱行。滲入大腸。與腸中津液相搏。致積熱結。血化爲膿。膿血相雜。故成膿血痢。秋冬診脾脈微澁者。是其脈滑大。或微小。沉細虛遲者。皆生。若懸絕。或實疾。或數大身熱者。皆死。

黃連丸 治下痢膿血羸瘦。

川連

龍骨

苦參

紫朴一兩

熟艾

枯礬

赤石脂

甘草

陳麩

乾薑五錢

共末。蜜丸如梧桐子大。飲下二十丸。

柏葉丸 治膿血久痢腹痛。

側柏葉

川黃連

阿膠

地榆

川歸五錢

共末。蜜丸梧子大。飲下二十丸。

乾薑丸 治膿血痢日久不止。

乾薑

川連

川柏一兩

附子

甘草

熟艾

烏梅肉三分

共末。蜜丸如梧桐子大。飲下二十丸。

二宜散 治新久痢下膿血。

川連

吳茱萸二兩

各製爲末。赤膿多。黃末一錢。連末倍之。白膿多。連末倍於黃末。俱飲下。

赤白痢

論曰。赤白痢者。由腸胃虛弱。冷熱相乘。客於腸間。變而爲痢。蓋熱乘於血。流滲腸內。卽赤。冷氣入搏。津液凝滯。則白。其候裏急後重。數至圜而不能便。膿血相雜。故名赤白痢。重者狀如膿涕。而血雜之。輕者血膿上有赤脈薄血。狀如魚脂腦。世謂之魚腦痢。

黃連散 治赤白痢腹中痛。口乾。或作寒熱。

川黃連炒三

白朮

片苓

甘草

乾薑

川歸

烏梅肉五錢

阿膠一兩

共末。水煎三錢。溫服。

白朮丸 治赤白痢及水穀冷熱氣痢。

白朮

川歸

龍骨

犀角

赤石脂

烏梅三分

紫朴

川連一兩

乾薑 甘草五錢

共末。蜜丸。梧子大。飲下二十丸。

烏梅散 治赤白痢久不止。腹痛下血。脫肛。

烏梅肉 川歸 地榆 赤石脂

川連 樗根白皮五錢 乾薑三分 甘草一分

共末。飲下二錢。

加減薑黃丸 治冷熱赤白痢。

乾薑 川連兩一

各末。糊丸。各收貯。白痢冷瀉。薑丸三十丸。連丸減半。空心飲下。赤痢下

血。薑丸十五。連丸倍之。赤白相雜。薑連各半。

龍骨散 治赤白痢腸胃虛滑。

龍骨五錢 川連 牡蠣一兩 烏梅肉三分

共末。飲下二錢。

阿膠丸 治赤白痢。

阿膠

枳殼五錢

川連

白芍

木香半炒

訶勒皮

乾薑

甘草一兩

川歸

地榆兩半

共末。酒糊丸。梧子大。飲下二十九。

黃連散

治赤白膿血痢。

川連

龍骨二兩

人參三分

地榆

紫朴

乾薑一兩

片苓一兩

赤石脂兩半

共末。飲下二錢。

艾葉丸

治赤白痢多。痛不可忍。

艾葉

木香半炒

川連

肉豆蔻三分

地榆一兩

阿膠炒粉

川歸五錢

共末。蜜丸。梧子大。飲下二十九。

阿膠丸

治赤白痢。腹痛不止。

阿膠三兩

川連二兩

胡粉

川歸一兩

共末。糊丸。飲下二十九。

黃連丸。治赤白痢。不問遠近。

川連

川柏

赤茯苓

當歸一兩

共末。蜜丸。如梧桐子大。飲下二十九。

四神散。治赤白痢。後重腸痛。

川連

乾薑

川柏

川歸一兩

共末。烏梅湯下二錢。赤痢加黃柏。白痢加乾薑。後重腸痛加黃連。腹痛

加當歸。大凡泄痢宜食酸苦。蓋酸收苦堅故也。

木香散。治一切赤白痢。

木香

檳榔

肉蔻一兩

乾薑五錢

共末。飲下二錢。

和中散。治冷熱痢。腹痛裏急。

附子

川連一兩

乳香一分

各為末。冷痢熱痢。連附末共一錢。乳末一字。飲下。未止。用青皮湯再下一服。

赤痢附末五分。連末倍之。乳末一字。白痢附末一錢。連末減半。乳末同前。

黑豆湯 治赤白痢。服藥不止。

黑豆 豆半升炒四兩去皮

甘草 一兩

用綿裹。入湖水三升。煎一升。分二服。

白礬丸 治赤白痢。

白明礬 鉛 丹 二兩

同入瓶中封固。火煨為末。糊為丸。如梧桐子大。飲下一二十九丸。

氣痢

論曰。氣痢者。由冷氣停於腸胃間。致冷熱不調。脾胃不和。腹脅虛滿。腸鳴腹痛。便痢赤白。名為氣痢。治宜厚腸胃。調冷熱。補脾氣。痢當自愈。縮砂丸 治氣痢。胃與腸虛。不能制伏。日夜無度。黃瘦食不生肌。困重無力。眼目昏澁。多年不愈。

砂仁

陳皮

川歸

赤石脂 一兩

川連二兩 肉豆蔻五錢

共末。蜜丸。梧子大。飲下二三十丸。

黃連丸 治久氣痢不止。或差或劇。

川連 川歸 烏梅肉

訶勒皮一兩

共末。蜜丸。梧子大。厚朴湯下二三十丸。日二。

猪肝丸 治冷勞氣痢久不差。

雄猪肝筋膜切去 陳皮 烏梅肉 乾薑

訶梨勒煨取 桂心 川歸一兩

川連

紫朴薑炒 大蒜煨熟

共末。用肝蒜研糊丸。梧子大。飲下二十丸。

木香丸 治氣瀉不止。

木香 丁香 砂仁 肉豆蔻一兩

赤石脂 訶梨勒煨 薑 香五錢

共末。糊丸。梧子大。飲下三十丸。

木香丸 治一切氣痢不止。

木香

肉豆蔻

砂仁

赤石脂五錢

共末。用棗肉爲丸。如梧子大。飲下三十丸。

香艾丸 治氣痢腹痛。臥眠不安。

熟艾

陳皮一兩

共末。酒糊丸。梧子大。鹽湯下二十丸。

烏梅丸 治氣痢不止。瘦劣痢成冷勞。

烏梅

草薺

紫朴一兩

甘草

川歸

訶勒皮

肉薺

乾薑

葶撥三錢

桂心五錢

猪肝一大葉醋
煮研糊

共末。肝糊丸。如梧子大。飲下三十丸。

木香砂仁散 治氣痢。腹脹虛鳴。

木香五錢

砂仁兩半

枳殼

訶勒皮三兩

共末。飲下二錢。

肉豆蔻散 治氣痢腹脹不下食。

肉蔻

訶勒

木

香半兩同上俱

甘草

白朮三分

葶撥

乾

薑五錢

共末。飲下二錢。

葶撥煎 治氣痢久不差。及諸痢困弱者。

葶撥三錢

牛乳半升

慢煎其半。頓服神效。

休息痢

論曰。腸中宿挾固滯。每遇飲食不節。停飲不消。即乍差乍發。故取名爲休息痢。治藥當加之以治飲消。削陳寒痼滯之劑。即愈。

阿膠湯 治休息痢。

阿膠

川連

龍骨一分

艾葉五錢

倉米三合

水煎三錢。溫服。

黃丹散 治休息痢。諸藥無效。

黃丹炒三兩

棗肉紙包煨研末

川連

枳殼五錢

共末飲下。

砂仁丸 治休息痢。

砂仁一兩

肉豆蔻五錢

羊肝半斤

共末拌勻。麵包紙裏煨熟研。米糊丸。梧子大。飲下三十丸。

黃連湯 治休息痢。

川連

龍骨五錢

熟艾

阿膠五錢

水煎三味去滓。入阿膠再沸。分二服。每服後濃煎艾湯飲之。

玉液丹 治休息痢。

枯礬二兩

硫黃

硝石五錢

同研化。研末糊丸。小豆大。飲下二十丸。兼治腸風下血。

砂仁丸 治冷氣腹痛不止。休息氣痢勞損。消化水穀。溫脾胃冷滑。下痢不禁。

砂仁 附子 乾薑 紫朴

陳皮 肉豆蔻 五錢

共末。蜜丸。梧子大。飲下二三十丸。

四神丸 治多年休息痢者。

川歸 龍骨 五錢 川連 一兩 烏梅肉 三枚

共為末。用薤白取汁。杵丸。小豆大。溫水下二十丸。

當歸丸 治多年休息痢。

川歸 川連 烏梅肉 一兩

共末。薑汁丸。梧子大。厚朴湯下二十丸。

金石散 治多年休息痢。

石 灰 風化 鉛 丹 炒 一 糲 米 炒 黑

將灰丹同入鍋。慢炒一炊久。入米同研末。空心飲下二錢。

蟲痢

論曰。凡下痢膿血。間雜瘀黑。有片如雞鴨肝。與血皆下者。蠱痢也。此由歲時寒暑不調。溼毒之氣。襲人經脈。漸至臟腑。毒氣挾熱。與血相搏。客於腸間。如病蠱注之狀。故名蠱痢。

苦根飲 治蠱痢下血。如雞鴨肝。腹痛難忍。

茜根

升麻

片芩

犀角

川柏

桔梗三分

白蘘葉

地榆一兩

水煎三錢。溫服。

升麻湯 治毒痢下血片。臍下刺痛。

升麻

地榆

片芩

茜根兩半

犀角一兩

山梔二十枚

水煎五錢。入生地。薤白。香豉。溫服。日二。

久痢

論曰。久痢不差。則元氣日耗。腸胃損傷。溼氣散入肌肉。浮腫。以胃土久虛故也。蟲

因虛動。上食於膈。則嘔逆煩悶。下蝕腸中。則肛門瘡爛。久而不差。變成疳蠱。或下赤汁。水血相半。腥不可近者。是謂五臟俱損。五液雜下。其病難治。

紫朴湯 治久痢經年不差。

紫朴

川連

熟艾

乾薑

阿膠炒

石榴皮炒

水煎三錢溫服。

茯苓丸 治久痢脾胃虛弱。食不消。腸鳴痛。

白茯苓

龍骨

川歸

乾薑

川柏

赤石脂三分

陳麩

川連一兩

附子

人參

甘草

共末。蜜丸。如梧子大。飲下二十丸。

黑神散 治腸滑久痢。神效無比。

酸石榴令一枚。劈四塊。灰燻。蓋存。性出。火毒。

研末。水煎石榴一瓣。取汁下二錢。久瀉亦治。

久痢不止。

生

薑切

砂

糖一兩

拌勻紙煨。五更初作一服。以臘茶嚙下。

下痢裏急後重

論曰。下痢裏急後重者。有痕聚也。經所謂大瘕泄者。裏急後重。數至圜而不能便。莖中痛是矣。法當和氣而祛蘊滯。則脾胃平和。飲食腐化。膿血自消。則大腸自固也。

當歸黃連湯 治後重下赤白滯。小腹內結痛。

川 歸

犀 角

赤 茯苓三分

川 連兩半

甘 草五錢

紫 朴

地 榆一兩

薑棗水煎。三錢溫服。

聖功散 治冷熱不和下痢赤白。臍腹痛。裏急後重。

乾 薑

五倍子一兩

甘 草

訶勒皮五錢

共末。飲下二錢。

白頭翁湯 治熱痢下重。

白頭翁

川連

川柏

秦皮三兩

水煎三錢溫服。

當歸湯 治冷痢裏急後重。

川歸酒炒

胡椒

乾薑

阿膠一兩

川連

紫朴二兩

共末。醋熬膠末爲膏。丸梧子大。陳皮湯下二十九丸。

通神丸 治膿血雜痢後重。疼痛久不差。

沒藥

乳香

五靈脂一錢

巴霜五分

共研。水丸小豆大。木瓜湯下五七丸。

小兒減半。

痢後脫肛

論曰。下痢脫肛者。因大腸虛弱。冷氣偃滯。致不能便。極力於下。肛門脫出。故名脫

肛。溫其藏則愈。古方有坐湯溫熨之藥。皆良法也。

黑聖散 治痢久脫肛痛。

大蜘蛛黑一枚。勿入泥合燒。

研末。入黃丹少許。先用白礬葱椒湯洗。拭乾。滲藥在軟帛上。揆托肛頭。即不下。

猪肝散 治洞瀉脫肛。

猪 肝 炙 一 片

川 連

阿 膠

川 芎 一 兩

烏 梅 肉 二 兩

艾 葉 醋炒 五錢

共末。酒下二錢。

壁土散 治脫肛。

故室東壁上土五合

皂 莢 三 枚

共末傅肛上。取皂莢灰煖。更互熨入。

枳實熨方 治積冷下痢脫肛。

枳 實 一 枚

石上磨令滑澤。鑽安柄子蜜塗。炙令煖熨之。冷易。肛入即止。一方以猪脂和

蒲黃傅肛上。手按令入。日二三愈。

疳蠹

論曰。疳有五種。久變爲蠹。蟲蠹一曰白疳。令人皮膚乾燥。而無潤澤之氣。二曰赤疳。令人毛髮枯焦。三曰燒疳。令人腰脊強重。四曰疳蠹。令人下部孳急背強。不能俯仰。五曰黑疳。患者必死。令人五臟俱損。或下瘀血。此蓋腸胃俱虛。嗜肥甘過度。致脾胃緩弱。穀氣衰微。衛氣虛損。腸間諸蟲因虛而動。蟲蝕於上。則手足煩疼。心中懊懣。嘿嘿不欲飲食。腰脊無力。食不知味。精神恍惚。夜夢倒顛。咽喉生瘡。齒斷黑點。損爛膿血俱出。胃氣逆則變嘔噦。下蝕腸胃。便痢膿血。或下瘀黑。久不已。則肛門爛開。漸至危殆。

治積年疳痢面黃瘦。

硫黃

川連

熟艾一兩

白

蜜一合

水一升。煮連艾取汁。入黃末數沸。綿濾過。入蜜數沸。分三服。

疳痢久不差。羸瘦欲死。

羊 屎 一 升

水一斗。浸一宿。明旦絞汁頓服。至日午惟食水。煮飯極重。不過三服差。

二白湯 治久痢變疳。下部生惡瘡。惡寒壯熱。

桃白皮 槐白皮 一升 苦 參 五合 大 棗 十枚

熟 艾 旺 取 者 於 二 月 二

用水五升。煮半入熊膽一棗。大攪勻。以一升灌下部。餘分三服。

治久痢成疳 百方不差。

丁香 麝 香 川 連 一 分

共末。用竹筒吹入下部。

溼淫匿

論曰。凡下痢不止。或發之餘。為水溼所乘。客於腸胃。令九蟲皆動。侵蝕臟腑。故為溼蠱之病。所謂蠱者。蟲動於匿而難尋。故也。謂蟲因溼而動。故名溼蠱。其症上蝕唇口。下食肛門。上脣生瘡。是蟲蝕五臟。令人心煩懊懣。下脣生瘡。是蟲蝕下部。令

人肛門傷爛。若胃虛氣逆。則變爲嘔噦。甚則臟腑被傷。齒上下斷皆生瘡。齒色暗黑。是其候也。下痢出瘀血者。不可治。黃連湯 治疳溼露蝕口齒及下部。

川連四兩 熟艾二兩

苦參

槐白皮三分

水煎五錢。重者。不過三服。

豬膽煎 治疳露下部上攻。除熱殺蟲。

豬膽一枚 米醋五合

煎醋百沸。入膽汁再熬。滿口飲之。蟲死差。

塗方 治疳露。無問所在皆治。

死蝦蟆燒灰

研末。麻油和塗患處。

丁香散 治疳溼露洗熨下部。

丁香一分 麝香一分 甘草 犀角三分

共末。以鹽、椒各三合。豆二合。水三升。煮乘熱用。綿蘸洗熨。



3.081
15
:4(1)3

聖濟總錄纂要

四

413.081
148
:4004

中國醫學大成第四集

方劑類

聖濟總錄纂要 四

上海大東書局印行



3 0472 8420 7

254629

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷七

咳嗽門

咳嗽

論曰。肺主皮毛。皮毛先受寒邪。乃爲咳嗽。五臟六腑。又皆稟氣於肺。故以其時感寒而受病。亦能爲咳。形症不同。治亦隨異。學者審之。

桑白皮湯 治咳嗽胸滿氣急。

桑白皮

半 夏

川貝母

知 母

五味子

款冬花

紫 蘇 一 兩

人 參

炙甘草

紫朴五錢

薑水煎三錢服。日二。

百部煎 治咳嗽久不已。

百部汁

生薑汁

生地汁

百合汁如無以蕭汁代之

白蜜各一

麥冬汁同

大棗肉四兩

將諸汁入砂鍋內慢煎。下蜜。又將棗肉搗爛入汁內收。成煎湯化。日頻服。

貝母散 治咳嗽。

貝母一兩

甘草

阿膠五錢

共末。空心飲下二錢。日二。

訶勒散 治咳嗽。

訶梨勒煨取皮

為末。每以二錢。用雄豬胰一枚。去脂切摻末。入烏梅肉一枚。令定以芭蕉包紙

裹煨熟慢嚼。

五味子湯 治咳嗽晝減夜增。不得眠。食即吐逆。

五味子

白石脂

桑白皮

百合

麻黃去根

白蔘藜

杏仁去皮

川貝母

柴胡

款冬花

旋復花

枳殼炒

紫苑

桂心五錢

薑水煎三錢。入糯米一撮。溫服。

暴嗽

論曰。肺感於寒微者。即成咳嗽。蓋肺主皮毛。寒傷膚腠。則肺先受之。其狀咳嗽。語聲嘶破。咽喉不利也。

杏仁湯 治中冷暴嗽。上氣喘逆。惡寒出清涕。

杏仁

紫苑

片苓

甘草

川歸

陳皮

麻黃

桂心五錢

木香一分

大黃炒兩

水煎三錢。溫服。日二。

貝母煎 治暴嗽胸膈不利。痰逆喘急。

川貝母 去心

紫菀 焙長

杏仁 去皮炒

桑白皮 兩一

甘草 蜜炙

百部 去心酒

五味子 炒

白前 焙乾 五錢

用水一斗。入諸味煎取汁二升。濾去滓。入生地汁五合。麥冬汁五合。白蜜三合。

牛酥二兩。慢煎成錫。頻頻含化。一匙飲下。

錫糖煎 治暴嗽肺寒。

飴糖

乾薑 半兩

豉 兩二

分二劑。煎去渣。入糖薑末服。

久嗽

論曰。肺主皮毛。易感風邪。寒邪傷於肺。則為咳嗽。五臟各以其時受之。為五臟之嗽。久不已。傳於六腑。六腑不已。三焦受之。是為久嗽。其人咳而腹滿。不欲飲食。多唾而腫。氣逆乃其症也。
人參煎 治積年咳嗽。

人參一兩 酥油 括樓搗 蜜糖二兩

飯上蒸九次。晒乾爲末。空心湯下一匙。日二。

蛤蚧丸 治久咳嗽喘急。

蛤蚧一對 半夏

杏仁去皮尖 括樓大者二枚去取肉蒸研 青皮去一分炒 乾薑二兩

阿膠散 始久咳嗽。 共末。蜜丸如小豆。空心飲下二十九。

阿膠

人參 黃耆 炙甘草

杏仁去尖炒 桑白皮炙 紫苑 桔梗一兩

共末。用猪胰一枚去油膜。切拌末二錢。葱白三寸。鹽少許。溼紙包煨熟。細嚼酒下。

下。

款冬花散 治肺寒久咳嗽。

款冬花不拘

爲末燒煙。令病人吸之愈。

阿膠飲 治久咳嗽。

阿膠一兩 人參二兩

共末用豆汁入葱白煎三錢。若嗽頻呷。

蒺藜貝母湯 治久咳嗽。

白蒺藜 川貝母

紫苑 麻黃去根

五味 川連

桂心 貫衆一兩

薑水煎三錢服。

冷嗽

百合

天雄 枳殼兩半

地榆 桑根白皮東引者炙

片芩五錢 旋復花炒三兩

論曰。形寒飲冷。內外合邪。因而客之。則為肺咳。蓋肺主氣。外合皮毛。其經環循胃口。故內外得寒。皆能傷之。而為冷痰嗽。其候吸呼氣寒。口如飲冰雪。嘔吐冷沫。胸中急痛。晝靜夜甚。得溫則止。遇寒即發是也。

乾薑湯 治冷痰嗽。

乾薑

麻黃去根節

桂心

炙甘草一兩

紫苑

五味子五錢

杏仁去皮尖炒

水煎三錢。空心溫服。

細辛散 治肺寒咳嗽喘滿。

細辛

甘草

五味子

乾薑三兩

赤茯苓四兩

共末。湯下二錢。蜜丸亦可。

乾薑飴糖煎 治冷嗽及一切嗽。

乾薑三兩

膠飴糖一斤

化飴糖。拌末勻蒸熟。頻含化一匙。

杏仁丸 治冷嗽呼吸氣寒。嘔吐冷沫。胸中急痛。

杏仁去雙仁皮尖

生薑一斤切

陳皮去白炒

共末。蜜丸如梧子大。空心酒下二十九丸。

熱嗽

論曰。熱嗽之狀。嗽而少涎。由邪熱熏於上焦。客於肺經。使津液內燥。搏於咽嗑。喉嚨不利。隨其吸呼而咳嗽也。

百部丸 治肺氣熱嗽。胸膈煩悶。

百部

黃耆

杏仁

桂心一兩

天冬

括樓五兩

馬兜鈴

紫苑

紫蘇四兩

玄參半兩

共末。蜜丸如梧子大。烏梅甘草湯下二十丸。

阿膠丸 治客熱嗽。止嗽化痰。

阿膠

人參

礬砂三分

丹砂

甘草五錢

冰片二錢

共末。蜜丸如芡實大。含化一丸。日二。

華蓋湯 治上喘咳嗽。兼治膈熱。

桑白皮

陳

麴炒香

桔梗炒一

人參

百合

杏

仁法炒

炙甘草五錢

水煎三錢溫服。日二。

涼膈散 治肺熱咳嗽。

甘草生二兩

雄猪膽汁浸五日。炙香爲末。蜜丸如梧桐子大。薄荷湯下二十九。

馬兜湯 治肺熱嗽。氣急喘悶。

馬兜鈴微炒

桑白皮一

苦葶藶桑紙

炙甘草五錢

半夏薑餅製

薑水煎三錢。空心溫服。

呷嗽

論曰。呷嗽者。咳而胸中多痰。結於喉間。與氣相擊。隨其吸呼。呀呷有聲。故名呷嗽。宜調順肺經。仍加消痰破飲之劑。

射干丸 治久呷嗽。喉中作聲。發即偃臥不得。

射干一兩 半夏 陳皮 百部

款冬 細辛 乾薑 五味子

貝母 白茯苓 皂莢去皮 郁李仁一兩

共末。蜜丸如梧子大。空心飲下二十丸。

杏仁丸 治呷嗽有聲。

杏仁去皮 甘草炙一 大黃蒸 牙硝熬五

共末。蜜丸如梧子大。空心薑湯下二十丸。

紫苑杏仁煎 治肺臟氣積。呷嗽不止。因肺虛損。致勞疾相侵。或胃中冷。膈上熱者。

紫苑 酥二兩 杏仁去皮尖 貝母

薑汁三兩 大棗去皮核 五味子 人參

白茯苓 甘草 桔梗 地骨皮洗一

白蜜一斤 生地汁五合

共末。與蜜汁同煎百沸。器盛。蒸三五次成飴煎。仰臥含化一匙。日二。

五臟諸咳嗽

論曰。內經謂肺咳之狀。咳而喘息有音。甚則吐血。心咳之狀。咳而心痛。喉中介介如梗狀。甚則咽腫喉痺。肝咳之狀。咳而兩脅下痛。甚則不可以轉。轉則兩脇下滿。脾效之狀。咳而右脅下痛。陰陰引肩背。甚則下可以動。動則咳劇。腎咳之狀。咳則腰背相引而痛。甚則咳涎。五臟之咳。久而不已。乃傳六腑。六腑之咳。內經論之詳矣。

前胡湯 治五臟諸咳嗽。

前胡 五味

生地 澤瀉

半夏 貝母

麻黃 人參

山藥 白朮

白茯苓 杏仁

甘草 葛根

烏梅去核炒

薑水煎三錢。空心溫服。

五靈脂湯 治肺咳嗽及諸嗽。

五靈脂

馬兜鈴一兩

人參

五味

甘草炙

桑白皮蜜炙

陳皮去白

杏仁去皮炒

薑水煎三錢。空心溫服。日二。

人參桔梗散 治心咳嗽。咽喉腫痛。

人參一兩

桔梗炒

白茯苓

牛蒡子炒

甘草炙

共末。薑湯空心下二錢。日二。

木乳散 治肝咳嗽。兩脇下滿。木乳即皂莢樹根皮

木乳瀝

杏仁去皮炒

貝母去心

甘草炙

共末。薑橘湯下二錢。

半夏陳皮湯 治脾咳嗽。

半夏

陳皮

杏仁一兩

赤茯苓

柴胡

麻黃一兩

生薑

甘草五錢

水煎三錢。空心溫服。

四味散 治腎咳嗽。

補骨脂炙

牽牛子炒生

杏仁一兩

郁李仁五錢

共末。茶下二錢。

黃耆散 治大腸咳嗽。

黃耆

人參

白茯苓

桑白皮二兩

甘草三兩

共末。湯下二錢。

半夏桔梗湯 治脾肺寒熱。勞咳。痰盛嘔逆。

半夏

桔梗

桑白皮

膽南星二兩

薑棗水煎三錢。溫服。

阿膠散 治肺胃不調。久咳不差。

阿膠

甘草

桔梗炒

桑白皮五錢

細辛一錢

共末。空心薑湯下二錢。日二。

鹿角膠湯 治大腸咳嗽。

鹿角膠

杏 仁法去皮尖

甘草

半 夏薑汁

麻 黃去根節

薑水煎三錢。空心溫服。

人參丸 治脾胃虛弱。痰壅咳嗽。

人 參 木 香

訶梨勒煨取皮

共末。蜜丸。梧子大。空心飲下二十丸。

咳嗽上氣

論曰。諸氣皆屬於肺。肺氣和平。則升降自若。若為寒邪所傷。則肺氣壅塞。不得宣通。故咳嗽而上氣。其症咳嗽多涕唾。甚者面目浮腫。久而不已。肺氣虛極。風邪停滯。令人胸背痛。以至唾膿血也。

潤膈丸 治積年咳嗽。上氣涎吐稠黏。五心煩躁。不思食。肺經留熱。

阿膠

熟地

人參

山藥

五味

白茯苓

遠志

防風

麥冬

貝母

杜仲

丹參

茯神

柏子仁

百部五錢

共末。蜜丸如彈子大。水煎一丸服。

香豉豆湯。治三十年咳嗽上氣。

豉炒五

細辛

杏仁

甘草

吳茱萸洗一兩

紫苑二兩

共末。蜜為丸。如梧桐子大。含化。日二。

郁李仁煎。治積年上氣。咳嗽不得臥。

郁李仁二兩

水二升。研如杏酪。去滓。責令無辛氣。入酥二棗許。和勻。空心頻頻溫服。

檳榔湯。治上氣腹脹。胸脅痛。咳嗽不下食。

檳榔十四

白蜜二合

生薑

酥三兩

乾薑一兩 枇杷葉一把去毛蜜炙

水三升煎一升去滓入酥蜜再沸分三服。

柴胡桑皮湯 治咳嗽上氣促急心躁寒熱四肢煩痛夜甚。

柴胡 桑白皮 天雄 枳殼

大腹皮 麻黃去根 羌活兩半 川黃連

甘草 桂心 川歸一兩 白梅四枚

片苓 旋復花五錢

薑水煎三錢服。

柴苑湯 治咳嗽上氣。

紫苑 款冬 枳殼 桔梗一兩

赤芍 赤茯苓 陳皮 百合兩半

大腹二枚

水煎三錢服。

四神散 治肺氣不和上氣咳嗽。

百部

白薇

川貝母

款冬花二兩

共末。將酥汁蜜慢煎。入末和勻。熬成煎。用磁瓶盛貯。甑上蒸。頻服一二匙。湯下。

地黃煎。治上氣咳嗽。肺氣壅熱不和。

懷生地升半

麥冬汁

天冬汁

生薑汁五分

玄參

柴胡

黃牛酥

赤茯苓五兩

五味子

款冬花

紫苑

黃耆

川貝母

桂心二兩

杏仁去雙五兩

參二兩

共末。將酥汁蜜慢煎。入末和勻。熬成煎。用磁瓶盛貯。甑上蒸。頻服一二匙。湯下。

內有白蜜五兩。

咳嗽唾膿血

論曰。咳嗽唾膿血者。由肺感寒氣。咳嗽傷於陽也。心主血。肺主氣。血隨氣上逆。故咳而有血。寒邪壅熱於肺間。津液相搏。凝滯蘊結。故化爲膿。因咳而咯吐膿血也。百部丸。治咳嗽上喘吐膿血。胸膈不利。咽喉腫痛。

百部

天冬

貝母

桔梗

紫苑

款冬花二兩

共末。蜜丸如梧桐子大。甘草烏梅湯下三十九。

桑白皮湯 治咳嗽吐膿血痰涎。

桑白皮

麥冬

款冬花一兩

貝母

甘草

黃明膠五錢

水煎三錢溫服。

萊菔子湯 治咳嗽唾膿血痰涎。

萊菔子五錢

白蜜

牛酥

桃仁

杏仁二兩 爛二味同法 研成膏 去皮尖 一兩

熬酥蜜入飴糖膏酥成煎湯化一匙。

蛤蚧湯 治咳嗽咯血吐膿。

蛤蚧

人參

貝母

杏仁

甘草

知母

鹿角膠

葛根

桑皮

枇杷葉酸一

水煎三錢。溫服。

五味子湯 治咳嗽吐膿血連胸膈痛。

五味子

生地

桔根

桑皮

紫苑

續斷

赤小豆

甘草五錢

水煎三錢。入竹茹丸煎溫服。

薤白湯 治久咳嗽。肺虛吐血。將成勞病。

薤白

阿膠

甘草

鹿角膠二兩

水煎三錢。入薤白三寸服。

括樓湯 治咳嗽咯血。喘滿肺痿。

括樓

葛根

防己

杏仁

貝母

馬兜鈴

甘草

阿膠二兩

水煎三錢。入蜜少許。溫服。

杏仁湯 治肺氣壅熱。咳嗽上氣。吐膿血。

杏仁

桑皮

柴胡三分

甘草

桔梗

紫苑

麻黃去根

款冬

川連

茜根

半夏五錢

薑水煎三錢。溫服。

咳嗽失聲

論曰。咳嗽失聲者。蓋肺氣上通於喉嚨。喉嚨者肺之系。肺感寒微者。成咳嗽。咳嗽不已。其氣奔迫。窒塞喉中。故因而失聲也。

杏仁煎

治咳嗽失聲。語不出。

木通

貝母

紫苑一兩

桑白皮五兩

薑汁

飴糖一升

分三劑。每水四鍾。煎去滓。入杏汁糖三之一。成煎貯器中。含化一匙。

補肺人參湯

治氣虛咳嗽。言語聲嘶。飲食減少。日漸消瘦。

人參

黃耆

熟地

桂心一兩

白朮

紫蘇三分

乾薑

杏仁

紫苑

五味五錢

鹿角膠一兩

棗水煎三錢。溫服。

漏聲散 治咳嗽聲不出。

五味子

款冬

人參

木通

細辛

竹茹

石菖蒲

牛酥三兩

杏仁

白蜜

薑汁一升

棗肉二升

桂心三兩

水煎諸味去滓。入酥汁蜜棗慢熬稠。酒下一匙。日三。

紫苑丸 治肺感風冷。咳嗽聲嘶。

紫苑

貝母

款冬

桂心兩半

杏仁

甘草二兩

陳皮

人參

白茯苓

百部一兩

共末。蜜丸如梧子大。空心飲下三十丸。

風冷聲嘶

論曰。其風冷聲嘶者。其聲嘶啞不通暢也。蓋肺象金。金主聲音。人五臟有五聲。皆稟肺氣而通之。今風冷乘於肺經。則氣道不調。故聲音不出而嘶啞也。

杏仁煎 治風冷失聲。語音不出。

杏仁去皮尖爛 桂 心二兩

五味子 貝母

細辛 紫苑一兩

共末。水煎去滓。入蜜、飴糖、薑汁、杏膏慢煎。酒下一匙。

石菖蒲散 治風冷搏肺。氣塞不通。聲嘶不出。

菖蒲 五味子 細辛 陳皮

紫苑 乾薑五錢 訶梨勒 杏仁一兩

共末。酒下二錢。

通聲辛甘煎 治肺氣虛。為風寒所傷。語聲嘶啞。氣息喘急不通。痰逆。上氣咳嗽。

真酥 白蜜 飴糖 薑汁

百部汁 棗 肉一斤 杏 仁一升
用微火慢煎。成煎酒下一匙。

諸氣門

諸氣統論

論曰。內經云。百病所生。生於五臟。肺之所生。獨主於氣。不足有餘。蓋由虛實。故所病不同。其症亦異。怒則氣逆。甚則嘔血及飧泄。故氣逆也。喜則氣和。榮衛通利。故氣緩也。悲則心系急。肺布葉舉。使上焦不通。榮衛不散。熱氣在內。故氣消也。恐則精怯。怯則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。故氣不行也。寒則腠理閉。氣不行。故氣收也。熱則腠理開。榮衛通。汗大洩。故氣洩也。驚則心無所倚。神無所歸。慮無所定。故氣亂也。勞則喘息。汗出內外皆越。故氣耗也。思則心有所存。神有所歸。正氣留而不行。故氣結也。

七氣丸 治寒熱愁怒。驚思恚氣。

大黃 仁 兩

人參

半夏

細辛

柴胡 乾薑 吳茱萸 桔梗

菖蒲五錢 赤茯苓 川芎 甘草

石膏 桃仁去皮 川椒三分

共末。蜜丸如梧子大。飲下三十丸。一方加桂心。

麝香丸 治一切氣逆。胸膈否悶。中脘不快。痰癖留滯。嘔吐惡心。肢體倦。不思飲食。

食。

麝香 丹砂 紫朴 木香

肉桂五錢 半夏 檳榔二兩 丁香

乳香一兩 桂心三分

共末。用薑汁煮半夏末為膏。丸小豆大。陳皮湯下二十丸。

薑香湯 治諸氣不調。胸膈痞滯。升降不勻。

藿香 紫朴 乾薑一兩 甘草

青皮三分 桂心五錢 枇杷葉一兩

生薑大棗。水煎五錢。空心溫服。日二。

上氣

論曰。凡人一日一夜。共一萬三千五百息。呼隨陽出。氣於是升。吸隨陰入。氣於是乎降。一升一降。陰陽交通。氣乃和融。所謂上氣者。蓋氣上而不下。升而不降。喘息有聲是也。本於肺臟之虛。腹感風邪。肺脹葉舉。諸臟氣又上衝而壅遏。此所以有上氣之候也。

地黃煎 治上氣乏急。

生地汁 升半

生薑汁

牛酥 半升

白蜜 一升

淡竹葉 半升

杏仁 二兩去皮半

炙甘草

貝母 去心

蘇子 二兩

赤茯苓

紫苑 兩半

水四升。煮竹葉、甘、茯苓、蘇、苑。去滓。入汁。蜜熬成煎。重湯煮攪稀飴。含化一匙。

款冬花湯 治上氣咽中不利。

款冬

五味子

半夏 二兩

射干

細辛

紫苑 一兩

麻黃 三兩

薑棗水煎三錢。空心溫服。

酥蒜煎 治上氣喘急。

酥半斤 大蒜三枚

以酥煮蒜。去蒜入薑汁成煎。頻服一匙。

雙仁丸 治上氣喘急不安。

桃仁 杏仁 杏仁俱去皮尖妙

爛研。水和生麵為丸。如梧桐子大。薑蜜湯下二十丸。

上氣喉中如水雞聲

論曰。肺主氣。上通於喉。隴。肺經客寒。則喉隴不利。痰唾凝結。氣道奔迫。喘息有聲。聲如水雞。

半夏丸 治上氣咳嗽。喉中作聲。坐臥不得。

半夏 紫苑 桑皮一兩 百部

款冬 射干 陳皮 五味

貝母

皂莢炙

赤茯苓三分

杏仁兩半

細辛五錢

共末。蜜丸如桐子大。薑棗湯下二十九丸。

射干湯 治咳而上氣。喉中如水雞聲。

射干

半夏

五味

款冬

紫苑二兩

細辛

麻黃

生地四兩

大棗水煎五錢。溫服。

短氣

論曰。短氣不足以呼吸者。肺虛也。倚息短氣不能臥。其形如腫者。飲也。短氣上喘。氣道促急者。肺虛而寒邪實也。如是者。不可概而論之。

紫蘇湯 治卒短氣。

紫蘇二兩

陳皮五錢

大棗酒水煎三錢。溫服。

拘杞湯 治短氣。

拘杞

薑棗水煎三錢。溫服。

陽厥

論曰。內經云。有病怒狂者。生於陽也。陽氣者。因暴折而難決。故善怒也。病名曰陽厥。夫陰陽未可偏勝。則氣逆。陽厥者。陽勝而氣逆不調也。蓋陽氣暴折。則鬱而不散。故多怒而狂。怒則氣上。故頸脈動而大疾者。爲陽厥之症也。其治奪食卽已。蓋食入於陰。長氣於陽。陽盛故厥逆怒狂。奪食者。所以平其氣也。

鐵落飲 治陽厥善怒。除煩下氣。

鐵落卽樂音鐵

每服重湯溫一鍾飲之。

竹瀝石膏湯 治陽厥多怒。狂躁不安。上攻頭頸。

竹瀝

石膏兩半

山梔

生地

玄參

赤茯苓

升麻

知母三分

薑水煎三錢。入竹瀝服。

犀角丸

治陽氣偏勝。氣厥多怒。如發狂狀。心胸煩滿。念念多怒。頸脈疾動。

犀角

防風

甘草一兩

枳殼

石膏五錢

升麻

姜蕤三分

共末。蜜丸如梧子大。飲下二十九。

定神丸 治陽厥怒狂。

白茯苓

遠志

人參

防風

柏子仁一兩

甘草一兩

龍骨兩半

牡蠣

棗肉一兩

共末。蜜丸如梧子大。湯下二十九。

羚羊角湯 治陽厥氣逆。善怒狂妄不常。

羚羊角

五味子

沙參

棗仁

茯神

遠志

姜蕤一兩

龍骨錢五

爲粗末。薑水煎三錢服。日二。

積聚門

積聚統論

論曰。積者五臟所生。氣之所積。名曰積。其始發有根本。其痛不離其部。由陰氣所生也。聚者六腑所成。氣之所聚。名曰聚。其始發無根本。其痛亦無常處。由陽氣所生也。然又有癥瘕癥結者。乃積聚之異名也。症狀不一。原其病本。大約相類。但從其所得。或診其症狀。以立名爾。且癥者爲隱現腹內。按之形症可驗也。瘕者爲瘕聚。推之留移不定也。癥者癥側於脅肋。結者沉伏結強於內。然有得之於食。有得之於水。有得之於憂思恚怒。有得之於風寒。種種不一。凡使氣血沉滯留結而爲病者。治須漸磨潰削。使氣血流通。則病自愈矣。

積聚

論曰。經云病有積有聚。何以別之。夫積者陰氣也。聚者陽氣也。陰沉而伏。陽浮而

動。故氣之所積。名曰積。氣之所聚。名曰聚。然積者。五臟所生。聚者六腑所成。積之爲病。其始發有常處。其痛不離其部。上下有終始。左右有所窮盡。聚之爲病。其始發無根本。其痛亦無常處。上下無留止。此積聚之分別也。

鼈甲丸

治腹內積聚。心肋氣滿。時吐清水。惡寒不下食。

鼈甲 醋炙

大黃 炒

檳榔 二兩

人參

附子

前胡

白朮

黑乾薑

枳殼

防葵

川歸

桔梗

甘草 一兩

食茱萸

紫朴 三兩

共末。入蜜杵丸。如梧子大。空心酒下三十丸。

萬靈丸 治積聚滯氣。胸膈否悶。心腹刺痛。

雄黃

陳皮 炒去白

大黃

白丑 一兩

肉桂 蓉

京三稜 煨

杏仁

巴豆 去油

乾漆 炒烟

青皮 五錢

訶勒皮 三分

天南星 薑製

木香

藿香 葉

白朮 炒一

胡椒 半分

共末。薄荷汁糊為丸。如小豆大。傷食薑湯下三五丸。傷酒薑湯下十丸。
大五積丸。治五積胸膈否悶。腹脅脹滿。宿食不消。積氣成塊。心腹疼痛。不能飲

食。

礪砂

芫花

乾漆炒一兩

木香同後

巴豆去心油

皂莢去皮

烏頭去皮臍三分同上

大黃炒

京三稜煨

鱉甲醋炙

川歸

陳麩

青皮去白

桂心三分

共末。用膏丸加小豆大。茶酒任下五七丸。欲疎利服十丸。

十味五積丸。治五積氣嘔吐酸水。心腹脹悶。不思食。

沉香

陳皮炒白

甘松

京三稜五錢

芫花醋炒

牽牛搗取

木香

甘遂連珠

大戟

薑黃一兩

共末。糊為丸。如梧子大。用陳皮湯空心下二三十丸。

木香丸。治五種積聚成塊。

木香

檳榔

人參

郁李仁

訶勒皮

大黃微瀝

蘇子

白芍

赤茯苓

枳殼去白

黑乾薑

硝石二兩

共末入蜜為丸。如梧子大。酒下二三十丸。

牛膝芍藥丸。治積聚癥瘕氣塊。

牛膝

白芍藥

大黃炒

桔梗

赤茯苓

訶梨勒取皮

柴胡

紫朴薑炒

枳殼

檳榔

陳皮去白

共末入蜜杵丸。如梧子大。空心大棗湯下二三十丸。

肥氣

論曰。凡人積氣在左脇下。如覆杯有頭足者。名曰肥氣。乃肝之積也。蓋肝藏血。故陰多而陽少。發為積氣。由肺病傳肝。肝傳脾。脾以季適王而不受傳。是邪氣留於肝。故積為積氣。久不愈。令人發欬逆痰瘧。連歲不已。此陰盛陽虛故也。

蓬壘根湯 治久積結癖氣不散。左脇下如覆杯。吐酸水。面色黃。此名肥氣。并女人血瘕。

蓬壘根

懷生地二兩

川歸

赤芍藥一兩

丹皮

枳殼炒

桂心三分

生薑錢五

水煎三錢。空心溫服。日二。

青蒿汁湯 治久積肥氣。寒熱痰瘧。

青蒿汁一合

生薑汁

童便半合

常山

柴胡三分

烏梅肉炒

鼈甲醋炙

炙甘草一分

水煎五錢。去滓。入三汁。少許沸服。日二。

酸棗仁丸 治肝積肥氣。久不已。變成寒熱痰瘧。令人熱多寒少。小便赤澀。咳逆。

酸棗仁生

蘇子

木通

薏苡仁

黃耆

枳殼麥麩炒

木香

坐躄草

升麻

大黃

麥門冬

赤茯苓一兩

共末。入蜜杵丸。如梧子大。麥冬湯下二三十九丸。日二。

石葦丸 治肝積肥氣。

石葦去毛

京三稜

附子

陳皮

川椒去目

吳茱萸炒一

共末入蜜杵丸。如梧子大。荆芥湯下二三十丸。

伏梁

論曰。內經謂病有小腹盛。上下左右皆有根。名曰伏梁。裹大膿血。居腸胃之外。不可治。治之每切按之至死。又曰。人有身體髀股胕皆腫。環臍而痛。病名伏梁。此風根也。夫氣之所聚。名曰聚。氣之所積。名曰積。聚。陽氣也。故無留止。積。陰氣也。故有形狀。伏梁。心之積也。起於臍上。故小腹盛。上下左右皆有根。裹大膿血。居腸胃之外。故環臍而痛。此為風水之病。使身體髀胕皆腫。名曰伏梁。以其若梁之隱於伏也。其症有淺深。居臍上為逆。以邪氣之逆上行也。居臍下為從。以邪氣之順下行也。治法不可動。動之為水瀦瀦之病。故曰論在刺法中。

鼈甲湯

治伏梁積氣。

髓 甲 醋炙

白 芍

京 三稜

大 腹 皮 一 兩

懷 生 地

柴 胡

川 歸 兩 半

桂 心

生 薑 三 分

水煎三錢。入木香少許服。日二。

桃奴散 治伏梁積氣。

桃 奴

暴乾為末。空心溫酒下三錢。未差再服。

訶梨勒丸 治憂積伏梁氣。

訶 勒 皮 二 兩

檳 榔

大 黃 兩 半

防 葵

柴 胡

枳 殼 去 白

羚 羊 角

川 連

赤 茯苓

生 薑 兩 半

子 芩

木 通 一 兩

共末。入蜜杵為丸。如梧子大。空心飲下三十九。日二。

痞氣

論曰。凡積氣在胃脘。覆大如盤者。脾積也。痞結不通。故名痞氣。此本肝病傳脾。脾當傳腎。腎以冬適王而不受。邪氣留於脾。故結爲積。久不愈。令人四肢不收。發爲黃疸。使飲食不爲肌膚。所以然者。脾藏肌肉之氣。能與胃行其津液。以榮養四肢。若爲積氣所留。則不能榮養。故有四肢不收。飲食不爲肌膚之症也。

平氣丸

治脾積痞氣。腹脅膨脹。心胸悶痛。不思食。

檳榔一枚 京三稜

砂仁

胡椒五錢

青皮炒一兩

烏梅肉半兩

巴豆三錢 心油法

共末。糊爲丸。如小豆大。薑湯下三丸。

白朮湯

治脾積痞氣。脅肋滿悶。

白朮

紫朴薑汁炒

桂心

柴胡三兩

炙甘草一兩

檳榔十枚

生薑水煎三錢。空心溫服。日二。

勻氣湯

治脾積痞氣。胃脘不安。肌瘦減食。

大腹皮二兩

白朮

桂心

牽牛半生

麥蘗

紫朴薑汁

郁李仁半生

甘草

陳麵一兩

高良薑五錢

生薑大棗水煎五錢。空心溫服。再晚服。

息賁

論曰。凡積氣在左脅下覆大如杯者。肺積也。氣上賁衝息有所妨。名曰息賁。此本心病傳肺。肺當傳肝。肝以春適王而不受。邪氣復賁於肺。故結為積。若久不已。令人灑淅寒熱。喘咳發肺癰。所以然者。肺主氣。外合於皮毛。今肺氣留積。故有咳喘寒熱肺癰之病。

枳實湯 治肺積。息賁。上氣衝。胸滿咳嗽逆。

枳實煨炒

木香

檳榔

炙甘草

葶蘗紙炒

吳茱萸錢五

杏仁去皮尖

葶蘗水煎三錢。空心溫服。日二。

桑白皮湯 治肺積。息賁。上氣。脹滿咳嗽。涕吐膿血。

桑白皮

麥門冬兩半

桂心

甘草五錢

陳皮炒

皂牙去皮炙

生薑水煎三錢。溫服。日二。

半夏湯 治肺積息賁咳嗽。

半夏薑汁

細辛

桑白皮

前胡兩半

訶梨勒煨

桔梗炒

人參

川貝母

白朮土炒

甘草

柴胡一兩

生薑大棗水煎三錢。空心溫服。日二。

賁豚

論曰。凡積氣發於小腹。上至心下。若豚狀。或上或下。來往無時者。腎積也。蓋腎水乘心。其狀賁衝如豚。名曰賁豚。此本脾病傳腎。腎當傳心。心以夏令適王而不受。邪氣復留於腎。故結為積。久不已。令人喘逆。骨痿少氣。所以然者。腎藏骨髓之氣。若其氣留積。不能榮養骨髓。故變為喘逆骨痿之病也。

四味丸 治久積賁豚氣。時攻膀胱痛。

川椒妙出 附子

肉苁蓉

藿香子一兩

共末。蜜丸。如梧桐子大。酒下。

桃仁丸 治腎積氣賁豚。

桃仁去皮尖二兩研用

木香

青皮去白

藿香子妙 桂心五錢

檳榔三分

黑乾薑一分

共末。膏丸。梧子大。酒下三十丸。

化氣沉香湯 治腎積。

沉香 木香

人參

附子

黃耆 烏藥

甘草

五味

大茴 牛膝

石斛

陳皮

高良薑 巴戟天

桂心五錢

生薑水煎三錢溫服。日二。

李根白皮湯 治賁豚氣衝心。汲汲短氣。發作有時。

李根白皮八

人參

附子

甘草二兩

半夏七兩

赤茯苓

黑乾薑

桂心三兩

水煎三錢溫服。日二。

吳茱萸湯 治貴豚氣上衝心胸逆渴。

吳茱萸一兩

人參

甘草

半夏四兩

桂心

薑棗水煎服。

木香散 治一切風。及腎臟貴豚氣上衝。心胸滿悶。

木香一兩

白芷

沉香

杉木節

蓬莪茂

藿香子炒

桂心

青皮五錢

木瓜

枳殼炒三

共末。薑湯下二錢。

磁石散 治貴豚冷氣上衝。昏亂。四肢軟弱不收。

磁石

木香

檳榔

肉豆蔻一兩

共末。葱白酒下二錢。日二。

壓氣木香丸 治貴豚氣上衝胸膈。

木香

丁香

肉豆蔻

白豆蔻

吳茱萸 鈔五

沉香 三分

青皮 一分

麝香 二錢

共末。用礪砂猪膽汁和丸。梧子大。酒下二十九丸。

木香檳榔散 治腎積氣不散。結伏貴豚。發即上衝心胸。令人喘逆。骨痿少氣等疾。

木香

檳榔

白芷

沉香

磁石

大茴

川芎

訶勒皮

牡蠣 五錢

桂心

陳皮 三分

共末。生薑鹽湯下二錢。

諸瘕

論曰。積氣在人腹中。久不差則牢固。推之不移者。瘕也。此由寒溫失宜。飲食不節。

致臟腑氣虛弱。食飲不消。按之其狀如杯盤牢結。久不已。令人體瘦而腹大。至死不消。診其脈弦而堅。其狀不轉動者。此其症也。

驚甲丸 治諸癥塊衝心氣滿。不下食。手足煩悶。

驚甲

訶勒皮二兩

人參

炙甘草

防葵

大黃兩半

白朮

郁李仁

桂心

杏仁去皮尖一兩研成膏

共末入蜜杵丸。梧子大。酒下二三十丸。

夾食丸 治癥癖食氣食勞。五膈痰逆。

乳香

木香

川歸

肉蔻

乾薑

京三稜濃

附子

丹砂

青皮

巴豆去油

紫苑

驚甲醋炙

丁香

共末入蜜杵丸。小豆大。丹砂爲衣。酒下三五丸。

吐衄瘕

論曰。結瘕者。積聚之類也。聚積久不散。謂之結。浮流腹內。按抑有形。謂之瘕。結之症候。形體瘦瘁。飲食不作。肌膚遇陰寒冷溼之氣。則發而腹脅塊硬。隱隱然痛者。是也。瘕之症候。腹中氣痛動轉。橫連脅下。有如癰氣。遇脾胃有冷。陽氣不足而發動者是也。

紫葛丸 治結瘕腹脹。堅硬如石。肚上青筋浮起。

紫 葛

郁李仁一兩

木 香

桔 梗

訶勒皮三分

大 黃炒兩

紫 苑三分

牽牛子五錢半

共末。入蜜杵丸。梧子大。木通大棗湯下二十九丸。

疝氣

論曰。疝氣謂臍腹左右緊硬而痛。橫逆如臂。取象如弓弦之急。故謂之疝氣。蓋因寒溫失宜。房勞過度。真陽虛憊。陰冷内生。所以水飲入於胃而不能銷鑠。流於脅下。經久不去。遂成痼疾。若遇陰寒。或食冷物。則作痛。久之則不能飲食。致肌膚消瘦。

訶梨勒丸 治痰氣胸脅滿。大腸常澀。

訶 勒

桂 心

白 芍

大 黃炒

甘 草

烏 藥

防 葵一兩

鼈 甲二兩

共末入蜜杵丸如梧子大。薑湯下二三十丸。

附子草薺丸 治痰氣急痛。嘔吐酸水。

附 子

草 豆薺二兩

桂 心

吳 茱 萸一兩

木 香五錢

桃 仁三兩去尖

丁 香三分

共末入糊丸梧子大。薑橘湯下二三十丸。

大黃丸 治痰氣急痛。嘔吐酸水。大便不通。滿悶。

大 黃二兩用酒二升煎成

丁 香

檳 榔煨三分

木 香

訶 梨 勒皮煨取

桂 心一兩

共末同煎杵丸。小豆大。酒下二三十丸。

京三稜丸 治五積痰癖氣塊。

京 三 稜

木 香

青 皮

檳 榔

石三稜

鷄爪三稜五錢

肉豆蔻二枚

礞砂三分

共末。用薑汁糊丸。梧子大。薑湯下二三十丸。

緩中丸 治痰氣急痛。腹脹胃脘痛。不下食。嘔逆。

乾薑

甘草一分

人參

附子

白芍

陳皮

檳榔

桂心

枳殼

鼈甲

半夏

紫朴五錢

薑水煎服。

酒癖

論曰。胃弱之人。因飲酒過多。酒性辛熱。善渴而引飲。遇氣道否塞。酒與飲俱不化。停在胸肋。結聚成癖。其狀按之有形。或按之有聲。脇下弦急。脹滿。或致痛悶。肌瘦不能食。因酒得之。故謂之酒癖。

乾薑丸 治酒痰癖水。飲不消。兩脅脹滿。時嘔吐。腹中水聲。

乾薑

葛根

枳殼一兩

白朮二兩

陳皮三分 甘草五錢

共末入蜜杵丸梧子大。飲下三四十丸。

栝蒌散 治酒癖脅下脹滿不能下食。

栝蒌實一兩 陳麴五錢

共末空心葱白煎湯下二錢日二

聖濟總錄卷七 積聚門 酒癖

聖濟總錄纂要

清

新安

程

林雲來纂輯

鄞縣

曹炳章赤電校點

卷八

吐血門

吐血統論

論曰。吐血病有三種。一則緣心肺蘊熱。血得熱則妄行。下流入胃。胃受之則滿悶。氣道貫衝。故令吐血。二則虛勞之人。心肺內傷。恚怒氣逆。肝不得藏血。乘虛而出。因怒氣逆。甚則嘔血。三者緣酒食過飽。胃間不安。或強吐之。氣脈貫亂。損傷胃心。血隨食出。此名傷胃。

黃耆散 治吐血。

綿黃耆

白芨

白斂

黃明膠四粉

共末。空心飲下二錢。

綠雲散 同前。

百合

人參

側柏葉

阿膠二粉

共末。空心飲下二錢。

神效鹿角散 治吐血咯血。

鹿角膠

川柏鈔五

杏仁去皮尖

共研入白麵。水下二錢。

阿膠散 治咯血吐血。

阿膠

白芨

白芷

白斂

川柏蜜一兩

共末。飲下二錢。

藕汁茯苓散 治吐血不止。

生藕汁

白茯苓

懷生地

炒黑蒲黃等分

以三味共末。調藕汁下二錢。

補肺猪肺散 治吐血咯血等。

杏 仁仁皮尖研極爛去雙

熟糯米三合

百合四兩

葱白三莖

共和勻。用猪肺一具。去筋管膜。同煮熟。蜜湯下。

異攻散 治吐血不差。

人參一兩

研極細。五更時打雞子清和服二三錢。

黃藥子散 治吐血。

黃藥子

防己等分

共末。用小麥湯下一錢。吐甚者一服減。二服止。

艾灰散 治吐血。

艾葉

燒灰存性為末。新汲水空心下二錢。

竹葉芍藥湯 治吐血衄血。大小便出血。

淡竹葉 六合

赤芍

甘草 一兩

阿膠 三兩

川歸 兩半

水煎五錢溫服。日二。

地黃藕汁飲 治心肺熱極。喘悶吐血。

生地汁

生藕汁

生薑汁

小薊根汁

生牛蒡子汁

生白蜜 等分

共和勻。徐呷數口。

地黃飲 治吐血不止。

懷生地 取一兩

鹿角膠 炙一兩

童便五合煎沸。入汁末十數沸。分三服。

吐血不止

論曰。藏真高於肺而主氣。藏真通於心而主血。藏真散於肝而藏血。是三者。或因

憂愁思慮。與夫恚怒氣逆傷之。則氣亂而血妄行。下入於胃。胃受之則脹滿。其氣貴衝於上。故吐血不止也。

白金散 治吐血肺元受損。

上白麵

石菖蒲一兩

共末。空心水下二錢。暑毒氣。薑汁蜜水下。

白斂湯 治吐血咯血不止。

白 斂三兩

阿膠二兩

用酒水合煎三錢去滓。入生地汁半合。沸服。

生犀桔梗散 治吐血似鵝鴨肝。晝夜不止。

生犀角

生桔梗一兩

共末。空心溫酒下二錢。晚下一錢。

補肺百花煎 治吐血不止兼咳嗽。

生地汁

生藕汁一升

生薑汁半升

黃牛乳 升半

胡桃肉十枚

大棗二十枚

乾青柿五枚 作糲 研

好白酒一升。同上數味煎如錫。入後藥。

黃明膠炙研五錢

杏仁去皮尖

秦朮五錢

同上合煎減半。入蜜四兩。養成煎。空心用糯米飲下一二匙。日三服。酒下亦可。

阿膠湯 治吐血不止。

阿膠炒研

熟艾三兩

白芍

地榆四兩

小薊根五兩

水煎五錢。

土馬驥湯 治心肺蘊熱。恚怒氣逆。便血妄行。日夜不止。

土馬驥焙二兩

人參

白茯苓

秦朮

炙甘草

枳實炒

懷生地酒洗

柴胡一兩

水煎五錢。空心溫服。日二。

嘔血

論曰。憂愁思慮則傷心。恚怒氣逆。上而不下則傷肝。蓋心主血。肝藏血。二臟俱受

傷。則血溢妄行。流散不止。氣逆則嘔吐而出血也。

三汁飲 治吐血、嘔血、衄血等。

麥冬汁

生地汁

生藕汁

熟冷水鍾一

白藥一兩

和勻溫服一二鍾。以差爲度。

生地黃湯 治憂愁恚怒。嘔吐出血。煩悶少氣。胸中痛。

懷生地半斤

阿膠粉炒

炙甘草兩半

用大棗水煎五錢。空心溫服。日二。

荊芥穗飲 治嘔血不止。

荊芥穗

山梔仁

片苓

蒲黃一兩

水煎五錢。空心溫服。晚再服。以差爲度。

唾血

論曰。邪熱熏於肺則損肺。恚怒氣逆傷於肝則損肝。肺肝傷動。故令人唾血。如唾

中有若紅縷者屬肺臟。如脇下先苦痛。而後唾鮮血者屬肝經。俱可折而治之。
紫苑散 治肺氣內傷。邪熱熏積。欬唾有血。

紫苑

川歸

川芎

附子

款冬

五味子

白朮

桂心

生地

甘草

細辛

側柏葉

杏仁

去皮尖

貝母一兩

共末入蜜少許。和滾湯空心下二錢。晚再下。

蒲黃散

治唾血不止。

蒲黃生一兩

研羅細末。用冷水和三錢。空心下。日二。

舌上出血

論曰。心主血。在竅爲舌。若心臟蘊熱。血得熱而妄行。或溢於心之竅。故有舌上出血之症。甚者出如涌泉。

升麻湯 治心臟有熱。舌上出血。勢如涌泉。

升麻

茜根

小薊根 兩半

熟艾 一把

凝水石 三兩

水煎三錢去滓。入生地汁半合。再沸服。日二。

阿膠散 治舌上出血不止。

阿膠 膠粉炒

黃耆 蜜炙

蒲黃 新者

共末。用生地汁空心下二錢。

熟艾葉湯 治心臟熱。舌上出血。及一切失血。

熟艾葉 用糯米炒

松黃

側柏葉 炙一

水煎三錢。空心溫服。日二。

汗血

論曰。內經云。臟經通於心。血脈之氣行焉。又曰。肝藏血。故人臥。血歸於肝。然血雖藏於肝。而妄則行之。若肝心二臟俱傷於邪。則血隨心液為汗而出。是為汗血也。

人參湯 治肝心二臟傷邪汗血。

人參 赤芍

白朮

甘草

桂心一兩 川歸

淡竹茹

川芎

子芩二兩

水煎三錢。空心溫服。日二。

神白散 治血汗從膚腠中出。

人中白

用瓦上炙乾研成末。入麝香末少許和勻。空心酒下二錢。

如聖散 治汗血不止。

郁李仁去皮

研爛。用梨取汁下一錢。日二。

竹茹湯 治吐血、汗血、尿血。

竹茹 人參

白芍

生地

甘草 川歸

桔梗炒

川芎

桂 心一兩

水煎三錢。空心溫服。以差爲度。

鼻衄

論曰。脾移熱於肝。則爲驚衄。是木剋土也。蓋脾土熱氣移於肝木。則神魂驚恐。而血行不由其道。夫肺主氣。開竅於鼻。血隨氣上。今血既妄行。故於鼻出而爲衄也。

懷生地

生藕節一兩

水煎五錢。空心溫服。以差爲度。

蒲黃散 治鼻衄。

蒲 黃

櫻

櫚燒存性

川 歸

阿 膠

亂髮灰

柏子仁

燒研一錢

共末。用藕節汁空心下二錢。如肺損傷吐血。生地汁下。腸風下血。樗根皮湯下。女人赤白帶。艾葉湯下。日二服。

貼背膏 治上焦肺壅熱鼻衄。

京三稜一枚
大者

溼紙包煨熟。乘熱爛搗。用醋煮糊。貼背上第三椎骨。

貼鼻方 同前。

鹿角膠

用沸湯浸軟一薄片。貼鼻凹上差。

紮耳方 治肺壅熱鼻衄。

玄胡索

爲末。綿包紮耳內。左衄扎右。右衄紮左。左右俱衄。兩耳俱紮。

吹鼻方 同前。

石榴花取百葉者

陰乾爲末。用少許吹鼻中。卽差。

葱白汁 同前。

葱白汁

以汁入酒少許。點二三匙。滴入鼻中愈。

衄不止

論曰。榮衛之行。常與胃氣相隨。則氣與血。未嘗一刻相離。蓋肝藏血。肺主氣。榮衛和平。則氣血調順。若人臟腑有熱。熱乘血氣。血性得熱。流溢妄行。夫肺開竅於鼻。故其發爲鼻衄。衄不止者。臟虛血盛故也。內經又云。脾移熱於肝。則爲驚衄。蓋脾土也。肝木也。今脾移熱於肝。則木不能制土明矣。肝藏血。其神魂。故爲驚衄之病。髮灰散。治衄不止。

亂髮灰一錢

人中白五分

麝香一

共研。用少許吹鼻中。立愈。

車前子散。治衄血不止欲死者。

車前子

牛耳內垢等分

用車前子爲末。與垢同研。和成挺子。塞耳中差。

柳枝散 同前。

柳枝寒食日收人參一分

共末。空心溫水下二錢。日二。

人參蓮心散 治血衄不止。

人參一錢 蓮子心一分

共末。空心溫水下二錢。以差爲度。

玉粉散 治鼻衄日夜不止。頭痛心煩。

石膏膏研牡蠣童便

共研極細。溫水下二錢。日二。

二花散 同前

酸石榴花 黃蜀葵花 一兩

共末。水煎三錢。溫服。日二。

粟灰散 治衄不止。

生栗取獨顆或中楮七枚連皮燒灰末

入麝少許研勻。酒下三錢。日二。

法紙散 治衄血不止。

衄血時以紙接血。將紙焙乾。燒灰溫水和服。但不可與病人知。

燈心散 同前。

燈心爲一兩

丹砂飛過一錢

共末。空心飲下二錢。頃再服。

大蒜貼足 治衄血不止。諸藥無效者。

大蒜法皮

研爛。用帛攤錢大。左竅出。貼左足心。右竅出。貼右足心。兩鼻並出。二足並貼。血

止急洗去。

通神散 治衄不止。心神悶亂。頭旋欲倒。

亂髮燒灰

伏龍肝一兩

共末。用溫水空心下二錢。頃再服。

茅花湯 治血衄不止。

茅花

用水煎濃汁二碗。分二服。如無花。以根代之。

大衄

論曰。大衄者。口耳皆出血是也。蓋血爲榮而藏于肝。氣爲衛而生於肺。肺開竅於鼻。二者相爲流通。若熱氣乘血。熱盛則氣血妄行。與衛氣錯溢於上竅。故鼻衄不已。而口耳皆出血也。是名大衄。

南天竺飲 治血妄行。九竅皆出。服藥不止者。

南天竺草生瞿麥者
是一大把

山 梔三十
枚 生 薑一兩

燈 心一把 炙甘草五錢

大棗肉五枚

用水一大碗。煎減半。空心溫服。

苦參湯 治大衄。口耳皆出血不止。

苦 參 川 連一兩

山 梔七枚 大 黃微炒
兩半

水煎五錢去滓。入生地汁服。

陷膠湯 阿大衄不止。

阿膠粉炒研 蒲黃五錢

水煎三錢去滓。入生地汗服。急帛繫兩乳。

白龍骨散 治大衄不止。

白龍骨煨

爲末。用少許吹鼻中。立止。

生地飲 治大衄出血。血上心胸。氣急勞熱。

懷生地四兩

子芩

赤芍藥

青竹茹三兩

蒲黃三合 地骨皮五兩

水煎五錢。空心溫服。晚再服。以差爲度。

衄蟻汗血

論曰。內經謂膽移熱於腦。則酸頰鼻淵。傳爲衄蟻。瞑目。夫血得熱則涌溢。得寒則凝泣。若膽受胃熱。循脈而上。乃移熱於腦。蓋陽絡溢則血妄行。在鼻爲衄。在汗空爲蟻。蟻者。皆熱厥血溢之過也。今之治衄蟻者。專於治血。不知血之行留。氣爲之

本。猶海水朝夕兩潮。乃陰陽之氣使然也。明夫經絡順逆。則血與氣俱流通。而無妄行之患矣。

青竹茹湯 治熱盛所致。衄血汗血。

青竹茹

子 芩

懷生地二兩

白芍藥

麥門冬

蒲 黃一兩

水煎五錢。空心溫服。以差爲度。

地黃散 治血汗不止。

懷生地

阿 膠沙兩

蒲 黃二兩

共末。空心飲下二錢。日二。

刺薊湯 治熱氣上行。衄血汗血。

刺 薊

紫 蘇二兩

川 連

犀 角

懷生地一兩

水煎五錢。溫服。

獨聖湯 治血熱妄行。或衄或蟻。

子芩

用酒浸微炒。水煎七錢。空心溫服。立差。

脚氣門

脚氣統論

論曰。風毒中人。隨處悉能爲病。偏著於脚何耶。蓋五臟經絡。心肺起於手十指。肝腎脾起於足十指。地之蒸溼毒氣。足先受之。久而不差。漸至四肢。腹背頭項。古人所謂微時不覺。痼滯乃知。所以謂之脚氣。其症不一。或見食嘔吐。憎聞食臭。或腹痛下利。或二便秘塞不通。或胸中忡悸。不欲見明。或精神昏憤。或善忘語錯。或壯熱頭疼。或身體冷痛。或時覺轉筋。或小腹不仁。或髀腿頑痺。或縱緩不隨。或腫或不腫。或百節攣急。凡是之症。皆脚氣候之。治法固多。惟孫思邈云。不得大補。亦不得大瀉。故須湯劑爲治法之最。學者宜加意焉。

風毒脚氣

論曰。內經謂暑勝則地熱。風勝則地動。溼勝則地泥。寒勝則地裂。寒暑風溼之氣。皆本乎地。人或履之。所以毒亦易中於足也。因病從脚起。故謂之脚氣。况五臟流注。脾與腎肝之經絡。皆起足指。故有風毒脚氣之病。其病或見食嘔吐。或腹痛下利。或便溲不通。或胸中驚悸。不欲見明。或言語錯忘。或頭痛壯熱。或身體冷疼。轉筋脛腫。癢痺緩縱。其狀不一。治不可緩。稍緩氣上入腹。或腫或不腫。胸中逆滿。上氣肩息者。死不旋踵。寬者數日必死。不可不急治也。但看心下急。氣喘不停。或自汗數出。或乍寒乍熱。其脈促短而數。嘔吐不止者。死。故不可緩也。

木瓜虎骨丸 風毒脚氣。疼痛少力。筋脈拘急。行步艱難。

木瓜

虎脛骨

沒藥

當歸

麒麟竭

骨碎補

木香

自然銅醋碎

敗龜板

楓香

安息酒重湯

桂心

甜瓜子一兩

地龍二兩

乳香五錢同後藥麟竭研入木瓜內用黑水洗安木瓜於中蒸爛研膏

共末膏丸。入酒少許。丸梧子大。木瓜湯下三十九。日二。

大續命湯 脚氣痺攣不隨。風毒攻四肢。壯熱如火。頭項攣急。氣衝胸中。

當歸 人參 防風 麻黃去根

石膏二兩 芎藭 杏仁炒微 赤芍

黃芩 炙甘草 桂一兩

薑水煎四錢。

越婢湯 風毒脚氣痺攣。行步不遂。

麻黃 石膏四兩 白朮二兩 附子

炙甘草一兩

薑水煎四錢。

木香散 脚氣緩弱。大肉頑痺。肢節疼痛。

木香三兩 牛膝 草薢 羚羊角

陳皮 杏仁 獨活 丹參

杜仲 秦艽 桂一兩 車前五錢

薑水煎三錢。日三。

犀角丸 風毒脚氣上衝。散入四肢。虛腫無力。

犀角二兩

白朮

檳榔

人參

川芎

赤茯苓

羌活

木香

防風

石斛

牛膝一兩

蜜丸。梧子大。酒下二十九日二。

五柔丸 腎虛冷。腎風或頭風。兼風毒脚氣。

大黃二斤蒸

前胡半兩

白芍

半夏

菴蓉

葶藶紙炒

赤茯苓

細辛

當歸四兩

蜜丸。梧子大。飲下五七丸。日二。以利為度。

蘆根湯 風毒脚氣。昏煩壯熱。頭疼嘔吐。口乾。

蘆根半兩

赤茯苓

葛根

知母

淡竹葉

麥冬三分

炙甘草五錢

水煎五錢。日二。

淋瀝方 風毒脚氣。腰膝癱痺腫。行履不得。皮膚如小蟲行。

羊桃

蒟藳

蒺藜

蒼耳

海桐皮

柴胡

白茯苓

柳木蠹末

水紅花一兩

水五斗。煎二斗。去滓淋洗。慎避風冷。

淋洗方 風毒脚氣。腰膝癱痺腫。行步不得。皮膚如蟲行。

水菘

附子

露蜂房

茵芋二兩

川椒一兩

蒟藳四兩

水五斗。煎取汁三斗。避風淋洗。

脚氣痺攣

論曰。脚氣痺攣者。寒氣多也。寒搏於筋脈。結而為病。則筋急不能轉側。行步艱難。甚則不可屈伸也。

肉菘菴丸 風溼脚氣。客搏筋脈。痺攣不仁。

菴蓉

牛膝

天麻

黃耆

何首烏

木瓜

各十兩 循五斤 良瓜一日晒入後藥

狗脊

續斷

草薺

三兩

共末。用木瓜三枚。剉空入青鹽一兩。閉口飯上蒸。研膏入上件和丸。如乾加酒

糊丸。梧子大鹽湯酒任下三十丸。

秦芫湯 脚氣行步痺

秦芫

枳殼

白朮

丹參

羌活

人參

柴胡

陳皮

紫蘇

薏仁

桑皮兩半

防風

石斛

大麻仁

炙甘草二兩

水煎五錢日二。

石南丸 脚氣攣痺。去風溼。活血脈。益元氣。

石南

白朮

牛膝同良上

天麻

防風

枸杞

黃耆二兩

鹿茸

桂兩半

共末。用木瓜一枚。去皮瓢。蒸爛搗膏。入糊丸。梧子大。酒下三五十丸。

大腹湯 脚氣痺攣。寒搏筋脈。不能轉側。

大腹四枚

防己

青皮

木通

羌活

紫蘇

草薢

川芎

地骨

訶勒皮五兩

木香五錢

五加皮二兩酒

薑棗水煎三錢。日二。

脚氣疼痛不仁

論曰。脚氣疼痛。皮膚不仁者。蓋人之氣血。得溫則流通。遇寒溼則凝澁。今脚氣之疾。緣風寒溫毒。客於氣血。榮衛虛弱。不能宣通。故有脚氣疼痛。痲痺之症。牛膝丸。下經氣弱。風溼毒氣與氣血相搏。皮膚不仁。足痛不能履地。上攻眼目。

迎風流淚。

牛膝

山黃兩半

防風

羌活

烏頭 川芎 地龍炒 檳榔一兩

共末。酒糊丸。梧子大。鹽湯下二十九。

整痛膏 脚氣腫痛。行履無力。及打撲傷折痛。

烏頭生 乾薑生 五靈脂生一兩 浮麥炒黑一分

共末。用醋一鍾。入藥三錢。熬成膏。攤紙上。傅患處。又以鉄醋炒熱。裹熨痛處。如

患脚氣。先燒熱砭。將藥在砭上。脚心熨之。引脚中氣。消腫止痛。

敗龜散 脚氣及筋骨疼痛。

敗龜醋炙 白芥子研 芸薑子研 木鼈子去殼

自然銅醋碎七錢 地龍炒 硫黃一兩

共末。用末與麵醋和貼。

牛膝丹參酒方 脚氣入冬。即苦脚痺弱。或筋骨疼。不能屈伸。皮膚癢痺不仁。手

脚指節腫滿悶。或四肢腫。腰脛直。

牛膝 丹參 薏仁 生地八兩

白朮 生薑 五加皮五兩

側子

赤茯苓

葶藶

防風四兩

獨活

石斛九兩

茵芋葉

人參

天雄

石南葉炙

川芎三兩

細辛

升麻二兩

磁石醋碎七

桂三兩

白酒五斗浸服。

柴胡湯

風寒溼毒脚氣痛。皮膚不仁。緩弱痛痺。足脛腫滿。心下急。大便澁。

柴胡

猪苓

紫蘇兩半

防己

陳皮

郁李仁炒

大麻仁兩一

桑皮二兩

水煎五錢。日二。

脚氣上氣

論曰。風溼毒氣之中人。多從下起。足先受之。故名脚氣。毒氣循經。上入於肺。則氣道奔迫。升降不順。故令上氣喘滿。桑白皮湯。脚氣面目腫。上氣眠臥不得。氣欲絕。

桑皮皮二 陳皮一兩 葶藶二兩

共末。水煎薑棗湯。入末三錢。再沸溫服。頃又服。當利一二行。腫氣下即差。三五日服一次。

大腹湯 脚氣脹滿。

大腹連皮 杏仁三枚

童便水煎三錢。日二。

枳實散 脚氣上氣。

枳實炒二 白朮 赤茯苓 桂四兩

共末。酒下二錢。日二。

烏豆湯 洗脚氣上氣。擡肩。喘衝心痛。

烏豆

水五斗。煮汁二斗半。入甕中浸足。令人從膝上向下淋洗百遍。病者不過再洗

差。服後丸。

加減木香丸 洗脚後服。

木香

白芍

枳殼

大黃炒二

檳榔四枚

桂五錢

共末。蜜丸。梧子大。酒下十五丸。日二。漸加至三十丸。大便利為度。

杏仁煎方 脚氣乘肺。上氣喘促。

杏仁炒

百合一分 升麻二分 生甘草

麻黃

射干五錢

共末。入百合汁中煎一升去滓。日服二合。此藥不得久停。惟宜旋合。

木香榔檳丸 脚氣衝心煩悶。上氣喘滿。

木香三分

檳榔五錢

葱水煎三錢去滓。下紫雪二錢。薑汁中合。童便一合。紫雪治脚氣最妙。方在虛勞門。

淋洗豌豆湯 脚氣擡肩喘。

豌豆二升

葱白十根

川椒三分

水五斗。煮半。令人從膝上淋洗。下百遍。患極者洗三次效。

脚氣腫滿

論曰。脚氣、風溼、毒氣、客搏腎經。腎者、胃之關也。關門不利。則聚水而生病。水性就下。故令腎氣不化。小便不利。溼寒之氣。下注足脛。腫脹不消。故謂之脚氣腫滿。赤茯苓湯。脚氣上攻。身體腫滿。小便赤澀。

赤 茯苓

防 己

桑 皮

陳 皮兩半

旋 覆五錢

杏 仁

麻 黃去根

白 朮

紫 蘇一兩

水煮黑豆汁鍾半。煎藥五錢。薑半分。

旋覆花湯 脚氣腫滿。上衝心胸。煩悶氣急。

旋 覆

犀 角一兩

前 胡

杏 仁

桑 皮

紫 蘇

赤 茯苓半

薑水煎三錢。

大豆湯 脚氣足脛胛腫。上氣。徧身疼脹。風引。

大 豆合半炒香

附 子三兩

枳 殼

澤 瀉

陳 皮四兩

炙甘草

赤茯苓

防 風二兩

水煎黑豆取汁。煎藥三錢。日三。若腫痛止。去大豆。澤瀉。

脚氣心腹脹滿

論曰。風毒之中人也。必先中脚。久而不差。徧及四肢。其氣淫溢。則腹脅脹滿。小便不利。氣喘息高者。其病爲重也。

訶梨勒丸。治脚氣疼痛。發熱腫悶。上攻心腹。脹滿吐逆。

訶梨皮

木香

防己

大腹躡皮

紫蘇一兩

白芍

杉木節

羌活

沉香五錢

水煎五錢。日二。

羚羊角丸。脚氣心腹妨悶。兩脅虛脹。不思食。漸覺心滿。氣隔不通。

木香

防風

升麻二兩

大麻仁

赤茯苓三兩

旋覆

羚羊角

茯苓神二兩

獨活二兩

大腹躡皮

共末。蜜丸。梧子大。酒下四十九丸。日一服。如腹內先冷。加附子二兩。大腸祕。澁。加大黃炒兩半。氣滯。加檳榔二兩。心胸膈熱。加麥冬三兩。筋急掣痛。加牛膝二兩。皮膚風癢。心下妨悶。加枳殼炒兩半。臟氣羸弱。加黃耆三兩。

前胡飲 脚氣攻心。腹脹滿。嘔吐不下食。

前胡

生薑

羚羊角

半夏

大黃炒

赤茯苓五錢

枳殼三分

水煎五錢去滓。下朴硝一錢。

松節湯 脚氣入腹。心腹脹急。煩躁腫痛。

松節炒貴

桑皮

紫蘇一兩

炙甘草五錢

檳榔三分

水煎三錢。入燈心、生薑、童便。日二。

脚氣衝心

論曰。脚氣衝心之狀。令人胸膈滿悶。上氣喘急。甚者嘔吐是也。蓋風溼毒氣。初從

足起。縱而不治。上入於腹。小腹癢痺不仁。毒氣上衝。是謂腎水尅心火。故名脚氣衝心。孫思邈云。凡小覺病候有異。卽須大怖畏。決意急治之。不可概以腫爲候。亦有不腫是。正謂此也。

吳茱萸湯 脚氣衝心。煩悶腹脹。氣急欲死。

吳茱萸

木瓜

榔 檳二兩

水煎五錢。入竹葉一把。以快利爲度。

獨活湯 脚氣衝心。

獨活

犀角

石斛

側子

川芎

防風

當歸

防己

炙甘草二兩

丹參

白芍三兩

赤茯苓四兩

桂兩半

薑水煎五錢。日三。凡服一二劑後。隔五日一服。若覺腹內氣散。兩脅有力。行動

無妨。宜常服香豆酒。

香豆酒方 同前。

香豆一升

酒三升浸。隨量頻飲。覺利多即止。

吳茱萸檳榔湯 脚氣毒氣攻心欲死者。

吳黃芩抄四

檳榔七枚

木瓜

陳皮一兩

厚朴二兩

竹葉水煎三錢。

木瓜湯 脚氣風溼毒氣攻心煩悶手足脈絕。

木瓜

吳黃等分

水煎三錢。頃又服。

犀角湯 脚氣若風熱輕。但毒氣入胃。唯心胸煩熱。索水灑胸。面乾嘔好叫。氣欲

斷絕者。

犀角

木香

人參

羚羊角

竹茹

沉香

射干

麥冬

赤茯苓二兩

鷄舌香

麝香另甌

石膏三兩

水煎四錢去滓。入麝末五分。再沸服。頃又服。覺眼明心悟是效。若嘔逆不下食。加

半 夏二兩 生薑一兩 陳皮兩半

木香湯 脚氣攻心悶絕欲死。

木香 檳榔一兩 赤茯苓 郁李仁

牛膝 大黃妙 吳黃 桂三兩

水煎桑皮木通汁入藥三錢服。如重又服。

木香湯 又方 脚風毒攻心悶亂狂躁口乾氣欲絕或祕澀。

青木香 生黑豆皮二兩 大黃妙 紅雪一兩卽紫雪

水煎五錢入紅雪三錢分二服。頃再服。當下燥糞。

烏頭湯 風毒脚急攻心。心悶倒仆。失音不語困甚者。

烏頭煎汁二升 升 甜竹葉一把 桑皮三兩

大腹七枚

用豆汁浸藥一日。次早煎。分二服。頃再服。已死者斡開口灌之愈。及灸脚心七

壯。男左女右。

麻仁湯 脚氣衝心上氣。二便澀。小腹急痛。

大麻仁微炒 赤小豆半升

水七升。煎二升半。分三服。過二日。又一劑。

朴硝湯 脚氣攻心悶絕。

朴硝 白芍

柴胡

旋覆

紫蘇五錢

大腹

桑白皮分三

檳榔二枚

生薑一兩

作三貼。水煎去滓。入朴硝二錢。分二服。

礬石湯 脚氣衝心。

白礬一兩

漿水一斗五升。煎。浸脚良。

九味木香丸 脚氣衝心。胸膈煩滿。喘急嘔吐。

木香

訶勒

枳殼

桂二兩

白芍 柴胡 厚朴 檳榔
 大黃 薑汁 炒 二兩
 共末。蜜丸。梧子大。酒下二三十丸。

脚氣語言蹇澀

論曰。風毒脚氣。語言蹇澀者。脾腎氣水。風溼中其經絡也。腎之經。循喉嚨。挾舌本。脾之經。挾咽連舌本。散舌下。二經爲風溼所中。故令舌本強硬。語言蹇澀也。大入風湯。脚氣上攻心脾。語言蹇澀。

當歸	大豆	白芍	烏頭
黃芩	遠志	獨活	五味
防風	川芎	麻黃	人參
秦艽	乾薑	甘草	杏仁
石斛	白茯苓	升麻	紫苑
黃耆	桂	二兩	

酒水煎三錢。

桂心湯 風毒脚氣。痛痺不仁。語言蹇澁。

桂心三分

麻黃

當歸一兩

防風

升麻

犀角

檳榔二兩

黃芩

赤茯苓半

棗水煎三錢。

乾溼脚氣

論曰。脚氣有乾溼之異者。蓋陰陽所以分也。在臟為陰。在腑為陽。然皆由風溼毒氣乘虛而入。其症大同小異。故乾脚氣之狀。血脈痞澁。皮膚癢痺。脛細痠疼。食減體瘦。臟腑祕滯。上衝煩悶。溼脚氣之狀。脚先腫滿。或下注生瘡。肌汗流下。兩脚疼。上攻心腹。咳嗽喘急。面浮膝腫。見食嘔吐。

四根湯 年深十九種乾溼脚氣。

桑麻根節心

松木根節心

柏木根節心

杉木根節心並細剉

肉蓯蓉酒浸

五靈脂

石龍芮剉一

天雄泡裂去皮

紫檀香

地龍炒

木香剉一

麝香五錢

乳香

沒藥一兩

共末。木瓜酒下二錢。日三。

立應湯 乾溼脚氣。衝注四肢。

大腹

木香

防己

紫蘇

白芍

羌活

訶勒皮

木瓜

杉木節

沉香一兩

水煎五錢。日二。

四斤丸 乾溼脚氣。差後常發。令永不發。

牛膝

木瓜

菴蓉

天麻一斤

酒五升。浸一日。晒乾爲末。用浸酒熬膏丸。梧子大。酒下三十丸。

杉木節湯 乾脚氣。頭痛。腰脚痠疼。心躁渴悶。汗出氣喘。

杉木節一升

橘葉一升

大腹連七枚

童便三升

同煮取半。分二服。如一服快利便止。唐柳宗元乾脚氣。夜半寤絕。右膏有塊如大石且死。因天寒不知人。三日家人皆號哭。滎陽鄭洵美傳此方服之。半食間氣通立愈。

防己湯 乾脚氣脚膝腫滿。

防己

猪苓

郁李仁

檳榔三分

木通

枳殼

紫蘇五錢

赤茯苓

炙甘草一兩

薑水煎四錢。

海桐皮散 溼脚氣及腎臟風。下注滿。脚瘡疼痛。膿水出。

海桐皮

草烏鹽炒

地龍炒

蒺藜一

共末。酒下二錢。日二。

脚氣變成水腫

論曰。昔人論脚氣。謂脾受陽毒即熱瘡。腎受陰溼即寒痺。是知脚氣之病。脾腎得

之爲多。今變成水腫者。亦緣脾腎俱虛。蓋腎虛則不能行水。脾虛則不能制水。故水氣散溢滲於皮膚。流於四肢。所以通身腫也。

葶藶丸 脚氣成水腫。上氣氣急咳嗽。二便苦澁。所服利水藥。反利大便。小便反澁。

葶 藶 三兩

防 己

炙甘草 一兩

杏 仁

貝 母 半兩

爲末。棗肉丸。梧子大。大棗、桑皮、粳米。飲下三十丸。小便未快。加十丸。

檳榔散 脚氣浮腫。漸變成水。心腹脹滿。二便不通。氣急喘息。

白檳榔 五枚

大腹皮 七枚

木 香 一兩

大腹細剉。二味爲末。用童便一鍾。煎大腹一枚。香末二錢。去滓。入檳榔末三錢。再沸服。日二。

猪苓湯 脚氣兼水氣。膈氣通身腫滿。氣急。小便不通。坐臥不得。

猪 苓

防 己

赤 茯苓 三分

木 香

郁李仁

澤 瀉 二兩

桑 皮 五兩

大 腹 七枚

水煎五錢。服下小便立效。日三。

脚氣大小便不通

論曰。脚氣二便不通者。中風溼之氣。搏於脚膝。上攻胸腹。脅肋填滿。榮衛痞隔。三焦之氣升而不降。所以傳導變化。皆不能出。而二便不通。蓋腎氣化。則二便利。脚膝者腎之候。今脚氣上攻。則腎氣不得化。腎氣不化。致二便不通也。

桑白皮湯 男女風毒脚氣。及偏身拘急刺痛。二便赤澀。不思食。嘔逆或寒熱。

桑皮

木通

青皮

紫蘇

羌活一兩

荆芥

藁香子根

木瓜

獨活

枳殼二兩

大腹十枚大者三枚

薑葱水煎三錢。日二。

檳榔湯 脚氣腫滿。坐臥不得。上氣衝心。二便秘澀。

檳榔七枚

木香

郁李仁二兩

桑皮

木通三兩

水煎三錢。去滓。入牽牛末一錢。二便快利爲度。

江東嶺南瘴毒脚氣

論曰。內經謂南方者。其地下。水土弱。霧露之所聚也。江東嶺南。大率如此。春夏之交。山水蒸鬱。風溼毒氣爲甚。足或感之。遂成瘴毒脚氣。其候脚先屈弱。漸至痺疼。膝脛微腫。小腹不仁。頭痛煩心。痰壅吐逆。時作寒熱。便澁不通。甚者控心而勢迫。治不可緩。支法存。所以留意經方編。善斯術者。豈非江左嶺表此疾得之爲多歟。

犀角湯

江東脚氣。小欲動作。漸覺心悶。脚脛痠疼。煩熱不止。

犀角

木香

前胡一兩

竹茹三分

麥冬兩半

大腹皮三兩

用水煎五錢。

羚羊角湯 江東脚氣盛發。上衝脾胃。胸膈妨悶。意氣不暢。口乾。目不知人。

羚羊角

犀角兩半

木香

升麻

旋復一兩

麥冬

大腹五枚

枳殼

前胡一兩

水煎五錢。快利爲度。

旋復花飲 乍處嶺南。未服水土。食飲不宜。兼卑溼脚氣發動時。復心悶。面目脚膝浮腫氣乏。脣口青黑。胸膈煩熱。見食吐嘔。心腹妨痛。冷氣結聚。如有此疾。急服

旋復

前胡

郁仁一兩

半夏

赤茯苓二兩

大腹全五枚

吳黃三分

薑水煎五錢。日二要。疏利加檳榔末。

犀角湯 脚氣之疾。先起嶺南。稍來江東。皆由卑溼得之。或微覺疼痺。或二脛腫滿。行起痺弱。或上入腹不仁。或時作冷熱。皆其候也。若先覺此症。食嘔不下。氣上逆者。宜急服

犀角

旋復一兩

赤茯苓

陳皮兩半

紫蘇半握

薑棗水煎五錢。豉一合。

獨活酒 嶺南脚氣發動。地氣鬱蒸。熱毒風盛。脾肺常有風熱。

獨活

生地三兩

海桐皮二兩

惡實根生

桂一兩

黑豆皮生

大麻仁炒升

生白酒三斗浸。頻服。

脚氣雜治膏藥淋瀝等

論曰。脚氣症候不一。隨症用藥。備載於前。然有一方。兼治數症者。有膏酒淋瀝傳者。皆昔經驗。用之多效。今復詳類於後。

木瓜丸 脚氣諸疾。

木瓜 四枚

乳香二兩

甘菊一兩

青鹽一錢

將瓜去瓢子。入末封固蒸研。丸梧子大。酒下五十九丸。日三。汗香爲驗。并膝脚等疾皆治。

桑葉煎 脚氣曾用諸方。苦脚弱宜服。

白桑木

用生桑者採
軟枝切一石

水一石。煎五斗。又加水五斗。煎去滓。慢煎成膏。約二升即止。收貯。頗含化一匙。服七日。覺四肢通暢。頻頻洩氣。已後兩脚或腫勿怪。乃是得藥力病差之候。

牛膝酒

脚氣極冷。着厚衣蓋覆不覺煖。

牛膝 生地半斤

紙包泥裹。又用紙包泥固。乾灰火養半日。次以火燒一伏時。取出漬酒服。

蒜酒 初覺似有脚氣宜服。

蒜 二升 切炒

桃 仁皮尖炒 豆炒香

酒一斗 浸服。

石斛酒 脚氣痺弱。筋骨疼痛。

石斛 四兩

人參

丹參

川芎

杜仲

白朮

黃耆

五味子

防風

陳皮

甘草炙

白茯苓

乾薑

山藥

當歸

桂二兩

牛膝 三兩

酒五斗浸服。

菝葜酒 脚氣屈弱。積年腰脊攣痺。及腹內堅結。

菝

菝葜斗水石。菝二十斤。用上汁。白糯米陶一石。

蒸攤入汁。麩拌勻。內甕中。常法取酒服。

脚氣發心膈悶宜此方。

取新磚二塊。中心鑿孔如毬子大。勿令透過。將火燒紅。用醋撥之。便入川椒於孔內。以物蓋看溫煖。以脚踏磚上立愈。

麻黃裹足方。久蘊風熱。足多冷麻。隱痛難行。夜常轉筋。如風所吹。皆脚氣之症。

麻黃二斤炒

令極熱。以帛包貯裹二足。勿透氣。良久脚上有汗。候麻黃溫不用。却着棉襪。無

令風吹。如此數次。永除病本。

芥子膏 風溼脚氣腫痛無力。

白芥子

蓖麻

木鼈

芸薑子

白膠香一兩

胡椒五枚

搗千杵成膏。如彈子大塗患處。

黑豆煎脚氣。

黑豆五升

桑

皮

五兩
煮水三升

羌活

蒺藜

吳

萸

海桐皮五錢

共末入汁煎膏酒下。



3.081
5
4(1)4

聖濟總錄纂要

五

413.081
145
:4015

中國醫學大成第四集

方劑類

聖濟總錄纂要
五

上海大東書局印行



3 0472 8416 5

254630

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄧縣 曹炳章赤電校點

卷九

膈氣門

膈氣統論

論曰。胸中者氣之府。呼吸升降之道也。陰陽升降順理。則氣道通調。胸中乃洽。喜怒寒熱不調。則氣聚於胸而爲膈氣。夫膈現有五。憂膈、恚膈、氣膈、寒膈、熱膈是也。憂膈之病。胸中氣結煩悶。津液不通。飲食不下。羸瘦無力。恚膈之病。心下若實欲嘔。輒噫醋心。食不消。心下痞澀。積結在於胸中。大小便不利。氣膈之病。胸脇逆滿。咽塞不通。惡聞食臭。寒膈之病。心腹脹滿。咳逆。膈上苦冷。臍腹常鳴。食不生肌。熱

膈之病。臟有熱氣。五心中熱。肉爛生瘡。骨煩。四肢重。唇口乾燥。身體頭面手足或熱。腰背疼痛。胸痺引背。水穀不消。不能多食。羸瘦少氣。此五膈爲病之症也。人之和氣。一有憂思恚怒。寒熱飲食。悉皆傷之。致陰陽不和。臟腑生病。氣痞於胸膈之間。故曰膈氣。諸方之論不一。又有十膈。症各不同。其發之原。不越於此也。

五種膈氣

論曰。人之胸膈升降。出入無所凝滯。命曰平人。若寒溫失節。憂恚不時。飲食乖宜。思慮不已。則陰陽拒膈。胸腕痞塞。故名膈氣。曰憂。曰恚。曰氣。曰寒。曰熱。五種雖殊。其爲膈病則一。

建中丸 治男女五種膈氣。及一切氣不思食。

白豆蔻

胡椒

甘草

陳皮

高良薑

藿香子炒一

紅豆蔻

人參

川芎

蒟醬

黑乾薑

藿香葉五錢

共末。入蜜杵丸。芡實大。酒下二丸。薑湯下亦可。

備急沉香散 治霍亂吐瀉。氣逆結胸。膈氣刺痛。不思食。

沉香

丁香

京三稜

黑乾薑

蓬莪茂 五錢

肉豆蔻

人參

木香

赤茯苓

藿香葉

桂心 一兩

高良薑

甘草

胡椒 一分

共末。用鹽點茶下二錢。

五膈丸 治五種膈氣。噎塞。胸中滿悶。不下食。

白朮

木香

陳皮 去白

訶勒皮

桃仁 去皮

襪布 三分 洗燒灰

桂心

大黃

半夏 薑汁炒

枳實 炒

檳榔 微煨

琥珀 研一

共末。入蜜杵丸如梧子大。薑棗湯下三十九。

人參白朮湯 治膈氣咽塞。憂結不散。

人參

白朮

甘草

京三稜

訶勒皮

陳皮 去白

木香

桂心

檳榔

草豆蔻

赤茯苓

枳殼炒五

生薑水煎三錢。溫服。日二。

人參丸 治膈氣咽喉噎塞。不下食。

人參

檳榔

紫朴薑汁炒

枇杷葉一兩

半夏薑炒

共末。糊丸如梧子大。薑湯下二三十丸。日二。

導氣散 治膈氣咽塞不下。

虎頭骨

人參

紫朴

羚羊角

草撥一兩

共末。飲下二錢。

襯布丸 治膈氣噎塞不下食。

襯布洗淨燒灰一兩 椿杵頭細糠一合

共研。用老牛涎一合。生柏葉汁一合。慢煎。入蜜攪成膏。與末杵丸。芡實大。每用

一丸。含化嚥下。

膈氣嘔逆不下食

論曰。膈氣嘔逆不下食者。由胃氣不足。風熱乘之。或憂恚氣結。不得宣通。故令膈腕痞滿。氣塞胸中。縱能食而卒不下。或入胃中。多致不消。與留飲相擊。則變為嘔逆也。

丁香丸 治膈氣嘔逆不下食。壅悶惡心。

丁香 二枚

木瓜

木香 一兩

檳榔 一枚

肉豆蔻 一枚

青皮 七枚

半夏 一兩

共末。入蜜杵丸。梧子大。薑湯下廿丸。

人參赤茯苓 治膈氣嘔逆不下食。或憂恚氣不宣通。

人參

赤茯苓

細辛

白芍藥

枳殼 炒去白

黑乾薑

桂心

炙甘草 一兩

檳榔

訶勒皮 兩半

共末。入蜜杵丸。如梧子大。用酒下二十丸。如覺有物在喉中。卽丸三五丸。如

彈子大。津嚥含化一丸。

五膈丸 治胃氣素弱。因於憂恚。膈氣虛弱。嘔逆。不思飲食。

人參一兩

附子

川椒

細辛

遠志

乾薑五錢

炙甘草

麥冬

桂心三錢

三。共末入蜜杵丸。如彈子大。食後含化一丸。津液嚥下。覺胸中氣逆。即服一丸。日

膈氣痰結

論曰。膈氣痰結者。謂結痰在胸膈之上。喉間噎塞。咳唾稠濁。氣滿胸中。妨害飲食。蓋緣脾肺久虛。氣道痞澀。不能升降。水飲停結。聚而為痰。久不差。則變虛弱上喘之病。

木香丸 治膈氣痰結。嘔吐酸水。

廣木香

青皮

白朮

桂心

益智仁

肉豆蔻一

吳茱萸

細辛

黑乾薑五錢

共末。用酒煮陳米糊丸。如小豆大。生薑湯下十五丸至二十丸。日二。

妙紅散 治膈氣痰結。嘔逆吐食。

紅麴炒

人參

丁香

白茯苓

藿香五錢

共末。飲下二錢。日二。

五膈丸 治膈痰結胸中不利。

赤茯苓

陳皮

桑白皮

紫蘇一兩

檳榔煨入

紫朴薑炒

生薑二

旋復花兩半

共末入蜜杵丸。如梧桐子大。飲下二三十丸。

嘔吐門

嘔吐統論

論曰。人之陰陽升降。三焦調順。脾胃和勻。乃能腐熟水穀。變化糟粕。傳瀉行導。下走腸間。若脾胃虛冷。水穀不化。則陰陽痞膈。三焦不調。濁陰之氣。不能下行。衝奔於上。故發爲嘔吐。然吐逆之病。有得之於膈實者。有生於中滿者。有發於下焦者。種種不同。悉本於胃氣。逆則嘔吐。蓋胃者水穀之海。三焦者乃水穀之道路。胃氣宣通。則上焦如霧。中焦如漚。下焦如瀆。命曰平人。若胃氣虛弱。水穀遲化。停滯三焦。格拒升降。不勻其氣。虛滿得食則嘔。而又有朝食暮吐。暮食朝吐者。有食已卽吐者。有嘔吐穀不得前者。有但嘔而無所出者。有先嘔却渴者。有先渴却嘔者。有嘔家本渴而反不渴者。治求其本。各有不同。假令內格拒逆。食不得入。是有火也。病嘔而吐。食久反出。是無火也。舉此二者。乃知嘔吐之名則一。而治藥之法各異。雖治有冷熱。有虛實之別。要在安胃氣爲本。使陰陽升降。呼吸平均。嘔吐之病順而愈矣。

嘔吐

論曰。嘔吐者。胃氣上而不下也。譬之空罍小口。頓漑不入。乃升氣所礙。人病嘔吐。

其理如此。蓋脾胃氣弱。風冷干動。使留飲停積。飲食不化。胃氣虛脹。心下澹澹。其氣上逆。故令嘔吐也。

厚朴丸 治脾胃虛寒。痰盛嘔吐。

紫 朴去皮一斤 夏半斤 生 薑三斤取汁又入

將汁同朴拌。共入砂鍋內。慢火煮乾。爲末。棗肉丸。如梧子大。酒下二十九。

藿香散 治脾胃虛寒。痰盛嘔吐不止。飲食不化。

藿 香 紫 朴一兩 桂 心 炙甘草五錢

青 皮去白炒 枇杷葉去毛炙 乾 薑兩半

薑棗水煎三錢服。

七寶湯 治脾胃虛冷。嘔吐痰涎。胸膈痞悶。不思食。

人 參 白 茯苓 甘草一兩 大腹皮全用

半 夏薑汁 草豆蔻四枚 訶勒皮五枚

薑棗水煎三錢服。

濟急丸 治脾胃虛寒。痰飲留滯。嘔吐不止。

附子大者一枚剉空

丁香

香附子孔內剉入

以薑自然汁浸附子於器中。重湯煑乾。爲末。每服一錢。津液嚥下。

和胃湯 治食飲不下。嘔逆清水。面目虛腫。

人參二兩

赤茯苓兩半

半夏

茅草根一兩

木通

青竹茹三分

甘草五錢

薑棗水煎三錢。空心服。

人參半夏丸 治嘔吐不下。食頭痛。

人參

半夏湯泡七次薑汁製二兩

前胡一兩

鉛丹水飛過

共末。蒸大棗去皮核。杵成丸。如梧桐子大。空心薑湯下二十九丸。晚再服。

乾嘔

論曰。嘔而欲吐。吐而無所出。故名乾嘔。此由陰陽不和。胃中虛弱。氣逆上行。不能下降。故有乾嘔之症。

麝香平氣丸 治胃氣虛弱乾嘔。心胸痞悶。痰逆惡心。吞酸噫食。腹脇疼痛。和脾胃。進飲食。辟除邪氣。

麝香

木香

沉香

肉豆蔻

乳

香 生薑汁製
研成膏

丁香

丹砂

桂心

紫 朴 薑汁

半夏 薑汁

檳榔 一兩

共末入膏糊丸。如梧子大。空心飲下二十九。

四倍散 治胃氣不和乾嘔惡心。

訶梨勒 煨取皮

人參 二兩

白茯苓 四兩 上蒸

白朮 陳土炒 八兩

共末鹽湯下二錢。或薑棗水煎服之。大補虛損。

安中散 治乾嘔。

小麥 炒四

甘草 炙

陳麴 五錢

乾薑 炒一

共末空心棗湯下二錢。日二。除邪熱。和胃氣。進飲食。

桂苓湯 治乾嘔煩悶不下食。

桂心

人參

白朮

乾薑 五錢

砂仁

紫朴一兩

陳皮

甘草二分

薑棗粟米水煎三錢服。

和安湯 治胃氣上逆乾嘔不止。

陳皮去白炒 甘草炙 二

乾薑炒 五

薑水煎三錢空心服。

參粟湯 治乾嘔不下食。

人參一兩 半夏湯洗 七

生薑片 五大

陳粟米二兩

同入鍋慢炒搗為粗末薑棗水煎三錢空心服。

胡椒湯 治胃氣上逆乾嘔煩悶。

胡椒二粒 木香二錢

熟糯米一合

同炒熟分三服水煎空心下。

痰飲門

痰飲統論

論曰。人之有形。藉水飲以滋養。水之所化。憑氣脈以宣流。蓋三焦者。水穀之道路。氣之所終始也。若三焦調適。氣脈平均。則能宣通水液。行入於經。化而爲血。灌漑週身。設三焦氣澀。脈道閉塞。則水飲停滯。不得宣行。因之聚成痰飲。爲病多端。古方論痰飲有四。痰飲。懸飲。溢飲。支飲。是也。若其人素盛。今瘦。水走腸間。漉漉有聲。謂之痰飲。水流脇下。咳唾引痛。謂之懸飲。飲水流行。歸於四肢。當汗出而不汗。體身疼重。謂之溢飲。其人咳逆短氣。倚息不得臥。其形如腫。謂之支飲。此飲疾之大概也。然又有五飲。及水在五臟。病各立名不同。與夫聚而不散。曰流飲。癖於脇肋下。曰癖飲。流移不定。曰流飲。沉伏於內。曰伏飲。因酒多而成名。曰酒癖。因寒多所致。卽曰冷痰。因熱邪所傷。卽曰熱痰。病雖多端。悉由三焦不調。氣道否澀。而生病焉。是以氣行卽水行。氣滯卽水滯。故知飲之爲病。在人最多。善治者以宣通其氣脈爲先。則水飲無所凝滯。所以治痰飲者。當以溫藥和之。蓋人之氣血得溫暖則宣流也。及結而成堅癖。則兼以消痰破飲之劑。攻之堅癖自消。痰飲自愈。

痰癖

論曰。痰癖之病。由三焦氣不升降。水飲停滯。留於脇下。寒氣乘之。則令脇肋堅脹。按之瀝瀝有聲。有時而痛。妨害飲食。久不施治。令人肢體羸瘦。謂之痰癖。

枳殼丸

枳殼

人參

五味子
柴胡五錢

甘草

石斛

訶梨勒一兩

共末。蜜丸。如梧子大。飲下三十丸。

消飲白朮丸

治痰癖及飲酒。停痰積聚。不利嘔吐。目昏耳聾。腸中水聲。

白朮

半

夏薑汁搗餅

枳殼去蘘炒

乾薑

薑二兩

共末。蜜丸。如梧子大。空心飲下三十丸。

支飲

論曰。水飲停積。胸膈不能消化。支乘於心。故名支飲。其狀令人心下築悸。咳逆喘息。飲食不下。身體虛浮。形如水腫是也。

參朮丸 治支飲不消。胸膈滿悶。

人參

赤茯苓

膽南星三分

半夏

生薑

晉礬一兩

將生薑、南星、半夏搗成餅。慢炙黃。與藥共末糊丸。如梧子大。薑湯下二十九。

甜葶藶丸 治支飲氣喘不得息。

甜葶藶紙上

木香

半夏薑汁

共末。薑汁糊丸。如梧子大。空心薑棗湯下二十九。

檳榔丸 治支飲胸膈否滿悶。

檳榔

肉豆蔻麩包煨

半夏薑汁

青皮去白

乾薑炒黑

共末。薑汁糊為丸。如小豆大。薑湯下五丸。以差為度。

留飲

論曰。留飲之病。得於三焦壅否。氣脈凝澀。致飲水不消。留聚胸膈之間。令人否滿短氣。脅下脹滿。喜渴數飲。是其候也。

赤茯苓 治膈間留飲。嘔逆頭眩。短氣多渴。

赤茯苓

柴胡

白朮

枳殼

檳榔一兩

杏仁

半夏三分

人參

旋復花五錢

薑水煎三錢。空心服。

半夏湯 治留飲不除。胸中痰冷。

半夏五兩

人參

附子

桂心

甘草

赤茯苓二兩

白朮三兩

薑水煎三錢。空心服。日二。

枳實湯 治留飲不消。心下否堅。時復作痛。

枳實欬妙二兩

白朮土三兩

桂心一兩

薑水煎三錢。空心服。日二。

沉香茯苓丸 治留飲。

沉香一兩

白茯苓

半夏薑汁

人參去蘆

丁香 香二兩

甘草

陳皮 去白

肉豆蔻 煨

檳榔 五錢

共末。蜜丸。如梧子大。薑湯下二十九。溫脾胃。利胸膈。和氣血。

草撥 煑散 治留飲食癖。

草撥

炙甘草

大腹皮

丁香

訶梨勒

乾薑 炒五

白朮

草豆蔻

陳皮 去白 炒

桂心 三分

共末。薑水煎三錢服。

冷痰

論曰。氣為陽。陽不足者。不能消燦水飲。遇脾氣虛弱。氣道痞膈。則聚飲而成痰。浸漬腸胃。上為嘔逆吞酸。下為洞泄寒中。久不已。則令人消瘦。倚息短氣。妨害飲食。昔人治痰飲。多以溫藥和之。為此故也。半夏湯 治冷痰癖飲。胃膈痞滿。嘔逆不止。

半夏湯泡七次 人參 白朮 附子

甘草 赤朴 桂心

薑水煎三錢服。日二。

吳茱萸湯 治胸中塞痰。心下煩滿。欲吐不下食。

吳茱萸洗炒 人參 半夏薑汁 桂心二兩

甘草一兩

薑棗水煎三錢。空心溫服。日二。

半夏湯 治胃中冷痰。嘔逆消食。溫胃止逆。

半夏 杏仁 陳皮二兩 桂心

甘草一兩 木香 乾薑五錢

薑水煎三錢。空心溫服。

吳茱萸湯 治胃中冷痰吐酸水。胸中不快。

吳茱萸湯洗 附子 半夏薑汁

用薑水煎三錢。空心溫服。

丁香半夏丸 治胃中冷痰。利胸膈。和脾胃。進飲食。

丁香 香一兩 半夏 薑汁炒 人參 木香

薑 香五錢 肉豆蔻 煨二枚 陳皮 五錢

共末。薑汁糊為丸。薑湯下二十九。

法製半夏 治冷痰。利胸膈。一切諸痰並治。

半 夏 酒入兩湯泡 白 礬 四兩 丁香皮 草豆蔻 三兩

同入酒浸。春夏七日。秋冬十五日。取出洗過焙乾。每嚼五六粒。茶酒任下。

熱痰

論曰。熱痰者。由氣滯壅塞。津液不通。熱氣與痰水相搏。聚而不散。若咽喉乾燥。或

塞或壅。頭目昏重。咳唾稠濁。面目赤熱。是其症也。

鵝梨煎丸 治熱痰。涼心肺。利胸膈。解毒補元益氣。

鵝梨 大者二十枚 皂莢 十條 去皮 懷生地黃 搗取汁

薄 荷 取汁 白 蜜 汁 煎 成 膏 人 參 白 茯苓

木香

肉蓯蓉

白蒺藜炒去

牛膝

半夏一兩

雲白朮

羌活三分

檳榔煨三分

山藥

青皮炒去白

防風

炙甘草

桔梗三分

共末。搗膏為丸。如梧桐子大。荆芥湯下二十九。

千金散

治熱痰壅盛。胸膈不利。

半夏薑汁

蛤粉五錢

甘草

羌活

凝水石三錢

共末。水下三錢。空心服。以利為度。

丹砂丸

治熱痰壅盛。虛煩躁渴。

丹砂半為

膽南星

枯礬一兩

炙甘草五錢

半夏製末作糊

共末。用薑汁糊為丸。如梧桐子大。丹砂為衣。每服薑湯下二十九。

麥冬湯

治胸間熱痰。不思食。

麥冬 人參 前胡 葛根
 犀角一兩 桔梗五錢 蘆根二兩
 水煎五錢。空心服。日二。

膈痰積實

論曰。膈痰者。氣不升降。津液痞澀。水飲之氣。聚於膈上。久而結實。故令氣道奔迫。痞滿短氣。不能眠臥。甚者頭目旋暈。常欲嘔吐是也。

金箔丸 治膈痰結實。咽喉不利。咳嗽喘息。

金箔片五十 牛黃 麝香五分 冰片

珍珠無油而柏者入 卷砂一錢 丹砂一兩

甘草二兩 馬牙硝一錢

共末。蜜丸。如芡實大。金箔爲衣。人參湯或薄荷湯下一丸。

半夏丸 治膈痰結實。滿悶喘逆化痰。

半夏薑汁製 皂莢五挺去皮揉 生薑五兩與半夏

爲末。蜜丸。如梧子大。薑湯下二十九丸。

犀角湯 治膈痰結實。頭目昏暈。不思食。咳嗽煩渴。

犀角

人參

片苓

柴胡一分

麥冬

白茯苓

升麻五錢

甘草半分

薑水煎三錢。空心服。

膈痰風厥頭痛

論曰。膈痰風厥頭痛者。謂膈上有痰。氣不下行。復感風寒。因之風痰相結。其氣厥逆。上攻於頭。故令頭痛。亦有數載不已。連額痛者。蓋風寒在於骨髓故也。

玉露丸

治風痰氣厥。攻擊頭痛。胸膈不利。嘔逆少食。

半 夏薑搗

白附子

膽南星二兩

冰片一分

共末。薑汁糊爲丸。如小豆大。薑湯下二十九丸。

菊花散 治風痰氣厥。頭疼昏眩。

甘菊一兩

防風五錢

白附子

枳殼三分

甘草一分

共末。空心茶下二錢。

犀角半夏丸 治風痰攻衝頭痛。

犀角

半夏

木香

桔梗二兩

人參

天麻一兩

檳榔煨

青皮去白炒

丹砂飛過

共末。薑汁糊為丸。如小豆大。空心薑湯下二十九丸。

此藥能利咽膈。和胃。進飲

食。去風痰。

金箔犀角丸 治風痰氣厥。攻擊頭痛。痰逆惡心。

金箔

犀角

膽南星

枯礬一兩

丹砂飛過

丁香

冰片

麝香一分

天麻五錢

半夏生薑煎

共末。用大棗肉為丸。如梧桐子大。空心薑湯下二十九丸。能退風壅化痰涎。

川芎湯 治胸膈風痰氣厥。上攻頭痛。嘔吐痰飲。

川芎

獨活

防風

細辛

藁本

旋復花

蔓荊子一兩

石膏

甘草

荊芥穗五錢

用薑水煎三錢服。

前胡飲 治痰嘔逆頭目不利。

前胡

赤茯苓

人參

陳皮

枇杷葉去毛炙

旋復花

半夏一兩

薑水煎三錢。空心服。日二。

消渴門

二二消統論

論曰。消瘴者。膏粱之疾也。肥甘之過。積爲脾瘴。瘴病既成。乃爲消中。皆單陽無陰。邪熱徧勝故也。養生之士。全真鍊氣。濟其水火。互於適平。若乃以慾竭其精。以氣

耗其真。所受乎天者。既已微矣。復餒肥甘。或醉醇醴。貪餌金石。以補益。引溫熱。以自救。使熱氣熏蒸。虛陽暴悍。腎水燥涸。無以上潤於心肺。故內外消鑠。飲食不能滋榮。原其本則一。推其標有之一。曰消渴。以渴而不利。引飲過甚言之。二曰消中。以不渴而利。熱氣內消言之。三曰腎消。以渴而復利。腎燥不能制約言之。此久不愈。能爲水腫癰疽之病。宜慎此者。服藥之外。當以絕嗜慾。淡滋味爲本。

消渴

論曰。消渴者。渴而引飲。乃復澀少是也。得之五石之氣。內燥津液。腎氣不化。故渴甚而澀少也。久之不治。則經絡壅澀。留於肌肉。變爲癰疽腫毒瘡癰之候。
桃紅散 治三消渴病。

石膏膏

鉛丹

赤石脂

白石脂

括蕪根一兩

炙甘草五錢

共末。空心溫水下二錢。日二。

沃焦散 治三消渴病。飲水無度。小便短少。

泥鱧魚頭十條陰乾去尾燒灰研去

荷葉陰乾研

共研勻。用新汲水下三錢。日二。不思水即止。

葛根丸 治消渴日飲水數斗不止。

葛根

附子

括蕞根

鉛丹一

共末入蜜杵丸。梧子大。用茅根湯下二三十丸。

神應丸 治消渴津液內耗。飲水不休。溺少。

桂府滑石飛過

寒水石研五錢

用鷄子一枚。取孔去黃。將清和末如膏。入殼封固。外以鹽泥包裹。曬乾煨赤。以

藥細研。大人飲下二錢。小兒五分。

止渴括樓飲 治因好熱。麵炙博。及熱藥并乳石。三焦氣膈。心肺乾熱。口乾舌焦。

飲水無度。小便數多。心欲狂亂。服此急救。

括樓一枚要黃熟者去皮用瓢并子

冬瓜中樣大者一枚去蒂入括蕞瓢子

用黃土泥裹瓜半指厚。陰乾。以火燒通赤。去泥。就熱將瓜爛研絞汁。約七八合。入蜜二兩和勻。稍冷分作三服。臟腑熱竭。即不思水。小便自無。如括蕞未熟時。

獨燒冬瓜服之亦妙。

生津丸 治消渴疾。津液內耗。飲水不止。溲少。

青蛤粉

白滑石飛礮一兩

共研勻。用黃頰魚涎和丸。小豆大。陳粟米飲下二三十丸。日二。

猪脊骨飲 治消渴久不差。

雄猪脊骨五寸

炙甘草

黑乾薑半分

大棗肉二十枚

用水三升煎二升。發時和熟水。不拘時服。以差為度。

竹龍散 治消渴引飲不止。溲少。服之止渴利便。

五靈脂

醋化礮去砂石

黑豆五錢

共末。用冬瓜湯下二錢。無瓜時用葉與子煎湯。日二。小可渴只用一服。差後

不可服熱。惟宜服八味丸。仍用五味子代附子。

八味丸 治消渴愈後服。發時服之俱妙。

懷熟地四兩

山藥

山萸肉

白茯苓

牡丹皮二兩

澤瀉

五味子

桂心一兩

共末。入蜜杵丸。梧子大。鹽湯下二三十丸。

甘露散 治消渴飲水不止。

猪胞乾者十枚

剪破洗淨以火燒。烟止研末。空心酒下一二錢。日二。

生津液梅蘇丸 治消渴膈熱煩躁。

白烏梅

紫蘇

烏梅肉五錢

人參一分

炙甘草兩半

訶勒皮一兩

百藥煎三兩

麥冬三分

共末。用黃蠟汁和丸。芡實大。津化一丸嚥下。暑月行路止渴甚妙。

人參煎方 治消渴。

人參一兩

葛根二兩

共末。發時用燐猪湯一升。入末三錢。蜜二兩。慢煎取汁三合。自稠如錫收貯。夜

飯後含化一匙。津下重者。不過三服。

牛膝丸 治消渴下元虛損。經久不止。

牛膝五兩

生地汁五升

以汁浸末。夜浸日曬。汁盡爲度。入蜜杵丸。梧子大。酒下三十九。久服壯筋骨。駐顏色。黑鬚髮。

薑魚丸 治消渴飲水不止。

生薑

切片焙乾爲末。用鯽魚膽汁和丸。梧子大。米飲下七丸至十九。

鷄臍脰散

治久渴不差。旬日見效。

鷄臍脰黃皮

鷄腸五具

鹿角膠

白龍骨煨

白石脂一兩

桑螵蛸一枚

土瓜根三兩

川黃連

牡蠣童便

苦參二兩

漏蘆一兩

共末。空心飲下二錢。日二。

黃連牛乳丸 治消渴。

川連去蘄

麥冬二兩

牛乳

生地汁

生葛汁四兩

二味共末。用乳汁煎沸杵丸。梧子大。空心飲下二三十九。日二。

竹葉湯 治消渴飲水不輟。多至數斗。

甘竹葉切

大麻仁炒

赤稗米各一

薤白兩二

鹿蹄四隻湯泡去皮

白茯苓一兩

共分八服。先以水三鍾煎麻仁、竹葉取汗。入藥煎一鍾。微微飲之。渴止為度。

消渴煩躁

論曰。消渴煩躁者。陽氣不藏。津液內燥。故令煩渴。而引飲且躁也。內經謂諸躁狂越。皆屬於火。蓋以心腎氣衰。水火不相濟故也。

蘆根湯 治消渴心脾中熱。煩躁不止。下焦虛冷。小便多。羸瘦。

蘆根一斤

括樓根

牡蠣便碎

黃耆二兩

知母三兩

生麥冬六兩

水煎三錢。空心溫服。日二。

翠碧丸

治煩渴不止。咽乾躁熱昏悶。

青黛

麥冬

葛根

懷生地二兩

括樓根三分

寒水石煨三

膽星

知母五錢

共末。用陳米糊丸。梧子大。金箔爲衣。煎人參竹葉湯下十五丸至二十九丸。日二。

天冬煎方

治消渴煩躁。引飲無度。驚悸不安。

生天冬半斤

白蜜五兩

用水五鍾。煎天冬至三鍾。以汲水淘數次。別以熱水一鍾。入蜜攪勻。浸天冬五日。每食後。食天冬一兩差。

白茅根飲。治丹石并熱。藥發動。毒氣不宣。心肺躁熱。煩渴飲水不止。旋作小便。久之卽爲癰疽腫毒。

白茅根

麥冬兩半

白茯苓三兩

桑白皮二兩

露蜂房炙黑

共粗末。如黍米大。水煎四錢。淡竹葉十二片。大棗二枚。溫服。日二。

消渴小便白濁

論曰。消渴飲水過多。久則滲漏。脂膏脫耗。精液下流。胞中與水液渾濁。隨其所之。

與小便利下凝膏。故謂之消渴。小便白濁也。

腎瀝湯 治消渴小便白濁如脂。

白羊腎脂膜切去

五味

杜仲

生薑

黃耆兩半

懷生地一兩

人參五錢

大棗五枚

磁石三兩打碎洗去

藥分二劑。先以水四升煎腎與磁石二升。入藥再煎八合。去滓分二服。

山茱萸丸 治消渴飲水極多。肌體瘦弱。小便如米泔。腰膝冷痛。諸方不能治者。

山萸肉

括樓根

苦參

土瓜根

龍骨半兩

川連三兩

共末。用生括樓汁搗丸。梧子大。飲下三十九丸。日二。

川連丸 治消渴飲水不知休。小便如脂。舌乾口渴。

川連

括樓根五兩

共末。用生地汁搗丸。梧子大。牛乳下三十九丸。

肉蓯蓉丸 治消渴下焦冷。小便如脂泔。

肉蓯蓉

丹皮

川歸

五味子

巴戟天

地骨皮

白龍骨

韭子

甘草

懷熟地

澤瀉一兩

磁石七兩碎

赤石脂

人參兩半

白朮

禹餘糧分三

桑螵蛸煨炒

共末入蜜杵丸。梧子大。牛膝湯下二三十丸。日二。

久渴

論曰。消渴之病。本於腎氣不足。下焦虛熱。若病久不愈者。邪熱蘊積。榮衛滯澀。精血衰微。病多傳變。宜知慎忌。凡忌有三。一飲酒。二房室。三鹹食及椒麵炙燻。又消渴病經百日以上者。當忌針刺。若妄針灸。則瘡上漏水。變成癰疽矣。腎瀝湯。治久消渴。飲水不絕。

遠志

赤茯苓

人參

川歸

龍骨

澤瀉

懷熟地

川芎

片 苓

桂 心二兩

五 味三分

麥 冬二兩

羊 腎一對

用水三鍾。煮羊腎取汁煎藥五錢。入薑棗溫服。日二。

升麻黃芩丸 治久渴不止。

升 麻

片 苓

麥 冬五兩

人 參

生 地三兩

苦 參八兩

括樓根七兩

川 連

川 柏五兩

共末。用牛乳和丸梧子大。飲下三四十丸。

消渴後成水

論曰。脾。土也。土氣弱則不能制水。消渴飲水過多。脾土受濕而不能有所制。則泛溢妄行於皮膚肌肉之間。聚為浮腫脹滿而成水也。

瞿麥穗湯

澤 瀉

滑 石飛過五錢

子 苓

治消渴欲成水氣。面目膝脛浮腫。小便不利。

大黃炒一 桑螵蛸四枚 防己三分

水煎三錢。溫服。頃又服。

赤茯苓湯 治消渴後頭面脚膝浮腫。胃氣虛弱。不能下食。心胸不利。或時吐逆。

赤茯苓 人參 白朮 前胡

紫蘇一兩 陳皮 檳榔 木香

桂心三分 甘草五錢

薑棗水煎三錢服。

消渴後成癰疽

論曰。消渴則隨飲而出。皆作小便。由少服乳石所致。久則榮衛損傷。精血不足。肌膚減耗。石氣增熾。隨附經絡。津液內竭。經絡凝澀。榮衛不行。熱氣留滯。故變爲癰疽。此當精窮治法。恐毒氣不出。穿通臟腑也。服熱毒助陽藥同一治法

玄參散 治渴利後經絡痞澀榮衛留滯壅熱結成癰疽。

玄參 犀角 木香 沉香

芒硝

黃耆

羚羊角一兩

甘草三分

共末。空心溫水下二錢。日二。

磁石散 治消渴後經絡壅熱。結成癰疽。

磁石引鐵者。醋碎二石。十次一兩。

生地

黃耆

地骨皮三分

檳榔

五味子

桂心

枳殼五錢

共末。溫水下三錢。日二。

石膏湯 治消渴後成癰疽。

石膏

知母兩半

括樓根生去皮者。四兩。搗取汁。如

犀角一兩

升麻三分

土瓜根生去皮者。四兩。搗取汁。如

水煎藥三錢。入小麥少許去滓。入二汁各半合。溫服。日二。

桑白皮湯 治消渴後。心肺氣獨盛。結成癰疽。

桑根白皮東引者。蜜炙。半斤。

用水煎三錢。空心溫服。日二。以差為度。

消中

論曰。消中者。不渴而多溲。一名內消。以邪熱熏鑠五臟。然後外及肌肉形體也。得之少年。餌石。房室太甚。真氣耗憊。石氣孤立。結於腎。則腎實。腎實則消水漿。故不渴而小便利多。不得潤養五臟。使所食之物。皆消為小便。治宜滋腎水。養津液。則差。

天冬丸 治初得消中。食已如飢。手足煩熱。背疼悶。小便白濁。

天冬兩半 融心二

鷄內金三具

知母

土瓜根

五味子兩半 微炒

桑螵蛸枚十

鹿茸去毛

澤瀉

赤石脂兩半

牡蠣童便碎

苦參一兩

共末。入蜜杵丸。梧子大。飲下二十丸。

薺菴湯 治內消所食物。皆化作小便。兼治強中。

薺菴

大豆

人參

白茯苓

石膏

葛根

括樓根

子芩

甘草 知母 磁石醋碎

水煎五錢。溫服。日二。

牡蠣丸 治消中食已即飢。手足煩熱。背膊疼悶。小便稠濁。

牡蠣醋碎 赤石脂 括樓根 肉蓯蓉一兩

知母 澤瀉去毛 天門冬 土瓜根

桑螵蛸 五味子 鹿茸 川連

子 芩三分 懷熟地兩半

共末。入蜜杵丸。梧子大。飲下二十九。日二。

猪肚連丸 凡消渴變為消中者。飲食到胃腑。即時消化。小便多而色白。飲食過

人而不覺飽者。是為消中。

雄猪肚去脂膜 川連去蘆

以大麻子仁二合。研水四升。調如杏酪汁。煎肚候爛。入連末。蜜縫蒸極爛。乘熱

搗丸。梧子大。暴乾。飲下三四十丸。臨臥再服。

肉蓯蓉丸 治消中真氣耗憊。小便無度。

肉蓯蓉二兩

人參

五味子

巴戟天

炙甘草

括樓根

地骨皮

丹皮

澤瀉

懷熟地

韭菜子一兩

桑螵蛸十枚

禹餘糧燒研醋碎

龍骨

赤石脂

磁石文醋碎二七

共末入蜜杵丸梧子大牛乳汁下三十丸

消腎

論曰。消腎者。由少服石藥。房室過多。精血虛竭。石勢孤立。腎水燥涸。渴引水漿。下輸膀胱。小便利多。腿脛消瘦細小。小便數。或赤似血色。骨節痠疼。故名曰消腎。地黃湯。治消腎。腿脛消瘦細小。小便數似血色。臟腑虛冷。

懷熟地

麥冬二兩

桂心

炙甘草

川續斷

白蒺藜炒五

黑乾薑一兩

水煎三錢溫服。日二。

山茱萸丸。治消腎自腰以下。瘦弱無力。小便數不禁。

山黃肉

牛膝

桂心

韭菜子炒一

黃耆蜜炙

肉蓯蓉酒洗

杜仲鹽酒炒斷
絲兩半

共末入蜜杵丸。梧子大。黃耆湯下二十九。日二。

人參鹿茸丸 治消腎肢體瘦弱無力。小便數。

人參

黃耆蜜炙
三分

鹿茸一兩

括樓根

桑螵蛸炙一

兔絲子酒煮
兩半

杜仲鹽酒
炒

山黃肉三分

鷄臍黃皮炙四
枚

共末入蜜杵丸。梧子大。棗肉湯下三四十丸。日二。

磁石湯 治消腎小便白濁如凝脂。形體消瘦。

磁石六兩。搗如米粒。分作二
十貼。煎用綿包入。同煎。

黃耆炙

杜仲鹽酒
炒

人參兩半 懷熟地二兩

水三鍾。先煮羊腎一對。切片。煮取汁二鍾。入磁石一分。再煎鍾半。用汁煎藥四

錢服。日二。

金銀箔丸 治消腎口乾眼澀。陰痿。手足煩疼。小便多。

金箔

銀箔片百

葛根

白茯苓

懷生地三兩

肉蓯蓉

天冬

麥冬二兩

川連四兩

括樓根

丹砂飛二兩

黑乾薑

五味

巴戟天

澤瀉兩半

共末入蜜杵丸梧子大。丹砂為衣。空心飲下二十九。日二。

人參附子湯 治消腎飲水無度。腿膝瘦細。小便白濁不差。

人參

附子

青黛五錢

水煎楮葉二片。取汁煎二錢溫服。日二。

聖濟總錄集要 卷九 消渴門 消腎

聖濟總論纂要

清

新安

程

林雲來纂輯

鄞縣

曹炳章赤電校點

卷十

水病門

水病統論

論曰。內經謂腎者。胃之關也。關門不利。故聚水以從類。上下溢於皮膚而爲臑腫。臑腫者。聚水而生病也。其狀目窵上微腫。若新臥起然。頸脈微動。時作咳嗽。股冷膚腫。口苦舌乾。不得正偃。正偃則咳清水不得臥。臥則驚而咳。甚則小便黃澁。以手按腫處。隨手而起。如裹水之狀是也。以脈別之。脈沉者水病也。洪大者可治。微細者難治。水病有不可治者五。脣黑傷肝一也。缺盆平傷心二也。臍出傷脾三也。

足下平滿傷腎四也。背平傷肺五也。蓋脾腎氣虛。三焦閉塞。至陰之氣內蓄。巨陽之氣不得宣通。如是則水道不利。飲濕攻脾。散於肌肉而為水腫之病矣。

水腫

論曰。水腫之病。以脾胃氣虛不能制水。水溢妄行。溢於皮膚。其脛股冷。膚腫時作。咳嗽不得安臥。小便黃澁。以手按腫處。隨手而起是也。

烏藥生

青皮

良薑

藿香子一兩

水煎三錢溫服。

煖腎散 同前。

巴戟天

甘遂炒一分

木香

葶藶

沉香一分

陳皮

羌活花醋炒

麥蘗五錢

膩粉一錢

澤瀉瀉一分

檳榔生一枚一熟

共末。用猪腰切滲末二錢。紙包煨。先食粟米。葱粥半碗吃腰。又食粥。臨臥服。至

五更。大小便下赤黃惡物愈。

大黃湯 治水腫腹滿。

大黃 醋炒 桑白皮二兩 人參 甘草

桂心 細辛一兩

水煎五錢。入棗二枚去滓。入白錫一匙。沸服。日三。利小便三五升差。

檳榔丸 治水腫。

檳榔 微煨 附子 防己 紫朴

吳黃 乾薑 葶藶炒紫 杏仁

甘草 椒目 赤茯苓 括藶仁

海藻 麻黃去根 白朮 黃耆

桂心兩半

共末。蜜丸。梧子大。飲下二十九。二便利為效。

十水

論曰。十水之病。腫從脚起。上氣而咳。名爲白水。其根在肺。腫從面目起。名爲清水。其根在肝。腫從腹肉起。名爲黃水。其根在脾。腫從脚趺起。名爲黑水。其根在腎。腫從心起。名爲赤水。其根在心。腫從腹起。名爲氣水。乍實乍虛。乍去乍來。其根在大腸。腫從頭面起至足。名爲垂水。其根在膽。腫從內起。堅塊。四肢小腫。名爲石水。其根在膀胱。腫從四肢起。腹大。名爲風水。其根在胃。腫從腹內起。名爲裏水。其根在小腹。凡此十水。生於臟腑。各從其根。究其所本。則肺與腎而已。故內經云。其根在腎。其本在肺。皆積水也。又曰。津液充郭。其魄獨居。精孤於內。氣耗於外。形不可與衣相保。蓋腎氣虛弱。水氣脹滿。上攻於肺。肺氣孤危。腎爲水害。子不救母。故陰精損於內。陽氣滅於外。三焦不溢。水道不通。水滿皮膚。身體痞腫。治之之法。備見內經。故曰。平治於權衡。去菀陳莖。微動四極。溫衣繆刺其處。以復其形。開鬼門。潔淨腑。精以時服。五陽已布。疏滌五臟。則精自生。形自盛。骨肉相保。巨氣乃平。賜名神助散。舊名葶藶散。治十種水病。百方不愈。面目四肢俱腫。氣息喘急。眠臥不安。小便漸澁。腹脹氣悶。水不入口。垂命欲絕者。

椒目微炒

猪苓

澤瀉四兩

牽牛五兩

苦葶藶粉六

共末。薑水煎三錢。入葱白三莖。酒半鍾。稍熱下。良久吃葱白粥一碗。酒一鍾。面東熱喫至子後。二便通利。喘定腫減。間日再服。百日盡消。

補藥木香丸 取下水氣。

木香

青皮一錢

莪朮二錢

共末。糊丸。梧子大。湯下十九丸。

靈保丸 治十水。

滑石二兩

膩粉一兩

共研木瓜汁丸。小豆大。五更飲下七丸。日只一服。服七日覺臍腹撮痛。小便多。爲效。忌鹽百日。覺效便服補脾胃藥。

再蘇丸 治十種水氣。大通三焦。此方仙經所載。天台山金壇石室中鑄記。但令

人忌口。無不差者。

大戟炒

甘遂炒

桂心

乾薑

春大麥麵炒

巴豆麵炒

大黃炒

共末。蜜丸小豆大。茶下十九丸。取利爲度。

桑白皮飲 治氣水面目浮腫。胸滿短氣。小便不利。

桑白皮

赤芍

郁李仁

百合兩半

木通二兩

大腹皮五枚

水煎五錢。空心溫服。日二。

風水

論曰。內經云。腎者北藏也。腎主水。故人勇而勞。甚則腎汗出。腎汗既出。復感於風。內不得入於臟腑。外不得出於皮膚。客於玄府。行於皮裏。傳爲附腫。本之於腎。名爲風水。其脈自浮。其外症骨節疼痛而惡風。且身腫如裹水之狀。頸脈動時咳者。是也。金匱方云。脈浮而洪。浮則爲風。洪則爲氣。風氣相搏。身體洪腫。汗出乃愈。惡風者爲風水。不惡風者。小便通利。上焦有寒。其口多涎。此爲黃汗。二者之症。不可不察。

麻黃石膏湯 治風水偏身洪腫。骨節疼痛惡風。汗出不仁。

麻黃去根節 石膏八兩 白朮三兩 附子一枚

甘草二兩

薑棗水煎服。

大豆湯 始風水一身腫滿。短氣欲絕。

杏仁三兩 防風 白朮半兩 赤茯苓

防己 麻黃去根節 甘草二兩 黃耆一兩

水煎五錢。入大豆酒一合。日三。利小便愈。

防己湯 治風水脈浮。浮為在表。其人或頭面汗出。而表無他病。但腰已下跗腫。

防己 白朮二兩 甘草一兩 黃耆半兩

薑棗水煎三錢。空心溫服。日二。如喘加麻黃去根節。身重胃中不和。加桂心。

心下久寒加細辛。每服藥取汗愈。

石水

論曰。腫從內起。堅塊。四肢遊腫。名為腎水。其根在膀胱。蓋腎主水與膀胱。膀胱者

州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。今腎虛則膀胱氣弱。膀胱氣弱則不能化氣。而隱滯不能行。水液停結於臍腹間。故其症胸腹鼓滿。按之如石。脇下脹痛。其脈沉遲。身體發熱。四肢頭面皆腫也。

桑白皮湯

治膀胱石水四肢瘦。

桑皮三兩

白朮

射干

赤茯苓

猪苓二兩

澤漆炒

澤瀉炒

防己一兩

水煮大豆半合。取汁煎三錢。溫服。日二。

楮白皮湯

治石水四肢細瘦。獨腹腫大。狀如懷孕。心中妨滿。食即氣逆。

楮皮

桑皮

防己兩半

白朮

射干

赤茯苓一兩

澤漆炒

大豆炒五

水酒合煎三錢。溫服。

杏仁丸

同。

杏仁去皮

苦

瓠去膜微炒一兩

共末。糊丸。梧子大。飲下二十九。水出為度。

大腹水腫

論曰。內經云。水病下爲跗腫。大腹。又曰。上下溢於皮膚。故爲跗腫。其症腹大。四肢小。陰下溼。手足逆冷。腰痛上氣。咳嗽煩疼是也。蓋三焦閉塞。水道不通。流溢皮膚。榮衛否澁。內連腹膜。則至陰內動。脹急如鼓。得病之本。多因大病之後。或積虛勞損。或新熱食畢。入水自漬。及浴冷水。水氣不散。理宜然也。

牛黃丸 治大腹水腫。氣息不通。症候危篤者。
牛 黃五錢 昆布 牽牛 海藻

桂 心一兩 椒 目 葶 藶 三分

共末蜜丸小豆大。飲下十九丸。小便利爲度。

蘇合香丸 治水氣腹大腫。

蘇合香 水 銀時後入研 白蘇末一兩

共研。蜜丸小豆大。空心飲下十九丸。

丹參酒 治久患大腹病。其狀四肢細瘦。腹大有勞苦則脛腫。滿食則氣急。此病

服下利藥不差。宜用此酒。以散除風溼。利小水。

丹參

兔箭羽

白朮土炒

知母

赤茯苓一兩

秦艽七分

猪苓

海藻水洗

真獨活

桂心三分

共爲粗末。以白酒五升。浸五日。每服一鍾。日三。

水腫欬逆上氣

論曰。內經謂腎爲水腫。肺爲喘呼。氣逆不得臥。蓋腎主水。肺主氣。腎虛不能制水。水氣脹滿。上乘於肺。肺得水而浮。故虛而咳嗽。古方有云。腫從脚起。上氣而咳。名曰白水。其病在肺。

緒澄防己煎散 水腫上氣。

防己

澤漆葉

澤瀉五兩

白朮

丹參

赤茯苓

桑白皮

陳皮

木通三兩

郁李仁五合

水煎五錢。入生薑。日三。小便利爲度。

防己湯 水氣欬逆上氣。四肢浮腫。坐臥不安。

防己

甜葶藶炒

木通

桑白皮

赤茯苓一兩

陳皮二兩

澤漆五錢

郁李仁微炒

百合一合

水煎五錢。

鯉魚湯 水腫腹大。喘欬。胸脅滿。不得臥。

鯉魚

魚去鱗腸二斤

紫苑

桂心三兩

防己

黃芩

硝石研

人參二兩

用水一斗。煮魚取汁五升。每二鍾煎末五錢。日三。

雌雞湯 胸中喘。噉逆。水氣身腫。利小便。

雌雞白者一隻

白朮

半夏一兩

澤漆二兩

炙甘草兩半

粗搗篩。用東流水五升。煮雞取汁。入藥五錢。薑、棗、赤小豆煎服。日三夜一。

澤漆根湯。水在肺。令人咳嗽。上氣。腹大脚腫。目下如臥蠶。微渴不得臥。小便難。

少而數。胸滿隱痛。此水氣迫肺。宜利小便。

澤漆根生四

人參

麥冬

炙甘草

赤茯苓一兩

鯉

魚三尾。大一斤。三以利為度。未利稍增。寒加生薑。

水氣徧身腫滿

論曰。腎主水。脾胃主土。土尅水。胃為水穀之海。其氣虛不能傳化水氣。使水氣浸漬水臟。又脾得水溼之氣。土衰不能制水氣。溢歸於腎。腎虛三焦不瀉。經絡閉塞。故水氣溢於皮膚。傳流四肢。所以通身腫也。其候上氣體重。小便黃澁。腫處按之。隨手而起是也。

木通湯 徧身腫。

木通

苦葫蘆兩半

防己

澤瀉三分

猪苓

海蛤一兩

酒水煎五錢。入葱白溫服。當下小便數升。腫消。

鯉魚湯 水病通身洪腫。

鯉魚一斤

澤漆微炒

人參兩半

杏仁錢五

共末。水三升。煮魚以汁煎末三錢。日三。小便利乃止。

海蛤丸 水腫腹滿。四肢瘦喘促。小便澀妨悶。

海蛤研二

木香

防己

厚朴

訶勒皮

旋復花一兩

桂心五錢

共末。蜜丸梧子大。大腹皮湯下二十九。

枳實湯 水氣。

枳實法白

白朮

升麻

炙甘草

紫苑

知母

桑白皮

赤茯苓

黃耆

秦艽

麥冬

黃芩等分

葱白水煎三錢。

白朮湯 水氣渴腹脇脹滿。

白朮

人參

赤茯苓

炙甘草

水煎五錢服。

平補鹿茸丸 水氣平愈。體瘦如舊。

鹿茸炙 菝葜酒洗

柏子仁一兩

白茯苓

地黃

兔絲子酒炒

黃耆

防風

遠志

車前子

五味子

桂心五錢

蜜丸梧子大。飲下三四十丸。

水蠱

論曰。水腫之狀。腹膜腫脹。皮膚粗黑。搖動有聲。此由脾胃氣虛。溼氣淫溢。久不治。則害人。如蠱之毒。故謂之水蠱。

大黃湯 水蠱二便不通。急脹壅塞。

大黃兩半 麥冬三分

川連

甘遂微炒

茅根一兩 貝母三分

水煎二錢。

瞿麥湯 水蠱腹脹滿急。小便不通。縱有少而黃赤。

瞿麥穗

車前

滑石

茅根

甘遂沙

苦參等分

水煎二錢。日三。

分水氣海蛤丸 水蠱腹脹喘嗽。

海蛤五

凝水石

滑石一兩

膩粉

粉霜一錢

白丁香五十

共末。麪和作餅子。紙包煨熟為末。糊丸菘豆大。酒下二十九。

鼠尾草丸 水蠱

鼠尾草

馬鞭草各五斤

水五斗。煮二斗。取汁再煎成膏。為丸小豆大。以輕粉為衣。飲下三丸。

惡實丸 水蠱身體洪腫。

惡實微炒

為末。糊丸梧子大。飲下十丸。勿嚼破。

瓠瓢煎 同前。

瓠 瓢一枚

水二升。煮一炊。去滓煎堪丸。卽丸小豆大。飲下十丸。取小便利後。勿飲水作小豆羹食之。

楮枝煎 蠱病水腫。

楮 枝半斤

水五升。煎半取汁。入黑豆末半升。煎成頻服一匙。

膜外氣

論曰。諸家方書。論水病甚詳。未嘗有言膜外氣者。唐天寶間有徒都子者。始著膜外氣方書。本末完具。自成一家。今并編之。然究其義。本於肺受寒邪傳之腎。腎氣虛弱。脾土又衰。不能制水。使水溼氣散溢於皮膚之間。氣攻於腹膜之外。其病令人虛脹。四肢腫滿。按之沒指是也。

徒都子論病本

臆外氣者。或謂之水病。起於他疾。不可常定。或因患瘧。或因積勞。或因腎臟中風。或因肺腑傷冷。或因膈上氣。或因衝熱遠行。或因酒肉中所得。始於肺。終於腎。或因咳嗽。或多涕唾。或因蓄聚冷氣。壅塞不散。遂使肺臟邪氣攻心。冷氣化為水。流溢膀胱。在大腸膜外。所以切脈不能知。針灸不能及。蓋人腎爲命本。不可虛也。本固枝葉茂。本虛卽枯槁。况四時衰旺。皆乘腎臟之氣。腎損則五臟皆衰。是致胃閉而脾不磨。氣結而小便澁。輕重之候。在大小便耳。若小便不通。則氣壅攻擊。腹內衝出膜外。化而爲水。使人手足頭面浮腫。若二便微澁。則微腫。極澁則極腫。二便俱不通。三日卽徧身洪腫。則陰亦腫。夫陰腫有二。有腫而小便自出者。有腫而小便澁者。又有莖囊連小腹臍皆腫者。此並爲死候。宜速治之。若患此腫病。亦不常定。或先手足面目浮腫。或先腰肋微腫。或先手足小腫。其候或消或甚。三五日稍愈。又發。亦以小便通澁爲效。積漸變成洪腫。女人得之。與此略同。凡患此疾。令人腹脹煩悶。胸間氣急。此由肺脹。甚至喘如牛吼。坐臥行立不得。或中夜逆氣攻心。胸重者。一二年方死。有一二月死者。若將息失度。誤食毒物。十日半月卽甚也。愚醫多以針灸出水爲功。又以鯉魚赤小豆爲藥。又令病人飲黃牛尿。服商陸根。反

有所損。少有差者。大抵此病。尤忌針灸。華陀云。患水病。勿遇良醫。第一不可針灸。言氣在膜外。已化爲水。水出卽引出腹中氣。水盡則死。有此病疾者。宜向陽行坐。遇陰雨。則愈覺壅滯。房中常須存火。服藥後。夜臥覺胸間熱甚。宜含紅雪與好茶之類。慎勿飲酒及冷藥茶冷水。若渴。宜喫五靈湯。錄在卷後。尤忌鹽生冷醋滑。

五靈湯 膜外水氣。

木通 訶勒皮

防己

赤苓

陳皮 一兩

水煎五錢。覺熱喫好茶。

紫蘇煑散 膜外水氣。

紫蘇

防風

白朮

桑皮 等分

共末。水煎。覺熱去白朮。加甘草。功效如前方。又有蛇蠱。狀如水病相似。四肢如故。小便不甚澁。但腹急腫而蠱脹。不下食。凡醫多誤作水氣治之。宜只細詳審。

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷十一

黃疸門

黃疸統論

論曰。疸病症有五種。一曰黃疸。二曰黃汗。三曰穀疸。四曰酒疸。五曰女勞疸。黃疸者。徧身面目悉黃如橘。黃汗者。身體黃腫。汗出如檠汁。不渴。狀如風水。穀疸者。食畢頭眩。心中怫鬱不安而發黃。酒疸者。心中懊痛。足腫滿。小便黃。面發赤斑黃黑。由大醉當風入水所致。女勞疸者。一身面目皆黃。發熱惡寒。小腹滿急。小便難。由大熱房室過度。此五者。症狀雖異。大率因酒食過多。水穀相並積。

於脾胃。復爲風濕所搏。熱氣鬱蒸。所以發黃爲疸。其症食已如飢。曰胃疸。額上黑。足下熱。曰黑疸。其因傷寒時氣後。變成黃者。緣陽明病無汗。小便不利。熱瘀在裏。心中懊懣。身必發黃。若被火額上微汗出。但小便不利。亦發黃。其狀如橘色。腹微滿。此由寒溼不散。瘀熱在於脾胃故也。又有九疸三十六黃。其症其名。悉各不同。治皆有法。具載後章。凡黃病當利其小便。疸而渴者。其病難治。疸而不渴。其病可治。

黃疸

論曰。內經謂目黃者曰黃疸。又曰。安臥脈盛。謂之黃疸。其外症身體面目及爪甲小便盡黃。其內症食已如饑。此由酒食過度。脾胃有熱。復爲風溼所搏。瘀結不散。熱氣鬱蒸。故發是疾。若面色微黃。身體或青赤黑色。皆見者。與純熱之症不同。當於溼家求之。諸黃疸發於陰部。其人必嘔。發於陽部。其人必振寒而發熱也。

茵陳蒿湯

麥冬

山梔仁三分

木通

柴胡

括樓根一兩

炙甘草五錢

水煎五錢。入竹葉二七片。溫服。日二。

木通湯 治黃疸脾胃積熱。皮肉皆黃。煩躁口苦。小便赤澀。

木通

瞿麥穗一兩

懷生地兩半

大青

赤茯苓

白茅根

秦艽三分

水煎五錢。溫服。日二。

黃連湯 治黃疸。面目徧身皆黃。小便盡黃。

川連

大青

人參

地骨皮

茵陳蒿

山梔仁

子芩

柴胡

芒硝一兩

大黃炒二兩

水煎五錢。溫服。日二。

桃根湯 治黃疸。面目一身如金色。及一切疸病。

桃根皮

東引者一把如雞股者勿見風及避女人雞犬

水煎取汁。空心頻服。如眼中黃色未退時。飲酒一杯。

白鮮皮散 治一切黃疸。面目皮肉如金色。小便赤黑。口乾煩渴。

白鮮皮二兩 芒硝 大黃三兩 土瓜根

茵陳蒿 括樓根 白芍 川連

柴胡 山梔兩半 子芩一兩 真珠燒赤研

大青兩半

共末。用白茅根取汁下三錢。取利。至晚不利。再服。服了以葱豉粥投之。取利為效。

柴胡湯 治黃疸。身面黃口渴。

柴胡五錢 炙甘草一枚 白茅根一把

水煎溫服。未差再服。

秦艽煮散 治面身目爪甲小便俱黃。

秦艽一兩

用牛乳二鍾半。煎鍾半。分二服。未差再服。

茵陳蒿丸 治一切黃疸。并小便如金色。及身皮皆黃者。

茵陳蒿四兩

大黃

片苓

山梔仁三兩

共末。入蜜杵丸。梧子大。空心飲下二三十丸。日二。

吳藍飲 治黃疸。身腫發熱。汗出而渴。汗著衣正黃。

吳藍

白芍

麥冬

白鮮皮

山梔仁

桑白皮炙

防己一兩

水煎五錢。溫服。日二。

急黃

論曰。諸發熱心顫。定必發為急黃。謂其卒然發黃。心滿氣喘。命在頃刻。故名急黃也。有初得病。身體面目即發黃者。有初不知是黃。死後變黃者。但先有其症。當急治之。此由脾胃有蓄熱。及客氣鬱蒸。又因熱毒所加。故發為斯病也。

茵陳蒿湯 治急黃。小便赤黃如梔子汁色。心中煩悶。

茵陳蒿

子苓

山梔仁

川連

大黃 微炒

白鮮皮一兩

貝齒煨

朴硝 研五

水煎五錢。去滓。入朴硝五分。沸服。日二。

茵陳川連湯 治天行急黃。身目如金色。

茵陳蒿

川連

子芩

大黃兩一

人參

炙甘草五錢

水煎五錢。空心溫服。日二。

龍膽草湯 治急黃。面目身體如金。躁欲飲水。

龍膽草一兩

石膏二兩

木通

土瓜根

大黃兩半

白茅根

朴硝研

犀角一兩

山梔五錢

水煎三錢。去滓。入朴硝末五分。沸服。

黑豆煎 治急黃。煩熱。口乾。徧身悉黃。

黑豆一升

用水五大鍾。煎汁二鍾。入生地汁、藕汁、麥冬汁、白蜜各二合。酥半合。慢煎成膏。含化一匙。日三夜一。

陰黃

論曰。陰黃者。面黃頭痛。不發熱。不欲聞人聲音。此由陽伏於陰。邪氣熱盛。沉潛散於肌肉。身黃如橘。故謂之陰黃。昔人有言下之後。身目發黃者。當於寒溼中求之。此其類也。

秦朮湯 治陰黃。不欲聞人言語。小便不利。

秦 朮一兩

赤茯苓

炙甘草

旋復花五錢

用牛乳煎四錢溫服。

茵陳蒿散 治陰黃。身面如橘色。小便不利。

茵陳蒿二兩

白朮

豬苓

赤茯苓三分

桂 心五錢

澤瀉去毛一兩

共末。空心水下二錢。日三。

半夏湯 治陰黃。小便色不變。欲自利。腹滿而喘者。必噦。

半夏湯 治陰黃。小便色不變。欲自利。腹滿而喘者。必噦。

夏湯 治陰黃。小便色不變。欲自利。腹滿而喘者。必噦。

夏湯 治陰黃。小便色不變。欲自利。腹滿而喘者。必噦。

生薑水煎四錢。溫服。日二。

赤小豆散 治陰黃。

赤小豆

丁

香各二十

麝

香研一

瓜蒂一枚

青棉布灰二錢

共末。熟水下一錢。日二。以吐爲度。又取少許吹鼻中。有黃水出效。

酒疸

論曰。胃虛穀少。醉以入房。冒犯風邪。胃中熱毒。隨虛入裏。小便黃赤。溼毒內聚。心下懊懣疼痛。熏發肌肉。則身目發黃。或發赤斑。足脛浮腫。或下之早。則變爲黑疸。令人心如病饑。大便黑瘕。皮膚不仁。治法概宜先去溼毒。後分小水。茵陳蒿湯 治酒疸。心中懊懣。小便黃赤。

茵陳蒿

葛根

赤茯苓五錢

升麻

秦芫一兩

括蔞根三分

山梔仁半分

水煎三錢。溫服。日二。以差爲度。

艾葉湯 治酒疸。身目俱黃。心中懊痛。

艾葉生用一匙如麻黃去根大黃炒兩

用酒煎四錢。入大豆半合。空心溫服。日二。

凝水石散 治酒疸。小便不利。或飲少澀多。如白泔色。

凝水石煨白石脂 括蔞根一兩

桂心 兔絲子酒煮二兩

共末。空心飲下二錢。日二。

小麥飲 治酒疸。

生小麥

用水煎二合。取汁頓服。未差再服。

追毒飲 治酒疸。徧身發黃。

狗脊去毛白芥子 炙甘草一分

用酒一升。煎半升。分二服。以利下為度。未利再服。

大黃湯 治酒疸。心懊痛。脛腫澀黃。面發赤斑。

大黃兩二

山梔仁

枳實兩一

大豉兩三

水煎四錢。溫服。日二。

穀疸

論曰。夫饑飽甚。則胃中滿塞。穀氣未化。虛熱熏蒸。遂為穀疸。其症心下懊悶。瞋睡。心忪。佛鬱發煩。小便不利。身黃如橘。是也。

茵陳蒿湯 治穀疸。食則目眩。心忪。佛鬱不安。久久發黃。

茵陳蒿

柴胡兩四

子芩

龍膽草

枳實兩二

大黃兩二

山梔仁

升麻兩三

水煎五錢。溫服。日二。若病人羸瘦而氣弱。去大黃。用懷生地五兩。山梔仁五兩。

苦參梔子丸 治穀疸。

苦參

子芩

山梔仁

龍膽草一兩

共末。用雄豬膽汁和丸。如梧子大。空心飲下二十九丸。日二。

胃疸

論曰。已食如饑者。胃疸也。夫胃熱則能消穀。今已食如饑者。以胃氣但熱而無陰也。然胃為足陽明。陽明之脈絡屬於心。陽明得熱。則心火上行。陽炎過矣。故單陽成瘴。心嘈雜而身面黃。小便赤色也。

瀉熱湯 治胃中有熱。食已如饑。不生肌肉。面色萎黃。

生大黃

麻黃節去根

子芩四兩

甘草

陳皮去白

杏仁去皮

赤茯苓

芒硝研

澤瀉一兩

水煎三錢。溫服。日二。

蘆根湯 治胃熱壅盛。食已如饑。面黃口燥。

蘆根

麥冬

括蕒根一兩

甘草

知母

赤茯苓三分

生薑水煎三錢。入小麥一撮。竹葉、生地一分。溫服。日二。

赤茯苓湯 治胃積熱。食已即饑。面黃肌瘦。胸滿脇腹。

赤茯苓

陳皮

澤瀉

桑白皮三兩

白芍藥

白朮四兩

石膏研入

人參

桂心二兩

半夏六兩

生薑水煎四錢。溫服。

犀角湯 治胃實熱。嘔逆不下食。

犀角屑

葛根三分

麥冬

枇杷葉去毛炙

生薑水煎三錢服。

黑上疸

論曰。諸黃疸。酒疸。女勞疸。久不已。皆變為黑疸。其狀小腹滿。身體盡黃。額上反黑。足下熱。大便黑是也。黃本脾病。脾者土也。脾病不已。傳其所勝。腎斯受之。腎為水藏。其經足少陰。其色黑。病在腎。故小腹滿。色黑。大便黑。足下熱。是皆足少陰經受病之症。

當歸湯 治諸疽久不差。變成黑疽。小腹滿。身黃額黑。

川歸三兩

桂心六兩

麥門冬

大黃炒一

黑乾薑

黃耆炙

茵陳蒿

子芩

赤茯苓

炙甘草

石膏研

川連

白芍藥

人參二兩

共十四味。剉如麻豆大。用生薑水煎三錢。空心溫服。日三。一方無黃耆。

土瓜根飲 治諸疽變成黑疽。諸醫所不能治者。

土瓜根

水煎取汁。每日空心服半鍾。其病隨小便出。即愈。須強壯人可半鍾。羸瘦人只

一合。無生者剉乾者一兩。水煎服。

女勞疽

論曰。脾胃素有溼熱。或緣大暑醉飽。房勞過度。引熱歸腎。溼氣交攻。小水不利。小腹堅脹。溼毒流散於肌肉之中。則四肢身面發黃。故謂之女勞疽。然其症又有額

上黑。微汗出。手足心熱。薄暮即發。膀胱急。小便自利者。各宜隨其症而治之。
硝石鑿石散 治女勞疸。身目皆黃。發熱惡寒。小腹滿急。小便難出。大勞大熱。房
室傷損。溼毒散於肌肉。

硝石

鑿石

石燒枯

共末。空心飲下一錢。覆衣取汗。隨利下。小便色黃。大便色黑。差未差再下。

犀角湯 治女勞疸及勞氣熱渴。額上汗出。手足熱。小便赤澀。

犀角

龍膽草一兩

升麻

炙甘草五錢

麥冬三心

生薑大棗水煎三錢。去滓。入生地汁一合。再沸服。日二。

髮灰散 治女勞疸。身目俱黃。惡寒發熱。小腹滿急。小便難。

亂髮

雞子大

猪脂半斤

用油慢火煎髮。令髮消盡。溫水下一匙。不拘時頻服。以小便利為度。

黃汗

論曰。黃汗者。汗出沾衣。色正黃如檠汁。故名曰黃汗。由脾胃有溼。瘀熱伏留。熏發肌肉。散而爲汗。其症使人身體浮虛。骨癢疼痛。發熱汗出而不渴。是其候也。黃耆苦酒湯。治黃汗。身腫發熱。汗出而不渴。狀如風水。汗沾衣色黃如檠汁。脈沉。由夫汗出入水中浴。水從汗孔入而得之。

黃耆五錢

白芍藥

桂心三兩

用苦酒二鍾。煎五錢。空心服之。當心煩苦酒阻故也。日二服。

吳藍湯。治黃汗。身重發熱。汗出而不渴。狀如風水。汗出衣黃。

吳藍

防己

白鮮皮

山梔仁

桑白皮

麥冬去心

白芍藥兩半

水煎三錢。溫服。未效再服。

茵陳蒿湯。治黃汗。身熱不退。大小便利。

茵陳蒿

木通

黃耆

赤芍藥

赤茯苓

炙甘草一兩

大青礬二

水煎五錢。溫服。頃再服。以二便通利爲度。

山梔括蕪丸 治黃汗身熱。大小便不利。

山梔仁

括蕪根

苦參一兩

共末。用醋浸雞子二枚。和丸梧子大。水下三十九。日三四服。

蔓菁子散 治黃汗如檠汁沾衣。身虛浮。

蔓菁子

爲末。用井華水空心下二錢。日二。以差爲度。

二十一至二十六黃

一、心黃

二、肝黃

三、脾黃

四、肺黃

五、腎黃

六、鬼黃

七、姦黃

八、血黃

九、人黃

十、髓黃

十一、癰黃

十二、急黃

十三、氣黃

十四、癩黃

十五、白黃

十六、陰黃

十七、膽黃

十八、驚黃

十九、風黃

二十、走精黃

二十一、酒黃

二十二、雞黃

二十三、蜓蚰黃

二十四、火黃

二十五、走馬黃 二十六、房黃 二十七、黑黃 二十八、厭黃
 二十九、水黃 三十、瓜黃 三十一、腸黃 三十二、犢黃
 三十三、氣黃 三十四、猪黃 三十五、土黃 三十六、蝦蟆黃
 右三十六黃。有烙法。有灸法。有方法。中多奇證。大約是溫疫中壞證。必有之惡候也。然三法俱難用。故不刊載。今存其名。以備醫家博覽。

胸痺門

胸痺統論

論曰。虛極之人。爲寒邪所客。氣上奔迫。痺而不通。故爲胸痺。其症堅滿痞急。或胸中悞悞如噎塞。或胸背皆痛。或胸滿短氣。咳唾引痛。煩悶白汗出。或心痛徹背。或肌痺皮痛。是皆閉塞而不通也。夫脈當取太過與不及。陽微陰弦。則胸痺而痛。又云胸痺之病。喘息咳唾。背痛短氣。寸口脈沉而遲。關上緊。是皆胸痺之候也。

胸痺

論曰。胸脾之病。其脈陽微而陰弦。陽虛則知在上焦。陰弦故令胸痺心痛。古方用理中湯。取緩其中氣則可也。然背者胸之腑。或築。或悸。或渴。或腹痛。或寒。或腹滿。其候不一。治當隨症加減。

理中湯 治胸痺。

人參

白朮

炙甘草

黑乾薑一兩

水煎五錢。溫服。頃又服。若築者。此腎氣動也。去白朮。加桂心。臍上築吐多者。去白朮。加生薑。下多者。復用白朮。悸者。加白茯苓。渴者。加白朮二兩。腹中痛。加人參一兩。寒者。倍乾薑。腹滿。去白朮。加附子。服後以稀粥投之取汗。

括蕒實湯 治胸痺。

括蕒實 一枚并

枳

實五枚

半

夏四兩

水煎五錢。入薤白五寸。生薑三片。煎溫服。日二。

半夏湯 治胸痺。心下堅痞。急痛徹背。短氣煩悶。白汗出。

半夏二兩

括蕒實 一枚

薤白切二

生薑水煎五錢。入薤白服。日二。

胸痺噎塞

論曰。胸痺噎塞之病。以胸中痞結不通。故有噎塞之症。蓋寒氣客於五臟六腑。因虛而發。上衝胸間。則氣痞而不通。甚則爲噎塞也。

視布丸 治心胸氣悶。喉中噎塞。

視

布洗燒灰

木香

赤茯苓

枳

實熬炒

檳

榔生五錢半

訶梨勒五錢

甘草

乾

薑一分

共末。入蜜杵丸。如梧子大。空心溫酒下三十九。日二。

赤茯苓湯 治胸中氣壅噎塞。

赤茯苓三兩

炙甘草一兩

杏

仁四十九枚

去皮尖炒研

水煎三錢。溫服。日二。

胸痺心下堅痞急

論曰。體虛之人。寒氣客之。氣結胸。鬱而不散。故爲胸痺。其症心下堅滿痞急。甚者疼痛搶心。如刺手不得犯。治之當辨至微。殆不可忽也。

五物湯 治胸痺心下堅。

陳皮去白

白芍

川歸五錢

木香一分

桔梗一兩

生薑水煎五錢服。

桔梗湯 治胸痺心下氣堅滿。痞急刺痛。不可俛仰。氣促咳吐。引痛不能飲食。

桔梗炒

陳皮炒二

甘草一兩

括蔘實炒一

生薑大棗水煎五錢。入薤白五寸。空心溫服。日二。

五味丸 治胸痺心下堅痞急。

附子

黑乾薑三兩

桂心

檳榔

訶勒皮一兩

共末入蜜杵丸。如小豆大。酒下二三十九。日二。

白豆蔻湯 治胸痺心下堅痞急。

白豆蔻

人參

木香

桂

心五錢

黑乾薑

京三稜醋煮

炙甘草

陳

麴一兩

陳皮

大麥蘗炒香

生薑水煎三錢。入鹽少許。溫服。日二。

胸痛

論曰。胸痛者。胸痺痛之類也。此由體虛挾風。又遇寒氣加之。則胸膈兩乳間刺痛。甚則引背膊。或徹背脊。咳喘引痛是也。

桔梗黃耆湯 治胸膈痛。

桔梗二兩

人參

川芎

甘草

蘇葉五錢

川歸

黃耆

沉香一兩

水煎三錢。溫服。日二。

白朮枳實散 治胸痺。

白朮土炒

枳實炒

陳

麴一

共末。酒下二錢。日一。

柏實散 治胸痺

柏子仁兩一

桂

心半分

共末。飲下二錢。日一。



3.081
5
:4(1)5

聖濟總錄纂要

六

413.081
108
:00126

中國醫學大成第四集

方劑類

聖濟總錄纂要 六

上海大東書局印行



3 0472 8412 4

254631

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷十一

心痛門

心痛統論

論曰。心痛諸候。皆由邪氣客於手心主之脈。蓋少陰心之經。五臟六腑君主之官也。精神所舍。諸陽所合。其藏堅固。邪氣未易以傷。是以諸邪在心。多在胞絡者。心主之脈也。其候不一。有寒氣卒客於臟腑。發卒痛者。有陽虛陰厥。痛引喉者。有心背相引。善癢偃僂者。有腹脹歸於心。而心痛甚者。有急痛如針錐所刺者。有其色蒼蒼。終日不得太息者。有臥則從心間痛作愈甚者。有發作腫

聚。往來上下。痛有休止者。或因於飲食。或從於外風中藏。卽虛邪氣客之。痞而不散。宜通而塞。故爲痛也。君主真心不痛。若痛卽實氣相搏。手足厥冷。非治藥之所及。不可不辨也。

心痛

論曰。心爲君主之官。神明出焉。正經不受邪。其支別之絡脈。爲風寒邪氣所乘。令人心痛。蓋風邪之氣。痞而不散。內干經絡。則發爲心痛。乍減乍甚。乃其症也。

木香湯

治心痛如錐刀刺。

木香

川歸

桔梗

鼈甲

檳榔

吳茱萸一分

薑水煎三錢服。

薑黃散 治心痛不可忍。

薑黃

川歸一兩

木香

烏藥

共末。吳茱萸醋湯下二錢。

莎草根散 同前。

香附根炒去毛

丁香炒一

共末。酒煎一錢熱下。

人參湯 同前。

人參兩半 吳茱萸洗一兩醋炒

薑棗水煎三錢。日二。

五靈脂散 治心痛。

五靈脂研

男人熱酒下一錢。女人當歸湯下一錢。

莪朮飲 同前。

蓬莪茂生用

水醋煎三錢熱服。

鉛丹丸 治心痛及腹痛。

鉛丹 白礬一兩

同研。入瓶中封蓋。火煨赤。研飯丸。梧子大。心痛薑湯下十丸。腹痛醋湯下十丸。
參香散 治心痛。不下食。脇下刺痛壅悶。

人參

木香

白芍

半夏

大腹

草撥三分

高良薑

丁香

川芎

青皮

桂心五錢

共末。空心薑湯下二錢。

木香湯 治心疼。氣刺痛。不下食。

木香五錢

白朮

白芍

枳殼

陳皮

桂心三分

甘草一分

薑水煎三錢服。

丁桂丸 治心痛不可忍。

丁香

乾薑五錢

枳殼

川歸

紫朴

桃仁

檳榔

桂心一兩

川芎三分

共末。蜜丸。梧子大。空心酒下三十丸。薑湯下亦可。

吳萸生薑湯 治九種心痛。

吳茱萸 湯炮七次炒

生薑 剉片 醋

人參 三分

大棗水煎三錢。空心熱服。頃再服。

卒心痛

論曰。卒心痛者。本於臟腑虛弱。寒氣卒然客之。其狀心如寒。痛不得息。千金治寒客心痛。而用大黃、黃芩。治心痛徹背。而用烏頭、附子之類。治藥相反如此。而在用之隨宜而已。

川芎丸 治卒心痛不可忍。

川芎

川歸

良薑

桂心 五錢

紫朴 一分

水煎三錢服。日二。

半夏丸 同前。

半夏

細辛三分

人參

附子

乾薑一分

共末。醋糊丸小豆大。酒下五丸。日二。

紫桂煑散 治暴心痛。

桂心

良薑

川歸一兩

紫

朴汁三分薑

吳茱萸洗炒

共末。薑棗水煎一錢五分服。

三聖散 治卒心痛不可忍。

附子

莖 茂一兩

胡椒五錢

共末。熱酒下一錢。女人醋湯下。

神應丸 治暴心痛危篤者。

石灰風化

乾薑一錢

共末。滴水丸豌豆大。用葱白一寸。刺開入川椒七粒。溼紙包煨。烹湯細嚼。醋下七丸。

高良薑散 治暴心痛。

高良薑

白芍藥一兩

共末。空心酒下二錢。

久心痛

論曰。心為諸臟之長。神之所舍也。其正經不可傷。傷之則旦發夕死。夕發旦死。是為真心痛。不可復治。其久成痛者。由風冷邪氣乘於心之支絡。停滯不去。發作有時。故經久不差也。

薑黃散 治久心痛不可忍。

薑黃炒

川歸一兩

木香

烏藥五錢

共末。吳茱萸醋湯下二錢。

木香散 同前。

木香生

白芍

川歸

細辛

炙甘草

吳茱萸一兩

桂心

檳榔

乾薑五錢

共末薑鹽湯下二錢。

丁香湯 同前。

丁香

胡椒分炒

陳皮

桂心

炙甘草

藿香子兩炒

水煎三錢服。

遠志湯 同前。

遠志

菖蒲一兩

水煎三錢空心服。

桃仁煎方 同前。

桃仁四十九枚去

分三服湯下日二未差又服。

吳茱萸湯 同前。

吳茱萸湯洗炒

水煎。空心頓服。

肝心痛

論曰。肝心痛。色蒼蒼如死灰狀。不得太息是也。蓋肝在色爲蒼。而足厥陰之脈。貫膈布脅肋。今肝脈虛受邪。傳爲心痛。故其色蒼蒼而不澤。拘攣不得太息也。

細辛湯

治肝心痛。胸膈氣滯。四肢厥逆。兩脅痛。

細辛

桃仁

人參

附子

川歸

前胡

柏子仁

川芎

陳皮

木香

白茯苓

桂心三分

吳茱萸

五錢湯洗炒

薑棗水煎三錢服。

紫苑丸 治肝心痛連脅。不得太息。

紫苑

木香

白朮

川歸

桔梗

五錢

桂心

郁李仁三分

共末。蜜丸小豆大。檳榔湯下二十九。

脾心痛

論曰。脾者屬中州為孤臟。以灌四旁。脾氣盛則四臟皆得所養。今脾虛受病。氣上乘心。故為痛特甚。古方謂如針錐所刺而痛迫急者。是為脾心痛之候。木香寬中散。治脾心痛。泄瀉不止。

木香

肉蔻

白茯苓

人參

甘草

陳麩

訶梨勒一兩

附子

草薢

白薢

麥蘗五錢

共末。薑湯下二錢。

訶梨勒湯。治脾心冷痛不可忍。霍亂吐瀉。

訶勒

甘草

白薢

陳皮

紫朴

良薑

乾薑

白茯苓

神麩

麥蘗一兩

水煎三錢。入鹽少許。

厚朴湯 治脾心痛。

紫 朴 人 參

吳茱萸 一兩

薑棗水煎三錢溫服。

食茱萸湯 治脾心痛兼吐水。

食茱萸 洗炒 白 朮

乾 薑 一兩

薑水煎三錢空服。

胃心痛

論曰。胃爲水穀之海。冲和之氣屬焉。固而保之。則邪不能襲。若經氣虛風冷傷。則乘於心之絡脈。痛歸於心而腹脹。是爲胃心痛也。六氣湯 治脾胃傷冷心腹痛霍亂吐瀉。

良 薑 陳 皮 白 朮 甘 草
大 茴 桂 心

薑水煎三錢。

高良薑散 治胃氣極冷。卒病心痛。吐逆寒痰。飲食不下。

高良薑三兩

酒浸。濕紙包。煨熟爲末。酒下二錢。

腎心痛

論曰。腎心痛者。心痛與腎相引。善瘕癥。如物從後觸其心。身傴僂者是也。蓋少陰之脈。貫脊屬腎。其直者上貫肝膈。入肺中。其支者從肺出絡心注胸中。今腎虛逆氣乘心。故其痛與腎相引。善瘕癥。如物觸其心也。

烏頭丸 治腎寒氣逆上奔。心痛引背。

烏頭一兩

川椒

桂心三分

乾薑

赤石脂五錢

共末。蜜丸。梧子大。酒下二十九。日二。

桃花散 治腎心痛。如物從背觸心。牽脊傴僂。

桃 花取片焙 苦 參兩半

共末。酒煎三錢服。

巴戟天丸 同前。

巴戟天 人參 附子 青皮

肉蓯蓉 藁香子一 檳榔五錢

共末。用羯羊腎二對。入鹽五錢。溼紙包煨熟。研入。蜜丸。梧子大。鹽湯下二十九丸。

高良薑湯 治腎寒氣逆。上乘心痛。

高良薑 紫朴 桂心三兩 川歸二兩

薑水煎三錢。熱服。日二。

厥心痛

論曰。手少陰心之經也。心為陽中之陽。諸陽之所會合。若諸氣虛。少陰之經氣逆。則陽虛而陰厥。致令心痛。是為厥心痛。當歸散 治厥逆冷氣上攻心痛。

川 歸 陳 皮 枳 殼 桂 心

桔 梗 檳 榔 一 兩 赤 芍 人 參

木 香 五 錢

共末。空心薑棗湯下二錢。

草豆蔻湯 治厥逆冷氣上攻。心痛不食。

草 蔻 兩 半 良 薑 桂 心 川 歸 一 兩

紫 朴 薑 汁 炒 二 兩

薑棗水煎三錢。稍熱服。頃再服。

麝香湯 治厥心痛氣痛。

麝 香 木 香 吳 茱 萸 一 兩 桃 仁 三 十 五 枚 去 皮 尖 炒

檳 榔 三 枚 煨

共末。童便水煎三錢。去渣。入麝末三分服。日二。

九種心痛

論曰。九種心痛者。曰蟲、曰注、曰風、曰悸、曰食、曰飲、曰冷、曰熱、曰去來者是也。治病必求其本。今九種心痛。其名雖異。而治藥各有其法。蓋正氣和調。則邪不能入。若或虛弱。外邪乘之。則種種皆能致疾。善醫者惟明攻邪以扶正。則九種之病。其治一理也。

木香煑散 治九種心痛。

木香

柴胡

陳皮去白炒

吳茱萸一兩

檳榔

郁李仁炒

白芍

川歸五錢

麝香研五分

共末。水煎五錢去滓。入麝末少許。空心溫服。日二。

厚朴湯 治九種心痛。

紫朴薑汁炒

檳榔

白芍

柴胡

食茱萸

川歸酒炒一兩

郁李仁三分

水煎五錢。空心溫服。日二。

弭痛丸 治九種心痛不止。

木香

川歸

五靈脂

高良薑

蓬莪茂一兩

共末入蜜丸。梧子大。空心木香湯下。二三十丸。

不換金煑散 治九種心痛滯氣。

玄胡索

蓬莪茂

威靈儂

鬼箭羽

薑黃

苦練根一兩

共末。空心酒水合煎。三錢溫服。日二。

無比丸 同前。

高良薑

赤芍藥

黑乾薑

縮砂蜜

桂心一兩

共末。米醋糊丸。彈子大。萊菔子湯下一丸。

萬靈丸 治九種心痛及滯氣。

石菖蒲二兩九節者

爲末。醋麵糊丸。梧子大。丹砂爲衣。男子鹽湯空心下。五七丸。女人醋湯下。日二。

停飲心痛

論曰。心屬火。其氣炎上。飲爲水。其性趨下。若榮衛和平。臟腑調適。則水液下行。不能逆害心火。若水飲停滯於胸中。火氣不能宣通。則陽虛陰盛。其病心中淡淡欲吐而痛者。是爲停飲心痛也。

半夏湯 治痰飲在心久不散。痛不可忍。

半夏

乾

薑三分

高良薑

桂心

旋復花 五錢

檳

榔 半炮

木香

丁香 一分

薑水煎三錢溫服。

旋復花湯 治痰飲在心下不散。痛不可忍。

旋復花 微炒

桔梗 一兩

半夏 兩半

柴胡

檳榔 二兩

薑水煎服。頃又服。

又方

桂心

紫朴三分

吳茱萸洗炒五錢

共末。酒下二錢。

蟲心痛

論曰。諸蟲在人身中。若臟腑平調。則自安其所。若臟氣虛弱。或因食肥甘過度。致動腸胃。聞諸蟲。往來上攻於心。終則令人心痛。痛有休止。腹中熱。喜吐涎。出是蠅心痛也。速宜治之。不治蟲貫心。則能殺人。

烏梅丸 治虵厥嘔逆。心痛不可忍。

烏梅

洗淨去核附子

子

人參

細辛六兩

川椒

去目炒

桂心

六兩

川連

去蘆炒

川歸

四兩

乾薑

十兩

川柏

蜜炙六兩

共末。以酒二升。浸梅一宿。取肉蒸爛。搗如泥。入蜜杵丸。梧子大。飲下三十丸。

木香湯 治三蟲心痛。面色黃。不下食。

木香

檳榔

陳皮三分

薏苡根一兩

水煎三錢服。頃又服。

檳榔散 治虻咬心痛不止。

檳榔 川椒兩一

共末。空心米飲下二錢。日二。

狗脊丸 治蟲心痛兼氣痛。

狗脊去毛 陳皮去白 吳茱萸洗 檳榔兩半

燕薹仁三分

共末。蜜杵丸。梧子大。陳皮湯下二三十丸。

皂莢丸 治心痛如蟲咬。

皂莢去子 杏仁去皮尖炒

先以皂爲末。入杏仁搗丸。小豆大。發時空心米飲下七丸。

乾漆湯 治蟲心痛如咬。

乾漆兩一 胡椒

用白水煎一錢。入葱白一寸。麝香末少許服。

冷氣心痛

論曰。風邪冷氣傷於心之絡脈。皆能致痛。若陽氣偏虛。宿挾寒冷滯氣。又因飲食傷動而致心痛。則其病喜溫而惡寒。其氣慘而不舒。甚者四肢厥冷。氣攻心而發痛也。

八味桂心丸 治冷氣心痛。不能飲食。

桂心兩半

人參

白朮

陳皮

吳萸

桔梗

高良薑

川歸一兩

共末入蜜丸。梧子大。酒下二十九。

防風湯 治虛冷氣胸滿短氣心痛嘔吐。

防風

赤茯苓

甘草一兩

人參兩半

桂心三兩

半夏

乾薑二兩

薑棗水煎三錢。空心溫服。日二。

三味桂心湯 治冷氣衝心痛。

桂 心五錢 川 歸三分 吳茱萸洗
共末入蜜丸梧子大早晚鹽湯下二十九丸。

中惡心痛

論曰。心者君主之官。神明出焉。心神安靜。則邪無得而干。若心氣不足。精神衰弱。邪惡之氣。因得干正。連滯心絡。令人氣不升降。卒然心痛如刺。悶亂欲絕者。中惡心痛也。

赤芍藥湯 治中惡心痛不可忍。

赤芍藥

杏

仁

去皮尖
炒二兩

桔

梗

炒半

水煎三錢。空心溫服。日二。

丁香白芍湯 治中惡心痛不可忍。

丁香

白芍

檳

榔

吳茱萸

洗
炒

白朮三分

水煎三錢服。

犀角散 治中惡心腹刺痛。服之去惡氣。

犀角

木香五錢

麝香一分

共末。空心薑湯下二錢。

沉香散 治中惡心痛不可忍。

沉香

赤芍

桔梗五錢

檳榔

芒硝一兩

酸石榴皮炒五

共末。水煎五錢。入葱白五寸。空心溫服。日二。

惡注心痛

論曰。凡人將理失度。陰陽俱虛。氣血不足。復因風寒水溼。客忤邪惡之氣。乘虛入於肌體。流注經絡。伏留臟腑。毒擊心包絡。時發疼痛。積滯日久。轉相注易。故曰惡注心痛。

當歸湯 治惡注脅連心痛。

川歸一兩

木香三分

麝香一錢

檳榔五枚

水煎五錢去滓。入麝末一字。溫服。以利爲度。

桃枝湯 治惡注心痛不可忍。氣逆奔走連胸脇如刀刺。及虻蟲咬心痛不止。

桃枝向東南引者去皮一把

水煎空心稍熱服。日二。

心掣

論曰。內經謂一陽發。病少氣善欬善泄。其傳爲心掣。夫心君火也。三焦相火也。蓋人氣血和平。三焦升降。則神明泰定。三焦既病。故上欬下泄。少氣致心火胥應而不能。其動若掣者。乃其症也。

調中湯 治心掣胸中少氣。善欬善泄。

白朮

人參

赤茯苓

川歸

乾薑二兩

甘草

五味子一兩

桂心兩半

水煎三錢溫服。日二。

赤茯苓麥散 治心掣胸中氣少。水穀不化。泄利氣逆。

赤茯苓

紫朴

人參

川芎

甘草

麥蘖一兩

乾薑五錢

共末。水煎三錢溫服。日二。

當歸散 治心掣少氣善欬善泄腹痛上攻。

川歸

枳殼

赤芍

桂心

陳皮

桔梗一兩

木香

人參五錢

共末。薑棗湯下二錢。

心腹門

心腹痛

論曰。臟腑氣虛。風寒客之。邪正相搏。故上衝於心絡而為心痛。下攻於腹膜而為腹痛。上下攻擊。則心腹疼痛。其或陰氣凝結。久而不散。內攻腸胃。則為寒中脹滿。泄利之症。

獨活湯 治心腹冷痛。

獨活 人參 白茯苓 甘草

陳皮 乾薑 吳茱萸 白芍

川芎 防風 桂心 黃耆 二兩

川歸 兩半

用羊肉煮取汁。入薑棗煎三錢。空心服。日二。

桔梗散 治心腹痛。食冷物即發。及吐惡水。

桔梗 麥冬 白茯苓 檳榔 兩半

人參 白芍 紫朴 陳皮

枳殼 一兩 桂心 三分

共末。薑棗湯下二錢。

沉麝丸 治一切心腹痛不可忍。

沉香 麝香 丹砂 血竭

沒藥 一兩 木香 五錢

共末。甘草煎膏。丸梧子大。薑鹽湯空心下三五丸。

調中丸 治心腹一切冷氣刺痛。

人參

白茯苓

白朮

甘草五錢

黑乾薑四兩

共末。入蜜丸。梧子大。空心酒下。二三十丸。日二。

小建中湯

治腹中虛寒。心腹切痛。

桂心三兩

白芍兩半

甘草炙五

薑棗水煎去滓。入飴糖稍熱服。日二。此藥能治腹中虛寒。補血調氣。尤止腹痛。常人見其藥性溫平。未必肯用。然腹痛按之便痛。重按却不甚痛者。此正是虛痛。若重按愈痛而堅者。當有積也。氣痛不可下。下之愈痛。此虛寒症也。尤宜服此藥。外臺治虛勞。腹中痛。夢遺失精。四肢痠疼。手足煩熱。口燥。及女人小腹痛。亦用此藥。張仲景金匱要略。陽脈澀。陰脈弦。法當腹中急痛。先與此藥。不差者。宜小柴胡湯主之。此二湯皆主腹痛。

腹痛

論曰。臟腑內虛。寒氣客之。與正氣相擊。故令痛也。又有冷積不散。乍減乍甚。爲久腹痛者。若重遇於寒。則致腸鳴下利。蓋腹爲至陰之所居。又爲陰邪客氣所搏。故也。

人參湯 治腹痛刺疼。除寒冷溼痺。

人參

附子

甘草二兩

川歸

黑乾薑

大黃炒一

水煎三錢。空心溫服。日二。

人參丸 治腹中疼痛。

人參

茯苓

木香

甘草

牡蠣

遠志

黃耆

桂心五錢

共末。大棗肉丸。梧子大。麥冬湯下二十九。

赤石脂丸 治心腹積冷。腹痛短氣。胸背痛。脅下有冷氣。不能飲食。如刀錐刺。及

蟲食痛。針灸不差。狀如鬼神往來。

赤石脂

附子

人參

遼細辛

烏頭

黑乾薑一兩

真

珠枉錢豆腐

桂

心一兩

共末入蜜杵丸梧子大。飲下十九。

吳茱萸湯 治寒冷氣腹痛。

吳茱萸

人參

川歸

半

夏薑汁

桂 心一兩

炙甘草五錢

小麥一合

薑棗水煎三錢。空心溫服。

久腹脹

論曰。久腹脹者。冷氣結於腹內。與臟氣相搏。積久而不散也。蓋腹為至陰之所居。脾胃為倉廩之官。今寒氣在內。與臟氣相搏。停積不散。故為久脹。脾胃既虛。則難以腐熟水穀。故脹久不已。則令人變飲溼之疾。

厚朴湯 治腹脹煩悶食不消。

紫朴

人參

白朮

沉香

桔梗

檳榔

桑白皮炙

丁香皮一兩

共末。糊丸。梧子大。陳皮薑湯下五十丸。日二。

木香丸 治久腹脹無力。不思飲食。

木香

陳皮

白朮五錢

檳榔一兩

萊菔子炒二兩

共末。入蜜杵丸。梧子大。空心薑湯下二三十丸。

腹脹腸鳴切痛

論曰。腹者至陰之所居。若寒氣所傷。則陽衰陰盛。於是有腹脹腸鳴切痛之病。此脾弱胃虛。氣脹痞滿。加之冷氣與正氣交爭故也。不已。則變爲下利之症。白朮湯 治腹脹腸鳴切痛。發作有時。

白朮

赤茯苓

人參

川歸

陳皮

桔梗

吳茱萸

桂心一兩

甘草

細辛五錢

紫朴二兩

薑棗水煎三錢。溫服。

高良薑湯 治脾虛腹脹。腸鳴切痛。食少無力。

高良薑

丁香 香五錢

人參

桂心 三分

草豆蔻

訶勒皮 一兩

陳皮 去白

紫朴 兩半

甘草 一分

棗水煎三錢。溫服。日二。

丹參湯 治腹脹腸鳴不下食。

丹參

白茯苓

細辛

桔梗

紫朴 薑汁

食茱萸 一兩

甘草 五錢

薑水煎三錢。溫服。日二。

附子粳米湯 治腹寒氣雷鳴切痛。胸脇逆滿。

附子

半夏

甘草 一兩

薑棗水煎三錢。入粳米一撮。空心溫服。

腹內結強

論曰。血氣溫則流通。寒則凝結。結強者。風冷邪氣結於腹中也。凝結而不散。與正氣相擊。上下流走。感按之有根。狀如覆杯。食寒則腹中硬痛。妨害飲食。留滯經久。則變結強。

丁香皮煎方 治寒氣結強。日久不消。

丁香皮

白朮

川歸

陳皮

檳榔

薑黃

京三稜

甘草一兩

董棗水煎三錢。溫服。

白朮散 治冷氣不散。腹內結強。堅硬疼痛。

白朮

人參

白朮

紫朴

陳麩

麥蘖

吳茱萸

川芎二兩

共末。空心飲下二錢。日二。

平胃丸 治腹內結強。不可俯仰。飲食不化。

杏

仁皮二十枚去

玄參

葶藶炒二

川芎

桂心一兩

丹參三兩

共末。入蜜杵丸。梧子大。空心飲下十五丸。日二。

膜脹

論曰。內經謂濁氣在上。則生膜脹。此陰陽反作。病之逆從也。夫清陽爲天。濁陰爲地。二者不可相干。今濁氣在上。爲陰氣干擾。清陽之氣鬱而不散。所以膜塞脹滿。而常若飽也。

桔梗丸 治虛冷氣滿。膜脹不飲食。雖食不消化。嘔逆惡心。虛滿。腹內雷鳴下氣。

桔梗

白朮

人參

白茯苓

甘草

陳皮

吳茱萸

枳殼

紫朴

乾薑一兩

桂心三分

共末。蜜丸。梧子大。酒下三十丸。

人參湯 治虛冷腹脹。及嘔逆醋心。番胃。不能食。面黃。

人參

白茯苓

白朮

紫朴二兩

桂心

陳皮一兩

半夏二兩

甘草三分

生薑水煎三錢溫服。日二。

臑脹

論曰。內經謂有病心腹滿。旦食則不能暮食。名爲臑脹。夫水穀入口。則胃實腸虛。食下則腸實胃虛。若乃飲食不節。寒溫失宜。胃滿氣逆。聚而不散。大腸無以傳導。故心腹逆滿。氣臑而脹也。旦食不能暮食者。則以至陰居中。五陽不布。水穀化遲。而然也。

鷄屎醴方 治旦食不能暮食。

鷄屎炒香

爲末。空心醇酒下二錢。弱人一錢。

牡丹皮湯 治臑脹。

牡丹皮

鼈

甲醋炙

枳殼

紫朴

郁李仁兩半

桃

仁枚十一

桑白皮

檳榔二兩

大黃兩一

薑水煎三錢。溫服。

桔梗丸 治噎脹不下食。

桔梗

白茯苓

白朮

人參

炙甘草

陳皮

紫朴

枳殼

吳茱萸

乾薑一兩

桂心三分

共末。蜜丸。梧子大。酒下三十丸。

赤茯苓湯 治噎脹不下食。

赤茯苓

木通二兩

吳茱萸

紫苑

郁李仁一兩

白芍炒兩

檳榔三枚

水煎三錢。溫服。日二。

脅肋痛

論曰。脅肋痛者。足厥陰肝經虛寒氣乘之也。足厥陰肝經。其支脈起於足大指叢毛上。循陰股入腹貫膈。布脅肋。寒邪之氣乘虛則傷於經絡。邪氣與正氣相搏。故

令脅肋痛也。

大黃附子湯 治脅下偏痛發熱。脈弦寒也。當以溫藥去寒。

大黃醋炒香 附子三枚 細辛一兩

水煎三錢。稍熱服。日二。

半夏湯 治胸脅氣不利。腹脹急痛。

半夏薑汁製七 桂心 檳榔一兩

生薑水煎三錢。溫服。日二。

吳茱萸丸 治胸脅冷氣妨悶。切痛不下食。

吳茱萸湯泡洗 川歸一兩 麝香分五

共末入蜜麝杵丸。梧子大。空心酒下二十丸。

息積

論曰。內經謂病脅下滿氣逆。二三歲不已。病名息積。夫消息者。陰陽之更事也。今氣聚於脅下。息而不消。積而不散。故滿逆而為病。然氣不在胃。故不妨於食。特害

於氣而已。治法不可灸刺。寒服藥導引。藥不可獨治者。蓋導引能行積氣。藥力亦藉導引而行故也。

桔梗湯 治息積脇下。氣逆妨悶。歲久不已。

桔梗

人參

白朮

枳實

川歸

鼈甲九助者醋炙

乾薑一兩

桂心

甘草

吳茱萸湯洗醋炒五錢

大麥蘖兩半

共末入蜜丸梧子大。空心酒下二三十丸。日二。

赤茯苓湯 治息積脅下。氣逆滿悶。

赤茯苓

桂心

陳皮兩

高良薑一兩

甘草一分

大腹皮五錢

吳茱萸三分

水煎三錢。空心溫服。日二。

白朮丸 治息積脅下。滿悶喘息。氣逆。消散導引。

白朮陳土炒

枳實麥麩炒

桂心兩半

人參

陳皮炒白

甘草蜜炙

桔梗兩一

共末入蜜杵丸梧子大。空心酒下三十九丸。日二。

腰痛門

腰痛統論

論曰。腰痛有五。一者陽氣不足。足少陰氣衰。令人腰痛。二風寒著腰。風痺腰痛。三腎虛勞役。傷腎腰痛。四墜墮傷腰。名腎腰痛。五寢臥溼地腰痛。凡此皆本於傷腎。蓋腎主腰脚。腎傷則腰痛也。內經云。腰者腎之府。轉搖不能。腎將憊矣。

腰痛

論曰。腰者一身之要。屈伸俯仰。無不由之。或風寒所客。或腎氣傷損。使筋脈拘急。動搖轉側不得。故腰痛也。

人參湯 五種腰痛。

人參	杜仲	川芎	桑寄生
桂心一兩	白芍三兩	當歸	白朮

木通

玄參

熟地三分

丹皮

獨活五錢

水煎三錢。日三。

寄生湯 五種腰痛。不能轉側。

桑寄生

附子

川芎

獨活

杜仲

狗脊

桂一兩

人參

炙甘草五錢

白朮

白芍

石斛

牛膝三分

水煎三錢。日二。

杜仲酒方 腎虛腰痛。

杜仲

丹參八兩

川芎五兩

酒一斗五升。浸服。

卒腰痛

論曰。卒腰痛者。謂氣脈凝滯。經絡壅澁。或舉動傷腰。故卒痛也。宜通行氣脈。調順經絡。平補腎臟。則病可愈。

牡丹湯 卒腰痛。

丹皮

牛膝

續斷

草薢

桂心一兩

酒水煎三錢。

杜仲湯 勞動傷腰卒痛。

杜仲

羌活

川椒

秦艽

石斛

續斷

括蔘根

丹皮

白芍

五加皮

當歸

桂一兩

酒水煎三錢。

風溼腰痛

論曰。夫腎氣虛弱。風寒溼氣著於腰間。則令腰痛。蓋腰為腎府。腎經留滯風溼。不

得發散。注於腰脚。故起坐立行皆痛。甚則浮腫。故名風溼腰痛。

羌活湯 風溼腰痛。

羌活

杜仲

乾薑

五加皮

桂三分

附子

巴戟天一兩

牛膝兩半

共末。蜜丸。梧子大。酒下三十九。

羚羊角湯 風溼著於腰脚。骨節冷痛。搖轉不能。

羚羊角

羌活

牛膝一兩

白芍

棗仁

升麻兩半

虎脛骨

山梔

防風二兩

水煎五錢。

腰痛強直不得俛仰

論曰。腰為腎之腑。足少陰腎之經也。其脈貫脊屬腎抵腰。勞傷之人。腎氣既衰。陽氣不足。寒溼內攻。經絡拘急。所以腰髁強直而痛。不能俛仰也。

郁李仁煑散 腰痛強直。不可俛仰。

郁仁

檳榔

朴硝一兩

白芍

當歸三分

木香

訶勒皮五錢

共末。水煎三錢。日三。

五加皮湯 同前。

五加皮

白芍

杜仲

薑根

草薢五錢

水煎三錢。

巴戟天酒方 治腰痛強實。不得俛仰。

巴戟天

牛膝

石斛一兩

羌活

當歸

生薑兩半

川椒一分

酒八升浸服。

牛膝酒方 治風冷傷腰。筋骨疼痛。

牛膝

虎脛骨

枳殼

羚羊角一兩

酒五升浸服。

石斛酒方 腰痛強直不可俛仰。

石斛 四兩

白茯苓

五味子

丹參

杜仲

黃耆

草薢 二兩

人參

枸杞 兩半

天冬

生薑 三兩

山藥

牛膝

山黃 二兩

苡仁

防風

細辛 一兩

酒五斗浸服。

羌活酒方 同前。

羌活 六兩

獨活 二兩

五加皮 三兩

生地汁 煎一升

黑豆 升者一

酒二斗浸服。

腰脚冷痺痛

論曰。痺之爲病。在骨則重。在皮則寒。在肉則不仁。在筋則屈而不伸。在脈則血凝而不流。腰脚得之。謂之冷痺痛。亦由風寒溼氣雜合而成也。蓋腎主腰脚。其經爲寒邪冷氣所客。注於腰脚。則膝脛髀膕腰脊冷痛。肌肉不仁。而腰脚俱痛也。

桂心丸

腰脚冷痺。痺痺不仁。

桂心三分

附子

丹參

續斷一兩

杜仲

乾薑五錢

蜜丸梧子大。酒下三十丸。

杜仲酒方 治腎虛冷。或感寒溼。腰脚冷痺疼痛。

杜仲

川椒

川芎

天雄

防風

羌活

草薺

炙甘草

秦艽

乾薑

桂一兩

細辛

石斛

地骨皮

續斷

五加皮三分

桔梗一兩半

酒浸服。

巴戟天酒方 治風冷寒溼傷著。腰脚冷痺疼痛。

巴戟

羌活

牛膝

石斛二兩

川椒五錢

生薑

當歸三兩

酒浸服。

牛膝丸 治腰脚痺疼。膝已下冷。不得屈伸。

牛膝三兩

附子

川椒

石斛

狗脊

乾薑

桂兩半

蜜丸梧子大。酒下三十丸。

獨粟丸 治腰膝沉重。及勞傷腰痛脚氣等疾。

粟獨者

蒸熟。煉蜜丸梧子大。酒下四五十丸。日二服。

聖濟總錄纂要

清

新安

程

林雲來纂輯

鄞縣

曹炳章赤電校點

卷十三

虛勞方門

虛勞方統論

論曰。虛勞之病。因五臟則爲五勞。因七情則爲七傷。勞傷之甚。身體疲極。則爲六極。所謂七傷者。一曰大飽傷脾。脾傷則善噫。欲臥面黃。二曰大怒氣逆傷肝。肝傷則少血目暗。三曰強力舉動。久坐濕地傷腎。腎傷則少精。腰脚痛。厥逆下冷。四曰形寒飲冷傷肺。肺傷則氣少。咳嗽鼻鳴。五曰憂愁思慮傷心。心傷則苦驚。喜忘善怒。六曰風雨寒暑傷形。形傷則髮落。肌膚枯槁。七曰大恐懼不節傷志。志傷則恍

惚不樂。此七者勞傷之因也。故名七傷。所謂五勞者。一曰肺勞。令人短氣面腫。鼻不聞香臭。二曰肝勞。令人面目乾黑口苦。目視不明。三曰心勞。令人忽忽喜忘。大便苦難。時或澹洩。口中生瘡。四曰脾勞。令人舌本苦直。不能嚥唾。五曰腎勞。令人背難以俛仰。小便黃赤。時有餘瀝。陰痛生瘡。小腹滿急。此五者勞氣在五臟也。故名五勞。所謂六極者。一曰氣極。令人內虛。五臟不足。邪氣多。正氣少。不欲言。二曰血極。令人無顏色。眉髮墮落。忽忽喜忘。三曰筋極。令人數轉筋。十指甲皆痛。苦倦不能久立。四曰骨極。令人瘦削。齒苦痛。手足煩疼。不可以立。不欲行動。五曰肌極。令人羸瘦無潤澤。飲食不生肌膚。六曰精極。令人少氣。吸吸然。內虛五臟。氣不足。毛髮落。悲傷喜忘。此六者勞傷之甚。身體瘦極也。故名六極。又五勞七傷六極之外。變症不一。治法皆以補養爲宜。形不足者溫之以氣。精不足者補之以味。氣味相得。合而服之。以補精益氣。此其要也。

肝勞

論曰。患怒氣逆上而不下。則傷肝。肝勞則面目乾黑口苦。精神不守。恐畏不能獨

臥。甚則筋急而爪枯。目盲無所見。毛悴色夭者難治。

芍藥飲 肝勞不足補虛。

白芍

丹皮

枳實

荊芥穗三分

熟地

青箱子

黃耆

炙甘草

白茯苓

白附子

山梔

防風兩半

細辛五錢

竹葉水煎。

前胡湯 肝勞虛熱。目赤難開。煩悶熱氣上衝。瀉肝除熱。

前胡

山梔

大青

細辛

秦艸

乾薑

決明子

片苓一兩

車前子一合

石膏一兩

竹葉三兩

水煎。欲利加芒硝。

茯苓湯 肝勞熱。恐畏不安。精神悶怒。不能獨臥。志氣錯越。

白茯苓

人參

防風

炙甘草

遠志

牡蠣

柏子仁五錢

龍骨二分

蜜丸梧子大。酒下二十丸。

青龍丸 治肝傷健忘。目視不明。面目青白。常多恐懼。

龍骨

羌活

秦艽一兩

茯神

羚羊角

甘菊

青葙子

白附子

丹砂三兩

蜜丸梧子大。人參湯下三十九丸。

心勞

論曰。心勞病者。補脾氣以益之。脾旺則感於心。人逆夏氣。則手太陽不長。心氣內洞。順之則生。逆之則死。順之則治。逆之則亂。反順爲逆。是謂內格。病則生矣。其候令人善怒不樂。大便鴨澹。口瘡久不差。耳枯而鳴。不能聽遠。皮毛焦色夭者。死於冬。

遠志湯 心勞多煩躁。背膊妨悶。面色時變。乍赤乍黑。或笑或歌。

遠志

白芍

犀角一兩

人參

知母五錢

赤茯苓

麥冬兩半

片苓

前胡

水煎五錢。頃時又服。

磁石湯 心勞熱耳焦多鳴。不能聽遠。

磁石

人參

白朮

赤茯苓

白芍

大青

菖蒲兩半

赤石脂一兩

竹葉水煎。

補心麥冬丸 心勞多驚悸。心氣不足。

麥冬

天冬

熟地

川連

遠志

升麻兩半

菖蒲

人參

白茯苓一兩

桂五錢

蜜丸湯下。開心氣。多記不忘。

獾肝丸 心勞熱。胸膈聚痰。頭目微痛。肌膚漸覺消瘦。

獺肝

川連

柴胡

鼈甲

地骨

升麻

天靈蓋

貝母兩半

天冬

知母

犀角

茯苓

紫苑

胡黃連

前胡

杏仁

百合

麻仁

炙甘草

生地

檳榔三兩

蜜丸飲下日二

朱雀湯 心氣勞傷

雄雀肝肉

人參

棗肉

赤茯苓

紫石英

小麥一兩

赤小豆一合

炙甘草一分

丹參

遠志

紫苑五錢

水煎

脾勞

論曰。飲食勞倦則傷脾。脾傷則善噫。欲臥面黃。舌本苦直。不得嚥唾。皆脾勞也。宜補益肺氣。則感於脾矣。

七香散 脾勞腹脹。憂思不樂。大便滑泄。不思食。肌肉瘦。

人參 白朮 白芍

陳皮 桔梗 紫苑 藿香子

白芷一兩 蒼朮五兩 乾薑二兩 柴胡兩半

共末。用豬腎切一對。入鹽一錢。末三錢。紙包煨飲下。

羊腎丸 脾勞臟腑滑泄。夜多盜汗。腹虛鳴。困倦少力。

羊腎 艾葉糯米粥拌焙 木香

肉蔻 菴蓉一兩 丁香五錢

棗肉丸。酒下。

藿香子丸 脾勞肌膚瘦瘁。面色焦黃。四肢無力。脚膝疼痛。大便不調。或風勞上

攻頭眩目暗。肌體沉重。皆憤嗜臥。皆宜急服。

藿香子 附子 川椒 牛膝

菝 蓉

青 鹽

巴戟天二兩

共末。羊腎三對。煑研蜜丸。酒下。

黃耆湯 脾虛勞傷。

黃 耆二兩

棗 肉

白石英

木 通

白石脂五錢

炙甘草

藁 本一分

水煎。

肺勞

論曰。肺勞者。因形寒飲冷。逆秋氣所致。其症短氣面腫。鼻不聞香臭。胸中結滯。氣乏聲嘶。咳嗽呀呷。咯唾稠黏。或吐膿血。或咽喉乾咳不能唾。上氣喘滿。漸至衰瘁。寒熱時作。飲食減耗。皆肺勞之症。

補氣黃耆湯 肺勞飲食減少。氣虛無力。手足顫掉。面浮喘嗽。

黃 耆

白 朮

人 參

五 味

麥 冬

熟 地

茯 神

陳 皮

阿膠

桂一兩

牛膝

白芍

當歸三分

炙甘草五錢

用薑棗水煎。

鰻鱺煎丸

肺勞咳嗽日久。

大鰻三條醋洗斷截酒煮取肉再入酒熬成煎

桔梗

柴胡

青蒿子

人參

附子

炙甘草

知母

秦艽

鼈甲

共末入蜜為丸梧子大酒下日二。

白虎湯 肺氣勞傷

龍骨

人參

白茯苓

白石英

百合

磁石

桑白皮

玄參五錢

大豆一合

酒水煎。

蛤蚧丸 肺勞咳嗽。

蛤 蚧一對

天冬

生地

麥冬 一兩

貝母 四兩

款冬

紫苑 二兩

杏仁 三百

蜜丸梧子大。薑湯下。

腎勞

論曰。腎勞者。勞傷腎也。腎傷則少精。腰背痛。難俛仰。小便不利。時有餘瀝。陰痛。囊濕生瘡。小腹滿急。厥逆下冷。皆其候也。經所謂強力入房。久坐濕地。傷腎特其一端耳。

羊腎湯 腎勞虛損。寒熱耳鳴。好睡善欠。腰脚痿弱。

羊腎一對

白朮

白茯苓

磁石

黃耆

乾薑 一兩

桂 三分

水煮腎汁煎五錢。

遠志丸 腎勞虛。夢寤驚悸。小腹拘急。面色黧黑。白濁。腰脊痛。

遠志

杜仲

白茯苓

枳殼

桂五錢 熟地
共末。蜜丸。梧子大。酒下三十丸。

兔絲子一兩

冷勞

論曰。冷勞者。由脾胃久積風冷之氣。不能灌溉四旁。潤養身體。致腑臟俱虛。陰陽衰弱。其狀食不化。心腹痞滿。嘔吐吞酸。面色萎黃。甚者心腹常痛。大腸泄利。手足逆冷。骨節痠疼。日漸羸瘦是也。

木香丸 治冷勞便利不調。腹脹嘔逆。困乏少力。

廣木香

附子

肉豆蔻

乾薑

陳皮去白炒

麥門冬

郁李仁一兩

熟艾

鼈甲醋炙

柴胡

陳麴炒二

紫朴薑炒

鍾乳粉

桂心五錢

共末。用雄猪肚一具。去脂膜細切。入好米醋三升。煮極爛。研細入末。搗丸。梧子大。空心溫酒米飲任下二十丸。

豬肝丸 治冷勞腹痛下利。面色萎黃。四肢無力。

雄豬肝一具去脂切片入 紫朴薑汁

乾薑炒黑

陳皮炒去白 川連一兩

枯白礬 柴胡二兩

附子 桂心五錢

共末。將肝爛搗如泥。入白麵五匙。沸湯煎三五沸。和肝末同搗丸。梧子大。空心酒下十九丸。日二。

熱勞

論曰。熱勞之症。心神煩躁。面赤頭疼。眼澁唇焦。身體壯熱。煩渴不止。口舌生瘡。食飲無味。肢節痠疼。多臥少起。時出盜汗。日漸消瘦是也。

驚甲丸 治熱勞羸瘦。壯熱盜汗。煩渴。

生薄荷汁乾如無用 生青蒿汁

生薑汁各一鍾。慢熬成膏。共末入膏搗丸。梧子大。空心米飲下二十九丸。日三服。

人參湯 治熱勞心神煩躁。肢體痠疼。不能食。

人參 茯苓 赤芍 棗仁

甘草 知母 生地 枳實

括蔞根 白薇一兩

水煎三錢。空心溫服。日二。

蛤蚧丸 治熱勞煩躁。面赤口乾唇燥。骨節痠疼。盜汗咳嗽痰壅。力乏氣促。

蛤蚧酥慢 人參 黃耆蜜炙 麥冬

胡黃連 甘草 地骨皮 知母鹽酒炒

柴胡 懷生地 龍甲醋炒 紫苑

桑白皮五錢 細辛 杏仁去皮尖炒

共末入蜜杵丸小豆大。空心米飲下二十九。臨臥再下二十九。

青蒿飲 治暴勞熱。四肢煩疼。手脚心熱。咽乾虛渴。食少宜退熱。

青蒿 甘草 龍骨 麥冬

知母 柴胡一兩 桃枝心一把 柳枝心一把

童便合水煎四錢。入葱白、薤白各三寸。空心溫服。

地黄煎 治熱勞五心壅熱煩渴不止。

生地汁

青蒿汁

生薄荷汁

童子便

白

酒二升入汁煎成秦

苧

鼈甲醋炙

柴胡去蘆

丹

砂飛過

麝

香另研

共末入煎。杵丸小豆大。丹砂為衣。空心酒下二十九。日二。

氣勞

論曰。氣勞者。由喜怒不節。憂思過甚。榮泣衛除。穀氣不洽。故氣血為之乾涸。不能榮養肌肉。使形體瘦悴。面色萎黃。胸脹痞滿。飲食減少。羸瘦困乏。故名氣勞。沉香湯 治氣勞心胸不利。日漸消瘦。四肢沉倦無力。飲食無味。骨節疼痛。小便

赤澁。榮衛不和。

沉香

川芎

桂心

檳榔

川歸

乾薑五錢

人參

草豆蔻

枳實

白茯苓

前胡

黃耆二分

柴胡

訶勒皮

附子

甘草

五味子一兩

半夏薑汁炙

生薑大棗水煎三錢。空心溫服。日二。

天冬丸治氣勞咳嗽喘急。下焦虛損。上焦煩熱。肌瘦。

天冬

麥冬

熟地

鼈甲二兩

人參

牛膝

黃耆

山藥

杏仁

白茯苓

五味子

石斛

枸杞

訶勒皮一兩

沉香

紫苑

肉蓯蓉酒洗去甲三分

共末入蜜搗丸。如小豆大。空心煎大棗湯下二十九丸。日二。

人參陳皮湯治氣勞心胸煩悶。痰涎壅塞。不思食。頭目昏眩。

人參

陳皮

白芍

前胡

柴胡

龍甲

枇杷葉炙二

半夏

白茯苓一兩 大腹皮全椒

薑棗水煎三錢。空心溫服。

急勞

論曰。急勞之病。其症與熱勞相似。而得之。差暴也。緣稟受不足。憂思氣結。榮衛俱虛。心肺壅熱。金水相刑。臟氣受剋。或感外邪。故煩躁體熱。頰赤心忪。頭痛盜汗。咳嗽咽乾。骨節痠疼。久則肌膚消燂。咯涎吐血。皆其候也。故名急勞。

青蒿飲 治急勞煩躁壯熱。四肢無力痠疼。

青蒿三兩

山梔

甘草五錢

地骨皮一兩

桃枝心

柳枝心各二兩

烏梅水煎三錢。空心溫服。

豬肝丸 治急勞瘦瘵。日晚寒熱。驚悸煩渴。

雄豬肝二具去筋 生甘草十五兩

將肝與末拌勻。入童便五升。浸一伏時。慢煮乾搗。丸梧子大。空心飲下。二三十

丸日三。

葱白飲 治急勞潮熱盜汗。肌肉消瘦。

葱白 薤白

炙甘草七寸

青蒿心七枚

杏仁七枚去皮尖炒

用童便浸一宿煎服。

皂莢丸 治急勞咳嗽痰涎。食少無力。

猪牙皂皮一兩去 蝦蟆一枚要青腸柱風處陰乾 麝香一錢

各研末和勻入羊腸內扎定。碗盛。安甌內蒸極爛。研杵極細為丸。約有二百餘粒。每服熟水空心下二三丸。避風取汗。良久瀉血。汗出去衣被。用白粥將息調養。合藥用五日。或天德日。忌見女人雞犬。

風勞

論曰。風勞者。即肝勞之類也。蓋肝主風。風善行而數變。無所不至。勞傷之人。氣血俱虛。風邪易侵。或遊行皮膚。或沉滯臟腑。其病令人手足痛痺。筋脈拘急。頭旋目

暗。好怒多驚。尋覓衣縫。臥語狂呼。爪甲枯。目黯黑。是其症也。故名風勞。
敗龜板湯 治風勞氣虛。咳嗽發熱。

敗龜板 醋炙

白芍

防風

川歸

海桐皮

虎骨 酥炙

木通 五錢

桂心

木香

酸棗仁

黃耆

麻黃 節去根

大腹皮 全用

牛膝 一兩

水煎五錢。入青蒿、烏梅肉少許。空心溫服。一方加熟地、柴胡一兩。

天麻散 治風勞氣虛不順。

天麻

附子 一兩

甘草

烏頭 二兩

麻黃 三兩

蕪荑仁 炒

柴胡

秦艽

前胡

鼈甲

青蒿 四兩

二。將藥粗搗末。用雄猪脊骨一條。白酒一斗。同煮乾。去骨為末。空心酒下三錢。日

苗陳蒿散 治風勞七種。冷氣六極等疾。脾胃虛寒。不思飲食。疝利。休息利。二便

秘澁。及屢年不差者。

茵陳蒿

人參

白朮

石斛三分

白蕪荑

吳茱萸洗一兩

白芍藥

桂心

防風

桔梗五錢

紫苑

柴胡去蘆

犀角三分

共末。用猪肝一具。切片去膜。分三服。每入末五錢。葱白食鹽少許拌勻。濕紙包煨香熟。細嚼酒下。

虛勞咳嗽

論曰。虛勞咳嗽者。以肺傷胃弱。榮衛衰微。氣不溫充故也。肺主氣。為五臟之蓋。其脈環循胃口。肺臟勞傷。則令人咳嗽上氣。或吐膿血。寒熱潮作。面赤口乾。偏臥喜汗。不能飲食。肌膚消瘦是也。

蛤蚧湯 治虛勞咳嗽。嘔吐痰涎。胸膈不利。喘急壅滿。呀呷有聲。飲食不進。

蛤蚧一對

人參

白茯苓

桑白皮一兩

杏 仁五兩 甘 草五錢

薑水煎三錢。空心溫服。

阿膠丸 治虛勞咳嗽發熱羸瘦。

阿膠 懷熟地 山藥

茯苓 神 百合 地骨皮 五 味五錢

麥門冬 人參 牡丹皮 遠 志三分

蛤 蚧酥炙對 柏子仁炒

共末蜜杵為丸。如彈子大。水煎一丸。細呷日二。

虛勞痰飲

論曰。虛勞之人。陽氣不足。水飲下咽。入於胃腑。不能流傳。致多痰飲。其候胸膈痞悶。肩息短氣。怠惰嗜臥。心下悸動。咳嗽痰水。不欲飲食是也。治宜調順三焦。升降陰陽。使氣道流通。痰飲自化。

人參半夏湯 治虛勞脾不和。痰飲留滯。心胸煩悶。嘔吐痰涎。頭昏目眩。不思飲

食。

人參

半夏薑汁炒

赤茯苓一兩

大腹皮二枚

前胡

白芍

陳皮去白炒

柴胡

鼈甲醋炙分

枇杷葉去毛炙

薑水煎三錢服。

虛勞勞寒熱

論曰。虛勞寒熱者。以臟腑久虛。陰陽交爭。榮衛不足。以致陽氣勝則熱。陰氣勝則寒。陰陽相勝。故寒熱互作。

秦艽丸 治寒熱虛勞。四肢無力。面色枯悴。

秦艽二兩

黃耆

桂心

白芷

柴胡

鼈甲

肉豆蔻

桔梗一兩

人參

荊芥穗

麥冬

甘草

川歸

海桐皮

白芍

熟地

枳殼 木香 沉香 棗仁
檳榔五錢

薑水煎三錢。空心溫服。

前胡湯 治虛勞榮衛不和。寒熱消瘦。肢體煩疼。頭目昏眩。飲食無味。多困少力。

前胡 人參 羌活 獨活

枳殼 柴胡 桔梗炒 鼈甲一兩

甘草五兩 石膏 旋復花兩半

水煎三錢溫服。

柴胡湯 治虛勞寒熱羸瘦。不下食。

柴胡 白朮三兩 人參 麥冬兩半

白朮 枳殼二兩

生薑大棗。水煎三錢。空心溫服。日二。

虛勞潮熱

論曰。虛勞潮熱者。潮作有時也。此由陰陽不和。氣有偏勝。其候頭面燼赤。體熱潮躁。臥寐不安是也。

柳枝湯 治虛勞煩躁。少力痰嗽。面頰紅赤。潮熱盜汗。飲食無味。五心煩熱。百節疼。

柳枝

柴胡

鼈甲二兩

木香

甘草

青皮

大黃錢五

水煎四錢。入青蒿、小麥溫服。

羚羊角湯 治虛勞潮熱。五心煩躁。口乾。咽喉不利。

羚羊角

人參

白茯苓

柴胡

鼈甲醋炙

麥冬

棗仁去殼炒

地骨皮

羌活

懷生地

陳皮去白炒

知母

炙甘草

葛根

黃耆一兩

薑水煎三錢。空心溫服。日二。

柴胡湯 治虛勞榮衛不和。朝熱盜汗。面黃痿瘦。四肢骨節疼痛。多困少力。飲食

少。

柴胡

知母

甘草

鼈

甲一醋炙

秦朮兩半

大棗水煎三錢。空心溫服。日二。

鼈甲猪肚丸

治虛勞潮熱。唇紅頰赤。呼吸氣粗。口乾盜汗。大小便秘澁。飲食減

少困乏。

鼈甲醋炙

柴胡

廣木香

青蒿

懷生地一兩

川連炒二

青皮去白炒

共末。用雄猪肚一具。去脂用鹽揉洗淨。入末藥於肚內。扎定蒸極爛。入石臼中搗千杵。丸梧子大。空心飲下二三十丸。日二。

虛勞盜汗

論曰。眠寢之間。汗出盜入氣血。久則津液枯耗。謂之盜汗。此蓋虛勞之人。陽氣外虛。風在肌表。腠理虛疎。心氣不足故也。不治則榮衛衰損。肌肉消瘁。變爲羸瘠。

麻黃根湯 治虛勞盜汗不止四肢困乏無力。

麻黃根

牡蠣童便

黃耆各等分

水煎三錢入葱白三寸溫服。

黃耆湯 治虛勞盜汗不止及陽虛自汗。

黃耆 蜜炙

人參 一兩

麻黃根 二兩

牡蠣童便 三兩

地骨皮 五錢

大棗水煎三錢空心溫服日二。

車前子散 治虛勞盜汗咳嗽潮熱。

車前子 鈔五

木賊 草鈔

兔絲子酒浸

椒 目鈔 一

共末用生猪肉精者一兩切片入末二錢拌勻濕紙包煨熟服。

虛勞勞咳嗽膿血

論曰。虛勞之人。氣血久耗。寒邪僭熱。伏結上焦。內傷心肺。殘賊榮衛。心主血。血爲榮。肺主氣。氣爲衛。榮衛不調。金火相剋。其病難治。則因咳嗽間有膿血者。津液腐

也。宜潤養上焦。滋益榮衛。則病緩而可已。

萎蕤湯 治虛勞咳嗽。咯吐膿血。

萎蕤

百部

人參

知母

桑皮一兩

阿膠

馬兜鈴

麥冬

白茯苓五錢

水煎三錢。入烏梅肉、生薑。

蛤蚧湯 治虛勞咳嗽。咯吐膿血。

蛤蚧

貝母

杏仁去尖炒

知母

鹿角膠

人參

枇杷葉去毛炙

桑白皮

甘草

葛根一兩

共末。水煎三錢溫服。

白前飲 治虛勞咳嗽。上氣壅熱。咯吐膿血。

白前二兩

桔梗

桑白皮一兩

白茯苓

杏仁兩半

甘草一兩

水煎服。

通神湯 治虛勞咳嗽不止。肺氣損傷。咯吐膿血。痿瘦。

白茯苓

枳實

人參

甘草

秦艽

柴胡一兩

生地兩半

土馬驢二兩

水煎三錢溫服。

虛勞嘔吐血

論曰。血與氣相隨而行。外養肌肉。內榮臟腑。若臟腑勞傷。則血液妄行。損輕則隨吐而出。損極則血下於胃。因嘔而出。胸膈氣逆。甚乃吐血。蓋虛勞之人。臟氣內傷故也。

香膠散 治血勞內傷吐血。

阿膠

鹿角膠

枳實

人參

荷葉

黃藥去皮

蒲黃

黃生一兩

同研。藕汁下一錢。日二。

人參散 治肺臟虛勞吐血。

人參法蘊 黃蜀葵一兩

共末。空心米飲下一錢。晚再下。

獨聖散 治虛勞咯血。吐血不止。

楓香脂不拘多

用人參糯米飲空心下一錢。日二。

箬葉散 同上。

箬葉燒灰 麝香研一

同研勻。用人參阿膠湯下一錢。日二。

虛勞不得眠

論曰。老人臥而不寐。少壯寐而不臥者。何也。少壯者血氣盛。肌肉滑。氣道通。榮衛之行。不失其常。故晝日精而夜寐也。老人血氣衰。肌肉枯。榮衛之道澁。五臟之氣相搏。其營氣衰少。而衛氣內伐。故晝不能精。夜不得寐也。虛勞之人。氣血衰少。榮

衛不足。肌肉不滑。其不得眠之理。與老人同。

半夏湯 虛勞煩躁不得眠。

半 夏二兩 白 茯苓四兩 糯米炒黃

生薑水煎三錢。溫服。日二。

陳皮湯 治虛勞晝夜不得眠。短氣。食不下。大病後虛熱痰冷。

陳皮一兩 半夏五錢 川芎分半 甘草半分

薑水煎五錢。入竹茹一丸。日二。

酸棗仁煎 治虛勞心熱。憂懼不得眠。

酸棗仁二兩 乳香二兩 炙 牛黃另研一分 砂五錢

糯米炒二 白蜜四兩

共末。用白酒半觔。入蜜與末。慢火煎如稀餈。勿令焦。收貯。空心酒下一匙。日二。

酸棗仁丸 治虛勞心煩熱。口乾。憂懼不得眠。

酸棗仁微火 地榆葉微炙

共末。入蜜杵為丸。如小豆大。空心米飲下三十九。晚再下。茶下亦可。

虛勞失精

論曰。經云。腎者主蛭。封藏之本。精之處也。蓋腎受五臟六腑之精而藏之。氣盛則輸瀉有常。虛勞之人。精臟已虧。邪氣乘之。則藏者不固。或於夢寐便溺。漏失無常。其症小腹強急。陰頭寒冷。目痛髮落。脈數而散。乳動微緊。是其候也。

韭菜子散 治虛勞傷損。小便失精。及夢泄等症。

韭菜子 一兩

麥 冬 一兩

川 芎 三分

兔絲子 一兩酒黃

車前子 一微妙

白龍骨 分煨三

共末。酒下二錢。日二。

韭菜子丸 治虛勞漏精。

韭菜子 炒

兔絲子

天 雄

車前子

龍 骨 一兩

黑乾薑

桑 螵 蛸

鹿 茸 三分

共末。蜜丸。梧子大。黃耆湯下二十丸。

白龍骨散 治元氣虛弱。精神不禁。腰脊疼痛。

白龍骨

肉蓯蓉

補骨脂一兩

兔絲子酒煮五錢

韭菜子鈔五

共末。酒糊丸。梧子大。空心酒下三十九。

正陽丸 治陽氣虛損。下元冷極。精洩不禁。小便頻數。腰脚無力。飲食減少困乏。

白馬莖酥炙

鹿茸二兩

附子

肉蓯蓉一兩

巴戟天

石楠

葫蘆巴

牛膝

五味子三分

韭菜子

石斛五錢

木香兩半

共末。蜜丸。梧子大。酒下二十九。

金鑠丸 治虛勞失精。久服補骨髓。去腎邪。

巴戟天

白龍骨

山萸肉一兩

韭菜子四兩

共末。蜜丸。梧子大。空心酒下三十九。

固氣不二丸 治虛勞元氣衰弱。精氣滑泄。夢中遺洩。

乾柿

雞頭舌雞頭纂下尖也

金櫻子

蓮蕊一兩

共末。用烏雞子汁杵丸。梧子大。空心酒下二十九。日二。

韭菜子散 治虛勞夢洩。日漸消瘦。

韭菜子炒一

人參

大棗

黑乾薑

黃耆

赤芍

白龍骨炒

半夏薑汁

川歸

甘草一兩

共末。入蜜杵丸。小豆大。空心酒下。三十九丸。日二。

鹿茸丸 治虛勞腎氣虛。乏失精。腰脚無力。小便數。

鹿茸

補骨脂二兩

附子

牛膝

桑螵蛸

杜仲鹽酒炒

山藥

兔絲子

桂心

黃耆

肉蓯蓉酒煮

懷熟地

遠志一兩

白龍骨

澤瀉

黑乾薑

防風

牡蠣童便碎三分

共末。入蜜杵丸。梧子大。空心酒下。二三十丸。日二。

虛勞小便白濁

論曰。虛勞小便白濁者。腎氣勞傷。胞絡內冷。氣道不宣通也。腎主水。腎虛則胞冷。而津液停滯。故令小便白濁。如米脂而下。

澤瀉散 治大虛損內傷。腎氣不足。小便濁。

澤瀉

白龍骨

車前子

桑螵蛸炙

狗脊一兩

共末。酒下二錢。

七聖丸 治虛勞下元虛冷。小便濁。精滑不禁。

原蠶蛾

牛膝

白石脂

白龍骨

桑螵蛸五錢

肉蓯蓉

山藥一分

共末。酒煮糊丸。梧子大。空心酒下二十丸。日二。

黃耆丸 治虛勞有熱。虛煩。口乾腰膝痛。便濁如米泔。

黃耆

茯神

羚羊角

牡蠣

甘草兩半

川連

括樓根二兩

苦參二兩

雞臙脰黃皮五枚

共末。入蜜杵丸。梧子大。飲下三十丸。

人參湯 治腎虛引飲。便濁腰痛。

人參

五味子

川芎

川歸

遠志

澤瀉

桑螵蛸

桂心

熟地一兩

白芍

片苓

白茯苓

雞臙胫黃皮銹五 麥冬二兩

水煮羊腎一對。取汁。入薑棗煎藥五錢。溫服。日二。

白淫

論曰。內經謂思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發為筋痿。及為白淫。夫腎藏精。以慳為事。志意內洽。則精全而嗇出。思想外淫。房室太甚。則固者搖矣。故使淫泆不守。隨洩而下也。然本於筋痿者。宗筋弛縱故也。

金鎖丸 治下元虛冷。小便白淫夢遺。

原蠶蛾

韭菜子

補骨脂二兩

白龍骨

牛膝

桑螵蛸

山茱萸

兔絲子

肉蓯蓉 一兩

共末。入蜜丸。梧子大。酒下三十丸。

秘真丸 治精氣不固。白淫不止。

白龍骨

砂 仁 五錢

訶勒皮 五枚

丹

砂 飛 一兩

共末。用糯米粥丸。梧子大。丹砂爲衣。空心熱酒下二三丸。不可多服。若大便不通。欲通。用葱白湯點茶服之。即通。

龍骨湯 治白淫遺泄。無故自出。

龍骨 五兩

人參

白茯苓

甘草

熟地

桂心

牡蠣 二兩

水煎五錢。空心溫服。日二。

石斛散 治陽氣虛憊。白淫不止。

金釵石斛 三兩

巴戟天

兔絲子 二兩

杜仲

鹽炒

桑螵蛸 煨 兩

共末。空心酒下一錢。日二。

筋極

丹參湯 治筋極。脚下腫滿而痛。不能遠行。脚心如割。筋斷折。痛不可忍。

丹參 木通 生地 麥冬

麻黃去根 川芎 杜仲 牛膝

續斷 地骨皮 禹餘糧醋碎 桂心

川歸一兩 牡蠣碎便 甘草五錢

薑水煎五錢溫服。日二。

地黃煎丸 治足厥陰經有餘。筋實極。足下滿痛。四肢筋急。

生地汁六升 天冬汁三升 生薑汁 白蜜

鹿髓 黃牛酥 棗肉取膏各三合 醇酒升半

茯苓分半 枳殼 川芎二分 金釵石斛

黃耆一兩 甘草炙一

上六味共末。先將前三汁與酒并煎減半。入蜜髓酥膏同熬。如稠糖。再下六末。重湯不住手攪勻。丸。梧子大。空心酒下三十九丸。

氣極

甘露丸 治肺臟氣極。風熱所傷。津液不通。

甘草

懷生地

天冬

大黃蒸一

遠志

桑白皮炙

防風

地骨皮

羌活

秦艽三分

羚羊角

胡黃連五錢

共末。入蜜杵丸。梧子大。空心薑湯下二十九丸。日二。

脈極

鎮心丸 治脈極驚悸。

丹砂

鐵粉

人參

遠志五錢

茯苓一兩

虎睛一對

琥珀研

牛黃

冰片一分 金箔 銀箔廿張

共末入棗肉杵丸梧子大丹砂爲衣金銀湯空心下十丸服之安五臟。

桑皮沐頭湯 治脈極虛寒鬚髮墮落。

桑白皮二升

用井華水漬一宿煮湯沐鬚髮極佳。

柏葉沐頭丸 治脈極虛寒鬚髮墮落。

生柏葉一兩 附子五錢 猪膏五錢

共末入猪膏丸作二十丸每用一丸入沐湯中洗頭令髮長不落。

肉極

防風湯 治肉極肌肉變色舌強陰縮脚膝痿弱。

防風 獨活 白茯苓兩半 人參

川芎 五加皮 乾薑 桂心

甘草 川歸一兩 附子五錢

共末。酒煎四錢。空心服。

石南散 治肉極實熱。身上如鼠走風痺。脣口壞。皮膚變色。

石南一兩

山藥二兩

山黃

升麻

萎蕤兩半

石膏

黃耆三兩

真珠

天雄

桃花

甘菊

甘草五錢

共末。酒下二錢。

骨極

酒浸芍藥散 治骨極。骨髓中痠痛。

白芍

生地

鹿骨酥炙二兩

酒一斗。浸晒為末。酒下三錢。日二。

木瓜湯 治骨極。腰脊痠痛。風虛氣衰。不能久立。腦髓痠疼。服之補虛損。壯元陽。

木瓜五枚去皮子切片用酒入後藥

雄雀霜拌蒸收貯每用三兩入醋煮爛取肉入乾薑

附子

兔絲子 三兩

木香

沉香

天雄去皮製

羌活 兩半

補骨脂炒一兩

白蒺藜

石斛

天麻 酒煮

肉蓯蓉酒浸

大茴炒三

共末入膏丸梧子大。鹽湯下三十九。

精極

地黃飲 治精極。臟腑俱損。徧身虛熱。骨節煩疼。

生地汁

麥冬汁

白蜜二合

竹瀝一合

炙甘草 兩半

片苓

石膏二兩

麻黃去根一兩

人參

川芎兩半

桂心

川當歸一兩

水煎五錢。去滓。入汁蜜竹瀝。分二服。

地黃煎 治精極。臟腑虛羸。骨節煩疼。精泄不止。益氣養神。駐顏色。調血脈。

生地汁 五斤

白酒一斗同汁

巴戟天

鹿茸

桑螵蛸炙

肉豆蔻

附子

黃耆蜜炙

蛇牀子

石斛

補骨脂炒

青木香

陳皮

牛膝

五味子三分

沉香

枳殼炒去白

葶澄茄五錢

肉蓯蓉二兩

共末入地黃膏爲丸。如梧桐子大。酒下三十丸。

聖濟總錄纂要 卷十三 虛勞門 粹極

聖濟總錄纂要

清

新安

程

林雲來纂輯

鄞縣

曹炳章赤電校點

卷十四

骨蒸傳尸門

虛勞五蒸

論曰。虛勞骨蒸者。本熱勞之氣。熱著氣血。深連骨髓。侵受五臟。久而不已。各隨其臟氣之虛。熏蒸而爲疾。骨蒸本於腎。其證早涼晚熱。煩躁寢不安。飲食無味。小便色赤。喘息無力。腰疼脚冷。手心常熱。蒸盛之時。內變爲疳。蝕人五臟。脈蒸者。本於心。其證日增煩悶。擲手出足。渴欲飲水。唾白沫。睡語驚恐。脈數。蒸盛之時。亦變爲疳。臍下悶。或暴下不止。皮蒸者。本於肺。其證大喘。鼻乾口燥。舌上白胎。小

便如血。蒸盛之時。胸滿兩脅下脹。背胛疼。臥不安。咳嗽。毒傷臟則唾血。肉蒸者。本於脾。其證體熱如火。煩躁無汗。心腹膨脹。食即欲嘔。小便如血。大便祕澀。蒸盛之時。身腫目赤。臥不安。肝蒸者。肝氣虛也。肝虛則血無所藏。血無所藏。肝亦無所養。使榮氣涸竭。虛陽內蓄。其證外寒內熱。亦名內蒸。按之附骨。即內熱甚。骨肉自消。飲食無味。皮燥不澤。蒸盛之時。目暗妄怒。時驚。四肢漸細。足跖腫起。凡此五蒸。與熱勞之病。大同小異。其治法有不同者。蓋蒸病內著骨髓。蒸發皮膚也。昔人論蒸有二十三證。細而推之。臟腑之病。變態多端。皆在於虛。不必拘之。

豬肚黃膏丸方 治骨蒸虛勞。傳尸肺痿。咳嗽不止。困重羸瘦。飲食無味。頭痛口乾。涕唾稠黏。渴不止者。

獾猪肚一具以童子小便黃令

紫苑去苗 大黃炒

鼈甲去裙鬚 百部

桔梗 貝母

黃連 龍膽

知母剉焙

檳榔

地骨皮

柴胡

人參

蕪荑仁炒各

蒼朮米泔

黃芩去心

白茯苓

黃耆各一

右十九味。搗羅爲末。鍊蜜丸。梧子大。每服空腹溫酒下二十九。

地骨皮湯方 治五蒸。

地骨皮

白茯苓

麥門冬

柴

胡各半

赤芍藥

甘草炙令赤 各一兩

右六味搗篩。每服五錢。水煎。食後分溫二服。

茯苓湯方

治心蒸若心驚悚慄。男子因讀書損心氣。傷思慮。損心吐血。心煩多

忘。失精神。或身體瘙癢風癬。或胸中氣滿。

白茯苓

麥門冬

款冬花

獨活

檳榔各六兩

桂

防風

防己各五兩

甘草炙

枳殼四兩

地骨皮去土

右十一味。剉如麻豆大。每服五錢。以水二盞。先煎山澤銀取水一盞半。入藥。并

生薑半分。切大棗三枚。擘破同煎。溫服。早晨日晚各一。

麥門冬飲方

治心蒸心中煩躁。手足熱疼。欲露其體。驚悸怵惕。咽乾虛渴。面色

萎黃。失前忘後。婦人血氣衰弱。多傳此疾。

麥門冬二兩

白茯苓

人參

龍齒

遠志略三

甘草一

防風

地骨皮略三

羚羊角一鎊末

共九味。剉如麻豆大。每用五錢。以水二盞。入山澤銀一分。棗二枚同煎。取一盞。

分溫二服。若大患煩熱渴燥者。入淡竹瀝一合煎服。若曾經吐血亦治。餘如上

法。一劑無不差。

髓甲湯方 治男子女人骨蒸熱勞。皮肉消瘦。面萎黃。不思飲食。夜多咳嗽。涕唾

稠黏。骨節疼痛。憎寒壯熱。心腹氣脹。坐臥不安。發如瘧狀。女人血風勞等疾。

髓甲去裙襴諸炙

秦艽二兩

紫苑半兩

柴胡三兩

牡蠣

麻黃去根

犀角

知母

升麻

甘草炙

梔子仁

檳榔剉

木香

當歸

桔梗

大黃炒

桑根白皮剉

黃連

桃仁炙

人參

桂

萎蕤

芎藭各一

右二十四味。搗篩。每服三錢。棗一枚。烏梅一箇。生薑三片。同煎熱服。

室女勞熱。經血不行。時發潮熱。煩燥虛渴。

鱈甲脊骨更煎醋炙令赤用二兩半

柴胡各二

生乾地黄

牛膝

當歸

麥門冬

桂皮去粗

甘草炙各

共三十味。搗為粗末。每服五錢。生薑半分。棗三枚。同煎稍熱服。空心臨臥服。按

中勞證用天靈蓋甚多此物人所不忍其意為傳尸殺蟲也今擇其方可用者亦備一二餘俱不取

京三稜五兩

草薺去皮

天靈蓋一兩

聖濟總錄

卷十四

骨蒸傳尸門

虛勞五蒸

五

髓甲豬肚丸方 治骨蒸脣紅。頰赤氣粗。口乾徧身腫熱。或多虛汗。大腸祕澀。小

便赤黃。飲食全少。

髓甲去裙爛

柴胡

木香

青蒿

生乾地黃各一

黃連二兩

青橘皮去白

共七味。搗羅為末。用豬肚一枚。去脂膜淨洗。入藥末在內繫定。蒸令爛熟。入白

杵千百下為丸。如綠豆大。每服十五丸。溫水下。食前。日午。臨臥各一服。

紫雪方 治骨蒸癘疾。瘟疫。寒熱。瘧病。五尸。五注。心腹絞刺。蠱毒。魅鬼。一切熱毒

脚氣。悶亂。攻衝。煩熱。口中生瘡。狂陽。叫走。及解諸毒。兼金石草藥。熱毒發黃。瘰

熱。疼痛。一切熱病方。與和劑局方略不同

金針十五

銀針十五

寒水石

石膏

磁石

滑石各三斤

右四石藥同搗碎後。以金銀共六味一處。以水一石。煮取一斗。去金銀并石滓。

入後藥味。

木香一兩

犀角五兩

丁香四兩

沉香五兩

甘草炙

升麻

玄參各一

右七味。除前六味外。用水三斗。煮取一斗。絞去滓淨。與前藥汁相和。卽內芒消五升。細研入藥汁。慢火同煎。手不住攪之。可有一斗餘。卽投入盆器內。欲凝內水飛丹砂末三兩。麝香末一兩一分。同砂如粉麵。和勻蓋覆之。二日成霜雪矣。暴乾。以新盒或餅內密封盛貯之。有病卽取。強人服一錢。冷水和服。以意隨人強弱增損之。脚氣病或增服。石藥發動毒悶者服之。水和半錢如神。凡服訖卽仰臥。以物搯腰令高。使藥向胸府間。若患眼赤及熱痛者。以冷水和之點眼。大小皆初著微痛。少時淚出自定。日三五次用。夜亦如之。卽無不效。口內生熱瘡。含如杏核許。令消痛止。按局方有硝石卽火硝也。藥品有追魂之妙。深於玄理者知之。

骨蒸肺痿

論曰。骨蒸肺痿者。由榮衛虛損。蘊熱熏蒸。上焦傳播胸膜。使人肺熱葉焦。發爲肺痿。其證咯唾膿血。胸滿短氣。欬嗽不止。多痰。或如膿涕。或吐之不能出。時發寒熱。肌體羸瘦。是其候也。

白前湯方 治骨蒸肺痿咳嗽。涕唾如膠。胸背煩熱。

白前

桑根白皮炙

麥門冬各一兩

旋復花半兩

木通炒二

甘草炙一

右六味。搗篩。每用五錢。水煎。分溫二服。空腹、食後各一。

皂莢飲方 治骨蒸肺痿咳嗽咯血病重者。

皂莢一挺長一尺

白錫一兩

生薑半兩

乾薑

棗七枚

右四味。除錫外細剉。入錫以酒一升。煮取半升。每食後溫服二合。

骨蒸肺痿欬嗽方

白蜜

熟羊脂

熟羊髓

熟猪脂

生薑汁

地黃汁各二升

右六味。依次第下於鍋中。慢火煎。不住手攪。熬至四分減一即止。貯密器中。遇

美食中著一兩匙。日三四服。

治肺痿骨蒸。咳嗽上喘。呀呷有聲方

青羊肺一具煑熟去筋
膜薄切焙乾

葇荳子米醋浸暴
乾微炒

二味搗羅爲末。鍊蜜丸如梧子大。每服七丸。空心米飲下。加至十丸。以知爲度。

傳尸骨蒸

論曰。傳尸之病。由相尅而生。毒氣內傳五臟。漸至羸極。死則復傳其家屬一人。故曰傳尸。其初得病。半臥半起者。名曰殭殍。氣急嗽者。名曰肺痿。骨髓熱者。名曰骨蒸。內傳五臟者。名曰復連。忽而不療。乃至絕後。假如男子因虛損得之。其源先從腎起。初受尸氣。兩脛痠疼。腰脊拘急。行步脚弱。食減耳鳴。夢洩陰汗。腎病不已。次傳於心。則驚悸少氣。夢見先亡。時有盜汗。食飲無味。口瘡好臥。脣頰赤白。五心皆熱。朝輕夕重。心病次傳於肺。則氣滿咳嗽。喘急口燥。四體微弱。肌膚枯槁。細起如疥。或刺痛如蟲行。鼻乾不聞香臭。聞惡氣欲吐。肺病不已。次傳於肝。面無顏色。坐常擡眉。視不及遠。目昏睛黃。或赤澀痛。惟欲合眼。又不得睡。肝病不已。次傳於脾。則兩脅虛脹。食不消化。時復渴利。腹肚痛脹。脣舌焦乾。髮無光澤。上氣喘息。利赤黑汗。傳變至此。不可復救。蓋傳五臟已盡故也。

麝香散方

治男子婦女傳尸骨蒸。冷熱五勞。

麝香研五

甘草去病人中指大

東引桃枝

東引柳枝

石榴皮各一

青蒿

犀角半兩

阿魏

柴胡各一

葱白

薤白各七

右十一味。除麝香外。剉碎。同用童子小便二升半。浸一宿。別入欖榔末三錢。同煎至一升半。去滓。分溫三服。男病女煎。女病男煎。勿令孕婦六畜見。初服訖。如人行五里。又進一服。恐惡心。可含白梅。病在上即吐。在下即瀉。出各惡物。如蟲類及頭髮馬尾狀。兼身如蟻行。瀉後以葱粥及輒飲補之。仍服後方扶神湯。調和五臟。避風一月。若遠年重病。不過兩劑。其吐下蟲腹紅色可治。黑者或差。或否。白色者不可治也。

扶神湯方

治傳尸骨蒸。先服麝香散取蟲後。服此方補五臟。

扶神

人參

遠志

甘草炙

陳橘皮

當歸

龍齒

熟乾地黄各一

五味子

麥門冬

桂各半

黃耆二兩

右十二味。每服五錢。入棗七枚。生薑五片同煎。空心溫服。日三。

珍珠丸方 治傳尸骨蒸。咳嗽上氣。痰喘寒熱。四肢瘦弱。

珍珠末

獾肝

茯神

貝母

柴胡

龍膽

黃連

芍藥各半

白檳榔煨

旋復花各一兩

右十味。搗羅為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食後溫水下。日再。

黑虎丸方 治傳尸骨蒸勞

乾蝦蟆一枚去頭足分爲兩段

蛤蚧一對各取一半并去頭尾

蘆薈研

天靈蓋研

雄黃研 白狗糞炒黃

麝香研各一兩

烏驢蹄炙乾

乳香一兩

猪膽一枚取汁於碗中

右十味。搗研九味為末。合勻細。以猪膽膏同粟米飯為丸。如梧桐子大。先吃熱

麵一椀。次以茅根香水沐浴。次以砂糖。麝香少許。調冷水一盞。投藥一丸。於星

月下浸一宿。平旦空腹服之。厚被蓋臥。應是傳尸冷勞者。脊骨中出白蟲。或出

赤蟲。若骨蒸則汗出腰脚疼痛不遂。脚下出汗如膠漆。諸風氣水病。並服一粒。若小兒無辜。可服半粒。如前法有蟲出鼻內如線狀是效。

烏雞丸方 治傳尸勞尸注骨蒸。眼目昏眩。面色青黑。咽喉噎塞。痰涕咳嗽。或瘧癘。攻刺疼痛。胸膈滿悶。時或恚怒。或多感傷。情思不樂。夢寐虛驚。精藏滑泄。失血。憎寒潮熱。盜汗。肩背拘急。腰膂肢節煩疼。四肢少力。不喜飲食。小便黃色。大便不通。乍進乍退。服取蟲藥後宜服此。

黃連

附子

去皮臍

柴胡

白附子

當歸

秦艸

槐膠

甘草炙

菘蓉酒浸切焙

續斷

遠志

巴戟天各一兩

乳香

陳橘皮

雄黃研

丹砂各半兩

丁香

乾薑炮各一分

右十八味。搗研極細。先養雌烏雞一隻。以雄黃三兩為末。分作三十分。每日拌飯。餵一月。日用大麻子一升。煨盡。宰治。去毛及嘴爪并腸肚。留心肝。將前藥末入在雞腹內。以麻線纏定。再用無灰酒一斗。銀器石鍋內。用文武火煮。令雞熟。

取出。除去粗骨。將雞并腸內藥同細研。更將雞骨焙乾。搗羅爲末。同研藥。和白中杵千百下。丸如梧桐子大。每服二十九。以煖酒吞下。空心日午。臨臥各一服。

傳尸勞

論曰。傳尸勞者。骨蒸之病。流傳五臟也。其證。殭殭半臥半起。旦卽醒。然午後微熱。情常不悅。心多驚悸。夜卽盜汗。夢與鬼交。兩頰紅赤。脣如血色。睡不得臥。欲食不能食。或喘急咳嗽。心胸滿悶。背膊煩疼。兩目精明。四肢無力。脊脊拘急。膝脛痠疼。兩肋虛脹。時或微利。鼻乾口燥。漸至尫羸。雖死在須臾。精神尙爽。是其候也。治之若緩。猶如水涸。不覺其死。

蘇合香丸方。治肺痿客忤鬼氣。傳尸伏連。殭殭及卒得心痛。霍亂吐利。時氣諸瘧。瘀血月閉。痲痺水腫。驚邪氣。狐魅瘴癘諸疾。

蘇合香
訶梨勒肉

白朮
丁香

丹砂
木香

沉香
莎草根

白檀香

乳香

萹撥

犀角

安息香各一兩

麝香研

龍腦研各半兩

右十五味。搗研爲末。鍊蜜和丸。如雞頭實大。每服一丸。溫酒。或人參湯嚼下。一名白朮丸。此藥大能安氣血。卻外邪。凡疾自內作。不曉其名者。服此往往得效。雖治氣注。氣厥。氣逆。氣不和。吐利。榮衛阻塞。尤有神功。人家不可無此藥。以備急難。辟疫尤驗。倉卒求人參不得。白湯亦可。勿用酒。古方雖云用酒。酒下口多不效。昔有人病瘵。日漸羸消。至於骨立。肌熱盜汗。勞狀皆具。凡服八九兩。所苦都差。一方用牛黃半兩。古方本無。乃後人加之。

諸症門

寒症

論曰。寒症爲病。陰冷內積。衛氣不行。結於腹內。故遇寒則發。其狀惡寒不欲食。手足逆冷。繞臍痛。自汗出。
蓬莖茂湯方 治寒症。四肢逆冷。氣弱汗出。

蓬莪茂一兩 乾薑半兩 附子去皮臍 芎藭三分

桂一兩 白朮三分 檳榔一兩 芍藥一兩

共八味。劉如麻豆。每服三錢。水煎溫服。不拘時。

人參湯 治寒疝冷痛。氣弱汗自出。不欲食。

人參 白茯苓各一 蜀椒去目 乾薑各半

附子去皮 檳榔 青橘皮湯白 白朮各一

右八味。劉如麻豆。每服三錢。水煎溫服。不拘時。

烏頭湯 治寒疝滿逆。手足不溫。徧身疼痛。

烏頭大者五服去 白蜜一斤 桂心二兩

三味。先以慢煎蜜及烏頭。候蜜減半。去烏頭。別就一處。以水三盞煮桂。候減半。

濾去桂。將桂汁共和別煎。取二盞許。服時每用半盞溫服。未知再服。其知如醉

狀。得吐為中病也。

高良薑湯 治寒疝卒痛。積聚不散。上衝心胸。與陰相引。痛則汗出。

高良薑 檳榔 木香 當歸各半

吳茱萸炒一

右五味。搗篩。每服三錢。水煎溫服。

心疝

論曰。內經謂診得心脈而急。病名心疝。小腹當有形也。心為牡臟。小腸為之使。故曰小腹當有形也。臟病必傳於腑。今心不受邪。病傳於腑。故小腸受之為疝而痛。小腹當有形也。世之醫者。以疝為寒溼之疾。不知心氣之厥。亦能為心疝。心疝者。當兼心氣以治之。

當歸

乾薑

赤芍藥

黃耆

蜀椒去目

人參

半夏為末薑汁作餅

附子去皮

青橘皮去白

甘草炙各一兩

厚朴

朴薑汁炙

桂心半兩

右十二味。㕮咀如麻豆。每服三錢。水煎溫服。不拘時候。

牡丹丸 治心疝心痛。如錐所刺。

牡丹皮

桂心

芍藥

烏頭去皮

細辛

甘草炙

木香

吳茱萸焙湯乾

檳榔各一

右九味。搗羅為末。鍊蜜為丸。梧桐子大。每服二十九。溫酒下。不拘時。

蓬莪茂 煑散 治心疝心痛。肢體虛冷。

蓬莪茂

檳榔

附子

甘草炙

桂心各一

胡椒半兩

芎藭

白朮各三分

八味。搗羅為散。每服二錢。水煎溫服。

橘皮益智湯 治瘡冷在內。陰氣交攻。心痛如刺。

青橘皮去白

益智去皮

烏頭去皮

威靈仙各一兩

右四味。剉如麻豆。每服三錢。生薑三片。鹽少許。同煎溫服。食前日二。

厥疝

論曰。內經謂黃脈之至也。大而虛。有積氣在腹。中有厥氣。名曰厥痧。女子同法得之。疾使四肢汗出當風。夫痧藏疾。隱而難見。陰沈而伏也。今脾虛風寒客於腹膜之間。不能與胃通行水穀之氣。結而成積。使氣道厥逆而痛。故謂之厥痧也。

山菜黃丸 治厥痧上搶心腹冷痛。
山黃 吳黃 炒 食黃 棟實 炒

馬蘭花 藜香子 青橘皮 橘紅 焙

京三稜 乾薑 各三分 附子 一枚 重半兩 去皮 臍

右十一味。搗羅為末。醋煮麵糊和丸。如梧桐子大。每服二十九丸。酒或鹽湯下。空心服。

木香湯 治厥痧逆上攻腹冷痛。

木香 檳榔 烏頭 細辛

當歸 吳黃 炒 枳殼 炒 甘草 炙 各

共八味。咬咀如麻豆大。每服三錢。水煎溫服。

寒痧心腹痛

論曰。疝者痛也。本緣寒氣內積。陽衰陰盛。不得散釋。寒邪因得攻擊。或上搶心。或腹內疼刺。發卽俱痛。故名寒疝。心腹痛也。人參湯 治寒疝心腹痛。胸脅支滿。不下食。汗出嘔逆。

人參

白茯苓

檳榔

木香

芍藥

芎藭

當歸

桂心

青橘皮去白各一兩

共九味。每服三錢。水煎溫服。不拘時。

蜀椒湯 治寒疝心腹痛不可忍。

蜀椒

去目炒二百粒

附子一枚去

粳米半盞

乾薑半兩

半夏湯洗七次去備切搗十二枚

甘草一兩

共六味。吹咀如麻豆。每服五錢。入生薑半分。棗二枚。同煎溫服。

地黃湯 治寒疝心腹痛。汗出厥冷。

生乾地黃三兩

甘草

白茯苓

人參

當歸各二兩

羊肉三斤去脂切

右六味。前五味細剉。將羊肉用水二斗。煮取汁一斗。去羊肉。入諸藥。煮取七升。入葱白一把。棗十四枚。再煎。取六升。絞去滓。溫服一盞。不拘時。

當歸湯

治寒疝心腹疼裏急。

當歸 三兩

生薑 五兩

羊肉 去脂膜切 一斤

三味。以水一斗。煮取五升。去滓。每服一盞。不拘時。日三夜一。

七疝

論曰。疝病有七。厥逆心痛足寒。飲食即吐者。名厥疝。腹中氣滿。心下盡痛。氣積如臂者。名堅疝。寒飲則腹中脅下盡痛者。名寒疝。腹中乍滿乍減而痛者。名氣疝。腹中痛在臍傍者。名盤疝。腹中痛在臍下有積聚者。名疝疝。小腹與陰相引而痛。大便難者。名狼疝。凡此七疝。皆寒氣內積。血氣凝滯。不得通利。冷劇則痛。故皆謂之疝。難經曰。任之爲病。其內若結。男子爲七疝。女人爲瘕聚。蓋以此也。

桃仁湯

治諸疝。

桃

仁 去皮尖 雙仁

吳茱萸 炒

陳橘皮 去白

海藻 洗去

白茯苓

羌活

蒺藜子炒去角

共七味。每服三錢。生薑一棗大同煎。溫服。

厚朴丸

治七疝肢體寒。臍腹堅痛。滿悶。

厚朴薑汁

附子去皮

藿香子炒

白朮

桂心

乾薑

枳殼

青橘皮

芎藭

烏頭去皮

木香

當歸略一

右十二味。擣羅爲末。鍊蜜丸如梧桐子大。每服二十九。溫酒下。薑湯亦可。

蟲蠱之病

論曰。經謂脾風傳之腎病。名疝瘕。小腹冤熱而痛。出白一名蠱。夫脾受風邪。傳於腎經。邪熱內燦。故其證小腹冤熱而痛。其精失守。故其證洩出白液。病名曰蠱。以邪熱內燦。其精不守。久而弗治。適以喪志也。水之精爲志。志喪則精從之。左傳謂惑以喪志爲蠱者如此。

大建中湯 治蠱病小腹急痛。便溺失精。

黃耆

遠志

當歸

澤瀉

各三兩

芍藥

人參

龍骨

甘草

各二兩

入味。剉如麻豆。每服五錢。生薑三片。棗二枚。水煎溫服。

澤瀉丸 治蟲病小腹寃熱而痛。精氣不守。溲便白出。

澤瀉

補骨脂炒

巴戟天

五味子

石斛

芍藥

人參

甘草

各一兩

共八味。為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服三十九丸。溫酒或鹽湯下。空心、日午、臨臥

各一服。

乾地黄丸 治蟲病精氣不守。便溺出白。小腹寃熱而痛。

熟乾地黄二兩

鍾乳粉半兩

龍骨

菟絲子

酒浸一宿別搗

磁石煨七遍

芍藥

黃芩各一兩

右七味。搗羅為末。酒煮麵糊丸。如梧桐子大。每服二十九丸。酒或鹽湯下。

陰疽門

陰疝統論

論曰。疝者痛也。邪氣聚於陰。令陰器腫大而痛者。陰疝也。一名癰疝。其類有四。卽腸癰、卵脹、氣癰、水癰是也。世俗云疝氣。亦云小腸氣。或曰膀胱氣。原其病本。緣腎氣通於陰。與膀胱爲表裏。胞囊者膀胱之候。此二經不足。下焦受寒。皆能致陰卵腫大。或熱疝痛。故通稱爲陰疝。若寒溼之氣。有連於小腸者。卽小腸控舉而痛。陰丸上下。謂之腸癰。寒氣客於經筋。足厥陰脈受邪。脈脹不通。邪結於陰卵。謂之卵脹。腎虛之人。因飲食不節。喜怒不時。津液內溢。下流於腎。寒氣結聚不散。謂之氣癰。水氣盛則津液內結。謂之水癰。水癰、氣癰。病生於標。故鍼灸可治。其疾易愈。腸癰、卵脹。病生於本。邪氣入深。其治難差。

陰疝

論曰。黃帝鍼經曰。足厥陰之脈環陰器。抵小腹。是動則病。丈夫癰疝。卽陰疝也。嗜慾勞傷。腎水涸竭。無以滋榮肝氣。故留滯內結。發爲陰疝。陰疝之病。世俗論陰疝。

者為腎餘氣。殊不知邪實又本於肝。經云。治法當瀉邪氣之實。補肝經之虛。

蒺藜子湯 治陰疝。

蒺藜子炒去

附子去皮

山梔子仁各一

右三味。哎咀如麻豆。每服五錢。水煎溫服。食前服。

昆布丸 治陰疝腫大偏墜。

昆布洗去

海藻洗去

蒺藜子炒去

蕪荑仁炒

檳榔各半

枳殼去瓢炒

大麻仁研各二兩

木香

黃耆剉

訶藜勒去核各三分

陳橘皮炒去白

桃仁去皮尖

兔絲子酒浸一宿別搗各一兩

共十三味。搗研為末。和勻。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服三十九。空心食前溫酒或

鹽湯下。

沙參丸 治疝氣。

沙參二兩

昆布洗去

藿香子炒各半兩

三味為末。酒煮麵糊丸。如梧桐子大。每服二十九。空心食前溫酒下。

二氣丸 治陰疝上而不下。臍腹疼痛。

石硫黃研

黑鉛各一

二味。先以鉛於銚內鎔成汁。次下硫黃烟焰透。移下候冷。取出研為細末。糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。酒下。

葫蘆巴煑散 治陰疝攻痛。

葫蘆巴

沉香

馬藟花

蓬莪茂煨

藿香子各一

練實取肉

木香

薑黃

檳榔剉

桂心各一

附子去破

甘草半

共十味。搗羅為散。每服三錢。水酒同煎。空心食前溫服。

葫蘆巴丸 治陰疝氣攻疼痛。

葫蘆巴

補骨脂炒

白豆蔻去皮

草薺

青橘皮

藿香子

附子去皮

肉蓯蓉酒浸

兔絲子

牛膝酒浸

桂心

防風各一

右十二味。為細末。酒煮麵糊丸。如菘豆大。每服二十丸。空心生薑鹽湯下。

應病丸 治陰疽撮痛不可忍。

韭子炒 芎藭

二味等分爲末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心溫酒下。

陰疽腫縮

論曰。陰疽腫縮者。寒邪客於厥陰之經。而陽氣不能自溫。故令諸筋拘急。陰器緊縮而疼痛也。肝者筋之合也。筋者聚於陰器而絡於舌本。脈不營即筋縮急。筋縮拘則引卵與舌。故舌卷卵縮也。皆厥陰爲病也。

翅灰散 治陰疽腫縮。

雞翅右左都用不多少燒灰

一味細研爲散。每二錢。溫酒調下。不拘時。

雄黃洗 治陰疽腫縮。

雄黃研 甘草各一 礬石研二

三味搗研爲末。每用藥一兩。熱湯五升。通手洗腫處。良久再煖洗。

車前子塗 治陰疝腫縮。

車前子不拘

一味。搗羅爲末。湯調塗腫處。

蔓菁子散塗 治陰疝腫縮。

蔓菁子不拘

一味。搗羅爲散。溫水調塗腫處。或絹帛傅之。以差爲度。

陰疝卒腫痛

論曰。陰卒腫痛者。腎氣虛弱。暴受邪氣。傳入陰中。冷熱相薄。故卒然而痛也。痛甚則邪勝。邪勝則熱勝。熱勝則腫。皆卒然而作也。

雞翎散 治陰卒腫痛。

雞翎燒灰大莖 蛇牀子一兩

二味。搗羅爲散。每服一錢。溫酒調下。如左邊腫。卽取雞右翎。右邊取左邊翎。

木香散 治陰卒腫痛。攻注腹脹悶。

木 香半兩

赤茯苓一兩

牡丹皮三分

防風半兩

檳榔一兩

澤瀉三分

郁李仁去皮炒一兩

七味。擣羅爲散。溫酒調下。

雄黃淋洗 治陰腫。

雄黃

白礬

甘草炙一兩

三味爲散。每用藥一兩。以水一斗。煎取三升。通手淋洗至冷。候汗出差。

黑豆熨 治坐久卑溼。忽陰囊虛腫。氣上築。

右方以米醋炒黑豆。青布袋盛。熨心腹。更以椒葱湯淋。燂腰膝。厚衣蓋下部。然

後服諸藥。

治陰腫偏著一邊。連小腸痛不可忍。

右方以藿香苗葉取汁一斗。服之。日三四服。其滓貼腫處。

控辜

論曰。甲乙經曰。小腹控辜引腰脊。上衝心肺。邪在小腸也。又曰。小腸病者。小腹痛。

腰脊控舉丸而痛。夫小腸者。連心系。屬於脊。貫肝肺。絡心系。其經虛不足。則風冷乘間而入。邪氣既盛。則有厥逆之證。其氣上衝肝肺。客冷散於胸。結於臍。控引舉丸。上而不下。痛引小腹。甚則衝於心胸。蓋其經絡之所系屬然也。

藳香子散

治小腸受邪控舉。痛引小腹。

藳香子炒

葶澄茄

棟實炒一方用肥豆同

木香各半

葫蘆巴

青橘皮去白各一兩

檳榔半兩

共七味。為散。每服一錢。溫酒調下。空心。食前。日二。

吳茱萸散

治小腸疝氣。牽引臍腹疼痛。腰曲不伸。

吳茱萸湯洗

棟實四十九枚

巴豆半兩椎令微破三味同炒候入棟實去核用

木香

馬藳花

藳香子炒各一分

沉香半兩

右七味。除巴豆。茱萸不用外。搗羅為散。每服二錢。炒葱酒調下。空心夜臥發時服。

木香丸

治小腸受寒。氣控舉牽痛。

木香一兩

石南

肉蓯蓉酒浸切焙

牛

膝酒浸切焙

菖蒲

藿香子炒

棟實炒各二兩

共六味。除蓯蓉、牛膝二味別作末外。搗羅爲末。以酒一升。熬蓯蓉、牛膝成膏和丸。如梧桐子大。每服三十九丸。空心食前以紙裹葱白一寸。煨熟細嚼溫酒下。



6.081
5
4(1)6

聖濟總錄纂要

七

413.681
165
:4017

中國醫學大成第四集

方劑類

聖濟總錄纂要
七

上海大東書局印行



3 0472 8408 2

254632

聖濟總錄纂要

清

新安

程

林雲來纂輯

鄞縣

曹炳章

赤電校點

卷十五

大小便門

大小便統論

論曰。脾胃大小腸膀胱者。倉稟之本。營之居也。名曰器。能化糟粕轉味而入出者也。蓋營受水穀之真精。榮衛之根源。大小腸膀胱得以變化。皆營爲之本。是以小腸爲受盛之官。水穀之未分也。及其化物歸於膀胱而爲溺。轉於大腸而爲糟粕。必由氣化。則能出矣。或陰陽之氣不平。寒熱相勝。或氣實塞而不通。或氣虛損而遺泄。或燥而結。或熱而秘。皆陰陽不和之病也。治此者。勿概以寒熱爲法。寒劑滌

蕩熱劑枯燥。反傷和氣。耗其精血津液。若關格不通。三焦約病。責以榮衛之否塞。若產後難便。與夫老者祕澀之病。又以津液不足。止可滑以利之。潤以滋之。苟蕩以快劑。則糟粕不通。真氣受弊。不可不知也。

大小便關格不通

論曰。大小便不通者。陰陽關格三焦約之病也。陰陽和平。三焦升降。則水穀糟粕。以時傳導。今陰陽偏盛。氣否於中。則榮衛因之。以不行。故氣結於腹內。脹滿不通。而大小腸俱閉塞也。

芒消湯方 治關格不通。脬腸妨悶。大小便不通。

芒消二兩 冬葵子合抄三 滑石三兩

三味除芒消外。咬咀。每服五錢。水煎。再入芒消末半錢。更煎空心溫服。
菜黃湯方 治腹脅脹滿關格。大小便不通。

吳茱萸湯浸

大黃

當歸

桂心

赤芍藥

甘草炙

芎藭各二

人參

細辛各四兩

桃白皮一握

乾薑一兩

雄黃三分

珍珠末半兩與雄黃同細研

右十三味。將十一味搗篩。每服三錢。水煎。再入雄黃、珍珠末一字。酒半盞。更煎三沸。空心服之。

車前子湯方 治大小便俱不通。

車前子五兩

木通四兩

黃芩

郁李仁湯浸去皮尖雙仁

右四味。將前三味搗篩。與郁李仁拌勻。每服五錢。入芒消半錢。同煎服。

豬脂酒方 治大小便不通。

豬脂半鷄子大切

一味。以酒一升微煮。沸投豬脂。更煎二沸。分爲二度。食前溫服。未通再服。

髮灰散方 治大小便不通。

亂髮一兩解

一味。細研。每服三錢。溫水調。食前服。日三。以通利爲度。

茯苓丸方 治大小便不通。

赤茯苓

芍藥

當歸

枳殼

白朮

人參各五

大麻仁

大黃各三

共八味。爲末。鍊蜜丸如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。空心煎茅根湯下。

治大小便不通腰脊堅脹蒸下部方

蓮葉三兩

葱并鬚

皂莢一挺

生薑一兩

共四味。以漿一斗二升。煮十餘沸。并渣分兩度用。旋盛入小白磁缸中。坐缸口上熏蒸。冷則易之。未通再傾藥於桶斛中。添熱水坐。薰下部卽通。

小便不通

論曰。腎藏不足。氣不傳化。膀胱有熱。水道不宣。故小便不通也。令人小腹脹滿。其氣上衝。心腹膨否。甚則喘急。不能升降。內經曰。膀胱不利爲癰者如此也。

滑石散方 治小便淋澀疼痛不通。

滑石

海金沙

木通等分

三味爲散。每服二錢。煎燈心湯調下。

松煙散方 治小便不通。

墨研汁者小農

酒半盞

葱 白三莖

膩

粉研半

四味同煎至七分放溫去葱白頓服即通。

獨蒜塗臍方 治小便不通。

獨顆大蒜一枚 梔子仁三七

鹽 花少許

三味爛擣攤紙上貼臍良久即通未通塗陰囊上立通。

治小便不通久即成淋方

以琥珀擣研成粉每服二錢濃煎萱草根汁調下空心食前服葱湯調下亦佳。

杏仁散方 治卒不得小便。

杏仁去皮尖雙

一味炒黃研細末米飲調下立差。

牛膝湯方 治小便不通莖中痛及女子血結腹堅痛。

生牛膝根莖葉

黃 芩半兩

當 歸一兩

三味細剉。每服五錢。水煎溫服。

桑螵蛸湯方 治小便不通。

桑螵蛸炙三

黃芩二兩

二味細剉。用水三盞煎。分溫二服。相次頓服。

治小便不通。臍下急痛。脹悶欲絕。鹽熨方

鹽二觔

一味。鍋中炒令極熱。布帛裹熨臍小腹。以小便通快爲度。

石葦湯方 治小便不利。

石葦去毛

瞿麥穗

冬葵子各二

滑石五兩

共四味。搗羅爲散。每服二錢。溫水調。食前服。

治小便不通方

蓬莪茂

藿香子

茶葉各半

三味。搗羅爲散。水煎入鹽二錢。葱白二寸。同煎空心服。

小便不禁

論曰。內經言膀胱不約為遺溺。亦腎竭不能約制水液。故便利多。甚則下焦傷竭。真氣不固。而小便不禁也。

菴蓉丸方。治腎臟虛冷。腰膝無力。小便不利不禁。或溺白色。

肉菴蓉淨刷去鐵皮酒浸二宿薄切焙乾二兩半 杜仲去粗皮二兩半炙紫色橫剉

黃耆三兩 韭子水淘去淨者三兩焙乾 桂心二兩

牛膝酒浸二兩 山茱萸二兩

右七味。搗羅為細末。鍊蜜和。更入白內塗酥杵令勻。丸如梧桐子大。每日空心煎黃耆湯下三十九。至晚再服。

鹿茸散方。治腎臟虛。腰臍疼冷。夜遺小便。

鹿茸去毛令熟 烏賊魚骨去甲炙當歸 白芍藥

龍骨研 人參 桑寄生各一兩 桑螵蛸一兩甲劈破慢火炙令黃

右八味。搗前七味為末。更與龍骨同研。令勻細。每服一錢。溫酒調服。日三。

兔絲子散方。治小便不禁。

兔絲子酒浸一宿焙乾微炒 蒲黃炒 黃連各一兩半

肉蓯蓉酒浸一兩

五味子

鷄臍黃皮酒浸半兩

共六味。先搗四味為細散。再入兔絲子粉與蒲黃同研勻細。每服二錢。酒調食前服。日三。

黃耆散方 治小便不禁。

黃耆

狗脊去毛

牡蠣煨

肉蓯蓉酒浸一兩切焙

草薺

牛膝酒浸

赤石脂研

山茱萸各半

土瓜根三兩

右九味。先搗羅八味為散。更與赤石脂同研勻。每服一錢。酒調食前服。至午間

夜臥各一服。加至二錢。

雞腸散方 治小便不禁。日夜無數。

黃雄雞腸四具切破淨洗炙黃

肉蓯蓉酒浸

苦參

赤石脂研

白石脂研

黃連各五兩

共六味。搗四味為散。更與赤白二石脂同研勻細。每服二錢。酒調食前服。日二夜一。

鵲巢散方 治小便不禁。

重鵲巢中草一斤燒作灰

薔薇根五兩

二味。先搗薔薇根爲散。每服三錢。水煎去滓。再入鵲巢灰二錢。空心服。

小便利多

論曰。腎者主水。膀胱爲腑。今腎氣不足。膀胱有寒。不能約制水液。令津滑氣虛。故小便利多。久不差。則腎氣傷。真元耗損。腰脊痠痛。身體寒顫。羸乏之病生焉。覆盆子丸方。治元臟虛弱。臍腹疼痛。膝脛少力。百節痠疼。昏倦多睡。小便頻濁。頭旋痰唾。背脊拘急。飲食無味。溫順臟氣。補益下經。

覆盆子

黃耆

肉蓯蓉

烏藥

五味子

石斛

補骨脂

澤瀉

萹澄茄

沉香

巴戟天一兩

芎藭

當歸

赤芍藥

山茱萸各三

兔絲子酒浸三

熟乾地黄兩半

共羅爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服二十九。加至三十丸。食前溫酒下。米飲鹽湯亦可。

八味補骨脂丸方 治小便滑數。

補骨脂

巴戟天去心

桑螵蛸炒

兔絲子酒浸三日別研

牛膝酒浸切焙

乾薑半兩

熟乾地黄一兩

枳殼剝去殼

共擣羅爲末。酒煮麵糊和丸。如梧桐子大。每服二十九。空心食前溫酒下。粟米飲亦可。

雌黃丸方 治小便滑數。

雌黃研如粉二兩半

乾薑半兩剉入鹽四錢同炒黃色

共擣研爲末。用乾蒸餅爲末。入水內拌和擣熟。丸如菉豆大。每服十丸。加至二十九。空心鹽湯下。

牡蠣丸方 治膀胱虛寒。小便數。

牡蠣

獨活

狗脊法炙

肉蓯蓉一兩

龍骨半兩

共爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。鹽湯下。空心食前。
治小便頻數。及引飲不止。糯米餐方。取純糯米。資一手大。臨臥灸令軟熟。啖之。
以溫酒送下。不飲酒人。湯下。多啖。彌佳。行坐良久。待心空便臥。一夜十餘行者。
服之即止。或言假火氣。溫水道。不然也。大抵糯米止縮水。凡人夜飲酒者。夜輒
不溺。此糯米之力也。昔有人病渴殆死。有人用糯米桿及根。斬去穗。取中心淨
器中燒作灰。每用一合許。湯一碗。沃浸良久。澄去其滓。管味如薄灰汁。乘渴令
頓飲之。是夜減飲水七八升。此亦糯米縮水之一驗也。

小便出血

論曰。內經謂悲哀太甚。則胞絡絕。絕則陽氣動中。數溲血。又曰。胞移熱於膀胱。則
癃溺血。二者皆虛熱妄溢。故溲血不止也。治宜去邪熱。調心氣。
金黃湯方。治小便出血。水道中澀痛。

鬱金

瞿麥穗

生乾地黄

車前葉

芒硝

滑石

每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓。溫服。不拘時候。

車前葉湯方 治小便出血。

車前葉

茜根

黃芩

阿膠

地骨皮

紅藍花一兩

每服五錢匕。水一盞。煎至七分。溫服。不拘時候。

人參湯方 治小便出血。

人參

生乾地黃

白芍

桔梗

當歸

甘草

桂心

芎藭一兩

淡竹茹二兩

每服四錢匕。水二盞。煎至一盞。溫服。不拘時候。

阿膠湯方 治腎客熱連心。小便出血。疼痛。

阿膠

黃芩各三

甘草兩半

生地黃汁絞取

車前葉汁絞取

藕節各取汁

生蜜一鍾

將前藥搗篩。同後四味攪勻。每一大匙。水一盞。煎至七分。溫服。

柏葉湯方 治小便出血不止。

柏葉

甘草

阿膠

黃芩

竹茹

生乾地黄各一

共搗篩。每服四錢匕。水一盞半。同煎至八分去滓。溫服。不計時候。

地黃湯方 治小便出血。

生乾地黄

兔絲子酒浸一宿

苙

冬葵子炒

當歸

芎藭

敗醬

赤茯苓

蔓荊實

蒲黃一兩

共為末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十九丸。煎粟米飲下。日三服。

車前子散方

治小便赤色。或小便鮮血。

車前子

木通

澤瀉

當歸

桑螵蛸

桂心

滑石各等分

共為散。每服二錢匕。煎冬葵根湯下。

治小腸尿血方

指 甲半錢 頭 髮一分

二味燒灰研勻。空心溫酒調一錢匕。頓服。

大便秘澀

論曰。大便秘澀。其證皆榮衛不調。陰陽之氣相持也。若風氣壅滯。腸胃乾澀。是謂風秘。胃蘊客熱。口糜體黃。是謂熱秘。下焦虛冷。窘迫後重。是謂冷秘。或因病後重亡津液。或老弱血氣不足。是謂虛秘。或腎虛小便過多。大腸枯竭。渴而多秘者。亡津液也。胃實燥結。時時作寒熱者。中有宿食也。治法須宜和順陰陽。然後疎風散滯。去熱除冷。導引補之法。不可偏廢。當審其證以治之。

麻仁丸方 治大便秘澀。

大麻仁別研膏

大黃炒各三兩

厚朴生薑汁炙二兩

枳殼去瓤炙二兩

共搗三味爲末。與麻仁同研。鍊蜜和杵令勻。丸如梧桐子大。每服二十九。空心溫水下。以利爲度。

麻仁丸方方 治三焦不和。臟腑虛結。胸膈痞悶。大便秘澀。

大麻仁四兩

大黃半生半

白檳榔

山茱萸

兔絲子酒浸一宿

車前子

桂心

羌活

山藥

枳殼

防風各半

木香一兩

郁李仁去皮四兩

共研爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。溫水下。

威靈仙丸方 治大腸冷秘。

威靈仙不拘多少

搗爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。生薑米飲下。

附子散方 治大便冷秘。

附子炮製去皮臍

削去外面。留中心如棗大。碾爲細散。蜜水調下一錢匕。

葱膠湯方 治年老虛弱。大便祕滯。

阿膠十片 葱一握

用水二盞。同煎膠烱取一盞。溫服之。立效。

大黃丸方 治脾胃不和。內有蟲滯。大便秘難。

大黃

赤芍藥三兩

厚

朴薑汁炙

枳

殼兩半

大麻仁別研如膏五合

共搗四味爲末。與麻仁同研勻。鍊蜜和杵丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。

食前溫水下。以通利爲度。

滑石散方 治大便不通。腹脹氣急妨悶。

滑石

細研二兩

手足指甲剪爲灰。人自身者燒

取滑石末一貼。以水一盞半。煎至八分去滓。調爪甲灰一貼。空心服。至辰再服。

葵酥湯方 治大腸閉澀。大便不通。

冬葵子二合

牛酥

二兩如無

將葵子搗篩分四貼。每貼以水一盞。煎至五分去滓。下酥半兩。再煎二沸。食前

冷服。

摩臍方 治大便不通腹脹。

杏仁

湯浸去皮尖

鹽一分

葱

白三莖去鬚

三味同研如膏。每取如酸棗大。計心摩臍上三百轉。須臾卽利。如利不止。以冷水洗手卽定。

治病後津液燥少大便不通腸結方

糲米二合炒灰 猪膽取一枚

沙糖少許

和研如膏。內少許入下部立通。

治卒大便不通或熱結或風秘及婦人產後大便不通等方

皂莢切去皮炙令

白梅肉五枚 蜜少許

將梅肉并蜜拌和皂莢如棗大。以綿紙裹引內下部中。須臾卽通。

郁李仁粥方 治大便不通。

郁李仁一兩去皮細

煮薄粥一碗。臨熟時下郁李仁。煮三兩沸。傾出。空心吃。便通。再服一分。以通利

爲度。

治下部窒塞大便不通方

烏梅五枚

內湯中漬輒。取肉熟搗之。丸如彈子。內下部中即利。

吐結陰門便血 詳痔 腸風 下血

論曰。經謂結陰者。便血一升。再結二升。三結三升。夫邪在五臟。則陰脈不和。陰脈不和。則血留之。結陰之病。以陰氣內結。不得外行。血無所稟。滲入腸間。故便血也。地黃煎丸方。治結陰便血。

生地黃汁

小 薊汁各一升

沙 糖一兩 同上 熬成膏

地榆根

阿 膠炙令

側 柏各二兩

除以上三味外。搗為末。入膏中和丸。如小彈子大。每服一丸。水一盞。煎至六分。和滓溫服。

神僊必效丸方 治便血無度。

阿 膠二兩

當 歸焙

烏賊魚骨去甲

白芍藥

劉寄奴各一兩

共為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。空心米飲下三十丸。加至五十丸。

龍骨餅子方 治臟毒血不止。

龍骨

烏賊魚骨去甲等分

為末。每服一錢匕。入鷄清一枚。用白麵同和。捏作餅子三枚。塘火內煨熟細嚼。溫米飲送下。空心食前服。

石榴散方 治結陰瀉血不止。

醋石榴皮

陳橘皮湯浸去白

甘草

乾薑炮

四味等分。焙乾擣羅為散。每服二錢匕。陳米飲調下。日三服。

地榆散方 治結陰瀉血。

地榆

桑耳

甘草

赤芍藥各三兩

艾葉二兩

黃耆六兩

熟地黄

伏龍肝各四兩

為細散。每服二錢匕。米飲調下。食後臨臥服。

金屑丸方 治便血一切血妄行。

葉子雌黃

不拘多少入在囊內綿繫定。煎湯用黑鉛一兩半。錄成汁。傾入湯內。同煮。自早至晚。不住添沸。湯取出。研細。以盞盛飯上蒸過。

以煮藥棗取肉和丸。如梧桐子大。每服三丸。煎黑鉛湯下。便血甚者。三服差矣。

金虎丸方 治結陰失血。

黃柏一兩去粗皮用
子清鹽炙

爲末。滴水丸。菘豆大。溫水下七丸。

諸淋門

諸淋統論

論曰。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。位處下焦。與腎表裏。分別清濁。主出而不納。若臟腑氣虛。寒熱不調。使氣不化。而水道不宣。故爲淋闕之病矣。諸淋之證。大體緣腎臟氣虛。膀胱有熱。唯冷淋爲異。善治此者。當熟察之。

卒淋

論曰。卒淋者。緣下焦有熱。傳入膀胱。其候卒然小腹急痛。小便淋澀痛。故謂之卒淋。蓋下焦在臍上。當膀胱上口。主分別清濁。主出而不納。以傳導也。今熱在下焦。故其病如此。

瞿麥湯方 治卒淋通利小腸。

瞿麥 半兩

木通

赤茯苓

陳橘皮 去白 一兩

滑石 碎 半兩

冬葵子 炒 一

甘草 炙

桑根白皮 兩 各半

共八味 搗篩 每服三錢 入葱白二寸 同煎 溫服。

茅根飲方 治卒淋結澀不通利。

茅根

木通 各三

石葦 刷去毛

黃芩

冬葵子

當歸

芍藥

滑石 碎 兩 各

亂髮 搗 燒 灰 大二

共九味 搗篩 每服三錢 水煎 溫服 不拘時。

黃耆飲方 治膀胱虛熱 小便卒暴淋澀。

黃耆

人參

白茯苓

旱蓮草

滑石 一兩 各

桑白皮

黃芩

枳殼 炒

芒硝

共九味 搗篩 每服三錢 水煎 溫服。

黑金散方 治卒淋不通。

好細墨燒一兩

一味為散。每服一錢。溫酒調下。不拘時候。

茯苓湯方 治小便卒淋澀。

赤茯苓三兩

滑石四兩

石葦去毛

瞿麥穗

蒲黃各二兩

榆白皮二兩

冬葵子二合

共七味。搗篩。每服五錢。水煎溫服。食前。

冷淋

論曰。腎與膀胱為表裏。下通於胞。宣行水道。腎藏虛弱。冷氣客於下焦。邪正交爭。滿於胞內。水道不宣。故其狀先寒顫。然後便溺成淋。謂之冷淋也。

菝葜飲方 治冷淋寒顫澀痛。

菝葜

土瓜根

黃耆

地骨皮

五味子各二兩

人參

牡蠣服各二兩

石膏四兩

共八味。搗篩。每服五錢。水煎溫服。
黃耆丸方 治腎虛。膀胱冷淋不利。

黃耆 剉

黃連

土瓜根 各二兩

玄參 三兩

菝葜

鹿茸 炙去毛 二兩

牡蠣 一兩

桑螵蛸

人參

五味子 各一兩半

右十一味。搗羅爲末。鍊蜜丸如梧桐子大。每服二十九丸。鹽湯下。不拘時。

兔絲子 別研 酒浸

白石脂

牡蠣 煨研 各二兩

桂心

土瓜根 各一兩

右五味。研爲散。每服二錢。煑麥粥飲調下。空心食前服。

兔絲子散方 治冷淋。小便多。或不禁。

兔絲子 別研 酒浸

黃連

黃連 一兩

硝石 半兩

肉苁蓉 酒浸 一兩

雞臙脰 黃皮 各半兩

五味子 半兩

共七味。搗羅爲散。每空腹溫酒調下三錢服。日二。

熱淋

論曰。三焦者。水穀之道路也。三焦壅盛。移熱於膀胱。流傳胞內。熱氣併結。故水道不通。利而成淋也。其狀澀便赤澀。或如血汁。故謂之熱淋。

滑石散方 治熱淋。小便赤澀疼痛。

滑石 研三兩

括蔞根 三兩

石 葦 半兩 去毛

三味。搗羅爲散。每服一錢。煎小麥湯調下。不拘時。

車前子散方 治熱淋結澀不通。

車前子 炒

牛 膝 各一兩

桑根 白皮 三兩

蒲 黃 一兩

共四味。搗羅爲散。每服二錢。煎葱湯調下。不拘時。

四汁飲方 治熱淋。小便赤澀疼痛。

蒲 萄 汁 自然

蜜

生 藕 汁 自然

生 地 黃 各五合 自然汁

四味和勻。每服七分一盞。銀石器內慢火煎沸。溫服。不拘時候。

瞿麥湯方 治心經壅熱。小便淋澀赤痛。

瞿麥穗三分 茅根 冬瓜子各半 葵子
 木通一分 黃芩六錢 竹葉一把 滑石研一分爲末
 共八味。除滑石外。搗篩。分作三劑。每貼用水三盞。煎去滓。入滑石末一貼攪勻。
 分溫二服。食前。

氣淋

論曰。腎虛則不能制小便。膀胱挾熱。則水道澀。腎虛膀胱熱。則胞內氣脹。小腹堅滿。因至淋澀之疾也。其候出少喜數。尿有餘瀝。亦曰氣癰。診其脈少陰脈數者。則爲氣淋。

木通湯方 治氣淋結澀不通。

木通一分 木香半兩 細辛一分 草豆蔻三枚
 人參半兩 赤茯苓三分 桃仁去皮尖雙 肉豆蔻二枚

共八味。搗篩。每服三錢。水煎溫服。不拘時。

桑白皮湯方 治氣淋結澀。澀便不利。

桑白皮半兩

茅根半兩

木通

乾百合各二

四味搗篩。每服三錢。水煎溫服。不拘時候。

海金沙散方。治氣疑結澀不快。

海金沙別研

滑石研

甘草

山梔子仁各一

四味將甘草梔子仁為散。入餘藥再研勻。每服一錢。茶清調下。不拘時。

通神散方。治氣淋結澀不通。

粟米一合

故筆頭燒灰

馬蘭花燒灰

三味為散。溫酒調下二錢。如不可忍者。連服三服。

貝齒湯方。治因氣成淋。小便痛。或澀血。或如豆汁。

貝齒研一

冬葵花研半

石膏半兩

滑石一兩

右四味。㕮咀如麻豆大。每服五錢。水煎。再入猪肪脂少許。再同煎數沸。空腹溫服。

血淋

論曰。心主血。氣通小腸與膀胱。俱行水道。下焦受熱。則氣不宣通。故溲便癢閉而
成淋也。熱甚則搏於血脈。血得熱則流行入於胞中。與溲便俱下。故爲血淋也。
白茅根湯方 治血淋。小便出血疼痛。

白茅根

芍藥

木通

車前子各三兩

滑石

黃芩各半兩

亂髮燒灰半兩

冬葵子微炒半兩

共八味。搗篩。每服三錢。水煎溫服。日三。

雞蘇湯方 治血淋。

雞蘇半兩

石膏碎

淡竹葉切

木通

甘草生

滑石

小薊根各一兩

生地黄半斤

共八味。搗篩。每服六錢。水煎空心服。

雞蘇飲方 治血淋不絕。

雞蘇苗

竹葉各二兩

滑石

木通各五兩

小薊根一兩

生地黄六兩

共六味。咬咀如麻豆大。每服五錢。水煎溫服。不拘時。以利爲度。

治血淋方

車前子葉三合 生地黄汁三合

二味相和煎三沸食。

膏淋

論曰。膀胱為滲泄之腑。腎氣均平。則溲便清。腎既虛不能制其肥液。故與俱出。色若脂膏。故謂之膏淋。又曰肉淋。

磁石丸方 治膏淋。小便肥如膏。

磁石火煨醋碎 肉蓯蓉切曬

澤瀉

滑石各一

共四味為末。鍊蜜丸如梧桐子大。每服三十九丸。溫酒下。不拘時候。

沉香丸方 治膏淋。

沉香 肉蓯蓉酒浸 黃耆

瞿麥穗

滑石火煨醋碎 磁石各一兩

右六味。搗羅為散末。鍊蜜丸如梧桐子大。每服三十九丸。溫酒下。不拘時。

滑石湯方 治膏淋。小便肥濁。

滑石

白茯苓

白朮

木通

熟乾地黄

赤芍藥

五味子各一

共七味。搗篩。每服三錢。水煎溫服。不拘時。

石淋

論曰。淋者淋病。而有沙石從小便道出也。蓋由腎氣虛損。則飲液停聚。不得宣通。膀胱客熱。則水道澀痛。胞內壅積。故令結成沙石。隨小便而下。其大者留礙水道之間。痛引小腹。令人悶絕也。

人參散方 治沙石淋。

人參

木通

青鹽研

海金沙別研各

莎草根炒去毛

右五味。除海金沙。青鹽外。搗羅爲散。合研勻。每服二錢。空心米飲下。

海金沙散方 治沙石淋澀。疼痛不可忍。

海金沙

滑石

石膏

木通

井泉石碎

甘草炙

右六味等分。搗研爲散。煎燈心湯調下二錢。不拘時候。

菝葜散方 治沙石淋重者。取出根本。

菝葜 二兩

一味爲散。每服一錢。米飲調下。服畢用地椒煎湯浴。連腰浸洗。

獨聖散方 治沙石淋

黃蜀葵花炒一

一味研爲散。每服一錢。食前米飲調下。

木通湯方 治沙石淋

木通

滑石各一

冬葵子二兩

三味搗篩。每服五錢。水煎溫服。

鼈甲散方 治沙石淋

鼈甲去裙襴燒灰存性

一味。搗羅爲散。每服三錢。空心溫酒調下。

茅根湯方 治沙石淋。

茅根細切一斤

葛花爲末一兩

露蜂房爲末二兩

三味分作三服。每服以水三盞煎溫服。

勞淋

論曰。人因勞傷腎經。腎虛膀胱有熱。氣不傳化。小便淋瀝。水道澀痛。勞倦卽發。故謂之勞淋。小腹引痛者。是其候也。

地黃湯方 治勞淋結澀不通。

熟地黃

人參

石葦各一

滑石三分

桂心

車前子

甘遂炒

王不留行

冬葵子炒

木通各半

共十味。搗篩。每服三錢。水煎溫服。不拘時候。

兔絲子丸方 治腎勞虛損。洩便不利。淋瀝不已。

兔絲子

酒浸別搗

人參

黃耆

滑石

木通

芍藥

車前子

黃芩

冬葵子

炒一合

右九味爲細末。鍊蜜丸如梧桐子大。每服二十九丸。食前溫酒或鹽湯下。日二。

石葦散方 治勞淋日夜數起小便不利引陰中痛

石葦

滑石

瞿麥穗

王不留行

冬葵子

各等分

右五味爲細散。每服二錢。食前葱白湯調下。

九蟲門

九蟲統論

論曰。蟲與人俱生。而藏於幽隱。其爲害也。蓋本於正氣虧弱。既食生冷。復感風邪。所以種種變化。以至蕃滋。初若不足畏。而其甚可以殺人。善攝生者。薄滋味。節嗜欲。蚤去三尸。防患於未然。彼九蟲亦將銷鑠於冥冥之中。惟未進此道。而攘孽則

蠱無使滋蔓。蓋有藥存焉。

九蟲

論曰。九蟲一名伏蟲。長四分。二名虻蟲。長一尺。三名白蟲。長一寸。四名肉蟲。狀如爛杏。五名肺蟲。狀如蠶。六名胃蟲。狀如蝦蟆。七名弱蟲。狀如瓜瓣。八名赤蟲。狀如生肉。九名蟯蟲。狀如菜子。至微細者。是九蟲皆依乎腸胃之間。若腑臟氣實。則不能爲害。及其虛也。發動變化。侵食氣血。寢成諸病。不可不察也。

雞子丸方 治九蟲。

雞子去殼 二枚

好漆總過 四兩

蠟 三兩

粳米粉 半斤

四味。先取漆蠟入銅鑊中。用慢火煎。攪令得所。次入粳米粉。又攪令勻。煎令凝。候可丸。卽取鑊中。置生黃土堆上。繞候稍溫。卽下雞子。又攪令得所。再置火上煎。令可丸。如小豆大。宿勿食。空腹煎粟米飲下二十丸。小兒五丸。

石榴枝湯方 治九蟲動作。腹中刺痛。口吐清水。面色黑黃。及蟲心痛者。

東引石榴枝 三兩 木香

陳橘皮湯浸 去白

吳茱萸湯洗焙 各一兩 半

大黃煨

芍藥各二

薏苡仁半兩

共七味。㕮咀如麻豆大。每五錢水煎溫服。空心。

南粉散方 治腹中諸蟲。令人腹痛。多食泥土及泄者。

南粉二錢
細研

五更初用生油調下。至食時蟲出盡。

蛭蟲

論曰。蛭卽九蟲。敍所謂長蟲者。今此析而治之。蓋較之他蟲。害人之爲多。觀其發作。冷氣臍腹撮痛。變爲嘔逆。以至心中痛甚。如錐刺。昔人謂蛭厥。貫心能殺人。則所以治之不可緩也。

茺胡湯方 治蟲心痛。

茺胡半兩

當歸

食茺黃各一兩

芍

藥半兩

檳榔三枚

郁李仁洗去皮三分

厚朴燻薑汁炙一兩

右七味。搗篩。每服三錢。水煎。食前溫服。日三。

桑根白皮湯方 治虻蟲心痛。

桑根白皮三兩 醋石榴皮一乾者

白蕪荑炒

檳榔炮

厚朴塗薑汁炙

右五味搗篩每服三錢。入生薑一塊。同煎空心服。至晚再服。

草薺散方 治虻蟲發作。

草薺炒

白蕪荑炒

狗脊去毛切

三味為散。每服二錢。溫酒調下。欲服藥先隔宿吃牛肉乾脯一片。次日空心服

藥。蟲下即差。

薏苡根湯方 治虻蟲。

薏苡根去土搗

一味搗篩。水煎分溫二服。空心先吃錫少許。然後溫服。

檳榔散方 治虻蟲。

檳榔炮剉

酸石榴根皮去土細剉一斤者

二味。先將檳榔搗篩。與石榴根各均分作三度用。每度用水二升半。煎至一升。

絞去滓。入粟米一合。煮如粥。平旦空心頓喫。利下蟲卽效。

蠶蛹汁方 治虬蟲。

蠶 蛹

取繅絲蠶蛹四合爛研。生布絞取汁。空心頓飲之。非繅絲時。卽須依時收取蠶蛹暴乾。擣羅爲末。用時以意斟酌。多少和粥飲服之。

寸白蟲

論曰。寸白蟲乃九蟲之一種。狀如絹邊葫蘆子。因臟氣虛。風寒溼冷。伏於腸胃。又好食生膾乾肉等。所以變化滋多。難於蠲治。說者謂食牛肉飲白酒所致。特一端爾。亦未必皆緣此。

香附丸方 治葫蘆蟲。

木 香爲末

附 子生去皮 硫 黃半兩

三味。先將蜜陀僧末半兩。入醋熬成膏。然後入三味藥末。一處和丸如小豆大。每服十五丸。溫酒下。食前服。

檳榔散方 治寸白蟲。

石榴根

陳橘皮去白

桑根白皮各一

三味細剉。分作三服。每服水一盞半。煎取一盞。去滓。五更初調檳榔末二錢。至欲明不瀉。至晚又一服。如蟲母未下。再服。或瀉不止。喫冷粥止之。

食榧實散方 治寸白蟲。

生榧實四十九枚去皮

右一味。於每清旦空腹食七枚。七日後食盡。其蟲卽化成水矣。

乾脯湯方 治寸白蟲。

乾脯

手一片如

石榴根東引者一握

右二味。並細剉。以水四升。浸一宿。明日平旦煎至一升。去滓分三服。空腹先嚼乾脯一片。卽服藥。如人行十里。又一服。每服藥後。以手按患人腹上。藥力易行。其蟲自下。凡服藥取月一日至五日。已前。蟲頭向上服良。

黑鉛散方 治寸白蟲累取不盡。久令人面黃。心中如飢。

黑鉛沙

子畫家銀塗是也

一味研極細。每服二大錢。五更初肉汁調頓服。至平明取下蟲立差。
玉粉散方 治寸白蟲。

定粉一兩

右一味研極細。每服二錢。用生麻油調。於五更初頓服。至晚蟲下。

蟯虬蟲

論曰。蟯蟲甚微細。若不足慮者。然其生化衆多。攻心刺痛。時吐清水。在胃中侵蝕不已。日加羸瘦。甚則成痔瘻。疥癬。癰疽。諸癩害人。若此絕其本根。勿使能殖。則毒而治之。所不可忽。

桃皮湯方 治蟯蟲虬蟲。及痔蠶蝕下部生瘡。

桃木皮

乾者去粗皮

槐

子微炒各一兩半

艾

葉半兩

三味搗篩。每服三錢。入棗一枚同煎。空心食前。夜臥各一服。

艾汁方 治蟯蟲攻心如刺吐清水。

生艾葉

取嫩心切二升

服。一味。搗絞取汁兩盞許。宿不食。平旦先嚼乾脯少許。後頓飲汁不能盡。卽兩日

槐皮丸方 治蟪蟲在胃。人漸加羸弱。

槐皮乾者

桃

仁去皮尖雙

棟

實去核生用各半兩

一味。搗羅爲末。鍊豬膏丸。如人指大。以綿裹導下部中。

治蟪蟲咬人下部癢方

水銀一兩

一味。用蒸棗膏和丸。如人指大。綿裹臨臥內下部中一宿。內藥時常留綿帶子在外。

熬漆丸方 治蟪蟲在胃。令人漸羸。

好漆

醇酒

白

蜜各半斤

一味。於銅器中和勻。微火熬令可丸。丸如雞頭大。每服一丸。宿勿食。空腹溫酒下。蟲未下再服。

五臟蟲

論曰。五臟蟲者。緣臟真衰弱。熱熏蒸而成之。傳所謂肉腐出蟲。魚枯生蠹。理固如此。其名狀之異。見於九蟲。可辨而察也。

雷丸丸方 治心臟勞熱傷心。有長蟲名曰蠱。長一尺。貫心為病。

雷丸灰火過

陳橘皮湯浸去白

桃仁去雙仁皮尖殼炒各一兩一分

貫衆大者去鬚半兩

狼牙連苗淨搗一兩半

白蕪荑

青箱子炒

乾漆炒令烟出各一兩

亂髮如鷄子大

共九味。除亂髮燒灰外。入味搗羅為末。然後與亂髮灰同研令勻。鍊蜜和。更於鐵臼內塗酥杵令勻熟。丸如梧桐子大。每服空心溫酒下十五丸。至晚再服。米飲亦得。

麥門冬丸方 治肺勞熱生蟲。其形如蠶。令人欬氣喘。或謂憂膈、氣膈、恚膈、寒膈、

熱膈。皆從勞氣所生。名曰膏肓病。鍼灸不至。

麥門冬去心

蜀椒去目及閉口者炒出汗一兩

人參一分

遠志去心

附子去皮

細辛各半兩

甘草炙半兩

乾薑炮一

桂心

百部焙

白朮

黃

書兩一分。杏仁乾炒令黃半兩。

法皮尖雙仁焙。

右十三味。搗羅為末。鍊蜜和更於鐵臼內塗酥杵令勻熟。丸如酸棗子大。含化

稍稍嚥津。

桑根白皮酒方 治肺勞熱生蟲。在肺為病。

桑根白皮

東引者一升。

狼

牙。其去土三兩。

吳茱萸根皮

東引者解刷。去土五升。

右三味細剉。用酒七升。煮至二升。去滓。分作三服。每日空腹一服。

茱萸根丸方 治肝勞生蟲。長蟲為病。恐畏不安。眼中赤。

東引行吳茱萸根三兩

蠟三兩

雞

子五枚。去殼取黃用。

粳米一盞

右四味。除蠟并鷄子外。各搗羅為末。先以銅鍋內煎蠟鎔。即下茱萸末。米粉。鷄

子黃煎。令煎可丸。即丸如小豆大。早晨煎粟米飲下五十九丸。小兒服二十九丸。蟲

出即差。

前胡湯方 治脾勞有白蟲長一寸。在脾為病。令人好嘔。胸中欬欬。即嘔而不出。

前胡

白朮

赤茯苓

枳

殼法炒

旋復花去葉炒

細辛

常山

松

蘿各一兩半

杏仁雙仁炒

龍膽去苗各一兩

右十味。擣篩。每服五錢。竹葉十片。淨洗細切。同煎去滓。空心溫服。吐之即差。若

腹中熱滿。入芒硝半錢。梔子仁一兩。黃芩一兩半。苦參一兩。

茱萸根浸酒方。治脾勞勞熱。有白蟲在脾中為病。令人好嘔。

吳茱萸根東引者一尺 麻子淨搗入升 陳橘皮去白炒

右三味。先擣碎橘皮。麻子如泥。然後拌茱萸根。用酒一斗。浸一宿。慢火上微煎。

絞去滓。分作五服。每服空心溫服。蟲即下。欲合藥時。忌言合殺蟲藥。

貫衆散方。治腎勞熱。四肢腫急。有蟻蟲如菜中蟲。生於腎中。

貫衆大者三枚去鬚 乾漆炒令烟出二兩 吳茱萸乾水洗七遍焙

白蕪荑炒 槐白皮乾者一兩 杏仁去皮尖雙仁

胡粉色一兩

右七味。除別研粉外。擣羅為散。更與胡粉同研令細。每服二錢。空腹用井華水

調服。日晚再服。

二一虫蠅

論曰。三蟲亦九蟲之數。曰虵。曰赤。曰蟻是也。其發動諸病。較之他種爲甚。虵蟲又曰長蟲。長一尺。動則吐清水。心痛貫心則死。赤蟲狀長似生肉。動則腸鳴。蟻蟲至細微。形如菜蟲。居腸間。多則爲痔。極則爲癩。或生諸癰疽癬癩疔疥。而其變甚多。三蟲爲患如此。古人必折而治之。意亦深矣。

蠶甲丸方

治三蟲發痛。面目黃。不下食。

蠶

甲去黃二兩醋白

朮半一兩

陳橘皮去白一兩

木香

狗脊

去毛各一兩半

檳榔

榔四兩

吳茱萸

水浸二宿每日三次換去涎乾炒一兩

右七味。搗羅爲細末。鍊蜜和爲劑。置白內入酥。杵令勻熟。丸如梧桐子大。每日空腹煎青橘皮湯下三十丸。晚食前再服。

天門冬煎方。治三蟲保定肺氣。去寒熱。養肌膚。益氣力。利水便。及諸暴中偏風溼痺。強骨髓。

天門冬祛心生白蜜七兩

二味。先取天冬細切。爛搗如泥。用酒一斗。和絞取汁。并蜜攪令勻。銅器中重湯上煎。仍用竹篦攪。候如錫。每服如彈丸大。空腹溫湯服之。或用生地黃汁一盞同煎更妙。

亂髮灰散方 治三蟲。

亂髮淨洗如雞子大燒灰

丹砂研如麵飛過一兩

二味同研極細。每服一錢。醋調空腹服之。

蘆蘆散方 治三蟲神效。

蘆蘆微炙二兩

一味搗羅為細散。每服二錢。隔宿勿食。於清旦用羊肉濃汁調服之。蟲自下。

檳榔湯方 治三蟲。

檳榔三枚灰火煨過

一味搗篩。用水三盞。煎至一盞半。去滓。分三服。空腹。日午。近夜各一服。其蟲盡下。或葱白鹽豉同煮飲之亦佳。

諸尸門

諸尸統論

論曰。人身中有三尸諸蟲。與人俱生。常忌血而惡能。善與鬼神通。每接引外邪。與人爲害。謂之尸病。其狀沈沈默默。不的知所苦。而無處不惡。或心腹痛脹。或礪塊踊起。或攣引腰脊。或精神錯雜。變狀不一。有飛尸者。有伏尸者。復有遁尸。沈尸。風尸之異。久不已。停注留滯。及死。又注易傍人。則爲尸注之病矣。

諸尸

諸尸病因不一。其最重者。惟五尸。若得之疾速如飛走狀者。名飛尸。停遁不消者。爲遁尸。沉痼在人臟腑者。爲沉尸。衝風則發者。爲風尸。隱伏積年不除者。爲伏尸。唯此五尸之氣。變態多端。各各不同。大率皆令人沉沉默默。痛無常處。五尸之外。復有尸氣。雖各有證。然其爲病。大同小異而已。亦可通一法治之。

雄黃丸方 治五尸痕積。及中惡心痛。蠱注鬼氣。

雄黃

丹砂

礬石

牡丹皮

巴豆

去炒破去油

附子

藜蘆

炙去蘆頭各一兩

共七味爲末。鍊蜜丸如小豆大。每服二丸。米飲下。食前服。

雄黃丸方

治卒中飛尸。遁尸。沉尸。風尸。腹痛脹急。不得氣息。上衝心胸。及攻

兩脅。或礪塊踊起。或攣引脊腰。

雄黃研

大蒜各一

二味爛搗丸如彈子大。每服一丸。熱酒化下。須臾未差。更服。尸疹者。常宜預收

此藥。

惡氣散方 治五尸鬼注百毒。

桂心

乾薑

二味擣羅爲散。每服三錢。炒鹽一錢。溫水同調下。

蒺藜子丸方

治中五尸。腹急痛。不喘息。上衝心胸。及攻兩脅。或礪塊踊起。攣縮

引腰脊。

蒺藜子炒去角

一味爲末。鍊蜜丸如小豆大。每服十二丸。食後水下。

遁尸

論曰。遁尸謂尸伏埋染注連滯。在於胸腹盲膜之間。尋常如無病。若因喜怒不節。飲食傷動。其隱之疾。發則心腹脹痛。連及肘脅。氣喘促急。不得安臥者。是其證也。木香湯方。治初得遁尸。鬼注。心腹中刺痛不可忍。

木香三分

鬼箭羽一兩

桔梗一兩

丁香三分

陳橘皮去白炒一兩

紫蘇莖葉微炒一兩

當歸一兩

白檳榔火煨十枚

桃仁湯浸去皮尖雙仁炒黃色十四枚

右九味搗篩。每服五錢。水煎溫服。日二服。不計時候。

蒸熨方。治遁尸。飛尸。及風毒腫。流入頭面四肢。

芥子蒸熟焙一斤

一味爲末。以鉛丹二兩拌之。分作兩處。用陳布袋盛之。更換蒸熟。以熨痛處。

飛尸

論曰。飛尸者。其狀令人心腹刺痛。氣息喘急。脹滿。上衝心胸是也。此病忽然而至。疾如飛走。故謂之飛尸。

走馬散方。治飛尸入腹。脹滿刺痛。氣息喘急。

巴

豆二枚去心

杏

仁二枚去尖

二味以綿纏。椎令極細。投熱湯二合。指取白汁。分三服飲之。食頃當下。老小量加之。

雄黃散方。治一切飛尸。鬼注。身痛如刺。

雄黃

甘草炙

黃芩各半

梔子

芍藥各一兩

共五味爲散。每服以溫酒調下二錢。再服不拘時。

尸注

論曰。尸注者。尸病注易於人也。多因哭泣。感染尸氣。流注身體。令人寒熱淋瀝。沉沉默默。不知所苦。而無處不惡。或腹痛脹滿。喘急不得息。上衝心胸。傍攻兩脅。

或礪塊踊起。或攣引腰脊。或舉身沉重。精神不爽。每更節令。愈加煩滯。不治者死。死則注易傍人。故名尸注。

虎掌丸方 治尸注寒熱往來。不思飲食。心腹刺痛。

虎 掌

丹

砂 炒各

白 茯苓

龍

齒各一

蓬 莪 茂 煨 剉

當

歸 各 三

右六味為末。用酒煮阿魏麵糊丸。如桐梧子大。每服二十九。薑為梅湯下。

神效蜜陀僧散方 治臨尸哭泣。尸氣入腹。沉滯臍臑。有時發動。取勞積。

蜜 陀 僧 研半斤 煨 醋 取 六 兩

京 三 稜 煨 搗 末

訶 藜 勒 用 一 兩 不 去 核 生

三味合研令勻。每服二錢。用煮麵濃湯下。當晚不食。臥一服。餘時切餅湯服三夜。次夜當下惡物。不下第三夜加生牽牛子末一錢。同調下。

杏仁丸方 治尸注。

杏 仁 雙 仁 炒

亂 髮 灰 各 一

二味研勻和丸。如小豆大。每服五丸。豬膏酒調下。

諸注門

諸注統論

論曰。諸注者。邪氣所注也。皆因精神衰弱。經絡空虛。傷於風寒暑溼。飲食勞倦。或感生死之氣。或挾鬼物之精。初爲中惡。客忤卒死。諸尸之類。雖或暫差。必有邪氣伏於經脈。流傳腑臟。深入骨髓。經久不已。皆成注病。變狀多端。時發時差。令人昏悶。無不病處。若因風寒暑溼之邪所注者。則爲風寒注。涼注。冷注。溫注之病。若因飲食勞倦之邪所注者。則爲食注。飲注。酒注。水注之病。若因生死之氣而爲其邪所注者。則爲喪注。哭注。轉注之病。若因挾鬼物之精而爲邪所注者。則爲鬼注。邪注。尸注。殃注之病。犯土禁爲注者。爲土注。產後得注者。爲產注。虛勞所成注。爲勞注。邪氣外浸爲泄注。凡此諸注。以受病之因爲名也。邪注於肺。則爲氣注。邪注於榮。則爲血注。久注不已。傷損骨髓。則爲骨注。凡此諸注。以病之所在爲名也。又有石注者。言其牢強如石。走注者。言其遊走無常。凡此諸注。以病之形變爲名也。名類雖多。各有形證。合而言之。皆注病也。治注病者。欲辨是非。但覆紙於痛處。燒髮令焦。投於紙上。若變粘紙者。注氣引之也。不粘者非注也。審知其因。隨證治之。無

專門者。診脈浮大者可治。細而數者難治。

諸注

論曰。諸注者。邪氣停而為病也。蓋由經絡空虛。傷於風寒暑溼。或因飲食勞倦。或因大病後。氣虛邪氣流注。或感死氣。或犯鬼邪。皆至是疾。其狀變易不同。各隨其本而治之也。

赤芍藥丸方 治五尸注。

赤芍藥 一兩

吳茱萸 湯浸焙

丹砂 研

烏頭 去皮

蜀椒 去目并閉口者

乾薑 三分

桂心 一兩

共七味。搗羅為末。鍊蜜丸如小豆大。每服十九。空心溫酒下。日三。

風注

論曰。風注者。由體虛風邪之氣。客於榮衛。邪氣行遊。連滯停注。故名風注。其狀皮肉掣振。痛無常處。一年之後。則有黃髮墮落。頸項掣痛。骨拉解鳴。目疼。鼻酸。牙蛀。

之證。又十二風所注不同。溫風所注。頭痛欲解髮。汗風所注。頭痛體熱。骨節兩強。柔風所注。遊腫在腹。或在手脚。水風所注。噉食服臥汗出。九風所注。腦轉肉裂。目系痛。惡聞人聲。絕風所注。暴倒仆。口有白沫。顛風所注。披髮狂走。遇物擊破。狂風所注。叫呼罵詈。獨語談笑。奇風所注。口噤面喎。四肢不隨。糾風所注。體生瘡。眉毛墮落。耗風所注。癩痺如虻螫瘡。或癢或痛。單風所注。舉身戰動。或鼻塞。其狀雖異。其為邪氣停注則一也。

安息香丸方 治一切風注痛。

安息香研 乳香研各一兩 白膠香研 地龍去土各半研為

胡桃仁研二枚 沒藥研一分 桃仁去皮尖雙枚

共七味。同研勻為細末。酒煎為丸。如彈子大。每服一丸。溫酒化下。

羌活湯方 治風注心腹刺痛。上攻胸背。

羌活三分 大豆合炒一分 桑根白皮半兩 陳橘皮三分

芎藭一兩 大腹井子焙三分

右六味搗篩。每服三錢。水煎溫服。良久再服。

走注

論曰。走注者。風邪客於衛氣也。風善行而數變。衛氣之行。慄疾滑利。邪正相搏。則淫溢皮膚。去來擊痛。遊走無常。故名走也。

蒸熨方 治走注風毒疼痛。流移不定。

芥

子一斤蒸熟
暴乾為末

鉛丹二兩

二味和勻。以疎布袋盛分二處。更互蒸熨痛處。

枳殼丸方 治走注疼痛。如錐刺皮膚。風氣心腹。四肢疼痛。

枳

殼去瓢
殼炒

厚朴薑汁炙

犀角半兩

桑根白皮一兩

檳榔二兩

蒟蒻胡半兩

半夏湯浸洗
作餅暴乾

大黃醋拌炒
各一兩

共八味為末。鍊蜜丸如小豆大。空心酒下二十九。

鬼注

論曰。鬼注者。忽因鬼邪之氣排擊。當時即病。心腹刺痛。悶絕倒仆。如中惡狀。餘熱不歇。停積彌久。有時發動。連滯不已。乃至於死。死則注易傍人。故謂之鬼注。

玉壺丸方 治鬼注風冷。飲食不消。心腹脹滿。攻刺心痛。大便不通。治萬病詳千要

雄黃研

丹砂研

礬石煨

附子去皮

藜蘆

巴豆去油各一兩

右六味為末。鍊蜜和丸如小豆大。每服二丸。米飲下。取快利為度。小兒以意減之。

八毒丸方 治鬼注中惡。心痛積癰。蠱注鬼氣。

雄黃研

珍珠研

礬石

牡丹皮

巴豆去油各一兩

附子去皮臍

藜蘆二兩

蜈蚣去頭足

共八味。研為末。鍊蜜丸如小豆大。每服米飲下二丸。得吐為效。

太極鰻鱺魚煎方 治鬼注傳尸。五勞七傷。

鰻鱺魚淨三斤

附子皮一兩去

柴胡三分

芎藭

貝母去心

鼈甲去裙鬚

當歸切焙

知母

荊芥穗各一兩

蕪荑仁一分

木香三分

秦艽

青蒿子小便侵

黃耆

木通各一

共十五味。除鰻魚外。搗羅為末。分作三貼。每貼以鰻魚一觔。清酒三斤。於銀器內。煮爛。去滓。入藥末一貼。重煎如稀餳。以淨器盛。空心溫酒下一錢服了。夜用被蓋出汗。加至一匙。

氣注

論曰。氣注者。邪氣傳注。蘊伏於肺也。肺主氣而通行表裏。若為注氣所傳。則其病隨氣遊。衝擊掣痛。上喘奔急。飲食不下。是為氣注之候。

厚朴丸方。治一切氣注大腸。結澀背膊刺痛。氣注四肢。及食物不消。奔豚氣逆。

厚朴薑汁炮

桂心

大黃醋炒各

桃仁浸去皮尖雙

四味。為末。研勻。鍊蜜為丸。如小豆大。每服三十丸。米飲下。食後臨臥服。微利即

效。一方加附子一兩。去皮臍。

桃仁飲方 治注氣肩膊刺痛不移。

桃仁去皮尖

酸棗仁炒

人參

赤茯苓

桂心

丁香

甘草

共七味。等分搗篩。每服五錢。水煎臨臥頓服。

木香散方 治卒注氣。

木香

當歸

白朮

桂心

白茯苓略一

共五味。搗羅爲散。每服二錢。沸湯點服。不拘時。日二。

卒魘不寤

論曰。其寤者魂交。其覺也形開。老弱數驚恐。心氣妄亂。精神惕鬱。志有搖動。則有鬼邪之氣。乘虛而來。入於寢寤。使人魂魄飛蕩。去離形體。故魘不得寤也。久不寤以致死。必須得人助喚。并以方術治之。乃蘇。若在燈光前。魘者是魂魄本由明出。

喚之無忌。若夜暗處。驚者。忌火照。火照則神魂不復入。乃至於死。又人驚。須遠呼。不得近而急喚。恐神魂或致飛蕩也。

小定心湯方。治形體虛羸。心氣怯弱。多驚善亡。

茯神一兩

甘草炙

芍藥

乾薑

遠志

人參

桂心略二

又方

右七味。剉如麻豆大。每服五錢。棗二枚。同煎溫服。日三。

右方以蘆管吹兩耳。并其人頭髮二七莖作繩。內鼻孔中。割雄鷄冠取血。以管吹喉咽中大良。

治卒驚方

右方以鹽灌之。多少在意。

又方

右方以雄黃如棗核繫在腋下。令人終身不驚。

治卒驚不寤方

右方用伏龍肝末。或末雄黃。或末桂心。以蘆管吹入兩鼻孔中。

治卒魘死方

右方以井底泥塗死人目。令人重頭就井呼姓名。卽活。此法靈異莫測。

又方

右方勿以火照。但痛齒其足後跟。及足大指爪甲卽活。齧其踵不覺者。宜用礬石散。方見卒死門。

中惡

論曰。志弱心虛。精神失守。忤犯邪惡。令人心腹暴痛。悶亂如死。無所覺知。故曰中惡。又曰卒忤。蓋陰陽否隔。氣道厥逆。上下不通。陽氣散亂。故令人不知也。氣還則生。不還則死。久不已。則變注。

麝香散方 治卒中惡。心腹刺痛。去惡氣。

麝 香一分

犀角屑

木

香 各半

三味。研爲末散。攪勻。每服二錢。空心熟水調下。日再未止更服。

又方

韭根一握

烏梅十四

吳茱萸湯浸二兩焙

三味以漆水五升煮。以病人櫛內其中。三沸櫛浮者生。沉者死。煮取三升時飲之。

治中惡氣欲絕不省方

右方以皂角生爲細末。內鼻孔中。一方用細辛等分。取屑如胡豆大。吹兩鼻。

治中惡氣欲絕方

右方取新牛糞絞汁。若無新者。卽以乾者汁服。

卒死

論曰。卒死者。緣人有三虛。一謂乘年之衰。二謂逢月之空。三謂失時之和。賊風鬼邪之氣。乘虛而入。故令陰氣偏竭於內。陽氣阻隔於外。二氣壅閉。不得升降。厥氣上行而暴絕也。氣還則復生。不還則死。內經曰。出入廢則神機化滅。升降息則氣立孤危。蓋謂是也。

扁鵲治卒死方

溼牛馬糞絞取汁。灌入口中。令入喉。若口噤者。斡開灌之。不可灌者。扣折一齒下之。若無新馬糞。以水或人屎和乾者。絞取用之。

又方

半夏末如大豆許吹鼻中。

治卒死而壯熱者方

白礬半斤

煑令消。漬脚令沒踝。

治卒死而目閉者方

騎牛臨其面。搗薤汁灌耳中。又未皂筴吹鼻。

尸厥

論曰。內經謂邪客於手足少陰太陰足陽明之絡。五絡俱竭。令人身脈皆動。而形無知。其狀若尸。故曰尸厥。蓋五絡皆會於耳中。苟爲邪所客。則其氣逆厥。上下暴

隔。五絡閉結而不通。故俱竭而令人狀若尸仆焉。治法。宜當先刺其足中指爪甲上各一瘡。後刺大指內側端如韭葉。後刺手心至少陰銳骨之端各一瘡。立已。不已。以竹管吹兩耳。使氣脈疎通。內助五絡。然後以藥石治之。

治尸厥脈動而無氣。氣閉不通。故忽然如死方。右方以菖蒲末吹入兩鼻中。又以桂末著舌下。

治尸厥方

鬢左角髮方寸燒灰。以醇酒一杯飲之。不能飲者。灌之立已。

鬼魅

論曰。心者精之合。神之舍也。心氣不足。精神衰弱。邪氣乘虛而感。則爲鬼魅。其狀令善怒不常。情思如醉。或狂言驚怖。向壁悲啼。夢寐多魘。與鬼交通。病苦乍寒乍熱。腹滿短氣。不能食。診其脈人迎氣口。乍大乍小。乃鬼魅所恃之候也。

治妖魅病人不言鬼方

鹿角銹屑

一味。搗羅爲細散。每服一錢。且言則差。

治鬼迷不寤方

雄黃研如粉

一味。吹入病人兩鼻中差。

辟諸邪祟附著及小兒驚哭恐悸方

安息香

一味。取一皂子大。焚令烟起。邪自去。

鬼擊

論曰。精足則神王。精耗則神衰。精神耗衰。血氣虛弱。則邪氣易襲。故爾邂逅。鬼邪相遇。則爲鬼擊之病。其得之無漸。卒著人。如矛戟所傷。令人胸脇腹滿。急痛不可按抑。或卽吐血。或下血。輕者獲免。重者或至不救。治宜符禁之法。兼辟邪安正之劑。

升麻散方

升麻 獨活

桂 心各半

三味爲散。每服一錢。溫酒調下。

治鬼排擊方

熟艾三枚子大

一味。以水五盞煎取二盞去滓。頓服之。

又方

以濃酒吹灌鼻中。

又方

以鹽一兩。水三盞。和攪飲之。并以冷水灑之。須更得吐卽差。

治卒中鬼擊方

雞冠血

一味。瀝口中。令下咽。仍破雞以搗心下。冷卽棄於道傍。得烏雞尤佳。

聖濟總錄纂要 卷十五 諸注門 氣擊

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷十六

臟腑虛實門

肝脹

論曰。肝脹之狀。千金謂脅下滿而痛引少腹。蓋厥陰之經起于大指。抵少腹。挾胃貫膈。布脇肋。脈經曰。肝病者。必兩脇下痛引少腹是也。夫肝受邪。則令氣血不通。故脇下脹滿。引少腹而痛也。

桂苓湯

肝受邪氣。兩脇下痛。牽引少腹。胸脇脹滿。

桂心

赤茯苓

柏仁

防風

細辛

犀角三分

鼈甲二兩

白朮

枳殼

獨活

桔梗五錢

甘草一分

棗水煎三錢。空心溫服。以知為度。

三補散 治肝受邪氣。客於肝經。攻脹兩脇滿悶。引少腹痛。四肢厥逆拘急。

赤茯苓七兩

桂心

蜀漆

石菖蒲二兩

柴胡

紫石英

山茱萸

丹砂一兩

赤芍三分

共末。酒下二錢。

山茱萸湯 治肝受邪氣。兩脇脹滿。筋脈拘急。痛引少腹。

山黃

川芎

山藥

木瓜

川歸

五味

黃耆

白朮

生地一分

獨活

棗仁二錢

大棗水煎五錢。空心溫服。

肝氣逆面青多怒

論曰。肝在色爲青。在志爲怒。故其氣逆則面青多怒。蓋本臟氣逆於內。干之則多怒而面青也。

防風湯 治肝氣壅逆。肢體沉重。面色青。時欲嗔怒。甚則恍惚狂言。心神不守。

防風

半夏

秦艽

麻黃

獨活 二兩

川歸

遠志

人參

白芍

防己

甘草

片苓

升麻 一兩

石膏 五錢

薑棗水煎五錢。去渣。入麝末少許熱服。

秦艽散 治肝氣逆。面青多怒。身難屈伸。頭目眩暈。

秦艽

人參

附子

白朮

川椒

桔梗

乾薑

天冬

川歸 一兩

山萸

防風

白芷

前胡

麻黃 去根

五味

甘草 五錢

烏頭

細辛 三分

共末。酒下一錢。日二。

膽腑門

膽虛

論曰。足少陽膽經不足者。膽虛也。虛則生寒。寒則其病恐畏。不能獨臥。口苦善太息。嘔膽汁。心下淡淡。如人將捕之狀。噎中介介。數唾頭眩痿躄。足指不能搖。坐不能起。僵仆。目視眊則膽氣虛。虛則精神不守。其氣上溢。循其所在而生病也。中正湯。治膽氣虛寒不足。常多恐懼。頭眩痿厥。心下淡淡。四肢不利。僵仆目黃。

茯神

羌活

黃耆

懷熟地

酸棗仁一兩

柏子仁炒研

防風

甘菊三分

人參

白芍藥

川歸酒洗

炙甘草五錢

水煎三錢。空心溫服。以差爲度。

人參湯。治膽氣虛寒不足。精神不守。眼目昏眩。奔氣在胸。眠臥多恐不安。

人參

桂心一兩

白茯苓

棗仁

知母 石膏 甘草
薑水煎五錢。空心溫服。日二。

膽實

論曰。膽實則爲有餘。有餘則生熱。故其症苦腹中氣滿。飲食不下。咽乾心脇痛。不能轉側。足外反熱。是爲陽厥。及頭疼目銳。背痛。缺盆中腫痛。脇下腫。馬刀俠癭。皆謂膽氣實。足少陽壅滯故也。

半夏東流水湯 治膽臟氣實生熱。腹中氣滿。飲食不下。口燥咽乾。頭重惡寒。脇脹肋痛。

半夏薑汁炙

棗仁

生地二兩

片苓

赤茯苓

遠志一兩

用東流水二鍾。煎五錢。入秫米。生薑溫服。

瀉熱湯 治膽實熱。精神不安。

龍骨

棗仁

片苓

竹茹

升麻

茯神

伏龍肝

甘草

水煎三錢溫服。日二。

膽虛不得眠

論曰。膽虛不得眠者。膽爲中正之官。足少陽其經也。其經不足。復受風邪則膽寒。故虛煩而眠臥不安也。

千里流水湯 治膽寒虛煩不得眠。

半夏

麥冬三兩

白茯苓四兩

人參

片苓

遠志

草薢

桂心

甘草

酸棗仁二

集驗外臺有
生薑無遠志

以千里水五大鍾。入秫米半合。煎候沸。揚千遍。澄清鍾半。入藥五錢。薑半分。再沸空心溫服。

五味子湯 治膽氣虛冷頭痛。心中驚悸。眠臥不安。常如人將捕之狀。精神不守。

五味子

白茯苓

人參

遠志

川芎

熟地

棗仁微妙

麥冬一分

桑寄生五錢

大棗水煎三錢服。

棗仁丸 治膽氣虛熱不眠。

棗仁

地榆一兩

丹砂

人參

白茯苓

石菖蒲五錢

共末。蜜丸小豆大。空心米飲下二三十丸。

山藥丸 治膽氣虛冷。精神不守。眠臥不寧。頭痛目眩。常懷恐畏。不能獨處。

懷山藥

酸棗仁

茯苓

柏子仁

山茱萸三分

共末。蜜丸小豆大。空心酒下三十丸。米飲亦可。

人參散 治膽虛眠臥不安。多驚悸。

人參

白茯苓一兩

丹砂飛過

茯苓神五錢

共末。米飲下一錢。或用蜜丸梧子大。飲下亦可。

乳香散

治膽風不得眠。精神恍惚。

乳

香油研

馬頭腦骨

燒灰研一兩

酸棗仁二錢

共末。空心酒下二錢。以差為度。

膽熱多睡

論曰。膽熱多睡者。蓋膽腑清淨。決斷乃所自出。今肝膽但實。榮衛壅塞。則清淨者濁而擾矣。故精神不守而多睡也。神既昏憤。是以常寢臥。半夏湯。治膽熱精神不守。昏困多睡。

半

夏薑汁炒

懷生地五兩

赤茯苓

遠志二兩

棗仁生用

黃芩一兩

長流水三鍾。煎秫米半合。取汁入藥。五錢溫服。

黃連湯

治膽熱口苦。神昏多睡。

川連

片苓

赤茯苓

麥冬

升麻一分

水煎三錢。溫服。

棗仁湯

治膽風毒氣。虛實不和。昏困多眠。

棗

仁生用研

蠟

茶薑汁塗
飲魚二兩

水煎二錢。溫服。

膽瘧

論曰。經謂有病口苦。名曰膽瘧。夫膽為中正之官。清淨之腑。十一臟之所取決。咽為之使。若數謀慮不決。則膽虛氣上溢而口為之苦。膽主藏不瀉。今數謀不斷。則清淨者濁而擾矣。故氣上溢而其症為口苦也。經所謂是動則病口苦。以氣為是動也。

麥冬湯

治膽氣虛逆。口中常苦。煩躁引飲。

麥

冬

片 芩

大 黃炒

地骨皮

炙甘草

羚羊角鎊

升 麻

茯 神一兩

水煎三錢。入竹茹半分。溫服。

黃連丸 治膽氣熱口苦。

胡黃連一兩 青羊角

蛇 黃粉炙研如錢 熊膽

青黛真者研一分

共末。用黃牛膽汁和丸。或羯羊膽亦可。丸如菘豆大。食後淡竹葉煎湯。放溫下七丸至十九丸。

心臟門

心中寒

論曰。心中寒者。心痛徹背。背痛徹心。如蠱注之狀。蓋心為陽藏。中寒則寒必甚。其心背徹痛。則寒邪乃藏深矣。

赤石脂丸 治心中寒。心痛徹背。背痛徹心。

赤石脂兩半 人參 細辛一兩 桂心

烏頭三分 黑乾薑二兩 川椒炒五錢

共末。入蜜丸梧子大。飲下十九丸。日二。未效漸加丸數。

吳茱萸丸 治心中寒。心背微痛。

吳茱萸湯洗醋炒一升

桂心

川歸二兩

共末入蜜杵丸。梧子大。酒下三四十丸。臨臥再下。

心健忘

論曰。健忘之病。本於心虛。若血氣衰少。精神昏憤。故心志動亂而多忘。蓋心者君主之官。神明出焉。苟為怵惕思慮所傷。或憂愁過損。驚懼失志。皆致是疾。故曰。憂愁思慮則傷心。心傷則善忘。

安神定志人參湯 治心善忘。小便赤澀。多夢亡人。或夢水澤中。驚恐惕惕。目視眊眊。不欲聞人聲音。食不知味。

人參

甘草二兩

半夏

龍骨三兩

麥冬

石膏

懷熟地四兩

遠志用甘草水浸過四兩

水煎五錢。入大棗、小麥去渣。入阿膠末一錢。錫糖少許。再沸溫服。日二。

延齡煑散 治心臟氣虛健忘。服之安神養氣。聰明不忘。

茯神

人參

益智仁

懷熟地

藿香葉

桑寄生

沉香

防風

炙甘草一兩

共末。空心米飲下二錢。日二。

白石英湯 治心氣虛健忘。精神不足。失志善忘。陰痿懶語多驚。稍思慮。即小便

白濁。

白石英

人參

川芎

白朮

藿香葉

紫石英

石斛

石菖蒲

續斷一兩

炙甘草

細辛五錢

水煎三錢服。

檀香丸 治心虛常忪悸。恐懼多忘。

白檀香

桂心

白茯苓

甘草三兩

石菖蒲

蘇合油酒化

天竺黃

犀角

懷生地一兩

人參

麥門冬

遠志兩半

共末。用蘇合油入蜜。杵丸。芡實大。食後含化。一丸飲下。

烏犀角丸。治心虛憂愁過度。驚悸善忘。精神恍惚。言語無度。心中煩悶。服之安

魂定魄。

烏犀角

麥冬

遠志

羚羊角

郁李仁

鐵粉飛過

丹砂飛一

人參

茯苓

龍齒五錢

冰片一錢

共末。入蜜杵丸。芡實大。金箔為衣。酒嚼一丸。飲下。小兒半丸。

善笑

論曰。內經謂神有餘則笑不休。蓋心藏神。在聲音為笑。在志為喜。今心氣實則神

有餘。神有餘則陽氣發越。此所以有善笑之症。

草龍膽丸。治心經實熱。驚悸喜笑。

草龍膽

白薇

茯苓

山梔仁

大黃二兩

麥門冬三兩

羚羊角

玄參二兩

人參

炙甘草 兩半

共末入蜜杵丸。梧子大。空心大棗湯下二三十丸。日二。

丹砂丸

治心氣有餘。精神恍惚。自語自笑。舉止不常。

丹砂

飛過

乳

香油去

酸棗仁生用

共末。酒糊丸。如梧桐子大。水下十丸。

龍齒丸

治心神狂越。多喜善笑如邪祟。

龍齒

遠志

人參

生地

山藥

防風

地骨皮

五味

白茯苓

麥冬

天冬

車前子炒一兩

共末入蜜杵丸。梧子大。用竹葉湯下二三十丸。日二。

丹砂酒

治心神不定。登高臨險。言語不避親疎。時時自笑。高聲叫呼。舉止無常。

大便秘。小便赤。解衣露體。不能安處。

丹砂

飛過

麝

香研二

同研勻。入白酒二升。重湯慢煨。隨患人平日酒量令醉。候患人睡着。急厚衣被。

蓋之。令汗出病愈。若病人不能多飲藥。只用其半。時時飲之良。

小腸腑門

小腸虛

論曰。小腸者。受盛之官。心之腑也。乃手太陽之經。其氣虛則爲不足。故左手寸口人迎以前脈陽虛者。小腸虛也。虛則生寒。是故有顛際頭角偏痛。耳聾不聰。驚跳。小便頻數之症。治宜補之。

牡蠣丸

治小腸虛寒。小便數。小便下久。面有膜。如乳膏狀。

牡

蠣童便

石斛

川芎

益智仁

草薢

石硫黃另研

龍骨

五味子

牛膝

狗脊

山萸肉

巴戟天

續斷一兩

共末入蜜杵丸。梧子大。鹽湯下四十丸。便止卽已。

益智仁丸 治小腸虛寒。小便後有餘瀝。陰痿。

益智仁

川芎

木瓜

巴戟天

川草薺

川續斷

牛膝

狗脊五錢

附子一枚

共末。蜜丸。梧子大。鹽湯下四十丸。日二。

斷弓弦散

治小腸氣虛寒撮痛。并女人血刺心痛。

五靈脂

蒲黃新者

先用好米醋一合。入藥二錢。熬成膏。以水一鍾。煎七分。熟呷。又名失笑散。

藿香子丸

治小腸虛冷。少腹氣痛。

藿香子

桂心一兩

木香

附子

萆澄茄

赤石脂三分

川歸酒洗

川椒炒五

共末。入蜜丸。梧子大。酒下二十丸。

小腸實

論曰。小腸者。受盛之官。心之腑也。手太陽之經。其脈盛則為有餘。故左手寸口人

迎以前脈陽實者。小腸實也。夫實則生熱。是故有身熱來去。口瘡心煩。身重汗不出。并小便不利之症。治宜瀉之。

麥冬湯 治小腸實熱。脈氣盛實。小便赤澀下血。

麥冬

知母

片芩

木通

升麻

蒲黃一分

大黃炒三

水煎三錢溫服。日二。以差爲度。

瞿麥穗湯 治小腸實熱。小便黃赤。結澀不通。

瞿麥穗

猪苓

川連

防己

烏犀角

車前子炒一

炙甘草五錢

木通一兩

水煎三錢溫服。日二。

脾臟門

脾痺

論曰。有病口甘者。此五氣之溢也。名曰脾痺。夫食入於陰。長氣於陽。肥甘太過。令

內熱而中滿。則陽氣盛矣。故單陽名爲瘰。其症口甘。久而弗治。轉爲消渴。以熱氣上溢故也。

蘭草湯 治脾瘰口甘中滿。

蘭草 兩

水三鍾。煎令減半。分三服。早中晚用。以差爲度。

麥冬湯 治脾瘰發口甘煩渴。

麥門冬

石膏 三兩

白芍藥

片 芩 兩半

烏犀角 一兩

梔子 五枚

水煎五錢去滓。入朴硝五分。再二三沸溫服。日二。

石膏湯 治心脾實熱。口甘煩渴。引飲無度。

石膏 四兩

人參

知母

白芍

紫苑

茯苓

赤石脂

白朮

山梔 兩半

竹瀝

生地汁

水煎五錢去渣。入竹瀝少許。生地汁一合。再二三沸溫服。若宣利。加芒硝一兩。

去白芍藥。

麥冬生地汁煎。治脾瘰內熱。口甘煩渴引飲。

生麥冬汁

懷生地汁

生白蜜半斤

栝樓根二兩

犀角生者

淡竹葉

知母鹽酒炒

地骨皮

萎蕤

綿黃耆

升麻一兩

炙甘草五錢

凝水石煨研

石膏研二

除二汁蜜。用井水七升。煮十一味。取三升。濾去渣。入汁蜜。同慢煎如稀飴。入瓷瓶內。重湯頓稠成煎。收貯。每用一二匙。含化溫湯送下。日二夜一。

穀勞

論曰。胃受水穀。其氣虛弱。不能傳化。則令人怠惰嗜臥。肢體煩重。腹滿善饑。而不能食。食已則發。穀氣不行使然也。故謂之穀勞。

沉香湯

治穀勞體重。食已便臥。使氣消食化。

白朮土炒

紫朴薑炒

人參

白茯苓

半 夏薑汁

木香

草豆蔻

甘草三分

陳皮三分去白炒

黑乾薑一分

生薑大棗水煎三錢。溫服。日二。

木香湯 治穀勞身重少力多困。

木香

陳皮

人參

甘草

陳麩三分

紫朴

蓬莪茂

大麥蘖炒一

棗肉五十枚

水煎三錢。溫服。日二。

白豆蔻丸 治穀勞身重。食已困倦少力。食已即眠。

白豆蔻兩半

枳殼去白炒

桂心

陳皮去白

訶黎勒取皮

川歸酒浸

共末。蒸大棗肉和末杵丸。梧子大。用淡薑湯空心下二三十九丸。臨臥再服。酒下亦可。

胃腑門

食飢

論曰。內經云。大腸移熱於胃。善食而瘦。謂之食飢。胃移熱於膽。亦曰食飢。夫胃為水穀之海。所以化氣味而為榮衛者也。胃氣和則食有節。氣血盛而膚革充盈。若乃胃受邪熱。消燂穀氣。不能變精血。故善食而瘦也。病名食飢。言雖能食亦若饑也。胃移熱於膽。飢曰食飢。以膽為陽木。熱氣乘之。則燂土而消穀也。

參苓丸 治胃中結。消穀善饑。不生肌肉。

- 人參
- 赤茯苓
- 菖蒲
- 遠志

牛膝 地骨皮二兩

共末。蜜丸。梧子大。飲下二十九丸。日二。

甘露飲 治胃熱。善食不生肌。

- 生地
- 熟地
- 天冬
- 麥冬

- 片芩
- 石斛
- 枇杷葉
- 甘草

- 枳殼
- 茵陳蒿一兩

水煎三錢服。

胃反

論曰。脾與胃合。主腐熟水穀。今脾胃氣虛。水穀不化。與停飲相擊。胃中虛脹。其氣逆上。食久反出。故名胃反。其候朝食暮吐。暮食朝吐。寒熱時作。心下痞結。狀如覆杯。

人參湯 治胃反食下便吐。

人

參

澤

瀉

甘

草

大

黃炒

桂

心二兩

赤

茯苓四兩

竹

茹三兩

陳

皮

乾

薑一兩

水煎五錢服。日二。

鉛丹丸 治胃反嘔吐噦逆。

黑

鉛三兩化汁入紙灰以柳木椎研成粉羅過二兩

米醋二升熬成膏入蒸餅少許熟丸。如赤小豆大。薑湯下十九。飲亦可。

木香湯 胃反不納飲食。開胃和氣。

木香一分

糯米一撮

胡椒二十粒

同炒米熟研末。分五服。水煎服。

田季散 久患翻胃及小兒驚吐諸疾。

硫黃五錢

水銀一錢五分
同色

生薑取汁

酒一鍾

和藥三錢。空心服之。以衣被蓋覆。自足指汗出。迤邐徧身汗微。卽差。嘗有人病反胃經三年不差。消瘦殆盡。用藥一服。汗出如膠。腥穢不可近。當日更不復吐。遂差。又小兒諸吐量大小。與藥一字至三四字。冷水下吐立定。此散極難調。須先滴少水。以指緩緩研殺。稍增湯調和。若傾入湯酒盡。浮泛不可服。又烏頭煑散。吳茱萸散。皆治反胃。惟田季散有陰陽理。勝於二方。今載於後。但性差熱。更量臟腑寒溫用之。

吳茱萸散 胃氣虛冷。不能飲食。食卽吐酸水。

吳茱萸湯洗七次

乾薑炮製二兩

共末。空心熱酒下三錢。

吳茱萸丸。治年深膈氣翻胃。早食曉吐。生存不化。膈上常有痰涎。時時嘔血。胸多酸水。吐清水無時。夜吐至曉。日漸消瘦羸弱。腹中痛楚。痰逆時復冷滑。又即秘結等疾。

吳茱萸湯洗炒

半夏一兩生薑四兩取汁

當歸酒洗

人參

胡椒

白礬燒枯

甘草五錢半生用半紙裹六七重醋浸濃乾又浸又煨七次

共末。膏丸。梧子大。桑柳枝煎湯下七丸。日三服。忌食諸毒發物。惟可食油煎猪

胰脾軟飯。

茯苓飲。治胃反吐逆。發渴飲水。

赤茯苓二兩

白朮

甘草

桂心五錢

澤瀉

乾薑炒一

水煎五錢。空心服。日二。

通膈湯。治胃反不下食。

棍

布鹹水磨乾者洗去

白朮 一兩

大黃 炒五

檳榔

丁香

訶黎勒

木香

半夏 三分

薑水煎三錢服。

噦

論曰。人食於口。而聚於胃。脾胃散精氣。以養四旁。臟腑氣和。乃能裨助於中。若脾胃氣虛。不能傳化水穀之精。與新穀相干。脾胃氣逆痞滿。復遇冷折之。故令噦逆也。

人參湯 治噦逆不止。

白朮

人參

白朮

藿香 五錢

甘草 一分

水煎三錢溫服。

水銀膏 治諸般噦逆。

水 銀不結

硫 黃細研

太陰玄精石各一兩

共和勻。研極細。用米醋五升。文武火熬成膏。磁盒收貯。旋丸梧子大。艾湯下七丸。

枇杷葉湯 治噦逆不止。飲食不下。

枇杷葉去毛炙

陳皮去白

甘草炙三兩

薑棗水煎三錢。稍熱服。

三聖散 治噦逆不止。

丁香香九枚

胡椒十四粒

半夏大者七枚

共末。大人薑湯下一字。小兒筋頭蘸薑汁點藥口中立愈。至甚不過二服。

神效方 治胃口冷噦逆不止。

大棗去核一枚 入胡椒七粒。溼紙包煨熟。出火毒。空心細嚼。溫酒送下。以粥投之。取效爲度。

噫醋吞酸

論曰。上焦有留飲。脾胃挾宿寒。致飲食滯於膈腕。不能傳化。令人腹滿氣逆。所以噫醋也。

半夏丸

治上焦冷氣噫醋。吞酸吐沫。嘔逆不思飲食。

半

夏薑汁製

丁

香五錢

乾

薑炒一

共末。薑汁糊丸。梧子大。空心木瓜鹽湯下十五丸。

藿香半夏丸

治胸膈有痰。脾胃積冷。噫醋吞酸。不思食。

藿香一分

半

夏薑汁製

丁

香五錢

共末。糊丸。梧子大。薑湯下十五丸。

丁香煑散

治噫醋吞酸。不欲飲食。

丁香

乾

薑五錢

人

參

白朮

白芷

赤

茯苓

桔

梗炒

半夏

甘草

桂

心一兩

檳

榔

高良薑

肉豆蔻一分

共末。薑棗水煎三錢服。

丁香丸 治食飲不化。噫氣吞酸。

丁香 人參 五味 半夏 五錢

甘草 琥珀 乾薑一分 桂心

枳殼 薤布 訶勒皮三分

共末。蜜丸。梧子大。空心薑橘湯下二十九丸。

胃寒腸熱

論曰。病有腹脹而泄者。為胃寒腸熱。胃受寒則氣收不行。而為脹滿。腸客熱則水穀不聚。而為泄注。病本濁寒之氣在上。清熱之氣在下。故為腹脹而且泄也。訶梨勒湯 治胃寒腸熱。腹脹滿悶。泄瀉不止。

訶勒皮兩半 青皮 大黃妙 陳皮

紫朴薑汁 高良薑炮 枳殼炒五 防風

甘草一分 乾薑一兩

薑棗水煎三錢服。

當歸黃連湯 治胃寒腸熱。腹脹泄利。

當歸

川連二兩

木香

紫朴薑汁

訶藜勒

吳茱萸洗炒

赤茯苓一兩

共末。蜜丸。梧子大。飲下三十九丸。日二。

紫朴丸 治胃寒腸熱。腹脹洩利。

紫朴薑汁炒

附子

龍骨

川連

白石脂

訶藜勒

吳茱萸洗炒

乾薑一兩

共末。醋浸炊餅。丸。梧子大。空心。吳茱萸湯下三十九丸。米飲亦可。

妙應丸 治胃寒腸熱。腹脹泄利。

烏頭炮去皮 梔子

乾薑一分

共末。薑取自然汁。和丸。梧子大。空心。酒下七丸。日二。

胃熱腸寒

論曰。腸胃相通。疾病相連。人因飲食不節。寒溫失宜。致腸胃受邪。有冷有熱。病症

俱見者。則善饑。小腹痛脹。為胃熱腸寒之病。胃熱則消穀。故善饑。腸寒則血凝脈急。故小腹痛。又寒則氣聚。故痛而且脹。地黃湯 治胃熱腸寒。食已小腹痛脹。

熟地

人參

白茯苓

地骨皮

甘草

枇杷葉去毛

麥冬

石斛

黃耆兩二

水煎三錢。空心服。

調中湯 同前。

人參

白茯苓十兩

甘草炙

紫河車兩二

水煎三錢。空心服。

麥冬湯 同前。

麥冬

炙甘草二兩

白朮

羌活

白茯苓

旋復花

人參

升麻

桑白皮

白芍藥

玄參

當歸酒洗

柴胡一兩 胡黃連一分 木香五錢
共搗粗末。薑棗水煎三錢。入甘草一寸。空心服。日二。

熟地兩半

肺臟門

肺消

論曰。內經謂心移寒於肺。故爲肺消。肺消者。飲一溲二。病不治。夫病必有傳。而傳則有順有逆。傳其所生者順。順則易治。傳其所勝者逆。逆則難治。緣心經受邪。傳之於肺。是爲逆症。蓋以寒邪隨心火內燦金精。肺臟旣已銷鑠。氣無所持。故症飲少而溲多也。當其始病之時。治宜去其寒邪。使不乘心火而移害於肺。至於肺已旣消。則又當補其肺氣。平其心火。邪無所容。而病自愈。

黃耆湯 治肺消飲少溲多。

黃耆三兩

人參

五味子

麥冬

貝母去心

桑白皮煎引

枸杞子酒浸

懷熟地兩半

水煎五錢。空心溫服。日二。

兔絲子散 治肺消飲少瘦多。

兔絲子 酒洗淨用白酒浸一宿 黃搗爛焙研乾一兩

蒲黃 紙隔 微炒 五味子 炒

肉蓯蓉 酒洗去甲 焙乾一兩 硝石 五錢

共末酒下三錢日二。

黃耆湯 同前。

黃耆 蜜微炙 土瓜根 二兩

五味子 人參

水煎五錢服日二。

菝葜 石 膏 地骨皮 牡蠣 童便碎

膈消

論曰。心移熱於肺。傳為膈消。夫心肺二臟。皆居膈上。心火既熾。移熾於金。二臟俱熱。熏蒸膈間。而血氣消鑠也。心主血。肺主氣。俱受邪熱。宜不息而消。故久則引飲。為消渴之疾。

麥冬飲 治膈消胸中煩滿。津液燥少。短氣多渴。

麥冬二兩 人參 生地

甘草 葛根 栝蒌

茯苓神一兩 知母 五味

水煎五錢。入淡竹葉十片。溫服。日二。

除熱地黃煎 治膈消煩渴。

生地汁 生括薑汁二升 牛乳三升 白蜜半斤

川連為新

合煎減半。入末收成膏。熱湯化下二大匙。日三。

知母湯 治膈消心煩渴咽燥。

知母 子芩 白茯苓 生薑焙

澤瀉二兩 小麥八合 大棗肉枚十五 甘草二兩

水煎五錢。入淡竹葉十五片。溫服。日二。

肺痿

論曰。內經謂熱在上焦。因欬為肺痿。其病之所得。或因汗出。或因嘔吐。或因消渴。或小便利數。或因便難。數被快藥下利。重亡津液。故得之。診其寸口脈數而虛。其人胸煩多唾。唇燥小便難。或數欬不得效。效則出乾沫。胸中隱隱痛者是也。

地黃湯 治虛寒肺痿喘急。

懷熟地

川芎五兩

人參

桂心三兩

桑白皮炒二

大麻仁研如脂

水煎五錢去滓。入麻仁脂少許。再數沸溫服。日二。

旋復花湯 治肺痿咳嗽。吐稠黏。虛瘦喘急。盜汗。

旋復花

甘草

牡蠣醋碎一兩

生地汁

生薑汁二合

紫苑

桔梗炒

萎蕤五錢

水煎五錢去滓。入二汁。少許沸服。日二。

紫苑湯 治肺痿咳嗽。涕吐稠黏。小便不利。

紫苑

天冬

桔梗五錢

白茯苓

知母一兩

百合二兩

生地汁

水煎五錢去滓。入生地汁半合。沸服。要利加朴硝末少許。此疾利多。為肺與大腸合。故秘澀者少。

鹿髓煎 治傷中氣。脈絕筋急。肺痿咳嗽。

鹿髓半斤 白蜜

真酥二兩

杏仁去皮尖三兩

桃仁去皮尖三兩兩妙

生地汁五合

先將二仁汁地汁煎減半。下鹿髓酥蜜攪勻。慢煎如飴。不拘早晚。頻服一匙。如無鹿髓。以牛髓代之。

肺痿咽燥

論曰。熱在上焦。因咳為肺痿。其脈則寸口數。其症則咳而口中有濁唾涎沫。甚者咽中乾燥。蓋以邪熱熏肺使然。或因快藥下利。重亡津液所致。天冬丸 治肺痿咽乾。煩燥痰壅。咳嗽。小便澀赤。眠臥不安。咳吐涎沫。咽喉腫痛。

天冬 人參二兩 杏仁 甘草一兩
貝母 阿膠 桑白皮 五味子五錢

共末。蜜丸。梧子大。臨臥人參湯下十丸。含化亦可。

生薑甘草湯 治肺痿咳吐涎沫不止。咽燥而渴。

生薑五兩 甘草四兩 人參三兩 大棗十五枚

水煎六錢溫服。日二。

天冬煎 治肺痿咳嗽。吐涎沫。咽燥渴。

生天冬汁 醇白酒 飴糖一斤 紫苑四兩

將酒汁重湯煎沸。下苑末攪勻。入飴糖。可丸。即丸。如杏仁大。津液含化一丸。日

三。

生地煎 治肺痿喘嗽。涕吐稠黏。咽膈不利。

懷生地 杏仁三兩 生薑二兩 與生地

玄參一斤 天冬半斤 麥冬一斤 生者

牛蒡子生用四兩 與玄參二冬 蘇子兩 炒二

同和勻。慢火煎令稠。入煉過蜜五兩。真酥二兩。攪勻。入磁罐內。放飯甑蒸。少時

收貯。頻化一匙。

肺痿小便數

論曰。內經云。臟真高於肺。又曰。真氣奪則虛。今肺中冷。則肺中真氣不足。而其人上虛矣。虛則無以制下。故上為肺痿。下為小便數。以致吐涎沫。而欲咳不能咳者。皆其症也。治宜以溫藥和之。

白茯苓

附子

桂心

白芍

三兩

川椒炒

肉蓯蓉兩半

補骨脂

黃耆

一兩

水煎三錢。空心溫服。日二。

甘草乾薑湯 治肺痿小便數。咳吐涎沫。

炙甘草四兩

黑乾薑二兩

用水煎三錢。空心溫服。日二。以差為度。

五味子湯 治肺痿小便數。

五味子

款冬花

人參

桂心

二兩

麥門冬

桑白皮炙三兩

生薑大棗水煎六錢。空心溫服。日二。

龍骨湯 治肺痿小便數。漸覺氣弱。

白龍骨

肉蓯蓉

黃耆蜜炙一兩

附子

白薇

牡蠣醋炙三分

炙甘草五錢

生薑大棗水煎三錢。溫服。日二。

肺癰

論曰。肺癰之病。脈數而實。蓋以風中於衛。呼氣不入。熱過於榮。吸而不出。風熱凝滯。蓄結為癰。其症惡寒。口乾。胸中隱隱痛。咳而胸滿。時出腥唾者是也。宜速治之。久則吐膿如米粥。始萌可救。膿成難治。

葦葉湯 治肺癰。

葦葉細切

桃仁去皮尖炒

瓜蒌仁

薏苡仁半斤

用水一斗。將葦葉取汁五升。入藥煮二升。去滓。分三服。當吐如膿差。

甜葶藶丸 治肺癰。

甜葶藶 紙炒

杏 仁 去皮尖一貝 母 鈔五

皂 莢 肥大不蛀

先將皂莢椎碎。入無灰酒半升。內熟按濾去滓。慢煎成膏。將三味共末入膏和丸。梧子大。溫水下二十九。如肺氣喘急。濃煎桑白皮湯下。

防己丸 治肺癰咳嗽久不差。

防 己

杏 仁 去皮尖

川貝母

炙甘草二兩

甜葶藶 紙炒

共末。糊丸梧子大。水下三十九。日二。

地黃湯 治肺癰。

生地汁一斤

人 參

附 子

白石英 醋炒

川 歸

甘 草 炙一兩

白 豆 小者二粒

白絲毛雞 一隻。男人用。雞者。食法。

用水一斗五升。先煮雞取汁七升。去雞入地汁再沸。下諸藥。慢火煎三升。濾去滓。每服一鍾。日三夜二。

桔梗湯 治肺癰吐膿。如粳米粥。

桔梗 粳米 炙甘草一兩

水煎六錢。空心溫服。須更吐膿數合再服。

煎苡仁湯 治肺癰咳嗽。

薏苡仁一升 苦酒三升

用酒煮薏仁至一升。溫頓服。吐出膿血驗。

桔梗白朮湯 治肺癰吐膿。經時不差。

桔梗 粳米 白朮 懷生地

炙甘草 敗醬二兩 桑白皮一升 川歸一兩

大豆四升

用水一斗五升。煮豆取汁七升。內清大酒三升。合諸藥煮之。去滓取三升。每服一鍾。日三夜一。

肺癰喘急眩滿

論曰。內經謂肺之癰。喘而兩肘滿。蓋肺主氣而合於息。其脈別支者。從肺系橫出腋下。故邪氣蘊積於肺。則上爲喘急。下連兩肘滿。治宜瀉其肺臟之邪毒。病斯愈矣。

葶藶大棗瀉肺湯 治肺癰喘急。不得安臥。

葶

藶冊者五兩紙炒

大

棗十枚

用水三大鍾。煮棗取汁。入葶末五錢。一二鍾溫服。日止一服。

平肺湯 治肺癰氣急。喘逆咳嗽。肘滿。

黃耆

陳皮

杏仁一兩

沉香五錢

人參

紫苑

紫蘇二兩

水煎五錢溫服。日二。

夜合湯 治肺癰咳嗽。體有微熱。煩滿。胸前皮甲錯者。

夜合白皮一兩炙即合歡皮肺癰之妙藥

水三鍾。半分二服。日服之。以差爲度。

大腸腑門

腸垢

論曰。內經謂大腸有熱便腸垢。巢元方云。腸垢者。腸間津汁垢膩也。蓋傳化之腑。熱氣積而爲痢。痢久不已。腸間虛滑。津垢乃出。是邪熱氣實。真臟氣虛。故有此症。

附子丸

治腸垢因久痢腸滑下垢不止羸困。

附子去炮

桂心

赤石脂

黑乾薑二兩

共末入蜜杵丸梧子大空心米飲下二三十丸臨臥再下。

處瘕

論曰。內經謂小腸移熱於大腸爲處瘕。夫小腸者。乃受盛之官。化物出焉。大腸者。乃傳導之官。變化出焉。二者皆以傳化爲事。今也小腸受熱移於大腸。則陰氣虛而津液耗。不能滑利。故糟粕內結。沉伏而爲瘕聚。腸間菴結。大便祕澀是也。

檳榔丸

治大小腸胃受熱氣不宣通瘕聚沉伏腸間菴結腹脇脹滿大便祕澀。

檳榔

大黃

枳殼炒二

桃

仁去皮炒

大麻仁炒

青皮炒

木香一兩

共末。溫水下一錢。日二。以知爲度。

秦芄湯 治大腸虛癢。秘澀躁悶。

秦芄兩半

防風

枳殼

檳榔

桂心

獨活

牽牛生搗

朴硝研

水煎三錢。去滓。入硝末五分。再沸服。日二。

腎臟門

腎虛

論曰。腎主水。受五臟六腑之精而藏之。若腎氣虛弱。則足少陰之經不利。故其症腰背痠疼。小便滑利。臍腹痛。耳鳴。四肢逆冷。骨枯髓寒。足脛力劣。不能久立。故曰診左手尺中神門以後陰脈虛者。爲少陰經病。令心悶下重。足腫不可按。蓋足少陰腎之經也。

磁石丸 治腎經虛憊。四肢無力。體面少色。惡風寒。手足冷。骨節痛。耳內蟬鳴。

磁石醋研七

附子

桂心

補骨脂

肉蓯蓉一兩

巴戟天去心

續斷

人參

白茯苓

柴胡

黃耆

山藥

紫朴薑汁炒

木香

牛膝酒浸

遠志甘草浸

川椒炒一

羊腎膜一對去筋

榔一枚

桃仁去皮炒

共末入蜜杵丸。梧子大。空心酒下二十九。日二。

鹿茸丸。治男子腎臟虛損。腰脚弱。氣不足。體煩倦。面色黑。小便數。

鹿茸去毛炙

附子

牛膝

人參

木香

巴戟天

天雄

肉蓯蓉酒浸

五味子

川椒

羌活

桑螵蛸

兔絲子

葫蘆巴

紅豆蔻

山藥

沉香

肉豆蔻

楮實子

懷熟地

白蒺藜

桂心

白茯苓

沒藥醋一

共末入蜜杵丸。梧子大。酒下二十九。日二。

羊腎丸 治腎虛攻注四肢。煩熱多汗。肢節痛。耳鳴。

羊腎一筋一膜去 杏仁去皮炒 川椒 川歸

麻黃去根 黃耆一兩

共末用羊腎酒煮爛研。酒煮糊丸。梧子大。酒下二十九。日二。

羊骨補腎丸 治腎虛寒。耳鳴好睡。日漸痿弱。

羊脛骨五兩 白朮 磁石醋碎二七 桂心三兩

黃耆蜜炙 白茯苓乳浸 乾薑一兩

水煎五錢溫服。日二。

葫蘆巴丸 治腎氣虛損。陽氣痿弱。補虛損。興陽氣。

葫蘆巴微炒 附子 肉蓯蓉 巴戟紫者

藜香子炒兩 川牛膝 蛇牀子 桂心

揀去皮 補骨脂一兩 蓬莪茂醋浸三兩

共末入蜜杵丸。梧子大。薑鹽湯下二十九。日二。

桑螺蛸丸 治腎元虛。耳聾脹滿。腰脊強直。小便赤黃。

桑螵蛸炒

山藥

沉香

山萸肉

肉苁蓉

磁石醋碎

五味子

川歸五錢

附子三枚

石菖蒲

續斷三分

藿香子炒一

共末。蜜丸。梧子大。酒下二十九丸。日二。

沉香飲 治腎氣虛。小腹急滿。骨肉乾枯。陰囊濕癢。

沉香

木香

羌活

熟地

黃耆

澤瀉

桑螵蛸五錢

白芍

川歸

天雄

續斷

磁石醋碎七次

草薢

牛膝

大腹皮三分

生薑水煎五錢。溫服。日二。

慶雲散 治陽氣不足。腎元虛。精乏不能施化。

兔絲子五兩

天冬九兩

五味子六兩

覆盆子十兩

紫石英二兩

桑寄生

天雄一兩

白朮

石斛三兩

共末。酒下二錢。氣寒者去桑寄生。用細辛二兩。

啟腎實腎何能實以腎火實也

論曰。足少陰腎經。其氣實爲有餘。有餘則舌燥咽腫。上氣嗌乾。咳喘汗出。腰背強急。體重內熱。小便黃赤。腰脊引痛。足脛腫滿。此由足少陰經氣實。或爲邪濕所加。故有是症。治宜瀉之。

瀉腎大黃湯 治腎元實熱。小腹膜脹。腰重不利。足下熱痛。耳聾腰解。夢伏水中。

大黃鹽水

懷生地

磁石醋碎七次二兩

玄參

片苓

澤瀉

五加皮

羚羊角

石菖蒲

炙甘草

赤茯苓一兩

水煎三錢。入竹葉二十七片。溫服。日二。

羚羊角湯 治腎元實熱。多怒好忘。肢體煩滿。腰腹急重。

羚羊角

升麻

檳榔

白芍

杏仁

甘草

澤瀉

子苓

木通

赤茯苓一兩

水煎三錢。入竹葉十四片溫服。日二。

大澤瀉湯 治腎元實熱。多怒善忘。舌燥咽腫喘急。耳聽不聰。四肢滿急。腰背強直。

澤瀉

茯苓

升麻

杏仁去皮

芒硝研三兩

磁石醋碎七兩

茯苓

大青

竹葉二兩

懷生地五兩

羚羊角一兩

柴胡三兩

水煎五錢。空心溫服。日二。

腎脹

論曰。腎脹之病。腹滿引背。央央然。腰髀痛者是也。蓋腎主腰脚。其經屬足少陰。與足太陽為表裏。故腎經所過。抵少腹。通膀胱。挾脊內。過髀樞。循髀外。是動則病。髀不可以曲。今寒氣積於腎經。不得宣。故氣留滯而為脹。名曰腎脹。溫經湯 治腎虛寒脹。氣不宣利。上攻腹內。及背腰脊髀痛。

附子

杜仲鹽酒炒

牛膝一兩

補骨脂

川續斷

黑乾薑

桂心三分

生薑水煎三錢。入鹽一捻服。日二。

藿香子散 治腎虛脹。氣攻腰腹髀痛。

藿香子

桂心

石斛

懷熟地

桃仁去皮炒

黑乾薑

杜仲酒炒

甘草一兩

共末。空心酒下二錢。日二。

八味丸 治腎氣虛。冷氣攻。腰腹痛。

附子去皮

桂心

澤瀉二兩

懷熟地八兩

山藥

山萸肉四兩

牡丹皮不見

白茯苓三兩

共末。入蜜杵丸。梧子大。空心酒下二三十丸。鹽湯下亦可。久服溫腎經。消脹滿。

解脌

論曰。內經云。冬脈太過。則令人解脌。其症脊脈痛而少氣。不欲言語。夫腎為作強。

之官。精爲養身之本。所以運動形體者也。一或受邪。則腎實而精不運。故有脊脈痛。少氣不欲言之證。其名解脬者。解有解緩之義。脬則疑其寒。亦疑其熱。疑於壯。又疑於弱。有不可必之之詞。診其尺脈緩而濇者。爲解脬也。

利腎湯 治解脬脊脈痛而少氣不欲言。此爲腎氣有餘。

懷生地

赤茯苓

澤瀉兩半

柴胡

枳殼去白

麥門冬

川牛膝

檳榔

子芩一兩

水煎三錢。空心溫服。日二。

通腎湯 治解脬少氣不欲言。脊脈急痛。腰背強直。足下熱疼。小便癱閉。心煩咽乾。

懷生地

羚羊角

赤芍

石菖蒲二兩

猪苓

炙甘草

五加皮

澤瀉一兩

水煎三錢溫服。日二。

瘖餅

論曰。內經謂內奪而厥。則爲瘖俳。此腎虛也。瘖俳之狀。舌瘖不能言語。足廢不能爲運用。蓋腎脈挾舌本。腎氣內奪。氣厥不至舌本。故不能言語而爲瘖。腎脈循陰股。循骸骨內踝。入足下。腎氣不足。故足廢而爲俳。名曰瘖俳。熟地黃湯。治腎氣虛厥。語聲不出。足廢不爲運用。

懷熟地

附子

石斛

五味

巴戟天

肉蓯蓉

山萸肉

桂心

遠志

麥冬冬去心

白茯苓

石菖蒲五錢

生薑、大棗水煎三錢。溫服。日二。

補骨脂丸。治瘖俳。腎氣內奪。舌瘖足廢。

補骨脂

肉蓯蓉一兩

遠志

麥冬

石菖蒲

鍾乳粉五錢

共末。入蜜杵丸。梧子大。用木通湯下三十九丸。日二。

腎虛陽痿

論曰。腎臟虛損。陽氣痿弱者。蓋由嗜慾不節。勞傷腎氣。精血耗竭。臟腑空虛。血氣不能充養故也。治宜補虛損。興陽道。益精氣。

五味子丸 治腎虛損精神。精神衰竭。陽道痿弱。腰脚無力。

五味子

兔絲子

鹿茸去毛

巴戟天

杜仲

肉蓯蓉一兩

共末入蜜杵丸。梧子大。酒下二三十丸。日二。

磁石丸 治腎氣虛損。骨髓枯竭。小便頻數。腰背拘急。耳鳴。面色黑黯。陽道痿弱。

磁石醋碎二兩

附子一兩

人參

白朮

白茯苓

地骨皮

桂心

五味

熟地

黃耆

牡蠣

澤瀉三分

共粗搗。每用羊腎一對。煮汁入藥三錢。薑棗煎服。日二。

助陽丸 治腎虛損。陽氣痿弱無力。志意不快。小便數。

附子

人參

鹿茸去毛

兔絲子

肉蓯蓉

鍾乳粉

黃耆

原蠶蛾一兩

共末。入蜜杵。丸梧子大。酒下二十九丸。日二。

腎虛多唾

論曰。水飲非升降不能傳導。非陽氣不能消鑠。腎虛多唾者。蓋緣腎臟不足。陽氣虛微。而又陰寒凝結。停滯於胸膈之間。不能消鑠。水飲上溢於齒牙。故喜唾也。

地黃湯

治腎虛使人痰唾不休。

懷熟地

鹿茸

巴戟天

丹參

五加皮

枸杞子二兩

車前子

桂心

防風一兩

水煎四錢溫服。日二。

半夏丸 治腎虛寒唾液不休。心胸痞悶。

半夏 夏湯炮七次爲末用薑汁和作餅晒乾炙

人參

附子

前胡一兩

五味子

枳殼

檳榔

赤茯苓

陳皮

桔梗

訶勒皮五錢

共末。酒煮糊丸。梧子大。薑湯下二三十丸。日二。

骨虛實

論曰。腎生骨髓。骨髓者。腎氣之餘。腎氣虛則骨髓痿疼。倦而無力。其氣實則骨熱苦煩。津液內燥。當隨症施治。

補骨脂湯 治骨虛痿疼。多倦不能久立。

補骨脂

人參

附子

五味子

肉苁蓉 一兩

水煎三錢。去滓。入酒二分。溫服。日二。

白芍虎骨散 同前。

白芍藥 一兩

懷熟地 五兩

虎骨 四兩

用白酒一斗。浸三宿。晒乾。又浸。又晒。以酒盡爲度。共末。不拘茶酒下二錢。日二。

四物湯 治骨髓實。苦疼煩熱。

葛根汁

生地汁

麥冬汁

白

蜜 各鍾

共和勻。分三服。每服入水半鍾。同煎溫服。

髓虛實

論曰。骨髓之病。應肝膽。若其腑臟有病。皆從髓生。蓋熱則應臟。寒則應腑。故髓虛者。腦病不安。身常清慄。髓實者。身體煩躁。勇悍驚熱。此髓虛實之候。當隨症施治。補虛羌活丸。治髓虛寒。腦痛不安。身常清慄。

羌活

川歸

人參

川芎二兩

桂心一兩

大棗去核三十枚

羊髓

牛髓

真酥

大麻仁各研

共末。入髓酥和勻。入器內重湯煨稠。丸梧子大。空心酒下三四十丸。日二。溫髓湯。治髓虛骨寒。

附子

人參

桂心

黃耆蜜炙

細辛一兩

水煎三錢溫服。髓實者。於腎實并骨實中求之。

膀胱腑門

胞痺

論曰。內經謂胸痺者。小腹膀胱。按之內痛。若沃以湯。澀於小便。上爲清涕。夫膀胱爲州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。今風寒邪溼氣客於胞中。則氣閉不能化出。故胞滿而水道不通。其症小腹膀胱。按之內痛。若沃以湯。澀於小便。以足太陽經氣闕。故熱而痛也。上爲清涕者。以足太陽經直行者。從顛頂入絡腦。腦氣下灌。出於鼻竅。則爲清涕矣。

溫腎湯 治胞閉小便不利。腰脊疼痛。腹背拘急絞痛。

澤瀉

白朮

赤茯苓

黑乾薑二兩

水煎四錢溫服。日二。

人參湯 治胞痺小便不利。

人參

白芍

川芎

生地

川歸

赤茯苓

遠志

子芩

五味 甘草 麥冬 乾薑一兩
桂心二兩

水煎羊腎取汁。入大棗煎五錢溫服。日二。

腎瀝湯 治胞痺小腹急痛。小便赤澀。

麥門冬

犀角

五加皮

杜

仲鹽酒

桑螵蛸十枚 炙黃

赤芍藥

木通

桔

梗一

水煮羊腎一對。取汁煎五錢去滓。入竹瀝半合。薑汁少許。再沸溫服。日二。

胞轉

論曰。胞受水液。氣未轉行。則小腸滿脹。或飽食用力。或因合陰。陽令胞屈辟。小便不下。遂致胞轉。其候水道不通。小腹急痛煩悶。汗出氣逆陰迫。甚至於死。名曰胞轉。宜速治之。

虎珀湯 治胞轉臍下急滿。或因霍亂而得者。

虎珀研一

阿膠五

車前草三兩

葱

白芷七

用水五鍾煎葱白。車前取汁三鍾下膠末。次下珀末。微煎分三服。

石菖蒲散 治胞轉不得小便。少腹急痛。

石菖蒲

滑石飛過一兩

共末。用雞子白和二錢下頃再下。

秦芫湯 治胞轉不得小便。小腸滿脹。

秦芫

水煎五錢。空心溫服。少頃又服。以差爲度。

琥珀湯 治胞轉小便不通。小腹痛煩悶。

琥珀研細

生大黃

滑石飛過

車前子

車前葉一兩

水煎五錢。入葱白三寸。空心溫服。日二。

車前草飲 治胞轉臍下急滿。小便不利。

車前草去根一握

用水三鍾煎。溫服。日二。以差爲度。



3.081
5
4(1)7

聖濟總錄纂要

八

413.081

148

:00178

中國醫學大成第四集

方劑類

聖濟總錄纂要 八

上海大東書局印行



3 0472 8404 1

254633

聖濟總錄纂要

清

新安

程

林雲來

纂輯

鄭縣

曹炳章

赤電

校點

卷十七

面體門

面黥黮

論曰。黥黮之狀。點如烏麻。班如雀卵。稀則碁布。密則不可容鍼。皆由風邪客於皮膚。痰飲浸漬。其形外著。或飽食安坐。無所作爲。養生方所謂積聚不消之病。使人面目黧肝是也。散之固。有常劑。若乃塗澤蠲除。朝夕從事者。又安可已耶。

治面黥黮方

雞子去黃

硃砂末一兩

二味。先研硃砂爲末。入雞子中封固。口與雞卵同。令雞哺。候雞雛出卽取塗面效。

治面黥黧方

沉香三分

牛黃三分

薰陸香三分

雌黃各半

丁香一分

玉屑三分

鷹屎半兩

水銀一分

共八味。先將三味香擣羅爲末。次將玉屑。雌黃入乳鉢中研令細。方入水銀及諸藥同研令極細。入白蜜調和。令稀稠得所。入瓷盒中盛。每至臨臥時塗面黥黧處。

杏仁膏

治面黥黧。塗之令白潤澤。

杏仁去皮尖雙核

黃一兩

瓜子一兩

白芷一兩

零陵香半兩

白蠟三兩

右六味。除白蠟外。並入乳鉢中。研令細。入油半斤。并藥內鍋中。以文火煎之。候稠凝卽入白蠟。又煎攪勻。內瓷盒中。每日先塗藥。後傅粉。大去黥黧。

羊髓膏方

治面黥黧。塗之令光白潤澤。

殺羊脛骨髓二兩

丹砂半兩 雞子白

三味先將髓并丹砂入乳鉢中。研令極細。以鷄子白調和令勻。入盒中盛。每用時先以漿水洗面後塗之。

益母草塗方 治面黧黯令光白潤澤。

益母草灰一升

一味以醋和為團。以炭火煨七度。後入乳鉢中研細。用蜜和勻。入盒中。每至臨臥時先漿水洗面。後塗之大妙。

面肝皴

論曰。面肝皴者。面生皴皴。細起如粟殼狀。由風熱相搏而生。蓋諸陽在於頭面。風熱乘之。結而不散。故成肝皴。養生方說。醉不可露臥。及飲酒熱未解。冷水洗面。令人面發瘡。輕為皴。正謂此也。

白芷膏方 治面肝皴塗面光白。

白芷

白欽砂三

白朮半兩

白芨

細 辛 三兩

白茯苓 半兩

白附子 半兩

右七味。搗羅爲末。用雞子白和勻。丸如彈子大。瓷盒中盛。每臥臨時先洗面。後取一丸。以漿水研化塗面上。明旦井華水洗之。不過七日大效。

礬石散方 治面皴皴令白塗面。

礬石 燒令汁盡

白石脂 各一分

白 斂 三分

杏 仁 去皮尖 研半兩

四味並爲散。以鷄子白調令勻。入瓷盒中盛。臨臥時先用漿水洗面。後塗藥。明旦以井華水洗之。

淨水膏方 治面皴皴令光白。

水 萍 曝乾 五兩

一味。搗羅爲末。以白蜜調和。稀稠得所。入瓷盒中盛。每臨臥時塗面。

面皴皴

論曰。諸陽皆會於面。風邪熱氣客於膚腠。不能流通。因發爲皴皴。形似米粟。色有赤白。亦有緣醉酒露臥。及飲酒未解。以冷水洗濯而得之。有率由風熱在皮膚間。

外感冷氣。擊搏而應。

杏仁膏方 治面皴皸。

杏仁 研半兩 去皮

硫

黃分一

蜜陀僧 研半

硫 砂 研一

白鵝脂 研成

右五味。除鵝脂外。再同研如粉。入鵝脂油。更研令勻。傾入瓷盒子。坐塘灰火中

養之。攪令稀稠得所成膏。每臥臨時以紙拭皸。令乾塗之。

防風散 治肺臟風毒。及過飲成鼓皸。

防風 一兩

石膏 細研

小荆子 一兩

梔子仁 一兩

薺 芫 一兩

枸杞子 一兩

白蒺藜 一兩

甘草 研半

共八味。擣羅為末。每服二錢。溫水調下。食後服。

面皴

論曰。面皴者。是粉刺也。面上有皴如米粒。此由膚腠受於風邪。搏於津脈之氣。因虛而作。亦去傅胡粉散。入虛肌使之然也。

白斂膏塗方 治面粉皰。

白斂

白石脂

杏

仁去皮尖雙仁

三味。搗羅爲末。更研極細。以鷄子白調和。稀稠時所。瓷盒盛。每臨臥塗面上。明早以井華水洗之。

菟絲汁塗方 治面粉皰。

菟絲苗 一握

一味。搗絞取自然汁。塗面上。不三五次效。

石粟膏塗方 治面粉瘡癩如麻子。

石 灰二兩

粟 米二合

二味。將石灰研細。同粟米內瓶中。以水浸三宿。取出研如膏。暴乾重研如粉。以面脂調勻。入瓷盒中盛。每洗面訖。拭面塗之。

面體疣目

論曰。風邪入於經絡。氣血凝滯。肌肉弗澤。發爲疣目。或在頭面。或在手足。或布於

四體。其狀如豆如結筋。綴連數十。與鼠乳相類。故謂之疣目。
去疣目方

石 灰二兩

又方 一味。以苦酒漬七日。滴汁點疣上即落。

牛口中涎

用以塗疣上自落。

又方

艾

一味。作注於疣目上灸之。三壯即除。

狐瘻

論曰。陰陽之在人。血與氣爾。二者調適。則行流散徙。莫或底滯。達於形色。暢於膚理。無不得其和。苟失其宜。血氣從而凝積。此所以有狐瘻之病。其候不一。有曰狐

癩。有曰體癩。有曰漏腋。狐癩者。指其腋間。體癩者。舉其大概。漏腋則又言其溼而生瘡者。不可不辨也。

治丈夫婦人腋氣不可近者方

右方以開通錢四十九文。用銅筋穿入炭火內燒赤。醋浸四十九次。碾羅爲細末。入麝香一分研和勻。先用熱酒洗腋下。後以藥末搯腋下數次。永除癩氣。

治腋氣人不可近者方

石 灰二兩 桑柴灰一兩 炭 灰一兩 雌 黃一兩

四味同研末。水調塗於腋下。可一食久。卽以柳木篦子刮藥。其腋下毛並落。然後用四灰散。

治腋氣四灰散方

粉 霜 艾葉灰 礬石灰 鉛 灰無卽用胡粉

四味唯艾葉灰稍多。餘並等分。研令極細。先以醋漿水洗拭。乾卽傅之。不過三五上。永除癩氣。如要試。但傅藥蒜上。良久自無癩。兼治脚汗。

治腋下溼汗不止。及足心手掌陰下股裏。常如汗溼癩方。

乾薔薇根

乾枸杞根

甘草半各

商陸

胡粉

滑石各一兩

右六味。先將四味搗羅極細。即入研者二味拌勻。以苦酒許和塗。當微汗出。夜復更塗之。不過三傅愈。

丁沉香方 治七竅瘵氣。

沉香一兩

丁香半兩

甘草半

白瓜子仁一兩

藁本三分

當歸

芎藭

麝香

共八味。研七味為細末。後入麝香拌勻。鍊蜜丸如小豆大。每服溫酒下二十九。日三。含化令徧體俱香。

滅癩痕

論曰。風熱諸毒。留於腑臟。發於肌肉。而為瘡癬。病後瘡愈。餘毒未殄。故瘡痂雖落。而癩痕不滅。治法既有塗澤膏潤之劑。亦須賴榮衛平均。肌溫氣應外。宜慎風冷也。

辛夷膏方 治面上癩痕塗之。

辛夷一兩

鷹屎白

杜若

細辛各半兩

白附子三分

共五味。除鷹屎外。並剉碎。以酒兩盞浸一宿。別入羊髓五兩。銀石鍋中以文火煎得所。去渣。將鷹屎研如粉。內膏中攪勻。再以微火煖入盒中。每日三塗。瘡癩上避風。

當歸膏方 治面上癩痕塗之。

當歸

白芷

烏雞糞以豬脂三斤。飼雞三日。後取乾雞糞各一兩。

鷹屎白半兩與雞糞同研。

右四味。先將當歸。白芷剉碎。酒浸一宿。別鎔豬脂一斤。消後入浸藥并酒。文火煎之。候白芷黃色去滓。將雞屎。鷹屎內膏中攪勻。傾入瓷盒中。每日三塗。瘡癩上避風。

臘脂膏方 治面上癩痕塗之。

臘月豬脂四兩

大鼠一枚

二味入鐺中。以文火煎之。待鼠銷盡。以新綿濾去渣。入瓷盒盛。每用先以布拭令癩痕色赤。次以膏塗之。三五度差。慎風。

雞子膏方 治瘡癩痕無問新舊塗之。

雞子五枚

一味熟煮。取黃於鐺中。炒如黑脂膏。以物先揩癩痕。然後塗膏。日三次。即自滅。

麥麩散 治面癩痕凸塗之。

右方秋冬以小麥。春夏以大麥麩。細擣爲散。酥和傅封癩痕上。

真玉磨方 治面上癩痕。

真玉

取平處一面磨癩痕。久則無痕。

髭髮門

眉髭髭髮統論

論曰。足太陽血氣盛則眉美。足少陽血氣盛則髭美。足少陰血氣盛則髮美。手陽

明血盛則髭美。夫經絡所至不同。血氣各有所屬。眉鬚髮髭。率本於經絡之血氣。或黑或紺。或黃或白。可以知盛衰。蓋血氣在人。猶水之津也。髭髮猶津之有髭也。津之槁澤。而髭隨之。則髭髮本氣血可知矣。

烏髭髮

論曰。髮本於足少陰。髭本於手陽明。二經血氣盛則悅澤。血氣衰則枯槁。容貌之間。資是以貴飾。則還枯槁爲悅澤法。焉可廢乎。

地黃丸方 烏髭髮

生乾地黃一斤

生薑汁五合

巨勝子

旋復花

熟乾地黃

乾椹子各二兩

共六味。除二味汁外。搗羅爲末。先將前二味汁用銀器煎熟。看稀稠。將藥末和丸。如彈子大。每服夜飲酒半酣。後含化一丸。

揩牙烏髭方

皂

懷州者
莢十條

以地黃自然汁。生薑自然汁各半盞和勻。旋刷皂莢於火上炙。以二藥汁盡爲度。研細爲末。入青鹽拌勻。逐日擦齒。藥用經旬效。

鬚髮黃白

論曰。足少陰血氣盛。則髮潤澤而黑。足太陽血氣盛。則鬚潤澤而黑。二經血氣虛乏。則鬚髮變爲黃白。然則還其潤澤。復其紺黑。雖有傳染之法。曾不如益血補氣爲常服劑。蓋血調適。則滋澤外彰。其視用傳染之功。遠矣。

乾漆丸方。治鬚髮白。可以變黑。

乾漆炒令盡

柏子仁炒

生乾地黃

熟乾地黃各一

共四味。搗羅爲末。研糯米飯和。搗三五百杵。塗酥丸如梧桐子大。每服二十九。空心溫酒下。

治鬚髮黃白。變令黑色。倒行油方。

右方取銀子三兩。作小盒子盛。汞一兩。以乾水蛭七枚爲末。同入盒內。用蚯蚓泥固濟。約半指厚。深埋在馬糞中。十九日取出。已化爲黑油矣。用魚胞裹指頭。

點藥擦之。

白禿

論曰。蟻之爲害。因血氣虛。乘風而上。則能生瘡。疽、癬、癩、疥。無不爲也。瘡痂不去而痒。髮髮禿落。無復生榮。是爲白禿。

五味子膏方 治白禿髮落。

五味子

肉蓯蓉

松脂

蛇牀子

遠志略三

雄黃研

雞糞白

雌黃研

白蜜

兔絲子五兩以酒浸宿各一兩

豬脂二

共十一味。先將草藥搗羅爲末。次將石藥及雞糞白再研令如粉。下豬脂、松脂入鍋中同熬化。復下諸藥。文火煎稀稠得所。以綿濾去滓。瓷盒盛。每用先以桑柴灰汁洗頭令淨後。塗藥不過三次。髮落生。

赤禿

論曰。諸陽脈皆在於頭。風熱乘之。則陽邪熾盛。發於頭皮腦絡之間。細瘡徧密。赤色有汁。痒痛侵淫。乃至髮落。故名赤禿。

旱蓮汁方 治赤禿髮落塗之。

旱蓮草三兩 鐵粉一分

二味。先將旱蓮草搗絞取汁。次入鐵粉。研令極細。入盒中。每用先以泔漿洗頭。次塗之。

牛羊角灰方 治赤禿髮落塗之。

牛羊角等分灰

一味。研如粉。以豬脂調傅之。

馬蹄灰方 治赤禿髮落塗之。

馬蹄燒灰

一味。研如粉。用臘月豬脂調塗之。

樞汁方 治赤禿髮落塗之。

黑樞一斗

一味。內瓶中密封。於北簷下埋之。百日卽變爲水。每用淨洗頭。次塗髮卽生。

眼目門

眼目統論

論曰。內經曰。肝主目。又曰。在臟爲肝。在竅爲目。難經曰。肝氣通於目。目和則知五色矣。內經又曰。心者五臟專精。目者其竅也。夫目旣爲肝之竅矣。又爲心之竅何也。曰。目者五臟之精華。固不專於肝也。所謂骨之精爲瞳人。筋之精爲黑。血之精爲絡脈。氣之精爲白睛。肉之精爲約束是也。析而言之。則通乎五臟。合而言之。則主於肝。夫惟通乎五臟。故曰精明。五色者氣之華於此乎。觀五臟有餘不足。六腑強弱。形之盛衰。以此參伍。決生死之分。夫惟主於肝。故肝虛寒。則目眊眊。視物生花。肝實熱。則目痛如刺。肝中寒。則目昏而瞳子痛。肝熱衝睛。則目眦赤痛。生瘰肉。不特如此。神志俱悲而泣下。則以水火相感故也。一水不勝五火。而目盲。則以陰陽各併故也。夫五臟陰陽。其變動俱感於目。又况攝養失宜。動過生疾者耶。或多熱食。或嗜五辛。或喜怒不時。或房室不節。以至凌寒冒暑。處溼當風。哭泣不寐。凡

過用目力。皆至疾病。其候不一。養生者不可不知也。

肝虛眼

論曰。肝虛眼其證不一。巢氏析之。有忽然發腫者。有淚出不止者。有精生翳膜暈者。有視物漠漠不能遠視者。有精彩昏濁黑白不明而暈者。蓋肝開竅於目。腑臟精華之所聚也。氣血既衰。不足以榮養。故證狀之異如此。龍木論有肝臟虛熱外障。謂其證忽發昏澁。淚出。痒痛摩隱。瞳人黑。睛腫。漸生翳障。視物不明者。宜審治之。

柏子仁丸方 治肝虛視物漠漠不能遠見。睛輪昏暗澁痛。翳暈時聚。補肝丸。

柏子仁

薏苡仁

烏麻仁

車前子

枸杞子

菴藷子

兔絲子

酒浸別搗末各一兩杜荊子

青葙子

五味子

蛇牀子

桂心

菊花

山藥略半

熟乾地黄

肉蓯蓉酒浸切焙

白茯苓略一

右十七味。擣羅爲末。鍊蜜和丸。如桐子大。每服二十九。空心溫酒下。

石決明丸方 治肝虛血弱。日久昏暗。

石決明

免絲子酒浸一 研

五味子各一

熟乾地黄

細辛

知母

山藥各一

七味爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服三十九。空心米飲下。

地黄丸方 治肝虛淚出不止。翳暈侵睛。視物不遠。或睛昏濁。黑白不明。

熟乾地黄

五味子

免絲子酒浸一 研

麩仁去皮

車前子各一

白茯苓

柏子仁研

細辛

甘草

防風各半

共十味爲末。鍊蜜和丸。如桐子大。每服二十九。空心溫酒下。

肝實眼

論曰。肝氣通於目。其氣平則諸疾不生。過實則生患。乃有肝實眼之證。令人目痛如刺。久不已。則目赤而生淫。膚息肉。治宜瀉之。又當視其老壯。凡人五十以前可

服瀉肝湯。過五十則不可。或有是疾。當不得已而用之。
菊花散方。治一切眼疾。肝熱上攻。羞明畏日淚出。

菊 花 一 兩

蜜 蒙 花

甘 草 生

梔 子 仁

芎 藭

大 黃 各 半 兩

蒺 藜 子 剝 去

防 風

當 歸 一 兩 各 焙 切

九味為散。每服二錢。食後。臨臥。麥門冬熱水調下。

生地黄湯方。治肝實熱。眼熱痛不止。

生 地 黃 汁

蜜

車 前 子 汁 各 二 兩 和 勻

玄 參

升 麻

梔 子 仁 各 一 兩

芍 藥 半 兩

細 辛 半 兩

共八味。羅五味為末。每服五錢。水煎入前三汁。再煎溫服。

點眼前方。治肝實熱。目皆熱痛。

梔 子 仁

麩 仁

決 明 子 一 兩 各 微 炒

石 膏 二 兩

車 前 葉 三 合

竹 葉 二 握

秦 皮 三 分

白 蜜 三 兩 後 入

共八味。剉碎七味。以井華水五斤。煎取汁一升。再入蜜調勻。瓷器中重湯煮如稀餳。每點如大豆許。

羚羊角散方 治肝臟實熱。眼目昏暗。時多熱淚。

羚羊角

羌活

玄參

車前子

黃芩

括蔞仁

山梔子各半

胡黃連

菊花各三

細辛一分

為散。每服二錢。食後竹葉熱水調下。

目胎赤

論曰。目胎赤者。緣在胎時。母嗜五辛及餌熱藥。傳移胞藏。內稟邪熱。及至生長。兩目赤爛。至大不差。故名胎赤。又人初生。洗目不淨。穢汁漬壞者。亦有之。內外之治小異也。

羚羊角湯方 治胎赤眼久不差。昏暗漠漠。瞳人脹痛。

羚羊角屑三兩

防風

芍藥

蕤仁

麥冬

地骨皮

決明子

甘草炙各

茯苓神三兩

每服五錢。水煎。食後臨臥服。

治胎赤眼點眼梨汁煎方

梨汁一盞

古字銅錢文七

胡黃連末二錢

青鹽半兩

龍腦一錢

共五味。先將古錢二七枚。重重着青鹽隔。每一重錢。着一重鹽。疊之填滿錢孔。中入火燒令通赤。去灰塵。投入前梨汁中。浸一復時。去錢。將汁煎三五沸。以新綿濾入瓷器瓶內。入胡黃連末浸七日。去黃連龍腦末令勻。要用以銅筋點少許在目眦頭。

治胎赤眼點眼龍腦膏方

龍腦一

麝仁分

杏仁七枚湯浸去

三味。研如膏。用人乳汁調和令勻。瓷盒中盛。每用以銅筋點少許在目眦頭。日兩度。

目赤痛

論曰。內經謂心主血。又曰。肝受血而能視。蓋肝開竅於目。若肝氣壅盛。心經熱實。熱氣既熾。血乃滂溢而上衝於目。故令目赤痛也。難經所謂痛者為實。宜散壅滯。決邪實。則病可已。

羚羊角湯方 治肝心氣熱。目赤痛。

羚羊角 鑄

蔓荊實 祛白

菊花

防風

芍藥 各一兩

黃芩 一兩

玄參 半兩

每服三錢。煎。再入馬牙硝半錢。食後溫服。臨臥再服。

旋復花湯方 治目赤痛。

旋復花

升麻

秦艽

防風

羚羊角

萎蕤 各一兩

黃連

柴胡 去苗

黃柏 去粗皮

甘草 各半兩

每服五錢。水煎。食後溫服。臨臥再服。

乳汁煎點眼方 治肝熱目赤痛。

人乳汁半兩 古字錢十文

二味。以乳汁於銅器中磨錢令變色。稀稠成煎即止。內瓷瓶盛。每以銅筋點少許於目背頭。日三五次。

犀角湯方 治赤目腫痛。

犀角末 秦 芫二兩 黃連

滑石 杏 仁去皮尖雙仁 馬牙硝

右六味。爲末。和勻。以沙糖一處入藥熬成膏。每用皂子大。沸湯化洗之。

通頂散方 治赤眼腫痛。

苦葫蘆子四十粒 穀精子研一 瓜 蒂十四枚 乳 香研半

薄荷葉一錢

五味爲末。入龍腦少許。鼻內搐一字立效。

石膏散方 治上焦壅熱。目赤口乾。

石膏 甘菊花 羌 活 白附子

白僵蠶

玄參

黃連

共七味。等分爲散。每服二錢。生薑茶酒調下。

目熱疼痛赤腫

論曰。五臟六腑之精華。皆上注於目。若風熱搏於腑臟。毒氣乘肝。衝發於目。則熱氣外泄。淚下眇多。日夜暴燥。故熱疼痛赤腫也。

地骨皮湯方 治風毒衝眼赤痛。朝乾礮。

地骨皮

甘菊花擇

升麻

黃連

防風

決明子微炒

細辛各一兩

竹葉

共八味。除竹葉外。搗篩。每服五錢。入竹葉七片。同煎服。食後。臨臥再服。

龍烟湯方 治眼礮澁如針刺。赤痛昏暗。

生麥門冬半兩

木通一兩

熟乾地黄三兩

旋復花

大青

茯神

黃連各一兩

每服三錢。水煎入芒硝半錢。攪勻。食前溫服。

地骨皮散方 治風毒氣上攻兩眼。眇澁疼痛。及暴赤眼。

地骨皮

羌活

防風

土蒺藜去刺

甘草一兩

爲散。每服二錢。荆芥茶清調下。如患暴赤眼。濃煎甘草湯調下。食後臨臥服。

洗眼蕤仁湯方 治目熱赤痛。眇澁。

蕤仁去皮

秦皮

防風各一兩

甘菊花半分

竹葉二握

山梔子仁

姜各半

共七味。剉如麻豆。以水五盞。煎取二盞半。熱淋冷頓。煖淋洗。痛止則止。卽住煎。

藥不得犯鐵器。

點眼黃連煎方 治眼目暴赤。眇澁疼痛。

甘草十二兩

黃連研半

二味。於銅器中。以慢火養。令汁涸去半。以綿濾淨。每日兩度點。

目赤爛

論曰。目赤爛者。瞼皆俱赤且爛。見風益甚。又謂之風赤眼。此由衝冒風日。風熱之氣傷於瞼。皆與津液相搏。故令赤爛也。迎風則癢淚出。遇熱則傷爛眵多。治宜鎮平肝氣。滌洗瞼膚。則清淨之竅自然明矣。

菊花湯方 治風毒氣攻眼生瘡爛。

菊花

升麻

黃連去鬚

木通

防風去叉

白茯苓

地骨皮

姜蕤各一兩

右八味。搗篩。每服五錢。入竹葉十片。同煎去滓。空心、日午、臨臥溫服。

茺胡洗眼湯方 治眼赤痛微腫。皆赤爛多時。

茺胡去苗

蕤仁去皮

黃連去鬚

升麻各一兩

右四味。搗篩。以水三升。煮取一升半。濾去滓。微熱淋洗。如冷再煖。洗三徧。

黃連散方 治赤白皆爛生瘡。衝風淚出。

黃連去鬚

雄黃研各半

細辛去苗

黃柏去粗皮

乾薑一分

右五味。搗羅為散。研令極細。以密器盛。每用二黍米許。點兩目。皆日三度。

目血灌瞳人

論曰。目屬肝。肝受血而能視。則目瞻視必資血。苟因物損傷。致血脈散亂。則敗血
侵睛。灌注瞳人。害於瞻視。不早治。或致喪明。故謂之血灌瞳人。
人參湯方 治血灌瞳人澁痛。

人參

赤茯苓

細辛

桔梗

車前子各一兩

防風去叉

五味子各半兩

共七味。搗篩。每服五錢。水煎溫服。食後臨臥再服。
決明湯方 治血灌瞳人。

石決明

人參

川芎

細辛

五味子各一兩

赤茯苓二兩

右六味。搗篩。每服五錢。水煎溫服。食後臨臥服。

沒藥散方 治血灌瞳人。

沒藥半兩

麒麟竭

大黃炒

芒硝各一兩

右四味。搗研爲細末。每服三錢。熟水調下。空心食後。日三。

赤脈衝貫黑睛

論曰。眼者五臟之精華。若風邪熱毒。內干於臟腑。則隨其經絡上衝於目。故令赤脈衝貫黑睛也。上下左右。各有部分。不可不察。其從大眦侵睛而癢者。肺胃熱也。其從小眦起者。手少陽脈動虛熱也。其自上而下者。足太陽脈動邪熱也。其自下衝上者。足陽明脈動邪熱也。其源不同。當察其部分。依經以治之。

通明湯方

治三焦熱。小眦偏赤。赤脈射黑睛。

木通

萎蕤

甘草炙

枳

殼去麩炒

黃芩去黑心

右五味。搗篩。每服五錢。水煎。入芒硝地黃汁各少許。再煎沸溫服。

黃耆湯方 治眼上下赤脈貫黑睛。

黃耆

芍藥

知母

升麻

犀角屑

苦竹葉五十片

右六味。搗篩。每服五錢。水煎。入芒硝少許。再煎溫服。
摩頂明目膏方 治風熱衝目赤脈贅肉。

生麻油二升

真酥五兩

車前葉

淡竹葉洗各

吳藍

大青

黃連去鬚

山梔子仁

麥門冬

槐白皮

甘草炙

柳白皮

黃芩

馬牙莧實

生犀角鎊

馬牙硝別研

朴硝別研各

鹽花研半

右十八味。除硝鹽油酥外。細通油瓷瓶中。綿罩口。重湯煎三復時。捩去滓。更新綿濾過。置生鐵器中。每日飯後及臥時。開髮滴頂心。以生鐵熨斗子摩頂一二千下。兼去目中熱毒。昏障痛澁。

墜生睛

論曰。墜睛者。眼因賊風所吹。血脈受寒。貫衝瞳人。風寒氣隨眼帶牽拽。眼瞳向下。名曰墜睛也。日久不治。瞳人損陷。遂致失明。

犀角散方 治墜睛眼。時發疼痛。視物散亂。

犀角

羚羊角各半

青牛膽一枚

五味子

槐實

茺蔚子

青箱子

惡實

胡黃連

盧會餅

地骨皮各一錢

兔肝炙乾

右十二味。除膽外。搗研為末。以膽汁拌勻。每服二錢。煎槐子湯調下。臥再服。忌發熱毒物。

槐實丸方 治墜睛失明。眼睛牽陷。

槐實

羚羊角

獨活

地膚子

天麻

沙參

人參各一兩

防風去叉

甘菊花

枳殼炒

決明子二兩

右十一味。搗羅為末。鍊蜜和搗百杵。丸如梧桐子大。每服三十九。空心。臨臥漿水下。

蟹目

論曰。臟腑壅滯。肝經積熱。上衝於目。令人目痛睛疼者。毒氣結聚。甚則黑睛上生。黑珠子。如蟹目狀。故以名之。或有如豆者。名曰損翳。或曰離睛。又曰蟹睛。病極難治。不可鉤割。及傳諸毒藥。唯宜服宣泄之劑。使邪熱退。病差矣。

瀉肝補膽防風湯方 治蟹目疼痛。

防風半兩

遠志

黃芩

人參

桔梗炒

細辛

芍藥各一

右七味。搗篩。每服五錢。水煎。食後。臨臥溫服。

萎蕤犀角散方 治眼生蟹目。黑睛疼痛。

萎蕤

犀角

蕤仁湯煨去

黃連去鬚

黃芩

梔子仁

甘草

升麻各等分

共八味。搗羅爲散。每服三錢。水煎。食後。臨臥溫服。

瀉肝黃芩羚羊角湯方 治蟹睛疼痛。

黃芩

羚羊角

赤芍藥

細辛

桔梗炒

人參

遠志

甘草炙各

防風去叉一

右九味。搗篩。每服五錢。水煎。食後。臨臥溫服。日再。

目珠子突出

論曰。人因風熱痰飲。攻瀆腑臟。陰陽不和。肝氣蘊積。熱毒之氣上衝於目。使目睛痛疼。甚者突出。治宜先服寒藥。以瀉肝氣。然後調治。勿求速效。惟漸治之。仍須微鍼引出惡汁也。

麥門冬芫蔚飲方 治風熱攻目赤痛。目睛欲凸出者。

麥門冬

芫蔚子兩各二

桔梗炒

防風

玄參

知母兩各一

黃芩去黑心

天門冬去心兩各

右八味。搗篩。每服五錢。水煎。食後。臨臥溫服。

黃連湯方 治風毒衝眼赤腫。睛欲突出。洗眼。

黃連去鬚

秦皮

黃柏去粗皮

乾棗去核

麩仁三分

右五味。哎咀如麻豆大。拌勻。每用一兩半。以水四盞。煎至二盞。稍熱去滓。抄洗眼。冷卽重煖。日三度。

治睛眼忽然突出。一二寸者。冷水灌。

右方急取冷水灌眼中。數次換水。須臾睛當自收。

目見黑花飛蠅

論曰。腎水也。肝木也。木得水而盛。其理明矣。腎水既虛。肝無以滋養。故見於目者。始則眈眈不能矚遠。久則昏暗見黑花飛蠅。其證如此。腎虛可知也。治宜以益腎水。去肝風之劑。則標本兩得矣。

治肝腎風虛。眼生黑花。宜服此方。

磁石二兩燒醋碎七

神麩炒四兩

硃砂一兩飛細

右三味。搗羅爲末。鍊蜜和搗一二百杵。丸如梧桐子大。食後酒下二十丸。

治肝腎虛風上攻。眼生黑花。頭目不利。能通神延年。

川椒一斤

一味。揀淨。去目并閉口者。於鉢內炒令透。於地上鋪淨紙二重。新盆合定。周迴用黃土培之。半日去毒。出汗。然後取之。乾爲度。只取椒於瓷盒子內收。每日空心新汲水下十粒。

五倍子丸方 治眼見黑花。去翳明目。

巴戟天一兩 治眼見黑花。去翳明目。

甘菊花三兩

旋復花四兩

蜀椒去目并閉口者五兩

右五味。將椒入銀器內。入青鹽四兩。醋三升。慢火煑乾。如器物小。旋添醋煑。候醋盡。又將椒與前四味焙乾。杵爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服三十九至四十九。空心。午夜。臨臥。溫酒。或鹽湯下。

枸杞丸方 治肝腎風氣上攻。眼生黑花。

枸杞子久暴二兩

巴戟天穿心紫色者去心 蜀

椒去目并閉口者炒出汗各一兩

旋復花擇淨

右四味。擣爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服三十九。臘茶下。不拘時。兔肝丸方 治肝腎毒風攻衝。眼生黑花。昏暗視物不明。

兔肝去筋膜

羌活

黃連

菊花各三分

地骨皮

龍齒

防風

蒟蒻

車前子

青葙子

白附子

萎蕤各半

右十二味。搗羅為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服二十九。食後竹葉湯下。

息肉淫膚

論曰。脾肺有熱。蘊積不散。傳播肝經。流注血脈。上衝於目。發於瞼眥。息肉脹起。攀系白睛。隱澁妨悶。故謂之息肉淫膚。

桔梗湯方 治目生雞冠蜬肉。

桔梗

大黃炒

細辛

黃芩

玄參

芒硝鍊過者 各一兩

防風

車前子各半

右八味。搗篩。每服三錢。水煎。食後溫服。

點眼蝸牛漿方 治息肉淫膚。赤白膜。曾見人說。治小兒痘後生翳。以蝸牛汁。丹

砂滴目中效。

生蝸牛一枚

一味。去其掩。內丹砂末於口中。火上炙沸。以綿注取汁。傅於眦中立效。

點眼雀糞膏方 治息肉淫膚赤白膜。

雄雀糞

一味。取細直者。以乳汁和研。細點傅翳上。

又方

杏仁雙仁用七枚

一味。嚼細吐於手掌內。以綿纏筋頭。點於翳肉上。不過三五度差。

點眼食鹽膏方 治眼中息肉。

食鹽研一分 驢脂一兩

二味。先熬驢脂。後下食鹽。調成膏。以銅筋點如黍米許。於目眦頭。日三夜一。

通神膏方 治眼生翳膜赤脈息肉。澁疹痒痛有淚。

白沙蜜四兩

青鹽研

麝香研各

礞砂飛過

白礬飛過

當歸為末

黃連去鬚為

右八味同研令勻。入青竹筒內。慢火煑半日。候冷綿濾去滓。瓷瓶收貯。每點眼了。瞑目少時。以溫湯洗。翳與息肉等俱平。

目生贅肉

論曰。目生贅肉者。由脾肺不利。風熱乘之。其候或痒或痛。赤瘀而爛。壅熱既久。息肉增長。近則侵睛輪。大則覆瞳人。治不可緩。鈎割熨烙。各自有法。至於祛風滌熱之劑。豈可偏廢哉。

玄參散方 治目赤痛。贅肉滿疼。

玄參

甘菊花

決明子

大黃炒

苦參

車前子

枳殼炒

山梔子仁

防風

黃連去鬚

升麻各二兩

右十一味。搗羅為細散。每服三錢。食後以米飲調服。臨臥再服。

決明散方 治眼生贅肉。侵睛及贅肉生瘡。暈眼赤。

車前子

青箱子各半兩

黃連去鬚

菱 蕤

甘草炙

羚羊角

枳殼 麸炒

芎藭 各一兩

右九味。搗羅爲細散。每服三錢。食後溫漿水下。臨臥再服。

升麻丸方 治目熱痛。贅肉生瘡。

升麻

車前子

黃芩

羌蔚子

玄參

決明子炒

龍膽

山梔子仁

防風

甘草炙

生地黃

地膚子 各一兩

右十二味。搗羅爲細末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服二十九。食後溫漿水下。臨臥

再服。加至三十丸。

點眼艾熏散方 治目生贅肉。

蕤仁 研細一兩

膩粉一錢

牛酥一兩

熟艾 如鷄子

右四味。搗三味。入乳鉢中。研令極細。攤開。次取艾火燒。將乳鉢覆。令煙熏之。候

燒盡艾煙。以槐木椎碎研。令煙氣勻。然後少少點眼背頭。日三五度。

鯽魚貼方 治目生贅肉。澁痛。

鯽魚鮮者

一味。去皮骨淨。取肉一片。中央開一竅。正貼眼上。日三五度易。

目內生瘡

論曰。目內生瘡者。以脾臟毒熱。熏蒸於上。鬱而不散。遂令瞼內生瘡。其初患時。或痒或痛。發歇無常。或多眵淚。皆門如丹砂色。於是漸有翳膜。龍木論謂不宜點藥。鍼灸。惟宜服瀉脾清膈之劑。滌蕩本源。當如是也。

決明子丸方 治肝肺熱毒氣攻。兩眼生瘡赤痛。

決明子炒

菊花

秦皮

黃連去鬚各一兩

車前子

地骨皮各一兩半

黃芩

羚羊角

生乾地黃焙

山梔子

姜 蕤

秦艽各一兩

青葙子

白茯苓各一兩半

升麻一兩

右十五味。搗羅為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服三十九丸。食後溫水下。再服。
梔子湯方 治肝心熱毒。目生瘡。及礫痛。

梔子仁半兩

犀角屑一兩

木通

黃芩各半

大黃炒

瞿麥穗各一

黃連去鬚

車前子一兩

右八味。搗篩。每服五錢。入竹葉七片。同煎。入芒硝末半錢。放溫服。日二。

清涼包子方 治眼赤熱生瘡退翳。

黃連爲粉

一味。用水一碗。面東撲取。倒流水些小。將黃連末勻摻在碗內。用熟艾一塊。如雞子大。安在古錢七文上。四面更用青銅錢四十文。足作四塊。塚子。覆黃連碗在上。點火燒艾。候煙盡。更掃下黃連末。用夾絹袋子盛了。取孩兒乳汁浸。時時點在眼中。覺口中苦透爲度。如暴赤眼。用之立效。

目膿漏

論曰。目膿漏者。緣血脈壅熱。傳入於足太陽膀胱之經。膀胱之脈起於目內眦。則令人臉背腫痒。久卽成瘡。濃汁時下。綿綿不絕。如器津漏。故謂之膿漏。不治則膿毒淹漬。穿壞白睛。黑點相連。卽難治療。

防風湯方 治眼漏睛膿出。

防風二兩

地骨皮

遠志

白茯苓

人參

黃耆各一兩

大黃炒

知母各二兩

右八味。搗篩。每服一錢。水煎。食後。臨臥溫服。

龍腦散點方 治睛漏瘡。目大皆出膿。汁有窠。

龍腦研

馬牙硝各半兩

菘豆粉一錢

三味。同研極細。用燈心黏藥。點之。再點。

目生珠管

論曰。目生珠管者。風熱痰飲。漬於肝。血氣蘊積。津液結聚。所由生也。肝藏血。故肝受血。而能視。氣調血。和則精華見於目。今邪乘於肝。肝氣受病。為風熱熏蒸。痰飲漸漬。使血氣壅闕。上衝於目。津液結聚。狀如珠管。故以名焉。

銅青丸方 治眼生膚翳垂珠管。

銅青一兩 細墨半兩

二味。合研爲末。醋和丸。如白豆大。每用一丸。以乳汁、新汲水各少許浸化。以銅筋點之。

鉛丹膏方 治眼卒生珠管。

鉛 丹 半兩

鯉魚膽汁量銀冊多少用

二味。合調如膏。點目眇中。日三五次。

治卒生珠管方

白 蜜

一味。以少許點目中。仰臥令淚出。半日許。洗之。

雀目

論曰。晝而明視。暮不覩物。名曰雀目。言其鳥鵲不能見於夜也。夫衛氣晝行於陽。夜行於陰。陰血受邪。肝氣不能上榮於目。肝受血而能視。今邪在於肝。陰血澀滯。至暮則甚。故遇夜目睛昏。不能覩物。世謂之雀目。

防風煑肝散方 治雀目。

防風去義

黃連去鬚

穀精草

黃芩

甘草炙

天南星略一

蛤粉半分

右七味。搗羅爲細散。每服一錢。用羊子肝一片。銅竹刀批開。摻藥在內。以麻繩纏定。研粟米飯一大盞。銀石鍋內煮熟。放溫。臨臥嚼服。切不得犯鐵器。病甚者。不過再服必效。

鬱金散方 治雀目。

鬱金三兩

新牛膽一枚

豬膽二枚

蛤粉三兩

大黃炙半兩

黃連去鬚半兩

雄黃一分

共七味。將五味爲細散。并豬膽拌和。入牛膽中填滿。陰乾爲細散。每服大人一錢。小兒半錢。食後新汲水調下。赤眼、氣眼、疳眼亦能治之。

煮肝散方 治雀目咫尺不見物。

紫芥菜子員香炒令黑色。碾爲細散。用羊肝一具。分作八服。每用散二錢。捻在肝上。以笋籜葉裹煮令熟。放冷服。以煮肝湯下。不過一具肝。永除根本。臨臥時服。

還睛丸方 治雀目。

人參

細辛

白茯苓

木香

知母

芎藭一

石決明

羌蔚子各二

共八味。搗羅爲細末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服空心茶下二十九。

目瞼垂緩

論曰。眼瞼垂緩者。以血氣不足。膚腠開疎。風邪客於瞼膚。其皮垂緩。下覆睛輪。故俗乎爲睢目。又曰。侵風。久之則垂覆愈下。眼閉難開。羌蔚散方 治風毒攻眼瞼垂下。

羌蔚子

防風

羌活

蔓荊實

玄參

細辛

甘菊花

黃芩

車前子

甘草各一

大黃半

右十一味。搗羅爲散。每服四錢。水煎溫服。食後。臨臥各一。

竹葉湯方 治眼熱毒。瞼垂腫遮睛。

苦竹葉

黃連去鬚

黃柏

梔子仁各一兩

麩仁湯浸法

右五味。細剉。以水五大盞。煎至二盞半。去滓。溫服。澄清洗眼。日五七次。

黃耆丸方。治氣血不足。膚臉下覆。睛輪垂緩。難開。又名睢目。

黃耆

蕤薺子剉去

生乾地黃焙

茆胡

甘草炙

梔子仁

苦參

白朮

白花蛇酒浸去皮

防風去叉

菊花

茯苓

山藥

秦艽各三

天門冬

枳殼蘇炒

白檳榔各半

右十八味。搗羅為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心溫酒下。

升麻散方。治風邪客於臉。膚其皮垂下。緩覆睛輪。眼閉難開。

升麻

山茱萸各三

甘菊花

細辛各半

蔓荊實

山藥

防風各一

右九味。搗羅為散。每服三錢。溫酒調下。

目瞼腫靨

論曰。目瞼腫靨者。內因肺肝積熱。上衝於目。外爲風邪所搏。風熱留結在於瞼眥。血氣不得宣通。故令腫靨。久不差者。多成風粟細瘡。眵汗淹漬。浸壞眼目。先宜鎌洗出毒。然後以藥攻治。則病可差。

黃耆湯方 治目瞼靨赤腫痛。

黃耆

芫蔚子

麥門冬各一兩

地骨皮

玄參

黃芩

知母各一兩

右七味。搗篩。每服五錢。水煎。食後。臨臥溫服。日三。

大黃桔梗散方 治目瞼腫靨刺痛。

大黃兩半

桔梗炒

黃芩

玄參

羚羊角

白茯苓

人參各一兩

七味。搗羅爲散。每服一錢至二錢。食後。臨臥米飲調下。日三。

洗眼防風湯方 治風熱客搏。目瞼腫靨。

防風

秦艽

甘菊花略二

蕤仁去腸皮

竹葉一握

梔子仁

萹蕤各半

右七味。細剉令勻。每服一兩。以水三盞。煎取一盞半。綿濾去滓。每煖洗之。

倒睫拳攣

論曰。臟腑久積風熱。內熏肝經。衝發於目。始則腫赤。隱痛多淚。日久津液澀少。瞼胥皮急。致睫拳倒刺隱瞳人。治法當起去毛睫。又刺太陽經令出血。及鉞鎌除其惡血。仍服除風退熱之劑。

防風湯方 治風熱衝肝。目多倒睫。

防風

甘菊花

旋復花

決明子炒

萹蕤

麥門冬

梔子仁

黃連

甘草炙

升麻

秦皮各等分

右十一味。搗篩。每服五錢。水煎。食後。臨臥溫服。

車前子散方 治倒睫赤眼。疼痛不開。

車前子 二兩

馬蹄決明 微炒

蕤仁 各半

地膚子

龍膽

甘草 炙

菊花 各半

青箱子

山梔子仁 各一

前胡 三分

右十味。搗羅爲散。每服二錢至三錢。空心粟米飲調下。食後、臨臥再服。

洗眼湯方 治風熱攻目。礪澁疼痛。漸致倒睫。

蕤仁

秦皮

防風 各一

山梔子仁

菊花

萋蕤 各半

竹葉

右七味。細剉。以水三升。煎取一升半。乘熱淋洗。冷卽再煖。作三度使。

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷十八

眼目門

目生膚翳

論曰。目生膚翳者。以腑臟氣血虛實不調。加以風邪痰飲。鬱於膈上。熏蒸既久。衝發於目。乃生膚翳。其睛上及瞳人有物如蠅翅狀。是爲膚翳也。

決明子丸方 治久患膚翳。遮覆瞳子。

決明子炒

蕤 仁去皮

地膚子

白茯苓

防 風

麥門冬

澤 瀉

羌蔚子

車前子 二兩

馬蹄決明 微炒

蕤

仁 各半

地膚子

龍膽

甘草 炙

菊

花 各半

青箱子

山梔子仁 各一

前胡 三分

右十味。搗羅為散。每服二錢至三錢。空心粟米飲調下。食後臨臥再服。

洗眼湯方 治風熱攻目。矇澁疼痛。漸致倒睫。

蕤仁

秦皮

防風 各一

山梔子仁

菊花

萎蕤 各半

竹葉

右七味。細剉。以水三升。煎取一升半。乘熱淋洗。冷即再煖。作三度使。

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷十八

眼目門

目生膚翳

論曰。目生膚翳者。以腑臟氣血虛實不調。加以風邪痰飲。鬱於膈上。熏蒸既久。衝發於目。乃生膚翳。其睛上及瞳人有物如蠅翅狀。是爲膚翳也。

決明子丸方 治久患膚翳遮覆瞳子。

決明子炒

麩 仁去皮

地膚子

白茯苓

防風

麥門冬

澤瀉

羌蔚子

枸杞子

五味子

青箱子酪一

細辛

車前子

兔絲子酒浸別搗末三分

生乾地黄二兩

桂心去粗皮半兩

黃芩

杏仁

右十八味搗羅為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服二十九。食後以米飲下。臨臥再服。九月服此藥。加兔肝一兩。至二月停甚妙。

盧會丸方 治眼熱赤痛及生膚翳。

盧會研半兩

鯉魚膽取一枚

牛膽乾者用汁半兩溼

熊膽研一分

石決明剖髓一兩

麝香半分

車前子一兩

右七味除膽外。搗研為細末。後入汁同和勻。鍊蜜丸如梧桐子大。食後米飲下二十九。加至三十九。

貝齒散方 治目風熱赤生膚翳點眼。

貝齒七枚燒

珍珠為粉

龍腦研半

三味合研如粉。每點眼時。用黍米大。於翳膜上日三度。

菊花散方 治眼目膚翳。侵及瞳人。如蠅翅狀。

菊花

防風

木通

木賊

僊靈脾劉

荆芥去梗

甘草炙各兩

右七味。搗羅為散。每服二錢。食後茶半錢。同點溫服。

目生花翳

論曰。目生花翳者。點點色白。狀如棗花魚鱗之類是也。此由肝肺實熱衝發眼目。其始則目痛淚出。變生白翳。宜急治之。不爾則致障翳也。

桑白皮湯方。治目生花翳白點。狀如棗花。

桑根白皮

木通各半

羚羊角

澤瀉

黃芩

旋復花

川大黃炒

玄參

茯苓神一兩各

甘草一分

甘菊花半兩

右十一味。搗羅為細散。每服二錢。水煎溫服。

羚羊角湯方。治眼生白翳如棗花。

羚羊角

大黃炒

桑根白皮

黃連

決明子

黃芩去心 炙黑

甘菊花各一

甘草炙 各

右八味。搗篩。每服三錢。水煎。食後溫服。

退翳僂朮散方 治眼生花翳。

蒼朮二兩 米泔洗 宿燻木 賊

甘草炙 各

穀精草

蟬蛻各一分 蛇蛻一錢 湯洗 燻

黃芩半兩

共七味。為散。每服一錢。空心。臨臥。冷水調下。

目青盲

論曰。龍木論稱內障有變青盲者。初患之時。昏暗。不癢。不痛。亦無翳膜。至於失明。與不患者相似。是知青盲之狀。外無異證。瞳子分明。而不見物。由肝腎氣虛。精血衰弱。不能上榮。故目盲而無所見者。經曰。肝氣通於目。目和則知白黑。養生方乃以塞故井水瀆。令人目盲。豈其本哉。

羊肝丸 治內外障。青盲雀目。眼生黑花白翳。十年以上者可治。

羯羊肝一具 切片 炙 文武火

仁一兩

錦文斑鳩一隻 去頭足 腸胃 取肉 炙 為末

細辛

防風

黃連去鬚

瞿麥子

蒺藜子

桂

甘菊花

牡蠣燒為末
各五兩

羌活三兩

白茯苓四兩

蔓菁子五升

決明子二兩

右十五味。搗羅十二味為末。入羊肝、斑鳩、牡蠣末、乳鉢內同研勻。鍊蜜和丸。如

梧桐子大。每服二十九。食後臨臥茶清下。

澤瀉湯方 治肝臟熱衝目赤。瞻視漠漠。積年青盲不見物。

澤瀉

杏仁湯浸去
皮尖研

決明子炒

大黃炒

黃芩

甘草炙

枳實熬炒

芍藥各一兩

梔子仁

人參

赤茯苓

黃柏

細辛

白朮各半
兩

柴胡四兩

青葙子一兩

桑根白皮三升

麻一兩

右十八味。搗羅。每服五錢。水煎。入生薑半分同煮。再入芒硝半錢。放溫。食後臨

臥服。日再。

真珠散方 治眼青盲。

真珠末三分

胡黃連三分

石決明

三兩搗碎

珀三分

地膚子一兩

天靈蓋三分

母猪肝

半兩切

右七味搗羅爲散。每服二錢。食後溫水調下。臨臥再服。日三。

治青盲烏雞丸方

右方用黃荊嫩頭春初取之。九蒸九晒。取半斤。用烏鷄一隻純黑者。以米飼五日。安淨版上。飼以大麻子。又二三日。旋收糞暴乾。取入淨瓷罇子內。熬糞令香黃。然後和荊頭搗成末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。陳米飲下。加至二十丸。日二服。

將變內障眼

論曰。眼疾始於浮淺。久而弗圖。變爲內障者。非一端也。龍木論內障皆有其漸。蓋從一眼先患。後乃相牽共損。是肝腎氣虛。風邪熱毒。上攻眼目。氣血衰微。久則爲害。但不痛不疼。亦無眵淚。目視如輕烟。或如薄霧。或見垂絲。或見蠅翅。或見飛蚊。其初若無足慮。至其成內障。則慢慢不知矣。今以將變內障者。敘之。蓋圖難於易。

之意也。

瀉肝飲方 治雷頭風。恐成內障。先服瀉肝飲。後服磁石丸。

防風二兩

五味子炒

細辛

車前子

黃芩

芫蔚子

桔梗炒

大黃炒

芒硝研各一兩

右九味。搗篩為粗末。每次服三錢。水煎去滓。放溫。食後。臨臥服。

磁石丸方

磁石二兩燒赤 五味子炒

牡丹皮

附子去皮

玄參各一兩

右五味。搗羅為細末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心鹽湯下。

黃耆丸方 治肝虛勞。兼膀胱久積虛冷。目眩見花不明。漸成內障。

黃耆

白茯苓

石斛去根各二兩

鹿茸去毛酥炙

五味子炒

防風去叉

生乾地黄

覆盆子

酸棗仁

牡丹皮各三兩

右十味。搗羅爲末。鍊蜜和丸如梧桐子大。每服二十九丸。空心溫酒下。加至三十丸。

蕤仁丸方 治內外障眼。

生乾地黄兩半

菊 花焙一分

蕤仁三兩

黃連去鬚

車前子兩各二

人參

麥門冬各三兩

防風

黃芩

青葙子湯浸

秦艸

羚羊角兩各半

甘草炙

丹參炒

決明子炒

天門冬

地膚子

升麻炒

苦參炒

地骨皮

羌活

玄參兩各一分

右二十二味。搗羅拌勻。鍊蜜和丸如梧桐子大。食後煮百合湯下二十九丸。加至三十丸。但有瞳人不拘內外障翳並治。

目眇曠

廣音曠 目汁凝目 傷腎曠目 赤也 曠也 曠音答 曠音鍼

論曰。目者五臟之精華。肝之外候。津液之道也。若腑臟挾熱。內熏於肝。衝發於目。

使液道熱澀。結滯於眥。則成眇曠。

羚羊角散方。治風熱衝肝。上熏於目。結成眇曠。

羚羊角二兩

犀角一兩

桑根白皮

生乾地黃焙

防風

五味子

白蒺藜炒

牛膝

羌活

芍藥各三分

為散。每服二錢。水煎溫服。

淋洗秦皮湯方。治目生眇曠。

秦皮

柴胡

黃連去鬚

黃柏

蛇銜各二兩

苦竹葉二握

細辛一兩

每一服。用藥二兩。河水細細煎濃去滓。須熱淋洗眼。冷即再煖洗。

黃柏膏點方。治風熱衝目。多生眇曠。

黃柏去粗皮

麩仁半兩

大棗青州者三枚

三味。以水三升。同內瓷器中。慢火煮至一升。去滓取清。再以淨瓷瓶子收。每用銅筋點眼。日五度。

睇目

論曰。睇目者。蚊蠅飛塵等物。入於目中。治宜亟出之。久不出。着於瞼。皆因而傷動。則爲澀痛。淚出。古方初睇時。令綿裹筋。擦去之。或以墨汁。或以雞血。浮出者皆良。

治雜物睇目不出方

桑根白皮

一味。取新者。一片如筋大。削一頭薄椎。令軟滑。漸漸入目中撥之。須臾自出。

又方

猪脂一分

一味。取塞鼻。隨左右用之。

又方

生粟米七顆

一味。爛嚼。并唾洗之。即出。

治雲母等入眼方

好墨

研爲細末。用新筆蘸點眼大小皆頭。卽時隨墨出

又方

鷄肝中血少許

取滴目中卽出。

又方

衣中白魚

暴乾研爲末。點背頭卽出。

又方

酥

以少許內鼻中。隨眯目左右垂頭。臥少時。令流入目中。淚與眯物同出。

鍼眼

御倫

論曰。鍼眼者。以邪熱搏於血脈。上攻眼目。發瞼皆結。焮腫痛。赤根白頭。包裹膿汁。痛如鍼刺。治法當詳其外證。隨宜砭刺。決泄邪毒。後以消毒敗熱之劑。斷其根本。半夏湯方。治目熱客目眦。結成腫泡。俗呼偷鍼者。

半夏湯方

治目熱客目眦。結成腫泡。俗呼偷鍼者。

半夏湯方

治目熱客目眦。結成腫泡。俗呼偷鍼者。

枳殼炒各

烏梅肉半兩

每服五錢。水煎。入生薑三片同煎。食後。臨臥溫服。

芍藥湯方。治熱毒攻目。眦目腫起。有膿汁者。

赤芍藥半兩

羚羊角

玄參

防風

黃芩各一兩

蔓荊實

甘菊花各三錢

每一次服五錢。用白水煎濃。入馬牙硝一錢。俟食後。臨臥時溫服。

點眼藥仁膏方。治熱毒攻注目眦。腫結赤痛。

麩仁皮

黃柏去粗

青竹茹洗切

秦皮各一兩

梔子仁半兩

剉碎拌勻。以水三升。入銅器中煎取一升。以綿濾取清汁點眼。日三五度。

耳病門

耳病統論

論曰。腎氣通於耳。心寄竅於耳。氣竅相通。若牕牖然。音聲之求。雖遠必聞。若心腎氣虛。精神失守。氣不相宣。內外窒塞。斯有聾聵之疾。經所謂五臟不和。則九竅不通是也。

耳聾

論曰。耳聾之證有二。有腎虛精脫而聾者。腎氣通於耳也。有經脈氣厥而聾者。經脈終於耳也。腎虛而聾者。其候面色黑。氣厥搏於耳而聾者。其候耳中輝輝焮焮。或耳中氣滿是也。輝輝焮焮。過在手少陽。耳中氣滿。過在手太陽。以至五絡皆會於耳中。各有證候。審而治之。

肉菴蓉丸方

治腎虛耳聾。

肉菴蓉

酒浸切焙

兔絲子

酒浸搗碎

白茯苓

去黑皮

山藥

人參

熟乾地黄

桂去粗

防

風去叉

芍藥

黃耆半兩

附子去皮

羌

活去蘆

澤瀉各一

羊腎對批去筋膜炙乾

共為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心溫酒下。

山藥丸方 治耳聾。

山藥

熟乾地黄

磁石煨碎

菊

花炒

黃耆

茯苓去木

木通各一

升

麻

獨活各三

共為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服二十九。米飲下。加至三十九。

磁石酒方 治耳聾及耳鳴。常如風水聲。

磁石搗碎綿裹半兩 木通

菖蒲米甜浸一日切燻各半斤

共咬咀。以絹囊盛。以好酒一斗浸。寒七日。暑三日。每飲三合。日再。

鐵酒方 治耳聾。

鐵五兩

酒一升

燒鐵令赤投酒中。去鐵飲之。仍以磁石塞耳中。

菖蒲丸方 治耳聾塞耳。

菖蒲

木通

磁石煨醋

乳香

杏仁炒去

松脂蠟各一

共研極細。入鵝膏同搗一二百杵。撚如棗核大。以鐵穿中心作一孔子。先挑耳令淨。然後內藥耳中入。再初著時癢。及作聲。勿怪。

治久耳聾方

烏驢乳一合

皂

莢半兩

蠟一兩

相和於銚子內。鎔成膏。即丸如棗核大。用針穿透。安耳中一宿。至來日看之。有物下來在耳門中。即便取却。再用一兩度。即差。

又方 治耳聾塞耳。

雄黃一分

硫黃一分

共研爲末。綿包裹一字於耳中。即差。

治耳聾灌耳方

鵝毛翎根筒七莖燈心七莖木通地龍三條
共相和燒灰研。每用半錢。以生油調。傾入耳中。便用綿紙塞耳。且側臥良久。如此三度。

鯽魚膽膏方 治耳聾滴耳。

鯽魚膽一枚

烏驢脂少許

生油半兩

和勻。內入葱管中七日。滴放耳內。

鵝膏方 治耳聾滴耳。

鵝膏一合

以少許滴耳中。

蟹汁方 治耳聾滴耳。

生蟹二枚

搗絞取汁。以少許滴入耳中。

龜尿方 治耳聾滴耳。

龜

一味。荷葉上養之。專看葉上有尿。收取滴耳中。

鼠膽方 治耳聾灌耳。

鼠膽雄者

取汁滴入耳內令透。初益聾。半日後便能聽。雖久亦差。

蠟紙角方 治耳聾。

蠟紙一張

一物裁爲四片。每一片於肌上緊捲。抽却筋。以蠟紙卷子安耳中燃之。待火欲至耳急除去。當有惡物出在殘紙上。日一角之角了以蠟塞定。

又方 治耳聾。

以綿裹鐵內耳中。隨耳左右。口含磁石一塊卽通。

風聾

論曰。風聾者。本於足少陰經。虛風乘之。令氣脈不通。風邪內鼓。則耳中引痛。牽及頭腦。甚者聾閉不通。故謂之風聾。

黃耆湯方 治風聾。聰聰如風雨鐘磬聲。或時出清水。或有膿汁。

黃耆半兩

附子去皮

菖蒲米泔浸一兩 木通二兩

五味子

防風各半

磁石醋碎七兩 杜仲炒去

玄參

白茯苓

熟乾地黄 人參各半

每服三錢。生薑三片。大棗一枚。同煎。空心溫服。日二。

魚腦膏方 治風聾年久。

生鯉魚腦二兩

當歸切焙

細辛 白芷

附子去皮

菖蒲各半

共為末。以魚腦置銀器中。入藥在內。微火煮候香去滓。入瓷盒中。候凝如棗核大。綿裹塞耳中。

然方龍耳

論曰。勞聾者。腎氣虛勞所致也。足少陰腎經宗脈所聚。其氣通於耳。腎氣虛弱。宗脈耗損。則氣安得聰。徹而不曠。舊說謂因勞則甚。要當節嗜欲。慎起居。無損腎藏。

爲要。

內補丸 治腎虛勞聾。

熟乾地黄

附子 去皮

桂心 去粗

肉蓯蓉 酒浸一宿

鹿茸 去毛酒炙

人參 各一兩

山藥 半兩

柴胡 三分

遠志 半兩

胡黃連 一分

白茯苓 一分

細辛

鍾乳 鵝管者三日以甘草水煮

共爲末。再研勻。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服空心溫酒下二十九。

肉蓯蓉丸方 治勞聾積久耳鳴。

肉蓯蓉 酒浸一宿切焙

附子 去皮

山茱萸 炒

乾薑

桂心 去粗皮

巴戟天 去心

熟乾地黄

石斛 去根

澤瀉

兔絲子 酒浸一宿別研

人參

白茯苓

蛇牀子 炒

牡丹皮

當歸 酒浸令潤

細辛

甘草 炙

菖蒲 米泔浸一宿批去

黃耆

遠志

芍藥 各一兩

羊腎 筋膜炙去

防風 三兩

除兔絲子外。為末。入兔絲子重羅。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服二十九。食後溫酒下。漸加至三十丸。日三。

五聾

論曰。五聾不同。曰風聾。曰乾聾。曰勞聾。曰虛聾。曰聾聾是也。腎通氣於耳。足少陰其經也。經虛受風邪。及勞傷血氣。停滯津液。皆能致聾。惟所受不同。故其證各異。葛氏所謂風聾者。痛掣。乾聾者。生疔。勞聾者。出黃汁。虛聾者。肅肅作聲。聾聾者。膿汁出。可不辨哉。

黃耆湯 治五聾。

黃耆半兩

附子皮一兩去

菖蒲米泔浸一兩

木通一分

磁石醋碎七次二兩

白茯苓

五味子

防風

熟乾地黄

玄參

人參各一分

杜仲粗皮一兩去

每服五錢。生薑半分。大棗二枚。同煮溫服。續喫羊腎粥助之。日四五服。

耳聾有膿

論曰。耳聾有膿者。蓋腎藏虛。勞傷血氣。與津液相搏。熱氣乘之。則結聚於耳中。腐化膿汁。氣不開竅。則致耳聾。

禹餘糧散方 治耳聾有膿。

禹餘糧煨醋淬一分

烏賊魚骨去甲

伏龍肝

龍

骨各半

附子去皮臍一兩

共爲散。每以一錢。綿裹塞耳中。日一易。取差爲度。如有蟲。加麝香一黑豆大。

一方加錙墨半兩。

治耳聾有膿水不絕臭穢方

肉菴蓉一兩

龍膽一兩

白茅根

共燒爲灰。以少蜜和令勻。後入鯉魚膽汁三枚。攪令稀。卽以絹捩取汁。瀝入耳中。其捩乾滓。捻作挺子。以薄綿裹塞耳。不過三日上愈。

治腎熱耳聾有膿血溜日夜不止方

鯉魚腦一枚

鯉魚腸一具

烏麻子一升

先搗烏麻令碎。入二味相和。微火熬。以煖布裹薄耳。兩食頃開之。當有白蟲出。

復更作藥。若兩耳並膿。分藥於兩耳中用。若只一耳。即於一面薄之。不過三度差。

二聖散方 治耳內出膿水。

白附子

羌活各一

爲散。用猪羊腎各一隻。切開。每隻入藥末半錢。不得着鹽。溼裏煨熟。五更初溫酒嚼下。續喫粥壓。

速效散方 治耳聾膿出久不差。

地

龍一條入白葱管

入麝香少許。研爲細散。摻入耳內。

魚醋膏方 治耳聾出膿或有蟲。

鯉魚腸一具

醋三合

搗如膏。取少許。綿裹塞耳中。二食頃當痛。或白蟲出。即易之。蟲盡乃止。

耳虛鳴

論曰。耳者心之寄竅。腎氣所通也。腑臟和平。則其竅通而無礙。腎氣既虛。風邪干之。復以思慮勞心。氣脈內結。不得疏通。則耳內燿焯。與氣相擊而鳴。或爲鐘磬雷鼓。或如蟬噪。皆腎虛所致也。

磁石散方 治腎氣虛弱。氣奔兩耳作聲。甚則成聾。

磁石煨醋碎 熟乾地黄 菖蒲米泔浸

白朮各一 白茯苓 人參 芎藭 牡丹皮

附子 牡荊子炒 桂心去粗 大黃炒

桑螵蛸炙切破 當歸各半 羊腎一對切去

共爲散。每服一錢。溫酒調下。日三。加至二錢。不拘時。

桑螵蛸散方 治腎氣虛弱。氣奔兩耳鳴。甚則成聾。

桑螵蛸炙 附子 人參 白茯苓

當歸 桂心各半 牡丹皮 白朮炒

熟乾地黄各一 羊腎去筋

每服一錢。空心食前溫酒調下。日三。加至二錢。

鹿茸丸方 治腎勞虛後。耳常聞鐘磬風雨之聲。補腎。

鹿茸去毛酒浸 磁石煅醋 枳實炒 附子去皮

山藥 肉蓯蓉酒浸 牡蠣服各一 五味子

巴戟天 各一 楮實炒 三兩

共為末。入楮實末同羅。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服二十九至三十九。空心牛

膝酒下。

塞耳方 治耳內晝夜虛鳴。

菖蒲 烏頭去皮臍生

為末。綿裹半錢。塞耳中再易之。

牛膝煮丸方 治腎虛弱。風邪干之。上攻於耳。常作蟬鳴。以至重聽。

牛膝 海桐皮二味各半斤於銀石器內熬成膏 藿香子炒

當歸 五加皮 赤箭 赤芍藥

桂心去粗 麻黃去根 地龍炒 木香

獨活 乳香研 防風 骨碎補

麒麟竭

乾

蠟土炒去

沉香

天南星生用各

附子去皮

烏

頭去皮

棟實

川芎各二

虎腦骨酥炙

沒

藥一兩

麝香研半

共研。再入前膏內。和搗三千杵。丸如桐子大。每服十九至十五丸。空心溫酒或

鹽湯下。

耳聾

論曰。耳者腎之候。心之寄竅。風熱搏於經絡。則耳中津液結聚如麩片之狀。久則

丸結不削。或似蠶蛹。致氣竅不通。聾為聾。

豬脂膏方。治聾。聾塞耳聾。強堅不可挑。塞耳。

生豬脂一合 釜下墨半兩

調和成膏。捏如棗核大。綿裹塞耳中。

地龍汁方。治聾。聾塞耳聾。強堅不可挑。灌耳。

地龍溼者五

取汁數滴。入耳中挑即自出。

聾耳

論曰。腎氣通耳。耳者腎之候。若其經爲風邪所乘。毒氣蘊結於耳中。以至膿汁俱出。妨悶疼痛。謂之聾耳。

白欵散方 治聾耳出膿血塞耳。

白 欵

黃 連

龍 骨

赤石脂

烏賊魚骨去甲各一兩

爲散。先以綿拭乾。用藥一錢。綿裹塞耳中。

鯉魚腸方 治聾耳出膿。久不差者。

鯉魚腸一具細切

醋三合

合搗。布裹囊核大。塞耳。半食頃。痛即有蟲出。著布。即拔之。更易新者。蟲盡爲度。

附子散方 治聾耳耳中痛。

附 子去皮

黃 連半兩

爲散以少許摻耳中。

又方 治聾耳塞耳。

母鼠肝一具

旋取產鼠乘肝熱時以棗核大塞耳中。

治聾耳方

石首魚腦中枕子

爲末摻耳中卽差。

百蟲入耳

論曰。百蟲入耳。其類不一。古方或灌以藥。或導以物。皆以意出之也。獨驢乳、牛酪二物最爲良法。諸蟲之入耳。灌之卽化爲水。其入腹者。則連服數劑取差。

灌耳牛乳方 治蚰蜒入耳

牛乳一盞
少少灌入耳內卽差。若入腹者。飲一二升。當化爲黃水出。未出再服。

塗耳百部方 治蚰蜒入耳。

百部切焙

爲末。以一字。生油調塗於耳門上。其蟲自出。

胡麻枕耳令出方 治蚰蜒入耳。

胡麻半升炒

碎研。以葛袋盛。側臥枕耳。

豬肉掩耳方 治蜈蚣入耳。

豬肉片一兩

炙令香。掩耳上立出。

鯪鯉甲方 治蟻入耳。

鯪鯉甲爲灰

以水調濾過。滴入耳中即出。

豬脂枕耳方 治蟻入耳。

豬脂一片 豬肉一片

將豬脂煮。炙豬肉令香。安耳孔邊。枕睡即出。

蜀椒醋灌耳方。治百蟲入耳。

蜀椒半兩醋半盞

以椒末入醋中。少灌入耳內。行一二十步即出。

葱油枕睡方。治百蟲入耳。

油麻一升炒出

葱白一莖切令香

將葱與油麻拌勻。以餅子盛。當耳門安。側睡令餅口向耳。無令傾。蟲從耳中出。至餅子內。即去之。

又方

以火照之。即向明出。

擊刀法。治百蟲入耳。

以刀口於耳上相擊作聲。蟲即出也。

治百蟲入耳方

雄雞冠血不拘少

滴耳內立出。

治蜈蚣入耳閉氣令出方

閉氣氣滿卽吐。復閉卽令出。或死耳中。徐徐以物鉤出之。若積久不出者。取新熱猪肉安耳竅上卽出。

治飛蛾入耳法

先大吸氣仍閉口。掩鼻呼出氣。蟲卽隨氣出。

又方

以雞肉塞耳中立出。

鼻立病門

鼻立病統論

論曰。肺爲五臟華蓋。開竅於鼻。肺氣和則鼻亦和。肺氣感風冷則爲清涕。爲鼈。爲息肉。爲不聞香臭。肺實熱則爲瘡。爲痛。膽移熱於腦。則濁涕不已。謂之鼻淵。惟證候不同。故治藥亦異。

鼻塞氣息不通

論曰。鼻塞氣息不通者。以肺感風寒。其氣搏結。不得宣快。窒塞既甚。而息不能出入也。巢氏謂息肉生長。致氣塞不通。蓋有未嘗生息肉而氣息不通者。宜析而治之。

人參湯方 治肺風上攻。鼻塞不通。

人參

白茯苓

陳橘皮 去白

蜀

椒 去目并合

麻黃 節 去根

黃芩

羌活 各半

每服三錢。水煎。食後溫服。

杏仁煎方 治肺傷寒氣。欬嗽唾痰。聲重鼻塞。補肺。

杏仁

去皮尖雙

肉核 去皮

白蜜

生薑汁

酥 各半

錫 一升

同合和於銀器中。微火煎。候熟。服一匙頭。溫酒調下。食後。

人參丸方 治肺風上攻。鼻塞不通。

人參

防風

細辛

黃耆

沙參

甘菊花炒

木通各半

共為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服十丸。溫水下。日再。

木通膏方 治鼻塞塞不通利。

木香

細辛

當歸

川芎

木通

麩仁研

白芷各半

共細剉。內銀石器中。入羊髓微火煎。候白芷色黃。膏成去滓。澄清凝。每用小豆

大。內鼻中。日再。以差為度。

鼻塞不聞香臭

論曰。鼻有息肉。不知香臭者。亦有無息肉而不知香臭。生息肉不知香臭。已例方。濟。此姑論鼻塞不聞香臭。蓋鼻之窒塞。或冷風乘。或肺壅熱。冷熱故異。其塞則一。皆肺臟不和。氣不宣通也。治塞者。當審其冷熱。

天門冬丸方 治鼻塞不聞香臭。

天門冬

白茯苓略五

人參

枳實炒

甘草炙略

檳榔二兩

共為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服二十九丸。食後漿水下。日再。暑月以牛乳下。

通氣膏方 治鼻中不利。窒塞不通。不聞香臭。

木通

當歸

川芎

蕤仁

桂心略半

細辛

白芷

共細剉。與羊髓三兩。同於銀石器中微火煎至白芷黃色。去滓澄凝。每取小豆

大。塞鼻中。日再。

芎藭散方 治鼻塞不聞香臭。

芎藭

辛夷略一

細辛三分

木通半兩

每用少許。綿裹塞鼻中。濕即易。

瓜蒂散方 治鼻塞不聞香臭。

瓜蒂

藜蘆各一

每用一錢。綿裹塞鼻中。日三易。

鼽鼻

論曰。鼻和則知香臭。夫鼻為肺之竅。非能自和也。必肺氣流通。然後鼻為用。而香臭可知。若心經移熱於肺。致肺臟不和。則其竅亦無以宣達。故為鼽鼻。此乃內經所謂心肺有病。則鼻為之不利也。
黃耆散方 治鼽鼻。順肺氣。四時服食。

黃耆

人參

防風

防己

生乾地黃

桔梗炒

芍藥

黃芩

澤瀉

石南葉

白朮米泔浸一宿炒

桂心去粗皮

甘草炙

牛膝酒浸一宿

赤茯苓

紫菀略三

雄黃丸方 治鼽鼻。
共為散。每服一錢。溫酒調下。如要丸。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服三十丸。溫酒下。

雄黃一錢

甘草炙

附子去皮

細辛各一分

為末。用羊膽汁和丸。如棗核大。以綿裹內鼻中。移時出惡物即差。

細辛散方 治鼾鼻不聞香臭。宜塞鼻。

細辛

甘草

附子去皮

木通各一

為散。以羊膽汁和如棗核大。塞鼻中。

治鼾鼻法

伏面臨牀。以新汲水淋玉枕上。即差。

治鼾鼻吹鼻

皂莢一挺炙去皮子

為散。以一字吹入鼻中。即差。

鼻中生息肉

論曰。鼻者肺之竅。鼻和而知香臭。風寒客於肺經。則鼻氣不利。使津液壅遏。血氣搏結。附著鼻間。生若贅疣。有害於息。故名息肉。

羊肺散方 治鼻中息肉

羊肺一具切去筋膜炙乾木

通半兩

白朮米泔浸一宿炒黃四兩

乾薑半兩

肉荵蓉酒浸一兩

川芎半兩

為散。每服一錢。食後米飲調下。日二。

攀石丸 治鼻生息肉。

攀石熬令汁枯四兩

木通

細辛各半兩

丹砂研一

共為末。麵糊和丸。如小豆大。每用一丸。綿裹內鼻中。一日一易。取下息肉止。

胡粉膏方 治鼻中息肉不通。傅鼻。

胡粉炒

白攀燒令汁盡各等分

為末。用青羊脂和成膏。以少許塗傅息肉上。

鼻淵

論曰。內經謂膽移熱於腦。則辛頰鼻淵。鼻淵者。濁涕下不止也。夫腦為髓海。皆藏至陰。故藏而不瀉。今膽移邪熱。上入於腦。則陰氣不固。而藏者瀉矣。故腦液下至。滲於鼻。其證濁涕出不已。若水之有淵源也。治或失時。傳衄蟻瞑目之患。防風散方 治腦熱鼻淵。下濁涕不止。

防風一兩

黃芩

人參

甘草炙

川芎

天門冬各一兩

爲散。每服二錢。食後沸湯調下。日三。

雞蘇丸方 治腦熱肺壅鼻淵多涕。

雞蘇葉乾者

麥門冬

桑根白皮

川芎

黃耆炙

甘草炙

生乾地黄二兩

爲末。鍊蜜和丸。如桐子大。每服二十九。食後臨臥人參湯下。

辛夷膏方 治肺熱鼻塞多涕。

辛夷一分

白芷三錢

藁本

甘草

當歸

細剉。以清酒二盞。羊髓十兩。銀器內微火煎五七沸。傾入盒中澄凝。每取一豆許。內鼻中。日夜各一服。

鼻流清涕

論曰。五臟化液。遇熱則乾燥。遇寒則流行。鼻流清涕。至於不止。以肺藏感寒。寒氣上達。故其液不能收制如此。且涕泗洩皆鼻液也。以繼泣則曰涕。以生於肺則曰泗。涕甚曰洩。此獨言涕。與宣明論五臟化液肺為涕同意。

細辛丸內鼻方 治腦冷鼻塞。時出清涕。

細辛

桂心

甘遂炒

芎藭

附子各一分

辛夷半兩

木通二兩

為末。鍊蜜丸如棗大。以綿裹內鼻中。勿令氣泄。覺小痛搗生薑汁和擦即愈。一方用狗膽和丸。

芎藭膏方 治鼻塞多清涕。

芎藭

吳茱萸炒湯

蜀椒去目

細辛

乾薑

皂莢去皮子

細剉。以醋浸一宿。內豬脂於銀器石器中。煎五七沸。去滓。傾入盒中澄凝。以綿裹少許內鼻中。

黃連汁方 治鼻塞多年。清水出不止。灌鼻。

黃連去鹽

蒺藜苗二握

細剉。水二升煎至一升。取一合灌鼻中。不過再灌。大嚏即差。

蒺藜汁方 治鼻塞清水不止灌鼻。

蒺藜苗一握

細剉。以水三盞。煮至一盞。去滓。仰面先滿口含飯。取汁一合灌鼻中。不過再灌。嚏出息肉差。

鼻中生瘡

論曰。心肺有病。鼻為之不利。蓋心肺在膈上。肺開竅於鼻。心膈壅熱。氣熏於鼻間。蘊積不散。其證乾燥而痛。甚則成瘡也。惟能平調心火。以利肺經。則瘡可已。

升麻湯方 治鼻乾癢生瘡。乾嘔不下飲食。

升麻

桔梗

黃芩

犀角

貝母去心

龍膽各半

甘草炙一

每服三錢。水煎食後溫服。不拘時。

硫黃膏 治面瘡鼻頭赤爛。

硫黃 研細一錢

以葱白三寸入童便二合。浸一宿。研絞取涎。和未如膏。塗上。不見風。日二。

梔子煎方 治肺氣風熱。鼻內生瘡。

山梔子 去皮

苦參

木通 各三兩

細剉。以四兩酥同煎令香。去滓傾入盒中。每以少許滴入鼻中。

礬石煎方 治鼻中熱氣生瘡。有膿瘻。兼有蟲。

礬石 一兩

苦參

生地黄 洗令淨。絞汁三合

二味爲末。以地黃汁并水二盞。煎至三合。綿裹去滓。少吹滴鼻中。三五度差。

黃柏飲方 治鼻中熱氣生瘡。有膿瘻。兼有蟲。

黃柏 二兩

以冷水浸二宿。絞取汁一盞服之。

疳蟲蝕鼻生瘡

論曰。五臟皆有蟲。蟲得風則化。肺開竅於鼻。肺經既虛。風熱乘之。鼻氣壅塞。不得宣通。則疳蟲因得侵蝕。瘡生鼻間。

治鼻中疳瘡方

牛鼻津

取塗瘡上。

椿根湯方 治疳蟲蝕人口鼻。

椿根切一升 鹽半合

椒去目

葱 白切半

豉半升

合和。以醋及清泔各三升。同煎數十沸。去滓約及一升。分作三服。有惡物出。小兒量加減。

如聖散方 治疳蟲蝕鼻生瘡。及鼻下赤爛。

胡粉半兩 麝香研一 甜瓜蒂七枚 礬同研末

合研勻。用蟾酥少許。水浸一宿。次日取蟾水先和粉。次同和丸如菉豆大。每用二丸。水化傅瘡上。鼻下赤爛者亦塗之。小兒每用一丸。

青金散方 治疳蟲蝕鼻生瘡及鼻涕淹漬。

銅青

白礬生研各

同爲散。每用少許傅瘡上。小兒亦可用。

聖濟總錄纂要

清

新安

程

林雲來纂輯

鄞縣

曹炳章赤電校點

卷十九

口齒門

口齒統論

論曰。足太陰脾之經。其氣通於口。足陽明胃之經。手陽明大腸之經。其脈並夾於口。故其腑臟風邪濕熱發於經。則於是有口吻之疾。牙齒者。骨之所終。髓之所養也。又手陽明之支脈。入於齒。故骨髓之氣不足。與夫陽明之脈虛。不能有所滋養。於是。有牙齒之疾。牙齒之疾。其候甚多。治療之法。固不得略也。養生方云。鷄鳴時叩齒三十六下。食畢令啄齒。皆宜長行之。令齒不蠹去蟲。又早朝未起。漱口中玉。

泉令滿口嚙之。啄齒二七遍。去蟲牢齒。千金又曰。每旦以鹽一捻內口中。以煖水揩漱。及叩齒百遍。爲之不絕。不過五日。卽牢密。若此之類。皆簡易可行。行之有效。不可忽也。

口瘡

論曰。口瘡者。由心脾有熱。氣衝上焦。熏發口舌。故作瘡也。又有胃氣弱。穀氣少。虛陽上發而爲口瘡者。不可執一而論。當求所受之本也。

當歸膏方 治口爛生瘡。水漿不下。

當歸一兩 射干

升麻

附子各半

白蜜四合

豬脂五兩

除蜜外。并剉。先煎脂化去滓。入諸藥。慢火煎。候附子色黃。又去滓入蜜。更煎如膏。以瓷器盛。每服如杏核大含之。日三五度。嚙津不妨。

黃連膏方

治口瘡并咽喉塞。

黃連三兩

豬脂一斤

白蜜四兩

羊髓研二

以慢火煎猪脂。取油去渣。入黃連。又煎令黑色。下羊髓。髓化以綿濾去滓。入蜜更煎成膏。瓷盒盛。每含一棗大。日三五度。嚥滓不妨。

燒肝散方 治口瘡久不差。

茵陳蒿

犀角屑

石斛

白朮

茹 胡各半

芍藥

吳茱萸湯浸

紫參

桔梗

防風

桂心

人參

白蕪荑各一分

每服五錢。以白羊肝五兩。切去筋膜。入葱白一莖。細擘相和。濕紙三五重裹。慢

火煨熟。空腹頓服。米湯下。

巴戟散方 治元藏虛冷。上攻口瘡。

巴戟天 一兩

白芷 半兩

高良薑爲末

爲細散。用猪腰子二隻。去筋膜。每一隻入藥散一錢。用紙溼裹煨熟。乘熱去紙。

以口吸熱氣。有涎即吐。候冷細嚼服之。

生薑煎方 治口瘡疼痛。

生薑取汁一盞 白沙蜜三兩

用煎十沸。用瓷器盛。時時以熱水調一匙。含嚥之。

柳花散方 治口瘡。

黃柏一兩 煨 花半兩

為散。臨臥乾搽。誤嚥亦不妨。

升麻含汁方 治口瘡。

升麻不拘多少

一味。含一里嚥津。

升麻飲方 治口內生瘡。齒斷肉爛。

升麻 黃連 羚羊角 玄參

麥門冬 黃芩 葛根

防風 羌活 大黃各半 人參三分

甘草炙 知母各二分

每服三錢。水煎。食後溫服。

玄參湯方 治心肺壅熱。口內生瘡。胸膈痰逆。

玄參

茅根

羌活

竹茹

木通

羚羊角

升麻各半

黃連

苦竹葉

人參

半夏三錢

甘草一

每服三錢。入生薑三片。同煎溫服。食後再服。

玄參丸方 治口瘡。

玄參

天門冬

麥門冬各一

為末。鍊蜜和丸。如彈子大。每用一錢丸。綿裹含化嚥津。

口糜

論曰。膀胱移熱於小腸。膈腸不便。上為口糜。夫小腸之脈。絡心。循咽。下膈。抵胃。陰陽和平。水穀入胃。小腸受之。通調水道。下輸膀胱。今熱氣厥逆。膀胱移熱於小腸。胃之水穀。不得傳輸於下。則令腸隔塞而不便。上則令口生瘡而糜爛也。大抵心胃壅熱。則必熏蒸於上。不可概以傳藥。當求其本以治之。

大青丸方 治口糜生瘡久不差。及心脾中熱。乍發乍退。

大青去根 甘草炙 枳殼麩炒 苦參各三

生乾地黄焙 升麻各一 黃連一兩

共為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服二十丸。食後熟水下。日二服。

升麻丸方 治口糜生瘡。

升麻 黃連 黃柏 杏仁各一兩

將上三味為末。次研杏仁如膏。鍊蜜三兩。以藥末并杏仁和為丸。如彈子大。每服一丸。含化嚥津。

口吻瘡

論曰。口吻瘡者。其瘡發於唇吻之間。疼痛微腫。濕爛有汁。世名燕口。又名肥瘡。此由脾胃有熱。隨氣熏發。上攻於口唇。與津液相搏所致。

芎藭丸方 治口吻瘡。

芎藭二兩 白芷 陳橘皮去白 黃連各半

爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服二十九。甘草湯下。不拘時候。

麝香散方

治口吻生瘡久不差。

人中白研

麝香一研各

再研勻塗瘡上。

葵根散方 治口吻瘡。

取秋葵根一握。燒作灰。研爲散。傅之。

口舌生瘡

論曰。口舌生瘡者。心脾經蘊熱所致也。蓋口屬脾。舌屬心。心者火。脾者土。心火積熱。傳之脾土。二臟俱著熱。毒不得發散。攻衝上焦。故令口舌之間。生瘡腫痛。

犀角屑三分

羚羊角屑三分

丹砂三分

黃耆半兩

大黃一分

升麻半兩

生乾地黃一兩

射干一分

天門冬心一兩

玄參三分

甘草一兩

每服三錢。水煎食後溫服。

防風散方 治口舌生瘡。

防風一兩

龍膽一兩

生地黄二兩

沉香半兩

升麻半兩

每用二錢。入鹽少許。沸湯調勻。揩齒含嚙便睡。

茯神丸方 治積年口舌瘡。諸方不瘥。

茯神一兩

白朮一兩

旋復花半兩

縮沙蜜去皮三分

大黃兩半

芍藥半兩

桂心三分

郁李仁一兩

大麻仁別研二兩

人參半兩

枳殼炒三分

訶黎勒一兩

厚朴薑汁炙一兩

白檳榔三分

白鮮皮半兩

陳橘皮去白一兩

地骨白皮半兩

為末。鍊蜜和丸如梧桐子大。每服二十九丸。空心粥飲下。加至三十丸。

口瘰

論曰。口瘻者。脾之候。心脾或熱。蘊積於胃。變為腐臊之氣。停聚不散。隨氣上出。熏發於口。故令瘻也。

升麻散方 治口瘻生肌長斷。

升麻 二兩

防風 一兩

當歸

白芷

各半

川芎

藁本 各三

麝香 一分

甘草

各半

木香

細辛 各一

每用一錢。傅齒根下。甚者綿裹含化。嚥津。

七香丸方 治口及身瘻。

白豆蔻仁

丁香

藿香

零陵香

青木香

白芷

桂心 各一

香附子 二兩

甘松香

當歸 各半

檳榔 二枚

沉香 一兩

為末。鍊蜜和丸。常含一丸。大豆大咽汁。日三夜一。亦可常含咽汁。五日口香。十日體香。二七日夜被香。三七日下風人聞香。四七日洗手水落地香。五七日把他人手亦香。慎五辛下氣去瘻。

芎藭散方 治心虛寒口瘻 蟲蝕齒痛。

芎藭 白芷各一 甘草炙三 桂心去麩

杜蘅各半 當歸切三

為散。食前煖酒調下一錢。日二服。三十日體皆香。即差。

草豆蔻丸方 治心脾蘊熱。隨氣上熏。發為瘻。

草豆蔻仁 丁香香 麝香一分 藿香葉

零陵香 桂心 莎草根去毛 木香

白芷 當歸 檳榔各半

為末。鍊蜜和丸。如鷄頭大。每含化一丸。嚥津液。日三丸。

唇瘡

論曰。唇瘡者。以脾胃有熱。熱氣循經而外發於唇。故生瘡也。蓋足陽明之脈。下循鼻外。入上齒縫中。還出挾口環唇。內經謂脾之合肉也。其榮唇也。是故脾胃之經與唇相應。熱氣乘經而衝發。所以唇為之生瘡。

硫黃膏方 治脣瘡及緊瘡久不差。

硫黃 研

白礬 枯研

丹砂 研

水銀

麝香 研

黃柏 各一分
為末

同研候水銀星盡。用臘月猪脂和如泥。先拭令淨。後以膏塗之。日三五上。即差。

五倍子散方 治口脣生瘡。

五倍子 去心

槐花 擇

等分為細散。每用蜜傅脣上。如瘡口乾。以葱汁調上。

治瀝脣瘡方

鯉魚血

一味。取血磨墨。相和塗之差。

脣生核

論曰。脣生核之候。大概與脣瘡。緊脣相類。然其腫至於生核者。蓋足陽明與太陰為表裏。臟腑俱有風熱。風熱之氣。衝發二經。與血氣相搏而為脣腫。外復為風冷。

所乘。血氣凝結。聚而不散。故生核也。

防風湯方 治脾胃蘊積熱氣。復為風冷所搏。脣邊生核。結靨疼痛。

防風祛風 菊 花一兩 升麻半兩 獨活半兩

黃芩半兩 知母半兩 玄參半兩 生乾地黃半兩

薑本半兩 大黃炒半兩 梔子半兩 前胡半兩

桔梗炒 甘草炙 麥門冬各半

每服用三錢。水煎食後溫服。日三。

黃連散方 治脾胃積熱。風冷乘之。脣結核。

黃連去鬚 升麻 龍膽各一

為散。綿裹如彈子大。臨臥新汲水浸過。含化嚥津。

治脣生核腫痛如彈子方

牛膝燒灰存性研

先以鍼刺出惡血。次用藥少許。以新汲水調塗核上。

治脣黑腫生核痛痒不可忍方

古銅錢青者

放石上。以臘月猪脂。磨取汁塗之。

重舌

論曰。重舌者。以心脾二經。蘊伏熱氣。循緣經絡。上衝舌本。遂令舌下血脈脹起。如小舌狀。故謂之重舌。蓋心開竅於舌。足太陰之脈。屬脾。絡胃。上膈。俠咽。連舌本。散舌下。故也。紫雪服之甚效。

牛黃散方 治重舌。

牛黃研

人參

各半

白茯苓三分

大黃

炒半

當歸一分

甘草

研半

丹砂

研半

爲散。每服半錢。水溫調下。甚者加至一錢。食後服。

舌腫強

論曰。心氣通於舌。脾脈挾咽。連舌本。散舌下。心脾二經受風邪。則舌本強。不能卷。

舒。久或熱氣加之則腫。腫則脈筋脹急。勢連咽喉。礙於呼吸。法宜刺之。洩去惡血。及餌以藥。

白茯苓湯方 治舌腫強。

白茯苓

牛

黃研各三分

犀

角一分

甘

草炙

人

羚羊角屑

熟乾地黄

白朮

桂各半兩

每服三錢。水煎溫服。日三。

百草霜方 治舌忽緊。輒。逡巡能塞。煞人者。

百草霜

好

鹽各半兩

同研勻。表裏塗之。立效。

麤蟲散方 治舌腫滿口。言語不得。

麤蟲

五十枚

鹽半兩

細研爲散。每服以水煎熟。含。冷吐。以差爲度。

蟬蛸散方 治木舌腫強。

桑螵蛸計二月者炙黃

每服半錢。萊菔汁調下。

蚯蚓塗方 治舌腫滿塞喉欲死。

蚯蚓一條

以少許鹽花化為水。以塗咽喉舌上。良久漸消。

牙齒歷蠹

論曰。牙齒歷蠹者。腎虛弱也。骨髓不固。氣血衰耗。不能榮潤於牙齒。故令人牙齒黯黑。謂之歷蠹。

麝香散方 治齒歷蠹。

麝香一匙

定粉一錢

黃蠟半兩

細研前二味。鎔蠟調之。攤在紙上。每臨臥時剪作片子。貼所患齒上。

升麻散方 治牙齒歷蠹。齒根黯黑。

升麻

槐枝灰各半兩

白附子

蜜陀僧煨

露蜂房各一

爲散。入地黃汁一合。和勻陰乾。每用揩齒。

牙齒疼、痛

論曰。牙齒疼痛有二。手陽明脈虛。風冷乘之而痛者。謂之風痛。蟲居齒根。蝕侵不已。傳受餘齒而痛者。謂之蟲痛。二者不同。古方有塗傅激濯之藥。治去風蟲。用之各有法也。

細辛散方 治牙齒疼痛。頭面浮腫。喫冷熱物不得。

細辛

芎藭

藁本

獨活各一

地骨皮半兩

藜蘆子三分

爲散。綿裹如紅豆大。含化嚥津。每日三五度。易之。去膈間風熱。若患頭風鼻塞。先以油塗頂心。以手摩一二百遍。次用散一錢。又摩頂心。依前法。

地骨皮湯方 治牙齒疼痛。吃物不得。

地骨皮一兩

細辛半兩

生乾地黃一兩

戎

鹽一分

每用五錢。以水煎三五沸。熱漱冷吐。以差爲度。

地黃湯方 治牙齒痛。

生乾地黃三兩 獨活一兩

咬咀。每用五錢。以酒一盞。浸一宿。煎十餘沸。熱漱冷吐。以差爲度。

柳枝湯方 治齒痛連牙額疼。

柳枝 槐枝

黑豆各一

蜀椒炒去目

青鹽 細辛

羌活各一

除椒鹽外。剉。先以水六盞。煎取二盞。入椒鹽。再煎一盞。通口漱之。不拘時候。以差爲度。

齒匿蟲

論曰。齒蠹如疳。蠹蟲之證。齒根先露壞爛。膿血俱出。口內氣息。蓋緣臟腑壅滯。熏發上焦。攻衝齒牙。又有嗜肥甘過多。或宿食在齒根。不能漱去。致腐壞之氣。淹漬而成者。

雄黃膏方 治齒齲蟲蝕牙齒。

雄黃別研半兩

牛酥五兩

黃蠟

白蜜各一

藁本三分

丹砂別研

藜蘆一分

升麻

川芎

白芷

杏仁去皮尖雙

除別研藥并蜜蠟外。餘細剉。先於鑊中以酥煎所剉藥。候杏仁赤黑色。去渣。下蜜復煎二十沸。候膏成。續下別研藥。攪勿住手。候凝成膏。於瓷器盛。每以少許塗齒病處。或蟲孔中。點之大驗。

薔薇根膏方 治齒齲。

薔薇根二兩

地骨皮一兩

慈根一兩

胡粉一兩

白蠟一分

前三味俱剉。以水二大盞。煎至半盞。以重抄紙半張。浸之暴乾。更濕浸。汁盡為度。乾了以粉蠟塗之於上。剪作條子。夜臥貼之神效。

細辛散方 治齒齲齒根腐爛。

細辛二兩

川升麻二兩

地骨皮二兩

角蒿二兩

牛膝二兩 生地黃五兩

都燒為灰。細研。每夜臨臥傳齒根。或以蠟紙上貼之。至旦即去。

黃礬散方 治疳齲齒根宣露。

黃礬燒灰一分 麝香研一 乾蛤殼燒灰研 防風去叉

獨活各一分

除別研外。為散。以煖漿水漱口。後用藥貼齒根上。有涎即吐。出日再貼。即差。

藜蘆散方 治齒疳風齲。疼痛不止。

藜蘆 蜀椒去目 附子各一分 麝香研一

先以三味為散。次下麝香和勻。每用一錢。綿裹置所患處。有涎吐之。

蟲蝕牙齒

論曰。字書謂凡動皆風。蟲以風化。蓋手陽明脈入於齒。其經虛損。骨髓不榮。風邪乘之。攻入於齒。毒氣與濕相搏而生蟲。故云蟲蝕牙齒也。其狀齒根有竅。或作疼痛。甚則搖動宣露。浮腫作殍。世俗亦呼為蚰牙。

玉池散方 治蟲蝕牙齒蛀。風痒搖動疼痛。及牙宣出血。氣息浮腫等疾。

地骨皮

白芷

升麻

防風

細辛

芎藭

槐花

當歸

藁本

甘草

共十味等分。搗羅爲末散。常用揩牙。良久。以溫水漱。次用藥散二錢。生薑三片。黑豆三十粒。同煎。含冷吐。

附子丸方 治久患牙疼及齒。附子

子

臍生

去皮

蜀椒

萆撥

黃蠟

各一

四味搗羅。三味爲末。鎔蠟和丸。如梧桐子大。每用綿裹一丸。以患牙咬之。如蝕安在。蝕竅內。

比金散方 治牙疼不止。去風。神效。

雄黃

不拘

一味研細。隨左右疼處。以剜耳子送入耳中。立止。

治牙齒風。蝕疼。痛方

烏頭法皮

芎藭

甘草

地骨皮

細辛

高良薑

白芷等分

共七味。搗羅爲散。以指點藥措於藥處出涎。以溫水漱三五度。卽差。

腎虛齒風痛

論曰。腎主骨髓。齒者骨之餘。而髓之所養也。足少陰經虛。氣血不能榮養骨髓。故因呼吸風冷。浮漱寒水。冷則令齒痛而不已。

地黃丸方。治腎臟虛。食冷熱齒皆痛。

生地黃一兩

白茯苓

防風

獨活

枸杞子

山藥各半

右六味。搗羅爲末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每空心煎棗湯下十九至十五丸。

雞腸草散方

白礬

訶梨勒皮

藿香子

早蓮子

晚蠶沙

青鹽

茜根

皂 莢各一 麻 粃半兩

共十味。除礬并青鹽、麝香、蠶沙外。各剉半寸。用磁瓶一枚。開口入諸藥在內。紙筋鹽泥固濟。以炭火半秤煨。盡火放冷。取出研如粉。早晨、食後、夜臥。搯三兩上。頃之漱口。

齒風腫痛

論曰。齒風腫痛者。齒根虛浮。牙齒疼痛。或過呼吸風冷。其痛愈甚。則斷臚腫赤。乃至動搖。此蓋手陽明經虛。風客其脈。流注齒間。故爲齒風腫痛之患也。

芎藭湯方 治風齒疼腫及口瘡。

芎 藭 當 歸 獨 活 細 辛

白 芷各一

共五味。搗爲末。每用五錢。水煎。熱含冷吐。如此三五次。易取差爲度。

萹撥散方 治諸陽氣虛。風攻牙齒疼痛。不任寒熱。嚼物隱痛。

萹 撥 苦 參 防 風 升 麻各三

藁 本 一 分

共五味。搗羅為散。每三錢水煎。熱漱冷吐。

皂莢湯方 治諸風齒疼痛。

皂 莢 一 挺 去 皮 子
炙 令 黃 色

露 蜂 房 一 枚
劈 碎

鹽 一 分

三味劈剉。分為三貼。每貼以漿水煎。熱漱冷吐。

齒 斷 腫 骨 髓 風 附

論曰。足陽明之脈。起於鼻交頰中。旁約太陽之脈。下循鼻外。入上齒中。手陽明之脈。其支者。從缺盆直入上頸。貫頰下。入齒縫中。若其經虛。風熱所襲。傳流齒牙。攻注斷肉。則致腫痒。甚者與斷間津液相搏。化為膿汁。或血宣而不可已。

黃芩湯方 治齒斷腫痛及蟲蝕。

黃 芩

甘 草

當 歸

細 辛 各 一

蛇 床 子

桂 心 各 一

右六味。共搗篩。為粗末。每用五錢。酸漿水一盞。煎十沸。熱含冷吐。

地骨皮散方 治骨膇風。牙齒宣露。腫痒浮動。疼痛作時。或斷爛生瘡。兼治大人

小兒口瘡。

地骨皮

麥蘗一

豬牙皂莢半兩

青鹽一分

右四味同搗碎。入鍋炒。搗羅爲散。每用先以鹽漿水嗽口。搽擦。

風疖

論曰。風疖之病。其候臆斷虛腫。牙齒動搖。侵蝕齒根。腐殞脫落。下攻斷頰損爛。膿血俱出者是也。蓋緣手足陽明之經氣虛。風邪熱毒。在胃蘊積。日久上熏胸間。攻發口齒。故成斯疾。

升麻細辛散方 治風疖痒痛。侵蟲斷爛。

升麻

細辛

藁本

防風

芎藭

凝水石研各一兩

甘草炙半兩

右七味。搗研爲散。取少許貼齒痒處。又取一錢。綿裹含化嚥津。當令藥味相接爲佳。

治風疳出血。及牙齒浮動。牢牙散方。

皂

五挺燒存性
小者用十挺

附

子生一枚

乳

香研半

麝

香許少

四味搗研爲末。如常措齒。良久漱之。頻用爲妙。

齒間出血

論曰。邪僭熱在上。流傳於手陽明之脈。注於齒間。則令齒斷虛腫。甚者齒間出血。蓋血性得溫則宣流故也。

龍腦散方。治牙齒疼痛。斷間血出。去口氣。辟風冷。

龍

腦研一

蔓荊實

細辛

升

麻酪一

共四味。搗羅。三味爲散。入龍腦拌勻。每用半錢。措齒良久。以溫湯漱口。胡粉散方。治牙宣血出不止。

胡

粉半兩

麝

香錢半

二味同研爲散。臨臥淨措牙漱口。兼能牢牙。

齒齲

論曰。齒齲之病。由風熱邪氣客於手足陽明二經。其狀斷腫。或腫膿出而瘻。久則侵蝕齒斷。宣露。一名風齲。

蜀椒湯方 治牙齒風齲疼痛。

蜀椒去目并

芎藭

細辛

升麻

莽草

防風

黃芩各一

右九味搗篩。每用五錢水煎。熱漱冷吐。

白礬散方 治齲齒斷腫出膿汁。

白礬燒灰分

蟾酥半分

乾蝦蟆

麝香半分

雄黃半分

熊膽一分

右六味搗羅為散。每用半錢。傅牙根。

牛膝散方 治牙齒風齲。疼痛解骨。膾風毒氣。

牛膝為一兩燒灰

爲末以少許著齒間含之。

又方 取郁李根一握切。水一盞。煎至六分。熱含之。吐出蟲長六分。黑頭蟲。

牙齒動搖

論曰。手陽明支脈。入於齒。足太陽之脈。又徧於齒。爲骨之所終。髓之所養。若經脈虛。風邪乘之。血氣損少。不能榮潤。故令動搖也。

治齒風動搖捍齒牢牙方

丹

砂別研一兩

青

礬別研半兩

白

礬別研半兩

馬牙硝

別研半兩

防

風半兩

細

辛半兩

黃

蠟一兩

麻

油三兩

松

節二兩

當

歸半兩

松

脂二兩

黃

耆一兩

臘月豬脂半斤

右十三味。除脂蠟油外。並細剉。先於鑊中。煎脂濾去滓。次下油。煎三兩沸。續下剉藥。煎十餘沸。以綿濾去滓。再下蠟。並別研藥。慢火養成膏。於瓷器盒盛。每用少許塗傅患處。卽差。

防風湯方 治齒根出露。動搖疼痛。

防風 一兩

蔓荊子 一兩

細辛 半兩

川升麻 半兩

地骨皮 半兩

赤茯苓 半兩

芎藭 一兩

共七味。都剉碎和勻。每用半兩。以酒水同煎。熟含。就於患處良久。冷卽吐。含盡爲度。日二。此一劑永差矣。

地黃丸方 治齒動搖。

生地黃 五斤粗

山藥 四兩

枸杞根 三兩

人參 一兩

白茯苓 四兩

右五味。先煎生地黃汁。搗諸藥末。用好酒一斗。別煎至三升。入煎下地黃汁。同再煎。入白蜜一斤。酥少許。煎候可丸。卽成。丸如小豆大。每服酒下二十九丸。日三服。加至五服。

咽喉門

咽喉統論

論曰。咽門者。胃氣之道路。喉嚨者。肺氣之往來。一身之中。氣之升降。出入莫急乎是。詳攷經絡流注。卽咽喉所繫。非特肺胃爲然。故孫思邈曰。應五臟六腑往還。神氣陰陽通塞之道也。又人之氣血。與天地相爲流通。咽喉尤爲出納之要。故內經曰。喉主天氣。咽主地氣。若藏熱則咽門閉而氣塞。甚則咽門破而聲嘶。以至腫痛。喉痺生瘡。懸癰之屬。與夫哽塞。如有物妨悶。痛痒多涎唾。其證不一。不可概以實熱爲治。大率熱則通之。寒則補之。不熱不寒。依經調之。湯劑蕩滌之外。復有鍼刺等法。要皆急治。時不可緩。非若臟腑積久之病。磨化調養之可比也。紫雪爲要藥

升麻湯方 治喉中痛閉塞不通。

升麻

木通各一

射干

絡石

芍藥

羚羊角分三

淡竹葉

杏仁去皮尖雙仁

共八味。除竹葉外。搗篩。每服三錢。水煎入竹葉七片。煎至六分。溫服。日三。

喉痺

論曰。喉痺謂喉裏腫塞痺痛。水漿不得入也。治稍緩殺人。由脾肺不利。蘊積熱毒。

外犯寒邪。二經壅熱。結於喉間。痺而不通。其狀身熱惡寒。治法有先鍼而後藥者。可謂之急先務矣。

射干丸方 治喉痺腫塞。

射干一兩

香豉一合

杏仁去皮尖

芎藭

犀角略二

升麻一兩

甘草炙半

右七味。搗羅爲末。鍊蜜丸如小彈丸大。每服一丸。含化嚙津。日可三五服。

治咽喉閉塞不通方

大黃末一分

蝸牛二七

白礬末

馬勃一分

四味。於五月五日午時。用白梅肉。蝸牛同研和丸。如棟實大。如患者開口不得。卽以水磨。用竹管子吹下喉中立差。如輕者以綿裹含化一丸。

透關散方 治男子婦人喉痺。口噤牙關緊。

雄黃研

豬牙皂莢蜜炙

藜蘆各一分

三味研爲散。每用一匙。分彈入兩鼻中。關透處卽差。

遂巡不救方 治急喉痺。

皂生去半兩 莢生去半兩
一味。搗爲末。每服少許。筋頭點腫處。更以醋調藥末。厚塗項下。須臾便破。血出即愈。

馬喉痺

論曰。馬喉痺之狀。勢如奔馬。喉間痺痛。腫連頰骨。壯熱煩悶。數數吐氣者是也。此蓋脾肺不利。熱毒攻衝。發於咽喉所致。

生犀丸方 治熱衝喉間連頰腫。數出氣煩滿。

犀角

枳實

射干

海

藻洗去

升麻各一兩

杏仁去皮尖

白附子

百

合半兩

胡黃連

蒺藜子各三分

右十味。搗羅爲末。鍊蜜丸。如彈子大。每服一丸。綿裹嚥津。不計時。

天門冬丸方 治馬喉痺。咽喉腫痛。唇焦舌乾。頰頰連腫。

天門冬

玄參

惡

實炒各一兩

百藥煎半兩

人參一分

紫蘇葉半兩

甘草兩半

蓬砂研一

龍腦一分

右九味搗研為細末。鍊蜜和丸。如皂子大。每服一九。食後臨臥熟水下。

治馬喉腫連頰吐氣方

馬嚼鐵一具

以水三升煎至一升。細細含嚥。

龍腦散方 治馬喉痺頰咽痛。

白龍腦細研

牛黃細研

犀角屑

羚羊角屑

玄參

馬牙硝細研

沉香

甘草炙剉

硃砂以上各一分

蓬砂研一

升麻半兩

右十一味除龍腦牙硝搗篩為散。每服三錢。水一盞。竹葉七片。同煎去滓。溫入

龍腦馬牙硝一錢。攪令勻。細細含嚥。

咽喉生癰

論曰。肺氣上通於喉。經外連於咽。其氣和平。則呼吸嚥納。無所妨礙。若脾肺壅熱。熏發上焦。攻於咽喉。結聚腫痛。不得消散。熱氣熾盛。致結成癰。妨害吐納。古方論一寸爲癰。二寸至五寸爲癰。其候使人寒戰。欬吐稠濁。善用鍼者。辨其可刺。宜速破之。仍施以點餌之劑。

天門冬煎方 治喉癰咽嗑不利。

生天門冬汁二升

參一兩

生麥門冬汁一升 生薑汁一升

桂一兩

半

夏夏暑暑乾乾一兩

赤茯苓二兩

生地黄汁一升

牛黃研半

甘草三分

右十味。除四味汁外。餘六味爲末。先以天門冬、麥門冬汁煎減半。次入生薑汁。又煎減半。次又入地黄汁。并餘六味末。同煎汁欲盡。卽入白蜜一斤。酥四兩。同煎成煎。以瓷盒盛。不拘時。以溫水調下一匙。以差爲度。

射干湯方 治喉癰咽嗑腫塞及心肺熱極吐納不利。

射干半兩

升麻

大黃生用

惡實生用各

木通

馬蘭子炒半

右六味。搗篩。每服三錢。竹葉七片。水煎去滓。下馬牙硝半錢。攪令勻。不拘時候。細細溫服。

尸咽喉

論曰。道家服藥。務先去三蟲者。以其爲人害也。尸咽之病。亦本如此。巢氏謂腹中尸蟲。上蝕咽喉。能令生瘡。或痒或痛。如蠶候者是也。善攝生者。儻未能除去。亦當服藥治之。勿使妄動則善矣。

黃柏湯方 治尸咽喉閉塞出瘡。及乾嘔頭痛。食不下。

黃柏炙半

升麻

木通各一

竹茹三分

麥門冬半兩

玄參一兩

前胡

大青各三分

共八味。搗篩。每服三錢。水煎去滓。入芒硝末一錢。攪勻溫服。如鼻中有瘡。以生

地黃汁少許滴入鼻中。日三五服。不計時候。若通利。加芒硝。不欲利去之。

一捻金方 治尸咽及走馬喉痺。或腦內生癰。

雄黃研

藜蘆

猪牙皂角去皮子

三味搗研爲散。先含水一口。用藥一米許。搐鼻內。卽吐去水。少時立效。

咽喉中如有物妨悶

論曰。喉者胃之系。故咽主嚥物。天氣通於肺。故主通氣。咽喉如有物妨悶者。乃肺胃壅滯。風熱客搏。結於咽喉。使然。故聖惠謂憂愁思慮。氣逆痰結。皆生是疾也。射干湯方。治咽喉中如有物。噎塞不下。

射干

升麻

紫菀

百

合各半

木通一兩

赤茯苓

桔梗各三

右七味。每服三錢。水煎。食後溫服。如要通利。每服加朴硝末一錢。同煎服。

半夏通湯方。治咽喉如有物噎塞。飲食妨悶。

半夏湯洗

木通

乾薑各半

芍藥

桑根白皮

共五味。每服三錢。入鹽少許。煎溫服。又一方。搗羅爲末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服十五丸。食後生薑湯下。加至二十丸。

四物湯方

治咽喉中如有物。嘔吐不利。

半

夏薑洗浸

厚朴薑汁

陳橘皮浸去白

赤茯苓二兩

共四味。每服三錢。入生薑三片。同煎。食後溫服。

厚朴湯方

治咽喉中如有物。

厚

朴薑汁

赤茯苓各一

半

夏薑洗七遍紫蘇葉一兩

共四味。每服三錢。入生薑三片。同煎。食後溫服。

石蓮湯方

治咽喉如有物噎塞。飲食不下。

石蓮

人參

杵頭糠各一

共三味。每服三錢。水煎溫服。日二。

杵糠丸方

治咽喉中如有炙鬱。食即噎塞。

碓杵頭細糠二合

一味為末。鍊蜜和丸。如彈子丸。每空腹含化一丸。微微嚥津下。

杏仁煎方

治肺胃壅滯。咽喉中如有物妨悶。

杏仁

湯浸去皮桑根白皮

貝母各半

生薑汁二合

地黃汁二合

酥半兩

大棗六十枚

紫苑二分

甘草炙

桔梗炒

五味子

赤茯苓炙黑

地骨皮各一兩

人參三分

共十四味。研杏仁。以水五升。濾取汁。將草藥細剉。同煎至二升。以綿濾去滓。續下酥及地黃汁。慢火煎成膏。每食後含一匙。細細嚥津。

骨鯁

論曰。用藥之法。有不取於氣味。特以意為用者。若魚網虎骨之治骨鯁是也。然網能制魚。乃魚之所畏。虎能伏獸。乃獸之所畏。其所制伏既不同。則用之不異矣。治咽喉諸鯁。輒骨散方。

赤茯苓

陳橘皮各半兩

甘草炙

縮砂仁各一分

共四味。為散。每用二錢。先摻口中。次用新水一盞。嚥下。

馬渤散方。治骨鯁在喉中不出。

馬渤

白礬灰

惡實

陳橘皮各半兩

共四味。研爲末。漿水和丸。如櫻桃大。含化嚥津。

橘皮丸方 治骨鯁在喉中不出。

陳橘皮半斤

烏賊魚骨去甲

沙糖各一

右三味。搗羅爲末。鍊蜜和丸。如皂子大。綿裹含嚥。

粟皮丸方 治諸骨鯁在喉中不出。

粟子肉半斤 上皮爲末 乳香

鮎魚各一

三味。同研爲丸。如梧桐子大。看骨遠近。綿裹一丸。水潤外留綿線。吞之即釣出。

飴糖丸方 治諸魚骨鯁在喉中。

飴糖少

一味爲丸。如鷄子大。吞之。又漸作大丸子。再吞即效。

魚網散方 治諸魚骨鯁在喉中。

捕魚網一片

一味。燒灰研細。每服一錢。新水調下。又以魚網覆鯁人頭上。即下。

薦薦散方 治諸魚骨鯁在喉中。

鷓鴣毛翅十片

一味燒灰細研。每服一錢。濃汁橘皮湯調下。或以綿裹含嚥卽下。
薤白嚼方 治諸魚骨鯁在喉中。

薤白

一味嚼令揉。取麗線繫之。持線一端。吞薤到鯁處。引之卽出。
揉筋引方 治諸魚骨鯁在喉中。

鹿

筋不拘多少

一味漬之令軟。索如彈丸。持一端吞之。至軟處徐徐引出。

虎骨散方 治諸獸骨鯁。

虎骨

一味研細。每服一錢。水調下。狸骨亦得。
血餘散方 治食中髮鯁不下。遶喉。

亂髮一團燒灰

一味研爲細散。每服一錢。粥飲調下。

豬膏吞方 治諸鯁。

豬膏

一味。吞如杏核大。未差再吞。

螻蛄散方 治諸鯁并刺不出。

螻蛄頭一枚

一味。爲散。以綿裹嚙津。勿令鯁人知。若刺不出者。塗刺瘡上卽出。

治諸鯁方

右方用木炭皮爲末。研令極細。如無炭皮。但堅炭亦可。粥飲調下二錢。四五服。以鯁下爲度。

誤吞諸物

論曰。誤吞諸物。若金銀錢鉤之類。雖非病之自內。然無術以出之。久則害人。若舊梳治髮。磁石出針。皆意爲之治。不特取其性味。治藥之工。可謂用心精微者矣。治誤吞針及箭鏃等方。

肥豬脂肉不拘

一味。煮令熟軟。恣意飽食即下。

治誤吞針方

磁石大一彈

一味。口含之即出。

癭瘰疔瘰門

五癭

論曰。石癭、泥癭、勞癭、憂癭、氣癭。是為五癭。石與泥則因山水飲食而得之。憂勞氣則本於七情之所感。氣則隨之。或上而不下。或結而不散是也。

治癭瘰海藻散方

海藻一兩

昆布半兩

海蛤

木通

白茯苓三兩

桂心

羊脂十枚去黃

右七味。搗研為散。非時溫酒下三錢。夜再服。

茯苓丸方 治氣結喉中。蓄聚不散。成癭。

白茯苓三兩

半夏湯洗

生薑二兩

昆布

海藻各五

桂心

陳橘皮各一

右七味。為末。煉蜜丸。如杏仁大。常含化一粒。細細嚙津。令藥氣不絕。

諸瘰

論曰。瘰之為義。留滯而不去也。氣血流行不失其常。則形體和平。無或餘贅及鬱結。壅塞則乘虛投隙。瘰所以生。初為小核。寢以長大。若杯盃。不痒不痛。亦不結強。方劑所治。以治癭法同。但瘰有可鍼割。而瘰慎不破爾。

消腫散方 治骨瘰、石瘰、肉瘰、膿瘰、血瘰。大如盃盃升斗者。二三十年不差。致有

膿潰。令人骨消肉盡。或堅。或軟。或潰。令人驚惕。寤寐不安。體中掣縮。

烏賊魚骨去甲

硫黃各一

白石英

紫石英

鍾乳各半

乾薑

大黃炒

附子去皮

胡燕屎

琥珀各一

丹參三分

共十一味。爲散。貯以韋囊。勿令氣洩。若瘡濕卽傅之。若瘡乾無汁者。以猪膏和傅。日三四易之。以乾爲度。若汁不盡者。至五劑十劑止。著藥令人不疼痛。若不消。加芒硝二兩。

神效散方 治項氣癰結附贅。日漸增長。

猪羊鬚各三十枚旋入猪

陳橘皮去白一兩

三味爲散。每服二錢。空心米飲調下。初結不過數服覺消。不用久服。

瘰癧門

瘰癧結核

論曰。瘰癧結核者。由風熱毒氣蘊積肝經。攻注筋脈。毒氣鬱而不散。故項腋之間。瘰癧結聚成核。或如梅棗核狀。累累相連。其證令人乍寒乍熱。頭項強痛。心神煩躁。蓋毒氣與氣相搏。則榮衛不知使之然也。

沉香湯方 治瘰癧毒腫。

沉香

丁香

木香

麝香

研各一分

連翹

黃芩各半

犀角半兩

升麻一兩

每服五錢。水煎溫服。空心、日午、夜臥各一服。

凝冰散方 治風熱毒氣。項下結核。及欲作癰疽、瘡癤、發背等疾。

菘豆粉

乳香研各一兩

二味合研爲散。實人分作四服。虛人分作八服。食後米飲調下。就有核處一邊臥。盡劑必差。大消腫痛。

內消方 治瘰癧腫結。

蝸牛殼炙少

一味搗爲細散。每服二錢。空心米飲調下。日再。至四十九日自消。消毒塗方 治風熱結鞭。腫赤疼痛。及腮頰下忽結成核。

大黃二兩 景天即慎火草

二味同研爛。塗於患處。日再傳。

平肌散方

黃狗骨頭燒灰

鯪鯉甲燒灰各一錢

亂髮一團紙

三味。研勻。如瘡口已乾。用自津唾調溼傅之。日三四次。瘡即平愈。
治瘰癧在項上。結成顆塊及觸處。但有結凝似作癩癰。急灸法。

獨蒜頭一斤

一味。截兩頭去心。作艾炷。火與蒜稱貼瘰癧子灸之。勿令破肉。但取氣而已。覺熱勿畏。每七壯易蒜。可至七易取消。

治五種瘰癧牡蠣散方

牡蠣煨研

連翹瓦上炒

二味。爲細散。每服一錢。臨臥無灰酒調下。差後更服一兩。永不發。

瘰癧寒熱

論曰。甲乙經論瘰癧寒熱。皆鼠瘻寒熱之毒氣。留於脈而不去。上攻於項腋之間。風熱毒氣。與血相搏。則榮衛不和。故瘰癧而發寒熱也。
連翹丸方。治瘰癧寒熱。結核在項腋之下堅痛。

連翹

玄參

木香

升麻各半

大黃燕半

大麻子別研

昆布各二

枳殼燕半

共八味。搗羅為末。煉蜜丸。如梧桐子大。每服十五丸。食前米飲下。加至二十丸。

木香消毒湯方 治瘰癧連連。大小寒熱煩悶。

木香

大黃生用各

竹葉乾者

連翹一兩

獨活半兩

梔子仁一分

共六味。每服三錢。水酒童子小便共一盞。同煎溫服。

瘰癧久不差左

論曰。風熱毒氣。蘊積腑臟。攻於筋膜。則結為瘰癧。其毒氣所感深者。則衝發肌肉。令久不差。此疾尤忌憂思。恚怒。氣血勞傷。飲食寒冷。

漏蘆湯方 治瘰癧久不差。將欲破者。

漏蘆洗半兩

海藻半兩

連翹一兩

沉香半兩

山梔子仁一分

玄參

丹砂各三分

右七味。搗篩。每服三錢。水煎溫服。

烏雞丸方 治瘰癧久不差。

烏雞卵一枚

錦貝子

二味將錦貝子入在雞卵內用濕紙裹頭七重。再用泥固濟。火煨過後入地坑內出火毒。一宿取出。研細入大黃末半兩。麝香一錢。同研細煉蜜丸。如菘豆大。空心蜜水下五十丸。不過五服效。

連翹湯方 治瘰癧不差。敗肉生膿。

連翹

犀角各一兩

玄參

木通

黃耆

漏蘆

杏

仁去皮尖雙仁炒

共七味。搗篩。每服五錢。水煎。食後溫服。日二。

聖濟總錄纂要 卷十九 療癰門 療癰久不差



081

(1)8

聖濟總錄纂要

九

413.081
145
:40117

中國醫學大成第四集

方劑類

聖濟總錄纂要九

上海大東書局印行



3 0472 8400 9

254634

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷二十一

癰疽門

癰疽統論

論曰。周官瘍醫。與疾醫分職而異。治凡有瘍者。受其藥焉。蓋非專門之學。不足以深究博識故也。人之氣血。與天地同流。經絡常數。與晝夜同度。一或壅而不通。沮而不利。則血老不作汗。肉陳不脫垢。蒸氣不達。癰疽內熱。甚於焚溺。治之不可緩。是以喜怒憂樂之不時。飲食居處之不節。芳草藥石之發動。內使陰陽不平而蘊結。外致榮衛凝澁而腐化。輕者起於六腑。浮達而爲癰。外潰膚肉。經所謂榮衛稽

留於經脈之中。血澁不行。衛氣壅遏不通。熱甚則肉腐爲膿。然不陷肌膚。骨髓不爲焦枯。五臟不爲傷損。其皮薄以澤是也。重者發於五臟。蘊結而爲疽。內消骨髓。經所謂熱毒熾盛。下陷肌膚。骨髓焦枯。五臟涸竭。當其病下。良肉無餘。其皮夭以堅上。如牛領之皮是也。夫瘡腫之患。莫大於癰疽。明乎二者。則凡腫毒丹癰。可以類推矣。故證有淺深。治有輕重。若瘡發之初。湯液疏其內。鍼石疏其外。內外之治不同也。五臟內虛則平補。內實則駛利。補瀉之法不同也。瘡發於虛處則難差。發於實處則易愈。則其生有虛實之辨。富貴體逸。危殆者多。貧賤形苦。困篤者少。則其形有苦樂之辨。淺瘡欲在厚處。攻之易平。深瘡欲在薄處。達之易及。則肌肉皮膚有厚薄之辨。脈見洪滑。籠散。其病難治。脈見微澁遲緩。其病易治。則脈之與病。有應否之辨。凡癰之類。其氣浮達。宜灸熇而不宜鍼烙。凡疽之類。其氣深沉。宜針烙而不宜灸熇。此灸熇針烙之異也。淋射爛貼。以清腫毒。膏潤溫養。以生肌肉。此先後終始之序也。昔人論癰疽病者。惑於人神所在。不可妄行鍼。鍼刺見血。不知神之與形。固爲休戚。體旣不平。神焉能定。內經癰疽不得頃時回。恐內爛筋骨。第通臟腑。豈有人神之忌耶。

癰疽所生忌穴

背面九處不可患瘡

第一、入髮際爲玉枕。亦爲舌本。第二、項頸節。第三、爲崇骨。第四、大椎爲五臟。第五、脊骨兩邊肺俞穴。第六、夾脊骨兩邊脾俞穴及肝俞穴。第七、脊骨兩邊腎俞二穴。第八、後心鳩尾穴。第九、鳩尾骨穴。

正面五處不可患瘡

第一、喉骨爲重膈。第二、當胸前爲神舍。第三、爲心鳩尾。第四、當乳穴。第五、臍下二寸爲腸屈之間。

側面三處不可患瘡

耳下近耳後。牙車尖中央陷中爲喉脈一穴。當膊下下穴爲肩骨。承山上三寸一穴爲膈腸。

辨癰疽證候美惡法

夫癰疽外發。其理易明。至於內癰內疽。隱而不見。目旣不接。治之至難。然五臟六腑。有俞募雖結困於中。而自形於外。外察其部。內審其源。定藥按方。若拔芒刺然。

則癰疽之發有五善七惡之證。不可不察也。煩躁時嗽。腹痛渴甚。或瀉利無度。或小便如淋。一惡也。膿血大洩。腫焮尤盛。膿色敗臭。痛不可近。二惡也。喘籠短氣。恍惚嗜睡。三惡也。目視不正。黑睛緊小。白睛青赤。瞳子上視者。四惡也。肩項不便。四肢沉重。五惡也。不能下食。服藥而嘔。食不知味。六惡也。聲嘶色脫。脣鼻青赤。面目四肢浮腫。七惡也。動息自寧。食飲知味。一善也。便利調勻。二善也。膿潰腫消。色鮮不臭。三善也。神彩精明。語聲清亮。四善也。體氣和平。五善也。

癰疽發背。治有專門。寒熱虛實。善惡淺深。陰陽臟腑。不深諳者。恐多錯誤。東垣曰。少有差謬。變症甚於傷寒。未可按方療治。故一方不錄。其餘一切癰癤瘡毒。則精選不遺也。辛酉麥秋程林識於淮陰師古堂

附骨癰

論曰。凡身體盛熱。不可當風冷之。氣入於肌肉。則熱搏伏不得出。故附着於骨而成癰也。其狀無頭。但腫而闊。皮膚薄澤者。以毒氣伏留於內故也。法宜外散。其寒

內達。蘊結之熱。

治附骨癰方

新鼠皮一張

一味。看瘡大小裁貼。日二次。若出膿已潰者。用豬脊脂貼。吮膿出盡。即差。

治附骨癰方

蓖麻子去殼不
拘多少

一味。研令細。取塗癰上。日三兩度。即差。

治附骨癰方

生地黄取汁

一味。用銀石器中煎如膏。候冷。塗傅腫上。日三五度。即差。

乳癰

論曰。足陽明之脈。自缺盆下於乳。又衝脈者。起於氣衝。並足陽明之經。夾臍上行。至胸中而散。蓋婦人以衝任爲本。若失於將理。衝任不和。陽明經熱。或爲風邪所

客。則氣壅不散。結聚乳間。或硬或腫。疼痛有核。皮膚焮腫。寒熱往來。謂之乳癰。然風多則腫硬。色白。熱多則腫焮。色赤。若不卽治。血不流通。氣爲留滯。與乳內津液相搏。腐化爲膿。然此疾產後多有者。以衝任之經脈。上爲乳汁。下爲月水。新產之人。乳脈正行。若不自乳兒。乳汁蓄結。氣血蘊積。卽爲乳癰。又有因乳子汗出露風。邪氣外客入於乳。因氣留不行。傳而爲熱。則乳脈壅滯。氣不疏通。蓄結成膿。疼痛不可忍。世謂吹乳。速宜下其乳汁。導其壅塞。散其風熱。則病可愈。

黃芩飲方 治乳癰初覺赤腫有異於常

黃芩

甘草炙令

桑上寄生炙

麥門冬

赤芍藥

防風

黃耆炒各

木通半兩

右八味。搗篩。每服三錢。入棗三枚同煎。再入乳糖一分。更煎令消。溫服。日三。早晨。日午夜臥各一服。

鯪鯉甲散方 治乳癰疼痛結硬不可忍。

鯪鯉甲燒灰

括一枚

萋燒灰

二味。研和爲散。每服二錢。空心用葱調酒下。

牡蠣散方 治乳癰初發。腫痛結硬欲成膿。令一服差。

牡蠣取腦頭厚
真生用

一味。細研爲散。每服三錢。研澱花冷酒調下。如癰成潰者。以藥末傅之。仍更服藥。一日三服。

樺皮散方 治乳癰初發。腫痛結硬欲成膿。一服差。

以北來真樺皮燒灰。酒服方寸匕。就病乳處臥。及覺已差。

甘草飲方 治乳腫痛慮作癰毒。

甘草黃牛炙令赤
半生用

括蕪皮一枚去
瓢

二味。先以酒二盞煎甘草至一盞。入括蕪瓢同絞和勻。濾去滓。溫頓服。未差更作服之。

丹參膏方 治乳癰疼痛。

丹參

白芷

芍藥二兩各

三味。以苦酒浸經一宿。又取猪脂半斤。微火上同煎之。令白芷黃。其膏成。去滓。以膏塗癰腫處差。

乳香塗方 治乳癰。

乳香香為末

丹砂碎末

葱白三兩

三味先研葱令細入二物末再研令勻塗傅乳上乾即易之。

治乳癰結硬疼痛方

和泥芥菜半斤

一味剉碎以水四升煮取二升傾於瓷瓶內熏乳腫處日三五度即差。

治乳癰結硬疼痛方

和泥葱半斤

一味細剉以水四升煮十多沸於瓷瓶子內盛熏乳腫處冷即再煖以差為度。

連翹湯方 治吹乳乳癰。

連翹

瞿麥穗各一

升麻

生乾地黄

芍藥各三

甘草一分

射干半兩

玄參三分

右八味細剉如麻豆大每五錢水煎服食後。

腸癰

論曰。腸癰爲病。其身甲錯。皮膚急。按之濡如腫狀。腹無積聚。身無熱。或惡寒自汗。其脈遲緊者。膿未成。可下之。當有血脈。脈洪數者。膿已成。不可下也。

牡丹皮湯 治腸癰。

牡丹皮一兩

芍藥

生乾地黃

丹參各二

桔梗炒

麥門冬去心

薏仁各半

赤茯苓

甘草炙

敗醬各一

右十味。搗篩爲粗末。每服用藥五錢。入生薑五片。同煎。空心、日、晚溫服。

附子湯方 治腸癰。

附子去皮

敗醬各三

薏苡仁半

右三味。㕮咀如麻豆大。每服三錢。水煎。空心、日、晚溫服。下膿血卽差。

大黃牡丹湯方 治腸癰。

大黃炒

牡丹皮各二

桃仁湯浸去皮尖

芒硝研

冬瓜仁三合

右五味。搗篩粗末。每服用五錢。白水煎。空心溫服。以利下膿血爲度。

薏苡仁湯方 治腸癰。

薏苡仁 一兩

牡丹皮

桃

仁雙腸去皮尖

瓜子仁半兩

右四味搗篩。每服五錢。水煎。空心。日晚溫服。

胃脘癰

論曰。內經謂人病胃脘癰者。當候胃脈。其脈沉細者。氣逆。氣逆者。人迎甚盛。甚盛則熱。人迎者。胃脈也。逆而盛。則聚於胃口而不行。故胃脘爲癰也。夫陰陽升降。則榮衛流通。氣逆而隔。則留結爲癰。胃脘癰者。由寒氣隔陽。熱聚胃口。寒熱不調。故血肉腐壞。以氣逆於胃。故胃脈沉細。以陽氣不得下通。故人迎甚盛。令人寒熱如瘧。身皮甲錯。或咳或嘔。或吐膿血。觀伏梁之病。亦有俠胃脘內癰者。以其裏大膿血。居腸胃之外故也。

射干湯方 治榮衛不流。熱聚胃口。血肉腐壞。胃脘成癰。

射干 去毛

梔子仁

赤茯苓

升麻各一

赤芍藥

白朮各一兩半

右六味。㕮咀如麻豆大。每五錢水煎。入生地黃汁一合。再煎三沸。溫服。不拘時候。日二服。

麥門冬湯方 治熱氣留聚胃脘。內結成癰。

麥門冬

犀角

萎蕤

薺芎

赤芍藥

石膏各半兩

甘草炙

紫雪各一兩

右八味。搗篩。每服五錢。水煎。入竹瀝一合。再煎二三沸。溫服。

芍藥湯方 治胃脘蓄熱。結聚成癰。

赤芍藥

犀角

木通

石膏

升麻各二兩

甘草生

朴硝

玄參

麥門冬各一兩 去心

右九味。搗篩。每服五錢。水煎。溫服。不計時候。

附骨疽

論曰。附骨疽者。由風入骨解。與熱相搏。復冷濕所折。風熱伏結。不得發散。蘊積成毒。故附骨而為疽。喜發於大節解間。按之應骨。皮肉微急。隱在肌而不外見是也。治之宜急。稍緩則膿不得潰。而肢體變青黯者。不可治也。

漏蘆湯方

治附骨疽。

漏

蘆去蘆

升麻

連翹

麻

黃去根節

防

己三分

大黃炒兩

木香

白斂

沉

香各三分

右九味。搗篩。每服五錢。入竹葉七片同煎。更入芒硝一錢。攪勻。空心溫服。取利。三兩行爲度。未利再服。

敗醬湯方

治附骨疽。

敗

醬二兩

大黃炒一兩

桃仁二兩

三味。搗篩。每服五錢。先取皂莢刺一兩。剉碎。以水二盞。煎至一盞半。漉出下藥。

及朴硝一錢。同煎。空心溫服。

內消小豆散方

治附骨疽。

赤小豆一合 糯米五合
二味爲散。水調如糊塗攤。放帛上貼。乾卽易之。

瘡腫門

諸瘡

論曰。諸瘡皆緣風濕熱毒之氣。種類甚多。載之方書備矣。然有俗名瘡。本論未見採錄。考之皆不離於邪氣。逆肉理。害肌膚者。今隨症以治法附之。雖田野下俚。取而用之。判然可曉。不必泥於誦襲也。

露蜂房散 治頭面上無名瘡。黃水不止。

露蜂房

蛇蛻

各燒灰等分。入膩粉少許。拌勻。麻油和傅。

黃香餅 治鬚毛瘡在頭上。初生如葡萄。痛不止。

川鬱金五錢

川柏一兩

乳香分一

共末。桃花水和。作餅貼之。

龍骨散 治髮際瘡初生如粟米大。或癢或痛。

白龍骨

胡粉

烏賊魚骨五錢

鉛

丹五錢

共研。用鹽湯洗過貼之。日二三次。

海帶散 治緣脣上瘡。

海帶

焙乾爲末。臨臥貼上。二三宿卽差。

白龍散 治眼睛漏瘡。目大皆出膿汁。有孔子。

龍腦

馬牙硝五錢

菘豆粉一錢

研極細。用燈心蘸藥點之。日四五。

井中苔散 治徹耳瘡。

井中苔

土馬駿等分

焙乾共末。麻油和傅患上。日二。

馬齒莧塗 治唇緊面腫。

馬齒莧

去根洗淨。搗取汁塗之。冬月用末水和塗。日二。

麝香散 治鼻疳瘡。侵蝕鼻柱。

麝 香研 草 烏燒灰 三錢

共研勻乾摻。日二三。

百合散 治頤頰瘡。一名獨骨瘡。

百 合 川 柏 白 芩 一 兩 蓖 麻 子 五十

共研。用朴硝水和。作餅貼瘡上。日三五次。

紅粉散 治粉鈴瘡。繞頸項。赤爛多汁。

蜜 陀 僧 煨 白 龍 骨 錢 五 胡 粉 二 錢 鉛 丹 一 錢

共研。油和塗。日三。

芙蓉傅 治腮腫痛。或破。或瘡。

芙蓉葉

取生者。爛搗如泥。傅之。帛繫。一日換。

敗蹄散 治天柱瘡。生脊大椎上。如錢大。赤色。出黃汁不止。

驢蹄刀削二十片燒炒胡粉熟一麝香少許
共研未破。用米醋麵糊和成膏塗上。已破乾摻。日二。

諸惡瘡

論曰。內經云。諸瘡瘍皆屬心。諸濕腫皆屬脾。蓋心主血。脾主肉也。由體虛受風濕邪毒。與氣血相搏。故發瘡也。甚者焮腫滿痛。潰而多汁。或形體為之壯熱。稍緩不治。則毒氣內攻。難以療也。

麝香散 治一切惡瘡。久不差。

麝香當門子二枚丁香香木香紫檀香一分

乳香沒藥錢五

共末。用雞子清和勻。入殼內。飯上蒸熟。晒乾。研。分六服。茶飲下。日二。
膩粉乳香散 治一切惡瘡。久不差者。

膩粉二錢乳香一錢慈白根一

共搗爛。攤帛上貼之。三日一易差。

二黃散 治一切不測惡瘡。年深不愈。

大黃

川連

山梔

白芨

青黛

連翹 五錢

共末。水和塗。

白香散 治一切惡瘡久不差。

楓香脂

膩粉

防風 一分

共研末。用甘草水洗過。傅上。痛立止。

蛇牀子散 治一切惡瘡久不差。

蛇牀子

膩粉

硫黃 一分

共末。用麻油和傅。日二。

反花瘡

論曰。瘡生惡肉。久則反出瘡外。故名曰反花瘡。其初如飯粟。破之血出。餘毒尙熾。惡肉隨生。根深而膿潰。皆風熱毒氣所作。

甘草塗 治反花瘡。

甘草半生

白枯礬

人中白煨

蜜陀僧錢五

共研爲細末。用童便慢熬成膏。煎葱椒水洗過。傅上。日三五次差。

胭脂塗 同上。

胭脂一兩

胡粉兩半

共研勻。以鹽湯洗過乾塗。日三次差。

藜蘆傅 同上。

藜蘆細末

雄猪脂一兩

化猪脂入末。和成膏。塗患上。日三五次。

柳槐煎 同上。

柳枝葉

槐枝葉

細剉各二升。用水五升。煎減半。去滓。煎如稠餈。塗患上。日三五。

浸淫瘡

論曰。心惡熱。若風熱蘊於心經。則神志躁鬱。氣血鼓作。發於肌膚而爲浸淫瘡也。其狀初生甚微。痒痛汁出。漸以周體。若水之浸漬。淫泆不止。故名曰浸淫。其瘡自內而出。流散四肢者輕。以毒氣外出故也。從四肢反入於內。則重。以毒氣內入故也。

升麻湯

治心有風熱。淫瘡偏體。

升麻

大黃

片芩

白芍

枳實一兩

甘草

川歸五錢

水煎五錢。入燈心一把。空心溫服。日二。

鯽魚塗

治瘡癬浸淫。

生鯽魚三四寸長者一尾

香豉一合

搗極爛。塗瘡上。日二易。

雄雞冠血塗

忽得浸淫瘡。不早治。繞身周匝。則能殺人。

雄雞冠血性烈雄大者

用針活取血塗。傅瘡。日三五次。卽差。

燕窠傅 治浸淫瘡久不差。

胡燕窠

取向東方者爲細末。用葱椒水洗過。傅瘡上。日二三效。

苦楝根傅 同上。

苦楝根及皮

燒灰研細。用猪脂和傅瘡上。日二三。

下注瘡

論曰。足三陰之脈。脾腎肝之經也。并起於足大小指之內。循足跗內踝。前上膝脛中。若風濕毒氣乘之。則榮衛枯澁。稽留不行。氣脈下注於脚膝脛間。故令皮膚腫軟。結核成瘡。膿水不絕。綿歷年歲。愈而復發。以毒氣自上而下。如水之注。故名曰下注瘡。

枳殼丸 治毒氣下注脚膝。膝脛皆瘡。

枳殼去白炒 懷生地

五加皮

防風二兩

羌活一兩 黃耆三兩

共末入蜜杵丸。如梧桐子大。空心酒下二三十丸。日二。

蚯蚓泥散 治下注瘡久不差。

蚯蚓泥非菜上者燒赤地上一兩

膩粉一分 麝香五分

共末用葱湯洗過乾傅。

白黃散 同上。

白枯礬一分 川連五錢 膩粉一錢

共研末以雞子白和塗患上。日二。

鯽魚散 同上。

鯽魚去鱗腸一尾三四寸大 川連五錢 鉛丹

胡椒粉 蜜陀僧煨赤研

共末入魚肚內纏扎。用泥固濟。燒赤出火毒。研末入猪膽汁和傅。日二。此方

亦治惡毒瘡。

蒜灰散 治一切惡毒風濕瘡。下注血氣冷。新肉不生者。

蒜大者百頭

去衣根苗。切片。暴乾。入小鐵鍋內。淨盆蓋之。用鹽泥封固。不令透氣。以火煉成灰。出火毒。研細。乾傅瘡上。日二。此治冷惡瘡最妙。若熱毒惡瘡不可傅。傅之肉反爛開故也。

冷瘡

論曰。形不足者。溫之以氣。氣能養形。故也。周官瘍醫。掌腫瘍、潰瘍、金瘍、折瘍。有五氣養之法。蓋以氣不足則血不行。血不行則經久不差。所謂冷瘡是也。蓋諸瘡既潰。風冷之氣。客於榮衛。傷於肌肉。故令瘡冷而不痛痒。俗謂之冷癩。治宜溫肌養心。淋瘀除膿則愈。

二黃散 治冷瘡不愈。

雄黃

雌黃

定粉

膩粉

蜜陀僧一兩

乳香一兩

共研末。入生蜜和傅。日二。

葱白湯蒸法。治一切瘡風冷腫痛。皆因瘡腫。坐於水中。及風所致。若腫脹入腹。則能殺人。

葱白

薤白半斤

川椒

香豉二合

川芎一兩

防風二兩

共粗搗。用長瓷瓶內藥。入水三升。以故帛紙數層封口緊縛。重湯煮熟。取孔通氣。以瘡當氣口上射之。令瘡出黃水盡即止。日二次。

月蝕瘡

論曰。月蝕瘡小兒多有之。蓋由嗜肥甘榮衛不清。風溼毒熱之氣。蘊積腑臟。其瘡多生於兩耳。及鼻面間并下部諸孔竅側。侵蝕之甚則潰爛。黃赤汁流達於筋骨。月初則瘡盛。月晦則瘡衰。以其隨月盈虛。故名之月蝕瘡。或謂小兒以手指月生。未必盡然。

水銀膏。治月蝕瘡。多在耳上及竅傍。隨月盈虛者。

水銀一分

胡粉與銀研不見星

松脂

川連末五錢

豬脂四兩

熬脂化香去滓。再熬入銀粉攪勻。以鹽湯洗過。傅瘡上。日二三。

酥粉塗 治月蝕瘡。

蟾酥五錢 胡粉一兩

共研。塗瘡上。日二三次。

又方 治卒得月蝕瘡。

地龍尿 豬脂

和塗患上。日三次差。

凍爛腫瘡

論曰。經絡氣血。得熱則淖澤。得寒則凝滯。冬月嚴寒。氣血凝聚不流。則皮肉不溫。瘡音凍。焮赤。痛腫而成瘡。輕則潰爛。重則損壞肢節也。

白欬散 治大人小兒凍手皴裂成瘡。

白欬末三分

白芨末五錢

油 麻仁搗

萊菔子二合

同爛研。酒和勻。日二。

猪懸蹄膏 治手足凍瘡。血出痛苦者。

猪後懸蹄

夜半時燒灰存性研末。以猪脂和。膏成傅上。日二。

雞腦膏 治凍面耳并手足凍瘡。年年發者。先癢後痛。腫破黃水及血出不止。

雞

腦雞者一枚搗

黃

蠟同上

麻

油織半

慢火熬去滓。收成膏塗傅。日二三。

羊肉湯洗 治凍瘡腫癢。

羊肉

葱

白半斤

用水煎。取汁頻洗。日二三差。

川椒湯 治寒凍面目。手足肉裂。

川椒炒

白芷

防風

食鹽一分

川芎三分

水煎頻洗。湯冷煖之。

尸脚方 治人足在冬月常裂。名曰尸脚。

雞 屎升一

用水三升。煮五沸。去滓。漬洗足裂處。冷即易之。以差爲度。

牛膠散 治寒凍足跟破裂。出血疼痛。

牛皮膠

燒灰研末。津唾和塗。

癩瘡今之膿

論曰。癩瘡者。疥瘡之類。由風熱溼毒。客搏於皮膚之間。變化生蟲。其狀生於皮肉之處。手足尤甚。赤根白頭。相對並生。狀如小豆。或若茱萸子。浸淫癢痛。抓之汁出。折裂成瘡。此蓋脾肺壅滯。風濕乘之。與熱相搏。結聚而成。治宜疏滌於內。傳藥於外。并淋洗之類。次第以治。

藜蘆膏 治癩瘡經久蟲出。

藜 蘆

枯 礬

松 脂

雄 黃二兩

苦參兩半 猪脂半斤

共研末。用脂熬末攪勻。塗瘡上。日二。

胡粉膏 治癩瘡經久不差。

胡粉三兩 水銀二兩 皂

莢取汁一水慢揉

慢火熬汁五合。入銀粉攪勻。塗瘡上。日二。

雄黃膏 同上。

明雄黃 川連一兩 片芩

胡松脂二兩

亂髮灰一分 雄猪脂六兩

用脂熬令髮盡。去渣。入末攪勻。塗患上。

蝦蟆灰塗 治濕癩瘡。

乾蝦蟆灰一隻燒 髮灰各等分

猪脂和塗。日二。

漆瘡

論曰。漆雖有毒。性有所畏。毒即中之。亦有氣適。然相近者。凡中毒輕。癢始於面。而胸臂脛膺應之。頭面腫起。赤延於目。搔之隨手生瘡。癩已而細瘡如粟。重則徧身作瘡。小如麻豆大。若桃李紅赤。腫焮異常痛楚。旋差旋發。如火燎之狀是也。

鐵漿飲

治漆瘡

鐵漿

用密絹濾過。隨量飲之。即差。

又方 同上

柳

葉生者

用水一斗。煮汁頻洗差。

芒硝湯淋洗

同上

芒

硝五兩

用滾湯入硝浸洗。日三次差。

又方 同上

豬脂

熬化頻塗瘡上。

蟹黃塗 治漆瘡焮腫痛楚。

生蟹黃

用之頻塗瘡上。乾即易之。

雞子黃塗 同上。

雞子

取黃頻塗。乾易差。

四和膏 治漆瘡徧身。焮赤腫痛。

麻油

松脂二兩

桂心末

黃蠟一兩

用油化脂蠟。入桂末和塗。

川椒湯 治漆瘡。

川椒

水煎湯。頻洗之。差。

湯火瘡

聖濟總錄纂要

卷二十

瘡腫門

湯火瘡

二九

論曰。水火之氣。當因其勢而利導之。夫湯火所傷。毒熱方熾。通導而洩其氣可也。苟救目前痛楚。遽以冷物淋搨。則熱毒寒氣內搏。致有爛骨傷筋之患。非熱氣本然也。湯火之傷。本非氣血所生病。故治不及於湯液。特在乎塗傅膏汁。專治其外而已。

清涼膏 治湯火傷。

生山藥

洗淨去皮。爛研如膏。傅瘡上。痛立刻即止。且無癍痕。

雞黃塗 同上。

雞子黃

將雞子煮熟。用黃。慢炒取油。入膩粉攪勻。傅上。無癍痕。

戊己散 治湯火瘡。大熱腫痛。

乾牛糞

燒灰存性爲末。用生麻油和塗。日二次差。

又方 同上。

好米醋

用醋傾淨土上。取醋泥傅之。日二次。立刻止痛。無癰痕。

又方 同上。

側柏葉

將葉燒灰存性。羅過。用生蜜和塗。日二三差。

聖濟總錄卷二十一 瘡腫門 湯火瘡

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷二十一

瘡腫門

丁腫

論曰。丁腫者。由風邪毒氣入於肌肉所生也。凡有十種。一者瘡頭烏而強凹。二者瘡頭白而腫實。三者瘡如堊塗色。四者瘡似葩紅色。五者瘡頭內有黑。六者瘡頭赤紅而浮虛。七者瘡頭葩而黃。八者瘡頭如金箔色。九者瘡頭如茱萸。十者瘡頭如石榴子。亦有初如風疹。搔破青黃汁出。裏有赤黑脈而小腫。亦有全不令人知。忽衣觸手摸着。則痛若故。取便不知處。亦有肉突起如魚眼之狀。赤黑疼痛徹骨。

久結皆變至爛瘡。瘡下深孔。如火針穿之狀。初作時。突起如丁。蓋故名丁瘡。令人惡寒。四肢強痛。三日瘡變焦黑。腫大光起。根硬不可近。犯之則痛徹骨。其發於手足頭面骨節間。爲氣血所會。尤宜速治。不然毒氣入腹。煩悶恍惚如醉人。治無所施矣。

丁腫方

河東柳宗元偶病丁瘡。凡四十日。他藥治之莫效。長樂賈宣伯教用蛻螂心貼之。一夕而穴。百苦皆已。次年春。因食鵝羊肉。丁又大作。再用之。亦如神效。按蛻螂心在腹下。度取之。其肉稍白者是也。以此貼瘡。半日許。可穴再易之。血盡根出而愈矣。

巴豆塗 治丁瘡。乃日本國傳來者。

巴豆十粒

半 夏一枚

附 子半枚

蛻 螂一枚

各爲末。以人糞相和。看大小瘡。作紙圈子圍瘡口。以藥傅上。用絹貼之。一日三易。

地骨皮散 同上。

地骨皮五錢

小麥

大麻子燒灰十粒

緋帛燒灰五寸

亂髮燒灰大

半夏七枚

曲頭棘刺二十枚 倒下多年 刺即棘

用骨皮半夏為末。與各灰同研勻。酒下二錢。日二。

乾薑胡椒傳 治一切丁腫惡毒。

乾薑

胡椒炒

龍骨

皂莢去皮

斑蝥去翅足

共末用酒和如膏貼上。日二。

諸疥

論曰。字書以疥有介守之義。言雖微小。介然守形體而難治。是以疥有五名。皆因風熱邪氣。客於皮膚之間。久則化為蟲。時作痛癢。故作為瘡腫。焮赤痛癢者。謂之大疥。皮內引起結根。搔之不痛。謂之馬疥。瘙癢皮起。謂之乾疥。三者為重。以風溼熱氣深在肌肉故也。若水疥。痞癩。如癩漿。溼疥。瘡小而汁出。特風熱溼於皮膚之間。故淺而輕。俱風熱之客。故皆有蟲。或謂蟻蟲內出。理或然也。治宜疏風滌熱。當

以熏浴傅塗。湯液並施則善。

苦參散 治偏身瘡疥。風毒癩癢。

苦參 白花蛇酒浸去皮骨炙

川連

川歸三兩

人參 玄參

丹參

白芍

防風五錢 白蒺藜炒去刺

共末。酒下二錢。

快肌丸 治偏身瘡疥癩癢。

威靈儂為三兩 雄猪膽三枚

用膽汁和末。丸梧子大。荆芥湯下二十九丸。

防風丸 治一切風疥瘡癬。皮膚癩癢癰疹。

防風 蟬脫 猪牙皂炙去皮 天麻三兩

共末。用精羊肉煮極爛。以酒熬成膏。丸梧子大。用荆芥酒下二十九丸。日二。

苦參丸 治一切疥瘡。

苦參 玄參 山梔 獨活二兩

甘菊

防風

大黃炒香

片苓

枳殼一兩

川連兩半

共末。蜜丸。梧子大。酒下二十九丸。日二。

五參散 治諸疥風虛惡瘡。

人參

玄參

丹參

沙參

苦參

秦艸

白蒺藜炒

山藥

子芩

防風

麻黃去根

獨活

茯苓

細辛五錢

山梔

枳殼三分

烏蛇肉酒炙

共末。水下三錢。日二。

雞子油塗 治一切惡疥瘡。

雞子黃七枚 煮熟用 慢炒取油

枯礬一分

石硫黃五錢

膩粉

髮灰

共研入油。和勻塗上。日三五次塗。

諸癬

論曰。癬之字從鮮。言始發於微。鮮縱而弗治。則浸淫滋蔓。其病得之風溼客於腠理。搏於肌肉。否澁久。則因風溼而變化生蟲。故風多於溼。則爲乾癬。但有周郭。皮枯瘙癢。搔之皮起白屑者是也。溼多於風。則爲溼癬。周郭中如蟲行。浸淫赤溼。搔癢汁出是也。風搏於氣血。則爲風癬。癢痺不痛。癢是也。如錢形。則爲圓癬。如雀目。則爲雀目癬。亦皆赤痛而瘙癢。又或牛犬所飲之水。刀刃磨淬之漿。取以盥濯。毒氣傳人。亦能生癬。故得於牛毒者。狀似牛皮。於諸癬中。最爲痛厚。乃邪毒之甚者。俗呼爲牛皮癬。狗癬白點而連綴。刀癬縱斜無定形。凡此八者。皆風溼毒氣搏於肌中。故痛癢不已。久而不差。又謂之大癬。

苦參丸 治一切風癬。皮膚瘙癢。

苦參

烏蛇肉散四

石菖蒲二兩

共末。入蜜丸。梧子大。酒下二三十丸。

丁香散傅

丁香

蝦蟆灰一兩

麝香一分

枯礬

五倍子

膩粉研五

各末研勻傅上。

一抹散 治乾癬。

天南星

草烏頭生為一椀

用羊蹄根搗取自然汁調塗三日差。

狼牙丹砂膏 治一切乾溼諸癬。

狼牙

丹砂

枯礬

雷丸

雄黃

藜蘆

硫黃一兩

共末入猪脂和成膏日塗三五次。

代指即天蛇頭

論曰。瘡發指端。爪甲脫落。名曰代指。蓋爪者筋之餘。筋骨熱盛。注於指端。故其指先腫。赤熱。焮痛。結聚成膿。甚則爪甲脫落。世俗謂之遭指。又名淪指。又名代甲。其

實此病類於指疽。然無蘊毒。故色不黯黑。卽病雖久亦不殺人。

漏蘆湯 治代指。筋骨臟腑中熱。焮赤腫痛。

漏蘆

升麻

子芩

大黃炒一

玄參三分

水煎五錢。入淡竹葉二七片。煎減半。去滓。入芒硝一錢。再二三沸。溫服。日二。已

利去芒硝。

地龍散 治代指。

地龍去泥

瓦上炙爲末。用猪脂和塗患上。日二。

升麻湯浸 治代指。雖內無蘊毒。然筋骨中熱氣壅盛。

升麻

生甘草一兩

用水煎去滓。入芒硝末一兩。攪勻浸指數十次。

蛇頭疔瘡痛不可忍。臭不可聞。

蜈蚣一條焙乾爲末。猪膽汁調。又用黑豆生研末。入繭內籠之。

替蜜塗 治代指不結靨。

替汁 白蜜

二味和煎令沸。稍熱塗上。日三五次。

熱湯蘸 治代指。爲五臟氣流注十二經。毒熱衝於手指。

熱湯

急蘸五七次。冷水浸之。又復如此。三度便塗羊膽汁。差未成膿者。用此方甚效。或以猪膽盛代指。用線紮之亦妙。

諸丹毒

論曰。熱毒之氣。暴發於皮膚間。不得外洩。則蓄熱爲丹毒。以其色如塗丹之赤。又復陽氣伏於皮膚中。故謂之丹。因熱氣慄悍。其發無常處。大則如掌。甚則周流四肢。若不急治。或壞爛出膿血。若發於骨節之間。則以藥斷截。毒氣入腹。則能殺人。治法用鑱割。明不可緩故也。

漏蘆湯 治丹毒遊走。

漏蘆

升麻

白芍

子芩

白斂

白薇

麻黃去根

甘草

大黃一兩

水煎五錢溫服。日二。

赤小豆塗 治丹毒如掌大。身赤腫痛癢。

赤小豆

為細末。以雞子白和如膏塗丹上。日二。

吳藍湯搨 治丹毒。

吳藍

升麻

石膏

片芩

白斂

犀角一兩

生地三分

山梔

大黃五錢

水煎一兩入竹瀝浸搨。

羚羊角塗 治赤黑丹毒。

羚羊角燒灰

研細。以雞子白和如膏。塗患上。日二次差。

鹿角散塗。治赤黑丹。

鹿角

燒灰存性。研末。入熟猪脂和塗。日二。

癩瘡

論曰。內經謂汗出見溼。乃生癩癧。蓋熱盛汗出。陽氣發泄而腠理疎。反以寒水洗浴。則熱氣內鬱於皮膚之間。輕則爲癩。重則爲癧也。世俗通謂之癩子。其狀皮肉如毫針所刺。徧體細瘡如疥片。愈而復發是也。

葛粉傅。治癩子。

葛粉三兩

生甘草

風化石灰微鈔

共研撲之。

滑石豆粉傅。治癩子。

滑石飛過

菘豆粉

棗木葉

共研末傅之。日三。

乾壁土傅。治暑月肌膚瘡爛。或因搔成瘡者。

陳乾壁土取向東方者

研細傅之。日三四次。隨手即愈。

肉刺

論曰。肉刺者。生於足指間。形如鰾。與肉相附。隱痛成刺。由靴履急穿相摩而成。名爲肉刺。俗呼爲雞眼睛是也。

膠脂膏貼。治肉刺。

柏木上白膠 明松脂 一兩

黃 蠟 五錢

將膠脂熬化入蠟成膏貼之。

酥粉傅。治肉刺。

蟬 酥自取 膩 粉 一錢

將酥浸溼入粉研勻。用鍼撥破。塗上蜜裹。日二。

礪砂傳 同上。

礪砂

用醋化熬成霜。以少許和柏膠傅之。其根即出。

金瘡門

金瘡血不止

論曰。血行脈中。周行灌溉。而無窮已。金刃所傷。深則其流湍激。若海洩河。馳禦之至難。要在杜其衝溢之勢。外觀其形。內診其脈之何如。若血出不斷。其脈大而止者。爲難治。若血出不止。前赤後黑。或黃或白。肌肉腐臭。寒冷鞦急者。爲難治。不可不察也。

麻黃散 治金瘡止血悶疼痛。

麻黃 兩半

白芷

附子

白芍

川歸

續斷

乾薑

炙甘草

子芩

川芎

桂心 五錢

共末。酒下二錢。日二。

天南星散 治刀刃所傷。血出不止。

天南星三枚

鉛 丹炒紫一錢

共末。研勻。乾貼患上。日二。

刀箭方 治血出不止。

石 灰燒年者一兩

鉛 丹炒三

龍 骨

狗腦骨燒五

共末。傅上。日二。

風化散 治金瘡止血定痛。

風化石灰一升 乾 薑三分

生粟子

白 藥五兩

午日共末。以備急用。

石榴花散 同上。

石榴花乾者五錢

石 灰炒升

共末。用少許傅上。少刻斷血止痛。

蒲黃散 治金瘡血出。腹脹欲死。

蒲黃 生地黄兩半 川芎 白芷
 川歸 黃耆 續斷一兩 甘草三分
 共末。空心酒下三錢。令腹中死血化為水。日三。若口噤用物斡開灌之。加大黃兩半。

金刃傷中筋骨

論曰。金刃所中。至於筋骨。其所傷深矣。然接骨絕筋。亦可接續。要在乘血氣未寒。急施治法。若不乘熱。則風冷易入。瘡縱暫愈。後必不仁。亦致痛煩而終身不完。至於小碎之骨。即當出之。不爾則膿血不絕。肌肉亦不能收斂矣。
 骨碎補丸 治一切金刃傷中筋骨。風冷所入疼痛。

骨碎補三兩

山藥

附子

虎骨炙

桂心

白檳榔

自然銅七錢醋碎

熟地

敗龜板醋炙

白薇

山黃肉

澤蘭葉一兩

五味子

川歸

乾薑五錢

肉桂二枚

肉菘蓉三分

共末入蜜杵丸。如梧子大。酒下二三十丸。日二。

金瘡中風水及瘰

論曰。金瘡中風水者。以封固不密所致也。夫中風之候。其倉卒無汗。中水之候。則出青黃汁。而又疼痛。發熱內腫硬。時爲瘰狀。可急治之。凡瘰狀口急背直。搖頭馬鳴。腰爲反折。須更十發。氣息如絕。汗出如雨。治不可緩。緩則不能救療。熟地丸。治遠年傷折。忽因風氣。於舊處痛不可忍。

懷熟地四兩

杏 仁去皮

牛 膝兩半

黃 耆

苦 參

兔絲子酒煮

肉菘蓉

草 薺一

升 麻

桂 心三分

青木香一分

訶勒皮五錢

共末入蜜丸。梧子大。酒下二三十丸。日二。

雞屎白豆酒 治金瘡中風反張者。

雞屎白一合

大 豆二合

先以豆炒焦黑。入尿白同炒熟。又以瓶貯酒三升。乘熱豆傾酒中。蓋良久。去滓。服五合。少頃又服。取汗出。飲酒後以薑粥助之。

羌活飲 治金瘡并傷折骨。諸瘡腫慎不可當風。臥溼地取涼。若風溼所傷。則發瘡口噤殺人。若覺頸項強。身拘急便服。

羌 活一兩 竹 瀝三鍾

用水煎羌活減半。去滓。入瀝再沸。分三服。

川椒罨 治金瘡中風。

川 椒生用三兩

看瘡大小。用麵作餛飩。灰火中炮熟。乘熱開一孔。當瘡上罨之。劫引風出。多做候換。數次差。

川芎湯 治金瘡中風。痛不可忍。

川 芎 防 風 羌 活 川 歸 一兩

炙甘草三分

水煎六錢。熱服取汗。如汗不出。加麻黃一兩。桂心三分。湯成。入竹瀝。沸服。日二。

鹽韭傳 治金瘡中風水腫。

韭 白 食 鹽 等 分

共搗爛。放瘡上。以火炙藥上。熱徹愈。

又方

鹿 角

燒灰存性研末。用豬脂和塗。日二差。

金瘡腸出

論曰。金刃所傷。有腸出者。有腸出已斷者。視其輕重。以決死生。腸有一頭見者。不可續也。若腹痛不可忍。短氣不能食。近則一日。遠則三日。治無及矣。腸有兩頭見者。速以桑白皮。接作線。或以麻縷續之。仍用雞白塗隙。勿令氣洩。推內之。密縫瘡口。用雄雞血塗之。腸有出而不斷者。以大麥汁洗而內之。亦如前法。須研米粥飲二十餘日。強糜百日。方可食飯。又不可令飽。恐其腸斷。仍常以湯散助之。

磁石散 治金瘡腸出宜入之。

磁石七醋碎 滑石飛過

同研。酒下一錢。日三。及以針砂塗腸上。其腸自收入而無害。

小麥飲噴腸方 治金瘡腸出不能入。

小麥三升

用水九升。煮汁五升。以綿濾過。候冷。含噴瘡上。漸入。以冷水噴其背。不令病人知。亦不可使傍人語。卒然急噴。其腸自入。不可食飽。勿使病人驚恐。恐驚則殺人難治。

毒箭所傷

論曰。箭鎗毒藥入皮膚肌肉間。令人短氣悶絕。口噤唇乾。血雖止而腹滿不能言。其人如醉者爲難治。若瘀血應時出。其瘡溫而熱。開口能言則可治。巢氏論毒箭有三種。曰嶺南夷俚人用焦銅作箭鏃。其嶺北諸處。以蛇毒螫物汁著管中。漬箭鏃。及有以苗藥爲之者。三種傷人。皆不易治。唯急飲糞汁。可以禦其毒。少緩則毒氣深入。不可救也。慎之慎之。

半夏飲 治毒箭所傷。箭鏃毒藥在內不出。

半 夏三兩用生薑二
斤取汁長三日 白 飲三兩

同炒爲末。酒下一錢。日三。瘡淺十日出。瘡深二十日方出。

雄黃塗 治毒箭所傷。

明雄黃

研極細。傅瘡上。日四五。汁出愈。此方治毒蛇、蜈蚣咬亦妙。

生薑飲 治中毒箭。

生 薑

取自然汁。飲五分。未退再飲。一方用甘草煎汁頻飲。

旋復根散 治中毒箭。

旋復根

爲末。酒下二錢。日三。仍傅瘡上。無根

箭鏃金刃入肉

論曰。凡箭鏃金刃入肉。治宜速出。內有碎骨。亦須去盡。然後傅藥。不然其瘡必不合。縱然少愈。亦常作疼痛。若神驚血亂氣奪。則死無救。

丹皮散

治金瘡箭頭在骨。多年不出。

丹皮

白 斂一兩 丁香

麝香

藿香

桑白皮一分

共末。溫酒下二錢。淺者十日。深者二十日。箭頭自出。

又方 同上。

磁石生研極細

明雄黃三分

同研勻。用菘豆煮汁下二錢。十日後輕撥便出。手足上用此末點之。亦自出。

紅散子 治中箭頭用之。摩瘡口上。

蔓陀羅子

草烏

茄子花

蓖麻子

麒麟竭五錢

共末。以好酒和調。塗摩瘡上。箭頭自出。

解骨丸 治箭鏃不出。能令自出。

明雄黃

象牙末

蜣 螞一兩

共末入蜜杵丸黍米大用一丸內瘡中以細膩羊腎脂貼之箭頭自出。

鼠肝傅 治箭頭不出。

鼠 肝五枚

研如泥傅之兼以鼠腦髓塗之良亦治針折肉中塗之自出。

象屑塗 治箭頭不出。

象牙屑

研末用蜜和塗瘡上并折針竹木刺皆出。

狐尿刺

論曰狐尿刺者乃狐狸尿草棘上人有誤犯則發腫痛熨熱多在於手足指節然亦有端居不出而被此毒者蓋毒氣有相類之症亦不因狐狸尿乃爾也。

白斂膏 治犯狐尿久不差。

白斂

羊 屎

括 蕪根 五錢

共搗如膏。裹瘡上。一伏時。其刺自出。

大豉傳 治狐尿刺在手指節間腫痛。

大 豉一兩

細嚼熟傳之。少頃取下。看豉中有毛效。如不見毛。又嚼傳之。以毛出爲度。

桂心黃蠟丸 治一切惡刺入肉者。

桂心

研末。用黃蠟化丸。看瘡口大小。置丸瘡內。以溼紙三五重搭。蓋以火燻。候丸化入肉。其刺自出。如無刺。其傷處亦平也。

獨粟塗 治惡刺不出。

獨顆粟

去衣嚼如泥。塗瘡上。帛裹半日。有刺自出。

惡刺

論曰。惡刺初得以蛇虺毒氣。經由草木水澤間。有人染着。忽似刺割。俄致腫痛。其

肉潰爛。若手足上着注。卽指節墮落。土人諳歷既多。初覺中刺。時以艾灸數十壯。十愈八九。灸弗愈者。速以下藥塗傅。

葱白蒲公英膏 治中一切惡刺。

葱 白一把 蒲公英 五兩 大 豉 一分

共爛搗。塗瘡上。外用醋麵紙封自出。

木蟲塗 治惡刺。

木中蟲 五枚

用米醋和研如泥。封之。差。

黑豆汁漬 同上。

黑豆 一升

用水煮取濃汁。頻頰漬之。差。

竹木刺傷肌肉不出

論曰。竹木刺所傷。爲患甚淺。然入人肌肉。久不得出。則損動榮衛而作瘡。或中風。

水則腫痛。若成膿淹留歲月。未易治也。但刺傷之初。宜速治之。加以塗傅。無致風水之患。

羊屎傅 治竹木刺。

羊屎

炙乾爲末。用豬脂和傅。日三五上。經宿自出。

象牙散傅 治竹木刺并鍼折不出。

象牙屑

爲末。以雄鼠腦髓和傅上立出。

糯米膏 治金瘡水毒癰疽熱毒。竹木等刺。

糯米 三升

於端午日前四十九日。以冷水浸之。日二換水。輕淘。至午日午時曝乾。挂風處。凡遇患。用少許炒焦爲末。水和成膏。塗瘡口帛縛。候瘡愈解去。若金瘡誤犯生水。作膿腫甚者。急用此膏塗之。良久其腫處即消。若癰疽毒瘡初發。纔覺焮腫痛并疔腮等症。用此末貼項下及腫處。若竹木簽刺入肉者。臨臥時貼之。明日

揭看。其刺自出在藥內。若貼腫毒。藥乾即換之。須常令溼爲妙。唯金瘡及水毒切不可換。恐傷動瘡口。

痔瘻門

諸痔

論曰。痔有五名。一曰牡痔。二曰牝痔。三曰脈痔。四曰腸痔。五曰血痔。症雖小異。大率皆飲食飽甚。情慾過度之所致也。夫飲食飽則腸胃傷。情慾過則氣血耗。毒氣乘虛流入下部。所以澀積而爲痔也。

如神丸 治腸風五痔。

烏蛇肉 酒炙

防風

大黃 煨二

枳殼 炒

黃耆

刺蝟皮 炙黑

陳皮

白蘘藜 炒去

秦芫 兩半

共末。入蜜杵丸。梧子大。空心酒下三十九。臨臥再服。當日血止定痛。

神妙湯 熏洗五痔。

草 薺

甘 草

五 倍 子

括 蕪 根

大 豉

葱 白等分

每日用一二兩煎水熏洗。日二。

神白散 治痔瘡下部發腫如梅李大痛硬不能行者。即時取效。

半 夏齊州

每用一枚研極細。入冰片一小皂子大。同研勻。用津唾和攤軟紙上貼之。即冷如冰。良久清水出漸消。未全愈再貼。去根尤妙。

牡 痔

論曰。內經謂飲食自倍。腸胃乃傷。因而飽食。筋脈橫解。故澀而為痔。其狀肛邊生鼠乳。或癢或痛。膿血時下。謂之牡痔。

蝟 皮 丸 治牡痔肛邊生鼠乳。疼痛寒熱。

附 子

槐 木 耳

枯 白 攀

川 歸

桑 白 皮

赤 芍 一 兩

楮 根 白 皮 炙

共末。入蜜杵。丸梧子大。飲下三十丸。

荊芥槐花散 治鼠乳、牡痔、便血、痛不可忍。

荊芥穗

槐花炒

枳殼炒

黃耆蜜炙

共末。空心飲下二錢。

牝痔

論曰。牝痔者。由邪熱壅在肺經。傳注大腸。又大腸久虛。風熱留滯。故令肛邊生瘡。而出血也。名曰牝痔。此皆酒食房勞過度。令毒氣攻注所為。故又謂之酒痔。

地榆湯

治牝痔肛門生瘡。下血不止。

地榆

赤芍

檳榔

川歸

黃耆炙

水煎四錢。空心溫服。日二。

淋洗白礬湯 治牝痔。

枯白礬

研末。每用五七分。入沸湯內和勻。浸洗。日二差。

脈痔

論曰。脈痔者。臟腑蘊積風熱。不得宣通也。風熱之氣。乘虛流入下部。故肛邊生瘡。癢痛血出也。蓋實為痛。虛為癢。今實熱乘虛。下攻肛腸。故癢且痛。又脈者血之腑。得熱則妄行。故血乃出也。

槐莢煎丸 治脈痔生瘡。下血癢痛。

槐 莢一斤洗入水

白 蜜二兩與莢汁

防風 黃耆炙五

杏 仁去皮 皂莢子炒三

枳殼炒一

共末。與杏末拌勻。入膏杵丸。梧子大。飲下二三十九。日二。

阿膠湯 治脈痔有蟲。時作癢痛。血出不止。

阿膠炒 艾葉 川歸 青蘗子一兩

水煎五錢。溫服。日二。

熏洗槐白皮湯 治脈痔有蟲。或下膿血。

槐白皮二斤

用水一斗五升。煎一斗。傾盆中坐熏。湯冷再煖。蟲當隨便利自出。仍用槐白皮爲末。綿包錢許。內下部中。日二差。

出蟲方 治脈痔下部如蟲咬。

桃葉十斤

搗研蒸熟。乘熱入小口器中坐熏。其蟲自出。

滌痔散 同上。

白礬研一

取小便三升溫熱。入礬末五錢。乘熱洗之。差。

血痔

論曰。血痔者。乃肺熱流毒也。肺與大腸爲表裏。今臟腑蘊熱。毒氣流滲入於大腸。血性得熱則流散。故因便而肛腸重痛。清血隨出。名曰血痔。

蝟皮散 治血痔。

蝟皮燒灰存性

白芷

黃耆

懷熟地

側柏葉

川續斷

地榆

川連一兩

共末。空心飲下二錢。日二。

地榆湯 治血痔。

地榆

熟艾

防風

枳殼炒

龍骨

黃耆

桑木耳一兩

水煎五錢。入生地一分。溫服。日二。

蒲黃湯 治諸痔下血。

蒲黃

川芎

生地

白芷

川連

川歸

白石脂

甘草一兩

水煎五錢。空心溫服。日二。

黃耆散 治血痔下血不止。

黃耆蜜炙

枳殼炒三

防風兩半

共末。空心飲下三錢。日二。

枳實槐角子散 治血痔下血久不差。

枳實 蘇炒 槐角子

木賊 五錢

共末。用皂莢湯下二錢。日二。

腸痔

論曰。腸痔者。以腸胃有風挾熱。二者乘虛入於腸間。衝發下部。故令肛邊生核。腫

痛不消。病始作令人寒熱。時有血出也。

枳殼湯 治腸痔腫痛生核。或發寒熱。

枳殼 炒 子 芩

白芍 黃耆 一兩

川芎 歸

檳榔 煨 丹參 兩半

水煎五錢。空心溫服。日二。

括蕒散 治腸痔下血。

括蕒 大者 一枚 烏梅肉 十枚

將薑切蓋去空。以梅肉實其中。仍蓋封。用黃泥包裹。晒乾。火煨存性。研末。溫酒下二錢。日二。

地榆散 治腸痔下部生核。腫痛時發。寒熱出血。

地榆 槐花半炒 甘草一兩

共末。用枳殼桑白皮湯下二錢。日二。

又方 治一切痔淋洗。

荆芥穗 生甘草二兩

同末。水煎一兩淋洗。日二。

白朮紫朮丸 治久積虛冷。腸風痔瘻。面色萎黃。虛羸。

白朮 紫朮三兩 人參

川歸一兩 黃耆 黑乾薑 陳皮兩半

共末。入蜜杵丸。梧子大。飲下二三十九丸。

二根散 治腸痔有血。

枸杞根白皮 白薔薇根白皮二兩

共末。水下二錢。日二。

氣痔

論曰。氣痔者。因便下血。或肛頭腫凸。良久乃收是也。此由毒氣蘊積腸間。及恚怒不節。酒食過傷。令下部氣滯。壅結而成。

烏蛇黃耆丸 治氣痔大便下血。脫肛腫痛。

烏蛇肉 五兩

人參

獨活

枳殼

地骨皮 一兩

郁李仁 去皮炒

羚羊角 三兩

黃耆

檳榔 兩半

大黃 炒

大麻仁 炒二

訶勒皮 一分

共末。入蜜杵丸。梧子大。酒下二十九。以利爲度。未利加丸數。

必效丸 治氣痔脫肛不收。或生鼠乳。時出膿血。久不差。

枳殼 炒

黃耆 蜜炙

共末。陳米糊丸。梧子大。空心飲下三十九。日二。

痔瘻

論曰。五痔之疾。或生鼠乳。或發寒熱。或生瘡癢痛。或下膿血。其症不一。治之不早。反勞傷過度。則毒氣浸漬。肌肉穿穴。瘡口不合。時有膿血。故成痔瘻。經曰。痔久不差。變爲痔瘻是也。又或蔓穿數處。或形似螺蛳。膿血與肌肉綿綿而下。故謂之痔瘻。昔人謂蟻蟲居腸間。多生瘻痔。方中用熏法及化蟲之藥。不可不察。

乳香丸

治一切痔瘻反花瘡。

乳

香五錢

麝香

冰片

丹砂

沒藥二錢

雄黃

黃蠟

生地一兩

共末。研勻化。蠟丸梧子大。用麥冬湯下十丸。少留末塗瘡上。

蝟皮丸

治五痔多年不差。漸成痔瘻。

蝟

皮炙焦

龍骨兩二

附子

川歸

枳殼炒

黑乾薑兩半

黃耆蜜炙

艾葉三分

共末。入蜜杵丸。梧子大。用黃耆湯下三十丸。

腸風下血

詳結陰下血

論曰。腸風下血者。由腸胃有風。氣虛挾熱。血得熱即妄行。因而滲入腸間。故令下血。故以為名。昔人謂先血後便為近血。先便後血為遠血。遠近之別。不可不察。

玉壺丸 治腸風下血。

皂莢取青嫩者半斤用水五升浸七日砂鍋煮

胡桃仁 十枚

枳殼火燒酒一升又熬鐵半入蜜一兩熬成膏 乳香

沒藥炙二兩

椿根白皮陰地者一兩

共末入膏杵丸梧子大。每服二十九。

腸風下血煎木賊湯下。五痔疾。荆芥湯下。時常瀉血。米飲下。日二。

玉屑丸 治腸風下血。及痔瘻藏毒久不差。

槐根白皮 椿根白皮

苦楝根白皮三兩三味探時春宜早夏宜遲

生天南星 生半夏五錢

威靈仙一兩 寒食麵二兩

共末拌勻。滴水丸梧子大。每服三十丸。先用水二鍾煎滾入丸。令浮再服。日二。

琥珀散 治腸風及一切血痢。脾臟下血不止。

琥珀屑 赤小豆 白芷 枳殼

槐花 鹿角霜一兩

上五味同炒焦黑爲末。入珀末拌勻。空心米飲下二錢。日二。

槐角子散 治腸風。

槐角子炒

防風

枳殼炒五

黃耆散一

共末。空心茶下一二錢。

防風散 治腸風下血。

防風微炒

黃耆散二

炙甘草

人參五錢

共末。空心飲下二錢。

白朮丸 治腸風痔瘻。脫肛下血。面色萎黃。久不差。

白朮

朮一斤用糯米三升同浸三日。曬乾細切。慢炒爲末。

懷生地半斤酒浸。飯上蒸熟。爛搗如泥。

二味和勻。用大力者搗二三千搥。如硬。入好酒。蜜少許。丸梧子大。陰乾。空心米

飲下二三十丸。日二。

牡蠣散 治腸風下血不止。及脫肛。

牡蠣

大者醋碎。七次。

細研如麵。空心飲下二三錢。日二。

傷折門

傷折統論

論曰。諸脈從肉。諸筋從骨。骨三百六十有五。聯續纏固。手所以能攝。足所以能步。凡厥運動。罔不順從。若乃倉卒之際。墜墮倒仆。傷折蹉跌。患者不測。詎可不圖療治。小則消腫而伸攣。大則續筋而接骨。各有方劑存焉。當按症施治。

從高墜下傷損腫痛

論曰。凡墜墮傷損腫痛。輕者在外。塗傅可已。重者在內。當導瘀血。養肌肉。宜察淺深以治之。

阿膠湯 治墜墮傷折手足痛。

- | | | | | |
|----|----|----|-----|----|
| 阿膠 | 白芍 | 兩半 | 生地 | 川芎 |
| 川歸 | 熟艾 | 一兩 | 黑乾薑 | 甘草 |
| | | | | 五錢 |

水煎三錢溫服。日二。

地黃糟裹方 治墜墮撲損。筋骨疼痛。瘀血凝滯。腫熱不消。

懷生地搗

酒糟等分

看輕重下藥。拌勻蒸熱。塗傅患上。用帛裹縛。日一易。

接骨膏 治一切打撲傷墜疼痛。

續斷一兩

白芨

附子

川歸

獨活

桂心

雄黑狗脊骨 燒灰白 釵

桑白皮 五錢

黃米 炒三

共末。用酒半鍾。和藥末三錢。白麵二錢。生薑自然汁少許。慢熬成膏。攤貼。三日一換。冬月用杉木皮綿繩夾縛。夏月以柳枝子五條夾縛。雖緊不妨。

續骨丸

黃蠟 煉過 半斤

鉛丹 飛過

自然銅 醋碎 七次

蜜陀僧 煨四

白礬 十二

麒麟竭

丹砂 飛過

乳香 炙去油

沒藥 炙去油

猪脂 十兩

先熬脂化蠟於冷處。入僧丹銅末再熬。攪滴水不散。又出鼎離火。下諸末。不住

手攪至凝。丸彈子大。且用笋皮襯之。極冷收貯。凡傷折用一丸。入少油化。塗傷痛處。以油紙帛護之。甚者以燈心裹木夾之。又以一丸分作小丸。熱酒下。痛即止。如藥力盡。痛未除。再一服。骨上便安。

玄胡索湯 治傷折疼痛。筋骨未合。肌肉未生。

玄胡索

川歸

白斂

懷熟地

鹿角膠

綿黃耆

桑寄生

桂心一兩

水煎五錢。空心溫服。日二。蓋煖。

傷折惡血不散

論曰。脈者血之腑。血行脈中。貫於肉理。環周一身。因其肌體外固。經脈內通。乃能流注。不失其常。若因傷折內動。經絡血行之道。不得宣通。瘀積不散。則為腫為痛。治宜除惡瘀。使氣血流通。則可復完。

黃耆湯

治傷折惡血凝滯腫痛。

黃耆

白芍

附子

生地

桂心 川歸 續斷一兩 大黃生

川椒 乾薑二兩

白水煎三錢。溫服。日二。

糟米塗 治傷折赤腫。惡血不散。疼痛。

酒糟二斤 糯米半升

用酒煮米熟入槽。煮稀稠得所。乘溫熱塗上。用帛封裹煖。一日一換。以差為度。

蒲黃散 治傷損惡血不散。不欲聞人聲。胸中氣塞。便利出血。

蒲黃一合 生地二兩 桂心 白芷

川歸 續斷一兩 炙甘草五錢

共末。酒下一二錢。日二。

葱白塗 治一切墜落打撲。腫毒疼痛。

葱白根三十

用灰火煨透。乘熱搗爛塗患上。用棉紙包縛令煖。

筋骨傷折疼痛

論曰。人之一身。血榮氣衛。循環無窮。或筋肉骨節。誤致傷折。則血氣瘀滯疼痛。倉卒之間。失於調理。所傷不得完。所折不得續。輕者肌膚焮腫。重者髀肉剝脫。治宜先整其骨。續其所折。後施貼熯封裹之劑。

麒麟竭散

治筋骨損傷疼痛。

麒麟竭

白芷

赤芍

沒

藥煨去

蒲黃

自然銅醋煨

生大黃

川

歸五錢

桂心

荷葉

骨碎補三分

共末。空心酒下二錢。日二。

川芎散 治傷折腫痛血不散。

川芎

桂心

附子

川

椒炒

甘草

蘭葉一兩

大黃醋炒

川

歸五錢

共末。酒下二錢。日二。

接骨桂芸膏 治撲打筋骨傷折。腫痛不可忍。

桂心

芸臺子

白芥子

敗龜板

大黃

虎頭骨醋炙

赤狗頭骨燒灰存性

木鼈子一兩

共末研勻。用小黃米粥攤布上。摻末一匙。裹損上。以竹片夾定。繩縛七日。

沒藥丸 治傷折筋骨疼痛。

沒藥炙研

丹砂

牛膝一兩

為末研勻。用酒麵糊丸。梧子大。丹砂為衣。用木瓜湯下二十九丸。日二。

八骨散 治筋傷骨損疼痛。

虎骨醋炙

龍骨煨研

牛骨醋炙

雞骨醋炙

狗骨

兔骨醋炙

羊骨醋炙

猪骨醋炙

楓香脂

自然銅醋碎七次

共末。每有傷折。以黃米粥熱攤布上。摻末貼患處。用布包裹。以繩縛之。

神授散 治傷折內外痛不可忍。

川歸

鉛粉五錢

蓬砂二錢

共研勻。用蘇木煎湯下二錢。仍用粟米粥攤布上。摻末。貼腫處。如骨碎用木皮

竹帛夾定繩縛。

五骨散 治傷折筋骨痛不止。

鯪魚甲項骨

虎頭項骨

猴獼項骨

黃犬項骨

野貓項骨 一兩

上五骨細剉。以米醋、好酒各半斤。浸一宿。炙黃爲末。入後藥用。

天

雄五錢 雌五錢 去皮

肉菘蓉五錢 洗淨

二味共末。與上末拌勻。每服酒下二錢。日二。又用粟米爲末。醋煮成糊。入末拌

稠。攤塗帛上。貼痛處。用帛包棉裹暖。痛立止。

傷折風腫

論曰。肌肉傷折。皮肉破裂。久而未合。爲外風所觸。則令肌肉受寒。旣不得收斂。又與氣血相搏。不得消散。故爲風腫。風腫不散。卽變膿血敗壞之疾。

荊芥湯 治傷折風腫。

荊芥穗

川 歸

川 芎

川續斷 一兩

共末。酒下二錢。日二。

地黃川歸散 治傷折爲風冷所侵。肌肉不合。腫痛。

懷熟地

川歸

羌活

獨活 一兩

共末。空心酒下二錢。日二。

沒藥散 治傷折風腫。

沒藥

川芎

附子

白芷

川椒

川歸

檳榔

甘草

桂心 五錢

共末。酒下二錢。日二。

川歸湯 治傷折皮肉破裂。風毒內攻。腫痛不消。

川歸

大黃 炒

白芷

防風

烏頭 一兩

水煎五錢。溫服。日二。

黃蠟膏 治傷折風腫痛。

黃蠟 五兩

桂心

吳茱萸 一兩

食鹽 錢炒二

聖濟總錄纂要 卷二十一 傷折門 傷折風腫

共用爲末。以麻油化蠟入末熬攪勻成膏攤。日一易。

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷二十二

傷折門

打撲損傷

論曰。打撲損傷。或焮腫疼痛。或血出不止。外須以貼澹塗傅。內須服去瘀血養肌肉和血氣之劑。次則生肌斂口傅之。以俟平復。此治損傷之大法也。

骨碎補

白芷

乳香去油

生地

當歸一兩

澤蘭葉

川芎

桂心

桃仁五錢

甘草

附子一分

共為細末。溫酒調下三錢。頃又服。

地黃湯 治墜墮傷折手足痛。

生地 川歸一兩

阿膠 白芍兩半

川芎 熟艾一兩 骨碎補一兩

桂心

甘草五錢

水煎五錢溫服。日二。

二奇湯 治打撲損傷。

威靈仙 骨碎補各五

作一服。酒煎盡量飲。蓋暖出汗即愈。

同生散 治打撲損傷疼痛。

大茴 官桂 烏藥 紫荊皮

甘草各一

右為末。每服五分。好生酒送下。盡量飲。取汗避風。瘦人三分。大便出血即愈。

被傷絕筋

論曰。被傷絕筋者。須觀其輕重治之。接續之法。要在氣血未冷之際。外用續筋止痛藥傅裏。內兼服藥調治。庶幾可救。緩則風冷入於裏。則難治矣。

聖功散 治筋骨傷折。疼痛不止。接骨續筋。

硃砂 明雄 乳香 沒藥俱去錢

麝香一字 土鼈十枚燒酒浸死焙乾

右為細末。磁餅封貯。勿令洩氣。用時強盛人服一字。瘦弱人服半字。燒酒調下。

未愈再服。

沒藥散 治跌打損傷。骨折筋絕。

乳香去油 沒藥去油 琥珀二錢 土鼈三箇燒

明礬一錢 硼砂一錢 麝香三分 半兩錢碎七次

蟹爪肉熟三錢 活牛角剉取妙黃

右為細末。每服五分。白酒送下。在下部食前服。在上部食後服。

諸骨蹉跌

論曰。諸骨蹉跌者。墜墮倒仆傷折。致諸骨蹉跌。治之須扶骨對正。用止痛生肌接骨之劑封裏。內服藥調治。倘骨碎者。便當出之。否則膿血不絕。肌肉亦不能收斂。則難愈也。

接骨紫金丹

乳 香 漱 去

紫 荆 皮

骨 碎 補

大 黃

血 竭

歸 尾

礪 砂

土 鱉燒上酒浸乾

自然銅煨碎七次 各一兩

右為細末。每服七分半。熱酒調服。其骨自接。此方治打撲骨折。瘀血攻心。發熱昏暈。其瘀血自下。吐血等症。皆可服之。如骨接而諸症未去者。去土鱉。自然銅。更服五分即愈。

傷損止痛生肌

論曰。傷折之候。皆因刑杖跌撲損傷。或掀腫疼痛。或血出不止。大抵最忌服冷物。恐血凝入心之故。內服之劑。要在溫補和血止痛為主。至於斂口生肌之外用。豈可偏廢哉。

虎骨散 治打撲損傷。疼痛不止。并治筋骨疼痛。血風走注。疼痛皆治。

虎骨 炙

自然銅 醋碎

地龍 水浸

牛膝

漏蘆

延胡索

威靈仙

龜板 炙

桂心

當歸 各一

共為細末。每服一錢。煖酒調下。

生肌散 治打撲墜損傷。諸骨蹉跌。筋絕血出。疼痛不止。傅之即愈。并治一切

癰疽腫毒。膿水將盡時用之。去腐生肌。金瘡刀斧傷。血出疼痛不止者。傅之神

妙。

白蠟

合歡皮

乳香 去油

赤石脂 煨

沒藥 去油

血竭

海螵蛸 去殼

雄黃

龍骨

兒茶

樟腦 各二

土鱉 焙乾 三枚

蟹爪肉熟

白芷

枯礬各一

珠砂一錢

麝香一字

金箔少許

右爲細末。磁罐收貯。每用少許傅傷處。立能止痛止血。合時須五月五日。或天醫日合爲妙。

傷折貼爛并膏藥

論曰。傷折之症。輕則肌膚腫痛。重則肉脫血出。既整其骨。內服去瘀生肌之劑。外必以貼爛膏藥并用可也。

接骨方 治打撲墜損傷。手足骨折。

用雄雞一隻。約一斤重者。生去毛。生去爪嘴。開腹底乘生氣卽搗爛。用五加皮研末和入搗之。以勻爲度。勿太爛。勿過乾。用時先以五加皮煮無灰老酒。飲至極醉。將骨折處用手按平。將雞藥傅上。棉帛縛之。如今日此時縛至明日此時解開。其骨卽生滿矣。如過一時其骨卽長一寸。如骨接後而尙痛者。以黑豆炒焦色。用老酒沃之。搗爛傅上。半日一換。

糟米塗 治跌打損傷疼痛。

糯米一升 酒 麴三丸

將糯米煮熟如飯。入酒麴和勻。乘熱塗上。用帛封裹。三日一換。酒香即愈。

龜板膏 治打撲損傷疼痛。

敗龜板燒灰 虎骨燒灰

川歸五錢 滴乳香炙 沒藥分一

生大黃

右為末研勻。用小黃米粥攤帛上。摻末一匙裹損上。以竹片夾定。繩縛七日。

雜療門

中藥毒

論曰。炎帝嘗百草而著本經。分上中下三品。聖功極矣。漢唐以來。漸增致千百種之繁。蓋無毒之中。而有有毒者。後代庸民。去聖已遠。不審良惡。偶誤餌之。經云。有病病當。無病胃傷。不急救之。漸致危斃。古方用甘草。菴豆能解諸毒。亦用諸藥而各相制伏者。

冬青汁飲 解砒霜毒。

先用白蠟爲末。和新汲水服之。護其腸胃。仍以冬青葉搗汁灌之。以大便去毒爲度。如冬月無葉。以根搗汁和水代之。

解中砒霜方。

羊血

雞血各一

和勻服之。

又方

稻稈。燒灰

新汲冷水淋汁濾清。冷服一碗。毒卽下。

黃連湯 解中巴豆毒。

黃連

黃柏各五

水二升。煎一升。候極冷服之。忌服熱物。仍以冷水浸兩手。

又方

寒水石

一味爲末。煮汁飲之。

解烏頭附子天雄毒

遠志一兩

防風五錢

水煎汁飲之。

服諸石藥中毒解方

白鴨屎汁

水和服之。

解中大戟毒方

石菖蒲

一味煎汁服二升差。或生搗汁更妙。

解荒花毒方

防風

甘草

防己等分

三味水四升煎二升服之。

解射罔毒方

藍汁。大豆。菜豆二合。藕汁一鍾。

二豆煎汁和勻服之。

解甘遂毒方

大豆五合

水三升煎升半服之。

食毒

論曰。飲食雖以養生。亦有時而傷生何也。凡食物諸品。莫不有陰陽五行具焉。漫不察其寒溫燥濕之性。順逆宜忌之因。人性南北異稟。食物南北異種。一或犯之。棘喉潰腹。可不慎與。倘誤中其毒。宜服藥解之。

解一切飲食毒方

大豆五合 大粉草五兩 微炒

二味搗細。用水四升。煎二升溫服。須臾或吐或瀉。毒即隨去。雖甚渴。不可飲水。又方。治誤飲饌中毒者。未審中何毒。卒急無藥可解。

薺 菴

甘草一兩

水二升。煎一升服之。入口便活。

食諸菜蕈菌中毒

論曰。諸菜雖地產陰物。而能養生。然氣有寒溼。性有善惡。偶不審辨之。其不爲禍也。幾希。如諸蕈菌。夜有光者。煮不熟者。煮訖其湯。照人無影。及欲爛無蟲者。皆不可食。倘誤中其毒。以地漿諸藥解之。

解食諸菜毒方 治食諸菜中毒發狂。煩悶吐下欲死。

葛根

生搗汁一升。服之良。或無生者。卽搗乾葛末水和服之。煮服之亦可。

治食諸菜毒方

苦

參二兩

甘草一兩

苦酒二升。同煎數沸去滓服。吐出卽愈。

治諸菌毒方

地漿水

掘地作坎。以水沃其中。攪之令濁。俄頃取之。飲三四鍾即解。又兼治楓樹菌。誤食之。令人笑不止。飲之即解。

又方

檄攬去核

搗爲泥服之。

又方

防風二兩 甘草一兩

用水四升。煎至二升。須冷飲即解。

解食諸葷毒方

木香 青皮

等分爲末。煎湯飲之。

飲酒中毒及大醉不解

論曰。本草謂酒通血脈。厚腸胃。禦霧露瘴氣。敵風雪寒威。惟糯米麵麴爲良。隨處出者名多不一。或用諸燥藥爲麴。皆大熱有毒。惟菘豆能解之。若恣飲過多。助火亂性。腐腸損身。倘中其毒。及大醉不解者。急宜服藥解之。

黃連解毒湯 治縱飲熱酒中酒毒。煩亂躁渴。引飲面赤眼紅。小便澀少。

黃連

黃柏

黃芩

山梔仁等分

水煎五錢。溫服。

解醒丸方

葛花一兩

桂花

菊花

五味子

烏梅肉五錢

共末。蜜丸。彈子大。每用一二丸。預先化下。能解酒毒。若已醉者。服之能解。飲燒酒醉死急救方

先用冷豆腐厚。傅胸膈。以護其心。仍急用清水煮滾。用鍋數箇。取氣汗水三鍾。

徐徐灌下即解。

治酒醉不醒方

甘草五錢 菘豆去殼一合

水二升。煎一升。溫服。

又方

甘菊花

九月九日採取。陰乾爲末。清飲調下三錢。

酒醉不醒方

葛根

生搗汁飲一二升卽差。

又方

菘菜子二合

細研。井華水一鍾。調爲二服。

食牛馬猪犬魚蟹中毒

論曰。天產屬陽。地產屬陰。禽獸皆陰陽生物。氣味各有冷熱之殊。性有好惡之異。

大抵諸肉補陽。能助起溼中之火。素問云。膏粱之變。足生大丁。故諸肉如熱血不
斷。落水不沉。及病牛壞馬。魚目有暎。目能開合。腦有連珠。蝦蜆不灣。蟹腹有毛。及
諸肉形色異常。皆有毒。不可食。孔子色惡不食。臭惡不食者此也。倘中其毒。宜服
藥解之。

解一切牛馬肉毒方

大粉草

細切。微炒搗細。量病人喫得多少酒。取無灰酒。一處研。去滓溫服。須臾大吐瀉。
毒亦隨去。雖十分渴。不可飲水。飲水難救。

解中雞子毒方

醇醋

飲三四口即解。

治食狗肉不消。心下堅硬。或臍脹口乾。忽發熱妄語方

韭根

杏仁一兩

蘆根三兩

水四升。煮取二升飲之。

治食魚肉毒方

苦參三兩

以苦酒一升煎三五沸去滓服吐出即愈。

解諸魚毒方

陳橘皮二兩

水三升煮取升半去滓服即愈。

又方

蘆根三兩

剉碎水三升煮一升飲之即解。

治河豚毒解方

扁豆五兩

水四升煮汁二升服之即解。

又方

橄欖十枚

水二升煎汁一升服。

治解蠃毒方

黃耆

吳

藍等分

水煎一兩服之即解。

治蟹毒方

冬瓜

生取汁飲一二升即解。

又方

紫蘇一握

搗汁一升飲之差。如無生者乾者煎汁飲之。

又方

乾蒜七枚

煮汁飲之即愈。

解金銀銅鐵石毒

治誤食金銀銅鐵方

蠶豆炒研爲細末。砂糖調服。卽從大便出。

解金毒方

斑鳩肉

治如食法煮食之解。或鷓鴣肉食之。

又方 治吞金欲死。

鴨一隻

殺取血飲之卽解。

解金銀銅鐵毒

雞屎

水淋取汁服之。或鴨屎汁亦可。

解鐵毒方

磁石

爲末。水服三錢。

蠱毒主母

論曰。蠱毒者。嶺南人多作之。凡病人中蠱。其狀令人心腹切痛。如有物咬。或吐下血。不卽治之。蝕人五臟。盡卽死。欲知是此。當令病人吐水。沉者是。浮者非。亦有以蟲蛇合作蠱藥。著飲食中。使人病瘕。此一種一年死。治之之法。當服藥使呼蠱姓名卽去。亦有服諸藥而制伏者。

蠱毒方 治卒中蠱毒。下血如鵝肝。晝夜不絕。臟腑壞敗待死。

敗鼓皮 燒灰

酒服三錢。須臾自當呼主姓名卽差。

試中蠱毒方

雞子一枚

煮熟去殼。以小銀簪一枝。插在蛋內。含口中。一頓飯時。視簪蛋俱黑卽是中蠱。倘若人與飲食。以犀角攪之。有白沫泛起。卽有毒也。用後方。

石榴皮飲 治中蠱毒

石榴根皮

東引者
剉一兩

煎濃汁飲之。卽吐出活物。

又方 治中蠱毒吐下血如爛肝。

苦瓠一枚

水二升。煮取一升服。立吐卽愈。

又方。煮苦瓠令消服神驗。

治蠱毒神驗方

胡萎根

搗爛絞汁半升。和酒服之立下。

治蠱毒神驗方

玳瑁

以水磨濃汁飲服。一盞卽解。

治中蠱毒或吐下血如爛肝方

蛭十四枚

以苦酒二升漬之。蛭死但服其汁。已死者皆可活。

治蝦蟆及蟬蚪蠱得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大喘而氣絕方

車轄脂半升

和溫酒一升。漸漸服之。其蠱自出。

又方

刺蝟皮

燒過爲末。水服三錢。當吐出毒。

治蠱毒方

牡丹根

搗羅爲末。每服一錢。日三良。

治中蠱毒方

胡荽子五合

酒二升。煮汁一升服之。

治狗咬方

甘草

杏仁一兩

紫蘇五錢

水四升煎。去滓溫服。更以三味末傅咬處。

又方

生鐵

不拘多少。煑令有味洗之。

又方

乾薑

爲末。內瘡中立差。

獼犬齧

論曰。獼犬齧者。犬發狂疾。跑躁齧人。若中之。令人疼痛不止。發狂如犬聲。不急治之。亦能殺人。男子過三日不治。婦人過五日不治。

治獼犬齧方

地榆 一兩

水二升。煑汁一升飲之。兼爲末傅瘡上。每服末三錢。白湯下。日三服。忌酒。若瘡

已差者。搗生韭汁。飲三升。

又方。治獾犬齧瘡。

礬石

爲細末。摻內瘡中。裹之立止痛。其瘡卽愈。

又方

生地黄

搗汁。飲四五合。并塗瘡口。

治獾犬齧方。

小兒胎髮炒

新香附

野菊花

研細末。酒調服。盡醉。

又方

鼠屎二升

燒存性爲末。傅瘡上。

蛇螫

論曰。諸蛇螫人。如青竹、赤練、虺蛇、地區之類。皆有大毒。倘中人。不急治之。則能殺人。

雄黃散 治諸蛇毒螫人欲死。佩之兼辟蛇毒。

雄

黃

乾

薑各等分

共爲細末。傅螫處。如辟蛇毒。用小絹袋盛繫臂上。男左女右。蛇聞藥氣遠避。香白芷散 治諸蛇螫。辟蛇毒。

香白芷

雄黃

蓼

根各等分

麝

香少許

共爲末。醋調傅螫處立愈。欲辟蛇。焚之卽遠遁去。一方用菊花根汁調傅。尤妙。

治一切蛇螫方

金線重樓

水磨少許。傅螫處。又爲細末。酒調飲之。

治毒蛇螫人方

地榆根

搗爛絞汁飲之。兼漬之。

治蛇入口并入七孔中方

母猪尾尖割斷。瀝血滴口中即出。

治蛇螫方

鳳僊花

搗爛傅之即愈。

辟蛇方

若蛇到。燒羚羊角令有烟出。蛇即去矣。

治蛇螫方

人糞

先以火酒洗過。次以糞傅螫處差。

治蛇螫方

治蠍螫人方

活蜘蛛

爛研。取汁傳之即差。

治九里蜂螫方

處士劉湯隱居王屋山。曾見一大蜂誤落蛛網。爲蜂所螫。墜地俄頃。蛛腹脹欲裂。徐徐行入草中。咬開芋梗。以傷就咬處磨之。良久腹漸消。輕走如故。自後有被蜂螫者。將芋梗傳之即愈。

治蜂螫人方

羊 酥

傳之即愈。

蜘蛛蟲等咬傷方

銹 鐵

即鐵上縮衣。取和獨蒜磨傳咬處。

治蜈蚣咬傷方

取活蜘蛛一枚。放咬處。則能吸其毒。如蜘蛛死。痛未知。更著生者。以愈爲度。

又方

蝮牛

捺取汁。滴入咬處。

又方

苦參末

百齒霜御頭

二味。酒調傅之。

治蜈蚣咬方

桑白皮

生者取汁。和白鹽傅之。

溺水死

附益

論曰。凡溺水死。心氣尚溫。而脈未絕者。宜換去溼衣。以厚衣裹之。灌以熱湯可活。切忌火烘。恐寒熱相搏之故。若或犯之。則不能救也。

治水溺死灸法

艾炷如黃豆。灸臍五七壯。如不應。移上一二分。再灸數壯可活。

溺水死方

皂角

爲末。綿裹內穀道中。須臾出水卽活。

自縊欲死。治縊死灸法。

凡自縊死。用麵塊塞糞門。勿急剪繩。用二人扶定。將繩解鬆。用艾火灸臍七壯。如不應。移上一二分再灸。只在上下臍孔間不住灸。至數十壯。猶有活者。不可因臍傷釋手。至嚙至嚙。令數人搓手心脚心熱更好。

五絕散 治自縊死併溺死。

半 夏一兩

搗篩爲末。丸如豆大。內鼻中卽愈。心溫者一日可治。

治自縊死方

梁上塵

如大豆各內一筒中。四人各一筒。同時極力吹兩耳鼻中卽活。

治自縊死。定安神。徐緩解之。慎勿割繩斷。抱定心下猶溫者。

雞冠血

刺取之。滴口中。卽活。男雌女雄。

又方

雞屎白

如棗大。酒半盞。和灌之。及鼻中佳。

聖濟總錄集要 卷二十二 雜療門 瀉水死



聖濟總錄纂要

十

413.081
148
2001/10

中國醫學大成第四集

方劑類

聖濟總錄纂要
十

上海大東書局印行



3 0472 8396 9

254635

聖濟總錄纂要

清

新安

程

林雲來纂輯

鄞縣

曹炳章赤電校點

卷二十一

婦人門

氣血統論

論曰。血爲榮。氣爲衛。行陰行陽。晝夜共行五十度。周於身內之五臟六腑。外之百骸九竅。莫不假此而致養。矧婦人所稟純陰。以血爲本。以氣爲用。在上爲乳飲。在下爲月事。養之得道。則榮衛流行而不乖。調之失宜。則氣血愆期而不應。衛生之經。不可不察。

婦人月水不通

論曰。婦人月水不通者。所致不一。有氣不化。血微不通。有先期太過。後期不通。有大病後。熱燥不通。有凝寒結滯不通。有積聚氣結不通。有心氣抑滯不通。凡此所受不同。治之亦異。蓋女人假血為本。以氣為用。血氣稽留。則澁而不行。其為病或寒或熱。或臍腹堅痛。或肌肉消瘦。久而不治。則為勞瘵之症。

地黃煎丸 治月水不行。心忪悸。身體熱。面頰紅赤。食味不美。臍下刺痛。腰膝重。

生地汁

青蒿汁

生薑汁一鍾共

麒麟竭

沒藥去油

玄胡索

凌霄花

紅藍花五錢

共末。用膏丸。彈子大。酒下一丸。

當歸湯 治血澁不行。心忪肌熱。腰重腹痛不可忍。

川歸

丹皮

川芎

白芍

牛膝

麥蘗

玄胡索

桂心五錢

琥珀

沒藥炙去油

水煎三錢。溫服。日二。

婦人月水不斷

論曰。女人以衝任二經爲經脈之海。手太陽小腸之經與手少陰心之經者。此二經相爲表裏。主下爲月水。若勞傷經脈。則衝任氣虛。衝任既虛。則不能制其氣血。故令月事來而不斷也。

白茯苓散 治女人血海不調。因虛冷成疾。致月水不絕。及赤白帶下。面色萎黃。

白茯苓

木香

懷熟地

石菖蒲

秦 芫

柏子仁

青 皮

兔 絲 子

赤石脂

烏賊魚骨

訶 勒 皮

川 歸

五加皮

牛角鯢 燒灰

杜 仲

艾 葉 燒存性

共爲末。不拘茶飲。酒任下二錢。日二。

川歸丸 治月水不斷。或多或少。四肢倦。身瘦瘁。

川 歸 三 兩

地 榆

人 參

白 朮

白 朮

鹿 茸

白 龍 骨

阿 膠

白 芍

卷 柏

石 斛

蒲 黃

紫 朴 一 兩

桂 心

枳 殼 二 兩

懷 熟 地 三 兩

共末。蜜丸。梧子大。酒下三十九丸。日二。

地黃湯 治衝任氣虛。經血虛損。月水不斷。綿綿不止。

懷生地二兩

子芩

川歸

側柏葉兩半

熟艾五錢

水煎三錢。入蒲黃一錢。食前溫服。日二。一方加地榆伏龍肝。

白芍藥湯 治月水經久不斷。

白芍藥炒

側柏葉炙各兩

用水酒同煎三錢。溫服。未差再服。

婦人月水來腹痛

論曰。月水乃經血之餘。和調則所下應期。無過與不及之患。若衝任氣虛。為風冷所乘。致氣脈不順。所下不調。或先或後。或多或少。風冷之氣。與月事相擊。故因所下而腰背拘強。臍腹刺痛也。

川歸飲 治月水不調。及欲來臍下痛。肌體熱。

川歸 白茯苓 人參 白芍
枳殼 紫朴 肉豆蔻 甘草五錢

水煎三錢。溫服。日二。

丹皮湯 治月水來而不利。攻臍腹痛不可忍。

丹皮 人參 川芎 子芩

甘草 乾薑 吳茱萸 桂心兩半

白芍 白茯苓 川歸一兩 桃仁八枚炒

水煎三錢服。

白芍湯 治月水來腹痛煩悶體熱。

白芍藥 紫朴 人參一兩 甘草

川歸 枳殼三兩 肉豆蔻五錢

水煎三錢。溫服。日二。

川芎丸 治月水來腰腹刺痛不可忍。或多或少。或來如清水豆汁。虛乏黃瘦。

川芎 白芷 生地 桃仁去皮炒

黑乾薑

蒲黃

甘草五錢

人參

白芍

丹皮

牛膝

桂心

川歸三分

共末入蜜杵丸梧子大酒下二三十丸日二。

室女月水不通

論曰。女子二七而天癸至。任脈通。月事以時下。若稟受不足。或任脈爲風寒所搏。致令風氣凝結。不能應時而下。經久不治。則致勞疾。人參湯。治室女思慮太過。心氣不足。氣結不得宣利。月水不依時。或久不通。或血隔成勞。漸有寒熱。肌肉不生。不思食味。凡此病症。不可復行破血急性之藥。宜通心氣。行榮衛。滑經絡。

人參

白芍

麥冬

丹皮

檳榔

草薺

大腹皮

白朮

川芎

生地

桔梗

防己

枳殼

丁香皮

甘草

茯神

川歸一兩

桂心

大黃

遠志

生薑大棗。水煎三錢。入酒少許溫服。日二。

赤芍藥散 治室女月水不通。

赤芍

牛膝

人參

木香

甘草

丹皮

玄胡索

川芎五錢

桂心

川歸三分

桃仁去皮尖炒一兩

共末。酒下二錢。

沉香湯 治室女榮衛凝滯。月水不利。目昏悶。肢體拘急。五心虛煩。多困少力。

沉香

檳榔

甘草三兩

人參

木香

桂心

川歸

生地

白茯苓

陳皮

青皮

柴胡

鼈甲醋炙兩半

生薑水煎三錢。溫服。日二。

羚羊角湯 治室女元氣不足。虛勞內燥。月水不利。四肢少力。頰赤口乾。五心煩熱。

羚羊角

防風

地骨皮

川芎

黃耆 蜜炙

赤茯苓

桂心

麥門冬

防風

炙甘草 一兩

懷生地 三兩

羌活

酸棗仁 炒

川歸

紅花子

白芍藥 兩半

生薑 三片。薄荷 七片。水煎三錢。入酒少許溫服。日二。

二地散 治室女月水不通。臍腹下刺痛。

懷生地

懷熟地 四兩

桂心

川歸 二兩

共末。酒下二錢。日二。

帶下

論曰。帶下有三十六種。名雖不同。其所致則一。蓋婦人衝任爲經脈之海。上爲乳汁。下爲月事。血氣和平。則生育之道得矣。苟乖於保養。風寒乘虛。襲於經絡。衝任

不能循流。血氣蘊積。冷熱相搏。故成帶下。冷則色白。熱則色赤。冷與熱并。則赤白雜下。間有五色者。各隨五臟虛損而應焉。

川芎湯 治帶下漏血不止。

川芎

吳茱萸

白芍藥

黃耆

炙甘草

黑乾薑

川歸一兩

懷熟地二兩

水煎三錢溫服。日二。

桑寄生湯 治三十六種帶下。

桑寄生

熟艾

川芎

鹿角膠一兩

川歸二兩

用酒水各半合煎。三錢溫服。日二。

若口乾渴者。加白茅根。懷生地。麥門冬各一兩。

龍骨散 治三十六種帶下不止。

白龍骨

黑乾薑一兩

黃牛角鰓燒灰三兩

禹餘糧醋淬七兩

續斷

阿膠炒

川歸五錢

共末。酒下一二錢。日二。以差為度。

側柏葉散 治帶下腹痛。

側柏葉煨二

白芍藥

川芎

牡丹皮

白芷

黑乾薑一兩

川歸五錢

共末。酒下二錢。日二。

禹餘糧散 治帶下五色久不止。

禹餘糧醋碎七

鹿茸

赤石脂二兩

烏賊魚骨去甲燒灰兩半

阿膠炒

川歸

白芍藥

蒲黃一兩

牡蠣童便碎二兩

共末。酒下二錢。日二。

川歸散 治帶下白黃不止。體瘦繞臍腹痛。

川歸

附子

白朮

白龍骨

桂心

鹿角膠粉炒一兩

共末。酒下一二錢。日二。飲下亦可。

漏下

論曰。漏下之病。經血淋瀝不斷是也。夫衝任之脈。所至有時。若非時而下。猶器之津洩。故名之漏下。蓋由血虛氣衰。不能約制。又有瘀血在內。因冷熱不調。致使血敗。其色或赤如豆汁。黃如爛瓜。黑如坏。青如藍。白如膿。五色隨五臟虛損而漏應焉。

沉香丹皮丸 治內挾瘀血。月水淋瀝不止。或多或少。四肢煩倦。

沉香 人參 丹皮 赤芍

川歸 木香 巴戟天 川芎

山藥 白茯苓 白芷 陳皮

黃耆 吳茱萸 桂心 枳殼

紫朴 肉蔻 牛膝 龍骨

黑乾薑一兩

共末入蜜杵丸。梧子大。酒下二三十九丸。日二。

白馬蹄湯 治赤白帶下。淋瀝不止。色敗如五色者。

白馬蹄 剉炒焦 二兩

白龍骨

禹餘糧 兩半

白殭蠶

赤石脂

附子

懷熟地

牡蠣 醋碎

炙甘草 一兩

川歸

烏賊魚骨 燒灰 兩半

水煎三錢。入酒少許溫服。日二。

鹿茸散 治漏下久不止。

鹿茸 去毛 炙

阿膠 粉炒

烏賊魚骨 去甲 燒灰 兩半 川歸

蒲黃 微炒 一兩

共末。酒下二錢。日二。

龜甲散 治漏下赤白。經久不止。

龜甲 醋炙

牡蠣 童便碎 二兩

共末。空心酒下一二錢。日二。以差為度。

白朮散 治赤白漏下不止。

白朮 土炒

川柏 炙 兩半

白薇 炒 五

共末。溫酒下二錢。日二。

大黃散 治漏下青色。

大黃分三

牡蠣童便

子芩

桂心一分

白薇五錢

共末。酒下二錢。

蒲黃散 治血漏不止。日久虛損。

蒲黃微炒

鹿茸去毛

川歸酒炒

共末。酒下二錢。日二。

黃耆湯 治漏下赤白淋瀝不斷。

黃耆炙兩

阿膠粉炒

炙甘草一分

大棗肉五十

水煎三錢服。

經血暴下崩血

論曰。女人經血。謂之月事者。常以三旬而一見也。若血氣和平。則所下應期。若衝

氣虛。則經血不能制約。故令暴下不止。乃至數升也。

生地散 治血傷暴下不止。腰脚疼痛。倦怠無力。心煩渴燥。面目虛浮。

懷生地

黃牛角鰓燒灰

酸石榴皮炙

人參

白芷

炙甘草

陳皮

地榆炙

川續斷

共末。飲下二錢。日二。

劉寄奴湯 治血下不止。臍下虛痛。

劉寄奴

赤芍藥二兩

艾葉炒四

白茯苓一兩

川芎

川歸兩半

水煎三錢溫服。日二。

如聖散 治經水暴下不止。

櫻櫚皮燒灰一兩

烏梅肉

黑乾薑性五味並燒存

共末。用烏梅湯下一錢。日二。久患不過二服。

續斷丸 治經水漏下。日久不止。或五色相兼而下。面萎黃。肌體瘦。腰重無力。

續斷

赤石脂

炙甘草

阿膠粉炒

川芎

丹參

地榆根

小薊根

側柏葉

鹿茸

川歸一兩

鼈甲醋炙

生地

黃牛角鯁

共末入蜜杵丸梧子大酒下三十丸。

白芍藥散 治經水不止兼五色雜下不定日夜不止。

白芍藥

黃耆

白朮

白龍骨一兩

烏賊魚骨醋炙

桂心

附子

乾薑

牡蠣醋碎五錢

懷生地三分

共末酒下二錢日二。

地黃湯 治經血不止顏色不定。

懷生地五兩

子芩

熟艾葉

川歸二兩

側柏葉

伏龍肝

蒲黃微炒

生薑三兩

地榆四兩

水煎三錢溫服。日二。

二灰散 治經水暴下不止。

蠶 絲燒灰

箬

用茶葉內者
葉燒灰各一兩

同研勻。酒下一二錢。日二。

禹餘糧丸

治經血不止。氣弱黃瘦。

禹餘糧

米醋碎

附

子臍炮

川芎

川

歸三分

白芷

黃耆蜜酥

白龍骨

桂

心

白石脂

共末入蜜杵丸。梧子大。丹砂為衣。酒下二三十丸。日二。

經血暴下兼帶下

論曰。女人臟腑久冷。素有赤白帶下。復因衝任氣虛。不能制約經血。以至暴下。則二病兼作。故謂經血暴下兼帶下也。

黃牛角鱧丸 治經水暴下兼帶下。經久不止。面黃困劣。

黃牛角鰓

赤石脂兩半

鹿茸去毛

桑白皮炒

阿膠粉炒

艾葉分三

白龍骨兩三

黑乾薑一分

共末入蜜杵丸梧子大酒下。

白芍藥酒 治經血暴下兼帶下。經久不差。

白芍藥炒

懷生地

黃耆兩三

艾葉兩一

酒一斗浸七日服。

牛角鰓散 治傷血並帶下。

黃牛角鰓酒炙

側柏葉炙

川續斷炒

熟艾

伏龍肝

川歸

赤石脂一兩

地榆

共末酒下二三錢日二。

人參散 治血傷兼赤白帶下。日久不止。

人參

五味子

艾葉燒灰

白茯苓

牡蠣醋碎

地榆

白龍骨

懷熟地

炙甘草

川芎

續斷一兩

共末。空心用酒下一二錢。日二。

白茯苓丸 治血傷兼帶下。積久不止。漸成虛勞。面黃腰脚沉重。

白茯苓 柏子仁 訶勒皮 兔絲子

木香 杜仲炒 赤石脂 五加皮

懷熟地 秦艽 川歸 石菖蒲

青皮 黃牛角鯁切 烏賊魚骨燒灰 艾葉燒灰

共末。酒下二錢。日二。醋糊丸亦可。

生地湯 治血傷帶下

懷生地炒 川歸 阿膠 黃耆炙

艾葉炒

生薑水煎三錢溫服。日二。

烏賊魚骨丸 治血海虛敗。赤白帶久下不止。肢體虛熱煩躁。頭目旋暈。口舌乾澀。

烏賊魚骨去甲

白芍藥

川歸

山萸肉

川芎

訶勒皮

酸棗仁

白茯苓

覆盆子

玄參

萆澄茄

懷熟地

地榆

黃耆煨一

共末。蜜丸。梧子大。酒下三十丸。

黃芩湯 治經水暴下帶兼赤白不止。

懷生地二兩

子芩

蒲黃微炒

熟艾

側柏葉

川歸五錢

水煎三錢溫服。日二。

車前子湯 治經血暴下。兼赤白帶下。經久不止。

車前子

子芩

懷生地

淡竹葉

阿膠一

水煎三錢服。

白龍骨散 治經血暴下。兼赤白帶下不止。

白龍骨

續斷

鹿茸

赤石脂

肉蓯蓉

白芍藥

懷生地炒

烏賊魚骨去甲燒

共末。用米飲下二錢。日二。

婦人血分

論曰。血分者。經水通之際。因寒濕傷其衝任。為之中止。氣壅不行。播在皮膚。邪氣相搏。經血分而為水。發為臍腫。故曰血分。脈經曰。經水前斷後病水者。名為血分。久之不治。積成水腫。即難治也。

枳實散 治血分身體浮腫。心腹煩滿不能食。

枳實麸炒

牛膝

青皮去白炒

猪苓去黑皮

桑白皮

川歸兩

木香

牡丹皮

防己

大黃炒

檳榔煨

甘遂炒五錢

人參一兩

共末。湯下二錢。日二。

檳榔湯 治血分上攻頭面。身體浮腫。心煩熱滿悶。

檳榔微妙

赤芍藥

郁李仁

牽牛子妙

人參

牡丹皮

百合

木香五錢

赤茯苓

牛膝

枳殼妙三

知母鹽酒妙一分

水煎三錢。溫服。日二。

婦人水分

論曰。水分者。以水氣上溢於皮膚。分散於四肢。發為臃腫。蓋腎者胃之關。關門不利。故聚水而從其類也。此病與血分相似。而治療有先後耳。
赤茯苓 治水氣在皮膚浮腫。經水不通。

赤茯苓

赤芍藥

澤漆微妙

木通

防己一兩

猪苓去黑皮

小海蛤

澤瀉兩半

桂心

陳皮妙三

共末。入蜜杵丸。梧子大。桑白皮湯下三四十丸。日二。

防己飲 治水病浮腫。因經水斷絕。名曰水分。

防己

澤漆

子芩

玄參

陳皮一兩

赤茯苓

葶藶紙炒

杏仁

白朮

猪苓

大豆半兩

桑白皮一

水煎三錢服。

甘遂丸

治水分四肢浮腫。經水斷絕。

甘遂微煨一兩

天冬去心

川連兩半

葶藶紙炒

苦胡蘆取瓢一枚

共末。蜜杵丸。小豆大。酒下十九至十五丸。水利止服。

木通散

治水分先病水腫。日久不消。致經水斷絕。

木通

赤茯苓

石葦去毛

桑白皮

防己

澤瀉三分

大腹皮四枚

水煎五錢溫服。日二。如水通利少服。

婦人無子

論曰。婦人所以無子者。由衝任不足。腎氣虛寒故也。內經謂女子二七而天癸至。任脈通。太衝脈盛。陰陽和。故能有子。若衝任不足。腎氣虛寒。不能繫胞。故令無子。亦有本於夫病婦疲者。當原其所因而調之。

白薇丸 治婦人久無子。

白薇

川歸

人參

附子

川芎

藁本

禹餘糧一兩

石斛

熟地

柏子仁

紫參

薑黃

川椒

桑寄生

牛膝

五味子

桂心

吳茱萸

防風

甘草五錢

共末入蜜杵丸。梧子大。酒下二三十丸。日二。

澤蘭葉丸 治久無子。

澤蘭葉

川歸

白龍骨

陳皮去白炒

遠志

菴藷子

川芎

桃仁去尖炒

禹餘糧醋碎七

紫石英

藁本

蒲黃微炒

覆盆子

白芷

卷柏一兩

人參

麥門冬

黑乾薑

車前子

懷熟地

細辛

白茯苓

赤石脂

川椒炒

石膏

白薇

蛇牀子五錢

共末。蜜丸。梧子大。酒下。

妊娠門

妊娠惡阻

論曰。婦人所食穀味。化爲血氣。下爲月水。凡妊娠之初。月水乍聚。一月爲牒。二月爲胚。三月爲胎。胎成則男女分。方食於母。而口如鳥。在牒胚之時。血氣未用。五味不化。中氣壅實。所以脾胃不思穀味。聞見於物。卽惡心有所阻也。其病心中憤悶。頭重目眩。四肢怠惰。惡聞食氣是矣。

茯苓湯 治妊娠惡阻嘔逆。肢疼頭痛。惡聞食氣。心忪煩悶。多損墜。宜安胎調血脈。

白茯苓

旋復

生地二兩

人參

白芍

陳皮

桔梗炒

細辛

芎藭

甘草轆兩

水煎三錢。

橘皮湯

治妊娠惡阻。嘔吐不下食。

陳皮

竹茹

人參

白朮三兩

厚朴二兩

薑水煎三錢。

柴胡飲

治惡阻頭疼瘦弱。不思食嗜臥。

柴胡

赤芍

人參

麥冬

黃耆

甘草炙五錢

生地取汁

水煎三錢。入地汁一分。日二。

人參飲

治惡阻煩悶。嘔噦吐逆。惡聞食氣。頭眩肢節疼。嗜臥出汗黃瘦。

人參

麥冬

白茯苓

生薑三分

陳皮

甘草錢五

大棗五枚

共分二劑。每劑水五鍾。煎二鍾。分三服。頃再服。

茯苓飲 治惡阻煩悶頭眩。憎聞食氣。聞便嘔逆。四肢不能自持。

白茯苓

人參

白朮

防風

枳殼炒

生薑五錢

甘草錢一

分爲二劑。每用水四鍾。煎半分。二服。頃再服。

妊娠漏胎

論曰。妊娠將理失宜。經血時下。謂之漏胎。由衝任虛弱。不能固養胞胎。故令經血時下。如器之漏也。久漏不已。則胎氣無所稟養。必致萎燥矣。續斷飲 治妊娠漏胎。下血不止。腹內痛。

續斷二兩

艾葉

熟地

當歸一兩

竹茹

阿膠

雞蘇五錢

爲粗末。水煎三錢。日二。

艾葉飲 治漏胎淋瀝不止。

艾葉五錢 乾薑

當歸三分

芍藥一兩

薑水煎三錢。日二。

膠艾湯 治漏胎下血過多。

阿膠五錢 艾葉一兩

水煎三錢。日二。

黃耆湯 治五六月下血。

黃耆兩半 熟地 桑寄生 地榆一兩

艾葉 龍骨三分

薑棗水煎五錢。日二。

竹茹桑寄生湯 治漏胎心腹痛。時下血。

竹茹 桑寄生 艾葉 白芍

阿膠 白朮各等

水煎三錢。

當歸阿膠散 治胞漏下血不止。

當歸

阿膠

熟艾五錢

龍骨二分

蒲黃炒

地榆三分

牛角鯁炙焦

熟地一兩

共末。酒飲任下二錢。日二。

妊娠胎動下血

論曰。妊娠之人。將護為難。若觸冒風寒。飲食生冷。及喜怒勞動太過。致患胎動。胎動則氣血失度。故下血也。古方云。母有宿疾。子藏為風冷所乘者。亦令胎動下血。皆失將護所致。

阿膠湯 治胎動腹痛。下血運悶。

阿膠一兩

生薑炒

側柏葉

桑寄生

當歸

艾葉三分

竹茹團一大

芎藭

續斷五錢

棗水煎三錢。

鹿角膠湯 治胎動漏血不止。

鹿角膠一兩 人參

白茯苓五錢

水煎三錢。

阿膠散 治損動胎氣。腹內結痛。血下不止。運悶。

阿膠 桑寄生二兩 人參

懷熟地

白芷 芎藭一兩 續斷兩半

共末。竹茹糯米湯下三錢。

秦芫湯 治胎動下血。身體煩熱倦怠。

秦芫 人參 炙甘草

芎藭

地榆 白芷 鹿角膠五錢

糯米一撮。水煎五錢。

芍藥散 治肺動下血不止。臍腹痛迷悶昏塞。

白芍 木賊炒一兩 牡蠣 熟地

乾薑 烏賊魚骨去甲五錢

共末。酒下三錢。

人參飲 治胎動腰腹痛。血下不止。

人參

芎藭

當歸

阿膠

杜仲二兩

熟地

炙甘草一兩

艾葉一把

棗水煎五錢。

妊娠胎萎燥

論曰。人由受氣於有生。十二經脈迭相滋養。猶生物也。得寒溫之正。土地之宜。無物不長。凡胎處胞中。或有萎燥者。蓋由孕婦所稟怯弱。不足自周。陰陽血氣循環。非冷即熱。胞胎失於滋利。所以萎燥而不長也。日月雖過。不能生育。亦有後時致失者。惟宜資母血氣。俾陰陽調通。本末相應。則胎從而有養矣。

艾葉湯 治胞中冷。致胎萎燥。

艾葉炒

芎藭

當歸炒

白朮

乾薑一兩

水煎三錢。日三。

白朮湯 治萎燥瘦劣。面黃黑。腹藏虛冷。

白朮 二

人參

當歸

白芍

芎藭

訶勒皮

厚朴

炙甘草五錢

薑水煎三錢。日三。

白朮當歸湯 治胎萎燥漏下。腹痛不可忍。

白朮

當歸

人參

芎藭

阿膠二兩

艾葉一兩

酒水煎五錢。入大棗。分三服。

桑寄生湯 治胎萎燥不能轉動。心中急痛。

桑寄生

人參

白茯苓

姜 蕪一兩

白朮 二兩

薑水煎三錢。入粳米半合。溫服。日二。

地黃湯 治胎萎燥。過時未產。滋氣血。益胞藏。

熟地

當歸

熟艾炒

芎藭 一兩

阿膠

炙甘草 五錢

水煎三錢。日二。

妊娠胎不長養

論曰。妊娠將理無方。脾胃不足。飲食減退。不能行榮衛。化精微。養衝任。故令胎藏內弱。子氣不足。生化稍虧。巢元方謂母病療母。則胎安是也。若使脾胃和而能飲食。水穀化而運氣血。則何慮胎氣不長也。

白朮散 治胎不長養。

人參

白芍

芎藭

阿膠 一兩

炙甘草 五錢

共末。葱粥飲下三錢。日三。

地黃湯 治氣血不足。胎瘦不長。

熟地

阿膠

芎藭

當歸 二兩

人參 赤芍
水煎三錢。入粳米。日三。

炙甘草五錢

妊娠嘔逆不下食

論曰。妊娠之人。脾胃氣弱。風冷乘之。則中焦否膈。胃中虛滿。其氣上溢。氣不下降。故雖食飲。卒不得下。甚則嘔逆。扶神湯。治妊娠嘔逆不下食。和胃順氣。

扶神

黃耆

人參

白朮五錢

藿香

甘草炙二錢

薑水煎二錢。

人參湯 同上。

人參

山藥

白茯苓

粳米陳者一兩

半 夏五錢

薑棗水煎三錢。

保生湯 治妊娠嘔逆不下食。

陳皮二兩

人參

白朮

麥冬

厚朴

白茯苓一兩

薑棗水煎四錢。入竹葉。

厚朴湯 同上。

厚朴

人參

白茯苓

白朮

陳皮

竹茹

半夏一兩

薑水煎三錢。

妊娠咳嗽

論曰。妊娠咳嗽者。以肺感寒氣也。經曰。形寒飲冷則傷肺。久嗽不已。則寒氣相移。不惟妊育有傷。而肺氣痿弱。皮毛枯悴。治宜發散寒邪。資補胎氣。則咳嗽自已。麥冬飲 治咳嗽不止。

麥冬一兩

紫苑

杏仁

桔梗炒三

炙甘草一分

桑白皮五錢

水煎三錢。入竹茹、白蜜。日三。

人參散 治妊娠咳嗽。

人參

陳皮

炙甘草三兩

生薑五兩

共末。湯下二錢。

桑白皮丸 治妊娠咳嗽。痰盛嘔逆。

桑皮二兩

半夏

人參

阿膠一兩

丹砂一分

炙甘草五錢

共末。粥丸芡實大。臨臥含化一丸。

妊娠傷寒

論曰。妊娠感冒。寒邪藏於皮膚。灑然而寒。燦然而悶。頭項痛。腰脊強。脈浮在表者。當汗之。在裏者下之。汗下之理。制方宜輕。但非破血傷胎之劑。和其陰陽。正其表裏。使經不傳。邪無深入。斯無危殆矣。

麻黃湯 治妊娠傷寒發熱惡寒體痛。

麻黃

蒼朮三兩

陳皮二兩

白朮

炙甘草一兩

水煎三錢。入葱白、鹽豉。

異功湯 治妊娠傷寒頭痛體疼安胎和氣。

麻黃

黃四兩去根節

白朮

蒼朮二兩

芎藭

炙甘草兩半

葱白水煎三錢。日三。

柴胡湯 治妊娠傷寒憎寒壯熱頭痛身疼。

柴胡

白朮一兩

芎藭

白芍藥

當歸

防風

赤茯苓一分

黃耆

生地五錢

薑棗水煎三錢。

白散子 治妊娠傷寒護胎。

白藥子 研末

用雞子清調塗紙上約碗大。貼在臍下。乾以溫水潤之。

妊娠下痢

論曰。妊娠飲食過傷。脾胃不和。冷熱之氣。入於腸間。腸虛則泄。故爲痢也。然冷多則白。熱盛則赤。冷熱相攻。赤白相雜。甚則膿血雜下。速宜療之。恐傷胎也。

阿膠丸

治妊娠下痢。日夜頻瀉。并安胎氣。止腹痛。

阿膠

醋石榴皮五錢

川連一兩

當歸

肉豆蔻二錢

共末。蜜丸小豆大。飲下十五丸。

黃連湯

治妊娠下痢頻瀉。并裏急後重。

川連炒

黃柏三兩

白朮四兩

薑水煎五錢。日三。

健脾湯

治妊娠下痢。臍腹撮痛。益胃氣。思飲食。

厚朴

蒼朮四兩

人參二兩

炙甘草二兩

大棗

汁一升煮熱去皮核研 乾與朴朮同煮乾

陳皮去白炒

白茯苓二兩

薑水煎三錢。進飲食。調脾胃。

阿膠丸

治妊娠下痢。膿血不止。腹痛。

阿膠

白朮五兩

川連

肉豆蔻一兩

共末。蜜丸。梧子大。飲下三十丸。

黃柏散

治妊娠赤白痢腹痛。腰疼如欲產。

黃柏微炒

當歸

赤芍藥

阿膠

艾葉

芎藭

桑寄生一兩

炙甘草

乾薑三分

共末。水煎四錢。

阿膠散

治妊娠赤白痢。腹痛不止。

阿膠

當歸一兩

白朮三分

艾葉炒

石榴皮炒五

共末。薑水煎四錢。

妊娠子淋

論曰。婦人懷子而淋者。謂之子淋。因腎虛膀胱經客邪熱。令澀少而數。水道澀痛。痛引於臍者。是其候也。

海蛤湯 治妊娠子淋。頻數澀痛。

海蛤

木通

猪苓五錢

冬葵子微炒

滑石一分

水煎三錢。入燈心三十根。

白芷散 治妊娠子淋。頻數澀痛。

白芷三分

阿膠

鬱金

滑石一兩

共末。葱白湯下二錢。

當歸湯 治妊娠子淋澀痛。

當歸

白芍藥

赤茯苓

炙甘草

山梔子等分

水煎三錢。

妊娠浮腫

論曰。脾合土。候肌肉。土氣和平。則能制水。水自傳化。無有停積。若妊娠脾胃氣虛。經血壅閉。則水飲不化。溼氣淫溢。外攻形體。內注胞胎。懷妊之始。腫滿必傷胎氣。如臨月而脚微腫。利其小便。則病自愈。防己湯。治妊娠通身浮腫。喘促。小便澀。

防己

大腹三分

赤茯苓

桑白皮一兩

木香

紫蘇一分

薑水煎四錢。

木通湯。治妊娠身體浮腫。心腹脹滿。小便不通。

木通

香薷

桑白皮一兩

木香

訶勒皮

黃芩三分

枳殼炒

檳榔

紫蘇五錢

薑水煎四錢。日二。

赤茯苓湯 治妊娠身體浮腫。心腹急滿。小便赤。

赤茯苓一兩

白朮

旋復花五錢

木通

杏仁

黃芩三分

薑水煎三錢。

赤茯苓飲 治妊娠胎間水氣。子滿體腫。

赤茯苓

白朮二兩

杏仁

旋復花一兩

黃芩兩半

水煎五錢。日二。

桑寄生飲 治妊娠偏身虛腫。

桑寄生

紫蘇一兩

木香五錢

桑白皮炒

大腹皮三分

水煎三錢。

妊娠小便不通

論曰。妊娠小腸挾熱。熱結胞內。使氣道否澁。故小便不通。令人腹脇脹滿。臍下急痛。是其證也。

榆白皮散 治妊娠小便不通。心神悶亂。小腹急痛。

榆白皮

王不留行

滑石一兩

共末。燈心湯下二錢。

冬葵子湯 治妊娠小便淋澁。小腹急。水道熱痛。

冬葵子三合

赤茯苓

白芍藥

車前子一兩

黃芩五錢

水煎五錢。

滑石傳 治妊娠子淋。小便數。熱痛。手足煩疼。

滑石飛

汲水調五錢。塗臍下一寸。小便即利。未利再塗。

妊娠大小便不通

論曰。妊娠大小便不通者。以臟腑盛實。熱氣蘊積。不時宣導之所致也。若熱結於大腸。則大便不通。結於小腸。則小便不通。今大小腸俱有熱。則二便俱不通。其候令人煩滿。小腹脹急。惟能均調腑臟。使氣疏達。則傳化無所留滯矣。

梔子湯

治妊娠二便不通。臍腹脹痛。

梔子

黃芩

柴胡

姜 蕤 兩半

石膏 四兩

澤瀉

赤芍 二兩

車前草 五錢

水煎四錢。入竹葉十片。

柴胡通塞湯

治妊娠二便不通。下焦熱結。

柴胡

黃芩

陳皮

澤瀉

羚羊 角三分

梔子

大黃 炒

石膏 一兩

水煎四錢。入生地一分。豉微炒半分。

茅根湯

治妊娠二便不通。結悶氣急。腹滿欲死。

茅根

滑石

車前子

大黃炒各

水煎四錢。

木通湯 治妊娠二便不通。下部脹滿。

木通

大黃甞二

滑石三兩

大麻仁一兩

水煎四錢。

又方 治妊娠二便不通。

豬脂二兩

酒半升。煎脂化。分三服。未通再服。

妊娠半產

論曰。妊娠日月未足。胎氣未全而產者。謂之半產。蓋由妊娠衝任氣虛。不能滋養於胎。胎氣不固。或顛撲閃墮。致氣血損痛。或因時病痢瘧之類。皆致半產。延胡索湯 治半產後氣血不快。惡露續斷。

延胡索

當歸

白芍藥

炙甘草

芎藭

桂心一兩

水煎三錢。

艾葉

治半產後惡露不斷。心悶氣短。

艾葉

生地黃

當歸

人參

地榆

乾薑

阿膠各等分

水煎三錢。

妊娠數墮胎

論曰。胚胎之始。賴血氣以滋育。若妊娠血氣盛強。陰陽之氣和。相與流傳於一體。唯能順時數。謹人事。勿動內傷。則生育之道得矣。衝任氣虛。將攝失宜。子藏風冷。不能滋養於胎。故每有妊。則數致傷墮也。

地黃散

治數墮胎。子宮虛冷。

熟地

黃耆

人參

白朮

乾薑五錢

共末。酒下二錢。

阿膠湯 治數墮胎。小腹痛不可忍。

阿膠

熟地

艾葉炒

芎藭

白朮

當歸

杜仲炒一

棗水煎四錢服。

地黃湯 治妊娠氣血衰微。胞藏挾冷。數墮胎。

熟地黃四兩

艾葉

當歸二兩

杜仲

芎藭

阿膠

五加皮三兩

水煎五錢。日二。

芎藭湯 治數墮胎。心腹痛。

芎藭

白芍藥

白朮

阿膠

炙甘草一兩

艾葉、糯米、薑水煎三錢。

聖濟總錄纂要

清

新安

程

林雲來纂輯

鄞縣

曹炳章赤電校點

卷二十四

產難門

逆產

論曰。逆產者。蓋因妊婦初覺腹痛。產時未至。驚動傷早。兒回轉未至。竟使用力產之。卽令逆也。

牛酥膏 治逆產數日。或生不以理。橫逆艱難。千方百計不安。急宜服之。膏至兒身上卽產下。

真牛酥

秋葵子 一升

大荳黃卷

滑石 二兩

瞿麥一兩 白蜜半升 煎并終二葵

共末用酥煎沸。入蜜再煎。下末攪勻收貯。酒下一二匙。頻服。

半夏飲 治橫產及倒生。胎死腹中。并衣不下。母氣欲絕者。

半夏汁五枚薑白 欬一兩

共末。溫酒下二錢。難產一服。橫產二服。倒生三服。胎斃衣不出四服。此方加瞿

麥尤佳。

竈心黃土塗 治逆產。

竈底心黃土研五合

以生薑汁和如糊。塗產母臍中。以帛繫換。

小麥飲 治逆產。

小麥 小豆炒一

共末。水煎二三錢。溫服。少頃又服。

鹽粉塗 治逆產足下。

食鹽 胡粉

共研勻。用米醋和。塗兒足心。卽順下。

蒜葱熏法 治逆產。

大蒜七枚

生薑五錢

葱白三十

共搗入盆中。以沸湯五大碗。投盆內。速扶產婦坐盆上。熏產戶。冷卽易之。三易胎正矣。

丹砂塗 治逆產。

丹砂五分

用蜜和。塗兒足心。又以丹書兒左足心千字。書右足心里字。

又法

以鍼刺先出足底。足痛還卽順。若手先出卽刺手。

又法

取三家鹽熬令黃。以津唾和。塗兒足心。次取三家飯放兒母手中佳。

艾葉湯 治逆產及子死腹中。

生艾葉五兩

用酒一升煎。旋服則順下。如不飲酒。以水煎服。

蛇脫灰酒 治逆產及子死腹中。

蛇 脫 燒 灰

研末。用白酒和。下。面向東方。服一錢。未下再服。

兔絲子酒 治逆產及子死腹中。

兔 絲 子 炒

爲末。酒下一二錢即生。一方以車前子爲末。酒下二錢。

蒲黃塗 治逆產。

蒲 黃

用水和塗兒手足心即順。

難產

論曰。臨產或難。蓋爲正氣擾亂。心神不寧所致。古人有預備方法。臨月用滑胎散。并日行二三十步。貴使血氣下順。產無留難。無令喧雜驚忙。必須產閣溫暖。遇嚴

寒之日。四圍燒火。及多備熱湯。焚諸異香。常令湯火氣及身。暗使人看候產婦。纔覺腹痛。速與飲食令飽。無使困乏。飢則雌雞煮粥。渴則白蜜煎湯。或空痛經日。兒胎未動者。宜安心熟忍。以薦蓆鋪牀。就上安產。免爲地氣所侵。又就週行三五百匝。或困於行。暫且扶立。須臾又行。如血水俱下。痛陣及腰。此欲產之兆。諸餘法度。宜次序行之。

車前子散 治難產經日不下。

車前子 微炒

滑石

川歸五錢

榆白皮

瞿麥穗 一兩

共末。用酒下二錢。如血水未下。用大黃二錢。煎酒服。胞胎卽下。

如意膏 治難產催生。

草麻子 去殼研 粒

丹砂 五分

共研如膏。用油紙攤貼臍下小腹間。外用帛緊縛。候產與胞衣下。速去之。稍緩卽脫人氣血。此藥覺腹痛便宜用。

牛酥膏

治難產催生。見前

苧蕪根飲

治難產及晚嫁難產。

乳母論云。三十後適人者。謂之晚嫁也。蓋少嫁則筋骨軟弱。故產門易開。晚嫁則筋骨堅強。所以難產。產婦臨月。宜常服之。

苧蕪根

人參

陳皮炒

懷生地

炙甘草

烏梅肉一兩

生薑水煎四五錢。溫服。少頃又服。

燒弓弦散

治難產。

弓

弦五寸燒

箭

幹燒灰

共研勻。作一服。酒下。

牛酥飲

治數日不產。胎上衝心欲死。

牛

酥五錢

冬葵子炒一合

滑

石研三分

共入袋盛。用酒一升煮。頻服一鍾。

白芍散

治數日不產。胎上衝心欲死。

白芍

川芎

甘草

川歸

茯神

陳皮二兩

芋蕪根一把

髮灰一分

共末。空心食前酒下二錢。少頃又服。

桂心湯 治難產數日不生。子死腹中。母氣欲絕者服之效。

桂心兩半

木通

牛膝

瞿麥穗

榆白皮二兩

水煎五錢服。

石燕酒 治難產催生。一方兩手握石燕亦產。

石燕

以童便磨取三四錢。微溫。吞赤小豆七粒立產。

子死腹中

論曰。胞衣未下。急於胎之未生。子死腹中。危於胎之未下。蓋胞衣未下。子與母氣通其呼吸。若子死腹中。胞藏氣寒。胎血凝泣。氣不升降。所以難下。古方多以行血順氣藥。及硝石。水銀。礪砂之類。其胎已死。軀形已冷。血凝氣聚。復以至寒之藥下。

之不惟無益。而害母命者多矣。古人用藥。深於用意。但後生不分子死。理有二端。用藥寒溫。各從其宜。有妊娠胎漏血盡子死者。有墜墮擲撲內傷子死者。有緣久病胎萎子死者。若此之類。遂令生人提掣妊婦。使身體平正。仍以裊蓐自腰抵足。令仰臥開足向地。如欲產勢。連進附子湯三服。後方見即以衣包溫瓦數片。二三人不住手自臍腹腰脇左右周回熨之。使胞藏溫煖。凝血流動。蓋附子湯能破寒氣墮胎。服之少頃。覺腹內痛陣漸作。惡血漸動。良久必產。此用溫藥之意也。有因傷寒熱病溫瘧之類。胎受邪熱。毒氣內外交攻。因致胎死。胎不卽下。留於胞藏。古人慮胎受毒氣。必致脹大。所以用硝石水銀礪砂之藥。蓋硝石水銀之性。不惟使胎不脹大。又能使胎化爛。副以行血順氣之味。死胎卽下。臨產更令生人以手體候胎。有橫有逆。有脹有爛。以意治之。庶免留難。凡生產之理。胎活則所生子日月已周。臍繫不養。所以自下。猶之果實既熟。不俟剪折。帶蒂自分。若子死腹中。則所生在母。日月未足。臍繫尙固。猶之果實未熟。枝末雖枯。不折不離。所以在母。行之有法。用之有度。斯無虞矣。凡審死胎。當熟辨有妊之婦。病胎隱伏不動。難認存亡。令生人以煖手就臍下款款按至胎處。覺腹中冷應手。是胎已死。稍溫卽非。更看妊

婦外症。面青舌冷。舌下脈青黑。口穢氣。手指甲黑。皆子死之候。

附子湯 治子死腹中。產後氣寒。胎血凝。子死難下。破寒墮胎。

附子皮大者一枚生去 生薑五片

水煎稍熱服。經時不下。服桂心湯。

桂心湯 治子死腹中。產後氣寒。胎血凝。子死難下。破寒墮胎。

桂心火不見 烏頭大者一兩

水煎稍熱連用三服。

地黃酒 治子死腹中未下。

懷生地酒洗搗取自然汁

用酒煎沸。和地黃汁連三服。胎不下。服牛膝湯。

牛膝湯 治子死腹中。氣血凝結。致子難下。

牛膝 朴硝三兩 川芎 大黃炒

桂心 蒲黃五錢 懷生地二兩

水煎五錢。去滓。入朴硝一錢。再沸服。連進三服。未下服後瞿麥湯。

瞿麥穗湯 治子死腹中。三日不出。母氣欲絕。

瞿麥穗 兩半 牛膝 榆根白皮 一兩 木通

桂心 三分

水煎五錢。去滓服。連進三服。胎未下。服後牛膝湯。

牛膝湯 治子死腹中。滑氣血。破胞胎。或子死壞爛。母氣悶絕者。

牛膝 一兩 川歸 桂心 三分 川芎

蒲黃 五錢 硝石 瞿麥穗 二兩 懷生地汁 一鍾

水煎五錢。入汁再沸。連進三服。惡血下。子即出也。或胎已損。令生人仔細探之。

勿令腐肉瘀在腹內。出畢。再一二服。逐惡。免生他病。

薑汁酒 治子死腹中。氣血凝滯不下。

生薑汁 六分 鷄子黃 三枚 白酒 三分 米醋 二分

共酒醋同煎。入薑汁二分。再沸。傾碗中。入鷄子黃一枚。乘熱打轉。稍熱服。須臾依

上法連進三服。

牛尿塗 治子死腹中。二三日不下。

牛尿

用之塗產母臍腹上并左右少頃立出。

水銀飲 治子死腹中悶絕者。

水 銀一兩

飲下。若母不知人事。幹開口灌下。口幹不開。當於鼻中灌下。令頭稍仰。銀入母腹中立出。

又方

竈中黃土

研末。用酒和服二三錢立下。

息胞

卽胞衣不出

論曰。凡產子母已分。而胞衣未下。名曰息胞。蓋由欲產之時。用力太過。產罷又被風寒冷氣所侵。血氣凝滯。乏力運用。以致持久。不惟有妨兒臍。兼亦致害母命。急須提掣產母。使形體平正。氣息少待。可以運動。及以壯氣益血湯散助之。俾氣血

滑利。其胞可下矣。若初生產婦。未經諳練。見胞衣未下。恐妨兒體。輒便剪臍。或誤牽斷。或執握不固。其胞直上掩心。使不盡。天年者多矣。古人剪臍之法。必用慣熟生人。先備金銀銅鐵稱錘之類。用軟熟衣帶一條。就一頭束定。仍留一頭。纔下腹。即將臍帶與衣帶相連結定。以緊牽爲度。所貴胞不上掩心也。

壯氣益母湯 治胞衣未下。被風寒所侵。血氣凝澁。或氣少力乏。不能運用。胞衣停息。

懷生地

人參

川歸一兩

代赭石醋碎五

木香一分

生薑大棗水煎五錢。稍熱服。少頃又服。以衣下爲度。

牛膝湯 治胞衣半出。半不出。或子死腹中。著脊不下。及二三日不產。血氣上衝。

牛膝

秋葵子

榆白皮三兩

懷生地取汁

水煎五錢。入汁服。

滑石湯 治胞衣不出。服之爛胞。

滑石

川歸

炙甘草一兩

牛膝

豐麥穗 兩半 秋葵子 二合

水煎五錢稍熱服。少頃再服。以下爲度。

惡血不下。盛於衣中。

鹿角

剉爲細末。用酒下一二錢。以下爲度。

草麻子塗 治胞衣不下。

草麻子 二十枚

去殼。研如泥。塗脚心。衣下速去。

又方 治胞衣不下。

水銀

用棗肉研不見星。丸皂子大。酒服一丸立下。

冬葵子酒 治衣不下令爛胞。

葵子

阿膠

牛膝

川歸 一兩

共末。酒下三錢。

產後門

產後血暈

論曰。產後血下或多或少者。皆致血暈。蓋血隨氣行。血多者氣虛。血少者氣逆。故也。其候頭目旋轉。精神昏憤。沉默不知人事。治法虛弱者。宜調氣而益血。氣逆者。宜調氣而下血。則治暈思過半矣。

玄胡索湯 治產後血暈。

玄胡索

川芎 一兩

人參

川歸

牛膝 兩半

懷生地 二兩

水煎五錢。去滓。入蜜少許。稍熱服。

益母草飲 治產後血暈。心煩悶亂。恍惚如見鬼神。

益母草汁 如無代土瓜根汁

生地汁

藕汁 半鍾

雞子白 三枚

童子便 一鍾

將四汁煎沸。入雞子白攪勻。分三服連進。

紅藍花湯 治產後血少。運悶嘔逆。

紅藍花

蘇枋木 一兩

水煎四五錢。稍熱服。日二。

薑黃飲 治產後惡血上掩心。如見鬼神欲死。

生薑汁

生地汁 一鍾

用白酒一鍾。同二汁煎十數沸。稍熱服。

醋雞子 治產後血運迷悶。不省人事。唇口冷面青。

米

醋 一鍾

雞子 一枚

將醋煎沸。以雞子打破攪勻頓服。

白芍湯 治產後血運。心中迷悶。不知人。錯亂少氣。

白芍藥

懷生地

炙甘草 一兩

生薑水煎五錢。去滓。入蜜少許。連進三服。

丹參 五錢

產後語言妄亂

論曰。憂愁思慮。則傷心。心虛故邪從之。新產之人。內亡津液。而血虛志弱。使人精神昏亂。語言差謬。恍惚不寧。甚者變狂顛之症。治宜補血益心。安心定志。其病自愈。

白茯苓湯 治產後血氣虛弱。精神不定。言語錯謬。

白茯苓

人參

桂心

澤瀉

蒲黃 兩半

懷熟地

川歸

麥門冬

遠志 一兩

共末入蜜杵丸。梧子大。人參湯下三四十丸。

白茯苓湯 治產後心氣不足。血虛狂言。

白茯苓

熟地 二兩

人參

甘草

防風

白薇

龍齒

獨活

遠志 一兩

水煎四五錢。稍熱服。

茯神湯 治產後血虛。狂言妄語。心志不寧。

茯神二兩

人參

白芍藥兩半

桂心

川歸

炙甘草一兩

生薑大棗水煎四五錢。稍熱服。日二。

遠志湯 治產後血虛心氣弱。為風邪所搏。語言妄亂。

遠志

人參

赤芍

白茯苓

子芩

獨活

炙甘草

防風一兩

懷熟地二兩

水煎四五錢熱服。日二。

產後中風

論曰。產後血氣未完。風邪乘之。入於經絡。則發為瘧。其候口噤不開。筋脈攣急。面目喎痺。至於五臟六腑。則隨所中而症候出焉。甚者瘵癈直視。角弓反張。神志昏塞。便溺遺失。瘖不能言。為中風之證。

小續命湯 治產後失血中風。口眼喎斜。冒昧不知痛處。拘急不得轉側。遺溺失

音。

麻黃

去根節 二兩

人參

附子

川芎

白朮

防己

白芍

子芩一兩

桂心

甘草二兩

防風兩半

生薑水煎五錢服。

大豆酒 治產後中風。背強口噤。或煩熱頭身皆重。身癢及嘔逆直視。皆風溼所致。

大豆三升

炒令聲斷。用酒五升。沃熟豆中。取豆汁服一鍾。日飲五七次。取微汗。身纔潤即愈。一則去風。二則消血。

麻黃湯 治產後中風。口眼喎斜。身背拘攣。

麻黃

去根 二兩

桂心一兩

川芎

白芍藥

防風半

竹瀝二合

白朮五

生薑水煎五錢。去滓。入竹瀝半合。二三服取汗。

地黃酒 治產後中風口噤。筋脈攣急。角弓反張。

生地汁二升 白酒三升 生薑汁二合

用二汁煎數沸。入酒再煎十數沸。任性細飲數杯。若冷多加桂心末二兩。若熱多加藕汁二合。

產後中風口喎

論曰。足陽明胃經。入上齒中。環出。挾口環脣。下交承漿。手太陽經循頸上頰。至目銳眦。此二經皆為風寒所中。使筋脈縮急。牽引於頰。故為口喎。癱不正。語言蹇澀。目不能平視也。

人參湯 治產後中風。口面喎斜。

人參 白芍藥 防己 白朮

甘草 防風 麻黃去根 附子

川芎 子芩 桂心一兩

生薑大棗水煎三錢。溫服。

天麻散 治產後中風。口眼喎斜。筋脈不利。

明天麻

懷生地

白殭蠶糯米炒

玄胡索

獨活

防風

川歸

荊芥穗

桂心五錢

共末。用酒下二三錢。日二服。

獨活湯 治產後中風。口面喎斜。

獨活

防風

川歸兩半

川芎

枳殼

桂心一兩

細辛五錢

蔓荊子兩半

竹瀝

水煎三錢。去滓。入竹瀝半合。再沸服。日二。

竹瀝湯 治產後中風。口面喎斜。手足不隨。語言蹇澀。昏昧。

竹瀝

防風

麻黃去根節 兩半

升麻

羌活

羚羊角

川芎

桂心一兩

杏仁八十枚 炒去

水煎三錢去滓。入竹瀝半合。再沸二三沸。少頃再服。取微汗差。
地汁竹瀝飲。治產後中風。口眼喎斜。筋脈攣急。

生地汁

竹

瀝各半

獨

活兩半

用水二鍾。煎獨活三錢去滓。入地汁。竹瀝各半合。再二三沸溫服。日二。

產後中風角弓反張

論曰。背爲陽。腹爲陰。陰陽之脈。交相維持。產後血脈不足。風邪中於陽經。使陽

拘急。反引腰背。如角弓反張。故以爲名。
麻黃湯。治產後中風。角弓反張。筋脈急痛。

防風

人參

白朮

川芎

甘草

川歸

麻黃去根

桂心一兩

附子

乾薑五錢

杏仁去皮尖炒

水煎三錢服。日二。

白茯苓湯。治產後角弓反張。

白茯苓

山仁梔

川芎

川歸

炙甘草 五錢

黑乾薑

吳茱萸

懷熟地

桂心

細辛 一兩

水煎三錢溫服。日二。

黑豆酒

治產後中風。腰背反折。筋急口噤。

黑豆 二小豬

白酒 四升

將豆炒香熟。傾入酒中。去豆用酒。不拘時頻服一鍾。服完再服後地黃酒。

地黃酒

治產後中風。腰背反折。筋急口噤。

生地汁 二升

白酒 三升

生薑汁 二合

先煎二汁數沸。入酒再沸十數沸。任意飲二鍾。若冷多加桂心末二兩。熱多

加藕汁二合。

產後羸勞

論曰。產尊之後。食飲起居。失於常度。使氣血不得其養。若血虛則發熱。氣虛則發

寒氣血俱虛。則寒熱更作。日漸羸瘦。故爲蓐勞。又產後惡露未盡。亦令致此。則時寒時熱。腰腹刺痛。甚者不能食。食亦不作肌膚。懷熟地湯。治產蓐勞後寒熱。肢體痛力乏。

熟地黃

人參

白朮

白茯苓

牛膝

鼈甲

淡竹葉

桂心

麥門冬

川歸

甘草一兩

水煎三錢溫服。日二。

赤芍湯。治產後蓐勞疼痛寒熱。頭目旋暈。多驚盜汗腹痛。大便秘利瘦劣。

赤芍

川芎

人參

丹皮

玄參

五味子

白薇

白茯苓

麥冬

甘草

川歸一兩

熟地二兩

水煎三錢服。

猪腎湯

治產後蓐勞似瘧。寒熱不能食。

猪腎一對

粳米

白芍藥

知母三分

川 歸分半 葱 白五寸

水。煮腎取汁。入米煎三錢。溫服。日二。

黃耆。煮散。治產後。尊勞。肌瘦。面無顏色。或寒。或熱。肢痛。頭疼。心煩。

黃耆 龍甲一兩 人參 白芍藥

川歸 白茯苓 桑寄生 麥門冬

熟地 桂心 牛膝 甘草五錢

共末。每用猪腎一對。煮取汁。入薑棗煎三錢。溫服。日二。

白薇丸 治產後。尊勞。寒熱。體虛。瘦弱。不思食。

白薇 附子 熟地 柏子仁

龍甲 川歸 肉蓯蓉 黃耆

人參 白芍 丹皮 桂心

石斛 羌活三分 川芎 甘草五錢

共末。蜜丸。梧子大。飲下三四十九。

產後大便不通

論曰。大腸者。傳道之官。變化出焉。產後津液減耗。胃中枯燥。潤養不足。糟粕壅滯。故令大便難。而或致不通。蓋新產之人。喜病此者。由去血過多。內亡津液故也。

訶梨勒丸

治產後大便不通。

訶梨勒皮

人參

懷熟地

大黃酒炒

川歸

大麻子一兩

共末。入蜜杵丸。梧子大。米飲下三四十九丸。日二。

人參丸

治產後大便不通。

人參

檳榔兩半

紫朴薑炒

川歸一兩

郁李仁去皮尖

共末。入蜜杵丸。梧子大。酒下三四十九丸。日二。

大黃丸

治產後大便秘澁不通。

大黃酒炒

赤芍藥

川歸

紫朴薑炒

枳實炒

懷生地

大麻仁三分

共末。入蜜杵丸。梧子大。陳米飲下三四十九丸。

升麻湯 治產後大便祕澀。

升麻 大黃一兩 生地 前胡三兩

山梔 川歸一兩

水煎服。

大腹皮湯 治產後下血過多。熱毒氣結燥。大便不通。壅滯氣悶。腰痛脅脹。

大腹皮五枚 枳殼 懷生地 赤芍藥一兩

甘草 天門冬三分 羌活 郁李仁

秦艽五錢

水煎三錢溫服。日二。

蜜煎導法 同上。

白蜜半斤

慢煎令稠。如硬錫。搓指大長二寸。內下部中。仰臥效。

烏梅導法 同上。

烏梅肉

爛搗如泥。入蜜少許。搗內下部中。即仰臥效。

溫中丸 治產後大便不通七八日以上者。

硫 黃生用 細研

以水浸炊餅糊丸。梧子大。用木香湯下一二十丸。

中和散 治產後大便不通。及老少皆可服。

附 子去皮 大 黃半兩 同上 俱

共末。臨臥飲下二錢。日二。

產後乳汁不下

論曰。新產水血俱下。暴傷津液。氣脈未順。所以乳汁不下。若能調其衝任。治手太陽少陰之經不足。則乳脈自然流行。若其經虛弱。氣脈閉而不通。雖治之。亦無益也。

猪蹄湯 治產後乳汁少。或不下。

猪 蹄四隻 用水五升 煮取汁三升

木 通 漏 蘆

瞿麥穗一兩

用汁煎三錢溫服。日二。以效爲度。

木通湯 治產後乳汁不通。

木通半兩

子芩

白芍藥

桑皮

漏蘆一兩

甘草

枳殼炒五

竹葉一把

水煎三錢溫服。日二。

藹苴子散 治產後乳汁不下。

藹苴子

糯米

粳米半合

水煎甘草五錢取汁。煎三味分三服。

括蕒酒 同上。

括蕒

取大者一枚。搗爛。入白酒煎。溫服。以效爲度。

魚灰散 治產後乳汁不下。

鯉魚骨

燒灰爲末。酒下一二錢。

產後妬乳

論曰。氣血流行。上爲乳汁。下爲月水。上下通達。不失常度。是謂平人。若不通而塞。則爲痛。熱氣復來乘之。則爲腫。向之流行者。今壅遏矣。倘失調治。則結硬成核。身體壯熱。盛則憎風。遂爲乳癰。世傳治結乳閉乳。亦卽爲妬乳者此也。

升麻湯

治產後妬乳。乳汁不洩。結成癰腫熱痛。

升麻

玄參

白芍藥

生地黃

甘草

連翹

瞿麥穗一兩

射干

五錢

水煎三錢。溫服。日二。

二灰散

治乳汁不下。結滯不消。熱腫。

蔓荊子

皂莢刺各燒灰存性一兩

共研勻。用酒下一二錢。日二。

升麻傅

治妬乳結成癰腫。

升麻 木香 檀香 五錢

各用成塊。砂盆酒磨相等。用翎傅乳上。

天麻草洗 治妬乳成癰腫。或已破膿血未散。

天麻草 不拘多少

用水煎濃汁。頻洗患上。日三四次差。

產後乳結核

論曰。產後乳結核者。以血氣虛弱。風邪搏之。乳脈凝滯。故結而為核。日久不差。蘊積生熱。熱勝則腫。腫甚則成癰也。

枳殼湯 治產後乳結核。或成癰腫。發熱疼痛。

枳殼 木通 人參 白蔘 藥 去

桂心 烏雞骨 醋炙 白芍藥 川歸

黃耆 大黃 礱 一

水煎三錢溫服。日二。

麥門冬湯 治產後乳結核及欲作癰腫痛。

麥門冬 去心

子 芩

木 通

白芍藥

人 參

赤茯苓

甘 草

綿黃耆

桑寄生

防 風 一兩

大棗水煎五錢。去滓。入沙糖二錢攪服。

川歸散 治乳結核堅硬。

川 歸

人 參

白芍藥

枳 殼

木 通

白蒺藜 炒

烏雞骨 醋炙

黃 耆 一兩

桂 心 五錢

共末。酒下一二錢。日二。

產後乳結癰 詳前乳癰門

論曰。產後衝任不足。氣血俱虛。其熱潛行入於足陽明之脈。其直行者從缺盆下乳內廉。下挾臍。入氣街中。衝脈者起於氣衝。並足陽明之經。夾臍上行。至胸中而

散。其經為邪熱攻衝。則血為之擊搏。氣為之留滯。擊搏則痛作。留滯則腫生。內經所謂榮氣不從。逆於肉理。乃生癰腫。產後多有此疾者。以乳汁壅積與氣相擊搏故也。

黃耆湯 治乳結核腫痛。煩熱漸成癰。

黃耆

生地黃

升麻

麥冬 兩半

人參

赤茯苓 一兩

遠志

川歸

白芍藥

甘草 五錢

水煎三錢溫服。日二。

白芍湯 治乳結癰。腫毒敗壞不散。發熱疼痛。

白芍藥

人參

赤茯苓

生地黃

川歸

黃耆

麥門冬

甘草

桂心 一兩

生薑大棗水煎三錢。去滓。入朴硝五分。沸服。日二。

甘草飲 治乳癰熱痛未結膿者。

甘草五錢半 括蕪去一枚

用酒。甘草取汁入蕪瓢再煎服。

括蕪散 治乳癰膿潰未潰熱痛不已。

括蕪二兩 防風

紫朴 黑乾薑

共末用酒下二錢日二。

黃耆膏 治乳癰欲結未結膿攻痛。

黃耆 白芍藥

防風 川連

共末用鷄子白和塗患上日二易。

人參 敗醬

川芎 白欵

細辛 桔梗一兩

子芩 川歸一兩

聖濟總錄纂要 卷二十四 產後門 產後乳結癰

聖濟總錄纂要

清 新安 程 林雲來纂輯

鄞縣 曹炳章赤電校點

卷二十一十五

小兒門

小兒初受氣法

小兒受氣在娠。一月胚。二月胎。三月血脈生。四月形體成。五月動。六月筋骨立。七月毛髮生。八月臟腑具。九月穀氣入胃。十月百神備而生。生後六十日目瞳子成。能頰笑識人。百日任脈生能反覆。百八十日尻骨成能獨坐。二百十日掌骨成能匍匐。三百日髓骨成能倚立。三百六十日爲一期。膝骨成乃能行立。此是定法。若有不依期者。必少壽也。

小兒相法

兒生枕骨未成者。能言而死。膝骨不能成者。能蹠而死。掌骨不成者。匍匐而死。踵骨不成。能行而死。胸骨不成者。能立而死。又初生頭四破者不成。啼聲散者不成。汗不流小便凝如脂者不成。此其大略也。

浴兒法

初生浴兒。用猪膽汁一枚投湯中。令終身無瘡疥。湯中勿加生水。浴訖斷臍。生三日浴法。

桃李梅根二兩。水煎浴之。去不祥。令無瘡疥。或入麝香少許

虎頭骨湯浴法。鎮心安神。永無驚風。顛癇。瘡疥。癰癤之患。

虎頭骨五兩

赤金十兩

白芷二兩

苦

參四兩

水煮入猪膽汁浴兒。

口噤

論曰凡兒初生便口噤不能飲乳者。此由在胎時母臟腑有熱。熏蒸胞胎。熱氣入兒心脾。致初生後熱結於口。點生口中。如黍米大。令兒不能吮乳。名曰口噤。

竹瀝飲 治口噤體熱。

竹瀝 一合

水頓令溫分三服。徐徐灌下差。

又方 治小兒口噤病在咽中。如麻豆許。令兒吐沫。不能哺乳。

雄鼠屎 一枚

研塗舌上。與兒飲差。

撮口

論曰小兒初生。未滿七日。面赤喘促。啼聲不出。乳哺艱難。名曰撮口。蓋因胎中受風挾熱。始生之時。氣血未定。洗浴當風。襁抱失宜。致成斯疾。最為急切。宜速治之。

麝香散 治初生胎熱撮口。

麝香 丹 砂 一分

蛇 脫 炙 一尺許

共研。津液和。塗兒唇口上五七次。

牛黃竹瀝散 治胎風熱撮口發噤。

牛黃一分 竹瀝半合

用瀝和黃一字服之。三四歲兒服二字良。

鵝口

論曰。小兒初生。口中有白屑。如粟米狀。鼻外有瘡。至舌上又生瘡。謂之鵝口。此由胎中稟受穀氣偏多。既生之後。心脾氣熱。上熏於口。致成斯疾。蓋心主舌脾之絡。脈散於舌下故也。

爪斷法 治小兒初生連舌下有膜如石榴子者。中膈連舌下。致令兒語不發。舌不轉也。

以爪甲摘斷。令微有血出無害。若血不止。可燒亂髮灰塗。傅即差。

鵝口

粟房

用并華水濃煎汁。以綿纏筋頭拈拭之。如無粟房。以粟木代用。

白礬散 治鵝口不能吮乳。

白枯礬

丹 砂 一分

同研細。傅舌上。日二夜一。

又方

白鵝屎

用水絞取汁。瀝塗口中舌上下良。

重脬

論曰。小兒初生。上脬有物脹起。若懸癰。或如蘆葦盛之狀者。名曰重脬。此乃脾胃挾熱。血氣不能收斂。令口中舌下。或在脬頰如吹脬。速宜以綿纏長針。微露鋒芒。刺腫上。決去惡血。則其病可消。若再生再刺。不爾。則脹滿口中。妨害乳食呼吸。不可少緩也。

二乳飲 治小兒重脬。

驢乳 猪乳二合

以二乳和煎。頻服一二匙良。

又方 治小兒重膠。

蛇脫 露蜂房各燒灰

研勻塗口中差。日二。

臍風

論曰。初生斷臍後。臍瘡未愈。不可令犯風邪。及浴水入瘡。溼冷。襁抱。皆致臍風。其候臍腫多啼。甚則風行百脈。口噤不乳。身體反強。乃致不救。

錦白散 治初生七日。臍風發腫欲落者。

錦帛燒存性 雄鼠屎七枚 麝香少許 大棗肉三分

共末。臍欲落不落。用末傅之。忌見外風。

川柏散 治臍風汁出不止。

川柏兩半 亂髮灰一分 釜黑煤三分

共研末。傅上良。

解顛

論曰。腎爲一身之骨髓。腦爲髓海。若腎氣和平。則骨髓充足。骨髓充足。則顛顛圓滿。若腎氣不足。則骨髓不充。年雖長大。其頭縫尙開。故名曰解顛。又名顛解。

細辛散

治解顛。

細辛

桂心

乾

薑妙五錢

共末。用乳汁和傅顛上。日二三。

封顛散

治顛門開解。

柏子仁

細辛

白芨

防風一兩

草烏五錢

共末。乳和傅開處。

蟹足散

治顛門開解。

蟹足炙

白斂五錢

共研末。用乳汁和傅開處。日二。

甘菊湯 治小兒鼻中多涕。是腦門爲風所吹。

甘菊花

炙甘草一兩

防風五錢

山萸肉四錢

水煎二錢服。日二。

合顛散 治顛門不合。

防風

白芨

柏子仁一兩

共末。用乳汁和塗。以合爲度。日二三。

鷄血塗 治腦長顛不合。

丹雄鷄

就兒顛上刺冠令血滴顛上。以赤芍藥末粉之。日二次差。

蛇脫膏塗 治腦長髮大。顛開不合。臂脛不能勝頭。

蛇脫燒灰

研末。以猪頰骨髓少許和塗上。日二次差。

顛陷

論曰。人之冲氣內團於胃。上通於頂顙。小兒胃氣冲和。則腦髓充足。顙項自合。若胃熱熏蒸。腑臟竭渴而引飲。或致泄痢。則腑臟血氣虛弱。不能充髓腦。所以顙陷也。

生地散 治小兒臟腑壅熱。氣血不榮。致顙陷者。

懷生地酒二兩

烏鷄骨一兩

共爲末。用米飲下一錢。日二。兒小者服三五分。以差爲度。

狗頭骨塗 治小兒胃虛。血氣不充。顙陷。

雄狗頭骨黃

研末。以鷄子白和塗顙上。日二三。以差爲度。

地黃丸 治小兒胃虛。血氣弱不充足。顙陷。

懷熟地

白朮

白芍藥

川歸玉錢

桂心一兩

共末。入蜜杵丸。如黍米大。飲下一二十九。日二。

急驚風

論曰。小兒急驚之狀。身體壯熱。痰涎壅滯。四肢拘急。筋脈牽掣。項背強直。目睛上視。牙關緊急。謂其發動掣急。故名急驚。此因心絡受邪所致。蓋心藏神而主血。小兒血氣不和。宿有實熱。若爲風邪所乘。則熱盛血亂。血氣相并。則神舍不安。故卒然而驚。古人所謂陽癇是也。

龍齒散 治小兒急驚風。四時傷寒壯熱。口焦乾。目翻露。搐搦昏迷。

龍齒二錢 丹砂 麝香五錢 鉛霜三錢

共末研勻。用水煎。金銀菴白湯下三五分。汗出立愈。

黑神丸 治小兒急慢驚風。

牛黃 麝香 冰片 青黛五分

膩粉二錢 蘆薈 京墨 使君子

白麵一錢

共研。陳米糊丸。芡實大。薄荷湯下一丸。

蠟梢散 治小兒急慢驚風。

蠟梢 烏頭尖七枚 丹砂五分 附子姓一

半 夏一枚
共末。柳枝湯下。

慢驚風

論曰。小兒慢驚者。痼病發於陰也。由在胎時稟受不足。心氣虛弱。外中風邪。入於臟腑。其發則手足瘳癢。頭目搖動。牙關緊噤。神情如醉。休作有時。潮搐不定。謂之陰癇。治則外以灸法。內以藥餌。臨機應變。可謂上工。若症見息高。魚口。泄瀉。遺尿者。皆所不治。

羌活煎 治小兒慢驚風。兼內外俱虛。

羌活

防風

人參

獨活

桂心一分

硫黃

水銀二錢

白附子五錢

全蠍

白殭蠶一分

共末。棗肉丸。小豆大。防風湯下一二丸。

全蠍散 治小兒慢驚風。兼內外俱虛。

全 蠟五分 乳香 細辛一分 青黛

白附子五錢

共末。冬瓜子湯下。

珍珠丸 治小兒慢驚風。

珍珠 牛黃 丹砂 雄黃

膩粉一分

共末研勻。用陳米糊丸小豆大。用薄荷湯下五七丸。日二。

睡脾散 治小兒慢驚風。

人參 半夏 膽星 山藥

全 蠟 薄荷一分 桑螵蛸四枚

共末。入麝香少許拌勻。用粟米飲下五分。

鉤藤煎 治虛風慢驚。

鉤藤 防風 川芎 天麻

麻黃一分 蠟 梢 荆芥穗 蟬 脫五錢

冰片

麝香一字

白僵蠶

薄荷心各二十枚

共末入蜜杵丸。皂子大。用荆芥薄荷湯下一丸。

天竺黃散 治小兒慢驚風。經久不差。

天竺黃

人參

使君子

炙甘草

蠟梢

胡黃連一分

冰片

麝香五分

半夏薑炒

藿香五分

共末。蜜湯下三五分。

天癩

論曰。小兒卒然驚悸。眼目翻騰。壯熱不止。四肢抽掣。上仰如釣縛之狀。名曰天癩。乍作乍止。此風熱痰涎之所發也。良由乳母恣噉五辛熱酒之類。毒熱氣流入乳中。因即乳兒。兒飲熱乳。腑臟風熱。脾胃生涎。痰涎既生。必壅滯不得宣通。致令心神不寧。為天癩之病。

赤靈丸方 治小兒天癩癇病。急慢諸風。

丹 砂研過 人 參各一兩 酸棗仁研二 乳 香研半

白 麵二錢

生蜜和膏入新竹筒內。以油紙封扎定。坐飯甑上炊。俟飲熟為度。分作三十丸。每一丸分四服。薄荷湯化下。更量兒大小服之。

白疔蠶散方 治小兒天癩。

白疔蠶炒 馬牙硝 鬱 金 乾 蠍去土炒

為散。每服一字匕。乳汁調服。甚者半錢。不拘時候。

天南星散方 治小兒天癩。

天南星大者一枚。掘地作坑。安磚子一片。先用火燒赤。後放南星於熱磚上用酒半升。頃天南星上。即用盞子蓋之。候冷。

為散。每服一字。溫酒調下。二歲以下用乳汁調。

備急塗頂膏方 治小兒天癩。

烏頭末 芸薑子末各二

每用一錢。新水調傅兒頂上。

諸疳

論曰。疔之爲病多矣。錢氏謂二十以下爲疔。二十以上爲勞。二症同出而異名也。總之不外毛髮焦稀。口嚙唇白。眼昏脊聳。肚脹腸鳴。或食炭米泥土等物。又有五疔之分。心疔卽驚疔。其症壯熱。臉赤唇紅。口瘡盜汗。煩渴便赤。虛驚是也。肝疔卽風疔。其症搖頭側目。白膜遮睛。筋青燥渴。汗多下痢是也。腎疔卽急疔。其症腦熱肌削。手足如冰。寒熱時來。滑泄肚痛。口乾爪黑是也。肺疔卽氣疔。其症咳嗽喘逆。皮膚粟立。口鼻作癢。生瘡流涕。咽喉不利是也。脾疔卽食疔。其症身黃困倦。肚大脚細。水穀不消。瀉下酸臭是也。此五臟成疔之謂也。其外又有脊疔。腦疔。蟲疔。蛔疔之不同。疔渴。疔瀉。疔腫。疔勞之各異。然詳其始。幼者不出。哺乳失常。大者不過甘肥無度所致。總在隨症斟酌治之。不可執一端以誤事也。蓋疔者乾也。因脾胃津液枯涸。治宜調補胃氣爲主。

福建剪紅丸 治小兒疔積初起。各種疔症。皆宜服之。

檳榔一筋

大黃一筋

牽牛末一筋

三稜六兩 醋炒

蓬朮六兩 醋炒

貫衆五錢

沉香五錢

麝香五錢

木香一兩

雷丸五錢

商陸五錢

丁香三錢

青木香 二兩

速香 五錢

香附米 二兩

生漆渣 四兩

棟樹根 七兩

牙皂煎汁

茵陳煎汁

金毛狗脊煎汁

不煎汁者各為細末。再用史君子肉二兩。同大黃好酒浸一日夜。先放柏葉於鍋底。次放大黃。史君子肉在上。酒煮三炷香。取出二味。曬乾為末。各色先以一圍者。檳榔。牽牛末。跌起。次用二圍者。次用三圍者。次用四圍者。將前汁跌為丸。以百草霜為衣。看兒大小虛實。自一錢至三錢止。空心溫茶送下。

蘆蒼肥兒丸 治諸疳並鼻下生瘡。愛喫泥炭米土諸物神效。

五穀蟲 二兩

蘆蒼 一兩

胡黃連 兩一

川黃連 薑汁炒

銀柴胡 二錢 一兩

扁豆 兩二

山藥 微炒 兩二

肉蓯蓉 去

山查肉 二兩 五錢 透

史君子肉 五錢 一兩

蝦蟆 肥大者 兩二

麥芽 六錢 一兩

檳榔 六錢

神麩 兩二

麩 兩二

麝香 五分

鶴虱 八

蕪荑 去皮 一兩

砂 二錢

麝香 五分

共為細末。醋糊為丸。如黍米大。每服大者二錢。小者一錢。米飲湯下。

蒸雞丸 治腎疳成勞。骨蒸潮熱。盜汗瘦弱。腹急面黃。食不生肌。日哭夜啼。

黃連

柴胡

蕪荑

鶴虱

秦艸

知母

丹參

史君子肉等分

右爲末。用黃雄雞一隻。重一斤者。籠之。用大麻子飼之。五七日。去毛令淨。於背
 上開一孔。去腸肚拭乾。入前末藥於雞腹內。以線縫之。先以黑豆鋪三寸於甑
 底。再安雞於甑中。仍以黑豆蓋滿。自朝蒸至晚。候溫冷。取雞肉研爛。同前末藥
 入酒麵糊丸。如赤豆大。二歲者米湯吞服二十九。十五歲溫酒吞五十九。忌猪
 雞肉。

無辜疔

論曰。小兒病面黃髮直。時時壯熱。飲食不生肌膚。頭項生核狀如瘰癧。以無辜而
 得。故名無辜疔。由小兒嗜肥甘過多。蟲因甘動。內緩脾氣。飲食不調所致也。治之
 當如治諸疔之法。凡小兒頭項有核如彈丸。按之虛軟。法當去之。爲此核初生。輒
 而不痛。中有蟲如米。得熱氣則能蔓生。蝕小兒腑臟。故外證肌瘦。毛髮聳直。下
 痢膿血。體常瘡癢。膿漏不已也。無辜疔者。言天有鳥名曰無辜。晝伏夜游。洗梳衣
 被。露之經宿。或遇此鳥飛從上過。將衣被與小兒

穿臥便令兒有所據
古人立言必有所據

丹砂丸方 治小兒一切無辜。黃瘦腹痛疳痢。或有蟲冷熱。悉宜治之。

丹砂

雄黃

乾蝦蟆一枚去頭足塗

石菖蒲

漏蘆各一

麝香一分

以菖蒲、漏蘆為末。與餘四味入乳鉢同研勻。再羅粟米飯為丸。如麻子大。每服二丸。米飲下。空心後午各一服。隨兒大小加減。

蘆薈散方 治小兒無辜疳氣。寒熱積滯不化。心腹脹痛。

蘆薈

人中白

蝦蟆炙黃各

麝香一分

為散。再合研令細。每服一字至五分。熟水調下。不拘時。日二服。後當下惡物。量大小加減。

鼈甲丸方 治小兒無辜疳。

鼈甲醋炙黃

黃連

桔梗炒

夜明砂各一

訶梨勒皮一兩半生

麝香一分

乾蝦蟆雄者一枚

為末。以糯米飲為丸。如菉豆大。粥飲下七丸。疳痢亦宜服。日三量大小加減。

哺露丁奚

論曰。小兒乳哺不調。傷於脾胃。脾胃衰弱。不能飲食。血氣減損。不榮肌肉。而柴辟羸露。其臟腑不宣暢。則吸吸苦熱。謂之哺露也。露丁奚者。黃瘦腹大。頸小。與無辜哺十全丹。治丁奚哺露。

陳皮

川芎

青皮

莪朮

五露脂

白豆蔻

檳榔

蘆薈

木香

史君子

蝦蟆

右為末。猪膽汁浸糕。糊丸。麻子大。每服二十九丸。米飲下。有熱。薄荷湯下。

赤芍藥丸。治小兒丁奚。雖食不生肌肉。腹大。食不消化。

赤芍

大黃

鼈甲

桂心

柴胡

赤茯苓

右件藥搗為末。鍊蜜和丸。如麻子大。每服五丸。日三服。

人參丸。治小兒羸瘦。腹大青筋。及丁奚等病。

人參

麥冬去心

半夏夏湯洗

黃耆

大黃微炒

茯苓

柴胡

黃芩各三分

甘草炙

芎藭半兩

訶梨勒煨用皮

鱉甲醋炙黃去一兩

右件藥搗羅為末。煉蜜丸如麻子大。一二歲以粥飲下三丸。四五歲五丸。日三服。量意加減用。

嘔吐

有物有聲名曰嘔。有聲無物則曰乾嘔。有物無聲曰吐。皆因胃氣不和。陽明之氣下行則順。今逆上行則嘔吐。有因胃寒。胃熱。痰水。宿食。氣攻之症。有乳吐。熱吐。寒吐。冷吐。傷食吐。傷寒吐。各受症不一。治法不同。但兒啼未定。氣息未調。遽以乳飲之。其氣尚逆。乳不得下。停滯胃中。則令嘔吐。又乳母貪涼。冷氣入乳。兒若飲之。亦生嘔吐。或因宿食未消。或解脫衣服。因受風冷之氣。入於腠理。則腹脹痛嘔吐。熱吐者先去風痰。冷吐者宜固胃氣。痰吐宜下其痰。次與固正氣之藥。食吐者當與塌氣諸症。豈可一概治之。吐瀉不止。脾虛生風。眼開風驚。眼合慢驚。慢脾當要固。

養正氣。若仍以驚藥治之。則效不旋踵。若不參詳治療。豈不誤哉。
加味二陳湯 治胃有熱。膈上有痰。以成嘔吐。

半夏製

橘紅

茯苓

甘草炙

黃連薑汁

山梔子炒黑

生薑各等

水一鍾。煎至六分。緩緩熱服。

加味理中湯 治寒痛嘔吐。

人參

白朮

乾薑

甘草

丁香

右藥各等分。用水一盞半。煎六分熱服。

藿香正氣散 治小兒風寒嘔吐。

藿香

紫蘇

陳皮

桔梗

大腹皮

甘草

茯苓

厚朴

白芷

半夏

右劉為末。每服二錢。加薑一片。棗一枚。水一盞。煎至六分。去滓溫服。

竹茹湯 治小兒積熱嘔吐。

葛根三錢

半 夏製

竹茹錢二

甘草一錢

共爲末。用水一盞半。煎八分。去滓。臨服加生薑汁一茶匙。

朱沉丹 治小兒嘔吐不止。

硃砂半錢

沉香三錢

藿香三錢

滑石半兩

丁香半錢

右爲細末。每服半錢。用新汲水一盞。芝蔴油滴成花子。抄藥在上。須臾墜。濾去

水。却用別水。空心送下。

紫金核 治小兒一切嘔吐。

半夏製洗

人參

白朮

木香

丁香半錢

藿香三錢

右爲細末。稀麵糊爲丸。如李核大。後用沉香一錢爲末。硃砂一錢。水飛二味。同

研勻爲衣。陰乾。每服一丸。用小棗一枚去核。納藥在內。溼紙裹燒熟。嚼與小兒

服。後以米飲壓之。

聖惠散 治心神煩熱嘔吐。

麥冬 半兩

淡竹茹 半兩

甘草

人參

茅根

陳皮 五分
去白各

右爲末。每服二錢。水一盞。薑三片煎至五分溫服。日二三服。

綠豆飲 治嘔吐誤服熱藥。

綠豆粉 一兩

黃連

乾葛

甘草 各五錢

右除豆粉外。餘藥三味。共爲細末。入乳鉢同萊豆粉杵勻。每服半錢至一錢。溫
豉湯調服。

噦吐

論曰。小兒初見乳自流出。謂之哕。哕之不已。謂之吐。吐之不已。則作嘔吐。嘔吐不已。則傳噦。噦之不已。卽作噦。自嘔。噦噦皆有出聲。動氣嘔者。口開而作。噦者。心膈上下氣逆鬱結。噦者。無物可出。卽膈虛胃寒。引氣噦噦作聲。皆由哺乳冷。冷乳入胃。與胃氣相逆。冷傷胃氣。不得宣通。故作噦也。此候若不調和胃氣。養正祛邪。須

與症變。而慢驚、慢脾風者立至也。

又曰小兒嘔嘔吐嘔四症。皆胃有傷而發。嘔則如簷水射出。嘔則開口而作。吐者吐出有物。嘔者無物可出。失於調治。則慢驚由此而成。四者之候雖同。而每症之寒熱虛實異。必須察其脈症以治之。

六君子湯

治小兒胃寒作嘔。

人參

白朮土炒

茯苓

甘草炙

陳皮

半夏製各

右剉咀。加薑三片。水二鍾。煎八分。溫服。

泄瀉

論曰。小兒肌膚脾胃脆弱。若解脫不時。風邪易侵。客於肌肉。搏於胃經。則爲胃風。其狀腹善滿。食寒則泄。診形瘦而腹大。蓋足陽明胃之經。其支者起胃下口。循腹裏。下至氣衝。故風冷入中。則腹善脹大。又胃爲水穀之海。得寒則食物不化。氣血虧損。故泄瀉而形瘦也。

胃風湯方 治小兒胃風泄痢。腹脹腸鳴。

人參

白茯苓

川芎

桂心

白芍藥

當歸

白朮

每服一錢。入粟米半匙。同煎溫服。空心食前。日二。以意加減。

訶梨勒湯方 治小兒胃風腹脹。得冷則瀉痢。

訶梨勒皮煨用

當歸炒

黃連炒

甘草炙

木香

乾薑各等分

每服一錢。水煎放溫。不計時候服。

厚朴散方 治小兒腸胃風冷。泄痢水穀腹脅脹滿不欲食。

厚朴薑汁

黃連各半

丁香

肉豆蔻

當歸

木香

龍骨

白朮各一分

為散。每服半錢。以粥飲下。食前服。日三。量意加減。

洞泄注下

論曰。小兒下痢不止。食已即泄。名爲洞泄注下。此由風邪客於腸胃。方春之時。爲風冷所傷。藏在肌肉。至長夏陰氣方盛。或因飲食居處不慎。復被風冷入於腸胃。其病下痢。冷盛則重。故爲洞泄注下。俗謂之水穀痢是也。病本於風。若甚則變胃風證。

草豆蔻湯方 治小兒洞泄不止。

草豆蔻二枚

高良薑

人參

甘草各一

乾木瓜一分

白茯苓

桔梗炒各

每服一錢。生薑七片。水煎分三服。乳食前各一量加減。

梁米湯方 治小兒洞泄注下。水穀不分。

梁米

稻米

黍米各三

蠟彈大半

以東流水二升。煮梁米三沸去滓。留汁煮稻米三沸去滓。復以汁煮黍米三沸去滓。置蠟於汁中和之。候蠟消放溫。每以半合。分爲二服。空心、午後各一。更量兒大小加減。

厚朴湯方 治小兒泄瀉不止。

厚朴薑汁

黃連去鬚各一兩

一二歲兒每用一錢。薑二片。水煎。分溫二服。空心。日午各一。量大小加減。

黃連丸方 治小兒腸胃虛寒。洞泄下痢腹痛。

黃連炒半

乾薑

吳茱萸炒各

肉豆蔻三枚

草豆蔻一枚

爲末。燒粟米飯和丸。如菉豆大。每服七丸。乳食前米飲下。量兒大小加減。

燕口瘡

論曰。小兒燕口瘡者。口吻兩際瘡生如燕口。世亦謂之肥瘡。此由脾胃客熱上衝。口唇熏發爲瘡。或者以燕泥和麝少許傅之甚良。蓋治之以其意也。

胡粉散方 治小兒燕口瘡。

胡粉妙研一分

黃連末半兩

二味同研勻。以少許傅瘡上。

治小兒燕口及口內生瘡方。

殺羊髭燒灰

一味研細。以臘月豬脂和。日三四上塗之。

又方

雞臙脰黃皮不拘多少燒灰

一味研爲末。以乳汁調半錢。日三。

黃柏皮散方 治小兒燕口瘡。

用黃柏皮爲末。甑汗。調塗。傅瘡上差。

語遲

論曰。心爲言。肝爲語。其經屬於手少陰。足厥陰。其氣上通於舌。舌者聲之機。若稟受之初。母懷驚怖。則子之心火不足。而肝木弱。令機關不利。氣不宣揚。而語遲期者。有經數歲月而不能言者。

雞頭丸方 治小兒諸病後。六七歲不能語。

雄雞頭燒炙一枚

鳴蟬去翅足三枚

甘草炙半

麥門冬一兩

大黃兩半 當歸三分 黃耆三分 川芎三分

遠志去心 木通半兩 人參一兩

爲末。鍊蜜丸如棗豆大。每服以粥飲送下五七丸。量兒大小加減。不計時候。

菖蒲丸方 治小兒五六歲不語。

菖蒲 人參 黃連各半 丹參

赤石脂各三分 天冬去心 麥門冬去心

右爲末。鍊蜜丸。如棗豆大。每服五七丸。溫水下。不拘時候。日三。量兒大小。以意

加減。

齒不生

論曰。牙齒是骨之所終。髓之所養。手陽明足陽明之脈。並入於齒。若血氣充實。則骨髓強盛。雖其齒損落。猶能更生也。若虛弱者。血氣衰耗。風冷乘之。致令齒久不生。假令生者。齒齲或蟲落。不能復生也。

治小兒牙齒不生方

雄鼠糞二七枚

一味。每日用糞一枚。齒根上拭。至二十一日。其齒卽生。

又方

道傍遺稻粒

一味。於齒根落處點三七下。其齒自生。

治小兒齒不生。無問遠近。皆得便生神效方

雄雞糞二七枚 雌雞糞二七枚

右二味。用火燒灰存性。先用鍼挑開齒斷上。後以雞糞灰點之。

涎液不收

論曰。小兒因氣不升降。膈脘否滯。致令乳飲不化。流入胃中。隨氣上溢。故令多涎。其候胸滿短氣。飲食遲化。內經謂脾爲涎。當調脾胃。升降其氣。則病可愈。

半夏丸方 治小兒脾胃氣不升降。氣溢於上。涎液不收。

半夏一

白礬生研

先以半夏爲末。再入白礬和勻。麵糊和丸。如粟米大。每服五七丸。量輕重加減。食後。臨臥薑湯下。

桑白汁方

治小兒脾熱。乳食不下。胸膈痞悶。涎溢不收。

新桑根白皮

不計多少細剉

自然汁塗於兒口內立效。如無新桑根白皮。取乾者一兩細剉。用水一盞。煎一半。放溫塗兒口亦可。

是書三副湊合。仍缺小兒方五卷。一百七十三卷。至余於祕閣內府江浙齊梁諸鑒古家。遍訪無有藏本。欲補全而未能。同學項視菴搜求小兒今古方論。補全五卷。議論簡要。方法詳明。可稱全璧矣。諸疳以下。卽其所補也。

黃海程 林識

聖濟總錄卷之二十五 小兒門 涎液不收

三二

聖濟總錄纂要

清

新安

程

林雲來纂輯

鄞縣

曹炳章赤電校點

卷二十六

神仙服餌門

神仙服草木藥石

論曰。神仙服草木。必取其柯葉堅固。形質不變。若松柏、茯苓之類。其意蓋以延年益壽爲本。至於其他。非具五行之秀。則必備四氣之和。其意深矣。千金謂服餌六法。必先去三蟲。三蟲既去。次服草藥。草藥得力。次服木藥。木藥得力。次服石藥。精麤相代。由麤以至精。其序不可紊也。

黃精丸方 延年補益療萬病。

黃精十斤洗令淨蒸爛熟白蜜三斤 天門冬三斤去心蒸令爛熟

拌和令勻。置於石臼內搗一萬杵。再分為四劑。每一劑再搗一萬杵。取出丸如梧桐子大。每服三十九丸。溫酒下。日三。不拘時。

兔絲子丸方 明目進飲食。益精壯下元。

兔絲子一斤酒浸三日控乾搗末 甘菊花去杜搗末

拌和令勻。鍊白蜜為丸。如梧桐子大。每日清晨至晚後食前。以溫酒送下。二十九丸。進食倍常。頻頻泄氣。是藥之應。若諸般眼疾。黑花昏暗者。並宜服之。

黃精酒方 延年益壽。返老還童。除萬病。

黃精五斤 天門冬三斤去心 松葉 枸杞根各五斤

搗為麤末。以水三石。入前藥在內。煮二石。用糯米一石。細麵麩半秤。蒸米麩入在前藥水中。封閉二七日。熟。任性飲之。

地髓散方 長年保命。

生乾地黃四兩 香附根 茜根 地骨皮洗焙

菴蘭子

茅草根各一

右六味擇日修合。春用甲子。夏用丙子。秋用庚子。冬用壬子。搗羅爲細散。每日早晨溫酒調下一錢匕。午後再服。五十日後。諸疾不生。身體輕強。養血去風。治吐血。衄血。失血諸疾。

靈仙散方 輕身延年却老還童。

白茯苓一兩

巨勝子酒浸半斤

天門冬去心

白朮

杏仁去皮

乾黃精各一

右六味搗羅爲細散。每於食前水飲下三方寸匕。日二服。或以蜜丸如赤小豆大。每服三十丸。溫水下。

松實丸方

延年復命

柏實淨揀各三兩

松脂煉成十斤

爲細末。鍊蜜和搗五六百下。丸如梧桐子大。每日食後。午前溫米飲下二十九丸。

漸加至三十丸。至百日不飢。顏色光潤。

胡麻散方 益壽延年去客熱。

胡麻子

白茯苓

生乾地黄

天門冬去心各

為細散。每服方寸匕。食後溫水調下。

芡實散方 河上公益壽延年。

乾雞頭實五兩

忍冬莖葉揀無蟲朽新肥者

乾藕斤各一

三味於甑內炊熟。暴乾。搗羅為細散。每日食後新汲水調下一錢。

益壽地仙丸方

甘菊花三兩

枸杞二兩

巴戟天二兩

肉蓯蓉酒浸一宿洗淨切片焙乾四兩

為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每日空心鹽湯或酒下三十九。久服清頭目。補益

丹田。駐顏潤髮。春秋枸杞菊花加一倍。冬夏蓯蓉巴戟加一倍。服餌勿令斷絕。

辟穀木耳丸方

木耳搗末

大豆炒熟搗末

棗煮熟去皮

三味。鍊蜜和丸。如雞子大。有食日服一丸。無食日服二丸。逢食即食。無食亦不

飢矣。

服松脂辟穀不老方

松脂五斤 桑灰汁一石

二味以灰汁一斗於釜內煮松脂三五沸取接置冷水中候凝復煮之如此十度乃止逐度易灰汁并換冷水其脂白矣取鍊成白脂研羅爲末每服一匙頭以酒或米飲調下空腹日午近晚服若至十兩以上不飢一年以後夜視明目久服不老

絕穀升仙不食方

松實去皮 菊 花等分

二味爲末鍊過松脂和丸如梧桐子大或鍊蜜爲丸每服十丸酒下日三服可至二十九丸亦可作散服二錢空心日午近晚各一服

天門冬丸方 辟穀延年

天門冬 白茯苓 白蠟 白蜜

白羊脂一斤去膜各

先搗羅天門冬茯苓二味爲末次以清酒五升入大鑊中煎三沸內羊脂煎三

五沸。又內蜜并蠟煎五沸。掠去沫。次入天門冬、茯苓末。用柳木篋不住手攪令勻。火勿令猛。候煎成膏。可丸。乃丸。如櫻桃大。又取大杏仁一升。浸去皮尖雙仁。研如膏。傾入淨通油瓷餅內。坐慢灰火中。內前藥丸子於杏仁膏中。養令色白。即取離火。每服三丸。空腹溫酒下。

廣福延齡丹方 去三尸。潔臟腑。鎮七魄。明耳目。

丹砂 研

雄黃 研如粉

人參

白茯苓 各二兩

白朮

乳香 研四兩

右六味。各搗研為末。和勻。入銀器中。用白蜜和如稀膏。以油單封口。又以水和白麵裹器物外厚兩指許。每日於飯上炊。候飯熟取下。如此半月。如藥乾更入蜜。丸如梧桐子大。空心溫酒下二十九。忌羊血。其功甚大。

神仙巨勝丸方 輕身壯陽。却老還童。去三尸。下九蟲。除萬病。芝麻

巨勝 二斤 酒浸一宿 九蒸 九晒

牛膝 酒浸切焙

巴戟天

天門冬

山藥

柳桂

熟乾地黄

酸棗仁

覆盆子

兔絲子 酒浸別搗暴乾

遠志 去心

菊花

人參

白茯苓各一兩

揀擇淨爲末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每日空心溫酒下二十九。服一月身輕體健。萬病不侵。

青元子返童散方 輕身延年除百病去三尸。

天門冬

人參

白茯苓

麥門冬

白菊花各六兩

爲散。每日溫酒或飲調下三錢。不拘時候服。三年身輕。

補益門

平補

論曰。一陰一陽之謂道。偏陰偏陽之謂疾。不明乎道。未有能已人之疾者。世之貪藥石。惟務酷烈。非徒無益。反傷和氣。故方論平補之法。欲陰陽適乎其中也。

平補五臟延年治百病方

兔絲子

酒浸七日
妙黃三兩

覆盆子

車前子

巴戟天

遠志

生地黃

白朮

細辛去苗

何首烏

葛蒲

地骨皮

牛膝一兩

續斷

菊花去梗各一兩半

除菊花外。以溫水和酒少許。洗過焙乾。杵羅為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每日空心常服三十丸。男子鹽湯下。婦女醋湯下。午食前更一服。至十服。其人病有發時。是藥動病本功應也。

枸杞丸方 平補心腎延年駐顏。

枸杞子

肉蓯蓉酒浸一宿

菊花

黃耆塗酥

桂心

牛膝酒浸一宿

生乾地黃酒浸一宿

遠志

山藥略一

人參

白茯苓

柏子仁炒酒浸各一兩半

右為末。以浸藥酒煮。麵糊丸。如梧桐子大。每服空心酒下三十九。鹽湯下亦可。無比山藥丸方 平補諸虛百損。五勞七傷。頭痛目眩。手足厥冷。或煩熱有時。或冷痺骨疼。腰髓不隨。飲食雖多。不生肌肉。或少食而脹。體無光澤。陽氣衰絕。陰氣不行。此藥能補經脈。起陰陽。安魂魄。開三焦。破積聚。厚腸胃。強筋練骨。輕身。

明目。除風去冷。無所不治。

乾山藥五兩

肉蓯蓉

皮酒洗去燉

五味子五兩

兔絲子酒浸三兩

杜仲炒三兩

牛膝

酒浸二兩

山茱萸二兩

熟乾地黄二兩

澤瀉一兩

茯苓

神去皮二兩

巴戟二兩

赤石脂一兩一方有

右為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服二十九至三十丸。食前溫酒下。溫米飲亦得。服之七日後。令人身輕健。四體潤澤。脣口赤。手足暖。面有光悅。消磨飲食。身體安和。音聲清響。是其驗也。十日後長肌肉。此藥通中入腦。鼻必酸疼。勿怪。

石菖蒲

地骨皮

牛膝酒浸

兔絲子酒浸

生乾地黄

遠志各等分

右為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服二十九丸。空心食前溫酒或鹽湯下。加至三十丸。

山藥四倍丸方 平補除風痰。益年壽。

山藥半兩

枸杞子一兩

甘菊花二兩

熟乾地黄四兩

爲末。鍊蜜丸。如梧桐子大。空心食前鹽湯下三十丸。溫酒亦可。

補骨脂丸方 平補諸虛。益精壯陽。

補骨脂

松脂

白茯苓

山

藥各八

杏

仁去皮尖雙胡桃肉

大棗各一

桂心

牛膝酒浸

澤瀉

菖蒲

薏苡仁

草薺

檳榔各一

鹿角膠炙燥

獨活

蛇牀子

蒺藜子妙去角

生地黄取汁

右除地黃汁外。爲末。以水煎至地黃汁成膏。入藥點蜜和丸。如梧桐子大。每服

空腹溫酒下三十丸。

峻補

論曰。陰陽之氣。本自和平。過則生患。峻補之藥。施於倉卒。緣陽氣暴衰。真氣暴脫。或傷寒陰證諸疾。急於救療者。不可緩也。蓋人稟受有限。嗜慾太過。病疾橫生。固當取陽氣以扶衰弱。則峻補諸方。經所謂補下治下制以急。急則氣味厚者。此之

謂也。

青硫丸方 治久冷峻補元藏。

硫 黃水一斤酒甘草 煎三日

牛 膝酒浸 白豆蔻去殼

艾 葉乾

附 子去皮 木 香二兩

山茱萸各四兩 肉豆蔻去殼

爲末拌勻。蒸木瓜肉和搗爲丸。如梧桐子大。每服十九至十五丸。空心鹽湯下。如脚腰疼痛。用木瓜湯下。

益神丸方 補元藏久冷。

硫 黃酒并甘草 木 香

桂 心 青橘皮去白各 附 子去皮

肉豆蔻 檳 榔

爲末和勻。用糯米粥丸。如梧桐子大。每服十九至十五丸。空心酒下。

補虛益氣

論曰。形不足者溫之以氣。精不足者補之以味。形精相感。氣血生化。則榮衛循流。

不失其度。食飲不節。起居靡常。嗜慾過度。神憊精搖。則真氣將耗。虛損之疾。由是而生。治法當補虛益氣。

兔絲子丸方 補元藏。益脾胃。止腹臍疼痛。思進飲食。固真氣。美顏色。

兔絲子水淘去浮者用酒浸七日別搗

草薺各二兩

肉蓯蓉酒浸四兩

黑狗脊骨并髓炙焦者亦佳

枳實炒一兩

熟乾地黄二兩

山藥一兩

為末。酒煮麵糊丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。空心。食前各一服。

地黃沉香丸方 治上熱下冷。五勞七傷。補益虛損。

沉香鹿茸酒浸 肉蓯蓉酒浸 牛膝酒浸

附子去皮臍各三兩 兔絲子酒浸搗末三兩 別

黃耆

熟乾地黄四兩 蒺藜子炒二兩

巴戟天

川芎

石斛 山茱萸 木香

羌活

補骨脂 蛇牀子 棟實取肉

人參

桂心 薤香子炒

檳榔

骨碎補

安息香胡桃二枚
各一兩

右爲末。別取地黃自然汁七升。棗膏四兩。酒三升。蜜半斤。酥五兩。於銀石器中熬如膏。放冷。入羯羊筒骨內髓半斤。鍊油去滓。和前末杵千百下。丸如梧桐子大。每空心溫酒或鹽湯下三十九。加至四十九。

四補丸方 益氣血補元藏悅顏色。

柏子仁

生絹袋盛

何首烏切片

肉蓯蓉切片

牛

膝生絹袋盛

用酒三升。春夏浸七日。秋冬浸二七日。取牛膝。柏子仁先搗如泥。次將何首烏。蓯蓉杵得所爲丸。如梧桐子大。每服二十九至三十九。空心溫酒下。

補虛益血精髓

論曰。內經謂腎者主水。受五藏六腑之精而藏之。又曰。腎之合骨也。骨者髓之府。故嗜慾過傷。精髓耗憊。則必用補腎之劑以益之。凡病虛則補之。不必專用熱藥。若腎虛之證。尤當以益精髓爲先。聖濟經謂陽劑剛勝。則曰天癸竭而榮涸。蓋謂此也。

覆盆子丸方 治五勞七傷。骨髓虛憊。

覆盆子

鹿茸去毛炙

巴戟天

五味子

桂心

山藥各半

黃耆

牛膝酒浸

熟乾地黄一兩

遠志一分

肉蓯蓉酒浸

石斛各三分

右為末。鍊蜜丸。如梧桐子大。空心溫酒下三十丸。

仙丸方 補不足。填精髓。除風變白。

生地黄取汁

生牛膝取汁

生薑取汁

兔絲子酒浸別取末

挑仁去皮尖

杏仁酒浸去皮

巨勝子瓶內炒熟暴乾九遍湯浸去皮炒研

蒺藜子各一

白蜜

先將地黃汁量三升。入銀石器內浸。到處刻記定。次入餘地黃汁。慢火煎至刻處。次下牛膝汁。又煎至刻處。其火常令如魚眼沸。次下杏仁、桃仁末。次下巨勝末。次下蒺藜末。次下兔絲末。又下白蜜。攪勿住手。候可丸。即搗三千杵。丸如梧桐子大。每服空心溫酒下三十丸。加至四十九丸。晚再服。百日後白髮變黃。二百日後。從黃變黑。諸風悉除。尤補腰腎。益氣明目。

金鎖丸方 壯元氣。益精髓。補虛損。

龍骨 一兩茅香湯浴
三遍研如麪

蓮花蕊 七八兩
採二兩

雞頭粉 三分

山茱萸 酒浸
取肉 沉香

肉蓯蓉 酒浸
去皮

附子 去皮
附子

桂心

為末。以金櫻煎膏丸。如無即鍊蜜丸。如梧桐子大。空心溫酒下二十九丸至三十丸。

地黃煎方 治精極。填骨髓。

生地黄 取一斤 牛酥 一斤 白蜜 一斤

以慢火煎地黃汁減半。內牛酥更煎良久。次下蜜攪勻。候稀稠得所。瓷器盛。每日空心食前溫酒調下數錢。

靈芝丸方 治脾腎氣虛。補骨髓。通利耳目。

蒼朮 一斤米泔
浸時換水

以竹刀刮去皮并土。夏浸三日。冬浸七日。晒乾為末。棗肉丸如梧桐子大。空心棗湯下二十九至五十九丸。蒼朮一味甚妙。人以至錢而忽。他藥多矣。熬膏亦佳。

補虛固精

論曰。腎主水。受五藏六腑之精而藏之。所謂天一在藏。本立始也。若腎衰精氣不固。或因洩而出。或因聞見而溢。或因虛勞漏泄精氣。或因邪氣乘虛。客於陰。爲夢遺。皆腎虛也。宜補益固之。澁以去脫之劑。

九物金鍊丹方 治虛損去風閉精固元陽。

龍齒

敗龜板酥炙

雄蠶蛾

白蓮花各半

各半

山藥二兩

巴戟天半兩

蓮子心

肉蓯蓉各一

各一

雄雞肝一具

爲末。麪糊丸。如梧桐子大。每服十丸。空心溫酒下。

補骨脂丸方 治夢泄。

補骨脂炒四

龍骨

山茱萸

巴戟天各一

各一

爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。空心鹽湯下三十丸。

神效散方 治夢洩。

白茯苓一兩

猪苓二錢

先用水煮合。宜去猪苓。再將茯苓焙乾爲散。每服一錢。溫酒下。空心夜臥各一。

半夏丸方

治夢泄。除痰。利胸膈。

半

夏二兩。湯洗七通。入猪苓四兩。炒。

爲末。酒麵糊丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心粥飲下。

韭子丸方。治腎藏虛冷。腰膝痠疼。冷痺。夜多小便。夢寐遺泄。日漸羸瘦。面無顏

色。兼治女人惡露赤白帶下。

韭

子七升
淨七升

以醋湯煮千百沸。取出焙乾。旋炒令作油麻香爲末。鍊蜜丸。如梧子大。每日空心溫酒下二十九。加至三十九。

補虛壯元陽

論曰。陰陽氣血之在人。初無餘欠。及勞動妄作。嗜慾過度。戕其太甚。則有陰陽傷
憊之病。氣血虛損之證。法宜補之。

菴蓉丸方 補元藏。益精氣。利腰脚。

肉菴蓉 酒浸二兩

天雄 去皮臍一兩

白馬莖 酥炙二兩

雀卵 四十枚

兔絲子 酒浸三宿一兩

右將四味爲末。以雀卵并鍊蜜丸。如梧桐子大。每服十丸。空心溫酒或米飲下。

兔絲子丸方 補虛益氣。壯元陽。

兔絲子 淘去淨者以酒浸七日曬乾三十兩

懷香子 炒八兩

青鹽 三兩

爲末。用浸藥酒。煮麵糊丸。如梧桐子大。每服空心溫酒下二十九至三十九。

補虛理腰膝

論曰。內經謂腰者腎之府。轉搖不能。腎將僊矣。膝者筋之府。屈伸不能。行則僊仆。筋將僊矣。蓋腎主腰。肝主筋。筋聚於膝。若腎藏虛損。肝元傷僊。則筋骨受病。故腰膝爲之不利。

酸棗仁散方 治骨極腎虛。脚膝骨髓痠疼。

酸棗仁 八兩微炒

虎脛骨 酥炙二兩

熟乾地黄 八兩

杜仲 炒二兩

桂 心三兩 牛 膝三兩

右為散。每服二錢。胡桃酒下。葱茶亦可。空心、日午、夜臥各一服。

杜仲丸方 補下元。烏髭鬢。壯腰膝。進飲食。悅顏色。治腰疼。

杜仲綏為 補骨脂炒香熟 胡桃仁湯浸去皮

研勻。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心溫酒下。

地仙煎方 治腰膝痠疼。腹痛。內一切冷病。令人悅澤顏色。骨髓堅固。行及奔馬。

山藥末一斤 杏仁去皮尖 生牛乳一升

先將杏仁細研。入生牛乳。絞取汁。次取山藥末相拌。入新瓷器密封。安放釜中。

重湯煎一日。煎成。每服一錢。空心溫酒下。

兔絲子丸方 治腰膝積冷痠疼。或癆麻無力。壯真元。

兔絲子 牛 膝各一兩

於銀石器內好酒漬之。令酒過藥一寸。經五日。空乾焙燥。搗羅為末。將元浸藥

酒煮麵糊丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心食前酒下。

神仙服餌三卷。非烹砂煉石。則嚙柏咀松。或吐納清和。或斬除尸害。皆藏經所

備載。亦難行難用也。一概刪去。今選其可服餌延年駐顏者方十餘道。又補益門方二十餘道。爲養生家備用。博雅君子求全書繙閱。則余纂要一書。濟世婆心。廣開聞見。當有賞識者矣。

康熙辛酉中秋日 靜觀居士程 林題於刊上三一齋

聖濟總錄纂要終

曹炳章主編
 中國警學大成
 聖濟總錄纂要

全十冊 實價國幣貳元

中華民國二十六年二月初版

宋·政和中奉敕編

清·程雲來纂輯

發行人 沈駿聲
 上海北福建路三三一號

印刷者 大東書局
 上海北福建路三三一號

總發行所 大東書局
 上海福州路三一〇號

分發行所
 開封 安慶 常州 無錫 信陽
 南京 北平 天津 濟南 西安
 長沙 漢口 廣州 重慶 大東
 徐州 南昌 雲南 杭州 廈門
 汕頭 衡陽 哈爾濱 書局

(本 書 校 對 者 朱 晉 材)



3.081

5

4(1)10

\$2.00