

婦人良方



婦人良方卷之五

臨江陳自明良甫編

吳郡後學薛己校注

婦人勞瘵各症方論第

夫骨蒸殭瘵復連尸瘵勞瘵蟲瘵毒瘵熱瘵冷瘵食瘵鬼瘵瘵者注也自上注下與前人相似故曰瘵其變有二十二種或三十六種或九十九種令人沉沉默默寒熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁或腹中有塊或腦後兩邊有結核咳嗽膿血下利羸瘦死而傳瘵甚至城門更有蜚尸遁

三百七

婦人良方卷五

一

尸寒尸喪尸尸注謂之五尸人為其瘵者不自知所苦雖有狸骨獺肝天靈蓋等方未嘗見効唯崔氏灸法早用有濟若寒熱自汗面白目乾口苦神昏善恐不能獨臥傳在肝也若寒熱面黑鼻燥善忘大便秘瀉口舌生瘡傳在心也若寒熱面青唇黃舌本硬強言語不出飲食羸瘦吐涎傳在脾也若寒熱面赤鼻白乾燥毛折咯嗽喘急吐涎膿血傳在肺也若寒熱面黃耳焦脚脛痠痛小便白濁遺瀝腹痛傳在腎也愚按前症誠然有之故葛仙翁用獺肝一具

陰乾杵末木下方寸匕日三服未愈再作末

宜和問一法師善考訊鬼惟時一婦以疾投

狀既而如有鬼祟所附曰非我為患乃病人

命自衰爾渠今已成蟲食肺故令吐血聲嘶

又屢掠問彼所畏何物云以獺爪為末酒服

之則去矣患家如其言得愈獺爪即獺肝之

類歟玄珠云蟲瘵多有兄弟互相傳染甚至

絕尸此乃冤牽相纏及風水所係雖有符文

法水下蟲之方然蟲去而人亦亡若能平素

保養亦可免矣竊究濟生微旨云益氣補肺

三百八十

婦人良方卷五

二

益精滋腎皆資其化源也蓋人之精血常不

足加之數奪其真資化失常則胃氣不固精

氣滑脫不能上接陽氣故頭重或痛氣弱而

食少元氣下陷脈即微弱外散欲絕而虛洪

或見損脈此實元氣不足之所致非有外感

賊邪之病也

附治驗

一婦人素勤苦因喪子飲食少思忽吐血甚

多而自止此後每勞則吐數口瘵症已具形

體甚倦午前以補中益氣午後以歸脾湯送

地黃丸而愈

一女子患前症反其唇視有白點此蟲蝕肺

也余云急尋獺肝治之不信果咳膿而歿後

聞其兄弟三人皆夭於此症大凡久嗽當視

其兩唇若上唇有點蟲蝕上部下唇有點蟲

蝕下部

二十四種蒸病論新附

所謂勞蒸者毛折髮焦肌膚甲錯其蒸在皮外

熱內寒身振肉瞶其蒸在肉髮焦鼻衄或復尿

血其蒸在血身熱煩躁痛如針刺其蒸在脉爪

甲焦枯眼昏脇痛其蒸在髓頭眩熱悶涎濁移

淚其蒸在腦男子失精女子白淫其蒸在玉房

乍寒乍熱中腕煩悶其蒸在三焦小便赤黃疑

濁如膏其蒸在膀胱大便秘泄腹中雷鳴其蒸

在小腸大腹隱痛口舌乾疼其蒸在大腸口鼻

乾燥腹脹自汗睡卧不安其蒸在胃口苦耳聾

兩脇下痛其蒸在膽裏急後重肛門秘澀其蒸

在廣腸小腹疝痛筋脉緩陰器自強其蒸在

宗筋眩暈下淚躁怒不常其蒸在肝舌黑氣短

煩悶灑浙其蒸在心唇乾口瘡胸腹脹悶畏寒

不食其蒸在脾咳嗽滿咯痰吐血聲嘶音啞

其蒸在肺耳輪焦枯脚氣酸痛其蒸在腎情想

不寧精物時下其蒸在右腎心膈噎塞攻擊疼

痛俯仰煩寃其蒸在鬲此症蟲多嚙心肺治當

絕其根也

愚按醫林集要云前症若蒸肺用天麥門冬

桔梗紫苑烏梅肉若蒸皮石膏桑白皮若蒸

氣喘促鼻乾身熱不安人參黃芩梔子若蒸

大腸大黃芒硝若蒸心黃連生地黃當歸若

蒸脉蒸血皆用地黃當歸童子小便若蒸

小腸赤茯苓木通生地黃若蒸脾胃藥木瓜

苦參若蒸肉芍藥若蒸胃石膏粳米大黃芒

硝乾葛若蒸膽柴胡瓜萸若蒸三焦石膏竹

葉若蒸肝川芎當歸前胡若蒸筋川芎當歸

若蒸腎生地黃石膏知母寒水石藜蘆若蒸

腦生地黃防風若蒸髓天門冬當歸生地黃

若蒸骨鱉甲地骨皮當歸牡丹皮生地黃若

蒸玉房知母黃柏當歸芍藥若蒸肝澤瀉茯

苓生地黃沉香滑石若蒸膀胱澤瀉滑石凡

此諸蒸 熱病食肉與油膩房勞飲酒而

成者久蒸不除變為疖症即死亦有瘡疾久而不愈以致咳嗽失治漸成骨蒸勞瘵之症當推標本而治之

崔氏灸骨蒸勞瘵用細繩一條男左女右從足大拇指頭齊量起從脚板底當脚跟中心向後引繩循脚肚貼肉直上至曲脊中橫紋截斷又令患人解髮分兩邊見頭縫自顛門平分至腦後乃平身正坐取前所截繩一頭從鼻端齊引繩向上正循頭縫至腦後貼肉垂下循脊骨引繩向下至繩盡處當脊骨以黑點記此黑點不

是灸穴

別取一繩令患人合口將繩按於口上兩頭至

吻却鈞起繩中心至鼻端根下如人字樣齊兩

吻截斷將此繩展直於前在脊骨上黑點處取

中橫量勿令高下於繩兩頭以白圈記之此是

初灸七壯累此名患門穴初灸此訖次令其人

平身正坐稍縮臂膊取一繩透項向前雙垂與

鳩尾齊鳩尾是心岐骨無是岐骨者皆前

斷却背翻繩頭向項後以繩中停取心正令當

喉嚨結骨上第二次墨點處摺中橫量繩兩頭

以白圈記之此是灸穴初灸又將第二次量口

繩摺中當脊直上下堅停中心在第二次墨記

上下繩頭盡處以白圈記之此是灸穴初灸七

壯若瘡愈其疾未効依法復灸故云累灸至百

壯凡灸時可用灸足若婦人纏足短小難為

量只取膏肓膈灸之在第四椎下兩次灸四花

穴道軒用此法灸之無有不効者

神仙秘法 取勞蟲須先擇良日焚香禱祝令

病人面有福德方服神効

青桑枝 楊柳枝 梅枝

桃枝俱向東者 葱白七

青蒿以子代 阿魏錢

真安息香錢

右用童便一升半煎一升入阿魏再煮數沸

入硃砂半兩小檳榔半兩麝香半錢五更并

天明各進一服下白蠱尚可治以淡粥補之

用藥調理三五月再服以除病根如蠱黑已

入腎不可救矣

治心胸痛引兩脇昏悶聲濁熱壅鼻衄或痰喘

發熱

婦人良方卷五

婦人良方卷五

六

桑白皮炒 枳殼炒 木通

子芩炒 生地黃 鹽白芍藥

甘草各五分

右水煎服

溫金散 治肺嗽惡寒發熱唾痰皮毛焦燥

甘草炒 黃芩炒 桑白皮炒

防風各一兩 杏仁二十七粒 人參

茯神各半兩 麥門冬三錢

右前五味用米泔浸一宿曬乾入人參等三

味每服三錢入蠟一豆大水煎

婦人良方卷五 七

桔梗飲子 治心氣不足解倦溢血或喘嗽痰

甚 桔梗炒 甘草炒 黃芪炒

人參 麥門冬各一錢 青皮三分

右水煎服

治咽喉痛

百藥煎去黑鵬砂 甘草

生白礬等分

右為末每服一二錢食後用米飲調細呷燕

之

含化丸 治肺間邪氣胸中積血作痛失音痰

喘 蛤蚧一隻去足炙 訶子去核 阿膠粉炒

麥門冬去心 細辛 甘草炒

生地黃各半兩

右為末蜜丸芡實大食後含化一九

河車丸 治一切勞瘵虛損骨蒸等疾

紫河車一具初生男胎者尤良洗淨并曬

面野皮黑 白茯苓半兩 人參一兩

諸疾瘦悴 乾山藥二兩

右為末麵糊和入河車加三末丸梧子大每

服三五十丸空心米飲下嗽甚五味子湯下

補肺湯 治勞嗽五臟虧損喘熱發熱盜汗自

汗唾痰喘嗽 桑白皮炒 熟地黃各一錢 人參

紫苑 黃芪炒 五味子炒各五分

右水煎入蜜少許食後服

養正膏 治傳尸出汗取蟲辟邪

鱉甲一兩醋炒 青蒿握 淡豆豉三七粒

葱白兩 安息香研 桃柳桑枝各七莖

天靈蓋用七豷大一片酥炙 桃仁四十九箇去

右隔夜以水一升浸至五更煎至半升入童

便半升煎取四合調檳榔麝香末各一錢且

高時頓服以衣覆十指汗出如藕絲瀉下如

蠱狀甚者旬日再服

阿膠九 治勞嗽出血咯血發熱晡熱口渴盜

汗

阿膠炒

生地黃

卷栢葉

山藥炒

大薊根

五味子炒

鷄蘇各一兩

栢子仁炒

人參

婦人良方卷五

防風

麥門冬去心各半兩

右為末煉蜜丸彈子大每服一九細嚼麥門

冬煎湯下

四君子湯加秦艽黃蠟水煎服尤妙治勞嗽咯

血

神授散 治傳尸蠱用川椒二斤去核并合口

者炒為末每服一錢酒糊丸空心米飲下服

盡見効

蘇合香丸 治傳尸骨蒸勞瘵疰并鬼氣心痛

方見三卷第四論

附方

四君子湯 方見二十四卷第五論

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

歸脾湯 方見二十四卷第四論

六味地黃丸 方見二十四卷第十一論

婦人骨蒸勞方論第二

夫骨蒸勞者由積熱附於骨而名也亦曰傳尸

瘵帶復連無辜其名不一此病皆由脾胃虧損

所致其形羸瘦腹脹泄瀉肢體無力傳於腎則

盜汗不止腰膝冷痛夢鬼交侵小便赤黃傳於

婦人良方卷五

心則心神忪悸喜怒不時頰唇赤色乍熱乍寒

傳於肺則胸滿短氣咳嗽吐痰皮膚甲錯傳於

肝則兩目昏暗脇下妨痛閉戶忿怒五臟既病

則難治療

愚按前症多因經行胎產或飲食起居七情

而傷肝脾之所致又或失於調攝或過於攻

伐而成東垣先生云發熱之症肺熱者輕手

乃得微按全無日西猶甚乃皮毛之熱其症

喘嗽寒熱輕者用瀉白散重者涼膈散白虎

之上輕手乃得微按至皮毛則熱少加力按之則全不熱是熱在血脉也日中太甚其証煩心心痛掌中熱而噦用黃連瀉心湯導赤散硃砂安神丸脾熱者輕手捫之不熱重手按至筋骨又不熱不輕不重在輕重之間此熱在肌肉遇夜猶甚其証怠惰嗜卧四肢不收無氣以動用瀉黃散肝熱者按之肌肉之下至骨之上寅卯時猶甚四肢滿悶便難轉筋多怒多驚筋痿不能起於床用瀉青丸柴胡飲腎熱者輕手重按俱不熱加重手按至

骨分其熱蒸手如火其証骨蒸如蟲蝕困熱不能起於床用滋腎丸此治實熱之法也竊謂肺經虛熱者用人參補肺湯脾氣虛而不能生肺者用六君子湯脾熱遺於肺者用三黃丸心經虛熱者用補心湯命門火衰不能生土者用八味丸肝虛不能生心者用補肝散腎虛心者用附子理中湯脾經虛熱者用人參黃芪散土尅水者用承氣湯脾不能培肝者用六君子湯元氣下陷及金不能生水者俱用補中益氣湯肺尅肝及腎經虛熱與

腎不能生肝者俱用六味丸

附治驗

一婦人發熱晡熱盜汗自汗味畏風寒飲食少思或腹脹吞酸或大便不實此脾胃不足諸經虧損朝用補中益氣夕用八珍湯倍用參苓白朮各二十餘劑諸症漸愈因喪母水傷患盜汗便血用加味歸脾湯數劑而止仍用前二藥又五十餘劑尋愈月經兩月而至適因怒去血過多發熱作渴肢體酸倦頭目暈痛用逍遙散加味歸脾湯藥調補而痊

一婦人盜汗自汗遍身酸疼五心發熱夜間益甚或咳嗽咽乾或盜汗自汗月經兩三月一至用加味逍遙散六味地黃丸煎服 卧又服陳朮丸三月餘諸症悉愈其經乃兩月一至又服兩月而痊 陳朮丸脾陳皮白朮為丸 一婦人患前症食少倦怠肌肉消瘦日晡發熱至夜益甚月水過期漸至不通時發渴躁誤用通經之劑熱倦愈重飲食愈少余用八珍湯加升麻丹皮山梔柴胡治之熱漸退又用八珍丹皮軟柴胡調理而愈

一婦人飲食少思胸膈不利或胸中作痛或大便作瀉或小便不利用逍遙散加山梔枳神遠志木香而愈後因怒寒熱往來倦怠煩熱以前藥加炒黑黃連三分頓愈用八瓊湯調理而愈後因怒吐血躁渴用人參五錢苓朮當歸各三錢陳皮甘草各一錢治之而愈一婦人胸脇作痛內熱晡熱月經不調余謂鬱怒傷損肝脾朝用歸脾湯以解鬱結生脾氣夕用加味道遙散以生肝血清肝火半載而愈後因飲食失調兼有怒氣月經如注脉浮洪而數用六君子加芎歸炮薑一劑而血止用補中益氣加炮薑茯苓半夏治之而元氣復又用歸脾湯逍遙散調理而康

三

婦人良方卷五

五

何

逍散百餘劑而諸症漸愈又因飲食停滯或用峻厲之劑口乾體倦余用七味白朮散補中益氣加茯苓半夏中氣漸愈又以補中益氣及八瓊湯兼服而痊

一婦人患前症將愈因怒胸膈不利飲食少思服消導利氣之藥大便下血余曰此脾氣復損不能攝血歸源用補中益氣加茯苓半夏炮薑血止用八瓊加柴胡炒梔熟退用八瓊湯逍遙散而痊

一婦人肌體瘦瘦口乾內熱盜汗如洗日晡熱甚用參芪歸朮茯神遠志棗仁麥門五味丹皮龍眼肉炙草柴胡升麻治之獲效後因喪子懷抱不舒腹脹少寐飲食少思痰涎湧月經頻數余為鬱悶傷脾不能攝血刺澀歸源耳用補中益氣濟生歸脾漸愈又用八瓊湯調理而痊

一婦人發熱口乾月經不調肢體無力臃腫體倦二膝浮腫余作足三陰經血虛用六味丸逍遙散兼服兩月形體漸健飲食漸進臃腫漸消而痊

三

婦人良方卷五

五

何

一婦人日晡熱甚月水不調飲食少思大  
 不實胸膈痞滿頭目不清肢體倦怠發熱煩  
 躁余為七情肝脾虧損之症用濟生歸脾湯  
 加味逍遙散補中益氣湯調治元氣漸復而  
 愈

一婦人月經不調晡熱內熱飲食少思肌體  
 消瘦小便頻數或用清熱生血之劑月經不  
 行四肢浮腫小便淋瀝余朝用全匱加減腎  
 氣丸夕用歸脾湯漸愈又用八珍湯兩月而  
 愈

一婦人胸膈膨滿小腹悶墜內熱晡熱飲食  
 不甘體倦面黃日晡則赤灑浙惡寒此脾肺  
 氣虛先用六君子加川芎當歸諸症漸愈又  
 用補中益氣加茯苓半夏諸症全愈後飲食  
 失節勞怒惡寒發熱不食用加味小柴胡二  
 劑而熱退用逍遙散歸脾湯調理而康

心煩

天靈蓋酥 安息香 地骨皮

當歸 山梔仁 人參

貝母心去 黃芪 桃仁去皮尖雙  
 檳榔各一 鱉甲醋 柴胡仁炒黃  
 生地黃 赤茯苓 麥門冬  
 阿魏

右每服五錢桃柳枝各七十薑五片葱白五  
 寸童使煎

愚按醫學綱目云柴胡本經並無一字治勞  
 熱今治勞方鮮有不用者誤世多矣凡此症  
 乃真臟虧損而虛熱王海藏先生云苟  
 熱而用柴胡不死何待蓋柴胡乃肝膽之藥

雖能升胃氣下陷每劑不過分許而可多用  
 哉產後氣血虛熱尤宜禁忌  
 懶肝丸 治骨蒸勞熱或潮熱發熱體瘦煩疼  
 不欲飲食

懶肝丸 鱉甲酥 柴胡各一

硃砂研 桃仁去皮尖雙

升麻 天靈蓋酥 犀角鎊

梔子仁炒 地骨皮 知母各一

黃芪炒 甘草炒各 麝香研

右為末煉蜜丸 桐子大每服三十九空心食

前滾水下

黃芪九 治骨蒸煩熱肢羸作痛口乾心躁睡

卧不寧等症

黃芪炒

麥門冬去心

茯神

柴胡

甘草炒

生地黃各一兩

酸棗仁炒

郁李仁去皮尖

杏仁去皮尖炒

枸杞子

人參

黃芩炒各三錢

鱉甲二兩製

右為末蜜丸桐子大每服三十九食遠清粥

飲下

婦食方卷三

煞鬼丸 治骨蒸傳尸鬼氣伏連

麝香三分

犀角鎊

木香

白朮各一兩

鬼箭羽

桃仁去皮尖雙

辰砂研另

虎頭骨酥炙

雄黃各一兩半

右為末蜜丸桐子大溫水下二十九此藥能

辟瘟疾可佩之

地仙散 治骨蒸肌熱煩燥勞熱口乾能生津

液而清肺火

地骨皮

防風

麥門冬各五分

甘草炒三分

右薑水煎服

十全大補湯 治氣血虛熱加柴胡地骨皮奉

芩

秦丸散 治五心煩熱頰赤

逍遙散 治血虛五心煩熱肢體疼痛頭目昏

重心忪煩赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧

月水不調膈腹脹痛寒熱如瘧痰嗽潮熱肌

體羸瘦漸成骨蒸方見十四卷第四論

枳殼散 治婦人手足煩熱盜汗肌痒經候不

調煩倦心胃滿悶狀如勞氣

婦食方卷五

枳殼去穢炒二兩

赤芍藥各五兩

柴胡

黃芩炒各一兩半

右為末每服三錢薑棗水煎服

華陀解勞生肌進食活血養心石膏每服水和

錢許甚驗

青蒿散 治體倦虛疼勞熱九月採青蒿去梗

用童子小便浸三日曬為末每服二錢烏梅

一箇煎湯調服

清心蓮子飲參蘇飲加黃芩麥門冬並治五心

煩熱手足熱甚

附方

加味小柴胡湯 方見二十四卷第二論

柴胡飲 治肌熱積熱或汗後餘熱脈洪實

數

柴胡 人參 黃芩

芍藥 甘草 當歸

大黃 煨各二錢半

右薑水煎服

瀉白散 治肺臟氣實心胸雍悶咳嗽煩喘大便不利

便不利

婦人良方卷五 九十一

桔梗 炒 地骨皮 甘草 炙

瓜蒌仁 升麻 半夏 薑

桑白皮 炒 杏仁 去皮尖等分

右每服四錢薑水煎

導赤散 治心虛蘊熱小便赤澀或成淋瀝口

舌生瘡等症

生地黃 木通 甘草 等分

右每服三錢竹葉水煎

瀉黃散 治脾熱口臭咽乾或口舌生瘡發熱

作渴

石膏 山梔子 炒 防風

甘草 藿香 等分

右每服三錢水煎

涼膈散 治上焦積熱煩躁作渴頭目昏聩咽

喉腫痛便溺赤澀語言謇妄等症

大黃 煨 朴硝 甘草 各二兩

連翹 四兩 梔子仁 炒 黃芩 炒

薄荷葉 各一兩

右為末每服二三錢竹葉七片水煎溫服

白虎湯 治胃熱作渴暑熱尤効又治熱厥腹

滿身難轉側面垢譫語遺溺手足厥冷自汗

脉沉滑大便泄清水無度

知母 石膏 各二錢 粳米 半合

右水煎服

附子理中湯 治脾胃虛寒手足厥冷飲食不

入或腹鳴切痛嘔逆吐瀉 方見二十一卷第八論

砂安神丸 方見三卷第十論

地骨皮散 方見六卷第二論

黃連瀉心湯用一味黃連為末每服二錢以白

湯調下

瀉青丸 方見二十四卷第三論

承氣湯 方見第一論

滋腎丸 方見八卷第一論

人參補肺湯 方見二十四卷第十二論

補中益氣湯

六君子湯 二方見二十四卷第六論

三黃丸 方見八卷第八論

補心湯 方見第一論

六味丸

八味丸 二方見二十四卷第十一論

補肝散 方見十七卷第七論

人參黃芪散 方見十三卷第十論

加味歸脾湯

八珍湯

加味逍遙散

逍遙散

歸脾湯 五方見二十四卷第四論

七味白朮散 方見二十一卷第二論

金匱加減腎氣丸 方見二十一卷第十論

婦人血風勞氣方論第三

婦人血風勞症因氣血素虛或產後勞傷外邪所乘或內有宿冷以致腹中疼痛四肢酸倦發熱自汗月水不調面黃肌瘦當調補肝脾氣血為主

愚按東垣云喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故困熱懶言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之時宜安心靜坐存養其氣以甘寒瀉其熱氣以酸味收其散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之要畧云平人脈大為勞以黃芪建中湯治之

附治驗

一婦人勞則足跟熱痛余以為是三陰血虛用聖愈湯而痊後遍身搔痒誤服風藥發熱抽搐肝脈洪數此肝家血虛火盛而生風以天竺膽星為丸用四物麥門五味芩連炙草山梔柴胡煎送而愈

一婦人素清苦勤於女工因感風邪自用表散之劑反朝寒暮熱自汗盜汗形氣虛甚其脈或浮洪或微細其面或青白或痿黃此邪

去而氣血愈虛也用十全大補湯三十餘劑  
漸愈又用加味逍遙散蒸治半載而痊

人參荆芥散 治遍身疼痛頭昏目澁心忪煩  
倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿月水不調  
腹痛瘕塊

荆芥

人參

生地黃

柴胡

鱉甲炙

酸棗仁炒

枳殼炒

羚羊角銹

白朮各七

川芎

當歸酒

桂心

防風

甘草各五分

百五

婦人食方卷

五

右薑水煎日二服

地黃煎 治血虛心忪發熱

生地黃

熟地黃自製

右用薑汁和水拌杵丸桐子大每服五十九

空心白湯下日三服若臟腑虛寒早間先服

八味丸一服

愚按前方肝脾血虛發熱內熱晡熱盜汗作

渴體倦筋骨疼痛筋脉拘攣血虛發躁虛熱

生痰咳嗽之良劑若因肝脾腎精血燥熱生

痰胸膈痞滿喘咳作渴及一切虛火症必用

六味丸為主

乞力伽散 治血虛肌瘦或脾虛蒸熱或內熱

寒熱

自朮

白茯苓

白芍藥炒各

甘草炒五分

右薑棗水煎

附方

黃芪建中湯方見二十四論

聖愈湯方見二十四論

四物湯方見二十四論

百五

婦人食方卷五

五

六味丸

加味逍遙散二方見二十四論

六君子湯

補中益氣湯二方見二十四論

歸脾湯

十全大補湯二方見二十四論

人參養榮湯方見二十四論

八味丸方見二十四論

婦人冷勞方論第五

婦人冷勞屬血氣不足臟腑虛寒以致臍下冷

痛手足時寒月經失常飲食不消或時嘔吐惡寒發熱骨節痠疼肌膚羸瘦面色痿黃也

愚按前症有內外真寒然有內外真熱亦有內真熱而外假寒者又有內真寒而外假熱者若飲食難化大便不實腸鳴腹痛飲食畏寒手足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內外真寒之症也宜用附子理中湯以回陽入味地黃丸以壯火若飲食如常大便堅實胸膈痞脹飲食喜冷手足煩熱面赤嘔吐不畏風寒此內外真熱之症也宜用黃連解毒湯以消

三言平

婦人良方卷五

三五

陰六味丸以壯水若飲食如常大便堅實胸膈痞脹飲食喜寒手足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內真熱而外假寒也亦用解毒湯六味丸若飲食少思大便不實吞酸噯氣胸膈痞滿手足逆冷面赤嘔吐畏見風寒此內真寒而外假熱也亦用附子理中湯與八味丸當求其屬而治之經曰益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光使不知真水火之不足泛以寒熱藥治之則舊疾不去新病復生矣夫所謂屬者猶在也謂心腎也求其屬也者

言水火不足而求之於心腎也火之源者陽氣之根即心是也水之主者陰氣之根即腎是也非謂火為心原為肝水為腎主為肺也大抵寒亦抑心熱亦強腎在治者審之

附治驗方藥

一婦人食少作嘔口吐痰涎面黃腹痛月經不調手足逆冷余謂此內外俱寒之症遂以六君加附子木香治之而愈

先太宜人忽嘔吐酸水內熱作渴飲食不進惟喜冷水面色青赤投之以藥入口即吐此

三言平

婦人良方卷五

三五

三言平

婦人良方卷五

三五

內外真熱之症積十餘日以黃連一味煎湯飲之徐加白朮茯苓仍加陳皮當歸炙草至月餘始進米飲稀粥調理而愈  
一婦人內熱作渴大便秘結畏惡風寒手足逆冷余以為內真熱而外假寒先用黃連解毒湯後用六味丸而愈  
大方室趙氏初患痰喘熱渴醫以降火散氣治之肌日削而氣日索延至甲辰木旺痰感身熱口腐腹脹神昏絕食幾死先生診之云此乃虛熱無火投以壯水生土之劑隨服隨

婦人良方卷之六

臨川陳自明良甫編

吳郡後學薛己校註

婦人熱勞論第一

婦人熱勞由心肺壅熱傷於氣血以致心神煩躁頰赤頭疼眼溢唇乾口舌生瘡神思昏倦四肢壯熱飲食無味肢體酸疼心怔盜汗肌膚日瘦或寒熱往來當審其所因調補氣血其病自愈矣

愚按前症乃壯火食氣虛火煎熬真陰之所致也王太僕云如大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止是無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止條忽往來時動時止是無水也當助其腎心盛則生熱腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱收於內竊謂前症若肝脾血虛用四物參朮肝脾鬱怒小柴胡合四物湯脾胃氣虛補中益氣湯肝脾血虛加味逍遙散肝經風熱加味小柴胡湯心經血虛天王補心丹肺經氣虛人參補肺湯肝經血

幼得以不死竊喜久安忽值戊申夏初坐則

頭墜不能起視卧則背冷覺風透體煩熱暈

眩咳嘔痰湧手足麻冷病勢危殆自分必死

得先生枉診之曰此內真寒外假熱之症也

遂以大補姜附之劑飲之不三四服而大勢

已平仍以前藥加減而愈則其他以有餘之

火治之無怪乎其展轉增劇也徵先生則山

妻不死於甲辰之春難免於戊申之夏矣大

方感慨不已援筆備述求附卷末庶幾醫者

之不昧病者之得全先生之惠番諸無窮豈

一世一人之幸哉長洲沈大方頓首拜書

八味丸

六味丸 二方見二十四卷第十一論

附子理中湯 方見二十卷第八論

黃連解毒湯 方見六卷第十一論

六君子湯 方見二十四卷第六論

婦人良方卷之五

虛加味四物湯大抵午前熱屬氣分用清心  
蓮子飲午後熱屬血分用四物參朮丹皮熱  
從左邊起肝火也實則四物龍膽山梔虛則  
四物參朮黃芪熱從臍下起陰火也四物參  
木黃柏知母酒拌炒黑五味麥門肉桂如不  
應急用加減八味丸不時而熱或無定處或  
從脚心起此無根虛火也用加減八味丸及  
十全大補湯加麥門五味主之

附治驗

一婦人經行不調飲食少思日晡熱甚余以  
為肝脾氣血俱虛用十全大補加山茱山藥  
丹皮麥門五味而愈次年秋寒熱如瘧仍用  
前藥而愈

一婦人生育多胎月經不調兩足發熱年餘  
其身亦熱勞則足痠痛又年許唇腫裂痛又  
半年唇裂見血形體瘦倦飲食無味月水不  
行此氣血俱衰之症彼誤用通經丸等藥復  
傷氣血遂致不起惜哉

黃芪散 治發熱羸瘦心燥口乾不欲飲食或  
盜汗晡熱

人參 黃芪炒 當歸各三

柴胡各五 黃芪炒 地骨皮

白茯苓 麥門冬去 生地黃

白芍藥炒 甘草炒

右水薑煎

猪肚丸 治熱勞羸瘦

柴胡 赤茯苓 人參

黃芪各 黃連炒 地骨皮

木香各半 桃仁去皮 鱉甲各一

右為末用嫩猪肚一枚入藥縫合蒸熟研爛

九桐子大每服三五十九食前米飲下日二

服

附方

清心蓮子飲 治熱在氣分口乾小便白濁夜

間安靜晝則發熱又治口舌生瘡或口苦咽

乾煩躁作渴小便赤澀下淋不止或莖中作

痛

黃芪炒 麥門冬去 地骨皮

車前子炒 甘草各一 石蓮肉

茯苓 黃芪炒 柴胡去苗

人參各一錢

右每服五錢水煎

補中益氣湯

加味四物湯

四物湯

加味小柴胡湯

小柴胡湯

十全大補湯

加味逍遙散

天王補心丹

咽乾育養心神

人參去蘆

丹參

當歸酒浸

天門冬

生地黃兩四

右為末煉蜜丸桐子大用硃砂為衣每服二

三十九臨臥竹葉煎湯送下一方多石葛蒲

熟地黃杜仲百部茯苓甘草此方內天麥門

三首升

冬玄參生地雖能降火生血化痰然其性沉

寒損傷脾胃尅伐生氣若人飲食少思大便

不實者不宜用

人參補肺湯方見二十四卷第十二論

加減八味丸方見二十四卷第十一論

婦人客熱方論第二

婦人客熱由元氣虛而外熱乘之以致口燥心

煩四肢壯熱肌肉消瘦治法當審其因而調補

之

愚按前症若客邪所侵用補中益氣加川芎

防風肝虛血少六味地黃丸胃火飲冷錢氏

瀉黃散胃虛飲湯七味白朮散潮熱時熱八

珍湯晡熱內熱逍遙散發熱體倦補中益氣

湯恚怒發熱小柴胡湯鬱怒發熱加味歸脾

湯寅卯酉戌時熱升陽益陰湯

附治驗

一婦人素有胃火服清胃散而安後因勞役

躁渴內熱肌肉消瘦月經不行此胃火消燦

陰血用逍遙散加丹皮炒梔以清胃熱用八

珍湯加茯苓遠志以養脾血元氣充足而經

婦人良方卷六

四

宗

婦人良方卷六

五

自行矣

麥門冬散 治四肢倦痛煩悶不食或寒熱往

來

麥門冬去心

柴胡

赤茯苓

羚羊角鎊

赤芍藥

桑白皮炒

黃芪炒各四分

生地黄

甘草炒各三分

右薑水煎

附方

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

六味九 方見二十四卷第十一論

瀉黃散 方見五卷第三論

七味白朮散 方見二十一卷第二論

八珍湯

加味歸脾湯

逍遙散 三方見二十四卷第四論

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

升陽益胃湯 方見三卷第九論

清胃散 方見二十四卷首論

婦人寒熱方論第三

經曰陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒

皆由勞傷氣血陰陽不調寒熱如瘧也當分氣血虛實而治之

愚按前症若寸口脈微名曰陽不足則陰氣

上入於陽中用補中益氣湯若尺部脈弱名

曰陰不足則陽氣下陷入陰中用益陰腎氣

丸若因氣血俱虛用八珍湯若因怒動肝火

用小柴胡湯若陰陽俱不足則氣血不歸其

本部以致寒熱交爭也

附治驗

一婦人年六十有四又鬱怒頭痛寒熱春間

乳內時痛服流氣飲之類益甚時有血如經

行又大驚恐飲食不進夜寐不寧兩孔腫脹

兩脇焮痛午後色赤余以為肝脾鬱怒火燥

先以逍遙散加酒炒黑龍膽一錢山梔一錢

五分服二劑腫痛頓愈又二劑全愈再用歸

脾湯加炒梔貝母諸症悉愈

地骨皮散 治血風氣虛時作寒熱或補熱內

熱

柴胡 地骨皮各一 桑白皮 炒

和殼 炒 前胡 黃芪 炒各五分

九

白茯苓 五加皮 人參

甘草 桂心 白芍藥各三分

右並水煎服

柴胡散 治寒熱體痛口乾心煩飲食少思肌

體消瘦

柴胡 黃芩炒 赤茯苓

白朮各一錢 人參 地骨皮

枳殼炒 生地黃 苦梗

桑白皮炒 赤芍藥各三分 鱉甲炙二錢

麥門冬去心 甘草分

婦人食方卷六

右水並煎服

益陰腎氣丸 治諸臟虧損發熱晡熱潮熱盜

汗或寒熱往來五心煩熱或口乾作渴月經

不調或筋骨痠倦飲食少思或頭目不清痰

氣上壅咳嗽喘甚胸膈痞悶或小便赤數兩

足熱痛或脚足痿軟肢體作痛等症此壯水

之主以制陽光之劑也

澤瀉 茯苓 生地酒拌

牡丹皮 山藥 茺蔚肉

當歸 五味子炒 熟地自製

右為末入二膏加煉蜜丸桐子大硃砂為衣

每服五十九丸空心淡鹽湯下

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

六味丸 方見二十四卷第十一論

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

八珍湯

逍遙散

歸脾湯 三方見二十四卷第四論

寡婦寒熱如瘧方論第四

倉公傳與褚氏論皆云師尼寡婦獨陰無陽慾

心萌而不遂是以懶懶成病以致乍寒乍熱而

類瘧狀又則為勞又有經閉白淫痰逆頭風膈

氣痞悶面黧瘦瘡等證皆寡婦之病診其脉獨

肝脉弦出寸口而上魚際皆血盛而致經云男

子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思

過半矣

愚按前症若肝脉弦出魚際用生地黃丸血

虛佐以四物湯若兼怒動肝火而寒熱佐以

加味逍遙散若虧損肝經而寒熱佐以八珍

湯若虧損元氣而寒熱佐以補中益氣湯若

湯若虧損元氣而寒熱佐以補中益氣湯若

婦人食方卷六

九

樽傷脾氣而寒熱佐以濟生歸脾湯

附治驗

一寡婦不時寒熱脉上魚際此血盛之症用小柴胡湯加生地黃治之而愈但畏風寒此脾胃氣虛用加味歸脾補中益氣二湯兼服而止

一婦人因夫久出經商發寒熱月經旬日方止服降火涼血藥內熱益甚自汗盜汗月經頻數余曰內熱自汗乃脾氣虛弱也月經頻數乃血不歸脾也用歸脾湯六味丸而愈

百九十一

婦人良方卷六

一室女寒熱肝脉弦長而出寸口用小柴胡湯加生地黃治之而愈既嫁而諸症悉痊一室女久患寒熱月經失期以小柴胡湯加生地治之少愈更以生地黃丸而痊

生地黃丸 許學士云有一師尼惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩大小柴胡湯雜進其病益劇予診視之曰三部脉無寒邪但肝脉弦長而上魚際服此丸而愈

柴胡

秦艸

黃芩各半

生地黃二兩酒赤芍藥一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九為梅湯

下日二服

附方

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

四物湯

加味逍遙散

八珍湯

加味歸脾湯

歸脾湯

小柴胡湯

六味丸

婦人良方卷六 方見二十四卷第十一論

婦人惡寒方論第五

婦人惡寒有陰陽二證發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者脉浮數宜解表發於陰者脉沉細宜溫裏凡惡寒不可過覆衣被及近火熱若寒熱相搏令人寒甚若寒氣入腹血室結聚最難治療

愚按前症若怠惰嗜卧洒浙惡寒乃陽不能伸發用升陽益胃湯若勞傷形氣而惡寒乃無陽以護衛用補中益氣湯若飲食傷脾胃

而惡寒乃元氣虛損用六君子湯若加煩躁妄言或欲飲水仍進前劑但加薑桂若體倦煩渴頭痛自汗用補中益氣加五味麥門東垣云晝則發熱惡寒是陰氣上溢於陽分也夜則惡寒是陰血自旺於陰分也海藏云六月大熱之氣反得大寒之症當捨時從症治以薑桂之類丹溪云久病惡寒乃痰鬱於脾抑遏陽氣不得外泄治當解鬱

附方

升陽益胃湯 方見三卷第九論

補中益氣湯

六君子湯 二方見二十四卷第六論

婦人血風煩悶方論第六

婦人血風煩悶由勞傷氣虛而風邪乘之血氣不和以致肢節熱疼口乾不卧而煩悶也當調補元氣為主

愚按前症多屬肝脾血虛發熱當參照前寒

熱方論主治

赤芍藥散 治煩悶不食體倦頭眩身軀疼痛等症

赤芍藥酒

白茯苓 各一甘草 炒

柴胡 各五

右薑棗水煎

婦人血風攻脾不食方論第七

夫脾為中州意智之臟也諸經皆賴其養與胃為表裏胃主司納脾主腐化若勞傷真氣外邪乘之諸症生焉

愚按經云胃乃脾之剛脾乃胃之柔傷胃則脾無所稟受傷脾則不能為胃運化是以脾胃為之表裏籍飲食以滋養百脉者也竊謂

婦人血風方論第六

三

前症若飲食所傷六君子湯勞役所傷補中益氣湯若風寒所傷用人參理中湯木旺乘土六君加柴胡嘔吐腹痛或大便不實前湯加木香胸膈虛痞或肚腹不利六君子湯鬱怒傷損肝脾歸脾湯命門火衰八味丸仍審諸經錯雜之邪而治之假如不能食而肌肉削乃脾胃經本病右關脉緩而弱乃脾胃之本脉若見弦緊或四肢滿閉淋洩便難轉筋此肝之脾胃病也若兼洪大或肌熱煩熱面赤此心之脾胃病也若兼浮澁或氣短喘急

咳嗽痰盛此肺之脾胃病也若燕沉細或善恐善欠此腎之脾胃病也各當於本經藥中加兼症之藥此東垣先生之治法也

附治驗方藥

一婦人停食飽悶或用人參養胃湯木香枳榔丸而泄瀉吐痰腹中成塊又與二陳黃連厚朴反加腹脹不食余以爲脾胃氣虛不能消磨用補中益氣加茯苓半夏五十餘劑脾胃健而諸症痊

三言

婦人良方卷六

十四

必吞酸愛腐或用二陳黃連枳實反加內熱作嘔余曰此末傳寒中不信仍作火治虛症悉至月經不止余用六君加炮薑木香數劑諸症漸退又以補中益氣加炮薑木香茯苓半夏數劑全愈後因飲食勞倦兼以怒氣飲食頓少元氣頓怯仍用前藥更加發熱脉洪大按之而虛兩尺如無此命門火衰用補中益氣加薑桂及八味丸兼服兩月餘諸症尋愈此症若因中氣虛弱用人參理中湯或六君子加木香炮薑不應用左金丸或越鞠丸

虛寒加附子理中湯無有不愈

一婦人飲食後或腹脹或吞酸自眼枳木丸飲食日少胸膈痞滿腿內酸痛畏見風寒或用養胃湯腿痛浮腫益盛月經不行今以爲鬱結所傷脾胃虛濕熱下注侵晨用四君芎歸二陳午後以前湯送越鞠丸諸症漸愈又用歸脾八珍二湯兼服兩月餘而經行

一婦人胸滿少食或腹脹吞酸或經候不調不能施化也用補中益氣加砂仁香附煨薑而飲食進更以六君芎歸貝母桔梗而經自

三言

婦人良方卷六

十五

調

一婦人年三十餘忽不進食日飲清茶水菓三年餘矣余謂脾氣鬱結用歸脾湯加吳茱萸四劑遂飲食如常若人脾胃虛而不飲食當以四神丸治之

一婦人不進飲食二年矣日飲清茶菓品之類肝脾二脉弦浮按之微而結滯余謂肝脾氣鬱用六君木香吳茱萸下痰積甚多飲食頓進形體始瘦卅床月餘仍服六君之類而康越鞠丸治鬱傷氣滯以致胸膈痞悶或肚腹

膨脹或咽喉不清或疲氣不爽或飲食少思  
或吞酸不腐宜用此藥清之若人脾胃虛弱  
用六君子湯為王大凡中氣虛弱變症百出  
難以名狀但用四君補其脾胃元氣漸復諸  
症自退若用治病之藥則誤矣

香附 蒼朮 炒 川芎

梔子 炒 神麴 炒 山查 各等

右為末用神麴糊丸菜豆大每服六七十丸  
食遠白湯送下

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯 三方見二十四卷第六論

八味丸 方見二十四卷第十一論

人參養胃湯 方見七卷第六論

二陳湯

左金丸 方見七卷第十七論

人參理中湯

附子理中湯 二方見二十卷第六論

歸脾湯

八瓊湯 二方見二十四卷第四論

二神丸 二方見八卷第八論

婦人夢與鬼交方論第八

人稟五行秀氣而生承五臟神氣而養若調理  
失節血氣虛衰則鬼邪干其正隱避而不欲見  
人時獨言笑或時悲泣是其候也脉息遲伏或  
如鳥啄或綿綿而來不知度數面顏不變亦其  
候也

愚按前症多由七情虧損心血神無所護而  
然也宜用安神定志等藥則正氣復而神自

安若脉來乍大乍小乍短乍長亦為鬼祟也

宜灸鬼哭穴 以患人兩手桡骨相並用線緊

灸七壯若果是邪祟病者 即亡末免灸云我自去矣

扶神散 治妄有所見言語雜亂時或昏昧痰

熱

扶神 半炒 扶苓 人參

石菖蒲 各一 赤小豆 五分

右水煎服

桃仁丸 治與鬼魅交通

辰砂 研 檳榔 當歸

桃仁各三錢 水銀一錢藥肉一

麝香 阿魏煨 沉香各半兩

右為末煉蜜丸桐子大每服十九空心跳仁湯下

辟瘟丹

虎頭骨二兩 硃砂 雄黃

雌黃 鬼臼 皂莢

蕪荑仁 鬼箭羽 滑石各一兩

右為末煉蜜丸彈子大囊盛一九男左女右

繫臂上及用一九當病人戶前燒之一切邪

鬼不敢近 婦人良方卷下 十一

妙香散

治心氣不足精神恍惚夢與鬼交語

言錯亂先服此以補氣血鎮心安神然後以

前方治之 方見三卷第十三論

婦人傷寒傷風方論第九

傷寒之症若氣口脉緊盛即下之人迎緊盛即

汗之左關浮緊亦當發其汗若犯胃熱譫語喜

忘小腹滿小便自利用抵當湯胃實譫語用承

氣湯脉緊無汗名傷寒脉緩有汗為傷風熱病

脉洪大為中暑用香薷飲脉細弱為中暈用白

虎湯胃實用承氣湯傷寒先服黃龍湯不分男

女但妊娠用藥宜清涼不可輕用桂枝半夏桃

仁朴硝等類凡用藥病稍退則止不可盡劑此

為大法

愚按前症當宗仲景先生治法但胎前產後

須以安胎補益為主須臨症審之

黃龍湯即小柴胡湯去半夏

桂枝紅花湯 治傷寒發熱口燥舌乾經脉不

來

桂枝 芍藥 甘草炒

紅花 黃芩 芍藥 治婦人內熱口燥咽乾腹滿不

食

黃芩 芍藥 芍藥酒炒 白木

右薑棗水煎服良久再進汗出可解

黃芩 芍藥

熟地黃自製各一錢

右水煎寒加生薑

當歸湯 治傷寒喘急煩燥或戰而作寒此陰

陽俱虛不可下宜服此藥

柴胡 白木炒 人參

柴胡 白木炒 人參

甘草炒 赤芍藥 當歸各五

五味子炒 木通各三

右水薑棗煎

瀉心三黃湯 治傷寒六七日內有燥屎大便

秘結譫語目赤毒氣閉塞

大黃煨 黃芩炒 黃連炒

右水煎服取微利如目赤睛疼加赤茯苓竹葉

燒裙散 治女子病新瘥與男子交者名曰陰

易其証則裡急膺痛頭重不舉口中生花或

頭面烘熱耳中蟬鳴胸中煩悶甚者百節解

散用男子舊視襠着五腹者剪取一塊燒灰

每日三服白湯下男子病則以女人者如不

應用參附湯

婦人熱入血室方論第十

婦人傷寒傷風發熱經水適來晝則安靜暮則

譫語有如瘡狀此為熱入血室治者無犯胃氣

及上二焦宜服小柴胡湯若脉遲身涼當刺期

門穴下針病人五吸停針良久徐徐出針凡針

期門穴必瀉勿補肥人二寸瘦人寸半也

愚按前症若因勞役或怒氣發熱適遇經行

而患前症者亦用小柴胡加生地黃治之血

虛用四物加柴胡若病既愈而熱未已或元

氣素弱並用補中益氣湯脾氣素鬱用濟生

歸脾湯血氣素虛用十全大補湯

附治驗

一婦人經行感冒風邪晝則安靜夜則譫語

此熱入血室也用小柴胡加生地治之頓安

但內熱頭暈用補中益氣加蔓荊子而愈後

因怒惱寒熱譫語胸脇脹痛小便頻數月經

先期此肝火血熱妄行用加味逍遙加生地

黃而愈

一婦人因怒寒熱頭痛譫言妄語至夜益甚

一月經暴至此怒動肝火用加味逍遙散加生

地黃治之神思頓清又用補中益氣湯而痊

一婦人經行感冒譫語或用發散寒涼之劑

前症益甚月經不止肚腹作痛嘔吐不食痰

涎自出此熱入血室而藥復傷胃也用香砂

六君及歸脾而痊

乾薑柴胡湯 治婦人傷寒經脉方來熱入血

室寒熱如瘧或狂言見鬼

柴胡錢

桂枝三分

括蕪根五分

牡蠣煨

乾薑炮

甘草各三分

右水煎汗出而愈

海蛤散 治婦人傷寒血結胸膈宜服此藥及

針期門穴

海蛤

滑石煨水

甘草各二分

芒硝兩一

右為末每服二錢用鷄子清調下小腸通利

其結血自散更用桂枝紅花湯發其汗則愈

卷十六

婦人良方卷六

三十一

前方見

附方

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

四物湯

香砂六君子湯

補中益氣湯 三方見二十四卷第六論

歸脾湯

十全大補湯

加味道遙散 三方見二十四卷第四論

婦人咳嗽方論第十一

夫肺為四臟之華蓋內統諸經之氣外司腠理皮毛若外邪入於肺中故令咳嗽當以脉息辨之浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而澁者起於寒風者散之濕者燥之熱者涼之寒者溫之虛者補之

愚按丹溪云春是木氣上升夏是火氣炎上

秋是濕熱傷肺冬是風寒外來當發散行痰

開腠理用二陳湯加麻黃桔梗杏仁痰飲隨

症加藥勞嗽宜四物加竹瀝薑汁乾咳嗽難

治此症乃痰鬱火邪也用苦梗開之夏用補

卷十六

婦人良方卷六

三十一

陰降火不已則成勞上半日多嗽者胃火也

用貝母石膏午後嗽者陰虛也用四物加炒

黑黃柏知母黃昏嗽者火氣浮於肺也用五

味子五倍子五更嗽者飲食之火流於肺也

以貝母軟石膏肺脹而嗽或在或在不得眠

此痰挾瘀血氣滯而病宜養血疎肝清痰用

四物加桃仁訶子青皮竹瀝之類嗽而脇下

痛宜疎肝氣以青皮挾痰實者白芥子之類

血礙氣作嗽者桃仁大黃薑汁丸服治嗽多

用生薑以其辛散故也痰因火動逆上作嗽

者先治火次治痰以知母止嗽清肺滋陰降  
火夜嗽用清陰分之劑若嗽多用粟殼不必  
疑但要治病根此乃收後藥也竊謂前症午  
前嗽屬胃火盛用竹葉石膏湯胃氣虛用補  
中益氣加炒山梔午後嗽屬陰血虛用四物  
黃柏知母二味酒煎腎水虛用六味地黃丸黃  
昏嗽用四物五味麥門并前丸五更嗽用六  
君子不得眠及兩脇下痛用六味地黃補中  
益氣若因氣虛腠理不密六淫所浸當祛外  
邪而實肝土若因心火太過當伐肝木而滋  
肺金若因肺金氣虛當補脾土而生肺氣若  
因腎水虧損虛火上炎上當補肺腎以滋化源  
大抵風邪胃火此實熱為患易治惟肺腎虧  
損此真臟為患最難調治

附治驗

一婦人素勤苦冬初咳嗽發熱吐血盜汗遍  
身作痛或寒熱往來用化痰降火之藥口噤  
筋攣此血本虛而藥復損之耳余用八味丸  
為主佐以補中益氣麥門五味山藥年餘而  
痊

一婦人咳嗽發熱嘔吐痰涎日夜約五六碗  
喘咳胸痞燥渴不食崩血如湧此脾土虛寒  
用八味丸及附子理中湯而愈全見女科撮要

一婦人不得於姑患嗽胸膈不利飲食無味  
此脾肺俱傷痰鬱於中也先用歸脾湯加枳  
撫芎貝母桔梗諸症漸愈後以六君加芎歸  
桔梗間服全愈

一婦人咳嗽早間吐痰甚多夜間喘急不寐  
余謂早間多痰乃脾虛飲食所化夜間喘急  
乃肺虛陰火上衝用補中益氣加麥門五味

而愈

一婦人患咳嗽脇痛發熱日晡益甚余曰此  
肝脾虛熱而傷肺也用加味逍遙散加熟地  
治之而愈後因怒氣勞役前症仍作兼太陽  
痛或寒熱往來或咳嗽遺尿此肺氣虛而尿  
脬失制也仍用前散及地黃丸而痊

一婦人久咳嗽面色痿黃或時皖白肢體倦  
怠飲食少思稍多則瀉此脾土虛而不能生  
肺金朝用補中益氣湯夕用六君子湯為主  
間佐以八珍湯三月餘漸愈後感寒邪喘嗽

胸腹作脹飲食不入四肢逆冷此中氣尚虛不能充皮毛肥腠理司開闔之所致也遂用六君加生薑桔梗而愈

附方

法製清氣化痰丸 順氣快脾化痰消食

半夏

南星去皮

白礬

皂角

乾薑各四兩

右先將白礬等三味用水五碗煎取水三碗却入半夏二味浸二日再煮至半夏南星無白點為度晒乾

婦人良方卷六

十一 七志

陳皮

青皮

紫蘇子炒

蘿蔔子炒

杏仁去皮尖 葛根

神麩炒

麥蘖炒

山楂子

香附子

右為末蒸餅丸桐子大每服五七十九丸臨卧

茶湯任下

茯苓湯 治胸中有痰飲吐水心胸虛滿不能

進食

茯苓

人參

白朮炒各三兩

枳實炒

橘皮二兩

生薑四兩

右用水六升煮取二升分三服

加減小柴胡湯 治咳嗽寒熱往來

柴胡

半夏

黃芩炒各一錢

甘草炒

乾薑炮各五分

五味炒各三分

右水煎服

黃連解毒湯 治一切實火喘咳脉洪大或狂

言煩躁口乾飲冷喘急鄭聲目睛赤痛

黃連

黃芩

梔子

黃柏各二錢

右水煎服

婦人良方卷六

十一 七志

梔子仁湯

治喘咳發熱潮熱發狂煩躁面赤

咽痛

梔子仁

赤芍藥

大青

知母各一錢

升麻

黃芩

石膏

甘草

杏仁各二錢

柴胡二錢

豆豉百粒

右水煎服

麥門冬湯 治火熱乘肺咳嗽有血胸脇脹滿

五心煩熱

麥門冬去心

桑白皮炒

生地黃各一錢

半夏

紫苑

桔梗

淡竹葉

麻黃各十分

五味子并

甘草各五分

右薑水煎服

二陳湯

方見二十四卷第六論

竹葉石膏湯

方見十三卷第十論

補中益氣湯

四物湯

六君子湯

三方見二十四卷第六論

六味丸

八味丸

二方見二十四卷第十一論

附子理中湯

方見二十卷第八論

歸脾湯

加味逍遙散

八瓊湯

三方見二十四卷第四論

咳嗽用溫藥方論第十二

初虞世

經曰微寒為嗽寒甚為腸澼古人立方多用乾

薑桂心細辛之屬若熱在上焦而咳虛則為肺

痿實則為肺癰或因氣血不足或因酒色厚味

或因重亡津液燥氣焚金故脈數發熱咳嗽膿

血宜辛溫建中之屬若用柴胡紫甲門冬葶藶等藥則誤矣

愚按丹溪云陰分嗽者多屬陰虛肺脹不得

眠者難治肺痿專主補氣養血清金肺氣有

餘者宜瀉之以桑白皮為主半夏茯苓佐之

瀉其有餘補其不足肺燥者當潤之屬熱者

桔梗大力子知母鷄子清聲啞者屬寒細辛

半夏生薑肺虛者人參膏阿膠為主陰不足

者六味地黃為要藥或知母茯苓湯陰虛氣

喘四物加陳皮甘草以降其氣補其陰竊謂

前症嗽而鼻塞聲重風邪傷肺也用參蘇飲

面赤喘嗽火剋肺也人參平肺散寒熱交作

肝氣不和也四君加知母柴胡桔梗咳喘短

氣肺虛也人參補肺湯體倦少食脾虛也參

朮補脾湯口乾咽燥虛火上炎也六味丸大

凡發熱喘嗽或咳唾膿血飲食不入急補脾

肺滋腎水多有得生者脈浮大而面色赤者

有難治脈浮短澹者可療

參蘇飲 治外感風寒咳嗽氣逆血蘊上焦發

熱氣促或咳血衄血或痰嗽不止加黃芩山

蘇飲

蘇飲

婦人良方卷下 十一

梔名加味參蘇飲

人參

紫蘇葉去梗

半夏姜汁炒

茯苓

陳皮

桔梗

葛根

前胡

枳殼麩炒各一錢

甘草炙五

右薑水煎服

金沸草散 治肺經受風頭目昏疼咳嗽聲重

淨唾稠粘

荆芥穗錢一

前胡

麻黃

旋覆花各一分

甘草炙

赤芍藥

婦食方卷六

半夏各五分

右薑棗水煎服

定喘湯 治痰喘胸滿坐卧不安聲重鼻塞頭昏

半夏

明阿膠炒

甘草炒各五分

薏粟殼一錢

五味子炒

桑白皮炒

麻黃去節

人參各三分

右薑三片烏梅半箇水煎服

金不換正氣散 治肺胃虛弱咳嗽痰已喘滿涎盛

薏粟殼一錢

杏仁製

枳殼各五分

右生薑烏梅水煎

錄驗橘皮湯 治肺傷冷濕咳嗽喉中作聲上

氣頭痛

陳皮

紫朮

麻黃根去

杏仁製

當歸各一錢

桂心

甘草炒

黃芩各五分

右水煎

華蓋散 治肺感寒邪咳嗽聲重胸膈煩滿頭昏

目昏眩

蘇子炒

陳皮

赤茯苓

桑白皮炒

麻黃各一錢

甘草五分

右薑水煎服

千金五味子湯 治咳嗽皮膚乾燥喉中有血

胸膈疼痛

五味子炒

桔梗炒

紫苑

甘草炒

續斷各一錢

竹茹三錢

赤小豆一握

生地黄

桑白皮各半

右水煎服

右水煎服

知母茯苓湯 治咳嗽不已往來寒熱自汗喘

促或肺痿

知母

茯苓一兩

五味子半斤

人參

薄荷

半夏

柴胡

白木

款花

桔梗

麥門冬去心

苦茶炒

川芎

阿膠

甘草炙

右每服一兩姜水煎

小青龍湯

治肺感寒咳嗽喘息加杏仁煎有汗去麻黃細辛發熱頭疼脉沉細或嘔或欬

藥

或利或噎或小便不利小腹滿脹喘嗽之聖

瀉白散

桔梗湯

人參平肺散

人參補肺湯

人參補脾湯

六味丸

四君子湯

四物湯

四君子湯

四君子湯

勞嗽方論第十三

經曰感於寒微則為咳甚則為泄蓋肺主氣合於皮毛邪傷皮毛則咳為肺病傳於各臟以時受邪肺為嫩臟邪易傷而難治其嗽有肺心脾腎肝風寒支飲膽六種亦有勞嗽者華陀謂之邪嗽孫真人謂之注嗽此因酒色過度勞傷肺經重者咯唾膿血輕者時發時瘥或先嘔血而後嗽或先咳嗽而吐血此又挾邪傳症孫真人用通氣丸夢與鬼交用四滿丸蛤蚧天靈蓋桃柳枝安息香之類若肺中有蟲入喉痒嗽須以藥含化其蟲即死嗽即止

婦人良方卷六

三三

愚按仲景先生云咳而兩脇痛不能轉側兩肋滿屬於肝臟用小柴胡湯咳而嘔苦水屬膽腑黃芩半夏生薑湯咳而喉中如梗狀甚則咽腫喉閉屬心臟桔梗湯咳而大便失氣屬小腸腑芍藥甘草湯咳而右肋痛陰引肩背甚則不可動則咳劇屬脾臟升麻湯咳而嘔嘔甚則出長蟲屬胃腑烏梅丸咳而喘息有聲甚則唾血屬肺臟升麻湯咳而失屎屬大腸腑麻黃附子細辛湯咳而遺溺屬膀胱

脱茯苓半夏湯咳而不止三焦受之其狀腹滿不食涕唾面目浮腫氣逆異功散用之對証其效如神仍參五卷看

附治驗

一婦人患前症晡熱內熱寒熱往來作渴盜汗小便頻數其經兩三月一行此肝脾氣血虛損用八珍湯六味丸各六十餘劑諸症漸愈其經兩月一行仍用前二藥間以加味逍遙散各三十餘劑後志怒適經行去血過多諸症悉至飲食少思腹脹氣促用十全大補

婦人方卷下 五十四

湯數劑漸愈仍用前藥調補漸愈復因篋子胸腹不利食少內熱盜汗便血無寐用加味歸脾湯仍兼前藥而愈

一婦人患前症不時發熱或時寒熱或用清熱之劑其熱益甚盜汗口乾兩足如炙遍身皆熱昏憤如醉良久熱止方甦或晡熱至旦方止此陰血虛而陽氣弱也余朝用六味丸料夕用十全大補湯月餘諸症稍愈更兼以補中益氣湯兩月餘而愈

深師四滿丸 治上氣嗽飲嗽燥嗽冷嗽邪嗽

謂之五嗽

乾薑炮

桂心

躑躅花

芎藭

紫苑各二兩

芫花根皮二分

蜈蚣一枚去頭尾炙

細辛

甘草炙

鬼督郵

人參

半夏洗各一兩

右為末煉蜜丸大豆許每服五丸米飲下日

三服未應加至七八丸

溫金散

治勞嗽喘悶咯痰中有血方見前

阿膠丸

治勞嗽并嗽血咯血方見前

團魚丸

治骨蒸勞嗽累効

婦人方卷下 五十五

貝母

前胡

知母

杏仁

柴胡各半

生團魚二箇

右藥與魚同煮熟取肉連汁食之將藥焙乾

為末用骨更煮汁一盞和藥丸梧子大每服

二十九煎黃芪六一湯空心送下病既安仍

服黃芪六一湯調理

附方

地骨皮散

知母炒

柴胡

人參

地骨皮

甘草炒

茯苓

地骨皮

茯苓

半夏姜製各一錢

右薑水煎服

海藏紫苑散 治咳中有血虛勞肺痿

人參 紫苑 知母炒

貝母 桔梗炒 茯苓

阿膠炒各一錢 五味子并三分 甘草炙五分

右薑水煎服

參朮調中湯 瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進

飲食

黃芪四分 桑白皮五分 人參

婦人良方卷六十一 手本

炙甘草 青皮 白茯苓各三分

五味子并五分 白朮三分 地骨皮

麥門冬 陳皮各五分

右水煎服

二陳湯 治脾胃虛弱中脘停痰或嘔吐惡心

或頭目不清飲食少思 方見齒卷第五論

異功散 方見二十四卷第五論

六味丸 方見二十四卷第十一論

八珍湯

加味逍遙散

十全大補湯

加味歸脾湯 四方見二十四卷第四論

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

喘滿方論第十四

岐伯曰夜行則喘出於腎淫氣病肺有所隨恐

喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘出於肺淫氣

傷心度水跌仆喘出於腎與骨皆因外邪所感

而致太陽病則脈浮無汗而喘用麻黃湯陽明

病則汗出腹滿喘而潮熱承氣湯表邪未解喘

促汗出葛根黃芩湯微喘桂枝厚朴杏仁湯汗

婦人良方卷六十一 手本

出而喘麻黃杏仁甘草石膏湯表邪未解小青

龍湯去麻黃加杏仁感寒伏熱而喘九寶湯氣

鬱度盛喘促四七湯涎多而喘干縉湯不得財

而喘神秘湯寒熱喘咳棗膏丸上氣喘促神授

湯上盛下弱吞黑錫丹若四肢逆冷脈息沉細

或寸大尺小胸脹冷汗大便頻數上氣喘促此

虛極採寒之陰症急用返陰丹

愚按東垣云肺金受邪由脾胃虛弱不能生

肺乃所生受病故咳嗽氣短氣上皮毛不能

禦寒精神小而渴情慘不舉皆陽氣不足陰

氣有餘也治法若肺氣虛弱用四君枳剉附  
夏脾虛不能生肺補中益氣湯七情氣結四  
七湯脾經鬱結歸脾湯脾氣虛弱人參補肺  
散肺經火盛人參平肺散腎水敗濁六味丸  
真陽虛損八味丸或兼小便不利為害尤速  
非二丸不能救仍與前十一論互用

附治驗

一婦人傷風寒作喘或用表散愈而復患仍  
用前藥其症益甚飲食少思胸腹不利此因  
脾肺氣虛也予先用六君子湯加桔梗漸愈

婦食方卷六

三五

又用補中益氣湯全愈

一婦人患前症屬命門火虛不能生脾土用  
補中益氣湯八味地黃丸而痊後復患其喘  
益甚用前藥不應遂用黑錫丹二服喘止仍  
用前二藥而諸症痊凡屬邪氣有餘者其症  
易識治効亦速其屬元氣不足者變症不一  
効非可以旦夕期也

神祕湯 治水氣乘肺作喘或支飲喘滿痰嗽

不食

陳皮去

紫蘇葉

人參

桑白皮

生薑各一錢

右水煎服

半夏七枚

皂角去皮尖甘草炙一

生薑大如指

右薑水煎服

棗膏丸

治息賁在右脇下大如杯令人灑淅

寒熱喘咳

甜葶藶

陳皮

苦梗各等分

右為末煮棗肉丸桐子大每服數丸白湯下

婦人良方卷六

三五

許學士云余常停飲水積食已必噎漸喘覺

肺系急服此良驗

神按湯

治上氣喘急不得卧

橘紅

苦梗

紫蘇

人參

五味子各一錢三分炒

右薑水煎服

九寶湯 治伏熱咳嗽喘急虛勞自汗者不可

服

薄荷

紫蘇

大腹皮洗

甘草炒

杏仁去尖

陳皮各一錢

右薑十片烏梅一箇水煎

四磨湯 治七情鬱結上氣喘急滿悶痰涎上湧

湧

人參 檳榔 沉香

烏藥

右四味各濃磨白沸湯少許溫服

五味子湯 治咳嗽皮膚乾燥唾中有血胸脇

痰痛

五味子 桔梗 紫苑

甘草 續斷 竹茹

婦人良方卷六

赤小豆 生地黃 桑白皮

右水煎服

附方

六君子湯

四君子湯

補中益氣湯 三方見二十四卷第六論

四七湯 方見十一卷第七論

歸脾湯 方見二十四卷第四論

人參補脾散

人參平肺散 一方見二十四卷第一論

六味丸

八味丸 二方見二十四卷第十一論

黑錫丹 方見四卷第四論

婦人風痰積飲嗽咳方論第十五

婦人脾胃虛弱風邪外侵以致痰滯咳嗽眼昏

頭眩經云九竅不利腸胃之所生也無擇云凡

屬風熱三生飲化痰丸屬寒冷全沸草散屬暑

熱消暑丸屬氣鬱四七湯在瓜蒂散吐之在

下控涎丹利之仍觀人勇怯脈之虛實

黑按前症若肝經志怒用小柴胡湯肝經風

婦人良方卷六

熱用釣藤散肝腎氣虛用川芎散脾經鬱結

用濟生歸脾湯鬱怒傷肝脾用加味逍遙散

脾虛痰逆用白朮半夏天麻湯脾氣虛弱用

六君子益氣湯肺氣鬱滯用二陳貝母桔梗

陰虧水泛六味地黃腎虛陰火加減八味丸

腎虛火不歸源八味地黃丸仍與前按互相

用之

附治驗

婦人內熱口乾勞則頭暈此痰帶下或用

化痰理氣藥前症益盛肢體或麻又用祛風

化痰藥肢體常麻手足或冷或熱此脾土不能生肺金也余用補中益氣加茯苓半夏炮薑二十餘劑漸愈又用加味逍遙散三十餘劑全愈後因怒吐痰胸痞或用清氣化痰丸食少痰甚胸脇脹滿脈或浮大或微細余以六君信用參朮少加木香而康

一婦人咳嗽脇痛或用清肺化痰降火等劑久不愈更加內熱晡熱若兩脇或小腹內熱其咳益甚小便自遺余曰此屬肝經血虛火動用六味丸加五味子滋腎水以生肝血用

婦人良方卷六 聖

補中益氣生脾土以滋肺金而尋愈

旋覆花湯治風痰嘔逆飲食不下頭目昏悶等症

旋覆花 枇杷葉 川芎

細辛 赤茯苓各一錢 前胡一錢五分

右水薑棗煎

大半夏湯 治痰飲脾胃不和咳嗽嘔吐飲食不入

半夏 白茯苓 生薑各二錢

右薑水煎服胃痞加陳皮如不應四七湯亦

善

導痰湯 治痰涎壅盛胸膈痞塞或咳嗽惡心

飲食少思

半夏二錢 南星 枳實炒

茯苓 橘紅一錢 甘草五分

右薑十片水煎

附方

川芎散 治肝腎氣虛頭風眩運

小川芎 山藥 白茯苓

甘菊花 人參各五錢 山茱萸兩一

婦人良方卷六 聖

右每服一兩食前空心水煎服或為末酒調

日三服

小柴胡湯 方見二十四卷第七論

釣藤散 方見四卷第四論

歸脾湯

加味逍遙散 方見二十四卷第五論

白朮半夏天麻湯 方見四卷第五論

六君子湯

補中益氣湯 方見二十四卷第六

陳湯 方見 卷第 論

六味丸

加減八味丸

八味丸 三方見二十四卷第十一論

婦人心胃嘈雜方論第十六

婦人嘈雜此脾胃鬱火痰滯血液淚汗而成用猪血炒食之乃以血導血而使之歸源爾旋覆花湯尤善

愚按前症若因食鬱用六君子山查山梔若因胃熱用二陳薑炒芩連若因六鬱用越鞠丸

若因氣滯用四七湯桔梗枳殼大抵此症屬

病氣元氣俱不足須用六君為主少佐以治

痰之藥若以火治之必變吞酸中滿

附治驗

一婦人飲食少思胸中嘈雜頭暈吐痰此中

氣虛而有熱用六君子湯加炒黑山梔桔梗

而愈後因勞碌頭暈發熱吐痰不食用補中

益氣加半夏茯苓天麻而痊

一婦人中脘嘈雜口中辛辣或咳嗽吐痰發

喘面色或白或赤此脾胃氣虛而肺中伏火也

用六君子加山梔桔梗柴胡及炒黑片芩治

之尋愈

一婦人嘈雜吞酸飲食少思大便不實此脾胃

氣虛寒而下陷用補中益氣湯加茯苓半夏

炮薑漸愈又常服人參理中丸則安

一婦人飲食後嘈雜吞酸此食鬱為痰用六

君子湯送越鞠丸漸愈又用加味歸脾湯而

痊後因怒兩脇脹痛中脘作酸用四君湯送

左金丸漸安仍用六君子湯送越鞠丸而痊

旋覆花湯 治脾胃虛寒中脘停痰汪洋嘈雜

腸鳴多睡嘔吐不食脇肋脹痛脉沉遲弦細

婦人良方卷六 四四

旋覆花

細辛

橘紅

桂心

人參

甘草炒

苦梗

白芍藥

半夏五分

赤茯苓

各三分

右薑水煎服

余治婦人心中脘嘈雜用茯苓補心湯治之而愈

前方見

附方

補中益氣湯

四君子湯

六君子湯 三方見二十四卷第六論

二陳湯 方見二十四卷第五論

越鞠丸 方見前第七論

四七湯 方見十卷第七論

歸脾湯 方見二十四卷第四論

人參理中湯 方見二十卷第八論

婦人良方卷之六 畢

八十六

婦人良方卷之七

臨川陳白明良甫編

吳郡後學薛己校註

婦人嘔吐方論第一

婦人嘔吐良由脾胃不調外邪乘之或胃中虛冷或胃口有熱或中脘停痰或胃經血弱治法胃冷者丁香散理中丸胃熱者小柴胡竹茹湯胃虛者藿香正氣散停痰者半夏茯苓湯二陳湯血虛者十全大補湯加陳皮半夏藿香

愚按東垣先生云前症內有故寒與新穀俱

婦人良方卷七

章

入於胃新故真邪相攻氣併相逆復出於胃故為噦補手太陰瀉足少陰又云胃因氣逆為噦夫嘔吐噦者俱屬於胃以其氣血多少為異耳如嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物血氣俱病也仲景云嘔多雖有陽明症慎不可下孫真人云嘔家多服生姜為嘔家之聖藥也氣逆者必散之故以生姜為主吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲為血病也有食入則吐以橘皮去白土之噦者少陽也多氣少血故有聲無物乃氣病也以

薑製半夏為主若脾胃虛弱寒邪所客飲食所傷者用六君丁香藿香生薑之類若胃中有熱膈上有痰用二陳山梔黃連生薑若久病胃虛嘔而不納穀者用生薑參朮黃芪香附之類亦有痰膈中焦食不得下者有氣逆而嘔者有氣鬱於胃口者有食滯於心肺之分而復出者有胃口有火與痰而嘔者若注船大吐渴飲水者即死童便飲之最妙前論云血不歸源而嘔用十全大補湯誠發前人所未發愚常用屢効

此論與王安道先生原集所論少異仍宜參

附治驗

太守陽山之內素善怒胸膈不利吐痰甚多吞酸噯腐飲食少思手足發熱數年矣所服非苓連枳實必擯蘇厚朴左關弦洪右關弦數此肝火血燥木乘土位朝用六味地黃丸以滋養肝木夕用六君歸芍以調補脾土而愈乙巳夏因大怒吞酸噯腐胸膈脹滿或用二陳石膏治之吐涎如湧外熱如灼脉洪大按之如無余曰此脾胃虧損虛陽發越於小

脾胃而涎泛出也用六君加姜桂一鍾即睡覺而諸症如失又數劑而康

先太宜人飲食後聞外言忤意嘔吐酸水內熱作渴惟飲冷水氣口脉大而無倫面色青赤此肝脾鬱火投之以藥入口即吐第三日吐宿食第七日吐酸黃水十一日吐苦水脉亦洪大仍喜飲冷以黃連煎湯冷飲少許至二十日加白朮茯苓二十五日加陳皮三十日加當歸炙草至六十日始進米飲半盞漸進薄粥調理得痊

婦人良方卷七

一婦人食後因怒患瘧嘔吐用藿香正氣散而愈後復怒吐痰狂言熱熾胸膈脹痛手按少得脉洪大無倫按之微細此屬肝脾二經血虛以加味逍遙散加熟地川芎二劑脉症頓退再用十全大補湯而安矣府庠沈姬文母患脾虛中滿痰嗽發熱又食濕麵冷茶吞酸嘔吐絕食誤服苓連青皮等藥益加寒熱口乾流涎不收聞食則嘔數日矣迎治余曰脾土涎此脾虛不能約制也欲用人參安胃散惑於眾論以為胃經實火宿食治之病日

增劇忽思冬瓜食如指甲一塊頓發嘔吐酸水不止仍服前藥愈劇復邀視之則神脫脈絕瀕死矣惟目睛尚動余曰寒淫于內治以辛熱然藥不能下矣急用益艾附子炒熟熨臍腹以散寒回陽又以口氣補接母口之氣又以附子作餅熱貼臍間時許神氣少甦以參朮附子為末仍以是藥加陳皮煎膏為丸如粟米大入五七粒于口隨津液嚥下即不嘔二日後加至十粒諸病少退甘涎不止五日後漸服前劑一二匙胃氣少復乃思粥飲

婦人良方卷七

四

後投以參朮等藥溫補脾胃五十餘劑而愈

丁香散 治脾胃氣弱嘔吐水穀不消

丁香 白木 縮砂

草菓 各三錢 人參 一兩 當歸

白荳蔻 藿香 甘草 各半兩 炒

橘皮 三分 神麩 少 阿子 各半兩

右為末每服二錢薑棗湯調

竹茹湯 治胃熱嘔吐

乾葛 二錢 半夏 姜製 三錢 甘草 五分

竹茹 子一錢 大

右薑棗水煎服

許學士先生云胃熱者手足心熱也政和中一宗人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥食不下用丁香藿香滑石等藥下咽即吐余曰此正汗後餘熱留胃脘正宜竹茹湯用之即愈

許仁則半夏丸 治胃冷嘔逆不食

半夏 洗去滑 一斤 小麥麩 一斤

右水和丸如彈子大水煮熟初服四五丸二

服加至十四五丸旋煮間服

婦人良方卷七

五

七味人參丸 服前丸不應可服此藥

人參 白朮 各五兩 厚朴 姜製

細辛 兩 生薑 橘皮 三兩

桂心 二兩

右為末煉蜜丸桐子大米飲下十九漸加至

二十九

青金丸 治嘔吐不已

硫黃 二錢 水銀 一錢

右入鉢內慢火化以木片撥炒成砂研至黑不見白星薑汁糊丸菉豆大每服二三十九

米飲下

附方

人參安胃散 治脾胃虛熱嘔吐泄瀉或飲食不入

人參一錢 黃芪錢炒二 生甘草

炙甘草各五分 白芍藥七分 白茯苓四分

陳皮三分 黃連二分

右水煎服

六君子湯 方見二十四卷第六論

加味逍遙散

十全大補湯 二方見二十四卷第四論

六味丸 方見二十四卷第十一論

藿香正氣散 方見二十一卷第九論

婦人霍亂方論第二

論曰嘔吐而利者名霍亂也因腸胃虛弱飲食過度觸冒風冷清濁相干所致或先腹痛而吐或先吐而痛或吐利並作當分寒熱而治之飲冷者五苓散飲湯者理中丸四肢逆冷脉微細者用通脉四逆湯加豬膽汁中暑霍亂煩渴飲冷轉筋者用香薷散脉浮洪者易治微遲者難

治

愚按賈元良先生云暑者相火行令也夏月人感之自口齒而入傷心胞絡之經其症頭疼口乾面赤自汗倦怠少氣或背寒惡熱甚者迷悶不省或霍亂吐利嘔痰腹痛或下血發黃生斑等症治法清心火利小便為主若自汗熱甚用白虎湯若頭疼惡寒用十味香薷散泄瀉煩渴飲水吐逆用五苓散熱甚煩渴用益元散清之若未解裡熱甚者用黃連解毒湯脉微下利作渴喜溫或厥冷不省人

婦人良方卷七

七

事宜竹葉石膏湯加熟附半枚冷飲次以來復丹五苓散治之故東垣云脾胃虛弱過夏月淫雨身重短氣甚則四肢痿軟脚軟眼黑當滋肺氣以補水之源是以五月常服五味子人參麥門冬之劑為熱傷元氣故耳丹溪所謂夏月伏陰在內也蓋人之陽氣亦浮于六陽盡出於地之上矣是人之陽氣亦浮于肌表散于皮毛而腹中之陽虛矣又加以涼臺水館大扇風車寒泉水菓水涼之物自內及外不用溫熱病所由生陳無擇云凡中暈

切不得用冷藥惟用溫養得冷即死道途無湯即以熱土熨臍中溺以熱尿即甦榮可見矣內經曰脉虛身熱得之傷暑難經曰傷暑得之為正邪火自病也當惡臭其病身熱而煩心痛其脉浮大而散傷寒論曰太陽中暈者身熱疼痛而脉微弱或發熱惡寒而脉微細芤遲大抵寒傷形熱傷氣蓋傷氣而不傷形則氣消而脉虛弱故先哲立法夏月宜補良有以也前症若內有所積外有所感用二陳湯加減治之或蘿蔔子搗碎服而吐之若飲米湯即死云云同前論若轉筋不住男子以手挽陰女子以手牽乳近兩邊此千金妙法也乾霍亂不得升降死在頃臯當以鹽湯吐之後以二陳湯加川芎蒼木防風白芷薑煎服若登園而不通加枳殼若食瓜菓飲冷乘風霍亂用六和湯倍加藿香比中暑而亡者皆因元氣虛弱而暑熱乘之以致泄瀉陽氣暴脫實為陰寒之症宜急補其陽庶得保生緩則不救其他執為暑熱投以寒藥鮮不誤事愚故以回陽固本之方繼之於後

婦人良方卷七

附治驗

進士李通甫之內冬間開衣箱其內衣袋乃夏月所晒者開時覺暑氣所侵良久患霍亂足指足跟俱轉筋甚惡自分必死用香薷飲一劑急煎下咽即愈

加減理中丸 治肚腹疼痛手足逆冷飲食不

入等症

人參

白朮

乾薑

甘草

各半

右為末煉蜜杵勻每兩作五丸每服一丸白

湯化下

嘔吐加枳實泄瀉加乾薑吐瀉乾嘔

加半夏體冷微汗腹寒加炮附子水煎服

四順附子湯

治霍亂吐利腹痛手足厥冷脉

微絕

方見八卷第十一論

四逆湯加猪胆汁名四逆猪胆汁湯

甘草

兩

乾薑

兩

附子

一枚

右每服五錢水煎入猪胆汁半合作二服

香薷散

治吐利腹疼發熱頭痛或霍亂轉筋

拘急

香薷

錢

白扁豆

厚朴

姜

茯苓各一錢

右水煎冷服連進二三劑加黃連名黃連香

薹飲

附方

十味香薹散 治伏暑身體倦怠頭疼惡寒或

吐瀉等症

香薹兩一

人參

陳皮

白木炒

茯苓

黃芪炒

木瓜不犯鐵器

厚朴姜製

扁豆

甘草半兩各

婦人良方卷七

十一

右每服一兩水煎

清暑益氣湯 治長夏濕熱所蒸四肢困倦精

神短少懶於動作胸滿氣促支節作疼或氣

高而喘身熱而煩心下膨悶小便黃數大便

溇瀕或瀉痢作渴不思飲食自汗體重

黃芪炒

蒼朮

升麻各一錢

人參

白朮

神麩炒

陳皮各五分

甘草炙

黃栢炒

麥門冬去心

當歸各一錢

葛根分一

五味子九粒

澤瀉分五

青皮分二

右水煎服

白虎湯 治胃熱作渴暑熱尤効又治熱厥腹

滿身難轉側面垢譫語不時暈溺手足厥冷

自汗脉沉滑

知母

石膏各二錢

粳米半合

右水煎服

人參白虎湯

治暑熱發渴脉虛等症

人參五錢

知母二錢

石膏兩半

甘草一錢

右八稜米一合水煎服

婦人良方卷七

十一

人參益氣湯 治暑熱傷氣四肢困倦嗜汗少

食兩手指麻木

黃芪炒八錢

甘草七錢內炙二錢人參兩半

升麻二錢

白芍藥炒三錢五味百四十粒

柴胡一錢

右以咀分作四服

大順散 治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水

穀不分清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐臑臍

不調

甘草炒

乾薑炮

杏仁去皮

桂皮

右為末每服二三錢湯點服

消暑丸 治傷暑發熱頭疼或嘔吐泄瀉二便

不分

半夏

甘草炒

茯苓各半

右為末生姜汁和丸桐子大每五十九水下

易簡方姜汁好醋煮半夏末作糊丸服

姜附湯 治霍亂轉筋手足厥冷汗出嘔逆腹

痛脉欲絕者

乾姜

炮

附子一箇

生用

十一

婦人良方卷七

十一

右為末每服五錢水煎服

通脉四逆湯 治霍亂惡寒腹痛身冷自汗脉

沉微如欲絕

吳茱萸

炒

附子

炮

桂心

通草

細辛

白芍藥炒

甘草

炙各

當歸

三錢

右每服四錢水酒生薑煎如不應更加倍服

之以效為度

半夏解毒湯 治一切暑熱毒五心煩躁口舌

咽乾

黃柏炒

黃芩炒

山梔子炒

半夏

分等

右每服五錢水煎

六和湯 治冒暑伏熱煩悶霍亂轉筋吐瀉寒

熱交作頭目昏痛嗜臥倦怠小便赤澀不問

胎產並服之

縮砂

半夏

湯炮

七次

杏仁

去皮

人參

甘草

炙各

赤茯苓

藿香

木瓜

各

白扁豆

薑汁

香薷

厚朴

姜製各

四兩

十二

婦人良方卷七

十二

右每服一兩姜棗水煎服

益元散 治中暑身熱小便不利或發熱體痛

口乾作渴

滑石

六兩

甘草

微炒

右為末每服三錢加蜜少許湯水任下

二陳湯 方見二十四卷第五論

來復丹

五苓散 二方見二十一卷第十論

竹葉石膏湯 方見十三卷第十論

婦人翻胃吐食方論第三 論新增

愚按病機云前症有三曰氣積寒也皆從三焦論之上焦吐者從於氣氣者天之陽也其脈浮而洪食已暴吐渴欲飲水大便燥結氣上衝胸發痛其治法當降氣和中中焦吐者從於積有陰有陽食與氣相假為積而痛其脈浮而匿其症或先痛而後吐或吐而後作痛治法當以小毒藥去其積檳榔木香行其氣下焦吐者從于寒地之道也其脈沉而遲其症朝食暮吐暮食朝吐小便清大便秘而不通治法當以毒藥通其閉寒溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不令大便秘結而自愈也王大僕曰食不得入是有火也食入反出是無火也又發明曰噎者六腑之所主陽也氣也塞者五臟之所主陰也血也二者皆由陰中伏火而作也劉宗厚先生曰若三焦傳化失常所致主於氣也若血虧胃脘乾稿所致因於血也塞猶填塞不通之義故發明有治幽門不通噎塞不便通幽湯例蓋陽無陰不能通化陰之失位而陽伏其中傳化不變而反上行矣故前症或由飲食起居士

情虧損脾胃痰飲停滯中氣不運當以補中益氣湯為主若鬱結傷脾用歸脾湯加枳殼桔梗若志怒傷肝用小柴胡加枳芍參木脾氣虛弱用六君加山柅枳殼氣血俱虛用八珍湯加山柅半夏若用行氣之藥胸膈痞悶用六君芎歸之類若遇用香燥之劑而人便結燥用四物參朮之類若飲食不能入用六君山柅吳茱萸製黃連若食入而反出用六君炮薑白豆蔻黃連製吳茱萸若痰滯而食反出六君枳殼桔梗若飲食少思大便不實

胸膈痞悶吞酸噯腐食反不化是為脾胃虛寒用東垣固真丸或八味丸若發熱煩熱身惡風寒腹畏熱食或手足俱冷胸滿腹脹是內真寒外假熱用神効附子丸或八味丸大凡嘔吐善食喜飲冷水是為有人嘔吐少食喜飲熱湯是為無火當審其因而治之

附治驗

一婦人患前症胸腹痞悶得去後或泄氣稍寬余曰此屬脾氣鬱結而虛弱也當調補為善不信乃別用二陳枳實黃連之類不應又

用香燥破氣前症益甚形氣愈虛余用加味  
歸脾湯調治半載而痊

一婦人患前症胸脇脹悶或小腹不利或時  
作痛小便滯余曰此肝火血虛也當清肝

火生肝血養脾土生肺金以余言為迂別服  
利氣化痰等劑前症益劇虛症蠶起余用加

味逍遙散加味歸脾湯兼服尋愈

一婦人患吐痰甚多手足常冷飲食少思余

曰此肝脾鬱怒兼命門火衰不信另服化痰  
利氣之劑胸腹愈脹又服峻利疎導之劑余

婦人良方卷七 十六

曰非其治也必變脾虛發腫之症急服金匱

加減腎氣丸庶有可救仍不信反服沉香化

氣等丸果發腫而歿

白朮散 治虛熱翻胃用白朮土一斤米醋一

升煨土赤入醋內再煨再入以醋乾為度取

土一兩入炮薑一錢為末每服一錢米飲下

甚者二錢須服四兩有效

治實熱翻胃用黃連五錢生薑汁浸炒山查三

錢保和丸三錢同為末糊丸麻子大胭脂為

衣每服六十九煎人參湯入竹瀝下之

太倉丸 治胃弱翻胃

肉豆蔻 砂仁 丁香

陳倉米 升

右為末薑汁糊丸桐子大每服六七十丸薑

湯下

青金丹 每服三十九生薑陳皮煎湯送下

前嘔吐類

附方

東垣補真丸

肉蓯蓉 胡蘆巴 附子 煨去

婦人良方卷七 十七

陽起石 肉豆蔻 兔絲子 淨洗酒

川烏 沉香 五味子 各五

鹿茸 巴戟 鍾乳粉 各一

右為末用羊腰子兩對治如食法葱椒酒煮

搗爛入酒糊丸如梧子大每服七十九空心

米飲鹽湯任下

神效附子丸 治脾腎虛寒嘔吐或翻胃膈噎

用黑附子重一兩四五錢端正底平尖圓一

枚灰火炮皮裂入生薑自然汁內浸潤晒乾

仍炮再入汁浸潤仍晒再炮用盡姜汁半碗

為度却去皮臍為末以人參煎膏丸黍米大  
每服數丸津唾嚥下胃氣稍復飲食稍進投  
以溫補之劑

六君子湯

補中益氣湯

四物湯 三方見二十四卷第六

歸脾湯

加味歸脾湯

八珍湯

加味逍遙散 四方見二十四卷第四論

八味丸 方見二十四卷第十一論

二陳湯 方見二十四卷第五論

金匱加減腎氣丸 方見二十二卷第十論

婦人血膈方論第四

愚按前症若氣逆而血滯用沅氣飲若志怒

而血逆用小柴胡山梔丹皮血虛用四物參

朮柴胡山梔丹皮若鬱結而血傷用加味歸

脾兼加味逍遙散脾虛不能生血用六君歸

芎胃虛不能生血用益氣湯若肝虛而不能

藏血用補肝散如不應兼以六味丸若因脾

肺虛用補中益氣湯如不應六君加芎歸

附治驗

一婦人患前症胸膈痞悶余曰此屬脾經血

虛遂用四君芎歸調補脾氣尋愈又因怒兼

兩脇痞悶頭目不清月經旬餘未竭用加味

逍遙散加釣藤治之復瘳

一婦人患前症胸膈作痛面青目劓小便頻

數或時寒熱此肝氣滯而血凝先用失笑散

二服痛止又用加味逍遙散而愈

一婦人所患同前泛用行氣破血之劑以致

不起

神功散 治血滯胸腹作痛

五靈脂 炒一兩

莪朮 炒各半兩

芸薹子 炒各半兩

右每服二錢酒水煎

附方

沅氣飲 方見三卷第七論

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

加味歸脾湯

加味逍遙散 方見二十四卷第四論

四物湯

補中益氣湯

四君子湯

六君子湯 四方見二十四卷第六論

補肝散 方見本卷第十七論

六味丸 方見二十四卷第十一論

失笑散 方見二十四卷第五論

製吳茱萸黃連法用二味等分用熱湯拌濕和

勻重湯頓煮使氣相通同炒焦各揀出聽用

婦人鼻血方論第五

信全 婦人良方卷七

婦人氣血調和則循環經絡若勞傷元氣陰虛

火動氣逆於肺則血隨鼻而衄產後尤不可治

陳無擇曰亦有因怒氣而得者趙恭人鼻衄先

用蘇合香丸四粒次用五苓散濃煎白茅花湯

調服即止又用芎歸湯調理而安一富男鼻血

六脉洪數訊之云曾服丹藥遂用芩連大黃為

末水調服解之而愈

愚按前症若熱鬱於胃經用犀角地黃湯若

伏暑於內用黃連香薷飲若大怒血蓄于土

用小柴胡湯若脾損不能攝血歸源用歸脾

湯大凡雜症見血多因陰分鬱熱或肉有所

傷皆屬五志所動經曰諸見血身熱脉亢者

難治是火邪勝也身凉脉靜者易治是正氣

復也仍與後症同用

附治驗

一婦人經素不調因怒衄血此肝火熾盛用

加味小柴胡加紅花二劑血止又用加味逍

遙散八珍湯兼服三十餘劑經行如期

一婦人鬱結而患前症用加味歸脾湯其血

漸止飲食漸進用加味道遙散元氣漸復寒

熱漸止後因怒仍衄寒熱往來用小柴胡湯

加芎歸丹皮而愈

一婦人因勞衄血服凉血之劑更致便血或

以血下為順仍用治血余曰此因脾氣下陷

而血從之當升補脾氣庶使血歸其經不信

果血益甚余朝用補中益氣湯夕用加味歸

脾湯而愈此症用寒凉止血不補脾肺而死

者多矣

刺藺散 治血熱鼻衄

刺藺

生地黃 各二桑耳

刺藺

亂髮灰 艾葉炒各一錢 蒲黃五分

右水煎服

犀角地黃湯 方見後

又方用白茅根汁一合飲之即止

又方用生葱心塞鼻中血即止若刀斧所傷用之血亦止

四物湯加側柏生地黃治虛熱吐血甚效若脾

經血虛須用四君加芍歸若脾經氣鬱須用

歸脾湯若肝腎虧損須用六味九若氣血俱

虛須用十全大補湯

附方

婦人良方卷七

三十一

濟生犀角地黃湯 治熱不解泛行經絡或流

腸胃隨氣湧泄以致衄血吐血或為便血並

皆治之

犀角鎊如無 生地黃 白芍藥

牡丹皮各一錢

右每服四五錢水煎若實熱熾甚加炒黃芩

若去血過多或脾肺之氣虧損不能攝血歸

源者急用四君子湯懷抱鬱結者用歸脾湯

枇杷葉散 治暑毒攻心衄血嘔血或吐瀉作

渴

香薷二錢 厚朴姜製一錢半 甘草炙

麥門冬心法 木瓜不見 白茅根各一錢

枇杷葉 陳皮 丁香各半錢

右末每服三五錢姜水煎

黃連香薷飲 治伏暑衄血便血不拘四時見

本卷第二論

小柴胡湯

加味小柴胡湯 二方見二十四卷第二論

歸脾湯

婦人良方卷七

三十一

加味逍遙散

八珍湯

加味歸脾湯 四方見二十四卷第四論

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

婦人吐血方論第六

婦人吐血者由臟腑傷損所致夫氣血外行於

經絡內榮於臟腑若六淫七情飲食起居有所

損傷行失常道逆則吐血也

愚按前若脾經鬱熱用犀角地黃湯脾胃

伏暑用黃連香薷飲心脾鬱熱用生地黃湯

心氣耗損用茯苓補心湯肺氣勞傷用鷄蘇散思慮傷脾用歸脾湯暴怒肝火用加味小柴胡湯久怒肝傷六味地黃丸脾肺虛熱用麥門冬飲肝腎虛熱用六味地黃丸氣血俱虛用十全大補湯經云肺朝百脉之氣肝統諸經之血必用甘溫之劑補其陽氣使血各歸其經如大吐血病母論其脉急用獨參湯救之若潮熱咳嗽而脉數者元氣虛而微熱之脉也皆由脾胃先損須用人參之類本草云人參治脾胃不足補中溫中瀉脾肺中火

婦食方卷七

十四

章

東垣先生云脾胃虛者心火亢甚而乘土位肺氣受邪須用黃芪最多人參甘草次之脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮毛而閉腠理營治氣血虛弱用十全大補最善若用寒涼止血胃氣反傷無不致禍

附治驗

老婦每作先飲食不進或胸膈不利或中脘作痛或大便作瀉或小便不利余以為肝脾之症用逍遙散加山柅茯苓神遠志木香而愈後爵結吐紫血每作先倦怠煩熱以前藥

加炒黑黃連三分吳茱萸二分頓愈復因吐赤血甚多燥渴垂死此血脫也法當補血乃用人參一兩苓朮當歸各三錢陳皮八黑乾薑各二錢炙甘草木香各一錢一劑頓止又用加味歸脾湯調理而痊

一女子懷抱素辭胸滿食少吐血面赤用六味丸及歸脾加山柅貝母芍藥而愈

一婦人為哭母吐血咳嗽發熱盜汗經水不行此悲傷肺思傷脾朝服補中益氣加桔梗貝母知母夕用歸脾湯送六味丸而愈

柔脾湯 治虎熱吐血衄血汗出

甘草 炒 白芍藥 炒 黃芪 各半

熟地黃 兩五錢

右每服五錢水酒煎○一婦人月經不利忽妄行嘔血察其形脉如常用四生丸即安

女子飽食負重而吐血用前湯及青餅子而愈世治吐血並用竹茹地黃藕汁亦不可向

况如陽乘於陰血得熱則流散經水沸溢理宜涼解大黃犀角之類如陰乘於陽所謂天寒地凍水凝成冰須當溫散乾姜肉桂之類

四生丸 治陽乘於陰以致吐血衄血

生荷葉 生艾葉 生栝葉

生地黃各等分

右研九雞子大每服一九水煎服陳日華云

先公嘗遊靈石寺主僧留飯設卓一僧見卓

不穩急俯穩之舉首即嘔血明年到寺問舊

嘔血者何如主僧言服得四生丸遂愈自得

此方屢治有效愚意前症乃內熱暴患用之

有効若人病久本元不足須補脾以滋化源

否則虛火上炎金反受尅獲生鮮矣

犀角地黃湯方見前

蓋草湯 若陰乘於陽寒而嘔血

甘草炒 乾姜各錢

右方煎服理中湯亦妙

花蘆石散 治瘀血積於內以致大小便不通

或血畜於上而吐不止一婦人苦吐血百藥

不効童便酒調不數服而愈方見胎衣不下

如聖散 治吐血不已每服二錢米飲下方見

卷催生 附方

濟生鷄蘇散 治勞傷肺經唾中有血咽喉不

利 鷄蘇葉 黃芪炒 生地黃

阿膠炒 貝母 白茅根各一分

桔梗炒 麥門冬去心 蒲黃炒

甘草炒各五分

右姜水煎服

生地黃散 治鬱熱衄血咯血吐血陰虛而不

能愈者

枸杞子 柴胡 黃連炒

地骨皮 天門冬 白芍藥炒

甘草炒 黃芩炒 黃芪炒

生地黃 熟地黃自製各五分

右水煎下血加地榆

三因茯苓補心湯 治面色黃瘁五心煩熱咳

嗽吐血

半夏 前胡 紫蘇

茯苓 人參 枳殼炒

桔梗炒 甘草炒 乾葛各五分

當歸錢 川芎 陳皮

白芍藥各一錢 熟地黃自製一錢五分

右姜棗水煎服

麥門冬飲子 治氣虛吐血或氣虛不能攝血

者

五味子粒十 麥門冬去心 黃芪炒各一錢

當歸身 人參 生地黃各半錢

右水煎服

十全大補湯 治胃氣虛弱吐血衄血便血不

止以致外症惡寒發熱自汗盜汗食少躄倦

或寒熱作渴頭疼眩暈而似中風或氣血俱

虛胸腹脇痛或骨節作痛經候不調或寒熱

往來發熱晡熱或五心發熱咽乾舌燥或痰

嗽喘促胸膈虛痞或嘔吐泄瀉手足冷熱等

症

歸脾湯

加味逍遙散 三方見二十四卷第四論

加味小柴胡湯 方見二十四卷第二論

六味丸

八味丸 二方見二十四卷第十一論

獨參湯 方見三卷十一論

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

黃連香薷飲

枇杷葉散 二方見本卷前

婦人痰癖諸氣方論第七

婦人痰癖因元氣虛弱而邪氣積聚蓋痰者在

腹內近臍左右有筋脈急痛如臂如指如絃之

狀癖者僻在兩肋之間有時而痛皆陰陽不和

經絡痞膈飲食停滯冷氣固結而成也

愚按前症因飲食起居七情失宜虧損臟腑

氣血垂違陰絡受傷循行失度所致羅謙甫

先生曰養正邪自除必先調養使榮衛充實

若不消散方可議下但除之不以漸則必有

顛覆之害若不守禁忌縱嗜慾其有不喪身

者鮮矣

附治驗

一婦人內熱作渴飲食少思腹內初如鷄卵

漸大四寸許經水三月一至肢體消瘦齒頰

似瘡脈洪數而虛左關尤甚此肝脾鬱結之

症外貼阿魏膏午前用補中益氣湯午後用

加味歸脾湯兩月許肝火少退脾土少健午

婦人食方卷七

婦人食方卷七

前以補中益氣下六味丸午後以逍遙散下  
歸脾丸又月餘日用蘆薈丸二服空心以道  
遙散下日晡以歸脾湯下喜其謹疾調理年  
餘而愈

一婦人腹內一塊不時上攻或作痛有聲或  
吞酸痞悶月經不調小便不利二年餘矣面  
色青黃余以為肝脾氣滯以六君加芎歸柴  
胡炒連木香吳茱萸各少許二劑却與歸脾湯  
下蘆薈丸三月餘肝脾和而諸症退又與調  
中益氣加茯苓丹皮中氣健而經自調

婦人良方卷七 三十一

一婦人性多鬱善怒勤於女工小腹內結一  
塊或作痛或痞悶月經不調恪服伐肝之劑  
內熱寒熱胸膈不利飲食不甘形體日瘦牙  
齦銹爛此脾土不能生肺金肺全不能生腎  
水腎水不能生肝木當滋化源用補中益氣  
六味地黃至仲春而愈

松江太守何恭人性善怒腹結一塊年餘上  
腭蝕透血氣虛極時季冬肝脉洪數按之弦  
緊或用伐肝木清胃火之藥余曰真氣虛而  
邪氣實也恐伐肝木至春不能發生耳用八

珍湯以生氣血用地黃丸以滋腎水肝脉頓  
退因大怒耳內出血肝脉仍大煩熱作渴此  
無根之火也仍以前藥加肉桂二劑脉欲熱  
退復因大怒果卒於季冬辛巳日乃金剋木  
故也

一歸人經候過期發熱倦怠或用四物黃連  
之類反兩月一度且少而成塊又用峻藥通  
之兩目如帛所蔽余曰脾為諸陰之首目為  
血脉之宗此脾傷五臟皆為失所不能歸於  
目也遂用補中益氣濟生歸脾二湯專主脾

婦人良方卷七 三十一

胃年餘而愈

麝香丸 治痰癖冷氣心腹作痛

麝香二錢 五靈脂炒 阿魏五錢 麝香另研 醋製

桃仁 三稜各二兩 芫花醋炒

檳榔各一 莪茂醋製 桂心

沒藥 木香 當歸各半

右為末飯丸桐子大每服十九淡醋湯下

治痰癖神効以豬猪肝一具重十餘兩用芑豆

仁五十枚入肝內用醃醋三碗慢火熬乾研

爛量入三稜末丸桐子大每服五丸食前熱

酒下

羅安人每經行臍腹痛甚以桃仁桂枝湯一劑

而瘥

方見第一卷十二論

治經來腹先痛用局方七氣湯送來復丹局方

積氣丸疝瘕癥瘕諸氣亦效

附方

蘆薈丸 治疳瘕肌肉消瘦發熱潮熱飲食少

息口乾作渴或肝疳食積口鼻生瘡牙齦腫

爛等症

蘆薈

胡黃連

黃連炒

木香

白蘘蕪炒

青皮各五錢

當歸

茯苓

陳皮各一兩五錢

甘草炒七錢

右為末米糊丸桐子大每服七八十九丸湯下

阿魏膏

治一切痞塊更服胡連丸

羌活

獨活

玄參

官桂

赤芍藥

川山甲

生地黃

兩頭尖

大黃

白芷

天麻各五錢

槐柳桃枝各三錢

紅花四錢

木鼈十枚去殼

亂髮如雞子一團

右用香油二斤四兩煎黑去粗入髮煎變化

仍去粗徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏

蘇合油乳香沒藥各五錢麝香三錢調勻即

成膏矣攤貼患處內服九藥黃丹須用真正

者効凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪半指厚

以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之

二時許方貼膏藥若是肝積加蘆薈末同熨

六君子湯

補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

八珍湯

婦人良方卷七

三三

加味歸脾湯

歸脾湯

逍遙散 四方見二十四卷第四論

六味丸 方見二十四卷第十一論

調中益氣湯 方見四卷第五論

婦人疝瘕方論第八

婦人疝瘕之病由飲食不調氣血勞傷或胎產

經行風冷相搏所致蓋疝者痛也瘕者作也脈

弦急者生虛弱者死尺脈滿浮牢為血實氣虛

腹痛逆氣上行此為胞中有惡血又則結成瘕也

愚按子和先生云遺漏閉癥陰疾疝痺精滑白淫皆男子之疝也若血滯月事不行行後小腹有塊或時動移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不謂之疝而謂之瘕

附治驗

一婦人小腹瘕脹小便時下白帶小水淋瀝此肝經濕熱下注用龍膽瀉肝湯而愈

一婦人小腹脹痛小水不利或胸乳作痛或

脇肋作脹或氣逆心吻余以為肝火而血傷

脾用四物柴胡青皮玄胡索木香而愈

一婦人小腹痞悶小便不利肉熱體倦懶食

用八瓊湯加柴胡山梔龍膽草治之而安

乾漆散 治疝瘕脇肋疼痛

乾漆炒令烟盡 木香 芫花醋炒

赤芍藥 桂心 當歸

川芎 琥珀各半兩 大黃二兩炒

牛膝一兩 桃仁兩另研

麝香一錢

右為末每服一錢溫酒調下

蟠葱散 治前症屬寒氣不散皮膚痛甚効方見

四卷第八論

附方

寶鑑茱萸湯 治陰疝小腹作痛小便不利手足逆冷或脇腹悶痛

茱萸刺去 附子炮

梔子去皮各半兩

右末每三錢水煎食前溫服

丹溪定痛散 治寒疝疼痛速効

枳殼十五箇 山梔子炒 唐菟子

吳茱萸過炒 荔枝核炮各等分

右末用長流水調下一二錢空心服

三因失笑散 治小腸疝氣痛或血疝肚腹作痛方見二十卷第五論

龍膽瀉肝湯 方見二十四卷第八論

四物湯 方見二十四卷第六論

八瓊湯 方見二十四卷第四論

婦人八瘕方論第九

婦人臟腑調和經脈循環則凡水以時故能生子而無病若乘外邪而合陰陽則小腹胸脇腰

痛

痛

痛

痛

背相引而痛月事不調陰中腫脹小便淋瀝面  
色黃黑則瘕生矣八瘕者黃青燥血脂狐蛇鱉  
是也千金外臺言之詳矣

愚按經曰氣主噓之血主濡之若血不流則  
凝而為瘕也瘕者中雖硬而忽聚忽散多因  
六淫七情飲食起居動傷臟腑而成常與瘵  
癖諸症治同慎不可復傷元氣

桃仁煎 治血瘕

桃仁

大黃炒各一兩 蜜蠶半兩炒黑

朴硝兩一

婦人良方卷七

三十九

右為末以醇醋一鍾石器中煮三分下煎三  
味不住手攪煎至可丸下朴硝丸桐子大不  
喫晚食五更初溫酒下五丸日午下穢物如  
未見再服仍以調氣血藥補之○向在毗陵  
一婦人小便不通臍腹脹甚予診之曰此血  
瘕也用前藥一服腹痛下血塊血水即愈此  
藥猛烈大峻氣血虛者斟酌與之

大硝石丸 治七瘕八瘕當用此藥去之不令

人困

一硝石兩三

大黃兩四

人參錢一

甘草分

右為末苦酒一升石器中先入大黃煎膏入  
餘藥九梧子大每服三十九米飲下三日  
服宜下赤物

婦人腹中瘵血方論第十

婦人腹中瘵血者由月經閉積或產後餘血未  
盡或風寒滯瘀久而不消則為積聚瘵瘕矣

愚按前症若鬱結傷脾用加味歸脾湯若恚  
怒傷肝用加味逍遙散若產後惡露用失笑  
散若肝脾虧損用六君柴胡以補元氣為主

婦人良方卷七

三十七

胃氣虛弱用益氣湯加茯苓半夏為主大凡  
腹中作痛畏手按者此內有瘵血若形體如  
常屬病氣元氣俱實用桃仁承氣湯直下之  
若痛而肢體倦怠飲食少思此脾胃受傷屬  
病氣有餘元氣不足用當歸散調和之若痛  
而喜手按腹形體倦怠飲食少思此形氣病  
氣俱不足用六君炮薑芎歸純補之若痛而  
大便不實飲食難化此脾腎虛寒用六君炮  
薑肉果溫補之若痛而作嘔少食此脾胃虛  
弱用六君炮薑藿香若痛而嘔吐不食泄瀉

用六君加姜桂若兼手足逆冷自汗更加附子此症多有因攻伐而致者

附治驗

一婦人耳下腫赤寒熱日苦月經不調小腹內一塊此肝火氣滯而血凝也用小柴胡加

山梔川芎丹皮治之諸瘕悉退

一婦人久患腹痛去瘀血方止而復大痛諸藥不納予以脾胃之氣虛寒用參木炮薑九

如黍每用數粒津嚙下後以二味濃煎漸呷而愈

婦人食方卷七

三八

桃仁丸 治瘀血不利月水不調發熱作渴心腹滿急或肚腹中作痛

桃仁

水蛭 炒焦各四十枚

大黃 炒各三四兩

蜚蠊 炒去翅足

右為末煉蜜丸桐子大每服五六丸空心熱

酒下

附方

桃仁承氣湯 治瘀血小腹急痛大便秘不利或

譫語口乾漱水不嚥遍身黃色小便自利或血結胸中手不敢近腹或寒熱昏迷其人如

狂

桃仁 兩半

大黃 兩半

甘草 二錢

肉桂 錢一

右薑水煎發日五更服

附方

加味歸脾湯 治瘀血已去或脾經失血小腹

作痛無寐發熱盜汗或脾傷不能攝血或心

脾傷痛嗜卧少食或憂思傷脾血虛發熱或

肢躄腫痛大便不調或經候不准晡熱內熱

加味逍遙散

二方見二十四卷第四論

三九

失笑散

方見二十卷第五論

六君子湯

補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

當歸散 方見後卷第五論

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

婦人癥痞方論第十一

婦人癥痞由飲食失節脾胃虧損邪正相搏積

于腹中牢固不動故名曰癥得冷則作痛冷入

子藏則不孕入胞絡則月水不通

愚按前症若脾胃虛弱用六君子加芎歸若

肝脾虛弱用補中益氣及歸脾湯若肝火剋  
滯佐以薑薈地黃二九外貼阿魏膏患者須  
慎七情六淫飲食起居治者不時審察病機  
而藥之庶幾有效

附方

川山甲散 治癥痞瘀血心腹作痛

川山甲 炭炒 鱉甲醋 赤芍藥

大黃 炒 乾漆地令 桂心各一

川芎 芫花醋 當歸尾 各半

麝香 錢一

三十一 婦人良方卷七 平

右為末每服一錢酒調下

六君子湯

補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

歸脾湯 方見二十四卷第四論

六味地黃丸 方見二十四卷第十二論

薑薈丸

阿魏膏 二方見本卷第七論

婦人食癥方論第十二

婦人食癥由臟腑虛弱經行不忌生冷飲食或  
勞傷元氣所致陳無擇云經不行者宜先導之

然後固元氣為主

愚按前症若形氣虛弱須先調補脾胃為主  
而佐以消導若形氣充實當先疏導為主而  
佐以補脾胃若氣壅血滯而不行者宜用烏  
藥散散而行之若脾氣虛而血不行者宜用  
四君芎歸補而行之若脾氣鬱而血不行者  
宜用歸脾湯解而行之若肝脾血燥而不行  
者宜用加味逍遙散清而行之大抵食積痞  
塊之症為有形蓋邪氣勝則實真氣奪則虛  
當養正闢邪而積自除矣雖然堅者削之客  
者除之胃氣未虛或可少用若病久虛乏者  
不宜輕用

烏藥散 方見後

婦人積年血癥方論第十三

婦人積年血癥由寒溫失節脾胃虛弱月經不  
通相結盤牢久則腹脇苦痛宜用三稜煎主之  
愚按前症多兼七情虧損五臟氣血乖違而  
致益氣主噓之血主濡之脾統血肝藏血故  
鬱結傷脾悲怒傷肝者多患之腹脇作痛正  
屬肝脾二經症也竊謂羅謙甫先生云養正

積自除東垣先生云人以胃氣為本治法宜固元氣為主而佐以攻伐之劑當以歲月求之若欲速效投以峻劑反致有誤右七症方藥當互相參用

附方

三稜煎 治血癥血痕食積痰滯

莪木 兩各三 青皮白

半夏 麥芽炒各一兩

右用好醋一鍾煮乾焙為末醋糊丸桐子大每服三四十九淡醋湯下痰積薑湯下

婦人血氣心痛方論第十四

婦人血氣心痛方論第十四

婦人血氣心痛由臟腑虛弱風冷所乘蓋心為諸臟之主若心受傷名真心痛朝發夕死夕發旦死若心絡傷故痛發乍輕乍甚而成斯症也愚按前症若寒邪所傷溫散之飲食停滯消導之肝火妄動辛平之脾氣鬱結和解之仍與後六症方藥同用

附治驗

一婦人久患心痛飲食少思諸藥到口即吐予以為脾土虛弱用白朮一味同黃土炒去

土每服一兩以米泔煎濃徐服少許數日後自能大飲用三斤餘而安

上舍陳履學長子室素怯弱產後患赤瘡年餘不愈因執喪旬月每欲收什一日感氣忽

患心脾高腫作疼手不可按而嘔吐不止六

脉微細或見其形實誤認諸痛不可稱氣乃

用青皮木香五味吳茱萸等藥而愈繼復患

瘡且墮胎又投理氣行血之藥病雖去元氣

轉脫再投參芪補劑不應矣六脉如絲欲絕

迎予至診之曰形雖實而脉虛極反用理氣

之劑損其真氣故也連投參芪歸朮附子薑

桂二劑間用八味丸五日寢食漸甘六脉全

復此症若心脾疼痛時即服此等藥瘡亦不

作矣

附方

烏藥散 治血氣壅滯心腹作痛

烏藥 義茂 醋浸 桂心

當歸 桃仁 青皮

木香 各等分

右為末每服二錢熱酒調下

靈苑方 用生五靈脂為末每服一錢沸湯下

日三服

八味丸 方見二十四卷第十一論

婦人血氣心腹疼痛方論第十五

婦人血氣心腹疼痛由臟腑虛弱風邪乘之真邪相搏隨氣上下故心腹作痛也

愚按前症若氣滯血瘀用沒藥散勞傷元氣

用益氣湯肝脾鬱結用四七湯怒動肝火用

小柴胡湯肝脾血虛用四物湯脾肺氣虛用

四君子湯中氣虛弱用補中益氣湯氣血俱

虛用八珍湯

婦人良方卷七

四十四

附治驗

一婦人每怒心腹作痛久而不愈此肝火傷

脾氣也用炒山梔一兩生薑五片煎服而痛

止史以陳加山梔桔梗乃不發

一婦人懷抱鬱結不時心腹作痛諸藥不應

用歸脾湯倍加炒山梔而愈

陳湖陸小村母久患心腹疼痛每作必胸滿

嘔吐手足俱冷面赤唇麻咽乾舌燥寒熱不

時月餘竟夕不安其脉洪大衆以痰火治之

屢止屢作迨乙巳春發頻而甚仍用前藥反

劇此寒涼損真之故內真寒而外假熱也且

脉息洪弦而有怪狀乃脾氣虧損肝木乘之

而然當溫補胃氣遂用補中益氣湯加半夏

茯苓吳茱萸木香一服熱寐徹曉洪脉頓斂

怪脉頓除諸症釋然

附方

琥珀散 治氣滯心腹撮痛或月經不行小腹

疼痛

烏藥

莪茂醋浸炒當歸各二兩

三金

婦人良方卷七

四十五

作

右為末每服二錢溫酒調下

綱痛散 治血氣刺痛

荔枝核

燒存性

香附子一兩

右為末每服二錢鹽酒調下

芎藭丸

治血積心脾作疼男六德

九節芎藭

六兩吳茱萸炒香附子各四兩

右為末醋調神麩糊丸桐子大每服四五十

丸淡薑湯調下

沒藥散

治血氣不行心腹作痛或行注疼痛

或月經不調發熱暗熱並宜用之

紅花 沒藥 當歸

玄胡索 妙各 特分

右為末每服二錢童便酒調下

木香枳木丸 破滯氣消飲食開胃進食消化

痰涎

木香 枳實 妙各 一兩 白木 二兩

右每服五錢薑棗水煎服

木香化滯湯 治脾胃虛弱飲食停滯腹脹作

痛或心下痞滿不思飲食若憂怒飲食而致者尤宜用之

三十 婦人良方卷二 甲二 作

木香 紅花 各三錢 橘皮

當歸 稍各二錢 柴胡 四錢 草豆蔻

甘草 炙半兩 半夏 一兩 枳實 妙二兩

右每服三五錢薑水煎服

補中益氣湯

四君子湯

四物湯 三方見二十四卷第六論

四七湯 方見十一卷第七論

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

八珍湯

歸脾湯 二方見二十四卷第四論

二陳湯 方見二十四卷第五論

婦人血氣小腹疼痛方論第十六

婦人小腹疼痛由胞絡受冷搏於血氣結於小腹因虛發動故痛也

愚按前症若氣寒血結用葳靈仙散氣滯血

凝用當歸散肝經血虛用四物湯加參木柴

胡肝經濕熱用龍膽瀉肝湯肝脾氣虛用六

君子湯加柴胡芍藥肝脾虛寒用六君子湯

加柴胡肉桂若兼嘔吐加木香四服逆冷再

二聖 婦人良方卷七 甲七 作

加炮薑

附治驗

通府張孟威云其妹小腹痛服附子理中湯

附子服過八十餘枚此乃沉寒痼冷之甚不

多有者

附方

葳靈仙散 凡冷氣滯血小腹疼痛或經行遇

怒腹脹痛宜用之

葳靈仙 一兩 當歸 沒藥

木香 桂心 各半兩

右為末每服一錢熱酒調

當歸散 凡血積小腹疼痛或因氣逆月經不

行肚腹作痛

當歸炒

赤芍藥

劉寄生

沒藥

枳殼炒

玄胡索炒各

時分

右為末每服一錢熱酒調下

四物湯

六君子湯

二方見二十四卷第六論

龍膽瀉肝湯

方見二十四卷第八論

附子理中湯

方見二十一卷第九論

婦人

婦人兩脇脹痛方論第十七

婦人

婦人兩脇脹痛因臟腑虛弱氣血不調風冷客

於胞絡相搏壅塞故也

愚按東垣先生云胸脇作痛口苦舌乾寒熱

往來發嘔發吐四肢滿悶淋洩便難腹中急

痛此肝木之妄行也竊謂前症若暴怒傷血

用小柴胡芎歸山梔氣虛用四物參朮柴梔

若火怒傷氣用六君芎歸山梔若氣血俱虛

用六味地黃丸若經行腹痛寒熱晡熱或月

經不調發熱痰咳少食嗜臥體痛用八珍柴

胡丹皮若脇脹發熱口渴唾痰或小便淋瀝

頭項結核或盜汗便血諸血失音用六味丸

若兩脇作脹視物不明或筋脉拘急面色青

小腹痛或小便不調用補肝散若槩用香燥

之劑反傷清和之氣則血無所生諸症作焉

丹溪先生云右脇痛用推氣散小龍薈丸當

歸龍薈丸控涎丹抑青丸十棗湯皆病氣元

氣俱實之劑用者審之

附治驗

一婦人性急吐血發熱兩脇脹痛日晡益甚

此怒氣傷肝氣血俱虛也朝用逍遙散倍加

炒黑山梔黃栢貝母桔梗麥門冬夕以歸脾

湯送地黃丸而愈

一孀婦內熱晡熱肢體痠麻不時吐痰或用

清氣化痰藥喉間不利白帶腹脹用行氣散

血藥胸膈不利肢體時麻此鬱怒傷肝脾而

藥益甚也予則朝用歸脾湯以解脾鬱生脾

氣夕用加味逍遙散以清肝火生肝血百餘

劑而愈後因怒飲食日少肢體時麻此乃肝

火侮土用補中益氣加山梔茯苓半夏而痊

三

一

三

一

又飲食失調兼有怒氣肢體麻痺其月經加注  
脉浮洪而數此脾受肝傷不能統血而致崩  
肝氣虧損陰血而脉大繼用六君加芎歸炮  
薑而血崩止又用補中益氣加炮薑茯苓半  
夏而元氣復更用婦脾湯逍遙散調理而康  
附方

戴靈仙散 治冷氣血滯兩脇作痛方見前

人參紫荊皮散 治心腹刺痛胸膈飽滿不進  
飲食

紫荊皮 蒼朮 石菖蒲各一兩

婦人良方卷七 五十一

香附子二兩 人參半兩 木香三錢

右為末米糊丸桐子大每服三十九食後薑  
湯下

左金丸一名四金丸 治肝火胸脇脹痛或發寒熱或

頭目作痛或大便不實或小便淋秘或小腹  
疼痛及一切肝火之症

黃連炒六兩 吳茱萸片時用

右為末粥丸白木陳皮湯下

當歸龍薈丸 治肝經實火胸脇脹痛或大便

秘結小便澀滯凡屬肝經實火皆宜用之

當歸 龍膽草炒 梔子仁炒

黃連炒 黃芩炒 大黃炒

蘆薈 青黛各五錢 木香五分

麝香另研五分

右為末用神麴糊丸桐子大每服二十九薑  
湯下

補肝散 治肝腎二經氣血虧損脇脹作痛或

脇脹頭暈寒熱發熱或遍身作痛經候不調

山茱萸肉 當歸 五味子炒

山藥 黃芪炒 川芎

婦人良方卷七 五十二

木瓜各半兩 熟地黃自製 白木炒 各一錢

獨活 酸棗仁炒 各四錢

右為末每服五錢棗水煎服

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

四物湯

補中益氣湯

六君子湯 三方見二十六卷第六論

六味丸 方見二十四卷第十一論

八珍湯

逍遙散

歸脾湯

加味逍遙散

四方見二十四卷第四論

婦人心腹脹滿方論第十八

婦人心腹脹滿由心脾虛損邪氣乘之此足少陰腎經之脉起於足小指貫腎絡膀胱入肝肺出絡於心若邪搏三經併結於脾脾虛則心腹脹滿矣

愚按前症脾胃虛痞用六君子湯脾胃虛寒

者用人參理中湯鬱結氣滯者用婦脾湯肝

侮俾土用六君柴芍脾氣壅滯用平胃散肺

氣壅滯用紫蘇飲宿食壅滯用養胃湯脾血

虛痞用四物參朮右六症當互相參用仍

附治驗嘔吐心腹痛見

一婦人胸膈不利飲食少思腹脹吞酸或用

疎利之藥反致中滿不食予以為脾土虛而

肝木勝用補中益氣湯加砂仁香附煨薑又

以六君子加芎歸桔梗而愈

吳江史玄年母久病之後遇事拂意忽胸腹

脹滿面目微腫兩腿重滯氣逆上升言語喘

促所服皆清氣之劑不効予曰此脾肺虛寒

也先用六君子湯一劑病勢頓減後用補中

益氣加茯苓半夏乾薑二劑形體頓安後以

七情失調夜間腹脹乃以十全大補加木香

治之而痊

附方

白朮散 治脾胃氣滯心腹脹滿不欲飲食

白朮炒 草果 一 呵子

茯苓 檳榔 桂心各五

陳皮 厚朴製美 人參各一

甘草炒三

婦人良方卷七

五十三

右薑棗水煎服

愚按前方治胸膈氣滯飲食內停之良劑若

脾血虛痞須用四物參朮脾氣虛痞須用四

君芎歸

補遺治心腹脹滿予嘗獨用厚朴薑汁炒每服

五錢薑七片水煎溫服不拘時候間服沉香

降氣湯得効此疝氣元氣壅實之治法也

附方

平胃散 治脾氣壅滯胸腹不利或飲食不進

停滯嘔吐

蒼木

厚朴姜製

陳皮各一分

甘草炙五分

右薑棗水煎服

人參養胃湯 治脾胃氣壅滯胸膈不利或飲食

壅滯胸膈脹悶或兼外感風寒頭痛嘔吐等

症方見二十一卷第九論

四物湯

六君子湯

補中益氣湯 三方見二十四卷第六論

人參理中湯 方見二十卷第八論

十全大補湯 方見二十四卷第四論

歸脾湯 方見十二卷第八論

紫蘇飲 方見四卷第九論

調中益氣湯 方見四卷第九論

婦人良方卷之七

婦人良方卷之八

臨川陳自明良甫編

吳郡後學薛己校註

婦人小便淋瀝不通方論第一

婦人淋瀝由腎虛而膀胱熱也蓋膀胱與腎為

表裏主於水行於脬者為小便也若腎虛則小

便頻數膀胱熱則小便淋瀝甚則不通腹脹喘

急當速治之

愚按前症若膀胱熱結用五淋散若脾肺虛

熱用補中益氣湯加山藥五味麥門若脾經

鬱熱用加味歸脾湯若肺經鬱火用黃芩清

肺飲若肝經濕熱用龍膽瀉肝湯血虛用加

味逍遙散陰虛用六味丸加柴胡山梔大抵

不渴而不利者熱在下焦血分也用滋腎丸

渴而不利者熱在氣分也用清肺飲尺脈數

而無力者陰火盛而陽不能化也用六味丸

滋腎丸為主尺脈浮而無力者陽氣虛而陰

不能生也用加減八味丸滋腎丸為主

附治驗

一婦人素有前患內熱體倦余以為肝火血

少脾氣虛弱用八珍湯而氣血復  
小便利又用八珍湯而氣血復

一婦人患前症面青胸脹諸藥不應予以為  
肝經氣滯而血傷用山梔川芎煎服而愈

一婦人小便不利小腹并水道秘悶或時腹  
脇脹痛余以為肝火用加味逍遙散加龍膽

草四劑稍愈乃去膽草佐以八珍散加炒黑  
山梔煎服而瘥

石韋湯 治小便實熱氣滯淋瀝

石韋 黃芩炒 木通

婦人良方卷八

榆白皮 葵子 藿麥

甘草 各五分

右薑水煎服

鷄蘇散 治血熱淋瀝

鷄蘇葉 木通 各二兩 生地黃

滑石 各三兩 刺薊根 一兩

右每服半兩淡竹葉三七片水煎

桃仁煎 治血瘦小便如淋臍腹脹痛方見血

七卷第  
九論

火府丹 治心經積熱小便澁及五淋加甘草  
各半升

散

生地黃二兩 竹膏 木通 各 黃芩炒 各

右加蜜九桐子大每服三十九木通煎湯

○許學士云一卒病渴日飲水手許不食者

三月心中煩悶時已十月余謂心經有伏熱

與火府丹數服越二日來謝云當日一服渴

止又三服飲食如故此本治淋用以治渴可

謂通變也

一方牛膝一合水煎入麝香少許服之郵縣耿

武尉夢得其內患淋下砂石剝剝有聲甚為

婦人良方卷八

苦楚一服而愈

附方

滋腎丸 治熱在血分不渴而小便不利或腎

虛足熱腿膝無力不能履地又下焦陰虛小

便不利肚腹腫脹或皮膚脹裂眼睛突出此

神劑也

知母酒炒 黃栢酒炒 各 肉桂二錢

右各另為末水丸桐子大每服二百丸空心

百滾湯下

黃芩清肺飲 治肺熱小便不利宜用此藥清

之

黃芩炒 山梔炒各一錢

右水煎服不利加鹽豉二十粒

五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不出或

尿如豆汁或成砂石或如膏汁或熱拂便血

赤茯苓一錢 赤芍藥一錢 山梔各一錢

當歸甘草各一錢

右入燈心水煎服

補中益氣湯方見二十四卷第六論

八珍湯

婦人良方卷八 四 章

加味歸脾湯

加味逍遙散三方見二十四卷第四論

龍膽瀉肝湯方見二十四卷第八論

加減八味丸

六味丸二方見二十四卷第十一論

婦人脬轉小便不利方論第二

婦人脬轉或內熱傳搏於胞或忍小便氣逆於

內以致小腹急痛不得小便甚者至死

愚按前症不問男女孕婦轉筋小便不利命

在反掌非八味丸不能救餘參前後論主治

附治驗 餘見第十五卷

一婦人小便淋瀝小腹脹悶胸滿喘急諸藥

不應念視為轉筋之症用八味丸一服小便

如湧而安

一婦人因鬱怒小便滴瀝漸至小腹腫脹痰

咳喘促余用八味丸料煎服小便即釋而痊

一婦人素善怒小便淋瀝不利月經不調半

載矣或兩脇脹悶或小腹作痛或寒熱往來

或胸乳作痛或咽喉噎塞或兩腳筋攣或肢

節結核面色青黃不澤形氣日瘦左關弦洪

右關弦數此鬱怒傷肝脾血虛氣滯為患朝

用加味歸脾湯以補脾氣解脾鬱祛肝火夕

用滋腎丸生肝散滋腎水以生肝血抑肝火

舒筋膜兼服月餘而愈

滋腎生肝飲

山藥

山茱萸肉各一錢 熟地黃自製二錢

澤瀉 茯苓 牡丹皮各七分

五味子杵炒五分 柴胡三分 白朮

當歸 甘草三分

右水煎服

葱白湯 治氣滯小便不通腹脹欲死

橘皮兩三 葵子兩一 葱白莖一

右水煎分三服

八味丸 治脬轉小便不通殊有神効但世所

不用以致誤人多矣方見二十四卷第十一篇

滑石散 治脬轉小便數日不通

滑石兩一 寒水石兩二 葵子合一

右為末以水一斗煮至五升時服一升即利

又方

亂髮燒灰 葵子 車前子各等分

右為末每服二錢酒調下方見

石韋湯 治脬轉小便不通方見

治強忍小便致脬轉尿不利因篤欲死

滑石兩二 亂髮灰一

右為末每服三錢桃白朮一觔細切熟杵入

水三盞絞取汁調服

千金翼用杏仁七粒去皮尖炒黃芩細水送下立

通

一方皂角為末吹鼻內取嚏

婦人小便數方論第三

小便乃腎與膀胱主之蓋腎氣通於陰若二經虛而熱乘之則小便澀滯虛則頻數也

愚按前症若肝經火動用逍遙散加龍膽草車前子膀胱火動六味丸加麥門五味肝腎

濕熱龍膽瀉肝湯鬱傷肝脾加味逍遙散加味歸脾湯肝脾肺氣虛補中益氣加麥門五

味肝經血虛加味逍遙散腎氣虛敗鹿茸散如不應用八味丸

附治驗

一婦人患前症小便頻數日晡熱甚此肝脾

血虛氣滯而蒸濕熱也用加味逍遙散加車

前子而愈

一婦人患前症發熱煩躁面目赤色脈洪大

而虛余謂此血虛發躁用當歸補血湯數劑

而痊

一婦人久患前症泥屬於火雜用寒涼止血

之劑虛症悉具余曰此脾胃虧損而諸經病

也當補中氣為主遂以六君補中二湯煎服

兩月餘尋愈

桑螵蛸散 治腎氣虛寒小便數少或時頻數

婦人良方卷八 六

婦人良方卷八 七

或夜間尤數

桑螵蛸三十枚 鹿茸炙

牡蠣煨

甘草炒二兩 黃芪炒

右為末每服二三錢食前空心用薑湯調下  
日二服

縮泉丸 治脬氣虛寒小便頻數或遺尿不止

小兒尤効

烏藥 益智仁分

右為末酒煎山藥末為糊九桐子大每服七

十九盞酒或米飲下

鹿茸散 治腎氣虛寒便溺數甚或夜間頻數

遺溺

鹿茸炙 烏賊魚骨 桑寄生

當歸 龍骨煨各二兩 白芍藥炒

附子炮各三錢 桑螵蛸炙各五錢

右為末每服二錢空心并食前用溫酒調下  
作九服亦可凡用附子重一兩二四錢底平

頂圓周圍有瓣者方是

附方

當歸補血湯

八味丸

六味丸

加減八味丸 四方見二十四卷第十一論

逍遙散

加味逍遙散

加味歸脾湯 三方見二十四卷第四論

六君子湯

補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

婦人遺尿失禁方論第四

經云膀胱不利為癰不約為遺溺乃心腎之氣

失其常度也故有便道溢而遺者有失禁而不

知自遺者亦有生產傷膀胱不時而遺者有脬

寒臟冷遺而不知者

愚按內經曰胞移熱於膀胱則癰溺血膀胱

不利為癰不約為遺溺注曰膀胱為津液之

府水注由之然足三焦脈實約下焦而不通

則不得小便足三焦脈虛不約下焦則遺溺

也靈樞經曰足三焦者太陽之別也並太陽

之正入絡膀胱約下焦實則閉癰虛則遺溺

竊謂前症若肝腎虛熱挺孔痠痺用六味丸

如不應用加減八味丸陽氣虛憊膀胱積冷用鹿茸丸如不應用八味丸若脾氣虛弱不能禁止用補中益氣湯加山藥山茱五味若肺氣虛寒前湯加桂附此症屬虛熱者多真寒者少治宜審察

附治驗 附小便遺尿

一婦人小便自遺或時不利日晡益甚此肝熱陰挺不能約制用六味丸料加白朮酒炒黑黃柏七分知母五分數劑諸症悉愈若誤用分利之劑愈損真陰必致不起

百六 婦人良方卷八 十一

一老婦患前症惡寒體倦四肢逆冷余以為陽氣虛寒用補中益氣加附子三劑不應遂以參附湯四劑稍應仍以前藥而安附子計用四枚人參三斤許

一婦人病愈後小便出尿此陰陽失於傳送名大小腸交也先用五苓散二劑而愈又用補中益氣湯而安

鹿茸丸 治陽氣虛寒小便白濁滑數不禁或

臍腹陰冷大便不實

鹿茸 炙 椒紅 桂心

附子炮 牡蠣煨 補骨脂炒

石斛 肉蓯蓉酒 雞肫脰炙

沉香各一 桑螵蛸炙

右為末酒糊丸桐子大每服三十九空心溫酒下

秘元丹 治陽氣虛小便不禁或夜多小便頻數

白龍骨兩 訶子十箇 縮砂去皮

右為末糯粥丸桐子大每服五十九空心溫酒下

又方鹿角鎊炒為末每服三五錢空心熟酒調下

又方雞肫脰炙為末每服二三錢空心酒調下

日二三服

又方桑螵蛸酒炒為末每服二錢空心薑湯調下

附方

六君子湯

補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

六味丸



右每服二錢以米醋湯調服

生地黄散 治血熱小便出血

生地黄二錢 黃芩炒五錢 阿膠炒

栝葉炒各一錢

右水煎服

當歸散 治血分有熱小便出血或時尿血

當歸 羚羊角錢 赤芍藥各半錢

生地黄 刺薊葉各一錢

右水煎服

又方治血分有熱用生地黄杵取汁每用一小

蓋日三服

又方治血分有熱小便尿血用炒蒲黃末每服

二錢溫酒調下滾湯亦下

又方腎虛鹿角膠二兩炙黃芩末作二服長流

水調

附方

八珍散

加味逍遙散

歸脾湯三方見二十四卷第四論

子芩丸方見十二卷第六論

清胃散方見二十四卷第一論

四君子湯

補中益氣湯二方見二十四卷第六論

婦人大便不通方論第六

夫大便不通者由臟腑不調寒熱之氣結於腸

胃或經水過多內亡津液宜用三拗散或四物

加青皮或七宣丸麻仁丸選而用之

愚按前症或大腸津血乾涸或血虛火鑠不

可計其日期飲食數多必待腹滿脹自欲去

而不能者乃用猪膽汁潤之若妄服苦寒辛

散之劑元氣愈傷或通而不止或成中痞之

症大抵血虛火燥用加味逍遙散氣血俱虛

用八珍湯燥藥傷血用四物連翹甘草剋伐

傷氣用四君川芎當歸內熱作渴飲湯脈實

用竹葉黃芪湯內熱作渴飲冷脈瀆用四物

送潤腸丸肝膽剋脾土而不能輸送用小柴

胡加山梔郁李仁腸胃氣虛而不能傳送用

補中益氣加芍藥厚味積熱而秘結用清胃

散加芍藥其有熱燥風燥陽結陰結皆不宜

損中氣治者審之

婦食方卷八 十五

附治驗

一婦人痰喘內熱大便不通兩月不寐脉洪  
大重按微細此屬肝肺腎虧損朝用六味丸  
夕用逍遙散各三十餘劑計所進飲食百餘  
碗腹始痞悶正前所謂血虛火鑠也以猪膽  
汁導而通之用十全大補湯調理而安  
通神散 治大便秘熱不通其證心腹脹痛手  
不得近心胸煩悶而欲飲食者

大黃炒

芒硝

檳榔

桃仁并

郁李仁湯浸去皮微炒各一兩

右為末每服二錢粥飲調

大便秘而欲飲食者

大黃別研如膏

檳榔

木香

枳殼一兩

右為末入麻仁煉蜜丸桐子大每服二十九

溫水下

皂角丸 治大腸經有風大便秘結而不堅實者

者

皂角子炙去

枳殼等分

飲下

右為末煉蜜丸桐子大每服七十九空心米

蘇麻粥順氣滑腸用紫蘇子麻子仁水研取汁

潤腸丸 治伏火風熱大腸乾燥若因失血或

因腎虛當滋腎水最忌此丸

麻子仁

桃仁去皮尖另研各一兩

羌活

當歸尾

大黃煨

皂角仁

秦艽各五錢

右另研為末煉蜜丸每服五十九空心白湯

送下如直腸乾澀用猪膽汁導之亦忌前藥

附方

加味逍遙散

八瓊湯 二方見二十四卷第四論

補中益氣湯

四物湯

四君子湯 三方見二十四卷第六論

竹葉石膏湯 方見十三卷第十論

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

清胃散

方見二十四卷第一論

瘡科竹葉黃芪湯方見二十四卷第四論

婦人老弱風人便秘戒用利藥方論第七

初虞世云肺主氣肺氣不降則大腸不能傳送宜用杏仁枳殼訶子等藥若老弱風人津液短少大便秘澀用胡麻杏仁麻仁阿膠皂角之類每見用駛利之藥大便雖通精血復傷反致他病一男子病風淫末疾或用駛藥利之患肺痿咯膿血至大便不通而死惜哉

愚按前症若胃強脾弱津液不得四布但輸膀胱小便數而大便難者用脾約丸若陰血

枯槁內火燔灼脾肺失傳大便秘而小便數

者用潤腸丸此丸若用之於熱甚氣實與西北稟厚者無有不効若用於東南及虛熱而氣血不足者則脾愈弱而腸愈燥反致虛痞矣此東垣先生之治法也其搜風順氣丸中貴及西北人用之多効東南人用之無不致害

附治驗

一老婦大便欲去而難去又不堅實腹內或如故或作脹兩關尺脉浮大余以為腸胃氣

血虛弱每服十全大補湯加肉苳蓉去後始快若間二三日不服腹內仍脹大便仍難

搜風順氣丸 治痔漏腸風風熱閉結元氣克

實者

車前子一兩 大麻子微 大黃五錢半

牛膝酒 郁李仁湯 兔絲子酒浸蒸

枳殼炒 山藥各二錢

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九空心白

湯送下

子和脾約丸

麻仁錢半 枳殼炒 厚朴薑

芍藥各一兩 大黃四兩 杏仁去皮尖炒

右為末入杏仁膏煉蜜丸梧子大每服三二

十九空心用滾湯送下內杏仁研爛

婦人泄痢秘結方論第八

經云春傷於風夏必飧泄蓋木刑土也土不能

滲泄則木氣勝故津液燥而秘不可專以風治

張氏母年七十患痢頻數腰脚拘攣百方不愈

用蒺藜酸棗仁治之即愈黃魯直苦秘結亦用

前藥而愈故受症有不同也

婦人良方卷八

婦人良方卷八

愚按前症若因足三陰虧損發熱作渴胸膈不利飲食善消面帶陽色脈洪而虛肢體倦怠者用補中益氣湯六味地黃丸脾肺氣虛補中益氣湯脾經鬱結用加味歸脾湯氣血俱虛者八珍加肉蓯蓉腎經津液不足者六味地黃丸胃火消鑠津液竹葉黃芪湯肝木侮脾土小柴胡加山梔郁李仁枳殼膏梁積熱清胃散加山梔郁李仁枳殼若燥在直腸用豬膽導之

附治驗

一老婦大便月餘不通痰喘內熱不得就枕脈洪大重按微細朝用六味丸夕用逍遙散各五十餘劑計進飲食百餘碗小腹始闕此火燥而消鑠也以豬膽汁潤之用十全大補而安後仍不通用八珍倍加蓯蓉常服而通治風人大便秘

皂莢子二百粒破作兩片煨火炒燥入酥  
度一葉大又炒燥又入酥至焦黑為

右為末蜜丸桐子大每服三十九煎蒺藜酸囊仁湯空心下良久未利再服漸加至百九

以通為度

蒺藜湯用蒺藜炒杵去刺三兩酸棗仁炒香一兩每用五錢水一盞煎七分去滓送下前九大五柔丸治臟氣不調大便難利或為秘結堅硬

大黃飯上蒸枳殼去穢白芍藥末

葶藶炒為末牛脂熱攪酒浸端

桃仁百枚去皮尖研杏仁炒黃別研

右和勻煉蜜丸桐子大每服三十九日服以和為度

以和為度

二仁丸 安康郡太守苦風秘乎處此方用之甚効

杏仁去皮尖麻仁別枳殼去穢

訶子炒去核

右用煉蜜丸桐子大每服三十九溫水下未利增之

蜜允法用好蜜四五兩罈器中微火熬不住手攪候可丸以蛤粉塗手捏如指長三寸許入大孔內以手掩良久即通未通再作文潞公泄利求速効用石脂龍骨等藥便秘累日甚

苦余告曰此燥糞在直腸藥所不及請以蜜導之下結糞四五十枚而愈

通氣散 治虛人憂怒以致傷肺與大腸不能

傳送

陳皮 蘇葉 枳殼 炒

木通 各一錢

右水煎服

皂角丸 蘇麻粥亦佳 見前

附方

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

六味丸 方見二十四卷第十一論

加味歸脾湯

八珍湯

逍遙散

加味逍遙散

十全大補湯 方見二十四卷第四論

竹葉黃芪湯 方見二十四卷第二論

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

清胃散 方見二十四卷首論

婦人泄瀉方論第九

論曰泄瀉之症因腸胃虛冷兩邪氣乘之經云春傷於風夏必殮泄蓋風傷肝肝木旺而剋脾土屬外因也若七情不平臟氣受傷屬內因也若飲食生冷傷脾屬不內外因也大法寒者溫之熱者涼之滑者澀之濕者燥之

愚按前症若生冷所傷用六君木香砂仁辛熱所傷用二陳炒連山柅麵食所傷用六君神麵米食所傷用六君穀藥飲食不時而傷用四君子湯飲食過多而傷用六君子湯飲食停滯人參養胃湯脾氣虛弱者六君升麻

婦人方卷八

柴胡脾氣虛寒六君木香炮薑肝木乘脾者六君柴胡芍藥肝火剋脾者六君芍藥山柅

中氣虛而下陷者補中益氣湯鬱結傷脾者濟生歸脾湯腎氣虛者五味子散脾氣虛者

二神九脾腎虛者四神丸命門火衰者八味丸真陽虛敗者固真丸仍與滯下方參用

附治驗

侍御沈東江之內停食腹痛作瀉以六君加

木香炮薑而愈後復作傳為腎泄用四神丸

而安

而安

侍御徐南湖予室瀉屬腎經不信余言專主  
滲泄以致不起

一婦人年踰五十不食夜飯五更作瀉二十  
年矣後患痢午前用香連丸午後用二神丸  
各二服而痢止又以二神丸數服而食夜飯  
不月而形體如故

吳江史玄年母素有血疾殆將二紀平居泄  
瀉飲食少思面黃中滿夏月尤甚治血之藥  
無慮數百劑未嘗少減余以為脾胃虛損用  
補中益氣湯送二神丸復用十全大補湯煎

送前丸食進便實病勢頓退若泥中滿忌參  
朮痰痞忌熟地便泄忌當歸皆致誤事

桂香丸 治虛寒滑泄腹痛或嘔吐不食手足  
逆冷

附子炮 肉苳蔻炮 丁香

桂心 白茯苓各一木香炮

白乾薑炮各兩半

右為末米糊丸桐子大每服五十九空心米

飲下

胃本散 治脾胃所傷吐瀉不止水穀不分即

五苓散合平胃散

右每服五七錢用薑棗水煎空心服仍節飲

食

木香散 治臟腑虛寒下泄米穀口舌生瘡或  
嘔吐不食

木香 煨 破故紙炒各一兩良薑

縮砂炒 厚朴製各三錢 赤芍藥炒

橘紅 桂心 白朮各半兩

胡椒 吳茱萸一錢 肉豆蔻煨

檳榔箇

右為末每服三錢用猪肝四兩批薄以藥摻  
拌量入水醋鹽葱薑煮乾空心頓食或丸桐  
子大每服百九粥飲下日三服○府博趙宜

人患泄瀉諸藥無効診之曰此肝腎虛也服  
前散而愈經曰洩痢前後不止腎虛也又曰  
諸厥固泄皆屬於下下謂下焦肝腎之氣也

門戶東要肝之氣也肝氣厥而上行故下焦  
不能禁固而泄痢腎為胃關門戶不要故倉

廩不藏也

香連丸 治痢疾并水瀉暑瀉腹痛不問赤白

神効

黃連淨二 吳茱萸去枝

右先將二味用熱水拌和入磁器內置熱湯

頭一日同炒至黃連紫黃色去茱萸用連為末

每末四兩入木香末一兩淡醋米飲為丸桐

子大每服二三十丸滾湯下久痢中氣下陷

者用補中益氣下中氣虛者用四君子下中

氣虛寒者加薑桂

三黃丸 治熱痢腹痛或口舌生瘡咽喉齒痛

及一切實火之症

黃芩 黃連

右各另為末水糊丸桐子大每服七八十九

白湯下

芍藥湯 治熱痢便血後重經曰洩而便膿血

此氣行而血止也行血則便自愈調氣則後

重自除

芍藥炒 當歸

檳榔 木香

桂二錢 黃芩炒

右每服半兩水煎如不減加大黃此症多有

因中氣虛弱脾氣鬱結者治當審察

二神丸加五味二兩吳茱萸 治脾胃虛弱晨五

更作瀉或全不思食或食而不化大便不實

神効

破故紙四兩 肉豆蔻二兩

右為末用大紅棗四十九枚生薑四兩切碎

同棗用水煮熟去薑取棗肉和藥丸桐子大

每服五十九丸空心鹽湯下

五味子散 治腎經虛弱大便不實或夜間或

五更泄瀉

五味子炒 吳茱萸半兩

右為末每服二錢空心米飲調下其効如神

米糊為丸亦可

白朮芍藥湯 治脾經受濕水泄注下體重腹

滿形體倦怠不欲飲食或暴泄無數水穀不

化

白朮炒 芍藥炒 甘草炒

右水煎服

茯苓湯 治濕熱泄瀉或飲食傷滿

白朮炒 茯苓各五錢

百字 婦食方卷八 五

五字 婦食方卷八 五

右用水煎食前服一方有芍藥等分名白木散

滲濕湯 治寒濕所傷身重腰冷如坐水中或小便秘澀大便溇泄此症多因坐卧濕地或陰雨所襲而致

蒼木 白木 甘草 妙各

乾薑 茯苓 陳皮 兩

丁香 錢半

右每服四五錢棗水煎

防風芍藥湯 治殮泄身熱脉弦腹痛及頭痛

防風 芍藥 妙 黃芩 二錢

右用水煎服

六君子湯

四君子湯

補中益氣湯 方見二十四卷第十六論

人參養胃湯 方見七卷第十八論

十全大補湯

濟生歸脾湯 二方見二十四卷第四論

八味丸 方見二十四卷第十一論

東垣補真丸 方見七卷第三論

婦人協熱下痢方論第十

論曰下利赤黃米穀不化作渴嘔逆小便不利心胸煩躁脉虛大而數此胃經虛熱津液不分併於大腸所致先用五苓散次用玉粉丹四味阿膠丸主之

愚按前症若胃氣虛弱用補中益氣湯肝木侮脾土用六君子湯鬱結傷脾土用歸脾湯命門火衰用八味地黃丸餘參各論主之

附治驗

婦人五月間患痢日夜無度小腹墜痛發

婦人良方卷八

熱惡寒余以為脾氣虛弱用六君子湯送香

連丸二服漸愈仍以前湯送四神丸四服全

愈至七月終怠惰嗜卧四肢不收體重節痛

口舌乾燥飲食無味大便不實小便頻數灑

浙惡寒悽慘不樂此肺之脾胃虛而陽氣不

伸也用升陽益胃湯而痊

玉粉丹

蛤粉 硫黃 分

右為末米糊丸桐子大每服五十九用米飲

下

四味阿膠丸

黃連炒

赤茯苓二兩芍藥炒三

阿膠炒

右為末以醋九桐子大每服三十丸食前米

飲下

附方

補中益氣湯

六君子湯二方見二十四卷第六論

歸脾湯方見二十四卷第四論

八味丸方見二十四卷第十一論

三頁高婦人良方卷八

婦人滯下方論第十一

手

經云春傷於風夏生飧泄蓋風喜傷肝然春時肝木反剋脾土以致滯下赤白裏急後重先服神朮散次用五苓散之類煩渴腹痛小便赤澀脈洪數為熱用白頭翁湯之類脈虛弱為伏暑用香薷散之類如風邪下血用胃風湯腹痛嘔逆手足俱冷六脈微細為臟腑虛寒急服四順附子湯灸氣海丹田二穴久痢腸滑用理中湯加肉果訶子或十全大補湯加木香肉果之屬若一方一郡所患相類者乃屬疫症

愚按東垣云太陰經受濕水瀉變膿血脾傳

於腎者謂之賊邪難愈先痢而後瀉者謂之

微邪易痊若厥陰經下痢脈沉遲手足厥逆

用麻黃小續命湯汗之若身冷自汗小便自

利脈微嘔吐用漿水散溫之若脈疾身動下

迫聲響用白朮芍藥湯脈沉身靜飲食不入

用薑附湯身軀沉重四肢不舉用木附湯竊

謂前症若飲食停滯用六君子湯以補脾胃

消飲食若胃氣下流用補中益氣湯以補脾

胃升元氣若風傷腸胃宜脾神朮散以補脾

胃解外邪若痰積中焦宜麻六神丸以補脾

胃化痰滯大凡脾胃虛弱宜補中氣調飲食

附治驗

一老婦食後因怒患痢裏急後重肛門脫下

此脾氣下陷用大劑六君加陳子肉菔煨木

香各一錢吳茱五分骨脂五味各一錢五分

二劑諸症悉退惟小腹脹悶此肝氣滯於脾

也與調中益氣加附子木香五分四劑而愈

後口內覺鹹此腎虛水泛與六味地黃丸二劑頓愈又以飲食失宜大便不實四肢逆冷

婦人良方卷八

三

十

此脾胃復傷與六君加附子五分及八味丸而愈

先太宜人仲夏患痢腹痛去後無度煩渴飲湯手按腹痛稍止脉鼓指而有力此真氣虛而邪氣實也急用人參五錢白朮茯苓各三錢陳皮炙草附子升麻各一錢服之即睡覺而索食脉症頓退再劑而安此取症不取脉也其時同患是症服痢藥者俱致不起惜哉神木散 治春傷於風夏生飧泄或傷風頭痛項背拘急鼻流清涕

頁十五

婦人良方卷八

三

蒼朮

錢二

藁本

川芎

錢一

羌活

粉草

五分

細辛

五分

右用薑水煎服欲發汗加葱頭

四順附子湯

生附子

去皮

白乾薑

甘草

錢一

人參

各一

右每服四五錢水煎吐瀉腹痛加肉桂半兩

小便不利加茯苓半兩若體寒自汗手足逆

冷六脉虛弱背寒面垢或面如塗油齒乾煩

悶躁渴引飲此為伏暑宜用小柴胡湯五苓

散酒蒸黃連丸

加減參附湯 治寒痢陽氣脫陷嘔吐不食手足俱冷

大附子

錢一

大人參

錢二

丁香

十五

粒

右用薑十片米一撮水一鍾煎服如不應再

加之

治禁口痢甚妙石蓮肉為末每服二錢陳米飲

調下

又方乾山藥半生半炒黃為末不拘時用米飲

調下

附方

胃風湯

治風冷乘虛客於腸胃以致水穀不

化泄瀉注下或腸胃濕毒下如豆汁或下瘕

血

人參

白茯苓

芩薈

肉桂

當歸

白芍藥

錢一

炒

白朮

錢一

各

右每服三二錢入粟米數粒水煎空心食前

熱服

水菘木香丸

治久痢裏急後重日夜無度其

熱服

水菘木香丸 治久痢裏急後重日夜無度其

効如神

罌粟殼

去穰 三兩 青皮 兩四錢 甘草 兩四錢

訶子

炮去核 當歸 木香 兩

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸水煎化空

心服

戊巳丸 治胃經受熱泄痢不止或飲食不入

腹痛不止

黃連

炒 吳茱萸 炒 白芍藥 各五兩

右為末麵糊丸桐子大每服三十九米飲食

前下

婦食方卷八 盡

真人養臟湯 治下痢赤白裏急後重腹痛脫

肛

粟殼

蜜炙 三兩 人參 錢六

肉桂

錢八 當歸 錢六 訶子皮 二錢

木香

煨 二兩 肉豆蔻 煨 兩半 白芍藥 炒 兩半

甘草

炒 八錢

右每服四錢用水煎臍寒加附子一兩

升陽除濕防風湯如大便閉塞或裏急後重數

至圓而不能便或有白膿或蒸下血此鬱結

而不通也以此湯舉其陽則陰氣自降矣慎

勿利之

蒼朮

米泔浸 四錢 防風 錢二 白木 炒

白茯苓

白芍藥 炒 各一錢

先將蒼朮用水一鍾半煎至一鍾內諸藥同

煎至八分食前熱服夫飲食入胃其氣上升

輸精心肺然後下降若脾胃有傷不能上升

下流腎肝而成泄利法宜升補中氣不可踈

下此東垣發前人所未論也

調中益氣湯夫脉弦洪緩而沉按之中下不得

一泄其證四肢滿閉肢節煩疼難以屈伸身

體沉重煩心不安忽肥忽瘦四肢懶倦口失

滋味大小便清利而數或上飲下便或大便

澀滯夏月飧泄或便後見血或下白膿胸滿

短氣咽膈不通嗜睡無力飲食少思

方見四 卷第五

論

麻黃續命湯

防風

杏仁 去皮尖 各二兩 麻黃 去節

人參

黃芩 炒 甘草 炙

芍藥

防已 肉桂 各一兩

附子

炮去皮 臍五錢

右每服半兩用薑水煎

白水芍藥湯 治太陰脾經受濕水泄注下體

重微滿困弱無力不欲飲食或暴泄無數水

穀不化宜此湯和之

白朮炒 芍藥炒各 甘草炒五

右每服一兩水煎

漿水散 治暴利如水周身汗出一身盡冷脉

微而弱氣短難言甚者吐血此為惡病急用

此藥緩則不救

半夏一兩 附子半兩 乾薑一作乾

婦人良方卷八 肉桂 甘草炙各 良薑二錢

右為末每服三五錢漿水煎和滓熱服不應

加之

薑附湯 治霍亂轉筋手足厥冷或吐逆身冷

脉微急用此藥救之

乾薑一兩 附子一箇

右每服半兩水煎

水附湯 治下痢脾氣脫陷肢體不動汗出身

冷氣短喘急或嘔吐不食等症須急用之

白朮 生附子頂周

好者

右為末每服五錢薑棗水煎和粗服如不應

六神丸 治食積赤白痢疾或腹痛不食或久

而不止

神麩糊 麥芽炒 茯苓

枳殼炒 木香煨 黃連炒赤各

右為末用神麩糊丸桐子大每服五十九白

湯送下

香連丸 方見前

六君子湯

婦人良方卷八 補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

五苓散 方見二十一卷第十論

六味丸

八味丸 二方見二十四卷第十一論

婦人痢後嘔噦方論第十二

滯下咳逆嘔逆古人謂之噦此胃氣虛寒之危

症也用橘皮乾薑湯半夏生薑湯丁香柿蒂湯

熱證欬逆用小柴胡湯橘皮竹茹湯管治一痢

欬逆脉沉弱投退陰散兩服而愈又一痢後咳

逆灸期門穴三壯而愈 其穴在

第六卷

愚按東垣云如泄痢而嘔者胃氣不和也上焦不和用生薑橘皮湯中焦不和用芎歸桂苓下焦不和而寒治以輕劑熱甚而治以重劑亦有胃火上衝而嘔者有積滯而嘔者有陰虛而嘔者丹溪云下痢吃逆自下衝上屬火之象古方悉以胃弱言之殊不知胃弱者脾陰弱也故久病變之乃胃弱脾寒之危症用半夏一兩生薑半兩或理中湯加枳殼茯苓半夏不效更加丁香柿蒂各十枚胃熱咳逆用橘皮竹茹湯別病忽然而致半夏茯苓湯加枳實半夏木香調氣散最佳

三百五

婦人良方卷八

三八

附治驗

一婦人痢後嘔噦服降火化痰等劑愈甚脉洪大按之虛細作渴飲湯諸藥到口即嘔余以為脾胃虛寒不能司納以參朮炮薑末各一錢以飯作丸米飲不時過三五粒至三兩許聞藥不嘔乃以六君加炮薑三十餘劑而安

一婦人患前症飲食少思胸腹膨脹大便不實所見之症悉屬虛寒假熱遂朝用補中益

氣湯加炮薑木香夕用六君子送四神丸漸愈又用八味丸料煎送四神丸而痊

一婦人因怒嘔噦時或昏憤口噤或時舉體肉動其面色或青或赤余以為肝火熾盛脾土受侮用小柴胡湯加山梔釣藤治之漸愈又用加味歸脾逍遙二藥調理而痊

橘皮乾薑湯 治胃寒嘔噦不食或吐痰腹痛

橘皮 通草 乾薑 炒

桂心 甘草 炒 人參 各一

右水煎服

橘皮竹茹湯 治噦逆

橘皮 錢二 竹茹 甘草 炒

人參 半夏 各一

右薑棗水煎

猪苓湯 治咳而嘔渴心煩不得眠

猪苓 赤茯苓 澤瀉

阿膠 滑石 各一

右水煎服

半夏湯 治噦欲死

半夏 錢一

半夏兩 生薑兩

右水煎為二服

丁香柿蒂湯 治欬逆

丁香十粒 柿蒂十五

右水煎熱服

生薑橘皮湯 治嘔噦手足厥冷

橘皮錢 生薑四錢

右水煎服

退陰散 治陰毒傷寒手足逆冷或咳逆不止

脉沉細頭痛腰重急進三服若傷冷每服一

字入正元散內同煎入鹽一捻

乾薑 川烏 炒黃

右每服一錢鹽一捻水煎

倉廩湯 治痢疾心煩手足溫頭痛此熱毒上

衝宜用此湯即敗毒散每服四五錢入陳倉

米百粒薑五片棗一枚煎若脉微弱或胸腹

虛脹手足厥冷或因服罌粟烏梅過多以致

作嘔者宜用山藥半生半炒為末米飲調下

日二三服

附方

木香調氣散 治氣滯嘔吐或胸膈不利心腹

刺痛飲食不思

木香 白豆蔻 丁香

檀香 各二 藿香 甘草 炒香

砂仁 兩

右為末每服二錢白湯調服

半夏茯苓湯 方見十二卷第三論

補中益氣湯

竹葉石膏湯

六君子湯 方見二十四卷第六論

八味丸 方見二十四卷第十一論

婦人良方卷八

婦人大便下血方論第十三

婦人臟腑損傷風邪所入以致大便下血或如

豆汁或腹中作痛若糞後下血其來遠糞前下

血其來近遠近者言病在上下也若面無血色

時寒時熱脉浮弱按之如絲者是前症也

愚按前症或飲食起居或六淫七情失宜以

致元氣虧損陽絡外傷若膏梁積熱加味清

胃散怒氣傷肝六君柴芍芎歸鬱結傷脾加

味歸脾湯脾氣虛弱六君子湯思慮傷心妙

香散大腸風熱四物側柏荆防枳殼大腸血  
熱四物丹皮柴胡中氣下陷補中益氣茯苓  
半夏心脾不能攝血必補脾肺之源舉下陷  
之氣

附治驗

一婦人下血不已面色痿黃四肢畏冷此中  
氣下陷用補中益氣湯送四神丸數服而愈  
光祿張淑人下血煩躁作渴大便重墜後去  
稍緩用三黃湯加大黃至四兩方應後用三  
黃湯又二十餘劑而愈此等元氣百中一二

婦人食方卷八

望

厚

韓地官之內脾胃素弱因飲食停滯服剋伐  
之劑自汗身冷氣短喘急腹痛便血或用諸  
補劑皆不應余用人參炮附子各五錢二劑  
稍應却用六君子每劑加炮附子三錢四劑  
漸安又用前湯每加附子一錢數劑乃瘥  
一婦人因怒胸痞飲食少思服消導利氣之  
藥痰喘胸滿大便下血余用補中益氣加茯  
苓半夏炮薑四劑諸症頓愈又用八珍加柴  
胡炒梔全愈  
一婦人瘀血腹痛便血見

加減四物湯 治腸風下血

側柏葉炒 荆芥 槐花母

甘草炒各五分 枳殼炒 生地黃

當歸 川芎各一錢

右薑水煎

腸風黑神散 治腸風下血腹疼後重或肛門

脫出

敗棕燒 木饅頭燒 烏梅去核

粉草各一錢

右水煎服

婦人食方卷八

望

愚按前二症若病久中氣虛弱者必用培補

脾胃為主

地榆湯陰結便血駱龍吉方

地榆兩四 甘草炒一兩半 縮砂仁四十粒

右每服三錢水煎

防風如神散 治風熱氣滯糞後下血

防風 枳殼炒各

右每服三錢水煎

愚按前二症若胃氣虛不能統血而下用四  
君中氣下陷用補中益氣湯脾氣鬱結用歸

脾湯氣血虛弱用八珍湯氣血虛寒用十全大補湯

治久下血成片用頭髮燒灰每服一二錢水調下

妙香散治心氣下血溫酒調下

附方

加味清胃散 方見二十四卷第六論

四君子湯

六君子湯

四物湯

三消

補中益氣湯 四方見二十四卷第六論

八珍湯

加味歸脾湯 二方見二十四卷第四論

二神丸

四神丸

三黃丸 三方見前第八論

婦人痔瘻方論第十四

婦人痔瘻因鬱怒風熱厚味膏粱所致其名有五肛邊如乳出膿者為牝痔腫脹出血者為牡痔痒痛者為脉痔腫核者為腸痔登廁出血者

為血痔治宜審之

愚按前症婦人多因胎產經行飲食起居六淫七情失調所致男子多因醉飽入房筋脉

橫解精氣脫泄熱毒乘虛而患或入房強固

其精木乘火勢而侮金或炙燔厚味陰虛濕

熱血潤躁踈風潰後當養元氣補陰精不

愈即成痔漏有串臀串陰穿腸者其腸頭腫

塊者濕熱也作痛者風也便燥者火也潰膿

者熱勝血也大便作痛者潤燥除濕肛門墜

痛者瀉火導濕小便滯者清肝導濕經二云

因而飽食筋脉橫解腸澀為痔症屬肝腎不

足故用加味地黃及六味丸有勁慎勿敷毒

藥及服寒涼之劑

鱉甲散 治五種痔漏膿血淋瀝或腫痛堅硬

下墜

鱉甲

露蜂房

蛇蛻

蝟皮

麝香

右為末每服一錢空心生地黃煎湯調中更

傳之

婦人良方卷八

聖

婦人良方卷八

聖

又方熱痛用寒水石朴硝為末以津調搽

附方

六味九 方見二十四卷第十一論

加味地黃九 方見二十四卷第六論

婦人脫肛方論第十五

夫脫肛者大腸之候也大腸虛寒其氣下陷則肛門翻出或因產努力其肛亦然也

愚按前症若大腸濕熱用升陽除濕湯若血

熱用四物條芩槐花血虛用四物白朮茯苓

兼痔痛用四物槐花黃連升麻中風虛弱用

補中益氣芍藥白朮中氣虛寒加半夏炮薑

五味腎虛用六味九虛寒用八味九夫肺與

大腸為表裏肛者大腸之門肺實熱則秘結

肺虛寒則脫出腎主大便故肺腎虛者多有

此症

附治驗

一婦人脫肛用補中益氣加味歸脾各百餘

劑而愈後因分娩復脫仍以前藥各二百餘

劑始愈

姚和衆以鐵粉傳之良聖惠方亦治陰脫陰腫

集驗方以生鐵三斤水一斛煮至五升取水洗

日二次

孫真人用蝦蟆皮瓶中燒烟熏功效玄微

一方用五倍子煎湯洗以赤石脂末搽上托入

或脫長者以兩床相並中空尺許以磁瓶盛

湯令病人仰卧浸瓶中逐日易之收盡為度

附方

升陽除濕湯 自下而上者引而竭之

升麻

柴胡

防風

神麴炒

澤瀉

豬苓各半

蒼朮兩

陳皮

甘草

大麥藥各三錢

右每服五錢水煎空心服胃寒腸鳴加益智

仁半夏各半錢薑棗同煎

四物湯

補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

六味九

八味九 二方見二十四卷第十一論

婦人陰腫方論第十六

婦人陰腫因胞絡素虛風邪客之乘於陰部血

氣相搏故也

愚按前症若氣血虛弱用補中益氣湯舉而補之肝經濕熱用龍膽瀉肝湯滲而清之若陰腫陰痒陰冷陰挺當與後論互相參看

附治驗

一婦人陰中腫悶小便澀滯兩脇作腫內熱晡熱月經不調時或寒熱此因肝脾鬱怒元氣下陷濕熱壅滯朝用歸脾湯加柴胡升麻解鬱結補脾氣升元氣夕用加味逍遙散清肝火生肝血除濕熱各數劑諸症悉愈又用

百字五

婦人良方卷八

三十一

宗

四君芎歸丹皮調補肝脾而經水如期

菖蒲散 治月水澀滯陰間腫痛

菖蒲

當歸 各一兩 秦艽 二兩

右每服五錢入葱白水煎

白礬散 治陰腫堅痛

白礬 兩

甘草 半錢 大黃 兩

右為末和用棗大綿裹內陰中日兩換以愈

為度

附方

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

龍膽瀉肝湯 方見二十四卷第八論

婦人陰痒方論第十七

婦人陰痒為三蟲在腸胃之間因臟虛而蝕陰中微則為痒甚則為痛也

愚按前症屬肝經所化當用龍膽瀉肝湯逍遙散以主其內外以桃仁研膏和雄黃末或鷄肝納陰中以制其蟲

附治驗

一婦人胸膈不利內熱作渴飲食不甘肢體倦怠陰中悶痒小便赤澀此鬱怒傷肝脾所致用歸脾湯加山梔而愈復因怒患處并小

百字

婦人良方卷八

三十一

宗

腹脹痛用小柴胡加山梔芎歸芍藥痛止用

逍遙散加山梔而愈又因勞役患處腫脹小便仍澀用補中益氣加山梔茯苓丹皮而痊

一婦人陰內痛痒不時出水食少體倦此肝

脾氣虛濕熱下注用歸脾湯加丹皮山梔芍

藥柴胡生草主之而安

一婦人陰內痒痛內熱倦怠飲食少思此肝

脾鬱怒元氣虧損濕熱所致用參芪歸朮陳

皮柴胡炒梔車前升麻芍藥丹皮茯苓而痒

皮柴胡炒梔車前升麻芍藥丹皮茯苓而痒

若陰中有蟲痒痛亦屬肝木以桃仁雄黃研  
納陰中以殺之仍用清肝解鬱之藥有以鷄  
肝納之者乃取蟲之法也

一方搗新桃葉綿裹納陰中日三兩易

龍膽瀉肝湯 方見二十四卷第八論

逍遙散 方見二十四卷第四論

婦人陰冷方論第十八

婦人陰冷因勞傷子臟風冷客之用五加皮乾

薑丹參蛇床子熟地黃杜仲各三兩鍾乳粉四

兩天門冬一兩地骨皮二兩酒十五升漬二宿

每服一盞空心食前飲之

愚按前症屬肝經內有濕熱外乘風冷所致

若小便澀滯或小腹痞痛用龍膽瀉肝湯若

內熱寒熱或經候不調用加味逍遙散若寒

熱體倦飲食少思用加味四君子若鬱怒發

熱少寐懶食用加味歸脾湯

附治驗

一婦人陰中寒冷小便黃澀內熱寒熱口苦

脇脹此因肝經濕熱用龍膽湯祛利濕熱用

加味逍遙散調補血氣而安

婦人良方卷八

五十一

宗

一婦人所患同前更寒熱嘔吐兩股腫痛先  
用小柴胡加山梔一劑寒熱嘔吐頓止次用

龍膽瀉肝湯一劑腫痛頓消

一婦人陰中寒冷小便澄清腹中亦冷飲食

少思大便不實下元虛寒治以八味丸月餘

飲食漸加大便漸實又月餘諸症悉愈

八味丸 治血弱不能榮養臟腑津液枯澀風

寒客於子臟以致陰冷

愚按此丸果孫肝脾腎虛殊有神効

附方

婦人良方卷八

五十二

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

龍膽瀉肝湯 方見二十四卷第八論

加味逍遙散

加味歸脾湯 二方見二十四卷第四論

加味四君子湯 方見二十四卷第六論

婦人陰挺下脫方論第十九

婦人陰挺下脫或因胞絡傷損或因子臟虛冷

或因分婁用力所致

愚按前症當升補元氣為主若肝脾鬱結氣

虛下陷用補中益氣湯若肝火濕熱小便澀

滯用龍膽瀉肝湯

附治驗

一婦人陰中突出如菌四圍腫痛小便頻數  
內熱晡熱似痒似痛小便重墜此肝脾鬱結  
蓋肝火濕熱而腫痛脾虛下陷而重墜也先  
以補中益氣加山梔茯苓車前子青皮以清  
肝火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱外  
以生豬脂和藜蘆末塗之而收

一婦人陰中突出五寸許悶痛重墜水出淋  
瀝小便濇滯夕與龍膽瀉肝湯分利濕熱朝

三五六

婦人良方卷八

五

與補中益氣湯升補脾氣諸症漸愈再與歸  
脾湯加山梔茯苓川芎黃柏間服調理而愈  
後因勞役或怒氣下部濕痒小水不利仍用  
前藥即愈

又方治前症用麻子仁研塗頂中自吸入即洗  
去

附方

補中益氣湯

方見二十四卷第六論

龍膽瀉肝湯

方見二十四卷第八論

歸脾湯

加味歸脾湯 二方見二十四卷第四論

婦人陰中生瘡方第二十

竊謂前症乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下注  
其外症陰中出如蛇如菌或如鷄冠狀或生  
蟲濕痒或潰爛出水或腫悶墜痛其內症體  
倦內熱經候不調或飲食無味晡熱發熱或  
胸脇不利小便痞脹或赤白帶下小水淋瀝  
其治法腫痛者四物湯加柴梔丹皮膽草濕  
痒者歸脾湯加梔丹皮淋瀝者龍膽瀉肝湯  
白木丹皮潰腐者逍遙散山梔川芎腫悶墜

三五七

婦人良方卷八

五

痛者補中益氣湯山梔丹皮佐以外治之法  
一婦人腐潰膿水淋漓腫痛寒熱小便赤濇  
內熱作渴肢體倦怠胸脇不利飲食少思余  
以為肝脾虧損用補中益氣內柴胡升麻各  
用一錢加茯苓一錢山梔二錢數劑少愈又  
與歸脾湯加山梔川芎茯苓三十餘劑諸症  
悉退惟內熱尚在再與逍遙散倍用山梔而  
愈

一婦人素性急陰內痛小便赤濇怒而益甚  
或發熱或寒熱此肝經濕熱所致用芎歸炒

梔柴胡朮朮丹皮澤瀉炒芍車前炒連生草  
數劑漸愈乃去黃連澤瀉又數劑全愈

附方

四物湯

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

逍遙散

歸脾湯 方見二十四卷第四論

龍膽瀉肝湯 方見二十四卷第八論

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

女人交接傷丈夫頭痛方二十一

愚按前症當用補中益氣六味地黃以滋化

源為主

來復丹交接相傷四肢沉重頭痛昏暈米飲下

右每服五十九 方見二十五卷第十論

附方

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

六味丸 方見二十四卷第十一論

女人交接輒血出痛方第二十二

一婦人每交接出血作痛此肝火動脾而不

能攝血用補中益氣濟生歸脾二湯而愈若

出血過多而見他症但用前藥調補肝脾

千金療交接血出

桂心 伏龍肝

附方

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

濟生歸脾湯 方見二十四卷第四論

婦人交接他物所傷方第二十三

一婦人交接出血作痛發熱口渴欲嘔或崩

寒涼之藥前症益甚不時作嘔飲食少思形

體日瘦余曰症屬肝火而藥復傷脾所致也

先用六君加山梔柴胡脾胃健而諸症愈又

用加味逍遙散而形氣復

一婦人陰腫下墜悶痛出水胸腹不利小便

頻數內熱瞞熱口苦耳鳴此肝脾火症用小

柴胡加車前膽草朮朮升麻二劑稍愈又用

加味逍遙加升麻數劑漸愈乃以加味歸脾

加升麻柴胡并補中益氣加山梔數劑頓愈

仍用加味逍遙加味歸脾二藥調理全愈

一婦人患前症熱痛或用寒涼敗毒藥飲食

不進

不進

不入時欲作嘔小腹重墜余謂此脾胃復損  
元氣下陷先用補中益氣加炮薑二劑重墜  
頓愈又加茯苓半夏二十餘劑而愈乃以歸  
脾湯少加柴胡升麻并六味地黃丸而康  
又方割鷄冠血塗之以赤石脂末摻之五倍子  
末亦良

附方

六君子湯

補中益氣湯二方見二十四卷第六論

加味逍遙散

婦人良方卷八

加味歸脾湯

歸脾湯三方見二十四卷第四論

六味丸方見二十四卷第十一論

婦人小戶嫁痛方第二十四

愚按前症當從二十一論互相主治

千金方療小戶嫁痛

甘草生薑各五分 白芍藥四分

桂心二分

右以酒二升煎三四沸服

又方海驃蛸燒為末酒服方寸匕日三服

又方小麥甘草等分煎湯洗甚効

婦人良方卷之八

婦人良方卷八

三