

醫

學

集

要

四

R24

2572

責任編輯：劉從明

图书在版编目 (CIP) 数据

医学集要/ (清) 朱凤台纂. - 北京: 中医古籍出版社,
2005.10

(中医古籍孤本大全)

ISBN 7-80174-381-4

I . 医 ... II . 朱 ... III . 中医学临床 - 中国 - 清代

IV.R24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 107171 号

浙江中医院图书馆藏

中醫古籍孤本大全

醫學集要

原 著
清·朱鳳臺

選 編
薛清錄 劉國正

出版發行
中醫古籍出版社

北京市東直門內南小街十六號郵編 100700

杭州蕭山古籍印務有限公司

二〇〇五年十月第一版第一次印刷
二百五十套

定 印 版 印
價 數 次 刷
號 號 數 次 刷
七一〇圓 ISBN 7-80174-381-4/R · 380

醫學集要目錄

通州盧恆胤龍孫父

武進金

敞廓明父

靖江朱易闇卿父

靖江

朱鳳台慎人父全纂

海門丁元弼右升父

靖江

朱鍔肅瞻父

卷一

診候大要論

脉大病進脉數氣耗陰虧

各脈體狀

論脉理精微須得其要

治神論

大氣載形論

醫學集要
目錄
陰陽要妙論

表裏虛實大法

益火之原壯水之主 少火之氣壯壯火之氣衰

不睡繫肝論

養肝論

論三焦部分

補劑宜緩論

正治反治論

痛無補法辯

下元生氣論

陰虛生內熱辯

諸鬱症當調氣論

補益論

寒涼禁久服論

生氣之原

傷寒源流

發熱辯

卷二

論風氣將護大法

論卒中風氣痰火等症急救法

論卒中多主於虛不可槩作風治

辯偏風偏枯半身不遂痿痺症治

痺症與偏風偏枯同類惟痛與麻稍別

瘋症七科

七孔損傷根源論

禁忌論

庸醫誤治論

必用之藥

七孔損傷因病用藥

耳聾屬腎虛

眼瞎知心病

鼻塞知肺病

眉落知肝病

牙落是腎及大腸病

筋縮骨斷是髓病

鼻墜是肺脾三焦病

口歪乃肝及膀胱病

聲啞是心脾胃病

大痳瘋

爛麻瘋

雲頭瘋

螞蟻布陣瘋

馬來瘋

剪指瘋

麻上麻下瘋

卷三

暑天乘涼鬱遏衛氣論

氣虛中暑昏仆不可作風痰症治論

暑月過食生冷內傷症治論

清暑益氣等方及驗案

外感風寒內傷冷熱咳嗽

論真臟受傷咳嗽

論嗽分臟腑

治嗽不用人參辯
寒痰爲嗽用附子例

各方及驗案

脾胃

眩暉

肺癰因治嗽過用峻藥

濕症總論併方

驥胃驗案各方

膈氣嘔吐總論併方

治瘧宜固衛氣論併方

霍亂

嘔吐

論鴻有標症真臟症案驗併方

治痢要法論併方

卷四

論喘症不同

論水喘

喘脹標本論

諸脹滿分寒熱

附治腫方

諸氣症治論

治痰之本論

痞

三消大要論

渴服入味尤議

腰痛

脇痛

腹痛

心脾痛治法不同論

欬逆

發熱

論疝症多因於勞怒

卷五

頭痛有五候不可偏歸之熱論

五勞七傷論

火乘金候土爲金母論

論血症論

血症分寒熱論

遺精

痺痛

五疽

發沙

大小便

赤白濁

卷六

傷寒論

傷寒死症併脈

傷寒脈法

辨六經形證

辨可發汗

辨不可汗

辨可下

辨不可下

辨可吐

辨不可吐

醫學綱要
辨可溫

辨不可溫

辨內傷外感

辨太陽脈似少陰

辨少陰證似太陽

辨合病併病

辨兩感症

辨陰陽二厥

辨三陰無傳經

辨傳足不傳手經謬論

辨目

察舌

察大小便通利

察病人心胸有無痛處

察渴與不渴

用藥要訣

各項證併方

婦科卷七

婦科總論

婦人脉法

月經

血崩

帶下

胎前

惡阻

胎漏

胎漏

胎動

子煩

子癟

子腫

子懸

子氣

子淋

轉胞

安胎

難產

死胎

臨產

血暈

惡露

產後

小兒卷八

提綱

急驚

慢驚

疳疾

諸熱

感冒

傷食

腹脹

嘔吐

泄瀉

吐瀉

痢疾

瘡疾

咳嗽

喘急

走馬牙癧

母毒

喉痺

尿濁

下淋

大小便

水腫

黃疸

膿疽

奶癬

口瘡

追蟲

通用

外科卷九

旨歸七孫

癰疽脲法

腫瘍要法

癰疽源論

辯淺深

辯虛實

固本

不可妄下

陽氣脫陷

分經用藥

腫瘍

潰瘍

內消

內托

止痛

生肌

別五善七惡

辯陰陽治法難易

壞症治法

提綱

足太陽膀胱經

上下搭

對口枕癰

足少陰腎經

喉癰

便毒

重舌

癰瘡

手厥陰心胞絡經

瘡瘍

手少陽三焦經

結核瘤氣

足小腸膽經

足厥陰肝經

手太陰肺經

手陽明腸經

足陽明胃經

足太陰脾經

手少陰心經

手太陽小腸經

膏藥四種

靈藥

陰疽

癰疽兼外感內傷

患毒兼別症

疔瘡

流注

懸癰

乳岩

腸癰

眼疾

蛇咬

疳瘡

喉蛾

臘梨

下部酸痛

楊梅瘡

銀紙

割根治心胞瘡

蟲毒兼火燄內熱

普興酒氣經

金華酒氣

生少陽風寒

走風酒肚脚聲

銀紙酒肚脚聲

扶木酒肚脚聲

醫學集要 卷之七

靖江朱鳳台慎人甫訂定 男廷密近宸甫對讀

婦科總論

婦室一科。自邯鄲而後有濮陽李師聖施郭稽古產論二十一篇。世所共尊。惜乎產前則無方。至巢氏病源證雖詳而方不具。太平聖惠方雖有而雜。見外此則未有聞也。史所載錄婦人嬰兒十九卷。楊氏產乳集驗三卷。皆有錄無書。顧人生疾病殊科。而婦人所

患較之男子不啻倍蓰矧胎產前後防閑不密調治失宜禍在瞬息則婦人受病且多而難治况醫之候病止於四術而切脉爲下望聞問三事可施諸丈夫嬰兒而每窮於女婦彼朱門艷質青瑣靜姝居輿室之中處帷幔之內既不能行望色之神聽聲之聖三指之下所得几許無已止恃乎問之一端醫者盡理質問愚人見所問繁多以爲醫學不精往往得藥不信昔者扁鵲見齊侯之色尚不能取信况未之見耶

則四診之術俱窮然則操何道而後可惟有尋繹其
源神明在我而已凡婦女之性陰濁勝而陽明微慈
戀愛憎嫉憂恚性情鬱滯染着堅牢又不出閨戶
無可遣解不習詩書無可寬慰義命之理茫然怨尤
之心橫起或有懷未能暢遂或有病不可告人含羞
諱疾積久成鬱鬱久生火火賊元氣元氣消燬外邪
乘虛來犯病斯成矣雖現症卽有百端惟鬱傷元氣
可一言以蔽之也至於師尼寡婦及違時未笄之女

鬱情尤甚奏効更難苟不繹源達情而徒責諸草木
是以江河填漏卮雖多亦奚以爲今擇婦科之至要
者如經血帶下胎產乳鬱等條分于左以便覽焉

婦人脉法

婦脉之異乎男者止胎前產後經事來往有孕無孕
等外此則俱與男同今採諸名家得心應手之訣以
爲診要

婦人女子尺脈盛而右手大皆其常也若腎脈微濶

或左手關後尺內脈浮或肝脈沉急或尺滑斷絕不
勾皆經閉不調之候也脈微弱而濶年少得之爲無
子中年得之爲絕產

三部浮沉正等按之無絕者姪也崔紫虛曰婦人有
病而無邪脉此孕非病所以不月有病謂經閉惡心
阻隔飲食脉來和平是也尺按之數而旺亦然左手
尺脉滑實者男右手浮滑者女經曰陰搏陽別謂之
有子陰搏者陰脉搏指全無陽脉是以內經謂之陰

搏陽別與陽脈分別之意。如有孕而陽脈一至此胎必旦夕墜矣。總在尺脈看。然而左寸亦要看。滑而微洪者妙。經水不通。脈尺數寸微。其胎已三月也。脈滑重以手按之。散者五月也。右手與左手脈俱大。產二子。孕婦脈弦急增寒壯熱。唇瓜俱青。面黃黑。而尺脉無神。是胎氣損也。當問胎動否。若不動。反覺上攻。捨心悶絕。或下血。當作死胎治。

凡天癸未行之時。屬少陰。既行之後。屬厥陰。凡婦女

病寒及寒熱往來氣滯須問經事若何

產後須問惡露有無及小腹有塊痛否

妊娠或左右脉微弱其胎必墮以氣血無養也屢驗急宜補養脉弦數太過亦墮火盛也

尺脉常盛滑而流利有神爲胎尺脉濇難于嗣

一呼一吸脉一至曰離經爲欲產也

難產體寒壯熱舌下脉青黑舌冷子母俱死面赤舌

青母活子死唇舌俱青口出沫子母俱死面青舌赤

母死子活。半產漏下。脈小流連者。生急疾大數者。
死。○新產寸口脈洪疾不調者。死沉微附骨不絕者。
生。妊娠八月欲產。脈實大有力弦緊者。生沉細者危。
脉細勻易產。浮緩氣散難產。

妊娠四月。○三部俱滑而疾在左爲男。在右爲女。遣
向南行從後呼之。左迴是男。右迴是女。

滑伯仁曰。脈者血氣之先也。血氣勝則脈勝。血氣衰
則脈衰。血氣熱則脈數。血氣寒則脈遲。血氣微則脈

微血氣平則脉治。長人脉長。短人脉短。性急人脉亦急。性緩人脉亦緩。左大順男。右大順女。男子尺脉常弱。女子尺脉常盛。反之者逆。

月經

經曰。女子二七天癸至。乃天一真陰之癸水。二七陰氣盛。盛則溢泄。又名月水。取月圓則缺之象。陰陽和平。則應時。氣血乖戾。則改度。故曰血者。氣之配。隨氣而行。調經者。調其氣。氣順而經自正。先期而行者。氣

熱也。法當清之。丹皮、生地、白芍、麥冬、青蒿香附、丹參、
地骨皮之類。後期而行者。血不足也。法當補之。歸脾
八珍之類。將行而痛者。氣滯也。當疏氣和血。芎歸、益
母澤蘭、香附、玄胡索、木香、砂仁、肉桂、陳皮、炮薑之類。
來後作痛者。氣血俱虛也。色淡亦屬虛。八珍歸脾補
中益氣選用。錯經妄行者。氣亂也。宜調其氣。紫者。氣
熱也。黑爲熱甚。涼血和血爲主。

凡經水將畢。或正行時。真氣方虧。切忌破氣尅伐。雖

有他症從輕而治乃可。如冒寒有表邪。補中益氣加表藥。如停滯。補中益氣。加消導。此妙法也。

凡婦人面色痿黃。四肢怠倦。右寸關脉弦滑無力。是脾胃受虧。食少不能生化氣血。宜補中益氣。脾胃和而經自行。

若軀脂滿閉。脈沉伏惡心。少食肉多色白。人屬痰多。占住血海。所生之血亦少。宜二術二陳升柴越鞠。以化痰燥脾。忌用地黃。性滯故也。

素多鬱悒。脈弦數。身潮熱。作痛兩脇脹。屬鬱悒。是肝燥而不行。宜平肝氣。養肝血。而經自行。

身體瘦弱。兩手脈俱細弱。倦怠少食。屬氣血兩虛。八珍歸脾主之。

形體漸瘦。消穀善饑。脈數疾。屬胃燥。不能生血。宜瀉火養胃。兼生血潤燥。

勞心太過。心血耗散。火動於中心。煩驚悸。月事不來。宜安心補血降火。柏子養心丸。或補心丹之類。

陰虛火甚。脈弦數。六味地黃丸加人參主之。

大便秘結。小便雖清不利。經水閉絕。右尺洪數乃下

焦血海乾枯。宜調血潤燥。瀉胞絡中火邪。經自行矣。

忌用通經利藥。

月水閉而飲食形容如故。或惡心阻隔。兩尺有神。此孕非病。

多身熱身痛。脈濶數。肌膚乾燥不澤。內無嘔脹。此血枯經閉。宜大補脾胃。以滋化源。血生而經自行。

大病後經閉屬虛。宜補脾養血。元氣復自通。

行經時浣濯入冷。或食冷物。熱血得寒。凝滯血海之中。每行經時。腹痛不可忍。宜芎歸、玄胡索、木香、乳沒、香附、炮薑、肉桂。逐去惡紫血爲佳。不然漸成血瘕。小腹有塊作痛。時白物下。經水不通。是血瘕。宜逐瘀補氣。

汚血在血海。必痛。且有形實者可通。虛者慎之。多鬱悶。人心下脹。不食。經事不調。身痛潮熱。漸變。

骨蒸不食。忽寒忽熱。耳下結核。瘰癧馬刀。形容枯槁。
脉弦數。或細數濇。或沉結。久之變成瘵。益氣養榮湯
主之。

經水過期瘦人。由於血少。宜助脾生血。補中益氣湯。
加紅花。益母子。肥人由於氣虛有痰。六君子。加芎歸。
身體羸弱。潮熱。脈細數。月水不通。屬陰虛血少。陽火
旺。火逼水涸。當養血益陰。慎勿以毒藥通之。柏子仁。

丸澤蘭丸妙。

柏子仁丸

柏子仁

炒研

牛膝

酒伴

卷柏

各半兩

澤蘭葉

川續斷

各二分

熟地

用生者三兩忌
酒蒸搗膏

俱末入地黃膏加蜜丸空

心米飲下三十丸

澤蘭湯

治同前

澤蘭

三錢

當歸

酒伴

芍藥

炒各

甘草

五分

水煎服

逍遙散用歸芍白朮白茯甘草柴胡乃清肝和血之

劑婦人肝經血分中有風有火炒品加丹皮梔子更

佳

牛膝散 臨行不利腹病痛

牛膝 桂心 赤芍 桃仁 玄胡索 當歸

川芎 木香 牡丹皮各七錢半 芫荽每服方寸七空

心溫酒下

五補丸 治婦人室女身體羸弱倦怠少食血海乾

枯經閉不行

熟地 人参 牛膝 白茯 地骨皮各等分 俱末

煉蜜丸每空心溫酒下五十丸

通經丸 治婦人身體健旺月事不通腹痛血瘕

桂心 青皮 大黃 炮乾薑 川椒 川烏

乾漆 當歸 桃仁 芪术各等分俱末先將四錢

用米醋熬成膏和餘六錢杵勻丸每服二十丸淡
醋湯下加至三十丸溫酒亦可

掌中金丸 血凝經閉下取法

川山甲 炮甘草 苦丁香 苦葶苈 白附子

川椒

猪牙皂角

草烏頭

各三錢

巴豆

一錢

右末生

葱綬汁和丸彈子大綿包一丸納陰中一日卽白

二日卽赤三日卽經神効

加減人參丸 治經脈不利化爲水流走四肢悉皆

腫癰名曰血分其候於水相類不可作水治

人參

當歸

桂心

澤瀉

赤茯

白茯

瞿麥

各半兩

牛膝

五錢滑石

三錢研

白朮

土炒五錢研

葶苈

炒另五錢研

一錢

俱末煉蜜丸桐子大每服十五丸至二三十丸

止空心米飲下

余按經病。大抵肝脾血有餘。四物爲主。肝脾血不足。補中益氣爲主。肝脾鬱結。歸脾湯爲主。肝經怒火。加味逍遙散爲主。至於臨症通變。存乎其人。又不可拘於此也。

補中益氣湯

六味地黃丸

補心丹

八物湯

六君子湯

益氣養榮湯

四物湯

俱見各症門

血崩

經水妄行。如山之崩。勢不可遏。故曰崩。因於氣者。逍遙散加參芪。主之。血熱妄行者。宜阿膠白芍丹皮麥冬。五味生地柴胡黃芩之類。濕熱相搏者。升柴二术。

二陳湯加茯苓。汚血阻礙不得歸經而下者。宜芎歸、
玄胡、蒲黃、乳沒、人參、白朮、白芍、兼養正以消瘀。脾胃
氣虛下陷者。補中益氣湯加魚膠、五味子、山萸肉、麥
冬最妙。

丹溪曰。婦人崩中。由臟腑傷損。衝任二脈血氣俱虛。
乃爾。二脉爲經脈之海。血氣之行外循經絡。內榮臟
腑。若氣血調適。經下依時。若勞動過極。臟腑俱傷。衝
任虛不能約制其血。故忽然而下。謂之崩中。暴下治。

宜大補氣血。補養脾胃。微加鎮墜心火之藥。補陰抑陽經自止矣。

氣盛。左脈弦急而數。腹脹下多。因於氣也。肝火迫血妄行。宜涼血地黃滋陰湯主之。

服涼藥過多。抑制陽氣於血海。諸藥不應。須桂附參芪。大補陽氣。陽氣一升。崩漏自止。

脾氣虛不能統血。血下陷而崩。補中益氣湯加減。性急多怒人。崩不止。或耳前後脹痛。逍遙散加減。

色欲過多。衝任傷損。亦令淋瀝不止。八物湯主之。
食少。或吐。或瀉。或噯酸。是脾胃弱。或服寒涼所致。六
君子補中益氣歸脾湯選用。

崩且水瀉。是前後二陰之氣下脫也。參术、芪附、山藥、
扁豆、山萸、五味、佐醋製升麻、柴胡、白芍、大升太補爲
佳。

悲哀太甚。則胞胎絕陽氣內動發。則心下崩。四君子
加升麻、柴胡、山梔。

凡崩下如湧泉。須獨參湯爲主。血脫補氣至妙法也。
崩下血盡而見滑白之物者。此因血海乾枯虛極所
致。獨參湯或救其萬一。

涼血地黃滋陰湯 治暴崩脈數是腎陰虛不能制
胞胎相火火迫血走

生地一錢五味子 黃芩各三錢炒 白芍 阿膠各一錢炒

麥冬去心 青蒿 丹皮各八分 柴胡六分 地骨皮一錢

歸身五分 甘草四分 水煎空心服

參膠湯 治婦人肝脾虛寒陽氣下陷血妄脫者

人參三錢魚膠二錢炒黑成珠山茱萸八分入分五味子六分熟附八分

乾薑六分炒黑甘草五分成珠升麻五分水煎服

加味逍遙散

二陳湯

補中益氣湯 俱見各症門

魚膠固本丸

補陽益元湯

當歸附子回陽湯

俱見帶下門

帶下

難經云帶脈起於季脇廻身一週婦人多氣陷下抑遏或濕熱盛于下焦從帶脈而下故名氣受傷則白血受傷則赤與男子精滑大同小異

丹溪曰帶下乃胃中濕痰滲入膀胱爲患宜燥中宮之濕升柴二朮二陳湯最妙 帶下小腹作痛是鬱結痰與濁氣也須兼辛散茴香炮薑之類不痛兼辛

涼炒黃柏之類。須斷厚味酒麴煎炒。

肥人多濕痰導痰湯加二术炒黃柏川芎久而氣虛倦怠氣口脉虛大加人參芪术以補氣氣旺而帶下自止瘦人陰虛火旺六味地黃丸爲佳若久而不止責之虛熱補中益氣湯

帶臨月經甚多食少倦怠面黃經中如有血塊者有如筋膜者宜參术等大補脾胃爲主

先崩後帶兩尺極微東垣謂其血少卽亡陽故滑白

之物下流不上是下焦血海將枯津液復亡周身筋膜失養痛不可當宜益津液以潤燥補氣以壯陽六君八珍補中益氣選用

帶下多起於氣鬱鬱非辛不開鬱久即成熟所以加味逍遙散歸脾湯最宜

余按血崩帶下之症起於虛者多縱有他症以固本爲主不可因濕熱之說輕用利藥

魚膠固本丸治婦人身體倦怠脉微食少赤白帶

下并下崩諸症

魚膠

五兩蛤粉炒成珠

山茱萸

酒潤去核二兩

北五味

二兩棗仁

炒

雨
茯神

一兩

枸杞

三兩

杜仲

鹽水炒去絲二兩

五錢

歸身

酒洗人一兩

參

二兩

白芍

炒一兩

懷山藥

炒四兩

白术

土炒三兩

丹皮

麥冬

二兩去心

蓮鬚

二兩

芡實

二兩升麻

醋製五錢

甘草

六錢

共末

煉蜜丸

每空心米飲下

五十丸

補陽益元湯 益津生液補氣壯陽

山藥

炒二錢

人參

一錢

白芍藥

炒八分

黑薑

二錢

阿膠

錢

錢

五分

白芍藥

分

黑薑

二錢

阿膠

錢

炒成珠

柴胡分

炙甘草七分

陳皮八分

山茱萸一錢

杜仲二錢

炒去絲分

五味子八分

熟附八錢

山藥二錢

炒研分

炒去珠

五味子五分

熟附八分

山藥二錢

炒研分

茯神八分

棗仁二錢

炒研分

當歸二錢

阿膠三錢

五分水煎服

歸附回陽湯

治寒痛臍下赤白帶下血崩不止

人參五分

黑薑錢

熟附各一錢

升麻五分

當歸二錢

阿膠三錢

炒成珠

黃柏少許

水煎服

補中益氣湯

六味地黃丸

加味逍遙散

六君子湯

二陳湯

歸脾湯

八珍湯 已上俱見各症門

胎前

二氣交感。凝而成胎。一月名始膏。二月名始胚。三月
名始胎。當胚膏時。真氣方遇。如桃花凝聚。柔脆易壞。

食忌辛辣。恐散其凝結。味稍甘美。欲扶其柔脆。二氣既凝。如泥在釣。如金在鎔。惟陶冶之所成。筋骨臟腑皮毛精血。日就月滋。氣足乃生。氣血旺。則胎易成。而無病。氣血弱。則胎多病。而難育。方書云。食氣於母。所以養精。食味於母。所以養形。形精爲滋。育氣味爲本。故天之五氣。地之五味。母食之。而子又食之外。則充乎形質。內則滋乎胎氣。母寒亦寒。母熱亦熱。母飽亦飽。母饑亦饑。皆因虛而感。隨感而變。膏梁之家。恣口。

腹逞怒慾飲食七情之火鍾之於內胎氣受之怯者
卽變諸病壯者毒不卽發而痘疹瘡驚遺禍於後是
胎元以脾胃飲食爲本故孕婦以脾胃氣血爲要如
或飲食不節七情內傷脾胃受虧氣血漸耗則痰火
必熾而惡阻癟腫等病作矣胎教之說豈可忽哉

惡阻

孕婦二三月惡心而阻隔飲食是也亦有六七月尚
病嘔者治同宜二陳加白朮黃芩砂仁竹茹脾胃虛

弱加人參主之。

胎痛

不時作痛或小腹重墜。名胎痛。宜熟地三錢、當歸一錢、煎服。不應加參术、陳皮。因氣者加砂仁。因中氣虛下墜而作痛者補中益氣湯。

胎漏

壯實人兩手脈和平、飲食如故、而經時下、宜和血涼血、健脾爲主。佛手散加黃芩、白朮不已、加阿膠去血

多入珍湯加膠艾、身弱脾倦而經時下者補中益氣
湯爲主。

有大怒傷肝而動血者、佛手散加炒梔子、白芍藥、
佛手散 治胎動、服之卽安、胎損服之卽下。

當歸 川芎各五錢 水酒煎服

胎動

下血腹痛、是胎動欲墜也、宜行氣安胎、佛手散加砂
仁、脈大有火、加芩朮、

子煩

心中煩懣不寧、由於心虛、有火、宜棗仁、黃芩、白茯竹葉之類主之。

子癟

孕婦痰涎壅塞、或時發搐、不省人事、名曰子癟、多因於氣、不可作風治、宜二陳加芩术砂仁川芎、當歸、痰甚加薑汁竹瀝。

子腫

面目虛浮四肢作腫皆脾虛不運清濁不分所致宜多用參术以補脾脾健而腫自消

子懸

胎氣不和上湊脹腹滿是濁氣舉胎而上湊也宜蘇梗枳殼芎歸白芍砂仁芩术以降濁安胎

子氣

三月已後兩足浮腫行步艱難食不甘且喘狀如水氣名子氣此因脾虛下陷宜健脾養血參术苓芍芎

歸陳皮爲主。

子淋

月少、小便淋痛、名子淋、屬火解熱、利小便、山梔、茯苓、條芩、麥冬、知母、燈心、車前、澤鴻爲主。

轉胞

六月已後、覺胎墜一邊、小水不通、名轉胞、宜二陳加升柴、芎歸、芩术、煎服探吐、以提其氣、胎一上行、小水卽利、吐後須參芪大補。

安胎

氣血旺。脾胃和。胎自無虞。若飲食不節。起居不時。其胎卽墜。以胎元全賴氣血以養。氣血又藉脾胃飲食而生。如胎婦脾胃不和。食不甘美。急宜調補脾胃。雖有他症。以未治之。然不可過於辛熱。宜清涼疎利爲主。丹溪曰。因火動胎。逆上作脹者。急用條芩、白朮、香附之類。俗以黃芩爲寒。而不用。反謂溫熱養胎。不知人之懷孕。如鐘懸在梁。梁軟則鐘墜。用白朮益脾。以

培萬物之母條芩固中氣瀉火能滋子戶之陰使火
不妄動興利除害其胎自安故爲安胎聖藥胎宜清
涼最喜疎利縮砂安胎以其止痛行氣故耳勞神動
怒情慾之火俱能墜胎推其本原皆因熱火能消物
造化自然之理古謂風冷傷子宮而墜未達病情者
也如慣墜之婦或中氣不調食少且不必養血先理
脾胃脾胃旺而氣血自生氣血生而胎自不墜

胎每在三月分而墜者爾時手厥陰心胞絡主胎勞

心多慮心胞絡虛不能養胎則墜宜養血制火四物
加炒黃柏玄參白朮條芩

左脉微弱腰痛胎不安屬血虛四物加杜仲芩朮
右脉寸關大而無力倦怠懶於言動屬氣虛補中益
氣加山藥杜仲條芩兩手脉俱弱胎常墜屬氣血虛
入珍加山藥杜仲續斷芩朮

若前次三月而墜後次必如期蓋先於此時受傷故
後期必應乘其虛也必多服調補血氣之劑始免後

患

固胎散 能養血益氣健脾清火

當歸 酒洗熟地各三錢 白芍 炒二錢 川芎 一人參二錢 白朮

二錢 土炒 甘草 五分 條芩 八分 炒見血不安加阿膠痛而氣

滯者加砂仁水煎服

束胎丸 七月後服

黃芩

酒洗夏一兩秋七錢冬五錢

荻苓

七錢五分

白朮

二兩土炒

陳皮

三兩

右爲末粥丸每服錢半

醫學集要

婦科

卷七

束胎散 妊娠臨月服之易產

人參 陳皮 各五分 白术 土炒 白芍 炙各一錢

當歸 全用一錢 甘

草
錢
紫蘇 分五錢 大腹皮 三分水煎服

保生無憂散 臨產服之易生兼治小產瘀血腹痛

木香 當歸 川芎 白芍 枳殼 乳香

血餘
洗淨
各等分水煎日二服

安胎散 孕婦宜常服

人參
錢
白术
土炒
二錢
條芩
炒八
分
砂仁
分
白芍
一錢
甘草
一錢

陳皮

入分

當歸

八分入

甘草

五分分

川芎

四分分

水煎服

氣血虛者多小產。如用安胎之藥不往下漿。血多腰痛甚者是欲下也。急投益母草、製香附、芎歸、紅花、陳皮煎服。

偶因跌撲其胎不動而痛。急煎芎歸湯服。服後痛止。覺動胎尚無恙。苦痛不止。更增寒發熱戰慄。是胎已死。急催下取出。

孕婦忽發寒熱不可妄指爲外感而用表藥。當問其

胎動否。痢疾裏急後重。用蘇梗。杏仁。枳殼。戒檳榔。
小產惡露多於正生。如胎雖下不可便睡倒。俟惡露
淨方可睡下。多飲童便爲上。

惡露不淨。腹痛。芎歸。玄胡。蒲黃。紅花。益母。澤蘭。陳皮。
煎成加童便服。

去血過多。昏悶身冷。或身熱。脈大無力。獨參湯。加蘇
木童便。

小產因脾氣素虧而致。產後益弱。較大生更宜調節。

飲食不可驟用肉食。慎之。

小產氣血虛下血不止人參黃芪湯主之。

人參

黃芪

炙

當歸

白朮

炒

白芍

炒

艾葉

各一錢

阿膠

炒二錢

水煎服

難產

并催生法

難產悉是平時不善調攝。飲食不節。氣惱過度。或七八月上犯淫。以致氣血虧損。污濁凝滯。不得清順而轉達下也。然中流之失。須預爲之防。大率以順氣和

血爲主。漿水乾而不下。兼滋潤。汚瘀阻礙者。兼逐瘀。
又不可催藥太早。如果漿水下多。其胎陷下。不得出。
方可下手。

催生當以芎歸爲主。加益母、滑石、牛膝、葵子、乳香等。
煎服。切不可輕用水銀大黃等猛劑。

三合濟生湯 治難產 一二日不下服此自然轉動

下生

川芎二錢當歸三錢粉草七分香附 蘇葉 腹皮各一錢半

枳殼麸炒二錢水煎服

催生柞木飲 治難產死胎

大柞木枝

一大握長一尺洗淨寸挫

甘草

大者五寸作五段

新汲水三

碗煎一碗難產心下脹飲一盞便覺豁然如覺饑渴再與一盞至三四盞覺下墜便生

免腦催生丸 治難產或橫或逆

十二月免腦

去皮膜研如泥

乳香

另研極細

母丁香末

一錢半另研

二分半右三味拌勻以免腦和丸鷄豆大陰乾油

紙裹每服一丸溫水下

胞破久而不下。其氣已耗。或元氣困憊。急煎八珍湯服。妙甚。

漿竭而不下。香油、白蜜、小便各半盞和勻。加益母煎濃湯服。

死胎

胎死腹中。婦人指甲舌青作寒熱。或上搶心悶絕。自汗喘滿不食。二日漿水已盡。不得下。先用佛手散加

益母葵子牡丹皮桂心等煎服不應用當歸二錢川芎一錢五分朴硝牛膝各五錢滑石三錢研煎服卽下

漿盡不得下用猪油蜜酒三味各三碗熬碗半分三次緩緩服

身重作寒熱舌下青黑其胎已死

面赤舌青子死母活

面舌俱青口中出沫子母俱死

面以候母舌以候

醫學集要
婦科
卷之三
子

黑神散 產經日不下胎死腹中舌青面白脈沉小時值寒月宜此暑月禁用胎衣不下亦効

熟地 炒蒲黃 炒里乾薑 當歸 白芍 桂

心各二兩

甘草炙

黑豆炒

右共爲末每服二錢童便

和酒下

牛膝湯 治胎衣不下臍腹堅脹急痛勢危迫者服此胎卽爛下死胎亦可

牛膝

瞿麥

各四兩

當歸

三兩

通草

六兩

滑石

八兩

葵子

五兩

水九碗煎三碗分三次服

若臍帶頭在外切須以帛條繫緊不遯則汚血流入胞中難下矣

兒一下時急牽緊臍勿驟剪斷胞下乃可剪

氣弱不能送出無憂散妙

交骨不開陰門不閉子宮不收皆元氣不足

交骨不開用芎歸湯加髮灰龜板補

醫學集要 婦科 卷之二
陰門不閉十全大補湯加五味子補。

子宮不收。補中益氣湯加醋炒芍藥五味子補。

臨產

月分既足。腰腹陣痛。微見漿水。是名弄胎。尚宜靜守。
必待腹痛二陰挺併。眼中溜火。方爲真產。脈一呼三
至。一吸三至。

微覺動作。家中勿驚慌。宜屏除一切穢物。掃室焚乳。
香。痛時稍放裙帶。吐氣數口。

如饑忌食肉及多食若食肉多食則礙於上焦氣不得下故難產雖產下食停滯於中反變生諸患多致危殆惟粳米作稀粥與服妙甚

腹痛宜忍耐站立散步房中慎不可攢腰以阻兒路須兒欲出時方可抱腰旁人戒驚擾

欲生之時卽煎佛手散加益母童便一劑妙甚

初生下卽飲童便一盞可免血晕諸疾或加芎歸湯中肥白人多氣虛濃煎人參湯加蘇木童便

三朝內宜食稀粥調理不可食暈并鷄子及粘硬之物猪肉尤忌

血暈

難產去血過多而暈。脉微弱色白者。獨參湯加蘇木、童便、脈芤大數。多火人產暈。是虛火。四物加澤蘭、陳皮、益母、童便。

血氣暴虛。污血隨虛火泛上。迷亂心神。故眼黑生花。甚者悶絕不知人事。口噤。人昏氣冷。但服清魂散。卽

醒。

澤蘭葉

人參

各二錢半

荆芥

三錢

川芎

三錢

甘草

五錢俱末

童便點湯下一錢灌

暉而大汗。是陽暴脫也。禁用辛散之藥。參芪白朮爲君。少佐歸地炒黑乾薑少許。

惡露

養胎餘血。雜濁漿水氣血旺者隨兒而下。怯者。阻碍於小腹爲患最惡。上攻卽暉。攻胃卽嘔。流於大腸卽

瀉溢於四肢則腫。須急用芎歸、玄胡、乳沒、桃仁、紅花、蒲黃、血餘逐去惡血爲佳。

產後

丹溪曰：產後當大補氣血爲主。雖有他證，以末治之。乃精確妙法。

左脈大而無力。或微弱。補血爲主。

右脈微弱。或虛大。補氣爲主。

兩手脈俱弱。四肢倦怠。或作潮熱。是氣血俱虛。參芪

歸朮爲君。

產後別無他症。只虛弱倦怠。脉弱。參朮芪草歸身陳皮煎服佳。

產後忌白芍。以其酸寒伐生生之氣也。如血虛腹痛必用者。酒浸炒過聽用。

產後脉浮大無力。卽名芤。乃失血之脉。悞認外感。正見傾危。其發熱者。因血虛陽無所依。浮散於外而爲熱。必參芪大補。少佐炮薑以收浮熱。

醫學集要
婦科
產後遺尿。因氣血太虛。不能約束。宜八珍加升麻。甚者加熟附子一片。

產後瘓癰之症。不可作風治。因去血過多。陽火熾盛。筋無所養而然耳。當用補中益氣。四君歸脾。以補土而生陰血。則陽火自退。諸症自愈。

產後乳少。因氣血虛弱。脾胃少生化之故也。宜參芪歸朮。大滋化源。以生乳汁。若因悶懶食少。不能生乳。而乳少。宜舒鬱健脾。香附。撫芎。枳殼。神麴。麥芽之類。

醫學集要 卷之八

靖江朱鳳台慎人父纂定 同邑朱諤蕭瞻父校

小兒提綱

孺子在襁褓中內無情慾外無勞傷其病大半是胎
毒與傷食外感寒暑而已曰變蒸曰痘疹曰斑爛曰
驚悸曰風癎曰發搐曰痰壅曰赤瘤曰白禿曰解顱
曰重舌木舌諸症豈非孕母不謹流毒之所致歟夫
小兒在胎母餓亦饑母飽亦飽辛辣適口胎氣隨熱

情慾動中胎息輒燥或多食煎燂嗜慾無節或喜
無常皆能令子受患爲母者胎前既不能謹節產後
又不能調護或未滿百晬遂與鹹酸或未週開葷或
當寒反熱或當熱反寒百病生焉。曰吐瀉。曰黃疸。曰
五疳。曰腹脹。曰腹痛。曰水腫。曰瘧痢。曰痰喘。曰發熱。
皆喫物過傷。調養失宜。外感所致也。然稟賦旺者氣
體充實。乳哺寒暑適宜。自無疾苦。有生之後全賴乳
哺。乳寒即寒。乳熱亦熱。情慾無涯。口腹縱嗜。毒釀於

乳而兒病矣。如乳母動肝氣。兒肝亦盛。乳母傷脾氣。
兒脾亦傷。所以先醫謂小兒肝與脾病居多者此也。
庸醫妄用攻下取快。一時脾氣轉損。乃生慢驚癥痢
等病。薛院使醫。按多用補脾法。誠萬世嬰兒之司命。
古人謂小兒爲啞科。以難問症。難察脈也。且臟腑脆
嫩。凡猛狠之劑。及峻寒峻熱。俱難輕投。務宜察色觀
容。如額赤知爲心熱。鼻紅知爲肺熱。左腮青知爲肝
有餘。右腮白知爲肺不足。頰白知腎虛。更參以虎口

三關之脈如魚刺形者主驚風痰熱如懸針形者主傷風泄瀉積熱如水字形者主食積咳嗽驚瘧乙字形者主肝病驚風蟲形主疳蟲大腸穢積環形主肝積吐逆亂紋主蟲珠形主死再以脈之形色辨之其于病情思過半矣

急驚

急驚屬肝屬陽風邪痰熱有餘之症治宜散邪消痰清熱爲主或加減敗毒散或琥珀抱龍丸

加減敗毒散 治急驚風初起發熱手足搐搦角弓

反張一切感冒風寒

人參

柴胡

薄荷

羌活

姜黃

炒

枳殼

炒

地

骨皮

白附子

桔梗

膽星

滑石

天麻

甘草

半夏

製

陳皮

全蝎

去毒等分

薑水煎服

琥珀抱龍丸

治急驚痰涎壅盛發熱氣喘失聲手

足搐搦不省人事面色青紫及中暑氣粗悶亂等

症

南星

爲末臘月納牛膽中砂硼陰乾百日取研四兩

硃砂

雄黃各五錢

麝香

牛黃

琥珀

各一錢

甘草末

一兩

滑石

二兩

姜黃

三錢

全蝎

去毒二錢

天竺黃

薄荷葉

半夏

各一兩

共末煉

蜜丸如芡實大薄荷燈心煎湯沉香磨汁送下

慢驚

慢驚屬脾屬陰中氣虛損不足之症治宜大補脾胃爲主或黃芪湯補脾散加減

黃芪湯 治小兒慢脾風

黃芪炒人參 白芍炒各一錢甘草五分右爲一劑水煎

食遠服

醒脾散 治小兒慢脾風脾困昏沉默默不食

白芍炒人參 白茯苓各五錢山藥二兩木香一錢

陳皮各三錢甘草各一錢白术半夏神曲六錢

砂仁三錢炒去衣蓮子三十粒打碎去心麥冬一錢共末每紅

棗煎湯送下一錢

疳疾

疳病由乳母寒熱失宜。食飲乖違。肥甘過度。喜怒氣亂。便以乳兒故成此病。或因久瀉久痢。久吐久瘧。久熱致脾胃大傷。津液耗極。治宜補脾胃。生津液。戒過用。尅伐藥。消疳湯生津散。消疳丸主之。

消疳湯 治大便色疳白。小便渾濁澄之如米泔。此疳病也。

山楂肉 白芍 炒黃連薑汁炒 白茯苓 白术 土炒

澤瀉各一錢 青皮四分 甘草三分 薏苡水煎服

疳積秘方

滑石

飛淨一觔

赤石脂

六兩

石决明

六箇用長流水加鹽

少許入砂罐煮一晝

夜或麵

一觔

牡蠣

一箇醋煅

石膏

煅三兩

蘆甘石

銀罐燥過

螺蛸

硃砂

黃丹

水飛過

玄明粉

升過以上各一兩

白色者

如糞乾結

身熱腹脹

倍黃丹

嗽而

倍滑石

瀉牡蠣虛

倍硃砂

身熱腹脹

倍黃丹

嗽而

有痰

倍玄明粉

以上十味

各研極細末

和勺聽用

加減以不落水

雄猪肝二兩

竹刀批開細路

摻藥

在內草紮好

米泔煮滾去藥食肝

神府散

鷄肫皮

七箇一兩各

鵝肺

一兩各
箇培爲末

黃荆子末

六兩各

鷄子打破頭

入藥五分紙封。飯上蒸熟。

空心酒下。重者五服愈。

起脾丸

史君子

膽草

蘿蔔子

炒山藥

蓮肉

白朮

麥冬

甘草

澤瀉

各一兩

神麵

當歸

麥芽

山楂

陳皮

穀蟲

生地

白朮

各二兩

黃連

炒一兩半

人參

五錢

俱末米糊丸空心白湯下一錢

生津散 治脾氣虛弱津液耗極致成疳疾

人參

白术

土炒

麥冬

各一錢去心

史君肉

茯苓

白

芍

神麴

炒

山梔

炒

山楂肉

各八分

陳皮

甘草

各五分

分蕪夷仁

六分

山藥

炒錢半

棗水煎服

消疳丸 治疳症

蛤粉

五錢

石燕

火煅一對

穀精草

六錢

俱末

每服藥末二錢

豬肝一兩同煮爛食

癬疾

醫學集驗
癬疾，因乳哺失調，飲食停滯，邪氣相搏而成。初起可用疎散藥一二劑，久則飲食減少，正氣必虛，必先以固胃氣爲主，使養正而積自消。若直攻其癬，癬未必除，則脾土愈虧，而癬疾益盛，且變症百出矣。宜朝服補中益氣湯，夕服消積丸。

消積丸 治癬疾積塊

人參 沉香 琥珀 延胡索 石菖蒲 桔梗

枳實

炒

厚朴

炒

半夏

製

橘紅

黃連

炒

茯苓

各六錢

巴霜

三錢另研

吳茱萸

炮乾薑

炒官桂

去皮各

川烏

炮各入錢

砂

仁

畧炒去衣

木香

柴胡

山楂肉

麥芽

炒各五錢

史君

子

去殼六錢

俱末皂角六兩煎汁丸菜豆大每薑湯下

六分漸加至八分

諸熱

小兒面色青慘而不舒。左額有青紋。手足稍冷。發熱惡寒。無汗。此傷寒熱也。宜羌活防風薄荷蘇葉川芎。柴胡甘菊地骨皮之類。清熱散邪。

面赤而光。手足微溫。自汗。此傷風熱也。宜薄荷甘菊川芎蔓荆柴胡地骨皮花粉。微散清熱。

右額有青紋。目胞腫。身熱而頭額腹肚尤甚。晝涼夜熱。面黃。或吐痢腹疼。此傷食熱也。宜山楂麥芽神麴厚朴枳殼。消食化滯。

面色青紅。額正中有青紋。手心有汗。時作驚惕。手脈絡微動而發熱。此驚風熱也。宜膽星薑黃全蝎薄荷半夏天竺黃荆芥硃砂滑石。消痰清熱。

唇紅頰赤身熱倍能食大小便秘此實熱也宜芩連
花粉大黃之類通利清熱

面色癆黃。身熱不能食。大小便時下。此虛熱也。宜人
參白朮茯苓山藥黃芪甘草助脾補虛。

凡小兒或變蒸而熱。或傷食而熱。或受風寒而熱。或
發痘疹而熱。甚是多端。在醫者隨時靈變可也。

感冒

發熱頭疼。惡寒無汗。鼻塞痰嗽。此感冒也。惺惺散主

之

惺惺散

人參 白朮 炒茯苓 桔梗 瓜蔞根 細辛

甘草 薄荷各等分 薑水煎服

傷食

飲食無節生冷過食宿食停滯中脘肚疼發熱此傷食也消食散主之

消食散

白朮

土炒二錢五分

青皮

神麴

炒橘紅

香附

製各七分

甘草

炙五分

麥芽

炒砂仁

炒山楂肉

各一錢

俱末每服

一錢半

白湯服一錢半

腹脹

小兒脹有虛實。實者消脹散主之。虛者補中益氣湯。
六君子湯主之。

消脹散

蘿蔔子

炒

蘇梗

乾葛

陳皮

枳殼

炒各等分

甘草

少許
薑水煎服

補中益氣湯

六君子湯俱見各症門

嘔吐

嘔吐或因傷乳食。或脾氣虛弱。宜安胃定吐湯主之。

安胃定吐湯

麥冬、半夏

製人參

茯苓

各八分

藿香

六分

白术

二錢

炒沉香

硃砂

各三分

淡竹茹

一錢

木香

五分

薑棗水煎

服

泄瀉

泄瀉因乳食所傷脾虛不運宜參苓白术散主之。

參苓白术散

人參 白术 炒 荀苓 山藥 炒 甘草 炙各
一錢半 薑
汁浸炒 蓮肉 打碎 蔡
去心 蕺苡仁 炒 砂仁 桔梗 各一
錢

俱末每薑棗煎湯調下二錢量兒大小虛實加減

吐瀉

凡小兒脾胃俱傷。則上吐下瀉。極危症也。宜固胃氣爲先。戒用尅伐之劑。白术散主之。

白术散

人参 白术 炒 茯苓 藿香 木香 乾葛

甘草炙各等分 薑水煎服

痢疾

小兒痢疾難以槩治。須分新久虛實。新而實者宜消食化滯。山楂麥芽厚朴檳榔黃連木香枳殼之類。久

而虛者宜補正固胃。參苓白朮散。補中益氣湯。四君

子湯選用。

參苓白朮散

見前

瘧疾

瘧疾因脾氣虛弱不能運化精微。食飲無節。風寒乘
避以致乳食悉變爲痰凝結膈間而作也。初起壯實
者宜清脾飲加減治之。稍久挾虛者補中益氣湯。四
君子湯選用。

醫學集要

清脾飲 見癰疾門

咳嗽

咳嗽因感冒風寒。肺氣不清所致也。宜清肺散邪參蘇飲主之。

參蘇飲

紫蘇 陳皮 前胡 桔梗 半夏製白茯苓

乾葛

枳殼

炒各六分

甘草

人參

木香

各三分

薑水

煎食後服

喘急

小兒喘急。因鬱熱在內。痰氣盛故也。宜下氣瀉熱。清膈飲主之。

清膈飲

神麴炒 半夏製 天花粉 橘紅 丹皮 桔梗各入

分蘇子炒研 麥冬去心 薄荷各一錢 前滑石各六分研

甘草三分 薑水煎服

走馬牙疳

口脣牙根生白點不能食乳者此馬牙也須急清涼
解熱

立効丹

秋石

兒茶

各三錢

五倍

雄黃

各一錢

硼砂

石膏

滑石

各二錢

硃砂

一錢

共末先用薄荷煎湯遍口脣

擦之然後吹藥一日五次

清胃升麻湯 治小兒齒腫流涎頤腫馬牙疳主陽

明之熱

升麻

川芎

白术

炒

白芍

各七分

乾葛

防風

黃連

酒炒二次

生甘草

各五分

軟石膏

煅一錢

白芷

三分

薑水煎服

丹毒

丹毒因火行於外故遊走遍體而赤腫也內服犀角
消毒湯外敷清涼膏

牛旁子

炒四錢

荆芥穗

防風

黃芩

炒各一錢

犀角

甘草

各五分

薑水煎服

清涼膏

五倍子

煅一兩

人中白

煅二兩

青黛

硼砂

乳香

各五

錢殊砂

三錢

雄黃

二錢

共末真醋調敷

喉痺

喉痺因風熱入裏未能發越熱毒上升致喉間腫痛。

內服甘桔湯外吹必効散。

甘桔湯

桔梗

三錢

防風

荆芥

薄荷

黃芩

炒

甘草

各一錢

水煎服

必効散

牛黃六分明礬

硼砂各二錢

秋石三錢

硃砂一片

腦五厘

共末每用半分吹入喉中一日六次

尿濁

小兒尿濁因濕熱在脾宜清熱利濕澄清飲主之。

澄清飲

白术

炒

茯苓

白芍

炒

黃連

炒

薑汁

澤瀉

山楂肉

各一青皮四錢分甘草三分滑石八分水煎空心服

下淋

下淋因鬱熱在膀胱致水道不通淋瀝不出或如沙石或冷淋如膏治宜清熱滲濕快淋散主之。

快淋散

赤茯苓

六錢

牛膝

赤芍藥

滑石

山梔仁

各二錢

車前子

一錢五分

條芩

三錢

當歸

甘草

各五錢

燈心水煎

食前服

小便不通

火在膀胱鬱而不散故小便不通宜煎快淋散加兒茶末一錢扁蓄一錢

大便不通

凡大便不通有虛閉有實熱壅滯若實熱壅而閉者宜大黃枳殼沒藥黃芩玄明粉之類宣通其滯虛閉者宜杏仁蘇子當歸熟地麻仁陳皮之類滋潤其塞各有不同治者宜細審焉

醫學集要 小兒 卷八 水腫

小兒水腫。因脾土虧。不能制水。水無所畏。則泛而上行。致頭面四肢俱浮腫也。治宜大補脾土。而兼以滲濕。忌過用利水尅伐之品。扶脾滲濕湯主之。

扶脾滲濕湯

山藥

白朮

炒各二錢。煮苡仁三錢。

茯苓

地膚子

車前子

人參

各一錢。

澤瀉

牛膝

半夏

各八錢。分製。

陳皮

六分。水棗煎服。

黃疸

黃疸因脾胃中濕熱甚故也。宜茯苓滲濕湯量兒虛實加減。

茯苓滲濕湯

茯苓 茵陳 山梔 黃連 黃芩 防已 白
术炒 苍术炒 陳皮 青皮 枳殼炒 猪苓各一錢 澤

瀉三分水煎徐徐溫服

腦疽

連根巴遊入兩去泥打成把。扎緊燒紅。以碗蓋悶灰。
香油調搽卽愈。如復發。用糯米飯合許蛇退二寸刀
背共剝爲泥布攤貼。任自乾落。永不發。

奶奶

用三白酒瓶二箇。以一箇貯黃豆。布罨口。火煨待油。
出滴入空瓶內。取搽神効。

口瘡

凡小兒口舌生瘡。乃心脾受熱。瘡赤係心臟熱。瘡白。

係脾臟冷。瘡黃。係脾臟熱。吳茱萸末。醋調敷脚心。

一夜愈。以引熱下行也。○又黃連爲末。每一次蜜水

調服。○兒茶

雄黃

各二錢

飄蛸

血竭

薄荷各五分

馬桶垢

打作小塊入黑棗肉中炭火燶連棗用

冰片

麝香

各二分

麝有

硬塊卽疳疔也。加人言四釐

以草紙包人言外用鹽泥封固。假紅放地上冷

取出連草紙用俱研末蘆管吹

追蟲

苦棟根色紅者不用。色黃向陽者佳。刮去粗皮。取白

皮二兩煎濃汁。和檳榔丸菜子大。清晨白湯下三十丸蟲盡下。

通用

保童丸

青皮

蘆薈

陳皮

蓬术

川芎

檳榔

青

黛

五靈脂

白豆蔻

穀蟲各五錢

木香

史君

子肉

蝦蟆末

去頭脚肚皮酥油炙各三錢

如大便燥加當歸

當歸

五錢俱末猪膽汁打糊爲丸。每空心米湯下五分。

桃紅至聖散 治百病痰食驚風俱効

生石膏

一兩

硃砂

一錢

俱末半蜜半水飯上頓熟調服

一二三歲服一錢二分

五六歲服一錢半

八歲至十五歲服二錢半

大人中風服三錢

至寶丹

治內積外感驚熱及胎中諸症以古三方

合併爲末爲丸任用

滑石

水飛過晒乾研末六兩

粉草

去皮蜜炙爲末一兩

和勺另包

益元散

香附

炒三錢一兩

甘草

去皮炒各一兩

山楂

炒各一兩

甘松

二錢

益智仁

六錢
義
术
醋
炒
砂
仁
各三
俱
末
和
勺
另
包
七氣

晒
乾
炒
各七
錢

各三

俱
末
和
勺
另
包

七氣

人
参

桔
梗

炒
各半

甘
草

炒
木
香

各八
分

雲
苓

黃

著
蜜

炒
黃
芩

神
麵

炒
遠
志
肉

甘
草
湯
煮

晒
乾

蜜
汁
炒

各二
錢

山
藥

薑
汁
炒

茯
神

各一
錢半

俱
末
和
勺

另
包

炒
香

散

合
成
大
料

益
元
散

二
兩
五
錢

七
氣
湯

二
兩

炒
香
散

五
錢

三
末
合
勺

蜜
丸

艾
實

大
硃
砂

爲
衣

三
歲
服

一

九
三
歲
至
十
歲

服
立
丸

或
三
末
三
處
收
貯

看
症
宜
以
何
方
爲
君

多
用
二
匙

餘二方爲佐。少用二匙。因症更湯下。

諸驚人、承花湯、赤白痢、陳茶薑湯、泄瀉陳米
飲、盜汗、浮小麥湯、腹痛、薑湯、夜啼、燈草燒
灰湯、潮熱、金銀薄荷湯、小便赤澁、木通湯、
赤白濁、淡竹葉湯、

內傷外感、發熱悸怖、喘咳氣粗、面赤無汗、薑葱湯
下、多服湯、取汗、傷風夾驚熱、咳嗽面青、夜啼停
滯、肚脹作渴、吐酸、小便不清及痘後虛熱、燈心湯、

通乳消腫、大腹皮、薑皮、枳苓、皮陳皮桑白皮湯、

醫學集要外科 卷之九

古績唐雲龍立真父原本

姑蘇孫胤嘉昌所校

靖江朱鳳台真人父增刪

旨歸

醫分內外。繇來久已。但一切腫毒實緣內而發外者。也。素問云。五臟不和。則九竅不通。六腑不和。則留結。爲癰。膏梁之變。足生大疔。又云。氣滯血亦滯。蓋人身。以血氣爲本。若氣血調暢。則五臟六腑。自然宣通。何。

有諸患惟人飲食起居性情好惡不循其宜或酒色過度憂思抑鬱或好椒薑炙燙厚味積溫成熟致血凝滯於陽絡則發爲癰閉寒於陰經則發爲疽苟氣血未敗者患此猶不傷生倘未發前血氣先虧則應發而死非因毒而死也毒無血氣則不能歟腫歟腫者血氣載毒也無血氣則毒不能消解消解者血氣流通也所貴知內知外參究其應在何經絡更審本經血氣多少臟腑虛實毒勢盛衰然後用攻用補用

守。以接引陰陽血氣爲本。解毒散邪爲標。則萬無一失。大都有形必有根。治者貴得其旨。如疽居陰分而少陽。法當扶陰而濟之以火。癰發陽分而少陰。法當疏陽而應之以水。如此救應。方得陰陽中之真水火。所謂治外而不從外治者也。

內經曰。百病皆從虛發。故腫毒根於臟腑。發於經絡。皮膚。醫師明經識症。辨脈得情。方不悞人。經云。無失病機。機字非指病邪而言。貴得人身元氣。應病與不

應病之機爾。

諸毒之作。生有據。主必有歸。如發於喉舌者。心毒。發於皮者。肺毒。發於肌肉者。脾毒。發於筋者。肝毒。發於骨髓者。腎毒。發於上者。陽毒。發於下者。陰毒。發於外者。六腑毒。發於內者。五臟毒。故內曰壞。外曰潰。上曰從。下曰逆。發於上者得之速。發於下者得之緩。感之六腑。則易治。感於五臟。則難瘳。又近骨者多冷。近虛者多熱。近骨者久不愈。則化成血蠱。近虛者久不愈。

則傳氣成漏。然蠱則多痒少痛。或先痒後痛。漏則多痛少痒。或不痛不痒。內虛外實者。多痛少痒。膿血不止者多死。疾潰者多生。或吐逆無度。飲食不時。皆癰疽死症。症候萬端。治法列各經條內。

凡腫毒必由經絡所過。留結而成。故設爲十二經絡之圖。使學者知所主治。而後可用攻守補瀉之法。針灸湯散之工。尤當旁參十二經之虛實。互相煥發而宣化陰陽。平調臟腑。方爲良師。

原病式曰。癰淺而大。疽深而惡。故經言陰邪殺人甚速。如患疽者。亦以治陽經之方藥治之。則速其敗。宜急救陰中之真火。以扶水中之真陽。則陽得陽運。方可獲生。當以八味丸料內。倍加生附子肉桂大劑以補之。佐以生芍藥。約守桂附。使陽得其正。則陰邪解矣。

毒者。陰陽不正之氣。偏勝乖戾之所爲也。因素失謹養。冒寒犯暄。動靜起居違和。失宜七情房勞耗損精。

神兼之甘肥膏梁積壅成病。真水虛而邪火熾。毒所由起也。經曰。邪害空竅。故毒之害人。猶邪害正小人害君子。皆乘虛而入。又從火而生。故名火毒。五行之中。惟水最善。火最惡。人惟真陰不足。故邪火妄炎。或陷陽分爲癰。或陷陰分爲疽。經絡榮衛並受其害。惟得水可解。世人泥以熱治熱之說。不問毒之盛衰。人之強弱。槩施炙焫之法。或有愈者。以火氣能通鬱結。故也。或不中效。則火氣外遏。毒氣反沉。其害轉加。豈

知五行惟水能滅火。何如內服辛涼苦寒之藥。使火得水而自解乎。然水主乎氣。又宜安胃氣爲主。誠使胃壯。則土亦能伏火。水土復。則自然邪不從邪。火不從火。毒不從毒。是火毒原從不正中來。還從得正中去矣。經曰。人生成於血氣。敗於陰陽。順之則生。逆之則死。故以水救火。以氣行血。妙法也。

治腫毒者。欲於危急之際。決斷生死。必先視其胃氣。之有無。谷神不死。則可長生。谷神者。胃氣是也。然胃

居中州之地。藉腎氣鼓動。如胃氣敗者。腎氣先絕也。
每有似毒而非毒者。醫者不審真僞。見其腫痛紅漫。
便曰毒勢甚盛。卽將鐵箍散敷貼。內服敗毒發散之
劑。攻傷胃氣。耗損津液。其毒勢愈甚。非毒而醫成毒
者多矣。殊不知因火邪客於經絡。拂鬱不通。以致氣
血凝滯。津液血脉不能流行。結瘀而爲紅腫。是爲假
毒。宜導引血氣。疏通津液。則熱退結散已。雖然治真
毒亦惟此法。況假毒乎。

醫學新編
卷之三
癰疽脉法

浮腫瘍爲虛爲風。潰瘍爲虛。

沉腫瘍爲邪氣深。潰瘍爲遺毒在內。

遲腫瘍爲虛爲寒。潰瘍氣血虛寒。不能榮養肌肉。

數腫瘍爲熱爲病進。洪數爲有膿。潰瘍爲難愈。

緊腫瘍爲寒爲痛。潰瘍主氣血沉滯爲痛。爲有外寒。

緩腫瘍大而緩爲虛。潰瘍爲病。脈相應。胃氣充易愈。

滑腫瘍爲熱。潰瘍爲熱爲邪氣未退。

濇、腫瘍爲氣實氣滯。潰瘍爲血虛。筋脈相應。
弦、腫瘍爲痛爲欲。膿、潰瘍爲血虛爲痛。

長、腫瘍宜敗毒。潰瘍爲氣治易愈。

芤、腫瘍爲血虛。潰瘍爲虛爲相應。

散、腫瘍爲氣不收斂。潰瘍爲氣血兩虛爲痛。

代、腫瘍爲氣血衰敗。潰瘍爲元氣竭絕。

伏、腫瘍爲陰中伏陽邪。潰瘍爲陽中伏陰邪。爲流注。

浸淫

結腫瘍爲邪氣結滯。潰瘍漸勻則愈。不調則危。
洪實牢促四脉。腫瘍爲邪盛爲熱。潰瘍爲邪氣不退。
難愈。

短微虛弱四脉。腫瘍皆爲元氣不足。潰瘍爲陰陽兩
虛爲脈病相應。

腫瘍要法

機要云。瘡瘍者火之屬。治分內外。若脈沉實。當先疎
內以絕其源。脈浮大。當先托裏。恐邪氣入內也。有內

外之中者邪氣至盛。過絕經絡。故發癰腫。此因先托裏。及先疎通。又先和榮衛也。故大要須明托裏。疏通和榮衛三法。內之外者。脈沉實。發熱煩燥。外無焮赤。痛源於內。其邪氣深。故疏通臟腑以絕其源。外之內者。脈浮數。焮腫在外。形症外顯。恐邪氣極而內行。故先托裏也。內外之中者。外無焮惡之形。內亦臟腑宣通。知其在經。當和榮衛也。用此三法。腫雖未能卽差。必無變症。可使邪氣浸滅而愈。

醫學集解
癰疽源論

丹溪云。癰疽因陰陽相滯而成。蓋氣陽也。血陰也。血行脈內。氣行脈外。相並周流。寒與濕搏之。則凝結而行遲。爲不及。熱與火搏之。則沸騰而行速。爲太過。氣得邪而鬱。津液稠粘。爲痰。爲飲。積久。滲入脈中。血爲之濁。此陰滯於陽也。血得邪而鬱。隊道壅塞。或溢。或結。積久。滲出脈外。氣爲之亂。此陽滯於陰也。百病皆由於此。又不止癰疽而已。又曰。因榮氣盛。偏助火邪。

而作。從虛而出於經絡也。如太陽虛。從背而出。少陽從鬚。陽明從髮。微熱則痒。甚熱則痛。血虛則痛。甚熱甚則腫。甚也。諸經惟少陽厥陰所生。宜預防之。以其多氣少血也。血少而肌肉雖長。瘡久未令必成死症。苟不知此。速用驅毒利藥。以伐其陰分之血。禍不旋踵矣。

辨癰疽淺深論

集驗云。治瘡瘍須辨淺深。腫高而軟者。發於血脉。腫

下而堅者。發於筋骨皮色不相辨者。發於骨髓。又以手按搖瘡腫根牢而大者深也。根小而浮者淺也。初起便覺壯熱惡寒。拘急頭痛。精神不寧。煩躁喜飲冷者深也。雖患瘡疽而起居飲食如故者淺也。深淺之辨吉凶分焉。

辨癰疽虛實論

癰疽須詳虛實。然後用藥。如腫起堅硬膿稠者實也。腫下軟慢膿稀者虛也。瀉痢腸鳴。飲食不入。嘔吐無

時手足俱冷。脈弱皮寒。小便自利。大便泄瀉。聲音不出。精神不興者。臟腑虛也。大便硬。小便濁。腹痛膨脹。胸膈痞悶。口苦咽乾。煩躁多渴。身熱脉大。精神昏憒者。臟腑實也。膿水清稀。瘡口不合。腫而不赤。肌寒肉冷。自汗色脫者。氣血虛也。腫起色赤。寒熱疼痛。皮膚壯熱。膿色稠粘。頭目昏重者。氣血實也。頭疼目赤。鼻塞心驚。咽喉不利。口舌生瘡。煩渴飲冷。睡語咬牙者。上實也。精神不斂。大便自利。腰脚沉重。睡卧不寧。下

虛也。肩項不辨。四肢沉重。目視不正。睛不了了。食不知味。暗嘶聲敗。四肢浮腫者。真氣虛也。狀腫尤甚。痛不可近。積日不潰。寒熱往來。大便秘滯。小便如淋。心神煩悶。恍惚不寧者。邪氣實也。經曰。真氣奪則虛。邪氣盛則實。實實虛虛。一或少差。利害甚大。審之慎之。

癰疽固本論

丹溪云。癰疽因積毒在臟腑。當先助胃壯氣。根本堅固。而以行經活血藥爲佐。參以經絡時令。使毒氣外

發施治之早可以內消。河間治癰腫於外，根淺不深。
形症在表，脉多浮。病在肌肉，非氣盛則必侵於內。急
須內托。宜復煎散除濕散鬱，使胃氣和平。如未已，再
煎半料飲之。如便秘及煩熱，少服黃連湯。如微利，及
煩熱已退，却與復煎散，使榮衛俱行。邪氣不能內傷
也。

癰疽不可妄下論

東垣云：凡瘡瘍而赤，雖有伏熱，禁不得攻裏。爲陽氣

拂鬱邪氣在經。以托裏榮衛湯之類。縱大便日不去。亦宜多攻其表。以發散之中。少加潤燥之藥汗之。則愈切不可下也。

陽氣脫陷論

瘡癆陽氣脫陷者。或因誤服尅伐之藥。或因膿血太泄。或因吐瀉之後。或因入房過度。或因潰後勞役。元氣虧損。或夢遺精。脫便血。或因虛而外邪乘之。或誤用寒涼等藥。皆能致氣血脫陷。故顯發熱頭痛。小便

淋漓或滑數便血。目赤煩喘。自汗發熱。氣短頭暈。體倦熱渴。意欲飲水。投水不入。身熱惡衣。揚手擲足。汗出如水。腰背反張。鄭聲不絕等症。此無根虛火之假熱也。若畏寒頭疼。咳逆嘔吐。耳聵目矇。小便遺瀉。痢腸鳴。裏急腹痛。玉莖短縮。冷汗時出。齒牙浮腫。肢體麻痺。或厥冷身疼。或咬牙嚼唇。舌根強硬。此陽氣脫陷之真寒証。皆勿論其脉。勿論其症。但見一二急用參附補之。多有復生者。

分經用藥論

瘡瘍止發於一經或兼二經者。止當求責於此一二經。不可干擾餘經。以致犯禁壞逆之變。尤當隨經絡氣血多少用藥。蓋氣多之經宜行其氣。血多之經可出其血。若夫少陽厥陰。雖曰多氣少血。然氣血皆不足。一見癰腫。便與滋補。可保終吉。

腫瘍論

腫瘍者。言癰疽未潰也。蓋癰疽初起。須審其經絡。所

爲勢之腫漫。色之赤白。痛之微甚。毒之淺深。氣之虛實。若腫高。焮痛。便利調和。邪在表也。宜表散之。腫硬痛深。大便閉滯。邪在裏也。宜利導之外。無拘急。內無閉塞。便利調和。邪在經絡也。宜調和榮衛。腫焮不痛。或麻木不痛。邪氣凝滯也。宜活其氣血。若煩燥飲冷。赤痛外熱。二便不通。火熱內熾也。宜清涼解毒。若人飲食疎。精神衰。氣血弱。肌肉消。宜參芪大補。若微腫微痛。或不痛。陽氣虛也。宜參芪托裏。微黯微赤。或不

亦真氣虛寒也。宜參附補氣。若虛寒而不作膿。膿成而不潰者。陽氣虛也。宜參附以回陽。癰疽論云。腫瘍內外皆壅。宜以托裏表散爲主。但見腫痛。參之脉證虛弱。便與滋補。元氣無虧。可保終吉。若不分受病之因。兼証之經。槩行敗毒。妄擾諸經。誅伐無過。必致不起發。或不潰不斂矣。

潰瘍論

潰瘍者。言癰疽膿潰也。膿出肉腐。氣血兩虛。邪氣亦

退脉之洪數漸宜減退。赤腫漸收疼痛俱減者爲順。
但見膿後須以補氣血藥爲主。解毒佐之。若破後不
潰瘍口堅硬者。風也。宜托裏以散風。若潰後而瘡肉
不去者。陽氣弱也。宜助胃以壯氣。若潰而瘡口易收。
乃氣血中餘毒。不至分消。即使長肉生肌。必防流注
之患。宜托裏以消毒。若潰後根脚尤焮赤。反展開瀾。
或不痛。此正氣虛。毒氣不退也。宜助正以消毒。若膿
潰腫痛或發寒熱。氣血虛寒也。宜大補氣血。若潰後

嘔吐食少。脾胃虛弱也。宜開胃健脾。手足並冷。脾氣虛寒也。宜姜附以溫氣。若潰後而仍痛。或二便閉塞者。熱毒未解也。宜清熱消毒。熱退而渴不退。津液不足也。宜滋液生津。熱退而小便淋數。腎虛也。宜補金以生水。熱不止。或腹痛反甚者。虛熱內作也。宜健脾壯水。熱退而肌肉不生者。氣血俱虛也。宜大補氣血。肉雖長而色紫者。遺毒也。宜助正解毒。瘡色太白。或陷下不歛者。寒氣所襲也。宜溫氣以散寒。膿血過多。

煩躁不安者陽脫也宜獨參湯以助陽癰疽論云潰瘍內外皆虛宜以托裏補接爲主蓋潰瘍之變皆因腫瘍治失其宜虧損元氣所致誠能謹之於始則無後患矣

內消法

集驗云癰疽之症無定處欲令內消於初起施行氣活血解毒消腫之藥審淺深大小經絡所形脉證虛實各隨本經標本寒溫氣血多少以行補瀉如發於

胸背腰項鬚膾者。太陽經也。宜清熱解表。腰連脇處爲近少陽。宜疎邪輔正。諸經惟少陽一經。雖多氣少血。然氣血皆不足。治與氣血兩虛同法。脈實者。宜疎利以消毒。脈虛者。宜助正以驅邪。氣虛者。參芪爲主。血虛者。歸芍爲君。腫痛發熱。大便秘結。邪在裏也。宜疎通之作痛寒。熱頭痛。邪在表也。宜解散之。歟。痛腫甚邪。在經絡也。宜和解之。微腫微痛而不潰。氣血虛也。宜補托之。黯微腫痛而不潰。潰而不斂。陽氣虛也。

宜溫補之人知瓜蔞射乾山甲銀花連翹地丁大黃之類爲內消之藥。內消丸牛膠飲。柞木飲返魂丹爲內消之方。不知補瀉虛實平治寒溫使氣血各得其常。不治腫而腫自消也。

內托法

癰疽已成血氣虛者。邪氣深實者。邪氣淺散漫者。不能突起。亦難潰膿。或破後膿少。或膿清稀。或堅硬不軟。或難得膿。而根脚紅腫開大。或毒氣不出。瘡口不

合。但腫不赤。結核無膿者。皆氣血虛邪盛之故。必須
內托。令邪氣出於肌表。則易愈矣。若膿已出。敗肉去。
紅腫消。當大補氣血。使肌肉易長。人知驅毒。卽爲內
托。不知補氣血。正所以托內也。

止痛法

瘡癆症候。或寒熱虛實。皆能爲痛。止痛之源。須審邪
之所在。証之所因。如寒熱而痛。邪在表也。宜解散之。
便閉而痛。邪在裏也。宜利導之。焮腫而痛。血氣凝滯。

也宜散滯活血。作膿而痛。宜托裏消毒。大痛或不痛。
或麻木。毒氣盛也。宜固正驅邪。膿脹而痛。宜內托而
潰膿出而反痛者虛也。大補之。穢氣所觸者。和解之。
因熱而痛者壯其水。因寒而痛者溫其氣。因風而痛
者散其風。因濕而痛者導其濕。燥而痛者潤之。塞而
痛者通之。惡肉侵潰者引之。經絡壅滯者活之。陰陽
不調者和之。大抵癰疽不可不痛。若大痛悶絕者危。

生肌法

人知收濬之品。可以生肌。不知生肌之法。當先理脾。胃助氣血。肌肉乃脾胃所生。收斂乃氣血所主。二者相濟以成者也。故潰後收斂遲速。皆由氣血盛衰。肌肉不生而色赤。脾虛血熱也。助脾以清熱。肉白而不斂。脾虛氣寒也。健脾以溫氣。脯熟內熱陰虛也。壯水爲主。膿水清稀。氣血俱虛也。太補爲先。少食體倦。脾氣虛也。補中益氣。煩熱作渴。起居如常。胃熱也。生津止渴。若瘡癆久不愈。皆元氣不足。或因邪氣凝滯於

忠處。能調補脾胃。則元氣自足。邪氣自消。死肉自去。
新肉自生。而瘡自斂。使不保其本。而徒治末。能免後
患乎。

別瘡瘍五善七惡

瘡瘍之作。皆由膏梁厚味。醉酒炙燙。房勞過度。七情
鬱火。陰虛陽轉。精衰氣弱。命門火衰。不能生土。土不
能生金。水絕其源。邪火獨熾。外邪內襲。氣血受傷而
爲患。當審其經絡。受症標本。緩急以治之。若病急而

元氣實先治其標。病緩而元氣虛先治其本。或病急而元氣又虛必先治本而兼治標。然症有五善七惡。五善者動息自寧飲食知味便利調勻膿潰腫消水鮮不臭神采精明語言清朗體氣和平是也。此屬腑症病微邪淺更能慎起居節飲食雖勿藥自愈。七惡者大渴發熱或泄瀉淋閉邪火內淫一惡也膿血既泄腫痛尤甚膿色臭敗胃氣虛而火盛二惡也目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上視肝腎陰虛三惡

也。短氣喘粗。恍惚嗜卧。脾肺虛火。四惡也。不能下食。
服藥而嘔。食不知味。胃氣虛弱。五惡也。聲嘶色敗。唇
鼻青赤。面目四肢浮腫。脾肺俱虛。六惡也。體弱不食。
膿泄太多。臭穢異常。七惡也。此五臟虧損之症。多因
元氣虛弱。或因膿水出多。氣血虧損。或因汗下失宜。
榮衛消爍。或因寒涼尅伐等藥。胃氣受傷。以致真氣
虛而邪氣實。外似有餘。內實不足。純補胃氣。多有生
者。不可因其惡而遂棄之。大抵五善見三則瘥。七惡

見四則危矣。

辨瘡瘍陰陽治法難易

屬乎腑者爲陽。屬乎臟者爲陰。治陽易而治陰難。何也。陽從實發。陰從虛起。實者或汗散。或疎利。其毒自愈。至於陰疽。外無形症。內多虛弱。汗散則虞亡。陽疎利則慮亡。陰惟宜參附大補命門之火。以生土。土健則根本固。陽氣一旺。而陰邪自不敢爲患。苟徒恃丸伐之。品以驅毒。毒未必去。而危症立見矣。

壞証治法

凡患腫毒。有他醫已經汗下炙焫攻傷。以致毒陷。而醫反言毒勢盛。再進攻毒之劑。致胃氣受傷。精血耗極。將立憊者。宜急救氣血。使毒得所資化以生膿。方爲上策。如氣虛不能作膿。血虛不能生膿。宜急補托裏氣虛。宜大劑人參以補元氣。表氣虛。宜大劑黃芪。以助表陽虛熱。佐甘草以瀉陰火。血不足。補以熟地。血熱涼以生地。和以當歸。血中滯者。使以川芎。血不


足不能應毒者。宜大劑歸芍。氣凝而生虛熱者。加桂以溫其血。未破者。加木香以破滯生膿。口未滿者。加白芷金銀花。入補養血氣藥中。或攻治太峻。則傷中氣而生虛煩。宜加麥冬五味。倍用人參。或脾胃虛弱。宜參苓术草以固本。不然恐生變症。如腎水不足者。早辰宜服六味地黃丸。無使妄動而生虛火。或腎氣虛寒。宜進增損八味地黃丸。以扶命門火。資生元氣。

瘡瘍提綱

大抵外科綱領。重在知氣血。兼參七情調理。須問其未病之先。所喜何事。所爲何因。喜食何味。致今日所苦之源。方免實實虛虛之禍矣。

問曰。寸口脉微而澁。法當亡血。若汗出。設不出汗者。云何。答曰。若身有瘡。被刀器所傷。亡血故也。浸淫瘡。從口起。流向四支者可治。從四支流來入口者。不可治。

足太陽膀胱經



足太陽膀胱經

足太陽經由眼大角循額上髮際入絡腦下項循肩
膊內挾脊抵腰中過膝膕以下貫膍內出外踝之後
循京骨至足小指外側之端此經係諸經之綱領衆
臟之川原內之有形者莫不係於背故十二經之陽
著於此患者惡極變異死生關係以此經太陽主
司邪氣難入也因本經不足則標邪湊之況是經多
血少氣若陰逆則陽失其宣化之令血氣凝結閉塞

清道而氣血不能止復歸源著而成毒因而下焦腎
肝不足結爲下搭中焦脾胃兼虛結爲上搭上焦心
肺不足結爲對口枕癰夫陰勝於陽者發爲癰腫爲
可生陽虛陰弱者結爲疽陷而不起不知疼痛內症
不覺口微乾而煩者爲難起患癰者宜宣陽救陰養
水以滅火無使毒陷內攻五臟患疽者宜救陽歸陰
使毒焮發無使毒陷害於元神方可免死

下搭背主方

白芍

三錢

熟地

枳殼

木瓜

各二錢

貝母

五錢

牛膝

黃柏

各一錢

山楂

兩

長流水三盞

先將貝母山楂枳

殼煮四五沸

再入衆藥合煎至一鍾，饑時熱服。

上搭背方

白芍

白术

貝母

各五錢

長流水煎食，遠熱服。初

起時宜日夜進二服。

對口枕癰主方

貝母

二兩

木香

一兩

長流水煎，不拘時服。

足少陰腎經

酉

中行正發灸疮即與腎經同法



足少陰腎經

足少陰經。從腳底心湧泉穴起。循內踝之後上膚。內出膚內廉。上股內後廉。貫脊屬腎絡膀胱。上貫肝膈。入肺中。循喉嚨。挾舌本。是經多氣少血。主司生化之源。因浸淫縱慾。邪火抑鬱。燥熱而患毒法。當活血通經。清肝潤燥。不可攻毒以傷陰。蓋陰傷則毒愈結。留滯而不去。變症多矣。凡魚口便毒後而成癰瘡者。多由此也。其或毒留咽喉。則終身遺害。可不慎與。喉

癰本於腎熱法當清腎以瀉心火。經云諸瘡瘍皆屬心火宜服後方。

玄參 天冬 各二錢 枳殼 一錢 山楂 五分 貝母 知母
各三錢 長流水煎隨便徐服

吹藥方

薑絲 十尾燒存性 雄黃 砧砂 分各八分 秋石 五錢 水片 一分
薄荷 三錢 滑石 二錢 真血竭 兒兒茶 砧砂 錢各一錢 俱末

下午吹入患處。

便毒魚口。或治以攻毒之劑。倐而獲効。其害人實甚。
殊不知此爲淫邪中於陰分。名爲陰結。法當破陰以
行陽。使陽得令則解矣。宜服後方。

山楂

五錢歸尾三錢川芎

枳殼各一錢

生地

白芍各二錢

檳榔

木瓜

貝母

黃柏

知母

各二錢牛膝一錢

五分河水煎食遠服日進二服

如他醫治過。瘡口不收。用甘草湯溫洗過。將赤砂糖
敷。日夜換三次。卽收口。

重舌 將前吹藥點宜服後方

山楂 生地各三錢 陳皮 甘草各一錢 黃連半錢 水

煎隨時徐服

癱瘓○由腎虛濕熱所致。每早空心服六味地黃丸。

加肉桂一兩

膏藥方

建猪骨髓一兩 輕粉七錢 乳香 松香 雄黃 血竭

各二錢 砥砂 石龍骨各一錢 炒甘石三黃水煅過三錢 香油

一兩
五錢

黃蠟四錢 鎔化和前藥勻成膏攤貼



手厥陰心胞絡經



手厥陰胞絡經

手厥陰由乳後天池穴起上腋循臑內下肘中入掌出中指之端中冲穴止是經多血少氣主司化生陰血因煩勞憂鬱而成毒法當通經理氣和血戒傷損血氣用清化之劑以宣和之當服後方

貝母 白芍 天冬 麥冬 枳殼 丹皮

各二錢


金銀花 山楂

各五錢

先將金銀花用水三碗煎二

碗方入衆藥煎一碗服

亥 手 少 陽 三 焦 經



手少陽三焦經

手少陽經由小指次指起循手表腕上貫肘上肩入缺盆布膻中上項繫耳後出耳前下頰至項是經多氣少血主司諸陽因表裏失於參和妄想失意三陽火動無所止息致煩熱拂鬱而生毒法當宣調陽火使陽復陰行統諸陽而運陰則自解已若妄投敗毒之藥過傷中清之令而敗其血脈必變生雜病矣結核瘤氣由三焦之陽氣不清則陰水不及故陽氣

鬱結而爲核爲瘤。初宜灸關冲陽池二穴以絕其根。
外貼琥珀千搘膏。空心服六味丸以取充任三焦之
水使水足則經絡自清氣道自暢兼服平肝救金水
之劑使少陽得令宜服後方。

天冬 麥冬 川芎各一錢 當歸七分 白芍 要母

桑皮各二錢 生地 山楂各三分 枳殼一錢 長流水煎

食遠熱服

子足少陽膽經

足少陽膽經




足少陽經。由眼小角外起。上抵頭角下耳後循頸至肩上。入缺盆以下。胸中過季脇以下。合脾厭中以下。循脾陽出膝外廉直下。抵絕骨出外踝之前。是經多氣少血。主司決斷。由真陽失令。狐疑不決。以致陽火抑制耗爍陰液。留結而爲瘰癧。法當補陰以舒陽。使陽氣振則經絡宣行而解矣。

此經與手經同治法。蓋膽與三焦二經不從標本而從乎中治者。以二經皆由相火之所司故也。

足厥陰肝經

足厥陰肝經



足厥陰經由足大拇指大敦穴起上內踝循膝關內廉上循股陰還繞陰器抵小腹斜上季脇抵乳下期門穴是經多血少氣主司將軍又爲陰盡之處或因暴怒抑鬱逆則陽無所施而陰失所宣運血凝氣滯而毒生法當活血破氣開結若攻毒太過恐陰盡之處難收功也

主方○山楂

白芍

各五錢

肉桂

一錢

木瓜

牛膝

各三錢

枳殼

二錢

先將甘草節五錢煎湯三大盞後入衆藥

手太陰肺經(寅)

煎一盞服



手太陰肺經

手太陰經。起於中焦。循胃口上膈。橫出脇下。循臑內下肘中。入寸口上魚際。出大指之端。是經多氣少血。主司相傳。其體陰而用陽。因憂疑不樂。以致氣滯血結。則肺胃不沖。留結爲毒。當舒陽和血。養肺助胃。

主方

白芷

炙甘草節

各二錢

桂枝

金銀花

各三錢

白芍

木香

各五錢

長流水煎食後服

手陽明大腸經

卯



手陽明大腸經

手陽明經起大指次指之端。循指上廉。出合谷兩骨之間。循臂上廉。入肘外廉。上肩出髃骨之前廉。下入缺盆。上頸貫頰。入下齒中。還出挾口。是經多氣多血。主司傳送。因過食辛熱厚味。有傷脾胃成毒。當清利滋融。宣通氣血。蓋大腸本燥金之化屬庚。然與乙木相合。得肝血以潤之。諸毒自解。初起宜服四物冲和湯。下午將茶化下琥珀丸。使內清則外自解。如他醫

以毒藥攻傷則胃氣弱而正氣虛急宜理胃生陰服
後方。

石菖蒲

扁豆

各五錢

白术

貝母

生地

白芍

各三錢

薏仁

麥冬

各二錢

甘草

一錢

將菖蒲用水三盞

煎一盞後入衆藥煎一盞隨便服。

足陽明經〔辰〕



足陽明胃經

足陽明經。起於鼻之交頰中。下入上齒中。還出挾口。循頤出大迎前。下人迎循喉嚨。從缺盆下乳內廉。入氣街中。以下髀關。抵伏兔下膝臍。循脛外廉下足跗。入中指間。是經多血多氣。主司水穀之海。蓋陽明藉甲膽之氣而宣化。若憂怒傷陽。則陰無所化。濁氣壅結而生痰核乳癰等症。當破氣活血散邪。開鬱治法與手經同。

足太陰脾經(巳)

足太陰脾經



足太陰經。起於足大指之端。循指內側白肉際過核骨。從上內踝前廉。循胫骨上膝股內前廉。入腹上膈。挾咽連舌本。是經多氣少血。主司運化。因憂思抑鬱。不得其志。久則伏於肉骨之間。名曰陰毒。當溫骨則肉和。肉和則毒化。若妄攻之。則傷胃損脾。恐成冷漏。

主方

石菖蒲 貝母各一兩 肉桂 牛膝各三錢 木瓜

白芍各五錢 長流水煎日進二服

經心陰少手(午)



手少陰心經

手少陰經。從心系上肺下出腋。循臑內後廉下肘。循臂內後廉入掌內後廉。至小指內側。是經少血多氣。王司神明。因人游思妄想。志意不遂。致傷陽神而患毒經。曰諸病瘡瘍。皆屬心火。此一經應十二經之變化。然因本經受病爲實邪。如從他經傳症爲虛邪。宜救腎水以奉養心火。使其無變。尤須臨機救應。

主方○黃連酒洗甘草炙各三錢白芍一兩貝母五錢水煎熱服

手太陽小腸經(未)



手太陽小腸經

手太陽經。由手小指外側起。上腕循臂骨下廉出用內側兩筋之間。上肩胛入缺盆。循頸上頰入耳中。是經多血少氣。主司受盛。屬丙爲陽火。而丙辛又化水。水火失調。則不能變化而毒成。當宣通清解。

主方

山楂二兩 貝母一兩 白芍各一兩 長流水煎熟服

附神効膏藥三種

琥珀干搘膏

草麻肉

四兩

真爪兒血竭

真乳香

沒藥

松香

各二兩

株砂

兒茶

各一兩

蟾酥

人乳酒浸開

硇砂

各五錢

冰片

三錢輕粉

八錢麝香

二錢

先將草麻搗爛次入松香

搗次入蟾酥同搗七百下再入衆藥末搗千下將
磁器收貯黃蠟封固以酒煮化青絹攤貼患處未
成膿者卽消

收口神異膏

新鮮健豬油

入兩

白蠟

四兩

冰片

麝香

各一錢半

沒藥

各半錢

血蝎

海螵蛸

兒茶

輕粉

象皮

赤石脂

各五錢

俱末。先將豬油熬去渣淨。再熬滴水成珠。入

蠟熬化。傾磁瓶內。稍冷定。入前藥末和勻。連瓶入

鍋水煮片時。取起攤用。

萬金膏

黃丹

三十兩製同前

真降香

沉香

檀香

麝香

乳香

各三錢

真麻油四觔。金銀花二觔。俱入鍋內熬

枯瀝去渣。再熬滴水成珠。入人參四兩。文火熬數沸。漸下丹。待成膏時。稍冷定。入前藥末和勻。將磁瓶收貯封固。此膏治背瘡諸大毒。收口神應。

收口靈藥方

鉛粉舊銷銀確煅

輕粉

白蠟

珍珠

爐甘石

紅去墜底粉

殼紅用童便淬黃芩黃柏黃連湯共殼三次

各一錢水片

三分

寒水石

銀確

煅紅瓦蓋防海螺硝

河水浸卽土牆上小

燥先研細末

海螺硝

卽土牆上小

白螺灰

卽土牆上小

白螺殼洗淨

去泥

各二錢共成末確貯聽用

萬聖乳金散

粉霜

飛過升打三次

真輕粉

石粉

卽禹餘糧粉各一兩

蟻螺

一箇酒洗

炙燥

龍腦

三錢

俱末。

先將猪蹄湯用竹紙抹去油加

川椒三錢

葱五根

食鹽二錢全煎數沸

淋洗患處

拭乾將藥末掃上

外用萬金膏護貼

溫分融陰湯

治毒初起痛甚增寒壯熱

白芍

八錢生用

能收陰氣以宣行陽道應金得水以應

土。

肉桂

三錢

凡用白芍必用桂能溫分肉行陰從

陽。又接引少陽。應陽明。肌肉以通瘀壅。白芷一錢。

三

入陽明經。爲引經聖藥。得此辛者。伏腐臭以化爲

神光。如瘦人。或中氣不足者。加紅棗十枚。通經絡

以助中氣。而勝外邪。長流水煎。半饑半飽時熱服。

衝陽宣陰從化湯

胃氣壯者宜此。胃氣弱者宜前方
加人參三錢

貝母四兩用長流水五碗煎湯三碗去貝母入
後藥煎至一大盞入無灰好酒一杯和服白

芷各五錢山楂八錢淮生地八錢臨服時磨真廣

木香一錢和服

從陰溫髓湯 治陰疽

人參一兩 白芍八錢 肉桂三錢 熟地五錢 附子

輕則一錢 重則三錢 水

煎不拘時熟服。善飲者加酒半盞。以助藥力。

癰疽兼外感內傷

凡患惡毒或已潰未收口。又外冒風寒。及傷飲食。致發熱頭疼腹痛等症。此因先虛其本。而後致其標。宜照婦產後法治。先保氣血。毋使妄動觸犯。本毒宜服

後方

養榮保化調中湯

丹皮 山楂 白芍

各三錢

生地

二錢

氣弱加人參

二錢 血虛加熟地

二錢 天冬

去心一錢半

長流水煎

食遠熬

服。如服後熱退身涼。遙日用補托法。如未退。再服前劑。必待熱退爲止。戒換方。

患毒兼泄瀉者。宜理氣以健脾。使氣旺善食。乃生腫長肌。或頭眩晕。亦宜服此藥。由脾氣不足。致精血少生故也。

溫中消毒托裏湯

人參

微炒

白扁豆

炒去殼各五錢

甘草

炙入分

雲术

土炒石斛水鹽

洗飯

白芍

煨各三錢

白芷

二錢研分

砂仁

研七分如腹疼加山楂

一錢水煎食前熱服

患毒不論已未收口。如陰虛火動。宜扶三焦之源水。
以生胃氣服後方。

益陰養榮湯

人參

淮熟地

各三錢

天冬

麥冬

各半錢

丹皮

生

地各二錢肉桂一錢水煎食遠熱服

腫毒由積鬱而成無論已未收口宜服後方。

益陰冲和湯

人參 生地各五錢石菖蒲 山楂 白芍各三錢長

流水煎加酒一盃食遠熱服。

高年患毒由陽衰血弱精水不足宜服後方。

八味地黃湯

人參三錢白芍 熟地 附子各二錢白茯苓 肉桂

山藥

各一錢

當歸

半錢

水煎食遠熱服

患毒由胃弱脾虛。勞役過度。宜後湯調理。兼腎虛者。
空心服六味丸。

補中益氣湯

方見勞傷門

血虛者加蒸晒熟地

二錢

肉桂

五分

患在下部及脚軟者。加牛膝肉錢半。長流水紅棗

煎食。遠熱服。夏月加麥冬錢半。五味子五分。陰火

動者加炒黃柏八分。

憂慮過度而患毒。宜服歸脾湯

方見勞傷門

胃氣弱食少。中虛而患毒。與諸毒不同。他毒曰胃氣壯。雜食過度。故毒甚。若因氣弱血滯而來。其症輕。但人不勝任而覺重。宜培養胃氣。使之善思肉食。其痛乃止。已成易膿。未成易消。宜服後方。

加味四君子湯

雲术

炒五錢

人参

黃芪

各三錢

炙甘草

節分人石斛二錢

扁豆

炒去殼二錢

白芍

酒炒各一錢

棗水煎晝夜

頻頻熟服

腫毒未收口暴怒致瘡裂痛甚急平肝養血服。

平肝養衛湯

白芍

五錢
麥冬

二錢

肉桂

一錢

白芷

熟地

丹皮

各二

錢

各二

歸身

半錢

氣虛者加入參三錢長流水煎不拘時熟

服

益陰扶陽湯 治夢泄遺致瘡潰不收口

枸杞

五錢

白芍

白术

熟地

人參

各三錢

長流水

大棗煎食遠熱服

疔瘡

疔瘡初生或腫或陷青黃赤黑無定色煩躁悶絕嘔吐惡心或先痒後痛或先寒後熱熱後復寒四肢沉重心驚眼花刺瘡口不痛無血是其候也生兩足者有紅絲至臍生兩手者有紅絲至心生唇面者有紅絲至喉須用針挑破其絲使出惡血隨用拔疔膏貼瘡上服清心消毒至寶丹切禁火炙仍察表裏虛實上下用藥脈浮數者宜散之脉沉實者宜疎利之表

裏俱實者。解表攻裏。麻木不痛與大痛者。速治。須於四畔刺出惡血。生下部者尤宜。蓋至陰之下。道遠位僻。藥力難到。若用峻劑。恐藥力未到。胃氣先傷。故宜出血也。

拔疔膏

西牛黃三分 大白珍珠七分 腐製金頂砒 真蟾酥乳浸

腐製

金頂砒

真蟾酥

乳浸

明雄黃一分 大硃砂

一分

白鵬砂

騰黃各八分

各八分

番硇砂

砂五分 血竭

滴乳香各四錢

沒藥二錢

各二錢

輕粉

兒茶各三錢

各三錢

錢俱末用草麻仁共搗成膏密貯聽用。如日久藥乾。用草麻油潤。每遇疔瘡。約其瘡形大小。以一餅貼過日更換。其疔即出。

清心消毒丹

滴乳香

四錢

明雄黃

沒藥

琥珀

各三錢

菜豆粉

川貝母

去心各一兩

硼砂

二錢

血竭

大硃砂

明礬

阿膠

蛤珠各五錢炒成

其末

每服二錢

甘菊

七克

金銀花

各五錢

煎湯下

毒輕者日一服

毒重者日二服

追毒丸 治疗毒陰疽等重症

蟋蟀百枚燒酒浸二時。取起以童便煮一滾用土
包。煅末聽用真蟾酥九錢去木骨淨燒酒浸一宿。
待溶軟用前蟋蟀末三錢與酥和勻分爲五分先將
一分捏作餅火煅存性研碎又以一分作餅再煅
再研如此五次完。蜈蚣去頭足炒枯二分雄黃一
錢俱末與前藥末和勻聽用。凡用麝香一分和勻
前末五分以甘草膏爲丸。胡椒大飛過殊砂爲衣。

醫學綱要
卷九
大人五六丸。小兒三四丸。毒在上部酒下。在下部白湯下。毒輕者服藥卽嘔或瀉可減一丸重者服藥不嘔瀉再加一二丸量人大小虛實用之忌羊肉。此方臨用爲丸見効尤速若丸久藥乾則難化而効緩矣

甘草膏。○甘草節四兩水三碗煎一碗濾汁貯。再以水二碗煎一碗濾汁再入水一碗煎半碗濾汁淀清去渾脚再熬至一小碗以赤砂糖色爲度如嫩再晒。

煎藥方

甘菊花

川貝母

金銀花

各二錢

半枝蓮

一錢

赤

芍

遜翹

地丁

生甘草

天花粉

乳香

各一

錢

皂角刺

玄參

薄荷

歸尾

柴胡

白芷

各八分

水煎照病上下服

針刺瘡出血。冷水調東丹明礬等分數。

流注

流注之源或因憂思鬱怒。虧損肝病。或因飢飽勞役。

復傷氣血。致榮氣不從。逆於肉理。腠理不密。外邪客之。亦有濕痰。及跌撲血滯。因而氣流而注。血注而凝。或生四肢關節。或流胸腹腰臀。或結塊。或漫腫。皆屬虛損。若腫起作痛。肢體倦怠。病氣有餘。形氣不足。尚可治。漫腫微痛。形氣病氣俱不足。最難治。總宜十全大補。八珍歸脾。補中益氣。六君諸湯。加減。忌攻利之藥。使元氣愈弱。

敷藥方

五倍子

五兩炒

陳小粉

四兩炒

乳香

四兩

沒藥

一錢

血竭

兩
雄黃

輕粉

各五錢

共末葱汁加醋調敷

煎藥方

人參

三錢

黃芪

炒木瓜

肉桂

歸身

杜仲一錢

白术

土炒

貝母

山藥

金銀花

各二錢

木香

白芷

砂仁

炒研

甘草

乳香

陳皮

各八分

煨薑棗水煎服

病上下服

懸癰

屬任督二經。此處名海底穴。又名會陰穴。乃真氣過
腎處。或入房恐精不洩。或用房術藥。霸截精道。或用
力入房。致傷元氣。氣弱不行。以致邪氣乘虛而入。結
毒於此。務貴速消。若破損出膿。最難收斂。久則成漏。
元氣到此。則洩必成虛損。始終俱用參芪滋補。切戒

攻毒

服藥方

沉香

磨

陳皮

黃芪

炒

白芷

玄參

丹皮

肉

桂 茯苓 乳香 各人分 人人參 山藥 炒杜仲 炒白

术 土炒各二錢 甘草 五分 金銀花一錢 煙燭水煎服

敷藥全前

乳岩

屬肝脾二經。鬱怒氣血虧損。故初起小核。結於乳內。肉色如故。內熱夜熱。五心煩熱。肢體倦怠。婦人則月經不調。加味逍遙散。効瓜蔞散。多自消散。若日積月久。其核漸大。色赤。出水腐潰。深洞如岩穴狀。歸脾湯。

及多用參可治。若悞用攻伐。危殆立至。

未潰服藥方

人參二錢白术一錢半木香 橘紅 乳香 茯苓
白芷各八分川貝母 當歸各一錢甘草五分加圓眼煎

食後服

已潰服藥方

人參三錢五味子三分黃芪一錢山藥炒上白术炒各二錢
蓮子廿粒去心山茱萸 神麴炒茯苓 麥冬各八分

甘草五分
加棗煎食後服
敷藥同流注

已破滲藥方

硃砂四錢
血竭一兩
乳香一錢
黃魚腦骨各一兩
假存性一錢
輕粉入

真降香六錢
紫河車各五錢
琥珀二錢
珍珠各五錢
腐梨一錢
龍骨二錢

半煅共末人參二兩煎濃膏和諸藥調勺燥乾再
研細末掺。

香白芷 川貝母各五錢
水酒各一碗煎八分溫服。
如有膿卽從乳孔出硬腫卽潰潰後用貝母末滲。

易完口。

腸癰

病腸癰者。身體甲錯。腹皮急。按之濡。如腫狀。小腹腫。按則痛。小便數如淋。時發熱自汗。復惡寒。其脈遲緊。膿未成下之。當有血。脉洪數者。膿已成。不可下。服後湯。

葵根湯。腸癰已未成俱効。

葵根一兩陳皮各二錢皂刺各二錢金銀花各三錢甘草節各三錢

薑水煎服

眼

一人眼痛。大便難解。服大黃八兩。眼微退。便漸滻。或閉。調理二月。舌口燥。內熱煩悶。腰如火燒。胸膈痛。一日一吐。諸藥不愈。發熱自汗。五月後復邀治。曰此內傷不足症。再用寒涼必死。病者曰。吾乃火也。又遇數月初用保元湯。加附子乾薑肉桂白朮當歸四劑。微汗將至。五劑而身微疏暢。至三十劑。用三斤半大便。

順身熱退而怕寒。後更加鹿茸服參二斤。來年六月。
仍不能去綿衣被。後服附子八十。桂薑鹿角膠各十
斤。乃愈。

洗各種眼病

川黃連三分杏仁三粒去油輕粉五厘歸尾一分明礬三厘共入
磁器內。以天水一茶盃。煎至大半盃。用綿紙蓋隔。
取紙上清水。蘸洗。并挑入眼頭角內。閉目片時。其
苦水從鼻中流出。紅減腫消。昏者即明。

治火眼

童便調乾黃泥。臨睡時敷上下眼皮三次愈。

火丹

芒硝入黃瓜肚置磁器內入地中月餘盡化爲水
以水搽患處。

耳內生膜及耳漏

五倍子燒存性少加麝香共末吹之

蛇咬

急飲奸醋二碗。令毒氣不隨血走。或清油亦可。

臘月初一取雄猪膽八箇倒出膽汁。將透明雄黃一兩研末。麝香一分。青黛二分。和勻仍灌膽內線孔頭懸透風處陰乾。每服六厘。六厘敷患處。俱清水調止用藥不用膽。

疳瘡

降香燒灰一錢半。人中白。黃連。水煅二錢。輕粉。水片各五分。甘草湯洗淨上藥愈。

喉哦

壁喜窠十八箇燒存性。米片五厘俱末。鵝毛管吹入鼻。哦右吹左。哦左吹右。

臘梨

松香三兩。花椒一兩半。明礬五錢。俱末用青布剪作長條二寸許。盛前藥縫好。浸真麻油四兩內。一晝夜取出。燈上燒逼油滴碗內。露一宿聽用。將米泔和花椒。葱頭煎四沸。洗頭待冷。將前油擦。

約搽五日愈。剃髮數日後瘡當復痒再發仍復洗搽永不發。

下部痠痛方 治大腿上下骨骱內疼痛不能轉動由勞傷腎氣及當泄不泄淫火留滯經絡所致服此効。

拘杞子 天麻 紅花 五加皮各一錢半 白蘚皮

牛膝 黃柏 當歸各二錢 木通三錢 水煎服

前方分兩十倍加虎脰骨二兩好酒炙脆其末蜜

丸空心淡鹽湯下効。

楊梅瘡

金銀花

樟皮

做弓用的

透明雄黃

各一兩

照本人量加

酒隔湯煮一炷香

飲醉出汗

○水片入大田螺內

化水點瘡即愈

土茯苓

四兩

野艾根

二兩

僵蚕

七條要直的

蟬退

頭足

杏仁

去皮尖肥皂仁

皂角子

各七粒

生脂油

一兩

碗磁器煎七碗。每清晨服二丸。午服三碗。夜服二

碗。

碗連服七日。毒氣全除。毒盛者再七劑。決効。