





孫真人著

婦女

經水不通 石榴根 一把要向東者靈乾 水二碗濃煎一

碗空心熱服二次 或薏苡根 兩 前服

或白芥子末 錢二 黃酒沖食前熱服數次

又鼠糞燒灰黃酒下一錢 又方多服節

糖 並可治乾血癆 或蕎麵大胭脂煨為丸每服

三錢 或葑菜汁入童便炖服 不宜多服

經閉驗胎有無法

川芎一二錢陳艾三四分

空心煎服一題

有胎則腹內微動  
無胎則不動

乾血氣痛 絲瓜一根燒存性末空心溫酒調

服

經從口鼻逆行

葑菜汁

一盞

入童便

半盞

燙熱服

或好墨磨濃汁一盞飲

經行不止

紅鷄冠花晒乾末水煎酒引每服

二錢忌葷腥三日

或陳蓮蓬壳燒存性

末開水每調服二

婦人血黃 黃茄子竹刀切片陰乾爲末每二

錢黃酒溫服

婦人血崩

葶薺

一歲一個

燒存性研末酒調服

或老母猪屎晒乾酒服三錢

或舊蒲席

燒灰酒服三錢

或棉花子

一兩炒

柏葉三錢

共末每服三錢 又諸藥不效者

杏仁

黃芩

燒存性研末

每三錢空心酒燉服

或扁

豆花焙乾末每空心服二錢炒米煮湯入

鹽少許調下或破羅底一個燒一順手

桿末不可開黃酒沖服或陳粽燒存性

為末空心淡酒沖服三錢或鍋底煤三

錢熱酒沖服或陳蓮蓬壳燒灰存性研

末五錢棉花子燒存性末三錢米酒沖服又

蓋墻頭之舊缸片搥碎如豆大砂鍋內炒

熱加醋入取醋飲之

經血俱崩 黑驢屎燒存性末麵丸桐子大每

崩中漏下

青黃赤白者俱難生育

好墨一錢水服日二次

白淫

糯米半升

花椒一兩共末醋糊丸桐子大

每四十九食前醋湯調服

白帶

千年石灰五錢白茯苓一兩共末麵糊丸桐

子大每服一錢米湯或開水下

又方孕婦亦可用

馬齒莧汁三鐘鷄子清二個

調溫酒服

赤白帶下

舊粘燒灰

白帶用白色赤帶用赤色日二錢黃

酒溫服 或扁豆爲末米飲下

交媾非時血出不由 雄鷄血塗之 或青白

布同髮燬灰用棉花拌灰塞入陰戶俟止

去之

陰吹

陰中出氣有聲

猪油

四兩亂髮團

一升麻

五分柴胡

錢半煎

服

陰毛蟲痒

白果打碎搽之

陰中生虱

檳榔嚼汁搽並以少許煎水洗



陰腫 菊花葉搗煎水薰洗

陰腫生瘡 梅根煎水多洗

陰挺

陰中突出一物如蛇形或如菌或如鷄冠狀

猪油調藜蘆末敷

或白果嚼敷 或芝麻嚼敷

陰茄

陰中生物如茄亦名陰搥

茄樹根燒灰爲末香油搽

或烏頭

燒枯研末

醋煎薰洗

或水仙花攪加

紅糖搗極爛敷

治陰挺尤效如神

或大蒜煎水多

洗 或槐白皮煎洗

並治年老  
厥肛

翻花陰戶大甲魚一個重二斤者去腸雜連頭整個水

煮極爛將汁用舊綢蘸滴患處使其滲入  
將骨連頭頸煨灰研末夜間拭淨搽之將

內作羹食之三日即痊

內外吹乳

舊綵扇

俗呼芭蕉扇

去筋燒灰

扇風爐多年者

尤妙熱黃酒冲服

年久無子

二月丁亥日收杏花桃花

須陰乾

爲末另擇戊子日和井水煎服一茶匙日

孕婦無故  
心虛驚恐  
悲泣並治

扭斷長  
約寸紅棗二斤秤準後去核用好燒酒數  
斤拌過放砂鍋內隔水燉半日俟冰涼後  
再以好燒酒二十斤泡二十日取出隨量  
飲其病若失而孕

臟燥

凡婦人平時悲傷好哭自己不知其  
故顛狂罵人如有鬼神附之者是

生甘

草

三兩

小麥

一升

紅棗

十個

水

六碗

煮

三次服

婦人乳忽縮入

急用兩手緊緊抓住取公鷄

一隻約重十兩開外連毛破開去腸如真麝香錢一入

鷄肚內覆肚臍上愈

乳吹

時時吹氣有聲

硃筆寫子丑寅卯辰巳午未申酉

戊亥等字於本婦所戴簪上

本命所屬戴之字不寫戴

之即愈初起時用之最妙

久年赤白帶下

貫眾

一個去皮毛

好陳醋泡透漫

火燒熱為末空心米湯下每二錢

五色帶下

年久古磚一塊燒極紅以油煎麵

並治男子  
女癆黃疸

蟲出治三五次愈

化妬奇方 取本婦月經布包蝦蟆一個離茅

厠前一尺遠密埋之地上卽不妬

治陰吹奇效方 猪板油八兩亂頭髮如雞蛋大三團以肥

皂水洗淨同熬至髮化分兩次服卽愈

婦女陰戶疼痛此愛寒也葱頭加乳香搗敷 或

鹽炒熱青布包熨之

陰戶生瘡生蟲身發寒熱狀似傷寒又似癆病

芝麻嚼爛敷 或大蒜煎湯頻洗 或硫

黃末香油調搽

婦人血枯 白鵝血甜酒兌服 有血積宜飲

白鴨血

赤白帶下 鷄冠花為末每錢酒下 白者用白赤者用赤

或墨魚骨為末服

乳內吹 路路通 一个如俯鷄娘狀者煨存性 加冰片少黃

酒送

胎前心痛 鹽一撮燒紅酒服

胎前腹痛

大紅棗

十四個

燒焦末童便化服

胎前腰痛

大黑豆一碗酒三碗同煎每早空

心隨量飲

傷胎結血心腹痛 每日服童便二三杯

治胎咳嗽

川貝

去心麩炒黃研末

砂糖爲丸如芡實

大口中含化一丸

胎前瘧疾

夜明砂三錢空心茶和服或研末

空心黃酒燉溫調服亦可

胎前痢疾中荷葉蒂佃燒存性爲末黃酒沖服

胎前產後下痢敗龜板米醋開水下數服

孕婦舌血不止雄鷄冠血滴之

胎上沖心蘿蔔煎湯飲 或弓弦繫腰上

或葡萄兩煎湯服

孕婦患淋 冬葵子一升水三斗煮至二升分

數次服

並治生產  
困悶及倒  
生口噤

並治胎動

胎漏 受胎後漏下黃黃芪一需米一煎水服



孕中有癰 慧苡仁煮汁緩緩飲之

胎壓尿閉 令孕婦睡下將腿吊起即通

妊娠傷寒 艾葉如鷄子大團一團酒三升煮一升

炖服取汗

胎墜 未足月胎墜其狀似欲小產或見紅帶壳鷄蛋三個如無野鴨蛋一可

苧麻根四兩同煮熟食蛋

孕婦腹痒 鐵箭頭舊用針線袋亦可安臥席下勿令

婦知及他人知

並治產後腸痒

孕婦遍身瘙痒 樟腦調酒擦

兒鳴腹中

黃連甘草各一錢

水煎服

或多年

空屋下鼠穴中土一塊口含之

或令孕

婦作男子拜狀

或以豆撒地令孕婦檢

之即止

孕婦風寒不省人事

狀似中風熱艾三兩

米醋炒極熱

以絹包熨臍下良久即甦

胎動不安

絲瓜二根煎水服

如無用藤亦可

或用

温醋調敷兩足心用布包好過一日夜足

心覺熱卽愈如未愈連換數次必痊

胎動下血不安

白蠟

一團如  
鷄子大

煎三五滾對好

酒服立愈

十日內  
忌食鷄

或五楮子末酒調服

二錢

或葱白煎濃汁飲

未死卽安  
已死卽出不效

加川芎粳米煮粥食

慢服藥胎欲墮

白扁豆

去皮

濃煎汁飲或研末

米湯調服亦可

孕婦乳腫作痛

名內吃

皂角一條燒枯存性酒下

胎漏

魚膠

炒黑為未

酒調服蓮蓬亦可

孕婦心忡

猪心

一個不水

用水一碗煎湯硃砂

飛淨三分調服

治小產

絲綿

兩

入瓦罐內封口煨灰存性熱

酒冲空心服

須於小產月內服之以後永不再墮

保小產秘方

頭二

蚕繭黃

名絆絲

瓦煨灰存性

末每三錢桂元二十個煎湯調服

安胎奇方 老母鳥 一墨魚 四司地食之更無

孕婦慣墮胎

平時無小產之患者蓮肉去心不

家用青苧麻

洗淨膠三錢

白糯米

三錢水煎去麻

每早連湯服一次單飲湯亦可

孕婦傷寒護胎

灶心土青黛等分末水調塗

臍下乾再換

跌撲動胎腹痛下血

砂仁不拘多少放熨斗內漫

火炒熱透

去筋膜

爲末每二錢熱酒下

孕婦小便多而動紅勢欲小產

葱頭

一大把約二三

十煎水服

月數未足胎死產危

大黑豆三升以醋煮濃

汁溫服立生

胞衣先破不產

魚膠

煨存性二兩

搗碎沖好黃酒

服

或兜曰

即南星之小者用黃為細末色者不拘多少去毛

不用篩播只搥之如粉為度

無灰酒一杯同煎服每服

一錢立生屢效

交骨不開

自死龜板

炙酥一錢

婦人頭髮

燒存性一錢

並治產門不開兼下死胎

當歸一錢

子四十九粒爲末

黃酒調服

如因跌撲打傷胎

死腹中者加紅花

二二三錢

胎死腹中

灶心土末

三錢

水調服

或黃牛糞

敷臍上卽出

糞用醋炒亦可

並治胞衣不下

難產

木匠所用鑿柄木燒爲末酒服

或蓮

花一瓣寫人字於上吞之

又方灶心紅土爲末

三錢

黃酒下

又方陳

年麥草

一兩

剪斷煎服

用舊草帽上

或參

蘆三個羊乳亦可煎服

或驚甲燒存性研

末黃酒服一茶匙

難產三四日不下者密將其夫陰毛剪下一

半燒灰冲酒夫手遞與婦飲即生勿令婦

知

逆產橫生

鍋底黑六錢

白芷

晒乾不見火六錢

共細末

米醋調如膏開水調服或童便一杯黃酒少

許同水煎服

每服三錢

或以中指蘸鍋底黑交

畫兒尼亦可係畫一



切勿針刺

橫生甚效

臨產下痢 梔子燒研空心熱酒服一匙甚者

五服愈

橫生逆生靈法 陳艾揉作丸如小麥大將產

婦右腳小指尖頭火靈三壯 或蛇退一

條煨爲末滾酒冲服

難產 用新硃筆在黃紙上無新硃筆用新墨筆亦可寫語

忘敬遺四字貼床柱及門窗上凡有門窗之處各貼

張一臨產令產婦默念此四字卽產可免邪

崇 又方用本年黃曆面上欽天監印花

燒灰白開水送服勿令人知屢驗 或用

新筆紙墨淨硯寫日月如箭急共五字均不宜挑勾

切貼產婦房口並房內如仍未生下急用

火焚此五字於淨水中與服下卽生矣

又方急採樹葉一片或花葉草葉要新鮮

青的以淨水貼在床背勿令人知

臨產暈絕不省人事 生半夏如豆大研末吹

鼻中得嚏卽活

臨產艱難及氣弱或矮小婦女交骨不聞白

蜜香油各半煎至一半服

一切橫生逆產 灶心土兩傍者不效研細酒調服

一錢並搽產母臍中 或蜜芝蔴油各半

煎至一半服

盤腸產下子腸不收 冷水和醋令人噴產婦

並治盤腸  
生兒不生  
下者用不  
得切記

面三噴三收 或枳壳錢三水煎服

子宮脫下 草麻子仁枯礬等分安紙上托入

仍以草麻子仁粒十四研膏塗頂上即入

即揭去勿遲 或蛇床子一升炒熱用帛包熨患處

胞衣不下 乾荷葉不抱多少開水冲服如無用蓮蓬壳亦可

或明礬三分開水冲服 又方用竹桿於

堂中正樑上截三下極效 或雄鷄一隻連

毛破開去腸雜蓋產婦臍上鷄頭向上以

心候胎衣下卽將藥洗去遲恐腸出也如  
腸已出仍用此藥敷顙門上左頭腸自入藥  
卽洗去勿遲

胎衣不下 無名異三錢藥店有爲末鷄蛋清調勻

陳米醋一茶鍾煎滾冲服卽縮如秤錘大  
而下如不下再一服必效 或將產母頭  
髮抓起以髮稍探入口中得一嘔卽下  
或鐵秤錘燒紅泡好黃酒服

脬音胞

此症名翻花

產後腸出不收 生半夏末啗鼻中取嚏 皂

角末亦可 或枳壳二兩煎湯温浸

產後尿脬脫出 棕樹根和瘦猪肉久煮去根

食肉與湯三五次自收

產後陰翻 澤蘭葉煎濃湯薰之 或用四兩加枯礬煎洗二三次

產後驚風 黑大豆一椀燒成炭黃酒煎數開飲

產後空肚痛 蓮蓬壳七個煎湯服

產後陰腫 桃仁煨研末敷

產後口乾舌縮 鷄子一個打破水一盞攪服

產後血逆上攻心煩悶刺痛 水牛角煨燒不拘多少

研末黃酒炖熱調服 或灶心土酒溫服

三錢

產後下血不止 黑母鷄下的蛋三個醋黃酒各一

杯和攪煮取一杯分作兩服 又方鍋底

黑三錢研細黃酒沖服 或蒲黃三錢或靈

桑白皮二錢煎湯服亦效

產後瀉血不止 乾艾葉半兩 老姜半兩 濃煎服

產後氣逆 青橘皮末一錢 葱白汁半小 童便大一

杯同煎服

產後道尿 鷄窠草煨灰末黃酒調服二錢

或鷄屎燒灰酒服一大匙

產後淋瀝 紫荊樹皮五錢 黃酒半杯水煎溫服

產後流尿此產傷尿胞茶 大鯉魚一個 只取鱗用

油炸令酥脆加鹽醋姜葱拌勻葉食之立



治傷寒

食 或大荆芥五於錢內燒存性不見火

麝香少許以沸湯些須調服 或石榴皮

錢一香附醋炒煎水服

產後痢渴 冬瓜一個黃土泥封厚煨熟絞汁

飲之

產後血痢 馬齒莧汁合煎開入蜜一合和服

產後五七日大小便結塞切不可妄服藥大麥芽微炒

每三錢開水調與粥相間服

胎產

產後血塊疼痛

山查

五錢白糖

一撮

煎湯服

產後中風

荆芥穗

去根焙末

每服

三錢

童便調服口

噤者攪灌齒噤者煎灌鼻中

又方黑豆

一椽

炒至烟起入連鬚葱頭

五個同炒入好

酒

一盅

煎至

一盅温服汗出愈

或魚

鰾燒灰每服三錢淡酒下連服二日愈

產後血昏

荆芥穗研末服或吹鼻

又燒鐵

秤錘以醋浸之使其氣入鼻

新產者不  
宜用猪蹄

乳汁不通 紅蘿蔔子冲汁一鍾送酒

乳孔塞痛 核桃肉搗碎滾酒冲服

乳毒乳吹 柳樹木耳煎水飲一二次

乳汁清少 母猪蹄猪蹄有七眼者尤妙一隻煮湯飲加通草煮尤妙

或單用水酒二物各半煎服

乳腫 馬屎塗之 或絲瓜囊燒存性為末冲酒

服取汗

產後血暈 葦菜切碎入壺內以熱醋冲入封

口將壺嘴向鼻遠遠薰之 或生半夏末

少許吹鼻中

產門不開 石灰三升燒黃以水一盆投之澄

清乘熱薰之 或雄鼠屎燒烟薰

兒咬乳破 北瓜蒂燒末香油和搽

產後口噤 牛穿鼻木不拘多少燒炭研末砂糖調

服牛穿鼻繩亦可

下乳 絲瓜兩約五蓮子兩約五共燒灰存性研末

並治對口 瘡 並治傷寒 口噤

黃西明眼蓋皮垂垂好朝者不用蓮

自止或本夫舊包脚有敷乳上過夜即消本婦現穿鞋包之亦可

產後血悶 好黃酒一椀地黃汁三錢同煎服

產後崩中 蓮蓬壳五個香附三兩各燒存性研

末米飲調下每服二三錢

產後吹奶 陳皮一兩甘草一錢水煎服

產後尿閉 陳皮去白一兩爲末空心溫酒下每

服二錢

產後尿血 牛膠水煎頻服

產後腸出不收 新鮮鯽魚頭焙枯研末 一半搽

腸一半酒服即時收上

產後尿脬破損小便直流 生成黃色絲絹尺一

用炭灰淋汁煮爛 以清水漂極淨 煎極細碎 白牡丹根

白芨各一錢 水二鍾煮至絹爛加糖食之

服時不可作聲 各補脬散

產後陰戶生蟲一對 此蟲約長寸餘埋入土中 數日暴大如拳名子母蟲

以後月 對苦參一兩淘米泔水浸 使君子五錢

產後陰戶腫痛或手足彎曲不能伸舒葱白

加乳香同搗成餅敷或羌活防風略

煎湯薰洗

產後血崩荆芥穗五錢炒黑煎服

產後血暈奇方白紙三十張煨灰熱酒冲服雖已

死一日打去一牙灌之亦活又方乾漆

渣破漆器燒烟薰之或乾荷葉燒灰温

酒調服

此方得自  
異人傳授  
不可輕視  
並治痲痘  
不起

產後中風並角弓反張等症 取糞坑陳年磚

一塊活水洗淨真紹酒五斤陳甜酒亦可放在盆內

用粟炭火將磚燒透浸在酒內提出復燒

如此三遍其酒不過二斤候酒溫卽令產

母服一二杯過半日漸愈將餘酒陸續飲

完而痊不飲者用  
好水亦可

產後舌出不收用硃砂點其舌令作產兒之

狀用人扶住一人悄悄在窗外將大瓦器

擗地打碎歸湯響而驚之即收人



飲

產後血氣痛不可忍

紅諸有名於柴炭灰中

燒熟食之愈

曾有百藥不效服此而愈者諸爲滯氣之物服之反效殊

不可解

產後痢疾

山查

三錢

以陳灶心土拌炒成炭研

未加紅糖米湯調服極效

產後大便不通

大麥芽

炒

每服三錢開水或

粥調服

孕婦痢疾

鷄蛋

二個各破一孔如指頭大

入黃丹

五錢

用銀

簪攪勻以紙封口入飯甑內蒸熟食之

產後乳頭生瘡

名如乳

梁上塵醋調塗

臨月易產法

榆樹皮焙爲末日三服

或常

食香油豆腐皮

子宮翻出

其形如兩角

棉花蘸黃酒四面緩緩潤之

卽上

產後腸痒難忍

或針線袋或箭幹或箭簇置

所臥處下勿令產婦及他人知之

無灰酒  
送服

又方

杏仁一枝去皮分開靠

裡一邊寫日字一邊寫月字仍合好用蜜  
粘住外用熟蜜爲丸開水吞或用酒吞

小兒

小兒胎毒 生甘草煎濃汁以綿纏大人手指  
蘸水放兒口中令吮之

永免瘡毒 小兒初生時用猪胆汁入水中洗

俗則永無瘡癩

小兒生下不啼 以五爪葱

根三

向兒背連敲之

自蹄

若天寒切勿剪斷臍帶用細紙條

點油火於臍下往來薰之

小兒咳嗽食少髮黃 眞山藥煮熟加糖調服

小兒頭疽 用有妻室者卧房內地脚踏處

取土煨過用麻油調搽疽四週圍留頂上

如棋子大出濃血 或用鱧魚尾貼亦效

小兒臍風等症 小兒初生七日內若有臍風等症小復必發青筋一條直行至

薄荷錢三煎濃湯灌二三口不可多立愈

口噤

又名噤風其病情眼閉口噤不乳啼聲如鵝或舌上聚肉如粟米狀大小便皆通但

口噤面赤多啼口不吐白沫異撮口牛口疳草絞汁灌之

又方鷄屎白

如棗大

線裏水一杯煮半杯分

二次灌 又雀屎塗口中

口噤撮口

皆治

神仙退

即父母指甲三分

靈灰乳調灌

或好燒酒對臍吮之

初生無皮

純黃土研細末盛絹袋輕撲兒

週身日三四次 或白朮米粉亦可 又

方土狗焙灰摻即蝮 又初生身如魚泡如

水晶破則流水 蜜陀僧末摻

小兒猝驚啼哭 雄鷄冠血刺出少許滴入口

中 或燕窩中糞煎湯俗之

吐沫不乳 牛口涎向東行者抹塗口中及頤上

瘡溼不乾 艾葉燒灰填臍中 或亂髮燒灰

油敷之不可沾水

臍風發噤

生甘草二錢半

水煎溫服令吐痰涎

後以乳汁滴兒口中

或枯礬末敷

赤遊風

葦菜連根搗爛絞汁擦之

或馬蘭

頭葉

無葉用根

洗去泥搗絞汁搽燥則換

小兒初生口泡

防有臍風等症

上腭及牙齦如見白泡

點用銀挖耳輕輕挑破以好墨

磨

搽若口開

有物似蝸牛或似黃豆白蟲者猪油切薄

片擦之

重舌鵝口

赤小豆四粒搗末醋調頻塗或桑

白皮煮汁塗

牙疳 白礬末盛五倍子內合燒爲末塗口又

甘蔗皮燒研末摻之 又方石萬蒲磨水

常洗嗽 或油芝麻嚼敷

小兒疳瘡 用蒸糯米甑蓬四邊滴下氣水用

盤成取敷之 或生瘡似楊梅破爛有孔者亦以此治之



兒食之不致生瘡

疳積

腹大黃瘦頭面生瘡

立秋後大蝦蟇

去頭足腸

以清油塗

之陰陽瓦靈熟連食五六個積穢自下

月之後形容光潤

疳泄

活蝦蟇

一個煨灰

存性開水調服

或柿餅

燒熟食之

復內蟲積

烏梅

一個

老姜片

樅子

十枝

花椒粒

黑糖少許煎服

火丹

從頭上背起者

瓦葱搗汁敷

童子癆

抽屎

瓦上乾白者佳黑黃者不用

水煎服

並治疳疹不發

及傳屍癰 或用黃土包裹火內煨焦取出候冷

去土研末糖丸服尤妙

鵝口白

生在牙根俗名馬牙

鷄純皮

燒研五分

乳調服

或用

馬牙煨末搽舌上或飲驢乳

初生大小便不通

人乳半碗葱白一寸同煎

分作四次服之

瘡癩頭瘡

卽熱癩長毒

大蝦蟆

活者一個

去爪剝一整皮

貼瘡上奇效

小兒龜背

龜屎常摩胸背久之瘥

小兒肚痛

淡豆豉生姜葱白均切細鹽半碗

同炒熱以手巾包熨臍上

又方苧麻根

搗碎開水潤溼貼臍上

小兒失音不語

蝦蟆胆取汁點舌尖上少頃

卽語

卵腫 蚯蚓連土爲末吐涎調敷 如因坐地

小兒被蚯蚓呵腫者雄鴨涎抹之

小兒熱疳

尿如米泔大便不調者是

糞蛆水洗淨晒乾燒

研入食物內食之

小兒痢疾

桐葉三四斤煎湯洗足日三五次

木刺入眼

白頭頸蚯蚓一條捻斷滴血入眼

卽出

小兒脖腫

絲瓜燈草葱白等分煎汁浴之并

痞塊參看  
胸胃門

老粳米

五錢炒

共研細末和羊肝搗為丸如

黍粒大日服二三錢米湯下

又口疳蔗

皮燒灰未吹之

小兒腹大肌瘦面黃痞塊等症

白芙蓉花陰乾

研末入鷄肝肉蒸合飯上蒸熱食

遍身奇痒叫啼

生姜搗爛稀布包擦自止

小兒瘡疾

蛇蛻於未發前一時塞鼻男左女右過

時即去

男女童癆蟲積 五穀蟲焙黃色一兩 粳米糯米各

兩炒和磨細以沙糖米湯調服

小兒氣弱久痢初痢者不可用 雞蛋一個煮熟去白以

姜汁研末食之忌茶

驚風此治急驚風 細葉菖蒲搗汁灌 葦菜汁亦可

慢驚風不可用

驚風不醒 白鳥骨雄雞冠血點唇上醒即抹

去

抱龍丸紫  
金錠回春  
丹等藥只  
宜治急驚  
風萬不可  
治慢驚風  
致誤性命  
切切

並治口舌  
熱瘡

小兒痰熱 亂髮同鷄子黃熬涼久出油服之

泄瀉 馬齒莧汁一合蜜二匙空心煎服 或

葱姜搗入黃丹末為丸填臍內以膏蓋之

疳痢垂死 新羊屎升水升浸一夜次日絞汁

燉服日午乃食重者三服愈

小兒流涎 冬青樹葉搗汁入口一漱即好

小兒火毒忽然熱痛或發出成塊如紅癰或肚痛是也 瘦猪肉切片

貼之

頭瘡 烏梅燒末油和搽 又鱸魚尾貼之

禿瘡 蜂房白礬入火同煨研末麻油和搽

肥瘡 黃牛糞燒灰麻油和搽頭面

小兒遺尿 故紙末錢五大甘草煎水送服

小兒鎖喉 芙蓉葉搗汁煎雞蛋貼胸門及肚

臍

驚風失語 雞蛋黃二個炒黑用碗蓋住將米醋

小兒半碗淋下以醋灌其口痰出愈



熱敷兒臍上冷卽換三四次愈 或剪刀破

貓尾取血數匙開水沖服

胎疝

新生小兒其卵甚大者恐變木疝如過

滿月外候端午日午時以脚盆盛熱水安  
於中堂隨抱小兒於水內一浸再將小兒  
在於中門檻上中間一攔其卵上之水印  
痕於檻將艾圓在檻上涇印處靈三壯其  
卵漸收小如此 此法甚驗

小兒遲語

四五歲只會叫人不能言語者

以赤豆研末酒調塗

舌下三次即能言語

小兒夜哭

燈花剉研爛塗母乳上令小兒吃

乳 又硃砂末寫子午字於臍上

免小兒病

兒時洗浴以益母草煎水洗之

小兒渾身起羅網蜘蛛瘡

豆腐皮燒灰存性

為末香油調塗

小兒積食不食

燒核桃存性研末食之 如

之

赤白痢疾

大人

蘇葛汁蜜各半和勻服之

小兒陰子腫大不消

棚砂二錢水研塗之

陽

物腫痛燈草煎湯服

小兒誤食錢物

半乾腐皮

張

切大片以麻油

拌食

或多食葶薺核桃

誤吞鐵物

栗樹炭二塊搗極細末沙糖和細

丸服三錢立出

參看急救  
門並喉舌

誤吞螞蟻

此蟲最毒雖燒灰為末頭水即活

食蜜可化水

誤吞木屑

鐵斧磨汁灌

或芝麻炒研未開

水調服

誤吞針

鷄眼一對豆腐皮包吞之

其兩眼緊捧頭尾從

大便

或煮蚕豆與葦菜同食

又方鹽蛋

一個葦菜一把不切斷畧煮食之

小兒赤遊危急

至心不

急以白菜搗汁敷之

青腿牙疳

青白馬乳早晚隨擠隨服甚效

羊鬚瘡口下生瘡一撮如羊鬚紅棗十四個燒存性香油調敷

或羊鬚燒灰末香油敷 又方舊棉絮胎

燒灰香油調敷

小兒脫肛 草麻子四十九粒研爛水調作膏貼頂心

立效 或猪脂二兩煉去渣入蒲黃末一兩調塗

小兒囊腫 薄荷生甘草煎汁和蚯蚓泥塗之

或蟬蛻五錢水一盞煎水日洗三三次

小兒月蝕小兒癬瘡口耳瘡久不愈者謂之月蝕統治五疳入積復大黃瘦骨立頭

髮生瘡

大蝦蟇一個放瓶中綿紙封口七日後

取糞中蛆洗淨不拘多少入瓶中俟蝦蟇食完

取蟻除去頭爪肝腸以芝麻油調蟻身瓦

上焙枯為末芝麻油塗患處

胎毒諸毒

金銀花

鮮者曬乾不炒研末四兩

上白糖二兩拌

勻收磁瓶隨時服 或作餅餠食 或以

物蘸食甚妙 並能稀痘

急慢驚風

螳螂七個煎服

蛤蜊亦可

小兒丹毒

由菜鴉點

黑糖拌勻新汲水送下

急慢驚風

杏仁桃仁黃梔子

各七 共研爛加

燒酒鷄子清白乾麩量小核年紀作丸如

元宵大小置手足心

男左女右用布條紮

緊一週時手足心皆青藍色則愈

小兒痞積

梔子

帶 紅棗

帶 杏仁葱鬚 各七

個黃米

撮 飛羅麩

不抱多少 鷄子清一個共搗

爛攤布上圍在臍中間上下用寬帶紮緊

三日一換至重者三服愈

拔驚慢風

肢體送冷痰帶咽喉如拉鋸狀唇黑面青口鼻氣微昏睡露睛者是忌服

小兒

涼藥胡椒粒生梔子葱頭各七丁香粒飛羅

麵撮一共研勻用鷄子清少許調攤青布貼

臍上一晝夜除者有青黑色即愈如未愈

再貼一次愈後宜服補脾藥

急驚風母丁香一個磨水服 或用蚌個一切

開瀝水灌小兒口內

小兒火面 吐心七哥氏某老叔等分爲未借



急慢驚風

酒藥丸

切開用牛大尾連身煮豆

數搗如泥中作一窩如柿餅狀再將香油

少許滴窩中新瓦鉢內

慢

火燉俟開透取起

攤布上如膏藥再將燈草兩段十字放在  
兒臍肚中間貼上膏藥不過頓飯時卽瀉  
出風熱寒滯而愈

臍瘡不合 灶心土研末敷 或馬齒莧燒灰

調敷

奇效良方

卷三小兒

三

此方並治大人蟲疾

小兒穿腸風

未落臍帶者難治

鮮桑皮

一塊剝去老皮蕎麩兩

水和做成圈圍肚臍

將桑皮蓋在蕎麩圈上用艾灸

七壯桑皮見汗即愈

消疳外治極效法

羊尿脬一個吹起陰乾入

好頂

汾酒或好燒酒數兩秤准用線紮緊脬口

掛在心口胃碗之間

須貼肉

疳重者不過數

時酒自消減另換酒如此數換稱酒不消

減病即愈矣

喉嘶聲啞

蝦蟆胆汁點舌上

臍腫出汗

枯礬末敷

或黃柏末敷

如出

血白石脂末敷未愈則微炒

俟令再敷

小兒愛食壁土米炭茶葉等類

炒芝麻一盅

拌雄黃末

二分

開水送三日後單食芝麻若

止愛食壁土用壁土末煎黃連汁和餅食

之

小兒中暑吐瀉或猝然昏倒

背陰側柏葉搗

汁三匙生蜜三匙井水三小杯調灌

男女童癆

野茄棵內蟲

看梗上有蚌孔內有蟲身帶綠嘴黑者是

數十條和入食物內食之勿使

病人知數次愈

小兒頭面胎毒

桐油調輕粉塗

小兒夜啼不止

鷄糞塗兒臍中

男用雄鷄糞女用雌鷄糞

或鷄窩中草或乾牛糞安席下勿令母知

身如蛇皮鱗甲

白殭蚕去嘴為末煎湯洗

頤門腫大

黃柏末水調貼兩足心

初生眼目紅赤腫爛

五引肥鳥散頤門乾則

此觀音夢  
授方

并治大人

口角生瘡 亂頭髮燒灰猪油調搽 或五倍

子焙末搽 兼治大人

痰喘 核桃壳去連皮搗爛麥牙煎水加冰糖沖

服

小兒陽物被髮纏腫 將兒坐冷水中卽刻縮

小去髮愈

小兒瘡疾 冰糖五錢沖湯飲數日 如四日兩頭十服必

愈或蟬退二兩包好作枕睡

小兒疳疾蟲疾

榧子

研末

服二兩除根如無榧

小兒用使君子

研末炒熱

調上白糖食至二三兩

除根服後必飲茶水為要

慢驚

鷄鴨窩

要養鷄鴨數十年者

糞泥下淨去一撮糞

數寸者不要有糞

煎水服立愈如神

水兒水瀉

巴豆

三粒

黃蠟

三錢

共搗成膏貼臍上

用絹縛住半日愈

如噤口不食者加麝香三厘

小兒脫肛

五倍子末鋪紙上捲成筒燒燃放

食癖椒方  
並治大人  
脫肛痔漏  
腸風下血  
食後下血  
更多則易  
愈也勿疑

並治急驚  
風

門自上可不再脫

又方食癖椒又名青椒極效椒宜癖食宜多食少不癖者不效

小兒木舌舌尖腫大塞口直硬不能轉動蒲黃末頻敷 或殭

蚕末吹取痰

小兒吐乳米七粒水乳各半煎至五分服

小兒初生或兩腮腫硬或口內生瘡或生馬牙

或重舌木舌蛇舌吐舌及口不開不食乳

等症 芙蓉花葉皮根均可槌極爛雞蛋二個和

奇效良方 卷三 小兒

三

勻煎熟候冷敷心口肚臍用布紮緊極效

小兒口生白點

俗名鵝口白

檳榔燒研末點之

小兒舌忽腫硬卽時氣絕

名碧舌

百草霜酒調塗

效又皂礬新瓦上焙紅色放土上候冷

研末擦舌上亦效

小兒蛇舌燈心泡水服

小兒初發瘧疾

名胎瘧

冰糖

五錢

煎湯每日飲十次

愈

或蟬退

二兩

包作枕與兒睡

小兒陰囊過大名胎疝日後



小兒陰囊赤腫 老杉木燒灰存性加宮粉清

油調搽

小兒胎毒

頭面或遍身生熱瘡者是

陳石灰黃柏滑石

各五錢研

桐油調搽

小兒小便不通

連鬚葱白

一斤搗爛炒熱

分作兩包

輪流熨臍下

或皂角少許吹鼻取嚏

小兒大小便不通

連鬚葱頭

七個姜塊

一大豆豉

鹽各三錢

同搗作一餅

焙熱掩胎臍上用帶

紫良久通

小兒重舌 舊銹鎖火燒打落鐵片爲末冷水

調服

小兒陰囊生瘡潰爛 蘇葉研細末 摻之乾者用

香油調敷 並治陰囊光腫

小兒泄瀉 五倍子研末醋調作膏藥貼臍上

小兒胸腹忽如水晶臟腑俱見名蝦蟇 用大蝦蟇

六將四足紫起以蝦蟇肚皮在水晶色處

無牽幾次置於小兒臍上再用第二隻亦

須防迸出射入宜以絹遮其眼用畢將蝦  
蟬放生勿傷其命

小兒初生足趾向後用軟綿捲如棍子縛兒  
膝後灣內外用木瓜湯常洗熨之日久筋  
長舒展能伸愈

小兒陰囊縮腹中硫黃吳茱萸  
各五錢爲細末

研大蒜調塗臍下再用蛇床子微炒帛包

熨臍

急慢驚風

大地龍

卽蚯蚓俗名  
蚰蟥一條

用竹刀齊

線切斷勿破肚腸前段跳者是首治急驚

後段伸縮不跳者是尾治慢驚

入鈎藤

勾四錢水半飯孟煎一茶杯溫服重者兩服

小兒赤游丹毒

陳年竹油燈

紹郡俗名閣常敲斷裝

入磁瓶內

須橫放不  
可露出

掘土坑先埋一空稿

將瓶口覆碗上外以松柴火燒之約計瓶

內竹燈熬枯爲度揭開取碗內所接竹油

小孩頭熱瘡 清涼膏加丁香末少許於膏中貼之不必出毒愈

小兒痢疾 雞子一個煮二三沸取起去白用黃研碎以生姜汁小半鍾和勻服之忌茶

小兒黃瘦者以生薑湯小半盞味甘以煎之  
小兒麻痺者以雞子一箇清酒三三盞煎去其

此方治小兒

小兒疳積者以生薑湯小半盞味甘以煎之  
小兒驚風者以雞子一箇清酒三三盞煎去其

眼中生痘 鯉魚胆 或連魚胆點之 或細

茶嚼敷眼外 或益母草熬水點

免痘入眼 牛肚子搗爛敷顙門痘不入眼

出痘眼目紅腫 人乳汁蒸熱點之

出痘眼有濃血 兔糞末清油調搽

舌與鼻孔有痘 黃丹老土磚共爲末吹 或

青扣布燒灰吹 或鴉糞燒摻

陰戶有痘 雄黃末清油調鴨毛蘸擦

痘症小便不通 細茶嚼融紙包敷臍上

痘症大便不通 葱握一搗成餅敷臍上用錫壺

盛水熨葱上

治痘扒飯 取多年蓋屋覆墻陳草或晒或焙

研極細末搽之倘遍身破損攤於席上令

兒坐卧 名腐草散

痘疹扒破搽過他藥復扒破者 取露天墻上

最高處白螺螄壳洗淨煨為末搽之不再

車八矣名曰白螺散



痘出稀疎但嘔吐不止藥不能入者 白芥子

末酒調敷足心

男左女右

如指頭大一塊敷一

二時吐止卽去之久則恐生泡也

兩足無痘及足冷浴熟附子搗爛唾津調敷兩

足心一二時

痘被經水觸犯如被生母觸犯用黃土焙乾

小袋盛繫褲襠中並多用乾土置床下他人觸犯則多取紅月季花梢鋪席下

痘癰及痘爛 鷄蛋一個先以篩細黃土分二

處將蛋打破以蛋白蛋黃各和其上不得

錯亂即將黃仍做如黃將白攤餅包黃仍

如鷄蛋形入灶火內燒候烟出盡為度不

可燒焦將土蛋研成細末痘癰初起易以

蛋白或醋和敷即消成者即潰潰者乾摻

即收口倘痘爛成坑乾摻甚效 名濕滄如金散

痘爛生蛆 楊柳葉鋪席上卧一夜蛆盡而愈

痘毒貴爛 小蓆麻由頭茶之 或藥

痘疹不起  
白雄鷄冠上刺血五七點白酒窩

冲調温服

永不出痘

鷄蛋一個童便浸七日水煮食之永

不出痘

痘出不起

葶薺不拘多少搗汁和酒窩調均

燉温服之

不可燉至太熱

痘悶邪語

出痘心悶亂喘妄語見鬼

不落水猪心內血

取出

和冰

三分

爲丸如芡實大每服一錢以紫

草燉黃酒調服少刻下瘀血神氣清爽痘

即紅活透出矣 此方專治黑靨等惡症

醫所不治者百發百中

痘不快發 老絲瓜 近蒂 三寸連皮燒存性研

末砂糖水調服

痘瘡脹痛 白芍藥研末黃酒調服五分

癩痘倒陷便血 昏睡不醒 鷄子壳初出去膜新瓦焙

研每服五分熱開水調服 如嬰兒 以黃酒調

抹唇舌上并胸背

卽撈起帶濕鋪床上隔乾紙一層令小兒  
卧於上如天寒卽蓋衣被一宿卽瘥

痘瘡便閉

肥猪臙

塊一

水煮熟切如豆大食之

臟腑滋潤痂易落無損

痘瘡疔蝕濃水不絕

用出子蚕繭以生白礬

填滿煨枯研末擦之

痘瘡作痒

房屋中燒茶烟薰之

又白蜜調

開水常用鵝翎蘸搽

痘瘡倒靨

箬葉

煨灰一錢

麝香半厘黃酒溫服

痘瘡日噤

齧菜莢一二粒擦之即開

痘瘡潰爛

蕎麥頻搽之

或黑大豆研末搽

或枇杷葉煎湯洗

或臘月黃牛屎燒白

灰敷 或多年蓋屋茅草焙末搽

痘疹乾黑不起

山查

炒研末一兩

紫草五錢黃酒三

杯煮一杯分數次調服

發搐黑陷

桃膠煎湯飲

或用水熬成膏黃

酒化服

眼日日加厚令眼封住 或胭脂嚼汁點

或白芥子末水調塗足心引毒從大小便

出

痘疹入目 仙靈皮 威靈仙等分爲末每服

五分米湯下 或青果磨水點之

眼珠出痘

三日

以鮮蝸牛

去皮用肉

點三四次卽移

去 或鮮白蝦肉亦可

痘入目生翳

多食荸薺

或猪蹄爪甲

用甲燒灰

浸湯濾淨服之 或兔屎燒乾為末每一

錢茶汁調服

痘時瘡發不起 芝麻五合開水泡乘熱薰頭

面 或猫屎瓦上乾白者佳水煎服

解痘毒 生蠟同飛羅麩搗如膏貼患處即消

或金銀花煎水溫洗

稀痘簡便方 橄欖核洗淨打碎連仁曬乾研

細末用磁瓶收好每逢水開相連日應來棟

閱自將末挑兩三茶匙加糖少許開水調

並治童子  
癩



除日以烏魚煎水浴小兒 又食白鴿子

蛋永不出痘

並解瘡毒痘毒

痘不起漿

凡痘至七八日無漿

生捉大蝦蟇三個

壯皮紅色者佳

用布包其身爪只留頭在外手持蝦蟇使其口與出痘者之口相對約一頓飯時久將蝦蟇放去再以第二個如前法爲之連用數個則漿自起極驗

瘡發不起氣喘欲死 芝麻五合開水泡乘熱

並治痘時  
出疹

薰頭面即發

仙方也

表散疹方

帶紅壳小米熱水不拘時服

疹隱不出

鼠糞沖開水代茶飲

痘後口角流涎

細茶葉末白糖調服

痘後兩眼難開

燈心蘸香油潤眼上或嚼

黃豆敷

痘後生瘡

黃豆炒黑研末香油調塗

或河

內青苔貼敷

並治疹隱  
不出

煎塗

痘後起疔 馬齒莧搗敷不數日拔出黑疔如

螺壳狀屢驗

切勿割挖誤事

痘後發疹

觀音柳

錢五煎湯去渣候半溫用芫

荜蕪洗即出亦可煎湯飲惟切記勿洗頭

面又忌夜間洗

痘後餘毒

馬齒莧晒乾

不拘多少

生菘豆赤小豆

石羔

各五錢

共細末猪油調搽

痘後腮項耳後生肉核 魚膘芝麻油炸焦頻

食

痘初發免險症 大蚊子 七個 水酒各半冲去

渣服冬則蚊藏犬耳 又大黃蒼朮燒烟

薰之

痘將出 老絲瓜近蒂三寸者燒存性沙糖冲

服多者可少

痘多不灌漿 白牛身上虱子 二錢 新瓦上焙為

痘疹發斑熱極

但令卧土地上卽能拔熱毒

痘潰不能着席

麥麩淘淨爽褥熱卧

痘不脫痂

白饴調開水常服

出花免抓

孩子出花往往有抓破者欲其不

抓可於床下用木盆一個內裝冷水將紅  
紙撕十數塊綠紙數塊漂在水面自不抓  
矣

矣

游湖中... 水面自不... 成

... 水... 命... 珠... 珍

出林... 亭... 山... 好... 香... 卷... 其... 不

... 不... 似... 藏... 者... 自... 謂... 則... 水... 常... 興... 存... 在... 此... 湖... 水

... 湖... 水... 興... 存... 在... 此... 湖... 水

... 湖... 水... 興... 存... 在... 此... 湖... 水

黑痧

立時昏倒微覺肚痛面色黑脹不呼不效兩三時不救又名滿痧

急用蕎

麥焙乾研碎去皮爲末溫酒調服三錢重

者兩服愈忌茶

烏痧脹 眞麻油一鍾溫服取吐卽安 並治

纏腰痧

腹痛眩暈腰間如有繩纏緊者

痧症垂危尿屎已出

頂髮

數十根燒灰

白礬

研二錢

陰陽水一碗調服取吐

又方生芋芳二個

搗灌後又將鹽置刀頭燒紅淬入水中乘

熱灌下死者亦活

絞腸痧心腹痛 大蒜搗爛塗足心即愈 或

生明礬錢二末熱開水冷水各半名陰陽水

調服 或生食芋芳數枚欲試此症食生芋味甘

斑痧 食鹽一握擦前後心腰脇出許多紫點

愈 或搗蒜頭塗兩足心

風寒痧症如死去者用姜汁滴兩眼角內立效重症

四角俱點即活

並治霍亂

陰陽痧 鹽一斤青布裏作一包背脊上熨之冷



則易或灸臍上亦可

暑月暈死 急以熱土為臍傍令人尿臍中仍

用熱土蒜搗去滓熱水調灌 又方急取

地漿水

係挖地坑深三尺取新汲水傾入坑內攪濁澄清名地漿水

一升飲之

纏腰痧

腹痛昏暈腰如繩纏

真菜油

一杯灌下一吐而愈

弔腳痧

忌針刺穀食發時覺腿轉筋過六時不治

蕤蔘草

開時花穗如膏梁狀

梗高數尺有節水邊多有即紅蔘花也 蕤之蕤者是 八兩搗爛鮮木

瓜 四兩乾者亦可 黃酒二斤加河水煎湯乘熱搯

洗手足麻木筋弔處渣過心胸立愈

中暑

昏暈跌倒  
氣欲絕

急取道路熱土

塊

大蒜

四五個

剝

淨衣皮共搗爛新汲水和勻去渣灌之

或蒜瓣冷水研灌

能嚼者自  
嚼冷水送

如無水渴甚

急嚼生葱仁同律嚙

此指  
行路

中風中暑中寒中氣中毒中惡及乾霍亂一切

卒暴之症 生姜汁一杯童便二杯同調温

服立解

中暑

水蓼搗汁灌或黑芝麻井水霜汁灌

中暑悶幾欲絕 扁豆葉搗汁飲或飲地漿水

數甌

熱死

不可用冷水澆亦不可飲冷水

急用草繩盤放臍上以路

上熱土填放在內令眾人以小便澆之無

小便熱湯亦可

陰暑

夏天入陰冷屋中及冷術卷內易受陰暑

此症

四肢厥冷指甲唇舌皆昏青迷

不急用雞蛋十個煮熟去壳以好銀簪插

入蛋內乘熱置肚腹內以手轉蛋俟蛋與

簪變黑色則換之十換即效

傷暑出丹

暑月身熱昏沉未明症候疑是出丹

以生白扁豆

數粒食

之如不腥則以生白扁豆水浸溼研汁一

小杯服之愈

乾霍亂

亦名攪腸痧

小蒜一升水二升煮一升燉服

或

連服地漿三五盞愈此症大忌米湯 又

方菲菜汁半碗重陽燉服

霍亂欲瀉不瀉

白開水一碗人炒鹽一撮冷

飲之不止以針刺少商穴十指頭出血愈

甲之處相齊只離指甲兩邊各一菲菜之  
地是也

霍亂轉筋 以墨書木瓜二字於痛處仍令病

人口呼木瓜隨聲而愈 又方木瓜煎湯

服仍以湯浸青布裹其足 又木瓜艾葉

黑糖煎水加鹽飲亦效 或大蒜搗塗足

心或菘豆粉白糖各一兩新汲水調頻服

轉筋不可忍者枕轉筋亦可男子以手挽陰女子以

手牽其乳近兩傍邊即愈 或以熱湯漬

之亦可

霍亂轉筋垂危者

如腹尚鹽填有暖氣

臍中靈鹽上七壯再用木梳

一個燒灰酒服二錢

霍亂吐瀉

生白礬末開水下一錢或飲小便

乾霍亂

此症發在夏至後霜降前須忌穀食及姜

三角尖

小磁片撮一

老茶撮一

用入鍋內炒熱煎水頻

服

又方鹽炒一兩

黑牙皂錢一

煎水服取吐

或生王瓜

絞汁一杯

生姜汁

一杯

和勻灌之

此治吐瀉不止

危在頃刻者

又方蜘蛛生斷

去部香之

三川台一八

絞腸霍亂

白礬

錢飭和為丸

大一服自止

或

白馬糞絞汁半碗灌入水絞

乾糞少

乾霍亂

井水

半杯開水

半杯和服

切忌姜湯米飲

或熱鹽

調熱童便飲

夾色傷暑

生鹽炒黃青布包熨小腹鹽冷換

以好為度

各項痧症及受暑昏暈不省人事生白礬末

一錢陰陽水調服

並治霍亂

便淋瀉痢

白礬有起死回生之功宜備帶身傍隨時濟人可作仙丹

小便不通

葱白連葉搗蜜調合包外腎上卽

通

或杏仁

去皮尖七枚炒黃研末

米湯服

或金

針菜煎水多飲

或陳麥草涼帽煎服

或菊根

搗白酒沖取汁

溫服

小便不時

雄鷄尾毛燒末水酒服一茶匙

或白果

十四枝七生七煨

同食數次

小便滴瀝或有或無

大蒜一個紙包煨熱露一夜空

心新汲水調下



許和鹽服之

二便關隔不通

皂莢燒灰研末粥飲下三錢

或雄鼠糞

頭尖者是

爲末敷臍上或同葱白搗

焙熱敷亦可

大小便血

劉寄奴爲末茶調空心服一錢

大便不通

松子仁研末蜜調服

或獨蒜煨

熱去皮綿裏塞糞門內

便下濃血

烏梅一個去核燒爲末每一錢茶

並治便毒  
仙方也

調服

大便下血

黑芝蔴黑豆

各五錢

水

七碗煎至四碗一

日服盡

或酒煮鯽魚常食

臟毒下血

乾柿燒灰米飲服二錢

酒毒酒積下血

茄子焙乾爲末新汲水調一

錢七分服

腸紅下血

黑芝麻常生嚼

兩許

除根

或絲瓜

藤燒灰研末淡酒冲服

糞前下血

石留皮借靈末每二錢柿更湯下

大小便血  
均治

白鷄冠花併子炒煎服

便血

此方異人傳授

帶皮苧薺生熱

各七錢

每用生熟各

一個同吃重者數服愈

又方鮮枸杞根

煎濃汁每一盞加黃酒少許食前溫服

或苧麻根煎湯服 又柏葉炒成炭研末

每日米湯調服二錢十服愈

或黑豆升

炒焦熱黃酒淋之去豆飲酒

下血危篤

絲瓜

一個燒存性

槐花

減半

共爲空心米

行收真方

卷三 便淋瀉痢

三

飲下二錢

交腸小便出糞大便出褲襠男用女褲燒灰開

水冲日服二三次或舊帽燒灰酒下五分

瀉血胡桃肉西黃蠟兩共研糊丸每服二錢

或山楂肉為末艾葉湯調下

小便尿血指甲五分頭髮錢燒研末每一錢空

心酒下或蒿苳搗敷臍上

睡中遺尿燕窩中草燒為末水調服或用

紙鋪席上將遺尿後濕紙晒乾燒灰酒服

三雞腸煨以魚末溫酒用九筭月片夏如

氣虛溺尿 雄鷄丑臟連腸燒為末溫酒調服

小便石淋 白扁豆根數煎服 或石竹花搗

末酒服一茶匙日三次

熱淋澀痛 馬齒莧搗汁服 或乾柿燈草等

分水煎日飲數次

淋痛 蜀葵花根洗剉煎五六沸服 或猪鬃三錢

煨存性末黃酒冲服 須避風

血淋 髮灰二錢藕汁和服極重者三服愈 或

男婦統治

奇效良方 更林篇劇

白鷄冠花燒灰存性米湯調服三錢數服愈

五淋統治 多年木梳燒存性空心冷水調服

男用女梳  
女用男梳

或苧麻根兩切碎水一碗煎

半碗服 或木通五錢甘草二錢煎服

諸淋痛苦 側柏葉柳梢各五錢煎汁露一宿空

心溫服 或白礬細末一滿小酒鍾覆臍

眼上用布包紮一晝夜

夜夢遺精 石菖蒲一兩白果十四個酒煎服

白濁白帶 青月日所商湯加葉煎湯服

或生白果仁十枚搗用水送服 或菲菜子

炒一兩空心酒調服一錢三分此方並治

為末或蕎麥炒焦末鷄子白和丸梧子大每五

十丸鹽湯下日三服 又方治白濁白果打

爛包於龜頭紮緊一夜愈 或每早搗生

白果冲豆腐漿服

赤濁 益母草葉莖子取汁一盞空心温服數

次

水瀉 鷄蛋一個燒酒四兩調勻合碗綿紙封口

蒸熟食之 或生姜二塊艾一把煎服 或五

倍子末開水調服 或鹽炒敷臍上 或

胡椒大蒜作餅敷 此治寒瀉

老幼脾瀉日久不愈 飯鍋粬四兩蓮肉去白糖

各四兩共末和勻每日三服 食遠服

反筋腹瀉 兩手抽掣搖擲用婦女木梳煎水服

蠟燭瀉 錢二雄黃錢三同搗敷 此陽物病

痢疾 鷄地皮三箇 普乾并末黃酒中服 或



橘皮豆腐  
兼治久痢

重治水瀉  
極效價者  
功大宜配  
製施送

白痢  
並治噤口痢  
又藺音所方

木香一塊約三四錢黃連五錢水半升煎乾去黃連

切木香焙乾為末分三次早上橘皮湯下

午陳米湯下雖危可治或醋煎豆腐食

須多或陳茶葉陳皮生姜各二錢鹽一錢水

煎服又奇驗方元胡索三錢黃酒調服

痢疾四分散孕婦忌服蒼朮米泔浸陳土炒焦三兩杏仁

去皮尖去生甘草炒一兩羌活二兩川烏

油二兩去皮麩包煨生大黃一兩熟大黃一兩共

透一兩五錢炒

爲細末每服四分赤痢燈心三十煎濃湯

下白痢生薑片煎濃湯下赤白痢燈心

三十生薑片同煎濃湯下水瀉米湯下

重者五服愈

久痢百方不效者陳石榴皮焙末每服二錢米湯下

又方鷄冠花煎黃酒服紅用紅花又方

蠶豆花陰乾每服二錢沙糖一錢煎湯下或香

油煎鹹魚食數次奇驗仙方也

白前... 魚... 人不愈... 白鳥... 隻... 血... 衰... 酒

血痢不止 荷葉蒂十個煎水服 或柿餅煎湯

日飲數次

休息痢及疴瀉 鷄蛋一個打破黃蠟指頭大

化拌蛋炒熟空心服之

噤口痢 五穀蟲七個焙末米湯灌下將死可救 或

石膏炒黃蜜姜汁各一匙開水下

暴痢脫肛 生鐵斤二斤水一斗煎五升洗 或驚

頭煨存入枯礬少許摻用絹托入並治腸脫

行收夏方 卷三 便林寫痢

酒醉小便不通

葛花

錢三

燈心

根七

酒煮服即通

小便不通

甘遂末水調敷臍下一寸三分並

將甘草節煎湯飲之

或白鳳仙花連根

葉熬水乘熱洗腎囊陽物及兩胯內 或

萘白煎濃汁洗臍下一寸三分 或猪膽

一個留汁以陽物挿入膽中如婦人以膽汁

滴入陰中 又方公鼠糞兩頭尖的研末

酒調敷臍下一寸三分 或蝸牛搗敷

或芋菜一鳥虫用新白布包扭出汗蒸熱

此方五淋  
統治

尿血也

不效者蝮蠖即土狗燒灰酒服

小便不通遍身水腫欲死  
青布十七層貼臍  
下用滾水燒酒一大壺熨之

強忍小便以致不通及通後有血點滴出者  
尖板榔煎濃汁沖白蜜服

夜間尿多懶於起動者  
臨睡服核桃數個  
小便出血  
蘿蔔葉沖汁加好墨少許飲之

或真柿餅三個研米湯調服  
或茅草根煎

水當茶飲

血淋小便內有血點淡豆豉五錢煎水服或浮

小麥加童便炒研細末砂糖調服五錢或生

藕搗爛酒冲服

沙淋小腹急脹瓦松煎濃湯薰洗小腹兩時

神即通或核桃肉煮粥多食效或牛

角燒灰酒服二錢日五服或生葱頭同鹽

搗敷臍上砂自出或古銅錢煮水服治

或田螺一個連殼熱酒冲服或鷄糞

者  
曬乾炒  
片末開水用錢日月

或童男髮燒一錢并水下 或玉米

又名根葉煎水時時飲之 此症忌食鹽

易效

五淋通治 蘿蔔切片白蜜泡半刻瓦上焙乾再泡再焙

連製二次用鹽開水細細嚼服日服數次

又葵花根水煮數沸即服不可久煮甚效 或

家麻根五錢煎服

五淋痛甚久不愈 主天門冬槌汁半盞服之

奇效  
便淋寫廟  
亮

或冬瓜加淡豆豉煮食一日三五次七日

愈

大便虛閉

連鬚葱頭

三個

姜塊

一錢

鹽

一錢

豆豉

十餘粒

搗作餅供熱敷臍中拈定良久氣通即愈

不通再敷效

或鹽炒熱填臍中艾火燒

五次通 或老姜寸許如指頭大紙包裹

火內煨熱取出蘸麻油在糞門內快則半

日遲則一日

通

不可輕視

大便熱閉

芝麻

二大黃

二好茶葉

錢

共研末



溫水沖服 或桃花瓣撮 開水半碗沖

服鮮者更佳 或採來陰乾備用

大小便開塞不通 令病人坐桶上燒皂角烟

薰之 或雄鼠糞研末納臍中

大便下血 豆腐

未曾入袋取漿者

炒老黃色攤冷每

空心服

錢三口

服三次

血紫者白糖調服血紅

者紅糖調服 雖垂危年久者均極效 或

蚕豆葉搗熱酒沖去渣服一碗日二三次

垂危可救

或葶薺搗汁兩酒杯對好酒

服數日愈

久泄不止 大蒜搗貼足心或貼臍中

脾泄不止泄瀉食物完穀不化 柿餅燒紅放

地上用碗蓋住俟冷定研末米湯調二錢

年久不愈者三服全愈

紅痢不止 馬齒莧汁半茶杯入蜜半酒杯空

心溫熱服煮食亦可

休息痢 老松樹皮研細末稀粥和服一碗日

三次三日必愈 又平時收紅白椿樹皮

聖治小兒

糖調服二三錢紅痢用紅白痢用白紅白

痢則紅白并用

水瀉不止 黃瓜葉搗爛米湯下

立止水瀉 車前子 澤瀉各一錢 厚朴一錢二分 姜汁

炒 共爲末開水送服

痢疾 柿餅一個 入白礬一塊 煨存性爲末黃酒服

三次

水瀉兼治痢疾 鷄子一個 加胡椒末白糖開水沖服

白濁

破故紙

二兩

煎汁拌茯苓

四兩

炒乾爲末米

糊丸如梧桐子大黃酒送下四五十丸

五山木

車前子

各一

丸

林

水

木

木

木

木

...

...