

二如亭群芳譜利部目錄

第四冊

藥譜二 共二十種 附錄三種

茯苓

附茯神
木威喜芝
神木

麥冬

天冬

百部

桔梗

枸杞

杜仲

何首烏

仙茅

肉蓯蓉

列當

淫羊藿

香附子

覆盆子

使君子

栝樓

益母草

防風

郁李

豨莶

二如亭群芳譜藥部卷之二

濟南

王象晉
蓋巨甫

集解

松江

陳繼儒
仲醇甫

虞山

毛鳳苞
子晉甫

全較

寧波

姚元台
子雲甫

濟南

男王與朋
孫士祐
曾孫啟沂
詮次

藥譜二

茯苓

一名伏靈
一名伏菟
一名松腴
一名不死

麵生深山大松下蓋古松久爲人斬伐其枯

槎枝葉不復上生者謂之茯苓撥撥大者茯
苓亦大有大如拳者有大如斗者外皮黑而
細皺內堅白似鳥獸形者爲佳皆自作塊不
附著根亦無苗葉花實性不朽蛀埋地中二
三十年色性無異有赤白二種甘平無毒白
主氣赤主血白者逐水緩脾和中益氣止渴
除溼補勞傷腰膝利小便除虛熱赤者破

結氣瀉心小腸膀胱溼熱利竅行水陳元素

謂其用有五利小便一也開腠理二也生津

液三也除虛熱四也止泄瀉五也本草言茯

苓利小便伐腎邪王海藏乃言小便多者能

止瀉者能通不幾相反乎不知肺氣盛者實

熱也其人必氣壯脉強宜用若肺虛心虛胞

熱厥陰病者皆虛熱也其人必上熱下寒膀

胱不約下焦虛者乃火投于水水泉不藏脫

陽之証其人必肢冷脉遲皆忌用不可不辨

皮治水腫腹脹通水道開腠理

○附錄茯神

抱木者爲茯神安魂魄養精神止驚悸辟不祥補勞乏開心益智人

虛小腸不神

一名黃松節治偏風口面喎

利者倍用神木

斜毒風筋攀不語心神驚掣

虛而健忘腳氣

木威喜芝

茯苓千歲其生小

痺痛諸筋牽縮

本狀似蓮花夜視

有光燒之不焦服之長

生帶之避兵

抱朴子

○採取

視茯苓發所在

四面丈餘內鐵錐刺地

有茯苓則錐不可拔乃掘取之二八月

未陰乾堅如

修製

凡用去皮搗細水盆中瀝

石者絕勝

如

濁瀝去浮者此茯苓赤筋

若誤服令人瞳子黑晴點小兼肓目陶弘景曰作丸散者先煮一二沸乃切曝乾用

○服食

集仙方多單餌茯苓其法取白茯苓五

斤去黑皮搗篩熟絹囊盛于二斗米下蒸之米熟卽止曝乾又蒸如此三遍取牛乳

二斗和合著銅器中微火煮如膏收之每食以竹刀割隨性飽食辟穀不飢如欲食穀先

煮葵汁飲

又茯苓酥法白茯苓三十斤去皮薄切曝乾蒸之以湯淋去苦味淋之不止

其汁當甜乃曝乾篩末用酒三石蜜三升相和置大甕中攬百匝密封勿洩氣冬五十日

夏二十五日酥自浮出酒上掠取其味極甘美作掌大塊空室中陰乾色赤如棗飢時食

一枚酒送下終日不食名神仙度世法又

茯苓合白菊花或合桂心或合木爲散丸皆可常服補益殊勝儒門事親方用茯苓四

山之陽者君美山之陰者味苦

兩頭白麵二兩水調作餅以黃蠟三兩煎熟
飽食一頓便絕食辟穀至三日覺難受以後

氣力漸生

又法用華山挺子茯苓削如棗

大方塊安新甕內好酒洗之紙封一重百日

乃開其色當如餳糖日食一塊百日肌體潤

澤一年可夜視物久久腸化爲筋延年耐老

面若童顏

又法茯苓松脂各二斤淳酒浸

之和以白蜜日三服之久久通靈

又法白

茯苓去皮酒浸十五日漉出爲散每服三錢

水調下日三

孫真人枕中記云茯苓久服

百日病除二百日晝夜不眠

年役使鬼神四年後玉女來侍

○療治

胸脇氣逆脹滿茯苓一兩人參半兩每
服三錢水煎服日三

心神不定恍惚

健忘火不下降水不上升時復振跳常服消

陰養火全心氣茯神二兩去皮沉香半兩爲

末煉蜜丸小豆大每服三十丸人參湯下

血虛心汗別處無汗獨心孔有汗思慮多則

汗亦多宜養心血以艾湯調茯苓末日服一

錢心虛夢洩或白濁茯苓末二錢米湯調

下日二虛滑遺精白茯苓二兩縮砂仁二

兩爲末入鹽二錢精羊肉批片摻藥炙食酒

下丈夫元陽虛憊精氣不固小便白濁餘

瀝常流夢寐多驚頻頻遺洩婦人白淫白帶

並治白茯苓爲末四兩作圓以猪苓四錢半

入內煮二十餘沸取出日乾擣去猪苓爲末

化黃蠟搜和丸彈子大每服一丸空心津下

以小便清爲度忌米醋小便頻多白茯苓

去皮乾山藥去皮以白黎水滌過焙等分爲

末每米飲服二錢心腎俱虛神志不守小

便淋瀝不禁或夢遺白濁白朮茯苓等分爲

末新汲水接洗去筋控乾酒炙地黃汁搗膏

搜和丸彈子大每嚼一丸空心鹽酒下上
盛下虛心火炎燶腎水枯涸不能交濟而成
渴証白茯苓一斤黃連一斤爲末熬天花粉
和丸桐子大每溫湯下五十丸下部諸疾
堅實白茯苓去皮焙研取清溪流水浸去筋
膜復焙入瓷罐內以好蜜和勻入銅釜內重
湯桑柴火煮一日取出收之每空心自湯下
二三匙解煩鬱躁渴一切下部疾皆可除
飧泄滑痢不止白茯苓一兩木香煨半兩爲
末紫蘇木瓜湯下二錢妊娠水腫小便不
利惡寒赤茯苓去皮葵子各半兩爲末每服
二錢新汲水下卒然耳聾黃蠟不拘多少
和茯苓末細嚼茶湯下面點雀斑白茯苓
末蜜和夜夜傅之三七日愈猪鷄骨哽五
月五日取楮子晒乾白茯苓等分爲末每服
二錢乳香湯下一方不用楮子以所哽骨煎

湯下

痔漏神方赤白茯苓去皮沒藥各二

兩破故紙四兩石臼搗成一塊春秋酒浸三

月夏二日冬五月取出木籠蒸熟晒乾爲末

酒和丸梧子大每酒服二十丸漸加至五十

丸手十指節斷壞惟有筋連無節肉虫出

如燈心長數尺遍身綠毛卷名曰面餘以茯

苓胡黃連煎湯飲愈水腫尿瀦

茯苓皮椒目等分煎湯日飲取効

○典故

王子季服茯苓十八年玉女從之能隱能彰不食穀灸瘢滅而體玉澤黃初

起服茯苓五萬日能坐在

立亡日中無影

抱朴子

○麗藻散語

千歲之松下有茯苓上有兔絲

淮

○贊

皓苓下居帛絲上在中狀雞鳬其容龜

南子

松脂入地千歲爲茯苓

典

蔡神侔少司保延幼艾終志不移柔紅

可佩劉

叢書門

宋王微

麥門冬

一名橐冬一名忍冬一名忍陵一名禹

韭齊名愛韭秦名烏韭楚名馬韭越名羊韭

一名禹餘粮一名階前草一名不死草一名

僕壘一名隨脂所在有之大小三四種功用

相似其葉青大者如鹿葱小者如韭浙中者

良多縱紋且堅韌長及尺餘四季不凋根黃

白色有鬚在根如連珠四月開淡紅花如紅

麥門冬此根似橘
麥有橐及
冬不凋故
有是名

蓼實圓碧如珠吳地者勝性甘平無毒治肺

中伏火補心氣不足療身黃目黃虛勞客熱
口乾燥渴止嘔吐安魂魄定肺痰吐膿止嗽
治時疾熱狂頭痛令人肥健美顏色有子

○種植

四月初採根于黑壤肥沙地栽之每年六月九月十一月三次上糞及耘灌夏

至前一日取

根洗晒取之

○修製

以滾水潤溼少填抽去心或以瓦焙軟乘熱去心若入丸散瓦焙熟即于風中吹冷如此三四卽易燥且不損藥力或以湯浸搗膏和藥亦可滋補藥則以酒浸搗之

○取用

治心肺虛熱及虛勞與地黃阿膠麻仁
同爲潤經益血復脉通經之劑與五味

子枸杞子同爲生脉之劑麥門冬治肺中伏火脈氣欲絕者加五味子人參三味爲生脉散補肺中元氣不足六七月間溼熱方旺人病骨乏無力身重氣短頭旋眼黑甚則痿軟故孫真人以生脉散補其天元真炁脉者人之元氣也人參之甘寒瀉燥金而清水源五味子之酸溫瀉丙火而補庚金兼益五臟之氣儒醫精要云麥門冬以地黃爲使服之令人頭不白補髓通腎氣定喘促令人肌體滑澤除身上一切惡氣不潔之疾蓋有君而有使也若有君無使是獨行而無功矣此方惟火盛氣壯之人服之相宜若氣弱胃寒者必不可餌

○療治

麥門冬煎補中益心悅顏色安神益氣

搗熟絞汁和白蜜銀器中重湯煮攪不待耳

候如飴乃成溫酒日日化服之消渴飲水

用上元板橋麥門冬鮮肥者二大兩宜用黃

連九節者二大兩去兩頭尖三五節小刀子

去皮毛吹去塵更以生布摩拭秤之搗末以

肥大苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即于

白中搗爛納黃連末和丸並手丸如桐子大

食後飲下五十丸再但服兩日其渴必定

若重者卽初服一百五十九二日服一百二

十九三日一百丸四日八十九五十九合藥

要天添晴明之夜方浸須靜處禁婦人雞犬

見之如覺可時只服二十五丸服訖覺虛卽

取白羊頭一枚治淨以水三大斗煮爛取汁

一斗以來細細飲之勿食肉勿入鹽不過二

劑平復

勞氣欲絕麥門冬一兩甘草炙二

兩粳米半合棗二枚竹葉十五片水二升煎

一升分三服

虛勞客熱麥門冬煎湯頻飲

吐血

諸方不効者麥門冬去心一斤

搗取自然汁入蜜二合分作二服卽止

勑

血不止麥門冬去心生地黃各五錢水煎服

立止

齒縫出血麥門冬煎湯漱之

咽喉

生瘡脾肺虛熱上攻也麥門冬一兩地黃半

兩爲末煉蜜丸梧子大每服二十九麥門冬

湯下乳汁不出麥門冬去心焙爲末每用

二錢酒磨犀角約一錢許溫熱調下不過二

服便下

下痢口渴引飲無度麥門冬去心

三兩烏梅肉二十個細剉以水一升煮七令

細細呷之

全石藥發麥門冬六兩人參四

兩甘草炙二兩爲末蜜丸桐子大每服五十

丸飲下日再

男女血虛麥門冬二斤取汁

熬成膏生地黃三斤取汁熬成膏等分一處
濾過入蜜四之一再熬成瓶取每日自湯點

服忌

鐵器

藥門



一名橐冬一名顛棘一名顛勒一名滿

冬一名天棘一名浣草一名萬歲藤一名地

門冬一名筵門冬一名婆羅樹在東岳名淫

羊藿在西岳名菅松在南岳名百部在北岳

一名無不愈在中岳名天門冬名雖異其實一

也草之茂者名橐此草茂而功同麥冬故名

天門冬處處有之莖間有逆刺夏生細白花
亦有黃紫者秋結黑子在枝旁入伏後無花
暗結子其根數十枚大如手指圓實而長黃
紫色肉白以大者爲佳中有心如麥冬心而

稍粗性若平無毒潤燥滋陰清金降火保肺
氣通腎氣養肌膚利小便止消渴治溼疥除

身上一切惡氣不潔之疾久服令人肌體滑
澤潔白陽事不起者宜常服手太陰足少陰

經營衛枯涸宜以溼劑潤之天麥門冬人參

五味枸杞子同爲生脉之劑此上焦獨取寸口之意趙繼宗曰五藥雖爲生脉之劑然生地黃貝母爲天門冬之使地黃車前爲麥門冬之使茯苓爲人參之使若有君無使是獨行無功矣故張三丰與胡濱尚書長生不老一方用天門冬三斤地黃一斤乃有君而有使也搗汁作液膏服至百日丁壯兼倍駛于赤

及黃精二百日強筋髓駐顏色與煉成松脂
同蜜丸服尤善天門冬清金降火益水之上
源故能下通腎氣入滋補方合群藥用之有
効若脾胃虛寒人單餌既久必病腸滑反成
痼疾此物性寒而潤能利大腸故也服天門
冬忌鯉魚誤食中毒者搗萍汁服之可解

○種植

正二月取苗種肥地中每根相去二尺餘不得稠不久其根甚茂若取根卽留

一分小者却栽時常上糞有草卽耘此物甚難種若都摘了恐不活種子卽成亦晚

○修製 二三七八月采根雖曝乾猶脂潤難搗
必須去皮心用柳冰髓及柳木柴蒸一

伏時洒酒令遍更添火蒸作小
架去地二尺攤于上曝乾用

○服食 孫真人枕中記云八九月采天門冬根

曝乾爲末每服方寸七日三久服補中益氣治虛勞絕傷年老衰損偏枯不隨風溼

不仁冷痺惡瘡癰疽癩疾鼻柱敗爛者服之皮脫 亟出釀酒服去癥病積聚風痰顛狂三

亟伏尸除溼痺輕身益氣令人不飢百日還

童耐老釀酒初熟微酸久停則香美諸酒不及也

耀仙神隱云用乾天門冬十斤杏仁

一斤搗末蜜漬每服方寸七名仙人糗

沃天門冬二斤熟地黃一斤爲末煉蜜丸彈

子大每溫酒化三丸日三服居山遠行辟穀良服至十日身輕目明二十日百病愈顏色

如花三十日髮白更黑齒落重生五十日行及奔馬百日延年又法天門冬搗汁微火煎取五斗入白蜜一斗胡麻炒末二升合煎至可丸卽止火下大豆黃末和作餅徑三寸厚半寸一服一餅一日三服百日已上有益又法天門冬末一升松脂末一升蠟蜜一升和煎丸桐子大每日早午晚各服三十九天門冬酒補五臟調六腑令人無病天門冬三十斤去心搗碎以水二石煮汁一石糯米一斗細麴十斤如常炊釀酒熟日飲三盃天門冬膏去積聚風痰補肺療欬嗽失而潤五臟殺三虫伏尸除瘡疫輕身益氣令人不飢以天門冬流水泡過去皮心搗爛取汁砂鍋文武炭火煮勿令太沸以十斤爲率熬至三斤却入蜜四兩熬至滴水不散瓶盛埋土中一七去火毒每日早晚自湯調服一匙

若動大便
以酒服之

○二冬主治 天麥門冬並入手太陰厥煩解渴
止嗽消痰而麥門冬兼行手少陰
清心降火使肺不犯邪故止嗽立効天門冬
復行足少陰滋腎助元全其母氣故消痰殊
功蓋腎主津液燥則凝而爲痰
得潤劑則化所謂治痰之本也

○療治 肺痿欬嗽吐涎沫心中溫溫咽燥而不
渴生天門冬搗汁一斗飴一升紫苑四
合銅器煎至可丸每服杏仁大一丸日三服
陰虛火動有痰不堪用燥劑者天門冬一
斤水浸洗去心取肉十二兩石臼搗爛五味
子水洗去核取肉四兩晒乾不見火共搗丸
梧子大每服二十丸茶下日三 滋陰養血
溫補下元天門冬去心生地黃各二兩二味

用柳醅算以酒洒之九蒸九晒待乾秤之人
參一兩爲末蒸棗肉搗和丸桐子大每服三
十九食前溫酒下口三虛勞體痛天門冬
末酒服方寸七日三忌鯉魚肺勞風熱止
渴去熱天門冬去皮心煥食或曝乾爲末蜜
丸服尤佳亦可洗面婦人骨蒸煩熱寢汗
口乾引飲氣喘天門冬十兩麥門冬八兩並
去心爲末以生地黃一斤取汁熬膏和丸桐
子大每服五十丸逍遙散去甘草煎湯下
風顛發作則吐耳如蟬鳴引脇牽痛天門冬
去心皮曝搗爲末酒服方寸七日三久服良
小腸偏墜天門冬三錢烏藥五錢以水煎
服面黑令白天門冬曝乾同蜜搗作丸目
用洗面口瘡連年不愈天麥門冬並去心
玄參等分爲末煉蜜丸彈子大每噙一丸
諸般癰腫新掘天門冬三五兩洗淨沙盆擂

細好酒據汁頓服
未効再服必愈

○典故

杜紫薇服天門冬御八十妾一百四十歲日行三百里

列仙傳云赤須子食

天門冬齒落更生細髮復出太原甘始服天

門冬在人間三百餘年聖化經云以天門

冬茯苓等分爲末日服方寸七

則不畏寒大寒時單衣汗出也

目部

一名野天門冬一名婆婦草山野處處有

之春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青而光亦有細葉如茴香者莖青肥嫩時亦可煮食莖多者五六十長尖內虛根數十相

連似天門冬而苦根長者近尺黃白色鮮時

亦肥實乾則虛瘦無脂潤性甘微溫無毒清

肺熱潤肺治傳尸骨蒸勞疳殺蟯虱寸白蟯

虫種法與百合同宜山地

○修治

凡采得以竹刀劈去心皮花作數十條懸簷下風乾却用酒浸一宿瀝出焙乾

剉用或一窠八十條者號曰地仙苗若修事

餌之可千歲尤真一種最長大懸火上令

乾取四五十切短夜含嚥

汁勿令人知治暴嗽甚良

○辨訛

百部亦天門冬之類故皆治肺病殺虫但百部氣溫而不寒寒嗽宜之天門冬

性寒而不熱熱嗽
宜之此爲異耳

○療治暴欬嗽百部根清酒溫服一升日三又

百部生姜各搗汁等分煎服二合又百

部藤根搗自然汁和蜜等分沸湯煎膏噙薰

小兒寒嗽百部炒麻黃去節各七錢半爲

末杏仁去皮尖炒仍以水畧煮三五沸研泥

入熟蜜和丸皂子大每服二三丸溫水下

三十年嗽百部根二十斤搗取汁煎如飴服

方寸七日三深師加蜜二斤外臺加飴一斤

遍身黃腫掘新鮮百條根洗搗傅臍上再百條根一

以糯米飯半升拌水酒半合揉軟蓋藥上用

帛包住一二日後口皮作酒氣則水從小便

出腫自消誤吞銅錢百部根四兩酒一升

浸一宿溫服一升日再服百重入耳百部

頭具苗葉

炒研生油調一字于耳門上熏衣去風百

柔纏一根

部秦艽爲末入竹籠燒烟
薰之自落亦可煮湯洗衣

桔梗

一名梗草 一名白藥 一名齊荅 一名利如

一名符扈 生嵩高山谷及寃甸今處處有之

二三月生苗嫩時可煮食根如指大黃白色

莖高尺餘葉似杏葉而長四葉對生夏開小

花紫碧色頗類牽牛花秋後結子八月采根

蘭中所出根黃其皮似蜀葵根莖細青色葉

小而青似菊葉性辛微溫有小毒治心腹服

痛胸膈痛如刀刺腸鳴血積痰涎嗽逆口舌

生瘡赤目腫痛清肺氣利咽喉破癥瘕治鼻
塞除腹中冷痛小兒驚癇爲肺部引經之藥
與甘草同用爲藥中舟楫有承載之功

○辨訛

凡使勿用木梗真似桔梗咬之腥澀不堪

桔梗芥花葉有差互者亦有葉三

四對者皆一莖直上葉既相亂惟根有

心者桔梗無心者芥花此足爲別耳

○製用

凡用桔梗須去頭上尖二三分並兩畔
附枝于槐砧上細剉用生百合搗膏投

水中浸一伏時瀘出緩火熬乾每桔梗四兩

用百合二兩五錢 李時珍曰今但刮去浮

卷之二
皮米泔水浸一

夜切片微炒用

○製用 桔梗煎先以米泔水浸去皮及爛者次以井水煮畢取入蜜煎盡添蜜晒至蜜乾再添

蜜收貯

○療治 胸滿不痛桔梗枳殼等分水二鍾煎一鍾溫服

傷寒腹脹桔梗半夏陳皮各

三錢姜五片水二鍾煎一鍾服

痰嗽喘急

桔梗一兩半爲末童便半升煎四合去滓溫

服 肺癰桔梗湯主之桔梗一兩甘草二兩

水三升煮一升溫服朝暮吐膿血則瘥

喉

肺滿振寒脈數咽乾不渴時出

痺毒氣桔梗二兩水三升煎一升頓服

少

潤喉腥臭久之吐膿

陰咽痛者可與甘草湯不差與桔梗湯桔梗

久之吐膿

一兩甘草二兩水三升煮一升分服口舌生如粳米粥

瘡方同上 茄囊腫痛桔梗煮苡仁等分爲此肺癰也

末服

牙根腫痛桔梗爲末

粟瓢和丸皂子

芥湯嗽

牙疳臭爛桔

大綿裹咬之仍以荆芥湯嗽

眼黑目睛痛肝風

盛也桔梗末一斤黑牽牛頭末三兩蜜丸桐

子大每服四十丸溫水下日二

鼻出衄血

桔梗爲末水服方寸七日四

一方加生犀角

屑吐血下血方同上

打擊瘀血在腹內

久不消時發動者桔梗爲末米飲下一刀主

中蠱下而四藏皆損惟心未毀或鼻破將

死者苦桔梗爲末以酒服方寸七日三服不

能下藥以物杓口灌之心中當煩須臾自定

七日止當猪肝肺以補之神良一方加犀角

下血如雞肝晝夜出

等分妊娠中惡心腹疼痛桔梗一兩剉水

一錘生姜三片煎六分溫服

小兒客忤死

湯服之仍吞麝香豆

不能言桔梗燒研三錢米

中蠱也

湯服之仍吞麝香豆

許

桔梗爲末水服方寸七日四

一方加犀角

下血如雞肝晝夜出

等分妊娠中惡心腹疼痛桔梗一兩剉水

一錘生姜三片煎六分溫服

小兒客忤死

湯服之仍吞麝香豆

許

枸杞

一名枸櫞 一名枸棘 一名天精 一名地仙

一名却老 枸杞二木名此物棘如枸之刺莖

如杞之條故兼二名處處有之春生苗葉如

石榴葉而軟薄堪食俗呼爲甜菜其莖幹高

三五尺叢生六七月開小花淡紅紫色隨結

實微長生青熟紅味甘美根名地骨根之皮

名地骨皮枸杞子地骨皮古以韋山者爲上

近時以甘州者爲絕品今陝之蘭州靈州以

西並是大樹葉厚根粗河西及甘州者子圓
如櫻桃曝乾緊小紅潤甘美可作果食沈存
中筆談言陝西極邊生者高丈餘大可作柱
葉長數寸無刺根皮如厚朴亦其地脈使然
也花葉根實並用益精補氣不足悅顏色堅
筋骨黑鬚髮耐寒暑明目安神輕身不老或
云有刺者名白棘宜辨

○葉甘涼除煩益志壯心氣助陽事解熱補五
勞七傷去皮膚骨節間風消麯毒散瘡腫

去上焦心肺客熱和羊肉

作羹益人忌與乳酥同食

皮

甘淡寒解骨蒸

痺堅筋骨涼血

挫拌麪煮熟吞之

去腎家風溼

益精氣治金瘡神驗去下焦

肝腎之虛熱

子

味甘而潤性滋而補不能退熱止能補腎

潤肺生精益氣乃平補之藥所謂精不足

者補之以味也

謬云去家千里莫

可作拄杖

枸杞言補益精氣強盛陽道也

莖堅硬者

杖一名西王母

杖

一名仙人杖

○移植

揀好地熟斷加糞逐畦開深七八寸取

枸杞連莖剉四寸長以草索束如碗大

壠中立種相去尺許調爛牛糞如稀糊灌束

上令滿減則更灌以肥土壅滿更加熟牛糞

然後灌水不久卽生極肥嫩從一頭割如剪

韭法種半畝料理如法可供數人割時以早

朝爲佳，避熱及雨，須與地而平，高留則無葉。
深剪則傷根，要數鉏壅灌，每月一加糞，尤妙。

○種子 取枸杞子水盆內，擇去枝取子，曝乾，廬肥地作畦，畦中去土二三寸，仍深斲熟。

加糞用二月初一日撒子，如種菜法，又以爛牛糞蓋之，又蓋土一層，令與畦平，苗出頻澆之。當年疎瘦，二年以後悉肥，可作菜食。割如上法一年，但五度不可過，勿令長，不堪食。如食不盡，卽剪作乾菜，以備冬用。如此從春及秋，其苗不絕，其根年年生發，可備常用。

○辨訛 葉厚而長，梗上無刺者，枸杞葉圓，梗有刺者，名白棘，味辛苦，麻人不堪服。慎之。

○製用 採枸杞子，紅熟者去蒂，水淨洗瀝乾，砂盆內燭研，以細布袋盛，瀘去滓，沉清一宿，去清水，若天氣稍暖，更不得，經宿入銀石器，中慢火熬成膏，不住手攪之，勿粘底，候稀。

稠得所瀉向新窯瓶中盛之蠟紙封勿令透氣每日早朝溫酒下二大匙夜臥再服百日身輕氣壯耳目聰明鬚髮烏黑

養生雜纂

卷二

澡浴除病正月一日二月二日三月三日四

月四日以至十二月十二日皆用枸杞葉煎

湯洗澡令人光澤百病不生九月上戊日

採枸杞十月上亥日製服

歲時記

廿一日

枸杞煎湯沐浴令人不病不老十月壬癸

日面東採枸杞子二升以好酒五升磁瓶內

浸二十一日開封入生地黃汁三升攬勺以

紙三重封口更浸候至立春前三日開瓶空

心煖飲一二盃至立春後髭鬚却黑補益精氣

服之耐老輕身忌食蘿葡萄

夷十四日取

枸杞煎湯沐浴令人光澤不病不老十一

月初十日取枸杞菜煎湯沐浴令人光澤不病不老枸杞久服令人長壽謠云去家千里

不用枸杞言無所用其補益也
十二月除夜取枸杞煎湯沐浴令人光澤不
病不老去災

云天生藥

地仙丹

昔有吳人赤腳張傳猗氏縣一

○療治老人服之壽百餘行走如飛髮白反黑
齒落更生陽事強健此藥性平常服能除邪

熱明目輕身春採枸杞葉名天精草夏採花

名長生草秋採子名枸杞子冬採根名地骨

皮並陰乾無灰酒浸一宿晒露四十九晝夜

取目精月華氣待乾爲末煉蜜丸彈子大每

早晚各用一丸細嚼以隔夜自沸湯下

一杓

杞煎治虛勞虛熱輕身益氣令一切癰疽承

不發用枸杞三十斤春夏用莖葉秋冬用根

實以水一石煮取五斗以滓再煎取五斗澄
清去滓再煎取二斗入鍋煎如餳取之每早

酒服一合 金龜煎 柑杞子逐日摘紅熟者

不拘多少以無灰酒浸之蠟紙封固勿令洩

氣兩月足取入沙盆內搗爛濾汁同浸酒入

銀鑊內慢火熬不仕手攬恐粘住不勻候成

膏如錫淨瓶密收每早溫酒服二大茶匙夜

臥再服百日身輕氣壯積年不輟可以羽化

枸杞酒補虛去勞熱長肌肉益顏色肥健

人治肝虛衝感下淚用生枸杞子五升隔破

絹袋盛浸好酒二斗密封勿洩氣二七日服

之任性勿醉 治腎經虛損眼目昏花或雲

翳遮睛甘州枸杞子一升好酒浸潤透分作

四分四兩用蜀椒一兩炒四兩用小茴香一

兩炒四兩用芝麻一兩炒四兩用川棟肉一

兩炒揀出枸杞加熟地黃白朮白茯苓各一

二升絹袋盛浸一斗酒中密封三七日飲之

肝虛下淚枸杞子

肝虛下淚枸杞子

目赤生翳枸杞子搗汁目點三五次神驗
面黯肝胞枸杞子十斤生地黃三斤爲末

每服方寸匕溫酒下日三久之自愈

注夏

虛病枸杞子五味子研細滾水泡封三日代

茶飲

地骨酒壯筋骨補精髓延年耐老枸

杞根生地黃甘菊花各一斤搗碎以水一石

煮取汁五斗炊糯米五斗細麪拌勺入甕如

常封釀待熟澄清日飲三盃

虛勞客熱枸杞

杞根爲末白湯調服有痼疾人勿服
骨蒸

煩熱及一切虛勞煩熱大病後煩熱并用地

骨皮三錢防風二錢甘草炙五分生姜五片

水煎服

熱勞如燎地骨皮二兩柴胡一兩

爲末每服二錢

麥門冬湯下

虛勞苦渴骨

節發熱或寒枸杞

根白皮切五升麥冬三升

小麥二升水二斗

煮至麥熟去滓每服一升

口渴卽飲

腎虛腰痛枸杞根杜仲萆薢各

一斤好酒三斗漬之密封鍋中煮一日飲之
任意 吐血不止枸杞根子皮爲散水煎日

日飲之 小便出血新地骨皮洗淨搗自然
汁無汁則以水煎汁每服一盞入酒少許食

前服

帶下脉數枸杞根一斤生地黃五斤

酒一斗煮五升日日服之 天行赤目暴腫

地骨皮三斤水三斗煮三升去滓入鹽一兩

取二升頻頻洗點

風重牙痛枸杞根白皮

煎醋漱之虫卽出亦可煎水飲

口舌糜爛

地骨皮湯治膀胱移熱于小腸上爲口糜生

瘡潰爛心胃壅熱水穀不下用柴胡地骨皮

各三錢水煎服

小兒耳疳地骨皮一味煎

湯洗仍以香油調末搽

氣癭瘡多年不

愈地骨皮冬月者爲末每用紙撲蘸入瘡內

頻用自然生肉更以末飲服二錢日三

男

子下疳先以漿水洗後搽地骨皮末生肌止

癰

婦人陰腫或生瘡枸杞根煎水頻洗

十三種疔春三月採葉名天精夏二月採枝

名枸杞秋三月採子名却老冬三月採根名地骨並用上建日俱曝乾爲末如不得依法

採但得一種亦可用緋縷一片裹藥牛黃一

梧子大及鈎棘針三七枚赤小豆七粒爲末

捲作團以髮束定熨斗中炒令沸定刮搗爲

末以一方寸匕合前枸杞末二匕空心酒服

二錢半日再服癰疽惡瘡膿血不止地骨

皮不拘多少先洗淨刮去粗皮取白穰以粗

皮同骨煎湯洗令膿血盡以細穰貼之立効

有一朝士腹脇間病疽經歲或以地骨皮煎

湯淋洗出血一二升家人懼欲止之病者曰

疽似少快更淋之用五升許血漸淡乃止以

細穰貼之次日結痂愈癰疽出汗着手足

肩背纍纍如赤豆用枸杞根葵根葉煮汁煎

如飴隨意飲之

足趾雞眼作痛作瘡地骨

皮同紅花研細傅之次日卽愈

火赫毒瘡

此患急防毒氣入心腹枸杞葉搗汁服立瘥

目瀟有翳枸杞葉車前葉二兩接汁以桑

葉裹懸陰地一夜取汁點之不過三五度

五勞七傷陽事衰弱枸杞葉半斤切粳米二

合豉汁和煮作

粥日日食之良

○典故

蓬萊縣南丘村多枸杞高者一二丈其
根盤結甚固村人多壽考

潤州開元

寺大井旁生枸杞歲久飲其水甚益人

朱孺子幼事道士王延正居大若岩一日汲于

溪見二花犬因逐之入枸杞叢下掘之根形
如二犬烹而食之忽覺身輕飛于峯上雲氣

擁之而去

續仙傳

蜀青城山老人村有五

世孫者道極險遠生不識鹽醯而溪中多枸

杞根如龍蛇飲其水故壽近歲道
稍通漸能致五味而壽益衰

東坡

○麗藻散語

薄言采杞于彼新田于此蓄畝
南山有杞



枸杞

千歲其形如



賦

天隨生宅荒少墻屋多隙地著圖書
所前後皆樹以杞菊春苗恣肥得以



採擷供

左右盃案及夏五月枝葉老硬氣味
苦澀旦暮猶責兒童輩拾掇不已人或嘆曰



千乘之邑

非無好事之家日欲擊鮮爲具以
飽君者多矣君獨閉關不出率空腸貯古聖



賢道德

言語何自苦如此生笑曰我幾年忍



飢誦經

豈不知屠沽兒有酒食耶退而作杞



菊賦

以自廣云惟杞與菊偕寒互綠或頑



或若煙

披兩沐我衣敗綿我販脫粟羞慙齒



牙苟日梁肉蔓延駢羅其生實多爾杞未棘



爾菊未莎其如予何

陸龜蒙

天隨生自言

常食杞菊及夏五月枝葉老硬氣味苦澀猶
食不已因作賦以自廣始余嘗疑之以爲士
不遇窮約可也至于飢荒齧草木則過矣而
余仕宦十有九年家日益貧衣食之奉殆不
如昔者及移守膠西意且一飽而齋厨索然
不堪其憂日與通守劉君廷式循古城廢圃
求杞菊食之捫腹而笑然後知天隨之言可信
不謬作後杞菊賦以自嘲且解之云吁

嗟先生誰使汝坐堂上稱太守前賓客之造
請後掾屬之趨走朝衙達午夕坐過酉曾不
酒之不投攬草木以誑口對案麤感舉箸噎
嘔昔陰將軍設麥飯與葱華升舟推去而不
喚惟先生之眷眷豈故山之無有先生忻然
而笑曰人生一世如屈伸肘何者爲貧何者
爲富何者爲美何者爲陋或糠穀而瓠肥或
梁肉而黑瘦何侯方丈庾郎三九較豐約于

夢寐卒同歸于一朽吾方以杞爲糧以菊爲
糗春食苗夏食葉秋食花實而冬食根庶幾

乎西湖南陽之壽

蘇東坡

張子爲江陵之

數月時方仲春草木敷榮經行郡圃意有所

欣非花柳之是問眷杞菊之青青爰命采掇

付之庖人汲清泉以細烹屏五味而不親甘

脆可口蔚其芬馨蓋日爲之加飯而他物幾

不足以前陳飯已捫腹得意嘔吟客有問者

日異哉先生之嗜此也乎蘇公之在膠西值

黨禁之方興嘆齋厨之蕭條乃攬擷乎草木

之英今先生當無事之時居方伯之位技吏

奔走願指如意廣廈延賓毬場享士清酒百

壺鼎臚俎載宰夫奏刃各獻其技固無求而

弗獲雖醉飽其何忌而乃樂從夫野人之飧

豈亦下取乎葑菲之棄不然得無近于矯激

有同于脫粟布被者乎張子應之曰天壤之

間孰爲正味厚或腊毒淡乃其至猩唇乳胎
徒取詭異山鮮海錯紛紜莫計苟滋味之或
偏在六腑而成贅極口腹之欲初何出于一
美惟杞與菊中和所萃微勁不苦滑甘靡滯
非若他蔬善嘔走水旣瞭目而安神復沃煩
而滌穢騷南陽與西河又頽齡之可制此其
爲功曷可殫記況于膏梁之習貧賤則廢雋
永之求不得則恚茲隨寓之必有雖約居而
足恃殆將與之終身又何貽夫同志子獨不
見吾納湖之陰乎雪銷壞肥其苒歲莫與子
婆娑薄言掇之石跳瓦盃啜汁咀蘪高論唐
虞詠歌詩書嗟乎微斯物孰同先生之歸於
是相屬而歌殆日晏以忘飴

張欽夫

詩五言

新芽摘杞叢

蘇東坡

深鎖銀泉梵

高葉駕雲空不與凡木並自將仙蓋同影疎
千點日聲細萬條風送子隣溝外飄香客位

中花盆承此飲春歲小無窮

自闊羅生滿山澤日有牛羊憂歲有野火厄

越俗不好事過眼等茨棘青荑春日長絳珠

爛莫摘短籬護新榆紫笋生卧側根莖與花

實收拾無棄物大將爺吾鬚小則餉我客似

聞朱明洞中有千歲質靈厖或夜吠可見不

可索仙人可許我借

七言

不知靈藥根成狗

杖扶衰疾

孫子瞻

怪得時聞夜吠聲

自樂天

僧房藥樹依寒井井有香泉樹有

靈翠黛葉生籠石甃殷紅子熟照銅瓶枝繁

本是仙人杖根老新成端犬形上品功能甘

露味還知一勺可逐齡

周易

芥花菘苔

餞春忙夜吠仙苗喜晚嘗味抱土膏甘復脆

氣含風露薰猶香作蘿淡著微施酪筆茗臨

時莫過湯却憶荆溪古城上翠條紅乳摘盈

箱鴻臚菊芽伏土繆青粟杞筍傍根埋

紫玉雷聲一夜雨一朝森然迸出如蕨苗先
生飢腸詩作梗小摘珍芳汲水井風爐蟹眼
候松聲罩箒親撈微帶生爛炊雕胡淋青精
筆以天隨寒綠萌飢時作虀仍作羹飽後龍
鳳同庖烹大官蒸羊壓花片宰夫脯蹠削瓊
軟豹胎熬出禍胎來貴人有眼何曾見天隨
尚有愁作魔愁杞作棘菊作莎君不見黃金
錢照紅玉豆秋高更覺風味多先生釀金煉
紅玉自莎自棘如予何金空玉盡苗復出喫
苗喫花并喫實天隨白眼屠沽兒不道有人

頭上立

楊廷秀

杜仲 一名思仲 一名思仙 漢中建平宜都者佳

脂厚潤者良豫州山谷及上黨商州陝州亦

有之樹高數丈葉類柘又似辛夷江南謂之
櫚初生嫩葉可食謂之櫚芽花實苦澀亦堪
入藥木可作屐益肺皮色紫而潤狀如厚朴
而更厚折之多白絲相連如綿二五六九月
皆可採味甘微辛氣溫平甘溫能補微辛能
潤故能潤肝而補腎主補中益精治腰膝痛
堅筋骨強志除陰下癢溼小便餘瀝療腎腰
脊攀潤肝燥補肝經風虛葉作蔬去風毒脚

氣久積風冷腸痔下血亦可煎湯腎虛火熾者忌用乎名逐折

○製用 凡使削去粗皮每一斤用酥一兩蜜三兩和塗火炙以盡爲度細挫用

○療治 腎虛腰痛杜仲去皮炙黃一大斤五味子半斤分十劑每夜取一劑以水一大升浸至五更煎減三分之一去渣以羊腎三四枚切入再煮三五沸加薤白七莖

羹空腹頓服

風冷傷腎腰背虛痛

仲一鹽作

斤切炒酒二升漬十日日服三合此陶隱居

得效方也治腰腿痛酒炙透爲末每旦溫酒服二錢

病後虛汗及目中流汁杜仲牡

墮胎杜仲入兩糯米煎湯浸透炒去絲續斷磣等分爲末卧時水服五七不止再服頻

二兩酒浸培乾爲末山藥六兩作糊丸桐子
每服五十九空心米飲下如三四个曾墮
預于兩月前服一方棗肉爲丸糯米湯下

產後諸疾及胎不安杜仲去皮丸上培乾木
臼搗末煮棗肉丸彈子大

每一丸糯米飲下日二

○典故一年少新娶後得脚氣病痛甚作脚氣
斷片拆每以一兩川半酒半水一大盞煎服
三日能行又三日全愈琳曰此腎虛非脚氣
也杜仲能治脚癰痛以酒行之則爲效易矣

龐元英談數

葛一名瘡帚一名紅內消一名九真藤一名
交藤一名夜合一名地精一名赤

桃柳藤一名馬肝石一名陳知白處處有之

以西洛嵩山及柏城縣者爲勝有形如鳥獸

山川者尤佳春生苗蔓延竹木牆壁間莖紫

色葉葉相對如薯蕷而不光澤夏秋開黃白

花如葛勒花結子有稜似蕎麥而雜小纏如

粟秋冬取根大者如拳連珠有赤白二種赤

者雄苗色黃白白者雌苗色黃赤根遠不過

三尺夜則苗蔓相交或隱化不見性苦澁微

一云苗如
木藁葉有
光澤形如
桃柳其背
偏皆單生
不相對俟

再考之

溫無毒白者入氣分赤者入血分腎主閉藏
肝主疏洩此物氣溫味苦濇苦補腎溫補肝
能收斂精氣所以能養血益肝固精益腎健
筋骨烏髭髮治五痔腰膝之病冷氣心痛積
年勞瘦痰癬風虛敗劣壯氣駐顏延年益壽
婦人惡面瘦黃赤白帶下毒氣入腹久痢不
止產後諸疾功難盡述茯苓爲使忌猪肉血
羊血無鱗魚鐵器犯之令藥無功此藥不寒

不燥功在地黃天冬諸藥之上 凡服藥用偶

日二四六八日服訖以衣覆汗出導引尤良

○製用

春夏秋采其根雌雄並用乘溼以布拭去土曝乾臨時以竹刀切米泔浸經宿

曝乾木杵臼搗之忌鐵器

新采者去皮銅

刀切薄片入甌內瓷鍋蒸之旋以熱水從上

淋下勿令滿溢候無氣息取出曝乾用近

時治法用何首烏赤白各一斤竹刀刮去粗

皮米泔浸一夜切片川黑豆三斗分九分每

次用一分以水泡過砂鍋內鋪豆一層首烏

一層重重鋪盡蒸之豆熟取出去豆將何

首烏晒乾再以豆蒸如此九蒸九晒乃用

○療治

七寶美髯丹烏鬚髮壯筋骨固精氣續嗣延年用赤白何首烏各一斤米泔浸

三四日究片刮去皮用淘淨黑豆二升以砂
鍋水甌鋪豆及首烏重重鋪蓋蒸之豆熟取
出去豆曝乾換豆再蒸如此九次曝乾爲末
赤白茯苓各一斤去皮研末以水淘去筋膜
及浮者取沉者捻塊以人乳十盞浸勺晒乾
研末牛膝八兩去苗酒浸一日同首烏第七
次蒸之至第九次止晒乾當歸八兩拘杞子
八兩俱酒浸晒菟絲子八兩酒浸生芽研爛
晒補骨脂四兩以黑脂麻炒香並忌鐵器石
臼爲末煉蜜丸彈子大一百五十九每日三
丸清晨溫酒下午時姜湯下卧時鹽湯下其
餘並丸桐子大每日空心酒服一百丸久服
極驗 滋補何首烏九壯筋骨長精神補血
氣久服黑鬚髮堅陽道令人體健輕身延年
何首烏三斤銅刀切片乾者以米泔水浸軟
切牛膝去苦一斤切黑豆一斗淘淨木甌鋪

豆一層藥一層重重鋪盡瓦鍋蒸至豆熟取出
出去豆曝乾換豆又蒸如此三次爲末蒸棗
肉和九桐子大每服三五十九空心溫酒下
赤白何首烏各半極大者八月采以竹刀
削去皮切片米泔水浸一宿晒乾壯婦男兒
乳汁拌晒三度候乾木曰春爲末以密雲棗
肉和杵爲丸如桐子大每服二十九每十日
加十九至百丸止空心溫酒鹽湯任下一方
不用人乳何首烏雌雄各半斤分作四分
一分當歸汁浸一分生地黃汁浸一分旱蓮
汁浸一分人乳浸三日取出各曝乾瓦焙石
臼爲末蒸棗肉和九桐子大每服四十九空
心百沸湯下骨軟風疾腰膝疼行步不得
遍身瘡痏何首烏大而有花紋者同牛膝各
一斤好酒一升浸七宿曝乾木曰杵末棗肉
和丸桐子大每服三五十九空心酒下寬

筋治損何首烏十斤生黑豆半升同煎熟皂

莢一斤燒存性牽牛十兩炒取頭末薄荷十

兩木香牛膝各五兩川烏頭泡二兩爲末酒

糊丸梧子大每服三十丸茶湯下皮裏作

痛不問何處用何首烏末姜汁調成膏塗上

以帛裹住火灸鞋底熨之自汗不止何首

烏末津調封臍中腸風藏毒下血不止何首

烏二兩爲末食前米飲服二錢小兒龜

背龜尿調紅內消點背上骨節久久自安

破傷血出何首烏末傅之卽止神効

結核或破或不破下至胸前者取根洗淨日

日生嚼并取葉搗塗之數服卽止神効癰

疽毒瘡紅內消不限多少瓶中文武火熬煎

臨熟入好無灰酒相等再煎數沸時時飲之

其滓焙研爲末酒煮麪糊丸桐子大空心溫

酒下三十九疾退宜常服之大風癘疾何

首烏大而有紋者一斤米泔浸一七九蒸九
晒胡麻四兩九蒸九晒爲末每酒服二錢日
二水煎濃湯洗浴甚能解痛生肌 風瘡疥癬
作痒莖葉

煎湯洗効

○典故此藥流傳雖久服者尚寡嘉靖初邵應
節真人以七寶美髯丹方上進

世宗肅皇帝服餌有効連生

皇嗣于是何首烏之方天下大行矣

宋懷州知

州李治與一武臣同官怪其年七十餘而輕
健面如渥丹能飲食叩其術則服何首烏九
也乃傳其方後治得病盛暑中半體無汗已
二年竊自憂之造丸服至年餘汗遂浹體其
活血治風之功大有補益其方用赤白何首
烏各半斤米泔浸三夜竹刀刮去皮切焙石

曰爲末煉蜜丸榧子大每空心溫酒下五十丸亦可末服何首烏以出南河縣及嶺南恩州韶州潮州賀州廣州潘州四會縣者爲上邕州桂州康州春州高州勒州循州晉興縣出者次之真仙草也五十年者如拳大號山奴服之一年髮鬚青黑一百年者如盤大號山哥服之一年顏色紅悅一百五十年者如盆大號山伯服之一年齒落更生二百年者如斗栲栳大號山翁服之一年顏如童子行及奔馬三百年者如王斗栲栳大號山精純陽之體久服成地仙

漢武時有馬肝石能烏人髮故後人隱此名亦曰馬肝石赤者能消腫毒外科呼爲瘡痔紅內消采人爲名爾此藥本名交藤因名因何首烏見藤夜交便卽采食有功因以

何首烏服而得名也唐元和七年僧文

象遇茅山老人遂傳此事

圖經本草

○麗藻贊

神効勝道著在仙書雌雄相交夜合
晝疏服之去穀日居月諸返老還少

變安病軀有緣

傳何首烏順州南河縣人祖

者遇昂爾自如

傳名能嗣又名延秀能嗣本

名田見生而困弱年五十八無妻子嘗慕道

術隨師在山一日醉卧山野忽見有藤二株

相去三尺餘苗蔓相交久而方解解了又交

田兒驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無

識者後有山老忽來示之荅曰子旣無嗣其

藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂許爲

末空心酒服一錢七日而思人道數月似強

健因此常服又加至二錢經年舊疾皆痊癒

烏容少十年之內卽生數男乃改名能嗣又

與其子延秀服皆壽百六十歲延秀生首烏

首烏服藥亦生數子年百三十歲髮猶黑有
李安期者祖首烏鄉里親善竊得方服其壽
亦長遂敘其事

傳之云

仙草

一名獨茅 一名茅瓜子 一名婆羅門參初

出西域今大庾嶺蜀川江湖兩浙諸州亦皆

有之葉青如茅而軟且畧闊面有縱文又似

初生櫻櫛秧高尺許至冬盡枯春初乃生四

五月間抽莖開小花深黃色六出不結實其

根獨莖直大如小指下有短細肉根相附外

皮稍粗褐色內肉黃白色二月八月采根曝
乾衡山出者花碧五月結黑子處處大山中
皆有人惟取梅嶺者用會典成都貢仙茅性
辛溫有小熱小毒治心腹冷氣不能食腰脚
風冷攣痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子
益顏色壯陽道健筋骨長肌膚助精神明耳
目填骨髓 許真君書云仙茅久服長生其
味甘能養肉辛能養節苦能養氣鹹能養骨

滑能養膚酸能養筋宜和苦酒服必効

○製用 清水洗刮去皮槐砧上用銅刀切豆許
大生稀布袋盛黑豆水內浸一宿取出

酒拌溼蒸從巳至亥取出曝乾勿犯牛乳及

鐵器斑人鬚髮 彭祖單服洗竹刀刮切糯

米泔浸去赤汁

出毒後無妨損

○療治 壯筋骨益精神明目黑鬚仙茅二斤糯
米泔浸五日去赤水夏月浸三日銅刀

刮剉陰乾取一斤蒼朮二斤米泔浸五日刮

去焙乾取一斤枸杞子一斤車前子十二兩

白茯苓去皮茴香炒柏子仁各八兩生地黃

焙熟地黃焙各四兩爲末酒煮糊丸桐子大

每服五十丸食前溫酒下日二定喘下氣

補心腎神秘散白仙茅半兩米泔浸三宿晒

炒團參二錢半阿膠一兩半炒膾脰一兩燒爲末每服二錢糯米飲空心下日二門僧進唐明皇方八九月采得竹刀刮去皮切如豆粒米泔浸兩宿陰乾搗末熟蜜丸桐子大每服二十丸空心酒飲任下忌食牛乳及黑牛肉大減藥力

○典故

開元中婆羅門僧進此方明皇服之有効禁方不外傳天寶之亂方書流散上

都僧不空三藏傳司徒李勉尚書路嗣供僕射張建封給事齊抗服之皆有効路公久服金石無效得此藥其益百倍齊給事生平少氣力風疹繼作服之遂愈

五臺山有仙茅

患大風者服之多瘥



廣西英州多仙茅羊食之舉體皆化爲筋食之補人名乳羊

睡則身冷如逝者旣覺須令人溫之良久乃

荔齋類

能動常服仙茅鍾乳硫黃莫知紀極觀此則
知仙茅性熱補三焦命門之藥也惟陽弱精
寒稟賦素怯者宜之若體壯相火熾盛者服
之反能動火沈存中醫說一人中仙茅毒
舌脹出口漸大與肩齊以小刀努之隨破隨
合努至百數始有血一點煮大黃朴硝與服
以藥摻之應時消縮此皆火盛性

淫之人過服之害也張果醫說

肉從容

一名肉松容 一名黑司命出肅州福祿

縣沙中今陝西州郡多有之然不及西羌界

中來者肉厚而力緊三四月掘根長尺餘切

取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮

有松子鱗甲性甘微溫無毒補五勞七傷益

精髓悅顏色養五臟延年輕身令人多子治

男子洩精遺瀝婦人帶下陰痛男子絕精不

興婦人絕陰不產從容爲腎經血分之藥治

腎須妨心

○製用

清酒浸一宿以棕刷去沙土浮甲劈破
中心去白膜一層如竹絲草樣有此能

隔人

心前氣不散令人上氣以甑蒸之從

午至酉取出再用酥炙得所

西人刮去鱗

甲酒浸洗去黑汁薄切合山芋

羊肉作羹極益人勝服補藥

○辨訛 朱震寧曰河西混一之後方識其真形
何嘗有所謂鱗甲者蓋蕷蓉罕得人多
以金蓮根用鹽盆制而爲之又或以草
蕷蓉充之甚或以嫩松稍鹽漬爲之

○療治

補益勞傷精敗面黑蕷蓉四兩水煮爛
薄切研精羊肉分爲四度下五味以米

煮粥空心食

強筋健髓蕷蓉蟬魚二味爲

末黃精汁丸服力可十倍

腎虛白濁肉蕷

蓉鹿茸山藥白茯苓等分爲末米糊丸桐子

大每棗湯下二十九

汗多便闊老人虛人

皆可用肉蕷蓉酒浸焙二兩研沉香一兩爲

末麻子仁汁打糊丸桐子大每服七十丸白

湯下

消痰易飢肉蕷蓉山茱萸五味子爲

末蜜丸桐子大每鹽酒下二十九

破傷風

病口噤身強肉蕷蓉切片晒乾用一小

盞底上穿透燒烟于瘡上薰之累効

列當

一名草蓆蓉 一名花蓆蓉 一名粟列秦州

原州靈州皆有之。暮春抽苗四月中旬采長五六寸至一尺莖圓白色采取壓扁日乾以其功劣於肉蓆蓉故謂之列當性甘溫無毒治男子五勞七傷補腰腎令人有子

○療治

陽事不興列當好者二斤搗爲末好酒一斗浸之經宿取起隨性日飲之又煮

酒侵酒服之

大補益人

一名仙靈脾 一名仙靈毗 一名放杖草

入臍口貼此物補下

一名棄杖草 一名千兩金 一名乾雞筋 一名

剛前 一名黃連祖 一名三枝九葉草 江東陝

有淫牛

西泰山漢中湖湘間皆有之 生大山中 一根

數莖莖粗如線高一二尺一莖二桿一桿三

葉長二三寸青似杏葉及豆葉面光背淡甚

薄而細齒邊有刺根紫色有鬚四月中開白

花亦有紫花者碎小獨頭子五月采葉晒乾

根如黃連根葉俱堪用生處不聞水聲者良

西川比都
於理尤通
日百度以
食此草也

故名

性辛寒無毒治陰痿絕傷莖中痛補腰膝強
心志益氣力堅筋骨男子絕陽婦人絕陰老
人昏耄中年健忘一切冷風勞氣筋骨痙急
四肢不仁久服令人有子

○製用凡使時呼仙靈脾以夾刀夾去四邊花枝每一斤羊脂四兩拌炒以脂盡爲度真陽不足者宜之

○療治仙靈脾酒益丈夫興陽理腰膝冷用淫羊藿一斤酒一斗浸三日逐時飲之偏風不遂皮膚不仁仙靈脾一斤細剉生絹袋盛于不津器中用無灰酒二升浸之重封

春夏三日秋冬五日後每日暖飲常令熏然不得大醉酒盡再合無不效驗令時切忌雞

犬婦人見

三焦咳嗽腹滿不飲食氣不順

仙靈脾覆盆子五味子炒各一兩爲末煉蜜

丸桐子大每姜茶下二十丸

目昏生翳仙

靈脾小桔梗紅色者等分爲末每服一錢茶

下日二病後青盲日近者可治仙靈脾一

兩淡豆豉一百粒水一盞半煎一盞頓服卽

瘳

小兒雀目仙靈脾根晚蚕蛾各半兩炙

甘草射干各二錢爲末用羊子肝一枚切開

摻藥二錢紮定黑豆一合米泔一盞煮熟分

二次服以汁送下

痘疹入目仙靈脾威靈

仙等分爲末每服五分米湯下

牙齒

虛痛仙靈脾爲粗末煎湯頻漱大妙

○典故

許聽菴云世稱淫羊藿卽仙靈脾滇中

鄭醫極言其謬真者俗謂之羊羶草生

衡

時有羊羶氣以酒炒過卽香余服之一載餘甚得其力今無可復問矣

香附子莎草根也一名草附子一名莎結一名

水莎一名侯莎一名夫須一名地毛一名水

香稜一名續根草一名地蘢根一名水巴戟

上古謂之雀頭否俗人呼爲雷公頭金光明

經謂之月萃哆記事珠謂之抱靈居士生田

野在處有之葉如老韭葉而硬光澤有劙脊

稜五六月中抽一莖三稜中空莖端出數葉

開青花成穗如黍中有細子其根有鬚鬚下
結子一二枚轉相延生子上有細黑毛大者
如羊棗而兩頭尖采得燎去毛曬乾氣味辛
微苦甘平無毒足厥陰手少陽藥也兼行十
二經入脉氣分主治散時氣寒疫利三焦解
六鬱消飲食積聚瘀飲痞滿附腫腹脹脚氣
止心腹肢體頭目齒耳諸痛癰疽瘡瘍吐血
下血尿血婦人崩帶下月候不調胎前產後

百病爲女科要藥花及葉治丈夫心肺中虛
風客熱皮膚瘙痒隱癰飲食減少日漸羸瘦
憂愁抑鬱等症取苗花二十餘斤挫細水二
石五斗煮一石五斗浸浴令汗出五六度瘙
痒卽止四時常用癰癩風永除煎飲散氣鬱
利胸膈降痰熱香附能推陳致新故諸書皆
云益氣而俗有耗氣之說又謂宜于女人不
宜于男子者非矣蓋婦人以血用事氣行則

血行無疾老人精枯血閉惟氣是資小兒氣
日充則形乃日固大凡病則氣滯而餒香附
于氣分爲君藥世所罕知臣以參芪佐以甘
草治虛怯甚速

○修治

凡采得曝乾火燎去毛童便浸透洗晒
搗用或生或炒或酒醋鹽水浸各從本

方稻草煮之味不苦

香附之氣平而不寒

香而能竄其味辛能散

微苦能降微甘能和

乃足厥陰肝手少陽三焦氣分主藥而兼通

下二經氣分生則上行胸膈外達皮膚熟則

下走兩腎外徹腰足炒黑則正血得童洩浸

炒則入血分而補虛益水浸炒則入血分而

潤燥青鹽炒則補腎氣酒浸炒則行經絡醋
浸炒則消積聚姜汁炒則化痰飲得參朮則
補氣得歸芍則補血得木香則流滯和中得
檀香則理氣醒脾得沉香則升降諸氣得芎
藭蒼朮則總解諸鬱得梔子黃連則能降火
熱得伏神則交濟心腎得茴香破故紙則引
氣歸元得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇葱
曰則解散邪氣得三稜莪茂則消磨積塊得
艾葉則治血氣暎子宮乃氣病之總司女科之主帥也

○服食

唐玄宗天寶單方圖云水香稜根味辛

微寒無毒凡丈夫心中客熱膀胱間連
脅下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣者取根
二大升搗熬令香以生絹袋盛貯于三大斗
無灰清酒中浸之三月後浸一日即堪服十
月後卽七日近暖處乃佳每空腹溫飲一盞

日夜三四次常令酒氣相續以知溫度若飲酒卽取根十兩加桂心五兩蕷夷三兩和搗爲散蜜和搗一千杵丸如桐子大每空腹酒及姜蜜湯飲汁等在下二十九日再服漸加至百十九以瘥爲度 交感丹凡人中年精耗神衰蓋由心血少火不下降腎氣憊水不上升致心腎隔絕營衛不和上則多驚中則寒痞飲食不下下則虛冷遺精愚醫徒知峻補下田非惟不能生水滋陰而反見衰悴但服此方半年屏去一切暖藥絕嗜欲然後習祕固派流之術其効不可殫述俞通奉年五十一遇鐵甕城申先生授此服之老猶如少年至八十五乃終香附子一斤新水浸一宿石上擦去毛炒黃伏神去皮木四兩爲末煉蜜丸彈子大每服一丸侵早細嚼以香附子如上法半兩伏神二兩炙甘草一兩半爲

末點沸湯

服前藥

○療治

黃鶴丹乃銖衣翁在黃鶴樓所授之方

香附

一斤黃連半斤洗晒爲末水糊丸

梧子大假如外感忽姜湯下內傷米飲下氣

病香湯下血病酒下痰病姜湯下火病白湯

下餘可類推

青囊丸乃邵康節真人禱母

病感方士所授者

香附畧炒一斤烏藥畧炮

五兩三錢爲末水醋煮麪糊爲丸隨證引用

如頭痛茶下痰盛姜湯下多用酒下爲妙

治氣熱上攻頭目昏眩及治偏正頭痛大附

子去皮水煮一時搗晒焙研爲末煉蜜丸彈

子大每服一丸水一盞煎入分服女人醋湯

煎一切氣病痞脹喘噦噫酸煩悶虛痛走

注常服開胃消痰散壅忍食早行山行尤宜

服之去邪辟瘴香附子炒四百兩瓦罐土

兩縮砂仁四十八兩炙甘草一百二十兩爲末每服一錢入鹽少許白湯點服一切氣

疾及宿酒不解者香附子一斤縮砂仁八兩甘草炙四兩爲末每白湯入鹽點服爲粗末

煎服亦可

心腹刺痛香附子擦去毛焙二十兩

烏藥十兩甘草炒一兩爲末每服二錢鹽湯隨時點服

凡人胸膛軟處

一點痛者

多因氣及寒起或致終身或子母相傳俗名

心氣痛非也

乃胃脘有滯耳獨步散治之甚

妙香附米醋浸畧炒爲末高良姜酒洗七次

畧炒爲末俱各封收因寒者姜二錢附一錢

因氣者附二錢姜一錢因氣與寒者各等分

和勻以熱米湯入姜汁一匙鹽一捻調下立

止不過七八次除根

心腹諸痛艾附丸治

男女心氣痛腹痛小腹痛血氣痛不可忍者

香附子二兩蘄艾葉半兩以醋湯同煮熟去

艾炒爲末米醋和丸桐子大每白湯服五十丸停痰宿歇風氣上攻胸膈不利香附皂莢水浸半夏各一兩白礬末半兩姜汁麪糊丸桐子大每服三四十九姜湯下元臟腹冷及開胃香附子炒爲末每用二錢姜塩同煎服酒腫虛腫香附米醋煮乾焙研爲末米醋糊丸服久之敗水從小便出神効氣虛浮腫香附子一斤童便浸三日焙爲末糊丸米飲下四十五丸日二老少痃癖往往來疼痛香附南星等分爲末姜汁糊丸桐子大姜湯下二三十丸癩疝脹痛及小腸氣海藻一錢煎酒空心調下香附末二錢并食海藻腰痛揩牙香附子五兩生姜二兩取自然汁浸一宿炒黃爲末入青鹽二錢擦牙數次其痛卽止血氣刺痛香附子炒一兩荔枝核燒存性五錢爲末每服二錢米飲調下

婦人女子經候不調兼諸病大香附子擦

去毛一斤分作四分醇酒醇醋鹽水童便各

浸四兩春三日秋五夏一冬七淘洗淨晒乾
搗爛微焙爲末醋煮麪糊丸梧子大每酒下

七十九瘦人加澤蘭赤茯苓末二兩氣虛加

四君子料血虛加四物料

婦人月經不調

久成癥積一切風氣用香附子一斤分作四

分以童溲鹽水酒醋各浸三日艾葉一斤漿

水浸過醋糊和作餅晒乾晚蚕砂半斤炒熟

茂四兩酒浸常歸四兩酒浸各焙爲末醋糊

丸桐子大每服七十丸米飲下日二

婦人

室女經候不調血氣刺痛腹脹心怔乏

力而色痿黃頭運惡心崩漏帶下便血癥瘕

積聚及婦人數墮胎氣不升降服此尤妙香

附子米醋浸半日砂鍋煮乾搗焙石臼搗爲

末醋糊爲丸醋湯下

又方香附子一斤熟

艾四兩醋煮當歸酒浸二兩爲末如上丸服

婦人氣盛血衰變生諸症頭運腹滿宜抑

氣散香附子四兩炒茯苓甘草炙各一兩橘

紅二兩爲末每服二錢沸湯下

下血崩

或五色漏帶並宜常服滋血調氣乃婦人之

仙藥也香附子去毛炒焦爲末極熱酒服二

錢立愈昏迷甚者三錢米飲亦可加櫻灰

赤白帶下及血崩不止香附子赤芍藥等分

爲末鹽一捻水二盞煎一盞食前溫服

安胎順氣鐵罩散香附子炒爲末濃煎紫蘇湯

服一二錢一如砂仁

妊娠惡阻胎氣不安

氣不升降嘔吐酸水起坐不便飲食不進二

香散香附子一兩藿香葉甘草各二錢爲末

每服二錢沸湯入鹽調下亦治頭風睛痛

臨產順胎九月十月服此永無驚恐福胎飲

香附子四兩縮砂炒三兩甘草炙一兩爲末

每服二錢米飲下 產後狂言而運煩渴不

止 生姜附子去毛爲末 每服二錢 姜棗水煎

服 氣鬱吐血童子小便調香附末二錢服

吐血不止莎草根一兩白茯苓半兩爲末

每服二錢陳粟米飲下 肺破咯血香附末

一錢米飲下 日二 小便尿血香附子新地

榆等分各煎湯先服香附湯三五呷後服地

榆湯至盡末効再服 小便血淋痛不可忍

香附子陳皮赤茯苓等分水煎服 諸般下

血香附童便浸一日搗碎米醋拌焙爲末每

服二錢米飲下 又方香附以醋酒各半煮熟

焙研爲末 黃芩冰糖丸梧子大 每服四十九

米飲下 日二 又方只以香附子末二錢入百

草霜麝香各少許同服効尤速 老少脫肛

香附子荆芥穗等分爲末 每服一匙水一大

盃煎十數沸淋洗 偏正頭風香附子炒一

斤烏頭炒一兩甘草二兩爲末煉蜜丸彈子
大每服一丸葱茶嚼下 氣鬱頭痛香附子
炒四兩川芎二兩爲末每服二錢臘茶清調
下常服除根明目華佗中藏經加甘草一兩
石膏二錢半 肝虛睛痛冷淚羞明香附子
一兩夏枯草半兩爲末每服一錢茶清下
耳卒聾閉香附子瓦炒研末蘿蔔子煎湯早
夜各服二錢忌鐵器 聰耳出汗香附末以
綿杖送入蔡邦度知府常用有効 諸般牙
痛香附艾葉煎湯漱之仍以香附末擦之去
涎 牢牙去風益氣烏鬚治牙疼牙宣乃鉄
龐先生妙方也香附子炒存性三兩青鹽生
姜各半兩爲末口擦 消渴累年不愈莎草
根一兩白茯苓半兩爲末每陳粟米飲服三
錢 日二 瘰癧瘡瘍皆用氣滯血凝而致宜
引氣通血凡氣血鬱行聞臭卽逆氣滯

則血聚最忌臭穢不潔觸之毒必引蔓喙正
節公云大凡癰疾多因怒氣而得但服香附
子藥進食寬氣大有効香附子去毛生姜汁
淹一宿焙乾研爲細末無時以白湯服二錢
如瘡初作以此代茶瘡潰後亦宜服之或只
以局方小烏沉湯少用甘草愈後服至半年
尤妙 埃蛇咬傷

嚼香附塗之立効

典故

江表傳

梁混心脾痛數年不愈供事穢跡佛夢傳獨步散方一服而

愈因名神授一七散 懸遊方外時懸壺輕
齋治百病黃鶴丹治婦人青囊丸隨用飲輒
有小效

飛經

○麗藻詩七言

越人翠被今何寂獨立江邊莎草碧紫燕西飛欲寄書白雲何

處逢來

客

襄況

笙音奎

薦音苞

苺音母
又音茂

覆盆子一名缺盆一名莖一名挿田藨一名烏

子似覆盆之形故名

藨子一名大麥芽一名西國草一名畢楞伽

一說益腎能縮小便

一名栽秧藨處處有之秦吳尤多藤蔓莖有

鈎刺一枝五葉葉小面青背微白光薄無毛

開白花四五月實成子小於蓬虆而稀疎味

酸甘外如荔枝大如指頂軟紅可愛生青黃

可覆溺盆

熟鳥赤山中人及時采賣少遲則就枝生蛆
食之五六分熟便采烈日曝乾不爾易爛氣
味甘平無毒益氣輕身補虛續絕強陰健陽
悅澤肌膚安和五臟男子腎精虛竭陰痿能
令堅長婦人食之有子

○辨訛蓬蘽藤蔓繁衍莖有倒刺逐節生葉大如掌狀類小葵葉而青背白厚而
○製用采得揀淨擣作薄餅晒乾密貯臨時酒拌蒸用米時不見水取汁作煎爲果着水則

不堪煎

○辨訛蓬蘽藤蔓繁衍莖有倒刺逐節生葉大如掌狀類小葵葉而青背白厚而

有毛六七月開小白花就蒂結實三四十顆
成簇生則青黃熟則紫黯微有黑毛形如熟
椹而扁冬月苗葉不凋俗名割田藨氣味功
用大略與覆盆同俱堪入藥一種蔓小子
蓬蘽一枝三葉葉面青背淡白而微有毛開
小白花四月實熟其色紅如櫻桃者俗名蕷
田藨卽爾雅所謂藨者也故郭璞註云藨卽
蕷也子似覆盆而太赤色酢甜可食此種不
入藥一種樹生者樹高四五尺葉似櫻桃
葉而狹長四月開小白花結實覆盆子樣但
色紅爲異俗亦名藨卽爾雅所謂山蕷陳藏
器本草所謂懸鈎子者也一種就地生蔓
長數寸開黃花結實如覆盆而鮮紅不可食者
本草所謂蛇蕷也

○典故 漳州趙太尉母病爛弦疳眼二十年有
老嫗云此中有虫吾當除之入山取草

蔓葉咀嚼留汁入筒中還以皂紗蒙眼滴汁
漬下弦轉盼間虫從紗上出數日下弦乾復
如洗滴上弦又得虫數日而愈後以治人
多驗乃覆盆子葉也蓋治眼妙品

東壁志

○療治目暗不見物冷淚浸淫不止及青盲天
行目暗等疾覆盆子曝乾搗極細薄綿
裹之用飲男乳汁浸半日點目中卽仰臥不
過三四日視物如少年禁酒麪油物長髮
不落不白覆盆子榨汁日塗之補肝明目
搗篩每旦水服三錢肺氣虛寒取汁同少
蜜煎爲稀膏白湯點服牙痛點眼用覆盆
子嫩葉搗汁點目眴三四次有虫隨眵淚出
成塊無新葉乾者煎濃汁亦可 腫瘍潰爛
覆盆葉爲末用酸漿水洗後摻之日一次以
愈爲度 痘後目翳取根洗搗澄粉日乾蜜
和少許點于醫丁上日二三次自散百日內

治之久
卽難療

便君子

一名留求子藤生手指大如葛繞樹而

上葉青如五加葉三月開五瓣花一簇一二

十葩初淡紅久乃深紅色輕虛如海棠作架

植之蔓延若錦實長寸許五瓣合成有稜初

時半黃熟則紫黑其中仁白上有薄黑皮如

榧子仁而嫩味如栗七月采久者油黑不可

用氣味甘溫無毒治小兒五疳小便自濁健

脾胃除虛熱殺蟲療瀉痢小兒百病瘡癰皆

治凡服使君子忌飲熱茶犯之卽瀉

○典故

俗傳潘州郭使君療小兒獨用此物因有此名

嵇舍南方草木狀詔之留求

子療嬰孺之疾則

自晉魏已用之矣

○療治

凡大人小兒虫病每月上旬空腹食使君子數枚以殼煎湯送下次日虫皆死

而出或云七生七熗食亦良

小兒脾疳使

君子蘆薈等分爲末米飲每服一錢

小兒

痞塊腹大肌瘦面黃漸成疳疾使君子仁三

錢木鱉子仁五錢爲末水丸龍眼大每一丸

雞子

一個破頂入藥在內飯上蒸熟空心食

小兒蛔痛口流涎沫使君子仁爲末米飲

小兒蛔痛口流涎沫使君子仁爲末米飲

五更調服一錢

小兒虛腫頭面陰囊俱浮

使君子一兩夫殼蜜五錢炙盡爲末毋食後

米湯服一錢

頭瘡面瘡使君子仁香油少

許浸三五个臨卧細嚼香油送下久自愈

竹籬茅舍趁溪斜白白紅紅牆

○麗藻詩七言

外花浪傳佳名史君子初無君

子到

君家

癟音裸
與蓏同

栝樓

一名果瀛一名瓜萎一名天瓜一名黃瓜

不上曰果

地下曰蓏

一名地樓一名澤姑所在有之三四月生苗

引藤蔓葉如甜瓜葉而窄作又有細毛七月

兼名

此物蔓生
附木故得

開花似壺蘆花淺黃色結實花下如拳生青

九月熟黃赤色形有圓者有銳而長者內有

扁子大如絲瓜子殼色褐子色綠多脂作青

氣根一名白藥一名瑞雪直下生年久者長

數尺大二三圍秋後掘者有粉夏月者有筋

無粉不堪用氣味甘寒無毒治胸痺潤肺燥

消欬嗽滌痰結利咽喉止消渴利大腸消癰

腫瘡毒降上焦之火使痰氣下降不犯胃氣

○子

性同實補虛勞潤心肺治吐血
腸風下血赤白痢手面皹口乾

根

甘酸微苦寒製

爲雌陽人
服長者皮
赤蒂粗爲
陰人服

皮厚蒂小

圓者色黃

爲粉潔白美好大宜虛熱人解煩渴行津液
除腸胃中痼熱治熱狂時疾通小腸消腫毒
乳癰發背痔瘻瘍排膿生肌消撲損瘀血
膿生肌消撲損瘀血 莢葉味酸生津止渴潤枯降火

○修製

凡使皮子莖根其效各別古方全用後乃分別各用用實者去殼皮革膜及油

用根者澄粉

作天花粉法

秋冬采大二三

鬱者去皮寸切水浸逐日換水五日後取出搗泥以絹衣瀘過澄粉晒乾每服方寸七
水化下亦可入粥及乳酪中食善治消渴

○療治

痰嗽不止瓜蔞仁一兩文蛤七分爲末以姜汁澄濃脚丸彈子大噙之 乾款

無痰熟瓜蔞搗爛絞汁入蜜等分加白礬一錢熬膏頻含嚥汁 痰嗽有痰熟瓜蔞十個

明礬二兩搗和餅陰乾研末糊丸梧子大每

姜湯下五七九 痰喘氣急蓏蘚二个明礬

一棗大同燒存性研末以熟蘿蔔蘸食藥盡病除熱欬不止用濃茶一鍾蜜一鍾大熟

瓜蔓一个去皮將瓢入茶蜜湯洗去子以盆

盛于飯上蒸至飯熟取出時時挑三四匙蘸

之肺熱痰欬胸膈塞滿瓜蔓仁半夏湯泡

七次焙研各一兩姜汁打麪糊丸桐子大每

服五十丸食後姜湯下酒痰欬嗽用此救

肺瓜蔓仁青黛等分研末姜汁蜜丸芡子大

每噙一丸飲酒發熱卽上方研膏口食數

匙一男子年二十病此服之而愈飲酒痰

澼兩脅脹滿時復嘔吐腹中如水聲枯樸實

去殼焙一兩神麴炒半兩爲末每服二錢葱

白湯下小兒痰喘欬嗽膈熱久不瘥瓜蔓

實一枚去子爲末以寒食麵和作餅子灸黃

再研末每服一錢溫水化下日三服効乃止

婦人夜熱痰嗽月經不調形瘦者用瓜蔓

右一兩青黛香附童尿浸晒一兩五錢爲末
蜜調噙化之 胸痺痰嗽胸痛徹背心腹痞

滿氣不得通及治痰嗽大瓜蔞去瓢取子炒

熟和殼研末麪糊丸桐子大每米飲下二三
十九日二服 胸中痺痛引背喘息欬唾短

氣寸脉沉遲關上緊用大桔樓實一枚切薤

白半升白酒七升煮二升日再服加半夏四

兩更善 小兒黃疸眼黃脾熱青瓜蔞焙研

每服一錢水半盞煎三分臥時服五更瀉下

黃物立可名逐黃散 小便不通腹脹用瓜

蔞焙研每服二錢熱酒下頻服以通爲度紹

興劉駐云魏明州病此御醫用此方治之得

効 久痢五色大熟瓜蔞一個煅存性出火

毒爲末作一服溫酒服之胡大卿一僕患痢

半年杭州一道人傳此而愈 小兒脫肛唇

白齒焦兩頰光眉赤唇焦啼哭黃瓜蔞一个

入白礬五錢固濟煅存性爲末糊丸桐子大
每米飲下二十九 咽喉腫痛語聲不出括

樓皮白姜蚕炒甘草炒各二錢半爲末每服
三錢半姜湯下或以綿裹半錢含嚥一日二

服 堅齒烏鬚大栝樓一個開頂入青鹽二

兩杏仁去皮尖三七粒原頭合札定蚯蚓泥

和鹽固濟炭火煅存性研末每日揩牙三次

令熱百日有驗先有白鬚拔去以藥投之卽

生黑者其治口齒之功未易具陳 面黑令

白栝樓瓢三兩杏仁一兩豬胰一具同研如

膏每夜塗之令人光潤冬月不皴 乳汁不

下瓜蔞子淘洗控乾炒香瓦上翕令白色酒

服一錢七合面臥一夜流出 乳癰初發大

熟栝樓一枚熟搗以白酒一斗貯取四升去

滓溫服一升日三服 便毒初發黃瓜蔞一

個黃連五錢水煎連服効 風瘡疥癩生栝

樓一二个打碎酒浸一日夜熱飲熱遊丹

腫枯樓子仁末二大兩

釀醋

楊梅瘡

痘小如指頭遍身者先服敗

毒散後用此解

皮膚風熱不過一服

愈用枯

樓皮爲末每服

三錢燒酒下日三服

傷寒

煩渴思飲枯樓

根三兩水五升煮一升分二服先以淡竹瀝

一斗水二升煮好根二兩半冷飲汁然後服

此 黑疽危疾瓜蔓根一斤搗汁六合頓服

隨有黃水從小便出如不出再服

小兒發

黃皮肉面目皆黃生枯樓根搗取汁二合蜜

二大匙和勻曖服日一服

虛熱欬嗽天花

粉一兩人參三錢爲末每服一錢米湯下

偏疝痛極切之立住用綿袋包曖陰囊取天

花粉五錢以醇酒一盃浸之自卯至午微煎

滾露一夜次早低凳坐定兩手按膝飲下卽

愈未愈再一服 小兒囊腫天花粉一兩炙

甘草一錢半水煎入酒服耳卒炒枯模

根削尖以臘猪脂煎三沸取塞耳三日卽愈

產後吹乳腫硬疼痛輕則爲姤乳重則爲乳癰用枯樓根末一兩乳香一錢爲末溫酒

每服二錢癰腫初起枯樓根苦酒熬燥搗篩以苦酒和塗紙上貼之又方用枯樓根赤

小豆等分爲末醋調塗之楊梅天泡天花

粉川芎窮各四兩槐花一兩爲末米糊丸桐

子大每空心淡姜湯下七八十九折傷腫

痛括樓根搗塗重布裹之熱除痛卽止箭

鏹不出針入肉枯樓根搗傅之日三易自出

痘後目障天花粉蛇蛻洗焙等分爲末羊

子肝批開入藥在內米泔汁煮熟

切食一女子病此服之旬餘而愈

一名茺蔚一名貞蔚一名益明一名野

天麻一名火欵一名蘿一名猪麻一名苦低

草一名夏枯草一名鬱臭草一名土質汗處

處有之春生苗如嫩蒿入夏長三四尺莖方

如黃麻莖葉青如艾而背青一梗三葉有尖

岐寸許一節節間花苞叢簇抱莖四五月開

花每萼內子數枚褐色三稜其草生時有臭

氣夏至後卽枯根白色味甘微辛氣溫和血

行氣有助陰之功治婦女經脈不調胎產一

切諸病妙藥也蓋包絡生血肝藏血此物活
血補陰故能明目益精調經治女人諸病久
服令人有子治手足厥陰血分風熱及女人
諸病單用子若治腫毒瘡瘍消水行血胎產
諸病則根莖花葉並用蓋根莖花葉專于行
而子則行中有補也

○修治

凡用益母根莖切以竹刀忌鐵器用子
微炒香或沙鍋蒸熟曝乾春取仁用

○辨訛

按閨閣事宜爾雅陳藏器皆以白花者
爲益母返魂丹註孫思邈以紫花者爲

益母李時珍以二色花皆益母白花者主氣分紫花者主血分如牡丹芍藥花有紅白之類及奇旨般產寶謂開花紅紫色者爲是白花者不是似當以旨說爲定

○療治 濟陰返魂丹治婦人胎前產後諸疾危証益母草花正開時連根收采陰乾用

忌鐵器

葉及花子石器碾爲細末煉蜜丸彈子大隨其根燒存証嚼服用湯使藥不限丸數以病愈爲度或性爲末酒丸如桐子大每服五七十九愈人甚多神効服功與黑又可搗汁濾淨熬膏服 胎前產後腹痛或作神散等

聲者米飲下

胎前產後腹刺痛胎動不安

忌鐵器

安下而不止當歸湯下

產後童子小便化

忌鐵器

下一丸能安魂定魄血氣自然調順諸病不

忌鐵器

生又能破血痛養脈息調經絡並溫酒下胎衣不下及橫生死胎經日服滿心悶痛並

忌鐵器

炒鹽湯下 產後血暈眼黑血熱口渴煩悶

忌鐵器

如見鬼神狂言不省人事童便和酒下 產

後血塊脣腹奔痛時發寒熱冷汗或面垢額

赤五心煩熱並童便酒下或薄荷自然汁下

產後惡露不盡結滯刺痛上衝心胸滿悶

童便酒下 產後瀉血水棗湯下 產後痢

疾米湯下 產後血崩漏下糯米湯下 產

後赤白帶下煎膠艾湯下 月水不調溫酒

下 產後中風牙關緊急半身不遂失音不

語童便酒下 產後氣喘咳嗽胸膈不利惡

心吐酸面目浮腫兩腸疼痛舉動失力溫酒

下 產後月內欬嗽自汗發熱久則變爲骨

蒸 產後鼻衄舌黑口乾俱童便酒下 產

後兩太陽亢痛呵欠心忪氣短羸瘦不思飲

食血風身熱手足頑麻百節疼痛並米飲化

下 產後大小便不通煩躁口苦薄荷湯下

婦人久無子息溫酒下 蓼母膏近效方

治產婦諸疾及折傷內損有瘀血每天陰則
痛神方也五月採益母草連根葉莖花洗擇

令淨于箔上攤曝水乾竹刀切長五寸勿用
鉄刀置于大砂鍋內水浸過二三寸煎煮候

草爛水減三之二瀝去草取汁約五六斗入
盆中澄半日以綿漉去濁滓清汁入釜中漫
火煎取一斗如稀餳狀瓷瓶封守每取梨大
喫酒和服日再服或和羹粥亦可如遠行卽

更煉至可丸收之服至七日則疼漸平復產
婦惡露不盡及血暉一二服便瘥其藥無忌

又能治風益心力女人難產益母草搗汁
七大合煎減半頓服立止無新者以乾者一

大握木七合煎服胎死腹中益母草搗熟
以喫水少許和絞取汁頓服之產後血暉

心氣欲絕益母草研汁一盞絕妙產後血

閉益母草汁一小盞入酒一合溫服帶下

赤白益母草連花採搗爲末每服二錢食前

溫湯下 水便尿血益母草搗汁服一升立

瘡 赤白雜瘡困重者益母草日乾陳鹽梅

燒存性等分爲末每服三錢白痢乾姜湯赤

痢甘草下各二靈散 小兒瘡疥垂死者益

母草嫩葉同米煮粥食以瘡爲度甚佳飲汁

亦可 瘡疾下血益母搗汁飲 一切癰瘡

婦人妬乳乳癰小兒頭瘡及浸淫黃爛熱瘡

疥疽陰蝕並用天麻草切五升以水一斗半

煮一斗分數次洗以絞辨 急慢疔瘡益母

草搗封及絞汁五合服卽消 醫方大成用

益母草連花采之燒存性先用小尖刀十字

割開疔根令血出次透根開破捻出血拭乾

以稻草心蘸藥撲入瘡口令到底良久當有

紫而捻令血淨再撲藥入見紅乃止一日夜撲藥三五度重者二日根爛出輕者一日

出有瘡根張起卽是根出以針挑之出後仍敷藥生肌易愈忌風寒房室酒肉一切毒物

癰毒已破益母草搗敷神妙勒乳成癰

益母草爲末水調塗乳上一宿自瘥生搗亦

得喉閉腫痛益母草搗爛新汲水一盃絞

濃汁頓飲隨吐愈冬月用根

聰耳出汁莖

葉搗汁滴之面上粉刺黑斑重五日收帶

根紫花者晒乾燒灰以商陸根搗自然汁加

酸醋和搜灰作餅炭火煅過收之半年方用

入面藥甚能潤肌唐天后澤面法五月五

日採根苗具者勿著土曝乾搗羅以水和成

團雞子大再曝乾作一爐四旁開竅上下置

火安藥中央大火燒一炊久去大火留小火

養之勿令火絕經一伏時取出甕器中研極

細收用如潔豆法日用一方每十兩加滑

塗之 新生小兒益母草五兩煎水浴之不

生瘡疥

癰癧作湯浴

浮腫下水惡毒疔

腫乳癰丹

遊等毒

及蛇虺毒並搗敷

防風

一名屏風 一名回芸 一名回草 一名銅芸

一名蘭根 一名百枝 一名百蜚 出齊州龍山

最善淄青充者亦佳 今汴東淮浙皆有莖葉

青綠色莖深而葉淡似青蒿而短小 春初嫩時紫赤色 五月開細白花 中心攢聚作大房

似蒔蘿花實似胡荽子而尖根土黃色與蜀

防禦也 瘡風最要故名屏猶防

葵根相類二月十月采關中者三月六月采

然輕虛不及齊州者良氣溫味辛而甘治三

十六種風男子一切勞劣補中益神通利五

臟心煩體重羸瘦盜汗散頭目中滯氣經絡

中留溼得葱白能行周身得澤瀉藁本療風

得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子臟風

○製用

二月采嫩苗作菜辛甘而香呼爲珊瑚
菜極爽口其根粗醜子亦可種入藥

以黃色脂潤頭節堅如蚯蚓

頤者爲好白者多沙條不堪禁忌人發狂火

尾者發

人癥疾

○療治自汗不止防風去蘆爲末每服二錢浮
煎湯下睡中盜汗防風二兩芎藭一兩人
參半兩爲末每服三錢臨臥飲下老人大
腸秘滯防風枳殼炒一兩甘草半兩爲末
食前白湯服二錢偏正頭風防風白芷等
分爲末煉蜜丸彈子大每嚼三丸茶清下
破傷中風牙關緊急天南星防風等分爲末
每服二三匙童便五升煎至四升分二服卽
止小兒解顱防風白芨柏子仁等分爲末
以乳汁調塗一日一換婦人崩中獨聖散
防風去蘆頭炙赤爲末每服一錢以麵糊酒
調下更以麵糊酒投之此藥累驗一方加炒
黑蒲黃等分解烏頭附子天雄芫花野菌

毒並用防風煎汁飲

解諸藥毒已死只心

間溫煥是熱物所犯防風一味擂冷水灌之

○典故

白居易在翰林賜防風粥一
甌食之口香七日

金鑑客註

郁李

一名薁李一名欒李一名爵李一名車下

李一名雀梅山野處處有之樹高五六尺花
千葉雪白粉紅二色如紙剪成甚可觀葉花
及樹並似木李惟子小如櫻桃熟赤色五月
熟可食又可入藥性潔喜曬日和風澆宜清
水忌肥核仁氣味甘苦酸平而潤無毒治大

腹水腫面目四肢浮腫利小便通水道消宿

食下結氣宣大腸氣滯燥澀不通

○療治

小兒多熱熟湯研郁李仁如杏酪一日服二合

榧

小兒二便不通并驚熱

研各一錢滑石末一兩搗合丸黍米大二歲

小兒

三丸量人加減白湯下

腫滿氣急不得

臥郁

李仁一大合搗末和麪作餅吃入口

即大便通泄氣便愈

腳氣

浮腫心腹滿二

便不通氣急喘息

郁李仁十二分搗爛水研

絞汁苡薏搗如粟大三合同煮粥食

卒心

刺痛郁

李仁三七枚嚼爛以新汲水或溫湯

下須臾痛止却呷薄荷鹽湯

皮膚血汗郁

李仁去皮研一錢鴉梨搗汁調下

皮膚血汗郁

癬疾郁

李仁去皮及雙仁同乾麵搗合如乾入少水
照病人掌作二餅微炙黃勿令熟空腹食一
枚當快利如不利再食一枚或飲熱米湯以
利爲度利不止醋飯補之利後當虛若病未
盡一二日再一服以病盡爲限忌酪及牛馬
肉累驗量病加減小兒亦可用 風重牙痛

根煎濃汁漱 小

兒身熱根煎湯浴

○典故

一乳婦因悸而病既愈目不得瞑醫錢乙
令煮郁李酒飲使醉卽愈所以然者
目絲內連肝胆恐則氣結胆橫不下郁李能
去結隨酒入胆結去胆下則目能瞑矣此真
得治之良藥者也

一名希仙 一名火欃草 一名虎膏 一名猪

膏母一名狗膏一名粘糊菜素莖有直稜兼

有斑點葉似蒼耳而微長似地菘而稍薄對

節生莖葉皆有細毛肥壤一枝生數十八九

月開深黃小花子如苘蒿子外萼有細刺粘

人氣味苦寒有小毒治金瘡止痛斷血生肉

除諸惡瘡浮腫治風氣麻痺骨痛膝弱風溼

○修治

五月五日六月六日九月九日采葉去根莖花實洗淨曝乾如法入瓶中層層

酒酒與蜜蒸之又曝如

此九遍則氣味極香美

○製用

嫩苗爛熟浸去苦味
油鹽調食

校荒本草

○辨訛

蘇恭謂似酸漿葉乃龍葵非豨莶也
菘則莖青圓而無稜無斑毛葉皺似菘

芥亦不對節今

不見有用者

○療治

豨莶丸九煎九晒搗末蜜丸服益元氣
治肝腎風氣四肢麻痺骨間冷腰膝無

論遠年近日一切中風臥床口眼喎邪時吐
涎沫諸病空心溫酒或米飲下二三十九服
至百服眼目明千服鬚髮黑筋力健效驗多
端

治風氣行于腸胃泄瀉火欬草爲末醋

糊丸梧子大每服三十九白湯下

癰疽腫

毒一切惡瘡豨莶草端午采者一兩乳香一

兩白礬飛半兩爲末每服二錢熱酒調下毒
重者連進三服得汗妙發背疔瘡豨莶草

五葉草卽五瓜龍小薊大蒜等分搗爛熱酒

一盃絞汁服得汗立效

丁瘡腫毒端午采

豨莶草日乾爲末每服半兩熟酒調下汗出

卽愈極驗

反胃吐食火欬草焙爲末蜜丸

梧子大每湯下五十九治惡瘡消腫毒搗

豨莶草封之湯漬散傅並良久瘧痰癰搗

汁服虎傷狗咬蚕蛆

蜘蛛蠻蛇溺瘡搗敷

○典故

江陵節度成訥進豨莶丸方表畧云臣

不瘥有道人鍾針因覩此患曰可餌豨莶丸

必愈其草多生沃壤高三尺許節葉相對當

夏五月以來收之每去地五寸剪刈以溫水

洗去土摘葉及枝頭凡九蒸九暴不必太燥

但以取足爲度仍熬搗爲末煉蜜丸如梧子

大空心溫酒或米飲下二三十丸服至二千

丸所患愈加不得憂慮是藥攻之力服至四
千丸必得復至五千丸當復須喫飯三五匙
壓之五月五日采者佳奉勅宣付醫院詳錄

知益州張詠

進豨莶九夷畧云切以殼食

飲水可作充腸之餌餌松含柏亦成救病之

功是以療飢者不在于羞珍愈病者何煩于

異術倘獲濟時之藥輒陳鄙物之形不耻管

窺輒干天聽臣因換龍興觀掘得一碑內說

修養氣術并藥方二件依方差人訪問采覓

其草頗有異金稜銀線素莖紫荄對節而生

蜀號火欃莖葉頗同蒼耳不費登高歷險每

常求少獲多急采非難廣收甚易倘勤久服

旋見神功誰知至賤之中乃有殊常之效臣

自喫至百服眼目清明卽至千服鬚髮烏黑

筋力輕健效驗多端臣本州有都押衙羅守

曾因中風墜馬失音不語臣與十服其病

立痘又和尚智嚴年七十忽患偏風口眼喎
斜時時吐涎臣與十服亦便得痊今合一百

劑差職貢
史元奏進


二如亭群芳譜樂部卷之二終

卷之二

卷之二

卷之二

二如亭群芳譜利部目錄



第五冊

藥譜三 共二十種 附錄三種

黃連

黃葵

黃芩

金銀藤

紫草

三七

紫菀

決明

半夏

牽牛

景天

附 憶火樹

穀精

蓖麻

王爪

麻黃

香薷

紫蘇

薄荷

澤蘭

大風子

宣城者爲勝施黔次之東陽歙州處州者又
次之苗高尺許叢生一莖三葉葉似甘菊凌
冬不凋四月開花黃色六月結實似芹子色
亦黃江左者根黃節高若連珠葉如小雉尾
正月開花作細穗淡黃白色六七月根緊始
堪采蜀道者粗大味極濃苦療渴爲最江東
者節如連珠療痢大善大抵連有二種一種
根粗無毛如鷹雞爪形色深黃而堅實一種

無珠多毛黃色稍淡而中虛味苦寒無毒止

消渴厚腸胃利骨益膽降火療口瘡其用有
六瀉心臟火一也去中焦濕熱二也諸瘡必
用三也除風濕四也治赤眼暴發五也止中
部見血六也

○製用布拭去毛漿水浸半日時漉出柳木火
燒乾用黃連入手少陰心經爲治火主
藥治本臟火生用治肝膽實火猪膽浸炒肝
膽虛火醋浸炒上焦火酒炒中焦火姜汁炒
下焦火鹽水或朴硝炒氣分濕熱之火茱萸
湯浸炒血分塊中伏火乾漆水炒食積之火

黃土炒不獨爲之引導蓋辛熟能制其苦寒鹹寒能制其燥性用者酌之

○附錄胡黃連

生波斯國海畔陸地今南海秦隴間亦有之初生似蘆苗若夏

枯草根頭似烏嘴乾則似楊柳枯枝心黑外黃折之內似鸕鷀眼塵出如烟者良八月上旬採苦平無毒治骨蒸勞熱三消五心煩熱

婦人胎蒸虛驚冷熱洩痢厚腸胃益顏色

○療治

肝火爲痛黃連姜汁炒爲末粥糊丸梧子大每服二十丸白湯下一方黃連六

兩吳茱萸一兩同炒爲末神麃糊丸梧子大每服三四十丸白湯下伏暑發熱作渴嘔

惡及赤白痢消渴腸風酒毒洩瀉諸病並宜酒煮黃龍丸主之川黃連一斤切以好酒二

升半煮乾焙研糊丸梧子大每服五十丸熟水下日三服陽毒發狂奔走不定宣黃連

水下日三服陽毒發狂奔走不定宣黃連

寒水石等分爲末每服三錢濃煎甘草湯下

骨節積熱漸漸黃瘦黃連四分切以童子

小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓分作

二服 小兒瘡熱流注遍身瘡蝕或潮熱肚

脹作渴猪肚黃連丸用猪肚一個洗淨宣黃

連五兩切碎水和納入肚中絳定放在五升

粳米上蒸爛石臼搗千杵或入少飯同杵丸

菉豆大每服二十九米飲下仍服調血清心

之藥佐之蓋小兒之病不出于瘡則出于熱

常須識此 三消骨蒸黃連末以冬瓜自然

汁浸一夜晒乾又浸如此七次爲末以冬瓜

汁和九梧子大每服三四丸大麥湯下尋常

渴只一服見効 消渴尿多黃連末蜜丸梧

子大每服三十九白湯下 消渴小便滑數

如治黃連五兩栝樓根五兩爲末生地黃汁

丸梧子大牛乳下五十九日服忌冷水猪肉

一方黃連末入豬肚肉蒸爛搗丸梧子大

飯飲下濕熱水病黃連末蜜丸梧子大每

服二丸至四五丸飲下日三四服破傷風

黃連五錢酒二盞煎七分入黃蠟三錢溶化

熱服之小便白淫因心腎氣不足思想無
窮所致黃連白茯苓等分爲末酒糊丸梧子

大每服三十丸煎補膏脂湯下日三服赤

痢久下累治不瘥黃連一兩鷄子白和爲餅

灸紫爲末以漿水三升慢火煎成膏每服半

合溫米飲下一方只以雞子白和丸服

熱毒赤痢黃連二兩切瓦焙令焦當歸一兩

焙爲末入麝少許每服二錢陳米飲下佛智

和尚在閩以此濟人赤白久痢並無寒熱
只日久不止用黃連四尺九寸鹽梅七個入

新瓶內燒烟盡熟研每服二錢鹽米湯下

赤白暴痢如鴨鴨肝者痛不可忍用黃連黃

芩各一兩水二升煎一升分三次熱服

冷

熟諸痢不問赤白穀滯休息久下悉主之黃

連長三寸三十枚重一兩半龍骨如碁子大

四枚重一兩大附子一枚乾姜一兩半膠一

兩半細切以水五合著銅器中去火三寸煎

沸便取下坐土上沸止又上水五合如此九

上丸下納諸藥入水內再煎沸輒取下沸止

又上丸下度可得一升頓服卽止

下

痢赤白日夜數十行臍腹絞痛黃連一升酒

五升煮取一升半分再服當止治赤白諸

痢裏急後重腹痛宣黃連青木香等分搗末

白蜜丸桐子大每服二三十丸空腹飲下日

再服効如神久冷者以煨蒜搗和丸之不拘

大人嬰孺皆効一方黃連茱萸炒過四兩

木香麵煨一兩粟米飯丸小兒冷熱痢加

煨熟訶子肉小兒湯痢加煨熟肉豆蔻

小兒氣虛瀉痢腹痛加白附子尖

久痢加

龍骨

禁口

痢加石蓮肉

痢渴加烏梅肉

久痢加

以阿膠化和爲丸

五疳八

痢用連珠黃連

一斤分四分一分酒浸

益智仁同炒去智仁研

分吳茱萸湯浸一分益智仁同炒去智仁研

白芍酒煮切焙四兩廣木香二兩使君子

仁焙四兩共爲末蒸餅和丸綠豆大每服三

十九米飲食前下日三服忌猪肉冷水

寒下痢不能食者黃連一斤烏梅二十枚去

核灸燥爲末蠟一碁子大蜜一升合煎和丸

梧子大一服二十九日三服

又方黃連二

兩熟艾如鴨子大一團冰三升煮取一升頓

服立止氣痢後重裏急或下泄宜連一兩

乾姜半兩各爲末收每用連一錢姜半錢和

勻空心溫酒下或米湯下神效濟生方秘

傳香連丸用黃連四兩木香二兩生姜四兩

氣痢後重裏急或下泄宜連一兩

服立止氣痢後重裏急或下泄宜連一兩

乾姜半兩各爲末收每用連一錢姜半錢和

勻空心溫酒下或米湯下神效濟生方秘

傳香連丸用黃連四兩木香二兩生姜四兩

氣痢後重裏急或下泄宜連一兩

服立止氣痢後重裏急或下泄宜連一兩

乾姜半兩各爲末收每用連一錢姜半錢和

勻空心溫酒下或米湯下神效濟生方秘

傳香連丸用黃連四兩木香二兩生姜四兩

以姜鋪沙鍋底次鋪連上鋪香新汲水三盞
煮焙研醋調倉米糊爲丸如常日服五次

小兒下痢赤白多時體弱不堪宜連用水濃
煎和蜜日服五六次 諸痢脾泄臘毒下血
雅州黃連半斤去毛切裝肥猪大腸內紮定
入沙鍋中以水酒煮爛取連焙研末搗腸和
丸梧子大每服百丸米湯下極効 赤白下

痢日夜無度及腸風下血用川黃連去毛吳
茱萸湯泡過各二兩同炒香揀出各爲末以
粟米飯和丸梧子大各收每服三十丸赤痢
甘草湯下黃連丸白痢姜湯下茱萸丸赤痢
痢各用十五丸米湯下救人甚効 脾胃受

濕下痢腹痛米穀不化用黃連吳茱二味加
白芍同炒研蒸餅和丸服 腸胃積熱或因
酒毒下血腹痛作渴脉弦數黃連四兩分作

四分一分生用一分切炒一分炮切一分水

浸晒研末條黃芩一兩防風一兩爲末麵糊丸梧子大每服五十丸米泔浸枳殼水食前

送下冬月加酒蒸大黃一兩

臟毒下血黃

連爲末獨頭蒜煨研和丸梧子大每空心陳

米飲下四十九酒痔下血黃連酒浸煮熟

爲末酒糊丸梧子大每服三四十九白湯下

一方用自然姜汁浸焙炒

雞冠痔黃連末

傳之加赤小豆末丸良

痔漏秘結用此寬

腸黃連枳殼等分爲末糊丸梧子大每服五

十九空心米飲下

痔瘻脫肛冷水調黃連

末塗之良

脾積食泄川黃連二兩爲末大

蒜搗和丸梧子大每服五十丸白湯下

水

泄脾泄宣連一兩生姜四兩文火炒至姜脆

各自揀出爲末水泄用姜末脾瀉用連末每

服二錢空心白湯下甚者不過二服亦治痢

疾

眼目諸病勝金黃連丸用首連不限多

少搗碎以新汲水一大盃浸六十日綿濾取
汁入原盃內重湯上漿不住攪之候乾卽穿
地坑深一尺以瓦鋪底將熟艾四兩坐瓦上
燃火以藥盃覆上四畔土封開孔出烟盡取
出刮下丸小豆大每甜竹葉湯下十九 男
女肝經不足風熱上攻頭目昏暗羞明及癢
翳青盲黃連末一兩羊子肝一具去膜搗爛

和丸梧子大每食後暖漿水吞十四丸連作
五劑瘥昔崔承元活一死囚囚後病死一旦

崔病內障逾年半夜獨坐聞階除窸窣之聲

問之荅曰是昔蒙活之囚今故報恩遂告以此方而沒崔服之不數月眼復明因傳於世

暴赤眼痛宜黃連剉以雞子清浸置地下
一夜次早瀘過雞羽蘸滴目內 又方苦竹

兩頭留節一頭開小孔入黃連片在內油紙
封浸井中一夜次早服竹節內水加片腦少

許外洗之

一方黃連冬青葉煎湯洗

一

方黃連乾姜杏仁等分爲末綿包浸湯閉目乘熱淋洗

小兒赤眼水調黃連末貼足心

甚妙

爛弦風眼黃連十文槐花輕粉少許

爲末男兒乳汁和之飯上蒸過帛裹熨眼上

三四次卽効屢試有驗

目卒痒痛乳汁浸

黃連頻點背上抱朴子云治目中百病

淚

出不止黃連浸濃汁漬拭之

牙痛惡熱黃

連末摻之立止

口舌生瘡黃連煎酒時含

呷之

趕筵散用黃連乾姜等分爲末摻之

小兒口瘡黃連蘆薈等分爲末每蜜湯服

五分走馬疳入蟾灰等分青黛減半麝少許

小兒鼻癰鼻下兩道赤色有瘡以米泔洗

淨用黃連末傅之日三四次

小兒月飴生

於耳後黃連末傅之

小兒食土取好黃土

煎黃連汁搜之晒乾與食

預解胎毒小兒

初生以黃連煎湯浴之不生瘡及胎毒
方末出聲時以黃連煎汁灌一匙令終身不

出癥已出聲者灌之癥雖發亦輕此祖方也

腹中鬼哭黃連煎濃汁母常呷之因驚

胎動出血取黃連末酒服方寸七日三

娠子煩口乾不得臥黃連末每服一錢粥飲

下或酒蒸黃連丸亦妙癰疽腫毒已潰未

潰皆可用黃連檳榔等分爲末以雞子清調

擦之中巴豆毒下痢不止黃連乾姜等分

爲末水服方寸七傷寒勞復身熱大小便

赤如血胡黃連一兩山梔子二兩去殼蜜半

兩拌和炒令微焦爲末用猪膽汁和丸梧子

大每服十九用生姜二片烏梅一個童子小

便三合浸半日去滓食後暖小便令溫吞之

臥時再服甚効

小兒潮熱往來盜汗胡黃

連柴胡等分爲末煉蜜丸大每服一丸

至五丸安器中以酒少許化開更入水五分

重湯煮二三十沸和滓服

小兒疳熱肚脹

潮熱發焦不可用大黃黃芩傷胃之藥恐生
別證以胡黃連五錢五靈脂一兩爲末雄豬

膽汁丸菉豆大米飲服一二十九

肥熱疳

疾胡黃連黃連各半兩硃砂二錢半爲末入
豬膽內紫定以杖子釣懸於砂鍋內漿水煮
一炊久取出研爛入蘆薈麝香各一分飯和

丸麻子大每服五七丸至一二十九米飲下

五心煩熱胡黃連末米飲服一錢 小兒

疳瀉冷熱不調胡黃連半兩綿姜一兩炮爲
末每服半錢甘草節湯下 滯下純血腹痛

黃連同槐花枳殼乳香沒藥等分煮服神妙

口糜口瘡黃連同五味子甘草等分煮濃

汁漱口甚良 小兒黃疸胡黃連川黃連各

一兩爲末用黃瓜一個去瓢留蓋入藥在內

合定麪裹煨熟去麪搗丸菉豆大每量大小
溫水下 吐血衄血胡黃連生地黃等分爲

末豬膽汁丸梧子大臥時茅花湯下五十九
血痢不止胡黃連烏梅肉竈下土等分爲

末臘茶清下 热痢腹痛胡黃連末飯丸梧

子大每米湯下三十九 嬰兒赤目茶調胡

黃連末塗手足心卽愈 癰疽瘡腫已潰未

潰皆可用之胡黃連川山甲燒存性等分爲

末以茶或雞子清塗之 痘瘍疼腫

不可忍者胡黃連末鴉膽汁調搽之

○典故

荆端王素多火病醫令服金花丸乃芩連梔柏四味服至數年其火愈熾遂至

內障喪明

本草綱目

弘治乙卯長

沙大旱黃連上生王瓜

徐楨呻異林

○麗藻贊

黃連味苦左右相因斷涼滌暑闢命輕身縉雲昔御飛蹕上晏不行而至

吾聞其人
黃連上草丹砂之次
禦孽辟妖

劉宋王

頌長靈久視驟龍行天馴馬匝地

鴻飛以儀順道

則利

梁江淹

江淹



一名蘖木 一名黃柏出邵陵者輕薄色深

爲勝出東山者厚而色淺樹高數丈葉似吳

茱萸亦如紫椿經冬不凋皮外白裏深黃厚

二三分二月五月採皮陰乾性苦寒無毒洩

伏火補腎水堅腎壯骨治衝脉氣逆不渴而

小便不通消五臟腸胃中結熱黃疸女子漏

下赤白陰傷鈍瘡男子陰痿及傳莖上瘡除
骨蒸瀉膀胱相火得知母滋陰降火得蒼朮
除濕清熱爲治痿要藥得細辛瀉膀胱火治
口舌生瘡元醫陳元素曰黃蘖之用有六瀉
膀胱龍火一也利小便結二也除下焦濕腫
三也痢疾先見而四也脾中痛五也補腎壯
骨髓六也凡膀胱腎水不足諸痿厥腰無力
黃芪湯中功用使兩足膝中氣力涌出痿厥

卽去乃癱瘓必用之藥李時珍曰知母佐黃
柏滋陰降火有金水相生之義黃柏無知母
猶水母之無蝦蓋黃柏能制膀胱命門陰中
之火知母能清肺金滋腎水之化源氣爲陽
血爲陰邪火煎熬則腎水漸涸故陰虛火動
之病須之非陰中之火不可用又必少壯氣
盛能食者用之相宜若中氣不足邪火熾甚
者久服有塞中之變近時虛損及縱慾求嗣

之人用補陰藥以二味爲君久服降令大過
脾胃受傷真陽暗損蓋不知此物苦寒滑滲
有反從火化之害也

○製用 削去粗皮用生蜜水浸半日晒乾每五
兩用蜜三兩塗之文武火灸令蜜盡爲
度黃蘖性寒而沉生用降質火熟用不
傷胃酒制治上鹽制治下蜜制治中

○典故 王善夫病小便不通腹堅如石雙睛凸
出飲食不下腿裂出血痛苦不可名狀
治中滿利小便滲洩之藥遍服無驗李杲診
之曰此奉養太過積熱傷腎水致膀胱乾涸
火又運上爲嘔噦潔古老人謂熱在下焦治
下焦其病必愈遂乃用知母黃蘖各一兩酒

洗焙研入桂一錢爲引熟水丸如芡子大每服二百丸沸湯下少時前陰如刀刺火燒之狀溺如瀑泉涌出顧盼之間腫脹消散內經云熱者寒之腎惡燥急辛以潤之以黃蘖苦寒洩熱補水潤燥爲君知母苦寒瀉腎火爲佐肉桂辛熱爲使寒因熱引也

○療治陰火爲病大補丸用黃蘖去皮鹽酒炒褐色爲末水丸梧子大血虛四物湯下氣虛四君子湯下男婦諸虛百損小便淋漓遺精白濁等證黃蘖去皮切二斤熟糯米一升童便九浸九晒蒸過晒研爲末酒煮糊丸桐子大每服百丸溫酒下上盛下虛水火偏盛消中等證黃蘖一斤分四分用鷄酒蜜湯蘸水童便浸洗晒炒爲末知母一丘去毛搗蒸膏和丸桐子大每服七十九白湯下臟毒痔漏下血不止川黃蘖皮刮淨一

斤分四分三分用酒醋童尿各浸七日洗晒
焙一分生炒黑色爲末煉蜜丸梧子大聖心

溫酒下五十丸久服除根治諸虛赤白瀉
川藥皮刮淨一斤分四分酒蜜人乳糯米汁

浸透炙乾切

研廩米飯丸如上法服

藥皮

丸黃藥一斤分作四分三分用醇酒薑湯童
尿各浸二日焙研一分用酥炙研末以猪臢

一條去膜入藥在內紮煮熟搗丸如上法服

下血數升黃藥一兩去皮雞子白塗炙爲

末水丸綠豆大每服七丸溫水下小兒下

血或血痢黃藥半兩赤芍藥四錢爲末飯丸

麻子大每服一二十九食前米飲下妊娠

白痢晝夜三五十行藥根黃厚者蜜炙令焦

爲末大蒜煨熟去皮搗爛和丸梧子大空心

米飲下三五十丸日三神妙小兒熱瀉黃

藥削皮焙爲末米湯丸粟米大每服一二十

丸米湯下

赤白瀉淫及夢洩精滑黃藥炒

真蛤粉各一斤爲末每服百丸空心溫酒下

黃藥苦而降火蛤粉鹹而補腎也又方加知

母炒牡蠣粉煅山藥炒等分爲末糊丸梧子

大每服八十丸益湯下

積熱夢遺心神恍

惚膈中有熱宜清心丸黃藥末一兩片腦一

錢煉蜜丸梧子大每服十五丸麥冬湯下

消渴尿多黃藥切片水一升煮三五沸渴即

飲之恣飲數日卽止

嘔血熱極黃藥蜜塗

灸乾爲末麥門冬湯調服二錢立瘥

時行

赤目黃藥去粗皮爲末濕紙包裹黃泥固煨

乾每用一彈子大紗帕包之浸水一盞飯上

蒸熟乘熱薰洗極効一丸可用三二次

嬰

見赤目在蓐內者人乳浸黃藥汁點之

眼

目昏暗每旦含黃藥一片吐津洗之終身行

之永無目疾

卒喉痺痛

黃藥片含之又以

一斤酒一斗煮二沸恣飲便愈

咽喉卒腫

食飲不通苦酒和黃藥末傅之冷卽易

小

兒重舌黃藥浸苦竹瀝點之

口舌生瘡黃

藥含之良深師用蜜漬取汁含之吐涎

脾有熱舌頰生瘡蜜炙黃藥青黛各一分爲

末入生龍腦一字摻之吐涎

赴逕散用黃

藥細辛等分爲末摻或用黃藥乾姜等分亦

良又黃柏蜜炒研末傳之如神

口疳臭爛

綠云散用黃藥五錢銅綠二錢爲末摻之漱

去涎

鼻疳有蟲黃藥二兩冷水浸一宿絞

汁溫服

鼻中生瘡黃藥檳榔末猪脂和敷

唇瘡痛痒黃藥末以薔薇根汁調塗立効

鬚毛毒瘡生頭中初生如蒲桃痛甚黃藥

一兩乳香三錢半爲末槐花煎水調作餅貼

于瘡口

小兒顫腫生下卽腫者黃藥末水

調貼足心

傷寒遺毒手足腫痛欲斷黃藥

五斤水三升煮漬之

癰疽

乳發

初起者黃

藥末和雞子白塗之乾卽易

癰疽

腫毒黃

藥皮炒川烏頭炮等分爲末唾調塗之留頭

癰疽

水潤濕小兒臍瘡不合黃藥末塗

之小兒臍瘡遍身不乾黃柏末入枯礬少許摻之卽愈

男子陰瘡有二種一種陰蝕

作白膿出一只生熱瘡用黃藥黃芩等分煎

湯洗

仍以黃藥黃柏作末傳之又法黃藥煎

湯洗之塗以白蜜

臍瘡

熱瘡黃藥末一兩

輕粉三錢猪胆汁調擦之或只用蜜炙黃藥

一味

火毒生瘡凡人冬月向火氣入內

兩股生瘡其汁淋灑用黃藥末摻之立愈

婦病此人無識者用此

愈

凍瘡裂痛乳

汁調黃藥末塗之

食自死肉毒黃藥末水

服方寸七

欽瘡生

黃藥末麪糊調塗効

黃芩

一名經芩 一名空腸 一名腐腸 一名內虛

一名黃文 一名印頭 一名妬婦 一名苦督郵

多中空外
黃乃舊根

內實者名子芩 一名痈尾芩 一名條芩 一名

多內實或
中空北芩

鼠尾芩 川蜀河東陝西近郡皆有之 苗長尺

餘莖粗如筋葉從地四面作叢生亦有獨莖

多內實

者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根如

中空北芩

知母長四五十二八月採根曝乾氣涼味微

苦而甘氣厚味薄得酒上行得猪膽汁除肝

經芩卽庄
芩乃舊根

君言
膽火得柴胡退寒熱得厚朴黃連止腹痛得芍藥治下痢得桑白皮洩肺火得五味牡蠣令人有子得白朮安胎得黃芪白欵赤小豆

療鼠瘻總之能治上焦皮膚風熱濕熱頭痛

奔豚熱痛火欬肺痿喉腥利胸中氣消瘀膈

諸失血疔腫排膿乳癰發背婦人產後養陰

退陽女子血閉淋露下血小兒腹痛李時珍

曰黃芩氣寒味苦色黃帶綠苦入心寒勝熱

洩心火治脾之濕熱一則金不受刑一則胃
火不流入肺卽所以救肺也肺虛不宜者苦
寒傷脾胃損其母也胸脇痞滿實兼心肺上
焦之邪心煩喜嘔默默不欲飲食又兼脾胃
中焦之症宜用黃芩以治手足少陽相火黃
芩亦少陽本經藥也

○療治三黃丸孫思邈千金方云巴郡太守奏
加減三黃丸療男子五勞七傷消渴不
生肌肉婦人帶下子是寒熱瀉五臟火春三
月黃芩四兩大黃三兩黃連四兩夏三月苗

芩六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃芩六

兩大黃三兩黃連五兩冬三月黃芩三兩大

黃五兩黃連二兩三物隨時合鵝下篩蜜丸

烏豆大米飲每服五丸日三不知增至七丸

服一月病愈久服走及奔馬人用有驗禁食

豬肉三補丸治上焦積熱瀉五臟火黃芩

黃連黃蘖等分爲末蒸餅丸梧子大每白湯

下二三十丸肺中有火清金丸用羌芩炒

爲末水丸梧子大每服二三十丸白湯下

小兒驚啼黃芩人參等分爲末每服一字水

飲下肝熱生翳不拘大人小兒黃芩一兩

淡豉三兩爲末每服三錢熟豬肝裹吃溫湯

送下日二服忌酒麵少陽頭痛不拘偏正

片芩酒浸透晒乾爲末每服一錢茶酒任下

爲末每服二錢茶下吐血衄血或發或止

眉眼作痛風熱有痰黃芩酒浸白芷等分

積熱所致黃芩一兩去中心黑朽者爲末每

服三錢水一盞煎六分和滓溫服

吐衄下

血黃芩三兩水三升煎一升半每溫服一盞

亦治婦人崩漏 血淋熱癟黃芩一兩末煎

熟服 婦人四十九歲已後天癸當住每月

却行或過多不止條芩心二兩米醋浸七日

炙乾又浸如此七次爲末醋糊丸梧子大每

服七十丸空心溫酒下日二崩中下面黃

芩爲細末每服一錢露靈酒下許學士云崩

中多用止血及補血藥此方乃治陽乘於陰

所謂天暑地熱經水沸溢者也 安胎清熱

露靈酒
秤鍾燒紅

條芩白朮等分炒爲末米飲和丸梧子大每

服五十丸白湯下或加神麌丸妊娠調理以

四物去地黃加白朮黃芩爲末常服甚良

產後血渴飲水不止黃芩麥門冬等分水煎

溫服無時 老小火丹黃芩末水調塗之

○典故

李時珍曰予年二十時因感冒咳嗽既久且犯戒遂病骨蒸發熱膚如火燎每

日吐痰益許暑月煩渴寢食幾廢六脈浮洪遍服柴胡麥門冬荆瀝諸藥月餘益劇皆以爲必死矣先君偶思李杲治肺熱如火燎煩燥引飲而晝盛者氣分熱宜一味黃芩湯以瀉肺經氣分之火遂按方用片芩一兩水二錘煎一錘頓服次日身熱盡退而痰嗽皆愈藥中肯綮如鼓應枹醫中之妙有如此哉一人素多酒慾病小腹絞痛不可忍小便如淋諸藥不効偶用黃芩木通甘草三味煎服遂止一人因虛服附子藥多病小便闊服芩連藥遂愈一人灸火至五壯血出不止如尿手冷欲絕酒炒黃芩一錢爲末酒服止

金銀藤一名忍冬一名通靈草一名鴛鴦草一

名左纏藤一名蜜桶藤一名鷺鷥藤一名老

翁鬚一名金釵股處處有之附樹延蔓莖微
紫色有薄皮膜之其嫩莖色青有毛對節生
葉葉如薜荔而青有濶毛三四月後開花不
絕花長寸許一蒂兩花二瓣一大一小長藥
初開者藥瓣俱白經三二日則變黃新舊相
參黃白相映故名金銀花氣甚清芬四月採
花藤葉不拘時俱陰乾氣味甘寒無毒功用

皆同治風除脹解痺逐戶消腫散毒療癰疽
疥癬發背楊梅諸惡瘡皆爲要藥張相公云
誰知至賤之中乃有殊常之効正此類也

○療治忍冬酒治癰疽發背不問發在何處皆
有奇効鄉落貧乏藥材難得但處心服
之俟疽破貼以神異膏其効甚妙忍冬藤生
葉一把沙盆研爛入生餅子酒少許稀稠得
所塗于四圍中留一口洩毒氣藤只用五兩
木槌槌碎不可犯鐵大甘草

入沙盆內水二盞文武火慢煎至一盞入無
灰好酒一大盞再煎十數沸去滓分爲三服
一日一夜喫盡病勢重者一日二劑服至大
小腸通利則藥力到沈內翰云如無生者只

用乾者然不及生者效速 忍冬丸治消渴

煎後預防發癰疽 忍冬草根莖花葉皆可不

拘多少入瓶內以無灰好酒浸以糠火煨一

宿取出晒乾入甘草少許研爲細末以浸藥

酒打麪糊丸梧子大每服五十丸至百丸湯

酒任下此藥不特治癰疽大能止渴 五痔

諸瘻方同上 一切腫毒不問已潰未潰或

初起發熱金銀花連莖葉取自然汁半盞煎

八分服以滓敷上敗毒托裏散氣和血其功

獨勝 疝瘻便毒喉痺乳蛾方同上 敷腫

拔毒金銀藤大者燒存性葉焙乾爲末各三

錢大黃焙爲末四錢凡腫毒初發以水酒調

擦四圍留心洩氣 癰疽發背腸癰乳癰無

名腫毒濕熱實狀類傷寒不問老幼虛實

服之未成者內消已成者卽潰忍冬葉黃芪

各五兩宮歸一兩甘草八錢爲細末每服二

俗名甜藤

錢酒一盞半煎一盞隨病上下服日再服以

滓敷之

惡瘡不愈左經藤一把搗爛入雄

黃五分水二升瓦礮煎以紙封七重穿一孔

待氣出以瘡對孔薰之三時久大出黃水後

用生肌藥取効

輕粉毒癰方同上

瘡久

成漏忍冬草浸酒日日常飲

熱毒血痢忍

冬藤濃煎飲

五種尸注飛尸者游走皮膚

洞穿臟腑

每發刺痛變動不常遁尸者附骨

入肉攻一血脈

每發不可見死尸聞哀哭便

作風尸者淫躍四

未不知痛之所在每發恍

惚得風雪便作沉尸者纏結臟腑冲引心脇

每發絞切遇寒冷便作尸注者舉身沉重精

神錯雜常覺昏癡

則大作並是身

中尸鬼引接外邪宜用生忍冬葉剉數斛煮

取濃汁煎稠每服

雞子大許溫酒化下一日

二三服

鬼擊身青作痛金銀花一兩水煎

飲之 脚氣作痛筋骨引痛金銀花爲末每

服二錢熟酒調下 中野菌毒急采鴛鴦草

啖之 口舌生瘡赤梗蜜桶藤高脚地銅盤

馬蹄香等分以酒搗汁雞毛刷上取涎出卽

愈 忍冬膏治諸般腫痛金刃傷瘡惡瘡金

銀藤四兩吸鐵石三錢香油一斤熬枯去滓

入黃丹八兩待熬至

滴水不散如常攤用

芙蓉根

茈音紫

夷音戾

魏音邈



一名紫丹 一名紫芙蓉 一名茈芨 一名藐一

名地血 一名鴉銜草 生礪山山谷南陽新野

及楚地 苗似蘭香莖赤節青二月開花紫白

結實亦白紫根色紫可以染紫味甘鹹氣寒

無毒入心包絡及汗經血分涼血和血利大
小腸故痘疹欲出未出血熱毒盛大便閉澀
者宜用得木香白朮佐之尤妙已出而紫黑
閉者亦可用若出而紅活者及白陷大便利
者切忌蓋脾氣實者可用脾氣虛者反能作
瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類所
以用發痘瘡今人不達此理一槩用之則非
矣一切惡瘡癰癧腫毒亦可用

○種植

宜黃白軟良之地青沙地亦善開荒黍不勝不

穄下大佳性不耐水必須高田秋耕深易生草根

細耢平至春又轉耕之三月種穫耩地逐壠

手下子良田一畝用子二升半薄田三升下

訖耢之或以輕砘碾過地刈穫

九月中子熟用鋤恐傷

潔淨爲佳壠底草手拔之刈之候燥聚

根不茂此

打取子收草宜速竟爲良一把隨以茅束之

草嬌嫩也

筐葛尤善四把爲一束當日斬齊一顛一倒

濕打則子

十層許爲長行置堅平地上板石壓之令

稻渥籬不速

兩三宿豎頭置日中曝之令浥浥然五十頭

恐遇雨損

作一洪著屋下陰涼處棚棧上棚下勿有驢

草

馬糞及人溺又忌烟皆令草失色其利勝藍不壓雖舊

若欲久停者入五月內著屋中閉門塞向密太乾則碎

泥勿氣風入漏氣過立秋然後開出草色不帶濕爲良

黑若經夏在棚棧上草

便變黑不復任用矣

太歲碎折

不晒鬱黑

○製用 秋深子熟傍去其土連根取就地鋪齊少乾輕振其土以茅策束切去虛稍以頭向外以之染紫其色殊美

喜慶傳之

○療治 解痘毒紫草一錢陳皮五分葱白三十
新汲水煎服一法熱至三四日痘疹
隱隱將出未出色赤便閉者紫草二兩剉百
沸湯一盞泡封嚴勿泄氣待溫時服半合則
瘡雖出亦輕大便利者勿用煎服亦可痘
毒黑疔紫草二錢雄黃一錢爲末胭脂汁調
銀簪挑破點之極妙癰疽便閉紫草瓜蔓
實等分新水煎服白秃紫草煎汁塗之

小便卒淋及產後淋瀝紫草一兩爲散每食
前井華水服二錢 惡重咬紫草煎油塗之

火黃身熱宜烙足手心背心百會下廉內
服紫草湯紫草吳藍黃連各一兩木香三錢

水煎服午後却涼身有
紅點或黑點者不可治

三七 一名山漆 一名金不換 生廣西南丹諸州

番峒深山中采根曝乾黃黑色長者如老姜
地黃有節味甘微苦似人參止血散血亦主
吐血衄血下血血痢崩中不止產後惡血不
下血暈血痛赤目癰腫虎咬蛇傷治金瘡箭
傷跌撲杖瘡血出不止嚼爛塗或爲末摻之
血立止青腫者卽消若受杖時先服一二錢

則血不衝心杖後尤宜服產後服亦良迺陽
明厥陰血分之藥治一切血病忌鐵器與駢
鱗竭紫銅同以能合金瘡如漆粘物故名山
漆以貴重故名金不換試法以末摻豬血中
血化爲水者真葉功效同

○附錄近傳一種草云是三七春生苗夏高三
四尺葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤
稜最易繁衍夏秋間開黃花莖如金絲盤紐
可愛而不香花乾成絮如苦蕡絮根葉味甘
治金瘡折傷出血及上下血病甚効根大如
牛蒡根與南中來者不類恐是劉寄奴之屬

○療治

血衄血山漆一錢細嚼米湯送下武
以五分入八核湯 赤痢血崩三七三

錢研末米泔水調服卽愈 大腸下血三七
研末同淡白酒調一二錢服三服可愈加五

分入四物湯亦可 婦人血崩方同上 產

後血多山漆研末米湯服一錢 男婦赤眼
十分重者以山漆根磨汁塗四圍甚効 無
名癰疽疼痛不止山漆磨米醋調塗卽散已
破者研末乾塗 虎咬蛇傷山

漆研末米飲服三錢仍嚼塗之

紫荳

一名青荳 一名紫倩 一名茈蕘 一名還魂

草 一名夜牽牛 處處有之以牢山所出根如
北細辛者爲良 三月內布地生苗五六月開

花色黃白紫數種結黑子本有白毛根甚柔
細色紫而柔宛故名二月採根陰乾凡使去
頭鬚及上東流水洗淨每一兩用蜜二分浸
一宿火上焙乾今人多以車前旋復根紫土
染過僞爲之紫菀肺病要藥肺本自亡津液
又服走津液藥爲害茲甚不可不慎又有類
紫菀而有白如練色者名白羊鬚草亦宜辨

○製用

連根葉採之醋浸入少鹽收藏作菜辛香號名仙菜蓋不宜多易腐

宋興國

時有任氏色美嫁進士王公輔不遂意鬱久
面漸黑母家求醫一道人用女真散酒下二
錢日二服一月如故求其方用女蕊黃丹二
物等分按女蕊卽白蕊一名茆一名女復一
名織女蕊卽紫蕊之色白者也紫蕊入血分
白蕊入氣分肺氣熱則面紫黑清則面白三
十以後肺氣漸減不可服

○療治肺傷咳嗽紫蕊五錢水一盞煎七分溫
服日三久嗽不癒紫蕊欬冬花各一
兩百部半兩搗羅爲末每服三錢姜三片烏
梅一個煎湯調下日二甚佳小兒咳嗽聲
不出者紫蕊末杏仁等分入蜜同研丸芡子
大每服一丸五味子湯化下吐血咳嗽吐
血後嗽者紫蕊五味炒爲末蜜丸芡子大每
含化一丸纏喉風痺不通欲死者紫蕊根

一莖洗淨納入喉中待取惡涎出卽瘥神妙
更以馬牙硝津嚥之卽絕根婦人小便卒
不得出者紫蠅爲末井華水服三

撮卽通小便血者服五撮立止

藥有二種馬蹄決明高三四尺葉大於苜蓿
而本小末奢晝開夜合兩兩相帖秋開淡黃
花五出結角如初生細豇豆長五六寸子數
十粒參差相連狀如馬蹄青綠色入眼藥最
良一種茳芏決明卽山扁豆苗莖似馬蹄決
明但葉本小末尖似槐葉夜不合秋開深黃

花五出結角如小指長二寸許子成數列如
黃葵子而扁色褐味甘滑二種苗葉皆可作
酒麴俗呼爲獨占缸茳芒決明嫩苗及花角
子皆可淪爲茹忌入茶馬蹄決明苗角皆勒
苦不可食以能明目得名其子鹹平無毒治
目中諸病助肝益精作枕治頭風明目勝黑
豆有決明處蛇不敢入外有草決明石決明
皆能明目草決明卽青葙子又有茳芒另是

一種生道傍葉小於決明多作飲甚香除痰
止渴令人不睡隋禪師採作五色飲進煬
帝者也

○療治決明爲末水調貼大陽穴治頭痛貼心
胸止鼻衄又消腫毒 積年失明決明

子二升爲末食後粥飲服方寸七 青盲雀

目決明一升地膚子五兩爲末米飲丸桔子

大米飲下二三十九 補肝明目決明一升

蔓菁子二升酒五升煮曝乾爲末每服二錢

溫水下日二 頭風熱痛及目赤腫痛決明

子炒研茶調傅兩太陽穴乾則易之一夜即

愈 癬瘡延蔓決明子一兩爲末入水銀輕

粉少許研不見星擦破上藥立瘥此東坡家

藏方也 發背初起草決明生用一升搗生

甘草一兩水三升煎一升分二服大抵血滯

則生瘡肝主藏血決明和肝氣不損元氣也

肝熱風眼赤淚每旦取一匙搾淨空心吞

下百日後

夜見物光

半夏

一名水玉 一名地支 一名守田 一名和姑

在處有之齊州者爲良 二月生苗一莖莖端

三葉淺綠色似竹葉三三相偶白花圓上生

平澤者名羊眼半夏圓自爲勝 五月采則虛

小八月采乃實大陳久更佳氣味辛平有毒

生微寒令人吐熟溫令人下射千柴胡爲之

使忌羊血海藻飴糖惡皂角畏雄黃秦皮龜

甲反烏頭消痰熱滿結咳嗽上氣心下急痛

時氣嘔逆除腹脹目不得瞑白濁夢遺帶下

○修治洗去皮垢以湯泡浸七日逐日換湯眼
乾切片姜汁拌煆入藥或研爲末以姜

汁入湯浸澄三日瀝去涎水晒乾用謂之半

夏粉或研末以姜汁和作餅子日乾用謂之半

夏餅或研末以姜汁白礬湯和作餅楮葉

包置籃中待生黃衣日乾用謂之半夏翹白

飛霞醫通云癥分之病半夏爲主造而爲翹白
尤佳治濕痰以姜汁白礬湯和之治風痰以

姜汁及皂莢煮汁和之治火瘡以姜汁竹瀝
或荆瀝和之治寒瘞以姜汁繫湯入白芥子
末和之此皆

造麴妙法也

○辯訛 江南半夏大乃徑寸葉微芍藥根下相
重土大下小皮黃肉白南人特重之用
之始知其異此乃由跋類半夏而苗不同誤
以爲半夏也 白傍蕷子絕似半夏但咀之
微酸不堪入藥

○療治 治不眠千里流水八升楊萬遍取清五
升炊以華薪大沸入秫米一升半夏五
合煮一升半飲汁一杯日三以知爲度病新
者覆盆則臥汗出則已久者三飲而已 法
制半夏清痰化飲壯脾順氣用大半夏湯洗
七次焙乾再洗如此七轉以濃米泔浸一日

夜每一兩用白礬一兩半溫水化浸五日焙乾以鉛白霜一錢溫水化又浸七日以漿水

慢火內煮沸焙乾收之每嚼一二粒姜湯下

紅半夏法消風熱清痰涎降氣利咽大半

夏湯浸焙制如上決每一兩入龍腦五分硃

砂爲衣染之先鋪燈草一重約一指厚排半

夏子上再以燈草蓋一指厚以炒豆焙之候

乾取出每嚥一兩粒溫水下化痰鎮心祛

風利膈半夏一斤湯泡七次爲末篩過一兩

入辰砂一錢姜汁打糊丸梧子大每姜湯下

七十九 消痰開胃去胸膈壅滯半夏洗泡

焙乾爲末自然姜汁和作餅濕紙裹煨香以

熟水二盞同餅二錢入鹽五分煎一盞服之

大壓痃毒及酒食傷極驗又方用半夏天南

星各二兩爲末水五升入壞內浸一宿去清

水焙乾重研每服二錢水二盞姜三片煎服

中焦痰涎利咽清頭目進飲食半夏泡七
次四兩枯礬一兩爲末姜汁打糊或煎棗肉
和丸梧子大每姜湯下十五丸寒痰加丁香
五錢熱痰加寒水石煅四兩老人風痰大
腑熱不識人肺熱痰實不利半夏炮七次焙
硝石半兩爲末入白麵搗勻水和丸菉豆大
每姜湯下五十丸 脑壅風痰半夏半斤酸
漿浸一夜溫湯洗五十遍去心氣日乾爲末
漿水搜作餅日乾再研鷄末每五兩入生龍
腦一錢以漿水濃脚和丸鷄頭子大紗袋盛
避風處陰乾每服一丸好茶或薄荷湯嚼下

搜風化痰定志安神利頭目半夏麯三兩
天南星炮一兩辰砂枯礬各半兩爲末姜汁
打糊丸梧子大每服三十丸食後姜湯下
痰厥中風半夏湯泡三錢甘草炙一錢防風
一錢五分姜二十片水二盞煎服 風瘡頭

暉 嘴

通目眩 面青色黃 脈弦者生半夏生天

南星寒水石 蕃各一兩 天麻半兩 雄黃二錢

小麥麵

三兩爲末 水和成餅水煮浮起 漏出

搗丸梧子大

每服五十丸 姜湯下 極効亦治

風痰咳嗽二便不通

風痰頭痛 風痰濕疾

半夏一斤

天南星半兩 各湯泡晒乾爲末 姜

汁和作餅

焙乾入神麯半兩 白术末四兩 枳

實末二兩 姜汁

麵糊丸 桐子大每服五十丸

姜湯下

風痰喘逆冗冗欲吐 眩暉欲倒 半

夏一兩 雄黃三錢

爲末 姜汁浸蒸餅丸 梧子

大每服三十丸

姜湯下 已吐者加檳榔 風

痰喘急半夏湯

洗七個甘草灸皂莢炒各一寸

姜二片水一盞

煎七分 服 上焦熱痰

咳嗽制過半夏一兩

芩末一錢 姜汁打

糊丸綠豆大

每服七十丸 淡姜湯食後服 肺熱痰嗽制半夏桔梗仁各一兩爲末 姜汁打

打糊丸梧子大每服二三十丸白湯下或以
桔梗瓢煮熟丸 热痰咳嗽煩熱面赤口燥

心痛脉洪數半夏天南星各一兩黃芩一兩
半爲末姜汁浸蒸餅丸梧子大每服五七十
丸食後姜湯下 小兒痰熱咳嗽驚悸半夏
南星等分爲末牛膽汁和入膽內懸風處待
乾蒸餅丸菉豆大每姜湯下三五丸 湿痰
咳嗽面黃體重嗜臥驚兼食不消脉緩者半
夏南星各一兩白朮一兩半爲末薄糊丸梧
子大每服五十七丸姜湯下 氣痰咳嗽面
白氣促酒淅惡寒愁憂不樂脉濇者半夏南
星各一兩官桂半兩爲末糊丸梧子大每服
五十九姜湯下 小結胸痛正在心下按之
則痛脉浮者半夏半升黃連一兩桔梗實大
者一個水六升先煮桔梗至三升去滓內二
味煮取二升分三服 湿痰心痛喘急者半

夏油炒

爲末粥糊丸綠豆大每服二十丸姜

湯下

急傷寒病半夏四錢生姜七片酒一

盞煎服

結痰不出語音不清年久者半夏

半兩桂心

一字草烏頭半字爲末姜汁浸蒸

餅丸芡子大

每服一丸夜臥含嚥停痰冷

飲嘔逆

半夏水煮熟陳橘皮各一兩每服四

錢生姜七片水二盞煎

一盞溫服停痰留

飲胸膈滿悶氣短惡心

飲食不下或吐痰水

半夏泡五兩茯苓三兩

每服四錢姜七片水

一錘半煎七分甚捷徑

支飲作嘔嘔家本

渴不渴者

心下有支飲也或似喘不喘似嘔

不嘔似嘔

不嘔心下憒憒半夏泡七次半升

生姜半升水七升

煮一升五合分服嘔逆

欲死及痘瘡

氣方俱同上嘔噦眩憒穀

不得下半夏一升

生姜半升茯苓三兩切水

七升煎一升半溫服

心下悸忪半夏麻黃

等分爲末蜜丸小豆大每服三十丸日三
傷寒乾豌半夏熟洗研末生姜湯服一錢七

嘔逆厥逆內有寒痰半夏一升洗滑培研

小麥麵一升水和作彈丸水煮熟初春四五
枚日三服稍增至十五枚旋漿旋吞覺病減
再作忌羊肉餳糖

嘔吐反胃半夏三升人
膈間支飲

胃寒噦逆停痰留飲半夏湯泡
二十遍煮取三升半溫服一升日再服亦治

炒黃二兩藿香葉一兩丁皮半兩每服四錢

水一盞姜七片煎服

小兒吐瀉脾胃虛寒

齊州半夏泡七次陳粟米各一錢半姜十片
水盞半煎八分溫服

小兒痰吐或風壅所
致或咳嗽發熱飲食卽嘔半夏泡七次半兩

丁香一錢以半夏末水和包丁香用麪重包
煨熟去麪爲末生姜自然汁和丸麻子大每

服二三十丸陳皮湯下

妊娠嘔吐半夏二

兩人參乾姜各一兩爲末姜汁麪糊丸梧子

大每飲服十丸日三服

霍亂腹脹半夏桂

等分爲末水服方寸匕

小兒腹脹半夏末

少許酒和丸粟米大每服二丸姜湯下不瘥

加之或以火炮研末姜汁調貼臍亦佳

疽喘滿小便自利不可除熱半夏生姜各半

斤水七升煮一升五合分兩服有人氣結而
死心下暖以此少許入口遂活

伏暑引飲

脾胃不利半夏醋煮一斤茯苓半斤生甘草

半斤爲末姜汁麪糊丸梧子大每服五十丸

熟湯下老人虛秘冷秘及痃癖冷氣半夏

炮炒主硫黃等分爲末自然姜汁煮糊丸梧

子大每空心溫酒下五十丸

失血喘急吐

血下血崩中帶下喘急痰嘔中滿宿瘀半夏

搘扁姜汁和麪包煨黃研東米糊丸梧子大

每服三十丸白湯下 白濁夢遺半夏二兩

洗十次切破以木香猪苓二兩同炒黃出火

毒去猪苓入煅過牡蠣一兩以山藥糊丸梧

子大每服三十丸茯苓湯送下腎氣閉而一

身精氣無所管揮妄行而遺者宜用此方蓋

半夏有利性猪苓導水使腎氣通也與下元

虛憊者不同 八般頭風半夏末入百草霜

少許作紙燃燒烟就鼻內噙之口中含水有

涎吐去再含見效 少陰咽痛生瘡不能言

語聲不出半夏七枚打碎雞子一枚頭開一

竅去黃納苦酒令小滿入半夏在內以鑲子

坐于炭火上煎三沸去滓置杯中時噙之

極驗未瘥更作 喉痺腫塞生半夏末噙鼻

內涎出効 脊喎在咽半夏白芷等分爲末

水服方寸匕當嚥出忌羊肉 重舌木舌脹

大塞口半夏煎醋含漱之又方半夏二十枚

水煮過再泡片時乘熱以酒一升浸之密封
良久熱漱冷吐之 小兒陷乃冷也水調
半夏末塗足心 面上黑氣半夏焙研米醋
調敷不可見風不計遍數從早至晚如此三
日皂角湯洗下面瑩如玉 瘰風眉落生半
夏半尿燒焦等分爲末自然姜汁日調塗
盤腸生產子腸不收者半夏末頻噙鼻中則
止 產後暈絕半夏末冷水和丸大豆大納
入鼻中卽愈 小兒驚風生半夏一錢皂角
半錢爲末吹少許入鼻卽甦 卒死不寤半
夏末吹鼻中卽活 五絕急病一曰自縊二
目墻壓三曰溺水四曰鬼魅五曰產乳並以
半夏末納豆大一丸入鼻中心溫者一日可
活 癬疽發背及乳瘡半夏末雞子白調塗
之 吹乳腫痛半夏一個煨研酒照立愈一
方以末隨左右噙鼻効 打撲瘀痕水調半

夏末塗之一宿卽沒 遠行足趼方 同上

金刃不出入骨脈中者半夏白蘚等分爲末

酒服方寸七日三服二十日自出 飛虱入

耳生半夏末麻油調塗耳門外 蟬蠅蟻人

半夏末水調塗之立止 蝰瘻五孔相通者

半夏末水調塗之日二 咽喉骨頭半夏白

芷等分爲末水服方

寸七當嘔出忌羊肉

牽牛

一名草金鈴 一名益瓶草 一名狗耳草 一

名白丑黑丑蔓生有黑白二種處處有之黑
者尤多二月種子生苗作藤蔓遶籬牆高者

二三丈蔓有白毛斷之有白汁葉青三尖如

楓葉花不作瓣如旋花而大碧色其實有蒂
裹之生青枯白核與棠棣子核相似但深黑
耳白者蔓微紅無毛有柔刺斷之有濃汁葉
圓有斜尖並如山藥莖葉花淺碧帶紅色核
白色稍粗其嫩實蜜煎爲果名天茄氣味苦
寒有毒治水氣在肺喘滿腫脹下焦鬱遏腰
背脹腫大腸風秘氣秘卓有殊功但病在血
分及脾胃虛弱而痞滿者則不可取快一時

及當服致傷元氣

○修治

凡採得子晒乾水淘去浮者再晒拌酒
蒸從巳至未晒乾收之臨用春去黑皮

今多只碾取頭末去皮麩

不用亦有半生半熟用者

○療治

搜風通滯牽牛子以童尿浸一宿長流
水上洗半日生絹袋盛掛風處令乾每

日塗湯下三十粒極能搜風亦消虛腫久服

令人體清瘦三焦壅塞胸膈不快頭昏目

眩涕唾痰涎精神不爽利膈凡用牽牛子四

兩半生半炒不蛀皂莢酥灸二兩爲末生姜

自然汁煮糊和丸梧子大每服二十九荆芥

湯下一切積氣宿食不消黑牽牛頭末四

兩蘿蔔剜空安末蓋定紙封蒸熟取出入白

豆蔻末一錢搗丸梧子大每服一二十九自

湯下

男婦五般積氣成聚用黑牽牛一斤

生搗末八兩餘滓以新瓦炒香再搗取四兩

煉蜜丸梧子大至重者三五丸陳皮生姜煎

湯臥時服半夜未動再服三十丸當下積聚

之物尋常行氣每服十丸甚効 胸膈食積

牽牛末一兩巴豆霜三箇研末水丸梧子大

每服二三十丸食後隨所傷湯下 追虫取

積方同上酒下亦消水腫 腎氣作痛黑豆

牽牛等分炒爲末每服三錢用豬腰子切縫入茴香百粒川椒五十粒摻牽牛末入內扎

定紙包煨熟空心食之酒下取出惡物効

傷寒結胸心腹硬痛用牽牛頭末一錢白糖

化湯調下 大便不通牽牛子半生半熟爲

末每服二錢姜湯下未通再以茶服一方加

大黃等分一方加檳榔等分 大腸風秘結

瀉牽牛子微炒搗頭末一兩桃仁去皮尖麩

炒半兩爲末熟蜜丸梧子大每湯服三十九

水蠱脹滿白黑牽牛各取頭末二錢大麥

麵四兩和作燒餅臥時烙熟食之以茶下降

氣爲驗諸水飲病張子和云病水之人如

長川泛溢非杯杓可取必以神禹決水之法

治之故名禹功散用黑牽牛頭末四兩茴香

一兩炒爲末每服一二錢以生姜自然汁調

下當轉下氣也陰水陽水黑牽牛頭末三

兩大黃末三兩陳米飯鍋糕一兩爲末糊丸

梧子大每服五十丸姜湯下欲利服百丸

水腫尿濇牽牛末每服方寸七以小便利爲

度濕氣中滿足脛微腫小便不利氣急欬

嗽黑牽牛末一兩厚朴製半兩爲末每服二

錢姜湯下或臨時水丸每棗湯下三十丸

水氣浮腫氣促坐臥不得牽牛子二兩微炒

搗末以烏牛屎浸一宿平旦入葱白一握煎

十餘沸空心分二服水從小便中出

風毒

脚氣捻之沒指者牽牛子搗末蜜丸小豆大

子黑色正如核小核

每服五丸生姜湯下取小便利乃止亦可取之

小兒腫病大小便不利黑白牽牛各二

兩炒取頭末井華水和丸菉豆大每服三十

丸蘿蔔子湯下

小兒腹脹水氣流腫膀胱

實熱小便赤濇牽牛生研一錢青皮湯空心

下一加木香減半丸服

疳氣浮腫當服自

消黑白牽牛各半生半炒取末陳皮青皮等

分爲末糊丸菉豆大三歲兒服二十丸米湯

下疳氣攻腎耳聾陰腫牽牛末一錢箬腰

子半個去膜薄切摻入內加少鹽濕紙包煨

空心食

小兒雀目牽牛子末每以一錢用

羊肝一片同麪作角子二個炙熟食米飲下

風熱赤眼白牽牛末以葱白煮研丸菉豆

大每服五丸葱湯下服訖睡半時

牽牛風

刺黑牽牛酒浸三宿爲末先以姜汁擦面後
用藥塗之面上粉刺癰子如米粒黑牽牛

末對入面脂藥巾日洗之面上雀斑黑

牽牛末鷄子清調夜傳旦洗

小兒急驚肺

脹喘滿胸高氣急脇縮鼻張悶亂咳嗽煩渴

痰潮聲啞俗名馬腳風不急治死在旦夕自

黑牽牛半生半炒大黃煨檳榔各取末一錢

每用五分蜜湯調下痰盛加輕粉一字名牛

黃奔命散小兒夜啼黑牽牛末一錢水調

傅臍上即止臨月滑胎牽牛子一兩赤土

少許研末覺胎轉痛時白榆皮煎湯下一錢

小便血淋牽牛子二兩生半炒爲末每

服二錢姜湯下良久熟茶服之腸風瀉血

牽牛五兩牙皂三兩水浸三日去皂以酒一

升煮乾焙研末蜜丸梧子大每服七丸空心

酒下日三服下出黃物不妨病減後日服五

九米飲下

痔漏有蟲黑白牽牛各一兩炒

爲末以猪肉四兩切

碎炒熟蘸末食盡以白

米飯三匙壓之取下

白蜜爲効

又方白牽

牛頭末四兩沒藥一錢爲細末

欲服藥時先

日勿夜飲次早空心

將猪肉四兩炙切片蘸

末細細嚼食取下

膿血爲効量人加減忌酒

食油膩三日

漏瘡水溢乃腎虛也牽牛末

二錢半入切開猪腎中竹葉包定煨熟空心

食溫酒下

濕熱頭痛黑牽牛七粒砂仁一

粒研末井華水調汁

仰灌鼻中待涎出卽愈

○典故

李時珍云一宗室夫人平生苦腸結旬

日一行甚於生產

服養血潤燥藥則泥

膈服稍黃通利藥若

罔知如此三十餘年時

珍豚其人体肥膏梁

而中多鬱日吐酸痰益

許乃寃又多火病此

三焦之氣壅滯有升無

降津液皆化爲瘀飲不能下滋臟腑非血燥

借腎入腎

惡水既泄
不復淋漓

比也潤劑留滯稍血徒入血分不能通氣俱爲痰阻故無効乃用牽牛末皂角膏丸與服卽便通利精爽能食蓋牽牛走氣分通三焦氣順則痰逐飲消上下通利矣 柳喬素多

酒色病下極

腹痛二便不通不能坐臥立哭

呻吟者七晝夜用通利藥不効予思此濕熱

之邪壅脹精道在二陰之間故前阻小便後

阻大便病不在太陽膀胱也乃用揀實茴香

穿山甲諸藥牽牛加倍水煎一服而減三服

而平牽牛能達右腎命門走精道惟李明之

知之故其治下焦陽虛天眞丹用之深得補

瀉兼施之妙

治脾濕太過通身浮腫喘不得臥腹脹如鼓海金

得臥腹脹

沙散亦以牽牛爲君

景天

一名慎火 一名戒火 一名護火草 一名辟

火人多種於石山上二月生苗脆莖微帶黃
赤色高一二尺折之有汁葉淡綠色光澤柔
厚狀似長匙頭及胡豆葉而不尖夏開小白
花結實如連翹而小中有黑子如粟其葉味
苦平無毒治大熱火瘡諸疕寒熱療金瘡止
血除熱狂赤眼頭痛寒游風女人帶下可
煅砂炒苗葉花並可用葉煮熟水淘可食南
北皆有人家多種於中庭或盆栽置屋上以

防火極易生折枝置土中澆灌旬日便活

○附錄

廣州有慎火樹大三
四圍卽景天也

○療治

驚風煩熱慎火草煎水浴之 小兒中
風汗出一日頭項腰熱二日手足不屈

用慎火草半兩麻黃丹參白朮各二錢半爲
末每半錢漿水調服三四歲服一錢 嬰孺

風疹在皮膚不出及熱瘡丹毒慎火苗葉五
大兩和鹽三大兩同鹽絞汁以熱手摩塗目

再 热毒丹瘡慎火草搗汁抹之日夜一二
十遍一方入苦酒搗泥塗之 烟火丹毒從

兩股兩脇起赤如火景天草苗珠末一兩搗
如泥塗之乾則易 漆瘡作癰接慎火草塗

之 眼生花翳澀痛難開景天草搗汁日點
三五次 產後陰脫慎火草一斤陰乾酒五

升煮一升

分四服

穀精草

一名文星草 一名戴星草 一名流星草

叢生處處有之收穀後生荒田中穀之餘氣
也葉似嫩穀秧抽細莖高四五寸莖頭有小
白花點點如亂星九月採花陰乾辛溫無毒
治頭風痛目盲翳膜痘後生翳目中諸病加
而用之良明目退翳功在菊花上餒馬令肥
主虫癩毛焦病又有一種莖硬長有節根微

赤出秦隴

○療治 偏正頭痛穀精草一兩爲末白麪糊調

擲紙上貼痛處乾換又穀精草末銅綠

各一錢硝石半分噙左右齶鼻
鼻竇不_止

穀精草末二錢熟麵湯服

目中翳膜穀精

草防風等分爲末米飲服甚効

痘後目翳

癰溫多汎穀精草爲末補或猪肝片蘸食一

方加蛤粉等分入猪肝內煮熟日食之 小

兒雀盲羯羊肝一具不見水竹刀割開入穀

精草一根瓦罐煮熟日食屢妙忌鐵器炙熟

作丸每茶下三十丸 小兒中暑吐瀉煩渴

燒存性器覆候冷

爲末米飲服半錢

菟處處有之夏生苗莖中空有節色或赤或

牛糞也 菟亦作煙

白葉如瓠葉凡五尖夏秋間極中抽出花穗

纍纍黃色每枝結實數十顆上有軟刺如蝟

毛一顆三四子熟時破殼子大半指皮有白

黑紋亦有白紫紋者形微長而末員頭上小

白點遠視之儼如牛蠅皮中有仁色嬌白甘

辛平有毒氣味頗近巴豆善走能利人通諸

竅經絡下水氣治偏風失音口禁口目喝邪

頭風七竅諸病止諸痛消腫追膿拔毒催生

下胞衣下有形諸物無刺者良有刺者毒此
藥外用屢奏奇功但內服不可輕易凡服菟
麻終身不得食炒豆犯之脹死其油服丹砂
粉霜或言搗膏以筋點六畜舌根下卽不能
食點肛內卽下血死今北方人種之田邊牛
馬過者不食其毒可知

○修治

凡使以薑湯煮半日去皮取仁研用

取油仁五升搗爛

水一斗煮沫起撇取

待沫盡去水將沫熬至無煙不滯滴

水不散爲度可和印色及油紙用

○辯訛博落廻

生江南山吹之作聲

卉之有黃汁大毒不可入口藥人立死治惡瘡瘻瘍肉瘡瘻白

癩風

蠱毒溪毒精魅此藥和百丈青雞桑灰

等分爲末傳之藥

黑天赤利子

似蓖麻緣在地蔓上是顆

兩頭尖

有毒

○療治

半身不遂失音不語取蓖麻油一升酒

一斗銅鍋

盛油着酒中一日煮之令熟

細綑服之

口月咽斜蓖麻子仁搗膏左貼

右右貼左卽正一方

蓖麻子仁七七粒研作

餅右咽安左手心左咽安右手心

以銅盂盛熱水坐藥上冷卽換五六次卽正一方用蓖

麻子仁七七粒巴豆十九粒射香五分作餅

如上用風氣頭痛不可忍者乳香蓖麻仁

等分搗餅隨左右貼太陽穴解髮出氣甚驗
又方用蓖麻油紙剪花貼太陽亦効又方蓖
麻仁半兩棗肉十五枚搗塗紙上捲筒挿入
鼻中下清涕卽止

八種頭風蓖麻子剛子

各四十九粒去殼雀腦萼一大塊搗如泥糊

丸彈子大線穿掛風處陰乾用時先將好茶

調成膏子塗盞內後將炭火燒前藥烟起以

盞覆之待烟盡以百沸葱湯點盞內茶藥服

之後以綿被裹頭臥汗出避風

鼻窒不通

蓖麻子二三百粒大棗去皮一枚搗勻綿裹

塞之一日一易三十日聞香臭

小兒疳疾

及諸病後天柱骨倒乃體虛所致宜生筋散

貼之木鱉子六個去殼

蓖麻子六十粒去殼

研勻先包頭擦項上令熱以津調藥貼之

舌上出血蓖麻仁油無

燃燒烟薰鼻中自止

舌脹塞口蓖麻仁四十粒去殼研油塗紙

上作燃燒烟薰之未退再薰以愈爲度有人

舌腫出口外

一村人用此法而愈

急喉痺

塞牙開緊急不通用此卽破蕷麻子仁研爛

紙卷作筒燒烟薰吸卽通或只用油作擦丸

妙咽中瘡腫蕷麻子仁一枚朴硝一錢同

研新汲水服之連進二三服効

水氣脹滿

蕷麻子仁研水三合清旦一頓服盡日中當

下青黃水或云壯人止可服五粒

脚氣作

痛蕷麻仁七粒研爛同蘇合香丸貼足心痛

卽止小便不通蕷麻仁三粒研細入紙燃

內挿入莖中卽通

齁喘咳嗽蕷麻仁炒熟

揀甜者食之須多服

兒効終身不可食炒豆

催生下胞蕷麻仁七粒研膏塗足心若胎

及衣下便速洗去不爾則子腸出卽以此膏

塗項則腸自入產難取蕷麻子十四枚每

手各把七枚須臾立下

子宮脫下蕷麻仁

枯礬等分爲末安紙上托入仍以蓖麻子仁十四枚研膏塗頂心卽入 般腸生産全順

金頤

方同上 催生下胎不拘生死胎蓖麻二個

巴豆一銅麝香一分研貼臍中并足心一方

催生一月一粒溫酒吞下 一切毒腫痛不

可忍 蔓麻子仁搗傅卽止 痛風鼻瘻手指

攀曲節間痛不可忍漸至斷落 蔓麻子一兩

去皮黃連一兩剉豆大以小瓶入水一升同

浸春夏二日秋冬五日後取 蔓麻子一枚劈

破面東以浸藥水呑之漸加至四五枚微利

不妨瓶中水盡更添兩月後喫大蒜猪肉試

之如不發是効也若發動再服直候不發乃

止

小兒丹癰 蔓麻子五個去皮研入麵一

匙水調塗之甚効

瘰癧結核 蔓麻子炒去

皮每睡時服二三枚取効一生不可食炒豆

療癧惡瘡及軟廌白膠香一兩瓦器溶化

去滓蘆麻子六十四個去殼研膏溶膠投之攬勻入油半匙頭至點水中試軟硬添減膠油得所以紺帛量瘡大小攤貼一膏可治三五癧 肺風面瘡起白屑或微有赤瘡用蘆麻子仁四十九粒白果膠棗各三粒瓦松三錢肥皂一個搗爲丸洗面用之良 面上雀斑蘆麻子仁蜜陀僧硫黃各一錢爲末用羊髓和勻夜夜傅之 髮黃不黑蘆麻子仁香油煎焦去滓三日後頻刷之 耳卒聾閉蘆麻仁一百大棗十五枚搗爛入乳小兒乳汁和丸作挺每以綿裹一枚塞之覺耳中熱爲一度一日一易二十日瘥 湯火灼傷蘆麻仁蛤粉等分研膏湯傷以油調火灼以水調塗鍼刺入肉蘆麻仁一兩先以帛襯傷處敷之頻看若見刺出卽拔去恐藥緊紓用好肉或加白梅肉同研尤好 竹木骨鰓蘆麻仁

一兩凝水石二兩研勻每以一捻置舌根噙嚥自然不見又方蓖麻油紅麪等分研細沙

糖丸皂子大綿裹含嚥痰出大良 雞魚骨
鰓蓖麻仁百藥煎研勻彈子大井水化下

半丸卽下 惡犬咬傷蓖麻仁五十粒井花

研膏先以塗水洗痛處貼之 賴醫癩瘍用

九尖蓖麻葉三錢入飛過白礬二錢以猪肉

四兩薄批摻藥在內荷葉裹之文武火煨熟

細嚼白湯送下 欽嗽涎喘不問年深日近

用經霜蓖麻葉經霜桑葉御米殼蜜炒各一

兩爲末蜜丸彈子大每服

一丸白湯化下日一服

○典故

一人病偏風手足不舉用此油及羊脂

麝香鯀鯉甲等煎作摩膏日摩數次月

餘漸復兼服搜風化瘀養血之劑三月而愈

一人病手臂上一塊腫痛蓖麻仁搗膏貼

之一夜愈 一人病氣鬱偏頭痛 茼麻仁同
乳香食鹽搗爛太陽穴一夜愈 一婦產後

子腸不收搗仁貼

丹田一夜而上



瓜 一名土瓜 一名野甜瓜 一名馬廻瓜 一名

赤雹子 一名老鴉瓜 一名師姑草 一名公公

鬚月令四月王瓜生卽此四月生苗其蔓多

鬚嫩時可茹葉圓如馬蹄而有尖面青黃淡

澀而不光五六月開小黃花花下結子如彈

丸徑寸長寸餘上微圓下尖長生青七八月

其實似瓜
或云根味
如瓜作上
氣故名

熟赤紅色皮粗澀根如栝樓根之小者用須

深掘二三尺乃得正根江西人裁以沃土取

根作蔬食如山藥南北二種微有不同若療

黃疸破血南者大勝

○根

苦平無毒治天行熱疾酒黃心胸煩熱消瘀血破癥瘕利大小便治面黑面瘡落胎

子

酸苦平無毒生用潤心肺治黃病炒用治肺痿吐血腸風渴血赤白痢反胃吐食

○療治

小兒發黃土瓜根生搗汁三合與服不過二次黃疸變黑醫所不能治用土

瓜

根汁平旦溫服一小升午刻黃水當從小便出不出再服小便如泔乃腎虛也用王

瓜根一兩白石脂二兩兎絲子酒浸二兩桂名王瓜散

心一兩牡蠣粉一兩爲末每服二錢大麥粥

飲下小便不通土瓜根搗汁入少水解之

筒吹入下部大便不通上方吹入肛門內

二便不通前後吹之取通乳汁不下土瓜

根爲末酒服一錢一日二服經水不利帶

下小腹滿或經一月再見及婦人陰癩土瓜

根芍藥桂枝廬蟲各三兩爲末酒服方寸七

日三服一切漏疾土瓜根搗敷之燥則易

中諸疊毒土瓜根大如指長三寸切以酒

半升漬三宿服當吐下面上瘡瘍土瓜根

搗末漿水和勻入夜別以漿水洗面塗藥且

復洗之百日光彩射人曾用有効耳聾濕

土瓜根削半寸塞耳內以艾灸七壯每旬一

灸愈乃止消渴飲水爬瓜去皮每食後嚼

二三兩五七度瘥傳尸勞瘵王瓜焙爲末

每酒服一錢入好棗肉平胃散末二錢酒服
食即可下卽野甜瓜北方多有之 瘰熱頭

風懸枯棲一個赤電兒十個焙牛旁子焙四

兩爲末每食後茶或酒服三錢忌動風發熱

之物 筋骨痛攀馬電兒子炒開口爲末酒

服一錢日二服 赤目痛濬不可忍土瓜瓠

九月十月采日乾槐花炒赤芍藥等分爲末

每服二錢臨臥溫酒下 瘰血作痛赤電兒

燒存性研末無灰酒空心服二錢 大腸下

血王瓜一兩燒存性地黃二兩黃連半兩爲

末蜜丸桐子大

米飲下三十九

麻黃 一名龍沙 一名卑相 一名卑鹽 近汴京多

有之以出滎陽中牟者爲勝春生苗至五月

則長及一尺稍上開黃花結實如皂角子味
甜微有麻黃氣外皮黃裏仁黑根皮色赤黃
長者近尺俗說有雌雄二種雌者三四月開
花六月結子雄者無花不結子微苦而辛性
熱而輕揚治中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗
去邪熱止欬逆除寒熱破癥瘕去營中寒邪
泄衛中風熱療傷寒解肌第一藥也過用洩

真氣

○修治

立秋後收莖陰乾去節及根水煮十餘沸竹筅掠去沫沫令人煩節能止汗

○製用

服麻黃自汗不正冷水浸髮仍用撲汎卽止

凡服麻黃須避風日不爾病

復作

須佐以黃

芩無赤眼

之患

○療治

天行熱病初起二日者麻黃一大兩夫節水四升煮去沫取二升去滓若米

一匙及豉爲稀粥先以湯浴後乃食粥厚覆

取汗卽愈

傷寒雪煎麻黃十斤去節杏仁

四升去皮熬大黃一斤十二兩先以雪水五

碩四斗瀆麻黃於東向竈釜中三宿後納大

黃攪勻桑薪煮至二碩去滓納杏仁同煮至

六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合

煎至二斗四升藥成丸如彈子大有病者以

沸白湯五合研一丸服之立汗出不愈再服

一丸封藥勿令洩氣

傷寒黃疸表熱者麻

黃醇酒湯主之麻黃

一把去節綿裹美酒五

升煮至半升頓服取小汗

春月用水煎裏

水黃腫一身及目黃腫其脉沉小便不利甘

草麻黃湯主之麻黃四兩水五升煮去沫入

甘草二兩煮取三升每服一升重覆汗出不

汗再服慎風寒有患氣急不瘥變成水病從

腰以上腫者宜此發其汗

水腫脉沉屬少陰其脉浮者爲氣虛脹者爲氣實非水也麻

黃附子湯汗之麻黃三兩水七升煮去沫入

甘草二兩附子炮一枚煮取二升半每服八

分日三服取汗

風痺冷痛麻黃去根五兩

桂心二兩爲末酒二升慢火熬如錫每服一

匙熱酒調下汗出爲度避風

小兒慢脾風

因吐瀉後而成麻黃長五寸十個去節白术

指面大二塊全蝎二個生薄荷葉包帳爲末

二歲以下一字三歲以上半錢薄荷湯下

產後腹痛及血下不盡麻黃去節爲末酒服

方寸匕一日二三服血下盡卽止心下悸

病半夏麻黃等分末之煉蜜九小豆大每飲

一服三丸日三服

痘瘡倒燶鄭州麻黃去節

半兩蜜一匙同炒良久水半升煎數沸去沫

再煎去三分之一去滓乘熱服之避風其瘡

復出也一法用無灰酒煎其効更速仙源縣

李用之子病

瘡風寒倒燶已困用此一服

便出如神

中風

諸病麻黃一升去根以王

相日乙卯日取東流水三石

斗淨

鎗盛五

七斗先煮五沸掠去沫逐漸添水盡至三五

斗去麻黃澄定濾去滓取清再熬至一斗再

澄再濾取汁再熬至升半爲度密封收之

二年不妨每服一二匙熱湯化下取汗熬時

要攬勿令着底恐焦仍忌雞犬陰人見此秘

方也

盜汗

陰汗

不止

麻黃根

椒目

等分爲

末每服一錢無灰酒

下外用

麻黃根

牡蠣故

蒲扇爲末

撲之

小兒盜汗

麻黃根三分故

蒲扇灰爲末

以乳服三分

日三服仍以乾姜

三分同麻黃根三分爲末

撲之

諸虛自汗

夜臥卽甚久則枯瘦

黃芪麻黃根各一兩

牡蠣米泔浸洗煅過爲散

每服五錢水二盞小

麥百粒煎服

又方麻黃根黃芪等分爲末

飛麪糊作丸梧子大

每用浮麥湯下百丸以

止爲度

產後虛汗

黃芪當歸各一兩

麻黃

根二兩每服一兩

煎湯下

陰囊濕瘡腎有

勞熱

麻黃根石硫黃各一兩

米粉一令爲末

敷之

內外障翳

麻黃根一兩當歸身一錢

同炒黑入射香小許爲末

噙鼻頻用皆効

○典故

李時珍云

一婦自腰以下脹腫而目亦

腫喘急欲死不能伏枕大便溏泄小便

短少服藥罔効予胗其脈沉大沉主水大主虛乃病後冒風所致名風水用千金神秘湯加麻黃一服喘定十之五再以胃冷湯吞深師薷术丸二日小便長腫消十之七調理數日全

愈

香薷

一名香菜一名香茸一名香菜一名蜜蜂

草有野生者有家蒔者方莖尖葉有刻缺似黃荆葉而小九月開紫花成穗有細子汴洛作圃種之暑月作蔬生茹十月采取乾之氣昧辛微溫無毒下氣除煩熱療嘔逆冷氣脚

氣寒熱

○修治八九月開花著穗時采取去根苗葉陰乾勿犯火氣服至十兩一生不得食白

山桃

○製用世醫治暑病以香薷飲爲首藥不知中暑有頭痛發熱惡寒煩燥口渴或瀉或吐或霍亂者宜用有大熱大渴汗泄如雨煩躁喘促或瀉或吐乃勞倦內傷之症宜瀉火益元若用香薷是重虛其表而益之熱矣

○療治香薷飲治暑月臥濕當風或生冷不節真邪相干便致吐利或發熱頭痛體痛或心腹痛或轉筋或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死香薷二錢五分厚朴姜汁灸白扁豆

微炒各一錢三分水二盞酒半盞煎一盞水
中沉冷連進二服立効活人書香薷二錢八
分厚朴一錢四分黃連七分姜汁同炒黃色
用 水病紅腫乾香薷五十片剉入盆中水
淹過三寸煮使氣力都盡去浮沫之微火煎
至可丸丸梧子大一日五丸日三服日漸增
之小便利則愈 暴水風水氣水通身皆腫
服至小便利爲妙香薷葉一斤水一斗熬極
爛去滓再熬成膏加白朮末七兩和丸梧子
大每服十九米飲下日五夜一服 四時傷
寒不正之氣用水香薷爲末熱酒調服一二
錢取汗 心煩脇痛連胸欲死者香薷搗汁
一二升服 鼻竇不止香薷研末水服一錢
舌上出血如鑽孔者香薷煎汁服一升日
三服 口中臭氣香薷一把煎汁含之 小
兒髮遲陳香薷二兩水一盞煎三分入猪脂

半兩和勻日日塗之。白禿

瘡痛上方入胡粉和塗之

一名赤蘇 一名桂荏 又一種白蘇皆二三

月下種或宿子在地自生莖方葉圓而有尖

四圍有鉅齒肥地者面背皆紫瘠地背紫面

青其面背皆白卽白蘇也五六月連根收採

以火煨其根陰乾則經久葉不落八月開細

紫花成穗作房如荊芥穗九月半枯時收子

子細如芥子而色黃赤莖葉子俱辛溫無毒

氣辛入氣分色紫入血分解肌發表行氣寬

中消痰利肺和血溫中止痛定喘開胃安胎
散風寒解魚蠍毒治蛇犬傷爲近世要藥

○製用

葉生採作羹殺一切魚肉毒嫩時採葉和蔬茹之或塩及梅滷作菹食甚香夏

月作熟湯飲

田畔

近道可種蘇以遮六畜

收子打油燃燈甚明亦可熬之油物

蘇

子油能柔五金八石

田畔

子與葉

同功發散風氣用葉清和土下用子

香紫

蘇採蘇嫩心長三寸許勿見水約三斤用鹽

二兩醃一宿梅瀝浸三日晒乾入甘草甘松

白芷末拌勻摻收之

製細酸紫蘇葉同葵

白青梅作絲入白糖曝乾細酸平時取咀嚥

之利痕結消五日 雲南紫蘇頭葉入梅醬
醃一日取出用糖浸可作佳蔬其子醋浸甚

爽酒 白蘇子乾炒炒熟最香入糖

宋

煎拌芝蔴均爲佳品

俱宋氏種植書

仁

宗命翰林院定湯飲以紫蘇熟水爲第一取
其能下胸膈浮氣也不知久則瀉人真氣

○療治

感寒上氣蘇葉三兩榆皮四兩酒四升
煮一升半分二服 傷寒氣喘蘇一把

水二升煮一升徐徐飲之 勞復食復欲死

蘇葉煮汁

二升入生姜豆豉同煮飲 卒吐

不止香蘇濃煮頓服三升良 霽亂脹滿未
得吐下生蘇搗汁飲之佳乾蘇煮汁亦可

諸失血病紫蘇不限多少入大鍋內水煎令

乾去滓熬膏以炒熟赤豆爲末和丸桐子大

每酒下三五十丸常服 金瘡出血嫩紫蘇

葉桑葉同鴉貼

跌撲損傷紫蘇搗敷瘡口

自合

傷損

血出不止陳紫蘇葉蘸所出血

接爛敷之血不作膿且愈後無癰

風狗咬

傷紫蘇葉嚼敷之

蛇虺傷人紫蘇葉搗飲

食蟹中毒

紫蘇煮汁飲子亦可

飛經入

自令人舌上生泡

紫蘇葉嚼爛白湯下

癰腫痛紫蘇煎湯頻服并搗封之

欬逆短

氣紫蘇葉二錢人參一錢水

鍤煎服子

研汁梗米煮粥亦可

順氣利腸紫蘇子麻

子仁等分研

爛水濾取汁同米煮粥食

氣利腸寬中紫蘇子一升微炒杵以生絹袋

盛于三斗清酒中浸三宿少少飲之

一切

冷氣及風濕脚氣紫蘇子高良姜橘皮等分

蜜丸梧子大每服十九空心酒下

風寒濕

癰四肢牽急脚腫不可踐地紫蘇子二兩杵

碎水三升研取汁煮梗米二合作粥和葱椒

姜豉食

消渴變水服此令水從小便出紫

蘇子蘿蔔子各炒三兩爲末每服一錢桑根白皮煎湯服日三夢中失精蘇子一升炒研末酒服方寸七日再漏血欲死雞蘇煮

汁一升服吐血下血雞蘇莖葉煎湯飲

拔蘭音
跋活

薄荷

一名菝蘭一名蕃荷茱一名南荷一名吳

南薄荷以別胡薄荷

菝蘭一名金錢薄荷二月宿根生苗清明前

後分栽方莖赤色葉對生初生形長而頭圓及長則尖人家多栽之吳越川湖多以代茶

蘇州以產儒學前者爲佳辛溫無毒利咽喉

口齒諸病治癆瘍瘻瘍風癩癰瘍去舌胎語

潤止衄血塗蜂螫蛇傷療小兒驚熱

○收採

凡收薄荷須隔夜以糞水流之雨後刈收則性涼不爾不涼野生者莖葉氣味

大畧

相似

○製用

可生食同薤作羹相宜病薄荷勿食令
人虛汗不止瘦弱人久食動消渴病

○療治

清上化痰利咽膈治風熱新瘥末煉蜜
丸芡子大每噙一丸白沙糖和之亦可

服一錢

風氣癰痒薄荷蟬蛻等分爲末每溫酒調
舌胎語蹇薄荷自然汁和白蜜姜

汁擦之

眼弦赤爛薄荷以生姜汁浸一宿

晒乾爲末

每用一錢沸湯泡洗

瘰癧結核

已破未破

新薄荷二斤取汁皂莢一挺水浸

去皮搗取汁銀石器內熬膏入連翹末半兩

連白青皮陳皮黑牽牛半生半炒各一兩皂
莢仁一兩半同搗和丸梧子大每服三十丸

連翹湯下

衄血不止薄荷汁滴之或以乾

者水煮綿裹塞鼻

血痢不止薄荷葉煎湯常服

水入耳中薄荷汁滴入立効

峰薑

蟄傷薄荷葉接貼之

因炎火火氣入內兩

股生癰汁水淋漓者

薄荷煎汁頻塗立愈

○麗藻詩七言

薄荷花開蝶翅翻風枝露葉弄秋妍自憐不及猩奴點爛醉籬邊

不用錢

一枝香草出幽叢雙蝶紛飛戲晚

風莫恨村居相識晚知名尤向楚辭中

鴟

一名虎蘭一名水香一名都梁香一名龍

棗一名虎蒲一名風藥一名孩兒菊生下濕

地二月生苗一出土便分枝梗葉生如薄荷
微香七月開花紫白色亦似薄荷花此草可
煎油及作浴湯人家多種之氣香而溫味辛
而散治水腫塗癰毒破瘀血消癩痕爲婦人

要藥

○修治

凡用取葉細剉絹袋盛

掛不見日處令乾用

○療治

產後血虛浮腫防已等分爲末每服二錢醋湯下小兒瘡瘍澤蘭心封之良

良產後及陰戶燥熱遂成翻花澤蘭四兩

煎湯薰洗三、三次再

入枯礬煎洗卽安

大風子出海南諸番國生大樹狀如椰子而圓
中有核數十枚大如雷丸子中有仁白色久
則黃而油不堪入藥大風仁辛熱有毒其油
治瘡有殺虫之功不可多服或至喪明用之
外塗功不可沒

○製用大風子二三斤去殼及黃油者研極爛
盛磁器中封口嚴勿泄氣入滾湯蓋鍋

嚴文武火煎黑色如

膏名大風油聽用