

中華民國十九年五月再版

藥用植物圖考中裝六冊

定價大洋兩元

版權
所有

編輯者 東陽王邁聲

藥用植物圖考卷六

東陽王適聲編

眼子菜科

眼子菜

眼子菜屬，生於池塘淺處及水田中，多年生雜草，根



寸梢上綴以多花，呈穗狀帶綠色。

效用

漢藥實驗談，民間用為解毒藥，民間治療法，酒中毒，煎

眼子菜，鰹及禽獸肉之中毒，用水煎眼子菜，多飲其汁。

欒櫚科

欒櫚

欒櫚屬，栽培於園圃，常綠喬木，莖圓柱形，無枝，在周圍

之全面，留有舊葉炳之基腳



部徑四寸至八寸，高三四十

尺，有雄株與雌株之別，葉叢

生莖頂，柄甚長，掌狀分裂開



向四面，花小，淡黃色，集生於分枝之花軸上，由苞以包被

之，其苞大而淡黃，雄花形如粟粒，雌花結實，呈核果狀，似豌豆，大葉柄之基部，有毛包莖，稱為欒毛，頗強韌，能耐水濕，適於製繩、帚、蓑衣等。

效用 箍及子花苦澀平，無毒，陳藏器云：有小毒，戰人喉，未可

止瀉痢陽
風金瘡疥

癬

輕服主治灑腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血皮氣味苦子

大明本草主止鼻衄吐血破瘀治腸風赤白痢崩中帶下燒存

性用李珣主治金瘡疥癬生肌止血

省藤

產於亞細亞熱帶地方常綠木本有刺其數甚多莖細

而頗長倚於他大木上得以上升

有長至數百尺者但其周圍不過

四五寸而已葉大長六尺許羽狀

複葉自許多小葉成此植物之莖

用以編椅子及籃等又供其他種

種之用



效用植物名實圖考長編云苦平無毒主治蛇蟲煮汁服之

又主齒痛打碎口中含之又取和米煮粥飼狗去癩

痛

治蛇蟲齒

欖椰子

欖椰子屬東印度原產木本高三十尺許葉為羽狀

複葉小葉之上端其形狀宛如嘴

而斷之者此植物之幹似椰子而

細每一幹有三四穗每一穗上結

實三四百顆其果實於健胃利尿

有效外又可以強齒在東印度馬

來半島之土人則將果實切細包於胡椒類之葉中時時噉之

與嘴烟草相似故土人之中如血鮮紅色齒呈黑色云

效用味苦辛溫無毒別錄主消穀逐水除痰澼殺三蟲伏

尺寸白時珍治癰瘍後重心腹諸痛大小便氣秘痰氣喘急

療諸瘧藥瘡癩

椰子 椰子屬亞非利加及東印度原產熱帶各地皆有之常



除痰澼殺
三蟲癰瘍
後重心腹
諸痛

綠喬木幹高五丈至十丈許周圍三尺以內葉大羽狀分裂叢



生於樹幹之頂上花單性雌雄同株果實每年生數十枚長形有三棱長八九寸徑四五寸此植物在熱帶為重要之品物其木材堅牢美麗供建築及器具之用樹液含多量之糖分用以釀酒葉供屋頂及其他用果皮外圍所採之纖維甚強韌適於作網果皮內圍之一層甚堅牢可代玻璃杯用在此層之內圍有堅胚乳含有多量之油此油為蠟燭及石礮之原料或供藥用其堅胚乳之內部有汁液如乳樣者為土人重要之食品也又此植物隨所產之地分為數種有南洋椰子錫蘭椰子西貢椰子鳳凰椰子帝王椰子等

吐血水腫
鼻衄吐逆

楊梅瘡筋
骨痛

效用 柳子瓢甘平無毒開寶本草主治益氣時珍食之不飢令人面澤 柳子漿甘溫無毒開寶本草止消渴塗頭益髮令黑李珣云治吐血水腫去風熱 柳子皮苦平無毒開寶本草止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁飲之時珍治卒心痛燒存性研末以新汲水服一錢極驗 賽時珍主治楊梅瘡筋骨痛燒存性臨時炒熟以滾酒泡服二三錢暖覆取汗其痛即止神驗



桄榔子 生於亞西亞之暖地與柳子相似木本高至四十尺許葉羽葉複葉自許多小葉成小葉細而長花小單性雌雄同株其肉穗花序之汁液可製砂糖又自幹之髓部採取澱粉葉柄之纖維有用

以作繩者


破宿血補
益虛羸

效用 子苦平、無毒。開寶本草主破宿血、麯甘平、無毒。李珣云：作餅啖食，腴美令人不飢。補益虛羸，損乏腰脚無力，久服輕身辟穀。

無漏子

一名海棗

無漏子屬南方草木狀海棗樹身無間枝直聳



三四十尺樹項四面共生十餘枝葉如栟櫚五年一實實甚大如梧盤兩頭不尖雙卷而圓其味甚甘美安邑御棗無以加也

效用

本草拾遺味甘溫無毒

主溫中益氣除痰嗽補虛損好顏色令人肥健生波斯國如棗一云波斯棗

除煩嗽補
虛損

治心腹年
痛補心血
路之血

麒麟竭

蘇頌曰：今南番諸國及廣州皆出之。木高數丈，婆娑



可愛，葉似櫻桃而有三角。其脂液從木中流出，滴下如膠餳狀，久而堅凝，乃成竭赤，故又名血竭。作血色，采無時。

效用：味甘鹹平，無毒。唐本草主治心腹卒痛，金瘡出血，破積血止痛，生肌去五臟邪氣。李珣云：傷折打損，一切疼痛，血氣攬刺，內傷血聚，補虛並宜酒服。補心包絡肝血不足，并益陽精，消陰滯氣。

香蒲科

香蒲：香蒲屬生於池沼中，多年生草本，高至五六尺，葉細長而尖闊，約五分許，有平行脈，花單性，花序圓柱狀，雌花在其下。

部雄花在其上部此雄花所成之

部與雌花所成之部互相接近其

形狀與水燭同惟水燭葉長而較

香蒲細雄花所成之部與雌花所

成之部大相隔離故有差別為觀

賞之用其葉作席與繩等雌花成

熟之穗灌以油可代蠟燭之用又雌花成熟者裂為火線嫩莖

與葉供食用

效用 本草經味甘平主治五臟心下和氣口中爛臭堅齒明目聰耳久服輕身耐老


浮萍科

水萍 水萍屬浮生於水塘或池沼等積水之面上一年生水

治五臟心
下邪氣



目赤翳膜
口舌生瘡
吐血癰風
丹毒



草其植物扁平倒卵形上面綠色下帶紫赤色其根為無枝之纖維於植物體之下面叢生數條以孢子繁殖發生頗速

效用

本草經味辛寒主暴熱

身痒下水氣勝酒長鬚髮止消

渴久服輕身

別錄下氣以沐浴生毛髮

時珍主治風濕麻

痺脚氣打撲損傷目赤翳膜

口舌生瘡吐血

紫背浮萍焙半兩黃芩吳二錢牛每

服一錢蜜水調下血吸之

浮萍未瓣風丹毒又治惡疾遍身瘡者取水中

浮萍濃煎汁漬浴半日多效此方甚奇驗也

萍草

蒴屬生於水田或淺水中多年生草本莖葉軟細長

匍匐於泥下莖之上方抽出長葉柄其頂端輪生四小葉片狀

塗熱瘡治
蛇傷



若田字狀名其下方生葉開之
根狀體夏秋之候葉柄下部特
歧出小枝着生囊狀體質堅如
豆二枚或二枚以上孢子着生
於囊狀體中

效用 味甘寒滑無毒吳普主治暴熱下水氣利小便 陳藏
器云搗塗熱瘡搗汁飲治蛇傷毒入腹內曝乾枯櫻等分為末
人乳和丸服止消渴

天南星科

蒟蒻 蒹蒻屬栽培於園圃中多年生草本高至三尺餘掌狀
複葉由各羽狀之裂片而成葉脈呈網狀葉柄長五月開單性
花為肉質穗狀花序頗長有苞頗大名曰佛焰其地下球狀部



味最烈，製為褐腐，可供食用。製為粉末，供輕汽球及空汽枕之塗料，以防氣體洩漏。

效用 關寶本草、弱頭、辛寒，有

毒，主治癰腫風毒，摩敷腫上，其

塊莖亦可敷癰毒。按三元延壽書云：有人患

而癰愈，又有患腮腺者，數人多食之，亦皆愈。

半夏

半夏屬

生於平野

金華為最道地

多年生有毒草本，莖高七八寸，地下有塊莖，如球形，由此抽

一莖或數莖，莖頂著葉，自三小葉而成複葉，有網狀脈，葉柄生肉芽，開單性花，肉穗花序，花軸甚長，雄花位於上部，雌花位於下部，外有大苞片包圍，名曰佛

敍，花軸之長部突出於苞外，如線狀。

消癰開胃
健脾止瀉
睡



白菖

白菖屬

菖屬亦作石

生於池塘邊多年生草本有長根莖橫

臥地中節節生鬚根其全部具
特殊之香氣葉狹扁如劍狀有
平行脈長三四尺其與石菖異
者石菖蒲葉較細無中肋白菖
葉較闊中肋甚明瞭是也夏月
自葉腋出花軸開淡黃色小花



為肉穗花序。

效用 俗於端午節、將此植物之葉插於檐前、以禦疫薦。其根莖製香味料、或用於健胃藥。

芋 芋屬、栽培於田野、多年生草本、四月下種抽苗、至秋即成

熟可食、高至四五尺、其塊莖

多肉、埋存於地下、內含澱粉

甚多、葉大、具長柄、色綠、狀如

短箭、秋日、自葉腋伸出花軸、

開單性花、肉穗花序、外包大

苞、如佛焰、雄花集生花軸上



部雌花生於下部、此地下莖供食用、葉銅家畜。

效用 芋子、平滑、有小毒、別錄主治寬胸胃、充肌膚、滑中。

傳蛇蟲咬
癰腫毒癟

大明本草破宿血去死肌和魚煎食甚下氣調中補虛

藥莖

辛冷滑無毒大明本草除煩止渴療妊娠心煩迷悶胎動不安

又鹽研傳蛇蟲咬癰腫毒痛及署毒箭

虎掌

天南星屬生於山野中多年生草本高至二三尺葉有

長柄掌狀分裂花與天南星相類似惟虎掌之肉穗花序上部甚延

長成為纖維狀黑紫色天南星之肉穗花序上部不延長而有鈍頭

是其異也此植物有毒圖經本草曰虎掌初生根如豆大漸長大似

半夏而扁累年者其根圓及寸大者如雞卵周匝生圓芽二三枚或五六枚三四月生苗高尺餘獨莖上有葉如爪五六出分



除痰下氣
消癰腫散
血

布光而圓，一窠生七八莖，時出一莖作穗，直上如鼠尾，中生一葉，如是裏莖作房，旁開一口，上下尖，中有花，微青褐色，結實麻子大，熟即白色，日本稱浦島草。

效用 本草經苦溫，有大毒，主治心痛、寒熱、結氣積聚、伏梁、癩筋、痿拘緩、利水道。別錄除陰下濕風眩。開寶本草主治中風、麻痺、除痰下氣、利胸膈、攻堅積、消癰腫、散血、墮胎。藏器主

金瘡、折傷、瘀血、鴉、傅之。

由跋 天南星屬，生於山間陰濕

地，多年生草本，地下有球莖，葉為掌狀複葉，自三小葉成，春日自二葉之中間抽出花軸，花單性，肉穗花序，頂端延長而細，佛焰形，大上



毒腫結熱

部卷曲表面暗黃綠色裏面帶紫色此植物有毒與天南星同
效用 本草經辛苦溫有毒主治毒腫結熱

海芋

海芋屬芋時珍曰海芋生蜀中今亦處處有之春生苗

高四五尺大葉如芋葉而有幹夏秋

間抽莖開花如一瓣蓮花碧色花中

有蓋長作穗如觀音像在圓光之狀

故俗呼為觀音蓮其根似芋魁大者

如升盤長六七寸蓋野芋之類也庚

辛玉冊云羞天草陰草也生江廣深谷澗邊其葉極大可以禦

雨葉背紫色花如蓮花根葉皆有大毒又名曰天荷

效用 時珍云味辛有大毒主治瘡瘍毒腫風癩伏硇砂

石菖蒲 石菖蒲屬生於溪澗清流中亦有植於水邊用以捍



治瘡瘍毒
腫

止土沙者與白菖同種其形較小多年生草本有匍匐莖葉劍

狀而細無中肋長至一尺餘有

特異之香氣花小淡黃色花蓋

六片雄蕊六枚肉穗花序如圓

柱狀有劍狀之佛焰此植物供

觀賞之用常栽培於盆石上則

有大小斑條等各種全年常綠故貴重愛玩之又其莖為強壯

藥或用為目藥李時珍曰菖蒲凡五種生池澤蒲葉肥根高二

三尺者泥菖蒲白菖也生於溪澗蒲葉瘦根高二尺者水菖

以砂栽之一年至春翦洗愈翦愈細高四五寸葉如韭根如匙

柄粗者亦菖蒲也甚則根長二三分葉長寸許謂之錢蒲是矣

效用本草經根辛溫無毒主治風寒濕痺欬逆上氣開心孔



國集人遺譜
欽定上氣

止心腹痛
霍亂轉筋

補五臟通九竅明耳目出音聲主耳聾癱瘓溫腸胃止小便利久服輕身不忘不迷惑延年益心智高志不老大明本草除風下氣丈夫水臟女人血海冷敗多忘除煩悶止心腹痛霍亂轉筋及耳痛者作末炒乘熱裹署甚驗

天南星

天南星屬生於山野中多年生草本有毒高至三四

尺形狀與斑枝相似莖葉綠色

無斑紋複葉有長葉柄自數片

小葉成小葉廣披針形其與斑

枝相異者天南星小葉緣邊無

鋸齒斑枝小葉緣邊有鋸齒是

也初夏葉之中央出花單性肉

穗花序橢圓形大如指頭有佛焰狀之苞包被之其苞綠色中



有紫色之間道、花軸之頂鈍形、花後密布小圓實、成熟則呈紅色、其地下莖如球狀、含有許多澱粉、併入虎掌、惟植物名實圖考長編、分天南星與虎掌為二種、蓋天南星肉穗花序之上部不延長而有銃頭、虎掌肉穗花序之上部甚延長成纖維狀、故可差別。

消癰腫利
胸膈

效用 開竇本草味苦辛有毒、主治中風、除疾、麻痺、下氣、破堅積、消癰腫、利胸膈、散血、墮胎。

鴨跖草科

鴨跖草 鴨跖草屬、生於山野路傍及麥田中、一年生草本、莖高一尺許、質柔、常傾臥於地面、葉廣被針形、與竹葉相似、較厚而柔、葉柄如鞘狀包圍於莖、互生、夏日、莖梢着花、花冠藍色、花瓣二片、不整齊、外部有大苞、呈佛焰狀、自晨開放、至午後則萎。

瘡瘻疾飲
大腹痞滿
身面氣腫

痢、蛇犬咬、癰疽等毒和小赤豆煎下水氣濕痺利小便

杜若

杜若屬，自生於林野
陰地宿根草本，春月抽莖高

一二尺，上部生七八葉，廣披
針形，畧如裏荷，夏日莖頂開
花，圓錐花序，花瓣白色，萼片

稱為藍紙，供繪具之用。



風入腦戶
頭腫痛

綠色，雄蕊六個，雌蕊之子房一體而分為三室，花後結蒴果，呈黑綠色。

效用 本草經味辛微溫，主胸脇下氣溫中，風入腦戶，頭腫痛，多涕淚出，久服益精，明目，輕身。


穀精草科

穀精草

穀精草屬生於水田池澤之近傍，一年生草本，葉細長，一株有數十葉片叢生，秋月

叢葉間抽多數花軸簇立，其項綴一小球形圓帶尖，內有多數鱗片相集合，各鱗片間俱藏一小花，呈濃綠白色。

效用 植物名實圖考，辛溫無



寒痛及諸
瘡癬

毒療喉痺齒風痛及諸瘡癩李時珍曰頭風痛目盲翳膜痘後生翳止血故為治目要藥

薯蕷科

薯蕷

薯蕷屬生於山野多年生蔓草莖細長纏繞於他物上



葉長心臟形具長柄對生夏日自葉腋抽軸開花呈穗狀花小單性淡黃綠色雌雄異株果實為蒴有三翅此植物之零餘子及多肉之根供食用

效用 根甘溫無毒本草經主治傷中補虛羸除寒熱和氣補中益氣力長肌肉強陰久服耳目聰明輕身不饑延年時珍云益腎氣健脾胃止泄痢化痰涎潤皮毛震亨白生搗貼腫硬瘡延手足癰瘍

益腎氣化
瘡延手足
癰瘍

毒能消散

儒門事親足手凍瘡山藥一截磨泥敷之甚效

黃獨

薯蕷屬自生山野或栽培於庭園多年生纏繞植物葉

互生呈心臟形

夏月葉腋出花

軸繖多數小花

成穗狀花序雌

雄異株花色帶淡黃

其生於葉

腋之零餘子圓而多疣

其球根

徑大二三寸

鬚根甚多可供食

用此植物全體與薯蕷相似惟

其莖左旋為異耳



補虛損強腰腳

效用 零餘子甘溫無毒陳藏器主補虛損強腰腳益腎食之不飢

草解

蘇頌曰今河嶺汴東荆蜀諸郡皆有之作蔓生苗葉俱


青葉作三叉似山薯又似綠豆葉花有黃紅白數種亦有無花

結白子者根黃白色多節三指許大春秋採根曝乾今成

德軍所產者根亦如山薯而體硬其苗引蔓葉似喬麥子

三稜不拘時月採根利刀切片曝乾用按此植物若灌木

狀莖高三四尺其上有刺葉互生橢圓形托葉變為卷鬚宋圖經列數種李時珍曰葉大如盤今人皆以土茯苓為草薢誤矣其實今人乃以萆薢為土茯苓耳南安謂之硬飯團屑粉食之效用根苦平無毒本草經主治腰脊痛強骨節風寒濕周痹



濕周脾

白濁頻數
腸風痔瘻

惡瘡不瘳、熱氣、大明本草、主治頭旋、癇疾、補水臟、堅筋骨、益精、明目、中風失音、附白濁頻數、旋面如海、澄下如膏、乃真元不足、下焦虛寒、草薢分清飲、
用草薢、石菖蒲、益智仁、烏藥等分、每服四錢、不入蓋一盞、煎七分、食前溫服、效乃止。
腸風痔瘻、
如聖散、用草薢去土等分為末、每服三錢、溫酒空心服之。

鳶尾科

鳶尾

鳶尾屬栽培於庭園中多年生草本春月抽莖高至一



二尺葉劍狀淡綠色各葉互
生相擁抱初夏花軸生自葉
間其上端常綴以三花花大
呈淡青紫色處處有紫色小
點又有白點者花蓋大小六

片外層三片較大在其下面上端之中央有一雞冠狀突起雌
蕊之柱頭扁平如花瓣覆於雄蕊上其與蝴蝶花相異者鳶尾
之花軸單一或分歧花蓋之片上無毛狀之鋸齒蝴蝶之花軸
恒分數枝花蓋之片上有毛狀之鋸齒是也

效用 本草經味苦平主治蟲毒邪氣鬼疰諸毒破癰瘍積聚
去水下三蟲

射干

射干屬生於山野中、或栽培於庭園。多年生草本，高至



枝子房下位，果實為蒴。

效用 本草經味苦平，主治欬逆上氣，喉痺，咽痛，不得消息，散結氣，腹中邪逆，飲食大熱。

番紅花 番紅花屬小亞西亞原產，多年生草本，高至四五寸，地下部與水仙之鱗莖相似，葉比水仙較細長，夏月花自葉叢

中出花蓋六片、青紫色或白色、有
香氣、雄蕊三枚、雌蕊一枚、此植物
各國皆栽培之、其花柱及柱頭之

已乾者稱為泊夫藍、用於健胃鎮
痙通經等之諸藥中、又次食餅及

其他之食品、常用以染為黃色者。

心憂鬱積
氣悶不散
活血

效用 氣味甘平、無毒、時珍主治心憂鬱積、氣悶不散、活血、久
服、令人心喜、又治驚悸。

鱸實

鳶尾屬、栽培於庭園間、宿根草本、葉線形、無劍脊、常有
撓扭二三度者、春日自鞘苞間開花、花蓋之裂片白色、有淡紫
色之線條、或有淡紫暈、筍部細長宿存而成蒴果之嘴、蒴果狹
長、長二寸許、橫徑三四分、根可製刷。



胃中熱氣

風寒濕痹

山臍中帶下

散葷毒傅

蛇蟲咬

效用 味甘平無毒本草經主

治皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕

痹堅筋骨令人嗜食久服輕身

大明本草治婦人血氣煩悶

產後血運并經脈不止崩中帶

下消一切瘡癧止鼻衄吐血通小腸消酒毒治黃病殺葷毒傅
蛇蟲咬時珍治小腹疝痛腹內冷積水痢諸病

石蒜科

石蒜 石蒜屬生於山野中多年生草本高至尺餘地下莖及其他之形狀與鐵色箭相似葉叢生細長如帶狀闊二三分長一尺許有平行脈冬季生葉至夏則枯腐秋月花軸在葉枯後生長頂上著有柄花數枚如繖形花色紅花蓋六片深裂各裂



片開而反卷、有長雄蕊六枚

突出於花外、雌蕊一枚比雄

蕊更長、其葉與花時期互異、

亦與鐵色箭同、惟鐵色箭花

蓋黃赤色、分裂較淺、各裂片

不反卷、雄蕊比花蓋不長、故有區別、此植物有毒、地下莖具澀

粉、可採取供食用、若誤食此花、則有言語澀滯之虞。

效用 鱗莖平甘溫、有小毒、蘇頌主傳貼腫毒、時珍云、疗瘡、

惡核、河水煎服、取汗、及搗傅之、又中溪毒者、酒煎半升服、取吐、良。

良。

水仙

水仙屬、栽培於庭園、多年生草本、高至一尺餘、葉叢生、狹長而扁平、有平行脈、冬月、自葉叢之中心出花莖、高約尺餘、



治腫毒

雞頭魚骨
受



上有苞，苞則出數花如繖形花。

白帶黃，有香氣。花被六片，內具副花冠，為杯狀，蜜槽金黃色。其副花冠較花被裂片短。此植物供觀賞用。其地下莖多粘液，有毒，用治腫毒甚有功效。又其粘液適於接合蠟質石印材等之缺損。

缺損

效用 地下莖味苦微辛，滑寒，無毒。時珍主治癰腫及魚骨哽。花作香澤，塗身理髮去風氣，又療婦人五心發熱，同乾荷葉赤芍等分為末，白湯再服二錢，熱自退也。

仙茅：仙茅屬，又有獨茅、茅爪子、婆羅門參等名。蘇頌曰：仙茅生西域，葉似茅，其根粗細有節，或如筆管有節，文理黃色，多涎。

自武城來蜀中諸州亦皆有之今大庾嶺蜀川江湖兩浙諸州

亦有之葉青如茅而軟腹

畧闊面有縱紋又似初生

櫻櫛秧高尺許至冬盡枯


春初乃至三月有花如梔

子花黃色不結實其根獨

莖而直大如小指下有短細肉根相附外皮稍粗褐色內肉黃
白色二八月採根曝乾衡山出者花碧五月結細子植物名實
圖考云今庾嶺產甚夥土人以為茶飲蓋嶺北泉潤陰寒藉此
辛烈以為溫燥服食者少或有其毒者

效用 嘉祐本草味辛溫有毒主治心腹冷氣不能食腰脚風
冷掣瘡不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神強

心腹冷氣
腰脚風冷




記助筋骨益肌膚長精神明日

燈心草科

燈心草

燈心草屬生於山野之濕地多年生草本高至一二

尺莖圓而長如細線狀綠色圓



莖之橫斷面外觀恰似葉中有白髓細胞為星芒形葉在莖之

基部鱗片

狀及花部無常葉夏日

莖之上部側生花梗分枝甚多

各綴以黃綠色小花花被六片

雄蕊三枚雌蕊一枚其莖供製席及籃等之原料莖心稱為燈心供燈用外科用外及其餘各種之用

效用 嘉祐本草味甘寒無毒治五淋生者服之敗席服更

石龍芻 龍鬚 燈心草屬宿根草本為水田中之耕作物莖細長而綠色其橫斷面為圓形無常葉夏日梢頭二三寸下歧出花梗開小花花被為護穎狀雄

蓋六枚雌蓋三子房三室胚珠

多形態與燈心草畧同惟莖較燈心草為短雄蓋之數倍於燈心草莖供織席之用

效用 本草經味苦微寒主治心腹邪氣小便不利、淋閉風濕鬼疰惡毒久服補虛羸輕身耳目聰明延年別錄微溫無毒補內虛不足、痞滿、身無潤澤出汗除莖中熱痛殺鬼疰惡毒氣地楊梅 地楊梅屬生於山野中多年生草本高至六七寸葉

心腹邪氣
淋閉風濕

叢生細長而尖生長毛花莖自葉叢而出花小有花被六片雄
蕊六枚其花密生如頭狀種子供
食用陳藏器曰生江東濕地苗如
莎草四五月有子如楊梅也但與
本草綱目及植物名實圖考所載
之圖形不同

效用

氣味平平無毒藏器主治赤刺取莖子煎湯服

百合科

蜘蛛抱蛋 蜘蛛抱蛋屬產於暖地多年生常綠草本葉扁大
長橢圓形兩端尖葉脈平行葉柄長其葉分狹葉與闊葉二種
狹葉直立闊葉尖頭傾斜春月開花花被暗紫色單生於短花
莖之頂上花後結實青色如梅頭大此植物供觀賞之用按蜘蛛





贛皆有之狀如初生樓葉下細上濶長二尺餘粗紋韌質凌冬不凋近根結青黑實如卵橫根甚長稠結名鬚形如百足故以其狀名之

效用 土醫以根卵治熱疝南

安土人呼哈薩刺以治腰痛咳嗽

松壽蘭

產贛州形狀類吉祥

草葉微寬花六出稍大冬開盆
益中植之秋結實如天門冬實
色紅紫有尖滇南謂之結實蘭

治筋骨痙
及遺精

效用 土醫云味甘辛治筋骨痙用根浸酒加虎骨膏治遺精
加骨碎補

綿藜兜

綿藜兜屬生於原野或路傍多年生草本春日葉自

地下之鱗莖叢生葉身細長初

秋葉間抽出花莖長八九寸上

部纏以總狀花序約二三寸許

花小花蓋淡紫色

效用 鱗莖味甜性寒取水煮

極熟食之不換水煮食後腹中鳴有下氣

百合

百合屬生於山地或栽培於園圃多年生草本高至二

三尺地下有鱗莖鱗內貯養分常葉互生為披針形夏日莖梢

開大形花頗美麗而馥郁花被六片分內外二輪白色帶紅無



下氣

邪氣腹脹
心痛

卷丹

花後結蒴果、
着雌蕊一枚、柱頭裂而為三、

效用 本草經味甘平、主治
邪氣腹脹心痛、利大小便、補
中益氣



百合屬、生於山野、或植於庭園、以為觀賞品、多年生草
本、莖高五尺許、葉互生、無柄、
為披針形、珠芽生於葉腋、墮
地能生新植物、花被六片、其
各片大而反卷、於外呈黃赤
色、有暗紫之小點、雄蕊六枚、

瘡瘍驚邪
婦人崩中

藥丁字着、花粉粒大而長頗多、粘液能粒粒相附着、并以之附於蟲體、雌蓋一個、柱頭三裂、花後結蒴果、地下之鱗莖、冬月收之、大至四寸、可供食用。

效用 根味甘涼無毒、天明本草、治疗腫、驚邪、時珍云、治婦人崩中。


天門冬 天門冬屬生於山地、多年生蔓草、莖有卷絡於他物

之性、春日萌芽、葉細微如鱗片狀、枝每自葉腋伸出、約一枚至三枚、細長而尖、若曲針、綠色、呈葉狀、此枝俗稱為葉、夏月開淡黃白花、往往二三花叢生、花蓋六裂、雄蕊六枚、雌蕊一枚、柱頭

三裂果實紅色大如小豆其塊根狀如紡錘攢簇而生肥大多肉採之用為強壯劑又以此浸漬於沙糖中供食用味甚佳

效用 植物名實圖考湖南俗人用以拔疔毒隱其名曰白蘿蔔本草經味苦平主諸暴風濕偏癱強骨髓殺三蟲去伏尸久服輕身益氣延年

發莫 牛尾菜屬生於山野多年生灌木莖高三四尺至六七



尺有刺而外曲葉互生卵形或橢圓形其托葉變為卷鬚以之纏絡於他物初夏自葉腋抽花軸為繖形花序開單性花雌雄異株花瓣六片呈黃綠色果實成熟為赤色漿果

腰背寒痛
風癱

效用

根甘酸平溫無毒別錄主治腰背寒痛風癱益血氣止

小便利

萬年青

萬年青屬栽培於庭園多年生常綠草本無地上莖



葉自地下莖叢生無葉柄披針形質厚深綠色長一尺餘春夏之間自葉叢之中央抽出花莖長四寸攢簇穗狀之細花呈淡綠白色花蓋短有六片雄蕊六枚雌蕊之

花柱上部分裂為三果實形如豆粒大冬月成熟赤色或黃色
效用 植物名實圖考俗以治無名腫毒疔瘡牙痛隱其名曰
開口劍或謂能治蛇傷亦呼為斬蛇劍

黃精 黃精屬生於山地多年生草本莖高三尺許葉互生披
黃精 痘瘡牙痛

無名腫毒
疔瘡牙痛

補中氣除
風濕填精
髓



效用 地下莖甘平無毒別錄主補中氣除風濕安五臟久服輕身延年不飢 李時珍曰補諸虛止寒熱填精髓下三尸蟲
蘆薈 蘆薈屬原來產於地中海沿岸及熱帶地方常綠植物葉大多肉緣邊有銳鋸齒葉端尖自葉叢中抽出花莖綴花於其上部成穗狀



效用 此植物所採之液汁為

潤藥及健胃藥，其藥即名蘆薈。
萱草 萱草屬，栽培於園中，多

年生草本，莖高二尺許，葉互生，
長帶狀，夏月自莖梢著以數花，
花蓋六片，分內外二輪，呈紅黃
色，朝開而夕萎。

效用 花及嫩葉甘涼無毒，大
明本草，煮食治小便赤澀，身體
煩熱，除酒疸。陳藏器曰：根治
沙淋，下水氣，酒疸，黃色偏身者。
搗汁服。宗奭云：大熱衄血，研

汁一大盞和生薑汁半盞細呷之

萎蕤

黃精屬變種甚多、生於山野中、全形與黃精相似、多年

生草本、莖方柱狀、縱部有棱狀

則與黃精如圓柱者異、又比黃

精粗而堅、高至一二尺、地下有

根莖、肉質葉互生、卵形、有平行

脈、初夏開筒狀花而下垂、帶綠

白色、每自葉腋生一二花、或二三花者、此植物之根莖、冬月採

之可製澱粉、或供食用、又根莖為外用之藥、則以治打撲傷云、

效用 本草經味甘平、主治中風、暑熱不能搖動、跌筋、結肉諸

不足、久服去面黑、好顏色、潤澤、輕身、不老、別錄主心腹結氣、

虛熱、濕毒、腰痛、



中風暑熱
跌筋

玉簪

紫萼屬，本生於山野，今則有栽培於庭園間者。多年生



草本，高至四五尺餘，葉大緣
色，具長柄卵形，叢生，面有白

粉蠟質，夏日葉間抽圓莖，上
部開花，色白，亦有帶淡紫色
者，花蓋六片，互相結合，苞呈

紫綠色，雄蕊六枚，總狀花序，此植物供觀賞用。

蛇虺蟄傷

效用 根味甘，辛，寒，有毒，時珍云：蛇虺蟄傷，取葉搗汁和酒服，以渣敷之，中心留孔，洩氣，又解一切毒，下骨哽，塗癰腫。

山慈姑 山慈姑屬，生於山野中，多年生草本，高至五寸許，春
月自地一下莖生葉，葉細長，有平行脈，花軸從地莖之中央發生，
其頂端具一花，下部有常葉，花軸側面，有少數之枝，各枝頂端，

癰腫瘡癰
癰癰結核



亦生一花，花常直立，花蓋六片，白色，外面有暗紫色之纖條文，各片不反向於外。此植物地下部為鱗莖，採製澱粉可供食用，其葉亦可煮食。

效用 根甘微辛，有小毒。陳藏器主治癰腫瘡癰、瘰癧、結核等。醋磨敷之亦刺人而皮膚黯。時珍主疔腫攻毒，破皮解諸毒，蠱毒蛇蠱蛇犬傷。又云葉塗乳癰，便毒尤妙。

薤 葱屬，栽培於園圃，多年生草本，葉細長，中空，自地下之鱗莖叢生，秋日葉間抽花莖，高尺餘，繖形花序，花被六片，帶紫色，雄蕊長於花被。此植物之鱗莖，如指頭大，夏月採之供食用，又浸漬於酒醋醬油之濃厚煎汁內，固封貯藏，至一二月後，亦可

食其與山薤異者、薤葉五棱鈍
三角、山薤葉甚細、三棱畧似牛
規形是也。

金瘡要胎
帶下赤白
骨哽在喉



刺及胸癰刺痛、下氣散血、安胎。
食之骨哽在喉不去者、食之即下。

菊
效用 蕃白、辛苦溫滑、無毒。本草經主治金瘡、瘡敗、輕身、不飢、耐老。時珍治少陰病厥逆洩、孟說治婦人帶下赤白作羹。

莖葉細長而扁、夏月花軸自葉間伸出、繖形花序、花被白色、帶紫、各花之間雜珠芽。春月採鱗莖及葉供食用、臭氣甚強。

功用 味辛溫、有毒。久服損人目、鼻、齒。主歸五臟、散癰腫、蠭瘡。

泄濁暴病
乾濕霍亂



除風邪殺毒氣溫水搗爛治

中暑不醒搗貼足心止鼻衄

不止服藥不應用蒜一枚去皮研如泥作錢大餅子

厚一豆許右鼻出血貼左足心左鼻出血貼右足俱出兩足根貼之立瘥和豆豉丸服治

暴下血通水道時珍云搗

汁服治吐血心痛生蒜搗汁服二升即愈

煮汁飲治角弓反張同鯽魚丸

治膈氣同蛤粉丸治水腫同黃丹丸治刺癰同乳香丸治腹痛搗膏敷臍能達下焦消水利大小便貼足心能引熱下行治泄

濁暴病及乾濕霍亂納肛中能通幽門治關格不通

韭菜屬亞細亞原產栽培於園圃中多年生草本春月其苗

叢生高至一尺餘葉細長而扁花有花被六片白色雄蕊

集生於莖頂、繖形花序、此與絲蔥有異者、絲蔥形狀畧類於薤。

葉細而中空、花被帶紫色、是也。

夏秋之間、刈其葉以供食用、

功用 味辛、微酸、溫清、無毒、根

葉煮食、溫中、下氣補虛、益陽、調

和臟腑、令人能食、止洩血膿、腹

中冷痛、生搗汁服、主胸痺肩痛、不可觸者、又解藥毒、療狂狗咬

人數發者、亦塗諸蛇虺蠍蠭惡蟲毒器時珍云、飲生汁、主上氣

喘息、欲絕、解肉脯毒、煮汁飲、止消渴、盜汗、熏產婦血運、洗腸痔

脫肛、



葱

葱屬、栽培於園圃間、變種甚多、多年生草本、莖高八九寸、乃至一尺餘、下部呈白色、葉管狀而中空、外塗蠟質樣、新葉每

穿舊葉而伸出叢生初夏花軸自葉叢中挺生開繖形花序如

球狀如生時有囊狀之白苞蕊
之花蓋六片帶白色雄蕊六雌

蓋一此植物之葉四時可採供
食用惟至冬月最為柔嫩味亦
最美



傷寒中風
面目浮腫

效用 葱莖白辛平無毒葉溫根鬚汁並無毒本草經作湯治
傷風中風面目浮腫能出汗 別錄傷寒骨肉碎痛喉痺不通
安胎歸目益目睛除肝中邪氣安中利五臟殺百藥毒根治傷
寒頭痛

山蒜

葱屬生於山野中多年生草本具氣與葱相同莖高一
二尺地下之鱗莖白色大如棗葉細長而尖有平行脈微有稜

積塊婦人
血瘕

之供食用。

效用 辛溫無毒蘇頌主治積塊及婦人血瘕用苦醋磨傅多效。

麥門冬 麥門冬屬生於山林中陰濕之所或栽培於庭園間常綠草本鬚根之端如連珠狀葉叢生長一二尺闊三四分夏月自葉叢中抽出花軸高一尺餘開紫紅色之穗狀花果實球形呈黑色如豆粒大。



夏月葉間抽莖開花於其項花小白色或淡紫色花被六片與雄蕊同數各花絲細長而突出有長花梗排列如繖形雜以黑紫色球芽此植物春夏之際採

心腹結氣
傷中傷飽



穀調中保神定肺氣安五臟令人肥健美顏色

知母 知母屬中國原產栽培於庭園多年生宿根草本叢生葉細長夏日自葉間抽二三尺長之花梗上綴小花成穗狀花序花蓋六片色淡其根莖可供

效用 本草經味甘平無毒主治心腹結氣傷中傷飽胃絡脈絕羸瘦短氣久服輕身不老不飢別錄微寒無毒主治身重目黃下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿廢強陰益精消



藥用

除邪氣肢
體浮腫

效用 氣味苦寒無毒。本草經主消渴熱中。除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣。別錄療傷寒久瘧煩熱。腸下邪氣膈中惡及風汗內疽多服令人洩。

王孫

王孫屬自生於山地。多年生草本。莖高四五寸。其葉四

片輪生於莖上。各葉長橢圓形而先端尖。五六月頃莖頂着一花。花瓣四片。雄蕊八枚。雌蕊一個。

效用 本草經味苦平主治五

臟邪氣濕痺四肢疼酸膝冷痛

五臟邪氣
四肢疼酸
虛勞

本草拾遺 王孫又名旱藕。生太行山中。狀如藕。故江右土醫

皆呼百節草用豬肉燙湯食之以治虛勞

貝母

貝母屬莖高尺餘地下有鱗莖地上著多數之葉葉狹

長項上之三葉其末卷曲春月

梢頭葉腋出短梗各著一花下

垂花被六片如鐘狀呈淡黃色

內面有淡線條與紫細點相交

錯為網狀紋雄蕊六枚有脚生

藥花柱或柱頭三裂供觀賞及



藥用

效用

根平溫無毒本草經主治欬逆上氣頭痛腦動百節拘
掌風濕痺痛死肌久服明日利九竅輕身長年別錄溫中下
氣破瘀利水道開胸中滯結除喉痺、鼈鼻不聞香、風癇癲疾下
破瘀

欬逆上氣

頭痛腦動

破瘀

乳結、汗不出、血不行、安五臟、益肝膽、通精氣。

鬱金香

山慈姑屬小亞細亞原產、多年生草本、高一尺餘、葉

披針形、帶白色、四五月間開花

大而美麗、單生於花頂之上、花

蓋六片、呈黃色、紅色、白色等、或

為重瓣花、供觀賞。

效用 氣味苦溫無毒、陳藏器

主治蟲症、諸毒、心腹間惡氣鬼

疰、鴟鴞等一切集、入諸香藥用。

趙胡根

麥門冬屬、今江西湖南有之、土人呼為土當歸、全似

萱草、惟苗葉薄而軟、近根處頗扁、不似萱草之圓滑耳、根微黃、味極似天門冬、其根比萱草根稍甜。



除煩去熱
明目



效用 本草拾遺根味甘
寒無毒主潤五臟止消渴
除煩去熱明目功用如麥
門冬凡用抽去心

藜蘆

藜蘆屬生於山地

多年生有毒草本高二三尺生毛如櫟被於根及莖之周圍葉
互生披針形甚長春日開小紫
黑花花被六片雄蕊六枚雌蕊
一枚此植物之全部可供藥用
效用 根辛寒有毒本草經主
治蟲毒欬逆瀉痢腸澼頭瘡疥
癬惡瘍殺諸蟲毒去死肌附

誤吞水蛭
疥癬虫瘡

藜蘆炒為末，水煎服一錢，必吐出。疥癬虫瘡，油和蜜生

誤吞水蛭

藜蘆炒為末，水煎服一錢，必吐出。疥癬虫瘡，油和蜜生

土茯苓

土茯苓屬為常綠攀登植物，有雄本雌本。春月延蔓，每葉下有卷鬚，葉腋出花梗。



開十餘花，花色帶紫紅或綠後結小圓實，熟則黑，採其塊根乾而用之。此外有狹葉竹葉圓葉者。

效用 根甘淡平無毒，時珍主治健脾胃、強筋骨、去風濕、利關節、止泄瀉、治拘攣、骨痛、惡瘡、癰腫、解汞粉銀朱毒。附楊梅毒瘡鄧筆峯誰與方用土茯苓四兩、皂角子七個、水煎代茶飲、浸參各三錢、金錢花一錢用好酒煎一日、服明寒治正德間因楊梅瘡盛行率用輕分藥取效、毒留筋骨、滑爛終身至人用此遂為要藥、諸醫無從考證、往往指為草薢及菝葜、然其根苗迥然不同、宜參考之、但其功用頗相近也。

健脾胃
筋骨去風
濕解汞粉
銀朱毒

撒爾沙

牛尾菜屬中央亞美利加原產

形狀與菝葜相類葉

略作心臟形互生托葉細長變為

卷鬚花單性花被六片雄花雄蕊

六枚雌花雌蕊一枚柱頭二裂

效用此植物之根稱為撒爾沙

根有用以治微毒者

秋水仙

生歐羅巴及地中海沿

岸多年生草本高至四五寸葉細長有平行脈花單生於莖頂
花被六片淡紅色雄蕊六枚雌蕊一枚果實為乾果熟則裂開
此植物之種子稱為古爾矢尼謨子



治痛風

效用 用子以治痛風及僵麻質
斯云故亦名古爾矢屈謨。

海葱


綿橐兜屬 生於地中海沿

岸 多年生草本 高至三尺餘 地下
有鱗莖 與玉葱相似 葉披針形 有

平行脈 花莖自葉叢之中央生 其
上部着以小花 白色 穗狀花序

效用 此植物之鱗莖用為利尿

利尿劑



麻黃科

麻黃 麻黃屬生於沿海之地 小灌木 高二三尺 其形狀與木
賊相類似 莖有節 節上生葉 葉小如鱗狀 由葉腋而分枝 夏日

開單性花雌雄異株此植物含有毒成分往時常充收斂藥用

治下劑亦有製發汗劑及止汗劑

者

傷寒頭痛
溫瘡發表
出汗消赤
黑斑毒



效用 本草經莖苦溫無毒主治


中風傷寒頭痛溫瘡發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥

堅積聚 別錄治五臟邪氣緩急風脅痛乳癰疾止好睡通膀理解肌膚邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛

松杉科

柏

檜屬有數種松葉柏身者櫟也柏葉松身者檜也松檜相半者檜柏也並幹聳立高達一二丈葉互生為披針形主脈尖端有刺故名刺柏花小單性花後結成球果肉質如球形木材



堅硬供建築器具之料

效用 實甘平、無毒、本草經主治驚悸、益氣、除風濕、安五臟。久服令人潤澤、美色、耳目聰明、不飢、不老、輕身延年。

葉微苦溫、無毒、別錄主治吐血、衄血、痢血、崩中、赤白、輕身。

益氣、令人耐寒暑、去濕、禪、生肌、東陽市醫以治水霍亂。法以青木香泡

湯先飲之、後即以柏實與蜀羊泉葉煎服、良效

松 松屬、自生於山野、多年生喬木、高達五六丈、莖徑有二三尺者、外皮甚厚、破裂甚深、狀若龍鱗、葉狀叢生、基脚有褐色膜鞘、春月開單性花、雌雄同株、花被缺如、雄花有雄蕊一本、成葢

癰疽惡瘻
風濕瘡



美狀雌花被有鱗苞排列若球形由鱗片狀之雌蕊而成其下部各裸出二個之胚珠

效用

本草經松脂味苦溫主治癰疽惡瘻頭瘡白禿疥瘻風氣安五臟久服輕身不老延年

別錄松葉味苦溫主治風濕瘡生毛髮安五臟守中不飢延年松節溫主治百節久風虛痺疼痛松花甘溫無毒時珍主治潤心肺益氣除風止血亦可釀酒木皮主治癰疽瘡口不合生肌止血治白禿杖瘡湯火瘡

杉 杉屬自生於山野中或栽培為觀賞常綠喬木高達數十尺葉小如針狀畧向上彎曲夏月開單性花雌雄同株花後

治腫瘡
大灼傷
無痛



結球果、大如指頭、果鱗尖裂、邊材白色、心材淡赤色、其中有呈暗黑色者、木理通直、堅軟得宜可供建築及器具之用。

效用

杉材、辛微溫無毒、別疎

皮、時珍主治金瘡出血、及湯火

傷灼、取老杉樹皮燒存性研傅之、或入雞子清調傅、一二日愈。
子、時珍主治疝氣痛、一歲一粒燒研酒服。

榧、榧屬、生於山地、或栽培於庭園間、常綠喬木、莖高數十尺、葉濃綠色、線形而扁平、其前端甚尖、銳硬如針、互生、成二縱列、春夏開單性花、雌雄異株、種子如核果狀、秋末成熟、橢圓形、長八九分、淡褐色、外部有多脂之肉、收其核、浸以灰汁、酒以水曝。

乾財藏核有尖長者有橢圓者
仁可生食焙食尤香

治五痔去
三蟲療寸白蟲



骨行營衛明目輕身令人能食多食滑腸五痔人宜之
云多食滑腸五痔人宜之

日食榧子七顆滿七日蟲皆化為水也

消穀助筋

弘景曰食之療寸白蟲

海松 松屬產於寒地常綠喬木高至數十尺有三樹脂道葉長針狀往往五葉相叢生花單性雌花與雄花同株果實大為毬果約長六七寸各鱗片間有二種子長五分許種子供食用有脂氣甚香美又此植物供觀賞用李時珍曰海松子出遼東



白散水潤五臟不肌

別錄逐風癱

皮膚肥五臟

杜松 檉屬產於北半球溫帶
地方自生山野或植於庭園常
綠喬木莖幹直立達二三丈葉
披針形往往三片輪生夏月葉
間開花花小單性雌花與雄花

五葉一叢者莢內結子大如巴豆而有三棱一頭尖爾

效用

開寶本草味甘小溫無毒主治骨節風頭眩去死肌髮

毒

逐風癱寒氣虛羸少氣補不足潤

腰膝痛補
中益精

異株果實球形稱為毬果大如指頭肉質熟呈黑色多脂油木
材黃色而堅實脂香馥郁堪耐水濕供建築及器具之料果實
可取油或充藥品又供觀賞

效用 皮平平無毒本草經主治腰膝痛補中益精堅筋骨強
志除陰下癙濕小便餘瀝久服輕身耐老 綿茅蘇頌云作蔬
去風毒脚氣久積風冷腸痔下血亦可煎湯

粗榧 粗榧屬生於山野或栽培於庭園常綠喬木莖高二三

丈葉對生略成二縱列葉身細長而尖呈黃綠色裏面有白色
之蠟質四月間開花花小單性雄花與雌花異株種子呈核果
狀秋末成熟赤色橢圓形長七



治腹中邪氣去三蟲

八分此植物之材供器具之料種子可榨油供燈火及器械之用惟此油有毒不可食其與粗榧相異者粗榧葉柔軟種子紅熟比榧較圓是也按神農本草所稱被子即粗榧也
效能被子甘溫有毒本草經主治腹中邪氣去三蟲蛇蟄蠱毒鬼疰伏尸

金松

金松屬產於山地中常綠喬木高至數十尺葉線形輪生夏月新梢開單性花雌雄同株

果實為球果大如兒拳與松柏類之果實相似此樹枝排生而葉呈車輪狀四季供賞故栽培於庭園間其邊材雪白色心材淡黃色有一種脂氣堪耐水濕供建築及器



治腸風

具之料

效用 子治腸風

一位科

羅漢松

自生山地或栽培於庭園以供觀賞常綠喬木高達

數十尺葉互生細長如線長三寸幅

三分許先端尖小革質表面呈

綠色裏面青白色有一條中肋其

新生之葉帶黃綠色五月間開單

性花雌雄異株雄株垂下葉荑花

淡黃色雌株結果實自二部合成

下部肉質熟呈赤色上部為種子綠色其狀恰如羅漢著袈裟故名羅漢松



益心氣

效用 俗云果實食之能益心氣蓋與松柏子同功

公孫樹科

公孫樹屬

自生於山野或栽培於庭園落葉喬木

高百尺餘其幹分枝頗茂盛

葉具長柄概如扇形作二瓣

裂叢生於枝項至秋則變黃

色而脫落春月隨新葉開花

花小無瓣自短側枝之葉及

鱗片腋而生單性雌雄異株



雄花成穗狀雄蕊有二粉囊花粉如球受精時生二精蟲雌花
在長花軸之頂端生二花以上種子外有堅殼及薄皮色之圓
形如核果黃白色

溫肺益氣

定喘散止
白濁

效用

核仁甘平，治無毒，李廷飛主生食引瘤，解酒，熟食益人。

時珍云：熟食溫肺，益氣，定喘嗽，縮小便，止白濁。生食除痰，消毒，殺蟲，嚼漿塗鼻面手足去皰胞，野鵝皰，皴皺及疥癬，痘瘡，陰蟲。

蘇鐵科

蘇鐵 蘇鐵屬，栽培於庭園，以供觀賞。常綠木本，幹粗大，高至十餘尺，外面被以鱗片狀之

葉痕，棕褐色葉長大集生於

莖頂，羽狀複葉，小葉甚多，形

細而長，有光澤，質硬，夏日開

花單性，無花被，雌花與雄花異株，開雌花者，其葉較大，開

雄花者，其葉生小芽胞房，由小芽胞房生精蟲，雄花呈圓棍狀。




逆 治痢及呃

長二三尺，雌花生於莖頂，其形扁平，緣邊有裸出之胚珠，結實大如桃，外皮光而赤色，種子供食用。
效用 漢藥實驗談作通經收斂藥。民間治療蘇鉄之澱粉、治痢疾有效。又治呃逆用之。切疵黑燒蘇鉄之葉與豚脂煉合用之。

卷柏科

卷柏 屬生於山巖上，多年生常綠隱花植物，莖高四五寸至尺許，生枝甚多，葉小，呈鱗狀，畧與扁柏之葉相似，其數亦多，常有大小二種芽胞，大芽胞房含有四大苞胞，此植物當乾燥時，則枝葉卷於內面，逢濕氣則展開，故又



名返魂草頌美觀盆栽者變種其多可供賞玩

效用 辛平無毒本草經主治五臟邪氣女子陰中寒熱痛癥
癥血閉絕子久服輕身和顏色 别錄甘平微寒無毒止欬逆
治脫肛散淋結頭中風眩痙攣強陰益精令人好容顏

石松科

石松 石松屬生於山地多年生常綠隱花植物莖如蔓狀匍
匐於地上處處生根長至數尺
有許多之枝分歧為數條葉小
細長而尖如鱗片狀密生於莖
上其繁殖器生於直立之特別
枝上胞子熟時色黃白自胞子



久患風痺
脚膝痺冷

衣或用以撒布於人體之癩爛部。

效用 味苦辛溫無毒。本草拾遺主人久患風痺、脚膝疼冷、皮膚不仁、氣力衰弱。久服好顏色變白、不老。浸酒良。

玉柏

石松屬。生於深山常綠草本。莖分地上地下兩部。地下

莖匍匐地中處處抽莖出地上

而直立密枝簇生體高約二三

寸至四五寸。其莖枝皆叢生鱗片狀之小葉。宛然似杉。秋日梢頭為穗狀而生孢子囊。李時珍曰：此石松之小者也。人皆采置盆中養數年不死。呼為千年柏。

萬年松



效用 別錄酸溫無毒。主治輕身益氣止渴。

益氣止渴


木賊科

木賊

木賊屬，自生於山野中，多年生草本，常綠，隱花植物形

狀與閭荆相似，高至二尺許。

其地上莖叢生，綠色中空，如管狀，有明瞭之節，不生枝葉。



小葉為鱗形，節節有之，成鞘狀，初夏出繁殖器，如筆頭狀。

生於莖頂，莖表多含矽質，堅韌糙澀，可擦木材及骨角等。

效用 嘉祐本草味甘微苦，無毒，主治目疾，退翳膜，又消積塊，益肝膽，明目，療腸風，止痢，及婦人月水不斷，得牛角鰐麝香，治休息痢，歷久不瘥，得禹餘糧，當歸，芎藭，療崩中赤白，得槐鵝桑耳，腸風下血，服之效。又與槐子枳實相宜，主治痔疾出血。

薇科

薇

薇屬生於山野中、多年生草本、葉高三四尺、無地上葉

自地下莖叢出有二種、一綠

色、二回羽狀複葉由長卵形

之小葉合成、一褐色由細長

小葉而成、其子囊群着生於

葉之狀態與他羊齒類微異、

因此而有實葉裸葉之分子、

囊群中之孢子囊所生孢子、至成熟則落地萌發而為扁平體、此扁平體呈紐狀與他之葉狀扁平體不同、其中央有縱走之中肋樣組織、蓋由數細胞而成者也。

效用 味甘寒無毒陳藏器曰、久食不飢調中利大小腸

海金砂科

海金砂

海金砂屬生於山野灌木林中之多年生隱花植物。

莖細長如絲纏繞於他物上。

複葉互生自分裂之小葉而

成小葉裏面生子囊子囊之

一端具彈性環略如帽狀熟

為黃褐色散砂狀之細子即

海金砂之供藥用者也

效用 甘寒無毒李時珍曰治濕熱腫滿小便熱淋膏淋血淋

石淋莖痛解毒氣故今之醫者為小腸膀胱血分之藥



小腸膀胱
血分之藥

瓦韋科

瓦韋

別名

瓦韋屬叢生於老樹之莖幹或山石上草本無地

上莖葉自地下莖叢生長二三寸乃至六七寸寬四五分乃至

八九分其裏面屆時着生褐色斑點如骨牌點此斑點由無數孢子

囊集成成熟自內散出孢子於

地遇適當時期萌發為綠色之

扁平體其下面着生多數細根并雌雄兩生殖器雌器生精蟲雌器生卵球精蟲入雌器內與卵球結合而行受胎作用其結果遂生通常之瓦草體

效用 植物名實圖考王治跌打損傷酒煎服


水龍骨科

跌打損傷

貫衆 貫衆屬生於山林之陰地或園圃舍傍均有之葉自地下莖叢生長一尺至二尺許為一回羽狀複葉小葉為廣披針



止鼻血斑
瘡毒癰瘍
骨硬結瘻
治瘧瘧



形互生於中軸之上葉之背面排列不規則之圓形子囊群。

效用

根地下苦

微寒有毒

本

草經主治腹中邪熱氣諸毒殺

三蟲

蘇頌云為末服一錢止

鼻血有效

時珍治下血崩

帶下產後血氣脹痛

斑瘡毒漆

毒骨哽解豬病

又曰諸書皆

以治血而俗以祛疫浸之井缸中飲其水不患時氣頗有驗方

中有治痘瘡不快快斑散用之蓋亦如血去邪之意

鳳尾草

井口邊草

蕨屬多生於山麓石砌等處常綠草本根莖生

褐色毛頗密質硬而短葉叢生長一尺許有實葉裸葉之別羽狀分裂一回或二回往往排列如雞足狀裂片線形上部漸細



裸葉緣邊有微鋸齒、尖而相
衝、略皺縮實葉在初夏時沿
葉緣而生子囊群其包被即
為葉之卷折者迨孢子散落、
遂繁殖。

經主治寒熱、惡瘡、大熱、辟鬼氣、不祥。植物名實圖考、治五林
止小便痛。

鵝掌金星草 水龍骨屬、生於岩石之常綠植物、根莖橫臥、有
赭褐之毛茸、葉生於其上、長一尺許、分裂三叉、如鵝掌、故名、亦
有不分裂而為單葉者、子囊群著生於葉背、排列如星點、色如
金、故又得金星草之名、各子囊群由多數孢子囊合成、孢膜或

治五淋白濁
濁背發癰
瘡

存或缺



效用 植物名實圖考味甘寒

無毒治五淋白濁又色敷無名

火瘡神效又熨臍治陰寒 嘉


祐本草金星草治發背癰瘡結

核解硫黃丹石毒連根半斤酒

五升銀器煎服先服石藥悉下亦可作末冷水服方寸匕塗瘡
腫殊效浸油塗頭大生頭髮

蕨 蕨屬生於山野中多年生草本地下莖橫臥於土中隨處
生葉葉柄長而葉身大為數回羽狀複葉長三四尺小葉有缺
刻初夏葉之下面緣邊生子囊群此植物嫩葉作旋渦狀可作
食品莖可採小粉

利水道敷
蛇蠍傷



效用 地下莖甘寒滑無毒。

陳藏器主去暴熱利水道令人睡。孟說曰燒灰油調敷

蛇蠍傷

烏韭

骨碎補屬多生於山

麓之向陽乾地常綠草本根
莖堅硬橫臥地下自此生葉葉柄
堅硬而滑澤呈柱狀葉身稍帶革
質較長葉柄全體為橢圓形裂片
細披針狀畧呈四回羽狀複葉其
中軸瘦長於葉身前面稍扁平
而有淺溝路至生殖時期則細裂

片之末端，有一二細小子囊群。其孢膜畧呈半圓形，前方廣開。

效用

甘寒無毒。本草經主治皮膚往來寒熱，利小腸膀胱氣。

別錄療黃疸、金瘡、內塞、補中益氣。

石韋

石韋屬生於山地常綠草本。根莖橫臥地中，具茶褐色

之鱗片。葉生於根莖葉柄長三

四寸至七八寸。葉身為長披針

形，長短不一。其質極厚，無分裂

者。表面暗綠色，裏面密布淡褐

色或濃褐色之粉狀物。至成熟



期裏面密布粉粒之子囊群，裂開而散出孢子。裁於盆中，可供

賞玩。

氣熱欬嗽
小便淋痛

效用

苦平無毒。本草經主治勞熱邪氣、五癰閉不通利小便。

水道

聖齊錄氣熱欬嗽石韋檳榔等分為末。薑湯服二錢。又

治小便淋痛

石韋滑石等分為末。每飲服刀圭最駿。

狗脊

名見神農本草。列為中品。今山野處處有之。蘇頌曰。苗

尖細碎青色高一尺以上無


花其葉似貫眾而細其根

黑色長三四寸多歧如狗之

脊骨故名大有兩指許其肉

青綠色春秋採根曝乾

效用 本草經味苦平主治



腰背強風
邪淋露

腰背強、關機緩急、周痺寒濕膝痛、頗利老人。一名百枝。別錄甘微溫無毒。療失溺不節。男子脚弱腰痛風邪。淋露少氣目闇。


堅脊利腰仰女子傷中關節重

水龍骨

水龍骨屬生於山地多年生草本莖匍匐於地中葉

柄長自地下莖而生葉身為分裂葉如一回羽狀者然各裂片狹長其緣邊有鋸齒狀之鈍鋸齒

乾燥則葉柄之下部卷縮時期至葉之下面生子囊群形圓而



相集為觀賞之用

效用 植物名實圖考主治腰痛酒煎服

骨碎補

一名胡
獮薹

陳藏器曰骨碎補本名獮薹開元皇帝以其

傷折補骨碎故命此名蘇頌曰今淮浙陝西夔路州郡皆有之生於木或石上多在背陰處引根成條上有黃赤色及短葉附

破血止血
風血疼痛
耳鳴腎虛



之又抽大葉成枝葉面青綠色有青黃點背青白色有赤紫點

春生葉至冬乾黃無花果采根

入藥時珍曰其根扁長畧如薑形其葉有極缺頗似貫眾葉

效用 開寶本草根苦溫無毒

主治破血止血補傷折 脊罐

主治骨中惡氣風血疼痛五勞六極足手不收上熱下冷時

珍云研末猪腎夾煨空心食治耳鳴及腎虛久泄牙痛附耳

鳴耳塞骨碎補削作細條燒乘熱塞之

風蟲牙痛骨碎補乳香等分為末糊丸寒孔中名金針丸

風失血胡蘿蔔燒存性用酒或米飲服

髮癬蕷蘿子水

石長生 石長生屬叢生於深山幽谷之懸崖上四時不凋草本春季新葉帶有紅色頗多雅趣根莖密生毛茸黑褐色葉長

尺許一株生數葉全部卵狀披針形葉柄帶紫褐色有光澤細

長而實硬葉身在羽狀分歧之

枝柄上排列許多小葉小葉倒

心臟形略與公孫樹之葉相似

每小葉往往附一子囊群其苞

膜自葉頂反折於裏面呈褐色

此植物供觀賞用有栽培於盆中者

效用 本草經味鹹微寒有毒主治寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不

祥甄權云治疥癬逐諸風治百邪魅

治惡瘡疥
癬



螺虧草 螺虧草屬根莖為絲狀而匍匐時有長達數尺者莖面有鱗片狀之暗褐色毛且諸處發根葉有實葉裸葉之別裸葉通常為卵圓形而其數多實葉狹長而其數少葉質皆厚表

面滑澤陳藏器曰蔓生石上葉狀似螺虯微帶赤色而光如鏡

此螺虯與鏡面之所由名也

癰腫風疹
脚氣腫

蛇纏惡瘡



草入益梓
蠟敷之妙

瓶爾小草科

陰地蕨 陰地蕨屬生於山野宿根草本高五六寸葉數回羽狀分裂呈黃綠色每一葉則抽一穗着生多數之子囊群一名花蕨蘇頌曰生鄧州順陽縣內鄉山谷葉似青蒿莖青紫色花

衄血齒痛附小兒頭痛
螺粉日乾為末和輕麻油傳之立效蛇纏惡瘡

腫毒風熱
吐血

作穗微黃根似細辛七月採用
時珍曰江浙亦有之



土馬驥科

效用 根苗甘苦微寒無毒蘇頌
主治腫毒風熱聖濟總錄治男
婦後胸膈虛熱吐血

土馬驥

土馬驥屬種類甚多生於山地性喜陰濕為常綠隱



花植物多年生草本高至四
五寸莖細長而直立葉小披
針形常密生與杉葉相類似
子囊方形有長柄生於莖頂
其包被子囊之笠略如白色


治骨熱
煩熱毒症
鼻衄

密生長毛，謂之蘚帽。孢子綠色，囊體橫斷面呈多角形。

效用 植物名實圖考。生於牆頭者，性能敗毒。嘉祐本草治骨熱敗煩毒，壅衄鼻。

松蘿科

松蘿屬，產於深山普通草本，常自樹梢懸垂，全體絲狀。



作淡黃綠色，分歧為多數枝條，往往長尺餘。其老成部之表面，有多數輪狀裂紋為之區別。與此種形態相似之種類甚多。一名女蘿，或名松上寄生。

效用 味苦甘平無毒。本草經主治嗔怒邪氣，止虛汗、頭風。女

子陰腫
瘡
漏
瘻
熱溫

子陰腫痛。別錄療瘧熱、溫瘧可為吐湯利水道。

葉狀地衣科

地衣

由菌類、藻類二種植物相互構成。菌類中以囊子菌為



多擔子菌亦間有之。藻則分裂藻
或綠藻。蓋菌絲捕獲藻類，貫穿其
細胞膜而入於原形質內，以構成

地衣。於是藻類之葉綠體攝取空

中之炭酸氣，造成有機物，將一部分供給於菌，而菌廣布細絲，吸收水分，並溶解水中之無機類，以一部分還之於藻，二者互

相為命，共營生活，故曰共生。

效用

植物名實圖考治中暑、陰瘧。雀盲又主馬反花瘡、生油

調敷

日子草、冷微毒。治卒心痛、中惡。以人垢賦為丸，服七粒。

石藥

王隱晉書云、石鴻生石之陰、如屋脊、垣衣之類、得雨即

展、故名石鴻、早春青翠、端開四葉、

山人名石介、李時珍曰、此物惟諸



高山石上者為良、今人謂之蒙頂

茶、生兗州蒙巖上、乃煙露熏染、日

取曝乾、餽人、謂之雲茶、

效用

味甘溫、無毒、別錄主明目、益精氣、令人不飢渴、輕身、延

年、時珍主生津潤咽、解熱、化疾、

菌類

竹蓀

名見食療本草、又有『竹肉』、『竹荪』、『竹蕈』等名、李時珍

曰、草更生曰蓀、得溼氣而成也、陳藏器本草作竹肉、因其

生津潤咽
解熱化疾

味也。孟說曰：慈竹林夏月逢雨滴汁着地，生幕似鹿角，白色，可食。陳藏器曰：竹肉生苦竹枝上，如雞子，如肉鬚，有大毒。李時珍曰：此即竹荪也。生朽竹節根上，狀如木耳，紅色，段成式如白樹雞，即此物也。惟苦竹生者有毒耳。

效用

味甘、鹹、寒、無毒。孟說主治一切赤白痢，和薑醬食之。

陳藏器曰：苦竹肉灰汁鍊過食，殺三蟲，邪毒氣破老血。

真正擔子菌科

木耳 木耳族，寄生於死物，如接骨木與桑等之莖上，及山中諸木之朽處。菌絲體生長後，則生實體，茶褐色，膠質，耳狀，大二三寸，其外面有毛，如剪絨。其芽胞由擔子柄為一列之四個細



酉陽雜俎云：江淮有竹肉，大如彈丸，味酉陽雜俎云：江淮有竹肉，大如彈丸，味



胞所成、各細胞之旁生小柄
上生一芽胞、即第一類之擔
子柄、與他族異。

效用 味甘平、有小毒、本草
經、主治益氣不飢、輕身強志、

時珍云、斷續治癒。

石耳科

石耳 石耳屬、生於深山之岩
石上、多年生隱花植物、呈扁平
狀、下面黑色、生小突起、其數甚
多、中央有短柄、附着於岩石上、
上面頗平滑、灰白色、乾而貯藏

明目益精

脫肛

之供食用。

效用

味甘平、無毒。吳瑞主治久食、益色、至老不改。令人不飢。

大小便少、時珍云：明目益精、附脫肛

石耳五兩、炒白桔梗一
兩、桑螵蛸半兩、為末、蒸

餅丸、本缺下二十丸。

地耳

石耳屬自生於地上、色褐綠、狀如木耳、春夏之際發生、

潮濕之地甚多、貧民乘其雨中


或雨後採之、以供食用、見日即

乾燥、不堪食也。

效用 味甘寒、無毒。別錄主治

明目益氣、令人有子。

塵菌科



明日益氣

馬勃

秋月生於山林之陰地、為小球狀長則大如人頭、其色

清肺治喉
瘡并癰瘍
馬疥

治惡瘡、馬疥、

芝梗科




暗褐，其質如綿，中含無數孢子，熟則乾燥，自頂端孔中飛散，褐色之粉採之可為止血藥。

效用 植物名實圖考為清肺治喉痛要藥。別錄味辛平，無毒。主

茯苓 地中菌屬，寄生於山林之松根，其形成塊球徑大五六寸，外皮黑褐而皺縮，內部白色或淡赤色，白者名白苓，赤者名赤苓，掘地採之，陰乾備用。今以滇產為上，歲貢僅二枚，重二十餘斤，皮潤細，作水波紋，極堅實，他處皆以松截斷埋於山中，經三載不腐，而茯苓成皮粗而質鬆，用之無力，然我浙所產者，名

浙考亦道地品也

胸脅逆氣
膈中痰水



效用 本草經味甘平、主胸脅逆氣、憂恚驚邪、恐慄心下結痛、寒熱煩滿、欬逆、口焦舌乾利小便、久服安魂養神、不飢延年。別錄無毒、止消渴、好睡、大腹淋瀝、膈中痰水、水腫、淋結、開胸腑、調臟氣、伐腎邪長陰、益氣力、保神守中。其有抱根者、名茯神、主治不祥、療風眩、風虛。

五勞口乾、止驚悸、多恚怒、善忘、開心益智、安魂養精神。

核菌科 肉坐菌科


冬蟲夏草
冬蟲夏草屬寄生於

之體上

藥用植物圖考 卷六

冕

保肺益腎
止血化痰



幼蟲死後，自蟲體發生有柄之子坐，古來誤認為昆蟲變成之植物，故有冬蟲夏草之名。按冬蟲夏草，冬在土中，身如老蠶，有毛能動，至夏則毛出土上，連身俱化為草，若不取，至冬復化為蟲，產雲貴及兩廣。

效用 本草從新，甘平，主保肺、益腎、止血、化痰、止勞嗽。

菌草科

松蕈 松蕈屬生於赤松之樹下，性好高燥，秋末甚盛，大者笠徑四五寸，高與笠徑畧等，有特殊之芳香，笠之裏面，生許多放射狀之襞，襞面生細微之芽胞，柄則接續於笠下面之中央，此

植物之子實體稱為松蕈，供食用，味脆而美。鮮者或煨、或煮，亦可鹽藏、糖藏、罐藏，及陰乾、煮乾而貯之者，需用甚多。



效用

菌譜云：治瀉濁不禁食之有

效。

多孔蕈科

紫芝

胡孫眼屬

寄生於枯死之樹木上，子實體自笠與柄成。夏月始生，儼如筆頭，漸次成長，其形如一柄，上着以一笠，質堅，不腐朽。笠畧似半圓形，上面帶有黑褐色光澤，環以雲紋，下面帶白色或黃褐色，粗糙，生許多細孔，柄亦光澤，若塗漆然。又有其笠重疊者，或有一柄分數枝者，此植物供觀賞用。



效用 本草經甘溫無毒主治耳聾利關節保神益精堅筋骨好顏色久服輕身不老延年時珍藥虛勞治痔

後跋

讀藥用植物圖考既竟。而曰吾國目前清變制以來興學校重實學。蓋二十年於茲矣。求其能闡發精微於科學。東放一異彩者。何其渺也。豈非貪多務得。不能專精於一之故歟。西國學子。恒有盡其畢生之力。以殫精一藝者矣。宜其物質文明日將月異。方興未艾也。同學王君文圃。治博物學有年。於植物一科。尤多所研求。因就平日經驗所得。彙成是編。俾國之耆耆。知吾儕所學之有益於用。非徒矜能眩博已也。而王君為學之專一。亦從可知焉。嗚呼。古籍草創。略而不圖。坊本射利。圖而不精。學者有志於用。非王君是書。何所考正。矧吾國藥品。大都採用植物。而醫者所用藥肆。或難徧備。則勢不能不以他藥代之。服者不察。為害滋大。手稿一編。膺真是辨。是則王君是書。其造福於

社會豈曰少補之哉

民國十有一年三月

日同學弟黃國銘敬跋