







OCT 31 1999

清涼膏

治一切瘡瘍膿去後用之

當歸

白芷

白芨

木別子

去壳

黃栢

乳香

白歛

白膠

各五錢

黃丹

淨五兩

麻油

十二兩

右入油煎黑去粗入黃丹以槐柳枝不住手攪

攪再煎成膏乃下乳香等藥

碧油膏

止痛排膿灸後用此

桑枝

柳枝

棠枝

槐枝

乳香

血竭

各五錢

黃丹

淨四兩

右用麻油十兩照常法煎成膏入乳香等藥

神效酒煎散

治一切瘡瘍其效如神

各藥

沒藥

當歸尾

各一兩

甘草

括囊

右以酒三碗煎二碗分四服粗焙乾加酒下
一兩酒糊丸桐子大每服五十丸以酒下
消毒活血

經驗方

治金石發瘡

黑鉛

甘草

各三斤

右用酒一斗置磁器內先以甘草置在一邊
將鉛熔投酒一邊取鉛再熔仍投丸度
醉寢即愈

治瘡疽用生甘草為末酒調

消前方乃清熱消毒之

石蓄毒血氣壅滯者最宜如脾胃虛血
者不宜驟用恐胃寒故也

升麻湯 肺癰胸乳間作痛嘔吐膿血腥穢

升麻 苦梗 以仁 地榆 黃芩 赤芍

丹皮 甘草 各等分水煎服

殺道前後生瘡謂之懸瘡 粉草一兩截斷以潤

水浸潤炙令透內細剉無灰酒煎服有人患此
已破服兩劑瘡即愈

崔氏云治手足甲疽或曰修甲傷肉或曰損足成
瘡潰爛上脚用汞凡置鉄板上煨色赤如金者
為真沸定取出研末以鹽湯洗搽之

薛氏云前症即脫疽也此方固有良驗尤當調元
氣為善大抵此症先醇酒炙煨膏粱厚味傷脾
或房勞虧損腎水故有先渴而後患有先患而
後渴者若色赤作痛自潰可治色黑不潰不治
色赤作痛者先用隔蒜灸活命飲托裏散再用
十全大補湯加減八味丸色黯不痛者隔蒜灸

以灸亦用十全大補湯加減八味丸
不致上侵元氣不致虧損庶可保生亦有曰修
手足口咬等傷者若元氣怯弱或犯勞事外塗
寒涼內服剋伐損傷脾胃患處不潰色黯上延
亦多致死重者須解去當以脚力轉解周髀輕
拽使筋隨骨出而毒得洩否則毒筋內斷仍上
潰雖云無益且偏僻之處氣血罕到藥難導達
况攻毒之劑先傷脾胃反損元氣不若灸法為
良重者須解毒為善故孫真人云在肉則刺在

指則截雖親之遺躰不忍毀傷然不如是則勢必至于夭歿非体親之心也况患處已壞雖解不痛又何憚而不為乎女子亦有此患多因鬱怒虧損肝脾所致治法與前同

疔瘡

多生四肢發黃瘡中或紫黑
痒后痛先寒后熱也

夫疔瘡者皆臟腑積受熱毒邪氣相搏於經絡之間以致血凝滯注于毛孔手足頭面各隨五臟部分而發也其形如粟米或疼或痒以致遍身麻木頭眩寒熱時生嘔逆甚則四肢沉重心驚眼花盖疔腫初發時突起如疔盖故謂

蓄毒氣突出寸許痛痒異常一二日間害人甚速是尤在癰疽之上也內經以白疔發于右鼻赤疔發於舌根黃疔發于口唇黑疔發于耳前青疔發於目下盖取五色之應五臟各有所屬部位而已然或肩或腰或足發無定處如在手足頭面及骨節間者最急其餘猶可緩也凡疔瘡皆宜刺瘡中心至痛處又刺四邊十餘刺令惡血出乃敷藥力方得入于針孔中則佳若

不刺破藥力不能入又看口中頰邊舌上有赤
黑如珠子者是也諸疔名目雖多其治法畧同
初起宜以針刺出毒血將蟾酥丸或迴疔錠子
之類從針孔維入之上用膏藥貼之仍服飛龍
奪命丹發汗及五香連翹漏芦湯之類并清心
之劑蓋諸瘡皆屬心火心清則毒氣消散而易
愈矣

追毒丹 取黃去疔頭追膿毒立効

蟾酥

用酒化

蜈蚣

酒炙

硃砂

白丁香

各一錢無此味加巴豆

雄黃

錢二

輕粉

錢一

硃砂

為衣錢二

巴豆

不去油

右為末用酒打糊為丸麥子大兩頭尖入於針
破口內用水沉膏貼之後用膏藥及生肌藥追
出膿血毒物又有如黑陷漏瘡者四圍死敗肉
不去不生肌者不可治也亦用此藥追毒去死
肌敗肉生新肉愈矣小者用一粒大者加用之
病輕者不必用針只以手指甲爬動於瘡頂上
安此藥水沉膏貼之其瘡即時紅腫為度去其
敗肉為妙用之神驗

水沉膏 將白芨末放在盞內用水沉下去用帛
貼之如用膏不可用生肌藥 凡用粘点之藥
用此膏圍貼則不傷好肉

追疔奪命丹 能立取効驗使腫內消

羌活 獨活 青皮君 防風君 黃連 赤芍

細辛 甘草節 蟬退 姜蚕 金線重樓

澤蘭 金銀花各等分

有膿加 何首烏 白芷 要通利加 青木香

黃 梔子 牽牛 毒在下加 木瓜各等分

右每服五錢先將一貼加澤蘭金銀花各一兩
生姜十片同藥搗爛好酒釀之熱服不善酒者
水煎仍以酒水各一盞半生姜十片煎至熱服
之汗出為度病退再加大黃二錢煎熱取利一
兩次去餘毒為妙

此方以藥味觀之甚若不切然効速如神方不
失一百發百中如有別証再出宜隨加減治之
若心煩嘔吐加 甘草節錢一 藜蘆粉錢一 酸漿
水下 嘔逆惡心加乳香荳蔻粉甘草湯下

飛龍奪命丹 治疔瘡發背腦疽乳癰附骨疽一

切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便

痛已成者服之立愈此乃惡症藥中至寶病危

者服之立安萬無失一係神人之秘方不可輕

忽 血竭錢一 蟾酥乾者二錢酒化 乳香 沒藥

銅汞 硃砂為衣各錢二 雄黃錢三 輕粉五分 膽礬

寒水石錢各一 射香 冰片各五分 海羊二十一条即蝸牛

蜈蚣去一條酒炙 右為末先將海羊連壳研如泥

和前藥為丸荒荳大或加酒打麵糊每服二丸

先用葱白三寸爛嚼吐于手心男左女右將藥

包在葱內無灰酒三四盞送下避風處被蓋出

汗約人行五里許再以熱酒數盃催之以汗出

為度

服前藥二丸即消如汗不出重者再服二丸汗出

即効三五日重者再進二丸即愈 如疔走黃

過心者難治汗出冷者亦死 如病人不能嚼

葱搗碎裹藥以熱酒吞下 服此藥後忌服冷

水冷物黃瓜茄子猪魚鷄鴨羊濕麵一切發毒

動風之物不可食之及月婦狐臭人見之此藥
活人萬：誠外科匙鑰

拔黃藥 用真取蟾酥飛羅麵為丸梧子大可將
一丸放在面前舌下即時黃出

百二散 又名護心散 治發疔煩躁手足不住發狂者

急宜服之 方在瘡疽門

蟾酥膏 治疔 新蟾酥以白麵黃丹搜作劑圓
如麥顆大用指甲爬動瘡上插入重者針破瘡
頭用一粒內之仍以水沉膏貼

射香子 治疔瘡大妙 草烏頭 一兩 蟾酥

巴豆 七箇 去皮 射香 一字 右為細末麵糊和就捏

錠子如有惡瘡透疔不痛無血者用針深刺至
痛處有血出以此推之上用膏貼疔瘡四畔推
之其疔二三日自然拔出此藥最宜緊用 此

証大抵與傷寒頗類其中亦有可針鎌砭射出
血者亦有久而敗爛出膿者其間變異百端不
可不慎也

內托連翹散 疔瘡出時皮色不變不疼痛按

不動身發寒熱便是此瘡有水疔魚臍疔紫莖
疔火疔諸般疔瘡如瘡黃于黃上用針刺仍服
內托散自然消散 連翹 生地 白芷

赤芍 各一兩 大黃 山梔 去頂 薄荷 各七錢 朴硝 二兩

黃芩 五錢 甘草 一兩 每服一兩灯心竹葉各

十莖水煎照其人喘加人參少許大病只三四

服愈如服下心煩嘔者以護心散止之

護心散 甘草 五錢 菴葶粉 一兩 為末分作二服

酸薑水下

治疔走黃不止 川婦 煎藥

山梔仁 牽牛 各二兩半 連翹 牡蛎 金銀花

紫花地丁 各一兩半 京三稜 甘草 各二兩 大黃

右為末煉蜜丸彈子大每服一九童便化開服

忌飲酒及生冷

治疔走了黃打滾將死者 牡蛎 大黃 木

山梔子 金銀花 連翹 牛旁子 地骨皮

乳香 沒藥 括萎 皂角刺 每服五錢壯

實者加朴硝用水一盞酒半盞煎服 此乃救

命仙方也

鐵粉散 治冷疔瘡經久不効用此大妙

多年生鐵炒過三錢 松脂錢一 黃丹 輕粉各五分

射香分一 右為細末清油調塗瘡口立効

走馬赴筵丹 治疔瘡 沒藥 乳香 蓬砂

礪砂 雄黃 輕粉各三錢 冰片分一 射香分一

右為細末蟾酥汁和為丸黃米大每服一九溫

酒送下立効

取疔瘡 道人頭微炒一兩 礪砂三錢

雄黃錢三 蟾酥以多為妙 右將瘡四圍刺破以少

油調藥末置於瘡內緋帛封之數日疔自出

蒼耳散 治一切疔腫神効

蒼耳草根莖苗子但取一色便可用燒存性研

細末用好米醋米泔澄淀和如坭隨瘡大小塗

上厚二分乾即易之不過十度即拔根出須針

破塗之加雄黃尤妙

蒼耳與白盞研爛貼疔上拔去根 毒氣入腹嘔

吐者搗蒼耳汁飲之立効

治疔最有效用蟬退僵蚕為末醋調塗四圍疔瘡口俟根出稍長然後拔去再用藥塗 海藏方
單用姜蚕為末津調塗亦佳

治疔危篤者二服即愈輕者一服立効

土蜂房

一小窠全此物能利大小便

蛇蛻

一條全

用瓦器盛

鹽坭固濟火煨存性研為細末每服一錢空心好酒調下少頃腹中大痛、止其瘡已化黃水矣仍服后方

五聖散

大黃

一兩

生姜

皂角刺

金銀花

各二兩

瓜蒌

一兩

甘草

一兩

用好酒二升煎八分不

時服

治疔瘡最驗

蒼耳

臭牡丹

各一大握搗爛

新汲水調服瀉下黑水即愈 單用蒼耳葉搗汁和童便服一日三次立効

肘後方

疔腫垂死者一服立効

菊花葉

紫莖者

一握搗取汁一升入口即活此神驗

根莖葉花皆可用

蒼耳散

治疔瘡累用神効

蒼耳根

三兩五錢

烏梅五箇帶鬚葱三根用酒二鍾煎至一鍾熟

服出汗後不散然後用勝金散

勝金散 取鐵屑炒為末每服四錢或三五六錢

用薺水滾過停冷調服不吐為佳

反花瘡 瘡有努肉凸出者是也

聖惠方治諸瘡努肉如蛇頭出數寸者硫黃末敷

之即縮

肘後方 治瘡有肉突出烏蠶燒灰敷立消

又方 白蠶肉杵細入蜜捏成餅貼之妙

又方 馬齒莧燒灰研末猪脂調敷

瘡突出寸許根如小莖或大如梅者用花腳蜘蛛

絲纏其根則漸乾而自脫落

又方 甘草 半生半炒 枯凡 人中白 密佗僧 分

右為細末以童便半盞用無灰酒和熬竹篾攪

成膏塗瘡上日三五次

經驗方 胆脂丕 貝母 各三錢 胡粉 二錢 白礬砂

沒藥 各二錢 為末先用溫漿水洗後服藥

雜瘡

諸惡瘡入心腹嘔逆藥食不下 菘荳粉 兩半

各等分煎湯溫洗

治漏瘡不收口 五倍子末 血竭末填塞之効

治一切瘡癩花散 葵花 梔子 黃連 黃柏

各等分 為末冷水調貼痛處

百合散 治頤頰瘡一名獨骨瘡 百合 黃柏

各一兩 白芨 二錢 草麻子 五十粒 為末朴硝水和餅

貼日三五次

面上耳邊生浸淫瘡久不愈出黃水 名香辨瘡

殺羊鬚 荆芥 乾棗 去核各二錢

俱燒存性研末入膩粉半錢每用少許清油調

搽先以溫湯淨洗拭乾塗藥二三次効

亦治大人小兒兩脰生瘡

附子散 治冷瘡日夜發歇疼痛 附子 半兩炮去皮

川椒 去目 雄黃 研末各二錢半 枯凡 七錢半

右為末麻油調敷瘡上日二次

白蒺藜散 熱毒瘡癢痒心神壅躁 白蘚皮

白蒺藜 炒去刺 防風 去芦 川大黃 炒 赤芍藥

梔子 麥冬 条芩 玄參 桔梗 前胡

炙甘草各一兩 為末每服二錢食後薄苛湯調服

七寶散 熱汗浸漬成瘡痒痛不止

黃耆 川歸 防風 荆芥穗 地骨皮

木通各二兩 明礬一兩 每用一兩水煎五六沸去

粗稍執滌淋患處拭乾避風 東垣此方曾治

推車客皮膚皴裂不仁痛兩手不能執轆足不

能履地日製此藥與之即効明日遂行自是屢

用屢効

玉女英 治瘡痒痛 滑石五分 菜菔粉微炒

右末之用綿包撲上妙 一方加棗葉一兩

連翹飲 治諸惡瘡紅赤痛痒心煩口乾及婦人

血風赤斑圓點開爛成瘡痒痛流黃水

連翹 生地 川歸 括萎根 荆芥 黃芩

赤芍 麥冬 瞿麥 木通 大力子炒 防風

山梔 川芎 甘草各等分 每服五六錢水煎

加灯心二十莖不拘時服

紫花地丁散 諸惡毒瘡腫痛如神

川歸 紫花地丁 大黃 赤芍藥 金銀花

黃耆各半兩 甘草根錢二 每服一兩水酒各一碗煎

水銀膏 月蝕瘡多在兩耳及竅邊隨月盈虛

水銀半二錢 黃連末 胡粉 松脂各半兩 猪脂四兩

右先熬猪脂令沸入松脂諸藥及水銀攪令勻

磁器收先以鹽湯洗淨塗上日三五度

治甲疽瘡 綠礬燒赤五錢 盧會一錢半

射香二分半 俱為末以絹袋盛包患指扎定以差

為度

漆瘡 生鱗取黃塗之効

又方 湯浸芒硝冷洗之効 明礬湯洗亦妙

又方 生紫蘇擦之累効 又人乳汁敷之好

又方 乾荷葉一斤水一斗煮濃汁洗瘡上日三瘡

又方 無名異末水調服

代指 手指甲頭腫痛

烏查肉并仁 研爛醋調稀入指浸之愈

升麻和氣飲 治瘡腫癩疥痒痛

升麻 桔梗 蒼朮 乾葛 甘草 大黃各

錢一 陳皮錢二 當歸 半夏 茯苓 白芷 乾姜

只壳各五分 白芍半一錢 右作一服水煎服

當歸飲子 治瘡痒疥癬湿毒風燥

當歸 川芎 防風 白芍 生地 茯苓

荆芥各半錢 何首烏 黃耆 甘草各一錢 右作

一帖水煎食遠服為末亦可

除濕散 大治一切風毒疥癬癩痒狀如癩風

苦參 何首烏 荆芥穗 蔓荊子 薄荷各一兩

白芷 烏蛇酒浸一宿焙乾 天麻 川芎 防風各半兩

右為末每服三錢酒調下日進三次六日一浴

令汗出血氣宣通一月膚澤如故

一掃散 一切瘡疥但相對而生者便是不問乾

濕痒痛日近年深用之立効

藜芦皮二兩 雄黃五錢 輕粉十帖 蚌粉

水粉各一兩 為末用大鯽魚一對入麻油煎熟

去魚攤冷調藥搽瘡 若効遲加信末少許研

杏仁十粒近陰處勿加

消毒飲丹溪云消毒散氣表藥也 防風一兩 甘草二兩

荆芥穗三兩 大力子四兩 每服五錢水煎服

治皮膚風熱遍身生癢疹 大力子 浮萍等分
為末薄苛湯調下二錢日再

東垣云 每風瘡大風病相似好葉葉洗蒸一宿
日乾為末白湯調服一錢

姜蚕散 治風遍身癢疹痛疼成瘡

白姜蚕 洗焙 為末每服一錢酒調服一日三

次立瘥

衍義方 有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連
腦脛臍腹及近陰處皆然涎痰多夜不得卧

苦參末一兩皂角二兩水一大升揉取

器熬成膏和苦參為丸如梧桐子大每

丸溫水吞次日便愈

小兒面瘡通面爛無完膚膿水流漓百藥不効

年為猪脂不入鹽者敷之若神

治諸般瘡疥加減法 腫多加白芷開鬱 痛

加白芷方解石 痒多加枯凡 陰囊瘡加吳

茱萸溫多香油調 乾痒出血加大黃、連猪

脂調 虫多加蕪荑錫灰旗即藜芦斑猫

色加黃丹 青色加青黛在上加通聖散 在下部多用瀘川丸下之 腳腫多出血加血分 濕熱藥

膿胞瘡 治熱為主帶燥濕 黃芩 黃連

大黃 各三錢 蛇床子 寒水石 二錢 黃丹 五分

白礬 一錢 輕粉 白芷 無名異 各少許 木香 魁

痛之 加 為細末麻油調搽

魚瘡如癬狀退熱殺虫為主 乾疥瘡開鬱為主

加吳茱萸 蕪荑 黑狗脊 殺虫 樟腦 一

松栢 頭上多 白礬 雄黃 硫黃 水銀 後

黃連 方解石 分 蛇床子 疔疥 殺虫 松皮灰 膿

及柏油調搽 濕多加之

疥癩瘡春天發佳疥開鬱為主不宜抓破

枯凡 吳茱萸 各二錢 樟腦 五分 輕粉 十

寒水石 半二錢 蛇床子 二錢 黃栢 大黃 各

硫黃 一錢 檳榔 一錢 右為末猪脂調搽

治癩疥濕瘡浸淫日久痒不可忍搔之黃水出瘡 后復發取羊蹄根去皮細切熬熟以大酢和先

洗淨傳上一時再以冷水洗之日一傳瘡若為末傳尤妙

外臺秘要治疥取羊蹄根和猪脂塗上或着鹽水許即結痂愈

千金翼 治遍身風痒生瘡疥茵陳煎濃洗立効衍義云有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚至頸而止粘着衣被晝夕不得睡痛不可忍以菖蒲三斗剉日乾之為末布席上使恣卧其間仍以衣被覆之既不粘衣被又復得睡不五

七日其瘡如失應手神驗

浸淫瘡痛不可忍者發寒熱大薊末水敷瘡上乾則易之

外臺秘要 治卒發疥秘驗方 風化石灰和醋

漿水調塗隨手即減 一法用石灰炒紅出火

氣香油調敷 千金方淋石灰汁洗之

木香散 一切惡瘡多時不斂此能生肌肉止痛

木香 煨即 黃連各一兩 白芷三錢 為末先

洗每日一次乾搽有水山勿訝未効再搽 又

方加地骨皮先于瘡上用温漿水洗湿拭乾上藥妙不可言槩治下疳瘡如神

洗諸瘡疥 取冬瓜藤或皮煎湯洗妙

治風癩瘡黃水瘡此方神効

用新竹筒十箇內裝黑豆一層頭髮一層數層至滿以稻糠皮火煨之於火盆內週圍同火煨竹筒內汁滴出以盞接之搗翎蘸掃於瘡上數日即愈

神仙活命飲 治一切惡瘡癰疽腫毒

川山甲 蛤粉炒黃 色淨六分

貝母 去心 八分

甘草節 去

防風 去 又 五分

沒藥 六分

赤芍藥 六分

白芷 五分

當歸尾 錢一

乳香 錢一

天花粉 八分

金銀花 錢一

陳皮 錢三

右作一服用無灰酒一大碗慢火煎

令出氣量上下食前後服如患人能飲酒者服

藥後隨意飲三兩杯為妙詩曰

真人妙訣世間稀 一切瘡疽總可醫

消腫如同湯沃雪 化膿立見肉生肌

消毒散 治一切惡瘡赤腫疼痛掃之如神

黃連

錢五

地骨皮

兩一

朴硝

兩三

右為末每用三五分水一盞煎至七分去渣停冷用鷄翎掃之立効

婦人陰瘡

仲景云少陰脉滑而數者陰中即生瘡狼牙湯洗之狼牙二兩水濃煎以綿纏筋頭浸湯瀝洗陰中一日三度

治陰蝕瘡

洗搨散

甘草

乾漆

黃芩

地黃

當歸

芍藥

龜甲

右細切以水七升煮取

一半去紅以綿帛納湯中用搨瘡處良久即易日二度每搨湯可作十里許即挹乾捻取甘濕散薄敷瘡上使徧可經半日又以湯搨之訖如前敷藥 有一婢此疾蝕處作兩瘡深半寸用此湯并浚甘濕散不經七日平復甚効

甘濕散

蜈蚣

青木香

硫黃

鉄精

射香

臨時加入綠射碎蛇盡若入早則蛇胆無力也

右等分為末每

取一錢并花水調日再服先令便利了即以浚

方莖枝薰下部訖然後取藥如碁子安竹管內
入下部中日再度

莖枝薰法 取東南莖枝五七枝將枝頭輕敲碎
綿纏之蘸硫黃末數轉令厚又截一竹筒先入
下部中却將莖枝藥燒着入筒內薰之
仲景云蛇床子散濕陰中之主藥

蛇床子仁為末以白粉少許和勻相得如束大
納入戶中自然濕散

莖胚散

陰蝕瘡

莖胚粉

蝦蟆灰

各二錢半

胆脂胚一錢二分

右為細末乾摻

沐浴長春散

男子下元陰濕久冷陰囊左右夜

痒抓之則喜住之則痛成瘡流水為害甚苦此

方極効 及治婦人陰濕子宮久冷

牡蛎 蛇床子

破故布

紫梢花

乾荷葉

官桂各一分

每用一兩半水一小鍋入葱白數

莖煎八分先薰後洗却用後津調散

津調散

治妬精瘡婦人陰濕瘡膿汁淋漓臭爛

黃連

款冬花各一分

射香

少許

為細末或先以地骨皮蛇床子煎湯洗軟帛拭
乾津調敷之 忌生湯洗

妬精瘡 青黛 款冬花分 射香許

為末先以棗白皮地骨皮煎湯洗軟帛拭乾津

唾調末藥敷

婦人玉戶疔瘡 及小兒走馬牙疳

活蜘蛛一枚以生薄荷葉或乾者包蜘蛛燒存

性為末酒調服之妙 如小兒走馬牙疳以此

搽之効

癬

丹溪云初起發熱者防風通聖散去硝黃加浮萍

皂角刺

羅太無何首烏散 治脾肺風毒攻腫遍身癬變

成癰疹搔之成瘡或有背拘急肌肉頑痺手足

皴裂風氣上攻頭面生瘡及治紫白癩風頑麻

風症

荆芥穗 蔓荊子 葳靈仙 何首烏

炙甘草 防風 車前子 各等分為末每服

一錢食後溫酒調下白湯亦可

癬在頸項間后延上至耳成濕癬他治不應以芩

會一兩甘草半兩和勻先用溫漿水洗癬拭乾

敷之効

一方 芩會 大黃 輕粉 雄黃 蛇床子

川槿皮 檳榔 為末先刮破癬醋調塗之

乾癬積年生痂疔搔之黃水出每逢陰雨即痒用

狼毒末塗之

栢脂膏治乾癬 栢油斤 黃臍半斤 杏仁四兩

朴硝抄一 右件鐵器內用老生姜葱白三根一

順攪五七次煎沸瀝過成膏搽之

又方 山苴根末臘猪脂調塗之

祛濕散 多年濕癬大有神功 蚕沙四兩

薄荷兩 為末摻之或用生油調搽

羌活膏 治頑癬疥癩風瘡成片流黃水久不瘥

羌活 獨活 明九 白蘚皮 硫黃 狼毒

各一兩 黃丹 白附子 蛇床子各半兩 輕粉

二錢半 為細末油調成膏搽之

八宝散 治風癩松皮頑癬久不瘥神効

藿香 栴郎 破故帛 大腹皮 雄黃

輕粉 硫黃 枯九 各等分為末油調搽日

三五次痒即搽之

香疥藥 治風疥癬瘡黃水瘡牛皮癬

輕粉 水銀 樟腦各三錢 大風子 四十枚

川椒 四十粒 杏仁 二十粒 柏油 一對 為細末疥

用絹包於瘡上熨之黃水瘡乾搽神効

一 抹散 治乾癬不瘥

天南星 草烏頭各用生一枚 為末以羊蹄根搗

取汁調塗不過三次妙絕

牛皮癬及久年頑癬神方

紅粉霜五分 明凡一錢 密陀僧三錢 川槿皮一錢

杏仁去皮油一錢 為末津唾調搽一日三次三日全愈

脚瘡皮厚如癬或流黃水黃水延處即爛浸淫年

久不愈者 此方屢試屢驗瘡癬俱佳

紅棗二枚去核將皂礬一錢納棗中以苧麻緊

扎用好酒二碗慢火煮成膏不要攪動膏成去

患不用以膏塗患處二三度全愈 若浸淫瘡
初塗時畧疼少刻便止其瘡就結乾痂妙甚

臙瘡

夫臙瘡者皆由腎臟虛寒風邪毒氣外攻三里之
傍灌於陰交之側風熱毒氣流注兩脚生瘡腫
爛疼痛臭穢步履艱難此瘡生於臙骨為重以
其骨上肉少皮薄故難愈至有多年無已口開
濶皮爛肉現臭穢可畏治法當先取蟲然後敷
藥如隔紙膏麝香輕粉散之類須翹足端坐勿

多行履庶可全愈矣

隔紙膏 治內外臙瘡 當歸 白芷 黃連

五倍子 雄黃 沒藥 海螵蛸 血竭

白芨 白欵 黃蘗 厚朴 已上各 黃丹

乳香 二錢 半研 輕粉 一錢 右為細末用清油紙貼

藥敷瘡上絹帛縛定有膿水解開刮去不潔再

貼藥如此數次即愈須先用燒鹽湯洗淨片帛

拭乾待片時水氣乾然後貼藥

又隔紙膏 專治臙瘡如神務要用絹帛縛得着

實貼肉方好過兩日取抹淨翻貼之

滴乳 沒藥各二錢 黃丹炒紫色 降真香灰各兩

已上俱另為細末 真黃蠟一兩 真蜂蜜一茶匙

右將黃丹入銅鏊內炒紫色次下降香灰末撓

令勻却下蜜黃蠟另熬化傾入油蜜撓令極勻

然後下乳香沒藥輕粉片腦再用銅匙撓之又

勻待藥稀稠得所取出磁碗收盛勿令泄氣臨

用看瘡大小攤之油紙綿紙尤佳竹帛不耐藥

在中紙在外翻覆貼之

治臙瘡久不愈 龍骨二錢 乾猪糞半兩 煨

輕粉少許 楨柳半兩 乳香 沒藥各一錢

右為細末先以燒鹽湯洗瘡以軟絹帛拭乾清

油調敷瘡濕則摻之

秘傳隔紙膏 治年月深久臙瘡不愈者

老松香 樟腦 谷丹炒 水龍骨即旧缸

輕粉 久不愈加 白芷 川芎 海螵蛸

總為細末溶化松香加少清油和之以油紙隨

瘡大小糊袋盛藥夾之用水洗淨縛在瘡口上

二日定四日一換若單用白芷，芎藭三味煎水洗之立効

屢驗方

枯凡錢^三

墨煤

煉存性

研勻以生桐

油做隔帛膏貼之先以五倍子川椒葱三味煎湯洗拭乾貼藥一日一換七日全愈

又方

治似臙非臙

蜂蜜

兩四

嫩松香

一分錢

先將蜜熔滴水成珠次入松香末攪勻如上法做貼洗亦同

又方

麻油

兩二

熬至滴水成珠又將蜂蜜四兩熬

至滴水成珠將油換入又將伏龍肝四兩為末入內攪勻成膏先將瘡洗淨以膏塗之一日一二次其効甚速

又方

冬青葉

臙猪胆

白草霜

二味和勻

將冬青葉與木人嚼爛先將瘡用椒葱湯洗淨乃以胆霜敷後却敷冬青葉三四次便愈

粉麝散

治內外癩臭爛數十年不愈者

生龜

一枚

去肉取壳醋一

盞炙醋盡為度煨

令白烟尽存性以盞蓋在地上出火毒為細末

入輕粉射香拌勻臨用先以葱水洗乾敷藥妙
絕妙絕

又方 新起未久者甚好 玉簪花葉小便浸貼
一日一換五日愈

諸凡癰毒惡瘡多年臭爛成坑不收口者此方極

佳一七成功 乳香 沒藥 各五錢 天靈蓋 煨一兩

右為極細末摻之神靈 肥清溪之子患痘後腦

癰肉爛成坑骨露不收口百藥無功敷此立効

終



