

萬有文庫

種一千一集第一

王雲五主編

本草綱目

(十三)

張紹棠重訂

商務印書館發行

目 綱 草 本

(十三)

訂重棠紹張

書 略 本 基 學 國

編主五雲王

目綱草本

冊十三

訂重棠紹張

號一〇五路山寶海上
五雲王人行發
路館書印務上商所刷印
埠各及海商所行發
館書印務上商

版初月十年九國華中

The Complete Library

Edited by

Y. W. WONG

PÊN TS'AO KANG MU
REVISED BY CHANG SHAO T'ANG
PUBLISHED BY Y. W. WONG

THE COMMERCIAL PRESS, LTD.

Shanghai, China

1930

本草綱目

拾遺卷九下

獸部

獅子油血糞

辛溫有毒。色微黑者真。善透經絡。凡用勿多。○沈良士云。塗指甲上涼透指甲者真。又方。以黍許入沸湯。湯卽不沸者真。○逢原云。獅爲百獸之長。性最難馴。一吼則百獸辟易。爾雅言其食虎豹熊太古言其乳入牛羊馬乳中皆化成水。西域人捕得。取其油入貢。以供宮人滌除衣垢之用。又能去紙上墨跡。刮少許隔紙熨之。卽脫。予嘗試用。垢雖去。而衣易毀。紙易爛。僅供一時之用。雖係方物。方藥罕用。近世醫者以之治噎膈病。蓋噎膈皆鬱疾瘀積所致。用取瘀痰之意。試之輒驗。由是方家爭爲奇物。但性最猛烈。力能墮胎。孕婦忌用。象油亦能去垢滌痰。但不能去墨跡耳。○椿園聞見錄。溫都斯坦。西域一大回國。從葉爾羌西南行。百日可到。其國西隅有巨澤。圍數千里。澤中有山。圍逾千里。萬峯聳峙。高入雲天。或曰。人間第一高山也。名曰牽各里麻膽達喇斯山。中產獅子。於新月皎潔。輒負雛於山中往來。頭大而毛虬。尾形帶黃質黑章如虎皮。長六七尺。時登山絕頂。望月垂涎。咆哮跳擲。猛飛吞月。有飛去八

九里十餘里而墜死山谷中者。其國人以豢養獅子爲上戶。每當秋月。其汗使人取獅。以精鐵作柱。大如瓮。密布層遮圍。畜之於中。飼以牛。時而吼如雷霆。滿城震動。人畜不甯。取之法。擇炮手之最精者。開地爲阱。人匿其中。遇有負雛者來。乘其不備。發炮斃之。而取其雛。倘一炮不中。則拋山裂石。而人無噍類矣。○張葵漪有此油。云熬之可挑絲一二尺不斷。他油則不及也。○陳海曙曾在京邸簡親王府見獅油。堅如石。絕如雞卵。白潔可愛。

朱排山柑園小識。獅子油白膩如豬肪。氣味俱薄。利小便。凡人小便不通。雖腹脹。莖痛。病在危急者。以酒或白湯送下三四釐或半分。卽通。嘗有一丐。因受暑熱。遂致小便不通。每月一發。發至二三日後。莖痛如割。至不可忍。屢投縕。祈死。人以獅油少許。投之。片刻卽通。奏效之速。無逾於此。而本草不著其功用。何哉。豈當時未知用歟。第虛祕者似宜酌而用之。○敏按。獅油性最猛烈。內服尤不可單用。更勿多服。嘉慶元年三月。予友邵某得獅油少許。因病欲服之。未果。爲一鄉人轉乞去市。於人獲重價。其人市得服半黍許。夜半而死。鄉人懼罪。亦投水死。蓋外用不妨。內服尤宜審慎。以人之腸胃太弱。不任峻利之攻削耳。

消熱結。治膈大小便不通。救生苦海。用獅油酒服二三釐。自效。

沈雲將食物會纂。獅血殺百蟲。燒之去鬼氣。

獅糞

王沂堂藏有獅糞一段。用鐵匣盛之。四圍以鐵屑養之。其形至堅。如鐵石。磨之作紅色。云非鐵屑養。則易朽爛也。

治一切腿足下部惡瘡。年久不愈者。塗之即癒而落。

象糞

象白毛尾

按象有家野二種。京師者食俸料。滇廣山產者食竹木雜草。入藥以野象糞良。京象糞銷皮坊皆多取濺黃。貂黃。狼能令毛黑如漆。綱目象下。凡牙肉睛皮臍骨俱入藥。不及其糞爲補之。

治鵝掌風。以象糞燒熏。自愈。

起死回生散。李文炳經驗廣集。治痘瘡至七八日。忽然變黑。收入腹內。遍身抓破。吭喘。死在須臾。服此從新另發出。立可回生。當歸。川芎。白芍。生地。升麻。紅花。上陷加白芷。下陷加牛膝。遍身黑陷加麻黃。象糞微炒。如一歲兒用二錢。大兒用至三五錢。右剉一劑。水酒各半煎服。從新發出腳下黑疔。至七八日用鍼挑去。以太乙膏貼之。卽拔去毒。連進二三服。

瘧疹。良朋彙集方。治小兒大人出瘧疹。回在心胸。作喘發燒。用象糞八錢。升麻二錢。水二鍾。煎一鍾。

服卽刻透出。

象白

乃象交於水。其精浮水面。象房人用磁瓶收貯。入藥傅面不皺。亦可入房藥用。

象尾毛

通雅云。今人剔牙杖。極重象尾。謂可去火。

犴血

孫含懿云。有客自川中來。帶有犴血。言此獸乃星禽。爲天上井宿。五百年一降於世。以濟人。其降也必於蜀。降之前三日。天乃大風。振屋拔木。爲降犴風。左右村落居民。知犴必降。悉遷避之。求鐵工造蓮萼箭鏃。如橄欖形。而窪其中。鏃上刻名。以記犴降之日。形如胡犬。有鱗。大十倍於象。首必朝歲星。蹲踞不動。土人從其後射之。矢集其身。如猬。三日後乃去。遺矢於地。各認所鏃。以歸矢。人無爭者。其鏃頭有血一塊。大如櫻核。可入藥。土人亦甚珍寶之。不輕售。自明洪武時曾一降。至今幾四百年。所珍藥亦罕有存者。縉紳舊族或有之。亦寶同和璧矣。

治一切陰疽發背。一切大毒。凡癰疽必死之症。無藥可救者。每以一釐潰則傅膏外貼。未潰則調酒服。一夕自愈。合治癰等藥一斤。加入分許。卽奏效如神。

醉虎油 膽

三閩識略壬子正月初十日福山戌卒遇一醉虎縛獻王大將軍轅門將軍剖肉分贈郡紳之小兒食之可以稀痘按虎食人與楊柳及狗皆醉

宦遊筆記載山人捕虎法云虎嗜食犬食之必醉如人中酒虎匿深谷峻嶺往來不時難尋其跡人以劣犬縛於山凹犬嗥不已虎聞聲而前果腹而醉不能遠去人迹犬血而捕之則無所遁矣此縛醉虎之法也

主稀痘

虎油

物理小識虎一身皆入藥而本草未載虎油之功效愚於獵戶取其油以塗臘梨瘡一二次卽愈亦可治大癩瘋○藥性考虎油療禿塗狗咬傷五痔下血反胃酒嘔

虎膽

治打傷垂死飲食不進前後不通乃瘀血在心命在旦夕可用此方虎膽五分去外皮用老黃酒在盃內研細爲末白茯苓二錢爲末用熱陳酒調灌下出可不死矣

虎脂

治打碎頭骨蓋方用虎脂一兩浸好熱酒內俟化勻服之汗出爲度如患處青者不治
反胃 不藥良方虎脂八兩清油一斤瓦瓶浸一月密封勿令洩氣每以油一兩入無灰酒一盞溫服
以瘥爲度油盡再添

按虎膽虎脂綱目雖載其用而未言及入折傷料之用此二方出錫山華氏經驗錄並屢試有效故補
其說以濟急

鹿胎乳餅
脛骨

瀕湖綱目鹿條精髓筋膽胎糞俱皆備載張璐逢原另列鹿胎一條頗詳辨可採錄出以補其遺璐曰
胎中鹿其嘴尾蹄跔與生鹿無異者爲真其色淡形瘦者爲鹿胎若色深形肥者爲麋胎慎勿誤用能
損真陽又獐胎與鹿胎相類但色皎白且其下脣不若鹿之長於上脣也其他雜獸之胎與鹿胎總不
相似也入藥取真者酥炙黃用

氣味甘溫無毒鹿性補陽益精男子真元不足者宜之不特茸角莖胎入藥而全鹿丸合大劑參耆桂
附大壯元陽其胎純陽未散宜爲補養天眞滋益少火之良劑然須參耆河車輩佐之尤爲得力如平
素虛寒下元不足者入六味丸中爲溫補精血之要藥而無桂附辛熱傷陰之患但慎勿誤用麋胎
反傷天元陽氣也

鹿乳餅

苦陰札記。孝豐深山產鹿。土人計其產子時。輒於夜半伺其洞側。鹿乳子必五更。乳畢出洞。至暮方歸。每日祇乳小鹿一次。小鹿食乳於腹。結十二小餅。每一時。輒消一餅。土人候母鹿出洞。卽將乳鹿抱歸。剖腹出餅。持貨遠方。爲珍藥。價值兼金。其餅如雲南棋子大。色微黃。乾者作老黃色。腥氣最烈。食之大能強陰。益命門火衰。於老羸最宜。

理怯弱虛損。發痘漿。通女子乾血勞。

鹿脛骨

綱目鹿條有骨。乃指全體而言。至脛骨不聞有用法。今時醫有斑龍散。純取其脛爲用。因載其方以補之。

生肌收口。救生苦海。用斑龍散。取鹿脛骨。溼紙包固。灰火煨之。以黃胞可研爲度。若焦黑色者爲過性。勿用。摻大毒。生肌甚速。

猴經

入藥名申紅。深山羣猴聚處極多。覓者每於草間得之。色紫黑成塊。夾細草屑。云是母猴月水乾血也。廣西者良。

治乾血勞。

犬豕胎糞

史長惺有不服藥而點眼發汗方。以初男胎糞煉而升之。加冰麝。磁釤收。有當發汗者。男左女右。以乳點之。臥卽汗出。本草所未載。小識云。犬豕初生糞皆可合煉。不必定嬰孩也。

瑞油

瑞卽獾字。所在山澤有之。穴居食蟲鼠。劉仲旭云。北直河堤一帶尤多。穴岸而居。最爲堤防之患。守河兵卒多捕之。一說瑞入蟄時必食蜂。始過冬不飢。有人於初冬發其蟄穴。得獾破腹。其肚胃中猶有蜂。獾腹中皮爲蜂螯。輒厚數寸。或藉此不飢。此說亦未可深信。堤民得瑞脂。多市煤礮作地燈。非此不可。他油輒爲地風吹滅。惟瑞油作燈能禦地風也。

入膏中拔溼如神。繆仲淳廣筆記。趙府膏藥中用之。

治頭上白禿。集驗用獾油火烤擦三四次。卽愈。如年久者。恐不生髮。以枸杞子煎湯飲。

痔瘡。劉怡軒云。一切內外痔。瑞油塗上立效。

欬血。胸中哽噎。忧愁如蟲行者。不藥良方。豬獾油入酒和服。或下或吐。或自消也。

海狗出遼東登州海中卽腽肭獸也。綱目載腽肭臍不言及其油之用故爲補之。○蓬萊李金什言其地登州海口出海狗皮可作裘帽俗美其稱曰海龍卽此其腎乃藥中腽肭臍土人取海狗名曰打狗此物晝夜潛海底惟孳乳時登島產子稍大卽相率入水人不可得須冬月極凍時海崖水口結冰天晴海狗羣出處冰上曝日必候其臥冰時驟入水以木棍擊其腰方可得之若冰裂或步履有聲非其睡時皆不可得然每年打狗墮水溺死者亦多因利重人亦不惜軀命以往。

性熱而降善消利治三焦濁逆之氣能清水臟積寒停飲觀近海人取鯪魚海參者用其油滴海面海水卽清見底砂石畢見可知其性之分利也。

近有人自關東帶來其油綠色如乾糊以塗駁瘀卽愈次年不復發其性熱烈可知。

狐麝

金沙江志產東川昭通二府較常麝香氣尤烈佩之辟邪絕惡夢定覺。

獺糞

綱目獺條載其屎治魚臍瘡及下痢而已不知有消瘤之功今補之。

王氏檢祕消瘤用獺糞一兩天南星三錢麝香三錢共研末醋調塗上卽愈。

狼脂

本經逢原云狼性追風逆行故其糞燒烟能逆風而上燒灰水服治骨鯁以其性專逆行而無阻滯也。狼脂摩風首推而本草不錄亦一欠事按周禮冬獻狼取其膏聚也內則食狼去腸古人以爲食品綱目獸部狼膏下瀕湖僅據飲膳正要載其能潤燥澤肌塗惡瘡而已不知其大功用乃能驅風散逆結之氣何可昧耶故急補之。

入風氣膏中能去積久風癆調酒服散逆結之氣。

山羊血糞油

常中丞筆記山羊生平樂山崖間能陟峻坂蹠捷若飛其血可治跌損傷及諸血症凡跌撲死者未絕氣以一分許調酒飲之遂甦神效立見第捕甚難每見人則決驟而去颺迅非常非足力所能及必密布繩網草間覓其足始能生得之刺其心血待乾凝結成塊可以攜遠蓋凡血皆患凝滯山羊踰高歷險旦夕不休則其血活矣而心爲主故心血最良語云流水不污戶樞不蠹觀此益信○本經逢原云山羊產滇蜀諸山中性善走逐好鬪肉能療冷勞山嵐瘧痢婦人赤白帶下其心血瀕湖綱目失載苗人取血法以麋竹通節削鋒利活刺心血收乾者良宰取者不堪用○柑園小識山羊血產廣西諸土郡山羊似羊而大善鬪能上絕壁每登高處失足或至骨折少頃如故喜食三七苗其血主治損傷極妙輕者服數釐重者二三分以心血爲上身血次之色黑有光而質輕者爲真○陸祚蕃粵西偶記試

山羊血取雞血半盃投一粒過宿變成水或以久凝臭雞血一塊投入山羊血過宿反變成鮮血乃真。○瀕湖綱目云山羊卽野羊也一名獣羊非今之家山羊也時珍於山羊主治條僅載其肉之功用不及油與血之用此並附之○今人收得乾血成塊者必用糯米養之云可久留不枯。

性溫味鹹無毒。逢原云爲和傷散血之神藥。其治跌撲損傷單用酒服取醉醉醒其骨自續每用不過分許不可過服雖不耗傷元氣而力能走散陰血然必初患使服得效最速若過三五日血凝氣滯無濟於治矣價等牛黃心血亦不易得。滲血丹用之真虛勞失血之續命丹也○藥性考山羊血味鹹療跌撲損傷咯吐嘔衄便溺諸血能止血消瘀和酒服其皮作茵褥愈筋骨疼痛角作火罐炙頭風以入水一絲不散者真。

吐血 蔣莘田經驗方臨臥時用廣西真山羊血每服三分能引血歸源不過二三服其血自止。
黎峒丸 治跌打及一切癰腫天竺黃八分牛黃四分冰片四錢三七四錢血竭四錢兒茶四錢麝香四分沒藥四錢阿魏二錢雄黃二錢藤黃四錢孩兒骨一兩山羊血製浸藤黃入藥共爲細末煉蜜爲丸如龍眼大陰乾外用蠟爲殼封固三白酒服。

祝氏效方 山羊血能解鮮菌河鮑毒傷損惡血。

治痘內無漿不起發○集驗良方用真山羊血三分用甜酒釀調服痘漿立起。

太乙神鍼方。人參四兩。三七八兩。山羊血二兩。千年健一斤。鑽地風一斤。肉桂一斤。真川椒一斤。乳香一斤。沒藥一斤。穿山甲半斤。小茴香一斤。蒼朮一斤。真蘄艾四斤。甘草二斤。麝香四兩。防風四斤。以上共爲細末。用綿紙一層。高方紙三層。紙寬裁尺二寸五分。長一尺二寸。將藥末薄薄鋪勻在上。一鍼約用藥七八錢。緊捲如花炮式。務要緊實。兩頭用紙封固。外用印花布包面。亦要齊整好看。此鍼能治一切痛風。寒溼筋骨疼痛諸症。用時將鍼以火淬著。或按穴道。或在痛處下襯以方寸新紅布數層。將鍼按上。若火旺布薄。覺疼多蟄布數層。但鍼必須三四枝。一鍼已冷。再換一鍼。連進七鍼。無不立驗。治喉癬。喉症惟此最遲。久則失音。不可救。種福堂方。西牛黃一分。真山羊血二分。川連五分。血珀三分。冰片一分。蓬砂一錢。青果核灰三分。燈草灰五分。共爲細末。每一茶匙藥用一茶匙蜜調放舌尖上。徐徐嚥下。一日五次。兩月可愈。或加蜒蝣梅灰更妙。

馬氏夾棍神方。吉雲旅抄。山左馬家市夾棍藥極效。方用蚺蛇膽二錢。山羊血一錢半。琥珀一錢。大白頸地龍七條去泥。珍珠三分。辰砂一錢。兒茶八分。金箔一帖。爲衣。爲細末。蜜丸桐子大。金箔爲衣。每服一錢。五分好酒下。如不打夾者。用刀破皮藥自出。

治急心痛。集驗方。用山羊血一分燒酒化下。

中遇邪鬼。醫鈴。此症乃陽氣衰而陰甚。治須急補其陽。以存正氣。則陰邪自平。卽或治痰。然亦當加

意補正爲本人參二錢。當歸六錢。白朮一兩。菖蒲二錢。半夏三錢。白芥子三錢。丹參五錢。阜角刺五分。山羊血八分。附子一錢。此方用山羊血阜角刺爲開關聖品。以通邪祟之要路。半夏白芥消其寒痰。無寒之侵。斷不中鬼。大用參以扶其陽。陽生陰滅。此不易之理也。

救絕仙丹。石室祕錄。此丹專救五絕。及有邪祟昏迷。一時卒倒者。皆可灌之。以起死回生。實神奇之極。宜端午日脩合備用。濟急大可救人。山羊血三錢。菖蒲二錢。人參三錢。紅花一錢。阜刺一錢。製半夏三錢。蘇葉二錢。麝香一錢。各爲末密丸。如龍眼核大酒化下。

敏按山羊血以產滇黔及蜀者佳。以其地深山多三七苗。及理血定風諸草。山羊每食之。峒人追逐得之。山羊本迅躍。無一刻之停。其體血自頂貫尾。終日旋運如飛。又被逐捕。則躁性頓發。血隨氣運。矯捷尤甚。黎峒人捕得以竹鎗刺入其心。取血用此上品也。其血成條。深紫有光。以少許入水中。自然旋運如飛。蓋矯捷之性猶存也。若網取刀剖而得者。血色黯滯。入水亦不能迅捷。他省產者。亦能如峒苗之合衆追逐。令其騰躍上下。而後刺取其心血用。亦可較次於滇黔山羊血。惟今之各處所獲山羊。皆用網取。其或鎗斃。而後剖其死血。以僞充心血。則力微性緩。更有以他血代充者。則尤屬贗質無用。故今市中每多此物。高索重價。非親歷其地。真知灼見而得者。勿用也。

山羊油

張卿子祕方集驗治主心疝用山羊油不落水者荷葉包裹挂風處陰乾不可著雨遇此症取三五錢沖熱酒服不飲酒者滾湯亦可并治諸疝。

按文堂集驗主心疝用山羊血其言與此同然細繹文義有不落水句則用油非血矣文堂誤以油爲血故並正之南方亦有山羊但不及粵產者其血尤爲迅捷也。

山羊糞

山羊糞同水粉各一升浸一夜絞汁頓熱午刻服治疳痢。

祝西菴本草山羊屎煅灰療潰爛生肌。

入外科收口藥用。祝氏效方大棗丸用山羊屎曬乾入鍋炒炭存性研細收藏每久爛不堪將見內腑者以大棗去皮核搗爛如泥後入前粉搥至成丸每服四錢黑棗湯送下此物大能斂潰爛諸口神效無比。

山蓮散用大活鯽魚一尾破腹去雜以山羊屎塞實魚腹放瓦上慢火炙乾存性研末加麝香一錢封貯如遇潰瘍爛見內腑止膈一膜者以此藥摻上立愈。

雷頭風 祝氏效方云諸藥不愈惟山羊糞炒炭研粉甚效歌曰雷霆頭裏震山羊糞有緣酒送二錢下不在腦門喧。

治心痛不論遠年近日。玉泉方山羊糞七粒油頭髮一握同燒爲末。好酒和服。永不再發。

石羊膽

廣東通志石羊色黑類人家羊而矯捷其角燒紙爲火罐能收頭風其皮作褥可愈筋骨疼痛其血能療跌打損傷猶秦中山羊也。○肇慶志石羊出高要山中似羊而高大長角厚耳此羊一孔三毛。服用柔而能久。內兄朱問亭官粵曾寄石羊膽一對盛以銀匣大如小指以絨線紮其一頭乃乾者據言此物不易得試驗之法以此膽囊掛胸前急行不喘者真治折傷勝於山羊血也。

治一切目疾勞眼青盲人乳調點風火防風汁調點此物去翳障如神水調亦可。

跌撲功同山羊血

曹閏亭先生曾宦黔中云邊邑皆產石羊形小如兔趨捷難獲有得之者須卽破其腹取膽少遲則裂於腹內矣其膽乾之可療肝厥暴絕酒服一二釐卽甦其心血能治真心痛頗有效骨皮熬膠去風活血如神。

山羆

坤輿圖說利未亞國有山羆似麝膽後有一肉囊香滿輒病就石上剔出始安其香似蘇合油黑色療耳病。

犀牛皮

物理小識近有從船上來者此真是海犀其皮入藥治風活血最效

貂尾

貂出西北塞外食松栗卽南中松狗之類其行捷穿樹枝如飛蓋以尾爲用者故其力在尾綱目貂鼠條止載其皮毛拭目去眡而遺其尾故爲補其功用

凍瘡用貂尾燒存性爲末摻爛處自愈未破者用舊貂皮毛煅研香油和搽養素園驗方

七葛

回疆志出伊犁西番一帶用馬乳裝皮袋內以繩繪口手捉袋提壓半時許放於熱處一夜卽成名之曰七葛飲之熱而補人若日服之有返老還少之功云性熱補虛羸長力怯弱者宜之

香鼠

珍異藥品云出雲南形如鼠僅長寸許周櫟園書影云密縣西山中多香鼠較凡鼠小死則有異香蓋山中之鼠多食香草亦如獐之有香臍也山中人捕置篋箇中經年香氣不散桂海志云至小僅如指

擘大穴於柱中行地上疾如激箭。

治癆甚驗。

鼠血

此乃家鼠血。綱目於鼠下獨遺鼠血。今補之。○本經逢原云。生鼠血蘸青鹽擦牙宣。有效。牡者良。

貓尿胞。胎尾。白松香。

取蒜片擦貓牙。溺卽下。

鳳聯堂驗方。治偷糞老鼠。用貓尿井底泥和勻。圍之立愈。○急救方。塗蠍毒蟄傷。○蟲入耳中不出。以貓尿滴之。立死。

貓胞衣

爲治膈噎之神藥。瀕湖綱目貓下雖附胞衣。惟引楊氏經驗方。治反胃吐食。燒灰入硃砂服。其他概未之及焉。且取之有法。食之有忌。均爲補之。

膈噎。同壽錄。用貓初生胞衣。以新瓦焙乾研細末。每服一二分。好酒送下。口含竹筆管睡。恐咬牙及咳嗽。米不下者。五六服卽愈。取貓胞法。貓將產。以木枷枷之。恐生出卽食也。忌燒酒。

翻胃。鳳聯堂經驗方。貓胞衣三個。好酒洗用。豬肉四兩淡煮熟服之。數年者立效。○莫際華云。胃脘

痛非服貓胞不能斷根。

金御乘云貓胞衣凡患小產婦於產後或爲羹或爲末食嗣後即不小產極驗。

貓胎

祝氏效方治癲癇用貓胎一個泥裏煨存性菜油調搽。

貓尾血

不藥良方急驚風翦破貓尾滴血沖滾湯下。

白松香

汪連仕云卽瓦上多年貓糞色白火煅用治鹽哮蛇厥作痛更理瘟疫鼠瘡立刻見效。

浙驢皮膠

黃雲盛言近日浙人所造黑驢皮膠其法一如造阿膠式用臨平寶莊水煎熬而成亦黑色帶綠項有豬鬃紋與東阿所造無二入藥亦頗有效蓋阿膠真者難得有浙膠則較勝於用雜膠也寶莊在臨平湖西岸有寶莊泉土人名爲大力水云食之多力向聞虎跑泉水注大缶中平口投錢於中能吞一百六十青錢而水不溢他水至八十已浸漫於外矣故虎跑泉食之益氣力寶莊水能吞二百青錢不溢其力更可知以此水作膠自可敵伏流之濟水然予每索此膠於市遍詢藥客皆云造者亦少不易得。

而雲盛言之甚詳。姑存之以備異日考證。

補血潤燥。功同阿膠。治內傷腰痛。強力伸筋。添精固腎。尤別有殊能也。

霞天膏

綱目畜部牛下附倒倉法。而無霞天膏製法。近時用之頗多。故附錄之。本草經疏亦載爲專品。其法用肥嫩黃牛肉三四十斤。洗極淨。水煎成糜。濾去滓。再熬成膏。用繆仲醇曰。胃屬土。爲水穀之海。無物不受。胃病則水穀不能以時運化。羈留而爲痰飲。壅塞經絡。則爲積痰。老痰。結痰等症。陰虛內熱生痰。則爲偏廢。口眼歪斜。留滯腸胃。則爲宿飲。癖塊。隨氣上湧。則爲喘急。迷悶。流注肌肉。則爲結核。王隱君論人之諸疾。悉由於痰。然而痰之所生。總由於脾胃虛不能運化所致。惟用霞天膏以治諸痰證者。蓋牛土畜也。黃土色也。肉者胃之味也。熬而爲液。雖有形而無濁質也。以脾胃所主之物。治脾胃所生之病。故能由腸胃而滲透肌膚毛竅。搜剔一切留結也。陰虛內熱之人。往往多痰。此則由於水涸火熾。煎熬津液。凝結爲痰。膠固難散者。亦須以此和竹瀝。貝母。橘紅。蘇子。栝樓根。枸骨葉之類消之。或以橘皮。白茯苓。蘇子。白豆蔻仁。半夏。蒼朮爲麴。治脾胃積痰。或以橘皮。貝母。蘇子。栝樓根及仁。蓬砂爲麴。治積熱痰結。

味甘溫無毒。主中風偏廢。口眼歪斜。痰涎壅塞五臟六腑。留痰宿飲癖塊。手足皮膚中痰核。經疏

氏

羊哀

形圓如彈。大小不等。產羊腹。在胃中。惟山羊有之。胡羊不能成也。蓋羊食百草。其精氣聚於胃。久則成此物。俗呼百草丹。亦牛黃狗寶之類。牛黃細膩而疎鬆。且香烈。故以黃名。狗寶花白。而堅凝如石。故以寶名。此則如爛草團成。輕鬆而氣羶。人多惜其不能如牛黃狗寶之精美。而亦產於羊腹。得日月精華。又食異草孕結。乃不堅重香凝。僅成此物。故哀之。因名曰哀。○常中丞宦遊筆記載軍營於羊腹中得石子。名鮮苔。形如鴨卵。色紫黃。兩頭有二白圈。圓如黃豆。腰有束帶。寬如韭菜。色青藍。束帶上亦二白圈。質細如玉。滋潤如水。輟耕錄亦載蒙古求雨取淨水一盆。浸石子數枚。持咒播弄。其石子名鮮苔。產畜腹中。牛馬皆有。不必定羊也。而羊哀又與鮮苔異。鮮苔堅重細潤。此則輕鬆羶臊。亦無束帶白圈。庚戌冬。友人李金什在臨安西關外屠羊肆。見屠者剖一羊。胃中忽湧出一彈。如鴨卵。黃勻圓光潔。浮水盆上。購歸示予。予曰。此羊哀也。氣躁而鬆。非鮮苔之類。彼云屠者呼爲百草丹。云業此三十年。止取得三枚。亦不易遇也。此物惟山羊始生。因山羊食百草。偶噙得異草或石乳。其膏液注胃中。日久凝成胃。爲精氣往來之所。日爲氣運動。故所結之物多圓如丸。鮮苔結於腹。不爲氣擾動。故形扁圓如石。金什卽以此贈予。予復取細視。其質鬆而亦堅。嗅之作羊臊氣。外則色澤光膩。儼如油潤。其體質非石非酥。如腐草融結。始信說略所載羊哀如溼茅紙之說爲不謬。因附記於此。以待折衷於格物諸君子。按百

草鏡羊臍結成在羊腹中色微黑可治反胃或卽此歟
解百草藥毒治噎膈翻胃

敏按慈航活人書端五日收羊屎名百草丹可絕瘧與羊胃所積草有別不可不知

蘭薰嘉鄉肉陳火腿骨猪項上靖製火腿法

俗名火腿出金華者佳金華六屬皆有惟出東陽浦江者更佳其醃腿有冬腿春腿之分前腿後腿之別冬腿可久留不壞春腿交夏卽變味久則蛆腐難食又冬腿之中獨取後腿以其肉細厚可久藏前腿未免較遜蓋金華一帶人家多以木飯撈米作飯不用餽煮飯湯醃厚者以飼豬其養豬之法擇潔淨欄房早晚以豆渣糠屑餵養兼煮粥以食之夏則兼飼以瓜皮菜葉冬飼必以熟食調其饑飽察其冷暖故肉細而體香茅船漁戶所養尤佳名船腿其腿較小於他腿味更香美凡金華冬腿三年陳者煮食氣香盈室入口味甘酥開胃異常爲諸病所宜○東陽縣志薰蹄俗謂火腿其實烟薰非火也醃曬薰收如法者果勝常品以所醃之鹽必台鹽所薰之烟必松烟氣香烈而善入製之及時如法故久而彌旨另一種名風蹄不用鹽漬名曰淡腿浦江爲盛本邑不多○陳遠夫藥鑑浦江淡腿小於鹽腿味頗淡可以點茶名茶腿陳者止血痢開胃如神○陳芝山食物宜忌火腿醃過晾燥高挂至次年夏間者愈陳愈妙出金華府屬邑者佳○常中丞筆記蘭薰金華豬腿也南省在在能製但不及金華者

以其皮薄而紅，熏淺而香，是以流傳遠近。目爲珍品，然亦惟出浦江者佳。其製割於冬月用鹽勻稱，使肉堅實不敗。最上者曰淡腿，味美香潔，可以佐茶。各處皆無此製。蓋此地畜豕，闢圈清潔，俟其將苗壯時，卽宰剝醃曬。或曰：其豕種原異他處，而又得香溪等水飼之，亦近乎理。○陳瑤藏藥祕訣：凡收火腿，須擇冬醃金華豬後腿爲上。選皮薄色潤，日照之明亮，通體隱隱見內骨者佳。用香油遍塗之，每個以長繩穿腳，排勻一字式下。以毛竹對破仰承，以接油置之透風處，雖十年不壞。倘交夏入梅，上起綠衣，亦無害。或生毛蟲，見有蛀孔，以竹簽挑出，用香油灌之。如剖切剩者，須用鹽塗切口，肉上荷葉包好，懸之。依此可久留不壞。○朱氏僕葛三言：少時曾傭金華習其業，知醃腿法甚詳。云火腿、金華六屬皆有，總以出浦江湯家村者爲第一。村止一二千戶，皆養豬作腿。其豬不甚大，極重者不過七八十斤。製爲腿乾之，不過三四斤或五六斤不等。四時皆可醃，惟冬腿爲第一。冬醃者，皮細無粟眼，手摸之潤膩，切開無黃臚、爪灣，可久留不蛀。他時者皆易蛀。春腿多粟眼，夏腿爪直，秋腿皮粗。醃法每腿十斤，用炒鹽四兩，以木刻楂如人手掌狀，摻鹽後用掌楂輕輕揉擦，四圍兼到。俟皮軟如綿，然後入缸，缸面蓋以鮮蓼竹匾，覆之。待七日後，有滷翻攪一轉，令上下勻。再以炒鹽四兩，如前法以手揉醃入缸，十日後出缸，卽用缸中原汁洗淨，一一以草繩縛定，挂懸風處。惟冬醃者不滴油。

味鹹甘，性平。○陳芝山云：和中益腎，養胃氣，補虛勞。○陸璣云：生津益血脈，固骨髓，壯陽，止泄瀉虛痢。

勞傷征仲。開胃安神。

藥性考。火腿鹹溫。開胃寬膈。病人宜之下氣療噎。

腹痛或三四日不止。○筆苑仙丹。火腿肉煎湯入真川椒在內。撇去上面浮油。乘熱飲湯立愈。累驗久瀉。○救生苦海。陳火腿腳爪一個。白水煮一日。令極爛。連湯一頓食盡即愈。多則三服。此予宗人柏雲屢試屢效之方也。百草鏡云。火腿出浦江縣。脰骨細者真陳者佳。皮上綠黴愈重。其味愈佳。須洗去垢及黃油用。

嘉香肉

食物宜忌云。又名家鄉肉出浦江者最佳。○藥鑑云。家鄉肉。金華屬邑俱有之。秋即醃。給客販入省城市賣。其肉皮白。肉紅鮮。氣香美。不似他處醃豬肉色少鮮澤也。但一入杭城店。便加消滷。投缸中浸透。然後出售。蓋不爾。則肉味淡反不美。而秋時尚暖。不漬透消滷。又易腐臭也。肉爲消漬食之。恐乏補益。不似火腿。冬醃陳久者爲佳。然今店中所售火腿。均以家鄉肉腿風乾。至次年皮上起綠衣。充陳火腿賣。人多不察。若療病作食餌。須真金華腿方有效也。

味鹹甘。性平。○陳芝山云。補虛開胃。○百草鏡云。平肝運脾。和血生津。○藥鑑云。滋腎健足力。

敏按芝山所言。乃未經杭肆滷漬之肉。故能補虛。若經滷漬透。便能燉肺。凡肺痿陰虛咳嗽者。恐非所

宜產婦虛勞須補者亦忌。其肥肉得消滷入腹卽成痰。體肥作痰者亦不宜多食。倘食之作痰。杏仁研食可解。

附治箭鏃不出方。家寶方用陳年醃肉去皮取紅活美好者同其肥細切剉濃將象牙末及人所退爪甲爲末共爲研細拌入所剉肉內再爲勻剉令其合一厚傅箭鏃周圍約一飯頃其鏃卽自迸脫竟有迸至二三尺遠者。

陳火腿骨

百草鏡云。煅黑研用治食積及痢。

治痢。救生苦海用陳火腿骨二根炭火煅灰篩過加上白糖一兩米湯飲或滾水或酒調服無不效。○又方治赤白痢。陳火腿骨灰陳皮炙草各一兩爲末蜜丸如綠豆大空心服一錢白痢用薑赤痢用白湯送下。○神錦方生火腿骨焙燥研極細末無灰酒送下卽止。○醫林集祕用陳火腿骨煅灰六兩飯鍋巴煅灰五兩砂仁炒三兩南山楂炒五兩共爲末每服三錢久痢人參湯下紅痢紅糖湯下白痢白糖湯下糞痢炒焦白朮三錢煎湯服霍亂吐瀉藿香湯下。

噤口痢。筆珠萃火腿骨煅一兩蓮肉二兩木香七錢烏梅三錢醋糊爲丸桐子大每服七丸蜒蟠湯下。

大人小兒積食諸藥不能消者。不藥良方。陳年火腿骨煅黑色研末三錢。用火腿一斤煮熟去汁上肥油。取清湯一盃。將末送下。

鼠咬。救生苦海。陳火腿骨燒灰。香油和傅。

小兒臘梨瘡。販翁醫要。陳火腿骨燒灰如癢。加礬少許。麻油調傅。不生髮。用老薑擦。

豬項上蜻蜓骨

燒灰塗一切頭項疽毒。凡腦疽鬰發對口等症。麻油調傅。立愈。王聖俞手集

雄豬眼梢肉

能拔殭肉。散毒滯。劉羽儀經驗方。治對口癤。用雄豬眼梢肉三錢。剝爛如泥。加滑石末四錢。和勻傅患處。項上以膏藥蓋之。拔去殭肉。放出黃水。即愈。

製火腿法

李化楠醒園錄。有醃火腿法。每十斤豬腿。配鹽十二兩。極多加至十四兩。將鹽炒過。加皮消末少許。乘豬鹽兩熱。擦之令勻。置大桶內。用石壓之。五日一翻。候一月將腿取起。晾有風處四五個月可用。金華做火腿。每斤豬腿配炒鹽三兩。用手將鹽擦完。石壓之。三日取出。又用手極力揉之。翻轉再壓再揉。至肉軟如綿。挂風處。約小雪後至立春後方可挂起。不凍。○戴義養餘月令有製火腿法。十一月內圈豬。

方殺下只取四隻精腿乘熱用鹽每一斤肉鹽一兩從皮擦入肉內令如綿軟以石壓竹柵上置缸內二十日次第三番五次用稻草灰一重間一重疊起用稻草烟薰一週時挂在烟處初夏以水浸洗仍前挂之按此乃村鄉土醃火腿法要不及金華之蘭薰也然較之杭市醃臘店所買火腿則又不啻霄壤矣故並載其法○造火腿醬法用南火腿煮熟切碎丁如火腿過鹽先用水泡淡再煮去皮單取精肉用火將鍋燒得滾熱將香油先下滾香次下甜醬白糖甜酒同滾煉好然後下火腿丁及松子核桃瓜子等仁速炒翻起磁罐收貯其法每腿一隻用好麪醬一斤香油一斤白糖一斤核桃仁四兩去皮打碎花生仁四兩炒去衣打碎松子仁去衣四兩瓜子仁二兩桂皮五分砂仁五分

拾遺卷十

鱗部

胞蛇

雲南志順甯府出胞蛇見人則斷人去復續取而乾之可治腫毒○滇黔記遊出滇黔土司長尺餘伏草莽見人輒躍起跌數段頃復合一色如白金光亮悞拾之觸毒卽斃○陳鼎蛇譜胞蛇產貴州土司中長尺有二寸圓如錢嘴尖尾禿背黑腹白暗鱗點點可玩見人輒躍起數尺跌爲十二段須臾復合

爲一不知者悞拾之卽寸斷兩端俱生頭齧人卽斃出入往來恆有度捕之者置竹筒於其逕側則不知而入其中急持之方可完稍緩則碎矣故名曰胞予家多蓄奇藥曾購得其腊見寸斷處皆光潤如新截然亦一異也○查慎行人海記胞蛇出崑崙山聞人聲卽寸斷人伺其斷鉗取之須寸各異處待風乾入藥若少頃無人聲寸寸仍續成蛇

治色癆及驚疑喪膽諸症

玉鏡新談

肉熬膏箋癆疽去風癥其骨醋磨圍腫毒良

接斷骨 漢黔記遊胞蛇人得而腊之用接斷骨價值兼金視其上中下治頭腹脰股無不效

大麻風 痢 漢略胞蛇一名片蛇產順寧大候山中長二尺許遇人輒自斷爲三四人去復續乾之色如黃金治惡疽腰以上用首以下用尾又治大麻風及痢近人貨之爲夾棍藥

環蛇

蛇譜云出三佛齊國如環大數圍至數十圍者逐獸卽疾走如轉車輪於千仞山獸入環中卽斃其口眼俱生環之半與尻相對

脂 服之刀劍不能傷

翠蛇

珍異藥品云形如曲蟠長可五六寸蟠旋作圈。

治癰毒癰疽良。

碧飛

湖州府志武康山多蝮蛇名碧飛大者如圍甕小亦如杯案斧首出目鋸齒方文而緩色厥雄赤紫厥雌青黑色瞳精如蜃甲光目亦如之山中人謂有目而無視也春夏布絲草篠人物觸絲激射迅於矢忽不見已攫肉去矣殺人至死霜降絲絕升高樹杪施吐白涎烏鵲下啄則吞之惟鹿以爲膳獵獲之前左足扼其腰中首尾盤繞右足又趾寸解啖無餘者人得而腊之可入藥凡西北諸山自餘英嶺而內皆是物也。

治風癆蝮傷人被其齧者還食其肉則生。

敏按湖志所言碧飛吾杭山鄉多有之土人名方勝板以其遍身花紋如錦中方勝形匾似板故名嚙人最毒惟野豬能食之土人言冬日蛇蟄地中野豕嗅其氣輒翻石掘土出而啖之蛇性大熱野豬食三條卽能過嚴冬綱目蝮虺爲二蝮卽方勝板虺卽土錦俗呼灰地匾是也惡風頑癆非此猛烈積熱之性驅之則肢廢者不能復舉殆以毒攻毒之義想碧飛或同類而異名者書此以俟證。

鱗油

爾雅。蟒王蛇注。蛇中最大者。故曰王蛇。今深山處處有之。大小不一。色如菜花蛇而較黃。頭上皆有王字。亦有黑色者。土人名曰烏蟒。捕蛇者有呼蛇法。不拘何種蛇。呼之即至。末後俟蟒到。則諸蛇皆圍伏不動。聽其擇取。惟不敢傷蟒。蟒傷則諸蛇無主。環起噬人。聞其人云。蟒蛇自有此種。生而皆有王字。故不論大小也。蟒至則諸毒蛇皆不敢傷人。

治漏瘡。集驗取蟒油銅鍋內熬熟。隨將黃蠟入油內攪匀。油紙攤膏貼患處。十餘日便封口全愈。

按蟒蛇名王字蛇。其首天生有一王字。予於庚子在奉化長橋見丐者手握此蛇乞錢。其蛇亦不甚大。性頗馴良。因以千錢買得縱之。綱目諸蛇獨遺此。因急補之。

斷草烏

粵志。斷草烏出廣中。蛇也。大僅指許。長五六寸。頭如龍形而小。身純烏。其行也。百草沾之立斷。人見斷草輒跡得之。故蛇每離地丈許。使身如矢直以入穴。使不沾草。人莫得而跡之。此亦烏蛇中一種。綱目烏稍蛇不載龍頭者一種。故錄其遺。

治大麻風。煮酒服。

龍涎香_瀝龍

通雅。龍涎有嶼。在花面國傍。獨立南海中。彼人言於樹收之。最收香氣。今大內甜香用之。○澳門記略

大食國產龍涎香爲上。西洋產於伯西兒海。焚之則翠烟浮空。結而不散。坐客可用一翦以分烟縷。○
嶠南璣記。龍涎香新者色白。久則紫。又久則黑。白者如百藥煎。黑者次之。似五靈脂。其氣近臊。和香焚之。則翠煙浮空不散。試法將結塊者奮力投沒水中。須臾突起浮水面。或取一錢口含之。微有腥氣。經宿。其細沫已嘸。餘膠結舌上。取出就溼秤之。仍重一錢。又乾之。其重如故。雖極乾枯。用銀簪燒極熱鑽入枯中。乘暖抽出其涎。引絲不絕。驗此不分褐白褐黑俱真。海東札記。海翁魚。大者三四十觔。小者千餘觔。卽海鯀也。皮生砂石。刀箭不入。或言其魚口中噴涎。常自爲吞吐。有遺於海濱者。黑色淺黃色。不一。卽龍涎香也。聞上淡水有之。欲辨真贗。研入水攪之。浮水面如膏。以口沫燃成丸。擲案有聲。噙之通宵不耗分毫者爲真。每兩值數十金。廣志。新安有龍穴洲。每風雨卽有龍起去地不數丈。朱鬣金鱗。兩目如電。其精華在浮沫。時噴薄如澹泉。如雨。土人爭承取之。稍緩則入地。是爲龍涎。或謂龍涎多積於海上枯木。如鳥遺狀。其色青黧。其香腥雜。百和焚之。翠烟千結。蜿蜒蟠空。經時不散。可以翦分香縷。然多不真。從番舶來者。出大秦波斯。於雨中焚之。脰膚有聲者真。坤輿圖記。龍涎香。黑人國與伯西兒兩海最多。有大塊重千餘觔者。望之如島。每爲風濤湧泊於岸。諸蟲鳥獸亟喜食之。汪機本草。龍吐涎沫可制香。○星槎勝覽。錫蘭山國。卜刺哇國。竹步國。木骨都東國。刺撒國。佐法兒國。忽魯謨斯國。溜山洋國。俱產龍涎香。○稗史彙編。龍涎香白者。如百藥煎。而膩理極細。黑者亞之。如五靈脂而光澤。其氣

近於臊似浮石而輕香本無損益但能聚香耳和香而用真龍涎焚之則翠烟浮空結而不散坐客可用一翦以分烟縷所以然者入蜃氣樓臺之餘烈也泉廣合香人云龍涎入香能收斂腦麝氣雖經數十年者香味仍存○廣東通志龍涎在水采者褐黑色在山采者褐白色○東西洋考海傍有花若木芙蓉花落海大魚吞之腹中先食龍涎花嚥入久卽脹悶昂頭向石上吐沫乾枯可用惟糞者不佳若散碎皆取自沙滲力薄○范咸臺灣府志龍涎香傳爲鯀魚精液泡水面凝爲涎能止心痛助精氣以淡黃色嚼而不化者爲佳出淡水者皆淡黃色無黑色○朱國楨大政記龍涎香出蘇門答刺國西有龍涎嶼峙南巫里大洋之中羣龍交戲其上遺涎焉國人駕獨木舟伺探之舟如龍形浮海面人伏其中隨風潮上下傍亦用漿龍遇之亦不吞也每一觔值其國金錢一百九十二枚準中國銅錢九千文嘉靖三十四年下戶部取香百觔遍市京師不得下廣東藩司採買部文至臺司集議懸價每觔銀一千二百兩僅得十一兩上進內驗不同姑存之亟取真者部文再至廣州夷囚馬那別的貯有一兩三錢上之黑褐色密地都密地山夷人繼上六兩白褐色細問狀之黑者採在水白者採在山皆真不贗尋有密地山商再上通前共得十七兩二錢五分次年進入內辨驗是真許留用自後夷船聞上供稍挾來市始定價每一兩價百金龍涎之爲用也入香合和能收斂腦麝清氣雖數十年香味仍存得其真者和香焚之翠烟裊空不散涎沫有三品曰汎水曰滲沙曰魚食汎水則輕浮水面善水者伺龍

出取之。滲沙則凝積年久氣滲沙中魚食則化糞於沙磧惟汎水者可食香用又言魚食亦有二種海旁有花若木芙蓉春夏間盛開花落海大魚吞之若腹腸先食龍涎花嚥入久卽脹悶昂頭向石上吐沫乾枯可用惟糞者不佳○嶺南雜記諸香龍涎最貴市值每兩不下百千次亦五六十出大食國近海有雲氣罩山間知有龍睡下或半年一二載土人守視雲散則龍已去必得其涎五七兩或十餘兩衆共分之又大洋中有渦旋處龍在其下湧出之涎日燦成片風漂至岸取之又嶺外雜記龍枕石而睡涎浮水積而堅新者色白久紫甚久者黑氣近臊形如浮石而輕膩理光澤入香焚之翠烟浮空結而不散又出沒海上吐出涎沫有三品一汎水二滲沙三魚食汎水輕浮水面善水者伺龍出隨取滲沙凡風浪飄泊舟嶼積年氣盡於沙土中魚食涎作糞散沙磧氣腥穢進貢亦不過四兩

按龍涎論色則瑣記言有白與紫黑之分而札記又有淺黃色廣志有青黛色辨真偽亦諸說互異大抵不必論其色總以含之不耗投水不沒雨中焚之能爆者良東璧綱目鱗部龍下龍腦龍胎俱有主治而於龍涎獨遺之惟附其名云龍涎方藥鮮用惟入諸香云能收腦麝數十年不散出西南海洋春間羣龍所吐涎沫浮出者番人採貨之亦有從大魚腹中剖得者其狀初若脂膠黃白色乾則成塊黃黑色如百藥煎而膩理久則紫黑如五靈脂而光澤其體細飄似浮石而腥臊其說亦未確核蓋所云魚腹中得者卽札記所云海鯀魚之精也亦名龍涎出臺灣不若大洋中產者佳夫龍腦龍胎世上所

無龍涎則閩粵貨售者多東璧何得於罕見者載之於所有者反略之耶則甚矣該博之難也入藥用隔湯頓化如膠糖狀者佳

氣腥味微酸鹹無毒○藥性考味甘氣腥性濡○張瑤實云夾砂者有小毒乃土人於砂磧上收取之入藥須以甘草水煮過用○酉陽雜俎云龍漦遇烟煤則不散入藥忌鐵器及石膏

活血益精髓助陽道通利血脈○廖永言驗方云利水通淋散癥結辟精魅鬼邪消氣結逐勞蟲尸疰○陳良士云在澳門見倭夷用合船硫及他藥作種子丸云漢時術士和丹用此倭夷皆有其方祕不傳中國○札記云出淡水者止心痛助精氣○周曲大云龍涎能生口中津液凡口患乾燥者含之能津流盈頰微若有腥氣粵中夷人合龍涎丸和以他藥便不腥入口亦不耗減一丸可用數十年不敗如單用龍涎入藥須先用雞湯將龍涎制死則入腹便化否則入腹絲毫不損蓋極難尅化者方書云焚之其烟能入水孟子嘗試之多不驗

按龍乃東方之神其體純陽能噓氣成雲陽之質輕浮故雲上升其骨反入手足少陰厥陰經者蓋凡知覺運動之物皆肖陰陽以立體孤陽則不生龍秉純陽而骨反屬陰入藥能收陽中之陰治心腎諸病所謂一陰一陽之謂道也其質靈其齒能治魂遊不定鎮驚癇凡病在肝而龍主肝木治之最神涎乃陽中之陽故其氣絕香龍屬木木之氣得太陽多者必香故諸香以龍爲最得孟水徑撲其中不落

空外龍以水爲用見水則精入焉入藥所以能利水道分陰陽能殺精魅鬼邪者亦以至陰之物見真陽而立解也。

龍泄

河南薛姓客言曾在嘉興永太守處見有龍泄結成大塊其質亦輕有六七兩及觔許不等每塊皆起螺旋紋如象牙花紋其色有純黑有褐白二種欲辨真偽刮屑少許以滾水泡之其氣悉溢而成雲遇婦人雲輒撲入髮際旋繞不散蓋龍性好淫故也人服之入腹亦不耗惟見雞湯輒化如服後不食雞湯次日糞出其藥仍在色亦不改淘出洗淨復可再用氣亦不臭其功效食之能煖婦人子宮治男子下元虛冷入房術中用又史良宇言曾見龍血結塊如棋子大光滑可鑒觸手冷如冰夫龍純陽也而血獨冷又不解何故龍泄又何物也其涎與血歟抑精與溺歟俱不可知悉存其說以俟證

西楞魚

坤輿圖說大東洋海產魚名西楞上半身如男女形下半身則魚尾其骨入藥用女魚更效止血治一切內傷瘀損等症

鱗魚鱗

本經逢原鱗魚性補溫中益虛而無發毒之慮其生江中者大而色青味極甘美生海中者小而色赤

味亦稍薄。觀其暗室生光，迥非常魚可比。○綱目主治言：其肉補虛勞，油塗湯火傷，於集解下記其鱗爲婦人鈿飾，不及入藥功用。○張佳時云：鯽魚須乘活時拔划水邊二鱗，尖長者佳。若死魚鱗便減藥力。

湯火傷 逢原云：用鯽魚鱗香油熬塗立效。茅集之云：鯽魚鱗貼腿瘡疼痛立效。

治疗 陳氏傳方：疔瘡用鯽魚鱗貼上，則咬緊先須與酒飯吃飽，然後將魚鱗邊略揭起些須，用力急揭去，疔根便帶出也。但揭出疔根時極痛無比，非醉飽卽量倒也。○傅氏方：水疔用鯽魚腮下近腹處有划水二瓣，瓣間有長鱗二瓣最佳，但難得。今人以背上大鱗代之，貼上卽消。○毛世洪經驗集：鯽魚醫用手剖下，不可見水陰乾收貯此拔疔第一妙藥也。用時以銀鍼撥開疔頭，將一片貼上，以清涼膏蓋之。俟一宿揭開，其疔連根拔出後，用生肌散收功。予治兩貴婦大腳趾患瘡，二三年不收功，將醫一片，以銀花湯浸軟拭乾貼之，不數日而愈。

下疳 救生苦海：鯽魚鱗焙乾研白色，名白龍丹，敷之卽愈，得此可包醫。

血痣 蔡雲白言：人生血痣，挑破血出不止者，用鯽魚鱗貼之，卽癒而愈。

苦魚

劉基苦齋記：匡山在處州龍泉縣劍溪之水出焉，注入大谷，其中多斑文小魚，狀如吹沙，味苦而微辛。

可食故名。

解酒毒可以醒酒。

藥性考苦魚微辛形細色斑烹食腴美消酒除癆。

金魚

此魚自宋南渡始有一名硃砂魚乃人家蓄玩於盆盎中者有三尾四尾品尾金管銀管之分有蛋魚名龍蛋文蛋虎頭及鱗諸品純紅純白或紅白相間體具五色極大者三四寸小者寸許綱目金魚條云主治痢而所用乃金絲鯉魚按金魚雖有鯉鯽鱗諸種殊不知鯉魚中一種紅鯉名金鯉鯽魚中一種紅鯽名金鯽皆有金魚之名與此全別而東璧合爲一則誤矣。

味苦微鹹有小毒食之令人吐綱目本條氣味下云甘平無毒此指紅鯽而言並非今之金魚也。
解服滷毒用金魚一二枚搗之灌下吐出涎水自甦。

治瘋癲石蠍水臌黃疸慈航活人書俱用紅色金魚一個取三尾者甘蔗大者一二枚同搗爛絞汁服立刻卽吐出痰涎愈。

阿羅魚

一首十身音如吠犬亦可禦火珍異藥品。

療癰疽

漢陂魚

輿地志。鄂縣漢陂出魚。味美可入藥。

治痔。

四足魚

物理小識。游子六曰。閩高山源有黑魚。如指大。其鱗卽皮。四足。可調粥入藥。
治小兒疳。

河豚目子。

逢原云。抉河豚目。拌輕粉埋地中化水。拔婦人腳上雞眼瘡可以脫根。

河豚子

性有毒。可絕壁蠶。行篋檢祕同。鱗殼樟冰各五分。拌棉花子安牀下燒烟熏之。

蛻娘魚

三才藻異產。撫仙湖狀如龜殼。青大如盤。無尾。八足。腹白。

食之辟瘴毒。

蜜姑魚

宦遊筆記。自光溪入四明二十餘里。有蜜巖。峭壁千尋。下臨深溪。窅洞無底。巖頽舊有蜂窩。聚蜂數百萬。其蜜滴下。溪魚食之。故魚味甘絕。曰蜜姑魚。其釣法倍多曲折。魚性極喜苦。須繩懸崖下。有水衣演漾深碧而細者。剝以爲餌。魚性暴。遇釣則跳巖。卒不可制。而蜜巖下溪水清甚。用粗綆。則恐魚之警見而驚遊也。用細絲。則又恐不足以勝魚跳巖之力。釣者乃取絲長十餘丈。盤於竿上。遙望見深波中魚。覩覩鼓鬣而至。則取絲徐徐放之。如小兒之送紙鳶者。使得縱其所往。魚入鉤果一躍數尺。翻波跋浪。橫激溪面。其鱗光閃爍。如千片碎金。雜珠顆中。隨風散灑。觀者莫不目眩心動。已而徐徐力倦。乃可取之。

性溫味甘。食之生胃津。益肺氣。補血脈。增髓去熱。除虛羸。壯筋骨。止嗽定喘。功同燕窩蛤蚧也。

按此魚最潔。惟食苦蜜。苔寒而蜜溫。得水火既濟之力。大能補土生金。燕窩性清肅而下行。蛤蚧性和中而溫臟。此則故能兼之。真勞嗽虛羸之食品上藥也。柳崖外編載張方海浙人。少年讀書四明。嘗斷炊者數月。山礀谷多竹。峭壁有蜜。蜜入江化爲魚。名蜜鮎。張遂掘笋釣鮎而食。自言笋味淡以清。蜜鮎濃而美。有天台胡麻所不如者。嗣後遂輕身耐寒暑。不復思烟火味。據此則其功用信不誣也。

粵語鯉魚廣人池塘多蓄之以魚秧長成與鯽性相反鯽屬土其性沈長潛水中鯉屬水其性浮長躍水上鯽食之可以實腸鯉食之可以行氣鯽守而鯉行性各不同如此其物以冬而肥故名喜泳浮波上得渾流則跳躍尋丈生食之益人氣力○梧澤雜佩鯉魚形似鰱而稍短味甚美作膾尤佳健筋骨活血行氣逐水利溼

帶魚

出海中形如帶頭尖尾細長者至五六尺大小不等無鱗身有涎乾之作銀光色週身無細骨止中一脊骨如邊箕狀兩面皆肉裹之今人常食爲海鮮據漁海人言此魚八月中自外洋來千百成羣在洋中輒啞尾而行不受網惟釣斯可得漁戶率以乾帶魚肉一塊作餌以釣之一魚上釣則諸魚皆相啞不斷掣取盈船此魚之出以八月盛於十月霧重則魚多霧少則魚少率視霧以爲貴賤云網目無鱗魚條獨遺此品故爲補之○五雜俎閩有帶魚長丈餘無鱗而腥諸魚中最賤者獻客不以登俎然中人之家用油沃煎亦甚馨潔○福清志帶魚身薄而長其形如帶無鱗入夜爛然有光小者俗名帶柳○物鑒帶魚形纖長似帶啞尾而行漁人取得其一則連類而起不可斷絕至盈舟溢載始舉刀割斷捨去其餘○玉環志帶魚首尾相啞而行釣法用大繩一根套竹筒作浮子順浮洋面綴小繩一百二十根每小繩頭上拴銅絲一尺銅絲頭拴鐵鉤長三寸卽以帶魚爲餌未得帶魚之先則以鼻涕魚代

之凡釣海魚皆如此。釣期自九月起至次年二月止。謂之魚汛。○朱排山柑園小識。帶魚生海中。狀如鰻銳首扁身。大眼細齒。色白無鱗。脊骨如籠。肉細而肥。長二三尺。形如帶。亦謂之裙帶魚。冬時風浪大作。輒釣得之。藁爲煮。以致遠。

味甘性平和中開胃。食物

宜忌

帶魚形長扁薄似帶。色白無鱗。肉細佳。膾醃鮓風乾久藏不敗。煎烹味美。多食發疥。註帶魚啞尾而行。得一可連數十。醃食佳。黑夜有光。故有毒。藥性考

血鰯

出浙江寧波府慈谿縣。以白龍潭產者爲第一。他產者尾尖尚黑。不能通體如硃砂紅也。葛三春言白龍潭血鰯周身紅如血。每年所產亦稀。取其血沖酒飲可以驟長氣力。行伍中學習八段錦工夫者。多服之。

增氣力壯筋骨益血填髓。

沙魚翅

沙卽鮫魚種類甚多。皆可食。網目鮫魚條集解下瀕湖註云。沙魚腹下有翅。味並肥美。南人珍之。主治下特載其肉皮膽之功用。翅獨略焉。今人習爲常嗜之品。凡宴會餚饌必設此物爲珍享。其翅乾者成

片有大小率以三爲對。蓋脊翅一划水翅二也。煮之折去硬骨。檢取軟刺色如金者。淪以雞湯佐饌。味最美。漳泉有養好剔取純軟刺作成團。如胭脂餅狀。金色可愛。名沙刺片。更佳。

味甘性平。補五臟。消魚積。解蠱毒。食物宜忌。益氣開膈。托毒長腰力。聞部食疏。清痰開胃進食。藥性考

土附

嘉興縣志。一名菜花魚。以其出於菜花時最肥美。故名。程大昌演繁露。土部吳興人呼爲鱸鱠。以其質圓而長。與黑鱈相似。其鱗斑駁。又似鱸魚。故兩名之。長興謂之蕩部。又曰蕩魚。湖州府志。鮒魚今呼土部。此魚質沈。常附土而行。不似他魚浮水遊也。故又名土附。錢塘縣志。土鰲俗名土哺。以清明前者佳。藻異云。吐哺產杭。本名土附。以其附土而生也。色黑味美。兩航雜錄。吐哺或曰食物嚼而吐之。故名。敏按美上諸說。皆無杜父之名。而綱目載杜父魚云。其色黃黑有斑。脊背上有鋸刺。螯人。又名渡父魚。黃鰣魚。船石魚。伏念魚似與土附絕不相類。沈雲將食纂陳芝山食物宜忌。皆以爲今之土部魚即杜父魚也。此乃承山堂肆考之誤。今土部杭城甚多。一年皆有。惟正二三月獨旺。背黑亦有淡黑帶土黃色者。不聞能刺人。俗云此魚立冬後則伏土閉眼不食。冬至後出土附土而行。清明後開眼。遍食小蟲蝦。故有毒。陳芝山云。土部清明後頭上生紅蟲。不可食。細核其形狀食性。與杜父全不相類。何能強合。予故於禽蟲考中魚類辨之甚詳。以杜父入吹沙類。而另立土附本條。蓋不敢附古人而欺後世也。土部

綱目所無復爲補之。

味甘性溫。○補脾胃治噎膈除水腫溼氣療一切瘡疥此物又能扶陽其子用燒酒醉食頗能興腎與對鯛同功以其食鯛力也。

子助相火煖腰腎。

烏魚蛋

產登萊乃烏賊腹中卵也藥性考以爲卽雄魚白味鹹開胃利水。

青魚膽

梧澤雜佩青魚膽出藤縣之禡禡字不見字書讀如萱郡人亦有此姓洲在江中長可五六里許其上居民甚多水多石上青苔此魚食之其膽極涼可入藥他處卽不堪用魚大者百餘觔漁人網得必以開官割取其膽乃鬻於市。

白皮子

蟫史蛇生南海四五月初生如帶至六月漸大如盤形似白綠絮而無耳目口鼻鱗骨一段赤色破碎者謂之蛇頭其肉如水晶以明礬醃之吳人呼爲水母鮮久則漸薄如紙俗呼爲白皮紙按今所云白皮紙乃海蟄外面之皮非陳久之海蟄也一名秋風子○朱排山柑園小識海蛇上有白皮潔白肥美。

過於海蛇。謂之白皮子。○綱目載海蛇名水母。人以石灰礮水醃之。去其血水。色乃白。其形最厚者。謂蛇頭味更勝云。而不錄其外皮之用。且其言性暖可治河魚腹疾。而農田餘話云。水母本陰。海凝結之物。食而暖。其性未詳。東壁亦無發明。敏曾居東甌數年。見土人販蛇爲生者。詢之。據言其物確係海水所結。東南海俱鹹。遇春夏天雨在海中者。一滴雨水入海。輒有一小泡凝聚海面。初則大如豆。隨波逐蕩。受日烘染。漸長大成形如笠。上頭下脚。塊然隨潮而行。土人撈蛇者。每於海塗間插竹爲小城。以稻草作網圍之。潮長。蛇隨潮而來。入竹城爲網所絡。不得去。然後取之。以刃斲其中段。砉然而開。有似腸胃穢積者。落落交下。名蟄花。食之亦最美。再以礮灰醃而售之。按海爲陰水。天雨水屬陽。相入而感。便生此物。受太陽真氣。所以日漸長大而性暖也。

味鹹澀。性溫。消痰行積。止帶祛風。

貼爛腿。救生苦海。用白皮子照瘡大小翦作膏貼。內摻銀硃。

無名腫毒。集聽方。用白皮子一片。白糖霜揉軟。中開一孔。貼上。重者潰輕者散。又止痛。

流火。文堂集驗。取海蟄皮薄者貼上。燥則易之。

頭風。貼兩太陽。能拔風溼外出。

膝髓風溼。以白皮子貼之。

消痞。王聖俞云。有二方。一用白皮子同荸薺燒酒浸服。一用白皮子荸薺同煮。止食荸薺。自消痞也。
○程克庵云。凡小兒一切積滯。用荸薺與海蟄同煮。去蟄食薺。則諸積自消。亦以積非寒不滯而成海
蟄能暖水臟。荸薺化堅。相因而用。其效故捷也。同壽錄載其方治痞。用大荸薺一百個。古錢二十個。海
蟄一觔。皮消四兩。燒酒三觔。共浸七日後。每早喫四錢。加至十個止。即愈。

鮀魚

演程記。雲南百夷中有小孟貢江。產鮀魚。彼夷食之。日御百婦。故夷性極淫。貴賤俱數妻。其地亦產蠶。○說略云。鮀魚產孟貢江。牡者恆多牝而遊。夷人常食其肉。一日能御百女。入藥用雄者。壯陽道固精髓。八十老翁服之。多子。

介部

海龍

赤嵌集。海龍產澎湖澳。冬日雙躍海灘。漁人獲之。號爲珍物。首尾似龍。無牙爪。大者尺餘。入藥。譯史。此
物有雌雄。雌者黃。雄者青。

功倍海馬。益房宿。催生尤捷。效握之即產。

百草鏡云。海馬之屬有三。小者長不及寸。名海蛆。不入藥。中等者長一二寸。名海馬。尾盤旋作圈形。扁

如馬其性溫味甘，緩水臟壯陽道，消瘕塊。治疗腫產難血氣痛。海龍乃海馬中絕大者，長四五寸至尺許不等。皆長身而尾直，不作圈。入藥功力尤倍。雖同一類形狀，微有不同。此物廣州南海亦有之。體方周身如玉色，起竹節紋，密密相比，光瑩耀目，誠佳品也。○介語鰕姑一名海馬，其扁如蜈蚣者燒服，主夜遺。

海牛

本草原始。海牛生東海，海蠃之屬。頭有角如牛，故名。其角硬尖銳有紋，身蒼色，有龜背紋，腹黃白色，有筋項花點，魚尾。今房術中多用之。

氣味鹹溫無毒，主治益腎，固精興陽。

白鼈

粵志：白鼈可以治痰火，其初得之神授。廣人甚珍之。有口號曰：烏耳蟬，白甲魚。滋陰降火，只須臾。一名玉鼈龍，以其背上側起如鼈龍也。連首白者良，甲白而首足仍青者不及。

補虛勞，愈痰火，滋陰降氣，養血益精。

鼈膽

盧之頤云：鼈無耳，以眼聽，故其目不可警。識精於明，復識於聰也。不惟精專肝竅，膽亦異衆，而味大辛。

穹脊連脅。脅亦少陽膽府所屬。此木金交互。故得聲色疊用。而肝爲膽藏。取決更相親耳。本草乘雅云。味辛。開聲瞽。除癥瘕。瘡瘍積癰肉惡陰蝕痔核。今人以入房術用。風斯下矣。痔瘡痔漏。家寶方。鼈膽一個。取汁磨香墨。入麝香冰片少許。雞毛蘸塗。

物理小識云。鼈膽最辣。通竅尤捷。此人所未知者。

蠅殼

綱目蠅條止載其肉。云治冷痢。補虧勞。不及其殼之功用。

治喉風急癆。萬選方用蠅殼置瓦上日曬夜露。經年取下。色白如雪。擣細水漂淨末。曬乾同冰片吹喉。專治咽喉一切急症。立愈。

海蠣

杭州府志。海蠣。杭俗立夏以爲應時之味。以花椒灑之。麻油拌食。○從新云。比螺螄身細而長。殼有旋紋六七屈。頭上有唇。春初蟻起。叮海崖石壁。海人設網於下。一掠而取。治以鹽酒椒桂。按海蠣有大如指長一二寸許者。名釘頭螺。溫台沿海諸郡多有之。海蠣螺生海塗中。立夏後有人見其羣變爲蠚。今人所稱豆娘是也。或云此螺能跳丈許。蓋遷其處。此物又能食蚶。明州奉化多蚶田。皆取苗於海塗種之。久則自大。時田者不時耨視。恐有海蠣苗。蓋蚶不畏他物。惟畏海蠣。蚶田中一有此物。蚶無遺種。皆

被其吮食盡。玉環出者大如指。名釘頭螺。

鹹寒。治瘰癧結核。能降鬱氣。

辟蛆。雲客傳方。立夏日食海螻後。以殼七枚。勿令人見。撒廁中或馬桶內。暑日不生蛆蟲。頗驗。

吐鐵

沈雲將食物本草曰。吐鐵。海中螺屬也。大如指中。有腹如凝膏白。其殼中吐膏。大於本身。光明潔白可愛。姑蘇人享客。佐下酒小盤。爲海錯上品。一名麥螺。一名梅螺。產寧波者大而多脂。餘姚者不及。生食之令人頭痛。土人以鹽漬之。去其初次涎。便縮可食。○海味索隱曰。土鐵一名泥螺。出寧波南田者佳。五月梅雨後收製。○會稽志。吐鐵歲時含以沙。沙黑似鐵。至桃花時。鐵始吐盡。見只編云。九月可食。蓋此物產泥塗。以泥爲食。八月至九月不復食泥。吐白脂晶瑩塗上。比他月出者佳。○福州府志。吐鐵爲海錯上品。色青外殼亦軟肉黑如鐵。吐露殼外。人以醃藏糟浸。貨之四方。別有小如菉豆者。桃花時方有名。桃花吐鐵。產泉州者名曰麥螺。○楷弟觀頤錄云。吐鐵出海寧者無脂多泥。肉韌不堪食。出寧波者極大。多脂無泥。肉胞水洗三次。用甜生白酒浸半日。待鹽味出。換白酒釀。加燒酒。或單用燒酒浸。亦可。必多入白糖。藏久不壞。○柑園小識。吐鐵生海中。微似扁螺。殼薄而白。肉青黑色。大者多脂。以鹽漬之。可以致遠。

甘酸鹹寒補肝腎益精髓明耳目。

按吐鐵色青得甲木之氣以斥鹵爲食不復他食更得土之餘潤而生脂膏八九月不食土者以秋金盛而木氣衰故吐泥而不食其能補肝腎益精髓亦猶脾土得養化津液上升而并及耳目也東壁以蓼螺爲泥螺味酸入肝二物形質不同性味亦異則強合爲一誤矣此物又能潤喉燥生津予庚申歲二月每患燥火入夜喉咽乾燥舌枯欲裂服花粉生津藥多不驗一日市吐鐵食之甘至夜咽乾亦愈可知生津液養脾陰之力大也。

田螺涎

保元方田螺涎能去水腫用田螺不拘多少水漂加香油一盞於水內其涎自然吐出取曬乾爲末每服不過三分酒調下水自小便下氣自大便出腫即消再服養脾胃藥全愈。

蛤蜊肉

厚殼紫口而圓者曰蛤蜊綱目本條下載其肉性寒而謂高武宗痘疹正宗以爲可發疹及治痘毒入目取其汁點之說爲謬不知其肉惟性寒方能解熱藥之毒正取其與丹石相反爲用耳。

治癰疔痘毒集聽載一捻金方治一切癰疽腫毒初起最驗兼治疗瘡喉風蛇傷犬咬及小兒痘毒乳香一錢雄黃三錢血竭錢半此三味不必製沒藥一錢明礬一錢硃砂三錢紅信六錢麝香六分蟾

酥一錢，蛤蜊肉二錢，蜈蚣三錢，甲片炒三錢，殭蠶一錢，川烏一錢，牙臙四錢，共爲末，以磁罐貯之。大人一分五釐，小人七釐，強者二分亦可。將葱白三寸搗爛，和藥爲丸，好酒服下，取汗再服，不必汙。

蜆腊

蜆生沙泥中，江湖溪澗多有其類，不一有黃蜆、黑蜆、白蜆、金口玉口等名。黃蜆殼薄肉肥，黑蜆殼厚肉薄，又番禺草浦地方產無耳蜆，更甘美異常。凡蛤之屬皆能孕子，而黃蜆化蛾而散卵，白蜆藉霧以生形，則又一異。海南介語：「蜆在沙者黃，在泥者黑。」蜆老則肉出小蛾而蜆死，小蛾復散卵水上爲蜆。凡南風霧重，則多白蜆。北風霧則否。蓋白蜆之生生於霧，霧味鹹，鹹爲白蜆所生之本。始生時，白蜆之形如霧自空而下，若無若有人見以爲霧也。漁人知之，以爲天雨蜆子也。蜆子旣成，以天暖而肥，寒而瘠，在菱塘沙灣二都江水中，積厚至數十百丈，是曰蜆塘，其利頗大。綱目蜆下集解，尙欠詳晰，且其主治下殼肉、蜆水皆載，而蜆腊無聞焉。特采介語以補。

解蟲，并治不服水土。介語。

蚌淚

蚌中水也。蚌生淡水中，色蒼入肝，故有清熱行溼治雀目夜盲之力。綱目載蚌肉及蚌粉功用，獨遺其殼內所含之水，不知此水乃真陰天一之精，入藥最廣，特爲補其缺。

清熱安胎消痰除溼解酒積丹石藥毒。

初生小兒啞驚。逢原云用活蚌水磨墨滴入口中少頃下黑糞而愈。
湯火傷用生蚌炙水塗之。

西施舌

屠本畯曰沙蛤土匙也產吳航似蛤蜊而長大有舌白色名西施舌閩部疏曰海錯出東四郡者以西施舌爲第一蠣房次之西施舌本名車蛤以美見謚產長樂灣中本草從新西施舌浙溫州有之生海泥中似車螯而扁常吐肉寸餘類舌故名○敏按臨安館劉芳洲明府署中劉爲諸城相國胞姪據言介屬之美無過西施舌天下以產諸城黃石瀾海濱者爲第一此物生沙中仲冬始有過正月半即無取者先以石碌碡磨沙岸使沙土平實少頃視沙際見有小穴出泡沫卽知有此物然後掘取之綱目海蛤蛤蜊條中獨遺此今依吳氏從新本補之

甘鹹平益精潤臟腑止煩渴爲補陰要藥從新

宦遊筆記西施舌似車螯而扁生海泥中一名沙蛤長可二寸常吐肉寸餘類舌俗以其甘美故名

石拗

俗呼龜脚蟶海濱多有之古未聞入藥瀕湖獨增此品止載其能利小便不知其別有功用今依介語

補之。

朱排山柑園小識。龜腳蟬形似龜腳。生海中石上。殼如蠍螯。其色紫可食。卽石蠍也。江淹有石蠍賦。下寒澼消積痞溼腫脹虛損人以米酒同煮食最補益。介語

乾鰕子鰕米
鷺爪

對鰕

鰕生淡水者色青。生鹹水者色白。溪澗中出者殼厚氣腥。以其得土氣薄也。湖澤池沼中者殼薄肉滿。氣不腥味佳。海中者色白肉粗味殊劣。入藥以湖澤中者爲第一。以鰕煮曬乾去殼。大者曰鷺爪。小者曰鰕子。名曰鰕春。錢塘八月潮盛時江濱人俟潮退後率於江沙淺水處撈取鰕子入市貨賣。點者以腐渣攪和須取少許置銅鑊中和鹽炒之。色純紅者乃真。多醃藏貯作來春食品。綱目鰕及海鰕分條明晰。於鰕內集解下載鰕米。海鰕集解下載對鰕。皆不立主治。僅云充饌品而已。故悉爲補正其缺。

鰕米

味甘性平逐風痰。胡潛法製編有蛤蚧鰕製法。云食之補腎益陽。鰕米一斤。蛤蚧二枚。茴香蜀椒各四兩。並以青鹽化酒炙炒。以木香末一兩和勻。乘熱收新餅中。密封每服一匙。空心鹽酒嚼下甚妙。

鷺爪

味甘性平治疣去癬

宜忌食物

治無乳及乳病鰯米酒 鮮鰯米一片取淨肉搗爛黃酒熱服少時乳至再用豬蹄湯飲之一日幾次其乳如泉

宣吐風痰

不藥良方連殼鰯米半斤入葱薑醬煮汁先吃鰯後吃汁緊束肚腹以雞翎探引取吐

赤白遊風

不藥良方鰯米搗碎傅之

鰯子

鮮者味甘醃者味鹹甘皆性溫助陽通血脉

俱見宜忌

○敏按粵語云鰯春非鰯子也江中有水蟻大僅

如豆其卵散布取之不窮然則鰯春之性當與鰯性有別陳芝山助陽之說或未加精核耳

對鰯

粵志蹲鰯產鹹水中大者長五六寸出水則死漁人以絲黏網其深四尺有五寸六寸者仄立海中絲柔而輕蹲鰯至則鬚尾穿罣弗能脫也兩兩乾之爲對鰯鮮者肉肥白而甘○朱排山柑園小識海鰯礫鬚鐵鼻背有斷節尾有硬鱗多足而好躍大於溪河所生長尺餘鬚可爲簪土人兩兩乾之謂之對鰯以充上饌○宦遊筆記淮海產對鰯長數寸兩兩乾之勾結如環烹以爲羹味鮮美居人往往以享客且可致遠或曰以雌雄爲對但當懷子既散之後雌雄亦無從辨至其出時自正月望後始二三四

月大盛，端陽而後卽杳不可得，亦物理之不可推者也。

補腎興陽燒酒浸服

治痰火後半身不遂，筋骨疼痛。醫學指南核，桃仁、棉花子仁、杜仲炒、巴戟、硃砂骨碎補、枸杞子續斷、牛膝各二兩。大鰯米四兩、兔絲餅四兩，用燒酒二十觔煮服。如年高者加附子肉桂各一兩，酒服完將渣曬乾爲細末，蜜丸每服二錢，酒送下。

鰯醬

粵語鰯醬以香山所造爲美。曰香山鰯，其出新甯大襟海上下二川者亦香而細，頭尾與鬚皆紅，白身黑眼。初醃時每百觔用鹽三觔，封定缸口，候鰯身漬爛，乃加至四十觔鹽，於是味大佳，可以久食。

解毒樹蠱。廣有毒樹蠱，其樹無花結子，如牛姻，食之立死。以鰯醬解之。

宦遊筆記。遼東大凌河出鰯醬，鰯油皆甘美。平海又出一種小鰯，名紅毛子，作鰯醬尤佳。今浙江甯波及蘇，皆有鰯醬，味亦佳。

石上螺螄

俗名鬼螺螄，形如海螄而小。秋冬常在牆腳石隙中，夏月在溼地青苔上，取用洗去土，治黃疸。慈航活人書取石上螺螄半盞，搗如泥，無灰白酒頓熱冲服之。

疔。濟世良方黃風膏治疗瘡及頭面熱毒瘡。雄黃一兩釘鑄。白梅肉各五錢。消風散一兩。夏月加鬼螺蠣二十個。共研細末。苦鹽滷調勻。貯密罐內。凡患疔腫毒瘡。用銀鍼挑破毒頂。敷上此藥。以綿紙蓋定。其毒收斂不走。三日後即愈。○黃氏醫抄。取細長小鬼螺蠣搗爛。連殼敷患處。露頭出膿。次日即可消。

拔疔。保合堂祕方。鬼螺蠣一個。荔枝核三個。煅存性白梅肉六個。共搗爛成膏。貼之。取出疔根後。用八寶丹收功。

鼻疔。慈航活人書。花盆中青螺二三個。同鹽搗塗立效。

白火丹。集聽丹有五種。青黃赤白黑。黃白易治。黑丹莫救。青丹十日內可治。赤丹亦然。俱不可見燈火。食鹽物治法。取溪澗中鬼螺蠣酒煮食。即消痕瘡氣悶者。食數次愈。

三漏丸。活人書。治穿屁漏。通腸漏。瓜簾漏。皆溼熱之邪毒。殺蟲退管穩當之劑。土蜂窩煅。鬼螺蠣煅。蟬蛻煅。各七錢。乳香。沒藥。川草薢。酥炙。陳櫻煅。管仲煅。各五錢。豬懸蹄甲煅。十個。刺蝟皮炙。一個。雷丸三錢。黃蠟四兩。化開。加麻油六七匙。入藥爲丸。桐子大。每服六七十九。空心白湯下。

通經。周氏家寶。鬼螺蠣十四個。研碎。油紙攤貼臍上。縛定週時。此螺生在陰處。

雪蝦蟆

憶舊遊詩話巴里坤雪山中有之。醫家取作性命根源之藥。軍中人爭買之。一枚價至數十金。且不易得也。○朱退谷曾於吳門見之。云遍身有金線紋。其形絕似蝦蟆。

性大熱。補命門。益丹田。能回已絕之陽。功兼參附。火盛者不可服。

內造伏虎丹。祕方集腋。興陽種子。強腎助神。用真川貝母四兩。須四製。第一次用大附子一個。童便一湯碗蒸切細。乾燒酒三湯盃。韭菜汁三湯盃。同入砂鍋。將貝母煮乾。去附子不用。第二次用雪蝦蟆一兩。無則以大蛤蚧一對代之。用石敲碎。亦用燒酒韭汁各三碗。同貝母煮乾。去蛤蚧不用。第三次用吳茱萸一兩。亦用酒韭汁各三盞。同貝母煮乾。去茱萸不用。第四次用公丁香五錢。亦用酒韭汁各三碗。同貝母煮乾。去丁香不用。製完。其貝母爛如泥。置石臼中。舂再入真阿芙蓉一錢。乳製蟾酥三錢。麝香五分。拌勻作條。焙乾收貯。用時唾津磨擦。

雪裏蝦蟆性熱微辛。壯陽卻冷。痿弱能興。藥性

海參

閩小記云。閩中海參色獨白。類擣以竹簽。大如掌。與膠州遼海所出異。味亦淡劣。入藥以產遼海者良。紅旗街出者更勝於綠旗街。有刺者名刺參。無刺者名光參。入藥用大而有刺者佳。一名海男子。有梗。

糯二種而黑膩者尤佳人以腎爲海此種生北海鹹水中色又黑以滋腎水求其類也○百草鏡云南海泥塗亦產海參色黃而大無刺肉亦硬不中食品土人名曰海瓜皮言其如瓜皮之粗韌也以其充庖煑豬肉食可健脾入滋補陰分藥必須用遼東產者亦可熬膏作膠用○藥鑑海參出盛京奉天等處者第一色黑肉糯多刺名遼參刺參出廣海者名廣參色黃出福建者皮白肉粳糙厚無刺名肥阜參光參出浙江甯波者大而軟無刺名瓜皮參品更劣矣○關東韓子雅言海參生東海中大小不一體滑如蜒蚰能伸縮羣居海底遊行迅疾取參者用海狗油滴水海水乃清見底見有海參卽入水取之此物沾人氣便不動先以兩手探握置頸兩傍再取置肋下次及兩腿胯下膝皆可夾取此物一沾人氣卽不動然後出水以刀剗去腸胃石灰醃去腥涎令體肉緊密乾之乃縮至寸許其實生者大如瓜長尺許也若乾者寸外生時體更大可知○蓬萊李金什言海參亦出登州海中與遼東接壤所產海參亦佳彼土人言海參多伏海中大石上水深不可見取參者必用海狗油滴入水中則有一量散開清澈見底然後入水取之每每遭鯊魚毒害故其價亦不廉其體生者身多滑涎去腸胃以灰醃去腥涎乾之出售每多灰鹹氣也○福山陳良翰云海參生北海者佳爲天下第一其參潛伏海底至二三月東風解凍時多浮出水面在海塗淺沙中孳乳入水易取然腹中出子後惟有空皮皮薄體鬆味不甚美價亦廉識者賤之名曰春皮四五月則入大海深水抱石而處取之稍難體略肥厚至伏月則

潛伏海中極深處石底或泥穴中不易取其質肥厚皮刺光澤味最美此爲第一名曰伏皮價頗昂入藥以此種爲上若秋冬時則又蟄入海底不可得矣○五雜俎海參遼東海濱有之一名海男子其狀如男子勢然淡菜之對也其性溫補足敵人參故名曰海參○藥性考海參遼產者佳吳浙閩粵者肥大無味虛火燥結同木耳切爛入豬大腸煮食歌云海參鹹寒降火滋腎通腸潤燥除勞怯症遼產小佳刺密胞硬南產厚大肉味稍遜

甘溫 食物宜忌味甘鹹補腎經益精髓消痰涎攝小便壯陽療痿殺瘧蟲

生百脈血。臨安儒醫盛天然語予云曾往青山里視一婦人病眼鼻口耳髮根皆出血下部亦然其人已昏不知人詢其夫得症之由數日前受驚而起時天酷暑大旱又中燥烈之氣致血溢奔騰上下散出卽不救矣諸醫皆斂手無策盛有叔曾於都中得一方專治此症幸尙記憶遂急喚人取山泉一桶燒酒一觔挾婦起坐裸其小腿先以燒酒淋之俾酒從踝下卽滴入水桶內淋訖然後將腿置水中一飯頃其上下血卽止婦亦甦面色如粉急叫人覓壯年乳婦以乳哺之再用海參半觔切片焙爲末每次調服三錢日三服蓋海參能生百脈之血若失血過多必須以此補之其生血之功捷於歸芍也治休息痢。宋春暉云餘姚有孝子某其父患休息痢經年垂危孝子日走神廟祈求醫藥如是月餘一日途遇老人教以用海參每日煎湯服不數日全愈。

治潰瘍生蛆。慈谿楊靜山云。曾有人患癰破爛。內生蟲蛆。纍纍千百計。治以殺蟲藥無效。一老醫以海參片焙末敷之。蛆皆化黃水。然後以生肌膏貼之。愈據言。凡一切金創及疽毒破爛。交暑內潰生蛆。惟海參末可療。○不藥良方。夏月潰瘍生蛆。係陰溼所化。海參爲末摻之。或皁礬飛過爲末摻之。皆化爲水。

隊隊

游宦餘談。隊隊形如壁蠶。生有定偶。緬甸有之。夷婦有不得於夫者。飼於枕中。則其情自合。故不惜金珠以易。○詹景鳳小辨。同年蘇侍御民傑。按雲南還語。予雲南有小蟲。名曰隊隊。狀如蠶。出必雌雄隨人偶得之。以賣富貴家。價至四五金。富貴家貯以銀匣。置枕頭內。則夫妻和好無反目。此則物氣之正人也。

入媚藥治夫婦不和。

風蛤

職方考。閩邵武府出風蛤。類蝦蟆。峨嵋峯麓之數村。每春初東南風起。則此物滿牀廚間。土人取而脯之。性溫。煖治風及手足拘攣折傷。

飯蒼蠅

謝天士云蟲中各種俱入藥用惟飯蠅無用故本草不載其主治予精思十年求其主治不可得嘉慶庚申偶在東江晤柴又升先生云昔在台州患面疔初起卽麻木癰幾入骨不可忍山中倉卒無藥有教以用飯蠅七個冰片一二釐同研爛敷之卽不走黃如言果癰定次日漸痊旬日而愈束疔根不走黃塗瘡疤卽生髮

吳秀峯用以塗小兒癩愈後脫疤不長髮用此搗塗立生

塞鼻治拳毛倒睫藥性考

蠟蜂

粵志陽春有蠟蜂嘗附橄欖樹而生雖有首足與木葉無別須木葉凋落乃得之土人以置篋笥每遇蠱毒必鳴鳴則自呼又以其聲之清濁卜禍福佩之辟蠱

蜜蜂

綱目止用子云入足陽明太陰而無用蜂者赤水元珠有治療癰方用之爲補於後

赤水元珠云蜜蜂同杏仁葉蝙蝠蛇蛻治瘰癧神效

苦蜜

出處州劉基苦齋記匡山之巔四面峭壁風從北來大率不能甘而善苦故植物中性之苦者莫不布族而羅生焉野蜂巢其間采花髓作蜜味亦苦山中方言謂之黃杜初食頗難久則彌覺其甘按綱目言蜜有黃連蜜味苦不知更有天成自然之苦蜜故補之

除積熱已煩渴解熱痢暑積驅風丸藥中用之更佳老人腸燥以一盞和酒食尤宜

蜜虎

似蜂而大首尖身圓狀如橄欖形有兩翼亦如蜂翅遍身生毛花斑色尾有短毫鋪張如鵝尾鼻上有鬚二根喜入花心中以鬚鉤取花蕊而出其鬚能伸縮屈曲如象鼻然以捲物登州人呼古路哥子安徽人呼爲蜜虎養蜜者最忌之○臺灣府志蜂虎蟲屬狀似燈蛾而大頭有斑點入蜜蜂窠則盡食其蜂○汪杭葦言蜜虎多喜入鳳仙花叢中散子於葉背上久生小灰色蟲如青蠻體上有黑白斑暈食其花葉長大及老則下根底變爲蛹頭粗尾尖如海蠣狀作老黃色久則蛹出爲蛾卽成蜜虎如此循環生生不已

治咽喉腫痛生蛾陳良翰云蜜虎登州最多人捕得裝入布袋懸掛簷下陰乾遇有咽喉腫痛或生單蛾雙蛾取一枚瓦上火焙去其週身絨毛翦去頭足尾翅再用火焙爲末加冰片少許吹入喉中卽愈此神方也又入壯藥用

治心痛。鞠子靜方。用嚼嚙哥。卽蜜虎。五六月飛行牆壁。山東甚多。取置竹筒中。此物難死。必待二十日方乾死在筒中。自能撲打。體上絨毛盡落。有患心痛者。及腹痛者。瓦焙研末。酒服一二枚。卽止。諸城王遜亭云。古路哥有雌雄。雄者身瘦小。雌者腹大。入藥用雄者。以線穿陰乾。可合房術藥用。其老僕王三云。此蟲山東極多。能食蜂。養蜂家最忌之。其蟲口中有黑絲。常捲若入蜂窩。卽吐直其絲。以刺蜂。蜂卽斃。然後食之。蓋蜂鍼在尾。而此蟲之鍼在首。想亦有毒鍼在尾者。陰在首者。陽以陽尅陰。故蜂爲所刺。無不立斃。其蟲於初秋散子。在豆莢中。則爲豆蟲。如青蠻狀。食豆在黍穠上。則爲朝天猴。如刺蟎狀。後黍葉自下食而上。最爲莊田之患。然可食。莊人候日未出時。此蟲着露體重。翅輕不能飛。易於撲取。人捕得去其翅。羣置瓦罐內。令其自相撲擲。其體上細毛自落。然後以油鹽椒薑炒食之。味勝蠶蛹。但其體上毛不可着人眼。着眼卽損目。

蟾皮舌

此乃癩蝦蟆皮也。能拔大毒外出。又能回毒。功效不可殫述。綱目蟾蜍條主治皆全用。無單用其皮者。惟附方引孫真人千金方中治腸頭推出。用蟾皮一片。燒熏并傅。僅錄其些小功用。反遺其大者。故特著明補之。

貼大毒。能拔毒收毒。○黃汝良行篋檢祕方。載指頭紅腫生毒。用活蟾一隻。生剝皮。將皮外面向患處

包好明日其毒一齊拔出或發背對口等症毒忽收內如又起再貼切記不可將其皮裏面着肉卽咬牢難揭凡痘疹後回毒亦可用此治

瘰癧斂口膏藥○治療瘰癧膿已盡腫已平瘡口未斂以此貼之○蝦蟆皮二個要活剝者鼠皮二張蛇蛻二條蜂房大者一個右四味俱煅灰將水膠一兩用井花水一酒鍾化開後加蜜一兩蜈蚣煎麻油一小鍾攪勻前四味灰臨起入麝香一分將絹攤來不溼爲度

靈祕丹藥云凡患癰疽瘡毒者用土中大蝦蟆一個剝全身癞皮蓋貼瘡口於蟆皮上用鍼將皮刺數孔以出毒氣自覺安靜且能爬住瘡口不令長大又可免蜈蚣聞氣來侵神妙神妙

舌

拔疔 外科全書夏月患疔用蝦蟆舌一個研爛蟾肚皮蓋貼其根自出

土檳榔

粵西叢載狀如檳榔在孔穴間得之新者猶軟相傳蟾蜍矢也不常有之

主治惡瘡

蠍蟄黃

物理小識余岸少養蜘蛛以小者飼大者久之以硃砂飼大者數十日滿身皆赤其腹有黃入藥用去

醫開醫

藥蜂鍼

物理小識。取黃蜂尾鍼合硫煉。加冰麝爲藥。置瘡瘍之頭。以火點之。灸瘡上。本草未載此法。須先以濕紙覆瘡。先乾者。卽瘡頭灸之。

驢龍

物理小識。驢腹中虬也。方體方目。有足。可以小使。入房術用。與臯厭黑兜蟲瓦雀卵衛子莖墮蛤蚧吉弔脂同功。

龍蟲

閩小記云。龍蟲形如小蟬螂。又似金龜而黑色。每八月十三至十五日。飛墮漳州海口。餘日絕。除面上勦駁赤氣。食之良。兼美男女顏色。活血。

物理小識。智少隨老父福甯。曾見龍蟲。後在姚有僕署中食此。云自濠鏡來。則他處亦出此。何漳獨異也。蓋是甲蟲大如指頂。甲下有翅。熏乾油潤。去甲翅啖。似火魚之變味。

洋蟲糞

一名九龍蟲。出外洋。明末年始傳入中國。或云出大西洋。康熙初年始有此物。形如米蛘子。初生蟻如

小蠶久則變黑如豆瓣。有雌雄。今人用竹筒置穀花飼之。性極畏寒。天冷須藏之懷袖中。夜則置衾褥間。否則凍死。得人氣則生。極蕃衍。有飼以茯苓屑。紅花交桂末者。則色紅而光澤可愛。入藥尤良。

性溫行血分。緩脾胃。和五臟。健筋骨。去溼摻風。壯陽道。治怯弱。○附治各症兼引。○老人不寐。茯苓引。○小兒夜啼。硃砂引。○女童夜溺。枸杞引。○少婦陰寒。附子引。○癰疽發背。沈香末引。○舌燥作渴。麥冬引。○眼目閉痛。甘草引。○耳鳴耳聾。當歸引。○感冒風寒。防風引。○中溼瘡毒。蒼朮引。○跌打損傷。全蠶引。○酒醉傷人。葛花引。○怒氣傷人。沈香引。○絞腸痧。痛青蒿引。以上十四症俱用蟲十四個。好陳酒沖服。

治刀斧傷。用蟲搗敷即愈。○瘋癲。用蟲九個。木香湯送。○打傷。用九個。黑棗薄荷湯送。○黃疸痧。用十二個。薄荷燈心湯送。○哮喘。用九個。薄荷湯送。○眼脹。用七個。薄荷湯送。○傷食用。九個。薑湯送。○水毒。用九個。薄荷燈心湯送。○氣痛。用九個。檳榔湯送。○中風不語。用二十四個。薄荷燈心湯送。○小肚痛。用九個。薑湯送。○急慢驚風。用九個。薄荷杏仁湯送。○喉痛。用二十四個。薄荷銀花湯送。○脾風。用二十四個。酒送。○胃痛心疼。用七個。木香末冲酒服。○無名腫毒。用十六個。陳酒送。五更服。○痘疹。用七個。米湯冲服。○膨脹。用二十四個。薄荷陳皮湯送。○嘔吐痰火。用七個。淡薑湯送。○乍寒乍熱。口乾舌燥。用七個。陳皮半夏煎酒冲服。○五勞七傷。白茯苓三錢。用七個。搗爛。每日空心酒冲服。以復元爲

止。○瘡後寒熱不調用七個以未發之先沖酒服三次卽止。○夢遺白濁血淋白帶以芡實三錢微炒研末白果五枚去皮心先將藥搗爛再加淫羊藿二錢去邊廣皮二錢韭子三錢同煎用蟲七個酒沖服。○赤白帶及產後等症以香附炙芪烏鵲骨各八分酒煎用蟲七個沖服卽愈。○氣急咳嗽以川貝母二錢牛蒡子當歸陳皮淮牛膝各八分水煎服如婦人去牛蒡子加益母炒香附各三錢水煎沖服三次神效。○腰痛以破故紙二錢雄豬腰一對竹刀剖開去衣將破故紙內入酒蒸熟爛加桔梗二錢爲末用七個搗沖酒服神效。○痢疾白痢用紅糖紅痢用白糖陳酒沖蟲七個服。○水瀉不止豬苓白朮各一錢陳酒煎沖七個服之忌油膩魚腥等物。○偏正頭風以川芎防風荆芥蟬蛻各一錢細辛八分陳酒煎沖七個服之忌生冷葱韭等物。○骨節酸痛胃寒等症以川芎白朮各八分酒煎沖蟲七個服三次卽愈。○吐血不止喘息燥熱等症以古墨研濃貝母三分研末蟲七個陳酒沖服七次愈。○小便不通以燈心車前各七根蟲七個陳酒沖服。○飽悶成痞肚腹脹脹用酒沖七個服三次。○翻胃瓦焙乾研末每次一分用蟲七個沖酒服三次愈。○吐血以藕節茅草根洗淨酒煎用人乳酒各半沖七個服三次愈。○筋骨疼痛以核桃肉三錢陳酒沖蟲七個服。○勞嗽以牛骨髓三錢核桃肉三錢共爲末入蟲七個再搗爲丸每丸三錢每日五更銜化一丸九日見效。○癰症蛇牀子三錢煎湯沖蟲九個

服三次卽愈。久服延年種子。○經水不調以香附陳皮益母草當歸元胡索各八分水煎和酒沖蟲七個服之卽愈。久遠者連服數次其效如神。○產後崩症以香附白芍益母草當歸陳皮茯苓白果蘇木各八分酒沖蟲七個服三次卽愈。

藥性考洋蟲色黑形如壁蟲活吞數枚止血勞怯。

糞如蠶砂狀金御乘云研末敷金刃傷立結痂止血最效。

蟋蟀

綱目於竈馬下附促織僅列其名云古方未用附此以俟考。

性通利治小便閉○藥性考蟋蟀辛鹹溫能發痘勝於桑蟲。

治跌躡傷小肚尿閉不出○養素園集驗方用蟋蟀一枚煎服立驗。

小兒遺尿慈航活人書取全蟋蟀一個焙末滾水下照歲服如兒十一歲者每次服一個服至十一個爲止。

治男婦小水不通痛脹不止○集聽用蟋蟀一個陰陽瓦焙乾爲末白滾湯下小兒半個卽通。

催生趙際昌云鬪蟲之戲蟋蟀最盛其百戰百勝者俗呼爲將軍其蟲至冬必死勿輕棄去留以救產厄神驗凡產不下用乾者一枚煎湯服卽生并無橫倒之患。

許景尼云鬪蟋蟀家冬則封盆待其自死成對乾之留爲產科痘科用須成對

藥入

治水蠱。朱娘齋任城日鈔云。促織可治水蠱。昔有人患水蠱。百治不效。一日偶飲開水。水中先有促織一對在內。其人倉卒一併吞之。越數日。其病漸消。方知促織可治此症。後傳此方數人。無不驗者。一對不足。連服二三對自效。

蚱蜢

綱目蟲蟲。僅引拾遺佩藥一條。並無主治。

按蚱蜢初夏大火始有。得秋金之氣而繁。性竄烈。能開關透竅。一種灰色而小者。名土碟。不入藥用。大而青黃色者入藥。有尖頭方頭二種。救生苦海五虎丹中用之。治暴疾氣閉。大抵取其竄捷之功爲引也。

味辛平微毒。性竄而不守。治咳嗽驚風破傷療折損凍瘡癰疹不出。

治鷓鴣瘧。王氏效方。鷓鴣瘧。其症咳嗽不已。連作數十聲。類哮非哮。似喘非喘。小兒多患此。取穀田內蚱蜢十個。煎湯服。三劑愈。○百草鏡云。鷓鴣鬱小兒有之。其症如物哽咽。欲吐難出之狀。久之出痰少許。日久必死。治以乾蚱蜢煎湯服。

破傷風。救生苦海。治破傷風。用霜降後稻田內收方頭灰色蚱蜢。同穀裝入布袋內。曬乾。勿令受溼。

致生蟲蛀壞常曬爲要遇此症用十數個瓦上煅存性酒下立愈。

痧脹 養素園集驗方用蚱蜢五六個煎湯溫服。

涼瘡 養素園待驗方用方頭黃色蚱蜢風乾煅研香油和擦摻亦可。

小兒驚風 李氏表方用蚱蜢不拘多少煅存性砂糖和服立愈。○一方治急慢驚風大小人多寡用之煎服。○王立人易簡方用螞蟻焙乾爲末薑湯調服少許立愈。

急慢驚風 百草鏡霜降後稻田中取方頭黃身蚱蜢不拘多少與穀共入布袋內風乾常曬勿令受溼蟲蛀遇此症用十個或七個加釣簾鈎薄荷葉各一撮煎湯灌下渣再煎服重者三劑愈李東來常施此藥據云山東王蟲尤妙每服只須二個。○王站柱不藥良方急慢驚風先用白鳳仙花根汁半盞服下卽用方頭蚱蜢焙乾研末滾水調下卽愈。

產後冒風 王良生救急方乾蚱蜢數十個瓦上煅存性好酒調服。

淮東子

今名跳鰐蟲生溼土中形如跳蚤而大逾倍色如鰐青腹下多足如鰐善跳躍兒童以器置於水中捕得輒投入便不能躍出秋時鬪蟋蟀家多畜之凡蛩遇鬪傷及虛羸必每日以此飼之云能益蛩力也其性最竄捷能達透經絡皮裏膜外無不行到。

治風癆去溼腫

燈蛾

今古方無入藥者。祝氏效方有治痔管法。用蟻蟬一個。同撲燈蛾十個。放罐內一宿。加麝香一錢。陰乾爲末。吹入管內。自能出水。水乾即愈。

蠅虎

古今註。蠅虎。蠅狐也。形似蜘蛛而色灰白。善捕蠅。一名蠅虎子。潛確居類書。一名蠅豹。身黑嘴有雙肉爪。攫蠅而食。兩目似虎。炯然生光。易曰。震來虩虩。雅俗稽言曰。虩蠅虎也。常若多懼。故取象焉。○按蠅虎亦蜘蛛之屬。腹亦有絲。而不能結網。惟居牆壁。捕蠅食。其體灰褐色。身上有微毛。嘴有兩鉗。翕吸頻動。跳躍如虎。亦有純白色。兩目朱色。絕可愛。兒童捕置器中。捉蠅以飼之。視其搏躍爲戲。此物未聞入藥。故瀕湖綱目壁錢螳螂皆列入。而此獨遺之。今徐氏驗方云。其性頻動而不靜。取以調血脈。治跌打。因錄其方以備品云。

治跌打損傷。徐順之驗方。取蠅虎數個研爛。好酒下。

竈馬

今之竈馬。俗呼蟻郎。又作蟻螂。綱目所謂蜚蠊也。綱目蟲部亦有竈馬。形如蟋蟀。今人名竈壁雞。又與

蟬蠅別瀕湖於蜚蠅條下無治疗瘡諸法今備錄之。

拔疔 集聽竈上蟬蠅不拘多少搗爛敷之其疔根自出。○卿子妙方蟬蠅蟲其黃紫色甚臭者取數個用患者自吐唾沫幾口研爛敷瘡四圍頂上露孔使毒氣從孔出一日愈矣。○邵仲達方治疗瘡取蟬蠅大者七個去頭足殼將砂糖少許同搗爛敷疔四圍露出頭晝夜即愈。

藥性考竈馬拔刺搗塗有效。

解諸疔毒 傳信方竈上紅蟬蠅五個研爛熱酒沖服取汗爲度。

紅絲疔 傳信方蟬蠅一個去頭和青糖搗爛搽上即效。

白火丹 葉氏方用蟬蠅瓦上焙乾爲末白滾湯服一二個立效兼治疗瘡。

對口 活人書桂州荔枝肉二三枚蟬蠅二三個同搗如泥敷露頭數次即散。

無名腫毒 慈航活人書蟬蠅十個鹽一撮同搗爛敷之留頭。

治諸毒惡瘡 嚴氏家用方蟬蠅搗石灰敷之。

癰症 周廷園方活蟬蠅蟲二三個用紙包竈上焙乾研細冷水和灌或吐或瀉即愈。

吐血 徐雲生方取蟬蠅五個止去翅淨在火盆淨瓦上焙乾爲末紙包安土上存性用溼腐皮包一個滾湯吞下每日如此吞五日不可間斷。

氣虛中滿。醫宗彙編以蟬蠅七個爲末。用地枯餽煎湯送數服愈。

臌脹。家寶方。蟬蠅一個。焙乾蘿蔔子一撮。共炒爲末。好酒吞十日全愈。

一切兒疳。集聽云。凡小兒患疳疾。不拘何等疳。垂死者皆效。取竈上蟬蠅焙乾。與之食。患者但聞其香。不知有腥臭之氣。猶中蠱者食豆無辛。含礮不苦也。有患此症。治之無不效。只須食一二次。卽愈。愈後體更肥白。且屢試屢驗。○百草鏡云。兒疳初起。用蟬蠅去頭足翅。新瓦焙乾。常與食之。百個病愈。

水馬

綱目名水鼴。於主治下云。令人不渴。殺雞犬。不知有治痔之功。更爲補之。按水馬四五月內出浮水面。身硬腳長。池沼中甚多。性喜食蠅。予在甌親見小兒捕之嬉戲。用釣竿繫繩。繩頭穿一蠅。擲水面誘之。卽來以四足抱蠅不放。因而獲之。

治痔。東醫寶鑑有水馬散。夏月三伏內。於止水中採婆子。一名水馬兒。高腳水面跳走是也。採取三十個。用三個紙包。每包十個。於背陰處懸掛陰乾。每包作一服。研爛空心酒調下。良久乃吃飯。三日連三服。十日內數久痔膿血者。二三十服絕根。

壁蠅

俗呼臭蟲。以其氣腥穢觸鼻。故名。行必南向。爲南方穢溼所產。今江南北人家多有之。稍不潔卽生此。

物亦有遠行於旅店驛舍中帶入衣被歸家卽生極易蕃育。一日夜生九十九子與螽斯同其形儀如半粒豌豆老則黑次則棗皮紅初生者色黃而細小其子如蟻子白色卵生與蟲同初生便噉人生二日卽能褪殼愈褪愈大漸漸而老色轉紅而黑老者噉人愈毒多藏糞薦中及壁內或桌櫈牀縫閒其身扁而易入至冬則入蟄多藏泥沙山穴中及古樹根下交春皆啓蟄而出入人家壁木內藏性畏蟻山中有一種紅蟻喜食之故近山及山寺僧舍此物甚少有帶入者輒爲山蟻銜去其噉人尤狡黠不與蚤蠅同昔人謂暑時有五大害乃蠅蚊蟲蚤臭蟲也然蠅蚊迭爲晝夜蠅可揮拂蚊可設帳蟲則暑時裸浴生者絕少蚤則因土溼而生夏時土乾亦不甚患惟此最可憎無分晝夜潛身牀蓐及几闌閒善識人氣伺人一徙倚卽嚼其膏血腫塊纍纍如貫珠然愈爬搔則愈大痛癢難禁小兒肉嫩尤遭其苦輒蚪號不已或云其物口有白氣一二寸噬人能隔簾穿膚吮血索之不可得在牀褥輒夜聚曉散率其醜類待人倦睡而恣噉焉古方辟除之法甚多無一驗者惟簾下鋪零陵香草及樟腦可稍殺其勢然隔一二日藥氣減則橫虐愈甚惟用真揚州安息香塗上好銀硃爲衣燃牀下周圍以簾護令烟薰透則壁蟲盡死子亦不能復生第香氣惡烈觸鼻令頭痛須熏後停一二日方可臥宿貧家何能辦理古云南方淫氣生短狐此亦淫溼腥穢之氣所感而生凡勤潔之家鮮有之閩人云此蟲滾水泡死者能復生惟以冷水浸死不能復生山堂肆考壁蟲身扁而臭不能跳善齧人名曰葵蚤又名扁蟲。

五雜俎壁蠧閩人謂之木蟲多杉木所生治者以蕎麥糞燒灰水淋之江南壁蠧多生水中惟延綏生土中遍地皆是入夜則緣牀入幙嗜人遍體成瘡雖徙至廣廈懸牀空中亦自空飛至事物紺珠壁蠧一名壁駝扁小褐色殞而噉人六書故扁蠧着牛馬食其血產薦蓐閒差小嗜人膚俗謂薦蠅又名茭蟲今人訛爲壁矣是古人雖有其名從無入藥者綱目并不列其品近來治療有用此者故錄之見天下無棄物也

氣腥味微鹹性平在土者有毒

凡用壁蠧須置溫水中令其臭氣洩盡入藥

治咽喉集聽方用壁蠧十枚滴花燒酒浸服

飯餽百草鏡云用臭蟲研塗

臘瘡臭爛西亭藥鏡用臭蟲同水龍骨搗和麻油調敷出盡黃水立愈

眼生偷鍼臭蟲血點之即散

海上方有用壁蠧治小兒驚風用壁蠧於淨水中漂去臭氣焙乾入藥

拔疔楊氏經驗方臭蟲同米飯搗勻擦疔上能立拔疔根外出

鰯魚刺戳醫宗彙編凹谷茴香葉使鹽花燒酒搗糊瘡上如口久爛用臭蟲剉去頭傅之

叩頭蟲

形黑如大豆。以手按其身。其頭能俯屈。剝剝有聲。出南方者小而力微。北土者大而力厚。小兒捕之爲戲。入藥用大者。試法取蟲置桌翻其背令仰。少頃便跳起三四寸。有跳起過五六寸及尺許者。力更大。綱目以之附蠍蟲後。亦不言主治之功。此蟲北人謂之跳百丈。

治腰腳無力。與山螞蟻子並入壯藥用。百草鏡云。外用可絕瘡。叩頭蟲一個。安眉心。蟲頭向上。膏藥蓋住。過時自愈。

大九丸。彙集。此馮嘉寶方。蒺藜酒洗炒去酒刺。白茯苓。白芍。蓴蓉酒洗。杜仲酥油炒。菟絲子酒煮。續斷。當歸。覆盆子。威靈仙。破故紙。薏苡仁。各一兩五錢。牛膝酒洗。無名異。自然銅。醋煅七次。各一兩。乳香。沒藥。硃砂。飛過血竭。青鹽。各五錢。天雄二兩。童便浸五日。象鱉一個。去頭足翅。如無用土鱉代之。跳百丈十個去足。虎骨二兩。酥油炙上藥俱爲細末。煉蜜丸。二錢半重。早晚鹽湯或黃酒送下。少時用力行功。散於四肢。

沙雞母

物理小識。土鼈是象房屎中所生。或以旋土成窩者充之。不知旋土窩者乃沙雞母。非土鼈也。

同金墨磨塗口瘡。

禾蟲

閩廣浙沿海濱多有之。形如蚯蚓。閩人以蒸蛋食。或作膏食。餉客爲餽。云食之補脾胃。廣志夏暑雨禾中蒸鬱而生蟲。或稻根腐而生蟲。稻根色黃。蟲乃稻根所化。故色亦黃。大者如筋許。長至丈。節節有口。生青熟紅黃。霜降前禾熟。則蟲亦熟。以初一二及十五六乘大潮斷節而出。浮游田上。網取之。得醋則白漿自出。以白米泔瀝過。蒸爲膏。甘美益人。得稻之精華者也。其醃爲脯。作醢醬。則貧者之食。○吳震方嶺南雜記。禾蟲絕類螞蝗。青黃色。狀絕可惡。厭潮所淹沒。淡水田禾根內出。數尺長至丈餘。寸寸斷皆活。能游泳。午後卽敗不可食。滴鹽醋一小盃。裂出自白漿。蒸雞鴨蛋牛乳最鮮。○粵錄。禾蟲狀如蠶。長一二寸。無種類。夏秋間早晚稻將熟。禾蟲自稻根出。潮長浸田。因乘潮入海。日浮夜沈。浮則水而皆紫采者。以巨口狹尾之網繫於杙。逆流迎之。網尻有囊。重則傾瀉於舟。補脾胃。生血利溼。行小便。瘡瘍勿食。能作膿。

茄稞蟲

此蟲生茄稞內梗上有蛀眼。內卽有蟲。其蟲帶綠色黑嘴者是。

治男女童癆。劉羽儀經驗方云。男女童癆。其症不必如大人咳嗽吐血洩精。只是身體瘦弱。皮毛焦枯。肌膚微熱。急宜早治。用野茄稞內蟲。取數十條。私和在食物之內。與病者吃。數次卽愈。

櫻蟲

滇南各甸土司記。櫻蟲產騰越州外各土司中。穴居櫻櫚木中。食其根脂汁。狀如海參。粗如臂。色黑。土人以爲珍饌。土司餉貴客。必向各峒丁索取此蟲作供。連櫻木數尺解送。剖木取之。作羹味絕鮮美。肉亦堅韌而腴。絕似遼東海參。云食之增髓益血。尤治帶下。彼土婦人無患帶者。以食此蟲也。

治赤白帶。腸紅血痢。其行血而又能補血。功同當歸。

蕉姑

漳泉種蕉田中出一種蟲。如蠶。食蕉根。名蕉姑。土人食之。味甚甘美。發痘行漿。托癰清毒。化痰醒酒。和中利小便。

桃絲竹蟲

此桃絲竹上所生竹蟲。李氏草秘云。罨疗瘡痘疗最妙。

牙阜樹蟲

救生苦海云。此樹大如錢。粗者方得有蟲。但取之有法。以利刀速砍其樹。遲則蟲卽下行入根。不可得。其蟲子時下行。過午則上行。須午後伐取。

治一切腫毒初起。其蟲有大小。大者用一條。小者用二條。證輕者用一條。證重者用二條。或三條。擂爛酒調服。已膿者不治。

黃麻梗蟲

須秋時先收取。以葱管藏之。○百草鏡。麻蟲生麻梗近根上一節中。二月化爲飛蟲。穿穴去。山左人每於刈麻時。將蟲連麻梗寸斷。布袋裝盛。帶至南方。貨與養禽鳥家。飼畫眉百翻之用。云其蟲性暖。去風行血。鳥食之可以禦寒。蟲形如小蠶。細長明淨。入藥須連麻梗蒸焙用。如用生者。須以葱藏。

治療。程林卽得方。用黃麻梗內蟲。以葱葉包貯。挂風頭令乾。將疔瘡挑破。以麻蟲少許。入於所挑之處。瘡卽化爲水而愈。○陶節菴。治疗蟻蠍膏。用蟻蠍三個。肚白者佳。黃麻蟲十個。二味搗勻。撥破患處貼之。如患在手足。有紅絲上臂。絲盡處。將鍼挑斷出血。仍用前藥。毒重者更服敗毒藥。○葉氏方。用黃麻梗中蟲一條。焙乾爲末。酒調服下。疔化爲水。

芝麻蟲

生芝麻梗中。三更輒從下而上。至頂食露。五更輒下。取之以夜。性熱助陽。入幃箔用。去痔管。用脂麻蟲。如蠶綠色。取焙乾爲末。開水送下。每日一錢。服七日。其管自出。

桐蛀

李氏草秘。生桐油樹中。卽木蠹也。最治惡腫毒。取七根焙末。沖酒服。卽愈。

牛膝蛀

李氏草秘蟲生牛膝草節中香油浸製。治指頭毒晝夜痛不可忍者敷上即愈。

山螞蟻窩子。

朱樂只云山草中有之係草樹之葉結成大者如斗冬月取之蟻在土而不在窩矣。○救生苦海山蟻窩深山內大樹根中有之十一月或正月草枯時尋取有二種一種大如升斗色黃柔軟形如乾黃蠟葉又若柔皮紙窩皮上層層有刷紋成暉若虎頭俗呼虎頭螞蟻窩不知何物所造惟內中多筋其筋係松毛草莖之類也抽去內中筋及泥土用之一種色白係是泥土所爲其形有類松皮研用入藥久不收口爛瘡貼之即收口。

治刀傷出血救生苦海用山蟻窩抽去內中筋及泥土包裹傷處再用布縛即血止收口沈氏傳云冬月用之有驗如神。

禿瘡 周氏傳方山螞蟻窩中土鹽滷調敷數日即愈。

生皮結瞼○凡瘡膿腐已盡新肉已生不肯收口用山蟻窩搓去草泥等物扯開貼之即結瞼生肉○張聖來云山蟻生深山窮谷中頭如虎有牙鉗甚鋒利有翼能飛凡虎食人過飽則醉醉後即吐蟻食其唾餘則形變虎頭而生翼即以其所吐涎嚙樹汁草漿和山土釀如泥緣樹枝成窩其窩重疊如蜂

窩內有臺外則黃白紋大如斗挂樹枝上山人見其窩以烟熏去蟻採之入藥

窩敷金刀傷止血定痛生肌收口

窩中臺治發背百鳥朝王毒

窩上緣枝治蛀脊

子

白如粞米俗呼狀元子大力丸用之然微有毒食之作脹綱目蟻下僅存其名無主治近行伍中營醫以此合壯藥頗效

益氣力澤顏色

敏按蟻有各種入藥用窩則取山蟻窩蓋山蟻形大在草中或樹根內作窩其子粗如粒米入藥力太猛用子以黃色細蟻所生子爲佳蓋此蟻力最大能舉等身鐵故人食其子亦力大也○宦遊筆記廣人美味有蟻子醬於山間收蟻卵淘淨滓垢鹵以爲醬詫爲珍品則其子亦無毒矣

蛆窩

王安采藥錄大窖坑內有蛆蟲窩如白繭子樣挂在蓬虆內者取來淨去泥灰曬燥焙用治臍瘡疳瘍一切蟲蛀爛孔外科收口藥用

瘡瘍蛀梗。柴氏獨妙方用糞坑內蛆蟲窠在蓬塵內者形如白繭子而小取來不拘多少放在罐中焙燥爲細末貯小口瓶內瓶口以細繩紗包紮復轉輕敲彈少許藥末於瘡口內如有小蛀眼藥末不能入用麥草稈吹藥入細孔內每日三五次其蛀爛者肉孔自能長平神效無比。

死人蛆蟲人
死人蛆蟲耳

此檢尸場中棺內死蛆也唐怡士云凡人死後魂魄散盡其生氣有未盡者肉爛後悉腐而爲蛆攢噬筋骨久之蛆亦隨死故強死者棺中無不有黑蛆凡用須問仵作於尸場收之。

治大麻瘋癩疾。赤水元珠治大麻瘋癩疾秘方用死人蛆蟲洗淨鋼片上焙乾爲末每用一二錢阜角刺煎濃湯調下若腫而有疙瘩者乃陽明經溼熱壅盛先以防風通聖散服二三帖然後再服此藥有補功以阜鍼爲引故能達表能久服之極有神效非泛常草木可比也○醫學指南有治大麻瘋秘方用人蛆一升細布袋盛之放在急水內流之乾淨取起以麻黃煎湯將蛆連布袋浸之良久取起曬乾再用甘草煎湯浸曬乾又用苦參煎湯浸曬乾又用童便浸曬乾又用葱薑煎湯投蛆入內不必取起就放鍋內煮乾焙爲末每一兩加麝二錢蟾酥三錢共爲一處入瓷器內每服一錢石蘚花煎湯下花即山中石上生白蘚如錢樣用蒼耳草煎湯洗浴然後服藥七日見效體壯者一日一服體弱者二日一服即愈。

治勞療能驅尸蟲。以賊攻賊之義。跌蹠絕邪瘡尸蛀石疣。

驅癆蟲 吳秀峯虛勞論云。癆有蟲爲溼鬱所化。在外爲蟲。在臟腑爲蟲。用死人身上蛆蟲製令潔淨。焙乾和藥服之。則癆蟲化爲水下。

人蚜

陳所安今見錄。近有一種不肖奸徒。輒於攢殯左右。勾賄寄戶。寄戶者。以產貨人厝棺。杭人呼爲開寄場。每有七日內之出厝棺木到場。即被昏夜啓棺。竊取人蚜。貨與方術家及走醫。爲夾棍藥。并治跌打。絕邪瘡等用。予初不解人蚜爲何物。後詢唐博士與宜。博士家有老僕來升。曾見之。云凡人死七日外。遍身肌肉腐如漿。心氣散漫。蒸爲人蚜。形如九龍蟲而小。色赤如血。光滑異常。男女皆有。入藥男棺者佳。其取之法。用大鑽於棺和頭前鑽一大孔。以香糟塗孔外。內蟲聞糟氣。皆從孔出。其蟲雖有甲。而不能飛。用手搦投入小瓶中。燒酒浸陰陽瓦上。焙乾用。

按人死血肉腐爲蟲。或爲蛆。或爲蚜。形各不一。或云二物並生。或云一物先後互化。又有云貧窮者多蛆。少蚜。富厚者多蚜少蛆。第勿深考。並存其說。以俟博雅君子折衷焉。

虹蟲

物理小識。虹爲淫氣。方士於東海見虹處掘地得蟲。紅色。得之入術用。

媚藥。益幃箔。同紫稍花。功力更大。

本草綱目拾遺跋

本草綱目拾遺十卷。乾隆閒吾杭趙恕軒先生所著利濟十二種之一也。十二種者醫林集腋養素園傳信方祝由錄驗囊露集本草話串雅花藥小名錄升降祕要攝生閒覽藥性元解奇藥備考及是編也。全目及總序備載於是編卷首鮑氏彙刻書目亦載十二種之目但有傳鈔本皆未刻至嘉慶末年傳鈔本則止有是編與串雅二種其十種已不傳且是編每藥品下論列各條顛倒錯亂眉目不晰余因訪知杭醫連翁楚珍藏其稿本假閱乃先生手輯未繕清本者初稿紙短續補之條皆黏於上方黏條殆滿而未注所排序次故傳鈔錯亂耳余乃按其體例以稿本校正排比傳鈔本之誤然後各條朗若列眉還其舊觀原稿本仍歸返連翁迨庚申寇亂翁家原稿本亡失串雅亦佚余編繕此本幸攜帶僅存得存先生遺著之一亦足寶重矣余又聞雍乾閒杭人汪君懷著有草藥綱目一書袁然大部與瀕湖綱目等其稿未傳鈔訪諸其族人皆未見想已湮沒失傳恨未得其書與李氏趙氏鼎峙爲本草之大全也惜哉同治甲子秋日錢塘張應昌仲甫氏撰。

奇經八脈考引

奇經八脈考者。李君灝湖所撰輯以活人者也。經有正有奇。獨考奇者。奇經人所略。故致詳焉。并病原治法。靡不條具。若指諸掌。豈惟醫學有賴。玄脩之士。亦因以見身中造化真機矣。用心之勤如此。何其仁哉。灝湖世儒兼以醫鳴。一門父子兄弟。富有著述。此特見一斑耳。問不佞。嘗推其直諒。多聞之益。因僭識簡端。以告後之君子。

明萬曆丁丑小暑日同里日岩顧問頓首書。

重刻脈學奇經八脈序

余奉中丞夏公教既刻本草綱目矣。臨川令袁君與李君時珍鄉人也。復取其脈學與奇經八脈考示余曰。李君平生學力盡在此。幸併刻之爲全書。余念古良醫治疾。未有不先診脈者。自軒岐已然。辨人鬼別男女。特其粗爾。微茫呼吸之間。而生死輕重係焉。如濟北才人顏色不變。而在死法中。其脈病也。故曰無數者同之。有數者異之。苟不明乎脈之法。則所同者多矣。脈學者專辨脈訣之誤也。今之醫者無不誦脈訣。而李君謂非叔和著。特條列而正之。然非李君之言也。宋陳無擇嘗斥爲高陽生作矣。亦非無擇之言也。朱晦翁嘗譏其鄙淺僞書矣。脈訣行而脈經隱。脈訣之誤既明。脈經其可復興乎。奇經八脈者。其名出于難經。而其論原于素問。以非十二經之正。故謂之奇經也。昔淳于意拜受公乘陽慶脈書奇欵術。卽此世之醫者。且不能舉其數。況通其義乎。叔和曰。天雨降下。溝渠溢滿。聖人不能圖也。脈絡流溢。諸經不能復拘也。然則八脈可以不講乎。八脈明而脈理盡矣。脈理盡而病無不察。可以窮吾治之之方矣。語云。人之所病病疾多。而醫之所病病道少。通乎脈學。又通乎八脈之學。道其患少也乎哉。因併刻附于本草之後。

癸卯秋七月上澣長洲張鼎思書。

題奇經八脈考

奇經八脈聞之舊矣。而不解其奧。今讀瀕湖李君八脈考。原委精詳。經絡貫徹。頓覺蒙開塞決。胸次豁然。誠僊醫二家入室指南也。然匪易牙亦未易味之。李君博極羣書。參討今古。九流百氏。咸有撰述。此特其一樹爾。因僭述其概而題之。

隆慶壬申中秋日道南吳哲拜題

考證諸書目

黃帝素問

王啓玄注

玄珠密語

王宗正紀天錫周與權

滑伯仁張世賢

太倉公生死祕要

皇甫謐甲乙經

楊玄操龐安時陳瑞孫

王叔和脈經

扁鵲脈經

華陀脈經

仲景金匱方

丁德用宋廷臣謝晉翁

仲景傷寒論

成無已注

熊宗立

褚氏遺書

澄王

千金方論

孫真

徐氏脈經訣文

巢氏病源

外臺祕要

王

吳廣脈賦

人

王函經

杜光庭

太平聖惠方

諸家注解高陽生脈訣

通真子李希范

張潔古

勿吮子

脈經手訣

南陽活人書

脈說

脈要新括

通真子劉三點

診脈須知

劉元賓

陳言三因方

崔紫虛脈訣

方脈舉要

劉三點

王貺指迷方

李希范脈髓

脈理玄祕

聖濟總錄

蔡西山脈經

醫學發明

李東垣

楊仁齋醫脈真經

蕭世基脈粹

碎金脈訣

張擴太素脈訣

魏伯祖脈說

張杲醫說

楊文德太素脈訣

王適齋脈訣

王世相醫開

詹炎舉太素脈訣

本草綱目

三十附錄 奇經八脈考引用書目

二

脈訣刊誤戴同

診家樞要滑壽

儲華谷法疑說

決脈精要黎民壽

醫經小學劉純

朱子文集

彭用光太素脈

醫學權輿傅滋

吳草廬集

脈訣圖說朱丹溪

儒醫精要宗趙撝叔

祁貫傳道集

奇經八脈考

奇經八脈總說

凡人一身有經脈絡脈。直行曰經。旁支曰絡。經凡十二。手之三陰三陽。足之三陰三陽是也。絡凡十五。乃十二經各有一別絡。而脾又有一大絡。并任督二絡爲十五也。難經作陰絡陽絡。共二十七氣相隨上下。如泉之流。如日月之行。不得休息。故陰脈營於五藏。陽脈營於六府。陰陽相貫。如環無端。莫知其紀。終而復始。其流溢之氣。入於奇經。轉相灌溉。內溫藏府。外濡腠理。奇經凡八脈。不拘制於十二正經。無表裏配合。故謂之奇。蓋正經猶夫溝渠。奇經猶夫湖澤。正經之脈隆盛。則溢於奇經。故秦越人比之天雨降下。溝渠溢滿。霧靄妄行。流於湖澤。此發靈素未發之祕旨也。八脈散在羣書者。略而不悉。醫不知此。罔探病機。仙不知此。難安爐鼎。時珍不敏。參考諸說。萃集於左。以備學仙醫者筌蹄之用云。

八脈

奇經八脈者。陰維也。陽維也。陰蹻也。陽蹻也。衝也。任也。督也。帶也。陽維起於諸陽之會。由外踝而上行於衛分。陰維起於諸陰之交。由內踝而上行於營分。所以爲一身之綱維也。陽蹻起於跟中。循外踝上行於身之左右。陰蹻起於跟中。循內踝上行於身之左右。所以使機關之蹻捷也。督脈起於會陰。循背而行於

身之後爲陽脈之總督故曰陽脈之海任脈起於會陰循腹而行於身之前爲陰脈之承任故曰陰脈之海衝脈起於會陰夾臍而行直衝於上爲諸脈之衝要故曰十二經脈之海帶脈則橫圍於腰狀如束帶所以總約諸脈者也是故陽維主一身之表陰維主一身之裏以乾坤言也陽蹻主一身左右之陽陰蹻主一身左右之陰以東西言也督主身後之陽任衝主身前之陰以南北言也帶脈橫束諸脈以六合言也是故醫而知乎八脈則十二經十五絡之大旨得矣仙而知乎八脈則虎龍升降玄牝幽微之微妙得矣

陰維脈

陰維起於諸陰之交其脈發於足少陰築賓穴爲陰維之郄在內踝上五寸膚肉分中上循股內廉上行入小腹會足太陰厥陰少陰陽明於府舍在腹哀下三寸去腹中行四寸半上會足太陰於大橫腹哀大橫在腹哀下一寸五分腹哀在日去腹中行四寸半循脅肋會足厥陰於期門直乳下寸半上胸膈挾咽與任脈會於天突廉泉上至頂前而終天突在結喉下四寸半宛宛中廉泉在結喉下二寸中央是穴凡一十四穴

陽維脈

陽維起於諸陽之會其脈發於足太陽金門穴在足外踝下一寸五分上外踝七寸會足少陽於陽交爲陽維之郄在外踝上七寸斜屬二陽之間循膝外廉上髀厥抵少腹側會足少陽於居髎在章門下八寸循脅肋斜上肘監骨上陷中

上會手陽明手足太陽於臂臑，在肘上七寸兩筋罅過肩前與手少陽會於臑會天髎，臑會在肩前廉去天髎在缺盆中上。卻會手足少陽足陽明於肩井，在肩上陷中缺盆上。入肩後會手太陽陽蹻於臑肺，在後大骨下胛上廉陷中。循耳後上循耳後會手足少陽於風池，在耳後髮大骨前一寸五分。上廉陷中。承靈後一寸半夾正營後一寸半夾承靈一寸半正營後一寸半夾目窗。臨泣後在瞳人直上入下額與手足少陽陽明五脈會於陽白。瘡上一寸直循頭入耳上至本神而止。本神直耳上髮際中。凡三十二穴。

二維爲病

越人曰：陽維陰維者，維絡於身，溢畜不能環流灌溉諸經者也。故陽維起於諸陽之會，陰維起於諸陰之交，陽維維於陽，陰維維於陰，陰陽不能自相維，則悵然失志，不能自收持。又曰：陽維爲病，苦寒熱，陰維爲病，苦心痛。溶溶緩慢貌。

張潔古曰：衛爲陽，主表，陽維受邪爲病在表，故苦寒熱；營爲陰，主裏，陰維受邪爲病在裏，故苦心痛。陰陽相維，則營衛和諧矣；營衛不諧，則悵然失志，不能自收持矣。何以知之？仲景云：病常自汗，是衛氣不與營氣和也。宜桂枝湯和之。又云：服桂枝反煩不解，先刺風池風府，卻與桂枝湯。此二穴乃陽維之會也。謂桂枝後尚自汗發熱惡寒，其脈寸浮尺弱而反煩爲病在陽維，故先鍼此二穴。仲景又云：藏無他病，時發熱自汗出而不愈，此衛氣不和也。桂枝湯主之。

又曰。陰維爲病苦心痛。治在三陰之交。太陰證則理中湯。少陰證則四逆湯。厥陰證則當歸四逆湯。吳茱萸湯主之。

李瀕湖曰。陽維之脈與手足三陽相維。而足太陽少陽則始終相聯附者。寒熱之證。惟二經有之。故陽維爲病亦苦寒熱。蓋衛氣晝行於陽。夜行於陰。陰虛則內熱。陽虛則外寒。邪氣在經。內與陰爭而惡寒。外與陽爭而發熱。則寒熱之在表而兼太陽證者。有汗當用桂枝。無汗當用麻黃。寒熱之在半表半裏而兼少陽證者。當用小柴胡加減治之。若夫營衛慄卑而病寒熱者。黃芪建中及八物湯之類主之。潔古獨以桂枝一證屬之陽維。似未擴充。至於陰維爲病主心痛。潔古獨以三陰溫裏之藥治之。則寒中三陰者宜矣。而三陰熱厥作痛。似未備矣。蓋陰維之脈雖交三陰而行實。與任脈同歸。故心痛多屬少陰厥陰任脈之氣上衝。而然暴痛無熱。久痛無寒。按之少止者爲虛。不可按近者爲實。凡寒痛兼少陰及任脈者。四逆湯兼厥陰者。當歸四逆湯。兼太陰者。理中湯主之。凡熱痛兼少陰及任脈者。金鈴散。延胡索散。兼厥陰者。失笑散。兼太陰者。承氣湯主之。若營血內傷。兼夫任衝手厥陰者。則宜四物湯。養營湯。妙香散之類。因病藥之。如此則陰陽虛實庶乎其不差矣。

王叔和脈經曰。寸口脈從少陰斜至太陽。是陽維脈也。動苦肌肉痺瘡。皮膚痛。下部不仁。汗出而寒。又苦顛仆羊鳴。手足相引。甚者失音不能言。宜取客主人。在耳前起骨上廉開口有空乃手足少陽陽明之會

又曰寸口脈從少陽斜至厥陰是陰維脈也動苦癲癧僵仆羊鳴又苦僵仆失音肌肉痺瘡應時自發汗出惡風身洗洗然也取陽白金門前僕參見陽

見陽

瀕湖曰王叔和以癲癧屬陰維陽維靈樞經以癲癧屬陰蹻陽蹻二說義異旨同蓋陽維由外踝而上循陽分而至肩肘歷耳額而終行於衛分諸陽之會陰維由內踝而上循陰分而上脅至咽行於營分諸陰之交陽蹻起於跟中循外踝上行於股外至脅肋肩髀行於一身之左右而終於目內眥陰蹻起於跟中循內踝上行於股內陰氣行於一身之左右至咽喉會任脈而終於目內眥邪在陰維陰蹻則發癲邪在陽維陽蹻則發癧癧動而屬陽陽脈主之癲靜而屬陰陰脈主之大抵二疾當取之四脈之穴分其陰陽而已

王叔和曰診得陽維脈浮者暫起目眩陽盛實者苦肩息洒洒如寒

診得陰維脈沈大而實者苦胸中痛脅下支滿心痛其脈如貫珠者男子兩脅下實腰中痛女子陰中痛如有瘡狀

素問腰痛論曰陽維之脈令人腰痛痛上怫然腫刺陽維之脈與太陽合腨間去地一尺

王啓玄曰陽維起於陽則太陽之所生並行而上至腨下復與太陽合而上也去地一尺乃承山穴也在銳腨之下分內閒陷中可刺七分

肉里之脈令人腰痛不可以歟。歟則筋縮急刺肉里之脈爲二瘡。在太陽之外少陽絕骨之後。

王啓玄曰。肉里之脈少陽所生。陽維脈氣所發。絕骨之後。陽維所過分肉穴也。在足外踝直上絕骨之端。如後二分筋肉分閒刺可五分。

飛陽之脈令人腰痛。痛拂拂然甚。則悲以恐。

啓玄曰。此陰維之脈也。去內踝上五寸膕分中並少陰經而上也。刺飛陽之脈在內踝上一寸少陰之前。與陰維之會築賓穴也。○甲乙經云。太陽之絡別走少陰者名曰飛陽。

陰蹻脈

陰蹻者。足少陰之別脈。其脈起於跟中足少陽然谷穴之後。然谷在內踝前一寸陷中同足少陰循內踝下照海穴。
在內踝上五分上內踝之上二寸。以交信爲郄。交信在內踝骨上少陰前太陰後廉筋骨間直上循陰股入陰上循胸裏入缺盆。上出人迎之前至咽嚨交貫衝脈入頤內廉上行屬目內眞。與手足太陽足陽明陽蹻五脈會於晴明而上行。
晴明在外一分宛中凡八穴。

張紫陽八脈經云。八脈者。衝脈在風府穴下。督脈在臍後。任脈在臍前。帶脈在腰。陰蹻脈在尾閭前陰囊下。陽蹻脈在尾閭後二節。陰維脈在頂前一寸三分。陽維脈在頂後一寸三分。凡人有此八脈俱屬陰神。閉而不開。惟神仙以陽炁衝開。故能得道。八脈者先天大道之根。一炁之祖。采之惟在陰蹻爲先。此脈纔

動諸脈皆通。次督脈衝三脈。總爲經脈造化之源。而陰蹻一脈散在丹經。其名頗多。曰天根。曰死戶。曰復命關。曰酆都鬼戶。曰死生根。有神主之名。曰桃康。上通泥丸。下透涌泉。倘能知此。使真炁聚散皆從此關竅。則天門常開。地戶永閉。尻脈周流於一身。貫通上下。和炁自然上朝。陽長陰消。水中火發。雪裏花開。所謂天根月窟。閑來往。三十六宮都是春。得之者身體輕健。容衰返壯。昏昏默默。如醉如癡。此其驗也。要知西南之鄉乃坤地。尾間之前膀胱之後。小腸之下。靈龜之上。此乃天地逐日所生炁根產鉛之地也。醫家不知有此。

瀕湖曰。丹書論及陽精河車。皆往往以任衝督脈。命門三焦爲說。未有專指陰蹻者。而紫陽八脈經所載經脈。稍與醫家之說不同。然內景隧道。惟返觀者能照察之。其言必不謬也。

陽蹻脈

陽蹻者。足太陽之別脈。其脈起於跟中。出於外踝。下足太陽申脈穴。在外踝下五分陷中。容爪甲白肉際。當踝後遠跟。以僕參爲本。在跟骨下陷中。拱足得之。上外踝上三寸。以附陽爲鄰。足太陽之穴也。直上循股外廉。循脣後髀上。會手太陽陽維於膕輪。在肩後大骨下。脣上廉陷中。上行肩髃外廉。會手陽明於巨骨。在肩尖端上行兩叉骨罅間陷中。會手陽明少陽於肩髃。在臂骨頭肩端上兩骨罅中。昭宛宛中。舉臂取之有空。上人迎夾口吻。會手足陽明任脈於地倉。夾口吻旁四分外。如近下有微脈動處。同足陽明上而行巨竈。夾鼻孔旁八分直瞳子平水溝。復會任脈於承泣。在目下七分。至目內眞。與手足太陽足陽明陰蹻五脈會於睛。

明穴見陰。瞤下從睛明上行入髮際下耳後入風池而終。風池在耳後夾玉枕骨下髮際陷中。凡二十二穴。○難經曰：蹻脈從足至目長七尺五寸合一丈五尺。

二蹻爲病

秦越人難經曰：陰絡者陰蹻之絡。陽絡者陽蹻之絡。陰蹻爲病。陽緩而陰急。陽蹻爲病。陰緩而陽急。王叔和脈經曰：陰蹻脈急當從內踝以上急外踝以上緩。陽蹻脈急當從外踝以上急內踝以上緩。

又曰：寸口脈前部左右彈者陽蹻也。動苦腰背痛。又爲癲癩。僵仆羊鳴。惡風偏枯。瘠瘦身體強。又曰：微濶爲風癓。並取陽蹻在外踝上三寸直絕骨是穴。附陽穴也。

又曰：寸口脈後部左右彈者陰蹻也。動苦癲癩寒熱皮膚淫癆。又爲少腹痛。裏急腰及骯靭下相連。陰中痛。男子陰疝。女子漏下不止。髓脾骨也。窮腰下穴也。

又曰：癲癩瘻瘍不知所苦。兩蹻之下男陽女陰。張潔古曰：蹻者捷疾也。二脈起于足。使人蹻捷也。陽蹻在肌肉之上。陽脈所行通貫六府。主持諸表。故名。

爲陽蹻之絡。陰蹻在肌肉之下。陰脈所行。通貫五藏。主持諸裏。故名爲陰蹻之絡。陰蹻爲病。陰急則厥。脛直。五絡不通。表和裏病。陽蹻爲病。陽急則狂。走目不昧。表病裏和。陰病則熱。可灸照海。陽陵泉。在膝下外廉陷中。足少陽之合也。筋病治此。陽病則寒。可鍼風池。風府。在項後入髮際一寸大筋內。宛中督脈太陽陽維之會也。又曰。在陽表者當汗之。在陰裏者當下之。又曰。癲癇晝發。灸陽蹻。夜發。灸陰蹻。

素問腰痛論曰。腰痛不可舉者。申脈僕參舉之。太陽之穴陽蹻之本也。又曰。會陰之脈。令人腰痛。痛止。潔潔然汗出。汗乾。令人欲飲。飲已。欲走。刺直陽之脈上三痏。在蹻上郄下五寸。橫居。視其盛者出血。

王啓玄云。足太陽之脈循腰下。會於後陰。故曰會陰。直陽之脈。挾脊下行。貫臂至臍。循臍過外踝之後。條直而行者。故曰直陽之脈也。蹻爲陽蹻所生。申脈穴也。蹻上郄下。乃承筋穴也。卽腨中央如外陷者中也。太陽脈氣所發。禁鍼刺。但視其兩腨中央有血絡盛滿者。乃刺之。出血。

又曰。昌陽之脈。令人腰痛。痛引膺。目睭睷然。甚則反折舌卷不能言。刺內筋爲三痏。在內踝上大筋前太陰後上踝二寸所。

王啓玄云。陰蹻起於然谷之後。上內踝之上。循陰股入陰。而循腹入胸裏。缺盆上出人迎之前。入頤內廉。屬目內眞。會於太陽陽蹻而上行。故病狀如此。內筋卽陰蹻之郄交信穴也。

素問繆刺論曰。邪客於足陽蹻之脈。令人目痛。從內眞始。刺外踝之下半寸所各二痏。即中脈也。左刺右。右刺

左如人行十里頃而已。

靈樞經曰目中赤痛從內皆始取之陰蹻交信穴也。

又曰風痙反折先取足太陽及臍中及血絡出血若中有寒邪取陰蹻及三毛上及血絡出血。

李瀕湖曰足太陽京骨穴也在足外側小指本節後大骨下赤白際陷中鍼三分灸七壯臍中委中穴也在曲膝後橫文中鍼三分陰蹻取交信穴見前三毛大敦穴也在足指大外側三毛中肝脈之井也鍼三分灸三壯血絡者視其處有絡脈盛滿者出其血也。

又曰陰蹻陽蹻陰陽相交陽入陰陰出陽交於目銳皆陽氣盛則瞑目陰氣盛則瞑目熱厥取足太陽少陽。

甲乙經曰人病目閉不得視者衛氣留於陰不得行於陽留於陰則陰氣盛陰氣盛則陰蹻滿不得入於陽則陽氣虛故目閉也。

病目不得瞑者衛氣不得入於陰常留於陽留於陽則陽氣滿陽氣滿則陽蹻盛不得入於陰則陰氣虛故目不瞑也。

靈樞曰五穀入於胃也其糟粕津液宗氣分爲三隧故宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心肺而行呼吸焉營氣者泌其津液注之於脈化而爲血以榮四末內注五藏六府以應刻數焉衛氣者出其悍氣之剽疾。

而先於四末分肉皮膚之間而不休焉。晝日行於陽，夜行於陰。常從足少陰分閒，行於五藏六府。今厥氣客於五藏六府，則衛氣獨衛其外，行於陽不得入於陰。行於陽則陽氣盛，陽氣盛則陽躡陷，不得入於陰，則陰氣虛，故目不瞑也。治當補其不足，瀉其有餘，以通其道而去其邪。飲以半夏湯一劑，陰陽已通，其臥立至。其方用流水千里以外者八升，揚之萬遍，取其清五升煮之，炊以葦薪火沸，置秫米一升，治半夏五合，徐炊令至一升半，去其滓，飲汁一小杯，日三稍益，以知爲度。故其病新發者，覆杯則臥，汗出則已久者三飲而已。

李瀕湖云：靈樞有云：足太陽之筋爲目上綱，足陽明之筋爲目下綱。寒則筋急，目不合，熱則筋縱，目不開。又云：壯者血氣盛，肌肉滑，營衛不失其常，故晝精而夜瞑。老人氣血衰，氣道澀，衛氣內伐，故晝不精而夜不瞑。又云：多臥者，腸胃大而皮膚澀，分肉不解，衛氣行遲，故也。張子和云：思氣所至，爲不眠，爲嗜臥。巢元方云：脾病困倦而嗜臥，膽病多煩而不眠。王叔和脈經云：水流夜疾有聲者，土休故也。人亦應之，人夜臥則脾不動搖，脈爲之數疾也。一云：脾之候在臉，臉動則知脾能消化也。脾病則臉澀嗜臥矣。數說皆論目閉目不瞑，雖不言及二蹻，蓋亦不離乎陰陽營衛虛實之理，可互考者也。

衝脈

衝爲經脈之海，又曰血海。其脈與任脈皆起於少腹之內胞中，其浮而外者，起於氣衝。一名氣街，在少腹毛中兩旁各二寸

橫骨兩端動脈。足陽明去腹中行二寸。少陰去腹中行五分。衝脈行於二經之間也。○橫骨在陰上。去腹中行一寸半。挾腋左右各五分。上行歷太赫。橫骨上行一寸。去氣穴。卽胞門。一名子戶。太赫上一寸。去巨闕兩旁各一分陷中。至胸中而散。凡二十四穴。

靈樞經曰。衝任皆起於胞中。上循背裏爲經絡之海。其浮而外者。循腹右上行。會於咽喉。別而絡唇口。血氣盛則充膚。熱肉血獨盛則滲滲皮膚生毫毛。婦人有餘於氣。不足於血。月下數脫血。任衝並傷。脈不榮其口唇。故鬚髮不生。宦者去其宗筋。傷其衝任。血寫不復。皮膚內結。唇口不榮。故鬚亦不生。天宦不脫於血。而任衝不盛。宗筋不強。有氣無血。唇口不榮。故鬚亦不生。

素問水熱穴論曰。三陰之所交結於腳也。踝上各一行者。此腎脈之下行也。名曰太衝。

王啓玄曰。腎脈與衝脈並下行。循足合而盛大。故曰太衝。一云。衝脈起於氣衝。衝直而通。故謂之衝。

素問陰陽離合論曰。聖人南面而立。前曰廣明。後曰太衝。太衝之地。名曰少陰。其衝在下。名曰太陰。相合爲表裏也。衝脈在脾之下。故曰其衝在下。名曰太陰。

靈樞經曰。帝曰。少陰之脈獨下行何也。岐伯曰。不然。夫衝脈者。五藏六府之海也。其上者出於頑頬。滲諸

陽灌諸精。其下者注於少陰之大絡。起於腎下。出於氣街。循陰股內廉。斜入膕中。伏行骭骨內廉。並少陰之經。下入內踝之後。入足下。其別者並於少陰。滲三陰。斜入踝。伏行出屬跗。屬下循跗上。入大指之間。滲諸絡。而溫足脛肌肉。故其脈常動。別絡結則跗上不動。不動則厥。厥則寒矣。

王海藏曰。手少陽三焦相火爲一府。右腎命門爲相火。心包主亦名相火。其脈同診。腎爲生氣之門。出而治臍下。分三歧。上衝夾臍。過天樞。上至膻中。兩乳閒。元氣所繫焉。又足三焦太陽之別。並足太陽正路。入絡膀胱。約下焉。三焦者。從頭至心。心至臍。臍至足。爲上中下三焦。其實真元一氣也。故曰。有藏無府。脈訣云。三焦無狀。空有名。寄在胸中。膈相應。一云。其府在氣街中。上焦在胃上口。治在膻中。中焦在胃管。治在臍旁。下焦在臍下膀胱上口。治在臍經。曰。原氣者。三焦之別使也。腎閒動氣者。真元一氣。分爲三路人之生命也。十二經之根本也。

李瀕湖曰。三焦卽命門之用。與衝任督相通者。故附著於此。

衝脈爲病

越人難經曰。衝脈爲病。逆氣而裏急。

靈樞經曰。氣逆上刺膺中陷下者。與下胸動脈腹痛。刺臍左右動脈。按之立已。不已。刺氣街。按之立已。李東垣曰。秋冬之月。胃脈四道爲衝脈所逆。脅下少陽脈二道。而反上行。名曰厥逆。其證氣上衝咽不得

息而喘息有音不得臥宜調中益氣湯加吳茱萸五分隨氣多少用之。論 脾胃夏月有此乃大熱之證用黃連黃蘖知母各等分酒洗炒爲末白湯和丸每服一二百丸空心白湯下卽以美膳壓之不令停留胃中直至下元以瀉衝脈之邪也蓋此病隨四時寒熱溫涼治之

又曰凡逆氣上衝或兼裏急或作躁熱皆衝脈逆也若內傷病此宜補中益氣湯加炒蘖炒連知母以泄衝脈○凡腎火旺及任督衝三脈盛者則宜用酒炒黃蘖知母亦不可久服恐妨胃也○或腹中刺痛或裏急宜多用甘草或虛坐而大便不得者皆屬血虛血虛則裏急宜用當歸○逆氣裏急膈咽不通大便不行者宜升陽瀉熱湯主之方見蘭室祕藏○麻木厥氣上衝逆氣上行妄聞妄見者宜神功丸主之方見蘭室祕藏

孫真人千金方云欬唾手足厥逆氣從小腹上衝胸咽其面翕熱如醉因復下流陰股小便難時復冒者寸脈沈尺脈微宜茯苓五味子湯以治其氣衝其方用茯苓五味子二錢桂心甘草一錢水煎服胸滿者去桂程宣墩曰太平侯病腹中痛喘嘔吞酸臍上一點氣上至咽喉如冰每子後申時輒發醫以爲大寒不效祝橘泉曰此得之大醉及厚味過多子後申時相火自下騰上故作痛也以二陳加芩連卮子蒼朮數飲而愈

素問痿論曰治痿獨取陽明者何也曰陽明者五藏六府之海也主潤宗筋宗筋主束骨而利機關衝脈者經脈之海主滲灌谿谷與陽明合於宗筋會於氣街而陽明爲之長皆屬於帶脈而絡於督脈故陽明

虛則宗筋縱帶脈不引故足痿不用治之當各補其營而通其腑調其虛實和其逆順筋脈骨肉各以其時受月則病已。謂肝甲乙心丙丁脾戊己主氣法時月也。

李東垣曰暑月病甚則傳腎肝爲痿厥痿乃四肢痿軟厥乃四肢如火或如冰心煩衝脈氣逆上甚則火逆名曰厥逆故痿厥二病多相須也經曰下氣不足則痿厥心悅宜以清燥去溼熱之藥或生脈散合四苓散加酒洗黃蘖知母以洩其溼熱○李瀕湖曰溼熱成痿乃不足中有餘也宜滲洩之藥若精血枯涸成痿乃不足中之不足也全要峻補之藥

靈樞經曰胸氣有街腹氣有街頭氣有街脰氣有街故氣在頭者止之於腦氣在胸者止之膺與背腧氣在腹者止之背腧與衝脈於臍之左右之動脈氣在脰者止之於氣街與承山踝上以下取此者用毫鍼先按在上久應手乃刺而與之所治者頭痛眩仆腹痛中滿暴脹及有新積作痛

素問舉痛論曰寒氣客於衝脈衝脈起於關元隨腹直上寒氣客則脈不通脈不通則氣因之故喘動應手

王叔和脈經曰兩手脈浮之俱有陽沈之俱有陰陰陽皆盛此衝督之脈也衝督之脈爲十二經之道路也衝督用事則十二經不復朝於寸口其人若恍惚狂癲

又曰脈來中央堅實徑至關者衝脈也動苦少腹痛上擔心有瘕痞遺溺脅支滿煩女子絕孕

又曰尺寸俱牢直上直下此乃衝脈胸中有寒疝也。

張仲景曰傷寒動氣在右不可發汗汗之則衄而渴心苦煩飲水卽吐次以竹葉湯先服不可下下之則津液內竭頭眩咽燥鼻乾心悸竹葉湯次○動氣在左不可發汗汗之則頭眩汗不止筋惕肉瞤此爲難治或先用防風白朮牡蠣湯次○動氣在上不可下下之則腹裏拘急不止動氣反劇身雖有熱反欲拳先服甘草乾薑湯次服小建中湯○動氣在下不可發汗汗之則氣上衝正在心端萬根不可下下之則掌握熱煩身熱汗泄欲水自灌竹葉湯先服大陳皮湯次服小建中湯○動氣在下不可發汗汗之則無汗心中大煩骨節疼頭痛目運惡寒吐穀先服大陳皮湯次服小建中湯不可下下之則腹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞堅甘草湯

李瀕湖曰此乃臍之左右上下有氣築築然牢而痛正衝任足少陰太陰四經病也成無己註文以爲左肝右肺上心下脾蓋未審四藏乃兼邪耳。

岐伯曰海有東西南北人亦有四海以應之胃者水穀之海其輸上在氣街下至三里衝脈爲十二經之海其輸上在於大杼下出於巨虛之上下廉膚中者爲氣之海其輸上在於柱骨之上前在人迎腦爲髓之海其輸上在於蓋下在風府○氣海有餘氣滿胸中悅息面赤氣海不足則氣少不足以言○血海有餘則常想其身大怫然不知其所病血海不足亦常想其身小狹然不知其所病○水穀之海有餘則腹滿水穀之海不足則饑不受食○髓海有餘則輕勁多力自過其度髓海不足則腦轉耳鳴脛痙眩冒

目無所見懈怠安臥

任脈

任爲陰脈之海。其脈起於中極之下。少腹之內。會陰之分。在兩陰上行而外出循曲骨。橫骨上毛際陷中。上毛際。至中極。膀胱之募。同足厥陰太陰少陰並行腹裏。循關元。膀下三寸。小腸之會。歷石門。卽丹田。一名命門。在氣海中。男子生氣之海。會足少陽衝脈於陰交。膀下一寸。當膀胱循神闕中央。水分。膀上一寸。當會足太陰於下脘。膀上二寸。歷建里。膀上四寸。會手太陽少陽足陽明於中脘。膀上四寸。當胃之募也。上上脘。膀上五寸。巨闕。鳩尾下一寸。鳩尾。蔽骨下。中庭。膀中下一寸。膻中。玉堂下一寸六分。直兩乳中間。玉堂。紫宮下一寸六分。紫宮。華蓋。璇璣。下璇璣。天突。下上喉嚨。會陰。維於天突。廉泉。天突在結喉下四寸。宛中。上頤。循承漿。與手足陽明督脈會。唇下環唇上。至下斷交。復出。分行循面繫兩目下之中央。至承泣而終。目下七分。直瞳子陷中。凡二十七穴。○難經甲乙經並無循面以下之說。

任衝之別絡名曰尾翳。下鳩尾散於腹。實則腹皮痛。虛則癢搔。靈樞經曰。缺盆之中。任脈也。名曰天突。其側動脈人迎。足陽明也。

任脈爲病

素問曰。任脈爲病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。

又曰女子二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下七七任脈虛太衝脈衰天癸竭地道不通故形壞而無子。

又曰上氣有音者治其缺盆中謂天突穴也陰維任脈之會刺一寸灸三壯

脈經曰寸口脈來緊細實長至關者任脈也動苦少腹繞臍下引橫骨陰中切痛取關元治之。

又曰橫寸口邊脈丸丸者任脈也苦腹中有氣如指上擔心不得俛仰拘急。

督脈

督乃陽脈之海其脈起於腎下胞中至於少腹乃下行於腰橫骨圍之中央繫溺孔之端男子循莖下至篡女子絡陰器合篡閒俱繞篡後屏翳穴前陰後陰之間也別繞脅至少陰與太陽中絡者合少陰上股內廉由會陽在陰尾尻骨兩旁凡二穴貫脊會於長強穴在骶骨端與少陰會並脊裏上行歷腰腧二十一椎下陽關椎十六椎下命門十四椎下懸樞十三椎下脊中十一椎下中樞十椎下筋縮九椎下至陽七椎下靈臺六椎下衝道五椎下身柱三椎下陶道大椎大椎一寸與手足三陽會合上齒門項後入髮際五分會陽維入繫舌本上至風府項後入髮際一寸會足太陽陽維同入腦中循腦戶在枕骨上強閒百會後三寸後頂百會後一寸半上巔歷百會項中央百會前一寸半頸會百會前三寸即頸門上星會寸一至神庭頸會前二寸直鼻爲足太陽督脈之會循額中至鼻柱經素髎鼻準頭也水溝即人中會手足陽明至兌端在唇上端入斷交上齒中與任脈足陽明交會而終凡三十一穴督脈別絡自長強走任脈者由少腹直

上貫臍中央。上貫心入喉。上頤環唇。上繫兩目之下中央。會太陽於目內。皆晴明穴。見陰下。上額與足厥陰同會於顛。入絡於腦。又別自腦下項循肩胛。與手足太陽少陽會於大杼第一椎下兩旁去脊中一寸五分陷中。內挾脊抵腰中。入循膂絡腎。○難經曰。督脈任脈四尺五寸合共九尺。○靈樞經曰。頸中央之脈。督脈也。名曰風府。

張潔古曰。督者都也。爲陽脈之都綱。任者妊也。爲陰脈之妊養。

王海藏曰。陰蹻陽蹻同起跟中。乃氣井而相連。任脈督脈同起中極之下。乃水溝而相接。

滑伯仁曰。任督二脈。一源而二歧。一行於身之前。一行於身之後。人身之有任督。猶天地之有子午。可以分。可以合。分之以見陰陽之不離。合之以見渾淪之無間。一而二。二而一者也。

李瀕湖曰。任督二脈。人身之子午也。乃丹家陽火陰符升降之道。坎水離火交媾之鄉。故魏伯陽參同契云。上閉則稱有。下閉則稱無。無者以奉上。上有神德居。此兩孔穴法金氣亦相須。崔希範天元入藥鏡云。上鵲橋。下鵲橋。天應星。地應潮。歸根竅。復命關。貫尾閭。通泥丸。大道三章直指云。脩丹之士。身中一竅。名曰玄牝。正在乾之下。坤之上。震之西。兌之東。坎離交媾之地。在人身天地之正中。八脈九竅十二經十五絡。聯轔虛閒一穴。空懸黍珠。醫書謂之任督二脈。此元氣之所由生。真息之所由起。脩丹之士。不明此竅。則真息不生。神化無基也。俞琰註參同契云。人身血氣往來循環。晝夜不停。醫書有任督二脈。人能通此。

二脈則百脈皆通黃庭經言皆在心內運天經晝夜存之自長生天經乃吾身之黃道呼吸往來於此也鹿運尾閭能通督脈龜納鼻息能通任脈故二物皆長壽此數說皆丹家河車妙旨也而藥物火候自有別傳

王海藏曰張平叔言鉛乃北方正氣一點初生之真陽爲丹母其蟲爲龜卽坎之二陰也地軸也一陽爲蛇天根也陽生於子藏之命門元氣之所繫出入於此其用在臍下爲天地之根玄牝之門通厥陰分三岐爲三車一念之非降而爲漏一念之是守而成鉛升而接離補而成乾陰歸陽化是以還元至虛至靜道法自然飛昇而僊

督脈爲病

素問骨空論云督脈生疾從少腹上衝心而痛不得前後爲衝疝女子爲不孕癰瘡遺溺嗌乾治在骨上謂腰橫骨上毛中曲骨穴也甚者在臍下營臍下一寸陰交穴也

王啓玄曰此乃任衝二脈之病不知何以屬之督脈李瀕湖曰督脈雖行于背而別絡自長強走任脈者則由少腹直上貫臍中貫心入喉上頤環唇而入於目之內皆故顯此諸證啓玄蓋未深考爾素問曰督脈實則脊強反折虛則頭重高搖之挾骨之有過者取之所別也

秦越人難經曰督脈爲病脊強而厥

王海藏曰此病宜用羌活獨活防風荆芥細辛藁本黃連大黃附子烏頭蒼耳之類

張仲景金匱云脊強者五痓之總名其證卒口噤背反張而瘛瘲諸藥不已可灸身柱大椎陶道穴又曰痓家脈築築而弦直上下行

王叔和脈經曰尺寸俱浮直上直下此爲督脈腰背強痛不得俛仰大人癲病小兒風癇又曰脈來中央浮直上下動者督脈也動苦腰背膝寒大人癲宜灸頂上三壯素問風論曰風氣循風府而上則爲腦風風入係頭則爲目風眼寒

王啓玄云腦戶乃督脈足太陽之會故也

帶脈

帶脈者起於季脅足厥陰之章門穴同足少陽循帶脈穴章門足厥陰少陽之會在季肋骨端肘尖盡處分陷中○帶脈穴屬足少陽經在季脇下一寸五分圍身一周如束帶然又與足少陽會於五樞帶脈下章門下五寸三分凡八穴

靈樞經曰足少陰之正至腦中別走太陽而合上至腎當十四椎出屬帶脈

楊氏曰帶脈總束諸脈使不妄行如人束帶而前垂故名婦人惡露隨帶脈而下故謂之帶下

帶脈爲病

秦越人曰帶之爲病腹滿腰溶溶如坐水中溶溶緩慢貌

明堂曰。帶脈二穴主腰腹縱。溶溶如囊水之狀。婦人少腹痛。裏急後重。癰癧。月事不調。赤白帶下。可鍼六分。灸七壯。

張潔古曰。帶脈之病。太陰主之。宜灸章門二穴三壯。

素問曰。邪客於太陰之絡。令人腰痛。引小腹控脇。不可以養息。眇謂季脇之下。謂空軟處。

張仲景曰。大病瘥後。腰以下有水氣。牡蠣澤瀉散主之。若不已。灸章門穴。

王叔和曰。帶脈爲病。左右遶臍腰脊痛。衝陰股也。

王海藏曰。小兒癩疝。可灸章門三壯而愈。以其與帶脈行於厥陰之分。而太陰主之。

又曰。女子經病血崩久而成枯者。宜澀之益之。血閉久而成竭者。宜益之破之。破血有三治。始則四物入紅花調黃芪肉桂。次則四物入紅花調鯁鯉甲桃仁桂童子小便和酒煎服。末則四物入紅花調易老沒藥散。

張子和曰。十二經與奇經七脈皆上下周流。惟帶脈起少腹之側季脅之下。環身一周。絡腰而過。如束帶之狀。而衝任二脈循腹脅夾臍旁。傳流於氣衝。屬於帶脈絡於督脈。衝任督三脈同起而異行。一源而三岐。皆絡帶脈。因諸經上下往來。遺熱於帶脈之間。客熱鬱抑。白物滿溢。隨溲而下。綿綿不絕。是爲白帶。內經云。思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。發爲筋痿。及爲白淫。白淫者。白物淫衍如精之狀。男子因

洩而下。女子綿綿而下也。皆從溼熱治之。與治痢同法。赤白痢乃邪熱傳於大腸。赤白帶乃邪熱傳於小腸。後世皆以赤爲熱。白爲寒。流誤千載。是醫誤之矣。又曰。資生經載一婦人患赤白帶下。有人爲灸氣海。未效。次日爲灸帶脈穴。有鬼附耳云。昨日灸亦好。只灸我不著。今灸着我。我去矣。可爲酒食祭我。其家如其言祭之。遂愈。予初怪其事。因思晉景公膏肓二鬼之事。乃虛勞已甚。鬼得乘虛居之。此婦亦或勞心虛損。故鬼居之。灸既著穴。不得不去。自是凡有病此者。每爲之按此穴。莫不應手酸痛。令歸灸之。無有不愈。其穴在兩脅季肋之下一寸八分。若更灸百會穴尤佳。內經云。上有病下取之。下有病上取之。又曰。上者下之。下者上之。是矣。

劉宗厚曰。帶下多本於陰虛陽竭。營氣不升。經脈凝澀。衛氣下陷。精氣積滯於下焦。奇經之分。蘊釀而成。以帶脈爲病得名。亦以病形而名。白者屬氣。赤者屬血。多因醉飽房勞。服食燥熱所至。亦有溼痰流注下焦者。腎肝陰淫溼勝者。或驚恐而木乘土位。濁液下流。或思慕無窮。發爲筋痿。所謂二陽之病。發心脾也。或餘經溼熱。屈滯於少腹之下。或下元虛冷。子宮溼淫。治之之法。或下或吐。或發中兼補。補中兼利。燥中兼升。發潤中兼溫養。或溫補。或收澀。諸例不同。亦病機之活法也。

巢元方病源曰。腎著病。腰痛冷如冰。身重。腰如帶五千錢。不渴。小便利。因勞汗出衣裏冷溼而得。久則變爲水也。○千金用腎著湯。三因用滲溼湯。東垣用獨活湯主之。

氣口九道脈

手檢圖曰。肺爲五藏華蓋。上以應天。解理萬物。主行精氣法五行。應四時。知五味。氣口之中。陰陽交會。中有五部。前後左右。各有所主。上下中央。分爲九道。診之則知病邪所在也。

李瀕湖曰。氣口一脈。分爲九道。總統十二經。并奇經八脈。各出診法。乃岐伯祕授黃帝之訣也。扁鵲推之。獨取寸口。以決死生。蓋氣口爲百脈流注朝會之始故也。三部雖傳。而九道淪隱。故奇經之脈。世無人知。今撰爲圖。并附其說於後。以洩千古之祕藏云。

診左手九道圖

左陽明少陰太陰太陽少陽少陰太陽太陽少陽

前如內者足厥陰左右彈者

中如內者足太陰左右彈者

後如內者足少陰左右彈者

右太陽少陽太陰太陽少陽少陰太陽太陽少陽

中央直者手太陽明後掌中央直者手少陽

俱牢直上直下者衝脈

診右手內外反此

右太陽少陽太陰太陽少陽少陰太陽太陽少陽

中如內者足太陰左右彈者

後如內者足少陰左右彈者

岐伯曰前部如外者足太陽膀胱也動苦目眩頭項腰背強痛男子陰下溼癰女子少腹痛引命門陰中痛子臟閉月水不利○浮爲風○濇爲寒○滑爲勞熱○緊爲宿食

中部如外者足陽明胃也動苦頭痛面赤○滑爲飲○浮爲大便不利○濇爲嗜臥腸鳴不能食足脛痹後部如外者足少陽膽也動苦腰背脢股筋節痛○浮爲氣○濇爲風○急爲轉筋爲勞

前部如內者足厥陰肝也動苦少腹痛引腰大便不利男子莖中痛小便難疝氣兩丸上入女子月水不利陰中寒子戶閉少腹急

中部如內者足太陰脾也動苦腹滿胃中痛上管有寒食不下腰上狀如居水中○沈濇爲身重足脛寒痛煩滿不能臥時欬唾有血洩利食不化

後部如內者足少陰腎也動苦少腹痛與心相引背痛小便淋女人月水來上搶心胸脅滿股裏拘急前部中央直者手少陰心手太陽小腸也動苦心下堅痛腹脅急○實急者爲感忤○虛者爲下利腸鳴女子陰中癢痛○滑爲有娠

中部中央直中者手厥陰心主也動苦心痛面赤多喜怒食苦咽○微浮苦悲傷恍惚○濇爲心下寒○沈爲恐怖如人將捕之狀時寒熱有血氣後部中央直者手太陰肺手陽明大腸也動苦欬逆氣不得息○浮爲風○沈爲熱○緊爲胸中積熱○

濇爲時欬血。

前部橫于寸口丸丸者任脈也。動苦少腹痛逆氣搶心胸拘急不得俛仰。○脈經云寸口脈緊細實長下至關者任脈也。動苦少腹邊臍痛。男子七疝女子瘕聚。

三部俱浮直上直下者督脈也。動苦腰脊強痛不得俛仰大人癩小兒癪。三部俱牢直上直下者衝脈也。苦胸中有寒疝。○脈經曰脈來中央堅實徑至關者衝脈也。動苦少腹痛上擔心有瘕疝遺溺女子絕孕。

前部左右彈者陽蹻也。動苦腰背痛癲癇僵仆羊鳴偏枯瘡瘍身體強。

中部左右彈者帶脈也。動苦少腹痛引命門女子月事不來絕繼復下令人無子。男子少腹拘急或失精也。

後部左右彈者陰蹻也。動苦癲癇寒熱皮膚強痺少腹痛裏急腰膀相連痛。男子陰疝女子漏下不止從少陰斜至太陽者陽維也。動苦顛仆羊鳴手足相引甚者失音不能言肌肉瘡瘍。

從少陽斜至厥陰者陰維也。動苦癲癇僵仆羊鳴失音肌肉瘡瘍汗出惡風。

釋音

蹻腳卻高蹻蹻四音舉足高也又蹻捷也。

跗音膚足背也。

跟音根足也。

踝花上聲足螺蟲骨也。

瘰 涩 仆 瘡 瘤 瘰 脓 腺 膜 腎 胸 咳
 疾音 便音 倒音 切音 楚腫音 軟音 痘音 脊音 脂音 目音 也
 滯也 搜也 赴也 痘也 慨也 穩也 委也 開也 骨氏也 也
 小也 顛也 痘也 陰也 肢也 驚也 尾也 也 也
 顛也 除也 切也 挑也 痘也 驚也 也 慰也 也
 也 痘也 除也 切也 挑也 痘也 驚也 也 慰也 也

也楚

嫩

悅 潤 漑 輻 瘡 痘 瘰 鱗 腺 潤 腸 腸 噎
 音音 滑音 濕音 同興 皰音 痘音 強音 空音 骨音 眼音 動音 腺音 腸音 噎音
 暢也 滯也 畫也 滯也 痘也 痘也 痘也 積也 痘也 腸也 腸也 腸也 也
 不也 累也 輻也 痘也 痘也 痘也 痘也 痘也 也 痘也 腸也 腸也 禁也
 感同 也義 又

惕 悄 泌 俠 瘡 痘 瘰 骨 瞼 瞹 皆 肝 腎 離
 動音 韶音 水音 捷古 同興 寒山 乍痴 音與 積音 弦音 角音 旁音 腎音 根音
 也 犹也 佛也 也筆通文 酸痛訕 後去 骨櫛 前偶 也 檢 際劑 骨甲 中國 肉銀
 心 佛 別用俠 痘二 痘聲 審同 也 二 痘二 痘二 痘二 痘二 痘二 痘二
 也音 也乍 也脫 也音 也音 也音 也音 也音 也音 也音 也音

前 文

頑 悄 涡 倦 痛 瘫 痛 瘫 肝 脾 昧 脅 膽 腸
 頭音 猛音 便音 簛音 痛音 瘓音 痛音 瘫音 肝音 脾音 不音 明妹 脅音 膽音 腸音
 也杭也汗也尿也免也涓也淋也隆也頑也顛也幹也骨也博也骨也骨也也肉也也肉也也
 小也 瘫也小也 痘也小也 仆也 脛也 膝也 脛也 也 目也也 脊也中也 腹也也
 也也 也也

頑 頸音 擴 頸音
膏 膏音 長 音也 求 面
築 築氣 上郭 之
築 築也 高 引
築 築也 痛 下荒
築 築也 心 也

頸 頸桑 隘 隘音
椎 椎音 路 路也 也
憊 憐音 縋 縋也 遂 小
丸 丸脈 弱 弱音 篋 篋也 聲
丸 丸也 如 也 脊 脊也 之
丸 丸也 也 蝶 蝶也 疾 之

郤 鄢與 孔隙
篡 初患 切
髀 髀音 骨 即 策掩
涼 滼音 踏 踏也 陰
洗 洗音 恶 恶皮 之汗 跳股
洗 洗音 亂 亂也 後
貌 慮 慮也

嬖 婦呼訝
募 同膜 也切
瘦 瘦癰 癰也
癰 癰音 不明 荒目
瘦 瘦癰 癰也
癰 癰音 足並 舒縮
瘦 瘦癰 癰也
癰 癰音 治縫 手

脈訣考證

脈訣非叔和書

晦庵朱子曰。古人察脈非一道。今世惟守寸關尺之法。所謂關者多不明。獨俗傳脈訣。詞最鄙淺。非叔和本書。乃能直指高骨爲關。然世之高醫。以其書屢遂委棄而羞言之。跋郭長陽書

東陽柳貫曰。王叔和撰脈經十卷。爲醫家一經。今脈訣熟在人口。直謂叔和所作。不知叔和西晉時。尚未有歌括此。乃宋之中世人僞托。以便習肄爾。朱子取其高骨爲關之說。不知其正出脈經也。

廬陵謝縉弟曰。今稱叔和脈訣。不知起于何時。宋熙寧初校正脈經。尙未有此。陳孔碩始言脈訣出而脈經隱。則脈訣乃熙寧以後人作耳。惟陳無擇三因方言高陽生剽竊作歌訣。劉元賓從而和之。其說似深知脈經者。而又自著七表八裏九道之名。則陳氏亦未嘗詳讀脈經矣。

河東王世相曰。診候之法。不易精也。軒岐微蘊。越人叔和撰難經脈經。猶未盡洩其奧。五代高陽生著脈訣。假叔和之名。語多牴牾。辭語鄙俚。又被俗學妄註。世醫家傳戶誦。茫然無所下手。不過藉此求食而已。於診視何益哉。

雲間錢溥曰。晉太醫令王叔和著脈經。其言可守而不可變。及托叔和脈訣行而醫經之理遂微。蓋叔和

爲世所信重故假其名而得行耳然醫道之日淺未必不由此而誤之也。

七表八裏九道之非

金陵戴起宗曰脈不可以表裏定名也軒岐越人叔和皆不言表裏脈訣竊叔和之名而立七表八裏九道爲世大惑脈之變化從陰陽生但可以陰陽對待而言各從其類豈可以一浮二沈爲定序而分七八九之名乎大抵因浮而見者皆爲表因沈而見者皆爲裏何拘于七八九哉廬山劉立之以浮沈遲數爲綱以教學者雖似捷徑然必博學反約然後能入脈妙若以此自足亦畫矣

樞寧滑壽曰脈之陰陽表裏以對待而爲名象也高陽生之七表八裏九道蓋鑿鑿也求脈之明爲脈之晦

謝氏曰脈經論脈二十四種初無表裏九道之目其言芤脈云中央空兩邊實云芤則爲陰而脈訣以芤爲七表屬陽云中閒有兩頭無仲景脈法云浮大數動滑爲陽沈濶弱弦微爲陰而脈訣以動爲陰以弦爲陽似此背誤頗多則脈訣非叔和書可推矣

草廬吳澄曰俗誤以脈訣爲脈經而王氏脈經知者或鮮脈書往往混牢革爲一夫牢爲寒實革爲虛寒安可混乎脈之浮沈虛實緊緩數遲滑濶長短之相反匹配自不容易況有難辨如洪散俱大而洪有力微細俱小而微無力芤類浮而邊有中無伏類沈而邊無中有若豆粒而搖搖不定者動也若鼓皮而如

如不動者革也。俱對待也。又有促結代。皆有止之脈。促疾結緩。故可爲對代。則無對。總之。凡二十七脈。不止于七表八裏九道二十四脈也。詳文集

瀕湖李時珍曰。脈經論脈止有二十四種。無長短二脈。脈訣歌脈亦有二十四種。增長短而去數散。皆非也。素難仲景論脈。祇別陰陽。初無定數。如素問之鼓搏喘橫。仲景之慄平榮章。綱損縱橫逆順之類是也。后世脈之精微失傳。無所依準。因立名而爲之歸著耳。今之學者。按圖索驥。猶若望洋而況舉其全旨乎。此草廬公說獨得要領也。

男女脈位

齊褚澄曰。男子陽順。自下生上。故右尺爲受命之根。萬物從土而出。故右關爲脾。生右寸肺。肺生左尺腎。腎生左關肝。肝生左寸心。女子陰逆。自上生下。故左寸爲受命之根。萬物從土而出。故左關爲脾。生左尺肺。肺生右寸腎。腎生右關肝。肝生右尺心。詳褚氏遺書

華谷儲沫曰。脈訣以女人尺脈盛弱與男子相反爲背看。夫男女形體絕異。陰陽殊塗。男生而覆。女生而仰。男則左旋。女則右轉。男主施。女主受。男之至命在腎。處臟腑之極下。女之至命在乳。處臟腑之極上。形氣既異。脈行于形氣之間。豈略不少異耶。此褚氏之說爲有理也。詳褚氏疑說

戴起宗曰。脈訣因男子左腎右命。女子左命右腎之別。遂言反此背看。而諸家以尺脈盛弱解之。褚氏又

以女人心肺診于尺倒裝五臟其謬又甚不知男女形氣精血雖異而十二經脈所行始終五臟之定位則一也安可以女人脈位爲反耶

丹溪朱震亨曰昔軒轅使伶倫截嶧谷之竹作黃鍾律管以候天地之節氣使岐伯取氣口作脈法以候人之動氣故黃鍾之數九分氣口之數亦九分律管具而寸之數始形故脈之動也陽得九分陰得一寸吻合于黃鍾天不足西北陽南而陰北故男子寸盛而尺弱肖乎天也地不滿東南陽北而陰南故女子尺盛而寸弱肖乎地也黃鍾者氣之先兆故能測天地之節候氣口者脈之要會故能知人命之死生世之俗醫誦高陽生之妄作欲以治病其不殺人也幾希

龍丘葉氏曰脈者天地之元性故男女尺寸盛弱肖乎天地越人以爲男生于寅女生于申三陽從天生三陰從地長謬之甚也獨丹溪推本律法混合天人而闢之使千載之誤一旦昭然豈不贊哉

臟腑部位

紹興王宗正曰診脈之法當從心肺俱浮肝腎俱沈脾在中州之說王叔和獨守寸關尺分部位以測五臟六腑之脈者非也

慈溪趙繼宗曰脈訣言左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命者非也心肺居上爲陽爲浮肝腎居下爲陰爲沈脾居中州半陰半陽半浮半沈當以左寸爲心右寸爲肺左尺爲肝右尺爲腎兩關爲脾關者陰陽

之界限。前取陽三分，後取陰三分。所謂土居金木水火之中，寄王于四時，不獨右關爲脾也。肝既爲陰，豈宜在半陰半陽半浮半沈之左關耶？命門卽是腎，不宜以右尺爲診。詳儒醫精要

吳草廬曰：醫者于寸關尺，輒名之曰此心脈，此肺脈，此肝脈，此脾脈，此腎脈者，非也。五臟六腑凡十二經，兩手寸關尺者，手太陰肺經之一脈也。分其部位以候他臟之氣耳。脈行始于肺，終于肝，而復會于肺。肺爲氣所出之門戶，故名曰氣口，而爲脈之大會。以占一身焉。詳文集

李時珍曰：兩手六部，皆肺之經脈也。特取此以候五臟六腑之氣耳。非五臟六腑所居之處也。凡診察，皆以肺心脾肝腎各候一動，五十動不止者，五臟皆足。內有一止，則知一臟之脈不至。據此推之，則以肺經一脈，候五臟六腑之氣者，可心解矣。褚儲、趙氏不知脈隨五臟之氣行于經隧之間，欲以男女臟腑顛倒部位，執泥不通。戴同父言褚氏倒裝五臟，丹溪別男女尺寸。草廬明三部皆肺，三說皆有真見。學者所當宗師。若夫趙氏所云，蓋本于宋人王宗正《難經圖解》，豈知脈分兩手，出于素問《脈要精微論》，而越人推明關脈及一脈十變于難經，非始于叔和也。若如其說，則一脈十變，何從推之？可謂鑿而任矣。○命門卽腎之說，乃越人之誤也。予嘗著《命門考》、《命門三焦客難二說》，凡二千餘言云。

瀕湖脈學

李時珍曰。宋有俗子杜撰脈訣。鄙陋紕繆。醫學習誦。以爲權輿。逮臻頽白。脈理竟昧。戴同父常刊其誤。先考月池翁著四診發明八卷。皆精詣奧室。淺學未能窺造。珍因撮粹擷華。僭撰此書。以便習讀。爲脈指南。世之醫病兩家。咸以脈爲首務。不知脈乃四診之末。謂之巧者爾。上士欲會其全。非備四診不可。

明嘉靖甲子上元日謹書于瀕湖廬所

浮陽

浮脈舉之有餘。

按之不足

脈經

如微風吹鳥背上毛。厭厭矗矗。輕汎

貌

如循榆莢。

問

如水漂木。

崔氏

如捻葱葉。

黎氏

浮脈法天。有輕清在上之象。在卦爲乾。在時爲秋。在人爲肺。又謂之毛。太過則中堅。旁虛如循雞羽。病在外也。不及則氣來毛微。病在中也。○脈訣言尋之如太過。乃浮無洪緊之象。非浮脈也。

【體狀詩】浮脈惟從肉上行。如循榆莢似毛輕。

三秋得令知無恙。

久病逢之卻可驚。

【相類詩】浮如木在水中浮。浮大中空乃是芤。拍拍而浮是洪脈。來時雖盛去悠悠。○浮脈輕平似捻葱。虛來遲大豁然空浮而柔細方爲濡。散似楊花無定蹤。

浮而有力爲洪。浮而遇大爲虛。虛甚爲散。浮而無力爲芤。浮而柔細爲濡。

【主病詩】浮脈爲陽表病居。遲風數熱緊寒拘。浮而有力多風熱。無力而浮是血虛。○寸浮頭痛眩生風。

或有風痰聚在胸關上土衰兼木旺尺中洩便不流通。

浮脈主表有力表實無力表虛浮遲中風浮數風熱浮聚
風寒浮緩風溼浮虛傷暑浮芤失血浮洪虛熱浮散勞極

沈陰

沈脈重手按至筋骨乃得脈如綿裹砂內剛外柔如石投水必極其底。

沈脈法地有淵泉在下之象在卦爲坎在時爲冬在人爲腎又謂之石亦曰營太過則如彈石接之益堅病在外也不及則氣來虛微去如數者病在中也○脈訣言緩度三關狀如爛綿者非也沈有緩數及各部之沈爛綿乃弱脈非沈也

【體狀詩】水行潤下脈來沈筋骨之間更滑勻女子寸兮男子尺四時如此號爲平。

【相類詩】沈幫筋骨自調匀伏則推筋着骨尋沈細如綿真弱脈絃長實大是牢形。

沈行筋間伏行骨上牢大有力弱細無力

【主病詩】沈潛水畜陰經病數熱遲寒滑有痰無力而沈虛與氣沈而有力積并寒○寸沈痰鬱水停胸關主中寒痛不通尺部濁遺并泄痢腎虛腰及下元痛。

沈脈主裏有力裏實沈滑淡食沈濡氣鬱沈弱寒熱沈緩寒溼沈緊冷痛沈牢冷積

遲陰

遲脈一息三至去來極慢脈經

遲爲陽不勝陰故脈來不及○脈訣言童手乃得是有沈無浮一息三至甚爲易見而曰隱隱曰狀且難是濇脈矣其謬可知

【體狀詩】遲來一息至惟三陽不勝陰氣血寒但把浮沈分表裏消陰須益火之原。

【相類詩】脈來三至號爲遲小缺于遲作緩持遲細而難知是濇浮而遲大以虛推

三至爲遲有力爲緩無力爲濇有止爲結遲甚爲敗浮大而弱爲虛○黎氏曰遲小而實緩大而慢遲爲陰盛陽衰緩爲衛盛營弱宜別之

【主病詩】遲司臟病或多痰沈痼癥痕子細看有力而遲爲冷痛遲而無力定虛寒○寸遲必是上焦寒。

關主中寒痛不堪尺是腎虛腰腳重溲便不禁疝牽丸。

遲脈主臟有力冷痛無力
虛寒浮遲表寒沈遲裏寒

數陽

數脈一息六至脈流薄疾問

數爲陰不勝陽故脈來太過○浮沈遲數脈之綱領素問脈經皆爲正脈脈訣立七表八裏而造數脈止語于心臟其妄甚矣

【體狀詩】數脈息閒常六至陰微陽盛必狂煩浮沈表裏分虛實惟有兒童作吉看。

【相類詩】數比平人多一至緊來如數似彈繩數而時止名爲促數見關中動脈形

數而弦急爲緊流利爲滑數而有止爲促數甚爲疾數見關中爲動

【主病詩】數脈爲陽熱可知只將君相火來醫實宜涼瀉虛溫補肺病秋深卻畏之○寸數咽喉口舌瘡

吐紅欬嗽肺生瘡當關胃火并肝火尺屬滋陰降火湯。

數脈主肺有力實火無力虛火浮數表熱沈數裏熱氣口數實肺壅數虛肺壅

滑陽中

滑脈往來前卻流利展轉替替然如珠之應指經濶濶如欲脫。

滑爲陰氣有餘故脈來流利如水脈者血之府也血盛則脈滑故腎脈宜之氣盛則脈濶故肺脈宜之○脈訣云按之卽伏三翻如珠不進不退是不分浮滑沈滑尺寸之滑也今正之

【體狀相類詩】滑脈如珠替替然往來流利卻還前莫將滑數爲同類數脈惟看至數間

滑數則如珠數則六至

【主病詩】滑脈爲陽元氣衰痰生百病食生災上爲吐逆下畜血女脈調時定有胎○寸滑膈痰生嘔吐。

吞酸舌強或欬嗽當關宿食肝脾熱渴痢癩淋看尺部。

滑主淡飲浮滑風痰沈滑食淡滑數痰火滑短宿食脈訣言關滑胃熱尺滑血畜婦人經病之旨相反其謬如此

濡陰

濡脈細而遲往來難短且散或一止復來經參伍不調間如輕刀刮竹脈訣如雨沾沙通真如病蠶食葉。

濡爲陽氣有餘氣盛則血少故脈來蹇滯而肺宜之○脈訣言指下尋之似有舉之全無與脈經所云絕不相干

【體狀詩】細遲短濡往來難散止依稀應指間如雨沾沙容易散病蠶食葉慢而艱。

【相類詩】參伍不調名曰濇。輕刀刮竹短而難。微似秒芒微更甚。浮沈不別有無間。

細遲短散時一止曰濇。極細而更重按若絕曰微。浮而柔細曰濡。沈而柔細曰弱。

【主病詩】濇緣血少或傷精。反胃亡陽汗雨淋。寒溼入營爲血癆。女人非孕卽無經。○寸濇心虛痛對胸。

胃虛脅脹察關中。尺爲精血俱傷候。腸結溲淋或下紅。

濇主血少精傷之病。女子有孕爲胎病。無孕爲敗血。杜光庭云。濇脈獨見尺中形散同代爲死脈。

虛陰

虛脈遲大而更。按之無力。隱指豁豁然空脈。

經

崔紫虛云。形大力薄。其虛可知。○脈訣言。尋之不足。舉之有餘。止言浮脈。不見虛狀。楊仁齋言。狀似柳絮散漫。而遲滑氏言。散大而更。皆是散脈。非虛也。

【體狀相類詩】舉之遲大。按之鬆脈。狀無涯類。谷空莫把芤虛爲一例。芤來浮大似慈蔥。

虛脈浮大而遲。按之無力。芤脈浮大。按之中空。乳爲脫血。虛爲血虛。浮散二脈見浮脈。

【主病詩】脈虛身熱爲傷暑。自汗怔忡驚悸多發熱陰虛須早治。養營益氣莫蹉跎。○血不榮心寸口虛。

關中腹脹食難舒。骨蒸痿痺傷精血。卻在神門兩部居。

經曰血虛脈虛曰氣來虛微爲不及。病在內曰久病脈虛者死。

實陽

實脈浮沈皆得。脈大而長微弦。應指幅幅然。

脈經

幅幅堅實貌。○脈訣言如繩應指來乃緊脈非實脈也。

【體狀詩】浮沈皆得大而長。應指無虛幅幅強熱蘊三焦成壯火。通腸發汗始安康。

【相類詩】實脈浮沈有力強緊如彈索轉無常。須知牢脈幫筋骨。實大微弦更帶長。

浮沈有力爲實。弦急彈指爲緊。沈而實大微弦而長爲牢。

【主病詩】實脈爲陽火鬱成發狂譖語吐頻頻。或爲陽毒或傷食。大便不通或氣疼。○寸實應知面熱風咽疼舌強氣填胸。當關脾熱中宮滿尺實腰腸痛不通。

經曰：血實脈實。曰：脈實者水穀爲病。曰：氣來實強。是謂太過。○脈訣言尺實小便難之說相反。潔古不知其謬。謂爲虛寒。藥用薑附。愈誤矣。

長陽

長脈不大不小迢迢自若。朱氏如揭長竿末梢爲平。如引繩如循長竿爲病。

素問曰：長者之長在時爲春。在人爲肝心脈長神

艮有三部之長。一部之長在時爲春。在人爲肝心脈長神。強氣壯腎脈長蒂。固根深經曰：長則氣治。皆言平脈也。

【體狀相類詩】過于本位脈名長弦則非然。但滿張弦脈與長爭較遠。良工尺度自能量。

實牢弦緊。皆兼長脈。

【主病詩】長脈迢迢大小匀。反常爲病似牽繩。若非陽毒癲癇病。即是陽明熱勢深。餘之病。

短陰

短脈不及本位。脈訣應指而迥不能滿部脈。

戴同父云。短脈只見尺寸。若關中見規上不通寸。下不通尺。是陰陽絕脈必死矣。故關不診短。○襄居士云。長短未有定體。諸脈舉按之附過于本位者爲長。不及本位者爲短。○長脈屬肝。宜于春。短脈屬肺。宜于秋。但診肝肺。長短自見。○短脈兩頭無中部。有不及本位。乃氣不足以前導其血也。

濡微動結皆兼短脈。

【體狀相類詩】兩頭縮縮名爲短。濶短遲遲細且難。短濶而浮秋喜見。三春爲賊有邪干。

洪陽

洪脈指下極大。脈來盛去衰。素問來大去長。通眞子。

洪脈在卦爲離。在時爲夏。在人爲心。素問謂之大。亦曰鉤。滑氏曰。來盛去衰。如鉤之曲上而復下。應血脈來去之象。象萬物敷布下垂之狀。○詹炎學言。如環珠者非脈訣云。季夏宜之。秋季冬季發汗通腸。俱非洪脈所宜。蓋謬也。

【體狀詩】脈來洪盛去還衰。滿指滔滔應夏時。若在春秋冬月分。升陽散火莫狐疑。

洪而有力爲實。實而無力爲洪。

【主病詩】脈洪陽盛血應虛相火炎炎熱病居脈滿胃翻須早治陰虛洩痢可躊躇○寸洪心火上焦炎肺脈洪時金不堪肝火胃虛關內察腎虛陰火尺中看洪主陽盛陰虛之病洩痢失血久嗽者忌之。

微陰

微脈極細而短按之如欲絕若有若無脈細而稍長又曰氣血微則脈微

【體狀相類詩】微脈輕微澈澈乎按之欲絕有如無微爲陽弱細陰弱細比于微略較粗

輕診卽見重按如欲絕者微也。澈如鑿上肥者陽氣微。鑿繁如蠶絲細者陰氣衰。長病得之死。卒病得之生。

【主病詩】氣血微兮脈亦微惡寒發熱汗淋漓男爲勞極諸虛候女作崩中帶下醫○寸微氣促或心驚關脈微時脈滿形尺部見之精血弱惡寒消瘦痛呻吟微主久虛血弱之病陽微惡寒陰微發熱脈訣云崩中日久肝陰竭漏下多時骨髓枯

緊陽

緊脈來往有力左右彈人手問如轉索無常數如切繩脈如級筭線

緊乃熱爲寒東之脈故急數如此要有神氣素問謂之急○脈訣言寥寥入尺來崔氏言如線皆非緊狀或以浮緊爲弦沈緊爲牢亦近似耳

【體狀詩】舉如轉索切如繩脈象因之得緊名總是寒邪來作寇內爲腹痛外身疼【相類詩】見茲

【主病詩】緊爲諸痛主于寒喘欬風癆吐冷痰浮緊表寒須發越緊沈溫散自然安○寸緊人迎氣口分當關心腹痛沈沈尺中有緊爲陰冷定是奔豚與疝疼諸緊爲寒爲痛人迎緊盛傷于寒氣口緊盛傷于食關緊痛居其腹尺乃疾在其腹○中惡浮緊軟

嘯沈緊
皆主死

緩陰

緩脈去來小駛于遲。一息四至。戴氏如絲在經。不卷其軸。應指和緩。往來甚勻。張太素如初春楊柳舞風之經。

揚玄

如微風輕颺柳梢。滑伯仁

緩脈在卦爲坤。在時爲四季。在人爲脾。陽寸陰尺。上下同等。浮大而稊。無有偏勝者。平脈也。若非其時。卽爲有病。緩而和匀。不浮不沈。不疾不徐。不微不弱者。卽爲胃氣。故杜光庭云。欲知死期。何以取古賢推定五般土。陽土須知不遇陰。陰土遇陰當細數。詳玉函經。

【體狀詩】緩脈阿阿四至通。柳梢裊裊颺輕風。欲從脈裏求神氣。只在從容和緩中。〔相類詩〕脈見遲

關爲風眩。胃家虛。神門濡泄或風秘。或是蹣跚足力迂。

浮緩爲風。沈緩爲溼。緩大風虛。緩細溼痹。緩濤牌薄。緩弱氣虛。脈訣言緩主脾熱口臭反胃齒痛夢鬼諸病出自杜撰與緩無關。

芤陰

中

芤脈浮大而稊。按之中央空。兩邊實。經中空外實。狀如慈蔥。

芤。慈蔥也。素問無芤名。劉三點云。芤脈何似。絕類慈蔥。指下成窟。有邊無中。戴同父云。營行脈中。脈以血爲形。芤脈中空。脫血之象也。○脈經云。三部脈芤。長病得之生。卒病得之死。○脈訣言。兩頭有中。脈以無是。脈斷截矣。又言主淋瀝氣入小腸。與失血之候相反。誤世不小。

【體狀詩】芤形浮大，裏如葱，邊實須知內已空。火犯陽經，血上溢，熱侵陰絡，下流紅。

【相類詩】中空旁實，乃爲芤。浮大而遲，虛脈呼芤更帶弦。名曰革芤，爲失血革血虛。

【主病詩】寸芤積血，在于胸，關裏逢芤，腸胃癰。尺部見之多下血，赤淋紅痢漏崩中。

弦陽中

【體狀詩】弦脈端直以長。素如張弓弦，脈按之不移。綽綽如按琴瑟絃。集狀若箏絃，訣從中直過。挺然指下。刊誤

弦脈在卦爲震，在時爲春，在人爲肝。輕虛以滑者平。實滑如循長竿者病。動急如新張弓弦者死。池氏曰：弦緊而數，動爲太過。弦緊而細，爲不及。戴同父曰：弦而喫，其病輕。弦而硬，其病重。○脈訣言時時帶數，又言脈緊狀繩牽，皆非弦象。今削之。

【體狀詩】弦脈迢迢，端直長。肝經木王土應傷，怒氣滿胸常欲叫。翳蒙瞳子淚淋浪。

【相類詩】弦來端直似絲絃，緊則如繩。左右彈緊，言其力弦言象。牢脈弦長沈伏間。又見長脈

【主病詩】弦應東方，肝膽經飲痰寒熱，瘡纏身浮沈遲，數須分別。大小單雙有重輕。○寸弦頭痛膈多痰。

【寒熱癥瘕詩】察左關，關右胃寒心腹痛。尺中陰疝，腳拘攣。

弦爲木盛之病，浮弦支飲外溢。沈弦懸飲，內痛，瘡脈自強。弦數多熱，弦遲多寒。弦大主虛。弦細拘急，陽弦頭痛。陰弦腹痛。單弦飲癖，雙弦寒癥。若不食者，木來克土，必難治。

革陰

革脈弦而芤。仲景如按鼓皮丹

仲景曰：弦則爲寒，芤則爲虛。虛寒相搏，此名曰革。男子亡血失精，婦人半產漏下，脈經曰：三部脈革，長病得之死，卒病得之生。時珍曰：此卽芤弦二脈相合，故均主失血之候。諸家脈書皆以爲牢脈，故或有革無牢，有牢無革，混淆不辨。不知革浮牢沈，革虛牢實，形證皆異也。○又按甲乙經曰：渾渾革革，至如涌泉病進而危，尋尋綽綽其去如弦絕者死。謂脈來渾濁，革變急如涌泉出而不反也。王叔以爲滻脈與此不同。

【體狀主病詩】革脈形如按鼓皮，芤弦相合脈寒虛。女人半產并崩漏，男子營虛或夢遺。【相類詩】見芤

牢陰中

牢脈似沈似伏，實大而長，微弦脈。

經

扁鵲曰：牢而長者肝也。仲景曰：寒則牢堅，有牢固之象。沈氏曰：似沈似伏，牢之位也。實大弦長，牢之體也。○脈訣不言形狀，但云尋之則無，按之則有，云脈入皮膚，辨息難，又以牢爲死脈，皆孟浪謬誤。

【體狀相類詩】弦長實大脈牢堅，牢位常居沈伏間。革脈芤弦自浮起，革虛牢實要詳看。

【主病詩】寒則牢堅，裏有餘腹，心寒痛木乘脾，疝癩癥瘕何愁也。失血陰虛卻忌之。

牢主寒，實之病，木實則爲痛。扁鵲云：牢爲虛，牢爲實，失血者脈宜沈細，反浮大而牢者死。虛病見實脈也。○脈訣言：骨間疼痛氣居于表池，氏以爲腎傳于脾，皆謬妄不經。

濡陰即異字

濡脈極耎而浮細，如帛在水中，輕手相得，按之無有脈，如水上浮漁。

帛浮水中，重手接之，隨手而沒之象。○脈訣言：按之似有舉還無是微脈，非濡也。

【體狀詩】濡形浮細按須輕，水面浮綿力不禁。病後產中猶有藥，平人若見是無根。

【相類詩】浮而柔細知爲濡沈細而柔作弱持微則浮微如欲絕細來沈細近于微。

浮細如綿曰濡沈細如綿曰弱浮而極細如絕曰微沈而極細不斷曰細。

【主病詩】濡爲亡血陰虛病髓海丹田暗已虧汗雨夜來蒸入骨血山崩倒溼侵脾○寸濡陽微自汗多關中其奈氣虛何尺傷精血虛寒甚溫補真陰可起疴濡主血虛之病又爲傷溼

弱陰

弱脈極弱而沈細按之乃得舉手無有脈

弱乃濡之沈者脈訣言輕手乃得黎氏醫如浮濡皆是濡脈非弱也○素問曰脈弱以滑是有胃氣脈弱以濡是謂久病病後老弱見之順平人少年見之逆

【體狀詩】弱來無力按之柔柔細而沈不見浮陽陷入陰精血弱白頭猶可少年愁【相類詩】見濡

【主病詩】弱脈陰虛陽氣衰惡寒發熱骨筋痿多驚多汗精神減益氣調營急早醫○寸弱陽虛病可知關爲胃弱與脾衰欲求陽陷陰虛病須把神門兩部推弱主氣虛之病仲景曰陽陷入陰故惡寒發熱又云弱主筋沈主骨陽浮陰弱血虛筋急柳氏曰氣虛則脈弱寸弱陽虛

尺弱陰虛關弱陽虛

散陰

散脈大而散有表無裏經渙漫不收崔氏無統紀無拘束至數不齊或來多去少或去多來少渙散不收如楊花散漫之象柳氏

戴同父曰。心脈浮大而散。肺脈短濶而散。平脈也。心脈裏散。怔忡。肺脈裏散。諸病脈代散。死脈也。雖經曰。散脈獨見則危。柳氏曰。散爲氣血俱虛根本。裏散。肝腫病脈也。腎脈裏散。諸病脈代散。死脈也。雖經曰。散脈獨見則危。柳氏曰。散爲氣血俱虛根本。脫離之脈。產婦得之。生孕婦得之墮。

【體狀詩】散似楊花散漫飛。去來無定至難齊。產爲生兆胎爲墮。久病逢之不必醫。

【相類詩】散脈無拘散漫然。濡來浮細水中綿。浮而遲大爲虛脈。芤脈中空有兩邊。

【主病詩】左寸怔忡右寸汗。溢飲左關應裏散。右關裏散肝腫。散居兩尺魂應斷。

細陰

細脈小於微而常有。細直而更若絲線之應指。

脈經

素問謂之小王。啓玄言如夢蓬狀其柔細也。○脈訣言往來極微是微反大于細矣與經相背。

【體狀詩】細來纍纍細如絲。應指沈沈無絕期。春夏少年俱不利。秋冬老弱卻相宜。【相類詩】見微濡。

【主病詩】細脈繁繁血氣衰。諸虛勞損七情乖。若非溼氣侵腰腎。即是傷精汗洩來。○寸細應知嘔吐頻。入關腹脹胃虛形。尺逢定是丹田冷。洩痢遺精號脫陰。脈經曰。細爲血少氣衰。有此證則順。否則逆。

伏陰

伏脈重按著骨指下裁動脈行筋下。

刊

脈訣言等之似有定息全無殊爲外觀。

【體狀詩】伏脈推筋著骨尋。指間裁動隱然深。傷寒欲汗陽將解。厥逆臍疼證屬陰。
【相類詩】見沈

【主病詩】伏爲霍亂吐頻頻。腹痛多緣宿食停。畜飲老痰成積聚。散寒溫裏莫因循。○食鬱胸中雙寸伏。

欲吐不吐常兀兀。當關腹痛困沈沈。關後痛疼還破腹。

傷寒一手脈伏曰單伏。兩手脈伏曰雙伏。不可以陽證見陰爲診。乃火邪內鬱。不得發越。陽極似陰。故脈伏必有大汗而解。正如久旱將雨。六合陰晦。雨後庶物皆蘇之義。又有夾陰傷寒。先有伏陰在內。外復感寒。陰盛陽衰。四肢厥逆。六脈沈伏。須投薑附及灸。關元脈乃復出也。若太陰衝陽。皆無脈者必死。○脈訣言。徐徐發汗。潔古以麻黃附子細辛湯主之。皆非也。劉元賓曰。伏脈不可發汗。

動陽

動乃數脈見于關。上下無頭尾如豆大。厥厥動搖。

仲景曰。陰陽相搏名曰動。陽動則汗出。陰動則發熱形冷惡寒。此三焦傷也。成無己曰。陰陽相搏則虛者動。故陽虛則陽動。陰虛則陰動。麗安常曰。關前三分爲陽。後三分爲陰。關位半陰半陽。故動隨虛見。○脈訣言。尋之似有舉之還無。不離其處。不往不來。三關沈沈含糊。蘊玄殊非動脈。詹氏言。其形鼓動如鉤如毛者尤謬。

【體狀詩】動脈搖搖數在關。無頭無尾豆形圓。其原本是陰陽搏虛者搖兮勝者安。

【主病詩】動脈專司痛與驚。汗因陽動熱因陰。或爲洩痢拘掣病。男子亡精女子崩。

仲景曰。動則爲痛。爲驚。素問曰。陰虛陽搏謂之崩。又曰。婦人手少陰脈動甚者。妊子也。

促陽

促脈來去數時一止復來。脈如蹶之趣。徐疾不常。黎氏

脈經但言數而止爲促。脈訣乃云井居寸口不言時止者謬矣。數止爲促。緩止爲結。何獨寸口哉。

【體狀詩】促脈數而時一止。此爲陽極欲亡陰。三焦鬱火炎炎盛進必無生退可生。【相類詩】脈促主陽盛之病。○促結之因皆有氣血飲食五者之別。一有留滯則脈必見止也。

結陰

結脈往來緩時一止復來。脈

脈訣言或來或去聚而卻還與結無關。仲景有聚聚如循長竿曰陰結。轔轔如車蓋曰陽結。脈經又有如麻子動搖旋收聚散不常者曰結。主死此三脈名同實異也。

【體狀詩】結脈緩而時一止。獨陰偏盛欲亡陽。浮爲氣滯沈爲積。汗下分明在主張。【相類詩】見代

【主病詩】結脈皆因氣血凝老痰結滯苦沈吟內生積聚外癰腫痘痕假爲殃病屬陰。主陰盛之病。越人曰：結甚則積。甚則微。則氣微浮結外有痛積。伏結內有積聚。

代陰

代脈動而中止不能自還因而復動。仲景脈至還入尺良久方來。吳氏

脈一息五至肺心脾肝腎五臟之氣皆足。五十動而一息合大衍之數謂之平脈。反此則止乃見焉。脾氣不能至則四十動一止。肝氣不能至則三十動一止。蓋一臟之氣衰而他臟之氣代至也。經曰代則病脈傷寒心悸脈代者復脈湯主之。妊娠脈代者其胎百日代之生死不可不辨。

【體狀詩】動而中止不能還復動因而作代看。病者得之猶可療。平人郤與毒相關。【相類詩】數而時止名爲促。緩止須將結脈呼。止不能回方是代。結生代死自殊塗。

促結之止無常數或二動三動一止卽來代脈之止有常數必依數而止還入尺中良久方來也

【主病詩】代脈元因臟氣衰。腹疼洩痢下元虧。或爲吐瀉中宮病。女子懷胎三月兮。脈經曰。代散者死。五十不止身無病。數內有止皆知定。四十一止一臟絕。四年之後多亡命。三十一止卽三年。二十一止二年。應十動一止一年殂。更觀氣色兼形證。

兩動一止三四日。三四動止應六七五六一止七八朝。次第推之自無失。

戴同父曰。脈必滿五十動。出自難經。而脈訣五臟譜皆以四十五動爲準。乖子經旨。○柳東陽曰。古以動數候脈。是吃緊語。須候五十動。乃知五臟缺失。今人指到腕臂。卽云見了。夫五十動。豈彈指間事耶。故學者當診脈間證聽聲。觀色斯備。四診而無失。

四言舉要宋南康紫虛隱君崔嘉彥希範著。明蘄州月池子李言聞子郁刪補。

脈乃血派。氣血之先。血之隧道。氣息應焉。其象法地。血之府也。心之合也。皮之部也。資始于腎。資生于胃。陽中之陰。本乎營衛。營者陰血。衛者陽氣。營行脈中。衛行脈外。脈不自行。隨氣而至。氣動脈應。陰陽之義。氣如橐籥。血如波瀾。血脈氣息。上下循環。十二經中。皆有動脈。惟手太陰。寸口取決。此經屬肺。上系吭嗌。脈之大會。息之出入。

一呼一吸 四至爲息。 日夜一萬。 三千五百。 一呼一吸。 脈行六寸。 日夜八百。 十丈爲準。
初持脈時。 令仰其掌。 掌後高骨。 是謂關上。 關前爲陽。 關後爲陰。 陽寸陰尺。 先後推尋。
心肝居左。 肺脾居右。 右大順女。 腎與命門。 本命扶命。 男左女右。 人無二脈。 病死不愈。 男女脈同。 關前一分。 人命之主。 惟尺則異。 舉按輕重。 左主司官。 右主司府。
左大順男。 肺脾居右。 脈有七診。 兩在關後。 曰浮中沈。 尺候于臍。 上下左右。 消息求尋。 各候五動。 反此病至。
寸候胸上。 關候膈下。 沈爲腎肝。 沈而弦長。 脾胃中州。 脾脈之沈。 沈實而濡。 心脈之浮。 太過實強。 脾胃屬土。 脾脈之沈。 沈而弦長。 是謂平脈。 是謂平脈。 脉宜和緩。 痘生于外。 痘生于內。 命爲相火。 肺脈之浮。 浮濶而短。 左寸同斷。 不病者否。 痘隨所在。 反此病至。
春弦夏洪。 秋毛冬石。 沈而弦長。 脾脈之沈。 沈實而濡。 太過實強。 脾胃屬土。 脾脈之沈。 沈而弦長。 是謂平脈。 是謂平脈。 脉宜和緩。 痘生于外。 痘生于內。 命爲相火。 肺脈之浮。 浮濶而短。 左寸同斷。 不病者否。 痘隨所在。 反此病至。
春得秋脈。 死在金日。 轉數轉熱。 呼吸定息。 轉遲轉冷。 遷數既明。 四至五至。 平和之則。 漏沈當別。 思悲恐驚。 人喜怒憂。 外因之浮。 辨内外因。 沈裏遲陰。 數則陽盛。
天有陰陽。 風雨晦冥。 轉遲轉冷。 調停自氣。 轉數轉熱。 遷數既明。 四至五至。 平和之則。 漏沈當別。 思悲恐驚。 人喜怒憂。 外因之浮。 辨内外因。 沈裏遲陰。 數則陽盛。

內因之浮。虛風所爲。沈氣遲冷。數熱何疑。
表裏陰陽。風氣冷熱。辨內外因。脈證參別。
浮脈法天。輕手可得。汎汎在上。如水漂木。
虛甚則散。漫漫不收。有邊無中。其名曰芤。
沈脈法地。近于筋骨。深深在下。沈極爲伏。
無力爲弱。柔小如綿。弱甚則細。如蜘蛛然。
二損一敗。病不可治。兩息奪精。脈已無氣。
遲細爲濇。往來極難。易散一止。遲脈屬陰。
數脈屬陽。彈如轉索。六至一息。九至爲脫。
有力爲緊。數脈相兼。過于本位。長而端直。
浮遲風虛。浮數風熱。各有主病。數見寸口。
浮濡陰虛。浮散虛劇。數脈主裏。則見諸證。
浮弦痰飲。浮滑痰熱。沈脈主裏。浮虛傷暑。
沈脈主寒。主寒主積。數見關中。短則氣病。
一脈一形。各主一形。數見關中。動脈可候。
浮遲風虛。浮緩風溼。不能滿部。厥厥動搖。
浮濡陰虛。浮虛傷暑。裏必不足。不見于關。
浮散虛劇。浮滑痰熱。主寒主積。浮脈主表。
沈脈主裏。浮洪虛火。有力痰食。浮洪虛火。
無力氣鬱。浮微勞極。惟尺寸候。狀如小豆。
是謂之滑。無力血弱。無力氣鬱。沈遲表虛。
沈數裏熱。浮遲表虛。沈遲冷結。引申觸類。
總括于四。既得提綱。遲而且柔。不任尋按。
實大弦長。牢甚則實。牢甚則虛。無力虛大。
浮小爲濡。綿浮水面。濡甚則微。幅幅而強。
遲脈屬陰。一息三至。小駛于遲。緩不及四。
浮大虛散。或見芤革。代則來緩。沈小細弱。
結則來緩。止而復來。往來流利。沈大牢實。
數見關中。數見寸口。有止爲促。數見關中。
有力爲緊。數脈相兼。則見諸證。則見諸證。
長則氣治。過于本位。有止爲促。數見寸口。
一脈一形。各主一形。數見寸口。數脈相兼。
浮遲風虛。浮緩風溼。各有主病。數脈相兼。
浮濡陰虛。浮散虛劇。數脈相兼。則見諸證。

沈遲虛寒。	沈數熱伏。	沈緊冷痛。	沈緩水畜。
沈弦飲痛。	沈滑宿食。	沈伏吐利。	沈牢痼冷。
數脈主腑。	主吐主狂。	有力爲熱。	陽氣伏潛。
濇脈少血。	或中寒溼。	無力爲瘡。	或傷于食。
浮弦支飲。	沈弦懸痛。	自汗厥逆。	滑脈主痰。
長脈氣平。	短脈氣病。	陰絃腹痛。	病屬膽肝。
洪脈爲熱。	其陰則虛。	細脈氣少。	又主諸痛。
濡小陰虛。	弱小陽竭。	細脈爲溼。	浮緊表寒。
陽動汗出。	陰動發熱。	其血則虛。	沈短宿食。
陽盛則促。	肺癰陽毒。	崩中失血。	緩細者溼。
脈之主病。	有宜不宜。	陽竭惡寒。	沈微虛損。
戶厥沈滑。	卒不知人。	陰虛發熱。	女微瀉血。
暑傷于氣。	身涼則安。	代則氣衰。	緩滑內熱。
汗後脈靜。	汗後脈躁。	虛寒相搏。	氣實脈實。
	熱甚必難。	陰盛則結。	緩滑血少。
	陰陽順逆。	凶吉可推。	血虛脈虛。
	入臟身冷。	入腑身溫。	沈遲中氣。
	溼傷于血。	脈緩細濇。	沈遲中氣。
	傷寒熱病。	風傷于衛。	沈遲中氣。
	陽病見陰。	急實則忌。	浮緊無汗。
	病必危殆。	脈喜浮洪。	證反必凶。
	陰病見陽。	沈微濇小。	雖困無害。

上不至關	飲食內傷	火鬱多沈	浮滑兼風	洩瀉下痢	浮滑兼風	火鬱多沈	陰氣已絕	下不至關	陽氣已竭	代脈止歇	臟絕傾危
頭痛多弦	癥癥之脈	癥乃重陰	小便淋悶	數熱遲寒	狂乃重陽	熱洪溼細	緩滑厥痰	氣虛弦弱	諸風眩運	血虛微濁	腎厥弦堅
浮風緊寒	癥乃重陰	鼻頭色黃	微濁而弱	火盛陰虛	浮洪吉兆	浮洪溼細	微伏則難	數大何妨	三消之脈	有火有痰	左濁死血
數熱遲寒	小便淋悶	火盛陰虛	脈數而虛	火盛陰虛	沈急凶殃	沈濡洪數	數大何妨	數大可憂	瘀血內畜	實急者惡	右大虛看
狂乃重陽	癥乃重陰	鼻頭色黃	脈必見芤	火盛陰虛	沈急凶殃	芤濡洪數	緩小可喜	緩小可喜	瘀血內畜	須分氣血	陽數而實
熱洪溼細	熱洪溼細	火盛陰虛	脈數而虛	火盛陰虛	沈急凶殃	芤濡洪數	數大何妨	數大可憂	瘀血內畜	浮大者生	細小微濁
緩滑厥痰	緩滑厥痰	火盛陰虛	脈數而虛	火盛陰虛	沈急凶殃	芤濡洪數	數大何妨	數大可憂	瘀血內畜	郤宜牢大	沈小濁微
氣虛弦弱	氣虛弦弱	火盛陰虛	脈數而虛	火盛陰虛	沈急凶殃	芤濡洪數	數大何妨	數大可憂	瘀血內畜	浮大者生	沈小濁微
諸風眩運	諸風眩運	火盛陰虛	脈數而虛	火盛陰虛	沈急凶殃	芤濡洪數	數大何妨	數大可憂	瘀血內畜	郤宜牢大	沈小濁微
血虛微濁	血虛微濁	火盛陰虛	脈數而虛	火盛陰虛	沈急凶殃	芤濡洪數	數大何妨	數大可憂	瘀血內畜	浮大者生	沈小濁微
腎厥弦堅	腎厥弦堅	火盛陰虛	脈數而虛	火盛陰虛	沈急凶殃	芤濡洪數	數大何妨	數大可憂	瘀血內畜	郤宜牢大	沈小濁微

心腹之痛。其類有九。
腰痛之脈。多沈而弦。
腳氣有四。^②遲寒數熱。
風寒溼氣。合而爲痹。
脈得諸沈。責其有水。
脈滿脈弦。土制于木。
五臟爲積。六腑爲聚。
癰疽浮散。惡寒發熱。
未潰癰疽。不怕洪大。
肺癰色白。脈宜短濶。
微濶而緊。未膿當下。
左疾爲男。右疾爲女。
新產之脈。緩滑爲吉。
其類有九。
細遲從吉。兼浮者風。
兼緊者寒。浮滑者風。
濡細者溼。浮濶而緊。
三脈乃備。浮氣與風。
沈石或裏。沈數爲陽。
沈細者死。沈數爲陽。
若有痛處。實強者生。
已潰癰疽。沈細者死。
洪大可怕。癰疽所發。
不宣浮大。唾糊嘔血。
緊數膿成。切不可下。
妊娠可喜。男腹如斧。
滑疾不散。欲產之脈。
胎必三月。其至離經。
七至爲平。水下乃產。
更察色證。未下勿驚。
與虎口文。濡細腎著。
濡細屬虛。脈必洪數。
沈遲爲陰。沈遲爲陰。
浮爲虛滿。中惡腹脹。
脈數發熱。肺癰已成。
寸數而實。婦人之脈。
滑數可知。腸癰實熱。
以血爲本。血旺易胎。
關脈芤虛。五月可別。
氣旺難孕。未下勿驚。
與虎口文。濡細腎著。
濡細屬虛。或濶或緊。
或細或濡。切忌發渴。
虛小可驚。浮大出厄。
虛急者生。積聚在裏。
大乃腎虛。沈實閃肭。
或細或濡。沈實閃肭。
弱急者死。牢急者生。

奇經八脈。其診又別。
尺左右彈。陰蹻可別。
督脈爲病。脊強癲癇。
陽維寒熱。癲癩瘓癰。
腎脈將絕。病脈既明。
眞脈既形。脾則雀啄。
胃已無氣。
直上直下。寒熱恍惚。
關左右彈。吉凶當別。
任脈爲病。如屋之漏。
陰維心痛。如水之流。
病脈既明。來如彈石。
脾則雀啄。至如省客。
參察色證。
八脈脈證。各有所屬。
八脈之外。又有眞脈。
肝絕之脈。如盃之覆。
平人無脈。如水之流。
命脈將絕。無根蕭索。
循刀責責。假游魚翔。
移于外絡。至如涌泉。
陽蹻爲病。至如涌泉。
陰蹻爲病。絕在膀胱。
帶脈當訣。胸脅刺築。
衝脈爲病。肝絕之脈。
陽蹻爲病。心絕之脈。
陽緩陰急。轉豆躁疾。
陰蹻爲病。浮波之合。
帶主帶下。脾痛精失。
至寸陰維。至寸陽維。
尺內斜上。尺外斜上。
至寸陰維。至寸陽維。
牢則爲衝。陽蹻可決。
緊則任脈。陽蹻可決。
寸左右彈。陽蹻可決。
陽蹻爲病。陽緩陽急。
逆氣裏急。陰緩陽急。
帶主帶下。陰緩陽急。
至寸陽維。至寸陰維。
尺內斜上。尺外斜上。
至寸陰維。至寸陽維。

