

大德重校聖濟總錄卷第一百四十五

傷折門

聖濟總錄卷第一百四十五

聖濟總錄

打撲損傷

腕折

倒仆蹶損

被傷絕筋

傷墮致損吐唾出血

傷損止痛生肌

頭傷腦髓出

傷折淋熨貼燻并膏藥

諸骨蹉跌

打撲損傷

論曰凡打撲損傷或為他物所擊或乘高墜下致傷手足腰背等處輕者氣血凝滯隨處疼痛重則聚為焮腫疔甚不可忍當察其內外輕重以治之

治傷撲疼痛蓬莪菝湯方

蓬莪菝

煨

白殭蠶

炒各壹兩

蘇枋木

剉貳兩

沒藥

研半兩

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日三若擣為細末熱酒調下亦得

治打撲傷損筋骨疼痛地黃散方

熟乾地黃焙 當歸切焙各 羌活去盡

苦參各貳兩 續斷肆兩

右五味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下不拘時服

治打撲損傷疼痛乳香丸方

乳香壹兩 桂去麤皮 安息香

沒藥各半兩 地龍炒 補骨脂炒各兩

當歸切 白芷各半兩 五靈脂貳兩

右九味各搗羅為末將乳香沒藥安息香三味用酒

研如糊和餘藥丸如龍眼大每服一丸酒磨溫服不

拘時

治打撲傷損疼痛延胡索散方

延胡索 桂去麤皮 沒藥研別

黃耆剉 當歸切 白欬

桑寄生 熟乾地黃焙各壹兩

右八味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下不拘時服

治打撲筋骨疼痛續斷丸方

續斷貳兩 防風又去 黃耆剉各壹兩

乳香研 沒藥研各半兩 自然銅煨醋淬柴

牛膝酒浸切焙壹兩半

右七味搗羅為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服三

十九溫酒下不拘時

治打撲內損及墜馬等傷白附子散方

白附子炮

續斷

防風去叉各壹兩

右三味搗羅爲散每服二錢匕童子小便和熱酒一盞調下併三服不拘時

治打撲內損疼痛海金沙散方

海金沙貳錢

大黃生

乳香研

沒藥研各壹錢

騏驎竭分

右五味除研外搗羅爲散和勻每服二錢匕乳香溫酒調下不拘時服

治打撲損疼痛麻根汁酒方

大麻根及葉生者去土參介

右一味細剉搗絞取汁每服半盞和溫酒半盞服不拘時無生麻根卽用乾者酒煎服

治打撲損疼痛木賊散方

木賊剉炒參兩

麻黃去根節壹兩半

甘草炙分

右三味搗羅爲散每服五錢匕熱酒調下隨酒量飲至醉候醒折處覺不痛是効未服藥先整骨裹縛方可服之

治打撲損傷手脚筋骨疼痛甘松丸方

甘松七

黃荆實

芥菜子糖

赤蓼花

檣子炒

白殭蠶炒

螻蛄殼各半兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如彈子大每服一丸溫酒化下不拘時候

治打撲傷損疼痛牡蠣散方

牡蠣

壹斤半炭火燒紅細研水飛過取壹斤

鉛粉

洛陽者炒黑細研半斤

當歸

切焙取半兩

蓬砂

研

乳香

研各壹兩半

右五味研勻先用醋煮小黃米粥攤紙上用藥末三錢匕勻搽粥上裏貼患處次用藥末二錢匕濃煎蘆

枋木汁一盞調下不拘時候服

治打撲傷損筋骨疼痛散方

鉛粉炒半兩

蓬砂研貳錢

當歸

切焙半兩

右三味搗研勻每服二錢匕濃煎蘇枋木汁調下若傷損在腰以上先喫淡麩少許後服藥如損處在腰下先服藥後喫淡麩少許後只如常調藥服更用糯米或黃米作粥拌藥二錢攤在紙上以故紙竹夾封

裹損處

治打撲內損疼痛摩膏方

蓖麻子

去殼研草烏頭半兩生烏末

乳香

研壹

右三味一處和勻量多少入鍊成豬脂研爲膏每取  
少許塗傷處炙手摩令熱做效如痛甚不可摩卽塗  
腫痛處

治打撲損傷瘀血不散疼痛木鼈裏方

木鼈子

去殼研

桂去蘊皮

芸薹子

酒浸研

丁香伍拾

右四味將丁香桂爲末與研者二味和勻次用生薑  
汁煮米粥攤紙上將藥末量多少糝入粥內看冷熱  
裹之一日一換

治打撲傷損補骨脂裹方

補骨脂

微炒

右一味搗爲末用醋煮黃米粥攤在紙上封裹損處  
治打撲損傷熱痰痛天南星貼方

天南星

兩

黃蘗

去蘊皮

右二味搗爲末用生薑汁調貼腫痛處

治筋骨傷折接骨知母裹方

知母

焙

貝母

心

白及

白欬

去蘊皮

乳香

研各

半兩

右六味搗研爲細末用好酒調如糊攤藥在新帛子  
上裹所傷處三五日一換

治打損成瘡不合方

蓖麻子去殼

右一味生研貼所患處如乾以津唾潤之

治破傷血出不止方

右用燈心爛嚼和津唾貼之或用帛裹縛之

治打撲損傷疼痛方

蓬莪莖剉

白殭蠶炒各壹兩

蘇枋木剉貳兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘時溫服

治打撲傷損止痛烏頭丸方

烏頭柴枚去皮生為末 黃狗膽壹枚

右二味以膽汁和藥末丸如棗豆大每以冷酒一盞

下三丸酒須飲盡

治傷損血入四肢疼痛不可忍乳香散方

乳香研 白芷研 桂去麤皮

沒藥研 安息香研 地龍去土炒

補骨脂炒 當歸炙剉各半兩

右八味搗研為散熱酒調下二錢匕

治傷損止血白欽燂藥方

白欽 白及 白芷

碧蘆皮炙黃各壹兩

右四味搗羅爲末雞子清拌石灰炒乾後入前未研細傷損處封之

腕折

論曰凡舉動不慎爲物所擊致腕折者筋骨損傷血氣蹉跌或留積成瘀焮腫疼痛宜速治之外則傳貼肌肉內加調養榮衛之劑則肢體可完矣

治腕折手足熱腫疼痛骨碎補散方

骨碎補祛

當歸切

芍藥切

桂去粗皮

蒲黃

蜀椒去目并閉口炒出汗各壹

兩

澤蘭葉

沒藥研各半兩

右八味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時  
治腕折筋骨疼痛延胡索散方

延胡索

橘子人

蒲黃

芸薹子去粗皮

當歸切

虎脰骨酥炙各壹兩

桂去粗皮

牽牛子參分壹半生壹半炒

右八味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治腕折骨損筋傷疼痛地黃傳方

右以生地黃不限多少熟搗用醋熬乘熱攤於所傷

處以帛繫定每日一換



治腕折氣血瘀滯疼痛黃耆散方

黃耆剉 生乾地黃焙 當歸切焙各

桂去皮去 烏頭炮裂去皮去 續斷剉

附子炮裂去皮去 芍藥各半 蜀椒去目并合口

乾薑炮裂 大黃炒 木通剉各

右一十二味擣羅為散每服二錢七溫酒調下不拘

時

治腕折疼痛芍藥散方

赤芍藥 黃耆剉各 附子炮裂去

當歸切 續斷剉 桂去皮去

羌活去頭去 虎骨酥 蜀椒去目并閉

大黃生各 烏頭炮裂去皮去

右一十一味搗羅為散每服二錢七溫酒調下不拘

時

治腕傷骨折青金散方

生龍腦研 麝香別研各 丁香炒末為

虎脛骨白者燒灰各 鱧鯉甲燒灰各

右五味將虎骨并鱧鯉甲灰丁香末同研極細次下

龍腦麝香和研令勻用瓷合盛每服半錢匕用小黃

米一合煮粥入醋少許攪勻下藥又取藥處所傷多

少用帛子攤裹之經宿一換

治腕折傷損附子膏方

附子生去皮燻豬脂兩

右二味先鍊豬脂去滓入附子末拌勻酒少許調如膏攤貼傷處日一易

治腕折止疼痛內損沒藥散方

沒藥研

騏驎竭

丁香炒

虎脛骨酥炙各半兩乳香別研

骨碎補壹兩

桑根白皮焙赤小豆各貳兩

右八味搗羅爲散每服二錢匕熱酒調下

治腕折活血丸方

桑枝東南引雞子大麤者細剉壹斗

雄黑豆參升入米醋炒栗子肆佰枚連皮

浸再燒再入醋內存性爲末乳香半兩

右四味搗研爲末以醋煮糯米粥和搗千杵丸如彈

子大陰乾勿見日後用米醋磨好香墨爲衣候乾以

布袋盛掛當風處每服一丸與乳香酒同煎令化溫

服服後向痛處臥日再疼痛自止

治腕折筋骨疼痛黑散子方

香墨半兩煨醋烏頭燒

芎藭

敗龜壹兩

木香兩

赤芍藥酒浸

桂皮壹

沒藥研

自然銅煨醋淬

當歸片切酒

地龍去土炒

乳香研

骨碎補

白芷各壹兩半

右一十四味搗羅爲散每服二錢匕熱薑酒調下不拘時

治腕傷折疼痛不可忍萬芑散方

萬芑子

壹兩黑  
色者炒乳香半兩

右一味同爲細散每服二錢匕熱酒調下不拘時服  
訖向痛處臥

治腕折先用止痛白礬湯熨方

白礬

右一味爲細末每用一匙沸湯一椀泡化以手帕子

蘸乘熱熨傷處少時痛定排整筋骨次用貼藥

雄鼠糞

尖者  
是桂去麤皮  
爲末

右二味等分研勻量傷折大小以冷水調藥末攤攤帛上裏之須臾如火暖三日後損處極痒是筋骨生長切不可動搖搔抓其藥力常如火暖如一兩日後覺藥力不暖卽換新藥裏之

治腕傷折乳香膏方

乳香兩

沒藥貳兩 味別如皂子大用生

冷別

銅錢肆拾玖文 火煨

蜜陀僧

雄黃各半

甜瓜子

當歸煨切

骨碎補

虎骨炙

黑狗頭骨

牛骨

人骨

木鼈子

麒麟竭各壹

右一十四味搗研為末拌勻入絹袋子內蒸如飴以  
瓷器盛如有傷折者旋取丸如豌豆大每服二十九

溫酒下

倒仆蹶損

論曰或因乘車馬或登陟危險誤多倒仆輕則蹉跌筋  
脉蹶損不能伸屈甚者乃至腰折筋骨治宜速以養血  
脉續筋骨之劑服之則其效速矣

治倒仆蹶損筋骨疼痛虎骨散方

虎骨

酥炙別為末

酒升

生地黃汁壹升

右三味將地黃汁并酒煎沸入虎骨末同煎數沸每

服一盞溫服不拘時候

治倒仆蹶損筋骨疼痛當歸湯方

當歸切

芍藥各貳兩

熟乾地黃兩肆

右三味蠶搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治倒仆筋脉蹶損芍藥散方

赤芍藥

黃耆剉

附子炮裂去皮臍

當歸切炒

續斷剉

桂去麤皮

羌活去蘆頭

虎骨酥炙

蜀椒去目并閉口者炒出汗各

壹兩

烏頭炮裂去皮臍半兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時

候

治墜墮倒仆蹶損筋脉芎藭湯方

芎藭壹兩

澤蘭取葉

附子炮裂去皮臍

牛膝酒浸切焙蜀椒去目及閉口者炒出汗

生乾地黄焙各分桂去麤皮半兩

右七味剉如麻豆大每服三錢匕水酒共一盞煎至

七分去滓溫服不拘時候

治倒仆筋蹶不得舒展地黃酒方

生地黃洗切研酒參升

右二味共煎數沸去滓每服一盞溫服不拘時候

治倒仆諸筋蹶損槐子煎方

槐子炒為末用酒壹升浸壹宿

桂去麤皮

秦艽去苗土

白朮剉炒

續斷

附子炮裂去皮  
臍各壹兩

右六味除槐子外搗爲麤末將槐子酒先煎次入豬脂半斤再煎沸卽入藥末再煎熟絞去滓菴合盛每服一匙溫酒調服不拘時候

治倒仆蹶損筋脉地黄酒方

生地黃汁壹升 酒壹升

桃人去皮尖別  
研壹兩

右三味先將地黃汁并酒煎令沸下桃人膏再煎數沸每服一盞溫服不拘時候

被傷絕筋

論曰凡肢體爲物所傷致筋斷絕不相續者使榮衛失

道血氣留瘀而爲腫痛治宜以活血續筋養之

治被傷筋斷益母草煎方

益母草汁貳升

生地黃汁半升

白蜜生用  
貳兩

右三味和勻以綿絹濾去滓入銀石器中慢火煎不住手攪候如稀餈以瓷合盛每服一匙用溫酒化下不拘時

治被傷筋絕蟹髓方

蟹髓取甲中并足中  
者不拘多少

右一味畧煮內筋斷處外以物帛繫縛卽搗葛根汁飲之

治骨折筋斷乾地黄散方

熟乾地黄

焙

當歸

切炒

羌活

去蘆頭

苦參

各貳兩

右四味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治被傷筋絕旋復根傳方

旋復根

洗不拘多少

右一味細搗爛量所傷處多少傳之一日一換

治筋傷骨損補接膈胛臍散方

膈胛臍

炙

熟乾地黄

焙

芸臺子

研

桑根白皮

沒藥

研

當歸

剉炒各壹兩

桂

去蘆皮半兩

右七味搗研爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治墜車落馬蹠折筋斷疼痛黃耆散方

黃耆

赤芍藥

各參兩

蜀椒

去目及閉口者微炒去汙

乾薑

大黃

剉炒各壹兩

當歸

剉炒

續斷

桂

去蘆皮

附子

剉裂去皮

熟乾地黄

焙

木通

剉各貳兩

烏頭

剉裂去皮臍半兩

右一十二味搗羅爲散不拘時候以溫酒調下二錢

匕

治骨折筋斷傷損疼痛桂附散方

桂去蟲皮

附子地裂去皮臍

白殭蠶炒

蒲黃

茅根剉

古銅銼末

當歸剉炒各壹兩

右七味搗羅為散不拘時候以溫酒調下二錢匕

治腕折筋傷地黃傅方

生地黃不拘多少

右一味熟搗用傅所傷處

傷墮致損吐唾出血

論曰凡墜打撲內動心氣榮衛氣血不至為患多矣若暴損胸膈氣留盲膜損血入胃停積不去甚則欬唾

吐血治法當調其榮衛緩其中逐去損血

治墜撲傷損肺氣欬唾血出甘草湯方

甘草壹兩

白茯苓去黑皮壹兩

杏仁湯浸去皮尖雙人炒研參

分  
人參壹兩

右四味除杏人外麤搗篩入杏人拌勻每服三錢匕

水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治一切傷損吐唾出血日漸痿瘦黃耆湯方

黃耆剉

芎藭

甘草炙

當歸剉

芍藥各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓



溫服不拘時

治墜墮內損吐唾出血桂心湯方

桂去蟲皮

當歸切

蒲黃各壹兩

大黃半兩切炒

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治因打撲損傷肺氣或欬嗽有血或吐出血地黃湯方

生地黄洗切

栝葉半兩

黃芩夫黑心

阿膠炙燥

甘草炙壹兩

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服不拘時

治打撲一切損內傷血瘀時吐唾中出血蒲黃散方

蒲黃貳兩

當歸切

桂去蟲皮

人參

檳榔各壹兩

右五味搗爲細散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治墜墮顛撲內傷藏氣吐唾出血艾葉湯方

艾葉炒半兩

白芍藥參分

熟乾地黄焙壹兩

乾薑炮半兩

阿膠炙令燥

甘草炙壹分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治傷損血滯在內吐唾中血出不止阿膠湯方

阿膠炙令燥

熟乾地黄焙

赤芍藥

當歸切焙

芍藥各壹兩

乾薑炮半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治傷損吐唾出血荆芥湯方

荆芥穗

淡竹筴細

當歸切焙各壹兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分臨熟入生地黃汁少許攪勻去滓溫服不拘時

治從高墜下肉損吐唾出血消血散方

蒲黃

當歸切焙

乾薑炮

桂去蟲皮各壹兩

蝨蟲去足翅炒壹分

大黃蒸剉壹兩半

右六味搗羅爲散每服三錢匕溫酒調下不拘時候治從高墜墮吐唾出血面青氣短胡粉散方

胡粉壹兩

右一味研細每服一錢匕溫水或酒調下

傷損止痛生肌

論曰凡肢節爲物所傷皮肉破裂久而疼痛不已肌肉

不生者以寒冷搏之榮衛不溫津液不養故也

治傷折氣血凝滯瘡口不合肌肉不生黃耆散方

黃耆剉 赤芍藥 熟乾地黃切

當歸切 桂去麤皮 乾薑壹分

木通剉 續斷剉各半兩 附子炮裂去皮

右九味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時候

治傷折肉破瘡口不合止痛生肌紫檀香傳方

紫檀香剉 山芋 鉛丹研各

馬齒莧拾兩細切暴乾

右四味除鉛丹外搗羅為末再和研勻每用隨瘡大

小乾傳之

治傷損瘡口不合止痛生肌檳榔散方

檳榔生 黃連去須 木香各壹兩

龍骨煨過半兩

右四味搗羅為散隨瘡大小傳之

治傷損皮破成瘡肌肉不生疼痛麒麟竭散方

麒麟竭兩 生人牙齒火煨過 蜜陀僧煨過各

右三味搗羅為細散隨瘡口大小傳之

治傷損止痛生肌烏賊骨膏方

烏賊骨去甲為末 舊船灰為末各壹兩 鉛丹貳兩

麝香研壹錢 麻油剉

右五味先熬油令沸熟次下船灰末烏賊骨末攪轉

夏入下鉛丹不住手又攪如稀稠得所黑色卽入麝香便傾入厚瓷石器內候冷塗所傷處

治傷折損破痛不止肉不合當歸膏方

當歸爲末

阿魏研壹

緋帛細剪

胎頭髮細剪

鉛丹貳

麻油肆

右六味先煎麻油令沸熟次入頭髮并緋帛煎令焦濾去滓再煎油候沸入鉛丹阿魏當歸以柳枝攪令勻候黑色滴水中成珠子卽以厚瓷合盛之塗瘡口或攤紙上貼之

治一切傷損止痛生肌黃耆膏方

黃耆剉

當歸切

附子炮裂去

芎藭剉 芩藭剉 大豆剉 續斷

細辛

主苗

薤白

細切各

豬脂切

斤壹

斤壹

右九味除豬脂外搗碎以酒半升拌一宿焙乾次日先煎脂沸下諸藥候色變濾去滓以合盛之不俱多少塗所傷處

頭傷腦髓出

論曰凡腦爲物所擊傷破而髓出者治療宜速蓋頭者諸陽所會凶者物所受命若腦破髓出稽於救治斃不旋踵宜速以藥封裏勿爲外邪所中調養榮衛安定精

神庶幾可活若其證戴眼直視不能語者不可治  
治頭為物所擊腦破髓出悶絕但有氣在心者豚血灌  
方

豚子血

豐合如無豚子猪血亦得

右一味每用少許灌腦中立醒

治腦破髓出欲死服水銀方

水銀

貳

右一味每用一錢許服之即活須臾未覺再服

治頭破腦髓出中風口噤大豆酒方

大豆

壹

桐子

壹

右一味搗碎安甑上蒸之乘熱以酒一斗淋下每服

一盞連三五服取汗為効

諸傷折淋熨貼燔并膏藥

論曰凡傷折有輕重淺深久新之異治法亦有服食淋熨貼燔之殊當詳所損之勢而療之去毒散滯生肌長肉亦各有序無致差紊乃明傷折之本末也

治傷折筋骨淋燂桂附散方

桂

去蘊皮

附子

生去皮

白礬

細辛

去苗葉

白芷

各壹兩

五加皮

桑葉

各貳兩

右七味搗篩為散每劑用三兩入葱連根十莖以水一斗煎沸逐旋淋燥立効

治傷折瘀血不散芫花麤散熨方

芫花

原蠶沙各參

生地黃斤貳

生薑兩

蜀椒去目及閉口

當歸各壹兩

牛膝

桑根白皮

艾葉

白芷各貳兩

右一十味並細剉麤搗以醋拌炒熟用青布裏熨之立効

治傷折疼痛淋燥芎藭湯方

芎藭

甘草炙

蜀椒去目及閉口

當歸切焙

吳茱萸浸炒各壹兩

桑根白皮剉

澤蘭各貳兩

松脂壹兩

黑豆壹升研碎入松脂內炒

右九味麤搗篩每用藥三兩水一斗煎沸淋燥痛處立効

治傷折接骨鯪鯉甲骨貼燴膏方

鯪鯉甲

塗醋炙參兩桂去麤皮

當歸切焙各壹兩

生地黃汁

麩壹匙

附子生去皮臍壹兩

生薑汁

右七味除汁外搗細羅為散熱煖地黃生薑汁調散

五錢七令勻攤於絹上乘熱裏貼損折處急繫縛每

日一換

治折傷接骨木鼈子貼燔膏方

木鼈子

去殼 貳兩

蜀椒

去目及閉 口炒出汗

虎脛骨酒

龜甲

醋炙各 壹兩

松節

參兩 細剉 醋燻 升炒令醋盡

右五味搗羅爲散用小黃米半升作稠粥調藥五錢

攤於絹上封裏損折處立効

治接骨桂附貼燔膏方

桂皮

去麩

附子

去皮 磨 生用

乳香

研

蜀椒

去目及閉 口炒出汗

白礬

碎

吳茱萸

浸炒各 壹兩

生薑汁

酒合伍

右八味搗研六味爲散將薑汁并酒各五合共煎取

七合入藥末調令勻於油單子上攤貼患處急裹縛

之其痛立定

治傷折接骨貼燔靈龜膏方

龜甲

醋炙 伍兩

大黃

剉

木鼈子

去殼各 參兩

當歸

切 燻

桂

去麩 各貳兩

桑寄生

右五味搗羅爲末每用時先將好酒一升煎去一半

停冷後入藥末一兩以柳木篋不住手攪成膏以油

單子上攤貼傷損處立効

治傷折皮肉破冷久不合宜用長肉合瘡口乳香膏方

乳香研

續斷

當歸炒

苘荇子

亂髮燒

麒麟竭魚上一半

薰陸香各貳兩

桂去蟲皮壹兩

麻油染

松脂

豬脂臘月者

鉛丹各肆兩去黃者

右一十二味除麻油豬脂鉛丹外並搗羅為末先煎油并脂等令熟停冷下藥末以柳木篋攪令勻用慢火更煎半日後下鉛丹攪令勻候成膏瓷合盛每用故絹攤貼立効

治傷筋骨腫痛不可忍摩痛膏方

丁香別搗為末

麝香別研

羌活去蘆頭

芎藭

防風又去

細辛去苗葉

牛膝去苗各半兩

駝脂拾兩

臘月豬脂貳拾兩

木鼈子去殼

附子去皮臍生用

栝樓根各壹兩

右一十二味除駝脂豬脂丁香麝香外細剉以米醋二升拌勻經三宿入鑪中炒令乾下駝脂及豬脂等以慢火再煎候諸藥焦黃色即住火用綿濾去滓後下丁香麝香攪勻內瓷合中盛旋取摩之

諸骨蹉跌

論曰凡墜墮擗撲骨節閃脫不得入臼遂致蹉跌者急



須以手揣搦還復樞紐次用藥調養使骨正筋柔榮衛氣血不失常度加以封裏膏摩乃其法也

治諸骨蹉跌補絕傷地黃散方

生乾地黃焙

桂去麤皮

乾薑炮

芍藥

甘草炙

當歸炒

芍藥各壹兩

右七味搗羅為細散每服二錢匕溫酒調下不拘時

候

治諸骨蹉跌補傷絕大豆湯方

大豆炒去皮

大黃炮

生乾地黃焙

桂去麤皮各壹兩

右四味麤搗篩每服二錢匕水酒共一盞煎至七分

去滓溫服不拘時候

治諸骨蹉跌血瘀腫熱疼痛大黃散方

大黃蒸切

大豆炒去皮各貳兩

桂去麤皮壹兩

右三味搗羅為細散每服二錢匕溫酒調下日三服

治諸骨蹉跌脫臼疼痛烏頭膏方

草烏頭去皮尖剉炒

細辛去苗葉

獨活去蘆頭

蛇牀子炒各半兩

吳茱萸洗焙炒壹兩

葱貳拾

生薑肆兩

右七味搗羅前五味爲末次將生薑葱二味研細後  
入藥末同和令勻乘濕攤絹帛上裏所損處日一  
治諸骨蹉跌不歸白疼痛地黃膏方

生地黃

洗切

右一味搗研細用好醋一升煎得所和之乘熱攤絹  
帛上裏蹉跌處日一易

治骨節蹉跌內傷疼痛地黃傳方

生地黃

洗研

芥菜子

研碎

右二味細研和勻入酥四兩同煎沸乘熱傳損處或  
以帛子繫之日一易

治傷損骨蹉跌地黃膏方

生地黃

洗切

藏瓜薑內糟

生薑

洗切研

右三味同以慢火炒乘熱卷損處以帛繫之日一易  
治骨出臼蹉跌不復疼痛當歸膏摩方

當歸

洗切

續斷

剉

細辛

去苗

木通

剉

白芷

切

芎藭

剉

甘草

剉

蜀椒

去目及

牛膝

去苗

附子

去皮臍生

右一十味麤搗篩用豬脂半斤先煎取油次下諸藥  
煎如膏以絹絞去滓卷合盛每用少許抹損處熱手

摩之

摩之... 摩之... 摩之...

摩之... 摩之...

摩之... 摩之...

摩之... 摩之...

摩之... 摩之...

摩之... 摩之...

摩之... 摩之...

大德重校聖濟總錄卷第一百四十五

大德重校聖濟總錄卷第一百四十五

大德重校聖濟總錄卷第一百四十六

雜藥門

中藥毒

食毒

食諸菜蕈菌中毒

飲酒中毒及大醉不解

服藥過劑

雜藥統論

論曰人之一身無尺寸之膚不愛無尺寸之膚不養食  
飲不可以不節起居不可以不常蓋藥石蔬茹禽獸蟲  
魚有失味之和蜘蛛蜈蚣蚊蝱蜂蠍有啞膚之患至於  
飲水涉溪穿井入冢一有不慎適中其毒有害生理雜  
療之方蓋不可闕今隨證編集于後云

中毒藥

論曰神農嘗百草一日而七十毒以辨相得相反相惡  
相畏至於有毒無毒各有制治然藥無毒則疾不瘳內  
經所謂知毒藥爲真者乃用藥之要也昧者誤有服食

當究其毒以制治之猶巴豆之用黃連半夏之用生薑是也

解一切藥毒椿皮飲方

椿白皮

東柳枝並細剉阿魏好者少許

右三味以水三盞同煎取一盞去滓空心頓服吐出

惡物卽差吐後服蜂窠散

治藥毒吐後蜂窠散方

土蜂窠

妙研末

赤小豆

糯米

粟米

藍實

肆味並生用各貳兩

猪苓皮

薺芎

各剉半斤

馬蘭

乾者貳兩

右八味嚙羅爲散每服三錢匕溫水調下空心日晚服一方入豬糞炒焦

治中毒藥心腹切痛不可當欲死者有救藥不及死後

身黑是中毒之證解毒丸方

大棗貳枚去核

巴豆

參柒粒去膜不出油

右二味共研勻只作四丸逐丸以大鐵穿就麻油燈

焰上熏令黑用菴合貯遇中毒者每服只一丸隨所

中毒物汁嚙下不得嚙破一二時辰取下毒其毒卽

包裹所服藥下或不知所中毒物卽以茶清一大盞

放溫嚙下

治中藥毒心膈煩悶甚者如錐刺痛不可忍宜速吐之  
甘草湯方

甘草生用  
貳兩

白藥壹  
兩

右二味細剉以水三盞同煎至二盞去滓候冷頓服  
以吐出惡物為度吐了後再單煎甘草一味服尤佳  
治一切藥毒發不問草石始覺惡心麥門冬飲方

生麥門冬

去心  
貳兩 葱白  
兩

豉貳兩  
半

右三味剉如麻豆大以水七盞煎取三盞半去滓分  
三服如食頃再服

治中藥毒心痛煩悶甘草飲方

甘草生剉  
貳兩

葛粉研壹  
兩

白蜜半  
兩

右三味以水六盞先煎甘草減半內葛粉并蜜更煎  
三兩沸去滓溫分三服如食頃再服

解毒藥藍根飲方

藍根剉壹  
握

蘆根剉壹  
握

菘豆研壹  
分

澱脚研壹  
合

右四味先將藍根蘆根以水一椀煎至七分去滓次  
將後二味和勻分三服或一二服利下惡物不用再  
服

解中一切毒藥唇口脉目暗心腹如刀刺或吐血解

毒散方

石綠 不計多少

右一味研細每服一錢匕研萊菔子汁調下立吐吐得毒出即服和氣藥調補

治藥毒吐出升麻散方

升麻 兩半

右一味為散食後及夜臥溫水調下一錢匕服半月後一切毒藥入口即便吐出宜常服

解中藥毒吐血腹內如錐刺者歸魂散方

白礬

草茶 各壹兩

右二味搗研為散分作三服用新汲水調下連服之立解此藥入口其味甘甜不覺苦味者是中藥毒也  
解藥毒如聖散方

露蜂房

甘草 各半兩同用  
麥麩炒去麩

右二味搗羅為散用水一盞半煎至八分放溫臨臥頓服明日取下惡物為效

解藥毒太白散方

山芋 兩

右一味為散每服二錢匕新汲水調下日三服治一切毒及藥毒辨毒散方

阿魏研

青鹽研各壹兩

甘草生剉參兩

右三味搗研為散如遇有毒物處每日空心沸湯點服一錢匕若食著毒物立便吐出

解一切藥毒蠶蠶散方

白蠶蠶直者

右一味為散每服一錢匕粥飲調下吐出毒差

解一切藥毒二珍丸方

天南星參兩為末

黃牛膽大者壹枚取汁

右二味和丸如雞頭大陰乾遇中毒者洗汗襪水澄清半盞入鹽少許磨下一丸或吐或利即差如吐利

後氣滿即服平胃散助之此藥但頭腹未裂並可治

治百藥毒方

甘草生剉貳兩

右一味以水三盞煎至一盞半去滓停冷每服半盞細細飲之未效更服

解一切藥毒薺萋飲方

薺萋剉碎貳兩

右一味以水三盞煎至一盞半停冷細細飲之

解一切藥毒大豆飲方

大豆壹升



右一味以水二升煮至一升去豆停冷細細飲之  
解一切藥毒麻人飲方

大麻人伍合

右一味研如膏入水二盞攪令勻取汁細細飲之

解巴豆毒方

黃連去須壹兩

右一味搗為細散每服一錢匕溫湯調冷服之

解半夏毒方

生薑細切肆兩

右一味細研取自然汁和冷水旋旋飲之

解躑躅毒方

槐子人肆兩

右一味為散冷水調下二錢匕未效再服

解藜蘆毒方

雄黃壹兩

右一味細研煎葱汁調下二錢匕未效再服

解甘遂毒方

大豆不拘多少去皮

右一味以水研取汁每服一盞未效再服

解蜀椒毒方

葵子汁

桂汁

豉汁各壹

右三味同和每服一盞未效再服

解礬石毒方

白鵝膏

不拘多少

右一味研細每服一匙大豆汁調下

解芫花毒方

防已

防風去

甘草生

桂去麤皮各壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕冷水調下連併三服

解烏頭附子天雄毒方

遠志去心

防風去又各壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕大豆汁調下連進三

服

解葇荂毒方

薺菀

犀角屑

甘草生剉各壹兩

右三味搗羅為散每服五錢匕溫湯調下

解大戟毒方

菖蒲壹兩

右一味搗羅為散每服二錢匕溫湯調下

解桔梗毒方

粳米貳合

右一味洗淨煮白淡粥食之

解杏人毒方

藍實不拘多少

右一味研取汁水和服之

解斑貓荒青毒方

右用豬脂大豆汁服之或戎鹽汁同服解之或以藍湯煮豬脂停冷服並解之

解狼毒毒方

杏人壹兩去皮尖研細

右一味每用一匙以藍汁調服

解藥毒蠱毒等疾丹砂丸方

丹砂研

雄黃研

附子炮裂去皮臍為末各壹兩

豉陸拾粒炒

巴豆陸拾粒去皮心膜炒去油

右五味細研巴豆并豉入前三味鍊蜜和搗數百下

丸如胡豆大瓷瓶密收每服二丸煖蜜酒下

治中金石藥毒黑鉛酒方

黑鉛壹斤

右一味以甘鑞鎔作汁投酒一升如此十數迴候酒至半升去鉛頓服之

食毒

論曰五穀五菜五畜五果以至藥石皆能養性益壽延年却老樂疾獨邪然有損有益有害不可不察飲食之間可不慎哉本草論物性味有相須相得相畏相惡相得則良相須則用相畏則制其毒相惡則置而不用然則飲食有毒宜有解散除治之法也

辨飲食毒法

右凡飲食傾澆於地地土湧起者不可食食之皆殺人

治新中雜食瘀實不消心腹堅者方

白鹽貳

右一味以水二大盞同煎至一盞半分三服連併服

取吐為效

治因食中毒黃龍湯方

右取竈底當釜直下掘取赤土搗羅為細末以冷水調隨多少服之或犀角水摩取汁飲大效

又方

右取赤馬溺不計多少每服飲十兩盞

又方

右取苦參一兩半以醇酒二升同煎一升去滓令溫

飲之得吐卽愈或取甘草汁藍汁飲之

又方

右取桑上葷破作段著釜中以水五升煮取二升漉出澄清以慢火再煎沸經宿不食來晨空腹服三合則吐食瘕每日服三合差羸者減服之

治食諸飢臞百物中毒方

貝齒壹枚

右一味含之須臾吐出所食之物卽差

又方

甘草生

薺各貳兩

右二味細剉以水五盞同煎取二盞停冷去滓分三服

外臺秘要論曰嶺南俚人毒藥皆因食得之卽覺漸不

能食或五更心中滿脹并背急悶似瘴微覺卽急取一

片銀方寸許含之一宿其銀變色卽是著毒藥也銀色青

是藍藥若黃是茵藥俚人有解瘴者畏人得法在外預

合藥防之或名三百頭牛藥或言三百兩銀藥並是常

用俚人不識本草乃妄言之其方如後未得此藥先以

餘藥治之且令定解毒飲方

生薑

甘草各壹兩

右二味各拍碎以水三盞煎取一盞半平旦空腹分  
二服服訖然後以別方治之

又方

常山肆

白鹽貳

右二味以水一斛浸之一宿以月盡日浸之月一日  
五更用土釜中煎之勿令奴婢雞犬見煎取二升於  
平旦分爲三服用少時卽吐以銅盆盛之看色青以  
杖舉得五尺不斷者卽是藥未盡候一日二日後更  
進一劑乃良

又方

都淋藤 拾貳兩此藥嶺南有之土人皆識呼爲三  
百兩愈藥甚細長其藤有高三三尺者生切

右一味以水一升酒二升同煎取二升分三服如人  
行十里進一服服盡三服訖其藥毒遂從大小便出  
十日慎喫壅毒諸食不差更服以差爲度

治解腹內諸毒二藤酒方

都淋藤

黃藤 各搗取二虎口  
長三寸並細切

右二味以酒三大升都入小甕罐中密封用慢火圍  
四邊燒之令沸伺溫出之溫服常有酒色無禁忌若  
不獲已欲食俚人食者先取甘草一寸炙令熟嚼嚙

汁若食著毒藥卽吐依前法治之若經含甘草而不吐者非也宜常取甘草十數截隨身帶之以自防嶺南人將生熱食物並於火上炮炙食之永無慮若席上撒藥臥著因汗入肉最難治可常自將淨席隨身及匙筋甘草解毒藥行爲妙

### 食諸菜蕈菌中毒

論曰朽木生蕈腐土生菌二者皆陰濕之氣蒸鬱所生也既非沖和所產性必有毒若誤食之令人吐利不已心腹切痛甚者身黑而死菜亦生於陰濕食之過多或與菌蕈同食性有反惡悉能害人可不慎哉

### 治食諸菜蕈菌中毒甘草散方

甘草炙

貝子

胡粉各壹兩

### 右三味搗羅爲散每服二錢七水調下 治食諸菜中毒方

童子小便

人乳汁各半

### 右三味煎和勻微煎過分溫二服連併服之 治食諸菜蕈菌中毒方

雞屎燒

右一味碾爲細末每服半錢匕用好豆醬半匙細研和藥溫酒調下連三服立解

治食諸菜中毒方

雞毛燒灰壹分

雞屎燒灰壹分

豆醬半盞

右二味細研和勻每服一錢匕用豆醬少許研酒調下三服效

治食諸菜中毒方

豆醬不拘多少

右一味逐旋量多少食之大解菜毒

治食苦瓠中毒方

黍剉半斤

右一味用水三升煮取一升時時服之

治食諸蕈并菌中毒方

生薑切研細肆兩

豆醬肆兩

麻油貳

右三味和研勻椽盛飯上蒸一炊許時取出不拘時候時時食之諸毒立解

治食蕈并菌中毒方

右掘地作坑用新水投坑中攪之乘混濁取出以絹

濾過用瓷器盛每服時打轉飲一盞至三盞當效

飲酒中毒及大醉不解

論曰酒者熟穀之液也其性慄悍急疾後食而入先食而出能通關節而走膚腠上古作湯液醪醴為而不用



後世嗜之無節或飲過度停積不散蘊滯於胃散流諸脉熏蒸府藏令人志亂乃至不醒有連日而無所覺知者甚則中毒而為酒疽諸熱之病也

治飲酒中毒不醒方

大豆升參

右一味以水三升煮取二升去滓每服一盞不拘時

溫服

治飲酒大醉不得安臥必須使人搖動不爾恐酒毒腐傷腸胃方

右以生茅根搗絞取汁每服一小盞頻服之

治酒毒昏悶煩渴或醉不醒柑皮煮散方

柑子皮貳兩洗焙乾

右一味搗羅為散每服三錢匕水一盞煎三五沸溫服或入少鹽末沸湯點未效再服

治飲酒中毒方

乾桑椹貳合

右一味用酒一升浸一時久取酒旋飲之即解

治酒醉不醒方

菘菜子不以多少

右一味每研半合以井華水一盞調服

治飲酒中毒葛花散方

葛花壹兩

右一味搗為散沸湯點一大錢匕不拘時候亦可煎服

治飲酒過度不醒葛根湯方

葛根細剉 貳兩

右一味鱗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時候

治飲酒過多大醉不醒石膏湯方

石膏伍兩

葛根剉

生薑細切各 參兩

右三味剉如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

治飲酒大過內熱煩躁言語錯謬人參湯方

人參貳兩

芍藥

栝樓實

枳實去瓤 炒

茯神去木

生地黄洗切

甘草炙

葛根剉

酸棗仁各 障 治 兩

右九味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治飲酒大醉心悶腹脹吐逆喘急豆蔻湯方

草豆蔻去皮 參分

丁香

小豆

人參

木香

高良薑

檳榔剉

陳橘皮湯浸去白焙各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑半分

切煎取七分去滓不計時候溫服

治飲酒過度酒毒積在腸胃或嘔吐不食渴多引飲橘

皮湯方

陳橘皮湯浸去白炒葛根剉

甘草炙

石膏打碎各兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治飲酒發渴又欲飲酒栝樓湯方

栝樓根

桑根白皮細剉各兩

麥門冬去心焙葛根剉

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治飲酒後酒氣襲人方

乾蔓菁根不拘多少蒸壹次切焙乾

右一味搗羅為散每服三錢匕飲酒後用新汲水調

下

服藥過劑

論曰唯動與過疾所由生故所守不固則邪得以干之  
以五藥內攻使邪不勝正而已然毒藥攻邪不必過劑  
過則反傷正氣猶以五味致養稍過亦能為害此理之  
必至也

治服藥過劑反傷正氣致八邪干心或三蟲變蟲或乘  
虛中惡或變為五淋或致子為驚癇或筋攣脉結或產  
婦血運或胸停客熱花光散方

璵璠屑貳兩

藍實妙壹兩半

安息香別研

丹砂別研

琥珀各壹兩

牛黃別研

人參

麝香別研

貫衆各半兩

右九味除別研外搗羅為細末拌勻每服一錢匕溫  
酒調下早晚食後服小兒半錢匕日再服

治因寒藥內攻大腸急痛或胸臧冷氣或為血蠱或霍  
亂或心脹短氣或羸瘦或腹痛不解或虛滿遺精或水  
腫或中惡充德丸方

艾去梗半

萑茵壹兩半

丁香

訶梨勒煨去核

桑根白皮炙各壹兩肉豆蔻去殼

益智子去灰

薰陸香別研

麝香別研各半兩

右九味除別研外搗羅為末同拌勻酒煮麩糊和丸  
如梧桐子大每服二十九早晚食前溫酒下

治中蠱不深久變為鬼瘡或中氣結邪或胸臆痰癖或  
目中血出或中惡或驚魘或八邪互變或產婦胎衣不  
下或致馬刀腫癰或處女不月宜真丸方

女青貳兩

蘭草壹兩

白菟藿壹兩

丹砂別研各壹兩

犀角鎊

馬先蒿

皂莢炙去皮子

蘭茹各半兩

巴豆拾粒去皮心  
膜存油炒紫

研色

右九味除別研外搗羅為末鍊蜜為丸如棗豆大每  
服七丸夜半冷茶清下

治服諸藥過劑心中悶亂方

右搗生葛根取汁半盞或一盞飲之或以葛根一兩  
細剉水二盞同煎至一盞去滓溫服亦良

又方

右於屋溜下作坑廣二尺深三尺以水七盞灌坑中  
攪揚之令沫出取沫五盞飲之未解更作

又方

右搗蓂荷取汁飲一二升夏冬用根夏用莖葉

又方

右燒犀角灰研細每服二錢匕水調服

又方

右刮東壁土以水調服

又方

右以粳米水研取清汁五升細細飲之

又方

右以雞子三枚取黃吞之

又方

右取板藍根七枚細切水一盞半同煎至一盞放冷

細細飲之

又方

右以豉汁一盞飲之

又方

右以黃連末一錢匕溫水調服

大德重校聖濟總錄卷第一百四十六

大德重校聖濟總錄卷第一百四十七

雜藥門

食牛馬豬犬魚蟹中毒

解金銀銅鐵石毒

蠱毒

馬咬并踏傷

新編醫方卷之六

食牛馬豬犬魚蟹中毒

論曰夫禽獸品類有根性本毒者有無毒而食毒物者有雜合相畏相惡相因成毒者人不慎而食之致傷府藏之和亂腸胃之氣或輕或重各隨其毒而為害今備禽獸雜忌并解毒諸方于後宜預知焉

治食牛肉中毒方

豬脂鍊為油壹兩

右一味每服一匙頭以溫湯調化服之未差更服

治食牛肉中毒方

豬牙不拘多少燒灰

恩錄卷之六

二



右一味搗為細末每服一錢匕以人乳汁調下

治食馬肝或肉中毒方

豬骨燒灰

右一味研細每服二錢匕冷水調下未差再服

治食馬肝中毒方

雄鼠屎貳柒枚炒

右一味為末冷水和服之未効再服

治食豬肉中毒方

大黃炒壹兩

朴消研壹兩

杏人和皮打碎壹兩

右三味為麤末每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服

治食狗肉或食不消化狂躁方

杏人參兩和皮用

右一味和皮細研以熱湯投之去滓每服一盞溫服

治食自死六畜肉中毒方

黃蘗去麤皮壹兩

右一味搗為末每服一錢匕溫水調下

治食六畜肝中毒方

豆豉壹兩

右一味以水浸絞取汁旋服之

治鳥獸中毒箭其肉有毒解之方

藍青參握細切

右一味搗取汁每服一盞飲之

治食魚中毒面腫煩亂方

陳橘皮湯去白焙壹兩

右一味搗為麤末以水兩盞煎至一盞去滓停冷細

細飲之大効

治食魚中毒方

冬瓜壹枚小者洗淨搗絞取汁壹大盞

右一味旋旋飲之効或甜瓜搗絞取汁飲之亦得

治食鱸魚中毒血腫煩亂欲死者方

生蘆根搗絞取汁壹盞

右一味旋旋飲之以差為度

治食魚鱸中毒煩亂方

大黃壹兩 朴消壹兩

右二味搗令碎每服三錢匕酒一盞煎至六分去滓

溫服早晚各一

治蟹腹中有毒食之或致死急治之方

大黃汁 紫蘇汁 冬瓜汁

右三味汁共一大盞飲之解毒立効

治食蟹中毒煩亂欲死者服五蠱黃丸得吐下皆差方

雄黃

壹兩以油從且至夜煎之取出別研

莽草

取葉水洗暴乾炙壹兩

蜈蚣

赤足大者壹條炙令勻

鬼臼

壹兩

巴豆

貳拾枚去皮心炒令黃

右五味搗羅三味為末別研巴豆雄黃和勻鍊蜜為

丸如小豆大瓷器中盛每服三丸至五丸米飲下

治食蟹中毒方

蘆梢

細剉研碎參兩

右一味以水一盞同研絞換取濃汁飲之大効

治食蟹中毒方

生藕汁

蒜汁

冬瓜汁各壹盞

右三味各取汁各自飲之或一汁已解別汁不用飲

治食蟹中毒方

紫蘓新摘者壹握

右一味搗碎以水煎取濃汁飲之

治食魚中毒橘薑丸方

陳橘皮

湯浸去白焙為末

生薑

去皮切爛搗研

豆豉

為末

右三味等分同和丸如梧桐子大每服二十九茶清

下

解金銀銅鐵石毒

論曰五金受五方精氣各有毒性不可謂有利無害也服之適宜足以瘳疾服之非宜徒傷正氣當隨所畏惡以制之服石法亦若是

治金毒方

鴨血壹盞

右一味每服半盞和鷄子清調下未効再服

治銀毒方

黃連去鬚

甘草生剉各壹兩

右二味麤搗篩以水三盞煎取二盞去滓時復飲之

治銀毒方

石亭脂壹兩

右一味搗羅為細末煎甘草湯調下二錢匕三服大

効

治銅毒方

鴨屎焙乾無泥土者

右一味搗羅為細末用水調下一錢匕三服立解

治鐵毒方

磁石大火煨醋淬貳柒徧壹兩

右一味細搗研如粉醋煮麩糊丸梧桐子大每服二

十九水吞下未差更服

治丹砂毒方

鹽兩半

右一味以冷水攪勻令渣旋旋飲之

治石鍾乳毒方

紫石英兩壹

右一味搗羅為細散每服一錢匕溫水調下連三服

治硫黃毒方

細辛壹兩 去苗葉

右一味搗羅為細散每服一錢匕煮豬肉白湯調下

冷服又白野鴿肉亦治硫黃毒凡一兩肉可解一兩毒

治消石毒方

女苑兩壹

右一味麤擣篩每服二錢匕水一盞煎七分溫服不

拘時

治陽起石毒方

菟絲子壹兩不 用酒浸

右一味搗羅為細末每服一錢匕溫水調下三服立

解

治雄黃毒方

防已壹兩

右一味爲細末每服二錢匕溫水調下連三服

治礞砂毒方

生菘豆不計多少研汁飲之

治礞砂毒方

漿水

右一味每服一盞不拘時服之

蠱毒

論曰千金論曰蠱毒千品種種不同有得三年方死有一

月或百日乃死者其爲病亦各有異或吐下鮮血或好  
臥聞室或心性反常乍嘔乍喜或四肢沉重痠痛緩與  
急皆有殊也且以五蠱推之有蛇蠱有蜥蜴蠱有蜚蠊  
蠱有蝦蟇蠱有草蠱若蛇蠱者面色青黃其脉洪壯病  
發之時腹內熱悶胸脇支滿舌本服強不喜言語身體  
常痛心腹似蟲行顏色多赤脣口乾燥經年不治肝膈  
爛而死蜥蜴蠱者面色赤黃其脉浮滑而短病發之時  
腰背微滿手脚脣口皆習習而喉脉急舌上生瘡二百  
日不治噉人心肝盡爛下膿血羸瘦顏色枯黑而死蝦  
蟇蠱者面色青白其脉沉濡發時咽喉塞不欲聞人語

腹內鳴喚或上或下若天陰久雨而病轉劇皮肉如蠱  
行手脚煩熱嗜醋食欬唾膿血顏色乍白乍青腹內脹  
滿狀如蝦蟇若成蠱吐成蛎蚪形是蝦蟇蠱經年不  
治噉人脾胃俱盡唇口烈而死蛻蝦蟇蠱者脉緩而散病  
發之時身體乍冷乍熱手脚煩疼吐逆無時小便黃赤  
腹內悶胸中痛顏色多青或吐出似蛻蝦蟇有足翅是蛻  
蝦蟇經年不治噉人血脉枯盡卽死欲知蠱與非當令  
病人唾於水內沉者是蠱浮者非也又云旦起取井華  
水未食前當令病人唾水內唾如柱脚直下沉者是蠱  
毒沉散不至下者是草蠱毒又云合大豆若是蠱豆脹

皮脫若非蠱豆不爛脫又云以鵠皮置病人臥下勿令  
知若病劇者是蠱又云取新生雞子煮熟去皮留黃白  
令完全日晚口含以齒微微隱之勿令破作兩炊時夜  
吐瓦上著霜露內且看大青是蠱毒也昔有人食新變  
鯉魚中毒病心腹痛心下鞭發熱煩寃欲得水洗沃身  
體搖動如魚得水狀有人診云是蠱其家云野間相承  
無此毒不作蠱治遂死

治諸蠱毒注氣變化無常鯀魚皮散方

鯀魚皮微炙

犀角麩

麝香麩

白龍骨

丹砂研

雄黃研

藁荷根 鹿角 鎔各 膏分 蜈蚣 炙去足 壹枚

右九味除研外搗羅為散共和令勻每服二錢匕溫

酒調下日三服

治中蠱毒腹內堅如石面目青黃小便淋瀝變易無常

殺羊角湯方

殺羊角 鎔伍 兩 藁荷根 肆兩 半 梔子人 柒 枚

牡丹皮 赤芍藥 黃連 去 鬚

犀角 鎔各 壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

不拘時溫服

治蠱毒喉中如物齧嚙之不入吐之不出或下鮮血漸

漸羸瘦腹大食飲不下桃白皮散方

桃白皮 五月五日採陰乾 搗 用去黑皮 壹兩半 大戟 剉 炒

斑猫 去翅足米 炒 各參分

右三味搗羅為散每服一錢匕空心清粥飲調下良

久更喫少粥飲當吐利蠱毒並出若一服未應再服

卽差

治蠱毒難愈喉中妨悶瘦瘁化蠱丸方

胡鷲屎 炒壹 合 獨頭蒜 伍 枚

右三味同搗如膏丸如杏人大每日空腹以清粥飲



下十九丸至十五丸其蟲盡化作鮮血下

治中蠱毒令人腹內堅痛面目青黃病變無常蜜髓煎

方

豬骨髓研伍兩 蜜壹

右二味同煎令熟分為十服日三四服即差

治中蠱毒令人腹內堅痛面目青黃形露骨立病變無

常寄生散方

挑上寄生兩參

右一味搗羅為散每服二錢匕不計時候如茶點服

治食中有蠱毒腹內堅兩目青黃瘦瘁鐵精丸方

鐵精不拘多少

右一味搗羅為末研生雞肝和丸如梧桐子大暴乾

每服五丸至七丸溫酒下

治蠱毒雄黃丸方

雄黃研

丹砂各半兩

藜蘆去蘆頭炙

鬼臼

巴豆去皮心膜研去油各壹分

右五味搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服三丸乾薑

湯下逐下惡物并蠱毒為効

治初中蠱毒升麻湯方

升麻

桔梗炒

栝樓根各壹兩

右三味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓不拘時服

治蠱毒生商陸汁方

生商陸伍兩

右一味洗細切用生薑半兩和搗取自然汁半盞五更初服之服了坐半時即睡至旦不動即以茶一盞投得利以冷水洗手面便止仍煮薤白溫粥食之

治蠱毒檉皮湯方

檉木皮

薔薇根等分

右二味細剉以水并酒共三盞同煮取二盞去滓溫

分二服利下蠱物為効

治蠱毒土瓜根酒方

土瓜根壹兩

右一味細剉以酒一盞浸一宿次日去滓作一服吐下蠱即差

治蠱毒皂莢酒方

皂莢半挺去皮子生用

右一味細剉以酒一盞浸一宿空心去滓服之得利即差

治蠱毒薺萐散方

薺芩兩貳

右一味搗羅為散每服三錢匕粥飲調下

治蠱毒槲皮湯方

槲木北陰白皮壹大握長伍寸細剉

右一味以水三盞煎至一盞去滓空腹頓服得吐即

愈

治中蠱毒胡荽根汁方

胡荽根壹握洗剉

右一味搗取自然汁半盞不計時候服之其蠱立下

和酒服亦得

治中蠱毒神驗散方

相思子參柒枚

右一味搗羅為散每服二錢匕空心溫水調下服後

欲吐且忍之勿便吐不可忍即佳便取吐其毒即快

出少時以稀粥助之

治忽中蠱毒方

白雞血不拘多少白鴨血亦得

右一味取灌口中立解

治中蠱心痛方

敗鼓皮壹片

右一味燒灰細研粥飲調二錢匕病人須臾或自呼  
行蠱人姓名便愈

治諸般蠱化蠱丸方

硫黃研壹兩

木香兩

蜜陀僧壹分

附子炮裂去皮臍別為末壹兩

右四味除附子別搗外搗羅為末先將附子末用米

醋一盞熬成膏入前藥末丸如梧桐子大每服十九

荆芥茶下空心食前服蠱化為水乃愈

治諸蠱在藏府久不差檳榔散方

檳榔剉半兩

右一味搗羅為散每服一錢至三錢匕煎葱蜜湯調

下空心食前服

治中蠱毒吐血雄黃散方

雄黃研壹分

伏龍肝研半兩

獾肝如棗大炙

斑貓去翅足搗米炒拾肆枚

右四味搗羅為散每服二錢匕空腹以酪漿調下或

吐蝦蟇及蛇等出為驗

治中蠱毒吐血藜荷根湯方

藜荷根

苦參各壹兩

敗鼓皮燒存性參分

右三味搗篩分為四服每以水一盞煎至七分去

滓不計時溫服

治中蠱吐血麥麩散方

小麥麩合貳

右一味分爲三服以冷水調服半日服盡蠱下卽差

治中蠱吐血桔梗汁方

生桔梗不拘多少

右一味搗取汁每服一小盞日三服

治中蠱吐血桑心湯方

桑木心剉貳

右一味於釜中以水五斗煮取三斗澄清再用微火

煎取五升夜勿食且服五合吐出蠱毒卽差

治蠱毒下血蝟皮散方

蝟皮壹枚燒灰

右一味細研以熱水調下三錢匕日三服

治卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不止藏府悉損桔梗散

方

桔梗

伏龍肝等分

右二味搗羅爲散每服以溫酒調下二錢匕日三不

能下藥幹口開灌之心中自定服七日止食豬肝臙

補之

治蠱毒下血如爛肉片心腹疔痛如有物齧若不即治  
蝕人五藏乃死槲皮散方

槲木北陰白皮

桃根白皮各肆兩並細剉

蝟皮灰

亂髮灰各壹兩

大麻子汁伍升

右五味先以水五盞煮槲皮桃根皮取濃汁二盞和  
麻子汁每服煖汁一盞調亂髮灰蝟皮灰二錢匕令  
患者少食旦服須臾用水二盆以雞翎引吐於水中

如牛涎諸蠱並出

治中蠱下血如鴨肝腹中疔痛急者茜根湯方

茜根

升麻伍分犀角錢陸

地榆剉

白蘘荷根各貳兩桔梗剉

蘘皮剉

黃芩去黑心各半兩

右八味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓不計時溫服

治蠱毒吐或下血如爛肝茜根湯方

茜根

蘘荷根各半升

右二味細剉以水五盞煎至三盞半去滓空腹分溫

三服

治蠱毒吐血或下血如爛肝苦瓠湯方

苦瓠壹枚切

右一味以水二大盞煎去滓取一盞空腹分溫二服  
吐下蟲卽愈

治五種蠱毒馬兜零根湯方

馬兜零根

兩壹

右一味細剉以水一盞煎至七分去滓空腹頓服當  
時吐出蠱未吐再服以快爲度

治五蠱吐血傷心腹中氣寒語聲不出氣悶飲食吐逆  
身體浮腫煩疼寒戰夢與鬼交及狐狸作魅卒得心痛  
上义心胸或痛如刀刺經年不起雄黃丸方

雄黃

椒目

鬼白

莽草

芫花

木香

藜蘆

礬石

獾肝

附子炮裂去皮蜈蚣炙壹

斑貓去翅足米

右一十二味搗爲末鍊蜜和搗五七百下丸如梧桐

子大每服五丸空心粥飲下以利爲度

治中五蠱下血喉咽妨悶犀角湯方

犀角

藁荷根

黃連

升麻

茜根

當歸

鞭羊皮

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

洋不計時候溫服

治五種蠱毒蛇蠱食飲中得之咽中如有物噤之不下吐之不出悶亂不得臥心熱不能食麝香散方

麝香研壹錢

右一味分二服以溫水空腹調下吐出蠱毒爲効

治五種蠱毒咽中如有物噤吐不出悶亂不臥馬兜零根湯方

馬兜零根壹兩 藁荷根半兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不計時候頓服其蠱並吐出

治五蠱及中惡氣心腹脹滿不得喘息心痛積聚及疝瘕宿食不消吐逆嘔噦寒熱癰癰奪命丸方

蜈蚣炙壹枚

巴豆去皮心膜研去油參拾粒

附子炮裂去皮臍壹枚 礬石燒令汁盡半兩 藜蘆去蘆頭

雄黃研壹分 鬼白去毛各壹分

右七味搗研爲末再研令勻鍊蜜和搗三五百杵丸如麻子大每服以溫酒下二九至三九

治蝦蟇蠱及蝌蚪蠱得之心腹脹滿口乾不能食悶喘急氣發獨効飲方

車脂半斤



右一味漸漸服之其蠱即出

治蠅蝨蠱得之胸中忽哽噎怵怵如蟲行狀而有血咽  
喉殞氣出方

豬脂合

右一味服之即下或吐之自消也

治草蠱術在西涼之西及嶺南人多行此毒入人咽喉

痛方

馬兜零苗壹分

右一味擣羅為散以溫水調服一錢匕自消

治草蠱術在西涼之西及嶺南人多行此毒入人咽喉

痛方

甘草炙

藍汁

右二味擣羅甘草為末每服一錢匕以藍汁調服

治草蠱毒入人咽喉刺痛欲死方

桔梗剉

犀角鑄各壹兩

右二味擣羅為散每於食前以煖酒調下三錢匕即

愈

汁蠱毒方

巴豆

兩粒去皮尖心膜

豆豉

壹柒粒

竈額上煤

貳錢

右三味同研極細以生甘草水作一服調下或吐血

或瀉血內有如蛇形及蛟蝶蛻蝦蚶蜘蛛蟻之類即  
効如有患者先令嚼大豆一合如日內覺豆腥卽不  
是蠱毒若覺甘美便是蠱也速服此藥

治蠱毒百病腹暴痛及飛尸惡氣犀角丸方

犀角屑 羚羊角屑 鬼臼末

桂末各肆七 莽草炙 真珠研

大黃炒 雄黃研各壹兩 赤足蜈蚣炙伍

麝香兩半 貝子煨伍枚 巴豆去心皮熬去油伍拾枚

射罔如雞子黃許

右一十三味搗研爲末鍊蜜和丸如棗豆大每服一

丸至兩丸空心米飲下若以囊盛之男左女右繫臂  
上祛邪氣佳

治蠱注四肢浮腫肌膚消瘦欬逆腹大如水狀漏泄人

參丸方

人參 紫參 半夏湯洗棗

菖蘆炒 代赭研 桔梗炒

白薇 肉蓯蓉酒浸切焙 石膏碎

牡蠣粉 丹參各參分 乾蝦葶灰

狼毒炒 附子炮裂去皮臍各壹兩 巴豆棗拾枚去皮心膜出油盡

右一十五味搗研爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服一

丸至三九量虛實米飲下

馬咬并踏傷人

論曰人誤被馬咬或踢踏傷損肌肉腫痛若不即治毒氣日深傳入藏府有致死者宜急治之

治被馬咬傷損皮肉疼痛方

馬鞭梢伍寸燒灰

雄鼠尿炒貳拾枚

白殭蠶炒兩半

右三味搗羅為末以豬脂二兩調傅咬處口三易良

治馬咬毒氣攻心方

藍汁參盡

右一味以水二盞同煎三五沸每服一盞不計時溫

服兼用洗瘡

治馬咬腫痛方

馬齒莧不拘多少洗切

右一味煮和湯食之即差

治馬咬肉破疼痛方

雞冠血不拘多少

右一味滴入瘡中即差

治馬咬及踏作瘡腫痛方

馬鞭梢貳寸燒灰

鼠尿貳柒枚燒灰

右二味研細以豬膏和塗之大効

治馬咬及踏傷腸胃脫出方

右推內之以桑白皮細作線縫合破烏雞取肝細剉  
以封之且忍小便爲妙

大德重校聖濟總錄卷第一百四十七