婦人大全良方

七之八

新編婦人大全良方卷之七

婦人嘔吐方論第一

夫婦人嘔吐者由脾胃有邪冷穀氣不理所為也胃為水穀之海其氣不調而有風冷乘之冷搏於胃胃氣逆則令嘔吐也 愚詳曰夫嘔吐之疾非特脾胃虛冷而嘔吐也亦有胃熱而嘔者亦有胃中冷胃口氣而吐者亦有痰盛而嘔者亦有血弱而嘔者經云無陰則嘔是也不可以一槩用藥如胃冷而嘔吐宜用局方人參丁香散理中圓及許仁則半夏圓人參七味圓如胃熱而嘔吐者宜用小柴胡湯蘆根湯竹茹湯搜花散如胃中冷胃口熱而嘔吐者宜用局方藿香正氣散生薑

新編婦人大全良方卷之七
婦人嘔吐方論第一
夫婦人嘔吐者由脾胃有邪冷穀氣不理所為也
胃為水穀之海其氣不調而有風冷乘之冷搏於
胃胃氣逆則令嘔吐也 愚詳曰夫嘔吐之疾非
特脾胃虛冷而嘔吐也亦有胃熱而嘔者亦有胃
中冷胃口氣而吐者亦有痰盛而嘔者亦有血弱
而嘔者經云無陰則嘔是也不可以一槩用藥
如胃冷而嘔吐宜用局方人參丁香散理中圓及
許仁則半夏圓人參七味圓 如胃熱而嘔吐者
宜用小柴胡湯蘆根湯竹茹湯搜花散 如胃中
冷胃口熱而嘔吐者宜用局方藿香正氣散生薑

東子煎況治服即止如疾盛嘔吐者宜向方半夏茯苓湯二陳湯(二卷三論)如惡阻兼服茯苓圓(胎有專門見十)加陳皮半夏藿香薑棗煎服或有脚氣而嘔者自有專門不敢濫及

益智子散 治婦人脾胃久虛氣弱多欲嘔吐全不下食四肢無力

益智一兩　附子炮　縮砂仁
丁香　厚朴　黃耆
白朮　白茯苓　藿香葉
川芎　陳皮　良薑
當歸各三分　人參　桂心各半兩

右㕮咀每服三錢薑三片棗一枚水一盞煎至四分去滓無時溫服

丁香散 治婦人臟腑虛冷脾胃氣弱食則嘔吐水穀不消

丁香　白朮　縮砂仁
草果仁各三分　人參一兩　當歸
白豆蔻　藿香葉　甘草各半兩
橘皮三分　神麯　訶子各半兩

右為細末每服二錢平鍼煎薑棗湯調下

竹茹湯 治胃熱嘔吐(三方用)

乾葛三兩　半夏湯洗七次薑汁半盞漿水一升煎各取半可取
甘草三分

右吹咽每服五錢水二盞薑三片竹茹一彈大
棗一枚煎至一盞去滓温服

許學士云胃熱者手足心熱　政和中一
宗人病傷寒得汗身凉數日忽嘔吐藥舉
飲食俱不下醫者皆進丁香薑香滑石等
藥下咽即吐予曰此正汗後餘熱留胃脘
孫兆竹茹湯正相當爾亟治藥與之即時
愈

良方梔花散　亦相類方

皂莢　白礬　梔花炒令黑色　黄
芪草等分

右為細末白湯調二錢

許仁則半夏圓　療積冷在胃嘔逆不下食方

半夏一升洗去滑　小麥麪一升
右擣半夏為散以水捏麪圓如彈子大以水煮
令麪熟則是藥成初吞四五圓旋煮旋服服
十四五圓日二服稍加至此覺病減欲更重合服
亦佳忌羊肉餳敖急同
又依前半夏圓雖覺漸損猶
圓又慮藥毒不可久服欲
人參七味圓服

人參　白朮各四兩　茯苓各四兩
細辛各四兩　生薑四兩　棗肉三十枚
桂心二兩　橘皮三兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大飲下十圓漸加至二十圓與半夏圓間服亦可忌桃李雀肉生葱生菜吳昇同

婦人霍亂方論第二

論曰嘔吐而利者名霍亂也原疾之由皆由腸胃虛冷飲食過度觸冒風冷使陰陽不和清濁相干致令撣霍變亂也或先心痛而吐者或先腹痛而利者或吐利俱作者或頭痛身體壯熱而脉浮洪者或陽氣暴絶而手足逆冷而脉息微絶者治之當分陰陽察其虛實辨其冷熱觀其脉息熱者涼之冷者温之以平為期百問云凡霍亂吐利熱多而渴者五苓散寒多不飲水者理中圓吐利已汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絶者通脉四逆加猪膽汁湯夏月中暑霍亂汗出脚轉筋者香薷散濃煎冷服即效凡霍亂得之洪浮者易治微澁者難治沉弦者短者治

加減理中圓 主霍乱臨時方亦可治男子出千金翼

人參 白朮 甘草各一兩 乾薑

右為細末煉蜜為圓每兩作五圓取湯和一圓服之日十服吐多利少者取枳實三枚炙去穰四破水三升煮取一升和一圓服之吐少利多者加乾薑一兩吐利乾嘔者取半夏半兩泡洗去滑水二升煮取一升和一圓服若體

疼痛不可堪者水三升煮枣三枚取一升和一
回服若吐(利大極轉筋者以韭汁洗腹胥從
胷至足踝勿逆即止
附子一枚炮去皮破以水二升煎取一升和
一圓服吐利止體冷微汗腹中寒取
湯神之
吐利止脈不出體猶冷者可服諸

千金翼四順湯治霍亂吐利腹痛手足逆冷脉微
欲絶
附子 一箇破八片
甘草 各一兩
乾薑 三兩
右㕮咀水煎服

四逆加猪膽汁湯治吐已下斷汁出而厥四肢拘
急不解脉微欲絶者
甘草 二兩
乾薑 三兩
人參
猪膽汁 一合
附子 一枚生
右三味㕮咀每服五錢水三盞煮至二盞去滓
內猪膽汁分作兩次溫服其脉即来

香薷散治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥鱠生
冷過度或起居不節或露卧濕地或當風取涼而
風冷之气歸於三焦傳於脾胃脾胃得治不能消
化水穀致令真邪相于腸胃之間便生吐利心腹疼痛霍乱气逆有先心
痛而吐者或先腹痛而利者有吐利俱発者有發
熱頭痛體疼而復吐利虚煩者或但吐利心腹刺

痛者或轉筋拘急痰痛者或但嘔而無物出者或
四肢逆冷脉微欲絶者或煩悶昏寒欲死者妊婦
霍亂吐利此藥主能主之

香薷葉 四兩 白扁豆 厚朴 各二兩

右㕮咀每服半兩水一大盞酒一分慢火濃煎
至六分去滓井中浸令冰治頓服無時候連併
二三服立見神効蘇沉良方中名香薷散百問
同有黄連無扁豆

詞子散 治老幼霍亂吐利一服取効又治九種心
痛及心痛冷痛不可忍其功如神

詞子 甘草 厚朴

乾薑 草菓仁

陳皮

良薑

麥芽 各等分

右為細末每服二錢候發刺痛不可忍用水一
盞煎七分入塩服急則塩點

胡椒湯 治霍亂吐利甚妙

胡椒 四十九粒

右為細末水一盞煎湯調下二錢

葉豆 一百四十七粒

婦人翻胃吐食方論第三

白聖散 治婦人翻胃吐食千金翼云不特治婦人
男子亦可服一斤以上為妙

白礬 一斤 以未醋浸令白 礬土 一斤 以未醋浸令赤 入醋內乾為良 取一兩 研

乾薑 燒一方

右為細末研停每服一錢飯飲調下甚者二錢

白芷散 治婦人鼽衄吐食

右用白芷一兩切作片於瓦上炒令黃為細末
用猪血二十文切片以淨湯泡七次將血蘸藥
嚼七片如剌藥未留後次用
婦人血腸方論第四

牡丹煎 治婦人血腸

牡丹皮 苦參 具母去心
玄胡索 白芍藥

右等分為細末煉蜜圓如梧桐子大每服十五
二十圓未飲吞下無時候
婦人鼻衄方論第五

夫婦人鼻衄者由傷動血氣所致也凡血氣調和則循環表裡經絡流潤若勞傷損動因而生熱氣逆流溢入於鼻者則成鼻衄也只有產後見衄者不可治許曰凡鼻衄雖多因熱而得之者分超衆人鼻衄亦有因怒氣而得之者分超衆人鼻衄不止諸治不差名余治之先用藝合香回四粒次用芎歸湯調服即七次用芎花湯調理又有一富室男子鼻衄不止六脉洪數究竟服丹藥太過遂用黃連芩大黃為末水煎服亦可

剌薊散 治婦人鼻衄血氣流不止

剌薊二兩 桑耳 亂髮灰
艾葉 各一兩炮 生地黃一兩 蒲黃兩半

右為細末每服二錢無時粥飲調下

伏龍肝散 治男子婦人五臟結熱吐血衄血並皆

治之

伏兔肝

芍藥　生地黃各一升
川芎　當歸　黃芩
桂心　甘草各二兩

右㕮咀以水一斗三升煮竹茹減三升內藥煮取三升分為三服千金無桂

百問有芎苧湯治以白芎苧花濃煎飲之立止

一方搗生白芎根取汁一合飲之止又方取生葱心塞鼻中即定若因刺著并力斧所傷血不止亟用之立定又方取釜底墨細研入鼻中又方取亂髮灰細研以竹管吹入鼻中立止又方取兔骨燒吹入鼻中立止

婦人吐血方論第六

夫婦人吐血者皆由臟腑傷損所致夫血者外行於絡給內榮於臟腑若傷損氣血絡則虛血行失於常理氣逆者吐血又怒則氣逆甚則嘔血然憂思驚恐內傷氣逆上者皆吐血也

雞蘇散　治婦人吐血心煩昏悶

雞蘇葉　阿膠　刺薊
生地黃酌一　黃耆　羚羊角屑
苗根　甘草酌半　麥門冬
黃芩　當歸　伏兔肝各二分

右為粗末每服四錢水一盞薑三片竹茹半雞子大棗至六分去滓溫服

雞蘇散　治婦人虛損氣逆吐血不止

雞蘇葉　赤芍藥（各半兩）　黃芩（一兩）　當歸（二兩）　茯苓（二兩）　阿膠（二兩炒）

右為粗末每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服

治婦人熱毒上攻吐血不止

生藕汁　生薑汁（各半合）　刺薊汁（一合）　白蜜（一合）　地黃汁（三合）

右和煎三兩沸無時以一匙一盞調炒麪塵一盞服

千金翼治吐血百方不差療十十差神驗不傳方

詳此藥性治熱毒吐血有効

（兩方皆合誤）

地黃汁（半升）　生大黃末（半兩）

右煎地黃汁三兩沸調大黃末分為三服

又方　伏龍肝　右研令極細每服二錢新汲水調下頓服取効

又方　白茅根（一握六寸長）

右以水一大盞煎取七分去滓溫服

又方治吐血　柱心末

右水調方寸匕日夜可二十服

又方　生地黃（三斤切）　蒲黃（大合）

右水五升煮取三升分三服

口滯吐因起極而服即放養生必用得之逐用蘇合香丸和雞蘇丸云凡吐血須煎乾薑共

（僕嘗治一人吐血氣診其脈肝部弦）

草湯與服或四物理中湯亦可如此無不無者服生地黃竹茹藕汁去生便妙

犀髒湯 治虛勞吐血衄血下自汗出方出養生必用方

甘草 白芍藥 黃耆 西各一

熟地黃三兩

右為末每服四錢水酒各一盞已上煎至七分去滓取六分清汁溫服食前

四生圓 療吐血凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥

生荷葉 生地黃 生艾葉 生柏葉

右等分爛研圓如雞子大每服一圓水三盞煎至一盞去滓溫服無時候

療熱甚嘔血者以犀角地黃湯局方小三黃圓以白茅根煎濃湯吞之妙

犀角地黃湯 治內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑

芍藥 生地黃 牛

逐去行血嘔血諸藥不效即安窠其人治一男子年十九月經不行既而吐血數升又嘗吐血不已自餌四生圓即愈

逐去瘀血小便自利此治血之通劑也

大凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行之證多因肝火動而然亦有因陰虛火炎而然者治法各異

解之以犀角地黃湯加減用之

犀角 生地黃 凍水 藕汁 生薑汁 竹瀝 童便 牛

大凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行之證多因肝火動而然亦有因陰虛火炎而然者治法各異

解之以犀角地黃湯加減用之

犀角 生地黃 凍水 藕汁 生薑汁 竹瀝 童便 牛

大凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行之證多因肝火動而然亦有因陰虛火炎而然者治法各異

解之以犀角地黃湯加減用之

犀角 生地黃 凍水 藕汁 生薑汁 竹瀝 童便 牛

大凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行之證多因肝火動而然亦有因陰虛火炎而然者治法各異

解之以犀角地黃湯加減用之

犀角 生地黃 凍水 藕汁 生薑汁 竹瀝 童便 牛

犀角屑 各一兩 如無升麻用者代

右吹咀每服五錢水煎服有瘥如狂者加黃芩二兩

青餅子 治咯血

青黛 杏仁 各一兩 炒去皮尖 牡蠣粉 華佗方以牡蠣不用

右一處同研成膏焙黃蠟和作三十餅子每服一餅子用乾柿半箇去蒂夾定以濕紙裹煨令香同嚼粥飲下無時候

乾薑甘草湯 治陰乘於陽心肺經寒而嘔血者宜服

甘艸 乾薑 各兩半

右㕮咀水煮頓服

理中湯亦妙 方和劑見

婦人疝癖諸氣方論第七

夫婦人疝癖者本因邪氣積聚而生也疝者在腹內近臍左右各有一條筋脈急痛大者如臂次者如指因氣而成如弦之狀名曰疝氣也癖者為僻側在兩助之間有時而痛故曰癖也夫疝之與癖皆陰陽不和經絡否隔飲食停滯不得宣流邪冷之氣搏結不散得冷則發作疼痛故曰疝癖者也

麝香圓 治婦人疝癖冷氣並疰氣心腹痛不可忍

麝香 半兩 別研

五靈脂

芫花 醋炒

桂心

阿魏 一分 麪裹煨令麪熟

桃仁 三銖 各三分

擔榔 各一枚

茯苓

沒藥

木香

當歸 白芍藥 半兩

右為細末入麝香合停用粳米軟飯為圓如梧桐子大每服十圓無時煎酢湯下

治婦人疝瘕癖及血氣等神效方

右以猪肝一具可及十兩者用巴豆五十枚去大皮劄在肝內圓用醯醋三椀慢火熬令肝爛熟入砂鉢內研令極爛入京三棱末和就得所為圓如梧桐子大每服五圓食前熱酒下復進熟

巴豆用口夫疝癖癥血氣塊硬發歇刺痛其則欲死究而言之皆血氣所為僕嘗治一婦人

一治一人血氣作祟一婦人伏定方小止亦用此二藥而愈

烏雞前圓 方見二十四卷指遠門

葱白散 治專一切冷氣不和及宿臟膀胱氣攻衝疼痛大治婦人產前後腹痛胎不安或血刺痛者兼能治血藏宿冷百節倦疼肌體怯弱勞傷帶癖久服尽除但婦人一切疾病最宜服此

川芎 當歸 桂心 乾薑

芍藥 青皮 厚朴 枳殼

苦練子 木香 甜地黃

麥芽 三稜 莪茂

茯苓 神麯 人參 等分

右為細末每服三平錢水一盞連根葱白二寸

大一作丈

拍破塩半銭煎至七分温服内大黄訶子宜相度病状如大便不利入大黄同煎却下入塩如大便自利入訶子煎

葉治浮沮之勿服諸葉無勿差緊此血気漸戈疾癖亦病此只以此二葉母煎

先生云此葉大治心気胛疾用之見効僕嘗以此勿召僕診之両関脈沉弱為肝脈沉

人病血気作楚搦不可為

羅母人毎遇経脈行時則臍與小腹下痛不可忍服藥無効僕以桂枝桃仁湯煎自後再發一投而差

桂枝桃仁湯 方見第一卷十三論

治經候未時先腹痛 男女德 局方七気湯君下来

復丹

婦人疝瘕方論第八

夫婦人疝瘕之病者由飲食不節寒温不調気血労傷臓腑虚弱受於風冷之気入腹内與血相結聚生疝者痛也瘕者假也其結聚浮假而痛推移乃動也婦人之病有異於丈夫者或因産後血虚受寒或因経水往来取冷過度非獨因飲食失節多挾於血気所成也診婦人之疝瘕其脈弦急者生虚弱小者死又尺脈濇如浮牢為血實気虚也其發腹痛逆気上行此為婦人胞中絶傷有悪血么則結成瘕也

乾漆散 治婦人疝瘕久不消令人黄瘦咳嚩両脇妨悶心腹疼痛

乾漆 炒令烟尽

木香

芫花 醋炒

赤芍藥　　當歸
川芎　　琥珀各半兩　　大黃二兩
牛膝三分　　桃仁一兩　　麝香一分

右為細末無時溫酒調下一錢

礞砂圓　治婦人疝瘕及積癖血在藏時攻腹脇疼痛

川芒硝　　當歸
雄黃　　桂心各半兩
三棱炮二兩　　大黃炮

右為細末用米醋一椀熬大黃末為膏次入餘藥末和圓如梧桐子大空心溫酒吞十圓漸漸加至二十圓以利下惡物為度

巴豆圓　治婦人疝瘕及血気疼痛

巴豆去皮心醋煮半日一分　　礞砂
五靈脂　　大黃炒各一兩
桃仁各三分　　木香半兩

右為末煉蜜圓如菉豆大煮醋湯空心下五圓熟酒亦可

良方黑神圓

神麴　　當香各四分
椒炒出汗香　　木香
漆六兩半生半用薑湯煮半日令香　　丁香各半兩　　檳榔四枚

右除椒漆五物皆半生半炒為細末用前生熟漆和圓如彈子大當香末十二兩鋪陰地蔭乾候外乾并當香收器中極乾去當香腎餘肓腸

膀胱疝癖及疝墜五臟血崩產後諸血漏下赤白並一圓分血脈死胎一圓皆瘥厥洒下難產炒葵子四十九枚搗碎酒煎下一圓諸疾不過三服疝氣十脈臟氣癥癖五服血瘕三圓當差予族子婦病腹中有時子婦已黃京下善大堀如杓海癥痛不可忍進之曰此血癥也醫者悉常服者藥莫能陳三圓杓氣尽消於身不復作

婦人八瘕方論第九

夫婦人八瘕者皆由胞胎生產月水往来血脈精氣不調之所生也腎為陰主開閉左為胞門右為子户主定月水生子之道胞門主於子精精神氣所出入合於中黃門玉門四邊主持關禁閉子精臍下三寸名曰関元主藏魂魄婦人之胞三焦之府常所從出然婦人經脈俞絡合調則月水以時来至故能生子而無病婦人榮衛經絡斷絶不通邪氣便得往入合於其藏若生血未尽而合陰陽即令婦人血脈攣急小腹重疼立滿胞脇腰背相引四肢疼痛飲食不調結牢血月事不時或前或後因生聚如懷胎狀那氣盛昌令人恍惚多夢寒熱四肢不舉陰中生氣癰内生風甚者害於小便小腹築痛淋瀝面色黃黑則不復生子其八瘕者黃瘕青瘕燥瘕血瘕脂瘕狐瘕蛇瘕螳瘕是也

桃仁煎 治婦人血瘕血積經候不通出午事方

桃仁 大黃 名兩 一 蝱虫、半兩炒黑

川朴消一兩

右血味為末以醋二升半銀石器中慢火煎取一升五合下大黃桃仁蟲虫等不任手攪欲下手圓下朴消更不住手攪良久出之圓如梧桐子大前一日亦用嘿晚食卯更下如赤豆圓日午取下狀未下再作如鮮血寸即止續以調血氣藥補之此方出千金便頃手在眦陵有一貴官妻患小婦人腹中瘀血方論等十

作淋治如八正散之類數種皆治不通腹脹不可忍遂卧少頃下血二升痛止得

予診之曰此血瘕也非瞑眩藥不可去予用此藥更服至日午大便如黑豆汁二三

初服數枚小便猛烈大咳

不可忍遂卧少頃下血二升痛止得

蟲恐蟲誤

失婦人腹中瘀血者由月經否澁不逆或產後餘瘀瘕未盡因而亲風取涼為風冷所乘血得冷則成瘀血也血瘀在內則時時體熱面黃瘀久不消則變成積聚癥瘕也

桃仁散

蟲虫　鯉魚鱗炙灰　當歸炒　牛膝　水蛭炒一　烏賊骨　芫花醋炒一　枳殼　桂心各半兩　赤芍藥　桃仁三方　

右為細末食前溫酒調下一錢

桃仁圓

治婦人腹內有瘀血月水不利或斷或未心腹滿急

桃仁　大黃 炒各二兩　水蛭 各炒焦　蝱虫 各炒去翅足

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服五圓熱酒吞下未知加至八圓

婦人癥瘕方論第十一

夫婦人癥瘕者由冷熱不調飲食不節積在腹內或腸胃之間與臟氣結搏其狀強雖之不移者名曰癥言其病形微可驗也氣壅塞為瘕言其氣瘕澁不宣暢也皆得冷則發動刺痛癥瘕之痛其狀若結若冷氣入於臟搏於血血得冷則澁亦令月水不通也藏則使無子若冷氣入於胞及惡血氣攻心腹疼痛面無顏色四肢瘦弱

川山甲 炮炒　大黃 炒　川芎　麝香 一分

右為細末入麝香令停每服一錢無時熱酒調下

蓬莪茂圓　治婦人癥瘕腹脇妨痛令人體瘦不思飲食

莪茂 三分　赤芍藥　木香　當歸 炒　桂心　檳榔　枳殼　昆布　琥珀 各半兩

川山甲 炮炒　乾漆 炒令煙盡　赤芍藥　桂心 各一兩　當歸 各半兩　芫花 醋炒

桃仁　鱉甲　大黃各一兩

右為末煉蜜圓如指頭大食前煎飲下二十圓

丁香圓　治婦人癥瘕結塊不散心腹疼痛

雄雀糞炒黃　鱉甲各兩　硇砂　當歸炒　芫花醋炒各半兩　巴豆一分去皮心油

右為末同研令停醋煮麵糊圓如小豆大食前煎飲下三圓

婦人食癥方論第十二

夫婦人食癥者由臟腑虛弱月候未時食生冷之物脾胃既虛不能消化與藏氣相搏結聚成塊日漸生長盤牢不移故謂之食癥也

硇砂圓　治婦人食癥久不消令人瘦弱食少

硇砂　青礞石各半兩　穿山甲炙令焦黃　三棱炒　乾漆炒煙盡　硫黃各半兩　巴豆三十枚去皮心炒不出油

右為末用軟飯圓如小豆大每服五圓生薑橘皮湯下

礞石圓　治婦人食癥塊久不消攻刺心腹疼痛

青礞石末　巴豆去皮心油　朱砂　粉霜並研　木香末各一分　硇砂半兩

右研令停以糯米煎飯和圓如菜豆大每服圓空心溫酒下取下惡物為度

婦人積年血癥塊方論第十三

夫婦人積年血癥堺者由寒溫失節臟腑氣虛風
冷在內飲食不消與血氣相結漸生瘕塊盤牢不
移動者是也皆因血氣勞傷月水往來經絡否澁
惡血不除結聚所生也久而不差則心腹兩脇苦
痛害於飲食肌膚羸瘦

乾漆圓 治婦人積年血癥瘕塊或攻心腹疼痛曲肢
不和面少血色飲食全少

乾漆 炒令烟盡 研
硇砂 研
紅花 一方
蝕券 一方
右為細末用棗肉和圓如梧桐子大每服五圓
於日未出時煎蘇木湯吞下量患人輕重加減
服之

瑿珀圓 治婦人積年血癥瘕塊不消狀若鬼胎之候
宜服

瑿珀 研
芫花 製
生地黃
鱉甲 醋炙
硇砂 各二兩
水蛭 炒各四十九枚
右為末醋煮硇砂為膏入藥末和搜三二百杵
圓如梧桐子大每服十圓空心溫酒下

柱心 生豚
檳榔 炒各三方
延胡索 當歸 各半兩
三棱 乾漆 炒
大黃 二兩 蝱虫 去翅足炒

硇砂圓 治婦人積年癥塊不消

硇砂 乾漆 雄黃 小銀以少肥棗研為度 雄雀糞各一方 巴豆十粒去油 右研停用棗肉圓如菉豆大空心當歸酒下三圓臨卧再服取下惡物為度

沒藥圓 理五積氣癖攻刺疼痛嘔逆噎塞心中迷悶不醒人事及驚悸血積癥癖血痕發歇癥瘕脹滿絰脈不行者豎效方

芫花去枝梗取末半分 沒藥別研 乳香去油二兩 硇砂研 巴豆去皮心膜用好米醋三升煮至一升去豆用只將醋入石器內入硇砂研如泥為度 木香 當歸 桂心 肉豆蔻二枚炮 檳榔一方

右一十二味除班猫沒藥乳香外為細末與班猫沒藥一處合研令停入前膏子內和搥千百杵丸如赤豆大初服一圓用醋炒韲蔔子令焦黑次酒浸同煮一二沸放温吞下漸加至五丸七丸即止如急卒血氣攻心脾以酒醋共一銀錢煮沸吞下婦人血瘕癥癖結塊攻心疼痛悶絶以醫不効者入鳥鰡糧一兩火煆醋淬七次研細和藥為圓每服五圓用蘇木節二兩細剉酒三升煮至七合去滓候冷分為三服吞藥併進三服當汗出則瘕隨大小隨遂下其病立差人弱者每服只二圓如是丈夫元臟小腸氣脾積氣癥塊

班猫三枚去頭足翅糯米炒令焦黃去米研細 附子一兩生用去皮

等疾即入丹砂一两細研和停以生薑塩湯吞
下三圓

五靈脂圓 治婦人積年癥疾手癥塊及惡血気久不除

五靈脂 乾漆 各一合 川烏 一合 炮
麝香 硫黄 各半両 砺砂 一合 並研
巴豆三十粒去皮醋煮赤
右為末研停醋煮麪糊圓如菉豆大每服五圓
空心温酒下

三稜煎 治婦人血癥食積疾滞 出選奇後集

三稜 麦芽 炒 各二両
半夏 莪茂 各二両
右用好醋六升煮乾焙為末醋糊圓如梧桐子
大每服三十圓淡醋湯下疾積多薑湯下
中卒暴疼痛而有黒黯奩黒黶瘡百病方

水府丹 治婦人久虚積冷経候不行癥瘕癖塊腹
経椒花藥石 研半両 砺砂 紙隔沸湯淋
桂心 別為末 取霜半両
縮砂仁 二両 木香 乾薑 各一両
臘月狗膽七枚 紅豆 半両 班猫百箇
生地黄汁
童子小便 各一升 蚖青 二百箇 班猫 蚖青二物
去頭足翅以糯米二
升同炒米黄去米不用
右九味為末同三汁熬為膏和上末圓如鶏頭
大朱砂為衣每服一圓温酒斟破食前服米飲
亦可孕婦莫服

婦人血氣心痛方論第十四

夫婦人血氣心痛者由臟腑虛血氣不調風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死者成疹者心為諸臟之主而主於神其正經不可傷傷之而痛者名為真心痛朝發夕死夕發旦死心之支別絡為風冷所乘而痛者故痛發有輕作甚而成疹者也

烏藥散 治婦人血氣攻心痛發歇不定

烏藥 莪茂 桂心 當歸 桃仁 青皮 木香

右等分為末每服二錢熱酒調下

阿魏圓 治婦人血氣攻心疼痛及一切積冷氣

當歸 炒 桂心 青皮 炮 附子 炮 阿魏 麪裹煨熟為度 川芎 各一兩 吳茱萸 泡 木香 乾薑 各三分 檳榔 肉豆蔻 煨 延胡索 各一兩 莪茂 朱砂 細研 良薑 劉細麻油炒 桂心 赤芍藥 等分

右為末先以醋一升煎阿魏成膏和藥末搗三百杵圓如梧桐子大每服二十圓食前熱酒下

雞舌香散 治男子婦人九種心痛一切冷氣

又一方名應痛散

治心脾痛不可忍者婦人脾血气作心脾痛尤
効方同只無桂心用醋煎醋湯點亦可乙丑春
初次女年十五結脈未行忽一日心痛如刺
吐飲不止脈沉緩宿細以藪合香圓沉香圓
服之神保圓理中圓詞子散七氣湯皆無效僕思
此證非蟲可逐金軟服即愈一圓詞子散作梗非
一二圓即愈

陳氏二神圓 治婦人血気不和作痛不止及下血
無時月水不調

真蒲黃 炒 蒲搓 鹽炒

右等分為細末煉蜜圓如指桐子大每服三十
圓空心温酒吞下如不能飲米飲下兩服即止

陳日華柚刀散 治婦人血風血気等疾或哯司
機宜候愷云見一道人用此方療病不一而足遂
以為獻真是奇妙

五靈脂 炒一兩 蒺茭 桂心

雲臺子 炒名半兩

右為末每服二大錢酒半盞煎至八分
疾作熱服

失笑散 見產後心痛門 詞子散 見霍乱門 亦妙

靈苑方治婦人卒血気心痛只用生五靈脂為細
末每服一錢酒一盞煎沸熱服

婦人血気心腹疼痛方論第十五

夫婦人血気心腹疼痛由臟腑虛弱風邪乘於其
間與真氣相擊而痛甚痛隨氣上下或上衝於心

或下坎於腹故云血氣攻心腹疼痛也

延胡索散 治婦人血氣攻於心腹疼痛

延胡索　當歸　川芎　木香　枳殼　桂心各三分　桃仁名半兩　熟地黃一兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓熱服

琥珀散 治婦人血氣攻心腹煩躁悶亂疼痛不止

琥珀　沒藥　當歸　牡丹皮　延胡索　莪茂　桂心等分

右為末每服二錢溫酒調下

沒藥散 治一切血氣膀胱腹撮痛及產後惡露不行兒枕塊痛血竭出駢方經

沒藥研細　桂心　當歸　木香　蒲黃　赤芍藥等分　紅花　延胡索　乾漆炒

右為細末每服二錢熱酒調下食前服

瑞金散 治婦人血氣攻心腹疼痛至危如哭不得可灌治血塊衝心叫噭其痛撮痛月經不行預先嘔吐疼痛及月信不通

右用臭大順散三錢熱酒調服立止

片子薑黃　牡丹皮　莪茂

紅花　當歸　赤芍藥
川芎　桂心　延胡索各一兩半
右為末每服二錢水一盞酒三分煎七分溫服
日三次

八僊散　治血氣心腹疼痛立驗
當歸　枳殼製　厚朴　人參各四分
茯苓各五分　肉豆蔻二分
右為末水二升煎取八合空心分三服　靈苑方

八僊散　治婦人血氣心腹疼痛立驗
棕櫚一兩　當歸一兩燒成灰存性
麝香一錢細研
右為末每服一錢溫酒調下

不換金散　治婦人血刺痛不可忍者　靈苑方
三棱　莪蒁並細研　巴豆去殼各一兩
右三味以醯醋一椀熬醋成膏為度先將擣罔
濟一鐺干燻乾後將藥并醋膏一處置鐺干中
外用泥裹以羊尾干一片蓋之用炭火五七斤
煅常看守纔候煙急出即取出看通黑則止不
得燒過了便入乳鉢內細研為末有患者灼生
薑酒調一錢服　靈苑方

定命散　治婦人急血氣
大生烏頭去皮尖　牡丹皮　桂心各二兩
右為細末每服一錢酒半盞童子小便半盞煎

至七分温服如婦人血瘕血気胎血積聚上衝心脾須臾欲絶者用酒一盞生薑一片煎至七分去滓通口服

大効琥珀散 治婦人心腹急気悶月信不調等疾

烏薬 蒺藜酸棗仁各二両 當歸一両

右並生為細末温酒調二銭服服後以食壓之忌生冷油膩等物如是産後諸疾炒生薑酒調下

治血気不調臍下痛 枉心

桑耳 菴蘭子各四方 牛膝 赤茯苓各九方

土瓜根 川芎各四方 白芍藥 大黄

右為末煉蜜圓如梧子大酷湯呑下二十圓

鎖痛散 治婦人血気刺痛

荔枝核燒存性半両 香附子去毛一両

右為細末塩湯未飲調下二銭不拘時候服

没藥散 治婦人血気疼痛不可忍者出博濟方

紅花 没藥 當歸

延胡索

右等分為末每服二銭童子小便酒各半盞同煎至六分熱服只用釋鍾淬過調亦可常服只用温酒

牡丹散 治婦人久虗羸瘦血塊走疰心腹疼痛不思飲食 出衛生方

牡丹皮 桂心 延胡索各一兩 莪茂 當歸 赤芍藥各二兩 荆三稜

右為粗末每服三錢水一盞酒半盞煎七分温服

至聖湯 治婦人血気産前産後百疾 出全前

當歸 芍藥 乾薑 莪茂 桂心 蒲黄炒各二兩 黑豆炒去皮二兩 地黄干二十圓

右為細末空心熱酒調下二錢

天仙散 方見卷第一百二十論 治婦人腹肠刺痛以石方七氣湯加延胡索少許同煎服若胞腸不快惡心更間服石方乃汤煮

菖蒲圓 治婦人脾血積気及心脾疾 方出續添德

菖蒲 九節者 吳茱萸泡 香附子炒去毛各六兩

右三味並剉細以醯醋五升煮乾為度焙乾為細末以好神麯打糊為圓如梧桐子大空心食前以淡薑湯吞下四五十圓日三服搗皮湯亦好

延胡索散 治婦人血気走作疼痛不可忍者及月

方見卷第七十論 本卷中 琥珀散 方見

水不調面色痿黃喫食減少及產後諸疾並皆治之

延胡索 生 三稜 生 當歸 去節酒浸 莪朮 醋浸七時各等分

右為末每服二錢空心温酒調如血氣發甚者及月水不調並皆童子小便酒紅花同並調下

當歸並圓 治婦人久積血氣時發刺痛肌瘦乏力月候不調

當歸二兩別末 牡丹皮 延胡索各一兩

右除當歸末用米醋熬成膏入衆藥末和圓如梧桐子大空心温酒下二十圓子食前再服

神聖北亭圓 治婦人積年血氣攻刺心腹疼痛不可忍者及多方醫療未差宜服

北亭去砂石研 當歸各一分 巴豆去皮膜心四十粒 芜花 莪茂各半兩

右先研北亭沒藥巴豆如粉用好米醋三升同煮為稀膏然後將餘四味為細末入於膏內搜合成塊用新无灰盛之臨時加減圓數用酒醋各半錢並數沸通口服不得嚼破仍須喫盡酒醋主差或男子元氣亦依前方服食如急候閉者男左女右以一圓鼻中嗅之立愈其中云臨時加減圓數皆不云大小數目詳之古人亦凶

莽也既有北亭芫花也豆合當圓如菜豆大每服只五圓

琥珀散 治產前產後血氣不和及一切疾

當歸 微炒 川芎 各一兩 赤芍藥 二兩

莪茂 煨 一兩

右為末每服二錢空心温酒調下如腰腹痛加陳皮去白半兩乾薑炮半兩為末同和停如不喫酒以水一盞煎至七分温服

婦人血氣小腹疼痛方論第十六

夫婦人小腹疼痛者此由胞絡之間風冷搏於血氣停結小腹因風虛發動與血相擊故痛也

葳靈散 治婦人久治氣滞血刺小腹疼痛

葳靈仙 一兩 當歸 挂心 各半兩 沒藥 一分

木香

右為細末無時熱酒調下一錢服忌茶

當歸散 治婦人久積血氣疗刺小腹疼痛四肢無力不能飲食

當歸 炒 赤芍藥 劉寄奴 延胡索 等分

沒藥 扵殼

右為細末熱酒調下一錢無時候

追氣圓 治婦人血刺小腹疼痛不可忍靈苑方

芸薹子 微炒 桂心 各一兩 良薑 半兩

右為細末醋糊圓如梧桐子大每服五圓無時淡醋湯下常服補血虛破氣堀甚有効

石灰散 治婦人血氣痛不可忍者陳五婆方出婦人科
驗方

右取猪貼脊血半碗於湯上煖用杖子攪停後用石灰於火上燒令黃為末羅過入灰一錢同血攪停放温服立愈

婦人兩脇脹痛方論第十七

夫婦人兩脇脹痛者由臟腑虛弱氣血不調風冷之氣客於腸胃傷於胞絡之間與血氣相搏壅塞不宣邪正交爭衝擊故令兩脇痛也

草豆蔻散 治婦人脾胃虛氣攻兩脇脹痛

草豆蔻 訶子肉 各一兩
苦梗 桂心 各三兩
厚朴 各三分
甘草一分

川芎 擣柳 各半兩
右為粗末每服四錢水一盞煎七分去滓熱服
當歸 乾薑

菴蘭子散 治婦人臟腑虛冷宿冷氣攻兩脇脹痛坐卧不安

菴蘭子 延胡索 桃仁
桂心 琥珀 當歸 各一兩
赤芍藥 木香 沒藥 各半兩
右為末每服二錢温酒調下无時候

人參紫金圓 治婦人榮衛不和心腹刺痛胸膈脹滿不進飲食 饒武傳方

紫金皮　蒼朮　石菖蒲各一兩
香附子二兩　人參半兩　木香三錢
右為末米糊和圓如拾桐子大每服三十圓食
後薑湯下

気針圓 治久積風壅痞利滯気空胸鬲止刺痛

木香　青皮去白　大黃炮
檳榔各一兩　黑牽牛二兩半生半炒
右為末煉蜜圓如拾桐子大温水下三十圓鄧
人年五十忽然気痛投神保圓六七十粒大便
不通一二日再服神保圓亦有要用沉香木香
則藥心藥用沉香木香定痛轉甚再安鄧
問曰脇時僕聲徹吉天召僕何僕不但以診
僕證脉實用痛藥也觀如診兩脇似有等藥而
未通假神保圓不能通以問之乍十人其脉
多弦大不乍可去寒心痛數準

甚下之用陰有気向通五此六以腹虛湯虛而脹加減芍藥未止實也脹上實之內夜內芍藥人即大滿鱉病人口心痛病向气景遇黃柴可轉痛湯云是治如脉之腹已脹但何癒也胡近甚君家腹也痛病診治有治僕痛提使手按大仲生處似薑乍十方甲手按處大不之遇黃景气向病

木通散 治胁肋苦痛偏效併心下胁肋并小腹牵引痛者皆主之

木通去皮 青皮去白 川楝子去皮核 各一两 上三味用巴豆三两炒黄去巴豆不用 槟榔子一两 船上茴香炒二两 茯苓 木香 滑石各半两

右为细末煎葱白酒调三钱一服甚者不过再服

三脘散 治中焦虚痞两胁气痛面目手足浮腫大便秘涩兼治脚气

大腹皮 紫苏 独活各一两 沉香 乾木瓜 白术

川芎 陈皮 槟榔 木香 各一分 甘草 一钱

右㕮咀每服三钱水一盏煎至七分去滓空心热服日中服一次

夫妇人心腹胀满者由臟腑久冷气血虚损而邪气客之乘於心脾故也大阴脾之经也脾虚则胀足少阴肾之经也其脉起於小指之下斜趣足心入跟中上腘内後廉贯肾络膀胱从肾上贯肝鬲入肺中其支者从肺出络於心藏虚邪气客於三经與正气相搏積聚在内气升於脾脾虚有胀

故令心腹煩滿而脹也診其脉遲而滑者脹滿也

白朮散 治婦人脾胃氣虛心腹脹滿不欲飲食四肢少力

白朮　草菓仁　赤茯苓　檀榔　陳皮　厚朴　甘草 一分

右為粗末每服四錢薑三片棗一枚煎至七分去滓食前熱服

檳榔散 治婦人脾胃虛冷心腹脹滿不欲飲食

檳榔　前胡　青皮 三分　赤芍藥　川芎　枳殼 各半兩　甘草 一分　木香　桂心

右為吹咀每服四錢薑三片棗一枚並至七分去滓溫服無時

局方　分心氣飲　亦妙見十二卷大公下論

三脘散　亦妙方見本卷下論

木香散 治婦人脾胃虛冷心腹脹滿不欲飲食

木香　桂心　乾薑炮　陳皮去白　草果仁　訶梨勒　神麯炒黃　人參 各一兩　甘州 半兩

右為細末每服一錢如茶點熱服

新編婦人大全良方卷之七

卷之八

新編婦人大全良方卷之一 通方論第一

婦人淋瀝小便不通方論

夫婦人淋者由腎虛而膀胱熱也膀胱與腎為表裏俱主於水行於脬者為小便也臟腑不調為邪所乘腎虛則小便數膀胱熱則小便澁其狀小便疼痛澁數淋瀝不宣故謂之淋也小便不通脹滿氣喘急用藥無異

木通散 治婦人五淋

木通　揄白皮　瞿麥穗
大麻仁　滑石各一兩　貝齒
葵子　白茅根各二兩　甘草半兩

右為粗末每服五錢水煎空心溫服

石蒂散 治婦人小便卒淋歷

石蒂 黄芩 木通

榆白皮 葵子 瞿麥穗

車前草

右等分為粗末每服半兩水盞半薑三片煎七分去滓熱服

桃膠散 治婦人氣淋勞淋

桃膠 榆白皮各一兩 車前子

冬瓜子 鯉魚齒各半兩 葵子

瞿麥 木通各一兩 扶殼一分

右吹咀每服四錢重水一盞煎至七分去滓温服

金沙散 治淋

海金沙草陰乾為末煎生茸湯調二錢甚者不過三四服

陳總領方

又方

真琥珀研細不以多少研麝香白酒調下 此二方出

雞蘇散 治婦人血淋

雞蘇葉 木通各二兩

滑石各三兩 刺薊根一兩 生乾地黄

右為粗末每服半兩水一盞煎至七分去滓食前温服

治婦人血淋及尿血澁痛

生乾地黃 三兩 鬱金 蒲黃 各二兩

右為細末每服二錢車前子菜煎湯調下日三服以利為度

亦有血瘕似淋小便不通臍腹脹滿痛亘桃仁煎方見第七卷第九論

後有用亂髮方治脬轉不得小便亦可治血淋尿血亦好

火府丹 治心經熱小便澁及治五淋 加甘草吹咀煎名導赤散

本事方

生地黃 二兩 木通 黃芩 各一兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大木通煎湯下三十圓此藥治淋瀝臍下滿痛 許學士云士戍年卒病渴日飲水一斗不食者三日心中煩悶時已十月予謂有伏熱奧此藥數服益二日不覺耒謝當日三服渴止又治淋用以治渴可謂通變也

治婦人諸般淋

苦梂根 俗呼為杜牛膝 多取淨洗碎之以一合用水五盞煎至一盞去滓用麝香乳香少許調下鄧縣武尉耿夢得其內人患砂石淋者十三年每漩痛楚不可忍溺器中小便下砂石剝有聲百方不効偶得此方服之一日所視也○本云牛膝治莖中痛少而

婦人脬轉不得小便方論第二

夫婦人脬轉之病者由脬為熱所迫或忍小便俱令水氣迫於脬屈辟不得充張外水應入不得入內溲應出不得出內外壅滯脹滿不通故為脬轉其狀少腹急痛不得小便甚者至死不可治也

局方有八味圓治婦人脬轉不得小便

滑石散 治婦人丈夫脬轉小便數日不通 千金翼

滑石一兩 寒水石二兩 葵子一合

右為末以水一斗煮取五升時〻服一升即利

又方

亂髮燒灰 葵子 車前子

右等分為細末每服二錢葵湯調下

葶藶散 治婦人脬轉小便不通亦可治男子

葶藶葉燒灰一兩 滑石研細半兩

右研停沸湯調二錢服

石葦湯 治脬轉小便不通出指迷方前同

石葦去毛 車前子

右等分為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓服

治婦人忽小便不得依時而起致令脬轉經四五日困篤欲死方

滑石二兩 亂髮灰一兩

右研停取桃白皮一斤熱搗以水三盞絞取汁無時温半盞調二錢服

又方 以滑石末葱湯調下二錢服

千金翼治婦人不得小便

杏仁七粒去皮尖

右一味麩炒黃為細末水調服立通

又方

紫草為末井華水調取三指撮立通又云紫苑
皆可用
若卒暴不通小腹膨急气上衝心悶絶欲死此由
暴気並令膀胱或從憂驚気無所伸鬱閉而不流
気衝脇系不正診其脈右手浡小左手急大宜蔥
白湯方
橘皮三兩　葵子一兩　蔥白一莖
右�once咀水五升煮取二升分三服出指迷方
婦人小便數方論第三
夫婦人小便數者由腎與膀胱俱主於水腎気通
於陰此二經俱虛而有熱乘之則小便浡虛則小
便數也
鹿茸散治婦人久虛冷小便日夜三五十行
鹿茸　龍骨各一兩　附子各三分　桑螵蛸半兩
右為細末食前温酒調下二錢
桑螵蛸散治婦人虛冷小便數
桑螵蛸三十枚炒　黄耆半兩　鹿茸　牡蠣粉
甘草二兩
右為細末食前薑湯調一錢服
遺尿失禁方論第四
經云膀胱不約為遺尿者乃心腎之気
傳送失度之所為也故有小便浡而遺者有失禁

而出不自知者又婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無時又有脬寒臟冷而遺尿不禁治之各有

鹿茸圓 治婦人久積虛冷小便白濁滑數不禁

鹿茸　　椒紅　　桂心
附子　　牡蛎　　補骨脂
石斛　　蒐絲　　雞胵胵
沉香 各一兩
桑螵蛸 三分

右為細末酒煮麪糊圓梧桐子大空心溫酒下三十圓

又方 以鹿角屑炒令黃為細末空心溫酒調二錢

又方 雞胵胵炙為末空心酒調二錢

治婦人遺尿不知出時 出千金翼

白薇　　白芍藥　等分

右為末酒服方寸匕日三服空心

又方 桑螵蛸酒炒為細末每服二錢生薑湯調下

又方 白蘞　　牡蛎　等分

右為細末飲服方寸匕亦能療丈夫遺尿

療婦人小便不禁以雄鷄翎燒灰為末酒服方寸匕

婦人小便出

夫婦人小便出血者由心主於血血之行身通遍

絡循環臟腑血性得寒則凝澁得熱則流散失其常絡溢滲入於脬內故小便出血也

治婦人卒傷於熱尿血

鹿茸散 治婦人勞損虛羸尿血

鹿茸 當歸 熟地黃

蒼子 蒲黃 續斷 等分

右為細末酒調二錢日三服

髮灰散 治小便尿血或先尿而後血或先血而後尿亦遠近之謂也又治飲食忿小便或走馬房勞

皆致脬轉膀下急痛不通氣治肺疽心痈內崩吐血一兩口或舌上血出如針孔若鼻衄吹內立已

亂髮燒灰 破癥瘕 止驚轉大小便 轉通 嘔血 止血 癥瘕 腫 孤尿 刺戶 庭 雜瘡 瘡

右一味用二錢以米醋二合湯七許調服井華水調亦得服葦詵即愈

生乾地黃散 治婦人尿血不止

生乾地黃二兩 拍葉

阿膠炒成珠一兩

黃芩各半兩

右為粗末每服三錢水一盞薑三片煎七分去滓溫服

又方

羚羊角屑　龍骨　當歸

蒲黃（各一兩）　生地黃（二兩）

右為細末粥飲調下二錢食前服

當歸散　治婦人小便出血或時尿血

當歸　羚羊角　赤芍藥（各半兩）

生地黃（一兩）　刺薊葉（三分）

右為粗末每服三錢水並去滓服

又方　以生地黃搗取汁每服一小盞日三服

又方　以蒲黃末酒調二錢服之水調亦可

又方　鹿角膠三兩炙令黃以水一大盞並至半

盞去滓分為三服食前服

婦人大便不通方論第六

夫婦人大便不通者由五臟不調冷熱之氣結於腸胃則津液煙煜竭大腸壅澁故大便不通也仲景云婦人經水過多則亡津液亦大便難也

犀牛千散　治婦人大便不通及並服

木香（半兩）　郁李仁（去皮微炒）　青皮（去白）

木通　枳殼（去白麩炒）　桂心（各一兩）

黑牽牛（三兩半生半炒）

右為細末每服二錢如並茶一沸攪起放溫空心服

（夫婦人大便不通者由五臟不調冷熱之氣結於腸胃則津液煙煜竭大腸壅澁故大便不通也仲景云婦人經水過多則亡津液亦大便難也　犀牛千散　治婦人大便不通及並服　木香（半兩）　木通　黑牽牛（三兩半生半炒）　郁李仁（去皮微炒）　枳殼（去白麩炒）　青皮（去白）　桂心（各一兩）　右為細末每服二錢如並茶一沸攪起放溫空心服）

（又名三和散見第十七卷第十論並見局方不復重錄）

通神散 治婦人大便不通 此藥者方可投此藥（近心胸煩大麻沉滑而實是其證也）

大黃 芒硝 檳榔

桃花 木香 半兩

右為細末空心煎飲調下二錢

牽牛圓 治婦人大便不通心腹脘脹痛方有大氣（針圓）

黑牽牛 二兩生 青皮 去白 一兩 木香 半兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫水下二十圓

大麻仁圓 治婦人腸胃風結大便常秘

大麻仁 去殼研如膏 秤別 大黃 各三兩炒 檳榔 木香 枳殼 各一兩

右為細末與麻仁研停煉蜜圓如梧桐子大空心溫水下二十圓

論老人虛人風人大便秘不可用駃藥

初虞世云余歷觀古人用通藥孕用降氣等藥蓋肺氣不下降則大腸不能傳送以杏仁枳殼訶子等藥是也又老人虛人風人津液少大便秘經云濇者滑之故用胡麻杏仁麻子仁阿膠之類是也今人學不師古妄意斟酌每至大便秘燥即以駃藥蕩滌之既走津液氣血大便隨手愈更秘濇蕙生它病子昔在魯山見有一譌少自稱太醫曹鎮

有寄居王世安少府本京師人始病風淫末疾為此生以駛藥累累利之後為肺瘡咯膿血卒至大便不通而死古人瞑藥尤所謹重不若今人之輕生故舉此以戒後人

風入腸間或秘或利方論第七

經云春傷於風夏必飧泄蓋木氣刑土也土不能滲泄則水氣勝故泄風氣行津液燥故秘即不可專以秘燥為風也余家中宗親張公度母氏年七十日下利數十行百方治之不愈又苦腰脚拘攣公度以蒺藜酸棗仁康郎太苦秘結以公度藥投之而大便利故知秘與利皆出於風公度潞人名駿世有令德君子今見父醫學而克其家清修不妄取真有德君子今見於此

治風人脚氣人大便或秘或利虛人尤宜方

皂莢子（三百枚搥碎一作破炒煙盡即入末）

右煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓煎蒺藜酸棗仁湯下空腹服兩時久未利再進一服漸加至百圓不妨以通為度

蒺藜湯

蒺藜不以多少炒至赤黑色臼內以木棒舂去刺揀簸淨每蒺藜三兩以酸棗仁一兩炒令香同杵為麤末馬尾羅簁每三錢水一盞煎至七

分去滓温服下前圓子藥

大五柔圓 主臟気不調大便難通榮衛剂九竅進飲食方

大黄酒浸切炒焙 杏仁四十枚去皮尖麩炒黄 白芍藥 枳殼去瓤麩炒 蓼蘆炒香別研 牛脂去筋膜熬成油與蓼蘆杏仁拌 桃仁百枚水洗去皮尖麩炒黄 從蓉酒浸軟温切焙口各一兩

右除有油葉並為末煉蜜圓入牛脂桃杏仁蓼蘆拌數千下圓如梧桐子大米飲下三圓日三服腹脂空時服未知稍增以知為度只可

二仁圓 安康郡太苦風秘予為處之

杏仁去皮尖麩炒黄 麻仁別研 枳殼去瓤麩炒赤

詞子慢火炒去核

右二物各一兩為細末同二仁拌煉蜜和拌圓如梧桐子大温水下二三十圓未知稍增潞公在北門日盛夏間苦大腸不調公隨行醫官李琥李公爨以醫事之始終相接又求速效即以赤石脂其大便者累日不大便者以言動之公之病泄利虚人不可服利菜予不為請以蜜兌導之是夕三更用菜七月中苦熱下糞四五行二三日間飲食如故世有一種色黑如漆不燥糞在直腸菜城未見公未坐定語及此事菜予告曰此公之艱難苦矣自予方喜服大黄芍藥等藥饋動氣乾薑甚苦予不喜又不敢進公勢甚不已

手未快再作已出初上四方虞世

婦人泄瀉方論第八

三因論曰夫婦人泄瀉者經中所謂洞泄瘧泄溏泄濡泄胃泄脾泄大腸泄大痕泄小腸泄水穀注下其實一也原疾之由皆由腸胃虛冷而邪氣乘之經云寒甚則泄春傷於風夏必飧泄（移氣於脾土）（肝旺而剋脾土）又云寒即溏熱則垢此得於外也喜怒憂思恐致使臟氣隔絶精神奪散必致溏泄此屬內也如飲食生冷食傷脾胃而泄者屬不內外也寒者温之熟者凉之滑者澁之濕者燥之治利之法無以過也

香朴圓 治腸胃虛冷泄瀉注下無度脾虛氣閉不進飲食

大厚朴 五兩

陳皮 各三兩

北茴香

訶子

白朮

右為細末麵糊圓如梧桐子大空心米飲下五十圓

桂香圓 治臟腑虛冷風濕寒冷搏冷滑注下不禁老人虛人危篤羸劣

附子

桂心

丁香 一分

右為細末米糊圓如梧桐子大空心米飲下五

赤石脂 各一兩半

肉豆蔻 並炮

白茯苓 各一兩

木香 炮

白薑 炮 各半兩

荳蔻丁氣飲 治臟腑虛寒泄瀉無度瘦極及婦人產後洞泄危篤甚藿香葉 甘草 肉荳蔻十箇炮 右㕮咀每服四錢水二琖糯米一撮煎七分去滓溫服

五香散 治食魚傷泄瀉不止氣刺奪衝及婦人產前產後腹痛血氣等疾用温酒下產後敗血衝心以糯米飲調下孕婦脾泄瀉用敗蒲煎湯下安胎煎前痢煎陳米飲調下食前 烏藥 白芷 炒 枳殼 炒 良薑 炒 甘草 炙

荳蔻圓 治臟寒泄瀉不止服諸藥無効 肉荳蔻麵裹煨香 白术 炒 茯苓 白滅半 右等分為細末每服二錢温酒調下

胃苓散 治夏秋之間脾胃傷冷水穀不分泄瀉不止 亦療男子 五苓散 平胃散 右合和薑棗煎空心服

人參荳蔻散 治久瀉不止服諸藥無効僕累試之 妙 陳日華方

有効

人參　肉蓯蓉　乾薑
厚朴　甘草　陳橘皮 各一兩
川芎　桂心　訶子

茴香 各半兩
右為細末每服三錢水一小盞薑三片棗一枚煎至六分服方出西道人食東水

木香散 治臟腑冷極及又治傷德口瘡下泄米穀不化飲食無味肌肉瘦悴心多嘆恚婦人產後虛冷下泄及一切水瀉冷痢

木香　破故紙 炒各一兩
縮砂仁　厚朴 製各三分
良薑
赤芍藥

橘紅
胡椒
肉蓯蓉 如酒下
擣都一箇

桂心　白朮 各半兩
吳茱萸 湯泡七次各一分

右為散每服三錢用牙經水猪肝四兩許去筋膜批為薄片重重擂藥置一鼎中入漿水一碗醋一茶脚許蓋覆煮肝熟入塩一錢葱白三莖細切生薑彈千許拍破同煮水欲盡空心為一服治冷之初服微瀉不妨亦是逐下冷氣少時自止經年冷痢滑瀉只是一服瀉即飲粥湯忌生冷油膩物如不能食冷物即添少漿水服〇

嘉興謝醫得此方患如指胴子大粥飲下五十圓其効亦若暴瀉痢

只是一服唯熱痢熱泄及諸丹服之皆無効予亦嘗召詢子園之僕診之何風冷絕肝氣濕毒曰之諸方論此侵於肝氣也又曰諸明不而不可不知肝之皆歸肝腎經屬氣無不不也泄瀉不止如附子博云其病莫說見過謂在

因外感五邪之気内傷生硬治塾之食其證不一有赤有白有赤白相雜有治有熱有虛有實大抵四時皆以胃気為本未有不因外感寒暑燥濕風之気而傷於脾胃脾胃既虧而又内傷飲食飲食不能磨化致令積滯而成滯下古人云無積不成痢者此也経云春傷於風夏生飧泄盖風喜傷肝悠春時肝木正旺而不受邪反移気就於脾土悠脾既受就又不能忌愼口腹悠食生冷粘硬之物致令脾胃不能磨化因此積滯又復秋之門或再感暑湿風冷之気發動而成痢也其證必先瞥腹疗痛洞泄水瀉裏急後重或有或無或赤或白或赤白相雜日夜無度如有此證不問治熱虛實但當先服神术散可以發散風寒湿之気次服五苓散分利水穀兼用加巳感應圓温脾胃去積滯或六神圓未有不安者也或曰雖古人有言無積不成痢亦不專以去積為先豈有一歲之内猶於夏秋之間人皆有積未腸土不為暴下則急為痢疾其神术散要藥也又有一方一郡之内上下傳染疾狀相似或只有一家長幼皆悠或上下鄰里間相傳染或有病同而證異亦有證異而治同或用温劑而安或用凉藥而悠有如此等是毒疫痢也治疫毒痢者雖當峯五運六気之相勝亦不可押泥此說且如運気相勝豈獨偏於一方一郡而偶於一家二家者乎如

有此證當先察其屎寒冷熱首以敗毒散多加人
參甘草陳米薑棗並服及三黃熟艾湯黃連阿膠
圓五苓散駐車圓可選而用之如下痢赤多或純
下鮮血裏急後重大便不通身體壯熱手足心熱
大煩躁渴腹脇脹痛小便赤澁六脈洪大或堅而
數或沉而實此熱痢也宜白頭翁湯及三黃熟艾
湯五苓散可選而用之若風痢下血太過宜用胃
風湯加木香黑豆並服若夏秋之間下痢或赤或
白或赤白相雜臍腹疼痛裏急後重增寒發熱心
胸煩悶燥渴引飲嘔逆惡心小便不利及五心煩
熱六脉虛弱此等脉證正因伏暑而得此疾宜服
香薷散加黃連甘草當歸酒水濃煎沉冷水空頓
服仍兼服酒蒸黃連圓或小柴胡湯加人參煎服
必愈（沉內翰云治痢之藥極多然無如小柴胡湯能治暑毒如雜證一
退而痢尚未止則以四物湯加膠艾煎服以調陰
陽未有不安者也如水穀不分小便不利宜用五
苓散淡竹葉煎湯調服如煩渴甚者亦宜服之若
不明伏暑之證但以脉虛而妄投硫附薑桂冊石
之藥而殺之浮可嘆息若下痢純白狀如魚腦髓
腹疼痛日夜無度奔豚逆冷或有嘔逆全不入食
飲食欲温而惡冷六脉微細此由臟腑虛冷之極
宜木香散加服四味理中湯及鍾乳建脾圓甚者
四肢逆冷六脉沉絶當一味峻補兼灸気海丹田
二穴更以助胃之藥此守而不攻之意也宜四順

附子湯三建丹白丱加味參附湯薑附湯皆可選
用如年尊虛弱之人或素秉堅弱亦宜以此
法詳酌調理然大宜開胃進食為先食可得入則
脾胃運化糟粕便聚糟粕既成垢膩鮮血瘀滯不
息其不阵矣如久痢不差腸滑不禁溏洩不止諸
藥無效方可施之澁腸止痢之劑亦宜先以酘骨
肉薑蔻訶子鍾乳胡粉之藥近人多用鶯粟殼地
榆之屬然此物性太緊澁能損胃氣若壯人
壯健者服之間委奇効若是疫毒受暑受濕之證
及年尊之人或稟学怯弱服此莫不受其大害若
以固秘澁腸為先則風寒暑濕之邪非惟澁而不
去而胃管閉而不通葦曰不食日見羸瘦糟粕不

迷恐亦誤

入腸中所患無由可除矣若有此證宜以參苓白
术散四君子湯及以石蓮山藥之劑治之必愈治
利欲投補藥必須有温通之意在焉如四君子湯
理中湯十全湯加砂香白豆蔻茯苓官桂參朮之
屬可以散風邪可以分水道可以開胃管可以治
纏擾可以通秘澁此攻守之意兩全也大抵治痢
之法虛者補之實者瀉之滑者澁之閉者通之有
積者推之風則散之暑則滌之濕則燥之熱則凉
之冷則温之冷熱者調之以平為期不可以過此
為大法葦隱老人序

黃下恐脫藥字

白頭翁湯 治熱痢下血連月不差 白頭翁 二兩 黃連 黃檗皮

李皮 兩各一

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓無
時温服

神术散 治春傷於風頭痛項
背拘急鼻流清涕

蒼术一斤 藁本 川芎 羌活 四兩 粉草 二兩 細辛 一兩 各六
右為粗末每服三錢水一盞薑三片煎至七分要
出汗加蔥去滓稍熱服無時候

六神圓 治赤白痢疾

神麯 別為末摊 麥芽 茯苓 木香 根圓白 黃連 六味等分
右為末煮糊為圓如梧桐子大每服
五十圓赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢
乾薑甘草湯下

可以解着毒清逐邪气止下痢有神麯麦芽可以消食

右為末用神麯末作糊為圓如梧桐子大每服
五十圓赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢

此葉城醫府藏得之京師宮殿講義山見傳是京師見詳此方有黃連有木香能温脾胃有茯苓能利水道寬腸胃有神麯麦芽可以消穀

三黃熟艾湯 治傷寒四五日大下熱痢時作服白
通湯諸藥多不止宜服此湯除熱止痢亦有人作
圓子熟水吞下四十圓治時行毒痢良驗

黃芩 黃連 黃蘗 各二
熟艾 半箇 雞子大
右㕮咀每服三錢重水一盞煎至七分去滓温
服無時

四順附子湯

生附子（去臍皮）　白薑炮　甘草炙　各一兩
人參　一兩

右㕮咀每服四錢童水二盞煎至七分去滓空心服吐瀉腹痛加枳殼半兩小便不利者加茯苓半兩夫氣痢疾雖體寒手足逆冷汗自出六脈沉伏不宜輕用附子多因伏暑而得此疾亦有冷汗自出四肢逆冷六脈虛弱但背寒面垢或面如塗油齒乾煩寬燥渴引飲此伏暑證也小柴胡湯五苓散酒蒸黃連圓必能奏効學者宜精思耳

三建丸

陽起石（煅飛半兩）　鍾乳粉（二兩）
大附子（炮取末半兩一半作瓣）
右用附子糊圓如梧桐子大每服五圓至十圓空心溫酒下如渴煎參湯下

加味參附湯

大附子（二兩半炮）　大人參（一兩）
右二味㕮咀每服四錢童水二盞薑十片丁香十五粒煎至七分空心溫服

治禁口痢蓋公實即中傳云甚妙石蓮肉不以多少不炒去殼將肉并心碾為細末每服二錢陳米飲調下便覺思食此疾蓋是毒氣上衝華蓋心氣不通所以不入食服此藥

之後心気通痢當頓下而愈未愈自服痢藥
治禁口痢
乾山藥不以多少炒黄為細末米飲調下
香茸圓 治下痢危困
麝香臨時入半錢別研 鹿茸一兩火燎去毛酥炙令脆 黄芩半生半炒黄為細末米飲調下
右以煙心煮棗肉為圓如梧桐子大每服五十
圓空心服 繆立夫云有医者每料添滴乳香半
兩九有効紹興人苦痢疾多往往而
死凡于時所用治痢如此等葉或沒石子之類不
可向口惟服此圓二十粒即愈
劉從周痢疾口訣〇栗酒赫諤之說醫人劉從周
治痢有功議論殊不凡且有驗云大凡痢疾不問
赤白而為冷熱之證若手足和暖則為陽只須服
五苓散用栗米飲調下次服感應圓二十粒即愈
若覺手足厥冷則為陰當服暖藥如己寒圓附子
之類如此治痢無不効方親曾用有効有人夏
月患痢一日方七十行用五苓散兩服此
治狀不詳治痢當用之良驗
卷吉
薑附湯 局方僕
酒蒸黄連圓
小柴胡湯
香薷散
敗毒散 理中圓
四君子湯
黄連阿膠圓
鍾乳建脾圓
駐車圓
感應圓 亦有用蘘荷台香白芍甘草黄芩梔子加薑服
胃風湯 和白服台蘘感白芍甘草梔子大棗各十粒
四物湯
玉華白丹 十全大補湯
斗門散
五苓散 真人養臟湯

水煮木香圓　大已寒圓
已上諸方並出官局不復重錄
如斗門散　養臟湯　水煮木香圓
參香散　薏苡餅
其中皆使鼈粟殼然此藥大能壞脾凡方不
用如脾胃壯健之人服者多有良驗姑存于
后

參香散　治男子婦人小兒陽陽不和冷熱相搏猜
而成痢或赤或白或赤白相雜日夜無度裏急後
重臍腹疼痛甚不可忍又治水瀉不止腸鳴腹痛
或熱毒中傷或寒気久猜並宜治之
鼈粟殼製　陳皮去白　防風各一兩

厚朴半兩　青皮　白薑各一分
右為末每服二錢水一小盞煎至六分去滓熱
調赤白相雜痢勿問陳米飲調如冷瀉陳米飲
新井水調空心服此藥正脾去猜和気理中忌
生冷肥膩油麵醃藏

薏苡餅　治赤白刺臍腹刺痛久而不愈大治冷痢
鼈粟殼製一兩　白芍藥　黃耆三錢
陳皮　青皮　木香
訶子肉　薏苡仁各一錢　人參半錢
羌活　當歸各錢
右為末煉蜜圓如彈子大每服二圓水一小盞
煎至七分溫服二方徐明仲先生方口曾有一婦人病痢疾月四十日服諸藥

不愈召僕診之全六脈沉弱大甚下痢白膿半月餘矣醫用補湯薑棗並無效驗又加白蜜經略五六日至實云不宜再飲但服滑石散十數服而此症遂已僕以甲子夏初偶患痛泄小便不通自服五苓散一服而愈後又因飲冷復作痛泄其脈沉遲而弱僕謂此脾胃虛寒之症非熱也醫者不信仍用滑石散二服痛泄益甚小便閉塞幾至危殆僕診之是血水相搏氣血俱虛之候也遂用理中湯加附子一枚煎服一劑而痛泄頓止小便頓通調理數日而安

調中湯方

葛根 黃芩 芍藥
藁本 赤茯苓
甘草炙 等分

右㕮咀每服二錢水一鍾煎至七分去滓溫服

葛根梗方

葛根 白朮

右㕮咀每服二錢水一鍾煎至七分去滓溫服

發時再服又有一婦人泄瀉不止予診之則非熱也用藥數服加陳米煎次入之則胃氣復矣

乙香去粟米煎大黃亦可療調中湯證方

痢後嘔噦方論第十一

凡滯下病之稍久或欲愈之時多有咳逆及嘔逆之證然熱逆者古人所謂噦是也噦者胃寒所生此證最危其它病症惡熱逆如見此證宜用擂皮乾薑湯半夏生薑湯若陽證熱逆者小柴胡湯橘皮竹茹湯○僕嘗治一痢疾熱逆不止六脈沉弱諸醫用藥灼艾皆無效僕投退陰散兩服愈○又嘗治許主簿痢疾愈後咳逆不止服諸藥無效遂灸期門穴三壯而愈其穴在第六卷第十論中如有嘔逆之證雖絃無陰則嘔然多有胃熱而嘔亦有胃寒而生如胃熱而嘔宜

服小柴胡湯孫兆竹茹湯蘆根湯官局桔梗湯加生薑主之嘔而發渴者猪苓湯○僕嘗治一痢後嘔不止六脉虛弱此胃寒而嘔又似暑毒凝於胃脘投局方香蒂圓愈

橘皮乾薑湯 治噦

橘皮 桂心

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分去滓温服

半夏生薑湯 治噦欬逆

半夏一兩一分洗 生薑二兩切

右以水二盞煎至八分去滓分為二服

丁香柿蒂湯 治欬逆

丁香十枚 柿蒂十五箇

右㕮咀用水一盞半煎至八分去滓熱服

橘皮竹茹湯 治噦逆

橘皮二兩 竹茹一升 甘草二兩

人參半兩 半夏一兩洗

右㕮咀每服四錢水二盞生薑六片棗一枚煎至七分去滓温服

生薑橘皮湯 治乾嘔噦若手足厥冷者

橘皮四兩 生薑半升

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分去滓温服

退陰散 本治陰毒傷寒手足逆冷脉沉細頭痛腰重連進三服小傷寒冷每服一字大正元散內同

煎入塩一撮陳毒傷寒咳逆煎一服細細熱呷便止

乾薑　川烏

右等分為粗末炒令黄色候冷擣為末每服二錢水一盞塩一撮煎至半盞服

猪苓湯　治咳而嘔渴心煩不得眠

猪苓　赤茯苓　澤瀉
阿膠炒　滑石酪半

右㕮咀每服三錢水一盞煎候膠消盡服

孫兆竹茹湯　方見第七卷第一論

盧根湯　方見第八卷

宮局括梗湯　局方不復重錄

小柴胡湯

竹葉石膏湯

香需圓　已上出

婦人大便下血方論第十二

夫婦人臟腑擾傷風邪易入凡熱気在内令人下血風気在肉亦大便血色或如豆汁腹中疼痛若糞後下血者其未遠糞前有血者其未近遠近者言病在上下也婦人面無血色時寒時熱脉浮弱按之絶者為下血也

防風如神散　治婦人風虚大便後時下血宜服

防風　等分

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓空心

治腸風下血

赤芍藥　一兩　炙存性　已上

右為末温酒調下二錢

又方　枳殼寸五合去瓤麩炒令黃色　巴豆三粒去殼皮安在內以線繫之用好米醋於砂盆內研成膏酒煮以黃耆五兩為末入膏內和杵捶千下每服二十圓空心米飲吞下酒亦可

治痢久不安下血成疰

頭髮一圓洗燒灰研每服一二錢新汲水調下

右為末酒糊圓如梧桐子大每服二十圓食前臨卧濃煎棗根白皮酒吞下忌羊血此同舍處

木香烏荊圓　治腸風酒痢已上出四方出治婦人方

木香一分　荊芥穗　川烏炮各一兩

右為末酒糊圓如梧桐子大每服二十圓食前傳之曾服有効

又方

荊芥穗　黃耆蜜炙　熟地黃　當歸　桑耳　地榆　撲白皮　乾薑炮　槐豆　角刺　牛蒡子　甘草

右等分為細末每服二錢粥飲調下空心服治腸風下血

蒼朮　不以多少以皂角濃椒汁浸一夕次炒日煮以乾焙燥

右一味為細末麵糊圓如梧子大米飲空心下五十圓日三

地榆湯　駱龜吉方　經云結陰者便血一升再結者二升

三錯三升宜用

地榆四両　甘草一両半　縮砂仁四枚七

右為粗末每服三錢水一盞煎至七分去滓空心温服

腸風黒散　治榮衛気虚風邪冷気進襲臓腑之間或食生冷或喫炙煿或飲酒過度積熱腸間致使脾虚弱糟粕不聚大便鮮血膿腹疼痛裏急後重或肛門脫出或久患酒痢大便攇併並皆治之

敗棕燒　粉草炙各等分　木饅頭燒　烏梅去核

右為細末每服三錢水一盞煎至七分空心温服〇僕嘗治一婦人便血不止用煮附圓加五

靈脂効方見第一論　婦人痔瘻方論第十三

婦人痔瘻者由酒色気風食及勞傷經絡其夫婦人痔瘻者皆長年久坐而成者其痔有五種血滲而成之亦有長年久坐而成者其痔有五種肛邊瘡如乳出於外時出膿血者為牡痔也肛邊腫生瘡而出血者為牝痔也肛邊生瘡痒而復痛者為脈痔也肛邊腫核痛發寒熱而出血者為腸痔也因便轉而清血隨出者為血痔也治之各有方

鱉甲散　治婦人五種痔疾

鱉甲　露蜂房　蛇蛻　蝟皮　楮後懸蹄甲　五味各二分　焼存性

麝香一分

右各研為細末和藥令停每服一錢空心用生乾地黃煎湯調下若肛門有竅膿痛傳之即愈

忌莧菜

局方鈎腸圓黑玉丹 治腸風下血及痔瘻之皆驗

僕嘗治一婦人久病心焦多怒遂成痔疾狀如蓮子熱膿而痛遂用熊膽入拖花腦子並研更用猪膽汁調閪塗痔之愈 方出張氏

又方療痔熱膿痛 鄭子華解元方

蛞蝓大者一條 江西名蛞蝓湖北名蚰蜒廣州名鼻涕出 研令爛入研了龍腦一字 大半字 以石薜荔婁熏洗乾 五加皮好緣桑葉者佳孫真人同 研為末 妙下暨大師趙尚書上汝南夫人痛此只用蛞蝓研塗亦効

婦人脫肛候方論第十四

夫肛門者大腸候也大腸虛冷其氣衝其肛亦令反出也出亦有因產用力努軀氣衝其肛亦令反出也治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不得 出聖惠方

蝸牛一兩去殼生研 猪脂和傳之縮 藥性論云蝸牛有小毒能治大腸脫肛口色黃而小兩後陰脫陰膿 范汪方云螺螄全似蝸牛好緣桑葉者佳孫真人同 出聖惠方亦治

姚和衆治男子女人小兒大腸虛冷肛門脫出以鐵精粉傳之良驗

集驗方療脫肛歷年不愈

以生鐵三斤水一斗煮取五升去鐵以汁洗日再

姚和衆治大人小兒因痢脫肛

鷺頭骨燒灰研取粉摸之（日華子云鷺頭燒灰療脫肛門經同茶性論）

孫真人療脫肛

腸頭若挺出一片蝦蟇皮燒中燒煙熏切令覺

玄微

婦人陰腫方論第十五

夫婦人陰腫者是虛損受風邪乃為胞絡虛而有風邪客之風気乘於陰與血気相搏令気否澁腠理壅閉不得泄越故令腫也

菖蒲散 治婦人月水澁滯陰閒腫痛

菖蒲 當歸 各一兩 炒 秦艽 三方

吳茱萸半兩 右為粗末每服三錢水一盞葱白五寸煎至六分去滓空心温服

經心錄驗治婦人陰中腫痛不可忍或瘡爛者麻黄湯洗方

麻黄 黄連 艾葉 五兩 防風 三兩 大戟二兩

右剉細以水一斗煮取五升熱洗日三切宜避風冷

古今錄驗治婦人陰腫或瘡爛者麻黄湯洗方

麻黄 黄連 蛇床子 各二兩 北艾葉一兩半 烏梅十箇

右剉細以水一斗煮取三升去滓熱洗避風冷

白礬散 古今錄驗治婦人陰腫堅痛

右為細末每用棗大綿裹內陰中日兩換
肘後方療陰中腫痛 其草半分 大黃生一分
択殼半斤炒令熱以故帛裹熨冷即換之
千毋秋錄療陰腫
鐵精粉傳上

婦人陰瘁方論第十六 與第廿三卷第十論通用

夫婦人陰瘁者是蟲蝕所為三蟲在於腸胃之間因臟虛三蟲動作蝕於陰內其蟲作熱微則為瘁重者乃痛也

大黃散 治婦人陰瘁
大黃 微炒 黃芩 黃耆 各一兩

赤芍藥 玄參 丹參
山茱萸 蛇床子 各半兩

右為細末食前溫酒調下錢服

廣濟方療婦人陰瘁不止
蚺蛇膽 雄黃 硫黃
朱砂 硝石 蔓荊 各半兩

右為細末研停以臘月猪腊和如膏用故布作纏子如指長一寸半以藥塗上內陰中日一易之易時宜用猪椒根三五兩水煮稍熱洗乾拭內之效

又方 小蘇不拘多少水煮作湯熱洗日三用之

崔氏療陰痒不可忍方

杏仁燒作灰乘熱綿裹內陰中日二易之

又方　蒜煮湯洗之一方用枸杞根

又方　狼牙二兩細剉　蛇床子三兩

右以水三升煮十沸熟洗

又方　取雞肝乘熱內陰中如有蟲蟲當盡下

古今錄驗療婦人陰痒如有蟲狀

右取牛肝切取三寸內陰中其蟲盡入肝內出之効猪肝亦得

礬石散　千金翼治婦人陰痒脫

礬石為末空心酒服方寸匕日三服

婦人陰冷方論第十七

婦人胞絡勞傷子臟虛損風冷客之冷乘於陰故冷也

療婦人癖瘦陰冷五加皮浸酒方

五加皮　乾薑　丹參

蛇床子　熟地黃　杜仲製各三兩

鍾乳粉四兩　天門冬一兩　地骨皮二兩

右細剉以生絹袋盛用酒十五升漬二宿每服溫一中琖空心晚食前各一服

治婦人陰冷痒方

遠志二分　乾薑　生蓮花各三分

蛇床子　五味子各四分

右為細末先以兔尿塗陰門中然後綿裹一銖

內陰中熱即為劾
傳心方治玉門寬冷子門痒閉方
硫黃末煎湯洗
近効坐導藥主陰冷子門痒閉方
吳茱萸 葶藶子 炒各二方 蛇床子 三方
沒石子 一枚
右為末以綿裹如棗子內子宮中
又方 五味子 四兩為細末每用以口中玉泉和如
兔屎大內陰門中熱即効
通真論療婦人子門冷坐藥法
蛇床子 四方 吳茱萸 六方 麝香 少許
右為細末煉蜜圓如酸棗大以綿裹內陰中下

惡物為度
婦人陰挺出下脫方論第十八
夫婦人胞絡傷損子臟虛冷氣下衝則令陰挺出
謂之下脫亦有因產而用力軀氣而陰下脫者診
其少陰脉浮動浮為虛動為悸故令下脫也
當歸散 千金翼療婦人陰挺下脫
當歸 炒 黃芩 各二兩 牡蠣 二兩
蜻皮 一兩炙熏 赤芍藥 半兩
右為細末每服二錢食前煖酒調下米飲亦可
又方
當歸 三兩 敗醬 二兩 獨活
地榆 白蘞 各半兩
白芷

右細剉水一斗煮取二升去滓稍熱洗
廣濟方治狀同前
皂角去皮弦子炙焦黃 半夏炒令黃 大黃
北細辛 蛇床子 各一兩
右為細末薄綿袋盛如指長內陰中日二易之
又方
蛇床子五兩 烏梅十四枚 白芜等分
右剉以水五升煮取三升去滓熱洗日五次
又方
川烏
右為細末綿裹一錢內陰中令入三寸腹內熱
即止未瘥再用一方有生椒一兩

千金翼療婦人陰脫垂療脫肛
羊脂煎訖適令暖塗上以鐵精粉傅脂上多少
又令調以火炙布令温以熨上漸漸推內之更細
未磁石酒調服方寸匕日三服
婦人陰中生瘡方 第十九 又見二十三卷 第十論
凡五方

集驗療婦人陰中痛生瘡
羊脂 當歸 杏仁
白芷 芍藥 各一兩
右五味細切羊脂和置鼎中煎之藥成取如大
豆一枚綿裹藥內陰中日一度
肘後療女人陰中生瘡方

杏仁焙末　雄黃　礬石各一分

麝香半分

右四味研細和傳陰中

又方　硫黃　右研細付之

古今錄驗療婦人陰中生瘡黃芩湯洗方

雄黃　黃芩　當歸　礬石各二分

芎藭　大黃　礬石各一分

黃連一分

右七味切以水五升煮取四升洗瘡日三

又雄黃散方

雄黃　芎藭　鹿酥

藜蘆　北細辛　當歸

川椒等分

右為末綿裹內陰中又傳外瘡上忌如常法

女人傷丈夫頭痛方第二十

集驗療女人傷丈夫四體沉重嘔吸頭痛方　三四

生地黃八兩　芎藭五兩　香豉一升

葱白一升　生薑四兩　甘草二兩

右六味切以水七升煮取二升半分三服不得

重作忌房事千金同

桑白皮湯千金翼療諸婦人傷丈夫苦頭痛欲嘔

悶

桑白皮半兩

大棗一十枚　乾薑二果　桂心五寸

右四味切以酒一斛煮三四沸去滓分温服衣
適厚薄毋令汙出千金同

女人交接輒血出痛方第二十一

千金療女人交接輒血出不止方

桂心 伏龍肝各二分

右為末酒服方寸匕差止

又方

黄連六分 牛膝 甘草各四分

右三味細切以水四升煮取二升洗之日三四
度差止

女人交接它物傷方第二十二

集驗療女人交接陽道違理及它物所傷犯血出
流漏不止方

取釜底墨新葫蘆窪藥内之

又療女童交接陽道違理血出不止方

燒髮并青布末為粉塗之

又方割鷄冠血塗之

小户嫁痛方第二十三

千金療小户嫁痛連日方

甘草三分 白芍藥二分

桂心 生薑三分

右四味細切以酒二升煮取三沸去滓温服神
良

又療小户嫁痛單行方

牛膝七兩

右一味切以酒三升煮至二升分三服

又療婦人嫁痛單行 大和湯方

大黄 三兩

右一味切以酒一升煮一沸頓服

又療婦人小户嫁痛 海蜱蛸散方

烏賊魚骨 二枚

右一味燒研為細末酒服方寸匕日三服

新編婦人大全良方卷之八