

何夢瑤醫碥冊上

鄭霞仙藏

南海何夢瑤輯

醫

編

李遜參署

民國十一年秋月
上海千頃堂印行

自序

文以載道。醫雖小道，亦道也。則醫書亦載道之車也。顧其文繁而義晦，讀者卒未易得其指歸。初學苦之。瑤少多病，失學於聖賢大道，無所得，雅不欲為浮靡之辭以貽虛車誚。因念道之大者，以治心。其次以治身。莊子曰：「哀莫大於心死，而身死次之。」所以治身也。身死則心無所寄。固小道中之大者。爰取少日所誦岐黃家言，芟其繁蕪，疏其淫鬱，參以己見，泐為一書，用以階梯。初學非敢謂是載道之車，欲使升車者藉此以登，如履碥石云耳。故以碥名編。或曰：方今景岳全書盛行，桂附之烈等於岷岡，子作焦頭爛額客數矣。人咸謂子非醫病寔是。醫是書出其時，醫之藥石歟，碥當作砭，予笑而不敢言。

乾隆十六年歲次辛未季春望日南海何夢瑤書于樂只堂

予友何君西池年三十八始成進士其成晚故得博通諸藝能醫尤其篤嗜而專精者也然自其為諸生時即文名藉甚學士惠公稱為南海明珠於是西池之見知於人者獨著於詩文餘技遂為所掩乙酉選拔策詢水利西池以醫喻娓娓且千言學士顧公亟賞之拔置第一予亦與選得讀其文然後知西池之旁通於醫而尤未悉其妙也西池聯捷後尋觀政西粵厯宰義寧陽朔岑溪思恩諸邑遷牧遼陽則又但以善政聞然其在恩也癘疫流行西池廣施方藥飲者輒起制府策公下其方於郡邑存活甚衆遼陽民王洪病風年餘狂易多力投入秫火中焦爛無完膚傳以藥數日愈於是西池坐廳事呼伍伯縛王洪庭柱間洪且詈且歌州人聚觀如堵西池先威以刑令怖懼旋予湯液兩人持耳灌之有頃暴吐下其病遽失人咸驚為神嗣是西池之醫遂稍稍著矣庚午夏予內子病兩月不少間諸醫皆束手已治木矣適西池請告歸里並延診先後處大承氣白虎小柴胡數十劑效若桴鼓予謂西池諸醫皆言陽虛宜扶陽非參附勿用予獨反之何也曰此非粗工所知且此輩妄引易義動言扶陽抑陰夫易陽君子陰小人故當扶抑醫言陰陽俱氣耳氣非正則邪正虛無論陰陽均當扶邪勝無論寒熱均當抑何得牽西補東耶人以溫補為起死回生而不識熱伏于內而妄投桂附竟不明其悞服殺人而承氣湯大黃朴硝即回陽之上品故能扶補瀉初無定名蓋視病之寒熱以為去留今不問何証概從溫補何

異憲溺一水趨火滅不亦惑乎又曰醫有所偏點庸醫不知溫補之能殺人也以為平穩而用之黠醫知溫補之能殺人而人不忍以為可以藏拙而用之於是景岳書徒偏天下而河間丹溪之學絕矣距邪闡正吾能已乎西池之言若此然則西池之醫之著於天下也所繫固不少矣西池所輯醫書凡數種向欲梓以問世而不名一錢此編乃朋好所醵刻先行者工竣命予弃其端予惟西池自序簡括精妙無可復益聊綴拾其言論案驗之未著於篇者告諸世使知西池之所長不獨在文章政事間而衆著之以嘉惠天下也是為序

賜進士出身截選知縣年眷同學弟趙林臨拜識

王金壇先生証治準繩膾炙人口予友何西池稱為近代醫書之冠慮其奧博難讀因作醫碥以羽翼之其書文約而義該深入而顯出當與準繩並傳無疑蓋皆以文學名儒而發軒岐之秘宜其足以行遠也獨是金壇之作準繩也以罷黜而西池之作醫碥也以幽憂之疾倘所謂窮愁著書者非耶因念西池少時妻子僕婢財十數人有田數十畝足供饘粥意興甚豪酒後耳熱縱談古今世事燭屢跋不肯休又嘗與予極論西曆平弧三角八綫等法及填詞度曲之理片言印合欣然起舞初不知人世有窮愁事一行作吏田園荒蕪而食指且半千於是引疾里居懸壺自給曩時豪興索然矣予嘗過其家老屋數椽僅蔽風雨琴囊藥裹外無長物有數歲免破衣木履得晴階間遽前揖人婉變可愛問之則其孫阿黃也予謂西池同年中惟君與孔兼容能醫又皆工詩而其窮亦相若兼容自宜春解組歸為小兒醫日獲百錢即彈琴歌商浩浩自得豈醫與詩皆能窮人耶抑廉吏固不可為耶今兼容補官有日矣西池尚高臥不起窺其意似欲以醫終老者然則貧固其所甘而窮愁著書又其所樂者矣或曰多文為富西池嘗舉鴻博著述追步金壇何富如之是編又繼準繩行世可以不朽視富貴利達朝榮夕萎者所得孰多宜西池不以彼易此也噫知言哉賜進士出身翰林院檢討加一級前翰林院漢書庶吉士壬子科鄉試福建文闈

同考官己酉科解元年眷弟辛昌五頓首拜撰

凡例

一論証須明其所以然則所當然者不言而喻茲集務窮其源故論証詳而繫方畧如怒太息等篇併不繫一方但明其理則方在其中如必欲考古人成法於準繩等書檢求可也

一論中所引古人成說欲令讀者易曉不無修飾之處即非古人原文故多不著其名氏非掠美也諒之

一議論多出臆見間與古人牴牾不避不敏求正有道幸恕狂瞽

一河間言暑火乃與仲景論風寒對講丹溪言陰虛乃與東垣論陽虛對講皆以補前人所未備非偏執也後人動議劉朱偏用寒涼矯以溫補立論過當遂開酷烈之門今日桂附之毒等於刀鋸夢瑤目覩時弊不得不救正其失初非偏執讀者幸勿以辭害意

一是集宦遊所作自粵西而遼左十餘年來風鷗烟江霜輪沙磧偶有所得隨付小史錄之以故體裁無定亦欲改從畫一而多事倉卒未能也

一論目方目各下註頁數而方目之前復冠以門目兩頁下註方目頁數使先得方目頁數而後查諸方頁數皆以便檢尋也

一諸方有在論外者如闢格門方全在論外蟲門取蟲積二方在論外是也檢方目即得

一論中主治諸方隸別門者註明見某門字樣其不註者即本門方或雖隸別門而

一篇之中重出數見亦但于首見者註之餘不復註

一方下例繫主治以著本方之功即以明用藥之理知某藥為某病設也凡品味庵雜者必所治之証不一丹溪所謂雜合之病須用雜合之藥治之也本宜備錄以鍛板力絀刪之用方者當因病加減更詳考原方主治為佳諸多方多從準繩錄入按門索之

一藥品分兩輕重古今不同炮製亦異當酌宜用之

一此書止論雜症尚有傷寒論近言婦科輯要幼科輯要痘疹輯要本草韻語針灸吹雲集等書俟續刻呈教

一五卷四診寧思恩時輯以教邑醫者本自為一書今附醫碥之未頗多改竄與舊本岐出當以今刻為定

余自幼時即喜購書。甲子歲入中醫學校肄業。選購名医專著。今年已老。目力已遜。書本猶新。希後嗣什襲珍藏為要。

醫編目錄

卷一

藏府說

心胞絡三焦說

五藏配五行八卦說

水火說

命門說

五藏生剋說

五邪說

十二經配三陰三陽說

六氣說

經絡考

見針灸吹雲集

六氣說

六氣後論

運氣說

虛實寒熱說

補瀉論

反治論

標本說

表裏論

陰陽論

夏月伏陰辨

氣

血三十五

發熱

潮熱

惡寒

戰慄

六十一

寒熱

六十四

諸中總論

六十七

中風

六十七

中寒

八十一

中暑

八十二

中濕

八十三

中氣

八十四

中食

八十四

中惡

鬼擊尸瘡

八十五

卷二

傷風寒

鼻渊

破傷風

二

傷暑

三

傷濕 八

傷燥 十

春溫

溫瘧

風溫

溫毒

濕溫

十一

瘟疫

十四

瘧似瘧非瘧

三十

咳嗽

三十九

喘哮

四十四

短氣少氣

四十八

噯氣

四十九

呃逆

四十九

久嘯

五十

傷飲食

五十二

不能食

五十七

勞倦傷

五十八

虛損癆瘵

六十五

火

七十一

欬

七十四

痰飲

七十七

痞滿胸痺

痞塊

八十八

積聚

八十九

蟲

九十五

中毒

九十八

卷三

腫脹

一

黃疸

九

消渴尋常渴

十三

瘻

注夏

十八

肺瘻肺癰

二十二

痺麻木

二十五

瘻

二十九

汗

二十二

嘔吐

噦惡心

三十六

反胃噎膈

四十

霍亂

四十一

泄瀉

四十七

腸鳴

五十一

痢

似痢非痢

刮場

痢後風

五十二

大便不通

六十一

大小便不通

六十一

小便不通

轉胞

六十三

淋

似淋

非淋胞胞痺

六十六

小便數

六十九

遺尿小便不禁 七十 小便黃赤 七十一 交腸 七十一

關格 七十二

頭痛 頭風
頭屑

頭重 雷頭風
眉棱骨痛

七十五 大頭痛
頭搖

眩暈 八十

項強痛 八十二

胸痛 八十二

心痛 心胞絡痛

胃脘痛

八十三

腹痛 少腹痛

八十六

腰痛 八十九

背脊強痛 肩脾痛

九十一

脇肋痛 九十二

臂痛 腹腫

九十三

身體痛 拘急

九十四

面痺腮 煙車蹊

九十五

耳 九十七

卷四

鼻 一

口 四

唇 六

齒 取牙

舌 十

咽喉 諸物哽喉

十三

瘡 二十一

皮毛鬚髮肌肉筋骨四肢二陰

二十三

厥逆 二十九

攣三十二

抽搐 即癆癰

三十三

顫振 三十四

脚氣 酒風脚 腿腕瘡

腳眼注孔

三十五

赤白濁 三十八

遺精 四十

陰痿 四十三

陰縮陰縱 四十四

疝木腎 小腸氣

膀胱氣 偏墜

莖囊痔

脫肛 五十

穀道疼痛 五十一

怒 五十一

太息五十二

喜笑不休五十二

悲五十二

驚五十三

悸即怔忡五十四

恐五十五

健忘五十六

煩躁五十

嘈雜五十八

不得臥五十九

多臥五十九

狂癲癇六十

卷五

四診

一望色

察面

察目四

察耳五

察鼻五

察唇齒六

察舌七

察身九

察手足十

一聞聲十一

一問証

問寒熱十二

問頭身十三

問飲食十六

問二便十七

問汗液及血十八

問晝夜輕重十九

問証見先後十九

問七情十九

一切脈

脈之部位二十

脈之形體二十五

脈之行動二十八

脈之歇止三十一

脈配四時五藏三十二

脈無胃氣則死三十五

各脈主病三十七

人迎氣口四十六

男女脈同異四十六

胎孕脈四十七

脈有順逆四十八

脈証從舍五十一

南北政辨五十一

奇經切法五十二

附藥只堂診病單五十四

卷六

門目

方目

諸方上

補遺

卷七

門目

方目

諸方下

方後附錄七方

十劑

服藥法則

煎藥用水歌

醫編卷之一

南海何夢瑤報之輯

松江李林馥啟賢氏重校

雜症

藏府說

喉在咽前其系堅空連接肺本為氣息之路呼吸出入由肺橐籥肺居胸上覆諸藏府故稱華蓋虛如蜂窠下無透竅吸氣則滿呼氣則虛肺氣上通鼻竅故謂肺開竅於鼻也肺下為心心有系絡上系於肺心中有竅與肺不同心氣上通於舌故謂心開竅于舌按舌之腠理即竅也此病式註云舌知味不可云無竅但細微不似耳目等藏之大耳故守真曰立微府也藏府皮毛骨肉筋膜無處不有乃氣出入升降之門路以此推之則心竅在舌心外有心包絡卽膻中也形如仰盂以包裹此心使邪不能犯犯者包絡當之若犯至心卽死矣脾胃肝胆腎膀胱各有一系系于包絡之旁以通于心此三者皆在膈上膈者隔也有膜與脊脇周迴相着遮藏膈下濁氣使不得上熏心肺膈膜之下為肝肝氣上通于目故謂肝開竅于目肝葉中有胆胆中有汁藏而不瀉以上肺心心包絡肝胆皆從喉之一路而下者也咽在喉後咽系柔空下接胃本為飲食之路水穀由此入胃與喉之氣道不相犯蓋喉竅有一會膚忽開食錯入喉喉不容物遂嗆而出矣胃在膈膜之下其上之左有脾形如刀

鑊能動而磨食使消化脾氣上通于口故謂脾開竅于口也胃之下口連小腸小腸

後附脊膂前附臍之上左環周迴疊積共二十六曲小腸之下口左接大腸

亦名迴腸當臍左

迴周疊積亦盤十六曲其下為廣腸附脊左環疊積其下名直腸出肛門為糞

道廣腸即大腸下節之更大者直腸又廣腸之末節耳

廣腸之左側為膀胱膀胱上無竅止有下口出尿飲食

入胃得脾消運其精華之氣上升于肺肺布之周身以充血液其餘下入小腸小腸受三焦之氣化泌別清濁糟粕趨大腸以出水飲滲入膀胱小腸與膀胱雖皆無竅相通而得氣運化腠理

可以滲產

為尿以出此全賴三焦氣化施行若氣不施化則閉塞不通而病矣已上脾胃小

腸大腸膀胱皆從咽之路而下者也腎有兩形如豆左右相對而附于脊各有二系上系于心下系于脊腎氣上通于耳故謂腎開竅于耳也心肺脾肝腎為

五藏藏者藏也所藏惟精氣藏而不瀉者也胆胃大小腸膀胱為府府如庫之貯物

胆所貯者汁亦藏而不瀉也餘所貯者水穀則瀉而不藏雖有瀉不瀉之殊而均有

所貯則均謂之府俱但所貯者乃精汁與水穀之滓穢不同故胆獨名為清淨之府

也心屬火腎屬水肝屬木肺屬金脾屬土而小腸與心經脈相連故從心屬火膀胱

與腎經脈相連故從腎屬水膽與肝經脈相連故從肝屬木大腸與肺經脈相連故

從肺屬金胃與脾經脈相連故從脾屬土而藏屬陰則配乙丁己癸辛之陰干故肝稱乙木心稱丁火脾稱己土腎稱癸水肺稱辛金府為陽則配甲丙戊庚壬之陽干

故胆稱甲木大小腸稱丙火胃稱戊土大腸稱庚金膀胱稱壬水也五藏五府兩其五行而為十干止矣而益以心包絡與三焦為十二何也此千古所未明而不可不言者說見後篇

心包絡三焦說

心包絡難經謂其無形然考內經論十二官無心包絡之名而有膻中之號蓋膻中乃心之窩心藏窩中若包裹然則膻中固卽心包絡非無形也三焦經謂上焦如霧
上焦膈已上也清陽之分其氣如霧中焦如漚中焦隔下膈上也穀之區停留如漚水下焦如瀆下焦膈已下也便溺所出如決瀆亦未言其形狀論者皆紛紛如捕風捉影毫無實指惟張景岳謂卽腔子藏府如物腔子如囊之括物人但知物之為物而不知囊之亦為一物其說甚通古謂三焦有名無形者蓋指腔子內焦火氣遊行之處也

予因是而思人之藏府止有十而以心為君餘為臣三焦卽腔子竊謂焦當作推人身脊骨二十一椎上焦乃上七椎中焦乃中七椎下焦乃下七椎也椎別作焦耳觀靈樞背輪篇五七九十一十四名推俱作焦可見如京城君臣所同居心包絡卽膻中如宮城君所獨居也宮城在內京城在外內為陰外為陽故三焦亦稱府而心包絡亦稱藏耳三焦既卽腔子則為有形有形則有經脉凡腔子中之經脉但不分地立名難于指稱故將其與各藏府絡系者分屬所絡系之藏府名曰某藏某府經脉而以其無所系屬者名三焦經脉猶之九州之地皆王土而除分封諸侯外餘為王畿耳心包經脉亦三焦經脉之絡系于胎中者所分

屬為十二經也

奇經八脉亦即三焦經脈另立名目
分出如王畿內有公卿大夫采地也

五藏配五行八卦說

心肺位居膈上而肺尤高天之分也故屬乾金肝腎位下而腎尤下為黃泉之分故屬坎水坎外陰而內陽陽氣潛藏于黃泉之中靜極復動故冬至而一陽生驚蟄而雷出于地腎水得命門之火所蒸化氣以上肝受之而升騰故肝子時為春子象為木子卦為震雷巽風肝之怒而氣盛如之陽氣上升至心而盛陽盛則為火故心屬火於卦為離離南方之卦也聖人向明而治心居肺下乾卦之九五也實為君主神明出焉離乾中畫之變也兌乾上畫之變也肺居心上乾之上畫也上畫變而為兌於時為秋子象為金金性況降秋氣歛肅陽氣升極而降由肺而降故肺又屬兌金心火上炎腎水上涸坎離之定位也火在上而下降水在下而上升坎離之交媾也腎水上升由肝木脾之汲引地道左旋而上于天也心火下降由肺金之斂抑天地右旋而入于地也脾藏居中為上下升降之樞紐飲食入胃脾為行運其氣于上下內外猶土之布化于四時故屬土子卦為坤為艮金木土皆配兩卦而水火各主一卦故五行惟水火之用為獨專也

水火說

男女媾精以成胎精卽水也精中之氣卽火也水火精氣妙合而凝是為胎元精以成形氣以成神以其原於父母故曰先天然五官百骸皆本此精以為質而無非此

水所灌充也呼吸運動皆本此氣以為機而無非此火所流行也其獨指腎為先天者則以精氣先結胞胎中起一莖形如蓮蓋一莖卽臍蒂也蓮蓋卽兩腎也兩腎為水命門之火寓焉一陽藏於二陰之中於卦為坎以藏府之始結在此故獨以腎中水火為先天也先天水足則兌肥盛而潤澤火足則兌強健而精明水得火則氣常溫而不至於寒火得水則形常潤而不至於槁苟先天水火一有偏勝則稟受失其中和而後天培養之功為不可少矣人生一日不再食則飢故有資于飲食則飢故司之胃主進納脾主運化飲食之氣味精華由脾胃以灌輸周身氣日盛而體日充先天之水火賴此滋養以生生不息故以脾胃為後天之本也總之人身中潤澤之氣卽水也溫煖之氣卽火也一有偏勝其致自飲食者調之甚易其稟於胎氣者治之甚難故先天為重然不以畏難而廢治全賴飲食以救弊補偏故後天為要也火根于腎而屬諸心何也曰腎于卦為坎於令為冬於位為北本水之宅也而陽根于陰則火生焉下潛而上升心于卦為離于令為夏于位為南則火之宅也至其宅而後旺故從其旺而屬之心也其曰心為君火腎為相火又曰君火以明相火以位何也曰君者主也向明以治心為一身之主神明出焉故稱君相者竭其才能以奉君出治者也腎位于下輸其火于心以為神明之用猶相臣竭其才力以奉君出治故稱相位以職掌言明以功能言也火者人身溫和之氣也五藏六府皆有此溫和

之氣各歸其部則各有其位各効其能則各有其明腎中相火非無明也陽方潛藏光未被乎四表職司封蟄龍不離乎深淵非不言明而言位失其位則有飛揚僭越之患矣心中君火非無位也君主無為不與臣下較職守神明有覺獨從方寸著虛靈故不言位而言明也失其明則有昏惑晦昧之憂矣然則君火相火皆吾身陽和之正氣而不可無者而或指之為邪謂君火可直折相火不可直折何也曰失其正則為邪失其和則為熱故謂君相火為邪火者乃指君火相火之邪熱者言非君火相火之本為邪也直折猶云正治治熱以寒治之正也君火屬心居于上焦其病無與于下無與于下則根本之真陽無恙特炎于上者過乎赫曦故可以寒治涼治其有餘之邪使歸于正無所損於水原也若腎中相火居于下焦病則必干乎上無論下焦為寒為熱固上僭寒亦上浮蓋腎中水火同根本無偏勝若熱盛而水虧則火必致上炎寒甚而火虛亦必火因寒逼不安其宅而上浮也故言相火為病者乃因其在上之熱而直探其在下之根言之病既根于下則不可以治上者治之矣何也火虛而治以寒涼是益助其下焦之寒火愈被逼而上浮矣且為寒所逼之火本無根之殘燄而又以寒折之有不消滅者乎水虛而火炎若無妨于寒涼不知火炎本乎水虛不用平潤之劑以補水而徒用苦寒以制火是何異因金銀之缺少而鑿平馬以相致併傷其火而後已故曰不可直折也相火靜而藏則屬腎動而

發則屬肝胆此火布濩于二焦而心包絡為三焦之藏若肝之配胆故又曰肝胆三焦心包絡相火也

命門說

難經謂腎有兩枚非皆腎也左為腎屬水右為命門屬火後人非之謂兩腎皆屬水命門在兩腎之中當脊骨自上數下第十四椎陷中若自下數上則為第七椎正與臍對引內經鬲首之上中有父母謂心七節即第七椎之旁中有小心為証謂兩腎在七節之旁兩腎中間即七節之陷中也小心即命門醫貫又以中字為解以太極形容謂一中分太極中篆作一○太極也一分太極為○者一象人之脊骨○象人之兩腎兩腎○相合仍為一太極○其中空白處象命門又兩腎既分為兩儀則左腎為陰水右腎為陽水陽水者氣之液也坎水也坎以一陽陷於二陰水氣潛行地中為萬物受命根本月令于仲秋云殺氣始盛陽氣衰水始涸是水之涸地之死也于仲冬云水泉動是月一陽生是水之動地之生也陰水者形也兑澤也一陰上徹二陽之上兑以有形之水普施萬物下降為資生之利澤其說甚有理然與難經所言大致亦自無殊蓋皆言腎雖屬水而水中有火耳所用補火之藥總屬一樣豈有分別此味則入右腎六味則入七節憂其岐誤致煩辨正哉至趙氏謂命火乃先天之元陽腎水乃先天之元陰為生命之根本治病必須求本故凡寒之不寒用寒藥以

退是無水也無水者壯水之主主水者腎以制陽光當主六味丸熟之不熱是無火也無火者益火之原以消陰翳當主八味丸並見虛損遵其說而用之敗証効誠如神若初起而遽以此投之則謬矣何則初病止傷其後天之血氣未遽累及先天之水火故但熟之則寒消寒之則熱退隨手立應何必他求乃不去其邪而遽補其正有不遷延時日坐失事機者哉何今之為醫者泥于醫貫之說不論新病久病非六味則八味非補中見氣則歸脾見血竟若歷古方書皆可刪却亦惑之甚矣或問氣卽火也血卽水也兒在胎中氣血已具是氣血亦先天所生六味補水八味補火是水火亦後天所養今謂氣血為後天水火為先天毋乃輕氣血而重水火乎曰氣血者水火之大綱也人身呼吸運動知覺神明皆此火之為之也氣可以言呼吸運動不可以言知覺神明是氣雖卽火而不足以盡火人身之血液精髓皆此水之為之也血特水中之赤者耳不可以概其餘故血雖卽水而不足以盡水有生之初胎孕始結形如露珠父母之精氣也是水火乃先天之先天數月形成而後血氣具是血氣為先天之後天若夫既生之後飲食所長養之氣血其為後天又不待言矣此水火氣血後天之分如此先天實為後天之根故水火為氣血之原而下焦又為中土之根故腎命為水火之本其輕重之分固不能以無別也先天水火又互相為根卽嘘氣成水陰根於陽也蒸水成氣陽根于陰也

五藏生剋須實從氣機病情講明若徒作五行套語茫然不知的寔多致錯誤今略著其概如左 飲食入胃脾為運行其精英之氣雖曰周布諸藏實先上輸于肺

土氣親也肺先受其益是為脾土生肺金肺受脾之益則氣愈旺化水下降澤及百體是為

肺金生腎水腎受肺之生則水愈足為命門之火所蒸化氣上升肝先受其益是為腎水生肝木肝受腎之益則氣愈旺上資心陽發為光明是為肝木生心火脾之所以能運化飲食者氣也氣寒則凝滯而不行得心火以溫之乃健運而不息是為心火生脾土此五藏相生之氣機也肺在心上心火上炎肺受其傷此為心火剋肺金也若由脾胃積熱或由肝腎相火或由本經鬱熱皆與心無涉腎陰太盛寒氣上沖心為之悸或腎寒甚而逼其龍火上乘心為之煩皆腎水剋心火也若飲食過多停畜不行心火被逼不安而悸者與腎無涉脾氣過燥則腎水為其所涸而失潤或過濕則腎水為其所壅而不流皆脾土剋腎水也若他藏之燥外感之濕與脾無涉肝木疏泄太過則脾胃因之而氣虛或肝氣鬱結太甚則脾胃因之而氣滯皆肝木剋脾土也若自致耗散自致凝滯及由他藏府所致者與肝無涉氣有降則有升無降則無升純降則不升何則濁陰從肺右降則胸中曠若太虛無有窒塞清陽則以從肝左升是謂有降有升若濁陰壅塞胸中不肯下降則肝氣被遏欲升不能是謂無降無升

東垣謂食墳太陰為金剋

肺金肅斂太過有秋無春是謂純降不升無降無

升純降不升皆肺金剋肝木也若肝木自沉或因他藏之寒鬱與肺無涉此五藏相
剋之病情也不足則欲其生太過則欲其剋故木疏土而脾滯以行金得火而肺寒
以解腎得脾之健運而水無泛濫之虞肝得金之斂抑而木無疏散之患人但知生
之為生而不知剋之為生心火偏勝則剋肺金若腎水充足則火有所制不但不
剋金且溫脾以生金餘藏同此論之此平人之無病寔由五藏互相剋制故不致偏
勝為災即經所謂亢則害害亢太盛也承乃制承父火來剋金水乃制之也刑生化受
水制則不特不剋金且益土以生金化猶生也
若已病之人則火盛者不但刑金且復涸水肝脾皆被焚灼
矣不治之而治其自然承制有此理乎乃醫者見其熱極血瘀而舌黑也熱伏于內
而外寒慄也謂黑為水色寒慄為水象是火極而反兼水化乃金之子水為母報火
之仇卽承制亢害之理其說雖本前人終久的當醫賁曰人皆曰水剋火予獨曰
水養火蓋水剋火者後天有形之水火也水養火者先天無形之水火也火互相水
為根故水養火如燈得油而愈明也人皆曰金生水予獨曰水生金蓋肺氣夜臥則歸藏于腎水之中
腎中火炎則金為火刑而不能歸無火則水冷金寒亦不能歸凡氣從腰下逆奔而
上者腎虛不能納氣還元也毋徒治肺或壯水之主此卽承制之理腎水心火一也或益火之元所謂謂火生土土生火
水冷金寒用丙丁也卽化生之理金向水中生矣人皆曰土剋水予獨于水中補土八味丸從
水中補火以蒸腐水穀是也尋常土寒止須補脾胃之陽若命門火衰猶金底無薪必須八味丸人皆曰木剋土予獨

升木以培土蓋木者春生之氣也與胃氣同出異名當遂其發生之性木氣升發卽
胃氣升發也及其發達既久生意已竭又當斂歸水土之中以為來春發生之本明
則金之剋木正所以斂聚其生意不使散也亦以剋為生之理焉有伐之之理此東垣脾胃論用升柴以升木氣諱
諱言之詳也王性中和有升有降雖曰本病亦卽土病故升木而愚按趙
氏之說甚有理誠能觸類引伸則五藏互相關係之故無不了然矣趙氏又論五行
各有五其說頗鑿未甚的當予謂五藏無一藏無血液是皆有水也無一藏無氣是
皆有火也無一藏不發生是皆有木也無一藏不藏斂是皆有金也有氣有血有發
有斂是無一藏不平和則皆有土也知五藏各具五行則其互相關涉之故愈推愈
覺無窮而生剋之妙不愈可見哉

五邪說

五藏互相關涉則五藏皆得為一藏之病故有本藏自病者有他藏傳來者何以別
之以証之先後見者別之如止見腰熱足心熱尺脉沉數是腎水虛而熱也若先見
目赤脇痛左關脉數而後見前脉証是子病及母也若先見咳嗽喘滿右寸脉數而
後見前脉証是母病及子也若先見腹痛肚熱大便祕結右關脉數而後見前脉証
是夫病傳妻也若先見心煩舌赤小便赤澑左寸脉數而後見前脉証是妻病傳夫
也他藏倣此 難經論五邪謂假令心病因傷暑得之為正邪暑屬心火本經自病因中風得

之為虛邪乃從後來者也後心病自肝傳來故曰從後來也因飲食勞倦得之謂寢
邪從前來者也因傷寒猶言因受寒得之為微邪從所勝來者也因中濕難經以濕屬腎
以濕即水也

得之為賊邪從所不勝來者也脉訣又以脉言之謂心火當夏令時反見肝脉為虛
邪虛則補其母難愈反見脾脉為實邪實則瀉其子易愈反見肺脉為微邪雖不治
自愈蓋以夏令心火當權脉應洪大今猶見春脉是至而不至不得乘時正位為火
氣不足故見傷風餐泄之証須用辛溫之品以補肝使木氣上升以生火而補正難
于速效也又脾脉未見長夏而先見為土氣有餘故見飲食停滯大便燥結等症須
用苦寒以瀉其子一瀉而邪卽去易于為力也又火令當權金偶來乘立即避去不
逐自退如夏月偶然感寒咳嗽卽不發表而暑月多汗邪隨汗散不藥而愈矣然脉
訣又謂春得脾而難療冬見心而不治反以微邪為可畏者何也解者謂本脉得合而
兼帶妻脉則為微邪不治自愈如夏令見洪脉畧帶濁也若本脉全無而獨見妻脉此則不可以
微邪論也如夏令脉濁而不洪是全見妻脉也恐金生水來剋火故不治當細察之

十二經配三陽三陰說

心經脉名手少陰經小腸經脉名手太陽經肺經脈名手太陰經大腸經脉名手陽
明經心色絡經脉名手厥陰經三焦經脉名手少陽經以各脉俱行乎手故言手以
別于足經也腎經脉名足少陰經膀胱經脉名足太陽經脾經脉名足太陰經胃經

脉名足陽明經肝經脈名足厥陰經胆經脈名足少陽經以各經俱行於足故言足以別于手經也陰陽之分則從其所系之藏府而命之耳然太陽少陽太陰少陰四象也四象之外又增陽明厥陰名色非蛇足乎則何不直以心經大腸經等稱稱之之為得乎又內經嘗以厥陰為一陰少陰為二陰太陰為三陰少陽為一陽陽明為二陽太陽為三陽矣則又何不以一陰二陰等稱稱之乎竊謂五藏配五行六經配六爻三陰經坤之三輩也三陽經乾之三畫也以一二三為序命之似為妥當而必立此太少厥等名色且泥此生解支離牽強無當病情千古相沿不改此莊生所謂呼牛者姑應以牛呼馬姑應以馬耳

六氣說

六氣風熱暑濕燥寒也風屬木暑熱皆屬火而分熱為君火暑為相火此與心為君火脅為相火濕屬土燥屬金寒屬水此內經之說也夫四時之氣春則溫夏則熱秋則涼冬則寒然溫熱蒸而為濕涼寒肅而為燥此四氣之外又添燥濕二氣也濕極于夏燥始于秋故繫濕于長夏繫燥于秋一以終言一以始言乃互文以見意非謂春無濕而冬無燥也又四時皆有風而屬巽木故繫之春豈夏秋冬無風乎不言溫涼者以寒熱為舉隅非謂春必當以風易溫秋必當以燥易涼也此等最宜活看倘若執運氣之說則于理難通矣何則陰陽水火相為對待本無偏勝故四序不愆若泥分大

寒立春雨水驚蟄屬風木則混冬月之節令入于春矣分春分清明穀雨立夏屬熱火小滿芒種夏至小暑屬暑火則春夏混亂火令過多矣分大暑立秋處暑白露屬濕土則秋氣反多于夏而上為失位矣九秋皆屬燥氣而割三節以與相反之濕止存秋分寒露霜降三節反取立冬一節以益之牽混破碎節序皆愆尚可信乎雖云陽有餘陰不足亦何至火二而水一因分火為熱暑二氣以致此盈彼縮而四序皆愆亦何為乎竊謂溫涼寒熱四氣分布四時鐵板不易燥濕二氣皆屬之土有寒濕有熱濕有寒燥有熱燥分布四季月辰戌為濕土溫熱之所蒸也戊丑為燥土寒涼之所肅也是為熱濕寒燥又火在地中而土燥坤土次于離火之後是也水在地中而土濕艮土次于坎水之後是也是為熱燥寒濕蓋土德兼該有如是也風則無時不有而秋冬更為凜冽合之為七氣夫何家可之有哉昔人謂內經非岐黃書乃後人之假託要未必出行一手故有醇有疵分別觀之可耳

六氣後論

有在天之六氣有在人之六氣上篇所言天之六氣也此篇所言人身之六氣也經曰人身之氣以天地之疾風名之是人身之氣可名之為風也各藏府皆有氣皆可名風而屬之肝者以風為動物肝主動也經曰在天為風在地為木在人則為肝故古人於肝或名之為木或名之為風凡醫書中所言風証作外感風寒者不合者作

肝氣者則合初學之士不可不知也若誤作外邪治妄行發散則非矣然內風亦有當發散者以肝氣鬱抑於中則與之升發或服藥後溫覆以取微汗令之外發或但服藥令之內升不用溫覆取汗酌之可也外感之風多屬寒雖夏月得風亦涼可見也內生之風則多屬熱何者人身之氣有寒有熱氣寒則微氣熱則盛盛則鼓盪飄忽而風生焉所謂熱極生風又謂風從火斷汗之宜也風既為熱氣所生則其氣必熱而亦有寒者以火氣暴盛者元氣被其冲激煽而為風風動而生涼也驗之焚燎火起則風發風即虛空之氣耳不煽不動火之冲氣與用扇煽之無異也火習習生涼可見故丹溪謂寒氣自下上冲為火卽此義也火在天為熱氣經以屬之春分後四氣暑氣經以屬之小滿後四氣在地為五行之火在人身為君相之火已詳水火論濕在天為濕氣在地為土在人為脾胃故古人言脾胃往往以土名之或以濕名之然脾胃居中兼該六氣六氣皆能為之病不獨生濕惡濕也燥在天為清氣在地為金在人為肺故古人言肺往往以全名之以燥名之而或主寒燥言或主熱燥言則當細與辨別庶不致錯誤寒在天為寒氣在地為水在人為腎故古人言腎往往以水名之以寒名之經曰冬傷于寒寒字卽腎字之替身非言時令之寒也人身六氣為病有自生者有與天之六氣相感應而生者故外感內傷大端最宜分晰也

運氣之說拘牽不通固為有識者所不信然其大指在詳舉六氣有許多變幻寒中有熱熱中有寒邪正交錯番變紛紜莫可紀極一以明人之病源一以例人之病情耳明人之病源者言人感六氣而生病欲人細推所感之氣其中有無夾雜也氣當兼治也例人之病情者天地之氣變幻無定則人身之氣亦變幻無定而病情不可以一律拘也如冬月固屬寒氣司令然亦有客熱加臨故冬亦有溫時所謂非時之暖也人于冬月病外感則未知為感寒而病歟抑感非時之溫而病歟是其源所當察也寒氣在上則陽伏地中故土上凜冽而井泉溫緩以驗人身則外感于寒而內鬱為熱也是其情之有可例也此言運氣者之大指取其大者略其煩碎棄其紕謬而實實體驗于人身是在善讀書者耳

虛實寒熱說

虛者正虛也謂其人氣血虛衰也實者邪實也一切內外寒熱諸邪不論有形無形但着滯為患亟宜消散者皆為是邪非謂其人氣血壯實也故曰虛中有實實中有虛所謂正自虛而邪自實也虛而不實者止用補虛而實者必攻補兼施若實而不虛則直攻之而已如虛人傷食輕則於補劑中加消導之品重則加下利之藥頃刻收功矣庸醫乃謂須與純補俟其氣旺則食自運行遷延時日坐失事機往往變生他証卽幸而奏效病者受苦久矣未有久苦於病而元氣下傷者也名曰補之實以傷之亦何為哉有虛寒有實寒如多食生冷及寒痰停滯之類

有虛熱有寔熱知寔熱而不知虛熱與知虛寒而不知寔寒皆庸醫也

補瀉論

瀉此即補彼如瀉火即補水是如瀉火即補水故瀉即補也補即瀉也寒以補陰故

驅寒

故瀉

即補

也

夏月飲水熱以補陽故冬日飲湯必以溫熱為補涼為瀉者謬也

張子和謂良

工治病先治其寔後治其虛亦有不治其虛時庸工治病純補其虛不敢治其寔以爲先固其氣元氣寔邪自去不知邪之中人輕則傳久而自盡頗甚則傳久而難已

更甚則暴死補之真氣未勝邪已交馳橫驚而不可制矣惟脉虛下脫無邪無積之

人方可議補其餘有邪積之人必以吐汗下三法先攻其邪邪去而元氣自復也又

曰汗吐下以藥石草木治病者也猶君之刑罰補者以穀肉果菜養口體者也猶君

之德教故曰德教興平之梁肉刑罰治亂之藥石若人無病梁肉而已及其有病當

先誅伐病之去也梁肉補之如世已治矣刑措而不用豈可以藥石為補哉又曰胸

已土大滿大寔病如膠粥微丸微散皆兒戲也非吐病安能出又曰風寒暑濕之氣

入於皮膚之間而未深欲亟去之莫如發汗又曰人知下之為瀉而不知下之為補

陳莝去而腸胃潔病瘕盡而榮衛昌不補之中有真補者存焉又曰人之食飲酸鹹

甘苦百味皆聚於胃壅而不行蕩其舊而新之亦脾胃之所望也其言可謂名通

按子和治病不論何證皆以吐汗下三法取效此有至理存焉蓋萬病非熱則寒寒

者氣不運而滯熱者氣亦壅而不運氣不運則熱鬱疾生血停食積種種阻塞於中矣人身氣血貫通而不貴塞非三法何由通乎又去邪即所以補正邪去則正復但以平淡之飲食調之不數日而精神勃發矣故婦人不孕者此法行後即孕陰陽和暢也男子亦陽道驟興子和云病久否間忽得涌泄心腎交媾陽事必舉宜切戒房室非其明驗乎丹溪倒倉法寔於此得悟後人不明其理而不敢用但以溫補為穩殺人如麻可歎也

反治論

以熱治寒以寒治熱謂之正治又謂之逆治逆也以熱治熱以寒治寒謂之反治又謂之從治從其性也而有真反假反之分假反者如熱邪內陷陽氣不達于外故身冷肢厥戰慄惡寒以大承氣湯下之而愈不識者見其外證似寒用寒訝其相反識者謂其內證真熱用寒寔為正治乃假反而非真反也真反者如風火暴盛痰涎上湧閉塞咽喉非辛熱之品不能開啟不得已暫用星半烏附巴豆等熱藥是則真反也又有寒熱並用者因其人寒熱之邪夾雜于內不得不用寒熱夾雜之劑古人每多如此昧者嘗為雜亂乃無識也然亦有純寒而于熱劑中少加寒品純熱而於寒劑中少加熱藥者此則名為反佐以純熱證雖宜用純寒然慮火因寒鬱則不得不于寒劑中少佐辛熱之品以行散之庶免凝閉鬱遏之患寒藥熱服此意也純寒證雖宜用純熱然慮熱性上升不肯下降則不得不于熱劑中少佐辛熱之品以引熱藥下行如

胆汁童便入熱藥中引入肝腎此反佐之義也。知此諸義則上病取下矣。由肺火上之類又熱藥寒服亦此意也。
下虛濕陰下病取上如小便不攝由肺氣而左病取右右病取左如左半身疾渴不遂由大自降則治右之大欲升先降濁降而後清可得而升如水停氣不化津氣逼注使然氣而左自寬欲升先降而渴用五苓去水升清則津生渴止是也。欲降先升如小便吐法欲行先止如氣虛散漫不能運行須先收斂其氣凝聚不散盛則自違所謂塞因塞用也。欲止先行如食積治用承氣去用等法皆觸類貫通矣。

標本說

標本中氣之說出于內經有謂天之六氣為本人之六經為標經之相為表裏者為中氣所謂少陽之上火氣治之中見厥陰天在人上故曰上言少陽感天之火氣而兼見厥陰證陽明之上燥氣治之中見太陰太陽之上寒氣治之中見少陰厥陰之上風氣治之中見少陽少陰之上熱氣治之中見太陽太陰之上濕氣治之中見陽明是也。有謂人之藏府為本六經為標藏府之相為表裏者為中氣如胃為本足陽明經為標脾為中氣脾為本足太陰經為標胃為中氣是也。有謂病之先受者為本病之後變者為標如病本於傷食因而證見吐瀉是也。又此藏此經先病後乃轉屬他藏他經者是也。經謂病有生於本者有生於標者有生於中氣者有在標而求之於標在本而求之於本有在本而求之於標在標而求之於本先病而後逆者氣血之逆而致病先逆而後病者先寒或熱而後病者先病而後寒或熱者先病而後泄者

先泄而後病者皆治其本惟先熱而後生中滿先病而後生中滿及大小便不利者
 皆治其標中滿指脹極肚腹欲裂者言大小便不利指點滴不通者言井膚危急之候故先治標十按中風寒涎壅氣不通則死急用三生飲稀涎通關等散去其疾又吐衄餘血停瘀不得不又謂病發而有餘邪盛去痰滯亦急則治標之義也
 先治其本後治其標病發而不足正虛標而本之不足則海藏來先治其標後治標為標病傳本以傳
 其本謹察間問即論語病間曰之間者并行標本兼治也甚者獨行又謂少陽太
 陰從本少陰太陽從本從標陽明厥陰不從標本從乎中從前解者殊欠明白愚謂少陽經之屬陽者也少陽之上火氣治之火亦陽也故少陽從本為以陽從陽不言從中者中為厥陰本從火化彼反從我故不言也太陰經之屬陰者也濕亦陰氣也故太陰從本為以陰從陰不言從中者中為陽明燥從濕化亦彼反從我故不言也少陰經之屬陰者也熱氣則為陽矣太陽經之屬陽者也寒氣則屬陰矣標本異氣各能生病故或從本或從標也亦俱不言從中者少陰之中為太陽言從本之陽足以該之太陽之中為少陰言從本之陰亦足以該之至若陽明亦經之陽者也燥亦氣之屬陽者也寔非以陽從陽而不言從本者以從本一義已於少陽太陰發之而有燥從濕化者其理不可不明故特舉從中言也厥陰亦經之陰者也風亦屬之屬陽者寔非標本異氣而不言或從標或從本者以從標一義已於少陰太陽發之而從本之風則又從乎火化故不從本而從乎中也然風從火化本木同氣其理無疑

若燥濕相反其從化理似難說然觀仲景治傷寒燥渴反用五苓去濕其理可推蓋脾土之濕壅滯不行則氣化不布津液不流而胃與大腸均失其潤反成燥結固有之矣 按從中之說不過於常理之外另立一義以示本能生火濕鬱成熟之例非謂厥陰病必有陽無陰陽明病必有濕而無燥也若執泥便說不去張子和標本歌云少陽從本為相火太陰從本濕土坐厥陰從中風是家陽明從中濕是我太陽少陰標本從陰陽二氣相包裹風從火斷汗之宜燥與濕兼下之可其意蓋謂燥證當以溫潤之藥治之耳觀其治燥諸條止用硝黃不用去濕之藥不泥經語可見矣 再按少陽太陰從本此純熱無寒純寒無熱標本合一者之治例也少陰太陽從本從標此寒中有熱熱中有寒陰陽夾雜者之治例也陽明厥陰不從標本從乎中治此陽證根陰陰證根陽表裏互求者之治例也如此看較活

表裏論

以周身言則軀壳為表臟腑為裏而以軀壳言則皮膚為表骨肉為裏以臟腑言則腑為表臟為裏也以經脉言太陽陽明為表三陰為裏少陽為半表半裏而於表中又分表裏則太陽乃表之表陽明乃表之裏於裏中又分表裏則太陰為裏之表少陰為裏之中厥陰為裏之裏也故傷寒傳經之次首太陽次陽明次少陽次太陰次少陰次厥陰 按太陽之腑為膀胱陽明之府為胃二府皆貯物濡而不藏外通出

表故其經脉屬表太陰之臟脾少陰之臟腎厥陰之臟肝皆貯精藏而不瀉不能外出故其經脉屬裏少陽之腑膽所貯精汁類于物則似府也然亦藏而不瀉則又似藏故其經脉屬半表半裏此無可疑獨腎位肝下最屬深藏其經脉應為裏之裏乃反為裏之中此則不能無疑豈經脉雖連繫於藏府而其表裏層次自以其行於飢膚之淺深分不照藏府之部位為次序耶且此止言足經耳若手經之次第亦有可能而言者耶竊疑內經熱病論論傷寒傳經之次乃倣運氣厥陰為一陰少陰為二陰太陰為三陰少陽為一陽陽明為二陽太陽為三陽之說以為言然此乃言客氣之次第恐未可為病機之據也且運氣之說亦謬而不足信也

陰陽論

人身從臍中分上部為陽下部為陰面為陽背為陰左為陽右為陰表為陽裡為陰府為陽藏為陰氣為陽血為陰動為陽靜為陰語為陽默為陰寤為陽寐為陰呼為陽吸為陰魂為陽魄為陰內經言背為陽是對腹為陰說非謂背為陽而面為陰也蓋腹處下而背居上故以上者為陽下者為陰耳後人不明其說以腹字當面字看悞矣觀易卦陽盛于午陰盛于子背比也比屬陰陰靜陽動背不動屬陰明矣又溺水死者女屍必仰女人陰氣重也男屍必仆男人陽氣重也不更可驗背之屬陰面之屬陽哉夫陽盛于午陰盛于子此面陽背陰之義也由復至乾左升為陽由姤至

坤右降為陰此左陽右陰之義也陽主氣陰主血陽大而陰小乃丹溪謂左半血多右半氣多人右手足大于左手足何也曰左右陰陽對待本甚均平無偏多偏少然雖屬陽而陰反盛右雖屬陰而陽反強固可見矣又何疑于左半身血多右半身氣多右手足之大于左手足乎醫貫謂冬至一陽生當漸向陽伏于下逼陰于上故井水寒而雷電合可以互證

醫貫謂冬至一陽生當漸向陽于下逼陰于上故井水寒而雷電合可以互證

一陰生當漸向清涼乃三伏溽暑酷熱反熾蓋陰于下逼陽于上故井水寒而雷電合可以互證

所謂乾柴者先灼濕者後燃也

予嘗病眼熱必右目先而甚左目後而微知左屬血火不易傷也

右屬氣濕尚易運也又嘗掩右目用左目視月則不如右目之明以右目火盛能達燭也掩左目用右目觀書則不如左目之朗以左目水盛能近鑒也然此猶各有所長也若較其強弱則右必強於左嘗吹筒弋鳥筒鳥相對若引繩以為必中也而不中知二目之力有強弱不同也因閉右目獨用左目視筒鳥如引繩乃開右目并用則大異矣是左目為右目所奪也又開左目獨用右目視筒鳥如引繩乃開左目并視其為如引繩者亦無異也是右目不為左目所奪也豈非右目強而左目弱哉故經言右耳目不如左耳目明者吾不信也府為陽藏為陰細分之則心肺處上部為陽肝腎居下部為陰又心與肺較則肺屬金為陰心屬火為陽肝與腎較腎屬水為陰肝屬木為陽又肺與肝較則肺主降為陰肝主升為陽又腎有水有火腎火為

陽腎水為陰紛紜蕃變無有定名醫書動言陰陽而不切指其為何項甚屬朦混當細分之如言陰虛則未知其言血虛耶肺虛耶腎水虛耶腎火虛之為明白也本集一一分晰之

夏月伏陰辨

丹溪謂夏月炎暑盛行人身内外皆熱其說甚的乃張景岳謂夏月伏陰人身外熱內寒冬至伏陽人身外寒內熱以夏至陰生地上熱而井水寒冬至陽生地上寒而井水溫為證其說似是而非乃知有天時而不知有地理者也人身之氣與天地通固從天時而變亦隨地勢而移既有東西南北之殊豈無上下高深之別人之身固在地上也非在地中也設夏時而身處井中則不特內寒即外亦寒也尚得如其說謂外熱內寒耶然則置身地上不特外熱即內亦熱自可反觀而見矣試觀浮瓜沉李燕水飲冰未嘗畏冷其情可見冬月能如是乎或曰夏月汗多汗多則亡陽陽亡則陰生于內謂之伏陰非歟曰夏月汗多是人皆然豈皆亡陽乎不過虛其津液耳津液虛即陰虛陰虛則陽愈熾觀小便之短而赤可知不滋金水而補火土吾見其惑也曰古人於暑證多用熱劑非歟曰此因證轉虛寒乃然不可一概混施也問夏月陽氣外泄冬月陽氣內藏非歟曰陽外泄則汗出而內涸故清潤之品為宜氣內斂則化水而陰滋故溫熱之劑可任觀夏月渴而小便短赤冬月不渴而小便清長則陽外泄者之內非冷陽內藏者之中非熱不辨自明矣

氣

營血陰有質故其行也必次第循經而入於脈道之中充於內而後達於外氣陽無形故其行也慄疾不循經而出于脈道之外寔于表而後返於裏觀內經謂飲酒者氣先行皮膚先充在外之絡脉而後滿于在內之經脈可見矣此二者之行所以有不同也經謂營氣之行寅時起由肺經而大腸胃脾心小腸膀胱腎心包三焦胆肝諸經復返于肺如是者每日五十周衛氣之行每日早至暮行陽分二十五周每周由太陽而少陽陽明足少陰復返于太陽暮至曉行陰分二十五周每周由腎而心肺肝脾復返于腎二者之行不同如此按經言營氣是言血中之氣非單言血蓋血中之氣既負血而行則亦不及衛氣之慄疾也 經言衛氣晝行陽二十五度偏也夜行陰二十五度大槩如此蓋晝則陽動而氣行于表者多夜則陰靜而氣斂于內者多非晝全不行于內夜全不行于外也至謂一晝夜必行五十周則鑿矣 氣一耳以其行于脉外則曰衛氣行于脉中則曰營氣聚于胸中則曰宗氣名雖有三氣本無二氣與血并根柢于先天而長養於後天經謂營氣出于中焦又謂心生血不過以胃受穀氣蒸化成血血色之赤稟於心火為言耳要之血即天一之水觀血味可知氣為坎中之陽同根於腎無岐出也 氣根于腎亦歸于腎故曰腎納氣其息深深喘咳不得卧肺司呼吸氣之出入于是乎主之且氣上升至肺而極升極則降由肺而降故曰肺為氣生 腎主納氣故丹田為下氣海肺為氣主故胸中為上氣海 晷水為坎中之陽所蒸則成氣上騰至肺所謂精化為氣

地氣上為雲也氣歸于肺復化為水肺布水精下輸膀胱五經并行行于經脈所謂水出高源天氣下為雨也陰陽互根于此可悟矣 腎以閉藏為職錐子半陽生而氣發淵泉機猶未暢故氣之升發不屬腎而屬肝也 藏屬腎泄屬肝升則此肝腎之分也肝主升肺主降此肺肝之分也心主動志壹則此心腎之分也而靜藏不至于枯寂動泄不致于耗散升而不致于浮越降而不至於沉陷則屬之脾中和之德之所主也然則升降動靜苟失其中雖為肝肺心腎之不職亦即脾之不職而但知氣之不升或有升無降為肝木克脾土者陋也 知各藏之病皆關於脾則知脾氣調和即各藏俱調和矣故補脾不如補腎不過舉要之詞固不若補腎不如補脾之論為得其全也 老人小兒尤以脾胃為主 經言陽之氣以天地之疾風名之又曰風氣通于肝故氣病往往稱風如肝風腸風胃風之類飲食在胃則胃寒食在腸則腸寒胃虛氣上于胃往來鼓動有聲所稱腸風胃風即此皆氣之往來鼓動若風耳非必外來之風也 已上明氣之理至其病證脈治詳下

氣之病證

內經列九氣為病一曰怒則氣上甚則嘔血暴怒傷陰隨氣逆飧泄完谷而出也怒氣上冲
鬱不運則水或血菀于上不嘔則鬱則水或血菀于上焦形氣絕卒然名薄厥薄迫也謂血氣或胸滿脹不分离也

蕩而不藏為笑不休為氣不收甚則為狂有喜極氣暴脫而死者必其人素虛氣浮

無根也所謂暴喜傷陽一曰悲則氣消心志摧抑沮喪則氣亦因之消索以怒則氣盛而

張反觀之可見悲則氣衰而斂矣為目昏悲泣多則目昏為筋攣為陰縮皆有降無升肝

為酸鼻辛頰為少氣不能報息報接意續為下血攝血也

却精精方欲化氣而上因恐則却而退下也王太僕謂恐則傷而上不下流下焦陰氣亦迴環而不散故聚而脹未安氣還下焦脹為陰痿

骨痠精時自下一曰驚則氣亂心無所倚神無所歸慮無所定為癲癇驚則神不守舍痰涎

入心為不省人事為僵仆一曰思則氣結心有所存神有所歸正氣留而不行為

不眠為中痞三焦閉塞為不嗜食為脊督為得後便即大與氣竚氣或尻氣鬱下陷之

則快然而衰氣得通而滯滅也一曰寒則氣收腠理閉氣不行上下所出水液澄澈清冷

一曰熱則氣泄腠理開汗大泄喘嘔吐酸暴迫下注所謂壯火食氣又云熱傷氣

也氣乘風則飄遇火則散火主發一曰勞則氣耗喘息汗出內外皆越精神竭絕

經曰靜則神藏躁則消亡為促乏為嗽血為腰痛骨痠為高骨壞為煎厥五心煩熱如煎熬而厥逆也男為少

精女為不月按七情皆生于心以悲則氣下故屬之肺怒則氣上故屬之肝恐則

怯而欲藏匿故屬于腎思則無所不通故屬之脾耳此義宜知

驚屬心肝氣動故風火交煽則病發驚蹶一曰清氣在下則生飧泄濁氣在上則生腹滿經謂清濁相干為亂氣水穀之清氣注五臟濁氣注六腑及清氣上升濁氣下行反之則亂也如卦畫之交於此想見霍亂情狀

如卦畫之交於此想見霍亂情狀

氣帶必痛經云諸痛皆因于氣又云氣傷痛形傷腫先痛後腫者氣傷形也先腫後痛者形傷氣也丹溪謂氣有餘便是火自覺冷氣自下而上者非真冷也火極似水耳不治其火則氣不降火極似水猶云熱證似寒氣為大所衝突飄忽若風故冷也氣本清滯而痰凝血瘀則濁矣不治其疾血則氣不行

脉

長則氣治 短則氣病 數則氣熱 遲則氣寒 大則陰傷 強則氣鬱 上盛則氣高 下盛則氣脹 滯則氣滯 衰則氣少 凡氣不舒者脉必沉

治法

結者散之鬱者達之閉者開之氣閉者無小便或兩手脉伏不見陷者舉之高者抑之浮越者鎮墜之脫者固之散者收之虛者補之瘡滿似難補然由脾虛不行正宜補脾以復其健運之職則濁氣行而痞滿自除所謂塞因塞用也熱者清之寒者溫之 其病在七情非藥可愈者以五志相勝故悲可以治怒以愴惻苦楚之言感之喜可以治悲以謔浪穀狎之言娛之恐可以治喜以迫遽死亡之言怖之怒可以治思以污辱欺罔之言觸之思可以治恐以慮彼忘此之言辱之又習可以治驚使之不驚見逸可以治勞也 大約青皮疎肝枳壳利膈香附散鬱木香舒脾厚朴散滿沉香降逆前胡下痰柴胡升清烏藥川芎紫蘇能散邪氣從汗而解橘榔大腹皮能使濁氣下行而去後重 萊菔子蘇子杏仁下氣潤燥肺氣滯子

大腸者宜之 豆蔻沉香丁香檀香辛熱能散滯氣暴鬱者宜之鬱久成火者忌用
須以薑炒山梔子佐之 已上皆治有餘氣病若兼痰火兼積滯兼血各隨症加減
調氣用木香然性溫上升若陰火上衝胸喉似氣滯而寢非氣者用之反以助火當
用黃柏知母少佐枳壳 氣虛氣滯六君子湯加益智蘇梗 血虛氣滯四物湯
覲加香附陳皮 脾陰虛氣滯六味地黃湯見虛損 加沉香石斛砂仁 腎陽虛氣滯
四逆湯見厥 加肉桂補骨脂 肥人氣滯必挾痰二陳湯見痰 加香附枳壳燥以開之甚
者加蒼朮白芥子 瘦人氣滯必挾火宜蘇子山梔歸芍降以潤之 婦人性執易
于動氣痞滿脹痛上脇心胸或攻築脇肋腹中結塊月水不調或眩暈嘔吐往來寒
熱正氣天香散四七湯酌用之 如氣不升降痰涎壅盛者蘇子降氣湯 氣不歸
元以補骨脂為主取其壯腎收濁氣歸就膀胱使化而出也或白朮亦可以其能和
胃胃和則氣自歸元此為脾腎兩虛者立法也若肺腎兩虛氣不歸元喘促不卧者
宜五味胡桃人參之類 氣鬱久則中氣傷不宜冠伐宜歸脾覲逍遙觀二方佐撫
芎香附枳壳以舒鬱胎產同法 木香流氣飲通治一切氣病利三焦通營衛達內
外腫脹喘嗽痛疼皆效 分心氣飲治七情氣滯 蘇子降氣湯治氣上逆補中益
氣湯治氣虛下陷 越鞠湯觀治氣鬱中焦

精髓血乳汗液外出為汗津出于涕_{畜于腦}出于鼻淚溺皆水也并屬於腎而血色獨紅者
血為心火之化數者色皆白乃肺氣之化也腎為陰肺為陽陽交乎陰而液以化腎
屬水心屬火水交于火而血以成以其為心火所成故經謂心生血又云血屬於心
又云心主身之血脉也 赤者心火之色心火不足則血色淡心氣虛寒則血凝而
紫黑紫黑為腎色自見無火也亦有火盛血瘀而色紫黑者總可見血之關於心張介
石曰凡身有血處觸之必痛痛屬心知而赤為火色故曰心生血又曰人身麻亦處則無血色血所不至是心所不治故不知痛痒又曰趙氏云血隨相火行故色紅非也相火居坎水中弗能自露陽為陰掩其色黑至於心火而陽老矣陰為陽閑故內暗外明其色赤血如隨相火行則必黑而不紅 汗液津淚溺皆清澈陽所生也精髓血乳涕皆稠濁陰所成也陽性速其生易故氣至而即生
如悲動則淚若湧內熱蒸騰則汗出如雨可見 陰性遲其成難故畜積而后富 細分之則精髓涕為一類
血與乳為一類而乳之成較血為易故曰血者難成而易虧髓藏而不洩涕即腦髓
其洩也以病腦熱惟精藏而能洩殊矣故精動而血靜精陽而血陰婦人之月事乃溢而
而不洩較精之藏而能洩少矣故精動而血靜精陽而血陰非施洩之謂也 而
精少血多貴賤之別也精生血死老少之分也精色白肺氣所化清陽也清陽為少火火少則生血色赤心大所成濁陽也濁陽為少火火則老 水凝為冰見曉則消血凝成塊雖煮不化水隨氣行能越於外血隨氣
行但運於中清濁陰陽氣質之分可覩矣 蓋謂血總統於心此即心生血之義矣
而曰化生於脾藏受于肝宣布于肺施洩于腎何也曰經言水穀入胃中焦受氣取

汁變化而赤為血蓋言胃中水穀之清氣藉脾運化成血故曰化生于脾然兒在胎中未嘗飲食先已有血可見血為先天之水不過藉後天為長養非全靠後天也云

脾統血者則血隨脾氣流行之義也

又經言人卧則血歸于肝蓋言人寤屬陽寐屬陰陽主外而親上

陰主內而觀下寤則血隨陽動外運而親上卧則血隨陽靜內藏而親下五藏皆在

內而肝腎居下為血之所歸藏言肝而腎可該何則肝動腎靜動者尚藏則靜者可

知故曰藏受于肝也

一說血不藏者肝之疎泄使然故以藏受責之亦通

其謂宣布于肺則血隨氣行之義耳

其謂施洩于腎則混精為血觀古人動稱父精母血可見要知是精非血不當混合

為一也 經府之血流行

藏府之血守位 已上明血之理其病證脉治詳下

血隨氣行氣寒而行遲則血滯氣熱而行駛則血涕滯

蓋血屬陰非陽不運故遇寒而凝氣屬火非火則壯

故渴而灼 滯皮膚則為痛痺凝結經絡則為疽癬瘀積腸胃則為敗腐虛寒不攝則

為脫崩沸騰上焦則為吐衄流注下焦則為便血壅塞經脈則為癰毒浮見皮膚則

為症癰而且濕盛而蒸為癟風血乾而化為癧蠱致病非一要不出寒熱二端大抵

療尚易治乾則難醫無潮熱者輕有潮熱者重

吐血

即嘔血舊分無聲曰嘔不必

吐由口出古人謂是胃府之血張景岳則謂出于口者有咽與喉之異喉為肺之上竅而兼總五藏之清道故諸藏之血皆得從清道以出于喉不獨肺也咽為胃之上

竅而兼總六府之濁道故諸府之血亦皆得由濁道以出于咽不獨胃也五藏之氣皆稟于胃則五藏之病亦皆及于胃如怒則氣逆而嘔血肝病也慾火上炎而嘔血腎病也而其血皆由胃脫以出則是出于喉者止五藏之血而出于咽者不止六府之血矣按景岳之說甚是然何以別之大抵由肝腎而出者往往傾盆而來如潮之湧此雷龍之火暴發乘胃所致肝腎胃血俱出彼時喘息不定面如醉酒心神煩亂少刻火退神清面白氣平血乃漸止若胃火自病其勢不甚暴烈所出必不若是之多也 凡血色初吐鮮紅而散少停一二時再吐則畧累而疑久而又吐則黑而結塊若吐血不停則初出者為上焦近血色鮮紅後出者為中下焦遠血其色深紅吐後未盡餘血色淡或糖色或粉紅色

欬嗽血

火刑金而肺葉乾皴則痳痒則欬此不必有痰故名乾咳咳多則肺絡傷而血出矣嗽則兼有痰痰中帶有血線亦肺絡之血也 其證有輕重但熱壅于肺者輕清火自愈久嗽肺損者重保肺為主阿膠為君白芨苡仁生地甘草枳壳橘紅貝母為丸噙化又須看痰色如瑪瑙成塊者出胃口易治若一絲一點從肺藏中來肺少血為火所逼雖少亦出漸至肺枯成癆難治 欬出白血必死血色淺紅似肉似肺者是 脉弦氣喘
欬嘶咽痛不治

咯唾血

咯與嗽為一類皆因有痰而欲出之或費力或不費力總以出痰為主非欲出其血也因值其失血故血隨痰出耳唾與吐為一類此則因血而然緣血為火所湧上升出自咽喉多則吐少則唾并不費力皆係純血無痰涎夾雜嘔唾既為一類吐不定屬胃唾獨必屬腎乎古謂唾血屬腎者因經論五液謂腎主唾水泛于泥也咯既與嗽為一類舊分嗽屬肺咯屬腎亦非腎肺上入肺中病則俱病腎亦有嗽肺亦有咯也然則何以別之曰血證由於火驚則火起於心怒則火起於肝悲傷火起于肺思慮火起于脾房勞火起于腎審察病因自見言不能盡也張景岳謂失血證凡見喘滿欬嗽及胸膈左右背隱隱脹痛者此病在肺也若胸膈膻中間覺有牽痛如縷如絲或懊憹嘈雜不可名狀者此病在心包絡也若胸腹膨脹不知飢飽飲食無味多涎沫者此病在脾也若兩脇肋牽痛或多怒鬱往來寒熱者此病在肝也若氣短似喘散哩不出骨蒸盜汗咽喉痛動氣上衝者此病在肺也若大嘔大吐煩渴頭痛大熱不卧者此病在胃也若有兼證則病不止在一藏肺病宜清降不宜升浮心主病宜養營不宜耗散脾病宜溫中不宜酸寒肝病或宜疏利或宜甘緩不宜秘滯腎病宜壯水宜滋陰不宜香燥尪弱胃病或宜大瀉或宜大補當察虛實

鼻衄

衄行清道經藏之血也多由督脉而上出經藏之氣通于鼻故其血之溢者亦出于
鼻張景岳曰凡鼻衄必自山根以上晴明之次而來而晴明一穴乃小腸膀胱胃陰
陽蹻五經之會皆能為衄又衝脉為十二經之血海其上俞出膀胱經之大杼下
俞出胃經之氣街膀胱胃二經血至則衝脉之血亦至而十二經之血無不至矣所
以血衄之微者不過一經之近甚者通身之血盡出蓋謂衄出于肺豈有然哉 準
繩云鼻通于腦血上溢于腦所以從鼻而出宜茅花湯調止衄散 嵩厓云不甚者
以水紙搭鼻衝或以涼水拊項後即止甚者犀角地黃湯對症之藥又黃芩白芨各
二兩水丸治久衄神效附角下人腎由督脈上通鼻腦故也胃衄者亦可用以胃脈
上入鼻也故火鬱陽明致衄者無犀角以斗木代之以升

麻陽明
藥也

齒衄

此胃大腸腎三經之病蓋大腸脉入下齒中胃脉入上齒中而腎主骨齒為骨之餘
也胃火盛則血出如湧而齒不動搖或見口臭牙齦腐爛腫痛此濃酒厚味所致宜
清胃火便結可下之若口不臭牙不痛但齒動不堅或微痛不甚而牙縫時多出血
者此腎陰虛火動而然宜滋腎水六味丸見虛損主之若腎火虛而上浮者八味丸見虛

加童便調下去黑糞而愈緣陽明熱盛衝任二脉皆附陽明故血如潮湧若腎虛血必點滴而出齒亦悠悠而疼必不如此暴且甚也

舌衄

舌上無故忽出血線此心脾腎諸經之火所致皆及舌槐花炒研末繆之或蒲黃繩云文蛤散治熱壅舌出血如泉五倍子白膠香牡蠣粉等分為末每月少許繆患處又云肝壅則舌血上湧服清肝之藥

按肝脈絡于舌本

耳衄

耳中出血也小腸三焦胆各脈俱入耳中又耳屬腎諸經皆足為病龍骨末吹入即止若左關脉弦洪柴胡清肝散尺脉或躁或弱六味地黃丸

見虛攏

肌衄

血自毛孔中出曰血汗又名脈益心主血脉極虛有火則見脈益湯人參黃芪當歸伏神麥冬石蓮珠砂薑汁生地

益疑

九竅出血

耳目口鼻一齊出血藥不及煎死在須臾先將水當面噴幾口急分開頭髮用粗紙數層蘸醋令透搭在頤門血即止次用當歸一兩煎好磨沉降香各五錢加童便服或瞿麥飲瞿麥生薑枝子燈心炙草棗再用髮灰二錢茅根車前草煎湯下之血自

歸經然後以四物加人參五味丸服可收萬全之功 九竅出血兼身熱不能卧者死惟婦人產後瘀血妄行九竅出血有用逐瘀之藥而生者若無故卒然暴厥九竅出血者死久病之人忽然上下出血亦死

搔癢出血

搔癢血出不止糞桶羈燒灰敷之 吕元齋治一僧搔胸中癢出血如湧泉竟日不止營氣暴衰止餘尺脉如絲與四神湯加荆芥穗防風晨夜併進明日脉漸出版十全大補見虛而愈

便血

分腸風藏毒二證三因諸邪皆致便血 腸風者或風邪外感或肝風內生風熱相合侵犯經絡血脉被阻漏出經絡之外滲入腸胃之中從大便出隨感隨見血清色鮮者是槐花湯加羌防秦艽羌防非外風亦可升陽燥濕按內風即氣也氣不順亦可用之 腸毒者濕與熱合蘊積日久傷損陰絡血滲腸胃積久乃下其色黯濁者是槐花湯加炒苦棟炒蒼朮 下腹中痛血色鮮為熱毒芍藥黃連湯主之不痛血色不鮮或紫黑如豆汁為濕毒黃連湯主之 先血而後糞近血也出于大腸槐花條芩烏藥先糞而後血遠血也出胃與小腸石膏山枝烏藥又結陰便血內經結陰者便血一升再 結二升三升下純是血經不言何邪所結景岳謂風寒之邪留結血分所致宜灸中

脫氣海三里以散風邪服平胃地榆湯以溫散之亦舉隅之論也。下血太甚人參升麻牡蠣栗壳。瘀血不可止待色鮮紅略加瀆藥椿皮烏梅最妙。用涼寒藥須酒煮或炒恐血凝便血日久服涼藥不應宜升補升陽除濕和血湯有熱略加黃連以吳萸泡水妙用虛加人參。此病多食乾柿或生柿最效。腸風臟毒結陰并血出腸中與五痔之血出于漏孔者不同亦與赤痢有異。

漫血

痛者為血淋見淋症門不痛者為溺血不論何臟之血但損傷妄行皆得滲入膀胱與尿同出蓋不上行則下趨可以滲入腸胃亦可滲入尿泡此準繩謂漫血淋血便血三者雖前後陰不同而受病則一其散血止血等藥無越數十品之間惟嚮導少異其說固甚允也若不與尿同出乃從精竅出也蓋清道之血上可從鼻出下亦可從精竅出多因色慾而成牛膝四物湯服諸藥不效者所溺之血成塊不得出而痛甚者珍珠散甚效。

畜血

畜血症多噦水不嚥言即煩熱欲飲水亦但噦不嚥也以熱止在經不在府之故熱在經則經血動不衄則畜小便利此膀胱外入膀胱也大便黑此腸胃跌打閃撞奔走努力惱怒皆能致之傷寒等熱證尤多畜血則氣不通故善忘時時鼻血犀角生地赤芍丹皮畜于中則心

下手不可近桃仁桂枝芒硝甘草大黃丹皮枳壳 畜于下則臍腹腫痛或如狂譫語發黃詳傷寒太陽篇生地四錢犀角一錢大黃三錢桃仁一錢水酒煎入生漆一錢再煎服半日血不下再一服下即止名生漆湯 一切瘀血大黃四錢芒硝一錢桃仁泥六個歸尾生地山甲各一錢桂五分為丸名代抵當丸在上血丸如芥子大去枕仰卧以嚥津令停留喉下中下血丸如桐子大百沸水下若血積久此藥不能下去歸地加莪朶醋炒一錢肉桂七分又破血方亦用之子通經 大黃醋煮桃仁益元散各一兩乾漆炒烟盡為度生牛漆各五錢醋糊丸每服七十丸大凡跌撲損折畜血腫痛發熱先服折銳湯大黃桃仁紅花當歸寄奴川芎赤芍大下數次再服行血破瘀湯三七當歸玄胡乳香沒藥血竭蘇木靈脂赤芍紅花然後服百和湯收功首烏地黃當歸骨碎補白芨鹿膠續斷甘草薄荷 凡血妄行瘀畜必用桃仁大黃行血破瘀之劑蓋瘀敗之血熱無復返于經之理不去則留蓄為患故不問人之虛寢弱強必去無疑虛弱者加入補藥可也 好酒者多陽明蓄血但牙齒蝕數年不愈者是桃仁承氣湯料為丸服屢效

脉法

濇為血少滑為血充失血脉應微細而反見浮大無力即為虛芤益陰既虧陽無所依浮散于外故見此象 凡失血證脉虛小沉弱安靜身涼者生是大急數躁動身

熱喘咳氣逆不得卧者死 痰血脇痛肝脉弦緊此為常勿以必死論

治法

吐血治法凡血逆上行宜降氣降氣火即降若徒以寒涼降火往往傷脾作濁脾寒不能行血血愈不歸經宜行血血行歸經自止歸經非已離經之血復能返于經也但未離經者得不脫即為歸耳若徒事止血必有瘀畜之患宜補肝不宜伐肝肝火動由肝血之虛滋陰則火自降用寒涼伐肝火被鬱則怒發而愈烈矣 凡吐血屬火者飲童便立止或搗側柏葉汁以童便二分酒一分和而溫飲之大能止血或白湯化阿膠二錢髮灰二錢入童便生藕汁生地黃汁刺薊汁各一杯仍濃磨好墨汁頓溫服 或急用加味四生飲生荷葉生艾葉生柏葉生地黃各等分入降香童便煎服元氣虛弱即將童便浸前藥水丸獨參湯送下或蘇子降氣湯加人參阿膠各二錢下養正湯并見氣氣降則血自下矣 凡土膈壅滯吐血脉有力精神不倦覺胸中滿痛或血是紫黑塊者用生地黃赤芍當歸丹皮荆芥阿膠滑石大黃醋製元明粉桃仁泥之屬從大便奪之此釜底抽薪法也蓋血從下出為順上出為逆用大黃等引血下行轉逆為順也觀仲景謂蓄血證下愈則愈又謂無病忽惡利血為病進若血上行後忽惡利血為邪欲愈可見矣 血下行後用苡仁百合麥冬地骨皮鮮者更佳 咳渴加枇杷葉五味子桑白皮有痰加貝母皆氣薄味淡肺金之本藥也 因其衰而減之於虛勞證尤宜 吐血在暑天人口渴面垢頭暉乾嘔煎茅花燈心麥門冬湯仍入藕節汁側柏葉茅根汁生薑汁少許生蜜亦少

許調五苓散見傷寒 血止用生地黃當歸牡丹皮赤芍藥百草霜末煎服一二貼却用

黃芪六一湯調理

暑中見

暑氣通心火毒刑肺雖致吐衄然大熱傷氣其人必脉虛氣怯

體弱息微此惟生脉散見中暑

人參湯之屬為宜不得濫用寒涼

若氣不甚虛者宜

局方犀角地黃湯或枇杷葉散見中暑

凡肝火盛者必有煩熱脉證宜芍藥生地丹

皮梔子澤瀉芩連之屬降其火而血自消

若肝氣逆者必有胸脇痛滿等證芍藥

生地青皮枳壳貝母澤瀉之屬行其氣而血其清

怒氣傷肝者唇青面青脉弦當

用柴胡清肝散或雞蘇丸煎四物湯吞下并用十四友丸見驚

燈心麥門冬湯吞下蓋

其中有理肝之藥

其有病雖因怒察其無脹無火是逆氣已散肝火已平無得再

散再清若脉虛神因病傷及脾治當專理中氣宜景岳五陰煎五福飲之類主之勿

謂始因怒氣而專意伐肝也

凡憂思損傷心脾以致吐血證見氣短形悴或胸懷

鬱然食飲無味或飢不欲食或魂魄驚困而卧不安是皆中氣虧損不能攝血所致

速宜救本不宜治標宜歸脾湯

飲酒傷胃吐血宜葛花解醒湯見傷寒

加黃連丹皮

或湯中加金鉤子乾葛茅花

遇啖炙博辛熟上焦壅滿痛血出紫黑成塊桃仁承

氣湯導之

酒色過度飢飽吐血效方枇杷葉欵冬花北紫苑杏仁鹿茸桑白皮木

通大黃為末蜜丸噙化

又有飢食胃冷不化強吐之使所食物與氣衝裂胃口吐

鮮血宜理中湯見平寒

加川芎扁豆或川芎乾葛

勞心吐血用蓮子心五十粒糯米

五十粒研末溫酒調服及天門冬湯 勞力太過吐血不止蘇子降氣盞氣加入參阿膠用猪肝煮熟蘸白芨末食之

打撲損傷吐血先以藕節汁側柏汁茅根汁韭汁童便磨墨汁化阿膠止之却以芎歸白芍百合荆芥穗阿膠丹皮紫金藤大黃滑石紅花煎湯調番降香末白芨末與服或先用蘇合香丸見諸却以黑神散和小烏沉湯童便調服

凡努力及跌打等傷吐血宜芎歸飲引血歸經有瘀則加大黃桃仁紅花或麝金黃酒以行之 凡吐衄失血如湧多致血脫氣亦脫危在須刻者此

際有形之血不能即生無形之氣所當急固急用人參一二兩為細末加飛羅麪一

錢許或溫水或井花冷水隨其所好調如稀糊徐徐服之或煎濃獨參湯徐服亦可此正血脫益氣陽生陰長之理也

凡鬱證吐血六淫七情皆能鬱氣成熱
鬱于經則衄
鬱于府則吐脈多枯

濬證惡風寒誤以為虛溫補之殆矣觀其面色多滯喜作嘔噦口苦酸即當散鬱加

味逍遙散觀主之後用六味見虛滋陰 楊仁齋曰血遇熱則留故止血多用涼藥

然有虛寒致血錯行者當溫中使血歸經理中湯見中寒 加木香或甘草乾薑湯甚效

醫貫云血得寒而凝不歸經絡而妄行者其血必黑黯面色必天白脉必微遲身

必清涼 古人謂凡失血證多以胃藥收功 腎寒火虛逼陽上升載血而出脉沉

足冷舌必嬌嫩八味湯見虛冷服 此為內傷之證又有外感寒邪直中腎經逼大上冲致吐血者須服白通湯即愈內傷漸致外感來暴分

別在
此為雷龍之火不可直折若覺時熱脉洪足溫又為水乾火炎去桂附純用六味

見預

熱嗽血治法宜金沸草散

見咳

加阿膠一錢疾盛加瓜萎仁貝母

癆嗽有血宜補

肺湯加阿膠杏仁桑白皮各一錢吞養正丹

見氣

或三炒丹間進百花膏或七傷散大

阿膠丸 陰虛火動嗽血滋陰保肺湯

痰帶血絲出童便竹瀝止之

感冒小恙

不知解表過服寒涼肺經之血凝滯咳嗽帶痰而出證惡寒而脈緊或寒束熱于肺久嗽出血麻黃桂枝甘草當歸杏仁枳梗

後證宜加清涼之品

得微汗愈

血證最忌汗

惟此當汗耳

咯唾血治法瘍瘵咯血七珍散加阿膠當歸各半錢惡甜人更加百藥煎半錢仍調

鍾乳粉為佳一味鍾乳粉用糯米飲調吐血嗽血亦治 因飽屈身傷肺吐嗽血者

白芨枇杷丸或白芨蓮鬚散 治咯血黃藥子漢防已各一兩為末每服一錢水一

盞小麥二十粒同煎食後溫服 白芨一兩藕節半兩為末每一錢湯調下 新棉灰半錢酒調下苡仁為末煮熟猪胰切片蘸藥食後腹微空時服

鼻衄治法亂髮燒存性細研水服方寸匕併吹鼻中

薑草根汁每一盞入生薑汁

半盞相和細呷 竹蛀屑水調服 線紮中指中節左鼻出紮左指右出紮右兩出

新棉

內紮之 有頭風自衄頭風纔發則衄不止宜芎附飲間進一字散 下虛上盛而

衄不宜過用寒劑宜四物湯加參芪麥冬五味磨沉香下養正丹

見八味地黃丸

衄不宜過用寒劑宜四物湯加參芪麥冬五味磨沉香下養正丹

見八味地黃丸

損

傷濕而衄見傷加川芎名除濕湯

飲酒過多而衄茅花湯

加乾葛雞距子或理中湯

去乾葛加乾葛茅花

小烏沉湯或添入黑神散

一錢鹽湯調下亦得

仍驚然以水噀其面使驚則血止

非

特癲衄凡五苓出見傷皆治

衄後頭暉四物湯十全大補湯

見虛捐

飲酒過多而衄合香丸見諸中一丸或以小烏沉湯一錢白湯調下或煎濃紫蘇湯獨調

小烏沉湯或添入黑神散一錢鹽湯調下亦得

仍驚然以水噀其面使驚則血止

非

特癲衄凡五苓出見傷皆治

衄後頭暉四物湯不效其人素病於色者此屬虛

証宜五苓散和膠艾湯吞鹿茸丸或八味地黃丸

見虛捐或鹿角膠丸或辰砂妙香散

有如砂石而色紅却無石淋之痛亦屬虛証宜五苓散和膠艾湯或五苓散和辰砂

妙香散吞鹿茸丸八味丸鹿角膠丸
灰髮二錢茅根車前草煎湯調下夏枯草燒
灰存性為末米飲或涼水調下

便血治法發熱煩躁不欲近衣大渴脉洪以無目痛鼻乾知非白虎証此陰虛發躁

當以黃芪一兩當歸二錢煎服

風冷入客腸胃下瘀血如豆汁八珍湯

見虛捐去生

地甘草加桂名胃風湯

暑毒入腸胃下血者一味黃連煎湯飲

酒積下血不止

糞後見神麆一兩半白酒藥二丸為末水調作餅慢火炙黃為細末每服二錢白湯

調下

腸風腸痛肛腫敗毒散

見傷加槐角荆芥或槐花湯枳壳散

臟毒腹畧疼

肛腫凸大便難通先以拔毒疎利之劑追出惡血膿水然後內托并涼血祛風虛兼
參水助養胃氣 下血久面色痿黃漸成虛憊宜用黃耆四君子湯見下斷紅丸
氣虛脫血補中益氣湯見氣 中蠱臟腑敗壞下血如雞肝如爛肉其証唾水沉心腹
絞痛馬蘭根末水服方寸匕蠱隨吐出 蜈蚣燒末水服方寸匕亦吐 苦瓠一枚
水二升煮取一升服亦吐

畜血治法仲景抵當丸難用用韓氏生地黃湯 虛人難下者以四物湯加穿山甲
煎服妙亦有用花蕊石散以童子小便煎服或酒調下

補虛 熟地 歸身 柏子仁

萸肉

棗仁

蓴蓉

潤燥 蜜 當歸 阿膠

柏子仁

乳酪

涼血 二冬 生地 苓 連 施子 知母 黃柏 元參 花粉 丹皮

白芍 牡丹 胆草 槐花

溫血 附子 肉桂 黑薑

止血 檻灰 髮灰 童便 茅花 烏梅 白芨 柏葉 蘭節 地榆 蒲黃

百草霜 椿白皮

行滯 瞿麥 川芎 香附 乳香 没藥 蒜汁 生牛膝 滑石 蒲黃

玄胡索 益母草 五靈脂

破結

大黃 芒硝

桃仁 紅花

三棱

莪朶

姜黃

歸尾

花葢石

蘇

木多用

舉陷

荆芥穗

升麻

川芎

柴胡

荷葉

有三藥必用二藥必禁服寒涼百不一生則知毋黃柏宜禁服童便百不死則童便宜服血雖陰類運之者陽荷葉仰孟象震最能運血則荷葉宜用降氣莫善於降香則降香宜用也

舊說如
此勿泥

發熱

發熱者熱之發現於肌表者也凡病多發熱熱生於火火本於氣

丹溪謂氣有餘便是火其義可見

其理不外氣乖與氣鬱二端

小兒痘癆
發熱別見

氣乖有三

一曰陽亢發熱

陰陽水火原自和平不熱不寒是謂正氣一有乖違不無偏勝經曰陽勝則熱此為亢陽之火証見煩渴燥結小便赤濁六脉洪數治宜寒涼

有因濃酒厚味蘊釀而成者有炎令燥氣觸而致

者有五志過極
心火亢暴者

一曰陰虛發熱

陰虛謂腎水虛也火性本上炎而外現得水以制之則離交於坎龍潛於淵內蘊而

為神明下濟而成交泰若陰虧水虛則柴乾火烈而焚灼為災矣或由色慾損精或燥熱傷液皆能致之也此之火炎乃由水虛所致與上條陽亢而陰未虧者不同証見口乾體瘦食少懶倦頭痛時作時止遺精盜汗骨蒸肉燥唇紅顴赤咳嗽痰血久成癆瘵治宜甘潤之劑滋水以制火若誤用苦寒則火被寒鬱其怒發愈烈矣按薛立齋治一老人腎虛火不歸經而游行於外發熱煩渴引飲面目俱赤偏舌生刺欬縮如荔枝兩唇焦裂或時喉間如烟火上冲急飲涼茶少解兩足心如烙瘡涎壅盛小便頻數喘急脉洪數無倫而且有力捫其身烙手以十全大補見虛加山茱萸澤瀉丹皮山藥麥冬五味附子及八味丸見虛治之而愈愚謂此証明是水虛火炎當用六味捐見虛而用前藥者必因其人年老水火並虛故爾。加大不虛不得因此案而誤用溫熱以致陰分愈傷也。虛不論水火脉皆無力而此有力者必曾服寒涼之劑激之使過服之即愈亦防鬱遏之意也。然故凡用寒藥直折者必須熱服不効則藥須用薑汁或酒炒離根浮越全體外現比實火之內熱透外輪光裏竅者自不同也已任編云有誤服白虎以致熱甚如燔沖關三五尺人不能近者可想見虛火之烈矣血虛發熱或由吐衄便血或由產後崩漏一切失血所致証見煩燥面白黑渴飲不止証類白虎惟脉不長不實浮大而重按全無為異耳誤服白虎必危治宜滋陰補血若陽並虛兼用氣藥血脫補氣陽生陰自長也

一曰陽虛發熱

易虛謂腎火虛也陽虛應寒何以反發熱則以虛而有寒若無寒而但陽虛則止寒

在內而格陽於外故外熱陽被寒拒出居肌表外越則脫而不脫而寒在下而戴陽於上故上熱也此為無根之火乃虛談耳証見煩躁欲坐卧泥水中面赤如微酣或兩顴淺紅游移不定與實熱之盡面通紅者異渴欲飲水或咽喉痛而索水置前却不能飲肌表雖大熱而重按之則不熱或反覺冷且兩足必冷小便清白下利清穀脉沉細或浮數無力按之欲散治宜溫熱之劑溫其中而陽內返溫其下而火歸元誤投寒涼立死

或口食冷物或真吸寒氣其人平素陽虛盛外寒一中陰邪遂張真陽因之失守也

氣鬱有七

一風寒鬱熱

陽氣自內達外喜暢達而惡遏閉若風寒外襲則陰凝之氣足以閉固腠理而表陽不宣則鬱而為熱也証見頭項強痛惡風汗出脉浮緩者為傷風兼體痛而惡寒無肝脉浮緊者為傷寒治宜解飢發发表得汗則熱泄而愈

此乃表陽受鬱

一飲食鬱熱

飲食停滯中脘則脾胃之陽氣被其遏抑不能宣通亦鬱而成熱証見頭痛發熱如傷寒而身不痛惡食欲吐噯腐吞酸胸口飽悶或脹痛氣口脉滑大甚或沉伏治宜

消導

此乃裏氣受鬱

一為痰飲鬱熱

痰飲所在之處氣被阻滯鬱而成熱理同食滯証見惡風自汗似傷寒但頭不痛項
不強或頭痛而作止無常胸膈不快惡心氣上冲目下如灰色或烟黑脉弦滑治宜
除痰

一為瘀血鬱熱癰疽同

理同痰飲証見小便利大便黑小腹脣或胸脇急結按之痛或兩足厥冷或吐紅臭
衄不渴即渴亦噦水不喫脉必濤治宜行血柴胡黃芩川芎白芷桃仁五靈脂甘草
便結加大黃濃蜜利出黑物愈 瘡毒則脉弦數惡寒飲食如常而有痛處

一為水濕鬱熱

水濕由外感者理同風寒由內傷者理同痰飲証見身重或腫痛不可轉側骨節掣
痛屈伸不利汗出惡風不欲去衣頭如裹聲如從甕中出脈遲緩治宜利溫

一為肝氣鬱熱

恚怒不發止自摧抑則肝氣不宣鬱而成熱婦人最多此証証見胸脇脹痛或飧泄
面青手足冷太息不樂脉沉弦木鬱則達之宜逍遙散見

一為脾氣鬱熱

或勞倦氣散或思慮氣結或飢餓氣餒中氣因而衰微不能運行或滯於中或脇子
下而鬱滯成熟証見怠惰嗜卧行動喘乏四肢困倦此勞倦易或時自言自語不知首

尾此思夜分即熱滯溫愈甚也故天明暫緩氣外出上升鬱陷得或晝夜不解鬱久

甚不分或日出氣暄則熱天陰夜涼則緩

火壯而氣耗節次如此乃病成而變之理不可不知

緩緣初則鬱熱而生火繼則火發而熱劇終則五心煩熱甚則肌肉筋骨如

火壯而氣耗節次如此乃病成而變之理不可不知

燒此李東垣所謂陽虛發熱也

此症內經名陰虛發熱陰字當內字看東垣名陽虛

與上條陽虛發熱戴陽格陽症不同蓋此為中焦之陽彼為下焦之陽彼格陽是內

寒而外熱此則內外皆熱而無寒戴陽是上熱而下寒此則熱反下陷而無寒故不

同也治宜培補中氣氣旺則滯者運氣升則滯者舉矣

五藏鬱証止舉肝脾勞倦者

加酸味以斂其浮越

右疏發熱之理至熱分藏府經絡三焦晝夜血氣虛實詳後

一 熟分藏府經絡

東垣云五藏有邪各有身熱其狀各異

脉皆洪數而有浮沉之別以輕手捫之則熱重按之則不

熱王海藏謂皮膚如火燎重接則不甚熱據則東

垣所云不熱非全不熱也特不甚熱也下倣此是熱在皮毛血脉也在皮毛者屬

肺熱申酉尤甚肺金氣旺時也症見喘咳瀉淅惡寒輕者瀉白散重者涼膈散白虎湯地骨

皮散之類治之白朮赤煩渴黃芩一物煎湯丹溪清金丸即黃芩為末粥丸二方瀉

肺中血分之火瀉白散瀉肺中氣分之火在血脉者屬心熱日中益甚症見煩心掌

中熱以黃連瀉心湯瀉丁導赤散瀉丙火府丹見瀉丙丁俱瀉砂安神丸見煩清涼

飲子

見傷

之類治之 重按至筋骨之分則熱蒸手極甚輕摸之則不熱是熱在筋

骨間也

在筋者

肌肉之下

骨之上也

屬肝

熱寅卯間甚

或寅年

間發

或寅年

症見胸脇滿悶便難轉筋多怒

善驚

四肢困熱筋痿不能起床

瀉青丸

柴胡飲

見虛

之類治之

或當歸龍鬚丸

見脧

左金丸

在骨者屬熟亥子尤甚

骨蒸酥酥然如蟲蝕

困熱不任任亦不能輕於床滋

腎丸

見小便不通

六味地黃丸

見虛

主之輕捫重按俱不熱不輕不重按之而熱是熱在

肌肉也屬脾

熱遇夜尤甚

脾陰土

夜屬陰

症見急瘡嗜卧四肢不收無氣以動實熱以瀉黃

散調胃承氣湯

見大便不通

治之虛熱以人參黃芪散補中益氣湯

見氣治之

胃中熱則

消穀令人懸心

心神被火灼

故善飢

脾已上皮熱

胃居上也

脾中熱則出黃

如糜粥

脾已下皮熱

腸居下也

由是推之

肝胆熱則脇亦熱

心肺熱則胸背亦熱

腎熱則當腰

亦熱矣

兩手太熱如在火中

為骨厥炎湧泉穴三壯立愈

手足心熱

梔子香附蒼

朮白芷半夏川芎

為末神龜糊丸

五心煩熱

火鬱脾中火鬱湯

三物黃芩湯

見煩

治婦人四肢煩熱

熱時發時止知不在表

在表則常熱也

大小便如常知不在裏非表

非裏是在經絡也

一熱分三焦

熱在上焦咽乾口爛梔子黃芩熱在中焦心煩口渴黃連芍藥熱在下焦便閉溺赤

黃柏大黃

一熱分晝夜血氣篇

詳惡寒末

晝熱夜靜是陽邪

即熱自旺於陽分也

陽分者表也

府也氣也

陽晝靜夜熱是陽邪

邪在陽分遇陽時故熱作

晝靜夜熱是陽邪

下陷於陰分也

觀熱入血室症日輕夜重可見詳傷寒少陽篇

晝夜俱熱煩躁是重陽無陰當亟瀉其陽峻

補其陰晝熱在氣分柴胡飲

見虛損以傷寒少陽篇

白虎湯以瀉氣中之火

骨皮散清涼飲子

見傷寒少陽篇

以瀉血中之火

一熱分虛實

血肉充盛支毛榮潤陰有餘而熱及能食而熱口苦乾燥大便難脉洪盛者為實熱
骨瘦肉燥筋緩血枯皮聚毛落陰不足而熱及不能食而熱氣短脉虛者為虛熱

潮熱

有作有止如潮水之來不失其期一日一發

熱者火也火氣所在之經必乘本經氣旺之時而發如心經熱則潮子午腎經

熱則潮子子之類已詳發熱門

若日三五發即是發熱不名潮熱矣潮熱有虛有實傷寒日晡潮熱

胃實也已詳傷寒論餘症潮熱若大便結濇小便赤短喜冷畏熱睡卧不安此氣盛

也參蘇飲見發熱或小柴胡湯見寒或氣乏食少神痺體羸病雖暫去而五心常有餘

熱此為虛茯苓補心湯十全大補湯養榮湯二方俱之類

病後欠調理者八珍散

症似虛而胸膈痞滿背心痛服補藥不效者痰飲也隨氣而潮故熱隨飲而亦潮五飲湯夜微熱病人不自覺早起動作無事飲食如常既無別症可疑只是血虛

陰不濟陽宜潤補宜上條茯苓補心等湯 脉滑有宿食常暮發熱子傷食門求之
血虛五心熱夜劇者四物二連湯 熱病愈後餘熱伏留在經復發熱者小便清
利誤用寒涼致中氣虛寒無以托邪不能行散大劑參朮等補之戰汗而解血虛加
歸地

惡寒輕則畏怯
重則戰慄

惡寒分內傷外感

外感惡寒有四

一 傷寒初感

傷風惡風傷寒惡寒猶傷酒惡酒傷食惡食也蓋表陽被邪所鬱方欲就溫暖以宣
通故惡寒之遏閉未發熱時固惡即發熱時亦惡不欲去衣被甚而近火猶凜當暑
亦惡不論有風無風皆生畏怯惡寒與惡風稍異惡風者有風乃惡無風則否不若惡寒之有風無風皆惡也必待表解方
罷症必發熱無汗頭項強痛脉浮緊所謂發熱惡寒發于陽也若不發熱而惡風踴卧則為直中
陰症矣所謂無熱惡寒發于陰也按傷寒論少陰厥陰篇俱言惡
寒而太陰篇無之闕文耳蓋六經皆有惡寒妄生分別便非

一為傷寒陽邪深入

傳經陽邪深入陰分熱鬱于內表氣不通手足厥冷惡寒狀若陰症所謂惡寒非寒
明是熱症者此也

一為傷寒將解

按傷寒論辨脉篇曰脉浮而緊按之反芤此為本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰以脉浮故當汗出而解也若脉浮而數按之不芤此人本不虛若欲自解但汗出耳不發戰也蓋傷寒欲解正氣實者邪不能爭則汗出而解不發戰若正氣本虛邪與正爭則先戰而後汗若但內燥而汗不出則正氣虛極無以托邪為危候

一為癰疾發作

癰邪與衛氣相爭正為邪滯內鬱不通不達於表則表寒不行於裏則裏亦寒故外戰而內燥也

內傷惡寒有五

一為陽衰表虛

此經所謂陽虛則惡寒也治宜薑附參芪之類助陽固表又有痺氣一症帝曰人身非衣寒也中指藏府言非有寒氣也寒從中生者何岐伯曰是人多痺氣也寒溫之氣體陽氣少陰氣多故身寒如從水中出此則陽衰而兼寒實者也

一為陰乘陽位

上焦陽虛下焦素有陰寒之氣發動乘虛上干故惡寒也

一為陽氣鬱臨

或酒食痰血水濕瘡毒鬱抑陽氣於裏不達於表或勞倦鬱抑中氣下陷不能升發則表虛而怯寒也或發之或吐之產後血瘀孔觀邪塞上焦不通抑遏陽氣東垣用升陽益胃湯丹溪用吐法吐出濕痰使陽氣隨吐升發可見矣

一為熱盛氣散

熱盛於裏火能生風冲突元氣氣從火散故凜凜而寒甚則振顫鼓領咬牙戰慄如喪神守有以大承氣湯見大便不通下之而愈者此外假寒而內真熱之証也此為陽盛格陰與陰言

盛格陽相反陽指內熱言陰指外寒言
內熱外寒兩相格拒所謂陽盛格陰也

一為肺被火刑

肺主皮毛熱則氣張汗越失其斂肅之權腠理虛疎不任風寒故惡之

右明惡寒之理至內傷外感之辨晝夜之分詳後

一內外之辨

外感惡寒雖近烈火不除內傷惡寒得就溫暖則解

一晝夜之分

夜寒者陰氣獨寒旺于陰分臟為裏血為血晝寒者陰邪加於陽分晝夜俱寒者重陰也

熟篇熟分晝夜條對看更詳味下各自明

按陽虛則畏寒而惡陰故旦安而暮亂至夜則寒也陰虛則畏熱

而惡陽故夜甯而朝爭晝則熱也此正虛之候也陽邪實者遇陽而愈旺故朝熱而暮

輕陰邪實者逢陰而更強故夜寒而晝減此邪實之候也陽虛而陰邪乘于陽分

則氣行陽二十五度而病發故日寒而夜息陰虛而陽邪陷於陰分即血分也則氣行陰

二十五度而病發故夜熱而晝涼觀癥疾或曰發或夜發可見矣此正虛挾邪之候也其有晝夜

俱熱甚者為重陽無陰晝夜俱寒甚者為重陰無陽晝寒夜熱者為陰陽交錯也

其有久病虛弱無分晝夜作止不時者以正氣不能主持而陰陽相乘勝復無常也

若壯實人初病見此又為邪正相攻不時擾動之故觀傷寒少陽証往來寒熱初無定期可見矣

寒熱惡寒發熱常相兼觀彼兩門自見此篇乃以寒熱往來及内外上下寒熱者言之

往來寒熱有期者瘧也無期者諸病也有傷寒邪在少陽及婦人病傷寒熱入血室

而往來寒熱者詳傷寒少陽篇有衰弱人陰陽之氣並虛相為勝復而往來詳傷寒平脉篇

條中病後產後多有之產後黃丸有鬱抑而致者如寡婦尼姑獨陰無陽慾火熾於中則

內熱不得遂而氣鬱于裡不外達則表寒久之鬱熱得伸則表熱是也抑陰地有宿

食結滯者輕則消導重則下之有結熱在裏者大柴胡湯見癥又氣鬱則痰停而寒熱作理詳瘡門

外熱內寒仲景云身大熱反欲得衣者熱在皮膚寒在骨髓也活人云先與桂枝湯見

濕治寒次與小柴胡湯治熱按二方謬甚此証大抵陰盛格陽用二方殆矣

外寒內熱仲景云身大寒反不欲衣者寒在皮膚熱在骨髓也活人云先與白虎加人參湯見發治熱次與桂枝麻黃各半湯治寒按熱入三陰其表必冷以陽陷於內

不達於表也但云裏熱則陽氣復還於表而外寒自解其可印定此二方乎

上寒下熱腰上寒靈樞云先刺項太陽大杼天久留之久留以補其陽已刺入針謂已則熨項與

肩脾兼用熨法令熱下合乃止上熱與下熱相合不復所謂推而上之者也嵩崖尊

以溫之以溫之二物況降引上寒入下炙草三分葱白三根薑三片

生書用炒梔二錢半瞿麥五分焦則下焦之熱得和

焦則

行以解上焦之寒

上寒

煎服叔和謂此為陽附陰言陽火下乘於陰部也

上熱下寒叔和謂此為陰附陽言陰火上乘於陽位也經云視其虛脉而陷之于經

絡者取之氣下乃止所謂引而下之者也上熱下寒則在下之脉必虛虛必陷下須

而補之候陽氣下行乃止封東垣云上熱下寒經曰陰病在陽陽上焦也言陰當

從陽引陰言當從上焦必須先去絡脈經隧之血指陽經脈絡言須若陰中火旺上

騰於天_{天謂}致六陽_{上焦}反不衰而上充者即經所謂陰先去五藏之血絡陰絡引

而下行歸下天氣降下則下寒之病自去矣慎勿獨瀉其六陽只去陰火只損血絡

經隧之邪勿誤也又云聖人以上熱下寒是有春夏無秋冬也有升無降當從天外猶云

指上焦言引陽降入地中此乃天上群陰火熾猶言陰火上乘反助六陽不能衰退先于六陽中

決血絡出血使氣下降故經曰視其虛脉下陷于經絡者取之所謂引而下之也病

大者三棱針決血去陽中之熱使得行秋令奉收道下降入地中也按經言視脈虛

穴而補之也東垣誤以為瀉故有此論又疑獨瀉六楊參政年踰七十病亟齧赤若

陽為非故又言頃去五臟之血絡總由不明經語耳

飲酒痰稠粘眩運兩寸脉洪大尺脉弦細無力上熱下寒明矣欲藥之為高年氣弱不任記先師所論凡上熱猶鳥巢高嶺射而取之即以三棱針于顙前髮際刺二十餘出紫血約二合許即時頭目清利諸苦皆去後不復作又治姚公六十有七頭面赤腫而痛耳前後腫尤甚胸中煩悶嗌咽不利身半已下寒足脰尤甚脉浮數按之弦細刺痛處五十餘痛止又炙氣海百壯助下焦陽氣退其陰寒次灸三里各七壯以引陽氣下行足脈寒退遂制既濟解毒湯以黃芩黃連酒製瀉上熱桔梗甘草佐諸苦藥治其熱升柴以散之連翹散結消腫酒煨大黃引苦藥上行止煩熱全愈按此症有實熱者如上二案治法可也若虛熱則是戴陽証也不用熱劑溫腎以引火歸原而反用寒涼殆矣審之

諸中總論

諸中謂中風中寒中暑中濕中氣中食中惡也皆卒然仆倒昏不知人若痰涎壅盛咽喉作聲証在危急但見閉証牙關緊閉兩手握固是也不見脫証者詳不論何中且先與治痰通關並可用麻油薑汁竹瀝調蘇合丸虛寒者三生飲加人參竹瀝薑汁抉開口灌之如抉不開則令人含藥口內以竹管吹入其鼻自能下咽二藥必是閉非脫者方可用若止中血脉不入藏府亦勿輕用恐引邪入內且先用通關散細辛皂角葛蒲為末或加南星生半夏薄荷末吹鼻得嚏則甦又痰壅宜吐急救稀涎散猪牙皂角肥實不蛀者

四挺去黑皮晉礬光明者一兩為細末輕者五分重者七分溫水調灌又碧霞丹揀
好石綠研水飛再研取二三錢同冰片三四豆許研勻以生薄荷汁溫酒調服二藥
不大嘔吐但微微令涎自口角流出即甦又本門方載此二方與此大同小異酌輕
重用之無汗表實三睞散有汗裏實巴礬丸皆吐藥也若見口開心經手撒脾經眼
合肝經遺尿腎經聲如鼾肺經此為脫症不治然五症不全見者速灸臍下氣海穴服參芪膏
亦有生者切忌蘇合牛黃等丸牛黃丸見中風髮直吐沫搖頭上攏面赤如粧或赤黑汗
綴如珠皆不治諸中或未甦或已甦或初病或久病忽吐出紫紅色者死卒中
眼上戴不能視者灸第二第五椎骨上各七壯一齊下火炷如半棗核大涎涎潮卒
則當扶入暖室中正坐沃醋炭火內當面薰之氣入鼻內良久涎之聚於心者自收
歸舊處立甦不可令吃一滴湯水恐涎繫于心絡不能去必成廢人

卒仆六脉多沉伏邪滯於裏氣不外達也亦有洪盛者暴仆時多沉伏甦醒時即轉洪盛矣浮緩吉堅大急疾凶
浮進為寒虛大為暑不當暑言非暑月則為虛浮濫為濕浮大為風浮數無力亦為風微而數沉而遲皆氣中風應人迎氣應氣口洪數為火滑為痰更當察時月氣候及其人之起居飲食參以顯証以定病之主名

中風

其症卒然仆倒昏迷不醒痰涎壅塞咽喉作聲或口眼喎斜四肢癱瘓或半身不遂

或口噤舌強瘡不能言者卒僵者中滿重證不倒

風有外風有內風內風者即人身

中之氣也

經曰人身之氣以天地之疾風名之又氣有外風由於外感內風由於內

餘便是火火氣之燥病如風也又肝屬風

傷此症有純是內傷者有內傷而兼外風者

從無純只外風者若單只感冒外風不過為頭疼發熱自汗等輕症如仲景傷寒論所云而已烏有昏迷卒倒瀕於死亡如

前所舉諸重証哉

前項重証皆因內傷虧敗而然

倒之事惟西北方寒風令人涼僵仆倒則有之然此即屬中寒不

名中風矣

按王安道謂卒暴僵仆等症昔人以為外中於風及劉河間李東垣朱丹溪

出所論始與昔人異河間主火東垣主氣丹溪主濕

詳下反以風為虛象蓋三子以相

類中風之病混同立論致使後人狐疑云云

後人袒其說咸以古人所言者為真中

風三子所論者為類中風張景岳又謂三子所論

與外中風邪無涉固不可以中風

名之并不可以類中風名之直名之為非風可耳

瑤按三子所論乃指內風立說與

外感之風對講內風外風皆可云中故予仍舊概以中風名之使人知有內風之義

非故與王張諸公立異也

內傷兼外風証

靈樞經云虛邪

即外風偏客于身半

因其人半身血氣空虛故風邪偏客之

其入深內居營衛營衛衰則

真氣去邪氣獨留發為偏枯

偏謂半身枯廢也真氣衰乃偏枯其非一外感即偏

枯可知可見外感風寒必無卒作及偏廢等証惟內傷

而後身偏不用不能運動也

而痛滯故痛

血氣為邪言不變志不亂邪未入藏府神明不亂也病止在分

肉分腠理之間巨針取之

通其經絡以益其不足損其有餘乃可復也癥之為病也

經謂

有四一曰偏枯如木之根未末甚枯而一邊枝幹先痿也即上証

中風謂

三曰風癰謂奄然忽不知人也即中藏証

四曰風痺謂痺証因風所成者也詳痺門

身無痛者病在裏故外不痛也

四支不收如癱瘓是也癱瘓者

矣志亂不甚其言微知其言尚可曉也

可治甚則不能言不可治也

仲景謂中風絡脉空

虛經絡之賊邪不濡或左或右邪氣反緩

邪滯故緩也緩遲滯弛縱之意

氣凝滯而寒則迫正氣于右

正氣即急正被邪遣故急迫也

而熱故右之筋脈縮急也

即口眼邪在于絡肌表

麻本不邪在于經即重不勝營分着邪筋脉廢而不用則

浮絡肌膚不仁如左被邪

知痛痒邪在于經即重不勝轉動艱難故重或兼濕氣也

邪入於府即不識人必歸

胃胃熱蒸液成痰由胃之大

心經痰必歸心舌者心之苗

絡入迷心竅故不識人也

浮絡肌膚不靈無以

運舌故舌強難言心火上蒸

心經痰滯筋脉不靈無以

舌下簾泉穴開故吐涎也

東垣則分中血脉

蓋兼仲景中

中藏者痰涎昏冒卒倒口不能言不識人

東垣所謂中藏

中血脉者偏枯至斜

麻木者是小續命湯加減分六經証治之証見太陽無汗惡寒此傷寒也

然風每兼寒故通言之本湯倍麻黃防風杏仁

併針至陰有汗惡風本湯倍桂枝芍藥杏仁

府証見陽明無汗身熱亦是傷寒証

不惡寒傷寒惡寒傳至陽明則不惡寒而反惡熱本湯加石膏知母各二

兩甘草一兩有汗身熱不惡風本湯加葛根二兩倍桂枝黃芩

刺膈谷

証見太陰無

汗身涼傷寒在三陽經則身熱傳至太陰則熱入本湯倍附子加乾薑二兩甘草三

刺膈谷

証見太陰無

白針隱証見少陰有汗無熱太陰不言有汗少陰不言無汗當是互文本湯倍桂枝附子甘草

若無
歸

此四証而但見少陽厥陰証者或六經証混淆者或枝節攣痛麻木不仁者每本湯

八兩加羌活四兩連翹六兩

其証見少陽者夾絕骨見厥陰者刺大敦以引其熱按小續命湯乃麻黃桂枝之變方止可用于中血脉然

亦不可輕用內熱熾者尤忌慎之金鑑以口眼喝斜肌膚麻木不仁為中絡形氣實者烏藥順氣散虛者大秦艽湯以喝斜癱瘓不遂為中經實者換骨丹虛者小續命

五物湯黃芪按六經形証在傷寒以頭疼

腦後項強背痛屬太陽以頭痛額前目痛鼻乾屬

陽明頭痛穴兩角脇痛嘔口苦寒熱往來屬少陽

顧頭項強背痛屬太陽以頭痛額前目痛鼻乾屬

若太陰之腹痛自利

飲食不消腹脹噯氣身重黃腫亦是少陰之脉沉細但欲寐

足下熱亦是厥陰之消渴氣上撞心等証

閉癃遺尿疝小門則皆以其經脉受邪之為病

足痛亦是厥陰之消渴氣上撞心等証

面癱瘻逆亦是則皆以其經脉受邪之為病

言之然三陰主裏病輒經藏相連病在經者有此症入藏者亦有此証何以別之曰

三陰入藏則身無熱在經則身熱

觀傷寒論三陰症以發熱為邪還于表可悟

則但有身熱惡風寒而

內無便溺阻隔及昏迷等証則可知為病在血脉之表而不在藏府之裡矣抑又思

之此皆以足經言耳豈手經獨無可言者乎考其經脉可知也

再按六經形証可參下文中府兼中藏條

中府者內有便溺之阻隔

大小二便不通也不利於飲食者亦是

三化湯或局方麻仁丸通利之

實者三化湯虛者搜風順氣丸

若外無六經之形証內無便溺之阻隔而但手足不能運動舌強不能言語乃血

金鑑

弱不能養筋故也大秦艽湯養血而筋自榮若內外症俱有先解表而後攻裡
表裏邪既解當服愈風湯以行中道行中道猶久服大風盡去縱有微邪亦從愈
風湯加減治之然治病之法不可失於通塞塞固不可太通利亦不可也或一氣之微汗十五日也
或一句十日之微利内外分觸使餘邪盡出也問此症既兼內傷何得數為汗下
醫惟知溫補不顧虛虛耶曰虛者自虛實者自實不去其邪何以存正庸古人亦可哂矣反訾久之清濁自分營衛自和矣

中藏者痰涎昏冒至寶丹活命金丹之類內有麝香入脾治肉牛黃入肝治筋龍腦
入腎治骨中血脉中府者不可用恐其通竅而引邪入筋骨不能出也

金鑑實者牛黃清心丸虛

者參附湯脫症見者倍參

中府多兼中藏如左關脉浮眩面目青左脇偏痛兩脇皆肝部位而左脇尤肝所居筋脉拘急肝主目瞤頭目眩肝火上冲手足不收坐蹠不得皆筋痛也此中胆兼中心犀角散之類如左寸脉浮洪面赤汗多汗為心液心神顛倒舌強言語蹇澁心脉上蒙舌本忪憮恍惚此中小腸兼中心加味牛黃散之類如右關脉緩或浮大面唇黃汗多牌濕盛也身重怠惰嗜卧肌肉潤動不仁脾主肌肉腹脹不食脾氣不運此中胃兼中脾也防風散之類如右寸脉浮濶而短臭流清涕多喘肺氣上壅胸中胃悶胸中胃之部分也氣短聲嘶肺主聲音四支痿弱肺熱則痿此中大腸兼中肺也五味子湯之類如左尺脉浮滑面目黧黑腰脊痛引小腹不能俛仰兩耳虛鳴骨節疼痛足痿善恐此中膀胱兼中腎獨活散之類按中藏必有痰涎昏冒卒

利等危證非只比等比等

特用以分別其

治風之法初得之當順氣順氣則可破氣及其久也當活血四物湯卷

為何府藏耳即此義若不順氣徒用烏附又不活血徒用防風天麻羌活輩未見其能治也按中

風必由於真氣虛則宜補氣以順之黃芪人參氣虛而逆冲則宜降氣以順之沉香

氣虛而滯則宜宣導以順之木香陳皮之屬皆所謂順也氣熱則涼之氣寒則溫之亦為順

則血枯滯寒則血行以活之皆所謂活也此症未有不因真氣不周

而病者故黃芪為必用之君藥防風為必用之臣藥黃芪助真氣者也防風載黃芪

助真氣以周於身者也亦能發散風邪許胤宗治王太后中風口噤口喎亦加秦艽恍惚錯語加

茯神遠志不得睡加酸棗仁內熱加梨汁人乳生地黃汁痰多加竹瀝荆瀝少佐以
薑汁治此症用諸汁最妙以其行經絡滲分肉旋於諸藥也

已止所論乃內傷而兼外風者也蓋內傷氣血虧敗日久有所觸則隨觸而發故一遇外感風寒而卒然倒仆顯出如許危証知非一朝一夕之故矣

內風証

內傷虧敗日久極則必發不必有所感觸也

久病或產後多有暴脫之證深居密室豈有外感哉

劉河間則主乎火謂熱甚生風非肝木之風如云不必泥定肝風耳亦非外感之風由將息失宜五志過極心火暴盛腎水虛衰不能制之熱氣鬱怫心神昏冒故卒倒無知病微

則但僵仆氣血流通筋脈不掣發過如故重則氣血鬱結不通陰氣暴絕陽氣後竭而死其說甚是然既曰火盛由于火虛則當用六味乃反用地黃飲子熟劑者以火既降次以防風通聖散汗之內火亦用汗散者蓋火雖已降而浮或大便門塞者三盛于表者未散故汗之使外越也或大便門塞者三化湯下之內外火邪已盡以羌活愈風湯調之宣其氣血導其經絡通痰滯也若腎水虛虧命門真火挾肝風上冲者大劑六味地黃丸料見虛損煎服若竟至陽脫宜先用參隋大劑峻補其陽而後實其陰繼以生脉散見中滋其化源暑

東垣則主乎氣謂人身之陽氣以天地之疾風名之中風証非外來之風此本氣衰也四旬氣衰之後或再傷其氣七情勞役房事飲食皆足傷之此為氣虛內壅之症蓋虛弱之人多有卒加諸汗治之此為氣虛而倒者與下中氣篇氣逆者不同支體不遂六君子氣丹溪則主于痰謂土濕生痰痰鬱成熟極生風

問內風亦有中血脉中府藏之分乎曰病自內發未有不傷其府藏者由於火盛則火發而血與痰壅矣由于氣虛則氣滯而血與痰凝矣痰血壅滯食亦不化填塞于府則二便不通阻礙藏氣則昏迷不醒其重者也輕者中後邪散布經絡而血脉之行不利固有之矣豈必兼外風必然哉至於下文所舉各症亦多內傷所致不必兼

涉外感也

口噤即牙關不開也由氣血凝結於牙關筋脈不能活動以蘇合丸或生南星冰片
烏梅肉為末擦牙或以麝金藜蘆末搐鼻或針人中頰車各四分或白礬半兩鹽花
一分細研擦點牙根下更以棉裹半錢七安牙盡頭用甘草比中指節截作五截
生油內浸過炭火上炙候油入甘草幹開牙關令咬定甘草如人行十里許時又換
一截後灌藥極效

口眼喎斜胃經細筋為目下綱膀胱經細筋為目上綱胆經脉起於目锐眥其筋亦
結焉小腸三焦筋脉俱至目锐眥又胃經大腸經脉俱挾唇口左右風寒之邪視諸
經筋脉之虛而中之左虛則左受寒筋脉急引而喎斜右虛反此以清陽湯秦艽升
麻湯散之內有熱者宜加辛涼患處宜炙目斜炙承泣承泣禁灸再考口喎炙地蒼不效更
炙人迎頰車若純是內風火邪而喎斜者則為熱灼筋枯短縮與寒而收引者相反
不可炙亦不可用溫散之藥須苦寒降火有用承氣湯見大便不通下之而愈者是也通
用牽正散白附子辛熱專去頭面之風內火盛者宜加清涼之品全蝎全蠍二味去風破結瘡癩等分為
末每二錢酒調服外搗草麻子一兩冰片三分為膏寒月加乾薑附子各一錢右喎
貼左左喎貼右舊謂左寒則右熱左熱則右寒此為內有熱而外感寒者言若止
外寒而內不熱或止內熱而外無寒則左寒者不必右熱左熱者不必右寒也大

抵純是內風而熱不甚者必無此症熱盛者乃有之然喝斜不甚以火即暴甚不至
遽枯其根也若兼外感風寒則甚矣以寒熱相激其勢愈累也純感風寒者亦甚以
寒之收引易也然亦必虛人乃有之

凡遇旋風而喝科者皆虛人也

半身不遂經云胃脉沉鼓濇胃外鼓大浮而鼓猶云心脉小堅堅即背偏枯男
子發左女子發右不瘡舌轉可治以其病止在血脈未及藏府也蓋胃與脾為表裏更實更虛更迷
胃陽虛則脾陰盛而胃從于脾故胃脉沉鼓濇也濇為多血少氣氣少故血雖多胃
陽盛則脾陰虛而脾從于胃故胃脉鼓大於臂外也大為多氣少血氣多故血雖少
而脉亦大然必兼虛而心之元陽不足陰寒乘之故脉小堅急者首陽不足也堅急者陰寒之邪也心
胃脾三等脉凡有其一即為偏枯者何也蓋心之神無處不周者也胃之氣無處不行者也神行氣流充足盈溢何有于病若神氣受傷則運行不能周徧而經脈偏枯
矣所謂未有不因真氣不周而病者也然豈特心胃為然哉五藏六府凡有一不周
皆足以致偏枯固可推耳丹溪謂左半多屬死血與血虛四物等補血之劑右半
多屬氣虛與痰四君等補氣之劑並加竹瀝薑汁以行痰是大概如此不可泥古
方順氣勻氣散虎骨散虎胫骨酒黃芪酒可選用外用蠶沙兩石分三袋蒸熟一
袋着患處冷則再換一袋羊肚釀粳米葱白薑椒豉等煮爛日食一具十日止

失音不語經謂內奪精血虧敗亡失如而厥逆上行名厥則為瘡痙此腎虛也水腎
被人奪去者然

上炎少陰脈不至者不至謂不上通也厥也腎脈不至于上則不得循喉嚨挾舌

本故不能言也地黃飲子六味八味等

見虛損主之或用竹瀝荆瀝

去熱各三盃

生葛汁去人乳汁

潤燥各二杯

陳醬汁半和勻隔湯頓溫服

舌為心之苗痰火盛則心

乾燥拘急故舌強而不能言

又痰迷心竅則心脉不用故不能語也

有痰者滌痰湯內熱者涼膈散

見發熱置龜新荷葉上繕

加石菖蒲遠志以

心竅為末煉蜜丸彈子大硃砂為衣每服一丸薄荷湯化下名轉舌膏或寶鑑訶子

湯瀉正舌散茯神散外用龜尿點舌神効

置龜新荷葉上繕其裏立出

語澁有舌縱舌麻皆

以痰火治之烏藥殼蠶膽星芩連枳壳防風竹瀝薑汁

痰盛者橘紅一觔逆流水五碗煮數滾去橘紅再煮至一碗頓服白湯導之

後又飲白湯以利吐也

導吐痰之聖藥也

中後氣未盡順痰未盡除當以藿香正氣散和星香散

煎服中氣中惡霍亂尤宜之

中後體虛有痰四君子

見氣和星香散或六君子氣

養正丹

見氣墜痰鎮氣氣實者以星香散吞之氣虛者六君子湯吞之

氣

者脾濕盛令筋脉緩軟宜去濕虛者脾燥熱壯火食氣無氣以動十全大補湯

見虛損

加減去邪留正

身體疼痛風寒濕三氣留滯經脉故不通而痛鐵彈丸十味剉

散

內有熱藥無

癰瘍湯

見癰瘍

昏冒活命金丹至寶丹至聖保命金丹牛黃清心丸

小便不通三因白散子加木通燈心茅根煎熱盛去附子

潔古云如自汗津液外

亡小便自少不可利之使營衛枯竭無以制火當退熱止汗小便自利

遺尿濃煎參芪湯少加益智子類啜之

多食火盛則脾陰虛而燥故能消食當瀉火脾陰復則食減是其驗也舊謂脾虛則

求助于食經云實則夢與虛則夢取即其義也亦通食以養血故脾陰虛則思

風須分陰陽

氣虛者多寒火盛者多熱

陰中面色青白手足厥冷多汗

風火內生亦有轉為寒症者

蓋風火發越汗出過多

陽隨外泄症轉陰寒固有之矣

昔人謂中風之疾始為熱癥後為寒癥亦此意也

陽中面赤如醉怒目上視強直掉眩經云

掉眩支痛強直筋縮為厥陰風木之氣

木旺生火風火屬陽多為兼化皆熱氣也又

風能勝濕而為乾燥風病勢甚因筋縮強直燥熱之甚也

寶鑑云凡人初覺大風先服愈風湯天麻丸各一料以預防之薛立齋云預防之理當養氣血節飲食戒七

情遠房幃若服前藥以預防適所以招風取中也

乾坤生意云凡人手足漸覺不遂麻痺不仁或口眼喎斜此皆經絡之病易中外風

語言蹇滯或胸膈迷悶吐痰相續此痰火之病易中內

風六脉眩滑而無力其去卒厥仆倒亦不遠矣須防之

有婦人先胸脇脹痛

肝血虛肝火

後四支不收

養筋也

自汗如雨

肝熱津泄

肝熱陰挺不藏

大便不實

火蒸脾土

口緊目瞤

引肺氣收引藏

齋曰非也若風中藏真氣既脫

指汗遺言

惡症既見禍在反掌安能延至十日

中風徒然

先見胸
脇之症視其色則青赤本火診其脉洪數而肝尤甚乃用犀角散四劑候愈又用加
味逍遙散觀調之後因鬱怒復作兼發熱嘔吐月經不止飲食少思乃木克土脾不
攝血也用加味歸脾佐以逍遙散而愈又有人素無疾苦忽如死人身不動目閉不
開口噤不言惡聞人聲狀如胃眩移時方寤此由出汗過多血少陽氣鬱胃子上不
行所致移時氣下而寤名曰鬱胃白薇湯倉公散

引此二証以為辨証之法

中寒

其症卒然仆倒身體強直口噤不語或四肢戰掉厥逆身冷無汗醒後惡寒或發熱
或不發熱脉沉細弦緊腹痛此與傷寒論寒邪直中三陰經同理但彼不至卒倒之
甚耳治之先用酒調蘇合香丸次用五積散加香附一錢麝香少許重則用薑附湯
若人漸甦身體回煖稍能言語問其別有何証寒脈遲緊挾氣帶洪攻刺作痛附子
理中湯加木香五分挾風帶浮眩暈加防風一錢挾濕帶濡腫滿疼痛加白朮一錢
筋脈牽急加木瓜一錢肢節疼痛加桂一錢亦可灸丹田穴以多為妙大抵中在皮
膚則為浮浮腫也觀凍中在肉則為苛為重為聚液血液分裂而痛或痛在四肢或
痛在胸膈或痛在腰背或痛在小腹引暎大抵初時周身受寒後則併走一處蓋視其虛而入之也或經絡引注
藏府之膜原為心腹痛或注連于藏府則痛死不知人中子筋骨為筋攀骨痛屈伸
不利中入府藏則死矣治當察微甚甚則附子理中湯無汗加麻黃細辛嘔吐加丁

香吳茱萸陰毒加生川烏脉微欲絕加人參微則不換金正氣散加附子五積散臍
腹痛唇白甲青四支厥附子理中湯薑附湯入肝加木瓜入肺加桑白皮入脾加白
朮入心加茯苓 麝香半夏皂角各二錢半為末填臍中生薑切片蓋之艾灸至手
足溫為度或灸丹田穴因房事致手足冷腹絞痛者亦然 凍倒人不得近火近火
即逼寒氣入心而死矣北方之人手足凍僵若湯浴火灸則肢節脫落須緩緩搓之
俟其回緩或反以雪搓之引出寒氣舒緩回乃愈即其理也 (僵凍成冰堅凝不解
與未融者解離不接故脱落也又水流濕火就燥皮膚之寒為內陽所拒原融者
外出而苦于無所引以雪搓之則以寒就寒而外附於是內陽得伸而緩回也)

中暑

或名暑風以與相似也

其症卒然悶倒汗多先出之汗多熱後出之汗多冷面垢汗多則面油膩昏不知人手足微冷或吐或瀉或
喘或滿多於田間路上烈日中得之以來復丹末同蘇合香丸見諸用湯調灌或單
用來復丹調灌或却暑散水調灌亦得如倉卒無藥急研蒜水以灌之蓋中暑毒陽
外陰內陽氣隨汗大泄在內之血夜疾食無氣以溫皆變寒凝故諸暑藥多用熱劑如大順散之用薑桂枇杷
葉散之用丁香是也大蒜辛煖取其回陽辛取其通竅散結陰寒凝結痰涎阻滯則關竅不通也又
蒜氣臭烈能通諸竅大概極香極臭之物皆能通竅也候稍甦繼以益元散見傷氣實者蒼朮白虎湯並見發熱熱死人切勿便與冷水恐熱血得冷及

熟土取罨其臍或令近火以熱湯灌之或布蘸熱湯更易熨其心腹臍下以引熱外

火傷者誤以冷水洗

之即激火內攻可見

急以二氣丹湯灌之

出也觀湯

盆合地上周圍令勿透烟每用皂角灰一兩甘草末六錢和勻每服一錢溫漿水調
下昏迷不醒者不過兩服蓋中暑人痰塞關竅皂角能疎利去痰也 又有暑迷一
証似中而輕但昏迷耳欲睡懶語未至暑氣乘心煩悶所致也 壯人香薷飲加黃連一錢虛人星香
散見中風加香薷一錢醒後冷汗不止手足尚逆煩悶多渴者香薷飲若遇投冷劑致
吐利不止外熱內寒煩燥多渴內寒何以渴汗出津竭也甚欲裸形此陰盛格陽宜溫藥香薷飲
加附子浸冷服渴者縮脾飲加附子亦浸冷服詳傷暑門

中濕

得之胃雨卧濕風瘴薰蒸外感濕氣內溫即丹溪所謂溫熱生瘡已見中風門積滯日久關節重痛浮腫
喘滿腹脹煩悶卒然昏倒其脉必沉而緩或沉而細宜除濕湯白朮酒此必積久乃然然見此者亦鮮有破傷處因澡浴濕氣從瘡口中入其人昏迷沉重狀似中濕名曰破傷濕白
朮酒問此症所受濕氣無幾何以致是曰氣血流行不容少有阻滯溫入不論多少但能阻礙正氣則鬱滯不行由是通入攻心則昏迷沉重矣

餘詳傷濕門

中氣此為氣逆與中風門東垣所論氣虛卒倒症各別

其症卒然仆倒不省人事牙關緊急身支冷中風則身支溫與此異無痰涎即有亦不如中風之多氣滯于內

不外達故身冷氣結因七情動氣尤多結塞于中上下不通故卒死也其脉沉應于中故疾不上出氣口應人迎與此異中氣甚類中風以氣藥治風則可以風藥治氣則不可續命等言蓋發散之劑也嫌其散氣若指清心瀉心等寒劑言以蘇合香丸見諸灌之候甦則中氣原非火症亦不應用寒涼矣三方並見中風于喉口間耳四七湯見星香散見中風若其人本虛痰氣結滯關隔不通上下不得升降或大便虛秘三和丹有不治而氣復自甦者經曰無故而瘡脉不至者雖不治自己為氣暴逆也氣復自愈

中食

其症卒倒無知口不能言四肢厥逆不能舉狀似中風因飲食過度醉飽之後或感風寒或着氣惱以致氣血鬱滯飲食無以運化填塞胸中陰陽痞隔升降不通若誤作中風中氣而以驅風行氣之藥治之其死可立而待胃氣已受傷不堪再為行散也凡遇此等卒暴之病必須審問曾否醉飽過度有此加以氣口脉緊盛且作食滯治之先煎鹽湯探吐其食挾痰者瓜蒂散見傷飲食吐之醒後察審如挾有風寒之症以藿香正氣散見風解之如挾氣滯者以八味順氣散見氣見中調之若別無他症只用平胃散見傷飲食加白朮半夏麴蘖之類調理

其証卒然仆倒口噤支冷肌膚粟起頭面青黑昏不知人參後精神不守錯言妄語由胃犯不正之氣吊死問喪入廟登塚多有此証蘇合香丸見諸灌之中灌之候甦以調氣散和平胃散服名調氣平胃散平胃散內有荅
术可以辟邪 飛尸鬼擊等邪証附後

此多由精神衰虛遂為邪鬼所擊或附着於體杳昏沉沉妄言譖語或許露人事或言未來禍福多中人有起心即能知之登高涉險如履平地或悲泣呻吟不欲見人此為鬼物所憑者也舊有五尸之說一曰飛尸發無由漸昏然而至尸即其人心腹刺痛氣息喘急脹滿一曰遁尸停遁在人肌肉血脉間觸即發動症與前同瘥後復發一曰沉尸發時亦心腹絞痛脹滿喘急雖歇之後猶沉錮在人臟腑一曰風尸在人四肢循環經絡其狀冷躍去來沉沉黓黓不知痛處衝風則發一曰伏尸隱伏五藏積年不除未發如無病人發則心腹刺痛脹滿喘急又諸尸疰乃死尸傳注之氣如傳尸癆蟲之屬流注身體令人寒熱淋漓腹痛脹滿喘急或礞礞踢起或攀引腰脊或舉身沉重精神昏謬每節氣改變輒至大惡積年累月漸至頓滯而死死後復易旁人乃至滅門已上皆用忍冬藤葉剉數斛煮濃汁日三服瘥 太乙神精丹蘇合香丸最妙 喻嘉言治祟方用犀角羚羊角龍齒虎威骨鹿角霜牡蠣粉人參黃芩等藥為末羊肉半斤煎濃汁調作一次服立效蓋祟附於身與人之神氣交持原

逼處不安但無隙可出故用諸多靈物之遺形引以羊肉之羶俾邪祟轉附骨角移

醫

碥

卷一

三十七

從大便而出也說甚有理

醫碥卷之二

南海何夢瑤報之輯

松江李林馥啟賢氏重校

雜症

傷風寒

附鼻淵一有卒倒等症為傷下各篇倣此無

甚者偏傳經絡已見傷寒論此言其輕淺者邪止犯皮毛皮毛為肺之合皮毛閉則肺氣不得外泄故上壅而噴蒸成涕液壅塞鼻中故聲出重濁肺氣鬱而成熱故肺癢而欬其人平素體氣寒者則無汗熱者則有汗或發熱或不發熱或頭痛或不頭痛蓋雖輕症其中又分輕重也虛者參蘇飲見發熱實者川芎茶調散此症與鼻淵相似而不同傷風屬肺有噴嚏且為寒邪故涕清鼻淵屬腦故無噴嚏且係熱邪故涕濁甚則有穢氣鼻出血蓋鼻淵屬風熱入腦熱氣湧涕傷鼻兩孔氣出如火痛或成瘡熱不得泄傷及所過營血則衄矣初起蒼耳散散之久病熱深防風通聖散見風清之効者犀角地黃湯見涼之鼻孔痛成瘡猪胆汁調冰硼散見塗之此醫宗金鑑云爾然鼻淵屬腦熱云無嚏於理未的詳欠嘆篇可見矣

破傷風

或損破或瘡潰風從破處入鬱遏正氣為熱理同傷寒而或甚者以曾經去血挾虛也故多搐痙等症先須辨瘡口平而無水者止于鬱熱而已若腫而出水則熱鬱

而蒸成濕矣 脈浮在表宜汗羌活防風湯九味羌活湯表解後以白朮防風湯補之 脈弦者半表半裏宜和解小柴胡湯見寒熱 羌活湯地榆防風散 脈沉實不大便在裏宜下大芎黃湯江鰓丸後服羌活湯 發表藥宜辛涼不宜辛熱 服風藥過多汗不止者白朮黃耆湯 搖痙不已蠲瘡湯凡瘡搖須養血潤燥加引經藥背後擣者羌活獨活防風甘草面前擣者升麻白芷獨活防風甘草兩旁擣者柴胡防風甘草右擣加滑石右屬脾
濕也 手足顫掉不已朱砂指甲散 頭目青黑額上汗珠不流眼小目瞪痛不在瘡處者傷經絡也並不治 亦有瘡熱鬱結多着白芨瘡口閉塞氣不宣通鬱熱生風者此為內風但須清熱解鬱 外治法初於人家糞堆內或爛草房上取蟻螬蟲一枚捏住其背待蟲口吐水就抹在瘡口上覺麻即汗出立愈或玉真散傅之或杏仁去皮細嚼和雄黃白麪傅腫消為度 牙關不開蜈蚣一條焙乾研末擦牙吐涎立甦

傷暑

熱盛傷氣壯火食氣也又氣為脉大而虛氣虛故其症自汗面垢背惡寒氣從汗泄則益耗散矣 汗泄則益耗散矣 脉大而虛脈虛故其症自汗面垢背惡寒氣從汗泄則陽虛背惡寒也 口乾前板齒燥熱氣從口出故前齒燥 煩悶或頭疼火上發熱熱外 神思怠倦殊甚暑傷氣而不傷形寒則傷形血脉為寒所滯也 故身體不痛與傷風寒異又與溫熱病相似而異此脈虛彼脉實也又與濕溫相似而異此身熱而渴彼身涼不渴也此症首在察汗

之多少 汗少則熱盛于裏而傷其內氣肺氣傷必喘乏人參白虎湯見發熱脾氣傷

則四支困倦不欲食人參白虎湯多用甘草腎氣傷則津液涸小便少六味地黃湯

加知柏見虛損又暑先入人心心屬火以類相從就燥之義也觀柴乾則後煩可見

而浮心血受熱而燥証見心煩口乾辰砂五苓散見傷寒硃砂安神丸見躁加黃連小

腸為心之府五苓利心經暑毒使從小便出為治暑上劑益元散尤佳

暑氣攻裏腹內作痛小便不通生料五苓散加木香七分或益元散大便不通者加味香薷飲

見中暑仍佐以三黃丸見發熱

暑毒客於上焦胸膈痞塞湯藥至口即出不能過關或

上氣喘急六和湯浸冷調入麝香少許

暑氣久不解遂成伏暑內外俱熱煩燥自汗大渴喜冷香薷飲加黃連一錢繼進白虎湯見發熱

若不愈暑毒深入結熱在裏讐語煩渴不欲近衣二便結澀調胃承氣湯見大便不通

或三黃石膏湯伏暑煩渴多熱瘦者消暑凡每兩入黃連末二錢名黃連消暑丸或二陳湯見頭痛或小半夏茯苓湯見並

可加黃連一錢自汗手足厥冷六和湯蘇合香丸見諸中

自汗手足時擗搦者謂

之暑風緣汗出毛孔開風乘之火得風扇益虐筋脉枯急故也香薷飲或香薷湯並

暑並加羌活一錢痰盛者風大交煽則痰湧盛六和湯星香散見中冬半貼暑月身痒如針刺

間有赤腫處亦名暑風風邪留于皮膚熱不得泄故痒痛六和湯為末和消風散見頭痛酒調服

汗多則熱泄于外陽衰于中真氣耗散宜急救其汗人參黃花白朮正味也屬以溫中

固表為宜

又汗大泄不止亡陽

且令腎水竭絕津液內枯是為亡陰急當滋水之

上源三伏之義為庚金受困也

金遇丙丁失其清肅故孫思邈謂夏宜常服五味瀉丙以補庚

恐金氣為敵之敵即補也

壬水絕于己癸水絕于午西北寒清絕矣故前人立

法謂夏月宜補乃補天元之真氣非補熱火也

令人夏食寒是也生脉散

見暑中主之

如兩足欹側脚膝痿弱行步不正是痿也

加酒洗黃柏知母令兩足湧出氣力

東

垣謂熱傷元氣四支不收兩足痿軟遇早晚則寒厥

日高之後陽氣將旺復熱如火

乃陰陽血氣俱不足故陰虛而熱厥陽虛而寒厥也

熱盛則陽亦虛也

口不知味

肝熱則口

酸心熱則口苦肺熱則口辛腎熱則口甘或淡是為

口中不和則不知味又氣虛則食不化傷食之人亦不知味也

目中溜火

肝火透也

視物瞭瞭無所見

精神恍惚也

小便頻數大便秘結

熱在下焦

胃脘當心痛

氣虛不運或死血滯于胃

腕或胸中閉塞時顯嘔噦皆不運

或有痰嗽

金受火刑

口沃白沫

腎水泛腰背腹皆痛甚則

如刀刺腹

皆氣血凝滯之故頭痛時作攻上

兩脇痛

肝氣或急縮脇下周圍如繩束之急帶

筋縮食不下或食入即飽全不思食

火氣脹悶自汗尤甚若陰氣覆在皮毛之上氣弱陽

不外伸

東汗多浸使然

皆熱傷元氣所致黃者人參湯主之

又察其有無別邪如冒暑飲酒酒熱與暑氣內盛發熱大渴小便不利其色如血生

料五苓散

見傷寒去桂加黃連一錢或以五苓去桂存酒煮黃連丸如傷食者其人

頭痛背寒

氣為食鬱不達于背也

畏食惡心噫酸臭氣胸膈痞滿六利湯倍砂仁若因暑渴飲

冷致暑毒留結心胸精神昏憒語音不出者
見諸中若先飲冷後傷暑者此必心下痞悶五苓散生姜湯調服佳或君子湯氣調中

亦可中和後或小便不利或莖中痛宜蒲黃三錢滑石五錢甘草一錢

又暑每兼濕時當長夏濕熱大勝蒸蒸而熾人感之四支困倦精神短少懶于動作
小便黃赤者熱也肢節疼痛大便溏泄身體沉重者濕也脉洪大熱而濡或遲濕須
以清熱燥濕之劑治之東垣清暑益氣湯謂熱傷氣故以黃耆益氣固表為君人參
甘草為臣蒼朮白朮澤瀉等滲利除濕升麻葛根解表熱兼勝濕風藥也故濕熱壅
滯則食不消而痞滿炒鞠青皮消食快食氣亂于胸中清濁相干陳皮理之黃柏以
瀉熱救腎人參五味麥冬救金以滋水之上源為佐血虛加當歸氣鬱加升柴中滿
去甘草咳去人參咽乾加乾葛血減心煩加人參陽能生陰也當歸少加黃柏瀉火如煩
猶不止加黃連然苟非兼溼則諸利水之品反足以耗竭腎水致損兩目慎之

東垣又謂風犯汗眼汗閉不出為溼身重體痛或渴或不渴小便不利此風溼相搏
也頭痛或上熱壅盛心煩情思慘淒有不樂生之意陰溼之情狀如此所謂陽舒陰慘也此陰勝陽之
極也病甚則傳為痿厥厥者氣逆上衝也痿者四肢痿軟無力也由濕鬱成熟熱極
上衝而厥筋脈受傷則痿也利濕清熱為宜矣清燥湯用

又傷暑後復感風寒者身痛頭疼發熱去衣則凜着衣則煩感風則有汗五苓散見傷

寒閉熱于肺管故聲不出

香薷湯見中

化蘇合香丸

暑氣調中

濕內用桂枝感寒則無汗六和湯加藿香紫蘇市井中多此症往往日間冒暑經營夜間開窗眠卧所致有此症而發潮熱似瘧而未瘧者六和湯養胃湯見處各半貼若鼻流清涕或鼻孔熱氣時出者亦六和湯加川芎五分羌活黃芩各七分已上皆夏月感受暑邪而為其所傷者也昔人所謂動而得之為陽症者是也有不又因必動而得者感其熱氣即病也益元散因避暑貪涼而反為寒涼所傷者或納風涼以傷其外或食瓜果以傷其內因而頭痛發熱惡風無汗昔人名此為中暑或又名為中暯名目混亂故削其名而存其症症似傷寒此為陰寒所遏周身陽氣不得伸越也治宜辛涼發散辛溫消導此全未傷暑而感風寒者與上文先傷暑續感風寒不同昔人所謂靜而得之為陰也

症者

暑月多食生冷忽受暑邪熱入於內陰陽錯雜冷熱相搏中氣擾動上壅則吐下迫則瀉故多吐瀉霍亂嘔不止者枇杷葉散見中暑去茅根谷來復丹見中暑嘔而痰却暑散見中暑吞消暑丸或小半夏茯苓湯見痰嘔而渴者浸冷香薷湯見中暑或五苓散見傷寒也建中湯見中寒瀉止仍渴春澤湯即理中湯加黃連白茯苓也加人參或縮脾飲見中暑瀉而腹痛有積者生料五苓散藿香正氣散見中暑各半貼雖無積而腹痛甚氣滯也生料五苓散加木香七分或六和湯加木香五分或用二湯調蘇合香丸見諸瀉而發熱者胃苓散如比金盛格陽香薷飲加附子或大順散加參附並

浸冷服又有吐極胃虛粒米不入病甚危篤者人參一錢黃連五分姜汁燒糊米一撮水一茶鍾煎至一酒盃候冷與一茶匙許漸漸與之與盡便可投藥食暑月人多服香薷飲以預防之若元氣素虛或房勞過度者服之為害不淺若飲預防惟生脈散為宜暑病多陰証死而肢體爪甲青黑者是也故治暑之劑多用溫熱

傷濕

雨露本乎天清陽也故傷于上止犯皮毛汗多衣濕不換致濕氣返入于內者同之泥水本乎下濁陰也故傷于下侵及骨肉二者皆自外入飲食之濕脾土所生之濕本乎人皆自內出在外在上者汗之以苦溫甘辛之劑辛散濕苦燥濕甘在內在下者利之以苦熱酸淡之品恐其上行故用酸苦以散邪而降之以淡泄之以淡泄之治飲食之濕在上則吐之在下則瀉之瀉大便則利之飲則利治脾土所生之濕則察其兼化蓋土德兼該挾風則為風濕走注者是挾火則熱濕煩者是挾寒則為寒濕痺痛者是又上下中外無處不到在上則頭重胸滿嘔吐在中則腹脹痞塞在下則足脛附腫在外則身腫重骨節痛當分部位為治隨所兼寒熱溫涼以用藥又須察其為何藏之邪如自病土虛生濕則補土如火盛生濕則清心如氣鬱成濕則升旺如金寒水冷泛溢為災則緩腎所治之藥各從所入不特二木也其症發熱惡寒惡濕身重自汗骨節痛小便秘濁大便多泄腰脚痺冷跗腫肉如泥除濕湯見中濕若兼腰痛特甚不可轉側如鰐五六貫錢重者濕入腎也腎着湯滲濕湯小便秘大便溏五苓散吞成已丸見驚若

兼感風則証兼惡風或額上微汗除濕湯桂枝湯各半貼令微發汗不可大發如已得汗

見中寒

和除濕湯見中寒

濕

五苓散各半貼若感寒又感風者汗出身重惡風喘滿骨節煩

痛狀如厯節風臍下至脚冷痺不能屈伸所謂風寒濕合而為痺也防已黃芩湯或

五痺湯見痺

若浴出未解濕裙褲忽爾熟睡濕侵腎經外腎腫痛腰背彎曲五苓散

加入真坏少許下青木香丸見氣三服藏府通腫消腰直痛止坐濕處腎丸腫痛六

味地黃見虛

加柴胡吳茱萸肉桂各一錢獨活五分若濕與熱相搏清熱滲濕湯

其証肩背沉重疼痛有熱則上行于肩背也

上熱胸膈不利及週身疼痛者拈痛湯見身體痛濕

熱發黃當從鬱治凡溼熱之物必鬱而後黃

逍遙散勿用茵陳五苓酒麴乳酪停滯不化除濕湯及蒼

白二陳湯消息之即二陳加二术

上吐下利二法利比吐為多以濕水也多就下

又利大便小便二法利小便比利大便為多以濕非挾痰食等濁物者皆當由小便出也故曰利濕不利小便非其治也燥濕三法風以勝之風動而地乾也羌防等

土以潤之水得泥乾也芩木等酸以收之斂約不使泛濫也肉繫縮則不虛黃丹白礬等肉繫

實則水不能藏不得不從二便泄去

濕脈必緩兼浮為在表兼沉為在裏兼弦為風濕兼數為熱濕

兼遲為寒濕通用蒼朮茯苓朱芩木通木瓜石斛在上加防風在中倍蒼朮在週身加烏藥羌活在兩臂加桑枝咸靈仙在兩足加牛膝草薢防已寒濕雖暑月亦覺清

涼加虎骨宮桂血必虛加當歸

傷燥

經曰諸燥枯涸乾勁者必硬動燥皴揭皴裂也揭掀起也凡物之皆屬于燥燥為肺金之化秋令也所以致燥有二一因于寒秋風清肅夏令之濕至是而乾所謂風勝濕也一因于熱夏時熱盛有濕以潤之至秋則濕退而熱猶未除故燥所謂燥萬物者莫燥乎大也其因于熱者固熱矣即因于寒者亦未始非熱何則秋令降斂陽氣內入寒氣外束故每當秋涼多覺口鼻氣熱是其理也此言天時之致燥也若或亡血亡津腎虛火盛致此多端則又屬於人事矣在外則皮膚皴揭枯濕在上則鼻咽喉乾在下則二便涸濕在手足則痿弱無力筋所致在脉則滯虛衰治以甘寒潤劑清肺以滋水源庶幾血充液滿澤及百骸滋燥養榮湯大補地黃丸清涼飲子導滯通幽湯潤腸丸二方見大便不通八正散淋皆可隨証選用也內經每云秋傷于濕蓋運氣之說以立秋處暑白露三氣屬濕土也畢竟傷燥者多

春溫

溫瘧為風溫

溫春陽之氣也時至春而陽氣發動人應之身中之陽氣亦發動一遇風寒外襲閉其腠理此氣不得升發即鬱而為熱與冬月傷風寒發熱無異而有惡寒不惡寒之分者以冬時陽氣潛藏表陽虛故怯寒春月陽氣升發表陽盛故不怯寒也無汗者

當發散然冬月陽微可用辛溫春月陽盛宜用辛涼仲景麻黃湯正為冬月傷寒立法不可混施於此証也。經謂冬傷於寒春必病溫又謂冬不藏精春必病溫又謂凡病傷寒而成熟者先夏至為病溫後夏至為病暑程郊倩謂冬傷于寒寒字當腎字看蓋腎水屬冬其氣寒故古人往往言腎為寒如言肝為風言脾為濕之類細閱前代醫書自見冬傷寒云云謂耗傷腎水陰精泄而不藏陰虛則大炎至春陽氣發動大炎之势不可遏止一為風寒所鬱故溫熱病生耳然豈特不藏精者乃然哉即火成熱因春陽而發為溫瘡也即先夏至為病溫之意邪不能自出句上當有岩字因遇暑氣腦髓灼肌肉消言熱至骨腰理開發此五句言若春時邪猶不能發至或有所用力邪氣與汗皆出此病藏于腎先後內出于外也如是者陰虛而陽盛盛則熱矣衰熱氣也則氣復返入入則陽虛虛則寒矣陽氣發泄太過則表虛而怯寒表怯寒則內返氣內返則表愈虛所以寒也明是言冬時觸寒子何敢程說耶曰禮記謂言非一端而各有當各求其當可也。風溫即春溫之重者仲景曰太陽病發熱而渴不惡寒者在冬月傷寒則為溫病春月感冒邪在太陽即得此証不俟發汗已泄應愈矣身灼熱者名風溫如風之搏大愈加燔盛也揚風溫為病脈陰陽俱浮自汗出風溫原本有汗由內熱燔盛蒸發之故身重壯熱傷氣無汗者為重矣身重氣以動故重多睡眠鼻息

必鼾熱壅神昏也 語言難出癱瘓陽氣不榮也 若被下者小便不利陰竭直視精不榮也 失溲陰不守也 若

被火者微發黃色火上加大熱壅欲發黃也 而熱多溼少故微黃也

火薰之一逆尚引日再逆促命期火燒筋脈為熱灼乾 大抵風溫忘汗亦不宜下

裡熱未實者不宜 尤不宜大

當用雙解散去麻黃加桂枝石羔余謂桂枝不必加也

散審其表裡之重輕為加減可也 也

雙解散乃防風通聖散合六一散金鑑稱其神效加減用之可也

此方雖內犯芒硝大黃然泄熱莫速於此且分兩有限不至天下無傷也前人云溫熱証誤下不妨

誤汗則殆硝黃可用則用之可不用則去之是在臨証斟酌耳

風溫汗太多脈虛者桂枝湯見傷寒 合人參白虎湯見發熱

溫病兼暑証名溫毒治法不出上條

濕溫即溫病換溼者其証身重胸滿多汗兩脰冷白虎湯加蒼朮茯苓

瘟疫病論

瘟疫非傷寒也世醫誤以為傷寒矣傷寒感天地之常氣此感天地之厲氣也邪自口鼻入內不容藏府外不容經舍于伏脊之內去表不遠附近于胃乃表裏分界是為半表半裏鍼經所謂橫連膜原是也凡邪在經為表在胃為裏令邪在膜原正當經胃交關之所病之始發凜凜惡寒甚則厥逆陽熱鬱極而通則厥回而中外皆熱始而惡寒既而發熱非若傷寒發熱而兼惡寒也瘟初起先憎寒後發熱頭痛身疼脈洪而數其脈不浮不沉蓋以邪在膜原故也不可認為傷寒表証而發其汗邪不

在經汗之徒傷又不可下邪不在裏下之無益宜達原飲疏之 檳榔二錢厚朴一
錢草果五分知母一錢芍藥黃芩各一錢甘草五分午後溫服右檳榔厚朴草果三
味消滯破結協力並逐使邪氣遠離膜原後四味為滋液和血清燥和中之用

按此湯初起可用若病成熱識用此恐無濟有表者宜用河間雙解散無表者宜用東垣

二聖散苦丹以及涼膈白虎黃連解毒普濟消毒等劑慎對症之药酌用可也

其邪

錢一

腰背項痛邪溢于太陽也加羌活

錢一

目痛眉棱骨痛眼眶痛鼻乾不眠邪溢

于陽明也加乾葛

錢一若不見三陽經証不必加藥止照本方

已上論初起用達原飲

服此藥其邪不傳裏者一二劑自解其証候頭痛身痛發熱而復凜凜但內無胸滿腹脹等証穀食不絕不煩不渴此邪氣外傳由肌表出或自發斑消或從出汗解班有斑疹桃花斑紫雲斑汗有自汗盜汗狂汗之異此病氣使然不必較論但求得班得汗為愈病耳此邪自外傳順証也勿藥亦能自愈

其有汗出不徹而熱不退者宜白虎湯生石膏

一錢知母甘草各五分

粳米撮服此藥辛

涼解散或戰汗或自汗而解蓋前服達原飲毒結漸開邪氣已離膜原尚未出表然

內外之氣已通故多汗脈長洪數故宜白虎辛涼散之也 其有斑出不透而熱不

退者宜舉斑湯白芍當歸各一升麻五分

白芷柴胡各七錢川山甲

二錢水薑煎服 其

有斑汗並行而熱不除者宜白虎合舉斑湯 斑汗既愈一二日或四五日後依前

論邪
傳表

發熱無胸滿腹脹等証脈洪而數此膜原有隱伏之邪發未盡也勿藥一二日間當仍自汗自斑而愈未愈者仍依前法治之然亦少有至於再三發者更少有也已上

若服達原飲而無汗無斑外亦無頭疼身痛惟胸膈痞滿此邪傳裏也 有欲吐不吐者有得少吐不快者邪傳裏之上也宜瓜蒂散吐之甜瓜蒂一錢赤小豆二錢生梔仁二錢用水二鐘煎至一鐘後入赤豆煎至八分先服四分一時後不吐再服盡吐之如未盡煩滿尚存者再煎服如無瓜蒂以淡豆豉二錢代之此病飲食不能胸膈煩而腹不滿吐之則邪減邪盡病自己 有心腹脹滿不嘔不吐或燥結便閉或熱結旁流或傷熱下利或大腸膠閉邪傳裏之中下也宜承氣湯大黃一錢厚朴一錢枳實一錢芒硝二錢若但上焦痞滿無便結等病去芒硝即小承氣湯也然雖無結糞而大便粘膩極臭者亦加之若不痞滿止便結者去厚朴枳實芒硝用二錢五分加甘草一錢即調胃承氣湯也服此導去其邪邪減病自減邪盡病自己 有胸膈滿悶心腹脹滿下部熱結膠粘者此上中皆病也不可吐之為逆但用承氣湯則上邪順流而下嘔吐立止脹滿漸除 具有吐後下後既愈二三日或四五日依前復發者在上者仍用吐藥在下仍用下藥此為再裏之証常事也甚有三發者亦少有已上論邪傳裏

中央此表裡分傳也其証外則身熱頭痛身疼腰背頸項痛眉棱痛口苦耳聾鼻乾內則胸膈心腹滿悶下部熱結此瘟病常事也斷不可強求其汗宜用承氣湯先通其裏邪去則氣通乘勢皆發于肌表矣若表裡証悉去而熱仍不退此膜原之宜三消飲檳榔草果厚朴白芍甘草知母黃芩大黃葛根羌活柴胡姜棗煎服調之可愈服藥既愈三兩日復發者仍用三消飲復下復汗如前而愈此亦常事也至有三發者亦少有若表邪多裡証少當治表兼治裡三消飲大黃少用若裡証多表証少但治裏或吐或下表証自愈

已上論表
裏分傳

若始病但發熱頭痛身疼口苦鼻乾而內無裏証止宜達元飲加減法若不見三經病止于發熱不用加法繼而脈洪大數自汗而渴邪離膜原未能出表也宜白虎湯辛涼解散脈靜身涼而愈愈後數日依前發熱仍宜達元飲至後反加胸滿腹脹不思食煩渴舌上刺等証皆由表傳裏也達原飲加大黃微利之久而不去在上者用吐方在下者用承氣下方若始則發熱漸加裏病既用承氣等湯下之而裏病除矣數日內復發熱反加頭痛身疼此由裏出表也脈浮者宜白虎湯下後熱減不甚熱雖無頭痛身疼而三四日後精神不慧脈浮者亦宜白虎湯汗之若服白虎湯不得汗者因精液枯竭也加人參覆卧則汗解若大下後大汗後表裏証悉去矣繼而一身盡痛身如被杖甚則不可轉側周身骨寒而痛故氣血虛非表証也當自愈已

瘟病備用諸方

天行大頭發熱頭項腫或喉痺腫痛苓連消毒湯柴胡甘草桔梗川芎黃芩荆芥黃連防風羌活枳殼連翹射干白芷右方先入大黃利去一二次後去之加人參當歸牛膀薑煎服

時行風瘟寒熱身頭痛咳嗽神木散藁本羌活甘草白芷細辛蒼术川芎姜葱煎
感冒聲啞是浪子瘟敗毒散羌活獨活前胡柴胡枳殼茯苓川芎乾葛甘草桔梗
一鄉人皆感冒咳嗽亦是瘟用敗毒散

一鄉人多發熱內熱逐瘟湯黃連戊癸年倍黃芩乙卯黃柏丙寅甘草甲子山梔丁壬香附紫蘇分大黃倍三加硃砂雄黃為丸亦可湯則冷服

嵐瘡溪毒中人病發則迷因燥狂或聲啞此敗血毒症乘脾也玄妙散人參枳殼大黃柴胡黃芩半夏甘草

腫頭傷寒玄黃辟瘟丹玄參大黃連翹牛蒡各一錢酒黃芩酒黃連各二錢羌活荆芥防風各五分石膏桔梗各一錢甘草一錢食後作二十次頻服

蝦蟆瘡類傷寒身生濃泡疹子防風通聖散防風當歸川芎白芍連翹薄荷麻黃各分石膏桔梗黃芩各八分白朮梔子荆芥各三分滑石二錢大黃芒硝各四分甘草一錢

瘟疫雜病論

汗論

不得汗雖被覆火灼亦無邪初發定在半表半裏至于傳變有出表者有入裏者有表裏分傳者凡見有表復有裏之病必先攻裏裏邪去而後得汗若裏氣壅滯陽氣不舒四肢且廢安能氣液蒸蒸以達長此如水注閉其後竅不能涓滴凡見表裏分傳之証務宜承氣裡氣一通不待發散多有自能汗解不然者雖大劑麻黃湯連進非惟一毫無汗且加煩燥矣

戰汗邪先表後裡忽得戰汗經氣舒泄當即脈靜身涼煩渴頓除若應下失下氣消血耗欲作戰汗但戰而不汗者危以中氣虧敝但能陷降不能升發也次日當期復戰厥回汗出者生厥不回汗不出者死以正氣脫不勝邪也戰而厥回無汗者真陽尚在表氣枯涸也可使漸愈戰而不復忽瘡者必死凡戰不可擾動但可溫覆擾動則戰而中止次日當期復戰凡戰而汗不出宜大劑歸地加參內托

自汗不因發散自然汗出邪欲去也若身熱大渴脈長洪而數宜白虎湯得戰汗方解若下後得自汗數日不止熱甚汗甚熱微汗微此表有留邪實病也邪盡汗止如不止者柴胡湯佐之表解汗當自止設有三陽經証當照前用本經藥加減法若誤認為表虛自汗用寢表正汗之劑則誤矣有裡証時當盛暑宜白虎湯若面無

神昏刮白表裏無陽証喜飲熱畏冷脈微忽自汗為虛脫夜發晝死晝發夜死急當峻補補不及者死大病愈後數日每飲食及驚動即汗此表裏虛怯宜人參養榮湯人參麥冬五味子地黃歸身白芍知母陳皮甘草黃耆倍加

盜汗裏証下後得盜汗者內有微邪也凡人目瞑衛氣行于陰令內有伏熱兩陽相搏則腠理開而盜汗出若伏熱一盡盜汗自止如不正者柴胡湯佐之柴胡三錢黃芩一錢陳皮一錢甘草一錢生薑一錢大棗二個煎服

愈後脈靜身涼數日後反得盜汗及自汗屬表虛宜黃耆湯黃耆三錢五味三錢當歸白朮各一錢甘草五分仍不止加麻黃根一錢如有熱者屬寢不宜用此

狂汗邪將去而欲汗解因其人稟素壯陽氣盛不能頓開三句當改云陽浮于表躁擾不寧忽然坐卧不安發狂燥少頃大汗而燥止脈靜身涼霍然而愈

發癰邪留血分裏氣壅閉則伏邪不得外透為癰若下之內壅一通則衛氣疏暢透表為癰而邪外解矣若下後癰漸出不可更大下設有宜下証少與承氣湯緩緩下之若復大下中氣不振癰毒內陷則危宜耗裏舉癰湯白芍當歸各一錢升麻五分白芷七分柴胡各一錢川山甲二錢黃水姜煎服如下後癰漸出復大下癰毒復隱反加循夜摸床撮空理線脈漸微者危本方加人參一錢補不及者死若未下而先發癰者設有下証少與承氣湯須從緩下

熱結旁流久痢清水奪液不得汗 痘証失下或挾熱下利脈沉久不下之致津液枯竭後雖下裏証去矣脈雖浮宜汗而不得汗此為奪液無汗然裡邪既去但得飲食少進十數日後中氣利下當作戰汗而解可滋其陰陰液內
充外溢自然得汗

下論

舌白胎邪在膜原也若變黃胎邪入胃也胎黃宜下 黑胎邪毒在胃宜下下後二三日黑皮自脫有一種但舌黑而無胎此經氣非下証也妊娠有此陰証亦有此不可下經血瘀熱或寒凝皆舌黑以在胃故無胎故不可下下後裏証去而舌尚黑胎皮未脫不可再下若無下証設舌見離離黑色者危急補之 舌芒刺熟傷津液此疫毒最重者急下之若老人微瘦無下証舌上乾燥生胎刺用生脈散生津潤燥胎刺自去 舌裂日久失下多有此証急下裂自滿 舌短舌硬舌捲皆邪氣盛真氣虧急下之舌自舒白胎乾硬如砂皮急下之

唇燥裂唇焦色唇口皮起口臭鼻如烟煤胃熱多有此症當下鼻孔煤焦急下之若唇皮起仍用別証互較慎下無遽也 口渴詳有下証者下之邪去而渴自減若用生津止渴藥無效也如大汗脈長洪而渴未可下宜白虎湯汗更出而身涼渴止目赤咽乾氣噴如火小便赤黑作痛小便臭揚手躡足脈沉數皆內熱也當下之心下滿心下高起如塊心下痛腹脹滿腹痛按之愈痛心下脹痛皆宜下氣通則已

頭脹痛詳有下証者下之。若初起頭痛別無下証未可下

小便閉行大使則小便通利水藥無益也

大便閉下之無辭若老人及素弱人用膽導法

大腸膠粘下之自愈渴熱下利宜下

四逆脈厥體厥此氣閉也宜下之下後反見此証者為虛脫宜補脈厥無脈也
體厥身冷也

發狂胃寒陽氣盛宜下之

下後諸變証論

下後脈浮既下矣脈浮而數身微熱神思或不爽此邪熱浮于肌表雖無汗宜白虎湯汗解之。若大下數下脈空而數按之如無白虎湯加人參覆杯則汗解似當加歸地下後脈浮而數宜汗不得汗或或遷延五六日脈証不改終不得汗或素有虧虛也亦或利久使然用加人參白虎湯得汗而解下後脈復沉既下脈宜浮是汗解兆也令不汗而脈復沉餘邪覆入胃也宜更下之。

更下後脈再浮仍當汗解宜白虎湯

下後病愈數日復發熱此非鬪飲食勞役勿歸咎于病人也此餘邪匿而復發必然之理再少下之即愈勿用大劑也

下後身反加熱下後當身涼令反加熱此結開而氣通鬱陽伸越也即如爐中伏火

撥開雖焰不久自熄此與下後脈反數義同若無下証而妄下之過早者其發熱乃病勢原當逐漸發熱非因誤用承氣更加發熱也日後邪氣傳胃有下証者宜更下之

下後脈反數應下失下口燥舌乾而渴身熱反減四肢時厥欲得近火擁被此陽氣壅伏也既下矣厥回不冷脈大而加數舌亦不乾渴此裏邪去陽氣暴伸也宜柴胡清燥湯柴胡黃芩陳皮甘草去花粉去知母加葛根隨其性而升泄之

下後數日舌上復生胎刺邪未盡也再下之胎刺未去然已輒但熱渴未除更下之胎刺既去日後又熱仍宜下之其中或緩或急或輕劑或重劑或兼用柴胡清燥湯犀角地黃湯至投承氣湯或宜多與或宜少與宜臨症斟酌

下後病全愈但腹中有塊按之痛氣時不利常作蛙聲此邪氣盡而宿結未除也可攻徒損無益待胃氣平復自能潤下或滋陰下食者新致則陳自推

下後腹滿去思食知味而熱未除脈近浮此表尚有餘邪也當得汗解如不汗以柴胡清燥湯和之復不得汗者以漸而解也勿苛求其汗

戰汗後復下後越數日腹痛不止欲作滯下也勿論已見病未見病宜芍藥湯白芍

當歸各一錢柳錢厚朴錢甘草分裏急後重加大黃錢紅積倍白芍白積倍檳榔

下後自汗不止詳自下後盜汗詳盜

下後癥漸出

註發

下後癥出復下癥反隱

病下詳發

下後或數下亡陰瘧病有宜下者不得已數下之致兩目澁枯乾津不到咽唇口
燥裂由其人素多火而陰虧令重亡津液宜清燥養榮湯知母花粉當歸身白芍陳
皮地黃汁甘草燈心煎服 如熱渴未除裏証仍在宜承氣養榮湯知母當歸白芍
藥生地大黃枳棗厚朴姜煎服 如表有餘熱宜柴胡養榮湯黃芩陳皮柴胡甘草
當歸白芍生地知母花粉姜棗煎服 如痰涎湧其胸膈不清宜貝母養榮湯知母
花粉瓜萎仁貝母橘紅白芍當歸蘇子姜煎服

忌參木

下後餘熱不能頓除以膜原之邪未盡傳胃故也當寬緩兩日以柴胡清燥湯緩劑
調理

下後反痞下後痞應去而反痞者虛也其人素弱或新病初起脾失健運故也再用
行氣藥則非矣宜參附養榮湯當歸白芍人參炒乾姜各一錢 生地黃三錢炮附子分七
果是虛一服必愈

虛寢宜辨表雖微熱脈不甚數口不渴者是虛痞若潮熱口渴脉數者是寢痞寢痞
宜再下之用此則大害

下後反嘔下後嘔宜去而反嘔此胃氣虛寒少食便吞酸宜半夏霍香湯一服嘔止
半夏一錢 霍香炮姜陳皮白茯苓白朮各一錢 甘草五分 姜煎服

下後脈浮宜汗不得汗見奪液不
得汗條

下後奪氣不語下後氣血俱虛神思不清惟向裏睡似寐非寐似寤非寤呼之不應此正氣奪也與其服藥不當莫如靜守宜人參養榮湯補之能食者自然虛回前証自愈設不食者病轉加法當峻補

瘟病兼証論

吐衄此胃熱也必非臟寒烏梅丸理中湯萬不可用但用調胃承氣琥珀自愈

畜血疫久失下血為熱搏敗為紫黑溢于腸胃漱水不咽小便利大便黑是其候也宜桃仁承氣湯大黃芒硝桃仁當歸芍藥丹皮服此藥熱除為愈若餘熱尚存者宜犀角地黃湯五錢
搗爛加水煎
汁其渣入鍋煎白芍一錢丹皮一錢犀角一錢同地黃汁服

發黃疫邪傳裏移熱下焦小便不利邪無輪泄經氣鬱滯而發黃身目如金宜茵陳

湯茵陳一錢山梔二錢大黃五錢姜煎服

循衣摸床撮空理線筋惕肉瞤肢體振戰目睛不了了皆為脫擗失下或用緩药羈遲之故此元神將脫也補之則毒甚攻之則氣已虛危証也不得已勉用黃龍湯大黃厚朴枳實芒硝人參地黃當歸或用人參養榮湯亦可但虛候少退即宜屏去勿久用也服藥不受額汗支冷振戰心煩坐卧不安此中氣虧不能勝藥也名藥煩急投姜湯立已或藥中多加生姜煎服則無此狀矣更宜均藥為兩三次服以防嘔吐

服承氣湯全不行或次日方行或半日仍吐原藥此因中氣虧不能運藥也大凶之兆宜加生薑人參以助胃氣然有病重劑輕亦致不行不在此例

思冷飲熱渴甚也勿論四時宜量與之若儘意飲則水停心下矣

虛煩坐卧不安手足不定六脈不顯尺脈不至此元氣不能主持法當大補
神虛讐語未下之前讐語必有內熱煩渴之証此為寢病宜下既下之後數日內讐
語不止此元神未復也急宜清燥養榮湯協熱下利泄瀉稀糞色必赤黃或焦黃此
胃不留邪也一二日利止熱退為病愈利不止者宜小承氣下之而利自止若利
一二日忽煩渴又泄此伏邪又發也仍照前治

大便閉結內熱故也宜下之諸病若失

呃逆有寒有熱以本証參之熱則白虎承氣寒則四逆湯

熱結旁流先便閉後純利清水全無糞此糞結于內也宜承氣湯下結糞而利自止
若服藥後結糞不下仍利臭水邪猶在也病必不減再下之

大腸膠閉極臭如粘膠而却不結此熱極也不下即死

小便赤色胃熱也宜調胃承氣湯

小便急數白膏如馬遺膀胱熱也宜猪苓湯猪苓錢澤瀉一錢滑石五分甘草八分木通一錢

車前二錢

小腹按之硬痛小便自調此畜血也桃仁湯桃仁三錢丹皮當歸赤芍各一錢

阿膠二錢滑

石五分

脈厥神色不敗言動自如別無怪証忽六脈如絲甚至于無或一手先伏此失下氣閉故也宜承氣湯緩緩下之六脈自復忘生脈散

愈後諸証論

愈後大便久不行作嘔不進食此下格病也宜調胃承氣熱服下宿結而嘔止

愈後數日腹痛裏急此下焦伏邪欲作滯下也宜芍藥湯白芍當歸厚朴各一錢榔榔

錢甘草七分

愈後大便數日不行別無他証此虛燥也切不可攻宜瀝導法甚則宜六成湯當歸

一錢

白芍麥冬各一錢

地黃五錢

肉蓯蓉三錢

日後更燥宜六味丸減澤瀉

半錢

白芍麥冬各一錢

地黃五錢

肉蓯蓉三錢

日後更燥宜六味丸減澤瀉

愈後五更夜半作瀉其脈遲細而弱此命門陽虛也宜七成湯故紙三錢炮附白茯苓

人參各一錢

五味子各一錢

甘草五錢

愈後更發者八味丸倍加附子

愈後微渴微熱不思飲食此正氣虛也強與之即為食復漸進稀粥以復胃氣

愈後能飲食肢體浮腫此氣復也胃氣大健則浮腫消勿誤為水氣若小便不利

而腫乃是水腫宜濟生腎氣丸

愈後因勞而復發熱宜安神養血湯茯神棗仁白芍藥當歸遠志桔梗地黃陳皮甘

愈後傷食吞酸噯氣而復熱輕則少食重則消導自愈若無故自復此前邪未盡除也稍與前証所服之藥以徹其餘邪自愈

婦人小兒瘟病論

經水適來而瘟邪不入胃入于血室至夜發熱譫語或止夜熱而不譫語宜柴胡湯柴胡黃芩半夏甘草生地

經水適斷而瘟宜柴胡養榮湯與適來有虛實之別

妊娠瘟病宜下者照前法下之毋惑參木安胎之說而用補藥則大凶矣但下藥得下則已勿過劑矣

小兒瘟病遇時氣盛行發熱目吊驚搐發瘙是也宜太極丸天竺黃胆星各五

三錢麝香三分

水片分殼鹽

三錢

糯米飯

丸如艾葉大硃砂為衣

凡遇疫症

蜜湯下一丸神效

補遺病論

疫兼痢發熱身痛渴燥滿吐最為危急宜瀉芍順氣湯瀉柳白芍枳實厚朴大黃生薑煎服

疫兼水腫宜小承氣下之

陽証似陰外寒而內熱則小便必赤最易辨也

陰証似陽此傷寒有之瘟病無有也

瘧

內經論瘧謂生于風蓋外感風寒邪在太陽陽明屬表則發熱在少陽屬半表半裏則寒熱往來觀傷寒論可見瘧疾往來寒熱邪在少陽也故仲景有瘧脈自弦弦數多熟弦遲多寒之說喻嘉言亦謂邪在少陽或兼他經証則有之謂他經而全不涉少陽則不成其為瘧故不論兼有何脈皆不離弦之一字以弦乃少陽脈也然傷寒少陽証往來寒熱無定期而瘧病往來寒熱則有定期者以彼正受感無形之邪風風者善行數變故無定期此雖亦感無形之邪風然必鬱成有形之痰涎留滯一處與日行之衛氣相遇邪正交爭乃作故有定期也古謂無痰不成瘧以此夫瘧由于痰滯而瘧之滯也豈獨由于風寒一切外感內傷皆能致之故又謂無食不成瘧以食滯成痰也外感以風寒為舉隅內傷以食為舉隅所當推廣以求之者也又推之外感內傷既能鬱熱畜痰獨不能停滯血而為是証乎此楊仁齋所以有黃水瘀血之論也問曰痰血留滯之說深為有理然嘗見痰滯血凝結為瘡腫發為寒熱亦無定期且或有不發寒熱者何也曰瘡腫初起發寒熱者必其邪盛勢大者也邪盛勢大連踞表裏無時不與衛氣相遇旋滯旋通旋滯故無定期其後不復發寒熱者以日久正氣鬪行徑不與之爭也說見續篇若其初亦不發寒熱者必其瘡腫之

小者乃無小邪不足以滯大氣也 經曰陽併於陰則寒 邪相爭正為邪滯內鬱不通不達于表則表寒不行于裏則裏寒內外皆寒似純陰無陽者 陰併於陽則熱陽然故曰併也何謂併於陰乃陽氣入于陰分亦即內鬱之說 陰併於陽則熱陽成熱鬱久則伸內熱外達內寒時毛髮豎立欠伸偏體寒慄鼓領陽併于陰則陽虛外皆熱似純陽無陰者然陽明脈循頸車也高鼓峯謂熱鬱將發火氣 腰背頭項俱痛 太陽虛也太陽脈抵腰冲突元氣走散故寒稟與經少異然亦通夾背工額交顙下項此時不必用藥可知熱時內外皆熱永水不能寒也

中外皆寒此非真寒乃陽鬱之寒耳湯大不能溫也

則此時不必用溫藥可知

此時不必用藥可

知此段醫經文

有一日一作而或日早或日遲者按內經謂風邪所客視其虛而入之如腰脊虛則入腰脊手足虛則入手足風府虛則入風府因舉入風府者以例之風府穴名在項上臨中邪客風府有淺有深淺者衛氣日行于表與淺分之邪相遇夜行于裡則不與遇矣深者反此故每日一遇如今日卯時與遇明日卯時又遇也衛氣到則肉理開邪氣之在風府者得以入之正不容邪相爭而病作矣此邪氣留滯其處着而不行者故每旬如期而發若邪氣行而不着每日循夾脊之脅下行一節自風府至尾骶骨共二十五節則風府之邪計二十五日下行至骶骨與衛氣每日離一節故其作日遲如今日卯時衛氣到風府與適在風府之邪遇而病者明日卯時衛氣又到風府與已離風府而下行一節之邪不相遇則必待衛氣追及邪氣相遇乃作故日遲也邪氣二十六入于脊內注于伏行夾脊脅間之脈其氣上行無關節之間隔故

九日而上出于缺盆之中衛氣從腹上行從背下行伏膂之脈亦背也下行之衛氣迎上行之邪氣故其作日早也此內經之說如是然有忽早忽晏又忽復早者則邪氣忽上忽下忽淺忽深行無一定之故也豈必下盡二十五節乃始上行乎發于晝者為陽邪淺在陽分也發于夜者為陰邪深在陰分也日早者邪由深出淺也日晏者邪由淺入深也經言上下不言淺深者以衛氣晝行表夜行裏即是言淺深耳府橫連膜原膜原者膈膜之處空曠若平原邪正可以並容阻礙不甚故久滯乃發也靈樞歲靈篇所謂蓄積乃作也發于子午卯酉日為少陰經瘡發于辰戌丑未日為太陰經瘡發于寅申巳亥日為厥陰經瘡舊說如此不必泥按衛氣遇邪之說經言不一而足又一條云夏傷于暑熱氣藏皮膚之內腸胃之外此營氣之所舍也能令人汗孔疎熱舍營分蒸汗故也腠理開暑邪若可泄矣因得秋氣至秋而感冒寒氣也汗出遇風及浴水感寒此言或當時遇風浴水不必至秋乃感寒氣藏膚內暑邪不得泄矣或謂暑邪已經汗泄此言寒邪內藏耳然經內謂夏暑汗不出秋成風瘡當從前說為是與衛氣併居相遇即衛氣日行陽夜行陰此氣邪得陽而外出得陰而內薄暑邪在陽分則外爭在陰分內爭也內外相薄或在外或在內與衛氣相迫薄故日作是亦以衛氣為言也乃又出一條云夏傷于暑汗出腠開遇夏氣淒清之水寒吳鶴臯謂水當作小藏于皮膚至秋復傷于風先傷于寒為陰邪後傷于風為陽邪故先寒後熱為寒瘡若先傷風後傷寒則先熱後寒

名溫瘡詳其意是言陽風與陰寒相爭而為熱往來全與衛氣無涉果爾則遇時可作何必每日一作耶且風寒無大分別無論冬月即當暑令得風則涼是風亦即寒也而謂風為熱氣可乎其說可疑必後人之偽託也又經論溫瘡先熱後寒謂得之冬中風寒氣藏骨髓中此與內經所言冬不藏精之人外感風寒深入骨髓鬱熱于為溫暑內精不藏則腎水先虛熱伏則腎水益涸至春夏遇風寒發病意同氣而大發也至春則氣大發寒鬱成熱因陽邪深藏也因遇暑氣腦髓灼肌肉消言熱至腰理開發或有所用力邪氣與汗皆出此病藏于腎先從內出之于外也如骨也是者陰虛而陽盛盛則熱矣衰熱衰也則氣復反入人則陽虛虛則寒矣陽氣發泄太過則表虛而氣內返則表愈虛故寒也此亦不言衛氣與邪遇且與上條所論溫瘡先傷風後傷寒故先熱後寒不同豈溫瘡固與他瘡不同特以其有寒熱與瘡相類故亦以瘡名之其証自有兩種耳安得起作內經者閑之

有經瘡內經曰足太陰膀胱之瘡腰痛頭重寒從背起太陽脈抵腰上頭夾背也先寒後熱刺却中羌活加生地黃湯中郎眼中太陽脈易老治法宜用足少陽之瘡膽經身體解你名解你身體解情寒不甚陽併于陰自外之內則寒甚陰併于陽自內之外則熱甚少陽乃在半表半裏往来不遠非若他經之大出大入也故其寒熱不甚想當然耳惡見人見人心惕惕然少陽以胆為府經虛則府亦虛故見人而恐也熱多汗出甚升發使然刺本經易老用小柴胡湯足陽明經之瘡先洒淅寒甚久乃熟熟去汗出喜見天日火光陽明受陽邪則惡日善之汗出熱泄陽氣乍虛雖原受陽邪亦喜之矣刺跗上本經衝陽穴易老用桂枝二白虎一湯黃芩芍藥加桂湯足太陰脾經之瘡不

樂好太息

脾脈不運則上焦氣不行故不樂而太息以舒之

不嗜食

氣不化故不飢

多寒熱汗出病至則嘔嘔已乃

良咽

故善嘔

刺本經穴

易老用小建中湯異功散

足少陰經之瘧嘔吐甚

腎脈上貫肝鬲循喉嚨故也

寒熱

邪入深熱多寒少也

水虛欲閉戶牖而處急躁喜靜其病難已

刺法失易老用柴胡加半夏湯

足厥陰肝經之瘧腰痛少腹痛小便不利

肝脉過陰器抵小腹故也

足厥陰

肝之益寒故心覺寒冷

已上論別足六經証不言手六經以足經長而遠可包手經故此與

按瘧分六經又分藏府正

傷寒并單舉足經言非病必不涉于手經也可以意推

按瘧分六經又分藏府正

利非意肝氣鬱故淋也

噫以舒之恐懼不足則恐也

氣不足腹中悒悒

不快之意氣不足則不得舒鬯也

刺本經

易老用桂枝附子湯

少陽經者居多此仲景嘉言所以專主少陽立說也

有藏瘧內經曰肺瘧心寒

肺金本清肅寒邪加之益寒故心覺寒冷

刺太陰肺經及手陽明大腸經

兩經相表裏故分刺以殺其熱易老用桂枝加芍藥湯

按五藏不受邪而經

耗故神不安

刺太陰肺經及手陽明大腸經

桂枝加芍藥湯

按五藏不受邪而經

桂枝加芍藥湯

桂枝加芍藥湯

列此五藏証者蓋有藏氣素虛之人為七情所傷藏氣不行因鬱痰欬諸邪于內而成瘧也

心瘧令人煩心欲得清水反寒多

太息以達之

刺本經

易老用桂枝黃芩湯

桂枝加芍藥湯

不甚熱

熱在裏故外不甚熱而多寒

刺本經

易老用桂枝黃芩湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加芍藥湯

若死者

木為春生之氣不舒而閉也

刺本經見血

易老用桂枝黃芩湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加芍藥湯

汗出刺本經

易老用小建中湯

腎瘧洒洒然腰脊痛

屬腎宛轉大便難

易老用桂枝附子湯

桂枝加芍藥湯

加當歸芍藥湯用桂枝

有府瘡

內經曰胃瘡善飢而不能食胃熱故飢牌食而支滿腹

大支撐刺本經及足太陰脾經橫脈

二經絡脈之橫者

出血以此論胃府瘡症不言諸府可

以諸經之邪皆得入胃也

大抵因風寒者先必有怯寒鼻塞等証宜發散若春時感風寒成溫

瘡者必渴必汗出不惡寒熱多寒少多先熱後寒

熱多陽勝陽性急故先發熱衰而退表氣乍虛故微覺寒宜白虎湯

因傷暑者必多汗煩悶喘渴體若燔炭宜加暑門之藥煎成露一宿乃熱之而服

感燥氣者必膚索脣揭咽乾鼻燥宜滋潤之劑

感溼氣者必身重而痛小便不利宜去溼

因時氣者必一方長幼病皆相似審係何氣之邪治之因飲食所傷

者証見痞悶惡食噉腐小柴胡湯

見寒熱

合平胃散

見傷飲食便結者

大柴胡湯加芒硝厚朴

因氣鬱者必面色青滯脈濁腸痛嘔吐清水或苦水意不樂逍遙散

見鬱加黃連

吳茱萸水浸炒貝母倍柴胡

見勞倦者

必氣虛喘乏四肢困倦遇勞即發補中益氣湯

見氣

經年不愈邪結痞塊脹痛曰瘡母已上均審所蓄之邪是痰是血是黃水分別

治之又須看熱多寒少寒多以分寒熱然熱多寒少而脈空虛未可使用寒

涼熱少寒多而脈洪數未可概用溫熱又當細察也此外又有純寒無熱者曰牝

瘡蜀漆散牡蠣湯主之或柴胡薑桂湯減黃芩加半夏蓋其人素寒所蓄之痰飲亦

寒與衛氣相觸寒氣發動純陰無陽故但有寒無熱也又有純熱無寒者曰瘡瘍

緣肺氣素熱陽氣盛

所蓄之痰涎亦熱才遇衛氣之觸熱勢即便發也

令人消癰脫肉經云陰氣先絕陽氣

獨發

言肺熱偏于陽而無陰也則少氣氣也壯火食煩冤項熱不手足熱而欲嘔白虎湯合

又有感山嵐瘴氣溼熱熏蒸而爲瘴瘧者王裴曰南方天氣暑熱地氣鬱蒸草木水泉皆稟惡氣故病者往來寒熱名冷瘴蘊熱沉沉如卧炭火中者名熱瘴甚者病即失音名啞瘴熱甚晝夜不止稍遲二三日則血凝難救南方謂之中箭又謂之中草子有挑草子法乃以針刺頭額及上下唇仍以楮葉擦舌皆令出血徐以藥解其內熱可愈楊仁齋曰瘴瘧挾嵐瘴溪毒之氣致然血乘上焦令人迷悶甚則狂躁啞不能言皆由敗血淤心毒涎聚脾治須涼膈疎通大腸小柴胡加大黃觀音丸治瘴木香凡皆爲要藥僧繼洪曰冷瘴宜用不換金正氣散見中寒熱瘴宜用挑草子法此病最難治涼藥多不可用勻未妥涼藥雖恐冰血獨不可加辛散之品乎熱藥亦不可輕用且與和解可也啞瘴即熱瘴之甚者血得寒則凝濁得熱則淖溢面赤心熱舌破鼻劙皆熱沸血壅所致故宜用挑草子法出其血甚則血上塞心竅啞不能言但噫噫作聲即啞瘴也治此皆當散血用黑神散見立散黑神須慎用其或痰迷心竅而舌强者不在此論

又有似瘧非瘧者如傷寒邪在少陽經往來寒熱似瘧而無定期或一日二三偏且熱已即寒寒已即熱相繼不息不似瘧之有定期有息時也又虛人亦有寒熱往來經云陽虛則外寒陰虛則內熱陰氣上入陽中則惡寒本身下焦陰寒之氣陽分則惡寒工干陽氣上入陽氣工入陰中則發熱上焦陽氣下陷陰中則發熱故亦有往來寒熱似瘧而寔非瘧病後產後多有之

必由積漸虛損而致與瘧之發于陡然者不同且亦忽作忽止無有定期與瘧之不
爽其期者又別也

按瘧瘧亦有無定期者不可不知

治法無汗須發汗散邪為主

丹溪謂外邪必用汗解惟足厥陰最難得汗其汗至足方佳大率取汗非必用麻黃輩開鬱通經則邪即散而

為汗有汗當斂汗扶正為先新發邪寢者可汗吐下久病正虛者宜補氣血稍久而
正虛邪滯者宜一補一發若深入于陰分者宜先升後汗至若邪乘虛入則宜以發
散祛其客邪然後扶持胃氣瘦食氣滯則先以消導散其壅滯然後漸補脾元 諸
瘡發過三五次表裏之邪皆清即宜截之 凡用藥病正發時當避其銳氣于未發
前二時服

咳嗽

火刑肺金燥痒不能忍因咳嗽因痒痒因火燥是咳必有火然有虛實之分不可概
用寒涼嗽因于痰瘧本脾溼脾熱則溼蒸為熱痰脾寒則溼泛為寒痰熱者挾火作
痒而咳嗽併見寒者無火不作痒但嗽出其痰而已故古人分有般無痰為咳非必
也以咳因于痒不因于痰故不言痰也 有痰無般為嗽非必無般也以嗽本欲出其痰 有般有痰為咳
非因火逆作般故不言般也

嗽也

分外感內傷二証皆以肺為主外感邪從皮毛入皮毛者肺之合也皮毛受寒則汗
孔為寒所凝閉而肺氣鬱成熟或皮毛受熱亦傳入于肺而肺熱此固以肺為主若

內傷大炎大性親上不論何藏府之火皆得上干于肺故亦以肺為主也

外感以有咳嗽為輕蓋肺氣雖鬱尚能通也故鼻流清涕鼻痒而喉喉痒而咳若鬱甚則不能上通則鼻乾且塞無噴嚏咳嗽之証矣蓋鬱不甚者尚欲外散與上通甚則不外散而內攻不上通而下鬱也內傷以有咳嗽為重如肝腎之火其初止病下焦未遽上干也久而炎熾乃及于肺則病重矣若肺火自盛者不在此論

傷風消風甯嗽湯

肺火素盛之人易于傷風以肺有火則常汗出腠開邪易入又

內火盛畧被過鬱即熱也治宜解表兼清其火

金匱咳而上氣喉中水雞殼

痰飲與氣相觸射干麻黃湯上氣肺脹喘目如脫謂喘咳之甚脉浮大越婢加半夏湯上氣喘成聲

而急燥屬肺脹欲作風水

詳睡脈門發汗則愈小青湯見痰加石膏咳而脉浮者厚朴麻黃湯

以散外邪脉沉者澤漆湯

見發熱以逐內飲時行咳嗽發熱惡寒鼻塞氣急初病即伏枕一二日

即輕俗名蝦蟆瘟參蘇飲

見發熱加細辛五分外感風寒失于解表久不愈因而咳

血醫誤以勞証治之清金降火頻進寒涼外寒未解內寒又生纏棉日久遂致委頓

假勞變成真勞

俗云傷風變成勞者此也

此最當察醫貫云肺經受寒血凝不行咳嗽隨瘦而出其人必惡寒其脈必緊其血必有或紫或黑數點

此亦有火証不可執

用麻黃桂枝湯微汗

而愈者數人蓋汗與血一物也奪血者無汗奪汗者無血若作陰虛火動治殆矣

感風者鼻塞殷重傷冷者淒清怯寒挾熱則煩躁受溼則重滯有血則膈間腥悶停

水則心下怔忪 夏月大盛宜滋水清金黃連必用 感溼者身體重痛小便不利

或有汗白术酒

見中濕

秋燥宜潤杏仁瓜萎之屬

有冷熱相兼者因增減衣服寒

熱俱感遇乍寒亦咳遇乍熱亦咳飲熱亦咳飲冷亦咳

肺火素盛者亦如此

宜金沸草散消風

散

見頭痛

合煎或取冬花散以薄荷葉代麻黃 駁暴啞者寒包熱也宜辛涼解散有

痰壅于肺者金寔則不鳴也必清肺中邪滯清咽甯肺湯 咳而駁嘶杏仁煎潤肺

丸清音丸有熱咳失聲咽疼多進冷劑而駁愈不出者生薑汁調消風散

見頭痛少少暑

與之然失音非獨寔証有之宜審察佐以橄欖丸含化仍濃煎枕杷葉散

見中熱服

凡外感風寒治宜辛散所謂肺欲辛也若發散太過或形氣病氣俱虛即宜補內

傷者陰虛火旺治宜甘潤最忌辛香所謂氣病毋多食辛也然虛中有寔者亦宜行

滯 大鬱肺經氣分喘咳面腫身熱無痰瀉白散

見發熱

若面赤咳出血是大鬱血分

加黃芩生地內熱甚者加黃連咳急嘔逆腸痛者肝火也加青皮青黛等若喘而面

浮不得卧者是有痰飲水氣加苦葶苈以瀉之 肺燥宜潤二冬貝母阿膠雞子清

之屬痰因燥難出加括蔥仁喘加杏仁 動則喘滿氣急者肺脹也

基則胸高骨昂

或左或

右不能眠此痰夾淤血碍氣為病四物湯

見前金匱二條忌收斂

加桃仁訶子青皮竹懸姜汁韭汁之屬

壅遏不得眠者難治 咳久肺脹宜收斂訶子為主佐以海石香附

童便浸三日用

括蔥仁

青黛半夏麵杏仁薑汁蜜調噙之

初病外感肺脹見前金匱五倍烏梅粟壳等皆收後之品初病切勿用也

痰嗽痰出嗽止痰甚者外作寒熱痰多而清為寒寢多而稠粘為熱寢並壅閉正氣
寒寢者透羅丹熱寢者瀉肺丸 痰積非青黛括裏不除 凡咳嗽面赤胸腹脇常
熱惟足有涼時脈洪熱痰在胸膈也小陷胸湯見胸痛礞石滾痰丸見痰或用張子和法
吐下之尤快面白悲憤或腸急脹痛脈沉弦遲細者寒痰在胸腹也半夏溫肺湯

食積痰作嗽發熱者半夏南星為君括裏藥服子為臣青黛石滅為使 食積人面

青白黃色不常面上有如蟹爪路一黃一白者是 治酒嗽青黛括裏靈丸噙救肺

飲冷熱酒或冷水傷肺致咳紫苑飲 飲酒傷肺痰多瓜薑杏仁青黛黃連為丸

竹沥煎入韭汁吞之若慮太寒過火先以辛散之後以酸收之甚者吐之後與五苓

見傷寒甘露見霍亂等勝濕去痰之劑

醫貫謂肺為嬌藏畏熱畏寒火刑金固咳

見水腎火虛水降火上浮乘肺肺熱而咳

不可云金寒然是虛熱亦同寒治八味

見水腎火虛水降火上浮乘肺肺熱而咳凡有脾胃先虛不

能制水水泛為痰乘肺而嗽者又有初雖心火刑金因服寒涼傷肺脾虛而嗽者須

用六君子見氣加炮薑以補脾肺八味丸見虛以補土母又謂王節齋云酒色過度損

傷真陰者不可服參芪此說大是誤人予遇此証先以六味見虛壯水降火隨以參

芪救肺使金水相生而愈世之用寒涼者固非知用參芪而不知先壯水者亦非致

陽火旺而陰愈傷乃不識先後着也 凡咳嗽動引百骸覺氣從臍下逆奔而上者

腎虛氣不歸元也安腎丸等 勞嗽有因久咳嗽而成勞者有因病勞而咳嗽者其

証寒熱往來或獨熱潮熱盜汗咽喉乾痛精神疲困痰或濃或淡或帶血腥語音不出保和湯滋陰清化丸五汁膏並可用乾咳無痰乃火鬱之証人多有之用苦梗開之更妙

道遙散

次用滋補之劑四物湯

見

加炒柏竹炭等不已則成勞

經年累月服藥人多有之用苦梗開

不瘥餘無他証却與勞嗽不同宜保肺一味百部膏桑枝煎必效散噙化丸並可用

凡咳嗽上半日多陽火也

陽火旺于陽

痰稠黃二陳

見

加貝母石膏竹茹下半日多陰火

也起于下焦痰青黑粘滯四物湯

見

加炒柏知母或用知柏八味丸

見

黃昏咳多火氣浮于肺也

肺氣當降時而得降火浮故也

不宜涼藥當以五味五倍等斂而降之又黃昏睡

熱中忽嗽痰數口食積痰也

睡則脾靜不運而嗽前証大咳此証痰停于內

二陳

見

山楂麥芽消導自

己五更清晨嗽亦為痰停

理詳

痰門咳亦屬火火空則發也

每日寅時氣血注肺其時空心無所阻礙故火隨氣

乘空上浮

二陳加黃芩桔梗桑皮

見

日輕夜重屬陰虛二陳加當歸

喘哮

喘謂呼吸迫促勞動之人多有之

如奔走氣喘是也

其在病機則氣之上奔也古人又以短

氣名之謂呼吸之氣短促也然有實喘虛喘之分所當詳辨寢者有邪邪氣寢也虛

者無邪正氣虛也寢喘之狀張口抬肩搖身擷肚胸脹氣粗殷高息湧惟呼出之為快也虛喘之狀氣少而不續慌張短怯殷低息微皇然若氣之欲斷

似喘不抬肩似

呻吟而無痛呼吸雖急而無痰是也

實喘有由于外感者六淫外邪壅肺氣以致胸滿上喘也有由于內傷者七情五志之動火酒食痰溼之鬱熱上壅于肺而喘也 又有一等火鬱甚者其上冲作喘與諸寔喘無異而陽氣內鬱之極不能鬯達以致四肢厥逆六脈伏濇按此指此不可用熱藥投亦不可以寒藥下用寒則大愈鬱惟逍遙散觀加茱連宣散蓄熱得汗即愈愈後六味損調之虛喘有由于陽虛者肺氣寔則能清肅下行脾氣寔則能健運四布虛則不能運行下降而但浮越于上也有由于陰虛者肝腎陰虛東水火言則火上炎乃真元耗損命門之火自下上冲也其人平居若無病但覺喘乏察其脈數大而虛或微而無力者是也東垣曰華陀云盛而為喘活人亦云喘為氣有餘然盛而為喘者非肺氣有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認作不足肺氣果盛當清肅下行而不喘以火入于肺肺氣衰乃喘耳故盛者非肺氣盛也乃火邪盛也故瀉之以苦寒非瀉肺氣也瀉肺中之火即所以補肺氣也 按東垣所言固是然壯盛之人忽為邪襲者有之未可便言氣衰也但喘則氣越亦必漸虛矣

丹溪謂新病屬寔久病屬虛按新病亦有虛者如其人本虛而忽感風寒是新病亦有虛也久病亦有寔者如其人痰塞肺竅久而不開喘何由除是久病亦有寔也是喘治法傷風寒者五虎湯三拗湯定喘湯華散湯

寒束熱成痰者東支湯天寒口桂枝三建三退得食則減為食所全一卯瑞二進

火桂梗二陳湯動作便有痰聲是痰定喘湯加瓜萎三服後照痰証治之甚者神仙住喘湯止喘而無痰者為氣寢喘蘇子降氣湯見並氣甚者加葶藶前胡七情鬱結上氣喘急寢者四磨飲四七湯見並氣諸寢喘並忘斂濤升補爆熱酸鹹之劑宜降氣清火潤肺辛散如蘇子桑皮枇杷葉前胡烏藥枳壳半夏山梔元參知母青黛黃芩貝母二冬花粉杏仁海石橘紅皆可用若脉洪寢偏身痰氣火氣坐卧不得宜黃連膏水氣喘者水氣逆行肺氣得水而浮觀沿河者水浸至胸則喘可見端不能卧葶藶大棗湯桂苓

甘湯見痰等或汗之是溼者滲溼湯見發暑熱喘者白虎湯見發熟瓜萎枳壳黃芩食喘者凡病初起即喘急多是停食也或放屁甚者或咬人消食自愈小兒行走氣急作喘多是食食喘兼外感散邪消食經有胃喘一証謂胃絡不和氣逆作喘胃氣本下行二陽脉亦從頭走足若不下行而反干乎上則氣逆然所以致逆者非火則食與痰耳審治之

又有肺積名息貴貴奔同肺氣結滯成積則呼吸之息上奔在右脇下如覆杯令人喘咳發肺癰詳積聚門虛喘治法肺氣虛者人參五味阿膠之屬人參為末雞子清投新水調下一錢勞即喘者胡桃不去衣九錢人參一錢杏仁去皮尖二錢姜棗煎帶渣服去大使一次即愈昔有二人同行一舍人參則不喘不舍者喘可見虛宜補腎水虛者相火由衝任直冲而上非四物所能治寒涼所能制其痰為腎水所泛溢亦非竹沥枳半所能化必用六味見虛加門冬五味大劑煎服水升火降喘自定若腎火虛

者下焦陰寒之氣逼其浮陽上越作喘外証面赤

戴陽煩燥脈浮大而數去死不遠用

助元接真鎮墜之藥尚可回生然不可峻驟且先以八味丸

見虛損黑錫丹

並

養正

丹見氣之類煎生脉散觀中送下覺氣稍定然後以大劑參芪破故紙阿膠牛膝等以

見虛損黑錫丹並

鎮于下又以八味加河車為丸遇飢則服方可保全火從衝任逆上則胃氣之下

行者亦從之逆上矣東垣用調中益氣湯

見勞倦加吳茱萸湯洗去苦味用

並

然須治腎為是

再按古人以短氣即喘而分寔虛喘具如前說若依後人分短氣與喘為二則以短氣為虛喘而喘單就實者言未為不可也參看短氣少氣篇

哮者喉間痰氣作响以胸中多痰粘結喉間與呼吸之氣相觸成聲得之食味酸鹹

太過幼時多食鹽醋往往成此疾俗謂之鹽癆滲透氣管痰入結聚一遇風寒氣鬱痰壅即發其發每在

冬初必須淡飲行氣化痰禁涼劑恐風寒難解禁熱藥恐痰火愈熾蘇子桑皮枳

壳青皮半夏前胡杏仁山梔必用八九月內用承氣預下其熱使冬時無熱可包是

妙法哮久用青皮一個劈開入巴豆一粒扎定瓦上炙黃每服三五分姜酒下愈

後用半夏八兩石膏四兩蘇子二兩丸服又方雞子畧擊破壳不可損膜浸尿缸

內三四日夜煮吃效能去風痰也或貓屎燒灰沙糖湯調下皂莢去皮弦子蜜炙

二錢明礬一錢杏仁一錢紫苑桑皮炙草石菖蒲半夏各二錢白丑頭末一錢胆星

一錢五分百部熬膏丸菉豆大每服七十九遇厚味却降者青金丹

短氣少氣

二者古人不甚分別如東垣謂二者皆氣不足戴復庵謂短氣者呼吸不來謂言無力宜補虛于進藥外選壯盛人吸氣噓其口中以助之此與素問謂怯然少氣者言而微終日乃復言此氣辱也乃少氣不足以言是以異乎是以二者同屬之虛也亦有分短氣為寢者如仲景論胸痺短氣為寢見病滿篇又論短氣皆屬於飲見疾徵篇是以短氣為寢也蓋水飲痰食諸寢邪足以阻礙正氣氣本不少因為邪阻上壅而呼吸喘急占人多以短氣為端可見不得如平氣之舒和悠長故謂之短耳此但去其邪邪去氣自舒矣須分別觀之

噯氣

即經所云噫氣由氣不得舒故噯以出之理與呃逆通彼則氣閉而逆冲自作響以出此則氣滯而不冲故著噫以出之也經以心為噫痺論所謂心痺者脈不通煩則心下鼓暴上氣而喘噦乾善噫又謂刺中心一日死其動為噫者是也王太僕解心火夾上烟嘔誤出又屬脾氣不舒經所謂太陰腹脹善噫者是也觀飽食則噯可見

呃逆

即內經所謂噦氣自下冲上而呃呃作聲也經謂諸逆冲上皆屬於火然必有所閉遏乃然有為寒氣所閉者有為熱氣所閉者有為水飲痰食及血諸有形之物所閉

者景岳譬之雨中之雷

陽為陰蔽奮出
于地而有聲也

水中之淳

氣為水覆上出
為淳淳汨作聲

深得其理予嘗吸

烟入喉胃口乍閉每每作呃故知熱氣亦能閉也丹溪治陳超越因飽後奔走

絡傷血內

濕患呃逆但食物則呃百餘粒

食之屬也

半日不止飲酒與湯則不作

酒水質清

脫發熱病故夜發脈濇數以血入氣中治之

猶云血上用桃仁承氣湯

血加紅花煎服

下汚血數次而愈又治一女子大吐頑痰而愈故知血食疾皆能閉也

有發于中

焦者脾胃之氣被閉也有發于下焦者肝腎之氣被閉也氣為陽陽屬火治須散閉
散火而有寔火虛火之分寔者利之清之散之虛者補之無病而呃者不必治也

即治不過用內經刺鼻取嚏或閉息不令出入或驚之之法皆可立已若有病而呃

者形氣壯寔別無惡候審其致閉之邪去之亦即已惟病重得此多為氣脫凡見其

呃自丹田而上久乃一聲

密頓相連者為寔久一聲者為虛通身振動者即是危候恐難治矣此

天命門真火與黑錫丹灸關元欲脫多不救

先

傷寒吐汗下後與瀉利日久誤服寒涼者理中湯

見中

產後丁香散傷寒熱病便燥脈數承氣湯

見大便不通便氣為寒閉未鬱成熟者

柿錢散丁香柿蒂散羌活附子湯氣逆而虛者陳皮竹茹湯

痰飲者二陳湯

導痰湯

并見加薑汁竹懸陽虛自汗者參附湯陰虛火炎者參附煎湯下大補

陰丸偶然呃一二日不止者木香調氣散

見中

灸法男左女右乳下黑盡處一韭葉許灸三壯甚者二七壯

久嘯

呵欠者必伸腰故又名久伸經謂衛氣晝行于陽夜行于陰陰主夜卧陽主上陰主下故陰氣積於下陽氣未盡入行于陰陽引而上陰引而下陰陽相引故數久此從陽之陰由動入靜之機也一人病吐血斗餘煩躁不得卧証甚危迫延予至時已半夜聞其久噦予曰不死矣知陰猶在也藥之而愈

經曰陽氣和利滿於心出于鼻故嘯河間謂鼻中痒因氣噴作噦鼻為肺竅痒為火化大基則痛微則痒也火干于肺發于鼻故痒而嘯也或以物擾鼻亦嘯者擾痒亦屬火也或視日而嘯者太陽火曜于目熱氣內通于鼻痒而嘯也仲景云其人清涕出發熱色和者善嘯即傷風淺證風在皮毛其陽氣于肺氣可見嘯由氣盛鬱勃使然故陽虛者無嘯得嘯則為佳兆

傷飲食此以飲食過度留積不化者言若飲食衰少不足之證見下勞倦篇

飲食或寒或熱或過飽皆能傷人

飲者水也在人身屬無形之氣分多飲則氣逆水戴氣上浮也觀浴者水浸至胸則氣喘可見蓋水滿于下則逼氣上浮如油在水飲冷則傷肺水之寒氣上射于肺則肺氣受傷為喘咳為腫浸淫于肌膚則腫為瀉則瀉輕者發汗利小便上下中外分消之重而蓄滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之利不獨兼利也須二便

酒者其質則濕其氣則熱飲之而昏醉狂易者熱也宜以汗去之既醒則熱去而濕存宜利小便以去之葛花鮮醒湯主之若不先汗而遽利小便則炎篶不肯下行濕去熱不去若動大便尤謬蓋酒之熱乃無形之氣也病在陽分而妄下之以傷其陰分是謂誅伐無過汗以辛溫從其上炎外寒之性也佐以苦寒清其熱也酒疽下之久則為黑疸尤宜切戒門症傷酒惡心嘔逆昏眩頭痛冲和湯即參蘇飲加木香半夏茯苓湯見理中湯

中寒

加乾葛或附子理中湯見中寒

和縮脾飲見中寒

酒渴縮脾飲或乾葛

煎湯調五苓散

見傷濕

久因於酒成酒積腹痛泄瀉或暴飲有灰酒亦能致之并酒

煮黃連丸

見傷暑

多飲結成酒癖腹中有塊隨氣上下冲和湯加蓬朮五分停為痰

飲者枳實半夏湯加神麃麥芽或冲和湯加半夏茯苓解酒毒枳椇子最妙

渝嘉言曰錢小魯善飲飲必醉歲無虛日嘔吐寒熱兼作骨節煩痛脈洪大促急身更着

蓆不能動展左腿痛如刀刺鼻燥從病起至是總未大便此癰疽之候也有謂燥金

司令酒客素傷熱濕至此而發熱被欬束不得外越津腋乾枯大腸失潤以清金潤

燥治之或曰不然酒毒大發腸胃如焚能俟掘井取水乎必以大下為急余曰下法

果勝但酒客胃氣素為多嘔所傷藥入胃中必致上湧不能下達掘井固難開渠亦

不易夫酒者清烈之物不隨濁穢下行惟喜滲入者也先從胃入胆膽為清淨之府

小便之攝受無幾其次從胃入腸膀胱滲之化溺為獨多焉迨至化

漏則所存者酒之餘質其烈性寔惟胆獨當之是以酒至半酣雖懦夫有揮拳罵座不顧餘生之胆

酒性極熱而親上心肺受之不獨胆也酒入則氣強故無所畏氣之降者屬肺升者屬肝胆肝陰胆陽酒氣乃陽升之極者故屬之胆耳

膽之府原無輪瀉而胆之熱他人可移于腦濁涕從鼻竅源源而出亦少殺其勢若小魯則陽分之陽過旺陽分之陰甚衰髮鬢全無直似南方不毛之地熱也極矣肯受胆之移熱乎幸其頭間多汗腦熱暗洩不為大患乃胆熱既無可宣又繼以酒之熱時之燥熱淫內熾故胆之熱汁滿而溢出于外以漸滲于經絡則身目背黃以其滲而出也亦可轉驅而納之膀胱從漏道而消也今病獨攻環跳之穴腿痛如刀刺則病結于胆之本經不能驅使從膀胱出矣即欲針之此久傷之穴有難于抉濁者吾更有慮焉有身以後全賴穀氣充養穀氣即元氣也穀入素少之人又即藉酒為元氣今以病而廢飲何所恃為久世之資耶吾諦思一法先搗腦中黃水出鼻次針胆穴云絡腦間者數處務期胆中之熱移從腦鼻而出庶乎上泄則下寬環跳穴中結邪漸運而腸胃之枯槁漸回然後以濁胆熱之藥入酒中每日仍痛飲一醉飲法同而酒性異始得陰行而妙其用蓋其以生平之偏造為堅壘必藉酒轉為鄉導乃克有濟也豈清金潤燥與下奪之法能了其局乎

食者物也在人身屬有形之血分傷食則胸腹痞滿惡心嘔酸噫敗卵臭惡食頭痛發熱惡寒

食薑或熱上攻頭痛外蒸

身熱氣不達于表故惡寒

證似傷寒但氣口脹倍大于人迎及身不痛為

異耳 輕則消導重則吐下 在上脘者吐之瓜蒂散之屬已下腸中者下之其證

熱所傷之物亦熱者承氣湯

見太便不通

其證寒所傷之物亦寒者小七香丸料一貼

引水煎吞感應丸或備急丸

經曰上部有脈

指頭部三候言

下部無脈

指足三候言

其人當吐

不吐則死東垣謂其理同本營宜吐以達之以為食塞胸中太陰肺金之部分也

肝木之氣為食所遏不得上升伏于脾土之中若受金之魁伐者然

以食在胸中肺部阻遏木氣不得升

也故曰木鬱吐之則木得舒又謂肺為清陽之分如天食壅于上則天氣不得下交

于地而成否地中之水源于天氣故曰水出高原氣隔于上則源絕而水不下流故

下部無脉其說迂曲大抵食在胃脘之上未入于腸故宜從上越之耳又上部之氣

在食之上不受遏則能運行故上部之脈亦通

脈隨氣行

下部之氣為食所遏不能運行

故下部無脈也 傷寒物者半夏神麌乾薑三稜廣茂巴豆之類治中湯加砂仁一

錢下紅丸子小七香丸半夏枳木丸寒熱不調每服加上二黃丸十九或用木香乾

薑枳术丸丁香爛飯丸 傷熱物者枳實白朮青陳麥芽黃連大黃之類上二黃丸

枳术導滯丸 寒熱通用保和丸枳术丸麵蘖枳木丸木香枳术丸橘榔丸 傷溼

熱不化痞滿悶亂枳實導滯丸 傷肉食濕癩辛辣厚味三黃枳术丸 傷熱食痞

悶兀兀欲吐上二黃丸 傷濕癩心腹滿悶支體沈重除濕益氣丸 傷豆粉濕癩

食狗肉不消心

下堅或腹脹口乾發熱煮蘆根汁飲之杏仁治狗肉食魚膾生肉不化每成癰癩

搗馬鞭草汁及生薑汁飲之

大抵神麴麥芽消穀食菜菔化穀食硝砂阿魏山楂

消肉食紫蘇化魚蟹毒麝香消酒果積

如傷冷物一分熱物二分則用寒藥二停

熱藥一停隨時消息面色青黑脈浮沉不一弦而弱者傷在厥陰

肝經受寒物之鬱也當歸四物湯

逆湯見加吳茱萸或生薑之類

面色青黑脈浮沉不一弦而弱者傷在少陰

腎受寒物

所傷逼火子通脈四逆湯見

面色黃脈浮沉不一緩而遲者傷在太陰理中丸湯

見中寒主之此條皆溫藥

凡脾脈微洪屬傷苦物

苦為火味也此等皆五行相配然勿泥

酸勝苦微弦傷冷硬物溫以克之弦緊傷酸硬物辛勝酸微澀傷辛辣物苦勝辛微滑傷腥鹹物甘勝

鹹洪緩傷甜爛物酸勝甘微遲傷冷痰積聚惡物溫胃化痰單伏主物不消化

麴蘖三棱廣茂之類洪浮而數乃中酒葛根陳皮茯苓湯作瀉不止于藥中加肉荳蔻

益智仁收固之傷食兼感風寒證與前同但添身疼氣口人迎并盛生料五積散

見氣和解散

凡傷食主平胃散傷穀食者加穀芽麥芽神

麵肉食加山楂麴滯加萊菔子快膈加枳實

若脾胃虛弱不能化六君子湯見加

丁蔻木香建蓮厚朴縮砂麥芽神

麴脾氣下陷補中益氣湯見肝火乘脾脾傷不運

左金丸見發歸脾湯

覲腎火乘脾六味丸攬虛命門火衰不能生土八味丸攬虛或

疑正當飽滿難于用補不知用補自有法疎啓其中竣補其下少用則助壅于上多

用則峻補于下以人參一兩少加升麻一服即愈所謂塞因塞用也 有胃強弱弱者能食而不能化也平胃散加炒鹽胡椒山楂麥芽神麩白蒺藜丸服更節飲食

不能食

傷食則惡食已詳飲食門此舉他證言之耳大抵不能食由于胃滿而致滿非一有寒氣滯于胃而滿者有熱氣壅于胃而滿者有濕痰不運而滿者有命門火衰致脾胃虛寒而滿者有腎水不足虛火上冲而滿者 寒滿者六君子見加乾薑 热壅者石膏白芍枳實黃連陳皮之屬 濕者除濕湯見中平胃散見傷 痰者二陳湯見痰疾積痞隔皂莢燒存性研末酒調服一錢 脾火虛者八味丸見虛二神丸 腎水虛者六味丸見虛

其有飢而不能食者脾熱則消穀而飢本欲食因胃脘枯槁不能納或火热上冲或痰涎上壅食不得下也若緣脾胃衰敗之極欲食不能則殆矣 熱則消穀善飢乃熱而能運行者若壅滯不行則不能食矣

勞倦傷

勞則氣耗以喘而汗出喘則氣內越汗出則氣外越故耗也又勞則動大火動則氣益散氣愈虛則火愈炎矣氣盛則運而不積縱有大亦行散不見其為火氣虛則不能運而火聚聚故炎也 然非特勞為然也七情過甚色慾過度飲食不時皆能傷其真氣皆能生火火為元氣之賊壯火食氣一盛則一衰火聚于中脾胃受熱則困倦四肢痙攣痙攣在而不去或走注也注也言四肢痛無氣注也

以動即喘乏脾失健運之常
陰陽和平乃運一有偏勝則不運矣寒固有之熱亦宜然
食日少穀氣不盛氣衰則資于飲食乃穀氣又衰則愈不運而鬱積矣以故氣不能升而上焦不行不能下降
而下脘不通止鬱于脾胃之中而作熱熱氣上蒸于胸外透于表以故氣喘心煩頭痛而渴或不渴津液或存或亡之故表熱自汗或皮膚不任風寒而生寒熱脈浮大而虛春夏劇秋冬瘥謂之陽虛內熱病者首宜安心靜坐以存養其氣而以酸味收其散越甘溫補其虛衰按東垣云經曰勞者溫之損者溫之又曰溫能除大熱是也大忌苦寒之藥損其胃氣王安道取之曰經謂勞者溫之溫乃溫養之謂凡調其飲食適其起居與用藥調養皆是非溫涼之溫損者溫之經原作損者益之溫能除大熱偏放內經無此語又曰溫能除熱亦惟氣溫而味甘者斯可耳蓋溫能益氣甘能緩火也愚謂安道此論甚是又以甘寒瀉其熱火東垣特立補中益氣湯見中者可為妄用附桂者當頭一棒也

又以甘寒瀉其熱火東垣特立補中益氣湯見中者何胃也氣生于胃蓋天元真氣雖五藏皆具而必得後天水穀之氣充養乃能生生不息胃獨為水穀之海飲食入胃其精氣遊行溼藉脾之運行以上輸于肺而充營衛布周身故言氣必歸之胃也胃氣虛則下陷于肝腎故用參芪以補其虛黃芪又能益肺固表不令自汗以泄元氣甘草能瀉脾胃之火火性急甘以緩之即為瀉也若脾胃太虛腹中急痛甘草宜多用升麻柴胡二物味薄陰中之陽從地升天者也能引清氣上升以舉其下陷兼引參耆甘草等甘溫之氣上升以補衛氣之解散而寔表清濁相干清不升則濁不降反混于清陽之位用去白陳皮以理之又能助陽氣上升以散滯氣白朮苦甘溫除胃中熱利腰臍間血脾得補則氣盛而濕行熱泄血氣流通也火盛則血虧血中有火日漸煎熬血

減則心無所養致心煩亂病名曰恍恍者煩悶不安也故以當歸補血又得人參補陽為陽生陰長之用已上補中益氣方共八味火雖屬心而起於下焦腎中之陰火也火旺則腎水虛少加黃柏以瀉陰火救腎水如煩猶不止加生地黃以滋腎水旺則心火自降如氣浮心亂別以硃砂安神丸見煩躁鎮固之若更煩亂血不足也如腹中或周身有刺痛血不足而澁滯也加當歸身五分或一錢如精神短少加入參五分五味子十二個頭痛加蔓荆子三分痛甚加川芎五分頂腦加藁本五分細辛三分諸頭痛并用此四味足矣若兼頭上熱風熱上盛則此不能治別以清空膏見頭痛主之如頭痛有痰沉重懶倦乃太陰濕土痰厥頭痛加半夏五分生薑三分耳鳴目黃頰領腫頸肩膚肘臂外後臙痛面赤脈洪大者皆風熱上攻也羌活二錢防風藁本各七分甘草五分通其經血風熱上壅經脈不行故腫痛也加黃連黃芩各七分以清熱消腫人參五分黃耆七分益氣而瀉火氣旺則運行而火散另作一服與之噬痛領腫加黃芩甘草各三分桔梗七分口乾噬乾胃中津液不升加葛根五分升胃氣以上潤之久病痰嗽肺中伏火去人參初病勿去之初病指未嗽時言正藉參以補氣故不可去若肺熱而嗽則當去之冬月或春寒秋涼加不去根節麻黃五分如春令大溫只加佛耳草款冬花各五分夏月加五味子三五枚去心麥冬五分夏月不嗽亦加入參三分并五味麥冬救肺受火邪也如舌上白滑胎者舌上涼是潤

陳皮五分此三味為定法如冬月加益智仁草荳蔻各五分如夏月加黃連黃芩名
不足益智草豆蔻可也胸中氣滯宜青皮如氣促氣少去之心下痞有寒有熱二者
運使氣不運而痞如覺寒熱兼者加附子黃連各一錢寒痞不能食加生薑陳皮各一錢熟痞
能食加黃連五分枳寔三分脈緩有痰而痞加半夏黃連各一錢脈弦四肢滿悶便
難還不達之故也而痞加柴胡七分黃連五分甘草三分痞而分悶加芍藥黃連各
一錢痞而腹脹加枳寔木香縮砂各三分厚朴七分如天寒少加薑桂腹中痛者加
白芍五分炙甘草三分肝熱散滿腹中急脹而痛故用白芍寒斂其熱甘草緩其急而扶脾如惡寒冷痛加桂心三分
如惡熱喜寒而痛于已加白芍甘草中更加生黃芩三分夏月腹痛雖不惡熱亦
然治時熱也苦惡寒則不可加矣如天涼時惡熱而痛于已加白芍甘草黃芩中更少加桂如
天寒去芍藥加益智仁三分或加半夏五分取其辛溫生薑三片如腹痛惡寒脈弦是木
蔻土小建中湯主之內芍藥味酸于土中瀉水為君寒證而用芍藥之寒何也蓋取
其收斂肝之散滿且有桂可制其寒如脈沉細腹中痛理中湯見中也
乾薑辛熱于土中瀉水為主此是腎氣虛寒於腸下痛或
縮急俱加柴胡三五分甘草三分臍下痛血虛加熟地五分立止如不止乃寒也更加
桂三分如脈緩體重節痛腹脹自利米穀不化濕也平胃散見傷食身體重者溼加
去桂五苓散一錢見傷濕如風濕相搏一身盡痛加羌活七分防風藁本根各五分升

麻蒼朮各一錢勿用五芩為風藥已能勝濕也別作一服與之病去勿再服小便遺失肺氣虛不能攝也宜安卧養氣黃芪人參補之不愈是熱也

熱下迫也

加黃柏生地各

五分如卧而多驚小便淋者邪在少陽厥陰宜太陽經所加之藥

指羌防藁本等位肝火鬱故用風藥

以升發之更添柴胡五分如淋觀此二字知上文只就卧而多驚言加澤瀉五分此下焦風寒合病也

風寒猶云

肝經云肝腎之病同一治為俱在下焦也非風藥行經則不可

故宜太陽經所加藥乃安客邪

之濕熱也肝腎受熱故卧而多驚受熱不行故淋也宜升舉發散以除之

風藥能散熱除濕也

大便祕

一錢潤而下行血藥也大便有形屬血分血燥故大便祕大黃酒洗煨五分或一錢仍不行者煎成正藥先用

清者一口調元明粉五分或一錢得行即止不宜大下致變凶證脚膝癢軟行步乏

力或痛乃肝腎伏熱熱則軟弱寒則加黃柏五分空心服不已更加漢防已五分脈

緩況困倦無力者加蒼朮澤瀉人參白朮伏苓觀此句則土文所云加減俱就補中益氣一方而言初病熱中則可用若寒中則不可用

補中益氣一方加減觀此句則土文所云加減俱就補中益氣一方而言初病熱中則可用若寒中則不可用

暑熱火鬱寒中之分傷氣有熱中濕熱勞役傷氣有熱中濕熱蓋此為甘酸之劑適足以益其病耳如參芪甘草芍藥五味

子之類是也不能治寒也

甘滯酸斂皆不能行散寒氣也

按陽虛內熱與外感風寒之證相類其辨

別處詳四診問寒熱條中夫內傷脾胃乃傷其氣外感風寒乃傷其形

營衛血脉乃形乃

其外則為有餘邪氣有餘有餘者濁之吐汗下皆濁也傷其內則不足

正氣不足

不足不足者補之

湯一二服得微汗即已非正發汗乃陰陽和

猶云氣充自然汗出也

又有時當夏令兼受暑邪肌膚壯熱煩躁悶亂惡熱大渴引飲氣上喘促目赤面紅身體疼痛日西譴語證似傷寒陽明經白虎證者誤服白虎湯見發熱必死白虎證脈洪大有力此洪大而虛重按全無氣血兩虛也經曰血虛則脈虛而發熱宜清益氣

湯見傷暑或當歸補血湯觀

寒中者乃水來侮土寒濕之證腹脹

寒濕不運

胃脘當心而痛

亦氣不膈

噎不通或涎唾

寒濕上泛

或清涕

肺寒

或多溺

氣虛寒濕盛

不能攝

足下痛

不能任身履地

足寒氣不運

骨乏無力

腎

兩丸多冷陰陰作痛或妄見鬼狀夢見亡人

陽虛無非陰象

腰背皆痛不渴脈遲細或盛

大以濇

盛強冷之類

寒大寒寢也如寒

不行故濇也

治用神聖復氣湯

見腹痛

白朮附子湯草

豆蔻丸

見心痛

或用理中湯

見中湯

加減臍下築者

腎氣動欲作奔豚也

氣壅而不行則

築築然動跳白朮壅滯去之而加肉桂以溫散之

吐多亦因氣壅而逆去白朮加生

薑若瀉多則留白朮

正取其壅補使氣不下泄

且瀉者多溫朮又能勝濕也

心悸者

加茯苓飲數則心神被水寒所迫不安故悸茯苓以利之渴者倍白朮水濕凝滯氣

不布化則津液不生故渴朮除濕濕去則氣行而津生也腹痛加人參氣虛則不運

不通而痛故加參以補氣寒加乾薑腹滿去白朮加附子附子味辛熱熱能勝寒辛

能散滿或用建中湯飴糖甘草以益土薑桂以散寒且辛潤能通營衛芍藥酸收津

液不通收而行之

既不通何以用酸收蓋氣散漫不行故津液能行也

性微寒以濟薑桂之熱

使不傷陰氣也嘔家不可用此湯以甜也

而滿悶則滯

內傷氣虛多汗調中益氣湯即補中益氣湯加白芍五味也以收耗散之氣又補中益氣湯除當歸白朮加木香蒼朮亦名調中益氣湯有濕而氣滯者宜之若濕多熱少清陽為濕所鬱不得上升其證身重而痛二便不調灑灑惡寒陽不達慘慘不樂陽不

升陽益胃湯

見惡寒

若過食寒涼遏火陽鬱于脾飢膚困熱烙手惡寒脈洪數升陽

散火湯火鬱湯

見發熱

若熱多濕少陰火困脾陽不上升補中益氣湯去白朮當歸陳

皮加石膏黃芩黃連蒼朮羌活若腎火上蒸時顯燥熱加生地黃柏

凡言補之以辛甘溫熱之劑及味之薄者乃助春夏之升浮即濁秋冬之收藏也凡言濁之以酸苦寒涼之劑及淡滲之味者乃助秋冬之沉降即濁春夏之升浮也

心肝

同春夏論肺腎同秋冬論

虛損癆瘵

虛者血氣不足也久則肌膚藏府亦漸消損故曰虛損勞者久為病苦不得安息如勞苦不息者然又其病多為勞心勞力房勞所致又其證多屬火勞字從力從二火故曰勞也瘵者敗也證至於勞則敗壞矣前人分為五勞曰肺勞其證面浮氣短皮

曰脾勞其證飲食減少肌肉消削大便溏泄曰肝勞其證口苦目病胸脇引痛筋病不能行曰腎勞其證骨痿不能久立腰背不利午後發熱盜汗骨蒸小便黃赤而有餘滯壅中痛小腹滿急又分六極曰氣極肺病極也喘促衝胸恒欲怒氣少不足以言曰血極心病極也面無血色頭髮墮落心痛唇舌紅赤曰肉極脾病極也肌肉消瘦四肢倦弱身上常如鼠走曰筋極肝病極也數轉筋爪甲枯痛手足拘攣脇下痛曰骨極腎病極也手足痛脊腰痛不能久立牙齒動曰精極藏府皆虛極也身無膏澤眼無精光耳常聾鳴精神短乏遺精白濁骨髓空虛又分七傷曰陰寒曰陰痿曰裏急曰精速曰精少陰下濕曰精滑曰小便苦數臨事不舉又曰大飽傷脾大怒氣逆傷肝強力舉重久坐濕地傷腎形寒飲冷傷肺憂愁思慮傷心風雨寒暑傷形大恐懼不節傷志蓋積傷而成勞積勞而致極非一朝一夕之故也 舊說感寒則損陽陽虛而復感外則損陽分也感熱則損陰陰虛更生內熱則損陰分損傷者自上而下初損肺皮聚毛落二損心血脈空虛三損脾飲食不為肌膚四損肝腸痛筋病五損腎骨痿不能起床損至腎則死矣所謂五藏之傷窮必及腎損陰者則反此自下而上至肺而死所謂內傷以有咳嗽為重詳咳門然寒損陽熱損陰及肺腎上下皆舉隅之論耳蓋風寒濕三者並能鬱肺氣成熟暑火燥三者亦並能傷肺氣致熱悲傷亦動肺火固不獨形寒飲冷能傷肺也腎水虛則熱火虛則寒強力舉重房勞不節恐懼不解等皆能傷腎

固不止於熱也又或飲食先傷其脾思鬱先傷其心鬱怒先傷其肝然後以次傳及諸藏者有矣盜必先傷肺與腎哉大綱須分氣血陰陽氣虛者四君子湯補中益氣湯並見保元湯等不外扶脾保肺血虛者四物湯當歸補血湯並見地骨皮散六物湯血虛而熱宜之加味四物湯血虛寒熱往來宜之等二方并見血不外養肝清心氣血兩虛者十全大補湯人參養榮湯等所謂陰陽皆指腎言陽虛者腎中之火虛也脈有尺必弱八味丸主之陰虛者腎中之水虛也脈必細數六味丸主之辨證之法陰虛者常熱大便燥結小便赤澁足心如絳形體消瘦陽虛者多寒亦有戴陽格陽等證身體大熱不惡寒反惡熱者然是暫時有此非常常是大便時溏小便清白腰足冷神氣短怯肝傷補肝湯逍遙散觀肺傷加味救肺潮熱或午後或子後潮熱自汗盜汗形體消瘦口乾咽燥聲嘶音啞消渴淋濁遺精失血易生嗔怒乾咳痰嗽不眠煩燥恍惚怔忡皆水虛火炎所致六味地黃湯為主勞嗽加五味子或合生脈散觀中熱甚暫加知柏大抵水虛者十之八九附桂勿輕用也丹溪主乎陰虛故午後發熱午後屬陰陰虛故午後發熱也盜汗痰涎上逆嘔吐不絕升屬陽降屬陰得脈浮取則洪大沉取則空虛用四物加知柏後人遵用而不效何也蓋歸芎芍辛香上竄非降火之藥知柏苦寒瀉寃火虛火則非所宜徒然傷胃故也改用薏苡仁百合二冬桑根白皮地骨皮丹皮枇杷葉五味子酸棗仁之屬佐以生地汁藕汁乳

汗童便有痰加貝母以保肺而滋水源無不應手取效蓋諸藥皆稟燥當涼降收之氣氣之薄者為陽中之陰從陽分而下降則能降上升之火又其氣清涼如當暑熱之時而商飈倏動則炎歎如失與治暑証用白虎湯見發熱同意然彼是外感證屬有餘故用沉寒之品此為內傷證屬不足但用燥降收之劑足矣此用藥之權衡也故曰氣虛則生脈見中暑不言白朮血虛則三才丸不言四物凡治水虛者以脾胃兼顧為難蓋水虛宜用涼潤以補肺腎而每滯脾故過用寒涼者脾必敗觀勞證多死于泄瀉可知也須間進甘溫之品或行滯快氣之藥以扶脾然不得過於辛燥以反耗腎水若火虛者脾腎皆寒一味溫補無所顧忌故曰受溫補者易治入參一味除肺壅熱脈洪數者不宜外餘證皆不可少王節齋服參必死之說大是誤人按人參生涼熟溫本非熟品又質重氣薄當是益陰之品本草謂是氣當是陽根于陰之義請質之高明病久虛弱厭厭不能食和中丸見不能食男子肌瘦氣弱咳嗽漸成勞瘵猪肚丸服之即肥服寒涼藥證雖大減脈反加數者陽鬱也宜升宜補大忌寒涼犯之必死有重陰覆其陽火不得伸洒酒惡寒或志不樂或脈弦數四支五心煩熱者火鬱湯柴胡升麻湯并見發熱病去即已有面色如故肌體自充外看如無病內寢虛損俗呼為桃花蛙當看有何證如法治之虛勞之疾百脈空虛非粘膩之物填之不能寢也精血枯涸非滋潤之物濡之不能潤也宜參芪地黃二冬枸杞五味之屬各煎膏另用青蒿以童便熬膏及生

地白蓮藕薄荷等汁人乳隔湯煉過酌定多少并麋角膠霞天膏見積和合成膏每用數匙湯化服如欲行瘀血加入竹沥之屬欲降火加入童便之屬 凡虛勞之證大抵心下引腸俱痛蓋滯氣不散新血不行也尤宜用膏子加韭汁桃仁泥韭汁之屬欲止血加散鬱之品故骨蒸用以透肌解熱用銀州者佳然不可常服為其疎散故也 柴胡為升清火動陽常舉皮硝放手心兩手合住自化陽即瘥矣 證本陰虛若吸呼少氣懶言語無力動作目無精光面色㿠白乃兼陽虛也人參麥冬各三錢五味子二十一粒橘皮桔梗炙甘草各五錢為末水浸油餅為丸如雞頭子大每服一丸嚼津嚥下虛損久為勞瘵積熱骨蒸熱深入骨髓中蒸達于外咳嗽唾血肌膚甲錯乾澀枯槁如鱗甲之相錯面目黑暗無光偏睡散啞咽痛頸生瘰癧兩脇疼痛轉筋拘急或周身筋骨皆痛夜夢鬼交即遺時多忿怒五心煩熱頭髮作穗面唇時紅如傅臘脂大便不調小便淋濁此腎水竭肝血虧無以制火使然火灼血乾雖用滋陰之劑亦不得效以死血不去則經脈壅塞氣血無以流通熱終不除也若其人能食而大便結者尚堪攻下急用大黃麌蟲丸陳大夫傳仲景百勞丸可與此丸互用以行其死血即無死血而積熱不除非下行無以折其勢亦當暫用大黃青蒿煎導之古方柴胡飲子防風當歸飲子麥散皆用大黃以折上炎之勢也然後隨證調理若不能食而泄瀉不堪攻下者必死 勞瘵日久或生惡蟲敗血濕熱所化蛀蝕藏府久而通靈

變化無常身死之後傳染子孫甚則滅門名曰傳屍勞宜癸亥日二更後灸兩腰眼

各七壯

見針灸後服傳屍將軍丸

膏肓四花穴可灸

見針灸

獺肝一具陰乾為末水

服方寸七日三服效未知再服

太抵以保養精血為上去蟲次之安息蘇合阿魏

麝香犀角丹砂雄黃固驅邪之品亦須加天靈蓋于中蓋傳屍之蟲鬼氣也伏而未

起一得枯骸則鬼氣飛越附之不復着人可瀉而出外此則虎牙鯉魚頭骨亦可此

乃食人之物鬼所畏者也先用芎歸血餘散吞北斗符次用鱉甲生犀散取蟲餘法

詳準繩

損虛勞瘵屬陰虛者多必形消著骨而後死可見也以陰主形陰全竭而

後形全毀也若是陽虛則有形盛而脫死者矣以陽主氣氣脫者不必待其形之脫

也真藏脈見者即形肉尚存亦不久矣

大骨枯槁

癰股腰之骨
瘡痛不能支

大肉陷

頭項
四支

大肉消
陷成坑

動作精神衰即真藏脈不見亦不過一歲死若更喘滿動形半年死若更痛

引肩胸

五藏內損

一月死若更破胞

消陷之處
枯燥破裂

身熱不已十日死兼以真藏脈見目眶下

陷視不見人即死矣若能見人為神尚未去至所不勝之日時而死虛勞危證不

受補大便泄瀉筋骨痛極偏睡失音脈弦數皆危證也

火

凡病多屬火丹溪謂氣有餘便是火此一火也治宜清涼氣不足以鬱而成火東垣所謂陽虛發熱也又一火也治宜甘溫以補其氣少加甘寒以瀉其火外感暑熱燥

氣增助內氣成熟此一火也治宜辛潤清涼外感風寒濕氣閉鬱表氣成熟亦一火也治宜辛溫發散內傷飲食辛熱之物致火得熱益熾此一火也宜以苦寒之劑消導之內傷飲食生冷之物致火被遏愈怒又一火也治宜辛熱之劑消導之腎水虛致令下焦之火上炎此一火也治宜六味觀虛壯水以制陽光腎陰盛逼其浮遊之火上升又一火也治宜八味觀虛益火以消陰翳又凡動皆屬火醉飮火起于胃大怒火起于肝悲哀火起於肺房勞火起于腎五臟火熾心火自焚種種已散見于各篇中而發熱篇更詳細閱自見夫人非寒則熱非寔則虛耳今寒熱虛寔皆能生火然則凡病多屬火河間丹溪之言豈不信哉而張景岳輩不達其旨極力調訛亦已過矣或曰虛火既不可用寒涼是有火之名無火之寔故景岳諸公直謂之非火子何訾之乎曰虛火不可用寒涼謂苦寒之味耳若甘寒之品何可廢乎蓋虛火有二其一可用溫熱如內寒外熱下寒上熱等證是也目為非火猶可也其一宜用甘寒水虛火炎者是也目為非寔火則可竟目為非火可乎至如滯下消渴吞酸蟲疳等證明明屬熱者亦概目為非火且反謂之為寒真菽麥不辨者矣彼意以為必目之盡人而知之矣直言此為駕馬不可駕未有不信者也必謂之非馬也鹿也誰則信之乎不信則有駕之而敗者矣是非火之說固將使人不信而用寒涼也孰若仍其

虛火之名而明夫不可用寒涼之故之為寔而可信哉

或謂上世人所稟厚寔可任攻伐晚近人所稟薄弱止宜溫補謬也丹溪去景岳不過二百餘年如果稟賦強弱相懸如是將數百年而後人皆變為陰鬼乎惟古人謂勞擾之多火與安靜者不同黑瘦之人多火與肥白者不同其說深為得理

桂附引火歸原此為下寒上熱者言之若水涸火炎之證上下皆熱不知用此引火引歸何處今日醫者動用桂附動云引火歸元殺人如麻可歎也說詳八味九方註

凡病有形者是痰無形者是火如紅腫結塊或痛或不痛皆形也痰也按結塊腫而不痛不紅者純疾也紅腫而兼火也

但痛不腫者無形也火也又謂濕火腫而不痛燥火痛而不腫亦此意也

又謂脹痛是濕火筋縮痛是燥火又謂平時筋不縮偶直足一屈則收而黑發徒然抽掣觀蛇之動而掣曲是其象也

一屈則收而黑發徒然抽掣觀蛇之動而掣曲是其象也

又謂火證睡覺忽腰背重滯轉覺不便睡則火欬于內蒸其血液滯于腰背也

欬氣助之上升故化涕以出不食時有渴無渴弱證人心血少易于動故轉側

墜一響右側睡則心右墜一響弱證人心血少易于動故轉側則傾墜與火氣相搏擊故響

心中滴漓噏噏響火

搏擊心

頭弦耳鳴心火黃連生地木通小腸火木通肝火柴胡片芩佐之

胆火龍胆草脾火白芍胃火石膏肺火黃芩桑皮佐之大腸火子芩腎

膀胱火知母黃柏凡用知柏芩連等寒藥少加枳壳行之否則凝滯又寒涼藥不可久服致傷脾胃不救三焦大山梔上中二焦火連翹虛火薑皮竹葉麥冬

童便生甘草生薑緩之散之或參芪等補之 實火熱盛黃芩黃連山梔黃柏宜下
者芒硝大黃 血虛發熱當歸生熟地 無根之火遊行作熱腎水乾涸相火上炎也陽以陰為根腎陰無根故曰六味丸見虛加元參作湯服 氣如火從脚下起入腹_{腎陽虛極欲脫十不救一六}
桂枝作湯外用附子末津調塗湧泉穴引火下行 燥火歸地麥冬 濕火
蒼朮茯苓猪苓木通 鬱火重按烙手輕按不覺取汗則愈 通食生冷遏少陽之
火于脾部者升柴葛根羌活細辛香附葱白 肝火鬱青黛

鬱

鬱者滯而不通之義百病皆生於鬱人若氣血流通病安從作一有拂鬱當升不升
當降不降當化不化或鬱於氣或鬱於血病斯作矣凡脈見沉伏結促弦澁氣色青
滯意思不舒胸脇脹痛嘔吐酸苦者是也治法經言木鬱達之火鬱發之土鬱奪之
金鬱泄之水鬱折之解者以吐訓達以汗訓發以下訓奪以解表利小便訓泄以制
其衝逆訓折大概如此不必泥定何則木鬱者肝氣不舒也達取通暢之義但可以
致其通暢不特升提以上達之發汗以外達之甚而瀉奪以下達之無非達也安在
其泥于吐哉餘倣之嘗見有病熱發汗不出者以承氣湯下之裏氣一通除邪自化汗以出豈非大鬱以奪為發之義哉 丹溪分六
鬱氣血濕火食疾也故制越鞠丸以香附理氣撫芎行血蒼朮開濕桔子治火神麴
消食痰鬱加貝母而大要以理氣為主蓋氣滯則血亦滯而飲食不行疾濕停積鬱

而成火氣行則數者皆行故所重在氣不易之理也趙獻可則以加味逍遙丸主之
之歸芍即趙鞠之川芎逍遙之白朮即趙鞠之蒼术逍遙之陳皮即趙鞠之橘子也謂肝胆少陽
之神麌逍遙之柴胡即趙鞠之香附逍遙之加味即趙鞠之梔子也

木氣象草穿地而出此時被寒風一鬱即萎軟遏抑而不能上伸惟溫風一吹即暢
達蓋木喜風風搖即舒暢寒風則畏溫風則喜柴胡薄荷辛而溫者辛故能發散溫
故入少陽其鬱甚而熱者加左金丸見發熱非寒品不除故用黃連治火寢則瀉其
損虛肝之氣亦躁同氣相求故用為反佐引以入
肝服後木鬱已舒繼用六味地黃湯見虛加柴胡芍藥以滋腎水逍遙風以散之也
六味而以潤之也木有不得其天者乎按趙氏此論甚精但為此方可以通治諸鬱
則主張太過舉一廢百烏乎可也 六淫七情皆足以致鬱如外傷于風寒濕三氣
皆足以閉遏陽氣鬱而成熱固也暑熱燥三氣亦足令氣鬱準繩謂燥金收濬收濬
則傷其分布之政不惟生氣不得升即收氣亦不得降不升屬肝鬱經曰逆秋氣則
不降屬肝鬱太陰不收肺氣焦滿又謂諸氣怫鬱皆屬於肺是燥氣之致鬱也又燥為化火易曰
燥萬物者莫熯于火是燥之致鬱無非火熱之氣所為也至于七情除喜則氣舒暢
外其憂思悲怒皆能令氣鬱結而疾食之遏閉水濕之停阻又可知也 準繩謂鬱
多在中焦蓋不論何臟府鬱結皆關中土也又謂用藥兼升降蓋欲升之必先降之
而後得升也欲降之必先升之而後得降也趙鞠之蒼朮足陽明藥也氣味雄壯辛

烈開發水穀氣上升之力多香附陰血中快氣藥也下氣之功多一升一降互用也按上升下降則中焦之鬱開矣 氣鬱胸腸痛脈沉而澁宜香附蒼朮撫芎 濕鬱週身走痛或關節痛遇陰寒則發其脈沉細宜蒼朮川芎白芷茯苓 热鬱目脅小便赤其脈沉數宜山梔青黛香附蒼朮撫芎 痰鬱動則喘寸口脈沉滑宜海石香附南星瓜萎仁 血鬱四肢無力能食便紅其脈芤澁宜桃仁紅花青黛川芎香附食鬱峻酸腹滿不能食右寸脈緊盛宜香附蒼朮山楂神曲鍼砂 右諸鬱藥春加防風夏加苦參秋冬加吳茱萸 蒼朮撫芎總治諸鬱

按百病皆生于鬱與凡病皆屬火及風為百病之長三句總只一理蓋鬱未有不為火者也火未有不由鬱者也濃酒厚味勞房損陰以致火矣似無關于鬱然亦必由不能運散乃然耳而鬱而不舒則皆肝木之病矣故曰知其要者一言而終

疾臘

痰本吾身之津液隨氣運行氣若和平津流液布百骸受其潤澤何致成痰為病苟氣失其清肅而過于熱則津液受火煎熬轉為稠濁或氣失其溫和而過于寒則津液因寒積滯漸致凝結斯痰成矣故痰一也而因寒因熱其源不同可概治數辨別之法古以黃稠者為熱稀白者為寒此特言其大概而不可泥也試以外感言之余

知為熱極所致蓋火甚壅逼頻咳頻出停留不久故未至于黃稠耳迨火衰氣平咳
嗽漸息痰之出者半日一口反黃而稠則火不上壅疾得久留受其煎煉所致而病
亦遂愈方知黃稠之痰火氣尚緩而微稀則火不上壅疾得久留受其煎煉所致而病
解散而不宜于溫熱者也又以內傷言之腎火虛水泛為痰其痰清稀當用溫熱固
也即腎火盛水沸為痰其痰亦清稀蓋龍雷動而雨水隨之卒然上湧雖略帶濁沫
終非黃稠可比亦宜用甘寒壯水而不宜於溫熱者也孰謂稀白之痰必屬於寒也
哉大抵稀白而吐疎者必屬寒予嘗吐痰出喉冷冰雜咳嗽頻併而不咳之多時仍是
證仍屬熱者蓋痰本水屬積久而多則火不能溫也故張子和謂新痰熱舊痰寒
者必屬熱因于脾氣虛寒不能攝涎頻吐偏地者必屬寒其人安靜無他既非傷風
火動可辨此等須細為辨別更當參之以脈可見也有氧化之津液有飲食之津液胃者津
液之海也故痰聚焉積久聚多隨脾胃之氣以四訖則流溢于腸胃之外軀壳之中
經絡為之壅塞皮肉為之麻木甚至結成窠囊牢不可破其患固不一矣法在平調
其氣熱者使復清肅之常涼風生而濕土燥寒者使回陽和之令旭日出而堅冰消
氣得其平疾源以絕而後其停蓄于腸胃之內肌膚之中者乃可徐圖否則根株不
拔旋去旋生無奏效之日矣更有一妙義痰隨氣行既隨氣以出于腸胃之外亦隨
氣以入于腸胃之內若潮之往返然人身之氣日則行于外夜則返于內者也故遇

夜安卧晨興盥漱則吐痰獨多豈非痰隨夜氣內返于胃之故乎然則往者必令復返外者必令復內乃有出路否則迷留經絡之中難于消導矣喻嘉言發明此理謂人不宜夜食恐脾胃之氣因食運動外達而不內收痰難返胃誠為篤論然遇夜而勞擾不息更屬大戒舉一返三喻氏之說所當推廣也

風痰屬肝脈弦面青肢體痛悶麻痺便溺秘滯詳二便及中風門心多鬱怒或成癰瘍擣揭眩暈水煮金花丸川芎丸防風丸祛風丸導痰丸星半天麻牙皂殼桑秦艽皆治風痰可用吐法或因痰悶絕烏藥枳壳明星薑汁灌之即醒

熱痰屬心脈洪面赤煩熱燥渴多笑眩暈嘈雜頭風爛眼或背心一點冰冷痰多稠濁小黃丸黃芩利膈丸觀瀉痰丸當下者控涎丹加盆硝等分每服三兩丸瓜萎仁芩連青黛山梔二冬竹沥童便可用因暑得者消暑丸見傷寒

濕痰屬脾脈緩面黃支體重倦弱嗜卧腹脹食不消泄瀉關節不利或作腫塊麻木不仁白朮丸二朮星半茯苓澤瀉可用腫塊加乳沒臂痛加薄桂薑黃助脹加柴胡白芥青皮滾痰丸最利飲盛者小胃丹濕痰多而易出痰之動濕也主于脾或由脾氣壅滯不行或由脾氣虛寒不運而生

氣痰屬肺脈澀面白氣上喘促酒浙寒熱悲愁不樂攻注走刺不定兩肋脹痛玉粉丸局方桔梗湯二陳湯去甘草加香附木香砂仁枳壳烏藥蘇子青皮竹沥薑汁氣

七氣湯見越鞠丸觀疾少而粘連不易出氣燥也宜潤之門冬地黃枸杞之屬使肺氣得清肅下行

寒痰屬腎脈沉面黑足寒心多恐怖痞塞骨痺四支不舉薑桂丸局方胡椒理中丸乾薑必不可少甚則加桂麻黃細辛 疾之本水也原于腎腎火虛則水泛為疾其
不論

痰清八味丸火盛則水沸為疾有濁沫六味丸

水沸為痰暴壅也若火非湧盛而但熱涸者痰則稠粘此二者皆屬於熱

又有因驚而心神出舍舍空疾入多成心痛癲疾婦人因產受驚多有此證腹有如孕一塊轉動躍跳痛不可忍甘遂大戟白芥子加硃砂痛加全蝎成塊加山甲炒蟻甲玄胡莪术

食積生痰多成癰痢痞塊口喫食臭山楂神麩麥芽枳壳木香黃連滾痰丸亦妙或保和丸見傷飲食 飲酒生痰常多嘔惡食不美妙應丸加雄黃全蝎各二錢每服十九老痰即癭痰結成粘塊吐咯不出非南星半夏茯苓蒼朮可治青黛為主五倍海石苦梗旋覆花瓜萎仁芒硝痰核疾結喉嚨如梅核狀用梅子半青半黃每一個用鹽一兩浸晒數次以水盡為度用大錢三個夾梅兩個麻線札定貼瓦罐埋地下百日含口中汁下即消 又一法用海石烏梅瓜萎桔梗芒硝射干海藻薑汁蜜為丸噙

頭面頸項身之中下有結核不紅不痛不硬不作膿皆疾核脾肺氣逆疾滯于內順氣消癥自愈 亦有鬱怒傷損肝脾血病結核者宜養血清肝火 外用白果肉南星搗貼

痰在身習習如卧芒刺如蟲行或走注疼痛或燥癢搔之則癰癧隨生 痰在皮毛烘熱色如錦斑 痰在頭偏頭風頭眩 痰在額額悶痛眉稜癢痛 痰在目目暈眼蠕動如蠻蟻膠粘癢澀目中時出火星眼前如見白氣或見兩月交輝或見金光數道或眼前黑暗或眼皮下烟灰黑色 痰在耳輪癢痛蟬鳴水響 痰在鼻鼻塞或聞焦臭 痰在口齒頰癢痛牙床浮口糜舌爛口燥唾稠嘔冷涎綠水黑汁胡言不語 痰在面形枯瘦焦領腮腫硬似疼非疼 痰在頸項無故腫繞項結核喉痺痰如破絮桃膠蜆肉咯不成咽不下或噎塞煩悶如烟火上冲頭面烘熱或喉間豆腥 痰在四肢肩背酸疼腫硬似疼非疼或筋骨疼無常處難名狀或手麻臂痺狀若風濕或倏然仆地四肢厥冷或麻木不仁或重滯或牽引或不舉非竹沥薑汁不開二陳加枳壳南星木香姜黃 痰在心胸噫氣吞酸嘈雜或痛或噫乾嘔也或心下如停冰鐵或驚悸怔忡如畏人捕或胸膈迷悶如癲呆狀或痞滿健忘惡心疾在脊背脊上冰冷一條如線或冰冷一點疼痛或如熱湯沃背 痰在兩肋肋脹痛如湯沸非白芥子不能達 痰在腰腎腰間骨節卒痛呼吸難任 痰在二便

癰閉秘結遺同米泔糞後魚凍婦人月水不通 痘在足足脫酸軟步履如蹠灰上
疾在夢寐睡時魔夢刑戮刀兵夢入人家四壁圍繞一竇得出不知何所夢在燒
人地上烟火枯骨焦氣摸鼻無路可出或不因觸發忿怒悲啼而寤怪誕百般不可
辨述隱君悉以滾痰丸治之

龐安常有言人身無倒上之疾天下無逆流之水故善治疾者不治疾而治氣氣順
則一身之津液亦隨氣而順矣并宜蘇子降氣湯見導痰湯各半貼和煎或小半夏
茯苓湯加枳實木香各半錢吞五套丸或以五套丸料依分兩作飲子煎服亦好
按疾標也所以致疾者本也治病固當求本然須看疾勢緩急緩則治本固也若疾
勢盛急度難行散非攻無由去者虛人可標本并治補攻兼施若勢甚緊急則雖虛
人亦當先攻後補如中風之用三生飲幌諸控涎丹是也當此咽喉閉塞之時不吐
去其痰立即堵塞而死矣昧者乃畏其虛而不敢用獨不畏其死矣夫人之虛莫虛
于中風者矣猶必先攻後補乃于尋常虛人反畏之耶準繩謂治痰固宜補脾以復
健運之常使痰自化然停積既久如溝渠壅遏瘀濁臭穢無所不有若不疏通而欲
澄治已壅之水而使之清決無是理又謂凡病痰飲而變生諸證不當為諸證牽掣
且以治飲為先如頭風眉稜骨疼累用風藥不效投痰藥收功眼赤羞明而痛與涼
藥弗瘳授痰劑獲愈云云真格言也按二證皆 痰壅熱上 喻嘉言曰脾之濕熱胃之壯火交

煽互蒸結為濁痰溢入上竅久久不散透開肺膜結為窠囊窠囊之痰如蜂子之穴
子房中如蓮寢之篋於蓬內生長則易剝落則難繇其外窄中寬任行驅導徒傷他
臟此寢閉拒而不納耳究而言之豈但窠囊之中痰不易除即肺葉之外膜原之間
頑痰膠結多年如樹之有蘿如屋之有遊如石之有苔附托相安倉卒有難于剝伐
者治法必靜以馭氣使三陰之火不上逆又必嚴以馭脾使太陰之濕不上蒸乃廣
服大藥以安和五臟培養肺氣肺金之氣一清則周身之氣翕然從之下降前此上
升濁邪允絕其源矣又曰人身之氣經盛則注于絡絡盛則注于經窠囊之成始于
痰聚胃口嘔時數動胃氣胃氣動則半從上出于喉半從內入于絡胃之絡貫膈者
也其氣奔入之急則冲透膈膜而痰得以居之日增一日故治之甚難必先去胃中
之痰而不嘔不觸俾胃經之氣不急奔于絡轉虛其胃以聽絡中之氣返還于胃逐
漸以藥開導其囊而涤去其痰則自愈矣 又曰李繼江常苦咳嗽生痰胸膈不寬
今夏秋間卧床不起瀕死者再將家事分撥安心服死忽覺稍安亦必死則身康之
一微也未幾仍與家事其病復作就診見其頤旁有小小壘塊數十高出謂之曰觀
爾脈盛筋強必當好色而喜任奔走本病宜發癰疽所以得免者以未享膏梁之奉
且火纔一動便從精孔洩出耳然雖不病癰而病之所造今更深矣爾胸背肩鶻間
巉岩如亂石插天擲比如新筍出土嵌空如蜂蓮之房芒銳如棘栗之刺每當火動

氣升痰壅緊逼之時百苦交煎求生不生求死不死比桁楊之罪人十倍過之由好色作勞氣不歸元騰空而上入于肝肺散葉空隙之間膜原之內者日續一日久久漸成熟路只俟晴氣一動千軍萬馬乘機一時奔轍有入無出如潮不返海潮兼天湧至倘後潮不熄則前潮不退古今死于此病者不知其幾但爾體堅堪耐是以病至太甚尚自無患耳尔宜歸家休心息神如同死去俾火不妄動則痰氣不為助虛胸背之堅疊始有隙可入吾急備藥為爾覆巢搗穴可得痊也渠以為病未即死且往鄉徵租因勞陡發暴不可言痰出如泉噏響如鋸面大舌脹喉梗目突二日而卒飲者停水之名又痰之清稀者曰飲故痰飲并稱金匱謂飲有四其人昔肥今瘦津中不上水走腸間瀝瀝有聲曰痰飲飲後水流脇下欬吐引痛曰懸飲於脇水乃有形之不下也飲水流行歸于四肢當汗出而汗不出身體疼重謂之溼飲水非水精四布之水止宜下行從小便出今不行而旁達應從汗泄而不得化汗欬逆倚息氣短以出故身體疼重即風水水腫之病也曰溢者言泛溢於四旁也

此四飲乃隨其部位分言耳又謂心下有留飲故留寒冷如掌大故背寒冷腸下痛引缺盆留于腸則碍肝氣故脇痛缺盆為十二經道路故引及之欬嗽則轉甚也胸中有留飲其人短氣肺氣被而渴水阻氣不布不能化生津液故胸雖停水而咽喉則乾也

又謂膈上病痰飲留膈上伏而不滿喘欬吐留伏日言伏飲乃上四飲之總綱也

喘滿肺氣被迫也。發則寒熱背痛腰冷。發謂伏而發也。今之值秋寒或感春風而發。發者此目泣自出。咳甚則肺葉舉而目泣自出也。振振身瞤。喘咳甚則身動必有伏飲。伏而難攻也。比

又謂水停心下甚者則悸。心氣為水所逼而跳動不寧也。微者短氣脈雙弦者寒也。皆大下後裏虛

偏弦者飲也。先渴後嘔。言飲本偏弦若大下裏虛寒相搏變為雙弦也。氣被水阻不能化生津液故渴。小半夏茯苓湯此

屬飲家。言平日多飲之人也。又謂嘔家本渴。嘔家謂非因停水而嘔者乃別病也。嘔傷津液故本應作渴。渴者為欲解病從

故雖渴亦為欲解也。今反不渴心下有支飲故也。此辨證之法。言卒然嘔吐則未知其為別病

之渴者是別病之嘔不渴者乃留飲之嘔也。留飲未嘔之先亦渴而嘔後反不渴者以嘔則水稍去而氣稍通能布化生津也。小半夏湯又謂心下

痞半夏加茯苓湯。臍下悸塞。水停心下則心下悸而痞若停臍下則臍下悸也。吐涎沫。觀此則上文所謂眩水者為涎沫可知。逼渴而嘔後反不渴者以嘔則水稍去而氣稍通能布化生津也。小半夏湯又謂心下

浮也。五苓散。見傷寒。又謂短氣有微飲。為悸微者短氣當從小便去之桂苓朮甘湯。腎之陰為水所碍用腎氣丸溫陽以行水按呼氣自下而上故屬心肺呼氣短者

氣丸即八味丸。金鑑云呼出為陽心肺主之吸入為陰肝腎主之若呼之氣短是心

肺之陽為水所碍用苓桂朮甘湯益土氣以行水若吸之氣短是肝

言水在上焦阻礙上焦呼吸之氣致令喘促也及舉呼以該吸非單言呼也吸氣微

此勿泥看又謂脈浮而細滑傷飲。初病未深之診脈沉者有留飲經云沉潛水畜病者脈伏為伏

其人欲自利水欲去不上出而此為留飲欲去也。雖利心下續堅滿乃伏飲盤結

遂半夏湯。甘遂甘草並用激之使出因已利又謂水在肝腸下支滿嘔而痛。氣動則

水在腎心下悸。心當作脾又謂支飲腹滿原文作胸滿從金鑑改之厚朴大黃湯又謂腹滿口舌

作痛水在腎易同有水氣鄭水已椒薑黃丸。防已椒目導飲從大便下前後分消也。大黃導

又謂脈沉弦

者懸飲內痛十乘湯覘腫又謂溢飲當發汗大小青龍湯又謂脈飲脈不弦但苦喘

短氣不能卧

肺飲即支飲

葶藶大棗湯覘哮

又謂膈間支飲喘滿心下痞堅

自胸連膈盤結甚面

色黧黑水邪深結之色

脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈

盤結

正也傷寒之故愈

寢者三日復發復與不愈去石膏

寒其加芒硝開結

茯苓滲

又謂脈弦數有寒飲

外寒而內鬱熱故脈弦數也

冬夏難治

冬用熱藥則妨其內之熱夏用寒藥則妨其外之寒也然不必泥

又謂久咳數歲

詳下乃支飲清肺而咳也

脈弱可治

久病脈虛則應弱

脈大數者死脈虛必苦冒其人本有支

飲在胸中故也

有物蔽之即傷濕首如裹之義

治屬飲家

言不從咳嗽門治法也按金匱所言停飲證當

門參看與水腫

張子和謂飲當去水溫補轉甚蓋寒飲在中反以熱藥從上投之為寒所拒水濕未

除反增心火火既不降水反下注其上焦枯其下寒慄當依內經留者攻之十乘

見腫脹神祐脈

之屬為宜次以淡劑流其餘蘊以降火之劑開其胃口自愈

按金匱所言停飲證當

痞滿胸痺 痞塊

痞者痞塞不開滿者滿悶不行也痞滿與脹滿不同脹滿內滿而外脹起痞滿但內覺滿悶而外無脹急之形也有在胸在腹之分皆由中氣不運而所以致不運者則或寒而凝閉或熱而膜脹或食滯痰停或氣結怒鬱或脾濕不化或血瘀不行皆能致之不特外邪陷入繩塞而成如傷寒論所云也

在胸者理同胸痺金匱謂陽微寸脈微也上焦虛寒陰強下焦寒盛即胸痺而痛陰邪上干胸所謂邪之所凑其氣必虛留而不去其病為寢也寢謂痰飲之類短氣不足以息以邪阻氣道呼吸喘促不利非真氣之短乏又云喘息咳嗽胸背痛短氣寸脈沉遲上焦內氣寒也關脈小緊數小為陽虛緊數為寒痛是中湯半溫行陽開痺又云胸痺不得卧心痛徹背者此證更甚矣上證又云胸痺緩急者其痛或緩或急也括囊薤白半夏湯心痛徹背背痛為重烏頭丸為輕輕者茯苓杏仁甘草湯或橘枳薑湯胸為氣海陽邪性開不病渾也病渾必陰邪干之陰邪化水水性凝故令氣塞水感于氣以茯苓湯利水氣感于水以橘枳湯行氣又云心下痞氣結在胸胸滿腸下逆捨心首條云陰弦此云腸下氣上逆乃肝脾之邪氣上逆也枳實薤白桂枝湯桂以伐肝人參湯上方散邪千文則化火火又云心中痞諸逆心懸痛上條不過冲心此則心痛而搖動若懸空然桂枝生薑枳實湯桂以人參湯上方散邪陽之分濁陰干之則氣不行為虛痞甚則痰涎停聚為寢痞更甚則痛也東垣謂痞但滿而不痛視胸痺有痛證雖不同理則無二兀兀欲吐者吐之食鬱上焦者亦然一味括囊子炒熟連皮煎或丸最能蕩滌胸中垢膩在腹中者黃芪補中湯加升柴結天地不交為否朱苓澤瀉降天氣使下濟升麻柴胡升地氣使上行飲食停滯輕者大消痞丸枳朮丸見傷寒甚者枳朮丸飲食下之酒積雜病下之太過致痞滿者升提其胃氣加血藥下多亡陰故補其血鬱者越鞠丸逍遙散并見濕者平胃散

飲食合五苓觀傷 氣滯四七湯見氣痰滯導痰湯見 脾弱不運者四君子湯異功

散氣井見

挾死血者丹皮江西紅麴穿山甲降香桃仁紅花當歸童便韭汁之屬

怒者加香附童便 在腹亦有虛寔之分寔則積久成形即名痞塊於積聚門求之

積聚

積者有形之邪或食或痰或血積滯成塊時常硬痛終始不離故處者也在婦人則謂之癥瘕者微也有形可驗也聚者無形之氣滯則聚行則散聚則有形而硬痛散則痛止形消忽此忽彼無有定處者也在婦人謂之瘕瘕者假也假氣為形而寔非有形也形屬陰氣屬陽故積屬陰聚屬陽古分積屬藏在血分聚屬腑在氣分即陰陽之義耳不必泥也至其病因則內經謂寒氣入腸胃則腸外汁沫凝聚不散日以成積又或飲食過飽或用力過度傷其腸胃之絡則血溢腸外與寒沫搏結成積或外中於寒而憂怒氣逆血凝液留皆成積可見外感內傷皆足以鬱滯其氣血痰液以成積聚而在婦人尤甚以婦人經產血行或食生冷或感風寒且多恚怒憂鬱易致瘀滯也

一食積酒積附

證見噯腐吞酸腹滿惡食宜秘方化滯丸山楂麥芽枳實神麩阿魏礞石牽牛巴豆之類倒倉法最佳 按食停腸內必蘊滯在隱曲之處乃能久而不下隱曲之處為

地無幾必附益以腸外之涎沫內外交結乃成大塊須兼治其疾飲乃效 酒積目

黃口乾肚腹脹痛少食宜葛根枳椇麥芽之類

酒濕熱傷脾疾血瘀滯成積煩兼清利濕導滯之藥舊謂食積在右血

積在左 痘積在中
大概如此不可泥

一 痘積 水積附

證見麻木眩暉痞悶嘈雜其人平素多痰宜控涎丹

見痰飲

硃砂膩粉瓜蒂甘遂之類

水積足脰腫脹

必有 窦囊宜郁李商陸甘遂芫花之類

一 血積

證見面色痿黃有蟹爪紋路

血不能上榮也

多怒善忘口燥便祕骨熱肢冷宜桃仁煎地榆

蟲蛭水蛭之類

已上皆有形之積阻礙正氣故痛也而亦有不痛者日久則正氣另闢行徑不復與邪相爭或邪另結窠囊不礙氣血隧道之故此為難治以藥不易到也又食痰血數者皆無知之物不能移動故常在其處然有飲汚井之水吞蛟蜃之精因而假血氣以成形含有活性時能蠢動游移者須以意治之如敗梳治蠱瘕銅屑治龍瘕之類

七癥八瘕載千金方
有蛟蛇鰐鱉等名

又積久則成瘻因經絡壅滯鬱成濕熱以致口糜齷爛當兼用

龍膏等丸

見腸痛以清疳熱凡治積宜丸不宜湯必兼用膏藥熨貼及艾灸乃除以其

一氣聚

證必肚腹膨脹時痛時止得嚏即寬旋復痛遊去攻刺宜木香橘枳壳牽牛之類不可下右明積聚之理至下文所舉色目不過隨部位而異名總不出積與聚二端

心積名伏梁起臍上大如臂上至心下心經氣鬱血滯所致久不已令人心煩宜大七氣湯加

石菖蒲半夏兼吞伏梁丸肝積名肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不已令人嘔逆

或胸脇痛引小腹足寒轉筋寒熱如瘧

肝經血氣鬱滯所致

宜大七氣湯煎熟待冷淋燒鐵鐵

器乘服兼吞肥氣丸肺積名息竇在右脇下大如覆杯氣逆背痛或少氣善忘久不

愈令人洒酒寒熱喘咳皮中時痛如蟲緣針刺

肺熱氣壅所致

宜大七氣湯加桑白皮杏仁

兼吞息竇丸

按內經謂脇下滿氣逆二三歲不已病名息竇當是肥氣之屬非即此證

脾積名痞氣在胃脘大如覆盤痞塞不通心背痛飢減飽見腹滿吐泄久則四肢不收發黃疸飲食不為飢膚足腫肉消宜大七氣湯下紅丸子見傷飲食兼吞痞氣丸

腎積者奔豚發于小腹上冲至心如豚狀上下無時少腹急腰痛久不已令人喘逆骨痿宜大七氣湯倍桂加茴香炒練子肉兼吞奔豚丸

痃在腹內近臍左右各有一條筋脈急痛大者如臂小者如指有時而現如弦之狀故名痃

癥偏僻也僻居兩肋有時而痛

石瘕生胞中因寒氣客于子門惡血留聚日漸大狀如懷子此氣先病血後病月事不以時下此病分病

腸蕈寒客大腸外結瘕始如雞卵漸益大如懷孕此氣病血未病故月水不斷此氣分病上二者皆女子病似妊娠治法可用辛熱如吳茱萸桂心附子加入消塊藥

脈法

沉弦為積浮弦為聚寔大有力者生虛小衰弱者死

治法

大法結者散之客者除之留者行之堅者削之鹹以軟之苦以泄之辛以開之義成三棱

鱉甲專治積聚

凡磨積之藥必用補正之藥兼服消及半即止過則傷正蓋壯人無積必

正氣不足邪乃留滯須分初中末三治初起正不甚弱邪尚淺可攻中則邪深正弱可補濁迭用末但補益正氣兼導達經脈使氣旺流通破殘之邪不攻自走矣 又

日久則氣鬱已久其初即寒至此亦鬱成濕熱積得濕熱愈大當兼驅濕熱之邪

胃弱少食勿與攻下二賢散常服自消 張子和謂五積六聚治同鬱斷蓋積聚由

于鬱滯也其治肥氣吐以獨聖散見傷食兼汗吐後必有血數滴勿續以磨積藥調之

治伏梁吐以茶調散見傷食兼汗并見腫脹

并見傷食兼汗又以禹功導水

并見腫脹奪之繼以降火之藥調之治痞

氣以瓜蒂散

見傷寒食

吐之

以導水禹功下之末以五苓瀉傷寒劑調之治息竇吐以瓜

蒂散汗下兼行治竇脈下以導水丸通經散次用治血化氣磨積之藥調之竇脈或言其峻子和曰積在臟府多着脂膜曲折之處如陳莝之在江河不在中流多着汀灣迴泊之地遇江河之溢一漂而去及之在藏理亦如之故先以丸藥驅逐新受之食使無梗塞其碎着之積已離未下次以散藥滿胃而下如橫江之筏一湧而盡設未盡者以藥調之惟堅積不可用此法宜以漸除塊瘕是也因述九積治法於後

食積心酸腹滿大黃牽牛之類甚者礞石巴豆 酒積目黃口乾葛根麥蘖之類甚者甘遂牽牛 氣積噫氣痞塞木香橘榔之類甚者枳壳牽牛涎積咽如搜鋸朱砂膩粉之甚者瓜蒂甘遂 痰積涕唾稠粘半夏南星之類甚者瓜蒂藜蘆 癥積兩脇刺痛三棱廣芝之類甚者甘遂蝎梢 水積足胫腫滿郁李商陸之類甘遂芫花血積打撲胸瘀產後不月桃仁地榆之類甚者蟲蟲水蛭 肉積癰瘤核癰膩粉白丁香破刺出血甚者硇砂信石 九積皆以氣為主

蟲

蟲由濕熱鬱蒸以生或雜生冷肥甘厚味停滯或五藏勞熱病後氣血鬱積凡可致濕熱者皆能生蟲不必過餐魚膾白酒誤啖蠶覓水蛭乃自然觀日中有雨則禾節生蟲可見玄珠云蟲得風木之氣乃生得雨氣乃化蓋風木氣溫雨氣濕其為濕熱所生無疑于金要方云蟲有九皆能食人藏府一曰伏蟲長

四分群蟲之主也一曰蛇蟲長一尺或五六寸生發多則貫心而殺人一曰白蟲長

一寸故名寸子孫相生其母轉大長四五丈

準繩作連長一丈

能殺人飲白酒以桑枝貫

牛肉免食或食生栗或食生魚後即飲乳酪所生發動則損人精氣腰腳疼

一曰肉蟲狀如爛杏令人煩滿一曰肺蟲狀

如蚕令人咳嗽一曰胃蟲狀如蝦蟆令人嘔吐胃逆氣噦一曰弱蟲又名膈蟲狀如

瓜瓣令人多唾一曰赤蟲狀如生肉令人腸鳴一曰蟻蟲至細微形如菜蟲居廣腸

中能為痔漏瘡癩疥癬等患人不必盡有有亦不必盡多本事方云心蟲曰蛔即脾

蟲曰寸白腎蟲如寸截絲縷即蟻蟲也

肝蟲如爛杏肺蟲如蚕皆能殺人肺蟲居肺葉內

蝕肺系成瘵疾咯血殼嘶藥所不到治之為難又有尾蟲與人俱生狀如馬尾或

如薄筋依脾而居乃有頭尾皆長三寸

蟲證心嘈腹痛或上攻心如咬

蟲動則心慌亂不寧故嘈雜蟲竄動咬齧則腹痛也

嘔吐涎沫清水或青黃水

蟲多在胃中胃氣被蟲擾動則津液隨氣壅泛也

經謂蟲動則胃緩胃緩則

廉泉開故流涎謂胃氣為蟲所滯不能行其津液故上泛而從廉泉穴出耳面色痿

黃胃脈上面胃因蟲病虛弱故痿悴之黃色見于面也

或乍赤乍白乍青黑

青黑為痛色白為少血色赤為火色蟲擾動無常痛甚則面色青黑

氣血滯于內不上行則面無血色久滯忽通火得上伸則赤也

或面有白斑

胃中蝕痕斑駁故面亦應而成斑若影之肖形然

唇常紅

脾血之而熱因滯故色見于唇或生瘡如粟米

準繩謂蟲蝕下部為狐下唇有瘡蝕上部為惑上唇有瘡按狐惑之名本金匱謂蝕于喉殼瘍為惑蝕下部咽乾為狐金

磁謂狐即下疳蝕爛肛門與下陰感即牙疳蝕咽腐斷脫牙穿腮破唇按牙疳下疳皆濕熱病也

或沉默欲眠卧起不安不欲飲食

蟲動則令人飢則痛得食痛更甚蟲飢動而求食又飽即安

蟲飽即不動矣時痛時止以手附擊即息震動蟲驚畏而止也不撻又作取蟲面愈腹大寒滯久暴伸脈洪而大腹痛脈當沉弱今反洪于外則發熱脈洪而大乃溫熱生蟲之象皆其候也

治諸蟲法常以白蓬草沐浴佳根葉皆可用草既香且為屍蟲所畏也

蟲有腹中月上旬頭向上中旬橫之下旬向下觀牛馬生子上旬生者行在母前中旬生者并母而行下旬生者後隨之猫食鼠上旬食上段中旬食中段下旬食下段皆自然之理故治蟲須于上旬用藥一云初一至四五頭向上一云初一至初三云肺蟲惟初四初六頭向上用藥末為末調藥若急不能待可忍飢一日使蟲餓於五更時先嚼火猪肉蘸津而勿食使蟲聞香則頭向上然後服殺蟲之藥或用藥末攪雞蛋煎食諸殺蟲藥皆苦惟榧子使君子甘小兒疳蟲慢使君子與食以其壳煎湯送下甚妙鶴虱雷丸蕪荑苦棟根檳榔錫灰等皆殺蟲之品錫灰為最

王景得寄病每語喉中必有物殺相應有道人教令誦本草藥名至藍而默然遂取藍捩汁飲之少頃吐出肉塊長一寸餘人形悉具自後無殺陳正敏遜齋閒覽載楊勔得奇病每發言應答腹中有小殺効之數年間其殺浸大有道人見而驚曰此應殺蟲也久不治延及妻子令讀本草至雷丸蟲無殺乃頓服之遂愈趙子山苦寸白蟲醫者戒云是疾當止酒而以素所耽嗜欲罷不能一夕醉歸寓已半夜口乾

燭燥倉卒無湯飲適廊廡下有甕水月色下照瑩然可掬即酌而飲之其甘如飴連
飲數酌乃就寢迨曉蟲出席覺心腹頓寬宿疾遂愈驗視乃織草履者浸紅藤根水
也 吳少師嘗得疾數月間肌肉消瘦每飲食下咽少時腹如萬蟲攢攻且痒且痛
張銳切脈戒云明日早且忍飢勿啖一物銳取黃土一盂溫酒一升投土攬其內出
藥百粒飲之覺腸胃掣痛幾不堪忍須臾暴下如傾穢惡斗許有馬蝗千餘宛轉盤
結銳曰蟲入人肝脾裏勢須滋生此蟲喜酒又久不得土味乘飢畢集故一藥能洗
空之耳 蔡定夫之子苦寸白為孽醫者使之研檳榔細末取石榴東引根煎湯調
服之先灸肥猪肉一箇寘口中嚼咀其津膏而勿食云此蟲惟月三日以前其頭向
上可用藥攻打餘日即頭向上縱有藥皆無益蟲聞肉香故空群爭赴之覺胸中如
萬箭攢攻是其侯也然後飲前藥蔡患如其戒不兩刻腹中雷鳴急登廁蟲下如傾
命僕以杖挑撥皆聯綿成串幾長數丈尚蠕動舉而拋於溪流宿頓愈
患此者雖羸弱必先去蟲後以和平之劑調之即此可為一切虛者
見此先攻後補之例暗者只用滋補
甚者謂蟲為臟寒所生妄加熱藥可哂也

中毒

不論所服何毒急取龜心土為末冷水調服方寸七地漿亦佳
見砒礦毒或以甘草濃煎汁多
飲之須放冷飲毒乃解
見諸藥皆然又食蜜少許佳
又服葱涎或煮大豆汁服亦可 又濃煎

齊荳汁飲之不及煮便嚼食亦得

又方生麥冬八兩葱白八兩

去心去葉搗

三升水七升煮

取三升半分三服

又齊荳一分藍葉花

井花陰乾二分

共搗末水調服方寸七日

三 又板藍根

乾者四兩洗淨晒乾

貫眾一兩剉

青黛研

生甘草各一為末蜜丸或水浸蒸餅

丸桐子大另以青黛為衣每服十五丸

嚼爛新水送下即解常服三五丸亦解暑熱

又紫金錠冷水磨服孕婦忌之

如欲死即取新小便和廁旁久屎一升絞取汁

一升盡灌之便活已死者亦可救

參下葷毒條
取薑汁法

砒礦毒 羊血及雞鴨血熱服

藍根砂糖擂水服入薄荷汁尤妙

亦治巴豆法

菉豆擂

漿新汲水調通口服

真靛花一二錢井花水濃調灌

豆豉煎濃汁飲亦治服藥過劑煩悶

芭蕉根搗汁飲

掘地至黃土入新汲水攬濁取出濾去滓

澄清飲之并解葷毒地名不必

幾

巴豆毒 黃連菖蒲小豆大豆汁芭蕉根汁并解之

狼毒毒 白斂鹽藍汁并解之

藜蘆毒 雄黃葱汁并解之

芫花毒 防風防己甘草桂枝汁并解之

鄭躅花毒 桔子汁解之

射罔毒 藍汁大小豆汁六畜血蚯屎蘿蔔汁并解之

莨菪毒 薺危甘草升麻犀角蟹汁并解之

半夏毒 生薑汁解之

大戟毒 蒲蒲汁解之

附子天雄烏頭毒 大豆菉豆各數合煎濃汁飲 又遠志防風棗飴糖并解之

杏仁毒 藍子汁解之

川椒毒 閉口者有毒
戰喉能殺人 食蒜或飲地漿 或濃煎豆豉汁并解之

雄黃毒 防已解之

丹砂毒 鹽五錢冷水調澄旋服

丹毒 地漿良 食蚌肉解丹石毒

五石毒 薺危汁生服

吞金屑未絕者 水銀一兩放口中搖動令下咽入腹 金即消滅成泥而出三服
即活

漆毒 捣蟹汁塗

蕈毒 忍冬草即金花生啖 人糞汁飲一斗截竹筒去青皮浸
糞窖中取筒內汁 大豆煮濃汁飲之
細茶芽研新汲水調服 石首魚或鱉魚頭白水煮汁服 荷葉殺蕈毒
苦瓠毒 奎穰煮汁服解之

麴毒 豆腐毒 井用蘿蔔煎湯服之亦可

六畜肉毒及一切藥毒 白扁豆生晒乾為末新汲水調下三錢七

鳥獸中毒箭死者有毒 大豆煮汁及藍汁服解之

牛肉毒 人乳合豉濃汁服

馬肉毒 香豉兩 杏仁兩 同蒸一食頃熟搗服日再 又方煮蘆根汁飲之

麝肉堅器蓋經宿者也 漏脯毒經屋漏水粘着之脯肉也 燒大麻酒服方寸匕 飲人乳或韭汁二三升良

六畜肝毒凡肝不宜食日死者尤毒 豆豉水浸旋服 治馬肝毒雄鼠屎尖者 二七枚為末水

和服日再 又人頭垢取方寸七酒調服

河豚毒 五倍子 白礬等為末水調服或多飲清油吐之

蟹毒 紫蘇煮汁飲三升 冬瓜汁飲二升

食果中毒 猪骨煅為末服方匕亦治馬肝漏脯等毒

蛇遺精水中誤飲中毒井治蛇咬 水調雄黃末飲之蛇咬兼塗傷處 蛇咬水洗頭垢稠濃
一云
泔洗
甘味
飲

蠱毒初尚在膈上者宜吐之 白礬 建茶各二錢 為末新汲水調頃服即吐又此
藥入口覺甘甜不苦可驗是毒也或令唾水汎者是浮者非或含銀器口中經宿色
黑者是 若在膈下宜瀉 麝香二錢半 雄黃 朱砂水飛俱另研 赤脚蜈蚣微火去足

續隨子各一
皮
糞退紙各燒存性
肉
又方鼓皮長五寸

刺蝟皮
五倍子
續隨子
薑薇根五寸如足趾大細切

朱砂飛
雄黃等分各爲末糯米搗末先以熟水一升清酒三升煮取一升頓服下

桔梗
瓜萎兩五克搗末先以熟水送下

又麻
桔梗
瓜萎兩五克搗末先以熟水送下

湯洗患者陰中再以湯調方寸匕日二服漸加至二三七毒即內消忌食粘物及猪肉
其毒即愈 又方蕷苓根爲末飲食方寸匕

許溫服之須臾吐出鹽甚驗 又方胡荽根搗取汁半升和酒飲之立下 又方以
猪胆導下部良 若吐血或下血如爛雞肝者茜根蘘荷根各三水四升煮取二升
去滓頓服愈 又方猾皮燒灰水服方寸匕七日即吐出之 又方酒服桔梗末加犀角更佳

方寸匕七日三服不能服可灌之心中當煩須臾自靜有頃下服至七日止食猪脾補
之 又治五蠱一曰蛇二曰蟾蜍三曰蝦蟆四曰科斗五曰草蠱細切胎衣晒乾爲
末水服半錢七日即消或含升麻曬汁亦佳

嵐瘴惡氣毒 犀角羚羊角雄黃麝香解之 又甘草二兩水三升煮一升分服
井中毒 凡五六月井中及深塚中皆伏有毒氣欲入者先以雞鴨毛投之直至底
則無毒若徘徊不下必有毒矣亦可納生雞鴨于其中試之不死者無毒也又須以

又灌其頭及身即活若其井無水即他井亦可一云他井水洒身上至三日食頃便活東井取西井南井取北井

香附子

白芍皮

云苓子

橘梗子

桔梗子

桔梗子

桔梗子

桔梗子

柏脂丸子大酒服七丸空心熟水送下

又麻

桂枝

麻黄根

麻黄根

麻黄根

麻黄根

柏脂丸子大酒服六丸空心熟水送下

又麻

桂枝

麻黄根

麻黄根

麻黄根

麻黄根

柏脂丸子大酒服五丸空心熟水送下

又麻

桂枝

麻黄根

麻黄根

麻黄根

麻黄根

柏脂丸子大酒服四丸空心熟水送下

又麻

桂枝

麻黄根

麻黄根

麻黄根

麻黄根

柏脂丸子大酒服三丸空心熟水送下

又麻

桂枝

麻黄根

麻黄根

麻黄根

麻黄根

柏脂丸子大酒服二丸空心熟水送下

又麻

桂枝

麻黄根

麻黄根

麻黄根

麻黄根

柏脂丸子大酒服一丸空心熟水送下

又麻

桂枝

麻黄根

麻黄根

麻黄根

麻黄根

柏脂丸子大酒服半丸空心熟水送下

又麻

桂枝

麻黄根

麻黄根

麻黄根

麻黄根

柏脂丸子大酒服四分之一丸空心熟水送下

又麻

桂枝

麻黄根

麻黄根

麻黄根

麻黄根

醫編卷之三

南海何夢瑤報之緝

松江李林馥啟賢氏校正

雜症

腫脹

腫脹有二一因於水水氣停蓄于肌膚或藏府因而肌膚或腫肚腹膨脹也其色鮮明潤澤其皮光薄水晶甚則如其肉腐其身重其腫不速每自下而上腫有分界按其手足上如糟如泥成窟不起按而散之猝不能聚也肢體如是腹未必然以腹中氣盛水多水挾氣能鼓起也一因於氣氣熱壅滯作脹所謂諸腹脹皆屬於熱也或氣寒不運作脹所謂胃寒則脹脹藏寒生滿病也或氣實作脹實者邪氣實也或氣虛作脹虛則不能運所謂氣虛中滿太陰虛則鼓脹也其色蒼老皮厚肉堅其脹或連胸膈或倏然而脹者陽性急速也或自上及下者陽本乎上也或通身盡脹者氣無不至也以手按之隨手即起者如按氣囊也兩足或有按之不能猝起者以觀噓氣成水蒸氣可知矣病常相兼水蓄水亦停則治水當兼理氣氣行水治氣當兼行水水行氣亦通

治水當分陰陽陰水無火本之也或益肺脾之陽水或補命門之火陽水有火之水也隨火之所在而治之少年內畜最多此証

偏身腫煩渴小便赤澁大便多閉此屬陽水輕宜四磨飲見氣添磨生枳壳兼進保和治水當分陰陽陰水無火本之也或益肺脾之陽水或補命門之火陽水有火之水也隨火之所在而治之少年內畜最多此証

丸見傷

飲食重則疏鑿

飲子利之以通為度亦有雖煩渴而大便已利者宜用五苓加

木通大腹皮以小便五苓見傷濕

偏身腫不煩渴大便自調或溏泄小便雖少而不赤澀此屬陰水宜實脾飲小便如常至晚有微赤却無澀滯亦屬陰也不可遽補木香流氣飲見繼進復元丹若便不溏氣息磨飲下黑丹

見呃逆

陰水雖宜補陽然小火不能勝大水必先瀉去其水乃用緩藥以補元氣陰水雖寒久亦鬱而成熱寒本也熱標耳

金匱分五水曰風水皮水正水石水黃汗

風水脈浮骨節疼痛

水流關節或重而酸

水在肌膚也

發熱無汗惡風

外感風邪

面目腫大目下微

腫如蚕

如新卧起狀

目下屬太陰

又胃細筋散

目下土

虛則水反

脾胃脹而上注也

頸脈動

人迎脈也

水浮時時

欬侵肺

當發汗

脈浮而洪浮則為風

洪則為氣

氣鬱熱也

風氣相搏

風強熱也

于則為

癰瘍身體為庠庠為泄風

言庠者名為泄風也

所閉欲泄不得泄故作庠

熱為風

久為癰瘍即癰瘍以風熱久

熱濕相蒸生蟲

氣強則為水

熱多而不得外泄

則蒸氣成水也

難以俯仰

水侵淫于肌膚筋脈中也

風氣相擊身

體浮腫汗出乃愈此為風水

此句上有惡風則虛句下有不惡風者小便通利上焦

有寒其口多涎

此為黃汗之文

焦當是錯簡刪之

水脈浮身重汗出惡風者防己黃耆湯主之

固表以散風水

腹痛加芍藥

加芍藥甘草以調中

風水

惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱越婢湯主之惡風

汗出而惡風則為表陽虛

加附子

皮水皮受水濕也脈浮

水在皮跗腫濕邪從下受安之沒旨不惡風非邪其腹口

如鼓則非鼓也以水在皮膚不在腹內故外有脹形而內無滿端也。不渴在表故當發汗渴而不惡寒者此為皮水獨有水而無風故不惡風寒亦有淺深之分深而近裏亦足以抑遏陽氣不化津液故渴也。皮水為病四支腫水氣在皮膚中防已茯苓湯主之。裏水當依金鑑作皮水越婢加朮湯主之甘草麻黃湯亦主之。

正水腎藏之水其腹如鼓脈沉遲喘水泛于上故喘

石水脈沉腹滿不喘陰盛結于少腹如石之下沉

黃汗汗出沾衣如黃柏汁濕上色黃如此脈沉遲身發熱濕滯陽氣不行故鬱而成熱

愈必致癰濕熱久而愈盛氣血被其壅塞而成癰膿沉遲身發熱濕滯陽氣不行故鬱而成熱

痛熱為寒濕所鬱相攻故聚痛聚結也身腫而冷狀如周痹胸中塞不能食濕滯

熱汗出而渴狀如風水皆面目浮腫也脈自沉以汗出入水中浴水從汗孔入得之水遇

于肌內為熱所蒸而成黃汗然汗出浴水亦舉隅之論耳當推廣之

黃耆芍藥桂枝苦酒即醋湯主之金鑑謂桂枝散邪酒汗以攝營氣調和自愈渴按此方無清熱去濕之品徒取固斂得無壅乎此方恐是錯簡終不可用

按風水皮水皆水之在表者以感風受濕為別故有惡風與不惡風之分正水石水皆水之在裏者以上浮下沉為別故有喘與不喘之異黃汗雖狀如風水而風水脈不沉汗不黃自不同也

黃汗當門

參

又按正水水之上浮者必于肺故喘然肺自有

水病故金匱謂痛在骨節欬而喘不渴者此為肺脹

本文作脾脹今從金鑑改之

其狀如腫似腫非腫

蓋肺脹於中未形於外也發汗則愈

越婢加水湯

又謂肺水其身腫

皮膚浮腫

小便難

肺氣為水所壅不能通調水道下輸旁光

時時鴨溏

水糞相雜也大腸水趨之

是也

又按石水水之下沉者即金匱所謂腎水者腹大

臍腫腰痛不得溺

陰腫舊在心水陰腫下降故逆液有時生

小便有時通

陰下濕如牛糞上汗其足逆冷面反瘦言

若他水之面浮腫也

是也

又按石水水之下沉者即金匱所謂腎水者腹大

生小續通

水氣上下降故逆液有時生

小便有時通

陰下濕如牛糞上汗其足逆冷面反瘦言

臍腫腰痛不得溺

陰腫舊在心水陰腫下降故逆液有時生

小便有時通

陰下濕如牛糞上汗其足逆冷面反瘦言

也 痘輕者枳實白朮湯白朮補土枳實破堅張元素治瘡變此湯為丸以微屬食積所傷故用丸以消磨之此水飲所作故用湯以溫滌之

水脹冬瓜宜長吃鯉魚重一觔已上者煮取汁和冬瓜葱白作羹食之青頭鴨或白

鴨去腸雜細切和米煮粥空腹食之老鴨十年佳者殺取血俟凝銀簪劃片燒酒熱泡食

之鴨身去毛雜燒酒頓爛空心食俱不着鹽服後小便利腫立消忌鹽三年 水腫

外散內利峻劑疏鑿飲子和劑茯苓導水湯 醫貫胃虛不能制水者以補土為主

補中益氣湯六君子等湯二方並見實脾飲亦可脾氣旺則水自行不必加行氣利水之品若

腎火虛三焦之氣化不行關門不利水聚不出惟濟生腎氣丸見虛損最驗若腎水虛

火炎水從火溢上積于肺喘不能臥腹大脣腫腰痛兩足先腫小水短澁面赤或腫

口渴大便反燥六味見虛損加麥冬五味牛膝車前水腫

氣脹又名鼓脹以其外雖堅滿中空無物止氣作脹耳有似乎鼓也若兼中實有物食痰

之盤踞藏府如木之藏蠹如皿之聚蟲則又名蠱脹又有中毒而腹脹者曰蠱毒鼓脈必浮革蠱

脈必牢實治蠱如大黃芒硝牽牛檳榔三棱蓬朮俱可用一味地栗乾最妙 氣實

作脹宜厚朴等以破滯氣虛中滿宜補氣加芍藥等以收其散滯更分寒熱虛而寒

者寒脹中滿分消湯虛而熱者熱脹中滿分消丸 七情脹五膈寬中散見反胃木香

流氣飲沉香降氣湯並見 大怒而脹分心氣飲 憂思過度而脹紫蘇子湯 大

病後浮腫白朮三錢參芪各一錢半白朮二錢陳皮半夏麴白芍木香各一錢炙草

並見

見反胃

大腹皮各五錢薑棗煎久瀉後脹者六君子

見氣

加白蔻蘇梗當歸服后脹益甚勿疑

久自效

因無而成水腫分氣香蘇飲老人虛寒脹厚朴炮附木香因飲食所傷

者氣必滯胸滿曖氣消導寬中湯失飢傷飽痞悶停酸早食暮不能食

早晨陽氣長穀易消

暮則陽氣微難化也

大異香散

畜血作脹腹皮上見青紫筋脈芤濁婦人多有此先以桃

仁承氣湯勢重者抵當湯下之或代抵當丸

並見

虛人不可下者且以當歸活血散

調治血脹多有煩燥漱水不嚥迷忘如狂痛悶喘急大便黑小便利虛汗氣為血

蒸

成厥逆等症人參歸芎湯

瘦能滯氣勿謂不能作脹故古人治氣為痰鬱作脹加

味枳术湯

氣水血三者病常相因有先病氣滯而後血結者

如婦人先病月經不行者此也

有病血結而後氣滯者

如婦人先病氣鬱後通致氣滯脹滿是也有先病水腫而血隨敗者

水積日久滲

隧道血亦化水

有先病血結而水隨畜者

灌入

本而治之積聚相攻疼脹初用七氣消聚散日久弱者參术健脾湯少佐消導藥

蟲聚作脹治法詳蟲門

以上論氣脹○食血痰蟲積聚雖非因氣滯使然亦必因此滯氣并以理氣為主故皆屬之氣也

藏府外胸腹中邪充塞則胸腹脹矣經絡營衛氣無不到則血脉皮膚無不脹矣

故有

脉脹膚脹之名脈脹者筋起絡色變本香流氣飲治膚脹加撫芎姜黃治脈脹

也

如常又脹在皮膚經脈者飲食亦如常在腸胃間者則飲食少皆宜細察

分虛實其藏府之氣本盛被邪填塞不行者為實氣本不足因邪所壅者為虛

亦有

扶實以其邪為食疾實者驅之虛者補之寒者熱之熱者散之留者行之

邪從外入內而盛于中者先治其外而後調其中陰從下逆上而盛于中者先抑之而調其中陽從上降而盛于中者先舉之而調其中手足不腫獨腹脹謂之單腹

脹俗名蜘蛛蠱難治以病全聚於藏府不分散于四支也實者厚朴散虛者調中健脾丸

以病全聚於藏府不分散於四支也實者厚朴散虛者調中健脾丸

以病全聚於藏府不分散於四支也實者厚朴散虛者調中健脾丸

服藥後手足腫病自內達外也不久愈若從手足至腹為從外入內難治以病全聚於藏府不分散於四支也實者厚朴散虛者調中健脾丸

服藥後手足腫病自內達外也不久愈若從手足腫至腹為從外入內難治男自下而上男陽盛邪不易侵今乃以下漸上犯則邪盛陽虛可知女自上而下女陰盛邪不易侵今亦以下漸上犯則邪盛陰虛可知皆難治

男止下侵則邪盛陰虛可知皆難治

止

下腫女止上腫皆不足慮不在難治之例譬如今寇竊發原易撲滅若直逼京師重地乃可危耳

子和治一婦水腫四支不舉令以草貯布囊高支兩足而臥乃服上涌下泄瀉之藥自腰以上水覺下行自足跗以上水覺上行會於臍下泄瀉而出病大減此法宜知勝於升提也

診治法內水脈沉 外水脈浮 氣脹浮沉無定氣時外行時總以有神和緩有為佳忌弦細微弱

水腫鼓脹死証 腹脹身熱陽盛也而失血則陰亡矣四末清冷脫瘦也陰盛可知瀉數行中亦腫

先四肢後入腹見前利旋腫滿服下利之藥而旋消旋脹筋青高起唇黑肝腫突脾傷陰囊腐腫

益脊背足心平抉益平心傷背平肺傷足平腎傷血氣敗腫脹達之總可驚

黃疸

病由濕熱蒸發如罨麪相似偏身頭目爪甲皆黃小便黃赤不利

有色如有外感鬱

熱與素有之濕相蒸或外感于濕與素有之熱相蒸而發黃者宜從汗解詳傷寒論

有內生之濕熱相蒸者在上則吐之在下則下之利之然有陽黃陰黃之分蓋熱勝

則為陽黃濕勝而寒則為陰黃不可概用寒藥內因有由于停食者仲景所謂穀

疸寒熱不食

言其人先有寒熱之病則胃不和故不能食也

食即頭眩強食不化濁

掛

濕而發茵陳蒿湯主之又謂穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通

濕熱

身體盡

黃是也

內經謂已食而飢者胃疸乃熱盛濕少故能消穀乃胃熱非食滯也與此不同

此陽黃也又謂陽明病脈遲胃食難

用飽飽則發煩

飽則不順煩而頭眩小便難此欲作穀疸始雖寒久亦成鬱熱

雖下之腹滿如故以脈

遲故也

詳傷寒論陽明篇中

此陰黃也

有因於酒者酒性熱而質濕濕熱內瘀多發黃仲景

所謂鼻燥心中熱脈浮欲吐者吐之愈

病在上焦

又謂心中懊憹或熱痛不能食梔子大

黃湯主之

病在中焦又謂或無熱知有外熱也觀或

字

譖言小腹滿脈沉者下之

病在下焦

又謂

酒疸下之久久為黑疸

病在上焦者應吐若誤下則傷其血分故血敗而見黑色

目青面黑

舉面目以該周身也

心中如噦

蒜薹狀

辛味刺心之色

大便黑瘀

血色

皮膚爪之不仁

血瘀

于是也

有由于房勞者致腎水虛

相火炎不特蒸濕成黃併瘀血變黑仲景所謂黃家日晡發熱

濕屬脾土故

寒

傷寒陽明証發熱者必不惡寒乃濕與熱瘀

寒車子內表陽不宣故惡寒也此乃半正之去

而反惡

黃額上黑額最高火氣之所薰故黑足下熱因作黑痘則周身皆黑其脹脹如水狀大便必黑時
湧此女勞病非水也腹滿者難治脾腎皆病矣故難治消石礮石散主之消石鹼寒除熱礮石除痼熱在骨髓大麥
粥調服恐傷胃也然此方難用又謂額上黑微汗出濕欲外泄手足中熱薄暮即發陰熱故善發膀胱急癥血急痛

小便自利可知膀胱之急乃由血瘀曰女勞痘是也 其餘所因尚多而古人止分穀痘酒痘女勞痘及總名之黃痘與五水中之黃汗詳水腫篇為五然不必泥當推廣之 仲景謂痘而渴者難治熱盛不渴易治發于陰部其人必嘔陰者裏也發於陽部表其人脹寒而熱濕勝則寒又謂腹滿舌瘻濕痰壅塞舌本之筋不得轉轉也躁不得睡又謂諸黃痘利其小便茵陳五苓散主之脉浮當汗解桂枝加黃芪湯主之此方不可輕用又謂肚熱熱在裏當下之又謂腹滿小便不利而亦自汗出為表和裏實當下之大黃消石丸此皆言陽黃也又謂小便色不變欲自利腹滿而喘此為寒氣痰壅不可除熱除熱必嘔乾嘔也虛陽為寒所閉上嘔而有聲小半夏湯主之散寒降逆此言陰黃也陰黃小便清白大便不實喜靜能卧脈遲弱無力身冷自汗當以虛寒治之仲景所謂男子黃小便自利與小建中湯見勞王海藏謂中州寒生黃用大小建中見勞不必因陳皆氣虛之陰黃也氣虛則脾不運久瘀于裏則脾敗而色外見故黃其黃色必淡戴復菴謂失血後多面黃或偏身黃但不及血不榮也如竹木春夏葉潤則綠至秋則乾黃宜養榮湯見虛損十全大補湯見虛損妨食者四君子見加黃芪扁豆此血虛之陰黃也此為乾黃小便利 已上 証準繩

謂之暴病

言其黃驟然而見也

故仲景以十八日為期

仲景謂治之十日已上瘥反劇者難治乃脾水寄旺于四季之期十者上之成

數逾十日不瘥則旺氣就衰故難愈也然可不泥

另有一種病黃者久而不愈者

其黃以漸見食積或由勞倦或由疳積所致或名黃胖

胖者腫也

黃胖者腫也

大小溫中丸棗礬丸煖中丸右三方以針砂醋之類伐肝以木

末之類助脾後一方以礬醋之酸瀉肝

濕熱蒸而發胖如饅頭蒸而起發礬醋收斂使之瘦縮凡收斂即屬伐肝

以棗肉之甘補脾虛人佐以補劑按此即今人所謂黃腫與黃疸分別處在腫而色帶白眼

目如故不如黃疸之眼目皆黃

濕盛則但黃而不亮熱盛則鮮明如橘子乾黃則枯槁不潤蓋色潤者屬水色光者屬火若色如烟薰黃黑晦滯枯槁無光為危証舊說濕勝如薰黃黑晦存矣按黑晦即不亮也然未必枯若併不潤則是瘀敗之死水難治矣

而不帶白且無腫狀葉之類用使君子檳榔川練雷丸之類食積則用消食藥劑中不可無針砂消積平

肝其功最速治法亦與黃疸有別也又有瘟疫發黃詳瘟疫門又有瘀血發黃

身熱小便利大便黑脈澁桃仁承氣湯

見下盡黑物愈

又有身不黃獨目黃者經云風氣自陽明入胃循脈而上至目皆其人肥風氣不得外泄則為熱中而目黃青

龍散主之

按此亦偶之論耳

治法丹溪謂五疸不必細分概以濕熱治之

養胃化痘湯茵陳蒼朮木通澤瀉猪

苓山梔白茯苓薏苡仁食滯加神曲山楂麥芽酒痘加首蓿葛根女勞痘加當歸紅花活血

有神驗方黃蠟香油攤膏長六寸筋頭捲濕麵二指厚大如掌中以指穿

一孔對臍貼將膏捲入孔燃火薰最久者九條立愈 穀痘紅丸二見傷飲食 寶鑑因陳

梔子湯穀痘丸 酒痘梔子大黃湯葛根煎湯或梔子仁煎湯調五苓散見傷濕 或生

料五苓散加葛根一錢或葛花解醒湯見傷飲食 酒痘變成腹脹漸至面目周身俱腫

霍脾飲加木香麥芽各五分 女勞痘加味四君子湯大便不健者宜 滑石散小便不利者宜 脘痘

湯 痘後脾氣虛而黃者異功散見氣加黃芪扁豆各一錢 黑痘多危急用土瓜根

一斤搗碎絞汁六合頓服當有黃水從小便出再服之 目黃不除瓜蒂散見傷飲食 搗

鼻取黃水

消渴此為渴而且消之証 其常止渴者附後

河間謂由水虛火炎燥熱之甚故渴而飲水多子和亦謂心火太盛津液耗涸在上則為膈消甚則消及肺藏在中則為腸胃之消甚則消及脾藏在下則為膏液之消甚則消及腎藏在外則為肌肉之消甚則消及筋骨四藏皆消則心自焚而死矣治此者但調之而不下則小濡小潤固不能殺炎上之勢下之而不調亦終不能沃膈膜之乾下之調之而不減滋味戒嗜欲節喜怒亦病已而復作証分上中下皆從火

斷之

上消者大渴飲多甚者舌亦赤裂經謂心移熱於肺傳為膈消者是也二便如常知其燥在上焦白虎加人參湯見發熱 主之小便少者乃熱消爍其水也此消之義也 亦用前

湯加生津滋燥之藥如花粉北味麥冬乾葛之屬若小便不利者不利非少也蓋

湯合五苓散

見傷濕

子和謂恐變為水腫者是也若小便利者所謂飲多溲亦多也

詳見下文

前湯加辛潤之品以開通腠理可也上消大概心火盛黃連一味煎湯候冷

遇渴頻飲久而自愈若用心過度致此者黃芪六一湯加蓮肉達志各一錢吞玄菟

丹仍以大麥煎湯間下靈砂丸 糯穀炒爆桑根白皮等分每服一兩水煎渴即飲

繩絲湯能引清氣上朝于口又蠶與馬同屬午火心也作繭成蛹退藏之義故能抑

心火而止渴也 治上者劑宜小而服宜頻東垣謂消渴未傳能食者必發惱痘背

瘡不能食者必傳中滿鼓脹蓋能食者為實火火盛則血壅于經絡故生痘瘡痛甚

出赤水或潰不能食者為虛寒虛寒則氣不運故脹滿而所以致虛寒者何曰以寒治熱

固如繩墨之不能廢然臟府有遠近心肺位近宜制小其腹肝腎位遠宜制大其服

使之適至病所而止否則或過或不及皆為誅罰無過如上消而制大則速過病所

而寒其中下焦因致脹滿之病所謂上熱未除中寒復起也是以處方宜審故曰心

肺之藥莫厭頻而少

中消者善食而瘦

熱能消穀也此消之一義也瘦熱肌肉消削也此消之又一義也

渴自汗大便硬小便頻數黃赤

是胃熱盛叔和所謂口乾飲水多食汎虛或消中者是也

子和釋經二陽之病發心

傳為風清謂二陽乃胃與大腸病熱心受之則血不流故女子不調脾受之則味不化故男子少精風火消酒腸胃此腸胃之消也調胃承氣湯便不通或三黃丸

見發熱

生地白蓮藉各自然汁牛乳各一觔麥膏和黃連末一觔丸如桐子大白湯下三五十丸日十服

黃連猪肚丸

清涼飲子

見傷燥

下消者煩渴引飲小便如膏面色黧黑耳輪焦枯兩腿消瘦此腎熱也又名腎消六味地黃丸

見虛主之多因色慾過度服金石藥腎水涸竭虛陽上炎不交精出小便

淋濁陽道常堅古謂之強中也

按三消在河間子和以為熱証而金匱謂消渴小便反多飲一斗溲一斗腎氣丸主之又內經謂心移寒于肺為肺消飲一溲二者死不治是三消固有寒証乎曰此雖亦名消渴而實不當以消渴名者也蓋金匱所言乃因其人命門火衰不能蒸動腎水與脾胃中穀氣以上達于肺故上焦失潤而渴其所飲之水未經火化直下膀胱故飲一溲一其味不鹹腎氣丸即八味丸用附桂以壯其命門之火如釜底加薪則水穀之氣上騰蒸為潤澤也然此証止因水不上滋而渴非如盛大之焚灼則其渴不甚飲亦必不多

其謂飲一斗溲一斗者乃合算之詞非言每飲必一斗也

其與熱証之大渴引飲不止者安得無殊

哉且腎熱則小便如膏腎寒則小便清白又自有辨也至若內經所言心火衰微反為水冷金寒之化不特所飲之水無氣以化且併身中之津液亦無氣提攝相併下趨而成飲一溲二之証則肺氣之消索已甚尚何大渴大飲之有此皆不當名消渴

致後人涇渭不分動手即從溫補熱証逢之不死何待此河間子和二公所為大聲疾呼而痛詆其非也 河間謂飲多而小便多者非虛寒無火不能制水乃燥熱太甚腸胃三焦之腠理怫鬱結滯痏密壅塞水液不能滲泄于外如水沃石過而不留故洩多也此消之又當除其燥熱濟津液之衰使道路散而不結氣血利而不澁即前所謂以通腠理也又謂常有陽極似陰者下部覺冷兩足如冰乃心火不降宜寒藥下之三五焦則火降水升寒化自退其言可謂名通 子和謂心為陽火先受寒邪火鬱傷肺火與寒皆來乘肺肺外為寒所薄陽氣不得泄內為火所燥故皮膚消索洩溺與積濕頻併飲一溲二膈消不為寒所薄陽得宣散故可治肺消為寒所薄陽氣自潰于中故不治亦一說也

三消通治好黃連治淨為末冬瓜自然汁和成餅陰乾再為末再和如是者七次仍用冬瓜汁丸桐子大每服三十丸大麥仁湯入冬瓜汁送下尋常渴一服效 小便既多大便必秘宜常服四物湯見血調之糯米泔折二亦可冷進 三消久而小便不臭反作甜氣在溺桶中涌沸其病為重更有如猪脂浮在溺面如柏燭淚濺在桶邊此精竭也難治 水在天地與人身皆有甘有鹹甘者生氣鹹者死氣小便死水也本鹹而反甘是生氣泄也脾胃之生氣下陷矣參汗門脫汗味淡更明 三消久之精血虧或目無所見或手足偏廢如中風須滋生精血 愈後須防發癰痘黃芪六一湯下忍

冬九 未傳鼓脹水氣五皮飲見膿送濟生腎氣丸見虛損東垣中滿分消諸方見膿

可選用 坎乾水也氣也小而井大而江河也兌坤水也形也微而露大而雨也一
陽陷於二陰之中為坎坎以氣潛行萬物之中為受命之根本故潤萬物莫如水一
陰徹於二陽之上為兌兌以形普施于萬物之上為資生之利澤故說萬物莫說于
兌三焦為無形之火制以有形之水者兌澤也可暫光也吾身自有上池真水氣也
天一所生也以無形之水沃無形之火常而可久者也是為真水火升降既濟渴自
止矣

尋常消渴飲食勞倦氣虛發熱致津液不足而渴不可與五苓見傷濕宜補中益氣湯
見氣加五味子葛根 無病自渴與瘥後渴參木飲四君子湯見氣縮脾飲暑俱加乾
葛 久病陰虛黃芪飲四物湯見血加人參木瓜或七珍散去木加木瓜 產婦血虛
渴宜益血 酒渴乾葛飲調五苓散 多食菓子致渴藥中加麝香 停飲致渴詳

瘦飲門

痿發於夏者俗名注夏

痿者手足軟弱無力縱緩不收也即俗所謂手腳軟之意蓋熱而兼濕使然觀物之寒而乾者必堅硬收引熱而濕者必柔軟弛長可見濕屬土胃為水穀之海主潤筋脈胃病則不能運行水穀濕停筋脉中不為潤而為癆與熱相合故治痿獨取陽明也五藏皆

有熱者火也火屬心而傷肺又制火者水金為水之源源傷則流絕重其源之傷故總歸於肺熱也然此証之有熱無寒則然矣其有濕與否則須細辨若無濕而概用燥藥以利水則火益燥烈筋脉反致枯乾攣縮求為弛長緩縱而不可得矣治者審之但因弱柔軟而不能行動也觀草木遇烈日而枝葉萎軟可見矣內經分五痿肺熱葉焦皮毛虛弱急薄著皮薄而著于肉也而生痿躯足不能行其証色白而毛敗心熱則下脉厥而上三陰在下之脉因心熱而逆上上則下脉虛虛則脉痿樞折挈膝腕似折而不能提挈也脛縱而不任地其証色赤而絡脉溢肝熱則胆泄口苦筋膜乾則筋

其証色蒼而爪

熱則胃乾而

肉痿其証色黃而肉蠕動

腎熱則腰脊

為骨痿其証色黑而齒槁又論其致

亡失所求不得則發肺鳴

咳

肺熱葉焦葉五藏因

熱葉焦發為痿躯悲哀太甚則

胞脈絕

則陽氣內

心下崩數溲血大經空虛發為肌痺傳

脉痿

思想無窮所

顧不得意淫于外入房太甚宗筋弛縱發為經痿及為白淫筋痿者生于肝使內有

漸於濕

漸

以水為事

如舟車者

居處相濕肌肉濡漬痺而不仁發為肉痿得之濕

地有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱舍于腎水不勝火骨枯髓

虛故足不任身發為骨痿細詳經意是言五藏各有自致之痿有他病傳變之痿觀

庫傳為脉而總歸於肺熱所發也至其致熱之由或言七情或言房色或言傷濕或

言勞倦乃互文以見內外諸邪皆足生病未見有歸重於濕之意但本証論治謂陽明為藏府之海主潤宗筋束骨而利機關與衝脈名血海合於宗筋屬於帶脉陽明虛衝脈無所
稟亦不虛則宗筋縱帶脉不收所謂虛則不能行濕不為潤而為澆也一切筋脉皆為縱可知故足痿而不用所以治痿獨取陽明又生氣論于濕熱攘大筋續短小

續短為拘弛長為此証固以濕熱言不以熱言也故古人方中多一个苓澤瀉及諸風藥但此証屬乾熱者畢竟多然則滋陽明水穀之氣以潤宗筋少陰之精以沃潤澤尚憂無濟反敢利其濕哉治法熱者補陰丸東垣取黃柏

為君以滋水清熱嵩崖謂風藥及香燥溫補之劑斷不可用童便一味最妙清燥湯詳傷暑用黃連黃柏麥冬五味生地當歸以清金滋水養血人參黃芪甘草以補肺氣有濕用二术二芩澤瀉濕在下部者加升柴升提以利之飲食少進用陳皮神曲肺熱

宜黃芪二冬石斛百合山藥犀角桔梗枯芩梔子杏仁之屬有濕加木通秦艽心熱黃連苦參牛黃龍齒牡丹皮地骨皮犀角肝熱生地天冬白芍柴胡龍胆草白

蒺藜黃芩黃連脾熱痰濕二术二陳霞天膏等甚則三化湯見風中調胃承氣湯見大便不下之控涎湯見痰取之損加知柏濕熱健步丸加黃芩或小胃丹見痰攻之薑汁血虛四物見加減

氣虛壯火食氣氣虛二陳加蒼朮黃柏死血桃仁紅花歸尾赤芍

謂恐懼

不解則傷精傷腎亦多端矣舉恐懼以該其餘勿泥也精傷則骨瘦痿厥精時自下腎傷精脫則水虛可知水虛則火炎熱而筋弛又謂三陽即旁光太陽經為病發寒熱下為癱腫熱勝可知及為痿厥是也又屬脾濕經云凡治痿厥肥貴人猶言富貴人則膏梁之疾也濃酒厚味積為濕熱又云秋傷于濕秋為燥令而云耳勿泥亦有傷濕發為痿厥是也東垣治粘合公三十二歲病此尻陰皆冷陰汗臊臭精滑不固此醇酒厚味滋火于內逼陰于外醫誤作寒治十旬不愈脈沉數有力以滋腎大苦寒之劑制之以急寒因急用再服而愈當時滋腎丸之類左經丸續骨丹治濕痰汚血阻碍經絡而致者 兼表邪越婢加朮湯見腫脹

肺痿肺癰

金匱問曰熱在上焦者因咳為肺痿火刑金因咳壯火食氣故肺熱葉焦手足困弱而不用曰痿肺痿何從得之師曰或從汗出言汗出過多也或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難血已燥矣又被快藥下利重亡津液已上數者皆亡津液之由可推廣之故得之濟陽而熱甚矣曰寸口脈數其人刻口中反有濁味涎沫者何津液既傷則熱為乾熱何故反有唾沫吐出故疑之師曰此為肺痿之病肺熱則清肅之令不行水精不四布併肺亦不濕乾者自乾唾者自唾也若口中辟辟燥渴即胸中隱隱痛脉反滑數此為肺癰肺痿病在氣分故津液隨氣分化為涎而出諸口肺癰病在血分故津液隨乾燥無痰涎則脉應澀何以反滑以欬唾膿血膿潰膿血又咳無血服數虛者為肺痿壯火

則氣虛津液

數實者為肺癰

氣壅血滯為實

問曰病咳逆何以知此為肺癰曰寸口

通三部言

脈微金鑑云微當

而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒

此以外感言故脈

寒風中干衛熱過于營

過入也外感風寒內外感言故脈

吸之氣出入不利

營未遽成熱由淺入深呼氣不入句舊在熱過于吸而不呼

也即下喘滿意

營句上今移此吸而不呼

喘滿咽燥不渴

熱尚在表未遽傷其津液故不渴以初病時言

營句上

過血為凝滯

時振寒則表久不解而熱不畜結癰膿

火刑金肺

救膿成則死

亦有不死者觀下文便知此條舉

時出濁唾腥臭

可知肺癰亦有唾涎沫者矣由此推之則肺癰亦必有不吐涎沫者

以乾熱為主即有涎沫亦吐者自吐乾者自乾況無涎沫可吐者其為乾涸又何待

言乎合瘧門詳看其理自見矣熱得濕而後壅腫成癰則肺癰多為濕熱故特吐濁

其不唾者乃凝結在裏之

故謂肺癰無濕恐非情理

條言死此條言

輕重之別也

肺癰喘不得卧葶藶大棗瀉肺湯主之

大苦大寒峻瀉肺邪恐

癰胸滿脹一身面目浮腫

濁氣不得鼻塞清涕出

大苦大寒峻瀉肺邪恐

辛溫氣充塞

咳逆上氣喘鳴迫塞葶藶大棗瀉肺湯主之

大苦大寒峻瀉肺邪恐

肺痿咳而吐涎沫

本証也今止吐涎沫而不咳則似肺痿而寔非肺痿矣

肺痿吐涎沫而不欬者

能制下故也此為肺中冷

肺冷則氣寒不能攝津液故小便不禁也必眩經謂上虛

乾薑湯以溫之若服湯已渴者屬消渴

肺冷然消渴病起時亦有不遽渴者誤作肺

冷治之遂現渴証此仲景教人辨別肺痿肺冷消渴之法

卷三

喻嘉言曰纔見久咳先須防此兩証肺癰由五藏蘊崇之火與胃中停蓄之熱上乘乎肺肺受薰灼血為之凝痰為之裏遂成小癰日漸長大則肺日脹而脇骨日昂乃至咳聲頻併痰濁如膠憎寒發熱日晡尤甚面紅鼻燥胸中甲錯甲錯謂枯索粗糙如鐵甲相錯也

始先苟能辨其脉証屬表屬裏極力開提攻下無不愈者迨至血化為膿肺葉朽爛

傾囊吐出十死不救嗟無及矣又去全匱治法貴得其大要多方圖之生胃津潤肺燥下逆氣開瀉痰止濁唾補真氣以通肺之小管散火熱以復肺之清肅亦能復起

可不致力乎 尊生肺痿舉肺湯桔梗甘草竹茹二冬阿膠沙參百合貝母 肺癰

手掌皮粗氣急顴紅脈數鼻煽不能飲食不治 肺癰清金飲刺蒺藜苡仁橘葉黃

芩花粉牛蒡貝母桑皮桔梗 咳吐稠痰胸脹喘急發熱玄參清肺飲玄參柴胡陳

皮桔梗茯苓地骨麥冬苡仁甘草檳榔煎成人童便一盞服 重者不能卧寧肺桔

梗湯桔梗貝母當歸瓜蔞仁黃芪枳壳甘草節桑白防已百合苡仁五味甜葶苈地

骨知母杏仁身熱加柴胡便祕加熟大黃 勿論已成未成通用金鯉湯鯉魚一個

重四兩去腸勿經水貝母未二錢入鯉腹內線縫童便一碗浸重湯煮至魚眼出為度去鱗骨淨

肉仍浸童便內頓熱連便服之日三次效速 已吐膿後排膿散黃芪白芷五味人

參各等分

內經謂風寒濕三氣雜至合而為痺。為三者之邪所閉滯也。身中血氣勝者為行痺。風善行動虛其走注不定故也。寒氣勝者為痛痺。血氣滯無不痛者而寒之痛為甚以寒則凝痛亦走而不定。寒氣勝者為痛痺。其滯而不通比濕尤甚故痛若虎咬世呼為白虎風。濕氣勝者為着痺。不如風勝者之流走但着而不移亦不如寒勝者之痛甚但是也。濕氣勝者為着痺。畧痛或但麻木不仁蓋濕如水而寒如冰腠理之鬱滑與聚滯有異則氣血之行其為阻滯冲擊者固有微甚之分也是名三痺者。

經又分以冬得之為骨痺。骨重不舉而痰癉。春得之為筋痺。筋攣而伸夏得之為脈痺。血脈不流長夏得之為肌痺。肌肉不仁不知痛痒秋得之為皮痺。皮逢寒則急逢熱則縱雖麻木尚知痛痒是名五痺。

又謂五痺久不愈重感于邪則名傳。其藏如見胸滿煩喘咳嗽是皮傳肺為肺痺也。嘔吐痰涎心下痞硬四支懈惰是肌傳痺為脾痺心煩心悸嗌乾善噫厥氣上則恐則恐惄之類是脉傳心為心痺多驚善怒脹脹多飲小便數是筋傳肝為肝痺善脹尻以代踵足攀不伸也。脊以代頭僵僂不是骨傳腎為腎痺。痺入五藏則死矣。又謂傳府數飲而小便不通中氣喘急時為飧泄不瀉則脹脹則瀉為腸痺。大小腸也。舉腸該胃小腹膀胱按之痛若沃以湯濇于小便上為清涕為胞痺。胞即旁光詳淋証門不言胆者缺文也。又有衆痺周痺之名謂各在其處歇而復起在右相移更發更休名衆痺若在血脉之中止隨脈以上下而不左右相移名周痺。周痺似中風之偏廢然有病而無口眼喎斜為異者按以上諸痺總皆風寒濕三氣為患特以其受病之所在區別言之耳要其病本則一也。

再按風即寒也瘡論雖曰風寒濕實寒濕二者足以盡之氣為寒濕所閉氣盛而寒

濕微者則走注而不甚痛若氣盛而寒濕亦盛者則不甚流走而痛劇氣弱而寒濕

甚者則着而不行亦不甚痛或但麻木也經所謂風勝為行痺者風有外風內風以

外風言即寒之淺者止傷於衛偏勝于衛猶云邪不甚閉遏故能流走而不甚痛若以內

風言則即人身之氣矣是經言風即兼言氣可知也至寒之痛必由于氣盛冲擊濕

之着必由於氣弱不運固可推而得之耳麻者非痛非癢如千萬小蟲亂行如麻

之亂也觀於腳麻可知木者不癢不痛併不麻頑然一物自己肌肉如他人肌肉按

之不知搔之不覺如木之無知也河間論麻謂是氣濁東垣謂是氣虛蓋氣盛能行

不麻全無氣不行亦不麻惟氣衰不能運行流利停滯此處噓其津液痰涎紛亂沸

動所致也若血利而氣行不得滑或言風者誤也觀人之久坐而起則脚麻及

繩縛久釋之則亦麻豈非氣久不行得起得釋而微通噓其久滯之血液而然哉李

正臣夫人病麻晝減而夜甚又閉目則甚開目則否蓋晝與閉目則陽行於外氣得

流通故減也再按外感之寒濕能痺豈內生之寒濕獨不痺乎寒能滯氣澁血濕

能停痰聚液觀之瘀血痰飲之為痺而初無外感者可見矣不特此也內生之風亦

為痺內風者熱氣之慄疾者也熱盛亦生濕生痰矣熱盛則血枯死血阻塞經隧則

亦不通而痺矣又忍尿亦成痺尿不行則氣亦不行而乍痺必膝冷又飲臂麻木一隅三反是在明者

治法

虛人痺者小續命湯

見中風

加減風勝倍防風寒勝倍附子濕勝倍防已皮痺加黃耆

或桂枝皮脈痺加羌黃或紅花肌痺加葛根或白芷筋痺加羚羊角或續斷骨痺加

虎骨或狗脊有汗減麻黃使薄減防已寒勝減黃芩加乾薑熱減附子加石膏

壯者增味五痺湯風痺以羌防為主寒痺麻黃附子為主濕痺防已羌活為主皮脈

等五痺加藥照前條

三痺通用木通不見水者二兩以長流水二碗煎一碗熟服

取微汗

昔人入夢得此方而痛愈此謂通則不痛也

不愈再三服視所勝照前方加味不得過

二痺湯

獨活寄生湯並治各痺久不已乘虛入藏

五苓散

見傷濕

加附子治胞痺加蒼朮治

腸痺

氣虛麻木黃耆益氣湯

冷痺

身寒無熱四肢厥冷蠲痺湯

熱痺

如火升陽散火湯

見勞倦加犀角羚羊角

又行痺黃耆蒼朮各酒炒二錢羌一斤煎調威靈仙酒未羚

羊角灰芥子末溫服

走注與歷節不同歷節是支節疼痛未必行也今將治走注

諸方開後如意通聖散

虎骨散桂心散仙靈脾散

沒藥散

小烏犀丸

沒藥丸虎骨丸十生丹骨碎補丸定痛丸

八神丹一粒金丹乳

香應痛丸外貼用牛皮膠一兩水鎔成膏芸薹子安息香川椒附子各半兩為細

末和貼亦有痰涎走注變生諸疾但察並非風寒濕外感而忽然肢體上下走易作痛神昏多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉有痰聲者是也但用控涎丹

見痰數服即愈

痛痺上部痛羌活桂枝皮桔梗威靈仙臂痛加桑枝羌黃 下部痛牛膝防己木通
黃柏加烏附以引經 關節痛穿山甲虎骨松節 上部腫痛五積散見寒中 烏藥順
氣散加姜葱發汗 下部腫痛五苓散見傷濕 八症散見中 大橘皮湯見腫脹 加燈心竹葉

利小便

腫而大便不通大柴胡湯見癰瘍

防風通聖散見中風

筋痛緩筋湯

渾身筋

骨痛立效散覺冷者甘草附子湯見身痛 覺熱者當歸拈

湯見身體痛

歷節腫痛犀角湯再

服茵芋丸

肢節痛大羌活湯

外用熨法三年釀醋五升煎三四沸入葱白二三

升再煎一沸濾出布裹乘熱熨之又方

芫花桑白川椒各二錢桂心一兩柳枝五錢

麥麸一升醋炒熟布裹熨

樟木屑一斗滾水泡薰洗勿令氣入眼

着痺白米

半碗薏苡仁數錢生川烏末四錢熬粥宜稀薄下薑汁蜜各二三茶匙空心啜之然

非有風川烏不宜用

張子和以苦劑吐去濕痰次用白朮茯苓寒加附羌煎服

着痺大概氣必虛四君子見氣為主加去邪之品

痺

痺強直也謂筋之收引緊急而不舒縱也其所以致此者有二一曰寒筋得寒則血
凍而堅凝故緊急觀物之寒凝者必强硬可見所謂寒則收引也濕亦寒之屬故經
謂諸痺皆屬於濕也一曰熱熱甚則灼其血液乾枯乾枯則短縮觀物之乾者必縮
可見也又經謂諸強直皆屬於風者風有內外內風則從乎熱外風則從乎寒也

經言瘡屬濕熱是濕與熱合故筋脈緩縱門 痘則濕與熱分故筋脈短縮蓋濕有寒濕有熱濕寒濕如水之冰凝故堅強熱濕如膠飴之鎔化故柔軟無濕而熱則筋

乾有熱而濕則筋潤也

金匱瘡証謂身熱惡寒

傷寒
証

頸項強急面赤目赤

陽明
陽性

頭熱足寒

陽升也

獨頭動搖

此下乃瘡証所獨有

卒口噤背反張者

瘡病也

太陽脈循

背上頭陽明脈挾口寒客

故用獨字以別之

則收引言然熱為寒鬱而

傷血筋枯致此者多矣

此寒傷營寒勝血凝

又謂太陽病無汗惡寒為剛瘡

筋脈收引之証也

不惡寒為柔瘡

汗出不惡寒溫病也

此血枯筋肝縮之証

又謂太陽病無汗而小便反少

內氣虛寒氣上化液也

衝胸

寒氣盛故牙關緊閉

欲作剛瘡葛根湯主之

以發散太陽陽明之寒

又謂胸滿

壅塞口噤臥不着席

反張甚也

腳攣急齦齒

可與大承氣湯見大便不通○攻其熱以救急

又謂太陽病其症備身體強凡凡然

俯仰自如之象脈反沉迷

應浮數而反沉遲是表裏皆寒矣加

沉數則內熱津乾

括蔥根何為遲當作數為是不浮而

加括蔥根也

此為瘡括蔥桂枝湯主之

解太陽之表加括

蔥根以生津潤燥

又謂太陽病項背強

几几

太陽脈下項循肩挾脊

無汗惡風

此寒傷營証

萬根湯主之

此風傷衛証

加葛根湯主之

較葛根湯少麻黃一味

已上身體強項強將欲

使鬱熱得伸以免焚灼筋縮也

又謂太陽病發汗太多因致瘡又謂風病下之則瘡又謂瘡家不可發汗

指潰後言

汗出則瘡

皆血溢傷

又謂瘡病有炎瘡難治

益枯也

合而觀之不出寒熱二端虛實兩途折衷治焉可也

按寒熱雖皆足以致瘡而多由於熱以熱者火之有餘也火之有餘由水之不足故

血液枯竭之人汗下過多亡其津液產後失血多患此以水虛無以制大火盛而水後大病後血虛小兒陰血未足多患此愈虧也此為內傷之証若外感風寒濕氣不過為發熱痺痛等証何遽致筋脈急縮竟至頭搖齒齶腰反折之甚哉仲景所言外感寒証自不多見辛溫發散之劑勿輕用也

準繩謂內熱因外寒所鬱則愈甚甚則津液乾燥而無汗大小筋俱受熱灼而枯縮故曰剛痙若柔痙則為濕熱相兼經謂濕熱大筋短小筋長又謂肺移熱于腎傳為柔痙註云柔謂筋柔無力痙謂骨強不隨則仲景所謂柔者豈非小筋得濕而弛長豈非項背強反張者豈非大筋得熱而強直乎後人乃以無汗為表實有汗為表虛而用羌附溫熱等劑寧不增大筋之熱歟其說雖未合仲景之意亦自可取

醫宗金鑑云六經皆有痙身背屬太陽凡項背強急脊腰反張髀不可以前曲臍如結者太陽也身前屬陽明頭面動搖口噤齒斷缺益紐痛肘膝相搘陽明也身側屬少陽口眼喎斜手足搐搦兩脇拘急半身不遂少陽也至若腹內拘急因吐利後而四肢攣急非太陰乎尻以代踵脊以代頭腳癱不能行背曲不能伸意俯而不能仰者非少陰乎睂丸上升少腹裏急囊縮舌卷非厥陰乎按經言足少陰之筋主痺瘻及痙在外者外背也腎筋不能俯在內者內身前也腎筋不能仰又曰腎脈為病脊強反折然則之行于背者之行于身前者不獨能俯不能仰也仲景謂痙脈按之緊如弦直上下行

又謂寒濕相搏發汗已其脈如蛇柔曲而直為欲解脈如故反覆弦者痙

從金鑑定

氣也

見中風

獨肝火旺者先用加味小柴

治法火盛血虛者當歸芍藥生地紅花黃連鈎藤鈎兼氣虛加人參兼痰加竹瀝

金衰木旺

壯火食氣也

先用瀉青丸

見中風

後用異功散

見中氣

獨肝火旺者先用加味小柴

胡湯

見寒熱

次用四物湯

見血氣

加柴胡丹皮山梔

鬱熱用加味逍遙散

見鬱若脾土受尅

補中益氣

見氣氣

加芍藥山梔

脾土濕熱三一承氣湯

見不通大便

腎虛六味丸

見腎損

太陰寒濕凝結腹痛桂枝加芍藥防已防風湯手足厥逆附子散桂心白朮湯

汗

汗者水也腎之所主也內藏則為液上升則為津下降則為尿外泄則為汗而所以外泄則火之所蒸發也火屬心故謂汗為心之液火盛者雖表固亦出不盛者必表疏乃出自汗者乃因發表而汗自出也其出無時火退乃已傷風傷寒皆熱蒸汗出中暑病濕亦然五志過極則生火亦汗出如驚則心神浮動飛越汗隨出可見勞動則生火飲食則長氣

經云食入于陰長氣于陽氣屬于陽氣有餘是火也

房事則精泄于下火散于上故皆汗出

火在裏則汗隨藏府出火在表則汗從經脈出

如太陽傷風熱在皮膚則翕翕汗出乃

肌表之汗也陽明胃實則蒸蒸汗出乃

翕翕蒸蒸皆熱貌翕字為合羽其身如合羽

飛越汗隨出可見

其身如合羽

汗出乃

胃府之汗也翕翕蒸蒸皆熱貌翕字為合羽其身如合羽所覆捫之自溫蒸蒸則如炊籠騰越捫之熱氣透手也春夏氣浮汗出肌膚秋冬氣沉汗出骨骼之疾宜汗者常於冬至後發之自汗舊云表虛然不可概論如傷寒其始無汗後傳陽明即自汗豈前則表實後則表虛乎前之無汗則陰邪凝固使然無

論其人平素表實無汗即表虛亦無汗後傳陽明熱盛蒸越無論其人平素表虛有汗即表實亦有汗問太陽傷風有汗用桂枝湯非表虛乎曰傷風有汗有汗則表疏故謂之虛是因有汗而表虛非因表虛而有汗也因表虛而有汗則重實表因有汗而表虛則重散熱其用桂枝是發散風邪非固表也固表乃其兼能耳有

實火有虛火陽虛

即東垣中益氣補証

陰虛

即血虛

腎陽虛腎陰虛皆發熱皆虛火也

火炎則

身溫汗熱而膚澁陽虛則身涼汗冷而膚滑陽衰則衛氣不固又陽虛則不能內守汗者蓋熱聚于內肌膚反冷膚冷而易於浮越也然亦有熱極而反出冷多而脫者其汗必先熱後乃冷耳丹溪謂熱極反汗冷乃火盛兼水化其說牽強盜汗者寤時無汗寐時汗即出如盜乘人睡熟而出也人寤則氣行于陽寐則氣行于陰若其人表陽虛者遇寐而氣行于裏之時則表更失所護而益疏即使內火不

盛而陽氣團聚于裏與其微火相觸發亦必汗出若內火素盛兩陽相搏陰液被擾雖表圓者亦必潰圓而出矣

其人陰虛尤易動

及其醒覺則陽氣還出於表而汗自止傷寒

之盜汗亦然蓋邪在半表半裏時寤則氣挾邪還于表陰得安靜不擾故無汗寐則氣挾邪入於表陰被擾而不竅故汗出也

丹溪謂雜証之盜汗有陽虛有陰虛大病後陰氣未復遺熱未清或勞役七情色慾之火或飲食積熱皆足耗損精血

陰氣既傷陽火獨旺內蒸成汗也

心孔汗別處無汗獨心孔一處有汗由思慮過多心神浮越使然頭汗別處無汗

熱不得外越但上蒸也或因黃鬱未發或因濕家誤下或因水結胸蒸或因火劫熱

迫或因陽明畜血或因熱入血室並詳傷寒論手足汗別處無汗脾胃之熱達於

四肢也

脾胃主肌肉四肢

熱達於肌肉則手足

汗耳

冬月足多汗氣降也又有手汗汗屬脾

胃虛寒不能運行津液乘虛陽外越而橫溢于四肢者如陰盛而淫雨滂沱也其汗必冷與實熱之汗

其汗必熱

不同

脫汗陰盛格陽汗從陽脫味淡不鹹

久藏之液則鹹經出盡併新化之液亦出則津隨氣脫可知矣

如珠不流

無繼故也

爲汗絕不治

淋漓如雨拭揩不及及液涸而火正炎熬煎如膠之粘者皆難治

治法

自汗屬熱者宜清火胃實者宜下涼膈散白虎湯

並見發熱

承氣湯

見大便不通

酌用氣虛者

生脈散

見暑中

補中益氣湯

見氣

加麻黃根浮麥 血虛者當歸六黃湯加地骨皮血氣

並虛者黃耆建中湯

見勞倦

自汗畏冷雖炎天必棉衣乃火鬱伏于內不達於表故

外畏寒而內實熱也防風湯 濕痰自汗雖去痰導濕每飲食即汗出益胃散

不論冬夏額上長有汗出因醉後當風致之名曰漏風漏風湯 病後汗常出察其人

精神飲食日增此是餘邪欲散也不須治之若陰氣未覆邪熱尚作須與汗理 陽虛陰乘

陰寒之氣一逼則虛陽浮越而汗隨出矣

因自汗而厥者黃芪建中湯

見勞倦

加附子或芪附湯

盜汗當歸六黃湯主之無內熱者

表虛者即內無火而寐時陽氣入裏久亦擾陰汗出

防風湯白朮散 肝火

當歸龍脣丸

見痛脣

有身熱加地骨皮柴胡黃芪秦艽

肝虛加酸棗仁實加龍膽草

右尺實大黃柏知母 脾虛參术白芍山藥白扁豆浮麥

經霜桑葉末茶調服

心虛熱而陰氣不斂者睡則多驚酸棗仁湯心實熱者多煩當歸六黃湯加連翹

母皮竹茹 虛勞盜汗青蒿散

嘔吐 嘈 惡心

有聲無物為嘔於月切乾嘔也又內經以嘔為呃逆義別有物有聲為嘔無聲有物為吐病在胃趙以德則以有聲無物或有水爲嘔有物無聲為吐有物有聲為嘔吐謂胃分三脘上脘法天為清陽屬氣分主動下脘法地為濁陰屬血分主靜雖陽中有陰陰中有陽然上脘終是氣多血少下脘終是氣少血多中脘則氣血相半飲食入胃亦分清濁水飲物之清穀食物之濁而清中有濁故清之清者上輸于肺布為津液清之濁者下輸膀胱出為便溺濁中有清故濁之濁者為糟粕由大腸出濁之清者淫精于息脈若邪在上脘之陽則氣停水積飲之清濁混亂為痰飲涎唾胸中阻碍不快清氣不升激而成嘔故嘔為氣病法天之陽動而有聲與水俱出猶雷震而雨注也邪于下脘之陰則血分滯而食停吐法地之陰靜而無聲食從吐出猶萬物之吐於地也若邪在中脘則嘔吐並作飲食皆出矣

潔古謂中焦吐者屬積由食與氣相假為積或先痛而吐或先吐而痛亦清濁相雜之義氣清食濁也又謂上焦吐屬寒朝食暮吐則亦屬陰之義矣東垣亦謂少陽多氣少血有聲有物太陽多血少氣有物無聲皆同此意但氣血多少不以胃之三分耳勿泥也

然上脘非不吐食也設陽中之陰亦病

如上脘有痰血積滯是有形之物即屬陰則食入即吐不得入于胃

見下篇非若中脘之食已而後吐下脘之食久而後吐也下脘非不嘔也設陰中之陽亦病

如雷龍則吐與嘔齊作但嘔少于吐不若上院之嘔多於吐

也。水穀入胃若脾氣不運清濁不分下趨大腸則為泄上壅則為吐故吐與瀉對講其義便明。水就下火炎上知嘔吐從于火化而屬熱者為多則知瀉利從于水化而屬寒者為多且可知小便淋澀乃為火氣所持不得降諸義皆明矣。是故外感邪入而嘔者胃陽被鬱而上冲也治宜辛散生姜所必用也不因外感而內熱胃火上冲治宜清降石膏所必用也痰濕鬱滯成熱上逆者陳皮半夏茯苓所必用也食鬱氣滯而上逆者枳實麥芽等在所必用也二便熱結下不通而反干乎上者大黃滑石等所必用也此治實熱之例也若非胃氣虛衰不運鬱熱而嘔者則推陽胃氣寒冷不運壓火而嘔者則溫中散寒胸中虛熱久不食而嘔者但得五穀之陰以和之則立止此治虛熱之例也熱固火逆而嘔寒亦鬱火上逆而嘔故嘔無不本于火者但不得一概治以寒涼耳又若鈴釵之探擦舟車之搖撼惡臭劣味之觸犯皆能擾動胃氣而致嘔夫擾動屬陽火之化也此雖不可以火治而未始不可云火若因其不可以火治而謂之非火且反謂之寒則誣矣一切病症皆同此論之不特嘔吐為然也或問傷寒論全匱明言嘔吐為胃寒而子必歸之火何也曰如但陰寒凝結而氣不上逆何以致吐氣即火也寒為本寒鬱氣致上逆為標仲景特言其本耳

熟嘔喜冷惡熱煩渴引飲脈洪數二陳湯見痰飲加黃連炒梔子枇杷葉竹茹乾葛生羌入蘆根汁服 胃熱惡食而吐聞食氣即嘔藥下亦嘔並用蘆根汁 下焦實熱二便不通氣逆不續嘔逆不禁病名走哺人參湯 身背熱臂肋牽痛膈間

醫石 卷二

或作後瀉

病名漏氣此因上焦傷風鬱熱入裏麥門冬湯 嘔

若水乃胆熱汁泄取足三里陽陵泉經曰諸嘔吐酸皆屬於熱平時津液隨上升之氣鬱積胃上濕熱不宣故作酸即酒糟熱之理 鬱極則上湧而吐甚則牙齒酸澀不能

相對此為吐酸平木湯少用萸茱為從治若不能吐湧而出伏于胃中咯不得上嚥不得下此為吞酸肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心若肌表得暖腠理開發內

熱得泄或得香熱湯劑津液行散亦可暫解東垣謂酸味為收氣乃金旺寒水乃金子子能令母實故用辛熱之劑以治寒

瀉肺其意亦謂太陽經外感于寒則皮毛閉而東熱然于內耳太陽屬寒水皮毛屬肺全此故以金水言之

熱劑終不可過用丹溪用黃

連吳茱萸各製炒隨時令迭為佐使蒼朮茯苓為輔為小丸吞之黃連湯作丸亦可有宿食亦酸如穀肉在器濕熱則酸也生料平胃散見傷食 加麥芽神曲有痰者開胃

湯 惡氣吐逆胸滿膈脹不食常飽食則吐逍遙丹見鬱 予嘗病乾嘔服生姜少止

誤以為寒屢治不效者十餘年後悞為胃熱用清熱生津藥而愈如果胃寒則必喜熱惡冷脉遲尿白理中見寒中 吳茱萸等湯自可用 昔人患胃寒吐用附子理中湯

加丁香到口即吐後去乾姜白朮只用參附加丁香木香沉香立止蓋乾姜白朮滯

故耳又熱藥有須冷服者若熱服則吐此熱因寒用之法 羅謙甫云服諸熱藥不

愈者紅豆丸神效 嘔吐諸藥不效當用鎮重之品以墜其上逆之氣 痰氣結在

咽膈間粥藥不得下到咽即吐薑蘇湯下靈砂丹俟藥可進治之 嘔膿胃脫癰也

不必治嘔膾盡自愈 嘔蟲蟲動則惡心故嘔藥入則蟲必動動則嘔蟲不出而藥反出非計也必於藥中入炒川椒十粒庶蟲見椒則伏而不動 泛泛兀兀心中快漾欲吐不吐名惡心氣與痰壅非烏藥不開大半夏湯或小半夏淡芩湯見痰飲仲景云欲吐者不可下之以氣方上湧不可逆之使下致抑塞憤亂也又云食已即吐火大黃甘草湯下之者以既吐矣吐而不已有升無降當引令下行也 嘔吐津液既出必渴宜生津 嘔吐大痛色如青菜葉者死

反胃噎膈

吐而已至每食必吐名反胃胃脘枯槁梗澀難入飲食噎塞迎逆于咽喉之間名噎噎塞迎逆于胸膈之間名膈過此乃得入胃 醫貫謂噎膈年高者有之噎則水飲可入食物難入亦不多膈則食雖可入亦不能多良久復出二者皆難于納勉強吞下終帶痰涎或白沫酸水或如醬汁者而出反胃非不能納原能多食乃不能容受朝食暮吐暮食朝吐或一二時而吐或積至一日夜腹中脹悶不安而吐亦有食已原物酸餽不化男女老少皆有之 丹溪謂得之七情六淫遂有火熱炎上之化多升少降津液不行積為痰飲被劫時以熱藥劫治也暫得快津液得辛熱暫行散不久復作前藥再行積成其熱血熱衰耗胃脫乾枯大便秘少如羊矢然火盛糞乾堅小又腸亦乾小故屎不大也必外避六淫內節七情飲食自養滋血生津以潤腸胃則全無畏火之炎腎有生水之漸脾氣健運

而食積傳化矣 王太僕云食入即出是無水也

嘔膈反胃皆有之

食久反出是無火也

反胃

有之嘔無此無水者壯水之主六味主之無火者益水之原八味主之並見

虛損

並見

火逆衝上

食不得入脉洪數有力者滋陰清膈飲加枇杷葉二錢蘆根一兩 又有一種肝火

鬱而不伸亦嘔不納食亦心痛但所嘔者酸苦青藍水大小便多不秘

亦有乍秘乍泄者

用

吳茱萸黃連濃煎細細吸之再服逍遙散

見鬱

愈後六味丸

詳

門 痰飲阻隔食繞下便

為痰涎裹住吐出者以人神來復丹控其痰涎

見痰飲

血稿者地黃麥冬當歸煎膏

入韭汁乳香童便蘆根汁桃仁泥細呷之大便祕澁加桃仁泥玄明粉但食物下咽

覺屈曲自膈而下梗澁微痛多是瘀血用前藥後以代抵當丸

見血

行之瘀血在膈

間阻碍飲食代抵當丸芥子大三錢去枕仰卧細細嚥之令搜盡停積天明利下惡物將息自愈五靈脂為末黃芪胆汁和丸龍眼大每服一丸好黃酒溫服三次亦行

療之妙劑也 有蟲者秦川剪紅丸取之此丸亦取瘀血嘔病喉中如有肉塊是食

滯于此不下也麥昆煎 童便

火降竹瀝

行痰

佐

韭汁

行

人乳牛乳

潤燥

蘆根汁

止茅根汁

涼血

甘蔗汁

和胃

驢屎

殺蟲

仍入燒酒米醋蜜各少許和勻隔湯頓溫服得藥不

吐切不可便與粥飯食物每日用參五錢陳皮一錢作湯細啜數日後方可飲陳米湯及粥糜 張子和曰內經謂三陽結為膈三陽手足太陽小腸經膀胱經也結

胃告熱也卜陽結熱則血脉燥膀胱熱結則津液涸二便祕塞下既不通必反上行

所以噎食不下經又曰少陽所至為嘔涌食不下又云肝移寒于心為狂膈中蓋陽氣與寒相薄故膈食中不通非獨專于寒也醫者不察妄用熱藥人言可下退陽養陰張眼吐舌恐傷元氣劉河間用三一承氣湯見大便不通獨超千古假如久闊慎勿陡

攻縱得攻開必慮後患宜先潤養小作湯丸累累加之閑局自透其或涎痰上阻輕用酸苦微涌因而治下藥勢易行設或不行蜜鹽下導始終勾引兩藥相通結散陽消飲食自下一官病此十年大便澀燥小便黃赤予以四生丸下三十行燥矢腸垢何啻數升其人昏困一二日頗以冰水呷之漸投乳酪芝麻飲數日外大啜飲食而愈有極力呌呼氣喉破損氣併胃管喉破氣不能從管行故從胃管行壅塞致吐法在不治牛喉管焙乾服之酒客多噎膈飲熱酒者尤多以熱傷津液咽管乾澁觀其口舌乾澁可知食不得入也

霍亂

霍言其手足之擾動如揮霍也亂言其內之邪正變亂也其証心腹卒痛或吐或瀉或吐瀉交作甚則兩足轉筋轉筋甚而從足入腹或通身筋皆轉舌卷囊縮者死若無吐瀉而止轉筋腹痛者名乾霍亂即俗所謂攬腸痧也病由邪氣結滯中焦阻隔上下正氣不通上之陽氣不得下通于陰則上壅故吐下之陰氣不得上通于陽則下迫故瀉也此言陽上陰下之阻隔也亦有陰上陽下者又有陰陽參錯清濁邪正混淆寒熱互爭彼此拒格不通者于是血氣營衛之行失次彼順此逆

搏擊于上吐下瀉則中焦之邪得以分消有不藥亦愈者若邪氣熾盛吐瀉適足虛中矣其正氣邪愈結而不運矣轉筋由筋中素蘊火邪血液久虛所致然未遽然也若因霍亂吐瀉頓亡津液則血液之虛者愈虛或不因吐瀉而外冒風寒腠理閉塞熱氣怫鬱激發則火邪之烈者愈烈乾霍亂之轉筋尋常之轉筋及于是攣縮急痛而不可忍矣觀其情形急暴屬火無疑或以為寒謂寒則收引不知收引特拘急牽強耳與轉筋之攣痛異常者不同烏可溫哉或疑轉筋多在足明屬陰寒蓋足居下部屬陰多寒又感風寒筋脈收引勁急霍亂不論寒証熱証皆邪結中焦陽氣不能下達兩足必冷故每轉筋若果由火熱則是筋皆轉矣何獨足乎此論足獨轉筋由於寒亦有理然謂一于寒而中無火邪則非矣若無火邪則陰凝而靜斷無燥急轉戾之理且霍亂乃脾胃病故足獨轉筋不可謂必由于寒也

丹溪治偏身轉筋入肚作極鹹鹽湯于糟中煖浸以潤其燥血熱也寒而勁急者亦可用以軟堅治霍亂常審其為何邪河間謂為熱甚所致火性燥暴也凡暴病暴死皆屬於火也準繩謂以脾濕為本脾濕盛則亦鬱而生熱也張子和則以風濕熱三氣合而為邪蓋脾濕土為肝風木所尅肝木清氣為濕所遏不得升不升則濕愈不鬱為熱而暴發發則心火上炎故吐脾濕下流則瀉也王海藏亦謂風濕熱與食相合為邪明理論則謂他病霍亂多由飲食所傷若傷寒霍亂則由

邪入中焦胃氣不和因之陰陽否隔而致諸公之論當兼採之不可執一說以誤人

也大抵夏秋之交最多此証蓋夏月人多食冷飲水其寒濕之氣與暑熱之氣交搏胃中是為寒熱不和即無所鬱遏亦將久而病發若外感風寒內傷飲食則閉滯不行其發也暴矣病之將作必腹中先疼痛高近心則先吐痛下近臍則先瀉因冒風則惡風有汗因冒寒則惡寒無汗冒濕則身體重着傷暑則心神煩燥問其曾否食過何物曾否七情動氣更分寒熱虛實治之 氣少唇青肉寒四支拘急畏冷喜熱脈沉遲人事清醒者寒也

霍亂暴証原屬於火但火由寒激發則火泄而寒獨存也

理中湯見中寒

脈絕者通脈

血凝

四逆湯

厥見

吐利不止元氣耗散格陽于外或口渴喜冷得水則不能飲或發熱煩燥

並宜

血凝

欲去衣被不可誤以為熱宜理中湯甚則附子理中湯

并見中寒不效則四逆湯見

並宜

血凝

放十分冷服轉筋者理中湯去木加生附子一枚或理中湯加凍膠剉炒一錢

血凝

並宜

血凝

血凝

狀如凍膠故加此

以潤其燥

或煎濃鹽湯浸仍縛繫其腿胫勿令人入腹或灸承山二十七壯神

並宜

血凝

效一法男子手挽其陰身熱煩渴氣粗口燥喜令畏熱心神悶亂脈洪數者熟也若

女子手牽乳近兩旁

身熱煩渴氣粗口燥喜令畏熱心神悶亂脈洪數者熟也若

並宜

血凝

更四支重着骨節煩疼者兼濕也中暑霍亂宜香薷飲

見中暑

井底沉極冷頓服桂苓

並宜

血凝

白朮散亦妙濕盛者除濕湯

見中

訶子散暑濕相搏者二香散熱多飲水者五苓散

並宜

血凝

漏陽轉筋者木瓜煮汁飲之或香薷煮汁亦可或燒梔子二十枚為末熟水調下煩渴者吐瀉後津竭也止渴湯增損縮脾飲茯苓澤瀉湯小麥門冬湯霍亂後下利不

見傷寒

訶子散暑濕相搏者二香散熱多飲水者五苓散

並宜

血凝

止腹中疼痛恐作痢宜黃連丸霍亂後下利見血止血湯赤石脂湯 按寒熱諸症

並宜

血凝

血凝

血凝

須辨其應指則亦難
有力無力

疑似解決必參諸脈然霍亂氣閉脈多沉伏不見或滯塞歇至
精細者湯溫之香油抹邊令滑不傷肉刮脊兩旁俞穴引出藏府之邪又刮手足灣
引之四散熱血隨刮透出起紅紫疙瘩紅者輕紫者重黑者更甚蓋氣結則血凝血
凝則氣愈滯血散氣行則立愈矣 七情鬱結者七氣湯 腸下痛者木冠土也建
中加柴胡木瓜湯 兼外感風邪者六和湯見傷暑倍藿香煎熟調蘇合香丸見諸大
見中抵蘇合香丸藿香正氣散見風 最能通關理氣所必用也 霍亂非有邪不致有邪
即為實雖虛人亦不得純補惟吐瀉後當細察之若已透暢人困弱脈虛軟是邪已
去而正虛也若吐瀉未透脈能滯滯有力人仍煩躁不寧是邪尚未盡也湏別之

吐瀉不止頭目暈眩肢冷轉筋湏臾不救者吳茱萸湯汗出厥逆不解者四逆湯見厥

吐瀉後小便利汗出者即內外熱亦宜溫之吐瀉後二便不通胃中實痛者結糞留
滯四君子氣加大黃一兩吐瀉後胸膈高起痞塞欲絕理中湯見中加枳實茯苓吐

寒瀉已透而餘吐瀉未止腹有餘小宜正味報秋豆葉煎服乾者尤佳

羅謙甫治

一人傷酒肉滯乳霍亂吐瀉脈沉數熱未去也按之無力所傷之物已去以新汲水半碗調桂苓

白朮散徐服之少安又于牆陰掘地二尺許入新汲水攬之澄清名地漿再調服之
而愈牆陰土重陰也暑熱躁甚非此不除又治一人年八十中暑霍亂吐瀉昏迷頭

熱如火足冷以桂苓甘露飲瀉熱補氣墜浮火以安神明加茯苓以分陰陽冰水調灌之而愈再以參术調中湯調理平復妊娠產後霍亂不外上法但須顧胎防虛乾霍亂不得吐瀉則邪結中焦用溫熱立死炒鹽入新汲水乘熱多飲探吐之不吐更服吐仍飲三吐乃止大抵邪盡即止勿泥此法極妙凡欲吐而不得吐及吐不遠者並宜之須極鹹乃妙吐後心腹病痛頻欲登圓苦於不通藿香正氣散見中風加枳壳一錢者速多下來復丹見中暑若瀉不可用此丹則不效須用神保丸見傷食但此丸必到大腸乃行若隔于上則轉服轉秘須服來服丹研末湯調吞養正丹見氣傷百粒庶可引前藥到下戴復菴法先服濃鹽湯探吐次調蘇合香丸吞來復丹仍進藿香正氣散加木香枳壳厚朴湯 活命散 冬葵子湯 頂心有紅髮急拔之取青蒿汁和水飲愈或刺委中穴併十指頭出血亦妙 火甚者藥須反佐古方煎鹽湯調童便入藥取其下降以通陰也美能行血凡霍亂切不可與粥飲蓋邪滯未化穀食一入益結滯不行往住致死併忌酒羌湯蒜烏梅醬熱湯一切收斂溫熱之藥

泄瀉

泄瀉之症水穀或化或不化腹痛或不痛並無帑責亦無膿血及裏急後重惟覺困倦耳故與痢疾異 飲食入胃下小腸得氣運行則清濁以分水滲膀胱穀趨大腸二便調矣何泄之有若氣不運化水穀不分併入大腸一路則瀉矣而氣之所以不

運則六淫七情種種之邪皆得而滯之畧具如左

或因於風經曰春傷于風夏為飧泄言春時傷于風寒由皮膚而經絡傳入腸胃腹

脹腸鳴

風氣往來腸胃間冲擊作响也

因而飧泄也

泄出原食不化

此風非汗不出始爲寒氣久則鬱熱又

肝木之氣亦名爲風春時肝氣宜升爲邪所傷鬱而下陷鬱久成熱熱久蒸化爲濕

遂至飧泄此宜升清除濕二証皆腸鳴

肝風內煽亦鳴响

脈弦泄時或閉而不下下多白沫辟辟有聲其氣不甚臭穢以完穀不化也夏以久言勿泥

或謂春木當令雖不能升亦不肯下趣但鬱成熟至夏熱

盛蒸濕如雲蒸而雨降故至夏乃泄亦通

或因於寒蓋寒則氣凝無以運行水穀故泄也寒氣攻刺腹中綿綿作痛腸鳴暴下

無聲水穀不化所下清冷如鴨屎之溏

大便如水中虛有少糞也

小便白脈沉遲身冷脈細心

皮寒肺前後泄利

腎飲食不入脾虛

為五虛難治用參术補劑早救之遲則不能挽矣

或因于熱蓋火性急迫逼其水穀下注往往不及傳化即出勿因其完穀不化誤作

虛寒其脉洪數小便赤澁腹中痛刺痛一陣瀉一陣口燥渴糞出辟辟有聲肛門

熱痛熱瀉固由火性急迫亦有熱氣壅滯不行不但寒不能運也所下多垢粘色

黃赤腹中悶痛

或因于暑與熱同理証則面垢多汗煩渴

或因于濕濕盛而小便不利水走腸中瀉瀉有聲腹不痛脈沉緩體重軟弱治濕宜

利小便若氣虛下陷而利之是降而又降也當升其陽所謂下者舉之也升陽用風藥風藥又能勝濕

或因于食蓋傷食則脾滯不能運行水穀故泄噫氣如敗卵臭腹中絞痛痛一陣瀉一陣下過稍寬少頃又痛所下臭穢粘膩前食既滯則後食繼停陳相因久而出故臭穢色黃或傷于酒每天明時瀉一二次酒質濕夜氣陰寒不能久攝故至明必瀉或因于飲渴而飲飲而瀉瀉而復渴復飲復瀉也

或因于痰痰滯氣不行故水穀不分腹中隱隱微痛或覺冷下如稠飲時瀉時不瀉或多或少不食不飢昔肥今瘦脈滑

有脾虛不能受食食畢即腸鳴腸滿必瀉出所食方快不食則無事名脾泄每天明時瀉一二次名腎瀉腎火虛寒也

有肝氣滯兩肋痛而瀉者名肝泄

有患口舌糜爛而瀉者乃心脾二經之熱心開竅於舌脾開竅于口其熱上攻故糜爛若移其熱于胃與小腸則運化失職故泄也名口糜泄

久瀉不已名滑泄又名洞泄大孔如竹筒飲食入口直出無禁氣將脫矣飲食不進則無救矣

治法 風瀉升陽益胃湯見惡寒

寒瀉理中湯見中寒

漿水散 热瀉益元散見暑加

上海千項堂印行

芩連燈芯竹葉止瀉湯去白朮加黃連滑石扁豆熱止在上膈渴而引飲水入胃中

胃中無熱不能行水致瀉久第一推下陷中五苓散見傷亦可 暑瀉青六丸見玉

龍丸 濕瀉胃芩湯五苓散升陽除濕湯吞戊己丸止瀉湯寒濕加羌桂熱濕加黃

連葛根 食瀉平胃散見傷枳實審其曾傷何物仍燒此物存性調服三五錢形

氣實者下之 酒瀉理中湯見傷食加乾葛杏酒煮黃連丸見暑或葛花解醒湯見傷

飲瀉實者神佑丸見腫虛者春澤湯見傷白朮調中湯 痰瀉止瀉湯加半夏海

粉實者吐之下之虛者六君子湯見氣脾泄快脾丸 脾瀉四神丸早晚二服 肝

泄止瀉湯加柴胡青皮若因肝氣不斂致脾氣散而不運加白芍 口糜泄其証上

發則下止下泄則上愈當口糜發時用瀉心導赤散滾湯淬服若當泄瀉時則早晚

用參苓白朮散糯米湯服若小便少利不止乃水走大腸用茯苓車前子各等分煎

湯代茶若服寒涼藥口瘡不效則為虛火上泛理中湯加肉桂大倍茯苓降陽利水

陽降則口糜愈水利則泄瀉止 久泄八桂散或四君子見氣加肉果升麻仲景云下

痢不止以理中與之益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯丸主之

瀉久不止多變為痢詳病實者以厚朴枳實湯預防之虛寒者四神丸 收濁之劑

固腸湯訶子散皆治熱瀉扶脾丸桃花丸訶子丸赤石脂禹餘糧湯皆治寒滑 泄

瀉久不止不可離甘草芍藥為脾病也不可離白朮為濕也忌枳殼為能寬腸也忌

當歸為能滑腸也

用補中益氣湯者白芍代之

已愈至明年此月復發者有積也熱積大承氣湯

見大便不通

虛者保和丸

見傷飲食加三稜蓬水之屬寒積備急丸

見傷飲食

理中加茯苓

見寒而瀉兼內傷生冷或熱邪已解

凡瀉津

見寒乃為熱初起即渴而

黃連名連理湯寒熱雜合而瀉者最宜

見暑濕氣加麥冬五味或腎陰虛而水自涸六

味丸

見虛損加麥冬五味或腎陽虛而陰無以化八味丸

見虛損若再行滲利則小便益

不行而水入不消腫脹之症反作矣

瀉脈必沉宜細小不宜大數實下泄上吐痰皆不已為上下俱脫死腹大脹手足厥利不止形脫元

腸鳴

大抵氣與水兩相衝擊而成聲氣多則響高水多則響沉或無水而有痰食之閉塞氣閉忽通則鳴也氣有寒有熱熱則氣盛其衝擊必有力寒則氣不足不足本不能衝擊然鬱積久之則亦必通觀寒凝腹痛者以炒葱羌鹽熨腹則痛響而氣行痛止可見也是故氣之和平而流暢者不鳴也必其或熱或寒有塞有通而後鳴經謂熱淫所勝病腹中雷鳴氣上冲胸治以鹹寒又謂中氣不足腸為之鳴脾虛腹滿腸鳴飧泄食不化是也胃寒泄瀉腸鳴升陽除濕湯

見泄

加益智仁半夏東羌火擊水者

二陳

見加苓連梔子

水氣客于大腸疾行則鳴濯濯如囊裹水之聲河間葶苈丸

痢

病由濕熱所致或飲食濕熱之物或感受暑濕之氣

不論外感六淫內傷七情積于
飲食勞倦皆能致濕熱

腸胃不論何藏府之溫熱皆得入腸胃以胃為中土主客受而傳之腸也

則正為邪阻脾胃之運行失常于是飲食日

益停滯化為敗濁膠粘腸胃之中運行之機益以不利氣鬱為火與所受濕熱之氣

混合為邪攻刺作痛此病証所以腹痛也

舊謂肺火之氣鬱于大腸間蓋以氣屬肺為言耳不必泥定是肺氣也

性急迫不得宣通其痛必甚虛寒則痛微益寒開則痛甚寒開則

實熱者火

痛微病者雖滯而不暢終是閉而非閉虛者少氣不甚壅故痛微

邪能傷正傷在血

分則便血曰赤痢當與腸風參看

膈有二一則胃中津液一則水

分則便膿曰白痢穀汁漿均為邪火煎熬成膿觀

是腸間脂膏剝刮而下不思腸胃之裏並無脂膏止有涎沫觀豬腸可見矣又大腸

合肺主氣小腸合心主血故古謂血從小腸來膿從大腸來不必泥也

若血氣並傷則紅白兼見又或濕盛血敗而色

如豆汁或極熱而色見紫黑血有血絲者亦然

或久痢而元氣虛弱濕痰敗濁色

塵腐如屋漏水漏中原蓋屋用泥故

或証轉虛寒色如魚腦如鼻涕如凍膠色同白痢但有初起

後劇及寒熱不同或藏府敗壞而色如死豬肝雞肝其色青黯此病之所以有各色也

氣既鬱

滯腸中則欲升不升欲降不降忽而下逼火性迫促竟若不及更衣然欲降而不能

降雖就圖却無所出氣鬱不宣則膠固之積不出即日食之糟粕亦銷鏗膠粘所出無幾

不降而偏欲降纔淨手又要

更衣急迫頻併最是惱人是為裏急邪迫肛門氣凝血聚因而重墜亦有脫滑者是

為後重痢本濕熱痢久陰傷濕熱轉成燥熱肛門如火廣腸血枯雖極力努責

求

其出也

而糟粕乾澀欲出不能但虛坐而無所出是為虛坐努責

瀉

利皆由於濕

而濕有寒熱皆能作瀉

利則因濕熱

此是寒湿即雷洞泄

無結滯不通

欲出不出証謂利有因寒濕者謬也

均之濕熱或瀉或利何也曰瀉因濕熱驟盛火性急速遽迫水穀暴下不及蒸

為腐敗傾盆而出腸胃即清故無膠固垢積積滯既無氣行弗礙濁降而氣隨升故

無裏急後重病發既速則血氣未傷故無赤白血膿痢則濕熱尚微積漸乃盛盛而

後發為日既久遂蘊釀出如許証候耳

有先瀉後痢者因濕熱多濕已瀉出熱尚

未除且瀉久亡陰陰虛又復生熱濕火轉成燥火刮逼腸垢與血而下故轉而為痢

也

古謂此為脾傳腎以脾惡濕腎惡燥

此証先溫傷

脾後燥傷腎故曰脾傳腎也其病為進賊邪也

有先痢後瀉者因濕多熱少痢

久熱去而濕猶存火與元氣不兩立邪熱既去則正氣得復正不容邪所餘積垢與

濕至是盡行掃蕩

邪在中肺氣被壅熱去則肺氣下行化水四佈有若時雨溝漕皆盈垢積盡蕩矣

故轉為瀉也

此為腎傷脾其病為

退微邪也

夏時受邪至秋病發或瘡或利其流則異其源則同

蓋夏月感受風涼喜食生冷風寒客於肌膚邪正雜處生冷停

于腸胃濕熱相蒸其時腠理開通未至鬱閉胃氣升發未至遇邪至秋而氣斂火降邪在肌膚者被斂而內爭為瘡在腸胃者被降而下迫為利也

瘡利並

作者如瘡止利甚加腹痛飲食少進此虛寒也瘡之止非真止乃陰勝而陽不敢與爭耳補中益氣湯見加薑桂一服愈如利止瘡復作乃陽得補而漸伸能與陰爭故瘡復作吉兆也再服前方以助微陽之力加附子五錢二証並除按此說甚是然豈

無熱陷於裏不與陰爭又豈無熱勝寒衰陰不敢爭故瘧止痢甚者乎一隅三反是在明者再按瘧病並作必先治瘧以表有風寒宜先瘧後痢致飲邪內伏或脾胃氣解表若先治痢恐虛其裏致表邪內陷也

虛下陷使然謂之似痢非痢痢後瘧乃氣血兩虛氣虛則發熱惡寒血虛則發熱故寒熱交爭似瘧非瘧二者俱作虛治並用補中益氣湯

凡痢症有身熱者為重若兼外感者外感風寒鬱為濕熱致用不在此論苟非外感而初起時身

熱是毒盛於裏而達於外也久痢身熱是陰虛而陽越於外也故皆為重論嘔逆為火邪上衝亦不宜見此即防噤口

噤口有因積垢壅滯有因宿食不消者有因熱毒上冲有因停飲上逆有因兜澁太早邪反上干有因過服寒劑傷敗胃氣以致飲食與藥俱不能入人即吐出此為危候胃憊氣陷絕不思食者不治

屢止屢發經年不愈者名休息痢多因兜澁太早積熱未清或過服寒涼元氣下陷腎虛不固所致

時行疫痢當求其時氣而治之蓋必有彼此相同之証候即其氣也如皆見身重即為時氣之濕也凡痢初起必無寒証然其人平素陽虛元氣衰弱又復過食生冷以致火鬱蒸成濕熱其標雖熱其本則寒治當求本若夫病久氣虛或過服涼劑轉為寒証固甚多矣所當細察如始見煩渴引飲喜冷畏熱小便赤澑面色黃赤手足溫煖脈見數盛久

之則心不煩口不渴即渴而喜熱飲小水由赤而黃由黃而白面色亦轉青白手足不溫而冷脈變弱則証轉虛寒無疑虛實當辨如腹痛拒按者為實喜按者為虛重者為實已經瀉蕩而仍重者為虛邪實之重糞出少減名糞前滯滯也少頃又重邪未盡也虛滑之重糞出愈甚名糞後隙也少頃畧可較愈甚時畧鬆也氣後升故也凡痢中所有之証如煩渴咽乾舌黑腫脹之類悉有虛實之殊無得概指為實當細別之

脈法

痢為裏証脈宜沉惡浮

在表邪者不在此論

宜細惡大

初起邪盛者不在此論

宜緩惡弦

治法

初起宜利濕清熱疎通積滯若久痢亡陰濕轉為燥則利濕又在所禁亦不可利恐致津液乾涸邪熱愈熾不救本寒標熱証見虛陽則寒劑又在所禁舊積已去新積旋生則下劑又在所禁矣積去而復生者血氣凝滯故也但當調其氣血耳不特此也舊積而伏虛亦不可下丹溪治葉氏先補完胃氣而後下之再按積垢膠固腸胃與溝渠壅塞相似刮磨疏通則可木香橘紅丸之類是也輕用硝黃牽牛巴豆等辟以清水蕩壅塞之渠安得疏暢必壯實人初起始可以一下而愈胃氣

弱者不宜

利濕

五苓散

見傷

益元散

見暑

等

清熱

杏連丸

白頭翁湯

等

盪積

承氣湯

見大便不通

芍藥湯

積利丸

導氣湯

脈浮大忌下

調氣

藿香正氣

散 見中 加木香吞感應丸 飲食見傷 血痢加黑豆三十粒 黃連阿膠丸 白頭翁湯

香連丸

蘇合丸見諸和血

芍藥湯

腹痛

紫參湯

肺氣鬱於大腸苦梗發

之 或食粥稍多或飢甚方食在中作痛白朮陳皮各半煎湯和之仍奪食

傷冷水瀉變痢腹痛食減燥熱困軟茯苓湯

脈弦或濇或浮虛建中湯

見勞倦

當歸芍

藥甘草能和腹痛

裏急宜行氣清火

後重宜調氣木香檳榔

宜下其積滯下

滑墜異常積中有紫黑色又痛甚為死血桃仁泥滑石粉行之

盪積後仍重為大腸

滑墜餘邪未盡者升消散兼升兼消已盡宜御米壳等濇之如升麻以升其陽按東

垣云裏急後重數至圓而不能便或少有膿血慎勿利之宜升陽除濕防風湯

見此

當是濕熱鬱閉上氣不通所致故升其陽而便自下古云大便不通用升麻即此意

也 虛坐努責血虛腸燥不能出當歸為君生血藥佐之

滑脫 桃花湯 斷下

湯 養臟湯

白朮安胃散

固瀉藥中須加陳皮為佐恐太瀉能作痛

甚者灸

天樞氣海 凡痢初起邪實當去積滯俟腹不痛即愈不愈可用鴉胆丸止之

脫肛 詞子皮散 磁石末二錢空腹米飲下外用鐵鎊磨湯溫洗

大孔痛 熟艾

黃蠟訶子燒薰之食淡味自安

大孔不閉 葱和花椒末擣爛塞穀道中 御米

壳訶子皮各一錢為末米湯下

噤口以脈証辨之如脾胃不弱頭痛心煩手足溫

熱未嘗多服涼藥者此乃毒氣上衝心肺所以嘔而不食宜下或用敗毒散

見傷寒

熱未嘗多服涼藥者此乃毒氣上衝心肺所以嘔而不食宜下或用敗毒散

見傷寒

每

服四錢陳蒼米三百粒羌三片棗一枚水一盞半煎八分溫服。若其脈微弱或心腹膨脹手足厥冷初病不嘔因服鶯粟壳烏梅苦澀寒冷太過以致聞食先嘔者此乃脾胃虛弱用山藥一味剉如小豆大一半入瓦錠內炒熟一半生用同為末飯飲調下。又方石蓮拖去壳留心並肉研為末每服二錢陳米飲調下此疾蓋是毒氣上衝心肺借此以通心氣便覺思食。山溪曰人參黃連羌汁炒濃煎汁終日細細呷之如吐再吃但一呷下咽便開痢亦自止神效。人參黃連石蓮煎湯徐呷外用黃瓜藤莖葉經霜者燒灰香油調納臍中即效。仁齋用參苓白朮散見泄加石菖蒲末以道地梗米飲乘熱調下或用人參茯苓石蓮肉入些少菖蒲與之愚謂莫妙於問病者所欲食之即開。

暑加黃連 益元散見傷暑

腹痛食不進六和湯見傷暑藿香正氣散見中風各半服

挾寒外感風寒先宜發表倉廩湯汗之次乃治痢。

酒痢葛根湯

久痢或瘀血或食積或頑痰或元氣虛弱當隨証治之。丹溪治族叔病雖久而神不瘁小便濁少而不赤兩手脈俱濁而頗弦自言胸微悶食亦減因悟必多年沉積癖在腸胃詢其平生喜食何物曰喜食鯉魚三年無日不用此積痰在肺肺為大腸之藏宜大腸之不固也當與澄其源而流自清以茱萸陳皮青葱薑首根生姜煎濃湯和以砂糖飲一碗許自以指探喉吐痰半升如膠其夜減半次早又服又吐痰半升而痢自止又

與平胃散見傷飲食加白朮黃連旬日而安愚按小便濇而不赤非熱矣非熱而濇則肺氣為痰所滯合之胸悶食減脈濶弦知痰在肺也

休息痢

宜四君子湯見氣加陳皮

木香吞駐車丸兜塞太早有餘積者利積丸去之後用神效參香散 經年累月愈

而復發補脾不效此係寒積在太腸之底諸藥不能到故無愈日用巴豆一味研炒

蠟丸桐子大空腹米湯送下七八丸一服永不再發感應丸見傷飲食亦佳 喻嘉言治

周信川休息痢陽邪陷入陰分以布條捲成鴛蛋狀墊肛門厚被圍坐熟飲人參敗

毒散見傷濕

良久又飲遂覺皮間微有津潤令其努力忍便不得移身約二時久病者

心燥畏熱不能忍始令連被臥病即減改服補中益氣湯見氣旬日愈蓋內陷之邪須

提出之以挽其下出之勢又須緩緩透出方為合法凡久痢久瘍久熱等証皆須識

此意 勞痢久不愈致虛五心發熱如勞証預蓮飲蓮肉山藥各等分赤多倍蓮

肉白多倍山藥愈后異功散見氣

或平胃散見傷飲食加參苓 清陽下陷始則飧泄久則

腸澼亦見裏急厚重膿血相錯專用補中益氣見氣痢不治而自止不效是無火也急

用八味丸見虛損

大瘕泄亦見裏急後重紅白雜便則痛欲小便大便先脫欲大便

小便自遺或小便流痛或不通或大小便牽痛急用八味丸見虛損 加故紙肉蔻阿膠

治之不可用痢門藥也說詳醫貫瀉痢門中

參下淋症似淋非淋

刮腸諸病壞証久下膿

痢藥則誤六柱散去附子加益智仁白芍藥或可冀其萬一 痘后風之痛或癰軟
或脛腫或膝腫名痢后風因痢後下虛感受風濕留滯關節所致獨活寄生湯見腰痛

吞虎骨四斤丸見脚氣 或大防風湯外以杜牛膝杉木節白芷南星草薢煎湯薰洗若

惡血痢下未盡留滯經絡作痛叫號者日久恐成鶴膝四物湯見血氣 加桃仁紅花牛膝

黃芩陳皮甘草煎生羌汁研潛行散入少酒飲之數十貼又刺委中出血又方松明

節一兩乳香二錢炒焦存性蒼朮黃柏各一兩紫葳一兩半甘草五錢桃仁去皮不

去尖一兩為末每服三錢生羌同杵細水盪起二三沸服若由下多亡陰而致者補

脾胃生血忌用風藥

用藥禁忌初起忌溫補即胃氣虛弱下不宜黃芪尤禁用之則發脹忌覽塞亦禁升
麻非元氣下陷而用之升毒上千速死之道忌利小便非濕盛小便不通而利之致
津竭熱熾必劇忌發汗非表証而妄汗致津涸熱盛必劇禁酒痢時酒則難愈愈則
復發

大便不通

有熱結者熱耗血液乾燥故結也脈洪數能食

即仲景所
謂陽結

麻仁丸四順飲子吞潤腸

丸若燥寢堅滿腹痛承氣湯見中治之

氣

有寒結冷氣隱於腸胃陰凝不運津液不通故結也脈沉遲不能食腹痛

即仲景所
謂陰結也

膏肓子潤腸

寒而實者備急丸見傷飲食溫脾湯寒而虛者半硫丸羌汁調乳香吞之或八味丸見損虛外用握藥

有氣秘氣壅塞不通不升不降其人多噫實者破結導滯木香檳榔枳壳陳皮杏仁等類虛者氣虛不運補而行之不宜破哉人參多用若氣阻隔不通而見脛膈反胃等証者人參利膈丸四磨湯見氣選用仍分虛實治之若氣少氣弱無力推送則惟有助氣而已肺主氣肺與大腸為表裏氣相治在肺丹溪云肺氣不降則難傳送用枳壳沉香訶子杏仁等老人虛人津液少宣滑之用胡麻麻仁阿膠等

有血秘老人老人後門固壽之徵產婦產後有秘至數十日者勿亟通之血液乾枯或病後血虛或發汗利小便以致津涸津亦屬血均宜潤劑慈容潤腸丸更衣丸四物湯見麻仁杏仁辛潤之品又腎司二便腎水虛燥宜以六味見虛躁滋水少佐辛味以潤之若鐵打損傷瘀血凝滯致氣不行而大小便不通者破瘀導滯為主

有風秘其人腸胃素有風風能燥濕燥血故大腸不潤而結搜風順氣丸見中風滋燥

養榮湯見虛損

老人氣血多虛察其脈浮虛者氣虛也沉虛者血虛也

凡結實難下之証可用穿結及妙香丸見煩躁

卷二更吉生江門難出名直腸結從導法治之

導法以蜂蜜煉成條大如指結皂角末油抹入便門寒結者加草烏頭末以化寒消
結 热結者以猪胆汁導之

大小便不通

証在危急用地中蚯蚓泥搗和水澄清飲之立通 又方大黃滑石皂角各三錢為
末如小便勢急倍滑石大便勢急倍大黃 又推車子七個土狗七個新瓦上焙乾
為末以虎目樹即虎枝皮向東南者煎濃湯調服 又皂角末葱白連鬚加麝香二分
蜜少許搗貼臍下至毛際 濕熱痰火結滯脈洪盛肢節煩疼濕熱也涼膈散見發熱通
聖散見中風 吐逆二便不通導氣清利湯 瘦膈中焦氣聚上焦不下二陳見痰加木
通先服後吐 燒皂角灰為末粥清調服 皂角去皮弦琥珀各一錢麝少許神麴

為丸作二次服用升提分利藥送下之立通少頃未通探吐之無不通者

小便不通

點滴不出小腹脹痛由氣道閉塞六淫七情瘦濕血食內外諸邪皆能閉氣氣分上中下三焦上焦之氣
肺主之肺熱則氣不行治宜清降中焦之氣脾胃主之濕盛或熱盛而氣滯不行
須治濕熱若氣虛而下陷不運須升清以降濁下焦之氣肝腎主之腎移熱於膀胱
無陰則陽無以化須純陰之劑滋腎丸肝脈過陰器肝火鬱不伸則癃閉肝火疏泄
則為遺溺治取肝經俞穴又下焦脈在膀胱經前胆經後出一樞中外廉曰委陽膀

膀經絡也下焦火盛則癃閉虛則遺溺又督脈女子入繫庭孔男子循莖下至篡其病癃閉遺溺治取督脈俞穴不取膀胱俞穴者以膀胱但藏溺其出弱者從三焦督脈及肝也

丹溪云肺熱不生

水清金乃隔二之治也脾濕不運清不升濁不降故肺氣壅閉不下行燥濕健脾乃

其非陰中之陰勿用

隔三之治也若不關脾肺但膀胱有熱直瀉膀胱乃正治也

東垣分在氣在血以

渴不渴為辨渴者熱在肺屬氣分用淡滲之藥茯苓薑苓澤瀉琥珀燈芯通草車前

瞿麥扁蓄等氣薄之品氣薄為陽中之陰從陽而下降者也不渴者熱在下焦屬血分須用純陰之劑無陰則陽無以化黃連黃柏知母滑石之類

淡滲之品乃陽中之陰勿用

熟實者八正散

見

加木香腹痛不可忍木通湯上喘紅林散

此

為下元冷秘常有用桂附乃通者

氣虛不化而不

甚而轉筋不救腎氣丸

見虛

此為下元冷秘常有用桂附乃通者

氣虛不化而不

急滿惟倦怠懶言春澤湯

見傷濕

津液藏於膀胱氣化乃能出故用沉香橘紅之屬

或用吐法以提其氣氣升則水自降如滴水之器上竅開下竅乃通也

氣虛而不升化用參芪等

藥先服後吐之痰多閉氣用二陳先服後吐之更推類以盡其餘

或由大便不通而小便漸閉者通大便則小便

自行瘀血閉氣者宜多用牛膝實者桃仁煎代抵當丸

見血牛膝膏見

渴而腹冷水

氣也

水畜腹中故冷停畜不運清氣不升津液不生故渴不降故小便閉

括婁瞿麥丸主之便利腹溫為度

小便不

通及轉胞危急諸藥不效用猪尿脬一個底頭穿一小孔貫一通透翎管線扎緊翎

竇口塞以蠟從脬口吹氣滿七分線扎緊再用手捻緊翎根令不曳氣乃去竇口

之蠟將筒口插入莖物竅內放手故開捻筒根之手也却捻猪脬使氣透入膀胱小便即出

小便不通嘔逆飲食不得入名關格若頭汗出者腸死脈細濇者知陰亦竭亦死葱白一

斤碎切入麝香五分拌勻分二包先用一包置臍上以紅火熨斗熨之半柱香久換

一包以熨斗盛冷水熨之互相換熨以通為度或以木通老葱煎湯服頓時探吐

再服再吐以通為度或身無汗以葱湯入木桶內令病者坐杌上設臍為度匝腰

繫裙以覆之少時汗出尿亦出即于桶中溺之勿出桶恐氣收而尿又回也孕婦

胎滿逼壓尿脬胞轉翻傾側胞系了戾不得小便名轉胞須舉其胎令穩婆香油抹

手入產戶托起其胎溺出如注次以人參白朮陳皮升麻加入四物丸內煎服頃時

以指探吐如此三四次則胎舉矣一法令孕婦坐榻上連榻倒堅起尿自出勝手托

男子亦有轉胞婦人轉胞不必盡由胎壓多因尿急脬脹而驟馬馳車飛跑急走

致脬擗翻或水溢中焦食滿腸胃下壓膀胱無處退避以致閃側翻轉者可推並

須吐法滑石散全匱婦人病飲食如故病不在胃煩熱不得卧倚息喘也下不通則並

浮越故熱此轉胞不得溺也此由虛寒氣不化溺腫墜翻轉者可推並

得卧陽被迎急胞脹腫墜翻轉腎氣丸即八味丸見虛損

淋

一滴不出名閉即小便不通點滴而出名癃即淋二証皆由氣閉濇其理已見上篇

淋証大概腎虛膀胱熱

五藏六府所受內外諸邪熱皆得入膀胱

腎虛則火動常欲泄而不能藏

火動欲泄

則屬之肝故上篇言肝火疎泄為瘡故數膀胱熱則水道枯澁故滲出澁滯數而且澁莖中痛淋瀝不宣故謂之淋腎虛膀胱熱則水液少子和治一人令煩食鹹魚少項大通曰淋者無水故澁也脈實大宜分理脈虛細澁精血敗壞難治治法行滯氣解邪熱通水道其大綱又在平心火此証最忌發汗淋症屬熱耗津液發汗則愈滿無水可出則動血矣汗之則尿血準繩謂暑月多此証以汗多小便常赤澁也治用五苓散見傷濕飲其外發之汗意謂內有白朮桂枝能緩汗也恐未必不如去桂合生脈散佳使液聚于內又從而導下之然有虛勞汗出而赤澁者乃津液枯燥又不宜滲利矣飲汗清熱滋液可也失血亡精者同此論之 淋証莖中必痛若先痛後癢則火退矣或是實証轉虛

氣淋初起為氣淋以氣滯而澁痛也白茯苓甘草稍白芷山梔木通猪苓澤瀉車前地膚子葱白 生料五苓散見傷濕加阿膠或五苓益元見傷暑各半服 火府丹佐以導赤散見發熱石葦散 或四苓見傷暑加木通滑石瞿麥燈心 肺熱清肅之氣不下降加味八正散 氣虛八物湯見虛損加杜牛膝黃芩

膏淋久為膏淋及砂石淋膏淋濕熱傷氣分水液渾濁如膏如涕如米泔實熱八正散加蒼朮虛熱鹿角霜丸精尿俱出精塞尿道欲出不能而痛海金沙散兔絲子丸鹿茸丸見血土牛膝地膚葉汁白茯苓澤瀉山梔甘草梢琥珀鬱金萆薢砂淋尿為熱所煎熬成沙石如煮海水成鹽八正散神效琥珀散如聖散石燕丸獨

聖散 石首魚腦中石十個煅滑石二錢琥珀三分為細末每服一錢木通湯下
蠻姑七個鹽一兩新瓦上鋪蓋焙乾為細末每服一錢溫酒下 冬葵子滑石瞿麥
琥珀土牛膝車前澤瀉山梔地膚葉汁 必斷鹽乃效一則淡食能滲利一則無鹽
不作石也

血淋熱傷血分莖中必痛不痛為尿血見血門歸尾土牛膝赤芍玄胡車前澤瀉鬱金山梔劉寄奴主之 血瘀則小腹硬痛加紅花五靈脂 血熱則色鮮紅脈數有力加生地
血虛六味損見虛加車前牛膝 血冷則色黯而枯尺脈沉遲腎氣丸見勞損 如死血
牛膝膏 牛膝根莖葉酒煮服治小便不利莖中痛欲死及婦人血結堅痛如神但
虛人不宜用當同補藥用之免損胃 側柏葉生藕節車前草等分搗汁調益元散
見傷髮灰散小薊子飲並見立效散瞿麥散

痰淋痰鬱氣成熱所致七氣湯見氣青州白丸子見中風

勞淋勞則動火熱流膀胱所致 脾勞勞倦所傷補中益氣見氣漏 合五苓見傷氣漏 腎勞色陽虛

腎氣湯陰虛知柏地黃湯並見心勞思慮虛損心清心蓮子飲見赤白濁

熱淋火府丹益元散見暑導赤散見發熱 五淋散榆白皮散

冷淋由冷氣客于下焦滿于脬中水道為寒所凝不得宣通故先寒戰而後便數成
淋邪正相爭正氣怯邪氣之冷故寒戰又為冷氣相激則鬱熱而成淋進冷劑愈甚者是也宜地龍湯下八味丸見虛損

或用生料鹿茸丸見血肉蓯蓉丸澤瀉散沉香散。若下元虛冷水寒冰凝小便不通或淋瀝証見筋轉喘急欲死不問男女胎產急用八味丸料煎服緩則不救蓋寒得熱則流通非附桂何能直達膀胱使雪消春水來耶。

又有似淋非淋者老人陰萎而思色則精不出而內敗火雖動而氣已衰不能送精出外也小便澀如淋敗精流入莖竅二便牽痛精傷血枯燥故大便亦痛愈痛則愈便愈則愈精傷血敗氣亦下臨大使紅白似痢小便白濁如淋因其痛而欲便以求通因便多而氣愈墮故痛更甚大兔絲子丸見咳鹿茸丸見腎氣丸見虛

又有胞痺一証小腹按之痛水閉故按之痛若沃以湯水閉氣蒸成熟小便不利上為清涕由風寒濕三氣客于胞中痺而不通故氣不化風寒由足太陽入太陽經絡腦下鼻故流清涕治以腎著湯見傷濕茯苓丸見小便不禁巴戟丸此本痺証而兼淋者也。

小便數

頻數無度似淋而莖中不痛故另分一類數而少且清則似淋以不痛故異數而少且清則似淋以不痛故異又似不禁然可忍為異証由腎虛有火火動欲出水不得藏腎虛六味丸數而少者茯苓琥珀湯利之免致澁痛成淋數而多者薯蕷蓮肉益智仁之屬收之然此証固屬有火亦有下元虛冷腎不攝水者免絲子丸八味丸見虛鹿茸丸見血中氣不足數而多補中益氣湯見氣夜多小便益智仁二十個為末鹽五分水一碗煎臨臥溫服或蓯蓉丸小便畢少頃謂已盡忽再出些少或尿後又急者多由忍尿行房所致忍尿則水不下行行房則火炎

後雖便亦不暢其去宜生料五苓散見傷濕加阿膠吞加減八味丸見損虛心移熱于未盡故清狀如此

宜生料五苓散

心移熱于

小腸致小便數火多有之大喜動心分清散見赤白濁四七湯見氣痛仍以長砂妙香散見心煎去小兒

絲子丸見赤白濁大便硬小便數者名脾約麻仁丸見大便不通說詳傷寒陽明篇天煖衣厚則氣

上升而外泄故多汗天寒衣薄則氣內斂而下降故多尿不在病論

遺尿小便不禁

不知而出為遺知而不能忍為不禁此小便數為甚故另為一類多由肺腎虛寒

氣不能攝補中益氣湯見氣送腎氣丸損虛大抵上虛補氣下虛固脫睡著遺尿大

免絲子丸見咳損猪脬灸碎煎湯下韭子丸六味丸見虛損去澤瀉加故紙四兩益

智仁人參各三兩肉桂一兩老人尿不節山茱萸一味最妙產後不禁血氣兼

虛八珍湯見虛損已上皆虛虛寒之証亦有熱甚神昏尿出不知者即傷寒論所謂

直視失溲也此為死証熱甚寒邪盛也失溲陰失守也故死河間謂熱甚客于腎

部干干肝經廷孔鬱結之極氣血不能宣通神無所用故遺尿不禁肝主疏泄鬱極則泄愈甚後

人又推廣之謂各藏府之熱皆能令小便不禁皆熱証也實熱者神芎導水丸見腫脹

每服百丸空心白湯下一服利即止後服

薛立齋治因勞發熱作渴小便自遺肝火或時閉滯或時閉滯作肝火血虛陰挺

不能約制午前服補中益氣湯見氣升散其鬱加山茱山藥午後服六味丸見虛損滋陰養血月餘

上海千頃堂印行

悉退此虛熱也。有洗手足尿即急不能忍者。豈房勞傷腎。尿為火持不下得水。則陽得陰化。故尿出乎。又豈腎冷不攝。得水則益其冷而即出乎。然陰性遲。火性急。似當以前說為是。大抵內水與外水相感應之理

小便黃赤

小便白則無火。是黃赤乃有火也。黃柏知母主之。然有實火虛火之分。如天熱多汗或陰分枯涸。則小便短少。短少則必黃。此為虛火。不得專用寒涼。

交腸

大小便易位而出也。糞出前竅
尿出後竅乃藏氣乘亂所致。或因醉飽或因大怒氣亂于中腸。胃失職不循輸化之常道。故也。法當宣吐以開提其氣。如走錯路者仍令回至原處則不再誤也使闌門清利得復司泌別之職。則愈矣。吐後宜五苓散。見傷濕木香調氣散。是中氣各一錢加阿膠末一錢。湯調服。或研黃連阿膠丸為末。加木香少許。湯送下。此皆除濕熱之劑。蓋氣亂由於鬱。不鬱則順道而行。何亂之有。惟鬱極暴伸勢必肆行橫決。不循當道。氣鬱則為濕熱也。嗜酒者血必瘀。濕熱所傷也。四物見血加海金砂。木香。檳榔。木通。桃仁。姜宜人二便俱從前陰出以為交腸。用五苓喻嘉言曰非也。交腸乃暴病。驟然而氣亂于中。此証乃久病以漸而血枯于內。先由脾不攝血下行。有若崩漏。胞門子戶之血漸亡。轉吸大腸之血亦盡。又轉吸胃中之血。亦盡。下脫之血始無源而止。血盡則氣孤而無偶。為拳為塊奔追散

亂水穀舍故趨新水道闢為穀道江漢兩渠併歸一道與交腸易位而出不同安可用五苓再刼其陰其說甚辨錄之夏子益奇疾方治婦人因產病交腸用舊幞頭燒灰酒服仍間服五苓散分利之如無幞頭舊紗帽可代以受頭氣日久取陽氣上冲之義即用吐升提意故又治血崩取漆能行敗血也

關格

關格之說不一而各有理

經謂寸口

即手寸關尺之總名

主中

寸口本肺脈屬

人迎

在喉旁

府以候外

主外兩者相應大小齊等春夏人迎微大

大冬寸口微大

曰平人

說見四証

人迎一

盛倍大于氣口一倍也下倣此

病在足少陽一盛而躁病在手少陽二盛病在足太陽二盛而躁病

陽明三盛且大且數

數即躁也

名曰溢陽

陽盛而溢為外格

不得入拒飲食

寸口脈一盛病在足厥陰一盛而躁病在手厥陰二盛病在足

少陰二盛而躁病在手少陰三盛病在足太陰三盛而躁病在手太陰四盛且大且

數名曰溢陰為內關

潤滑不通

皆死不治人迎寸口俱盛四倍以上命曰關格與之短期

按此皆以躁數為言是主熱立論乃舉隅之詞觀其又一

條云必審按寒熱以驗藏府之病可知此証有寒有熱矣

又謂五藏不和則七竅耳

目口不通氣不通也

六府不和則留結為癰故邪在府則陽脈不和不和則氣留而陽盛矣

氣大盛則陰脈不利

此二句當依難經云邪在藏則陰脈不利接下不利則血留而

相觸彼此聯絡傳注之

古人文字往往如此

不利則血留而陰氣盛矣陰氣大盛陽氣不能榮也血氣相

和則榮

通氣不順與上文邪在府對講今云陽太盛則陰不利者以見陰陽

相觸彼此聯絡傳注之

古人文字往往如此

不利則血留而陰氣盛矣陰氣大盛陽氣不能榮也血氣相

和則榮

茂今血不行而邪聚于故曰關陽言閉關不使陽入也陽氣太盛則陰氣不能榮也故曰格陰
拒格其陰不得入也陰陽俱盛不得相榮故曰關格不得盡期而死按經言陰陽之邪偏盛
或俱盛則其經脈不和而見於人迎寸口如此後世獨診寸口故秦越人以上魚為
溢陽被陰格脈從為外關內格外陽為內陰所拒格不入尺溢上魚際也如被關閉也入尺為覆陰被陽格脈從尺
得下通如被關閉也仲景則謂寸口脈浮而大浮為虛正氣內虛故外浮越大為實
邪氣在尺為關在寸為格關則不得小便格則吐逆此與越人同意越人以脈之長而有餘言仲景以脈之大而有實也又謂下微本大者下謂沉分本謂尺言沉則為關格不通不得尿況而微小
而微盛也又謂下微本大者下謂沉分本謂尺言沉則為關格不通不得尿況而微小
寒邪盛寒虛無陽則不化故小便不能出不言格食者省文也頭無汗者可治有汗者死陽脫又謂趺陽脈伏而濁
伏則行濁則化伏則吐逆水穀不化濁得食不得入胃名曰關格不言小便不通亦省文也上二條以尺言此以趺陽言也詳此後賢所論各有其理亦推廣內經未盡之意也又雲
岐子云關格者陰陽易位蓋陽上陰下定位也今寒反在胸中舌有白胎而水漿不下熱在丹田而小便不通治關格上寒治以熱下熱治以寒若皆兼有寒熱分主客治之治主宜緩治客宜急此亦一說也由此論之則夫陽極于上陰極于下否隔不交者當通其陰陽轉否為泰可知矣又張景岳謂內經謂人迎盛四倍以上為有
陽無陰寸口盛四倍以上為有陰無陽二者俱盛四倍以上為陽極于上下焦無陽
陰極于下上焦無陰陽離絕多由酒色傷其情氣以致陽飛于上陰走于下脈浮

豁無根散大躁動如此為欲脫危候凡見六脈如弦如革洪大異常而且躁數脈動則身亦動乳下之虛里及臍旁皆有動氣蠢蠢築築與脈相應上氣微喘動作則甚肢體無力謂為虛損則木無欬嗽失血等証謂為痰火則又無寔邪發熱等証此真陰敗竭元海無根最危之候也彼不納食不得小便自有本証與關格何涉哉其說雖與前人異然理甚精按諸家皆就吐食不溺之証言而無一定之脉景岳則指定大數之脈言而無吐食不溺之症各如其說施治可也

頭痛

頭為清陽之分外而六淫之邪氣相侵內而外府經脈之邪氣上逆皆能亂其清氣相搏擊致痛須分內外處實實者其人血氣本不虛為外邪所犯或蔽覆其清明或壅塞其經絡或內之實火上炎因而血瘀涎滯不得通行而痛其痛必甚此為實虛者其人氣血本虛為外邪所犯或內之濁陰上干雖亦血瘀涎滯不能通行而搏擊無力其痛不甚此為虛寒風即氣之飄上升者繩調真氣虛寒遇外之寒濕所侵血濁脈縮緊急引其小絡而痛得煖則止實者邪氣實而正氣不虛可任攻虛者正氣自虛而邪氣自實補正仍須治邪若邪亦不實但補正則邪自退六淫外邪惟風寒濕三者最能鬱遏陽氣火暑燥三者皆屬熱受其熱則汗泄非有風寒濕襲之不為患也然熱甚亦氣壅脈滿而為痛矣內邪不一皆統于風風即氣之飄上升者以高顛之上惟風可到也故不論內外邪湯劑中必加風藥以上引之風藥味之薄者陰中之陽自地升天者也升麻薄荷之類痛如破不能忍蔓

荆子風在太陽巔頂連頸強痛脈浮緊君羌活加羌葱葱白宣連鬚用風在少陽頭角痛口

苦脈弦細君柴胡加羌葱風在陽明額痛連目脈浮長君白芷加羌葱少陰太陰脈

至胸頸而還故無頭痛惟厥陰脈會巔頂故巔痛君膏本如脈沉足冷乾嘔吐沫加吳茱萸附子

用風藥者由風木虛不能升散土寡子畏得以壅塞而痛猶言少陽升氣不清脾濕上壅不降耳故用風藥以散之若疎散太過風藥反甚

發散太過清陽之氣而愈虛濁陰終不得降且表虛易招外侮

宜補氣實表順氣和中湯 凡外感頭痛詳傷寒論 頭痛久不愈者名頭風 頭

風頭面多汗惡風時止時發先風一日則痛甚至風日則少愈

清陽之氣被鬱故善通而惡塞風者天氣

之通者也先鬱後通先風一日正鬱極欲通之候也欲通不通故擾動而痛甚至風日則天氣通而人氣應之遂通故少愈也

由內而鬱熱或痰火

毛竅常疎風易入外寒束內熱閉逆為痛醫用辛溫之藥散其標寒雖暫效以熱濟

熱病益深宜瀉火涼血佐以辛散南星蒼耳子石菖蒲天麻最當

頭風久不愈恐

損且邪害空竅清空膏主之有痰加半夏諸般頭痛並治惟血虛頭痛下不宜正巔頂痛

者亦勿用 内傷頭痛氣虛者耳鳴目眩

清氣不升陰火上冲九竅不利氣不能達于九竅也自覺空虛

惡勞動動則痛更甚脈虛大必包裹其頭乃少寧四君子湯

見氣加風藥 血虛頭痛

魚尾眉尖後陷終日星星如細筋抽引痛不甚脈芤或數善驚惕當歸川芎連翹熟地各二錢水煎泡薄荷末二錢鼻吸其氣候溫服安卧或四物湯

見血加風藥 氣血

具虛者調中益氣湯見勞加川芎蔓荆子細辛神效陰虛發熱兩太陽穴作痛此

相火自下冲上六味丸見虛 產後血瘀頭痛膈熱上千也 热厥頭痛雖嚴寒猶

喜風寒在煖處或見烟火尤甚宜清上瀉大湯後用補氣湯

頭目赤腫胸膈煩悶

大便微秘身半已下寒足骯尤甚

此條詳寒熱篇上熱下寒條

既濟解毒湯見寒熱

頭痛暈

眩煩亂惡心欲吐半夏白朮天麻湯見眩暈

虛風內作非天麻不治痰非半夏不除黃

芪實表止自汗人參補氣二木澤瀉茯苓除濕橘皮調中升陽炒

麵麥芽消食蕩胃

乾姜除寒黃柏酒炒 治伏火發躁

濕熱作痛必昏重欲吐兼眉棱骨痛二陳見陳加風

藥 傷食頭痛胸膈痞塞嘸酸噫敗卵臭惡食治中湯加砂仁一錢或紅丸子或平

胃散並見傷飲食 加枳實傷酒頭痛惡心昏冒眩暈葛花解醒湯見傷飲食

頭痛巔疾下虛

上實也寒濕上干 過在足少陰太陽甚則入腎寒濕自經而入藏也

腎主骨髓髓通腦寒入骨髓逆上至腦阻碍清陽故腦痛連齒齒亦骨之餘也

此幾幾乎真頭痛矣

濕熱上千者必以苦吐之輕者透頂散搐鼻取涎

頭重如裹由濕氣在頭頭者輕清象火清故

輕也濕者地之濁氣濁故重也外濕蒙蔽故如裹宜微汗勿大汗恐汗去濕留紅豆

搐鼻散 外有喚毒頭痛吃炒香附一味愈

真頭痛手足寒至節全腦連齒皆痛

旦發夕死不治與黑錫丹見呢逆

灸百會猛進參朮烏附或可生然天柱折者必死

頭痛與真心痛皆寒証陰滅陽也

偏頭痛舊分右屬熱與痰

熱用半夏蒼朮

以陽明胃府居右多熱多痰也分左屬風屬

血虛以肝木主風居左又左屬血也
風用荆芥薄荷血虛然不必泥定
生蘿蔔汁
仰卧注鼻中左痛注右左痛則左壅塞雖注之亦不通故可注從右透左則並通矣右痛注左
華撥散 猪胆清搗鼻 川芎散 細辛散 川芎柴胡為主佐以荆蔓子蒼耳葉升麻甘草葱羌大便秘大黃下之外用草麻子五錢大棗十五枚搗成泥塗棉紙上箸捲成筒去箸納鼻中良久下涕痛止 又右膏二錢牛蒡子二錢為末酒下飲大醉立愈

雷頭風頭痛而起核塊或頭中如雷鳴風動作聲如籟之發清震湯或不省人事地膚子生羌搗爛熱酒冲服取汗愈 子和用茶調散見傷飲食吐之後用神芎丸見腫脹下之再服烏

荆丸見及愈風餅子之類弱者用涼膈散熟發消風散熱 瘓熱生風作响半夏皂牙

羌汁煮過一兩大黃酒浸透濕紙包煨如是者三次二兩白羌荳連翹橘紅結梗天麻各五錢片芩酒炒七錢薄荷葉

三白芷青礞石粉草各一為末水浸蒸餅丸菉豆大臨卧茶吞二錢以痰痢為度後服清痰降火之藥 氣燄肝火作响加味道遙見鬱最當亦有如蟲响者名天白蟻茶子為細末吹鼻

大頭痛頭腫如斗俗云大頭瘟天行疫氣所發頭面赤腫或發瘡瘍先發鼻額屬陽

明先發耳前後屬少陽先發腦後及頂屬太陽若三陽俱受邪則各處併發治戒急

下恐遺高分之邪當先緩後急退熱芩連板藍根之類緩緩治之細口呷或食後服酒炒使上升不速

皆緩候大便熱結上焦之邪熱皆降聚于中州乃下之三承氣見大便巽用此毒苦

結塊不散必成膿外用柏葉和蚯蚓糞泥搗敷或井底泥調大黃芒硝末亦可 赤腫結核排針出血愈頭眩掉眩屬風熱風火主動也 差活川芎白芷藁本蒼朮細辛甘草天麻若因肝腎二經血虧致火炎生風湏養血又凡人內有痛則頭搖心絕則頭搖狀如烟煤直視者死 瘟病亦頭搖

頭風屑羅謙甫謂肝風盛全來犯之使頭有雪皮難解大抵風熱上蒸其液乾則化為白屑耳 大便實瀉清丸見中風 虛者人參消風散

眉稜骨痛或外邪鬱成風熱上攻于腦從目系過眉骨下注于

系上屬於過眉骨也

或內

之風熱濕痰上攻選奇湯主之風熱者清上散痰二陳加酒芩白芷風寒羌烏散 肝虛者纔見光明眼眶骨痛生熟地黃丸肝血虛火旺也 肝經停飲發則眉骨痛眼不可開晝靜夜劇濕為陰邪故夜病甚導痰湯 痰或小芎辛湯加半夏橘紅南星茯苓

眩暈

眩惑亂也從目從玄玄黑暗也謂眼見黑暗也虛人久蹲陡起眼多黑暗是也 暈與運同旋轉也所見之物皆旋轉如飛世謂之頭旋是也此風火上冲使然經以掉眩屬風木風即火氣之飄忽者風從火生火藉風煽觀誠得風而旋轉可見矣外風內風熱風冷風皆能煽火 經言五藏六府之精氣皆上注于自然則目之能視者乃藏府之精氣靈明為之也此上注之精氣必安靜不搖而後燭物有定若為風火所煽而旋轉則所見之物亦旋轉

矣此乃目之精氣為病非目睛之轉動也然經謂目系屬於腦出項中邪

邪指風中言

項入深隨目系入腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目轉眩趙以德謂順靜寧謐者水之化動擾撓亂者火之用頭以腦為主腦者髓之海目之童子亦腎之精二者皆屬腎水喜寧靜而惡動擾亂靜則清明內持動擾則散亂昏惑故目眩腦轉云云則風火煽動故有腦轉急而目轉眩者乎六淫七情飲食痰水諸邪皆能動火生風風火盛極即然雖壯實人亦有之不必虛弱也但虛者多耳昧者定歸之虛試觀醉人眼花與虛何涉哉劉宗厚以為上實經以為上虛非相悖也蓋虛者血與氣也實者風火與痰涎也正自虛而邪自實也痰涎隨風火上壅濁陰干於清陽也故頭風眩暈者多痰涎丹溪謂無痰不作眩必搐去而後愈

治法

氣虛者補中益氣湯

見氣

血虛者補肝養榮湯或四物湯

見加

腎陽虛八

味丸

見虛

或黑錫丹

見逆

逆腎陰虛六味

中腕伏痰嘔逆旋覆花湯

見

中

加半夏等

閉不出者吐之獨聖

可用清上辛涼之藥防風通聖散

見

中

風加半夏等

青黛散搐鼻取涎神效

痰涎盛而大小便結利下之

但見有吐涎者知其有痰因停水眩暈者詳水腫門

半夏橘紅旋覆等風痰南星羌荳

因停水眩暈者詳水腫門

因熱者煩渴梔子黃連甘菊實者大黃酒炒

虛人更甚五苓散

見傷濕

除濕湯

見中

因熱者煩渴梔子黃連甘菊實者大黃酒炒

三次為末茶調每一二錢。因氣鬱者則志氣不舒逍遙散。見雙加薄荷菊花虛寒者宜三五七散或芎附湯。見血生料正元飲加鹿茸一錢下靈砂丹。見吐或正元飲加炒川椒十五粒下草珠丸不效則獨用鹿茸一味每服五錢無灰酒煎入麝香少許服。緣鹿茸生于頭故治頭眩也瀉多脫陰虛陽上浮時時眩暈或視物不見者危。眩暈非天麻不治不可缺。

項強痛

多由風寒邪客三陽亦有痰滯濕停血虛閃挫久坐失枕所致。感冒風寒者驅邪湯。痰盛者消風豁痰湯。濕盛者加味勝濕湯。血虛火盛筋燥者。項強急動則而暉疎風滋血湯。閃挫久坐失枕所致項強不可轉移多由腎虛不能生肝。肝血虛無以養筋六味丸。見虛損常服更妙。

胸痛

缺盆下曰胸當與痞滿門胸脾條參看

五藏及胆心包絡七經筋脈俱至胸是計經之邪皆得為胸痛而胸者肺之部分則其痛尤多屬肺可知乃醫書多以肝病為言此舉隅之論耳勿泥須知胸為清陽之分其病也氣滯為多。實亦滯虛亦滯氣有餘為火而屬心火本千濕而屬脾其義可兼舉矣若乃肝氣實而上冲因載血以下降不宜上壅者也。至肝火之上炎由腎水之渴肝氣之虛寒由腎

火之衰治法於上下篇參之 經云春脈如弦其氣不實而微此謂不及令人胸痛亦可推治法於上下篇參之 經云春脈如弦其氣不實而微此謂不及令人胸痛引背兩脇脹滿此肝虛也補肝湯見脇痛 全匱肝中寒者此下有兩臂不舉舌本燥字醫宗金鑑謂是衍文 刪善太息胸中痛不得轉側則脇痛可知 食則吐肝性條達為寒所鬱不得伸故太息以舒之食則吐者氣上逆也 而汗出也又云肝着氣着帶不行也常欲踴其胸 摩之謂先未苦時但欲飲熱寒則塞滯熱則旋覆花湯主之方用旋伏花三兩葱十四根新絳少許水三升煮一升頓服全鑑謂與不合疑誤愚謂此乃停飲而陽氣不宣故用此逐飲陽通加絳以和血 此肝實也 素問曰陽明所謂胸痛短氣者水氣在藏府也輕者五苓散見傷濕重 者用張子和法取之 木香欒金二味氣欒痛者倍木香血欒痛者倍欒金為末每服二錢老酒下虛者加人參 瘦飲痛輕者小腦胸湯重者大腦胸湯丸治之若痰唾稠粘者則用控涎丹見痰飲 甚合

心痛

心包絡痛 胃腕痛

心為君主義不受邪若邪傷其藏而痛者謂之真心痛其証卒然大痛咬牙喫

口氣冷汗出不休面黑手足青過節冷如冰旦發夕死夕復旦死不治不忍坐視用猪心煎取湯入麻黃肉桂乾羌附子服之以散其寒或可死中求生如但見爬床搔席面無青色四支不厥聲尚出外即非真心痛乃心包絡受邪作痛也而包絡之邪皆由各藏府經脈傳來如從胸痛至心是肺心痛從胃腕痛至心是胃心痛從脇痛至心是肝心痛從腰痛至心是腎心痛可類推之蓋五藏六府任督各支脈皆絡于

心其邪氣自支脈而乘心者不易入于心而但犯其包絡也于是氣血為邪所滯邪正相擊故痛矣

心包絡痛在胸下觸骨處稍下即為胃腕痛胃上腕名貴門在臍上五寸去鶻骨三寸而痛每相連故世俗總以心痛呼之且有九種心痛之說曰蟲飲食風冷熱悸症去來痛丹溪云心膈痛須分新久若明知身受寒氣口食寒物于新得之時當與溫散或溫利之仲景九痛丸潔古煮黃之類病久則鬱蒸成熟若用溫散溫利恐助火須加山梔仁氣鬱即痛不必待成熟也而槩以火鬱言之者以氣屬陽即屬火也此義宜知寒痛寒氣客于腸胃卒然而痛二陳見痰飲草菓乾姜吳茱萸扶陽助胃湯草荳蔻丸之類熱盛清中湯黃連龍胆草之屬痰積痛星半安中湯海蛤丸或吐之痰痛濕痰嘈雜不寧如飢如飽欲吐吐即寬二陳加草蔻蒼朮清痰流飲漚漚有聲攻走腰肋胃苓湯見泄鴻寒痰一月一發或兩發或二三月一發發時痛極悶死偶怒或勞乘勢湧起平胃見傷飲食加乾姜草蔻枳壳咳逆上氣痰飲心痛海蛤粉瓜蔥實帶等分為末米糊丸氣攻刺作痛加味七氣湯沉香降氣散此及下方並見氣正氣天香散但忍氣即發者是也死血作痛脈必澁發作時飲米湯下或作呃有時氣逆騰如蟲擾唧唧有聲勿誤作蟲壯人用桃仁承氣湯見血弱人用歸尾川芎丹皮紅花蘇木玄胡索桂心桃仁泥赤麴番降香通草川山甲之屬煎成人童便韭汁大劑飲之

或失笑散 蟲痛如咬面有白斑又面色乍青乍白乍赤唇紅吐清水或青黃水時
痛時止能食或食即痛以蟲得食而動故痛也飽後痛即止化蟲丸見蟲門 川練子苦練
根使君子檳榔黃連雷丸烏梅不可用花椒太辣恐大驚跳治詳蟲門 食痛如有
物礙累累不下時噯腐氣畧傷食悶悶作痛平胃散見傷飲食加枳實半夏檳榔 舊有
食痰積一遇觸犯便痛挾風寒者參蘇飲見發熱 加葱姜挾怒者二陳見痰 加青皮
山枝麵葉山查草菜挾火熱者二陳加枳壳黃連羌活炒 山梔 脈堅實不大便心下
滿痛不可按者實也用柴胡見大便不通 三承氣見大便不通 下之 痛不可按為實可按為虛虛
則補而行之或純補 丹溪治許文懿公食積痰飲往來如潮升上則為心脾痛降
下則為膀胱以製甘遂末入猪腰內煨食 即張子和煨腎散方峻勿輕用 連泄七次足便能步然
多年鬱結一旦泄之徒引動其猖獗之勢仍以吐劑達其上焦連用瓜蒂藜蘆苦參
等俱吐不透仍用附子尖三枚和漿水以蜜飲之方大吐膠痰 桶然後治及中下
二焦以朴硝滑石黃芩石膏蓮翹等一斤濃煎冷飲之四日服四斤腹微痛二便秘
脈歇至卯酉時乃陽明之應胃與大腸積滯未盡也乃作紫雪見遺精論末 三日服至
五日腹稍安後又小便閉痛飲以蘿蔔汁得吐立通又小腹滿痛以大黃牽牛等分
水丸服至三百丸下如爛魚腸者二升許脈不歇又大便併痛與前丸下穢物如柏
油條尺許自病至安脈皆平常弦大次年行倒倉法聚見積全愈此得于張子和無胆識者敢乎

腹痛小腹痛

經脈有正有別其別分絡藏府部位邪在正經則注於別絡而從藏府所虛之部位而入焉

胸為心肺部位 肝脾部位 腹為脾肺部位 腰為腎部位也

邪入則氣停液聚痰血不行脈絡皆滿邪正相搏故痛六淫七情飲食勞倦皆能致之不獨寒也

痛脈多緊急河間謂急脈固屬寒象然寒脈當短小而遲若兼洪數則為熱痛之脈 分寒熱虛實氣血飲食痰蟲施治 寒痛綿綿無增減喜熱惡寒白中和二便清利脈沉遲乾羌肉桂吳萸草蔻木香厚朴陳皮香附之屬 諸寒痛得熱即止者用熟艾半斤隔白紙鋪腹中又以葱數枝批作兩半片鋪艾上再用紙蓋之慢火熨斗熨之冷則易覺腹中熱腹皮熱難當仍用帛裹緊將冷乃解一法用炒鹽熨 房事後受寒腹痛灸神闢氣海等穴或炒羌荳熨之內服理中

見中寒

四逆

見厥等湯

熱痛時痛時止口乾舌燥二便結滯喜冷惡熱脈洪數白芍黃芩黃連山梔甘草之屬 寒亦有實熱亦有虛熱實者寒藥下之

三承寒

實者熱藥下之

備急丸等

辨虛實法不一而可按屬虛拒按屬實尤其顯著者治虛分氣血痛時常覺虛豁似飢非飢呼吸無力氣虛也六君子

見氣

加木香若悶悶作痛似細筋抽引不寧又如芒刺牽引屬血虛四物

見血

加陳皮甘草木香氣滯作痛則腹脹脈沉木香順氣散七氣湯

見氣此為氣實

又飲食痰濕死血蟲作痛皆為實 食痛欲大便便後痛減脈沉滑或弦食得寒則凝得熱則行平胃

散見傷飲食加枳實草蔻半夏保和丸枳术丸二丸併見傷飲食之屬 酒積痛三稜蓬术香附

蒼术陳皮厚朴茯苓木香檳榔丸主之多年敗田螺壳煅存性加三倍于木香檳榔

丸中更加山梔茵陳其效甚速 瘰痛脈必滑眩運吐涎或下白積或小便不利瘀碍

氣道或得辛辣熱湯則暫止二陳見痰飲加蒼术香附撫芎枳實羌汁 死血作痛脈

必濇痛有定處元胡歸尾五靈脂蘇木桃仁沒藥赤芍等或桃仁承氣湯見虛者加

歸地蜜丸服以緩除之 蟲痛心腹懊憹往來上下痛有休止或胸中塊起惡心吐

清水食厚味或飽即正面色青白赤不定蛇蟲攻咬面必黃參看心痛門雞汁吞萬應丸

見蟲雄黃白礬飯丸亦可 感濕而痛小便不利大便溏泄脈必細胃苓湯見泄瀉感

暑而痛吐利併作脈必虛豁十味香菇飲六和湯並見詳霍亂門失笑散見心治

心腹痛神效劉寄奴末六錢玄胡索末四錢羌汁熟酒調服亦佳皆通理氣血之劑

也 中脘痛太陰也理中見寒中建中之類 脘腹痛少陰也四逆見厥真武之類

景東陽謂心脾筋結臍胃筋脈挾臍當臍明屬脾胃其腎之筋脈從腰貫脊並不及

臍當臍痛用腎經藥太誤愚謂腎附于脊正與腎對又胎胞初結中起二莖形如蓮

瓣一莖即臍蒂蓮蘚即腎是臍乃腎之根蒂而位又正對則當臍痛雖與少陰經無涉而謂與腎藏無關亦不可也 小腹痛厥陰也重則正

陽散回陽丹之類輕則當歸四逆湯見厥之類 小腹痛因小便不利者五苓散見濕

若小便利者審是血証桃仁承氣見血之類若肝氣鬱痛者青皮柴胡之屬亦以可按

為虛拒按為實 氣寒血滯或氣帶血凝當歸散若連食作痛安之即止為汗

經血虛四物見加牛膝人參艾草又白膠香一味最妙其有青筋見于小腹及大腹乃肝火乘脾小柴胡見寒熱合四物加胆草山梔 若因署丸腫疼牽引而痛乃疝氣病也霍亂腹痛必吐利兼作亦有不吐利者名乾霍亂又腸癰腹痛小腹痛並小便數似淋身甲錯腹皮急按之軟如腫狀或邊臍生瘡可辨也 又有胞瘻一証小便不利小腹按之痛若沃以湯詳瘻及淋二門

腰痛

膀胱脈抵腰腎脈入腰又經曰腰者腎之府也轉搖不能腎將憊矣是腰痛乃腎與膀胱之病也太陽經虛則風寒濕諸客邪皆得為患而腎虛之所患尤多腰肢瘦弱小體疲倦脚膝酸軟脈或洪細細皆無力痛亦悠悠隱隱不甚是其候也分寒熱二証脈細無力氣怯弱小便清利為陽虛宜腎氣丸見氣損 橘香丸生料鹿茸丸見血精之類仍以茴香炒砂猪腰切片勿令斷粉末其內紙裹煨熟黃酒下脈洪而無力小便黃赤虛火時炎為陰虛東垣所謂醉以入房損其真陰則腎氣熱熱則腰脊痛不能舉久則髓減骨枯發為骨痿六味丸見虛損 虛滋腎丸見小便不通 封髓丹見遺精 之類 瘧痢後月經後痛者多屬虛于補氣血藥加杜仲側柏葉 丹溪云久腰痛必用官桂開之痛方止脇脹痛亦然 有風有寒有濕有熱有閃挫有瘀血有滯氣有痰積 傷于風脈必浮或左或右痛無常處牽引兩足羌防秦艽必用 感寒而痛腰間冷如冰

脈必緊得熱則減得寒則增羌附湯見中加辣桂杜仲外用摩腰膏 傷于濕如坐

水中脈必緩遇天陰或久坐久坐則

寒濕之氣

凝着不行

治宜除濕兼溫散 風濕獨活寄生湯

並見傷濕體重腰冷飲

倉朮湯獨活湯羌活湯

寒挫或跌撲損傷而痛乳香趁痛散五積散

見中

加桃仁

大黃蘇木各一錢倍當歸或以茴香根同紅麴擣爛熱酒調服若因勞役負重而痛

和氣飲

見腫

或普賢正氣散 瘰血脈必濇轉側若刀錐之刺大便黑日輕夜重桃

仁酒調黑神散或四物

並見血加桃仁紅花之屬

氣滯脈必沉烏藥順氣散

見中

人參順氣散 瘦注脈必滑或沉弦二陳

見痰加南星香附烏藥枳壳威靈仙治痛要藥

為末每用二錢繆猪腰內煨吃熟酒下微利為度 杜仲

羌附炒去皮

黑丑破故紙桃仁

玄胡索等分為末酒煮麪糊胡桃肉和丸桐子大空心溫酒或白湯下五七十

丸宜下者用之

腰痛雖屬腎與膀胱然有子病累母者故鬱怒傷肝故致腰痛宜

調肝散有土病及水者故憂思傷脾亦為腰痛沉香降氣湯

見氣和調氣散

見中腰痛面忽紅忽黑為心腎交爭難治之証也

背脊強痛

督脈主脊經云督脈之別名曰長強別走太陽實則脊強取之所別也

刺灸之類

大腸筋挾脊 心脈與脊裏細筋相連貫故心痛有連背者 脾筋着脊 腎筋脈貫脊

脊髓空則痛 膀胱筋脈挾脊上項為風寒濕所襲則僵強不能屈伸取本經脈中血絡 背上兩角為肩解小腸脈出之肩解下成片肉為肩胛大小腸筋脈俱繞之又肩背屬肺部分太陽中風濕經脈不行脊痛項強而不可回顧羌活勝濕湯見傷濕

兼氣實鬱滯者則常常作痛加木香香附氣虛鬱滯者則時止時痛加升柴參芪血虛

鬱痛者則夜甚時止加歸芍血瘀鬱痛者則夜痛不止加羌黃靈脂紅花風盛項背

強加威靈仙濕盛肩背重加二术痰氣凝滯則嘔眩本湯送青州白丸子見中風 看

書對奕久坐而脊背痛者補中益氣湯見氣或八珍 加黃芪 咳氣逆肩背痛

汗出肺實也熱也肺虛亦痛覺寒少氣不足以息當補氣 腎氣上逆先背痛後及

肩和氣飲見腫脹 加炒鹽小茴 當肩背一片冷痛而用神保丸者見傷飲食 此有積氣故

也 素虛人或病後或發汗過多心膈間痛引乳脇或肩背此氣上逆當引使歸元

有患肩胛縫一線痛起上跨肩肩背屬經 至胸前側脇止見火從小腸出煎湯下龍會丸 除肝膽火而愈

錢思慮則氣結不行故補其氣以行之木通二錢見火從小腸出煎湯下龍會丸 除肝膽火而愈

脇肋痛

腋下為胠腋下為脇脇下為脇

肝胆脈布脇而心包絡筋脈亦挾脇肝脈布肋而脾筋亦結肋胆筋脈乘季脇而肺筋亦抵季脇胆脈乘脇是脇肋痛未必盡由肝胆而肝膽為多 大概分氣血食痰

四種而怒氣瘀血居多治者湏分左右審虛實左痛多留血或肋下有塊右痛多氣鬱氣鬱則瘀亦停然左血右氣亦難泥定大抵瘀血按之痛不按亦痛痛無時息而不膨脹氣痛則時止而膨得嗳即寬以此辨之 腸痛火實者忌陳皮生羌細辛能令肝脹火盛忌熱藥三者性熱而味又辛散火得風而益熾也故忌之 龍薈丸柴胡青皮必用 肝火鬱甚用黃連龍胆草等苦寒直折火愈鬱愈烈用大瓜蔓一枚連皮搗爛加粉草二錢妙瓜蔓甘寒潤滑於鬱不逆又如油之洗物未嘗不潔也詳準繩 氣實痛枳壳青皮羌黃香附甘草有痰加蒼朮半夏白芥子枳壳乃治脇痛的劑必用 死血阻滯必日輕夜重午後發熱脈短濶桃仁承氣湯見血 加鱉甲青皮芎歸之屬 瘦飲痛脈沉弦滑導痰湯見痰 食痛凡痛有一條扛起者是也 煮黃丸見痛 治脇下痃癖痛如神 悲哀傷肝氣引兩脇痛疼枳實煮散 房勞傷腎氣虛血滯胸脇多有隱隱作痛宜補腎加芎歸之類和血 酒色太過脇下一點痛不止名乾脇痛甚危惟大補氣血而已 虛冷作痛不宜疎散須辛熱補劑 肝虛視物不明筋脈拘急而青爪甲枯脇引小腹痛補肝湯 凡痛而脇骨偏舉者肝偏傾也

臂痛臥腫

臂痛有六道經絡究其痛在何經以行本經藥行其氣血氣血通則愈矣 以兩手伸直臂貼身垂下大指居前小指居後而定之其臂膕之前廉痛者屬陽明經以升

麻白芷乾葛行之後廉痛者屬太陽經以藁本羌活行之外廉痛者屬少陽經以柴胡行之內廉痛者屬厥陰經以柴胡青皮行之內前廉痛者屬太陰經以升麻白芷葱白行之內後廉痛者屬少陰經以細辛獨活行之並用針灸法 脊為風寒濕所搏或飲液流入或因提挈重物致痛或腫或不腫除飲証外其餘並可五積散見中風寒及烏藥順氣散見中風或蠲痺湯見痺審知是濕蠲痺湯每服加蒼朮末三匙防已四分挈重傷筋者琥珀散刲勞散或和氣飲見腫脹每服加白羌黃五分以羌黃能入臂故也薄桂味淡能橫行手臂引藥至痛處亦不可少痰飲臂痠疼軟麻導痰湯見痰癥加木香白羌黃各五分重者控涎湯見痰癥加去油木鱉子一兩桂枝五錢每服二十丸加至三十丸 血虛不榮于筋者蠲痺湯四物湯見血氣各半貼煎服 氣血凝滯者舒經湯

腋屬心包經肝經 腋前屬肺經 腋後屬心經 腋下屬肝經 經氣熱則腋腫察其部位治之

身體痛 身體拘急

體痛謂一身盡痛傷寒太陽表証六脈俱緊發汗後痛為氣血不和脈弦遲陰毒傷寒陰毒痛如被杖霍亂吐瀉中暑汗多脈虛濕痺濕流關節一身盡痛風濕相搏重痛不可轉側脈緩虛勞氣血虛損脈皆有之 寒者甘草附子湯熱者當歸拈痛湯 内傷勞倦飲食兼感風濕者補中益氣湯見氣加羌黃升麻蒼朮藁本治之 春月寒濕鬱遏升陽不得升火伏下焦浮而燥熱雖在陰室中亦汗

出壯火食氣困乏懶言以麻黃復煎湯漸漸發之令寒濕去陽氣升困倦乃退偏身痛如勞証者參芪甘草附子炮羌活木香知母芍藥川芎前胡枳壳枳梗白朮當歸茯苓半夏製各五錢柴胡鱉甲灸各一兩桂心酸棗仁各三錢杏仁炒五錢為末每服四錢姜三片棗二個烏梅三個葱白三寸水煎空心調服少年虛損冷憊老人諸疾並治惟傷寒體痛不宜活血丹與四物蒼朮各半湯相表裏治偏身骨節疼痛如神身體拘急屬寒寒則收引也又屬濕濕亦寒也寒屬腎濕屬脾于二經取

面詳四診察面
頰車蹉

諸陽經皆上至于頭而胃脈起鼻交頰中俠口環唇循頰車上耳前過客主人故面

部屬胃經

按小腸脈別支從顴上
頤抵鼻絡顴亦面部也

胃熱則面熱便躁結者先用調胃承氣湯見大便不通

徹其本次用升麻加黃連湯以去其經絡中上行之風熱胃寒則面寒先以附子理

中丸見中寒

溫其中氣次以升麻加附子湯以散其經絡中上行之寒風熱甚則面

腫痛白芷升麻葛根薄荷防風荆芥

羌活蒼朮黃芩石膏外杵杏仁膏塗之腫如蛇

狀青苔水調塗

風水亦浮腫詳腫脹門腫與浮異風火上炎紅腫而痛此邪有餘而腫也脾肺氣虛不能運行上壅不降面

因虛浮此正不足而浮也

面瘡或粉刺或起白皮作痒但淺在皮膚者皆屬肺經風熱清肺飲

面焦胃脈衰人參黃芪甘草白芍升麻葛根白芷

面上黧黑班水虛也女人最多六

涸則不潤故晦暗如蒙塵土宜疎肝清肺滋腎

面上黧黑班水虛也女人最多六

味丸

見虛

外用甘松山奈細辛白芷白芨白芨防風荆芥羌活藁本大麻羌活陀僧

川椒菊花獨活枯礬檀香各一錢棗肉七個肥皂肉一斤同為丸秋冬加生蜜五錢皮粗槁加牛骨髓三錢洗面

面上黑子石灰鹽水調稠糯米插入灰內留半截在外片時米色如水晶用以點之即落

瘡腮雞子青調亦小豆末加蠅牛飛麪搗勻

貼之又用靛缸底泥塗之即消

面上黑者胃陽虛腎寒侮土故黑色見于面唇

唇者皮之

華土不勝水故黑以升麻葛根防風白芷推陽胃氣而散其滯蒼木散其寒白芍以斂脾陰參芪甘草羌活以補其陽午前陽升之時服之數貼而愈又有登廁感非常臭氣而得者以沉檀焚于帳內薰之旬日而愈蓋臭屬腎水香屬脾土取其相勝也又有因

吃斑鳩而得者鳩常食半夏苗有毒以羌汁解之而愈

欠伸煩車蹉口開不能合醉以酒俟睡皂角末吹其鼻嚏即止

耳

經謂腎開竅于耳又謂心開竅于耳解者謂心本開竅于舌因舌無竅故借竅于耳

肺絡會于耳胆三焦脈皆走耳前入耳中過耳後胃脈上耳前筋結耳前

小腸膀胱脈俱結耳後完骨胃之支脈亦過耳後又素問心腎肺脾胃五絡皆屬之

于耳中又謂肝病氣逆則耳聾

耳聾聲有所蔽塞則不通在外之蔽塞與在內之蔽塞一也內氣本流通何以蔽塞

則風火痰血之為之也在上為心肺之氣在下為肝腎之氣在中為脾胃之氣氣動而為火火動而為風壅于上焦擾攘不清則外入之聲為其所亂若更精液而痰凝傷陰而血瘀則耳竅蔽塞甚則為痛為腫結核停膿不但聾也不甚則為鳴氣上出于耳而作响也氣上盛則鳴甚不盛則鳴不甚上焦氣壅屬實下焦氣逆屬虛或陰虛而火上炎或陽虛而火上浮也中焦多屬濕熱酒食之所鬱積也各藏府經脈皆能動氣生火作聲豈必拘定脈絡通耳者乃然哉此皆言內氣上壅者若氣虛下陷則亦聾以清氣自下濁氣自上清不升則濁不降也更有老年精銳氣衰不能上通者即無濁火上亂而精氣萎弱既不上通則竅遂漸閉如路久不行而茅塞也亦有沉靜之人收視返聽精氣退藏于密而上竅亦漸閉者乃高壽之徵也明此義而紛紛之說皆一以貫之矣 耳聾治法熱者犀角飲子大便秘者加大黃壅熱生風犀角散兼外風者防風通聖散見中風兼痰者滾痰丸見痰 鬱火防風通聖散加大黃酒煨再用酒炒三次又同各味通用酒炒加味道遙散觀厥氣上逆者多見眩暉之証沉香降氣湯蘇子降氣湯甚者吞養正丹並見氣以鎮墜之 腎水虛精脫者必顧頰黑六味地黃丸見虛損本事地黃湯內有差防二味為腎虛而受風邪也無風邪者去之 兼腎虛寒者八味丸見虛益腎散多恐為肝虛四物湯見血加防風柴胡菖蒲茯神 勞役傷房勞傷虛火上炎更卒奇貴是為勞聾益氣聰明湯 耳者宗脈之所附脈虛而外風襲使經氣閉

塞是為風聾多見頭痛排風湯見中風桂星散磁石丸 氣壅頭目不清清神散 氣

閉不通通氣散 外治通神散通耳法追風散 甘遂半寸棉裏插耳中口嚼甘草

蒼朮長七分一頭削尖插耳內一頭平安艾灸覽耳中有熱氣效 人聾草麻子

丸勝金透闕散

耳鳴經謂上氣不足又謂腦髓不足則腦轉耳鳴皆精氣虛弱之故也王汝言謂耳鳴甚者多是痰火上升又感憤怒而得若腎虛而鳴者其鳴不甚當見勞怯等証薛立齋云若血虛有火四物湯見血熱加山梔柴胡氣虛補中益氣湯見氣血氣俱虛八珍見虛熱加柴胡若怒而鳴氣實小柴胡見寒熱加芎歸山梔虛用八珍加山梔若午前甚者陽氣實熱也小柴胡加黃連山梔陽氣虛補中益氣見氣氣加柴胡山梔午後甚者陰血虛也四物見血量加白朮茯苓若腎虛火動閑閑然脛痺或痰甚作渴必用地黃丸見虛熱甚者當鎮墜正元飲見眩暈加黑錫丹見逆呃有熱者龍齒散 腎者宗脈所聚竅于耳宗脈虛風邪乘虛隨脈入耳氣與之搏而鳴先用生料五苓散見濕加製枳壳橘紅紫蘇生羌同煎吞青木香丸見氣散邪疎風下氣續以芎歸飲和養之若更四支抽掣痛睡着加打戰鼓耳內覺有風吹奇痒黃芪丸甚效

耳腫痛生瘡臘粘子湯柴胡清肝飲 耳濕腫痛涼膈散 見發熱 加酒炒大黃黃芩酒浸防風荆芥羌活濕多外用枯礬吹入耳中耳濕結塊生猪脂地龍糞金下墨研末

葱汁和捏如棗核棉裏塞耳潤則換耳乾痛亦用此方耳痛如蟲內走蛇蛻吹入立
愈矣

聾耳勞傷氣血熱氣乘虛入聚則生膿汁也內服柴胡聽耳湯蔓荆子散外用紅綿
散壯人積熱者玉屑無憂散送解毒雄黃丸並見咽喉下三四次效出膿髮灰吹之耳膿
潰爛礬灰鉛丹吹又方陳皮燒灰一錢輕粉三分麝五厘吹入即乾 **耳出血**龍骨
未吹即止按初起忌斂濬鉛丹礬不宜用紅綿散亦勿用也 耳痒沈存中病亦目
百治不瘥邱華問耳中痒否痒是腎風四生散見中風二三服即瘥如言服二次目反
大痛更二服遂愈以語孫和甫孫曰嘗見呂吉甫目久病服透冰丹乃瘥透冰丹亦
療腎風也聖惠云有耳痒直挑剔出血乃止者此腎浮虛毒上攻也宜透冰丹戒酒
麪雞猪之屬一月若不能戒者無效也 **蟲入耳**生姜擦猫鼻即尿取滴耳蟲即出
或用管入耳極力吸之 **蟻蜈蚣入耳**生姜汁或蒜汁灌或灸豬肉雞肉置耳邊
蒼蠅入耳皂角子蟲研爛生鱗血調灌耳中 **蚕虱入耳**菖蒲末炒乘熱棉裹着耳
邊 **蝶蛹入耳**鹽擦耳內或朋砂胆礬等分為末吹即化水 **水入耳**薄荷汁點立
效 **耳中有物不能出**弓弦頭散處傅好膠入耳中點之徐徐引出立效 **百蟲入
耳**用茶油一滴滲入耳內即效而安

醫編卷之四

南海何夢瑤報之輯

松江李林馥啟賢氏校正

雜症

鼻

肺開竅于鼻 胃脈起鼻兩旁

筋亦
鼻兩旁
交結

大腸脈夾鼻孔

根

即山

小腸脈抵鼻

大腸

脈夾鼻孔

小腸

膀胱筋結鼻下兩旁 氣出干鼻氣熱且鬱則蒸成水而為涕但熱不鬱則乾且

痛而帶辛 鼻塞一由腦冷而氣化液下凝於鼻

如天寒
水也

呵氣成

水也

脳

火立通

一由氣熱蒸涕壅

壅

固

矣

乃極力去其涕而仍不通者則竅之外皆涕液之所浸淫肉理脹滿竅窄無

縫故也

風寒外束氣不外越止從鼻竅上出則鼻氣盛而喘息有音初時氣勢上

壅

之甚故化水速而多且清後則勢畧緩故涕不即出久蒸而成濁然濁涕有不由

外感者素問謂膽移熱於腦則辛頸鼻淵

鼻流
泉不止也

傳為衄衄

衄衄
鼻出血

也

熱甚所致

瞑目

也

熱甚所致

暗

也

血因衄而

虛不能養目

由膀胱脈絡腦受腦之熱注于胃脈薄于頸中故鼻辣痛而濁涕下蓋

腦液下滲也俗名腦漏防風湯 術血詳血症門 偶感風寒鼻塞者自作風塞治

若平日常常鼻塞不聞香臭或值寒月或暑感風寒即塞者乃肺經素有火鬱喜熱

熱則行散惡寒故畧一感寒即發氣壅不舒熱鬱於脳孰淵癥痔皆由此生清金降

火為主

桑白皮不可少

佐以通氣之劑 氣有餘為火固矣亦有脾胃氣虛不能升發鬱而

故喜之

熱則行散

惡寒故畧

一感寒即發

氣壅不舒

熱鬱於脳孰

淵癥痔皆由

此生清金降

火為主

桑白皮不可少

佐以通氣之劑

氣有餘為火固矣亦有脾胃氣虛不能升發鬱而

若平日常常鼻塞不聞香臭或值寒月或暑感風寒即塞者乃肺經素有火鬱喜熱

熱則行散惡寒故畧一感寒即發氣壅不舒熱鬱於脳孰

淵癥痔皆由

此生清金降

火為主

桑白皮不可少

佐以通氣之劑

氣有餘為火固矣亦有脾胃氣虛不能升發鬱而

故喜之

熱則行散

惡寒故畧

一感寒即發

氣壅不舒

熱鬱於脳孰

淵癥痔皆由

此生清金降

火為主

桑白皮不可少

佐以通氣之劑

成火者補中益氣湯見主之 外治瓦蒂細辛麝為末棉裏塞鼻或草蓆仁和棗搗塞每日易之

常流濁涕名鼻淵六味丸見虛損者 甘菊薄荷玄參蒼耳子腦屬腎故用六味又有腦痛鼻出臭黃水俗名控腦砂有蟲食腦用絲瓜藤近根者三五寸燒存性酒服二錢立効外用桃葉作枕見鼻淵又傷風門

常流清涕名鼻鼽肺熱者肺熱則氣盛化水成清涕其不為稠濁者火性急速隨化隨流不及濁也 桔梗山梔薄荷麥冬玄參辛夷甘草若因腦冷所致腦冷則氣化液下溜如天寒呵氣成水也 蒼耳子乾薑升麻藁本辛夷川芎肉桂

肉痔癰鼻中肉贅鼻不可近痛不可搖此濕熱壅盛所生如地濕熱而蒸成芝菌也清肺飲恙活勝溫濕見傷寒者 或白茯桔梗山梔黃芩辛夷白芷木通柴胡防風蒼朮薄荷外用白礬末加硇砂少許吹之或瓦蒂細辛麝香為末棉裏塞鼻即化黃水桃葉嫩心亦可塞又雄黃白礬苦丁香為末霜梅肉搗膏作條入鼻內亦効鼻瘡黃連大黃麝香為末擦鼻中辛夷膏亦可內服烏犀丸

肺熱鼻乾無涕心神煩亂犀角散桑根白皮散

鼻痛葛根竹葉青黛薄荷防風石膏升麻石斛外用宣腦散取鼻中黃水 食物卒從鼻中縮入介介痛不出以牛脂或羊脂如脂頭大內鼻中吸入須臾脂消則物與

同出

鼻紅赤或紫黑陽明血熱多得之好酒熱氣薰蒸肺葉故鼻紅赤若為寒冷所搏凝結不行則瘀濁而變為紫黑治須融化滯血滋生新血去風熱丹參生地當歸紅花山梔桑白防風薄荷煎服或酒製四物湯見血加酒炒片芩陳皮生甘草酒紅花生薑煎調五靈脂末形肥氣弱者加酒黃芪臨服入好酒數滴為引若素不飲酒則為肺家風熱前一方加荆芥亦或臟中有蟲用去蟲藥外用杏仁二十個去皮胡桃二個連瓦上焙不可焦大楓肉三個水銀三分唾津手研成黑水塗之三兩次愈

鼻氣臭非癰痔其人病重者乃臟壞氣臭不治

口

脾開竅於口 胃筋脈夾口胃經血氣少兩吻多絞畫 大腸脈夾口交人中

口苦心熱黃連生地麥冬丹皮必用膽膽熱則膽汁上溢亦苦柴胡龍膽草生甘草棗仁茯神生地 口淡胃熱石斛石膏竹葉青黛濕盛加白朮半夏茯苓又大瀉後多有口淡者不可作熱治口甘脾熱白芍山梔蘭草花粉黃連 口鹹腎熱六味湯
見虛損加玄參知柏 口酸肝熱柴胡黃連胆草逍遙散越鞠丸並見 檳榔山梔黃芩桑皮二冬沙參

口常流涎脾胃熱津溢也清胃散見齒亦有脾虛不攝者六君子見加益智妙亦有腎

醫
石
熱者六味丸

見虛損

加知柏

口乾澀火盛津虛大忌五苓星半五味為君加二冬白芍生甘草人參烏梅又用黃芩葛根生津防風薄荷

二味疎風即熱也

按括箋去疾不用星半而

此取潤惡燥也

又生津方神效

口瘡熱與痰上盛也口舌狀如無皮曰口瘡糜爛曰口糜實熱者板用寒涼金花丸涼膈散

發升麻飲之類西辰漿最妙

冬用西辰皮燒灰噙黃連散去熱涎亦有虛熱者脾胃氣虛下陷鬱而成火上炎所致補中益氣湯

見加

竹葉花粉若下焦虛寒逼其無根之火上炎者八味丸引火歸元外用生附子末唾調塗足心若腎水虛火

淡者六味丸加知柏晡熱夜熱血虛也八物

並見虛損

加丹皮五味麥冬

口破色紅腮

舌腫乾渴涼膈散

見熱發

赴筵散色淡白不渴由思煩多醒少睡虛火所發滋陰四物湯

湯柳花散

口瘡連牙根爛痛

玄參散久不愈以

五倍末擦之使收斂

鷄口初生小兒滿口生白屑也心脾熱所致先用綿蘸冰水洗去後用冰硼散吹之內服涼膈散

口瘡多食肥甘積熱所致用口瘡藥吹之

口苦無皮中氣虛熱清熱補氣湯

口臭竹葉石膏湯

見煩躁

加減甘露飲

胃火之真必識濁若真而餽腐則食停不化之真當所

口腥臭肺熱也

桑白皮地骨皮黃芩知母五味子麥門冬桔梗

懸癰生上腭發紫泡者是銀針挑破吹口瘡藥碧丹

見喉

亦可口菌生牙肉上隆起

見咽

形如菌紫黑或生舌上俱口瘡藥吹或用荳母蒂燒灰鹽拌醋調時擦

唇

脾之榮在唇四白 胃脈環唇 肝脈環唇內 三經熱盛則唇紅甚寒則青黑氣血兩虛則黃白血液虛熱則乾燥甚則裂風動則瞤唇動不驗臟府之寒熱莫便於此

唇乾生地麥冬山藥當歸白芍人參蜜 冬月唇乾拆裂血出用桃仁搗猪脂調塗唇裂石膏黃連當歸生地石斛竹茹生甘草蜜風熱者白芷升麻防風黃芩甘草唇潤柴胡防風荆芥山梔生甘草當歸赤小豆薏苡 唇青黑理中湯見中風 唇

繭腫起白皮皺裂如蠶繭亦有唇下腫如黑棗者亦有不腫縮緊小起白皮者名緊繭皆燥熱所致治須潤燥清風消火大概以養血為要腎虛者內熱口乾吐痰體瘦濟陰地黃丸肝火柴胡清肝散胃火清胃散見齒脾經風濕瀉黃飲子 唇瘡蟲食喉則上唇瘡聲啞食肛則下唇瘡咽乾黃連犀角烏梅木香雄黃桃仁煎服 亦有氣鬚生瘡既上滴下汗敷之如神白荷花瓣貼之亦效 小兒燕口瘡燕窠土擦髮灰擦並效 大抵唇口舌諸瘡暴發赤腫痛者多實熱涼膈散見熱發梔子金花湯可用若日久色淡瘡白時痛時否多屬虛熱清心蓮子飲見赤白濁四物湯見加知柏丹皮少佐肉桂補中兼清可也若服涼藥久不愈者以七味地黃湯見虛冷服引火歸元甚

則加附子

齒取牙

男子八歲腎氣實而生齒三八而真牙生五八則齒槁八八而齒去矣女子亦然以七為數蓋腎主骨齒乃骨之餘髓之所養故隨天癸為盛衰又胃經之支者入於上齒大腸經之支者入於下齒故腎髓足腸胃實則齒堅牢虛則齒搖動齒痛者皆齒之根肉痛也由風熱濕之邪入聚為液為涎與齒間之氣血相搏擊而痛濕熱盛則痛且腫風熱盛則痛而不甚腫又濕熱生蟲蝕其牙根則亦痛又風熱甚搏擊於血則血出甚則氣血腐化為膿出臭汁名齒齷齷肉消蝕則齒根露而挺出名齒挺腎熱則齒色黑而槁腎竭則面赤黑

齒痛腎虛無熱者但搖動不痛痛必因風火與蟲風有外風有內風內風即熱氣外風則外感之風寒也內有火為外風所鬱則益烈故痛甚亦有頭腦感受風寒腦痛連齒者羌活附子湯發散之此腎經虛而犯風寒也齒屬腎腦亦屬腎寒邪犯腎為傷根本宜急治緩不可救真頭痛者必死是也白芷散亦可此証必喜熱齒亦不腫不蛀蓋暴病也與素病齒者異若不連腦止連頭頂者乃外風鬱熱於內也立效散濕熱甚而不愈菌陳散中氣虛而痛清陽不升而渴火上炎也補中益氣湯見氣此証多有齒齷脹不能嚼者腎經虛熱者承氣湯見大便不痛越鞠丸見風熱而痛者獨活散

六味丸見虛損

諸証未能細辨且與消風散觀頭揩抹又並宜香附黑三分炒鹽一

炒鹽一

分研擦又石膏胡椒為末擦立愈 牙痛用清涼藥反甚者從治之草撥川椒薄荷荆芥細辛樟腦青鹽為末擦則熱散而不齧 得熱則痛得涼則止常欲吸涼風者以黃連梧桐律之苦寒薄荷葉荆芥穗之辛涼治其濕熱更以升麻引八胃經以羊角灰引八腎經加麝香少許為末擦又以調胃承氣湯見大便不通去芒砂加黃連下五次 胃熱致痛不可忍連頭腦滿面發熱大痛其齒喜寒惡熱清胃散亦有得寒而反痛者熱被鬱也亦有惡風寒者熱已為風寒所鬱故惡也金沸草散喉咳齒縫有紅肉努出者消風散頭痛見頭臨卧茶點服乃入荆防白芷蜂房之屬煎頻漱口 亦有寒熱並惡者寒熱之邪混雜作痛也宜當歸龍胆散益智木律散惡寒之情多于惡熱者寒多熱少也草豆蔻散惡熱之情多於惡寒者熱多寒少也立效散麝香散上牙疼升麻散惡熱者炙足三里 下牙疼白芷散惡寒者炙三間 腎虛牙浮長動搖欲脫而痛者六味丸並見虛損黑錫丹見逆擇用齒長漸至難食名髓溢蓋腎水不藏而浮泛之故白朮煎湯漱服 長用制牙牢牙散白牙散羊脰散
鯪蛀數年不愈當作陽明畜血治之桃仁承氣湯見料丸服好酒者多患此參血証蟲齧蛀牙痛蘆薈白膠香塞蛀孔內 松脂銳如錐者塞孔中少頃蟲出脂上 溫米醋漱出蟲愈 天仙子燒烟用竹筒抵牙引烟薰之蟲即死 水瓦片置油拌韭子

燒烟閣在水碗上以漏斗覆之薰牙蟲如針者皆落水中蟲出穴空而痛者乳香吳茱實之樟腦川椒各五分研碎放銅杓內茶鍾蓋稠麪封四圍勿令走氣微火升之少頃覺聞樟腦氣取起地上候冷揭開藥俱升在鍾底入磁器收貯每用少許塞痛處立愈

牙齦宣露蔓荆子生地黃地骨皮青蒿各一兩郁李根皮二兩每用五錢水煎熱含冷吐 蚝屎水和為泥火煅赤研如粉臘月豬脂調敷日三次

牙齒動搖還少丹地黃丸見虛損 陰虛內熱者甘露飲

牙齒不生黑豆三十枚牛糞火燒令烟盡取出細研入麝少許研勻先以針挑破不生處令血出乃塗藥不可見風忌酸鹹物露蜂房散 川升麻散

牙槽風齒痛不已齦肉連頰浮腫紫黑出血腐爛口疳藥內加牛黃倍珍珠兜茶頻吹久不愈牙縫出膿甚則齒落名牙漏上邊龍門牙落不治外吹疳藥內用滋陰降火之劑又牙槽風潰後腫硬不消出臭血而不岀膿者名牙疳臭穢難近清胃散有風加防風甚則用蕪荑消疳湯數下之牙疳爛黑防穿腮蘆薈消疳飲外用人中白散疳速者一日爛一分兩日爛一寸殺人最速名走馬疳鼻梁發紅點如硃及上唇龍門牙落者死口疳藥見加牛黃小兒痘後毒發多此証或用綠礬一塊安鐵繡器上燒乾先用青絹蘸濃茶攏口淨乃敷之若惡寒喜熱胃氣傷者補中益氣見虛損

牙癰俗名牙蜞初起齦肉或上或下或內或外腫硬成條是也口疳藥吹之牙齦
牙盡處痛也初起勢盛夜尤痛甚清陽散火湯外用金碧二丹吹咽喉並見若牙關緊閉
用黃熟香削釘漸漸撬進牙關漸開即吹之 牙肉腫如豆大或內或外無定處先
用金丹後用口疳藥

穿牙疔先二日牙痛發寒熱後痛更甚齦上發一紫塊齦肉皆紫黑者是主金丹加
碧丹吹之內服涼血清火解毒之劑破者口疳藥加牛黃小兒馬牙齦上有白色
如脆骨者是將發此毒即打嚏曰日以針挑之

牙楚因食酸所致胡桃解之

滿口牙出血枸杞為末煎湯漱之然後吞下立止又馬糞燒灰存性擦之立止
欲取牙鳳仙花子為末糁牙根自脫乾玉簪花根亦效

舌

舌為心苗 脾脈連舌本散舌下 腎脈挾舌本 膀胱三焦筋並結舌本 肝脈
絡舌本

舌胎見四診察舌條

舌衄詳血門

舌腫痛舌下腫似又生一小舌名童舌腫硬

不柔活名木舌皆心脾胃經蘊熱涼膈散

見發

梔子金花湯

見

玄參升麻湯熱而痰

盛者清熱化痰湯

重舌外治桑皮殼蠶髮灰醋調敷舌下金丹

見

喉吹更妙並用

黃連犀角山梔丹皮生地木通赤芍麥冬連翹生甘草木舌腫甚色如豬肝滿口脹

塞先於舌尖或兩旁刺之又看舌下有如蠟蛇臥蠶腫突者刺出紫血棉蘸甘草水潤之用百草霜細研醋調傅舌上下或同鹽等分井花水調塗凡舌腫脹宜刺舌尖或舌上或兩旁出血惟舌下廉泉穴屬腎經慎刺恐出血太過則瘡按木舌有不痛者痰溫盛於熱也又有麻舌火噬痰沸故麻或血虛氣滯亦麻理詳痺門舌強舌腫必強即木舌之不能柔活也干黃散又用蛇蛻燒存性全蝎等分為細末傳之又有痰涎滯其筋脈不能轉運而强者詳中風門甚則為卷縮舌卷縮肝經熱極血枯不能榮筋故卷縮又傷寒直中陰經寒痰門甚則為卷縮并詳傷寒然經謂邪客三焦之絡喉痺舌卷口乾心煩又謂大腸筋病轉筋舌卷則不止肝之一經為然可知亦不止傷寒一証為然可知矣 風寒溫所中而舌強卷縮小續命湯見中挾熱升麻湯加桔梗漱之碧雪傳之 舌出不收熱基縱長之與腫大一珠末冰片等分敷之內服黃芩殭蠶膽星烏藥竹瀝等去痰清熱 傷寒熱毒攻心及傷寒愈後不能調攝陰陽易常有此與中毒大驚產後俱有之甚有出數寸者用巴豆一枚去油取霜紙燃卷之內鼻中舌自收此治傷寒後不調攝者產後者硃砂未傳舌令作產子狀以二女掖之乃於壁外潛累盆盞觸倒作聲聲聞而舌收矣餘者雄雞冠血浸舌或冬青濃汁浸舌縱流涎涎從舌下廉泉穴出乃腎火盛而逼津液上出也神龜滋陰丸見芩連梔柏竹瀝薑汁等可用

舌

乾裂花粉散瀉心湯舌生瘡甘露飲 口舌生瘡體倦食少清熱補血湯不應補中
益氣湯見加五味子 思慮太過血傷火動者歸脾湯見加柴胡梔子丹皮 舌下
生水泡初起一漸至七八枚名連珠痘吹口疳藥見

咽喉

咽在喉後主納食胃之系也 喉在咽前主氣出入肺之系也 胃腎肝三脈循喉
任脈至咽喉 靈樞謂手陽明大腸手太陰肺經之正循喉嚨足少陽膽經之正挾咽
脾脈挾咽 心脈支者挾咽 小腸脈循嗌咽 按咽喉為飲食呼吸之路居臟
府之上不論何經之邪皆得上千之觀經謂邪客手少陽三焦經之絡令人喉痺可知
不必其經脈之循於咽喉者乃能為病矣 咽喉之病皆屬火有上焦火盛者有下
焦火衝者以致痰涎氣血聚結腫痛閉塞

蛾喉腫痛在咽喉兩旁者名雙乳蛾形若蠶蛾故名亦有形若粟者 在一邊者名單乳蛾如白星
上下相連者名連珠蛾但張口可見者吹藥易到針刺易施深而不可見者頗難治
俱宜服清咽利膈湯吹冰硼散見易見者膿熟針之難見者桐油錢探吐膿血若痰
壅氣急聲小探吐不出者危急用三陵針刺少商穴在大指甲內邊去甲半葉許刺深二分 出血仍吹
服前藥緩緩取效 若形如圓眼有紅絲相裹或單或雙生於喉旁有項大者 不犯不
痛名為喉瘤由肺經鬱熱多言損氣而成忌針益氣清金湯外用消瘤碧玉散點之

喉痺者閉塞之謂飲食難入語言難出喉中或有瘡或無瘡或有塊如丸如拳若初起即發寒熱勢甚而急且痛且痺繞頸紅腫痰涎壅塞聲如拽鋸即名纏喉風須臾不救急令張口針其喉中腫處並刺兩手少商穴出血或以桐油錢探吐其痰隨用甘草湯漱口以解桐油之氣為上策若牙關緊閉用巴豆油紙燃薰燃吹滅令鼻吸其烟即時口鼻流涎牙關自開或水化解毒雄黃丸吹鼻達烟即吐牙關亦開隨用上法以通其閉塞頻服喉痺飲或清咽利膈湯吹金碧二丹或冰硼散見藥內須加牛黃功效乃速準繩急喉痺有聲如鼾痰涎響者此為肺絕之候宜參膏用薑汁竹瀝開服或先煎獨參湯救之遲則不及予按此証屬風火急暴痰涎壅塞致氣閉塞以死非氣虛也不務擦痰出血而補氣何也及見醫貫引此有証云類中風多此証又觀景岳全書論陽虛喉痺謂非喉痺因於陽虛乃陽虛由於喉痺緣患喉痺而過服寒涼或難於飲食致中氣虛寒暴脫聲如鼾痰如拽据宜人參湯救之云云乃知準繩所言不為初起實証立法勿誤會也 腫發項外脹脹痛者防透咽喉不可輕針急用皂角末吹鼻取嚏其腫即破或兼用皂角末醋調厚敷項腫 凡喉証皆由內火熾甚若兼感風寒則火被寒束其性更烈有舌脹出口攬動者名弄舌喉風治法大概相同凡兼外感者切忌胆凡等酸收之藥吹點歟熱不散又忌硝黃等下剝致陽下陷同時多病此而惡寒者屬肺行之寒疫也即為外感當用甘桔湯加黃連殭蠶荆芥半夏鼠

粘子根薄荷等發之挾虛者加人參當歸輩水漿不入者先用解毒雄黃丸四五粒極酸醋磨化灌令吐痰言不可用酸收此用醋者為吐痰計也計也吐痰須收斂更用生薑汁灌之一以散寒一以用醋之滯却用上藥咽喉証最忌半夏生薑以內火得辛散愈熾也惟兼外感可用若風寒結熱

先於耳前聽會穴起形如瘰癧漸攻咽喉腫痛者宜速用牛黃清心丸兼服清咽利隔湯吹冰硼散呴若純是內火不兼外寒則酸澁之品硝黃之劑正當用矣大約擦痰出血為此証急務按此証有無兼外感最難辨何則外感必發熱惡寒脈浮而此症急者初起亦發寒熱脈浮若初起一二日不發寒熱三日後乃發者則為緩証故難辨也須問其有無受風受寒及有無時行証同細細察之大抵無外感者必先一二日見胸膈氣滯痰壅後見喉痛乃身發寒熱若因外感者必先發寒熱後見胸膈氣滯痰壅咽喉痛也

以上皆言急証若緩証便宜緩治喉痺飲徐徐頻與不可過用寒涼恐痰結胸中得寒則凝滯不運漸至喘塞不治其有氣急閉甚者殭蠶為末薑汁調下立愈或馬蘭根苗搗汁鵝翎蘸探吐或飲汁亦妙或以汁和醋含漱皆可此証必問二便便利者浮游之火上攻宜消風熱降氣解毒喉痛連胸紅腫而痛恐是肺癰必用蜜調藥加百草霜桔梗為要婦人喉証先問月經閉者用通經藥一服愈此証雖因於火而火有虛實實火因過食煎炒濃酒厚味蘊積熱毒其証煩渴便閉宜用重劑潤下泄其積熱大便通後乃用去痰解熱之藥清和上焦然元氣有餘可用硝黃弱

者須滋潤腸或蜜導虛火由勞心好色七情內傷以致腎水虧損火上炎午後痛甚者宜滋陰降火此証初起有覺咽喉乾燥如毛草硬物刺梗微紅腫痛甚者日久紫暗不鮮頗似凍榴子色其後破爛腐衣疊若蝦皮聲音雌啞臭腐延蝕妨礙飲食宜知柏地黃湯見虛損若吐酸甜涎者甘露飲觀加黃連便燥者燥過猪油白蜜各半挑服二匙日三五次腫吹紫雪散腐吹八寶珍珠散此治腎水虛火炎者若腎陽衰虛下焦陰寒之氣逼其無根之火上冲者亦午後痛甚須八味丸見虛損料大劑煎湯冰洽與飲引火歸原乃可救切不可用寒涼人之咽喉如曲突火炎若以水自上灌下突爆裂矣惟竈床下以盆水映之上炎即熄所謂上病療下也亦忌發汗針砭出血又有中焦陽衰虛浮之火上炎而咽痛面赤喉乾口舌生瘡遇勞更甚或午前甚者其脈必浮大理中湯見寒中加山藥以右山茱萸以左降之理或補中益氣湯見氣加麥冬桔梗牛蒡子若面唇俱白不寐懶食歸脾湯見血加酒炒川黃連俱用冰硼散見口一錢加燈草灰存性者三分吹之立效凡紅腫最形者凡屬虛証其勢必緩其色亦淡其腫亦微

喉癬喉間生紅絲如戈窯紋又如秋海棠葉背乾燥而癢久則爛開有小孔如蟻蛀故又名天白蟻由過食辛熱致胃火上炎灼肺所致癆証亦多此皆屬火盛水虛觀其乾燥不腫可知矣宜廣筆鼠粘湯未潰吹鑿精散已潰吹清涼散須清心寡欲戒

厚味發物庶可保全若至喉啞或爛開疊起腐衣形如蟻蛀多不救 喉菌狀如浮萍色紫憂鬱氣滯血熱使然婦人多患之初用碧丹五金丹一後則碧三金二吹之噙清靈膏服喉痺飲喉瘡層層如疊不痛日久有竅出臭氣枸杞葉燒酒頓服 久嗽喉痛烏梅肉五分柿霜天冬麥冬朋砂各二錢玄參一錢蜜丸合化 會膿痛詳下瘡門 喉柱腫痛燒鹽枯礬研勻箸頭點之即消內服甘桔射干湯禁針傷命凡喉証已碎也 損者先吹長肉藥後用碧丹痰不出用金丹加製皂角少許倘至穿爛多用口疳藥見加龍骨珍珠 凡喉証無痰者不治水涸也且無可去閉從何通故難 凡喉証舌腫滿口色如胡桃茄子硃砂紙不治 最忌口渴氣喘痰如桃膠一脰皆腫面紅紫或青白無神皆惡候 凡喉証急切無藥牙皂一個蜜調程水煎服 凡喉証用諸冷藥不效者宜薑汁然已破損者用薑汁則辣痛且散而難收又在所禁矣

喉痛則呼吸難通言語難出咽痛則不能嚥唾納食喉痺必兼咽痛咽痛未必兼喉痺

咽中結塊飲食不通此危証射干牛舌葉汁海藻俱治此然不若百草霜蜜丸芡實大新汲水化服甚者不過兩丸

咽痛必用荆芥陰虛火上炎者必用玄參氣虛人參加竹瀝血虛四物見加竹瀝實

熱三黃丸見發熱或黃連荆芥薄荷為末薑汁蜜調噙或山豆根噙風熱表散之散之

不已則收之或單用硼砂或和胆礬白殭蠶白霜梅噙不宜過用寒藥括裏一個白殭蠶微炒五錢桔梗七錢甘草炒二錢為末每用少許吹之紅腫可用此散一錢加朴硝一錢吹之嚥津有小白頭瘡者此散一錢加白礬五分吹之 咽痛諸藥不效者非咽痛也乃鼻中生一紅絲懸一黑泡如櫻珠垂掛到咽門碍飲食用生牛漆根直而獨條者洗淨加好醋三五滴同研細就鼻孔滴二三點入去則絲斷珠破立安若潰腐久不愈由楊梅毒者須以草薢土茯苓為主

咽喉中有物不能吞吐如毛刺如絮如膜如梅核如肉癰均名梅核氣由氣結生痰日久恐成噎膈木香四七丸蘇子降氣湯四七湯見氣方或人參官桂枇杷葉各五錢杏仁二錢五分蜜丸彈子大含化以愈為度或胆礬硼砂牙皂雄黃棗肉丸芡實大噙化溫黃酒一杯過口清咽屑更佳

諸物哽喉三因方煮薤白令半熟以綿縛守手熱線頭少嚼薤白嚥之度薤白至硬處便牽引硬即出矣 秘方用傾銀爐上倒掛灰塵砂糖和丸嚥之自下 骨硬槿樹葉油馬屁勃砂糖三味熬膏為丸噙化 芒麻杆爛丸如彈子大將所哽物煎湯化下 禽獸骨硬以犬弔一足取其涎徐徐嚥之 剪刀草如野茨菇生籬塹間其根白研之則如膠用順水吞下即吐出骨不過兩三口效 研萱草根順水下亦佳

朴硝研對入雞蘇丸如彈子大含化不過三四丸 南硼砂井花水洗滌含化最
軟骨 貴眾濃煎一盞半分三服連進片時一咯骨自出 魚骨硬以皂角少許入
鼻中得嚏便出 細茶五倍子等分為末吹入咽喉立愈 食橄欖即下或用其核
為末順流水下 魚骨在肚中刺痛煎吳茱萸汁一盞飲之則骨軟而出 雞骨硬
用水簾草搗汁飲之其骨自消 野苧麻洗淨搗爛如泥每用龍眼大如被雞骨所
傷雞羹化下魚骨所傷魚湯化下 稻芒糖殼哽喉將鵝弔一足取涎徐徐嚥下即
消或取薦頭草嚼亦妙 吞釘鐵金銀銅錢等物但多食肥肉自隨大便而下 吞
錢及鐵物在喉不得下南燭根燒細末湯調一錢下之 吞鐵或針用錫糖半斤濃
煎艾汁調和服或用磁石磨如棗核大鑽眼以線穿令吞喉間針自引出磁石須陰
陽家用驗者 吞錢燒炭末白湯調服數匙即出 或服蜜升許 或食苧蔴茨菇
其錢自下 或用艾一把水五升煎至一升頓服即下 或用百部根四兩酒一升
漬一宿溫服一升日再 吞釘取薤白曝令萎黃煮使熟物切食一叢大即出 蠶
錢釘及鑲飴糖一斤漸漸食之 舌髮繞喉不出取自亂髮作灰白湯調服一錢
陳無擇云凡治哽之法皆以類推如鷄治魚哽磁石治針哽髮灰治髮哽狸虎治
骨硬亦各從其類也 金鑑魚骨用河中養畜之鴨倒掛取涎仰卧頻灌

一曰舌瘡乃舌不能轉運言語而喉嚨聲音如故也。婁全善云人舌短語不清乃瘻。涎閉塞舌本之脈而然蓋腎脈挾舌本脾脈連舌本心脈別繫舌本三脈有虛則瘻。涎入之脈道閉塞不能運舌矣以參芪术歸陳皮竹瀝薑汁治之半月愈若三脈亡血筋枯縮亦瘡經云刺舌下中脈太過血出不止為瘡又云脈濇甚為瘡是也前方加補血藥又風寒客之則急縮經云脈搏堅而長即弦動意病舌卷不能言是也大秦艽湯見中風又熱則脈弛緩亦不能運宜清熱經云脾脈病舌本強視盛虛熱寒隔下

取之又云手太陰之別曰通里去腕下一寸五分別而上行入於心中繫舌本虛則不能言取之掌後一寸產後敗血迷心竅心氣不通脈亦不行舌强者七珍散

妊娠瘡者其言啞細無音由腎脈為胎盛阻絕不能上通舌本也不必治

一曰喉瘡但喉中聲啞而舌則能轉運也由勞嗽久而然蓋聲出於肺凡物中空有竅者能鳴肺虛者也喉為道路勞病日久火刑肺金傷破則不鳴又火盛則痰壅痰塞肺竅是

為金實亦不鳴也若熱壅成瘡肺癰喉爛則更甚矣不甚者聲止嘶破甚則竟不能出聲也此屬內傷又有外感風寒入肺鬱熱成痰火室塞肺竅不利聲亦嘶啞重濁又有大聲疾呼謳歌失音者亦金破之義也平常痰火上壅香附童便浸透

為末調服以疏通上焦

訶子泡去核以消痰降火開音木通以降火清肺導熱

小腸出桔梗以利肺氣童便以降火潤肺故諸方通用之

發聲散開結痰

橘紅

煎湯化痰甚捷 寒包熱者解表鬱金生地阿膠知母杏仁桔梗沙參蟬退牛蒡子童便 寒痰結滯玉粉丸 積血作痛失音蛤蚧丸血為熱壅
結滯肺竅 勞証血枯火盛青黛蛤粉蜜調服 旅惑聲啞詳傷寒 氣虛感濕痰涎凝肺補虛去濕 風寒鬱熱暴咳失音杏仁煎或炙豐隆二穴各三壯照海二穴各一壯立效仍藥之

又有寒客會膚而卒喑吞吐不利者生附子去皮臍切大片蜜炙噙之勿嚥一云嚥津忌苦寒藥恐成瘡難消難潰

皮毛鬚髮肌肉筋骨四肢二陰

皮毛經曰肺之合皮也其榮毛也又云肺生皮毛肺氣不榮則皮毛焦津液去爪枯毛折

皮膚痛屬火邪傷肺經云夏脈太過則病身熱膚痛為浸淫

濕熱
小瘡

皮膚索澤枯索而潤澤也 不由精血枯涸清燥潤肺可也牛骨髓真酥油合煉一處每日空心熱酒調服三匙治皮膚枯燥如鱗糙澀如鱗甲之相錯曰甲錯仲景謂勞傷虛極羸瘦內有乾血兩目黯黑肌膚甲錯大黃麌蟲丸覩虛主之 又云咳有微熱煩滿胸中甲錯為肺癰葦莖湯主之

皮膚麻木詳痰門 傷寒論曰身如蟲行汗多亡陽也可見麻由氣虛氣虛則運行不能流利噓其痰涎紛然沸動有如蟲行 若為風邪所湊痰被風噎如波湧沸騰其麻更甚矣先用生薑為嚮導枳壳以開氣半夏以逐痰羌防以散風木通牙皂以通經

絡又殭蠶為治麻聖藥麻在手臂加桑條在股足加牛膝待病減用補中益氣湯加參芪 夏天熱傷元氣手與背麻參芪升柴白芍五味甘草空心服手摩患處午前又一服 經年累月無日不木乃死血凝滯於內外挾風寒用附桂為嚮導烏藥木香行氣當歸桃仁紅花阿膠活血木通牙皂穿山甲通經絡待病減用八珍湯虛補氣血必效 漢身麻木八仙湯當歸茯苓川芎熟地陳皮半夏羌活白芍人參秦艽牛膝白朮桂枝柴胡防風炙草煎服 四肢面目皆麻補中益氣氣加木香炮附麥冬羌防烏藥 但在腿麻木沉重黃芪甘草五味升柴當歸紅花陳皮青皮澤瀉名除濕益氣湯 疼血麻木四物見加桃仁紅花韭汁 因氣麻木紫蘇陳皮香附烏藥川芎羌活蒼术南星半夏當歸桂枝橘草 身麻有瘻黃連半夏瓜蔞仁黃芩茯苓桔梗枳壳陳皮天麻細辛南星甘草煎口舌麻木吐涎者並治

皮膚癢痛癢皆屬火火甚則痛微則癢觀火近灼則痛遠烘則癢可見或以為風者風即火氣非有二也此內風也亦有大氣欲散忽感外風醫火不得外散進退皮膚間擾動作癢者仲景傷寒論太陽篇有脈浮遲面赤不能得小汗身必癢之文可參也若無外風不得誤用風藥以証既屬火則血必虛風藥燥血不可用也但宜清火養血血行風自滅並見等大抵偏身搔癢由肺家血虛火盛而生風宜四物覩加二冬桑枝蟬蛻殭蠶

牛蒡刺蒺藜威靈仙外用蒼耳葉地膚子浮萍煎水浴

偏身搔癢起疙瘩俗名風疣瘡紅者名血風血分風熱也白者名白膜氣分風熱也廣州名風落瘼魚膚煮水浴或羊桃葉火燄熱擦並效此與赤白遊風相類所異者彼遊走而此否耳又與發癰異此無病而陡發彼因病而後發也

暑月痱子癢痛苦參四兩菖蒲二兩水五瓢煎數滾添水二瓢蓋片時臨洗和入公猪膽汁四五枚洗之不三次全愈若拆破者菉豆粉一兩滑石五錢黃柏三錢輕粉二錢搽之

偏身青紫斑點色若葡萄初起用羚羊角防風玄參麥冬知母黃芩牛蒡各八分甘草二分

鬚髮經曰腎之合骨也其榮在髮多食甘則骨痛而髮落又曰女子七歲腎氣實齒更髮長五七陽明脈衰面始焦髮始墮丈夫八歲腎實髮長齒更五八腎氣衰髮墮齒稿又曰衝任皆起於胞中上循胸裏為經絡之海其浮而外者循腹上行會於咽喉別絡唇口婦人數脫血衝任之脈不禁口唇宦者去其宗筋傷其衝任血濁不傷唇口不禁故鬚不生有人未嘗有所傷不脫於血其髮不生何也曰此天之所不足也稟衝任不盛宗筋不成有氣無血唇口不禁故鬚不生張子和曰年少髮早白落或頭起白屑者血熱太過也世俗止知髮者血之餘以為血衰不知血熱髮反不茂火多水少木反不禁火至於項炎上之甚也大熱病汗後勞病後髮多脫落豈有

寒耶用鉢針刺神庭上星

會前頂百會出血次調鹽油以塗髮根甚者至再至三

少白可黑髮落可生按子和所論甚是嘗見人年三四十後頂髮脫落者其人必躁動多火常患目疾頂髮茂密者其人必沉靜少火從不病目可驗也

丹溪治一少

年髮盡脫飲食起居如常脈微弦而濇輕重皆同此厚味成熱濕痰在膈間又平日

多喫梅

故脈強濇酸

味收濕熱之濇隨氣上升薰蒸髮根之血漸成枯槁故脫髮處以補

血升散之藥用防風通聖散

見風中去朴硝

嫌其速下也

大黃三度酒炒

使上行

兼四物湯

見酒製合和作小劑

治上故煎以灰湯

灰可治其服梅酸

入水頻與之

在上之藥不厭小而煩

兩月後診

其脈濕熱漸解停藥淡味調養二年髮長如初

甜瓜葉搗汁塗即生

麻葉桑葉

泔煮沐髮七次可長六尺

三青膏可染鬚

肌肉經曰脾主肉邪在脾胃則病肌肉痛

邪溢氣壅脈熱肉敗營衛不行必將為

膿

濕傷肉風勝濕甘傷肉酸勝甘又云多食酸則肉胝脣而唇渴

久坐傷肉

形樂志藥病生於肉治之以針石

筋骨經曰肝主筋筋病無多食酸傷筋辛勝酸

又云多食辛則筋急而爪枯

爪筋之

骨也轉筋皆屬血熱四物

見加黃芩紅花蒼朮南星四千熱者用此

攀急痛痛松節二兩

細剉如米粒乳香一錢共放銀石器內慢火炒出火毒研末每服一二錢熟木瓜酒

調下者用此

要全善謂轉筋之時當隨其所痛之處燔針刺之以知為度愚謂用

因於寒

燈心蘸油燃淬可也而用發散者是促其危也 有飲食過當腿足或臂內癢脹浮腫作痛又責之脾胃補中益氣加茯苓半夏 足腿熱漸至腰膝蒼朮二兩酒黃柏熟地各一兩川牛膝歸尾草薢防己各五錢酒糊丸 脚弱無力及小兒不能行走天麻白附牛膝木鱉子各五錢烏頭炮一錢羌活五錢地龍一分乳香沒藥各二錢硃砂一錢酒煮南星末為丸每十九薄荷湯下 一切腿痛乳香官桂血竭丁香麝香各六分杏仁一分四釐斬艾一兩木香六分沉香四錢檀香四錢各為粗末捲紙捻用油蘸點着烏滅照穴道針之 腦痛足肚疼音淵足太陽膀胱病防風羌活紫蘇蔓荆之類 脚赤腫痛潰膿足三陽濕熱下注可治微赤微腫膿清足三陰虧損難治若黑暗不腫痛不潰膿煩熱作渴小便淋漓陰敗未傳急証急用八味丸着肉炙亦有生者濕熱下注隔蒜灸解壅毒次服補中益氣六味丸自愈 又四肢皆稟氣於胃胃血氣盛則善步胃血氣少足少肉善寒漸成痿厥足痺故足疾必用補中益氣不可不知 足跟痛足跟屬膀胱腎熱痛乃陰血虛極聖愈湯生地熟地當歸人參黃芪又經驗方牛膝一兩苡仁一兩五錢蒼朮七錢五分杜仲黃柏當歸石斛草薢木瓜葛根各五錢 足心屬腎或熱或癢痛虛水火或麻或腫脹虛火皆腎虛六味八味消息之又有足心如中箭發歇不時腎不虛而此腎之風毒滯腎則愈

餘詳臂痛厥逆掣抽

因寒因
俱可用

餘詳霍亂門

腎主骨寒則堅熱則腐骨病無多食

甘食甘積熱傷骨故過食甜而齒痛

齒者骨又苦走骨骨病無多食苦

久立傷骨

四肢經謂四肢為諸陽之本又云陽受氣於四肢又云陽氣者起於足五趾之表其說可疑人身陰陽之氣皆從臟府外達至於四肢故四肢為末今反以之為本謂陽受氣於此起於此可乎若云手之三陽從手走頭則足之三陽又從頭走足矣此等

疑義千古莫晰何也陽實則肢腫熱腫也陽虛則肢滿寒脹也脾主四肢脾實則四肢不舉濕熱盛也脾虛則四肢不用氣困乏也風淫末疾故四肢顫掉五

臟有邪留在支節經云肺心有邪其氣留於兩肘肝有邪其氣留於兩腋脾有邪心有邪其氣留於兩髀腎有邪其氣留於兩膝是也手心熱屬心與包絡手熱赤

瘡掌皮厚裂脾熱肝風也

脾主四肢
風淫末疾

加味道遙散加鈎藤熟地手足心腫風也花

椒鹽醋和敷之手足抽掣動搖弄舌吐沫不可遽作風火痰治其脈沉弱即是脾

虛生風之証宜大補歸脾湯最妙

臂發熱四物湯加秦艽丹皮白朮茯苓鈎藤甘草柴胡亦有怒動肝火小柴胡加川芎當歸亦可用加味道遙散膝屬脾胃肝

人逸則痿軟無力勞則痛如針刺脈洪數有力皆肝腎陰虛所致痿軟無力真病之形作痛如錐邪火之象六味加牛膝車前此証多有疑其風痰搐顫振脚氣各門

二陰詳泄瀉痢二便不通小便淋數黃赤遺尿不禁交腸關格赤白濁遺精陰痿陰

縮陰縱疝脫肛穀道痒痛各門

厥逆

仲景所謂厥逆與內經所言不同蓋仲景單就傷寒言以陰邪直中寒入三陰而手足冷者為寒厥陽邪傳經熱入三陰而手足冷者熱深入陽內髓不為熱厥蓋主外邪言不論寒熱証皆手足冷者也內經則指內傷言以上盛下虛氣血逆衝而上暴仆卒倒者為厥逆厥者盡也逆者上冲而欲脫也又分熱厥者手足熱寒厥者手足寒其不同如此仲景所謂熱厥寒厥及蛇厥藏厥等已詳傷寒論篇止就內經所論言之經云內奪而厥則為瘡瘍此腎虛也詳風門又云氣血並走於上則為厥暴死氣復反下子則生不反則死又云脈至如喘急促曰暴厥不知與人言即中風人証不又云陽並於上則火獨光陰並於下則足寒又云陽氣者煩勞則張氣高喘也精絕水虛辟積於夏使人煎厥辟積即襞積衣褶也有疊積意疊積至夏令則益熱而如煎如熬矣即中暑証又云大怒則血菀於上血隨氣上壅也使人薄厥薄者相迫之謂言氣血亂於胸中相迫而厥即中氣証也又云偏枯痿厥肥貴人則膏粱之疾也即中食証又云衝脈者臟府之海其上者出於頑頬滲諸陽灌諸精其下者并於少陰之經滲三陰下循跗故別絡結則跗上不動不動則厥厥則寒詳靈樞逆順肥瘦篇脉實通身經絡之所會歸故又性命之根本也根本一敗諸經皆敗然則卒厥暴仆豈止一經之所致哉又云邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會於耳中上絡左角左角也五絡俱竭稱血海與任督二脈並起胞中即丹田在女子謂之胞在男子為精室乃達於四支故冷也

謂脈為邪也。令人身脈皆動而形無知也。如死人所謂形其狀若尸曰尸厥。瘡疽其左角之髮不至也。方一寸燭治即燒灰存性也。飲以美酒一杯。血餘氣通酒通脉不能飲者口噤灌之立已。此即中惡証也。

已上經文與諸中篇中所言無異是經所謂厥逆者明以暴仆卒倒為言初不繫於手足之為寒為熱也。此其與傷寒論所稱固大異矣。然經亦有以手足寒熱為言者詳下文。

厥論謂陽氣衰於下則為寒厥。以陰氣起於五趾之裏而聚於膝陰氣勝則從趾至膝上寒。由此人質壯以秋冬奪於所用。於秋冬陽氣收藏之時。妄行托散其陽如被奪去也。陽氣衰損陰氣獨在故手足寒也。陰氣衰於下則為熱厥。以陽氣起於足五趾之表。陰脈者集於足下而聚於足心。故陽氣勝則足下熱。由其人數醉若飽以入房氣聚於脾中不得散食。在胃因房事傷其精氣不能運行也。酒氣與穀食相薄熱盛於中偏於身內熱則溺赤腎氣日衰水受陽氣獨勝故手足為之熱也。

詳此經文熱厥則手足熱寒厥則手足寒亦與仲景不論寒熱厥皆手足寒者異矣。

治法煎厥人參固本丸

薄厥蒲黃湯

戶厥二十四味流氣飲蘇合香丸

見諸葛中

蒲末火鼻

寒厥四逆湯

六物附子湯

灸陽輔絕骨

或酒水各半溫瀆至膝

熱厥

六味地黃丸

損見虛

小便三升溫瀆手足 另有痰厥即中風篇丹溪所云因於濕熱

生痰者也若是寒痰迷悶四肢逆冷而卒倒薑附湯見中寒 又氣厥分氣虛氣實虛

者即中風篇東垣所謂因於氣虛者也實者即中氣篇所言者是也 又有血脫之

厥大吐大崩多到卒倒宜先搗人中或燒炭沃醋薰鼻以收其氣急用人參一二兩煎湯灌之

然後依血証門用藥 有色脫之厥淫慾過度立即脫死者急搗人中令陰人擡定

用口相對噓暖氣通接之切勿放脫隨灸氣海數十壯飲以獨參湯如遲至三兩日

乃脫者精去於先而氣脫於後也亦灸氣海飲參湯

見傷飲食大醉則上盛下虛故卒厥

厥過飽適有感觸胃氣不行陽併於上上半身熱下半身冷脈中食上部無脈

見中食下部有脉

食暖誤行溫補則死此陽明氣逆故兩手不冷平胃加減保和丸並見

傷食

攀

攀者久不伸錮則難醫非如捕撻拘急暫病可比其理不外寒則收引熱則乾縮二端而寒者易治熱者難治何則寒雖收引而筋脈不枯但用溫熱之劑以去其寒則陽回凍解而縮者以舒不難治也亦有日久寒氣聚沫結痰包裹堅凝藥惟熱而乾縮者日久槁枯已定雖極力滋潤終難復元耳 热者多虛血液枯也亦有實者或為風寒所閉或為痰涎所滯血脉不得流通火性不受遏鬱激而暴發陡然攀曲蛇之動而攀曲觀脚之轉筋抽縮可見矣 寒者多實血液痰濕為寒所凝滯亦有虛

是其象也

者陽氣不足也 丹溪治一村夫背僂足攣已成廢人脈沉弦而濶用張子和煨腎散治之吐瀉兩月餘而愈

抽搐

準繩謂即癱瘓瘛拘急也癱弛縱也抽搐屬癱然亦微異蓋拘急者筋脈拘束緊急不得伸舒觀腳指受寒筋急可見抽搐則頻伸頻縮也

抽搐者手足頻頻伸縮也或言抽搐者搦謂十指頻頻開合兩拳緊握也証屬風火風火為陽邪主動而不寧其不為躁擾而為搐搦者血枯筋急也若妄加灼艾或發其表則死不旋踵小兒急驚風多此証宜瀉水火涼驚丸主之 血虛續斷丸 肝邪盛宜救脾者小建中湯見勞加減 熱傷元氣人參益氣湯見血氣虛弱內火盛後血虛發熱熱盛生風得此八珍湯見虛損 加丹皮鈎藤以生陰血不應兼補脾胃以生血小兒吐瀉後脾胃之陰氣虧損成慢驚風者亦多見此為虛風虛熱若更陽氣虛陷其風火尤為無根之虛談虛者十全大補見虛損 加桂附陷者補中益氣湯見加桂附此等陽虛之証肢體惡寒脈微細為真狀若脈浮大發熱煩渴為假象不可泥於証屬風火一語以為實邪也若戴眼反折汗出如珠不治按血枯筋急恐未盡然

與小兒驚搐咬牙掙拳形狀相同可知此証必因風火內攻有難于禁當者故有此抵觸情狀風火忽動忽息故搐搦有作有止若果由血枯筋急則應縮多伸少兩拳常控且不必有咬牙情狀矣 抽搐風木曲直之象也 握搦咬牙病人禁當之情也

顫振

顫搖也振戰動也亦風火搖撼之象由水虛而然水主靜虛主風火虛脾為四支之本四支乃脾之末故曰風淫末疾有頭搖動而手足不風火盛而脾甚如綿引傀儡以防風通聖散見中汗之繼服涌劑吐痰一二升又下行五七次數

風見中汗之

虛則不能行其津液而痰濕亦停聚當兼去痰子和治馬叟風搐三年掉顫抖攬之

動者木氣上冲也風火盛而脾虛則不能行其津液而痰濕亦停聚當兼去痰子和治馬叟風搐三年掉顫抖攬之

日又再涌去痰三四升又下數行乃愈但覺極寒蓋衛氣未復也以散風導氣藥調之不用溫熱恐又動火故也風火交盛者推肝丸氣虛者參术湯氣虛不能周所鼓動心血虛者補心丸挾痰導痰湯見加竹瀝老人戰振定振丸

脚氣

酒風脚

腿腕瘡

腳跟注孔

腳氣之名始於晉蘇敬上古所無然其腫痛頑麻即經所謂痺也縱緩不收即經所謂痿也甚而氣上冲心腹即經所謂厥逆也病由濕致或水濕外侵或水飲內注其初多寒止見頑麻其後濕鬱成熟遂為腫痛濕熱蒸發則腫血氣壅滯則痛也若加以風寒外襲則熱愈不得泄而痛益甚矣兩脚之氣血既壅滯不行則周身之氣血亦不宜通鬱而發熱氣不宜通則不周於表故洒洒惡寒而証類傷寒矣縱緩不收者筋得濕熱則軟而無力也凡物之濕甚而上冲者下不通則反乎上也治法須分濕熱多寡濕多熱少則腫甚而痛微濕少熱多則腫微而痛甚亦有單濕而無熱者但腫脹而不痛俗名濕脚氣單熱而無濕者但熱痛而不腫甚者俗名乾脚氣雖

無濕亦必有老疾

初起止覺冷凍頑麻而腫炎患處二三十壯以引濕氣外出更飲

驅濕藥酒以通經散邪用藥宜麻黃川烏薑附之屬麻黃發散使濕從外泄川烏辛

熱走而不守以通行經絡薑附以散其寒羌防升麻葛根輩以升散之風勝濕也二

术以燥之土尅水也兼用二苓澤瀉輩以利之此治寒濕之大法也

苡仁酒獨活寄生湯可用

若初起止覺熱痛不腫乃三陰血虛陽邪下陷成熟不散血脈不通而痛也無濕故不

腫治宜清熱養血四物見六味見虛損並加牛膝黃柏知母又用補中益氣湯見氣以升

提陽氣之下陷此治虛熱之大法也 實熱則兼濕痰腫而痛也便結者羌活導滯

湯微利之後服當歸拈痛湯見身痛身有寒熱者加味敗毒散後服當歸拈痛湯痛

見身痛身有寒熱者加味敗毒散後服當歸拈痛湯疼如火燎熱至腰胯加味二妙丸

痛不可忍者五積散見中寒加全蝎三個酒煎大抵濕熱壅塞治宜宣通活絡丹見中

最妙邪深伏者非此不能透達若壅塞既成須砭惡血以殺其勢而後藥之

見中風此証

須分經用藥前簾為陽明白芷升麻葛根為引後簾為太陽羌活防風為引外簾為

少陽柴胡為引內簾為厥陰青皮川芎吳茱萸為引內前簾為太陰蒼朮白芍為引

內後廉為少陰獨活為引 又須察其有無外感感風則自汗感寒則無汗並加發

散之品風加羌活防風若病甚而上攻少腹不仁或見食嘔吐腰脊身體俱痛胸脇

寒則麻黃細辛但見少腹不仁不過二三日即上攻心心煩氣喘嘔逆頭痛眩冒不

痛則為重証

得眠譖妄目額黑汗大出脈短促而數左乍大乍小乍無尺絕者皆不治所謂冲

心即死也今列數方於左 丹溪用四物湯見血虛者宜之加炒黃柏另以附子末津調傅湧泉

穴安艾灸之以引熱下行見血虛者宜之金匱八味丸見虛損者宜之治腳氣上入少腹不仁

腎寒濕氣

者宜或茱萸丸茱萸木瓜湯 檳榔為末童便調服 大腹子散 三脫散 桑白

皮散已上實者宜之犀角散熱者宜之沉香散無熱者宜之紫蘇葉三兩桑白皮炒二兩前胡

去一兩每服八錢檳榔二枚杏仁去皮尖二十粒生薑五片水煎湯服 蘇子降氣湯

佐以養正丹或四磨飲並見氣急者宜之八味平胃散見吐者宜之畏食者生料平胃散見傷

飲並加木瓜一錢 半夏散 橘皮湯已上嘔逆惡心者宜之嶺南人嗜酒者每多病此名酒

風脚由酒之濕熱傷脾不能運化因而下墜結為痰涎不得解散所致其痛不可忍

雖蚊蠅着脚重若石壓治此鮮有效者蓋利濕清熱易而去結痰難也準繩載治廉

平章患此初用當歸拈痛湯見身痛二服效後食濕麵復發以羌活辛溫透關節去濕

為君當歸辛溫散壅枳壳苦寒消食為臣大黃苦寒導濕麵下行並利留結老血為

使全愈又云控涎丹見癥加臙脂一錢檳榔木瓜各一兩卷柏半兩先以鹽水煮半日又用白水煮半日

同為丸每服三十丸加至五十丸利下惡物立效又云威靈仙為末蜜丸桐子大酒

下八十九丸利出惡物如青膿桃膠當倣其意而用之先去其濕熱使氣血得通次以

升柴等輕清之藥提拔痰涎上行以控涎丹及諸軟堅消結之品取之更研去其惡

血可也 活人書云脚氣忌服補藥禁用湯淋洗按此為邪氣壅實者言故忌補又為濕氣太盛將欲上冲者言恐淋洗蒸動其濕助之升騰也若濕正沉墜在脚不能外達正宜淋洗以導之外出用防風荆芥威靈仙草烏川椒白芷烏藥蒼朮紫蘇之屬煎湯熱洗可也 兩脚須常護令暖有微汗仍不時令人按揉飯後常自行動以散泄其濕熱為佳夜飯宜少不食更好蓋夜食難消最能壅滯氣血也 脚氣有腿腕生瘡者腫痛用漏蘆白歛五加皮槐白皮甘草各七錢半蒺藜子二兩水煎去渣於無風處洗之心神煩亂者犀角散 脚跟注一孔深半寸許每下半日痛異常以人中白火上煅中有水出滴入瘡口

赤白濁

有精濁有便濁 精濁出自精竅與便濁之出於溺竅者大異其出不因小便竅端時常牽絲帶膩如膿如眵頻拭頻出莖中或痒或痛甚如刀刮火炙大抵初起大盛則痛日久火微痒而小便自清不相混也多由房事時精已離位或強忍不泄或被阻中止離位之精化成敗濁流出竅端故如膿如眵其氣臭腐又不泄則腎火鬱而不散敗精挾鬱火以出故莖腫竅溢而痛也日久敗精盡出則止矣而不止者雖火勢已衰但病久滑脫已敗之精與未敗之精相引而出故源源不絕也若火勢不衰或反盛者則併其未敗之精亦鼓之使出甚者精已枯竭併其未及化精之血亦出故有赤濁也精

血化觀天癸初至之子強力其後火勢亦衰証轉虛寒者有矣舊分赤濁為熱白濁好色所泄半精半血可見矣

為寒非也若寡慾之人患此多因濕熱流注精房精為所逼不得靜藏所致與濕熱遺精同理熱者清心蓮子飲寒者草薢分清飲虛勞者滋其陰胃弱者參术加升麻柴胡濕熱流注二陳見傷加白朮升柴感暑熱者四苓見傷加香薷麥冬人參石蓮肉白濁初起勢甚敗精結塞竅道澁痛異常五苓見傷妙香散合清心蓮子飲白濁清火為主補次之赤濁補為主清火次之清心健脾滋腎固脫缺一不可清濁飲主之

便濁多是胃中濕熱下流傷氣分則白即膏淋也便濁飲主之傷血分則赤即血淋也多者為尿血治詳淋証及血門洩血條

遺精

精者一身之至寶原於先天而成於後天者也精者水也天一生水原於有生之初而成立於水穀之滋長五藏俱有而屬於腎靜則藏動則泄靜者水之德動者火之用火不勝水故在平人大雖動而非與內接則亦不至於泄也若水極虛火極炎則心有所感雖不交亦泄矣夫必交乃泄者亦必寐且夢交乃遺可知也不必交亦泄者亦不必夢交與寐乃遺可知也故有不寐之遺與寐而不夢之遺寐而夢交之遺宜分別論之夢交何也曰相火客於陰器也陰器為客火所動動則舉舉則欲交故夢接內也使火不客於陰器

則但為他夢矣然有有慾無慾之分焉無慾念而夢交者志壹則動氣也氣動志者夢不必遺志動氣者夢無不遺相火獨肝腎乎曰足三陰陽明之筋與衝任督三脈之所會諸筋皆結聚於陰氣則諸經之火皆得客之矣豈特肝腎為然哉以腎主精肝主泄故歸重此二者耳治者當審其所由致可也

有腎水虛而火炎者滋陰降火為主 有肝氣鬱滯而火盛者散鬱升陽為主 有脾胃濕熱下流者除濕清熱升清為主 有用心過度而火熾者清心養血為

主有肺感外邪或悲哀所傷而動火者散邪清肺為主此皆易治久曠之人盛滿而溢者更不用治惟思慕色慾者為難非斬斷情根滌除妄念雖藥亦無濟也 若乃不寐亦遺慾念一萌即泄 與纔寐不待夢交即遺則精滑之至也或房事過多而滑或夢遺

曰久而滑或虛寒不固而滑氣不攝精 比之夢遺為甚矣然其治法亦無異也鎖精丸固

本丸金櫻丸鳳髓丹固真散用心過度心不攝腎者遠志丸用交感湯加蓮肉五味

子吞下仍佐以靈砂丹吐嘔 思色不遂精以離位客於陰器至卧而夢泄者四七

湯親吞白丸子見中風 中甚者耳聞目見聞見其聲容也 其精即出名曰白淫妙香散見赤

吞玉華白丹 色欲過度下元虛憊泄滑不禁鹿茸丸見山藥丸 腰痛大兎絲子丸

見咳 固陽丸之類按此等皆熱劑 非虛寒勿輕用 五倍瀆精敏於龍骨牡蠣 交通心腎菖蒲遠

志蓮子 不可少 古方多治鬱滯庸醫誤用瀆劑一少年遺濁少腹有氣上冲肝氣

逆 每日腰熱腎火知其有鬱先用滾痰丸見大下之次用加減八物湯吞滋腎丸見

小便大下之次用加減八物湯吞滋腎丸見

不百粒若稍用蛤粉等滻劑則遺濁更甚遂改用導赤散見發大劑煎服遺濁皆

止又一男子夢遺與滻藥更甚因與神芎丸見腫脹大下之却製豬苓丸與服而愈

脾胃濕熱下流者蒼白二陳湯見濕加黃柏升柴

火大熾者清心使火不妄起遠

志丸伏神湯

一人勞心讀書致此卧時陰器但着被與腿即夢交而遺懸空則不

夢蓋用心太過血虛火炎腎水亦竭火客下焦鼓其陰房精不得藏陰氣着物如得

接然故作淫夢而遺上則補心安神中則調其脾胃升舉陽氣下則益陰固精病隨

安

此等當以六味歸脾補中之屬主之

一人年六十患瘧噦誤治致濕熱下盛脈數而有力與補中

益氣

見加涼劑續與黃柏丸尺脈頓減問之曰夜來夢交否曰然幸不泄曰年老精

衰固無可泄然火之結於精房者得藥已散走於陰器之竅病可減矣再服二日又

夢其瘧噦全愈亦有鬼魅相感者其牀不欲見人如有晤對時獨言笑或時悲泣

如痴如呆是也脈乍大乍小乍有乍無左右互異治以硃砂雄黃麝香鬼箭虎頭骨

之屬喻嘉言治祟方亦佳

方見中惡門論末

以滻治脫不止不如瀉心瀉心不止不如升

陽升陽最妙腎氣獨沉者宜升脾濕下流者宜升肝鬱者宜升不止一途也思想

氣結成痰迷於心竅猪苓丸之類利其痰經絡熱而得者作虛寒治則愈甚清心

丸一人至夜脊心熱夢遺用珍珠粉丸猪苓丸遺止終服紫雪

見篇末

吞熱始除又有

腰熱遺精者用滾痰丸下之又用導赤散治其火乃愈知者有熱而遺者多為

熱遺也心神浮越水火不交而滑泄者鎮固之秘真丸八仙丹之屬

精脫玉闕不閉者急用八味丸或金鎖正元丹

遺証初起未有不由大盛者久則大
致寒者脈多緊濇寒藥火於下焦也當先升提若脈
沉遲是下元虛冷惟亟與溫補仍升提以挽其下趨

有一種肝經濕熱甚者莖中作痛或挺縱不收白物如精隨溺而下此筋疝也龍胆瀉肝湯主之

此為白濁之類

紫雪方黃金百石膏寒水石磁石滑石各三斤碎共用水一斛煎至四升去滓入犀角屑

羚羊角屑青木香沉香各五分參升麻各一斤

甘草炒兩

八丁香一粒煮取一斗五升去滓

入朴硝精者十斤消石每升重七兩七錢半亦可微火煎柳木櫬不住手候煎至七升投水盆

中半日欲凝入麝香當門子一錢半飛硃砂三錢半攪勻候冷成霜雪紫色冷水調服一二錢

小兒量減能治煩熱狂躁兼解諸熱藥毒及小兒驚癇等証按咽喉門有紫雪散

與此大同小異當參之

陰痿

陽動則舉陰靜則痿雖無慾亦然

觀子兒子夜峻作可知

況有心者乎然而不舉者則氣不從

心也其故有六一則天稟使然而不可強者也一則有所恐懼而氣餒也一則神搖

火飛氣上不下也此皆無病之人也一則濕熱太盛下注宗筋弛縱不收也一則耗

散過度命門火虛也一則腎水虛衰熱盛壯火食氣也

薛立齋所謂如木得露則立遇酷暑則痿瘠也蓋水火

和平則舉有水無火無水及水大者知柏八味丸並見濕熱固真湯柴胡勝濕湯其証多有陰汗臊臭兩股熱者或反蓋濕熱在臟府熱親上火上炎不下交者降之恐懼者鎮之而濕下流故証如此也

陰縮陰縱

陰受寒則縮受熱則縱

傷寒囊縮陰証固有之熱証亦有以熱灼筋燥故縮也但以平人論則縮必因寒觀夏月囊軟縮冬月囊硬縮可知矣

丹溪治鮑姓莖挺長腫痿皮揭濕潤磨股不能行兩腸氣上手足倦弱以小柴胡加黃連大劑行其濕熱畧加黃柏以降其通上之氣挺腫收減但有堅塊未消又以青皮為君佐以散風之藥夫服外以絲瓜汁調五倍末傅之愈 濕熱挺腫朴硝荆芥煎湯浸洗甚者三一承氣湯見大便不通下之

疝

暎丸連小腹急痛曰疝或無形無聲或有形如瓜有聲如蛙小腹陰囊暎丸皆肝經部分蓋肝經筋脈環陰器而上抵小腹也故張子和謂此為肝經之病肝主筋暎丸非肝筋環引與玉莖無由伸縮經謂足厥陰之經筋聚於陰器傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收又言足厥陰之別曰蠡溝循脰上暎結於莖其病氣逆暎腫卒疝可見矣俗稱膀胱冷或曰腎冷腎氣通於外腎膀胱系與暎丸系會也或曰小腸氣皆非也膀胱為水府小腸為水道專主滲泄通流腎統二水皆與筋無涉雖經有言邪在小腸連暎系

屬於脊貫肝肺絡心系氣盛厥逆上衝腸胃薰肝散於肓原以散之刺大陰以平之取厥陰以下之乃知疝必關於厥陰無疑又謂三陽膀胱為病發寒熱其傳為癲疝此亦言膀胱非受病之處必傳於厥陰部分乃為疝也又言脾風傳腎病名曰疝瘕小腹冤熱而痛出自白精濁也風者熱也一名曰蠱強中入房所感也曰風則屬之肝木可知矣已上當疝非膀胱之病又云厥陰滑為狐風疝精得濕熱為敗濁太陽滑為肺風疝金燥則熱少陰滑為肺風疝水生風也太陽滑為腎風疝火勝膀胱與腎為表裏也少陽滑為肝風疝皆言風者厥陰木氣之所主也又云心脈滑為心疝肝脈腎脈滑甚為瘡瘍亦以滑為疝也意謂上條言滑乃風疝之脈則又云脈大急則為疝心脈滑搏為心疝肺脈沉搏為肺疝搏急非肝邪而何又云督脈生病從少腹上衝心而痛為衝疝蓋足厥陰與衝任督俱會於前陰也然則疝為肝病豈不明哉已上言諸經之疝皆歸於肝也按子和以疝病屬肝部分甚是然各臟府經脈相通有由肝經自病者則亦有由諸經之病傳注者其論中所舉已自可見況經又有云足陽明之筋病瘡疝腹筋急足太陰之筋病陰器紐痛小腸病者小腹痛腰脊控掣而痛腎下則腰尻痛不可以俯仰為狐疝寸口脈沉而弱曰寒熱及疝瘕少腹痛黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣曰厥疝其詞不一而足此當細察蓋肝經為朝宗之地少陰太陰陽明少陽太陽諸經亦會

各經為發源之區源流並究可耳 再按張子和以疝屬之肝趙以德則又

屬之任脈謂衝任二脈起於胞中諸經皆受氣於此因以海名之二脈通則陽氣下降陰氣上行塞則陽壅於上陰結於下其所以閉塞者或任脈之自病偏寒偏熱或各經病邪相犯致任脈結滯陰氣不化使然引經任脈為病男子內結七疝女子帶下瘕聚為據其說甚有理然衝任督同體何不併舉乎竊謂諸經之邪皆得傳注衝任督三脈而結於肝經部分為疝則諸說皆會通矣 再按趙以德謂疝有二不必小腹痛引睾囊乃名疝但心腹痛即名為疝引巢氏七疝為據一曰厥疝厥逆心痛飲食吐不下也二曰癰疝腹中氣乍滿痛氣積如臂也三曰寒疝飲食寒冷即脇下腹中痛也四曰氣疝腹中乍滿乍減而痛也五曰盤疝腹中痛在臍旁也六曰腑疝腹中臍下有積聚也七曰狼疝小腹與陰相引而痛也趙氏蓋以上六疝止言腹脇痛而不及睾囊故謂心腹痛即名為疝庸詎知其非省文乎今定以小腹痛引陰丸為疝庶免岐惑又子和謂遺瘻滑濁陰瘻胞瘻皆男子之疝血涸不月經后腰膝上熱足蹙嗌乾瘻閉小腹有塊或定或移前陰突出后陰痔核皆女子之疝但女子不曰疝而曰瘕蓋皆肝經任脈之病故云爾

疝病之由人皆以為經絡得寒收引不行而作痛

丹溪謂是始於濕熱鬱遏又感外寒濕熱被鬱作痛其初致濕熱之故固太勞而火起於筋醉飽而火起於胃房勞而火起於腎大怒而火起於肝火鬱之久蒸為盛濕濁液凝聚併入血隧流於厥陰肝火性最急暴為外寒所束宜其痛暴而甚也痛者熱

氣之衝擊腫而重墜則濕之為耳

虛亦腫但不甚墜耳

左丸屬血諸寒收引則血泣故左丸

痛多而腫少右丸屬氣諸氣鬱蒸則濕聚故右丸痛少而腫多張子和分七疝一曰

寒疝囊冷結硬如石陰莖不舉或控引睾丸而痛得於坐卧濕地或寒月涉水久而無子宜以濕劑下之二曰水疝腎囊腫痛陰汗時出或囊腫如水晶或囊痒搔出黃

水或小腹按之作水聲得之飲水醉酒使內過勞汗出遇風寒濕之氣聚於囊中宣以逐水之劑下之三曰筋疝陰莖腫脹或潰或膿或痛而裏急筋縮或莖中痛痛極

則痒或挺縱不收或白物如精隨溲而下得於房勞及邪術淫方所致宜以降心火

之劑下之四曰血疝狀如黃瓜在小腹兩旁橫骨兩端約文中俗云便癰得於重感春夏大燠熱則流溢勞動使內氣血流溢滲入脬囊結成癰腫膿多血少宜以和血之

劑下之五曰氣疝上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒則氣鬱而脹過後氣散則消者是也宜以散氣之藥下之小兒亦有此疾得於父已年老或年雖少而多病陰痿精怯勉強入房有子此胎中病不可治也築賓穴言之六曰狐疝狀如瓦卧則入小腹行立則下入囊中狐晝出穴夜入穴與相似故名今人帶鈎鈴者是也宜以逐氣流經之藥下之七曰癩疝陰囊腫墜如升如斗不痒不痛者是也得之地氣卑濕所生潮濕之鄉多感此疾宜以去濕之藥下之女子陰戶突出雖亦此類乃熱則不禁固也不可便謂虛寒而濕之燥之本名曰瘕宜以苦下之堅之

按子和於七疝皆言下之者以內有濕熱

實証不通也然必有此
乃可下耳不可泥

趙以德云子嘗病脾肺濕熱流入右丸腫大寒熱交作雖
張子和言疝病在下當下不當吐然脾氣下陷必升舉之因先服調胃之劑一二貼
次早注神使氣至下焦嘔逆而上覺肋下積動到中焦則吐而出之腫減半次早復
吐吐後和胃氣疎通經絡而愈凡用此法治傷酒水注右丸腫者輒效

治法內寒者當歸溫疝湯外寒入腹者烏桂湯內熱者川烏頭炮梔子仁炒各
三錢煎服濕熱受外寒十味蒼柏散水疝尿不利茴揀五苓散瘕硬血疝大黃皂刺
湯衝疝厥疝奪命湯氣疝諸疝走注痛者青木香丸神效狐疝及一切疝茴香揀實
丸婦人產後血分受寒疝者羊肉湯諸疝灸大敦穴即安尊生書謂治法斷
不宜補薑橘同煎補肝細辛閉肝氣必禁虛亦須補疝脈必弦急忌微弱亦有挾虛
者脈雖沉緊必豁大無力其痛亦輕但重墜牽引耳人參牛膝可用餘皆作實治破
疝湯主之木香玄胡橘核荔枝核茴香川棟子沒藥地膚子青皮馬鞭草根煮汁煎
寒疝加吳萸附桂亦有單丸升上入腹者加飛鹽沉香或用雞鵝蛋壳燒灰空心酒
下三錢二服壓至故所亦有脇旁動氣橫入陰處響聲如蛙墜下照前方去鹽沉水
疝有一丸漸小竟消盡成獨丸者沉沉牽小腹作痛水疝湯白茯苓草薢澤瀉石斛
車前各二錢臨卧及五更各一服外用帶鬚葱一大把煎湯洗單丸頻添熱湯以手
撓之即在湯內撒尿其病易去若囊破水流竈心土糁之狐疝晝夜安氣病血不

病也不宜辛香流氣之劑補中益氣湯見氣加知柏虎骨治之血疝丸偏大宜和血

四物見血加桃仁玄胡橘核於夜分時一手托下一手按上由輕至重九弄百迴彌月

瘀血盡散筋瘤莖筋掣痛得之房術者宜解毒緩急甘草稍黑豆五梧同煎服癩疝

五苓散見漏傷加葱白茴香鹽若丸腫如斗不痒不痛者得之有生之初無治法又有

木腎頑痺硬大或痛或不痛者是也由寒冷凝滯當溫散破疝湯加海藻昆布川椒

附子外用艾炒熱裹丸冷則頻換 痘由小腸經得者舊名小腸氣又名橫弦堅弦

遼臍走注小腹刺痛喝起湯救痛散由膀胱經得者舊名膀胱氣毛際上小腹作痛

五苓散見漏傷加川棟子形如瓜聲如蛙木香神效散 偏墜不拘左右川棟木香茴

香蒼术石菖蒲為丸每服三錢空心鹽湯下安卧片時微汗即止左邊痛不可忍茹

神散外腎脹大麻木痛硬七治金鈴丸 偏墜藥不愈用草麻子每歲一個研爛貼

頂門以繩縛兩足中指合縫處艾如麥粒大炙七壯即時上去隨去草麻 肛門陰

囊腎莖痒甚拆破好了又痒人言熬醋洗立愈 外有發熱忽生瘡腮瘡腮愈墨丸

脹者耳後屬胆胆受風熱生瘡腮移熱於肝故墨丸腫加味逍遙見醫入防風荆芥青

皮

脫肛

氣虛不能收者宜補氣以升提之血虛加血藥寒者以香附荆芥等分煎湯洗若大

腸受熱而突出者朴硝煎湯洗之腸風者涼血清腸散
而出托而虛而挾熱者槐花散薄荷散 日久不愈常宜服收腸養血和氣湯更須
瀉之龍骨散瀉腸散 外用五倍末糁蕉葉上托之數次即不復脫 生鐵三斤水
一斗煮取五升洗內服磁石散 一法鱉頭燒灰塗

穀道痒痛

多因濕熱生蟲欲作痔瘻以雄黃入艾棉燒烟薰之并納蟻螂丸蟻螂七枚五月五
日收去翅足災為末新牛糞五錢肥羊肉一兩炒香共為丸如棗肉大災令熱新棉
裹納穀道中半日莫喫飯蟲即出三五度瘥 杏仁搗膏傅 桃核一斛蒸極熱
納小口器內坐薰之蟲即死 木鱉子肉四五枚研如泥沸湯沖洗另用少許塗患
處

怒

陽為陰閉不得伸則怒如雷之奮於地也震為雷陽在陰下陰雨則雷動陰雨以氣
言之則寒也以象言之則水也水者有形之物也故人身陽氣或為無形之寒氣所
閉或為有形之痰血所遏皆不得伸而鬱為怒經謂血併於上氣併於下則善惡是
也東垣以食填太陰為木鬱用吐以達之亦此理也 陽氣主外屬肝胆故雷發於春陽主舒遇怫逆之事則
不得舒而怒亦鬱遏之義也 怒而不得發者發之 怒而屢得發者平之經曰悲

勝怒

太息

經曰憂思則心系急急則氣道約約結而不行也憂思鬱結則氣不行志為氣帥自人之偏故太息以出之舒之氣盛而鬱則為怒氣不盛而鬱則為太息觀經謂胆說耳病者氣不得升善太息口苦嘔宿汁可知太息之與怒同屬於鬱矣

喜笑不休

笑由於喜喜屬心則笑亦屬心經曰心藏神神有餘則笑不休神即心火也觀於火燔燾甚則鳴笑可知也燭笑而光搖人笑而氣浮子和以燒鹽滄鹽二兩火燒通赤探吐熱痰及黃連解毒湯而愈水尅火寒勝熱也

悲

悲屬肺悲則氣降肺主降故屬肺也仲景云婦人藏燥則悲傷欲哭象如神靈所作無故而哭即本人亦不知故如鬼神所憑也小麥一升大棗十枚水煮服子和診一婦問曰娘子常欲痛哭為快否婦人曰然子和曰火灼肺金受鬱制無所投告肺主悲故欲痛哭也投黃連解毒湯見喜而愈

喻嘉言診姜宣人大腸血枯燥曰病中多哭泣否曰然蓋大腸與肺為表裏大腸則火熱於肺也

驚

遇事而驚者由於外也因病而驚者動於中也心為熱所乘則動而驚而屬之肝胆者以肝主動而胆虛則善驚也膽小及胆大而虛者皆善驚由血液不足也血液者水也水主靜水足則靜而不易動故不驚心肝賴血以養血虛則心之神無所依肝之魂亦不藏謂陽明病者惡人與火胃熱則惡人之擾與火之熱不得安靜清涼也聞木音則惕然而驚木生火而舉陽明可概其餘矣內火之驚脈多浮數外事之驚脈多浮動動脈如豆搖搖不定是也黃連安神丸驚則氣上以重墜之藥鎮其浮越丹砂龍骨之類由於火盛血虛者甘寒滋潤之劑以瀉心補血驚則心神出而舍空液入成痰拒其神不得歸而驚不能已十味溫胆湯養心湯壽星丸見狂飲加辰砂遠志驚由於火而致大多端有五飲停蓄鬱成火者五飲湯丸見痰飲由濕鬱成熟者羌活勝濕湯見傷濕因寒而鬱成熟者散寒火自退熱鬱有痰寒水石散氣鬱有痰加味四七湯睡卧不安時時驚覺者溫胆湯加棗仁蓮肉以金銀同煮吞十四丸或鎮心丹遠志丸驚者平之子和謂平乃平常之義如聞響而驚者常擊物作響使習聞如平常則不驚矣

悸 即怔忡

悸者心築築惕惕然動而不安也

俗名心跳

一由血虛血虛則不能養心心氣常動幸無

火熱相乘故不至於驚而但悸也若血不虛而動者則為心火盛亦有腎火主動

也幸血不虛故但動而不驚此驚與悸之別也一由於停飲水停心下心火為木所

逼不能下達而上浮故動而不安也

必有氣喘之正腎水上浮凌心義亦如之而治有異

飲食

所停之水宜疏導腎陰上泛之水宜益火

但思慮即動者屬血虛時作時止者痰因火動有失志

之人由所求不遂或過誤自咎恨歎不已獨語言空則心不息不安時常勞動而怔

忡作矣溫胆湯驚去竹茹加人參柏子仁各一錢下定志丸仍佐以酒調辰砂妙香

散見心痛有痞塞不思飲食心中常有所歎愛處暗地或倚門後見人則驚避似失

志狀心常跳動此為卑憊之病以氣血兩不足也人參養榮湯虛損飲食少者嘉禾

散見瘧加當歸黃芪各一錢

恐

恐者心有所怯也蓋心氣虛使然而屬之腎者恐則氣下故屬腎也經曰精氣併於

腎氣本親上今因虛而下與精血併居腎部則恐是也又屬之肝胆者以肝胆之氣旺則上升虛則下降

今恐而氣下是肝膽之氣不足也故勇者謂之胆壯怯者謂之胆小張子和曰驚

者不自知因外有所觸而卒動恐者自知不能獨坐安卧必須人為伴侶驚由血

虛恐因氣怯此大概也恐亦有由血虛者熱傷腎陰水涸血虛復為火所擾則志昏

惑而不定腎藏志志者心之定向也腎屬水水清故體物分明明則不惑生定也火擾之則濁濁則昏暗又火為熒惑故昏惑也不定則不靜

故恐恐亦心之動也故孟子言不動心以無懼為訓驚恐常相因恐則驚矣驚則
恐矣驚則安其神恐則定其志心之神下交則腎有所主而志定即坎中之一陽
也腎之精上奉則心有所滋而神安即離中之一陰也丹溪治周本心病恐如人
將捕之夜卧不安口乾飲食不知味以參朮當歸為君陳皮為佐鹽炒黃柏炙玄參
各少許煎服月餘而安經云恐傷腎恐則退却而下則精傷矣精傷則腎氣亦虛而陰
證皆作矣故用柏立引之入腎以補之人參散茯神散補胆防風湯皆治胆虛

健忘

水清明而火昏濁此智愚之別水靜而神藏火燥而消亡此存亡之殊故性靜則心
如止水情動則心若亡猿煩擾外馳存乎中者幾希矣存乎中者幾希則語後便妄
不俟終日縱復追憶邈若山河惟當夜半雞鳴牿亡之餘靈明復蘖日間所作所言
所誦皆歷歷能記由是言之藥雖有安心養血之功固不若自為存養之為得耳
七情五志動即為火皆足擾我安靜之神而痰閉血鬱又無論矣若乃精神衰短心
惛然不能須臾苟非者而遺忘何以天奪其魄牿之反覆夜氣不足以存此孟氏所
為致歎於牛山之本也思慮過度心血耗散不任思索每追憶心火即動如油
竭之燈倏然燄大即滌慮凝神收斂久之乃畧甯息歸脾湯見有痰加竹瀝痰迷
心竅者導痰湯見狂癲吞壽星丸見狂精神短少者人參養榮湯見虛讀書勤政勞心

者安神定志丸 心腎不交者朱雀丸 孔聖枕中丹 菖蒲一枝苓茯神人參各五遠志七為末服如上法 商陸花陰乾百日為末暮服方寸七 汪軻菴曰金正希先生嘗言人之記性皆在腦中凡人外見一物必有一形影留在腦中小兒腦未滿老人腦漸空故皆健忘愚思凡人追憶往事必閉目上瞪而思索之此即凝神於腦之意也案此說甚善腦者髓之海腎之精也在下為腎在上為腦虛則皆虛此証之為腎虛信矣易曰智以藏徃智於五行配水屬腎腎虛故不能藏也

煩躁

煩者心煩亂不安躁者手足擾動不寧也大概皆火之為病五臟之火皆令煩躁故或言心熱或言脾熱肺熱腎熱肝熱也而有分煩為陽躁為陰者以陽火內生心為熱所乘惡其擾亂故煩悶非甚而狂越則不必手足之擾動蓋火在內而不在外也若陰寒內生逼陽於外中寒而外則熱熱在外而不在內故但手足躁擾而心不必煩也此陰陽以寒熱分也又心火為陽火盛則煩腎火為陰火炎則躁此陰陽以心腎分也又人將死則手足擾亂急遽毫無和緩之象此與真藏脈弦強挺動毫無胃氣同理是名鬼躁亦陰象也 煩有實有虛虛煩者或氣虛或血虛也血虛則無以養心而怔忡不寧不得寐則煩矣氣虛則火旺東垣所謂邪火與元氣不故乘心而煩也治法熱在心兩立此衰則彼旺是也故乘心而煩也治法熱在心肺起卧不安宜梔子豉湯竹葉石膏湯竹茹湯硃砂安神丸 下利後更煩梔子豉

湯身熱汗出煩不解名風厥太陽傷風則發煩熱曰風少陰之熱亦上冲故汗出不解曰厥經謂表裏刺之太陽為表
太陰為裏飲以湯止其上逆之氣也仲景麥門冬湯之煩而心手極熱喜居陰處脈沉口渴妙香丸下其熱痰不得眠溫胆湯見酸棗湯見不津耗者生其津血耗者補其血腎水竭者滋腎產痘滯下後血液耗散心煩不安危矣猛進獨參湯心中蘊熱清心蓮子飲見赤白湯虛煩有身熱與傷寒相似但頭身不痛不惡寒脈不緊為異陰躁欲裸衣坐井中以熱藥治之四逆見厥理中見中之類

嘈雜

俗名心嘈其証似飢急欲得食心中擾擾不寧如酸如辣似慌張由肝火乘於脾胃土虛不禁木搖故煩擾不安火盛則穀易消食已則飢得食則安少頃又飢又復嘈矣此為火嘈宜清火若有痰飲停聚似飢非飢欲食而不能多食脈滑為痰嘈宜化痰若兼吞吐酸水乃痰飲與火所為清火去飲兼治總宜補土為主六君子湯見加氣減久不愈者養血以火盛則血虧也故思慮血虛五更嘈者及婦人嘈雜恒用四物見加血加減

不得卧

臥屬陰屬靜陰虛有火則動擾故心煩而不得卧也經謂衛氣日行於陽則寤夜行於陰則寐因厥氣逆氣也諸逆冲上皆屬於火即陰火也客於臟府則衛氣不得入於陰不得入息故目不

晉書

卷之三

瞑又曰胃不和或熱則卧不安皆此義也 虛勞虛煩不得卧酸棗仁湯 骨蒸煩心不得眠酸棗仁一兩水一大盞半研絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一合更煮過不拘時服已上 溫胆湯見驚治大病後虛煩不得眠 流水千里外者八升揚之萬偏取其清者五升煮以葷薪火沸入秫米一升北人謂之黃米可以釀酒製半夏五合炊熟去滓飲一小杯日三已上去疾 不寐有二有大病虛煩及高年人陰虛陽孤不寐有痰舍心經神不歸舍不寐虛者六君子湯見氣加炒酸棗仁炙黃芪各一錢痰者溫胆湯減竹茹一半加南星酸棗仁各一錢下清靈丹或導痰湯見痰加石菖蒲五分 喘不得卧治其喘 煥不得卧治其煥 咳嗽不得卧左屬肝脹宜清肝右屬肺脹宜清肺

多卧

經謂其人腸胃大則衛氣之入行於陰者留久皮膚濕分肉不解膚腠因濕而密緻也則衛氣之行於陰者遲則其還於表者亦遲可知留久而行遲其氣不精氣純而不精靈也視出陽入陰夾利而不滯者異矣故多卧 大抵精明之人卧少昏濁之人卧多飽食終日無所用心靜而不擾則多卧若因濕盛而然者則必怠惰四肢不收或大便溏泄脈緩去溫為主 亦有屬熱者火主動本應不得卧然火盛瀰漫壅閉閉則不通不通反不擾精神為熱所耗而昏故沉困嗜卧也然必卧不能安除熱為主 热病愈後陰氣得復必恬睡醒則清爽與

熱証昏睡醒亦沉迷者不同 食入則困倦欲睡者脾弱得食不能即運不運則靜矣靜故欲睡也 六君見加麥芽山查神軸之類

狂癲癇

狂者猖狂剛暴裸體詈罵不避親疎甚則持刀殺人踰垣上屋飛奔疾走不問水陸多怒不卧目直叫呼時或高歌大笑妄自尊貴妄自賢智者是也 癲者如醉如囁或悲或泣或笑或歌言語有頭無尾穢潔不知左顧右盼如見鬼神有時正性復明深自愧沮少頃狀態復露者是也 癇者發則昏不知人卒倒無知口噤牙緊將醒時吐痰涎甚則手足抽搐口眼相引目睛上視口作六畜之聲醒後起居飲食皆若平人心地明白亦有久而神呆者然終不似癲狂者當時迷惑也 諸中卒仆似之而仆時無聲醒時無 淚內經論狂為陽証其詞不一而足病為火邪無疑觀傷寒熱入胃府往往發狂可見然傷寒乃暴病不過一時火熱乘心心神狂越熱陰則已若經年累月病狂不省者則豈徒火之為哉必有痰涎留心竅乃成固疾也蓋火氣乘心則心血必虛兼之心神浮越不守其舍以故痰涎得乘虛入踞耳癲亦同此而痰火不甚不似狂之火盛而暴也癲病亦屬痰熱而有發有止則痰未入心不過伏於心下氣動則發而上乘氣平則止而下退與癲狂之痰常迷心竅者異矣 三証各別皆屬於熱而難經以癲為癲有重陽者狂重陰者癲之說於是後人以癲為陰寒之証亦有分癲為

陰陽二証以陰癇為寒者夫癇者或因誤治而轉為虛寒者有之未有初起即屬陰寒者劉宗厚謂陰陽癇如小兒急慢驚陽癇不因吐下由痰熱客心胃間因驚而作燥痰之藥若謂不因壞証而有陰陽之分則是指痰熱所客藏府表裏淺深而言癇病豈本有陰寒者哉按難經謂脈居陰部乘陰也陰虛陽入乘之主發熱脈雖時浮滑而長此為陰中伏陽也至夏陽至矣脈居陽部而反見陰脈者為陰乘陽也至冬必病原文錯簡今訂正重陽者狂重陰者癲只癲呆無直視僵仆經又云癲病始發意不樂直視僵仆癲証也難經以癇為癲故其詞如此其脈三部陰陽俱盛是也既云三部陰陽俱盛則重陰者癲一言固未可沉淀矣

治狂內經謂宜奪食以食入於陰長氣於陽也生鐵落飲抱胆丸陽明實則下之當歸承氣湯見大便不通後用黃連解毒湯見吐痰瓜蒂散下痰清心滾痰丸並見虛久而愈者甯志膏一醉膏靈苑辰砂散蓋此病少卧衛氣不行於陰故陽盛陰虛今昏其神使得睡則衛氣得人於陰陽不偏盛陰不偏虛陰陽均平矣經謂悲哀動中則傷魄魄屬陽主動主升悲哀則歛抑遠其性故為傷故狂當以喜勝之又謂喜樂無節則傷魄

劉氏說本此若熱

疾

靜主降喜則氣浮越故傷

風

故狂當以恐勝之按此係舉七情之致狂者言耳夫致狂亦多端矣

治癲星香散見中加石菖蒲人參和竹瀝薑汁下壽星丸或或涌去痰涎後服竄神

之劑 因驚而得者抱胆丸 恩慮所致者酒調天門冬地黃膏多服取效 鬢金
七兩明礬三兩為末薄荷汁丸桐子大每服五六十丸湯水任下最能去心竅鬱痰
孫兆治一僧令食鹹物使渴與藥調酒飲之愈問其治法曰醫能安神矣而不能
使神昏得睡此乃靈死辰砂散也人不能用耳 若脈乍大乍小乍有乍無忽而如
平人忽而如雀啄屋漏鯰遊魚翔此鬼祟也奉承祖灸鬼法及針鬼宮等十三穴見針

治癇趙以德曰癇疾淺者止在經脈氣不通眩運仆倒深者入腎邪留於陰不行不行則陰氣畜滿鬱極乃發發則相火自下逆上填塞其聲音惟迫其羊鳴者一二聲而出偏身之涎沫皆迫於上胸臆流於口諸經脈筋骨皆不勝其衝逆故平倒無知少頃火氣退散乃醒不治則邪不散遂成常証經謂癇者內經亦以癇為癲宜當瘤字看氣下泄及發如狂者死蓋邪入於陰者陰氣滿閉塞於下而逆上今氣下泄則腎氣下脫故死又心之陽不勝其陰氣之衝逆陽氣暴絕故如狂亦死也然不可一概論蓋陰脫者尺脈不應如狂者寸脈不應若尺寸俱盛則是陰陽俱實不可斷為必死也 先身熱瘓癰驚啼叫呼乃發脈浮病在府也為陽癇易治先身冷不驚掣不啼呼忽然而

發脈沉病在藏為陰癇難治久則有六畜之聲反折上竄聲如犬吠屬肝目瞪口呆聲如羊呌屬心直視腹滿聲如牛呌屬脾驚跳反折聲如雞鳴呌屬如尸吐沫聲如豬呌屬腎然治法則一總以行痰為主逐痰飲南星半夏竹瀝薑汁瓜萎殼蠶天麻龍齒石菖蒲遠志加附子少許大加柴胡羊加黃連牛加白芍雞加黃芩猪加知母

痰盛必用吐先一夕勿食次早搗茶子煎湯束小腹飲之即吐虛者先補後攻

妙功丸久而有蟲亦用此丸

妙香散見心痛

牛黃丸楊氏五癇丸選用晝發灸陽蹻夜發灸陰蹻

為二蹻能行下焦之氣也

二蹻為病主癇見奇經八脈

各二七壯凡灸癇必須先下之乃可灸否

則氣不通能殺人平旦發者足少陽晨朝發者足厥陰日中發者足太陽黃昏發者足太陰人定發者足陽明半夜發者足少陰加引經藥愈後痰熱藥中加養血寓神之品脈虛弦屬驚浮數屬實熱虛者脈宜虛緩若急實沉小或虛而弦急皆難

治