

蜀中醫纂

王予達印

蜀中醫纂卷三目錄

內傷門

氣

衄血

癆瘵

氣脹

惡心嘔氣

噎膈

陽痿

喘

血

溺血

腫脹

積聚

吞酸

痺

痰飲

咳嗽

虛勞失血

便血

水腫

嘔吐

反胃

痿附痿驗方

泄瀉

痢疾

王子達印

疝

赤白濁

汗

不得臥

淋

小便黃赤

汗憎風

不能食

遺精

怔忡

健忘

蜀中醫纂卷三

內傷門

蜀南陳清濬輯

王予達印

氣以氣出於命門。形盛脈細。少氣不足。
死。形瘦脈大。多氣者亦死。

此論出集解。淳
添刪之。

脾生氣也。不言
下焦命門是東
垣淺處。

經曰。諸氣膨鬱。皆屬於肺。又曰。怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。寒則氣收。熱則氣泄。驚則氣亂。勞則氣耗。思則氣結。九氣不同。百病多生於氣。夫人之所恃以生者。此氣耳。源出中焦。統攝於肺。外護於表。內行於裏。周流一身。頃刻無間。出入升降。曷常病於人哉。及七情交攻。五志過極。乖戾失常。清者化而爲濁。行者阻而不通。升者陷而不舉。氣本屬陽。反勝則爲火矣。及其爲病。則爲冷氣、滯氣、上氣、逆氣。氣虛、諸變症矣。當審其何經何症。寒熱虛實。而補泄之下。手脈沈。便知是氣。用藥有四法。氣虛宜補。參朮芪草。氣壅宜降。輕用烏陳蘇子。

枇杷葉。重用沈降。氣逆宜調。砂蔻木香香附。氣實宜破。枳朴檳青。

此方以升柴爲使。去升柴錯矣。

煩勞內傷。身熱心煩。頭痛惡寒。喘渴自汗。氣虛不能攝血。及瘧痢脾虛。久不能愈。一切清陽陷下。中氣不足之症。補中益氣參芪陳升柴朮草當歸身。便結重加

升麻此東垣千古名方。用者宜善加味。淳

勞倦傷陰。精不化氣。陰虛外感不解。寒熱痰癆。便結不通等症。補陰益氣煎。

前方去芪朮。加山藥熟地。胸膈脹滯。有不宜芪朮者。

上盛下虛。痰涎壅盛。喘咳嘔血。蘇子降氣朴沈香。通陳前草夏生薑。胡小降氣湯。紫烏陳芍草。

七情氣鬱。痞滿膨脹。痰涎結聚。心腹絞痛。七氣湯芩夏蘇朴。四七湯參桂

夏草。以四味治七情。故名四七氣虛。寒滯藥也。心腹痛。加延胡索。六鬱湯。二陳加蒼梔砂附。

食積脹痛。枳實大黃湯。朴草木香榔。

血元 陰精血腎水津液汗俱是
物蓋隨所見而異名耳。

謬言心生血者大

營者水穀之精也。飲食日滋。陽生陰長。取汁變化而赤爲血。生化於脾。統攝於心。藏受於肝。宣布於肺。施泄於腎。調和五臟。洒陳六腑。耳目手足皆賴以滋。注於肺。充則實。少則滯。生旺則諸經恃此長養。衰竭則百脈由此空虛。血盛則形盛。血弱則形衰。難成而易虧。可不謹養乎。陰血一虛。諸變立至。妄行於上。則吐衄。妄行於下。則腸風便血。衰涸於內。則虛瘍枯槁於外。則消瘦。移熱膀胱。則溺血。陰虛陽搏。則崩中溼蒸熱瘀。則血痢。熱勝於陰。發爲瘡瘍。溼滯於血。則爲癰疥。此皆失於攝養。變爲諸病也。然血無氣不行。氣無血不化。氣血分陰陽。陰陽不可離。即景岳補氣生精。補精化氣之說。學者

淳宜知記。

熟君歸臣芍佐
芎使

一切血虛及婦人經病。四物湯歸芎芍熟。八珍湯。當歸補血湯。

虛勞失血批駁。凡大病。淳多經驗揣摩。故詳刪。
又曰。勞則喘息汗出。內外皆

經曰。陰虛生內熱。陰者水之屬。腎水不足。則虛火
越。故氣耗矣。氣蒸而汗。內越也。又曰。勞則喘息汗出。內外皆
燔炎。故內熱。此言血虛之勞。

下脘不通。而胃氣熱。熱氣薰肺。故內熱。勞則傷脾。脾主肌肉。故形氣衰少。脾主消穀。脾虛不運。故穀氣不盛。肺者。脾之母。肺上焦主氣。以下布者也。土虛不能生金。則肺薄。而濁氣不能達於下脘。清氣陷下。濁氣逆上。故內熱。此言氣虛之勞。

癆症諸虛。浮軟微弱。土敗雙絃。火炎則惡。宜見虛脈。絃則肝木乘脾。故土敗失血。脈數多。亦有微細來去多少。革數有之。芤未見。淳失血諸症。脈或見芤。緩小可喜。洪數堪憂。失血脈貴沈細。火炎數脈。癆症六至以上。難治。骨蒸勞熱。脈數而虛。熱而濁小。必殞其軀。

兩寸無脈爲虛勞。左手脈細。右手脈浮大勁急。爲正虛邪甚。必死。若一手無脈。

熟記。

更甚。久病沈細而數者死。結者三年死。代者三月亡。浮亂亦死。

癆症九死。不服參芪爲不受。補者死。咳聲啞者死。一邊不能睡者死。大肉去者死。久泄者死。吐血淺紅色似肺。謂之咳白血死。痰最多最濁者死。虛損原無邪熱。譖妄失倫心臟之敗神去之兆死。筋骨疼痛之極乃肝臟之敗死。

內經之言虛癆。惟是氣血兩端。至巢氏病源始分五癆七傷。又分二十三蒸。本事方。更分傳屍鬼疰。至於九十七種。鑿空附會。重出複見。使學者惑於多歧。用方錯雜。伊誰咎乎。曷若以內經爲式。第於胃腎分主氣血。約而賅。確而可守也。夫人之虛。非氣即血。五臟六腑莫能外焉。而獨舉脾腎者。水爲萬物之元。土爲萬物之母。二臟安和。一身皆治。百疾不生。夫土爲金母。金實水源。則土不陵水。且陰血生於脾土。故脾安。則腎愈安也。腎兼水火。腎安。則水不挾肝。上泛而凌。

土溼火能益土運行而化精微。故腎安則脾愈安也。孫思邈云。補脾不如補腎。許學士云。補腎不如補脾。二先生深知二臟爲人之根本。其說似背。其旨實同。救腎者必本於陰。血主濡之。血屬陰。主下降。虛則上升。當斂而抑。六味丸是也。救脾者必本於陽。氣主煦之。氣爲陽。主上升。虛則下陷。當升而舉。補氣益中丸是也。近世治癆專以知柏。四物加柏知不知四物乃秋冬之氣。非所以生萬物者。且血藥常滯。非痰多食少者所宜。血藥常潤。久致滑腸。知柏苦寒。能泄實火。名曰滋陰。其實燥而損血。名曰降火。其實苦先入心。久而增氣。反能助火。至其敗胃。所不待言。實火可泄。虛火可補。癆症之火。虛乎實乎。泄之可乎。大抵癆症。疑難不少。如補脾保肺法。當兼行。然脾喜溫。燥肺喜清潤。保肺則礙脾。補脾則礙肺。惟燥熱甚。能食不泄者。潤肺當急。而補脾之藥亦不可少。倘虛羸甚。食少泄多。雖喘咳不。

不知附子尤要。

寧但以補脾爲急。而清潤之品宜戒。脾有生肺之能。肺無扶脾之力。常見勞多死於泄瀉。泄多因於清潤。司命者能不兢兢耶。故補脾要於保肺也。又如脾腎法當兼理。然以甘寒補腎恐減食。礙脾以辛溫快脾又恐耗水兩者并較重脾者以脾交心腎故也。若腎火虛者又不可拘。要知滋腎之中佐以沈香砂仁。壯脾之中參以五味肉桂。隨症活法。又如無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。不可偏也。東垣曰。甘溫能除大熱。又曰。血脫補氣。又曰。春夏之溫可以發育。秋冬之寒不能生長。虛者必補以人參之甘溫。陽生陰長之理也。且虛癆症受補可治。不受補不治。葛可久治癆用參芪十之七。丹溪治癆用參芪亦十之七。不用參芪乃新傷輕淺者耳。自好古肺熱傷脾節齋服參必死之說。印定後人眼目。專用苦寒。直至上吐下瀉。猶不悔悟。良可悲矣。幸瀕湖石山詳爲之辨。而習俗

書。可久有十藥神

氣血先後察症
用之不必拘此。

心可謂洞達內經之旨。深窺根本之治矣。
醫賈曰。世醫視參芪爲靈丹。反狀脾胃。用參芪者。不先壯水以制火。遽投參芪。此不知先後之着。

癆症之火多假
熱。癆症之氣多
有虛而不納。學
者臨症切記。

岳景經曰。陽絡傷。則血外溢。陰絡傷。則血內溢。外溢吐衄。內溢下血。凡治血症。須知其要。而動血之由。惟火。惟氣。故察火者。但察其有火無火。察氣者。但察其氣實氣虛。知此四者。而得其所以治血之法。無餘義矣。一火盛。逼血妄行。必有火症。火脈可據。乃可以清火爲先。火清而氣自安矣。然火有虛實兼補兼清所當酌也。若以假火作真火。害不旋踵矣。一氣逆於臟血。隨氣亂錯。經妄行。然必有氣逆喘滿。或胸脅脹痛。尺寸絃強。當以順氣爲先。氣順而血自寧矣。其或實中有虛。不堪消耗者。或宜暫用。或酌其佐使。不可拘也。一火不盛。氣不逆。而血動。

景岳未嘗不言
火必認的火脈
火症方是火。

看認症。

二方要加沈降。
方妥認症竅眼。
凡症多有學者
留心淳記。

醫能及此可稱
明手。

不止乃元陰失損不宜妄用寒涼以伐生氣妄用辛燥以助火邪宜純甘至靜之品。左歸拯陰六味之類若虛在氣分大補中加味之類一格陽失血之症多因煩燥咽喉乾痛大吐大衄失血不止但六脈細微四肢厥逆小水清利大便不實此格陽虛火症也速宜引火歸源用鎮陰煎八味丸料冰冷服火降而血安矣若用寒涼陽絕則死。凡治血症當察虛實是固然矣然實中有虛於疼痛處有不宜攻擊者此似實非實也熱中有寒於火症中有速宜溫補者此似熱非熱也夫正者正治誰不知之反者反治吾未見有知者矧反症甚多詎可忽略乎一所吐之血黑而黯必停積失位之血非由火逼而動或面白息微脈見緩弱身涼此脾胃氣虛不能攝血三因方云湯中能止傷胃吐血若察其虛在陰分理陰煎

熟記此條。

治血元機。

總在左右尺窺之。

惟假熱難人。知假熱能活人。景岳所以再四言之。

陰加參。最妙。暴吐暴衄失血如湧多致血脫氣亦脫危在頃刻速以氣爲主劑獨參湯大補中鎮。

火盛則肺燥絡傷而嗽。血涸而成痰。標固在肺。本則在腎。舍腎而治血。非治微者。則洞垣之目無過是矣。火一語。水虧補水。世醫知之。火虧而用桂。附以補數語。高出前古。惜乎。世醫畏熱不前。難在善觀水。

之火。乎。誰。淳。其。能。

凡假熱之症。腎陰大虛。陽無所附。浮散於外。反多內熱。此內真寒外假熱也。外熱既甚。多見口瘡、喉裂、舌乾、咽痛、煩渴、喜冷。而辛熱溫補之劑難以入。口。薛立齋治韓州同之癆熱。以味丸料加減八分。一斤煎五六碗。冰冷與服。此法最妙。

余因效之。崔氏八味。或右歸飲。用治陰虛症。假熱傷寒。及勞熱煩渴等症。服後頓退。而虛寒悉見。乃進溫補。無不愈者。真神妙法也。

吐血有氣。當順氣。

有三藥必用。童便。青荷藥降香。知柏必去。

一陰煎。

方見寒門。

歸脾湯

參朮芪草。歸蓮神遠木酸棗。

龍眼引。宜加熟地。加丹梔。

富多志。

名加味歸脾治兼火者。

脈來微弱。精神困。氣虛。不能攝血者。

薛氏加味補中益氣湯。加麥味神遠山

熟。次當其人參飲。

要加熟地。妙參芍草歸黃芪。

河間生熟地芪各一兩。莪三七二錢。

有瘀血用。

三陰

煎。歸熟芍草參棗仁。

汗加芪。張悶加陳皮。

虛癆失血。脾虛溏泄。忌用潤劑。

五陰煎。

四君味扁山熟芍。

重加蓮米引。

三陰虧損。營虛失血。瘡疾汗多。陰虛失血。大劑。

六味。加阿便。

六味地黃丸。熟八棗

藥四丹芩澤瀉二丸。密若加桂附。名八味。去附。名七味。

加減八味丸。六味加桂

二兩。味四兩。

真陰不足。不能養營。神不守舍。血不歸原。遺淋昏暈。津液枯涸。眼花耳聾。口燥。

景岳脫胎六八
味爲左右歸。補
火水有餘。利溼。
熱不足。用者量
加。

舌乾。腰痠。腿軟。左歸飲。

皮

熟棗山藥杞芩草。

加茸更妙。肺熱加麥冬。骨蒸多汗。加北味地骨皮。

左歸

丸。去甘草。加牛兎龜鹿膠。壯水之劑。加減主之。

元陽不足。命門火衰。不能生土。少食嘔惡。膨脹翻胃。怯寒畏冷。虛淋寒疝。痺痛浮腫。四肢不收。眼見邪祟。陽衰無子。右歸飲。藥杞熟棗。桂附杜草。

氣虛脈弱。加參。附。桂。苓。芍。皮。

瀉腹痛。加參。蔻。吳萸。淋帶。加故脂。腰膝軟痛。加歸。帶。

右歸丸。去甘草。加兎絲龜鹿二膠。益火之劑。加減

主之。亦宜
加茸。

男婦氣血大壞。精神失守。危劇等症。

大補元煎。參熟藥棗。

皮

歸杜杞草。

附。桂。苓。氣

虛加芪。朮。泄。去歸。加升。味。

陰虛內熱。皮寒骨蒸。食少痰多。咳嗽短氣。

士材

拯陰理癆湯。麥味芍草參蓮苡。生

歸橘紅牡丹皮。

內經。火多。加熟地。桑仁。泄去歸。加山荳。此方初用。多效。

陽虛氣耗。倦怠懶言。發熱自汗。士材拯陽理癆湯。參芪桂朮陳草歸。咳甚麥冬與

北味。內經氣虛之癆。宜加生熟地。此方不及大補元煎加減。薛氏加味補中效。

陰虛於下。格陽於上。血隨而溢。速宜用此。使孤陽有歸。血自安矣。鎮陰煎熟牛。

澤草與桂附。陽假熱用之多效。景岳得意之方。脾肺俱虛。但服此方。亦宜隨

四物四君。參朮荅草。四物。川芎熟。人參養營湯。十全去芎。加陳遠味。補八珍加減。

加芪桂四君加陳皮爲異功散。加半夏爲六君子湯。

葛可久方。

癆咳發熱。盜汗。體瘦。唾血。歸神湯。參芪芩夏草。歸芍熟味膠。又名刦

癆湯。

虛癆泄瀉。腹脹。飲食不思。困倦。自汗。夢遺。腳軟。加減補中益氣湯。本方。加山

芩蓮芡砂。加熟地妙。此方以升柴爲使。原方去升柴。欠妥。

肌體瘦弱。盜汗遺濁。還少丹。熟草芩藥牛枸杞。蓄遠味荷蓉杜巴。棗肉蜜丸。加續斷。名。

打老兒丸。

和陽。謂補陽氣。

氏遺書曰。咳血。便血。殺人。便血猶可治。咳血甚難醫。飲童便。百不一死。服寒涼。火。若陽虛陰盛。傷在脾胃。大非所宜。

傳屍瘍症。

同氣傳染。當補以復元。殺蟲以絕根。

芎歸血餘散雄黃木桃鯉頭蝎息香。

水煎。入香末。用黃

紙。硃書符。向北仰天咒曰。症神。害我生人。吾奉帝敕。服藥保得。急急如律令。咒五遍。書符又咒五遍。燒符入藥。五更服。

案予實未見錄此以防未然。

衄血

衄血症。諸家謂出於肺。蓋以鼻爲肺竅。不知鼻爲手足陽明之正經。而手足太陽亦至鼻。尤有要者。衝脈爲十二經之血海。衝脈至十二經無不至。豈特手太陰一經耶。臨症不可不察。一衄血由內熱者。多在陽明。以清降爲主。

局方犀角地黃湯。

地黃散。生

飲。熱甚者。

黃連解毒。抽薪。加減一陰煎。

兼頭痛口渴者。

玉女煎。

白虎湯。熱極。便不通火壅於

上。地黃湯。

角。見治。寒門。一

通其下而上自愈。

一

齶血由外感者。在足太陽。宜發散。

症治見

寒門。

一

齶血爲陰虛。

尤多脈來。洪大無力。絃革細數。素多酒色內傷者。以甘平之劑。補

養真陰。務令元氣完固。永無後患。

如左歸陰三陰六味。必用一格陽。齶血。上熱下寒。六

脈細微。或浮洪假實。此症不惟內傷有之。

傷寒亦有。由素損真陰。乃見此症。惟

鎮陰。八味。冰冷服。對症之劑。

麥門冬散。生地芍蒲黃。

陰虛。

生地黃飲。二地芪芍杞。天草芩骨皮。

一切止齶捷方。不及栽秧芭根七頭。錘碎。煎湯服。立止。

五竅出血。死在頃刻。先將冷水噴面。并濯其兩足。用粗紙蘸醋。搭額門。即煎當歸

一兩。磨沈降香各
錢。和童便服。後用六物湯。加北味。

三黃補血湯。芎歸芍二地。升柴芪丹皮。

溺血

詳淋濁門。景岳雖分精道。小腸膀胱難辨。不知有火脈火症。澀痛爲熱。宜清利。如無悉是陰虛。好辨。宜左歸固陰。加減。若命門火衰。非右歸四維。加味。

不可淳附。

景

岳溺血有三。從溺孔出者二。從精道出者一。其來近者。出自膀胱。必孔道濇痛。小水不利。治宜清膀胱之火。七正五苓大分清飲。其來遠者。出自小腸。溺孔不痛。血隨溺出。精道之血。自精宮血海而出。約陰。若陰虛。左歸丸。人參固本丸。虛滑不禁。固陰。脾肺氣虛下陷。不能攝血。歸脾補中。

白

男婦血熱便紅等症。約陰丸。歸芍生芩。尤脂味榆芩。續參。蜜丸。約營煎。生芩

續草芍。梅槐荆地榆。

因火下血。清熱爲主。無論大小腸膀胱。惜紅煎。尤藥草荆穗。續榆芍味梅。

陰虛有火。人參固本丸。二地與二冬。蜜丸。

便血此學者無忽。

經曰。陰絡傷。則血內溢。然有溼熱下墜者。脈必洪數滑實症。必煩渴而微痛。先用知柏湯。以清火。後用升麻龍骨。若無火脈火症。兩尺細弱。乃元陰失守。純

用左歸丸。加龍味。固陰重。加熟地龍味。補。若右尺獨微弱。乃陽虛陰走。四維加升熟龍骨右

膏脂通用散。加蔻白朮。以收功。

癆瘍

立齋云。此症屬足三陰虧損。虛熱無火之症。以味爲主。以中調補脾胃。多有生者。若用知柏之類。復傷脾胃。元氣下陷。腹痞作泄。不可救矣。夫吐衄。因虛火妄

卽窺水火之微意。然寸弱而尺獨壯。亦陰虛不
止微弱。

凡虛症。只陽脈實症。定假脈假症無疑。

數。左腎之真陰不足。六八右尺遲軟或細數。命門之相火不足。八八至兩尺微弱。陰

陽俱虛。十全加附子

此皆滋化源也。治韓州同色慾過度。煩熱。飲水祕結。痰湧。面

目俱赤。心如焰。左三部洪而無倫。此腎陰虛陽無所附。而發於外。蓋大熱而

甚。寒之不寒。是無水也。當峻補其陰。以料一斤。加減六味煎五六碗。冰冷服。半晌熟睡。

諸症悉退。翌日畏寒足冷。諸症仍至。是無火也。急用味。諸症頓退。王以道積勞

致疾。大熱。口乾。目赤。面黯。脈洪大鼓。指按之如無。此內真寒外假熱也。以十全大補

其脈當收斂。熟睡。覺而惡寒。增衣。脈果微細如絲。此虛寒之真象也。夜間脈復

脫。以參二兩。熟地五錢。大劑附各五錢。脫復後。以補中。調理而安。一星士談命良久。不時吐血一二口。

余謂癆傷肺氣。以加補中味而痊。

景岳以微細緩弱爲格陽假熱。立齋以洪而無倫。及絃洪爲假熱。立齋又高一籌。俱用桂附反治。其認症則同。察氣虛實而補降。察火有無而清補。窺假脈假症而反治。察水虧而純甘。至靜補陰火虧而兼桂附補火。盡癆症失血之長矣。

癆咳多咽喉痛。湧用香_{鎮陰}失聲_{加桔味}柯子_降不應。必是假火上炎。仍以_{八味}冰冷反治。

少用_{水硼}吹之。此症人云多死。皆誤於寒涼也。余見一婦果喉痛。食不下咽而

淳治癆症。不過十活四五。此纂俱經揣摩。諸生勿忽。

死。前賢惟張薛以假火論治。惜未表出。學者當與咽喉門參悟。其有咽喉緊細。仍以壯脾補腎爲主。湧閱歷較多。故附錄於此。

腫脹

景岳取金匱去苓澤。加白朮。余

脹滿之脈。浮滑洪實。細而沈微。岐黃無術。

每用右歸加丁
沈。脹。加。澄。茄。大。
抵。此。症。不。補。腎。
之。真。陽。兼。以。丁。
沈。萬。不。能。愈。

腹脹。身熱。寒熱如瘡者。死。便血。脈大。時絕者。死。泄甚者。死。肚大。青筋。足背手掌俱平。男從脚腫上。女從頭腫下。不治。水腫缺盆平。心傷。脣黑腫。肝傷。臍突。脾傷。背平。肺傷。足心平。腎傷。五傷者。死。陰囊玉莖。腫腐者。死。先起於腹。後散四肢。可治。先起四肢。後歸於腹。難治。水腫之候。眼胞下微腫。如新臥起狀。皮薄色澤。或腫有分界。自下而上。多屬水氣。腫之候。皮厚色蒼。或一身盡腫。自上而下。多屬氣。景岳言氣腫。按而起。水腫如泥。按而不起。明見。

愚按。內經之論腫脹。五臟六腑皆有之。又言實脹。又言虛脹。又言寒脹。又曰。溫勝腫脹。又曰。木邪侮土。及金氣反勝之腫脹。又曰。熱甚則脹。由是五運六氣。亦各有腫脹矣。然經有提其綱者。曰。諸溼。腫滿。皆屬於脾。又曰。其本在腎。其末在肺。皆積水也。又曰。腎者。胃之關也。關門不利。故聚水而從其類也。可見諸經雖

五氣即五行五臟

凡審症俱宜如此則認症的確矣

此症惟中衰多有少壯未見與景岳同一見解然不用溫腎八味金匱治法不及景岳

暑有腫脹無不由於脾胃腎者蓋脾土主運行肺金主氣化腎水主五液凡五氣所化之液悉屬於腎五液所行之氣悉屬於肺轉輸二臟以制水生金者悉屬於脾故腫脹不外此三經也但陰陽虛實不可不辨大抵陽症必熱熱者多實陰症必寒寒者多虛先脹於內後腫於外者爲實先腫於外後脹於內者爲虛小便赤澀大便祕結爲實色白溏泄爲虛色紅氣粗爲實色悴聲短爲虛新病年壯多實中衰積勞多虛滑數有力爲實絃浮微細爲虛凡諸實症或六淫外客或飲食內傷陽邪急速其至必暴每成於數日之間虛症或情志多勞或酒色過度日積月累其來有漸每成於經月之後然治實頗易理虛恆難虛人氣脹者脾虛不能運氣也虛人水腫者土虛不能制水也氣水雖制於脾實則統於腎腎本水臟而先陽寓焉命門火衰既不能自制陰寒又不能溫實脾土

即六氣

則陰不從陽而精化爲水。故腫脹多屬火衰也。丹溪以爲溼熱宜養金以制木使脾無賊邪之患。滋水以制火使肺得清化之權。夫制火固可保金。獨不慮其害土乎。屬熱宜之。陽虛豈不益其病哉。更有不明虛虛實實專守下則脹已一法。雖少寬一時。真氣愈衰。未幾腫脹再作。必致不救。余於此症。察其實者。直清陽明。反掌收功。苟涉虛者。溫補脾腎。漸次康復。其不實不虛者。先以清利。繼以補中調攝。又有標實而本虛者。泄之不可。補之無功。極爲危險。在病名有鼓脹。蠱脹之殊。鼓脹中空無物。腹皮繃急。多屬氣。蠱脹中實有物。腹形充大。非蠱即血。在女科有氣血之分。氣分者心胸堅大。病發在上。先病水脹而後經斷。血分者血結胞門。病發於下。先因經斷而後水脹。在治法有理脾肺之殊。先喘後脹。治在肺。先脹後喘。治在脾。以上諸法。此其大略也。若夫虛實混淆。陰陽疑似。貴

在臨症之頃。神而明之。其免虛虛實實之害乎。

此條理解深邃。
總補水補火。一
言可解。

岳景

總在腎中之真陽上言

察之經旨。按之病情。惟氣水二字。足以盡之。知此二者。辨其虛實。無餘蘊矣。

乃指命門之火而言。治氣有二法。一以補中益氣。一以溫腎陽。

妙。貴在圓機變通。欲辨氣水之異。在辨其陰陽。在氣則陽。症陰。症皆有之。在水多爲陰。症蓋陽旺。則氣化而水卽爲精。陽衰。則氣不化。而精卽爲水。水卽身中之血。氣爲邪。爲正。總在化與不化耳。人知土能制水。不知陽實制陰。人知氣化爲精。不知精化爲氣。夫氣化者。卽腎中之氣也。卽陰中之火也。故治腫先治水。治水先治氣。氣不能化。水必不利。惟下焦之真氣得行。始能傳化。下焦之真水。得位。始能分清。求古治法。惟立齋腎氣。誠對症之方。用之屢效。其有氣血衰。不受補者。大危之候。或半補。須千方百計。救其根本。庶可保全。

此論出集解較之張李竟似雪泥。

腫脹。有痰阻、食積、瘀血。致清不升濁不降而成者。有溼熱衝激。祕結不通而成者。爲有餘。有過服寒涼。中氣衰而成者。有大病後。正氣虛而成者。有小便不利。水液妄行。脾莫能制而成者。爲不足。治法。上身腫。用羌、防、麻、蒼、獨活。以閉鬼門。下身腫。用澤、通、二苓、桑皮、海藻。以潔淨府。若虛弱。俱不可用。以補脾爲主。六君補中。塞因塞用。

脾腎火虛。遍身腫脹。小便不利。大便溏泄。痰氣喘急。已成蠱症。

立齋

金匱腎氣

丸。八味加車前牛夕。腫脹良方。景岳去澤瀉。加白朮治之。更妙法。

腫脹兼痛。神香散。白蔻丁香。

共求。晉

湯下。健脾胃以培本。利水道以治標。

補中益氣。加澤瀉。

瀉參荅白朮散。加芥澤。

脾腎虛寒。不能制水。爲陰水。肢體浮腫。色悴聲短。不渴便通。

六味回陽飲。

數方要加一二
氣水之藥更妙。
俱淳經驗纂入。

右歸飲丸。附子理中。胃關煎。加肉桂。香附片。

平痰利溼順氣。

年力未衰。三焦壅滯。或單腹脹。兼實症者。廓清飲。陳芩澤朴。腹枳芥菔。
氣脹痞滿。大便虛閉。分心氣飲。二陳五皮桂二香。檳枳通芍烏蘇羌。平痰利溼順氣。

盡此方之長。胡用許多藥味。方之不善。即是此種學者宜知。淳

水腫

五苓散。加硃砂燈心。熱飲。

上氣喘急。腰下水腫。五皮飲。桑陳薑腹赤苓皮。發黃。加茵陳。

數方俱攻伐。雖實症。只宜三口。切不可多用。

腫脹。形氣俱實。口渴。面赤。氣粗。腹堅。大小便祕。舟車丸。青陳檳黃。丑遂戟蔻。

輕木香。佳。水丸。濬川散。木丑郁李硝黃遂。

一切積滯。百順丸。大黃牙皂。蜜丸。

因熱積聚。神芎導水丸。大黃丑芎。薄滑芩連。

氣脹

百消丸。丑附靈脂。糊丸。

簡易方。內服甘草。外塗甘遂。蒜煮熟。蘸鹽醋。

五苓散。以熟蒜丸。

以沈憲八味爲
主。間用十味保
和。和中丸。以消
之。參苓白朮加
麥牙蔻朴亦可。

積聚淳見用攻者十有九死。內經數條皆言由寒成積。何後人不察。專事攻邪。余以溫脾補腎爲主。偶用消法。多效。

五臟爲積。六腑爲聚。實強可生。沈細難愈。絃短滑結。是皆積脈。勁微亦積。沈細附骨者積脈。沈

經曰。積之始生。得寒乃生。厥乃成積也。厥氣生足悅。言肢痛而不利。足悅。生脛寒。脛寒。

則血脉凝滯。寒氣上入於腸胃。則腹脹。腹脹。則腸胃之汁沫。迫聚不散。日以成積。卒然多飲食。則腸滿。起居不節。用力過度。則絡脈傷。陽絡傷。則血外溢而吐衄。陰絡傷。則血內溢而便血。腸胃之絡傷。則血溢於腸外。腸外有寒。汁沫與血。

六輸六腑空處。

癥瘕等。皆積聚之別名。

相搏則合聚不散。而積成矣。卒然外中於寒。若內傷於憂怒。則氣上逆。六輸不通。溫氣不行。凝血蘊裏而不散。津液滲濇而不去。而積皆成矣。五積屬陰。五臟生。始發有常處。痛不離其部。六聚屬陽。六腑成。始發無根。痛無常處。癥瘕假物成形。如血鱉石瘕之類。痃。厚皮。在肌肉間。可見。癥僻也。內結於隱僻。不可見。腸覃。屬氣。寒氣客於腸外。與衛氣相搏。始如卵。益大。狀如懷子。按之則堅。推之則移。月事以時。石瘕屬血。生於胞中。月事不時。血結胞門。女子可導而下。

積之成也。凡飲食血氣風寒皆能致。由正氣不足而邪氣據之。初中末三法。不可不講也。初起邪淺正強。任受攻。有弊。初起多虛。何云受攻。學者宜以脈症辨記。中者。受病漸久。邪氣較深。正氣較弱。任受且攻且補。末者。病魔經久。邪盛正衰。任受補。蓋積之爲義。匪伊朝夕。去之亦當有漸。急則傷正氣。不能運化。而

去。欠妥處多。俱刪

去。

處。淳

記。中者。受病漸久。邪氣較深。正氣較弱。任受且攻且補。末者。病魔經久。邪盛正衰。任受補。蓋積之爲義。匪伊朝夕。去之亦當有漸。急則傷正氣。不能運化。而

治此症者當三復數語。

犯邪反固矣。經曰：大積大聚，其可犯也。衰其半而已，過者死。故去積及半，純與甘溫調養，使脾土健運，則破殘之餘積不攻自走。必欲攻之，無餘其不貽人夭殃者鮮矣。經曰：壯者氣行，即愈；怯者着而爲病。潔古云：壯盛人無積，虛人則有之。故養正則邪積自除耳。

岳景

臟腑空處爲募原。

堅硬不移，有形曰積，或緊或散，無形曰聚。無形之聚散易，有形之積破難。臨此症者，但辨其有形無形，在氣在血，得治積聚之梗概矣。癥瘕痞塊多在腸胃之外，募原之間，當以漸消磨求法治之，慎毋欲速孟浪妄行攻擊，積仍未去，徒致胃氣受傷，反以速其危也。不知飲食之滯非寒未必成積，風寒之邪非食未必成形，大都血積多在下，氣積則上，自胃脘下至小腹，若左血右食不可爲法。右豈無血，左豈無食乎？治法有三：曰消散補_{淳去其攻}。難在虛症，脾虛則中焦不運，要語。

此論高過一切
方書

腎虛則下焦不化。其或虛中夾滯。不妨消以佐使。其要在知攻補之宜。欲知其
宜當於孰緩孰急。中辨之。若積久元虛。此而攻之。積遠不易。胃氣切近。先受其
傷。愈攻愈虛。不死於攻所重。在命不在乎病。所當察也。

凡堅頑之積。非火攻難散。灸法。背脊十三樞下。當脊中點墨記之。此非灸穴。却
於墨之兩傍各邊三寸半。以手揣摩。覺微有動脈。即點墨灸之。大約穴與臍平。
即痞根也。患左灸右。患右灸左。或左右俱灸。逐漸增加。火力所到。自然漸解。有

神化之功。岳積聚門。見景

今人三焦不行。往往有礙於中丸。八味

倘妄用棟哉。徒益其勢。

沈蔻八味丸。八

此症。凡用攻者。
俱是庸手。不信。
淳言。請試攻之。
看效否。

而下。方服。
淳之高見。

氣逆食滯痛等症。

排氣飲。陳木薑香附。

枳澤烏藥朴。

食加麵麥。寒加薑桂。茶。

小

茴。疝。加
荔枝核。

消痞除痰健脾進食。

枳實消痞丸。四君薑枳朴。半夏砂麥冬。

加青陳。

脾丸。淳以砂仁。

易黃連佳。

參苓白朮散。

加麥芽。

蜜丸。枳木丸。

加陳。

芍藥枳木丸。

凡不堪攻擊只宜消導者。

和中丸。四君加枳朴檳木。

十味保和丸亦佳。

酒積吐泄腹痛頭疼小便不利。

亦有不

葛花解醒參四苓。砂蔻木薑麵青陳。

根子。即黎瓜米。

丁香根子必用。古云酒大熱而兼溼。景岳云。

酒性本熱。酒質必寒。故酒病用胃

關煎。右歸丸。峻補命門。可見病有陰陽。不得執酒性本熱爲葛花解醒所局。

酒病。湏省甚多。其症腹痛頭疼。嘔不能食。便結。嘔痛者。中酒之寒毒也。不能食者。酒寒傷脾也。便結者。因熱而虛閉也。症亦難人。要以治嘔痛爲主。溫散寒邪。

丹溪葛花解醒平穩。

余多用溫胃飲。加桂。重加秦歸。根效。

無桂子。以桂代之。

單方。波透桂子。細嚼妙此症。景岳性熱質寒。道破病根。余見庸醫只因便閉一着。概用大黃。不究病根。誤人不淺。不知死人在寒毒之嘔痛。不在不能食之閉結。孰輕孰重。胡不辨別。

蟲積堅固者。追蟲逐積。遇仙丹。檳丑大黃。稜莪木香。

萬應丸。見心腹痛門。

蠱脹腹痛。喜食茶米土炭。蟲多正氣衰。溼蒸熱鬱而成。食茶米者。胃有伏火。景岳以清火滋陰之劑愈之。蓋察脈症有火。故效。食土炭者。胃寒而溼。故喜燥澀之物。當辨脈症。以健脾溫胃爲主。

景岳蟲蟲之爲病人多有之。雖由溼熱。口腹不節。飲食停積而生。然臟強之人。未聞有蟲臟弱之人。消化甚遲。停聚而生。然惟生冷爲最。凡愛養小兒。當節其水菓。以防脾敗生蟲。至若治蟲之法。雖當去蟲。而欲杜生蟲之源。以溫養脾胃元氣。

景岳小兒嘔吐
門有案宜熟看

爲主。溫臟丸。妙八味。
加榧子亦佳。淳。

蟲勢驟急。上攻心腹作痛。先治其標。掃蟲煎。青蒿檳榔吳。烏草榧雄硃。
雄硃。使君丸。檳星雷練。鶴齋胡粉與燕礬。即殺蟲丸。以所嗜之物炒蜜丸。以糖水下。

諸蟲積既逐而復生。由臟氣虛寒。此方主之。溫臟丸。參朮歸芍川椒芩。細榧

吳茱萸使檳。
蜜丸。臟寒加附子。熟黃連。

嘔吐
嘔吐。暴起。其病深。非大劑久服。可愈。反。

嘔吐反胃。浮滑者昌絃。數緊濁結腸者亡。

嘔吐以六君理。
中爲主治。要熟。
鍊景岳虛實二條。方應然。余每用丁香。效。

經曰。諸逆衝上。皆屬於火。諸嘔吐酸。皆屬於熱。

太陰所謂食則嘔者。物盛滿。

洞泄也。

不及景岳火脈
火症爲熱高

然諸臟皆有逆氣。陰陽虛實各殊。實火可泄。虛火可補。不可不察。素問以

氣俱還入於胃。新故相亂。真邪相攻。氣并相逆。復出於胃。故爲嘔。

火性炎上。故逆上皆屬火。

胆病者。善太息。口苦。嘔宿汁。腎脈微緩。爲洞。食不化。下嗌還出。故寒氣與新穀

而上溢。脾虛不能化。寒氣客於腸胃。厥逆上出。故痛而嘔。足太陰病。舌本強。食則嘔。

要熟鍊辨症認
症方能應手取
效淳

嘔吐一症。當詳虛實。實者。有邪去其邪。則愈。虛者。無邪。全出胃氣之虛。所謂邪者。或傷寒涼。或傷飲食。或因胃火上衝。或因肝氣內逆。或痰飲水氣聚於胸中。或表邪傳裏。聚於少陽陽明之間。皆嘔。此嘔之實邪也。然實邪必有見症。因寒滯者。多疼痛。因食滯者。多脹滿。因氣逆者。必脹痛。連於胸脅。宜和胃飲。大小和丸。排氣飲。加丁香。因火鬱者。煩燥熱渴。脈洪滑數實。吐必勇猛。形色聲氣必壯。麗宜。安胃飲。加半夏。竹葉石膏。半夏瀉心。微嘔。微吐。邪在少陽。小柴胡。大嘔。大吐。邪在陽明。藿香正氣不換

金正氣散

所謂虛者。總由胃虛。胃脘不脹。非食滯。胸脅不脹。痛非寒。與氣逆。內無燥。

熱。非火。症外無寒熱。非表邪。時作時止者。胃虛食無所停。聞食則嘔者。胃虛飲

食微寒。即嘔者。胃虛吞酸。嗳腐冷嚥。靡寧者。胃虛治當溫補脾胃。

理中。爲正次。

溫胃飲。四味。黃芽丸。寒甚。附子。若陰分虛。水泛爲痰。嘔吐者。金水六君。理陰煎。六君。爲正次。回陽。淳易和胃。

飲食留滯積聚。大和中飲麥陳枳查肉砂朴澤。

胎氣滯滿。小和中飲陳朴草查扁苓。二方亦宜。丁夏。

嘔吐吞酸。脘痛呃逆。加減二陳湯。二陳加丁香。

脾胃虛寒。反胃嘔泄。大七香丸。麥桂附丁藿陳砂草松爲。加參。

半夏瀉心湯。芩連參草棗乾薑。

不換金正氣散。和胃。加丁藿木參芩。原方平胃。淳易和胃。

四味回陽飲。參附草乾薑。

黃芽丸。參乾薑。

蜜丸。大。噙化。實

好寒涼者。入目。

凡嘔吐。若胃虛而有停滯。此虛中有實。宜暫從清理。而後培補。若停滯而虛困不支。當顧元氣。而略兼清理。貴知權也。孫真人曰。嘔吐聖藥是生薑。此的確之見。河間單執內經屬火屬熱二語。乃一偏之見。東垣著脾胃論。爲胃虛也。余言因火而嘔者少。因寒而嘔者多。胃實嘔者少。胃虛嘔者多耳。

凡中毒嘔吐者。當察所中何物。中熱毒者。解以苦寒。中寒毒者。解以溫熱。若吐

泄多而脾胃虛。宜大溫補。

景岳中
毒案。宜
潤。

吐蛻者。必因病而吐。蛻非因蛻而致吐也。但治其所以吐。而蛻自止。有因胃火而吐蛻者。以內熱無所容也。清火而蛻自靜。仲景烏梅丸。萬應丸。有因胃寒而吐蛻者。以

內寒蛻不能存也。溫胃而蛻自安。蛻湯中安理有因胃虛無食而吐蛻者。倉廩空虛。

蛻因求食而上出也。速宜溫補。溫胃飲。理中湯。三者皆治蛻之法。然有死蛻。有活蛻。若

吐死蛻。但治嘔如前。若活蛻上出不已。不得不逐之。掃蟲煎。蟲膽丸。蓋蛻性畏酸畏苦。

加烏梅爲佐。蛻自伏。胃火盛。加黃連。練根。景岳吐蛻案。宜閱。

仲景烏梅丸歸參。桂枝連柏薑椒辛。蜜丸。海用酒蒸去核。搗膏。

此等見解俱淺
見猶之辨咳嗽者。

愚按。古人以嘔屬陽明。多氣多血。故有聲有物。吐屬太陽。多血少氣。故有物無聲。嘯屬少陽。多氣少血。故有聲無物。獨東垣以嘔、吐、嘯俱屬脾胃虛弱。或客風寒。或傷飲食。致上逆而食不下也。潔古從三焦分氣積寒三因。吐愈速愈在上。愈久愈在下。陰陽虛實之間。未易黑白判也。獨東垣云。生薑止嘔。只治表實氣壅。若胃虛。惟當補胃。改服大半夏湯。立愈。詳別其因。對症用藥。可應無窮之變矣。夾

必讀無景岳之
方。此係淳所添

寒者。嘔吐冷涎。喜熱惡寒。肢冷。脈沈遲。多陰。二陳加丁香炮
理中加半夏。夾熱者。嘔吐煩燥。

喜冷惡熱。脈滑數。多陽。安胃飲。二陳加連。氣滯者。脹滿不通。二陳加橘竹茹枇杷葉。食積。飽悶

作酸。消導乃安。和胃加砂糖麥。吐酸水。責之肝臟。溫胃加香砂胡椒。氣滯者。脹滿不通。二陳加橘竹茹枇杷葉。食積。飽悶

小柴胡加陳皮生薑。嘔清水者。多氣虛。六君加石膏理陰煎。吐而中氣久虛。六君加石膏。嘔苦水者。邪在胆。

紅杏丸。丁砂胡椒薑汁糊丸。

三門總宜溫胃
順氣

惡心噯氣

經曰。太陰所謂上走心爲噫。足太陰病。腹脹善噫。又曰。寒氣客於胃。厥逆從上散。復出於胃。故爲噫。

恶心者。實胃口之病。此症之因。有寒。有食。有痰飲。有穢氣。有火邪。有寒溼傷脾。但察其寒熱虛實。盡之矣。惟虛寒十居八九。即有實邪。亦脾虛不能運化而然。

治此多宜溫補。咳嗽嘔惡。

君。痰滯。金水。

脾胃虛寒。

溫胃。

或傷生冷。或過飲。

加減。

暑熱煩渴。

竹葉石膏。

嘔氣者。即經謂噫。實脾胃之滯氣。起自中焦。而出上焦。故經曰。上走心爲噫。丹溪以爲有痰有火。未必皆然。蓋嘔多由滯逆而氣不行。多寒少熱可盡謂火邪。

凡飲食太飽。多有作嘔。此係實滯。宜行氣化食。若飲食遲化。虛悶作嘔。係胃氣

虛寒。治宜溫補。若痰火作嘔。亦有但停痰因以胃弱。胃弱多因無火不可不詳。

脈症而的治也。胃虛氣滯而嘔。

十味保和丸。

胃寒生痰。惡心嘔氣者。

和胃。

飲食難化。

溫胃。

養中。理中。脾腎虛寒。命門不煖。寒滯上焦。痞滿嘔氣。

理陰。加香。

十味保和丸六君。加木藿香附砂仁。

和胃二陳煎。二陳加薑砂。

吞酸

人之飲食速化爲貴。若胃中陽盛。健運如常。何酸之有。火力衰。化必遲。停積而爲酸腐。即敗之漸也。病此者多見飲食不快。漸至中滿。痞隔。泄瀉等症。豈非脾胃虛弱。陽虛之病乎。治宜溫補。若認爲火熱而妄用寒涼。鮮有不誤者。壯年胃盛。停積爲酸。和胃二陳。香安胃。以治標。中年胃虛。溫胃中。主之。若陰虛在陰分。水邪上泛爲酸。丁香加理陰。

藿香安胃散。丁陳與參薑。

此症丁沈桂附。
必不可少。

反胃

真陽不衰。定無此症。治法。陽虛兼寒。右歸八味。加歸薑。左歸六味。加乳汁。童便。酥油。蜂蜜。

反胃一症。本屬火虛。蓋食入於胃。果胃緩。脾強。則食無不化。何至復出。諸家謂有痰有熱。不知痰飲之留。正因胃虛。而完穀復出。豈猶有熱。王太僕云。食不得

還宜辨症。不得
概言有火。

亦宜加丁沈砂
透此屢用之妙
法切不可忽。
切不可標本雜
進。

入是有火也。食入反出。是無火也。斯言盡矣。然無火之由。有上中下三焦之辨。
寒在上焦。惡心欲吐。此胃脘之陽衰也。寒在中焦。食入或少頃。或半日。復吐。此
胃中之陽虛也。寒在下焦。朝食暮吐。暮食朝吐。此命門之陽衰也。使不知病本。
混行猜摸。難矣哉。治法當辨新久及所致之由。或酒色過度。或縱食生冷。敗其
真陽。或七情憂鬱。竭其中氣。無非內傷損胃。宜以健脾胃爲主。但新病強壯者。
胃氣猶未盡壞。如二陳湯。^{加減}皆能清痰順氣。^{不換金正氣散。}丁沈透膈湯。^{半夏乾薑散。吳}皆能去溼去滯。^{半夏乾薑散。}吳
湯。皆能去寒。惟真有邪滯。乃可用之。若病久。當專用溫補。使用開導消食化
痰。重傷胃氣。必不起。
一虛在上中二焦。皆責在脾。_{太倉丸。}半夏湯。下焦。五君。溫胃。附子理中。六味回陽。下焦責在腎。非補。
命門以扶脾土之母。終無濟。_{附子理陰。六味回陽。}右歸飲丸。八味湯丸。若大便閉結者。血涸於下。故

養胃膏。係淳添。

閉結不行。真陰枯涸症也。必使氣血漸充。臟腑漸潤。方是救本之治。苟徒計目前而推之逐之。雖見漸通。真陰愈竭矣。治法。陽虛兼寒者。補陽爲主。右歸八味。大加歸薑。陰虛兼熱者。補陰爲主。左歸六味。大加乳。蜜。亦妙。此症難。毋欲速。

大半夏湯。參蜜薑汁。

仲景吳茱萸湯。參棗薑。

透膈湯。太煩。淳
刪之。

丁沈透膈湯。六君砂蔻麥藿香。

立齋太倉丸。砂蔻丁沈陳。薑汁

內九。

全大養胃膏。人牛乳。薑韭汁。童便。各碗。

一參蓮草。各五錢。共煎一碗。蜜收膏。噙化。

噎膈理脾腎爲主。察其鬱氣痰火。兼味治之。果七情憂思。
酸棗仁湯。加熟梗。七福。加沈蔻。不應。大全開膈法。淳。

一陽。作少陽。與
肝爲表裏。結氣。

陰陽別論曰。一陽發病。其傳爲膈。三陽結。謂之膈。邪氣臟腑病形篇曰。脾脈微

脈。結也。言微急二

右歸加丁沈歸
脾加熟透丁香。
方爲至當。

急爲膈中飲食入而還出。通評虛實論曰。膈則閉絕。上下不通。則暴憂之病也。風論曰。胃風之狀。頭多汗。惡風。飲食不下。膈塞不通。腹善脹。本神篇曰。憂愁者。氣閉塞而不行。舉痛論後曰。思則心有所存。神有所望。正氣留而不行。故氣結矣。上膈篇曰。氣爲上膈者。飲食入而還出。

景岳提脾腎。固當。然丁沈砂蔻諸氣藥必用。淳綱。學者宜知提

噎膈症。必憂愁思慮。積勞積鬱。或酒色過度。損傷而成。蓋憂思則氣結。施化不行。傷陰。則精血枯。氣不行。則噎膈病於上。精血枯。則燥結病於下。且胃司受納。脾主運化。而腎爲水火之宅。生化之本。是運行生化之權。則爲脾腎。今既噎膈不行。便結不通。豈非運化失職。血脈枯槁之病乎。矧少年少見此症。惟中衰者有之。其虛實概可知矣。治此者。舍根本而言捷徑。又安望其成功也。又噎膈反胃。丹溪謂病出一體。不知實有不同。反胃能飲入而反出。噎膈隔塞不通。食不

真令人拍案拜
服。

能下。噎膈病於胸臆上焦。反胃病於中下二焦。此見症之不同也。反胃以陽虛不化可溫可補。治易。噎膈以氣結不行。或開或助。治有兩難。此輕重之不同也。張子和妄引三陽結。謂之膈。盡以爲熱。戒用丁桂。胡椒。之屬。不知經止言結。未言熱。河間執用氣。承。以攻之。丹溪云。不可用燥藥。三子俱寒涼之輩。不知膈乃命門無火。氣不化。精其臟氣之健否。爲何如。猶云爲熱。豈必使元陽盡去。別有生生之道乎。謬亦甚矣。

凡治噎膈法。以脾腎爲主。脾主運化。脾之大絡布於胸膈。腎主津液。腎之化氣主於二陰。上焦之噎膈責在脾。下焦之閉結責在腎。治脾宜溫補。治腎宜滋潤。舍此二法。他無捷徑矣。初起微虛者。溫胃。加厚朴。如果痰滯。二陳。加歸。朴。加減。俱虛。七全福。虛兼寒。五君子。溫胃。加歸。熟陰虛。小營。陰中之陽虛。右歸。八味。血燥。生薑。煎。便結。養胃。滋方之中方應。

宜寓氣藥於數

其津液使之漸潤。而以調脾胃等劑治其上。最爲良法。毋欲速也。如果氣血未敗。下焦脹閉之甚。不得不暫通。人參利膈丸。夫用溫補以治噎塞。人疑其迂緩。不知中氣敗甚。非速救根本。脾氣何由再健。設用溫補。噎塞愈甚。不得不曲爲加減。須千方百計。務從元氣中酌其所宜。庶可保全。若用溫補。雖未見效。但無窒礙。便是藥症相投。宜多服此。症甚難既受補。久方見效。苟性急致疑。圖目前之快。妄用桃仁黃芪稜瓜姜之屬。必致胃氣日敗。萬無生理矣。

胸膈煩悶。

生薑汁煎。

百

薑汁參合密牛酥。

人參合湯。文火熬膏。

人參利膈丸

藿木檳歸甘草黃枳朴。

大黃酒蒸蜜丸。

大全開膈法。

生附子一個。和狗牛涎。童便。煮熟。

先以麝塗手中。取附子搓弄。就罐口嗅其熱氣。半日即開。後用膏。胃

數方俱用麝大
奇亦通關捷法
脾腎也一通卽大補

關格上不得入。下不得出。

通關飲。參夏草棗君。皂麝與降木。蔻薑通珀辛。

關格四肢冷。既濟丸。人參熟附子麝香。糊丸。淳地。

大

大便不通。麻仁丸。檳榔歸皇麝木芍杏黃枳朴。蜜丸。勿通。

神思憂恚必讀亦提脾腎但不及景岳治法之精耳。

不知死脈多絃強假實脈。
變化精微。朝暮迭吐。反胃所由成也。噎塞雖屬熱。反胃雖屬寒。亦不可拘。脈大有力。當作熱治。脈小無力。當作寒醫。色黃白而枯。爲虛寒。紅赤而澤。爲實熱。以脈合症。以色合脈。庶乎無誤。經曰。能合色脈。可以萬全。審其陰陽。火旺者。養血爲急。脾傷陰盛者。溫補爲先。此臨症之權衡也。

必讀凡有弊者。余俱刪之。淳。
必讀凡有弊者。余俱刪之。淳。

氣滯胸痞。胃寒噎塞。治中湯。卽理中加青陳。

脾虛噎塞。補氣運脾丸。芪砂六君蜜爲丸。

久病。聞食聞藥即吐。比和飲。即異攻散加砂蔻神麩。

凡反胃噎膈。得藥而愈。不可便與飲食。以參苓白朮散。煎汁煮粥。服旬日。再進飲食。

無後患矣。

此門方多。其要
在三氣五痺。大
營大防風乎。大
痺閉也。三氣雜
合壅閉經絡。氣

痺凡痺都痛。此門多妙方。淳悉攝入。皆應手取效者。風寒溼。
三氣雜至。合而爲痺。風勝行痺。寒勝痛痺。溼勝著痺。淳

脈大而濶。爲痺。微緊。亦痺。行痺脈浮。痛痺脈濶。著痺脈緩。

經曰。風寒溼三氣雜至。合而爲痺也。其風氣勝者爲行痺。

風者善行而數變。凡走注厯節疼痛之類。

俗名流火是也。寒氣勝者爲痛痺。

寒氣凝結。陽氣不行。故痛楚處異常。俗名痛風是也。溼氣勝者爲著痺。

肢體重着不移。

或癟痛。或不仁。溼從土化。病多發於肌肉。俗名麻木是也。腎痺善脹。尻以代踵。脊以代頭。

腎爲胃關。陰邪乘胃。故脹代踵。足攢。

身代頭。

愚按內經論痺。四時之令。皆能受邪。五臟之氣。各能受病。六氣之中。風寒溼居半。曰雜至。曰合。則知非偏受一氣。可以致痺。其下一勝字。則知但分邪有輕重。未嘗非三氣雜合爲病。皮肉筋骨脈。各有五臟之合。初病在外。久而不去。則各固其合。而內舍於臟。在外者。祛易。在內者。攻難。治外。散邪猶可。治內。養正爲先。治行痺。散風爲主。禦寒利溼。仍不可廢。大抵參以補血之劑。蓋治風先治血。血行風自滅也。治痛痺。散寒爲主。疏風燥溼。仍不可廢。大抵參以補火之劑。非大辛大溫。不能釋其凝寒之害也。治着痺。利溼爲主。祛風解寒。亦不可缺。大抵參以補脾補氣之劑。蓋土強可以治溼。氣定自無頑麻也。

此卽治是症之竅。宜留心百讀。臨症自能高人。

景岳欲辨寒熱。多熱陽症。無熱陰症。然痺本陰邪。寒多熱少。不可不察。總由真陰衰弱。故三氣得以乘之。筋脈爲之不利。經曰。邪入於陰。則痺。正此謂也。治法最

補真陽尤要。

宜峻補真陰。使氣血流行。邪氣隨去。若過用風溼痰藥。再傷陰氣。必反增病。此痛痺之大端也。惟五防風。三氣。之類方能奏效。易老天麻丸。亦可數方酒浸尤佳。

筋痺卽行痺。邪與氣血相搏。聚於關節。或赤或腫。走注疼痛。上下左右游行不定。大防風湯。十全大補加羌防牛杜附片。如意通聖散。芍歸草麻防丁陳

乳沒香。腰膝痛。加虎膝。小續命湯加減。

亦能治痢後鶴膝風。

骨痺。即痛痺。寒傷營血。筋脈攣急。關節浮腫。痛苦切心。三氣飲。歸芍杞芩杜牛熟。北辛炙草芷桂附。氣虛。加參。尤風。寒甚。加麻黃。

加附子。嘔惡。加焦薑。獨活寄生湯。

精血虧損。腰膝筋骨心腹疼痛。婦人經遲血少。大營煎。歸枸熟草桂牛杜。滯。

肌痺。即着痺。汗多。四肢緩弱。麻木。皮膚不仁。精神昏憤。神效黃芪湯。參澤與

陳朮草苓蔓京芍。

大加黃柏。酒炒。

十全大補湯。補中益氣。加肉桂苓夏。

五痺湯。八珍加辛桂。

前賢用方。何等
簡當。淳加參更妙淳

易老天麻丸。歸熟牛夕桂附羌。

歸熱補血。桂附行血。補火。附寒。麻羌散風。牛夕引下行。

三因附子湯。四君歸熟芍桂薑。

此方亦佳。

流注。或結核。或漫腫。或生四肢關節。胸腹腰臀。皆氣血虛。腠理不密。外邪客之。
用葱搗爛熱貼。冷則易。內服前諸方。擇用。

立齋益氣養營湯。八珍加陳芪貝桔香。

藥

香。此方應刪。因有四物血藥。姑留之。

方脈流氣飲。二陳。四物。加青烏蘇桔防枳木。

此方應刪。因有四物血藥。姑留之。

余以溫肝腎爲主。方列於後。

瘻。大營等方。重加人參虎骨。成功未聞。單以瘻藥痊者。內經雖重陽明。前

後二條獨重於腎。蓋腎主骨。肝主筋。腎足則筋強。學者宜知補腎。雖脾主四肢。然脾藥多不應。大抵此症甚難。故內經首重之。豈寒涼庸手。所

能微倖耶。此予獨得之竅。諸生勿忽。

本神篇曰。精傷。則骨痠瘞厥。精時自下。曰瘻疾。取之陽明。視有餘不足。肺脈微緩。爲瘻瘞偏風。脾脈緩甚。爲瘻厥。四肢不用。心慧然若無病。腎脈微弱。爲骨痿。
明白也

坐不能起。

皮毛之弱。焉使人瘻。淳人瘻。淳不服。內經在此條。熱字。應作虛字。較妥。內經以瘻歸肺。令人難解。且有凶熱成瘻。爲後世寒涼作俑。淳不無遺憾。

瘻論。帝曰。五臟使人瘻。何也。岐伯曰。肺主身之皮毛。心主身之血脈。肝主身之筋膜。脾主身之肌肉。腎主身之骨骼。故肺熱葉焦。則皮毛虛弱急薄。著則生瘻也。心氣熱。則下脈厥而上。上則下脈虛。虛則生脈瘻。樞折掣脰。縱而不任地也。肝氣熱。則胆泄口苦。筋膜乾。則筋急而攣。發爲筋瘻。脾氣熱。則胃乾而渴。肌肉不仁。發爲肉瘻。腎氣熱。則腰脊不舉。骨枯而髓減。發爲骨瘻。曰。肺者。臟之長。

宗筋言筋之總。

也。爲心之蓋也。有所失亡。所求不得。則發肺鳴。鳴則肺熱葉焦。五臟因發爲痿。嬖。悲哀太甚。則胞絡絕。傳爲脈痿。二條乃七情之傷。入房太甚。宗筋弛縱。發爲筋痿。生

於肝使內也。條言肝腎傷。內即入房此。有漸於溼。以水爲事。痺而不仁。發爲肉痺。得之溼地也。論治痿者。獨取陽明。何也。陽明者。五臟六腑之海。主潤宗筋。宗筋主束骨而利機關也。故陽明虛。則宗筋縱。帶脈不引。故足痺不用也。

帶脈在季脅之下。

愚按。痿者重疾也。故內經直出諸篇。而前哲之論。或附見虛勞。附見風溼。大失經旨。賴丹溪表而出之。惜乎言之未備也。經言病本五臟。獨重太陰肺經。治法雖諸經各調。獨重陽明胃經。何與。肺金體燥居上。主氣化以行令於一身。畏火者也。五臟熱火薰蒸。則金被尅。而肺熱葉焦。故致疾。雖有五臟之殊。而手太陰偏曲之見之地。未有不傷者也。肺土體溼居下。受水穀以灌溉四肢。畏木者也。肺金之受解經不高明。士材明手亦如是耶。

好言五行。淳往
往羞之。

不補腎。奈何。

厭人。

邪失正。則木無制。而侮其所勝。故治法雖有五臟之分。而足陽明之地。未有或遺者也。夫既傷肺。治之宜肺金矣。獨洪陽明何也。靈樞所謂真氣受於天。與穀氣並而充身。陽明虛。五臟無所稟。不能行血氣。濡筋骨。利關節。故百體中有不用而爲痿。不取陽明何取哉。丹溪云。泄南則金清。東方不實。補北則火降。西方不虛。斯言雖當。若胃虛。宜辛溫之劑。養胃香。若拘泄南。胃愈虛矣。至六淫七情。夾不虛。此言雖當。若起岐軒而問之。當亦推服。何況淳乎。

有多端。

非筆舌可罄。

所論不着痛癢。可知此症非士材所長。

姑錄之。以待後學之悟。

岳景元。

氣傷則精益虛。不能灌溉營養。概從火論。恐真陽虧敗。及土衰水涸者。有

不能堪。故當酌寒熱之淺深。審症虛實之緩急。庶得治痿之全矣。一痿由實溼熱。脈洪滑。而症煩熱。當先去其火。二妙散。經驗虎脰丸。若只因肝腎虧損。惟膠角丸。最善。

立齋曰。痿症多因足三陰虧損。味還火丹六。

要言不煩

二方。全不信。

鹿角膠霜熟歸丸。參朮龜牛芩虎杜。肝腎虛。筋骨痿。

附

藿香養胃湯。六君砂苡麴烏茄。

二妙散柏蒼。非溼熱。慎用。

經驗虎脰丸。蒼柏四兩歸牛二。龜板虎脰防已一。

九。

氣血俱虛。大防風湯。虎潛丸。歸芍知柏熟銷湯。陳龜牛虎麥乾畫。有熟

脈大無力。此營衛俱虛。

朝服十全加光附。夕服八味加牛杜枸

煨腎丸。牛熟杜兎藜。

桂防胡蓉脂。熟猪腰和蜜杵。九。

附療驗方。比症除桂附。決不效。

淳治此症。多用

大營溫腎。右歸。八味。加參。茸。虎脰。

屢效。以

三氣飲。加虎脰。虎風散。加人參。桂附。浸酒。時用。黃芪。

湯薰洗。貧者。百草花藤煎。加亦可。

陽痿

確論。

男子陽痿不起。由命門火衰。精氣虛冷。或七情勞倦。損傷生陽之氣所致。亦有濕熱熾盛。以致宗筋弛縱而爲痿弱者。然有火無火。脈症可辨。但火衰者十居八九。火盛者僅有之耳。凡思慮焦勞。憂鬱太過者。多致陽痿。經曰。二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月。即此之謂。驚恐不釋者。亦致陽痿。恐傷腎也。

命門火衰。精氣虛寒。陽痿者。右歸丸。

贊育丹。見求嗣門

火不甚衰。只因氣息薄弱者。斑龍丸。

鹿膠霜。枸杞。菟。熟。荳。補。骨。

右歸。

思慮恐懼。陽痿者。若不益火。終無生意。七福。

歸脾。加桂附。柏。

溼熱。宗筋弛縱。陽痿。滋陰八味丸。虎潛丸。

治痿當以脾胃爲主。八味丸理。

痰飲。稠濁爲痰。清稀爲飲。痰在身。習如臥芒刺。如蟲行。二者風痰。或有之。淳實未見。

陰煎。加陳朮。

飲脈絃微沈滑。眼胞及眼下眼皮。如烟炭者。痰也。甚者。即死。亦晦氣。

經曰。太陰在泉。溼淫所勝。民病飲積。又曰。歲土太過。兩次流行。甚則飲發。又曰。

土鬱之發。太陰之復。皆病飲發。鬱與復皆受傷

景岳內經本無痰之名。老痰之名。起自仲景。後世相傳。無論是痰非痰。開口便云

熟讀此篇。勝看
王肯堂一部導
痰書。淳

痰火。有云怪病之爲痰者。有云痰爲百病母者。似乎痰之關係甚重。何內經之忽之也。不知痰之爲病。必有所以致之。如因風火生痰者。但治其風火。風火息而痰自清矣。因虛實生痰者。但治其虛實。虛實愈而痰自平矣。未聞治痰而風火可息。虛實可調者。所以痰必因病而生。非病因痰而致也。正以痰爲病之標耳。世醫但知攻痰。標本失矣。

痰即人之精液。無非火穀所化。悉由中虛而然。痰即水也。其本在腎。其標在脾。在腎者。以腎虛水不歸源。水泛爲痰也。在脾者。以脾虛飲食不化。土不制水也。

凡痰藥俱不補。
學者當知。淳
獨見高人一切
方書。俱無此論。

強腎要知水火
二着淳

說理透澈。令人
心服。

強壯之人隨食隨化未見爲痰惟不能食者反能生痰故病虛癆者其痰必多病至垂危其痰益甚正以脾虛不化而水液盡爲痰也故治痰者必溫脾強腎以治痰之本根本充痰不治自去矣是以實痰無足慮可畏者虛痰耳治痰之法能使元氣日強痰必日少卽有微痰不能爲害若元氣日衰則水穀津液無非痰耳隨去隨生有攻之使盡而保元氣無患者吾不信也善治痰者惟能使之不生方是補天之手吳菱山云八味理陰煎治痰之本也不若加陳皮神效

必讀按痰之爲病其源不一有因風寒暑溼而生者有因驚而生者亦有因虛而

內經只言飲未
言痰

精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經并行精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經并行

何痰之有。惟脾土虛溼。清難升。濁難降。留中滯膈。瘀而成痰。故治痰先補脾。脾

復建運之常。痰自化矣。

以下分五痰。五飲。淳悉刪去。必讀提理。脾爲主。不言補腎。未免遺漏。余多用二陳。六安。寧肺。金水等湯。察其有

火兼清。有氣兼順。風寒兼表。溼兼燥。痰兼澀。加血藥無火。開手便用溫補。若分五痰。五飲。反成穿鑿。要之六君理陰補中。十全六味。八味。左歸右歸。金匱腎氣。

罔非痰藥。痰症方無甚佳者。諸多可厭。余悉不纂。淳附

脾胃不和。一切痰症。

二陳湯。陳半芩草枳。

加星。名導痰湯。生薑。烏梅。引。脇痰。在皮裏膜外。加白芥。此

虛寒嘔吐。飲食難化。理中化痰丸。四君加星夏。

實熱老痰怪痰百病。

滾痰丸。礞沈酒蒸大黃芩。

老痰怪痰。俱屬不經之談。看保元者。以此方爲至寶。淳見

服此丸者。十死七八。多成難挽。暫用以泄火。可矣。久用爲害不淺。

痰在胸背。手足腰項筋骨引痛。走易不定。

俗名灌痰。不知爲痺。

妙應丸。遂載白芥。

糊丸。一名

良。味雖簡而方不

控涎丹。此方亦攻痰而已。見人以十全愈者。何必此方乎。

保元亦以爲要方。

淳考脈沈人多不死。然沈脈多內傷。咳嗽脈沈。要作內傷咳嗽。

食積酒積之痰。保和丸。二陳加麯麥砂連。

無火去連。不及十味保和多矣。

咳脈多浮。浮濡易治。沈伏而緊。死期將至。

脈滑。手足溫者順。脈濇。四肢寒者逆。咳而氣逆。身熱。不得臥。難治。上氣喘咳。面腫肩息。脈沈大者死。咳嗽羸瘦。脈形堅大者死。手足宜溫。身不宜熱。

黃帝曰。肺之令人咳。何也。岐伯曰。五臟六腑皆令人咳。非獨肺也。皮毛者。肺之合也。皮毛先受邪氣。邪氣以從其合也。其寒飲食入胃。從胃脈上至於肺。則肺寒。肺寒則外內合邪。因而客之。則爲肺咳。人與天地相參。故五臟各以其時治。時感於寒。受病微。則爲咳。甚。則爲痛。爲泄。

言外感亦咳。內傷生冷亦咳。

咳雖有外感內傷。辨之在脈。脈

浮或緊。六安加減。

麻黃。咳痰費力。二方加歸脈

沈。主內傷。金水。

寧肺。三陰。拯陰。

通加蘇梗。惟沈

洪數緊。不惟陰虛。皆是逆脈。

久咳不忌脾藥。

參苓蓮苡。在所必用。

五臟之久咳。乃移於六腑。脾咳不已。則胃受之。咳而嘔。嘔甚。長蟲出。肝咳不已。則膽受之。咳嘔胆汁。肺咳不已。則大腸受之。咳而遺屎。心咳不已。則小腸受之。咳而失氣。腎咳不已。則膀胱受之。咳而遺溺。久咳不已。則三焦受之。咳而腹滿。不欲飲食。此皆聚於胃。關於肺。使人多唾涕而面浮腫氣逆也。

愚按。咳雖肺病。五臟六腑。皆能致之。析其條目。經文尙漏。總其綱領。不過外感內傷而已。風寒暑溼。傷其外。則先中皮毛。皮毛爲肺之合。脈邪不解。他經亦病。此自肺而後傳於諸臟也。勞慾、情、志、傷、其、內。則臟氣受傷。先由陰分。而病及上焦。此自諸臟而後傳於肺也。自表而入者。病在陽。宜辛溫以散邪。則肺清而嗽愈。自內而生者。病在陰。宜甘以壯水潤以養。金則肺寧。而咳愈。大抵治表者。藥不宜靜。靜則留連。不解變生他症。故忌寒涼收斂。如五臟生成篇。所謂肺欲辛

保元先生定死
黃芩不知何見

竅眼。

必讀此見不讓
景岳。

是也。治內者藥不宜動。動則虛火不寧。燥癢愈甚。故忌辛香燥熱。如宣明五臟氣篇所謂辛走氣。氣病無多食辛是也。然治表者雖宜動以散邪。若形症俱虛者又當補中氣而佐以和解。倘專於發散。恐肺氣益弱。腠理益疎。邪乘虛入病。反增劇也。治內者雖宜靜以養陰。若命門火衰不能歸源。則參芪桂附在所必用。否則氣不化水。終無補於陰也。至夫因火宜清。因溼宜利。理氣消痰。隨症調治。在老人虛人。皆以溫養脾胃爲主。稍稍治標可也。若欲速愈。亟攻其邪。危固要着。

多矣。

景岳

咳嗽之要。只惟二症。外感內傷盡之矣。但於二者之內。當辨陰陽虛實耳。蓋外感陽邪也。治宜辛溫。邪得溫而自散也。內傷陰病也。治宜甘平養陰。陰氣復而咳自愈也。然外感之咳多有餘。若實中有虛。則宜兼補以散之。內傷之咳多圓活。卽治宜。

惟內傷之咳。最多最難。醫家鮮效。景岳所以切切言之。

用藥爭關竅眼。
學者留心。

不足。若虛中夾實。亦當兼清以潤之。於此求之。自得其本。內傷之咳。皆本於陰分。雖五臟皆有精氣。而腎爲元精之本。肺爲元氣之主。五臟之氣分受傷。病必自上而下。由肺由脾。以極於腎。五臟之精分受傷。病必自下而上。由腎由脾。以極於肺。肺腎俱病也。他臟不免。所以勞損之咳。最爲難治。正以病在根本。不易爲力。尙堪治。不求本乎。故治上者不在乎上。而在乎下。治下者不在乎下。而在乎上。知氣中有精。精中有氣。斯可以言虛癆之治矣。

解集

有腎中陽虛。水冷金寒而咳者。猶進寒涼。殆矣。六君加炮丸。八味丸。有肺因火灼而咳。

恰肖丹溪。

不知咳得洪實
之脈。不可爲矣。

清金降火。誰不知之。芩連冬知。究非本論。補北泄南。是也。後以參芪救肺。使金水相生。咳易愈矣。治法。新咳脈浮。爲表邪。宜發散。脈實。爲內熱。宜清利。濡弱爲虛。宜溫補。久咳肺胃俱虛。宜溫中助胃。兼治咳藥。張垣。高李與東。下自別。

風寒咳嗽。痰滯氣逆。

六安煎。二陳加香芥。

麻蘇辛桂隨利喉費力加痰氣

肺腎虛寒。水泛爲痰。及老弱外受風寒。咳嗽嘔惡。多痰喘急。

金水六君煎。二

陳加歸熟。

氣滯胸脅。加白芥。寒。加細辛。氣虛加參。

營衛俱虛。熱汗喘咳。

寧肺湯。八珍加阿桑麥味。

隨症少兼表藥。

風寒邪形症俱實。

加減麻黃湯。麻黃湯加陳夏蘇葉。

風寒鼻聲重。咳嗽痰多。

金沸草散麻前辛。夏草荆芥芍茯苓。

熱加柴芩。頭痛加川芎。

食積痰咳。老弱睡夢中忽咳。食痰也。

二陳加杏枳麴麥萊菔。

咳吐痰食俱出。

二陳加辛枳麥木。

水寒射肺。咳而上氣。喉中水作雞聲。

射干麻黃湯。辛夏味菀款冬花。

七情氣鬱。上逆爲咳。

七氣湯。加杏味桑參。阿麥枇杷葉。

此方不過表散平淡而已。較之六安金水。寧肺。殊覺平平。奉爲神奇。太過。

咳嗽煩冤。腎氣之逆。此虛火來乘金。用拯陰刦。療人參養營等方。稍兼咳藥。審症用之。惟用寒涼。多死。淳

經年久咳。飢時腹脹。上脣白點。蟲噉其肺。一味白部加檳榔。搗膏。乾咳嗽。先用道遙散。

後用補陰之劑。

咳嗽通劑。清肺飲。桔貝陳芩草味杏。外感勿用。

淳治一婦。咳而遺溺。以金水六君加益智。愈。

又治一虛癆。久而不愈。以人參養營效。淳附。

喘附吼。喘多腎虛不納氣。淳

喘每用腎藥。加丁沈骨脂效。

喘宜治腎。腎虛多不納氣。歸腎貞元。大加丁沈骨脂。歸氣。加骨脂。亦宜。

死右寸沈緊。爲肺感寒邪。亦有六部俱伏者。淳考沈死。右寸沈緊。爲肺感寒邪。亦有六部俱伏者。淳考沈死。

岳景氣喘之病。最爲危候。辨之惟二而已。一曰實喘。一曰虛喘。實喘有邪。氣實也。

辨喘脈亦微刪。

虛喘無邪。氣虛也。實喘氣長而有餘。虛喘氣短而不續。實喘胸脹氣粗。聲高息湧。膨脹若不能容。惟呼出爲快。虛喘慌張氣怯。聲低息短。皇皇若氣欲斷。一責在肺。一責在腎。蓋肺爲氣之主。腎爲氣之根。且氣盛有邪之脈滑數有力。氣虛無邪之脈微弱無神。此脈候之不同也。有浮洪或絃大至極而稍按無力。此正無根之脈也。但脈之微弱者真虛易知。猶順而易醫。浮絃者假實難辨。最險而多變。若絃強之盛。全無和緩者。胃氣敗也。真臟脈見也。虛喘但察其表裏無邪。

脈息微弱無力。貞元飲加減。主之。神效。大小營煎大補元煎。擇用。若溏泄兼下寒者。右歸飲丸。實喘。

火喘宜寒涼。黃芩半夏湯。涼肺湯。風寒喘宜溫散。大安加麻蘇小龍華蓋散。

又有痰喘之說。前人皆曰治痰。不知痰豈能喘。必有所以生痰者。或因風寒暑溼。或因脾腎虛弱。有一火喘。必有火脈。數方。假實脈亦可用。然以淳驗之。丁沈養脂必加方效。

於此皆能生痰。欲治痰而不治所生之痰。則痰終不治而喘。何以愈哉。

愚按內經論喘。其因衆多。究不越乎火逆上而氣不降也。夾虛者亦有數條。非子母情牽。即仇讎肆虐。害乎肺金之氣。孰非火之咎耶。雖然。火則一。而虛實則分。丹溪曰。實火可泄。芩連之屬。虛火可補。參芪之屬。每見世俗治喘。純行破氣。於太過當矣。不及可乎。余論此症。因虛死者十九。因實死者十一。實者攻之卽效。無難也。虛者補之未必卽效。須悠久成功。其間轉折進退。良非易也。故辨症宜急。巢氏嚴氏只言實熱。獨王海藏云。肺氣果盛。則清肅下行。豈復爲喘。氣衰而喘。所謂盛者。非肺氣也。肺中之火也。斯言高出前古。惜乎。但舉其端。未能縷析。氣虛而火入於肺。補氣爲先。六君。陰虛而火來乘金。壯水爲急。六味。腎虛火不歸源。導龍入海。八味。腎虛水邪泛濫。逐水下流。金匱。腎氣。風寒者。解其邪。三拗。溼骨脂淳附。沈丁加宜俱俱。

氣者。利其水。

神湯治。秘湯。

暑邪者。滌其煩。

白虎湯。

肺熱清之。涼肺湯。

七氣湯。

氣屬疏之。

湯。

肺癰而喘。保金化毒。

肺癰神湯。

以上諸款皆其大綱。七情六氣何在。非致喘之由。舉

一反三方不愧司命明手。別有哮症。由痰火鬱內。風寒束外。或坐臥塞溼。或過食酸鹹。或虛火薰蒸。病根深久。難以卒除。理氣疏風。勿忘根本。方爲善治。

景岳 哮喘遇寒卽發。遇勞卽發者。未發時。以扶正氣爲主。既發時。以攻邪氣爲主。

扶正氣須辨陰陽。攻邪氣須分微甚。或溫散風寒。或清痰火。然發久者。氣無不

治法與喘略同。
明論不磨。

虛於消散中。酌加溫補。溫補中量。加消散當。拳拳以元氣爲念。使元氣漸充庶可。望愈。若攻之太過。未有不日甚而危者。

吼症甚多。治者莫愈。余究其故。全無

症不顧人之元氣。只見病治病。真庸手耳。淳附。

喘者。呴呴氣急。喝喝痰聲。張口抬肩。擦身擗肚。

短氣者。呼吸雖急。而苦不能接續。出多入少。似喘而無痰聲。不張口抬肩。
哮者。與喘相類。但不似喘。張口出氣之多。有呀呷之聲。呷者。口開。呀者。口閉。似
痰結喉間。與氣相屬。故呀呷作聲。三症當詳辨。

陰虛而喘。婦人血海虧者。多此症。貞元飲。歸熟炙草。虛氣微脈。加煨桂。手足冷。加桂尤寒。
加骨脂。歸氣飲。加參歸。

喘急多痰。可坐不可臥。可俯不可仰。兩尺獨大而軟。乃上盛下虛之象。歸腎

丸。熟芩茱藥。歸杞杜兎。淳。原方治精血少。腰疼膝軟。

寒喘。四肢冷。六脈多沈細。附子理中。加桂。朴。陳皮。蘇子。香砂。

風寒喘急。鼻塞痰壅。三拗湯。甘草。杏仁。乾姜。華蓋散。麻杏陳草。蘇子赤苓桑薑棗。

溼傷喘而身重。治喘滲溼湯。二朮陳芩草丁薑。

脈浮緩者。心下有水。腹必響。小青龍湯。

水氣乘肺作喘。立齋神祕湯。桑蘇陳參薑。宜加茯苓

涼肺湯。桑草陳二母二冬黃芩。

短氣。生脈散加陳朮阿膠。歸腎丸加骨脂。亦妙。

勞傷氣血。胸滿隱隱痛。咽乾口燥。吐膿。生腥臭。脈或滑數。右脅按疼。肺癰神湯。陳草蔻。桔

貝苡芪銀葶蓼。宜加歸。新起加防。潰加參。不斂加槿皮。即夜合。

吼哮。自汗厥冷。六脈沈細者。補中益氣加。荳夏杏味麥。此方亦佳。一二陳加枳梗防蘇

子。寒加膏。

燒存性

不及金水六安。
加減妙。

食積痰吼。青金丸。菔子一兩皂三分。餅蒸。汁。丸。一方。淡豉、枯礬、陳米共末。臨臥。薑湯調下。

泄瀉。利溼健脾。
胃苓參。白朮。
飲不應。胃鬱加梅味。

泄瀉

泄脈沈細。沈遲寒侵。沈弱滑脫。暑溼緩濡。

洪逆實死。下泄上吐痰不已爲上下俱脫死。暴泄非陰久泄非陽。殞泄下利清穀洞泄下利清水。六氣爲火泄。絕少。淳有辨在癥疹門。

經曰春傷於風夏生殞泄邪氣流連乃爲洞泄又曰清氣在下則生殞泄又曰溼勝則濡泄又曰暴注下迫皆屬於熱諸病水液澄澈清冷皆屬於寒。

讀必經曰風寒暑溼四氣皆能爲泄又云清氣在下則生殞泄明脾虛下陷之泄。

統而論之土虛不能制溼故曰溼多成五泄則風寒與暑皆得干之而爲病治法有九一曰淡滲使溼從小便而去經云治溼不利小便非其治也又云在下者引而竭之是也惟陰虧火衰俱不可利。一曰升提氣屬於陽性本上升胃氣注迫輒爾六淳去其三取其

難曰熱淫。然不
傷水溼。生冷。斷
不至溼。火溫。津
不信也。

當。久瀉之陰。此條

下陷。升柴羌葛之類。鼓舞中氣。上騰則注下自止。如土地淖溼風之卽乾。所謂下者舉之是也。一曰清涼。熱淫所至。暴注下迫。所謂熱者清之是也。黃芩湯類。一曰疏利。經云。通因通用。是也。芍藥湯。一曰酸收。泄下有日。氣散不收。無能統攝。酸泄皆成於土溼。溼皆本於脾虛。倉廩得職。水穀善分。經云。虛者補之是也。一曰溫腎。腎主二便。封藏之本。雖屬水真陽。寓焉少火。生氣火爲土母。此火一衰。何以運行三焦。熟腐五穀乎。脾虛必補。母經云。寒者溫之是也。一曰固澀。注泄日久。幽門道滑。卽投溫補。未克奏效。須用澀劑。所謂滑者澀之是也。之數者。治泄之大法。業無餘蘊。至先後緩急之權。豈能預設。須臨症之頃。圓機靈變。可以胥天下於壽域矣。

清濁兩不分。陰陽要分別。

胃苓湯。平胃合五苓。

無外邪或嘔。以乾薑易蒼朮。

風泄脈浮絃。白沫多有聲。

升陽除溼蒼防升。羌柴猪澤麴麥陳。

寒泄脈沈遲。悠悠腹痛時。

附子理中加桂苓木香。

薑棗烏梅引。

虛寒嘔泄。

養中煎。參苓山扁草乾薑。

暖加陳砂。胃中覺悶加熱地。

泄宜減歸淳易山藥。

中寒嘔泄。不思飲食。婦人胎氣不安。

溫胃飲。參朮山扁陳草薑。

氣滯胸腹痛。加丁木吳蔻。

下寒帶濁。加骨脂。嘔不止。加胡椒水泛爲痰。加苓熟。

食入卽泄。脈微弱。

補中加蓮蔻山苓木薑。又宜參苓白朮散甘陳。山扁梗苡

蓮砂仁。

此補脾第一方。泄痢宜此調之。梅蔻吳澤隨加。

加歸芍麴夏棗肉丸。名參苓白朮丸。

蜜丸更妙。

暑泄。暴泄如水。面垢脈虛。自汗煩渴。

薷苓湯去桂。

溼泄。脈微細。腹響如雷鳴。

五苓散。

升陽除溼湯。

火泄。痛一陣泄一陣。必有火脈火症方的。

涼胃湯。加澤芍。見小便

黃赤。

食積作泄者。腹痛甚而泄。泄後痛卽減。其脈多絃滑。

香砂枳朮丸。加麵麥。

猪澤。

腎泄在五更。久而不愈。是腎虛失藏之本。

八味丸。四維散。參附薑草梅。脾

虛寒。泄痢滑脫不止。二陰
血脫不禁。無出此方之右。

久泄。精神困倦。補中去歸。加蔻熟薑夏。

脾腎虛寒。大便不實。飲食不思。精神短少。

仲景二神丸。蔻脂。

薛氏四神丸。蔻吳

味脂。腹痛加木茴。二方俱生薑煮聚肉丸。米飲下。

久泄。諸藥不效。益智一兩。濃煎飲之。立愈。

痢疾。痢以脂血傷敗。胃關煎。加肉蔻。八味地黃

泄瀉下痢。沈小微弱。實大浮數。發熱則惡。

脈洪數。與症相
反。發熱。則陰虛
之甚。故惡淳。

身宜涼。不宜熱。若見實大浮數之脈。必發熱而成惡候。仲景云。沈絃者重。大者

爲未止。微弱爲欲止未止。雖發熱不死。脣若塗硃者死。下純血者死。大孔如竹筒者死。如魚腦猪肝者半生半死。

經名腸澼。古稱滯下。言積滯不行。積者物積。滯者氣滯。積欲出氣不與俱出。故裏急後重。

岳景或垢或血。或見五色。或多紅紫。或痛或不痛。或嘔或不嘔。或爲發熱惡寒。甘要。在虛實寒熱耳。得其要。則萬無一失。失其要。則爲害最多。

泄淺而痢深。泄輕而痢重。泄由水穀不分。出於中焦。溼由脾胃而分於小腸。故可澄其源。所以治宜分利。痢以脂血傷敗。病在下焦。肝腎大腸分利無及。故宜調養真陰。并助小腸之主。以益氣化之。源症治之不同也。夫痢因於暑。然炎熱者天之常令也。因熱貪涼者人之常事也。過食生冷。所以致痢。夫以生冷致

病源。

治法。

辨專用寒涼。

痢。豈即化爲熱乎。奈何近代醫流。只見此時之天熱。不見此人之臟寒。開口便言熱毒以寒涼治。生冷何異。雪上加霜。然亦有寒涼愈者。何也。以胃強陽盛邪。不勝正。故可寒涼而愈。亦可通利而愈。但此輩極少。胃弱陽虛者極多。若再用寒涼。妄加滌蕩。無有不死。故俚詞曰。夏日多炎。陰邪易入。暑熱是主。風寒是客。身不被風。瘧從何惹。口不受寒。痢從何得。治必求本。岐軒醫則。

愚按。痢之爲病。多本脾腎。脾司倉廩。土爲萬物之母。腎主蟄藏。水爲萬物之元。皆根本之地。投治少差。冤沈幽冥。究其疵誤。皆寒熱未明。虛實未辨耳。晚近不足論。即前賢如局方與復庵。行辛熱。河間與丹溪。專用苦寒。何其執而不圓。相去天壤耶。夫痢起夏秋。溼蒸熱鬱。本乎天也。因熱求涼。過吞生冷。由於人也。氣壯而傷於天者。暑熱居多。氣弱而傷於人者。陰寒爲甚。言熱者遺寒。言寒者。

必讀此論。不謬。
景岳

廢熱。豈非立言之過乎。至以赤爲熱。白爲寒。亦非確論。果爾。赤白相兼。豈眞寒熱同病乎。必以見症與色脈辨之。而後虛實寒熱不淆也。須知寒者必虛。熱者必實。更以虛實詳之。寒熱愈明耳。腹脹惡食。急痛拒按。實也。煩渴引飲。喜冷畏熱。熱也。脈實滑數者。熱也。外此。則靡非虛寒矣。而相似之際。尤當審慎。以口渴爲實熱似也。不知凡係痢症。必亡津液。安得不渴。當以喜熱喜冷分虛實也。以腹痛爲實熱似也。不知痢出於臟腸胃。必傷膿血。剝膚。安得不痛。當以痛之緩急。按之可否。脹與不脹。脈有力無力。分虛實也。以小便黃赤短少爲實熱似也。不知水從痢出。溲必不長液。以陰亡溺。因色變。當以便之熱與不熱。澀痛不澀痛。分虛實也。以裏急後重爲實熱似也。不知氣陷。則倉廩不儲。陰亡。則門戶不閉。當以病之新久。質之強弱。脈之盛衰。分虛實也。治法須求何邪所傷。何臟受

病。因於溼熱。去溼熱。因於積滯。去積滯。因氣血。宜調和。新感而實。通因通用。久病而虛。塞因塞用。是皆常法。獨怪世之病痢。十有九虛。治者百無一補。氣本下陷。而再行其氣。後重不益。甚乎。中本虛衰。復攻其積。元氣不愈竭乎。溼熱傷血。自宜調血。過行推蕩。血不轉。傷乎。津亡作渴。宜補陰生津。但與滲利。津不轉耗。乎。利治痢。禁小便。且庸工謂痛無補法。不知因虛而痛。愈攻愈虛。愈痛矣。此皆本末未明。但據現在者爲有形之疾病。不思可慮者在無形之元氣也。悉言宜補之症。脈來微弱。形色虛薄。疾後而痢。因攻而劇。皆可補。尤要脾腎。如先痢後泄。腎傳脾。微邪易醫。先泄後痢。脾傳腎。賊邪難療。腎爲胃關。開竅於二陰。未有久痢而腎不損者。故治痢不知補腎。非治也。凡六君十全。補脾雖善。若火衰土位。無母非桂附大補。命門何以復。腎中之陽。救脾家之母耶。如畏熱不前。僅以一參朮。

補土多致不起大可哀矣。

岳噤口痢最危之症自古未有明辨丹溪用參連言用甘溫以火濟火以滯益

滯不知此症有食積者其胸腹必脹滿鞭痛當行滯去積

青陳查樸

之屬有火鬱者

臟腑必多熾熱脈見洪數當泄火去熱

柏連

之屬此邪蓄於中乃噤口痢之實

症也外此有二一由脾氣之弱或嘔惡吞酸或惡聞溼氣此以中焦不運故食

不入責在脾一由腎氣之弱命門不緩則大腸不固小腸不化下焦失守化源

無主責在腎欲健中焦非參朮草薑不可欲健下焦非熟附吳桂不可脾腎強

而食自入其理甚明余以此活人不勝紀矣丹溪悉以實火爲言乃一曲之見

耳局人意智絕人生機關係非小脈症陰陽真假疑似傷寒痢疾爲最不可

不細察

壯盛人初痢。通之去積滯。芍藥湯芩連木香枳朴歸草檳大黃。但清不宜利。

芍藥湯去大黃加菔子車前。二方治實熱症。

木

脹痛嘔惡先宜略祛寒滯。抑扶煎陳薑朴烏草朱澤山香砂吳。

脾胃虛弱。宜先服佐煎關陳薑朴草桂朱澤山扁吳。腹痛加木香。溫胃飲加吳木。

脾胃虛寒。腹痛久泄。冷痢等症。胃關煎山蓮扁熟草朮吳薑。泄甚加蔻脂吳朴。陽虛。

下脫不固。加附子滯不
通。加當歸不禁。加梅味。六味回陽。八味飲丸。俱宜加蔻脂吳朴。凡加味要隨症靈機。

下痢稍久。調和氣血。大加升提。痢自止歇。調和飲參歸芍藥芩草砂陳朮山

梅蓮升麻。不及參苓白朮散加升歸木味。

久痢滑脫。宜兜塞之。大補升提。四維散補中。加蔻附熟地。

真人養臟湯乾薑肉桂粟阿升歸芍朮蔻木草參。治虛寒滑脫甚。加熟附。

河間柯子散。半生半熯。香連草芍朮。滑脫加厚朴。治積熱滑脫。

桔

大斷下丸良乾薑。牡礪柯蔻辛附當。龍骨石脂礬榴皮。醋糊爲丸米飲嘗。治寒滑膩

脫宜加參熟妥。

赤白痢。實熱者。木香連丸。醋糊下。

淳治脈微弱者。胃關加附子大效。

休息痢。兜寒太早。香連丸加四君枳實。亦有脾腎敗而滑脫者。宜審脈症。毋拘。

疫痢傳染。憎寒壯熱。倉廩散。人參敗毒。加白芍。吞香連丸。亦隨虛實寒熱。

溫臟丸。加木香。

香連丸。加槐花。

蛇蟲痢形細癢從穀道出。

芍藥

有虛寒嘔逆者。治中湯。理中。加青陳砂蔻木香。

芍藥

裏急而不得便者。火也。重湯。承氣湯。

芍藥

輕湯。芍藥

裏急而頻見汚衣者。虛也。補中。加砂蔻。

芍藥

至圊不減虛也。真人養臟。虛坐而不得大便。責之血虛。加歸熱。病後腫。澤瀉。加砂蔻。中加

芍藥

後重。

噤口痢。有積穢在下薰蒸者。芍藥

有虛寒嘔逆者。治中湯。理中。加青陳砂蔻木香。

芍藥

裏急而不得便者。火也。重湯。承氣湯。

芍藥

輕湯。芍藥

裏急而頻見汚衣者。虛也。補中。加砂蔻。

芍藥

至圊不減虛也。真人養臟。虛坐而不得大便。責之血虛。加歸熱。病後腫。澤瀉。加砂蔻。中加

芍藥

後重。

急即緊。

疝屬肝病。脈必絃急。牢急者生。微弱者死。絃急搏皆疝脈。視在何部而知其臟。尺部脈滑爲寒疝。墨丸連小腹痛曰疝。

疝宜治腎緩肝
煎。加熱地八味。
加丁茴補中加
丁桂熟地。只知
破氣。而不知補。
腎者終不能愈。

經曰。任脈爲病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。子之疝。從小腹上衝心而痛。上衝不得前後。爲衝疝。肝所生病。爲狐疝。臥則入腹。立則出腹。三陽爲病。小腸。膽。膀胱。發寒熱。其

傳爲癩疝。

癩者。頑痺不仁。墨丸腫如升斗。亦有不痛者。溼氣使然。或得於有生之初。

黃脈之至也。大而虛。積氣在腹

中有厥氣。名曰厥疝。氣逆有積。脾傳之腎。名瘕疝。少腹冤熱而痛。出於足陽明

之筋痛。癰疝。腹筋急。又曰。肝脈滑甚。爲癰疝。

癰者。裏膿血甚。則下膿血。血滲脅胞內。有瘀血。結成癰腫。小腹兩旁。

王瓜。脾脈微大。爲疝氣滑甚。爲癰瘍。又曰。腎脈滑甚。爲癰瘍。外小便閉。

衝任皆在小腹毛際之間。主氣海血海。故女科有衝任不調。月事不準之病。任爲氣海。衝爲血海。雖各有所主。然氣血分陰陽。陰陽不可離。不可強分。若強分。

未免吹毛求疵矣。此言經絡耳。又非奇經脈者。淳附。

愚按、內經所謂任脈爲病。內結七疝。合言七疝之源。所謂衝狐癩厥瘕癰癧瘻。分言七疝之狀。巢氏不能詳考。乃强分厥癩、寒氣盤附、狼妄矣。子和又添寒水、筋、血、氣、狐癩、七腫。其疵誤與巢氏同。故言疝爲筋病。皆挾肝邪。則可。若言止在厥陰一經。不與內經相戾耶。且熱病在下者。引而去之。不問虛實。概與攻下。其禍何可勝言。豈下後始補。而可回生乎。丹溪謂疝皆始於溼熱。火鬱之久。溼氣勝。濁液凝積。聚并入血。墜流於厥陰。亦補前人未備之一端。不可訓也。學者但以內經爲正。勿惑多歧。治法寒則多痛。熱則多縱。溼則腫。墜在血分。不移氣分。多動。蓋墨丸有兩。左丸屬水。水生肺木。木生心火。三部皆司血。統納左之血者。是然亦不可強。肝也。右丸屬火。火生脾土。土生肺金。三部皆司氣。統納右之氣者。肺也。是故諸

此等淺甚。雖左右爲陰陽之道。不過部位如分。

寒收引。血泛而歸肝。下注於左丸。諸氣膨鬱。溼聚而歸肺。下注於右丸。且署丸。

所絡之筋。非盡由厥陰太陰陽明之經。亦入絡也。故患在左丸者。痛多腫少。患

在右丸者。痛少腫多耳。

後數語未確。余見左亦有不痛者。病非腫。即痛亦無分乎左右。蓋人之氣血貫注週身。若分左右見之。左矣。余

治此症。見痛多寒氣。腫多實。分其寒溼。虛補實破。寒溫濕利。治法得矣。學者切記。淳附。

岳景

凡治症當察所由。有遇寒而發者。有鬱熱而發者。有受溼成疝者。或以色慾。

或以勞損。當因其所因。辨而治之初起。必以溫經散寒行氣除溼爲主。切不可

早用寒涼。致留邪氣。及其久也。有始終以寒者。有因寒鬱熱者。有元氣受傷虛

陷日甚者。但察其形氣。病氣因病制方。若顯見熱脈熱症。方可治以寒涼。如無

可據。而執云溼熱則無者。生之微者甚之矣。此習俗之通弊。不可不鑒也。

治疝必先治氣。故病名疝氣。非無謂也。每用五苓散。加橘梗通茴。行氣之藥屢效。暴痛甚。

景岳每症必分
微甚用藥。高過
諸家。

先用**辨核散**。一寒疝最痛。多冒寒邪或犯生冷所致。喜煖畏寒。脈絃細。鼻尖手

足冷大小便無熱是也。寒微者。緩肝煎。醫林四味加。**甚者丁沈一法以鹽五積散加**

大分清飲。茵陳飲俱加

茴練。又方。加味通心飲。

又莖中作痛。筋急縮。或挺縱不收。

炒吳茱

茴小大治疝氣痛。一熱疝大痛。火邪聚於陰分。必有熱脈。熱症。二便祕澀。或脹滿。

而煩渴喜冷是也。宜茴大分清飲。茵陳飲俱加。**甚者丁沈一法以鹽五積散加**

白物隨溺而下。此瘕疝。龍胆泄肝。烏頭梔子。一溼疝。多重墜脹滿。亦有痛者。以前寒熱。參

而治之。五苓散三層玉燭茴香丸散。一血疝。少腹鞭而有形。大便祕而黑。小水利宜黃桃。或

散。一疝遇酒而發。當去溼熱。五苓葛蒼解醒。加茴核。**甚者丁沈一法以鹽五積散加**

相火。滋陰八味加茴。兼寒痛者。杞丁沈。一疝有實邪。當下者。宜子和導水丸。一疝久必

虛。或元氣虛而患者。當以脈症詳之。虛在陰分。益氣煎。陽分補脾。甚者。六味丸補中。同陽。

若虛中夾滯。以上數方。加練茴香枳疏導之。藥無滯亦宜酌加之。

破癰湯。木茴延胡沒青皮。橘荔核練與膚子。

子和導水丸。大黃丑芩滑。糊丸。

肝腎陰寒。小腹疼痛。疝氣等症。

緩肝煎。

歸芩茴杞桂烏沈。

吳薑附。荔香散。荔

核大茴。末。

寒疝脹痛。

醫林四神丸。澄茄吳一香。

糊丸。鹽湯下。

十香丸亦可。

陰丸腫大。痛不可忍。

荔枝散鹽青練肉。二茴沈木酒調服。

溼熱滿中。

胃苓湯加知柏、茴枳。

狐疝。補中益氣加虎頭骨去皮。

淳加沈。桂附。

癰。三層茴香丸一料。大茴五錢。練子沙木一兩。丸二料。加華撥一兩。檳五錢。丸三料。加芩四兩。附子一兩。丸切。米糊。鹽湯下治一。

瘕疝。烏頭梔子湯。桃仁吳橘核。

瀆疝。四物加延桃芩木草枳橘荔查核。

癰瘍疝。加味通心歸梔芩通瞿枳草練查仁。

五芩散。

加查核。

水疝。囊腫如水晶。陰囊汗出或搔出黃水。囊破水流。

五芩散。

加車前。

外用。

膀胱氣。陰囊腫痛。莖不得小便。五苓。加葱白鹽苟。

小腸氣。小腸虛。風冷乘之。小腹控引睾丸。上而不下。連腰脊而痛。緩肝煎。

李

世人以左爲勝。
右爲疝。
氣錯矣。

附知淳。

淋即癰症也。小便不通謂之

之。

淋雖屬熱。用涼藥不效。見陰脈者當知金匱腎氣。

小便淋閉。鼻色必黃。實大可療。濇小知亡。

實大。用分理之劑。濇小。爲精血敗壞。年老濇而有力。亦死。

少陰脈

數。女則陰瘡。男則氣淋。

經曰。脾受積溼之氣。小便黃赤甚。則淋。風火鬱於上而熱。其病淋。

愚按。內經言淋。溼與熱兩端而已。病源論。謂膀胱與腎爲表裏。俱主水。水入小腸與胞。行於陰。爲溲便也。若七情勞倦。致腎虛而膀胱熱。腎虛。則小便數。膀胱熱。則水下澀。數而且澀。則淋瀝不宣。小腹緊急。痛引於臍。分石勞血氣膏冷六種。石淋。下沙石。膀胱蓄熱而成。正如湯餅入在火中。結底自碱也。清其積熱。滌去沙石。水道自利。勞淋。有脾腎之分。多思多慮。應酬紛擾。負重遠行。勞於脾也。歸脾。與五苓分進。若強力入房。施泄無度。勞於腎也。六味丸。分進黃芪湯。腎虛而寒。金匱腎氣。血淋。心移熱於小腸。血入胞中。與溲俱下。有血瘀。血虛。血熱。血冷之分。小腹硬滿。莖中痛欲死。爲瘀。通牛丹皮。加紅桃。血虛。柏車芍。六味加側。血色鮮紅。脈數有力。爲熱。犀角地黃湯。連柏澤。

通
蒂側柏
芩
楠

血色黑暗。面色枯白。尺脈沈遲。爲冷腎氣。

金匱

氣淋。肺主氣。

氣化不及州都。

胞中作脹。小腹滿堅。溺有餘瀝。宜分虛實。實者。臍下急滿。小便大痛。脈沈有力。

沈香散

氣虛脈弱。

八珍加杜楂芩牛沙散

膏淋。

色如米泔。

如鼻涕。

極類脂膏。

此精溺俱出。

精寒。

海金散

溺道故痛。

金散

冷淋。

多是腎虛。

寒客下焦。

水道不快。

先見寒戰。

然後成淋。

金匱

腎氣。

更有過服金石。

入房太甚。

敗精強閉。

流入胞中。

致此之故。

殆有多端。

治法行滯。

氣疏小便解邪熱。平心火虛者。尤當用補。若不求其本。鮮有獲痊者。

岳景

淋之初病。無不由熱。然有久服寒涼而不愈者。又有淋久不止。澀痛皆去。而膏液不已。淋如白濁者。此中氣下陷。益氣歸中。命門不固之症也。右歸。必以脈症爲

主。察其虛實寒熱。庶不致誤。

凡蓄熱膀胱。或澀痛者。當專去其火。宜

抽薪七正

大分清飲。

大便燥結。散。

八正

若微熱。宜

赤導

明見高人。

散。火府丹。清。
心蓮子飲。

淋症三方甚妙。

導赤散。生地甘草通麥冬。一方有參。

火府丹。生地通芩。

石骨

清心蓮子參草芪。柴芩芩遠車麥皮。

沙石淋。牛夕湯。牛夕麝香。

赤

此方有二淋與
芩不同。

淋瀝不止。五淋散。滑通梔草茵。芍淡竹赤芩。

宜
膏淋加木香。沙石
皆治。

海金沙散。滑石甘。當歸牛夕木香伴。

甘草用
梢驗方。

化陰煎。驗方。

八正散。車瞿通滑。扁蓄草梢梔大黃。去滑瞿大黃。
加赤苓龍胆。名七正散。

石

沈香散。葷滑歸朮。瞿葵芍草王不留。

赤

黃芪湯參熟滑枳。蓮芩北味芩桑皮。易以北味磁石。

淳於此症見淋不澀痛。脈症無火。又見微弱。知下元虛冷。多以金匱腎氣效。可見淋非盡屬熱也。何時醫妄喙。余以熱藥治淋。多以金

遺精實本心腎。

補中加熟味棗。

仁荅尤兎絲加澀藥。八味加澀藥。

遺精

遺精白濁。當驗於尺。結滑動緊。二症之的。兩尺洪數。便濁失精。細革。亦多主遺精。

經曰。恍惕思慮。則傷神。神傷則恐懼流淫而不止。又曰。五臟主藏精者也。傷則失守。又曰。腎者。主水。受五臟六腑之精而藏之。又曰。厥氣即寒客於陰氣。則夢

接內。後一條言陰寒客腎。乃命門火衰。元陽虧敗。以致陽虛陰走。而方書俱無溫補命門之說。淳所不足。惟景岳云。元陽不固。每多遺滑。當溫補下元。今人動以知柏爲君。用坎離丸類。不知腎有補無泄。苦寒之性。

極沈降泄火。此輩亦何補於腎。適爲腎之害耳。淳所拜服。淳

按古今方論。皆以遺精爲腎衰之病。若與他臟不相干涉。不知經言五臟六腑

度數。即至數。

各有精。腎則受而藏之。以不夢自遺者。心腎之傷居多。夢而後遺者。相火之強爲害。治法獨因腎病而遺者。治其腎。由他臟而致者。他臟與腎兩治之。當以六脈參詳。昭然分辨。然所因多端。有用心過度。心不攝腎。而失精者。七福歸脾。有色慾不遂。而致精泄者。疾神。有色慾過度。腎虛精滑者。固陰煎。荅尤兔絲。有脾虛下陷者。補中加味。有壯年久曠。精滿而溢。甚者。耳聞目見。其精即出。名曰淫。妙香散。或有鬼魅相侵。其狀不欲見人。有如對語。時獨言笑悲泣。脈息乍大乍小。乍有乍無。及脈來綿綿。不知度數。而顏色不變。宜蘇合丸。加雄硃。總其大綱。精滑澀之。龍蠶虎頭骨。或夢女交者。心不守舍。腎不攝精也。疾神湯。加減。

湯

丸

散

膏

丸

散

膏

丸

散

膏

丸

散

膏

丸

散

膏

丸

散

膏

丸

散

泄而不效。即以熟棗仁。升提。往往有功。

景岳
夢遺精滑。總皆失精之病。蓋精之藏制雖在腎。而精之主宰則在心。故精之

蓄泄。聽命於心。正以心爲君火。腎爲相火。心有所動。腎必應之。凡年少多慾。心有妄思。外有妄遇。以致君火搖於上。相火熾於下。則水不能藏。以致癆損。可無畏乎。苟知惜命。先須惜精。苟欲惜精。先宜正心。每見伶俐乖巧之人。多有此病。田野愚魯者無之。使不知求本。全恃藥餌。欲望成功。蓋幾希矣。

命門火衰。陽虛遺泄。

右歸丸。八味丸。加澀藥。

補腎。宣君熱。

精滑常遺者。此丸最佳。荳朮菟絲丸。味熟杜山蓮。

淳以熟地易甘。

心脾氣弱。思勞卽遺。

菟絲煎。參歸荳草。山遠棗膠。

仁鹿亦宜加熟地。

慾火大熾。夢遺心悸。

茯神湯。生地草。荳參。歸菖。遠棗。茯神。

重加蓮米引。此方有二。見小兒大驚。

卒恐。佳。

陰虛滑泄。帶濁遺淋。經血不固。

固陰煎。參熟棗藥。遠草味兎。

宜重加蓮荳。更妙。滑加龍牡。更能。

火。加升附。此方
主肝腎。十有九應。

便血遺精帶濁。祕元煎。山遠四君。棗茨味櫻。

痛有火。加苦參。氣虛。

邪感而遺。安神解鬱。妙香散症。見耳

山藥丸。即無比

三方有固精藥。
無補精藥。宜加熟茱萸味。更妙。

精滑不禁。澀藥雖多。不出三方之外。餘俱不取。

金鎖固精丸。龍骨。蒺藜。鬚蠣。

米穀。金櫻子煎膏爲丸。米

蓮米糊。金鎖玉關丸。山萸。二茯二蓮藕節丸。

飲下。余用蜜丸。亦妥。

濁宜補腎。右歸。

加澤瀉。金匱腎。

赤白濁。

經曰。思想無窮。所願不得意。淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發爲筋痿。及爲白淫。

此已見遺精條矣。茲復收者。爲濁病。仍在精竅。與淋病之在溺竅者。不同。

時醫多以淋法治濁。八正五苓。雜授不已。病反增劇。不知經論。正屬精病。

按經文及前哲諸論。而知濁病卽精病。非溺病也。故患濁者。莖中如刀割火灼。而溺自清。惟竅端時有穢物。如瘡膿目眵。淋漓不斷。與便溺絕不相混。大抵由

敗精而腐者。十之六七。由溼熱流注者。十之一二。有赤白之分。何也。精者血之所化。濁去太多。精不化及。赤未變白。故成赤濁。此虛之甚也。丹溪以赤屬血。白屬氣。未盡然也。又以赤爲心虛。有熱。白爲肺虛。有寒。亦非確論。總之心動於慾。腎傷於色。或強忍房事。或多服淫方。敗精流溢。乃爲白濁。虛滑者。赤未及變。乃爲赤濁。夾寒。脈來沈遲無力。小便清白。金匱。夾熱。口渴便赤。脈數有力。二陰煎。加味清煎。香荳散。

心飲。有屬虛癆。六味加蓮英。免味龍牡。有澀痛異常。乃精塞竅道。香荳散。此其大略也。臨症之頃。極當詳審治法。清心健脾。滋腎固本。缺一不可。

加味清心飲。即清心蓮子。去地骨。加益智澤瀉。

香荳散。即妙香合五荳。

小便黃赤

凡經言四時五色脈者。即以五臟所屬而言。

經云。肺熱病者。小便先黃。又云。胃氣盛。則身已前皆熱。消穀善飢。溺黃色。又云。肺氣虛。則肩背痛。寒少氣不足以息。溺色變。又云。冬脈不及。脈。即腎。令人眇清。脊痛。小便變。上二段。言肺胃有實熱。下二段。言肺腎有虛寒。四者皆令小便黃赤。又云。運氣屬風。運氣屬熱。又云。中氣不足。溲便爲之變。

愚按。小便黃赤。人皆謂下焦有熱。清之利之而已。寧知內經臟腑寒熱之別。有如是耶。故一切症候。莫不有五臟六腑之分。虛實寒熱之辨。不詳察之。其不禍人者鮮矣。

三方簡當入妙。
可爲用方法程。
諸生熟記揣摩。
用方得矣。

脾胃有熱。消穀善飢。小便黃赤。涼胃湯。陳草連通芩。
脾虛。小便黃赤。加味補中益氣湯。本方加茯苓車前。
尺脈虛濇。足胫逆冷。小便黃赤。溫腎湯。附桂熟芩夕。

遺溺無多法。右
歸補中加澀藥。

遺溺

經曰。肺脈生病。爲遺溺。又曰。肝所生病。爲遺溺。又曰。手太陰虛。小便遺數。

愚按。小便不禁。肺者。主氣以下降。生火以下輸。水泉不止者。膀胱不藏也。此內經實爲總司。肺虛爲上虛。當補氣。益氣。歸子丸。加智。膀胱虛爲下虛。當澀脫。歸子丸。加智。更有睡則遺溺。皆責之虛。所以嬰兒脬氣未固。老人下元虛冷。多有此症。

此辨巨眼。

治療。

岳此症。古方書皆以屬熱屬虛爲辨。不知不禁者。以小水大利爲言。皆屬虛寒。若是熱症。則淋瀝澀痛。自有淋濁門正治。非遺失之謂。故治水須治氣。以參芪、歸朮、桂附、乾薑爲主。然後相機加以澀藥。其咎在上中二焦。歸朮。桂附。乾薑。爲主。中理脾。加澀藥。鞏堤丸。不效。當責之腎。澤瀉丹皮。俱加澀藥。鞏堤丸。

六脈沈遲。水泉不藏。無火也。八味右歸。兼進。

六君子加桂智。益

鞏堤丸。熟兎

苓朮味脂益智韭子附。山藥糊丸。

氣虛加參。

立齋云。姪娠。尿出不知。牡蠣枯礬爲末。酒調。若脾肺氣虛。補中益氣。加益智。

若

當悟立齋加味
簡妙

肝腎虛。六味。加益智。左歸。更妥。

產後小便不禁。氣血虛。不能制也。或因穩婆損胞。八珍加益智。

汗寤則汗出。醒則倏收。曰盜汗。不分。寐不因勞動。自然汗出。曰自汗。

汗症。大補黃芪湯。芪山六君加北味。有火者。當歸六黃湯。

濡多自汗。肺脈軟散。當病灌汗。

不治有七。喘甚。脈脫。如油珠。髮潤。身痛。淋似雨。

內經云。陽氣有餘。爲身熱無汗。陰氣有餘。爲多汗身寒。血之與汗。異名同類。故

奪血者無汗。奪汗者無血。腎病者寢。

景岳

汗發於陰而出於陽。其根本則由陰中之營氣。其啓閉則由陽中之衛氣。故

凡欲疏汗而不知營衛之盛衰。欲禁汗而不知橐籥之牝牡。不見其敗不止也。

人知熱能致汗。而不知寒亦致汗。所謂寒者。非曰外寒。正以陽氣內虛。則寒生

於中。而陰中無陽。則陰無所主。而汗隨氣泄。故大驚。大恐。大懼。病後。產後。大吐。

大泄。失血之後。皆令人汗出。豈非陽氣頓消。真元失守之兆乎。故仲景曰。極寒

反汗出。身必冷如冰。凡治陰汗者。當察氣虛之微甚。微虛者。略扶正氣。其汗自

收。甚虛者。非薑桂附子速救。元氣不可。景岳有治案。在寒戰汗門。

汗憎

獨得主腦。

愚按。心之所藏。在內爲血。在外爲汗。汗者。心之液。而腎主五液。故汗症未有不由心腎虛而得者。心陽虛不能衛外。而爲固。則外傷而自汗。腎陰衰不能內榮。

淳用右歸丸加味。以治右尺弱而極汗者。

不用桂附治汗。
士材見有未到。
必讀長於辨症
而治。

景岳精於論症
主眩。

而退藏則內傷而盜汗。然二者各有冷熱之分。因寒氣乘陽虛而發者所出之汗必冷。因冷氣乘陰虛而發者所出之汗必熱。至夫肺虛者固其皮毛。大補黃芪。脾虛者。中益氣。腎虛者。歸黃芪。腎虛者助其封藏。
六味。加龍牡遠志。玉屏風散。脾虛者。壯其中氣。芪山六君。兼火者。補以涼之。當歸黃芪。腎虛者。助其封藏。
無窮之變乎。

黃芪六一湯。芪六炙草一。

玉屏風散。芪朮防。

芪山六君子湯。卽六君。加黃芪山藥。

當歸六黃湯。芩連芪柏二地黃。

怔忡心築築
然跳動。

怔。忡。驚。恐。健。忘。

七福歸脾加熟
味。開手必用之

方。陰虛。左歸。加

棗仁。陽虛。右歸。

加棗仁。景岳補

精化氣。補氣生

精。斟酌用之。

驚悸怔忡。寸動而弱。寸緊關浮。悸病乃作。

經曰。心痺者。脈不通。煩則心下鼓。閉而不通。故致煩。又曰。胃之火絡。名曰虛里。出於左

乳下。其動應衣。宗氣泄也。

此症惟陰虛。瘍損之人。乃有之。蓋陰虛於下。宗氣無根。而氣不歸源。在上則浮。撼於胸臆。在下則退動於臍旁。速宜養氣。養精滋培。根本若認爲痰火。妄施清利。速其危矣。此症要以景岳爲主。說痰說火。謬甚。淳。

必讀。兼寒門而
言。

按經文及原病式云。水衰火旺。心胸燥動。天王心。傷寒論曰。心爲火而惡水。水停心下。築築然跳動不安。亦有汗吐下後。正氣衰而悸。不得臥者。溫胆湯。症狀不齊。總不外於心腎之虛。若夫虛實氣血。外感內傷之分。在臨症詳之。

壯水補。七福飲。大補元煎。加棗仁。平補鎮心丹。見耳

時醫以此方爲至寶。不知其不

利於陽衰。

此丸高於天王補心。

天王補心丹。人丹玄冬柏熟苓。歸硃桔遠味棗仁。

蜜丸竹葉湯下。

淳治一陽衰心悸用右歸丸。

補心丸參芪神遠柏棗熟味硃蜜丸。

加柏棗保元諸醫俱用寒涼丸。

驚

經曰。東方青色。入通於肝。其病發驚駭。肝應東方屬木於象爲風。風木多振動故驚。又曰。陽明之脈病。惡人與火。聞木音惕然而驚者。土惡木也。

名論高過內經。

道破病根。

醫之入手高人。
在此數語。其工
在脈症上討消
息也。

岳驚出於暫。暫者可復。恐積於漸。漸者難解。甚至心怯而神傷。精怯而陽痿。日銷月縮。不亡不已。非大勇大斷。難拔其病根。徒資藥力。不易及也。余治暴驚。十愈八九。治恐懼者。十不得一二。凡治怔忡、驚恐、健忘者。雖有心、肝、脾、腎之分。然陽統於陰。心本乎腎。所以上不寧者。未有不由乎下。心氣虛者。未有不因乎精。

然或先氣而後精。先精而後氣。或兼熱之。宜清兼寒之。宜緩。當因其病情而酌

用之。故用方宜圓。不宜鑿也。

愚按外有危險。觸之而驚。心胆强者。不能爲害。心胆怯者。觸而易驚。變生諸症。或短氣自汗。或眠多異夢。隨即驚覺。十味溫胆。加蓮子。

此丸可。

心血不足。怔忡多夢。如墮崖谷。鎮心丸。二冬二茯酸棗味。參遠山龍車熟桂。

蜜丸。殊衣淳治此症。多補腎成功。遠志丸。二茯參龍菖。

蜜丸。殊衣。此方宜君熟地。

心悸煩熱。黃連安神丸。生地草硃歸。猪心一剖開擦硃砂入內紙裹煨搗丸。

恐

經曰。在臟爲腎。在志爲恐。又云。精氣併於腎。則恐。肝藏血。血不足。則恐。胃爲恐。心惕惕。則神傷。神傷。則恐懼自失。

按經文論。恐有肝胃心腎四臟之分。而恐之一症。屬腎之本。志旁及於他臟者。

原本無佳方。方俱淳添。

也治法百別。治腎宜厚味。六味加茸杞。治肝胆宜養陰。七福歸脾。治陽明壯其氣。益氣。

腎補心者。鎮其神。補心湯。加硃珀。

心血虛少。神志不寧。

十四友丸。參芪歸熟志神苓。阿棗腦澤紫石英。蜜丸。硃衣。

健忘原本余不用腎藥。一刪改。方見無弊淳。

用歸脾。要法立
齋加熟地。

按內經之言健忘。俱責之心腎不交。心不下交於腎。濁火亂其神明。腎不上交於心。精氣虛而無神。或痰或燥。擾擾絃絃。昏而不寧。故補腎而使之時上。養心而使之善下。則神氣清明。志意常治。何健忘之有。治法思慮過度。歸脾湯。精神困倦。人參養營。痰迷心竅。金水六君加棗仁送壽心丸。丸莫泥於平痰。痰藥可暫用。不可久用。痰藥無。

而已。味簡姑留。
二方平痰降氣

壽心丸星珀硃砂。猪心血。蜜丸。

補牢記淳。無

朱雀丸。沈香茯神丸。

蜜

不得臥

內經主治腎方書多平淡見亦左矣故虛勞多不寐惟補腎諸湯丸及溫胆湯重加熟地棗仁方應淳附。

臥屬於腎。舍腎胡以治之。

經曰。衛氣不得入於陰。常留於陽。則陰氣虛。故目不瞑矣。又曰。胃不和。則臥不安。又曰。臥則喘者。水氣之客也。水者。循津液而流。腎者。水臟。主津液。主臥與喘也。

方多淳添。

詳考內經。及前哲諸論。而知不寐之故。大約有五。一曰陰虛。左歸加棗仁。一曰氣虛。六君加棗仁。一曰膽虛。溫胆湯加棗仁。一曰水停。菖蒲加棗仁。一曰和胃。酸棗仁湯加半夏。大端雖五。寒熱互有不齊。神而明之。存乎其人。

精血虛耗。心腎不交。怔忡不寐。酸棗仁湯參草芪。二茯歸蓮遠陳皮。

臥而多驚。邪在肝胆。

祕旨安神丸。見小兒驚恐。

思慮勞倦。怔忡不寐。歸脾湯。壽脾湯。

不能食

惟虛勞多不食。

丹田火盛。則脾家之母旺。八味。右歸。其要方乎。

含桂附其誰與歸。庸流胡不省悟。

東垣云。胃中元氣盛。能食不傷。過食不飢。能食而肥。脾胃俱虛。不能食而瘦。許學士云。不能食。不可全作脾治。腎氣虛弱。不能消化。譬之釜中水穀。下火無力。其何能熟。嚴用和云。房勞過度。真陽衰弱。不能上蒸脾土。中州不運。以致飲食不進。或脹滿痞塞。或滯痛不消。須知補腎。腎氣若壯。丹田火盛。上蒸脾土。膈開能食。蓋土強則出納自如。火盛則輪轉不息。每見世俗遇不能食。便投香砂枳朴。麵麥查菔。甚用連梔。以爲開胃良品。天枉多矣。不知此因元氣未衰。邪氣方張者設也。虛而伐之寒之。有不敗其氣。絕其穀乎。故不能食。皆屬脾虛。尤加肉白参苓。

看保元者。通弊。

六君。不效。八味。右歸。加肉蔻。脾爲五臟之本。安穀則昌。絕穀則亡。慎毋少忽。

開胃養氣。補脾進食。七珍散。四君。

氣鬱宜開。育氣湯。異功散。加青皮山藥。檀木丁藿。

二神丸。故脂四兩肉蔻

一。故脂補腎爲癸。肉蔻補土爲戊。戊癸化火。仲景進食妙方。亦無甚深意。