





由國家圖書館數位化、典藏

福建省農業改進處淺說第七種

養

豬

淺

說

畜牧獸醫股編印

二十七年十二月

增刊



蘇州府立圖書館藏書



養正齋
二十九年十二月

一 本省提倡養豬的必要

福建養豬的頭數，全省統計雖約有二百二十餘萬頭，但是仍然不夠自用，每年要由浙江江西等省輸入以補需要的不足，這批輸入豬隻的費用，年年約有數百萬元，現在抗戰期間，海運不通，我們農家應設法自己多養些豬隻，以謀自給，一方又可省却大量金錢的流出，這是和我們農村經濟有極大關係的。

再講到肥料的出產，在這抗戰期間，後方最重要的任務，要算增加食糧的生產，豬是食品的一種，牠的肥料是間接增加食糧的要素，如果沒有肥料，要想利用荒地收益，種作產量增加，那是很難的。本省現在進行墾荒，改良種作，那麼同時還要提倡多養豬隻，希望多得些肥料，以供應用。

至在閩西閩北多山地方，交通不便，運輸困難。農家生產的甘薯，蘿蔔，山藥，芋，葛，豆類和各種農作的副產品，用來養豬。可以增加農產的價值，減輕挑運的費用。若能再行豬肉加工

製成火腿，醃肉，香腸，肉脯，肉鬆，骨粉等，那末搬運更易，尤合社會的需要，利益愈厚。

二 福建養豬的情形

(一) 豬種

本省豬有黑豬，多見於福州延平永安等縣，有黑白花豬，多見於清流明溪安溪各縣，還有白毛豬每見於建甌浦城等縣，福建各縣的豬從外表形態看起來，體架方面，浦城沙縣明溪清流安溪等縣的豬大致尚佳，不過本省豬的壞處，在個體方面是屠宰率低，生長太慢，不能收經濟上最大的效果。在品種方面，豬種是混雜，良莠不齊，在豬羣方面，是豬的大小不一律，急需注意選種，購養他處較良的豬，淘汰本地惡劣的豬，一方再就豬羣中加以嚴格的揀選。照此去莠留良，希望將豬種漸漸的改良。

(二) 飼養方法

本省農民喂豬，在米穀便宜地方，有用米煮粥的，但大半是聽其自然覓食菜根野草，在幼豬

437/34
8378

時期很少加喂精料，幼豬在生長發育的時候，吃不飽肚，那裏能夠充分發育，但是從小就關在櫃子式的豬欄裏，施以肥育，不令牠有相當的運動，這也是不對的。他如豬舍日常管理方法，都有改良的必要，務必適宜的環境，使豬能夠安適生活着，方可收飼養上最大的效果。

(三) 疫病

豬病在本省是很普遍的，尤其在春夏多雨的時期，每年染病而死的數目說起來真是驚人，據中央農業實驗所民國二十二年調查本省病亡的豬，佔全豬數的百分之十五。補救的方法，首先應注重豬的清潔衛生，和畜舍的乾燥潔淨，並要打破迷信，信任獸醫所指導的防疫消毒方法。

(四) 豬舍

一、適宜豬舍必備的條件

豬舍要能夠合乎實用，無論形式如何，建造方法如何，必備下列幾個條件方可保持豬的強健

，免掉疾病：

甲，乾燥：豬舍乾燥就住得舒適，豬的生長也就快，



乙、空氣流通：豬舍的構造能夠使空氣流通，疾病就不容易發生。

丙、陽光充足：陽光可以殺菌，可以乾燥豬舍，許多意外的疾病可以免掉。

丁、寬敞：豬舍寬敞，豬在舍內，纔可以有充分的運動，使體格健全。

二、福建的豬舍如何改良

本省民間的豬舍，需要改良的是豬欄的位置大小，地面和豬舍內的清潔衛生，本處印有豬舍改良淺說，曾加以詳細的說明。現在再簡單地列述如下：

中央點甲，豬欄的位置和大小；豬欄的位置不可做在灶邊，廳堂，前門背後，垃圾堆上，臥床

下面。因為在這幾處地方做豬舍，不是有害人的清潔，就是妨礙豬的衛生。但是在福

建倒有不少的豬舍是做在上面所說的幾處之一的，尤其在閩西各縣大都將豬欄設在門

前檐下，櫃內黑暗，又濕又臭，這應當趕快改良，至於豬欄的地積，也太狹小，應稍

為加寬。

乙、地面：一般豬舍最不講究最不衛生的就是地面，豬舍地面最好是鋪石板，用水洗刷纔

容易清潔，如不能用石板可用三合土，三合土用不起，那就用沙泥填高地基，把地打緊，使牠堅牢乾燥後才用。無論用那種地面，都要比平地高些，並且由前向後成一個斜面，靠後開一條溝，使尿糞可以隨時流到溝裡。假使豬欄內堆積了許多的糞尿，或稻草和泥土的混合物，濕而又臭，這樣的環境，要避免豬生病，豈非夢想。所以改良豬舍內地面，亦是一件要事。

丙，豬欄的清潔衛生：一般農家養豬，總是不講究清潔，這種不良習慣，要趕快改正。豬欄四週的竹條木板，尤其飼槽切不可使他污穢，要常用清水或新製灰煎洗刷潔淨，能再加澆石灰水更好，地面的糞尿要常時打掃，鋪上乾淨的稻草，並要常時更換。

二三，喂飼

標準的喂飼，固然要各種營養料的分量充足，品質優良，同時配合和給喂的方法也要恰當，才能收最大的效果。不過福建雜糧既少，價值又昂，如完全採用標準飼料法喂豬，一定不會經濟的，故在福建現有環境之下，祇能就下列兩點加以改進。

(一) 凡豬在生長期內(五六個月)不使牠營養過於缺乏，任豬自己覓食青草外，應就當地情形，酌量多喂碎米，米糠，麥麩，豆餅，豆腐渣，酒糟，青菜，脚谷等飼料，懷胎母豬，所喂養料，更須充足。

(二) 多種牧草，如馬鈴薯，山芋，蘿菔，芋，莧菜，芸苔，苜蓿，紫雲英等，均係喂豬的良好飼料，應利用田角荒場，多量栽培，又如浮萍，水藻，蕁桐(俗名赤莖)，野苧菜，馬齒莧(俗名豬母菜)，野生苜蓿，鹽膚木(俗名蒲連旋葉)等野生牧草，應利用農閒多量採取。

(五) 選種

一、種豬的選擇

娘好姐好種好後代就好，要生好的仔豬一定要選擇好的豬種，選用種豬應注意下面的幾點：

甲、年齡：豬種最適當的年齡是二歲到六歲之間，在這時期裡，能生出最優良的小豬來，已經達到八歲以上的就太老，不應再用，普通公豬已滿八個月至一歲時，就可以開始

利用配種。我國土種豬母生下五六個月後，就開始發情，但是至早亦須滿一歲時方好使牠交配，實際考察各地種豬年齡過幼或太老者頗多，幼少者應加限制，過老者應予淘汰。

乙，體態：種豬的個體須健全康強，毛質堅硬密生而滑潤，沒有皮膚病和遺傳性的疾病，各部的生長發育要正常，骨骼要強健，公豬外貌須結實優美，性情活潑，母豬體長腹大，結構寬鬆，性情要靜逸，還要有後列各條件：

1. 頭：頭頸要生得潔淨，長短適中，公豬頭部應有精神，雄偉，強壯，有雄性的本質，母豬頭部應當有母性的本質，不粗魯，宜細潔。
2. 胸：胸圍要寬闊廣大，肺部發達，身體康健，倘使胸部窄狹，豬肺弱小，就容易生病。
3. 背：背要廣闊，背脊線平直，最好能稍隆起，脊椎骨要堅實。
4. 腰：不彎曲，應廣闊，豐滿，強壯。

5. 臀：要和背同闊，須長而平直。

6. 腹：腹部須平直整潔。公豬腹部寬狹適中，不宜過大，母豬腹部要廣大，肋骨深廣，腹皮須寬，乳頭數多，且相距要寬，乳腺要發達。

7. 腿：腿部要堅實圓滿，脛踝間潔淨，骨骼結實，脛皮無繃褶。

丙，其他：公豬的睪丸不宜過於垂下，陰囊要緊。母豬身體不宜過肥，乳房乳腺都要充分發達，乳頭每邊至少須有六七個以上，排列整齊，不要有瞎眼乳頭，生產力大，畜能哺仔。小豬發育均勻，生長很快。

二、肥豬的選擇

子，年齡：豬的肥育年齡，由各種情形而不同，普通在生下滿六個月至八個月後、體架充分發達時，開始肥育，年齡過小或過大都不經濟。

丑，體態：要有較長大的體架，方容易肥育，頂線要強壯，底線要平直，身體各都要均稱。

下面再分別討論各部分。

1. 骨骼皮毛：骨骼要精壯，皮毛要細緻，潤滑，沒有縐紋。

2. 身軀：要體高，背闊，胸圍寬大。

3. 四腿：要肥胖光滑，肌肉堅實，距離要寬。

4. 背：要寬闊，背脊線平直。

5. 腰：闊和背一樣，豐滿而不彎曲。

6. 腹：腹線平直，肋骨開展，肚不過大，且宜堅實。

7. 臀：和背同闊，髓長，頂上豐圓而不傾斜。

寅·其他：性情活潑，精神飽滿，沒有不良的僻性，那就容易管理。

(六) 豬的管理

(1) 種豬的管理

甲，配種年齡：利用公豬最好，滿足一歲方始配種，母猪第一次交配的年齡，也要在滿八個月或一年後，或體重到一百斤以上，否則母猪體質容易損壞，乳房不能平均發

達。

乙，交配的時期和時間：公豬沒有一定的發情期，隨時都可以交配，但不能在喂料後就
行交配，防其體質受傷。母豬發情時間有一定，普通為三個星期一次，每次發情期
間可延至三天，最好在發情的第二天使牠配種，發情時期以春季為多。

丙，交配次數：已成年的公豬，每星期可配四五次，沒有成年約應當以三天交配一次為
原則，母豬在豬仔斷乳後一星期左右就發情，懷胎期共須十六星期，哺乳期要六個
星期至八個星期，再休息四星期即可交配，每年可供配種兩次。

丁，配種前配種時配種後的處理：公豬在配種前要有適宜的休息，暫時停喂飼料，略給
清水。配種時要加以週到的管理，增加受精的效率。配種後應喂溫暖清水及青草，
使牠稍為走動，不擾亂牠的安靜，給以充分的休息。母豬在發情期，精神常呈不安
狀，配種前要設法使牠安靜，並要預先使牠和公豬接觸認識，那末，交合時不致受
到驚嚇，既交配後須使緩步運動，再使休息。

戊、母豬懷胎時的管理：利用放牧使牠有相當的運動。飼料要軟和，多含養分，麥麩和豆子等最適作妊豬的飼料，尤其在懷娠後半期，要多喂這類精料。畜舍內須清潔安靜，不使受震動，驚駭，褥草要鬆軟乾厚。

己、生產前生產時生產後的處理：生產前預先查明分娩的日子，檢查有無疾病。飼料應稀薄，產房應乾燥，溫暖，通氣。注意母豬性情是活潑或呆笨，倘使是呆笨的，防牠壓死小豬。管理要特別注意。生產時要使產房內安靜，地上舖些稻草，看守人要溫和有耐性，手足不粗魯。生產後使母豬安然臥下，約過十二小時，等牠自己恢復精神，才給喂飼料，最初用溫水，再加稀薄飼料，經過兩三天後，加喂普通飼料。

(2) 小豬的管理

小豬落地後產房中要溫暖，並須用稻草或乾布立刻將全身擦乾，不使其受涼，傷風，可先放置於草籃內，待全數生出後，才同時喂乳，吃乳愈早愈好。

甲、飼喂：小豬在吃乳滿三星期後，就要使牠學習吃飼料，喂時不可和母豬在一處，防止母

甲、豬搶食，又須設法防止小豬互相爭鬥。幼豬飼料須要好點。不好的，牠的生長不足，所以要添喂些麥麵，豆子，豆餅，花生餅，骨粉，蛤殼粉等，助長牠的發育。

乙，斷乳：在六星期或八星期後即和母豬分開，在未分離斷乳前，須喂以飼料。

丙，閹割：手術須熟練，迅速，在生產後四五星期行之，所用器具都須預先消毒。

丁，剪牙：小豬生時有四個尖銳乳齒，應當在落地擦乾後，即行剪斷，免得咬破母豬的乳頭。

(3) 肥豬的管理

無論少豬或老豬，肥育的飼料，要含充分養分，並要多給青飼料，且給料要有定時。肥豬所用的飼料很多，麥麩，米糠，大豆，玉蜀黍，豆餅，豆腐渣，酒糟，牧草等均可應用，尤以玉蜀黍為最好。至利用殘羹剩飯，原無不可，惟須留意，內中如含有酸或辣的東西，切不可用，最好煮過喂給，較為妥當。運動不宜多，畜舍要略暗，要清潔，環境要安靜。

(4) 病害的預防

甲，肉豬和種豬應該分欄飼養，因為種豬的喂料要比較好些。

乙，每日至少須令豬出外運動一小時光景，在六個月以內的幼豬，運動尤為需要，因為運動可以助長牠筋骨的發育。

丙，小豬購買到家後，要隔開喂養七日至十四日，等到認為確實沒有毛病時，方可關入豬欄，和原有的豬一同喂養。

丁，常時用木梳括豬體，替他括去皮垢，防牠生虱，

戊，梅雨季節，豬舍更應收拾乾燥清潔，少給多汁飼料，可免發生種種害病。

己，養豬的人家，不可在外購食病豬的肉。

庚，豬害病時，切勿外放，切勿出賣，隣近有病豬時，自家的豬也不可外放，免有相互傳染的危險。

辛，病豬的糞尿要撒拌石灰末，或澆洒石灰水埋入土坑內。

壬，病死的豬肉不可出賣，要醃藏後方好拿出，牠的變敗內臟，血水，及一切污物，都要拌石灰末或石灰水深埋土中。

下流...

王...

李...

...

趙...

呂...

吳...

丁...

...

...

...



民國 93 年 度 教育 部 補 助



中華民國中央圖書館

國家圖書館



002878597



社分刷印行風城連

1374278



國家圖書館



002878597

