



世醫得效方卷第九

大方脉雜醫科

健忘

心定志圓 治心氣不定五臟不足甚者憂憂愁愁不樂忽
忽喜忘朝羞暮劇暮羞朝發及因事有所大驚夢寐不祥
登高履險致神魂不安驚悸恐怯

菖蒲

遠志 去心養心

茯苓

茯神

人參 各二兩

辰砂 壹兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服一圓米湯下一方
去茯神名開心散每服二錢匕不以時服

治喜忘恍惚破積聚止痛安神定志聰耳目

菖蒲心 遠志去心 川牛膝酒浸 桔梗炒

人參各三分 桂心三分 茯苓壹兩 附子壹兩炮

右為末煉蜜圓梧子大每服三十圓食前溫酒米湯下

加味快心湯治痰迷心胞健忘失事言語如癡

人參去芦 半夏湯洗 陳皮去白 白茯苓去皮

粉草五錢 益智去殼 香附子炒 枳殼炒

右劉散每服肆錢水壹盞半生薑三片烏梅半箇同煎

不拘時溫服

朱圓治心神恍惚舉事多忘方見心恙類

虛煩

治心虛煩悶頭疼氣短內熱不解心中悶亂

知人產後心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬去心 小麥各半 甘草炙 人參

白茯苓各半 半夏湯洗

右劉散每服四錢水貳盞生薑七片棗子三枚淡竹茹

一塊如指大同煎食前服虛勞煩悶尤宜服之

溫膽湯治大病後虛煩不得眠此膽塞故也此藥主之又

治驚悸自汗觸事易驚

半夏 竹茹 枳實炒 天麻

陳皮炙 甘草炙 茯苓壹兩 人參壹兩

右劉散每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎食前

服未效加遠志去心薑汁炒北五味子各壹兩酸棗仁壹兩蚌粉炒入

酸棗仁湯 治霍亂吐下增劇虛勞煩擾奔氣在胸中不得眠或發寒熱頭疼暈悶

酸棗仁 三分

人參

桂心 各壹分

知母

茯苓 各叁錢

石膏 半兩

甘草 炙

右剉散煎同上

小兒湯 治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草

黃耆

黃耆

當歸

麥門冬

去心

石斛

去根 各一兩

酸棗仁

人參

甘草

炙 半兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片煎不以時服

地山散 治傷寒後伏暑後煩熱不安及煩熱虛勞

地骨皮

去木 式兩

防風

甘草 炙 半兩

右剉散煎同上

清心散 治心中蘊積虛熱煩燥 方見有漏箱

○自汗

風證 治傷風脈浮自汗惡風

桂枝 不見火

白芍藥 各壹兩

甘草 炙 半兩

右剉散每服四錢生薑五片大棗二箇煎不拘時服發

汗汗不止者謂之漏風宜加炮熟附子壹兩

五苓散

白朮散

白朮散

治傷暑自汗 方並見

木附湯

治傷濕自汗 方見傷濕類

治同上 方見四氣相感類

汗夜臥即長久而不止 羸瘠枯瘦 心忪驚惕 短氣煩倦

牡蠣味咸 性平 麻黃根 黃耆 知母各壹兩

右為末 每服用小麥百餘粒煎湯濃調服 一方為散 每三錢水三盞 雞白三寸煎一盞 半分三服

黃耆湯 治喜憂驚恐 房室虛勞 致陰陽偏虛 或發厥自汗 或盜汗不止 悉宜服之

黃耆去骨 炙 兩半 白茯苓去皮 炙 熟地黃酒蒸 肉桂不見火 炙 天門冬去心 炙 麻黃根 龍骨各壹兩

五味子 小麥 防風去土 炙 當歸去土 炙

甘草炙 各半兩

右剉散 每服四錢 生薑五片 煎不拘時候 發厥自汗 加乾附子發熱自汗 加石斛未效 或多飲麩食則安

無名湯 治自汗 頭眩 痰逆 惡心

無名 白木去油 炙 橘紅各式兩 甘草炙 半兩

右剉散 每服四錢 生薑七片 煎濕服

建中湯 治表虛自汗

官桂炙 分 芍藥壹兩半 甘草炙 半兩

右剉散 每服四錢 薑五片 棗二枚 食前服 本方加黃芪

壹兩 名黃耆 建中湯 治虛勞自汗 加當歸 壹兩 名當歸

建中湯 治婦人血虛自汗 其自汗漏不止者 加桂 半兩



原件短缺

熟附子半箇名桂枝附子湯每服四錢生姜七片棗子
二枚心煎服

白朮散 治盜汗

川芎壹分 人參半分 防風壹分

右為末每服一錢臨卧米飲調下

白朮散 治盜汗極驗

白朮不拘多少剉成

右用酒麥一升水一斗煮乾如白朮尚硬又加水一二

升煮取汁出功作片焙乾去麥不用研為末別用淳麥湯

每服二三錢不以時候

茯苓湯 治虛汗盜汗

食後服如久患後亦宜服此以退其勞倦調理經絡

青蒿散 治虛勞盜汗骨蒸咳嗽胸滿皮毛乾枯四肢懈

骨節疼痛心腹驚悸咽燥唇焦煩赤煩燥涕唾腥臭因倦

少力肌躰潮熱飲食減少日漸瘦弱

天仙藤 鱉甲 醋炙 香附子 炒 桔梗 去芦

柴胡 去苗 秦艽 青蒿 記 上各 烏藥 半兩

甘草 灸 壹兩半 川芎 貳兩半

右剉散每服姜三片煎不拘時候温服小兒骨蒸勞熱

肌瘦減食者每一錢水盞半小麥三十粒煎服

陰汗丸 治陰汗濕痒

右用大蒜不以多少煨剝去皮爛研同淡豆豉末搜圓

如梧子大朱砂為衣每服三十圓棗子灯心煎湯送下

青葙圓 治同上每服五拾圓酒服大效 方見虛損類

治陰汗濕癢方 爐甘石 壹分 真蚌粉 半分 為粉撲傳

治陰汗不止方 小方腎圓恩乾膏醬煎湯入 益少許吞下方見虛損類

洗方蛇床子酒浸炒白礬陳醋煎水淋洗

○宿食

香蘇散 治宿食留飲聚積中脘噫臭腐氣心腹疼痛或臍

腑殮泄每服四錢生薑葱白烏梅煎 方見傷寒和解類

盧氏感應丸 建脾進食消化宿滯酒食飽後宜服 方見諸

縮砂香附湯 治心腹虛滿噫宿腐氣或時冷疼 方見諸

穀神丸 消食健脾益氣進美飲食

人參

縮砂

香附子 炒去毛 三稜 煨

義木 煨

青皮

陳皮

枳殼 炒

麥芽 炒

枳殼 炒去穢 各等分

右為末粳米糊圓梧子大每服三十圓空腹米飲吞下

益湯亦可

狂圓子 磨化宿食止腹痛方見瘕瘕類

三稜前圓 治膨滿消食積氣塊及傷食夾臍痛其 方見諸

○瘕瘕

總說夫胃蒸餽殊復連死疰瘕疰毒疰熱疰冷疰食

疰鬼疰皆白傳屍者以疰者有注也病自上注下與前入

相似故曰疰其變有二十二種或三十六種或九十九

種大略令人寒熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁髮乾而聾耳
或腹中有塊或腦後兩邊有小結核連復數箇或聚或
散沉沉默默咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或復
下痢羸瘦困乏不自勝持積月累年以至於死死後乃
疰易傍人乃至滅門是也凡疾始覺精神不爽氣候不
調功須戒慎酒色調節飲食如或不然妄信邪師或言
鬼祟以致不起慎之慎之又云男女傳尸之病心骨滿
悶背膈疼痛兩目不明四肢無力雖欲寢卧卧不得寐
脊骨急痛膝腦痠疼多臥少起狀如佯病每至平日精神
神尚好日午向後四肢微熱面無顏色喜見人過常懷
忿然續不如意又便多噴行立脚兩夜則盜汗夢與鬼

交感鬼先亡或多驚悸有時咳嗽雖思飲食不化
死在須臾精神尚好或時微利兩脇虛脹口噤身常
多粘唾有時辰亦有時欲睡漸成沉齋猶若涸魚不覺
死矣

尸蟲遊食日辰及治法

大抵六蟲一旬遍遊四穴轉流周而復始具后六代法中
自立春一日後食起三日一食五日一醉歸於所歸穴
大醉五日故五日蟲醉可以下藥及灸其三日蟲食切
不可妄有醫治蟲在人身中一蟲可占十二穴六蟲在
人身中共遊七十三穴上旬十日從心至頭遊四穴中
旬從心至臍遊四穴下旬從臍至足遊四穴上旬可先

服藥後灸所遊穴其蟲頭向上若下火灸蟲如紫蚕苗
出在穴中更服藥取之以蟲盡為度便服補藥未得安
耳中旬其蟲所遊穴中頭向內可服藥取之下旬蟲在
所遊穴中頭向下亦服藥取之不灸也恐蟲覺悟未難
取蓋此蟲性已通靈務在精審勿令有悟可也

○觀尸蟲色知病淺深法

凡明醫者先須知毒氣與蟲並行攻入臟腑遇陽日長雄
蟲陰日生雌蟲綠先食臟腑脂膏故其蟲色白次食血
肉血肉盡故其蟲黃赤次食精髓故其蟲紫色精髓盡
故其蟲黑色傳入腎中病人方死須求醫者士曉達病源
先取其蟲視其色理自知輕重其虫如白色可三十日

服藥補之其虫如黃赤色可六十日服藥補之其虫如
紫黑色此疾已極可百二十日服藥補之十中可保一
二雖不能為一身除害亦可為子孫除害矣服藥仍須
一載之中刻意調攝方可痊愈如此得命可謂再生於
世又云蟲頭赤者食患人肉其病可治頭口白者食患
人髓其病難治只得斷後不傳子孫矣

○六代傳病及諸蟲形狀

凡治病之道要須藥病相應效同神聖仍在湯藥自補虛調
治臟腑方得痊愈故三月九蟲種、靈異莫不知之或
似蜣螂或似紅絲馬尾或似螻蛄或似刺蝟或似鼠形
或如爛麩或有足無頭或有頭無足或化精血歸於元

陽之內種上形類實難辨之淺幸之流難施方劑誤醫
 甚多在死不少或則取虫不補或則淺幸妄傳比日其徒
 費資財終無去病之理遂致夭折豈不悲哉
 第一代謂初勞病受其病而不測病源酒食如後漸覺羸
 瘦治療蹉跎乃至病重醫人不詳其故誤用湯藥狂而致
 死

此虫在人身中如嬰兒狀背上毛長二寸



此虫變動形如帶在臟腑中



此虫形如蝦蟆變動在人臟腑中

上三虫在人身中染著之後或大或小令人夢寐顛倒
 魂魄飛揚精神離散飲食不減形容漸羸四肢酸痛百
 節勞倦增寒壯熱皆膊拘急腦与頭痛口苦舌乾面無
 顏色鼻流清涕虛汗常多行步艱難眼睛多痛其虫遇
 丙丁日食起醉歸心膈穴中四穴輪轉周而復始大醉
 可醫矣取出後補心當瘥

第二代為覺勞病細體受此疾已覺得病覺病者愚乃自

知夜夢不祥与亡人為伴醒後全無情思似醉神識不安
所嗜食味輒成患害或則發氣動風所加四體不和心胃
滿悶日漸羸瘦骨節乾枯或嘔酸水或則醋心唇焦口乾
鼻塞腦痛背膊酸疼虛汗常出腰膝刺痛如此疾狀早須
醫治失時致傷命



此虫如亂髮可長三寸或似守宮



此虫形如蜈蚣在人臟腑中

此虫形如蝦在人臟腑中



上三虫在人身中令人氣喘唇口乾咳嗽增寒心煩壅
滿毛髮焦落氣脹吞酸津液漸衰次多虛竭鼻多清水
四肢將虛臉赤面黃皮膚枯瘦腰膝無力背脊酸疼吐
血唾膿語聲不利鼻塞腦痛胃膈多痰重者心悶吐血
強倒在地不能自知其虫遇庚辛日食起歸肺膈中
穴輪轉周而復始大醉可醫矣取虫後補當瘥
第三代為傳尸癆病傳受病人自得知之日漸羸瘦頰改
容顏日日憂惶夜々恐懼不遇良醫就死不遠



此虫形如蚊蟻在人身中俱遊臟腑



此虫形如蠅娘在人身中俱遊臟腑



此虫形如刺蝟在人三焦

上三虫在人身中令人三焦多昏日常思睡嘔吐苦
或吐清水粘涎腹脹虛鳴卧後多驚口鼻生瘡

青日漸消瘦精神恍惚寢夢飛揚飲食不消氣咽声嘶
汗出如油目昏多淚其虫遇庚辛日食起醉歸厥陰元
中四穴輪轉周而復始大醉可醫矣取其虫出後服補
藥當痊

論第四代病并尸虫形狀遊食日治法



此虫形如亂絲在人臟腑中



此虫形如猪肝在人臟腑中

此虫形如蛇在人臟腑中




上三虫在人身中令人臟腑虛鳴嘔逆腸中疝瘕氣塊
增寒壯熱肚大筋生腰背疼痛或虛或瘦瀉痢無時行
履困重四肢憔悴時氣上喘口苦皮乾飲食過多要喫
酸鹹之物其虫遇戊己日食起醉歸脾膈穴中四穴輪
轉周而復始夾醉可醫矣取虫出後服補藥當瘥

論第五代病并尸虫形狀遊食日治法



此虫形或有足無頭或有頭無足

此虫形如鼠在人身中俱游臟腑



此虫形如精血變動在人臟腑或在湯宮

上三虫在人身中令人多怒氣逆筋骨拳挛四肢解散
面黑面青增寒壯熱腰背疼痛起坐無力頭如斧斫眼
睛時痛翳膜多淚背膊刺痛力憊身羸手足乾枯卧著
床枕不能起立狀似中風四肢頑麻腹內多痛眼見黑

花忽然倒地不省人事夢寐不祥晝後遍身虛汗其虫
 遇甲乙日食起醉歸肝膈穴中四穴輪轉周而復始大
 醉可醫矣取虫出後補肝當瘥
 論第六代病并尸虫遊食日治法



此虫形如馬尾有兩條一雌一雄



此虫形如蟹在人臟腑



此虫形如爛麩或長或短

此三虫在人身中居於腎臟透連脊骨令人思食是物
 要食身軀汪羸腰膝無力髓寒骨熱四肢枯乾眼見火
 生或眼多黑暗耳內虛鳴陰汗燥痒冷汗如油夢与鬼
 交小便赤黃醒後昏沉臍下結硬或奔心胃着物如艷
 心腹悶乱骨節疼痛其虫遇丑亥日食起醉歸腎臟穴
 四穴輪轉周而復始大醉可醫矣虫出後補腎填精當瘥

取虫防護法

先令病人家用好紙糊一密室不留些罅隙尋一老成

人過逝以安息香米洒了過逝人之身又以雄黃雌黃
塗其鼻孔耳眼唇上安排鉄鉗一个布巾一幅用香油
二斤以鍋盛頓微煎令沸仍用高桶一个以好石灰
桶内生布巾蓋桶口却服取虫藥五更初一服五更三
點時一服服藥後腹中疼痛如刀斧劈不妨至巳牌必
須下虫或取下臭穢如膠漆或吐瀉膿血癥塊皆於灰
桶中其虫或從汗出紫蚕苗狀或於耳鼻口中出或小
便中出異般形狀不止一也或白或黑或黃紅大者急
用鉄鉗取於油內煎當日將油紙裹虫入瓦罌內石灰
填實埋弃於深山遠僻處免致再染人患人衣服床席
並皆弃去醫人分付藥後亦須遠避

神效取虫

青葉枝

柳枝

石榴皮

桃枝

梅枝

各採並許

鬼臼

五錢

青蒿

壹小握

赤箭

五錢

右用童子小便壹升半葱白柒莖去頭葉煎及一半去
滓別入安息香阿魏各一分再煎至一盞去滓調辰砂
末半錢攪柳末一分麝香一字分作二服調下五更初
一服五更三點時一服至巳時必取下蟲紅者可救青
黑不治見有所下即進軟粥飯温煖將息不可用性及
食生冷毒物合時須擇良日不得令猫犬孝服穢惡婦
人等見一方不用鬼臼赤箭

雄黃半兩 虎骨貳兩 天靈蓋壹兩酥炙黃

驚甲 木香各半兩 輕粉

石為末法酒壹升大黃半兩熬膏圓如彈子大朱砂為衣凡此疾先燒安息香煙吸之不嗽非傳尸也不可用此藥若煙入口咳不止乃尸也宜用此藥五更初服勿令人知用童子小便同酒一盞化一圓服之如人行二十里正吐出蟲或如燈心或如爛瓜李或如蝦蟆未效再服以應為度蟲用紅火燒之又用油煎

傳尸散 治諸傳尸勞氣殺虫

川椒貳斤擇去子并青炒出汗

石為末每服貳錢空心來湯調下須痺重悶少頃如不

能禁即以酒糊圓如梧子大空心服三五十圓昔人嘗與病勞婦人交婦人死遂得疾遇一異人云勞氣已入臟遂令急服貳斤其病當去如其言服之幾盡大便出一蟲狀如地遂安續有人服之獲安濟者多矣

虛勞散 治勞瘵增寒發熱口乾咽燥自汗煩鬱咳嗽聲重唾中血絲瘦劇倦乏

人參去蘆 當歸去尾 白芍藥 白茯苓去木

白茯苓 黃耆去蘆 白木 半夏麩

五味子 熟地黃洗酒 甘草 蓮肉去心

大麥門冬去心 桔梗各等分

右劉散每服四錢水一盞半為梅紅棗各一箇煎服如

嗽加阿膠虛極留滿者加木香濕紙裹煨沉香亦可不思食加扁豆

勞嗽散

治心腎俱虛勞嗽時復三四聲遇夜發熱熱過即

有盜汗四肢倦怠體瘦恍惚異夢嗽中有血名曰肺痿

白芍藥

伍兩

黃耆

甘草

人參

白茯苓

熟地黄

洗酒

當歸

去尾

五味子

半夏

阿膠

蚌粉炒

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎與

疑神飲相類

黃耆散

治諸虛勞氣四肢倦怠骨節酸疼潮熱乏力自

汗怔忡日漸黃瘦骨蒸潮熱不思飲食咳嗽痰多甚則唾血

黃耆

蜜炙

當歸

酒浸

紫苑

洗去土

石斛

去根

地骨皮

人參

桑白皮

去青

附子

炮去

鹿茸

酒蒸

欬冬花

各壹兩

半夏

湯泡

甘草

炙

右剉散每服三錢生薑七片棗子一枚煎不拘時服此

藥溫補榮衛枯燥者不宜進此唾血不止者加阿膠蒲

黃冬半兩

十全大補湯

治虛勞發熱加北柴胡地骨皮煎

養榮湯

黃耆益損湯

治同上

方見虛損類

秘證

生犀散

枳殼半夏湯

治嗽甚咽痛失音

方見痰飲類

溫金散

治積勞咳嗽喘悶咯痰中有血

甘草

黃芩

桑白皮

防風

茯苓 半兩

麥門冬

杏仁

去皮尖米泔浸壹兩取出搗乾零炒壹兩

右劉散每服三錢水一盞入黃蠟一片如指頭大同煎

食後熱服

驚甲地黃湯

治熱勞手足煩心怔悸婦人血室有乾血身

體羸瘠飲食不為肌肉

柴胡

去薑

當歸

酒浸

麥門冬

去心

驚甲

醋炙

石斛

去根

白朮

熟地黃

酒浸

茯苓

去皮

秦艽

去薑

人參

肉桂

不見火

甘草

炙

右劉散每服四錢水一盞半生薑五片烏梅少許煎不

拘時服此藥專治熱勞其性差寒脾胃快者方可服餌

虛甚而多汗者不宜服

阿膠圓

治勞嗽并嗽血唾血

阿膠

蛤粉炒

生地黄

洗

卷柏葉

山藥

劉炒

大薊根

五味子

雞蘇

各壹兩

柏子仁

炒別

人參

防風

去薑

麥門冬

去心

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼濃煎小麥湯

或麥門冬湯嚥下

地仙散

治骨蒸肌熱一切虛勞煩燥生津液

地骨皮

去薑

防風

甘草

半兩

麥門冬

去心

右劉散每服三錢水一盞生薑五片煎不拘時候

黃蓮飲

治骨節間熱積漸黃瘦

黃連 劉壹兩

右用童子小便壹大升浸經宿微煮三四沸去滓食上分二服如人行五里再服

四美圓

凡骨蒸莫非是勞者骨尤屬腎虛髓竭也以局方

黃耆散

沉香散

秦艽散

青蒿散

四散和合為末以雄羊脊骨一具研碎煉汁調和為圓溫酒吞下治脊痛骨熱漸成蒸疾一劑而效其功全在脊骨膏蓋醫者意也

通流丸

河車者天地之先陰陽之祖乾坤之橐

籥也求之丘廓胚腫將兆九九數足我則戴而成之故謂

之河車麻上驗篇中名曰漉沌皮蓋亦生天地陰陽之始為七十二丹之首高士垂慈始開端緒太上云若欲長生當修所生實資於此所以成功靈應非金石草木夜露曉霜之所比倫修真之士服之不輟誠足以返本還元補益之道真得其真

紫河車

壹具用初生男子者良帶子全者以東流木洗斷血脈入麝香貳錢在內以絳絲定用生

酒五升慢火熬成膏子

沉香

朱砂 各壹兩

人參

從容 酒浸

乳香 各貳兩

白茯苓 去皮

安息香

去沙 酒熬 各貳兩

右為末入河車膏子和藥末杵千百下圓如梧子大每服七十圓空心溫酒送下沉香湯尤佳詳此丹以紫河

車爲主但佐使之藥太輕無病之人久服可以輕身延年補損扶虛乃若病重之人服之却宜增添之法也一方有天靈蓋一片酥炙黃

治男子真陽耗竭腰背疼痛自汗怔忡痰多咳嗽喘急遺白濁潮熱心煩脚膝無力宜於內加

鹿茸

火燎去毛酥炙

川巴戟

去心

鍾乳粉

陽起石

酒噴

附子

炮裂去水浸

黃耆

桑寄生

生鹿角

龍骨

紫苑

五味子

各壹兩

右依法修製和前藥末用膏子爲圓

治婦人血海虛弱榮衛不足多致潮熱心煩口乾喜冷腹脇刺痛腰膝痠疼多咳嗽驚悸怔忡經候不調或閉斷不

通宜於內加

當歸

去尾

石斛

去根

柏子仁

紫石英

服醋淬柒次

鹿茸

去毛酥炙

救急甲

醋炙各壹兩

卷柏葉

壹兩去土

川牛膝

酒浸壹兩半去苗

右依法修製和前藥末膏子圓虛寒者加炮附子貳兩

咳嗽者加紫苑茸貳兩

治熱勞尤加

河車

依前法修製

鱉甲

醋炙半兩

桔梗

白芍藥

大黃

煨

甘草

苦參

貝母

知母

秋石

鼓心

草龍膽

黃藥子

義木

煨

犀角

鎊

消石

各半兩

右為末以前膏子圓湯使如前

蘇合香圓

治傳尸骨蒸瘵肺痿疰疢鬼氣心痛霍亂時氣瘴癘等方見中氣類

青蒿散

治男子婦人骨蒸勞瘵增寒壯熱

青蒿

春夏用葉秋冬用子用子不用葉用根不用莖

使有功效無毒壹握

大鱉甲

炙黃醋碎伍柒次去腥

白朮

濕紙焙

地骨皮

白茯苓

粉草炙

棟參去頭

瓜蒌根

北柴胡去蘆

桑白皮

蜜炙各半兩

右為散每服三錢水一盞半煎溫服不拘時候

加減黃耆建中湯

治男子婦人五勞骨蒸者世用神效

白朮

白茯苓

桔梗

各參錢人參參錢半

秦艽

北柴胡

去蘆

防風

白芍藥

甘草

當歸

去尾

澤瀉

生乾地黄

熟地黄

地骨皮

肉豆蔻

檳榔

縮砂仁

各五

猪苓

四

黃耆

乙兩

右為散每服參錢水

盞半煎溫服不拘時候老人更

加黃耆一兩或為末蜜湯調服臨期斟酌

青骨散

治男子婦人童叟骨蒸初覺勞瘵五心煩熱去骨

熱如神

北柴胡

生地黄

熟地黄

人參

防風

秦艽

赤茯苓

胡黃連

薄荷葉

七

右劉散每服二一干木一盞半煎溫服先服荆蓬煎圓一服微泄臟腑後服此方見痰飲類

團魚散 治骨蒸潮咳嗽累效

貝母 前胡 知母 杏仁

北柴胡 各等 團魚 二箇

右用藥同團魚煮魚熟提上去頭取肉連汁食之却將前藥焙乾為末就用團魚裙甲及骨更煮汁一盞和藥為圓如梧子大每服二十圓煎黃耆湯空心下病安仍服黃耆益損湯補理方見虛損類

蛤蚧圓 治積勞咳嗽日久不差自汗口中無味

蛤蚧 乙長酥以冬花 皂角 不姓者酥炙去皮了夜一

木香 不見火 熟地黄 酒蒸 杏仁 乙去皮炙黃子小便浸

五味子 各乙兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服十五二十圓生薑湯送下食後臨睡服

灸法 癸亥夜二更六神皆聚之時解去上躰衣服於腰上

兩傍微陷處謂之腰眼直身平立用筆點定然後上牀合面而卧每灼小艾炷柴壯虫或吐出或瀉下即安

又法四花穴灸見蘇沈良方及資生經効

又法膏肓肺腧穴每穴各灸五壯仍依前法醉日各穴論灸為妙灸後百日忌煎燂生冷熱物毒食仍戒房事避風寒感喜怒安心靜處將息若一月不愈未獲痊

初炷上二炷灸

陰癩

采真肉消圓 治陰癩偏大上攻臍腹疔痛膚癩腫脹或生瘡瘍時出黃水腰腿沉重足胫腫滿行步艱辛服之內消不動臟腑

川練三兩

大腹皮

五味子

海藻洗

玄胡索各一兩

茴香炒

桂心

川烏炮去

吳茱萸

食茱萸

桃仁各乙兩

山茱萸焙二

木香乙西半

桔梗

青皮

木香流氣

右為末酒糊圓梧子大每服三十圓溫酒下飲兼服效

大義圓 治陰癩腫脹或小腸氣痛

大戟去皮劉炒

葫蘆巴各兩

木香

附子炮去

舶上茴香

訶子去核

檳榔各壹兩

川練伍兩

麝香別研

右八味為末外留川練以好酒二升葱白七莖長三寸煮軟去皮核取肉和末藥圓如梧子大五七圓至十圓空心溫酒下薑湯亦可潮發疼痛炒薑熱酒下十五圓

煖陰丹 治陰器下隊腫脹如核偏大堅如痛不可忍

玄胡索微炒

海藻洗

昆布洗

青皮去核

茴香炒

川練去核

馬蘭花各壹兩

木香半兩

大戟酒浸叁宿切

右為末別將硃砂阿魏安息香各壹分用酒醋各一升

淘去沙石熬成膏入麝香壹錢沒藥壹分入前藥和圓
如菜豆大用綿灰酒下十圓至十五圓空心服

兼金圓治熱火膀胱臍腹上下兼脇肋疼痛便燥欲飲水
按之痛者

大黃濕紙裹硝石 桂心 甘草

桃仁肆拾个
去皮尖

右為末煉蜜圓如梧子大每服五七圓至十圓米飲下
婦人血閉疼痛亦宜服之

應痛圓治敗精惡物不去結在陰囊成疝疼痛不可忍又
服去病

阿魏式兩醋和用蕎麥作餅
厚三指畏阿魏漫炒煨熟

檳榔大者式个刮作瓮子
下末用蕎麥炒餅子慢火煨熟

右同研為末入硃砂末一錢赤芍藥末一兩同為麩糊
搜和圓梧子大每服十圓至二十圓食前溫酒鹽湯下

三白散治膀胱熱濕相乘陰癰腫脹大小便不利

白牽牛各半兩 白朮 桑白皮 陳皮

右為末每服空心薑湯調下初進一服末竟再進此藥
不損臟氣只道利留滯疝方大率多用熱藥此方惟壅
執證宜服之

金圓散治膀胱疝氣閉塞下元大小便不通疼痛不可
忍者服之神效分心氣飲吞青木香圓亦效方見諸症

金鈴子肆拾玖个去核到如豆大不得碎細用巴豆
深黃色為度
去巴豆不用茴香一兩

右不用巴豆將一味為末每服二錢食前溫酒調下

命命圓治膀胱腫硬牽引疼痛及小腸氣陰囊腫毛間
出並能治之

金鈴子肉 伍兩

茴香 炒

馬蘭花 炒

海蛤

兜絲子

破故紙

海帶 各三兩

木香

丁香 各一兩

右為末糊圓如梧子大每服一三十圓空心食前溫酒
鹽湯任下

命命圓治膀胱有熱服煖藥攻成癰滯作痛

黑牽牛 三升

大黃 二升

白礬 一升

右用巴豆去皮三十粒先入鈹炒焦乾去巴豆入衆藥
炒香為末煨大蒜研細為圓茴香湯送下

命命散治腎大如斗不過二劑除根

舶上茴香

青皮

芳朮 枝核

右等分剉散炒出火毒為末酒下一錢日三服

命命圓治四種癩病

桔核 炒

海藻

昆布

海帶

川練肉酪 一

桃仁 炒

厚朴 姜炙

木通

枳實 炒

玄胡索 炒

桂心

木香 各半兩

右為末酒糊圓如梧子大每服六十圓空心鹽湯酒任

下虛寒者加川烏一两腎腫久不消加硃砂二升醋煮
旋入有熱氣滯者加黑牽牛火黃各半兩

牡丹散 治小兒疔腫偏墜

防風 牡丹皮

右等分為末每服二錢溫酒調服鹽湯亦可

肉桂湯 治交接勞後陰囊腫脹痛入腹中

右刮竹青皮一升以水三升煮一半去滓分三服立愈

灸法 關元穴在臍下三寸灸三七壯

大敦穴在足大指甲後三毛上灸七壯

脚氣

香薷散 治男子婦人初患脚氣其病寒熱或頭

痛忽然脚弱有筋一條自脚脛骨至臂及腰面起作痛皆
因風寒暑濕之氣相感而成先須解散每四錢加檳榔一
个切片木瓜二片生姜三片葱白二根水一盞煎熟服不
拘時候大便秘加大黃每服半錢方見傷寒和辨類

神效五寶湯 治風寒暑濕流注足三陽經手足拘攣疼痛

行步艱難增寒發熱自汗惡風頭眩腰重關節掣痛或卒
中昏寒大小便秘泄或腹痛嘔吐下利惡聞食氣兩腿頑
麻緩縱不隨熱悶驚悸心煩氣上臍下冷痺喘滿有息

麻黃去節 乾葛 細辛去蘆 厚朴姜製

茯苓去皮 防己 枳殼麩炒 肉桂去蘆皮

羌活 防風去叉 柴胡去蘆 黃芩

小草

白姜炮

半夏湯洗

甘草

麥門冬各等分

右劉散每服姜三片棗一枚煎空心服自汗加牡礪白
朮去麻黃腫滿加澤瀉木通熱甚無汗加桂加橘皮前
胡升麻腹痛吐利去黃芩加芍藥及炮附子大便秘加
大黃竹瀝喘滿加杏仁桑白皮紫蘇所加並等分凡有
此病詳認證狀逐一加減無不愈者常服下氣消痰散
風濕退腫滿諸師固秘此方雖父子兄弟不傳幸者
如瘧自汗惡風或無汗惡寒

羌活

獨活

前胡去蘆

柴胡去蘆

枳殼去穢炒

桔梗去蘆

甘草

人參

茯苓去皮

川芎

大黃蒸

芍藥米泔浸

右等分劉散每服薑三片薄荷二片煎服不過貳服

愈皮膚瘙癢赤疹加蟬蛻煎

陰經表散

以桑白麻散五種散合和治證與陽經同

湯使並同未效加金鈴子木香

六氣傷寒險證 解類

水味

治腎經虛弱坐臥當風者溫所得腰痛

若不涼治流入脚膝乃為偏枯冷痺緩弱痿重或腰脊痛

脚重痺正宜服之

獨活各兩

桑寄生無真者

杜仲製炒

細辛去苗

牛膝去土

秦艽去心

茯苓去皮

白芍藥

桂心 不見火 苦窮

防風 去蘆

甘草 炙

人參

熟地黃

洗蒸

當歸 去蘆 各取兩

右剉散每服四大錢水二盞煎空心服氣虛下利除地

黃并治新症腹痛不得轉動及腰脚牽痺弱不得屈

此方最除風消血一方有附子壹箇無寄生人參甘草

當歸近人將治癰癤風并脚氣流注甚妙為圓加乳香沒藥酒服

四不圓

治肝腎脾三經氣虛為風寒暑濕搏著流注

經絡竭日曠歲治瘵不痊凡遇六化更變七情不寧必至

發動或腫滿或頑痺增寒壯熱嘔吐自汗

歲靈仙

苦章子靈

黃耆

續斷

蒼朮

橘皮

烏藥

去本與黃

各半兩以大木瓜四箇切法前件藥仍用盞

簪定酒洒蒸熟三蒸三熅取藥出焙乾為末研木瓜為

膏搜和搗千杵圓如梧子大每服五十圓空心溫酒送

湯任下世傳木瓜圓最多惟此方有效當敬之黃松節

即扶令中木

川膝丸

治肝腎虛為風寒濕毒所中流注腿膝痠痛

如錐刀銳刺不可名狀

大烏頭

花筒端正者燒破以錐袋盛用烏頭壹斗

川牛膝

取出去皮小大日乾

右二味並不得見銅鐵氣綠肝氣惡之木日搗碎牛膝

同入石磨中磨為末酒糊圓如梧子大每服四十圓用

無灰酒一瓶中樣木瓜一箇切作片子入瓦瓶中浸木
瓜爛為度用此酒下不以時服

十全丹 治脚氣上攻心腎相繫是心隱痛小腹不仁煩渴
小便或秘或利關節牽痺疼痛神效不可具述

茯苓 酒浸

石斛 酒浸

狗脊 火去毛

黃蘗

茯苓

牛膝 酒浸

地仙子

遠志

熟地黃

酒浸 杜仲 去皮坐 炒參 兩

右為未煉蜜圓如梧子大每服五十圓溫酒鹽湯任下

治少陰腎經脚氣入腹小腹不仁上氣喘急嘔吐
自汗此證最急以腎棄心水寇火死不旋踵

牡丹皮

澤瀉

茯苓 各二兩

附子

桂心 各一兩

山茱萸

各四兩

熟地 杜仲 八兩

右末煉蜜圓如梧子大每服五十圓食前溫酒米湯任下

應急膏 治厥陰肝經為四氣逆能解肝臟左癱右瘓延

潮昏塞半身不遂手足頑麻語言蹇澀頭旋目眩牙關緊
急氣喘自汗心神恍惚肢體緩弱上攻頭目下注脚膝榮

氣凝滯遍身疼痛寒治婦人產後中風角弓反張墜重落
馬打撲傷損瘀血在內

當歸 酒浸

天麻

川芎

羌活

白芍藥

熟地黃

各等分 法無羌活 入木 炒阿膠等分

右為未煉蜜圓如雞子黃大每服壹圓木瓜兔絲子浸

酒下脚痺意效仁浸酒下中風溫酒米湯下

乳香宣靈圓 治躰虛為風濕寒暑襲四氣相搏半身不遂

手足頑麻骨節煩疼足脛浮腫惡寒發熱漸成脚氣肝腎

不足四肢挛急偏身攻注或閃肭打撲內傷筋骨及風邪

內搏男子亦取婦人經脉不調活血止痛補虛壯筋骨

葶藶去蘆

烏藥去木

茴香炒

川練子對炒

結皮

牽牛子

草薢

防風各二兩

五靈脂

乳香各半兩

草烏

黑豆宣合同者火炒刀切者透黑為度去皮

焙

右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓鹽酒或鹽湯下

婦人食前醋湯送下

通心散 治脚弱上氣陰陽交錯清濁不分上重下

中滿喘急嘔吐自汗無復紀律

蘇子炒

半夏洗

前胡

厚朴去皮切

甘草炙

當歸各二兩

桂心不見火

桔梗各三兩

右剉散每服姜七片棗二枚煎食後服虛甚者加炮附

子壹兩黃芪二兩

柴黃圓 治脚氣入腹腹脹不仁喘悶欲死

吳茱萸洗

木瓜去穢切

右等分為末酒糊圓如梧子大每服五十圓至百圓酒

或米湯任下或以木瓜蒸爛研膏為圓尤妙

獨活散 治經年腰脚虛弱筋骨疼痛難於屈伸

全蝎半兩

天麻二兩

蒼朮

乙兩去蘆皮

草烏生用

黑附子二錢 炮去皮臍

右為末每服一大錢已用黑豆炒熱麻酒調熱服藥氣所發麻痺少時其病隨安如骨髓中痛用胡桃去皮研爛入酒調服凡中風亦可服此疾經年累取不效服之如神非尋常脚氣藥比

寒暑風損手脚疼痛

治寒暑風損手脚疼痛 方見正骨科止痛類

山嵐瘴氣

治脚下汪者因久坐久立陰濕之地當風醉脫靴鞋皆成脚氣若暑月久立濕熱鬱蒸滯不和發冬月寒氣冷麻或發疼痛悶亂晴陰皆發富貴之家亦有此疾

蓬木乙兩半 玄胡索乙兩 蛤粉冬兩 陳皮乙兩

右為末每服二錢炒黑豆五十粒以湯壹盞生姜三片

分去滓調服用之經驗

大柳散

治遠年脚氣難治此方特效躄虛人減半服

捲柏隨用先以塩水煮半日火用 甘遂水煮半日焙乾東向者佳

黑牽牛頭末

甘遂 檳榔

右各為末不得相雜每服每件各一錢惟檳榔末二錢

五更初濃煎葱白湯下至辰巳時取下惡物如魚凍隨

契淡粥病安更宜服後藥

大腹皮三兩 乾宣木瓜法搗二兩半

紫蘇子微炒

檳榔 荆芥穗 烏藥 橘紅

蘇葉各一兩 蘿蔔子炒 沉香不見火 桑白皮炙

枳殼去穢剉各一兩半

右判散每服三錢姜五片煎不以時溫服

治腎經虛弱

治腎經虛弱下注腰膝或當風取涼冷氣所

乘沉重少力移步遲緩筋脉挛痛不能屈伸脚心隱痛有

妨履地大治乾濕脚氣赤腫痛楚發作無時呻吟難思氣

滿喘促卒動艱難面色蒼黑傳送秘泄並皆治之

薏苡仁

石南葉各

乾木瓜 四兩

肉桂

天麻 去苗

當歸 天麩

附子 炮去

羌活 各一兩

續斷 半兩

防風 去叉

天南星 湯洗

姜

石斛 去根

草薢 炙

川牛膝 酒洗

黃耆

續斷 各一兩

蒼朮 米泔浸

右為末麩糊丸梧桐子大每服三十九至五十九空心

溫酒或木瓜湯吞下日二一服常服舒筋輕足永無脚

氣之患昔人有此疾服之一月脚力頓愈委有換腿功

治風毒脚弱

治風毒脚弱少力脚重夜痺脚腫生瘡脚下隱痛

不能踏地脚膝筋亦柔不能屈伸項背腰脊拘急不快風毒

上攻頭面浮腫或生細瘡出黃赤汁或手臂少力或口舌

生瘡牙齦宣爛齒搖髮落耳中蟬聾頭眩氣促心腹脹悶

小便時澀大便或難

赤芍藥

五加皮

草薢 肆兩

當歸 去苗

麻黃 去根節

陳皮

赤小豆 各二兩

獨活 去苗

薏苡仁

杏仁 去皮尖及奴

赤

牽牛子 炒

石南葉 各二兩

木瓜 肆兩

大腹皮

川芎

杜仲各二兩牛膝三兩

右為未以酒浸蒸餅九摺桐子大每服十丸至十五二
十九木瓜湯下早起日中臨卧各一服偏風腫痛服之

治脚氣順氣防壅

檳榔

香附子 去毛 陳皮 去白

紫蘇葉

木瓜

五加皮

粉草 各一兩

右劉散每服四錢生姜五片煎八分温服婦人脚氣多
由血虛加當歸半兩室女脚氣多因血實加赤芍藥一
兩半大便秘結虛弱者加枳實盛者加大黃一方治脚
氣衝心大便秘宜服三和散如土鳴藥者真常服之

治脚氣入腹困悶欲死腹脹喘急

木瓜乾大片

檳榔各式

吳茱萸

洗淨壹兩

右劉散每服四錢水一盞半煎服食前用木瓜大者式
枚吳茱萸五兩湯洗次式味併用水四攪煎至一攪
分作兩服如人將十里久再進一服或汗或吐或瀉即
瘥不拘時服

三將軍圓治脚氣入腹衝心大便不通

吳茱萸

湯泡

宣木瓜

去穢

川大黃

各等分大黃或

右為未米糊圓如菔豆大每服五十圓粳米枳殼湯下
未應加圓數再服以通為度

移木節湯治脚氣入腹衝心或心脇有塊毒勝疹逆瘡滿

喘急汗流搐搦昏悶上視咬齒甚至垂絕不知人宜此藥

以救急

杉木節大橘葉無大腹子杜鱧鱧

右以童子小便三升煎取一升半分二服若一服得快

利傳後服

木瓜牛膝圓治寒濕脚氣冷濕下注脚弱無力及腎經虛

弱腰膝沉重腿脚腫急筋脉拘攣或時疼痛步履艱難二便不利日見倦乏

木瓜

肉桂酒浸

石楠藤

當歸去尾

烏藥

熟地黄

木仁去皮尖

川牛膝去苗

黑牽牛炒陳皮去白

續斷去芦

赤芍藥各等分

右為末酒糊圓梧桐子大每服三十圓空心用木瓜煎湯

吞下益湯亦可未效用羌活木瓜酒或加川牛膝酒浸

一盞許吞下

不通散治脚氣服熱藥太過小便不通淋閉臍下脹

當歸

梔子仁炒

赤芍藥

赤茯苓

甘草各壹兩

右劉散每服三錢水一盞煎溫服

六神散治一切風寒濕熱令足膝痛或赤腫脚骨間作熱

痛雖一點能令步履艱苦及腰膝臂脚大骨疼痛令人痿

癈一切脚氣百用百效

蒼朮炙甘草炙燄

黃藥去蘆皮酒浸一日

右劉散每服四錢水壹盞煎七分溫服日進三四服

專治脚氣

木香 兩半 川烏 煨

沉香 檳榔

乳香 各別研 兩

羌活 各一兩 白茯苓 三兩

木瓜 川芎

右為末 麩糊圓如梧子大 每服六十圓 薑湯下

烏藥酒 治脚氣發動 鄉村無處問藥 特效

土烏藥用乾籠布巾揩淨 以瓦片刮下屑 收於磁器內 以好酒壹升 浸一宿 次日空心去藥 屑止 將磁器內所 浸藥酒 熱湯上坐 溫入生麝香少許 尤妙 一服即安 無 傷 則多服 服後 澀泄病去

三和散 脚氣稍愈 常服 弱人更宜 宜開服

收毒散

方見諸氣中湯 傷寒陽證類

林洗方 治脚氣 用此藥 熏蒸 淋洗

矮樟葉

石南葉

西江杉片

藿香

大蓼

獨活

白芷

紫蘇

紫金皮

藁本

羌活 各等分

右剉碎 加大椒 五六十粒 葱一握 用水二斗 煎七分 置 盆內 令病者 以足 加其上 用厚衣 蓋覆 熏蒸 痛處 候溫 熱 可下手 時 令他人 淋洗

脚氣水法

先以復元通氣散 一方 用黃芪 圓倍 加甘草 酒糊圓 每 服三十圓 用淡淡酒 吞下 如人行五里 又進一服 連進

三服却用甘草細末半兩用好醋調仍以炭三四斤生
火於地上烹至十分通紅却去火以脫底桶子一枚或
二件圍住患人足決其醋在地上急用被絮裹蓋其足
得脚上有汗為妙甚者經再取可去其病根一方以復
元通氣散并甘草先以酒服之却取猪腰子一隻分為
兩邊用甘草末二錢頓在腰子上用托兩脚心以片帛
扎定仍濃煎甘草湯更服之又方主脚氣流注四肢結
成腫核不散赤熱焮痛及癩一切腫毒以甘草細末醋
調傳腫處濃煎甘草湯一味服之其腫即散一服未安
再用二藥須兩人各買亦不可同處安頓及不許併手
修合耳聾亦可煎甘草湯服之以甘草塊塞耳

用藥法

猪牙皂角

擇不蛀者

大皂角

不爛

南木香

右各等分為末黃子醋濃調先於腫之上不腫處用藥
圍塗之闊三四寸若圍然截斷毒氣不使衝上久塗下
面腫處只留脚尖不塗仍修事脚甲出毒氣時時用醋
潤之一方用不蛀皂角為末入平胃散內醱醋調傳一
方謂倉卒祇用皂角火上燒灰存性薑汁調傳雖皆可
用乃不及上方為妙

脚氣法

每夜用鹽塗擦腿膝至足甲淹少時却用熱湯泡洗昔
有人得脚氣諸方不效後得此春月常用淹洗不再發

近效方

凡脚氣初作兩足伸屈之間或拘牽或痠疼或有赤腫
用香蘇散香薷散加蒼朮木瓜大蓼搗碎川椒葱白煎
水傾在盆內衣被覆足熏一時取汗再淋洗不可頻用
灸法風市穴可令病人起正身平立垂兩臂直下舒十指
掩著兩髀便點當手中央指頭髀大筋上是

三里穴在膝頭骨節下三寸人長短大小當以病人手
尖度取灸之

絕骨穴在脚外踝上一夫亦云四寸以上三穴多灸取
效凡病一脚則灸一脚病兩脚則灸兩脚未效再灸犢鼻
穴在膝頭下胛上俠解大筋中以手按之得窟解是或

灸肩隅穴在肩骨骨端兩骨間陷者宛宛中率臂取之
曲之穴在肘外輔骨屈肘曲骨之中以手按胸取之是
十趾端名曰氣端日灸三壯並有神效此穴在足趾

腫滿

虛證復元丹

治水腫夫心腎真火能生脾肺真土今真火

氣亏不能滋養真土故土不制水水液妄行三焦不瀉氣
脉閉塞樞機不通喘息奔急水氣盈溢滲漏經絡支膚溢
滿足脛尤甚兩目下腫腿股間冷口苦舌乾心腹堅脹不
得正偃偃則咳嗽小便不通夢中虛驚不能安卧

附子

炮二兩 南木香

茴香

川椒

炒去汗

獨活

厚朴

白木

陳橘皮

陳橘皮

鹽食毫末許不得入口若無以為味即水病去後且以醋少許調和食不能忌鹽勿服果欲去病切須忌鹽但試服藥即於小便內旋去不動臟腑病去日日三服以溫和調補氣血藥助之真神方也又名萬金丹

治陰水先實脾土

厚朴去皮

白木

木瓜去穢

木香不見火

草果仁

大腹子

附子炮去

白茯苓去土

乾姜炮名

甘草炙

右剉散每服四錢水一盞半生姜五片棗子一枚煎至七分去滓溫服不以時服

加味寶丹

治腎虛腰重脚腫小便不利

附子炮

白茯苓去土

山茱萸取肉

山藥炒

車前子酒蒸

牡丹皮去木

官桂不見火

川牛膝酒浸

熟地黄各半兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服七十九空心米飲下

木香流氣散

治面目虛浮四肢腫滿喘急水道澀赤方見諸氣

熱証神助散

治十種水氣面目四肢遍身俱

腫以手按之隨手而起欬嗽喘急不得安卧腹大腫脹口

苦舌乾小便赤澀大便不利

澤瀉二兩

椒目一兩半

黑牽牛微炒取末

猪苓去黑皮

葶藶炒香

右剉散每服以葱白三莖漿水一盞煎至半盞入酒半

蓋調藥三錢絕早面向東服如人行十里久以漿水葱
白煮稀粥至葱爛入酒伍合熱服量入幾多少須發一
升許不得與鹽并麩自早至午當利小便三四升或大
便利喘定腫減七分隔日再服既平之右必須大將息
及斷鹽房室等三年

治熱証消浮退腫下水大效方見喘急類

治水氣通身洪腫喘急氣急煩躁多渴大小便不利服熱藥不得者

澤瀉 赤小豆炒 商陸 羌活去蘆

大腹皮 椒目 木通 秦艽去蘆

檳榔 茯苓皮

右等分剉散每服四錢水一盞半姜五片煎至七分去
滓溫服不拘時候

治腫滿口燥咽乾小便絕少方見傷暑類

治年少血氣俱熱遂生瘡疥變為腫滿或煩或

渴小便不利

商陸 赤小豆炒 當歸去蘆 澤瀉

連翹仁 赤芍藥 漢防己 木猪苓去

桑白皮炙 澤瀉已上各半兩

右剉散每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去滓溫
服不計時候熱甚者加犀角二錢半

治水腫喘急大小便不利

郁李仁

杏仁炮去尖

薏苡仁各一兩

右為末米糊丸如梧子大每服四十九丸不拘時米飲下

行滯氣去浮滿利瀉大效方見諸氣類

和暢三焦治痞脹浮腫加赤茯苓二兩可以和氣

利水方見諸氣類

治水腫小便絕少

地龍

猪苓去皮

針砂各一兩

右為末搗葱涎調成膏敷臍中約一寸高闊絹帛束之

以小便多為度日兩劑

治脾水四肢頭面悉腫按之沒指不惡風其腹如

鼓不喘不渴膝不浮

桑白皮

茯苓皮

生薑切

皮各等分

散每服四錢水一盞半煎七分去滓熱服日二

服方用青木香丸每服三十五丸黑牽牛子末少許

治水腫從腰以上俱腫以此湯發汗

麻黃四兩

甘草三兩

右剉散每服二錢水一盞半煮麻黃并沸內甘草煎至

八分取汗慎風冷有人患氣促積久不差遂成水腫

之有效但此藥發表老人虛人不可輕用更宜審察

花圓消水腫

大巴豆去殼

華麻子

大黃

桂枝

元花

杏仁

各等分

右為末米糊丸每服五十九空心溫酒吞五更早喫下
水大效

藥 催發

巴豆

甘遂 各叁分 檳榔

大戟

當歸 各五分

青皮

黑牽牛

取頭末各壹兩

右為末用一大錢葶藶子煎湯調下五更初喫下水

藥 用補

木香 五分

肉豆蔻

煨

肉蓯蓉

酒洗炙各壹兩

右為末每服一大錢米飲調下忌生冷油面

藥

治水腫消腫及四肢腫

烏鯉魚 壹斤

赤豆

桑白皮

白朮

陳皮

各壹兩

葱白 五根

右用水三椀同煮不可入鹽先喫魚後服藥

藥

治腫滿小便不利

陳皮

郁李仁

檳榔

茯苓

白朮

各壹兩

甘遂 伍錢

右為末每服二錢薑棗湯下

藥 治水氣腫

羌活

蘿蔔子 炒

各壹兩

右為末用酒調下

藥

緊皮

丁香

木香

各三錢

縮砂

紅豆

白薑

桂枝

陳皮

青皮

桔梗

胡椒

各五錢

右為末每服二錢秋石湯調下

紫金丹

白薑

香附子

去毛

紫金皮

石菖蒲

青木香

針砂

時煖紅

右各等分為末米糊團用三十圓第一茶清下第二商陸根湯下第三赤小豆常藥用好酒吞下秘傳方止此

治風腫

治風腫皮癢麻木不仁或時疫痛

麻黃

牽牛

取頭末

甘草

各分半

杏仁

防風

半夏

芍藥

辣桂

白芷

防已

當歸

川芎

羌活

獨活

檳榔

各五分

右劉散每服二錢姜四片蘇葉三皮煎服

治諸氣腫等疾

芫花

澤瀉

郁李仁

甜葶藶

漢防已

藁本

各半

陳皮

白茯苓

白檀

瞿麥

各半兩

白滑石

大戟

各半

為末每服一錢葉白皮煎湯空心調下取下碧綠水如爛羊脂即差未及隔日又服腫消如故不服忌鹽百日

治諸命湯

小續命湯加羌活一倍煎服之遂愈

方見

背腫方

以煉石塗之立瘥

烏梅法

治手指甲頭腫

烏梅搥碎去核肉只取仁研米醋調入指漬之自愈

眼腫方

以赤小豆為末傳之立效

陰腫方

治男子陰腫大如升核痛人所不能治者

以馬鞭草搥爛塗之

治婦人陰腫取毒方

杜實半斤碎炒令熟舊帛裹熨即易之

灸法

足第二指上一寸半隨年壯又灸兩大手指縫頭七

壯治水氣通身腫滿效太衝腎膈各百壯治虛勞浮腫效

世醫得效方卷第九終

聖