



明監察御史東萊桂亭蔡才僉

趙州教授進之王好古筌次

兩淮運同西明

兩淮運副姚江嚴昌世校正

厥陰證

調胃散

治一切吐逆傷寒四
肢逆冷粥食不下

硫黃

水銀

各半

右先碾硫黃極細次下水銀同碾至黑色為度每服一錢重者二錢溫米飲調服無時

許學士破陰丹 論伏陽一脉 並見陰證論

還陽丹活人丹砂丸 火焰散 回陽丹

反陰丹 並見陰證論

半硫丸治老弱虛人臟腑秘 主治脩製 並見局方

硫黃 半夏

局方金液丹 主治脩製 並見局方

上二藥並在五苓化水丹後

三寶丹

雄黃 半夏 牡蠣 硃砂

楊氏五神丸 一名連復丹

硫黃 另碾 硝石 另碾

右同與磁器內用文武火炒得所勿令太過須一

氣透方可若未透則氣不相感

五靈脂 青皮 陳皮 去白等分

右件陳皮等末與硫黃硝石和勻 麵糊丸桐子大

此藥二氣相配陰陽均平天地平和之氣可熱可

冷可緩可急是以治陰陽不調冷熱交攻榮衛相

勝心腎不升降水火不交養丈夫婦人因病嬰兒

未復丹乃

危急但胃氣在無不獲邪氣炎上煩燥冷氣攻急
痛膈氣痛塞不可忍腎氣脅下攻之氣滿不可轉
動諸霍亂吐瀉渴藥不止一服定大抵吐逆唇口
青手足厥冷脚轉筋者兩服傷寒煩燥昏塞倒卧
不省人事不得飲新久患崩漏泄利不問赤白冷
熱量患深淺服數服止若非時嘔吐飲食不下服
之立愈每服五十九空心米飲下甚者七十九重
稚十九嬰兒五七九新生兒二三九化破與服如
小兒急慢驚風胃氣在雖困無不救者但是藏
腑一切急病不明證疾並可治之非與尋常方一
同乃博効救濟人藥也

易簡來復丹

主治脩製之法並見局方

硫黃

五靈脂

橘紅

青皮

玄精石

每服二十九米飲下食前此藥可冷可熱與養正
丹黑鉛丹相類但體輕不能鎮墜耳然硝石性寒
佐以陳皮其性踈快硫黃且能利人若作熱藥用
以止瀉誤矣但霍亂一證吐利交作蓋因飲食生
冷暑濕熱之氣中脘結閉揮霍變亂此藥通利三

焦分理陰陽服之其効最驗兼治翻胃嘔逆其効尤速中暑霍亂此藥最切小兒驚風用亦有驗蓋上證候皆由涎飲中節致之此藥溫利涎飲既出則諸悉去若男子婦人心腹作痛踈利之劑得効者未應遽補當以藥徐徐飲之令大便常通利則痛不復作矣嘔吐用之其意亦然不可不知腎厥頭痛老人頭痛並宜常服一法治老人並虛損之人寒氣入腹大小便不通者用生姜半兩連根葉和泥葱一根搗一撮豆豉五十粒爛碾畧炒盒臍心兩劑更易用之以利爲度亦良法也

局方來復丹

此藥配類二氣均調陰陽奪天地中和之氣乃水火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交養心腎不升降上實下虛氣閉痰厥心腹冷痛臟腑虛滑不問男女老幼危急之證但有胃氣無不獲安助真補虛救陰助陽爲効殊勝

舶上硫黃

透明不夾石者

大陰玄精石

一兩研水飛

硝石

半兩同硫黃並爲細末入定磁內以慢火炒篋子不住手攪令陰陽勻不可火大過

傷藥力再研極細名曰二氣末五靈脂二兩酒浸用五臺山者

淨陳皮去白三兩青皮去白三兩

右用五靈脂二皮為細末次之玄精石末及前二藥末拌勻以酒醋打糊為丸如豌豆大每服三十丸空心粥飲吞下甚者五十粒小兒慢驚風或吐痢不止變成風搐癇非風也胃氣欲絕故也用五粒碾細末飲送下老人伏暑逆亂紫蘇湯下婦人產後血逆上搶心悶絕并惡露不止及赤白帶下並用醋湯下常服和陰陽益神散腰腎間陰濕止脅痛疼立見神效應諸疾不辨陰陽證者並宜服之神異不可具述

四神丹

治百病補五臟遠疫病厲却嵐疔除尸疰蠱毒鬼魅邪氣大治男子婦人真元虛損精髓耗傷形羸氣弱中滿下虛水火不交養陰陽失升降精神困倦面色枯槁亡血盜汗遺溺失精大便自利小便滑數夢寐驚恐陽事不舉腰腿沉重筋脉拘急及治一切沉寒痼冷痲痺疝瘕絞痛义久久痢傷寒

陰證脉候沉微身涼自汗四肢厥冷婦人百病胎
臟久冷結孕無子赤白帶下月候不調服諸藥久
不差並皆主之此丹假陰陽造化之功得天地中
和之氣却與尋常一煅一煉僭燥丹藥功效不同
此丹活血實髓安魂定魄悅澤顏色輕身保壽
不恃藥力縱情恣欲久久服之可通仙道

雄黃 硫黃 雌黃 朱砂

右件四味各五兩碾細入瓮合內將馬鞭草爲末
鹽泥固濟慢火圍燒煅一日一夜取出再碾細
以糯米粽和爲丸如菉豆大每服一丸空心新汲
水吞下妊婦勿服忌羊肉菘菜

龍腦太白丹

治風壅偏正頭疼痰膈不利四肢拘急疼痛辟風
邪清神志

硫黃

細碾

硝石

細碾各二兩

白附子

炮爲末一分

右件入龍腦少許同碾細滴水丸鷄頭大每服一
丸細嚼荊芥湯無時

易簡養正丹

脩製主治並見後局方

硫黃

黑錫

水銀

硃砂

右每服五十九食前米飲送下此藥用硫黃黑錫本無利性存利在丹藥用以補虛冷治泄瀉之類大不得其宜難卒中之患痰涎壅盛此鎮墜使大便溏利病亦隨去則於三生飲選藥爲之湯液若氣虛喘急或發咳嗽沉疴煎湯調鍾乳粉咽下於降氣湯中選用之若補胃之患皆因中脘停寒涎痰凝滯食入卽吐當用此藥以丁香附子之類煎湯下但子附性熱恐爲痰飲隔節蓄在上

焦反爲僭燥則於二陳湯中選藥用之凡治嘔者先以加減感應丸微利之次用此藥無不尅效半硫丸亦有性利用之尤當切仍以水煮半夏丸服之見二陳湯後若脚氣之患入腹衝心或見嘔吐之證無法可療千金以大黃利之大黃性寒病既深入必難導達是其嘔吐也不若用此藥或黑錫丹來復丹之類煎降氣湯下便須多服以大便流利爲度脚氣無補法此有利性卽非補藥服之無疑 痰癖疝氣膀胱奔豚之氣入腹者亦宜用

此若尊年之人，大腑寒秘者，尤宜服之。黑錫丹與此同類亦效。

局方震靈丹

紫府元君南岳魏夫人方出道藏一名紫金丹。此丹不犯金石飛走有性之藥，不借不燥，奪造化中和之氣，又治男子婦人真元衰憊，五勞七傷，臍腹冷痛，肢體疼痛，上盛下虛，頭目眩暈，心神恍惚，血氣衰微，及中風癱瘓，手足不遂，筋骨拘急，腰膝沉重，容枯肌瘦，口疳耳聾，口舌乾苦，飲食無味，心腎不足，精滑夢遺，腰腹痠墜，小便淋瀝，夜多盜汗，久泄久痢，嘔吐不食，八風五痺，一切沉寒痼冷，服之如神。及治婦人血氣不足，崩漏虛損，帶下久冷，胎臟無子，服之無不愈者。

禹餘糧石

火煨碎不許過數，以手撚碎爲度。

丁頭代赭石

赤

再銜糧石煨法

赤石脂

紫石英

各四兩

右四味並用乾鍋內，搗泥固濟，候乾用炭十斤煨通紅，火盡爲度，入地坑埋出，火毒二宿。

滴乳

研二冊

沒藥

去砒石研二冊

五靈脂

去砒石研二冊

珠砂 火飛過

右通前藥共八味並爲細末以糯米粉煮粥爲丸如鷄頭大爆乾出光每服一九空心溫酒冷水亦得常服鎮心神駐顏色溫脾胃理腰膝除尸疰蠱毒辟鬼魅邪厲久服輕身漸入仙道忌猪羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可服極有神效

朝真丹

治腸胃虛弱內受風冷或食生冷內傷泄瀉暴下日夜無度腸鳴腹痛手足厥冷

硫黃

生研一兩

煅燹 七錢五分

朱砂

三錢一分

右合勻水浸蒸餅爲丸桐子大米飲下三十九無時夏月宜用以備急諸沉寒痼冷之疾諸熱藥不能效者灸關元五七壯卽效

至寶丹

脚氣亦有分寒熱處三日及有用紅雪紫雪及諸元藥者

軟金丹

天竺黃

各三錢

龍腦

字一

麝香

牛黃

各一錢

金銀箔

各十片

已上七兩九錢一字通碾細再杵白蜜十兩溫溶

紙覆取蠟淨次日再煨利藥末每兩作十五丸茶酒任下

海藏云初病疾不宜服至寶丹小見微疾亦不宜服

人參 天麻 白姜蚕 菖蒲 乾蝎 各半兩

防風 半夏 牛膽製 白茯苓 各九錢 遠志 八錢

薄荷 一兩 黃連 兩 雄黃 二錢 烏犀 玳瑁

琥珀 朱砂

至寶丹大抵風毒始自皮毛入留孫絡孫絡不已流入大絡小絡不已流入大經小經不已流入骨髓先

湯液次丸散次丹劑丹劑爲風入骨髓不能得出故用入骨髓透肌膚之劑爲開窓牖之藥龍麝牛雄犀珀金珠皆入骨髓透肌膚之劑而使風邪得以出於外也初病風疾未及於裏便服入透骨肌之藥是引賊入家如油入甍不可出也其反招害如此大抵疾有溪淺治有次第初焉至淺不可以重劑治兼之小兒腸胃細小肌肉與脆遽以入骨透肌之藥治之若有他證草木之劑不可近也富貴之家深宜戒此若遇潮涎不省痰證急甚不拘此例事至不得已而用

之是謂得其當矣。猶之射也。高則過下則不及。要之適乎中而已。無病人服風藥。開發過極。反使風入。亦猶引賊入家。與無病在經而服至寶丹無異。

聖功丸 專治血痢

臙粉 五錢

定粉 三錢

一法加蛤粉 三錢

右同研勻水浸蒸餅爲丸。菘豆大。煎艾湯下。五七

丸或十九

蝎稍丸 當在妙香丸後

治急風牙疳。驚癇。搐搦。自不定。恍惚。潮涎昏悶。不

省人事。利胞。膈清。頭自化痰。實寧。心神安。臙腑

蝎稍 微炒

白附子 炮二兩

天麻 一兩

龍腦 錢一

朱砂 研一兩

半夏 湯製一兩

右細末。白麩糊丸。菘豆大。每服三十九丸。細嚼薄荷

湯下。臨臥

不換金丹

荆芥穗 一兩半

薄荷 二兩

天麻 一兩

甘草 一兩

白姜蚕 一兩

防風 一兩

藿香葉 一兩 細辛 一兩

川芎 白附子 羌活

全蝎 炒各半兩 朱砂 爲衣

右末蜜爲丸彈子大每服一二丸茶下

治破傷風

蝎稍七條爲細末熱酒調下

上青白附丸

同錢氏溫白丸例

白附子

炮

白姜蚕

天南星

半夏

天麻子

川芎

甘菊花

旋覆花

陳皮

一

全蝎

半兩

右細末姜糊丸桐子大每服三十丸姜湯下

錢氏溫白丸

治小兒脾氣虛困泄瀉瘦弱冷疳洞利及因吐瀉

或久病後慢驚身冷瘰癧

天麻

半錢

姜蚕

炮

白附子

生

乾蝎

南星

右細末湯浸寒食麩丸菽豆大丸子仍以寒食麩
養內七日取出每服七丸加至二三十丸空心生

姜米飲湯下漸加丸數

易簡如聖餅子

修合治療之法並見後局方

川烏

南星

乾姜

甘草

川芎

天麻

防風

半夏

右每服二十餅嚼破生姜湯下本方只服五餅安
能作效初感傷寒因汗而解尚餘頭疼濃煎生姜
葱白湯皆可此藥須是自合庶幾糊少且料藥精
製餽易爲效也一切頭疼不問內外所因並宜服
之 兼治中脘痰飲停積及療脾胃飲食所傷温
中快膈尤得其宜 偏正頭疼茶湯下久久服之
不復再發

局方如聖餅子

治男子婦人氣血上盛下虛痰飲停積風寒伏留

陽經偏正頭疼連腦顛吐逆惡心目眩耳聾常服
清頭目消風化痰煖胃

川烏

去皮

南星

洗

乾姜

各二兩

甘草

川芎

各二兩

天麻

防風

半夏

各半兩泡

右細末湯浸蒸餅丸如鷄頭大捻作餅子暴乾每
服五餅同荊芥三五穗細嚼茶酒任下熱水亦得
無時服之

化風丹

治中風涎盛胞膈不快頭重目不開或目睛上視

一切諸病

烏蛇

生去骨
一兩

白附子

炮一兩

南星

一箇重
一兩

朱砂

二兩

姜蚕

一兩

麝香

半錢

雄黃

二錢

右蛇附星蚕爲細末另入麝香朱砂等肆物細末

再碾勻煉蜜丸鷄頭大酒化下如牙關緊急不開

以蒜一大瓣搗爲泥塗在兩牙關外豆淋酒化下

蘼藥擦牙自開更服二錢效如神

治患後轉瀉腹脹如鼓竭氣散

全蝎

燒灰研

麝香

少許

右細末每服二錢七米飲下甚者再服必愈

治傷寒將炊者

川烏

生

南星

半夏

天麻

生去蘆
各等分

右爲細末每服一錢煎豆淋酒下稍濕服次用一

二盞投之者若牙關噤幹嚙之但藥得下無不活

者

烏荆丸

川烏

一兩炮
去尖

荆林穗

二兩

右爲細末醋九桐子大每服二十九温酒送下熱

水亦得有病日食三無病日一服此藥腸風尤妙
化水丹

川烏 附子炮

乾姜炮

赤石脂

蜀椒 桂各等分

右蜜丸桐子大每早服三丸夜三丸温酒下

老君神明散

温疾

白朮二兩

桔梗二兩

細辛一兩

附子

炮去皮 臍二兩

川烏

炮去皮 臍四兩

右五味爲麤末縫絹囊袋盛帶之居閭里皆無味

若有痰疾温酒服方寸七覆取汗得吐卽差若經

三四日抄方寸七以水二碗煮令大沸去滓二服

換骨丹

槐蔓蒼桑香 葳人防何苦 十味麝牛麻

佳人稱換骨

右製度並見廣濟宣明方

拯濟換骨丹

海藏云白汗不愈不置服亦汗家忌重發汗也

槐皮芎朮並 仙人防首蔓 十味各停勻

苦味香減半 龍麝卽少許 朱砂作衣纏

麻黃膏煎丸 大小如指彈

治半身不遂、口眼喎邪、手足不仁、言語蹇寒、或骨痛連髓、或痺襲皮膚、或中急風、涎潮不言、精昏澁、行步艱難、筋脉拘急、左癱右換、一切風疾、並皆治之。

槐莢子 人參 桑白皮 蒼朮 白芷

何首烏 蔓荊子 威靈仙 防風

各二兩

五味子 苦參 香附

各二錢 另張

龍腦二錢 川芎一兩

右十四味為細末入麝香令勻又用麻黃十斤去根節用天河水三石熬至六升去渣再煎至二升半入銀石器內熬成膏入前藥和勻杵五千下每兩作十九丸朱砂為衣每服一九搗碎酒一盞自晨浸至晚食後飽得卧微攪之神清無睡是藥之驗再服須更五日服之如中風無汗宜服若體虛自汗服之是重亡津液也若風盛之人當於密室中温卧取汗稍避若風實者至寶丹之類風虛者靈寶之類

局方大已寒丸 易簡大已寒丸同

治久寒積冷腑臟虛弱心腹疼痛脅脹滿泄瀉腸鳴自利自汗米穀不化陽氣暴衰陰氣獨盛手足厥冷傷寒陰盛神昏脉短四肢怠惰並宜服之

乾姜 六斤

炮 高良姜 六斤

桂 四斤

革撥 四斤

每服五十九米飲下此藥熱燥能治臟腑虛寒滑而下利反泄瀉腸鳴水穀不化若心腹疼痛中脘停寒大溏泄者尤宜服之

大已寒丸

吳茱萸 官桂

乾姜

良姜

烏頭

附子

一法加芍藥

一法加茴香引陽氣下行不傷

眼目

右為細末醋糊丸亦得桐子大每服三五十九未

飲下空心食前日二服無所忌

吳茱萸丸

治下痢臟腑不調脹滿腹痛水穀不化怠惰嗜卧

時時下痢

吳茱萸

一兩半 湯洗炒

神麴 炒五兩

白米

四兩

桂二兩

乾姜炮二兩半

川椒去目炒一兩

右細末糊丸桐子大米飲湯下十五丸至二十九食前上澄乃陰濕勝也

小吳茱萸丸

吳茱萸

半兩洗焙乾

良姜三兩

乾姜焙三兩

右醋糊丸桐子大每服三五十九丸米飲下

快活丸

治痰痞嘔吐不愈腹脹大便不通秘者陰燥勝也

吳茱萸

洗

木香各一兩

良姜

乾姜炮

枳實

陳皮各三兩

右酒煮神麩末作糊丸桐子大姜湯下十五丸至

二十九無時陳皮湯亦得

艾煎丸

治男子陰證女人寒帶下

艾葉

四兩炒

大椒

赤石脂

乾姜

川烏

炮去皮

生硫黃

已上各一兩

右糊丸桐子大每服二三十丸艾湯鹽湯任下

艾煎丸

治婦人久病氣虛冷羸瘦

蒼朮

四兩製

當歸

酒浸焙二兩

小椒

半兩炒

右細末好醋一斗好艾葉一斤浸一宿砂鍋慢火
熬至五升去滓再入鍋內熬出膏子同和前藥丸
桐子大每服三四十九溫醋湯下食前炒陳艾上
餘藥共爲末糊丸亦可

壹氣湯

吳茱萸 半兩 倍

桂 二錢 半夏 姜制

右咬咀每服伍錢生姜五片水一盞餘煎六分去

查溫服

奔氣湯

吳茱萸 人參 生姜 棗

右於吳茱萸湯中去棗加半夏桂心甘草亦名奔

氣湯

小七氣湯 具見太陰證

戊巳丸

吳茱萸 白芍藥 黃連 各等分

右三味同炒微黃放冷爲末糊丸米飲下三十九

食前

小已寒丸 一名強中丸

治脾胃積冷中寒洞泄倦怠不思飲食進食止自

汗厚腸胃見肝後甚驗

艾葉四兩 蒼朮一兩 陳皮二兩 吳茱萸二兩

右件用米醋二升浸一宿漉出暴乾再於原浸藥

醋內拌和勻炒令紫色焙乾為末稀糊丸桐子大

每服三十九溫酒鹽湯醋湯下空心食前

前烏頭例

張鐵確前烏頭蒼朮法

右烏頭去黑皮用白心微炒蒼朮泔浸炒黃為細

末酒糊丸

移刺相公神仙保命金丹

治男子丹田衰弱五臟虛損血少氣微肌瘦面塵

手足顛掉目視荒荒迎風出淚耳鳴旋運筋骨無

力春秋發嗽疾痰喘滿悶腰膝疼痛脚上癢疹難

坐立伎多盜汗四肢怠惰陽事不強精滑無子悉

宜服此丹

草烏頭四兩 秋收黑色者去皮同蛤粉炒

黃存性地內埋一宿去火毒焙乾

金鈴子三兩 破故紙二兩 茴香二兩

去皮酒一宿炒香

川烏

白附子

半夏 各半兩

地龍 去土一兩

黃芩

松香

五靈脂

錫蘭脂 各半兩

自然銅

二兩半醋滓七次

南星 蓰蓉

川芎

破故紙

各半兩

糯米 半升炒

右細末酒糊丸桐子大每服五九温酒下

張守道傳化張鉄確方

治男子陽精不足女子赤白過多

牡蠣

一斤燒

赤椹子 斗

草烏頭 半斤焙

右爲末酒糊丸桐子大每服二三十丸温酒下

湯亦得一法張守道加蒼木一斤不去皮炒黃與

上同爲末丸

安宜差傳到筋骨藥

川烏頭

澤瀉

五靈脂

地龍 去土

蘿蔔子

上各兩

蒼木 二兩

川當歸

赤芍藥

各一兩

木鱉子

半兩去皮

沒藥

乳香

各三錢

右細末醋糊丸桐子大自然銅爲衣每服十九食

前温酒服

朱砂劍

玉倪丹

補心益腎上下通主升降
以至丹田湯坎之像也

丹砂

二十兩

甘草

遠志去心

檳榔

一兩

訶黎勒

皮一兩

桂

八兩去皮搗碎

右每食前服一九日三食計服三九温人參湯下

海藏老人云此砂煉成亦可與大補丸五臟隨藥合

和用之或全用五臟藥和丸亦可大補丸在少陽條下局方五

補丸後

造丹砂法

右甘草等四味剉水二大斗釜中以細布袋盛丹

砂盛於釜中着水和藥煮之 第一日兼夜用湯

火絞動 第二日兼夜湯火魚眼沸 第三日兼

夜木火花沫沸 第四日兼夜炎火涸泪沸 第

五日兼夜土火微微沸 第六日兼夜金火沸愈

緩作急 第七日兼夜水火沸緩緩調調 先期

泥二釜一釜常煖水用漆煮藥釜中水減即漆煖

水常令不減二斗七日滿即出丹砂於銀器合中

盛其合內先布桂一兩勻即與桂布朱砂又以金

桂一兩覆足即下合置甌中先布糯米厚二寸乃

置合又以糯米覆培之亦合厚三寸許築柴火蒸之每五日換米挂其甕蔽一日以行竹子爲之不爾側間一小孔常煖水同竹筒注添釜中勿令水減第一五日兼夜用如春火如常炊飯第二五日兼夜用夏火猛如炊飯第三五日兼夜用秋火如炊飯乍緩乍急第四五日兼夜用冬火煖如炊飯依五行相生文武助之藥卽成出丹砂以五搥鉢碾之如膩粉卽可用服之煎楮實搜和桐子大每日食前服一丸人參湯下每日三服食煎計之煉成丹砂秤四兩爲一劑二年服盡復服每十年卽煉三兩仍取正月一日取服一月使盡既盡酒服十年一二兩不令旋合宜須煉一劑

造楮實煎法

六月六日收取楮實熟者緩絞取汁拾銀器內慢火熬成膏搜和前藥末爲劑丸

小珠砂丸

硃砂兩五

牙硝兩六

寒水石兩四

麝香一字

鵬砂一字

梅腦錢半

甘草半錢浸

汁熬膏

右碾勻用甘草膏和每兩作一十九每噙化一九
小兒夜驚啼薄荷水化下

朱砂寒熱溫涼各百加減例

寒大黃 巴豆 牛黃 黃連 黃栢

熱附子 巴豆 烏頭 南星 半夏

朱砂散

治小兒神亂驚悸睡卧不安大便秘利譫語齒齕

痰嗽

辰砂七兩 桔梗五兩 人參 蛤粉 牙硝各三兩

甘草二兩 腦子二錢 金箔二十斤

右細末一歲兒半錢薄荷湯調下未滿百日兒發

熱多睡不安大便秘利蜜湯調下一字大人小兒

口瘡咽喉少許搽咽膈熱新水調臨卧

鶴頂丹

治大人小兒風痰不利煩渴不安中暑頭痛不解

麝香二錢 朱砂十兩 牙硝十二兩

寒水石一兩 甘草三兩

右細末煉蜜丸龍眼大大人生姜湯化下中暑腦

子新水下小兒心經執薄荷汁化下

鎮心丸 金箔鎮心丸 安神丸

驪珠丹

麥門冬 牙硝 白茯苓 乾山藥

寒水石 甘草 各半 朱砂 一龍腦字

已上數藥泄手太陰大人絳宮下至丹田

前八味加 人參 生地黄 沉香

各為細末入藥為東垣先生離珠丹法例許設具

見難知一名石龍散

石龍散

寒水石 腦子 朱砂

抱龍丸 化毒丹 大青丸 並見錢氏

牛黃膏 治驚化疾涼膈鎮心祛邪無止逆散

人參 半錢 甘草 半 牙硝 一錢 雄黃 七錢

朱砂 錢一 蛤粉 二兩 生龍腦 半錢 金銀箔 四箇 為衣

右為細末煉蜜為丸搜和每兩秤作二十九丸以金

銀箔為衣一錢兒每服菜豆大薄荷湯化下量歲

數臨時加減服之食後

虎睛丸

治小兒驚風壯熱風濕邪熱

天麻

防風

人參

乾蝎

各一兩

白姜蚕

半兩

朱砂

雄黃

各半

牛黃

麝香

各一字

甘草

錢一

右末蜜丸如桐子大每服一二丸薄荷湯下

御方活命金丹

主治並見本條

烏犀

牛黃

眞珠

薄荷

各半兩

金箔

一兩

牙硝

貫衆

甘草

板監根

乾葛

官桂

各一錢

片腦

麝香

青黛

各三錢

大黃

半兩

蒸餅末

二錢

煉蜜丸每兩作十九金箔爲衣

五福化毒丹

主治並見錢氏

苦參

桔梗

茯苓

人參

牙硝

青黛

甘草

麝香

右勻細末蜜丸鷄頭大薄荷湯下班疹毒氣生地

黃汁化下有日夜不見物陳米泔化下

金箔鎮心丸

紫河車

人參

茯苓

山藥

甘草

朱砂 龍腦 麝香 牙硝 金箔等

右勻細末蜜丸桐子大薄荷湯下

定風丹

治大風癩疾鼻崩塌眉鬚脫若遍身疙瘩或瘡疥

等

升麻 細辛根 川芎 穿山甲炙 天麻

防風 定風草 白附子 丹參 人參

苦參 玄參 紫參 蔓荊子 威靈仙全

蜈蚣一對 何首烏木日中取末二兩

右細末每二兩用胡麻一升淘淨炒香為末和勻

蜜丸彈子大每用一丸細嚼溫漿水下日三初服

時或嘔吐勿怪或亦不吐

紫苑丸治五種風癩之疾

紫團參 人參 沙參 玄參 檳榔 黃連

川芎 山梔子 海桐皮 紫苑 防風

赤芍藥 羌活 赤茯苓 生地黃 天仙子

地骨皮 白蒺藜 天麻 乳香各等分

右二十味細末蜜丸桐子大每服三十九清米湯

下日三忌動風發氣物

脫蛇丸

治癩風遍身膿血及諸惡瘡疥癬等經云厲風成癩

若丁香

白丁香

等分

皂莢

去皮弦子熬成膏

右與上藥末爲丸桐子大先十九丸至十五漸至二十丸溫水下疾退爲止不可使多恐致惡心從少至多乃其法

治風疾癩病遍身生瘡者

天麻

七錢半

荆芥

二錢半

薄荷

三錢半

白花蛇

四兩酒浸

右四物爲細末好酒二升蜜四兩石器中蒸成膏子每服一盞溫服日三煎餅壓下急於暖處令汗十見效

神仙經進透骨膏

治大風疾遍身生瘡變成頑麻不痛不痒眉髮脫落鼻梁崩塌日斷白仁

海金沙

半兩

草烏頭

一兩

絲礬

靛花

丸松

盆硝 膽礬 鵝管石 朱砂 雄黃另研

磁石 杏仁各一兩 黃蘗 雌黃 萹藤

砒霜另研各壹兩 硃砂二錢 木賊六兩 木鱉子二十箇

寒水石六兩 僧祇黃半兩 斑猫十箇 巴豆二十粒

川烏頭半兩 石燕子一對 蛤粉半兩 天仙子四兩

黃松脂一兩 粉霜二錢 乳香一錢 麝香半兩

硫黃半兩 小油一箇 賦粉三錢

右將剉細末油勻和新坩瓶子一箇埋于地下止用新瓦瓶子一隻于地上鑽數十孔益泥固濟盛

藥在內用碗一隻合定亦固濟勿令透烟坐在泊瓶子口上穩放木炭火八秤看緊慢燒灰盡為度其藥滴在坩瓶子內孩鬼胎髮一塊細剪藥內攪勻入後藥信霜雄黃僧祇黃粉霜輕粉乳麝等細不燒數

漂洗藥

何首烏 荆芥 防風 馬鞭草 蔓荊子

右瓮末二兩水二斗煎十數沸得藥力無風虛漂洗後塗前藥

神效膏

當歸兩半

杏仁兩半

木鱉子兩半

好油斤一

黃丹兩三

油髮兩二

乳香

苦參錢二

沒藥錢三

人參錢二

右除丹外剉細油煮褐色與丹一處熬成膏塗病處

生眉散

桑寄生 天南星 半夏 沒藥

右各一錢為細末生姜自然汁調成膏子先用自

然銅擦過次以膏塗之

又治鼻梁崩塌喘息不快者

雄黃 黃連 沒藥 川芎 益硝各一兩

腦子半錢 麝香一字

右細末搗之日三次

如聖散 漂洗藥

頑荆兩一 蔓荆子兩四 威靈仙兩四 白芷兩四

苦參兩二 厚朴兩二 荆芥兩二 紫參兩二

陳皮 沙參 防風兩四 麻黃兩二

右龕末每用藥末一兩水一桶菟柳枝同一處煎
五七沸避風淋洗

還魂丹

治中風不語延潮不
者與寢左難右癱

天麻

川芎

防風

乾山藥

羌活

各二兩

姜蚕

犀角

細辛

各一兩半

當歸

白附子

甘草

藿香葉

人參

各一兩

全蝎

四十個

右爲細末蜜丸櫻菟大每用一九細嚼酒下

化風丹

治中風涎多胞膈不利目瞑不開睛上視一切諸

風

烏蛇

生去骨

白附

炮各一兩

南星

一兩五錢

龍

姜蚕

二兩

麝香

半錢

硃砂

三錢

雄黃

一錢

龍腦

一字

右前四味爲細末入麝香等再碾令勻煉蜜丸鷄
頭大用水酒化下如牙關緊急不開以大蒜一大
辦杵爲泥塗兩牙關外豆淋酒化下一丸蘸藥擦
牙自開更服藥二丸神效

局方樺皮散

並見本方

文潞公療癱瘓外臺方

生地黃

淡竹瀝

荆瀝

各一兩

防風

四分

獨活

八分

附子

一枚

右咬咀三升煮取二升去查空心分四服或五服
隔日一劑若虛者三日一劑可絕根本

聖餅子

草烏

川芎

細辛

白芷

荆芥

蒼朮

防風

甘草

各等分

右生用細末糊丸桐子大捻作餅細嚼茶清下加

羌活獨活為十生餅子

斗門方

治中風口面喎斜用

灰向右即於左邊塗之向

左即於右邊塗之候方正如舊即須以水洗下大
妙

聖惠方治中風口喎

以巴豆七箇去皮爛碾如左喎塗右手心如右過

塗左手心仍以煖水一盞安向手心須更便正洗

去藥頻抽掣中指

活人脚氣木瓜散例

木瓜散

大腹子

二箇

紫蘇

一錢半

乾木瓜

甘草

炙

木香

各二錢半

羌活

三錢半

右剉散分作三服每服用水一盞煎至半盞通口

服

脚氣木瓜丸

木瓜

大者二箇切作二片去心

菊花

一兩

青鹽

二兩

右內藥木瓜中合定線繫醜蒸爛碾成膏子丸桐

子大每服五十九丸空心酒下日三病甚者百丸病處有香汗出為效

四斤丸

治風寒濕合而成痺脚腫痛或不仁及諸證脚氣

牛膝

去芦

天麻

去芦

右咬咀好酒五升浸三日取出焙乾為細末以浸藥酒煮糊丸桐子大每服二十九丸空心食前温酒

下

香附子散 已下總血崩例

治血崩不止面色黃血刺疼痛不可忍小產血不止一名倍金

香附子不以多少炒去毛搗碎再炒黃

右極細末每服三五錢好酒調下能破血積米飲調下能止血冷氣姜湯下帶下艾湯下醋少許婦人一切心腹諸疾並治之粥飲下許學士治婦人血氣不調有積血者能破之若血崩者能止之立應散治心腹急痛

香附子炒半兩良姜

右細末每用二錢七沸湯點服立効

治血崩臍腹痛

當歸 木賊去節 香附子 熟地黃 赤芍藥

牡丹皮各二兩 沒藥 丁香 桂各三錢

右細末酒調三錢溫服

立効散治婦人臍腹痛

香附子炒二兩 當歸一兩 赤芍藥半兩 良姜半兩

五靈脂半兩

右細末三錢酒一盞童子小便少許同煎服

香附子例 寒則加乾姜 熱則加黃芩

立應散

治婦人血海崩敗又治男子婦人腸風下血

香附

三兩 半炒

櫻皮

一兩燒 取存性

右為細末每五錢酒半盞童子小便半盞煎至七

分溫服無時如腸風不用童便用酒一盞煎至八

分服

霹靂散

治經脈不安行

香附子

三兩

川芎

一兩 炮

石灰

一兩 炒

右細末燒秤銚浮酒調服二錢七甜酒亦得

定血散

此四方當在後

治婦人血海崩漏小產血不止

烏梅

燒存性

櫻布

燒

甘草

二寸一分 生一牛燒

右為細末每服二三錢淡醋湯調服立止

靈苑內補丸

溫中調血治婦人久病血崩不止累醫不效宜此

立驗

黃連

山茱萸

乾姜

當歸

鱉甲

羌花

醋浸

白芷

乾漆

油浸 令濕

川烏頭

去皮 勝丸

味各一分

巴豆

大者連殼

桃仁

和皮

亂髮

三味各半兩

已上十二味同入一瓶子內用泥固濟頂上留一

眼子火煨候白烟出急取炭冷取細羅

官桂

一分去皮

陳橘皮

一分碎剉炒

芸臺子

一分炒取白色

右四味為細末同前碾藥都作一處拌合再研令

勻煉蜜為丸桐子大每服一丸臨卧温酒下久患

甚者不過四服

又方

巴豆

紙裹裝燒蒸熟

羌

黃

硃砂

白芷

檳榔

面裹厚燒訖

乾漆

油開炒微烟

當歸頭

大黃

蒸乾姜

炒製到再炒

又方

木香

檳榔

縮砂仁

神麴

麥蘖

訶子

麴裹煨

當歸

乾漆

金絲水蛭

火灰中煨去黑或鹽炒微焦亦

交感丸

茯苓

四兩

香附子

一斤炒黃

右細末煉蜜丸彈子大每晨一丸

降氣湯

茯神二兩

香附子半斤

甘草一兩

右細末點服

又方

香附子

五兩生姜三兩汁浸
三兩炒存性細末

青鹽一發

右同為細末擦牙

孫思邈九竅血出方

荊葉搗取汁酒和服之

小烏沉湯

當在前為
沉湯後

香附子

二兩

烏藥

一兩

甘草

二兩
半生

右細末塩少許湯點服

千金白堊丸

在四物
湯後

螵蛸散

治血崩漏下久
不止臍腹疼痛

烏魚骨燒存性細末二兩煎木賊湯調下

又方

蚕退紙

燒灰
一兩

木賊

燒灰
一兩

寒水石

燒
一分

黑附子

炮半
斤

白礬

枯半
兩

烏魚骨

炙
兩

右為細末水一盞煎四五沸食前和滓服効

又方

龍骨

蒲黃

各半

艾葉

附子

炮二錢半

當歸

七錢半

右為細末水煎三錢

又方

當歸

川芎

黃芩

芍藥

等分

右麤末水煎

柱燒灰酒調下立愈

五靈脂末炒出烟盡當歸酒煎如血室乾醋煎和

洋服空心

血崩如流防風炙焦為末每二錢白麩半錢酒調下晝夜不止者丁香二兩酒煮服之

又黃芩粗末水煎

右並治血崩如流藥異不一隨經可擇是為知本

地榆條唐本注云出孔氏音義玉帶十二病

一曰多赤

二曰多白

三曰水不通

四曰陰蝕

五曰子藏堅

六曰子門闢

七曰合陰陽患痛 八曰小腹寒

九日子門閉

十日子宮冷

十一日夢與鬼交

十二日五臟不定

用地榆作菜飲代茶甚解

無濕不成瀉無積不成痢大腸泄者小便少濕在後也小腸有敗血久有積滯崩漏不已隨帶而下大便燥結濕在前也濕在後當利小便濕在前當利大便此其法也

或因胎產而得或因酒色而得山崩海嶽前後脫矣血漏不已元由子藏侵入赤腸澤液惡穢前行大

過滓糞燥結後滯不通此胎腸俱病治宜推去敗血膿積益血而致新也心所不生脾所不裹肝所不藏此三焦經絕也崩雖爲病亦有淺深新久治從而輕重之

張仲景云三焦絕經是爲血崩又經云血得熱而妄行又云血結前後血得之年少時有所大得脫血醉後入房氣竭肝臟久久成血閉畧舉於此皆有熱也脉或洪大而有力或能食不能食漏下不止或陰中如有瘡癢或大便難因而暴下或觸之而

不定內外俱治慎勿遺一

王叔和云微脉主敗血面無色歌曰微指下尋之有若無旋之敗血小腸虛崩中日久爲白帶漏下多時骨脉枯此脉有瀉之貌芤之脉皆血病也此皆陰脉而爲冷譏寒熱卽分藥不可執一所以有連藥生地黃四物牡丹芍藥續斷縮砂香附烏賊魚並乾姜之分也明者其擇之

產寶方

秦崩中不止不問年深月遠

槐木耳燒灰爲末酒服方寸七

簡要方

治婦人漏下血不絕

槐花萼不以多少燒灰細碾食前溫服二錢七

正經云治婦人乳癡子藏急痛

槐實以七月七日取入搗取汁銅孟內盛之日煎令可丸大如鼠矢內竅中三易愈又主墮胎

千金方

治婦人無故尿血

龍骨二兩以酒調服方寸七空心日三

又方治崩中晝夜不止

芩窮八兩清酒五斤煎取二升半分三服徐徐飲

又治胎婦忽然倒地舉驚重促損腹中不安及子死腹中

川芎生末酒服方寸七須臾一二服出

治崩中

防風去蘆頭炙赤色爲末每服二錢以麩糊酒調下更以麩糊酒投之

治婦人經血不止

五靈脂末炒令過熟出盡烟每服五六錢當歸二

酒一盞與藥同煎至六分去滓溫服連三五服效

治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者

五靈脂

二兩五錢一半
生用一半熟效

右爲細末每服一錢溫熟水調下如口噤者以物幹開灌之入喉卽愈謂之獨勝散

又治血崩不止

五靈脂

十兩

右爲細末水五盞煎至三盞去滓澄清再煎爲膏

入神麩末二兩和丸桐子大每服二十九空心温酒下便止

正元廣利方

治婦人赤白帶下年深月久不差者

白芍藥

二兩 乾姜 半兩

右細剉炒令黃搗羅細空腹利飲汁服之二錢七治婦人本臟虛損元氣冷敗崩中漏下經歲不止服諸藥不效極甚者宜服此藥

龍骨

一兩

蒲黃

一兩 艾葉

二兩 當歸

五靈脂

半兩炒去烟

黑附子

炮半兩 香附子

炒紫色一兩

右件同爲末水一盞半藥秤三錢同煎至六分去滓食前空心日三病輕者二服重者一料

雷氏方

治婦人遠年近日醫不差血崩或血氣不止

木賊

二兩

香附子

一兩 朴硝

半兩

右三味爲細末色黑者好酒一盞煎三五沸和滓温服色紅赤者水一盞煎至七分和滓温服忌生冷硬猪魚肉雜物每服三錢空心每日二如臍下作痛乳香沒藥當歸各一錢剉細人上漿一處同煎不痛勿用

論傷寒雜病分二科

海藏云世之治傷寒有法療雜病有方是則是矣然猶未也吾謂治雜病亦有法療傷寒亦有方方卽法也法卽方也豈有異乎要當全識部分經絡表裏臟腑豈有二哉以其後世才智之不及古也所以分傷寒雜證爲二門故有長於此而於彼者亦有長於彼而短於此者逮宋國家取士分科爲此宜乎愈學而愈陋愈專而愈粗也試以傷寒雜病二科論之傷寒從外而之內者法當先治外而後

治內雜病從內而之外者法當先治內而後治外至于中外不相及則治主病其方法一也亦何必分之爲二哉未^故牀雜病之外不離乎表傷寒之內不離乎裏表則汗裏則下中則和不易之法也劑之寒熱溫涼在其中矣餘風產二條目疾瘡腫小兒等科各自專門無怪其工之陋且粗也是以知証不知脉知藥不知性是豈真知而全識者哉耳熱目眩習壞多經涉久誤合則病愈弊則不疾甚所常見所常聞者粗有曉會其所未常見未常聞

則有所不知也。此繼述而不及於物者遠矣。嗚呼！
天之所錫，其智識有限量。故邪哀哉。庸夫以衣食
迫以口舌，爭視學業如罅隙，妬忌爲能幹，誤人性
命，恬不知恤，甘爲忍夫，不顧道理。其此言之有虧失，
邪時世之所有，俾邪抑疾者之不幸，而有所自致。
邪處暑後嘆而書。

是書已成於辛卯至丁酉春爲人陰取之，元藁
已絕更無餘本。予職州庠杜門養拙，壘塩之暇
無可用心想像，始終十得七八。試書首尾僅得

復完猶遺一二，尚未之備。故今日得而今日錄明
、日得而明日書，待以歲月久則方成，無欲速無忌
心也。好古再題。

重刻醫壘元戎後跋



予方垂髫時即病脾復病肺肌
消骨立絕不採卒賴醫藥起故
苦心醫家肯蓋歷多年于茲矣
噫醫豈易言哉醫家者言代有
人人有發矇其言何啻千百種
若古本草素難脉經諸書皆出

先聖賢手流世久遠不無舛逸
人猶病之至張仲景氏劉守真
氏李東垣朱丹谿氏並有著述
傑然一家名言顧人指之曰某
主外感某主內傷某專傷寒某
專雜症嗟夫醫之道如是乎彼
諸君子者俱擅其術以鳴于世

實祖仲景旨而兼收雜症治法
分隸陰陽六經如提綱張目一
見瞭然真醫家獨步矣予向慕
其書而未及觀一旦予同官四
明屠君出其藏本示之乃書刻
于嘉靖癸卯年吾姚秋山顧先
生序其端更今纔數十載板遂

脫落不完而舊梓中訛錯亂次
大失其真予見之既喜且懼喜
其書在足藉以拯諸君子之偏
因念此書不傳將夭折罔賴而
傳非其故即生殺以之子月是
惴惴懼耳輒自忘其淺陋於公
餘之暇細加考訂缺者補訛者

詎肯偏持一說以悞人而亦安
能以一偏之說攻人諸疾取效
若桴鼓第中不無所特舉而詳
言之者謂發前人所未發耳而
或偶有所遺人遂病之夫亦諸
君子未及為大通之說之過歟
人安得而不病之也姑就仲景

傷寒書用之以治雜症亦輒應
此何以故歟理可概見已而迄
今猶號之曰傷寒書大都傷寒
雜症原無異理總屬之十二經
絡中而外感內傷則十二經絡
中所受病根源也歧而二之者
非也王好古氏所著醫壘元戎

正失次者序之即一字一畫靡
不釐而歸于初乃因屠君請之
督齏直指綦公獲命允復請言
冠諸篇首用昭嘉惠廼付之梓
其剞劂之費則三原王君所義
捐居半而江都武令君助之若
首事及後事諸費則屠君與予

任之矣刻告成復加磨
經國堂之別藏以垂

萬曆歲癸巳冬兩淮都

使司副使浙姚嚴昌世拜

于簡末

