

上海药物制剂产品手册

第二分册

片剂

江苏工业学院图书馆

藏书章

第二分册

片 剂

1962.9. 上海

第二分册产品名称目录

片 剂

滴維淨片	202
乙酰甲萘醌片	203—204
乙酰氧基黄体酮片(口服黄体酮片)	205
乙酰普馬嗪片	206
抗坏血酸片(維生素C片)	207
叶酸片	208
菸酸片	209—210
乳清酸片	211
安达諾新片	212
仙鶴草色素片	213
氨基比林片	214
复方氨基比林片(凡拉蒙片)	215
氨非咖片	216
氨茶硷片	217
氨基蝶环片	218

氯化鉍片	219
复方碘化鉍片(含碘喉症片)	220
安乃近片(罗瓦而精片)	221
复方安乃近片(解痛片)	222
抗炎松片	223
安痛片	224
安坦片	225
阿司匹林片	226—227
复方阿司匹林片	228—229
硫酸阿托品片	230
宝塔糖片	231
复方颠茄片	232
長效西林片	233
灭虫宁片	234—235
盐酸黄连素硷片	236
白血福恩片	237
乳酸鈣片	238
依地酸鈣鈉片	239
鈣尔生丁片	240

卡巴腴片	241
妥克拉司片	242
噻碘方片(安痢生片)	243
盐酸氯丙嗪片(氮普馬嗪片)	244
磷酸氯喹片	245
辛可芬片	246
醋酸可的松片	247
抗癆胍片(氟乙酰胍片)	248
盐酸團氯胍片	249
胱氨酸片	250
强地黄片	251
地塞米松片	252
海鮮生片	253
氮苯礪片	254—255
多麟片	256
地巴唑片	257
双香豆素片	258
洋地黄片	259—260
洋地黄毒甙片	261

丁維鈣片	262
盐酸苯海拉明片	263
多种鈣片	264
耳霖片	265
枸橼酸妊娠酚片	266
紅霉素片	267
妊娠素片	268
复方当归浸膏片	269
硫酸亞鉄片	270
福美片	271
福命喉症片	272
味喃西林片(内服)	273—274
鈣素母片	275
胃舒平片	276
肝太乐片	277
复方甘草片(不含阿片)	278
复方甘草片(含阿片)	279
果导片	280
汗定片	281

盐酸胍苯噻嗪片	282
双氢克尿塞片	283
醋酸氢化可的松片	284
肌醇片	285
异丙萘胍片	286
双醋酚胺片(—轻松)	287
异萘胍片	288—289
异萘胍磺钠片	290
百生胍片	291
异萘腺片	292
降压灵片	293
九合维他	294
咳停	295
基林片	296
感尔松片	297
元—宝塔糖片	298
媽媽多片	299
磺胺二甲氧基嘧啶片	300
胃瘍平片	301

美卡明片	302
胍硫酸氢钠甲萘醌片	303
复方薄荷含片	304
薄荷喉症片	305
眠尔通片	306
乐疾宁片	307
溴本辛片	308
甲硫氨基酸片	309—310
美索因片	311
甲基孕丸素片	312
甲基硫氧嘧啶片	313
碳酸氢钠片(小苏打片)	314—315
复方碳酸氢钠片(苏打明片)	316
含盐清凉片	317
对氨基水杨酸钠片	318
新霉素片	319
溴化新斯的明片	320
菸酰胺片	321—323
水杨酸钠片	324—325

克瀉痢寧片	326
胰酶片	327
扑热息痛片	328
青霉素片	329
青霉素含錠	330
青霉素V片(苯氧甲基青霉素片)	331
安血定片	332
奋乃靜片	333
非那西汀片	334
抗胺萆片	335
苯巴比妥片	336
酚酞片	337
苯丙甾片	338
保泰松片	339
复方保泰松片	340
苯妥英鈉片	341
羧苯甲酰磺酰醋胺片(息拉米片)	342
羧苯甲酰磺胺噻唑片	343
漂粉精片	344

枸橼酸噁嗶嗪片	345
米拉脫灵片	346
去氫氫化可的松片	347
去氫可的松片	348
磷酸伯氨噻啉片(扑瘧噻片)	349—350
普魯本辛片	351
盐酸吡多辛片(維生素 B ₆ 片)	352
乙胺嘧啶片(息瘧定片)	353—354
硫酸奎尼丁片	355
重硫酸奎寧片	356—357
大黃碳酸氫鈉片(大黃苏打片)	358
核黄素片(維生素 B ₂ 片)	359
潤腸果子糖片	360
复方路丁片	361
糖精鈉片	362
干酵母片	363—365
水楊酰胺片	366
散尔痛片	367
复方五味子片	368

息宁痛片	369
鏈霉菌片	370
索灭痛片	371
磺胺嘧啶片	372—373
磺胺二甲基嘧啶片	374
磺胺甲氧基吡嗪嗪片	375
磺胺脒片	376—377
磺胺噻唑片(消治龙片)	378—380
磺胺硫脲片	381
合霉素片	382
无味合霉素片	383
盐酸硫胺片	384
新維生素 B ₁ 片	385
甲状腺片	386—387
替比昂片(氮硫脲片)	388
妥拉苏林片	389
三醋酚汀片(通舒片)	390
三溴片	391
三甲双酮片	392

三磺片	393
維生素 B ₁₂ 片	394
复合維生素 B 片	395
維他賜保命片(男用)	396
維他賜保命片(女用)	397
胃宁片	398
維他鈣片	399
哮喘平片	400
暈动藥片	401
优散痛片	402
月月紅片	403
中苏潤喉片	404
爱儿康元一宝塔糖	405
爱儿康宝塔糖	406

产品名称	滴維淨片 <i>Tabella acetarsoni (Tabellae Devogani)</i> (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
處 方	每十萬片	每片	使用前先进行腔内洗滌，然后将本品放入腔后穹窿部，一次1—2片，用后次晨行一次坐浴。
	乙酰胺肿	25.0公斤	
	硼酸	3.0公斤	30.0公絲
	乳糖粉	30.0公斤	0.3公分
	淀粉	47.0公斤	0.47公分
	硬脂酸鎂	0.8公斤	8.0公絲
			內在質量 存在問題
			品種規格
			片重1公分，每片含乙酰胺肿 0.25公分。
操作要点	称取乙酰胺肿，用60目篩篩过；称取乳糖粉及淀粉，硼酸均用100目篩篩过；混合均匀，用5%的淀粉漿湿潤用12目篩制粒，用70°C溫度干燥。干粒加入滑石粉(100目細粉)，混勻压片。生产本品时，应注意劳动保护，如密閉攪拌，戴防护口罩……等。		
治疗范围	本品用于治疗鞭毛滴虫，白帶以及一切因腔壁机能衰退而引起的帶下。		
包装規格	20片		失效期限
儲运条件	密閉保存		負責期限
			2年

产品名称	乙酰甲萘醌片 <i>Tabella Acetomenaphthoni</i> (現由九福藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		劑量及 疗程
处 方 (一)	乙酰甲萘醌	每十万片 0.2公斤	每片 2.0公絲
	糊精	7.0公斤	70.0公絲
	硬脂酸鎂	适量	适量
			內在質量
			存在問題
			品种規格
			糖衣片重0.14公分 每片含乙酰甲萘醌2公絲。
操作要点	称取糊精，篩过，制成16目空白顆粒。70°C溫度干燥后，称取乙酰甲萘醌細粉，均匀混入空白顆粒中，再加入硬脂酸鎂，混匀压片。包糖衣。		
治疗范围	适用于阻塞性黄疸与其他缺乏維生素K所致出血症等。		
包裝規格	100片、1000片	失效期限	2年
儲运条件	置遮光的容器內，密封，在干燥处保存。	負責期限	2年

产品名称	乙酰甲萘醌片 <i>Tabella Acetomenaphthoni</i> (曾由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程
处 方 (二)	乙酰甲萘醌	每十万片	每片
	淀粉	0.2公斤	2.0公絲
	糊精	5.5公斤	55.0公絲
	蔗糖粉	1.8公斤	18.0公絲
	硬脂酸鎂	1.5公斤	15.0公絲
		90.0公分	9.0公絲
			内在質量
			存在問題
			品种規格
	片重: 糖衣片0.19公分, 每片含乙酰甲萘醌2公絲		
操作要点	称取乙酰甲萘醌、淀粉、糊精、及蔗糖粉分別篩过, 混合均匀, 用7%的淀粉漿約2公斤湿润, 用16目—18目篩制粒, 以60—65°C干燥后加入硬脂酸鎂, 混勻压片, 包墨灰糖衣层。本品有刺激作用, 操作时应戴長橡膠沒肘手套及口罩, 对少数人有过敏反应。制成的顆粒及片剂易吸湿, 应注意防止。		
治疗范围	适用于阻塞性黄疸, 与其它缺乏維生素K所致的出血症等。		
包装規格	100片、1000片	失效期限	未定
儲运条件	密閉保存	負責期限	未定

产品名称	乙酰氧基黄体酮片(口服黄体酮片) Tabella Acetoxyprogesteroni (現由信誼厂生产)		
规格	卫生局暂行标准		剂量及 疗程
处	每十万片	每片	一般剂量1日量1—2片。用于习惯性流产1日量8—16片。
方	乙酰氧基黄体酮 2.5公斤	25.0公絲	
	糊精 2.0公斤	20.0公絲	內在質量 存在問題
	淀粉 3.5公斤	35.0公絲	品种规格
	硬脂酸鎂 80.0公分	0.80公絲	
操作要点	將乙酰氧基黄体酮研成細粉,与淀粉、糊精混勻,用10%淀粉漿湿润,通过16目篩制粒以70°C温度干燥,干粒加入已篩过的硬脂酸鎂,充分混勻与压片。		
治疗范围	适用于先兆性与习惯性流产、子宮功能性出血痛經、与月經过多等症。		
包裝规格	100片	失效期限	
儲运条件	密封保存	負責期限	3年

产品名称	乙酰普馬嗪片 Tabella Acetylpromazini Maleatici (現由九福藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處	每十萬片 乙酰普馬嗪 1.0公斤 糊精顆粒 6.0公斤 硬脂酸鎂 适量	每片 10公絲 60公絲 适量	遵照醫囑
			內在質量
方			存在問題
			品種規格
操作要點	取糊精用20~40%乙醇制成16目空白顆粒，在70°C溫度干燥。干粒過篩后，与乙酰普馬嗪及硬脂酸鎂充分混勻，壓片，包糖衣。		
治療範圍	本品适用于治疗精神分裂症，精神不安，感情紊亂，惡心、嘔吐、打呃等。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲運條件	密閉保存	負責期限	2年

产品名称	抗坏血酸片(維生素C片) Tabella Acidi Ascorbici (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療 程
處 方	每十万片 每片		內在質量 存在問題
	抗坏血酸	10.0公斤 100.0公絲	
	淀粉	2.0公斤 20.0公絲	品種規格
	糊 精	2.8公斤 28.0公絲	
	酒 石 酸	3.0公斤 30.0公絲	片重0.15公分，每片含抗坏血酸 0.1公分
操作要点	取抗坏血酸，淀粉及糊精，篩过，混合均匀。用含有酒石酸的稀醇湿润，通过16目尼龙篩制成顆粒，以60—75°C温度干燥。使用酒石酸可以防止抗坏血酸片貯存后变色。		
治疗范围	本品适用于坏血病和缺乏抗坏血酸所引起的病症，以及其他如各种疾病，孕妇，乳母，发育期儿童，哺乳婴儿等消耗抗坏血酸特多的情况。		
包裝規格	100片、1000片	失效期限	
儲运条件	置遮光的容器內，密閉，在涼处保存	負責期限	1年半

产品名称	叶酸片 Tabella Acidi Folici (現由信誼藥厂生产)																	
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療程															
處 方	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>每十萬片</td> <td>每片</td> </tr> <tr> <td>叶酸(100%)</td> <td>0.5公斤</td> <td>5.0公絲</td> </tr> <tr> <td>蔗糖粉</td> <td>3.0公斤</td> <td>30.0公絲</td> </tr> <tr> <td>淀粉</td> <td>7.5公斤</td> <td>75.0公絲</td> </tr> <tr> <td>硬脂酸鎂</td> <td>0.1公斤</td> <td>1.0公絲</td> </tr> </table>			每十萬片	每片	叶酸(100%)	0.5公斤	5.0公絲	蔗糖粉	3.0公斤	30.0公絲	淀粉	7.5公斤	75.0公絲	硬脂酸鎂	0.1公斤	1.0公絲	內 在 質 量
		每十萬片	每片															
叶酸(100%)	0.5公斤	5.0公絲																
蔗糖粉	3.0公斤	30.0公絲																
淀粉	7.5公斤	75.0公絲																
硬脂酸鎂	0.1公斤	1.0公絲																
			存 在 問 題															
			品 種 規 格															
操作要點	<p>称取主藥与輔料，糖粉，淀粉，先拌勻，后用5%淀粉漿湿润成軟料，以旋轉式圓筒軋粒机，軋制无斑点为止，再通过搖摆机14目篩一次，以65—70°C通风干燥，加入滑料通过14—16目篩，充分拌和压制成片。</p>																	
治療範圍	本品适用于营养缺乏性，怀孕期癩皮病，口炎性腹瀉等巨紅血球性贫血。																	
包裝規格	100片	失效期限																
儲运条件		負責期限	2年															

产品名称	菸酸片 Tabella Acidi Nicotinicici (現由九福藥厂生产)		
規格	中国藥典 (1953)		劑量及 疗程
处 方 (一)	菸 酸 粉 糊	每十万片	每片
		5.0公斤	50.0公絲
		5.0公斤	50.0公絲
糊精	2.0公斤	20.0公絲	內在質量
			存在問題
			品种規格
操作要点	片重0.12公分,每片含菸酸50公絲。		
治疗范围	取菸酸, 淀粉, 及糊精, 分別篩过, 混合均匀, 用8%的淀粉漿湿润用16目篩制粒, 在60—65°C 温度干燥, 干粒加入适量硬脂酸鎂, 混勻压片。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件	密閉避光保存	負責期限	3年

产品名称	菸酸片 Tabella Acidi Nicotinicici (曾由信誼藥厂生产)			
规格	中国藥典 (1953)		剂量及 疗程	1日3次, 1次1—2片, 或遵医嘱。
处 方 (二)	每十万片		内在質量 存在問題	品种規格
	菸酸	100.0 公絲		
	淀粉	2.68 公斤	4.38 公斤	50公絲片重0.09公分, 每片含菸酸 50公絲。100公絲片重0.125公分, 每片含菸酸100公絲。
	硬脂酸鎂	80.0 公分	80.0 公分	
	每片			
	菸酸	100.0 公絲	50.0 公絲	
	淀粉	26.8 公絲	43.8 公絲	
	硬脂酸鎂	0.8 公絲	0.8 公絲	
操作要点	取菸酸及淀粉(4.0公斤)分別篩过, 混合均匀, 取淀粉制成8%淀粉漿湿潤用16目篩制粒, 以70—80°C温度干燥, 干粒加入硬脂酸鎂, 混匀压片。			
治疗范围	本品适用于治疗癩皮病, 又有擴張血管作用, 适用視神經萎縮, 網膜变性等症。			
包裝規格	100片	失效期限		
儲运条件	負責期限		3年	

产品名称	乳清酸片 Tabella Acidi Orotici (曾由信誼藥厂生产)			
规格	卫生局暂行规定		剂量及 疗程	1日3次,每次2—3片,或遵 医嘱。
处 方	每十万片	每片	内在質量	
	乳清酸 淀粉 硬脂酸鎂	10.0 公斤 2.24公斤 0.1 公斤	0.1公分 22.4公絲 1.0公絲	
			存在問題	
			品种規格	片重0.12公分, 每片含乳清酸 0.1公分。
操作要点	取乳清酸及淀粉(2.0公斤)分別篩过,混合均匀。用淀粉(0.24公斤)制成7%淀粉漿,湿润后,通过圓筒式顆粒机相当10~12目制粒,注意不要太松或太坚硬。以70°C溫度干燥,干后,通过16目篩,加硬脂酸鎂,混合均匀,压片。			
治疗范围	本品可用于急性和慢性肝炎脂肪肝、肝硬化黄疸及肝臟机能障碍等症			
包裝規格	100片		失效期限	
儲运条件	密封保存		負責期限	3年

产品名称	安达諾新片 Tabella Adrenosemi (現由九福藥厂生产)			
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程	
處 方	水楊酸鈉	每十萬片 6.25公斤	每片 62.5公絲	每次1—2片
	安達諾新 糊精 硬脂酸鎂	0.25公斤 3.5公斤 適量	2.5公絲 3.5公絲 適量	內在質量 存在問題
			品種規格	片重0.1公分，每片含安達諾新2.5公絲
操作要點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 取安達諾新與糊精 3 公斤混和均勻，篩過，加入水楊酸鈉，再篩過混勻。 2. 用乙醇與水(8:2)混和作濕潤劑，以16目尼龍篩制成濕粒，用50—55°C溫度干燥，加入硬脂酸鎂，及干燥糊精(0.5公斤)，混勻，壓片。 3. 顆粒不宜制得太硬。盡量縮短暴露在空氣中的時間。 			
治療範圍	適用於毛細管引起之出血症。			
包裝規格	100片		失效期限	
儲存條件	密閉避光保存。		負責期限	
			2年	

产品名称	仙鶴草色素片 Tabella Agrimonini (曾由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 疗程
处	每十萬片	每片	內在質量
	仙鶴草色素 2.0公斤	20.0公絲	
方	淀粉 2.8公斤	28.0公絲	存在問題
	滑石粉 1.2公斤	12.0公絲	
	硬脂酸鎂 40.0公分	0.4公絲	品种規格
操作要点	將仙鶴草色素研成 100 目細粉, 加淀粉滑石粉拌混均勻, 加入 15% 淀粉漿制成 14—16 目的湿顆粒, 用 60°C—70°C 溫度干燥, 干燥后, 加入潤滑剂充分拌勻, 压片。		
治疗范围	本品有促进血凝作用, 使用于出血情况, 能促助止血。		
包裝規格	20 片、100 片、500 片。		失效期限
儲运条件			負責期限 3 年

产品名称	氨基比林片 Tabella Amidopyrini (Tabella Pyramidoni)(現由九福藥厂生产)														
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程												
處 方	<table border="0"> <tr> <td>氨基比林</td> <td>每十萬片</td> <td>每片</td> </tr> <tr> <td>淀粉</td> <td>10.0公斤</td> <td>100.0公絲</td> </tr> <tr> <td>硬脂酸鎂</td> <td>4.0公斤</td> <td>40.0公絲</td> </tr> <tr> <td></td> <td>適量</td> <td>適量</td> </tr> </table>	氨基比林	每十萬片	每片	淀粉	10.0公斤	100.0公絲	硬脂酸鎂	4.0公斤	40.0公絲		適量	適量	內在質量 存在問題	1次服1—3片。
		氨基比林	每十萬片	每片											
淀粉	10.0公斤	100.0公絲													
硬脂酸鎂	4.0公斤	40.0公絲													
	適量	適量													
		品種規格	片重0.15公分,每片含氨基比林0.1公分。												
操作要點	稱取氨基比林,及淀粉,分別篩過,混合均勻。用18%的淀粉漿濕潤用16目篩制粒,在60°C溫度干燥。干粒通過16目篩,再與硬脂酸鎂混和均勻,壓片。														
治療範圍	本品有鎮痛解熱作用,適用於治療神經痛,頭痛,偏頭痛,風濕痛,月經痛及牙痛等症。														
包裝規格	100、1000片	失效期限													
儲存條件	密閉保存	負責期限	三年												

产品名称	复方氨基比林片(凡拉蒙片) Tabella Amidopyrini Composita(現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規範(1959)		劑量及 療程
			需要時服1片,不宜連續服用
處	氨基比林	每十萬片	每片
	巴比妥	21.45公斤	214.5公絲
	淀粉	8.55公斤	85.5公絲
	硬脂酸鎂	5.3公斤	53.0公絲
方		適量	適量
			內在質量
			存在問題
			品種規格
			片重0.35公分,每片含氨基比林 214.5公絲,巴比妥85.5公絲
操作要點	<p>稱取氨基比林及巴比妥,混合均勻,熔融製成結合體,冷後研細加入已過篩之 淀粉(0.03公分),混和均勻,以13%的淀粉漿濕潤,通過16目尼龍篩制粒。在60°C 溫度乾燥,干粒中加入干燥淀粉(0.01公分)及硬脂酸鎂,混與壓片。</p>		
治療範圍	<p>本品有鎮痛作用,適用於治療神經痛,頭痛,偏頭痛,風濕痛,月經痛與牙痛 等。</p>		
包裝規格	1000片		失效期限
儲運條件	密閉保存		負責期限
			3年

产品名称	氨基比林 Tabella Amidopyrini Phenacetini et Caffeini (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品 規 范 (1959)		劑量及 療 程
			每次服 1 片, 或遵医嘱。
处	每十方片	每片	內在質量
	氨基比林 10.0 公斤	100.0 公絲	
方	非那西汀 15.0 公斤	150.0 公絲	存在問題
	咖啡 因 3.0 公斤	30.0 公絲	
	糊 精 0.5 公斤	5.0 公絲	品种規格
	淀 粉 6.0 公斤	60.0 公絲	
	硬脂酸鎂 适量	适量	
			片重 0.34 公分, 每片含氨基比林 0.1 公分, 非那西汀 0.15 公分, 咖啡 因 0.03 公分。
操作要点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以氨基比林, 淀粉 (0.02 公分) 篩过混和均匀, 用淀粉漿 (18%) 制成顆粒 (A 粒) 2. 以非那西汀, 咖啡 因, 淀粉 (0.02 公分) 及糊精 (0.005 公分) 篩过混和均匀, 亦用淀粉漿 (18%) 制成顆粒。(P.C. 粒) 3. A 粒及 P.C. 粒分別用 60°C 干燥, 干燥后混合, 加适量潤滑剂压片。 4. 制粒时应使用 16 目尼龙篩。 		
治疗范围	本品有鎮痛与退热作用, 适用于治疗神經痛、头痛、偏头痛、风湿痛、感冒等。		
包裝規格	1000 片	失效期限	
儲运条件	密閉保存	負責期限	3 年

产品名称	氨茶硷片 <i>Tabella Aminophyllini</i> (現由天平藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療程
處	每十萬片 每片		內在質量
	氨茶硷	10.0 公斤 0.1公分	
方	磷酸氫二鈉	0.35公斤 3.5分絲	存在問題
	滑石粉	0.5 公斤 5.0公絲	
	硬脂酸鎂	0.2 公斤 2.0公絲	品種規格
	羧甲基纖維素	0.02公斤	
操作要點	原料在圓筒式顆粒機中磨碎，將磷酸氫二鈉與羧甲基纖維素溶于蒸溜水中，加入原料中，拌和，用16目尼龍網過篩，50°C干燥，篩勻后壓片。制粒時忌與銅接觸，以免變色。顆粒含水量要求在5%以下，以防在貯藏期內變色變質。		
治療範圍	本品有強心、利尿、擴張血管、松弛支氣管平滑肌等作用，适用于心臟性或支氣管性氣喘、狹心症、心臟性水腫等症。		
包裝規格	100片、1000片	失效期限	
儲運條件	15~35°C干燥貯藏	負責期限	1½年

产品名称	氨基蝶环片 Tabella Aminopterini (現由信誼藥厂生产)		
规格	卫生局暫行規定		劑量及 疗 程
处			本品須遵医嘱
	氨基蝶环	每十万片	每片
方	淀粉	50.0公分	0.5公絲
	蔗糖粉	7.0公斤	70.0公絲
	硬脂酸鎂	3.0公斤	30.0公絲
		0.1公斤	1.0公絲
内在質量			
存在問題			
品种規格	片重0.1公分,每片含氨基蝶环0.5公絲。		
操作要点	<p>称取抗叶酸与等量淀粉混和均匀,过篩,然后再以兩倍量的淀粉混和过篩,再將此混合物与糖粉、淀粉混和过篩,攪拌均匀,用12%淀粉漿制成軟材,过14目篩制粒,以70°C干燥,干粒加硬脂酸鎂过16目篩压片。</p> <p>注意:本品在操作过程中注意劳动保护,应戴口罩。</p>		
治疗范围	本品应用于急性白血病、牛皮癣等。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件		負責期限	3年

产品名称	氯化铵片 Tabella Ammonii Chlorati (曾由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)	剂量及 疗程	1次1—3片。
处	每十万片 每片 氯化铵 30.0公斤 300.0公絲 硬脂酸鎂 0.3公斤 3.0公絲	内在質量 存在問題	
方		品种規格	片重0.3公分，每片含氯化铵0.3公分。
操作要点	取氯化铵置50°—60°C温度的烘箱内烘干，加入硬脂酸鎂，用16目搖摆式顆粒机篩过，拌勻后，压片。		
治疗范围	本品为祛痰与利尿剂。		
包裝規格	500片	失效期限	
儲运条件		負責期限	3年

产品名称	复方碘化铵片(含碘喉症片) <i>Tabella Ammonii Iodati Composita</i> (現由天平藥厂生产)			
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 疗程	
處	每十萬片	每片	內 在 質 量	
	碘化铵	0.15公斤		1.5公絲
方	胭脂紅(色素)	30.0公分	0.3公絲	存 在 問 題
	樹膠粉	0.1公斤	1.0公絲	
	酚	0.6公斤	6.0公絲	品 種 規 格
	枸橼酸	0.2公斤	2.0公絲	
	薄荷腦	0.22公斤	2.2公絲	
	液狀石腊	0.16公斤	1.6公絲	
	氧化鎂	0.4公斤	4.0公絲	
	蔗糖粉	49.0公斤	0.49公分	
滑石粉	2.0公斤	20.0公絲	片重0.5公分, 每片含碘化铵1.5公絲。	
操作要点	称取碘化铵, 胭脂紅, 樹膠粉以少量水溶解后, 加至蔗糖粉中, 充分混合均匀, 再加入酚溶液及枸橼酸細粉, 混勻, 用水为湿润剂, 通过16目篩, 制成顆粒。在60°C以下干燥, 注意避免烘焦变色。另称取薄荷腦, 溶解于液狀石腊中, 加氧化鎂吸收拌勻, 加至上制干燥顆粒中, 再加入滑石粉, 混勻压片。加入液狀石腊的目的, 可以防止薄荷腦在貯存期析出, 氧化鎂可吸收液狀石腊, 使片剂坚硬。			
治疗范围	本品适用于喉炎, 喉痛, 扁桃體炎等症。			
包裝規格	100片、1000片	失效期限		
儲运条件	密閉貯藏	負責期限	1 ½年	

产品名称	安乃近片（罗瓦而精片） Tabella Analgini（現由九福藥厂生产）		
規格	藥品 規 范（1959）		劑量及 疗 程
			1日3-4次，每次1-2片。
处	安乃近 淀 粉	每十万片	每片
		50.0公斤	0.5公分
		11.7公斤	0.117公分
方			內在質量 存在問題
			品种規格
			片重0.6公分，每片含安乃近0.5公分
操作要点	取安乃近及淀粉，混合均匀，用15%淀粉浆湿润，通过14目尼龙筛制成颗粒，以60—70°C温度干燥。加入硬脂酸，混合均匀，压片即得。		
治疗范围	本品为解热镇痛剂，适用于治疗急性关节炎、风湿性神经痛、坐骨神经痛、肌肉痛、头痛等。		
包裝規格	10片、100片、1000片。		失效期限
儲运条件	置遮光的容器内，密封保存。		負責期限
			2年

产品名称	复方安乃近片(解痛片) <i>Tabella Analgini Composita (Jie Tong Pain)</i> (現由九福藥厂生产)				
規格	藥 品 規 范 (1959)		劑量及 疗 程	1日3—4次, 1次1片。	
处	安乃近	每十万片 31.5公斤	每片 315.0公絲	內在質量	
	氨基比林	18.5公斤	185.0公絲	存在問題	
方	淀 粉	9.8公斤	98.0公絲	品 种 規 格	片重0.63公分, 每片含安乃近0.315公分及氨基比林0.185公分。
	蔗糖粉	2.0公斤	20.0公絲		
	糊 精	2.0公斤	20.0公絲		
	硬脂酸鎂	适量	适量		
操作要点	称取安乃近用60目篩篩过, 氨基比林用40目篩篩过, 淀粉(5.4公斤)蔗糖粉及糊精分別过篩, 混合均匀, 以15%的淀粉漿湿润16目篩制粒, 在50—60°C温度干燥。干粒通过12目篩, 再与淀粉(3公斤)及硬脂酸鎂混合均匀, 压片。				
治疗范围	本品为解热鎮痛剂, 并适用于牙痛, 风湿痛, 神經痛, 月經痛。				
包裝規格	100片、500片。		失效期限		
儲运条件	密閉保存		負責期限	2年	

产品名称	抗炎松片 Tabefla Antiflamisoni (現由信誼藥厂生产)		
规格	卫生局暫行規定		劑量及 疗 程
处 方		每十萬片	每片
	抗 炎 松	2.5公斤	25.0公絲
	淀 粉	4.4公斤	44.0公絲
	蔗 糖 粉	1.4公斤	14.0公絲
	硬脂酸鎂	80.0公分	0.8公絲
			內在質量
			存在問題
			品种規格
			片重90公絲,每片含抗炎松25公絲。
操作要点	將抗炎松研細,通过100目篩,加已篩过的淀粉(4.2公斤)及蔗糖粉,混合均匀。用淀粉0.2公斤制成10%淀粉漿,放冷至50°C以下,制成16目湿粒,以60°C左右溫度干燥,干后加入硬脂酸鎂,混勻压片。		
治疗范围	本品应用于疗效与可的松同适用于风湿关节炎风湿性心臟炎等。		
包裝規格	100片、500片或1000片。	失效期限	
儲运条件	避光密閉保存	負責期限	3年

产品名称	安痛片 Tabella An Tong (現由九福藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療 程
處 方	每十萬片		內在質量
	阿斯匹林 22.68公斤	每片 0.2268公分	
	咖 啡 因 3.24公斤	0.0324公分	存在問題
	水楊酸酰胺 16.2 公斤	0.162公分	
淀 粉 0.15公斤	0.015公分	品種規格	
	片重0.44公分每片含阿司匹林0.2268公分，咖啡因0.0324公分，水楊酸酰胺0.162公分。		
操作要点	称取阿司匹林，咖啡因，水楊酸酰胺及淀粉，另取10%淀粉漿湿润，通过16目尼龙篩制粒，以30—40°C溫度干燥，干粒中加入少量滑石粉，混勻压片。		
治疗范围	本品适应解热止痛，伤风感冒及抗风湿等用。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲运条件	密閉保存	負責期限	3 年

产品名称	安坦片 Tabella Artani (Tabella Benzhexoli Hydrochlorici) (現由天平藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 疗程
处	每十萬片 每片		1日3—4次，每次1片。
方	安坦	0.1 公斤	2.0公絲
	乳糖	1.5 公斤	15.0公絲
方	蔗糖	1.5 公斤	15.0公絲
	淀粉	3.86 公斤	38.6公絲
方	硬脂酸鎂	0.1 公斤	1.0公絲
	品种規格	片重70公絲，每片含安坦2公絲	
操作要点	取原料过80目篩，用乳糖稀釋后与糖粉，淀粉混和，以5%淀粉漿湿润制粒，20目尼龙网过篩兩次，70°C干燥，加硬脂酸鎂混和压片，本品主藥含量很小，原輔料混和必須均与。		
治疗范围	本品适用于治疗震顫性麻痺症，可弛緩肌肉痙攣状态，恢复四肢不随意的震顫，亦可抑制胆碱能傳导作用。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件	密封貯藏	負責期限	3年

产品名称	阿司匹林片 Tabella Aspirini (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療程
處 方 (一)	每十萬片 每片		內在質量 存在問題
	阿司匹林 50.0 公斤	500.0公絲	
	淀粉 6.66公斤	66.6公絲	
品種規格	片重0.57公分，每片含阿司匹林 0.5公分		
操作要點	取阿司匹林50.0公斤，加入淀粉3.33公斤，以10%淀粉漿潤濕，用14目尼龍篩網篩過，制成顆粒，在溫度60°C干燥。干燥顆粒中加入干淀粉3.33公斤，混和均勻，壓片。		
治療範圍	本品有鎮痛與退熱作用，適用於風濕痛，神經痛，肌肉痛，關節痛與感冒等。		
包裝規格	20片、100片、1000片。	失效期限	
儲存條件	密閉保存	負責期限	1年半。

产品名称	阿司匹林片 Tabella Aspirini (曾由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程
处 方 (二)	每十万片	每片	1次半至1片。
	阿司匹林 50.0 公斤	0.5公分	
	枸橼酸 0.15公斤	1.5公絲	內在質量 存在問題
	淀粉 9.5 公斤	95.0公絲	
	滑石粉 2.4 公斤	24.0公絲	品種規格
操作要点	称取阿司匹林与淀粉置攪拌机中, 攪拌15分鐘使均匀, 以50°C以下含有0.3%枸橼酸的10%的淀粉漿, 使成軟材, 移至不銹鋼搖擺式顆粒机, 通过16目尼龙網后, 低温干燥, 用120—130°F, 干燥5—6小时, 干燥后, 加入滑石粉和干淀粉, 通过12目篩, 充分拌勻压片。		
治疗圍范	本品有鎮痛与退热作用, 适用于风湿痛, 神經痛、头痛、肌肉痛、关节痛与感冒等。		
包裝規格	100.1片000片。	失效期限	
儲运条件	避光密閉保存	負責期限	2年

产品名称	复方阿司匹林片 Tabella Aspirini composita (A.P.C.) (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療 程
處 方 (一)		每十萬片	每片
	阿司匹林	22.68公斤	226.8公絲
	非那西汀	16.2 公斤	162.0公絲
	咖啡 因	3.24公斤	32.4 公絲
	淀 粉	6.4 公斤	64.0 公絲
			內在質量
			存在問題
			品種規格
			片重0.5公分, 每片含阿司匹林226.8公絲, 非那西汀 162 公絲, 咖啡因 32.4公絲。
操作要點	称取非那西汀, 咖啡因及淀粉, 分別篩过, 混合均匀, 用17%的淀粉漿湿润14目制粒70°C溫度干燥过篩。另称取阿司匹林的結晶体, 加入至上制的非那西汀及咖啡因的干燥顆粒中混合均匀, 再加适量干燥淀粉, 混匀压片。压片时应控制相对湿度在68%以下, 可避免粘冲。		
治疗范围	本品有鎮痛与起热作用, 适用于风湿痛, 肌肉痛, 关节痛, 神經痛, 头痛与感冒等。		
包裝規格	20片、100片、1000片		失效期限
儲运条件	密閉保存		負責期限
			1 ½年

产品名称	复方阿司匹林片 Tabella Aspirini Cmposita (A.P.C片) (曾由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程
处 方 (二)	每十万片 每片		內在質量 存在問題
	阿司匹林	22.68公斤 0.2268公分	
	非那西汀	16.2 公斤 0.162 公分	品种規格 片重0.5公分,每片含阿司匹林 0.2268公分,非那西汀 0.162 公分 及咖啡因0.0324公分。
	咖啡因	3.24公斤 0.0324公分	
	枸橼酸	68.04公分 0.68 公絲	
	淀粉	10.0 公斤 0.1 公分	
	滑石粉	3.0 公分 30.0 公絲	
操作要点	称取非那西汀及咖啡因,分別篩过,混合均匀,用13%淀粉漿湿润通过14—16目制粒以65—70°C干燥。阿司匹林如为細結晶或鱗片狀結晶亦用上法制粒,如为40目顆粒狀結晶,則用重压法制粒,均在制粒时加入枸橼酸。二种顆粒合併,加入滑石粉,混勻压片。如遇有粘冲現象,可加用0.5%以下的硬脂酸鎂。		
治疗范围	本品有鎮痛退热作用,适用于风湿痛,肌肉痛,关节痛,神經痛,头痛,感冒等。		
包裝規格	1000粒裝	失效期限	
儲运条件	密閉避光保存	負責期限	2年

产品名称	硫酸阿托品片 Tabella Atropini Sulfurici (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療 程
			1次1—2片。
處 方	每十萬片	每片	內在質量 存在問題
	硫酸阿托品 30.0公份	0.3公絲	
	淀粉 4.5公斤	45.0公絲	品種規格
	糊精 1.0公斤	10.0公絲	
	糖粉 1.8公斤	18公絲	
	硬脂酸鎂 适量	适量	片重70公絲， 每片含硫酸阿托品 0.3 公絲。
操作要點	取硫酸阿托品溶解于少量溫水中，加入淀粉中混勻，反復篩過，再加入糊精及糖粉充分篩過混勻。用8%的淀粉漿濕潤，用16目尼龍篩篩過制粒，在60—65°C溫度干燥，干粒過篩，加入硬脂酸鎂，混勻壓片。		
治療範圍	本品為副交感神經消解藥，能抑制多種平滑肌，制止腺體分泌。適用於腸胃痙攣，幽門痙攣，支氣管痙攣，胆管與輸尿管腫痛，制止唾液腺與汗腺分泌過多症等。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲運條件	密閉保存	負責期限	3年

产品名称	宝塔糖片 Tabella Bao Ta Tang (現由爱尔康藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		
处	山道年	每十萬片	每片
	酚酞	0.4公斤	4.0公絲
方	蔗糖粉	0.8公斤	8.0公絲
	食用桑子紅色素	98.0公斤	980.0公絲
	桑子香精	30.0公分	0.3公絲
		300.0毫升	0.003毫升
		劑量及 療程	口服每日一次，早飯后半小時放入口中嚼碎後服用。連服二天，不可多服。 用量：1~2歲服 $\frac{1}{2}$ ~1片，3~4歲服2~3片，5~6歲服4~4 $\frac{1}{2}$ 片，7~8歲服5~5 $\frac{1}{2}$ 片，9~10歲服6片。
		內在質量 存在問題	
		品種規格	片重1公分，每片含山道年4公絲，酚酞8公絲。
操作要點	取山道年酚酞及蔗糖粉分別研細篩過，充分混合均勻，然後以少量淀粉及樹膠粉為粘劑，並加入色素及香精，拌勻，制成70目顆粒，60°C烘乾後加入適量滑石粉作為潤滑劑，壓片。（粘劑為15%內膠粉5%生粉10%W/V）		
治療範圍	驅除蛔蟲。		
包裝規格	900片	失效期限	
儲運條件	密閉乾燥保存	負責期限	2年

产品名称	复方颠茄片 <i>Tabella Belladonnae Composita</i> (現由天平藥厂生产)																				
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療 程																		
			1日2—4片																		
處	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>每十萬片</td> <td>每片</td> </tr> <tr> <td>颠茄浸膏</td> <td>1.0 公斤</td> <td>10.0公絲</td> </tr> <tr> <td>苯巴比妥</td> <td>1.5 公斤</td> <td>15.0公絲</td> </tr> <tr> <td>淀 粉</td> <td>3.14公斤</td> <td>31.4公絲</td> </tr> <tr> <td>蔗 糖 粉</td> <td>1.5 公斤</td> <td>15.0公絲</td> </tr> <tr> <td>硬脂酸鎂</td> <td>0.1 公斤</td> <td>1.0公絲</td> </tr> </table>			每十萬片	每片	颠茄浸膏	1.0 公斤	10.0公絲	苯巴比妥	1.5 公斤	15.0公絲	淀 粉	3.14公斤	31.4公絲	蔗 糖 粉	1.5 公斤	15.0公絲	硬脂酸鎂	0.1 公斤	1.0公絲	內在質量
	每十萬片	每片																			
颠茄浸膏	1.0 公斤	10.0公絲																			
苯巴比妥	1.5 公斤	15.0公絲																			
淀 粉	3.14公斤	31.4公絲																			
蔗 糖 粉	1.5 公斤	15.0公絲																			
硬脂酸鎂	0.1 公斤	1.0公絲																			
			存在問題																		
方			品种規格																		
			片重70公絲，每片含颠茄浸膏10公絲。																		
操作要点	称取颠茄浸膏，苯巴比妥，及蔗糖粉，置磨粉机中磨成80目粉。加入淀粉后，移置搅拌机内，充分搅拌，加8%淀粉浆湿润，通过16目筛制粒，70°C干燥。干粒通过18目筛，加入硬脂酸镁，混匀压片。																				
治疗范围	本品为镇痛与解痉剂。																				
包裝規格	1000片	失效期限																			
儲运条件	密閉貯藏	負責期限	2年																		

产品名称	長效西林片(二苯乙二胺苄青霉素片) Tabella Benzathini Benzyl Penicillini (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療程
處 方	每十萬片	每片	1次1—1½片, 每6—8小时 1次, 或遵医嘱。
	長效西林 20.0公斤	0.2 公分	
	磷酸氫鈣 3.0公斤	30.0 公絲	內在質量 存在問題
	淀粉 10.6公斤	0.106公分	
	硬脂酸鎂 0.3公斤	3.0 公絲	品種規格
	片重 0.3 公分, 每片含長效西林 200,000單位。		
操作要點	取長效西林, 磷酸氫鈣、及淀粉(10.0公斤)混合磨成80目細粉。另取淀粉(0.6公斤)制漿, 并加入¼的醇, 以此含醇的8%淀粉漿濕潤后, 通过16目尼龙篩制成顆粒。置65—70°C溫度热风烘箱內干燥; 干燥后, 再通过16目篩, 加入硬脂酸鎂, 混勻, 压片。顆粒干燥后, 經半制品檢驗, 根据結果, 計算片重。		
治療範圍	本品适用于对青霉素敏感細菌所致的輕度或中度感染疾患, 如肺炎、猩紅热、扁桃體炎、中耳炎、淋病等, 及用于須長期使用青霉素的預防措施上。		
包裝規格	24片	失效期限	2年
儲運条件	密閉, 在干燥的涼处存放		負責期限

产品名称	灭虫宁片 Tabella Bepheni Naphthoati (現由天平藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療 程
			1次服10—15片
處 方 (一)		每十萬片	每片
	● 灭虫宁 淀粉 糊精 滑石粉 硬脂酸鎂	30.0公斤 0.8公斤 0.4公斤 0.5公斤 0.5公斤	0.3公分 8.0分絲 4.0公絲 5.0公絲 5.0公絲
			內在質量
			存在問題
			品種規格
			片重0.32公分，每片含灭虫宁 0.3公分。
操作要點	称取灭虫宁研磨成80目細粉，用8%淀粉及4%糊精的混合漿湿潤，用16目尼龍篩制粒。60°C溫度干燥，干燥的过程中，要掌握溫度，防止变色。并且須要保持顆粒中一定的含水量，(1%左右)方能符合“崩解时限：15—60分鐘”的要求。顆粒中加入滑石粉及硬脂酸鎂，混勻压片。		
治疗范围	驅除十二脂腸鈎虫，对蛔虫鞭虫亦有一定效疗。		
包裝規格	1000片		失效期限
儲运条件	密閉貯藏		負責期限 3年

产品名称	灭虫宁片 <i>Tabella Bepheni Naphthoati</i> (曾由信誼藥厂生产)		
规格	卫生局暂行规定		剂量及 疗程
处 方 (二)		每十万片	每片
	羧基酚乙鈹鹽	30.0 公斤	0.3 公分
	蔗糖粉	1.8 公斤	18.0 公絲
	淀粉	3.0 公斤	30.0 公絲
	羧基甲基纖維素	0.144 公斤	1.44 公絲
	硬脂酸鎂	0.30 公斤	3.0 公絲
			內在質量
			存在問題
			品种規格
			片重0.33公分，每片含羧基酚乙鈹鹽0.3公分。
操作要点	称取羧基酚乙鈹鹽及蔗糖粉，淀粉，分別篩过，混和均匀。取羧基甲基纖維素配制成2%溶液加入混合粉內湿润通过12—14目篩制粒，用70°C温度干燥，干粒中加入硬脂酸鎂，混勻通过14—16目篩压片。		
治疗范围	本品适用于驅治十二脂腸鈎虫，对蛔虫鞭虫亦有一定效果。		
包裝規格	100片、500片、1000片	失效期限	
儲运条件	避光密闭保存	負責期限	2年

产品名称	鹽酸黃連素硷片 <i>Tabella Berberini Hydrochlorici</i> (現由信誼藥厂生产)													
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療程											
處	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>每十萬片</td> <td>每片</td> </tr> <tr> <td>鹽酸小藥硷</td> <td>5.0 公斤</td> <td>50.0公絲</td> </tr> <tr> <td>淀粉</td> <td>5.95公斤</td> <td>59.5公絲</td> </tr> <tr> <td>硬脂酸鎂</td> <td>0.1 公斤</td> <td>1.0公絲</td> </tr> </table>		每十萬片	每片	鹽酸小藥硷	5.0 公斤	50.0公絲	淀粉	5.95公斤	59.5公絲	硬脂酸鎂	0.1 公斤	1.0公絲	1次1—3片
			每十萬片	每片										
鹽酸小藥硷	5.0 公斤	50.0公絲												
淀粉	5.95公斤	59.5公絲												
硬脂酸鎂	0.1 公斤	1.0公絲												
方			內在質量											
			存在問題											
			品種規格											
	片重0.17公分，每片含鹽酸小藥硷50公絲。													
操作要點	將黃連素與輔料淀粉、置攪拌機中混勻，以5%淀粉濕潤，軟材通過14—16目制粒，以60°C干燥，加入滑料，通過16目篩，充分拌勻壓片，外包白色糖衣至片重在0.17公分左右。													
治療範圍	本品適用於治療細菌性痢疾，腹瀉及眼結膜炎等症。													
包裝規格	20片、600片。	失效期限												
儲運條件			負責期限 2年											

产品名称	白血福恩片 Tabella Busulfani (曾由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程
处	每十万片	每片	1日量, 2—3片, 遵医嘱。
	白血福恩 0.05公斤	0.5公絲	
方	蔗糖粉 4.8公斤	48.0公絲	內在質量
	白糊精 1.6公斤	16.0公絲	存在問題
	淀粉 5.8公斤	18.0公絲	品种规格
	硬脂酸鎂 0.12公斤	1.2公絲	
乙醇(95%) 500毫升		片重0.35公分, 每片含白血福恩 2公絲及0.5公絲二种。	
操作要点	取蔗糖粉、白糊精、淀粉充分混勻, 加入白血福恩与乙醇的混悬液, 在密封的攪拌机中混合均匀, 再用8—10%淀粉漿制成16—18目顆粒, 在60°C以下之溫度干燥, 然后加入硬脂酸鎂, 压片, 包白色糖衣。 制造时需在适当的劳动保护措施下进行。		
治疗范围	治疗慢性骨髓性白血病。亦可用于X射线放射治疗或一般氮芥治疗失效的病例。		
包装规格	100片	失效期限	
储运条件	放在阴冷干燥之处。	負責期限	2年

产品名称	乳酸鈣片 Tabella Calcii Lactici (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
處 方	每十萬片	每片	內在質量 存在問題
	30.0公斤	300.0公分	
	5.0公斤	50.0公絲	品種規格
	適量	適量	
	片重0.35公分，每片含乳酸鈣0.3公分。		
操作要點	取乳酸鈣經圓筒式顆粒磨碎，以16目篩篩過，加入干澱粉及適量硬脂酸鎂，混勻壓片。		
治療範圍	本品用於補充鈣質，可固齒，助長骨的發育與作為肺結核的輔助治療劑。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲運條件	密閉保存	負責期限 3年	

产品名称	依地酸鈣鈉片 Tabella Calcio-Natrii Edetici (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處	每十萬片	每片	成人一日用量為4公分(8片) 孩童則按體重16公斤 用量為每日 為1公分,須遵醫囑。
方	依地酸鈣鈉	50.0公斤	0.5公分
	蔗糖粉	3.0公斤	30.0公絲
方	滑石粉	3.0公斤	30.0公絲
	硬脂酸鎂	0.5公斤	5.0公絲
	稀醇(50%)	12.0公斤	
內在質量 存在問題			
品種規格	片重0.7公分,每片含依地酸鈣鈉0.5公分。		
操作要點	稱取依地酸鈣鈉打成80目細粉(或用依地酸二鈉5份,與碳酸鈣1.4份,用少量水攪拌混勻,以80°C烘乾即得)與蔗糖粉,滑石粉混和均勻,用50%稀醇通過尼龍篩網制粒,以70—80°C溫度乾燥,干粒加入滑石粉,硬脂酸鎂拌勻壓片。		
治療範圍	本品應用於急性或慢性鉛中毒和鉛腦病降低血鉛積蓄鉛等症。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲運條件	置遮光器內密閉保存	負責期限	3年

产品名称	钙尔生丁片 Tabella Calsum D (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處		每十萬片	每片
	磷酸氫鈣	11.4公斤	0.114公分
方	葡萄糖酸鈣	4.8公斤	48.0 公絲
	甘油磷酸鈣	1.8公斤	18.0 公絲
	骨化醇	150.0公絲	100.0 單位
	香莢醛	60.0公分	0.6 公絲
	蔗糖粉	39.0公斤	0.39 公分
	淀粉	3.5公斤	35.0 公絲
	硬脂酸鎂	0.6公斤	6.0 公絲
			內在質量
			存在問題
			品種規格
			片重1.0公分, 每片含磷酸氫鈣0.114公分, 葡萄糖酸鈣48公絲, 甘油磷酸鈣18公絲, 維生素D ₂ 100單位。
操作要點	1. 称取磷酸氫鈣, 葡萄糖酸鈣, 甘油磷酸鈣, 糖粉, 淀粉混和后, 通过24目篩勻, 置攪拌机中用蒸餾水适量湿润, 通过搖搖机12目制粒, 70~75°C干燥, 2. 取骨化醇用少量乙醚溶解后, 加入硬脂酸鎂中拌勻, 通过40目篩与少量干淀粉一起加入干料中, 通过搖搖机12~14目然后余量合并进行充分拌勻后压片。		
治療範圍	本品应用于固齿健骨, 助長发育, 及肺結核病的輔助治疗剂。		
包裝規格	50片、100片。		失效期限
儲运条件			負責期限 3年

产品名称	卡巴腴片 Tabella Carbarsoni (現由天平藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程 日服2次,每次1片。
處	卡巴腴	每十萬片	每片
	滑石粉	20.0公斤	0.2公分
方	硬脂酸鎂	0.8公斤	8.0公絲
		0.3公斤	3.0公絲
			內在質量
			存在問題
			品種規格 片重0.21—0.22公分,每片含 卡巴腴0.2公分。
操作要點	將卡巴腴磨成細粉,過篩、放入攪拌機內加入8%淀粉漿濕潤,用16目搖擺機制粒,干燥時常常翻動,防止變紅色,干粒加入滑石粉及硬脂酸鎂壓片。		
治療範圍	適用於變形蟲痢疾,亦可用於絲虫病。		
包裝規格	100片、1000片。		失效期限
儲運條件	密閉貯藏		負責期限 3年

产品名称	妥克拉司片 Tabella Carbetapentani Citrici (Tabella Toclase)		(現由天平藥厂生产)
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療 程
處	每十萬片	每片	1次 $\frac{1}{2}$ -1片，1日3-4次。
			內在本質
方	妥克拉司	2.5公斤	製成顆粒后发軟难于干燥，压片时 要粘冲。
	淀粉	2.0公斤	
	糊精	3.0公斤	存在問題
	滑石粉	0.2公斤	品种規格
	硬脂酸鎂	0.1公斤	
操作要点	取妥克拉司，淀粉，及糊精，分別篩过，混合均匀。用8%的淀粉漿潤湿后制 成18目顆粒，70°C干燥后，加入滑石粉及硬脂酸鎂，混与压片。		
治疗范围	鎮咳，适用于急性上呼吸道感染所引起的反射的咳嗽。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件	密閉貯藏	負責期限	1年半

产品名称	噻碘方片(安痢生片) Tabella Chiniofoni (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
處	每十萬片 每片		內在質量 存在問題
	7-碘-8-羥噻啉-5-磺酸	19.3公斤 193公絲	
方	8-羥噻啉-5-磺酸	0.375公斤 3.75公絲	品種規格
	碳酸氫鈉	5.325公斤 53.25公絲	
	糊精	1.8 公斤 18.0 公絲	
	淀粉	1.8 公斤 18.0 公絲	
	硬脂酸鎂	175公分 1.75公絲	糖衣片重 0.325 公分, 每片含噻碘方 0.25 公分
操作要點	<p>称取主藥与輔料,充分混和,用淀粉漿混潤,用尼龙篩制成 14 目顆粒,用 55—65°C 干燥,加入硬脂酸鎂过 16 目篩混和压片,外包糖衣。</p> <p>注意:湿粒在制造过程中,避免与金屬鉄接触,以防变质,顆粒中細粉愈少愈好。</p>		
治疗范围	本品适用于治疗变形虫痢疾。		
包裝規格	50片、100片。	失效期限	
儲运条件			負責期限 2 年

产品名称	鹽酸氯丙嗪片(氯普馬嗪片) Tabella Chlorpromazini Hydrochlorici (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規範(1959)		劑量及 療程
處	每十萬片 1.25公斤	每片 12.5公絲	1次2—4片
方	氯丙嗪 糊精 硬脂酸鎂	4.25公斤 適量	內在質量 存在問題
		適量	品種規格
操作要點	取糊精用乙醇作濕潤劑，通過16目鐵絲篩制粒在80°C溫度干燥，作為空白顆粒。將氯丙嗪及硬脂酸鎂混合均勻，加至空白顆粒中，混勻壓片。包糖衣。		
治療範圍	本品適用於治療精神分裂症，精神不安，感情紊亂，惡心，嘔吐，打呃等。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲運條件	置遮光的容器內，密閉保存	負責期限	2年

产品名称	磷酸氯喹片 Tabella Chloroquini Phosphorici (現由天平藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
處 方	每十萬片	每片	第一次服4片,以后每6小时,24 小时,48小时,各服2片。 每1疗程48小时,共服10片。
	磷酸氯喹 25.0公斤	0.25公分	
	淀粉 2.0公斤	20.0公絲	內在質量 存在問題
	滑石粉 1.0公斤	10.0公絲	品種規格
	硬脂酸鎂 0.2公斤	2.0公絲	
操作要點	称取磷酸氯喹及淀粉,分別篩过,混和均匀,再用32目篩篩过,以8%的淀粉漿湿润14目制粒。淀粉漿不宜太热50°C以下,防止顆粒太坚硬。顆粒以60°C干燥,干燥过程中注意防止磷酸氯喹熔化。干粒中加入滑石粉及硬脂酸鎂,混匀压片。		
治疗范围	治疗各型瘧疾		
包裝規格	100片、1000片	失效期限	
儲运条件	15—30°C 密閉干燥貯藏	負責期限	2年

产品名称	辛可芬片 <i>Tabella Cinchopheni</i> (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品 規 范 (1959)		劑量及 療 程
處	辛可芬 淀 粉	每十萬片	每片
		50.0公斤	500.0公絲
方		3.0公斤	30.0公絲
		內在質量 存在問題	片重0.53公分，每片含辛可芬0.5公分
操作要點	取辛可芬及淀粉分別篩過，混合均勻，用8%的淀粉漿濕潤，先在圓筒式顆粒機製成條狀物，再用搖擺式顆粒機12目尼龍篩制粒。此法所製成的顆粒較堅硬。濕粒以70°C左右溫度干燥，在干粒中另加適量硬脂酸鎂及干淀粉，混勻壓片。		
治療範圍	本品適用於治療風濕痛。		
包裝規格	100片、1000片。	失效期限	
儲運條件	置遮光的容器內，密閉保存	負責期限	2年

产品名称	醋酸可的松片 Tabella Cortisoni Acetici (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
處	每十萬片 每片		內在質量 存在問題
	醋酸可的松	2.5 公斤 25.0公絲	
方	硬脂酸鎂	0.16公斤 1.6公絲	品種規格
	填充顆粒	13.34公斤 133.4公絲	
	填充顆粒配制:		
	乳糖粉	4.65公斤	
	淀粉	10.65公斤	片重0.16公分，每片含醋酸可的松25公絲。
	淀粉(冲漿)	0.2 公斤	
操作要點	称取乳糖粉及淀粉，分別过篩，混合均匀，用淀粉10—12%漿湿润用14—16目制成空白填充顆粒，80—85°C干燥后称取空白填充顆粒13.34公斤，加入醋酸可的松及硬脂酸鎂，混勻压片。		
治疗范围	本品应用由于肾上腺皮質机能不全所引起之疾病，风湿性关节炎痛风，过敏反应，气喘、鹽类排泄失常，所引起之血糖降低等症。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件	避光密封保存		負責期限 3年

产品名称	抗癆胍片 (氰乙酰胍片) <i>Tabella Cyanacethydrasidi</i> (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
處	每十萬片 每片 氰乙酰胍 5.00公斤 50 公絲 淀粉 1.50公斤 15 公絲 糖粉 1.50公斤 15 公絲 焦亞硫酸鈉 50 公分 0.05 公絲 或亞硫酸氫鈉 依地酸二鈉 5 公分 0.005 公絲 淀粉 0.6 公斤 6.0 公絲 硬脂酸鎂 80 公分 0.8 公絲	內在質量 存在問題	1日3次, 1次150—200公絲。 本品須在醫師指示下服用
			品種規格
操作要點	称存氰乙酰胍研細, 过80目篩, 加入淀粉、糖粉混和均匀, 另將焦亞硫酸鈉(或亞硫酸氫鈉)和依地酸二鈉溶于水中, 然后加入10%淀粉漿中攪拌均匀制成軟材, 用20目尼龍篩制粒, 以60°C以下溫度干燥, 顆粒加入硬脂酸鎂过篩充分拌和均匀压片。		
治療範圍	本品可用于治療長期肺結核, 初期浸潤性肺結核, 及生殖系統結核等症。亦可与鏈霉素或对氨水楊酸鈉合并使用。		
包裝規格	100片。	失效期限	
儲存條件	密閉避光貯藏	負責期限	1年半

产品名称		鹽酸圖氯胍片 Tabella Cyclochloroguanidi Hydrochlorici (現由天平藥厂生产)	
規格	衛生局暫行規定		劑量及 治療程
處	每十萬片	每片	預防用: 1次4片, 每半月服1次 治療用: 1日1次, 每次3片, 通 服4日。
方	鹽酸圖氯胍 10.0公斤	0.1公分	
	蔗糖粉 2.4公斤	24.0公絲	內在質量 存在問題
	糊精 1.4公斤	14.0公絲	
	淀粉 2.75公斤	27.5公絲	品種規格
	硬脂酸鎂 60.0公分	0.6公絲	
操作要點	稱取鹽酸圖氯胍, 研磨成100目細粉, 與輔料充分混合均勻, 用6%淀粉漿, 通過18目篩制粒。70°C干燥后用搖擺式顆粒機16—18目篩過, 加入淀粉及硬脂酸鎂, 混勻壓片。制粒干燥時, 應保持含水量在3%以上, 否則壓片時易造成裂片。		
治療範圍	本品適用於治療各型瘧疾, 亦可用作瘧疾預防用。		
包裝規格	100片、1000片。	失效期限	
儲運條件	密閉貯藏	負責期限	3年

产品名称		胱氨酸片 Tabella Cystini (現由信誼藥厂生产)	
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療 程
			每次 1—2, 或遵医嘱
处		每十万片	每 片
	胱 氨 酸	2.5 公斤	25.0公絲
方	糊 精	5.0 公斤	50.0公絲
	淀 粉	0.15公斤	1.5公絲
	硬脂酸鎂	80.0 公分	0.8公絲
			內在質量
			存在問題
			品种規格
			片重80公絲, 每片含胱氨酸25公絲。
操作要点	称取胱氨酸与淀粉, 通过 24 目篩混和均匀, 置攪拌机內, 然后加入糊精攪拌 5 分鐘, 用稀醇 1:2 μ /w 湿润制粒, 通过尼龙 20 目篩網, 用 70°C 干燥, 干燥后, 加入硬脂酸鎂通过 16 目后, 充分拌勻压片。		
治疗范围	本品适用于病后、产后脫髮, 特发性的脫髮症。		
包裝規格	100 片		失效期限
儲运条件			負責期限
			3 年

产品名称	强地黄片 Tabella Deslanosidi C (曾由信誼藥厂生产)		
规格	卫生局暂行规定		剂量及疗程 每次1—2片, 需遵医嘱。
处 方	每十万片	每片	内在質量 存在問題
	去乙酰基毛花洋地黄甙丙		
	25.0公分	0.25公絲	品种規格 糖衣片重0.2公分, 每片含去乙酰基毛花洋地黄甙丙0.25公絲。
	乳糖粉 4.0公斤	40.0公絲	
	淀粉粉 3.7公斤	37.0公絲	
	硬脂酸鎂 70.0公分	0.7公絲	
操作要点	称取乳糖粉及淀粉, 分別篩过, 混合均匀。称取乙酰基毛花洋地黄甙丙, 溶于适量乙醇中, 拌和混入上述乳糖粉及淀粉中, 用55°C以下溫度干燥。干燥后反复篩过, 加8—10% 淀粉漿湿润用16—18目篩制粒, 仍用55°C以下溫度干燥, 干粒篩过, 加硬脂酸鎂, 混匀压片。包糖衣, 用玫瑰紅食用色素着色。		
治疗范围	本品为强心剂, 适用于充血性心力衰竭。		
包装规格	100片	失效期限	
储运条件	避光密封保存	負責期限	1年半

产品名称	地塞米松片 <i>Tabella Dexamethasoni</i> (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		
处	每十万片	每片	劑量及 療程
• 方	9-氟-16甲基去 氫氫化可的松	75.0公分	
	乳 糖	13.9公斤	139.0公絲
	淀 粉	4.15公斤	41.5公絲
	硬脂酸鎂	0.3公斤	3.0公絲
			內在質量 存在問題
			品种規格
			片 重 0.18公分 每片含地塞米松 0.75公絲
操作要点	称取地塞米松75.0公分，研細，通过100目篩。称取淀粉4.15公斤，通过100目篩，逐渐用等量法与地塞米松混合均匀。再称取乳糖13.9公斤，亦通过100目篩，再依上法与地塞米松及淀粉混合物混合均匀，通过100目篩。以蒸溜水作湿润剂制粒，用16目尼龙篩篩过。以60°C温度干燥。干粒加入硬脂酸鎂，混勻，压片。		
治疗范围	本品应用于过敏性皮炎，牛皮癣天疱瘡、支气管性气喘、肺气腫及风湿性关节炎等症。		
包装規格	100片		失效期限
儲运条件	密閉保存		負責期限 3年

产品名称	海群生片 <i>Tabella Diaethylcarbamazini Citrici</i> (<i>Tabella Hetrazani</i>) (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品 規 范 (1959)		劑量及 療 程
處 方		每十萬片	每片
	海 群 生 糊 精 淀 粉 滑 石 粉 硬 脂 酸 鎂	5.0 公斤 2.0 公斤 1.68 公斤 0.8 公斤 0.8 公斤	50.0公絲 20.0公絲 16.8公絲 8.0公絲 8.0公絲
			內在質量
			存在問題
			品種規格
			片重90公絲，每片含海群生50公絲
操作要點	取海群生，糊精及淀粉(1.5公斤)分別篩過，充分混合，另取淀粉(0.17公斤)制漿濕潤后，通過16目篩制成顆粒，用70°C溫度干燥，干后加入滑石粉及硬脂酸鎂，混勻壓片。		
治療範圍	本品适用于治療絲虫病。		
包裝規格	100片、500片、1000片。	失效期限	
儲運條件	密封保存	負責期限	2年

产品名称	氨苯砒片 Tabella Diaminodiphenylsulfoni (Tabella Dapsoni) (現由天平藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療 程
處 方 (一)	每十萬片	每片	1次 1—2片
	氨 苯 砒 淀 粉 糊 精 硬脂酸鎂	5.0公斤 1.4公斤 0.4公斤 0.1公斤	50.0公絲 14.0公絲 4.0公絲 1.0公絲
			內在質量 存在問題
			品種規格
	片重0.07公分, 每片含氨苯砒50公絲		
操作要點	取氨苯砒、糊精、及淀粉(1.2公斤)混合, 另取淀粉(0.2公斤)制成10%的 淀粉漿濕潤10目制粒60°C干燥后, 加入硬脂酸鎂, 混勻壓片。顆粒需制成較堅 硬片劑。		
治療範圍	本品适用于治療麻瘋病。		
包裝規格	100片		失效期限
儲存條件	密閉干燥貯藏		負責期限
			2年

产品名称	氨苯砷片 Tabella Diaminodiphenylsulfoni (Tabella Dapsoni) (曾由信誼藥厂生产)			
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程	1次服1—2片。
处 方 (二)		每十万片	每片	內在質量 存在問題
	氨 苯 砷	5.0 公斤	50.0公絲	
	淀 粉	2.24公斤	22.4公絲	品种規格
	糊 精	0.9 公斤	9.0公絲	
	硬脂酸鎂	80.0 公分	0.8公絲	
操作要点	称取氨苯砷、白糊精，淀粉、充分过筛混匀，放置搅拌机中，用10%淀粉浆制成软材，过12—14目制粒，以70°C干燥，干粒加硬脂酸鎂过16目筛压片。			
治疗范围	本品适用于治疗麻瘋症。			
包裝規格	100片、500片、1000片		失效期限	
儲运条件	在遮光容器內密閉保存		負責期限 2年	

产品名称	多酶片 Tabella Diastasi Pepsini et Pancreatini (現由信誼藥厂生产)		
規格	制 剂 規 范 (1952)		劑量及 療 程
處	每十萬片	每片	內 在 質 量
	片心: 胰 酶 12.00公斤	0.12公分	
方	糖 粉 2.00公斤	20公絲	存 在 問 題
	虫膠溶液10% 适量		
	硬脂酸鎂 0.10公斤	1.0 公絲	品 种 規 格
	外层: 淀粉酶 12.00公斤	0.12公分	
	枸橼酸鈉 0.80公斤	8.0 公絲	
	胃蛋白酶 4.00公斤	0.04公分	
酒精70% 1500毫升	0.015毫升	糖衣片重0.67公分, 每片含: 淀粉酶0.12公分, 胃蛋白酶0.04公分, 胰酶0.12公分。	
硬脂酸鎂 0.10公斤	1.0 公絲		
操作要点	將胰酶及糖粉混和均匀, 用10%虫膠溶液湿润14目制粒, 以55°C干燥后, 加入硬脂酸鎂, 过16目篩用联合压片机压制片芯。另將淀粉酶与枸橼酸鈉(80目細粉)及胃蛋白酶混和均匀, 用70%酒精湿润12—14目制粒, 以40°C以下干燥后加入硬脂酸鎂过篩, 用联合压片机压制双层片。并立即进行包楊梅紅色糖衣层。 注意事項: 1. 枸橼酸鈉作为淀粉酶緩冲剂 pH 值調节至5.0。 2. 压片必須在相对湿度50%冷气干燥室内进行。		
治疗范围	适用于消化不良症。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件	密闭保存	負責期限	3月

产品名称	地巴唑片 Tabella Dibasoli (現由天平藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
處 方		每十萬片	每片
	地巴唑粉	0.3公斤	3.0公絲
	蔗糖精	1.5公斤	15.0公絲
	淀粉	3.7公斤	37.0公絲
	硬脂酸鎂	0.1公斤	1.0公絲
			內在質量 存在問題
			品種規格
			神經系統疾患: 1日量2—10片 妊娠晚期毒血症: 1日量8—40片 高血壓狹心症, 腸胃道痙攣: 1日量18—24片
			片重70公絲每片含地巴唑3公絲
操作要點	將原輔料均與混和通過60—80目過篩在攪拌機中拌勻用5%淀粉漿潤濕20目尼龍網過篩1—2次, 60°C干燥, 18目篩混壓片。		
治療範圍	治療神經性疾患, 血管及內臟平滑肌痙攣, 脊髓灰白質炎的恢復期, 高血壓狹心症及腸和幽門痙攣等症。		
包裝規格	100片		失效期限
儲運條件	密閉貯藏		負責期限 3年

产品名称	双香豆素片 Tabella Dicoumaroli (現由延安藥厂生产)		
規格	衛生局審批規格		劑量及 療程
處 方		每十萬片	每片
	双香豆素	5.0 公斤	50.0公絲
	淀粉	6.5 公斤	65.0公絲
	滑石粉	1.0 公斤	10.0公絲
	硬脂酸鎂	0.15公斤	1.0公絲
			內在質量 存在問題
			品種規格
			片重12.5公絲，每片含双香豆素 50公絲。
操作要点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 称取双香豆素及淀粉(5.0公斤)，混勻，以24目篩篩过，另用淀粉漿(10%)适量制成顆粒，以12目篩篩过，用60—70°C溫度干燥。 2. 干燥的顆粒用12目篩篩过，加入滑石粉，硬脂酸鎂及淀粉(1.5公斤)拌勻，再用10目篩过，压片。 		
治疗范围	預防及处理血管內栓塞，施行手术或受伤后靜脉血栓塞炎，肺栓塞炎，周圍血管之急性栓塞性閉塞及再发性特发之靜脉血栓塞炎。		
包裝規格	100片		失效期限
儲运条件	密閉保存		負責期限 2年

产品名称	洋地黄片 Tabella Digitalis (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療 程
處 方 (一)		每十萬片	每片
	洋地黄粉	10.0公斤	100.0公絲
	蔗糖粉	2.0公斤	20.0公絲
	糊精	2.0公斤	20.0公絲
	淀粉	0.85公斤	8.5公絲
			內在質量
			存在問題
			品種規格
	片重0.148公分，每片含洋地黄粉0.1公分。		
操作要点	取洋地黄細粉，蔗糖粉及糊精分別篩过，混合均匀，取淀粉制漿(10%)湿润16目篩制粒。在50°C干燥后，加入干淀粉及硬脂酸鎂，混勻压片。		
治疗范围	本品适用于充血性心力衰竭，尤其伴有心房纖維性顫动者。		
包裝規格	100片、1000片。		失效期限
儲运条件	置遮光的容器內，密閉保存，瓶內得加适量砂膠		負責期限
			2年

产品名称	洋地黄片 <i>Tabella Digitalis</i> (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
處 方 (二)	每十萬片	每片	內在質量 存在問題
	洋地黄粉 10.0公斤	100.0公絲	
	蔗糖粉 3.0公斤	30.0公絲	品種規格
	淀粉粉 2.0公斤	20.0公絲	
	硬脂酸鎂 0.15公斤	1.5公絲	片重0.15公分，每片含洋地黄粉 0.1公分
操作要點	取洋地黄細粉用100目篩篩過，與篩過的蔗糖粉及淀粉充分混和，用乙醇(50%)濕潤，制成12—14目顆粒，用55°C干燥，加入滑潤劑硬脂酸鎂，混合均勻。采样測定效價，核算片重，使每片的效價與一個洋地黄國際單位相當。壓片。		
治療範圍	本品适用于充血性心力衰竭，尤其伴有心臟纖維性顫動者。		
包裝規格	100片	失效期限	2年
儲存條件	置遮光器內密閉保存防止受潮失效		負責期限

产品名称	洋地黄毒甙片 <i>Tabella Digitoxini</i> (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療 程
處	每十萬片	每 片	內在質量
	洋地黄毒甙 10.0公分	0.1公絲	
方	乳 糖 2.5公斤	25.0公絲	存在問題
	淀 粉 6.5公斤	65.0公絲	
	硬脂酸鎂 90.0公斤	0.9公絲	
品种規格	片重 90 公絲, 每片含洋地黄毒甙 0.1 公絲。		
操作要点	將糖粉与淀粉混和, 通过 24—30 目篩, 置攪拌机內。再取洋地黄毒甙溶于乙醇中 (45%), 然后倒入攪拌机中一起攪拌, 并将盛洋地黄毒甙的容器用乙醇洗滌, 合并洗液充分攪拌均匀, 約 40 分鐘左右, 加入淀粉漿制成軟材, 用搖摆机尼龙篩網通过 2、3 次, 60°C 干燥, 干燥后加入滑料, 通过 16 目篩, 充分拌和压片。		
治疗范围	本品适用于充血性心力衰竭者。		
包裝規格	100 片、500 片、1000 片。	失效期限	
儲运条件	密闭避光保存	負責期限	2 年

产品名称	丁維鈣片 Tabella Ding Wei Gai (現由九福藥厂生产)																				
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程																		
處	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>每十萬片</td> <td>每片</td> </tr> <tr> <td>磷酸氫鈣</td> <td>15.0公斤</td> <td>150.0公絲</td> </tr> <tr> <td>骨化醇</td> <td>3.3公斤</td> <td>33.0公絲</td> </tr> <tr> <td>香蕉香精</td> <td>0.6公斤</td> <td>6.0公絲</td> </tr> <tr> <td>蔗糖粉</td> <td>65.0公斤</td> <td>650.0公絲</td> </tr> <tr> <td>硬脂酸鎂</td> <td>適量</td> <td>適量</td> </tr> </table>			每十萬片	每片	磷酸氫鈣	15.0公斤	150.0公絲	骨化醇	3.3公斤	33.0公絲	香蕉香精	0.6公斤	6.0公絲	蔗糖粉	65.0公斤	650.0公絲	硬脂酸鎂	適量	適量	每日3次, 每次1—2片
	每十萬片	每片																			
磷酸氫鈣	15.0公斤	150.0公絲																			
骨化醇	3.3公斤	33.0公絲																			
香蕉香精	0.6公斤	6.0公絲																			
蔗糖粉	65.0公斤	650.0公絲																			
硬脂酸鎂	適量	適量																			
方			內在質量																		
			存在問題																		
			品種規格																		
	片重0.78公分每片含磷酸氫鈣0.15公分, 骨化醇33公絲。																				
操作要點	<p>称取磷酸氫鈣及蔗糖粉, 分別篩过, 混合均匀, 用水湿润用12目篩制粒, 以70°C 溫度干燥。称取骨化醇及香蕉香精, 溶解于乙醇中。再自上述干燥顆粒中篩出若干細粉, 將含有骨化醇及香蕉香精的醇溶液用細粉吸附, 与硬脂酸鎂混合后, 加至顆粒中, 混与压片。</p>																				
治疗范围	妊娠和授乳期妇女, 发育期儿童, 用以补充鈣質缺乏或不足。																				
包裝規格	500片		失效期限																		
儲运条件	密閉保存		負責期限 2年																		

产品名称	鹽酸苯海拉明片 Tabella Diphenylhydramini Hydrochlorici (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
處	鹽酸苯海拉明 每十萬片 每片 糊精 2.5 公斤 25.0公絲 淀粉 3.25 公斤 32.5公絲 硬脂酸鎂 6.75 公斤 67.5公絲 0.16 公斤 1.6公絲		成人每日3—4次每次1—2片 兒童酌減或遵醫囑
			內在質量 存在問題
方			品種規格 糖衣片重0.3公分，每片含鹽酸苯海拉明25公絲。
操作要點	称取鹽酸苯海拉明、糊精及淀粉，分別篩过，混和均匀，用8—10%淀粉漿湿润14—16目篩制粒以60°—65°C干燥后，加入硬脂酸鎂，混勻压片。包白色糖衣。		
治療範圍	本品适用于治疗枯草热，荨麻疹，过敏性症，血清反应，血管运动神經性鼻炎与其他过敏性病症等。		
包裝規格	100片、500片、1000片。	失效期限	
儲運条件			負責期限 2年

产品名称	多种钙片 Tabella Duo Zhong Gao (現由九福藥厂生产)				
規格	衛生局暫行規定			劑量及 療程	每次1—3片
處	葡萄糖酸鈣	每十萬片 10.0公斤	每片 100.0公絲	內在質量	
	磷酸氫鈣	10.0公斤	100.0公絲		
方	乳酸鈣	10.0公斤	100.0公絲	存在問題	
	奶粉	15.0公斤	150.0公絲		
	蔗糖粉	55.0公斤	550.0公絲	品種規格	片重1.0公分
	枸橼酸	30.0公分	0.3公絲		
	香草香精	50.0公分	0.5公絲		
	香莢醛	50.0公分	0.5公絲		
	巧克力色素	35.0公分	0.35公絲		
	滑石粉	適量	適量		
操作要点	称取葡萄糖酸鈣，磷酸鈣乳酸鈣及蔗糖粉，分別篩过，混合均匀。称取枸橼酸及巧克力色素溶于温水中，加至8%的淀粉漿内，用以湿润上述蔗糖粉混合物，制成12目顆粒70°C温度干燥。称取香草香精及香莢醛，与滑石粉混合均匀，篩过，加入干粒，混匀压片。				
治疗范围	缺乏鈣質之小儿及孕妇可服用				
包裝規格	100片 500片		失效期限		
儲运条件	密閉保存		負責期限	2年	

产品名称	耳霖片 Tabella En Lin (現由九福藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療 程
處	磺 胺 碳酸氫鈉 淀 粉 硬脂酸鎂	每十萬片	每片
		33.0公斤	330公絲
方	17.0公斤 5.0公斤 適 量	170公絲	50.0公絲
		適 量	適 量
			內在質量
			存在問題
			品種規格
			片重0.55公分，每片含磺胺0.5公分。
操作要點	稱取磺胺用10%的淀粉漿濕潤制粒。稱取碳酸氫鈉與淀粉混和用10%的淀粉漿濕潤制粒。待二種顆粒干燥后，分別用14目篩篩過，加1%硬脂酸鎂，混和壓片。		
治療範圍	本品适用于急慢性中耳炎，外听道濕疹及耳內膿瘍。		
包裝規格	10片		失效期限
儲運條件	密閉保存		負責期限
			2年

产品名称	枸橼酸妊娠酚片 Tabella Ergosumini Citrici (現由天平藥厂生产)			
規格	藥品規範 (1959)	劑量及 療程	1日3次, 1次1—2片。	
處 方	每十萬片	每片	內在質量 存在問題	
	枸橼酸妊娠酚	0.862公斤		8.62公絲
方	淀粉	4.0公斤	40.0公絲	品種規格
	糊精	1.8公斤	18.0公絲	
	蔗糖粉	1.2公斤	12.0公絲	
	硬脂酸鎂	0.1公絲	1.0公絲	
	片重80公絲, 每片含枸橼酸妊娠酚 8.62公絲。			
操作要點	取淀粉, 糊精及蔗糖粉分別篩過, 混合均勻。將枸橼酸妊娠酚溶解於熱水中, 用16目制粒。60°C以下干燥, 干燥后的顆粒應避濕貯存。干粒中加入硬脂酸鎂, 混勻, 壓片。			
治療範圍	本品適用於一般性子宮出血, 分娩子宮收縮弛緩無力等症。			
包裝規格	100片	失效期限		
儲運條件	密閉避潮貯藏	負責期限	1年半	

产品名称	紅霉素片 Tabella Erythromycini (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處 方	每十萬片	每片	內在質量 存在問題
	紅霉素(1mg=1000單位)	0.1公分	
	10.0公斤	40.0公絲	裂片及腸溶時間达不到要求
	淀粉 4.0公斤	2.4公絲	
	硬脂酸鎂 2.4公斤	2.4公絲	品種規格
	糖衣片重0.33公分，每片含紅霉素0.1公分(100,000單位)		
操作要點	稱取紅霉素和淀粉混和均勻，用乙醇(每十萬片用3000—5000毫升)混潤，以16目篩制粒，以55°C以下溫度干燥，干燥后加入硬脂酸鎂過篩，混勻壓片，包白色腸溶糖衣層。		
治療範圍	本品应用于治療急性及慢性阿米巴、肺炎及鏈球菌、葡萄球菌的感染等症。		
包裝規格		失效期限	3年
儲運條件	密閉避光保存	負責期限	3年

产品名称	妊娠素片 Tebella Ethisteroni (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
			1日3次, 1次1—2片, 或遵医嘱。
处 方		每十万片	每片
	妊娠素	1.0公斤	10.0公絲
	淀粉	6.0公斤	60.0公絲
	糊精	2.0公斤	20.0公絲
	蔗糖粉	1.5公斤	15.0公絲
	硬脂酸鎂	0.1公斤	1.0公絲
			內在質量
			用戶反映療效不显著
			存在問題
			品种規格
			片重0.1公分, 每片含妊娠素10公絲。
操作要点	称取妊娠素、淀粉、糊精、及蔗糖粉, 分別篩过, 充分混合均匀, 用蒸溜水湿润, 通过搖摆式顆粒机16目篩制粒, 用70°C温度干燥, 干燥后再通过16目篩, 加入硬脂酸鎂, 混匀压片。		
治疗范围	适应于习惯性流产, 經痛, 月經过多。		
包裝規格	每管20片		失效期限
儲运条件			負責期限 3年

产品名称	复方当归浸膏片 <i>Tabella Extracti Angelicae Composita</i> (現由信誼藥厂生产)		
規格	重編制剂規格 (1954)		劑量及 1日3次, 每次2—6片
处	每十万片	每片	疗程
	当归浸膏5.0公斤	500.0公絲	
方	(相当生藥)		內在質量
	沒藥浸膏 3.0公斤	30.0公絲	
	磷酸亞鐵 3.0公斤	30.0公絲	存在問題
	乳酸鈣 6.0公斤	60.0公絲	
	干酵母粉 8.0公斤	80.0公絲	品种規格
	抗坏血酸 0.8公斤	8.0公絲	
淀粉 9.0公斤	90.0公絲		
	硬脂酸鎂 0.18公斤	1.8公絲	糖衣片重0.7公分, 每片含当归浸膏量相当于生藥0.5公分。
操作要点	称取当归浸膏、沒藥浸膏、磷酸亞鐵、乳酸鈣、干酵母粉及淀粉充分混合均匀, 用乙醇湿润, 通过搖摆式顆粒机制成湿粒, 在真空干燥箱內用50—60°C溫度干燥。干燥中加入抗坏血酸及硬脂酸鎂, 混勻, 通过目篩, 压片。包糖衣。食用玫瑰紅色素。		
治疗范围	本品应用于月經失調与痛經。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件	密閉保存	負責期限	2年

产品名称	硫酸亞鐵片 Tabella Ferri Sulfurici (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
			1日3次, 1次2片。
處	每十萬片	每片	內在質量 存在問題
	硫酸亞鐵 硬脂酸鎂	30.0公斤 75.0公分	
方			品種規格
			糖衣片重0.54公分, 每片含硫酸 亞鐵0.3公分。
操作要點	硫酸亞鐵通過20—24目篩加入硬脂酸鎂, 充分拌勻后壓片。原料成份最好控制在99—100%, 否則壓片容易產生裂片。		
治療範圍	本品適用於缺乏鐵質所致的貧血症。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲運條件			負責期限 1年半

产品名称	福美片 Fu Mei Pian (現由延安藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 疗 程
处	每十萬片	每片	每小時含服1—2片，亦可用作預防。
方	多聚甲醛	0.5 公斤	5.0 公絲
	酒石酸	0.5 公斤	5.0 公絲
	薄荷腦	0.125 公斤	1.25 公絲
	淀粉	2.5 公斤	25.0 公絲
	糊精	5.0 公斤	50.0 公絲
蔗糖粉	40.0 公斤	0.4 公分	內 在 質 量
滑石粉	1.0 公斤	10.0 公絲	
			存在問題
			品種規格
			每片含多聚甲醛50公絲。
操作要點	稱取蔗糖粉及糊精，分別用100目篩過，置攪拌機中混和均勻，用醇(33%)溶解酒石酸後，濕潤制粒，在搖擺式顆粒機中，用8目篩過。在水汀烘箱中干燥3—4小時，再用18目篩過，再干燥。加多聚甲醛，薄荷腦及滑石粉，混勻壓片。		
治療範圍	治喉頭腫脹扁桃腺炎，喉管炎等。		
包裝規格	40片、80片。		失效期限
儲運條件	密閉保存		負責期限 1年

产品名称	福命喉症片 Fu Ming Hou Zheng Pian (現由延安藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		
处	每十万片	每片	劑量及 疗程
	多聚甲醚 0.2 公斤	2.0 公絲	
方	汞溴紅 0.2 公斤	2.0 公絲	內在質量 存在問題
	枸橼酸 0.4 公斤	4.0 公絲	
	香莢醛 适量	适量	
	薄荷油 0.15 公斤	1.5 公絲	
	桉叶油 200.0 毫升	0.002 毫升	
	甜桔油 适量	适量	
	淀粉 0.8 公斤	8.0 公絲	
	蔗糖粉 48.0 公斤	0.48 公分	
	硬脂酸鎂 0.6 公斤	6.0 公絲	
	滑石粉 1.2 公斤	12.0 公絲	
品种規格	每片含多聚甲醚 2 公絲		
操作要点	称取汞溴紅溶解于适量热水，瀘过，加入适量乙醇，称取枸橼酸粉，淀粉及糖粉，分別篩过，混合均匀，再用40目篩篩过。將汞溴紅溶液加入，用2号顆粒机11目篩篩出，以50—60°C温度干燥。于粒中篩出部分細粉，將多聚甲醚，滑石粉，硬脂酸鎂，香莢醛的混合物及薄荷腦，甜桔油，桉叶油的混合物通过40目篩拌和。加至干燥顆粒中通过12目篩混勻压片。		
治疗范围	适应喉炎、喉痛、喉腫等。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲运条件	密閉保存	負責期限	1年

产品名称	呋喃西林片(丙服) Tabella Furacilini (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
			1日3次,每次1~2片。
处 方 (一)	每十萬片	每片	內在質量 存在問題
	10.0公斤	1000公絲	
	呋喃西林 淀粉 硬脂酸鎂	2.4公斤 24公絲 適量	
			品種規格
			片重 0.124公分, 每片含呋喃西林 0.1公分。
操作要點	將呋喃西林與淀粉混合均勻,篩過,以10%淀粉漿製成濕粒,用16目尼龍篩網篩過,以60—70°C溫度干燥,干粒中加入適量硬脂酸鎂,混勻壓片。		
治療範圍	本品適用於治療細菌性痢疾,腸內異常發酵,腎盂炎,膀胱炎、尿道炎等。		
包裝規格	100片 1000片	失效期限	
儲運條件	置遮光的容器內,密閉保存。	負責期限	3年

产品名称	呋喃西林片(内服) Tabella Furacilini (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品规范 (1959)		劑量及 療 程
处 方 (二)	每十万片	每片	1日3次, 每次2—4片。
	呋喃西林 5.0 公斤	50.0公絲	
	淀粉 4.69公斤	46.9公絲	內在質量
糊 精 0.5 公斤	5.0公絲	存在問題	用戶反映副作用大。
硬脂酸鎂 0.1 公斤	1.0公絲	品种規格	片重0.1公分, 每片含呋喃西林50公絲。
操作要点	取呋喃西林, 以24—40目篩篩过一次, 称取5.0公斤, 另称取淀粉4.5公斤及糊精0.5公斤。充分混勻, 以其余淀粉制8—10%漿, 用12目篩制粒。以65—70°C溫度干燥后, 加入潤滑剂压片。		
治疗范围	本品适用于治疗細菌性痢疾、腸內异常发酵、腎盂炎、膀胱炎、尿道炎等。		
包裝規格	50、100、500、1000片。	失效期限	
儲运条件	貯藏于冷暗处, 避免日光直射。	負責期限	3年

产品名称	钙素母片 Tabella Gai Su Mu (現由九福藥厂生产)		
规格	卫生局暫行規定		剂量及 疗程
处	每十萬片	每片	1日3次, 1次1—2片。
	葡萄糖酸鈣 16.0 公斤	160.0公絲	
方	甘油磷酸鈉 0.20公斤	2.0公絲	內在質量
	磷酸氫鈣 0.92公斤	9.2公絲	存在問題
	核黄素 9.6 公分	0.096公絲	
	骨化醇 0.06公分	24国际单位	
	香 精 32公分	0.32公絲	
	蔗糖粉 62.0 公斤	620.0公絲	
	硬脂酸鎂 0.8 公斤	8 公絲	品种規格
操作要点	片重 0.9 公分		
治疗范围	称取葡萄糖酸鈣, 磷酸氫鈣, 及蔗糖粉, 分別篩过, 磷酸氫鈣与核黄素混和, 用60目篩二次制成母粉, 將已溶于醇中之骨化醇及香蕉香精加至部份糖粉中 (2公斤), 过60目篩一次, 作为干粒混和时用。按处方称取葡萄糖酸鈣, 蔗糖粉, 甘油磷酸鈉, 及核黄素母粉, 混合均匀, 用冷开水湿润, 12目篩制粒, 70°C温度干燥后, 篩过, 加入含有骨化醇及香蕉精之蔗糖粉, 充分拌和, 再加硬脂酸鎂, 混匀压片。		
包裝規格	520片	失效期限	
儲运条件	密封保存	負責期限	3年

产品名称	胃舒平片 Tabella Gastropina (現由天平藥厂生产)		
規格			劑量及 疗 程
			1日3次, 1次3—4片。
处	每十万片	每片	內在質量
	氢氧化鋁	2.45公斤 245.0公絲	
方	三矽酸鎂	1.05公斤 105.0公絲	存在問題
	順茄流浸膠	260.0毫升 0.0026毫升	
	淀 粉	6.5公斤 65.0公絲	品种規格
	薄 荷 油	22.0公公 0.22公絲	
	糖 精	19.0分分 0.19公絲	
	硬脂酸鎂	0.4公斤 4.0 公絲	片重0.41—0.42公分,
操作要点	取淀粉篩过, 制成淀粉漿。糖精制成5%溶液, 將順茄流浸膏加入混合, 再混入淀粉漿內。取氢氧化鋁及三矽酸鎂磨成細粉, 在攪拌器內拌勻后, 將含有糖精及順茄流浸膏的淀粉漿加入湿潤, 用搖摆式顆粒机12目篩制粒, 100°C以下溫度, 在良好通风条件情况干燥。干后, 加入潤滑剂及薄荷油, 在八角調和机內混勻, 压片。		
治疗范围	本品适用于治疗胃酸过多, 胃潰瘍, 十二指腸潰瘍及一般性胃痛等症。		
包裝規格	40片、120片、1000片。	失效期限	
儲运条件	干燥貯藏	負責期限	1年半

产品名称	肝太乐片 Tabella Glucuralactoni (現由天平藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 疗 程
			1日3-4次, 每次1-8片。
处 方		每十万片	每片
	肝太乐	5.0公斤	50.0公絲
	蔗糖粉	1.0公斤	10.0公絲
	淀粉	1.5公斤	15.0公絲
	硬脂酸鎂	0.1公斤	1.0公絲
			內在質量
			存在問題
			品种規格
			原料貯藏一年后有变色現象, 片剂尚未发现。
			片重70-80公絲, 每片含肝太乐50公絲
操作要点	將肝太乐磨成細粉, 与蔗糖粉及淀粉充分混合, 用5%的淀粉漿16目制粒, 70°C干燥后, 加入硬脂酸鎂, 混勻压片。肝太乐性質不穩定, 容易变色。		
治疗范围	本品适用于治疗流行性肝炎、肝臟硬化, 慢性肝臟障碍, 食物藥物中毒, 风湿性关节炎等。		
包裝規格	100片		失效期限
儲运条件	密閉貯藏		負責期限 2年

产品名称	复方甘草片(不含阿片) <i>Tabella Glycyrrhizae Composita</i> (現由信誼藥厂生产)		
規格	制劑規範(1952)		劑量及 療程
處 方	每十萬片 每片		內 在 質 量 存 在 問 題
	甘草浸膏	10.0公斤	
	滑石粉	10.0公斤	0.1公分
	酒石酸鉍鉀	0.1公斤	10.0公絲
	樟腦	0.2公斤	20.0公絲
	苯甲酸鈉	0.2公斤	20.0公絲
	八角茴香油	200.0毫升	0.002毫升
	蔗糖粉	10.0公斤	0.1公分
	硬脂酸鎂	0.167公斤	1.67公絲
	品種規格		
	片重0.35公分, 每片含量相当 于复方甘草合劑60滴。		
操作要点	称取甘草浸膏糖粉, 滑石粉, 酒石酸鉍鉀, 苯甲酸鈉, 置攪拌机中, 攪拌均匀 后, 移至搪瓷盘內(盘底面上撒上滑石粉)置烘箱內, 以75°C左右温度减压干燥, 干燥后加入少量滑石粉和硬脂酸鎂, 通过搖摆机以18—20目充分拌勻压片。		
治疗范围	本品为鎮咳祛痰剂。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件	密閉保存	負責期限	3年

产品名称	复方甘草片(含阿片) Tabella Glycyrrhizae Composita cum Opio (現由信誼藥厂生产)		
規格	制 剂 規 范 (1952)		劑量及 口含, 1次1—2片。
处 方 (二)		每十萬片	每片
	甘草浸膠	10.0 公斤	0.1 公分
	滑石粉	11.0 公斤	0.11公分
	酒石酸鉍鉀	0.1 公斤	10.0 公絲
	阿片粉	0.18公斤	18.0 公絲
	樟腦	0.2 公斤	20.0 公絲
	苯甲酸鈉	0.2 公斤	20.0 公絲
	八角茴香油	200.0 毫升	0.092毫升
	蔗糖粉	9.0 公斤	90.0 公絲
	硬脂酸鎂	0.167公斤	1.67公絲
			內 在 質 量
			存 在 問 題
			品 种 規 格
			片重0.35公分, 每片含量相当于 复方甘草合剂60滴。
操作要点	称取甘草浸膏及滑石粉, 混合均匀, 筛过, 再加入酒石酸鉍鉀, 阿片粉, 苯甲酸鈉及蔗糖, 混勻, 用水湿润过12目制粒, 75—80°C干燥后, 加入樟腦, 八角茴香油, 及硬脂酸鎂, 混勻压片。		
治疗范围	本品为鎮咳祛痰剂。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲运条件	密閉保存	負責期限	3 年

产品名称	果导片 Tabella Guo Dao (現由延安藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處 方	每十萬片 每片 酚酞 10.0 公斤 100.0 公分 蔗糖粉 2.77 公斤 27.7 公絲		每次服1—2塊，早晨空腹時或晚間臨睡前在口中溶化，徐徐嚥下。孕婦服用，需遵醫囑指示。
			內在質量 存在問題
			品種規格 片重0.6公分，每片含酚酞0.1公分
操作要點	取酚酞及蔗糖粉分別磨細篩過。以胭脂紅(55公分)溶解于熱水(約1500毫升)中，濾過，用此溶液濕潤酚酞及蔗糖粉，通過8目篩制成顆粒，在70°C溫度干燥。干后通過10—12目篩，拌入甜桔油(20.8毫升)及液狀石腊(230毫升)的混合液，再加滑石粉(2290公分)及硬脂酸鎂(143.3公分)的混合物適量作滑潤劑，混勻壓片。		
治療範圍	适用于習慣性便秘。		
包裝規格	25片、50片、100片。	失效期限	
儲運條件	密閉保存	負責期限	2年

产品名称	汗定片 Tabella Han Ding Luan (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		
处	每十万片	每片	
	顛茄浸交 0.25 公斤 次亞磷酸鈣 10.0 公斤 抗坏血酸 2.5 公斤 淀粉 0.725 公斤 糊精 1.0 公斤 硬脂酸鎂 0.13 公斤	2.5 公絲	0.1 公分 25 公絲 7.25 公絲 10 公絲 1.3 公絲
方	劑量及 疗程		睡前頓服 4 片虛弱者如白晝无故自汗，日服三次，一次二片：小兒 5—10 岁服 1—2 片；10—15 岁服 2—3 片，睡前一次服。
	內在質量 存在問題		
品种規格		糖衣片重 0.26 公分，每片含顛茄浸交 2.5 公絲，抗坏血酸 25 公絲及次亞磷酸鈣 0.1 公分。	
操作要点	將顛茄浸交，淀粉，糊精混合均勻，篩过二次，然后与次亞磷酸鈣及抗坏血酸混合，用 24 目篩篩过二次，以 5% 的淀粉漿制湿粒，通过 16 目搖摆式顆粒机制粒。湿粒以 60—65°C 干燥后，需迅速裝入鉄桶，密閉貯放，因次亞磷酸鈣极易吸湿，造成压片时粘冲現象。压片后，包糖衣，以檸檬黃着色。		
治疗范围	盜汗、虛汗、夜尿症。		
包裝規格	100 片	失效期限	
儲运条件		負責期限	2 年

产品名称 鹽酸胛苯噻嗪片 Tabella Hydralazini Hydrochlorici (曾由信誼藥厂生产)			
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處	每十萬片	每片	本品應遵照醫師指示服用。一般1日4次，在飯後及臨睡前服用。第一星期1—4日，每次¼片，5—7日，每次½片。第二星期可增至每次1片。第三星期每次1½片。第四星期每次2片。
方	鹽酸胛苯噻嗪 5.0 公斤	50.0公絲	
	硬脂酸鎂 0.17 公斤	1.7公絲	內在質量 存在問題
	填充顆粒配比:		品種規格
	磷酸氫鈣 1.00 公斤		糖衣片重0.43公分，每片含鹽酸胛苯噻嗪50公絲。
	碳酸鈣 2.50 公斤		
	淀粉 0.875 公斤		
操作要點	稱取磷酸氫鈣，碳酸鈣及淀粉，分別篩過，混和均勻，用10%淀粉漿濕潤用16目篩制粒，以60°—65°C干燥後稱取空白填充顆粒11.83公斤，加入鹽酸胛苯噻嗪及硬脂酸鎂，混勻壓片。包大紅色糖衣。		
治療範圍	本品適用於特發性高血壓症，對良性的高血壓效果更為顯著。		
包裝規格	50片	失效期限	
儲運條件	密封保存于陰涼處	負責期限	未定

产品名称	双氢克尿塞片 Tabella Hydrochlorothiazidi (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規格		劑量及 療 程
處 方		每十萬片	每 片
	双氢克尿塞	2.5公斤	25.0公絲
	淀粉	3.0公斤	30.0公絲
	糖 粉	2.5公斤	25.0公絲
	硬脂酸鎂	0.1公斤	1.0公絲
			內在質量
			存在問題
			品種規格
			片重80公絲，每片含双氢克尿塞量25公絲。
操作要点	称取主藥与輔料，拌和均匀后，用10%淀粉湿润成軟材，通过塑料篩（相当16目）制粒，用85°C左右干燥，加入滑料，过14—16目篩后，充分拌和压制成片。		
治疗范围	本品适用于利尿，治疗各种水腫、充血性心臟衰竭、肝硬化高血压等症。		
包裝規格	100片、500片、1000片。		失效期限
儲运条件	密封保存		負責期限 3年

产品名称	醋酸氢化可的松片 <i>Tabella Hydrocortisoni Acetici</i> (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規範(1959)		劑量及 療程
處	每十萬片 每片		內在質量 存在問題
	醋酸氢化可的松	2.0 公斤 20.0 公絲	
方	硬脂酸鎂	0.16 公斤 1.6 公絲	品種規格
	填充顆粒	13.84 公斤 0.1384 公分	
	填充顆粒配制:		
	乳糖	4.8 公斤	片重0.16公分, 每片含醋酸氢化可的松20公絲。
	淀粉(冲漿)	0.2 公斤	
操作要點	称取乳糖及淀粉, 分別过篩混和均匀, 用10%淀粉漿湿潤通过16目篩制成空白填充顆粒, 以65—70°C干燥, 干燥后称取 13.84 公斤空白填充顆粒, 加入醋酸氢化可的松及硬脂酸鎂混勻压片。		
治療範圍	本品适用于由腎上腺皮質機能不全所引起之疾病、可治疗 风湿性關節炎、痛風、過敏反应、气喘、鹽类排洩失常血糖降低等症。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件	避光密閉保存	負責期限	3年

产品名称	肌醇片 Tabellae Inositoli (現由九福藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療 程
處	肌 醇 每十萬片 2.5公斤 淀 粉 0.57公斤 硬脂酸鎂	每片 250公絲 57.0公絲 適量	內在質量 存在問題
方			品種規格
操作要點	將肌醇及淀粉分別篩過，混合，以10%淀粉漿用16目尼龍篩制顆粒。用60—65°C溫度干燥，另加硬脂酸鎂作潤滑劑，混勻壓片。制粒時的淀粉漿不易過熱。		
治療範圍	治療脂肪肝，肝硬化症，血管硬化症，四氯化碳中毒。		
包裝規格	100片。	失效期限	
儲運條件	密封保存	負責期限	2年

产品名称	异丙萘肼片 Tabella Iproniazidi (曾由延安藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
			服法与用量,由医师視病情况决定。
处	异丙萘肼	每十万斤	每片
	淀粉	2.5公斤	25.0公絲
方	硬脂酸鎂	8.5公斤	85.0公絲
		0.15公斤	1.5公絲
			內在質量
			存在問題
			品种規格
	片重 0.11 公分, 每片含异丙萘肼 25 公絲。		
操作要点	取异丙萘肼及淀粉(8.0公斤)分別篩过, 混合均匀, 另取淀粉适量, 制成10% 淀粉漿, 湿潤制粒(12目), 以50°C以下溫度干燥, 避免熔溶, 干顆加入淀粉(0.5公斤)及硬脂酸鎂, 混匀压片。		
治疗范围	本品主要适用于精神忧郁症, 也可用于肺結核症。		
包裝規格	100片		失效期限
儲运条件	密閉保存		負責期限
			2年

产品名称	双醋酚酞片(一轻松) Tabella Isaphenini (现由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程
处 方		每万片	每片
	双醋酚酞	0.5 公斤	5.0公絲
	蔗糖粉	5.6 公斤	56.0公絲
	淀粉	2.86公斤	28.6公絲
	硬脂酸鎂	80.0 公分	0.8公絲
			內在質量 存在問題
			品种規格
			片重80公絲，每片含双醋酚酞 5 公絲。
操作要点	將双醋酚酞与蔗糖粉淀粉混和均匀后，用10%淀粉漿使成軟材，通过14—16目篩制粒，以65—70°C干燥，干燥后加入硬脂酸鎂通过16目篩，充分拌和均匀后，压片。		
治疗范围	本品适应各种急性、慢性、偶发性及习惯性之便秘臥床患者、手术后患者、腎臟病患者、孕婦产婦小儿等之便秘症。		
包裝規格	500片、1000片		失效期限
儲运条件			負責期限 3年

产品名称	异菸肼片 Tabella Isoniazidi (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品 規 范 (1959)		劑量及 疗 程
处 方 (一)		每十萬片	每 片
	异 菸 肼	5.0 公斤	50.0公絲
	淀 粉	2.75公斤	27.5公絲
	硬脂酸鎂	50.0 公分	0.5公絲
		內在質量	
		存在問題	
		品种規格	片重60公絲,每片含异菸肼50公絲。
操作要点	將主藥与輔料拌和均匀后,用14%淀粉漿湿润成軟性,用不銹鋼搖摆机,通过20目尼龙網,以65~70°C干燥,干燥后加入滑料,通过16目篩,充分拌勻压片。		
治疗范围	本品适用于慢性血行播散性肺結核的浸潤进展期及其他肺外活动性結核症。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件		負責期限	3年

产品名称	异菸肼片 Tabella Isoniazidi (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品 規 范 (1959)		劑量及 疗 程
处 方 (二)		每十萬片	每片
	异 菸 肼	10.0公斤	0.1公分
	淀 粉	2.3公斤	23.0公絲
	硬脂酸鎂	0.1公斤	1.0公絲
			內在質量
			存在問題
			品种規格
			片重0.12公分，每片含异菸肼 0.1公分。
操作要点	取异菸肼及淀粉(2.1公斤)分別篩过，混合均匀，另取淀粉(0.2公斤)制成10%淀粉漿湿润用16—18目篩制粒。以65—75°C干燥后，加入硬脂酸鎂，混匀压片。		
治疗范围	本品适用于慢性血行播散性肺結核的湿润进展期及其他肺外活动性結核症。		
包裝規格	100片、1000片。		失效期限
儲运条件			負責期限 3年

产品名称	异菸肼磺钠片 Tabella Isoniazini Methansulfonici Natrici (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
			1日3次, 1次1—3片, 或遵医嘱。
处	每十萬片	每片	內在質量
	异菸肼甲烴磺酸鈉		
	10.0 公斤	0.1公分	存在問題
	淀粉	1.12公斤 11.2公絲	
	蔗糖粉	0.5 公斤 5.0公絲	品種規格
方	硬脂酸鎂	0.15公斤 1.5公絲	
	片重0.12公分, 每片含异菸肼甲烴磺酸鈉0.1公分。		
操作要点	称取异菸肼甲烴磺酸鈉, 淀粉(1.0公斤), 及蔗糖粉, 分別篩过, 混合均匀。取淀粉(0.12公斤)制成10%淀粉漿, 湿润用16目篩制粒, 以70°C溫度干燥, 加入硬脂酸鎂, 混勻压片。		
治疗范围	各型肺結核症及肺外結核症。		
包裝規格	100片、500片、1000片。	失效期限	
儲运条件		負責期限	3年

产品名称	百生肼片 Tabella Isoniazidi Para-Aminosalicicylici (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規范 (1959)		劑量及 療程
處	每十萬片	每片	1日3次,每次1—2片,或遵医嘱。
	百生肼 10.0公斤	0.1公分	
方	淀粉 1.9公斤	19.0公絲	內在質量
	硬脂酸鎂 0.1公斤	1.0公絲	存在問題
			品種規格
	片重0.118公分,每片含百生肼0.1公分。		
操作要点	將百生肼与淀粉混勻,用淀粉漿粘台剂移置不銹鋼搖摆机,通过20目尼龙篩網制粒,用65—70°C干燥,通过16目篩,加入滑料,充分拌勻压片。		
治疗范围	本品适用于各型肺結核及肺外結核症。		
包裝規格	100片 500片	失效期限	
儲运条件	避光密封保存	負責期限	3年

产品名称	异菸胺片 Tabella Isoniazoni (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
			1日3次, 1次1—2片。
處	每十萬片	每片	內在質量
			存在問題
方	异菸胺	10.0公斤	0.1公分
	淀粉	2.3公斤	23.0公絲
	硬脂酸鎂	0.1公斤	1.0公絲
			品種規格
			片重0.12公分, 每片含异菸胺0.1公分。
操作要点	取异菸胺及淀粉分別篩过, 混合均匀, 用10%的淀粉漿湿潤用16目篩制粒, 以溫70°C度干燥后, 加入硬脂酸鎂, 混勻, 压片。		
治疗范围	本品为結核病治疗剂。		
包裝規格	100片、500片、1000片。		失效期限
儲运条件			負責期限
			3年

产品名称	降压灵片 Tabella Jiang Ya Ling (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規格		劑量及 療程
處	每十萬片	每片	內在質量 存在問題
	蘿美木總生物鹼 0.4公斤 淀 粉 5.8公斤 蔗 糖 粉 2.0公斤 硬脂酸鎂 0.3公斤	4.0公絲 58.0公絲 20.0公絲 3.0公絲	
方			品種規格
	片重0.17公分，每片含蘿美木總鹼 4公絲		
操作要點	取淀粉及蔗糖粉分別篩過，混合均勻，用淀粉漿（12%）制成空白16目顆粒，以75°C左右干燥。以蘿美木總生物鹼（80目細粉）與硬脂酸鎂混合，加至空白顆粒中，混勻，壓片。包白色糖衣，包衣操作的溫度，控制在37°C左右。		
治療範圍	本品應用於各期高血壓病，及其他病因如腎性動脈硬化性及內分泌性等所致之症狀性高血壓。		
包裝規格	100片、500片、1000片	失效期限	
儲存條件		負責期限	2年

产品名称	九合維他 Tabella Jiume Wei Ta (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處	每十萬片	每片	每日服1次黃色糖衣片与紅色膠丸各一粒或遵照醫師指示服用。每粒膠丸(紅色)含量: V.A.5000單位 V.D.400單位
	鹽酸硫胺 0.2公斤	2.0 公絲	
方	泛酸鈣 0.1公斤	顆粒 I	內在質量
	維生素E 10.0公分		
	白糊精 13.0公斤	0.13公分	存在問題
	核黃素 0.3公斤	3.0 公絲	
	抗坏血酸 5.0公斤	50.0 公絲	貯存中容易發霉
	鹽酸吡多辛 50.0公分	顆粒 II	
	菸酰胺 1.0公斤	10.0 公絲	
	白糊精 9.0公斤	90.0 公絲	
硬脂酸鎂 0.28公斤	2.8 公絲	品種規格	
操作要點	顆粒 I: 將鹽酸硫胺, 泛酸鈣, 糊精混合均勻, 過篩。另將維生素E溶于乙醇中, 加入以上混合粉中濕潤攪拌均勻制粒, 以65—70°C溫度干燥。 顆粒 II: 將核黃素, 菸酰胺, 鹽酸吡多辛及維生素丙混和均勻以稀醇潤濕制粒, 以55—60°C溫度干燥。 將二者干燥后, 分別過篩加入硬脂酸鎂混和均勻壓片, 包檸檬黃糖衣層。		
治療範圍	營養補充劑。		
包裝規格	30粒裝及60粒裝	失效期限	
儲運條件	避光密閉保存	負責期限	1年半

产品名称	咳 停 Ke Ting (現由延安藥厂生产)		
规格	衛生局暫行規定		劑量及 療 程
处	每十万片	每片	1日3—4次，1次1—3片。
	氯化鉍 2.5公斤	25.0 公絲	
方	乳酸鈣 4.5公斤	45.0 公絲	內在質量
	甘草浸膏 2.0公斤	20.0 公絲	
	甘草粉 5.0公斤	50.0 公絲	存在問題
	淀粉 3.5公斤	35.0 公絲	
	糊精 12.5公斤	125.0 公分	品種規格
	貝母流浸膏 2.0升	0.02毫升	
	远志流浸膏 3.0升	0.03毫升	
	桔梗流浸膏 3.0升	0.03毫升	
	大茴香油 200.0毫升	0.002毫升	
	滑石粉 1.35公斤	13.5 公絲	
片重0.3公分			
操作要点	称取甘草浸膏及甘草粉，混合均匀，通过100目篩。称取氯化鉍，乳酸鈣，淀粉及糊精，混合通过24目篩，拌加貝母、远志、桔梗三种流浸膏及甘草粉与浸膏的混合物，先用8目篩繼用10目篩过制粒，以50—60°C温度干燥。干粒中加大茴香油及滑石粉的混合物，混勻压片。		
治疗范围	适应咳嗽多痰		
包装规格	30, 60片	失效期限	
储运条件	密封保存	負責期限	2年

产品名称	基林片 Tabella Khellini (現由天平藥厂生产)																				
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程																		
			1日3次, 1次1—4片。																		
處 方	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>每十萬片</td> <td>每片</td> </tr> <tr> <td>基 林</td> <td>2.5公斤</td> <td>25.0公絲</td> </tr> <tr> <td>乳 糖</td> <td>5.0公斤</td> <td>50.0公絲</td> </tr> <tr> <td>淀 粉</td> <td>65.0公分</td> <td>0.65公絲</td> </tr> <tr> <td>滑 石</td> <td>0.5公斤</td> <td>5.0公絲</td> </tr> <tr> <td>硬 脂</td> <td>0.1公斤</td> <td>1.0公絲</td> </tr> </table>		每十萬片	每片	基 林	2.5公斤	25.0公絲	乳 糖	5.0公斤	50.0公絲	淀 粉	65.0公分	0.65公絲	滑 石	0.5公斤	5.0公絲	硬 脂	0.1公斤	1.0公絲	內在質量	
			每十萬片	每片																	
基 林	2.5公斤	25.0公絲																			
乳 糖	5.0公斤	50.0公絲																			
淀 粉	65.0公分	0.65公絲																			
滑 石	0.5公斤	5.0公絲																			
硬 脂	0.1公斤	1.0公絲																			
存在問題																					
			品種規格																		
			片重75公絲, 每片含基林25公絲。																		
操作要點	取基林及乳糖粉分別用80目篩篩過, 混合均勻, 取淀粉製成5%淀粉漿濕潤通過16目尼龍篩制粒, 70°C溫度, 干燥后, 再通過搖擺式顆粒機18目篩, 加入滑石粉及硬脂酸鎂, 混勻壓片。																				
治療範圍	适用于心絞痛, 支氣管哮喘等症。																				
包裝規格	100片	失效期限																			
儲運條件	密閉貯藏	負責期限	1½年																		


产品名称	感尔松片 Tabella Kursoni (曾由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程
处 方	感 尔 松	每十万片	每片
	淀 粉	0.5公斤	5.0公絲
方	糊 精	1.0公斤	10.0公絲
	硬脂酸鎂	5.0公斤	50.0公絲
		50.0公分	0.5公絲
			内在質量
			存在問題
			品种規格
			糖衣片重0.17公分。每片含感尔松 5公絲。
操作要点	称取主藥与輔料淀粉，白糊精充分拌和，用50%稀乙醇制成12目湿粒，用60°C干燥，干燥后，加硬脂酸鎂过14目篩，压片，包桔黄色糖衣，糖衣片重0.2公分左右。		
治疗范围	本品适用于治疗流行感冒		
包裝規格	20片、100片。		失效期限
儲运条件	免光密閉保存		負責期限
			2年

产品名称	元一宝塔糖片 Tabella Liu Yi Bao Ta Tang (現由九福藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處 方	磷酸哌嗪	每十萬片 20.0公斤	每片 0.2公分
	蔗糖粉	80.0公斤	0.8公分
	食用檸檬黃色素	30.0公分	0.3公絲
	桑子香精	30.0毫升	0.003毫升
內在質量 存在問題	汚片較多		
品種規格	每片重1公分,含磷酸哌嗪0.2公分(相當于哌嗪含水合物0.192公分)。		
操作要點	將碳酸哌嗪研細與蔗糖粉混合均勻,用糖漿及少量淀粉、膠粉為粘劑,并加入色素及香料制成70目顆粒,60°C溫度烘乾,加適量滑石粉壓片即得。		
治療範圍	驅除蟯蟲、蛔蟲。		
包裝規格	900片	失效期限	
儲存條件	乾燥,密閉保存。	負責期限	2年

产品名称	媽媽多片 Tabella Ma Ma Duo (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 1.日3次1次2—3片
處	每十萬片	每片	劑程
	王不留行子細粉 10.0公斤	100.0公絲	
方	磷氨基苯甲酸 1.0公斤	10.0公絲	內在質量
	干酵母粉 5.0公斤	50.0公絲	
	乳酸鈣 6.0公斤	60.0公絲	存在問題
	淀粉 0.32公斤	3.2公絲	
	硬脂酸鎂 0.2公斤	2.0公絲	
品種規格	糖衣片重0.45公分		
操作要點	<p>称取王不留行子細粉，鄰氨基苯甲酸，干酵母粉，乳酸鈣，分別研細篩過，混合均勻。用5%的淀粉漿及留行子粗篩頭煮漿加入攪拌濕潤，用搖濕機12目制成濕粒。移置烘箱中，用60—70°C溫度干燥。干燥后加入硬脂酸鎂用14目過篩，混勻壓片。包白色糖衣。</p>		
治療範圍	乳母之催乳與營養劑		
包裝規格	100片	失效期限	
儲運條件	密閉保存	負責期限	2年

产品名称	磺胺二甲氧基嘧啶片 Tabella Madriboni (現由天平藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
			1次1—2片
處 方	每十萬片	每片	內在質量 存在問題
	磺胺二甲 氧基嘧啶 淀粉 糊精 滑石粉 硬脂酸鎂	50.0公斤 0.5公分 2.5公斤 25.0公絲 1.0公斤 10.0公絲 0.5公斤 5.0公絲 0.5公斤 5.0公絲	
			品種規格
			片重0.55公分，每片含磺胺二甲氧 基嘧啶0.5公分
操作要點	稱取磺胺二甲氧基嘧啶及淀粉(1.5公斤)，分別篩過，混和均勻，用10%的淀粉漿濕潤14目制粒，80°C干燥后加入其余淀粉作崩解劑用，必要時得多加適量干淀粉。另加入滑石粉及硬脂酸鎂，混勻壓片。		
治療範圍	可用于軟組織，呼吸道和泌尿道的細菌感染。		
包裝規格	100片、1000片	失效期限	
儲運條件	15—35°C干燥貯藏	負責期限	3年

产品名称	胃瘍平片 Tabella Mebropini (現由天平藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
			1日4次, 1次2公 絲。
處	每十萬片		內在質量
	每片		
方	溴化甲烷阿托品	0.1公絲 2公絲	存在問題
	淀粉	4.0公絲 40.0公絲	
	蔗糖粉	1.5公絲 15.0公絲	品種規格
	糊精	1.5公絲 15.0公絲	
硬脂酸鎂	0.1公絲 1.0公絲	片重70公絲, 每片含 胃瘍平1公絲及2公 絲二種。	
操作要點	取淀粉、蔗糖粉及糊精分別篩過, 混和均勻。溴化甲烷阿托品加少量蒸溜水微溫溶解後在8%淀粉漿中和入輔料。因溴化甲烷阿托品有劇毒, 故混合必需均勻。用20目尼龍網過篩二次。70°C干燥後, 壓片。本品與眼接觸, 將使瞳孔擴大, 故操作時應注意防護。		
治療範圍	治療胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 胃酸過多, 胃炎, 慢性下痢, 痙攣性大腸炎等。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲運條件	密閉貯藏	負責期限	2年



产品名称	美卡明片 <i>Tabella Mecamylamini Hydrochlorici</i> (現由天平藥厂生产)																	
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程															
			初劑量1次 $\frac{1}{2}$ 片, 1日2次。繼續增 至1次1片。1日5片左右。															
處	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>每十萬片</td> <td>每片</td> </tr> <tr> <td>美卡明</td> <td>0.5公斤</td> <td>5.0公絲</td> </tr> <tr> <td>糊精</td> <td>6.0公斤</td> <td>60.0公絲</td> </tr> <tr> <td>淀粉</td> <td>1.0公斤</td> <td>10.0公絲</td> </tr> <tr> <td>硬脂酸鎂</td> <td>0.1公斤</td> <td>1.0公絲</td> </tr> </table>		每十萬片	每片	美卡明	0.5公斤	5.0公絲	糊精	6.0公斤	60.0公絲	淀粉	1.0公斤	10.0公絲	硬脂酸鎂	0.1公斤	1.0公絲	內在質量	
		每十萬片	每片															
美卡明	0.5公斤	5.0公絲																
糊精	6.0公斤	60.0公絲																
淀粉	1.0公斤	10.0公絲																
硬脂酸鎂	0.1公斤	1.0公絲																
方			存在問題															
			品種規格	片重75公絲, 每片含美卡明5公絲。														
操作要點	取糊精及淀粉分別篩過, 混合均勻。以美卡明用40%乙醇溶解後, 將糊精及淀粉濕潤, 通過20目搖擺式顆粒機制粒, 共篩二次70°C干燥。加入硬脂酸鎂, 混勻, 壓片。干燥後的顆粒防濕貯放。																	
治療範圍	可改善由於高血壓及心血管性疾患所引起的症狀。青光眼, 幽門狹窄症及患有尿毒的病人禁用。																	
包裝規格	100片		失效期限															
儲運條件	密閉貯藏		負責期限	1年半														

产品名称	亞硫酸氫鈉甲萘醌片 Tabella Menadioni Natrii Bisulfurosi(曾由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)	劑量及 療程	1次量1—2片,或遵医嘱。
处 方	每十万片	每片	內在質量 存在問題
	亞硫酸氫鈉甲萘醌		
	乳糖	0.2 公斤	2.0公絲
	淀粉	3.4 公斤	34.0公絲
	硬脂酸鎂	5.25公斤	52.5公絲
		80.0 公分	0.8公絲
		品种規格	片重0.08公分, 每片含亞硫酸甲萘醌2公絲。
操作要点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 称取乳糖及淀粉, 混和均匀, 篩过, 用10%淀粉漿潤湿, 用16目尼龙篩制成空白湿粒, 干燥。 2. 將亞硫酸氫鈉甲萘醌研成100目細粉, 加入硬脂酸鎂, 混合均匀, 篩过, 加入二倍量的空白顆粒, 攪拌均匀, 逐渐再加入空白顆粒, 至达需要量为止。 3. 顆粒混和均匀、压片、包庄均需相对室溫50%下进行。 4. 包裝材料必須用黄瓶、橡皮塞、鋁盖軋口。 		
治疗圍范	本品治疗阻塞性黄疸, 与其他缺乏維生素K所致的出血症等。		
包裝規格	50片、150片、1000片。	失效期限	
儲运条件	避光密閉保存。	負責期限	1年半

产品名称	复方薄荷合片 Trochisci Menthae Composita (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療 程
			每隔半至1小时含化1~2片
處		每十萬片	每片
	蔗 糖 粉	30.0 公斤	300.0公絲
方	淀 粉	2.2 公斤	22.0公絲
	糊 精	4.0 公斤	40.0公絲
	苯甲酸鈉	0.5 公斤	5.0公絲
	三氯叔丁醇	0.08公斤	0.8公絲
	薄 荷 腦	0.20公斤	2.0公絲
	桉 油	0.06公斤	0.6公絲
	茴 香 油	0.08公斤	0.8公絲
	液狀石腊	0.10公斤	1.0公絲
	硬脂酸鎂	適量	適量
內在質量			
存在問題			
品種規格	片重0.36公分		
操作要點	<p>称取苯甲酸鈉与淀粉充分混合，用40目篩篩过，称取蔗糖粉及糊精，分別篩过，共同混合均匀。用10%的淀粉漿湿潤制成12目顆粒，在60~70°C溫度干燥。將桉油，茴香油与液狀石腊混合，取薄荷腦及三氯叔丁醇溶解油中，均匀的加至顆粒中，再加入硬脂酸鎂，混勻压片。</p>		
治療範圍	本品适用于咽喉炎，扁桃體炎，口臭等。		
包裝規格	100片、1000片	失效期限	
儲運条件	密閉保存	負責期限	2年

产品名称	薄荷喉症片 <i>Tabella Menthae Gurgitis</i> (曾由信誼藥厂生产)			
规格	重編制剂规范(1954)		剂量及 疗程	每隔半至一小时含化1—2片徐徐 嚥下,或遵医嘱。
处 方	蔗糖粉	每十萬片 30.0公斤	每片 0.30公分	
	淀粉	5.5公斤	55.0公絲	
	糊精	4.5公斤	45.0公絲	品種規格
	苯甲酸钠	0.5公斤	5.0公絲	
	薄荷腦	0.1公斤	1.0公絲	
	薄荷油	0.2公斤	2.0公絲	
	桉叶油	60.0公分	0.6公絲	
	氯丁醇	60.0公分	0.6公絲	
	八角茴香油	80.0公分	0.8公絲	
	硬脂酸鎂	适量	适量	
操作要点	称取蔗糖粉(27.6公斤)、淀粉及糊精,分別以80目篩篩过,用含有苯甲酸钠的淀粉漿(8%)約2—2.5公斤湿潤,制成14—16目顆粒,干燥时温度不宜过高,在60°C左右。另称取薄荷腦,薄荷油,桉叶油,八角茴香油及氯丁醇,混合后在水浴中微溫溶化,加至蔗糖粉(1.4公斤)中,篩过2次制粒。二种顆粒合併,加0.6—1%的硬脂酸鎂,通过14目篩充分拌勻后压片,压片时細粉不宜太多,顆粒不宜太硬,否則片上易发生斑点。			
治疗范围	本品应用于喉痛,喉腫諸症。			
包裝規格	100片、1,000片。		失效期限	
儲运条件	避光密閉保存		負責期限	2年

产品名称	眠尔通片 Tabella Meproamati (Tabella Miltowni) (現由天平藥厂生产)		
規格	藥品 規 范 (1959)		劑量及 疗 程
处	每十万片	每片	1日4次, 1次1片。
	眠 尔 通 淀 粉 蔗 糖 粉 滑 石 粉 硬 脂 酸 鎂	20.0公斤 3.5公斤 1.0公斤 1.0公斤 0.2公斤	2.0公分 35.0公絲 10.0公絲 10.0公絲 2.0公絲
方			內在質量
			崩解較慢。
			存在問題
			品種規格
			片重0.25公分, 每片含眠尔通0.2公分。
操作要点	取眠尔通, 淀粉, 蔗糖粉分別篩过, 混合均匀, 用淀粉漿(60%)及糖漿(40%)混合漿湿润制成顆粒, 通过14目篩以50°C溫度干燥。干燥后, 加入滑石粉及硬脂酸鎂, 混勻压片。		
治疗范围	适用于精神忧虑緊張、神經不安等症。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件	密封貯藏	負責期限	2年

产品名称	乐疾宁片 Tabella 6-Mercaptopurini (現由信誼藥厂生产)		
规格	暫行规格		剂量及 疗程
处	每十万片	每片	一般对儿童及成人的开始剂量为每日每公斤体重2.5公絲，无白血球抑制現象，可增至5公絲或遵医嘱。
方	6-硫醇嘌呤 淀粉	2.5公斤 52.0公絲	
	糊精 硬脂酸鎂	2.5公斤 80.0公分	25.0公絲 0.8公絲
			內在質量 存在問題
			品种规格
			片重0.1公分，每片含6-硫醇嘌呤 25公絲
操作要点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將6-硫醇嘌呤置密閉器內研成細粉，加入淀粉0.5公斤及糊精，密閉混合。 2. 另用淀粉20公分制成淀粉漿(8%)湿潤用16—18目篩制粒，用70°C干燥。 3. 干粒加入硬脂酸鎂，密閉篩过混合，压片。压片时須密閉，同时須备有排风設备裝置。 4. 本品生产时必须加强劳动保护措施。 		
治疗范围	本品应用于急性白血病的治療。		
包装规格	100片		失效期限
储运条件	避光密閉于干燥阴凉处保存		負責期限 3年

产品名称	溴本辛片 Tabella Methanthelini Bromati (現由天平藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
處 方		每十萬片	每片
	溴本辛 糊精 樹膠粉 滑石粉 硬脂酸鎂	5.0公斤 0.8公斤 0.3公斤 0.4公斤 0.1公斤	50.0公絲 8.0公絲 3.0公絲 4.0公絲 1.0公絲
			內在質量 存在問題
			品種規格
			糖衣片重0.14公分，每片含溴本辛 50公絲。
操作要點	称取溴本辛、糊精及树膠粉，分別篩过，混合均匀，用淀粉漿(12%)作湿润剂，通过16目尼龙篩制粒，60°C干燥后，加入滑石粉及硬脂酸鎂，混匀，压片。包糖衣。本品易吸湿，水解变质，故制粒的醇濃度不宜低于70%。醇稀釋时应用蒸溜水，以免影响片剂的含量測定，本品对眼睛有刺激，接触后能放大瞳孔，故操作时应戴眼鏡，注意防护。		
治疗范围	本品适用于治疗胃潰瘍，胃炎，急性胰臟炎，胆硷性神經痙攣，多汗症，腸蠕 动过度，及膀胱炎，应激机能异常等。		
包裝規格	100片、1000片。	失效期限	
儲运条件	密封貯藏	負責期限	1 ½年

产品名称	甲硫氨酸片 Tabella Methionini (曾由信誼藥厂生产)														
规格	卫生局暂行标准	剂量及 疗程	1日3次, 每次1—2片												
处 方 (二)	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>每十万片</td> <td>每片</td> </tr> <tr> <td>甲硫氨酸</td> <td>50.0公斤</td> <td>0.5公分</td> </tr> <tr> <td>淀粉</td> <td>20.0公斤</td> <td>0.2公分</td> </tr> <tr> <td>滑石粉</td> <td>5.0公斤</td> <td>50.0公絲</td> </tr> </table>		每十万片	每片	甲硫氨酸	50.0公斤	0.5公分	淀粉	20.0公斤	0.2公分	滑石粉	5.0公斤	50.0公絲	内在質量 存在問題	
	每十万片	每片													
甲硫氨酸	50.0公斤	0.5公分													
淀粉	20.0公斤	0.2公分													
滑石粉	5.0公斤	50.0公絲													
		品种規格	片重0.7公分, 每片含甲硫氨酸 0.5公分												
操作要点	取甲硫氨酸及淀粉(6.0公斤)充分拌勻, 另取淀粉(8.0公斤)制成20%的淀粉漿, 加入制軟材, 用尼龙篩(20目)篩过, 以80°C温度干燥, 再加入干燥的淀粉(7.0公斤)及滑石粉, 混勻, 压片。														
治疗范围	預防和治疗肝臟疾病及肝臟解毒剂														
包裝規格	100片	失效期限													
儲运条件		負責期限	3年												

产品名称	甲硫氨基酸片 Tabella Methionini (現由九福藥厂生产)		
规格	衛生局暫行規定	劑量及 療程	1日3次, 每次1—2片
处 方 (一)	每十萬片 每片 甲硫氨基酸 50.0 公斤 0.5 公分 淀粉 13.75 公斤 0.135 公分 硬脂酸鎂 适量 适量	內在質量	
		存在問題	
		品种規格	片重0.64公分, 每片含甲硫氨基酸0.5公分
操作要点	称取甲硫氨基酸及淀粉, 分別篩过, 混合均匀。用15%的淀粉漿湿润, 置圓筒式顆粒机軋压二次, 篩过12目篩制成顆粒, 在60—70°C溫度干燥。干粒中另加干淀粉及硬脂酸鎂, 混匀压片。		
治疗范围	本品适用于肝炎, 及增加营养用。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件	避光保存	負責期限	3年

产品名称	美索因片 Tabella Methoini (曾由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		劑量及 療程
处	每十萬片	每片	1次1—2片, 須遵医嘱。
	美索因 5.0公斤	50.0公絲	
方	淀粉 3.0公斤	30.0公絲	內在質量 存在問題
	蔗糖粉 0.7公斤	7.0公絲	
	食用玫瑰紅色素 H1789 0.5公分	0.005公絲	品种規格
	硬脂酸鎂 80.0公分	0.8公絲	
操作要点	称取主藥与輔料糖粉, 淀粉混勻, 通过24目篩, 置攪拌机中以淀粉漿湿潤、制粒, 將色素用沸水溶解后, 過濾, 濾液与淀粉一起冲漿, 置搖摆机14—16目过篩兩次。括平, 檢查顆粒有无花斑, 否則繼續过篩至无花斑为止, 以65~70°C干燥, 通过16目篩, 加入滑料, 充分拌勻压片。		
治疗范围	本品用于瀉痢大发作。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件	密閉保存	負責期限	3年

产品名称	甲基睾丸素片 Tabella Methyltestosteroni (現由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程
			1日3次每次1—2片 或遵医嘱。
处	每十万片	每片	内在質量
	甲基睾丸素 0.5公斤	5.0公絲	
方	蔗糖粉 3.8公斤	38.0公絲	存在問題
	白糊精 1.1公斤	11.0公絲	
	淀粉 4.4公斤	44.0公絲	品种規格
	硬脂酸鎂 0.1公斤	1.0公絲	
操作要点	称取甲基睾丸素与糖粉混匀，通过24目篩兩次置攪拌机內，以淀粉漿制成軟材，用旋轉机軋至无漿斑点后，放置攪拌机內，加入糊精，繼續攪拌15—20分鐘，再通过不銹鋼搖摆机，16目尼龙篩網制粒，以60°C以下溫度干燥，干燥后加入滑料，充分拌和压制成片。		
治疗范围	本品应用于无辜或类无辜症狀內分泌性阳萎、发育迟緩、月經过多、泌乳过旺等症。		
包裝規格	20片		失效期限
儲运条件			負責期限 2年

产品名称	甲基硫氧嘧啶片 Tabella Methylthiouracili (曾由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		劑量及 疗 程
处	每十万片 每片		內在質量
	甲基硫氧嘧啶	5.0公斤 50.0公絲	
方	淀粉	4.2公斤 42.0公絲	存在問題
	硬脂酸鎂	0.2公斤 2.0公絲	
品种规格	片重 0.1 公分, 每片含甲基硫氧嘧啶 50公絲。		
操作要点	称取主藥与淀粉混和均匀后, 用 10% 淀粉漿制成軟材, 通过 14 目篩制粒, 以 70—75°C 干燥, 干燥后加硬脂酸鎂, 通过 16 目篩, 充分拌和均匀, 压制成片。		
治疗范围	本品应用于抗甲状腺机能亢进、毒性甲状腺腫, 切除术前的准备。		
包装规格	100 片	失效期限	
储运条件	置遮光的容器內, 密閉保存。	負責期限	3 年

产品名称	碳酸氢钠片(小苏打片) Tabella Natrii Bicarbonici (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療 程
处 方 (二)	碳酸氢钠 淀粉 硬脂酸镁	每十万片	每片
		50.0公斤	500.0公絲
		2.95公斤 适量	29.5公絲 适量
			內在質量 存在問題
			品种規格
	片重0.52公分， 每片含碳酸氢钠0.5公分。		
操作要点	称取碳酸氢钠，筛过，用15%的淀粉浆湿润以14目尼龙筛制粒（不宜用太热的淀粉浆），颗粒在50~60°C温度干燥，干粒中加入干燥淀粉，混匀压片。		
治疗范围	本品为制酸剂，可用以中和胃酸，并降低尿的酸度或使之硷化。		
包裝規格	1000片		失效期限
儲运条件	密閉保存		負責期限
			2年

产品名称	碳酸氢钠片(小苏打片) Tabella Natrii Bicarbonici (現由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		劑量及 疗 程
处 方 (一)	每十万片	每片	內在質量 存在問題
	碳酸氢钠 淀粉 硬脂酸镁	0.5公分 25.0公絲	
	50.0 公斤	2.5 公斤	品种規格
	0.25公斤	2.5公絲	片重0.52公分，每片含碳酸氢钠 0.5公分。
操作要点	称取碳酸氢钠与淀粉先混匀均匀后，用15%淀粉浆湿润，通过摇摆机尼龙筛14—16目制粒，以60—65°C干燥，干燥后加入硬脂酸镁及少量生粉，通过14目筛后，充分拌匀，先取少量颗粒先压制若干片，作崩解试验，合格后可正式压片。		
治疗范围	本品为制酸剂可用以中和胃酸，并降低尿的酸度或使之硷化。		
包装规格	1000片	失效期限	
储运条件	密闭保存	負責期限	3年

产品名称	复方碳酸氢钠片(苏打明片) Tabella Natrii Bicarbonici Composita (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 疗程
处	每十萬片 碳酸氢鈉 30.0 公斤 薄荷油 0.15 公斤 淀粉 2.5 公斤 硬脂酸鎂 适量	每片 300.0 公絲 15.0 公絲 25.0 公絲 适量	1 日 2—3 次, 1 次 1—12 片
			內在質量
方			存在問題
			品种規格
操作要点	称取碳酸氢鈉, 篩过, 用 15% 的淀粉漿湿潤用 14 目尼龙篩制粒。用 50°C 温度干燥后, 篩出部分細粉, 与薄荷油拌和后, 加入淀粉, 混勻, 再加至顆粒中。另加硬脂酸鎂, 混勻压片。		
治疗范围	本品为制酸剂, 可用以中和胃酸, 并降低尿的酸度或使之硷化。		
包裝規格	1000 片	失效期限	
儲运条件	密閉保存	負責期限	2 年

产品名称	含鹽清凉片 Tabella Natrii Chlorati Tartarici (曾由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 疗 程
处	每十萬片	每片	1次1—2片，用适量冷开水溶化后 作飲料。
	氯化鈉	70.0公斤	
方	酒石酸 (或枸橼酸)	9.5公斤	95.0公絲
	糖精鈉	0.7公斤	7.0公絲
操作要点	取酒石酸(或枸橼酸)及糖精鈉分別研細，低溫干燥，另將氯化鈉以100°C溫度干燥后与酒石酸、糖精鈉之細粉混合均勻，压片。		
治疗范围	本品在高溫車間工作人員用于补充鹽分并作解渴剂。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲运条件	密閉干燥保存	負責期限	1年半

产品名称	对氨基水杨酸钠片 Tabella Natrii Para-Aminosalicylici (現由信誼藥厂生产)																	
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療程															
處 方	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>每十萬片</td> <td>每片</td> </tr> <tr> <td>对氨基水楊酸鈉</td> <td>50.0 公斤</td> <td>0.5 公分</td> </tr> <tr> <td>糊精</td> <td>3.0 公斤</td> <td>30.0 公絲</td> </tr> <tr> <td>淀粉</td> <td>0.25 公斤</td> <td>2.5 公絲</td> </tr> <tr> <td>硬脂酸鎂</td> <td>0.75 公斤</td> <td>7.5 公絲</td> </tr> </table>			每十萬片	每片	对氨基水楊酸鈉	50.0 公斤	0.5 公分	糊精	3.0 公斤	30.0 公絲	淀粉	0.25 公斤	2.5 公絲	硬脂酸鎂	0.75 公斤	7.5 公絲	1次2—6片，須遵医嘱。
		每十萬片	每片															
对氨基水楊酸鈉	50.0 公斤	0.5 公分																
糊精	3.0 公斤	30.0 公絲																
淀粉	0.25 公斤	2.5 公絲																
硬脂酸鎂	0.75 公斤	7.5 公絲																
			內在質量															
			存在問題															
			品种規格															
	糖衣片重0.78公分，每片含对氨基水楊酸鈉0.5公分。																	
操作要点	<p>將主藥与糊精混和均匀，用7%淀粉漿湿潤制粒，低溫干燥压片。片外先用75%明膠糖漿，亞刺伯膠粉滑石粉，碳酸鈣包粉衣（最內层用樹膠漿，外层用明膠糖漿粉）再用墨灰糖漿包糖衣。</p> <p>注：包衣部分，輔粉用量因操作关系略有上下，片重也稍有增加。</p>																	
治疗范围	本品为結核病的口服治疗剂，适用于治疗急性滲出性肺結核与粘膜炎結核，如腸結核，喉头結核等症。																	
包裝規格	100片、500片、1000片。	失效期限																
儲运条件		負責期限	2年															

产品名称	新霉素片 Tabella Neomycini (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處	每十萬片 每片		遵醫囑
	新 霉 素(1mg⇔1000單位) 10.0 公斤 0.1 公分		
方	填充顆粒 24.65公斤 0.2465公分		內在質量
	硬脂酸鎂 0.35公斤 3.50 公絲		存在問題
	填充顆粒配制: 乳 糖 14.00公斤		品種規格
	淀 粉 14.00公斤 淀粉(冲漿) 适量		
操作要点	1. 空白顆粒制法: 称取乳糖与淀粉混和后用7%淀粉漿湿润成軟材, 通过搖摆机14—16目篩制粒, 以70—75°C干燥6小时左右, 湿顆粒宜制紧些, 2. 將主藥通过80目篩称定重量, 加入空白顆粒中, 先充分拌勻, 加入硬脂酸鎂, 繼續进行一次, 充分拌和在相对湿度50%室內压片。		
治疗范围	本品适用于治疗小儿腹瀉。		
包裝規格	50片	失效期限	1年
儲运条件	应密塞置于涼暗处		負責期限

产品名称	溴化新斯的明片 Tabella Neostigmini Bromati (曾由信誼藥厂生产)																	
規格	藥品規格 (1959)	劑量及 療程	1日3次, 1次1片, 或遵醫囑															
處 方	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>每十萬片</td> <td>每片</td> </tr> <tr> <td>溴化新斯的明</td> <td>1.5公斤</td> <td>15.0公絲</td> </tr> <tr> <td>淀粉</td> <td>5.7公斤</td> <td>57.0公絲</td> </tr> <tr> <td>糊精</td> <td>1.0公斤</td> <td>10.0公絲</td> </tr> <tr> <td>硬脂酸鎂</td> <td>80.0公分</td> <td>0.8公絲</td> </tr> </table>		每十萬片	每片	溴化新斯的明	1.5公斤	15.0公絲	淀粉	5.7公斤	57.0公絲	糊精	1.0公斤	10.0公絲	硬脂酸鎂	80.0公分	0.8公絲	內在質量 存在問題	
	每十萬片	每片																
溴化新斯的明	1.5公斤	15.0公絲																
淀粉	5.7公斤	57.0公絲																
糊精	1.0公斤	10.0公絲																
硬脂酸鎂	80.0公分	0.8公絲																
		品種規格	片重80公絲, 每片含溴化新斯的明15公絲。															
操作要點	將溴化新斯的明, 淀粉, 白糊精充分拌和, 以7—8%淀粉漿濕潤, 通過14目篩, 用65°C左右溫度干燥, 加入滑料, 通過16目篩, 充分拌勻壓片。																	
治療範圍	本品应用于腸道及膀胱弛緩, 重症肌無力, 手术后腹氣脹之防治																	
包裝規格	20片、100片。	失效期限																
儲運條件	密閉保存	負責期限	3年															

产品名称	菸酰胺片 Tabella Nicotinamidi (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品 規 范 (1959)		劑量及 疗 程
处 方 (一)	菸 酰 胺 淀 粉 糊 精	每十万片	每片
		5.0公斤	50.0公絲
		3.0公斤	30.0公絲
	2.0公斤	20.0公絲	內在質量
			存在問題
			品种規格
	片重0.1公分,每片含菸酰胺50公絲。		
操作要点	称取菸酰胺、淀粉、及糊精分別篩过，混合均匀，用醇4容与水6容的混合物湿润通过16目尼龙篩制粒，在50°C溫度干燥。干后加入适量硬脂酸鎂，混勻压片。		
治疗范围	本品适用于治疗癩皮病与因缺乏菸酰胺所引起的病症，如胃腸病与頸皮性精神病等。		
包裝規格	100片		失效期限
儲运条件	密閉保存		負責期限
			3年

产品名称	菸酰胺片 Tabella Nicotinamidi (曾由信誼藥厂生产)			
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程	
处 方 (二)	菸酰胺	每十萬片 10.0公斤	每片 0.1公分	1次1片, 或遵医嘱。
	淀粉	2.0公斤	29.0公絲	內在質量
	蔗糖粉	0.4公斤	4.0公絲	存在問題
	硬脂酸鎂	0.1公斤	1.0公絲	品种规格
操作要点	將菸酰胺与淀粉糖粉, 充分混和, 用10%淀粉漿制成軟材, 制成16目顆粒, 以70°C干燥, 加入硬脂酸鎂过16目篩压片。			
治疗范围	本品适用于治疗癩皮病与因缺乏菸酰胺所引起的病症, 如胃病腸病与癩皮性精神病等。			
包裝规格	100片	失效期限		
儲运条件			負責期限 3年	

产品名称	菸酰胺片 Tabella Nicotinamidi (曾由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
处 方 (三)	每十万片 每片		內在質量
	菸酰胺	5.0 公斤 50.0公絲	
	淀粉	2.92公斤 29.2公絲	
	蔗糖粉	0.8 公斤 8.0公絲	存在問題
	硬脂酸鎂	70.0 公分 0.7公絲	品种規格
	片重87公絲，每片含菸酰胺50公絲。		
操作要点	將菸酰胺、淀粉、糖粉、充分混和，用淀粉漿湿润，过14目篩網制成顆粒，以70°C干燥，加硬脂酸鎂过16目篩压片。		
治疗范围	本品适用于治疗癩皮病与因缺乏菸酰胺所引起的病症如胃腸病与癩皮性精神病等。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件		負責期限	3年

产品名称	水楊酸鈉片 Tabella Natrii Salicylici (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
處 方 (一)	水楊酸鈉	每十萬片 30.0公斤	每片 300.0公絲
	糊精	12.0公斤	120.0公絲
	枸橼酸	75.0公分	0.75公絲
			內在質量 存在問題
			品種規格
			片重0.42公分，每片含水楊酸鈉 0.3公分。
操作要點	称取水楊酸鈉，糊精(10公斤)及枸橼酸，分別篩過，混合均勻，用醇(75—80%)濕潤用16目尼龍篩制粒，篩過，在60—70°C溫度，干粒中加干糊精(2.0公斤)，混勻壓片。本品遇銅、鐵金屬將變色，應注意避免。濕粒放置，不宜超過1小時，以免結團。		
治療範圍	本品有鎮痛退熱作用，對風濕病有效，適用於治療急性風濕熱與風濕性關節炎等。		
包裝規格	1000片		失效期限
儲存條件	置遮光的容器內，密閉保存。		負責期限 1年半

产品名称	水楊酸鈉片 Tabella Natrii Salicylici (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療程
處 方 (二)	每十萬片	每片	每次2—6片, 可与碳酸氫鈉片同服, 以减少对腸胃的刺激
	水楊酸鈉 30.0公斤	0.3公分	
內 在 質 量 存 在 問 題	白糊精 2.0公斤	20.0公絲	粘冲
	蔗糖粉 6.0公斤	60.0公絲	
品 種 規 格	酒石酸 60.0公分	0.6公絲	片重 0.38 公分, 每片含水楊酸鈉 0.3 公分
	(或枸橼酸) 醇(60—70%) 3.0公斤	0.03公撮	
操作要点	取水楊酸鈉、白糊精、混和均匀, 以60—70% 稀醇(溶有枸橼酸)作为湿润剂, 以不銹鋼搖摆机通过尼龙網制粒, 以60°C干燥, 加入硬脂酸鎂及糖粉充分拌和后, 室內控制相对湿度75%, 机器先行預热后压片。		
治疗范围	本品有鎮痛退热作用, 对风湿病有效, 适用于治疗急性风湿热与风湿性关节炎等症。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲运条件	置遮光的容器內, 密閉保存。		負責期限 1½年

产品名称	克瀉痢宁片 <i>Tabella Oxyquinolini Sulfathalici</i> (現由天平藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療程
處	每十萬片 每片		內在質量
	8-羥喹啉酰胺磺胺噻唑		
方	25.0 公斤	250.0 公絲	存在問題
	滑石粉 1.5 公斤	15.0 公絲	
	淀粉 1.25 公斤	12.5 公絲	
	硬脂酸鎂 0.5 公斤	5.0 公絲	
	液狀石腊 0.3 公斤	3.0 公絲	品種規格
	片重 0.42 公分, 每片含克瀉痢宁 0.25 公分。		
操作要点	称取克瀉痢宁及淀粉, 分別篩过, 混合均匀, 用 12% 淀粉漿制粒, 应制成坚硬顆粒, 并充分干燥, 防止粘冲。顆粒干燥, 应在 50°C 以下溫度防止克瀉痢宁分解。加入硬脂酸鎂及液狀石腊, 混勻压片。		
治疗范围	本品治疗腸胃道感染, 适用于治疗細菌性痢疾及阿米巴痢疾。		
包裝規格	1000 片	失效期限	
儲运条件	干燥貯藏	負責期限	1 ½ 年

产品名称	胰酶片 Tabella Pancreatini (現由天平藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療程
處	每十萬片		內在質量 存在問題
	每片	1日3次, 每次1—2片。	
方	胰 酶	30.0公斤	所使用包腸溶衣的材料未能達到要求。
	硬脂酸鎂	0.1公斤	
方	品種規格		片重0.55公分, 每片含胰酶0.3公分。
	操作要點		
取胰酶用60目篩篩過, 以乙醇(70%)濕潤14目制粒, 用70°C溫度干燥, 加入硬脂酸鎂, 混勻壓片。包腸溶層糖衣。顆粒制成後, 應防濕貯存; 包腸溶層及糖衣時, 應注意干燥, 否則貯藏期間糖衣易變色及效價下降。			
治療範圍	本品適用於消化不良, 胰臟外分泌失調而引起的水瀉, 乳糜素及粘液缺乏症, 慢性腸炎等。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲運條件	15~35°C密閉干燥貯藏	負責期限	1½年

产品名称	扑热息痛片 Tabella Paracetamoli (現由九福藥厂生产)		
规格	卫生局暫行規定		剂量及 疗程
处 方	每十萬片		內在質量 存在問題
	每片	每片	
	扑热息痛 50.0公斤	扑热息痛 50.0公絲	
	糊精 1.5 公斤	糊精 15.0公絲	
	淀粉 6.0 公斤	淀粉 60.0公絲	
			品种规格
			片重: 0.585公分, 每片含扑热息痛0.5公分
操作要点	称取扑热息痛, 糊精及淀粉, 分別篩过, 混合均匀, 用18%的淀粉漿湿润, 通过14目尼龙篩制粒。在60—65°C温度干燥, 干粒篩过后加入硬脂酸鎂, 混与压片。		
治疗范围	本品适应解热鎮痛, 感冒等。		
包裝规格	100片		失效期限
儲运条件	密封保藏		負責期限 2年

产品名称	青霉素片 Tabella Penicillini (現由信誼藥厂生产)		
规格	衛生局暫行規定		剂量及 疗程
处	每十萬片	每片	本品应在空腹时服用, 1次2—4片, 每隔3小时服1次。
	青霉素G鈉鹽或鉀鹽 50亿单位	5万单位	
方	碳酸鈣	17.26公斤	0.1726公分
	磷酸氫鈣	5.75公斤	57.5公絲
	淀粉	4.39公斤	43.9公絲
	硬脂酸鎂	0.28公斤	2.8公絲
内在質量			
存在問題			
品种規格	片重0.28公分, 每片含青霉素G鈉鹽或鉀鹽50,000单位		
操作要点	取碳酸鈣、磷酸鈣、及淀粉混合均匀, 加10~12%淀粉漿圓筒式顆粒机制成空白填充顆粒, 再加入青霉素G鈉鹽或鉀鹽及硬脂酸鎂, 混合均匀压片。		
治疗范围	本品适用于对青霉素发生敏感的細菌所致的疾病, 如由鏈球菌、肺炎球菌、淋球菌、及多种酿膿球菌而发生的疾症, 如亞急性細菌性心內膜炎、扁桃體炎、耳、鼻、喉炎、齿膿腫、肺炎、猩紅熱、丹毒、瘡癤、淋病、化膿性關節炎及其他外科感染各症。		
包裝規格	12片	失效期限	1年半
儲送条件	密閉, 在干燥的凉处存放		負責期限

产品名称	青霉素含錠 Trochisci Penicillini (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處	每十萬片 每片		內在質量
	青霉素G鉀鹽或鈉鹽		
方	1億單位	1000單位	貯藏期中,效价下降。
	蔗糖粉 60.0公斤	0.6公分	
	羧甲基纖維素 3.0公斤	30.0公絲	存在問題
	食用檸檬黃色素 30.0公分	0.3公絲	
	香莢醛 42.0公分	0.42公絲	品种規格
	滑石粉 1.8公斤	18.0公絲	
硬脂酸鎂 0.6公斤	6.0公絲		
操作要点	取蔗糖粉与羧甲基纖維素混合均匀,以溶有食用檸檬黃色素的醇2公斤湿润,通过16目搖摆机制成填充顆料以70—75°C干燥后,加入青霉素香莢醛,滑石粉,及硬脂酸鎂,混合均匀,压片。		
治疗范围	本品适用于治疗口腔发炎,扁桃腺炎等。		
包裝規格	1000錠	失效期限	9月
儲运条件	密閉,在干燥的凉处存放。		負責期限

产品名称	青霉素V片(苯氧甲基青霉素片) Tabella Penicillini V (曾由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范(1959).		剂量及 疗程
处	每十萬片 每片		1晝夜6次(每4小时1次), 1次1片,須遵医嘱。
	青霉素V	100亿单位 10万单位	
方	乳糖	10.4公斤 - 0.104公分	內在質量 存在問題
	淀粉	16.5公斤 0.165公分	
	硬脂酸鎂	0.3公斤 3.0公絲	
	品种规格	片重0.3公分,每片含青霉素V 100,000单位。	
操作要点	取乳糖(10.4公斤)与淀粉(15.6公斤)充分混合,用淀粉(0.9公斤)制7%漿湿潤,用圓筒式旋轉軋粒机相当8目制粒,在真空干燥箱內100—120°C干燥。干燥后,称取23.7公斤,加入青霉素V及硬脂酸鎂,充分混合均匀,压片。		
治疗范围	同青霉素片。		
包装规格	12片。	失效期限	2年
储运条件	密封,在干燥的凉处存放		負責期限

产品名称	安血定片 Tabella Pentolini (現由九福藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療 程
處 方	潘托林 糊 精 硬脂酸鎂	每十萬片	每片
		2.0公斤	20.0公絲
		6.5公斤	65.0公絲
		適量	適量
			內在質量
			存在問題
			品種規格
			片重85公絲，每片含潘托林20公絲
操作要點	將糊精先制成16目顆粒，以70°C溫度干燥。取潘托林及適量硬脂酸鎂充分混合，加至糊精的干燥顆粒中，充分混勻，壓片。		
治療範圍	治療高血壓症，並可用於嚴重突變和惡性期高血壓。		
包裝規格	100片		失效期限
儲存條件	密閉保存		負責期限
			2年

产品名称	奋乃静片 Tabella Perphenazini (現由天平藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
			1日3—4次, 1次1—2片。
處 方		每十萬片	每片
	奋乃静	0.2公斤	2.0公絲
	淀粉	4.0公斤	40.0公絲
	糊精	1.5公斤	15.0公絲
	蔗糖粉	1.5公斤	15.0公絲
	硬脂酸鎂	0.1公斤	1.0公絲
			內在質量
			存在問題
			品種規格
			片重0.08公分, 每片含奋乃静2公絲。
操作要点	取淀粉、糊精及糖粉、分別篩过, 混和均匀。將奋乃静以稀釋法和入輔料中, 充分拌勻, 用10%淀粉漿潤湿, 以16目篩制粒, 70°C干燥后压片。		
治疗范围	适用于精神分裂症, 精神不安, 感情紊乱, 惡心嘔吐, 呃嘔等。		
包裝規格	100片		失效期限
儲运条件	密閉貯藏		負責期限
			1年半

产品名称	非那西汀片 Tabella Phenacetini (現由九福藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
			每次一片
处	非那西汀 淀粉 硬脂酸鎂	每十萬片	每片
方		30.0 公斤	300.0 公絲
		5.5 公斤	55.0 公絲
		適量	適量
			內在質量
			存在問題
			品種規格
			片重0.35公分，每片含非那西汀 0.3公分。
操作要點	称取非那西汀，淀粉，分別篩過，混和均勻，加17%的淀粉漿濕潤，制成14目濕粒。用70°C溫度干燥，干粒過篩后与硬脂酸鎂，混勻，壓片。		
治療範圍	解熱鎮痛。		
包裝規格	100片、1000片。		失效期限
儲運條件	密閉保藏		負責期限
			3年

产品名称	抗眩專片 <i>Tabella Phenagani Hydrochlorici</i> (現由九福藥厂生产)				
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程	遵照医嘱	
处	非那根 糊精	每十萬片 2.5 公斤 3.44公斤	每片 25.0公絲 34.4公絲	內在質量 存在問題	
方				品种規格	糖衣片重0.14公分，每片含抗眩專 25公絲。
操作要点	將糊精用20—40%乙醇制成空白顆粒，在60—70°C溫度干燥，加入非那根及适 量硬脂酸鎂，混合均匀，压片。包糖衣。				
治疗范围	本品适用于精神病患者及风疹等。				
包裝規格	100片		失效期限		
儲运条件	密閉保存		負責期限	2年	

产品名称	苯巴比妥片 <i>Tabella Phenobarbitadi</i> (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療程
處 方	每十萬片 每片 苯巴比妥 10.0公斤 100.0公絲 淀 粉 5.0公斤 50.0公絲 硬脂酸鎂 适量 适量	內在質量	每次1片
		存在問題	
		品種規格	片重0.15公分, 每片含苯巴比妥 0.1公分。
操作要點	取苯巴比妥用40目篩篩過, 淀粉用120目篩篩過, 充分混勻, 以10%的淀粉漿潤濕, 通過14目篩制成顆粒, 以70°C溫度干燥。干粒再通過14目篩, 加适量硬脂酸鎂, 壓片。		
治療範圍	本品為作用時間較長的鎮靜與安眠劑。		
包裝規格	100片~1000片。	失效期限	
儲運條件	密閉保存	負責期限	3年

产品名称	酚酞片 Tabella Phenolphthaleini (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療程
處 方	酚 酞 淀 粉 硬 脂 酸 鎂	每十萬片	每片
		10.0公斤	100.0公絲
		2.0公斤	20.0公絲
		適量	適量
			內在質量
			存在問題
			品種規格
			片重0.12公分, 每片含酚酞0.1公分。
操作要點	称取酚酞及淀粉, 分別篩过, 混合均匀, 用8%的淀粉漿湿润, 通过16目尼龙篩制粒。在60—70°C 溫度干燥, 干粒中加入適量硬脂酸鎂, 混勻压片。		
治療範圍	本品为輕瀉剂, 作用較持久, 能持續2—3天。		
包裝規格	100片		失效期限
儲運条件	密閉保存		負責期限
			3年

产品名称	苯丙磺片 Tabella Phenprofoni (現由天平藥厂生产)		
規格	藥品 規 范 (1959)		劑量及 療 程
處 方		每十萬片	每片
	苯 丙 磺 淀 粉 滑 石 粉 硬 脂 酸 鎂	50.0公斤 6.1公斤 3.4公斤 0.5公斤	500.0公絲 61.0公絲 34.0公絲 0.5公絲
			內 在 質 量
			存 在 問 題
			品 種 規 格
			片重0.6公分，每片含苯丙磺0.5公分
操作要点	取苯丙磺磨成80目細粉，加入淀粉及滑石粉混合均勻即可压片。本品甚易受潮，压片时車間保持相对湿度在70%以內。旋車車速調节在每分鐘25轉左右。		
治疗范围	本品适用于治疗麻瘋病症。		
包裝規格	100片、1000片。		失效期限
儲运条件	密閉干燥貯藏		負責期限 2年

产品名称	保泰松片 Tabella Phenylbutazoni (曾由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程
处	每十万片 每片		初服量每日2—6片,分3次服飯后服用,或遵医嘱。1日量不宜超过8片。
	保泰松	10.0公斤	
方	淀粉	6.4公斤	64.0公絲
	硬脂酸鎂	0.16公斤	1.4公絲
	内在質量 存在問題		
	品种規格		糖衣片重0.45公分,每片含保泰松0.1公分。
操作要点	將保泰松研成100目細粉,与淀粉(6.0公斤)混合均匀,另取淀粉(0.4公斤)制成10%的淀粉漿湿润后,通过16目尼龙篩制粒。干燥后,加入硬脂酸鎂,混勻压片。包大紅色糖衣。		
治疗范围	治疗风湿性关节炎。		
包装规格	50片、100片。		失效期限
储运条件	密封保存		負責期限 2年

产品名称	复方保泰松片 Tabella Phenylbutazoni Composita (曾由信誼藥厂生产)		
规格	卫生局暂行规定,		剂量及 疗程
			1日3次, 1次1—2片。并应在医师指示下服用。
处 方	每十万片	每片	内在質量 存在問題
	保泰松 12.5 公斤	0.125公分	
	氨基比林 12.5 公斤	0.125公分	品种規格
	淀粉 2.5 公斤	25.0 公絲	
	白糊精 8.75 公斤	87.5 公絲	糖衣片重0.6公分, 每片含保泰松及氨基比林各0.125公分。
	硬脂酸鎂 0.312公斤	3.12 公絲	
操作要点	<p>1. 称取保泰松与淀粉, 混和均匀, 以10%淀粉浆湿润, 通过摇摆机14—16目制粒, 以65—70°C干燥, 干燥后通过16目篩。</p> <p>2. 称取氨基比林, 糊精, 淀粉, 混和均匀, 同样以10%淀粉湿润, 通过14—16目制粒, 以65—70°C干燥, 加入硬脂酸鎂, 通过16目篩, 然后把1. 与2. 两种顆粒, 一起充分拌勻, 压片, 包白色糖衣。</p>		
治疗范围	本品应用于风湿痛, 效果較单独使用保泰松或氨基比林为佳。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件	密閉避光保存	負責期限	2年

产品名称	苯妥英钠片 Tabella Phenytoini Natriici (現由信誼藥厂生产)		
規格	中国藥典 (1953)		劑量及 療程
處	每十萬片	每片	1日3次,每次1片,或遵醫囑。
	苯妥英納 5.0公斤	50.0公絲	
方	糊精 0.7公斤	7.0公絲	內在質量
	滑石粉 0.7公斤	7.0公絲	存在問題
	硬脂酸鎂 60.0公分	0.6公絲	品種規格
			糖衣片重 0.12 公分, 每片含苯妥英 納 50 公絲
操作要點	取苯妥英納, 滑石粉, 及糊精混勻, 用水作濕潤劑, 用 16 目快速制粒, 開始以 低溫約 55°C 干燥 2 小时, 以后逐漸升至 80°C 干燥, 要求很干, 加入滑料通过 16 目 充分拌和压片, 片子外包白色糖衣, 至每片重 0.17 公分。 注: 中間品須經含量測定核算片重。		
治療範圍	本品适用于治疗癲間。		
包裝規格	100 片	失效期限	
儲運条件		負責期限	1 年半

产品名称	羧苯甲酰磺酰醋酰胺片(息拉米片) Tabella Phthalylsulfacetamidi (現由天平藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療 程
處	每十萬片	每片	內在質量
方	息拉米 50.0公斤	0.5公分	
	淀粉 3.0公斤	30.0公絲	存在問題
	硬脂酸鎂 0.5公斤	5.0公絲	品種規格
	片重0.53—0.54公分, 每片含息拉米0.5公分		
操作要點	取息拉米以60目篩篩過, 以淀粉漿(10%)潤濕, 用搖擺式顆粒機16目篩制粒。70°C溫度干燥后, 加入每片25公絲的干淀粉作為崩解劑, 及硬脂酸鎂為潤滑劑, 混合均勻, 壓片。		
治療範圍	本品適用於細菌性痢疾和腹瀉, 并可防止腸道手術前后的細菌感染。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲運條件	密閉貯藏	負責期限	3年

产品名称	羧苯甲酰磺胺噻唑片 <i>Tabella Phthalylsulfathiazoli</i> (現由天平藥厂生产)		
規格	中国藥典 (1953)	劑量及 疗程	1日3—4次, 1次2—5片
处 方	每十万片	每片	內在質量 存在問題
	羧苯甲酰 磺胺噻唑 淀粉 滑石粉 硬脂酸鎂	50.0公斤 0.5公分 1.0公斤 10.0公絲 1.5公斤 15.0公絲 0.5分斤 5.0公絲	
操作要点	称取羧苯甲酰磺胺噻唑, 篩过, 用10%淀粉湿潤16目尼龙篩制粒, 70°C干燥后加入滑石粉及硬脂酸鎂, 混匀压片。如在煤气烘房內干燥顆粒时, 甚易变色, 应注意勤翻动。干燥需充分, 否則压片时易粘冲, 甚至影响崩解度。		
治疗范围	本品适用于細菌性痢疾、腹瀉与防止腸道手术前后的感染。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲运条件	密闭避光貯藏	負責期限	3年

产品名称	漂粉精片 Tabella Piao Fen Jing (現由九福藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處	漂粉精 滑石粉	每十萬片	每片
		36.0公斤	360.0公分
方		4.0公斤	40.0公絲
		內在質量	
		存在問題	
		品種規格	片重0.4公分，每片含漂粉精0.36公分。
操作要點	稱取漂粉精及滑石粉，篩過，混勻，直接壓片。		
治療範圍	消毒水用		
包裝規格	500片		失效期限
儲運條件	密閉保存，防濕		負責期限
			1年半

产品名称	枸橼酸哌嗪片 Tabella Piperazini Citrici (現由信誼藥厂生产)			
规格	藥品规范 (1959)		劑量及	
处	每十萬片		療程	
	(0.48公分)	(0.16公分)		
方	枸橼酸哌嗪	18.0公斤	16.0公斤	
	淀粉	3.5公斤	3.32公斤	
	硬脂酸鎂	0.6公斤	0.24公斤	
	每片			
	(0.48公分)	(0.16公分)	內在質量	
	枸橼酸哌嗪	0.48公分	0.16公分	存在問題
	淀粉	35.0公絲	33.2公絲	品種規格
	硬脂酸鎂	6.0公絲	2.4公絲	
操作要点	將主藥粉碎成 60—80 目細度无結晶形态的粉末,按配比称定重量,与輔料,淀粉混勻,通过 24 目篩網,置攪拌机中,先攪拌 5 分鐘,用 10% 淀粉漿湿潤,然后以搖摆式顆粒机尼龙網篩过,以 65—70°C 干燥,干燥后,加入滑料通过 16 目篩,充分拌和均匀压片。			
治疗范围	本品为驅蟻虫、蛔虫的有效藥剂。			
包裝規格	50片、100片、500片或1000片。	失效期限		
儲运条件	密閉保存	負責期限	3年	

产品名称	米拉脱灵片 Tabella Pipradroli Hydrochlorici (現由信誼藥厂生产)		
规格	卫生局暂行标准		剂量及 疗程
			1日3次,每次1—2片,或遵医嘱。
处	米拉脱灵	每十万片 0.1 公斤	每片 1.0公絲
	蔗糖粉	6.5 公斤	65.0公絲
方	淀粉	1.6 公斤	16.0公絲
	玫瑰紅B (罗丹明B)	1.0 公絲	十万分之 一公絲
	硬脂酸鎂	0.1 公斤	6 公絲
内在質量			
存在問題			
品种規格	片重80公絲,每片含米拉脱灵1公絲		
操作要点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 取米拉脱灵研細通过 100 目篩,称取 0.1 公斤,加入通过 100 目篩的淀粉 1.5 公斤,混和均匀,再用 80 目篩过。 2. 加入蔗糖粉,在拌和机內,用玫瑰紅B水溶液制成軟材。通过搖摆式顆粒机 16—20 目尼龙篩制成湿粒。 3. 用 60°C 以下溫度干燥,再通过 14—16 目篩,加入硬脂酸鎂压片。 		
治疗范围	本品为中樞神經兴奋剂。		
包装規格	100 片	失效期限	
儲运条件	密閉置干燥阴凉处	負責期限	3 年

产品名称	去氢氢化可的松片 Tabella Prednisoloni (現由信誼藥厂生产)		
规格	卫生局暂行标准		剂量及 疗程
处	每十万片 每片		1日2—10片,分数次服,須遵 医嘱。
	去氢氢化可的松	0.5公斤 5.0公絲	
方	乳糖粉	4.25公斤 42.5公絲	內在質量
	淀粉	12.75公斤 0.1275公分	存在問題
	食用玫瑰紅色素 H1759	1.3公分 0.013公絲	品种規格
操作要点	先取乳糖粉, 淀粉混勻, 用溶有玫瑰紅食用色素的水溶液, 通过搖摆式顆粒机, 制成 14~16 目顆粒, 以 70—75°C 干燥后, 称取 1.534 公斤干燥顆粒与去氢氢化可的松及硬脂酸鎂充分拌勻, 压制成片。		
治疗范围	本品应用于休克气喘中风粒狀白血球缺乏症、风湿性心炎、急性风湿性关节炎、急性过敏反应、类风湿关节炎、慢性荨麻疹、秃发症、多形性紅斑、脫皮性皮炎等。		
包装規格	20片、100片。	失效期限	
儲运条件	避光密封保存	負責期限	3年

产品名称	去氢可的松片 Tabella Prednisoni (現由信誼藥厂生产)		
规格	卫生局暫行規定		剂量及 疗程
处	每十万片 每片		成人初服每日量为 30—50 公絲， 2—7 天后酌量減至 5—10 公絲，續 服 4—5 天或遵医嘱。
	去氢可的松	0.5 公斤 5.0 公絲	
方	乳糖粉	4.8 公斤 0.048 公分	內在質量
	淀粉	11.8 公斤 0.118 公分	存在問題
	硬脂酸鎂	0.16 公斤 1.6 公絲	
			品种規格
操作要点	先取乳糖粉及淀粉 1.16 公斤混勻，余下的淀粉制成漿糊，以此制成 16 目填充顆 粒，用 70—75°C 抽风干燥后，称出 1.534 公斤与去氢可的松及硬脂酸鎂充分拌勻， 压制成片。		
治疗范围	本品适用于风湿性关节炎，心臟炎、支气管哮喘、枯草热过敏性皮炎及急慢性 眼炎等症。		
包装规格	100 片	失效期限	
储运条件	避光密封保存	負責期限	3 年

产品名称	磷酸伯氨喹啉片(扑癩嗪片) Tabella Primaquini Phosphorici (現由天平藥厂产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療 程
處 方 (一)	每十万片	每片	1日1—2片。
	磷酸伯氨喹啉	1.32公斤	
	糊 精	4.5 公斤	45.0公絲
	滑石粉	0.5 公斤	5.0公絲
	硬脂酸鎂	0.1 公斤	1.0公絲
			內在質量
			存在問題
			品種規格
			制粒后含量下降3—5%，貯藏期間部份产品糖面現紅色斑点。
			糖衣片重0.13公分，每片含磷酸伯氨喹啉13.2公絲
操作要点	称取磷酸伯氨喹啉及糊精，分別篩过，混合均匀，用醇(35%)湿润16目制粒，宜制成較坚硬顆粒，充分干燥后加入滑石粉及硬脂酸鎂，混勻压片。包衣开始时，先用含有1%十二醇磺酸鈉的糖漿包制3—4层，可起潤滑作用，使糖漿加入后，在干燥过程中，片剂相互不粘結成团，易于分散。外层用碳酸鈣，滑石粉及糖漿包糖衣粉层。		
治疗范围	治疗間日癩，惡心瘧		
包裝規格	1000片		失效期限
儲运条件	密閉干燥貯藏		負責期限 1年半

产品名称	磷酸伯氨喹啉片(扑癩奎片) Tabella Primaquini Phosphorici (曾由信誼藥厂生产)			
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程	
处	磷酸伯氨喹啉	每十万片 1.32公斤	每片 13.2公絲	1日1—2片, 連服14天。
	淀粉	3.4公斤	34.0公絲	
方 (二)	糊精	2.28公斤	22.8公絲	内在質量
	硬脂酸鎂	70.0公分	0.7公絲	存在問題
			品种規格	片重0.14公分, 每片含磷酸伯氨喹啉13.2公絲
操作要点	称取主藥与輔料淀粉, 糊精等混和均匀后, 以10%淀粉漿作粘合剂, 以60—65°C干燥, 加入滑料, 通过16目充分拌勻, 压制成片, 包桔黄色糖衣至每片重0.2公分左右。			
治疗范围	本品适应于治疗間日瘧, 恶性瘧。			
包裝規格	1000片		失效期限	
儲运条件	避光密閉保存		負責期限	2年

产品名称		普魯本辛片 Tabella Propanthini Bromati (現由天平藥厂生产)	
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
			1日4次, 1次1片。
处	普魯本辛 乳糖 氫氧化鋁 滑石粉 硬脂酸鎂	每十万片	每片
		1.5公斤	15.0公絲
方		2.0公斤	20.0公絲
		3.0公斤	30.0公絲
		0.3公斤	3.0公絲
		0.1公斤	1.0公絲
			內在質量
			存在問題
			貯藏日久潮介变色
			品种規格
			糖衣片片重0.2公分, 每片含量普魯本辛15公絲。
操作要点	称取乳糖, 氫氧化鋁分別篩过, 混合均匀, 將普魯本辛溶于醇(30%)中作为湿润剂, 通过16目篩制粒, 在40°C温度干燥, 本品易吸湿, 故不能以水制粒。干燥顆粒吸湿后即变质, 难再行干燥, 故干粒应妥善貯藏。干粒中加入滑石粉及硬脂酸鎂, 混匀压片。普魯本辛有刺激性, 能使瞳孔放大, 操作时应注意防护。制片时应用蒸馏水, 以免影响片剂的含量測定。		
治疗范围	本品适用于消化性潰瘍胃炎胆汁分泌阻碍, 胰腺炎, 孕妇嘔吐多汗等症。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件	密封干燥貯藏	負責期限	1年半

产品名称	鹽酸吡多辛片(維生素B ₆ 片) Tabella Pyridoxini Hydrochlorici (現由九福藥厂生产)			
規格	藥品規范 (1959)		劑量及 療程	
處 方	鹽酸吡多辛	每十萬片 1.0公斤	每片 10.0公絲	內在質量 存在問題
	糊精	7.4公斤	74.0公絲	
	淀粉	3.0公斤	30.0公絲	品種規格
	硬脂酸鎂	適量	適量	
操作要點	称取鹽酸吡多辛, 糊精, 及淀粉, 分別篩过, 混合均匀。用乙醇(30%)湿润, 通过16目尼龙篩制粒, 在60°C温度中干燥, 干粒加入硬脂酸鎂, 混勻压片。			
治療範圍	本品可試用于妊娠期的惡心与嘔吐, 有时亦可用作癩皮病与他种营养不良症的輔助治療劑。			
包裝規格	100片	失效期限		
儲運条件	置遮光的容器內, 密閉保存	負責期限	3年	

产品名称	乙胺嘧啶片(息癩定片) Tabella Pyrimethamini (曾由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程
处 方 (一)	每十万片	每片	預防: 每星期1片。治疗: 每天 1片連服2天。遵医嘱。
	乙胺嘧啶	2.5公斤 25.0公絲	
	蔗糖粉	1.5公斤 15.0公絲	內在質量
	淀粉	4.5公斤 25.0公絲	
	硬脂酸鎂	80.0公分 0.8公絲	存在問題
			品种规格
			片重 0.08 公分, 每片含乙胺嘧啶 25 公絲及 6.25 公絲。
操作要点	称取主藥与輔料, 糖粉、淀粉、拌和均匀后, 以 5% 淀粉漿溫潤成軟材料, 然后通过 12~14 目篩網制粒, 以 65~70°C 通风干燥, 加入硬脂酸鎂, 通过 14—16 目充分拌勻, 压制成片。		
治疗范围	适用于間日癩, 惡性癩, 3 日癩的治疗和預防用。		
包裝规格	1500片		失效期限
儲存条件	密封保存		負責期限
			2 年

产品名称	乙胺嘧啶片(息癩定片) <i>Tabella Pyrimethamini</i> (現由天平藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療程
處方 (二)	每十萬片	每片	預防: 成人每星期4片, 兒童5—15岁2片5岁以下1片。 治療: 成人每次服8片兒童5—15岁每次4片5岁以下每次2片; 以上劑量均限服1次。
	乙胺嘧啶 0.625公斤	6.25公絲	內在質量 存在問題
	淀粉 3.84公斤	38.4公絲	
	蔗糖粉 2.5公斤	25.0公絲	品種規格
	桑子紅 1.0公分	0.01公絲	
操作要點	取乙胺嘧啶用14目篩篩過加入蔗糖粉, 混合均勻, 再加入10%桑子紅溶液, 用磨粉機磨成80目細粉。加入淀粉, 篩勻, 以淀粉漿(5%)濕潤, 先在圓筒式顆粒機篩過, 再經搖擺式顆粒機20目篩制粒。干燥后, 加入適量滑潤劑壓片。本品能引起鼻粘膜出血, 操作時應注意防護工作。		
治療範圍	适用于間日瘧、惡性瘧、3日瘧的治療和預防用, (本品能引起積蓄性中毒) 使用時應特別注意。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲運條件	密閉貯藏	負責期限	2年

产品名称	硫酸奎尼丁片 Tabella Quinidini Sulfurici (曾由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程
处	每十萬片	每片	1日5次, 1次1—2片。1日 量不得超过12片, 需遵医嘱。
	硫酸奎尼丁	20.0公斤	
方	淀粉	5.8公斤	58.0公絲
	糊精	2.0公斤	20.0公絲
	硬脂酸鎂	0.2公斤	2.0公絲
	內在質量	存在問題	
品种规格	糖衣片重0.5公分, 每片含硫酸奎尼丁0.2公分。		
操作要点	將硫酸奎尼丁淀粉, 白糊精, 置攪拌机中, 充分拌和, 加10%淀粉漿制成軟材, 制成12目顆粒, 70°C干燥, 干燥后加硬脂酸鎂过14目压片。		
治疗范围	本品应用于陣发性心动过速, 心房纖維性乱顫等症。		
包装规格	100片	失效期限	
储运条件	避光密閉保存	負責期限	2年

产品名称	重硫酸奎宁片 Tabella Quinini Bisulfurici (現由天平藥厂生产)																				
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程																		
處 方 (一)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>每十萬片</td> <td>每片</td> </tr> <tr> <td>重硫酸奎宁</td> <td>12.0公斤</td> <td>120.0公絲</td> </tr> <tr> <td>糊精</td> <td>1.5公斤</td> <td>15.0公絲</td> </tr> <tr> <td>蔗糖粉</td> <td>1.0公斤</td> <td>10.0公絲</td> </tr> <tr> <td>滑石粉</td> <td>6.5公斤</td> <td>65.0公絲</td> </tr> <tr> <td>硬脂酸鎂</td> <td>0.2公斤</td> <td>2.0公絲</td> </tr> </table>			每十萬片	每片	重硫酸奎宁	12.0公斤	120.0公絲	糊精	1.5公斤	15.0公絲	蔗糖粉	1.0公斤	10.0公絲	滑石粉	6.5公斤	65.0公絲	硬脂酸鎂	0.2公斤	2.0公絲	每次2—5片
		每十萬片	每片																		
重硫酸奎宁	12.0公斤	120.0公絲																			
糊精	1.5公斤	15.0公絲																			
蔗糖粉	1.0公斤	10.0公絲																			
滑石粉	6.5公斤	65.0公絲																			
硬脂酸鎂	0.2公斤	2.0公絲																			
			內 在 質 量																		
			存 在 問 題																		
			品 種 規 格																		
			糖衣片重0.25公分每片含重硫酸奎宁0.12公分																		
操作要點	<p>称取重硫酸奎宁及糊精，分別篩过，混和均匀，用10%的淀粉漿潤16目制粒顆粒干燥时先50°C左右干燥待水分减少后再逐渐升高温度，如驟然高温將使顆粒融化。干燥后，加入硬脂酸鎂，混匀压片，包糖衣。顆粒中水分含量应保持約10%，以免在包好糖衣后，因重硫酸奎宁失去了結晶水引起糖衣裂开。</p>																				
治疗範圍	本品对多种瘧原虫的裂殖体的作用很强，适用于治疗各型瘧疾。																				
包裝規格	1000片		失效期限																		
儲运条件	密閉貯藏		負責期限 3年																		

产品名称	重硫酸奎宁片 <i>Tabella Quinini Bisulfurici</i> (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
			每次 2—5 片
處 方 (二)	重硫酸奎宁	每十萬片 12.00 公斤	每片 0.12公分
	淀粉	6.00 公斤	60公絲
	滑石粉 外加	1.00 公斤	10公絲
	樹膠粉	1.40 公斤	14公絲
	干淀粉 外加	1.466 公斤	14.66公絲
	硬脂酸鎂	0.0666公斤	0.666公絲
內在質量			
存在問題			
品種規格	糖衣片重0.35公分，含重硫酸奎宁0.12公分。		
操作要點	<p>將二硫酸奎宁加入淀粉，滑石粉，拌勻，用 8% 樹膠漿以搖擺機 12 目篩制成濕顆粒。用 70°C 以下溫度干燥，干燥后加入干淀粉及硬脂酸鎂過篩，充分混和均勻，壓片，包白色糖衣。</p> <p>注意事項：干燥溫度必須嚴格控制在 70°C，以免結晶水失去后，壓片時產生裂片現象。</p>		
治療範圍	本品對多種瘧原蟲的裂殖體的作用很強。適用於各型瘧疾。		
包裝規格	1000 片	失效期限	
儲運條件	密閉貯藏	負責期限 3 年	

产品名称	大黄碳酸氢钠片(大黄苏打片) <i>Tabella Rhei et Natrii Bicarbonici</i> (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程 每次1—3片。
處 方	每十萬片 每片 大黃粉 15.0 公斤 150.0 公絲 碳酸氫鈉 15.0 公斤 150.0 公絲 薄荷油 0.088公斤 0.88公絲 硬脂酸鎂 適量 適量		內在質量 存在問題
			品種規格 片重0.3公分,含大黃及碳酸氫鈉各 0.15公分。
操作要點	1. 称取大黃粉及碳酸氫鈉,分別篩過,混合均勻,用55—65°C溫水濕潤制粒。 2. 顆粒在60°C干燥,篩出部分細粉,將薄荷油拌和,加入干粒中混勻,再將硬脂酸鎂加入混和,壓片即得。		
治療範圍	本品為制酸、健胃劑。		
包裝規格	1000、2000片。	失效期限	
儲運條件	密閉保存	負責期限	2年

产品名称	核黄素片 (維生素 B ₂ 片) Tabella Riboflavini (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品 規 范 (1959)		劑量及 療 程
处 方	每十萬片	每片	1日3次, 每次半片至2片。
	核 黃 素 蔗 糖 糊 精 淀 粉 硬 脂 酸 鎂	0.5公斤 1.7公斤 2.5公斤 6.5公斤 適量	
			內在質量
			存在問題
			品種規格
			片重0.112公分, 每片含核黃素5公絲。
操作要点	称取核黄素、蔗糖粉、糊精、及淀粉, 分別篩过, 混合均匀, 再过篩一次, 用醇(50%)湿润, 通过16目尼龙篩制粒。在55—65°C温度干燥, 干粒过篩后, 加入适量硬脂酸鎂, 混勻压片。		
治疗范围	本品适用于防治因核黄素缺乏而致的病症常与維生素B合用, 眼科方面, 用以治疗疱疹性角膜炎, 結膜炎, 臉緣炎等。		
包裝規格	1000片、2000片	失效期限	•
儲运条件	置遮光的容器內, 密閉保存。	負責期限	2年

产品名称	潤腸果子糖片 Tabella Run Chang Gun Zi Tang (現由九福藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定	劑量及 疗程	1次1—2片，1日2次，早晨及 臨睡前服。
处	每十万片。 每片 酚酞 62.5公絲 枸橼酸 4.0公絲 楊梅紅色素 适量 香蕉香精 适量 蔗糖粉 300.0公絲	內在質量	
方		存在問題	
		品种規格	片重0.367公分，含酚酞62.5公絲。
操作要点	称取酚酞，枸橼酸，及蔗糖粉，分別篩过，混合均匀，用适量淀粉漿湿润以14目篩制粒。60°C溫度干燥后，加入适量潤滑剂，楊梅紅色素及香蕉香精的混合物，混勻压片。		
治疗范围	本品适应大便秘結及习惯性便秘		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件	密閉保藏	負責期限	2年

产品名称	复方路丁片 <i>Tabella Rutini Composita</i> (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)	劑量及 療程	1次1~2片
處 方	每十萬片	每片	內在質量 存在問題
	路丁 2.0公斤	20.0公絲	
	抗坏血酸 2.0公斤	20.0公絲	品種規格
	淀粉 7.0公斤	70.0公絲	
	糊精 1.5公斤	15.0公絲	
	硬脂酸鎂 适量	适量	片重0.126公分, 每片含路丁与抗坏血酸各20公絲。
操作要点	称取路丁、抗坏血酸、淀粉及糊精, 分別篩过, 混合均匀, 用乙醇(45%)湿润, 通过16目尼龙篩制粒, 顆粒宜較松。用60—75°C溫度干燥, 干粒篩过后加入硬脂酸鎂, 混匀压片。		
治疗范围	食物中缺乏路丁与微血管, 脆性的增加有关, 对于高血压症的伴有微血管脆弱者, 应用本品可有助于預防出血, 但并不能降低血压, 本品亦可用于預防因缺乏路丁或抗坏血酸而致的其他出血情况。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲运条件	置遮光的各器內, 密閉保存	負責期限	2年

产品名称	糖精钠片 Tabella Saccharini Natrici (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥片 規 范 (1959)		劑量及 疗 程
处	每十萬片 (20公絲) (40公絲)		內 在 質 量 存 在 問 題
	糖精鈉	2.0公斤 4.0 公斤	
方	蔗糖粉	6.0公斤 12.0 公斤	品 种 規 格
	硬脂酸鎂	80.0公分 0.12公斤	
方	每 片 (20公絲) (40公絲)		片重 0.08 及 0.16 公分, 每片含 糖精鈉 20 公絲及 40 公絲。
	糖精鈉	20.0公絲 40.0 公絲	
蔗糖粉	60.0公絲 0.12公分		
硬脂酸鎂	0.8公絲 1.2 公絲		
操作要点	取糖精鈉及蔗糖粉篩过, 拌勻, 加入煮沸常水适量, 混和均匀, 制成顆粒, 以70°C 以下溫度干燥, 干粒加入硬脂酸鎂过 16 目篩, 篩勻后进行压片。		
治疗范围	食糖代用品。		
包裝規格	2500片	失效期限	
儲运条件		負責期限	

产品名称	干酵母片 <i>Tabella Saccharomycetis Sicci</i> (現由九福藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程
处 方 (一)	每十万片 每片		内在質量
	干酵母粉 30.0 公斤	0.3 公分	
	蔗糖粉 12.5 公斤	0.125 公分	存在問題
	白陶土 1.25 公斤	0.0125 公分	品种規格
	片重0.55公分每片含干酵母0.3公分		
操作要点	將50—60°C温开水加入干酵母粉中拌和,在圓筒式制粒中篩一次,然后在搖盪机中制成16目顆粒。顆粒在60°C干燥。將蔗糖粉及高嶺土过篩混勻加入干顆粒中压片。		
治疗范围	本品为消化不良、脚气病、神經炎、癩皮病与其他因缺乏維生素B所引起疾病的輔助剂。		
包裝規格	100片、1000片。	失效期限	
儲运条件	密闭,在凉处保存	負責期限	1½年

产品名称	干酵母片 <i>Tabella Saccharomyces Sicci</i> (現由信誼藥厂生产)			
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療程	
處	每十萬片	每片	1日3次, 每次3—4片。	
方	干酵母粉 30.0公斤	0.3公分		
(二)	碳酸鈣	6.0公斤	60公絲	內在質量 存在問題
	蔗糖粉	17.0公斤	0.17公分	
	硬脂酸鎂	0.24公斤	2.4公絲	品種規格
	滑石粉	0.53公斤	5.3公絲	
	檸檬油	2.0公分	0.02公絲	
	桔子油	6.0公分	0.06公絲	
	香草精	8.0公分	0.08公絲	片重0.54公分, 含干酵母0.3公分。
操作要點	先称取配比量酵母粉 38.33% 与糖粉 92% 和碳酸鈣混和, 通过 24 目篩, 使混勻, 置攪拌机內加入适量冷开水, 攪拌 15 分鐘, 然后繼續掺入酵母粉 61.67%, 并繼續攪拌 10 分鐘, 先通过 20 目篩, 再通过 22 目篩, 以 70°C 温度干燥, 干燥后加入香料, 滑粉与硬脂酸鎂, 及 8% 糖粉, 通过 16 目篩拌勻压片。			
治疗范围	本品为消化不良, 脚气病, 神經炎, 癩皮病与其他因缺乏維生素B所引起疾病的輔助剂。			
包裝規格	100片、1000片。	失效期限		
儲运条件	密封, 在凉处保存。	負責期限	2年	

产品名称		干酵母片(食母生片) <i>Tabella Saccharomycetis Sicci (Zymasun)</i> (現由信誼藥厂生产)	
規格	藥品規格(1959)		劑量及 療程
處		每十萬片	每片
	干酵母粉	20.0 公斤	0.2 公分
方	蔗糖粉	15.0 公斤	0.15 公分
	碳酸鈣	4.0 公斤	40.0 公絲
	硬脂酸鎂	0.16 公斤	1.6 公絲
	滑石粉	0.4 公斤	4.0 公絲
	檸檬油	6.0 公分	0.06 公絲
	桔子油	6.0 公分	0.06 公絲
	香葉素	8.0 公分	0.08 公絲
			內在質量
			存在問題
			品種規格
			片重 0.4 公分, 每片含干酵母 0.2 公分。
操作要點	同干酵母片		
治療範圍	本品為消化不良, 食慾減退, 與其他缺乏維生素乙所引起疾病的輔助劑。		
包裝規格	300片、1000片。	失效期限	
儲運條件		負責期限	2 年

产品名称	水楊酰胺片 Tabella Salicylamidi (現由九福藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定	劑量及 療程	每次1—3片
處 方	每十萬片	每片	內在質量 存在問題
	水楊酰胺 30.0公斤 淀粉 1.5公斤 硬脂酸鎂 適量	0.3公分 15.0公絲 適量	
		品種規格	片重0.315公分，每片含水楊酰胺 0.3公分
操作要點	稱取水楊酰胺及淀粉，分別篩過，混和均勻，另以10%的淀粉漿濕潤，通過16目尼龍篩制粒，用60°C以下溫度干燥，干粒中加入硬脂酸鎂，混勻壓片。		
治療範圍	本品有鎮痛與退熱作用，適用於風濕痛，神經痛頭痛，肌肉痛，關節痛與感冒等。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲存條件	密閉保存	負責期限	2年

产品名称	散尔痛片 Tabella Sanertong (現由九福藥厂生产)			
规格	卫生局暫行規定		劑量及 疗程	1日3次, 1次1片。
处 方	非那西汀	每十万片 25.0公斤	每片 250.0公絲	內在質量 存在問題
	异丙基安替比林	15.0公斤	150.0公絲	
	咖啡因	5.0公斤	50.0公絲	品种規格
	淀粉	9.0公斤	90.0公絲	
	硬脂酸鎂	适量	适量	片重0.54公分, 每片含非那西汀 0.25公分, 异丙基安替比林0.15公 分, 咖啡因0.05公分。
操作要点	称取非那西汀, 异丙基安替比林及咖啡因, 分別篩过, 混合均匀, 用15%的淀粉漿湿润, 通过16目尼龙篩制粒。在30°C温度干燥后, 干粒中加入适量硬脂酸鎂, 混勻压片。			
治疗范围	本品适用于头痛、牙痛、神經痛、月經痛及伤风感冒等症。			
包裝規格	100片	失效期限		
儲运条件	密封	負責期限		2年

产品名称	复方五味子片 <i>Tabella Schizandra Chinensis Baill Composta</i> (現由延安藥厂生产)																		
規格	衛生局暫定規格		劑量及 療程																
處	<table border="1"> <tr> <td>每十萬片</td> <td>每片</td> </tr> <tr> <td>五味子流浸膏25.0升</td> <td>0.25毫升</td> </tr> <tr> <td>甘草粉14.5公斤</td> <td>14.5公絲</td> </tr> <tr> <td>氯化亞鈷50.0公分</td> <td>0.5公絲</td> </tr> <tr> <td>鹽酸硫酸胺0.5公斤</td> <td>5.0公絲</td> </tr> <tr> <td>甘油磷酸鈣2.5公斤</td> <td>25.0公絲</td> </tr> <tr> <td>甘油磷酸鐵2.5公斤</td> <td>25.0公絲</td> </tr> <tr> <td>滑石粉1.25公斤</td> <td>12.5公絲</td> </tr> </table>		每十萬片	每片	五味子流浸膏25.0升	0.25毫升	甘草粉14.5公斤	14.5公絲	氯化亞鈷50.0公分	0.5公絲	鹽酸硫酸胺0.5公斤	5.0公絲	甘油磷酸鈣2.5公斤	25.0公絲	甘油磷酸鐵2.5公斤	25.0公絲	滑石粉1.25公斤	12.5公絲	每日早上中午各服一次， 每次服2片。
每十萬片	每片																		
五味子流浸膏25.0升	0.25毫升																		
甘草粉14.5公斤	14.5公絲																		
氯化亞鈷50.0公分	0.5公絲																		
鹽酸硫酸胺0.5公斤	5.0公絲																		
甘油磷酸鈣2.5公斤	25.0公絲																		
甘油磷酸鐵2.5公斤	25.0公絲																		
滑石粉1.25公斤	12.5公絲																		
方			內在質量																
			存在問題																
			品種規格																
			片重0.25公分																
操作要点	取五味子流浸膏加入甘草粉中，混和，烘干，磨細。称取甘油磷酸鈣，甘油磷酸鐵及鹽酸硫酸胺，与五味子甘草的混合粉混和，用氯化亞鈷水溶液及乙醇适量湿润，通过8目篩，用60—70°C温度干燥。干粒用24目眼过，加入滑石粉，混匀，压片，包糖衣。																		
治疗范围	适应病后衰弱，营养不良，用腦过度或感受刺激以及神經炎所引起的精神不安神經过散，头痛，头晕，失眠、恐惧，精神与肉体易感疲劳等神經衰弱症狀。																		
包裝規格	100片、1000片	失效期限																	
儲运条件	密閉保存	負責期限	2年																

产品名称	息宁痛片 Tabella Sinetoni (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處	每十萬片	每片	內在質量
	非那西汀 25.0 公斤	0.25公分	
方	異丙烷安替比林 15.0 公斤	0.15公分	存在問題
	丙稀基異丙烷醋基脲素 6.0 公斤	60.0 公絲	
	咖啡因 4.0 公斤	40.0 公絲	品種規格
	淀粉 18.0 公斤	0.18公分	
	十二醇磺酸鈉 0.12公斤	1.2 公絲	
硬脂酸鎂 0.6 公斤	6.0 公絲	片重 0.68 公分。	
操作要点	將異丙烷安替比林, 非那西汀、丙稀基異丙烷醋基脲素、咖啡因、淀粉, 混和均勻, 以厚濃度淀粉漿加十二醇磺酸鈉濕潤, 制成軟材, 用旋轉式機軋制, 顆粒宜緊, 以 60—65°C 干燥, 压片。		
治療範圍	本品适用于頭痛发热、筋肌酸痛、风湿肌痛、牙痛、創傷痛、及婦女月經痛等。本品亦适用于因流行性感冒而致发热, 但如遇稽留性或間歇性发热病人应請医师治疗。		
包裝規格	50 片	失效期限	
儲运条件		負責期限	2 年

产品名称		鏈霉素片 Tabella Streptomycini (現由信誼藥厂生产)	
規格	暫行标准	劑量及 療程	須遵医嘱
处	每十万片 每片	內在質量 存在問題	
	鏈霉素(硫酸鹽) (1mg-G-1000单位)		
方	填充顆粒	22.15公斤 0.2215公分	片重0.35公分, 每片含鏈霉素硫酸鹽0.1公分
	硬脂酸鎂	0.35公斤 0.0035公分	
	填充顆粒配制		
	碳酸鈣	24.40公斤	
	磷酸氫鈣	5.76公斤	
	淀粉	5.04公斤	品种規格
	淀粉(冲漿)	1.86公斤	
操作要点	將碳酸鈣、磷酸氫鈣、淀粉拌和均匀, 用12—13%淀粉漿湿潤, 置旋轉式圓筒机制粒, 以102—120°C真空干燥, 干燥后篩除細粉备用, 称取鏈霉素, 硬脂酸鎂及干燥的填充顆粒, 充分拌和均匀, 进行压片。 注意压片时室內控制湿度, 保持干燥。		
治疗范围	本品应用于小儿腹瀉等症。		
包裝規格	每瓶 50片	失效期限	2年
儲运条件	密塞置于凉暗处	負責期限	

产品名称	索灭痛片 Tabella Sui Mei Tong (現由九福藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處	每十萬片	每片	1次1片
	安基比林 15.0公斤	150.0公絲	
方	非那西汀 15.0公斤	150.0公絲	內在質量
	咖啡因 5.0公斤	50.0公絲	存在問題
	苯巴比妥 1.5公斤	15.0公絲	品種規格
	淀粉 5.0公斤	50.0公絲	
	糊精 4.5公斤	45.0公絲	
			片重0.5公分。
操作要點	称取氨基比林, 非那西汀, 咖啡因, 苯巴比妥, 淀粉及糊精, 分別篩过, 混合均匀。加入适量的水, 在橡膠車上压成薄片, 放置过夜, 在顆粒机上制成12目顆粒, 加适量潤滑剂, 压制成片。或用湿制法, 氨基比林加淀粉适量, 用18%淀粉漿制成14目顆粒。非那西汀及咖啡因加淀粉及糊精适量, 亦用18%淀粉漿12目篩制粒。分別干燥, 混合后加适量潤滑剂, 压制成片。		
治疗范围	本品适应于, 头痛, 牙痛, 妇女經痛, 神經痛及感冒。		
包裝規格	20, 100, 500, 1000片	失效期限	
儲运条件	密封保藏	負責期限	3年

产品名称	磺胺嘧啶片 Tabella Sulfadiazini (現由九福藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療程
處 方 (一)	每十万片	每片	常用量, 1次1—2片。極量1次4 片, 限于第1次飽和劑量时使用。
	磺胺嘧啶 50.0公斤	500.0公絲	
	淀粉 2.0公斤	20.0公絲	內在質量
	硬脂酸鎂 适量	适量	存在問題
			品種規格
操作要点	称取磺胺嘧啶及淀粉, 分別篩过, 混合均匀, 用8%的淀粉漿湿润, 在圓筒式顆粒机中軋二次, 篩过用12目篩制成顆粒。用70—80°C温度干燥, 干粒篩过后, 另加入少許干淀粉及硬脂酸鎂, 混勻压片。		
治疗范围	本品适用于治疗溶血性鏈球菌, 腦膜炎球菌、肺炎球菌、肺炎杆菌鼠疫杆菌与葡萄球菌等的感染疾病及細菌性痢疾等。		
包裝規格	100片、1000片	失效期限	
儲运条件	置遮光的容器內, 密閉保存	負責期限	3年

产品名称	磺胺嘧啶片 Tabella Sulfadiazini (現由信誼藥厂生产)		
規格	藥品規格 (1959)		劑量及 療程
處 方 (二)	磺胺嘧啶	每十萬片 50.0公斤	每片 0.5公分
	淀粉	5.0公斤	50.0公絲
	硬脂酸鎂	0.5公斤	5.0公絲
			內在質量 存在問題
			品種規格
			片重0.55公分，每片含磺胺嘧啶 0.5 公分。
操作要點	<p>称取磺胺嘧啶与淀粉充分攪拌均匀，加10%淀粉漿制成軟材，通过14目篩網制成顆粒，以80°C干燥之(不能太干燥)，干燥后加硬脂酸鎂过16目篩混和均匀。压制成片。本品崩解时較長，可用十二醇磺酸鈉 0.3%作为輔助崩解剂。</p>		
治療範圍	本品适用于治疗因葡萄球菌腦膜炎球菌、肺炎球菌、肺炎杆菌、溶血性鏈球菌、淋球菌等的感染疾病。		
包裝規格	100片、500片、1000片		失效期限
儲運条件	避光密閉保存		負責期限 3年

产品名称	磺胺二甲基嘧啶片 Tabella. Sulfadimidini (現由天平藥厂生产)		
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程
處 方	每十萬片	每片	第1次服4片，以後每小時服2片。
	磺胺二甲基嘧啶	50.0公斤	
	淀粉	2.0公斤	20.0公絲
	滑石粉	0.6公斤	6.0公絲
	硬脂酸鎂	0.4公斤	4.0公絲
			內在質量
			存在問題
			品種規格
			片重0.53—0.54公分，每片含磺胺二甲基嘧啶 0.5公分
操作要點	<p>称取磺胺二甲基嘧啶，篩过，用10%淀粉漿湿润14目制粒，80—90°C干燥后，加入滑石粉及硬脂酸鎂，混匀压片。在制粒时如用輕質原料，需攪拌結实，并尽量减少細粉，以免粘附片面，造成字迹不清，如用重質原料，制粒攪拌時間应适当縮短，以免过分坚硬，影响崩解度。</p>		
治療範圍	适用于溶血性鏈球菌腦膜炎。球菌，肺炎球菌，葡萄球菌等感染疾患。		
包裝規格	1000片		失效期限
儲存条件	密封貯藏		負責期限
			3年

产品名称	磺胺甲氧基吡嗪嗪片 Tabella Sulfamethoxy pyridazini (現由天平藥厂生产)		
规格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
处	每十萬片 每片		內在質量
	磺胺甲氧基吡嗪嗪	50.0公斤 0.5公分	
方	淀粉	3.3公斤 33.0公絲	存在問題
	滑石粉	1.0公斤 10.0公絲	
	硬脂酸鎂	0.5公斤 5.0公絲	
品种规格	片重0.55公分，每片含磺胺甲氧基吡嗪嗪0.5公分		
操作要点	称取磺胺甲氧基吡嗪嗪，磨成60目細粉，与淀粉混勻，用10%的淀粉漿湿潤14目制粒，顆粒不宜太硬，以免影響崩解。干燥的顆粒中，加入滑石粉及硬脂酸鎂，混勻压片。		
治疗范围	本品适用于治疗溶血性鏈球菌，腦膜炎球菌，肺炎球菌，肺炎杆菌，鼠疫杆菌、葡萄球菌等的感染疾病。		
包装规格	1000片	失效期限	
储运条件	密閉貯藏	負責期限	3年

产品名称	磺胺脒片 Tabella Sulfamidini (現由九福藥厂生产)		
規格	中国藥典 (1953)		劑量及 疗程
处 方 (一)	每十万片	每片	1次2—8片
	磺胺脒 50.0 公斤	500.0公絲	
	糊精 1.25 公斤	12.5公絲	
淀粉 3.75 公斤	37.5公絲	內在質量	存在問題
硬脂酸鎂 适量	适量	品种規格	
操作要点	称取磺胺脒，糊精，及淀粉，分別篩过，混合均匀，用10%的淀粉漿湿润12目篩制粒以12目篩70°C温度干燥，篩过后，加入硬脂酸鎂，混勻压片。		
治疗范围	本品适用于治疗細菌性痢疾，与防止腸道手术前后的細菌感染。		
包裝規格	100、1000片	失效期限	
儲运条件	密閉保存	負責期限	3年

产品名称	磺胺脒片 Tabella Sulfamidini (現由信誼藥厂生产)		
规格	中国藥典 (1953)		劑量及 疗 程
处 方 (二)	磺 胺 脒 淀 粉 硬 脂 酸 鎂	每十万片 50.0公斤 7.2斤公 0.34公斤	每片 0.5公分 72.0公絲 3.4公絲
			內在質量 存在問題
			品种規格
			片重0.56公分，每片含磺胺脒 0.5 公分。
操作要点	称取磺胺脒，淀粉，混合均匀后，用15%淀粉漿，通过14目篩網制成顆粒，以60°C干燥，加入滑料，通过14—16目充分拌勻，压制成片。因本品崩解时較長，可用十二醇磺酸鈉0.3%作輔助崩解劑。		
治疗范围	本品适用于治疗細菌性痢疾与防止腸道手术前后的細菌感染。		
包裝規格	500片 1000片裝		失效期限
儲运条件	避光密閉保存		負責期限 3年

产品名称	●磺胺噻唑片 Tabella Sulfathiazoli (現由信誼藥厂生产)		
規格	中国藥典 (1953)		劑量及 疗 程
处		每十萬片	每 片
方	磺胺噻唑	50.0公斤	0.5公分
(一)	淀 粉	4.7公斤	47.0公絲
	硬脂酸鎂	0.35公斤	3.5公絲
			內在質量 存在問題
			品种規格
			片重0.55公分，每片含磺胺噻唑 0.5公分
操作要点	称取磺胺噻唑与淀粉拌和均匀，以15%淀粉漿潤湿，通过14目制成顆粒，以75—80°C干燥，加入滑料，通过14目篩过，拌勻，压制成片。		
治疗范围	治疗适用于治疗因葡萄球菌、腦膜炎球菌，肺炎球菌、肺炎杆菌、溶血性鏈球菌，淋球菌等的感染疾病。		
包裝規格	500片、1000片		失效期限
儲运条件	避光密閉存保		負責期限 3年

产品名称	磺胺噻唑片(消洽龙片) Tabella Sulfathiazoli (現由信誼藥厂生产)		
規格	中国藥典 (1953)		劑量及 疗 程
处	每十萬片 每片		1次1—4片, 1日量斟酌狀況 決定。
方	磺胺噻唑	50.0 公斤	0.5 公分
	淀 粉	4.70 公斤	47.0 公絲
(二)	硬脂酸鎂	0.325 公斤	3.25 公絲
	內在質量		存在問題
品种規格		片重0.55公分, 每片含磺胺噻唑 0.5公分。	
操作要点	取磺胺噻唑及淀粉(4.2公斤)分別篩过, 混合均匀。另取淀粉(0.5公斤)制成15% 淀粉漿, 湿润后通过搖摆机12—14目篩制粒, 以75—80°C干燥后, 加入硬脂酸鎂, 混勻, 压片。		
治疗范围	本品治疗溶血性鏈球菌、腦膜炎球菌、肺炎球菌、葡萄球菌、大腸杆菌、淋球 菌、痢疾杆菌与鼠疫杆菌等的感染疾病。		
包裝規格	20片、100片、500片。		失效期限
儲运条件			負責期限 3年

产品名称	磺胺噻唑片 Tabella Sulfathiazoli (現由九福藥厂生产)		
規格	中国藥典 (1953)	剂量及 疗 程	1次1—2片
处 方 (三)	每十万片	每片	內在質量 存在問題
	磺胺噻唑 50.0公斤	500.0公絲	
	淀粉 3.5公斤	35.0公絲	
	硬脂酸鎂 适量	适量	品种規格
	片重0.535公分，每片含磺胺噻唑0.5公分。		
操作要点	称取磺胺噻唑及淀粉，分別篩过，混合均匀，用10%的淀粉漿湿润，在圓筒式顆粒机中軋二次，篩过用12目篩制成顆粒。用70—80°C溫度干燥，干粒篩过后，另加入少許干淀粉及硬脂酸鎂，混勻压片。		
治疗范围	本品治疗溶血性鏈球菌，腦膜炎球菌，肺炎球菌，葡萄球菌，大腸杆菌淋球菌，痢疾杆菌与鼠疫杆菌等的感染疾病。		
包裝規格	100、1000片	失效期限	
儲运条件	密閉保存	負責期限	3年

产品名称	磺胺硫脲片 Tabella Sulfathiourea (現由天平藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處 方	每十萬片	每片	內 在 質 量
	每十萬片	每片	
	磺胺硫脲 50.0公斤	0.5公分	存 在 問 題
	淀 粉 3.5公斤	35.0公絲	
	滑 石 粉 1.0公斤	10.0公絲	品 種 規 格
	硬脂酸鎂 0.5公斤	5.0公絲	
操作要點	<p>称取已過篩的磺胺硫脲，用10%淀粉漿濕潤，制成14目顆粒，以80°C干燥，然後與滑石粉，硬脂酸鎂及每片以20公絲的干燥淀粉作為崩解劑，混和壓片。本品原料有輕質重質，用藥量應隨原料性質不同而適當增減。</p>		
治療範圍	本品適用於治療泌尿系統感染疾患，以及泪囊炎，眼瞼緣炎，角膜炎等。		
包裝規格	1000片		失效期限
儲存條件	密閉避光貯藏		負責期限 3年

产品名称	合霉素片 Tabella Syntomyeini (現由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		
处 方	合 霉 素	每十萬片	每片
	淀 粉	25.0 公斤	0.25 公分
	硬脂酸鎂	5.0 公斤	50.0 公絲
		0.25 公斤	2.5 公絲
			劑量及 疗 程
			每 4 小时 2—4 片, 体溫正常后, 改为 每 8 小时 2—4 片, 仍須服 3—4 日。但 全疗程不得超过一星期。或遵医嘱。
			內在質量 存在問題
			裂片
			品种規格
			糖衣片重 0.56 公分, 每片含合霉素 0.25 公分。
操作要点	取合霉素細粉与淀粉混合均匀, 另用 15% 淀粉漿湿润, 用 14—16 目篩制粒, 以 70°C 干燥, 压片, 包白色糖衣。		
治疗范围	本品适用于治疗伤寒、斑疹伤寒、革蘭氏阴性杆菌的腸道傳染、与泌尿道傳染、 异型肺炎等症。		
包裝規格	20 片, 100 片	失效期限	2 年
儲运条件	密封在凉处保存	負責期限	

产品名称	无味合霉素片 <i>Tabella Syntomycini Palmitici</i> (現由延安藥厂生产)		
規格	衛生局审批規格		劑量及 疗程
处	每十萬片	每片	每4小时服4片, 体温正常后, 改为每8小时服2—4片, 仍須服3—4日, 但全疗程不得过一星期, 或遵医嘱。
	无味合霉素 25.0 公斤	250.0 公絲	
方	碳酸鈣 8.0 公斤	80 公絲	內在質量 存在問題
	淀粉 20.0 公斤	200 公絲	
	滑石粉 2.5 公斤	25.0 公絲	色澤較差
	硬脂酸鎂 0.25 公斤	2.5 公絲	
	吐溫40 0.1 公斤	1.0 公絲	
	酒精 适量	适量	
品种規格	片重0.6公分, 每片含无味合霉素0.25公分		
操作要点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 称取无味合霉素, 碳酸鈣及部分淀粉(約7.5公斤), 加吐溫40的乙醇溶液(將吐溫溶于乙醇約750ml中)混和, 加15%淀粉漿湿润, 拌和, 通过20目篩制粒, 用60°C干燥。 2. 干顆粒用20目篩篩过, 加淀粉, 滑石粉及硬脂酸鎂, 拌勻, 再用16目篩篩过, 压片。 		
治疗范围	伤寒、副伤寒, 斑疹伤寒, 百日咳异型肺炎, 細菌性痢疾, 腸炎及革蘭氏阴性細菌所引起的腸道傳染及泌尿道傳染等症。		
包裝規格	20片、100片。	失效期限	2年
儲运条件	密封保存	負責期限	

产品名称	鹽酸硫胺片(維生素 B ₁ 片) Tabella Thiamini Hydrochlorici (現由九福藥厂生产)														
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療程												
處	<table border="0"> <tr> <td>鹽酸硫胺</td> <td>每十萬片</td> <td>每片</td> </tr> <tr> <td>糊精</td> <td>1.0公斤</td> <td>10.0公絲</td> </tr> <tr> <td>硬脂酸鎂</td> <td>5.8公斤</td> <td>58.0公絲</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.2公斤</td> <td>2.0公絲</td> </tr> </table>	鹽酸硫胺	每十萬片	每片	糊精	1.0公斤	10.0公絲	硬脂酸鎂	5.8公斤	58.0公絲		0.2公斤	2.0公絲	內在質量	1次半—3片。
		鹽酸硫胺	每十萬片	每片											
糊精	1.0公斤	10.0公絲													
硬脂酸鎂	5.8公斤	58.0公絲													
	0.2公斤	2.0公絲													
存在問題															
方			品種規格												
操作要點	<p>称取糊精，篩过，用乙醇(20~40%)湿润用16目篩制粒，在60~70°C溫度干燥。过篩后称取鹽酸硫胺及硬脂酸鎂混入干粒內，压片。糊精顆粒不宜太坚硬，以免压成的片上产生斑痕。</p>														
治疗范围	<p>本品适用于防治因缺乏維生素 B₁ 所引起的病症，如脚气病，多发性神經炎，厌食，嘔吐与脚气病性，心臟病等。</p>														
包裝規格	100片 1000片	失效期限													
儲运条件	置遮光的容器內，密閉保存	負責期限	2年												

产品名称	新維生素 B ₁ 片 Tabella Thiamini Propyl Disulfidi (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處	每十萬片	每片	1次1—4片, 或遵醫囑。
方	新維生素 B ₁ 0.5公斤	5.0公絲	
	糊精 6.5公斤	65.0公絲	內在質量 存在問題
	硬脂酸鎂 70.0公分	0.7公絲	品種規格
	糖衣片重 0.165 公分, 每片含新 維生素 B ₁ 5 公絲。		
操作要點	稱取糊精, 篩過, 用醇(50%)濕潤, 以16目篩制粒, 以60°C以下干燥后, 稱取 空白填充顆粒6.43公斤, 加入新維生素B ₁ 及硬脂酸鎂, 混勻后, 壓片。包白色糖衣。		
治療範圍	本品用于防治因缺乏維生素 B ₁ 所引起的病症, 特別适用于体内有硫胺酶的患者。		
包裝規格	100片、1000片。	失效期限	
儲運條件	密閉保存	負責期限	2年

产品名称	甲状腺片 Tabella. Thyroidi (現由天平藥厂生产)					
規格	中国藥典 (1953)			剂量及 疗程	每日服30—250公絲	
处 方 (一)	每十万片		每片		內在質量 存在問題	貯藏期內含量易下降
	甲狀腺	3.0 公斤	6.0 公斤	30.0 公絲		
	蔗糖粉	3.5 公斤	7.0 公斤	35.0 公絲	70.0 公絲	品种規格 片重170及85公絲,每片含 甲狀腺分60公絲,30公絲 二种
	糊精	1.0 公斤	2.0 公斤	10.0 公絲	20.0 公絲	
	淀粉	1.3 公斤	2.6 公斤	13.0 公絲	26.0 公絲	
	硬脂酸鎂	0.05 公斤	0.1 公斤	0.5 公絲	1.0 公絲	
操作要点	甲狀腺用80目过篩和入蔗糖粉、糊精、淀粉內,充分拌和篩勻,以8%淀粉漿潤湿,用16目篩过。60°C以下低溫干燥,压片。本品避見日光以免含量下降。					
治疗范围	治疗甲狀腺机能减退,粘性液水腫与克汀病等。					
包裝規格	100片、1000片。			失效期限		
储运条件	密闭避潮避光貯藏			負責期限	2年	

产品名称	甲状腺片 Tabella Thyroidi (曾由信誼藥厂生产)		
规格	中国藥典 (1953)		剂量及 疗程
			1日3次,每次1—3片,或遵医嘱。
处 方 (二)	每十万片	每片	内在質量
	甲狀腺 3.0 公斤	30.0公絲	
	蔗糖粉 6.72公斤	67.2公絲	存在問題
	淀粉 6.72公斤	67.2公絲	
	硬脂酸鎂 0.12公斤	1.2公絲	品种規格
			片重 0.16公分, 每片含甲狀腺 30 公絲。
操作要点	將甲狀腺磨成細粉, 通过 120 目篩, 与糖粉, 淀粉, 混和均匀, 通过 24 目篩, 置攪拌机用 10% 淀粉漿湿润制粒, 以 65°C 左右温度干燥, 加入硬脂酸鎂, 通过 14—16 目篩, 充分拌勻压片。		
治疗范围	治疗甲狀腺机能减退、粘液性水腫与克汀病等。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件		負責期限	2 年

产品名称	替比昂片(氨硫脲片) Tabella Tibioni (曾由信誼藥厂生产)														
规格	卫生局暂行规定		剂量及 疗程	需遵医嘱											
处	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>每十万片</td> <td>每片</td> </tr> <tr> <td>氨硫脲</td> <td>5.0公斤</td> <td>50.0公絲</td> </tr> <tr> <td>淀粉</td> <td>4.2公斤</td> <td>42.0公絲</td> </tr> <tr> <td>硬脂酸鎂</td> <td>90.0公分</td> <td>0.公絲</td> </tr> </table>		每十万片	每片	氨硫脲	5.0公斤	50.0公絲	淀粉	4.2公斤	42.0公絲	硬脂酸鎂	90.0公分	0.公絲	内在質量	
			每十万片	每片											
氨硫脲	5.0公斤	50.0公絲													
淀粉	4.2公斤	42.0公絲													
硬脂酸鎂	90.0公分	0.公絲													
存在問題															
方			品种規格	片重90公絲，每片含氨硫脲50公絲											
操作要点	称取氨硫脲淀粉，充分混和，用10%淀粉漿制成軟材，过14目篩，以70°C干燥，加入硬脂酸鎂过16目篩压片。														
治疗范围	本品适用于抗結核性麻瘋病。														
包裝規格	100片	失效期限													
儲运条件	密閉保存	負責期限		2年											

产品名称	妥拉苏林片 Tabella Tolazolini Hydrochlorici (現由天平藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處	每十萬片 每片		內在質量
方	妥拉苏林	25.0公絲	存在問題
	淀粉	80.0公絲	
	糊精	40.0公絲	品種規格
	硬脂酸鎂	2.0公絲	
操作要点	取淀粉及糊精分別篩过，混合均匀，將妥拉苏林溶解于适量蒸溜水中（每10公斤原料加水5—6公斤）加到淀粉及糊精混合物中，潤湿后，通过16目尼龙篩，制成顆粒，60°C以下干燥后，加入硬脂酸鎂，压片。包糖衣。本品极易吸湿，生产过程中，应注意。		
治疗范围	适用于手足发紺，四肢麻痺，动脉硬化閉塞，血栓閉塞性脉管炎，灼性神經痛，血栓性靜脉炎等。		
包裝規格	100片、1000片。	失效期限	
儲运条件	密閉貯藏	負責期限	2年

产品名称	三醋酚汀片(通舒片)Tabella Triacephentini (Tong Show Pain) (現由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程
处	每十万片	每片	1次服1—4片,临睡前頓服。
	三醋酚汀	1.0公斤	
方	蔗糖粉	6.0公斤	60.0公絲
	淀粉	3.8公斤	38.0公絲
	硬脂酸鎂	0.1公斤	1.0公絲
	內在質量		
			存在問題
			品种規格
	片重0.11公分,每片含三醋酚汀10公絲		
操作要点	称取通过80目篩的三醋酚汀、淀粉(3.0公斤),及通过100目篩的淀粉,密閉混合均匀。取淀粉(0.8公斤)制成5%淀粉漿,湿润后經16目尼龙篩制成顆粒,以70°C温度干燥,加入硬脂酸鎂,混合均匀,压片。三醋酚汀对眼粘膜有刺激作用,严重时可发生紅腫,操作时应注意防护。		
治疗范围	本品为緩下剂,适用于一般性大便秘結及习惯性便秘。		
包裝規格	10片、100片、1000片。	失效期限	
儲运条件		負責期限	3年

产品名称	三溴片 Tabella Tribromati (現由九福藥厂生产)														
規格	藥品規範 (1959)		劑量及 療 程												
處	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>每十萬片</td> <td>每片</td> </tr> <tr> <td>溴化鉀</td> <td>12.0公斤</td> <td>0.12公分</td> </tr> <tr> <td>溴化鈉</td> <td>12.0公斤</td> <td>0.12公分</td> </tr> <tr> <td>溴化銨</td> <td>6.0公斤</td> <td>0.06公分</td> </tr> </table>		每十萬片	每片	溴化鉀	12.0公斤	0.12公分	溴化鈉	12.0公斤	0.12公分	溴化銨	6.0公斤	0.06公分	內在質量	每次1—3片
			每十萬片	每片											
溴化鉀	12.0公斤	0.12公分													
溴化鈉	12.0公斤	0.12公分													
溴化銨	6.0公斤	0.06公分													
存在問題															
方		品種規格	片重0.3公分每片含溴化鉀，溴化鈉各0.12公分，溴化銨0.06公分												
操作要點	<p>稱取溴化鈉，溴化銨用14目尼隆篩篩過。溴化鉀用10目鐵絲網篩過。(不用漿做顆粒) 立即在60°C干燥二小時，混合均勻，壓片即得。</p> <p>本品遇銅與鐵質等要變色。本品不適宜暴露在空氣中。</p>														
治療範圍	本品有鎮靜作用，適用於治療神經衰弱，歇斯底里症與舞蹈病等。														
包裝規格	100片、1000片、2000片	失效期限													
儲運條件	置遮光的容器內，密閉保存	負責期限	2年												

产品名称	三甲双酮片 <i>Tabella Trimethadioni</i> (曾由信誼藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程
处	每十万片 三甲双酮(結晶) 15.0公斤 滑石粉 1.0公斤	每片 150.0公絲 10.0公絲	每日量1—2公分,每次2片1日3—7次。儿童六岁以下,服量1—2片,1日3次。需要时酌增适当剂量,应作个别规定,服藥期应每周或每月定期作白血球計数檢查,以了解病情,考虑用藥。本品須在医师指导下服用。
方			內在質量 存在問題
			片重0.16公分
操作要点	將三甲双酮用16目篩后,加入滑石粉拌勻直接压片,操作时溫度应在20°C左右进行。		
	治療範圍 本品应用于輕微性癲癇小发作。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件	本品应密閉保存放置30°C以下阴凉处	負責期限	未定

产品名称		三磺片 Tabella Trisulfas (曾由信誼藥厂生产)	
规格	藥品规范 (1959)		劑量及 療程
处	磺胺噻唑	每十萬片	每片
	磺胺嘧啶	16.7公斤	0.167公分
方	磺胺嘧啶	16.7公斤	0.167公分
	磺胺双甲基嘧啶	16.7公斤	0.167公分
	淀粉	2.0公斤	0.02公分
	硬脂酸鎂	0.4公斤	4.0公絲
			內在質量 存在問題
			品種規格
			片重0.55公分。每片含磺胺噻唑0.167公分，磺胺嘧啶0.167公分，磺胺双甲基嘧啶0.167公分。
操作要点	先称取磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺双甲基嘧啶置攪拌机內，攪拌9分鐘左右，然后以8%淀粉漿湿润成軟材，再通过16目尼龙篩網制粒，以85~90°C干燥，干后加入滑料，通过14~16目篩充分拌勻压片。		
治疗范围	本品有治疗，敗血症、产褥热、扁桃腺炎、流行性腦膜炎、淋病、腹膜炎、細菌性痢疾創伤傳染，及其它适应于磺胺类的細菌感染疾病。		
包裝規格	20片		失效期限
儲运条件			負責期限 3年

产品名称	維生素 B ₁₂ 片 Tabella Vitamini B ₁₂ (現由九福藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規格	劑量及 療程	1日3次, 1次1片
處 方	每十萬片	每片	內在質量 存在問題
	維生素 B ₁₂ 糊精	250.0公絲 6.0公斤	
方			品種規格
			糖衣片 0.12 公分, 每片含維生素 B ₁₂ 2.5 微克。
操作要點	稱取維生素 B ₁₂ , 溶解于 95% 醇約 500 毫升中, 用此醇溶液濕潤經 60 目篩過的糊精, 通過 16 目尼龍篩, 制成顆粒。在 50—60°C 溫度干燥, 干粒過篩后, 加入硬脂酸鎂, 混勻壓片。包制糖衣。		
治療範圍	本品适用于惡性貧血、脂痢, 营养性或其他巨紅血球性貧血。		
包裝規格	100、1000 片	失效期限	
儲運條件	密閉保存	負責期限	2 年

产品名称	复合维生素B片 Tabella Vitamini B Complicis (现由九福藥厂生产)		
规格	藥品规范 (1959)		剂量及 疗程
处	每十万片	每片	1次1~3片
	鹽酸硫胺 0.3 公斤	3.0公絲	
方	核黄素 0.15公斤	1.5公絲	內在質量
	鹽酸吡多辛 20.0 公分	0.2公絲	
方	菸酰胺 1.0 公斤	10.0公絲	存在問題
	混旋泛酸鈣 0.1 公斤	1.0公絲	
	淀粉 7.1 公斤	71.0公絲	品种規格
	糊精 2.5 公斤	25.0公絲	
	蔗糖粉 1.5 公斤	15.0公絲	
	硬脂酸鎂 适量	适量	片重 0.12公分
操作要点	称取核黄素及部分淀粉，混合均匀，用100目篩篩过。再称取糊精、蔗糖粉，及 其余淀粉，分別用40目篩篩过，再与有核黄素的淀粉部分混合均匀。將鹽酸吡多辛 溶解于200c.c.温水中与8%的淀粉漿湿润，通过14目尼龙篩制粒，以60°C以下温度 干燥。干粒中加入鹽酸硫胺及适量潤滑剂，混匀压片。		
治疗范围	本品适用于营养不良，厌食，脚气病，癩皮病与因缺乏维生素B所引起病症的 輔助治疗。		
包裝規格	1000片	失效期限	
儲运条件	置遮光的容器内	負責期限	2年

产品名称	維他賜保命片(男用) Tabella Vita-Spermin (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處		每十萬片	每片
	睪丸浸膏(相当干粉) 5.0 公斤 胚胎浸膏(相当干粉) 1.0 公斤 枸橼酸鐵銨 2.0 公斤 卵磷脂 0.8 公斤 鹽酸硫胺 0.1 公斤 糊精 11.20 公斤 滑石粉 2.10 公斤 硬脂酸鎂 0.2 公斤	50.0 公絲	10.0 公絲 20.0 公絲 8.0 公絲 1.0 公絲 0.112 公分 21.0 公絲 2.0 公絲
方			內在質量
			存在問題
			品種規格
操作要点	称取睪丸粉，加蒸餾水80升及鹽酸0.12升，保溫半小時，過濾；濾渣依上法再提取二次(鹽酸改用50毫升)三次的濾液合併濃縮成浸膏。称取胚胎粉，依照睪丸粉方法提取，制成浸膏。取睪丸及胚胎浸膏，卵磷脂，枸橼酸鐵銨，糊精，滑石粉混和勻，用稀醇濕潤16目制粒，以60—65°C干燥后加入鹽酸硫胺及硬脂酸鎂混勻压片。包黃色糖衣。		
治療範圍	本品应用于神經衰弱食慾不振失眠发育迟緩貧血脚氣病以及一般衰弱。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲運条件		負責期限	2年

产品名称	維他賜保命片(女用) Tabella Vita-Spermin (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處	每十萬片	每片	1日3次, 1次1-2片, 飯前服用, 或遵醫囑。
	卵巢浸膏(相当干粉)	0.1公斤	
方	睪丸浸膏(相当干粉)	2.0公斤	20.0公絲
	胚胎浸膏(相当干粉)	2.0公斤	20.0公絲
	枸橼酸鉄鈹	2.0公斤	20.0公絲
	卵磷脂	0.8公斤	8.0公絲
	鹽酸硫胺	0.1公斤	1.0公絲
	糊精	10.0公斤	100.0公分
	滑石粉	2.00公斤	20.0公絲
硬脂酸鎂	0.20公斤	2.0公絲	內在質量 存在問題
			糖衣变色
			品種規格
操作要点	<p>卵巢浸膏, 睪丸浸膏, 胚胎浸膏的制法同“維他賜保命片”(男用)項下的睪丸浸膏制法。称取这些浸膏及卵磷脂、枸橼酸鉄鈹、糊精、滑石粉混和勻, 按“男用維他賜保命”操作方法制粒, 压片。包楊梅紅色糖衣。</p>		
治疗范围	本品应用于神經衰弱食慾不振失眠发育迟緩貧血脚气病月經失調以及一般衰弱。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件		負責期限	2年

产品名称	胃宁片 Tabella Wei Ning (現由延安藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
			1日3—4次，1次2—3片，飯后 2小时或胃痛发作时服。
处	每十萬片 每片		內在質量
	氫氧化鋁	20.0公斤 200.0公絲	
方	氧化鎂	15.0公斤 150.0公絲	存在問題
	颠茄浸膠	0.3公斤 3.0公絲	
	姜粉	2.5公斤 25.0公絲	品种規格
	桂尔通粉	2.5公斤 25.0公絲	
	糊精	2.5公斤 25.0公絲	片重0.6公分。
操作要点	取颠茄浸膏溶解于稀醇内，分析含量后备用。取氢氧化铝、氧化镁、薑粉、桂尔通粉及糊精分別篩过，充分混勻，然后以颠茄流膏的稀醇溶液及适量水潤湿，先通过8目篩，再通过10目篩制粒，以50—60°C左右温度干燥，干后称干粒总重量，加入淀粉8%，滑石粉2%，硬脂酸鎂0.5%，混合均匀，再通过10目篩，压片。		
治疗范围	适应胃酸过多，胃痛。		
包裝規格	50片、100片。	失效期限	
儲运条件	密閉保存	負責期限	2年

产品名称	維他鈣片 Tabella Wei Ta Gai (現由九福藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處	每十萬片	每片	1日3次, 1次1—2片。
方	磷酸氫鈣	10.0 公斤	
	乳酸鈣	10.0 公斤	100.0公絲
	骨化醇	0.15公斤	1.5公絲
	核黃素	96.0 公絲	0.0096公絲
	檸檬黃	17.5 公分	0.175公絲
	桑子香精	0.1 公斤	1.0公絲
	硬脂酸鎂	適量	適量
蔗糖粉	78.0 公斤	780公絲	內在質量 存在問題
			品種規格
	片重1.0公分		
操作要點	稱取磷酸氫鈣, 乳酸鈣, 及蔗糖粉, 分別篩過, 混合均勻。稱取骨化醇, 核黃素及檸檬黃, 混合後, 篩入蔗糖的混合粉中。用8%的淀粉漿濕潤用12目篩制粒, 70—75°C溫度乾燥後加入硬脂酸鎂及香精, 混勻壓片。		
治療範圍	妊娠和授乳期婦女, 發育期兒童, 可以補充鈣質缺乏或不足。		
包裝規格	500片	失效期限	
儲運條件	密閉保存	負責期限	3年

产品名称	哮喘平片 Tabella Xiao Li Ping (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處	每十萬片 每片		內在質量 存在問題
	鹽酸麻黃素	1.5 公斤 15.0公絲	
方	苯巴比妥	0.8 公斤 8.0公絲	品種規格
	甘草粉	16.5 公斤 0.165公分	
	糊精	5.0 公斤 50.0公絲	
	淀粉	0.32公斤 3.2公絲	
	硬脂酸鎂	0.12公斤 1.2公絲	
操作要點	稱取鹽酸麻黃素，苯巴比妥，及糊精分別研細篩過，混合均勻，與通過60目篩的甘草粉共置攪拌機中混勻，用5%淀粉漿濕潤後，攪拌5—8分鐘，製成軟材，通過搖擺式顆粒機12目篩制粒，以65°C溫度乾燥後，加入硬脂酸鎂，混勻，壓片。包白色糖衣。		
治療範圍	本品有抗痙攣作用及鎮靜作用適應於氣喘枯草熱各種過敏性症。		
包裝規格	50片、200片。	失效期限	
儲運條件		負責期限	2年

产品名称	暈动藥片 Tabella Yian Tong Yu (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 療程
處	每十萬片	每片	內在質量 存在問題
方	硫酸阿托品 15.0 公分	0.15 公絲	
	氫溴酸东莨菪礆 20.0 公分	0.20 公絲	品种規格
	苯巴比妥鈉 3.0 公斤	30.0 公絲	
	淀粉 12.0 公斤	0.12 公分	片重 0.18 公分，每片含硫酸阿托品 0.15 公絲，氫溴酸东莨菪礆 0.2 公絲，苯巴比妥鈉 30 公絲。
	硬脂酸鎂 0.18 公斤	1.8 公絲	
操作要点	称取淀粉及苯巴比妥鈉 100 目粉，混和均匀。称取硫酸阿托品及氫溴酸东莨菪礆，溶解于适量蒸餾水，加入淀粉及苯巴比妥鈉混合物中，混勻。用 8% 的淀粉漿濕潤 14—16 目篩制粒，以 65°C 以內的溫度干燥，干粒中加入硬脂酸鎂，混勻压片。		
治疗范围	本品可应用于預防和避免在旅行时因受舟車等的顛动而发生暈眩和嘔吐等疾患。		
包裝規格	10 片	失效期限	
儲运条件		負責期限	3 年

产品名称	优散痛片 Tabella You San Tong (現由九福藥厂, 优生藥厂生产)		
规格	衛生局暫行規定		劑量及 疗程
			1日3次, 每次1片
处	每十萬片	每片	內在質量
	氨基比林 10.0公斤	100.0公絲	
方	安替比林 10.0公斤	100.0公絲	存在問題
	非那西汀 12.5公斤	125.0公絲	
	咖啡 因 5.0公斤	50.0公絲	品种規格
	淀 粉 5.0公斤	105.4公絲	
	糊 精 1.0公斤	15.0公絲	
硬脂酸鎂	适量	适量	片重0.49公分, 每片含氨基比林, 安替比林各0.1公分, 非那西汀0.125公分, 咖啡因0.05公分。
操作要点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以氨基比林、非那西汀、咖啡因、淀粉(3.5公斤)、糊精(0.5公斤)篩过混和均匀, 用淀粉漿(18%)制成12目顆粒(P.P.C.粒) 2. 以安替比林、淀粉(1.5公斤)、糊精(1.0公斤)篩过混合均匀, 亦用淀粉漿(18%)制成14目顆粒(A粒) 3. P.P.C.粒及A粒分別用60°C干燥, 干燥后混合, 加适量潤滑剂压片。 4. 制粒时应使用尼龙絲篩。 		
治疗范围	适用于头痛牙痛月經痛及感冒。		
包裝規格	10片、20片、100片、1000片	失效期限	
儲运条件	密閉保藏	負責期限	2年

产品名称	月月紅片 Tabella Yue Yue Hong (現由信誼藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		劑量及 1日3次,每次1—2片,或遵医嘱。
处	每十萬片	每片	療程
	硫酸亞鐵 6.0 公斤	60.0公絲	
方	桂皮粉 1.0 公斤	10.0公絲	內在質量
	硫酸奎寧 1.2 公斤	12.0公絲	
	顛茄流浸膏 0.6 公斤	6.0公絲	存在問題
	益母草浸膏 0.36公斤	3.6公絲	
	当 归 2.0 公斤	20.0公絲	品种規格 糖衣片重0.15公分
	滑石粉 2.5 公斤	25.0公絲	
	糊 精 1.5 公斤	15.0公絲	
	硬脂酸鎂 0.144公斤	1.44公絲	
	淀粉(制藥用)0.192公斤	1.92公絲	
操作要点	称取玉桂粉、硫酸銀、糊精、当归、滑石粉、顛茄流浸膏、益母草浸膏等，一起混和均匀，用淀粉漿湿润，置搖摆机14—16目制粒，以70—75°C干燥，放冷加入硫酸亞鐵与硬脂酸鎂，通过16目篩，充分拌勻压片。以碳酸鈣、明膠、糖漿等包制粉衣层，然后再上有色糖漿(紅)干燥，打光。		
治疗范围	本品应用于月經困难或无月經及合併症。		
包裝規格	100片	失效期限	
儲运条件		負責期限	2年

产品名称	中苏润喉片 Tabella Zhong Su Run Hou (现由九福藥厂生产)			
规格	卫生局暂行规定		剂量及 疗程	
处	薄荷油	每十萬片 75.0公分	每片 0.75 公絲	每日数次, 每次1—2片
	桉叶油	50.0公分	0.5 公絲	
方	檸檬油	50.0公分	0.5 公絲	內在質量
	薄荷腦	125.0公分	1.25 公絲	
	枸橼酸	75.0公分	0.75 公絲	存在問題
	糖精鈉	37.5公分	0.375 公絲	
	甲基藍	0.6公分	0.006 公絲	品種規格
	淀粉	3.2公斤	32.0 公絲	
	糊精	3.2公斤	32.0 公絲	片重0.46公分
	蔗糖粉	14.0公斤	140.0 公絲	
	滑石粉	适量	适量	
	硬脂酸鎂	适量	适量	
操作要点	称取蔗糖粉及糊精篩过, 取甲基藍, 枸橼酸及糖精鈉溶解于适量蒸餾水中, 加至蔗糖粉中, 湿润以14目篩制粒, 用60°C左右溫度干燥用12目篩过。取薄荷腦溶解于薄荷油, 桉叶油及檸檬油混合油液, 加至淀粉中, 吸附后, 另加入适量滑石粉及硬脂酸鎂, 混合均匀, 加至蔗糖干粒中, 混匀压片。			
治疗范围	口腔咽喉之消毒剂, 适用于咽喉炎等症。			
包装规格	.20片	失效期限		
储运条件	密闭保存	負責期限 2年		

产品名称	爱儿康元—宝塔糖 Al Er Kang Liu Yi Bao Ta Tang (現由爱尔康藥厂生产)		
規格	衛生局暫行規定		
处	每十萬粒	每粒	劑量及 療程
	磷酸嘔嘍素	20.0公斤	
方	蔗糖粉	176.3公斤	1.763公分
	淀粉	2.0公斤	20.0公絲
	粘 合 剂	适量	适量
	桑子香精	300.0毫升	0.003毫升
	食用檸檬色素	30.0公分	0.3公絲
	糖 精 醋 酸	0.1公斤 300.0毫升	1.0公絲 0.003毫升
			內在質量 存在問題
			品种規格
			治蛔虫：每日量每一足岁服一粒十二足岁以上服16粒，隔七天后服一次。 治蟯虫：每日量每足岁服一粒，十二足岁以上服十九粒，早晚二次分服連服七天。
			粒重2公分，每粒含磷酸嘔嘍素0.2公分(相合于嘔嘍素水合物0.19公分)
操作要点	將磷酸嘔嘍素研細，通过100目篩，与糖粉、淀粉充分攪拌均匀，加粘剂(蛋白干或明膠)溶液及香料色素液等，調制成湿軟块狀，經特制模形压制成塔形，60°C12小时以上干燥即得。		
治疗范围	驅除蟯虫，蛔虫		
包装規格	800粒		失效期限
儲运条件	密閉干燥保存		負責期限 1½年

产品名称		爱儿康宝塔糖 Al Er Kang Bao Ta Tang (現由爱尔康藥厂生产)	
規格		衛生局暫行規定	
处	山道年 酚酞 蔗糖 粘合 剂	每十万粒	每粒
		0.4公斤	4.0公絲
方	桑子香 食用色 素	0.8公斤	8.0公絲
		14.7公分	1.47公分
		适量	适量
		300.0毫升	0.003毫升
		0.3公斤	0.3公絲
		300.0毫升	0.003毫升
		劑量及 療程	
		每日一次，早飯后半小时服用連服 二天，不可多服。 用量1-2岁服 $\frac{1}{2}$ -1粒 7-8岁服5-5.5粒 3-4岁服2-3粒 9-10岁服5粒 5-6岁服4-4.5粒	
		內在質量 存在問題	
		品种規格	
		粒重1.5公分，每粒含山道年4公絲。	
操作要点		將山道年与酚酞經研細过100目篩与糖粉充分攪拌均匀，加粘合剂(干蛋白或 明膠)溶液及香料色素等，調制成湿軟块狀，經特制模型压制成塔形，60℃溫度干 燥12小时以上即得。	
治疗范围		驅除蛔虫	
包裝規格		500粒、1000粒。	失效期限
儲运条件		密閉干燥保存	負責期限 1½年

第二分册

汉文索引檢字表

- 〔一划〕 乙
- 〔二划〕 丁九二
- 〔三划〕 三千大小儿口
- 〔四划〕 中水双无月
- 〔五划〕 甲去卡灭叶对白仙扑
- 〔六划〕 合优多安汗异百地米虱耳肌長
- 〔七划〕 克含吠妊妥抗肝辛
- 〔八划〕 奋乳非阿青依果宝苏罗
- 〔九划〕 枸洋紅美胃苯咳保重复降
- 〔十划〕 核氮索哮海胱胰息盐眠食
- 〔十一划〕 基酚
- 〔十二划〕 嗜散普硫菸替鈣强甯
- 〔十三划〕 媽氮感溴新暈羧爰福
- 〔十四划〕 滴漂碳維

- 〔十五划〕 醋潤乐
- 〔十六划〕 糖
- 〔十七划〕 磺薄磷
- 〔十八划〕 鏈

第二分册汉文索引

片 剂

(一 划)

一轻松	287
乙胺嘧啶片	353—354
乙酰甲萘醌片	203—204
乙酰氧基黄体酮片	205
乙酰普马嗪片	206

(二 划)

丁维钙片	262
九合维他	294
二苯乙二胺苯青霉素片	233

(三 划)

小苏打片	314—315
三甲双酮片	392

—索引2—

三溴片	391
三醋酸汀片	390
三磺片	393
干酵母片	363—365
凡拉蒙片	215
大黄碳酸氢钠片	358
大黄苏打片	358
口服黄体酮片	205

(四 划)

中苏润喉片	404
水杨酰胺片	366
水杨酸钠片	324—325
双香豆素片	258
双氢克尿塞片	283
双醋酸酞片	287
无味合霉素片	383
元一宝塔糖片	298
月月红片	403

(五 划)

甲状腺片	386—387
甲基睾丸素片	312
甲基硫氧嘧啶片	313
甲硫氨酸片	309—310
去氢可的松片	348
去氢氢化可的松片	347
卡巴肼片	241
灭虫宁片	234—235
叶酸片	208
对氨基水杨酸钠片	318
白血福恩片	237
仙鹤草色素片	213
扑热息痛片	328
扑瘧噻片	349

(六 划)

合霉素片	382
------	-----

优散痛片	402
多种钙片	264
多酶片	256
安乃近片	221
安达诺新片	212
安血定片	332
安坦片	225
安痛片	224
汗定片	281
异丙菸肼片	286
异菸肼片	288—289
异菸肼磺钠片	290
异菸肼片	292
百生肼片	291
地巴唑片	257
地塞米松片	252
米拉脱灵片	346
亚硫酸氢钠甲萘醌片	303
耳霖片	265

肌醇片·····	285
長效西林片·····	233

〔七 划〕

克瀉痢宁片·····	326
含碘喉症片·····	220
含盐清凉片·····	317
呋喃西林片·····	273—274
妊娠素片·····	268
妥克拉司片·····	242
妥拉苏林片·····	389
抗坏血酸片·····	207
抗炎松片·····	223
抗胺萆片·····	335
抗癆胙片·····	248
肝太乐片·····	277
辛可芬片·····	246

〔八 划〕

罗瓦而精片·····	221
奋乃静片·····	333
乳酸酸片·····	211
乳酸鈣片·····	238
非那西汀片·····	334
阿司匹林片·····	226—227
青霉素片·····	329
青霉素V片·····	331
依地酸鈣鈉片·····	239
果导片·····	280
宝塔糖片·····	231
青霉素含錠·····	330
苏打明片·····	316

〔九 划〕

枸橼酸妊娠酚片·····	266
枸橼酸喉嚨藥片·····	345

洋地黄片	259—260
洋地黄毒甙片	261
紅霉素片	267
美卡明片	302
美索因片	311
胃宁片	398
胃舒平片	276
胃瘍平片	301
苯巴比妥片	336
苯妥英钠片	341
苯丙福片	338
苯氧甲基青霉素片	331
咳停片	295
保泰松片	339
重硫酸奎宁片	356—357
复方甘草片(不含阿片)	278
复方甘草片(含阿片)	279
复方安乃近片	222
复方当归浸膏片	269

复方五味子片	368
复方阿司匹林片	228—229
复方保泰松片	340
复方碘化鉍片	220
复方路丁片	361
复方碳酸氢钠片	316
复方薄荷含片	304
复方颠茄片	232
复方氨基比林片	215
复合维生素B片	395
降压灵片	293

(十 划)

食母生片	365
核黄素片	359
氨非咖片	216
氨茶碱片	254—255
氨茶硷片	217
氨基比林片	214

氨硫脲片.....	388
索灭痛片.....	371
氨基蝶环片.....	218
噻利平片.....	400
海群生片.....	253
胱氨酸片.....	250
胰酶片.....	327
息宁痛片.....	369
息癯定片.....	353
息拉米片.....	342
盐酸吡多辛片.....	352
盐酸圆氯胍片.....	249
盐酸苯海拉明片.....	263
盐酸胍苯噻嗪片.....	282
盐酸硫胺片.....	384
盐酸黄连素硷片.....	236
盐酸氯丙嗪片.....	244
眠尔通片.....	306

(十一划)

基林片.....	296
酚酞片.....	337
通舒片.....	390

(十二划)

氰乙酰胺片.....	248
喹碘方片.....	243
散尔痛片.....	367
普鲁本辛片.....	351
硫酸亚铁片.....	270
硫酸阿托品片.....	230
硫酸奎尼丁片.....	355
菸酰胺片.....	321—323
菸酸片.....	209—210
替比昂片.....	388
钙尔生丁片.....	240
钙素母片.....	275

強地黃片..... 251

〔十三划〕

解痛片.....	222
媽媽多片.....	299
氯化銨片.....	219
氯普馬嗪片.....	244
感尔松片.....	297
溴化新斯的明片.....	320
溴苯辛片.....	308
新維生素 B ₁ 片.....	385
新霉素片.....	319
暈動藥片.....	401
羧苯甲酰磺酰醋胺片.....	342
羧苯甲酰磺胺嘧啶片.....	343
愛儿康元一宝塔糖.....	405
愛儿康宝塔糖.....	406
福美片.....	271
福命喉症片.....	272

〔十四划〕

滴維淨片.....	202
漂粉精片.....	344
碳酸氫鈉片.....	314—315
維生素 B ₁ 片.....	384
維生素 B ₂ 片.....	359
維生素 B ₆ 片.....	352
維生素 C 片.....	207
維生素 B ₁₂ 片.....	394
維他鈣片.....	399
維他賜保命片(女用).....	397
維他賜保命片(男用).....	396

〔十五划〕

醋酸可的松片.....	247
醋酸氫化可的松片.....	284
潤腸果子糖片.....	360
乐疾宁片.....	307

(十六划)

糖精鈉片..... 362

(十七划)

磺胺二甲氧基嘧啶片..... 300

磺胺二甲基嘧啶片..... 374

磺胺甲氧基吡嘧啶片..... 375

磺胺脒片..... 376—377

磺胺嘧啶片..... 381

磺胺嘧啶片..... 372—373

磺胺噻唑片..... 378—380

薄荷喉症片..... 305

磷酸伯氨喹啉片..... 349—350

磷酸氯喹片..... 245

(十八划)

鏈霉素片..... 370

第二分册拉丁文索引

片 剂

A

Tabella

acetarsoni (tabella Devigani)	202
acetomenaphthoni	203—204
acetoxyprogesteroni	205
acetylpromazini maleatici	206
acidi ascorbici	207
acidi folici	208
acidi nicotinicī	209—210
acidi orotici	211
adrenosemi	212
agrimonini	213
amidopyrini (tabella pyramidoni) 214	
amidopyrini composita	215

amidopyrini phenacetini et caffeini	216
aminophyllini	217
aminopterini	218
ammonii chlorati	219
ammonii iodati composita	220
analgini	221
analgini composita (Jie Tong Pain)	222
antiflamisoni	223
An Tong	224
artani (tabella benzhexoli hydrochlorici)	225
aspirini	226—227
aspirini composita (A. P. C) ..	228—229
atropini sulfurici	230
Al Er Kang Liu Yi Bao Ta Tang ...	405
Al Er Kang Bao Ta Tang	406

B

Tabella

Bao Ta Tang	231
belladonnae composita.....	232
benzathini benzyl penicillini.....	233
benzhexoli hydrochlorici	225
bepheni naphthoati.....	234—235
berberini hydrochlorici	236
busulfani	237

C

Tabella

calcii lactici	238
calcii-natrii edetici	239
calcium D	240
carbarsoni	241
carbetapentani citrici (tabella toclase)	242

—索引 10—

ehinofoni	243
chlorpromazini hydrochlorici	244
chloroquini phosphorici	245
cinchopheni	246
cortisoni acetici	247
cyanacethydrazidi	248
cyclochloroguanidi hydrochlorici	249
cystini	250

D

Tabella

dapsoni	254
deslanosidi C	251
devegani	202
dexamethasoni	252
diaethylcarbamazini citrici (tabell Hetrazani).....	253

diaminodiphenylsulfoni	
(tabella Dapsoni).....	254—255
diastasi pepsini et pancreatici	256
dibasoli	257
dicoumaroli	258
digitalis.....	259—260
digitoxini	261
Ding wei Gai	262
diphenylhydramini hydrochlorici	263
Duo Zhong Gao	264

E

Tabella

En Lin	265
ergosumini citrici	266
erythromycini	267
ethisteroni.....	268
extracti angelicae composita	269

F

Tabella

ferri sulfurici	270
furacilini	273—274
Fu Mei pian	271
Fu Ming Hou zheng Pian	272

G

Tabella

Gai Su Mu	275
gastopina	276
glucuralactoni	277
glycyrrhizae composita	278
glycyrrhizae composita cum opio.....	279
Guo Dao.....	280

H

Tabella

Han Ding Luan	281
hetrazani	253
hydralazini hydrochlorici	282
hydrochlorothiazidi	283
hydrocortisoni acetici	284

I

Tabella

inositoli	285
iproniazidi	286
isaphenini	287
isonizidi	288—289
isoniazini methansulfonici natrici	290
isoniazidi para-aminosalicylici	291
isoniazoni	292

J

Tabella

Jiang Ya Ling.....	293
Jiume Wei Ta	294

K

Tabella

khellini	296
kursoni	297
Ke Ting	295

L

Tabella

Liu Yi Bao Ta Tang.....	298
-------------------------	-----

M

Tabella

Ma, Ma Duo	299
madriboni	300
mebropini	301
mecamylamini hydrochlorici	302

menadioni natrii disulfurosi	303
Mentha, trochisci composita	304
Tabella	
menthae gurgitis	305
meprobamati (tabella Miltoni)...	306
6-mercaptipurini	307
methanthelini bromati	308
methionini	309—310
methoini.....	311
methylestosteroni	312
methylthiouracili	313
miltoni.....	306

N

Tabella	
natrii bicarbonici	314—315
natrii bicarbonici composita	316
natrii chlorati tartarici	317
natrii para-aminosalicylici	318

neomycini	319
neostigmini bromati.....	320
nicotinamidi	321—323
natrii salicylici.....	324—325

O

Tabella	
oxyquinolini sulfathalici	326

P

Tabella	
pancreatini	327
paracetamoli.....	328
penicillini	329
Penicillinum, trochisci	330
Tabella	
penicillini V.....	331
pentolini.....	332
perphenazini.....	333

phenacetini	334
phenagani hydrochlorici	335
phenobarbitali	336
phenolphthaleini	337
phenprofoni	338
phenylbutazoni	339
phenylbutazoni composita	340
phenytoini natrici	341
phthalylsulfacetamidi	342
phthalylsulathiazoli	343
Piao Fen Jing	344
pipèrazini citrici	345
pipradroli hydrochlorici	346
prednisoloni	347
prednisoni	348
primaquini phosphorici	349—350
priscolini hydrochlorici	389*
propanthini bromati	351
pyramidoni	214

pyridoxini hydrochlorici	352
pyrimethamini	353—354

Q

Tabella

quinidini sulfurici	355
quinini bisulfurici	356—357

R

Tabella

rhei et natrii bicarbonici	358
riboflavini	359
Run Chang Gun Zi Tang	360
rutini composita	361

S

Tabella

saccharini natrici	362
saccharomycetis sicci	363—364

<i>saccharomycitis sicci</i> (<i>Zymasum</i>)	365
salicylamidi	366
Sanertong	367
<i>schizandra chinensis</i> baill <i>composita</i>	368
sineton	369
streptomycini	370
Sui Mei Tong	371
sulfadiazini	372—373
sulfadimidini	374
sulfamethoxypridazini	375
sulamidini	376
sulfathiazoli	378—380
sulfathiourea	381
syntomycini	382
syntomycini palmitici	383

T

Tabella

thiamini hydrochlorici	384
thiamini propyl disulfidi	385
thyroidi	386—387
tibioni	388
tolazolini hydrochlorici	389
toclase	242
triacephentini (Tong Show Pian)	390
tribromati	391
trimethadioni	392
trisulfas	393

Trochisci

menthae <i>composita</i>	304
penicillini	330

V

Tabella

vitamini B ₁₂	394
vitamini B complicit	395
vita-Spermin (for men)	396
vita-Spermin (for women).....	397

W

Tabella

Wei Ning	398
Wei Ta Gai	399

X

Tabella

Xiao Li Ping	400
--------------------	-----

Y

Tabella

Yian Tong Yu	401
You San Tong	402
Yue yue Hong.....	405

Z

Tabella

Zhong Su Run Hou	404
------------------------	-----