

東山子
宋國書

本草綱目果部目錄第三十卷

果之二 山果類三十四種

梨

別錄

鹿梨

圖經

棠梨

綱目

海紅

綱目

木瓜

別錄

楂子

食療

楨楂

圖經

榅桲

開寶

山楂

唐本
卽山楂

柿

別錄

椑柿

開寶

君遷子

拾遺
牛嫋
柿

安石榴

別錄

橘

本經
開寶

柑

開寶

橙

開寶

柚

日華

枸櫞

圖經
卽香櫞

金橘

綱目

枇杷

別錄

楊梅

開寶

櫻桃

別錄

山嬰桃

別錄

銀杏

日用
卽白果

胡桃

開寶

榛子

開寶

阿月渾子

拾遺

楮子

拾遺

鈎栗

拾遺

橡實

唐本
卽櫟子

右附方舊五十二新一百七十四

本草綱目果部第三十卷

果之二 山果類三十四種

梨

別錄下品

釋名快果 果宗 玉乳 蜜父

震亨曰梨者利也其性下行流

利也宏景曰梨種殊多並皆冷利多食損人故俗人謂之快果不入藥用

集解

頌曰

梨處處皆有而種類殊別醫方相承用

乳梨 鶩梨 乳梨出宣城皮厚而肉實其味極長鶩梨 河之南北州郡皆有之皮薄而漿多味差短其香則過之其餘水梨消梨紫糜根赤梨青梨茅梨 甘棠梨 禦兒梨之類甚多俱不入藥也一種桑梨 惟堪蜜煮食之止口乾生食不益人冷中又山邢道人以此梨絞汁進之帝疾遂愈復求之不

可得常山郡忽有一株因緘封以進帝多食之解煩燥殊效歲久木枯不復有種今人不得而用之矣時珍曰梨樹高二三丈尖葉光膩有細齒二月開白花如雪六出上已無風則結實必佳故古語云上已有風梨有蠹中秋無月蚌無胎賈思勰言梨核每顆有十餘子種之惟一二子生梨餘皆生杜桑樹接過者則結子早而佳梨有青黃紅紫色乳梨卽雪梨鶯梨卽綿梨消梨卽香水梨也俱爲上品可以治病禦兒梨卽玉乳梨之訛或云禦兒一作語兒地名也在蘇州嘉興縣見漢書註其他青皮早穀半斤沙糜諸梨皆粗濶不堪止可蒸煮及切烘爲脯爾一種醋梨易水煮熟則甜美不損人也昔人言梨皆以常山真定山陽鉅野梁國睢陽齊國臨淄鉅鹿弘農京兆鄆都洛陽爲稱蓋好梨記云淮北榮南河濟之間千株梨其人與千戶侯等也又魏文帝詔云真定御梨大如拳甘如蜜脆

如菱可以解煩釋悞辛氏三秦記云含消梨大如五升器墜地則破須以囊承取之漢武帝嘗種於上苑此又梨之奇品也物類相感志言梨與蘿蔔相閒收藏或削梨蒂種於蘿蔔上藏之皆可經年不爛今北人每於樹上包裹過冬乃摘亦妙

實

氣味甘微酸寒無毒多食令人寒中萎困金瘡乳婦血虛者尤不可食志曰別本云梨甘寒多食成冷痢桑梨生食冷中不益人

主治熱嗽止渴切片貼湯火傷止痛不爛蘇恭治客

熱中風不語治傷寒熱發解丹石熱氣驚邪利大

小便開竇除賊風止心煩氣喘熱狂作漿吐風痰大明

開竇

卒喑風不語者生搗汁頻服胸中痞塞熱結者宜

多食之

孟潤肺涼心消痰降火解瘡毒酒毒時

發明

宗奭曰梨多食動脾少則不及病用梨者當斟酌之惟病酒煩渴人食之甚佳終不能卻

疾慎微

曰孫光憲北夢瑣言云有一朝士見奉御

梁新

診之曰風疾已深請速歸去復見鄜州馬醫

趙鄂

診之言與梁同但請多喫消梨咀齶不及絞汁而飲到家旬日唯喫消梨頓爽也時珍曰別錄

著梨止

言其害不著其功陶隱居言梨不入藥蓋古人論病多主風寒用藥皆是桂附故不知梨有

古治風熱潤肺涼心消痰降火解毒之功也今人痰

病火病十居六七梨之有益蓋不爲少但不宜過食爾按類編云一士人狀若有疾厭厭無聊往謁

楊吉老診之楊曰君熱證已極氣血消鑠此去三

年當以疽死士人不樂而去聞茅山有道士醫術通神而不欲自鳴乃衣僕衣詣山拜之願執薪水

之役道士留置弟子中久之以實白道士道士診
盡則取乾者泡湯食滓飲汁疾自當平士人如其
戒經一歲復見吉老見其顏貌腴澤脈息和平驚
曰君必遇異人不然豈有痊理士人備告吉老
言之說彷彿觀夫二條則梨之功豈小補哉然
惟乳梨鶯梨消梨可食餘梨則亦不能去病也

附方

舊六

消渴飲水

用香水梨或鶯梨或江南雪梨皆可取汁以蜜湯熬成瓶

收無時以熱水或冷水

或冷水

卒得欬嗽

頌曰崔元亮海上方用好梨去核

核搗汁一椀入椒四十粒煎

一沸去滓納黑鶴

大兩消訖細細含嚥立定○說曰用梨一顆刺五

十孔每孔納椒一粒麪裹灰火煨熟停冷去椒食

升煎食之又方搗汁一升入酥蜜各一兩地黃汁一升煎成含嚥凡治嗽須喘急定時冷食之若熱食

本草綱目果部卷三十一梨

反傷肺令嗽更劇不可救也若痰喘氣急納小黑梨剜空

豆令滿留蓋合住繫定糠火煨熟

摘元方

搗作餅每日食之至效

喑風失音生梨搗汁

一錢飲之日再

食療本草

小兒風熱

昏懵躁悶不能食用消

煮取汁一升入粳米一

聖惠方

赤目弩肉

日夜痛者取好梨一顆搗絞汁

以綿裹黃連片一錢浸

圖經

赤眼腫痛

鷺梨一枚搗汁黃連末半兩膩藥物不下用大

粉一字和勻綿裹浸梨

聖惠

反胃轉食

雪梨一個以丁藥物不下用大

汁中日日點之

聖惠

四五重煨熟食之

總錄

花主治去面黑粉滓

時珍

見李花○方

葉主治霍亂吐利不止煮汁服作煎治風

恭蘇治小

兒寒疝

蘇頌搗汁服解中菌毒

吳瑞

附方

舊三
新一

小兒寒疝

腹痛大汗出用梨葉濃煎七

玉經

驗方也

中水毒病

初起頭痛惡寒拘急心煩

圖經

本草

中水毒病

用梨葉一把搗爛以酒一

蓋

攬飲

蠼螋尿瘡

出黃水

用梨葉

汁塗

篋

中方

蠼螋尿瘡

之乾

卽易

篋

中方

食

梨過傷

梨葉煎汁解

黃記

木皮主治

解傷寒時氣

珍時

附方

新

傷寒溫疫

已發未發用梨木皮大甘草各

一錢

每服三錢

白湯下日二服取愈

此蔡醫博方也

黎居士簡易方

人有氣從臍左右起上衝胸滿

煮汁飲

氣積鬱冒

氣促鬱冒厥者用梨木灰伏出

聖惠

枝

滿

煮汁飲

氣積鬱冒

氣促鬱冒厥者用梨木灰伏出

聖惠

枝

滿

氣促

氣促

滿

雞卵殼中白皮紫苑麻黃去節等分爲末糊丸梧子大每服十丸酒下亦可爲末服方寸匕或煮湯

服總錄結氣欬逆三十一年者服之亦瘥方同上

鹿梨

圖經

校正

原附今分出

釋名

鼠梨

詩疏毛

山梨

詩毛

陽燧

雅爾

羅

時珍曰爾雅云燧

羅也其木有紋如

樹榦毛

長注云榦一名赤羅一

羅故名詩云隰有樹榦毛長注云榦一名赤羅一名山梨一名樹梨今人謂之陽燧陸機詩疏云燧

卽鹿梨也

一名鼠梨也

集解

頌曰江甯府信州一種小梨名鹿梨葉如茶

根如小拇指彼人取皮治瘡八月采之近處

亦有但采實作乾不知入藥也時珍曰山梨野梨

也處處有之梨大如杏可食其木文細密赤者文

急白者文緩按陸機云鹿梨齊郡堯山魯國河

內皆有人亦種之實似梨而酢亦有美脆者

實氣味酸澀寒無毒主治瘡疥煎汁洗之

蘇

頌

根皮氣味

同

主治瘡疥煎汁洗之

蘇

頌

附方

新

一切瘡

鹿

梨散用鹿梨根

蛇牀子各半斤

真翦草四兩

硫黃三錢

輕粉一錢

爲末

麻油調

傅之

小兒塗于

絹衣

上着之

七日不

解自愈

爲末

麻油調

傅之

小兒塗于

絹衣

一切癬

鹿

梨根

仁存方

一切癬

鹿

梨根

刮皮搗

擦之乾者

爲末

以水和

搗

爛醋和

麻布包

擦之乾者

爲末

以水和

搗

唐瑤經驗

方

棠梨

綱目

釋名

時珍曰

爾雅云

杜甘棠也

赤者杜白者棠

或

云牛

曰杜牡

曰棠

或云

澀者杜甘者棠

白者棠杜者

澀也棠者餧也

說俱通末說近是

集解

時珍曰

棠梨野

梨也處處山

林有之樹似梨

而小葉似蒼朮

葉亦有團者三

叉者葉邊皆

澀

有鋸齒色頗
霜後可食其樹接梨甚嘉有甘酢赤白二種按陸
機詩疏云白棠甘棠也子多酸美而滑赤棠子澀
而酢木理亦赤可作弓材救荒本草云其葉味微
苦嫩時燥熟水浸淘淨油鹽調食或蒸曬代茶其
花亦可燥食或曬乾磨麪作燒餅食以濟飢又楊
慎丹鉛錄言尹伯奇采檳花以濟飢註者言檳卽山
梨乃今棠梨也未知是否

實氣味酸甘濁寒無毒主治燒食止滑痢

時珍

枝葉氣味

同

主治霍亂吐瀉不止轉筋腹痛取一

握同木瓜二兩煎汁細呷之

時珍○聖惠方

附方

新

反胃吐食

棠梨葉油炒去刺爲末每旦酒服一錢山居四要

海紅

綱目

釋名海棠梨

時珍曰按李德裕花木記云凡花木名海者皆從海外來如海棠之類是

也又李白詩註云海紅乃花名出新羅國甚多則海棠之自海外有據矣

集解

時珍曰飲膳正要果類有海紅

不知出處此

爾雅赤棠也沈立海棠譜云棠有甘棠沙棠棠梨卽花實至八月乃熟鄭樵通志云海棠子小二月開紅皆非海棠也海棠盛於蜀中其出江南者名海棠沙棠棠梨黃條暢其葉類杜大者縹綠色小者淺紫色或三萼大如櫻桃成有香而正桃者有香爲正

慢數十年乃花以枝接梨及木瓜者易茂其核生者長海梨卽黃而盤勁且木堅而多節外白中赤其枝葉密而若宿妝其蒂長寸餘淡紫色或三萼大如櫻桃成有香而正

餘叢其蕊如金粟中有紫鬚其實狀如梨大如櫻桃成有香而正

秋可食味甘酸海棠花不香惟蜀之嘉州者有香

耳海海棠花大抵海棠花以紫綿色者爲正

七
卷二
海紅
木瓜

木大有黃海棠花黃貼齡海棠花小而鮮垂
絲海棠花粉紅向下皆無子非眞海棠也

子氣味酸甘平無毒主治洩痢

時珍出正要。

木瓜

別錄中品

釋名

楙音茂

時珍曰按爾雅云楙木瓜郭璞註

云木實如小瓜酢而可食則木瓜之名取

此義也或云木瓜味酸得木之正氣故名亦通楙從林矛諧聲也

集解

宏景曰

木瓜山陰蘭亭尤多彼人以爲良果

又有模楂大而黃有楂子小而濱禮云楂梨

鑽之古亦以楂爲果今則不也

保昇曰其樹枝狀如柰花作房生子形似栝樓火乾甚香楂子似梨狀

而醉江外常爲果食頌曰木瓜處處有之而宣城

者爲佳木狀如柰春末開花深紅色其實大者如

瓜小者如拳上黃似着粉宣人種蒔尤謹遍滿山谷始實成則鏤紙花黏於上夜露日烘漸變紅花

稱色其文如生本州以充土貢故有宣城花木瓜而木瓜無者爲楨楂類木瓜但看蒂閒別有重蒂如乳者爲圓子色微黃蒂粗其子小圓味濃微酸能傷人有蜜氣有蔓子顆小味絕濃不堪用有土伏子味絕苦也宗奭曰西洛大木瓜其味和美至熟止青白色可種可接藥絕有功勝宣州者味淡時珍曰木瓜可種可接可以枝壓其葉光而厚其實如小瓜而有鼻津潤味不木者爲木瓜圓小於木瓜味木而酢濃者爲木桃似木瓜而無鼻大於木桃味濃者爲木李蒂亦曰木梨卽楨楂及和圓子也鼻乃花脫處非臍蒂也木瓜性脆可蜜漬之爲果去子蒸爛搗泥入蜜與薑作煎冬月飲尤佳木桃木李性堅可蜜煎及作糕食之木瓜燒灰散池中可以毒魚說出淮南萬畢術又廣志云木瓜枝一尺有百二十節可爲數號

實脩治

數曰凡使木瓜勿犯鐵器以銅刀削去硬皮并子切片曬乾以黃牛乳汁拌蒸從已

至未待如膏煎乃曬用也

時珍曰今人但切片曬

乾入藥爾

按大明會典宣州歲貢烏蠟蟲蛀木瓜

入御藥局亦取其陳久無木

氣如栗子去木氣之義爾

氣味

酸溫無毒

思邈曰酸鹹溫濁說曰不可多食損齒及骨

主治

溼痹

腳氣霍亂大吐下

轉筋不止

別錄治腳氣衝心取嫩

者一顆去子煎服佳

強筋骨下冷氣止嘔逆心膈痰唾消食止水利後渴不止作飲服之器

藏

止吐瀉

奔豚及水腫冷熱痢心腹痛

大明調營衛助穀氣

數雷

去溼和胃滋脾益肺治腹脹善噫心下煩痞

好古

發明

發明 (呆) 曰木瓜入手足太陰血分氣脫能收氣滯其名及書上作木瓜字皆愈此理亦不可解俗人能入肝故益筋與血病腰腎腳膝無力皆不可缺挂木瓜杖云利筋脛也 (宗奭曰) 木瓜得木之正酸也能人以鉛霜或胡粉塗之則失酢味且無渣蓋受人皆脾胃病非肝病也 (時珍曰) 木瓜所主霍亂吐利轉筋腳氣皆金之制也 (時珍曰) 木瓜所致故筋轉必起於足跗脉寒溼之邪襲傷脾胃也 (時珍曰) 肝雖主筋而轉筋則由溼熱及宗筋皆屬陽明木瓜治轉筋非益筋也理脾胃而土病則金衰而木盛故用酸溫以收脾肺而土中瀉木以助之耗散而藉其走筋以平肝邪乃土中瀉木以助也木平則土得令而金受蔭矣 (素問云) 酸走筋金之病無多食酸孟說云多食木瓜損齒及骨皆伐金也 (時珍曰) 木瓜入手足太陰爲脾肺藥非肝藥膀胱氣滯之明驗而木瓜入手足太陰爲脾肺藥非肝藥益可徵矣又鍼經云多食酸令人癰酸入於胃中下不去膀胱胞薄以收兩焦之氣不能出入流入胃中下不利膀胱筋病之明驗而木瓜入手足太陰爲脾肺藥非肝藥益可徵矣又鍼經云多食酸令人癰酸入於胃中下不去膀胱胞薄以收兩焦之氣不能出入流入胃中下不利膀胱

而瘞濇也羅天益寶鑑云太保劉仲海日食蜜煎
木瓜三五枚同伴數人皆病淋疾以問天益天益
曰此食酸所致也但奪食則已陰之所生本在五
味陰之所營傷在五味五味太過皆能傷人不獨
酸也又陸佃埤雅云俗言梨百損一益核百
益一損故詩云投我以木瓜取其有益也

附方

舊二
新十

項強筋急

不可轉側肝腎二臟受風也用宣州木瓜二個取蓋去瓢

沒藥二兩乳香二錢半二味入木瓜內縛定飯上
蒸三四次爛研成膏每用三錢入生地黃汗半盞
午後發黃昏時定子謂此必先從足起少陰之筋
自足至項筋者肝之合今日中至黃昏陽中之陰
肺也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶畢法云離
至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受邪故發腳氣
於此時予授此及都梁丸服之而愈本事脚氣
腫急用木瓜切片囊盛踏之廣德顧安中患腳
氣筋急腿腫因附舟以足一袋上漸覺不

痛乃問舟子袋中何物曰宣州木瓜也

腳筋攣痛

及歸製木瓜袋用之頓愈名醫錄乘熱貼于臍
用木瓜數枚以酒水各半煮爛搗膏食療本草
痛處以綿裹之冷卽換日三五度

下絞痛

木瓜三片桑葉七片大棗三枚水

小兒洞

痢

木瓜搗汁服

升煮服

湯浸青布裹其足

霍亂轉筋

木瓜一兩酒不飲酒者煮湯服仍煎

聖惠方

四蒸木瓜圓

治肝腎脾三經氣虛爲風寒暑溼相搏流注經絡凡遇氣化更變七情不

和必至發動或腫滿或頑痹憎寒壯熱嘔吐自汗霍亂吐利宣州大木瓜四個切蓋剜空聽用一

個入黃芪續斷末各半兩于內一個入蒼朮橘皮

末各半兩于內一個入烏藥黃松節末各半兩于內黃松節卽茯神中心木也一個入威靈仙苦葶藶末各半兩于內以原蓋簪定用酒浸透入瓶內

蒸熟曬三浸三蒸三曬搗末以榆皮末水和糊丸

如梧子大每服五十丸溫酒鹽湯任下
御藥院

方

腎臟虛冷

氣攻腹脇脹滿疼痛用大木瓜三十

枚去皮核剜空以甘菊花末青鹽末

各一斤填滿置籠內蒸熟搗成膏入新艾茸二斤

搜和丸如梧子大每米飲下三十丸日二

聖濟

總錄

髮槁不澤

木瓜頭浸油梳

反花痔瘡

木瓜爲末以

調貼之以紙護

住醫林集要辟除壁蟲

以木瓜切片鋪于席下

臘仙神隱

木瓜核主治

霍亂煩躁氣急每嚼七粒溫水嚥之

時珍○
出聖惠。

枝葉皮根氣味並酸澀溫無毒

主治煮汁飲並止霍亂吐下轉筋療腳氣

錄別

枝作杖利筋脈根葉煮

湯淋足可以已癰木材作桶濯足甚益人

蘇頌

枝葉

煮汁飲治熱痢

時珍出千金。

花主治面黑粉滓

方見李花

榼子

音渣。食療。

校正

原附木瓜下今分出

釋名木桃

埤雅和圓子

時珍曰木瓜酸香而性脆木桃酢澀而多渣故謂之榼雷

公炮炙論和圓子卽此也

集解

藏器曰榼子生中都似榅桲而小江外常爲果食北土無之頌曰處處有之孟州特多宏

景曰禮云榼梨鑽之

謂鑽去核也鄭元不識以爲梨之不臧者郭璞以爲似梨而酢澀古以爲果今

不大例矣時珍曰榼子乃木瓜之酢澀者小於木瓜色微黃蒂核皆粗核中之子小圓也按王禎農

書云檨似小梨西川唐鄧闡多種之味劣於梨與木瓜同入蜜煮湯則香美過之莊子云檨梨橘柚皆可於口淮南子云樹檨梨橘柚食之則美嗅之則香皆指此也

氣味酸澀平無毒

詵曰多食傷氣損齒及筋

主治斷痢

宏景

去惡

心咽酸止酒痰黃水

藏器

煮汁飲治霍亂轉筋功與

木瓜相近

孟詵

楨

音冥渣宋圖經

校正

原附木瓜下今分出

釋名蠻檀

通志

瘤櫟

拾遺

木李

詩經

木梨

埤雅

木李生

時珍曰

於吳越

故鄭樵通志謂之蠻櫟云俗呼

木梨則楨

櫟蓋蠻櫟之訛也

木葉花實酷類木瓜但比木瓜大

集解

頤曰楨櫟木葉花實酷類木瓜但比木瓜大而黃色辨之惟看蒂閒別有重蒂如乳者爲

楨櫟

木葉花實酷類木瓜但比木瓜大而黃色辨之惟看蒂閒別有重蒂如乳者爲

楨櫟

木葉花實酷類木瓜但比木瓜大而黃色辨之惟看蒂閒別有重蒂如乳者爲

楨櫟

木葉花實酷類木瓜但比木瓜大而黃色辨之惟看蒂閒別有重蒂如乳者爲

木瓜無此則榎櫧也可以進酒去痰道家生壓取
汁和甘松元參末作溼香云甚爽神也說曰榎櫧氣
大而黃色無重蒂者也榎子乃木瓜之短小而味
酢濶者也榎梓則櫧類之生於北土者也三物與
木瓜皆是一類各種故其形狀功用不甚相遠但
木瓜得木之正氣爲可貴耳

氣味酸平無毒主治解酒去痰宏景食之去惡心止
心中酸水藏器煙食止痢浸油梳頭治白髮赤大明

煮汁服治霍亂轉筋吳瑞

榎梓

音溫李○

釋名

時珍曰榎梓性溫而氣醇故名榎音李香氣也

集解

志曰：榅桲生北土似櫞子而小。頌曰：今關陝有之。沙苑出者更佳。其實大抵類櫞，但膚慢

而多毛味尤甘其氣芬馥置衣笥中亦香。

藏器曰：樹如林檎花白綠色。宗奭曰：食之須淨去浮毛。

爾損人肺花白色亦香最多生蟲少有不蛀者。

時珍曰：榅桲蓋楃檳之類生於北土者故其形狀功

用皆相彷彿。李珣：南海藥錄言：關中謂林檎爲榅桲。

按述征記云：林檎佳美。榅桲微大而狀醜有毛。

其味香關輔乃有江南甚希觀此則林檎榅桲蓋相似而二物也。李氏誤矣。

氣味酸甘微溫無毒。

士良曰：發毒熱秘大小腸聚胸中痰壅澀血脈不宜多食。

瑞曰：同車螯食發疝氣。

主治溫中下氣消食除心閒酸水去

臭辟衣魚。

開寶：去胸膈積食止渴除煩將臥時噉一

兩枚生熟皆宜。

蘇頌曰：此太多亦痞塞胃脘也。

主水瀉腸。

虛煩熱散酒氣並宜生食

李珣

木皮主治搗末傅瘡

蘇頌

山楂

音渣。唐本草

校正

唐本草木部赤爪木宋圖經外類

棠棣子丹溪補遺

山楂皆一物也

今併于一但以山楂標題

釋名赤爪子

側巧切唐本

鼠楂

唐本猴楂危氏茅楂

日用杌子

音繫梅並爾雅

羊棟

唐本

棠棣子

圖經

山裏果

食鑑時珍曰

山楂味似楂子故亦名楂

世俗皆作查字誤矣查

音楂乃水中浮木與楂何關

郭璞註爾雅云杌音

求樹如梅其子大如指頭赤色似小柰可食

此卽山楂也世俗作棟字亦誤矣棟乃櫟實於杌何關

楂杌之名見於爾雅自晉宋以來不知其原但用

査棟耳此物生於山原茅林中猴鼠喜食之故又

山楂也俗作査字亦誤矣査乃櫟實於杌何關

査耳此物生於山原茅林中猴鼠喜食之故又

有諸名也唐本草赤爪木當作赤棗蓋棗爪音訛也榦狀似赤棗故爾范成大虞衡志有赤棗子王酸棗百選方云山裏紅果俗名

集解

恭曰

赤爪木赤榦也

出山南申安

隨諸州小

榆赤色

藏器曰

赤爪草卽鼠榦

生滁州

二月開白

小榦而赤人食之

頌曰

棠棣子生滁州

二月開白

花隨便結實采無時

彼人用治

下痢及腰疼有效

物

他處亦有不入藥用

時珍曰

赤爪棠棣山榦

後人不知卽此也

也古方罕用故唐本雖有赤爪

後人不知卽此也

自丹溪朱氏始著山榦之功而後遂爲要藥其類也

有二種皆生山中一種小者

山人呼爲棠杞子茅芽

有二種皆生山中一者

如牽牛子核搗和糖蜜作爲榦糕以充果物其核

榦小者去皮核

如指頭

九月乃熟小兒采而賣之閩人取

其核

狀如牽牛子黑色甚堅

一種大者山人呼爲羊核

林人取其核

子樹高丈餘花葉皆同但實稍大而色黃綠皮纏
肉虛爲異爾初甚酸澀經霜乃可食功應相同而
采藥者

不收

實脩治

時珍曰九月霜後取帶熟者去核曝乾或蒸熟去皮核搗作餅子日乾用

氣味酸冷無毒

時珍曰酸甘微溫生食多令人嘈煩易飢損齒齒齶人尤不宜也

主治煮汁服止水痢沐頭洗身治瘡癩

唐本草煮汁洗

漆瘡多瘥

宏景治腰痛有效

蘇頌

消食積補脾治小腸

癰氣發小兒瘡疹

吳瑞健胃行結氣治婦人產後兒

枕痛惡露不盡煎汁入沙糖服之立效

震亨

化飲食

消肉積癥痰飲痞滿吞酸滯血痛脹

時珍

化血塊

氣塊活血

原甯

發明

震亨曰

山楂大能尅化飲食若胃中無食積脾虛不能運化不思食者多服之則反尅伐

脾胃生發之氣也時珍曰凡脾弱食物不尅化胸腹酸刺脹悶者於每食後嚼二三枚絕佳但不可

多用恐反尅伐也按物類相感志言煮老雞硬肉入山楂數顆卽易爛則其消肉積之功蓋可推矣

珍隣家一小兒因食積黃腫腹脹如鼓偶往羊枕樹下取食之至飽歸而大吐痰水其病遂愈羊枕乃山楂同類醫家不用而

有此效則其功應相同矣

附方

新六偏墜疝氣

山楂核肉茴香炒各一兩爲末糊丸梧子大每服一百丸空心

白湯下

生易簡方

老人腰痛及腿痛用山楂核子鹿茸炙等分爲末蜜丸梧子大每服一百丸空心

服百丸

腸風下血

用寒藥熱藥及脾弱藥俱不效者獨用山裏果俗名酸棗又名

鼻涕團乾者爲末艾湯調
下應手卽愈一百一選方

乾山楂爲末湯點服之立

出紅活

又法

猴楂五個酒煎

危氏得效方

痘疹乾黑

危困者

入水溫服

卽出

危氏得效方

痘疹乾黑

用棠棣

痘疹乾黑

子爲末紫草煎酒

調酒

全幼心鑑

食肉不消

山楂內四兩水煮

食之并飲其汁

方

簡便

核主治吞之化食磨積治癩疝

時珍

附方

新

二難產

山楂

核七七粒百草霜

爲衣酒吞下

海上方

陰腎癩腫

見方

欖橄

赤爪木氣味苦寒無毒

主治消積治反胃

時珍

主治水痢頭風身癢

唐本

根主治

消積治反胃

時珍

莖葉主治煮汁洗漆瘡

時珍○出肘後

菴羅果

宋開寶

釋名

菴摩羅迦果

出佛書

香蓋

時珍曰菴羅梵音二合者也

言清淨是也

集解

志曰菴

羅果樹生若林檎而極大

宗奭曰西

洛甚多梨之類也其狀似梨先諸梨熟

七夕

前後已堪噉

色黃如鶯梨纔熟便鬆軟入藥亦希

時珍曰按一統志云

菴羅果俗名香蓋乃果中極

品種出西域亦柰類也葉似茶葉實似北梨

五六月熟多食亦無害今安南諸番亦有之

士良曰酸微寒

志曰動風疾凡天

氣味甘溫無毒

行病及食飽後俱不可食同大蒜

主治食之止渴

開寶

辛物食令人患黃病

主治食之止渴

開寶

主婦人經脈不通丈

夫營衛中血脈不行久食令人不飢

良

葉主治渴疾煎湯飲

士

柰

別錄下品

葉主治渴疾煎湯飲

良

釋名頻婆

音波。時珍曰篆文柰字象子綴于木之形梵言謂之頻婆今北人亦呼之猶

云端好也

集解

宏景曰柰江南雖有而北國最豐作脯食之不宜人林檎相似而小俱不益人王良曰此

有三種大而長者爲柰圓者爲林檎皆夏熟小者

味澀爲檸秋熟一名楸子

時珍曰柰與林檎一類皆似林檎而大西土最多可栽可壓

二種也樹實皆似林檎而大西土最多可栽可壓

有白赤青三色白者爲素柰赤者爲丹柰亦曰朱

柰青者爲綠柰皆夏熟涼州有冬柰冬熟子帶碧

色孔氏六帖言涼州白柰大如兔頭西京雜記言

土林苑紫柰大如升核紫花青其汁如漆著衣不可浣名脂衣柰此皆異種也郭義恭廣志云西方例多柰家家收切暴乾爲脯數十百斛以爲蓄積謂之頻婆糧亦取柰汁爲豉用其法取熟柰納瓮中勿令蠅入六七日待爛以酒醃滿拌令如粥狀下水更拌瀘去皮子良久去清汁傾布上以灰在下引汁盡劃開日乾爲末調物甘酸得所也劉熙釋名載柰油以柰搗汁塗繪上暴燥取下色如油也今關西人以赤柰楸子取汁塗器中暴乾名果單是矣味甘酸可以饋遠杜恕篤論云日給之花似柰柰實而日給零落虛偽與真實相似也則日給乃柰之不實者而王羲之帖云來禽日給皆囊盛爲佳果則又似指柰爲日給矣木槿花亦名日及或同名耳

實氣味苦寒有小毒多食令人肺壅臚脹有病人尤甚

別錄。思邈曰酸苦寒濁無毒時珍曰案正要云頻婆甘無毒

主治補中焦

諸不足氣和脾治卒食飽氣壅不通者搗汁服孟說

益心氣耐飢

千金

生津止渴

正要

林檎

宋開寶

校正

併入拾遺文林郎果

釋名來禽

法帖

文林郎果

藏器

曰文林郎生渤海閒云其樹從河中浮來有文

林郎拾得種之因以爲名珣曰文林郎南人呼爲榆梓是矣時珍曰案洪玉父云此果味甘能來眾禽于林故有林禽來禽之名又唐高宗時紀王李謹得五色林檎似朱柰以貢帝大悅賜謹爲文林

郎人因呼林檎爲文林郎果又述征記云林檎實佳美其榆梓微大而狀醜有毛而香關輔乃有江

南甚希據此則林檎是文林郎非榆梓矣

集解

志曰

林檎在處有之樹似柰皆二月開粉紅花子亦如柰而差圓六月七月熟頌曰亦有

甘酢二種白者早熟而味脆美酢者差晚須爛熟乃堪噉今醫家乾之入治傷寒藥謂之林檎散時珍曰林檎卽柰之小而圓者其味酢者卽楸子也其類有金林檎紅林檎蜜林檎黑林檎皆以色味立名黑者色似紫柰有冬月再實者林檎熟時曬乾研末點湯服甚美謂之林檎麩僧贊蠹物類相感志云林檎樹生毛蟲埋蠶蛾于下或以洗魚水澆之卽止皆物性之妙也

氣味酸甘溫無毒

思邈曰酸苦平澑無毒多食令

痰澑氣令人好唾或生瘡癧閉百脈人百脈弱志曰多食發熱及冷

亂肚痛

大明消渴者宜食之蘇頌療水穀痢洩精孟謗小

兒閃癖

時珍

附方

舊水病不止

升并林檎食之 林檎半熟者十枚水二升煎一

小兒下痢

林檎構子同杵汁任意服之

子母秘錄

小兒閃癖

頭髮黃瘰疬

瘦弱者乾林檎脯研末和醋傅之

同上

東行根主治白蟲蛻蟲消渴好唾

孟詵

柿

音士○別
錄中品

正字

按柿說文赤實果从木東聲
東篆文从巾正書宜作柿

釋名

時珍曰柿從昜音萍諧聲也俗作柿

集解

頌曰柿南北皆有之其種亦多紅柿所在皆有黃柿生汴洛諸州朱柿出華山似紅柿而

圓小

皮薄可愛味更甘珍椑柿色青可生啖諸柿皆美而益人又有一種小柿謂之軟棗俗呼

爲牛嫋

柿世傳柿有七絕一壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉可玩六嘉實可啖七落葉肥大

可以臨書

宗奭曰柿有數種著蓋柿于蒂下別有一重又有牛心柿狀如牛心蒸餅柿狀如市賣蒸

餅

華州朱柿小而深紅塔柿大于諸柿去皮挂木上風日乾之佳火乾者味不甚佳其生者可以溫

水養去澀味也

時珍曰柿高樹大葉圓而光澤四月開小花黃白色結實青綠色八九月乃熟生柿

置器中自紅者謂之烘柿

日乾者謂之白柿火乾者謂之烏柿水浸藏者謂之醞柿其核形扁狀如

木鼈子仁而硬堅其根甚固謂之柿盤案事類合

璧云柿朱果也大者如楪八棱稍扁其次如拳小

或如雞子鴨子牛心鹿心之狀一種小而

如拆二錢者謂之猴棗皆以核少者爲佳

烘柿

時珍曰烘柿非謂火烘也卽青綠之柿收置器中自然紅熟如烘成澀味盡去其甘如蜜

歐陽脩歸田錄言襄鄧人以楓櫟

或榅桲或橘葉于中則熟亦不必

氣味甘寒澀無毒

宏景曰生柿性冷鹿心柿尤不可食令人腹痛宗奭曰凡柿皆

涼不至大寒食之引痰爲其味甘也日乾者食多

動風凡柿同蟹食令人腹痛作瀉二物俱寒也時

珍曰按王璆百一選方云一人食蟹多食紅柿至夜大吐繼之以血昏不省人一道者云惟木香可解乃磨汁灌之卽漸甦醒而愈也

主治通耳鼻氣治腸胃不足解

酒毒壓胃閒熱止口乾

別錄續經脈氣 試

發明

藏器曰飲酒食紅柿令人易醉或心痛欲死別錄言解酒毒失之矣

白柿 ○ **柿霜脩治**

時珍曰白柿卽乾柿生霜者其法用大柿去皮搊扁日曬夜露

至乾內瓮中待生白霜乃取出今人謂之柿餅亦曰柿花其霜謂之柿霜

氣味甘平滯無毒

宏景曰日乾者性冷生柿彌冷火熏者性熱

主治補

虛勞不足消腹中宿血滯中厚腸健脾胃氣

試開

胃澀腸消痰止渴治吐血潤心肺療肺痿心熱歎

本草綱目果部

卷三十一

藏

治反胃咯

血血淋腸澼痔漏下血

時珍曰

霜清上焦心肺熱生津

止渴化痰寧嗽治咽喉口舌瘡痛

時珍

發明

震亨曰乾柿屬金而有土屬陰而有收意故止血治嗽亦可爲助也

時珍曰柿乃脾肺血分之果也其味甘而氣平性滯而能收故有健脾

潤腸治嗽止血

之功蓋大腸者肺之合而胃之子也真正柿霜乃其精液入肺病上焦藥尤佳按方

勺泊宅編云外兄劉豫云病臟毒下血凡半月自

分必死得一方只以乾柿燒灰飲服二錢遂愈又王璆百一方云會通判子病下血十年亦用此方自

一服而愈爲散爲丸皆可與本草治腸澼消宿血

矣又經驗方云有人三世死于反胃病至孫得一方用乾柿餅同乾飯日日食之絕不用水飲如法

解熱毒之義相合則柿爲太陰血分之藥益可徵

方用乾柿餅同乾飯日日食之絕不用水飲如法

各等分搗丸梧子大每服五
十九丸茅香湯下日三普濟面生野黯

乾柿日日食之

普

濟鼻窒不通

乾柿同粳米煮粥日食

聖濟耳聾鼻塞

乾柿三枚細切以粳

米三合豆豉少許煮粥日空心食之

聖惠

痘瘡入目白柿日日食之良

腫脹

爛瘡用柿霜柿蒂等分燒研傅之甚效

筆峰雜興解桐油毒

乾柿餅食之

普濟

烏柿火熏者氣味甘溫無毒主治殺蟲療金瘡火瘡

生肉止痛

別錄

治狗齧瘡斷下痢

宏景

服藥口苦及嘔逆者食少許卽止

逆者食少許卽止

藏器

酈柿音脩治瑞曰水藏者性冷鹽藏者有毒時珍

廩也水收鹽浸之外又有以

熟柿用灰汁澡三四度令汁盡着主治濬下焦健

器中經十餘日即可食治病非宜

脾胃消宿血

訖

柿餅脩治

時珍曰案李氏食經云用糯米洗淨一斗大乾柿五十個同搗粉蒸食如乾入

煮棗泥和拌之

主治作餅及糕與小兒食治秋痢

訖

黃柿

和米粉作糗蒸與小兒食止下痢下血有效

藏器

柿蒂

氣味濶平無毒主治欬逆噦氣煮汁服

訖

發明

震亨曰人之陰氣依胃爲養土傷則木挾相

火直冲

清道而上

作欬逆

古人以爲胃寒既

用丁香柿蒂不知其孰爲補虛

敦爲降火不能清

氣利痰惟有助火而已

時珍曰

欬逆者氣自臍下

冲脈直上至咽

膈作呃忒蹇逆

之聲也朱肱南陽

書以噦爲欬逆王履源洞集以欬嗽爲欬逆皆誤

矣噦者乾呕有聲也

欬逆有傷寒

吐下後及久病

產後老人虛人陰氣大虧

陽氣暴逆自下焦逆至

卷三十一

柿

上焦而不能出者有傷寒失下及平人痰氣抑遏而然者當視其虛實陰陽或溫或補或泄熱或降氣或吐或下可也古方單用柿蒂煮汁飲之取其辛苦溫能降逆氣也濟生柿蒂散加以丁香生薑之收效矣至易水張氏又益以人參治病後虛人欬逆亦有功績丹溪朱氏但執以寒治熱之理而不解從治之法矯枉之過矣若陳氏三因又加以良薑之類是真以爲胃寒而助其邪火者也

附方

新欬逆不止

濟生柿蒂散治欬逆胸滿用柿蒂丁香各二錢生薑五片水煎

服或爲末白湯點服○潔古加人參一錢治虛人欬逆○三因加良薑甘草等分○衛生寶鑑加青皮陳皮○王氏易簡加半夏生薑

木皮主治下血曬焙研末米飲服二錢兩服可止

頌

湯火瘡燒灰油調傅

時

根主治血崩血痢下血

時

樟

柿

音卑士○
宋開寶

釋名漆

日華綠

用青

樟

廣

寶

花

樟

日

赤

棠

樟

時珍曰熟則黃赤惟此雖熟亦青黑色

搗碎浸汁謂之

他柿至

物故有漆柿之名

集解

志曰居賦

所謂梁侯烏

之柿是也

頌曰樟

出

宣歙荆襄閩廣諸州

大如杏惟堪生啖不可爲乾也

氣味

甘寒清無毒

宏景曰

樟生啖性冷服石家宜

之不入藥用不可與蟹同食

本草綱目卷四十一

樟

樹

三

樟

樹

三

樟

樹

三

樟

樹

三

樟

樹

三

主治壓丹石藥發熱利水解酒毒去胃中熱久食

令人寒中

開寶

止煩渴潤心肺除腹臟冷熱

日華

君遷子

拾遺

釋名

千金作軟棗

楔棗

廣志

音逞

牛嫋柿

名苑

丁香柿

用

紅藍棗

齊民要術

○時珍曰

君遷之名始見于左

思吳都賦而著其狀于劉欣期交州記名

義莫詳

楔棗其形似棗而軟也

司馬光名苑云

君遷子似馬嫋卽今牛嫋柿也以形得名崔豹古今

注云牛嫋柿卽楔棗葉如柿子亦如柿而小唐宋

諸家不知君遷楔棗牛嫋柿皆一物故詳證之

集解

藏器曰

君遷子生海南樹高丈餘子中有汁

如乳汁甜美吳都賦平仲君遷是也

時珍曰

君遷卽楔棗其木類柿而葉長但結實小而長狀

如牛嫋乾熟則紫色

黑一色

種小圓如指頭大者名狀

君遷

如牛嫋乾熟則紫色

如乳汁甜美吳都賦平仲君遷是也

時珍曰

君遷卽楔棗其木類柿而葉長但結實小而長狀

如牛嫋乾熟則紫色

黑一色

種小圓如指頭大者名狀

丁香柿味尤美救荒本草以爲羊矢棗誤矣其樹接大柿最佳廣志云梗棗小柿也肌細而厚少核可以供御卽此

氣味甘濤平無毒**主治**止消渴去煩熱令人潤澤
器藏鎮心久服悅人顏色令人輕健珣

安石榴下別錄

下別
品錄

釋名若榴

雅廣
四

舟若古注今
金罍

時珍曰榴者瘤也丹實垂垂如贅瘤也博

歸物志云漢故名安

石張
抑塞

鷔出使西域得
福又按齊民要

塗林安石榴種以
術云凡植榴者須安

取僵此石也枯若骨

木子
又明

根下卽花實繁乃扶桑之名榴

茂則安石之名義或

矣丹
筆若
衡之
云稱

五傳

代元吳檻越賦王所錢謂謬灼

改若旭日金闕扶桑者是

俎言榴甜者名天漿道家書謂榴爲三尸酒言三尸蟲得此果則醉也故范成大詩云玉池咽清肥如歸

集解

宏景曰

石榴花赤可愛故人多植之尤爲外國所重有甜酢二種

醫家惟用酢者之根壳

榴子乃服

食者所忌

頌曰安石榴本生西域今處

處有之木不甚高大枝柯附榦

自地便生作叢種

極易息折其條盤土中便生也

花有黃赤二色實

有甘酢二種甘者可食

酢者入藥又一種山石榴

形頗相類而絕小不作房

生青齊閒甚多不入藥

用蜜漬以當果甚美

宗奭曰石榴有酸淡二種

旋結實中紅孫枝甚多秋後經霜則

開單葉花旋結實

自拆裂一子白瑩澈

如水晶者味亦甘謂之水晶石榴惟酸石榴入藥須老木所結收留陳久者

乃佳時珍曰榴五月開花有紅黃白三色單葉者

言不結實者出積石山或云卽山石榴酸苦者

也

酉陽雜俎言南詔石榴皮薄如紙瑣碎錄言河陰
石榴名三十八者其中只有三十八子也又南中
有四季榴四時開花秋月結實實方綻隨復開花
有火石榴赤色如火海石榴高一二尺卽結實皆
異種也案事類合璧云榴大如盆赤色有黑斑點
皮中如蜂窠有黃膜隔之子形如人齒淡紅色亦
有潔白如雪者潘岳賦云榴者天下之奇樹九州
之名果千房同膜千子如一禦飢療渴解醒止醉
甘石榴氣味甘酸溫潤無毒多食損人肺別錄曰多
食損齒令黑凡服食藥物人忌食之震

亨曰榴者留也其汁酸性滯戀成痰

主治咽喉

燥渴錄能理乳石毒

孟制三尸蟲

時

主治咽喉

搗汁頓服一枚孟時珍止瀉痢崩中帶下

酸石榴氣味酸溫潤無毒主治赤白痢腹痛連子

搗汁頓服一枚孟時珍止瀉痢崩中帶下

孟

止瀉痢崩中帶下

時

珍

發明

時珍曰：榴受少陽之氣而榮于四月，盛于五月，實于盛夏，熟于深秋。丹花赤實，其味甘酸。

其氣溫濁，具木火之象，故多食損肺齒而生痰涎。酸者則兼收斂之氣，故入帶下崩中之藥。或云白酸。

皮治紅痢，紅皮治白痢，紅亦通。

榴

附方

新

腸滑久痢

黑神散

用酸石榴一個，煅烟盡出火毒，一夜研末，仍以酸石榴一塊煎湯服。

久瀉不止

方同上

並普濟方

痢血五色

或膿或水冷熱

神效無比

並普濟方

小便不禁

聖濟

酸石榴燒存性無則

酸石榴燒存性無則

不調酸石榴五枚連子搗汁

並普濟方

小便不禁

聖濟

酸石榴燒存性無則

酸石榴燒存性無則

二升每服五合神妙

並普濟方

小便不禁

聖濟

酸石榴燒存性無則

酸石榴燒存性無則

用枝燒灰代之每服二錢用柏白皮切焙四錢煎

並普濟方

小便不禁

聖濟

酸石榴燒存性無則

酸石榴燒存性無則

湯一盞入榴灰再煎至八分空心溫服晚再服

並普濟方

小便不禁

聖濟

酸石榴燒存性無則

酸石榴燒存性無則

聖惠

並普濟方

小便不禁

聖濟

酸石榴燒存性無則

酸石榴燒存性無則

原皮封之，麻紮定牛屎封護，待經霜摘下，傾出壳

並普濟方

小便不禁

聖濟

酸石榴燒存性無則

酸石榴燒存性無則

個劈破炭火簇燒存性出火毒爲末每服一錢
別以酸石榴一瓣水一盞煎湯調服 經驗方

痢久瀉

陳石榴皮酢者焙研細末每服二錢米飲
下患二三年或二三月百方不效者服之久

便止不可輕忽

小兒風癇

大生石榴一枚割去頂
剜空入全蠍五枚黃泥

固濟煅存性爲末

每服半錢乳汁
聖濟錄

卒病耳聾

八九月間

調下或防風湯下亦可

孔如毬子大內米醋令滿以原

蓋入少黑李子仙

取石榴一個上作

孔如毬子大內米醋令滿以原

蓋入少黑李子仙

夜沼子末取水滴耳中勿動

腦中若動勿驚如此三

案唐慎微本草收采此方云出孫

眞人而黑李子不知爲何

物也其仙沼子卽預知子

食石榴損齒 黃研末棗肉炙

傅上丸和丸白湯梧子大每日空腹三

急麵圍四畔灸之以痛爲度仍內

榴末一方 腳肚生

普濟

用榴皮着瘡

瘡

初起如粟搔之漸開黃水浸淫癢痛潰爛遂致遶脰而成痼疾用酸榴皮煎湯冷定日日掃之

取愈乃止

醫學正宗

酸榴東行根氣味

同皮

主治蛻蟲寸白

別錄

青者入染

鬚用

權

治口齒病

頌

止澀瀉痢帶下功與皮同

附方

舊三汁

金蠶蠱毒

吮白礬味甘嚼黑豆不腥者即是中蠱也石榴根皮煎濃

新二汁

卽吐出活蠱無不寸白

一握石榴東引根

一握洗剉用水

升煎

取半盃五更溫服

盡至明取下蟲一大團崔元亮海上方用榴皮煎

永絕根本食粥補之

米作粥

握炙乾水二大盞濃煎

東生者一大盞空心服之亦良

通再服

斗門赤白下痢

方同

水煮米作粥

握炙乾水二大盞濃煎

東生者一大盞空心服之亦良

通再服

初

榴花主治陰乾爲末和鐵丹服一年變白髮如漆

藏器○鐵丹飛鐵爲丹也亦鐵粉之屬

百葉者治心熱吐血又研末

吹鼻止衄血立效亦傳金瘡出血

頌蘇

附方

舊一
新二

金瘡出血

榴花半斤石灰一升搗和陰乾每用少許傅之立止崔

元亮
方

鼻出衄血

醋榴花二錢半黃蜀葵花一錢爲末每服一錢水一盞煎服效乃止

聖濟
錄

九竅出血

石榴花取效葉亦可

橘

本經上品

校正

志曰自木部移入此

釋名

時珍曰

橘從喬音鵠諧聲也又雲五色爲慶

二色爲喬喬雲外赤內黃非烟非霧郁郁紛

紛之象橘實外赤內黃剖之香霧紛郁

有似乎喬雲橘之從喬又取此意也

集解

別錄曰柚生江南及山南山谷十月采

叢

如橘有甘有酸酸者名胡柑今俗謂橙爲柚非矣案郭璞云柚似橙而實酢大于橘孔安國云小曰橘大曰柚皆爲柑也頌曰橘柚今江浙荆襄湖嶺皆有之木高一二丈與枳無辨刺出莖間夏初生白花六七月成實至冬黃熟舊說小爲橘大爲柚乎宗奭曰橘柚自是兩種本草云一名橘皮後人誤加柚字妄生分別且青橘黃橘治療尚殊況柚爲別種乎惟郭璞所言乃眞識橘柚者若不如此橘柚蘇恭所說甚是蘇頌不知青橘卽橘之未黃者乃以爲柚誤矣夫橘柚柑三者相類而不同橘實小其瓣味微酢其皮稍厚而黃味辛而甘柚大小皆如橙其瓣味酢其皮最厚而黃味甘而不甚辛如橘分之卽不誤矣按事類合璧云橘樹高丈許枝

多生刺其葉兩頭尖綠色光面大寸餘長二寸許
四月著小百花甚香結實至冬黃熟大者如盃包
其中略有瓣瓣中有核也宋韓彥直著橘譜三卷甚詳
州皆不入云柑橘出蘇州臺州西出荊州南出閩廣撫
多是接成惟種成者爲上也柑品有八橘品十有四
可霧乃橘之上品也朱橘小而色赤如火綠橘扁小而多香
外橘狀似乳柑皮堅瓢多味佳隆冬采之生意如新乳碧
結其脈心紅瓣巨多液經春乃絕酸芳塌橘狀大而扁
沙橘細小甘美油橘皮微小極軟美包橘外薄內盈
倍陽春之採下品也早黃甘美油橘皮似油飾中堅外黑乃橘
而自變鼠其理皺密相密感如實大橘秋半已丹凍橘八月開花
故膚理皺地實志荔子也大橘皮光半已心丹凍橘八月開花
枳果相密感如實大橘秋半已丹凍橘八月開花
然周曰橘也俗言橘見戶傳橘下淮繁涅槃則結實出冬結橘
而自變鼠其理皺地實志荔子也大橘皮光半已心丹凍橘八月開花
而自變鼠其理皺地實志荔子也大橘皮光半已心丹凍橘八月開花
而自變鼠其理皺地實志荔子也大橘皮光半已心丹凍橘八月開花

橘實氣味甘酸溫無毒

宏景曰食之多痰恐非益也原曰多食戀膈生痰滯

肺氣○瑞曰同螃蟹食令人患軟癰

主治

甘者潤肺酸者聚痰器止

消渴開胃除胸中膈氣

明大

發明

時珍曰橘皮下氣消痰其肉生痰聚飲表裏之異如此凡物皆然今人以蜜煎橘充果食

甚佳亦可
薺菹也

黃橘皮

釋名紅皮

湯陳皮

食療○

宏景曰橘皮療氣大勝以東橘爲好西

江者不如須陳久者爲良好古曰橘皮以色紅日久者爲佳故曰紅皮陳皮去白者曰橘紅也

脩治

敷曰凡使勿用柚皮柑子皮二件用不得凡

脩事須去白膜一重剉細以鯉魚皮裹一宿

至明取用宗奭曰本草橘柚作一條蓋傳誤也後世不知以柚皮爲橘皮是貽無窮之患矣此乃六

陳之一天下日用所須今人又多以乳柑皮亂之
不可不擇也柑皮不甚苦橘皮極苦至熟亦苦或
以皮之緊慢分別又因方土不同亦互有緊慢也
時珍曰橘皮紋細色紅而薄內多筋脈其味苦辛
厚柑皮紋粗色黃而厚內多白膜其味辛甘柚皮最
但以此別之卽不差矣橘皮性溫柑皮性冷不可
不知今天下多以廣中來者爲勝江西者次之然
亦多以柑皮雜之柑皮猶可用柚皮則懸絕矣
凡橘皮入和中理胃藥則留白入下氣消痰藥則
去白其說出於聖濟經去白者以白湯入鹽洗潤透
刮去筋膜曬乾用亦有煮焙者各隨本方

氣味苦辛溫無毒主治胸中瘕熱逆氣利水穀久
服去臭下氣通神經下氣止嘔欬治氣衝胸中吐
逆霍亂療脾不能消穀止洩除膀胱留熱停水起
逆霍亂療脾不能消穀止洩除膀胱留熱停水起

淋利小便去寸白蟲別錄清痰涎治上氣欬嗽開胃

主氣痢破癰瘕痃癖甄權療嘔噦反胃嘈雜時吐清

水痰痞痃瘧大腸閼塞婦人乳癰入食料解魚腥

毒時珍

發明

杲曰橘皮氣薄味厚陽中之陰也可升可降爲脾肺二經氣分藥留白則補脾胃去白則

理肺氣同白朮則補脾胃同甘草則補肺獨用則

瀉肺

損脾其體輕浮一能導胸中寒邪二破滯氣

三益脾胃加青皮減半用之去滯氣推陳致新但

多用久服能損元氣也原曰橘皮能散能瀉能溫但

能補能和化痰治嗽順氣理中調脾快膈通五淋

療酒病其功當在諸藥之上時珍曰橘皮苦能瀉能燥辛能散溫能和其治百病總是取其理氣燥

溼之功同補藥則補同瀉藥則瀉同升藥則升同

橘皮苦能瀉能溫能和其治百病總是取其理氣燥

降藥則降脾乃元氣之母肺乃攝氣之籥故橘皮爲二經氣分之藥但隨所配而補瀉升降也潔古張氏云陳皮枳殼利其氣而痰自下蓋此義也同杏仁治大腸氣閼同桃仁治大腸血閼皆取其通滯也詳見杏仁下按方勺泊宅編云橘皮寬膈降氣消痰飲極有殊功他藥貴新惟此貴陳外舅莫強中令豐城時得疾凡食已輒胸滿不下百方不效偶家人合橘紅湯因取嘗之似相宜連日飲之一日忽覺胸中有物墜下大驚目瞪自此汗如雨須臾腹痛下數塊如鐵彈子臭不可聞自此胸次廓然其疾頓愈蓋脾之冷積也其方用橘皮去穰一斤甘草鹽花各四兩水五盞慢火煎乾焙研爲末半夏南星之屬何足以語此哉珍按二賢散世醫徒知變之爲潤下丸用治痰氣有效惟氣實人服之爲潤下丸用治痰氣不足者不宜用之也

附方
二舊十七新
潤下丸
款唾溼痰因火泛上停滯胸膈

皮半斤入砂

鍋內下鹽五錢化水淹過煮乾粉甘草二兩去皮蜜炙各取淨末蒸餅和丸梧桐子大每服百丸白

湯下丹溪方寬中丸治脾氣不和冷氣客於中壅遏不

兩爲末酒糊丸梧子大每食前木香

橘皮湯治男通是爲脹滿用橘皮四兩白朮二

湯下寒并一切雜病嘔噦手足逆冷者用橘皮四兩生薑一兩水二升煎一升徐徐呷之卽止仲景方

心脾之卽睡三日必效皮不眞則不驗

嘈雜吐水真橘皮去白爲末五更安五分於掌心

怪證奇方霍亂吐瀉不拘男女但有一點胃氣存者服

之再生廣陳皮去白五錢眞藿香

五錢水二盞煎一盞時時溫服出一百一選方聖

惠用陳橘皮末二錢湯點服不省者灌之仍燒磚

沃醋布裹磚安心下熨之便活反胃吐食

真橘皮以日照西壁土炒香爲末每服二錢生土

薑三片棗肉一枚水二鍾卒然食噎

橘皮一兩湯浸去瓢焙爲

煎一鍾溫服直指方

本草綱目卷之三十一

橘皮

魚蟹毒

方同上

風痰麻木

凡手及十指麻木大風

橘紅一斤逆流水五碗煮爛去渣再煮至一盃頓

服取吐乃吐痰聖藥也不吐加瓜蒂末摘元方

脾寒諸瘧

不拘老少孕婦只兩服便止真橘皮去白切生薑自然汁浸過一宿銀器內重

湯煮焙乾研末每服三錢用隔年青州棗十個

水一盞煎半盞發前服以棗下之適用方

兒疳瘦

久服消食和氣長肌肉用陳橘皮一兩黃連以米泔水浸一日一兩半研末入麝三

分用豬膽盛藥以漿水煮熟取出用粟米飯和丸

綠豆大每服一二十丸米飲下錢氏小兒方

產後尿閼

不通者陳皮一兩去白爲末每空心溫酒服二錢一服卽通此張不愚方也

婦人產後吹姍

陳皮一兩甘草一錢水煎服卽散良方

散已成者卽潰痛不可忍者卽不疼神驗不可云

喻也用真陳橘皮湯浸去白曬麪炒微黃爲末每

服二錢麝香調酒下初發者一
服見效名橘香散 張氏方

陳皮燒研一錢

麝香少許爲末
日摻名立效散

痛不能行履者濃煎陳皮湯浸良久

青橘皮脩治時珍曰青橘皮乃橘之未黃而青色者薄而光其氣芳烈今人多以小柑

小柚小橙僞爲之不可不慎辨之入藥以湯浸去瓢切片醋拌瓦炒過用

氣味苦辛溫無毒主治氣滯下食破積結及膈氣

頸破堅癩散滯氣去下焦諸溼治左脇肝經積氣

元素治胸膈氣逆脇痛小腹疝氣消乳腫疏肝膽瀉

肺氣珍時

發明

元素曰青橘皮氣味俱厚沉而降陰也入厥陰少陽經治肝膽之病

裏

引經之藥能引食入太陰之倉

破滯削堅皆治在厥陰

下引之病有滯氣則破滯氣無滯氣則損真氣好古

也

陳皮乃足厥陰

之病

也

曰陳皮治高青皮治低與枳壳治胸膈枳實治心下同意震亨曰青皮乃肝膽二經氣分藥故人多

怒

也

有滯氣

也

行其氣也若二經實者當先補而後用之以疏通二經氣加青皮炒黑則入血分也時珍曰青橘

也

又

以疏

也

云疏肝氣加青皮炒黑則入血分也時珍曰青橘皮古无用者至宋時醫家始用之其色青氣烈味

也

又

以疏

也

皮苦而辛治之以醋所謂肝欲散急食辛以散之以

也

又

以疏

也

酸泄之以苦降之也陳皮浮而升入肺脾氣分青

也

又

以疏

也

兒消積多用青皮最能發汗有汗者不可用說出楊仁齋直指方人罕知之嘉謨曰久瘧熱甚必結自

也

又

以疏

也

也不結

也

又

以疏

也

附方

舊二
新七

快膈湯

治冷膈氣及酒食後飽滿用青橘皮一斤作四分四兩用鹽湯浸四兩用醋浸四兩用酒浸各

浸四兩用白沸湯浸四兩用酒浸各三日取出去白切絲以鹽一兩炒微焦研末每用

二錢以茶末五分水煎溫服亦可點服

理脾快氣

青橘皮一斤日乾焙研末甘草末一

兩檀香末半兩和勻收之每用一二錢入鹽少許白湯點服

法制青皮

常服安神調氣

消食解酒益胃不拘老人小兒宋仁宗每食後咀

數片乃邢和璞真人所獻名萬年草劉跂改名延

年草仁宗以賜呂丞相用青皮一斤浸去苦味去

瓢煉淨白鹽花五兩炙甘草六兩舶茴香四兩甜

水一斗煮之不住攬勿令著底候水盡慢火焙乾

勿令焦去甘草茴香只取青皮密收用

王氏易

簡瘡疾寒熱青皮一兩燒存性研末發前溫

酒服一錢臨時再服

聖惠方

傷寒

方

青皮全者研末

產後氣逆

橘青

呃逆

聲聞四隣四花青

下醫林集要

橘

皮爲末葱白童子小便
煎二錢服 經驗後方 婦人乳癧因久積憂鬱乳房內有核如指頭

頭不痛不癢五七年成癰名乳癧不可治也用青皮四錢水一盞半煎一盞徐徐服之日一服或用

酒服丹溪方 聰耳出汁青皮燒研末綿包塞之唇燥生瘡研豬脂

塗調

橘瓢上筋膜主治口渴吐酒炒熟煎湯飲甚效明大

橘核脩治時珍曰凡用須以新瓦焙香去殼取仁研碎入藥

氣味苦平無毒主治腎疰腰痛膀胱氣痛腎冷炒

研每溫酒服一錢或酒煎服之大明治酒燉風鼻赤

炒研每服一錢胡桃肉一個搗酒服以知爲度宗

小腸疝氣及陰核腫痛炒研五錢老酒煎服或酒

糊丸服甚效

時珍

發明

時珍曰橘核入足厥陰與青皮同功故治腰

方治諸疝痛及內癰卵腫偏墜或硬如石或腫

至潰有橘核丸用之有效品味頗多詳見本方

附方

新腰痛

橘核杜仲各二兩炒研末每

服二錢鹽酒下

簡便方

葉氣味苦平無毒主治導胸膈逆氣入厥陰行肝

氣消腫散毒乳癰脇痛用之行經

亨震

附方

新肺癰

綠橘葉洗搗絞汁一

盞服之

吐出膿血即愈

經驗良方

柑寶

宋開

釋名木奴

志曰柑未經霜時猶酸霜後甚甜故名

號爲木

柑子時珍曰漢李衡種柑于武陵洲上

集解

頌曰乳柑出西戎者佳志曰柑生嶺南及江

沙惟乳柑皮入藥山柑皮療咽痛餘皆不堪用又有黃
柑皮皆去氣調中實俱堪食就中以乳柑爲上也時輩
珍曰柑南方果也而閩廣溫臺蘇撫荊州爲盛川
蜀雖有不及之其樹無異于橘但刺少耳柑皮比
橘色黃而稍厚理稍粗而味不苦橘可久留柑橘易
腐敗柑樹畏冰雪橘樹略可此柑橘之異也柑橘易
皮今人多混用不可辨詳見橘下案韓彥直橘正膚理
譜云乳酪故名彼人呼爲眞邑惟泥山者爲最以其味似
婆娑其葉纖長其花香韻其實圓正柑爲假矣其木蠟

其大六七寸其皮薄而味珍脈不黏瓣食不留滓
中一顆僅二三核亦有全无者擘之香霧噀人爲柑
之枝閒可耐久也俟味變甘乃帶葉折故名海紅
柑樹小而顆極大有圍及尺者皮厚色紅可久藏
今獅頭柑亦是其類也洞庭柑種出洞庭山皮細
味美其熟最早也甜柑類洞庭而大每顆必八瓣
不待霜而黃也木柑類洞庭膚粗頑瓣大而少液
故謂之木也朱柑類洞庭而大色絕嫣紅其味酸
人不重之饅頭柑近蒂起如饅頭尖味香美也

頌曰

冷志曰

多食令人肺冷生

痰脾冷發癟

癩大腸瀉利發陰

寶開

皮氣味

辛溫柑皮辛

甘寒外

形雖似而氣味不同

汗

主治利腸胃中熱毒解丹石止暴渴利小便

寶開

附方

新

一難產

柑橘瓢陰乾燒

存性研

末溫酒服

二錢

集效

皮氣味

辛甘寒

無毒

時珍曰

橘皮苦辛溫柑皮辛

甘寒

外形雖似而氣味不同

詵曰多食
令肺燥

主治

下氣調中

藏器

解酒毒及酒渴去白

焙研末點湯入鹽飲之

大明治產後肌浮爲末酒服

雷敷傷寒飲食勞復者濃煎汁服

時珍山柑皮治咽喉

痛效

開寶

核主治作塗面藥

蘇頌

葉主治聾耳流水或膿血取嫩頭七個入水數滴

杵取汁滴之卽愈

蘭氏

橙

宋開寶

釋名金毬

鵠殼

時珍曰案陸佃埤雅云橙柚屬也可登而成之故字從登又諧

本草綱目卷四十一

卷四十一

柑橘

橙

三

也聲

集解

志曰：橙樹似橘而葉大，其形圓大于橘而香皮厚而皺。八月熟時，珍曰：橙產南土，其實似

柚而香葉有兩刻缺，如兩段亦有一種氣臭者，柚乃柑屬之大者，早黃難留，橙乃橘屬之大者，晚熟耐久，皆有大小二種。案事類合璧云：橙樹高枝葉不甚類橘，亦有刺。其實大者如盃，頗似朱欒，經霜早熟，色黃皮厚，蹙衄如沸，香氣馥郁，其皮可以熏衣，可以芼鮮，可以和薤醢，可以爲醬，可以蜜煎，可以糖製爲橙丁，可以蜜制爲橙膏，嗅之則香食之，則美誠佳果也。宗奭曰：橙皮今止以爲果，或合湯待賓，未見入藥宿酒，未解者食之速醒。

氣味

酸寒無毒

士良曰：暖多食傷肝氣，發虛熱，與

乃水獺之屬也。諸家本草皆作檳榔誤矣。

主治洗去酸汁，切和鹽蜜煎。

成貯食止惡心能去胃中浮風惡氣寶行風氣療

開

癰氣發癧癰殺魚蟹毒

良

皮氣味苦辛溫無毒主治作醬醋香美散腸胃惡

氣消食下氣去胃中浮風氣開和鹽貯食止惡心

寶

解酒病孟詵糖作橙丁甘美消痰下氣利膈寬中解

酒時珍

附方

新

二 香橙湯

寬中快氣消酒用橙皮二斤切片

一
餅

兩 檳榔末半兩和作小餅每嚼

生薑五兩切焙擂爛入炙甘草末

送下

奇效良方 痔瘡腫痛

隔年風乾

橙子桶內燒煙熏之

神效

醫方摘要

核主治面黓粉刺溼研夜夜塗之

時珍

附方

新

閃挫腰痛

橙子核炒研酒服

三

錢卽愈攝生方

柚音又○
日華

釋名

櫟與柚

條爾同

壺柑

唐本

臭橙

食性

朱欒

時珍曰

柚

時珍曰

蜜

油然其

狀如卣故名壺亦象形今人呼其黃而小者爲蜜

筭正此意也其大者謂之朱欒亦取團欒之象最

大者謂之香欒爾雅謂之欒音廢又曰榦音賈廣

雅謂之鐸柚鐸亦壺也桂海志謂之臭柚皆一物

但以大小古今方

言稱呼不同耳

集解

恭曰

柚皮厚味甘不似橘皮薄味辛而苦其

肉亦如橘有甘有酸酸者名壺柑今俗人謂

雲夢之柚非矣案呂氏春秋云果之美者江浦之橘

橙爲柚郭璞云柚出江南似橙而實酢大如橘

但以大小古今方

言稱呼不同耳

但以大小古今方

言稱呼不同耳

禹貢云揚州厥包橘柚孔安國云小曰橘大曰柚皆爲柑也頌曰閩中嶺外江南皆有柚比橘黃白色而大襄唐閒柚色青黃而實小其味皆酢皮厚不堪入藥時珍曰柚樹葉皆似橙其實有大小二種小者如柑如橙大者如瓜如升有圍及尺餘者亦橙之類也今人呼爲朱欒形色圓正都類柑橙但皮厚而粗其味甘其氣臭其瓣堅而酸惡不可食其花甚香南人種其核長成以接柑橘云甚良也蓋橙乃橘屬故其皮皺厚而香味苦而辛柚乃柑橘自明矣郭璞云纖大柚也實大如盞皮厚二三寸子似枳食之少味范成大云廣南臭柚大如瓜可食其皮甚厚染墨打碑可代氈刷且不損紙也列子云吳越之間有木焉其名爲櫞碧樹而冬青實丹而味酸食其皮汁已憤厥之疾渡淮而北化而爲枳此言地氣之不同如此

氣味酸寒無毒主治消食解酒治飲酒人口氣

去腸胃中惡氣療妊娠不思食口淡明

皮氣味甘辛平無毒

正誤

時珍曰案沈括筆談云本草言橘皮苦柚皮甘

誤矣柚皮極苦不可入口甘者乃橙也此說似與今柚不同乃沈氏自誤也不可爲據

主治

下氣宜食不入藥

宏景

消食快膈散憤懣之氣化痰

時珍

附方

新

一 痰氣嗽嗽

用香

櫟去核切砂餅內

浸酒封

固一夜煮爛蜜

拌勻時時含咽

葉主治頭風痛同葱白搗貼太陽穴

時珍

花主治蒸麻油作香澤面脂長髮潤燥

時珍

枸櫞

音矩員○宋圖經

校正

原附荳蔻下今分出

釋名香櫞俗作佛手柑

時珍曰義未詳
佛手取象也

集解

藏器曰枸櫞生嶺南柑橘之屬也其葉光其

澤人呼爲香櫞子形長如小瓜狀其皮若橙而光

澤可愛肉甚厚白如蘿蔔而鬆虛雖味短而香芬

大勝置衣笥中則數日香不歇寄至北方人甚貴

重古作五和參用之時珍曰枸櫞產閩廣閒木似

朱欒而葉尖長枝間有刺植之近水乃生其實狀

如人手有指俗呼爲佛手柑有長一尺四五寸者

皮如橙柚而厚皺而光澤其色如瓜生綠熟黃其

核細其味不甚佳而清香襲人南人雕鏤花鳥作

蜜煎果食置之几案可供玩賞若安芋片子蒂而

以溼紙圍護經久不癟或搗蒜罨其蒂上則香更

充溢異物志云浸汁

浣葛紝勝似酸漿也

皮瓢氣味辛酸無毒

宏景曰性溫參曰性冷陶說誤矣藏器曰性溫不冷

主

治下氣除心頭痰水 藏器煮酒飲治痰氣欬嗽煎湯

治心下氣痛

時珍

根葉主治同皮

橘譜

金橘

綱目

釋名金柑

橘譜

盧橘

漢書

夏橘

廣州志

山橘

北戶錄

給客橙

北戶錄

給客橙

魏王花木志

○時珍曰

此橘生時青

盧色黃熟則

如金故有金橘

盧橘之名盧

黑色也或云盧

酒器

之名其形肖之故也

註文選者以枇杷爲盧橘誤

矣案司馬

香如上林賦

云盧橘夏熟

枇杷核大以

二物並列

非一物明矣此橘夏冬相繼故云夏

熟而裴淵廣州志謂之夏橘給客

橙者其芳香如

給客也

集解

時珍曰金橘生吳粵江浙川廣間或言出營道者爲冠而江浙者皮甘肉酸次之其樹似

橘不甚高大五月開白花結實秋冬黃熟大者徑寸小者如指頭形長而皮堅肌理細瑩生則深綠

色熟乃黃如金其味酸甘而芳香可愛糖造蜜漬

皆佳案魏王花木志云蜀之成都臨邛江源諸處

有給客橙一名盧橘似橘而非若柚而香夏冬花

實常相繼或如彈丸或如櫻桃通歲食之又劉恂

嶺表錄云山橘子大如土瓜次如彈丸小樹綠葉

夏結冬熟金色薄皮而味酸偏能破氣容廣人連

枝藏之入臍醋尤加香美韓彥直橘譜云金柑出

江西北人不識景祐中始至汴都因溫成皇后嗜

之價遂貴重藏綠豆中可經時不變蓋橘性熱豆

性涼也又有山金柑一名山金橘俗名金豆木高

尺許實如櫻桃內止一核俱可蜜漬香味清美已

上諸說皆指今之金橘但有一類數種之異耳

氣味酸甘溫無毒主治

下氣快膈止渴解醒辟臭

卷之二十一

皮尤佳

時

枇杷

別錄
中品

釋名

宗奭曰其葉形似琵琶故名

集解

頌曰枇杷舊不出州土今襄漢吳蜀閩嶺江西南湖南北皆有之木高丈餘肥枝長葉大如驢耳背有黃毛陰密婆娑可愛四時不凋

盛冬開白花至三四月成實作核生大如彈丸熟

時色如黃杏微有毛皮肉甚薄核大如芋栗黃褐

色四月采葉暴乾用

時珍曰案郭義恭廣志云枇杷易種葉微似栗冬花春實其子簇結有毛四月

杷熟大者如雞子小者如龍眼白者爲上黃者次之

無核者名焦子出廣州又楊萬里詩云大葉聳長

耳一枝堪滿盤荔支分與核金橘卻無酸頗盡其

狀註文選者以枇杷爲盧橘誤矣詳金橘

實氣味甘酸平無毒

志曰寒說曰溫多食發痰熱傷脾同炙肉及熱麴食令人

患熱黃疾

主治止渴下氣利肺氣止吐逆主上焦熱潤

五臟

大明

葉脩治

恭曰凡用須火炙以布拭去毛不爾射人肺令效不已或以粟稈作刷刷之尤易潔

淨數日

凡采得秤溼葉重一兩乾者三葉重一兩乃爲氣足堪用粗布拭去毛以甘草湯洗一遍用

綿再拭乾每一兩以酥二錢半塗上炙過用時珍

日治胃病以薑汁塗炙治肺病以蜜水塗炙乃良

氣味

苦平無毒

權曰甘微辛宏景曰煮汁飲之則小冷別錄○宏景曰若不治嘔噦不止

止下氣煮汁服

別錄○宏景曰若不治嘔噦不止暇煮但嚼汁咽亦瘥

主治卒喫不止

婦人產後口乾

大明煮汁飲主渴疾治肺氣熱嗽及

肺風瘡胸面上瘡

訖

和胃降氣清熱解暑毒療腳

氣

珍時

發明

時珍曰枇杷葉氣薄味厚陽中之陰治肺胃之病大都取其下氣之功耳山下則火降痰

順而逆者不逆嘔者不嘔渴者不潤欬者不欬矣

宗奭曰治肺熱嗽甚有功一婦人患肺熱久嗽身

如火炙肌瘦將成勞以枇杷葉末通款冬花紫菀

杏仁桑白皮各等分大黃減半如常治訖爲末蜜

丸櫻桃大食後夜臥各含化

一丸未終劑而愈矣

附方

新

七溫病發噦

因飲水多者枇杷葉去毛炙香茅根各半斤水四升煎二升稍

稍飲之方

龐安常方

反胃嘔噦

枇杷

葉去毛炙丁香各一兩

人參二兩

每服三錢

水一盞

二錢

日二服

同上

茶

酒

皷

服薑

三片煎

聖惠

衄血不止

枇杷

葉去毛焙研末茶

服一二錢

日二服

同上

茶

酒

皷

茶

酒

赤鼻

枇杷葉巵子各等分爲末每服二錢溫酒調下日三服本事面上風瘡同方

上

痔瘡腫痛

枇杷葉蜜炙烏梅肉焙爲末以烏梅湯洗貼之集要痘瘡潰

爛

枇杷葉煎湯洗之

摘元

花

主治頭風鼻流清涕辛夷等分研末酒服二錢

日二服

時珍

木白皮

主治生嚼咽汁止吐逆不下食煮汁冷服

尤佳

思邈

楊梅

宋開寶

釋名

杔子音求○時珍曰其形如水楊子而味似梅故名段氏北戶錄名杔子揚州人呼

白楊梅爲聖僧

集解

志曰楊梅生江南嶺南山谷樹若荔枝樹而葉細陰青子形似水楊子而生青熟紅肉在核上无皮壳四月五月采之南人醃藏爲果寄至

北方時

珍曰楊梅樹葉如龍眼及紫瑞香冬月不凋二月開花結實形如楮實子五月熟有紅白紫

三種紅勝于白紫勝于紅

顆大而核細鹽藏蜜漬

餽收皆佳東方朔林邑記云邑有楊梅其大如盃

盃青時極酸熟則如蜜用以釀酒號爲梅香耐甚

珍重之贊甯物類相感志云桑上接楊梅則不酸

楊梅樹生癩以甘草釘釘之則无皆物理之妙也

藏器曰張華博物志言地

瘴處多生楊梅驗之信然

實氣味酸甘溫無毒

說曰熱微毒久食令人發熱損齒及筋忌生葱同食瑞曰

致瘧

主治鹽藏食去痰止嘔噦消食下酒乾作屑發瘡

臨飲酒時服方寸匕止吐酒

開

止渴和五臟能滌

腸胃除煩憤惡氣燒灰服斷下痢甚驗鹽者常含

一枚咽汁利五臟下氣

訛

附方

舊

一下痢不

止

楊梅燒研每米飲服

二錢日二服

普濟

頭痛不

許嗜鼻取嚏妙

楊梅爲末以少

荷茶服二錢或以消

薄

食後

朱氏集驗

彈丸

一切損

楊梅和核搗如泥

會稽錄云

會稽

止

楊梅爲末以少

荷茶服二錢或以消

薄

食後

朱氏集驗

彈丸

一切損

楊梅和核搗如泥

會稽錄云

會稽

傷

散同煎服或同搗末以白

梅肉和丸

薄

食後

朱氏集驗

彈丸

一切損

楊梅和核搗如泥

會稽錄云

會稽

彈丸

一切損

楊梅和核搗如泥

會稽錄云

會稽

彈丸

一切損

楊梅和核搗如泥

會稽錄云

會稽

聖絕妙

核仁主治腳氣

時珍曰案王性之揮塵錄云

會稽

楊梅爲天下冠童貫苦腳氣或云

會稽

楊梅

性之揮塵錄云

會稽

楊梅爲天下冠童貫苦腳氣或云

會稽

楊梅

性之揮塵錄云

會稽

楊梅

性之揮塵錄云

會稽

楊梅仁可治之郡守王嶷餽五十石貫用之而愈取仁法以神漆拌核暴之則自裂出也

樹皮及根主治煎湯洗惡瘡疥癬大明煎水漱牙痛服之解砒毒燒灰油調塗湯火傷時珍

附方

新

二 中 砒 毒

心腹絞痛欲吐不吐面青肢冷用楊梅樹皮煎湯二三盞服之卽愈

王碩

易 風 蟲 牙 痛

普濟方用楊梅根皮厚者焙一

簡 方

每用半錢鼻內瘡之口中含水涎出痛止○摘要

方用楊梅根皮韭菜根廚案上油泥等分搗勻貼于兩腮上半時辰其蟲從眼角出也屢用有效之方

櫻桃

別錄上品

釋名鷺桃

禮註

舍桃

月令荆桃

宗奭曰孟詭本草言此乃櫻非桃也雖非桃類

以其形肖桃故曰櫻桃又何疑焉如沐猴梨胡桃
之廟卽此故王維詩云纔是寢園春薦後非關御
苑烏銜殘藥中不甚用時珍曰其顆如瓊珠故謂
通之案櫻而許慎作鶩桃云鶩所含食故又曰含桃亦
爾雅云楔音戛荆桃也孫炎註云卽今櫻桃

謂之崖蜜者最通大而甘者

集解

頌曰櫻桃處處有之而洛中者最勝其木多

色者謂之朱櫻紫色皮裏有細黃點者謂之紫櫻
味最珍重又有正黃明者謂之蠟櫻小而紅者謂之
尤難得時珍曰櫻桃樹不甚高春初開白花繁英
如雪葉團有尖及細齒結子一枝數十顆三月熟
時須守護否則鳥食無遺也鹽藏蜜煎皆可或同
櫻蜜搗作餠食唐人以酪薦食之林洪山家清供云
桃經雨則蟲自內生人莫之見用水浸良久則

蟲皆出乃可食也試之果然

氣味甘熱濇無毒

大明曰平微毒多食令人吐說食多无損但發虛熱耳有暗

風人不可食食之立發李廷飛曰傷筋骨敗血氣有寒熱病人不可食

脾氣令人好顏色美志錄別止洩精水穀痢

孟詵

主治調中益

發明

宗奭曰小兒食之過多无不作熱此果三月末四月初熟得正陽之氣先諸果熟故性熱

喘嗽者得之立病且有死者也時珍曰案張子和震亨曰櫻桃屬火性大熱而發溼舊有熱病及

儒門事親云舞水一富家有二子好食紫櫻每日啖一二升半月後長者發肺癰幼者發肺癰相繼

而死嗚呼百果之所以養人非欲害人富貴之家縱其嗜欲取死是何天耶命耶邵堯夫詩云爽口物多終作疾眞格言哉觀此則寇朱二氏之言益可證矣王維詩云飽食不須愁內熱大官還有

蔗漿寒蓋謂寒物同食猶可解其熱也

葉氣味甘平無毒

煮老鷺易軟熟

主治蛇咬搗汁飲并傳

之

頌

東行根主治煮汁服立下寸白蛇蟲

大明

枝主治雀卵斑點同紫萍牙阜白梅肉研和日用

洗面

時珍

花主治面黑粉滓

方見李花

山嬰桃

別錄上品

校正

唐本退入有名未用今移入此

釋名朱桃

別錄吳普

麥櫻

別錄李桃

英豆

別錄此說曰此嬰桃俗名李桃又名柰

桃前櫻桃名
櫻非桃也

集解

別錄曰嬰桃實大如麥多毛四月采陰乾宏景曰櫻桃卽今朱櫻可煮食者嬰桃形相似

而實乖異山閒時有之方藥不用時珍曰樹如朱嬰但葉長尖不園子小而尖生青熟黃赤亦不光澤而味惡

不堪食

實氣味辛平無毒主治止洩腸澼除熱調中益脾氣令人好顏色美志

別錄止洩精孟詭

銀杏

日用

釋名白果

日用鴨腳子

時珍曰原生江南葉似鴨掌因名鴨腳宋初始入貢改呼

銀杏因其形似小杏而核色白也

臣詩鴨腳類綠李其名因葉高歐陽脩詩絳囊初

入貢銀杏貴
中州是矣

集解

時珍曰銀杏生江南以宣城者爲勝樹高二
三丈葉薄縱理纖如鴨掌形有刻缺面綠背
淡二月開花成簇青白色二更開花隨卽卸落人
罕見之一枝結子百十狀如棟子經霜乃熟爛去人
肉取核爲果其核兩頭尖三棱爲雄二棱爲雌其
仁嫩時綠色久則黃須雌雄同種其樹相望乃結
實或雌樹臨水亦可或鑿一孔內雄木一塊泥之
亦結陰陽相感之妙如此其樹耐久肌理白膩術
家取刻符印云能召使也文選吳都賦
註平仲果其實如銀未知卽此果否

核仁氣味

甘苦平澗無毒

時珍曰熟食小苦微甘性溫有小毒多食令人

臚脹

瑞曰多食壅氣動風小兒多食昏霍發驚引疳

同鰻鱣魚食患軟風主治生食引

宿解酒熟食益人

李廷飛

熟食溫肺益氣定喘嗽縮

小便止白濁生食降痰消毒殺蟲嚼漿塗鼻面手

足去皺胞黑皺及疥癬瘡驟陰蟲

時珍

發明 時珍曰銀杏宋初始著名而脩本草者不收近時方藥亦時用之其氣薄味厚性濶而收色白屬金故能入肺經益肺氣定喘嗽縮小便生搗能浣油膩則其去痰濁之功可類推矣其花夜開人不得見蓋陰毒之物故又能殺蟲消毒然食多則收令太過令人氣壅臚脹昏頓故物類相感志言銀杏能醉人而三元延壽書言白果食滿千個者死又云昔有饑者同以白果代飯食飽次日皆死也

附方

新十
七

寒嗽痰喘

白果七個煨熟以熟艾作七丸每果入艾一丸紙包再煨

香去艾喫

方

哮喘痰嗽

鴨掌散用銀杏五個麻黃二錢半甘草炙二錢水一鍾半

煎八分臥時服。又金陵一鋪治哮喘白果定喘湯服之無不效者其人以此起家其方用白果二十個炒黃麻黃三錢蘇子二錢款冬花法制半夏桑白皮蜜炙各二錢杏仁去皮尖黃芩微炒各一錢牛甘草一錢水三鍾煎二鍾隨時分作二服不用薑並攝生方

嗽失聲

白果

仁四兩白茯苓桑白皮二兩烏豆半升炒蜜半斤煮熟日乾爲末以乳汁半盞拌溼九蒸九曬丸如

綠豆大每服三五十丸白湯下神效余居士方

小便頻數

白果十四枚七生七煨食

之取效止小便白濁生白果仁十枚搗水飲日一服取效止

赤白帶下

元下

虛僥白果蓮肉江米各五錢胡椒一錢半爲末用烏骨雞一隻去腸盛藥瓦器煮爛空心食之集

簡方 腸風下血銀杏煨熟出火氣食之米飲下

腸風臟毒

銀杏四十九枚去壳

生研入百藥煎末和丸彈子大每服二三丸空心細嚼米飲送下戴原禮證治要訣

牙齒

蟲蠶

生銀杏每食後嚼二個良

手足皴裂

生白果嚼爛夜夜塗之

鼻面酒皹

銀杏酒醉糟同嚼爛

塗旦洗

永類鈐方

切斷頻擦取效

邵氏經驗方

下部瘡瘍

生白果杵塗

陰毛際肉中生蟲如蝨或紅或白癢不可忍

陰毛際肉中生蟲如蝨或紅或白癢不可忍

白果仁嚼細頻擦之取效

劉長春方

頭面癬瘡

生白

成瘡

白果仁嚼細塗之

乳癰潰爛

銀杏半斤以四兩研酒服之

救急水疔暗疔

水疔色黃麻木不痛暗疔瘡凸色

易方

杏去壳浸油中年久

者搗盦之

普濟方

胡桃

宋開寶

釋名羌桃

名物志

核桃

頌曰此果本出羌胡漢時張騫使西域始得種還植之秦

中漸及東土故名之時珍曰此果外有青皮肉包
其形如桃胡桃乃其核也羌音呼核如胡名或
以此或作梵書名播羅師

集解

頌曰胡桃生北土今陝洛間甚多大株厚葉
多陰實亦有房秋冬熟時采之出陳倉者薄

皮多肌出陰平者大而皮肥急捉則碎汴州雖有
而實不佳江表亦時有之南方則無時珍曰胡桃
樹高丈許春初生葉長四五寸微似大青葉兩兩
相對頗作惡氣三月開花如栗花穗蒼黃色結實
至秋如青桃狀熟時漚爛皮肉取核爲果人多以
櫟柳接之案劉恂嶺表錄云南方有山胡桃底平
如檳榔皮厚而大堅多肉少穰其壳甚厚須椎之方破然則南方亦有但不佳耳

核仁氣味甘平溫無毒

頌曰性熱不可多食思邈曰甘冷滑多食動痰飲令

人惡心吐水吐食物志曰多食動風脫人眉
同酒食多令人咯血穎曰多食生痰動腎火

發明

震亨曰胡桃屬土而有火性熱本草云甘平

是無熱矣然又云動風脫人眉非熱何以傷

肺耶

時珍

曰胡桃仁味甘氣熱皮澀肉潤

孫真人

言其冷

滑誤矣

近世醫方用治痰氣喘嗽醋心及

癟風

諸病而酒家往往醉後嗜之則

食多吐水吐

脫眉及酒同食咯血之說亦未必盡然也

但胡桃性熱能入腎肺惟虛寒者宜

之而痰火積熱者不宜多食耳

主治

食之令人肥健潤肌黑鬚髮多食利小便去

五痔搗和胡粉拔白鬚髮內孔中則生黑毛燒存

性和松脂研傅療癰瘍

開寶

食之令人能食通潤血脈

骨肉細膩

說見下

治損傷石淋同破故紙蜜丸

服補下焦

頌

補氣養血潤燥化痰益命門利三焦

溫肺潤腸治虛寒喘嗽腰腳重痛心腹痛血痢

腸風散腫毒發痘瘡制銅毒

時珍

油胡桃氣味辛熱有毒主治殺蟲攻毒治癰腫瘍
風疥癬楊梅白禿諸瘡潤鬚髮

時珍

發明

韓悉曰

破故紙屬火能使心包與命門之火

相

通

胡桃屬木主潤血養血屬陰陰惡燥

故油以潤之佐破故紙有木火相生之妙

古有

云黃蘖無知母破故紙無胡桃猶水母之無鰓也

時珍曰

三焦者元氣之別

使命門者三焦之本原

蓋十原

一委也

命門指所居之府而名爲藏精係

一

胞之物三焦指分治之部而名爲出納腐熟之司

蓋一以體名一以用名其體非脂非肉白膜裹之

在七節之旁兩腎之間二系著脊下通二腎上通

心肺貫屬於腦爲生命之原相火之主精氣之府

一

明光

心肺

貫屬於腦爲生命之原相火之主精氣之府

一

明光

人物皆有之生人生物皆由此出靈樞本臟論已著其厚薄緩結之狀而扁鵲難經不知原委體用之分以右腎爲命門謂三焦有名無狀而高陽生僞譏脈訣承其謬說以誤後人至宋肱南陽活人書陳言三因方論戴起宗脈訣刊誤始著說闢之而知之者尚渺胡桃仁頗類其狀而外皮水汁皆故紙同爲補下焦腎命之藥夫命門氣與腎通藏精血而惡燥若腎命不燥精氣內充則飲食自健肌膚光澤腸腑潤而血脈通此胡桃佐補藥有令人肥健能食潤肌黑髮固精治燥調血之功也命門旣通則三焦利故上通于肺而虛寒喘嗽者宜之下通于腎而腰腳虛痛者宜之內而心腹諸痛可止外而瘡腫之毒可散矣洪氏夷堅志止言胡桃治痰嗽能斂肺蓋不知其爲命門三焦之藥也胡油胡桃有毒傷人咽肺而瘡科取之用其毒也胡桃制銅此又物理之不可曉者洪邁云邁有痰疾因晚對上遣使諭令以胡桃肉三顆生薑三片臥

致水弱火强口舌乾精自溢出或小便赤黃大便燥實或小便大利而不甚渴用胡桃肉白茯苓各

四兩附子一枚去皮切片

蜜丸梧子大每服三十丸米飲下

蛤粉同焙爲末普濟方

便頻數

胡桃煨熟臥時嚼之溫酒下

石淋痛楚

便中有石子者

米煮漿粥一升相和頓服

卽瘥崔元亮海上方

茶生薑等分搗爛水一鍾煎七

分熱服覆衣取汗談楚翁方

風寒無汗

此立定胡桃肉去皮杏仁去皮尖生薑各一兩研膏入煉蜜少許

和丸彈子大每臥時嚼

老

一丸薑湯下普濟方

七分核桃仁五十個煮熟去皮人參五

頓服久嗽不止核桃仁三百五十個炒湯浸去

皮研勻入煉蜜丸梧子大每空心細嚼

一丸人參湯下臨臥再服蕭大尹方

食物醋心

胡桃爛嚼以生薑湯下

立止傳信適用方

食酸齒齦

細嚼胡桃卽解日華子本草

誤吞銅錢

多食胡桃自化共食卽成粉可證矣

李樓方

揩齒

烏鬚

胡桃仁燒過貝母各等分爲散日用之

眼目暗昏

四月內取聖惠根水吞下便覺

桃每日午時食飽以無鼻孔中有泥腥氣爲度

衛生易簡方

耳聾不挺新瓦上

止

胡桃仁枳壳各七個阜角不蛀者一挺新瓦上燒存性研爲細末分作八服每臨臥時一服二

荆芥茶下更一服五更一服

總錄血崩不止

胡桃肉五十枚燈上燒存性研作一服空

心溫酒調下神效

急心氣痛

核桃一個裏煨熟以生薑湯一鍾去核夾

細嚼送下永久不發名盞落湯趙氏經驗

小腸氣痛

胡桃一枚燒灰研末熱酒服之

方良便毒初起

子和儒門事親用胡桃七個燒研

楊氏經驗

用胡桃三枚夾銅錢一個食之卽愈

魚口毒瘡

端午日午時取樹上青胡桃筐內陰乾臨

時全燒爲末黃酒服少行一二三次有膿自大便出無膿卽消二三服平

楊氏經驗一切癰

腫背癰附骨疽未成膿者胡桃十個煨熟去壳槐花一兩研末杵勻熱酒調服

古今錄驗

瘡惡腫胡桃一個平破取仁嚼爛安壳

普濟

痘瘡倒陷

胡桃肉一枚燒存性乾胭脂半錢研勻胡荽煎酒調服

儒門事親

小兒頭瘡久不

桃和皮燈上燒存性盃蓋出火毒入輕粉少許生油調塗一二次愈

保幼大全

酒皺鼻

赤橘核

同上挺子綿裹塞之

普濟方

傷耳

成瘡出汁者用胡桃杵

黑研傅

壓撲

傷損胡桃仁搗和溫酒頓服

圖經本草

疥瘡瘻癢雄黃一錢艾一個

火燒成瘡胡桃仁燒

葉杵熟一錢搗勻綿包夜臥
裹陰囊厯效勿洗 集簡方

胡桃青皮氣味苦澑無毒主治染鬚及帛皆黑

志曰

仙方取青皮壓油和詹
糖香塗毛髮色如漆也

附方

新烏鬚髮胡桃皮蠅等分搗泥塗之染

即黑○總錄用青胡桃三枚和皮

搗細入乳汁三盞于銀石器內調勻搽

鬚髮三五次每日用胡桃油潤之良

癰瘍風胡

桃皮

搗泥入醬清少許硝砂少許

先以泔洗後傅之

外臺

胡桃

白癬風

青胡桃皮一個

搗細入乳汁三盞于銀石器內調勻搽
鬚髮三五次每日用胡桃油潤之良

癰瘍風胡

先以泔洗後傅之

外臺

胡桃

搗細入乳汁三盞于銀石器內調勻搽
鬚髮三五次每日用胡桃油潤之良

癰瘍風胡

先以泔洗後傅之

外臺

胡桃

皮一個

胡桃

搗細入乳汁三盞于銀石器內調勻搽
鬚髮三五次每日用胡桃油潤之良

癰瘍風胡

先以泔洗後傅之

外臺

胡桃

皮一個

胡桃

皮主治止水痢春月研皮汁沐頭至黑煎水可染

褐寶

開

附方

新染鬚髮

胡桃根皮一秤蓮子草十斤切以
芸薹子油一斗慢火煎取五升收之凡

至五斤入炭灰汁洗用油塗之外以牛柿葉包住絹

用先以炭灰汁洗用油塗之外以牛柿葉包住絹

裏一夜洗去用七日卽黑也

總錄

殼主治燒存性入下血崩中藥

時珍

榛子

宋開寶

釋名

古榛字

時珍曰案羅氏爾雅翼云禮記鄭
元註云關中甚多此果關中秦地也榛之

從秦蓋取此意左傳云女贊不過榛栗棗脩以告

虔也則榛有臻至之義以其名告己之虔也古作

莘莘從辛從木俗作

莘誤矣莘音訛

集解

志曰榛生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍
行食之當糧中土亦有鄭元云關中鄜坊甚

多頑曰桂楊有栗叢生實大如杏子中仁皮子
形色與栗無異但小耳大明曰新羅榛子肥白最
良時珍曰榛樹低小如荆叢生冬末開花如櫟花
成條下垂長二三寸二月生葉如初生櫻桃葉多
皺文而有細齒及尖其實作苞三五相黏一苞一
實實如櫟實下壯上銳生青熟褐其壳厚而堅其
仁白而圓大如杏仁亦有皮尖然多空者故諺云
十榛九空案陸機詩疏云榛有兩種一種大小枝
葉皮樹皆如栗而子小形如橡子味亦如栗枝莖
可以爲燭詩所謂樹之榛栗者也一種高丈餘枝
葉如水蓼子作胡桃味遼代上黨甚多久留亦易油壞者也

仁氣味甘平無毒主治益氣力實腸胃令人不飢
健行開寶止飢調中開胃甚驗大明

阿月渾子

拾

校正

自宋部移入此併入海藥無名木皮

釋名胡榛子

拾遺無名子海藥

集解

藏器曰阿月渾子生西國諸番與胡榛子同樹一歲胡榛子二歲阿月渾子也珣曰案徐

袁南州記云無名木生嶺南山谷其實狀若

榛子號無名子波斯家呼爲阿月渾子也

仁氣味辛溫濶無毒

主治諸痢去冷氣令人肥健

藏器治腰冷陰腎虛瘦弱房中術多用之得木香山

茱萸良

李珣

無名木皮

海藥

氣味辛大溫無毒

主治陰腎萎弱囊

下溼瘡竝煎汁小浴極妙

珣

橘子

拾遺

校正

原附鈎粟今拆出

三換良

吳瑞

鉤栗

拾遺

釋名巢鉤子

拾遺

甜櫧子

瑞曰

鉤栗

卽甜櫧子

時珍

二字方音相

近其

狀如櫟

當

作鉤櫟

集解

藏器曰

鉤栗

生江南

山谷木大數

圍冬月不

凋其子似栗

而圓小又

有雀子相

似而圓黑

久食不飢

詳櫧子下

仁氣味甘平無毒

主治食之不飢

厚腸胃令人肥

健

藏器

橡實

音象唐本草。

校正

自木部移入此部

釋名

橡斗

同

櫟柂

音厯

求

杼

杼同序

說

阜斗

同

櫟柂

音厯

求

杼

杼同序

柂

音許。

禹錫曰

案爾雅云

柂杼也

又曰櫟其

實也

柂盛

于苞柂

孫炎註云

柂一名杼也

櫟似櫓之木也

柂其實

也

人謂之櫟

徐人謂之杼

或謂之柂

其子謂之阜

亦

人謂之

杼蓋五方

通語皆一物也

時珍曰

櫟柞木也

實名

也

阜如柞音

相近也

集解

頤曰

櫟實櫟木子也

所在山谷皆有木高二

丈三四月開花黃色八九月結實其

實爲

阜斗櫟

櫟皆有斗而以櫟爲勝

宗奭曰

櫟葉如栗

葉所在有之木堅而不堪充材亦木之性也爲炭

色淡他木皆不及其殼雖可染阜若曾經雨水者其

則他木皆不及其殼亦有殼但小而不及櫟也

時珍曰

櫟有二

種一種不結實者其名曰械其木心赤詩云瑟彼柞棫是也一種結實者其名曰栩其實爲橡二者樹小則聳枝大則偃蹇其葉如櫛葉而文理皆斜句四五月開花如栗花黃色結實如荔枝核而有斜尖其蒂有斗包其半截其仁如老蓮肉山人儉歲采以爲飯或搗浸取粉食豐年可以肥豬北人亦種之其木高二三丈堅實而重有斑文點點大者可作柱棟小者可爲薪炭周禮職方氏山林宜阜物柞栗之屬卽此也其嫩葉可煎飲代茶

實脩治

雷曰霜後收采去殼蒸之從巳至未剉作五片日乾用周憲王曰取子換水浸十五

次淘去澀味蒸極熟食之可以濟飢

氣味苦微溫無毒主治下痢厚腸胃肥健人

恭蘇澀

腸止瀉煮食止飢禦歉歲

大明

發明

思邈曰：橡子非果，非穀而最益人。服食未能
斷穀啖之，尤佳。無氣而受氣，無味而受味。消

食止痢，令人強健不飢。

時珍曰：木實爲果，橡蓋果也。儉歲人皆取以禦飢。昔摯虞入南山飢甚，拾橡

實而食。

唐杜甫客秦州采橡栗自給是矣。

附方

新水穀下痢

日夜百餘行者，橡實二兩、楮葉

灸一兩爲末。

每服一錢，食前烏梅湯調下。

血痢不止

上方加縮砂仁半兩。

下痢脫肛，燒存性。

研末，豬脂和

傅直指方。

痔瘡出血，橡子粉、糯米粉各一升，炒

黃滾水調作

果子飯，上蒸熟食之。不過四五次，效

之不過四

五石癰堅硬

如石，不作膾用。橡子

磨汁塗之，乾則易不

過十度，卽平。

千金方

斗殼脩治

大明曰：入藥並宜搗細。

炒焦或燒存性，研用。

氣味潤溫無毒主治爲散及煮汁服止下痢并可

染阜

恭

止腸風崩中帶下冷熱瀉痢并染鬚髮

大明

附方

新

下痢脫肛

橡斗殼燒存性研末豬脂和擦并煎汁洗之

直指方

腸

風下血

橡斗子殼用白梅肉填滿兩個合定鐵線

用硫黃填滿煅研酒

研末每服二錢米飲下一方

服

用硫黃填滿煅研酒

余居士選奇方走馬牙疳

橡斗殼入鹽填滿合定燒透出火毒

研末先以米鑑同煅過研末日擦三

一

汗漱過搽之

全幼心全幼心

米鑑同煅過研末日擦三

鹽在內阜莢

五

次荆芥湯漱之良

經驗良方

木皮根皮

拾

氣味苦平無毒主治惡瘡因風犯露

致腫者煎汁日洗令膿血盡乃止亦治痢

藏器

止水

致腫者煎汁日洗令膿血盡乃止亦治痢

藏器

止水

痢消瘰癧大明

附方

新

蝕爛癰腫

及疣贅瘤瘻柞櫟木灰四斗桑

柴灰四斗石灰一斗五升以沸

湯調溼餌中蒸一日取釜中沸湯七斗合餌灰淋
之取汁再熬至一升投亂頭髮一雞子大消盡又
剪五色綵投入消盡餅盛密收每以少許挑破
點之煎時勿令雞犬婦人小兒見

曹濟方

槲實

音斛

校正

自木部移入此

釋名

槲櫟

音速

樸櫟

並雅爾

大葉櫟

俗櫟櫃子

時珍曰
槲櫟猶

穀鱗也栗子綻縣有顛慄之象故謂之栗槲葉搖
動有穀鱗之態故曰槲櫟也樸櫟者婆娑蓬然之
貌其樹偃蹇其葉芃芃故也俗稱衣物不整者爲
樸櫟本此其實木彊故俗謂之櫟櫃子史言武后
挂赦書于槲樹云遂呼爲金雞樹云

集解

頌曰槲處處山林有之木高丈餘與櫟相類亦有斗但小不中用耳不拘時采其皮葉入藥宗奭曰槲亦有斗木雖堅而不堪充材止宜作

柴爲炭不及櫟木時珍曰槲有二種一種叢生小

者名抱子見爾雅一種高者名大葉櫟樹葉俱似栗長大粗厚冬月凋落三四月開花亦如栗八

九月結實似橡子而稍短小其蒂亦有斗其實僵澀味惡荒歲人亦食之其木理粗不及橡木所謂

樗櫟之材

者指此

仁氣味同橡子

時珍

氣味同槲若脩治

頌曰若卽葉之名也

入藥須微炙令焦

甘苦平無毒主治療痔止血及血痢止渴

恭

活血利小便除面上皺赤

時珍

附方

舊五
新三

卒然吐血

槲葉爲末每服二錢水一盞煎七分和滓服

簡要濟眾

鼻衄不止

槲葉搗汁一小盞頓服卽止

聖惠方

腸風血痔

熱多者尤佳槲

葉微炙研末一錢槐花炒研末一錢

米飲調服未止再服

寇氏衍義

冷淋莖痛

槲葉三片煎湯

研末每服三錢水一盞葱白七寸

煎六分去滓食前溫服日二服

孩子淋疾

槲葉燒存性研以米泔別浸槲葉取

寸煎六分去滓食前溫服日二服

時下也孫真人方

蠼螋漏疾

槲葉燒存性研以米泔別浸槲葉取

汁洗瘡後乃納灰少許于瘡中

聖惠方

鼻上皺皰

出膿血者以泔水煮槲葉取汁洗之

拭乾納槲葉灰少許于中良

聖惠腋下胡臭

槲葉三升切水煮濃

汁洗畢卽以甘苦瓠

瓠浸一夜傅之千金方

壳煙熏之後用辛夷細辛杜衡

末醋浸一夜傅之

千金方

末醋浸一夜傅之

千金方

木皮

俗名龍皮赤

氣味

苦澀無毒

主治

煎服除蟲及漏

甚效

恭

煎湯洗惡瘡

良

權能吐癧癰澀五臟

大明止

赤白痢腸風下血

時珍

附方

舊四新五

赤龍皮湯

治諸般爛瘡乳瘡

用槲皮切

三升水一斗煮

五升春夏冷

用秋冬天溫

用洗之洗

米飲每

用秋冬天溫

用洗之洗

乃傅諸膏

肘後

肘骨疽瘡

槲皮燒研

米飲每

千金

方下部生瘡

槲皮

檉皮煮汁

熬如餠

以導下部

肘後方

一切瘻疾

金

用槲樹北陰

白皮三十斤剉

以水一石煮

一斗去

滓煎如餠

又取通都廁上

雄鼠屎雌鼠屎各十四

枚燒汁盡研和

之納溫酒一升

和勻瘦人食五合

當有蟲出也

○崔氏纂要用

槲白皮切五升水八

升煮令泣盡去

滓再煎成膏日服

棗許并

塗瘡上宜食苜蓿鹽飯

以助之以瘥爲度

小兒瘰

癰

槲樹皮去粗皮切煎湯頻洗之

聖惠方

蟲毒下血

槲木北陰白皮一大握長五寸

以水

三升煮取一升空腹分服卽吐毒出也

赤白久痢

不拘大人小孩用新槲皮一斤

去黑皮

切以水一斗煎取五升去滓煎膏和酒服

久痢不止

槲白皮薑汁炙五度一兩

去乾薑

炮半兩爲末

每服二

槲木皮一尺

錢米飲酒下

聖濟總錄

久瘡不已

闊六寸切以

水一斗

煮取五升入白沙糖十挺煎

關六寸切以

取一升

分三服卽吐而愈

肘後方

本草綱目果部第三十卷終