

醫
統
正
脈
全
書

五
三

R2-57

5314

蘭室秘藏目錄

卷上

飲食勞倦門

飲食所傷論

勞倦所傷論

調中益氣湯

交秦丸

木香乾薑枳朮丸

扶脾丸

寬中喜食無厭丸

木香人參生薑枳朮丸

黃香膏

和中丸

檳榔丸

消積滯集香丸

黃耆湯

黃耆當歸湯

參朮湯

益智和中丸

益胃散

脾胃虛損論

三黃枳朮丸

巴豆三稜丸

白朮丸

草豆蔻丸

中滿腹脹門

中滿腹脹論

諸腹脹大皆屬

中滿分消丸

消湯

廣茂潰堅湯

半夏厚樸湯

破滯氣湯

草薺薤湯

心腹痞門

消痞丸

失啖丸

黃連消痞丸

消痞湯

葶藶丸

胃脘痛門

草豆蔻丸

神聖復氣湯

麻黃豆蔻湯

酒客病論

葛花解醒湯

枳朮丸

半夏枳朮丸

橘皮枳朮丸

除溼益氣丸

除溼散

升麻黃連丸

上二黃丸

瓜蒂散

消渴門

消渴論

和血益氣湯

當歸潤燥湯

生津甘露湯

辛潤緩肌湯

甘草石膏湯

甘露膏

生津甘露飲子

眼耳鼻門

諸脈者皆屬於目論

內障眼論

芎辛湯

碧天丸

廣大重明湯

百點膏

選奇湯

神効明目湯

羌活退醫膏

明目細辛湯

復明散

助陽和血湯

吹雲膏

防風飲子

撥雲湯

神効黃耆湯

圓明內障升麻湯

黃芩黃連湯

蔓荊子湯

歸葵湯

救苦湯

熟乾地黃丸

益陰腎氣丸

羌活退翳丸

當歸龍膽湯

補陽湯

瀉陰火丸

升陽柴胡湯

溫衛湯

圓明膏

嗜藥麻黃湯

療本滋腎丸

加味滋腎丸

退翳膏

龍膽飲子

柴胡聰耳湯

羌活退翳湯

還睛紫金丹

麗澤通氣湯

溫肺湯

禦寒湯

卷中

頭痛門

頭痛論

清空膏

徹清膏

川芎散

白芷散

碧雲散

羌活清空膏

清上瀉火湯

補氣湯

細辛散

羌活湯

養神湯

安神湯

半夏白朮天麻湯

口齒咽喉門

口齒論

羌活散

草豆蔻散

麻黃散

麝香散

治蟲散

益智木律散

蠍梢散

白牙散

刷牙藥

獨聖散

當歸龍膽散

牢牙地黃散

細辛散

立効散

牢牙散

清胃散

神功丸

桔梗湯 又方

神驗法

嘔吐門

丁香茱萸湯

白朮湯

補牙湯

吳茱萸丸

衄血吐血門

麥門冬飲子

八參飲子

麻黃桂枝湯

黃耆芍藥湯

三黃補血湯

救脈湯

止衄血法

腰痛門

川芎肉桂湯

獨活湯

破血散疼湯

地龍散

蒼朮湯

麻黃復煎散

緩筋湯

拈痛湯

蒼朮復煎散

羌活蒼朮湯

婦人門

經閉不行有三論

經漏不止有三論

升陽除溼湯

涼血地黃湯

酒煮當歸丸

固真丸

烏藥湯

助陽湯

水府舟

丁香膠艾湯

黃耆當歸人參湯

當歸芍藥湯

柴胡調經湯

益胃升陽湯

升陽舉經湯

半產暈用寒涼之藥論

全生活血湯

當歸附子湯

調經補真湯

坐藥龍鹽膏

勝陰丹

迴陽丹

柴胡丁香湯

延胡苦練湯

桂附湯

人參補氣湯

黃耆白朮湯

白朮茯苓丸

增味四物湯

補經同真湯

溫衛補血湯

立効散

四聖散

溫經除溼湯

補氣升陽和中湯

麻黃桂枝升麻湯

卷下

大便結燥門

大便結燥論

通幽湯

潤燥湯

潤腸丸

麻黃白朮湯

升陽湯

活血潤燥丸

潤腸湯

小便淋閉門

小便淋閉論

通關丸

清肺飲子

導氣除燥湯

腎疽湯

痔漏門

痔漏論

秦艽白朮丸

秦艽蒼朮湯

七聖丸

秦艽防風湯

秦艽羌活湯

當歸郁李湯

紅花桃仁湯

秦艽當歸湯

陰痿陰汗門

陰痿陰汗及臊臭論

龍膽瀉肝湯

清震湯

固真湯

清菟湯

椒粉散

補肝湯

溫腎湯

延胡丁香丸

瀉痢門

訶子皮散

升麻補胃湯

升陽去熱和血湯

益智和中湯

芍藥蘗皮丸

和中益胃湯

槐花散

茯苓湯

黃耆補胃湯

升陽除溼湯

人參益胃湯

升麻補胃湯

瘡瘍門

散腫潰堅湯

升陽調經湯

連翹散堅湯

龍泉散

救苦化堅湯

柴胡連翹湯

黍粘子湯

淨液湯

消腫湯

內托羌活湯

升麻托裏湯

內托黃芪湯

柴胡通經湯

白芷升麻湯

保生救苦散

一上散

聖愈湯

獨聖散

黃耆肉桂柴胡酒煎湯

雜病門

安神丸

硃砂安神丸

補氣湯

當歸補血湯

柴胡升麻湯

火鬱湯

小黃丸

黃芩利膈丸

補益腎肝丸

太陽經噎藥

麻黃茱萸湯

黃耆湯

除溼補氣湯

參歸湯

升陽湯

自汗門

自汗論

調衛湯

清燥湯

當歸六黃湯

紅豆散

活血通經湯

瀉榮湯

人參益氣湯

導氣湯

補中湯

麻黃蒼朮湯

上清湯

木桂湯

正氣湯

趁痛湯

退熱湯

解表升麻湯

天麻黃芪湯

健步丸

白朮除濕湯

加味四君子湯

瀉血湯

洗面藥

瑩肌如玉散

面油摩風膏

小兒門

治驚論

黃芪湯

益黃散

升陽益血湯

厚腸丸

補陽湯

大蕪荑湯

塌氣退黃湯

中滿分消丸

消痞丸

癰疹論

消毒救苦散

桔梗湯

黍粘子湯

麻黃柴胡升麻湯

蘭室秘藏目錄終

蘭室秘藏卷上

江陰朱氏校刊本

金 眞定李 杲撰

飲食勞倦門

飲食所傷論

陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六府痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之爲二飲也食也飲者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺病則爲喘咳爲腫滿爲水瀉輕則當發汗利小便使上下分消其濕解醒湯

五苓散生薑半夏枳實白朮之類是也如重而畜積爲滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之此其治也食者物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脉橫解腸澼爲痔又云食傷太陰厥陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿或下痢腸澼當分寒熱輕重而治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麴乾薑三稜廣茂巴豆之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮陳皮麥蘗黃連大黃之類主之亦有宜吐者陰陽應象論云在上者因而越之瓜蒂散之屬主之然而不可過

劑過劑則反傷腸胃蓋先因飲食自傷又加之以藥過故腸胃復傷而氣不能化食愈難消矣漸至羸困故五常政大論云大毒治病十去其六小毒治病十去其七凡毒治病不可過之此聖人之深戒也

勞倦所傷論

調經篇云陰虛生內熱岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通而胃氣熱熱氣熏胸中故內熱舉痛論云勞則氣耗勞則喘且汗出內外皆越故氣耗矣夫喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣

衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故困熱無氣以動懶於語言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之時宜安心靜坐以養其氣以甘寒瀉其熱火以酸味收其散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之者是也金匱要略云平人脉大爲勞脉極虛亦爲勞矣夫勞之爲病其脉浮大手足煩熱春夏劇秋冬差脉大者熱邪也極熱者氣損也春夏劇者時助邪也秋冬差者時勝邪也以黃芪建中湯治之此亦溫之之意也夫上古聖人飲食有節起居有常不妄作勞形與神俱百歲乃

去此謂治未病也今時之人去聖人久遠則不然飲食失節起居失宜妄作勞役形氣俱傷故病而後藥之是治其已病也推其百病之源皆因飲食勞倦而胃氣元氣散解不能滋榮百脉灌溉臟腑衛護周身之所致也故蒼天之氣貴清靜陽氣惡煩勞噫飲食喜怒之間寒暑起居之際可不慎歟

調中益氣湯

治因飢飽勞役損傷脾胃元氣不足其脉弦洪緩而沉按之中之下得時一澀其證四肢滿悶肢節疼痛

難以屈伸身體沈重煩心不安忽肥忽瘦四肢懶倦
口失滋味腹難舒伸大小便清利而數或上飲下便
或大便澀滯或夏月餐泄米穀不化或便後見血或
便見白膿胸滿短氣咽膈不通痰唾稠粘口中沃沫
食入反出耳鳴耳聾目中流火視物昏花努肉紅絲
熱壅頭目不得安卧不思飲食並皆治之

橘皮 如腹中氣不轉運加木香一分如無此證不加

黃蘗 酒洗各二分

升麻 此一味為上氣不足胃氣與脾氣下流乃補上氣從陰引陽

柴胡 各三分

人參 有嗽者去之

炙甘草

蒼朮 各五分

黃芪 一錢

如時顯熱躁是下元陰火蒸蒸然發也加生地黃 二分

黃蘗 三分

如大便虛坐不得或大便了而不了腹中常常逼迫皆

是血虛血澀加當歸身 三分 無此證則去之

如身體沈重雖小便數多亦加茯苓二分黃蘗三分澤

瀉五分蒼朮一錢時暫從權而去濕也不可常用兼

足太陰已病其脉亦絡於心中故顯濕熱相合而生

煩亂

如胃氣不和加湯洗半夏五分生薑三片有嗽者加生

薑生地黃二分以製半夏之毒

如痰厥頭痛非半夏不能除此足大陰脾邪所作也

如無已上證只服前藥

右件判如麻豆大都作一服水二大盞煎去粗稍熱

食遠服之寧心絕慮靜坐少語藥必爲効耳

如夏月須加白芍藥三分

如春月腹中痛尤宜加

如惡熱而渴或腹痛者更加芍藥五分生黃芩二分

如惡寒腹痛加中桂三分去黃芩謂之桂枝芍藥湯亦

於前藥中加之

如冬月腹痛不可用芍藥蓋大寒之藥也只加乾薑二

分或加半夏五分以生薑少許製之

如秋冬之月胃脉四道爲衝脉所逆脇下少陽脉二道

而反上行名曰厥逆其證氣上衝咽不得息而喘息
 有音不得卧加吳茱萸五分至一錢湯洗去苦錢觀厥氣多少而
 用之亦於前藥中作一服服之

如夏月有此證為大熱也此病隨四時為寒熱溫涼也

宜以

黃連酒洗

黃蘗酒浸

知母酒浸各等分

右為細末熟湯為丸如梧桐子大每服一百丸或二
 百丸白湯送下空心服仍多飲熱湯服畢少時便以
 美食壓之使不令胃中停留直至下元以瀉衝脉之

邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛勞七損證也
常宜以甘温平之甘多辛少是其治也

寬中喜食無厭丸 一名寬中進食丸

資形氣喜飲食

木香 五分

青皮

人參

乾薑 各一錢

炙甘草 一錢五分

白茯苓

澤瀉

檳榔

橘皮

白朮 各二錢

縮砂仁

猪苓 各二錢半

半夏 七錢

枳實 四錢

草豆蔻仁

五錢神麴 五錢

大麥蘖麩 一兩

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服三五十丸米湯下食遠服

交泰丸

升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食助精神寬腹脇除怠惰嗜卧四肢沉困不收

乾薑炮製三分

巴豆霜五分

肉桂去皮搗一錢

人參去蘆一錢

柴胡去苗

白朮

小椒

炒去汗子并閉目各一錢五分

厚樸

去皮炒三錢秋冬加七錢

苦練

酒煮

白茯苓

縮砂仁

各三錢

知母

四錢一半酒炒一半酒洗春夏用秋冬去

川烏 炮製去皮膚
四錢五分

吳茱萸 湯洗七
次五錢

皂角 水洗煨
去皮莖
紫苑 去苗各
六錢
黃連 去鬚七錢
減一錢五分

右除巴豆霜別研外同為極細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九丸溫水送下食遠虛實加減

木香人參生薑枳朮丸

開胃進飲食

乾生薑 二錢五分
木香 三錢

人參 三錢五分

陳皮 四錢

枳實 一兩
白朮 一兩

右為細末荷葉裹燒飯為丸如梧桐子大每服三五

蘭室秘藏 卷二
十九 溫水下食前

木香乾薑枳朮丸

破除寒滯氣消寒飲食

木香 三錢

乾薑 五錢

枳實 一兩

白朮 一兩

右爲細末荷葉裏燒飯爲丸如梧桐子大每服三五
十丸溫水送下食前

扶脾丸

治脾胃虛寒腹中痛澹瀉無度飲食不化

乾生薑

肉桂 各五分

乾薑

藿香

紅豆各一錢

白朮

茯苓

橘皮

烏梅肉

訶子皮

炙甘草

半夏各二錢

神麩炒

大麥蘖炒各四錢

右爲細末荷葉燒飯爲丸如梧桐子大每服五十丸
白湯送下食前

和中丸

補胃進食

人參

乾生薑

陳皮各一錢

乾木瓜二錢

炙甘草三錢

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十丸

白湯送下食前

檳榔丸

破滯氣消飲食

炙甘草

錢一

木香

人參

檳榔

各二錢

陳皮

錢五

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十丸

白湯下食前

消積滯集香丸

治傷生冷硬物不消

京三稜

廣茂

青皮

陳皮

丁香皮

益智

川練子

茴香

各一兩

巴豆

和皮米炒
焦五錢

石為細末醋糊為丸如菜豆大每服五七丸溫水生

薑湯送下食前服

黃芪湯

補胃除濕和血益血滋養元氣

木香

氣通者
去之

藿香葉

各一錢

當歸

酒洗

陳皮

各一錢

人參

澤瀉各五錢

黃芪一兩

右咬咀每服五錢水二大盞煎至一盞如欲汗加生

薑煎食遠熱服之

黃芪當歸湯

治熱上攻頭目沿身胸背發熱

當歸身一錢酒洗黃芪五錢

右咬咀作一服水二大盞煎至一盞食前熱服

參朮湯

治脾胃虛弱元氣不足四肢沉重食後昏悶

黃蘗 酒浸

當歸 各二分

柴胡

升麻 各三分

人參

陳皮

青皮 各五分

神麴末 七分

炙甘草

蒼朮 各一錢

黃芪 二錢

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞食遠服

益智和中丸 李秋合

木香

黃連

生地黄 各二分

黃芪

人參

麥門冬

神麴末

當歸身

乾生薑

陳皮

薑黃 各五分

縮砂仁 七分

桂花 一錢

桂枝 一錢五分

益智仁 二錢二分

炙甘草 二錢

五分

麥蘖麩

錢三

草豆蔻仁

錢四

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九

白湯下細嚼亦當

益胃散

治因服寒藥過多以致脾胃虛損胃脘疼痛

人參

甘草

縮砂仁

厚樸

錢各二

白豆蔻

薑黃

乾生薑

澤瀉

錢各三

益智仁

錢六

黃芪

陳皮

錢各七

右為麤末每服三錢水二盞生薑五片煎至一盞去

粗食前温服

脾胃虛損論

易水張先生常戒不可峻利食藥下咽未至藥丸施化其標皮之力始開便言快也所傷之物已去若更待一兩時辰許藥盡化開其藥峻利必有情性病去之後脾胃既損是真氣元氣敗壞促人之壽當時設下一藥枳實一兩麩炒黃色爲度白朮二兩只此二味荷葉裏燒飯爲丸以白朮甘温甘温補脾胃之元氣其苦味除胃中之濕熱利腰臍間血故先補脾胃之弱過於枳實尅

化之藥一倍枳實味苦寒泄心下之痞悶消化胃中所傷此一藥下胃其所傷不能卽去須待一兩時辰許食則消化是先補其虛而後化其所傷則不峻利矣當是之時未悟用荷葉燒飯爲丸之理老年味之始得可謂奇矣荷葉之物中央空象震卦之體震者動也人感之生足少陽甲膽者風也生化萬物之根蒂也內經云履端於始序則不愆人之飲食入胃營氣上行卽少陽甲膽之氣也其手少陽三焦經人之元氣也手足經同法便是少陽元氣生發也胃氣穀氣元氣甲膽上升之氣

一也異名雖多止是胃氣上升者也荷葉之體生於水
土之下出於污濺之中不爲所染挺然獨立其色青形
乃空青而象風木者也食藥感此氣之化胃氣何由不
上升乎其主意用此一味爲引用可謂遠識深慮合於
道者也更以燒飯和藥與白朮協力滋養穀氣而補令
胃厚再不至內傷其利廣矣大矣若內傷脾胃辛熱之
物酒肉之類自覺不快覓藥於醫醫者亦不問所傷付
之集香丸小丁香丸巴豆大熱藥之類下之大便下則
物去遺留食之熱性藥之熱性重傷元氣則七神不熾

經云熱傷氣正謂此也其人必無氣以動而熱困四肢不舉傳變諸疾不可勝數使人眞氣自此衰矣若傷生冷硬物世醫或用大黃牽牛二味大寒藥投之隨藥下所傷去矣遺留食之寒性藥之寒性重瀉其陽陽去則皮膚筋肉血脉無所依倚便爲虛損之證論言及此令人寒心夫辛辣薄味之藥無故不可亂服非止牽牛而已至眞要大論云五味入口各先逐其所喜攻攻者尅伐瀉也辛味下咽先攻瀉肺之五氣氣者眞氣元氣也其牽牛之辛辣猛烈傷人尤甚飲食所傷腸胃邪當以

苦泄其腸胃可也肺與元氣何罪之有用牽牛大罪有五此其一也况胃主血所生病爲物所傷物者有形之物也皆是血病瀉其氣其罪二也且飲食傷之於中焦止合尅化消導其食重瀉上焦肺中已虛之氣其罪三也食傷腸胃當塞因塞用又曰塞因塞用枳實大黃苦寒之物以泄有形是也反以辛辣牽牛散瀉真氣大禁四也殊不知鍼經有云外來客邪風寒傷人五臟若誤瀉胃氣必死誤補亦死其死也無氣以動故靜若內傷腸胃而反瀉五臟必死誤補亦死其死也陰氣有餘故

躁今內傷腸胃是謂六腑不足之病反瀉上焦虛無肺
氣肺者五臟之一數也雖不卽死若更旬日之間必暗
損人壽數謂如人壽應百歲爲牽牛之類朝損暮損其
元氣消耗不得終其天年但人不覺耳將爲天年已盡
此乃暗裏折人壽數大禁五也故特著此論并方庶令
四海聞而行之不至天橫耳此老夫之用心也胃氣不
可不養復明養胃之理內經云安穀者昌絕穀者亡水
去則榮散穀消則衛亡榮散衛亡神無所依仲景云水
入於經其血乃成穀入於胃脉道乃行故血不可不養

胃不可不溫血養胃溫榮衛將行常有天命穀者身之
大柄也書與周禮皆云金木水火土穀惟脩以奉養五
臟者也內傷飲食固非細事苟妄服食藥而輕生殞命
其可乎哉黃帝鍼經有說胃惡熱而喜清冷大腸惡清
冷而喜熱兩者不和何以調之岐伯曰調此者食飲衣
服亦欲適寒溫寒無淒愴暑無出汗飲食熱無灼灼寒
無淒淒寒溫中適故氣將持乃不致邪僻也是必有因
用豈可用俱寒俱熱之藥倉卒致損與以刃殺人者何
異內經說內傷者其氣口脈反大於人迎一倍二倍三

倍分經用藥又曰上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死如但食不納惡心欲吐者不問一倍二倍不當正與瓜蒂散吐之但以指或以物探去之若所傷之物去不盡者更診其脉問其所傷以食藥去之以應塞因塞用又謂之寒因寒用泄而下降乃應太陰之用其中更加升發之藥令其元氣上升塞因通用因曲而爲直何爲曲內傷胃氣是也何爲直因而升發胃氣是也因其飲食之內傷而使生氣增益胃氣完復此乃因曲而爲之直也若分經用藥其所傷之物寒熱溫涼生硬柔軟

所傷不一難立定一法只隨所傷之物不同各立治法
臨時加減用之其用藥又當問病人從來稟氣盛衰所
傷寒物熱物是喜食而食之耶不可服破氣藥若乘饑
因而傷之耶當益胃氣或爲人所勉勸強食之宜損血
而益氣也診其脉候傷在何臟可與對病之藥豈可妄
瀉天真元氣以輕喪身寶乎且如先食熱物而不傷繼
之以寒物因後食致前食亦不消化而傷者當問熱食
寒食孰多孰少斟酌與藥無不當矣喻如傷熱物二分
寒物一分則當用寒藥二分熱藥一分相合而與之則

榮衛之氣必得周流更有或先飲酒而後傷寒冷之食
 及傷熱食冷水與冰如此不等皆當驗其節次所傷之
 物酌量寒熱之劑分數各各對證與之無不取効自忖
 所定藥方未敢便謂能盡藥性之理姑用指迷辯惑耳
 三黃枳朮丸

治傷肉濕麩辛辣味厚之物填塞悶亂不快

枳實

麩炒五錢

黃連

去鬚酒洗

大黃

濕紙裏煨

神麩

炒

橘皮

白朮

各一兩

黃芩

二兩

右為極細末湯浸蒸餅為丸如棗豆一倍大每服五

十九白湯下臨時量所傷多少加減服之

巴豆三稜丸 一名木香見現丸

治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

巴豆霜

五分

木香

二錢

升麻

柴胡

各三錢

草豆蔻

麩裏煨熟用仁

香附子

炒各五錢 神麴炒黃

石三稜

去皮煨

京三稜

煨各一兩

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如菜豆一倍大每服一二
十九温白湯下量所傷多少加減服之

白朮丸

治傷豆粉濕麩油膩之物

白礬

枯三錢

黃芩

五錢

橘皮

七錢

神麩

炒黃色

半夏

湯洗七次

白朮

各一兩

枳實

麩炒黃色一兩一錢

右爲極細末湯浸蒸餅爲丸如棗豆大每服三五十丸白湯下素食多用乾薑故加黃芩以瀉之

草豆蔻丸

治秋冬傷寒冷物胃脘當心而痛上支兩脇咽膈不通

炒鹽

五分

乾生薑

青皮

橘皮

各二錢

麥蘖麩

炒黃色

生黃芩

冬月不用

半夏

湯洗七次

神麩

炒各五錢

草豆蔻

麩裏煨去皮取仁

白朮

各一兩

枳實

麩炒二兩

右爲極細末湯浸蒸餅爲丸如棗豆大每服五十丸

白湯下

中滿腹脹門

中滿腹脹論

六元政紀論云太陰所至爲中滿太陰所至爲畜滿諸

濕腫滿皆屬脾土論云脾乃陰中之太陰同濕土之化

脾濕有餘腹滿食不化天爲陽爲熱主運化也地爲陰

爲濕主長養也無陽則陰不能生化故云藏寒生滿病
調經篇云因飲食勞倦損傷脾胃始受熱中未傳寒中
皆由脾胃之氣虛弱不能運化精微而制水穀聚而不
散而成脹滿經云腹滿臍脹支膈肱脇下厥上冒過在
太陰陽明乃寒濕鬱過也脉經所謂胃中寒則脹滿者
是也鍼經三卷
雜病第八腹滿大便不利上走胸溢喘息喝喝然
取足少陰又云脹取三陽三陽者足太陽寒水爲脹與
通評虛實論說腹暴滿按之不下取太陽經絡胃之募
也正同取者瀉也經云中滿者瀉之於內者是也宜以

辛熱散之以苦瀉之淡滲利之使上下分消其濕正如
開鬼門潔淨府溫衣繆刺其處是先瀉其血絡後調其
真經氣血平陽布神清此治之正也或曰諸脹腹大皆
屬於熱者何也此乃病機總辭假令外傷風寒有餘之
邪自表傳裏寒變爲熱而作胃實腹滿仲景以大承氣
湯治之亦有膏粱之人濕熱鬱於內而成脹滿者此熱
脹之謂也大抵寒脹多而熱脹少治之者宜詳辨之

諸腹脹大皆屬於熱論

諸腹脹大皆屬於熱此乃八益之邪有餘之證自天外

而人是感風寒之邪傳裏寒變爲熱作胃實日晡潮熱
大渴引飲譫語是太陽陽明并大實大滿者大承氣下
之少陽陽明微滿實者小承氣下之泄之則脹已此之
謂也假令痲瘧爲脹滿亦有寒脹熱脹是天之邪氣傷
暑而得之不卽時發至秋暑氣衰絕而瘧病作矣知其
寒也局方用交解飲子者是也內虛不足寒濕令人中
滿及五臟六腑俱有脹滿更以脉家寒熱多少較之胃
中寒則脹滿濁氣在上則生膈脹脹取三陽三陽者足
太陽膀胱寒水爲脹腹暴滿按之不下取太陽經絡者

胃之募也正同腹滿臘脹肢膈眩脇下厥上冒過在太陰陽明胃中寒濕鬱遏也太陰臘脹復不利不欲食食則嘔不得卧按所說寒脹之多如此中滿治法當開鬼門潔淨府開鬼門者謂發汗也潔淨府者利小便也中滿者瀉之於內謂脾胃有病當令上下分消其溫下焦如瀆氣血自然分化不待泄滓穢如或大實大滿大小便不利從權以寒熱藥下之或傷酒濕麪及味厚之物膏粱之人或食已便卧使濕熱之氣不得施化致令腹脹滿此脹亦是熱脹治熱脹分消丸主之

如或多食寒涼及脾胃久虛之人胃中寒則脹滿或藏
寒生滿病以治寒脹中滿分消湯主之

中滿分消丸

治中滿熱脹鼓脹氣脹水脹此非寒脹類

白朮

人參

炙甘草

猪苓

去黑皮

薑黃

各一錢

白茯苓

去皮

乾生薑

砂仁

各二錢

澤瀉

橘皮

各三錢

知母

炒四錢

黃芩

去腐炒夏

用一兩
二錢

黃連

淨炒

半夏

湯洗七次

枳實

炒各五錢

厚樸

薑製一兩

右除茯苓澤瀉生薑外共爲極細末入上三味和勻
湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服一百丸焙熟白湯
下食遠服量病人大小加減

中滿分消湯

治中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收四肢厥
逆食入反出下虛中滿腹中寒心下痞下焦躁寒沈
厥奔豚不收

川烏

澤瀉

黃連

人參

青皮

當歸

生薑

麻黃

柴胡

乾薑

葶澄茄

各二分

益智仁

半夏

茯苓

木香

升麻

各三分

黃芪

吳茱萸

厚樸

草豆蔻仁

黃蘗

各五分

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞食前熱服忌房室酒濕麪生冷及油膩等物

廣茂潰堅湯

治中滿腹脹內有積聚堅硬如石其形如盤令人不能坐卧大小便澀滯上喘氣促面色痿黃通身虛腫

廣茂

紅花

吳茱萸

升麻

各二分

半夏

七分

柴胡

澤瀉

神麴

青皮

陳皮

各三分

厚樸

生用

黃芩

黃連

益智仁

草豆蔻仁

五分

生甘草

當歸梢

五分

如渴加葛根

四分

右剉如麻豆大水二大盞煎至一盞稍熱服食遠忌

酒醋濕麴服二服之後中滿減半止有積不消再服

後藥

半夏厚樸湯

紅花

蘇木

各半分

吳茱萸

乾生薑

黃連

各一分

木香

青皮

各二分

肉桂

蒼朮

白茯苓

澤瀉

柴胡

生甘草

生黃芩

草豆蔻仁

陳皮

各三分

京三稜

猪苓

當歸梢

升麻

各四分

神麴

六分

厚樸

八分

半夏

一錢

桃仁

七箇

昆布

少許

如渴加葛根

三分

右咬咀作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱服此藥

二服之後前證又減一半却於前藥中加減服之

破滯氣湯 一名木香化滯散

破滯氣治心腹滿悶

炙甘草 四分

白檀

藿香

陳皮

大腹子

白豆蔻仁

白茯苓

桔梗

各五分

砂仁

人參

青皮

檳榔

木香

薑黃

白朮

各二錢

右咬咀每服三錢水二盞煎至一盞去粗溫服不拘

時

草豆蔻湯

治腹中虛脹

澤瀉 一分

木香 三分

半夏 製四分

枳實

草豆蔻仁

黃芪 春夏去之

益智

甘草 各五分

青皮

陳皮 各六分

茯苓

當歸 各七分

神麴 四分

右為麤末都作一服水二大盞生薑三片煎至一盞去粗溫服冬月加黃芪五七分春夏止服正藥食遠

心腹痞悶門

消痞悶方

治心下痞悶一切所傷及積年不愈者

乾生薑

神麴炒

炙甘草各二分

猪苓二錢五分

澤瀉

厚樸

砂仁各三錢

半夏湯洗七次

陳皮

人參各四錢

枳實炒五錢

黃連淨炒

黃芩各六錢

薑黃

白朮各一兩

右為細末湯浸餛餅為丸如梧桐子大每服五七十

丸至百丸白湯送下食遠服

失咲丸

一名枳實消痞丸

治右關脉弦心下虛痞惡食懶倦開胃進飲食

乾生薑

一錢

炙甘草

麥蘖麩

白茯苓

白朮

各二錢

半夏麩

人參

各三錢

厚樸

四錢

枳實

黃連

各三錢

右爲細末湯浸餗餅爲丸梧桐子大每服五七十丸

白湯下食遠服

黃連消痞丸

治心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不安

澤瀉

薑黃各一錢

乾生薑一錢

茯苓

炙甘草

白朮各三錢

陳皮

猪苓各五錢

枳實七錢炒

半夏九錢

黃連一兩

黃芩二兩炒

右為細末湯浸餗餅為丸如梧桐子每服五十九溫

湯下食遠

消痞湯

一名木香化滯湯

治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微痛心下痞滿不思飲

食

枳實炒

當歸梢各二分 陳皮

生薑

木香 各三分

柴胡 四分

炙甘草 各五分

紅花 少許

草豆蔻 五分

半夏 一錢

右為麤末作一服水二盞生薑三片煎至一盞食遠

服忌酒濕麪

葶藶丸 一名人參順氣飲子

治心下痞胸中不利

半夏 洗

厚樸 炙

石膏

青皮 各五分

當歸身 七分

白豆蔻仁

縮砂

茵陳 酒製

乾葛 各一錢

炙甘草

羌活

黃芩 酒洗

炒一半

苦苧麤酒洗

人參

柴胡

獨活各三錢

右為細末湯浸餛餅和勻篩子內擦如米大每服二

錢臨卧用一口湯下

胃脘痛門

草豆蔻丸

治脾胃虛弱而心火乘之不能滋榮上焦元氣遇冬
腎與膀胱寒水旺時子能令母實以致肺金大腸相
輔而來尅心乘脾胃此大復讐也經云大勝必大復

理之常也故皮毛血脉分肉之間元氣已絕於外又大寒大燥二氣併乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相引而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛大惡風寒目時眩不欲開腹中爲寒水反乘痰唾沃沫食則反出腹中常痛心胃作痛脇下縮急有時而痛腹不能努大便多瀉而少秘下氣不絕或腹中鳴此脾胃虛乏至極也胸中氣亂心煩不安而爲霍亂之漸咽膈不通極則噎塞有聲喘喝閉塞或於日陽處或於暖室中少緩口吸風寒之氣則復作四肢厥逆身體沉重

不能轉側頭不可以回顧小便洩而時躁此藥王之
秋冬寒涼大復氣之藥也

神麴末

柴胡

詳脇下痛
多少用之

薑黃

各四分

當歸身

青皮

各六分

黃芪

人參

益智仁

吳茱萸

湯洗
焙乾

陳皮

白殭蠶

各八分

澤瀉

小便數
減半

半夏

各一錢洗

甘草

生六分
熟六分

麥蘖麴

一錢五分炒

草豆蔻仁

麴裹燒熟為
度一錢四分

桃仁

七箇湯浸
去皮尖

右除桃仁別研如泥餘為細末同研勻湯浸餽餅為

廣生利病 卷一
三
丸如梧桐子大每服五七十九丸白湯下食遠服

神聖復氣湯

治復氣乘冬足太陽寒水足少陰腎水之旺子能令
母實手太陰肺實反來尅土火木受邪腰背胸膈閉
塞疼痛善噓口中涎目中泣鼻中流濁涕不止或如
息肉不聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒如冰頭作
陣痛目中溜火視物眊眊耳聾耳鳴頭并口鼻大惡
風寒喜日晴暖夜卧不安常覺痰塞咽膈不通口不
知味兩脇縮急而痛牙齒動搖不能嚼物臍腹之間

及尻醫足膝不時寒冷前陰冷而多汗行步欹側起
居艱難麻木風痺小便數氣短喘喝少氣不足以息
遺失無度及婦人白帶陰戶中大痛牽心面色黧黑
男子控睪痛牽心腹或面色如赭食少大小便不調
煩心霍亂逆氣裏急腹不能努或腸鳴膝下筋急肩
脾大痛此皆寒水來復火土之讎也

乾薑

炮

黑附子

炮各三分

防風

人參

郁李仁

另研各五分

半夏

湯洗研

升麻

各七分

藁本

甘草

各八分

當歸身

六分酒洗

柴胡

羌活各一錢

白葵花

五朶去心剪碎

右件都作一服水五大盞煎至二盞入黃芪一錢橘紅五分草豆蔻仁一錢麪裹煨熟去皮一錢同煎至一盞再入下項藥黃蘗三分酒浸黃連三分酒浸枳殼三分生地黃三分酒洗此四味預一日另用新水浸又以華細辛二分川芎細末三分蔓荊子三分作一處浸此三味并黃蘗等煎正藥作一大盞不去粗入此所浸之藥再上火同煎至一大盞去粗熱服空心又能治嚙頰嚙唇舌舌根強硬等證如神忌肉湯

及食肉不使助經絡中火邪也大抵腎元與膀胱經
中有寒氣不足者并宜服之於月生月滿時食隔三
五日一服如病急不拘時候

麻黃豆蔻丸

治客寒犯胃心胃大痛不可忍

木香

青皮

紅花

厚樸

各二分

蘇木

三分

葶澄茄

四分

升麻

半夏

湯洗

麥蘖麩

縮砂仁

黃芪

白朮

陳皮

去白

柴胡

炙甘草

吳茱萸

當歸身

各五分

益智仁

八分

神麴末

二錢炒

麻黃

不去節 三錢

草豆蔻仁

五錢

右為細末湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服五十丸

白湯下或細嚼湯下亦可

酒傷病論

論酒大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之則止當發散汗出則愈矣此最妙法也其次莫如利小便二者乃上下分消其濕何酒病之有今之酒病者往往服酒癥丸大熱之藥下之又有牽牛大黃下之是無形元

氣受病反下有形陰血乖悞甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之况亦損腎水真陰及有形陰血俱爲不足如此則陰血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是謂元氣消亡十神何依折人長命雖不卽死而虛損之病成矣金匱要略云酒疸下之久久爲黑疸慎不可犯此戒不若令上下分消其濕當以葛花解醒湯主之

葛花解醒湯

木香 五分

人參 去蘆

猪苓 去黑皮

白茯苓

橘皮 各一錢五分

白朮

乾生薑

神麴 炒

澤瀉 各二錢

蓮花青皮 三錢 縮砂仁

白豆蔻仁

葛花 各五錢

右為極細末和勻每服三錢匕白湯調下但得微汗酒病去矣此蓋不得已而用豈可恃賴日日飲酒此藥氣味辛辣偶因酒病服之則不損元氣何者敵酒病故也若頻服之損人天命

枳朮丸

治痞消食強胃

枳實麩炒黃白朮二兩

右為極細末荷葉裹燒飯為丸如菉豆一倍大每服
五十丸白湯下不拘時候量所傷多少加減服之

半夏枳朮丸

治因冷物內傷

半夏湯洗七次一兩枳實麩炒黃色白朮各二兩

右三味為極細末荷葉裹燒炊飯為丸如菉豆一倍
大每服五十丸白湯下量所傷加減服之

橘皮枳朮丸

治元氣虛弱飲食不消或臟腑不調心下痞悶

橘皮

枳實

楚炒黃色 各一兩

白朮

二兩

右為極細末荷葉裹燒飯為丸如菉豆一倍大每服

五十丸白湯下量所傷加減服之

除濕益氣丸

治傷濕麴心腹滿悶肢體沉重

紅花

三分

蘿蔔子

炒熟 五錢

枳實

楚炒 黃色

黃芩

生用

神麴

炒黃 色

白朮

各一兩

右同為細末荷葉裹燒飯為丸如菉豆一倍大每服

五十九白湯下量所傷加減服之

除濕散

治傷馬孀子并牛羊酪水一切冷物

甘草 炙

紅花 各二錢

半夏 湯洗七次三錢 茯苓 七錢

乾生薑 三錢

車前子

澤瀉 各五錢

神麴 炒黃一兩

右為極細末每服三錢匕白湯調下食前

升麻黃連丸

治多食肉口臭不欲聞其穢惡氣使左右不得近

白檀 二錢

生甘草 三錢

生薑 取自然汁

升麻 五錢

蓮花青皮五錢黃連去鬚一兩

黃芩去腐酒洗二兩

右為極細末湯浸餗餅為丸如彈子大每服一丸細

嚼白湯下食後

上二黃丸

治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

甘草二錢

升麻

柴胡各三錢

黃連酒洗一兩

黃芩二兩

一方加枳實五錢

右為細末湯浸餗餅為丸如棗豆大每服五十丸白

湯下食遠

治傷冷飲者以五苓散每服二錢三錢七加生薑煎服之

治傷食兼傷冷飲者煎五苓散送半夏枳朮丸

治傷冷飲不惡寒者腹中亦不覺寒惟覺悶身重食不化者或小便不利煎去桂五苓散依前斟酌服之

瓜蒂散

上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死何謂下部無脉此謂木鬱也飲食過飽填塞胸中胸中者太陰

之分野經曰氣口反大於人迎三倍食傷太陰故曰木鬱則達之吐者是也

瓜蒂

赤小豆各等分

右二味爲極細末每服二錢七溫漿水調下取吐爲度若不至兩手尺脉絕無不宜便用此藥恐損元氣令人胃氣不復若止是胸中窒塞悶亂不通以指探去之如不得吐者以物探去之得吐則已如食不去用此藥吐之解云盛食填塞於胸中爲之窒塞兩寸脉當主事兩尺脉不見其理安在胸中有食故以吐

出之食者物也物者坤土也是足太陰之號也胸中者肺也爲物所填肺者手太陰金也金主殺伐也與坤土俱在於上而旺於天金能尅木故肝木生發之氣伏於地下非木鬱而何吐去上焦陰土之物木得舒暢則鬱結去矣食塞於上脉絕於下若不明天地之道無由達此至理水火者陰陽之徵兆天地之別名也故曰獨陽不生獨陰不長天之用在於地下則萬物生長矣地之用在於天上則萬物收藏矣此乃天地交而萬物通也此天地相根之道也故陽火之

根本於地下陰水之源本於天上故曰水出高源故
人五臟主有形之物物者陰也陰者水也右三部脉
主之偏見於寸口食塞其二是絕五臟之源源絕則
水不下流兩尺竭絕此其理也何疑之有假令所傷
前後不同以分爲率傷熱物二分傷生冷硬物一分
用寒藥三黃丸二停熱藥巴豆三稜丸一停合而服
之如熱物傷少而寒物傷多則寒藥少而熱藥多也
假令夏月大熱之時傷生冷硬物當用熱藥巴豆三
稜丸治之須加三黃丸謂天時不可伐故加寒藥以

順時令若熱物只用三黃丸何謂此三黃丸時藥也
假令冬天大寒之時傷羊肉濕麪等熱物當用三黃
丸治之須加熱藥少許草豆蔻丸之類是也爲引用
又爲時藥經云必先歲氣無伐天和此之謂也餘皆
倣此

消渴門

消渴論

陰陽別論云二陽結謂之消脉要精微論云痺成爲消
中夫二陽者陽明也手陽明大腸主津病消則目黃口

乾是津不足也足陽明胃主血熱則消穀善飢血中伏火乃血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱爲病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉爲消渴治之以蘭除陳氣也不可服膏粱芳草石藥其氣慄悍能助燥熱也越人云邪在六腑則陽脉不和陽脉不和則氣留之氣留之則陽脉盛矣陽脉大盛則陰氣不得榮也故皮膚肌肉消削是也經云凡治消瘴仆繫偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏粱之疾也岐伯曰脉實病久可治脉弦小病久不可治後分爲三消高消者舌上赤裂

大渴引飲逆調論云心移熱於肺傳於膈消者是也以
白虎加人參湯治之中消者善食而瘦自汗大便硬小
便數叔和云口乾飲水多食亦肌虛痺成消中者是也
以調胃承氣三黃丸治之下消者煩躁引飲耳輪焦乾
小便如膏叔和云焦煩水易虧此腎消也以六味地黃
丸治之總錄所謂末傳能食者必發腦疽背瘡不能食
者必傳中滿鼓脹皆謂不治之證潔古老人分而治之
能食而渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢氏方白
朮散倍加葛根治之上中既平不復傳下消矣前人用

藥厥有旨哉或曰未傳瘡疽者何也此火邪勝也其瘡痛甚而不潰或赤水者是也經云有形而不痛陽之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得強者生失強者死未傳中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢其繩墨而更其道也然臟腑有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大其服皆適其至所爲故知過與不及皆誅罰無過之地也如高消中消制之太急速過病所久而成中滿之病正謂上熱未除中寒復生者非藥之罪失其緩急之制也處方之制宜加意焉

和血益氣湯

治口乾舌乾小便數舌上赤脉此藥生津液除乾燥

生肌肉

柴胡

炙甘草

生甘草

此味治口乾舌乾也

麻黃根

各三分

酒當歸

稍四分

酒知母

酒漢防己

羌活

各五分

酒生地黃

七分

升麻

一錢

杏仁

桃仁

各六個

紅花

少許

酒黃連

八分治舌上赤脉也

石膏

六分治小便赤色

酒黃蘗

一錢

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去粗温服忌

熱濕麪酒醋等物

當歸潤燥湯

治消渴大便閉澀乾燥結硬兼喜溫飲陰頭退縮舌燥口乾眼澀難開及於黑處見浮雲

細辛 一分

生甘草

炙甘草

各三分

柴胡

七分

熟地黃

三分

黃蘗

知母

石膏

桃仁

泥子

當歸身

麻子仁

防風

荊芥穗

各一錢

升麻

一錢五分

紅花

少許

杏仁

六個

小椒

三個

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去粗熱服食

遠忌辛熱物

生津甘露湯 一名清涼飲子

治消中能食而瘦口舌乾自汗大便結燥小便頻數

升麻 四分

防風

生甘草

漢防已

生地黄

各五分

當歸身 六分

柴胡

羌活

炙甘草

酒黃芩

酒知母

黃芩

各一錢

石膏

酒龍膽草

黃蘗

各一錢五分

紅花

少許

桃仁 五個

杏仁 十個

右咬咀都作一服水二盞酒一匙煎至一盞稍熱服

食遠

辛潤緩肌湯 一名清神補氣湯

前消渴證纔愈止有口乾腹不能努此藥主之

生地黃

細辛

熟地黃

三分

石膏

四分

黃蘗

酒製

黃連

酒製

生甘草

知母

各五分

柴胡

七分

當歸身

荊芥穗

桃仁

防風

各一錢

升麻

一錢五分

紅花

少許

杏仁

六個

小椒

二個

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞食遠稍熱服之

甘草石膏湯

渴病久愈又添舌白滑微腫咽喉嚥津覺痛噤腫時時有渴喜冷飲口中白沫如膠

生地黃

細辛

各一分

熟地黃

黃連

各三分

甘草

五分

石膏

六分

柴胡

七分

黃蘗

知母

當歸身

桃仁

炒去皮尖

荆芥穗

防風

各一錢

升麻

一錢五分

紅花

少許

杏仁

六個

小椒 二個

右如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食後溫服

甘露膏 一名蘭香飲子

治消渴飲水極甚善食而瘦自汗大便結燥小便頻數

半夏 二分湯洗

熟甘草

白豆蔻仁

人參

蘭香

升麻

連翹

桔梗 各五分

生甘草

防風 各一錢

酒知母 一錢五分

石膏 三錢

右為極細末湯浸餗餅和勻成劑捻作薄片子日中

晒半乾擦碎如米大每服二錢淡生薑湯送下食後
生津甘露飲子

治消渴上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不能下時有
腹脹或瀉黃如糜名曰餐泄渾身色黃目睛黃甚四
肢痿弱前陰如水尻髻腰背寒面生黧色脇下急痛

善噫喜怒健忘

藿香

二分

柴胡

黃連

木香

各三分

白葵花

麥門冬

當歸身

蘭香

各五分

葶澄茄

生甘草

山梔子

白豆蔻仁

白芷

連翹

姜黃

石膏

各一錢

二分

全蝎

二個去毒

炙甘草

酒知母

升麻

人參

各二錢

桔梗

三錢

杏仁

去皮

酒黃蘗

各一

錢五分

右爲細末湯浸餛餅和勻成劑捻作片子日中晒半乾擦碎如黃米大每服二錢津唾下或白湯送下食

遠服

眼耳鼻門

諸脉者皆屬於目論

陰陽應象論云諸脉者皆屬於目目得血而能視五臟
六腑精氣皆上注於目而爲之精精之窠爲眼骨之精
爲瞳子筋之精爲黑眼血之精爲絡其窠氣之精爲白
眼肌肉之精則爲約束裏擷筋骨血氣之精而與脉并
爲系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之
虛其入深則卽隨眼系入於腦則腦轉腦轉則引日系
急日系急則目眩以轉矣邪中其精其精所中不相比
也則精散精散則視岐故見兩物目者五臟六腑之精
榮衛魂魄之所常營也神氣之所主也故神勞則魂魄

散志意亂是故瞳子黑眼發於陰白眼赤脉發於陽故
陰陽合傳而爲精明也目者心之使也心者神之舍也
故神精亂而不轉卒然見非常之處精神魂魄散不相
得故曰惑也夫十二經脉三百六十五絡其血氣皆上
走於面而走空竅其清陽氣上散於目而爲精其氣走
於耳而爲聽因心事煩冗飲食失節勞役過度致脾胃
虛弱心火大盛則百脉沸騰血脉逆行邪害空竅天明
則日月不明矣夫五臟六腑之精氣皆稟受於脾上貫
於目脾者諸陰之首也目者血脉之宗也故脾虛則五

臟之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主人之神宜靜而安相火化行其令相火者包絡也主百脈皆榮於目既勞役運動勢乃妄行又因邪氣所并而損血脈故諸病生焉凡醫者不理脾胃及養血安神治標不治本是不明正理也

內障眼論

凡心包絡之脈出於心中以代心君之行事也與少陽爲表裏瞳子散大者少陰心之脈挾目系厥陰肝之脈連目系心主火肝主木此木火之勢盛也其味則宜苦

高室利癩 卷一 三
宜酸宜涼大忌辛辣熱物以助木火之邪也飲食中常
知此理可也夫辛主散熱則助火故不可食諸酸主收
心氣瀉木火也諸苦瀉火熱則益水也尤忌食冷水大
寒之物此則能損胃氣不行則元氣不生元氣不生胃
氣下流胸中三焦之火及心火乘於肺上入腦灼髓火
主散溢瞳子開大大熱之物又助火邪此蓋不可食驗
也藥中云茺蔚子一味辛及主益睛辛者是助火也故
去之乃加黃芩黃連瀉中焦之火芩能瀉上焦肺中之
火以酒洗之乃寒因熱用也又去青箱子爲助陽火也

加五味子以收瞳人開大且火之與氣勢不兩立故內
經曰壯火食氣氣食少火少火生氣壯火散氣諸酸之
物能助元氣孫真人云五月常服五味助五臟氣以補
西方肺金法云以酸補之以辛瀉之辛瀉氣則明矣或
曰藥中有當歸其味亦辛而甘其不去者何此辛甘一
味以其和血之聖藥況有甘味又欲以爲鄉導爲諸藥
之使耳

芎辛湯

治兩眼晝夜隱澀難開羞明惡日視物昏暗赤腫而

痛

細辛 二分

芎藭

蔓荆子 各五分

甘草

白芷 各一錢

防風 一錢五分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞臨卧温服

碧天丸 一名井珠丸

治目疾累服寒凉藥不愈兩眼蒸熱如火之熏赤而不痛滿目紅絲血脉貫睛昏暗羞明畏日或上下臉赤爛或冒風沙而內外眦皆破洗之神効

枯白礬 二分

銅綠 七分

瓦粉炒黑 一兩

右先研白礬銅研令細旋旋入粉同研勻熟水和之
共爲一百丸每用一丸熱湯半盞浸一二箇時辰洗
至覺微澀爲度合半時辰許臨卧洗之瞑目便睡一
丸可洗十遍再用湯內坐令熱此藥治其標若裏實
者不宜用

廣大重明湯

治兩目瞼赤爛熱腫疼痛并稍赤及眼瞼痒痛搯之
至破眼楞生瘡目多眵淚隱澀難開

龍膽草

防風

生甘草

細辛

各一錢

右剉如咀內甘草不剉只作一折先以水一大碗半煎龍膽一味至一半再入餘三味煎至少半碗瀘去粗用清帶熱洗以重湯坐令熱日用五七次但洗畢合眼一時去努肉泛長及痒亦驗

百點膏

張濟氏眼病翳六年以至遮瞳人視物不明有雲氣之狀因用此藥而效

麩仁 去皮尖 三分 當歸身 甘草 各六分 防風 八分

黃連 揀淨二錢剉如麻豆大 一大碗煎至少半入藥

右件剉如麻豆大蕤仁別研如泥同熬滴在水中不散入去沫蜜少許再熬少時爲度令病人心靜點之至目中微痛日用五七次臨卧點尤疾効名之曰百點膏但欲多點使藥力相繼也

選奇湯

治眉骨痛不可忍

炙甘草

夏月生用

羌活

防風

各三錢

酒黃芩

一錢

冬月不用此一味如能食熱痛倍加之

右呔咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食後服之

神効明目湯

治眼櫛緊急致倒睫拳毛及上下瞼昏赤爛睛疼昏
暗晝則冷淚常流夜則眼澀難開

細辛 二分

蔓荆子 五分 防風 一錢

葛根 一錢五分

甘草 二錢

一方加黃芪 一錢

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱臨卧服

羌活點翳膏 一名復明膏

治足太陽寒水膜子遮睛白翳在上視物不明

藁本

漢防已

各二分

黃連

防風

麻黃

去根節

柴胡

升麻

生地

各三分

羌活

七分

生甘草

四分

當歸身

六分

麩仁

六個

椒樹

東南根二分
西北根二分

右用淨水一大碗先煎漢防已黃連生甘草當歸生

地黃煎至一半下餘藥再煎至一盞去粗入銀石器

中再熬之有力為度

明目細辛湯

治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒怕火眼睫成紐

眊糊多隱澀難開眉攢腫悶鼻塞涕唾稠粘大便微

硬

川芎 五分

生地黄 酒製

蔓荊子 各六分

當歸梢

白茯苓

藁本 各一錢

荆芥 二分

防風 二錢

麻黃根

羌活 各三錢

細辛 少許

紅花 少許

椒 八個

桃仁 二十個

右咬咀分作四服每服水二盞煎至一盞去粗稍熱

臨卧服之忌酒醋濕麪

復明散

治內瘡

青皮 三分

橘皮

川芎

蒼朮 各五分

炙甘草

生地黄

連翹

柴胡 各一錢

黃芪 一錢五分

當歸身 二錢

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去粗
稍熱服之食後忌酒醋濕麪辛熱大料物之類

助陽和血湯

治眼發之後微有上熱白睛紅隱澀難開睡多眵淚

蔓荊子 二分

香白芷 三分

柴胡

黃芪

炙甘草 當歸身酒洗 防風各五分 升麻七分

右咬咀都作一服水一盞半煎至八分去粗稍熱服

臨卧避風寒處睡

吹雲膏

治目中淚及迎風寒泣羞明畏日常欲閉目喜在暗

室塞其戶牖翳膜歲久遮睛此藥多點神驗

細辛一分 升麻 麩仁各三分 青皮

連翹 防風各四分 柴胡五分 生甘草

當歸身各六分 生地黃一錢五分 揀黃連三錢 荆芥穗一錢

微取
濃汁

右咬咀除連翹外用澄清淨水二碗先熬餘藥至半
碗入連翹同熬至一大盞許去粗入銀石器內文武
火熬滴入水成珠不散為度入煉去沫熟蜜少許熬
勻用之

防風飲子

治倒睫拳毛

細辛

蔓荊子 各三分
葛根

防風 各五分

當歸身 七分

炙甘草
黃連

人參 各一錢

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食遠服
避風寒

撥雲湯

戊申六月徐總管患眼疾於上眼皮下出黑白翳兩
箇隱澀難開兩目緊縮而無疼痛兩手寸脉細緊按
之洪大無力知足太陽膀胱爲命門相火煎熬逆行
作寒水翳及寒膜遮睛證呵欠善悲健忘噓噴眵淚
時自淚下面赤而白能食不大便小便數而欠氣上
而喘

黃芪 一分

細辛

生薑

葛根

川芎 各五分

柴胡 七分

荆芥穗

藁本

生甘草

升麻

當歸身

知母 各一錢

羌活

防風

黃蘗 各一錢五分

右咬咀如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗

熱服食後

神效黃芪湯

治渾身麻木不仁或頭面手足肘背或腿脚麻木不仁並皆治之如兩目緊急縮小及羞明畏日隱澀難

開或視物無力睛痛昏花手不得近或目少精光或
目中熱如火服五六次可効

蔓荆子 一錢

陳皮 去白 五錢

人參 八錢

炙甘草

白芍藥

各一兩 黃芪 二兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗臨卧稍熱

服

如小便淋澀加澤瀉 五分 一服去則止

如有大熱證每服加酒洗黃蘗 三分

如麻木不仁雖有熱不用黃蘗止加黃芪 兩 通用三

兩也

如眼縮急去芍藥忌酒醋麪大料物蔥韭蒜辛物

如麻木甚者加芍藥一兩通用二兩

圓明內障升麻湯一名冲和養胃湯

治內障眼得之脾胃元氣衰弱心火與三焦俱盛飲

食不節形體勞役心不得休息故上為此疾

乾薑 一錢 五味子 二錢 白茯苓 三錢 防風 五錢

白芍藥 六錢 柴胡 七錢 人參 炙甘草

當歸身 酒洗 白朮 升麻 葛根 各一兩

黃芪

羌活

各一兩
五錢

右咬咀每服五七錢水三大盞煎至二大盞入黃芩

黃連

各二錢

同煎數沸去粗煎至一盞熱服食遠

黃芩黃連湯

黃芩

酒洗炒

黃連

酒洗炒

龍膽草

酒洗四次
炒四次

生地黄

酒洗各一兩

右咬咀每服二錢水二盞煎至一盞去粗熱服

蔓荊子湯

治勞役飲食不節內障眼病此方如神効

蔓荆子 二錢五分 黃蘗 酒拌炒 四遍 白芍藥 各三錢 炙甘草 八錢

黃芪 各一兩 人參 各一兩

右咬咀每服三錢或五錢水二盞煎至一盞去粗臨

卧温服

歸葵湯 一名連翹飲子

治目中溜火惡日與火隱澀難開小角緊視物昏花

迎風有淚

柴胡 二分 生甘草 蔓荆子 連翹

生地黃 當歸身 紅葵花 人參 各三分

黃芪

酒黃芩

防風

羌活

各五分

升麻

一錢

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食後溫服

救苦湯

治眼暴發赤腫臉高苦疼不任者

桔梗

連翹

紅花

細辛

各一分

當歸身

夏月減半

炙甘草

各五分

龍膽草

蒼朮

各七分

黃連

羌活

太陽

升麻

陽明

柴胡

少陽

防風

藁本

各一錢

知母

生地黃

黃蘗

黃芩

各一錢五分

川芎 三錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去粗食後溫服
若苦疼則多用苦寒者兼治本經之藥再行加減如晴
昏加知母黃蘗一倍

熟乾地黃丸

治血弱陰虛不能養心致心火旺陽火甚瞳子散大
少陰爲火君主無爲不行其令相火代之兼心包絡
之脉出心系分爲三道少陽相火之體無形其用在
其中矣火盛則令母實乙木肝旺是也心之脉挾於

目系肝連目系况手足少陽之脉同出耳中至耳上
角斜起於目外皆風熱之盛亦從此道而來上攻頭
目致偏頭腫悶瞳子散大視物則花此由血虛陰弱
故也法當養血涼血益血收火之散大除風之熱則
愈矣

人參 二錢

炙甘草

天門冬

湯洗去心

地骨皮

五味子

枳殼 炒

黃連 各三錢

黃芩

當歸身

酒洗焙乾各五錢

柴胡 八錢

熟乾地黃

一兩

生地黃

酒洗七錢五分

右件同為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸
茶湯送下食後日進二服

益陰腎氣丸

此壯水之主以鎮陽光

澤瀉

茯苓

各二錢五分

生地黃

酒洗乾

牡丹皮

山茱萸

當歸梢

酒洗

五味子

乾山藥

柴胡

各五錢

熟地黃

二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十丸淡鹽湯下空心

羌活退翳丸

治內障右眼小眦青白翳大眦微顯白翳腦痛瞳子
散大上熱惡熱大便秘澀小便如常遇天氣暄熱頭
痛睛脹可服此藥翳在大眦加葛根升麻翳在小眦
加柴胡羌活是也

黑附子

炮

寒水石

各一錢

酒防已

二錢

知母

酒炒

牡丹皮

羌活

川芎

各三錢

酒黃蘗

生地黄

酒洗

丹參

羌蔚子

酒當歸身

柴胡

各五錢

熟地黄

八錢

芍藥

一兩三錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五七十九白
湯下空心宿食未消待饑則服之藥後省語言以食
壓之

當歸龍膽湯

治眼中白翳

防風

石膏

各一錢五分

柴胡

羌活

五味子

升麻

各二錢

甘草

酒黃連

黃芪

各三錢

酒黃芩

炒

酒黃蘗

炒

芍藥

當歸身

草龍膽

酒洗各五錢

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗入酒少許
臨臥熱服忌言語

補陽湯

治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通令青白翳
見於大眥及足太陽少陰經中鬱遏足厥陰肝經氣
不得上通於目故青白翳內阻也當於太陽少陰經
中九原之下以益肝中陽氣衝天上行此乃先補其
陽後於足太陽太陰標中標者頭也瀉足厥陰肝經
火下伏於陽中乃次治也內經云陰盛陽虛則當先

補其陽後瀉其陰此治法是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯臨卧服瀉陰丸若天色變經大寒大風并勞役預日飲食不調精神不足或氣弱俱不可服待體氣和平天氣如常服之先補其陽使陽氣上升通於肝經之末利空竅於目矣

肉桂一錢
去皮

知母炒

當歸身酒洗

生地黄酒炒

白茯苓

澤瀉

陳皮各三錢

白芍藥

防風各五錢

黃芪

人參

白朮

羌活

獨活

熟地黄

甘草

各一兩

柴胡 二兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一大盞去粗空心服

之

瀉陰火丸 一名連藥益陰丸

五味子

羌活

獨活

甘草

當歸稍

防風

各五錢

草決明

細黃芩

黃連 酒炒

黃蘗

知母 各一兩

石決明 三錢

炒存性

右為細末煉蜜為丸如棗豆大每服五十丸至一百

九茶清下常多服補陽湯少服此藥多則妨飲食

升陽柴胡湯

肉桂 五分

柴胡 去苗一分 錢五分

防風

白茯苓

澤瀉

陳皮 各一錢

生地黃 酒炒 楮實 酒炒微潤

黃芪

人參

白朮 各五錢

甘草梢

當歸身

羌活

熟地黃

獨活

白芍藥 各一兩

知母 酒炒如大者 加作五錢

右判每服五錢水二盞煎至一盞去粗稍熱食遠服

別合一料煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九茶清

下每日與前藥各一服食遠不可飽服

如天氣熱加五味子 三錢

天門冬 去心

芍藥 楮實 各五錢

溫衛湯

治鼻不聞香臭目中流火氣寒血熱冷淚多臍下冷

陰汗足痿弱

陳皮

青皮

黃連

木香

各三分

人參

甘草 炙

白芷

防風

黃蘗

澤瀉 各五分

黃芪

蒼朮

升麻

知母

柴胡

羌活

各一錢

當歸身一錢五分

右都作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服之

圓明膏

治勞心過度飲食失節乃生內障及瞳子散大此方

收睛圓明

訶子皮濕紙裹煨 甘草各二錢 當歸身三錢 柴胡

生地黃 麻黃去節搗開 黃連各五錢

右七味先以水二碗煎麻黃至一碗掠去沫外六味各咬咀如豆大篩去末入在內同熬滴水不為

度入熟蜜少許再熬勤點眼

嗜藥麻黃散

治內外障眼

麻黃

一兩

當歸身

一錢

右二味同為麤末炒黑色入麝香乳香少許共為細末含水鼻內嗜之

療本滋腎丸

黃蘗

酒炒

知母

酒炒已上各等分

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服一百丸至一

百五十九空心鹽白湯下

加味滋腎丸

肉桂 三分

黃連 一錢

姜黃 一錢五分

苦參 三錢

苦苧蘼 酒洗

石膏 覺肚冷勿用

黃蘗 酒炒

知母 酒炒各五

錢

右爲極細末打薄麵糊爲丸如梧桐子大每服一百

丸空心服白湯下食壓之

退翳膏

治黑白翳

龍胆飲子

升麻 各三分

連翹

防風

青皮 各四分

甘草

柴胡 各五分

當歸身 六分

黃連 三錢

生地黃 一錢五分

荆芥穗 一錢水半盞別浸用

右用水一碗入前藥煎至半碗去粗更上火煎至半

盞入荆芥水兩匙入蜜少許再上火熬勻點之

龍膽飲子

治疳眼流膿主疳翳濕熱為病

穀精草

川鬱金

蛇退皮

炙甘草 各五分

分

升麻 二錢

麻黃 一錢五分

青蛤粉

草龍膽

黃芩炒

羌活各三錢

右為細末每服二錢食後溫茶清調服之

柴胡聰耳湯

治耳中乾結耳鳴耳聾

連翹四錢

柴胡三錢

炙甘草

當歸身

人參各一錢

水蛭五分炒

麝香少許

蚶虫三個
去翅

足炒
另研

右除三味別研外生薑三片水二大盞煎至一盞去

粗再下三味上火煎一二沸稍熱服食遠

羌活退翳湯

治太陽寒水翳膜遮睛不能視物

羌活

一兩五錢

防風

一兩

酒生地黃

一錢

薄荷葉

藁本

各七錢

酒知母

五錢

黃蘗

四錢

川芎

當歸身

三錢

小椒

五分

細辛

少許

麻黃

二錢用根

荆芥穗

煎成藥加之

右吹咀每服三錢水二大盞煎至一盞半入荆芥穗

再煎至一盞去粗稍熱服食遠忌酒醋濕麪等物

遠睛紫金丹

治目眶歲久赤爛俗呼爲赤瞎是也當以三稜針刺
目眶外以瀉濕熱如眼生倒睫拳毛兩目緊蓋內伏
火熱而攻陰氣法當去其熱內火邪眼皮緩則毛立
出翳膜亦退用手法攀出內瞼向外以針刺之出血

白沙蜜

二十兩
六兩水飛

南乳香

各三錢

烏魚骨

二錢
麝香一錢

白丁香

直者五分
輕粉一字

甘石

十兩燒七遍
碎連水浸拌

揀連

三兩小便
浸碎爲末

礪砂

一錢小盞內放
於瓶口上熏乾

右將白沙蜜於沙石器內慢火去沫下甘石次下丹

以柳枝攪次下餘藥以粘手為度作丸如雞頭大每用一丸溫水化開洗

麗澤通氣湯

治鼻不聞香臭

黃芪 四錢

蒼朮

羌活

獨活

升麻

葛根

防風 各三錢

炙甘草 二錢

川椒

麻黃 不去節 冬月加

白芷 各一錢

右咬咀每服五錢生薑三片棗二枚蔥白三寸同煎至一盞去粗溫服食遠忌一切冷物及風寒涼處坐

卧行立

温肺湯

治鼻不聞香臭眼多眵淚

丁香 二分

防風

炙甘草

葛根

羌活 各一錢

升麻

黃芪 各二節

麻黃 不去節四錢

錢

右為麤末水二盞葱白二根煎至一盞去粗食後服

禦寒湯

寒氣風邪傷於毛皮令鼻壅塞嗽嗽上喘之證

黃連

黃蘗

羌活

炙甘草

各二分

佛耳草

款冬花

白芷

防風

各三分

升麻

人參

陳皮

蒼朮

各五分

七分

黃芪

一錢

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗食後熱服

蘭室秘藏卷上終