



三家醫案合刻

薛雪生白著

後學吳金壽手稿

骨小肉脆定非松柏之姿脈數經停已現虛勞之候先天既弱而水虧壯火復熾而金燥歲氣一週一損豈容再損秋風乍薦已傷難免重傷證具如前藥惟補北非敢說夢聊以解嘲

金石斛

生地  
沙參  
生髓用

生地

沙參

地骨皮

麥冬

蘇祿國貢使契苾丹副使阿石丹久欬不能臥案  
辨八方之風測五土之性大率貴邦偏在中華之與上  
箕尾之前翼軫之外陽氣偏泄卽有風寒易感易散來  
此華夏已屬三焦況不得臥下肺氣大傷止宜潤降而  
已。

蜜炙枇杷葉

麥門冬

川貝母

甜杏仁

經霜桑葉

米仁

內經謂骨肉柔脆之人其質本弱然以脈症較之其欬

原屬手太陰得之間先一人補之後一人瀉之邪則從  
補而升元則由瀉而虛竟成廁兵出而岸兵入也亦參  
末議共博一笑

北沙參

燕窩

桑葉

冰糖

川貝母

紫苑

史馬行疾也

少腹有形隆起如阜上至心下則厥逆來疾去駛雖大  
力人拒之不能郤上則人身爲之上竄下則人身爲之  
下墜不能強掙一翕一闢一上一下廻至人身上下如

春杵口鼻兩陰之血隨其上下溢出。羣醫不能治。余思此症載在難經。特未曾縷晰示人耳。且云此物伏在臍旁上下。則少楚伏入臍中。則少安。可見臍旁兩穴。亦與此條相合。且弗掲明其義。一任羣公思而得之可也。

用薄荷湯送下神秘丸。以病人自思此湯飲之。其物倏伏而不動。故亦用之。

素來擾虧根本。不特病者自嫌。卽操醫師之術者。亦跋前疐後之時也。值風木適旺之令。病目且黃。已而遺精。日至祇也。

日集 藏也止也

淋濁少間則又膝脛腫痛不能行及來診時脈象左弦  
數右搏而長面沈紫而時時作嘔靜思其故從前紛紛  
之病全一邪也均爲三病次第纏綿耳由上而下由下  
而至極下因根本久撥之體復蒸而上爲胃病是腎胃  
相關之妙也倘不稍爲戢除一二但取回陽返本竊恐  
劍闢苦拒而陰平非復漢有也謹擬一法略効丹溪未  
識何如

羚羊角

木瓜

酒炒黃柏

伏龍肝

生米仁

橘紅

馬料豆

癱勞得愈。如麟毛兔角。或叩之瓊臺丹局間。求金光一葉。庶幾脫然。

小建中湯

脈象右三部洪數絃急並現。左上數中緊。先患陽精不升。次及於陽絡不固。蓋至陰生陽不屯。失精爲先天。至陽出陰。失蒙吐紅爲後天。是有形始兆之後。復現先後天俱病。卽稟至真有餘之軀。亦不足以供其漸耗。今將

投味厚入陰者乎。抑投味薄清陽者耶。竊恐山川草木。  
皆不足以還返金品。莫妙夫大藥金丹。週天火候耳。然  
又不可以服食之方佐之。擬候尊師全訂終慙布鼓。  
希諒之。

建蓮肉一觔。帶心撲如麻子大。麥冬肉一觔。

飯上蒸曬九次爲末

嫩荷葉半觔。頂生地四兩。金櫻子去毛半觔。

以前四味熬膏。全蓮肉粉杵爲丸。秋石湯送五錢。  
抑鬱頓挫。侘傺無聊心。乃偏倚十二官。皆無主。則陰氣。

楚折傷。  
余僚立止失志也。

並於陽也。投以重鎮之劑。

生鐵落

鬱金

半夏

苦參

橘紅

塊薺

陽極升而不入陰。鬱沈而不附。是以有晝無夜。離明當午而睡。水漸衰矣。治以交陰陽。引衛入營。母云血家忌半夏也。

半夏

酸棗仁

生地

生甘草

糯米

茯苓

米仁

去油乳香

暑熱時邪病經二十日。諸法具備。何必問途於蹇足。既承觸暑相招。勉爾揮汗撰方。

川連

半夏

生甘草

淡芩

茯苓

生薑

此症原屬胃乏冲和之氣而起。要之冲和之氣卽太和元氣。位天地。育萬物。無非此氣。少有不足。已非所宜。况大有所損乎。拙見宜謝絕一切高養山齋。餌以藥石。廓然世外。庶幾霍然。若在操觚蓮幕。非所宜也。吾聞君子

贈人以言。愛人以德。故瑣屑及此。

旋覆花

木瓜

生穀芽

炙草

代赭石

白芍

糯米汁

病更節後。醫歷多人。朝張言熱暮李論寒。藏府各有受  
盛。運氣各有翕闔。渺爾一軀。遍嘗補瀉。不病亦病矣。宜  
守正持法。幸勿好大喜功。

當歸建中湯

脈絃勁如循刀刃。全無冲和之氣。木蒸太過。金令不及。

從後來者謂之賊魁。苟非致太和之氣以消乖戾必至  
陰失潛藏陽無所倚。履霜堅冰至。豈可不未雨而綢繆  
乎。老子云。齒剛則折。殆其是也。切囑切囑。此方存之於  
左參。

炙甘草

北沙參

料豆皮

冬桑葉

生白芍

麥冬肉

中土以嵩高而定。八方之位。是蜀在坤矣。毓斯境者。脈  
宜緩而流利。今洪搏太過。面黃氣重。幸在浙已久。若處

故鄉是脈象當血溢卽日回蜀宜早服丸以滋之

### 六味地黃丸

清貴之脈類多六陽次則六陰是皆純淳之象今體稟六陽是一徵也息分九候位分三部雖一部之中均察藏府而左部顯然者心肝腎三藏今寸來空大是心不藏神也關脈滑數木無水養也尺來浮大水氣不衡也火以木爲體木以水爲母先天一炁由是通明故知離中耦晝生陰心氣日欲下交坎中奇晝生陽腎氣日欲

上承是卽心腎一交也。丹訣云。水火交永不老者此也。  
無非尋常日用之間。心欲寧。肝欲和。腎欲實。庶無恍惚  
悸動。以及肢末不利。而四體泰然矣。謹疏一方。先滋營  
衛。頤養之法。再圖疏呈。

人參

棗仁

遠志

當歸

炙草

熟地

茯神

元參

白芍

木香

脈象較前稍和。兩手平均。俱就六陽本體。可卜無外來  
之氣。惟營衛少虛耳。但觀簿書旁午。是心陰不得不養。

腎陽不得不藏。以供日用之精神。以副臨民之至意。先配湯藥。帶往省中。日進一劑。培補隨配膏丸。相繼憲體。精神自當日臻康泰矣。

人參

棗仁

蹄身

炙草

茯神

元參

白芍

杞子

熟地

胡桃

桂圓肉

內經稱三陽結。乃成膈者。單指太陽陽明少陽也。今從脈色較之。少陰與厥陰亦病。若以填補下焦爲首務。固

所當然。但胃關一部從何飛渡。且有一團燄火挾木邪。  
橫亢於中州。得熱爲伍。愈肆猖狂。苦寒勢所不容。甘寒  
勢不容緩。倘令肺不生津。大腸不生液。津液愈虧。爲病  
愈築矣。且逆上者肝邪也。水不生之耳。不納者胃病也。  
肺氣不降耳。一身之中。津液真精。皆爲切要。愚見專事  
於此。未識如何先進五汁飲。次商投藥可也。

蘆根汁

甘蔗汁

茅根汁

鮮藕汁

水梨汁

各一盃

生薑汁

沈香汁

各一小匙

診得脈象惟有虛細無力弦象俱退手足顫振此元炁  
虧弱之徵前此投藥俱無少效者蓋爲元炁不克載藥  
行令耳今元氣一日不復則病機一日不退病機與元  
氣本不竝峙此長彼消理之常也據愚見湯藥在乎其  
次必以直走先天之品劑爲膏丸朝斯夕斯久久自足  
元氣元精一朝而復後天飲食不強自強矣因此症非  
暴感內傷不必數數更方以苦陽明胃口且經不云乎  
適於胃者爲補煎藥久服適於胃者否耶愚自吳中丞

給諫公之命來斯一診色脈固知不出此理勉爲鎮臺  
留三日者一則感鎮臺下士之隆一則爲給諫公篤親  
之愛而欲浙中諸醫一批郤導寂以報鎮臺今參脈症  
母事更張直補先天可也議呈煎膏丸三方煎則暫用  
膏則時時頻服丸則清晨爲定俟填補二十日外便有  
消息尙當叩墮復診何如

方未見

尊體本陰虛陽氣并邪獨發熱廿餘日不解蓋陰液枯

不能作汗邪亦不解也。連劑養陰之後，邪少鬆，則大汗泄。是雲行雨施，品物咸亨之候。何疑其脫邪？但弱體久病不解，元炁愈虧。此邪稍出，大汗作，亦屬接補關頭。不容少懈耳。心靜則氣定而神住，切不可憂擾神氣，致陽上升，至囑至囑。

人參四錢熟地一兩抱木茯神二錢天冬三錢  
製首烏五錢左顧牡蠣六錢

脈空弦，腹中急痛，所病也。治肝不應，治脾亦良法也。

粗桂枝一錢 没藥五分 白芍二錢 甘草一錢  
炒黃甘草炒黑

琥珀一錢 餡糖錢半

窘 腸中脂也

骨小肉脆本非松柏之質補瀉溫涼雜投豈是濟生之術。幸能食便實秋令尚可扶持然破胸脫肉側眠經阻醫者猶然夢夢何也僕老不談醫聊書數語并擬一方。

熟地 炙草 當歸 生左牡蠣

十二經皆有欬胃病安得不欬况此土病於金藏而府亦病於此面求其痛與瀉一在於胃之上脘一在於肺

之府所以無從踪跡也。仰屋圖維必須分兵合勦乃得擬一法。請諸道長以此而益精之。或薦義可采爲蝦力於行舟何如。

江西赤石脂六兩 蝦炒黑乾薑 一兩

二味爲末黃米飯爲丸

人參一錢炙黑甘草一錢大棗五錢飴糖五錢桂木一錢酒炒白芍二錢煨熟生薑一錢

水煎一次去渣送前桃花丸三錢

前也掃也

病本濕溫。元氣不能載邪外出。有直犯中焦之勢矣。擬以梔豉上下分開之。薑芩左右升降之。芳香之草橫解之。以冀廓清諸邪。未識得奏膚功否。

黑山梔

淡芩

川鬱金

生香附

炒香豉

生薑

鮮石菖蒲

生甘草

病久緒索。終不離乎厥陰一藏。今商佐金氣以暗制之。滋營氣以撫綏之。實太陰以堵禦之。亦子貢存魯霸越、滅吳之意。

羚羊角

人參

製首烏

清阿膠

麥冬

雲茯神

診得真氣入不週于四肢。又暴受暑邪。類中遺溺目瞑。  
脈弦數而上承魚際。肝風爲足厥陰。暑風爲手厥陰。手  
足兩經得病。瘡而不能言者不治。且移至近地涼處爲  
病室。外解暑邪。內用對證之藥。以救其逆。

羚羊角

竹茹

連翹仁

鮮桑枝

半夏

鮮石菖蒲根

人生五十一藏衰。况向六乎。所患聚訟者皆主腎藏。蓋以所述大旨。在扼定脾藏。則樞機得而四運成矣。

獨尤膏先用十觔可也。

真氣已漓。病何能愈。有愈之方者其仙乎。

歸芍六君去甘草鮮桑枝煎湯代水。

此太陰被濕氣薰蒸。無清肅之權。木無畏。右肩臂漸顯不仁之象。翹葉傷生。而尙甘之。我不解也。

生米仁

鮮蘆核

生地

嫩桑枝

白歸身

赤芍

人身之脈。胸走手。腹走足。八十丈週于一身。未有沈寒傷筋之損。而不及於下者。先後異時爲患。則一非鮑姑之艾。文伯之鍼。不能愈。內服八味湯可也。

桂附八味丸

僂佈之人多嗜。積鬱之人多火。久而久之。怫鬱之性。颺發。波掀若狂。若魅藥石既不能與。先與丹藥。焚於室中。以辟易其狂悖可也。

標狂風  
先以手高舉  
媚妖邪氣也

閑濡甚 和也

如意丹七丸

鬚眉白落。皮毛淖澤。脈來浮濶。此風也。非衰白也。三十  
六種同出異名。非淺可之疾。夏月宜食香風蛇。卽俗名  
黑風蛇也。與雞煮食之。

白歸身

白麻

赤芍

生地

旱蓮草

殭蠶

銀花

茺蔚子

夏枯花

頭痛脅不見人爲一忌。肝風嘔吐膽汁爲一忌。相與有  
杳深日也。

年知已惟此一人。豈宜坐視。移得挽回爲妙。然固有數  
抒焉者矣。

溫膽湯去枳實加天麻鉤藤桑葉

是證究屬肝風。則厥陰一經未易制也。在古法有鎮攝  
一法。有培土禦之一法。所以東垣有半夏天麻湯。而景  
岳又換左歸以補其闕略。今二法皆不能純用之矣。擬  
出入一方備采。

人參

焦尤

茯苓

柏子仁

半夏

陳皮

熟地

白歸身

欒草

鼈甲

久咳移邪犯胃。因咳而肺肅無權。故氣升逆。勿用瀉損肺氣之藥。

水梨去心帶皮搗爛絲綃瀝清慢火熬成膏收入磁餅內蟻封口。每日開水送五錢。

陽明脈實。氣急而喘。壯火食氣。消爍真陰。夏氣開張而劇。剝棗時坦境也。此刻不能他圖。姑與溫膽湯少衰其

熱以保傷金。

溫膽湯

目順。目動也。搖動也。

體盛之人。氣必弱。寒熱乍起。卽現小便短數。頭項瞞動。  
舌乾齒燥。氣促。脈左弦右弱。渴不欲飲。皆元不勝邪之  
象。恐其乘津液之衰。遽爾內陷。宜謹慎斟酌。緣此時正  
當燥令故耳。

天花粉

卷竹葉

厚橘紅

青蒿梗

麥冬

六一散

脈數五六日不更衣。舌黃脣焦。胃熱熾矣。况前服之藥。  
皆辛溫耗陰之品。今非寒涼不可。然宜小心保護爲主。  
因熱邪深入陰中。而陽氣獨亢故耳。

川黃連

枳實

瓜蔞

赤芍

生甘草

陳皮

杏仁

木通

病之原由食柿過多得寒而起於茲二十餘年矣。要知  
柿爲西方之木。其實稟秋金之氣而成。其與肺金爲同  
氣相求。可知其邪入肺發爲氣哮。久則腎水無本虛而

首翰勇也

上泛爲痰。胃爲貯痰之器。所以降氣湯。六君子。由肺及胃。皆得小效而不除。要蓄與卽墨不拔齊地。終非無有。況脈象尙悍。當深入病所爲是。擬仲景方法。

甜葶藶

苦葶藶

大棗

嗽而失血。已逾三載。纏綿不已。色黯脈弦。嗽益甚。環口色黃。由于肝脾及于腎。上藏爲其所取給而不能應矣。飲亦從而爲患。逐之不得。滋之無功。遷延日損。莫可彌縫。當取其中。以冀流布。庶幾近之。擬宗建中法。加以滌

飲之。而俟陽明升而繼以大補太陰。然後漸入純陰之  
法。否則非治也。

小建中湯去薑加茯苓薑皮

古人造字。兩火著力爲勞。故爲君相二火而說溫補中  
州。以靜瘀之源。補下焦。以益水之源。但病勢已深。恐非  
一擊可破也。

熟地      枸杞子      元參      牛膝

橫則爲三坎。豎則爲出水中間。一點真陽。水虧則露。爲龍火。三爲震。震下之陽與之同源。升爲雷火。所以雷爲木屬。皆陰中之火也。覩陰之藥愈發愈熾。一切草木無能制之。當用一元丹久服愈矣。

蟾秋石五六粒。紅棗槳爲丸。早服五六錢。晚服二三錢。以陽秋石少許。點湯送下。

脈弦數尺。獨大。咳而喉痛失音。乃數載尖紅之後。其陰虧火炎。不言可喻矣。唯有至靜之品。引陽潛入陰中。庶

近內經之旨。然須作靜攝工夫。使陰秘陽密。得坎離相  
交之力爲妙。

熟地海石粉

金石斛

北沙參

茯苓

麥門冬

生白芍

龜腹板

山藥

形忽漸瘦。脈虛極。氣怯偶咳。目黑微眩。忽忽不樂。補氣  
補血人所知也。宜將陰獸引入陰中。藥猶得力。早晚捕  
獺一頭。取肝陰乾用鹿角膠各于木器杵碎。早服鹿角  
膠末一錢。晚服獺肝末一錢。皆開水送下。此常用百日。

之法。今擬煎方先服。

人參

茯苓

菟絲餅

南棗

焦冬水

炙草

枸杞子

左關搏指急疾。右關弦大無胃氣不歸元。充海無根。右關如是當剝于春。左關如是當折于秋。恐左關爲應。勉擬古人乙癸同源之治。

大生地

女貞子

枸杞子

茯神

元參

懷山藥

紫石英

此病起于費心勞碌，風寒不節，遂致咳嗽吐痰，久則內傷。內傷者，內中之藏氣傷也。卽古人所謂虛勞證。總不得愈，必須絕去費心勞碌之事。一毫凡念不起，助之以藥，或可延年。

麥冬

阿膠

桔梗

炙草

沙參

米仁

茯苓

此瘀勞也。由于太陰傷損，日傳至足少陰，脾氣少塘，則入下藏也。百無一治，速宜返棹閉關，靜養方一首奉贈。

日飲可也。

熟地

阿膠

百合

枸杞子

花甲之人兩尺獨大二藏已衰之際。豈宜如此急進七  
癸同源之法可矣。

熟地

女貞子

菟絲餅

茯苓

元參

旱蓮草

枸杞子

蜜丸

此真陰虧證。俗名百日勞也。稍有伏暑。所以寒熱愈甚。  
錯乎治之不早爾。

熟地

茜草

青蒿

元參

滑石

丹皮

坎中一畫真陽孤飛于上。一爻巳午之月。神水金丹亦奈之何。

老生薑

天冬

懷牛膝

甘草

川石斛

元參

女貞子

稟性好食辛。醫書云。多食辛。令暴卒。今診得色脈形骸俱憊。不須暴卒。亦不長生。宜自持其病。今先服三生飲。

生地黃

赤茯苓

麥冬

粉甘草

生米仁

紅棗

此一損證也。從上損之下者，一損肺。肺再傳心。傳肝。傳脾。脾損便溏。傳至腎。則骨痿不能子。牀斷不可再投理。肺藥以速其損。惟猪肚丸可服。

猪肚丸

未過五旬。形脈色俱衰。叩之連喪三子。得不如是耶。況復傷其孫乎。此非藥餌所能療者也。

川貝母

生地

茯苓

麥冬

脈得數而且弦此陰虧症也並非外感今以虛火升而頭痛漸有金水兩傷之勢靜攝乃得藥餌其次也

熟地

女貞子

麥冬

龜板

元參

滌秋石

紫欒

爲丸開水送下

肺爲水主。熟滌則融。融則水源竭矣。土爲金母。不承則金無生。土金水三藏日漸。苟無玉液神精。安能返既憊之有形。雖擬禁方。亦據古人之常談耳。

羣華湯

心陰虛則易汗。肺陰虛則多嗽。肝陰虛則火升。腎陰虛則發熱。脾陰虛則便溏。非一真陰乎。怯症之漸也。但知頭痛醫頭之爲良醫。不知履霜堅冰至。君子其爲憂危之心也。

炒白芍

小生地

麥冬

棗

桂枝木

炙甘草

青蒿梗

雲苓

診得脈細數而微。舌乾黃。下利身焦燥而不潤。此爲下

多傷陰歟邪因之而內陷大可慮也治法輕以清其邪  
苦以潤其熱未識應否

川連

小生地

人中黃

淡豆豉

木通

金銀花

飲食不和者太陰虧也葛稚川肘後方有一味治虛勞  
之法少陰厥陰虧者鹿角散太陰虧者神麴散今用神  
神

麴散

真陳六神麴研細炒香四兩每食後用開水調服

二錢

中焦爲氣血津液朝會之所。今診得胃氣不能脈中流而其亦元氣中餒也。酸以攝滯。辛以流動。惟甘以培養。因增腫滿而卻之。擬方備閱。

橘白

灼艾

醒頭草

麥冬

木瓜

五味子

厥有十四。洩爲一法。鎮爲一法。蓋因曲直太過。不特下侮上。并其上不畏金鎗法。恐其格不相入。宜因其勢而

利導之。然後潤之滋之。妙有不濟者。

羚羊角

金鈴肉

生甘草

淡吳萸

黑糟豆

生白芍

雲茯苓

川鬱金汁

仲景書云。瘧脈自弦。一句閒盡人夫眼目。今三部九候之中。並無一毫弦象可見。與正氣相戰者。非比春之風夏之暑。南方之瘴也。於此推之。思過半矣。

草果仁

炒厚樸

陳皮

白茯苓

製蒼丸

炙草

脈愈按愈大。可知陰氣不足。瘧邪得以深入。漏蘆鱉甲  
瘦陰太過。非花甲勞心之體所宜。汗洩過多。陽氣亦虛。  
胃間伏邪水飲不入。種種皆所不勝也。豈宜再從汗解  
耶。病者小心。醫者慎之。

人參

蔻仁

淡黃芩

生牡蠣

生地

陳皮

少青皮

生首烏

新穀

薑汁

明係肝風上冒。左尺脈碎亂搏指。此乙癸同源。腎肝同

病也。但少陰之脈不至於厥，惟厥陰能至以肝爲重腎次之。

羚羊角 生地 半夏 白芍

當歸身 陳皮 茶芩 菊花

女貞子

此由金水不相承挹，故欬久不愈。切勿理肺，肺爲嬌藏，愈理愈虛，證不可泛然滋陰。

北沙參 整玉竹 雲茯神 川石斛

甜杏仁

生扁豆

短氣失音。喉中時作水雞聲。右脈如革。面浮色疾。肺胃應之心下痞。鞭補瀉紛更動無一效。甚于水令劇于春候。擬進葷莖越婢成湯。進飲三劑。

石膏

桂枝木

白芍

杏仁

冬瓜子

生米仁

本屬濕溫。犯在三焦。充斥腠理。誤傷乎太陰足太陽之氣。必致漸入虛損一途。非病之過治之過也。必移入高

明靜虛之室治以百日之遙庶幾得之擬方開太陽益  
太陰

淡乾薑

同五味子搗爛

茯苓

地骨皮

桑葉

生扁豆

生甘草

弦動無情之脈卽名胃少雖非難經所謂但弦無胃而久病有此不宜莫因失血而久進純陰之藥陽氣抑而陰無所恃也拙見且進甘溫

建中湯加人參炙綿芪歸身

病在奇經治他經不應。要知血行清道。便知清氣不肅。  
所以鼻紅昏暈。二者皆出督脈。好異無用。以古法之法  
治之自效。

生地

犀角

廣圓核

側柏葉

右蜜丸早服五錢晚服三錢開水下

暑者熱中之陰邪也。心先受之。侵入胞絡。怠惰不語。神  
昏肢冷爲不治。今脈遲頓。漸有是機。因未漸令竟有內  
向外脫之虞。急用通陽救逆之法。倣古大順散之義。未

令總在誤寫。冷字

識何如。

桂枝

半夏

焦白芍

炙甘草

右脈乳搏耳聾血下溢寒熱不已陰絡所傷而厥陰不攝當從至陰中宣出熱邪是存陰第一義也。

青蒿

白知母

生白芍

炒黃柏

鱗甲

鮮荷葉

元米一合泡湯爲水

右脈一息七至弦左脈一息六至緊脉不得息陰氣已弱金水同受病且議景岳六君煎投之。

金水六君煎

素有喘症形氣怯弱。咽痛不腫時。此新感風溫在肺。  
氣不下肅。尙宜清降。

桑葉

白芍參

塊茯苓

杏仁

川貝母

南棗肉

稟質既薄。喉紅極易傷陰。不可理肺。緣水出高源。肺主  
氣母。藉以生津補液。周環百脈。故耳。

生地

清阿膠

枸杞子

料豆皮

麥冬 百合

昨所同議之方。以兩關按之脈弦。特借仲景旋覆代赭法。同四磨飲投之。旋覆有轉旋之功。代赭爲鎮墜之品。鹹寒可降。酸可入肝。四磨則漸摩運化。使手太陰得行清肅之令。足厥陰無冠海之暴。今診得兩關弦象已減而浮少退。是藥已應而暑渴欲飲。則仍然如故。是則陽明之府中垢不去。煎熬津液下流一日不通。上流一日上泛。雖有補虛之策。孰敢泛投。且其虛脈虛象顯然彰。

著勢不容緩。前既借仲景之法以退兩關之弦。此獨不可借仲景急去宿垢以存津液。然未可以子和霸法投之。擬以緩法推陳致新。仍候昨日兩道長印可何如。

旋覆花

代赭石

人參

煎送沉香化氣丸二錢五分

滋營養液膏

女貞子

廣皮

乾桑葉

熟地

旱蓮草

白芍

黑芝麻

枸杞子

鮮菊花

歸身

黑翫豆

玉竹

南燭葉

白茯神

沙蒺藜

炙草

右前十四味各四兩後五味各二兩天泉水桑枝  
火熬成膏收入真阿膠三兩煉淨白蜜三兩磁餅  
貯好每日卯時挑服五六錢開水送下

此方爲林下服食之大藥。肝氣不和之妙品。貞蓮二味  
法。二至以暗轉陰陽。佐以桑麻爲調風氣。應候播植生  
機。助以杞菊爲升降之春秋。亦承流以宣化。歸芍辛酸。

一通一泄。使無壅滯之情。地黃養藜。一填一養。不致肌虛之困。櫟豆滋水息肝。南燭培元益氣。茯神玉竹。爲營衛報使。橘紅甘草。爲喉舌真司。阿膠濟水。造成激濁場。清之凜冽。蜂蜜百花。釀就和風甘雨之仁。慈服之。不特調元卻老。且以見天地之生生。有如是也。

心脾雙補丸

人參  
元參  
五味子  
遠志肉  
麥冬  
茯苓  
酸棗仁  
柏子仁

於冰

川貝

生甘草

苦桔梗

丹參

生地

川黃連

金華香附

硃砂

右爲末用桂圓肉熬膏代蜜搗丸如彈子大每晨嚼服一丸以溫水送下

經云女子以心脾爲立命之根。凡心脾氣鬱鬱則從火。  
久不解漸耗五陰。特製此方有通有補。允與丹溪立  
齋諸公相頡頏者。方義蓋取人參養心氣。麥冬益心津。

生地丹參元參益心陰茯神柏子遠志安心神。五味  
無收心液。川連甘草瀉心陽桔梗利心氣硃砂鎮心怯。  
白朮健脾陽。香附暢脾陰。川貝療脾鬱特重其數。以對  
待心脾二藏。龍眼代蜜大補心血。甘草和脾尤如彈丸。  
細嚼吞下不致直趨下焦。其功倍著矣。名曰心脾雙補  
法。

治產後少腹結癰

人參 雲母粉 當歸 金鈴子

生地

吳茱萸

炒白芍

炒白川芎

乾漆

製香附

藕粉生用

老白韭根

右爲末真神麯糊丸菉豆大每日百丸空心開水

服下