



重訂 增補

内科撰要

卷十七

洋学文庫
文庫 8
C 27
17



增補經開篇第五十八

津山 李田川 玄真 方亭 增

加賀 井 方亭 增

增補經開篇第五十八

增補經開篇第五十八

增補經開篇第五十八

增補經開篇第五十八

增補重訂内科撰要卷十七

遠西諸玉函涅斯垓我爾德兒 著

津山 宇田川玄隨 晉 譯

加賀藤井方亭俊 校註 增譯

病屬婦人

增補經閉篇第五十八

羅甸名「メンストルム」ア、シツブル
サ和蘭名「ラブス」トビニク、デル

經閉ノ大較ヲ論ス

醫書

增訂内科撰要

卷十七



壯年ノ婦人。懷孕ニ非ス。乳兒アラスシテ月經閉滯或
稀少或數月ニ一回來ルハ皆是ヲ經閉ニ屬ス○婦人
十四歳以前或四十九歳以後及孕婦乳婦ハ月經ナシ。
縱是アルモ調順ナラス。然ラスシテ常例ニ來ルハ却
テ是ヲ病ニ屬スルナリ○經閉ト懷孕ト分別シ易カ
ラス然レ孕婦ハ大抵此篇中述ル所ノ經閉ノ諸症ヲ
發セス。縱是アルモ漸ク消散シ。乳房腹肚起脹シ。終ニ
子宮ニ胎アルヲ觸知スルナリ按腹或胎動ヲ以テ知ルヲ云
經閉ノ病因ヲ論ス
經閉ノ因。一ナラサルヲ猶大小便閉ノ諸因アルカ如

經閉

シ是其看法及治法ノ關係スル所ニシテ是ヲ辨晰ス
ルヲ一大緊要タリ○壯年ノ婦人ト雖モ失血過多或
産後或刺絡或篤疾ヲ患レハ其後月經一兩月閉滯ス
レ厄害ナシ。故ニ此症ハ通經劑ヲ與フヘカラス。是其
虧損ヲ補充スヘキ所ノ良血液ヲ驅泄スレハナリ○
或大小便發汗嘔吐潰瘍癩瘡水腫等ヨリ多ク津液ヲ
脱泄シ。體血液匱乏ニ因テ月經減少或延滯或壅閉
ルヲアリ。或長病ニ罹リ若ハ病漸ク快復スル人モ亦
月經閉滯シテ害ナキ者アリ
經閉諸液ノ粘稠ニ因ルノ症治ヲ論ス

經閉

居常水液多キ食膳ヲ喫シ或粘稠ニシテ凝結スル性ノ物ヲ食シ身體ノ勞動少ク靜坐多キハ諸液稠厚膠粘ニナリ是ニ因テ月經延滯シ或經閉ヲ患ルナリ此症通例尤多シトス○其症脉遲ニシテ弱喜テ眠リ肢體怠惰シテ動作ニ懶ク陰處ヨリ粘液ヲ通泄シ皮膚黧澹灰白肢體冷ル等ナリ此即チ粘液病○此症ハ先解凝劑及衝動劑ヲ與ヘ勉テ肢體ヲ舉動シ按摩拊循シテ其病原ヲ治シ其後通經劑ヲ用テ月經ヲ驅泄シ全治スベシ○解凝下劑ハ此症ニ多ク良効アル故ニ常ニ兼用スヘシ○此症刺絡ハ害アリ是唯多血ノ經閉ニ

施シテ功アルノミ

增註

按ニ此篇治法有テ藥劑ナシ故ニ今遠西名醫斯微旬及依百乙ノ說ニ據リ因症藥劑ヲ裁酌ノ略引シ其考證ニ備フ前後照合ノ類推シ其症治ヲ領會スヘシ

飲食起居

居常多飲液ヲ用ヒ且靜坐スル者ハ體質薄弱肌肉軟脆筋脉緩弛多病ニノ孕難ク孕メハ墮胎シ易ク或萎黃病粘液腫ヲ發ス故ニ虛弱ノ婦人ハ勉テ乾食ヲ喫シ肢體ヲ舉動シ或步行其他適意ノ運動ヲ以テ身體ヲ健運ノ強壯スヘシ萎黃病粘液病處女病ハ肢體ノ運動一大緊要タリ此病治療ヲ加テ回復スト雖モ懶惰靜坐ノ飲食ヲ慎マサレ

ハ必ス再發ス

斷

粘液病 婦人粘液病

又粘液腫。惡液質。處女病。トニ因名。ク即萎黃病ノ一種ナリ

テ經閉及月經不順ヲ患ル多シ。○其症顔面肢體黧澹灰白。瘰然トシ浮腫シ。肌肉軟弱。多冷。唇斷皆等。喜テ坐臥シ。精神鬱重ノ爽了ナラス。○是皆體中良血液缺乏シ。寒性膠粘ノ惡液過多ニシ總身ノ諸脉管ニ充滿シ。皮表ノ細絡ニ透見ノ黧澹灰白色ヲ現スナリ。試ニ此患者ニ刺絡シテ其血ヲ見ルニ粘稠灰白ノ沬^ヌ乙^イ居多シテ凝血少許アルノミ。然ハ是粘液過

多ニシ良血液虧乏ニ且諸藏脉管虛弱弛緩ノ拮約健輸ノ精カヲ失ヒ經閉ニ罹ルナリ。是ヲ惡液質ノ經閉ト謂フ。○或經閉ニ因テ初瘀血過多ナル者モ久テ經テ終ニ粘液病トナル者アリ。是其血初過多ニシ全身及子宮ノ血脉甚膨脹縱緩シ其脉管ノ質是カ爲ニ終ニ衰弱憔悴シ其血液ヲ健輸シテ泡釀化熟ヲ爲スヲ能ハス。精華美紅ノ血質漸ク消耗シ黧澹色ノ粘液トナリ肌膚血色ヲ失テ萎黃惡液質ノ病ヲ發スルナリ。治法此症ハ寒性ノ粘液過多ニシ經閉スル故ニ胃腸モ亦粘穢汚物鬱蓄スルヲ多

之故ニ先解凝下劑後ヲ用テ粘液ヲ稀解シ且驅除
 スヘシ。然シテ諸藏脉管ノ虛弱衰弊スル者ハ是後
三百三十九章ノ更ニ強壯劑後ヲ用テ諸器ノ官能
 ヲ故ニ復スヘシ。是ニ由テ惡液漸ク諸竅ヨリ排
 シ。日常用ル所ノ飲食ヨリ自ラ良血液ヲ製造シ。終
 ニ子宮ノ血脉ニ盈滿スルニ至テ月經自ラ通スル
 ナリ。若シ其子宮ニ盈滿スル候第三百四十
第三章ニ註スアリテ經
 血仍通セサルハ乃通經ノ法方後ニ舉ル浴湯蒸
法刺絡通ヲ施シ其壅滯セル瘀血ヲ通泄スヘシ斷
經劑ヲ云

解凝劑衝動劑 解凝劑ハ總テ粘稠液。諸脉管ニ凝結

ノ壅塞セルヲ溶解ノ疏釋スル劑ナリ。衝動劑ハ總
 テ諸脉管ヲ刺戟衝動シ血液ノ運行ヲ憤起ノ増發
 シ病毒ヲ驅逐セシムル劑ナリ。但壅塞ノ起原一ナ
 ラサル故ニ其劑亦衆多ニノ爰ニ悉記シ難シ。此章
 說所ハ諸管纖維ノ弛緩虛弱ニノ粘液過多ヨリ發
 スル萎黃病様ノ經閉ナリ故ニ弛弱ヲ強壯ニ解凝
 衝動ノ効ヲ兼且經閉ニ用テ多ク功アル藥ヲ的當
 トス即左ニ略舉スルカ如シ
 蘧謨安沒尼亞幾 瓦爾拔奴謨 沒藥 琥珀
 撒瓦百奴謨 蓬砂 葛私多僕謨 鍊劑 鍊屑 松格

曾丁月斗異原 卷十七

爾扶斯 鍊丁幾先爾等 健質亞那 葛爾儒
 其他鍊劑多ク名ニ出ツ 薄荷同油 芸香 亞爾鮮以上
 老利兒 加密列 薄荷 芸香 亞爾鮮以上
 白芷 羌活漢種 苦蕒 艾葉 鬱金等ナリ以上
 又勿搗祭亞石鹼。酒石鹽。剝篤亞斯。亞爾鮮鹽等ヲ加
 テ解凝ノ効ヲ助ク○右諸藥其症ニ隨テ或一味用
 ヒ或數品調劑シ或散劑丸藥。泡劑。丁幾劑。越幾斯劑。
 蒸餾油トシ用フ右諸藥ノ性功通經ノ方劑。但右ノ
 諸藥ハ血ノ過多稠厚及血脉強硬ヨリ發スル經閉
 ハ大害アリ

解凝下劑前說ノ解凝衝動劑ニ瀉下劑ヲ加者ナリ

是ヲ以テ粘稠液ヲ溶解稀釋ノ瀉下シ虛冷ヲ溫暖
 シ膽液ノ虧損虛乏ヲ補助シ胃腸ヲ健運ノ飲食ヲ
 消化ス。即盧會。旃那。大黃。蒲里阿尼亞。藥刺巴共ヲ加
 カ如シ○本編ニ出ル方劑中ノ解凝下劑ハ第二十
 章ノ健胃散。健胃丸。健胃酒。第十六章ノ健胃祛敗散。
 健胃祛敗飲。第六十八章ノ盧沒解凝散。第百十七章
 ノ盧沒健胃露。第二百十四章ノ解凝健胃酒。健胃
 幾去爾。第二百十九章ノ制酸健胃飲。制酸健胃散。第
 二百六十四章ノ越栗失爾解凝飲等ナリ○或律比
 丸名 每朝空心十五氏若ハ一タヲ用フ○沒藥越謨

安沒尼亞幾ハ大便ヲ微利シ藥氣竄透ノ神經ヲ開暢シ胃腸ニ鬱蓄セル風氣ヲ驅散シ諸藏ノ運動乏弱虛衰セルヲ醒發ノ振起ス○盧會ハ健胃瀉下ノ効アリテ能粘液ヲ稀釋ス三四日宛毎日數次用フ。沒藥。越謨。安沒尼亞幾ヲ加テ能經閉痔血壅滯ヲ通ス。是ニ雜腹蘭ヲ加ハ即律比丸及越栗失爾剝祿布利怛名ナリ。共ニ大便ヲ利シ稍衝動ノ粘液ヲ稀釋ス○蒲里阿尼亞ハ解凝瀉下ノ峻藥トス。末トシ半錢ヲ服スレハ大ニ粘液停水ヲ瀉下ス。浸劑。泡劑。露精トシ服スレハ瀉下ノ効緩ニノ解凝ノ効多シ

摩擦法

脚ヲ摩擦スレハ血液健運ノ流利シ靜脈ノ血多ク動脈大幹ニ運行シ。是ヨリ子宮動脈ニ進輸スルヲ多ク月經ヲ誘起ス

通經劑

大抵辛熱竄透刺戟衝動ノ血行ヲ增進シ血脈ヲ鑽開ノ瘀血ヲ驅泄スル峻藥ナリ故毎病能其因ヲ審察シ戒慎ヲ加用ヘシ或初輕劑ヲ用テ漸峻劑ニ至リ或滋潤緩和ノ藥ヲ加テ酷烈刺戟ノ藥性ヲ抑制シ或先解凝劑ヲ用粘稠ノ血液ヲ稀釋メ後此劑ヲ用ヘシ。否サレハ遠ニ其久ク頑凝滯著セル血液ヲ驅逐シ推盪スル故更劇症ヲ加或子宮ノ血

脉。寧急拘強セル者。卒ニ開通スル。能ハス。其血。諸部ニ泛濫シ。衄血吐血。下血尿血等ヲ發ス。故宜子宮血脉ヲ軟化緩柔ノ膨脹濶開スル法方後ニ舉ル浴湯蒸濕及薩毘那油名ナリ。是熱性辛烈。竄透刺戟衝動ノ速ニ血液ヲ溶解シ。經閉ヲ驅泄スル峻藥トス。孕婦是ヲ服スレハ墮胎ス。此油ハ殊峻功アリ。竄透刺戟ノ精氣專ラ此油ニ含メリ。或此木屑一匕ヲ取水適宜ニ加。蒸餾スレハ油出レ。或木屑ヲ水煎若ハ浸劑トシ。或露水ヲ取用モ亦良効アリ。刺絡ノ出ル血ニ此

露水ヲ滴スレハ忽溶解稀釋ノ赤色ヲ益ス。○微爾デレ垲ヒ設イ乙布列斯杉ノ類氣味性功大抵薩毘那ノ如シ。○阿魏ハ辛熱竄透刺戟ノ凝結ヲ疏解シ。壅塞ヲ開通ノ經閉。痔血閉ヲ通スル峻藥トス。○琥珀油亦竄透揮發ノ血液ノ運行ヲ増進シ。經閉ヲ通ス。○艾葉。茺蔚。接骨木花。芸香ハ緩性ノ通經藥トス。**禁刺絡**萎黃病様ノ經閉ハ多血ヨリ來ラス。唯粘液過多。良血乏少ニ細血絡ニ流通スルニ足ラス。肌膚血色ヲ失故粘液ヲ驅除シ。良血ヲ補充ノ治スヘシ。然ニ刺絡シ。或峻攻ノ通經劑ヲ用レハ諸症逾増

劇シ或是ヲ用テ月經通スレハ患者虚衰ノ逾血色
 ヲ失ナリ此經閉ハ月經ノ常期ニ於テ瘀血子宮血
 脉ニ盈滿スルカ如キ諸症ヲ發スルニアレハ腰少
 痛等後是多血ニノ發スルニ非ス他病ヨリ發ス
 一多シ○多血ノ經閉ニ於テ瘀血子宮血脉ニ凝聚
 シ子宮拘攣牽痛スル者ハ刺絡浴湯蒸溺法等後ニ註ス
 ヲ施メ軟化縱緩スレハ其血脉開濶ノ月經通スヘ
 シ然レ粘液質ノ經閉ニ此療法ヲ施メ子宮血脉縱
 緩スルハ動輒崩漏ヲ發メ患者逾虚憊スルナリ
 經閉飲食不消化ニ因ルノ症治ヲ論ス

經閉

飲食能消化セス且百體ヲ循環スル諸液モ醇釀精熟
 セス或諸液自性ノ腐敗ヲ兼ルニ因テ遂ニ萎黃病惡
 液質失苟兒陪苦ノ體質ニ在カ如キ腐敗液トナルハ
 ハ亦經閉ニ罹ルナリ此症ハ皆其本病ヲ治スレハ經
 閉モ亦隨テ治スルカ故ニ先下劑健胃丸或解下劑ヲ云ヲ與ヘ
 常ニ大便ヲシテ順利セシメテ漸其敗液ヲ滌除シ血
 液回復スルヲ須テ則通經劑ヲ用テ經閉ヲ治スヘ
 ナリ此症健胃丸或解凝下劑ヲ用テ其敗液ヲ驅除シ
 凝體且胃腸ヲ健運シテ良血液ヲ生セシメ或次章ノ
 シ良血ヲ生スルニ至テ仍經閉スル者ハ通經劑ヲ用
 ルナリ然ハ其治法
 全ク前章ト同シ

凡苦心費慮。恐懼懊悶。等總テ精神ヲ勞傷シ。或常ニ清涼性若ハ軟化緩弛性ノ飲食ヲ用ヒ。或起居攝生ヲ節慎セス。或卒病若ハ長病ヲ患ル等ニ因テ全身凝體ノ諸器。虛弱衰弊シ。生氣ノ運行怠慢不及ニ血液健運セス。是ニ由テ其血ヲ子宮ノ血脉ニ送輸ノ順利スルニ足ラス。且諸液モ亦粘稠トナリ。又特ニ子宮ノ諸脉ニ稟ル所ノ排泄進輸ノ運營。衰損スルハ亦經閉ヲ致ナリ。○此症ハ強壯劑衝動劑前說ノ解凝及子宮劑ヲ用テ是ヲ治スヘシ

子宮ヲ健運強壯ニシ。或刺戟竄透ノ月經ヲ通スル藥劑ヲ稱ス。然ハ即解凝劑衝動劑中ノ殊ニ能月經ヲ通スル藥品ヲ云

強壯劑胃腸ニ粘液汚物鬱滯スル者ハ先是ヲ稀釋ノ滌除シ。然メ強壯劑ニ衝動藥ヲ加用テ諸脉纖維ノ弛弱ヲ強壯シ。胃腸ヲ健運ノ飲食能消化シ良血液ヲ製造スルニ至レハ月經自通暢ス其強壯劑ハ

鍊劑幾那劑鍊及幾那ノ主治方劑ニ香竄溫壯劑良
薑綱草根山柰撒爾非亞水楊梅根椗垚兒等桂四錢一葡萄酒里一勃的右浸一宿一弓宛用一日三次○又方。鍊屑極細末沙糖各一桂末四右

調勻シ分テ二十四服トシ。日三服食時ノ半時前ニ一服宛用大抵一月許モ連服ノ効アリ。○右藥劑ヲ用テ其凝體諸器ノ虛弱故ニ復シ良血液生メ仍經閉治セサル者ハ諸症ヲ審察ノ通經ノ方法ヲ施スヘシ

經閉

凝體強硬ニ因ルノ症治ヲ論ス

婦人體質壯實。輕健強固。居恒勞動ノ業ニ慣テ筋肉強硬ナル者ハ月經稀少或暫ク閉滯スト雖モ害少シ。若是ニ由テ患症ヲ發スル者ハ熱性ノ通經劑ヲ禁シ唯消石劑。軟化劑第百七十一章和解定痛飲ノ類。清涼劑熱病編第

多血候

諸劑ヲ用テ是ヲ治スヘシ

多血候 婦人惡液質。粘液病ノ候ナクノ經閉スル片ハ毎月排除スヘキ多量ノ血體中ニ蓄積スル故ニ多血ノ症ヲ發ス。其候顔面總身赤色ヲ帶ヒ唇斷喉內。眼眥。臉裏赤色。脉實。靜脉起脹。四肢冷氣ナク。月經ノ常期ニ於テ顏屢赤色ヲ現シ。眼中光彩アリ。或乳房起脹シ。體重ク倦惰。或肌肉盈脹。屈伸不利。勞動或飲酒ニ由テ手指拘強ノ屈シ難ク。多ク眠リ。精神鬱重ノ爽了ナラス

多血經閉治法 壯實多血ノ者ハ先足ニ刺絡シ次ニ

下劑ヲ用テ凝結ヲ溶解シ汚液ヲ滌除シ血ノ強盛ナル運行ヲ抑制スヘシ。丹服劑ハ答末林度旃那葉。酒石英等ヲ用。或消石半錢宛用。或甘乳清名モ亦良効アリ。或酒石英半錢宛。每朝空心ニ用フ。此皆月經ヲ通シ。兼テ大小便蒸氣ヲ發ス。○多血ノ經閉ハ諸熱性ノ通經劑。血液ノ運行ヲ增發スル衝動劑。鐵劑皆害アリ。唯刺絡。浴湯。蒸漏法。薰蒸法。等ヲ施ノ子宮血脉ノ拘攣強硬セルヲ緩柔弛解スルヲ良法トス

經閉。稟賦薄弱ニ因ルノ症治ヲ論ス

稟賦薄弱ナル未孕ノ少婦。月信ナク。或稀少スクナク。或久閉滯

經閉

スト雖モ唯虛弱。肌膚黧澹色ナルノミニテ較著ノ病患ナキ者アリ。此症ハ血液未夕旺盛充實セスノ每月其血ヲ節減スルニ至ラサルナリ。故ニ必ス通經ノ諸法ヲ施スヲナク。唯其體漸長ノ壯實ニ至。ハ月經自ラ調順ス

經閉

經閉。稟賦感動ニ因ルノ症治ヲ論ス

婦人元來子宮衝逆ノ病アリ。或或ニ觸テ神思ノ感動シ易キ者ハ顯著ノ起因ナクシテ腹部攣急。雷鳴。風氣痞滯。腰痛。并ニ月經通利ノ時。種々ノ患症ヲ發スルヲ多シ。斯ノ如キ婦人ハ神思ノ感動ニ因リ。或感動ノ或

經閉

ナシト雖モ動モスレハ經閉ニ罹リ。或經行ノ始若ハ終ニ於テ卒ニ閉止スルコトアリ此皆痙攣ノ發動ニ因ル者ナリ○此症ハ神思感動ノ諸症ヲ治スル藥劑ヲ用レハ自ラ治スルナリ 痙攣擗掣篇第四百三章ノ藥劑ヲ謂フ

經閉。外因ヨリ發スルノ症治ヲ論ス

凡外因ハ卒ニ寒氣ニ冒觸シ或大ニ神思ヲ擾動スル等ニ因テ子宮ノ血脉ニ流通スル血ヲ阻遏ノ凝固シ經閉ヲ爲スコト通例甚多シ。其血子宮血脉ニ凝聚シ滯積スルヲ以テ腰痛。腹肚困重。焮熱痞脹。惡寒發熱。腰及全體調動シ或諸竅失血ヲ發スルコトアリ 吐血。衄血。下血。尿血等

云 此症ハ刺絡。浴湯。蒸溺法。薰烟法。 第百七十六章第百九十二章ニ舉ル乳香ノ薰烟法ヲ以テ 或滋潤緩和劑 第百七十一章ノ和陰所ヲ薰スルナリ 胸湯 第三百六章ノ和解毒 ヲ用テ治スヘキナリ

痛飲

月經ノ時。足ヲ温ムレハ經血ヨク通暢ス。冷レハ卒ニ閉止スルコトアリ是冷氣ニ因テ腸ニ痙攣ヲ生シ其牽縮絞痛子宮諸脉ニ連及ノ共ニ擗縮シ其血凝滯スルナリ。是ニ於テ足脚ヲ温メ或摩擦スレハ其血ノ運行増進メ温煖氣及血液下部ニ通暢シ諸症速ニ寛解ス

經血壅滯于子宮候 經閉ノ多血ノ候アリ又月經ノ

常期ニ於テ頭痛。腰部少腹攣痛シ。或陰處幾蹊ニ牽
 テ痛ミ。或少腹重クノ物ヲ容ルカ如キハ。是子宮血
 脉及其傍邊諸部ノ血脉ニ瘀血凝聚盈滿ノ逼迫シ
 或鬱滯停止ノ緊脹シ。攣急拘強ノ弛解セサル候ト
 ス。此時ニ於テ仍^ホ月經來ラサル者ハ其子宮動脈ノ
 末梢攣急甚フノ開通セサルナリ。此症ハ浴湯。蒸漏
 法等ヲ施メ其攣急ヲ緩弛スヘシ

刺絡 足ニ刺絡スレハ其血足ニ減スルヲ以テ子宮
 ニ循行スル血モ亦減シ。月經逾閉滯スヘキカ如シ
 ト雖モ多血ニ因テ子宮ノ血脉盈滿膨脹スルハ

是ヲ以テ其諸靜脈壓塞シ。又其膨脹セル動脈大枝
 ヲ以テ諸動脈末梢ノ細口ヲ壓塞シ。其血循環ヲ失
 テ停止シ。其諸血脉拘攣強硬ノ逾壅閉ス。故ニ足ニ
 刺絡メ下部ノ血ヲ減スレハ子宮動脈ノ血モ亦減
 ノ緊滿膨脹セス。緩縱疏解メ脉口開通シ經血通ス
 ルナリ。○多血太甚ナレハ血脉ノ運行凝泣澁滯メ
 脉沈微。精神鬱結。肢體困倦等ノ症ヲ發ス。然ニ刺絡
 ヲ施シ瀉血スレハ其血流利メ脉洪滑精神爽了ヲ
 致スナリ。○瘡ニ刺絡ノミナラス。鉞鍼ヲ以テ足ノ
 小靜脈ヲ刺シ瀉血メ亦良効アリ。月經ノ常期ニ施

ノ殊良。是能血ヲ下部ニ誘導シテ月經ヲ進輸ス。○
婦人月更調順。曾テ常期ヲ愆ツコナキ者。絶經ノ齡
ニ至テ月經頓ニ止ミ。腰。少腹。陰處。巖蹊等。攣急痠痛
スル者ハ刺絡ノ良驗アリ

浴湯。蒸溺法。薰蒸法。按摩。子宮血脉ニ血盈滿ノ拘攣
強硬シ閉滯スル者ハ浴湯蒸溺法。薰蒸法等ノ温潤
融和ノ諸法ヲ施メ其血脉ノ末梢ヲ軟化弛解シ且
其運行ヲ増進メ月經ヲ熒起スヘシ。○其法。子宮及
其傍邊ノ部ヲ温湯ニテ蒸溺シ或温湯ヲ以テ足脚
ヲ浴シ或腰湯ト爲シ臍以下ヲ浸浴シ或全軀ヲ浴

スルモ佳トス。宜ク日ニ兩次行フヘシ。或子宮薰蒸法
ヲ施スヘシ。其法。漏斗ヲ倒メ温湯ニ蓋ヒ。其嘴ニ蘆
管ヲ挿シ是ヲ子宮口ニ容レ其蒸氣ヲ以テ宮内ヲ
薰蒸スルナリ。但其湯過タ熱スルコト勿レ。或湯中大
蒜ヲ投シ其氣ヲ以テ宮内ヲ衝動シ。血脉ヲ軟化融
解スルモ亦良驗アリ。○脚湯ヲ施シ或蒸溺スレハ
脚ノ血脉緩弛メ膨脹シ上體ノ血。多ク脚ニ流滿ス
故ニ大幹動脈ノ血。脚ニ循行スル餘地ナクメ自ラ
子宮動脈ニ循行シ滿溢スルナリ。其血子宮ニ盈滿
スル候アリテ仍經閉スル者ハ子宮ノ血脉攣縮強

硬ノ症トス故ニ前説ノ浴湯等ヲ施スヘシ○處女。月經アルヘキ齡ニ至テ乳房漸起脹シ。身體長育シ顔赤。頸背腰。少腹。嵐蹊等拘急攣痛スルハ月經來ル候トス。然レ月經仍通セサル者ハ脚ニ浴湯按摩等ヲ施シ或通經ノ輕劑ヲ用テ是ヲ扶クヘシ

經閉ノ諸症ヲ論ス

經閉ヨリ發スル諸症甚多端ニメ枚舉スヘカラス。是レ一ハ經閉ノ原由衆多ナルニ因リ。二ハ全軀或子宮ニ血ノ過多ナルニ因リ。三ハ經閉ニ因テ血液ノ性。滲變スルニ因リ。四ハ天稟子宮ノ造質異常ナルニ因ル。或

右ノ起因多少合併ノ幾多ノ患症ヲ發スル故ニ今是ヲ全身各部ニ配ノ説明ス○患者頭痛ノ困重逼迫。巔頂及頭後ニ於テ殊甚ク。夜中更ニ増劇ス其痛巔頂ニ在レハ眼腫起シ。頭後ニ在レハ項肩背腰ニ牽引シ或脚腫ヲ兼ヌ頭ノ内部ニ在レハ卒倒昏冒精神錯亂昏睡搐掣頭眩暈不寐ヲ發シ眼ニ在テハ腫痛視力乏弱昏暗口ニ在テハ睡中咬牙頸ニ在テハ屢咽喉焮腫ヲ發シ胸ニ在テハ短氣喘急煩悶胸痛心動悸欬嗽ヲ發シ腹ニ在テハ腹脹疝痛風氣痞悶雷鳴心下膨脹食進ニス消化セスノ停滯腐敗シ或食ヲ嫌惡ム此症孕

婦ニ在テハ三四月ニメ自ラ治ス或惡心嘔吐或吐血
善饑異嗜腰背重クメ痛ミ下部ニ在テハ大便少ク小
便濃クメ熟セス通瀉スルニ劇痛シ若ハ閉塞シ或黧
黑稠濁或血ヲ交ヘ通メ輕快ヲ覺或陰處巖蹊屢腫痛
攣急ヲ患ヒ或子宮ニ頑硬腫癌腫ヲ生シ或白帶下ヲ
患テ粘穢敗液ヲ漏泄シ或數脚腫ヲ發シ若ハ惡厲ノ
潰瘍脉瘤關節痛等ヲ發ス全體ニ在テハ惡液質ノ腫
ヲ發シ顔色黯澹蒼白處女病ノ如ク或羸瘦骨立シ或
逆上焮熱驚悸子宮衝逆肢體勞倦乏弱動作ニ懶ク稍
舉動スレハ短氣喘息或身體冷或遷延瘦削代熱

發シ或諸液腐敗若ハ不熟ノ汚液ヲ生シ或酷厲ナル
酸敗液ヲ生シテ頭頸ニ挿飾ル所ノ珊瑚變ノ白色ト
ナリ或粘稠ノ腐敗液ヲ下利シ或諸部顛振瞤動シ心
及頸ニ於テ殊甚シ或水腫粘液腫ヲ發シ或毛髮粗糙
或鬚髭ヲ生シ或聲變ノ男子ノ如ク或經血瘀滯妄行
メ吐血等ヲ發ス然レ他病ノ吐血ニ比スレハ害少シ
或潰瘍ヲ發メ血及汚液ヲ漏泄シ或白帶下トナル等
ナリ斯ノ如キ諸液ヲ通泄スト雖モ其病曾テ快復ス
ルヲナシ○然レ羸瘦尪弱ナル者經閉シ是ヨリ全體
肥腴スルハ損害ナシ

經血子宮ニ壅滯スレハ鬱蒸ノ熱ヲ生シ。總身ニ漫延ス或子宮靜脈其瘀血ヲ吸收スレハ腰背。臍股。巖蹊。四肢關節ニ滯著凝住ノ切痛シ或流注轉移ノ刺痛シ。或體重ク懈惰シ。或惡心。食進マズ。或喜ンテ非常ノ物ヲ食ヒ或目下浮腫。或額頭痛或頭痛甚或戰慄ス○經閉久キハ其血或變ノ粘液トナリ或子宮及其血脉ニ凝滯鬱蓄ノ腐敗ス。故ニ自後偶腐穢粘物ヲ下シ或黯黑ノ衄血。若ハ腺肉ノ如キ物ヲ通スルコトアリ。若外泄セスノ子宮ニ鬱蓄スレハ少腹漸膨脹或攣痛或患者腹中重量ノ物ヲ容ルカ如ク覺キ。

宛懷孕ノ如シ。然^レ胎動ノ候ナシ或經閉四五月ノ經^レハ其血腐壞ノ子宮ヲ侵蝕シ膿瘍ヲ生ス。其候發熱。小腹痛。動悸アリテ是ヲ按ニ堪^タス或巖蹊ニ腫瘍ヲ生ノ膿潰シ或其膿。眇ニ聚テ腫痛ス或幸ニ膿血ヲ下メ治スル者アリ或子宮ノ靜脈ヨリ其膿若ハ敗血ヲ吸收シテ總身ノ血液ニ混淆シ。諸部ニ侵襲スル片ハ萎黃病。惡液質ノ病ヲ發シ或壞液病若ハ癆瘵ニ陷リ。其他幾多ノ險症ヲ發スルコト勝テ數ハ難シ

經閉ノ治法ヲ論ス

經閉ヲ治スルニ就テ豫メ考察スヘキ三件アリ。第一。通經ノ法方ヲ施シ月經ヲ進起シテ害ナキ症タルヤ否ヤヲ察スルニ在リ。月經ヲ驅泄ノ害アル症前ノ第三章及次ニ註ス第二。何ノ起原ヨリシテ經閉ニ罹ルト云フヲ察スルニ在リ。是施療ノ原キ據所ナレハナリ。第三。凡經閉ニ施ス所ノ藥劑各其性能主用ヲ覈知スルニ在リ。○外因ヨリ來ル經閉。第三章百四十八足跗ニ刺絡シ其過多ノ血ヲ減ノ効アリ。然レ屢是ヲ施シ或經久ノ經閉ニ施モ亦害アリ。經閉ニ因テ初メ多血ナル者久ヲ經テ粘液病トナル說前ノ第三章百三十七章ノ註ニ出○老婦ノ經閉ハ腕ニ於テ刺絡スヘシ是ヲ壯

ノ婦人經閉ニ比スレハ害少キカ故ナリ。壯年ノ婦人多ク下部ニ壅滯スル故ニ足ニ刺絡ノ良効アリ。老婦ハ絶經ヲ常トス故ニ唯腕ニ刺絡ノ全體ノ多血ヲ減スル○下劑ハ總テ經閉ニ良効アリ。其胃腸中鬱蓄スル所ノ不化失性ノ乳糜ヲ大便ト共ニ驅除シ且子宮ノ運動ヲ誘起スレハナリ。解凝下劑但孕婦及血液ノ虧乏ヨリ來ル經閉ハ斟酌スヘシ。○搗掣子宮衝逆及稟賦感動甚キヨリ發スル經閉。第三章百四十八催眠劑ヲ用テ容易ニ通利スルナリ。痙攣篇第百三十三章ノ劑○外因若ハ子宮諸部ノ攣急牽縮ヨリ來ル經閉。第三章百四十八軟化滋潤ノ藥ヲ以テ瑟布蒸漏法薰蒸法トシ施ノ能通利ス。

經閉ヲ通スル劑分テ二種トス。其一ハ經閉ノ因ヲ除
 治スル劑ナリ。是レ孕婦老婦ヲ除テ其他ハ皆是ニ據テ
 治スヘシ。其二ハ血液ノ運行ヲ増進シ月經ヲ通スル
 劑ナリ。此劑ハ能意ヲ用戒慎ヲ加テ施スヘシ。總テ通
 經劑ヲ
 ○專ラ子宮ノ運動ヲ増進シ經血ヲ驅泄スルヲ宛
 モ下劑ノ腸ヲ衝動シ瀉下スル如キ通經劑。第三百三
 十七章ノ
註ニ出ル通ハ孕婦并ニ血液虧損ノ經閉ヲ除テ其他
 經劑ヲ云
 ハ是ヲ用ヘシト雖モ先胃及子宮ヲ開達スル劑。第三
 百三
 十九章ノ子
 宮劑ヲ云ヲ用ヒ其後月信ノ適ニ來ヘキ一二ノ微
 候。第三百四十
 三章ノ註ヲ現ス時若ハ經行ノ常期ニ於テコ

ヲ用テ殊効アリ。然レ初ハ通經劑中ノ最輕緩ナル者
 ヲ擇用ヘシ。○右ノ如ク丹服劑ヲ用テ經血ヲ子宮ニ
 増進スト雖モ又蒸漏法。薰烟法。坐藥和胸湯ノ如キ緩
 和ノ藥品ヲ以テ
坐藥ト作
 スヲ云等ヲ陰處ニ施シ子宮諸部ノ運動ヲ誘起シ
 殊効アリ。然レ酷厲辛熱ノ藥ヲ以テ是ヲ作ルヲ勿レ。
 動モスレハ其部ニ焮腫ヲ發スレハナリ。○處女ノ經
 閉ハ配婚セシメテ回復スル者アリ。
 子宮口腫生合及閉膜稟賦子宮口若ハ腔中生合ノ
 孔竅ナキ者アリ。是ニ因テ經血子宮若ハ腔中ニ滯
 留メ經閉ヲ患フ。此症經血少ク來ル者アリ。然レ是

子宮ヨリ來ル血ニ非スノ腔中ノ動脈ヨリ滲出スル者ナリ。孕婦間腔中ノ動脈ヨリ血滲出スル症アリ宜細察ノ知ヘシ。或子宮口及腔全生合セサレ其甚狹窄ニノ僅ニ羽管ヲ挿ヘキ者アリ。此症ハ經血少ク通スルナリ。○或子宮口。若ハ腔中厚膜アリテ閉塞シ或腔中ニ二膜重複セル者アリ。此症亦全經閉ス。然レ其膜ニ細孔アル者ハ經血少ク通ス。○其生合或陰門唇ニ膜アル者ハ是ヲ知易ト雖モ其膜子宮口或腔ノ底ニ在レハ審ニ探索スルニ非ハ難シ。此經閉モ亦瘀血。子宮ニ盈滿凝聚スル候久レ

閉ノ諸症ヲ發ス。是其生合若ハ膜ヲ截開テ瘀血ヲ通スルニ非ハ治セサルナリ。○或子宮口。正直ナラスシテ上下左右ニ歪斜屈曲シ。是ヲ以テ其口竅ヲ壓塞ノ經閉若ハ不順スル者アリ。此症ハ子宮口甚強硬ナル故ニ軟化ノ蒸漏藥ヲ施ノ頻ニ蒸漏シ綿布ニ藥汁ヲ蘸ノ數腔ニ容レ或水銃ニテ射入シ或其蒸氣ヲ以テ腔中ヲ薰蒸スルナリ。手指ヲ以テ徐クニ矯正シ鈎管ヲ子宮口ニ挿テ漸々本位ニ復スヘシ。○處女ノ經閉ハ右ノ諸因アルヲ察スヘシ。若此症タルヲ察セスノ妄ニ通經ノ方法ヲ施セハ其通泄ノ道路ナキ故ニ瘀血激迫妄行ノ

ノ吐血。衄血。下血。尿血等ノ危篤ノ失血ヲ發スルナ
リ

配婚治經閉

處女ノ經閉ニ因テ其血子宮ニ聚滯シ
諸症ヲ發スル者ハ嫁セシメテ良驗アリ。總テ獸類
交接シテ。後速ニ剖觀スレハ子宮赤色ニメ其諸血
脉腫脹シ。宛モ焮腫スルカ如シ。尋常ノ者ヲ剖解ス
レハ子宮灰白色。血脉亦腫脹セス。處女ノ子宮血脉
ハ微細ニメ顯著ニ見難シ。孕メハ漸起脹シ太サ鵝
翎ノ如クニメ其血ヲ胞衣ニ運輸シ。分娩スレハ是
ヨリ能惡露ヲ下シ自後其脉漸收縮ノ平常ニ復

然^レ氏經時ニ於テハ腫脹ノ潤閉シ能通利ス。故ニ未
産ノ婦人ハ既ニ産スル者ニ比スレハ月經ノ諸症
殊ニ多シ。但^レ經閉ノ處女ヲメ嫁セシムルヲ能ハサ
ル者ハ宜ク浴湯。蒸溺法。薰蒸法等ヲ施ノ其攣急強
硬セル子宮血脉ヲ軟化弛解シ經血ヲシテ通利セ
シムヘキナリ

崩漏篇第五十九

羅甸名^ノメニシウム。プロフルムヒウム
和蘭名^ヲンマーチケブルド。デルマーン

崩漏ノ大較ヲ論ス

壯年ノ婦人月經通利ノ日數常例ヲ過テ長ク或一月ニ數回來リ或連綿シテ久止ス或崩泄過多ナル者統テ是ヲ崩漏ニ屬ス或虛弱ノ婦人月經通泄ノ絶サル者亦是ニ屬ス○少女月經常例ヨリ早來ルハ是ヲ早經ト曰フ孕婦此症ニ罹リ或子宮創アリテ是ヲ發スルハ即子宮失血ト名ケテ此門ニ屬セス

崩漏

崩漏利益アルヲ論ス

多血ノ人或劇病生氣運行大過病勢劇盛ナル諸病壯熱病腦膜焮衝其他焮衝ヲ兼子血液運行大過強盛ナル病ノ初發ニ於テ月經過多ナルハ皆利益アリ是其有餘ノ血ヲ減損

崩漏

ノ大過ノ運行ヲ靜止スレハナリ然レ崩血連綿シテ止サレハ損害アリ

崩漏損害アルヲ論ス

天行諸病羅斯第百三十二章ニ註ス 腐敗病壞液病腐敗熱膿瘍等其他血液溶解渙崩スル諸病痘瘡麻疹發斑熱驚口瘡膽液熱羸瘦病熾盛熱失苟兒陪苦等ノ病末ニ於テ崩漏ヲ發スレハ其病逾危險トス此症ハ清涼ニメ收斂スル劑ヲ用テ是ヲ制止スヘシ

注 清涼ニメ收斂スル散劑ノ方 清涼斂血散

珊瑚 血石 赤石脂

明礬 各半

精製阿芙蓉 四氏

名

右各別研末ノ調勻シ。分テ六服トシ毎夜一服ヲ與
崩漏ノ治法ヲ論ス

酷烈ノ利尿劑。通經劑。墮胎劑。起熱劑。香竈劑。刺戟衝動
劑。慄悍精烈ノ諸液 銳烈ナル蒸餾油精露火酒等ヲ過用シ或ハ坐藥
子宮及ニ腔ノ諸症ヲ治スル爲ニ腔ニ挿ム藥ヲ施シ或房勞過度等ニ因テ崩
漏ヲ發スルヲアリ。斯ノ如キ者ハ先其病因トナル諸
件ヲ休メ坐藥ヨリ發スル者ハ是ヲ去リ陰處ヲ洗淨
ノ藥氣ヲ除クヘシ。內服ノ諸件ヨリ發スル者ハ清涼
收斂劑 上ニ出ヲ用テ其酷厲毒ヲ制伏シ治スヘシ。

思ノ勞動或子宮衝逆ヨリ發スル崩漏ハ神思ノ勞動
及子宮衝逆。靜止スレハ崩漏モ亦自ラ治ス。或催睡劑
精製阿芙蓉。阿芙蓉液。白罌粟舍利別等ヲ與テ治スヘシ。○多產。難產。流產
シタル婦人ハ子宮ノ諸部弛弱縱緩ニシテ血液。子宮
ノ諸血脉ニ聚リ來レハ其重量壓迫ノ勢ニテ子宮內
ニ在_レ所ノ諸血脉口括閉スルヲ能ハスノ常ニ弛開シ
崩漏ヲ發スルヲアリ。此症若_レ上腹ヲ緊禁スルキハ下
部ヨリ心藏ニ上輸シ來ル靜血脉ノ血ヲ遮遏スルカ
故ニ其症逾險重ニ至ルナリ。其治法。清涼收斂劑ヲ用
テナク唯強壯劑 經閉篇ノ註及白帶下篇ニ出ヲ內服外用シ。臍以下

横骨マテノ部ニ繃締ヲ施シテ治スヘシ○胞衣。畸胎。血塊等ノ碎片自餘斯ノ如キ類。子宮中ニ懸留滞著スル片ハ子宮平常ノ如ク縮收スルヲ能ハスノ子宮血脉ノ血常ニ子宮内ノ血脉口ヨリ滲出シ亦崩漏ヲ發スルナリ。此症ハ其懸留セル物ヲ除去ルニ非ハ必ス治セサルナリ一畸胎ハ羅旬名「モラ」和蘭名「ソイゲル」是テ養長ス其質塊肉ノ如ク或疑血ノ宮底ニ著キ血脉連テ絡彌滿シ骨ナク諸藏ナク又胞衣臍帶ナシ但外面皮膜ヲ被フ其候腹盈脹スルヲ尋常孕婦ノ如クニ胎動ナク乳房起脹スレハ乳汁出ルナシ又十月ニ産セス腹益膨脹スレハ或數年繫著ス

崩漏ノ諸症ヲ論ス

諸般ノ失血ニ於テ幾多ノ患症ヲ發スル如ク崩漏ニ於テモ其脫血ノ多少ニ隨テ諸症ヲ發ス。即身體億弱。虛冷。戰慄。搐掣或萎黃病惡液質ノ病ヲ發シ或半生未熟ノ汚液ヲ生シ或羸瘦喘急昏冒水腫脚腫自性ノ壞液酸敗液煩悶。吏ニ觸テ感動シ易ク或粘液腫。勞瘵。頭眩。羸瘦熱。性急怒易ク。精神錯亂。或子宮及腔ノ諸病。不孕。白帶下等ヲ發シ。是ニ因テ遂ニ乳房及胃ノ諸病。惡心。嘔噦。食ヲ嫌且消化セス或腰背疼痛。子宮衝逆。大便閉等ヲ患ナリ

崩漏治法ノ括套ヲ論ス

凡崩漏ハ起原多端ナレ_レ臣皆收瀉劑ヲ以テ一頓ニ是
ヲ閉止スル_レ勿_レ。唯漸クニ是ヲ抑制減損ノ竟ニ止
ニ至_ルヘシ。或藥劑ヲ陰所ニ施ノ是ヲ閉止スルモ亦害
アリ○壯年ノ婦人ハ此病回復スト雖モ月經ノ常期
ニ於テハ復自然ニ任セテ其有餘ノ血ヲ通泄セシム
ヘシ。但孕婦。乳婦及老婦少女ニ於テ多血ノ患症アル
片ハ唯刺絡シテ其血ヲ減スヘシ

增補重訂内科撰要卷十七終

凡諸病之起源多由於血之虧損或過熱之故
一、血虧之病。或起於勞心過度。或起於憂思
二、血熱之病。或起於房事不節。或起於
三、血虛之病。或起於飲食不節。或起於
四、血滯之病。或起於氣鬱不舒。或起於
五、血燥之病。或起於火氣上升。或起於
六、血寒之病。或起於陰寒內盛。或起於
七、血毒之病。或起於外感風寒。或起於
八、血瘕之病。或起於積聚不化。或起於
九、血癥之病。或起於結塊不散。或起於
十、血崩之病。或起於經水不調。或起於
十一、血漏之病。或起於血脈不固。或起於
十二、血枯之病。或起於精血不足。或起於
十三、血燥之病。或起於火氣上升。或起於
十四、血寒之病。或起於陰寒內盛。或起於
十五、血毒之病。或起於外感風寒。或起於
十六、血瘕之病。或起於積聚不化。或起於
十七、血癥之病。或起於結塊不散。或起於
十八、血崩之病。或起於經水不調。或起於
十九、血漏之病。或起於血脈不固。或起於
二十、血枯之病。或起於精血不足。或起於

此類書訂各件請參卷之三

五

