

特56

351

寺島良安編纂

倭漢三才圖會

卷之卅七

№ 5869 / 23

和漢三才圖會卷第九十五之目錄

毒草類

大黃

狼牙

白麻

萬年

天南星


半夏

烏扇

鳳仙花

平戶躑躅

荒花



商陸

蔓如

續隨子

常山

附子

歡喜草

蚤休

鳶尾

曼陀羅花

永來部躑躅

堇花

狼毒

大戟

蔓蓉

藜蘆

草烏頭

蒟蒻

鬼臼

玉簪

羊躑躅

山躑躅

醉魚草

防葵

澤漆

雲實

木藜蘆

白附子

苦薩草

射干

小玉簪

繭躑躅

映山紅

琴草



茵芋

石龍芮

毛茛

透山根

牛扁


鉤吻

海芋

和漢三才圖會卷第九十五

毒草類

攝陽 城醫法橋寺島良安尙順編



唐音
ダア、ハアン

だいわう
おほし
大黃


黃良 將軍
腐如 火參
和名於保之

本綱大黃蜀川河東陝西皆有之而蜀川錦文者佳二月卷生黃赤其葉子莖並倍羊蹄莖高三尺許脆其葉四四相當粗長而厚三月花黃五月實黑八月采根其根有黃汁大者如盤長二尺切片陰乾然性濕潤而易蛀壞火乾乃佳作時燒石使熱橫寸截著石上燂之一日微燥以繩穿眼乾

一種出於秦隴者名土番大黃正月內生青葉一侶麻大者如扇根如芋大者如盤長一二尺其細根如牛蒡小者如芋四月開黃花亦有青紅侶麥花者莖青紫色形如竹採根去黑皮切作橫片火乾乃作橫片二物功用等

一種有羊蹄大黃雖侶大黃實非一類羊蹄根之老者也
大黃苦寒氣沉而降陰也須峻下者生用若邪氣在上非酒不至必用酒浸驅熱而下若月生者則遺至高之邪熱也下瘀血破積聚瀉腸胃推陳致新如蟻定禍亂以致中平上所以有將軍之號血分之藥也凡病在氣分及胃寒血虛並娠產後勿輕用畏惡乾漆忌冷水

△按大黃堅或橫殺片者名殺大黃通穴細繫者名繫大黃雖謂如錦文者佳今藥肆錦文者無之蓋歷月日故錦文消失乎今多出倭大黃皆羊蹄根及酸橫根大者也凡通利之劑可用唐大黃傳疥癬諸瘡宜用倭大黃



商陸

シヤウリク
ヤマゴボウ
遠藟 當陸
章柳 白昌
馬尾 夜呼
和名伊保須木
俗云山牛葵


本綱商陸生園圃中春生苗高三四尺青葉大如牛舌而厚長脆莖青赤至柔脆夏秋開花作柔莖根如蘿蔔而長八九月採根日乾花赤者根赤花白者根亦白其白者入藥赤與黃色者有毒不可食昔人種之為蔬根苗莖並可洗蒸食或用灰汁煮過亦良消腫之效如神入藥根有酸辛陽中之陰能療水腫切生根雜魚鮓作湯服又治腫滿小便不利者以赤根者按商陸處處有之葉如煙草嫩葉其花房如鐘覆花而大其根如牛葵因俗稱山牛葵出於蘇州及蘇州者良或云水腫者食之無功刺瀉利蓋疑不撰赤白用赤者被中藥矣但粘膿藥用亦可也



狼毒

ラウドク
スントツ


本綱狼毒葉似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以質重者為良陳而沉水者長輕者力劣矣此六陳之一也根毒積實與茶葉是也防葵及草蘭茹能似狼毒誤用最宜詳審根辛平有治九種心痛一蟲二蛇三風四悸五食六飲七冷八熱九氣又治連年積冷流注心胸及落馬墮車瘀血中惡等證名九痛九狼毒灸香吳茱萸湯泡巴豆去心乾薑炮人參各一附子三兩各為末煉蜜丸梧子大每空服溫酒下一丸



防葵

ヤマナスヒ
房苑 梨蓋
利茹
和名夜末奈須比

本綱防葵莖葉似葵每莖三葉一木數十莖中發一幹其端開花如蔥花景天輩而色白六月開花即結實根似防風香味亦如之今乃用枯朽狼毒當之緣真相似也勿誤用狼毒根辛寒治疝瘕腸洩膀胱熱結瀉不下欬逆癩癧驚邪



狼牙

コマツナギ
牙子 狼齒
犬牙 抱牙
支闌
和名古末豆奈木

本綱狼牙苗似蛇莓而厚大深綠色根黑若獸之牙齒七月華八月實黑色其根三八月采暴乾

若中濕腐爛生衣者殺人色白者善

根有毒 治邪氣熱氣疥癬惡瘡

△按狼牙山野處處有之高一尺二尺莖枝葉花並似萩而小七月開花作莢如小豆莢中子黑色

其根甚強故蕩人可繫牛馬俗呼名駒繫

ねあさみ

離婁 掘据


白者名草藺如

藺如

和名禰阿佐美

又云仁比萬草

リエイ ヲニイ



本綱藺如春初生苗高二三尺莖葉如大戟而葉長微闊不甚尖折之有白汁抱莖莖有短葉相對
團而出尖葉中出莖莖中分三三小枝二三月開細紫花結實如豆大一顆三粒相合生青熟黑
中有白仁如續隨子之狀其根長大如蘿蔔莖狀或有岐出者皮黃赤肉白色破之有黃漿汁
初斷時汁出凝黑如漆往往用其根充狼毒誤也 狼毒根無漿
根辛寒有 治惡肉敗瘡又治甲疽生干脚趾 藺如 三兩黃芪 二兩苦酒 以猪脂五合合煎取膏
小毒 三合日三塗之即消又能治馬疥
△按藺如古本朝有之今無識者

皮黃肉白者更峻利



和芽大戟紫色



たいげき

功 鉅 一 下 馬 仙

和名波夜
比止久佐

ダア、キツ

本綱大戟生平澤春生紅芽漸長莖高一尺以來莖中空折之有白漿葉長狹似柳葉而不圓其
稍葉密攢而上三四月開黃紫花圓圓似杏花杭州紫大戟為上
江南生者葉似荷葉為次又北方綿大戟色白其根皮柔韌如綿甚峻利能傷人弱者服之或至
吐血
根苦寒有 利大小便治十二水腹滿急痛不問年月淺深大戟當歸橘皮各一切以水二升煮
取七合頓服利下水二三升勿怪至重者不過再服便瘥禁毒食一年永不復作凡大戟得漿
甘草用之使惡藥禁
小豆為之使惡藥禁
△按大戟和州金山剛山之產良名小大戟丹波伊豫次之其葉圓葉間開細花有白赤紫數品結
實以宜麻根為

どうだいくさ

五鳳草漆莖


貓兒眼睛草

綠葉綠花草

俗云燈臺草


澤漆

ツニツ ツイツ



本綱澤漆原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢柔莖如馬齒莧綠葉如首楷葉葉圓而黃綠頗似貓睛莖頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花青綠色復有小葉承之齊整如一搖莖有白汁粘人根白色有硬骨莖葉苦微寒利水治浮腫功類大戟而其莖有白汁亦同故誤以為爲大戟然大戟根苗皆有毒澤漆根硬不可用苗亦無毒可作菜食使惡毒積

△按此草形狀似燭臺俗呼名燭臺草其莖汁能治疣黑子且牛馬亦不食此草乃有毒明矣




甘遂

かんすい
甘藷 陵藷
重澤 苦澤
白澤 主田
鬼醜

本綱甘遂苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉白作連珠大如指頭實重根苦寒能瀉十二種水腫水結胸中非此不能除故仲景大陷胸湯用之但有毒不可輕用一蒂爲之使惡遠今人多以麩煨熟用以去其毒

△按甘遂一名蠟波曾本朝古有之今無志反甘草




續隨子

ぞくづし
千金子 拒冬
苦薩豆 聯步
千兩金

本綱續隨子苗如天戟初生一莖莖端生葉葉中復出葉花亦類大戟自葉中抽幹而生實青有殼秋種冬長春秀秋實莖中亦有白汁可結水銀人家園亭中多種以爲飾

子辛溫下水最速然不可多服此與大戟澤漆甘遂莖葉相似主療亦相似其功皆長于利水又治疣黑子以續隨子煎時塗之自落

△按續隨子其殼青子如小豆大而黃色紀州之產良




葇蓉

らうじり
積唐 行唐
たほみるくさ
天仙子
ランラン
和名於保
美留久佐

本綱葇蓉生海濱川谷今處處有之苗莖高二三尺葉似地黃王不留行紅藍等而濶如三指莖葉皆有細毛四月開花紫色一云五月結實有殼作子狀如小石榴房中子至扁細青白色如粟米粒其子不可生服傷人見鬼狂亂痰之一二日而芽方生其毒爲物可知矣葇蓉雲實防葵赤商陸皆能令人狂或見鬼者

子苦溫入下癩頗狂方然不可過劑綠豆甘草升麻

△按葇蓉海濱有之其葉形畧似野菊而莖葉皆有白細毛四五五月開花有白有赤結實如嬰子俗稱之河原艾非也河原蓬別有一種以葇蓉訓煙草甚誤



からすのまんどろ

雲實

草雲母 臭草
粘刺草 子名
圓實 雲英
天豆 羊石子
馬豆 和名淡
佐々介

イニョレン


本綱雲實平澤處處山原多赤莖中空有刺高者如蔓其葉如槐三月開花然滿枝莢長三寸許狀如肥皂莢有子五六粒正如鴿豆兩頭微尖有黃黑斑紋厚殼白仁咬之極堅重有腥氣其花有毒能令人見鬼發狂

實無毒治泄痢腫脹去邪惡結氣除寒熱治瘡

按雲實原野地堤有之俗謂之鴿乃胡豆莢而結莢

一種有野胡豆者其花淡紫色其葉似胡豆莢而結莢

共出柔滑菜部而入食其葉雲實相似而有開黃花之異耳不可不知是毒草之屬也



たうごま

蓖麻

和名加良加之波
一云加良衣

ヒイマア

本綱蓖麻夏生苗葉其莖有赤有白中空其葉似大麻葉而甚大每葉凡五尖夏秋間極裏抽出花穗葉黃黃色高丈餘每枝結實數十顆上有刺如蝟毛而軟凡三四子合成一顆枯時裂開狀如巴豆殼內有子大如豆殼有斑點狀如牛蟻再去斑點中有仁嫩白如積隨子仁有油可作印色及油紙子無刺者良子有刺者毒

子甘辛有毒外用屢奏奇効但不可輕內服搗膏點六畜舌根下即不能食點肛內即下血死其毒可知矣如服蓖麻者一生不得治口眼喎斜搗膏左貼右貼右貼左貼即正又催生下腹取七粒

去殼研膏塗脚心若胎及衣下便速洗去不爾則子腸出如子腸出則腸自入以此膏

油取毒乃外科要藥鴉油能引藥氣入內能拔病氣出外故諸膏多用之


按蓖麻和名唐推言其葉唐在言其油今俗稱唐胡麻出於和州者良紀州蘇州之產次之近頃煉成用代蠟燭又取油法蓖麻仁去殼五升用水一斗煎之沫出盡取一點入水不散為度

朱印色

其方有數品一方蓖麻子五十錢去皮川棟子五十個去皮黃蠟五錢銀朱二錢艾葉揉去莖屑先用川棟子肉黃蠟煉和冷定蓖麻油及艾搗合成絹裹用又墨印用油煙灰和蓖麻子油用之

一種有傳落廻者生江南山谷莖葉如蓖麻莖中空吹之作聲如傳落廻折之有黃汁不可用入口有大毒入立死

按傳落廻本朝未知有之



じやうさん

恒山 鵝屎草

くさぎ

互草 鴨屎草

常山

根名常山
葉名蜀漆

チヤンサン

和名久佐木
一云山字豆

木綱常山。生山谷間。莖圓。有節。高者不過三四尺。葉似茗而狹。長兩兩相當。二月生白花青莖。五月結實。青圓。二子為房。其草暴燥。色青白。堪用。若陰乾便黑。爛壞矣。根似荆。根黃色。而破細。實黃者為雞骨。常山用之最勝。五月采。一種出於海州者。葉似檉。葉八月有花。紅白色。子碧色。似山楝子而小。常山苦寒。蜀漆辛平。共為治瘧之最要。不可多進。令人吐逆。老人久病。切忌之。生用。則上行。必則吐氣。稍緩少用。亦不致吐也。得甘草。則吐氣。稍得大黃。則利。結便為之。使。

按常山處。處有之。出於丹波者。為良。其葉甚臭。高丈許。木之屬。故稱臭木。葉似檉。葉而圓。尖。零融不澤。六月開細花。白紅雜。穢亦似梓。花蓋蘇頌所謂海州之常山。是乎。然本草不言葉。與者未審。人以其葉為治瘧藥。屢有功效。但本經常山。葉如茗。葉者。本邦未有之。常山蟲。在此木。枝中。蟻也。蝕木。心六七月。破。取之。用入疳藥。或食小兒。凡取。法有蟲木。株必有小孔。用管吹水於中。蟲首出於孔。輒剪木。兩端。探得之。



倭藜蘆

藜蘆

山葱 葱菹
豐蘆 葱菹
葱菹 鹿葱
葱菹
和名山宇波良
一云之乃久比乃木

本綱藜蘆。山谷處。處有之。冬凋春生。苗葉似初出。櫻心。又侶。車前草。重侶。葱白。青紫色。高五六寸上。有黑皮。莖。莖。莖。皮。有花。肉紅色。其根。侶。馬。馬。根。長四五寸。黃白色。細三二寸許。二三月采。根陰。乾。生。高。山。者。為。佳。根。苦。辛。寒。或。云。吐。上。膈。風。痲。痲。病。凡。吐。藥。不。一。常。山。藜。蘆。瓜。丁。藜。蘆。烏。附。尖。痰。吐。濕。萊。藤。子。吐。氣。藜。蘆。則。吐。風。疾。者。也。黃。連。為。之。使。反。荷。藥。細。辛。人。參。炒。服。之。吐。不。止。飲。葱。湯。即。止。


按藜蘆。今多植庭園。愛其花。形狀。全如。上。說。而。根。少。異。耳。性。宜。陰。處。冬。亦。不。凋。葉。似。車。前。草。而。厚。長。布。地。生。三。四。月。抽。莖。開。花。肉。紅。色。或。淡。黃。或。梯。色。或。外。褶。內。白。或。外。紫。內。黃。或。綠。色。或。外。青。內。白。者。名。吾。須。手。或。淡。紫。者。名。山。船。根。圓。似。見。此。而。中。根。多。如。髭。故。名。蝦。根。恐。此。藜。蘆。也。然。自。古。以。方。年。青。為。和。藜。蘆。甚。非。也。倭。方。有。桑。山。小。粒。丸。能。治。小。兒。諸。蟲。驚。癇。方。中。有。苦。參。藜。蘆。此。相。反。之。物。何。得。宜。乎。但。知。倭。方。藜。蘆。即。用。方。年。青。佳。也。故。藥。肆。和。藜。蘆。方。年。青。根。也。見。于。後。



木藜蘆

はまゆふ
はまはせき
はまかもと
黄藜蘆
鹿藜
俗云浪木綿
又云浪芭蕉

本綱木藜蘆。生近水溪澗石上。小樹也。莖葉與藜蘆大同。葉狹而長。多皺。文四月開細黃花。五月結小長子。如小豆。大根。根。百餘。莖。苦。辛。溫。不。入。藥。用。按木藜蘆。南紀海濱澗。有之。高。二尺許。莖。葉。微。似。芭。蕉。而。狹。長。又。似。蜀。黍。苗。有。淺。黑。皮。藜。蘆。數。片。層。層。夏。抽。莖。開。黃。花。不。如。藜。蘆。花。之。艷。性。畏。寒。移。植。之。於。京。大。坂。多。難。茂。又。以。不。甚。美。人。不。為。珍。自。古。以。藜。蘆。稱。於。毛。止。故。是。亦。呼。曰。浪。於。毛。止。各。誤。而。已。




倭



萬年青

きもと
千年草 萬年春
今云於毛止
本草新編云氣味苦澀微寒入腎經及肺專通任督之脉

三才圖會云万年青葉似芭蕉隆冬不凋以其多壽故名
 △按万年青性好陰濕石間葉布地生似玉蜀黍葉而小厚勁深青四時不凋夏根傍抽莖生花
 無氣瓣其莖一寸許淡青色花房黃白色而亦一二寸大可握指形如橫棗結子初青後正赤
 累累攢生大如櫻桃
 一種有葉縱文白者呼名筋万年青以為珍三才圖會所載有經理
 致富全書云宜於春秋
 採蓄葉葉令入俗誤藜蘆為万年青之訓花實大而終以万年青根為後藜蘆枯之豐前中
 津之產長蓬州朝比奈蘇州廣島亦佳補藥及實於花瓶稱万年青前置以為極秘傳



別有草烏頭白
 附子故呼之為
 黑附子川烏頭

本綱烏頭乃附子之母綿州彰明縣多種之今之四川地最為上江南來者不堪用每年以上田
 熟耕作壟十一月種種春月生苗其莖類野艾而澤其葉類地麻而厚其花紫瓣黃莖長莖而圓
 其品凡七本同而未異其初種之小者為烏頭附子而旁生者為附子又左右附而偶生者為
 高子附子而生出或變出形長而不生子者為天雄附子而尖者為天雄附子而上出小者為側子附子而
 散生者為漏藍子皆脈絡連貫如子附母凡種一而子六七以上則皆小種一而子二三則稍大
 種一而子特生則特大
 附子辛溫有毒陰虛要藥凡傷寒傳變三陰及中寒夾陰身大熱而脈沈者必用之或厥冷腹
 痛脈沈細甚則唇青齒縮者急須用之有退陰回陽之力起死回生之功陽中陰浮中沈無所
 不至為諸經引用之藥
 凡附子行無諸經引不熱得甘草則性緩得桂則補命門得生薑則能散以熱攻熱又導虛熱下
 行以除冷病長防風黑豆綠豆甘草人參黃耆犀角等藥煎汁得國椒食鹽下連命門下以

躡坐正節角少者為上其色以花白者為上而有節如風乳色亦細色者次之形不正而傷缺風
 賦者色亦青綠者為下
 本草必讀云市肆售者當以體乾堅實項圓正底平者為良

烏頭

別有草烏頭故呼之川烏頭乃附子之母也能治諸風
 附子性重滯溫脾逐寒
 烏頭性輕疎溫脾去風若患寒疾即用

天雄

一名白幕種附子生出長者至三四寸許或種附子而盡變成長者即如種芋形狀不一之類
 也但不生子故曰天雄其長而尖者謂之天雄象形也須重一兩半有象眼者乃佳
 天雄辛溫有毒治大風寒濕痺骨節痛凡虛寒須用附子風家多用天雄烏頭附子共是補下焦
 命門陽虛之藥


側子

一名前子蓋附子之側粘連小者名側子辛大熱有大毒治癰腫風痺又治遍身風癢神妙也
 烏頭乃原生得母之氣守而不移居乎中者惡與附子同治癰腫風痺又治遍身風癢神妙也
 四肢充達皮毛為治風之藥天雄長而尖其氣親上宜其補上焦之陽虛漏藍子則餘氣所結
 其形催殘宜其不入
 湯服令人喪目也

漏藍子

一名木鼈子又名虎掌虎掌此物與同名此乃附子之環細未成者小而漏藍故名之苦辛
 此不堪服餌止宜入藥料也服之令人喪目

△按附子有毒藥而虛寒厥冷症必用之良藥也凡體重實一個十錢有余爲上七八錢者爲下浸鹽水一渡之故至夏月如不曝乾則濕爛不堪用延喜式有真附子則昔本朝出附子乎今止有草烏頭耳中華亦四川外多無之



草烏頭



どりかぶと 烏喙兩頭
土附子 秀毒
歌子 毒公
金鶴苗名良音
及音近音獨白草

又名鴛鴦菊汁煎名射罔本綱云草烏頭根苗花實並與川烏頭同但此係野生又無釀造之法其根外黑內白皺而枯燥爲異爾然毒則甚焉烏喙則偶生兩岐俗曰兩頭尖者也偶生兩岐者亦謂正月始生葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似
氣味辛溫有毒 治中風惡風洗出汗破積聚寒熱及畏飴糖黑豆冷水能解其毒

射罔

苦有大毒此即草烏頭生去皮搗碎莖汁濾汁澄清旋漆晒乾取膏爲射罔以傳箭射禽獸十步即倒中人亦死人中其毒以甘草藍汁小豆葉浮萍冷水薺菜皆可一味飲之
△按草烏頭俗呼名止藥似菊葉而厚八九月開花淺紫色形似俗人所著烏冠故名之又有白花者其根乃草烏頭也用殺頭毒瘡外科用之和州金剛山之產其若洲江州次之今人家種之賞花也 此與蝦夷射罔一物別種也

蝦夷人每用射罔毒塗箭其鐵圓木也名無以射禽獸彼土無兵器用之禦人中者斃焉如今能知其解毒藥不強怖矣羽州有之牛房野藥形尋常草烏頭無異其毒甚烈誤食一葉即死土人名蕪射罔射罔夷人所用也



白附子

びやくふし
ベツフウツウ

本綱白附子本出高麗新羅生砂磧下濕地獨莖似鼠尾草細葉周匝生於穗間根正如草烏頭之小者長寸許乾者皺文有節蓋因與附子相似故名白附子彼稱黑附子實非附子類也氣味辛甘溫 陽明經藥純陽引藥勢上行治中風失音一切冷風

天南星



天南星

てんなんしやう 虎掌
鬼真謁
虎膏
和名於保々曾美

八莖時出一莖作穗直上如鼠尾中生一葉如匙莖莖作房旁開一口上下尖中有花微青褐色結實如麻子大熟即白色自落布地一子生一窠其根初如豆大漸長大似半夏而扁年久者根圓大者如雞卵周匝生圓牙三四枚或五六枚

天南星 冀州菜園中種之二月生苗似荷梗其莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石榴子紅色其根似芋而圓扁與蒟蒻相類但蒟蒻莖斑花紫此是根小柔膩肌細炮之易裂為可辨爾蓋天南星即本經虎掌也小者名古方多用虎掌不言天南星始於唐時也虎掌因葉形似之非根也南星因根圓白形如老人星狀故名南星

天南星 苦辛 乃手足太陰脾肝之藥味辛而麻得屏風故能治風散血氣溫而燥得牛膽故能勝濕除涎性緊而毒則不火炮故能攻積拔腫而治口疳舌糜生蠱欲其下行以黃藥引之

按虎掌本名也後名抄亦有虎掌無天南星蓋天南星之名始出於唐時也明馮今却虎掌無識者疑此從虎掌子種所出異品名天南星一物異品近頃亦出異品武藏鏡草之類是也既虎掌與天南星相似而各別也又天南星有二種花房淺青色而未如鼠尾者高不過尺惟如匙及佛後光也無鼠尾者高二尺許是自一類二種也三才圖會及本草必讀出虎掌與天南星之二圖為二物明馮天南星日向薩摩之產最良豐前中津藩州廣島之產次之




武藏鏡

ひさしあふみ

草珊瑚珠

按此出於虎掌子種高尺許葉大似虎掌三四月開花外青內赤黑色形似馬鏡故俗名武藏

鏡其稍秋結實似天南星及万年青子而小嫩生為一團正紅色至冬葉落而唯見子耳故側植石章而假用其葉



歡喜草

くはんきさう


歡喜草

雪餅草

習俗稱也

ゆきもちさう

按歡喜草即天南星變生於子種者也近頃始出豫州移栽攝陽人以爲奇異好事者附異名也三月生一莖作花房其本一二寸如筒帶微褐色而爲半片如匙白色亦似佛後光末尖曲覆干花上其花生筒中圓白如餅故名雪餅草四五月花落結實形如玉團黍而細小青色熟乃紅色莖葉如莖弱



蒟蒻

若 舉

こんやく

蒟蒻

鬼頭

和名古邇夜久

キユイノモツ

莖多斑點其花紫色宿根亦自生苗經二年者根大如碗及芋魁其外理白秋後採根須淨擦或搗或片段以醋灰汁煮十餘沸以水淘洗換水更煮五六遍即成凍子切片以苦酒五味淹食不以灰汁則不成也切作細絲沸湯淘過五味調食狀如冰母絲


根有寒生則戰人喉出血延壽書云有人患瘰癧百物不思見隣家修葺請求食之美遂多食而瘰愈又有病癰者數人多食之亦皆愈

△按蒟蒻紀州粉河總州錦山之產為上備前丹波次之讚州又次之七八月採根晒乾掛磗問表之為餅釀類下又為紙衣糊表熟以裨心透通取出搗為糊又痼疾人食之發

菩薩草

本綱生江浙州郡凌冬不凋秋冬有花直出赤子如鈴頭冬月採根用味苦無毒主中諸毒酒毒研服之又諸蟲傷搗汁飲并傳之

△按菩薩草即今云歡喜草之類乎然歡喜草冬枯春生苗此物凌冬不凋以為異故重出



半夏

ハアン ロヤア、

はんげ

守田 冰玉

地文 和姑

和名保曾久美

俗云鳥杓

本綱半夏以青州齊州者為佳二月始生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似竹葉百花園上也月令五月半夏生蓋當夏之半故名之八月採根實大生江南者似荷葉藥根下相重上大下小皮黃肉白

根辛生微寒 肉白者佳不厭陳久凡用生者戰人咽喉方中有半夏必須用生蠶者以制其毒

也惡鳥糞畏生蠶乾薑反烏頭治熱痰黃芩風痰南星寒痰乾薑痰痞皮白木口渴者禁用其液燥津孕婦忌之則無害

○修治 洗去皮垢以湯泡浸七日逐日換湯令消盡眼乾切片薑汁拌焙入藥


半夏餅 用半夏研末以薑汁和作餅子日乾用

半夏散 用半夏研末以薑汁白礬湯和作餅子日乾用

經云腎主五液自入為唾入肝為淚入心為汗入脾為涕入肺為痰無痰曰嗽痰者因嗽而動脾之濕也半夏治痰之標不能治痰之本治本者泄腎也俗以半夏為肺藥非也俗以半夏有毒用貝母代之夫貝母肺經藥也何可以代若勞虛咳嗽吐血咯血肺痿肺癰婦人乳癰及癰疽惡毒乃禁服用半夏故皆以貝母為代也至於脾胃濕熱涎化為痰久則生火痰火上攻昏憤僣仆寒澁等症死且夕亦豈貝母可代者耶

△按半夏 出於豫州者最良豐州中津蘇州廣島雲州島根郡江州之產皆次之凡大粒而色白無皮者為良小粒而色不白及有皮者不可用也藥肆所造趨半夏多用小者其製亦不精也特有藥之修製不可輕忽宜自製詳審也

治五絕急病自縊搗木石壓 以丸半夏細末用冷水和丸如大豆納鼻孔中心頭溫者雖經一日可治



蚤休

きんせんぢうろう

蚤休 三層草

七葉一枝花

草甘遂 蟹休


紫河車 重臺

白甘遂

本綱又名金線重樓或云重生深山陰濕之地一莖獨上莖當葉心葉綠色似荷葉又云葉似王

獨荷草。山荷葉。馬目。毒公。瑤田草。有數本。網有二種。根皆似天南星。赤莖直上。莖端生葉。一種葉凡七瓣。一種葉作數層。葉似鏡。而青背紫。而有細毛。葉下附莖。開一花。狀如鈴。倒垂。青白色。黃蕊。中穴。結黃子。風吹不動。無風自搖。又曰。此草一年生。一莖。既枯。則生一白。及八九年。八九日矣。然一年一白。生而一白。麻蓋。陳新相易也。

根有辛溫。解百毒。治子死。腹中胞破。不生者。此方。聚效。救鬼。白不拘。多少。黃色者。去毛。為細末。用節。羅只。熱之。每服一錢。酒一盞。同煎。八分。通口。服。立生。如神。名。一字散。



鬼白

クイキウ


九日 天白 鬼藥
 雷屏 解毒 早荷
 毒母草 莖天花
 木律草 八角盤
 唐婆鏡 獨脚蓮

本網射干。有數說。今取春生。苗高一二尺。葉大。類蠶。而狹。長。橫。張。如鳥翅。及扇之狀。中抽莖。似苦草。莖而強。硬。六月。開花。大。如。萱。花。黃。紅。色。上。有。細。文。秋。結。實。作。房。中。子。黑。色。

根。按。本。草。綱。目。射。干。與。烏。扇。為。一。物。因。倭。名。抄。亦。云。射。干。一。名。烏。扇。和。名。加。良。並。未。詳。審。其。二。物。莖。葉。花。形。狀。各。別。也。蘇。頌。所。謂。莖。硬。疎。長。正。如。射。之。長。竿。之。狀。者。射。干。也。莖。短。葉。側。相。比。而。如。扇。者。烏。扇。也。

射。干。葉。似。烏。扇。而。濕。段。抱。莖。上。生。中。心。抽。一。莖。高。三。四。尺。七。月。開。花。似。萱。草。花。而。六。瓣。黃。赤。色。有。細。點。零。如。山。丹。花。結。實。作。房。如。胡。麻。房。而。三。稜。一。房。六。隔。有。中。子。二。三。十。粒。大。如。豌豆。而。生。青。熟。紫。黑。色。而。硬。


一種。小。射。干。名。姬。葉。小。而。長。六。七。寸。如。石。首。翬。花。亦。小。淺。紫。畧。似。萱。蒲。花。而。小。美。可。愛。



射干

シヤガ

野萱花草盤
 黃蓮 仙人掌
 紫金牛



烏扇

ハムキ


烏嬰 烏吹
 烏蒲 鳳翼
 鬼扇
 和名加良須阿布岐
 俗云檜扇

△按本網。烏扇。射干。以爲一物。今別之。異名亦分。附于此。凡物。某與某。以相似者。謂之。烏。此。似。官。家。所。持。檜。扇。故。名。烏。扇。又。名。檜。扇。手。其。葉。似。烏。扇。而。狹。勁。色。亦。深。潤。比。比。扁。平。相。雙。頗。如。扇。抽。莖。不。過。二。尺。四。月。開。花。狀。似。烏。扇。花。而。小。灰。白。色。有。黃。文。而。不。結。實。其。根。蘆。微。紫。色。俗。相。傳。修。驗。者。呪。咀。調。伏。以。此。花。爲。佛。供。故。尋。常。忌。之。未。知。然。否。

又。世。俗。所。謂。烏。扇。乃。射。干。射。干。乃。烏。扇。也。共。以。形。狀。辨。之。則。自。明。焉。蓋。二。物。培。柴。灰。於。根。則。葉。生。融。以。爲。奇。珍。

射。干。之。名。有。二。佛。經。射。干。貂。掖。此。是。惡。獸。似。青。黃。狗。食。人。能。緣。木。阮。公。云。射。干。隨。層。城。者。是。樹。殊。


有高大者一本草射干是草即今人所種者也射字神夜切音蛇為音



いちばつ
こやすくさ

鳥園
根名鳶頭
和名古夜須久佐
俗云伊知波豆

本綱鳶尾其苗低下於射干葉布地生狀如鳶之尾其葉似射干而潤短不抽長莖夏開花紫碧
色根似高良薑節大數箇相連皮黃肉白
根苦平嚼之戟人咽喉但治邪氣鬼症諸毒
四物煎頭散治鬼魅邪氣感頭黃牙即金黃若子防葵為末方酒服欲令病人見鬼增防葵一
分欲令知鬼又增一分立驗不可多服
但鳥屬射干共與今三四月抽短莖開花形似燕子
花而紫色花之底微白




ぎばうし
白鶴山
俗云岐保字之

本綱人家栽為花草二月生苗成叢高尺許柔莖如白菘其葉大如掌圓而有尖葉上紋如車前
葉青白色頗嬌瑩六七月抽莖莖上有細葉中出花朵十數枚長二三寸本小未大未開時正如
白玉搔頭簪形又如羊肚蕈之狀開時微綻四出中吐黃蕊頗香不結子其根連生如鬼白射
干生叢叢有鬚毛舊莖死則根有白新根生則舊根腐
根甘辛寒治癰腫酒服以渣傳之
古今醫統云嚴冬用稻草覆其根則來春易發
畫譜云春初移種肥土中則茂其花辨入少糖煎食香清味淡可入清供
△按玉簪葉潤圓未尖似橋欄干之形故俗呼名岐保字之五月開花也如上說六七月結實作
莢長寸許一莖十余莢垂下生青熟枯黃色內有細子正黑色也然本草謂不結子者非也又磨
蕈之菇當作拭疑傳寫之誤矣而羊肚菜久知
須美單詳于芝栴類



こぎほうし
小玉簪

本綱玉簪之紫花者葉微狹○畫譜云玉簪紫者花小葉上黃綠間道喜水分種盆石栽之可
玩
△按俗云小玉簪葉狹長抽莖也二三尺長於白鶴仙其花微紫或純白也又有葉上黃縱理者
謂之筋玉簪花以為異近年出之畫譜所言者是也



鳳仙花


ほうせんくは
急性子早珍珠
金鳳花小桃紅
染指甲草菊婢
夾竹桃海蔘

アナン スエン ハア、

本綱鳳仙花極易生二月下子五月可再種苗高二三尺莖有紅白二色其大如指中空而脆葉長而尖似桃柳葉而有銀齒極開花或黃或白或紅或紫或碧或雜色亦自變易狀如飛禽頭翹尾足具如鳳狀女人采其花及葉包染指甲自夏初至秋盡開謝相續結實纍然大如櫻桃其狀微長色如毛桃生青熟黃犯之即自裂皮卷如拳苞中有子似蘿蔔子而小褐色子微苦温能治骨哽以竹筒灌之立愈但此草不生蟲蠹蜂蝶亦不近恐亦不能無毒也其子性急速故能透骨軟堅疔疔人烹魚肉硬者投數粒即易軟爛是其驗也凡服之者不可着齒也最損齒與玉簪根同多用亦破人咽

畫譜云金鳳花六種有重瓣單瓣紅白粉紅紫色淺紫如藍有白者上生紅點凝血俗名酒金六色花開一落即去其蒂則花茂與二月季同

△按鳳仙花蜂蝶亦不近之說非也特蝶喜吸其花也然為人則可有小毒能解藥物○故亦不可不損人齒



曼陀羅花

まんだらげ
ちやうせんあさかほ
風茄兒
山茄子


マン トウ ロウ ハン、

本綱曼陀羅花生北土人家亦栽之春生苗夏長獨莖直上高四五尺生不旁引綠莖葉如薔薇葉八月開白花凡六瓣狀如牽牛花而大攢花中折斷葉外包而朝開夜合結實圓而有丁拐中有小子九月采實

法華經言佛說法時天雨曼陀羅花又道家北斗有陀羅星使者手執此花故後人因以名之

花子辛温治面上生瘡曼陀羅花晒乾研末少許貼之時珍曰相傳此花笑釀酒飲令人笑舞采釀酒飲令人舞予常試之飲酒半酣更令一人或笑或舞引之乃驗此與火麻子花陰乾等分爲末熱酒調服三錢少頃昏昏如醉割瘡灸火宜先服此則不覺苦

△接近頃來於朝鮮今人家多栽之花似大牽牛花及博多百合花故俗曰朝鮮牽牛花其實似檳榔子而有細編文又別有名曼陀花者同名異種見溫草部



羊躑躅

れんげつ、じ

黃躑躅 老虎花
黃杜鵑 驚羊花
玉枝 羊不食草
鬧羊花 鬧當字

ヤナツ チヨツ

俗云蓮華豆々之

本綱近道諸山皆有之小樹高二尺葉似桃葉三四月開花黃色似凌霞花而五出蕊辨皆黃而氣味皆惡

△按羊躑躅一名以波豆々々之據本草之諸說則今云蓮華躑躅也丹波及和州吉野山多有之其木二三尺高者五六尺葉似楊梅葉而薄有微白毛三月開花五出似凌霞花一莖八九葇蕤望之如蓮華故名之又有赤蓮華者蘇頌云嶺南有深紅凡躑躅之品類雖多黃花者惟蓮華躑躅豆萇躑躅之二種也而鵝躑躅岩躑躅等亦一類而花色不黃

豆萇躑躅


俗云末女加良豆豆之

△按豆萇躑躅深山巖石間有之三四月開花似美容柳花而黃色其葉四時不凋端卷反似豆之丹波水上有之

もちつゝじ

俗稱

俗云毛知豆々之




鵝躑躅

△按鵝躑躅葉淺綠色有細毛枝少花繁三四月開花淺紅似桃花花色而一枝數葇其花及莖觸手即粘如鵝故名之花形色不美今人四月八日灌佛用之或插竹竿供之未知其據但當此時甚多故取其簡易耳

一種有躑躅名江戶万葉似鵝躑躅其花千葉而色濃不粘爲異夫木 くれなののやしほの岡のしはつゝじこや山姫のまくりての袖 長方

一種有岩躑躅伊波豆葉花共小花色深赤



ひらとつゝじ


琉球躑躅

平戸躑躅


△按平戸九州之地名本出於琉球四月開花單瓣白最易繁茂其大者至一二丈一種有朝鮮躑躅高五六尺葉似楓葉三四月開花大如平戸躑躅花而淡鼠白色潤澤最爲珍

よらぶつゝじ

永來部躑躅



△永來部薩摩之南島也出於彼土甚峻故如離移種干畿內怕寒難茂盛其花赤大徑五六寸許甚奇凡躑躅之種類最多不下三百種不能悉記之




山躑躅

山石榴
杜鵑花
和名阿伊豆々之
今云左豆木

カンナツナモツ

本綱山躑躅處處山谷有之高者四五尺低者一二尺春生苗葉淺綠色枝少而花繁一枝數莖
二月始開花如羊躑躅而帶如石榴花有紅者紫者五出者千葉者小兒食其花味酸無毒
草木畫譜云杜鵑花喜陰惡肥天蚤以河水澆之樹陰下放置則茂葉色青翠可觀有黃白二色
一種有藤牽牛花者葉似躑躅而花似山石榴而大淡紫色蓋藤者言色牽牛花者言形
△按山躑躅高者五六尺其花有白有赤有紫有桃紅有赤白雜開者至三百餘種四月始開五
月為盛人呼五月稱佐豆幾故名之凡紀州遠州等山中躑躅山鵲花共大木多有高二三丈
周二尺許者攝州須磨一谷二谷至權現山凡三四里許遠州秋葉山麓乾川兩邊亦三四
里許躑躅山鵲花甚多夏月滿山頗如錦凡正月折枝插地則活攝州多田鄉圃人常栽之販
市又木株最堅燒炭以為園炭園者茶湯室名




映山紅

紅躑躅
俗云岐利之末

きりしま

草本畫譜云映山紅生滿山頂其年豐稔人競之
△按本草綱目山躑躅山石榴花映山紅躑躅以為一物今別為二種凡躑躅葉形類桃及柳葉映
山紅葉零帶圓形杜鵑花葉形比映山紅狹長三種大異也
映山紅花類杜鵑花而小深赤色單葉三月開花能映滿山故名之有大小二種小映山紅開
花最繁蔽枝條堪愛今又有白花者有單葉八葉千葉之數品大抵二三尺高者一二丈以為珍
薩摩日向山谷多有之移種干諸國彼地有霧島嶽每嶺燒起且此花映山故名之朝鮮載晉
山世稿云本朝明成化年御門得日本躑躅數盆及其花開葉單而花瓣甚大色類石榴重附疊
藥久而不衰其與我國色紫而千葉者妍貴不啻若孃母與西施也上嘉賞之命下上林園分
植外人秘莫能得一以種盆一以種地以試之種地者凍死而盆者無恙數年之間枝條方
盛映山紅之類也



芫花


杜芫敗華赤芫
毒魚兒草去水
頭痛花其根名
黃大戟蜀桑

イニンハア

俗云以波布知

本綱芫花近道處處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小
而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細三月采花五月采葉八九月采
根陰乾小人爭鬪者取此葉擦皮膚作赤腫如被傷以經人其花有紫赤白者緜州出者花
黃謂之黃芫花凡因其氣惡呼為頭痛花
芫花大毒 治欬逆上氣喉喘咽腫水腫用當微熬不可近眼取張仲景治傷寒太陽證表

已解有時頭痛出汗惡寒心下有水氣乾嘔痛引兩脇或喘或欬者用十棗湯治之中有芫花
 △按芫花俗云 葉花並似藤而小三月開花紫色或白色乃如有紫藤白藤二種然未見赤黃
 者
 別有谷藤草類出干蔓又有華蔓草出干濕 共似芫花而異




芫花

曉音

はまにれ
 和名波末仁禮

本綱芫花即芫花黃色者也小株花成簇生其花生時色黃乾則如白或言無芫花以桃花代之
 取其利耳
 △按芫花有毒治傷寒溫瘧下十二水破積聚癥瘕
 氣味苦寒




醉魚草

ツイイニイツアツ

すいぎよさう
 闊魚花櫛木
 魚尾草

本綱醉魚草在藍岸邊作小株生高者三四尺根狀如枸杞莖似黃荆有微稜外有薄黃皮一枝易
 繁衍葉似水楊對節而生經冬不凋七八月開花成穗紅紫色儼如芫花一樣結細子漁人采花
 及葉以毒魚盡圍而死池沼邊不可種之此花色狀氣味並如芫花毒魚亦同但花開不同時
 為異爾 又有狀如蠶而赤華名曰葶藶者可以毒魚




葶藶

罔音

もうさう
 蒟草 芒草
 風葶 葶俗
 或入木部

本綱葶藶木若石南而葉稀無花實揉之其臭如椒搗以和陳粟米粉納水中魚吞則死浮出人
 取食之無妨又山人以毒鼠周禮煎氏堂除蟲物以蒟草煎之則死
 氣味辛溫 治喉痺及牙痛取葉煎湯熱含冷則吐之誤食之害人惟黑豆煮汁服可解豆汁澀
 其根即爛性相制也
 △按葶藶俗以為檉者非也檉有花實是亦入水中魚死故相誤乎 檉見于



茵芋

インイユイ

いんよ
 茵藶 芫草
 卑共
 和名仁豆々之
 一云手加豆々之

本綱茵芋、雍州、絳州、華州、杭州有之。春生，苗高三四尺，莖赤，葉似石榴而短厚，又似石南。葉四月開，細白花，五月結實。莖葉有溫，茵芋、葶草皆古人治風藥，為妙品。近世罕知。按茵芋和名有，踰躅之號，詳今踰躅類中，無結實者。



石龍芮

たがらし
ふかつみ
地根天豆 石能
魯果能 水莖
胡椒菜 莖莢
彭根 苦莖
和名不加豆美
俗云田芥子

本綱石龍芮生近水，下濕地，高者尺許，其根如薺，二月生苗，叢生，莖分枝，一枝三葉，葉青而光滑，有三尖，多細缺，四五月開，細黃花，結小實，大如豆，狀如初生桑椹，青綠色，槎散，則子甚細，如葶藶子，宜半老時采之，入藥，有二種。

水生葉光，未圓者石龍芮也。陸生葉毛，未圓者毛茛也。莖與莖切，則有香，故名。治風寒濕痺，心腹邪氣，利關節，補陰氣，久服，輕身明目，不老。初起者，並按葉塗之，平補之藥，古方多用之，其功與枸杞、覆盆子相持，而世人不知用，何哉。按石龍芮葉如人參葉，而花實與毛茛同，截瘡，按葉貼，寸口一夜作泡，功亦與然，則是不無毒者也。




毛茛

毛建草 水茛
毛莖 天葵
自灸 猴蒜
俗云鬼田芥子
今云金寶花

本綱毛茛，下濕處，即多蓋，良，乃草，鳥頭之苗，此草形狀及毒皆似之，故名之。春生，苗高者尺餘，一枝三葉，葉有三尖，及細缺，與石龍芮莖葉一様，但有細毛，為別。四五月開，小黃花，五出，甚光艷，結實狀如欲綻，青桑椹，而有尖峭，與石龍芮子不同。葉及子，有辛溫，惡瘡，癰腫，疼痛，未潰者，搗葉傳之，勿入瘡，截瘡，采葉，按貼，寸口，男左女右，一夜作泡，如火燎。

按毛茛形狀如上，說今千葉花，亦有花，莖如莖，莖則更生，苗一莖一葉，無枝，極無毛，畧似小款，冬而冬亦不枯，至春別抽莖，枝葉形變，生毛，黧青色，不似石龍芮，光澤。




牛扁

たちまちぐさ
扁特 扁毒
倭名太知未知久佐

本綱牛扁生平澤下地似葶草石龍肉輩根如秦一兀而細
根苗苦微寒治身皮膚熱氣可作浴湯殺牛虱又能治牛病

武建草

本綱生山足濕地發葉似山丹微赤高一二尺味苦無毒接汁沐頭虱蠱盡死



尋麻

ツイン マア、

毛莖草
同字

本綱尋麻山野諸處多其莖有刺高二三尺葉似花桑或青或紫背紫有毛芒可畏觸人如蜂螫
氣味辛苦寒治蛇毒搗塗之入食之吐利不止投水中能毒魚杜子美有除蠶草詩是也



海芋


ハイイニイ

觀音蓮 羞天草
隔河仙 天荷

本綱海芋生蜀中今處處有之春生苗高四五尺大葉如芋葉而有幹其大者可以禦雨葉背紫
色夏秋間抽莖開花如一瓣蓮華碧色花中有紫長作穗如觀音像在圓光之狀其根如芋魁大
者如升盤長六七寸蓋野芋之類也以可變金味辛有大毒

透山根

本綱生蜀中山谷其草類藤蕪昔有人採藥誤研此草刀忽黃軟成金也取汁可以點鑲成金有
大毒人誤食之化為紫水及庚辛玉冊
一種有金英草亦生蜀中狀如馬齒莧而色紅撰鑲成金亦有入口殺人須臾為紫水也
△按蜀中者今之四川地出諸藥名草透山根金英草亦有之矣但鑲成黃金者變色耳



鉤吻

ケウホツ

野葛 斷腸草
毒根 胡蔓草
黃藤 火把花
俗云奈倍和利

本綱鉤吻南方桂州益州等村墟間巷間皆有蔓生莖大如箭而方其葉如柿圓面光春夏嫩苗
毒甚秋冬枯老稍緩五六月開花似櫻柳花而色紅又有黃花者數十朵作穗其根新采者皮白
骨黃宿根似地黃與白花藤相類人亦惑之新者折之無塵氣經年以後則有塵起從骨之細孔
中出今又折枸杞根亦然人誤食其葉者半日則黑爛死無復生少入口則鉤人喉吻也故名鉤
吻然羊食其苗大肥物有相伏如此或云葉如茶然謂昔岐伯對黃帝言黃精益壽鉤吻殺人乃
二草善惡死生如食鉤吻藥而飲冷水即死急也冷水發其毒也
之反草比對而言如食鉤吻藥而飲冷水即死急也

雍菜能解其毒取三雅菜汁滴之鉤吻苗即萎死如中二釣吻毒口不可開者取大竹筒洞節以頭拄其
 兩脇及臍中一濯冷水入二筒中一數易水須臾口開乃可下藥解之惟多飲甘草汁人尿汁或取雞卵
 抱未成離者研爛和麻油澀之吐毒物乃生稍遲即死
 △按駿州遠州及備州有鍋破者延蔓生莖有刺葉似山茶葉而不尖有縱理六月開小花秋結
 實熟則外皮開裂內子赤其葉有毒紙亦唇舌裂故名紙破鍋破如此鉤吻草之類乎然本草
 鉤吻不言子有無

和漢三才圖會卷第九十六目錄

蔓草類

白	何	葛	纒	佛	鐵	預	馬	樹	兔
蘇	首		絲	見	線	知	錢	苺	絲
	鳥		花	笑	草	子	子		子
				<small>牡丹 いはら</small>					
赭	草	黃	棣	荼	風	牽	馬	蛇	五
魁	薺	環	棠	藤	車	牛	兜	苺	味
			花	花	草	子	鈴		子
						<small>あさかほ</small>			<small>さねかつら</small>
鵝	菝	天	栝	月	紫	旋	蘿	使	蓬
抱	葵	門	樓	季	葳	花	蘼	君	蘼
		冬	仁	花				子	
			<small>天花粉</small>						
九	土	百	王	玖	墻	纏	榼	木	覆
仙	茯	部	瓜	瑰	藤	枝	藤	鼈	益
子	苓	根	花	花	子	丹	子	子	子
	<small>山飯來</small>	<small>ほとつら</small>							<small>あさいま</small>

黃藥子 威靈仙 通脫木 赤地利 烏蘇苳 常春藤 鈴掛草 紫藤 項王草 牛尾菜 落花生

山豆根 茜草 釣藤 紫葛 絡石 千歲藥 天仙藤 藤黃 留紅草 狗掉尾草 錦荔枝


解毒子 防已 雪下紅 律草 木蓮 忍冬 南藤 谷藤 千里及 野木瓜

白藥子 木通 白英 羊桃 地錦 玉蔓 省藤 羅生門 粘魚鬚 水胡蘆

和漢三才圖會卷第九十六

蔓草類

攝陽 城醫法橋寺島良安尙順編




免絲子 菟絲野狐絲 菟蘆金線草 菟藥火線草 菟丘唐紫 赤綱玉女

本綱免絲子田野荒園多有之其子入地初生有根如細絲不能自起及長得他草覆則纏繞而生其根自斷無葉有花白色微紅香亦襲人結實如批豆而細色黃生干硬上尤佳
子氣味辛甘 益氣力補不足強陰堅筋骨養肌久服明目延年治男女虛冷得酒長為之使
苗甘平 治野粉刺絞汁塗之立處瘰
△按菟絲子俗加豆世也
六狀我加世也



五味子 和名佐補加豆良

本綱五味子皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味而五味具故名之春初生苗引赤蔓於高木其長六
 七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類蓮花狀七月成實叢生莖端如豌豆許大生青熟紅紫
 有南北二種南產者色黑入滋補藥必用北產者乃良可取根種之當年就莊若二月種子次年
 乃旺須以架引之
 子酸微苦鹹陰中微陽入手少陰血分酸鹹入肝而補腎辛苦入心而補肺甘入中宮益脾胃
 味厚氣輕乃火熱必用之藥故治嗽以之為君但有外邪者不可驟用恐閉其邪氣必先發散
 而後用之乃良入嗽藥生用
 後撰名に上れは逢坂山のさぬかつら人にしられてくるよしも哉 三條右大臣
 △按五味子朝鮮之產最良中華次之倭亦次之日本處處多有之而紀州田邊之產良藤州廣
 島及日向丹波之產次之其硬似甘草色浸水取粘汁塗髮甚佳俗呼名美軟石名義未詳




蓬蘽

つるさちこ

覆盆 酸蘽
 陰蘽 寒蘽
 割田蘽

俗云豆留以知古

本綱此類蓬蘽覆盆子凡有五種時珍嘗親採以爾雅所列者按之始得其的諸家異說多皆未
 可信也蓋蓬蘽者藤蘽繁衍莖有倒刺逐節生葉葉大如掌狀類小莢葉面青背白厚而有毛六
 七月開小白花就常結實三四十顆成簇生則青黃熟則紫黯微有黑毛狀如熟椹而扁冬月亦
 苗葉不凋
 子甘酸 安五臟益精氣強志倍力久服輕身不老



覆盆子

さちこ


ハワホソツツ

葦音 西國草
 缺盆 畢撈伽
 大麥 葦 掃田
 蘽 烏蘽子
 和名以知古

本綱覆盆子蔓小於蓬蘽亦有鈎刺一枝五葉葉小而面背皆青光薄而無毛開白花四五月實
 成子亦小於蓬蘽而稀疎生則青黃熟則烏赤冬月苗葉凋
 氣味甘平安和五臟溫中補虛益氣力強陰健陽女子食子有子
 蓬蘽覆盆子二物功用大抵相近雖是二物其實一類而二種也一早熟一晚熟兼用無妨

蘽 一名藕田蘽

藕田蘽其蔓小於蓬蘽一枝三葉葉面青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃
 似覆盆而太赤味酸甜可食不藥入用 藕田蘽熟者紅色



樹莓

きいちこ

懸鈎子 木莓
 沿鈎子 箭音
 山莓

俗云木以知古




榼藤子

コツテソツ

かふたうし

象豆 榼子

本綱榼藤子生廣南山林間作藤着樹如通草藤其實三年方熟角如弓袋子若雞卵其外紫黑色微尖大一二寸圓而禰人多剔去肉其殼用作藥懸于腰間貯丹藥經年不壞
仁潘甘 治諸藥毒五痔下血小兒脫肛血痢燒灰存性
平



預知子

チニイソツ

じよらじ

聖知子 聖光子 盍合子 仙沼

本綱預知子諸州皆有之蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七八月有實作房生青熟深紅色每房有子五七枚如見茨子斑褐色光潤如飛蛾今關人極貴重之亦難得相傳取子二枚綴衣領上遇有蠱毒則聞其有聲當預知之故以名之



牽牛子

ケンニウツ

けんごし

あさかは


黑丑 白丑 盍既草 草金鈴 狗耳草 和名阿佐加保

氣味 苦寒 治諸毒殺蟲去皮膚 治一切風補五勞七傷消宿食利小便催生治一切病每日吞二粒永瘳也 其功不可備述

本綱此藥初出田野人牽牛謝藥故名之處處處有之二月種子三月生苗作藤蔓繞牆高者或二三丈七月生花其花不作瓣如鼓子花而大但微赤帶碧色日出開日西萎八月結實外有白皮裏作縷每縷內有子四五枚大如蠶麥有三棱有黑白二種
黑者尤多蔓有白毛斷之有白汁葉有三尖如楓葉

白者 多種之其蔓微紅無毛有柔刺斷之有濃汁藥團有斜尖其花小千黑牽牛花淺碧帶紅色 子苦寒 利大小便除虛腫落胎乃瀉氣之藥也不脹滿不大便秘者不可輕用 秋去黑皮或只取頭末去皮 秋不用亦有半生半熟用者
△按牽牛花寅卯辰三時為盛向日光則萎再不開而余皆開花乃一莖數十花逐日開不經旬皆結實其花有深碧淺碧純白淺紅色四種而紅者希也
朝かほは朝なくにさき替て盛り久しき物にそありける

一種有小牽牛花高三四寸未延蔓不倚架二葉而開花故名二葉牽牛花亦小美也蓋此生瘴地不能長者也復種其子乃如之
有朝顏畫顏夕顏之三品朝顏牽牛畫顏旋花夕顏瓠瓜花皆以其花盛時稱之




旋花

ツニンハア、

ひる かほ
鼓子花。旋菴
純陽草。筋根
天劍草。美艸
續筋根
和名波夜比止
久佐


本綱旋花生于田野甚多。難劬艾治之。又生其根寸截置土。澀澀沙。旬苗生。逐節蔓。延葉如波菜。葉而小。至秋開花。如白牽牛之花。而粉紅色。不作瓣狀。如軍中所吹鼓子。故名之。不結子。其根白色大如筋。一種千葉者。色似粉紅。牡丹謂纏枝牡丹。
莖葉花根微甘滑。益氣利小便。久服續筋骨。合金瘡。
凡藤蔓之屬。象人之筋。所以多治筋病。
旋花根細如筋。△按旋花盛于日午。而且暮萎。故俗對以牽牛花。稱朝顏。此名豈顏。加保。



纏枝牡丹

てんし ぼたん

本綱纏枝牡丹。即旋花之一種。千葉而色粉紅。似牡丹。而生花有牡丹熊度。甚小。纏小屏而開。爛然亦有雅趣。
草本花詩譜云。纏枝牡丹。柔枝倚附。△按纏枝牡丹。未見如此者。有纏線花者。形狀稍似。而花葉大異也。




鐵線花

てつせん

本名未詳

△按鐵線花。二月苗生。於宿根一極三葉。微似芍藥。秋而小。莖細。韌甚。勁故俗曰鐵線。無蔓。其葉乃倚架繁衍。四月開花。草下有六葉。抱莖亦一異也。其花白色。六瓣平開。而葉圓。紫色最飽美。其葉葉統則似天蠶絲。為總其本。有子採之。八月種之。
千葉鐵線。外六瓣白色。如常。而內瓣亦白色。千葉短細。隨開葉青色。外瓣既綻。落則內葉開。



風車草

かざぐるま

本名未詳

小兒所玩之風車
似此花形故名


△按風車草者。鐵線草之類。而葉不同。花亦鐵線。六瓣。是乃八瓣也。葉大於鐵線。而無又一枝三葉。四五月開花。單葉蒼碧。色又有白花。有千葉者。花綻葉亂。形與鐵線之總同。凡鐵線。出葉於葉枝。風車。出葉於舊枝。



のうせんかづら
紫葳
ツウタイ

凌霄 陵苕
陵時 女葳
菱華 武威
霍陵 鬼目
和名末加夜木
一云農世宇

本綱 陵苕 多生山中 人家園圃 亦或栽之 初蔓纒數尺 得木而上 即高數丈 年久者 藤大如杯 春初生 枝一枝 數葉 尖長 有齒 深青色 自夏至秋 開花 一枝十餘 朵大如牽牛 花而頭開五瓣 赭黃色 有細點 詩云 有君之秋 深更赤 八月結莢 如豆 莢長三寸許 其子輕薄 如榆仁 馬兜鈴 仁其根 長亦如兜鈴 根狀其黃矣 花不可近 鼻聞傷腦 花上露入 自令人昏眩 花根甘酸 莖葉帶苦 帶其花 手足厥陰經 藥行血分 能去血中伏火 故治產乳崩漏 諸疾及血熱生風之證也
△按 陵苕 乃字世牟 延蔓于高樹 生故民間鮮




しやうび
牆靡
ツヤンヨイ

薔薇 山棘
牛勒 刺花
牛棘
訓 無波 長又呼
字音
實名 營實

本綱 牆靡 野生林野 間春抽嫩莢 小兒摘去皮刺 食之既長 則成葳 似蔓而莖硬 多刺 小葉尖薄 有細齒 牛喜食之 四五月開花 四出 黃心有白色粉紅 二者以白花者為長 結子成簇 而生如營

星然 故謂之營實 和名無波 生青熟紅 其核有白毛 如金櫻子 核人家栽 玩者莖粗葉大 延長數丈 花亦厚 大有白黃紅紫 數色 百葉 八出 六出者
營實 酸 根 苦 瀉 能入陽明 經 除風 熱 濕 熱 生肌 殺蟲 故癰疽 瘡 癬 古方常用
○小便 失禁 尿床 者 用薔薇根 煮汁 飲 或為末 酒服 野生白花者 更良
○口舌 糜爛 者 用薔薇根 煮汁 溫含 冷則吐 夏用根皮 凡口瘡 日久 延及胸中 生瘡 三年已上 不瘳者 皆效
六狀 我はけさうかにそ見つる花の色をあたなる物といふへかりけり
△按 嫩莢之莢 字當作莢 胡貢 草葉心長也



ぶつげんせう
佛見笑
ぼたんいやら

寶相花

本綱 牆靡之花 最大者 名佛見笑 其小者 名木香 皆香艷 可入藥用
書譜云 寶相花 其花較薔薇 葉大而瓣 塞心有大紅粉 色二種 較字當
△按 佛見笑 俗名牡丹 失其實相 花亦一物 二名矣 正月剪稍枝 植於陰處 濕地 則能活 生最 多而花 艷美 以譬之 女人 華嚴經云 外面似菩薩 內心如夜叉 蓋佛見笑之名 據此 矣凡有棘刺 之草 通稱無波 長俗用 或字 黎之別名



茶藤花

俗云古也乎岐

畫譜云其花大朵色白而香千瓣枝硬多刺詩云開到茶花事盡為當春盡時開耳外有密色一種
△按茶紫花導成八體所言亦同今名古夜乎岐者是乎其花白單瓣狀似花栢櫛之花



ちやうしゆん

月月紅 勝春

開雪紅 瘦客


月季花

俗云長春勝春之訛

ユヱツリイバア、



本綱月季花人家多栽挿之亦當薇類也青莖長蔓硬刺葉小於齒薇而花深紅千葉厚瓣透月開放不結子氣味甘温活血消腫治癩瘰未破者
錢各碎對入大鱈魚腹中就以魚腸封固酒水各一盞煮熱食之即愈魚須安藥水內遊死者方効此是家傳方
△按月季花地薇之類挿之能活有單葉千葉大小數品



玫瑰花

俗云波末奈須

はまなす

畫譜云色黃花稍小於紫玫瑰種紫玫瑰多不久者用入湖澆之即斃種以分根則茂本肥多悴黃亦如之紫者乾可作蠶以糖霜同搗收蠶膾之玫瑰醬各用俱可
△按玫瑰花齒薇之屬一刺多四月開花單瓣有白有紫並花最大又有赤紫而千瓣者其花稍小有香氣但黃花者未見之




繖絲花

阿彌陀鉢

ねらんだいばら

俗云

畫譜云繖絲花儼如玫瑰而色淺紫無香枝生刺針時至寒繖花盡開放亦以根分



棣棠花

萬葉集用山吹字

地棠花

御帶花

也末不木


金盃喜水

單ノ山吹

導生八種及草木花詩譜云棣棠花若金盃一葉一莖生甚延蔓春深與齒瓣同開可助一色單葉者名金碗喜水秘傳花鏡云棣棠花藤本叢生葉如茶靡多尖而小邊如鋸齒三月開花金黃色圓若小珠一葉一莖但繁而不香其比齒瓣更弱心延蔓屏樹間與齒瓣同架可助一色春分剪嫩枝并於肥地則活其本妙在不生蟲勝

△按棣棠花其葉似櫻桃葉而長尖四月開花千瓣深黃單葉者花大其色飽如山吹之黃金故名又有單葉白花者不美橘諸兄公愛之山州井手里宅地多植之公任卿朗詠集用款冬字者誤也款冬未布山語也

夫木也末布越の人の見せはや燒金のこかねの色にさける山ふき 花山院




栝樓仁

くはろうにん ひさこより 果露 瓜萹 天瓜 黃瓜 地樓 澤姑 和名加良須字里 此倭名非也 比左古字里

本綱栝樓仁三四月生苗引藤蔓葉如甜瓜葉而窄作山家小兒亦食其形有正圓者有銳而長者內有扁子大如絲瓜子殼色褐仁色綠多脂作青氣炒乾搗爛水熬取油可點燈其根直下生年久者長數尺皮黃肉白作粉潔白如雪故謂之天花粉秋後掘者有粉一名白藥又名瑞雪栝樓仁甘寒潤肺燥能降上焦之火使痰氣下降治嗽之要藥也且又能洗滌胸膈中垢賦鬱熱為下治消渴之神藥

△按栝樓仁出於紀州者良豫州蘄州並次之



王瓜

からすうり

老鴉瓜。土瓜 馬炮瓜。鉤鹹 赤雹子。野甜瓜 師姑草。公公鬚 和名加良須字里


本綱王瓜生垣墻間三四月生苗其蔓多鬚嫩時可茹葉圓如馬蹄而有尖面青背淡澁而不光六七月開五出小黃花成簇結子纒纒熟時有紅黃二色皮亦粗澁其殼徑寸長二寸許上微圓下尖長七八月熟殼中子如蠶卵頭其根如栝樓根之小者澄粉甚白賦須深掘二三尺乃得正根作蔬食味如山藥月令云四月王瓜生即此也熟則鴉喜食之故名老鴉瓜

根苦寒有小毒治消渴痰血月閉帶下乳汁不下止小便數不禁又能利大小便

小便不通者王瓜根搗汁入少水解之筒吹入下部大便不通者吹入肛門內

黃疸變黑醫所不能治用王瓜根汗平且溫服一小升午刻黃水當從小便出不出再服

△按王瓜葉似栝樓葉但無叉缺有毛刺其實殼中子如玉章者呼曰玉章人誤以為此與栝樓一物和名亦相混者非也蓋栝樓字里古王瓜即老鴉瓜加良須和名自明也




葛

割音

鹿食九草此其一也故名鹿藿
和名久須加豆良

本綱葛有野生有家種其蔓延長一二丈紫色取治可作縮絡其葉有三尖如楸葉而小面青背淡七月着花其花成穗葉相綴紅紫色其莢如小豆莢亦有毛其子綠色扁扁如鹽梅子核生嚼腥氣其根外紫內白長者七八尺者頭也服之令人吐有微毒故以入土深者為佳今人多作粉食冬月取生葛搗爛入水中揉出粉澄成塊入沸湯中良久色如膠其體甚韌以蜜拌食音忍與韌同
葛根味甘辛平氣輕而上行浮而微降陽中陰也其用有四止渴一解酒二發散表邪三發瘡疹難出四陽明經藥兼入脾經治傷寒有葛根湯以其主大熱解也若太陽初病未入陽明而頭痛者不可便服升麻葛根湯之是反引邪氣入陽明為引賊破家
凡痲痘已見紅點不可用升麻葛根湯增毒反中諸藥毒發狂煩悶吐下欲死者葛根湯汁服佳
葛花甘平消酒同小豆花乾末酒服飲酒不醉也
新古今葛のはの根に歸る夢の世を忘れかたみの野への秋風 俊成女
△按葛蔓長者二三丈其葉韌薄微似于楮葉而面青背白至風則能翻恰如反掌婆娑而作聲

故稱歌人葛葉裏見譬人恨其蔓青黑色有微毛強韌不可截斷本草綱目謂紫色者乃枯蒼色也以堪縛器物
葛根出於和州金剛山者良丹波次之葛粉吉野為最上西國亦多有之春月取根搗爛漬水一宿以白漚為上其次灰白色者名布野人充食澆如絲瓜皮以代薪凡此物葉及蔓至根其用居多為民利用




黃環

わうくわん

凌泉 大就
就葛 生蜀
根韭
實名狼跋子
又名度穀


本綱黃環亦葛之類生山谷二月生苗正赤高二尺作藤生葉黃而圓端大經日葉有汁黃白其花紫色其子名狼跋子似之故名其根名黃環黃色從理如車輻解
氣味小苦寒有治鬼魅百邪痰嗽利小便消水腫



天門冬

てんもんとう
すまろ草
萬歲藤
和名須未呂久佐

△按何首烏狀如小瓜有五路紋而有三四相連者今所渡者多切片正黑不能辨其赤白此用黑豆蒸製者矣倭稱何首烏者黃獨而非何首烏其黃獨滑菜根罷多其子如零餘子而畧大然則根葉子形狀甚異入藥宜用唐何首烏也本草彙言曰何首烏固精氣截瘡止痢之藥也延年種子之說屬荒唐歷有服此而後至死而人不識此藥之毒也蓋此言亦偏也何首烏乃薯蕷之屬本不有毒類然深山自然生歷數年唯雄夜交鬣者謂有奇効則不擇雌雄老嫩而何有効况黃獨乎




ひから
どころ
草薺
赤節 百枝
竹木 白菝蕪
和名土古呂
野老 漢語抄用
宅延喜式用之
宅恐此和字矣

本綱草薺處處皆有之作蔓生苗葉俱青葉作三又似山薯又似綠豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者根黃白色多節三指許大又有根亦如山薯而體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜者根苦平足陽明厥陰經藥也厥陰主筋骨屬風濕蕪之功長于去風濕所以能治緩弱瘰癧瘰癧濁惡瘡諸病之屬風濕者草薺菝蕪土茯苓三物形雖不同而主治之功不相遠之使畏蕪根前胡


△按草薺蔓葉頗似薯蕷開小白花結青子三稜其根類老薑薯蕷之狀最肥者如甘藷而黃色有節多長鬚俗以爲野老以鹹爲海老其充嘉祝之食品出於武陽者肥大肉柔味苦甘相半煮之食甚佳也山中自然生者肉瘠味甚苦呼曰鬼野老豫州今治蕪州廣島多出草薺可藥入用○草薺黃獨佛掌諸薯蕷之蔓葉相似難辨各圖于左

草薺




黃獨

訛云何首烏



佛掌薯



薯蕷



唐何首烏亦似

△按草薺葉小黃獨葉大相似而色淺潤橫文理鮮明
佛手薯葉圓薯蕷葉長其色稍深不潤橫文理幽微薯蕷無橫文附梁之處深入背




はつヒウ
まびついでら
菝蕪 金剛根
王瓜草 瓊菱角
和名佐流止里
一云於保字波良
俗云惠比豆伊波良
又云五郎四郎柴

菝蕪

ハツキイ

本綱菝蕪山野中甚多其莖似蔓而堅強植生有刺其莖圓大狀如馬蹄光澤似柿葉秋開黃花結紅子其根甚硬有硬鬚如刺其葉煎飲酸澆或采其根葉入藥家用
根甘酸溫性足厥陰少陰藥治腰背寒痛風痺與草薺彷彿又治時疾瘧瘧故元且所飲辟邪屠蘇酒中亦用
△按菝蕪和河二州山中多出之俗以爲倭山飯來西國野人用葉包麥餅呼曰五郎四郎柴



土茯苓

仙遺糧。刺猪苓
冷飯團。土草解
硬飯。草馬餘糧
山猪糞。山地粟
俗云山歸來
又云加天草

本綱土茯苓生山谷。蔓生如葦。莖有細點。其葉不對。狀類大竹。葉而質厚滑。如瑞香。葉而長五寸。其根狀如菝葜。而圓。其大若雞鴨子。連綴而生。透者離尺許。近或數寸。其肉軟。可生啖。有赤白二種。入藥用白者。良。昔人不知。用此。近時弘治正德間。年。因楊梅瘡盛行。自廣東人始。率用輕粉藥。取效。毒留筋骨。潰爛終身。後人用此。遂為要藥。諸醫無從考證。往往以菝葜及菝葜與土同蓋。此亦菝葜菝葜之類也。


根 甘淡 食之當穀。不飢。調中。健行。不睡。健脾胃。強筋骨。去風濕。止泄瀉。治拘攣。骨痛。惡瘡。解赤粉毒。及鐵器。按土茯苓。阿媽港之產。為最上。皮薄。外色淺赤。內白。如今以廣東者為上。交趾。東京。並次之。太寬。為下。但色白。柔輕。虛者。良。色赤。堅重。實者。不可。凡楊梅瘡。盛行也。於今。凡不過二百年。市中好淫。人交濁。陰。彼此傳染。焉古者罕識。其治療。而肢體拘攣。終至眼鼻腐爛。故如有患之者。則不同。器巾。其重者。或棄於山野。近來多服。土茯苓。用使病人。自山歸。來。實良藥也。其方有數品。總名歸建方。中得效驗者。以為家秘。凡土茯苓。為君。羌活。木通。杜仲。黃連。薤白。芍藥。之輩。為佐。但服之。有時瘡既出。盡結。痂。將愈。時宜用之。永免癩痛之患。如瘡未出。盡時。不可服之。服藥。問忌。浴湯。及凡。瘡。小。如。麻。瘡。者。一。二。箇。月。而。結。痂。謂。之。四十日。物。稍。重。者。日。八。十。日。物。瘡。平。圓。如。灸。瘡。隆。或。堆。大。如。楊。梅。者。即。楊。梅。瘡。俗。云。不。經。半。年。不。痂。其。間。無。雜。病。者。必。不。服。藥。最。忌。補。藥。恐。令。瘡。毒。補。住。如。年。久。餘。毒。留。滯。一。處。腐。爛。或。為。穴。者。宜。用。五。寶。丹。方。出。萬。春。



白蕪

白草 白根
兔核 豈崙
貓兒卵
和名夜末加々美

本綱白蕪二月生苗。多在林中。作蔓。赤莖。枝端有五葉。其葉如小桑。五月開花。七月結實。根如雞鴨卵。而長三五枚。同一窠。皮黑。肉白。惟治瘡方多用之。故名白蕪。一種赤蕪。花實功用皆同。但表裏俱赤。爾。白蕪根苦平。治癰疽。發背。癩瘡。痔漏。血痢。刀箭瘡。生肌。止痛。生取根。搗。傳。癰。腫。有。效。按白蕪本朝古者有之。今則無焉。長而色白。輕者為良。本草用蕪字。疑此。傳寫誤矣。蕪音。欲。音。耐。也。收音廉也。



豬魁

和名為乃止止木
既有倭名則本朝
古者有之乎


本綱赭魁蔓生草木上葉似杜衡根腐黑肌赤形如魁器又似何首烏切破中有赤理如檳榔有汁赤如赭味甘治心腹積聚聞人用入染青甌中云易上色或以染皮製靴



がほう
まめ つら
鵝抱
エウバウ

俗云末女古介

本綱鵝抱生山林中附石而生作蔓似大豆其根形似葉腹大者如三升器小者如拳二八月采根切片陰乾氣味苦寒治風熱上壅咽喉腫痛
△按鵝抱葉圓扁徑三分許裁之鹽鉢石傍則延蔓一面蔽石如撒數青豆其根最細小所謂如葉腹者未見




きうせんし
九仙子
キウスエンツウ

仙女嬌


本綱九仙子出均州大和山二月生苗蔓高六七尺莖細而光葉如烏柏葉而短扁不圓每葉極生子枝或一或二鳥島下垂六七月開碎青黃色花隨即結實碎子叢簇如穀精草子狀其根連

綴九枚大者如雞子小者如半夏白色氣味苦涼治咽痛喉癢散血磨汁含噉甚良




わうやくし
大苦 木藥子
赤藥 紅藥子
黄藥子
ハアンヨツウ

本綱黃藥子原出嶺南今處處栽之以忠州萬州者為勝莖高二三尺柔而有節節有枝相當似藤非藤葉大如拳長三寸許其根長者尺許大者圍二三寸外稠內黃亦有黃赤色者肉色頗似羊蹄根人皆搗其根入染藍甌中云易變色也
黃藥子根苦平涼血降火消癭凡吐衄不止者水煎服或與蒲黃等分為末掌中紙之又治馬疾



さんづこん
解毒 黃結
山豆根
中藥
サンテウケン




あかね
スエイツァツ

菝音 風車草
茹慮 血見愁
地血 過山龍
茅蒐 染緋草
牛蒡 和名阿加彌

本綱茜有東方少不如西方多故為西說文所謂人血所化之說恐亦俗傳耳詩云茹慮在阪者是也生山谷今國人亦作畦種時十二月生苗蔓延數尺方莖中空有筋外有細刺數寸一節每節五葉葉如鳥藥葉而糙澀面青背綠七八月開花結實如小椒大中有細子根紫赤色北即今藥者微酸而手足厥陰血分之藥專干行血活血女子經水不通以一兩煎酒服之一日即通甚効勿犯氣


△按茜赤根也河州石川郡山田茜為上可以染絳近世用蘇方木代茜



ハライ
あをかつら
防己

解離 石解
和名阿乎加豆良

本綱防己莖如葛蔓延其根外白內黃如桔梗內有黑紋如車輻解者長但漢中出者破之文作車輻解黃實而香莖甚嫩苗葉小類牽牛折其莖一頭吹之氣從中貫如木通然他處者青白虛軟又有腥氣皮皺上有下足子名木防己地別漢木二物一曰漢木二防己即是根苗為名治風用木防己治水用漢防己紫莖云漢防己即根破之紋作車木防己即苗皮皺上有下足子青白氣味苦辛療風水要藥利大小便能瀉血中濕熱通其滯塞大抵上焦濕熱者皆不可用下焦濕熱流入十二經致二陰不通者然後審而用之




もくつう
あけびかつら
木通

通草 萬年藤
附支 丁翁
子名燕覆

本綱木通藤生蔓大如指其莖幹大者徑三寸一枝五葉頗類石草又似芍藥二葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小瓜食之甘美其枝謂之木通莖有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭者良紫者皮厚味辛肺治頭痛利九竅下能濕熱利小便通大腸治遍身拘病利其小便也與琥珀同功無他藥可比者

山家 ますらをか妻木にあげひ持添てくるれば歸る大原の里 寂然
△木通自華所渡者有香氣佳倭之產出於丹波者長藝州者次之




根

つうだもく
通草 活菴
離南

トントツモツ

本綱通脫木蔓生山側莖大者圍數寸高丈許大葉似荷而肥其莖空心中有顯輕白可愛愛女人
取以飾物今園圃亦有種時者或作蜜煎充果食之甘美
氣味甘淡 入心太陰肺經引熱下利小便便與心同功入陽明胃經通氣上達而下乳汁催生
△按通脫木者木通之屬而大者如燈心草莖中有白顯木朝未會有之莖草也



てふとろ
吊藤
ふちどりはり

テヤウテエン


俗云布知止里
波利

本綱釣藤處處山中皆有之藤長八九尺或一二丈大如指其中空狀如葡萄藤長其莖間有
刺若鈎鈎紫色療小兒不入餘方也以莖中空小人用致酒甕中盜取酒以氣吸之涓涓不斷

氣味初微甘 古方多用皮后世多用鈎取其力銳爾手足厥陰藥手足厥陰主火小兒驚癇眩暈
皆肝後微苦火之病鈎藤通心包平肝木風靜火息則諸證自除
一種有倒掛藤 生深山有逆刺如懸鈎倒掛于樹葉尖而長治產後諸疾結痛血上欲死煮汁
服之
△按釣藤出於豐州中津者長藝州廣島者次之

せつかかう

雪下紅



草木花詩譜云其藤生子類珠大若交實色紅如日 榮榮下垂積雪盈夥似更有致故名雪下紅

ひよどりじやう

穀菜 白草

白幕 排風

子名鬼目

和名保曾之

白英

ほそし

ベッイン


一云豆久美乃伊比爾

今云鴨上戸



本綱白英蔓生正月生苗白色可食秋開小白花葉似王瓜小長而五稜子圓如龍葵子生青熟紫赤色根苗甘寒補中益氣治消渴黃疸

子酸平明目△按白英葉似菊葉而柔大深叉七月開小白花五瓣抱子翻外有飛鳥之狀其子赤熟時鴨喜啄之故俗曰鴨上戶亦謂鴨嗜之故曰鴨手然鴨不嗜如鴨之類




いしみかは
うしのはなつら
赤赤茹 五葺
五毒草 蛇蟻
山蕎麥
以之美加波
又云牛紫

本綱赤地利所在皆有春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥葉七月開白花亦似蕎麥結實青色根若菝葜皮紫赤肉黃赤八月采根

根苦平治赤白痢赤白帶下癰疽惡瘡生肌肉

△按赤地利作蔓莖赤葉青似蕎麥葉長別貫莖小圓葉如輪夏開小白花結一子於小葉中熟碧色莖及葉背筋有細刺其根如桔梗薺之輩所謂如菝葜根倭方用赤地利莖葉為折傷金瘡要藥此與菝葜接骨如膠故名石膠美加波者仁一種有田蕎麥又云溝其葉零似赤地利故以之偽




あびかつら
ツウカン
紫葛
和名衣比加豆良
蒲萄亦和名同

本綱紫葛生山谷中春生冬枯苗似蒲萄長丈許根皮肉俱紫色其根大者徑二三寸但有二種此是藤生者

根皮甘苦治癰腫惡瘡和封之金瘡傷損生肌散血用紫葛一兩水三盞煎一

△按紫葛葉似蒲萄而不結子又一種有野蒲萄者出于鹹果類下



むぐら
勒草葛勒蔓
來菴草
和名毛久良
俗云無久良
毛與無通

本綱猪殃殃生山谷中春生冬枯苗似蒲萄長丈許根皮肉俱紫色其根大者徑二三寸但有二種此是藤生者

氣味甘苦主癰腫血止精氣利小便治五淋治久病成疔未入肛門中

万葉 玉しける家も何せん八重葎はへたる宿も妹としすまは


猪殃殃 救荒本草云猪殃殃生山野道傍猪食之則病故名之入春時采莖葉煮食之

△按稱無久良者多而葎草少有之猪殃殃多有之葎草生水溝傍見于濕草部



しらんくさ
羊桃
鬼桃 羊腸
長楚 銚苳
細子
倭名伊良久佐

本綱羊桃生山林及田野莖大如指似樹而弱如蔓春長嫩條柔軟葉大如掌上緣下白有毛狀似麻而圓其條浸水有涎滑花紫赤色似桃花子細如棗核其根似牡丹近下根刀切其皮看熱灰中脫之可顯筆管其子苦不堪食詩云隔有蔓楚者即是也莖根苦寒利小便又煮汁洗風痒及諸瘡腫極効



烏歛苳

つた
ウウレンモウ

拔音五葉苳
龍草 龍葛
赤葛 五瓜龍
赤澄藤
俗云豆太

本綱烏歛垂莖間多其藤柔而有稜一枝一賢凡五葉葉長而光有疎齒面青背淡如白蘇葉名歛七八月結苞成簇青白色花大如粟黃色四出結實大如龍葵子生青熟紫內有細子其根白色大者如指長一二尺擣之多涎滑氣味酸苦治癰瘡及蟲咬搗根傳之




絡石

てしりかつら
ロツソ

石鯨 應石
耐冬 雲花
雲丹 雲英
石血 雲珠
石龍藤

本綱絡石生陰濕處冬夏常青其莖折之有白汁其莖蔓延繞樹石側莖節着處即生根鬚包絡石旁其葉小千指頭厚實木強而青背淡漚而不光有尖葉圓葉二種若在石間者葉細厚而圓短澁樹生者葉大而薄人家亦種之為飾

莖葉甘微 神農列之上品治筋骨關節風熱癰腫不老延年通神又刀斧傷瘡傳之立處瘰使仲壯母丹為之今醫家鮮知用者豈以其近賤而忽之耶
△按絡石和名俗云定家葛相傳黃門定家卿之古墳石生因名之葉似菘柑葉而無刻齒無花實又莖白汁無



木蓮

きはちす
モッレン

藤茄 木饅頭
鬼饅頭

本綱木蓮延樹木垣墻而生四時不凋厚葉堅強大干絡石不花而實其實大如盃微似蓮蓬而稍長正如無花果之生者六七月實內空而紅八月後則滿腹細子大如椰子一子一瓣其味微瀾其殼虛輕鳥鳥童兒皆食之 藥酸平治背癢下利即愈又治血淋痛瀉酒用木蓮四十九個搗去毛研細下乳止血治腸風下血治一切癰疽初起不問發於何處酒解開溫服功與忍冬草相上




地錦

ふゆかれせぬつた
ダイキン

地嚙
別石草類有
地錦草與此
不同

本綱地錦生林下葉如鴨掌藤蔓着地節處有根亦緣樹石冬月不死氣味甘溫治產後血結及赤白帶下或有塊不能飲食者並煎服



常春藤

トヤウシゆんとう

龍麟薜荔
土鼓藤

本綱常春藤生林薄間作蔓繞草木上其葉頭尖結實正圓熟時如珠碧色小兒取其藤於地打作鼓聲故名土鼓葉苦子甘溫癰疽初起研汁和酒服利下惡物去其根本

あまぢや

藥蕪 芭瓜

倭名阿末豆瓦


千歲藥

俗云甜茶

ツニンスイルイ



本綱千歲藥蔓延木上葉如葡萄而小四月摘其莖汁白而味甘五月開花七月結實八月采子青黑微赤冬惟凋葉春夏間取汁用葉甘平補五臟益氣續筋骨長肌肉久服不飢通神明
△按千歲藥代茶煮吃味甚甘故俗名甜茶如小兒多吃則發蟲
一種樹生之甘茶葉似萩而深綠色似茶而嫩味甚甘出於山州宇治田原



忍冬

ツント

金銀藤 老翁藤
驚蕪藤 驚蕪藤
左纏藤 通靈草
金釵股 蜜桶藤
和名 須比加豆長

本綱忍冬附樹延蔓莖微紫色對節生葉葉似薜荔而青有潘毛三四月開花長寸許一帶兩花二瓣一大一小如半邊狀長葉花初開者葉瓣俱白色經三三日則色變黃新舊相參黃白相映故呼為金銀藤氣甚芬芳其藤左纏凌冬不凋故有忍冬左纏等之名以花為金銀花
忍冬甘小 煮汁釀酒飲補虛療風益壽可常服而仙經少用凡易得之草人多不肖為之更求難得者貴遠賤近庸人之情也昔人稱其治風除脹解痢為要藥而後世不復知用後世稱其消腫散毒治瘡為要藥而昔人並未言及乃知古今之理萬變不同未可一轍論也
功用皆同

忍冬酒

用藥入沙盆研爛入生餅酒少許稀稠得所塗于四圍中留一口視氣其藤只用五兩木糖
損不可大甘草節生用一兩同入沙瓶內以水二盞文武火慢煎至一盞入無灰酒一大盞再煎
十數沸去滓分為三服一日一夜喫盡病動重者一至大小腸通利則藥力到能治癰疽發背
不問發在何處發眉發頤或頭或頂或服之俟其疽破仍以神異膏貼之其效甚妙
背或腰或脇或乳或手足皆有奇效也
△按忍冬處處皆有之攝州之產良其忍冬酒紀州弱山源二郎太夫之製得名但欲為藥用者若本草製而可矣



玉蔓

たまかづら

△按玉蔓其蔓引地葉似忍冬葉而厚春開小花青色青綠可愛

たまかけさう

俗稱本字未詳



鈴掛草

△按鈴掛草引蔓其葉似櫻而圓小夏秋葉間著花紫色而圓零似千日紅之花

てんせんどう

天仙藤

てんせんどう



本綱天仙藤生浙江山中春生苗蔓作藤葉似葛葉圓而小有白毛四時不凋根有鬚夏月采取根苗南人多用之氣味苦溫同麻黃治傷寒發汗同大黃鹽治得安胎藥治子癇症又治癩
△按天仙藤本草無開花之說然三才圖會所圖者有花

ふうとうかつら

風藤 石南藤

南藤

ナンテン

丁父 丁公藤 丁公奇

俗云風藤蔓



本綱南藤諸大山有之細藤圓膩紫綠色一節一葉葉深綠色似杏葉而微短厚其莖貼樹處有小葉癰疣中有小孔四時不凋莖葉皆臭而極辣白花蛇食其葉
氣味辛溫 治金瘡痛去風邪強腰脚除痺
△按南藤能治諸風故有風藤之名乎今痿痺癱瘓人用為洗藥痘後手足腫痛者用風藤煎汁搨洗有效


どう

赤藤 紅藤

省藤

スエントエン

俗云登字 止呼藤一字音為名




本綱省藤生南方深山皮赤大如指堪縛物片片自解也或織草履氣味苦平治蛇蟲通五淋糞痢狗去癩

科藤

音科

明張雙東西洋考云藤藤蔓抽被地無枝葉有皮表其外如竹皮刺之則落長數丈不值薪伐可練繞數國齊民要術云科藤圍數寸重於作可以代篋以縛船及以為席勝竹也
△按省藤藤藤恐此一物矣凡如東埔寨太泥六甲暹羅咬啣吧番且南方多出藤及藤廷今所來藤皆無外皮黃白色滑堅大如箭竹纏被之刮白肉以縛卷器物其用最多今用其白肉入淋病藥中



紫藤

招豆藤 和名布知 止用藤一字訓為名

フチ ツウテン

本綱紫藤藤皮着樹從心重重有皮四月生紫花可愛長安人亦種飾庭也其子作角角中仁熟香着酒中令酒不敗敗酒中用之亦正其花採碎拭酒醋白腐爛氣味甘微溫煎如糖服下水後病心即愈

△按紫藤花朶二三尺纏樹垂架最麗美邇州野田藤得其名蓋冬月酒糟汁及米泔汁澆根則茂盛
又有白藤 蔓葉皆無異唯花白耳 凡種藤花於水最易萎澁酒於其本莖則歷時不凋




藤黃

沙黃 臘黃 俗云喜和字

きわう テンハン

本綱藤黃出岳州鄂州諸山崖樹名海藤花有藥散落石上彼人收之謂之沙黃就樹采者經妙謂之臘黃此與石淚盡家及丹竈家時用之
又真臘國有盡黃乃樹脂彼人以刀斫樹枝滴下次年收之不知即右與一物否也今盡家所用藤黃皆經煎煉成者紙之麻人
△按藤黃今盡家漆工以塗黃色又堂塔塗漆樹是也



谷藤

俗稱本字 未詳

たに ふち


△按谷藤蔓草也葉似小梅葉而圓三月葉間開花似紫藤花一種有岩藤即此花也詳干毒草類



羅生門

俗稱 本名未詳


△按羅生門蔓草也葉似胡麻葉而短三月葉間開小花深青紺色



項王草

俗稱 本字未詳


△按項王草葉似黃波丁子葉開單黃花結小莢宿根不生當年下種即開花自四月至十月有花出於漏草



留紅草

俗稱 本字未詳


△按留紅草細莖勒葉細密如衫襖而表裏淺青色莖所出莖八月枝又抽短莖開花形如丁子樣而紅色長六七分可愛花體結角中有細子



千里及

せんりきう

本綱千里及生天台山又筠州有生淺山及路旁葉似菊而長背有毛枝幹圓而青春生苗秋有黃花不結實采莖葉入眼藥



粘魚鬚

ねんぎよひん

龍鬚菜

農政全書云粘魚鬚生山野中初先發筍其後延蔓生莖發葉每葉間皆分出一小又及出一絲莖葉似土苗葉大而大又似金剛刺葉而光澤味甘




きうびんそう

牛尾菜

全云牛尾菜生山野間苗高二三尺葉似粘魚鱗葉葉間分生又枝及出二細絲蔓又似金剛刺葉而小紋脈皆堅莖葉稍間開白花結子黑色其葉甘採嫩葉燻熱水浸淘淨油鹽調食

くとうひ

狗掉尾草



農政全書云狗掉尾草生山中苗長二三尺抱蔓而生莖方青色其葉似歪頭菜葉稍大而尖艸色深綠紋脈微多稍間開五瓣小白花實心衆花攢開其形如穗葉微酸採嫩葉燻熱去酸味油鹽調食

やもつくは

八月櫃、梓瓜


野木瓜




農政全書云野木瓜生山野中蔓延而生葉附草木上葉似黑豆葉微小光澤四五葉攢生一處結瓜如肥皂大味甜熟者可摘食

すいごろ

水胡蘆



農政全書云水胡蘆生水邊就地抱蔓而生每節間開四葉而葉如指頂大其葉尖上首作三叉又味甘採嫩葉連葉燻油鹽調食



落花生

らしくはせし

番豆 土露子

滴水生

長生果

致富全書云落花生藤蔓莖葉似扁豆開花落地一花就地結一果其形與香積相似亦二月內種之喜鬆土用隔年肥灰塗宜栽背陰處秋盡冬初取之煮食味甚甘美人所珍貴若未經霜則苦難入口

△按落花生近年來于長崎形似蠶豆而零斜歪大寸余皮灰白色文理堆繁剝皮中有三四子褐色形味共似胡桃海松子等香美試雖數百粒種難生

