

天  
17  
虛  
我  
生  
重  
刊

梅氏驗方新編

西湖甲蘭題





天虛祿生重刊

(第二集)

梅氏驗方新編

西湖伊蒲題



商  
標



註  
冊

牌 角 三

寶 馬 真

斑一症病治主

▲常備三服 可應急需▼

功效千真萬確

每	輕	癱	驚	吐	肝	文
服	症	瘓	恐	血	旺	武
一	三	反	不	使	痰	癲
分	服	胃	甯	血	盛	狂
國	即	均	急	痰	咳	猪
幣	可	有	性	迷	嗽	羊
一	全	奇	驚	中	氣	癩
元	愈	效	風	風	喘	瘋

▲逢人介紹 功德無量▼

藥力王道無比

◀寄即索承錄驗實效功▶

行發社業實友三海上



手部

●手指上一切疔瘡 初起未成者用古泥牆上半中間小將草草葉根者任搗爛敷之即消 如已成者宜用小刀或磁鋒將瘡頭刺破即用猪胆壹個將胆柄剪去胆汁傾去壹半加雄黃貳分炙蜈蚣研末壹分黃靈三仙丹五分共研勻入胆內攪勻套指上紫根數日即愈

●螃蟹散 治手指縫腫痛不可忍或大指次指中間生毒名虎口毒若不早治即爛入手 用鮮活螃蟹搗爛敷上即愈 如無鮮者以蟹黃蜜調塗之愈後戒食蟹

●手指生蛇頭疔 用小泥鰕壹條搗爛敷之立愈

●手生舌頭毒 用蜒蛭研爛如醬搽壹日夜即愈

●指上生疔瘡 俗名天蛇頭 用雄黃七分 白芷叁分 共研細末入雄猪胆內

調勻將指套入猪胆內以線紮之自愈 先將猪胆剪去蓋將胆汁傾去壹半方好入藥調勻套指如壹次不能全消再換壹個以愈為度

●手生天蛇頭方 元參五錢 甘草叁分共研細末用雞蛋白調搽立效

●天蛇頭生在指尖者 用猪胆壹個入雄黃叁分攪勻套指上縛貳叁時即愈 (

又方) 生鴨蛋貳個 蜈蚣壹條焙研末以壹半入鴨蛋內攪勻套指上俟蛋熟再用壹

半入蜈蚣末壹半再套指上即消 (又方) 大蜈蚣壹條晒乾為末紙捲為摺點燃吹熄

以烟薰指叁四次即痛止瘡消真奇方也

●手指紅腫作痛 俗名泥鰍肚 用酒調石灰敷之乾則再換數易即愈

●手指手掌受寒濕作痛 桂枝叁錢 真五加皮叁錢 當歸叁錢 白芷壹錢

木通貳錢 麻根貳兩 用猪前脚煮藥連湯食之即愈右手痛用右前脚 左手痛用左

前脚

●手指砍斷 真降香研極細末糝之包以絲綿壹次即痊惟七日不可落水不可冒

風慎之慎之

●手生叉指 大指貳指間為虎口又名叉指 取石灰內未曾燒化過之石子 和

生蜜在粗石上椎融敷患處即愈

●手掌心生毒 手心忽腫突成疽晝夜疼痛非常名曰掌疽又名托盤用 元參

銀花各貳兩 生地 當歸各壹兩 紫花地丁五錢 貝母貳錢 水煎服未潰者叁服

即愈已潰者八服收功 (又方) 用水藻如松毛者同生蜜搗爛塗之亦效

●穿掌毒 生手心中 新桑葉搗爛塗之即愈愈後戒食鵝肉為要

●手足疼痛及無名腫毒初起 用草烏叁五個醋磨塗之 或生南星磨塗亦妙

●手臂出血不止 有人右臂毛竅如針孔晝夜出血不止面色潔白身倦無氣用穿

山甲炒珠研為細粉罩之用帕紮住立止隨服補血湯數服而愈

●鵝掌風癬 手掌脫皮血肉外露 用豆腐熱沫洗之洗後拭乾塗以桐油再用松

毛燒煙薰之愈後戒食鵝肉 (又方) 用密陀僧壹兩為末取初出籠熱饅頭壹個分為

兩開將末撒在饅內合住以兩手把握饅頭使熱氣薰蒸良久不過叁肆次即愈 (又方)

用青鹽 防風 地骨皮 槐條 各等分煎水多洗極效 (又方) 用蒼耳子仁為

末將痂起去香油調搽神效並治牛皮癬 (又方) 真斬艾四五兩煎水入大口瓦瓶口

上用粗麻布數層蓋口縛住將手心放瓶口麻布上薰之待溫以手洗浸如冷再熱再薰再

洗奇效 (又方) 雄黃 甲片火燒薰之數次自愈此呂祖乩傳之方 (又方) 艾葉

側柏葉煎湯薰洗壹月即愈 (又方) 用豆腐泔水洗手壹月即愈 (又方) 雄黃

甲片 五倍子去蟲 各五錢研細 斬艾四兩 藥和艾葉放瓦瓶內將火燒烟薰之

立軟 (又方) 治鵝掌風並面癬諸癬天麻葉煮濃汁熱洗多擦之如無葉即用天麻子

煮汁亦效 (又方) 五倍子研末桐油調搽以炭火烘之

●指甲潰爛名代指 黃蠟 松香溶和作筒籠指頭上久之自愈

●指頭腫毒痛甚 烏梅肉和魚鮓搗爛封之極效

●手足麻木不知痛癢 取霜降後桑葉煎湯頻洗有效

●手指掣痛 醬清和蜜溫熱浸之痛乃止

●手足腫痛欲斷 蒼耳搗汁漬之並以渣敷上立效 春用芽冬用子

●治手足痛風方 黃芪 當歸 秦艽 等分浸酒飲之有效

●風寒洗藥方 治感受風寒手足臂腿疼痛麻木並偏墜等症槐條四兩 花椒貳

兩 透骨草壹兩 一枝蒿壹兩 木瓜壹個 連鬚葱頭貳拾個 蒜瓣子半挂 以上

七味共熬水燙洗洗過仍將原水留着再熱再洗如水少再添一日可洗兩叁次壹料可用

數日以愈為度

●治風濕臂痛 桑枝壹大把切碎水叁升煎貳升壹日服盡 許叔微常患臂痛諸

藥不效服此方數劑即愈相按此方頗效以東向之稍為良功能直達指尖

●手足裂縫 瀝青貳兩 黃蠟壹兩熬膏敷之 (又方) 牛骨髓不拘多少 五

梛子炙研末搗和填入縫內即合 (又方) 頭髮壹大握桐油壹碗於瓦器內熬候油沸

頭髮溶爛出火以瓦器收貯不令灰入每用百沸泡洗裂處令軟拭乾敷之即愈 (又方)

五梛子 牛鼻繩共研末填縫內即合相按無敵牌蛤壳油填裂縫甚效

●手足凍裂 用蘿蔔菜橘皮煎湯先洗 再用蟹殼燒灰研末和麻油調敷 (又

方) 蘿蔔略剉空貯滿柏油火上熬透冷搽 (又方) 冬瓜皮 茄子根 煎水洗之

(又方) 鴿子屎煎水洗之

●手足諸病 手心足心突腫乃風也用川椒食鹽等分研末醋和敷之治手指甲頭

腫用烏梅槌碎去核去肉只取仁研爛米醋調敷雖潰亦愈 又治指縫搔癢成瘡有竅出

血不止用多年糞桶篾燒灰敷之

●手足閃拗 生姜葱白搗爛用燒酒和麵炒熟厚敷之

●手足酸痛微腫 芝麻研熬壹升 酒五升浸壹宿隨意飲之 又手掌及指層皮

剝落血肉外露痛癢不堪即鵝掌風用豆腐沫乘熱多洗數次即效

乳部

●治乳不通 絲瓜連子燒存性研末酒冲服壹貳錢蓋被取汗即通

●乳癰初起 芙蓉根切碎用酒煎盡量飲之即消

●專治乳癰乳疽乳中結核內外吹乳腫脹等症真乳症之至寶丹也修合濟人功莫

大焉 鮮石首魚脊翅炙研淨末五十兩 小青皮晒脆磨末壹百兩貳味細末共和勻用

米飲湯泛為丸如梧子大磁瓶收貯每服叁錢葱白頭大壹個小叁個 陳酒送下酒隨量飲



醉臥蓋被出汗即愈避風為要 初起未成者壹服即消已成者服之內消外潰倘未潰壹連叁服無不潰者如已潰服之內消餘毒腫塊症重者外用丹藥拔毒去腐體虛者內服參耆補托氣血之劑自然膿腐易去新肉漸生 桐按石首魚甬人稱為黃魚杭人稱為江魚

●積乳成癰良方 土牛膝根酒煎服極效 (又方) 鮮蒲公英連根搗爛取汁沖

酒服以渣敷患處即愈如無鮮者即以乾蒲公英用酒煎服並治乳癰亦神效

●內外乳吹未潰方 穿山甲酒炙黃脆壹錢五分 蟬退麻油炒透新瓦上炙燥四

分半共為末分作四服酒調下叁服必愈

●治乳癰乳癖 活蟹壹隻搗爛沖黃酒服即消 (又方) 舊木梳上垢膩刮下糝

膏上貼之即止痛

●治乳癰 葱白壹觔搗爛取汁以陳黃酒分貳次沖服外用麥芽壹兩蝦醬少許同

煎湯洗并用舊梳時時梳之

●治產母乳癰神驗方 生小米半杯無小米用菜豆紹興酒壹杯本地黃酒亦可令

患者坐住房門檻上面朝裏左手執米杯右手執酒杯以酒送米入口畢半日疼止腫漸消

平復如常屢驗 (又方) 用全瓜萋壹個煨灰末黃酒沖服即愈

●治乳癖 當歸棟極大者 生地 金銀花 蒲公英各壹兩 右藥用黃酒壹鍾

半水壹鐘半沙鍋內煎好食後服被蓋煖令出汗仍以藥渣敷乳上即愈（又方）白戟

魚膠壹個於瓦上炙灰存性研細沖入熟老酒內送下重者更服壹個此方每試必效（

又方）宣木瓜 鈎藤鈎 橘核以上叁味焙燥研末用黃酒調服自愈（又方）香

附末壹兩 麝香叁分 和研蒲公英叁兩酒煎服渣敷患處或以瓜萋壹個酒煎服亦消

●治乳癬初起 漏蘆 木通 川貝各五錢 甘草貳錢 以上四味用水酒各壹

碗煎服之立消（又方）用巴豆壹粒 細辛壹錢五分 以上貳味焙研用稀絹包縛

紮塞鼻孔壹周時即消（又方）生半夏壹粒塞鼻中壹宿即消癬生左乳塞右鼻癬生

右乳塞左鼻

●治乳巖 此病先因乳中壹粒大如豆漸漸大如雞蛋叁四年不破或七八年方破

破則難治初起宜急服此方 生蟹殼砂鍋內焙焦為末每服貳錢酒調下日日服之不可

間斷（又方）大瓜萋壹個半生半炒酒貳鐘煎壹鐘食後服

●治乳巖已破 荷葉蒂七個燒灰存性研末酒沖服 又方用 貝母 核桃楸

金銀花 連翹各叁錢酒水各半煎服

●治乳癰良方 兼治各種大毒 大當歸八錢貳分 生黃耆五錢 金銀花五錢

炙甘草壹錢八分 桔梗壹錢五分黃酒貳碗煎半飢半飽服

●乳少 乳少者血虛之故或產母去血過多又或產前有病以及貧賤之家僕婢下人產後失於調養血脈枯槁或年至四十血氣漸衰皆能無乳但服通脈散自有乳若亂用川山甲王不留行等味住住不效即勉強打通乳汁清薄令兒不壽且損傷氣血產後多病不久便乾反為不美

●通脈散 治血衰無乳或乳少 生黃耆壹兩 當歸五錢 白芷五錢用七乳猪蹄壹對煮湯吹去浮油代水煎藥壹大碗服之覆面臥即有乳或未效再壹服無不通矣  
新產無乳者不用猪蹄用半酒半水煎服體壯者加紅花叁五分以消瘀血

●治乳腫奇方 蒲公英 澤蘭葉 金銀花 白芷 生甘草 木瓜各叁錢共為末每服貳錢水酒各壹鍾煎服出汗即消

●栝萋散 治吹乳腫痛 栝萋壹個 乳香貳錢 用酒煎服 外用南星研末溫湯調敷即愈

●湧泉散 治產母乳汁不通 王不留行 瞿麥 麥門冬 龍骨各貳錢用猪蹄汁壹碗酒壹杯煎服 再以木梳於乳上梳下神效 (又方) 王不留行 天花粉 甘草各叁錢 當歸貳錢 穿山甲壹錢五分炙黃共為細末每服叁錢猪蹄湯下或熱黃酒下其乳如湧泉極效 (又方) 王不留行 通草 歸尾 炙穿山甲各等分七星猪前

蹄湯並黃酒煎服

●下乳簡便方 木通 通草 豕猪前脚蹄連湯一並食完 (又方) 紅砂糖煎

豆腐不用油鹽以黃酒共食之 又方 芝蔴炒研入鹽少許食之大便結者尤更相宜

●乳汁不通 鯉魚頭壹個燒研末每服壹錢酒調下 (又方) 黑芝蔴炒焦為末

每用叁錢熱酒冲服 (又方) 雄猪胰子切碎不另入油乾炒半熟以黃酒煮滾空心服

●乳吹 香白芷貳錢 川貝母叁錢共為細末以滾黃酒調服出汗頻以手擦患處

已成未成俱治 (又方) 用鵝毛煨存性研細末酒調服叁錢即愈

●吹乳極驗方 白芷貳錢 貝母貳錢 青皮壹錢 防風壹錢 炒麥牙叁錢水

貳茶鍾煎乘熱服之極效 (又方) 用葱壹大把連根搗成餅壹指厚攤乳上以灰火壹

罐覆葱上須臾出汗痛止腫消立愈屢屢經驗特重刊之

●吹乳結痛 蒲公英五錢 金銀花五錢 黃酒貳碗 煎壹碗食遠服壹劑即愈

如不愈再服斷無叁劑不愈者倘有膿服此亦輕熱服取汗仍以藥渣敷患處睡壹夜即消

●吹乳結乳乳滯 蒲公英壹兩入無灰酒壹觔煎熱服 (又方) 蚯蚓糞用陳醋

調塗患處 (又方) 生鮮山藥不拘多少搗爛敷之即消後即去藥遲則肉腐矣

●內外乳吹 乳內結核腫痛寒熱交作甚者惡心嘔吐胎熱所致為內吹兒食所致

為外吹並用此方皆效 柴胡 陳皮 川芎 山梔炒黑 青皮 煨石膏 酒炒黃芩

連翹各壹錢 甘草五分 橘葉廿片水貳碗煎八分食遠服 外用 葱白切碎炒熟

敷乳上以帛包之冷再換 (又方) 用不經鹽蟹殼瓦上焙乾為末熱酒冲服叁錢即愈

相按柴胡方治乳吹頗見效又下乳簡方用木通通草者亦屢效

●乳頭腫痛 鹿角尖燒灰存性研末酒調服貳錢外用葱白搗爛敷之

●乳結硬痛 大鯽魚頭煨灰酒調服貳錢汗出即瘥

●乳中有塊積久不消 活鯽魚壹個搗爛去鱗骨和老酒糟厚敷患處壹宿即消治

乳串久潰 乳癰串爛年久不愈洞見內腑此方治之神效 取搖船櫓捏手之處舊藤蘊

於陰陽瓦上焙乾研細末以竹管紮網篩日日糝之如乾處以香油調搽半月必愈

◎一醉散 治乳癰 石膏煨為末每服叁錢溫酒下能飲者添酒盡醉而睡壹服即

愈相按此方曾經屢試均效或加蒲公英三錢

●地丁膏 治乳吹並一切毒俱效 黃花地丁即蒲公英紫花地丁各半觔 以長

流水洗淨用水熬汁去渣又熬成膏攤貼

●乳癰乳巖方 蒲公英 金銀花 夏枯草各五錢 土貝母叁錢黃酒貳碗煎壹

碗空心熱服愈 一方加當歸壹兩花粉叁錢甘草貳錢炙穿山甲壹片同上煎服



●治乳巖乳癰方 葫蘆巴叁錢搗碎酒煎服渣敷患處未成即散已潰即愈

●乳癰無名腫毒 芙蓉嫩根帶皮洗淨搗爛加鹽少許敷腫處留壹頭有膿即出少許而愈無膿即消其效如神

●乳吹乳巖方 大栝萸貳個去皮子多者有力 當歸酒炒 甘草各五錢 乳香

去油 沒藥去油各錢半共為末用無灰酒叁升砂鍋文火煎壹升分叁次食後良久服如有乳巖服此可斷根如毒氣已成能化膿為水如未成即於大小便中通利如痰甚者再合服以退為度

●治乳癰奇方 用青橘葉百片 青皮五錢 柴胡壹錢 水貳鍾煎壹鍾入好酒

半鍾熱服蓋被出汗立愈

●遠志酒 治乳癰奇方兼可托散一切腫毒 用遠志不拘多少米泔水浸洗槌去

心為末每服叁錢用好酒壹鍾調勻遲少頃澄清飲之將藥渣敷患處自愈 (又方) 鴨腳草又名鳳尾草搗爛入無灰酒煎數沸盡量飲醉破者以渣敷之

●乳癰 白礬 雄黃 松蘿茶各壹錢共研細末飽時服每用壹錢以豆腐皮包之

吞下飲酒盡醉未成者壹服即消已成者兩叁服即愈

●內外乳吹紅腫堅硬乳汁不行 生熟豆腐漿壹大碗內入通草灰貳分燈芯燒灰

貳分百草霜五分須鄉間燒茅草山柴鍋蒂上取下者為真統入腐漿內調勻壹氣食下頃刻通行即愈

●乳癰及內吹及外吹 砂仁去殼五分 冬葵子八分共研末作壹服用蒲公英五

錢 栝蓂仁叁錢煎水將前藥末調勻沖服如初起七日內者不過叁服即可內消

●乳頭破爛 敗龜板炙研細末加冰片研勻以麻油調搽即愈 (又方) 丁香末

敷之極效

●乳上生疽 芝麻炒焦搗爛以燈蓋內油腳調敷即散

●乳巖散 經霜上揀子叁兩 雄鼠糞叁兩 炙露蜂房叁兩共研細末每服叁錢

陳酒送下吃壹服間貳日再吃壹服神效

●乳起結核 初起並不疼痛最惡之症久之防成乳巖每日用山茨菰壹錢 胡桃

肉叁枚共搗爛用酒送下以散為度如不急治遲延日久不免變患莫測外仍用醋磨山慈

菰塗之

●乳頭開花 用諸藥不效者以寒水石壹錢研細末和冰片五厘用荸薺汁調搽或

荸薺粉加冰片以水調搽皆效

●簾珠倒挂 凡大人小兒胸間乳旁各生紅白瘰泡浸淫疼癢每處直長壹條連生

十餘個不等名曰簾珠倒挂久則殺人諸藥不效者用端午日人家簷口所挂刀茅取下連根葉切碎火煨研末香油調搽五六次即愈此係一過路僧人所傳屢試屢效

●治乳巖 栝萋壹個切碎 當歸五錢 蒲公英叁錢 乳香去油沒藥去油各壹

錢 生甘草貳錢 鮮橘葉每歲壹葉 右藥以酒煎服立消如初起只用橘葉壹味或栝

萋壹個煎濃湯冲酒服亦消

●治乳巖 枸橘李切片炙研每日酒調服貳錢服半月即愈

●乳痛良方 凡婦人無論實乳虛乳忽然紅腫作痛急將婦人梳篦上髮間垢膩剔淨短髮細髮刮下垢膩搓成小丸外用雄黃裹之如桐子大勿令患人知以陳黃酒煮極熱吞下綿被覆蓋一汗而愈倘一服不效再二三服亦可數十年來愈人以千計矣

●治乳結欲作瘡並回退乳方 橘核 葫蘆各叁錢焙研末黃酒冲服如一劑不能

全消回退再服三劑必愈 (又方) 麥芽四兩炒研末分作四服以兩日服完開水送下

退乳甚效 栝按麥芽退乳屢試皆效

●乳頭開裂 秋後冷露茄子裂開者陰乾燒灰存性研末用水調服

●乳癰乳巖乳串神方 用蟹殼不拘多少將童便浸七日每日換便一次浸足七日放瓦上焙乾研為細末每服壹錢加入乳香去油壹分勻好酒冲服盡量以醉為度壹服

消硬叁服全消服至全愈而止

●治乳巖及一切吹乳腫爛神效屢驗方 用橘壹枚連皮帶絡及核俱全者取瓦貳

片合而炙之至焦乃研末用黃酒吞服每服橘壹枚服至數枚即愈即腐爛潰膿已甚者服

至十枚無不全愈真神方也惟橘每炙可叁四枚而研仍須各枚分研不可以貳枚併研切

記切記

胸膈部

●治胸中脹悶 陳皮壹錢 半夏錢半 甘草六分 白朮錢半 砂仁六分 香

附壹錢 姜叁片水煎服如中氣不足加台黨參壹錢亦妙

●治胸間食膈 白鳳仙花子叁合炒黃為末每服叁錢好酒送下

●治胸腹諸痛 並治小便不通 陳海蜃四兩 葶薺貳個煎湯服之神效

●胸膈忽然痰閉氣塞 白蘿蔔子炒香以白滾湯吞下數錢立通 (又方) 新象

牙末壹錢河水煎湯服之即愈

●百疾消散 無論胸膈飽悶肚腹疼痛傷風發熱俱可治 葱頭七根 生姜五大

片 陳茶葉叁錢 砂糖半酒杯水貳碗共煎熱服加陳酒隨量飲蓋被出汗諸病消散

惟暑熟天氣不宜多用生姜 天氣寒冷生姜加重

●心漏方 胸前有孔常出血或流膿水名曰心漏人多不識此方治之神效 又能兼治腰痛 鹿茸去毛酥炙 附子炒去皮 鹽花各等分為末棗肉為丸每服叁拾丸空心酒下 (又方) 鳳凰衣即哺出雞子蛋殼又云出過雞子蛋殼內之白皮為鳳凰衣焙燥乳香去淨油等分研極細糝之

噎膈

●韭汁飲 此方治血膈或因跌撲或因大怒以致血積胸膈而病者服之神效 生韭汁壹鍾 無灰酒壹鍾共壹處煮熟溫服之

●噎膈不通 野貓頭骨炒研為末酒調服

●噎食開關 白礪砂壹錢五分 青黛壹錢 好沉香貳錢叁味研細末聽用 再用白馬尿壹觔 白蘿蔔壹觔取汁 生姜半觔取汁共入銅鍋內熬成膏每服用叁匙加

前藥末壹分酒調下壹日叁服可以開關如係翻胃以黑驢尿壹觔易白馬尿

●五噎膈氣 用白鵝毛燒灰酒調服

●噎食 五穀蟲用蘇布包好水內洗淨炒黃色加木香沉香共研為末燒酒調服

(又方) 生薑汁 韭菜汁 童便 各壹鍾放大碗內入鍋中水煮熟數沸候冷取出露壹宿重煎溫服日日如是以愈為止 (又方) 白馬尿壹觔 地骨皮壹觔 白蜜壹觔 羊



糞四十九粒以上用水七升滾數滾濾去渣再熬至壹碗為度每服壹鍾忌馬齒莧蒸鍋水

●噎膈酒 芋薺四兩搗末 厚朴壹兩姜炒 陳皮壹兩 白蔻仁炒壹兩 白糖

四兩 橘餅壹兩 冰糖四兩 蜜貳兩用白酒漿叁觔燒酒叁觔入罈浸藥十數日早中

晚飲

●皮製太陰丸 專治膈噎瘧疾神驗異常 預查月蝕何時當日虔誠齋戒備辨潔

白乾麵壹觔再用老紫蘇半觔煎濃汁取汁拌麵軟硬得中放潔淨磁盆內臨時向月下恭  
設香案叩頭跪月下自月蝕初虧時起即將拌麵作丸如梧桐子大至月蝕將復圓時即停  
止放棄上露壹宿陰乾甞瓶收貯按照年歲服若干丸此丸服下無不通者價廉功大靈驗  
非常尤奇異者麵丸外實內空初虧時所作之丸內空一半蝕盛時所作之丸內竟全空不  
在月下則不效臨時多用幾人向月下多製廣為濟人功德無量（又方） 生姜刮去粗  
皮切成厚片以竹絲穿成壹串五月底入厚糞缸內浸七日至六月初六日取出去糞水冲  
淨陰乾研末每服壹錢燒酒送下即愈至重不過數服極效

●枳殼丸 整個枳殼去穰四兩每個入巴豆叁粒麻線十字紮定用水五六碗煮透

去豆將枳殼切碎晒乾 橘紅皮壹兩 青皮去穰壹兩 廣木香不見火研叁錢共研細

末陳老酒陳粳米粉打糊為丸臨臥服五十九

● 膈食驗方 大豆卽羅漢豆或炒或煮頻頻食之久則自愈蓋此症諸物不能下咽惟食此無碍以其相畏也

● 噎食轉食 黃鱸魚壹條用無灰黃酒量魚大小酌酒多少煮乾為度連皮帶骨用淨砂鍋焙存性研為細末病勢重者每服叁錢輕者每服貳錢五分為止不可多用黃酒調服若在上半月其效尤速若在下半月其效較遲叁服見功五服全愈後宜薄淡飲食陸續吃稀粥忌一切思慮籌畫氣惱葷腥發物酒色房勞尤宜慎之 轉食用靛花水送下

● 治鼠膈 凡在人前不食必於密地背人偷食見人則畏置之肌瘦面黃是食過夜鼠饑之延名為鼠膈 用十大功勞葉一名鼠怕草葉形似蒲扇有五角角有刺焙乾為末每服壹錢早晚隔送下服至半月自愈

● 治膈氣 慕撫軍天顏其母太夫人曾患膈氣異人傳授此方服之而愈 大黃酒製九次貳兩 上沉香末六錢 桃仁泡去皮尖研去油六錢 烏藥腐水煮炒壹兩 硃砂貳錢 以上各藥共研細末每服叁分五更時舌上紙津嚥下

● 細糠丸 治膈氣其症咽喉噎塞飲食不下 用打米碓杵上細糠刮下煉蜜為丸如彈子大常含壹丸以津嚥下久服自愈

● 噎隔秘方 羊糞壹兩瓦焙為末 甘草壹錢貳味開水泡澄清逐漸飲之俟開關

以陰糯米入麻真仁蘇子煮稀粥食之半月後方可食飯若遠食厚味一反難治

●無論虛實年月遠近噎膈 頂細料破碗磁片燒七次醋淬七次用壹錢 鐵銹

鉛粉 錫各壹錢 砂仁貳粒 母丁香貳粒 各研極細方可合共又研每日酒送下叁

五分極效 相按此方不實

●膈食初起 烏梅 辣椒 香豆豉 蒸猪肉常吃 (又方) 翻毛雞又名倒毛

雞蒸糯米吃貳叁隻自愈 (又方) 用老姜壹觔放童便內浸七日埋土內七日洗淨烘

燥為末又白朮用土炒各等分共研末飯丸梧子大每晨空心服壹錢米飲送下 (又方)

用甘蔗汁貳碗姜汁壹碗和勻每服壹碗日叁服即愈

●治翻胃噎膈 凡有此症大便燥結切不可用香燥藥取快一時破氣而耗血只好

用稠牛乳入白糖少許時時炖熱嚥服自然漸漸而愈 (又方) 佛手乾荸薺蓮子肉紅

棗柿餅橄欖桂圓苡仁各壹兩浸大麥燒酒五觔每日飲三次即愈 (又方) 柿餅叁枚

連蒂搗爛酒調服甚效切勿以他藥雜入如無柿餅或用乾柿亦可 (又方) 石蓮肉為

末入肉豆蔻末少許米湯調服之 (又方) 甘蔗汁七碗 姜汁壹碗和勻日日服之

(又方) 白荳蔻 白檀香 鬱金各貳錢研細末每服壹錢用姜汁熱酒調服

●治噎膈神方 貓胞衣用新瓦放火上焙燥研末入硃砂末少許每服壹貳分放舌

上以溫湯徐徐服下數服即愈 取貓包衣法貓將產以人看守須急急取之稍遲則貓食矣 (又方) 用抱出雞子殼瓦上焙燥研末每服貳錢熱酒送下 (又方) 大橘子壹個入胆礬壹錢將橘子頂上切去壹片以胆礬納入仍以切下之片蓋上外用鹽和黃泥裹壹大毯以炭火煨之候冷取出去泥將橘肉灰研末每服叁分滾水調下 (又方) 雞肫外黃皮名雞內金取叁個用新瓦焙燥研末用燒酒調服 (又方) 皂礬五兩用麵饅頭頂上開口挖空將礬填滿以新瓦合住外用鹽和黃泥包裹封固放文武火內燒半日取出去泥棗肉為丸梧子大每服貳拾丸空心酒湯送下 (又方) 取螺螄數斗清水浸之俟螺螄吐出泥沙去螺螄取水底之泥晒乾每服壹錢酒調下 仍將螺螄送入水中放生立效 (又方) 蒲公英壹梗兩花高尺許者掘下數尺根大如拳旁有人形拱抱搗汁酒服治膈噎其驗如神

● 甘露湯 朝食暮吐曰反胃隨食隨吐曰噎食下良久吐出曰膈 此方能治反胃噎膈等症用乾錫糖六兩在糖坊中買頭榨者 生老姜四兩貳味和勻搗作餅焙乾加炙甘草貳兩共研為末每服貳錢用滾湯入鹽少許調服甚效常服快利胸膈調養脾胃能進飲食 桐按錫糖本為麥芽糖近來多用米柄混入但亦可用

● 橘餅湯

除膈消食順氣化痰

橘餅細嚼滾姜湯送下奇效慎勿以輕易而忽之

心胃部

●九種心胃氣痛 千年陳石灰壹兩 生熟白礬各五錢共為末姜汁為丸如桐子大或姜湯或燒酒送下七丸即愈 (又方) 用真蘄艾灸大拇指男左女右五次極效

●急心痛 其症牙關緊閉欲死者用老葱白五莖去皮鬚搗膏將匙送入喉中灌以麻油四兩能得下咽即醒 (又方) 用山羊血壹分燒酒化下 或用淡豆豉五錢煎湯半鍾服之亦愈 (又方) 五靈脂 蒲黃等分研末每服貳錢醋湯調服即愈此方並治產婦血氣痛尤效

●大小男女一切心氣疼痛 馬兜鈴壹個燒存性研末溫酒調服 (又方) 製香附壹兩 白礬貳錢共為末麵糊丸豆大空心每服七丸好酒送下服畢即蓋棉被而睡使汗出即除根 忌食青菜魚肉生姜發物七日

●九種心胃氣痛因受寒而痛者尤效方 五靈脂貳錢 公丁香四分不見火研末 明雄黃四錢巴豆霜四分去油淨末 白胡椒四分 廣木香四分不見火研末 子紅

花貳錢 枳殼貳錢 以上八味各研細末稱準分兩和勻再共研極細甌瓶收貯幸勿洩氣每服五厘男以左手心女以右手心盛藥末以舌尖舐之津嚥下壹個時辰不可飲茶無論遠年近日發時服貳叁服皆可除根極為神效



●九種胃氣痛神方 五靈脂醋炒 廣木香切片曬燥不見火 枯礬 雄黃各貳錢共研細末臨痛服壹錢熱酒調下立止

●急心氣痛 胡桃壹個 棗子壹枚去核夾桃內紙裏煨熟以生姜湯壹鍾細嚼送下桐按心胃氣痛以煨製錢為最妥最有效無敵牌開胃藥即煨製錢所製

●卒心痛 急燒陳倉米為末和蜜服之不爾則逆 (又方) 猪心壹枚照每歲入胡椒壹粒同鹽酒煮食之

●卒急心痛 棗九歌云壹個烏梅貳個棗七個杏仁壹處搗男酒女醋送之下不害心痛直到老 (又方) 硃砂漂淨 木香不見火各叁錢 黃蠟壹兩化開貳藥共研末

為丸如菴豆大服每七丸燒酒送下 (又方) 多年陳醋浸大蒜食數枚其效如神 (又方) 延胡索研末叁錢溫酒調下即止

●心痛簡便方 用飯粒粘白礬為丸每服叁分 (又方) 用芝麻壹合炒黃 米醋壹杯煎至叁分服之 (又方) 用真麻油壹鍾煎入燒酒壹小盃乘熱飲之 (又方)

用厚些的木耳壹兩焙乾為末白酒送下叁服全愈 (又方) 用荔枝核以漫火緩燒存性研細末熱酒調下即愈 各方均經效驗

●心痛危急症奇效方 黃瓜壹條剖對開去肉去子填入明礬末合住用線縛懸挂

陰乾待瓜皮上起白霜刮下研入瓷瓶封固凡遇急症心痛危極欲死者但口有微氣將瓜霜點眼四角立愈

●陶真君心痛方 胡椒七粒 棗子十四個去核用水同煎乾去椒服之

●胡麻散 有人心痛八九年百藥不效服此而愈 胡麻壹貳兩炒研末每服叁錢

黃酒送下日數服之即愈 桐按胡麻即芝麻

●治九種心痛及腹背積聚滯氣 乾漆壹兩搗碎炒至烟盡為度研末醋煮麵糊為

丸如梧子大每服五丸至九丸熱酒送下 (又方) 元胡索 當歸 乳香 沒藥 良

姜 五靈脂各五錢共為細末每服叁錢燒酒送下 桐按此二方俱不妥

●心胸背下邪細結實硬痛脹悶 生姜壹觔搗爛絞汁將渣炒熱以絹包於痛處徐

徐熨之冷再加姜汁再炒熱再熨自然痛止硬消

●心連腰臍並痛 食鹽如雞子大用青布包裹燒存性研末酒調燉服當吐出惡物

自愈 (又方) 晚蠶沙壹兩滾湯泡過濾淨水炖溫熱服之即愈

●治食寒氣心痛 麩麪五錢鐵上焙炒黃色研末燒酒調服甚效

●停痰心痛 小白螺螄殼洗淨燒灰存性研末酒調服少許 (又方) 白芥子炒

研末酒醋調服貳錢並治冷心痛

●蟲心痛 面青唇白口吐清水 葱白貳寸 鉛粉貳錢搗為丸空心服之即止

(又方) 五靈脂貳錢 枯礬五分共研末每服貳錢水送下吐出蟲即愈 (又方)

香油食鹽熬熱服壹杯即愈 (又方) 海蝶蛸壹塊以醋磨濃汁燉服 (又方) 胡椒

萊豆各四十九粒同研滾酒沖服無論新舊氣痛皆效並治霍亂腹痛 (又方) 生芝

麻不拘多少預備之候痛時亦不必看隨手取來放銅鍋內炒黑為末以好酒送下 (又

方) 歌云心頭痛急不能當吾有仙人海上方扁蓄醋煎通口服管教立刻得安康 柳按

鉛粉不可輕服

●男女心痛 白礬叁錢鬱金七錢共為末麵糊丸桐子大每服叁錢白湯送下

●胃氣痛 人稱心氣痛即胃脘痛也脾痛也若真心痛則手足發青不可治矣 烏

梅壹個 杏仁七粒 紅棗貳枚去核搗極爛男用酒調女用醋調服 (又方) 荔枝核

煨存性研末用七分加廣木香不見火研末叁分酒調服神效 (又方) 陳年葵扇去筋

燒灰存性壹錢 乳香五分 沉香叁分 鬱金五分 共為末金銀煎湯酒半盃調服

(又方) 白砂糖五錢生姜壹片熱黃酒壹杯白滾湯沖服

●獨步散 凡人胸膈軟處有壹點痛者名胃脘痛無非因氣因寒而起或致終身不

愈或母子相傳而然俗名心氣痛者非也乃胃脘中之氣滯或寒滯耳 香附子米醋浸七

次炒七次研為細末 高良姜酒浸壹宿炒研細末 以上貳味各分用磁瓶封貯如因寒痛者用良姜末貳錢香附末壹錢如因氣者香附末貳錢良姜末壹錢因氣與寒者各用壹錢五分和勻加生姜汁壹茶匙食鹽壹捻以熱米湯或滾開水調服立可止痛服過七八次可以除根不發矣 (又方) 用雞內金貳錢瓦上炒枯存性雞內金即雞肫皮加沙糖少許調服治胃中因有滯作痛者甚效 (又方) 畢澄茄壹錢五分炒焦為細末好酒送下可以除根此惟寒多無氣滯者甚相宜

●黃蠟丸

治胃氣痛

黃蠟四兩

銀硃八錢

將黃蠟化開入銀硃和勻俟冷作

丸如梧子大每服七錢用艾葉叁片胡椒七粒研細煎湯送下即愈 (又方) 真菜油或

麻油 白糖各四兩將油煎滾離火將糖放入油內和勻服下即愈 (又方) 娑羅子出

產南京者焙乾為末熟黃酒冲服 (又方) 附子用鹽酒炒叁錢 肉桂去皮叁錢 廣

木香不要見火晒乾研末叁錢 製白朮叁錢 黑姜 胆星各叁錢 酒炒甘草錢半

共研細末蜜為丸每丸重壹錢熱酒送下 (又方) 砂仁 豆蔻 胡椒 母丁香各七

粒共研細末滾開水冲服 (又方) 訶子殼叁錢 畢澄茄叁錢焙 真沉香貳錢 共

研細末每服叁錢用熱陳酒冲服 (又方) 黑砂糖半鍾熱燒酒冲服

●胃氣心疼 五靈脂 元胡索各叁錢 石菖蒲四錢 砂仁貳錢以上各藥共研

細末每服貳錢紅木香叁錢煎湯送下卽愈

●艾灸法 男左女右於小指第叁節下掌紋盡頭握拳高起處灸艾火叁炷神效

●婦女心氣痛 用川芎 梔仁炒 淡豆豉 延胡索酒炒各壹錢加生姜七片水

煎溫服痛卽止須餓壹貳日再徐徐用清粥進之

●心胃寒痛 陳皮 製香附研 吳茱萸 良姜 石菖蒲 各等分水煎熱服

●卒熱心痛 生麻油壹合服之極效

●胃脘大痛 黑棗叁枚去核填明礬令滿炭火燒枯存性研末熱酒調下蓋被煖臥

片時卽愈 (又方) 宣木瓜壹錢 吳萸五分 食鹽壹錢 各炒燥為末白滾湯送下

(又方) 紅棗七枚去核搗爛橘皮叁錢 生姜叁片水煎服 (又方) 古銅錢燒紅淬

入陳醋中令醋微溫熱將醋服之

●胃脘火痛 田螺殼燒灰研末白滾湯冲服 (又方) 大梔子七個或九個炒焦

用水貳鍾煎八分加生姜自然汁貳叁分服之

●治胃氣痛方 石燕米醋炙酥五分 榛子燒焦五錢 枯礬叁錢 叁味共研細

末熱酒冲服後用綿被蓋今出汗為妙藥到口卽止痛一服立除 (又方) 瓦楞子十

個 蛤蜊殼十個 貳味火煨共為細末姜湯送下

●胃脘血氣痛 紅花壹大撮水貳鍾煎壹鍾服

●治九種心胃疼痛服過諸藥不效者可用此方 附子黃連各壹錢 白芍五錢水

煎服即愈

●治心胃疼痛無論男婦老少遠近年深皆可通治 高良姜壹錢 生白芍貳錢

川鬱金五分 淡吳萸叁分 生甘草五分 石榴花頭五枚作引 如反胃口吐清水加

竈心土貳錢或煎服或水法為丸服之極效

●心胃氣痛秘方 新棉花核即棉花子炒黃為末每服叁錢陳酒送下連進叁服可

以除根 (又方) 用海參內腸焙燥研末黃酒冲服

●真心痛方蓋因寒邪直入心經經久衰弱反為寒氣所劫故也如手足青至節寒至

節不救即死 猪心壹個煮熟去心留湯待用 麻黃 官桂 乾姜 附子各壹錢用猪

心湯煎服乃死中求活法也 (又方) 桑葉搗爛滾水送下立愈

●胃脘痛經驗方 舊剃刀布燒灰黃酒送下並治心胃一切諸痛俱效

●冷氣心痛 並治疝氣腹痛 延胡索 胡椒 等分為末每服貳錢食前溫酒調

服

●國老散 治心腹疼痛嘔吐不止或係蟲咬服此立見奇效 生甘草叁錢研末用



艾葉烏梅煎湯緩緩送下

●開胃醒脾丸 孫北甫云補腎不如補脾胃氣壯則能飲食飲食既進則益榮胃

養精血滋骨髓是以素問云精不足者補之以胃形不足者補之以氣此藥能補脾胃虛損

溫中進食降氣化痰去冷飲泄瀉等症 厚朴去粗皮切片壹觔 生老姜連皮切片八兩

水壹升同煮乾揀去姜將厚朴焙乾又用乾姜壹兩 甘草五錢 水壹升再同厚朴煮

乾揀去甘草將乾姜厚朴焙燥研為細末 另用大棗壹觔 生老姜貳兩煮熟揀去姜將

棗搗如泥和厚朴末為丸如梧子大每服五十丸清晨米飲湯下

●桃靈散 治胃氣痛百發百中 白礬五分 五靈脂壹錢 乳香去淨油八分以

上叁味共研細末遇痛時每服叁分燒酒送下

●陳香櫟散 治胃氣痛神效 陳乾香櫟壹個切開蓋去穢連蓋秤準現重若干配

陽春砂仁亦若干裝入香櫟內原蓋蓋好并泥圍塗放陰陽瓦上火煨見青煙將盡為度取

起放地下以碗覆蓋免致化成白灰俟冷透去泥研為細末每服貳叁錢開水冲服極重者

亦可除根體虛者服半料愈後接服二賢散除根

●二賢散 治胃氣並肝氣痛可以除根 鹽水炒橘紅 生甘草 等分為末每服

貳錢滾水冲服日日服之切勿間斷以愈為度

●五膈寬中丸 治七情四氣傷於脾胃以致陰陽不和胸膈痞滿停痰氣逆遂成此症並治一切冷氣皆效 姜汁厚朴八兩 白蔻仁去殼貳兩 丁香貳兩 砂仁四兩

製香附六兩 小青皮炒叁兩 廣木香貳兩 廣陳皮去白四兩 石菖蒲貳兩 炙甘草

草八錢 共為細末每服壹錢姜鹽湯送下不拘時服

●五香導氣丸 治一切食積氣滯五臟不和九竅不通大便閉結胸中飽脹心胃氣

痛等症並治皆極神效 沉香壹兩 檀香壹兩 製香附壹兩 廣木香壹兩 紫丁香

六錢 砂仁壹兩 枳實八錢 檳榔壹兩 姜汁厚朴壹兩五錢 石菖蒲五錢 郁李

仁六錢去殼 共研細末用神麩糊為丸如梧子大每服叁錢淡姜湯下

●心腹冷痛 以布裹胡椒安痛處用熨斗熨之令椒出汗即止

●心腹卒然脹痛 急煮熱湯須百沸湯以漬手足冷即易之

●心如刀刺口吐清水有蟲 生艾杵汁壹大碗先半日勿吃晚飯次日五更先嚼燒

肉於口內切勿吞下似口中水入肚蟲聞香則頭朝上即飲艾汁壹大碗立時打下

●口渴心熱 天花粉煎水當茶常常服之

●惡心煩燥 真萊豆粉壹兩 乳香五錢 辰砂壹錢五分俱研極細末每服壹茶

匙甘草湯下

●中惡心腹痛 宰白烏骨雞壹隻覆心口上卽瘥死可回生之法如鬼擊用血塗之或滴口中俱妙 雞要骨黑者為佳

●三厘藥 治胃脘痛極效 紅花壹兩 枳殼壹兩 五靈脂壹兩 廣木香不見

火叁錢 丁香叁錢 胡椒叁錢 明雄黃叁錢 巴豆霜叁錢卽巴豆去淨油如霜者以上各藥共為細末甕瓶收貯封固勿令洩氣遇患者用叁厘本人自以口水津嚥下頃刻見功忌飲茶水半日初合此藥須遲數日方用恐其藥性太猛也

●胃脘痛方 牙皂去淨弦壹兩 陳神糶五錢共研末再用陳神糶五錢打糊為丸

如芡實肉大每服貳丸淡姜湯下貳服除根 (又方) 乳香壹錢 沒藥雙瓦焙去油烟

盡存性壹錢大棗七個去核 杏仁炒去皮尖貳錢半 烏梅七個去核蒸浮 共搗為丸

分作叁服白滾湯送下神效 (又方) 五靈脂去砂水飛淨壹兩 丁香研淨末叁錢

巴豆霜叁錢 麝香貳分五五日用神糶米醋糊為丸如菜豆大每服叁丸含口中待將化以開水送下重者五丸服之極效 壹方加沉香末叁錢

●香砂平胃丸 木香四兩 砂仁四兩 蒼朮十六兩 厚朴十六兩 廣皮十六

兩 甘草四兩共為細末蜜和為丸每丸重貳錢凡胃脘脹痛者每於早晚飯後服貳丸開水冲服不過數服卽愈年深者久服亦愈神效

反胃嘔吐

並附呃逆諸般氣痛及五臟各病

●反胃奇方

韭菜汁貳杯入

姜汁

牛乳各壹杯細細溫服蓋韭菜汁活血姜汁

下氣消痰和胃牛乳解熱潤燥補虛也

●反胃吐食結腸方

有人反胃吐食藥物不下結腸至七八日大便不通垂死危極

者用白水牛喉壹條去兩頭節並脂膜筋肉切片米醋壹盞浸之微火炙乾又淬入盞內再炙再淬盡為度研末每服壹錢食前陳米飲調下輕者壹服可愈牛喉可向屠人處買切勿特殺為要

●反胃及隔食病

靛青葉曬乾預為收好每用叁錢

姜壹錢用水壹碗煎至壹茶

杯另用米壹酒杯日煮粥壹碗俟前藥煎好即將粥預備服藥後隨即將粥吃下不必吃飯又將藥再煎過半日又服仍又隨以粥投下三日三服即愈不用吃他藥每日吃粥貳叁碗十日方可吃飯百日不可吃鹽倘吃鹽此病復反不可治矣

●翻胃嘔吐

白豆蔻去殼貳錢

檀香

川鬱金各貳錢共研細末每服七分姜汁

調藥陳紹酒壹杯送下服完即愈

(又方)

生老姜叁觔用鐵絲或竹絲穿成串入糞缸

內浸四十九日取起長流水擺淨晒乾研為末陳米粉打糊為丸如梧子大每服叁五丸滾水送下 (又方) 白礬壹半生壹半熟不拘多少用冷水調服

●翻胃吐食 烏雄雞壹隻治淨入胡荽子半觔於腹內烹食食完貳隻即愈 (又方) 抱出雞子壳為末酒調服貳錢即愈

●翻胃 大白蘿蔔壹個入壯年人糞於內用竹簽簽住以炭火煨至粉紅色研為末不拘茶酒飯食拌入少許再服最效

●嘔逆 橘皮四兩 生姜壹兩 加開口川椒拾粒 水貳大碗 煎至壹碗徐徐嚥之即止

●呃逆 用柿蒂 丁香各貳錢 姜五片煎服或研末滾湯調下亦可 (又方) 乳香同硫黃燒烟嗅之即止並治傷寒陰症呃逆神效

●久患吞酸諸藥不效 用魚膾以鮮活魚薄切洗淨血味腥沃以蒜醬姜醋照常烹而食之是也愈後勿夜食勿飲冷水可保不發

●香圓丸 治一切氣逆不進飲食或嘔噦等症 陳極香圓貳個 真川貝叁兩去心 炒黑當歸壹兩五錢 白通草烘燥壹兩 陳西瓜皮壹兩須隔年預備晒乾者 甜桔梗叁錢 共研細末用白檀香劈碎煎濃汁泛為丸如桐子大每服叁錢開水送下大虛者酌用

●氣上暴逆 嚼姜兩叁片即止神效

● 呃逆吞酸醋心 用吳茱萸壹合以黃連水浸壹日炒乾去黃連將吳茱萸每早吞四十粒米湯送下 或用吳茱萸壹錢煎服亦可按中國藥店之左金丸即吳茱萸黃連也

● 嘔吐不止 用大鯽魚壹個破開洗淨不加油蒸熟食之即止

● 氣滯痛 米醋磨青木香溫服即愈 或用小插鉢磨廣木香以溫水沖服亦極效

● 三焦氣滯 陳米用麵炒 萊菔子炒 等分為末每服叁錢 水煎入麝香少許

調勻沖服 孕婦忌之 相按麵炒恐係鈇炒之訛

● 氣痛常發十年五年不愈者 用小繇連葉七根以鹽醋煮熟痛時燉服竟可除根

愈後永戒食甲魚可免復發

● 諸般氣痛急救方 用好燒酒半茶杯浸大冰糖壹塊須壹兩多重者將酒燒燃俟

燒完自熄將冰糖研碎開水沖服即愈

● 諸般鬱氣疼痛方 製香附叁錢 炒山檜貳錢 青皮貳錢 陳皮壹錢 元胡

宗壹錢 姜黃壹錢 廣木香五分 半夏壹錢 甘草六分 白芍錢半 水煎服

● 氣痛奇方 陳皮 青皮 高良姜 廣木香 各等分水煎服奇效

● 諸種氣痛 凡感受風寒暑濕飲食所傷中脘痞悶嘔吐吞酸氣痛氣脹諸氣攻刺

用陳皮洗淨以新汲水煎服極效 走氣疼痛用酸醋淬皮炒熱按痛處熨之極效 氣



卒奔上呼吸有聲喘急欲死者用韭菜搗汁飲之 氣疼結聚心下不散用桃樹上不落下  
乾桃子叁個為末 每服貳錢空心溫酒送下 走注風毒疼痛用芥菜子為末以雞蛋白  
調敷即消 一切冷氣鬼邪毒氣艾和乾姜為末作丸每服叁拾丸

●氣痛經驗方 小茴香叁錢 五靈脂叁錢 廣木香貳錢 共研細末為丸米醋  
湯送下壹服痛止叁服即能斷根

●治肝氣痛 道地潮煙貳兩白米飯壹碗拌和槌百杵分作四餅用濕草紙包放灶  
火內煨存性研末作四股肝氣發時用沙糖調以陳酒送下 又治肝氣方 赤芍六錢  
烏藥叁錢以豆腐水洗蒸 用水貳碗煎至壹碗服

●又治肝氣痛方 小肚塊脹大便結燥嘔吐清水 青皮甘蔗 飴糖 貳味時常  
食之其痛即止紅皮次之

●治肝癰方 左乳下微腫疼痛不紅即係肝癰服此方後解出烏血塊即愈 柴胡  
桃仁各貳錢 炙芪 芒硝各錢半 酒炒生軍叁錢 蜜黨參貳錢 全當歸 金銀

花各四錢 天花粉叁錢 甘草節貳錢半 燈芯引水煎服貳劑

●又肝癰方 用化肝消毒湯 當歸 白芍各叁兩 炒梔子 金銀花各五錢  
生甘草叁錢 水煎服叁服病減八服全愈

●又方 紅胡 香附 薄荷各叁錢 當歸 白芍 金銀花各壹兩 陳皮 枳殼 生甘草 天花粉各叁錢 水煎服愈後再服四物湯大劑調理

●東安散 治肝胃氣痛神效 娑羅子四兩炒 陳木瓜兩個切碎炒 陳香圓貳

個切碎炒 生蛤殼貳觔生研切勿經火 瓦楞子四兩醋煨共研細末每服叁錢赤沙糖調服滾水送下體弱者減半孕婦忌服

●溫膽湯 治心膽虛怯怔忡多驚 半夏 炒 麥炒枳實 遠志肉甘草泡洗 白

茯苓 陳皮各壹錢 炙甘草五分 竹茹壹錢 姜叁片棗貳枚 水壹鐘半 煎七分

食遠服

●肺癰試驗方 病人右手難舉高不能過頂側臥吐痰似魚腸極臭即是肺癰 用

老絲瓜去皮瓦上焙先下子次下穰焙黃色為度存性研末黃酒調服貳錢服數次即愈

●肺癰初起 凡胸膈脹懣咳嗽氣急口臭多痰用生黃豆入口細嚼不知豆腥氣即

是肺癰 用五爪金龍又名九頭獅子草搗爛取汁酒送下六七次可愈

●治肺癰神方 白花百合搗汁日服壹碗不拘時服服至七日必效 (又方) 野

芥菜又名山芥菜搗自然汁和酒沖服立愈 (又方) 取生鮮百部根搗汁壹盞入酒壹

盞灌下兩時辰即效叁服全愈如口中作渴以水飲之切忌飲茶

●肺癰胸膈作痛 咳嗽尤痛手按氣急亦痛 元參 麥冬各貳兩 錦地羅 生甘草各壹兩 桔梗貝母各五錢 水煎服壹劑即效叁劑全愈

●肺癰口不聞香臭 元參四兩 麥冬 銀花 甘草各四兩煎服此方最穩

●肺癰口吐臭痰膿血 用牛口苾根去粗皮濃煎壹罐生酒釀調服極效 (又方)  
用多年老鴨壹隻 白芨壹兩為末入鴨腹內蒸極熟合鴨與白芨連湯食之可補肺癰  
穿潰相按又方已有多人試服見效

●肺癰吐臭痰 用大青葉樹根皮為末煮肉食數次即愈

●肺癰咳嗽唾膿血腥臭 不論膿成未成 柘木耳即柘黃研末同百草霜貳錢陳

米糊丸如桐子大米飲下叁拾丸

●脾弱不食 大黃豆貳升 大麻子叁升炒香為末每服壹合飯下每月四五服孕

婦忌之

●健脾能食 猪舌和五味煮汁食之

●壯胃健脾方 白羊肉貳觔切碎梁米壹升同煮下五味作粥飯

●大腸癰 金銀花叁兩 當歸貳兩 地榆 麥冬去心 元參各壹兩 生甘草

叁錢 苡米五錢 酒黃芩貳錢 水煎服四劑可愈 或飲食不進用開胃救生湯 真

台黨參製白朮 元參 懷藥 苡米各壹兩 金銀花貳兩 生甘草叁錢 山羊肉末

叁錢 上藥用水煎將山羊肉末調服四五劑即愈

●小腸癰 金銀花叁兩 生甘草 車前子 劉寄奴 澤瀉各叁錢 茯苓 苡

仁各壹兩 上桂壹分 叁服即愈

●腸癰試驗方 病人壹足攣口有臭氣即是腸癰之症 用桑樹結累壹塊以陳米

醋磨汁服之毒即下瀉後急服補中益氣湯以防氣脫此方神效

●大小腸癰極驗方 地榆壹觔水十碗煎叁碗再用生甘草金銀花各貳兩同煎至

壹碗服壹劑即消極為神效 (又方) 金銀花八兩水十碗煎貳碗再用當歸叁兩 地

榆壹兩 苡仁五錢亦水十碗煎至貳碗同金銀花汁和勻分作貳服上午壹服臨臥壹服

兩劑全愈凡患 腸癰必須內消而火邪甚急非杯水可救必用大劑始效然大劑敗毒恐

傷元氣惟金銀花敗毒而又補陰故可重用若少用則無效矣

肚腹部

●男女腹痛緊急不識何症 用食鹽微炒溫熱以布裹按痛處熨之痛即止

●治腹痛 或初起或宿疾兼治感傷水瀉 白胡椒壹錢 麝香壹分貳味共研末

入肚臍內少許外以膏藥貼蓋之少頃自愈 (又方) 胡椒 萊豆各四十九粒同研細

末滾酒冲服寒熱腹痛並治

●護臍丸

胡椒五分

硫黃壹錢共為細末

黃蠟壹錢溶化為丸如芡實大如肚

腹諸痛取壹丸入臍內以膏藥蓋之甚效

●熱天腹痛一時無藥

藿蓼子搗汁水冲服

或黃葉搗汁水冲服亦效

●伏暑肚痛方

用瓜瓢掀攪缸中水百遍取泡子壹碗薄荷葉十餘皮長燈芯七根

同煎湯調六一散叁錢服之不時即愈

●肚腹暴瀉方

車前子炒為末米湯調服貳錢治夏秋間肚腹暴瀉清濁不分者頗

效虛瀉溇瀉均不相宜

●肚腹水瀉方

茯苓貳錢

厚朴錢半

陳皮壹錢

炒枳殼貳錢

甘葛壹錢

川木瓜叁錢

陳石榴酒炒貳錢

紅棗煨姜作引水煎服

(又方)

石榴皮煎水服之

甚效 (又方)

乾蘿蔔種兒煎水服之如無兒即蘿蔔子亦佳

(又方)

山查肉炭

大麥芽炭等分研末

紅糖各叁錢

連皮淡姜湯冲服

●腹內蟲痛

烏梅壹個

老姜叁片

榧子七個

花椒十四粒

加黑糖少許用

水煎服蟲即出矣

(又方)

苡仁根壹觔切碎水七升煮叁升服之蟲死盡出

(又方)

白鴿屎燒存性研末米飲下壹錢即愈

●蟲積肚痛 葱汁半鍾 菜油半杯調和服之蟲化為水即除根矣

●蟲積又方 苦楝根四兩取向東不露出土者去皮去骨 使君子貳兩去殼 生

姜叁兩 水五碗煎至叁碗去渣再熬至貳碗加白蜜四兩又熬至壹碗隔湯炖熱空心服

壹日服完須於朔日服最妙蟲頭向上不吐不瀉蟲從大便出少則壹服多則貳服除根一

切蟲積皆治小兒分兩略減

●大人小兒腹內諸蟲方 取向東棟樹根去皮洗淨晒乾炒黃為末砂糖調服七八

錢蟲即化為水相按先嚼爛熟使君子七粒繼以生者七粒屢試輒效

●凡腹內生癰毒不可藥治者 皂角刺看病症酌量用多少切碎用酒煎溫服壹碗

其膿血下從小便中出 不善飲者用水煎亦可

●冷氣入腹 漸見陰囊腫脹日夜疼痛布裹川椒包腎囊下令熱氣大通日再易之

以消為度

●房事後中寒腹痛 生姜葱白同搗爛熱酒沖服強睡片時汗出即愈如痛甚再以

葱頭搗爛炒熱攤貼臍上用艾灸之鼻尖有汗其痛立止

●氣滯腹脹 及手背脚膝疼痛 大麥醋糟炒熱布裹熨之叁兩換即愈

●寒火相結小腹疼痛 俗名陰寒 枯白礬如棗子大壹塊 帶鬚葱白叁段 胡



椒按病人歲數壹歲壹粒 用男孩兒吃之乳合壹處共搗為丸安放肚臍上壹炷香久痛即止 愈後忌用生冷

●腹中寒痛 痛極以致蹇曲不能伸熱手按之相安此乃寒痛也 熟附片貳錢

炒乾姜貳錢 肉桂去粗皮壹錢 益智仁貳錢 川椒殼貳錢 吳萸貳錢 丁香壹錢

法半夏五錢 草菓仁麪炒壹錢 水煎壹服即愈

●土熨法 或房事後感受風寒腹中疼痛欲絕 用陳乾土磚打成粗末約貳升許

以鍋炒大溫熱用青藍布分作兩包以壹半揉熨胸腹腰背等處冷則另換壹半周流揉熨半時氣血流通自愈 或用皂角研細末吹入鼻中得噴嚏則氣隨通暢

●小腹痛諸藥不效方 用婦人油頭髮燒成灰研末酒調服叁錢即愈

●治陰寒腹痛 雞蛋壹個煎成餅用胡椒七粒研末先放臍內後以熟蛋餅貼上冷即再換壹餅胡椒重換吸去陰寒即愈 或用雞蛋拾數個煮百滾蛋頭少去殼對臍口掩上蛋冷即換以愈為度

●痧症腹痛 查看痧症諸方 陰痧則腹痛而手足冷看身上有紅點用燈芯火爆

之極效陽痧則腹痛而手足煖用針刺指頭少商穴使出血即解痧症腹痛無論陰陽忌食

熱湯熱物

●肚腹疼痛丸 雄黃貳錢 枳榔貳錢 白礬貳錢 共研細末用白米飯和為丸 每服貳十壹丸白湯送下即止

●寒腹痛 鷓鴣糞燒灰存性研末熟酒調服壹錢即愈並治冷心痛

●冷氣腹痛 艾葉同香附醋煮和為丸服之極效

●新久腹痛 畢澄茄炒 蒲黃醋炒 元胡索醋炒 等分為末每服壹錢醋湯送

下永不再發

●心腹惡氣口吐清水 用生艾葉搗汁飲之 乾艾煮湯服亦可 又腹中惡氣用

高良姜炒焦酒煎服 或用胡椒研碎沖服亦效

### 疝氣部

疝氣有五寒熱氣血濕又有房勞氣滯木腎筋疝頰疝狐疝疝者日縮而夜出種種不同必須審症擇方治之庶幾易於見效凡患疝者切忌飲楊梅燒

●諸疝初起方 荔枝核十四枚鹽水浸瓦上焙枯存性 小茴香貳錢鹽水炒 紫

背天葵四兩曬乾研末以上叁味共研末白酒調服即愈 (又方) 荔枝全用五六枚搗

爛滾燒酒沖蓋片刻飲之立愈 (又方) 生姜四兩 葱十莖 大蒜壹枚去衣共搗爛敷

患處將豉皮炒極熱於敷藥外烘之

●小腸疝氣 用松樹子壹歲壹粒燒存性研末用好酒送下粒少者壹貳次服粒多者分作數次服 (又方) 橘核晒乾去厚薄殼兩層研細每服五錢用好酒壹貳杯砂鍋內煮四五沸空心服再飲熱酒壹貳杯一切下部諸疾皆可療治 (又方) 用川棟子十個以巴豆十四粒同炒至黑色去殼與巴豆不用 烏藥 木香 茴香炒 良姜 青皮各五錢 檳榔叁錢共研細末每服壹錢溫酒調下痛甚炒姜酒下 (又方) 茴香晚蠶沙各鹽炒等分研末蜜為丸彈子大每服壹丸酒送下

●治疝氣走入腎囊內 五月五日採穀樹葉陰乾為末空心酒送下 (又方) 棟樹葉切碎臨發時酒送下 (又法) 於腳中趾節橫紋上灸二壯即愈 (又法) 灸腳外踝穴在兩腳外羅拐骨下壹指乃圓骨下灸叁壯

●腎囊赤腫如斗 荔枝核 青橘皮 茴香等分各炒研為末每服貳錢日叁服 (又方) 生蔓青根搗爛厚敷之 (又方) 用艾灸腳大趾甲肉相連之處貳叁壯亦即效

●疝氣偏墜 猪毛燒灰研細每服貳錢空心熱酒送下或加小茴更妙 (又方) 灰麩煮成厚糊離火即加入胡椒細末壹兩攪勻攤成膏貼陰子患處一時小便如湧貼壹日去膏即愈

●疝氣腫痛方 大茴香姜汁浸壹宿晒乾 荔枝核打碎鹽水炒等分研末水煎服  
或作丸服之更佳 (又方) 霜打葫蘆燒灰為末好酒調服 (又方) 瓜萸研末紅糖

調服 (又方) 小茴 荔枝核鹽水炒研 橘核鹽炒三味等分酒水各半煮空心溫服

●化木湯 治木腎 白朮壹兩附子 肉桂 柴胡各五分野藍菊花根五錢水煎

服後蓋被取汗至暈丸之外汗出如水為度壹劑即愈如病重者加倍煎服

●逐狐湯 治狐疝日則縮而痛夜則出而安且能強陽善戰真狐疝也 台黨參六

錢白朮叁錢茯苓叁錢肉桂叁分橘核五分白薇五分荆芥壹錢五分半夏壹錢甘草五分

水煎服

●小腸氣痛 嵩治腎囊堅硬小便不通者雞蛋兩枚取清去黃加入胡椒細末貳錢

於蛋碗內調勻即將腎囊置於碗內用手捧住初不覺暖漸熱則堅痛漸消至熱極不能忍

耐然後去之永不復發 (又方) 紫蘇艾葉各貳兩 防風壹兩 水煎數滾傾入腳盆

內或小圓桶亦可先薰後洗薰時四面將衣服圍護緊密俟微溫浸之連洗數次自然全愈

(又方) 核桃壹枚燒枯研末熟酒調服 (又方) 川棟子叁錢 破故紙叁錢 大

茴香叁錢 小茴香叁錢 廣木香叁錢 共研細末每服用叁匙熟陳酒調服

●藥兜肚方 治小腸氣痛 川棟子 吳萸等分共研末用灰麵壹角和藥裝入紅

色稠兜肚內束小腹上藥末易於垂下須鋪勻用針線密縫橫截為要

●治膀胱氣痛方 用膀胱子炒貫入雄雞內煮熟食之即愈 (又方) 用生梧桐子嚼融嚥之數次即愈

●腎氣痛方 川羌貳錢 桃仁去皮尖錢半 橘核叁錢 鹽水炒荔枝核叁錢  
吳萸八分 野菊花根壹兩 白花黃心者水煎服即愈 (又方) 八九月收取鴨春樹子  
鹽水炒九蒸九晒水煎以酒兌服之亦效

●腎囊腫大如升腎核作痛 用馬鞭草搗爛塗之 或用口嚼爛敷之更妙

●小腸疝氣經驗方 荔枝核叁個 鹽水炒研碎 防風 荆芥 青皮 葫蘆巴

益智仁 小茴各壹錢 山梔 川棟子各貳錢 丁香川椒各五分 生姜叁片 水煎  
熱服 (又方) 葫蘆巴七錢 小茴香叁錢共研末每服叁錢滾湯下

●治寒疝方 鐵秤錘壹個火內燒紅取出以黃酒壹碗淬之趁熱飲下

●疝氣疼痛危急 地膚子即掃帚子炒研空心酒送下貳錢 (又方) 連蒂老絲  
瓜燒存性研末每用叁錢食前熱酒調服

●小腸氣連脅下引痛喘息不得 小茴香壹兩炒 枳殼五錢麥麩炒去麥共研細  
末每服貳錢鹽酒調下神效

●霹靂酒 治疝氣偏墜及婦人崩中下血胎產不下以鐵器放火中燒紅淬酒中空  
心飲之

●偏墜腫痛 蘇木貳兩好酒壹壺煮熟頻頻飲之立效 (又方) 荔枝核 青橘

皮 山查肉 茴香 各炒燥等分共研末或為丸每服貳錢或熱酒或滾湯送下 (又

方) 槐子壹錢炒研末入鹽叁分空心熱酒送下腫痛不可忍者服之腫消痛止均極神

效 (又方) 荔枝核 龍眼核各七個俱燒灰存性 大茴貳個鹽炒共研末酒調服即

愈 外用生姜貳兩搗爛腎腫即消

●鼓脹經驗十九方 前有患鼓脹之疾百藥罔效奄奄待斃得此壹拾九方照方次

第服之服至壹周已有效驗又服兩周始得全愈蓋所患鼓脹乃極重難治之症此方真有  
起死回生之功藥味平穩功效甚大惟服此方必要依照時刻服之不可差錯蓋取人身血  
脈所致與藥性適合乃能去病此立方之巧妙也前見服此方者有時忽而項強忽而肩背  
壅腫忽而心怯忽而下身微腫將病層層推出然後就痊親歷見之屢試屢驗 服此方禁  
鹽百日總以淡食為要一切鹽醋醬菜概宜禁戒俟病症全愈精神復完然後開鹽用炒熟  
芝麻點食以瞿麥煎湯代茶最妙

●第壹方 用淨水煎晚服貳次 忌葷 焦白朮土炒貳錢半 大腹皮酒洗晒乾



壹錢 白茯苓去皮錢半 木通壹錢 紫蘇葉壹錢 陳皮錢半 赤茯苓去皮錢半  
姜製半夏壹錢 生薑壹片黑棗貳枚

●第貳方 空心服貳次忌生冷不忌葷 焦白朮土炒錢半 陳皮錢半 白茯苓

去皮錢半 砂仁去衣研壹錢 赤茯苓去皮錢半 青皮醋炒壹錢 生薑叁片引

●第叁方 午服貳次 焦白朮土炒壹錢 砂仁醋炒研壹錢 木通壹錢 姜製

半夏壹錢 草菓去皮壹錢 蘇子炒研八分 黃芩酒炒八分 猪苓去皮錢半不要見

鐵 沉香磨叁分冲

●第四方 晚服貳次 焦白朮土炒壹錢 猪苓去皮忌鐵錢半 炙黃芪壹錢

瞿麥壹錢 白茯苓去皮壹錢 香附醋炒壹錢 尖檳榔壹錢 烏藥壹錢 姜半夏壹

錢 澤瀉壹錢 姜製厚樸八分 白芷八分 砂仁去衣研八分 麥冬去心壹錢 沉

香磨四分冲服

●第五方 早服貳次 木香片錢半 草菓去皮壹錢 炙黃芪壹錢 陳皮八分

焦白朮土炒壹錢 蒼朮米泔浸炒壹錢 姜製厚樸八分 白芷八分 姜半夏壹錢

砂仁去衣研八分 丁香片叁分 蘇子炒研八分 磨廣香五分冲服

●第六方 與第五方相同

●第七方 午服貳次 白茯苓去皮錢半 香附醋炒錢半 木瓜壹錢 姜製厚

樸壹錢 焦白朮土炒錢半 木通壹錢 陳皮八分 青皮醋炒八分 當歸身壹錢

澤瀉壹錢 砂仁炒研八分 黃芩酒炒八分 不加引

●第八方 五更時服貳次 焦白朮土炒錢半 香附醋炒壹錢 大腹皮酒洗晒

乾壹錢 蒼朮米泔浸炒壹錢 白茯苓去皮壹錢 陳皮壹錢 藿香梗八分 麥冬去

心壹錢 姜製半夏壹錢 木通壹錢 白芷尾八分 檳榔壹錢 木瓜壹錢 枳殼壹

錢 磨沉香五分冲服為引

●第九方 四更時服貳次 白茯苓去皮貳錢 木瓜八分 蘇子炒研八分 姜

厚樸八分 姜半夏八分 陳皮壹錢 香附醋炒八分 枳殼七分 焦白朮土炒錢半

麥冬八分 砂仁去衣研七分 不加引

●第十方 空心早服貳次 炙黃芪八分 瞿麥壹錢 蒼朮米泔浸炒壹錢 木

香切片壹錢 姜半夏錢半 砂仁去衣研壹錢 蘇子炒研壹錢 木瓜壹錢 不加引

●第十壹方 午後服貳次與第十方相同

●第十貳方 與十壹方相同

●第十叁方 晚服貳次 焦白朮土炒貳錢半 陳皮壹錢 木瓜壹錢 檳榔壹

錢 白茯苓去皮錢半 木通壹錢 瞿麥壹錢 木香切片八分 姜半夏錢半 蘇子炒研壹錢 枳殼壹錢 烏藥八分 不加引

●第十四方 晚服貳次 焦白朮土炒貳錢 猪苓去皮忌鐵錢半 陳皮壹錢 瞿麥壹錢 白茯苓去皮錢半 澤瀉錢半 木通壹錢 萹蘆炒研壹錢 不加引

●第十五方 早服貳次 焦白朮土炒錢半 蘇子炒研壹錢 白茯苓去皮錢半 木香八分 陳皮壹錢 不加引

●第十六方 午服貳次 白茯苓去皮錢半 木通錢半 香附醋炒錢半 陳皮壹錢 蘿蔔子炒研壹錢 砂仁去衣研壹錢 蘇子炒研壹錢 枳殼壹錢 石榴皮壹

錢 檳榔壹錢 加磨沉香八分冲服為引

●第十七方 晚服貳次 焦朮土炒貳錢半 猪苓去皮忌鐵壹錢 白茯苓去皮錢半 澤瀉錢半 陳皮壹錢 瞿麥壹錢 加燈草十莖每莖長六寸為引 服到此劑

要見全效如未見全效服完十九方後當再服壹周

●第十八方 空心服貳次 焦白朮土炒貳錢半 木通錢半 砂仁去衣研壹

錢 姜半夏壹錢 白茯苓去心錢半 陳皮壹錢 蘇子炒研壹錢 姜厚樸壹錢 香

附醋炒壹錢 白芷八分 木香片壹錢 不加引

●第十九方 午服貳次 焦朮土炒錢半 麥芽錢半 砂仁去衣研八分 陳皮

壹錢 姜半夏壹錢 蘇子炒研壹錢 木通錢半 枳殼壹錢 白芷壹錢 檳榔壹錢

香附醋炒壹錢 桑皮壹錢 木香片八分 青皮醋炒壹錢 磨沉香八分冲服為引

以上十九方藥料務要真正道地藥材分兩必要秤准切不可稍事妄加增減如病勢重者服完十九方不妨再服壹周自見功效况藥味極其和緩平穩雖多服亦無礙耳藥性相忌者勿食如厚樸忌豆半夏忌羊血之類是也

●緊皮丸 生地黃炒鬆壹兩 姜半夏壹兩 車前子壹兩 台黨參叁兩 姜厚

樸兩半 當歸身酒洗貳兩 赤茯苓去皮壹兩 蒼朮米泔浸炒貳兩 神糶炒壹兩

木通壹兩 猪苓去皮忌鐵壹兩 澤瀉壹兩 青皮醋炒壹兩 破故紙鹽水炒貳兩

陳皮兩半 麥芽炒兩半 莪朮醋炒八分 澤瀉壹兩 以上共研細末麵糶糊為丸如

桐子大每日早服四十九丸午服叁十九丸晚服貳拾丸白湯送下

●開鹽方 服緊皮丸後神完氣足然後用此方開鹽 白朮八分 蒼朮八分 麝

香半分 共為細末用鯽魚貳條洗去腸雜將藥末並鹽壹兩入魚腹內用紙包煨瓦上焙

乾為末早晚各下壹錢

●雄鴨酒 治一切鼓脹 大雄鴨壹隻去毛洗去腸雜 蒼朮米泔浸炒叁兩 防

風壹兩 荆芥五錢 生苡仁叁兩 生木香叁錢 砂仁叁錢 雄黃叁錢 各藥酒拌  
共入鴨腹內用線縫口入瓦罐內用無灰陳酒叁四觔浸之封口入鍋內重湯煮四炷香去  
藥只將鴨酒分作七八次熱服之服完以大便放屁為驗忌鹽醬醋油膩氣怒生冷之物其  
效如神

●硝牛肉 治鼓脹神效 黃牛肉壹觔以河水煮極爛加入皮硝壹兩隨意食之貳  
叁日其腫即消至重者再服壹觔全愈百日內忌食鹽醋葷腥油膩生冷及堅硬之物 (一  
又方) 五月五日取大蝦蟆壹個入硃砂七錢於蝦蟆腹內懸至次日以黃泥裹之火煨  
存性研末每早五釐白水送下 (又方) 年久皮鼓當中壹塊燒灰存性研末好醋調服  
(又方) 苦丁香即甜瓜蒂乘未熟時以手摘下曬乾五錢研末白湯送下

●水鼓方 地栝萋即蘿蔔 生白朮 各等分煎服

●香中丸 治鼓脹發腫 陳香櫟去穰四兩 真人中白叁兩 貳味共為末每服

貳錢用猪苓澤瀉煎湯空心送下忌鹽叁月即痊

●水鼓腫脹方 大蒜壹歲壹頭以沙糖煮爛不拘時吃極效忌鹽叁月 又水腫部

內烏魚方治水鼓奇效

●水鼓小便淋閉 氣鼓方 木香六錢 檳榔 姜黃 黑丑各叁錢研細末每服

參錢空心酒送下 (又方) 陳香圓壹個 蘿蔔子貳合水酒各壹鍾煎八分服 (又

方) 生鮮香附 鮮荷葉共搗汁加生姜汁少許溫熱老酒送下 (又方) 五穀蟲洗

淨炒黃色為末用黃米飯和為丸白滾湯下 (又方) 用陳久大麥芽煎湯服之

●鼓脹仙方 用白童子雞不拘雌雄用竹刀宰殺不可下水將肚雜取出塞入大蒜

頭在內縫好不用鹽將碗蓋好不可出氣隔水蒸熟每日當藥服之即愈忌鮮物鹽物 (

又方) 胡蘆筍經霜雪者煨灰存性老酒冲服空心下之

●浮腫脹滿 即氣鼓也 猪肝壹具洗淨切碎用葱豉姜椒炙食之或煮羹食亦可

●脹滿不食 猪脊肉煮熟切片用生蒜薤拌食之

●腫滿並肚腹鼓脹 蘿蔔子壹兩微炒水壹碗煎數滾服之 (又方) 獨頭大蒜

煨熟去皮綿裹塞糞門冷即換亦治關格脹滿並大小便不通

●似鼓脹症 凡小腹及胸腹猝然鼓脹小便不利有似鼓脹症者即用蛤粉搗大蒜

如泥為丸如豆大每服貳十九滾水送下小便利則鼓脹自消矣

●治氣鼓氣脹 蘿蔔子貳兩研末再以生蘿蔔搗爛和子末絞汁將砂仁壹兩浸汁

內壹宿撈起晒乾再浸再晒七次為度研為末每服壹錢米飲調下立效

●治鼓脹已驗方 老絲瓜絡壹條切細用巴豆七粒打碎同絲瓜絡炒待絲瓜絡炒

成黃色去巴豆留絲瓜絡 白糯米壹升淘淨瀝乾即將前炒黃之絲瓜絡乘熱同糯米共炒待米炒至黃色又去絲瓜絡 將炒米磨成細粉早晚開水拌食不可用鹽或入秋石少許亦可此方平穩簡便而極神效

水腫

●治通身腫滿 土炒白朮 澤瀉各壹兩 研為末水丸梧子大每服叁錢赤茯苓

煎湯空心服 (又方) 赤尾鯉魚壹個破開不見水不用鹽醋醬以生礬五錢研末入腹

內用紙包裹外又以黃泥包裹放火內煨熟去紙泥連粥食之先食頭上腫消後食尾下腫消壹日食盡屢試皆驗 (又方) 冬瓜任意食之連食叁四日即效切不可用鹽醬

●水腫從腳入腹則殺人 赤小豆壹斗煮爛取汁五升溫浸足膝若已入腹但食小豆勿雜食亦愈

●治水腫垂死諸醫不治 大繇十個搗爛如泥入蛤粉為丸如梧子大每食前白湯送下貳拾丸服完小便下數桶而愈

●治身面浮腫 用烏豆煮至皮乾為末每服貳錢米湯送下

●治日腫夜消為陽水 敗荷葉燒存性研末每服貳錢米飲調下日服叁次

●治腹腫四肢消瘦為石水 苦瓠瓢炒壹兩 杏仁去皮尖炒五錢共研末糊為丸



如小豆大每服十九米飲送下日服叁次極效

●土狗散 治水腫神方 土狗瓦上焙乾為末服之 土狗用上半身即能消上身

之水腫土狗用下半身即能消下身之水腫用左可消左用右可消右真奇術也屢試屢驗

●大戟棗 治水腫腹大遍身浮腫 紅棗叁觔 紅芽大戟壹觔用水共煮壹日壹

夜煮乾去大戟將紅棗晒乾食之水腫立消

●金蟾肚 治水腫神效 蝦蟆貳個放在猪肚內好酒煮壹伏時去蝦蟆將酒吐盡

吃大便屁放自多其腫自消神效 一方加砂仁壹錢胡椒壹歲壹粒 (又方) 烏魚壹

個去鱗甲腸雜洗淨入大蒜於內壹歲壹瓣用濕紙包裹外再和黃泥封好包裹火煨熟為

度取出食之屁下即愈

●藥赤豆 治水氣腫脹 赤小豆半觔 大蒜頭叁個 生姜五錢 商陸根壹兩

右方用水叁大碗同煎俟豆熟透去姜蒜商陸根以汁拌豆空心食之食完腫自消奇效

(又方) 土狗焙乾為末壹錢 甘遂末壹錢 商陸根搗汁壹調羹叁味調勻用白滾湯

食前服下小便通即效忌鹽百日

●螺蒜掩臍法 治水氣浮腫 田螺貳個 大蒜去皮壹個 芥辣子貳錢以上叁

味共搗勻隔帛貼臍上壹寸至壹周時水從小便而下 (又方) 治水腫 大鯽魚壹個

去腸雜留鱗 商陸貳兩 赤小豆貳兩共填滿魚肚內紮定水煮極爛去魚商陸 用豆

並汁飲之不過叁次其腫自消 (又方) 冬瓜不限定多少可以任意多煮常食之或取

汁服亦可 (又方) 薏苡仁炒黃研末每服叁錢鹽湯送下此皆消水腫之妙法 (又

方) 黑丑六錢 木香 檳榔 姜黃 各叁錢共研細末每服三錢空心酒送下

●水腫神效方 土狗子七個焙乾去頭足為末燒酒調下水自小便出叁次全消

陰人用陽陽人用陰更效 桐按土狗即蜈蚣亦名蜈蚣杭人稱為地狗兒

●治周身發腫方 真沉香五錢 針砂貳錢 青礬叁錢半 蒸熟灰麴炒乾八兩

以上共研細末 另用黑棗煮熟去核搗如泥和前末作為丸如梧子大每日早晚服貳錢

開水送下

●四肢浮腫 用黃瓜壹條切開不去子以醋炙半條以水炙半條俱令爛空心同燉

服

●虛腫 凡男女下元虛腫服健脾藥及腎氣丸不效者急宜服此名二天同補丹

白朮醋炒壹兩 真雲苓五錢 芡實壹兩 懷藥炒壹兩 訶子壹錢 百合五錢 肉

桂叁分 煨姜皮為引服五六劑即愈

●氣滯虛腫 陰芋蒿煮泥鰍吃數次或煮猪肚猪大腸亦妙肚腸洗淨

●男婦虛腫已驗方 焦朮壹兩 苡米壹兩 懷藥五錢 台黨六錢 真雲苓壹兩 枳殼貳分 上桂貳分 神糶八分 車前子壹錢 萊菔子八分

●石水腫症 小腹及腿足皆腫而脹 大鯉魚一尾 醋叁升 煮乾食之 壹日壹服

(又方) 大鯉魚壹尾 赤小豆壹升 水貳斗 煮食汁壹頓 服盡 當見下痢為愈 並治孕

婦水腫同方

●風水腫症 身面皆腫 用黃母雞生下之雞蛋黃白相和塗腫處 乾再塗之 並治

一切腫毒皆效

●水病足腫 葱子煮湯漬之 冷再兑熱日浸叁五次

### 黃疸

按黃疸之症乃由肝胆之熱令人目黃甚至遍身金色久則腰膝腿腳俱黃

●黃疸通治方 各種黃症皆治 茵陳貳兩 矮黃梔子根叁兩 共煎湯數升 自早

至晚以此當茶飲之 不可飲茶至七八日黃漸退 十餘日全愈 (又方) 蚯蚓糞韭菜地

內覓來焙乾研末 紅糖水調服 (又方) 雞蛋壹個連殼燒灰 存性研末 醋調溫服 以鼻

中蟲出為效 極黃者不過叁枚即愈 (又方) 陳臘肉數片 稻草包裹燒灰 存性研末 用

雞子清調如膏藥樣貼臍上 壹日壹換 六七次即愈

效  
●五種黃病 身體微腫汗出如黃漿汁 用生茅根壹把切細合豬肺煮作羹食極

效  
●腹脹黃腫 亞腰葫蘆連子燒灰存性每服壹錢食前溫酒下不飲酒者白湯下十餘日見效

●傷酒成黃疸症 老絲瓜筋燒灰存性研末滾水調服毒自小便出奇效 (又方)

萱草根搗汁水冲服極效 桐按絲瓜治黃疸已有多人見效

●食積黃疸 絲瓜連子燒存性研末每服貳錢因麵得病麵湯下因酒得病溫酒下連進數服即愈

●黃疸如金小便出血 用生蔓菁子末煎湯壹日數服即愈

●猪胆酒 治黃疸痧 猪胆壹個將胆汁冲入白酒娘內每日空心溫服連服五胆

其病即愈或嫌胆苦用米粉和胆汁為丸白酒送下務要每日服壹胆五日服完其病如失

●猪胆蛋 治黃病極效 猪胆壹個 雞蛋壹個 共調勻不拘時服如嫌苦難下

用乾糕咽之連服叁次即愈

●絲瓜酒 治黃疸眼與週身黃如金色 絲瓜根用五六根搗爛水壹碗煎八分黃

酒冲服極效

●淨疸湯 治黃疸黃汗濕熱不清 淡豆豉五合 茵陳貳兩 猪苓五錢 生姜皮五錢 用水煎徐徐溫服

●砂米丸 此方治黃病兼治食積腹痛及手足癱瘓無力並小兒好食磚炭泥土茶葉等物效驗如神慎勿輕視 針砂用好醋浸叁宿炒紅色貳兩 糯米炒略枯壹兩 貳味共研細末用河井水各半調和為丸如梧子大大人每服貳錢小兒壹錢清晨米湯送下有病者叁服即效無病者亦可常服

●治黃疸神方 廣木香錢半 小麵饅頭五個 黑棗貳拾壹枚 將麵饅頭底下剝壹小孔每個填入廣木香叁分仍將原剝下麵填補孔處文武火煨成炭存性研末將黑棗湯泡去皮核搗如泥和煨饅頭末分作五丸每早用茵陳叁錢煎湯化服 (又方) 馬鞭草煎湯常飲亦效

●獨妙丹 治黃疸奇效 毛腳芹搗爛塗男左女右臂大肉上用蜆子殼蓋定以帛紮牢起小泡即愈忌食發物大葷壹月 茵陳菜治疸聖藥 茵陳蒿或作菜或作羹或蒸米麥飯日日食之數日即愈 茵陳鮮者細切乾者研末煮姜湯食之皆治黃疸症妙藥也

●時行發黃 用酒醋浸蛋壹宿食蛋白數枚即愈

●治黃黑二疸神方 此方專治患疸病者或嗅鼻內或塞鼻中俱可男左女右鼻有

黃水流出口驗 用苦丁香卽香瓜蒂壹兩炙研末嗅鼻內壹日數次或搓丸塞入鼻中亦可 又法取苦丁香將半生半熟者摘下用線穿掛空中陰乾極細末入麝香少許嗅之卽愈

### 痞積

●治痞塊 用玉簪葉 獨大蒜共搗爛 川山甲炒為末好醋和成餅量痞大小作

餅貼之只可兩炷香久為度其痞卽化為膿血從大便而出然須量人大小強弱貼之

又方) 青油壹觔煎滾 次下蜜陀僧六兩 羌活壹兩候成膏再下阿魏五錢 麝香

貳錢退冷火氣隨患大小攤貼立消 (又方) 大葶薺壹百個 古銅錢貳拾個 海蜃

壹片 皮硝四兩 燒酒叁觔共浸七日後每早吃四五個加至十個為止卽愈

●治積塊 不論男女老少及左右上下大小皆可治用南香附壹觔以醋浸四兩童

便浸四兩紅花煎汁浸四兩梔子煎汁浸四兩各浸叁日晒乾入乾漆末四兩同香附炒烟

盡吹去漆灰再用當歸酒浸炒六兩山查連核炒乾四兩蘿蔔子炒貳兩海粉洗淨貳兩共

為末醋糊為丸菴豆大每服壹百丸食遠茶下脾胃虛弱者白朮煎湯下

●腹中有塊如石痛如刀刺者 用商陸根不拘多少搗碎蒸之以新布裹熨痛處冷

再換

●腹中癖塊堅硬如石者 取白楊東南枝去青皮細切叁觔熬令焦絹袋盛用酒壹斗浸之密封數日每食前煖壹杯服之

●治痞滿 用糖坊內糖漿溫飲壹貳盞極效

●食粽成痞 用白酒醪貳丸焙燥研末清晨白滾湯下或酒下

●化痞膏藥 用桐油五兩 松香八兩 當歸壹兩熬枯去渣入乳香沒藥各壹兩

將起鍋時入真阿魏叁錢用紅絹攤膏先以生姜煨過擦肌膚方貼此膏頻將熱手摩之或炒熟鹽在膏外熨之更好 (又方) 用大蒜數個搗爛加大黃皮硝各壹兩共搗成膏貼

患處即消 (又方) 新鮮水紅花即水邊紅蓼花同老蒜搗爛量入皮硝壹貳兩捏成餅

比痞塊大壹圍貼痞上用帛紮緊乾再換貼其痞即消

●治一切癥瘕積聚瘰癧 水紅花即水邊蓼半老總頭葉帶子曬乾不拘多少量用

老蒜頭去皮膜同放石臼內搗如泥捏成餅曬乾為末每觔入蚶子殼煨灰存性研末四兩再將老蒜搗膏為丸如桐子大每服百丸白湯下壹日叁服極效

●諸物食積作痛 白茯苓 炒白朮 製半夏各壹兩 蘿蔔子貳錢 查肉壹兩

五錢 陳皮五錢煉蜜為丸彈子大空心米飲下壹丸 又酒積 用官料白酒藥炒燥研

細每晨開水調服叁錢連進叁服即愈 諸積作痛口吐清涎危急者用烏梅花椒生姜叁



味煎湯飲之即愈

●消痞去積丸 治一切痞積氣積酒積食積 黑豆 製香附 五靈脂各五錢炒

研末醋糊為丸綠豆大每服五分姜湯送下

●平肝消癥湯 治兩脅有塊動則痛靜則止日漸大面色黃吐痰此症惟婦人多有

之用酒白芍五錢 當歸身叁錢 焦白朮五錢 柴胡八分 醋炙鱉甲五錢 炒神

糶五分 炒山查五分 炒枳殼五分 白芥子五分 半夏五分 製香附五錢 水煎

服十劑消貳拾劑全愈按此方屢試皆效或加川芎及延胡索但不妥反易增痛

●桃紅膏 治腹脅積痛 風化石灰四兩鐵鍋炒熟入大黃末壹兩再同炒紅取起

入肉桂末五錢共扣勻米醋調成膏攤厚帛上貼之

●三妙膏 胸腹脅肋積聚痞塊貼之甚效 松香煎四兩 草蓆肉去殼貳兩 皮

硝五錢 共搗成膏量痞大小攤青布上再加麝香叁厘貼患處極效

●消積丸 治米麥菓菜肉食積滯 綠礬炒紅貳兩 炒山楂 炒麥芽 陳皮

煨草菓 檳榔 三稜 莪朮 生木香不見火神糶 共研末用大腹皮四兩煎湯與神

糶打糊為丸每服叁錢米飲湯下

●男婦痞塊方 雞蛋五個 阿魏五分 黃蠟壹兩 調勻煎餅分作十塊每早吃

壹塊滾湯下諸物不忌腹痛無妨大便解下膠漆即散矣（又方）全白鵝之血向口中  
宰之乘熱服下四五次如盛碗內則腥氣難食此方既治噎隔又治痞塊均極神效（又  
方）甲魚壹個約重半觔搗爛加麝香叁分數患處俟魚肉乾則愈

●咳嗽諸方

外感風寒咳嗽初起用生姜叁錢連皮搗爛白糖叁錢煎湯服蓋被

取汗即愈

又款冬花研末

姜汁五錢

黃米糖貳兩炖化熱服

又桔梗六分

川貝

母壹錢

白菊花壹錢

水梨肉壹個水煎服

（又痰火久咳方）生姜汁

蘿蔔汁

梨

汁 白蜜各四兩

白糖貳兩

紫蘇

杏仁各壹兩研末和前汁熬成膏不拘時服（又

陰虛火嗽方）絲瓜燒灰存性研末棗肉和丸如彈子大每酒化下壹丸

又痰喘咳嗽方

好茶葉末

白殭蠶各壹兩共末臨臥開水冲服

又方

川貝母壹錢

炒枳殼壹錢

蘇葉壹錢

甘草壹錢

蘿蔔汁壹鍾同酒煎服

又胡桃肉叁個和生姜叁片

臨臥

細嚼就枕服

又姜汁壹小杯

梨汁

蘿蔔汁

茅草根汁各壹碗

白蜜四兩共入瓦

罐調煎不拘時冲服（又消痰止咳膏）白米糖壹觔

猪板油四兩

穀雨前茶葉貳兩

水四碗先將茶葉煎至貳碗半再將板油去膜切碎連茶葉米糖同熬化收貯每以白滾湯

冲數匙服（又咳嗽氣喘方）杏仁去皮尖胡桃肉等分研如膏入蜜少許和丸如彈子大

每服壹貳丸臨臥細嚼姜湯送下

又蕎麥粉四兩

茶葉末貳錢

白蜜貳兩

水壹碗

順手攪千下必須壹順攪去不可倒逆飲之良久氣下即愈（又勞傷咳嗽方）真麻油  
白蜜各四兩煎數滾入雞蛋五個再煎數滾取出空心服連服數次自愈（又太平丸）治  
勞症咳嗽喘急久成肺痿肺癰天冬 麥冬 知母 貝母 款冬花 杏仁炒 各貳兩  
當歸 生地 熟地 黃連炒 京墨 桔梗 薄荷各壹兩 白蜜四兩共研細末和  
勻用瓦鍋先將白蜜煉熟後下各藥末攪勻再上火入麝香少許熬壹貳沸作丸如彈子大  
每日服叁丸口中噙化（又氣嗽痰喘咳吐膿血方）萊菔子炒研末煎湯服之（又咳嗽  
不止胸膈氣壅滯方）取桃仁壹升去皮尖銼皮同炒為黃色研細貯瓶中以酒五升浸蜜  
封叁日後每溫服壹鍾日飲叁四次 又蟬蛻七枚研末粥飯調服（又多年哮喘痰多咳  
嗽）明礬壹兩 硃砂四錢共為細末飯糊為丸每晚臨臥送下七丸藥完自愈名滾痰丸  
並治傷風咳嗽（又肺燥咳嗽方）松子仁壹兩 胡桃仁壹兩和熟蜜共研如膏收之每  
服貳錢食後水冲服（又肺虛咳嗽方）猪肺煮熟蘸苡仁末食之（又冷氣咳嗽方）乾  
生姜或加飴糖以熱酒冲服（又氣逆咳嗽方）杏仁連皮炒研熟蜜和為膏含嚥自止（  
又勞嗽方）大白蘿蔔壹個挖空入冰糖填滿於飯鍋上蒸熟露壹宿溫熱食之（又久嗽  
氣急方）知母去皮毛切片炒壹錢 杏仁姜汁泡去皮尖炒五錢水煎服次以蘿蔔子杏  
仁等分研末米麵糊為丸梧子大每服五十丸姜湯下（又久嗽言語不出方）訶子壹兩

去渣杏仁壹兩去皮尖 通草貳錢共剉每服四錢煨姜五片水煎服 又真蘇子貳兩  
訶子叁兩 山查叁拾個 百草霜叁兩共為末每服貳錢熱酒調服（又久嗽聲啞方）  
青蒿不拘多少童便煮服（又男女咳嗽吐血方歌）叁兩蘇油四兩蜜叁兩生姜自然汁  
明礬訶子各五錢文武火煎黑如漆不論臨睡並起早遠年咳嗽無踪跡（又老年人痰喘  
咳嗽氣急胸滿極能調和胸胃）紫蘇子 蘿蔔子 白芥子等分晒乾微炒研細隨飲食  
啜之（又咳嗽已久朝暮更甚者）川貝母去心研末冰糖等分每用貳錢滾湯調服數日  
漸次而愈（又久嗽不止方）貝母壹兩研細末蜜為丸龍眼湯送下立止 又豬肺壹具  
姜汁半盞 白蜜四兩 杏仁四十九粒共入肺內煮熟睡壹會將肺吃下可止又百部壹  
味熬膏入蜜不時服 又真蛤粉瓦煨加青黛少許淡蘆菜汁並麻油數點調服貳錢極效  
又桔梗茯苓貝母甘草玉竹沙參麥冬蘇梗百部等分水煎服 又三月三日薺菜有花  
者連根拔起掛簷下陰乾煮食數次不可加鹽 又鯽魚骨燒灰研細末飲服均極效（又  
五汁肺治虛勞咳嗽見血神效）用健豬肺壹個不落水去膜扯碎忌鐵器 人乳壹碗  
藕汁壹碗 青皮甘蔗汁壹碗 水梨連皮汁壹碗童便壹碗多加尤妙用瓦鍋同肺煮極  
濃極爛加入懷山藥茯苓末搗和為丸早晚用開水送服貳叁錢奇妙異常（又咳嗽祕方  
）胡桃肉壹觔去殼切勿去皮 白蜜壹觔將豬板油壹觔熬取汁去渣再將胡桃白蜜入

油滾熱貯磁器內每早取貳兩滾水冲服雖一年半載之痼疾亦可漸次減除精神復舊不可妄投補劑為要

●哮喘痰厥（哮喘方）每早空心吃苡仁粥壹碗神效 又無論遠年近日冷熱哮喘

病於三伏日將生老姜切片日晒夜露四十九日足雨天不算晒露足後將姜片研細末磁瓶收貯聽用再用糯米升半白米升半磨成細粉用時以粉壹貳合水和勻用姜末作包心餡子搓成湯圓待病人熟睡預備滾水煮熟湯圓輕輕喚醒病者即與之食或九圓十壹圓須成單數小兒減半每夜食壹次久食自愈（又哮喘奇方）殭蠶七個焙黃研末米湯送下其效如神 又方取鹽蝙蝠壹個去毛焙燥研細末黃酒冲服（又哮喘氣急方）核桃肉壹兩 細茶末五錢入蜜叁四匙搗成丸如彈子大不拘時含入口中噙化嚥下（又

方）半夏前胡當歸厚朴陳皮肉桂甘草蘇子沉香香附共研細末每服數挑滾水冲服（又痰哮方）川棟子壹兩 枳殼五錢 製香附壹兩 生牡蠣七錢 生地栗壹兩

青鹽叁錢共研末水泛為丸每早吞服叁錢（又痰喘氣急方）用梨剝空中心納入小黑豆令滿留蓋合住紮緊以糠殼火內煨熟搗作餅每日食之 又咳嗽方內滾痰丸極妙

（又痰厥方）白礬壹兩水壹碗煎半碗入蜜少許再煎少時溫服得吐即愈如不吐再飲熱滾水壹盞吐之自安

●痰迷心竅方 陳胆南星貳錢 廣木香叁錢 天竺黃 茯神 沉香 石菖蒲

遠志肉 甘草汁炒 淨棗仁 辰砂各貳錢共研細末每服叁錢姜湯送下 (又方)

石菖蒲 生姜共搗汁灌下即愈 (又風痰方) 萊服子生用研末水冲服之得吐即愈

(又中痰方) 生明礬末調陰陽水灌之再服再吐極效如不吐再用明礬煎熟湯催之

(又胸膈積痰方) 取頂大葱白頭貳叁拾個略搗爛入鍋內炒熟俟微溫塗敷胸坎不久

痰即盡出

吐血門

●吐血驗方 凡吐血症切不可吃藥誤用寒涼之藥固不得法而驟投滋補之劑亦

非所宜惟有童便壹味最良或服自己小便更妙名曰回龍湯可以除根戒房勞忌食羊肉

雞酒葱蒜姜椒辛辣發物每日早起先將隔宿小便溺去再將第貳次小便用潔淨大碗盛

之其色白其味淡即乘熱吃下隨以南棗貳枚口含咀嚼自不惡心如小便黃濁者不可吃

即用開水壹碗少加白糖待溫飲之閉目靜坐其小便必然清如泉水日日飲之不可間斷

久服常服不惟吐血可以除根而精神身體益加強壯其功最大奇驗奇靈誠吐血症第壹

良方 (也又吐血經驗方) 取馬桶碱壹大塊即多年馬桶底下結成糞尿礮者是也囓倒馬桶者留心

取之用陰陽瓦略煨存性研末另用黑棗去皮核蒸熟搗爛加入馬桶碱末和勻為丸每服



叁錢白湯送下已見奇效相按自己小便亦名還原酒不如童使之有效仍須去頭及脚用

●勞病嘔血氣弱等症 大黑棗數筋裝紅布袋中用線蜜縫浸尿桶內童使更佳至七晝夜取出漂淨去皮核另用蓮子肉磨成粉搗和為丸如桐子大每早開水送下叁錢切勿輕視屢見奇效相按浸童使服已有多人見效

●吐血仙方 不論何經之血俱效 蠶豆花必須莖上第壹朵陰乾研末煎湯頻飲即止并可除根如無花時即用葉抽去筋陰乾煎湯服之亦效

●引血歸源方 忽然血暈吐血多至數升者一時切勿服藥急服童使貳叁碗後得血止神安再用廣西真山羊血臨臥每服叁分不過叁服引血歸源即自止矣

●吐血除根方 生西瓜子貳升淘淨泥灰用大砂鍋濃煎瀝清加入冰糖少許代茶飲之常服勿間斷可以除根至輕至微之物竟能大效大驗

●勞傷鬱悶吐血 全黑豬蹄四個要猪身上無一雜毛者加入六月雪草用瓦罐澆水勿加鹽煮食極效

●勞心吐血 蓮子廿壹粒磨為末酒調服食後久服自愈（又方）蓮子心七個糯米貳十壹粒為末酒調服或用墨汁作丸服之

●卒暴吐血 海蝶蛸研末米飲下壹錢 又藕節蒲黃血餘燒灰等分研勻開水調



服 又廣陳皮生粉草研細末每錢半酒調服

●傷肺吐血嘔血 白芨數兩炒黃色為細末每服壹貳錢晨早米湯送下

●嘔出全是血 此血從胃中來 韭菜 茅草根 藕節 側柏葉 荷葉 以上

五味或全用或隨使用俱取汁 磨陳墨五分 姜汁叁匙冷服寒天則隔溫之如無陳墨

則用童男剃下頭髮洗淨瓦煨研細過篩調汁服

●吐血成盆 貫眾五錢研末 黑頭髮五錢瓦煨研細 扁柏葉多用搗汁壹碗入

末於汁內隔湯煮壹炷香取起加童便壹杯黃酒壹小杯徐徐飲之

●咳嗽吐血 木耳壹兩 槐米壹兩即槐子不開花者荆芥壹兩 蒲黃壹兩俱炒

黑共為細末每早服叁錢米湯送下

●痰嗽帶血 大柿餅飯上蒸熟批開入真青黛壹錢臨臥常服壹枚效

●吐血諸方雄猪肺壹個須不見水入童便內浸壹晝夜取出再用藕汁入乳童便梨

汁梨連皮搗取汁蘿蔔汁杏仁汁各壹碗不加水入瓦罐用炭火煮爛忌鐵器將炒糯米粉

收乾為丸每日早服叁四錢即愈 (又方) 用雞蛋壹個打開和叁七末壹錢藕汁壹小

杯陳酒半小杯隔湯炖熟服之不過叁五次即愈 (又方) 用少壯人亂頭髮以肥皂水

洗淨晒乾燒灰存性用絹包煎湯服之 (又方) 側柏葉童便炒黑枇杷葉刷去毛淨

藕節共煎湯服數次 (又方) 益母草搗汁壹杯童便壹杯炖熱服無鮮者以乾益母

草叁兩煎湯兌童便服亦可 (又方) 七星草葉背有似骨牌點卅貳張全者煎湯服之

(又方) 舊襪底灰黃酒冲服去渣 (又方) 藕節 蒲黃炒 扁柏葉 丹皮 白

茅根各壹錢 水煎兌童便壹鍾空心服忌食煎炙 (又方) 黑姜灰為末童便調服壹

錢 (又方) 側柏葉煎湯兌童便當茶常服 (又方) 新絲綿燒灰五分酒調服 (

又方) 藕節搗煎濃湯調白芨末服之即止 (又方) 兔首壹個整燒存性為末每服

貳錢黃酒調下 桐按七星草杭州花塢有之但亦不易覓得俗稱骨牌草

### 瘡疾

●瘡疾初起 生姜搗自然汁半杯露壹宿發日五更時面北立飲即止 又牛膝草

根水煮當茶不時服之 (又方) 南蒼朮米泔水泡炒黃厚朴姜汁炒陳皮各貳兩 生甘

草 製半夏 藿香各壹兩共研末葱姜自然汁和丸桐子大每服叁錢開水送下 (又治

瘡神方) 姜皮陳皮山查麥芽神糶各壹錢冰糖水調服極效或五月五日修合更妙 (

又方) 生首烏五錢 青皮 陳皮各叁錢用酒水各半煎服不論久近皆效 凡治瘡

疾無論陰瘡陽瘡總以前十五卷倪涵初瘡疾叁方依次服之無不應手取效屢試屢驗

●治瘡屢效方 青皮醋炒 陳皮 姜皮 白朮 柴胡 桔梗 製半夏各貳

錢水煎六分 另用山查貳兩水煎四分和在壹處露壹宿次早溫服 (又方) 能飲酒者用白糖四兩 燒酒半觔瘡來時燙極滾盡量飲之 (又方) 當歸 茯苓 陳皮各壹錢 甘草五分用好燒酒浸壹宿臨發時去渣溫服量大者加倍服之必須多服數次瘡必止 (又方) 棉花子 胡椒各七粒為末病前壹時燒酒送下蓋被蒙睡取汗即愈

●間日瘡疾 蜜陀僧六分研極細白洋糖五錢未發時早壹刻熱酒調服小兒用叁分之壹 又截瘡丹五月五日取獨頭蒜不拘多少舂爛加入好黃丹再舂作圓如圓眼大晒乾收貯凡瘡疾發過貳叁次後臨發日雞鳴時以藥壹丸略槌碎取井花水面東服之即止 又經驗方用陳乾香櫟壹個破開以雄黃末壹錢置其中仍以香櫟合攏放瓦上火煨存性研末空心淡姜湯下七分老弱者減叁分 又男婦胎瘡及陰陽瘡均治方 蟹甲醋炙貳錢 常山酒炒壹錢 枯苓壹錢 桃枝叁個煎服即愈

●三日瘡方 甲魚殼用醋炙透青蒿等分共研細末每服叁錢或酒或水早一時沖服 (又三日瘡方) 每日用冰糖五錢煎湯飲之十服必愈 (又方) 雄黃叁分 蜜陀

僧叁分共研細將燒酒壹小盃炖熱沖藥臨發向東服勿使四眼人見用被蓋煖取汗即愈

(又方) 生姜 細茶 山查 柴胡各貳兩用酒河水井水各壹大碗煎露壹宿次早溫服 又獨蒜壹枚 黃丹壹錢搗和分作叁丸於發日早起向東以井花水送下壹丸連

服叁日效（又三陰瘡驗方）絲瓜絡貳個 熟麵和菊花汁少許填入絲瓜絡內以刀切片不拘多少以荳油煎熟露醋浸壹宿隨量食之其瘡卽化叁次除根永不再發（又三陰瘡方）烏梅叁個 陳皮 青皮 當歸 知母各叁錢水煎服五服除根如初起加川山甲炙叁錢同煎服卽愈

●瘡疾外治各方 胡椒 硫黃各叁厘研末糝膏藥上貼背脊之正對肚臍眼處過期卽愈 又明雄黃 製附子 真樟腦各等分為細末於瘡未發前一時以棉花少許包裹藥末叁分塞鼻孔中男左女右塞藥後勿食湯水睡過此時卽愈重者依法塞貳叁次必效小兒量為減用 又葶撥研細置煖臍膏上貼臍中叁日可愈 又治間日瘡方 明雄黃

獨頭大蒜於端午日午時將粽子尖搗爛和丸如桐子大硃砂為衣叁發後清晨貼在眉梁間以太乙膏蓋之卽愈 又用旱蓮草搗爛置左手寸口上以古錢壹文壓定將帛條包紮良久起小泡謂之天灸止瘡甚效 又小兒瘡以蟬蛻貳叁兩包好與兒作枕其瘡卽止

●祝由科治瘡法 不論桃杏棗栗或乾葉用壹枚念咒曰吾從東方來路過壹池水水裏一條龍九頭十八尾問伊吃甚麼只吃瘡疾鬼念壹遍吹氣壹口在菓子上連念七遍吹七次卽將菓子令病人食之須於五更時雞犬不聞面向東立念之忌食葷腥生冷此方無藥之處濟人甚效（又方）清晨日未出時脫下病人貼肉衣壹件用小蠶壹個將衣

服入蠶內令病人吹氣叁口入蠶即以紙封蠶口紮住送去僻靜處行此法時不令人見見則不效（又方）五月五日取全本時憲書燒灰以雄黃酒調和為丸如桐子大每清晨

開水吞下壹丸止瘡甚效 又瘡發過叁次後於未來先壹日用川貝母末叁錢黃酒冲服

盡量而醉外用老姜壹塊搗爛敷海眼穴即是後頸齊領圍骨處以筋骨痛膏蓋貼蒙被熟睡取汗而愈愈後須多貼幾日方不復發忌食南瓜芋芡雞鴨蛋等發物百日

●熱瘡熱多寒少 川山甲壹兩紅棗十個同燒存性為末發日五更用井華水調服叁錢叁服即愈

●寒瘡寒多熱少 生姜四兩 連皮搗汁壹鍾露壹夜空心冷服

●久瘡不愈 白朮土炒為末每服貳錢酒調服十劑除根此脾寒瘡 又久瘡方蕎麥細麵不拘多少以活鱉魚刺血和為丸陰乾未發之先預服叁錢白滾湯下 又老瘡

經年不愈方 用龜板以醋炙酥存性研末酒調每服貳錢均極效

●久瘡腹中結塊名曰瘡母 醋炙鱉甲 土炒白朮 蜜炙黃芪 酒白芍 川芎

各壹錢 炙甘草五分水煎服

●孕婦胎前發瘡乍寒乍熱 夜明砂叁錢空心用茶調服瘡 痢不止 龜殼燒存

性研末酒調服少許極效

●却瘡痢百病法 立秋日五更時取井華水閤家長幼各飲壹杯全家可免瘡痢一切病症

●新久瘡疾驗方 土炒白朮 芥菜子各叁錢 乾姜貳錢 姜半夏壹錢水煎叁服即愈

●久瘡成痞 凡多年瘡痞遇秋即發服此藥壹貳兩無不斷根初瘡發過多日後亦可服 常山壹觔切極薄之片用鹽與礬醋五觔煮乾晒叁日再煮貳次晒乾後研細末雞心檳榔半觔研細末貳味和勻用醋糊米粉為丸如桐子大每服叁錢小兒減半

### 霍亂

●霍亂症 本草從新集註云霍亂有寒熱二症倉卒患此脈候未審慎勿輕投偏熱偏寒之劑曾見有服姜湯而立斃者凡一切霍亂最忌滾湯滾水及米飯粥飲姜椒忌物食之不救凡吐瀉交作名濕霍亂猶易治惟心腹絞痛不吐不瀉者為乾霍亂症最危險稍為遲緩多致不救無論症勢緩急惟有查照卷十五霍亂症內用鋒利碎磁片刺少商穴委中穴二處使出血即愈誠百發百中真霍亂各症及絞腸腹痛外治第壹簡便仙方也屢見奇效用鋒利磁針略刺破皮只要見血並不傷痛立刻起死回生其靈驗好過服藥尤更效速奉勸老幼男婦小孩切勿疑畏廣為傳人功德無量窮鄉僻壤倉卒夜深一時無處覓藥者



受惠實非淺鮮。相按少商穴在兩大指甲之兩旁與指甲處相齊。先從手臂膊捺至指尖。後刺委中穴在兩腿灣先用手蘸水拍打顯出紫紋。卽效。

●霍亂諸方

用滾開水兌生冷水各壹半名陰陽水。加入生明礬末貳錢。調勻服之。

又方)

食鹽壹大撮。炒黃入童便壹大鍾。溫水兌服。少頃吐下卽愈。此二方治乾霍亂。

症上不得吐下不得利。肚腹絞痛。冷汗欲絕。服之奇效。(又乾霍亂腹痛方)食鹽壹兩。

牙皂壹錢。水煎服卽吐而愈。

又霍亂欲死不省人事。急刺十指頭正面。離甲分半處。出紫

血卽甦。

(又方)

用千里馬卽舊破草鞋煎湯服之。以手指探入喉中得吐而愈。使胃氣

一回霍亂卽解。

又吳茱萸叁四兩。食鹽數兩。炒熱用布包熨臍下極效。或卽用本人包

脚布或舊襪底。洗水澄去泥穢。飲之神效。

此均經驗良方也。取其簡便而極神效。(霍亂

腹痛吐瀉不止)

用藿香葉廣陳皮各五錢。煎水服之。又真茱豆粉和白砂糖少許服之。

又胡椒四十九粒。茱豆四十九粒。研勻以木瓜煎湯調服壹錢。

又乾佛手切碎煎湯飲。

之。又韭菜搗汁壹盃。以重湯煮溫服之。又白扁豆葉壹把。生搗入醋少許。絞取汁服之。

或白扁豆為末。和醋服。暑霍亂吐瀉不止尤效。又飲新汲水壹碗。再以水壹盆浸兩足。吐

瀉立止。忌食熱物。

又霍亂腹痛甚者。用食鹽炒熱。用布分作貳包。以壹包熨其心胸。肚腹

以壹包熨其背。腿手足此法極妙。

又用皂角研極細末。吹入鼻中。或卽用聞鼻丹。或痧藥。



均可得嘔即止 又選潔淨黃土地處掘叁四尺深坑入新汲水壺補用棍亂擾混濁連泥帶水取起澄清飲之各地漿水服之即解並解一切中毒極效 霍亂轉筋心腹脹痛手足厥冷 以大蒜搗敷足心 (炒鹽熨法) 吳茱萸炒鹽熨臍下均極神效 又木瓜壹兩水煎服仍用木瓜煎濃湯浸青布裹其足 (腿轉筋上入腹) 木瓜貳錢 吳茱萸壹錢 食鹽五分水煎服 又樟腦兩許壹大塊布包好入燒酒內浸透濕由背脊往下順擦至尾間數拾次即愈 (霍亂吐瀉頭眩眼花及轉筋腹痛方) 百草霜即燒茅草鍋臍煤灶櫃烟煤各五分共研細滾湯順調千餘下待溫服之立效 又用大蒜瓣嚼爛涼水吞下 又白馬糞燒灰存性研末五錢入新黃土五分溫水調服 又舊小梳壹柄燒灰研末溫水調服

●時疫痧氣霍亂良方

即脚麻肚痛症也

辣蓼草半觔搗爛

宣木瓜四兩切片

福珍酒貳觔即好黃酒亦可加河水煎湯乘熱抹洗手足及麻木之處極效 辣蓼草似

水紅花而小其葉狹而光其花若穗其色淡紅其梗微紅有節其味辣者是也此草田間俱有可預為採好以便濟急本草云味辛溫無毒專治天行時疫霍亂轉筋極為神效 (霍亂乾嘔不止) 薤子煎汁服之即止

肚腹泄瀉

水瀉初起 細茶葉貳錢 核桃仁五個燒焦 生老姜叁錢 紅砂糖叁錢水煎

空心服 又山楂炒焦研末加紅糖調服（又暴瀉不止小便短少）車前子炒為末每服

貳錢米飲下並根葉搗汁服亦妙 脾胃虛寒者不宜服 又因瓜果食多水瀉用好橘餅

壹個切薄片作貳次滾水泡服 又車前子 澤瀉 厚朴姜汁炒各壹錢共為末水調服

又茯苓貳錢 厚朴壹錢半 陳皮壹錢 枳殼炒貳錢 甘葛壹錢 川木瓜貳錢

陳石榴酒炒貳錢 紅棗煨姜引水煎服

●脾虛泄瀉凡久瀉每早溏瀉壹貳次此係脾虛用此補脾養胃而瀉即止 土炒白

朮貳兩 白茯苓貳兩 小茴香炒壹兩 肉蔻煨壹兩 鹽水炒破故紙貳兩 木香五

錢共研細末用生姜煑紅棗肉搗如泥和藥為丸梧子大每早空心服叁錢白湯下 又核

桃肉用鹽炒熟不拘多少每日隨意食之久食自愈 又川花椒炒研細末每日加入飯菜

內食之極效 又土炒焦朮 炒乾山藥 陳米炒老黃色各貳錢加黑沙糖少許水煎服

又訶子壹枚以濕草紙包裹煨熟去核 肉果壹枚麩裹微火煨黑色共研末每服五分

米湯下不論老幼男婦及噤口瀉痢服之皆效（老年人脾虛五更泄瀉方）老陳米半升

炒叁次成老黃色 蓮肉貳兩 炒 焦朮 乾姜各貳錢 木香壹錢共研細末加白砂糖

壹兩每服叁錢空心白湯下其效如神可以常服 又水瀉不止方 炒蒼朮 猪苓 澤

瀉 焦朮 陳皮 茯苓各錢半 肉桂 甘草各八分水煎服忌生冷（又脾虛瀉方）  
烏骨母雞壹隻洗淨腸雜用肉豆蔻麩裹煨壹兩草果仁麩裹煨貳枚燒存研末糝入雞  
腹內紮定煮熟空心食之（又方） 山藥切片炒黃研末調入粥內食之（又脾瀉腸滑  
方）石蓮肉炒為末每服貳錢陳倉米調下均極神效

●膽瀉年久不愈方 魚瞍炒 芡實 茯苓 茯苓各四兩 苡仁炒八兩 蓮肉  
去心六兩 兔絲餅叁兩 燒飯鍋巴五十一兩共研細末每早滾水調和少加糖食之  
如肚瀉甚者再加川椒末五錢

●腸滑久瀉方 石榴劈破燒存性烟將盡急取出放地下以碗覆之免成白灰研為  
末每服貳錢以酸石榴壹片水煎服

●因食滯泄瀉方 山查神糲麥芽蘿蔔子各等分水煎加紅白糖沖服（無論何項  
泄瀉）用米壹碗炒候冷再炒連炒叁次成老黃色水煎服之老年脾虛腸滑久瀉無不神  
效

### 痢疾

●痢疾各方 痢疾初起即用山查瓦上炒黃色每服五錢水煎濃汁調紅白糖每日  
四五次服之可免成痢老幼男婦皆可服又五穀蟲瓦上炒黃色研末加紅白糖調滾木沖

服 又雞內金即雞肫皮瓦上焙枯存性研末或加石蓮子研細末加紅白糖調水冲服  
又治痢甘露飲烏梅去核叁錢山查去核五錢白砂糖貳錢或煎或泡不時代茶飲之又姜  
茶飲治赤白痢寒熱瘧及嘔吐等症初起陳細茶葉老生姜各叁錢赤痢留皮白痢去皮水  
煎服 又乾馬齒莧蒸熟紅白痢加紅白糖多食為妙

●參香丸 治紅白痢極放苦參六錢木香四錢不見火甘草五錢共為末飯搗為丸  
加梧子大每服壹錢 紅痢甘草湯下 白痢姜湯下 紅白痢米湯下 噤口痢砂仁蓮  
肉湯下 水瀉猪苓澤瀉湯下

●治痢神方 淨查肉炒四兩 車前子叁兩 砂仁末 廣木香不見火各五錢共  
研末紅痢加白糖白痢加紅糖紅白痢紅白糖並加每服叁錢滾湯調下小兒減半孕婦不  
忌此方初起極為神效並治泄瀉 (又方) 三月三日採薺菜花風乾俟秋間治紅白痢  
疾加紅白糖少許煎服即愈 (又方) 油當歸壹兩 枳殼叁錢炒 黃芩五錢水煎  
服渣再煎忌葷腥重用當歸取其滑潤枳殼專利大腸黃芩清暑解熱此方屢見奇效

●萬應痢疾丸 油當歸八錢 陳皮壹兩貳錢 廣木香八兩不見火晒乾研末茅

山蒼朮鹽水炒 川厚朴姜汁炒 枳殼炒各壹兩貳錢 白豆蔻去衣炒 生甘草  
小木通 蓬朮醋炒各八兩 三稜醋炒叁兩 陳米壹升用巴豆四十九粒與米同炒至

米黃色為度選去巴豆將米磨粉入藥 共為細末荷葉煎湯泛為丸壯年每服叁錢老年減半小兒每歲服壹分 水瀉生姜湯下 肚腹痛枳殼湯下 紅痢甘草湯下 白痢生姜湯下 紅白痢甘草生姜湯下 停食陳皮湯下 如倉卒無引即用開水送下亦可傷寒後忌服 產後忌服

●香連丸

此丸清邪熱導滯氣行瘀血為治痢之聖藥服之神效 川黃連壹兩貳

錢 廣木香八錢不要見火 山查肉壹兩貳錢炒 川厚朴去粗皮姜汁炒 小青皮醋

炒各八錢 生甘草五錢 紅花叁錢酒洗 大黃貳兩酒炒 黃芩 大白芍各壹兩貳

錢 陳枳殼炒 尖檳榔各八錢 油當歸 地榆各五錢 桃仁六錢去皮尖 橘紅

四錢共為細末荷葉包米煨飯為丸每服叁錢扁豆花泡湯化下熱痢最為相宜服之神效

孕婦忌服 以上貳方須預為配製以便隨時濟人功德無量 又五月五日取完好葶

薺洗淨拭乾勿令損破放瓶內入好燒酒浸之黃泥密封收貯遇有患者取壹貳枚令細嚼

空心食之仍用原酒送下極效

●熱毒血痢

金銀花藤煎濃汁服之極效 又柿餅煎湯日飲數次

●久痢不止

用茄根燒灰存性石榴皮等分為末砂糖水調服即愈 又陰乾陳蘿

蔔葉煎湯服立止 又生老姜細茶葉韭菜連根搗汁叁味溫酒冲服

●治痢神方 油當歸壹兩 枳殼叁分 若欲速效紅痢加黃連壹錢 白痢加乾姜叁分 服之百發百中神效 噤口紅痢加鮮石斛叁錢 噤口白痢加炒穀芽八錢 多服自愈

按痢由鬱而成亦由燥而生且總由虛而得所以裏急後重欲下不下與治水瀉大不相同治瀉宜止而治痢則偏宜利然醫家每用大黃以蕩滌其垢穢而不知已剝削其脂膏壯者或暫能見效變症多端怯者必致愈重甚是可畏且大黃即可以治熱痢實痢而不能以治寒痢虛痢因輕致重因重致危因危致亡余見受害者多矣因細揣其致病之由在鬱與燥而靜想其治病之法宜散宜潤油當歸為血中氣藥其味多辛辛則能潤品又和平多用無妨本草從新云極善滑腸便泄者勿用茲則正取其能潤也潤自痢除最為妙法況痢之病本在鬱當歸能散其鬱痢之病根在虛當歸能補其虛此方治痢仙藥也不論陰陽虛實放胆用之俱可見效當歸微溫便於塞痢而熱痢亦不助其火邪况加黃連同力相濟萬無可疑當歸能補便於虛痢而實痢亦不泥其外邪且所云實者乃症實非人實也症則有時而實人則斷無不虛扶正可以去邪更妙而又妙矣尤恐力不到腑再以枳殼寬其大腸裏急後重以除百發百中屢試屢驗但枳殼力猛衝墻倒壁不可重用以傷元氣紅痢間有血虛而不由熱者白痢間有氣虛而不由寒者但血痢不加黃連



多服自愈。氣痢加白朮叁錢可愈。他若傷寒大便不通，用油當歸壹兩，大麻仁八錢，再加滋陰清補，自無不下。大黃切忌，務祈將相告諭，不費錢之功德也。

按治痢屢試屢驗，莫如前卷七痢疾方內所載，重用當歸、白芍、蘿蔔子，輕用枳殼、檳榔、車前、甘草壹方，極為神效。

●噤口痢神方 用蘿蔔切片蘸蜂蜜含口中噙之，有汁嚥下，味淡再換，又噙之久則自然思食，再以稀粥緩緩進之。（又方）砂糖白蜜 蘿蔔汁各壹盃，飯上炖化服壹貳次。（又方）石蓮子肉壹兩去心 廣木香叁錢 共研末，每服貳錢米湯下。又山藥半生半炒用萊菔煎湯服之。又前方五穀蟲焙黃研末，用黑砂糖調服，治噤口痢屢見奇效。（又方）用肥皂莢壹枚以鹽實其內，燒存性為末，以少許入米粥內食之。

●痢疾外治方 茵草壹握煎水浸兩足底。又梧桐葉叁四觔煎水洗足。（又神效方）起病叁日後用川椒五分 麝香五分 共為末，用棗壹枚去皮核，將藥末糝棗肉放入肚臍，不拘何等膏藥貼之，無不全愈。

●噤口痢外治方 丁香五粒 巴霜壹分 杏仁五粒 砂仁五粒 沒藥叁厘 紅棗壹枚去核同搗如泥，分作貳丸，以壹丸貼臍上，以壹丸服之，即能進飲食。



