

徐氏醫學十六種

依

祝

吳江徐靈胎洞溪著

積聚癥痞

靈素

靈百病始生篇黃帝問於岐伯曰夫百病之始生也皆生於風雨寒暑清濕喜怒不節則傷臟風雨則傷上清濕則傷下三部之氣所傷異類願聞其會岐伯曰三部之氣各不同或起於陰或起於陽請言其方喜怒不節則傷臟臟傷則病起於陰也清濕襲虛則病起於下風雨襲虛則病起於上是謂三部至於其淫決不可勝數黃帝曰積之始生至其已成奈何岐伯曰積之始生得寒乃生四字乃成積之總訣厥乃成積也黃帝曰其成積奈何岐伯曰厥氣生足悅悅生脛寒脛寒則血氣凝滯血氣凝滯則寒氣上入於腸胃入於腸胃則腹脹腹脹則腸外之汁沫迫聚不得散日以成積卒然多飲食則腸滿起居不節用力過度則脈絡傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢則後血此為腸經之血宜涼後血為陰經之血宜溫腸胃之絡傷則血溢於腸外腸外有寒汁與沫血相搏則併合凝聚不得散而積成矣因積未有不卒然外中於寒若內傷於憂怒則氣上逆氣上逆則六輸不通溫氣不行凝血蘊裏而不散津液滲滲著而不去而積皆成矣六元正紀大論大積大聚不可犯也衰其大半而止過則死骨空論任脈為病男子內結七疝女子帶下瘕聚

息積 素奇病論帝曰病脇下滿氣逆二三歲不已是為何病岐伯曰病名曰息積此不妨於食不可灸

刺積為導引服藥藥不能獨治也積最宜外治

伏梁 靈邪氣臟腑病形篇心脈微緩為伏梁在心下上下行時唾血 素腹中論帝曰人有身體髀股

筋皆腫環臍而痛是為何病岐伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而著於膏肓之原在臍下故環臍而痛也不可動之動之為水溺瀦之病

難經

病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟所生聚者六腑所成也積者陰氣也其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處故以是別知積聚也五臟之積各有名乎以何月何日得之然肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下脾之積名曰痞氣在胃脘腹大如盤肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯腎之積名曰貞豚發於少腹上至心下若豚狀或上或下無時

金匱

師曰病有奔豚有吐膿有驚悸有火邪此四部病皆從驚發得之師曰奔豚病從少腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必衝不衝心下則痞問曰病有積有聚有繫氣何謂也師曰積者臍病也終不移聚者腑病也發作有時展轉痛移為可治繫氣者脇下痛按之則愈復發為繫氣積聚皆有形繫氣則無形而有氣耳病者腹滿按之不痛為虛痛者為實可下之舌黃未下者下之黃自去腹滿時減復如故此為寒當與溫藥脈緊如轉索無常者有宿食也薤白可共牛肉作羹食之成瘕病非亦然醋合酪食之令人血瘕

病源

瘕瘕皆由寒溫不調飲食不化與臟氣相搏結所生也其病不動者直名為瘕若病雖有結瘕而可推

移者名為癥瘕。假也。謂虛假可動也。

蠶癥 謂腹內有癥結如蠶之形狀。有食蠶觸冷。不消生癥者。有食諸雜物。得冷不消。變化而作者。

蟲癥 人有多蟲而性好啗之。所啗既多。腑臟虛弱。不能消之。變化生癥。患者見蟲必啗之。不能禁止。時

從下部出亦能斃人。

米癥 人有好啞米。轉久彌嗜。啞之若不得米。則胸中清水出。米不消化。遂生癥結。其人常思米。不能飲

食。久則斃。腹內有人聲。有人腹內忽有人聲。或學人語而相答。此乃不幸致生。火變非關經絡。腑腑冷

熱虛實所為也。服雷丸可愈。

髮癥 有人因飲食內誤有頭髮。隨食成癥。胸喉間如有蟲上下來去者是也。

蛟龍病 三月八日。蛟龍子生在芹菜上。人食芹菜入腹。變成蛟龍。其病之狀發則如癩。

魚癥 有人胃氣虛弱者。食生魚。因為冷氣所搏。不能消之。結成魚癥。揣之有形狀如魚也。

蛇癥 人有食蛇不消。因腹內生蛇。瘕也。亦有蛇之精液。誤入飲食內食之。其狀常若飢。而食則不下。喉

食至胸內即吐。其病在腹。揣摸亦有蛇狀。謂蛇瘕也。

酒瘕 人有飲酒多而食穀少。積久漸瘦。遂常思酒。不得則吐。多睡不復能食。是胃中有蟲使之然。名為

酒瘕也。

腹內有毛 人因飲食內誤有毛。隨食入腹。則漸漸羸瘦。但此病不說別有證狀。常自言食毛。因以知之。

積聚癥瘕方

奔豚湯 奔豚氣上衝胸腹痛。往來寒熱。此主之。

甘草 川芎 當歸 各二兩 半夏 四兩 黃芩 二兩 生薑 五兩 芍藥 二兩 生薑 四兩 甘草 根 白皮 升

右九味以水二斗。煮取五升。溫服一升。日三夜一服。

茯苓桂枝甘草大棗湯發汗後臍下悸者欲作奔豚此湯主之

桂枝四兩 茯苓半斤 甘草二兩 大棗十五 右四味以甘爛水一斗。先煮茯苓減二升。納諸藥煮取

三升。去滓溫服一升。日三服。

桂枝加桂湯發汗後燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚 小腹上至心。灸其核上各一

壯與此湯此灸法不循穴道亦甚易 即桂枝加桂二兩

備急丸治寒氣冷食積留胃中。心腹滿痛大便不通

大黃 乾薑各二兩 巴豆研如脂 右先搗大黃乾薑為末。納巴豆合搗千杵。和蜜丸如豆大。臧

密器中。勿洩氣。候用。每服三四丸。煖水或酒下。又主中惡。心腹脹滿。卒痛如錐刺。氣急口噤。如卒死

者。捧頭起。灌令下咽。須臾當差不差。更與三丸。當腹中鳴。即吐利便差。若口噤者。須化從鼻孔用葶管

吹入。自下於咽。此溫下之法。口噤不能服藥者亦是一法。

食食食多不消。心腹堅滿痛治之方針

鹽一升 水三升 右二味煮令鹽消。分三服。當吐出食便差。

蛟龍病方治春秋二時龍精帶入芹菜中。人偶食之為病。發時手背腹滿痛不可忍。

硬糖二 日兩度服之。吐出如蜥蜴三五枚。差。

療犬肉傷治食犬肉不消。心下堅。或腹脹口乾大渴。心急發熱。妄語如狂。或洞下。

杏仁一升 合皮沸湯三升。和汁分三服。剗下肉片大驗。

療食繪傷治繪食之在心胸間不化。吐復不出。連下除之。久成癥病。

橘皮一兩 大黃二兩 朴硝二兩 右三味以水一大升煮至小升頓服即消

療齧癥 治食齧多不消結為癥病

馬鞭草搗汁飲之或以薑葉汁飲之一升亦消又可服藥吐之

療蠱癥 由啗蠱在腹生長為蠱癥按此病發服水銀

故範子一枚 故梳子一枚 右二味各破為兩分先取一分燒灰末之又取一分以水五升煮取一

升頓服前末盡少時病出無所忌

療十年疔癬方千金

桃仁去皮尖雙仁煮熬 鼓乾飽去皮點搗歸各六升 蜀椒去目開口者搗歸三升 乾薑搗歸三升 右四味先搗桃仁如膏合搗千杵如

乾可入少蜜和搗令可丸如酸棗大空腹酒服三丸日三仍敷法

椒敷方千金

取新盆一口受一斗者鑽底上作三十餘孔孔上布椒二合椒上布鹽鹽上安紙兩重上布冷灰一升

冷灰上安熱灰一升熱灰上安熱炭火如雞子大常令盆熱底安薄糲其口以板蓋上以手捉勿令落

仰卧安於腹上逐病上及痛處自捉遣移慰之冷氣及癥結皆從下部中作氣出七日一易椒鹽滿三

七日百病差乃止

破癬湯千金

白朮 枳實 柴胡各三 右以水五升煮取二升分三服日三

備急敷癥方千金

吳茱萸三升以酒和煮熱布裏敷之

廣濟療瘰癧外

白馬尿五升溫服之令盡差

廣濟瘰癧米瘰癧其疾常欲食米若不得米則胸中出清水

雞屎一升白米五合搗散用水一升頓服

瘰癧米瘰癧瘦至死外

葱白兩瓠烏梅三升右二味以水三升宿漬烏梅使得極濃清晨噉葱白隨飲烏梅汁盡頃之心

腹煩欲吐即令出之三晨瘰癧之當吐出米瘰癧差無所忌

廣濟瘰癧髮瘰癧人因食誤食髮即胸間如有蟲上下惟欲飲油一斤以香澤煎之大錘鎊貯之安病

人頭邊以口鼻臨油上勿令得飲及傳之鼻面今有香氣當叫喚取飲不得與之必疲極眠睡其髮當

從口出飲油人專守視之并石灰一裹見瘰癧出以灰粉手捉瘰癧抽出須臾抽盡即是髮也法

積塊丸 治瘰癧積聚癖塊蠱積

京三稜 莪朮略爛自然銅 蛇含石各燒研雄黃 蜈蚣各一錢木香一錢鐵花粉兩

一錢米醋炒辰砂 沉香各八片冰片五分蘆薈 天竺黃 阿魏 全蝎各四錢右為末用

雄猪胆汁丸如桐子大每服七八分諸蟲皆散

治食索粉積方 用紫蘇煎濃汁加杏仁泥服之即散

易簡紅丸 破瘰癧消瘰

蓬朮 三稜 橘皮 青皮 胡椒 乾薑 阿魏 礬石 右水泛為丸每服

六十九薑湯下又小兒脾胃之症極有神效

大七氣湯 治一切癥瘕

三棱

莪朮各煨青皮

陳皮去白木香

藿香

肉桂

益智仁

甘草各七錢五分

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食前服

半硫圓丸

除積冷溫脾胃一切痲痺大便冷閉

硫黃

用淨好者研令極細用柳木槌子研過

半夏煨乾為末

右等分以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入臼

內杵數百下丸如桐子大每服空心溫酒或生薑湯下十五丸至二十九丸婦人醋湯下

髮癥飲油方

夏子奇病方

雄黃

半兩

右為末水調服之蟲自出

食髮成癥方

猪脂二升酒三升

右以水煮三沸溫服日三

酒驚氣驚血驚方

直指方

治平時嗜酒血入於酒為酒驚任氣血凝於氣為氣驚虛勞錮冷敗血雜疫為

血驚或附脇背或隱腸腹須急治之

生硫黃

以老酒調下時時服之此味人多畏之不敢輕服其實性甚和緩且已

蛇癥方

千金翼

白馬尾切細酒服初服五分一匕次服三分一匕更服二分一匕不可頓服殺人

蛟龍病方

唐明皇雜錄云有黃門奉使交廣回太醫周顧曰此人腹中有蛟龍上驚問對曰臣馳馬大庾嶺熱困

且渴遂飲澗水竟腹中堅痞如石周遂以石硝雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲皆具

此疾遂愈

蛇瘕危氏 治面光發熱如火灸 蒜汁一盃飲之吐出如蛇即愈

腹內蛇瘕方禰

誤食菜中蛇精成蛇瘕或食蛇肉成瘕腹中常飢食物即吐以赤足蜈蚣一條炙研末酒服

血瘕方甄氏

鰲甲 大黃 琥珀等分 右三味作散酒服二錢少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即

休服也

虱瘕 喜食血 用極舊木梳煨灰服

婦人狐瘕方對因月水來或悲或驚或逢疾風暴雨被濕致成狐瘕精神恍惚令人月水不通胸脇腰背

痛引陰中小便難嗜食欲吐如有孕狀其瘕手足成形者殺人未成者可治

用新鼠一枚以新絮裹之黃泥固住入地坑中桑新燒其上一日夜取出去絮入桂心末六銖為末酒

服方寸匕不過一二服當自下

瓜蒂散金匱 大承氣湯 小承氣湯 調胃承氣湯以上四方俱見傷寒保和丸丹溪枳朮丸潔古 皂礬平胃散

感應丸上四方見通治阿魏撞氣丸防蛭蛇含石丸丸即禹餘糧丸見聯脈

蟲附於莖

靈樞

上腸篇蟲為下腸其詳備載

蟲瘕蛟虻 厥病篇腸中有蟲瘕及蛟蛇皆不可取以小針心腸痛懷作痛腫聚往來上下行動有休止

腹熱喜渴涎出者是蛟虻也以手聚按而堅持之無令得移以大針刺之久持之蟲不動乃出針也

金匱

虻蟲之為病。令人吐涎心痛。發作有時。毒藥不止。虻厥者。當吐虻。令病者靜而復時。煩此為臍寒。虻上入膈。故煩。須臾復止。得食而嘔。又煩者。虻聞食臭。出其人當自吐虻。狐惑之為病。狀如傷寒。默默欲眠。目不得閉。卧起不安。蝕於喉。為惑蝕於陰。為狐。不欲飲食。惡聞食臭。其面目乍赤乍黑乍白。此皆傷寒餘毒所結。濕熱生蟲。

病源

九蟲者。一曰伏蟲。長四分。二曰虻蟲。長一尺。三曰白蟲。長一寸。四曰肉蟲。狀如爛杏。五曰肺蟲。狀如蠶。六曰胃蟲。狀如蝦蟆。七曰弱蟲。狀如瓜瓣。八曰赤蟲。狀如生肉。九曰蟻蟲。至細微。形如菜蟲。伏蟲羣蟲之主也。虻蟲貫心則殺人。白蟲相生子孫。轉大。長至四五尺。亦能殺人。肉蟲令人煩滿。肺蟲令人咳嗽。胃蟲令人嘔逆。吐喜噦。弱蟲又名膈蟲。令人多唾。赤蟲令人腸鳴。蟻蟲居脘腸。多則為痔。極則為癰。因人瘡處。以生諸癰疽。癩痿病。疥。鱗蟲。無所不為。人亦不必盡有。有亦不必盡多。或偏無者。此諸蟲依腸胃之間。若臍臟氣實。則不為害。若虛。則能侵蝕。隨其蟲之動。而能變成諸患也。凡蟲毒有數種。皆是變感之氣。人有故造作之。多取蟲蛇之類。以器皿盛貯。任其自相噉擊。惟有一物獨在者。即為之蟲。便能變感。隨逐酒食。為人患。福患。禍於他。則蟲主吉利。所以不羈之徒。畜事之。齒慝。是蟲食齒。至齧膿爛。汁臭。如屯之收。故謂之齒慝。

蟲方

甘草粉蜜湯。虻蟲之為病。令人吐涎心痛。發作有時。毒藥不止。此湯主之。

甘草二兩。粉一兩。蜜四兩。右以水三升。煮甘草取二升。去滓。納粉蜜攪令相煎。如薄粥。溫服一升。

瘥即止。

烏梅丸 治病者靜而時煩因臟寒虻上入其腸為虻厥當吐

烏梅三百黃連一斤黃柏六兩乾薑十兩附子六枚蜀椒四兩熱桂枝六兩細辛六兩人參六兩

當歸四兩 右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令

相得納臼中與蜜杵二千下丸如梧桐子大先食飲服十九日三服稍加至二十九禁生冷滑物臭食

療虻蝨攻心腹痛針 用石榴根搗取汁平旦服亦可水煎

療蝨蝨下部針 胡粉 雄黃 右二味各等分為末著穀道中亦治小兒

療傷寒墮病針 取生雞子小頭叩出白入漆一合熟和攪令極調當沫出更納著殼中仰吞之食頃或

半日乃吐下蟲劇者再服蟲盡熱除病愈

追蟲丸治一切蟲積

黑牽牛取頭末橫柳各八兩雷丸醋炙南木香各二兩茵陳二兩 大皂角 苦楝皮各一 右煎濃汁

水為丸菜豆大大人每服四錢小兒三錢或二錢或一錢半量人虛實用砂糖水吞下待追去惡毒蟲

積二三次方以粥補之按濃煎汁水為丸原本如此

下蟲丸 追蟲取積

苦楝皮根皮為上樹面火 右為末麵糊丸彈子大如欲服藥宜戒午飯時預食油煎雞卵餅一

二個待上床時白滾湯化下一丸至五更取下異蟲為效

療寸白蟲

榧子 檳榔 蕪荑各等 右為末每二錢溫酒調服先喫燒牛肉脯後服食水瀉永除

又方 榧子四十九皮去皮以月上旬平旦空心服七枚日服盡蟲消成水永瘥又云食實七枚七日滿蟲化為

水

瘡濕惡蟲千金

此症多是熱病後或久下不止或有客熱結在腹中或遇暑濕涼氣者多生此病亦

有燥慙不甚洩利而下部瘡癢不問燥濕久則殺人為病診齒無色舌上盡白甚者滿口有瘡四肢沉重喜眠如此者為蟲下食其肛肛爛盡見五臟即死矣

黃連

生薑切各十兩艾葉八兩苦參四兩右四味咬咀以水一升煮取三升為三服日三

療蛔蟲

病由勞熱傷心有蟲名蛔蟲長一尺貫心則死

雷丸

橘皮 桃仁各五狼牙六分貫眾三枚蕪荑 青箱子

乾漆各四分亂髮如雞子燒

礪二十枚

右十味搗篩蜜丸以飲及酒空腹服二七丸日再服

療百蟲方外

石榴皮

東引者一檳榔七枚 經去瘡皮

右以水二升煎減半頓服欲服時先嚼鹿脯咽汁即進之每月一二

三日喫藥必瘥以蟲頭向上月三五以後不效以蟲頭向下也服藥前一日莫食其蟲喫藥之後或痢

或內消皆瘥忌食生膾白酒諸冷物一月餘

鶴虱散外

療蛔蟲心痛 鶴虱二分末溫酢一盞和服之蟲當出

胡粉丸外

療心痛不可忍似蛔蟲者

生胡麻

一合 胡粉半 胡粉半 胡粉半

右二味先以猪肉脯一斤空腹啖咽汁勿咽肉後取胡粉和胡麻搜作丸

以少清酒使成頓服盡十歲以上增減忌生冷猪血魚雞蒜醋等七日若是蛔蟲吐水者是也

甘草瀉心湯驗

治狐惑之為病狀如傷寒默默欲眠目不閉卧起不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐不欲

飲食惡聞食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕於上部則聲啞此湯主之蝕於下部則咽乾苦參湯洗之蝕

於肛者雄黃薰之。

甘草四兩黃芩

人參

乾薑各三兩

黃連一兩

大棗枚二

半夏半升

右七味水一斗煮取六

升去滓再煎溫服一升日三服。

苦參湯

苦參一升水一斗煎取七升去渣薰洗日三。

雄黃散

雄黃一味為末筒瓦二枚合之燒向肛薰之。

赤小豆當歸散

病者脈數無熱微煩默默但欲卧汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日目四昏

黑若能食者膿已成也此湯主之。

赤小豆

三升浸冷當歸右二味杵為散漿水服方寸匕日三服

療心痛欲死

外濃搗地黃汁和麵作冷淘不用鹽服一椀蟲即出

蕪荑散 治蟲咬心痛欲驗之大痛不可忍或吐青黃綠水涎沫或吐蟲發有休止

蕪荑

雷丸各半兩乾漆碎研炒烟

右共為末每服三錢調和服

諸痛

靈素

靈終始篇病痛者陰也痛而以手按之不得者陰也

素舉痛論視其五色黃赤為熱白為寒青黑為痛 調經論實者外堅充滿不可按之按之則痛虛者鼻

辟氣不足按之則氣足以溫之故快然而不痛 陰陽應象大論氣傷痛形氣腫故先痛而後腫者氣傷

形也先腫而後痛者形傷氣也 痺論痛者寒氣多也有寒故痛也

頭痛

靈素

靈經脈篇足太陽膀胱脈動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折脾不可以曲腦如結端如裂是為
蹠厥督脈之別名曰長強挾脊上項散頭上下當肩胛左右別走太陽入貫脊實則脊強虛則頭重
足少陽膽脈是主骨所生病者頭痛領痛厥病篇真頭痛頭痛甚腦盡痛手足寒至節死不治
素奇病論帝曰人有病頭痛以數歲不已此安得之名為何病岐伯曰當有所犯大寒內至骨髓髓者以
腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛病名曰厥逆

病源

高痰風厥頭痛 風痰相結上衝於頭即令頭痛數歲不已即連腦痛手足寒至節即死真頭痛亦必有痰

千金

卒頭痛頭痛如破非中冷又非中風是胸膈中痰厥氣上衝名為厥頭痛吐之即差

頭痛方

頭痛方千金 葶藶子搗末以湯淋取汁洗頭良 又方千金 吳茱萸三升以水五升煮取三升以綿

拭髮根良

厥頭痛吐方外 治痰厥頭痛

但單煮茗作飲二三升許須臾適吐吐畢又飲能如是數過劇者須吐膽汁乃止不損人

石膏散寶鑑

川芎 石膏 白芷略等 右為末每服四錢熱茶清調下此治風火頭痛之方

透頂散本事 治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問遠年近日

細辛三莖 瓜蒂七分 丁香三粒 糯米七粒 腦子

麝香各一黑

右將腦麝研細將前四味另研

細然後合研令勻封好患人在左右搗一大豆許良久出涎一升許即安

痛風餅子聖惠

五倍子

全蠍

土狗各八

右為末醋丸作如錢大餅子發時再用醋潤透頂太陽穴上灸

熱貼之仍用帕子縛之吸濃茶睡覺自愈

止痛太陽丹效奇

天南星

川芎等分

右為末同蓮鬚葱白搗爛作餅貼太陽痛處

氣攻頭痛方效奇

草麻子

乳香等分

右搗爛作餅貼太陽穴上如痛止急去頂上解開頭髮出氣即去藥

治頭痛方效奇

用大蒜一顆去皮研取汁令病人仰臥以銅筋點少許滴鼻中急令搐入腦眼中淚出差

玉液湯效奇

治眉棱骨痛

半夏六錢泡湯七次切片作一服加生薑十片水煎去渣納沉香末少許服

麝犀湯效奇

治暗頭風旋眼黑昏眩倦怠痰涎雍塞骨節疼痛

羚羊角屑

旋覆花

紫苑

石膏

甘草各一兩細辛半兩前胡七錢犀角屑二錢

右藥每服三錢加生薑三片太棗一枚水煎服

秘方貼頭風熱病

大黃

朴硝等分

右為末用井底泥捏作餅貼兩太陽穴頭風皆屬寒此獨

清震湯

治頭面疔瘡憎寒拘急發熱狀如傷寒

頭風

升麻

蒼朮各四錢 荷葉一個

水煎食後服楊梅毒入頭亦有此病當用治毒之方治之

治頭內如蟲蛀響

此名天白蟻

用茶子末吹鼻中

此奇病不可不知

玉真圓

方本

治腎氣不足氣逆上行頭痛不可忍謂之腎厥其脈舉之則弦按之則石堅

硫黃

二兩

石膏

煨通赤研

半夏

各一兩

硝石

五分

右為細末研勻生薑汁糊丸如梧子大陰乾每服二

十丸或薑湯或米飲下更灸關元穴百壯

茶調散

治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛鼻塞身重及婦人血風攻症太陽穴疼

白芷

甘草

羌活

各二兩

荆芥

去梗

川芎

各四錢

細辛

一兩

防風

半兩

薄荷

葉不見

右為細末

每服二錢食後茶清調下常服清頭目

頭風摩散

方見風門

頭風有偏正之殊其病皆在少陽陽明之絡以毫針刺痛處數穴立效其外有瘡毒入頭名楊梅頭痛此乃外科之症另有治法

心胃痛

靈樞

厥病篇厥心痛與背相控善癢如從後觸其心偃倭者腎心痛也厥心痛痛如以錐鍼刺其心心痛甚者脾心痛也厥心痛色蒼蒼如死狀終日不得太息肺心痛也厥心痛卧若徒居心痛間動作痛益甚色不變肺心痛也真心痛手足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死

千金

胸痺令人心中心堅痞急痛肌中苦痺絞痛如刺不能俯仰胸前皮皆痛手不得犯短氣咳唾引痛咽塞瘖燥時欲嘔吐煩悶自汗出或引背痛不治數日死

外臺

九種心痛 一蟲 二注 三氣 四悸 五食 六飲 七冷 八熱 九去來痛

惡注心痛

中惡心痛心腹絞刺吞吞欲絕

近人患心胃痛者甚多十人之中必有二三皆係痰飲結於心下久成飲囊發作輕重殊數雖各不同而病因一緣

治法以瀉飲降氣為主凡病竟有時代之不同如近三十年中咳嗽吐血者十人而五余少時此病絕少亦不可解也

心胃痛方

枳實薤白白酒湯

胸痺之病喘息咳唾胃背痛短氣寸口脈沉而遲關上小緊數此湯主之

枳實一枚 薤白半斤 白酒七升

右三味同煮取三升分溫再服

枳實薤桂枝湯

胸痺不得臥心痛徹背者此湯主之即前方加半夏半斤

枳實四枚 厚朴四兩 薤白半斤 桂枝一兩 枳實一枚

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去渣納諸藥煮數沸分溫三服

人參湯

胸痺胸中氣塞短氣此湯主之橘枳薑湯亦主之

茯苓杏仁甘草湯

胸痺胸中氣塞短氣此湯主之橘枳薑湯亦主之

茯苓三兩 杏仁五十枚 甘草一兩

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三不差更服

橘皮枳實生薑湯

胸痺胸中氣塞短氣此湯主之橘枳薑湯亦主之

橘皮一升 枳實三兩 生薑半斤

右三味以水五升煮取二升分溫再服

薤白仁附子散

胸痺緩急者此主之

薤白仁附子散

大附子炮一枚 右二味杵為散服方寸匕日三服

薤白仁附子散

大附子炮一枚 右二味杵為散服方寸匕日三服

桂枝生薑枳實湯心中痞諸逆心懸痛此湯主之

桂枝 生薑略三枳實五枚 右三味以水六升煮取三升分溫三服

赤石脂丸心痛徹背者背痛徹心者此主之

蜀椒一兩烏頭一分附子半兩乾薑一兩赤脂一兩 右五味末之蜜丸如梧子大先食服一九日

三服不知再加此治大寒之症

九痛丸治九種心疼

附子三兩狼牙一兩巴豆一兩法去皮心人參 乾薑 茱萸略一 右六味末之煉蜜丸如梧

子大酒下強人初服三九日三服弱者二丸 兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷流注心

胸痛并冷氣上衝落馬墜車血疾等皆主之忌口如常法

大建中湯心中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛不可觸近此主之

蜀椒二合乾薑四兩人參二兩 以水四升煮取二升去渣納膠飴一升微火煎取一升半分溫再

服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日食糜溫覆之

療胸痹心痛方針 灸臍中百壯穴在鳩尾上一寸此灸神效百壯灸瘡愈再灸非一日滿百壯也

灸背法千金 治胸痹心背疼痛氣悶

烏頭 細辛 附子 羌活 蜀椒 桂心略一川芎兩三 右共為散以少醋拌

綿裹微火炙令燥以射背上

療心痛方針 生油半合溫服此乃治蟲痛之方

海蛤丸治受飲心痛

海蛤燒反為末過日火盡微用 瓜蒌仁研 右以海蛤入瓜蒌肉乾濕得所為丸每服五十九

失笑散治婦人心痛氣刺不可忍

五靈脂黃等分 每用二錢醋熬膏入水煎服此方治赤白心

鶴龜散外胡粉九 外癰心痛如蟲啣方外益黃散以見上四防平胃散 通 半夏瀉心湯規

腰痛

靈樞

經脈篇肝足厥陰也是動則病腰痛不可以俯仰 終始篇刺諸痛者其脈皆實從腰以上者手太陰陽明皆主之從腰以下者足太陰陽明皆主之病在腰者取之臑

病源

腎主腰脚腎經虛損風冷乘之故腰痛也又邪客於足少陰之絡令人腰痛引小腹不可以仰息診其尺脈沉主腰背痛尺寸俱浮直下此為腎脈腰強痛

風濕腰痛 勞傷腎氣經絡既虛或因卧濕當風風寒乘虛搏於腎腎經與血氣相擊而腰痛

腎著腰痛 腎主腰脚腎經虛則受風冷內有積水風水相搏浸積於腎腎氣內著不能宣通故令腰痛

其痛狀身重腰冷腹重如帶五十錢如坐於水形狀如水不渴小便自利飲食如故久久變為水病腎濕故也

背倭 肝主筋而藏血血為陰氣為陽陽氣精則養神柔則養筋陰陽和同則血氣調適共相榮養也邪不能傷若虛則受風風寒搏於脊脊之筋冷則掌急故令背倭

脇痛 邪氣客於足少陽之絡令人脇痛欬汗出陰氣擊於肝寒氣客於脈中則血注脈急引脇與小腹

診其脈弦而急脇下如刀刺狀如飛尸至困不死脇痛屬足少陽不屬足厥陰

腰痛方

甘藷苓朮湯腎著之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣裏冷濕久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢

甘草

白朮各二錢 乾薑

茯苓各四兩

右四味以水五升煮取三升分溫三服腰中即溫

青娥丸治腎虛為風冷所乘或處濕地或墜墮傷損或因風寒皆令腰間似有物垂墜也悉主之

胡桃二十個去殼皮 破故紙酒炒四兩 杜仲薑汁炒十六兩

十九

加味小柴胡湯治傷寒脇痛

柴胡二錢 半夏一錢 黃芩二錢 人參五錢 牡蠣粉一錢 枳殼一錢 甘草一錢

右作一服加薑五片

紅棗二枚煎服

摩腰膏治老人腰痛婦人白帶

附子尖

烏頭尖

南星各二錢 硃砂

雄黃

樟腦

丁香各半錢

乾薑一錢

麝香五粒

右共為末蜜丸龍眼大每一丸用生薑汁化開如厚粥火上烘乾放掌上摩腰中候藥盡貼腰上即烘

烘綿衣縛定腰熱如火間二日用一丸此法近有人專用此治形體之病凡虛人老人頗有效驗其術品摩虛損及老人更妙又一法以麻油黃蠟為丸如胡桃大烘熱摩腰上熱然後紮好一丸可用數十次腹中痛亦可摩

療腰痛方良方

杜仲

肉從蓉

破故紙

人參

當歸

秋石

川巴戟

鹿角霜各等

右

為末用猪腰子一個洗淨淡鹽湯泡過劈開兩邊中間勿斷細花開用前藥滲入另用柿絹一塊包裹綿絮外用小罐入酒少許紙封毋令走泄藥氣煮熟取食之飲醞酒三杯立愈

又方

奇效 胡桃肉

補骨脂

杜仲各四兩

右作二貼每貼用水二盞煎服

麋茸丸

本

治腎虛腰痛

麋茸一兩鹿角亦可兔絲子末

一兩 舶上茴香半兩

右為末用羊腎一對酒煮爛去膜研和九桐子大如

羊腎少入酒糊佐之每服三五十九溫酒或鹽湯下

藥碁子

本

治腰腿痛氣滯

牽牛不拘多少用新瓦入火煨得通紅便將牽牛頓在瓦上自然半生半熟不得撥動取末一兩入細

研硫黃一錢同研勻分三分每用白麵一匙水和得開切作碁子大五更初以水一盞煮熟連湯溫送

下如住即已未住隔日再作予嘗有此疾每發止一服痛止

二神丸

本

左金丸

俱見通治按腰痛屬虛者固多而因風寒痰濕氣阻血凝者亦不少一味靈補必成痼疾不可不審

腹痛

金匱

跌陽脈微弦法當腹滿不滿者必便難兩胠疼痛此虛寒從下上也當以溫藥服之病者腹滿按之不痛為虛痛者為實可下之舌黃者下之黃自去腹滿時減復如故此為寒當與溫藥夫中寒家喜其人清涕出發熱色和者善噦中寒其人下利以裏虛也欲噦不能此人肚中寒夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必衝不衝者心下則痞

傷寒論

病人不大便五六日。繞臍痛煩躁發作有時者。此有燥屎。故使不大便也。太陰之為病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。若下之。必胸中結鞅。傷寒五六日。腹中痛。若轉氣不趣。少腹者。此欲自利也。

腹痛方

厚朴七物湯 病腹滿發熱十日脈浮而數飲食如故此湯主之

厚朴半斤 甘草 大黃略三 大棗十枚 枳實五枚 桂枝二兩 生薑五兩 右七味以水一斗煮取

四升溫服八合日三服嘔者加半夏五合下利去大黃寒多者加生薑至半斤

附子粳米湯 腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐此湯主之

附子一枚 半夏半升 甘草一兩 大棗十枚 粳米半升 右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一

升日三服

蒸臍法 亦可隨病所在蒸之外科寒症亦能蒸散

丁香 木香 半夏 南星 川烏 歸身 肉桂 麝香 冰片 乳香

大黃 硝 山甲 雄黃 蟾蜍 白菟 右粗末放麵圈內上用銅皮一片多鑽細

眼用艾火灸銅皮上每日十餘火滿三百六十火病除藥味亦可因症加減其藥用燒酒薑汁等拌濕

厚朴三物湯 痛而閉者此湯主之

厚朴八兩 大黃四兩 枳實五枚 右三味以水一斗二升先煮二味取五升納大黃煮取三升溫服

一服以利為度

大黃附子湯 脇下偏痛發熱其脈緊弦此寒也以溫藥下之宜此湯

大黃三兩 附子三枚 細辛二兩 以水五升煮取二升分溫三服強人煮取二升半分溫三服服後

如人行四五里進一服

黃連湯

嘔

小建中湯

虛桂枝加大黃湯

大柴胡湯

小柴胡湯

大承氣湯

桂枝加芍藥湯

理中湯

四逆湯

以上俱蘇合丸

通

脚氣

附轉

千金

諸經方有脚氣之論。古人少有此疾。

脚氣之名全隱已載但患者少耳

自永嘉南渡衣纓士人多有遭者。有支法存仰道

人等並留意經方。偏善斯術。多獲全濟。

又宋齊之間。釋門深師述二公等諸家舊方。為二十卷。其脚弱一

方。近百餘首。魏周之代。蓋無此病。所以姚公集驗。殊不慙。徐王撰錄。未以為意。特以三方鼎峙。風教未

一。霜露不均。寒暑不等。關西河北。不識此疾。自聖唐開闢。無外南極之地。作鎮於彼。往往皆遭。近來中國

士大夫。亦有患者。良由今代風氣混同所致耳。此病先從脚起。因即脛腫。時人號為脚氣。深師云。脚弱者

即其義也。問風毒中人。隨處皆得作病。何偏著於脚。答曰。人有五臟心脈經絡所起。在手十指。餘三臟

經絡所起。在足十趾。地之寒暑風濕。皆作蒸氣。足常履之。所以風毒之中人。必先中脚。久而不瘥。偏及四

肢。腹背頭項。經云。次傳間傳是也。凡脚氣皆感風毒所致。治脚氣必兼風此乃要訣人多不即覺會。因他病一度始發

或奄然大悶。經兩三日。乃覺。庸醫不識。作餘病治。莫不盡斃。始起甚微。飲食如故。惟卒起脚屈。弱不能動

為異耳。黃帝云。緩風濕痺是也。有脚氣未覺。而頭項臂膊已有所苦。諸處未知。而心腹五內已有所困

或嘔食臭。腹痛下痢。二便不通。衝悸不欲見光。精神昏憒。迷忘錯亂。壯熱頭痛。身體酷冷。疼痛轉筋。頑痺

緩縱。百節攣急。小腹不仁等症。皆脚氣狀貌也。亦云風毒脚氣之候。婦人亦爾。又有產後取涼。多中此毒

其熱悶掣。癢驚悸。心煩嘔吐。氣上。皆其候也。又但覺臍下冷痞。幅幅然不快。小便淋瀝。即是其候。頑弱名

緩風痲痛為濕痺 熱者治以冷藥冷者療以熱藥以意消息之諸病心下急氣喘不停自汗脈促嘔吐皆然

不止者死 凡脚氣皆由氣實而死終無一人服藥致虛而殞故不得大補亦不可大瀉凡治病大瀉相同 脚氣

其人黑瘦者易治肥大肉厚赤白者難治瘦人肉硬肥人肉軟也初脚氣有腫者有不腫者其小腹頑

痺不仁者脚多不腫小腹頑後不過三五日即令人嘔吐名脚氣入心如此者難治以腎水剋心火也

初得脚弱便速灸之服竹瀝湯灸訖服八風散無不瘥者若但灸不服藥但服藥不灸後必更發

脚氣當灸之穴

初灸風市 次伏兔 次犢鼻 次膝兩眼 次三里 次上廉 次下廉 次絕骨

病源

脚氣疼不仁 由風濕毒氣與血氣相搏故疼邪在膚腠則血氣滯而皮膚厚搔之如隔衣故不仁

脚氣痺攣 風毒搏於經風濕乘於血故令攣痺也

脚氣心腹脹急 風濕毒氣從脚上入於內與臟氣相搏結聚不散故心腹脹急

脚氣腫滿 由風濕毒氣搏於腎經則腎氣不能宣通水液使傳於小腸反漬於皮膚故腫滿也

脚氣驚悸 由溫濕挾風毒初客膚腠後經腑臟與神氣相搏則心驚悸也

脚氣轉筋 靈樞四時氣篇轉筋於陽治其陽轉筋於陰治其陰本輸篇轉筋者立而取之可令遂已

脚氣方

礬石湯治脚氣衝心

礬石二兩以漿水一斗五升煎浸脚良

第一竹瀝湯治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腹脹起如腫按之不陷心中惡不欲食或患冷方

竹瀝五升

甘草

秦朮

葛根

黃芩

麻黃

防已

細辛

桂心

乾薑各一兩

防風

升麻各一兩

茯苓

二兩

附子

二枚

杏仁

五十

三升分三服取汗

此脚氣主方
多治風之藥

烏麻酒釀

治風虛氣滿脚疼痺攣弱不能行

烏麻五升

微熬搗酒漬一宿隨所能飲之盡更作

茱萸木瓜湯

治脚氣衝心悶亂不識人手足脈欲絕

吳茱萸半兩

木瓜一兩 檳榔二兩 生薑五片 水煎服

蘇子粥書老

治老人脚氣毒悶身體不仁行履不能

紫蘇子

五合熬研細粳米四合淨
以水投取汁沈淘

右煮作粥臨熟下蘇汁調之空心食之日一服亦温中

杉木湯方事

唐柳柳州云元和十二年二月得脚氣夜半痞絕脇有塊大如石且死困塞不知人三日

蔡陽鄭洵美進杉木湯服半日食頃大小便三次氣通塊散用杉木節一大升橘葉一升無葉以皮

代之大腹檳榔七個合子碎之童子小便三大升共煮一升半分二服若一服得快劑停後服

檳榔散活人書

治脚腫

橘葉大

沙木一握 小便一盞 酒半盞同以

右煎數沸調檳榔末二錢食後服即前方

木瓜散活人書

治脚氣

大腹皮一枚 紫蘇一分 乾木瓜一分 甘草一分 木香一分 羌活一分

右細剉為散分作三服每用

白水一盞煎至半盞去滓通口服

雞屎白散

轉筋之為病其人臂脚直脈上下行微弦轉筋入腹者

雞屎白一味為散取方寸匕以水六合和溫服

療轉筋方外 以鹽一升水一升半作湯洗漬良

延效療轉筋外 并治渾身轉筋 煖水稍熱於浴斛中坐浸須臾便差如湯沃雪


轉筋灸法外 轉筋在兩臂及胸脇者灸手掌白肉際七壯 在十指者灸手踝骨上七壯 在脛骨者

灸膝下廉筋上三壯 又法灸湧泉七壯亦可灸大都七壯穴在足大指本節內側白肉際 腹腸轉筋者灸臍上一

寸十四壯

烏頭湯觀風 麻豆湯觀水 大活絡丹 崔氏八味丸即腎氣丸

俱見通治



吳江徐靈胎河溪著

疫癘鬼症

素問

遺篇刺法論黃帝曰余聞五疫之至皆相染易無問大小病狀相似不施救療如何可得不相移易者歧伯曰不相染者正氣存內邪不可干避其毒氣天札從來天札內經注云鼻也空虛能受天復得其性氣出於腦即不邪干氣出於腦即先想心如日欲將入於疫室先想青氣自肝而出左行於東化作林木次想白氣自肺而出右行於西化作戈甲次想赤氣自心而出南行於上化作焰明次想黑氣自腎而出北行於下化作水次想黃氣自脾而出存於中央化作土五氣護身已畢以想頭上如北斗之煌煌然後可入於疫室又一法於春分之日日未出而吐之又一法於雨水日後三浴以藥泄汗

病源

一歲之內節氣不和寒暑乖候或有暴風疾雨霧露不散則民多疾疫無長少卒皆相似如有鬼厲故云疫癘

中惡 精神衰弱為鬼神之氣卒中者卒然心腹刺痛悶亂欲死凡卒中惡腹大而滿者診其脈緊大而浮者死緊細而浮者生 又中惡吐血數升脈沉數細者死浮焱如疾者生脈大段如此亦不可泥卒然吐血多者多係中惡莫作

治吐血

尸厥 陰陽逆也其狀如死猶微有息而不恒脈尚動而形無知也脈沉大而滑身溫而汗此為入腑氣復自愈若唇青身冷此為入臟即死

鬼擊 謂鬼厲之氣擊著於人也。得之無漸。如人以刀矛持刺。狀胸膈腹內絞急切痛。不可抑按。或吐血。或鼻中出血。或下血。一名為鬼排重者死。

卒魔 魂魄外遊。為他邪所執。欲還未得。忌火照之。照則神魂遂不復入。乃死。若在燈光前魔者。是。本由明出。不忌火。

三尸諸蟲 其蟲與人俱生。而此蟲忌血。能與鬼靈相通。常接引外邪。為人患害。其發作之狀。或沉沉默默。不知所苦。而無處不惡。或腹痛脹急。或礮塊踊起。或掌引腰脊。或精神雜錯。變狀多端。其病大同小異。但以一方治之者。故名諸尸也。

尸注 是五尸內之尸注。而挾外鬼邪之氣。流注身體。令人無處不惡。每卽氣改變。輒至大惡。積月累年。漸就頹滯。以至於死。死後復易旁人。乃至滅門。以其尸病注易旁人。故謂尸注。

喪尸 人有年命衰弱。至於喪死之處。心意有所畏惡。其身內尸蟲性既忌惡。便更接引外邪。共為疹病。其發亦心腹刺痛。脹滿氣急。但逢喪處。其病則發。故謂之喪尸。

尸氣 人有觸值死尸。或臨尸。其尸氣入腹內。與尸蟲相接成病。其發亦心腹刺痛。脹滿氣急。但聞尸氣。則發。故謂之尸氣。

諸注 謂邪氣居住人身內。故名為注。又注易旁人也。乃有三十六種。九十九種。而方皆不顯其名。所載有風鬼。轉生死邪氣。寒熱冷毒。毒惡。悍道走溫。畏哭。殃食水骨血。溫痺勞微。泄石。產土。飲以上諸注。皆正氣虛而邪氣傳綿也。與諸尸病相近。

又有九種注

- 一曰風注
- 二曰寒注
- 三曰氣注
- 四曰生注
- 五曰涼注
- 六曰酒注
- 七曰食注

八日水注 九日尸注

疫癘方

小金丹方

辰砂二兩 水磨雄黃一兩 叶子雌黃一兩 紫金半兩
研之可為細末

同入合中。外固了地一尺築

地實不用爐不須築制用火二十斤煨之也七日終常令火候冷七日脫次日出合子合子即磁取出

順日研之順日研之三日煉白沙蜜為丸如梧子大每日望東吸日華氣一口水水下一丸和氣咽之

服十粒無疫干也

還魂湯金匱 救卒死客忤死

麻黃三兩 杏仁七十個 甘草一兩 右三味水八升煮取三升去渣分令咽之通治諸

感忤千金方云此方主卒忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕復覺或已無脉口噤拘不開去齒下湯湯入口

不下者分病人髮左右足踏肩引之藥下復增取一升須臾立甦

又方

韭根一把 烏梅七枚 吳茱萸升 右三味以水一斗煮之以病人櫛內中三沸擲浮者生沉者死

煮取三升去滓分飲之

外臺走馬湯附方 治中惡心痛腹脹大便不通并通治飛尸鬼擊

巴豆二枚 杏仁二枚 右二味以綿纏捷令碎熱湯二合捨取自然汁飲之當下老少量之

雄黃粉千金 治卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絕雄黃一味為粉以酒服一升日三

血化為水

治瘧方外臺 瘧疫轉相染著至滅門延及外人無收視者

赤小豆 鬼箭羽 鬼白 雄黃研 丹砂略二 右五味搗末蜜丸如小豆大服一丸可

與病人同牀

辟瘧殺鬼丸外臺

虎頭骨五兩 硃砂一兩 鬼白一兩 雄黃半兩 皂莢一兩 雌黃半兩 葶藶一兩 右七味搗篩以蠟蜜

和彈丸大絳囊盛繫臂男左女右家中置屋四角月朔望夜半中庭燒一丸忌生血物

八毒赤丸續 治鬼疰病

雄黃 礬石 硃砂 附子泡 藜蘆 丹皮 巴豆各一兩 蜈蚣一條 為末蜜丸小

豆大每服五七丸冷水送下無時礬石或作礬石

紫金錠 蘇合丸二方俱見通治

諸疸附黃汗

素問

平人氣象論溺黃赤安臥者黃疸已食如饑者胃疸目黃者曰黃疸

金匱

跌陽脈緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食即為滿脈緊而數則有熱兼有寒故用藥本當寒熱兼顧古方可考也尺脈浮為傷腎

跌陽脈為傷脾風寒相搏食穀即眩穀氣不消胃中苦渴濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體

盡黃名曰穀疸額上黑微汗出手足中熱薄暮即發膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治心中

懊懣而熱不能食時欲吐名曰酒疸夫病酒黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其證也酒疸

心中熱欲吐者吐之愈。酒疸下之久久為黑疸。目青面黑。心中如噉蒜齏。狀大便秘黑。皮膚爪之不仁。脉浮弱。雖黑微黃。故知之。黃家從濕得之。一身盡發熱。而黃壯熱。熱在裏當下之。黃疸之病。當以十八日為期。治之十日以上。瘥反劇。為難治。疸而渴者。其疸難治。疸而不渴者。其疸可治。發於陰部。其人必嘔。陽部。其人振寒而發熱也。黃汗之病。兩脰自冷。假令發熱。此屬飢飢。食已汗出。又身常晷臥。盜汗出者。必榮氣也。若汗出已反發熱者。久久其身必甲錯。發熱不止者。必生惡瘡。若身重汗出已輒輕者。久久必身瞶。瞶即胸中痛。又從腰以下。必汗出。下無汗。腰髀弛痛。如有物在皮中狀。劇者不能食。身疫痛。煩燥。小便不利。此為黃汗。

病源

黃病 黃病者。一身盡發熱。面色洞黃。七八日後。壯熱口裏有血。當下之法。如純肝狀。其人少腹內急。若其人眼睛溼疼。鼻骨疼。兩膊及項強。腰背急。即是重黃。多大便澀。但令得小便快。即不慮死。不用大便多。多即心腹脹不存。此由寒濕在表。則熱蓄於脾胃。腰理不開。瘀熱與宿穀相搏。煩鬱不消。則大小便不通。故身體面目皆變黃也。利小便為治黃總訣。

急黃 脾黃有熱。穀氣鬱蒸。因為熱毒所加。故猝然發黃。心滿氣喘。命在頃刻。故云急黃也。

勞黃 脾臟中風。風血瘀。故相搏。故令身體發黃。額上微黑。汗出手足中熱。薄暮發。膀胱急。四肢煩。小便自利。名為勞黃。

腦黃 熱邪在骨髓。腦為髓海。故熱氣從骨髓流入于腦。則身體發黃。頭痛眉疼。

陰黃 陽氣伏。陰氣盛。熱毒加之。故但身面色黃。頭痛而不發熱。名為陰黃。

癖黃 氣水飲停滯。結聚成癖。因熱氣相搏。則鬱蒸不散。故脇下滿痛。而身發黃。名為癖黃。

噤黃 心脾有痰熱。心主於舌。脾之絡脉出於舌下。若身面發黃。舌下大脉起青黑色。舌噤不能語。名為噤黃。

五色黃 凡人著五種黃。其人冥漠不知東西者。看其左手脉。名手肝脉。兩筋中其脉。如有如無。又看右手屈肘前臂上。當有三歧脉。中央者名為手肝脉。兩廂者名岐脉。看時若肝脉全無。兩廂壞。其人九死一生。若中央脉近掌三指道。有如不絕。其人必不死。

酒疸 虛勞之人。飲酒多。進穀少。則胃内生熱。因大醉當風入水。則身目發黃。心中懊痛。足脛滿。小便黃。面發赤斑。

穀疸 穀疸之狀。食畢頭眩。心忪怫鬱不安。而發黃。由失飢大食。胃氣衝熏所致。

女勞疸 其狀身目皆黃。發熱惡寒。小腹滿急。小便難。由大勞大熱。而交接即入水所致也。

黑疸 黑疸之狀。小腹滿。身體盡黃。額上反黑。足下熱。大便黑。是也。諸疸久久多變為黑疸。

黃汗之為病。身體洪腫發熱。汗出不渴。狀如風水。汗染衣。正黃如柏汁。其脉自沉。此由脾胃有熱。汗出而入水中浴。若水入汗孔中。得成黃汗也。

諸疸方

茵陳蒿湯金匱 穀疸之為病。寒熱不食。食即頭眩。心胸不安。久久發黃。為穀疸。此湯主之。

茵陳蒿六兩 梔子十四枚 大黃二兩 右三味以水一斗。先煮茵陳減六升。納二味。煮取三升。去滓分

溫三服。小便當利。尿如皂角汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

消石礬石散金匱 黃家日晡所發熱。而反惡寒。此為女勞。得之膀胱急。少腹滿。身盡黃。額上黑。足下熱。因

作黑疸。其腹脹如水狀。大便必黑。時溲。此女勞之病。非水也。腹滿者難治。此方主之。

消石

礬石 燒等

右二味為散以火麥粥汁和服方寸匕日三服病隨大小便去小便正黃大

便正黑是候也

梔子大黃湯

酒黃疸心中懊懣或熱痛此方主之

梔子枝

十四

大黃

一兩

枳實

五枚

豉

一升

右四味以水六升煮取二升分溫三服

桂枝加黃耆湯

諸病黃家

但利其小便假令脈浮當以汗解之此方主之亦主治黃汗

桂枝

芍藥

甘草

略

生薑

三兩

大棗

十二枚

黃耆

二兩

右六味以水八升煮取三升溫服

一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆取微汗不汗更服

猪膏髮煎

諸黃主之

猪膏

半斤

亂髮

如雞子大三枚

右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出

茵陳五苓散

黃疸主之

茵陳蒿末

一錢

五苓散

五分

右二味和先食飲方寸匕日三服此利小便

大黃消石湯

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之

大黃

黃柏

硝石

各四兩

梔子枝

十五

右四味以水六升煮取二升去渣納硝更煮取一升頓

服黃疸變腦滿者最服多此方下法也

麻黃醇酒湯

治黃疸

麻黃

三兩

以美酒五升煮取二升半頓服盡冬自用酒春月用水

黃疸方

千金

治身目皆黃皮肉鞠塵出

茵陳

一把

梔子

四枚

石膏

一觔

以水五升煮二升取二升半去渣以猛火燒石膏令赤投湯中沸定

服一升。覆取汗。周身以粉粉之。不汗更服。燒石膏之
義其精妙

赤苓散千金 主黑疸身皮大便皆黑。

赤小豆按十 茯苓按六 雄黃一銖 瓜丁四銖 女萎六銖 甘草二銖 以水三升。煮豆茯苓取八合。搗四

味為散。和半錢服之。須臾當吐。吐則愈。亦主一切黃。

寒水石散千金 主肉疸飲少小便多。白如泔色。此病得之從酒。

寒水石 白石脂 括萸絡五知母 兔絲子 桂心各三 搗篩為散。麥粥服五分。七日三服。

五日知十日差。此方不常用
聊備一格

女勞疸千金 治黃疸之為病。日晡所發熱。惡寒。少腹多。體黃額黑。大便黑溇洩。足下熱。此為女勞也。腹

滿者難療。

滑石研 石膏研各五兩 為散。麥粥汁服方寸匕。日三。小便極利差。

牛疸煎千金 酒疸身黃麴疸。出此主之。

牛疸一石 大黃八兩 芫花一升 薤花半劑 右三味以酒一升。切三味清之一宿。煮減半。去渣納牛

膽。微火煎。令可丸。丸如豆大。服一丸。日移六七尺。不知更服一丸。膈上吐。膈下利。或不吐利而愈。

救急三十種黃方外 用雞子一顆。并殼燒灰。研酢一合。又溫之。總和頓服。身體眼暗。極黃者。不過三顆。

鼻中蟲出神效

療黃疸方外 取生小麥苗。搗絞取汁。飲六七合。晝夜三四。飯三四日。便愈。無小麥苗。穰麥苗亦得。

近效瓜蒂散外 療黃疸 瓜蒂二七 赤小豆七枝 生秫米二七 丁香二七 右四味。搗篩。重者取如大豆二枚。各著一枚。鼻孔

中痛縮鼻須更鼻中漉清黃水或從口中出升餘則愈病輕者小豆大則可不愈間日復頻用效或使人以竹筒極力吹算中無不死者噴鼻出黃水糖之前即有此法或用東膠研

麻黃連軀赤小豆湯

論寒

治傷寒發熱在裏身必發黃此主之

麻黃

二兩連軀二兩

赤小豆

一升杏仁

十四粒

甘草

二兩

生梓白皮

一升生薑

二兩

大棗

十二

右以

潦水一斗先煮麻黃去沫納諸藥者取三升分溫三服

此方治傷寒發熱未盡之黃與諸證別

黃者芍藥桂枝苦酒湯陰黃汗之為病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如檠汁脉自沉以汗出入水中浴水從汗孔入得之此湯主之

黃耆

五兩芍藥三兩

桂枝

三兩

右三味以苦酒一升水七升相和者取三升溫服一升當心煩服

至六七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也

治一方以美生醱代苦酒此病在表不在裏金匱等書

發必中者何也蓋症之重者有膿在喉中包裏黃水藥不能入非決破其囊或混其黃水出淨必不除根此等病當求屢試屢驗和平輕淡之單方治之專恃古方竟有全然不應者

小建中湯

治通

瓜蒂湯

方見

情志臥夢

靈素

靈大惑論五臟六腑之精氣皆上注於目而為之精精之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精為約束裏擗筋骨血氣之精而與脉并為系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣邪同其精其精所中不相比也則精散精散則視歧視歧見兩物目者五臟六腑之精也榮衛魂魄之所常榮神氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脈法於陽也故陰陽合

傳而精明也。目者心使也。心者神之舍也。故精神亂而不轉，卒然見非常處，精神魂魄散不相得，故曰惑也。素舉痛論帝曰：余知百病生於氣也。怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，炅則氣泄。

驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣急，陰陽氣象大論：東方生風，在聲為呼，在變動為握，在志為怒，怒傷肝，悲勝怒。所勝五行南方生熱，在聲為笑，在變動為憂，在志為喜，喜傷心，心勝喜，中央生濕，在聲為歌，在變動為噦，在志為思，傷脾，怒勝思，西方生燥，在聲為哭，在變動為咳，在志為憂，憂傷肺，喜勝憂，北方生寒，

在聲為呻，在變動為慄，在志為恐，恐傷腎，思勝恐。調經論：神有餘則笑不休，神不足則悲。血有餘則怒不足，則恐。血并於陰，氣并於陽，故為驚狂。血并於陽，氣并於陰，乃為疔中。血并於上，氣并於下，心煩惋

善怒，血并於下，氣并於上，亂而善忘。情志以上不臥多臥。靈柞客篇：黃帝問於伯高曰：夫邪氣之客人也，或令人目不瞑，不臥出者，何氣使然？伯高曰：

五穀入於胃也，其糟粕津液宗氣分為三隧，故宗氣積於胸中，出於喉嚨，以貫心脈而行呼吸焉。榮氣者，泌其津液，注之於脈，化以為血，以榮四末，內注五臟六腑，以應刻數焉。衛氣者，出其悍氣之慄疾而先行於四末，分肉皮膚之間，而不休者也。晝日行於陽，夜行於陰，常從足少陰之分間行於五臟六腑，今厥氣

客於五臟六腑，則衛氣獨衛其外，行於陽，不得入於陰，行於陽，則陽氣盛，陽氣盛則陽蹻陷，不得入於陰，陰虛故目不瞑。黃帝曰：善治之奈何？伯高曰：補其不足，瀉其有餘，調其虛實，以通其道而去其邪，飲以半

夏湯一劑，陰陽已通，其臥立至。大惑論：黃帝曰：人之多臥者，何氣使然？歧伯曰：此人腸胃大而皮膚濕

而分肉不解焉。善食人多善黃帝曰：卒然多臥者，何氣使然？歧伯曰：邪氣留於上焦，閉而不通，已食若飲湯，衛氣留久於陰而不行，故卒然多臥焉。

不夜瞑，不盡眠。靈柞衛生會篇：黃帝曰：老人之不夜瞑者，何氣使然？少壯之人不盡眠者，何氣使然？歧

伯答曰壯者之氣血盛其肌肉滑氣道通榮衛之行不失其常故晝精而夜眠老者之氣血衰其肌肉枯氣道滯五臟之氣相搏其榮氣衰少而衛氣內伐故晝不精夜不眠寒熱病偏陽氣盛則瞑目陰氣盛則瞑目

不得卧 素逆調論不得卧而息有音者是陽明之逆也足三陽者下行今逆而上行故息有音也陽明者胃脈也胃者六腑之海其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得卧也下經曰胃不和則卧不安此之謂也夫起居如故而息有音者此肺之絡脈逆也絡脈不得隨經上下故留經而不行絡脈之病人也微故起居如故而息有音也夫不得卧卧則喘者是水氣之客也夫水者循津液而流也腎者水臟主津液主臥與喘也以上臥按風邪入於陰經亦多臥

靈注邪發夢篇陰氣盛則夢涉大水而恐懼陽盛則夢大火燔燔陰陽俱盛則夢相殺上盛則夢飛下盛則夢墜其飢則夢取其飽則夢予肝氣盛則夢怒肺氣盛則夢哭懼哭泣飛揚心氣盛則夢喜笑恐畏脾氣盛則夢歌樂身體重不舉腎氣盛則夢腰脊兩解不屬素脈要精微論短蟲多則夢聚衆長蟲多則夢相擊毀傷以上夢

情志臥夢方

半夏秫米湯以流水千里以外者八升揚之萬遍取其清五升者之炊以葦薪火沸置秫米一升治

半夏五合徐炊令竭為一升半去其滓飲汁一小杯日三稍增以知為度故其病新發者覆杯則臥汗

出則已矣久者三飲而已也漢時一斗僅今二升余說見古銅量一枝較準如此

半夏麻黃丸心下悸者此主之

半夏 麻黃等分 右二味末之煉蜜丸小豆大飲服三九日此治飲石

桂枝救逆湯全 火邪者主之

桂枝三兩 甘草二兩 生薑三兩 牡蠣五兩 龍骨四兩 蜀漆三兩 洗 大棗十二 右七味末之 以水一

斗二升 先者蜀漆減二升 納諸藥者取三升 去滓溫服

黃連阿膠湯論寒 治少陰病心中煩不得卧

黃連四兩 黃芩一兩 芍藥二兩 阿膠三兩 雞子黃二枚 右五味以水六升 先煮三搗取二升 去渣

納阿膠烱盡少冷 納雞子黃攪和 溫服七合 此治腎氣冲心之不得卧故清心火以納腎氣

酸棗仁湯全 治虛勞虛煩不得眠

酸棗仁二升 甘草一兩 知母 茯苓 川芎各二兩 右五味以水八升 先者棗仁取六升 納諸

藥煮取三升 分溫三服 同一心煩不眠而用藥則別何醫者之多不審也 此方外臺有加乾薑者亦可採取

溫膽湯全 治大病後虛煩不得眠 此膽寒故也 宜服

半夏 竹茹 枳實各二兩 橘皮三兩 生薑四兩 甘草一兩 右六味以水八升 煮取二升

分三服 以一不眠之症 方中一味生薑已足散腹中之寒 庸醫以熱藥溫膽 斯知膽為清虛之病 無用熱補之理也

治多忘全

菖蒲二分 茯苓 茯神 人參各五 遠志七分 右五味治下 篩酒服方寸匕 日二夜 一五日

後知神良

枕中方針 治好忘

龜甲炙 龍骨 遠志去心 菖蒲等分 右四味治下 篩酒服方寸匕 日三 常服令人大聰

鎮心省睡益智方全

遠志五十兩 益智子

菖蒲各八兩

右三味為末以醇糯米酒服方寸匕一百日有效秘不令人知

瘵虛煩不可攻方外

青竹茹二升

以水四升煮取三升去渣分溫五服

梔子鼓湯見傷寒 補心丸

天王補心丹道藏

鎮心丸以上三方俱見通治

五數病耳目鼻口

靈樞

靈脉度篇五臟不和則七竅不通

耳

靈素

靈麗氣篇精脫者耳聾液脫者耳數鳴素繆刺論邪客於手陽明之絡令人耳聾時不聞音刺手大

指次指爪甲上去端如韭葉許各一瘡立聞不已刺中指爪甲上與肉交者立聞其不時聞者不可刺也

此乃邪氣入絡卒然所得之症故可刺耳聾刺手陽明不已刺且通脉出耳前者

病源

耳聾瞶耳 津液為風熱所乘結鄰成丸塞耳

耳方

補腎治五葷方千金

治勞聾氣龍風聾虛龍毒龍如此久聾耳中作聲

草麻仁五分

杏仁去皮

桃仁去皮

蠟八分

葛蒲

磁石各一兩

巴豆仁一分去

石鹽三分 附子泡

通草各半兩 薑蔞香一分

松脂二兩

右十二味先搗諸草石等令細別搗諸仁如脂加松脂及蠟合

搗數千杵可丸乃止取如棗核大綿裹塞耳一日四五度出之轉捻不過三四度日一易之

從蓉丸補 治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉從蓉 山萸肉 石龍芮一名胡 石菖蒲 兔絲子 羌活 鹿茸 石斛 磁石

附子各一兩 全蠍七個 麝香半兩 右為末煉蜜丸梧子大每服百丸空心酒下或鹽湯下

麝香佛手散奇效 治五般耳出水者

麝香 少許 人牙牙遇存性出火毒 右為細末每用少許吹耳內即乾及治小兒痘瘡出現壓

煮酒調一字服之即出

磁石猪腎羹養老 治老人久患耳聾養腎臟堅骨氣

磁石 一斤斤碎水淘 猪腎一對去脂 右以水五升煮磁石取二升去磁石投腎調和以葱豉薑椒

作羹空腹食之作粥及入酒並得

通耳法清

磁石用緊者如 穿山甲燒存性為 右用新綿紙裹了塞耳口中銜少許鐵覺耳內如風雨即愈一

方用班毛一個巴豆一粒研細綿裏塞耳痛取出按此症如有火者服清火藥解毒

目

靈素

靈論疾診尺篇診目痛赤脈從上下者太陽病從下上者陽明病從外走者少陽病 決氣篇氣脫者目

不明 素解精微論夫風之中目也陽氣內守於精是火氣燭目故見風則泣下也

目方

七寶散十金 主目醫經年不愈方

琥珀 珠子 珊瑚 決明子 紫貝 石胆 馬珂各一 硃砂二分 麩仁五錢 右

為細末傳目中如小豆大日三良

去醫方千金貝子燒右為末取如胡豆著醫上日再正仰臥令人傳之如炊一石米久乃拭之有

息肉者加珍珠如貝子等分研如粉

補肝丸千金主明目

地膚子 藍子 蒺藜子 車前子 瓜子 兔絲子 羌蔚子各二兩黃連半兩

青箱子一合 大黃二兩 決明子 細辛 螢火蟲各五桂心五分 右十四味搗篩

煉蜜和丸如桐子大飲服下十五丸可加至二十丸慎生冷油蒜等物眼暗神方也

磁硃丸燒磁德原治神水寬大漸散昏如霧露中行漸觀空中有黑花觀物成二體及內障神水淡綠色

淡白色及治耳鳴及聾

磁石二兩辰砂一兩神麴三兩右三味更以一兩水和作餅煮浮入前藥煉蜜丸每服十丸加至

三十丸空心米湯下

石斛夜光丸 治神水寬大漸散昏如霧露空中有黑花觀物成二神水淡綠淡白色者

天門冬二兩兔絲子七錢人參 茯苓各二兩甘菊 山藥 枸杞 石斛 杏仁各七

草決明八錢麥冬 熟地 生地各二兩肉苁蓉 青箱子 羚羊角錢蒺藜 川芎

甘草多黃連 防風 枳殼 烏犀錢各五牛膝七錢右二十四味為細末煉蜜丸如桐子

大每服三十五丸溫酒鹽湯送下眼科藥不

羚羊角散局 治風熱毒上衝眼目暴發赤腫或生瘡痂痛隱澀羞明

羚羊角 鈞車前子 甘草 黃芩 川升麻各二兩 決明子二十枚 龍胆草去蘆 山梔仁各五兩 右

為細末每服一錢食後溫熱水調下日進三服小兒可服五分

蟬花散局 治肝經蘊熱風毒上攻眼目翳膜遮睛赤腫疼痛昏暗視物不明隱澀難開多生眵淚內外

障眼

草決明炒 甘菊花 川芎不見 蟬退洗去土 山梔子 殺精草 防風不見 黃芩去土 蔓荊子

木賊草 羌活不見 荊芥 蜜蒙花 白蒺藜炒去刺 甘草各等分 右為末每服二錢用茶清

調服或用荊芥湯入茶少許調服亦得食後及臨臥時服此去翳通治方

洗眼藥養老書

膽礬一兩 煨今白 滑石研 秦皮半兩 膩粉二錢 右四味每用一字湯泡候溫閉目洗兩眥頭以

冷為度胆礬入目極痛癢用頗宜按五臟之病准目病最多所以另有專科此藥路述內治數方以滿揀取至於全體治法則當廣求眼方諸書而探討之風火時眼前方即於丸散中擇與症之

藥兩用可也

鼻

靈素 靈憂恙無言篇人之鼻洞涕出不收者頰頰不開分氣失也 素五臟別篇五氣入鼻藏于心肺心肺有

病而鼻為之不利也 辛頰鼻淵 素氣厥論膜移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為翳膜眼目機血汗也 故得之氣

厥也

鼻方

通草散千金

治鼻中息肉

通草半兩

礬石一兩 真珠一錢

右三味下篩攪碎如棗核取藥如小豆著綿頭納鼻中日三次真珠

能去一切息肉

鼻方千金

治鼻中息肉不得息

礬石燒

藜蘆各半

瓜蒂二七 附子半兩

右四味各搗下篩合和以竹管取藥如小豆大納孔中

吹之以絳絮塞鼻中日再以愈為度吹不

消鼻痔方

苦丁香

甘遂各二錢 青黛

草烏尖

枯礬各二分

右為細末麻油搜令硬不可爛旋丸如

鼻孔大小用藥納鼻內令至痔肉上每日一次

凌霄花散百一

選方 治酒齶鼻

凌霄花

山梔等分

右為末每服二錢食後茶湯調下

蒼耳散 治鼻流涕不止名曰鼻淵

辛夷仁半兩

蒼耳子炒

香白芷一兩 薄荷五分

右為末每服二錢用葱茶湯食後調服

治鼻淵方本草

山梔子不拘多少

末之搗入鼻中立愈

又方 藿香為末用豬膽汁或牛膽汁丸每服一錢按鼻病惟鼻淵最重當辨求效方不得徒恃外治法也

又方 絲瓜連根處藤炙為末酒服此治鼻中

鼻中瘰肉

硃砂

雄黃

巴豆炭

製信

提硝

珠

冰片

硼砂

苦丁香

以

上俱可選用耳痔及諸瘰肉皆同

口齒

靈素

口苦 靈邪氣臟腑病形論膽病者善太息口苦嘔宿汁心下滯滯恐人將捕之噎中訶訶然數唾

齒痛 靈雜病篇齒痛不惡清飲取足陽明惡清飲取手陽明

重舌 靈終始篇重舌刺古柱以拔針也

瘡 靈憂患無言篇人卒然無音者寒氣客於厥則厥不能發發不能下至其開闔不致故無音 肝脈

驚暴有所驚駭脈不至若瘡不治自己驚駭而瘡者與有

口糜 素氣厥論膀胱移熱于小腸高腸不便上為口糜

齒寒 素繆刺論邪客於足陽明之經令人軌衄上齒寒

病源

齟齬者 睡眠而齟相磨切也此由血氣虛風邪客於牙車筋脈之間故因睡眠氣息喘而邪動引其筋

脈故上下齟相磨切有聲謂之齟齬

滯頤 脾冷不能收攝涎唾漬於頤也

口齒方

口甘方 有病口甘者此五氣之溢也名曰脾瘕夫五味入口藏於胃脾為之行其精氣津液在脾故

令口甘也此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥者也肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上

溢轉為消渴治之以醇除陳氣也醇性味甘寒能利水道辟不祥除胸中痰癖其氣清香能生津止渴潤肌肉故可除陳積蓄熱之氣

口苦方神 有病口苦者病名膽瘰。夫肝者中之將也。取決于膽。咽為之使此人者。數謀慮不決。故膽虛。

氣上溢而口為之苦。治之以膽。募俞。數謀慮不決。肝膽俱勞。則必虛。虛則氣不調。故胆氣上溢。而口苦。取陽陵泉。亦膽經之穴。在委中之外。應。

苦取陽陵泉亦膽經之穴在委中之外應

療口瘡針 治口瘡久不差入胸中。並生瘡。三年以上不瘥者。

濃煎薔薇根汁含之。又稍稍咽之。日三夜一。冬用根。夏用莖葉。冬青葉湯亦可。

推頰車法金 治失欠頰車。蹉開張不合。一人以手指牽其頤。以漸推之。則復入矣。惟當疾出其指。恐

誤嚙傷入指也。外塗南聖末

口氣鼻穢方金 常以月旦日未出時。從東壁取步七步。回頭向垣立。含水嚙壁七遍。口即美香。此名禁法

口中臭方金 細辛豆蔻含之甚良。

口香去臭方金 井花水三升。漱口吐廁中良。

治緊唇方金 取蛇皮拭淨。燒為灰數之。又方。灸虎口。男左女右。

塗唇方金 治唇黑腫痛。瘡不可忍。燒亂髮及蜂房。去畜毛。作灰。猪脂和敷之。亦治藩唇。

刺舌法金 治舌卒腫滿口。溢如吹猪胞。氣息不得通。須臾不治。殺人。刺舌兩邊大脉。血出。勿使刺著

舌下中央脉。血出不止。殺人。如上治不愈。或血出數升。則燒鐵篋令赤。慰瘡數遍。以絕血也。

療舌腫方金 治舌腫起如猪胞。釜下墨末。以酢厚。傅舌上下。脫去。更傅。須臾即消。若先決出血。汁竟

傅之。彌佳。凡此患人。皆不識。或錯治。益困。殺人甚急。但看其舌下。自有疔蟲。形狀或如蟻。或如蠶。子

細看之。有頭尾。其頭少白。燒鐵釘烙頭上。使熱。即自消。

療舌腫方金 治舌上黑。有數方。大如筋。出血如湧泉。此心藏病。

戎鹽 黃芩 黃柏 大黃略五人參 桂心 甘草略二 右七味蜜丸梧子大以飲服十丸日三亦燒鐵篋焙之

療重舌針 并治舌上生瘡涎出 以蒲黃末傅之不過三度差

療舌脹方針 用雄雞冠血盞盛浸舌咽下即縮

療舌腫脹本方 治心脾壅熱生木舌腫脹

元參 升麻 大黃 犀角 甘草略等 右為細末每服三錢水一盞煎至五分溫服不拘時

治失音養老

皂角一挺刮去黑皮并子 薤白一個切 右以水二碗同煎至半碗服之不過三服便語喫却薤白更妙此方

喉間之涎也

療馬喉痺千金 治喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉痺

馬鞭草根一握一名杜牛膝 勿中風截去兩頭搗取汁服之

琥珀犀角膏 治咽喉

真琥珀研 犀角一名生用 人參 棗仁 茯苓 辰砂研各錢片 腦研一錢 右為末研勻蜜為膏

以磁器收貯候其疾作每服一彈子大以麥冬濃煎湯化下一日連進五服此治陰火上

喉腫刺法千金 治咽喉不得息若有毒氣硬咽毒攻咽喉 刺手小指爪文中出血即愈逐左右刺出血

神祕立愈一法刺兩手少商穴出血其穴在大指內廉去爪甲如韭葉

口旁惡瘡方千金

亂髮灰

故絮灰

黃連末

乾薑末等分

右四味合和為散以粉瘡上不過二遍

敷面醫方針

治野鷲鳥醫令面潔白

馬珂二兩

白附子

鷹屎白

珊瑚各一兩

右四味研成粉和勻用人乳調每夜取敷面明旦

溫漿水洗之

又方針

李子仁為末和雞子白敷一宿即落

一方用白附子末酒和敷之即落

止牙痛方

蟾酥七分 硃砂

雄黃各三分 甘草一分

右研極細以飛羅為丸如茱萸子大絲綿裹包塞在痛處

治牙痛仙方

以羊前蹄膝合盤骨以酥塗炙黃為末入細辛末一錢雄黃末五分共三味研極細末擦

患處立愈

治牙疼方千金

蒼耳子五升

右一味以水一斗煮取五升熱含之疼則吐吐復含不過三劑愈無子莖葉皆得用之

如神散方局

治風牙疰攻疰疼痛牙疰動搖連頰浮腫

露蜂房微炙

川椒法目及開口

右為末每用一錢水一盞入鹽少許同煎八分乘熱漱之冷即吐

一服立效二味交者末擦亦效

細辛散方局

治風疰牙疰牙疰宣爛牙疰搖動腮頰浮腫

紅椒

縮砂去殼 鶴虱

牙皂

華撥各半 荊芥

細辛各一兩

白芷

川烏各二兩

右

為細末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得嚼少時用溫水漱口頻頻擦之立有神效治風寒牙

按牙疼有異種寒熱風火蟲虛治各不同非對症則不愈故有不一效至於喉痺一症病變各殊此屬外科病變無窮茲偶錄一二方未及萬一若欲尋治此症非廣求博識不可

靈素

靈口問篇黃帝曰人之久者何氣使然岐伯曰衛氣晝日行於陽夜半則行於陰陰者主夜夜者臥陽者主上陰者主下故陰氣積於下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故數欠陽氣盡陰氣盛則目暝陰氣盡而陽氣盛則寤矣黃帝曰人之噦者乾嘔為噦或云即噦氣何氣使然岐伯曰穀入於胃胃氣上注於肺今有故寒氣與新穀氣俱還入於胃折故相亂真邪相攻氣并相逆復出於胃故為噦黃帝曰人之唏者何氣使然岐伯曰此陰氣盛而陽氣虛陰氣疾而陽氣徐陰盛而陽氣絕故為唏黃帝曰人之振寒者何氣使然岐伯曰寒氣客於皮膚陰氣盛陽氣虛故為振寒寒慄黃帝曰人之噫者何氣使然岐伯曰陽氣使然岐伯曰寒氣客於胃厥逆從上下散復出於胃故為噫黃帝曰人之噎者何氣使然岐伯曰陽氣和杓滿於心出於鼻故為噎黃帝曰人之嘔者何氣使然岐伯曰胃不實則諸脉虛諸脉虛則筋脉懈惰筋脉懈惰則行陰有力氣不能復故為嘔黃帝曰人之哀而泣涕出者何氣使然岐伯曰心者五臟六腑之主也目者宗脉之所聚也上液之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五臟六腑皆搖搖則宗脉感宗脉感則液道開液道開故泣涕出焉液者所以灌精濡空髮者也故上液之道開則泣泣不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見矣黃帝曰人之太息者何氣使然岐伯曰憂思則心系急心係急則氣道約約則不利故太息以伸出之黃帝曰人之涎下者何氣使然岐伯曰飲食者皆入於胃胃中有熱則蟲動蟲動則胃緩胃緩則廉泉開故涎下黃帝曰人之耳中鳴者何氣使然岐伯曰耳者宗脉之所聚也故胃中空則宗脉虛虛則下溜脉有所竭者故耳鳴黃帝曰人之自翳舌者何氣使然此厥逆走上脉氣革至也少陰氣至則鼈舌少陽氣至則鼈頰陽明氣至則鼈唇矣凡此

十二邪者皆奇邪之走空數者也故邪之所在皆為不足

經氣為邪所據則正氣不能復歸故為不足當引本經之正氣以逐邪出外所謂正氣者即本

經之氣故能御邪此指針法言之庸醫不知竟用補藥于邪氣所留之經則是補住其邪矣害忍言哉

故上氣不足腦為之不滿且為之苦鳴頭為之苦傾

目為之眩中氣不足溲便為之變腸為之苦鳴下氣不足則乃為痿厥心恍五味為酸走筋多食之令

人癢鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悶

心師傳篇岐伯曰入國問俗入家問諱上堂問禮臨病人問所便此句為世黃帝曰使病人奈何岐

伯曰夫中熱消癉則便寒寒中之屬則便熱胃中熱則消穀令人懸心善飢臍以上皮熱腸中熱則出黃

如糜臍以下皮寒按寒字當作熱字胃中寒則腹脹腸中寒則腸鳴飧泄凡服瀉宜溫藥瀉亦同胃中寒腸中熱則脹而且

泄胃中熱腸中寒則疾飢小腹痛脹黃帝曰胃欲寒飲腸欲熱飲百病始生篇陽絡傷則血外溢血

外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則

并合凝聚不得散而積成矣邪客為黃帝問於岐伯曰人有八虛各何以候岐伯答曰以候五臟黃帝

曰候之奈何岐伯曰肺心有邪其氣留於兩肺肝有邪其氣留於兩腋脾有邪其氣留於兩髀腎有邪其

氣留於兩膕凡此八虛者皆機關之室真氣之所遊邪氣惡血固不得住留住則傷筋絡

骨節機關不得屈伸故拘攣也大惑篇黃帝曰人之善飢而不嗜食者何氣使然岐伯曰精氣并於脾

熱氣留於胃胃熱則消穀殺消故善飢胃氣逆上則胃脘寒故不嗜食宣明五氣論五味所入酸入肝

辛入肺苦入心鹹入腎甘入脾是謂五入五氣所病心為噫肺為欬肝為語脾為吞腎為欠為噦胃為氣

逆為噦為恐大腸小腸為泄下焦溢為水膀胱不利為癃不納為遺溺膽為怒是為五病五精所并精氣

并於心則喜并於肺則悲并於肝則憂并於脾則畏并於腎則恐是為五并虛而相并者也五臟所惡心

惡熱肺惡寒肝惡風脾惡濕腎惡燥是為五惡五臟化液心為汗肺為涕肝為淚脾為涎腎為唾是為五

液五味所禁辛走氣氣病無多食辛鹹走血血病無多食鹹苦走骨骨病無多食苦甘走肉肉病無多食甘酸走筋筋病無多食酸是為五禁無令多食五病所發陰病發於骨陽病發於肉陰病發於冬陰病發於夏是為五發五邪所亂邪入於陽則狂邪入於陰則痺搏陽則為癰疾搏陰則為瘡陽入之陰則靜陰出之陽則怒是為五亂五邪所見春得秋脈夏得冬脈長夏得春脈秋得夏脈冬得長夏脈名曰陰出之陽病善怒不治是謂五邪皆同命死不治五臟所藏心藏神肺藏魄肝藏魂脾藏意腎藏志是為五臟所藏五臟所主心主脉肺主皮肝主筋脾主肉腎主骨是謂五主五勞所傷久視傷血久臥傷氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋是謂五勞所傷五脈應象肝脉弦心脉鉤脾脉代肺脉毛腎脉石骨定謂五臟之脉至真要大論大要曰君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君三臣六偶之制也故曰近者奇之遠者偶之汗者不以奇下者不以偶補上治上制以緩補下治下制以急急則氣味厚緩則氣味薄通其至所此之謂也是故平氣之道近而奇偶制小其服也遠而奇偶至大其服也大則數少小則數多多則九之少則二之奇之不去則偶之是謂重方偶之不去則反佐以取之所謂寒熱溫涼反從其病也岐伯曰辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味塗泄為陽六者或收或散或緩或急或燥或潤或堅或堅以所利而行之調其氣使其平也岐伯曰有毒無毒所治無主適大小為制也帝曰請言其制岐伯曰君一臣二制之小也君一臣二佐五制之中也君一臣三佐九制之大也寒者熱之熱者寒之微者逆之甚者從之堅者削之客者除之勞者溫之結者散之留者攻之燥者濡之急者緩之散者收之損者益之逸者行之驚者平之上之下之摩之浴之薄之劫之開之發之適事為故帝曰反治何謂岐伯曰熱因寒用寒因熱用塞因塞用通因通用必伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必已岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣之

謂使非上下三品之謂也。岐伯曰：諸寒之而熱者，取之陰；熱之而寒者，取之陽。所謂求其屬也。帝曰：善。服寒而反熱，服熱而反寒，此其故何也？岐伯曰：治其王氣，是以反也。五味入胃，各歸所喜，故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常也。氣增而久，天之由也。陰陽應象大論。因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內；其有邪者，瀉形以為汗。五常政大論。岐伯曰：大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。殺肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡行復，如法必先歲氣，無伐天和。至真要大論。帝曰：願聞病機。何如？岐伯曰：諸風掉眩，皆屬於肝；諸寒收引，皆屬於腎；諸氣膹鬱，皆屬於肺；諸濕腫滿，皆屬於脾；諸熱瞀瘖，皆屬於心；諸痛淫瘡，皆屬於心；諸厥固泄，皆屬於下；諸痿喘嘔，皆屬於上；諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火；諸症項強，皆屬於濕；諸逆衝上，皆屬於火；諸脹腹大，皆屬於熱；諸燥狂越，皆屬於火；諸暴強直，皆屬於風；諸病有聲鼓之如鼓，皆屬於熱；諸病附腫，疼酸驚駭，皆屬於火；諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱；諸病水液澄澈清冷，皆屬於寒；諸嘔吐酸暴注下迫，皆屬於熱。生氣通天論。陽因而上，衛外者也。因於寒，欲如轉樞，起居如驚，神氣乃浮。因於暑，汗煩則喘渴，靜則多言。體若燔炭，汗出而散。因於濕，首如裹，濕熱不攘，大筋緘短，小筋弛長，緘短為拘，弛長為痿。因於氣，為腫。四維相代。陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕，辟積於夏，使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汨汨乎不可止。陽氣者，大怒則形氣絕，而血莞於上，使人薄厥。有傷於筋，縱其若不容。汗出偏沮，使人偏枯。汗出見濕，乃生痲痺。高粱之變，足生大疔。受如持虛，勞汗當風，寒薄為皴，鬱乃癢。陽氣者，精則養神，柔則養筋。開闔不得，寒氣從之，乃生大偃。陷脈為瘻，留連肉腠，俞氣化薄，傳為善畏，及為驚駭。榮氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。魄汗未盡，形弱而氣燁，六俞以閉，發為風虐。故風者，百病

之始也。清靜則肉腠閉拒。雖有大風苛毒，弗之能害。此因時之序也。春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄。夏

傷於暑，秋為痲痺，秋傷於濕，上逆而咳，發為痿厥。冬傷於寒，春必溫病。四時之氣，更傷五臟。通乎虛實

論。黃帝問曰：何為虛實？岐伯對曰：邪氣盛則實，精氣奪則虛。刺志論：氣盛身寒，得之傷寒；氣虛身熱，得

之傷暑。穀入多而氣少者，得之有所脫，血濕居下也；穀入少而氣多者，邪在胃及與肺也。玉機真藏論

黃帝曰：余聞虛實以決死生，願聞其情。岐伯曰：五實死，五虛死。帝曰：願聞五實五虛。岐伯曰：脈盛皮熱，腹

脹前後不通，悶瞢，此謂五實。脈細皮寒，氣少泄痢前後飲食不入，此謂五虛。帝曰：其時有生者，何也？岐伯

曰：漿粥入胃，泄注止，則虛者活。身汗得後痢，則實者活。此其後也。臟氣法時論：肝苦急，食甘以緩之。

肝欲散，急食辛以散之，用辛補之。酸瀉之心，苦緩急，食酸以收之。心欲與，急食鹹以與之，用鹹補之。甘瀉

之脾，苦濕急，食苦以燥之。脾欲緩，急食甘以緩之，用苦瀉之。肺苦氣上逆，急食苦以泄之。肺欲收

急，食酸以收之，用酸補之。辛瀉之腎，苦燥急，食辛以潤之。開腠理，致津液，通氣也。腎欲堅，急食苦以堅之。

用苦補之。鹹瀉之。夫邪之客於身也，以勝相加。至其所生而愈，至其所不勝而甚。至於所生而持，自得

其位而起，必先定五臟之脈，乃言問其之時，死生之期也。毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五

菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。以上皆辨病治病之總訣能
術通其理方能識症擇方

解休。素王機真藏論：冬脈太過，則令人解休，脊脈痛而少氣，不欲言。刺瘧論：足少陽之瘧，令入身體

解休，寒不甚，熱不甚，惡見人，見人心惴惴然，熱多汗出甚。

食休。素氣厥論：大腸移熱於胃，善食而瘦，又謂之食休。胃移熱於膽，亦曰食休。

膈洞。靈根結篇：太陰為開，折則食糜無所輸，膈洞故開折者，氣不足而生病。邪氣臟腑病形篇：腎

脈微緩為洞，洞者食不化，下噎還出。

重強 素王機真藏論脾脈不及則令人九竅不通名曰重強

齟齬 靈論疾診尺篇診齟齬痛按其陽之來有過者熱在左左熱在右右熱在上上熱在左下熱在右

刺論齟齬刺手陽明不已刺其脈入齒中者立已手陽明之脈貫頰入於齒中故當刺商陽穴不已則刺

問三問谷陽經偏
恩溫溜七穴主齟齬

金匱

跌厥 其人但能前不能却刺腦入二寸此太陽經傷也所載雜病其方俱散見於各證條內茲不復贅按病施治無遺法矣

