

武庫
237
28

伊東瑤川院譯

十帙

遠西方彙

原本紀元一
千八百五十
二年鏤行

廣胖堂藏



遠西方彙卷之二十八



獨乙

加。藥。安頓



和蘭

傑。婪。婆。都。譯

侍醫法印伊東瑤川院 貞文仲 重譯

南洋伊東 亨健夫 參校

癩毒シヒリス。ヘ子レ

輓近水銀ノ癩毒ニ奇効アルヲ疑議スル者アリ蓋癩毒ハ他病ト同ク諸種ノ療法ニ由テ能ク治シ汞劑ヲ用ヒザルモ亦能ク治ス殊ニ癩毒初起ノ者ハ大抵第三千方ニ由

廣胖堂

テ能ク癒エト雖法ノ如ク善ク水銀ヲ用フルハ實ニ癩毒ノ最勝適藥タルヲ知ルヘシ但其攝養ヲ戒スルハ其効功ヲ収ムルニ須要タリ則次件ニ注意スベシ(第一病人定温列氏十八度至二十度清淨氣中ニ常住シ(第二嚴ニ食養ヲ節メ食量氣味俱ニ度ニ過サルヲ要ス氣味ヲ以テ之ヲ謂ハシ則淡薄肉羹汁ニ米裸麥或ハ大麥ヲ加フル者菜蔬淡味ノ肉類及ヒ白蒸餅少許ヲ與フベシ(第三總テ身體ヲ勞動スル一勿ク殊ニ後証癩毒ノ漢ニ所謂結毒ノ如キヲ云フノ如キハ辱中ニ在テ静息スベシ)静息スレハ病者能ク減食ニ堪フ勞動スレハ腫瘍其他局處疾患アル者之カ爲ニ衝動セラレテ其症増

劇ス(第四癩毒瘡ハ清潔スルヲ慢ル_一カレ○汞製ノ經驗

方法ハ序証後証俱ニ第三千一方乃至第三千三十六方ニ

列載ス○汞劑ノ外又他ノ金屬ヲ以テ癩毒藥ニ供ス即金

三千三十七方至三千四十方銀白金 三千四十一方鍍銅三千四十三方安質沒尼劑鹽酸

亞鉛三千四十四方及ヒ砒石等是ナリ此金屬單症ニ用フレハ或

ハ効ヲ奏スト雖竟ニ汞劑ノ聲價ヲ敵フ_一難シ○亞兒加

里劑殊ニ別私那爾度ノ殊稱セシ酒石鹽三千四十五方別

幾モ亦一タビ名譽ヲ得タリト雖爾後之ヲ歴試スルニ獨

輕症ヲ治スルニ足ルノミ○鑛酸ノ中ニ就テ硝酸三千四十六方

ヲ殊稱セリ實ニ之ヲ以テ偉効ヲ得ル者間アリト雖亦寸

驗ナキ者多シ失苟兒陪苦ヲ合併セル症並ニ緩慢汞毒症
 ノ如キハ殊ニ之ヲ的當トス○又燐酸八百廿五方。八百六
十八方。三千八十九
 方ヲ以テ骨節癩毒ニ稱用ス○往昔ヨリ此症ニ試用スル
 所ノ者ハ愈瘡木。薩沙弗刺斯。撒爾沙巴。栗刺。阿列那里亞附
 山午房。濱瞿麥。瑞香皮。胡桃殼等是ナリ三千五十四方至
三千六十七方此
 等ノ煎液ハ最良佐タリト雖獨之ヲ以テ本病ヲ治スルニ
 足ラズ但之ヲ癩毒及ヒ汞毒合併症ニ於テ新食法ト併用
 スレハ根治ノ適藥タリ殊ニ悉薦滿煎三十五
十八方名譽アリ○
 輓近沃胃謨加里三千四十七方至
三千五十二方ヲ以テ後証癩毒ヲ治ス
 ルノ藥劑トシテ世醫或ハ之ヲ稱メ水銀ニ優レリト此法

ニ從テ之ヲ用ヒ攝養宜シキニ適スレハ最良効ヲ得殊ニ
 沒乙失束故屈斯名ノ療法
三十五
十一方ニ倣フヲ稱賛スベシ○
 下疳。便毒。骨肉腫コンヂ
ロク等ノ的藥ハ三千六十八方乃至三
 千八十九方ニ列シ幼兒癩毒ニ用フル者ハ三千九十方乃
 至三千九十三方ニ開載セリ○劇甚吐涎ヲ止ムルノ方法
 ハ巳ニ二千二百八十方乃至二千二百九十七方ニ揭示セ
 且麻疾及ヒ白帶下通例此ニ症ヲ癩毒ニ
算入スルハ不可ナリニ處スル者モ亦
 上ノ千八百十五方乃至千九百三十八方及ヒ千九百三十
 九方乃至千九百五十七方ニ列舉セリ

○第三千方第栗結簡易法不用汞劑

瀉利鹽半一 苗香水八 溶解

右調勻每服一食匙日三服

主治癩毒序証後証俱ニ用フヘシ之ヲ服スレハ室中寒
温變換ナク蓐中ニ在テ嚴ニ食養ヲ節スヘシ顧爾
地ノ病院ニ於テ病者醫治ニ就クノ初メ先白蒸餅四兩
及ヒ淡薄肉羹汁ニ漿粉少許ヲ加ヘ每服一匙寫日ニ三
回午時ハ菜蔬六食匙ヲ喫セシメ飲料ニ燕麥淡汁ヲ與
ヘ麥酒燒酒及ヒ水ヲ與フルナシ腫瘍アル者之ヲ服
メ將ニ消散セントスルハ稍加餐シ肉食モ亦許スヘ
シ此溶液ヲ用ヒテ初毎日瀉二三行後一行ヲ得ルヲ要

ス若効ナキハ一ニ食匙ヲ加増スヘシ峻下ヲ要スル
ト勿レ却テ其治ヲ妨碍孤律傑別魯列印名地ノ病院
ニ於テ上ノ治法ヲ施セリ其法初每一週爾後毎三日ニ
瀉利鹽ヲ以テ苗香水ニ溶シ甘草膏ヲ加ヘテ與フル
瀉三行乃至五行ヲ得ルヲ度トシ之ヲ施スニハ植物ノ
食餌ヲ撰ミ蓐中ニ在テ温保シ寒暖不定ナカラシ患
所ヲ清潔ニシ又屢微温湯ニ浴セシ或ハ微温湯若ク
ハ之ニ接骨木花加密列ノ淡浸石灰水稀淡羅獨窠兒
ヲ加ヘテ罨法ニ供ヒ瀉利鹽連進ノ後口内驚口瘡狀ニ
剥爛スルハ後服ヲ停メテ収斂酸性ノ含漱水ヲ用ヒ

或ハ刺必斯印歇兒那栗斯ノ以テ爛所ニ點ス○序証癩毒ハ大抵此治法ニ由テ十四日乃至二十一日内ニ根治ス後証モ亦平治スル者少シトセズ○瀉利鹽禁忌ノ症下欸ノ如シ(第一)其人性質瀉利鹽一弓乃至一弓半ノ大量ヲ服メ纔ニ瀉一行ヲ得ル者此ノ如キノ大量ヲ服スレハ胃腸衰弱ノ或ハ腹水症ヲ發スル者アリ(第二)癩毒ニ間歇熱ヲ合併セル者此症瀉利鹽ヲ久服スレハ間歇熱荏苒連發スルニ由テナリ(第三)其人甚脆弱ニノ腺病質ノ者並ニ癩毒ニ夫苟兒陪苦ヲ合併セル症(第四)孕婦ニ此下劑ヲ與レハ流産スル者屢之アリ(第五)後証癩毒

嚮ニ承劑ヲ多服スル者ハ之ヲ忌ム

○第三千一方(布連鏡)

清淨水銀錢一 亞刺昆亞蘆謨 加蒸餾水少許研和至不見星投後呆

尖鳩答越幾斯錢一 甘草末適

右調勻二匹為一丸衣甘草末早晚服六丸乃至十九

○第三千二方(私松)

清淨水銀二 漿粉錢一 亞刺昆亞蘆謨適

右為六十九衣石松粉每晚服二丸乃至三丸漸加至八九十九或二十九

主治 松氏ニ據ルニ此方布連幾^名ノ護謨水銀丸ニ代用
 シテ簡易ノ良方トス松氏頑固癩毒ノ序証及ヒ後証俱
 ニ皆之ヲ稱用ス且諸鑛劑中ニ就テ最服シ易シトス之
 ヲ服スレハ病者便秘スルヲ屢之アルカ故ニ三日或ハ
 四日毎ニ後服ヲ停メテ下劑ヲ要スルヲ多シ護謨水銀
 ハ容易ニ吐涎症ヲ發スルヲナシ但之ヲ多量頓服セシ
 ムルヲ勿レ丸粒硬固ニメ溶解セズ以テ完利スルヲア
 レハナリ松氏ハ三藥ヲ以テ純粹癩毒及ヒ汞劑合併ノ
 癩毒ヲ根治スルヲ主張ス即布連幾^名ノ護謨水銀丸甘
 汞及ヒ水銀膏是ナリ松氏二十五年間廣ク癩毒ヲ療ス

ルニ此三藥ヲ專用シ問外汞及ヒ赤降汞ヲ用フルノ外
 曾テ他藥ヲ要セザリシト云フ

○第三十三方 癩毒

華溼滿溶汞散^ハ

精製甘草膏^ニ

蒸餾水^適

右為四十八丸衣石松粉朝暮服ニ丸漸加至六丸

主治 序証下疳ニ宜シ○四日毎ニ一丸ヲ增メ以テ吐涎
 スルニ至ル瀉スル者ハ本方ニ阿芙蓉ニハ乃至四ハヲ
 加フ○華溼滿溶汞散ハ甚緩藥ニシテ甘汞ノ如ク容易ニ
 瀉スルヲナク又忽チ吐涎スルヲナシ適宜ニ用フルハ
 ハ序証ノ癩毒大抵之ヲ以テ治スルニ足ル

○第三千四方 遠突土

華涅滿溶汞散六

阿芙蓉末四

蜷蛄石末廿四

白

糖三

右調勻為散分十二服日三服

主治序証癩毒ニ宜シ但三四日毎ニ服量ヲ加増シ之ヲ

持重ノ吐涎ニ至ルヲ須要トス

○第三千五方 同上

甘汞十二

精製阿芙蓉末三

蜷蛄石末半

白糖三

右調勻為散分十二服朝暮一服

主治序証癩毒ニ宜シ○甘汞ヲ用フルモ亦漸々加増ス

ルヲ要トス

○第三千六方

暴律私名 甘汞九

甘汞五

甘草末十五

精製甘草膏一

常水適

右為二十九衣石松粉

○第三千七方

甘汞一

精製甘草膏一

右調勻為八十九衣石松粉每晚服四九乃至八九漸加増

主治癩毒序証後証俱ニ用フベシ甘汞ハ水銀鹽中ノ最

緩劑ナリト雖速ニ流涎スルノ害アリ○私名松名ノ説ニ

據ルニ甘汞ハ九ト為スヲ最佳トス初毎服一分乃至二

ハ晡時之ヲ服シ後毎日四合ハ一或ハ三分ハ一ヲ加
 此法ニ由テ後証癩毒未深夕宿根セサル症根治スル者
 尠シトセズ○尋常ノ用法甘汞ヲ散トシ晨夕半ハ一ハ
 或ハ二ハ一ヲ頓服セシムル者ハ癩ノ用フルル勿レ後汞
 毒症ヲ遺シ且癩毒依然トメ退カズ或ハ却テ増劇スル
 者アレバナリ

○第三千八方 壹便樹膠

甘汞ハニ 白糖半

右調勻為散午饌後即時頓服

主治序証癩毒ニ宜シ○之ヲ服メ翌日休シ第三日三ハ

ヲ服シ第四日休シ第五日四ハ第六日休シ第七日五ハ
 ヲ服ス此ノ如ク隔日ニ連用スルル第十四日ヨリ第十
 八日ニ至ル大抵甘汞五十但食養ヲ節シ總テ汞劑服法
 ノ如ク須要ノ攝生ヲ守ラシム

○第三千九方 越印忽魯度名治宿根癩毒法

病者卧前一時半ニ當リ甘汞十ハ砂糖十五ハニ和シテ
 空心ニ服シ尋テ温煖肉羹汁ニ蓋ヲ喫シ後四合時同量
 甘汞ヲ一服シ并ニ肉羹汁ニ蓋ヲ喫ス體質強壯ナレハ
 又四合時ノ後五ハヲ服メ翌朝哥喜喜ニ三蓋ヲ喫スベシ
 通例瀉三四行ヲ得ルナリ若瀉セサル者ハ藥刺巴孕驗

酒石各十五分乃至二十分ヲ散トシ與ク二日休藥ノ後
 又前方ヲ服スル上法ノ如シ四日毎ニ服スルナリ此ノ如ク連
 用スル一七八回ニ至ル即第四日第七日第十日第十三
 日第十六日第十九日及ヒ第二十二日ニ至リ上方ヲ服
 シテ治ヲ終ルナリ上方第二三回ヲ經レバ腸甘汞ノ刺
 戟ニ慣ル、ガ故ニ毎服藥刺巴五六分ヲ加ヘサレバ瀉
 一行ヲ得ベカラズ此法ヲ施ス一半ハニ至レハ越印忽
 魯度氏幾那淡煎ヲ與ヘ且肉食飲酒ヲ以テ補益ス然レ
 亦其量ヲ節ノ常用ノ半ニ過ル一ナカラシム極メテ病
 者ノ早朝外出ヲ戒シ以テ蒸發氣ヲ催進ス但天氣朗清

ナラハ昼日外氣ニ觸ル、ニ宜シ此法ニ由テ吐涎スル
 者罕ナリ唯嚮ニ水銀ヲ多服セル病者ハ吐涎スル一ア
 リ故ニ此等ノ病者ハ此法施ス一勿レ子カ涅優滿名越印忽
 魯度ノ此療法ヲ甚嘉トシ殊ニ貴要部毀損メ其症危險
 ナル者ニ的當シ第三四服ニシテ既ニ全癒スルノ經驗屢
 之アリト云フ又慢性癩毒瘰癧眼及ヒ鼻中瘡オザ初
 起鼻孔閉塞ノ未腐骨ニ及ハサル者ニ稱用ス且咽喉潰
 瘍ニ好トス○暴訥爾名田名ハ頸圍ノ潰瘍ニ先中和鹽ヲ
 與フル一十四日乃至二十一日爾後上法ヲ施シ殊効ア
 リト稱込私名振名ハ上ニ反シテ此療法承劑ヲ服スルニ
頻要ノ攝養ヲ怠

論セズ 最初ヨリ甘汞ノ量過多ニシテ屢汞毒熱危險症ヲ
發シ或ハ速ニ吐涎症ヲ發スルガ故ニ廢メ用フベカラ
スト云ヘリ

○第三千十方 譎速突止

升汞_二 酒製桂水_一 阿芙蓉丁幾_一
右調勻每服四十滴粘滑液點服日四次

○第三千十一方 同上

升汞_二 蒸餾水四勺溶化加阿芙蓉丁幾一勺
右調和早晚服一食匙

主治 癩毒序証後証俱ニ之ニ宜シ ○然レ序証ハ升汞ヲ

要セズ却テ緩和ノ汞製劑ヲ用フルニ宜シ且升汞ハ丸
トシ用フルヲ佳トス

○第三千十二方 穢歇蘭度

升汞_二 蒸餾水適宜溶化加後味
精製阿芙蓉_二 清淨蜜_一 白蒸餅心_一
適

右為四十九夜過見托末早晚服六丸乃至十九漸加至十
二丸

備考 每丸升汞二十分_一ノ一ヲ含ム

○第三千十三方 弗噶斬歌

升汞_二 蒸餾水二三滴溶加後味
量 脫秤

精製阿芙蓉

龍腦各十

甘草末

甘草越幾斯各一錢

右調勻為六十九衣石松粉早晚取一粒以白蒸餅一二塊送下

備考每九升永六分ノ一ヲ含ム

○第三千十四方遠突土

升永 阿芙蓉各半

精製甘草膏各四

蒸餾水適

右丸為百粒衣桂末早晚服二丸漸加至三四丸

備考每九升永十分ノ一ヲ含ム

○第三千十五方暴訥爾田

升永 水製阿芙蓉越幾斯各三

蒸餾水適宜溶加甘

草膏末二錢

右每九二分为六十九衣石松粉朝暮服三四丸漸加增

備考每九升永二十分ノ一ヲ含ム

○第三千十六方幾優列魯

升永二 亞的兒一 溶化加甘草末一錢搗和至乾燥

加精製甘草膏適宜

右為六十四衣甘草末玻璃壺收貯早晚服一丸漸加增

備考四九中外永八分ノ一ヲ含ム ○此方ノ親和舍密

則ニ適フヲ以テ他方ニ優レリトス

○第三千十七方柔魯天私

升汞^三 亞的兒 一^二 溶解加過兒托末 一^二 搗和至乾
燥加後味

白糖末^半 亞刺毘亞趨謨末^半

右加蒸餾水適宜為八十九夜過兒托末玻璃壘收貯早晚
服一丸漸加增

備考 茂優列魯^名ガ稱用セル方ニ比スレハ此丸升汞ヲ
含ム一少シ

○第三千十八方高勅矢門

升汞^十 加沸滾蒸餾水少許石臼研和加後味

過兒托末 白糖^{各一} 蒸餾水^{宜滴}

右為九十九夜過兒托末玻璃壘收貯早晚服一丸漸加增
備考 每丸升汞九分^一ノ一ヲ含ム此丸モ亦舍密則ニ適
フヲ以テ好トス

主治 三千十二方ヨリ三千十八方至宿根癩毒深蝕潰瘍
惡性癩毒疹等ニ宜シ劇証退クノ後ハ更ニ緩劑ニ轉ス
ベシ○升汞ハ後証癩毒ヲ制刺スルニ速効アリ然レ根
治スルハ稀ニアル所ナリ升汞ヲ禁忌スルハ體質虛弱
ニノ感觸靈敏殊ニ肺ノ感觸敏捷或ハ結節腫アル者效
血及ヒ勞瘵等是ナリ越^ト堙^ト僅^ト度^ト及ヒ弗^ト栗^ト結^ト同ハ升汞
ヲ浴湯ニ加フ每浴三四錢皮膚無病ナレバ此療法の當

スト雖潰瘍狀皮病アル者之ヲ施セハ吸収甚旺盛スル
ガ故ニ却テ内攻セシムルアリ

○第三千十九方 獨尊地名 治癩毒法

(甲方)

升汞^{十二} 蒸餾水適宜溶化加後味

白蒸餅心 白糖^{各適宜}

右為二百四十九衣桂末或石松粉

主治最初四九^{每九升汞二十分}ヲ取リ午饌後即時ニ水
^{ハノ一ヲ含ム}或ハ麥酒少許ヲ以テ送下^{爾後ハ今時或ハ四今此ノ}

如ク隔日一服每服三九ヲ加増シ最後三十九^{升汞一}

至テ已ム^{廿七日ニシテ}之ヲ服メ即吐スル者ハ少頃アリ

テ再三十九ヲ取リ前法ニ仍テ阿芙蓉丁幾二三滴乃至

四滴ヲ加ヘテ送下^ハ服後腹痛スル者モ亦阿芙蓉丁幾

二三滴ヲ用フルニ宜シ又薩兒沙巴栗刺一食匙水八碗

ヲ以テ煎シ三碗ヲ取リ毎日服セシム^ハ施治ノ間緩々蒸

發氣ヲ促スヲ要スルガ故ニ冬日ハ外出ヲ戒シ夏月ト

雖美日ノミ外出ヲ許シ然テ賊風ヲ避ケ玻璃障子ノ傍

モ亦遠隔シテ恒ニ重衣温保セシム又餐食ヲ半減シ殊

ニ朝暮ハ淡味ノ食少許ヲ與フ多キモ小乾餅一個ニ過

クル^ハ勿レ豕肉。鴈。鴨。白製酪。乳汁。酸性物。標杆飲液ヲ禁

シ其他欲スル所ノ飲食ヲ許メ可ナリ外治ヲ施スナ
シ○獨尊地氏屢歴驗スルニ此法ニ由テ治スル者ハ決
メ他日再發スル者アラジト云フ但曾テ數回癩毒ヲ感
染シ而メ其治適當ナラサリシ人ニ在テハ本法ノ如ク
服シ終リテ尚數日連用スベシ或ハ二三週ヲ經テ後再
本劑ノ半ヨリ始メテ法ノ如ク服盡セシハ施治ノ間病
者寒ヲ冒スハ害ヲ招クアリ吐涎シ且口内潰瘍ヲ
生スル者多シ其症治スル迫後服ヲ停ムベシ胃寒ニ由
テ足部膝等疼痛腫起スルハ亦之ヲ停メテ浴湯硫黃
阿芙蓉龍腦等ヲ用ヒテ發表スルニ宜シ癩毒既ニ除キ

テ後施治間ノ攝養適當ナラザルカ為ニ鼻孔唇口内等
ニ間潰瘍ヲ生シ其狀弛緩シテ瘡縁侵蝕シ忽滋蔓シテ
大患ヲ致ス者アリ獨尊地氏之ヲ治スルニ刺必斯高私
秩屈斯ヲ點シ以テ良方トス或ハ内服ニ供スル一左方
ノ如シ

乙方

刺必斯高私秩屈斯錢ニ 蒸餾水ニ可溶化
右調勻晨夕取一茶匙加乳汁多量度舌上不覺灼熱與之
○五六日毎ニ加増ノ終ニ每服四五茶匙ヨリ六茶匙ニ
至ル

○病者前ニ多量承劑ヲ服シ且温保適宜ナラザリシ者ハ獨尊地氏施治ノ前二週乃至三週間硫黃劑ヲ與フル
一左方ノ如シ

(丙方)

硫黃華或乳糖二錢 阿芙蓉丁幾滴 蒸餾水四
右調勻每服一食匙日三服臨服振盪

又方

(丁方)

肝色硫黃八分 蒸餾水一匁溶化加桂舍利別二錢
右調勻分三服每日服盡

又肝色硫黃一匁ヲ以テ浴湯ニ溶和シ每晚或ハ隔晚ニ浴セシメ浴後即蓐ニ就カシ便列印名地ノ病院ニ於テ孤劉傑名獨尊地ノ法ヲ歷試セシ説ニ據レハ此法他法ニ優レルヲ見ス第十三員第十四員ノ病者ノ如キハ不治ナリ孤劉傑氏按スルニ其効アラサル所以ノ者ハ并承ノ量微ニノ每常全身ノ癩毒ヲ治スルニ足ラザルナリ故ニ孤劉傑氏ハ用ヒテ三十九ニ至リ其症治了スル迄尚之ヲ持重シ漸ヲ以テ減殺ス此ノ如ク服法ヲ變メ甚良驗ヲ獲タリ口内咽喉鼻中等ノ後証潰瘍骨腫及ヒ著大ノ息肉等速ニ全癒シ其効他法ニ優レリ肺勞素因

胃腸虛弱及口妊娠ハ此ヲ禁ス

○第三千二十方 基利碌名外承膏

外承錢一 家猪脂一

右玻瓈臼研和二十四時作軟膏塗擦足蹠治癩毒

〔主治〕基利碌氏此膏ヲ塗ルノ前浴湯及口灌腸ヲ行フ

二三回兼テ清涼解釋飲ヲ用フル一四五日間軟膏用量

初一錢後漸増ノ二錢ニ至ル初日甲足ニ塗リ次日乙足

ニ擦シ第三日浴湯ヲ施ス此ノ如ク之ヲ持重ノ病全癒

スルニ至ル又發表飲ヲ服シ數次襯衣ヲ更換スルヲ要

ス此法蒸發氣ヲ進メ利尿ヲ促シ而メ吐涎スル一ナシ

基利碌之ヲ稱ノ最勝法トス○私名振名ハ之ニ反シテ諸

治法中最不當ノ法ト稱ス

○第三千二十一方 臧歇蘭度改製基利碌名外承膏

外承 精製礪砂各二錢 薔薇水二ヲ溶解濾過加精製

家猪脂二ヲ入玻瓈臼上沙火研磨至薔薇水蒸散放

冷再加後采

枸橼油十五滴

右調勻作軟膏每晚取一茶匙塗擦足蹠

〔主治〕全身癩毒ニ宜シ此膏ヲ塗ル一諸証解散ノ後モ尚

數日持重スベシ效血及口肺癆ノ恐アル者モ害アル一

ナシ○穢歌蘭度ハ頑固依屈馬其他惡液病ヲ治スルニ亦之ヲ稱賛ス

○第三千二十二方穢歌蘭度

赤降汞一 生安質一 没尼末二 甘草越幾斯適

右為八十九衣石松粉每晚服十粒頑固症朝暮用之

主治後証癩毒ニ宜シ○赤降汞ハ胃腸ヲ犯シ多量ナレバ胃瘕疝泄瀉ヲ發シ或ハ病人服スルニ堪ヘサル者間アリ然レ經久癩毒ニ屢殊効ヲ奏ス

○第三千二十三方遠突土

赤降汞二 至三 精製阿芙蓉四 至六 乳糖三

石調勻為散分十二服日三服

主治頑固癩毒性皮膚病骨疾及ヒ總テ後証癩毒ニ宜シ體質虛弱歟血及ヒ總テ胸病ノ恐アル者慢久胃腸虛衰等皆赤降汞禁忌ノ症ニ係ル並ニ大量赤降汞ハ服ニ堪ヘサル者多シ

○第三千二十四方薄刺野斯

赤降汞四 加砂糖舍利別少許丁寧研和再加後果
白蒸餅心 白糖各適宜

右為八十九衣桂末早晚服四九每五日加四九

主治全身癩毒ニ宜シ症ニ從ヒ日服二十九ヨリ四十九

ニ至リ又之ニ準シ遡回ノ減殺ス

○第三千二十五方

便_名人_名治經久癩毒法

赤降汞_二

硫黃安質沒尼_附

白糖_{各ハ}

右調勻為散分十六服日二服

主治鼻中經久ノ癩毒性潰瘍骨疾及口皮病ニ最適當ス

○四日毎ニ_{甚經久症}赤降汞ノ量八分ハノ一ヲ増シ終

ニ日服半ハニ至ル或ハ流涎スルヲ度トシテ已ハ快路

ニ向フ片ハ又上ニ準シ遡回ノ減殺ハ瀉スル者ハ本方

中阿芙蓉少許ヲ加フ之ニ兼テ蜀羊泉莖瑞香皮過列那

里根_附ノ泡劑ヲ飲服セシム○此法ハ吐涎及口熱ヲ發

スル者多シ便_名人_名之ヲ施ノ十週乃至十二週内ニ頑固ノ癩毒ヲ治セリト云フ

○第三千二十六方

赤降汞_一

甘草越藥_{斯二}

甘草末_{宜適}

右為六十九丸衣粉末午餐後每四分時服_{一丸}一丸_中含_赤

之三日

主治頑固癩毒胸間虛弱ニノ外汞ヲ用フベカラサル者

ニ便列印_{名地}病院ニ於テ上方ヲ施シ驗ヲ得タルノ多シ

上方ノ如ク午饌後四分時毎ニ一丸ヲ服スルノ三日ヲ

經レハ又加増ノ每服二丸ヲ用フルノ三日此ノ如ク漸

加増ノ毎日赤降汞一匁半或ハ二匁ニ至ル若胃中或ハ口内疾患ヲ生スル者ハ後服ヲ停メ其症治ノ後再小量ヨリ始メテ法ノ如ク此ヲ用レ本病癒エル者ハ前法ニ準シ又遡回ノ減殺ス

○第三千二十七方〔衛。堊。越。癩。斯。做。設。魯。列〕

硝酸汞溶液廿 滴水一

右調勻朝夕服四十滴

主治癩毒性腐骨疽ニ宜シ○毎日二十滴漸加増之ニ兼テ癩瘡木薩沙弗刺斯過列那里附瑞香皮ノ煎液及ヒ生安質没尼ヲ與ヘ且水銀膏ニ失鳩答及ヒ龍腦ヲ和メ

瘡處ノ周圍ニ塗擦ス○蓋硝酸汞ハ獨體質强健腹臍知覺遲鈍ノ者ニ適當ハ此緩性汞劑ヲ適宜ニ用フルハ瘡處腐蝕ヲ防クニ甚好トス

○第三千二十八方〔栗格爾突〕

普洛篤沃胃謨各半 萬莖越幾斯九

癒瘡木越幾斯一錢

右調勻為三十六丸衣石松粉

主治栗格爾突氏癩毒序証並ニ後症ヲ治スルノ良法トシテ稱用ス○普洛篤沃胃謨ノ服量每服八分ハノ一。半ハ乃至一匁日ニ二三回トス栗格爾突名ニ從ヘハ日服

六回ニ至ルヘシ○此劑ハ速ニ他物ト親和シ甚ク分離シ
 易シト匹木^{モイ}乙失速^{非屈私}ハ曾テ普洛篤沃胃謨半匹
 沃胃謨加里二三匹ヲ以テ蒸餾水一弓ニ溶解シテ一時
 毎ニ一食匙ヲ試用ス然レニ三日ニノ後服ヲ停ム何者
 病者胃部壓迫ニ堪ヘ難ク咽喉縮収ヲ覺ヘ兼テ愛氣ヲ
 發シ竟ニ嘔吐シテ此劑ヲ嫌惡スルヲ甚シキニ由テナ
 シ又之ヲ強壯人ニ用フルモ亦同シク惡証ヲ發ス故ニ
 木^{モイ}乙失^{非屈私}上^見按スルニ恐ラクハ是胃液ニ合ノ分離
 シ又更ニ一物ヲ生成シ隨テ一種ノ作用ヲ起スニ由ル
 歟或ハ散方ニ作ルモ亦適當ナラズ故ニ世醫之ヲ丸ト

シ用フル者多シ蓋九モ亦配合物ノ性ニ由リ普祿篤沃
 胃謨ヲ分離セサルヲ得ス丸料研和ノ間モ亦已ニ分
 離スヘシ是故ニ爾後木乙失非屈私ハ普祿篤沃胃謨ヲ
 内服ニ供セズノ軟膏ニ和シ外用ノ甚佳効ヲ得タリ通
 例家猪脂ニ錢ニ普祿篤沃胃謨十匹ヲ加フ此膏毎日新
 製セシム但家猪脂ハ新鮮純精ニシテ臭氣ナク腐敗セザ
 ル者ニアラザレバ即分離シ此軟膏ハ刺戟衝動スルヲ
 ナク大ニ吸収機ヲ催進スルヲ以テ焮衝症末期列印巴
 滲出スルヲ甚シキ者ニ最効アリ又焮衝症旺盛ノ期蜂
 窠體ノ腐蝕スル者例スルニ標痘^{パナ}チ^チノ如キ之ヲ用ヒ

テ奇効アリ然^レニ軟膏腐敗スル片ハ刺戟甚シクノ之ガ
爲ニ劇痛ヲ發ス但筋纖維ノ嫩衝症ハ効驗甚シ

○第三千二十九方備薦

普祿篤沃胃謨ハ 杜松子舍利別ハ 甘草末適

右為八九衣石松粉初早晚服二九後加增至三四九

主治癩毒腺病合併症ニ宜シ

○第三千三十方同上

普祿篤沃胃謨ハ 家猪脂六

右調勻作軟膏

主治經久癩毒潰瘍緩慢治セサル者此方之ヲ主ル

○第三千三十一方秘制律私

姪優篤沃胃謨ハ 亜的兒半ヲ溶解

右調勻每服四滴乃至六滴日二服

主治經久癩毒皮膚疹合併ノ症ニ宜シ○姪優篤沃胃謨用

量每服十六分ハ一乃至四分ハ一日ニ二服トス○

此劑連用暫クニモ既ニ胃中困難ヲ發スル一普祿篤沃

胃謨ノ如クニモ彼ニ較レバ一層甚シ木乙失速非屈私

名之ヲ經驗セシニ効功アル者甚罕ナリ而ノ此効力ハ

沃胃謨加里ト復ニ殊ナル一徵セリ更ニ補給機ヲ防

グノカナク却テ體質ノ收合ヲ妨クル一甚シ故ニ解疑

ノ劑タリ慢久ノ吐涎症ヲ發スルモ亦其速ナリ是故ニ
 姪優篤沃胃謨ヲ内用スルハ適當ナラズトス然レ内部
 硬結腫及ヒ結節腫ゲズユレヲ治スルニ須要ナルベシ
 但軟膏ニ作り外用スルハ確功アリ軟膏用法二般アリ
 リ曰ク塗擦曰ク貼定硬膏ノ塗擦ハ如シ乙膜焮衝症ノ未
 期ニ於ケルガ如シ刺戟衝動セシメ強ク吸収ヲ催進セ
 シト要スル者ニ的當ス故關節焮腫ニ屢見ル所ノ列印
 巴滲出ニ由テ關節硬腫スル者ニ亦好シ並ニ攝護腺津
 唾腺肝臟等ノ如キ腺質器ノ焮衝後ニ遺ル所ノ硬結腫
 ニ宜シ陰囊ニ此軟膏單味塗擦スルハ二三回ニノ焮腫

疼痛大水疱ヲ發スルガ故ニ的當ナラズ然レ此衝動ハ
 大ニ益アリ二三日ニノ水疱乾收白屑剝離シテ腫起大
 抵三分ノ一ヲ減スベシ再塗スルハ焮痛更ニ少シト
 雖病人再用ヲ喜バザル者多シ水銀軟膏ヲ加フレハ能
 ク其猛カラ緩和ス但水銀膏中ノ酸化汞沃胃謨ノ一分
 ニ和シ分離スト雖此合膏ハ假令分離スル者モ亦甚良
 効アリ便毒ヨリ粘液多ク流出スル者ニ尿道焮衝ノ時
 期過テ后單方姪優篤沃胃謨膏ヲ用フルハ佳驗アリ
 姪優篤沃胃謨一錢單膏半弓ニ調和シ毎用一刀ヲ取リ
 塗擦スル一日二次乃至三次トス○貼定法ハ刺戟衝動

誘導吸収ヲ催進セント要スル症ニ適當ニ用法姪優篤
 沃胃謨一錢常用軟膏ニ和シ革蠟紙或ハ癩瘡膏ニ攤ベ
 厚刀背ノ如クシ之ヲ貼メ四分時乃至半時ノ後灼クカ
 如キノ痛ヲ發ス其痛一時若クハ一時半或ハ尚久シク
 持續セル後肌膚小疱ヲ發シ漸ク増大シ乳湊様液充實
 二日ニ至レハ起脹セル所ノ表皮厚固トナリ漸帯
 黄白色ノ痂ヲ結ビテ終ニ剥脱ス落痂スル片ハ瘡痕既
 ニ新皮ヲ生シテ全瘡ニ但疱ヲ破ラズ落痂ニ及フ迄軟
 膏ヲ貼定セサレハ此ノ如ク經過順正ナラハ軟膏ハ始
 メテ貼スルノ後三日ニメ換フベシ若疱剥爛スル片ハ

甚シク痛ヲ發シク膿化シテ癒エ難シ貼定法ハ
 衝症已ニ清涼劑ヲ用ヒテ其勢ヲ制刻セル者殊ニ癩毒
 焮衝眼耳焮衝ニ卓越ノ効アリ頸腫コロップゲヲ治スル
 モ亦他法ニ優レリ肉腫粘液滲出スル症ニ他藥寸驗ヲ
 見サル者姪優篤沃胃謨ヲ以テ治スベシ攝護腺ノ慢性
 腫起軟膏ヲ塗擦スルノ數回ニメ解散スベシ或ハ貼定
 ヲ要スル者モ屢之アリ又此軟膏ヲ以テ關節病ノ殊藥
 ト稱ス六百四十八方並ニ二千九百十八方ヲ參照スベシ

○第三千三十二方越會溼風

重蒲碌密優謨二

蒸餾水四

右每服十滴日二次漸加增至百滴

○第三千三十三方

重蒲祿密優謨附一 亞的兒錢一

右每日午饌後取十滴十五滴乃至二十滴水或ハ燕麥粘
汁和服

〔主治〕右二方總テ癩毒ニ宜シ然レ此方未經驗足ラザル

ガ故ニ其効確定シ難シ

○第三千三十四方〔列墨爾〕

燐酸汞附二 葛私加栗刺皮末錢二

右調勻為散分十二服日三服

〔主治〕後証癩毒ニ宜シ○他ノ有力ノ汞劑効ナキ症ニ燐
酸汞屢驗アリ

○第三千三十五方〔遠突士〕

癒瘡木脂末 越秩阿布私安質沒扭 白糖各半

右調勻為散分十二服日三服

〔主治〕癩毒性發疹息肉肉腫コロンダ等ニ宜シ

