

程



小兒衛生總微論方卷第十九

咽喉病論

小兒咽喉生病者由風毒濕熱搏於氣血隨其  
經絡虛處所著則生其病若發於咽喉者或  
為喉痺或為纏喉風或為乳鴉重者或為馬  
喉痺又或懸癰腫或腮頰腫或喉中瘖一切  
諸病隨症具方于後

治喉痺腫悶

以露蜂房燒灰研細末每服一錢

以蛇蛻皮燒灰研細末每服一錢乳汁調服

以鯉魚七枚和釜底土釜患處





以川升麻令含一片

以薤一把杵爛熬傅上冷即易

以白礬棊子大含之

以陳白梅一个取肉裏白殭蚕一枚含咽津

以地龍一條研爛內鷄子白和勻便入喉中

以繩纏扎手大指屈於節上針挑刺出血即差

鐵粉散治如前 鐵葉粉一分 鵬砂一分

右為末每服半錢冷水調下 蛇蛻散治如前 蛇蛻一分

白梅肉一分 牛蒡子半兩 甘草一分生

右為散每服一錢匕綿裏湯浸少時含咽津

汁小兒吮之

又方治喉痺咽腫出氣不快

右以鼠粘子二兩炒焦甘草半兩炙黃同為

細末每服一錢新水調下更入蜜少許

又方治喉痺不能語 以大豆煎汁放冷含之

以龜膽少許生薑薄荷汁化服得吐便愈

青魚膽得收得以青黛釀之

治纏喉風束氣不通 蛇蛻鯨鯢當歸 各等分

右為末温酒調下半錢得吐良



又方治如前 單麻子 去皮不 朴硝 二錢

右為末新水調下一錢未效再服

又方治如前 天南星 生 白僵蚕 生去熱醬 各等分

右為末每服一字或半錢生姜自然汁調下

又方治如前 右以白僵蚕二箇去絲為末生

姜自然汁調更入蜜少許拌勻分二三服或

只用半錢一字旋調服之

定命散治纏喉乳鵝等病

川大黃 燭黃 連 去頭 白僵蚕 蠶 者炒去絲

甘草 麩酪 五倍子 一分 臙粉 五箇子

右為細末每用一字竹筒吹入喉中如

毒氣攻心肺喉中生瘡噤飲不得者以兒穉

兒乳汁調藥一字雞羽蘸探入喉中得吐

者活不吐者死

又方治纏喉乳鵝喉痺咽喉頷項腫悶閉塞氣

不得通者 右令患人先呷好麻油少許後

以蒼葉燒灰研細末水調下半錢立效大者

增之

犀角散治馬喉痺其候如喉痺更加連明項頷

頰腫甚咽喉閉塞但數噴氣此症極惡



犀角屑兩

射干三

桔梗去芦三分

馬蘭根二分

甘草半兩

川升麻半兩

右為粗末每服一錢半水一盞入竹葉五片

煎至六分去滓入馬牙硝半錢攪勻細合嚥

又方治如前

右以馬嚼一具水二盞煎至半量

大小分服

治懸癰暴腫妨悶

以乾姜半夏等分為末少

以筋點藥著上半夏以白礬湯洗數次去滑

以硃砂半錢綿裏含之細嚥津

又方治懸癰忽倒

右以白礬灰生薑各半兩研細筋頭點上撥正

亦治腫悶日七八遍

治咽喉腮頰腫悶

右以蒜塞耳鼻中

又方治如前

右以馬鞭草根截去兩頭取在中者搗汁服之

又方治如前

右以黃蘗寒水石等分為末量

腫處以薄荷水調藥用鷄羽掃上乾即再掃

綠雲散治喉痺馬喉纏喉鴨乳重舌木舌一切

咽喉之疾

螺青

盆硝

生蒲黃

生甘草各等分



右為細每服一錢生薑自然汁調細三含咽  
若已閉塞不通者用葶筒入藥吹入喉中重  
舌木舌生薑汁調塗之患處腫痛咽頷者服之  
口瘡舌上生瘡用此藥塗之最效李方叔聞  
孝忠皆以此方救人甚多以磁合密封收貯  
如聖湯治咽喉一切諸疾

甘草 一兩

桔梗 去芦一兩

右為粗末每服一大錢水一盞煎服時  
龍石散治如前并治口舌瘡腫

寒水石 煨通赤 朱砂 研飛一兩

腦子 研半分

右為細末每用少許摻患處病在咽喉者  
吹入喉內細燕津日五七次臨臥一兩次用妙  
如聖圓治咽喉一切諸病

川大黃粉

白礬粉

馬尾動一分

蝸牛 十斤

陳白梅肉

十分

右於五月五日午時取蝸牛以白梅肉同研  
爛入藥和丸如練子大每用一丸綿裹含花  
燕津若病重不能開口即研藥作末葶筒吹  
入喉中滴水三兩點送之或以淨水磨藥送  
之立差



通關散治如前

粘白礬

雄黃水

煎藥水

白僵蚕去絲青

猪牙皂角去皮

右各等分為細末每用一字鼻內搗之其毒  
筆筒吹入喉中涎出或血出立愈

治小兒咽喉腫痛塞閉

以桑上蠶娘窠一兩燒灰馬尾勃半兩同研  
勻細煉蜜和丸桐子三歲下煎犀角湯研下  
三圓大者加之

治小兒飲乳不快竟似喉痺

以沙牛角燒刮取灰塗乳上吮兒嚙下即差

射干湯治如前咽喉一切諸病

射干

川升麻各一兩

馬牙硝

馬尾勃

各半兩

右為末每服一錢水一盞煎至六分去滓

金雷之膏治如前

寒水石煨過

雄黃水一盞

鵝砂二錢

甘草末四錢

腦子一盞

右拌勻煉蜜和圓桐子大食後含化一圓

荆芥去灰薄荷去灰人中生去灰

甘草生 玉泉子炒



七為細末在瓶內或水內小蓋煎至五六分去

又方治... 小蓋入青箔心并

又方治... 為末又別以膽

又方治... 一字箒筒吹入喉中病處

小兒項瘰... 定速以粘飲致氣逆不散

留結而生其狀在項壘之然漸之長大而公  
有辨又云葛根在地泉流浸之人因取其水  
以食飲則生項瘰故近山居人多有之以葛  
生在山中故也

昆布圓治項瘰 昆布一兩洗鹹味

海藻味一兩洗去鹹 草龍膽去芦一兩橫切半兩

甜葶藶一兩隔紗 牽牛子半兩炒

右為細末麵糊和圓黍米大每服十圓飲  
又方治或生項瘰已及一二年

右以黃蘗子半斤須萬州緊重者為上若輕



虛者即是別州所出力慢須用一倍取无灰酒  
一斗入藥固瓶口以糠火煨燒一伏時不可  
搵酒不可有灰待冷即開瓶令患者時之飲  
半合入呆可令絕酒氣經三五日看之竟消即  
止飲不尔便令兒項細也刘禹錫亦著效驗  
其驗如神佳燒酒候香氣出瓶頭有津出便  
止不必須待一伏時也仍禁喜怒但以線子  
逐日圍度乃知其效也

惡核瘰癧論

小兒腑臟不和及遇項边經絡虛隙為風熱毒

氣所干与血氣相搏於項边結成核子復遇  
風寒所加則不消不潰名曰惡核若更風濕  
相加搏於津液与府臟相乘則潰化膿血或  
乾而後發或相傍別生以至數个連續不差  
名曰瘰癧俗呼癭子此府藏血氣内外相屬  
之病也

皂角膏治項边生核子不消

皂角煨結一錢 糯米炒黑 草烏頭二錢生

黃皮二錢炒黑色

右為末量多少以井花水調貼核上未消与



水晶丹下之利過以觀音散補之仍再服

水晶丹 天南星 洗淨生為末一分滑石 生為末二錢

水銀粉 秤生蘇黃煎乾 巴豆 五十粒 去毒

右先研巴豆極細次入蘇黃仁復研方入眾

葉研勻爛飯和圓黍米六每張三五圓量大

小加減臨臥稍飢葱白瀝送下利過忌生冷

硬物仍以觀音散補之方已其前

如聖散治如前

綿黃耆 一兩到 連翹 一兩 鴿糞 半合燒

川大黃 半兩 糯米 半兩用班指七 犀角 半兩

右為細末每服一錢水八分入酒三四滴同

煎至五分去渣放溫時之呷

紫檀膏治如前

紫檀香 木香 川朴硝 研

卷柏 各一兩 赤芍藥 川大黃 各二兩

右為細末每服少許以鷄子白調稀稠得所

塗患處

取瘰癧內消 右以長三寸鯽魚一箇去腸以

和皮巴豆填滿麻皮扎定以一束稊草燒用

及取出放冷研為細末爛稠和圓黍米六



每服一九粟米飲下臨臥未利加一九  
又方治如前其右以斑猫一两去翅足用粟米  
一升同炒至米焦去米不用只以斑猫為糊  
未入薄荷細末四兩拌勻烏鷄子清和丸黍  
米大空心茶清下一丸一日加一丸至五丸  
止一日却減至一九以後每服五丸  
胡麻圓治瘰癧胡麻四兩香羊躑躅一两  
右以為末煉蜜和丸麻子大每服七圓新加  
至二十一圓熱水下日二見效為度已破者  
更用黑母牛糞燒灰研末傳之

治一切瘰癧經效方

右以牡蠣火煨通赤取出濕地上紙襯出  
火毒一宿每四兩用玄參三兩同為末麩  
糊和北菜豆大早晚食後酒下各下三十丸  
藥尽則病除根本

又方治瘰癧已破未破其效如神

右以如前煨過牡蠣四兩用甘草二兩每  
一錢薦茶點服日二

治小兒瘰癧以蝸牛殼一两用牛乳半升  
子中慢火熬令乳尽取蝸牛殼研如粉入大



黃末一分更研勻每服半錢皂莢子仁湯調下大小便中出惡物差

又方治如前

以白僵蚕去絲菁炒過為末每服半錢

龜背論

小兒有龜背者因乳母有宿乳惡汁去之仍以

飼兒忽遇風熱邪毒相干乘傷於肺經致肺

氣滯停重壅背骨漸高起狀如龜壳故曰

龜背

百合圓治小兒龜 百合一兩

川朴硝半兩 杏仁半兩湯浸去皮尖 木通半兩

赤小豆皮半兩 川大黃半兩 天門冬去心半兩

右為細末煉密和圓黍米夫每服十圓米飲下

又方治如前

右以龜屎摩擦背骨取龜尿法以蓮葉內

頓一物安龜在上用鏡照之則尿自出流蓮葉以物盛

用之甚佳 龜背論

小兒有龜背者由兒在嬰小時鵝骨未成強令獨

坐則背隆阜而偶為風邪干襲与血氣相搏

入骨髓壅滯不散致背高隆起若龜壳之狀

故曰龜背又名隆背若如陀有峯塊起者是

名馳背乃胎孕之病不可不治



松葉丹治兒龜背 松花一兩洗焙乾只殼燒少法

獨活 天麻 各一兩 防風 羌活 各一兩 川大黃 半兩

前胡 去其辛而 麻黃 去根節半兩 桂心 半兩

右為細末煉蜜和丸黍米大每服十粒米飲下  
又方治如前 右以龜屎摩背脊骨取屎法在前

手足拳攣手論

小兒有手脚拳攣者由本氣不強筋骨力弱血氣  
不榮而為風邪所乘搏於經絡則筋脉縮急  
骨本死力則手拳而不能展用脚攣而不能  
伸拳也若生下便拳者此胎乃子中病不可  
治也

薏苡仁圓治手拳不能展開

薏苡仁一兩洗當歸洗秦艽去苗一兩

防風去其辛而羌活去其酸棗仁去酸

右為細末煉蜜和丸鷄頭實大每服一圓對

香荊芥湯化下兒大增之

海桐皮散治脚攣不能伸拳 海桐皮

當歸去其辛而牡丹皮去心熟乾地黄

牛膝去其酒浸焙山茱萸 補骨脂炒

右為細末每服一錢水八分入葱白二寸煮

至五分去滓溫服



風痲癩疹論

小兒風痲癩疹者小兒肥膚嫩血氣乘弱或因  
暖衣而腠理疎開或天暄而汗津潤出忽為  
風邪所干搏於血氣凝滯於皮膚之間不能  
消散而成痲成疥相連而生其狀如生薑片  
輕者名曰痲不至改色重者名曰癩疹改赤  
赤紫發搔痒搔之不解甚者使人心神悶亂  
若先着其色澤白者以牛膝酒浸一宿焙乾  
為末每服一分或半分溫酒調下若色赤  
者以全下黃土研細末生薑蜜水調下一分或  
半分

又洗方治如前

荆芥

細辛 去苦

白芷

薄荷葉 各等分

右為粗末每用兩大匙水一桶取羊蹄菜一  
斗連根葉枝莖細剉同煎至葉爛傾盆中先  
以尋常熱湯煖處浴身體候有汗出即用藥  
湯淋洗、畢避風忌海鮮鮓醬毒物

又塗方治如前

右以白礬一兩二錢煖酒投化用馬尾草之  
防風湯治如前

防風枝 去苦

鼠粘子

荆芥穗



人參去蘆各

甘草 炙 天麻 各半兩

右為細末每用一錢水八分入生姜薄荷各少許同煎至五分去滓溫服

治卒發風疹 右以石灰不拘多少和酸漿水調搗

治小兒癩疹若不治入腹即能殺人

以鹽湯洗了用麥子按爛傳之又以枳殼剉

未煎湯洗之又以蚕沙二盞水二椀煮洗之

又方治如前

右以吳茱萸半升酒二升半煮取五合以綿糖

三奇散治風痰癩疹遍身搗之不認痛痒

凌霄花

白扁豆

甘草 各等分

右為細末每用一字或半錢 蜜湯調服

又方治風痰癩疹心神迷悶

右以巴豆二兩搗破用水七升煮取三升

蘸搗拭之

麝香丹治風疹不差甚奇如瀉服之神驗

犀角屑 一兩 烏蛇肉 半兩 白及 去皮骨粉

天麻 半兩 白附子 半兩 白僵蚕 上者為

朱砂 一兩 龍腦 射香 各一錢

右拌勻煉之登和圓黍米大每服十粒瀉下



又方治風疹入腹身強舌乾亦能殺人

一右以蔓菁子為末溫酒調下一錢或生薑末

以蛋沙二盞水二梳煮一梳洗之

一疥癬論

小兒血氣熱為風濕所干搏於血氣聚於皮膚

之間而生疥癬又云蟻虫咬動內外相乘

推黃膏治小兒遍身疥癬如要一痒而搔之膿血出

推黃一兩研水飛推黃一兩研水飛松脂一分研

川烏頭除去皮亂髮一分

一右以猪脂六兩於銚子中炒成油入烏頭

松脂亂髮煎至氣消尽以綿濾去粗入一黃

末攪勻盛磁器中候冷成膏每用少許塗擦

瘡上白三亦治癰

又方名同治同雄黃末一錢黃丹一錢

臙粉一匣一塊巴豆十粒去皮

葱五根切碎

一右用油一兩入右心巴豆煎至焦濾去滓入餘

藥攪勻候蠟燭取下磁器中盛放冷成膏

每用抓破疥疔石塗擦

碧粉散治如前

蛇床子一兩微炒



狼毒 半兩 硫黃 半兩 青黛 半兩

右為末賦粉少許拌勻好油調塗擦神效

又方治如前

大腹子 二分 蛇床子 二分 硫黃 一分半

一右為細末入輕粉少許好油調勻臨臥抓破

擦疥上及以粟少許塗手心脚心手擦極

熱甚者不過兩三次

治癬新生 右以砂糖各一小塊同爛抓破塗之

又方治諸癬 右以蛇床子為末和猪脂為膏塗之

又方治 右以桃樹青皮為末和醋傳之

人方治圈而癬

右以羊蹄根乾生為末与白礬等分

又方治諸癬 右以決明子為末入水銀粉研勻

以物擦破癬上塗之立差

又方治如前 斑猫 五个去翅足微炒

鹽豉 四十九粒浴令潤 砂糖 皂子大一塊

右先研斑猫 將細入二味同研成膏

一大豆許湮津調塗上大效

又方治妳癬 黃連 去須 赤芍藥 等分

右為細末入輕粉少許罨芝麻搽汁調藥先



洗淨拭乾以藥傳之不過數次而愈

治下練癬瘡常對在兩脚 右以白飯塗之立差

治上練癬瘡常在頭上 右以盧會一兩甘草半兩

同為末先以溫漿水洗之以帛子拭乾用藥傳

之立乾便差甘草灸過用

又方治如前 右以大梔子不限多少燒存性為末好

油調傳之

又方治疥癬因用硫黃砒霜藥病愈後臭毒之

### 金瘡論

小兒有誤被尖刀割傷其肌膚其輕淺者雖有

血出不至危殆其重深者有損傷於經脉血

出不止又有因傷中風者則口噤身強俗云

破傷風也

治諸金瘡 檳榔 黃連去頭名 木香半兩

右為細末如治一切金兩所傷血出疼痛以

末傳之血定不痛不膿如所下指果血未定

速將藥裏便得連接

又方治諸金兩所傷血出不止 檳榔

黃連去頭 石膏各二兩 黃蘗半兩



右以為細末隨多少摻傳瘡上血定便入水

又方治如前 右以白芍藥為末貼傳即住

又方金瘡深者不可以藥速合則肉潰傷肉

右但以黃丹滑石等研細末傳之

天蠶散治諸金瘡 右以晚蚕蛾不拘炒為細末摻傳傷上用絹帛封裏隨手血止瘡合效

又方治如前 右以五倍子刷淨為末掩傷處

血立止較即無痕

又方治如前右磁石末燒盡灰千金石既帶燒灰長石倉卒之間得一味傳之皆可

治破傷風口噤身強 右以天南星一个防風

二寸同為末先用童子小便洗瘡口後用藥

傳之追出赤水是效

又方治如前 右以肉蓯蓉切作片子曬乾用

一小盞子底上穿一孔合著火燒藥如香煙

從孔中出熏瘡口累驗

又方治如前 右以好鱉膠二錢火上炙焦為末熱湯調下分二服連服一方用一仰一合瓦內燒鱉至烟漸研細末熱酒調下汗出愈

又方治破傷風腰脊反張牙關緊急四支強直



右以鷄糞白半升大豆二升半和炒令變色  
乘熱用酒沃之微煮令豆味出量性飲之

追風散治破傷風 草烏頭四箇二升生用二升炮蒸

椒二十八粒 右為末貼瘡上風毒自出

又方治如前 右以黑豆四十粒朱砂一字同研  
為末酒半盞調下一字差

又方治如前 右以白麴鹽各一撮新水調瘡

又方治如前 右以蘇木剉煎濃汁灌瘡中十  
數盞不令絕候瘡中黃水出是效

又方 瘡口作白痴死血者殺人最急以雄雞

直糞研熟酒調下一字或半錢

又方治破傷風經驗 右以狗頂上毛燒灰貼瘡

湯火傷論

小兒有偶被湯盪火燒成瘡者輕則初乃炮起  
破有黃水而為瘡也重則便皮破肉傷而為  
瘡也切不可使用冷物泥蜜之類塗之恐令  
熱氣不出伏留潰爛深傷經脉宜加藥之  
叙方于後

麻子膏治湯火瘡經驗

大麻子一合 柏木白皮一兩 香白芷一兩



甘草

一两

生地黄

一两

右為糖以猪脂八兩同蒸熟色黃以綿濾去滓盛磁器中成膏每用少許塗瘡上

又方以洗麵脚日曬乾炒焦黑研細好麻油調塗更解熱毒以蒼葉燒灰研細油調塗之止痛无癢經驗以水煮大豆汁塗之易差无癢以醋和泥傅之務光憲家婢抱一孩兒誤落炭火上燒瘡便以醋和泥傅之較無癢痕旨子房曬乾通烟掛之要用時旋為末好油掃上如鋪水膏便止

以蛤蚧為細末油調塗之如水無癢

以小麥麩炒焦黑研如粉生麻油調塗鷄

刺掃上大妙又以風化石灰不拘多少

銚子中炒黃色地上出火毒畢研細末生

麻油調塗凡傷至重做痛不已敗壞筋

骨皮肉者皆治

又以捉一大活鼠先用銚子煎芝麻油一斤至

熟旋打死鼠候冷麵油內煎直至毛骨俱

散灑去滓不用入乳香末沒藥末各半兩

攪勻上炭火熬成膏磁器盛封繫定搥



一坑深一尺許窖之候三月取出凡遇湯  
火傷塗之立效亦治金瘡

論下卷第十元

小兒衛生總微論方卷第二十

疳瘡論

小兒有諸疳瘡者由內有疳氣因而虫動外被  
風毒所干內外相乘搏於血氣蝕發之所作也  
若發於口鼻牙齒者初則瘡小漸蝕大其蝕  
有緩急緩者名曰常疳急者名曰走馬疳有至  
鼻口蝕爛牙齒脫落者若發於緣身四肢者只  
名疳瘡若發於陰物者名曰下疳其疳皆不甚  
痛但微痒而已不竟之間蝕以深大若不早治  
皆能為害也



澤瀉散治疳蝕其鼻生瘡及鼻下赤爛

澤瀉而川鬱金生甘草炙

山桅仁炒各二分

右為細末每嬰小一字二三歲半錢五七歲

一錢甘草湯調下日二及用青金散傳之

青金散 銅青 白礬生各一錢

右為末每少許傳瘡上

黃連散治如前

右先以米泔水洗瘡訖用黃連細末傳之日

三四

盧會散治如前

右以盧會為末吹鼻中鼻下有瘡即傳

又方治如前

右以熊膽半分湯化塗患處

又方治如前

右以黑牛耳中垢傳瘡上

又方治如前

右以鯽魚膽滴鼻中連三五日甚効

石膽散治疳蝕口鼻生瘡赤爛

石膽二兩 亂髮燒灰半兩 葇荑子半兩



地龍去土洗淨焙一分

右為細末入射香半錢同研勻細每用一字

毒瘡上

主治治痔瘡口齒銹透

右以白僵蚕去絲嘴炒黃為末蜜和傳之

主治治疥癩齒齦爛瘡潰

右以髮不拘多少燒作灰麝末少許同研

勻搽上立効

龍骨散治走馬疳口齒齦爛

砒霜半錢 粉霜半錢 龍骨一錢

定粉一錢半

蟾酥一字

右先研砒細入龍骨研細方入諸藥入龍腦

半字同研勻細每用少許傳上

治小兒牙疳蝕斷肉潰血出

人中白取法用瓦盆盛衆人尿旬餘日至滿澄去其清取白

乾秤半兩 麝香半錢

右為細末入糯米飯研勻和劑搗細小短條

子臨時隨牙縫大小割在病處縫中甚効一

方只用末傳之

治小兒走馬牙疳



右以雄黃不拘多少研細以連紙條子摻上  
熬作紙燈上燒過入鉢中同麝香少許研細  
摻瘡上

治小兒走馬疳蝕牙齦損爛

以膽礬為末薄切蘿蔔作片子反覆搥末於  
火上炙令乾研更入麝香研勻傳患處立安  
已驗

以五倍子中蚰末研細更於麝香拌勻先用  
漿水漱口小兒未能漱者以帛子搥漿水搥  
之須令留漿水氣以藥傳之若斷爛即病

已深矣若小兒面上或骨節上生瘡  
如爛梨靨者即用此藥貼之一方用五倍子  
存性為末傳之

又方以不蚰皂莢一錠燒灰膽礬四錢為末

盪一彈子大用紙包了黃泥固濟炭火煨青  
煙起為度頓冷地上枕覆一宿出火毒三味  
同研勻細末用先以鹽湯漱口了以藥於病  
處搽至痛復用鹽湯漱之妙以楊花少許

燒灰存性入麝研勻傳之

治小兒急疳蝕口鼻數日至盡欲死



以文蛤燒灰臘月猪脂和傳

治小兒疳蝕鼻爛 以膽礬一塊燒令煙盡研

末搽病處一二日差

治小兒疳蝕口鼻作瘡黃瘦

石膽一分 盧會一分

右同研細末搽病處但頻用即爛肉自然成

膿便生肉亦不生差愈

治小兒疳蝕鼻下兩道赤者名曰疳鼻

以黃連去鬚為末先以米泔洗淨用末

日三四次

又方治如前 石膽一分 黃連去末一分

右同研勻細生油調塗之

又方治如前 五倍子三分為末 共舟一分又

右同研勻細以綿裹貼病處七塗之亦得日

四五次

治小兒疳蝕滿口微鼻 麝香口錢一

蟾酥三片如柳葉大錢一便火煉候黃色別集

五靈脂去砂石末一錢 蜜一兩

右相和於銚子內慢火熔成膏 每用先去却

上爛 物後以藥塗之 日夜四五次



治痔瘡 以胡粉熬八分猪脂和傳油亦得  
又方 以姐殼洗淨焙乾末每用先以葱

湯洗瘡拭乾用藥搽之以栗子嚼爛傳之  
龍腦膏治走馬急疔蝕口鼻

龍腦一字 射香一字 砒二 白敏一字

右為細末用獾猪膽汁調並適稀稠以紙仁  
子塗上即差

又方治走馬急疔蝕口鼻數日間欲死

右以藍淀傳之令遍日十次 夜四次取差

又方治走馬急疔蝕牙齒漸透損骨

右以天南星一箇當心取作坑子安雄黃一  
塊在內用麪裹燒之候堆黃作汁取出以盞  
子合在淨地上出火毒了即并麪裹研為細  
末入麝香少許勻之傳瘡上量多少用  
熊膽膏治走馬急疔蝕口鼻牙齒

熊膽一分 蚌蛇膽一分 麝香一分

牛黃一分 龍腦一分

右同末更入射香末一錢拌勻以井花水一  
小盞攪和藥勻入磁器中重湯慢火熬盡  
膏每服一豆大薄荷湯化下蒸塗瘡上一



更有黃礬一分治緣身痒瘡用七許塗之

蟾蜍散治走馬急疔虫傷府藏上口鼻牙齒

赤爛乾蟾燒灰研半兩 黃定子半兩

白礬半兩 生硫黃分毫末 熊膽半兩

雄黃一分研水飛 盧會一分研 射香一分研

右拌勻細末每用一字煎荊芥湯調下及傳

瘡鼻中痒生瘡者以少許吹入鼻中日三

兩覆散治走馬急疔蝕口齒惡血臭氣不喜所

聞牙齒脫落 黃連末去頭三錢 銅綠一錢

水銀一錢用棗葉肉二箇同研 射香一分研

若同勻細先淨以藥傅瘡上用生肌

香葉覆之蝕肉成坑皆一傳肉生

三白散治走馬急疔蝕口牙齒臭爛送巡狼

蟻者 砒霜 粉霜二物先研細末 石灰三錢

右相合先左研千下却右轉研千下當極細

膩如粉每用以雞羽尖擦少許掃瘡上其瘡

夜乾慎勿多用恐毒入腹無令嚙津此藥見

小者難用

治疔瘡立効方

黃連去頭一分 膩粉二錢 麝香少許



右為細末先含水洗瘡淨乾貼之

又方治如前 大糞內蛆踏洗淨曬乾

蠅蟻只用四脚雞乾 蜜陀僧 定君子去殼

右各等分為末先以溫水洗瘡淨用藥搽貼

之及以滴水和元菴豆大煎史君子湯下五七

又方治急疔瘡

右以蝮蛇膽研細水調傳之

治下疔定効散 訶子一兩去核

好臘茶二兩 臘鴛一筒 射香少許

右同為末先用漢葱木賊川椒三味煎湯乘

熱熏瘡候通手洗淨令膿血淨將藥置瘡上

又方治如前

右先以韭菜根打碎百沸湯洗淨將藥子

搥乾用蜜陀僧不以多少研細末入藥散和

勻乾搽傳之効

又方治如前

一右以胡生薑一錢為末入醋粉十文同

研極細勻以油調塗仍先以葱湯洗瘡

一帛子搥乾然後用藥忌酸辣鮮薑等毒

癰癩論



小兒生癰癤者由六府不和風毒邪熱干於皮膚搏於血氣入客經絡之間留結而生小而無頭者為癰大而無頭者為癰初生則赤腫漸起外則皮薄而光內則肉腐致潰變而為膿無頭者須針刺破有頭者不必刺也熱則搃去膿血得盡者隨即便差若膿血不盡瘡口合者難時暫得差終須更瘡或根邊別生若邪毒入深附骨留結者則為附骨癰若出膿血復濕冷所乘傳傳日久而不差者則為疽瘡若外面皮膚雖合而毒氣入裏攻潰轉深只有瘡孔時

惡汁者此變癩瘡也

右以甘草一兩剉各二寸長用水八分一椀將甘草煎水文武火上炙至水盡為粗末別用水一椀煎至半椀放溫時、量性服取微利其毒自消未利再服

又方治癰癤欲成未見其頭但腫痛不已

官桂 陳皮等分 右拚末水調傳腫處

又方治如前

右以大黃朴硝等分為末每用三錢入麩一

錢新水調塗



椎黃膏治癰疽總發赤腫作痛便用龍角散忍

冬散三方大效  
椎黃<sup>半兩研</sup> 天南星<sup>半兩生末</sup>

寒水石<sup>煨過兩研</sup> 黃丹<sup>分</sup> 乳香<sup>半兩研</sup>

右拌勻細蜜調成膏攤帛子上貼之

龍角散  
地龍<sup>去土秤兩</sup> 荆芥穗<sup>兩</sup>

甘草<sup>兩炙</sup> 角刺<sup>二兩取紫色不枯者淨洗搗去</sup>

右為粗末每用一合水三盞酒一盞煎至二

盞半去滓再至二盞入研細乳香末一錢匕

調勻量大小旋與服五七歲兒半盞已下

分二服日三神驗

忍冬散  
忍冬草<sup>兩</sup> 甘草<sup>半兩</sup> 大黃<sup>半兩</sup>

右同為細末每用三錢匕水一大盞煎至七

分調乳香末半錢匕服如上法

文方治癰疽無頭要生

煮以葵菜子一粒新汲水吞下即生頭破而

膿出要兩處破服二粒要破處即逐粒加之

文方治癰疽無頭

右以川山甲猪牙皂角去皮絃各一兩共炙

焦黃為末每用一錢熱酒調下服藥畢其瘡

便破甚妙仍以冬瓜藤為末傅瘡乾即水調



傳之諸癰瘡皆可用

乳香膏貼癰癩

乳香兩

膩粉半兩研

松脂半兩研

蜜陀僧半兩研 生地黃汁半兩

右拌勻先用一銚子煎好油四兩黃蠟二兩至熔熟下諸藥攪勻入射香細末一錢熬成膏取下磁器盛之窸一宿每用看大小剪貼于攤藥在上貼之一日兩換

散治癰癩

沉香半兩

黃耆半兩

白欬一分 川朴硝一分 川大黃一分 甘草一分 右為粗散每用一錢水一小盞入射香少許

五分去滓溫服

又方治背上生癰癩凡瘡生背上者非善瘡也

右以多年煙熏壁土并黃蘗二味等分為細末生薑自然汁調成膏攤紙上貼之更以茅香湯調下一錢匕大妙

治附骨癰

右以樹皮燒末每服一錢匕以破者以燒狼七枚和大麥爛搗貼封之

治癰瘡久不差敗壞成蟲

大蝦蟇我身毒

乱髮現雞子六

猪脂一斤



右同煎之至消尽上二物時取下入盞一合  
搗勻放冷成膏每用先以龍骨研作粉圍瘡  
四面厚二分許以膏藥著瘡中日二易有虫  
出如髮出尽愈

又方治如前

右以白楊葉杵末傅之

又方治如前雞舌香散

雞舌香 木香

沉香各兩

麻黃去根節

海藻洗去鹽

大黃兩各半

右為粗散每用一大錢水一盞入竹瀝二三

點煎至五分去滓溫服煎過溫熱淋滌其瘡

治癰疽瘰癧

餘治癰瘡方並在後

綠

濕生虫

右同研細末每用芥子心許紙

瘡口

惡瘡論

小兒有綠身生諸惡瘡者由府藏有熱衝發於  
外被風濕所干內外相乘搏於血氣隨其經  
絡虛處停滯留結而生成或大或小或痒或痛破  
潰成瘡或膿或血或腐或敗挾毒所作者久  
而不差皆曰惡瘡若毒行攻裡亦皆能變毒也  
治兒身生小瘡作痒痛  
宣連 去頭二兩  
膩粉分  
白及一兩  
藥黃 去皮半兩



右為細末先洗瘡淨拭乾生油調塗

治生大瘡作嫩痛 黃丹二兩 賦粉一錢

右研勻細嚼杏仁取汁調傳

治生瘡如火燒

右以赤藤荔葉杵末油調塗之

治肺毒風瘡如癩

右以好桑葉洗淨蒸一宿日曬乾為末每服

一錢溫水調下無時

治惡瘡不識者

右以蠹娘杵爛絞汁傳之亦治痔瘡

治諸惡瘡

右以黃牛蹄甲燒灰酒再三燒令極細末入

射香少許拌勻乾搗瘡上

又方治如前

右以地骨皮先刮取淨皮別收之次取淨皮

下白皮如粉者為細末又以其下赤堅皮細

剉共淨皮一處相和為粗末粗細各貯之每

用一粗末一合煎濃汁乘熱洗瘡直候湯冷

以軟帛拭乾用細末傳之每日洗傳一次

又方治如前



右炒豉焦至煙絕為細末傳之不過數次差  
又方治如前

右以陳小麥半升不犯鐵器中炒黑色黃白  
黍灰半錢同為細末每用少許貼瘡上

又方治如前

黃藥厚者去粗皮

黃連去瀝

山梔子去壳

甘草各一兩

右各剉如豆大於沙石鉢子內炒令煙絕如  
數炭樣放冷研細入射末一錢拌勻先以溫  
漿洗瘡去膿血淨軟帛拭乾搽藥在瘡上以  
紙片子蓋了軟帛子包繫護之隔日再用不

得入水共備別一老兵患瘡九年積爛且骨  
得此藥効愈

治久惡不愈

右以

內髓粉和為劑却入骨內泥裏

火煨熟取出先以鹽水洗瘡淨後乃傳之  
追惡瘡膿血

右以巴豆二十粒槌碎用清麻油二兩煎至

黑焦去豆濾過入黃丹一兩以東引柳條數  
枝攪之前成膏每用以絹帛攤藥貼之以  
節燒灰傳之



治小兒魚臍瘡謂瘡形狀似魚臍也此亦惡瘡候  
以蛇蛻皮炙焦黃一兩燒灰細研用雞子清  
旋調少許塗之

治小兒魚臍瘡

以寒食餠燒灰研末傅之以白蒿莖并煎液  
汁先以針刺瘡四畔滴汁於瘡口上

治小兒風氣相搏身生瘡瘍

地龍去土一兩白殭蚕去糞絲兩川芎二兩甘草一兩

右為細末薄荷湯調下一錢或半錢

治惡瘡久不斂肉黑爛膿色黑赤

右先以不灰木攪柳各一分為細末摻貼瘡

上候肉紅膿盡即用後木香散

木香二錢檀柳各黃連去酒四錢

右同為細末乾摻貼上用之必效

馬莧散治諸瘡久不差變瘦瘡

馬齒莧一兩土零一兩烏蛇肉一兩酒浸二兩煎

茯苓子半兩去刺亂髮半兩燒灰

曲頭棘針半兩燒灰緋帛子半兩燒灰

右為細末每量瘡大小用白酒調藥攤帛子

上貼瘡上



貼久癩瘡

白膠香

赤石脂

黃藥

蜜陀僧

各半兩

右為細末乾貼瘡上

又方治諸癩瘡

右以蝸牛三箇磁合子內收入射香少許蓋了火內燒過研為細末水和小圓子每用一圓內瘡中又方以牛膝末傳之妙

又方治如前

右以赤小豆黃連等分為末溫漿水入鹽洗瘡淨搽藥或只以白膠香末搽之亦効

烏金散治疔瘡癩出膿凍痛不止諸藥無效者

有虫

右以羊羔兒骨不以多火入藏瓶內鹽泥固濟炭火燒合宜研細每用末五錢入射末一錢雜黃末一錢同研拌勻時看瘡大小先以通手湯洗膿血淨口含洗之軟帛拭乾藥末滿真瘡口當以生肉三日外瘡合

浸淫瘡

小兒生浸淫瘡者由府有熱熏發皮膚復為風濕相持轉於血氣而其瘡初生碎小後有膿汁



浸淫漸大膿汁著處便生故謂之浸淫瘡也又  
一証風毒濕瘡頗似浸淫瘡亦膿汁浸引而生  
但膿亦適周比浸淫瘡稍大尔

治浸淫瘡痛不可忍寒熱三日

右以刺薊為細末新水調傅瘡上乾則易之

雅黃膏治浸淫瘡經効

雄黃一兩研水飛

雌黃一兩研水飛

川烏頭一兩去皮煎

松脂一分研

亂髮一分燒灰

右以猪脂六兩於鉢子內熬成油後入下三  
味煎至髮消尽以綿濾去滓入二黃末攪勻

盛磁器中成膏每用尖許塗瘡上日三次

又方治如前

右以蠟胭脂於灯下用鏡子照瘡口念呪曰  
浸淫瘡好夜粒明鏡照紅粉粧每念一遍  
胭脂塗瘡上如此七遍胭脂抹周遍其瘡即  
愈此法極驗甚者不过再

苦參散治風毒濕瘡

苦參一兩

蛇蛻半兩燒灰

露蜂房燒灰

右為細末每用半錢生油調塗瘡多添之

四生散治

綿黃耆

白附子



西華活毒

藥各等分

右為細末每服一錢以酒調下

標漿瘡論

小兒生標漿瘡者由風熱毒氣客於皮膚搏於血氣而所生也始生如火燒湯盪作泡而死尋即皮破標漿出以成瘡亦甚疼痛漸引相續而生有至遍身潰爛皮肉不可救者故又名爛瘡宜速治之又一証生瘡狀長如魚臍黃出水四面亦標漿泡起此雖與標漿相似而有以異標漿瘡者先起漿泡破而成瘡此瘡先乃

後即四面續生漿泡其狀狹長渾似魚臍故名曰魚臍瘡標漿瘡即不似魚臍也

治標漿瘡神效屢驗

右以栢葉洗淨切碎細研傳之隨手便乾夏取汁半盞水解服之

又方以桃仁去皮尖熟研和面脂傳之

又方治標瘡黃爛

右燒艾葉灰傳之一方燒馬骨灰傳之

生地黄膏治標瘡毒甚發引遍身

生地黄

去毒洗淨

川升麻

藍葉



搥子仁

大黃各兩

右研細以猪脂八兩同於鉢內慢火煎色盡  
濾去滓以磁合盛放冷成膏每用火許塗瘡上  
治小兒面日緣身卒生燥泡

右以發羊角燒灰研細末雞子白和塗神驗  
卒無和亦妙

治小兒燥 瘡如魚胞赤爛成瘡熱痛不可忍

右以磨家駝糞或塊結而不散者不以多少  
點乾地上堆定用手壘作屋狀以灯點着  
至欲過盆子合殺令作黑灰勿令白研為末

每用一錢和膩粉二錢殘灯油調塗如冰  
熱痛甚妙

治小兒燥漿瘡起如丁蓋發頭上一兩日後面  
上背緣身皆生其瘡熱痛

朱砂半兩研水飛 胡粉二兩半 水銀半兩

右一處研入水二三滴研至水銀無星用臘  
月猪脂三兩於鉢內慢火熬熔去滓入藥末  
攪勻成膏磁合盛放冷即用火許塗之

治緣身生火燥瘡如麻豆有膿汁作痒痛一身  
盡徧 甘草 芍藥 白欬 黃芩



黃連去須

黃蘗去粗皮

苦參各等分

右為細末用蜜和傅之日二夜一亦可作粗散煎湯洗之

治小兒燥爛瘡以鉄燒赤泔水中二七遍浴

洗以燒艾熟灰傅之又以酒煎茶葉拭上又以

桃仁杵爛和面脂傅又以赤小豆煮汁冷洗不

過三次差

凍瘡論

小兒有凍瘡者多生於耳倫或脚上由冬月嚴寒之氣傷容於肌膚搏於血氣所作初即腫

須漸破而成瘡頗難得差至春暖時自可到冬

月冷時復發故名凍瘡

黃蘗膏治凍瘡

黃蘗末

白欵末各二兩

白及末半兩

生芝麻

二合杵爛取汁

右同研勻細以蒸蘿蔔一枚好酒一盞一處

杵爛成膏每用少許先以童子小便洗瘡了

後以藥塗

又方以雀兒腦髓塗之立差

沸瘡論

小兒夏月多生沸瘡此由盛熱汗津出而腠理



開被風熱毒氣干於血氣所生其狀細碎苦藁如粟芥之類色赤而痒多生額頭背脊之上甚者徧身俗呼子痒而搔之亦能成瘡

治癩瘡

以兔絲子莖按湯洗之亦治頭瘡及女人面

瘡

治癩瘡痛不止

乾藕節末三兩 生油麻三合

右先杵油麻爛后下藕節末更入生蜜和調得所塗之三五次差

龍腦散治癩瘡

龍腦一兩 黃蘗半兩 末 白麵二兩

臘茶一兩 研末

又方 右拌勻每以新綿搵藥撲上破者傳之取差

又方 古以蚌粉研細用雪水稀調臨臥塗之能以熱湯浴畢塗之更佳無雪水用新水

又方 古以雪水磨檀香麝毛燕掃上

漆瘡論



小兒有偶謂漆傷者本不耐漆或因見聞或因  
使新漆器被漆氣所觸便著其毒而生腫赤狀  
似癢疹破而作瘡微有涎汁亦頗疼痛俗呼為  
漆咬瘡也

化毒散治漆瘡痒痛

木通一兩剉 藍葉半兩 麥門冬半兩去心

犀角屑一分 馬牙硝一分 甘草一分炙微赤剉

右麤散每服一錢水一小盞煎至半盞去滓

温服

由柳膏治如前

垂柳枝三升 苦參二兩 黃芩一兩

之剉散每用三匙水兩一併煎至一椀去滓研

入好蜜汁半匙攪勻再熬成膏以蠟合感候

冷用少許塗瘡上

又方 以好麻油生用塗上

以黃芩木剉碎煎濃汁放冷淋之

月蝕瘡論

小兒有月蝕瘡者或生一耳鼻或生手指隨月生  
死世云月初生之時兒以手指月乃生其瘡故  
因以名之



治耳伴生月蝕瘡

右以黃連為末傳之

治手指生月蝕瘡或腫或破隨月生死

右以生薤一把苦酒中煮數沸熟出以傳之

治諸處月蝕瘡

右於月望夕取人屎內蝦蟇腹中同燒研細

傳之

又方治如前

右於五月五日

取蝦蟇燒灰研細不和搗膏

傳之

又方治如前

右取蛇蛻皮燒灰研不和搗脂傳

又方治如前亦治月蝕九竅皆有瘡

右燒蚯蚓糞研末和猪脂傳

治月蝕瘡生兩耳出膿水不止

水銀

胡粉各二兩入水銀三兩煎成水

黃連去頭為末二兩

松脂一兩研末

右並同研勻細以粉瘡上若乾即周煉成搗

脂和膏傳仍先以豆湯洗瘡淨然後乾塗藥一

方只用胡粉和土傳之



又方治耳後月蝕之瘡

敗鼓皮一兩燒

蝦蟇一兩燒灰

右同研為末以煨成猪脂和膏塗之

### 蠖蝮瘡論

小兒生蠖蝮瘡者因居處屋壁之間有其虫名曰蠖蝮其形寸許脚甚多而細瘦其遊走之時偶遇人影則尿之隨所尿著處人身則應而生瘡多在腰間初生赤小瘡癰如黍粟麻豆荏苒不已長出濃汁成瘡因其虫名而名之也此方人便為浸淫瘡也未知的否今兩存具之

### 治蠖蝮瘡

取胡鷲巢中土水和傅之或以猪脂苦酒

具和傅

又方右取白扁豆葉傅之最佳

又方治蠖蝮瘡繞身周匝則死云繞腰腹

右取蒺藜葉搗傅之無葉用子

### 水毒論

小兒有諸般瘡瘍因洗面或洗手脚或洗浴等偶然水入瘡中則發腫而疼痛名曰水毒宜早治之不尔則潰發其瘡變出膿汁遷延時日



久不能較也。

治湯水入瘡為水毒發腫痛

右以香附子乾姜各一分皆燒存性研細末  
傅之

赤遊論

小兒患赤遊腫痛者由內有積熱熏發於外。  
被風毒所干內外相乘搏於血氣則皮膚赤腫  
其風邪毒氣隨經絡行遊不定故為赤遊也若  
重者隨血氣處處流注為赤腫或片或渦毒漸  
引大疹痛難忍若遊至於心或毒入腹者皆能

殺人

治赤痛遊通身上下不定若至於心即危

右以芒硝投湯中取濃汁拭之亦治丹毒

又方治如前

右以葫蘆煎汁洗淋之

治小兒綠身赤腫漸引腫起

以米粉熬令黑色研細唾和傅之

治小兒半身赤漸長引不止

以牛膝甘草二味等分咬咀一方其下減半

每用一兩水一盞煎五分去滓調 止龍肝



末塗之大効

又方治如前

以亂髮燒灰同代龍肝末用膏油和佳

治赤熱毒腫遊行身上下至心即死

以草鞋亂髮燒灰醋和傳之以伏龍肝研末

雞子白和傳乾即再又以生景天并爛傳上

亦治疔發一方用一握絞汁拭之以水中苔

杆爛傳之又以松葉并爛傳之以白豆末水

和傳之乾即易

治頭面緣身生赤毒腫起作片

以括樓根二兩伏龍肝半兩為末醋調塗

乾即再傳

治赤流腫半身紅漸展引不止

以紅藍花末醋調傳之又以芸薹葉并爛傳

又方治如前赤腫遊行上下遍身不定

右以芭蕉根汁煎塗之

防已散治如前

防已半兩

川朴硝

犀角屑

黃芩

黃耆

川升麻各一分

右為細末每服半錢煎竹葉湯調下

不通散治赤遊成片渴赤色如染腫毒漸引大



木通一兩 川升麻 川大黃 剉碎

川朴硝 各兩 梔子仁 甘草 微炙 各一分

右為粗散每服一盞水一小盞煎至五分去滓溫服之

截毒散治如前

川大黃生

麝香

赤芍藥

膩粉

猪牙皂

兩 梔子仁 各一分

右為細散每用少許生油調塗之

又方治如前

君以五味子去枝葉焙乾為末熱酒調下一

錢痛自消神效

又方治如前

右以黃蘗寒水石等分為末用薄荷水稀調雞翎掃塗之乾即再

治赤遊腫遍身入腹即殺人

右取竈下黃土研為末油調塗勿令乾若入腹及入陰者以慎火草取汁一盞分服如元生者用乾者末之水調服

赤毒論

小兒丹毒者由風熱毒邪容於腠理搏於血氣發於皮膚之所作也又千金論小兒黃丹惡毒



皆熱積所成或冬間向火烘衣夜間蓋覆太暖  
或乳母愛食燒炙飲酒皆令兒病丹發處其熱  
如火輕、手近則痛不可忍又有五色丹雖赤  
色者最多皆燉熱作痛甚者遍身壯熱煩渴悶  
亂更有諸火丹其名証甚多不可尽述皆赤丹  
之異名也其毒入腹者亦能殺人宜速治之  
治赤丹此熱毒所作其色純赤如丹塗之故名  
赤丹

右以蕎麥麵醋和傳之一方用蕎麥麪用鳩  
腦和餅索串吊起放乾要用時研末雞子

以雞翎翎掃上効如神

又方

以胡荽汁傳之又以寒水石半兩白

土一分研細末米醋調傳以藍淀或慎火草  
水蒼生地黃梔子仁但得一味為末水調傳  
之皆可

治白丹虛腫如吹此風熱所作而風多者其色  
則白 香菱二合炒令黃 伏龍肝一兩

右同為細末每用半錢生油調塗之

治黑丹痛腫此本熱毒復有冷以乘之互相痰  
抑故黑色 川升麻 川芎 漏芦去苦各二兩



黃芩

梔子仁各二兩

右為粗末每用兩匙水三盞煎至二盞去滓  
消熱以軟帛蘸塌患處以消為度

此丹五色變易不常此風毒冷熱相搏成瘰癧  
同故色無定也

棗木根留

丹參

菊花揀淨二兩

右細剉并勻每用酒匙水二椀煎數沸適溫  
蒸避風處浴洗

又方治如前

右以蜜和乾姜傅之

治急卅引上

右以雞子白和赤小豆傅之

治赤丹

以葛勒藤蔓輕之摩破醋研訶梨勒汁塗之

效以泔鉄水飲一合得打鉄處泔鉄槽中水

澄清用

治黑丹此木熱毒搏於血氣熱輕而挾於風多

故色黑也

以風化石灰二兩屋四角茅草三兩燒灰同

研細末雞子白調塗日三五次効以猪槽下



泥塗之

治白丹此本熱毒搏於血氣熱輕而挾於風多  
反色白也

以猪糞燒灰研末雞子白調塗

治殃火丹生於兩脇腋及膀上

以川朴硝研細竹瀝調下半錢更量大小加減

治天竈火丹發於筋裏尻間正赤流陰頭腫或

出

以蚕沙一升水煮去滓取汁洗之

治竈火丹發狀亦色

以赤小豆末一兩牛角二兩燒灰同研勻細

雞子白和塗

治尿竈火丹發膝股起臍間走腹頭

以屋四角茅草燒灰研細雞子白和傳

治火爛丹發兩臂及背膝如火灸

以老雅眼睛草葉和醋研爛傳之亦治赤腫

治五色丹遍身壯熱如焚燒若透臍即換人

以薊葉柈爛水和傳之

治丹毒從臍中起

以伏龍肝研末用屋漏水和傳之乾即專用



取効為度如無屋漏水新汲水亦得

治丹腫起於兩脇心背不速治即殺人

以殺羊角屑八兩水五升煎至一升絹濾去

滓入煉了猪脂五兩和勻傳之

治丹毒忽生頭上皮赤腫起暈有碎瘡初發如

錢漸開及身長一尺良久遍体入口耳到唇

府胃爛即死此候可畏宜速治之

以甘草一兩擘破入水一大盞煎湯溫

乳母滿口呷含鼓漱徐吐洗病處以手掌

摩措不得犯指甲恐傷破仍更甘草湯服之

三用即差

治丹毒

以鯽魚肉細切五合小豆屑三合同杵如泥

水和傳上

千金漏蘆湯治小兒熱毒赤白諸丹癰疽瘡癤

漏蘆

連翹

白欵

芒硝

甘草各五分

大黃

升麻

枳實 麩炒

麻黃去根節黃芩各三分

右咬咀以水一升半煎取五分量兒大小增

減服



治一切諸丹

以馬齒莧杵爛傳之治赤丹熱如火透腰即損  
以黃芩末水調傳之以葶麻子五箇去殼并  
皮研細入麵一匙水調傳之以水煮棘根洗  
之以栗子刺殼煎湯洗之以柳葉一斤水一  
斗煮取三升去滓挹洗病處日五六次以地  
胡糞水和傳之以蒴藿葉浮萍草五葉藤海  
藻葉但得一味為末水調傳之  
又方治諸丹已破作瘡出黃水酸痛  
右以豆豉炒焦煙絕為細末油調傳之

千金麻黃湯治諸丹惡毒發處如火輕、手近  
則痛不可忍急與砭針出血仍與此湯并塌湯  
治之

麻黃去根節

升麻

葛根各兩

射干

雞舌香

甘草炙各半兩

石膏半斤

右咬咀以水三升煮取一升三歲兒分三服  
日三

塌湯治諸般數十種丹毒

大黃生

甘草生

當歸

芍藥

白芷

獨活去蘆

黃芩

赤芍藥



升麻

沉香

木香

木蘭皮 各一兩

芒硝 三兩

右咬咀以水一斗二升煮取四升去滓內芒硝覽烱以綿搵塌之乾則易仍適溫熱用取差止

消毒散治諸丹發赤腫作痛甚久赤遊腫背

川升麻

黃芩 各半兩

麥門冬

川大黃

剉碎微炒

川朴硝 各一分

右為粗末每服一錢水一小盞煎至五分去

滓溫服

鱗體論

鱗體者謂皮膚之上如蛇皮鱗甲之狀故又名蛇體此由氣血否澁不能通潤於皮膚矣又生下便有者此兒在母腹形像未具之時母曾觀看或曾食喫或服藥餌有犯鱗甲網罟穢毒之物見胎中感而化之故又謂之胎垢謂生下身皮黑若若鱗者也此必難治

治小兒身上皮膚若蛇皮之鱗

以白殭蚕去絲茸為末煎湯適溫煖浴之一云與蛇蛻同煎



疵靨論

疵靨者謂皮膚之上生赤色或黑色之點大小不等如滓粒之狀緣身猶可若生面上則多惡之女子尤甚此由風邪搏於津液之氣而作又言因傅胡粉皮膚虛而謂粉氣入於腠理也生又有生下便有者此由兒在胎中形像未之時母食雜有毒感氣而化又有父母遺体所主者此下二項不可治也治小兒皮膚上生赤疵以馬尿洗之日四五次

又方治小兒生赤黑疵

以針刺父唾中血滴疵上即消

又以狗熟尿傅之疵自卷落

小兒衛生總微論方卷第二十



Large stylized watermark or seal impression, possibly reading '三才' (Sancai) or similar characters.

Small square seal impression in seal script, likely reading '三才' (Sancai).

Small square seal impression in seal script, likely reading '三才' (Sancai).

Faint vertical text columns within a rectangular border, likely bleed-through from the reverse side of the page.



