

醫方便覽序

自古起疾培元引延壽脉必假諸
醫信醫能續命其道非下九流者
故岐黃佗扁之術至今賴之然世
未有盡其術者非其術之不傳業
術者之未精耳余斗城殷次臺氏
少業儒有天下之志時無知遇乃



移其志於醫博覽本草素難脉經
諸書鑽研醫道三十餘年無暇日
嘗苦方帙各持一家執之漫無要
領一日閱皇甫氏世傳明醫指掌
圖賦慨然若有得焉謂其立論詳
括方盡也間有隱顯繁畧互異者
乃從而折衷之補偏脫冗執簡剔

繁論極根源症察標本其處方分
類一皆增損參酌適宜固不以已
意晦原圖亦不以局方隘吾意力
經三載編成一帙析之不踰乎四
卷夫皇甫圖說視往帙固最簡者
必合父子祖孫三世而後成次臺
托筆非不詳且盡也惟假之以年

編輯較原圖尤便非其天資穎異
學力精到者未易及此且其說令
人易曉方尤鑿鑿有經驗縱僻土
細人按方投劑無弗當病者則是
編也可謂博而能約誠醫之指南
矣次臺學其知要哉古人遺術今
也無患無傳矣編成次其意不私

已特持以示余余喜其惓惓有濟
人之心更竒其方尤簡便可濟人
也遂梓而播之用成其志使業醫
者果因病檢方因方以藥天下之
病則凡天下之抱病待斃者未必
不因藥而起也古所謂六不治者
何有哉吾切于有志濟人者望貴

萬曆壬午季春之吉

中憲大夫陝西臨洮府知府前戶部
福建清吏司郎中蜀棠梅原夏鏗

書



醫方便覽序

萬曆己卯余自鞏之清水令叨轉臨洮府倅

越歲值戎

梅原翁奉

命來守是邦甫下車即振舉百廢聿新庶務民
間利病疾苦罔不洞察而撫育之僅數月政
平訟理風清弊絕愛洽僚屬惠溥黎元頌聲
在西北者籍甚仍於政務之暇出醫方便覽

一帙壽諸梓以廣四方屬余叙諸簡端余惟
醫道其來遠矣昉於黃帝內經盛於扁鵲倉
公杏林橘井揚其波東垣丹溪衍其流其書
有八十一難其傳凡一百七十有九家誠未
易更僕數也顧方以世遠業以人殊篇什之
盡藥方之屬字跡豕與魚者可勝言哉夫醫
以寄生死也十全為上一味弗臧百躰罔寧
仁人君子不惻然乎今我翁集次臺殷公所
已成補其所未備繁浩者刪残缺者全舛訛
者正音臣佐使寒熱溫涼胥有所稽而不謬
由是危者安病者瘳疲瘳殘疾賴以全活者
衆而翁之仁心仁政可寄以不窮矣何也醫
者意也仁術也與政通也故藥有以和平為
貴者翁之德教綏良者實似之藥有以攻伐
為尚者翁之刑威懲奸者實似之藥有以加
減為善者翁之時寬時嚴而參和不偏者又

是焉稱心因政而益彰政因書而愈廣此方
在一世則一世之天下被其澤此方在萬世
則萬世之天下被其澤博施濟衆之至念不
與之相為悠久也哉噫後之君子覽斯集也
其有以識翁之心云

萬曆壬午季夏之吉

承直郎臨洮府通判懷來文中質書

醫方便覽引

醫書浩瀚學者不便觀覽每思先儒謂學者必務知要知要
則能守約守約則足以盡博此非獨入道者為然雖醫學無
不以此為向方者如丹溪纂要約矣而未足以盡博也玉機
微義博矣而未能反約也惟蒙齋傷寒指掌有歌有賦有法
有方可謂博且約焉昔人謂教童子當以洒掃應對禮義廣
耻等事作為詩歌今朝夕歌之則其言易入蒙齋非此意乎
夫蒙齋指掌意則善矣然止及傷寒而未及雜病恐于醫治
未廣也余有志數年未逮萬曆丙子得皇甫先生明醫指掌

於燕市中深於余心有獨契焉第其歌有太繁而不便記誦者有太簡而未盡病情者且其論與歌不貫方與法不聯俱未可易曉也乃謬詠百章凡病原治法即註逐句之下合用諸方即載本病之後仍以運氣經絡病機醫旨列之首卷俾學者熟而誦之因病以求法因法以用方庶乎守約盡博而醫要亦幾矣書成因名之曰醫方便覽將以俟有道之質正云

萬曆壬午季春蜀遂寧殷之屏書

醫方便覽目錄

首卷

運氣要畧歌四首

經絡要畧歌六首

醫旨

運氣論

君臣佐使論

病機賦

一卷

真中風一

破傷風三

痿症五

麻木七

瘧症九

中寒痼冷十一

傷寒十三

暑症十五

燥症十七

發熱十九

類中風二

痛風四

厥症六

痺症八

傷風十

惡寒十二

發斑丹疹十四粉刺汗斑體氣

濕症十六

火熱十八

諸氣二十

血症二十一
齁喘二十三

痰症二十二

二卷

咳嗽二十四

勞瘵二十五

虛損二十六

汗症二十七

內傷二十八

脾胃二十九

瘡疾三十

泄瀉三十一

痢疾三十二

驚症三十三

痞滿三十四

積聚癥瘕三十五

水腫三十六

鼓脹三十七

黃疸三十八

嘔噦翻胃三十九

霍亂關格四十

惡心四十一

嘈雜四十二

飢逆噯氣四十三

酸症四十四

三卷

虫症四十五

噎隔梅核氣四十六

三消四十七

瘡任四十八

崇症四十九

怔忡驚悸健忘無睡嗜卧五十

癩症五十一

頭痛五十二

頭風五十三

眩暈五十四

面部五十五 附鬚髮

目病五十六

耳病五十七

鼻病五十八

口齒五十九

咽喉六十 附失音

胸脇痛六十一

心痛六十二

腰痛六十三

腰痛六十四

疝氣六十五

脚氣六十六

便濁遺精六十七

淋閉不禁六十八

秘結六十九

脫肛七十

四卷

外科

痔漏七十一

腸風臟毒七十二

瘡癬七十三

癰疽七十四

發背七十五

乳癰七十六

附骨疽醫癰七十七

疔毒七十八

癰癭結核七十九

療癰馬刀八十附神應比天膏

婦人門

經候八十一

崩漏八十二

帶下八十三

中子八十四

胎前八十五

臨產八十六

產後八十七

老人八十八

小兒科

初生護養八十九

變蒸九十

脈候形色九十一

急慢驚風天鈞內鈞二症五痢夜啼客忤九十二

諸疳九十三

怪病九十四

吐瀉九十五

腫脹腹痛哮喘瘧痢九十六

風寒咳嗽癰疹九十七

痘瘡順症九十八

痘瘡險症九十九

痘瘡逆症一百 醫方自錄終

醫方便覽首卷

蜀遂寧殷之屏集

崇城夏暹校正

運氣要畧

五運歌

甲巳化土乙庚金丙辛水運木丁壬須知戊癸南方火太過陽年

不及陰如甲巳化土甲子年干支皆陽乃歲土太過巳丑年支干皆陰乃歲土不及乙庚化金庚寅年金運太過

逐年五運歌 每運主七十二日

大寒木運始行初清明前三日火運居芒種後三日土運起立秋

後六金運推立冬九日太陽水周而復始萬年如

逐年六氣歌 每氣主六十日

大寒厥陰氣之初春分君火二之隅小滿少陽分三氣太陰大暑
四相呼秋分陽明五氣位太陽小雪六之餘

六氣司天在泉天符歲會同天符太乙天符歌

子午少陰君火天陽明燥金應在泉丑未太陰濕土上太陽寒水

伏泉間寅申少陽相火旺厥陰風水地中聯卯酉却與子午倒辰

戌巳亥亦皆然運合司天是天符如戊子戊午年戊辰化運合年

支為歲會如甲巳化土而遇運合在泉同天符如庚子庚午年乙

在泉歲會天符稱太乙如乙酉年乙庚化金而會酉歲上見燥金司

運氣論 出管見

運氣之說起于素問本為四時之變而設蓋以春為木夏為火夏

秋之交為土秋為金冬為水以此察天地之氣候辨人物之病證

以為治療之主耳素問六節藏象論謂五運相襲而皆治之終期

之日周而復始又謂春勝長夏長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝春

且以一期三百六十日分為六氣每氣主六十日則其意可見矣

紀以天干則曰五運紀以地支則曰六氣其實一也傳久致訛至

天元紀大論等篇則遂以年歲之干支分管六氣蓋已失先聖之

昔矣蓋年歲之干支天下皆全且通四時不變也天氣之溫暑寒涼民病之虛實衰壯東西南北之殊方春夏秋冬之異候豈有皆全之理此其妄誕蓋不待深論而可知也近世傷寒鈐法則以得病日之支干為主其源亦出于此決不可用蓋金木水火土之氣各主一時當時則為主氣為司天非其時而有其氣則為客氣其氣與時止相反者則為在泉如木氣司天則相火在泉火氣司天則燥金在泉濕土司天則寒水在泉謂其氣伏于黃泉之下而不見也治療之法用熱遠熱用寒遠寒蓋所謂必先歲氣勿伐天和者也春時木氣司天則四方皆溫夏時火氣司天則四方皆熱夏秋之交土氣

司天則四方皆濕秋則皆涼冬則皆寒民病往往因之此則理之易見者也其有氣與時相反者如春應溫而反寒夏應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反溫則所謂客氣者也故治療之法亦有假者反之之說如夏用熱藥以治客寒冬用涼藥以治客溫觀此則運氣之說斯過半矣

經絡要畧

手之三陽從手走頭足之三陽從頭走足六陽皆會于首陽自高而接下也足之三陰從足走腹手之三陰從腹走手六陰不至於首惟厥陰會于顛頂陰自下而趨上也手足太陽厥陰四經多血少氣太陰少陰少陽六經少血多氣惟有陽明多血多氣

醫方
手太陰肺手陽明大腸表裏經絡歌

太陰肺脉始中焦下絡大腸上出腋天府尺澤過大淵更出少商
與魚際

大腸之脉起商陽上連合谷曲池旁從肩入缺內絡肺頸頰齒鼻
注迎香

手少陰心手太陽小腸表裏經絡歌

少陰心絡小腸通支從肺系走咽瞳直者上肺出腋下肘內少海
抵少衝

小腸之脉起少澤陽谷過肩下入缺絡心抵胃上頰車耳鼻皆頰

交絡徹

手厥陰心主手少陽三焦表裏經絡歌

厥陰心主起胸中循膏出脇腋膈通太陰少陰兩經間直從曲澤
透中衝

三焦之脉關衝起逐臂循肩入缺盆膻中分散絡心膈上項循頤
耳角旋

足太陰脾足陽明胃表裏經絡歌

太陰脾脉始隱白核骨期門入腹中絡胃俠咽連舌本支絡從胃
注心宮

胃脉起鼻交頰中下循唇齒頰喉嚨絡脾入胃氣衝膝三里衝陽
次指終

足少陰腎足太陽膀胱表裏經絡歌

腎經湧泉水泉過陰谷入絡膀胱貫脊行直貫肺肝循舌本一支

從胃絡於心

膀胱以皆頰交巔絡腦下項更循肩俠脊抵腰仍絡腎鬻委
委中

崙小指尖

足厥陰肝足少陽膽表裏經絡歌

厥陰肝脉大敦行內照陰股入環陰絡膽入肝貫脇肋循喉入項

會巔層

少陽膽脉銳眇先循角在耳下胃前絡肝循脇氣衝出環跳外輔

竅陰端

十二經絡穴道有不知者當於針灸手足圖上考之

君臣佐使論

醫家之術謂上藥為君主養命中藥為臣主養性下藥為佐使主

治病大抵養命之藥宜多君養性之藥宜多臣治病之藥則宜多

佐使此固用藥之經然其妙則未盡也大抵藥之治病各有所主

主治者君也輔治者臣也與君相反而相助者佐也引經及引治

病之藥至于病所者使也如治寒病用熱藥君也凡溫熱之藥皆

輔君者也臣也然或熱藥之過甚而有害也須少用寒涼藥以監制之使熱藥不至為害此則所謂佐也至於五臟六腑及病之所

醫旨

在各須有引導之藥與病相遇此則所謂使也餘病准此用藥之權也二義素問俱有而讀者不察故特發明之以俟夫智者採云
竊謂醫維小道迺寄死生最要變通不宜固執明藥脉病治之理藥性脉訣
病機治法 悉望聞問切之情 望色聞聲 問故切脉 藥推寒熱温凉平和之氣與夫辛甘淡苦酸鹹之味升降浮沉之性宣通瀉補之能脉究浮沉遲數滑濇之形與夫表裏寒熱實虛之應阿阿嫩挪之和弦鈞

毛石之頌藥用君臣佐使

主病之謂君最多輔君之謂臣 火之應臣之謂佐使又其次之脉分老

幼瘦肥

老人脉濡小兒脉數 瘦者脉大肥者脉細

藥乃天地之精藥宜切病

藥不泛用 則切病矣

脉者氣血之表脉貴有神

脉中有力 謂有神也

病有外感內傷風寒暑濕燥

火之機治用宣通瀉補滑濇温燥重輕之劑外感異乎內傷

外感乃有

餘之證內傷 乃不足之證

寒證不同熱證

傷寒直中之邪為寒 傷寒傳經之邪為熱

外感宜瀉而內

傷宜補寒證可温而熱證可清補瀉得宜須臾病愈清温失度頃

刻人亡外感風寒宜分經而解散

外感風寒傳變不一 宜分經絡解散方可

內傷飲食

可調胃以消滯

內傷飲食只在一處 不過調胃消滯而已

胃陽主氣司納受陽常有餘

脾陰主血司運化陰常不足胃迺六府之本

能納受水穀 方可化氣液 脾為五

臟之源能運化氣液胃氣弱則百病生脾陰足而萬邪息調理脾胃

乃醫中之王道節戒飲食迺却病之良方病多寒冷鬱氣氣鬱發

熱寒謂風寒外感晝夜發熱或出七情動火火動生痰有因行裁

動靜以傷暑邪或是出入雨水而中濕氣亦有飲食失調而生濕

熱倘或房勞過度以動相火已上六條制伏相火要滋養其真陰

已下六條祛除濕熱須燥補其脾胃外濕宜表散內濕宜淡滲陽

暑可清熱陰暑可散寒尋火尋痰分多分少而治究表究裏或汗

或下而施是風寒則汗之謂溫散痰因火動治火為先火因氣生

理氣為本火之輕者可降重則從其性而升消氣之微者宜調甚

則究其源而發散實火可瀉或瀉表而或瀉裏指外感也虛火宜補或

補陰而或補陽指內傷也暴病之謂火怪病之謂痰寒熱濕燥風五痰

有異溫清燥潤散五治不同寒痰溫之熱痰清之濕痰有因火而

生痰有因痰而生火或鬱久而成病或病久而成鬱金木水火土

五鬱當分泄折達發奪五法宜審金鬱泄之水鬱折之木鬱鬱則

生火生痰而成病病則耗氣耗血以致虛病有微甚治有逆從微則

逆治以寒藥治熱甚則從攻以寒藥治熱佐以熱藥病有本標急

則治標緩則治本法分攻補虛而用補實而用攻少壯新邪專攻

是則老衰久病兼補為規久病兼補虛而兼解鬱陳廢或蕩滌而

或消溶積在胃腸可下而愈塊居經絡宜消而痊女人氣滯於血

宜開血而行氣男子陽多乎陰可補陰以配陽從蓉山藥男子之

佳珍補陰故也香附縮砂女人之至寶行氣故也氣病血病二者宜分陽虛

陰虛兩般勿紊陽虛氣病晝重而夜輕自子至巳為晝血病陰虛晝輕而

夜重自午至亥為夜陽虛生寒寒生濕濕生熱陽為氣為真火陰虛火生燥燥

生風陰為血為真水陽盛陰虛則生火火通血而錯經妄行陰盛陽虛則

生寒寒滯氣而周身浮腫陽虛畏外寒陽氣虛不能衛外故畏外寒陰虛生內

熱陰氣虛不能配陽故生內熱補陽補氣用甘溫之品滋陰滋血以苦寒之流

調氣貴用辛涼氣屬陽無形者也氣鬱則發和血必須辛熱陰虛

形者也血積則作痛故宜用辛熱之藥以開之陽氣為陰血之引導陰血遇陽氣之依歸

陽虛補陽而陰虛滋陰氣病調氣而血病和血陰陽兩虛惟補其

陽陽生而陰長氣血俱病只調其氣氣行而血隨藏冰發米以節

陽氣之燔滋水養水以制心火之亢火降水升斯人無病陰平陽

秘我體長春小兒純陽而無陰老者多氣而少血肥人氣虛有痰

宜豁痰而補氣瘦者血虛有火可瀉火以滋陰膏果無厭發癰疽

熱燥所使淡薄不堪生腫脹寒濕而然北地聳高宜清熱而潤燥

南方洿下可散濕以溫寒

病機賦

仁和皇甫雲洲撰註

病機玄蘊脉理幽深雖聖經之備載匪師授而罔明病之樞機脉

問脉經之備載若非口傳處百病而火死生須探陰陽脉候陰陽

之理所以處百訂七方而施藥石當推苦樂志形七方者大小緩

病而火死生也所以因病而訂人有形志俱樂者有形志俱苦者有形樂志

所客標本莫逃乎六氣客者外邪之所客也病初受曰標病原根

六氣而或病之所起樞機不越乎三因外因風寒暑濕內因七情飲食

也一辨色二辨音迺鑿家聖神妙用謂之聖察五色辨五音能知

病之所主者三折肱九折臂原病者感受與情左傳定公十三年

非聖神而何知為良醫楚詞云九折臂而成醫分吾能窮浮沉遲數滑濇大緩

八脉之奧便知表裏虛實寒熱邪正八要之名表者病不在內也

虛者五虛是也實者五實是也寒者臟腑之冷也熱者臟腑積熱

也邪者非臟腑正病也正者非外邪所中也若能精究八脉之理

則八要自八脉為諸脉綱領八要是衆病權衡濇為血少精傷責

責然往來濇滯如刀刮竹之狀滑為痰多氣盛替替然應指圓滑

似珠流動之形失血之候也滑脉之狀如珠圓滑替替然往來流

利此氣盛痰多之候也二脉遲寒數熱紀至數多少平人脉以四

日遲一息三至也太過曰數一息六至也經云浮表沉裏在舉按

重輕輕手舉之于皮膚上得重按乃無如水浮泛者曰浮重手按

其素至筋骨而得者曰沉經云浮為在表沉為在裏二脉所以別

裏也緩則正復和若春風柳舞大則病進勢如秋水潮生緩者胃

來和緩而不急疾脉訣云阿阿緩若春揚柳緩則胃氣復故邪退而正復也大者脉來洪大經云脉來渾渾革革如湧泉者病進而危故如秋潮之洶湧者狀其大也仲景所謂大則病進而緩則病退六脉同等者喜其勿藥診得六脉大小浮沉遲數同等者不治自愈正猶易之無妄之疾勿藥有喜六脉偏盛者憂其採薪脉經云沉滑濡遲數偏盛者名曰殘賊脉能為諸經作病故將有採薪之憂表宜汗解裏即下平邪在表者者下之此表實救表則桂枝著芍救裏則姜附參苓桂枝若著芍裏實之治也救裏則桂枝著芍救裏則姜附參苓藥救表之虛也芩桂附子乾姜人病有虛實之殊虛者補而實者瀉實有稟之虛實故虛則補之實則瀉之補瀉之開當以明辨邪有寒熱之異寒者溫而熱者清寒淫以辛溫之熱淫外邪是風寒暑濕燥之所客此六淫之邪從外而入者故曰外邪也所勝以寒清之難經云從前來者為虛邪從後來者為實邪從所勝來者為微邪從所不內邪則虛實賊微正之相乘

勝來者為賊邪本經自病為正邪此五藏互相乘剋之邪故曰內邪正乃胃之真氣良由國之鯁臣人之有胃氣猶國之有鯁直之臣則邪倭不得肆其志而害正勝邪也驅邪如逐寇盜必亟攻而盡戰人身之有邪所侵者猶邦家之有寇盜也不攻養正如待小人在脩已而正心能人若正氣不足則邪乘之故曰正不可不養地土厚薄究有餘不足之稟賦西北地厚則所稟亦厚東南土薄運氣勝復推太過不及之流行五運六氣者主一歲之令故陽年為行勝復鬱發之災變存焉善治者推其歲令災變調之可也故曰必先歲氣毋伐天和脉病既得手心法用藥奚患乎弗靈則處方用藥安有不靈乎

原夫中風當分真偽由外中者真中風不真者現六經形症有中

原夫中風當分真偽由外中者真中風不真者現六經形症有中

臟腑血脉之分頭疼脊強少陽胸滿寒熱陽明身熱目痛而煩少
 陰口渴時厥太陰自利腹疼或便難厥陰囊縮遺溺手足厥冷中
 府者淺中藏者深中經脉者半表裏血脉之分所以分其邪之淺
 深也偽者遵三子發揮有屬濕火氣虛之謂而卒中皆因熱甚故主
 乎火東垣以元氣不足則邪湊之令人卒倒殭付如風狀故主乎
 氣虛丹溪以東南氣濕多濕有病風者非風也由濕生痰痰生熱
 熱生風故主乎濕三子之發中臟命危中臟者多滯九竅有唇緩
 揮皆非外中之風故曰偽也中腑肢廢中腑者多著四肢此
 之症其口開眼合撒手遺尿鼾睡中腑受邪淺故肢廢
 者不治此中臟受深故曰命危非衷邪無定居或偏于
 任經絡則口眼喎斜中血脉則半身不遂邪中經絡血脉者非表
 左或偏于右無內外症故口眼殭仆卒倒必用補湯卒倒者氣虛
 喎斜半身不遂而有汗下之戒殭仆卒倒必用補湯也參芪補之
 痰氣壅塞行吐劑痰氣壅塞胸手足痲痺口搐痲者筋緩痲也手足
 臆吐而解之

揚跳而抽掣背項反張曰痲背項強直角弓反張痲症也無汗曰
 痲痲之候也背項反張曰痲剛痲汗多曰柔痲先因中風復感寒

濕所致或為風痲偏枯或變風痲風懿風痲者于身無痛四肢不收
 也偏若者半身不遂也風痲

者痲痺不仁也風懿者奄忽痲痲痲痲易四肢緩而不仁左不遂曰
 不知人也四者皆風之變也痲痲痲痲易四肢緩而不仁左不遂曰

曰痲痲者膠弱不任身骨弱不能起丹溪云肺熱葉焦五藏因而
 受之發為痲痲易者變易也三者膏梁之疾皆屬于土故四肢緩

縱而不仁者似風濕寒并三氣合而為痲風濕寒三氣雜至合而
 風而實非風也風濕寒并三氣合而為痲為痲風氣勝為行痺濕

氣勝為着痺寒雖善行數變之莫測皆木勝風淫之所致風者善
 氣勝為痛痺行數變

不可預測已上諸疾皆肝水風淫之雪霜凜冽總是寒邪雪者寒
 變也左傳云風淫末疾此之謂也雪霜凜冽總是寒邪凝結也

雷者肅殺氣也凜冽寒威也三者皆為寒變酷日炎蒸皆為暑類
 故曰寒邪仲景云冬令嚴寒最成殺厲之氣酷日炎蒸皆為暑類

酷烈也炎火勢也蒸熱氣熏蒸也故在天為日傷寒則脉緊身寒
 在地為暑在人以心應之凡此之類皆為暑也傷寒則脉緊身寒

傷暑則脉虛熱熾仲景云脉盛身寒得之傷暑暑當欬補而清寒可

溫散而去暑傷氣故多汗宜欬汗而補虛如清暑益氣湯是也諸瘧強

直體重肘腫由山澤風雨濕蒸經云諸瘧強直積飲店膈中滿霍亂體重肘腫皆屬濕濕者風雨襲

虛山澤蒸諸泄枯涸乾勁皺揭皆天地肅清燥氣經云諸泄枯涸乾勁皺揭皆屬

于燥燥者陽氣已降陰氣復升天地肅清悽愴風勁氣也濕則害其皮肉燥則涸其腸胃經云

濕氣感則害人皮肉筋骨燥者陽明燥金之化胃與大腸皆屬陽明故因其類而感之腸胃受邪故有枯泄燥結之病西北

風高土燥嘗苦渴閉癰瘍西北高寒多生燥病故渴閉癰瘍之病多東南地卑水濕多

染疽腫泄痢東南地卑多濕故黃疽浮腫泄痢之濕病多其邪有傷有中蓋傷之淺而

中之深凡風寒暑濕之邪有傷有中傷者傷于氣血之分膚腠之間由淺而漸深傳之入裏故緩而淺中者其邪直入于中

故急而深在人**有壯有怯**故壯者行而怯者刺壯者氣充膚密邪不能侵雖中邪氣行而散

弗能為害怯者氣虛空疎邪得而傷之且氣弱不行則病也天人七火君相五志君相二火天

火人馬也故為工者能知直治順性之理而術可通神君火陽水

曰天人七火水寒涼直折治之相火陰火也不可直治當順其性而伏之此治火之妙法識此理之玄其術神矣善鑿者解行反

治求屬之道而病無不治反治者以熱治熱以寒治寒如寒因熱用熱因寒用則其邪易從經云病服冷

而反熱服熱而反寒當求其屬以衰之熱之不已責其無水寒之不除責其無火壯水濟火之法故曰求屬所謂壯水之源以鎮陽

光壯火之主以消陰翳是也虛火實火補瀉各合乎宜丹溪云虛

火可濕熱火熱攻發必異乎劑濕熱甚攻之火熱甚發之各異其劑也既通六氣之

機可垂千古之譽諸此風寒暑濕燥火六氣之病機可垂名于後世也

嘗聞血屬陰不足則生熱斯河間之確論氣屬陽有餘便是火佩

丹溪之格言陰虛則火盛氣旺則生火此二賢發前人所未發也俱有詳論茲不贅及氣盛者為喘急

為脹滿為痞塞兼降火必自已喘急者氣上升也脹滿者氣不舒也痞塞者氣不通也雖乃氣

之有餘是皆火之使然不治氣而降火者治其本也蓋氣是標火是本血虛者為吐衄為煩蒸為勞

瘵匪清熱而難痊吐衄者火載血上行也煩蒸者火氣熏蒸也勞瘵者陰虛火動也雖皆血虛之候火不息則煎

熬真陰而理中湯治脾胃虛冷理中湯補脾胃逐寒邪潤下丸化胸膈痰涎

痰感者由火炎于上水液上騰以救火不能潤下故腎益虛而火益甚丹溪製此藥使火下降則水歸源而下潤故以名之暴

嘔吐逆為寒所致胃有暴寒則吐逆河間云食已暴吐是無火也久嗽咯血是火之愆

咯血者火炎而熱肺金故也平胃散療濕勝濡泄不止濡泄者下多水濕自甚也故用平胃散以去

其益榮湯治怔忡恍惚無眠怔忡心悸動也恍惚陽如人捕也皆榮血不足致心神不寧故無眠益

帶湯枳殼散達生散令孕婦束胎而易產膏孕之人奉養太過則胎肥安逸太過則氣不

運每有難產之患二藥特以削其氣而束其胎故令易產達生散羊也羊生子而無留難毛詩所謂无生如達是也故曰達生散

麻仁丸潤腸丸治老人少血而難便老人血少不得帶潤大腸故多閉結不可峻攻二藥所以

養血開導而便自通定驚悸須索牛黃珠珀鎮墜之劑化蟲積必仗鶴虱雷

丸人有蟲積用此化之通閉以菴朮蒺藜取其滑能養竅戴人用此以開老

滑利消癭以昆布海藻因其鹹能軟堅丹溪取鹹寒之劑消堅結之癭氣斯先賢

之秘妙矧後進之無傳

所謂夏傷於暑秋必作瘧近而暴者即時可瘳遠而痲者三日一

發經云夏暑汗不出者秋成風瘧發于夏至後處暑前者近而暴
也受病淺可截而已發于霜降後者遠而疾也受病深三日一
發名曰瘧瘧瘧老瘧若瘧瘧但用清肌瘧瘧者但熱不寒在陰分
也久而不已成瘧母

勿行截藥老瘧者多發于下午陰分藏病也不可截之宜
人參養胃治寒多熱少而虛柴胡清脾理熱多寒少而涓
邪盛氣虛故寒

瘧人參養胃湯熱多寒少而渴者自汗陽虧盜汗陰弱陽虛則膝
暑瘧也大小柴胡湯及清脾飲自汗陰虛則相火動故盜汗出于嗽而有聲有痰兮脾受濕侵咳
夜寐出寤歛有似于盜故名盜汗

而有聲無痰兮肺由火燥而有聲有痰曰嗽有聲無痰曰咳脾受濕
火鬱其霍亂有寒有暑何局方泥乎辛溫寒暑皆冷霍亂寒者濕
痰故也積聚有虛有實豈世俗偏于峻削王積者五藏之
寒立論不及之積聚有虛有實豈世俗偏于峻削

府之所成世俗不辨虛實一槩也稠破耗當知木鬱可令吐達
之藥攻劑蓋不知紫古有養正隨自除論

達之是吐之金鬱泄而土鬱奪水鬱折而火鬱發泄發即汗利之
令其條連也

稱折奪是攻抑之別金鬱泄之謂利竅煎分導令其溲利也火鬱
使無壅滯也水鬱折倒倉廩去陳莖中州蕩滌良方二法皆所以
之謂抑之制其冲逆

宿垢積滯推開鬼門潔淨府上下分消妙法開鬼門者謂開腠理
隙而致新也潔淨府者謂清水如斯瞑眩反掌生殺尚書云若藥不瞑眩厥疾
道以刊下部之濕

生反輒有一失悔噬臍之莫追因而再逆耻方成之弗約經云一
常耳再逆促命期可不慎之稍有差失悔之勿追矣羅謙甫云粗工
則成人生初學者當

玩方成弗約之論

大抵暴病匪熱久病匪寒蓋寒中人不能藏蓄即時而發若積久則變而為熱故暴病者多寒久病者多
熱臂背生直良由熱積所致心腹卒痛却乃暴寒所干舉斯二症蓋所以明

暴病匪熱久病匪寒五泄五疸因濕熱惟利水為尚
五泄者胃大腸小腸腎大瘕泄也五疸穀

酒濕女勞黃汗是也皆濕熱而成惟利小便三消三衄為燥火若滋

陰自安三消者消渴消中腎消是也三衄者鼻舌莖衄也
嘔吐咳

逆谷歸於胃有聲無物曰嘔聲物皆出口曰咳咳逆
陰癩疔瘰統屬

於肝青黃燥血脂狐蛇驚八瘕也難經云男子為七疔女子為瘕

聚皆足厥陰肝之所主蓋厥陰液歸心而作汗飲之者黃著六一

汗為心液汗多熱內熾而發疹消之者人參化癩陽明少陽火熱者黃著六一湯熱內熾而發疹消之者人參化癩甚者必發空

疹人參身不安分為燥心不寧分為煩煩燥者內外煩熱亦有陰極而反發煩燥者宜審之

忽然寒殭起栗昏冒者名為尸厥卒然殭仆不知人肌膚寒栗者名曰尸厥此由入廟登塚問病

所得卒爾跌仆流涎時醒者號曰顛癇卒然跌仆昏不知人痰涎

者名曰顛癇不醒腹滿吞酸此是胃中留飲留飲者故

蓋緣膈上停痰丹溪云胃中有火膈欲挽回春之力當脩起死之

丹

竊惟陰陽二症療各不同陰症則身寒陽症則身熱內外兩傷治

須審別內傷外傷辨口鼻呼吸之情內傷飲食勞役所致外傷風

之不利鼻息調勻外傷則口中和鼻陰症陽症察尺寸往來之脉

息不利蓋鼻受無形口受有形故也

陰症則寸弱而尺浮來往無力陽症則尺微而寸大來往有力蓋寸陽尺陰故脈應之也 既明內外陰陽便知

虛實冷熱內傷為不足外傷為有餘陽症為熱陰症為寒能究內

也曰濁曰帶有赤有白男子赤白二濁 女子赤白二帶或屬痰而或屬火白干氣

而赤干血本無寒熱之分但有虛實之說濁帶者屬痰與火干于 氣分則白干于血分則

赤世俗多以白為寒非也但有氣虛 痢亦同然痰積濕熱勿行淡

滲堯滋湯丸可用汗下寒溫漏泄痢因痰積濕熱而腸中所滯之 積下故曰帶下有赤有白有赤

白雜下有如豈汁魚腦塵腐屋漏水其色不一皆有形物不可以

淡滲獨利小便亦不可用堯滋之劑及巴硃毒藥下之當用仲景

法表協風寒者汗之身有熱者疎之在裏者承氣下之內寒者姜

附溫之虛者參朮補之在上者涌之小便不通者分導之此為活

法導赤散通小便癰閉癰者罷也閉者急痛不通 也導赤散者分利之聖藥溫白丸解太腸

痛結寒與食積痞結不開腹滿痛而 便結者溫白丸主之量虛實用地骨皮散退勞熱偏宜勞熱 皆骨

蒸煩熱也地 青礞石丸化結痰甚捷結痰非礞石不能開丹溪云 此藥重在風化硝蓋取兵賊

寒軟堅火鬱者必捫其肌鬱熱與尋常發熱不同其熱在於筋骨 及四肢肌膚不覺熱甚或一時火熱如

除以手捫之烙手是也由胃虛 過食冷物抑遏陽氣于內故也 胎死者可驗其舌婦人胎死腹中 若不早行多致

不棟若伏而不動舌黑者胎死 也舌紅者不死以此驗之無疑 玄胡苦練鑿寒疝控引於二丸寒 疝

控引罽丸痛者 當歸龍會瀉濕熱痛攻於兩脇濕熱攻注兩脇作 痛及肝木旺盛者

此藥諳曉陰陽虛實之情便是鑿家玄妙之訣 瀉之 當以諸痛為實諸痺為虛痛者邪來之故實痺者血氣不充故虛 河間以痛痺分大熱微甚亦虛實之意 虛者精氣不足實者邪氣有餘經云邪氣盛則 實精氣奪則虛 泄瀉有腸垢鴛瀉

若滑脫則堯澁為當腸垢者所下粘垢稠穢協熱也驚漉者所下

大凡如竹筒虛甚也故熟者清之腹痛有食積鬱熱倘陰寒則豎

附可施鬱熱者時痛時止食積者食已即痛大便通後痛減是也

足逆冷者急厥心痛客寒犯胃手足和者溫散即已胃脫當心而

以蓋附溫之厥心痛客寒犯胃手足和者溫散即已痛非心痛故

日厥若客寒犯胃手足和溫寒不太甚也草茝薤九真頭疼入連

於腦爪甲黑者危篤難暨真頭疼者旦占結陽則肢腫有準結陰

則便血無疑諸陽不行陰府留結成熱則四肢腫滿陰氣足膝屈

弱口脚氣腫痛者濕多熱盛脚氣由濕熱而成故足脛腰痛不已

腎虛脛閃者氣滯血瘀腎虛腰痛者綿綿痛之不已轉側不能

行氣血瘀者行血即已顛頂苦疼藥尊葉本東垣云顛頂苦疼寒氣鼻淵不

止方選辛夷鼻淵者鼻流臭濁第如彼淵泉內經云膽移熱手麻

有濕痰死血手木緣風濕氣虛丹溪云十指麻是死血濕痰阻滯

與氣虛蓋氣不死于手故也淋瀝似欲通不通氣虛者清心蓮子淋瀝者小便

通而不通故也有砂膏血肉勞五種大抵總屬于熱若氣虛而協熱者清心蓮子飲便血審先糞後糞陰結

者平胃地榆便血者濕熱乘於大腸也先糞者其血來也近後糞

三結三升羅謙甫製平胃地榆湯主之

蓋聞澁便不利謂之關飲食不下謂之格迺陰陽有所偏乘故脉

息因而覆溢紅云陽氣太盛陰氣不得相營也故曰關關則不得

得下食難經云關之前者陽之動也脉當現九分而浮過曰太過
減曰不及遂上魚為溢此陰乘之脉也關以後者陰之動也脉當
現一寸而沉過曰太過減曰不及遂入尺為覆此陽乘之脉也故曰
覆溢是其真臟之脉人不病而死也咳血與嘔血

不同咳血嗽起嘔血逆來咳血者嗽動有血出於肺也嘔血
吞酸各別吞酸刺心吐酸湧出

時津液隨上升之氣鬱積濕熱水停心下曰飲水積脇下曰癖行
遂成酸味吐出酸水如醋是也

水以澤瀉茯苓攻癖以芫花大戟胃寒強飲冷水無熱不能消化
于脇結成痞積久而便痛曰癖飲輕者茯苓控涎丹雖云峻利可

逐伏痰癖非此不除保和丸性味温平能消食積保和丸治身血
則血去無痛有痛者自是赤淋溺血者小便血也去血不痛是也

瀝瀝痛短氣乃氣難布息粗息者却為喘急短氣者氣不續也故
小前湯

祖氣逆出胃脘當心而痛要分客熱客寒胃脘痛客寒嘔水惡寒
多入少也

者心煩燥渴遍身歷節而疼須辨屬風屬濕遍身肢節痛名白虎
時作時止

在下痛通聖散專療諸風通聖散一名雙解越鞠丸能開六鬱六
屬濕散祛風熱之聖藥

氣血食濕痰熱鬱虛弱者目眩頭暈亦本痰火而成目眩頭暈虛
也越鞠丸通治之

火而致丹溪云痰在濕熱者精滑夢遺或為思想而得夢中交感
上火在下多作眩暈

遺不因夢交自泄四精滑皆濕熱相火也珍綠雜病緒繁無據機
珠粉丸若思想而得者其病在心當寧其心

要難明非傷寒經絡有憑形症可識臨病若能三思用藥終無一
失畧舉衆疾之端俾為後學之式

失畧舉衆疾之端俾為後學之式

失畧舉衆疾之端俾為後學之式

失畧舉衆疾之端俾為後學之式

失畧舉衆疾之端俾為後學之式

醫方便覽首卷終

醫方便覽卷之一

二二

蜀遂寧殷之屏詠註

崇城夏暹校正

真中風一

風邪如射乘虛入中腑須當審六經

風者百病之長善行而數變風之中人如射之中的但有

中府中藏中經之異耳然風雖外來未有不乘虛而入表虛則中府裏虛則中藏血虛則中左氣虛則中右或上或下謂之中經府者六府也中府在表多著四肢其治恒易外惡風寒顯六經形症以小續命湯隨經加減之汗或先服藿香正氣散汗後有餘症隨症治之然亦不可過汗恐損其衛氣九竅不通知在臟上宣下利可回生藏者五藏也中藏在

裏多滯九竅其治恒難痰涎壅盛口眼喎斜不能言者皆用宣吐之法稀涎散瓜蒂散一吐不已再吐之吐中即有發散之義蓋風從上受之頭面口鼻之風得吐則散非止出痰而已若妄投硝磺礞石等苦寒墜痰之藥則風邪下陷多致危困內有便溺之阻當用下利之法便阻者三化湯或通聖散潤之然亦不可過下恐損其榮血且致內虛風陷溺澁不通者五苓散利之若自汗則津液外亡不可復利小便當候熱退汗止小便自行吐利後又有餘症治之或用牛黃清心丸

若無表裏尋經絡標本充當知重輕若外無六經形症內無痰涎便溺之阻邪中於天麻防風荆芥薄荷姜蚕全蝎之類隨經使治之引上菴活藁本歲灵仙引下牛膝防已木瓜楨即薄桂橫行手臂肉桂附子直達下焦又當看氣虛補氣血虛補血有痰豁痰有火降火有痰逐痰而佐以祛風引經之藥或先服八味順氣散左離血虛大秦朮湯姜制四物右痰氣虛有痰順氣導痰湯竹瀝二陳湯火盛通聖散胃虛食少禁涼藥中府中藏用三法者急則治其標也中經尋痰

其本也故標本充當知重輕初中昏迷求醒法火防絕症藥無靈

急搐人中穴或針人中不醒用通天散吹鼻得嚏則醒如不嚏者風痺不知痛痺也牙關緊急用生姜烏梅擦牙或酒磨紫金錠嚥之不語者稀涎散六一丹大吐其痰自能語更防手撒口開眼合鼾睡目睛直視搖頭上竄噴藥悶亂吐涎遺尿汗出如珠喉響拽鋸髮直如麻面赤如粧皆危絕之症藥無靈也

通天散 細辛 牙皂 等分細末入射少許小竹管吹鼻中

稀涎散 明礬 牙皂 牙皂 皮 炙 去 子

瓜蒂散 瓜蒂 赤小豆 各七 人參 甘草 錢

六一丹 吐痰涎食積治瘡神效 明信錢 甘草末 錢

右研細末每服四分小兒三分冬溫水夏涼水一碗調下再服水一碗聽吐治瘡前二時服小兒食積痰涎滯于膏中昏迷不醒得此藥一吐即醒中風尤神效

小續命湯 治府中風邪外惡風寒顯六經形症

防已 桂心 黃芩 杏仁 炒 白芍 炙甘草 川芎

麻黃 鱧 人參 路七 防風 附子 炮 姜五片 棗一枚 煎服 太陽無汗 惡風 倍麻黃 防風 杏仁 有汗 惡風

去麻黃 倍桂 杏芍 藥陽明 無汗 身熱 不惡寒 加石膏 知母 去附有汗 身熱 不惡寒 倍苓 桂加葛根 去附少陽 寒熱 往來 去麻黃 加柴

胡太陰 無汗 身涼 倍附子 甘草 加乾姜 如六經 混淆 或肢節 疼痛 加羌活 連翹 精神 恍惚 加茯神 遠志 心煩 多驚 加犀角 嘔逆 腹脹

加半夏 倍人參 燥悶 便秘 去附子 倍芍藥 入竹瀝 藏寒 下痢 去防已 黃芩 倍附子 加白朮 自汗 去麻杏 加白朮 腳膝 弱加牛膝 石斛

身痛 加秦艽 腰痛 加桃仁 杜仲 失音 加杏仁 三化湯 治中風 便秘

厚朴 枳實 大黃 羌活 各二錢 半水煎 溫服 以利為度 防風通聖散 治中風 二便不利 及諸風 熱頭面 諸瘡 口耳 眼熱

防風 當歸 川芎 芍藥 薄荷 山 地 炒 黃芩 路 八 石膏 白朮 各一錢 桔梗 連翹 滑石 芒 荆芥

麻黃 各六片 或葱 一根 有痰 加半夏 破傷風 拜小兒 驚搐 倍荆芥 大黃 煎調 全蝎 羌活 末

各一錢 打撲 傷損 倍當歸 大黃 加川山甲 煎調 乳沒 末各一錢 濁涕 倍薄荷 加黃連 膽移 熱于腦 則辛額 鼻淵 煎調 木香 末一錢 口

耳眼 目之熱 皆去麻黃 本方 去麻黃 芒硝 加金銀花 倍連翹 治一切 瘡疥 加鼠粘 蟬退 治面瘡 加土茯苓 金銀花 治海瘡

八味順氣散 白朮 白茯苓 青皮 陳皮 白芷 烏藥 人參 路一 甘草 狂痰 盛加半夏 錢一 姜三片 水煎服

大秦朮湯 治手足拘攣 語言蹇澀 秦朮 白茯苓 酒芍 當歸 石膏 獨活 路一 熟地 生地

白朮 黃芩 羌活 防風 白芷 路五 川芎 路內 桂 甘草 細辛 路三 姜引食 少去石膏 黃芩 痰加橘半 竹瀝 瘦人 血虛 有火

加苓 連春 加知母 左癱 加酒紅花 桃仁 牛膝 右瘓 加參 芪上 加葳靈 仙下 加木通 防已 或少 加附子 行經 順氣導痰湯 治肢體 疼痛 頑麻 痿弱 口眼 喎斜 痰壅 語澀 烏藥 陳皮 麻黃 路一 錢 有姜 蛋 分 川芎 枳壳 桔梗

白芷 黃芩 南星炮半夏炮各甘草三分乾姜五分有生姜三片煎服風急煎調全喝末三分左右上下依前方加引經藥

芥連導痰湯 治痰火上攻胸膈不利語言蹇澁 南星 半夏 陳皮錢二 只實 黃芩 黃連錢一 白茯苓錢一

姜製四物湯 治血虛中風四物俱姜汁炒有痰加橘半竹瀝姜汁瘦人陰虛火熱加芥連黃柏牛膝筋枯舉動便痛亦加之

竹瀝二陳湯 治半身不遂氣虛挾痰在右者 二陳加參木竹瀝姜汁能食者用荆瀝生薑引

許徽宗治王太后病風不能言用黃芪防風煎湯數斛牀下熏之 牛黃清心丸治諸風癱瘓語言蹇澁涎壅恍惚怔忡驚悸顛狂

牛黃一錢龍腦 射香另羚羊角兩各一當歸 防風 黃芩 白朮 麥冬 白芍 各兩 柴胡 桔梗 白茯苓 杏仁研

芍藥 二兩 肉桂 大豆黃卷 阿膠 各一兩 蒲黃 人參 神曲 半兩 雄黃 錢五 甘草 錢五 白朮 乾姜 錢半 犀角末 兩 乾山藥 兩 金箔 除四百為劫大棗 一百枚 去核 膏

右除金箔牛黃片腦射香雄黃各研入餘末煉蜜棗膏杏仁為丸 每兩十九金箔為末每一丸溫水化下外用黃蜡固濟不泄 婦人產後中風口禁筋攣用荊芥末每三錢童便酒調服亦治血暈 八珍湯加疎風藥治之為當

類中風二

卒倒分明是氣虛暑風胎氣火痰迷 卒然跌仆昏迷氣虛者六君子湯加天麻黃芪氣血俱虛八珍

湯加姜汁竹瀝然正氣既虛則因痰因火暑風胎氣皆令人卒倒 用通天散吹醒或用塩湯催吐醒後痰用半夏天麻湯火用通聖

散中氣烏藥順氣散蘇合丸暑風清 筋攣口禁兼風熱通聖不語 暑胎運安胎食悶則吐食和胃自安

痰涎吐最宜 六一稀涎 死血濕痰分左右四肢不舉屬於脾左邊死 血并無

血四物湯加苑仁紅花羌活杜濕痰能中右邊肢導痰湯 更兼接 疎風化痰丸脾主四肢痿弱不舉四物湯加芥冬二木

厥拜麻痺 各有條款 治法在後 休作風邪真中醫

烏藥順氣散 烏藥 陳皮 歸一 麻黃 有汗 疆蚕 紗 去 川芎

枳壳 炒 炙 甘草 桔梗 白芷 絡 七 乾姜 伍 姜 棗 煎 服

蘇合香丸 順氣化痰祛邪辟瘴止痢定驚開闕破結

沉香 射香 研 柯子 肉 煨 丁香 香附 一 華 擦 白朮 青木香

安息香 煎 末 酒 白檀香 朱砂 飛 犀角 略 一 薰 陸 香 研 龍 腦 研

蘇合油 研 五 錢 右 細 末 煉 蜜 并 息 香 膏 和 丸 如 梧 子 大 酒 下 四 丸

疎風化痰丸 貝母 瓜仁 南星 荆芥 防風 羌活 黃柏

黃芩 黃連 天花粉 薄荷 甘草 葳靈仙 白朮 陳皮

半夏 各 等 分 為 末 煉 蜜 入 姜 汁 竹 瀝 和 丸 彈 子 大 白 湯 調 下

秘方白丸子 治風痰驚風 大半夏 南星 俱 炮 白附 川烏 炮

天麻 煨 全 蝎 各 五 錢 木香 枳壳 炒 各 一 兩 姜 汁 糊 丸 梧 子 大 二 三 十

九 臨 臥 茶 清 下 小 兒 丸 細 服

破傷風三

金刀刺棒傷皮肉瘡口虛寒邪易入 人身清淨則勝運開能避大風

或熱湯淋洗艾火灸灸其湯火之毒皆能為害 或得傷寒發執同

或如瘞狀多驚搐 發熱如傷寒在表則汗之羌活防風湯敗毒散 汗多者白朮防風湯在裏者大小芎黃湯運聖散

下之半表半裏小柴胡湯 和之邪入經絡則口禁目利或如角

弓之狀外用蜈蚣末擦牙關吐痰立甦內用蝎稍七箇為末熱酒調

下或大羗活湯天麻尤仍看氣虛血虛有汗無汗加減治之脉散者

死痛不在傷處者傷經絡也亦死

羌活防風湯 羌活 防風 川芎 藁本 當歸 芍藥 各 錢 一

甘草 地榆 細辛 各 五 大便秘加大黃五分姜葱引熱服

白朮防風湯 白朮 錢 防風 錢 黃芪 錢 水煎溫服如大便秘小便赤

而汗不止者知無寒也速用芎黃湯

小芎黃湯 川芎 錢 黃芩 錢 甘草 伍 水煎不拘時服三服即止

大芎黃湯 川芎 錢 羌活 黃芩 大黃 各 錢 水煎溫服以和為度

玉珍散 治破傷風及刀傷撲損顛大傷 南星 防風等分為末

外敷瘡口內用酒調服二錢口禁角弓打傷欲死者童便調下

大恙活湯 破傷風半表半裏症狀 羌活 菊花 麻黃 川芎

石膏 防風 前胡 黃芩 細辛 甘草 枳殼 茯苓

蔓荊絡 薄荷 白芷 姜三片水煎連進二服

天麻丸 川烏 生草烏 生天麻 煨椎黃 研麩酒糊丸每十九丸溫酒下

痛風四

歷節酸疼白虎風寒凝熱血滯經中 痛風者遍身骨節走痛如虎咬

冷受濕寒凝熱血不得運行所以作痛夜則痛 濕痰死血煎風熱上

甚行於陰也二妙散加踈風行氣引經之藥

下須憑佐使功 肥人是濕痰流注二陳加酒苓羌活南星蒼木竹瀝

白木肢節腫痛者濕甚也加二木羌防風熱痛者清燥枯痛湯

加味二妙散 黃栢蒼木二妙散除濕熱痛痺之聖藥又為二妙丸

蒼木此浸黃栢酒浸當歸 羌活 防風 青皮 陳皮各七

肉桂三甘草二姜引肥人加白木南星竹瀝姜汁瘦人合四物湯

死血加桃仁紅花牛膝熱加苓連上加威靈仙下加牛膝防已或

加附一片行經

清燥枯痛湯 白木 陳皮鹽茯苓 當歸 麥冬 地骨皮

酒苓 柴胡 牛膝各八犀角 羚羊角 海桐皮 五加皮

歲靈仙各六甘草三 水煎食遠服

痿症五

諸痿多緣肺熱生又云痿獨取陽明 痿者骨節痿弱不能動履也痿

地肝熱為筋痿筋急而攣脾熱為肉痿胃渴飢肉不仁腎熱為骨痿

骨枯而髓減腰膝不舉然肺為五臟之華蓋肺熱葉焦五臟因而受

之發為痿雙故諸痿多緣肺熱生陽明五藏六府之海主潤宗筋能

束骨而利關節虛則宗筋馳縱骨痿而不能用俱用加味四物湯

膏梁嗜慾因成病補瀉須將南北分

肺金主氣而畏火脾主四肢而畏木味過膏梁者慾無節則水

失所養火寡于畏肺得火邪而熱焉金失所養則木寡于畏脾受木邪而傷焉肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能為用而諸痿作矣補北方則心火降而肺金不虛何肺熱之有瀉南方則肺金清而木不實何傷脾之有故陽明實則宗筋潤能束骨而關節利蓋陽明者脾肺之府水火平而陽明實也治痿之法無出於此而局方醫用治風之藥何其謬哉

防碍不通行

上文治痿之本若有所挾而防碍機關不得升降者用二妙散

本連食積加山查曲蘗痰加二陳氣虛加四君血虛加四物兼而治之加朱四物湯

白芍 川芎 芍 五味 人參 黃連 知母 枳 半膠 絡 或煎或丸俱可血虛者四物加黃柏蒼朮煎下補陰丸

厥症六

厥形有六要消詳痰氣尸蚘陰共陽

厥者逆也手足逆冷而昏曠也用通天散吹醒後隨六厥用藥

順氣安虫虛用補稀涎姜附與硝黃

氣虛卒厥六君子湯氣血俱虛八珍或大補湯俱加附行經

中湯 加川椒 五 即 黃柏 錢 石 烏梅 丸 尸厥者容忤飛尸鬼

擊或八虛發塚得之妄言錯語吹醒用追菟湯痰厥者痰迷心胃隧通塞塞口中流涎稀涎散 導痰湯 加姜汁竹瀝瘦人雖無痰而

有火亦加竹瀝竹瀝能養血而降火寒痰姜附湯 陰厥脉沉而細便利不渴四逆理中湯 炙關元 吐陽厥脉數而大便秘氣氣湯

六厥之外更有酒厥頭旋不知人姜汁灌醒以解醒湯 治之婦人血厥忽如死人因汗出過多血氣并于陽分上而不下血溢不行

陰陽後通遺時方醒先用倉公散次用白薇湯

三因追魂湯治尸厥氣絕口禁麻黃 桂 杏仁 去 炙甘草 錢 下

白薇湯 白薇 當歸 錢 人參 錢 甘草 錢 作二服水煎

倉公散 瓜蒂 藜蘆 枯礬 雄黃等分細末吹鼻嚏則醒

麻木七

氣虛經絡不周營唧唧麻如解縛繩麻屬氣虛經終不能周流痛痒

不知原是木濕痰死血胃中停木屬濕痰死血不知痛痒十指麻木

紅花加若然氣血俱虛者麻木相兼寤即輕或因風濕因痰火治法

無過補瀉行氣血虛而麻木並作八珍湯如行滯之藥眼合則麻

麻苧挂枝升麻湯因痰仁陳湯有濕加二木有火加苓連濕熱下流

人參益氣湯治氣虛手指麻木四肢困倦

黃芪錢炙甘草升麻錢五分五味二錢柴胡六分陳皮八分人參

生北草各分錢白芍此水煎熱服導氣湯治兩腿麻木沉重黃芪錢甘草錢青皮錢柴胡歸稍

澤瀉分各五陳皮分八紅花錢少五味子粒三十水煎溫服

沖和補氣湯治合眼則麻木四肢無力醋心頭目昏眩

羌活分七獨活分七川歸分七黃柏分七柴胡分七神曲分七木香分七羌活分七獨活分七川歸分七黃柏分七柴胡分七神曲分七木香分七

升麻分五黃芪錢黃連錢麻黃分二分二貼水煎服

天麻黃芪湯治表有風症口眼牽引手足麻木

川歸分七黃芪錢甘草錢升麻錢黃柏錢葛根錢蒼木錢猪苓錢

澤瀉分七柴胡錢水煎溫服

麻黃桂枝升麻湯治渾身麻木睡覺則減或遍身肢節疼痛

木香錢生薑錢桂枝錢半夏錢陳皮錢草薢錢厚朴錢黑附錢炮

黃柏錢甘草錢升麻錢白朮錢茯苓錢澤瀉錢黃芪錢麻黃錢

人參錢水煎食遠服

三妙丸治濕熱下流兩脚麻木或如火烙

酒柏兩蒼木兩浸川牛膝兩一麵糊丸空心姜塩湯下忌魚翅煎炒

筆物

醫方

痺症八

三氣襲人成痺症風行濕著痛因寒

風氣勝者為行痺脉浮身體不仁遊走不定或氣血凝于手足

三痺湯濕氣勝者為著痺脉沉緩留著不去四肢拘急浮腫茯苓川芎湯腰膝髀腫痛蒼木散當歸拈痛湯寒氣勝者為痛痺身體煩疼項背拘急手足冷痛蠲痺湯寒濕腫痛茯苓湯寒氣甚者附子湯

肝感在皮膚還易已深於五藏治應難

以春遇此為筋痺久不已復感于邪內舍于肝其狀夜卧感于邪內舍于肝其狀夜卧

則驚多飲小便數以夏遇此為脉痺久不已復感于邪內舍于心其狀脉不通煩則心鼓上氣盛乾長夏遇此為肌痺不已復感邪內舍于脾四肢怠惰欬嘔以秋遇此為皮痺不已復感于邪內舍于肺煩滿喘息以冬遇此為骨痺不已感邪內舍于腎遺溺腰以代踵脊以當頭在皮膚者淺而易治在筋骨者留連入臟者深而難治須真以其名狀淺深而隨經調治斯免危困豈可槩作風治而用燥劑哉

三痺湯冷風氣血痺

川結以斷

杜仲煨桂心

細辛

人參

防風

茯苓

酒歸

甘草

芍藥

秦艽

生地

川芎

獨活

五酒牛膝

黃芩

一姜棗煎

茯苓湯

治痛痺兼寒濕四肢四肢疼痛浮腫

茯苓

親皮

防風

桂心

麻黃

川芎

芍藥

各一錢

甘草

分三姜棗引去甘草加當為茯苓川芎湯治著痺浮腫

蒼木散

治寒濕熱成痺脚骨熱腰膝臂髀大骨痛及脚氣

蒼木

鹽酒

拍酪

四虎脛骨

二酒

防風

兩細末

溫水調服

當歸拈痛湯

下部濕熱腰引膝髀痛

酒歸

白木

蒼木

酒芩

羌活

防風

澤瀉

猪苓

首陳

乾芍

苦參

酒人參

知母

甘草

炙麻水煎

食前服

蠲痺湯

身體煩疼項背拘急手足冷痺

當歸

芍藥

黃芪

姜黃

羌活

各三錢

甘草

分二服姜棗引

附子湯

治寒甚痛痺

生附

錢白芍

官桂

茯苓

人參

各二錢

白木

分二甘草

分二

貼姜棗引寒甚倍附子

症九

太陽風濕因成痲汗別剛柔虛與實口禁角弓痲症同桂麻續命煎

承氣 風濕二氣襲于太陽之經濕為本而風為標風氣勝者無汗為

剛為實麻黃續命湯輕則麻黃葛根湯濕氣勝者有汗為柔為

虛桂枝續命湯輕則桂枝葛根湯和湯虛甚補中益氣湯八珍湯

在裏者大小承氣湯 外有諸虛之候氣虛不任風寒亦成痲病是

以產後金瘡癰潰之後皆有此症血脫無以養筋也是乃虛為本而

風為標血脫防風當歸散氣脫補中益氣湯 不可作風治

續命湯 剛柔二症項背反張口禁手足攣搯似痲狀

人參 川芎 防風 甘草 桂枝 無附麻黃 附防己 絡五

白朮 白芍 黃芩 附子 姜引

麻黃葛根湯 剛症無汗 麻黃錢葛根錢桂枝錢為藥 甘草錢 姜棗引取汗

桂枝葛根湯 柔症有汗桂枝錢為藥 芍葛根錢 甘草錢 姜棗引

白朮湯 柔症多汗 白朮半錢 葛根錢 升麻 黃芩 七錢

芍藥半錢 炙甘草 桂心 錢 黃芪 錢 分二服水煎

防風當歸散 發汗過多去血過多搦頭口禁反張

防風 當歸 川芎 生地 錢 水煎服

傷風十

頭疼聲重外傷風咳嗽增寒鼻不通 肺主皮毛司腠理元氣稍虛腠

增寒壯熱聲重頭疼咳嗽咽乾鼻塞不通或噴嚏清 理疎世風邪侵之內舍於肺故

涕通用消風百解散無頭疼參蘇飲無咳嗽神木散 更有六經瀆審

治內因風熱外因同 若有六經形症太陽桂枝湯 陽明桂枝湯加

三分太陰桂枝湯倍芍藥加人參一錢少陰桂枝湯加附一大片厥

陰八物湯 若上焦素有痰火肺為火爍又因重衣厚被熱感而生

荆芥 白芷 陳皮 麻黃神根不用 蒼朮 桔梗 枳壳 細辛
 杏仁 人參 北草 姜葱引有痰加半夏有汗加桂枝
 參蘇飲 傷風咳嗽頭疼涕唾調粘
 木香 蘇葉 乾葛 半夏 前胡 人參 茯苓各一 枳壳
 桔梗 陳皮各七 甘草分三 咳甚加桑白杏仁夜咳加麻黃倍甘草
 神木散 傷風頭疼鼻塞聲重
 蒼朮五 藁本 白芷 細辛 羌活 川芎 甘草各一
 右為細末每五錢姜葱煎服或葱茶湯調下二錢

中寒痼冷十一

胃虛膚豁中寒厥逆身涼脉細沉要辨內傷并外感理中發散即

回春 元氣素虛膚腠疎外感天地大寒之氣直中于中手足厥冷

脉脫或遲理中湯 三建湯温脾法胃氣虛弱口食生冷寒涼手足厥冷臍腹絞痛

若人痼冷先滋養休主回陽劑太温 惡心久泄暴下臍腹冷痛

男子流精女子帶下皆痼冷之候當看氣虛養氣四君子血虛滋血

四物湯而以温補佐之不可專主回陽而用太熱之劑以戕其生也

或用十全大補湯 附子理中湯 或八味丸 麻黃附子湯 麻黃去節 細辛 附子炮去皮 水煎温服

五積散 麻黃 白芷 陳皮 厚朴制 桔梗 枳壳 川芎
 茯苓 當歸 蒼朮 肉桂 芍藥 甘草 乾姜 半夏研

姜棗葱引 姜附湯 身強口禁 乾姜炮 附子去皮 天樞炮 水煎凉服

温臍法治陰毒及中寒挽腸沙症脫陽厥逆腹痛
 以繩縛葱白如餅大切去根葉留白切作餅長一寸許先以火炙
 熱一面着臍上以熨斗熨火熨之令熱氣透入更熨三四餅壞則
 易之良久漸醒手足温有汗即服四逆湯

惡寒十二

惡寒表泄及陽虛振慄增寒火有餘惡寒有五表虛腠理開泄者必自汗桂枝湯汗多脈弱者黃

芪建中湯胃氣不和腠理不固調中益氣湯倍加芪桂陽虛不任風寒者四君子加芪桂虛甚加熟附一二片或黃芪建中湯加

附子已上仲景所謂無熱惡寒發於陰也有火甚反煎水化故振慄增寒非真寒也四物加黃芪黃柏黃連火降寒自巳外感脈

浮頭項痛肺虛酒浙更何疑外感風邪者脈必浮頭項痛無汗發熱惡寒羌活散加麻黃有汗惡風桂枝湯四時感冒惡寒神木散有肺受火尅不能固腠理酒浙惡寒若甘桔湯加酒苓山梔麥冬五味棗仁以上發熱惡寒發于陽也

傷寒瘟疫十三

傷寒鬱病為溫熱表裏陰陽須審別冬時嚴寒萬類深藏君子固密不傷於寒觸胃之者乃名傷寒

蓋寒傷榮血不得發泄運行故脈緊無汗頭疼發熱身體疼痛傳變蓋常虛怯之人隨感即發為正傷寒病多在表或專在一經治之恒

易安樂之人多有之勇壯之人皮膚蒼厚觸胃之寒鬱在肌膚筋骨之間至春感溫氣而發謂之溫病三月謂之晚發至夏感熱氣而發

謂之熱病長夏謂之大熱病病多在裏或自表而傳裏治之恒難辛苦之人多有之故溫熱之病必有戰汗而臭穢者所鬱寒毒自筋骨

間發出也若即病傷寒則無戰汗矣即病在表口中尚和若溫熱則初病即口不和矣大法頭疼身熱脊強遍身肢節疼痛或皮膚如被

杖打屬太陽用麻黃湯或羌活散加減治之月痛鼻乾不眠屬陽明升麻葛根湯口渴飲水者白虎湯寒熱往來耳聾脇痛乾嘔口苦屬

少陽小柴胡湯加減治之太陽與陽明合病葛根湯陽明與少陽合病柴胡解肌湯有渴柴胡石膏湯太陽少陽合病柴胡桂枝湯下利

黃芩湯三陽合病表裏有熱白虎湯無表症者俱宜下六柴胡湯併病者始因二陽合病後則一陽氣盛一陽氣衰歸于一經太陽併于

少陽小柴胡湯少陽併于太陽麻黃湯太陽併于陽明大承氣湯陽明併于少陽傳所不勝脈弦者名曰負木尅之也小柴胡湯有只治

太陽一經而愈者有只在三陽經而不傳裏者若裏症燥渴使實而表症未盡罷大柴胡湯微利之表症悉罷傳入於裏有陰有陽難拘

定法腹滿自利胃苓湯^三有表症而利柴苓湯陰寒自利埋苓湯協
 熱而利黃連解毒湯^六寒邪直中於裏厥逆身涼者理中四逆之劑
 濕之陰毒用溫臍法^七痞滿而不痛者枳桔湯鬱熱而痞加三黃湯
 結胸痛不可按者陷胸湯或大承氣湯水結胃小半夏茯苓湯腹痛
 桂枝芍藥湯痛甚者桂枝加大黃湯口渴飲水吐熱譫狂煩滿便秘
 豚沉實者大承氣湯或已下而燥熱譫狂不止者大腸中燥屎未盡
 也調胃承氣湯畜血狂者小便自利苑仁承氣湯婦人傷寒經水適
 行熱入血室燥熱者柴物湯譫狂至燭散舌乾口渴黃連瀉心湯救
 水不飲噤者小腸之熱上干于心也五苓散囊縮有二陰症脈遲者
 附子理中湯脈實熱甚譫狂者大柴胡湯熱病煩渴竹葉石膏湯白
 虎湯汗下後熱不退柴胡解毒湯舌胎乃丹曰邪熱攻心也色黃者
 半黑者皆用涼瀉散大下之純黑者不治發斑者玄參升麻湯化斑
 湯赤斑吐膿血者陽毒升麻湯咽痛甘桔湯陰陽二厥剛柔二庄各
 從本條治之症後昏沉者發汗未盡餘毒藏于心包絡知母麻黃湯
 勞食再復枳壳梔子大黃湯飲酒後發熱者黃連解毒湯此特論其
 大藥而已若夫傳變百端則非仲景之三百九十七法一百一十三

方下大以 兩感尤當究其深四時疫癘什疑說 其兩感于寒者表裏
 盡其變也 獲傳藏府俱病一日

太陽與少陰俱病則頭痛煩滿而渴二日陽明與太陰俱病則腹滿
 身熱不欲食謔言三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不
 入不知人欬汗之則有裏熱欲下之則表惡風寒仲景無治法然虛
 而感之深者必死實而感之淺者猶可治治而不救者有之未有不
 治而獲生者也易老制大羌活湯十救一二然脉有陰陽陽生而陰
 死表裏重輕治有先後助正祛邪補不足而損有餘醫者不可無一
 定之見於胷中也至于四時疫癘乃天地不正之氣如春應溫而反
 清夏應熱而反寒秋應涼而反熱冬應寒而反溫人感其氣雖頭疼
 身熱與傷寒相似切不可作傷寒正治而大汗大下初病在太陽者
 九味羌活湯六經未明者人參敗毒散吐藿香正氣散仍看所中
 陰陽經絡二便有無阻滯脉症虛實加減治之更有頭面腮腫亦係
 時行之病消毒飲加減治之然疫癘之發大則流行天下次則一方
 一境或偏在一家者悉由時令不止如久旱則苗枯久涉則苗黃午
 風則稻耗夜雨則粟批之類今世之人專以為鬼疫傳染但是病家

畏避不往聽信術人
鼓惑延送其惑殊甚
蒙齋指掌井然明陶節全書詳且切
傷寒之書

掌井然有條途症可考陶節卷全書議論重復詳明使
後學易于通曉合二書而能治傷寒者不能無悞也
仲景雖然主

足經手經方法未嘗缺
愚按仲景立論雖祖內經止以足經為主而
其方法未嘗缺手經之藥如黃連瀉心五苓

利小腸承氣利大腸手經之方也舌胎乃丹田邪熱攻心症後昏沉
乃餘毒藏于心胞絡手經之法也蓋在表則十二經皆受其邪在裏

則五臟六腑皆受其病但所傳有次第深淺之殊大抵六日以前多
在足經六日以後多在手經嚴冬傷寒多在足經春夏溫熱多在手

經有只傳足經而愈者故內經止以足經立論若止傳足經則初病
太陽止是頭疼脊強足痛已耳何又渾身發熱周身百節疼痛而不

輕于手之經絡筋骨哉且素問熱論于六經之後亦有三陰三陽五
臟六腑皆受病榮衛不行五藏不通則死之說而手足經皆受病明

矣豈有傳足不傳手之理哉劉草窻謂足經亦主木畏寒手經金火
不畏寒蓋似是而非也

麻黃湯 大陽無汗冬寒時方可服

麻黃 錢三 桂枝 錢六 甘草 錢一 杏仁 箇三

水煎覆被取汗內熱加知母石膏各二錢黃芩一錢
桂枝湯 大陽有汗冬時可用

桂枝 半錢 芍藥 錢三 生姜 錢三 甘草 錢一 棗 二枚 水煎溫服微汗熱加石

膏知母黃芩各一錢去生姜名桂枝芍藥湯加大黃名桂枝大黃

湯合柴胡湯名柴胡桂枝湯
羌活散 代麻黃桂枝湯治太陽頭疼身熱脊強

羌活 蒼朮 各錢半 川芎 枳殼 黃芩 防風 錢一

細辛 五 甘草 分三 姜葱 引無汗惡寒加麻黃一錢杏仁八分熱服取
汗有汗惡風桂枝八分芍藥一錢有渴加石膏二錢知母一錢胸
膈不利加厚朴陳皮麥牙勞役內傷而外感寒邪者補中益氣湯
隨六經加減治之

升麻葛根湯 治陽明日痛鼻乾不眠

升麻 錢三 葛根 錢三 芍藥 錢二 甘草 五 渴加石膏知母頭疼加川芎

小柴胡湯 少陽耳聾脇痛寒熱口苦乾嘔但有寒熱潮作皆用

柴胡 二錢 黃芩 錢半 夏 人參 錢一 甘草 分五

薑棗引小便不利去黃芩加茯苓錢半渴者去半夏加瓜蒌仁一錢石膏二錢惡寒加桂枝五分咳嗽加五味子五分本方合四苓散為柴苓湯合四物為柴物湯合解毒湯為柴胡解毒湯

葛根湯 太陽與陽明合病無汗惡寒身體肌肉俱痛
葛根 錢二 麻黃 錢桂枝 芍藥 錢一 甘草 分五
姜棗引微汗見陽明症多者加升麻倍芍藥嘔加半夏

柴葛解肌湯 陽明與少陽合病
柴胡 錢 葛根 錢二 黃芩 芍藥 錢各一 甘草 分五 人參 分五

黃芩湯 太陽少陽合病下利
黃芩 錢三 芍藥 錢各二 大棗 枚四 嘔半夏生薑

大柴胡湯 三陽合病內熱大便實身熱頭疼不惡風寒者
柴胡 錢二 黃芩 錢半 夏 芍藥 錢各一 大黃 錢半 枳實 錢炒

姜棗煎服未利再服

理中湯 陰症身涼自利不渴 加附子一錢名附子理中湯
人參 甘草 乾姜 白朮 錢各半 水煎溫服

腎氣動去白朮加肉桂二錢四多加生薑三錢利多倍參朮陰旦
加茵陳二錢蛇黃連一錢合五苓散名理苓湯

四逆湯 陰症四肢厥逆脈沉細加茵陳名茵陳四逆湯
生附子 枚 甘草 錢六 乾姜 錢分二 服水煎微汗

枳桔湯 陰症候下成痞 枳殼 桔梗 厚朴 錢二 陳皮 錢一
表未盡解加柴胡湯實熱痞加三黃湯有食加曲蘗

小陷胷湯 陽症下早成結胷痛不可按者
黃連 錢三 半夏 錢六 瓜蒌子 一枚 先煮瓜蒌取水煎藥未和再服

大陷胷湯 大結胷并熱實結胷大痛高起不可按
大黃 錢三 芒硝 錢半 甘遂 錢二分 熬大黃去渣納芒硝再煎調遂末服

小承氣湯 六七日不大便脹滿狂言而喘無表症脈沉實者
大黃 錢六 厚朴 枳實 錢各半 水煎以利為度加當歸名當歸承氣湯

大承氣湯 內實熱甚譫狂者即小承氣加芒硝半兩煎厚朴只實
三五沸次入大黃再煎去渣入硝再煎溫服以利為度加甘草一

錢名三一承氣湯去只實厚朴加甘草二錢名調胃承氣湯去只
朴加菝仁杜心甘草名菝仁承氣湯合四物名玉燭散肛門結澁

不通者用家煎胆汁法充

小半夏茯苓湯 水結胃惡心

半夏四錢茯苓三錢水煎入生姜汁半合再煎溫服

黃連瀉心湯 黃連二錢厚朴一錢人參一錢芍藥一錢乾姜八分甘草五分

生姜引黃連末水調服石瀉心湯 芍藥連大黃各三錢瀉心湯

五苓散 中脘煩渴小便不利飲水即吐

白朮一錢茯苓二錢豬苓一錢澤瀉一錢桂枝一錢姜棗煎服或為末白湯

調下三錢 戒桂名四苓散加茵陳名茵陳五苓散

竹葉石膏湯 熱病煩渴去石膏名竹葉湯

石膏一錢麥冬一錢人參一錢甘草一錢半夏四分竹葉一錢粳米三錢煎服

白虎湯 陽明煩渴 知母六錢石膏二錢甘草二錢粳米半合

水煎溫服加人參二錢名化斑湯

涼膈散 膈熱傷寒餘熱舌胎黃黑 連翹一錢梔子一錢薄荷

淡竹葉 黃芩 桔梗 生甘草各一錢朴硝五分去硝倍桔梗更治六

經熱咽痛 發斑咽痛 升麻 玄參 甘草各半水煎服

陽毒赤斑狂言吐膿血

升麻二錢犀角屑一錢射干一錢黃芩一錢人參一錢甘草一錢水煎服

耳枯湯 咽痛 桔梗一錢甘草一錢水煎徐徐呷之痛甚加薄荷

紅母麻黃湯 瘧後昏沉

知母一錢麻黃一錢去根甘草一錢芍藥一錢黃芩一錢桂枝一錢水煎服

枳壳梔子湯 治勞復食復加大黃曲蘗氣虛柴胡六君子湯

只壳 梔子 厚朴 大黃不用麥牙 水煎服

梔子豆豉湯 吐下後身熱不退心中痛結

梔子四錢豆豉五錢先煎梔子入豉再煎服得吐止後服

金沸草散 傷寒咳嗽頭疼發熱痰喘

旋覆花 前胡各一錢半夏一錢荆芥 赤茯苓一錢細辛 甘草一錢

姜引水煎溫服

大羌活湯 兩感 防風 羌活 獨活 防已 黃芩 黃連

蒼朮 白朮 甘草 炙細辛 知母 川芎 地黃各一錢

水煎溫服未解再服三四劑病愈則止有餘症並依仲景法治之

九味羌活湯 春分後霜降前瘟疫在太陽者

羌活錢二防風 川芎各錢半白芷 黃芩 蒼朮 生地各一錢

細辛分三甘草分三姜葱煎服胃痞加厚朴枳壳渴加石膏知母

此藥治雜病亦有神効中風破傷風加附子行經便秘加大黃

人參敗毒散 四時疫癘在三陽者

羌活 獨活各錢二柴胡 前胡錢一只壳 茯苓錢八人參

川芎 桔梗錢七甘草分五姜三片頭疼葱一根咳嗽加杏仁桑皮

加荆防名荆防敗毒散加連翹名連翹敗毒散發散瘡瘻

藿香正氣散 四時感冒頭疼寒熱嘔吐山嵐瘴氣

大腹皮洗紫蘇葉藿香 白芷 茯苓錢六厚朴錢白木 陳皮

桔梗 甘草錢四炙甘草分二姜棗引椀內傷加香砂瀉加猪苓澤

瀉為藿苓湯

善濟消毒飲 大頭天行頭面腮腫目不能開濕熱在高頂之上藥

連則過其病上熱未除中寒復生必傷人命陽明為邪首大腫加

乾葛升麻少陽為邪出於耳前後倍柴胡桔梗更巔頂加羌活防風

酒苓 酒連各半人參錢三陳皮錢白甘草 連翹 玄參各二錢

升麻 姜蚕各七柴胡 枳梗錢五板藍根 馬勃

鼠黏子妙研各一錢

右細末半用湯調徐徐呷服半川壺丸噲化或加防風薄荷方歸

每五錢水煎噲下大便硬加酒大黃腫盛刺之通聖散噲下亦可

又方治腮腫雷頭風 柴胡 黃芩 防風 連翹 黃連 芍藥

川山甲炮金銀花 酒大黃 升麻頭有疙瘩加蒼朮葛根或用

通聖散俱徐服

加味甘桔湯 四時風寒喉疼腫痛

桔梗錢甘草 荆芥 防風 薄荷 黃芩 鼠黏子各八

水煎噲下頭痛加芫苢石膏胡熱加柴胡胸不利加枳壳陳皮咳

嗽如知貝母五味嘔加半夏生薑聲啞加半夏挂枝

發斑丹疹十四 附米粉刺汗斑體氣

斑無頭粒錦文紅紫黑中分吉與凶

斑有已點如錦文而無頭粒乃陽明之火旋風熱而成紅赤者

胃熱也紫黑者胃爛也紫者半生黑者多死煩渴大熱脈洪數便秘通聖散一便利去硝黃燥渴飲水化斑湯一傷寒汗下失度有陽毒

濕毒之異陽毒發此陽毒梔子
湯濕毒斑爛黑膏熱極黑奴丸
陰症內傷斑各異陰陽虛實莫差攻

陰症發斑出背脊手足稀少隱隱微紅如蚊跡不渴是也調中湯內
傷吐者胃氣極虛無根之火遊行于外宜補以降之大建中湯然陰

症內傷十無一二虛實陰陽當切脈
驗症以察其端的而不可差攻也
火丹疔疹有頭粒出沒無常心

肺熾 丹應於心心火熾盛則熱毒之氣搏于帶血而風熱乘之所以
赤浮肌肉而為之走注也然亦有青黃黑白之異乃風熱微甚

變易之不同耳目胃腹流散四肢者易愈自四肢入腹入腎則殺人
藍葉散犀角消毒飲從肚皮上起者通聖散

肺火熾甚則熱氣搏于皮膚而風寒暑濕之氣襲之發為瘡瘡頭粒
隨出隨沒而又出天時炎暄而燥氣乘之則為赤疹天時寒涼而冷

氣折之則為白疹赤者遇清涼而消白者遇溫煖而滅此用藥之推
度也天麻散消風散火熾甚者消毒飲疹已出而風熱尤甚者通聖

散出不快者生麻葛根湯
疹毒不解者鼠粘子湯
應疹皮膚未出頭脾風火仍濕
者隱

在皮膚不透出也屬脾風濕濕升麻葛根湯加茯苓蒼朮色紅者煎
火化用黃瓜水調伏龍肝服不已再服勞汗當風寒薄為熨破刺長

于皮毛之中俗名米粉刺通聖散去兩倍歸芍治之
陽毒梔子湯 傷寒壯熱百節疼痛發斑

升麻 梔子 黃芩 芍藥 石膏 知母 杏仁 柴胡
甘草 各等分姜五片豆豉百粒煎服

黑膏 溫毒發斑嘔逆 生地 錢七 豆豉 錢一 兩 猪脂 兩
合而露之煎三分減一去查入雄黃射香如豆大攪和分三服

黑奴丸 湯毒熱病發斑煩燥 黃芩 釜底煤 芒硝 出突墨
梁上塵 小麥奴 麻黃 酪一 大黃二 兩 煉蜜九 彈子 大水化下

調中湯 無根失守之火聚于胃中上薰于肺發于皮膚為陰斑
蒼朮 穢陳皮 砂仁 藿香 炒芍 甘草 炙桔梗 半夏

白芷 羌活 枳殼 錢一 川芎 麻黃 桂枝 錢五 姜引
大建中湯 黃芪 錢遠志肉 酒歸 澤瀉 各二 錢 人參 龍骨

甘草 各為藥 錢分二貼姜引

藍葉散 諸丹發熱赤腫 川芎 白芷 升麻 柴胡 石膏

知母 杏仁 乾葛 生地 甘草 赤芍 梔仁各五

藍葉分三熟甚加黃芩玄參煎服

朱儼散 解丹疹諸毒 青儼 土朱略一軟石膏荆芥穗各半

犀角消毒飲 火丹紫赤 牛榜子三錢荆芥穗 麥冬枯梗各五

甘草錢防風 升麻各半犀角分三一方加朴硝分煎服

塗丹方 寒水石 石膏各三黃柏 甘草略一為末芭蕉汁調塗

一方大黃朴硝土蜂窩末水調塗一方芒硝汁拭丹上一方以藍

青付乾則易之丹毒破出黃水豆豉炒炎盡為末油調付之

附火帶瘡 研百合汁頓付之

天麻散 風熱癩疹 天麻 川芎 升麻 半夏制各防風

細辛 羌活 荆芥 蟬壳 甘草略二每三錢姜引挾寒加官

桂挾暑加柴芩挾濕加茯苓蒼朮

清風散 丹疹屬血風血熱 荆芥穗甘草炙陳皮各厚朴

白姜各蟬退 人參 茯苓 鼠粘子研防風 芎藭 藿香

卷活 等分為末每三錢荆芥茶清調下水煎亦可

消毒飲 斑疹 牛榜子錢六荆芥 非草略一水煎服或加防風五

分名鼠粘子湯治痘疹出不快

解毒防風湯 斑疹痒痛 防風一地骨皮 黃芩 芍藥 荆芥

枳壳 牛榜子錢五每五錢水煎服

敷藥方 明礬 朴硝 為末井水調雞翎掃又方赤小豆荆芥穗

晒為末雞子清調付蚕沙煎水閉處溫洗亦效

汗斑附子錢三硫黃錢一末陳艾槐皮水洗姜汁擦醋煮茄蒂蘸藥擦之

體氣用枯礬輕粉蜜陀僧等分射少許為末洗净搽只枯礬亦效

暑症十五

衝炎冒日暑相侵解熱清金病自寧 動而得之為中熱辛苦之人日

亂不寧或身如針刺熱傷肉分黃連解毒湯白虎湯加柴胡氣

虛加人參或咳嗽寒熱汗出不止脉微者熱在肺經火乘金也清金

衛暑湯天水散之類腹痛水瀉者胃與大腸受之惡心胃口有痰飲

也黃連香薷飲五苓散主之痰加陳皮半夏南星虛加人參元氣

素弱因暑而因倦不思飲食者清暑益氣湯卒倒不知人事者此痰
火為暑風所鬱也益湯吐醒後以黃連香薷飲加薤活陳皮半夏治
之道問伏暑昏迷小便或
地漿確之切不可用凉水避暑涼亭寒氣逼或食生冷藥宜溫
為中暑富貴之人避暑于涼亭大廈或乘風縱扇暑氣為風寒所逼
頭痛惡寒身形拘急此因暑而自致之病寒為標而熱為本當先用
敗毒散以散其表或川大順散以溫其裏次用黃連香薷飲以治
其本熱氣虛者清暑益氣湯脉伏者生脉散若恣食瓜果冰水以致
嘔逆霍亂清暑六和湯大順散之類

清暑益氣湯 暑月四肢困倦精神短少肢節煩疼痞悶白汗泄瀉
黃芪汗錢蒼朮各錢白朮錢升麻錢人參錢陳皮錢神曲錢澤瀉錢
麥冬錢炒栝錢川歸錢青皮錢乾葛錢五味錢甘草錢溫服

清金衛暑湯 暑月遠勞熱傷肺金常服可保肺氣
黃芩錢麥冬錢天冬錢白朮錢陳皮錢茯苓錢滑石錢八人參錢
知母錢桔梗錢枳實錢五味錢甘草錢痰加半夏熟加黃

清暑和中湯 傷暑嘔吐瀉泄胸痞腹痛飲食不進
人參錢砂仁錢香薷錢扁豆錢赤芍錢藿香錢制朴錢半夏錢
木瓜錢杏仁錢止草錢姜引錢白朮錢芍藥錢各一錢泄
瀉加白朮杏仁水不利加澤瀉茯苓各八分煩渴加麥冬乾葛
六和湯 藿亂吐瀉 砂仁錢半夏錢杏仁錢人參錢甘草錢

赤茯苓 扁豆 木瓜錢香薷 厚朴錢錢姜引
香薷飲 消蓄水霍亂吐利煩渴
香薷錢扁豆錢厚朴錢甘草錢加黃連為黃連香薷飲合四苓
散為香薷苓湯加茯苓為五物香薷湯再加參芪橘木木瓜為十味
香薷飲

六順散 暑月生冷引飲過多脾胃受濕水穀不分或腹疼嘔吐
甘草 乾姜 杏仁錢桂心錢用白砂先炒甘草次入杏仁同炒
去砂與姜為末每三錢水煎或調服

生脉散 人參 五味 麥冬等分或加黃芪甘草令人氣力湧出
益元散 滑石錢飛甘草末錢水調服解煩渴利小便治水瀉痢疾
注夏屬陰虛元氣不足夏初春末頭疼脚軟食少體熱者是

黃芪 人參 陳皮 白朮 當歸 芍藥 炒栝 甘草

黃芪 人參 陳皮 白朮 當歸 芍藥 炒栝 甘草

麥冬 五味 痰加半夏姜汁水煎服
中暍者夏月汗出惡寒身熱而渴也白虎人參湯發熱惡寒身重疼
痛溺澁毛聳手足逆冷少勞即熱脉弦細虛遲表中暍也補中益
氣湯加扁豆一錢香薷二錢熱加黃芩

濕症十六

內濕皆從脾土生

濕者火土相蒸之氣自內出者諸濕腫滿皆屬脾
土蓋恣食乳膠魚翅瓜果之類濕從内生其症腫

滿發黃西北之人多有之用胃苓湯

以實脾滲濕加苓冬清肺金

以制肝木使脾無賊邪熱加黃連氣虛加人參發黃用茵陳五苓散

肥人二陳加二木酒苓羌活如

外衝陰雨及山蒸上焦聲窻頭如

暴中下腰沉脚氣頻

濕自外入者地之濕氣感則害人皮肉多因衝
胃陰雨山蒸坐臥濕地沐浴涉水濕從外入又

濕從下受之東南之人多有之濕在上焦清氣不通則頭如物聾
如甕中肩背不可回顧羌活勝濕湯濕在中焦腰重如石獨活寄生

難以下焦腿足沉重
關節腫疼風濕并脉來雖緩辨浮沉或宜微汗或

升利外濕多因內濕成

四肢關節腫痛除風濕羌活湯小便不利茯苓
苓滲濕湯大法脉浮緩在表宜微汗沉緩在

裏宜滲利又云濕在上宜汗在下宜利宜升提或表裏上下分消之
然治濕以利小便為主故曰治濕不利小便非其治也又云外濕非

內濕不能成病則治外濕者尤當以健脾為主節食為戒矣
羌活勝濕湯 上濕頭重肩背不可回顧脊強腰痛

羌活 獨活 藜蘆 葉木 防風 甘草 炙川芎 絡 五 蔓荆子 分

頭重加石膏倍葉木川芎蔓荆腰重加酒防已或加烏附行經
羌活勝濕湯 肩背痛 酒羌活 錢 當歸 蒼木 絡 錢 酒 苓 瀝 二

川芎 歲火仙 槲 枳壳 錢 一 防風 杜 茯苓 半夏 絡 八 甘草 二分

姜引痛甚加桂枝南星下部痛加牛膝防已黃柏木瓜

舒筋散 臂痛腰痛心痛 嫩莪木 芍藥 甘草 白木 當歸

海桐皮 羌活 防風 素寄生 木煎

防已飲 濕脚氣 酒栢 蒼木 白木 防已 牛膝 楨即

生地 川芎 陳皮 木通 甘草 熟加不連痰加南星半夏
除風濕羌活湯 風濕相搏一身盡痛
羌活杜防風 升麻 柴胡 絡五葉本 蒼木絡一

血虛加四物痰加二陳熱加苓連或加桂附行經
茯苓 滲濕湯 小便不利身面浮腫黃疸

黃芩 黃連 梔子 防己 麥冬 白朮 陳皮 蒼木
青皮 茯苓 豬苓 澤瀉 桂心 少茵陳 水煎

升湯除濕湯 分消升提 升麻 柴胡 防風 炒曲 澤瀉

豬苓 錢各一 蒼木 錢陳皮 甘草 炙麥牙 炒五分
秘傳治濕方 下焦腫痛 白朮 炒蒼木 浸陳皮 漢防己

茯苓 木通 鹽 甘草 香附 酒芍 酒歸 薏苡仁 知母 鹽
酒栢 酒芩 澤瀉 酒牛膝 棋即解 空心服為丸亦可

四製栢木丸 滋陰降火開胃進食除周身之濕
淨栢四斤米泔童便乳汁酥油各制一斤俱十三次蒼木泔浸刮
切一斤川椒故紙五味川芎各炒木四兩蜜丸早酒午茶晚湯服

燥症十七

中州虛損耗真陰燥似秋金木落形 諸症枯涸乾勁皺揭皆屬於燥
人因饑飽勞役傷損中州脾胃

嗜食辛辣厚味助火之物耗散真陰遂成此疾在腸胃則枯
涸秘澁在皮膚則乾勁皺揭有似秋金斂肅木落草枯之形 外燥必

然因內竭更兼三氣要分明 外燥必由內燥所致治皮膚者必自其
腸胃而滋之脾胃伏火大便秘結潤腸

丸 潤燥湯煩渴引飲白虎湯 清涼飲小便澁者六味地黃丸
陰虛火燥大補陰丸 內脇燥痛當歸龍會丸 兼風者血弱不能

養筋燥熱生風手足不能動履指爪枯燥大秦芫湯 腸風秘燥搜
風順氣丸 兼寒者虛人臟冷而血脉枯老人臟寒而氣澁半硫丸

元戎四物湯通幽湯 蜜導法肌膚皺揭生血潤肌飲
搜風順氣丸 閏三焦和五藏潤腸胃除風濕腰脚風氣

酒大黃 錢麻仁 研 山茱萸 肉山藥 郁李仁 研免絲子 蒸酒
酒牛膝 棋即各二 只壳炒獨活 各一 防風 兩車前子 兩

酒牛膝 棋即各二 只壳炒獨活 各一 防風 兩車前子 兩

燥蜜丸如梧子大三十九茶酒任下

清涼飲 大黃 赤芍 當歸 甘草 水煎

天冬膏 血虛肺燥皮膚折裂及肺痿咳膿血

天冬新者去皮心搗濾汁沙鍋慢火熬膏每一二匙空心温酒服

生血潤肌飲 川歸 生地 熟地 黃芪 麥冬 錢 一天冬 錢

五味 玃酒片苓 瓜婁仁 菴仁 五分 酒紅花升麻麻仁郁李仁

火熱十八

陽盛陰虛則生火經言七火辨天人天成君相人龍壁人妄煩勞五

志生 夫陽者陰之配火者水之對若陰陽和平水火相濟則天非此

餘者天地之常真陰易耗者人情之常水不勝火熱病由是而生焉

經言一水不勝二火者君相二火也蓋君火者心君之火配五藏五

行而言故謂之人火若大過則可以直指相火者起於肝腎二藏以

水中生火故謂之龍火若熾甚則不可以直指惟黃柏知母可以

治之隨其性而伏之也宜大補九坎離丸氣從臍下冲上者陰火

也宜壯水之主以制之生地牡丹玄參知母之類此二火乃天成之

人也經又言一水不勝五火者乃五藏之火人妄煩勞則五志過極

諸氣憤鬱屬肺火悲哀動中火起于肺黃芩葶藶苦酒瀉之瀉白散

清金丸諸風掉眩屬肝火大怒火起于肝又氣從左邊起者肝火也

柴胡黃連龍膽瀉之左金丸抑青丸諸濕腫滿屬脾火醉飽則火起

于脾為藥黃芩石膏瀉之瀉黃散心為君主自焚則死故多暴死之

症瀉心湯解毒湯諸逆冲上屬腎火房勞火起于腎黃柏知母煩其

性而伏之大補陰丸火起湧泉腎水虛極不能制之加味四物湯補

陰丸 史有三焦之火三補丸涼膈散 治之此五者乃人為之火

瀉實補虛黃發壽甚從微逆法當分 實火者邪氣實也諸氣有餘皆

是火實火可瀉黃連解毒三黃 九之類人性氣實火盛顛狂首可以正治硝黃米水之類大便秘者

大承氣湯 陽明火熾燥渴白虎湯 火盛者亦用從治法則火易

伏虛火者正氣虛也虛火可補參朮生甘草之類補中益氣湯 加

黃柏知母人虛火盛頭紅者宜以從治若以冰水正治立死有補陰

則火自降者炒黃酒熟地黃之類大補陰丸○鬱火可發當看何經風寒外來者可發四肢及肌膚骨髓間熱者血虛也四物湯加黃柏知母地骨皮或胃虛過食冷物抑遏陽氣于脾土中五心煩熱者升陽散火湯手足心熱火鬱湯火之微者可以逆治以寒治熱是也火之甚者從其性而升之如寒藥稍加溫藥○諸經瀉火隨能用拾劑還或加姜酒制炒以從其性下可驟用涼藥○諸經瀉火隨能用拾劑還當九濟陰 諸經瀉火各有所能黃連瀉心火木通瀉小腸火柴胡加本梔子加柴皮瀉肺火條苓加大黃瀉大腸火知母瀉腎火黃柏加細辛瀉膀胱火梔子瀉三焦火下焦去壳青黛瀉五藏之鬱火玄參瀉無根之遊火山梔子降火從小便中泄出童便降火急連無人知此凡用藥過於寒者尤易溫補陽於熱者極難除拾劑之中當有九劑濟陰之藥庶可抑有餘之陽而扶不足之陰也黃連解毒湯 治火之要藥量虛實加戒隨引經而至黃連 黃芩 黃柏 梔子俱炒等分水煎服一名梔子金花丸三黃丸一名三黃瀉心湯治三焦諸熱消渴等症

酒大黃 炒苓 炒連等分蜜丸加黃柏名大金丸九去大黃名三補丸鹽酒炒黃柏一味名大補丸血虛四物氣虛四君子湯下滋腎丸 治腎熱 酒栢配酒知母配肉桂水丸百沸湯下知栢氣味俱陰能補腎瀉火加桂乃寒因熱用之法導赤散 小腸實熱 生地 木通 甘草等分入竹葉煎服加味四物 補陰降火 四物加黃栢黃芩熟地水煎服火盛加龜板兼氣虛加參朮黃芪一法用附子末津調塗湧泉寫白散 治肺火 桔梗 防風 絡二 甘草 錢地骨皮 錢二 水煎服清金丸 肺火炒苓為末水丸一方用苦參為丸皆加柴皮為使左金丸 肝火 黃連配茱萸湯 兩蒸餅丸白湯下仰青丸 肝火心火 姜炒黃連為丸白湯下千金麥冬湯 火熱乘肺咳血喘滿五心煩熱而渴麥冬 桑白 生地 絡七 貝母 紫苑 桔梗 竹葉天冬 絡五 五味 甘草 絡三 水煎服瀉黃散 脾熱霍香錢山梔兩石膏錢甘草兩防風兩右為末蜜酒拌炒白湯調服

玉液九 胃火廢火 火煨石膏研極細醋糊九

瀉青九 肝熱搐搦脉洪實 當歸 龍胆 川芎 山梔 大黃

羌活 防風 等分煉蜜九

當歸龍會九 瀉肝腎火及風熱驚搐燥擾狂越等症

當歸 龍胆 梔子 黃連 黃柏 黃芩 略一 大黃 青黛

芳薈 略半 木香 錢射香 分煉蜜九 姜湯下

升陽散火湯 血虛筋骨皮膚間熱或胃虛過食冷物抑遏陽氣于

脾土中此火鬱發之也 升麻 葛根 獨活 羌活 白芍

人參 略六 炙甘草 分生甘草 防風 柴胡 略三

火鬱湯無獨活炙甘草有葱白治五心熱姜引煎服忌生冷手心

熱加芩連麥冬足心熱加生地知柏 地骨皮散 陽毒身熱脉長終渴 地骨皮 茯苓 略半 柴胡

知母 黃芩 生地 略一 石膏 兩 羌活 略半 麻黃 五 散 每兩 攪

上清湯 眼痛面瘡 防風 川芎 白芷 桔梗 黃芩 黃連

連翹 梔子 略八 荆芥 薄荷 枳殼 略五 甘草 分

水煎溫服眼痛加龍胆菊花面瘡加鼠粘蟬退痰火眩運加芩夏

天麻石膏巔頂痛加藁本

發熱十九

外感內傷皆發熱陽虛莫作陰虛說 人迎脉浮盛為外感發熱翕翕

然明知其熱在外也無汗惡寒

麻黃湯有汗惡風桂枝湯風寒參蘇飲半表半裏小柴胡裏症多大

柴胡湯氣口脉緊盛為內傷發熱膏滿噫氣蒸蒸然明知其傷食也

消導熱自己柴陳湯加只實山查神曲飲酒發熱解醒湯四肢怠惰

無力自汗明知其勞役傷也補養熱自退補中益氣湯挾房勞加知

栝披外邪加羌活陽虛發熱脉大而無力自汗不任風寒小建中湯

陰虛發熱脉數而有力作於午後夜分四物加知栝柴芩氣虛加

芩 五心鬱熱不相同煩熱骨蒸須審別 鬱熱者手足心熱肌膚不甚

熱火不伸越也升陽散火湯 火鬱湯煩熱燥熱也解毒湯骨蒸者陰虛骨間熱也逍遙散 五地骨

皮散 六

諸氣二下

氣始中焦統屬肺克皮導血流無息

人身生氣之源始于中焦統屬于肺周流一身在外則衛護皮

毛克實腠理在內則導引血脈調和陰陽運行生化流而不息者也

六淫九氣若相干清者濁而行者

滯

起居不常則外為六淫所侵陰陽風雨晦冥六淫也將息失宜則內為九氣所干怒則氣逆甚則嘔血及飧泄喜則氣緩悲則氣消

恐則氣下寒則氣收是則氣泄驚則氣亂思則氣結勞則氣耗由是乖戾失常清者遽變而為濁行者抑遏而反止所謂一息不運則機

緘窮一毫不續則窮穰刈矣氣滯在上桔梗枳壳香砂在中厚朴只實三稜茂木在下青皮木香枳即相火上冲者知栝苳連香附陰虛

四物加知栝因怒氣者二陳加香附諸氣有餘皆是火冷生氣者十山梔痛者加木香烏藥肥人加參木

無二

諸氣有餘皆五志過極五味偏嗜釀成火毒鬱于藏腑充于三焦氣血留滯諸痛痞脹作焉氣從左邊起者肝火也左金丸

氣從右邊起者肺火也瀉白散氣從臍下冲上者腎火也滋腎丸凡氣屬火者各從其類而治之若明知身受寒氣口食寒物客寒滯氣

而作痛一中有一高陽生謂冷生氣者此也但將生字作滯字看何大謬之有客寒犯胃香砂化滯湯

少腹痛麻違厥逆須分虛實與陰陽無槩辛香竣削劑氣有虛實因逆滿加芩萊萸

中氣不足者補中益氣湯

脈脫神衰氣短人參養胃湯

虛十全大補湯

氣實喘急蘇子降氣湯痞悶四青飲胸脇連背痛者分心氣飲脹滿者四七湯木香流氣飲諸氣挾火者加芩連山梔

披痰者加瓜仁香叶海石氣實龍會九

男子屬陽得氣易散女子屬陰得氣多鬱故男子氣病常少而女子氣病常多男子宜養其氣以全其神女子宜行其氣以調其血凡見痞滿壅塞喘急且宜暫行疎利而詳虛實寒熱以調治之若局方槩用丁沉官桂莪朮三稜辛香竣削之劑令人久服常服寧不助火添病而耗其真氣乎

蘇子降氣湯

痰火上攻氣不升降

痰火上攻氣不升降

痰火上攻氣不升降

痰火上攻氣不升降

痰火上攻氣不升降

痰火上攻氣不升降

痰火上攻氣不升降

痰火上攻氣不升降

痰火上攻氣不升降

痰火上攻氣不升降

痰火上攻氣不升降

世草^{各五}姜引火或加苓冬喘加青皮枳壳煎合四磨湯

四磨湯 氣喘痰塞咽喉人參換即烏藥沉香各磨水合一處溫服

四青飲 消痞 青皮 陳皮 只實^炒枳壳^炒水煎服

分心氣飲 七情過傷酒色過度臨食憂煩胸痞嘔眩食減羸瘦

蘇葉^{錢二}羌活 半夏^泡青皮 陳皮^白大腹 桑白^炒芍藥

赤茯苓^{各八}木通^{錢一}官桂^{錢五}甘草^{分二}姜棗^{燈心}引氣秘加只壳萊菔

子皂角仁各一錢咳嗽加人參五味桔更腰痛加枳壳木瓜浮腫

加車前子麥冬葶藶^耐澤瀉^諸苓^{名小}流氣飲

分心氣飲前症 桔更 麥冬 草果 腹皮 木香 桑白^各

大腹子 制朴 白木 人參^{各五}香附^炒紫蘇 陳皮

藿香^{各七}丁皮 生草^{各五}姜棗^{燈心}引

分氣紫蘇飲前症 五味 桑皮^各陳皮 桔更茯苓 草果仁

大腹皮^{各七}甘草^{分三}蘇葉^{錢一}姜三片^{搗少許}煎服

流氣飲 男婦中焦氣壅^阻塞胸痞腹肋脹痛喘咳身而浮腫

蘇葉 青皮 酒歸 芍藥 烏藥 茯苓 桔梗 半夏^炮

川芎 黃芪 只實^炒防風 陳皮^白炙甘草^{各七}木香^炮不見

大腹皮 換即 只壳^炒姜棗^煎

木香化滯湯 氣鬱痞滿 中脘皮裏微痛

歸尾 只實 陳皮 生姜 木香^{各六}柴胡 草叩 半夏^{各六}

紅花 甘草^{各三}姜引

摘皮一物湯 諸氣刺痛感冒四氣酒食所傷中脘痞塞嘔吐吞酸

橘皮洗淨新汲水煎服

三因七氣湯 七情鬱結痰如破絮梅核在咽喉痞悶嘔逆

半夏^{錢二}茯苓^{錢二}厚朴^制紫蘇^{錢一}姜引一方加蘇子只壳柯子

治氣噎嘔逆又七氣湯青陳皮稜莪木香益智官桂甘草

指迷七氣湯 七情相干氣道壅塞攻衝作痛

香附^錢青皮 陳皮^白桔更 莪木 藿香 益智 半夏^泡各

官桂 甘草^{各五}姜棗^引

加味四七湯 氣不升降痰塞咽喉 青皮 只實 桔更 換即

香附 白朮 山查肉半夏^炮紫蘇 厚朴 梔仁^{各一}姜引

治氣六合湯 亡血後七情所傷產後月信中氣

四物加木香枳郎陰虛氣滯去二味加玄胡黃柏只壳

導氣枳壳丸氣結不散心胸痞痛逆氣上攻 枳壳炒木通炒青皮

陳皮白朮 粟白炒茴香 蘿蔔子炒黑丑 白丑各炒取三稜煨

我木煨等分為末姜汁糊丸梧子大五十九橘皮湯下

木香換郎丸 流濕潤燥推陳致新滋陰抑陽散鬱結活血通經嘔

吐酸水痰涎一切酒毒食積痢疾腹痛

酒相 義木煨只壳炒黃連 酒大黃 黑丑炒取香附

木香 檳榔 青皮炒陳皮 酪一當歸半

右細末滴水丸如梧子大三十九白湯下

黃鶴丸 香附註黃連註香附為主黃連減半為丸外感姜葱湯內

傷米飲氣病木香湯血病酒痰病姜湯火病白湯下

血症二十一

脾胃能生水穀精肝藏心統血歸經 血者水穀之精生化于脾土統

一身五臟安和則血歸經絡而榮 行視聽形神賴筋骨皮毛腑臟

養百骸無凝滯矣行虧損之患矣

榮 血者形神之所恃以生手一得血而能持足得血而能行固得血而

能視耳得血而能聽臟得血而能液府得而能氣筋骨皮肉形神

機發莫不賴血榮養血盛則形盛血弱則神衰神靜則陰生形勞則

陽亢注之於脉少則瀯克則實生化旺則諸經恃此而長養衰耗則

百脉由此而空 吐血錯經因火逼 紅痰咳唾必滋陰 血屬陰難成而

虛可不謹哉 易虧人之節慾

者少嗜味者多以致陽火亢盛煎熬真陰火逼血而錯經妄行越出

上竅者逆而難治從胃而出為吐血四物加山梔側柏葉童便或加

阿膠蒲黃荊芥或四生丸暴吐紫血成塊四物解毒湯先惡心而後

吐者為嘔血四物加炒梔煎入童便姜汁服初起脾胃尚健或胸中

氣塞者菝仁承氣湯 從肺而溢于鼻者為衄血犀角地黃湯加鬱

金或服諸藥不止者三黃湯加蘇木菝仁紅花下之傷寒衄血不止

大柴胡湯下之脾胃虛弱精神短少血不止者參芪補血湯咳血嗽

而出血痰帶血絲出于肺清肺飲咯血唾血出于腎補陰散天冬丸

心氣虛耗不能藏血茯苓補 蓄瘀行滯虛宜補便溺崩淋虛熱分 者

氣之配氣行則血行氣滯則血滯氣逆則血逆怒則氣逆血菀于上
血蓄于上犀角地黃湯加青皮枳即少加大黃蓄于下菀于氣湯
結于腸胃之間為血瘕或瘕在四肢胸膈胃口作痛俱宜引經行滯
破血之藥破血用菝仁紅花蘇木和血用當歸血痛用乳沒補血用
四物血刺痛用當歸凡血受病皆用血從下流者順而易治便血者
四物加山梔黃連槐花或加升麻秦艽阿膠臟連丸腸中痛者芍藥
黃芩湯腸風下血當歸和血散伏暑下血黃連香薷飲小便見血為
弱血四物加木通牛膝山梔小薊飲實者當歸承氣湯小便痛
為血淋導赤散煎調益元散婦人血崩有虛有熱見本門

犀角地黃湯 吐衄 犀角 鎊生地 赤芍 丹皮等分煎服

又方犀角大黃各一錢芩連各二錢生地四錢水煎食後服

四生丸 吐衄 生荷葉 生艾葉 生地黃 側柏葉等分

右搗爛丸如鷄子大每一丸水煎去渣服

二黃補血湯 吐衄 黃芪 川歸 柴胡 熟地 川芎 各錢

芍藥 生地 各二錢 升麻 各五錢 水煎食後服

又方韭汁姜汁鬱金汁童便飲之其血自清

生地黃散 衄吐咯 枸杞 柴胡 黃連 地骨皮 天門冬

白芍 甘草 黃芩 黃芪 生地 熟地 若下血加地榆等分

正血散 勞傷衄血 白芍 川歸 生芩 阿膠 各二錢 每末二錢 黃芪 湯

麥門冬 飲子 衄血 麥冬 生地 等分煎服

血餘散 髮灰吹鼻即止或酒調服或韭汁飲之 衄吐皆効

參芪補血湯 見血後胃弱神少血不止 人參 錢 黃芪 錢 芍藥

甘草 川歸 麥冬 各五錢 五味 三錢 水煎服或加鬱金汁

怒則氣逆血菀于上嘔血

瓜蒌子 川歸 生地 桔更 通草 丹皮 等分煎服

清肺飲 痰內有血 當歸 芍藥 知母 桔更 天冬 各錢

生地 天花粉 各錢 貝母 錢 二 茯苓 八分 甘草 五錢 水煎

天冬丸 吐咯血大能潤肺止咳

天冬 兩 甘草 茯苓 阿膠 炒杏仁 炒貝母 各五錢 蜜九 噲化

辟穀丹 咳血 天冬 熟地 煉蜜九酒嚼下

咳血痰盛身熱多是血虛青黛瓜仁柯子海石山梔煉蜜姜汁為丸

噤下嗽甚如杏仁後以八物湯加減調理痰盛再加痰藥

補陰散 咯唾血或痰帶血絲 白朮 丹皮各錢當歸 芍藥

薤仁研貝母各錢一山梔炒黃芩 桔梗各八青皮分

甘草分水煎一方有知栢麥冬無青皮黃芩

先吐紅後見痰嗽乃陰虛火動痰不下降

四物各錢半炒梔貝母天花粉各一錢丹皮八分 水煎入童便

先痰嗽後見紅是痰積熱

知貝母 瓜仁生地為藥麥冬各一炒梔分二天花粉錢煎服

茯苓補心湯 心虛不能統血面黃五心煩熱咳喘咯血

四物湯對參蘇飲去木香煎服

芍藥黃芩湯 便血腹痛 芍藥 黃連 當歸各二竹葉 大黃

甘草錢一痛甚煎調木香枳榔末各五分

黃連散 便血不痛 黃連 當歸各半甘草錢空心服

常歸和血散 腸澀濕毒下血 槐花炒青皮各八當歸 升麻錢

川芎分荆芥穗 熟地 白朮各六每末三錢米飲調下

涼血地黃湯 熟地 青皮 槐花炒當歸各一炒栢 知母錢一

平胃地榆湯 結陰使血 白朮 陳皮 白芍 厚朴 葛根分五

地榆分茯苓 甘草分當歸 炒曲 乾姜 人參 益智分三

蒼朮 附子地升麻各五姜棗煎服

臍連丸 便血赤痢 宜黃連末裝入雄豬大臍蒸好丸服

杏梅丸 糞前後紅崩漏

烏梅連核燒存性白芷生百藥煎燒存性等分麩糊丸米湯下

小兒尿血甘草升麻煎調益元散空心服

婦人吐衄謂之逆經四物加降火通經藥木香青皮枳榔大黃

痰飲二十二

水穀消磨氣血或脾傷胃弱飲留停 脾胃強健水穀消磨則津液流 通養氣而生血何痰之有若七

情四氣有所干飲食起居有不節致傷脾胃不能營運則津液凝滯

胃口停飲一留飲心下二澀飲膈下三痰飲胃中四溢飲膈上五流

飲膈間五飲湯蠲飲只實丸自積成飲濕鬱成痰濕在心絡為熱痰

其色紅濕在肝絡為風痰其色青在脾為濕痰色黃在肺為氣痰色

自在腎為寒痰色黑俱用
二陳湯隨經加戒治之
千般怪症因痰作三法權宜莫妄行
諸症

者十常八九九奇怪之疾皆痰所為大法風寒外束則汗之參蘇飲
千倍湯膈上之痰須用吐法膠固稠粘壅塞悶亂昏迷顛倒狂越皆

用吐法瓜蒂散一吐不已再吐之風痰潮壅稀涎散痰在經絡非吐
不可吐中即有發散之義腸胃之痰可下而愈顛狂譏語皆可下痰

痰九紫金銀然表虛不可妄汗年高不可
妄吐胃弱不可妄下要在權宜而行也
燥濕溫寒風用散軟堅消

積熱宜清濕甚則吐痰肥人多濕濕生痰半夏南星二末海粉之類
燥之蛤粉丸實者小胃丹寒痰用細辛白附之類溫之濕

胃化痰九風痰多見半身不遂口眼喎斜攣痺眩暈之病用南星烏
附天麻細辛姜蚕牙皂之類散之白丸子
疎風化痰丸
老痰稠

粘堅固如菟膠蜆肉者用醃以軟之海石芒消瓜仁杏仁半夏貝母
香附五倍之類丸服海石熱痰能降濕痰能燥頑痰能消五倍子能
治頑痰喻化尤妙吐咯不出者瓜仁杏仁海石桔梗更連翹貝母五倍

少佐朴硝枯礬煉蜜姜汁丸喻化節齋化痰丸或青礬石丸食積生
痰枳實白朮曲蘆橘半茯苓之類只實化痰有衝墮倒壁之功蘿蔔

子能化食積痰滿半只水丸青礬石丸清氣化痰丸能養胃化痰消
食積熱痰者痰因火動治火為先苓連梔子青黛石膏天花粉麥冬

之類潤下凡眩暈嘈雜二陳加炒梔苓連膏膈不利清膈化痰丸火
盛黃芩利膈丸口燥咽乾咳出如米粒之狀瓜仁
杏仁天冬冬冬黃栢知母貝母桔梗更之類潤之
在經宜達宜開結

順氣扶脾痰不生
痰在四肢絡非姜汁竹瀝不能行痰在腸下非
白芥子不能達二陳導痰湯能治一身痰隨引經

而至前胡除內外之痰痰之為物隨氣升降無處不到氣滯則痰滯
氣逆則痰逆宜開結而行氣氣順則一身之津液隨氣而順又當以

扶養脾胃為主脾胃既和飲食運化痰自不生若用利藥過多則脾
氣愈虛而痰易生中焦有痰胃氣亦頓所養卒不可攻蓋如痰丸青

礬石丸虛弱之人決不輕用
二陳湯治一身之痰隨上下引經而至

陳皮去白茯苓去皮半夏換水甘草炙姜引加南星只壳為導
痰湯加參朮為六君子湯加枳桔為枳桔二陳湯治痰軟寬胸痞

痰湯加參朮為六君子湯加枳桔為枳桔二陳湯治痰軟寬胸痞

血虛合四物湯勞嗽加天麥冬知貝母食積痰加連枳曲蘆山查
酒痰加乾葛炒梔濕痰加二木痰火眩暈加芩連石膏天麻白木
嘈雜加姜炒黃連梔子白朮痰清倍半夏痰調加梔芩

五飲湯 旋覆花 人參 陳皮去枳實炒茯苓 白朮 厚朴製

半夏泡 猪苓 澤瀉 前胡 桂心少芍藥 甘草等分

姜引因酒成飲加葛根砂仁

干縲湯 痰喘 半夏泡七皂角炮甘草炙格姜三片水煎服

清氣化痰湯 痰火咳嗽 黃芩 麥冬 茯苓 貝母 蘇莖

天花粉 厚朴錢各一陳皮 只實 香附 藿香錢各七甘草分

姜引濕痰加半夏

橘皮湯 胸膈停痰二陳加 旋覆花 青皮 桔更 枳壳

人參 路一細辛 甘草錢各五姜引

法制清氣化痰丸 順氣化痰健脾消導

半夏 南星俱泡明礬 生姜切皂角脚五味各二兩同煮透

香附洲山查枳實炒陳皮去白朮淘去皮蘇子研瓜蒌仁研

蘿蔔子研黃芩炒黃連炒白茯苓錢各一連翹 乾姜錢各五

各為末稱和重羅人蘇子瓜仁蘿蔔子和勻姜汁浸蒸餅為丸如

梧桐子大六十九白湯下老痰加海石五錢風化硝枯礬各三錢

燥痰加天冬麥冬各一兩火盛加芩連各五錢

節齋化痰丸 老痰稠粘吐咯不快

酒芥 陳皮 蛤粉研瓜仁初略桔更 連翹 香附鹽炒各

青黛研芒硝研礬煉蜜姜汁凡噲化或細丸姜湯下

蛤粉丸 燥濕痰 南星 半夏略蒼朮 青黛略一蛤粉兩

神曲糊丸姜湯下

小胃丹 上可取胸膈之痰下可利腸胃之痰實者可用

其遂透薑乾大戟長流水芫花醋炒黑酒大黃兩炒兩

右末粥丸麻子大每十丸温湯下

加味潤下丸 南星磨醋煮半夏制二黃芩 黃連兩二橘皮半斤

甘草兩姜汁浸蒸餅為丸丹溪開下丸 陳皮一監炒甘草兩酒糊

中和丸 濕熱痰氣 蒼朮 黃芩 半夏 香附粥丸姜湯下

達痰丸 陳皮茯苓黃芩兩南星半夏瓜仁礬石白朮香附蘇子
白芥子蘿蔔子兩沉香錢大黃兩各製末竹瀝浸晒數次為丸

溫胃化痰丸 膈寒不快痰涎不已

半夏制二陳皮 乾姜炮白太略一姜汁糊丸白湯下

清膈化痰丸 熱痰 黃芩 黃連 醋一黃栢 山坭 各五香附 半

蒼木兩蒸餅為丸白湯下

利膈化痰丸 南星制蛤粉 研半夏制貝母法瓜仁研香附 便

皂角炙杏仁去油研青黛研石六味為末皂角膏杏仁泥姜汁浸蒸餅為丸青黛為衣姜湯送下

黃芩利膈丸 除胸中熱利膈上痰 生苧 炒苧 略一半夏制

澤瀉 黃連 各五南星制只壳炒陳皮 白木 各三白礬 各五

姜汁浸蒸餅為丸白湯下忌酒麪魚腥

獨飲只實丸 逐飲消痰導滯清膈

只實炒半夏泡陳皮法黑丑 賴等分麵糊丸姜湯下

痰痰丸 治濕熱食積老痰 酒大黃 黃芩 各半沉香 研五錢

礞石 研碎如金一兩 水九 梧子大朱砂為衣三五丸量虛實加減一方加用星半斤 竹瀝糊丸對金丸

青礞石丸 降火化痰濕痰食積痰重任風化痰

風化硝 三錢投淨冬月以半夏炮茯苓 南星制青礞石 依前

黃芩 各五 姜汁神曲糊丸姜湯下一方加蒼木五錢滑石一兩

竹瀝大治 熱痰養血清熱痰厥幾死者灌之即甦用淡竹除苦竹

之外皆淡竹也又云笋可食者瀝可用也胃實用荆瀝凡使六分

中加姜汁一分熱甚如半分

紫金錠 解毒療瘡利竅下痰功過於牛黃九通治百病

千金子仁一兩 山茨菰兩五倍子三兩射香錢紫大戟 兩

各為細末和糯米粥和木舊中千杵每錠一錢薄荷湯或酒磨

服外有瘡腫醋磨搽數次即消合藥日宜端午重陽七夕如急用

擇辰日天月德日靜室焚香脩製勿令婦人雞犬不具是人見之

齣喘二十三

哮喘當分息與聲寒包肺熱昂潮嗎 孝以聲響言喘以氣息言五裁

皆風寒外束則肺氣促急痰涎浮湧激亂爭鳴如昂之潮沸而齣喘之病作焉治哮喘多主於痰兼發其表或用吐法治喘多主於火兼降

其氣有數年哮喘時作時止者未發時以清肺
降火順氣化痰為主已發時以攻邪發表為主
火炎氣鬱痰蕪水胃

喘須將虛實論
或研椒目七錢姜湯調服喘止後有痰治痰有火

降火時輕時重得食則減或食寒涼少止者以降火為主二陳加枳
桔茶連山梔或涼膈散下之陰虛自臍下冲上者四物加知柏只虎

黃芩氣喘者呼吸急促無痰聲蘇子降氣湯
加茶蓮石膏煎合四

磨湯服因服補藥而喘者三拗湯
上氣喘神秘湯有肺虛挾寒而

喘者五味子湯有驚憂氣鬱而喘者惕惕悶悶引息鼻張七氣湯四
磨湯
哮喘者喉中有痰聲導痰湯合千縷湯
小兒九室湯煎調

奪命散痰喘者先降其氣二陳合四磨湯水氣乘肺而喘者漉漉有
聲怔忡浮腫五苓散小半夏茯苓湯
胃絡不和喘出陽明須分虛

實胃虛者搗有頓肚喘而不休五味子湯加白朮久病氣虛喘者生
麻散
加白朮阿膠陳皮胃實喘者分氣紫蘇飲指迷七氣湯
加

半夏二陳湯加砂仁之
脾腎若虛難攝養肺虛短氣不同形
脾氣虛

類有用利下而愈者
弱不能

攝養一身之痰令人發喘以健脾理中為主腎氣虛憊不能納氣歸
元八味丸
肺虛氣不能布息呼吸不相接續出多入少名曰短氣

與喘不同不可用苦寒之藥宜六君子湯加五味麥冬
傷寒脚氣尋

痰氣阻短者導痰湯腎虛不能攝氣而短者補腎丸
傷寒脚氣尋

標本諸病臨危喘不生
傷寒微喘緣表之未解汗之喘滿而不惡寒
者當下而痊脚氣喘滿病為本而喘為標但

療本病其喘自安或于脚氣藥內少加疎導之藥諸病臨危人喘者
多不可救汗出髮潤喘不休者為肺絕身汗如油喘者為命絕直視

謔語喘滿不治然則喘之危惡豈可以尋常忍之哉
治胸膈氣喘痰壅咳嗽大人小兒皆治

知母 貝母 滑石 麻黃 訶子 甘草 枳 八 卷活
葶藶 浴 五 大黃 錢小麥 二 薑引水煎食遠服小兒減半
五味子湯 肺虛挾寒理喘下氣去痰飲
五味子 官桂 茯苓 略 一 陳皮 錢 柏 七 乾姜 炮 甘草 鞞 略 每 五
錢水煎食遠服
蘇陳九室湯 經年喘嗽 麻黃 龍 橘 紅 薄荷 略 一 辣 桂

紫蘇 赤白炒杏仁 祛皮 連皮大腹子 甘草 各兩

每服五錢 姜五片 烏梅一箇 入童便半盞 煎卧時服 常用此方 加牙皂五分 煎調奪命散 治小兒 齁 胎神効 奪命散 煇硝 煇青 礞石 細研或五分 或一錢 量兒大小 加減用之

定喘湯 治上氣喘嗽 一名定肺湯

紫苑 陳皮 杏仁炒北五味 枳壳炒半夏制 赤白

蘇子 麩 甘草 蘇葉 務五 生姜五片煎服

調降湯 喘嗽 只壳錢半夏 北梗 青皮 陳皮 檳榔

蘇子 茯苓 葶藶 礞石 木香 白菝 砂仁 蘇葉 務三

甘草 分二 姜五片水煎服

八仙丸 喘嗽神効 南星 炮一 半夏 泡冬花 牙皂 炙枯礬

炙甘草 略半 巴豆 醋杏仁 箇五 大棗 慢火燒 煙盡

石末 醋糊丸如梧子大二三十九 食後溫薑汁下 或嚼蘿蔔栗子 生姜湯下

皂角丸 治喘 皂角為末 煉蜜丸如圓眼大 每用姜汁化下一丸

薄荷湯 磨紫金錠亦効

治肺氣行餘火炎痰盛作喘 赤白 杏仁 半夏制貝母 山梔

片苓 蘇子 黃連 姜引

肺氣不足久嗽而喘 人參 茯苓 甘草 麥冬 五味 阿膠

冬花煎服

治陰虛挾痰作喘 當歸 酒芍 生地 枳壳 五味

制半夏 煎服自臍下冲上着加知柏麥冬

五味子湯 治喘促脉伏而數者胃虛加白朮

五味錢 人參 麥冬 杏仁 研搗紅錢 半姜棗引不拘時服

治寒喘 五味 杏仁 陳皮 麻黃 桂枝 乾姜 甘草

蘇葉 肺虛加阿膠兜鈴

玉華散 喘嗽清肺利膈安神 葶藶 研炒 赤白炒半夏 制貝母 炮天冬 煇鈴 杏仁 研紫苑

百合 蒸人參 錢一 百部 甘草 炒 牡姜棗引

神秘湯 上氣喘急 陳皮 桔梗 紫蘇 五味 檳榔

赤白炒半夏 制炙甘草 姜五片 卧則喘者水氣逆乘於肺也

杏蘇散 上氣喘嗽浮腫

杏仁炒去皮蘇葉 五味 腹皮 紫苑錢一烏梅 甘草

陳皮白麻黃 桑白 阿膠炒桔更姜五片

蘇子湯 憂思過度邪傷脾肺腹脹喘促腸鳴氣走二便不利

蘇子炒半夏 木通 腹皮洗木香不見陳皮 人參 草果

枳壳 白朮 厚朴制甘草 姜棗不拘時服

治氣鬱痰喘 南星 半夏制杏仁 瓜仁制香附 陳皮

皂莢燒存蘿蔔子研等分為末神曲糊丸姜湯下

葶藶散 治過食煎炒或飲酒過度喘塞不得卧肺癰濁唾醒臭

甜葶藶炒桔梗 瓜蒌實 升麻 薏苡 桑白 葛根錢二

甘草錢一分二貼姜引

郁李仁九 水氣乘肺動痰作喘微腫 蘇子炒陳皮去

苦葶藶炒杏仁研防已 郁李仁去皮 蘇子炒陳皮去

赤茯苓兩煉蜜為丸生姜紫蘇湯下 半夏制甘草 天冬 麥冬

治肺虛短氣而喘 人參 白朮 半夏制甘草 天冬 麥冬

阿膠 五味等分姜引一方有蜜炙黃柏地骨皮

加味瀉白散 小兒傷風喘嗽

桑白 地骨皮錢各一北草分一方加荆防一方加麻杏俱神效

痰喘方 萊菔子蒸二皂莢燒存性 瓜仁海粉研

南星白乾各一兩宿煉蜜丸化