

臨證指南

卷之二

古吳葉桂天士先生著

錫山鄒錦畹滋九全較

暑濕

(一痢)

沈 暑必扶溼傷在氣分。古稱滯下。此滯字非停滯。飲食著濕內侵。腑中流行阻遏。而為滯矣。消導并舉。溫補暑邪無有出路。胸痞不饑不食。粘膩未已。而肛門沈墜裏結。三焦皆受邪蒸。上下渾如兩截。延為休息痢。疾纏綿展轉。豈旦晚驟愈之病。淡乾薑 雖有苦連不能散也 生薑 小川連 人參 枳實

徐 夏季痢症多是濕熱食積初起。宜分消其邪。但肌柔白嫩。乃氣虛之質。且性情畏藥。口宜少與勿過。

檳榔汁 青皮 陳皮 厚朴 川連 黃芩 木香 炒黑山查

又 溼熱下痢。必用苦辛寒。為治。藥穀瀉腸止瀉。久痢成疝。當此熱邪未清。宣通斯滯。可去。因色白氣弱。未敢峻攻。

耳 厚朴 黃芩 川連 木香汁 查肉 炒銀花 麥芽

盧 痢症濕熱。皆是夏令伏邪。但以攻消。大傷胃氣。不能去病。今微嘔不飢。不寐。大便欲解不通。是九竅六腑不和。

總是胃病。人參錢一。吳萸錢一。炒川連錢一。泡淡生乾薑錢一。茯苓錢一。川棟子肉錢一。生白芍錢一。

某 女 古色灰黃。胃不多飲。不飢惡心。下利紅白積滯。小溲不利。此暑溼內伏。三焦氣機不主宣達。宜用分理氣血。不

必見積以攻滯下藥。飛滑石 川通草 猪苓 茯苓皮 藜香梗 厚朴 白蔻仁 新會皮

陸氏經來暑穢。痧脹心煩。不宜自利里痰。淡黃芩 枳實 川連 石菖蒲 鬱金 橘紅

陳 瀉痢兩月。肢體浮腫。高年自屬虛象。但胸脘痞悶。納穀惡心。每利必先腹痛。是夏秋暑熱鬱滯於中。虛體扶邪。

馬有補瀉可去。枳實錢一。理恐交節令礙。症明是棟手重症矣。人參 茯苓 川連 淡乾薑 生白芍 枳實

某 臍上青筋突痛。太陰脾受傷。此前症也。近日腹痛白積。兩旬不已。是新受夏秋暑氣。與病異歧。先理新病。導氣

分清主之。藜香 厚朴 廣皮 茯苓皮 川連 木香 木瓜 扁豆

某 疾哮喘宿病。正在初秋而發。又值寒熱下痢血積。腹痛吐逆。脈來右弦左弱。目黃羞明。必是暑濕凝滯着裏。以補

虛之中。佐以清邪。乃通劑法。人參二味與 黃芪 白芍 廣皮 石蓮子 川連 山查肉 草決明 金銀花

是方非

此乃正法 何與前方 類也

立方與素 相反何故

類也

溼熱 疴疾古稱滯下。乃是溼熱氣薄腸胃阻閉氣分。故利仍不爽。河間丹溪。僉用清熱導氣者為此。

黃芩 川連 草決明 炒黑查肉 生白芍 石蓮 丹皮 廣木香汁

倪士面垢舌白。心下腕中。淒淒痛窒。至圍復便不爽。此水穀之溼。內蒸為熱。氣道阻閉。上熱下冷。若外受客邪。既過

幕原必有寒熱矣。淡黃芩 川連 淡竹葉 檳榔 白芍 厚朴 廣皮白

某 溼溫下痢。脫肛。五苓散加寒水石。食物不調。腸胃蘊蓄。積聚而滯。下三月不愈。清疎帶補之。人參 川連 炒白芍 炒查肉 廣皮

陸 溼熱內纏。中焦痞結。陽氣虛。體質溼注。自利不爽。神識昏亂。將變赤痢。炒半夏 人參 枳實 川連 乾薑 黃芩 薑汁

顧 得瀉。飲腹中澆。瀉自利稀。水平昔酒客留溼。溼勝內纏。腸胃不爽。疑積。東垣清暑益氣。亦為溼熱傷氣而設。但

脾胃久病。仍能納食。當苦味堅陰。芳香理脾。

生茅朮 兩 炒黑黃柏 兩 炒黑地榆 兩 猪苓 兩 澤瀉 兩 水法丸服三錢

葛 酒客大便久瀉。腸上曾於瘡瘍。春夏脇下有形。腹形滿脹。此久蘊溼熱。羸瘦自利。未能泄邪。腸胃氣壅。利頻不

爽。法當分消。以去溼熱。若攻劫太過。必傷脾胃。議用丹溪小溫中丸。早進二錢五分。夜進二錢五分。三兩

某 潮熱自利。腹痛。黃芩 生白芍 枳實 桔梗 檳榔汁 木香汁 乾薑

徐 能食腹痛。下痢兼和其陰。人參 生白芍 黃芩 枳實 川連

某 十溼熱內蒸。下痢紅積。炒黑神麴 炒黑查肉 茯苓皮 飛滑石 新會皮 厚朴 淡竹葉 扁豆葉

祝 八十年久痢。須推飲食。避忌酒客溼滯腸中。非風藥之輔。佐苦味入腸。何以勝溼逐熱。久病飲食不減。腸中病也

此非煎藥所能治者 綿茵陳 香白芷 北秦皮 茯苓皮 黃柏 藿香

某 形瘦陰虧。溼熱下痢。誤投消食。反劫津液。邪未盡。津先耗。咽喉痛且噎。所謂溼未罷。已上燥矣。

川連 銀花 通草 黃芩 川貝 茯苓皮 寒水石 川連 厚朴 秦皮 鬱金

山 十五溼鬱腹痛。痢紅如豆汁。生茅朮 炒山查 厚朴 紅麴 廣皮 猪苓

此扶飲之 砂方極宜

某 夏秋痢疾固是溼熱傷氣脾胃氣滯後重裏急不爽古方香連丸取其清更熱必依理氣謂氣行斯溼熱積聚

無谷留矣知母生地滋陰除熱治陰分陽亢之火與痢門溼熱大異蓋滋則呆滯氣純室塞宜乎欲便不出究竟

溼熱留邪仍在桂附熱燥又致肛墜痛如刀割補中益氣東垣成法僅僅升舉下焦清陽未能直透腸中再用大

黃重藥兼知母生地等味更令傷及下焦書義謂諸痢久都屬腎傷亦不小腹墜息冷顯然是下症議與升陽亦

須下治 人參 茯苓 澤瀉 又草 防風根 羌活 細辛 生薑 大棗

某 舌白濁不欲飲心腹熱每痢必痛肛墜病又不爽微嘔有痰口味有變頭中空痛兩頰皆赤此穀氣蒸濕熱鬱

於腸胃清濁交混忽加煩燥難鳴苦况法當苦寒泄熱苦辛香流氣滲泄利溼蓋積滯有形溼與熱本無形質耳

川連 黃芩 鬱金 厚朴 猪苓 槐米 秦皮

包 先厥下利膿血腹痛嘔惡乃寒熱互傷 淡黃芩 川連 丹皮 生芍 炮薑 炒銀花

陳氏 溫邪經前不解發熱自利神識有時不清此邪伏厥陰恐致癰瘰 白頭翁 川連 黃芩 炒芍 白頭翁湯加茶芍

又 溫邪誤表劫津神昏恐致瘧厥 炒生地 阿膠 炒麥冬 生白芍 炒丹皮 女貞子

邱 樞 進潤劑痛緩積稀知厥陰下利宜柔宜通血虛有風顯然 生地 阿膠 丹皮 生白芍 銀花 小兒穉慶

某 熱漸入裏胸痞便泄議酸苦泄熱 黃芩 川連 枳實 白芍 廣皮白 滑石 甘草 殺芽

蔡 內虛邪陷協熱自利脈左小右大病九日不減是為重症議白頭翁湯方加黃芩白芍

潘 時令暑溼都從口鼻而受氣鬱則營衛失於轉運必身熱無汗其邪自上以及中必循募原致腸胃亦鬱腹痛

瀉積無非濕熱之化此分消利溼則可若以表藥則傷陽氣矣 茯苓 陳皮 厚朴 木香 炒扁豆 炒山查

又 協熱下痢沾膩血水是腸胃中濕熱之化也 北秦皮 白頭翁 茯苓 澤瀉 炒銀花 益元散

某 春溫內陷下痢最易厥脫 川連 阿膠 淡黃芩 炒生地 生白芍 又草

王 熱毒逗留不化潮熱下利 川連 黃芩 炒白芍 茯苓 澤瀉 木瓜

血痢 張三 江南地薄氣弱夏季食物內蘊時令熱迫內聚溼熱赤痢入冬不愈皆飲食不忌之累宜淡海滋味

生芡朮 厚朴 南山查 草果仁 檉根皮 槐花 廣皮 銀花

上海文...

...

...

馬虛氣滯

又痢血三月晝利夜止肛門欲墜以氣陷門戶不藏

人參 當歸 白芍 肉桂

炙草

白朮

此非血痢之方更用煎藥以絡其血 廣皮 南棗

某四血痢半載少腹痛六味地黃加炒查肉炒延胡

血積痛痢起於夏令秋半不減明是濕熱滯於腸胃久延面色消奪右脈搏大乃痢症所大忌稍通積聚兼以

和血 酒炒大黃 川連 黃芩 丹皮 肉桂 歸身 白芍 生甘草

袁七久痢腹疼下血 生黃芪錢 生白朮錢 炒歸身錢 炒查肉二錢 炒地榆半錢 廣皮錢 厚朴錢

美活分 防風根五分

朱凡下痢滯瘀血 肛中氣墜 腹不痛 炒黑樗根皮兩 生茅朮錢 生黃柏一錢 炒黑查肉三錢

炒黑銀花半錢 赤苓錢 猪苓半錢 炒黑地榆半錢 生茅朮錢 生黃柏一錢 炒黑查肉三錢

某痛痢不爽已有血下暑濕不獨在氣分且積滯如素攻奪宜慎 當歸 白芍 南山查 厚朴 草果 炮薑

某脈緩臍上痛便稀溺短此乃濕鬱脾胃之陽致氣滯裏急宗古人導滯分消意

生茅朮 廣皮 厚朴 官桂 飛滑石 茯苓 猪苓 澤瀉 炒山查 桑朮散

張五脈沉伏久痢腹痛畏寒少食氣弱腸滯以溫通方法 熟附子 生茅朮 生大黃 茯苓 厚朴 木香

又溫下相投腸滯不通皆因腑陽微弱古腎治痢不離通瀉二法 當歸 肉桂心 茯苓 厚朴 南山查 生茅朮

生六平昔溫補相投是陽不足之體聞患痢兩月不忌食物脾胃滯壅今加嘔惡夫六腑宜通治痢之法非通即瀉

從中不消。因而下注矣。遠延日久。正氣固虛。仲景論列三陰。至太陰篇中。始言出腹滿。字樣。脾為柔臟。惟剛藥可。以宣揚驅濁。但今二腸窒痺。氣不留行。理中善法。決難通腑。考內經二虛一實者。治其實。開其一面也。然必溫其。陽佐以導氣逐滯。欲圖扭轉機關。捨此更無他法。製附子論。不。生厚朴。木香。製大黃。炒黑大茴。

又。懈弛。半月。脾腎復健。脾敗不主健運。納食皆發痰味。腎真失司。納氣水液上泛。阻咽。皆痢傷濁。壅發。脈未傳。脈。見弦勁。是無胃氣。小愈。變病。最屬不寬。入冬為藏陽之令。今陽漸清散。而陰液枯槁。渴不多飲。飲不解渴。治陽必。用剛藥。其陰更涸矣。轉展無可借者。勉與脾腎分調。脾陽動則冀運。腎陽靜可望藏。王道固難速功。揆之體用。不。可險藥。早服炒焦腎氣丸。午服參苓白朮散。加益智仁。

陽虛

許三勞倦咳嗽失血。仍然不避寒暑。食物腹中瀉。病上加病。後感法當先治。以分病有新舊。厚朴。益智。廣皮。茯苓皮。白芍。炙草。木瓜。炒扁豆。

又。咳嗽瀉痢。藥治相背。治肺礙脾。治脾礙肺。方今文冬。治痢為要。病人說早食相安。晚食脹滿。脾胃陽氣已。勿。徒消滯寒。越矣。白芍。桂酒。益智。廣皮。茯苓。焦白朮。炙草。穀芽。砂仁。殼。炒菟絲餅。茯苓。

張。下痢瀉泄之後。診脈右弦大。胃虛少納。陽弱不司運化。法當通腑之陽。人參。益智仁。炒砂仁。未。廣皮。白。陸六腹滿。自痢脈來濡。小病在太陰。況小便清長。非腑病溼熱之比。法當溫之。生於木。附子。茯苓。厚朴。乾薑。

許。痢疾一年。已浮腫瀉瀉。古稱久痢必傷腎。月前用理陰煎。不應。詢及食粥吞酸。色痒脈濡。中焦之陽日。儘水穀。之溼不運。仍早溫以甦脾陽。佐以分利。用胃苓湯去甘草。加益智。

陳。痢積雖然少緩。諸款不減。面色青晦。四肢厥冷。仍在險途。擬。益黃散法。某。脈微細。肢厥下痢無度。吳茱萸湯。但能止痛。仍不進食。此陽敗陰濁。腑氣欲絕。用桃花湯。

某。痢後大便不實。食不健運。色脈俱是虛象。此清陽失曠於中。陰氣先走泄於下。先理中焦。再當攝陰。

某。自痢不渴者。屬太陰。呃忒之來。由于胃少納穀。衝氣上逆。有土敗之象。勢已險。議金匱附子粳米湯。得症。人參。白朮。茯苓。炙草。厚朴。炮薑。益智。廣皮。乾薑。粳米。人參。附子。

久痢忘陰
又屬有年
豈可再傷
其津液
溫中自炊
不應

補血... 卷五

某 長齋有年。土薄氣饑。加以久痢。少穀欲嘔。脾胃之陽衰矣。由夏及今。幸哉不痊。倘忽腫脹。何法施治。

人參 白朮 乾薑 炮薑 丁香 茯苓

袁 中下陽微。嘔呃下利。溫中不應。恐延衰脫。夫陽宜通。陰宜守。此關開不致潰散。春回寒舍。生氣有以把握。候王

先生主議。人參 附子 炮薑 炒粳米 赤石脂 生白芍

某 春痢入冬。痢止腹痛。食少。童年那有淫慾之擾。此係寒熱不和。脾胃受傷也。六君子湯加肉桂

某 脈沉微。下痢紅紫黑。當和 舌胎粉白。並不渴飲。此大陰脾胃虛寒也。做理陰煎。

唐氏 下痢四十餘日。形寒腹痛。炒當歸 生白芍 肉桂 炒山查 青皮 茯苓

沈 議堵截陽明一法。人參 炒白粳米 炮薑 赤石脂

某 六高年下痢。痰多。舌乾。脈右空大。神困音低。乃脾胃兩虧。二氣交虛。有年致此。恐非所宜。

人參 芫絲子 赤石脂 炮薑 茯苓 木瓜

王 伍久痢。久瀉。為腎病。下瀉久而陰傷。氣墮四神。凡治脾胃。腎氣泄。辛溫香燥。皆剛佐入。五味酸柔。不過稍製其雄烈。

此 肛墜尻疲。乃腎液內少。而氣陷矣。腥油肉食。須忌。 燻熟地 禹餘糧石 五味子

將 五久痢。用辛甘溫而斂。是脾陽久傷。治由東垣法。極是。迷食血腥。滑必便澹。四肢忽有肉疹。營衛內應脾胃。氣血

未得充復。五旬外下。亦法用脾胃兩補。人參 山藥 茯苓 湖蓮 芡實 補骨脂 茯苓 炙草 芫絲 覆盆子

某 下痢腹痛。舌乾。肛墜。痢傷陰也。 熟地炭 炒歸身 炒白芍 炒查肉 茯苓 炙草

某 滯濁下行。痛緩。議養陰通腑。 生地 阿膠 丹皮 山梔 豬苓 澤瀉

孫 脈左數。下利腹不甚痛。暮夜微熱。所伏暑熱。乘陰虛下陷。是清熱理脾。不效。當攝陰升陽。

熟地炭 當歸炭 山查炭 炒黑麥芽 炙黑甘草 防風根 炒黑升麻

又 照方去山查麥芽。加人參。真白芍。

又 瀉痢久。必陰損。液耗。此口渴微咳。非實火客邪。與甘酸化陰。人參 山藥 芡草 炒烏梅 炒胡蓮肉

茶 脈右數。左細。數面垢。舌淫。白苔點點。肌胃甲錯。左脇動氣。伏暑當秋涼而發。初病如瘧。當從苦辛寒法。果邪熾。

此為正論

恐變為下痢。胃津液劫。陰液大耗。昔賢於熱病受瀉。急以救陰為務。苟胃關得甦。漸以冀安。否則犯喻氏所指。客邪內陷。液枯致危之戒矣。復脈湯去薑桂麻。

又 酸甘化陰法 人參 生地 烏梅 炙草 麥冬 木瓜

鮑 痢久陰液消亡。無以上承。必唇燥舌乾。胃關不和。善噫難飢。此由陰膩柔剝所致。擇其不膩滯者調之。

人參 炙草 炒白芍 炒烏梅肉 炒麥冬 茯苓 炒山查 炒烏梅

周 五痢後氣墜。都主陰陽。但嗔恐不已。木犯土。致病留連。攝陰之中。聊佐和肝。熟地 茯苓 炒山查

某 陰液涸則小水不通。胃氣逆則厭食欲嘔。此皆痢之款症也。治以中下二焦為主。宜理陰煎。

此方與 熟地 白芍 附子 五味 炮薑 茯苓

矣 十痢久陰傷。腹痛肛門墜脹。秋病入冬不愈。已屬休息症。和陰劑中。仍有升降。做東垣法。

炒熟地 炒當歸 炒白芍 炙草 生山查 生穀芽 茯苓 柏茴香

陳 三瀉痢久則傷腎。亦未必多見。下焦沉墜。先傷在陰。剛藥不效。人參 鹿茸 入丸不煎 羌縶子 砂仁 製補骨脂

張 五晨泄痢血屬腎病。無痛墜等因。用黑地黃丸。瀉痢起於長夏。腎謂時令溼熱。胃苓湯芍芍法。固非謬說。因高年腎陽肝陰先虧。使客氣內擾。阻滯中流。乏砥

柱坐鎮。致狂瀾滔天。耳病經兩旬不減。重陰無陽。驗諸神識甚清。其小邪為少。而內損為多。八脈無機。下無收攝。漏危不已。理必生陽泄下焦冷。此皆陰陽二氣微絕。治病則務治本。則宜非置之不理。實寬天人而已。

人參 鹿茸 炒黑當歸 生杜仲 生沙苑 茯苓

李 五自痢五六年。即周身痛痺。蓋腸胃病致經絡筋骨藩籬疎懈。陽失衛。藥難效靈。書此代煎。

又於未 茯苓 熟附子 河水煎

吳 四治痢大法。無過通塞二義。夏秋濕熱固多。初痢不痛。已非溼熱。色滯者。腸中陳腐也。至今痛而痢。痢後復痛。按

之痛減。腐虛。小雪不愈。陽不來復。久痢治腎。然非滋膩。先用苓薑朮桂湯。

某 氏治痢古法。不越通瀉。經停有痛。腹浮腫。八脈之病。醫感於見。頑認為脾胃。議用濟生腎氣丸。

來五痢久肛墜是下焦腎虛失於收納治脾胃藥無功熟地炭炒歸身赤石脂五味子炒查肉
周六痢久必傷腎陰八脈不固腸膩自滑而下但執健脾無用病不在中納穀運運下焦攻陽亦衰用三神丸

五味子 補骨脂 肉果

某痢久陰陽兩傷少腹肛墜連兩腰膝脊髀痠痛由臟腑絡傷已及奇經前議輕劑升陽頗捷仍從下治

人參 鹿茸 入劑用鹿茸古有此法但有火者不宜 附子 炒當歸 茴香 羌活 杜仲

周轉方柔藥相安顯然久痢傷及腎陰當用理陰煎兼用禹糧石脂丸以攝固腸中

熟地炭 歸身炭 人參 炙甘草 五味子 炒查肉 兼服禹糧赤石脂丸

金氏脈數勁下痢腹鳴痛後墜臥則氣衝咳嗽吐粘涎產後過月顯是下損至中納穀日少形神日衰勢已延成奪

勞難期速功 此方全不治病與業相反 熟地炭 人參 茯神 炒山藥 建蓮 赤石脂

某氏休息痢經二年明是下焦陰陽皆虛不能收攝經期不來小腹撫摩有形上行似乎微癢其實氣結若不急

進溫補恐滋擾腫脹之累也 人參 附子 茯苓 炙草 五味 白芍

某氣虛下陷門戶不藏 人參 黃芪 廣皮 炙草 歸身 炒白芍 防風 升麻

某痢經五十日來小愈再發獨見後重下墜此為氣陷則門戶不藏亦胃弱內風乘襲議陷者舉之

人參 歸身 白芍 炙草 升麻 荷葉

瘕變石 瘕邪熱氣內陷變痢延已三月脾胃氣衰面浮肚脹仍有裏急欲墜之象中虛伏邪進以和解

黃芩 柴胡 人參 丹皮 炒當歸 白芍 殺芽 炒山查

蔡神氣索然腹中動氣古紅溢乾寒熱日進平素積勞致虛邪伏厥陰脈促細堅溫清難用勉議復脈湯存陰勿

涸希圖援救 復脈湯

又兩投復脈色脈略轉所言平素積虛不但瘕邪內陷陽結於上則胸痞陰走於下則頻利非徒開泄攻邪也

救逆湯去薑

又奔脈動氣皆是陽虛濁逆當和營理陽 人參 茯苓 歸身 炙草 桂心 牡蠣 煨薑 大棗

林是類必
有伏邪沈
積

氣虛
下陷

疝症不現
即遺延時
宜用
疝症之象
宜用

又 衝氣填塞邪陷下痢勢非輕小用瀉心法

又 人參 淡乾薑 熟附子 川連 黃芩 枳實

又 人參 淡乾薑 生地 炒桃仁

又 氣衰熱伏腹痛下痢腕中痞悶不欲納食由瘧變痢經邪入腑斯病勢已重清理濕熱以開痞延久必須扶正

此宜非經 一劑之方 淡黃芩 川連 人參 生白芍 乾薑 枳實

某 邪陷瘧後變痢傷及厥陰症見氣上撞心飢不能食乾嘔腹痛全是肝病肝為至陰之臟相火內寄仲景治法

不用純剛燥熱之藥以肝為剛臟故也今正交土旺土木為儲五日內未為穩當

人參 炒當歸 炒白芍 炒烏梅肉 茯苓 淡吳茱 生香附汁 真北秦皮 煎藥送赤石脂凡三錢

腸風

孫 下痢無積肛墜腸開汨汨有聲此屬腸風當用攝固 炒地炭 黃肉炭 炒歸身 炒枳子 川斷 此味肉 煎藥送赤石脂凡三錢

某 當年痢久用三神丸得效是脾腎兩困兼理氣分之滯體質陽虛遇冷病加今病起長愈小水不通必係夏熱阻其宣化久則氣血凝著而為腸紅先與桂苓甘露飲分清其濕 於朮 茯苓 澤瀉 滑石 宜地薑

包 川連 人參 黃芩 白芍 草決明 炒山查 炒銀花

噤口

又 噤口痢乃熱氣自上下衝而犯胃口腸中傳導皆逆阻以閉腹痛在下尤甚香連梅 僅宜中但未能泄下熱

又 痞塊若不急清陰液同歸於盡姑明其理以俟高明備擇 白頭翁湯 乾薑 與川連同 白芍 木香汁

又 脈左細數右弦乾嘔不能納穀腹痛裏急後重痢積不爽此暑溼深入著膈勢屬噤口痢症非輕渺議用苦

寒清解熱毒必痛緩胃開方免昏厥之變 川連 黃芩 銀花 炒山查 乾薑 用方是 白芍 木香汁

又 下午病劇乃陰氣消亡之徵若但陰柔恐生生不至疎補胃藥正宜進商 生地 阿膠 炒山查 炒銀花

喬 初起無寒熱即瀉痢嘔惡不食乃噤口痢重病夫暑邪之傷由口鼻吸氣而入邪與水穀交混蒸變溼熱釀為

積滯膿血腸胃氣窒欲解不能通爽遂致裏急後重香連苦辛理氣導溼清熱初用頗是皆緣勞碌之人非膏粱

溫養之質淡薄積勞中氣易傷四十日來積少痛緩醫稱病解而食不下咽不知飢飽診得脈弦形裏舌白不渴

飲水日瀉數行全屬胃倒氣奪中宮損極下關不攝殺不能咽焉能承受湯藥藥味氣苦胃衰必惡久痢久瀉務

得古方服藥之法

陰暑二字不通已極其用熱藥病根在此

天有陰暑人亦有陰熱豈非笑

在能食。古人非醒脾胃。即安腎攝納。再詢粉漿下咽。或倉或噎。議以上脫宜通其清陽。下焦當固攝其滑脫。做古方中參苓白朮散未當。以米飲日服二次。間以不膩滑之物。食此步勿多。以示胃之所喜為補。必須胃氣漸醒。方可轉危為安。
人參錢二 焦朮錢半 茯苓錢半 炙甘草錢五 炒扁豆錢二 苡仁錢半 桔梗錢一 砂仁錢半

炮薑炭錢一 肉豆蔻錢一 右藥研細秤准分兩。每次用香梗米湯調服一錢五分。每日進二次。

舌心黃微白。渴飲水漿停胃脘。乾嘔微冷。呢自利稀水。小便不利。診脈堅勁。不和。八白。又二暑濕熱邪內著。

必脾胃氣醒。始可糜耐。以高年不可過清。過消。用清暑益氣方法。
川連 黃芩 石蓮子 煨乾葛 青皮 人參 茯苓 厚朴 積殼 澤瀉

又 口中乾燥。小水全無。泉源已竭。陰液無以上承。痢症噤口。都是溼熱壅於胃口。下元衰敗。衝脈氣震高突。此攻

病保真。理難捉摸矣。川連 黃芩 草決明 石蓮子 烏梅 白芍

痢症古名滯下。惟夏秋暑溼挾積者居多。其次則風淫火迫寒侵也。推之燥氣。獨不為患。攻前法悉有定例。不必再述。至於暑者。有陰暑陽暑之分。其邪必兼乎濕。夫陰暑由於人之陽氣先虧。加以貪涼喜冷。鬱折生陽。故

主於溫陽。暑由於天之熱。伏阻氣化。濁則重於清。而醫之下手工夫。於此須細心認定。但邪之來也。似水之流

臟腑間。一有罅隙。則乘虛而著。故有在氣在血之分。傷臟傷腑之異。若表之邪鬱。而氣機下流不息者。喻氏論

人參敗毒散裏之積壅。而寒熱交粘者。潔古立芍藥湯。在氣分有苦辛調氣。與甘辛益氣等法。在血分有酸苦

行血。及鹹毒養血諸方。若表症急。從乎三陽。有桂枝湯。葛根苓連湯。小柴胡湯。裏熱實。專究脾胃。有小承氣湯。

溫脾湯。總之治腑。以三焦見症為憑。治臟。以足三陰為要領。及不必辨得虛實之情形。酌以或通或瀉之法。則臨

症權宜。庶乎不錯矣。但是症不治之條甚多。最難愈者。莫如休息痢。攻補之法非一。予亦不贅。最危險者。莫如

噤口痢。却有兩端。若因暑溼外充。格拒三焦者。氣機皆逆傳。而開上下之勢。渾如兩截。若治不得其要。則邪無

出路。正立消亡。此丹溪立法最高。後世都宗其旨。先生又借用半夏瀉心湯。減去守中之品。取補以運之。辛以

開之。苦以降之。與病情尤為允協。所以先生之見長。是集之真妙。每每在此。又因脾胃之陽素虛。陰邪從中而

下者。先傷太陽。繼傷少陰。關關大開。痛泄無度。戊癸少化火之機。命陽無蒸變之力。此不飢不食。為嘔為脹。理

宜求寒與邪多積熱之候。相此絕然不同。參之仲景理中湯。腎氣丸。及景岳理陰煎。胃關煎等法。可也。吾鄉姚

宜求寒與邪多積熱之候。相此絕然不同。參之仲景理中湯。腎氣丸。及景岳理陰煎。胃關煎等法。可也。吾鄉姚

陰虛
陽虛
寒濕
濕熱

此乃持此
不知此者
名醫與一
以百計可
為一刺

濕熱

頭真先生化出捷徑良法。以大劑茯苓配入參歸薑附桂製白芍之類治之。過大虛弱中一二劑。有虛不應手而愈。想茯苓之性。溫能逐下。鹹可利胃。質之柔順。以補陽中之陰。較地黃阿膠尤勝。與之腸胃竭盡。絡脈結滯而痛者。堪稱神品。自此推廣。用活甚多。若曰某方某藥。但治某症。不知活用。反稱杜撰。則禁絕後人靈活之心。無從施發矣。即新甫。○夏秋之痢。總由溼熱積滯。與傷寒。傳入三陰之痢。不同。案中合法者。亦是夏一過老年。及又補而補。以此中實無定見。也。後人竟用溫補。以為本之。此老殺人無算。願目傷深。

便血

鄭夏主後溼熱內蒸。腸風復來。議酸苦法。川連 黃芩 烏梅肉 生白芍 黃皮 厚朴 荆芥炭 芍花炭 又駐車九仁錢
某脈右數。形色蒼黑。體質多熱。復受長夏濕熱。內蒸水穀氣壅。血從便下。法以苦寒佐以辛溫。薄味經月。可冀病愈。 茅朮 川連 黃芩 厚朴 地榆 槐木

愈

程年疴疾。飲嗜喘。不得安卧。以辛溫通陽。切飲而愈。知脾陽內弱。運動失職。水穀氣蒸。飲邪由溼而成。溼屬陰。又鬱化熱。熱入絡。血必自下。但體質仍屬陽虛。凡腸紅成方。每多苦寒。若臟連之類。於體未合。毋欲速也。

陽虛

俞陽虛。腸紅洞瀉。議劫胃水。理中換生。茅朮生厚朴。附子炭。炮薑。 茅朮 厚朴 廣皮 炮薑
程寸脈沉。裏後下血。少。是痔漏。年淳。補得此。乃食物不和。腸絡空隙。而滲。與升降法。 茅朮 厚朴 廣皮 炮薑
又脈緩。濡弱。陽氣不足。過飲溼勝。大便漉滑。似乎不集。便後血色紅紫。亦兼有成塊。而下。論理是少陰腎臟失

寒濕

司固攝。而陽明胃脈。但開無合矣。從來治腑。以通為補。與治臟。補法迥異。先擬暖胃通陽一法。 生茅朮 人參 茯苓 新會皮 厚朴 炮附子 炮薑炭 地榆炭

濕退

脾陽 程三食入不化。飲酒厚味。即瀉。而腸血未已。血蓋陽微。健運失職。酒食氣蒸。溼聚陽鬱。脾陽清陽日陷矣。議用東垣 升陽法。 人參 茅朮 廣皮 吳草 生益智 防風 炒升麻

中虛

某陽虛體質。食入不化。飲酒厚味。即瀉。而腸血未止。血蓋陽微。健運失職。酒食氣蒸。濕聚脾陽。清陽日陷矣。當從 謙甫先生法。 人參 二錢 乾薑 二錢 半瓊 附子 三錢 茅朮 五錢 升麻 三錢 歸身 錢 白朮 二錢 半

陷

濕下

此何以竟道著

鬱蒸
木火
犯土

木鬱
土中

大腸
血熱

陽明
不問

厚朴二錢

地榆三錢

神曲三錢

右藥各製薑棗湯丸

廣皮二錢

又草二錢

葛根二錢

白芍錢

益智錢

溫

溼勝中虛便紅

焦木

炒當歸

炒白芍

炙草

防風根

煨當歸

乾荷葉

廣皮 生熟茅

劉

鬱蒸腸紅復來木火乘腑絡腹中微痛議與和陰

冬桑葉

丹皮

生白芍

黑山桅

乾荷葉 薑棗湯

張

二年前衝氣入腕有形痛嘔查前後有血此屬厥陽按絡風動內燥頭顛昏眩痛每日用龍膏丸

清陽下陷

門戶失藏

致裏急便血

參木

參木

葉

噴怒動肝絡血乃下按之痛減為虛夫肝木上升必犯胃口遂服欲嘔清陽下陷門戶失藏致裏急便血

自覺冷者非真冷也

駐車丸

參木

參木

參木

程

少陽終病必犯太陰脾陽衰微中焦痞結色痿加痺便後有血痔論脾乃柔臟非剛不能魁陽狀鬱勃致病溫

燥難投

議補土泄木方法

人參

當歸

枳實汁 炒半夏 桑葉 丹皮 參歸養脾之營

某

凡有痔疾最多下血今因噴怒先腹滿隨瀉血向來糞前近日便後是風木鬱於土中氣滯為膨氣走為瀉議

理中陽泄木法

人參 附子 炮薑 茅朮 厚朴 地榆 升麻 醋炒 柴胡 醋炒

黃柏 黑糖 豆皮 地榆炭 柿餅炭 槐花 金石斛

元參 黑山桅

元參 黑山桅

某

便紅脈數生地三錢

銀花三錢

黃芩一錢

白芍半錢

槐花一錢

槐花一錢

某

脈數能食腸紅陰自下泄腸腑熱燥所致非溫補之症

細生地此方卻

地榆炭 柿餅炭 槐花 金石斛

元參 黑山桅

元參 黑山桅

元參 黑山桅

某

內熱腸紅發痔當清陰分之熱

生地 炒丹皮 酒炒黃芩 炒黑槐花 柿餅炭 元參 黑山桅

嗽血已止囊中見紅中焦之熱下移腸胃屬腑止血亦屬易事花甲以外年歲數移入下到底下元衰矣

細生地 川石斛 柿餅炭 天冬

細生地 川石斛 柿餅炭 天冬

細生地 川石斛 柿餅炭 天冬

趙

勞倦便後血

炒黑槐根皮

炒黑地榆

炒黑丹皮

五加皮

炒黑銀花

錢

陰虛內熱腸紅不止

炒黑槐根皮

炒生地

炒銀花

炒黑地榆

炒黑地榆

蔡

脈濡小食少氣衰春季便血大便時結時瀉思春夏陽升陰弱少攝東垣益氣之屬升陽恐陰液更損益以甘

人參 炒梗米 禹糧石 赤石脂 木瓜 炒烏梅

酸

固澁開明為法

人參 炒梗米 禹糧石 赤石脂 木瓜 炒烏梅

錢

陰虛內熱腸紅不止

炒黑槐根皮

炒生地

炒銀花

炒黑地榆

炒黑地榆

蔡

脈濡小食少氣衰春季便血大便時結時瀉思春夏陽升陰弱少攝東垣益氣之屬升陽恐陰液更損益以甘

人參 炒梗米 禹糧石 赤石脂 木瓜 炒烏梅

酸

固澁開明為法

人參 炒梗米 禹糧石 赤石脂 木瓜 炒烏梅

錢

陰虛內熱腸紅不止

炒黑槐根皮

炒生地

炒銀花

炒黑地榆

炒黑地榆

蔡

脈濡小食少氣衰春季便血大便時結時瀉思春夏陽升陰弱少攝東垣益氣之屬升陽恐陰液更損益以甘

人參 炒梗米 禹糧石 赤石脂 木瓜 炒烏梅

凡詳血內
時多外
時少

腸仁無十
四年者拜
血則千及
者甚多

脾胃
氣滯

脾胃
陽虛

心脾
皆損

脾不
統血

陰陽
虛弱

陰虛
血滯

勞傷
營衛

某 龍食腸血脈色也。肝序下。或酸苦。或風。或堅。或陰。或肉。或炭。或血。或黃。或柏。或地。或榆。或炭。或禹。或石。或赤。或石。或

九蒸白木

南山楂

茯苓

廣皮

穀芽

麥芽

薑棗湯法

其二便血如注

面黃脈小。已經三載。當益胃法。

人參錢

焦木錢

茯苓錢

炙草錢

木瓜錢

李仁 上年夏季。絡傷下血。是操持損。營治在心脾。

歸脾飴糖丸

未 入暮腹痛。鳴響。墨丸久已偏墜。春正下血。經月顏色鮮明。此痛決非傷於積聚。乃營損寒乘。木來侮土。致十

四載之纏綿。調營培土。以甘。泄木散鬱。宜辛。節口戒慾。百天可效。人參 痔血大 炒當歸 炒白芍 肉桂 炮薑

又 細推病情。不但營氣不振。而清陽亦傷。洞泄不已。而辛潤宜減。甘溫宜加。從桂枝加桂湯立法。

人參 又大

桂枝

茯苓

生白芍

炙草

肉桂

煨薑

南棗

又 仍議理營 人參 又大 於木 茯苓 炮薑 桂心 白芍 真武丸二錢

某 便後下血。此遠血也。焦木 炒白芍 炮薑 炙草 木瓜 炒荷葉 連 方 脈小左數。便實下血。乃肝絡熱。騰血不自甯。醫投參芪歸桂。甘辛溫煖。昧於稍火。寄藏肝膽。此語火燄風翔。上

蒙清空。鼻塞頭暈。噎咳不已。一誤再誤。遺患中厥。夫下虛則上實。陰傷陽浮。陰乃一定至理。

連翹心

竹葉心

鮮生地

元參

丹皮

川斛

又 下血陰傷。走泄。虛陽上升。頭上清發。參芪木桂。辛甘助上。致鼻塞耳聾。用清上五六日。右脈已小。左仍細數。乃

陰虧本象。下愈虛則上愈實。議以滋水制火之方。生地 元參 天冬 川斛 茯神 炒牛膝

又 脈左數。耳聾。腸痛。木夫水涵養。以致王泛。用補陰丸。補陰丸五錢。又虎潛丸。羊肉膠丸。

某 腸紅粘帶。四年不痊。陰氣致傷。肛墜刺痛。大便不爽。藥難驟功。當以潤劑通腑。生地 稽豆皮 查肉

姚 勞傷下血。絡脈空乏。為痛。營衛不主。循序流行。而為偏寒偏熱。診脈右空大。左小促。通補陽明。使開關有序。

歸芪建中湯 唐 內經以陰絡傷。則血內溢。蓋燒酒氣雄。擾動臟絡。聚血之所。雖得小愈。而神采爪甲不榮。猶是血脫之色。肛墜

腎

腎陽

久用成虛
連及腰腎
此方可用
又為骨丸
九合法度
耳食之入
以此作煎
方大無理

便甚治在脾腎以脾為攝血之司腎主攝納之柄故也晚歸脾去木香早六味去丹澤加五

沈五酒溼汚血皆脾腎柔膩主病當與剛藥黑地黃丸凡脾腎為柔膩可與剛藥心肝為剛臟可受柔藥不

可不知謙甫治此症立法以平胃散作主加桂附乾薑歸芍重加炒地榆以收下溼用之神效即此意也

吳四腹痛下血食停薺豆覆而愈治痔乃泄肺導溼之藥既愈以來復有筋骨痿痺寒熱夜臥口乾乃溼去氣泄陽

明脈之不主用事營衛失度津液不升之象天真丸主之去人參

支五痔血久下肌肉痿黃乃血脫氣餒漸加喘促浮腫再延腹脹便不可為此症臟陰有寒腑陽有熱詳於金匱發

疸篇中極難調治人參 焦木 茯苓 炒菟絲子 廣皮 生益智 木瓜

楊四中年形勞氣餒陰中之陽不足且便血已多以溫養固下男子有年下先虛也

人參 茯苓 歸身 淡從蓉 補骨脂 巴戟 炒遠志 生精羊肉熬膏丸服五錢

田三久矣晨泄腹痛近日有紅積此屬腎虛補骨脂非治積 大茴香 五味 茯苓 生菟絲

陳三脈左虛瀉右緩大尾間痛連脊骨便後有血自覺惶惶欲暈兼之約穀最少明是中下交損八脈全虧早連青

囊斑龍丸 疏補玉堂關元 暮服歸脾膏 涵養營陰 守之經年形體自固

鹿茸另切薄 鹿角霜另研 鹿角膠鹽湯 柏子仁去油 熟地九 韭子鹽水 菟絲子另磨

赤白茯苓 補骨脂胡桃肉搗爛蒸 右浴膏煉蜜為丸每服五錢淡鹽湯送

鹿茸壯腎脈之陽鹿霜通督脈之氣填補 鹿膠補腎脈之血骨脂獨入命門以收散越陽氣柏子涼心以益腎

熟地味厚以填腎韭子菟絲就少陰以升氣固精重用茯苓淡滲本草以陽明木藥能引諸藥入於至陰之界

耳不用藥味之酸以酸能柔陰且不能入脈耳

胡八上下失血先瀉血後便瀉踰月陰傷液耗胃納頗安且無操家之勞安養閒坐百日所謂靜則陰充

汪腎虛當春陽氣動咳嗽嗽止聲音未寒裏有血陰難充復不肯工承用陰藥固攝

熟地非嗽 白芍 茯苓 山藥 五味 龍骨 炒焦烏梅肉嗽失音所宜大忌

即非丹
總宜陰藥

以上諸藥
俱不能分
別入參量
柱此老與
此症竟注
然無知誤
入不少

集中不但
行血入紅
即知其為
痔血矣而
方

陳仁賢陰虛絡中執肝風動腸紅三載不已左脇及腹不爽少陽亦逆多以補中調攝故未見奏功姑用疎補為益

臟通腑 熟地炭 炒當歸 炒杏仁 炒地榆 炒丹皮 冬桑葉

又 益陰泄陽四劑血止但腰痠腕中痺咽燥喜涼飲肛熱若火焙陽不和平仍是陰精失涵用虎潛法

熟地炭 白芍 當歸 地榆炭 龜膠 知母 黃柏 諸眷髓丸

某 沫血鮮紅凝塊紫黑陰絡傷損治在下焦况少腹疝瘕肝腎見症前此精濁日久亦令陰傷於下

人參 茯神 熟地炭 炒黑杞子 五味 炒地榆 生杜仲

又 左脈小數堅肛墜脈 人參 茯神 湖蓮肉 芡實 熟地炭 五味

奇脈 陳氏脈小瀉血有二十年痔經云陰絡傷血內溢自病起十六載不得孕育述心中痛墜血下不論裏前屢後問脊

推腰尻痠楚而經水仍至跗膝常冷而骨髓試灼由陰液損傷傷及陽不固密閱頻年服藥歸芪雜入涼肝馬是

遵古治病議從奇經升固一法 鹿茸 鹿角霜 枸杞子 歸身 紫石英 沙苑 生杜仲

炒大茴 補骨脂 禹餘糧石 蒸餅聚丸 人參 歸身 白芍 茯苓 芡草 肉桂

勞力 張三勞力見血胸背脇肋諸脈絡牽掣不和治在營絡 人參 歸身 白芍 茯苓 芡草 肉桂

傷筋 計五瘀血結在絡絡反腸胃而後乃下此一定之理平昔勞形奔馳寒暄飢飽致傷苟能安逸身心痰不復聚不然

年餘再痰不治 旋覆花 新絳 青蔥 桃仁 當歸頭 柏子仁

宋氏當年腸紅繼衄血喉痛已見陽氣乘絡絡為氣乘漸若懷孕者然氣攻則動如夜與胎動迥異倘加勞怒必有

污濁暴下推理當如是觀 柏子仁 澤蘭 卷柏 黑豆皮 茯苓 大腹皮

便血一症古有腸風臟毒脈痔之分其見不外乎風注腸胃溼熱傷脾二義不若內經謂陰絡受傷及結陰之

旨為精切仲景之先便後血先血後便之文尤簡括也陰絡即臟腑隸下之絡結陰是陰不隨陽之機以先後

分別其血之遠近就遠近可決其臟腑之性情庶不致氣失統攝血無所歸如漏卮不已耳肺病致燥瀆宜潤

宜降如桑麻及天冬地黃銀花柿餅之類是也心病則火熾血沸宜清宜化如竹葉地黃湯及補心丹之類

是也脾病必溼滑宜燥宜升如蒼朮理中湯及東垣益氣湯之類是也肝病有風陽痛連宜柔宜泄如駐車丸

是也脾病必溼滑宜燥宜升如蒼朮理中湯及東垣益氣湯之類是也肝病有風陽痛連宜柔宜泄如駐車丸

是也脾病必溼滑宜燥宜升如蒼朮理中湯及東垣益氣湯之類是也肝病有風陽痛連宜柔宜泄如駐車丸

是也脾病必溼滑宜燥宜升如蒼朮理中湯及東垣益氣湯之類是也肝病有風陽痛連宜柔宜泄如駐車丸

又不得與
法方等
也血脈中
必有受之
虛者氏所
謂腸有氣
便血殺人
是也當知
今惟知用
人參黃附
及五味等
燥熱收斂
之藥助其
腸中之火
而於脫血
之後更劫
其陰非
純虛是益
其疾矣
當有外治
之法
此乃大腸
之大害清
火更煎外
治若升提
則非宜矣

及甘酸和緩之劑是也。腎病見形消腰折宜補宜填。如虎潛丸及理陰劑之類是也。至膽經為樞機逆則木火
煽營。有桑葉山梔柏子丹皮之清養。大腸為燥臟。每多溼熱風淫。如辛涼苦燥之治。胃為水穀之海。多氣多血
之鄉。臟病腑病。無不兼之。宜補宜和。應寒應熱。難以拘執。而言若努力損傷者。通補為主。骨蒸癯積者。清疎為
宜。痔瘡則滋燥兼投。中毒須知寒熱。餘如黑地黃丸以治脾溼。腎燥。失真丸以大補真氣。真精。平胃地榆之升
降脾胃。歸脾之守補心脾。斑龍以溫煦奇督。建中之復生陽。枳實之疎補中土。禹糧赤脂以堵截陽明。用五仁
湯復從前之腸液。養營法善病後之元虛。此皆先生祖古方而運以匠心。為後學之津梁也。
邵新甫

脫肛

溼熱
下陷
氣虛

腎氣
不攝

翁

溼熱皆主傷氣。氣下陷。墜肛而痛。溼滯後陰。囊筋牽著於肛。其痛為甚。夫厥陰肝脈。遠陰。按脈濡弱。決非疎泄
主治。議道陷者舉之。從東垣補中益氣湯。先當治大腸之火邪

孫

面色痿黃。腹痛下血。都因飲食。重傷脾胃。氣下陷為脫肛。經月不愈。正氣已虛。宜甘溫益氣。少佐酸苦。務使中
焦生旺。而稱年易虧之陰。自堅。冀有向安之理。人參 川連 炒歸身 炒白芍 炙草 廣皮 石蓮肉 烏梅

又

肛翻純血。不但脾弱氣陷。下焦之陰亦不攝固。面色唇爪已無華色。此益氣乃一定成法。攝陰亦不可少。然幼
穉補藥須佐宣通。以易虛易實之體也。人參 焦木 廣皮 白芍 炙草 歸身 五味 升麻 醋炒 柴胡 醋炒

某

便後少腹痛。肛墜溺則便滑。腎虛不攝。熟地炭 五味 萸肉炭 茯苓 炒遠志 炒菟絲子

某

肛墜尻痛。利多傷陰。熟地炭 五味 茯苓 炒山藥 炒查肉 炒菟絲子 煎送禹糧石脂丸

王

六陽氣下陷。腎氣不攝。肛墜氣泄如風。向老下元陽。非升藥能舉其陷。

人參

鹿茸 補骨脂 炒大茴香 茯苓 調入陽起石三分
斑龍丸加五味子蜜丸
脫肛一症。其因不一。有因久痢久瀉。脾腎氣陷而脫者。有因中氣虛寒。不能收攝而脫者。有因酒溼傷脾。色慾
傷腎而脫者。有因腎氣本虛。關門不固而脫者。有因溼熱下墜而脫者。又肛門為大腸之使。大腸受寒受熱。皆

能脫肛老人氣血已衰小兒氣血未旺皆易脫肛經云下者舉之徐之才曰瀆可去脫皆治脫肛之法也觀先生治脫肛之症亦不越乎升舉固攝益氣三法如氣虛下陷而脫者宗東垣補中益氣湯舉陷為主如腎氣不攝而脫者宗仲景禹糧石脂丸此治崩漏及熟地五味羌絲葷固攝下焦陰氣為主如肝弱氣陷脾胃氣虛下陷而脫者用攝陰益氣兼以酸苦泄熱為主如老年陽氣下陷腎真不攝而脫者又有鹿茸陽起石等提陽固氣一法汪詒菴云有氣熱血熱而肛反挺出者宜用冷連槐柏及四物升柴之類愚謂即或間有此症終非可訓之法此症存之以質君子邪滋九〇脫肛多由濁氣下降淫毒火合併為害故腫痛異常此實症也必清其用補中益氣之法以提之十不得一者也不論何因俱用升提之法肛門之疾火濁氣將升提而置之何地耶又脫肛之疾屬熱多又用溫燥更非所宜

肺熱葉焦

湯六有平偏痿日瘦色蒼脈數從金匱肺熱葉焦則生痿履論

肺熱之痿是痿症中一症其實屬陽明居多

玉竹 大沙參 地骨皮 麥冬 桑葉 苦百合 甜杏仁

徐巖面癩跖癩此屬肺熱痿躄連翹 花粉 黑山梔 赤小豆 桑葉 白通草

溼火

張 溼中伏熱沈著下焦用苦勝溼辛通氣分然必循經入絡漸次達及陽明

綿茵陳錢 生茅木五分 黃柏半錢 晚蠶沙錢一 寒水石錢三 茯苓皮錢三

又 色蒼脈實體質堅壯雖年逾四旬氣元充旺詢知平日善飲酒醴甘肥此釀成溼火蘊結下焦今少腹微腫硬

二便帶瀉自覺少腹氣脹上沖兩足沉重艱於步履腿股皮中甚熱即內經所云溼熱不攘大筋痠短小筋弛長

綆短為拘弛長為痿也更述曾因煎煉膏藥中有蘆蟲蜈蚣等物吸受穢濁毒氣未始非與溼熱糾蓄沉伏下焦前

議苦辛寒燥茲再佐以搜逐絡隧其此病從口而入必茹素戒飲一二年之久病根可拔當恪守勿懈為要

綿茵陳錢 黃柏半錢 川草解錢一 茯苓皮錢三 金鈴子錢 穿山甲錢三 大桤榔汁錢一

又 綿茵陳 草解 茯苓皮 黃柏八兩 蠶沙 漢防己 龍膽草 山梔 青黛

又 病去七八常服二妙丸可也

黃柏八兩 茅山木米泔浸切片同芝麻拌飯上蒸三五次去芝麻培乾三兩 二味研末水法凡空心服三錢開水下

更夫丸治
大腸火閉
非潤腸藥
也此等方
存而不論
可也

補下之法
此方最穩

濕熱
蒸燥
筋骨
胃氣
空筋
利骨不

邪風
入絡
陽明
虛營
絡熱
動風

肝胃
虛內
風動
肝胃
虛胃
胃陽
皆虛

吳十雨溼泛朝外來水穀聚溼內起雨因相湊經脈為痺始病繼以瘡癢漸致痿緩筋弛氣隘不用溼雖阻氣而熱

蒸鑠及筋骨久延廢棄有諸 大豆黃卷 飛滑石 杏仁 通草 木防己

廉三診脈論體從遺精漏瀉繼而環跳穴痛遂不堪行走臟陰傷及腑陽陽氣日加室塞經脈不司舒展食入壅脫

欲吐大便旬日不通痞阻日甚而為瘧症內經論治瘧獨取陽明無非流通胃氣蓋胃脈主手束筋骨利機關數

也議用加味溫胆湯 此症乃精血枯而有 留邪之症此方無著

又 大便旬日不通用更衣丸取意小腸火腑非苦不通非下不奪也

某五頭目口鼻鳴邪繼而足痿此邪風入絡所致

羚羊角 犀角 元參 細生地 黃柏 川斛 川草解

俞 五旬又四陽氣日薄陽明脈絡空乏不司束筋骨以流利機關肩痛肢麻頭目如蒙行動痿弱無加此下虛上

實絡熱內風沸起當入夏陽升為甚燥溼利疾必不應病議清營熱以熄內風

犀角 鮮生地 元參心 連翹心 冬桑葉 丹皮 鉤藤 明天麻

陳 陽明脈空厥陰風動自右肩臂漸及足跗痿躄長夏氣泄秋半不主收肅顯然虛症先用通攝方法

淡從蓉 熟地 杞子 川牛膝 川斛 茯苓 遠志炒黑 石菖蒲

夏四自穉壯失血遺精兩交夏月四肢痿癱不得轉動指節亦不能屈曲凡天地間冬主收藏夏主發洩內損多年

不復元陽明脈衰所致 當歸 羊肉膠 杞子 鎖陽 菊花炭 茯苓 青鹽

吳九下焦痿躄先有遺泄溼瀉頻進滲利陰陽更傷雖有參朮養脾肺以益氣未能救下即如畏冷陽微幾自飯

後吐食乃胃陽頻衰應乎外衛失職但下焦之病多屬精血受傷兩投桑刺溫通之補以腎臟惡燥久病宜通任

督通攝兼施亦與古賢四斤金剛健步諸法互參至於胃藥必須另用夫胃腑主手氣氣得下行為順東垣有升

陽益胃之條似乎相悖然苓連非苦降之氣味乎凡吐後一二日暫停下焦血分藥即用扶陽理胃二日俾中下

兩固經旨謂陽明之脈束筋骨以利機關諒本病必有合矣 鹿茸 淡從蓉 當歸 杞子 補骨脂

巴戟尖 牛膝 柏子仁 茯苓 川斛 吐後開服大半夏湯加淡乾薑薑汁

濕熱
肝腎
虛

沈 長夏溼熱經脈流行氣鈍。兼以下元絡脈已虛。痿弱不耐步趨。常似酸楚。大便或結或溏。都屬肝腎為病。然益下必佐宣通脈絡乃正治之法。倘徒呆補。恐季夏後溼熱還擾。須為預理。鹿角霜 當歸 生茅木 熟地 鹽汁

茯苓 桑椹子 茯苓 巴戟 遠志 小茴 金毛狗脊 三筋酒蒸水熬膏和丸 淡鹽湯送下

李 痿躄在下。肝腎病多。但素飲必有溼熱。熱痰溼滯。氣血不行。筋縮肌肉不仁。體質重者難移。無非溼邪之深沉也。若論陽虛。不該大發瘡癩。但久病非速攻。莫計效遲。方可愈疾。

細生地 鹹茯苓 當歸鬚 牛膝 黃柏 生刺藜 川斛 單解

包 五寢食如常。脈沉而緩。獨兩腿內外肌肉麻木。五旬又三。陽脈漸衰。踰維下為用事。非三氣雜感也。溫通以佐脈絡之流暢。做古賢四斤全剛之屬。

淡茯苓 枸杞子 牛膝 茯苓 白蒺藜 木瓜 單解 金毛狗脊膏丸

郭 兩足痿弱。遇冷筋掣。三年久病。藥力馬能速拔。況不明受病何因。徒見病而治。難期速功。據云精滑溺後。通納下焦為宜。淡茯苓 茯苓 川斛 生茅木 生杜仲 金毛狗脊

沈 眩暈怔忡。行走足肢無力。肌肉麻木。骨節色變。早晨腹鳴。痲泄。此精勞久傷。陽氣肝風內動。勢欲痿厥。法當脾腎雙補。中運下攝。固體治病。脾腎雙補丸 山藥粉丸 櫻仲浮方

沈 三寢食如常。儀容日瘦。語言出聲舌絡牽強。有風 手足痿弱。不堪動作。是肝腎內攝。漸及奇經諸脈。乃痿痺之症。未能驟期速功。地黃飲子 去黃味桂

席 雨水後。診得右脈頰和。左關尺大。堅搏不附骨。春陽初動。裏真漏泄。有風動枯痿之虛。議乙癸同涵意。

熟地 淡茯苓 杞子 五味 黃肉 牛膝 川斛 茯神 菊花 山藥精丸

李 氏右股跗足。無力如痿。父子夜痰多。噎嗽。帶下且頻。是衝脈虛寒。浮火上升。非治救清熱。夫衝為血海。隸於陽明。

女科八脈。奇經最要。內經論之。女子五七年。歲陽明日衰。今天矣。將絕年。歲脈絡少氣。非見病治病。膚淺之見。愚意通陽攝陰。以實奇脈。不必縷治。薛氏加減八味丸。二兩。勻七服。鹽湯送下。

許 金瘡去血。乃經脈營絡之傷。若損及臟腑。倏忽莫救。後此嗔怒動肝。屬五志中陽氣逆。與客邪化火兩途。若

奇經
肝腎
虛

奇經
肝腎
虛

奇經即八
此必衝
二子之
任脈

平泄氣頻服既多陽遂發泄形雖若豐盈而收藏固攝失職少腹約束陽道不舉背脊喜靠步履無力皆是弱症端漸至痿廢議以通納之法專事涵養生真冀下元之陽八脈之氣收者收通者通庶乎近理

此當大補藥也 鹿角霜 淡從蓉乾 生克絲粉 生杜仲粉 歸身 五味 大茴香 遠志

唐脈左沉右弦兩足腰膝疲爽無力舌本腫脹刺頸轟然蒸熱痰涎湧出味鹹此腎虛收納少權督脈不司約

束陰火上泛內風齋煽又延痿厥沉痾病根在下通奇脈以收拾散越之陰陽為法

虎潛去知柏歸加枸杞青鹽羊肉膠丸

陰虛

萬脈濡弱右大心熱煩渴兩足膝腰髀伸縮不得自如此乃下焦陰虛熱鑠筋骨而為痿躄

生虎潛去龜鹿銷加元參

骨痿

黃四冬藏精氣既少當春夏發泄失血遺精筋弛骨痿不堪行走精血內注奇脈中少氣三年久損若不絕慈安開

有僂發難狀之疾 鹿筋膠 獨羊肉膠 牛骨髓 猪脊髓 線魚膠 菝菴乾

紫巴戟 枸杞子 茯苓 沙苑子 牛膝 青鹽

某病後陰傷骨痿 生杜仲 熟地 龜甲 黃柏 虎骨 牛膝 當歸 巴戟

背陽虛

某症如歷節汗出筋緩而痛冬月為甚腰脊偃僂形俯據述未病前夢遺已久是精血內損無以營養筋骨難與攻迫議香茸丸溫通太陽腎脈

鹿茸兩 生當歸兩 麝香錢 生川烏錢 雄羊腎一對酒者爛搗丸

經云肺熱葉焦則生痿躄又云治痿獨取陽明以及脈痿筋痿肉痿骨痿之論內經於痿症一門可謂詳審精

密矣奈後賢不解病情以諸痿一症或附錄於虛勞或散見於風溼夫夫經旨賴丹溪先生特表而出之惜乎

其言之未備也夫痿症之旨不外乎肝腎脾胃四經之病蓋肝主筋肝傷則四肢不為人用而筋骨拘攣腎藏

精血相生精虛則不能灌溉諸末血虛則不能營養筋骨肺主氣為高清之臟肺虛則高原化絕化絕則水

涸水涸則不能濡潤筋骨陽明為宗筋之長陽明虛則宗筋縱宗筋縱則不能束筋骨以流利機關此不能步

版應刺筋縮之症作矣故先生治痿無一定之法用方無獨執之見如衝任虛寒而成痿者通陽攝陰兼實奇

脈為主溼熱沈著下焦而成痿者用苦辛寒燥為主腎陽奇脈兼虛者用通納八脈收拾散越之陰陽為主如

下焦陰虛及肝腎虛而成痿者用河間飲子虎潛諸法填納下焦和肝熄風為主陽明脈空厥陰風動而成痿

者用通攝為主肝腎虛而兼溼熱及溼熱蒸灼筋骨而成痿者益下佐以溫通脈絡兼清熱利溼為主胃虛室

塞筋骨不利而成痿者用流通胃氣及通利小腸火腑為主胃陽腎督皆虛者兩國中下為主陽明虛營絡熱

及內風動而成痿者以清營熄內風為主肺熱葉焦而成痿者用甘寒清上熱為主邪風入絡而成痿以解

毒宣行為主精血內奪奇脈少氣而成痿者以填補精髓為主先生立法精詳真可垂諸不朽矣耶滋九

下體痿弱確是屬虛者多案中多溫補肝腎亦不為過但其中必兼有風

疾寒溫一味變補亦有未到之處此等方起於宋而盛於明古人不如是也

周痺

風溼相搏一身盡痛加以墮米外寒裏熱痛極發厥此屬周痺

- 桂枝木 片薑黃 羚羊角 海桐皮 花粉 白蒺藜

又照前方去薑黃白蒺藜加大豆黃卷木防己

鮑四風溼客邪留於經絡上下四肢流走而痛此名邪行觸犯不拘一處古稱周痺且數十年之久豈區區湯散可效

凡新邪宜急散宿邪宜緩方不切攻 蠅螂蟲 全蠍 地龍 穿山甲 蜂房 川烏 麝香

乳香 右藥製末以無灰酒煮黑大豆汁泛丸必用此後腐以傷正氣

杜三溫暖開泄驟冷外加風寒溼三氣交傷為痺遊走上下為楚邪入經隨雖汗不解貴乎宣通

- 桂枝 杏仁 滑石 石膏 川草薺 漢防己 苡仁 通草

又經脈通而痛痺滅絡中虛則痿弱無力周身汗出陽泄已多豈可再用苦辛以傷陽泄氣乎內經以筋緩為陽

明脈虛當此宗旨 黃芪 防風 白朮 茯苓 炙草 桂枝 當歸 白芍 苡仁

又天凡邪中於經為痺邪中於絡為痿今痿痛全止行走痿弱無力經脈受傷陽氣不為護持法當溫養通補經

旨春夏養陽重在扶培生氣耳 黃芪四 茯苓三 生白朮三 炙草 淡從容二 當歸三 牛膝二

仙靈脾兩 虎骨膏 金毛狗脊十二兩無灰酒 膠骨為丸

劉三瀕海颯風潮溼者於經脈之中。此為周痺。痺則氣血不通。陽明之陽不主司事。食腥膩遂不化為滯溼。病有六

七年。正虛邪實。不可急攻。宜緩。生白朮 生黃芪 海桐皮 荆桂枝木 羌活 防風

行痺 周 痛勢流走而腫。後感外邪。參藥不可與也。從行痺治。

羌活 木防己 石膏 生甘草 海桐皮 杏仁

吳 寒入陰分。筋骨痛矣。此為痺症。遺泄內虛。忌用表散。切真。

當歸 沙苑 北細辛 桂枝木 生白朮 茯苓

又 虎骨 當歸 北細辛 生白朮 茯苓

又 行痺入左足。生虎骨 防己 萆薢 改仁 半夏 茯苓

某氏風濕發熱。萃於經脈。腫痛遊走。病名行痺。世俗呼為歷節風是也。此古病名

桂枝 羌活 石膏 甘草 杏仁 防風

又 行痺。腹中痛。便難。不知飢。瓜蒞皮 紫苑 杏仁 鬱金 半夏 山柰 桑枝

股痺 俞 肩胛連及臂指。走痛而腫一年。乃股痺也。絡虛留邪。和正祛邪。

黃芪 防風 海桐皮 生白朮 歸身 川羌活 片薑黃 白蔞藜

李三 脈小弱。當長夏四肢痺痛。一止之後。筋骨不甚舒展。此衛陽單薄。三氣為繫。先用陽明流暢氣血方。

黃芪 生白朮 漢防己 川獨活 改仁 茯苓

朱三 肢痺痛頻發。羚羊角 木防己 川桂枝尖 晚蠶沙 川草薢 白通草 生改仁 茯苓

汪 冬月溫煖此病所由來 真氣未得潛藏。邪乘內虛而伏。因驚發。節春陽內動。伏氣乃發。初受風寒。已從熱化。兼以夜

坐不眠。身中陽氣亦為泄越。醫者但執風寒溼三邪合成為痺。不曉病隨時變之理。羌防葛根。再泄其陽。必致增劇

矣。馬望痛緩。議用冲景木防己湯法。木防己 石膏 桂枝 片薑黃 杏仁 桑皮

又 氣中伏邪得宣。若肢痺痛已緩。血分留熱。壅著左肢。痛勢未衰。足微腫。體質陰虛。仍以宣通輕劑。

寒濕

羚羊角 桂枝木 片薑黃

顧 溼熱流著四肢痺痛 川桂枝 木防己

花柳

木防己

杏仁

桑皮

威靈仙

其 左脈如刃。右脈緩濇。陰虧本質。著熱為瘡。水穀溼風下墜。肢末遂成痺痺。今已便瀉減食。畏冷陽明氣衰極矣。

當緩調勿使成疾。 生白木 狗脊 獨活 茯苓 木防己 仙靈脾 防風 威靈仙

又 濕痺。脈絡不通。用苦溫溼瀉小效。但汗出形寒。泄瀉。陽氣大傷。難以溼其生熱。例治通陽宣行。以通脈絡。生氣

周流。亦却病之義也。 生於木 附子 狗脊 苡仁 茯苓 萆薢

徐九長夏溼勝氣阻不飢不食。四肢痺痛。痛甚於午後子前。乃陽氣被陰溼之過。色痿黃。脈小澹。以微通其陽。忌投

劫汗。 茯苓 萆薢 木防己 晚蠶沙 澤瀉 金毛狗脊

黎 肢膝麻痺。足膝為甚。 當歸 杞子 生虎骨 油松節 川芎 狗脊 萆薢

淮牛膝 仙靈脾 檀香泥 白茄根 沙苑 大酒醇酒各半浸七日

某 寒溼滯於經絡。身半以下。筋骨不舒。二便不爽。若非迅疾飛走。不能效。 觸痛丹

某 勞力感溼。腰痺酸痛。四肢乏力。 生杜仲 生苡仁 沙苑子 茯苓 粗桂枝木 金毛狗脊 晚蠶沙 木防己

其 十五年中。痺痛三發。迷痛久流。及肢節。骨筋屈曲之所。皆腫赤。此寒溼變熱。為欲解。病在軀殼筋骨。無害命之

理。但病深沉下。甚已屬陰邪。小腹脹。小便全無。

川獨活 漢防己 川熟附 粗桂枝木 茯苓 川萆薢 木猪苓

又 生白木 茯苓 川熟附 川獨活 北細辛 漢防己 猪苓 澤瀉

又 陽虛溼痺。痺愈下焦。無力。用斡旋其陽。 茯苓 生白木 一味燥 泡淡生乾薑 肉桂

已上四味生研末。滾水泛丸。每早服三錢。開水下。

何 六脈沉。目黃舌腫。在 周身四肢疹發。胃痛肢末皆腫強。遇冷飲涼即病。此久服溼邪。陽氣傷損。議溫氣分以通

周行之脈 川烏頭 生白木 桂枝木 茯苓 半夏 薑汁

唐甄右後腸痛連腰膝發必惡寒逆冷腹護良久乃溫此脈絡中氣血不行遂至凝塞為痲乃脈絡之痺症從陽維

陰維論病

鹿角霜

小茴香

當歸

川桂枝

沙苑

茯苓

風溼王

努力經氣受傷客邪乘衛陽之疎而入風濕阻遏經隧為腫為痛大汗連出痛仍不止而大便反滑其溼邪無有不傷陽氣者固衛陽以却邪古人正治以溼家忌汗耳

生於木錢

防風根五

生黃芪錢三

片薑黃錢一

桂枝木五

海桐皮錢一

羌活分五

獨活分五

人參錢一

生於木錢

黃芪錢三

炒當歸錢一

炙甘草分五

川桂枝錢一

環蘆分三

南棗錢一

風溼腫痺

舉世皆以客邪宜散愈治愈劇不明先因勞倦內傷也蓋邪之所湊其氣必虛參朮益氣佐以風藥

氣壯托出其邪痛斯止矣病人自云手足如墮如無詎非陽微不及行乎四末乎此皆誤治致參藥過費耳

人參錢一

有補無耗何以去病

生於木錢

黃芪錢二

歸身錢一

肉桂分三

炙草分三

環蘆錢一

南棗錢一

遺泄陰傷兼以斂攝

人參錢一

此方其知痛乎

生於木錢

黃芪錢三

歸身錢一

熟地錢三

茯苓錢三

五味分五

白芍錢一

人參二

黃芪兩四

茯苓兩二

杞子兩二

鹿角霜兩二

鹿茸兩二

歸身兩三

炙草兩一

菊花炭兩二

風溼痺痛

防已

生於木

川獨活

茯苓

炒黃柏

生苡仁

痺在四肢

羚羊角

白蒺藜

海桐皮

滑石

大豆黃卷

苡仁

照前方去蒺藜苡仁

加連翹青菊葉花粉

羚羊角

犀角

連翹

海桐皮

大豆黃卷

花粉

薑黃

金銀花

風溼熱走痛

二便不通此痺症也

杏仁

木防已

寒水石

鬱金

生石膏

木通

風溼肌腫而痛

畏熱

炒黃柏

茅木

製蒺藜

木防已

秦艽

鉤藤

又黃柏

防已

茯苓

苡仁

萆薢

虎骨

楊

四肢流走痺痛風勝移走溼凝為腫下焦為甚邪入陰分

蠲痛丹

將氏便溼食少腰腹以下骨節肢節沈痛

以上諸方皆不中病

人參 生於木 製白松香不入 茯苓 漢防己 北細辛 川獨活 苡仁

王 身半以上屬陽。風溼雨露從上而受。流入經絡。與氣血交混。遂為痺痛。經月來外邪已變。火化攻散。諸法不能

取效。急宜宣通清解。毋使布及流注。防己 薑黃 蠶沙 杏仁 石膏 滑石

毛氏風溼相搏。一身腫痛。周行之氣血。為邪阻蔽。做仲景木防己湯法。木防己 石膏 威靈仙 羌活 杏仁

洪泗溼盛。生熱生痰。漸有痿痺之狀。乃陽明經隧為壅。不可拘熱。左屬血。右屬氣也。金匱云。經熱則痺。絡熱則痿。今

有痛處。治在氣分。生於木 生薑芪 片薑黃 川羌活 半夏 防風 加桑枝

又 芪木固衛升陽。左肩胛痛未已。當治營中。以辛甘化風法。黃芪 當歸 炙草 防風 桂枝 肉桂

張 骨節走注行痛。身體重著。不能轉舒。此為溼痺。但陽虛之質。忌辛散苦寒藥。

桂枝木 木防己 苡仁 羚羊角 大豆黃卷 杏仁 橘紅

方 左脈弦大。面赤痰多。大便不爽。此勞怒動肝。令陽氣不交於陰。陽維陽蹻二脈無血營養。內風燥筋。跗躡痺痛。

暮夜為甚者。厥陰旺時也。病在脈絡。金斛 晚蠶沙 漢防己 黃柏 半夏 草解 大栴榔汁

又 痛右緩左痛。溼熱未盡。液虛風動也。生地 阿膠 龜版 稽豆皮 茯苓 通草

某叶舌白。目彩油光。腰痺痛。溼邪內蘊。尚未外達。必分利溼邪為主。杏仁 蘇梗 木防己 厚朴 茯苓皮 花柳粉 晚蠶沙 茵陳

吳氏風溼化熱。蒸於筋絡。周身痺痛。舌乾咽燥。津液不得升降。營衛不肯宣通。泊延中痿。

生石膏 杏仁 川桂枝 苡仁 木防己

又 石膏 杏仁 木防己 炒半夏 橘紅 黑山柅 薑汁 竹瀝

石 脈數右大。溫漸化熱。灼及經絡。氣血交阻。而為痺痛。陽邪主動。自為遊走。陽動化風。內脹浮腫。俗諺稱謂白虎

彪節之謂。川桂枝 木防己 杏仁 生石膏 花粉 鬱金

又 照前方去鬱金。加寒水石。晚蠶沙。通草。

又 脈大已減。右數象未平。痛緩什七。肌膚甲錯。發癢。腹微滿。大便不遑。陽明之氣未化。熱未盡去。陰已先虛。不可

過劑。麻仁 鮮生地 川斛 丹皮 寒水石 鈎藤

濕熱入血

痰血 癰塞 絡

暑濕 熱入 絡

衛陽 疎風 邪入 絡

肝陰 虛

某 久痺釀成惡節。舌黃痰多。由溼邪阻著經脈。漢防己 嫩滑石 晚蚕沙 寒水石 杏仁 苡仁 茯苓
 家 病者長夏靈天奔走。內踝重墜發斑。下焦痛起。繼而筋掣。及於腰窩左臂。經云傷於溼者。下先受之。夫下焦奇
 脈不流行。內踝重著。陰維受邪。味久必化熱燻血。風動內舍乎肝膽。所謂少陽行身之側也。診得右脈緩。左脈實。
 溼熱混處血絡之中。搜逐甚難。此由溼痺之症失治。延為痠廢沈痾矣。三年病根。非倉猝迅攻。姑進先通營絡。泰
 之奇經為治。考聖治痠痺獨取陽明。惟通則留邪可拔耳。

鹿角霜 生白朮 桂枝 茯苓 撫芎 歸鬚 白蒺藜 黃菊花

某 初病溼熱在經。久則痰熱入絡。膿瘍日多。未已。漸而筋骨疼痛。全墮云。經熱則痺。絡熱則痠。未見數年宿病。勿
 事速攻。夜服蒺藜丸。肝 犀角 元參 連翹心 野赤豆皮 細生地 丹參 薑黃 桑枝

張 凡四股經隧之中。遇天冷陰晦。疼痛拘攣。癰疽瘍潰膿。其病不發。瘍愈病復。至抑且時常。歎經以風寒溼三氣
 合而為痺。然經年累月。外邪留著。氣血皆傷。其化為敗痰凝痰。混處經絡。蓋有諸矣。倘失其治。年多氣衰。延至廢

棄沉疴 當歸鬚^四 方無 著落 乾地龍^和 穿山甲^兩 白芥子^兩 小撫芎^兩 生白蒺^兩 酒水各半法丸

沈 從來痺症。每以風寒濕三氣雜感。主治召恙之不同。由手暑贈外加之溼熱水穀。內蘊之濕熱。外來之邪。著於
 經絡。內受之邪。著於腑絡。故辛解汗出。熱痛不減。余以急清陽明。而致小愈。病中復反者。口鼻復吸暑熱也。是病
 後宜薄味。使陽明氣爽。斯清陽流行。不自肢節脈絡舒適。而痺痿之根盡拔。至若溫補而圖速效。又非壯盛所宜。

人參 茯苓 半夏 廣皮 生於朮 枳實 川連 澤瀉 竹瀝薑汁法丸 暮服白蒺藜丸

某 冬月溫舒。陽氣疎豁。風邪由風池風府流及四末。古為痺症。忽上忽下。以風為陽。陽主動也。診視鼻明。陽明中
 虛可見。却邪之劑。在乎宜通經脈。桂枝 羚羊角 杏仁 花粉 防己 桑枝 海桐皮 片薑黃

又 症已漸安。謂筋脈絡有流通意。仲景云。經熱則痺。絡熱則痠。知風淫於內。治以甘寒。寒可去熱。甘味不傷胃也。

甜杏仁 連翹 元參 花粉 萊豆皮 梨汁

又 餘熱尚留。下午足寒。晨發汗。胃未調和。食不甘味。因大便微澀。不必過潤。北沙參 麥冬 川貝 數芽
 沈 三用養肝血熄風方。右指仍麻。行走則屈伸不舒。戌亥必心熱煩蒸。想前法不效。杞歸辛溫。陽動風亦動矣。議去

此正方也

血絡入

熱入
下焦
血分

風寒
溼入
下焦

經隧

氣滯
熱鬱

肝胃
虛滯

肝膽
風熱

血虛

氣虛

營虛

王

沈

辛用鹹若秋虛逢次癸卯未盡致脈絡留滯兼以通運緩攻亦妙
天冬 麥冬 五味 扶神 蜜丸晨服 桃仁 穿山甲 紅地龍 龜膠 阿膠 秋石

某 仲景以經熱則痺絡熱則痿今痺痛多日脈中筋急熱入陰分血中致下焦為甚所謂上焦屬氣下焦屬血耳
柏子仁 當歸 丹皮 鈎藤 川斛 沙苑 苡仁 茯苓

又 痺痛右膝甚 生虎膏 柏子仁 牛膝 萹解 茯苓
某 脈弦動右足踝腫痛得暖得摩稍適此風寒溼三氣混入經隧而為痺也當用辛溫宣通經氣為要
活絡丹一丸陳酒下 川烏 全蝎 地龍 山甲 大黑豆皮

某 痺痛在外踝筋骨妨於行走邪留經絡須以搜剔動藥
某 病後過食肥膩氣滯熱鬱口膩粘延指節當有痺痛當從氣分宣通方法
陳 五 勞動太過陽氣頻蒸中年液衰風旋周身痺痛此非客邪法宜兩調陽明厥陰 當歸 白蒺藜 黑糯米皮 製首烏

張 三 煩勞鬱勃之陽變現熱氣內風內經以熱淫風消必用甘寒前議謂酒客不喜甘味且痰多食少亦忌甘膩滋
滯用清少陽膽熱者酒氣先入肝膽也酒汁溼著腸胃受之理明以通胃胃腸氣機流行食加滑泄頗膩今者氣
熱當午上冒經絡痺痛亦減於平日主以和陽甘寒宣通經脈佐之 童桑 於羊角 天門冬 丹皮 茯苓

某 氏 血虛風痺骨節腫痛 羚羊角 細生地 元參 當歸 桂枝 桑枝 白蒺藜
金 三 痺痛在下重著不移論理必係寒溼但左脈搏數經月遺泄三四痛處無形豈是六淫邪聚然隧道深遠藥餌
未易奏功佐以艾炙冀得效靈 枸杞子 肉苻蓉 虎骨膠 麋角膠 杜仲 桑椹子 天冬 沙苑 茯苓 溶膠丸

孫 又 益氣頗安知身半已上痺痛乃陽不足也 人參 黃芪 熟於木 炙草 桂枝 歸身 白芍 川羌
又 痺痛在右氣弱有痰 生於木 川桂枝 川獨活 片薑黃 白茯苓 陳防己

孫 又 益氣頗安知身半已上痺痛乃陽不足也 人參 黃芪 熟於木 炙草 桂枝 歸身 白芍 川羌
又 痺痛在右氣弱有痰 生於木 川桂枝 川獨活 片薑黃 白茯苓 陳防己

孫 又 益氣頗安知身半已上痺痛乃陽不足也 人參 黃芪 熟於木 炙草 桂枝 歸身 白芍 川羌
又 痺痛在右氣弱有痰 生於木 川桂枝 川獨活 片薑黃 白茯苓 陳防己

孫 又 益氣頗安知身半已上痺痛乃陽不足也 人參 黃芪 熟於木 炙草 桂枝 歸身 白芍 川羌
又 痺痛在右氣弱有痰 生於木 川桂枝 川獨活 片薑黃 白茯苓 陳防己

孫 又 益氣頗安知身半已上痺痛乃陽不足也 人參 黃芪 熟於木 炙草 桂枝 歸身 白芍 川羌
又 痺痛在右氣弱有痰 生於木 川桂枝 川獨活 片薑黃 白茯苓 陳防己

本營氣失養轉旋自鈍然攻病必藉藥氣之偏朝夕更改豈是去疾務盡之道另於暮夜進營養一貼

人參 茯苓 桂枝木 炙草 當歸 炒白芍 南棗

吳三筋縱痛甚邪留正痺當此天暖問用針刺以宣脈絡初補氣血之中必佐宣行通絡之治

生黃芪 防風 桂枝 炒黑常山 歸身 青荊葉汁

某痺痛偏左入夜尤甚血中之氣不行歸鬚 桑枝 以仁 白蒺藜 薑黃 木防己

血中 氣滯 血虛 絡滯

劉三周禮採毒藥以供醫事蓋因頑死沉痾者於驅殼非臟腑虛損故必有毒攻拔有毒即本草所使邪不留存凝著氣血乃效既效矣經云大毒治病十去其五當此只宜愛護身體勿勞情志便是全功道理愚入必曰以藥除

根不知天地之氣有勝有復人身亦然穀食養生可御一生藥餌偏勝豈可久服不觀方士煉服金石丹藥疽發

而死者比比何首烏 黑芝麻 桑枝桂枝湯泛丸

某脈沉小數營中留熱筋骨尚有微疼宜通經絡佐清營熱 鈎藤 細生地 當歸鬚 白蒺藜 薑黃片 丹皮

此症血風病相似但風則陽受之痺則陰受之故多重者沉痛其在內經不越乎風寒溼三氣然四時之令皆

能為邪五臟之氣各能受病其實痺者閉而不通之謂也正氣為邪所阻臟腑經絡不能暢達皆由氣血虧損

膜理疎豁風寒溼三氣得以乘虛外襲留滯於內致濕痰濁血流注凝滯而得之故經云三氣雜至合而為痺

又云風勝為行痺寒勝為痛痺溼勝為著痺以及骨痺筋痺脈痺肌痺皮痺之義凡可知痺病之症非偏受一

氣足以致之也然而病症多端治法亦異余亦不能盡述茲以先生治痺之法為申明一二有街陽疎風邪入

絡而成痺者以宣通經脈甘寒去熱為主有經脈受傷陽氣不為護持而為痺者以溫養通補扶持生氣為主

有暑傷氣溼熱入絡而為痺者用舒通脈絡之劑使清陽流行為主有風溼腫痛而為痺者用參朮益氣佐以

風藥壯氣為主有濕熱傷氣及溫熱入血絡而成痺者用固衛陽以却邪及宣通營絡兼治奇經為主有肝陰

虛癯邪入絡而為痺者以鹹苦滋陰兼以通逐緩攻為主有寒溼入絡而成痺者以微通其陽兼以通補為主

有氣滯熱鬱而成痺者從氣分宣通為主有肝胃虛滯而成痺者以兩補厥陰陽明為治有風寒溼入下焦經

隧而為痺者用辛溫以宣通經氣為主有肝膽風熱而成痺者用甘寒和陽宣通脈絡為主有血虛絡滯及營

明理之論

寒多重複可刪

既風寒溼三氣雜至合而為痺可加高用參朮及溫補之藥者十居二三恐有留邪之患

凡屬形體之疾當外治之

戊火
上開
前歐

體中
熱鬱
蒙蔽

腎厥

虛而成痺者。以養營養血為主。又有周痺行痺。肢痺筋痺。及風寒溼三氣雜合之痺。亦不外乎流暢氣血祛邪養正。宣通脈絡諸法。故張景岳云。治痺之法。祇宜峻補真陰。宣通脈絡。使氣血得以流行。不得過用風燥等藥。以再傷陰氣。亦見道之言也。鄒滋九

〔痙厥〕此病者居多愈者絕少

李 先因嘔吐腹痛。隨即昏迷。此氣火痰上蒙清神為厥。先用烏梅擦牙。令牙關得開。然後用藥。至寶丹三分。

某 陽氣暴張。精絕令人前厥。細生地兩。方不切。阿膠錢三。 出山鉛打薄五錢 調珍珠末錢一 元參 龜膠 阿膠 淡菜水

又 前厥者。下焦陰液枯燥。衝氣上逆為厥。議用鹹寒降逆。血肉填陰。細生地 元參 龜膠 阿膠 淡菜水

又 液涸消渴。都是厥陰為病。前議填陰。藥汁濃膩。不能多進。但胃口不醒。生氣何以再振。陽明陽土。非甘涼不復。

肝病治胃。自來有諸。人參 麥冬 川斛 新會皮 白粳米 乾佩蘭葉

王 經云。煩勞則張。精絕辟積於夏。令人前厥。夫勞動陽氣弛張。則陰精不司留絕。其陽雖有若無。故曰絕積之既。

又逢夏季。陽正開泄。五志火動。風生若煎熬者。然斯為暈厥耳。治法以清心益腎。使肝膽相火內風。不為暴起。然

必薄味靜養為穩。連翹心 元參心 竹葉心 如母 細生地 生白芍 方不切病

某 腎厥。由背脊而升。發時手足逆冷。口吐涎沫。喉如刀刺。蓋足少陰經脈上循喉嚨。挾舌本。陰濁自下上犯。必循

經而至。做許學士極附意。通陽以泄濁陰耳。炮附子此方對症 淡乾薑 川椒 胡盧巴 半夏 茯苓 薑汁

某 腎厥。氣逆至頭。玉貞丸二十粒

盛 四臍上心下熱熾。咽喉間陳腐氣。遂神昏仆厥。經時汗出而醒。病來口湧血沫。乃臆中熱擁。以致心蒙受蒙。若非

芳香清透。不能宣通絡中痰痺。天竺黃兩一 丹參兩一 鬱金兩一 雲茯苓兩一 石菖蒲五錢 生烏犀角兩一 方卻切病

麝香錢一 冰片五錢 各生研野赤豆皮煎湯泛丸。竹葉湯送下。二錢食後服。

謝 女熱鬱於內。則機巖不靈。春令升泄。木火化風旋擾。痙痲搖搦。有癩癩之慮。不可進通經。再劫其陰液。

細生地 鬱金 犀角 丹參 石菖蒲 生白芍 竹瀝

又 火淫於內。治以苦寒。佐以鹹寒。黃連 黃芩 黃柏 黑山梔 牡蠣 生地 沖入方諸水

溫邪 劫液 上逆

又脈左堅經阻半載或亥陰時厥逆肢掣通時方甦即欲渴飲龍奮奮敷鹹苦清火未效且大便兩旬不解定是熱結在血倣古人厥陰下之義用張子和玉燭散 玉燭散

又羅溫邪內陷津液被劫厥陽挾內風上逆遂致痙厥 生牡蠣 阿膠 熟地炭 生白芍 炒遠志 石菖蒲 厥陰浸進剛藥五液劫盡陽氣與內風鴟張遂變為痙平昔內損繼以暴邪本屬難調此陰氣竭絕或亥當防

毛瘦人而病溫熱神呆舌赤診脈時兩手牽掣震動治此津液受劫肝風內鼓是發痙之原議以養胃汁煨肝風務在存陰耳用仲景復脈湯法去參薑桂

余脈細促神迷舌縮言蹇耳聾四肢牽引牙關不緊病已月餘乃溫邪劫液陽浮獨行內風大震變幻痙厥危疴議以育陰熄風法必得瘳止神清方有轉機 阿膠二錢 雞子黃一枚 人參一錢 天冬一錢 白芍錢半 枳殼一錢 神氣稍甦脈來斂靜五液交潤風陽尚動滋液救其焚燎清補和陽去熱用藥全以甘寒津液來復可望向安

又神氣稍甦脈來斂靜五液交潤風陽尚動滋液救其焚燎清補和陽去熱用藥全以甘寒津液來復可望向安

毛少陰不藏溫邪深入喘促汗出渴不多飲舌辛似縮症非輕小擬用復脈湯為邪少虛多之治去薑

又唐積勞伏暑欲寐時心中轟然上升認自覺神魂縹緲此皆陽氣上胃內風鼓動所以陡然昏厥

方熱閉神狂因手食復畏人與肢筋牽動仍屬暑病變痙通三焦以清神明冀有轉機 紫雪丹二錢

又舌欲痙膚燥筋掣熱劫脂液殆盡為痙用河間甘露飲再服紫雪丹一錢

楊謂之發痙熱閉在裏肢體反不發熱熱邪內閉則外脫豈非至意考古人方法清絡熱以煎芳香開裏竅以清神識若重藥攻邪直走腸胃與胞絡結閉無干涉也 犀角 元參 鮮生地 連翹 鮮菖蒲 化至寶丹四丸

內陷 胞絡 閉結

石膏

知母

甘草

梗米

生地

麥冬

竹葉心

阿膠

人參

淡菜

鮮生地

天冬

川斛

不此症

熟地炭

磁石

生白芍

木瓜

遠志

茯神

務在存陰耳

用仲景復脈湯法

去參薑桂

治此津液受劫

肝風內鼓

是發痙之原

議以養胃汁

煨肝風

議以育陰熄風法

必得瘳止神清

方有轉機

阿膠二錢

雞子黃一枚

人參一錢

天冬一錢

白芍錢半

枳殼一錢

神氣稍甦

脈來斂靜

五液交潤

風陽尚動

滋液救其焚燎

清補和陽

去熱用藥全以甘寒

津液來復

可望向安

少陰不藏

溫邪深入

喘促汗出

渴不多飲

舌辛似縮

症非輕小

擬用復脈湯

為邪少虛多之治

去薑

舌絳汗泄

齒燥痰膩

熱劫津液

最防痙厥

復脈湯去薑桂

積勞伏暑

欲寐時心中轟然上升

認自覺神魂縹緲

此皆陽氣上胃

內風鼓動

所以陡然昏厥

楊

謂之發痙

熱閉在裏

肢體反不發熱

熱邪內閉則外脫

豈非至意

考古人方法

清絡熱以煎芳香

開裏竅以清神

識若重藥攻邪直走腸胃與胞絡結閉無干涉也

犀角

元參

鮮生地

連翹

鮮菖蒲

化至寶丹

四丸

厥之狀昨大便既下。而現此象。豈是垢滯。議考香宣。竅通解在裏。紫雪丹一錢五分。開水化勻。三服。大

鮑。舌白。渴飲冷飲。氣促。喘咳。而呃。胸悶昏。此暑風溼熱。微濁痺塞。宿垢尚在小腸。旬日漸變。厥是為險。機

議。逐穢。結以黃消清。大杏仁。連翹心。竹葉心。川貝母。葛蒲根汁。辰砂。益元散。煎藥化牛黃丸。一服

茶。暑溼熱。都者氣分。乃消食苦降。滋血亂治。熱熾津涸。舌板成痙。究竟邪閉阻。勢屬不穩。

人參。生甘草。石膏。如母。梗米。

肝風。潘。肝陽化風。上冒為厥。風陽內燥。脂液涸而作痛。此非實症。剛燥忌用。生地。阿膠。牡蠣。天冬。茯神。

夏。二。中年以後。陽氣日衰。是下焦偏冷。陽不及護。衛周身。氣分更虛。右肢如痿。當春地氣上升。身中肝風大震。心嘈

嗔。怒。痰湧音啞。乃厥象也。皆本氣自病。最難見效。熟地。熟淡附子。牛膝。炒麥冬。遠志炭。茯苓。

馬。面青。眈白。入夜顫顫漸赤。耳聾。舌心乾板而縮。並不渴飲。聞有寒戰後熱。此厥陰肝臟液涸。風旋勢成。痙厥危

症。勉從經旨之訓。辛苦急。當食甘以緩之。甘麥大棗湯加阿膠。

陸。面青。頭痛動搖。手足搖擗。牽掣。醫。病從肝起。如饑求食。晝夜無寐。都是肝風。盤旋鼓舞。漸為痙厥。

此乃五志之病。阿膠。治痙之藥。不可少也。牡蠣。生地。天冬。小麥。生白芍。

某。衝氣。顛脹厥。龍蒼丸一錢二分。

顛。此痿厥也。蓋厥陰風旋。陽明神迷。則為厥。陽明絡空。四末不用。而為痿厥。午後黃昏。乃厥陰陽明旺時。病機發

現矣。凡此皆屬絡病。全匯篇中有之。仲景云。諸厥宜下。下之利不止者。死。明不下降之藥。皆可止厥。但不可銷黃

再傷陰陽耳。但積年沉痾。非旦夕速效可知矣。活盤甲。真阿膠。方諸水。鮮生地。元參。青黛。

又。照前方去元參。加天冬。厥從肝起。其病在下。木必得水而生。陰水虧。斯陽風燥筋。而絡中熱滯。即厥抽。擬血

屬介類。味鹹。入陰。青色入肝。潛陽為法。

又。陰絡空隙。厥陽內風。振然鼓動。而為厥。余用鹹味入陰和陽。介類有情之潛伏。頗見小效。但病根在下深遠。湯

劑輕浮。焉能填隙。改湯為膏。取藥力味重。以填實之。亦止厥一法。鮮鼈甲。敗龜版。猪脊髓。

羊骨髓。生地。天冬。阿膠。淡菜。熬膏。早服七錢。午服四錢。

林據說六七年。驚駭起病。氣從左脇有聲。有嘔及及胸膈。心中脹極。氣降脹減。必汗出溲溺。此屬肝厥。凡煩勞

動怒。即刻舉發。肝木風火內寄。其來必驟。且有聲音。久恙。非湯藥可投。緩調須用丸藥。更發作。自必輕減。

不得轉凡 溫補藥 人參 乾薑 附子 桂枝 川椒 川連 川棟子 當歸 白芍 烏梅 肉丸

顧平昔腸紅陰絡久傷。左脇下宿痰。肝家風氣易結。形瘦面青。陰虛陽氣易冒。血絡不得凝靜。諸陽一併。遂為厥

衝。氣自下犯胃為呃。症似蓄血為狂。奈脈細勁。咽喉皆痛。真陰枯槁之象。水液無有。風木大震。此剛劑強鎮不能

熄其厥胃耳。生雞子黃一枚 真阿膠二錢 淡菜五錢 龜板五錢 沖入熱童便一杯

戴酒客中虛多濕。陽明素虛。厥陰來乘。當穀雨土旺用事。風木與陽俱升。逆鬱胃而厥。此平昔積勞內因。與外邪

無涉。閱醫多用風藥。是再傷肌表。護衛之陽。乃召風以致中耳。

方中仍兼治 風痰故妙 川桂枝 羚羊角 炒半夏 橘紅 明天麻 茯苓 當歸 鈎藤

吳三肝風癩厥。迅發莫制。都因腎真內怯。平素多遺。診脈乳弱。議用固本丸。固本加五味。黃肉龍骨金箔蜜丸

謝八有年。下虛春木自地而升。陽浮上蒙。清竅經云。下虛上實為厥。癩疾肝風內震。倘加惱怒。必致厥仆。疰中大忌

攻痰祛風藥。熟地 天冬 黃肉 五味 牛膝 龜甲 磁石 茯神 遠志

夏九少腹氣攻有形。嘔吐頭脹。陰脈不至。頭而厥。陰脈上至巔頂。四肢逆冷。即厥象也。不是瘧母宿冷。肝脈環遠陰

氣為遺洩。炒黑川椒 川棟子 炒橘核 青木香 小茴香 茯苓

王右脈已伏。左小繫。四肢冰冷。乾嘔煩渴。厥陰濁泛。胃陽欲絕。此屬痛厥。姑以早熱泄瀉通陽。

泡淡吳萸 製附子 川棟子 延胡索 淡乾薑 茯苓

又脈微為無陽。下利冷汗。嘔逆不食。肢厥不肯回陽。一團濁陰阻蔽。却有閉脫之危。議四逆之屬。護陽驅濁。

人參 淡附子 枳實 茯苓 生淡乾薑

又肢厥惡心吞酸胸滿。此是大便不通。有六日。川連 淡乾薑 人參 枳實 陳皮 半夏 茯苓 宜用

史溫熱已入厥陰。陰傷致風陽上巔。遂為瘧厥。厥發且雷。陽明少陽之陽震動。昨進鹹苦。清其陰分之熱。已效。今

厥陰 熱邪

復入鎮陽以止厥。邪未清如生地 天冬 阿膠 雞子黃 生龍骨 小麥

何用補 生地 天冬 阿膠 雞子黃 生龍骨 小麥

肝 眩暈心痛脈嘔吐涎沫周身麻木此厥陰肝脈中陽過胃貫膈逆衝不已有瘕厥之意

川連黃英 乾薑 川棟子 烏梅 牡蠣 白芍

又 開泄和陽入陰已效當停煎藥 龍脊丸

程 厥邪熱深生薑性辛温大泄肝陰陽遂上胃心熱暈厥但陰虛熱熾苦寒不可多進以滋陰却熱為穩

生薑甲 鮮生地 生白芍 知母 山柰 橘紅

張 未病先有驚恐先寒戰後發熱心中極熱乾嘔煩躁渴冷飲仍不解渴診脈小弦舌白無胎曾肢冷如水此熱

邪已入厥陰肝經所謂熱深厥深也病全入裏極為棘手議用紫雪丹開深伏之熱結取其芳香靈敏冀得躁擾

勢緩方有轉機 紫雪丹二錢錢

王 心中痰熱耳聾自利熱邪已入厥陰三日不厥方有好音 鬱金 川連 秦皮 黃芩 連翹心 石菖蒲汁

某 先發水痘已感冬温小愈不忌葷腥餘邪復熾熱不可遏入夜昏煩軀云頭痛邪深走厥陰所以發厥診脈兩

手俱細是陽極似陰臭煤舌乾目眇黃多屬邪閉環敗諒難挽回用涼膈散

伍 女室女經來衝脈自動動則陽升內風遠旋不息為薄厥前厥陽明虛胃失降厥陰熱肝愈橫風陽上胃清空神

迷諸竅似阻皆入夏大地發泄之微本虛表實先理其實議用局方龍薈丸純苦直降非湯飲雷連腸胃之比每

服三錢不拘二三次分服接用復脈法去參薑桂

肝 胃 逆 虛

施 氏諸厥屬肝肝病犯胃為嘔逆腹痛乃定例也診脈虛小望色皖白據述懷妊病竟不發思中流砥柱斯肝木凝

然則知培植胃土乃治病法程矣 六君子去木皮加芍藥木瓜煨薑南棗

某 氏厥屬肝病幾番病發都因經水適來夫血海貯聚既下斯衝脈空乏而風陽交動厥之暴至之因由也鹹寒濡

潤亦和陽泄內風之義治之未應下焦獨冷喉啞胸痺思衝脈乃陽明所屬陽明虛則失闔厥氣上犯莫邊內經

治肝不應當取陽明制其侮也暫用通補入腑取乎腑以通為補 小半夏湯加白糯米

冀 三諸厥皆隸厥陰症瘕心熱腸脹中消便難乃肝陽內風妄動消燥犯及陽明矣經言治肝不應當取陽明肝胃

一臟一腑相對不耐温補者是肝用太過肝體不及也

此老幼云... 奇經十二... 者之溫出... 經能統之... 推衝脈則... 為血海女... 子經水及... 頻之第全... 可不一不... 治法若餘... 經並若無... 治者他藥... 有也此... 治者也... 以欲欺人... 時不知故... 經立說而... 耳食之... 亦拾其... 餘動云... 經動云... 物真直... 笑

痛厥 氣逆 肝腎 欲絕 陰涸 嘔吐 熱 營 奇脈 陽動

九孔石決明 好異後人遂無 淮小麥 清河膠 細生地 天冬 茯神

陳 噴怒微厥 肝陽升舉 宜益胃陰以制伏 人參 冷 麥冬 茯神 鮮蓮子 竹葉心 生甘草 微溫服

葉氏 脈右大 熱升風動 鬱胃為厥 宗陳無擇 羚羊角散方 羚羊角 小生地 元參 丹參 連翹 黑豆皮

又 厥後驚陽汗泄 陽風無制 都緣陰枯 不主繼陽 議用六味益陰和陽 炒六味去山藥 加人參 秋石

又 渴不欲飲 陰不上乘 泥寐醒神 識不靜 易驚 汗出法當飲補 人參 黃肉炭 此汗不是毒持也故在生清心 熟地 五味 茯神 遠志

又 半月經水兩至 痛自下 其衝突而厥 病由陰維衝任 蓋八脈所司也 此養營僅到中宮 所以無病

從蓉 鹿角霜 當歸 柏子霜 桂枝木 茯神

又 前法已中 病情須從奇經治義 照前方去桂枝木 加鹿角膠 炒杞子 當歸 柏子仁 茯苓 小茴香

又 病去八九 僅以溫補下元為法 不必窮治 淡從蓉 炒杞子 當歸 柏子仁 茯苓 小茴香

陶氏 脈數 厥止 熱在營中 犀角 元參 丹參 連翹心 膽星 橘紅

王 口鼻觸入異氣 胃傷 嘔吐 上衰 則未起 肝風內橫 三蟲擾動 為痛 從坑厥論治

川 枳 乾薑 桂枝木 川棟子 人參 川連 烏梅 生白芍

黃仁 據述十一年前 夏秋間 多用井水鹽梅 因此昏厥 已後三五日一發 病愈 雖醒 日瘦 日減 間有語言 不自接續

想其主理 冰鹽梅酸 大泄 肝腎臟陰 厥者 陽氣逆亂 胃神憤憤 勢成沉痾 非癰厥門 治痰 治火 清竅者 是臟陰受

病 臟主乎藏畜 醫偏搜逐 劫燥 凡陰涸 欲絕 辟諸油 盡燈 燭 忽明 忽昏 撲然 息矣 先聖先賢 從無成法 苟可治 未

敢 奏藥 欺人 常用 人乳 一 杯 不 脫 胎 如

某 脈左動如數 右小濡弱 病起 噴怒 即寒熱 汗出 心悸 繼而 神魂 自覺 散越 夫肝臟 藏魂 因然 則諸陽 皆動 所見

病源 無非 陽動 變化 內風 而為 厥 故凡屬 厥症 多隸 厥陰 肝病 考內經 治肝 不外 辛以 理用 酸以 治體 甘以 緩急

今 精彩 散失 鎮固 收攝 猶 慮 弗及 而方 書泄 肝平 肝抑 肝方法 儘多 至於 補法 多以 子母 相生 為治 此病 全以 肝 腎下 焦主 法為 正 所服 醫藥 並無 師古 之方 未識 何見 阿膠 穢 雞子 黃 人參 錢 生地 三 金箔 五 某 冷是 足上 貫於 心 初起 周身 麻木 今則 口鼻 皆是 冷氣 病起 驚恐 內傷 肝腎 為厥 衝脈 隸於 肝腎 二臟 失藏 衝

氣沸亂其脈由主陰而上故多冷耳
汪 胃陽傷殘濁氣上攻將為痛厥當治陽明之陽 吳茱萸 薑汁 半夏 茯苓 梗米 又照前方去吳茱萸
瘧厥甚 熱甚而厥其熱邪必在陰分 古稱熱深厥深病中遺泄陰傷邪陷發表攻裏斷難施用和正托邪是為正法

草果 知母 人參 半夏 薑汁 烏梅

厥者從下逆上之病也瘧者明其風強之狀也所以二字每每並言原與傷寒門所載者有間想是症總由氣血日偏陰陽一併而成譬如風雷之猛烈鬱極而發也若發而漸復者猶可轉危為安若發而轉逆者必至直拔根莖乃已斯存亡之機在乎命臟之盈虧耳考方書之名目不一致病之因由亦繁大抵可吐者如痰食填塞於胸中用瓜蒂散之類及燒鹽探引方法可清可折者如厥陽壯火升逆而莫制用玉女煎及宣明龍薈丸法可開可降者如氣厥薄厥而形氣暴絕有五磨飲子及薄荷酒法穢濁蒙神而昏亂無知有牛黃至寶及蘇合香丸之兩法飛尸卒厥先宜酒醴以引導并可按穴而施鍼法及灸法若從虛而論者如內奪而厥則為疝疝有地黃飲子之通攝下焦法煩勞陽張令人前厥有人參固本加入金匱方諸水為壯水制火法血厥而陽騰絡沸奈乎從陰從陽法色厥而精絕於下急與大劑挽元法腎厥宗許學士之椒附以通陽蛟厥有仲景之安蛭法陽極用杖陰峻劑陰極有扶陽方法種種規模已為全備及春案中先生於是症獨重在肝蓋肝者將軍之官善干他臟者也要知肝氣一逆則諸氣皆逆氣逆則痰生遂火沸風旋神迷魂蕩無所不至矣若犯於上者不免凌金礫液有門冬湯及瓊玉膏之補金柔制法若犯於中而為嘔為脹者用六君去木加木瓜薑芍之類及附子梗米湯加人參為補胃疑肝法若震及心脾而為悸為消者用甘麥大棗湯合龍蟬之屬為緩急重鎮法若挾少陽之威而乘巔搖絡者用羚羊鈎藤元交連翹之劑為熄風清絡法若本臟自病而體用失和者以椒梅桂芍之類為益體宣用法若因母臟之虛而擾及子臟之位者用三才配合龜甲磁珠及復脈減辛味復入雞黃之屬為安攝具子母法至於痿厥之治尤覺神奇取血肉介類改湯為膏謂其力味重實填隙止厥最速此豈非補前人之未備開後學之法門者乎參是案者幸毋忽諸 邵新甫

案中所述甚雜或有痲症或有痘症或有怔忡症或有火鬱症或有驚恐症或有痰迷症皆謂之厥此編書者之過也至于常用人參則厥症于不得一者乃居其三恐邪留之害必有受之者矣

氣逆 陽火 阻竅 臟燥 陽浮

肝腎 陰虛 陽浮

此等症頭 宜服鎮心 清痰等凡

驚

某 驚則氣逆。陽泄為汗。用重鎮壓驚。

川桂枝木五 黃芪二錢 人參一錢 龍骨半 左顧牡蠣半

某 驚恐傷神不語。建蘭根汁

薑汁 金汁 共和一處隔湯燉徐徐服

某 因驚外觸見症神法欲迷。已經肢厥冷汗怕動。做鎮法理虛。

人參 茯神 棗仁 生龍骨 石菖蒲 炙草 南棗 陳淮小麥 早上服

楊氏 經血期至。驟加驚恐即病寒熱心忪不寐。此驚則動肝。恐則傷腎。最慮久延臟燥。即有肝厥之患。

淮小麥 天冬 龍骨 牡蠣 白芍 茯神

陳九 心中若煙霧。喉則氣散。少頃即聚。易驚恐畏懼。嘔逆不渴。自述難鳴。苦況瀉後亡陰。熱藥剗陰。前議和胃不應。

主以鎮之攝之。又甘草 當再加 淮小麥 大棗 棗仁 青龍骨

某 驟驚陽逆暴厥為肝膽病。晝則心忪。是陽動。夜則氣墜。屬陰虧。用收固攝肝可效。

生地錢 黃肉一錢 龍骨三錢 牡蠣三錢 五味一錢 真金箔三張

經云驚則傷膽。恐則傷腎。大凡可畏之事猝然而至者。謂之驚。若從容而至。可以宛轉思維者。謂之恐。是

驚急而恐緩也。夫驚症大人亦有之。小兒最多。因其神志未堅。膽氣未充。故每遇異之形聲。即陡然而驚。矣

驚之所傷。由心猝及乎膽。由膽即及乎肝。遂致心主君火。兼肝膽中相火。風木驟然而起。症現搐搦癎厥。神昏

譫妄。肢冷厥逆。吐乳身熱。自竄口噤。種種所患。無非心肝膽之現症。而實毫無外感之風邪。此因外受之驚。而

動內之木火風也。故但當以一驚字立為病名。斯乃切當。因其內風沸起。遂加一風字。因病來迅速。又加一急

字。故遂有急驚風之病名。此小兒之病名。此已屬牽強附會矣。至於今之混稱為急驚風者。更屬背謬。總因小兒陰氣

未充。外感之風溫風熱風火。以及寒邪化熱并燥火諸症。最易傷陰。陰傷則血不營筋。液傷則脈絡滯澇。熱感

亦能使內之木火風相繼而起。所現之症。與受驚者類亦相同。然實非因受驚而起。其所治之法。大有區別。如

果因驚者。治宜安養心神。鎮驚定法。甘涼清內熱。柔潤熄肝風。或少佐芳香。通其竅絡。舒其結閉。至於剛熱燥

清表之藥。概不可用。若血驚。而但感外邪者。有宜於涼散。有宜於溫散。有宜於苦寒清火。有宜於甘溫扶陽。

或補或瀉。自當按六淫之邪而施治。血虛字亮無關涉。余今之醫者。每遇非驚之症。無不驚而名。因不能辨明六氣中所傷何氣。却定不出病名。遂強將一驚字混入。藉口漫稱為驚。風症掩飾欺人。病家亦信之。以為小兒防範難過。焉有無驚之理。其所訂之方。錯雜游移。不知治驚。以心肝膽為主。若治時邪。須兼脾胃脾腎三焦。營衛經絡而論。大不相同也。更有一種稱慢驚風之病名者。尤屬陰誕不經。必當亟為駁正。有論在幼科吐瀉之後。宜合觀之。華雲岫

風字最妙。凡肝膽之疾。無不因風。肝為風臟。經云風者百病之長也。不但外風。名風即內風亦名風。故大人之眼歪斜。神昏厥胃之名。中風與小兒亦相類。柯爾小兒之病。不得名風也。

癩痢

驚恐 升疾火

孫十神呆。脈沉。因驚恐。以致癩疾。語言不甚明了。此痰火阻其靈竅。深戒酒肉厚味。靜室善調。經年可愈。
黃連 黃苓 山柰 枳實 橘紅 膽星 菖蒲 遠志

陳 動怒驚觸。乃外加擾。內致五志。陽越莫制。古人集癩痢狂辨。以陽併於陰。陰并於陽。互異。今以陽逆狂亂。非苦藥之降。未能清爽其神識也。當歸龍薈丸三錢。

倪 驟然驚惕。陽氣上逆。遂神呆。不寐。條爾喊叫。不食不飢。不便。有癩痢之象。龍薈丸三服。

盧 疴疾。病已成。癩疾難愈。竹節白附子 天竺黃 陳膽星 石菖蒲 川連 鬱金 茯神 橘紅

汪 驚恐。陽升風動。宿癩遂發。吐痰嘔逆。不言。絡脈失利也。

曹 吐春病及長夏。癩厥屢發。前用龍薈丸。意苦泄肝膽。初服即瀉。此久病陰分已虛。議理陰和陽。入酸以約束之。

生雞子黃 阿膠 川連 黃柏 生白芍 米醋 切不

金 仁癩厥神呆。肢強。犀角 羚羊角 元參 菖蒲 炒半夏 炒遠志 鬱金 橘紅

吳 驚狂。乃木火擾動。雖得平靜。仍心悸怔忡。夜臥不寐。診脈虛細如絲。已非痰火有餘。議補心丹以理心之用。

葉 氏每遇經來紫黑。癩疾必發。暮夜驚呼聲震。晝則神呆。面青多笑。火風由肝而至。泄膽熱以清神。再商後法。

未火 帶鬱血

丹皮 丹參 細生地 黑山柰 羌蔚子 胡黃連 調入琥珀末

肝腎 陽升 火鬱 心腎 風陽 陽亢 太過 勞心

厥通神明 用其方甚 法其方甚 多非尋常 清火通氣 諸藥可愈 見方並未

論三五治 法頗是

張二入冬不寐癩疾遂發此陽不潛藏治在肝腎 用虎潛法

某癩疾脈不鼓指議交心腎益神志 生地 龜甲 黃柏 川連 茵陳 菖蒲 茯神 遠志 山梔 竹葉

五志陽升神識迷惑忽清忽甚者非有形質之邪乃熱氣化風上竄致於竟夜不寐攻痰疎利決不效驗先以

極苦之藥冀其亢陽潛降 生地 龍膽草 丹參 木通 山梔 蘆薈 青黛 薄荷

某平昔操持身心皆動悲憂驚恐情志內傷漸漸神志恍惚有似癩癩其病不在一臟矣醫藥中七情積損二千

年來從未有一方已羅者然約旨總以陰陽迭偏為定評凡動皆陽當宗靜以生陰是議陽乘於絡脈陰不安欽

鎮攝固久追可效家務見聞必宜屏絕百日為期 此丸 人參 廉珠 茯神 棗仁 炙草 生龍骨 炙肉 五味 金箔

天地一陰陽也陰陽和則天清地甯一有偏勝遂有非常之變人身亦一陰陽也陰陽和則神清氣定一有偏

勝自致不測之疴故內經曰重陽者狂重陰者癩癩與癩其原則同也古人集癩癩狂辨以為陽併於陰陰併

於陽此誠不刊之論言乎現症狂則少卧不饑妄言妄笑甚則上屋踰牆其候多躁而常醒癩則或歌或哭如

醉如癡甚至不知穢潔其候多靜而常昏癩則發作無時卒然昏仆筋脈痠痲口中作聲後人因其聲似分

馬癩牛癩猪癩牛癩雞癩五名其候經時而必止推其病因狂由大驚大怒病在肝膽胃經三陽并而上升故

火熾則痰湧心氣為之閉塞癩由積憂積鬱病在心脾胞絡三陰蔽而不宣故氣鬱則痰迷神志為之混淆癩

病或由驚恐或由飲食不節或由母腹中受驚以致內臟不平經久失調一觸積痰厥氣內風猝焉暴逆莫能

禁止待其氣反狀後已至於主治察形證診脈候以辨虛實狂之實者以承氣白虎直折陽明之火生鐵落飲

重制肝膽之邪虛者當壯水以制火二陰煎之類主之癩之實者以滾痰丸開痰壅閉清心丸洩火鬱劫虛者

當養神而通志歸脾枕中之類主之癩之實者用五癩丸以攻風控涎丸以劫痰龍會丸以瀉火虛者當補助

氣血調攝陰陽養營陽河車丸之類主之狂癩癩三症治法大旨不越乎此今如肝風痰火者苦辛以開泄神

虛火炎者則清補並施肝膽厥陽化風旋逆者以極苦之藥主之神志兩虛者用交心腎法勞神太過者宗靜

以生陰意為斂補鎮攝方藥雖未詳備而零珠碎玉不悉堪為世寶哉醫者惟調理其陰陽不使有所偏勝則鬱

逆自消而神氣得反其常焉矣 張清年

治衄諸方
為案中
最當

溫邪

某

溫邪衄血

連翹

淡黃芩

黑山梔皮

杏仁

鬱金

元參

風溫

某

風溫衄血

丹皮

連翹

赤芝

茅花

黑梔皮

元參

上蒸

某

此熱蒸於水穀之溼

血熱

血熱

血熱

血熱

血熱

血熱

陰虛

陽虛

趙仁脈左數

血火升

生地

阿膠

天冬

麥冬

淡菜

生白芍

酒熱

傷胃

朱九脈數

陰虧

頭暈

心中煩雜

鼻衄

生地

元參

湖蓮

某

咳逆失音

衄血

生地

龜板

丹皮

艾寶

補骨脂

山藥粉丸

某

食燒酒

辛熱

及青梅

酸泄

遂衄

血咳

心腹極熱

五味偏勝

膈陽臟陰為傷

某

生血

扁豆

北沙參

而實增嗽也

麥冬

白梗米

血行清道從鼻而出古名曰衄與濁道之吐咯者不同清道即指志高之分由山根以上清明之次而來也其穴乃手足太陽足陽明陰陽踰五脈之會及衝脈交會其間可見諸經皆能為衄不獨肺胃而然諸書雖以詳明惟景岳辨之尤切但衄之為患總由乎火外為六淫之變化內因五志之愆騰氣血日為錯亂陰陽為之相乘天人交感之處虛實攸分矣若風寒壅盛於經陽氣鬱而迫營者宜參麻黃桂枝症之大意若溫風暑熱拂

上海文益書局石印

鬱而動血外溢者用辛涼清潤等劑認定經絡之高下若火邪極甚而載血上泛者有苦寒鹹寒之法審其原委之淺深此外因主治法也至於煩尤曲運耗及木火之營肝臟厥陽化火風上灼者甘鹹柔婉理所必需多勞過傷病及天一之真陽浮引陰血以胃上覆者滋潛厚味法從峻補血脫則挽回元氣格陽則導火歸源因酒用和陽消毒之劑因勞力用培中益下之方此內因主治法也學者須審內外兩因庶乎施治無誤矣印新

疝

某 疝麻治法最祥子和其旨辛香以泄肝得氣疎泄而病緩矣按法調理不愈七味導引納腎益氣升舉脾陽而氣仍然艾炙蒸臍原得小安內經任脈為病男子內結七疝女子帶下聚聚同為奇經主之故疎泄諸方能治氣實參朮升補僅治中虛下陷與元海奇經中病無補壯歲至老病根不輟下焦日衰可知升陽一法體症頗合衰年僅可撐持勿使病加可矣

濁陰 肝聚 絡

朱二 勞傷溫裏已效臍旁動氣少腹結疝畢丸偏隊皆陽氣不自復濁陰聚絡不宜急於育子
方不 生鹿茸錢 鹿角霜錢 當歸錢 生菟絲子錢 沙蒺藜錢 川桂枝尖五分 飢時服

當歸

船茴香

淡從蓉

枸杞子

安息香

茯苓

孫

疝墜於右筋縮連小腹痛此寒主收引議溫通厥陰之絡川棟子兩 穿山甲二兩 乳香錢

明

疝黑川烏五錢 炒黑小茴香兩 橘核炒兩 用老韭白根汁泛丸飢時服二錢五分

臍下少腹形象橫梗發必痛繞脇腰以及陰囊此乃厥陰肝氣不宣議以苦辛加左金佐通經脈之凝滯

川連

吳萸 穿山甲 青木香

金鈴子

延胡

青橘葉湯丸

郁肝病絡虛氣聚少腹滯脹前用河間金鈴子散加牡蠣橘葉合鹹苦辛勝法小效如食迷飢則脇腹鳴盛而濁

氣下泄頗安乃絡虛不足中之有餘形質瘦怯不可純攻 桃仁 當歸稍 炒小茴 南棗 郁李仁 蔥白汁丸

謝五 疝皆肝少腹堅聚有形是閉塞不通之象百日久恙血絡必傷古人治病必用辛香助燥氣勝之品宜緩商

矣 歸鬚

杜牛膝根

小茴香

川棟子

穿山甲

柏子仁

林 脈右弦左濡當臍痛連少腹已屬凝聚有形嘔吐黃濁大便欲解不通若患處漉漉有聲痛勢稍減惟外著體

藥味切病
製方本宜
如是古人
無不然也

勝脫
寒滯
筋病

奇脈
陽虛

鬱怒
肝脹
腫脹

肝疝
犯胃

不轉移其痛更加。此屬肝氣疝瘕。辛香流氣所稱通則不痛耳。

此通泄厥陰氣血方也。痛甚於下。濁結有形。非辛香無以入絡。非穢濁無以直走。至陰之域。以子和方合奉。

施四立冬前一日。寒戰後熱。屬厥陰。食蟬鹹寒。沈墜。浮腫囊大。溲溺甚少。至晚腫脹愈。加顯狀。陽微濁聚。治從氣分。

開泄冷溼。粗桂枝。吳萸。川棟子。茯苓。生牡蠣。澤瀉。麝香皮汗十匙。

唐六寒溼已入太陽之裏。勝脫之氣不利。陰囊墜腫。五苓散加獨活。漢防己。

某肝風筋疝。怒勞致傷。宜通補熄風。菝葜。補骨脂。歸鬚。小茴。韭子。茯苓。羊內腎。蒸熟和丸。

朱動氣疝。厥繞臍。汨汨有聲。男子精氣不充。是下焦損傷。溫補勿過剛燥。須察八脈。以推病情。

淡菝葜。歸身。炒枸杞。小茴。炒沙苑。茯苓。紅棗肉。

汪自云鬱怒不已。夏季忽起腹脹。醫以快氣疏滯湯藥。其脹竟入小腹。下墜。青筋外突。脹甚。延及腎囊。乃肝疝之症。議子和法。歸鬚。橘核。青木香。青皮。小茴。黑山梔。青蔥管。

周六久勞怒。肝木內震。腸中少腹。皆肝脈遊行之所。氣凝聚為脹。聚久結形為瘕。疝情懷憂鬱。永不能痊。以內起。

情志不昂。草木微功耳。炒小茴。黑山梔。川棟子。延胡。青木香。青皮。生香附。橘核。

吳六味酸。食不化。湧吐。述少腹厥氣上沖。下有宿疝。以肝濁攻胃。經云。食出完穀。是無陽也。

生泡黑附子。生淡乾薑。猪胆汁。吳萸。川棟子。

吳疝結少腹。按之堅。凡過飢必衝突。至脫吐酸膜脹。述病從怒勞而得。內應乎肝。肝逆犯胃。飢則胃弱。肝乘上噎。

下洩氣則減。肉桂。真橘核。青木香。小茴。穿山甲。粗桂枝。李根白皮。

項寒勝疝。疝亦屬厥陰。蓋陽明衰。厥邪來乘。須胃陽復辟。凝寒自罷。人參錢半。炮烏頭一錢。淡乾薑一錢。吳萸。炒。三錢。

朱七疝在肝內。經謂衝脈為病。但衝脈隸於陽明。肝木必乘。尅胃土。胃翻湧。逆致吐。吐。嘔。吐。湯飲不入。呃忒不止。

皆逆亂無已。為臟厥危疝矣。肝體本剛。相火內寄。一派熱燥藥餌。以剛濟剛。竟有缺折之虞。欲泄其濁。擬用朱南。

陽法。韭白根。兩頭尖。金鈴子。延胡。歸鬚。肉桂心。

毛疝發已過。肢冷潮熱。其納食減半。濁陰內迫犯胃。無發汗攻表之理。議泄厥陰。以安陽明。

入病 濕熱

人參 炒黑川椒 附子 茯苓 川棟子 胡盧巴

老年久病因嗔怒而腫大熱痛肝失疎泄火腑溼熱蘊結不通溫補升陽固謬蓋肝性主剛濕閉以從燥化此

龍膽苦堅不應議柔苦制熱反佐辛熱以開血中鬱痺用東垣滋腎丸

戴五溼熱下注久則囊腫形堅下焦血多氣少子和法中原有虎潛諸論後醫棄置不用惜哉

龍膽草 黃柏 蘆薈 山柰 知母 海金沙 猪苓 澤瀉 細辛

陳五疝多肝病宜乎辛泄但形體參脈是溼熱內蘊阻塞二便不為通爽先以通太陽方

寒水石 海金沙 猪苓 澤瀉 通草 木香汁

倪疝多結聚少腹大便閉阻小溲短澹舌白渴飲不能納穀無對症方藥姑與滋腎丸嘗服十粒十服

許六久有疝症十年來寒熱勞形則右胸脇中一股氣墜直走少腹凡大小便用力皆然面赤亮痰多食臃臃更令

病加此溼熱久壅墜中緩攻為宜控涎丹四分間日服十服

又脈沉痰多手肱赤瘡宿疝在下右脇氣墜少腹前議控涎丹逐瘴未應想久聚溼熱沉痾非皮膜經脈之理用

濟川丸四十粒勻二服間日一進竟通腑聚然後再議

又通腑宣壅祛痰既下其疝仍聚於右且感於寒天冬月卧安必有聲自能行走勞動必有形直墜陰囊久病急

攻無效議辛甘化風方法古人以疝為肝病什居八九當歸 鹿角 桂枝 肉桂 小茴 川芎 羌活 獨活 木瓜 茯苓 薏苡仁 白芍 甘草 芍藥 枳實 厚朴 木香 砂仁 豆蔻 檳榔 烏梅 山楂 神曲 麥芽 萊菔子 大黃 芒硝 礞石 礞石散 礞石丸 礞石散 礞石丸 礞石散 礞石丸

張五痛自腎囊漸踞少腹之左夫厥陰之脈繞乎陰器操持謀慮都主傷肝一氣結聚變幻形象而痛病名曰疝疝

分有七暴疝多寒久疝多熱泄氣痛緩宣通可以却病只因下焦乃深遠之鄉氣熱溼鬱概可知矣

川連 小茴 黑山柰 橘核 川棟子 青木香 郁李仁 冬葵子

陳脈沉弦舌灰邊白腰跨氣痛腎囊丸腫大此溼熱為病亂吃發散消導溼熱下墜為疝治當分消

草解此利濕 黃柏 山柰 茯苓 丹皮 防己 猪苓 澤瀉

陳二辛香流氣以治疝未嘗不通服之五日遍身疼痛下午四肢浮腫肌膚漸見高突塊瘰思走泄氣勝都是陽傷

疎泄 陽街 西藥

朱正厥陰三厥又延邪攻肝經絡脈少腹痛漸硬氣串繞陰器筋脈乃結疝瘕之象病久雖少壯不可治於泄氣溫

腎宣肝為急 淡從容 歸身 枸杞子 炒黑小茴 穿山甲 全蝎

陸九疝母十年沈痼宿疴藥不能效夫瘧邪既久邪與氣血兩結結聚絡脈藥難入絡耳瘧不離乎肝膽病不外乎

肝病七疝子和分部夫著虛質不可尚以辛香下墜為甚議有情溫通以培生氣

鹿茸 大茴香 穿山甲 當歸 水安息香 炮黑川烏 全蝎 用黑大豆炒

赤淋酒一杯瀘酒汁和丸每服二錢暖酒送

經云任脈為病男子內結七疝女子帶下瘕聚又腎脈生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝又曰脾傳

之腎病名曰疝瘕又曰三陽為病發寒熱其傳為癰疝又曰邪客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛此素問言諸

經之疝也又經脈等篇云足陽明之筋病癰疝腹筋急足太陽之筋病陰器紐痛下引臍兩脇痛足厥陰之經

筋病陰氣不用此靈樞言諸經之疝也後人因有筋水孤癩氣血寒七疝之名其主治各有專方立法可謂又

備狀其中不無錯雜之處終非可訓之定法惟仲景先生獨以寒疝為名其所出三方亦以溫散祛寒調營補

虛為主並不雜入氣分之藥而子和治法又以辛香流氣為主謂肝得疎泄而病愈矣其金鈴虎潛諸法可謂

發前人所未備故疝病之本不離乎肝又不越乎寒以肝脈絡於陰器為至陰之臟足太陽之脈屬腎絡膀胱

為寒水之經故仲景所云寒疝腹中痛逆冷手足不仁腹滿脈弦而緊惡寒不欲食繞臍痛及脇痛裏急是內

外皆寒氣作主無復界限其烏頭二方專以破邪治標為急虛實在所不論是急則治標之義也其當歸羊肉

一方專以補虛散寒為主故以當歸羊肉辛甘重濁溫暖下元而不傷陰佐以生薑隨血肉有情之品引入下

焦溫散泣寒是固本不治標也和所云疝不離乎肝者以疝病有陰囊腫脹或痛而裏急筋縮或莖中作痛

或牽引睪丸或少腹攻衝作痛或號哭忿怒而致此皆肝經脈絡之現症其金鈴散一法以世肝散逆為主故

以川棟導膀胱小腸之熱元胡和一身上下諸痛以肝主疎泄故也其所取虎潛一法以柔緩導引為主故方

中用虎骨煨肝風壯筋骨羊肉龜板補髓填精佐以地黃補腎當歸補肝使以陳皮利氣疎肝皆藥通肝調營

是治肝而顧及於腎也及觀先生治疝之法又更有追疝者其旨以暴疝多寒久疝多熱為疝病之大綱其餘

增品發育力奇宗

疝

增品發育力奇宗

隨症施治。如氣墜下結者。以鹿茸鹿角并陽為主。其脈結有形。痛甚於下者。宗丹溪通陽泄濁為治。其火腑溼熱鬱結不通者。用桑苦刺熱。及佐辛熱以開血中鬱痺為主。其寒溼下墜。太陽之裏。膀胱之氣不和。二便不為通利者。五苓散加減。通太陽膀胱為主。其溼熱又聚。氣墜少腹陰囊者。用控涎丹滑川丸等。連理通腑分清。兼辛甘化風法為主。如下焦陰陽兩虛者。用有情溫通。以培生氣。兼通補風為主。而先生於治病之法。可謂曲盡病情。諸法備矣。仲景又有狐疝一方。究非王道之品。茲不具贅。邪滋凡治痢之法。大反亦不外此。惟痢血必諸大症。尚未有治法。想當時未及遇此等大症也。

頭痛

風火

徐六冬月嘔吐之後。漸漸顛頂作痛。下焦又有積疝痔瘍。厥陰陽明偏熱。凡陽氣過動。變化火風。迅速自為升降。致有此患。連翹心 元參心 桑葉 丹皮 黑山梔 荷葉汁

胡六脈左弦數右偏頭痛左齒痛此為上方 連翹 薄荷 羚羊角 夏枯草花 黑梔皮 鮮菊葉 苦丁茶 乾荷葉邊

某高年氣血皆虛。新涼上受。經脈不和。腦後筋掣牽痛。倏起倏靜。乃陽風之邪。議用清散輕劑。

荷葉邊 苦丁茶 蔓荊子 菊花 連翹 黑山梔 蔓荊子 杏仁 木通 白芷

王六邪鬱偏頭痛 鮮荷葉邊 苦丁茶 連翹 黑山梔 蔓荊子 杏仁 木通 白芷

柳五風鬱頭痛 鮮荷葉 苦丁茶 淡黃芩 黑山梔 連翹 蔓荊子 木通 白芷

某內風頭痛淚冷矜淚自 炒杞子 製首烏 柏子仁 茯神 炒菊花炭 小黑稽豆皮

沈氏痛在頭左腦後厥陽風木上觸 細生地 生白芍 柏子仁 炒杞子 菊花 茯神

孫四暑伏寒熱頭痛 鮮荷葉邊 連翹 苦丁茶 夏枯草 山梔 蔓荊子 厚朴 木通 石膏 生甘草 桑葉 滑石

某暑風溼熱混於上竅。津液無以運行凝滯。逆偏頭痛。舌強乾澀。治宜清散。蔓荊子 羚羊角 荷梗 桑葉

程既知去血過多。為陰虛陽實之頭痛。再加發散。與前意相反矣。復脈去參薑桂加左牡蠣 牡蠣 阿膠 人參 生地 炙草

又脈數虛而動。足微陰氣大傷。陽氣浮越。頭痛筋陽。仍與鎮攝之法。牡蠣 阿膠 人參 生地 炙草

朱據說就涼即安。遇暖必頭痛筋掣。外以厚栝可緩。大凡肝風陽擾。胃絡必虛。食進不甘。是中焦氣餒。雖鹹問介

肝陽 陽虛 肝風 上犯胃 朱

此風變火之症

屬清陽獲效說來依稀想像諒非入理深談即以代煎酸甘是高且五旬又四中年後矣况陰久逾亦有斷代生

氣之弊半月來乏少診之功姑為認慎用固本膏

徐當年下虛曾以溫腎涼肝獲效春季患目是陽氣驟升乃冬夫藏聚水不生木之徵也頻以苦辛治目風陽上聚頭顛肝木橫擾胃受戕賊至於嘔吐矣今心中乾燥如焚頭中岑岑震痛忽冷忽熱無非陰陽之逆肝為剛臟溫燥決不相安况辛升散越轉凶豈可再蹈前轍姑以鎮肝益虛冀有陽和風熄之理

不是無 阿膠 小麥 麥冬 生白芍 北沙參 南棗

又 侵冷忽熱心煩顛痛厥陽之逆已屬陰液之虧前審申用剛藥之非代赭味酸氣墜乃強鎮之品亦剛藥也考

七疝中子和慣投辛香走泄其中虎潛一法亦採可見疝門亦有柔法醫者孰當成法苟不潛心體認皆希圖附會矣今嘔逆既止其陰藥亦有暫投即水生涵木之法議以固本成方五更時從陽引導可也加秋石

葉嘔臨晚頭痛火升心嘈風陽上冒防厥 細生地 阿膠 牡蠣 茯神 麥冬 生白芍

厥陰 氣血 邪痺 頭形象天義不受濁今久痛有高突之狀似屬客邪蒙閉清華氣血然常餌桂附河車陰受其害 但不覺耳亦未見其害思

身半以上屬陽而元首更為陽中之陽大凡陽氣先虛清邪上入氣血瘵痺其痛流連不息法當宣通清陽勿事表散以艾熯按法灸治是一理也 熟半夏 北細辛 炮川烏 炙全蝎 薑汁

又 陽氣為邪阻清空機竅不宣考周禮採毒藥以攻病藉虫蟻血中搜逐以攻通邪結乃古法而醫人忽略者令痛滋腦後心下嘔逆厥陰見症久病延虛攻邪須兼養正 川芎 當歸 半夏 薑汁 炙全蝎 蜂房

張二 太陽痛連顛骨耳後牙跟夏令至霜降不痊伏邪未解治陽明少陽

連翹 羚羊角 牛蒡子 葛根 赤芍 白芷 鮮菊葉

頭為諸陽之會與厥陰肝脈會於巔諸陰寒邪不能上逆為陽氣室塞濁邪得以上據頭風無不由於風寒內入氣逆者地 少而太寒耗腦元氣大症且不可不厥陰之風火乃能逆上作痛故頭痛一症皆由清陽不升火風乘虛上入所致觀先生於頭痛治法亦不外

此如陽虛濁邪阻塞氣血瘵痺而為頭痛者用蠱蟻搜逐血絡宣通陽氣為主如火風變動與暑風邪氣上鬱而為頭痛者用鮮荷葉苦丁茶蔓荊山梔等辛散輕清為主如陰虛陽越而為頭痛者用仲景復脈湯甘麥大

棗法。加膠芍牡蠣鎮攝益虛。和陽熄風為主。如厥陽風木上觸。兼內風而為頭痛者。用首烏。柏仁。檀豆。甘。刺。生。芍。杞。子。輩。熄。肝。風。滋。腎。液。為。主。一。症。而。條。分。縷。析。如。此。詳。明。可。謂。手。法。兼。到。者。矣。鄒。時。來。頭。風。一。症。往。往。本。熱。而。標。寒。寒。中。多。清。火。之。藥。固。能。愈。風。火。輕。症。或。有。寒。邪。犯。腦。或。有。風。寒。外。來。則。溫。散。之。法。固。不。可。畧。而。外。提。之。法。尤。當。博。考。也。

心驚

田汁脈數聞雷被驚。心下漾漾作痛。道遠散去。柴胡。加。鈎。藤。丹。皮。當。用。鎮。心。方。

宋 脈左濇伏。心下痛。甚。舌白。不能食。穀。下咽。阻。隔。痛。極。昏。厥。此。皆。積。勞。損。陽。前。者。曾。下。瘀。血。延。綿。經。月。不。止。此。為。難。治。

譚 心痛引背。口湧清涎。肢冷。氣塞。腕中。此為脾厥。心痛。病在絡。脈。例。用。辛。香。

朱 重按痛勢稍衰。乃一派苦辛燥。劫傷營絡。是急心痛症。若上引泥丸。則大危矣。議用金匱法。

人參 桂枝尖 川椒 炙草 白蜜 公丁香柄 草果仁 厚朴

厥心痛一症。古人辨論者多且精矣。茲不復贅。但厥心痛。與胃脘痛情狀似一。而症實有別。世人因內經胃脘當心而痛一語。往往混而視之。不知厥心痛為五臟之氣厥。而入心胞絡。而胃實與焉。則心痛覺胃痛。不得不各分一門。今先生案中。聞雷被驚者。用道遠散去。柴胡。加。鈎。藤。丹。皮。治。之。以。其。肝。陽。上。逆。不。容。升。達。為。之。養。血。以。平。調。也。積。勞。損。陽。者。用。歸。鹿。姜。桂。桃。仁。半。夏。治。之。以。其。勞。傷。血。痺。無。徒。破。氣。為。之。通。絡。以。和。營。也。脾。厥。心。痛。者。用。良。薑。薑。黃。茅。朮。丁。香。草。葉。厚。朴。治。之。以。其。痺。寒。氣。厥。病。在。脈。絡。為。之。辛。香。以。開。通。也。重。按。而。痛。稍。衰。者。用。人。參。桂。枝。川。椒。炙。草。白。蜜。治。之。以。其。心。營。受。傷。攻。劫。難。施。為。之。辛。甘。以。化。陽。也。方。案。雖。未。全。備。然。其。審。病。之。因。製。方。之。巧。無。不。一。一。破。的。果。能。舉。一。反。三。其。義。實。有。益。乎。龍。齋。年。

心驚胃痛。確是二病。然心痛絕少。而胃痛極多。亦有因胃痛而及心痛者。故此二症。古人不分。一項。醫者細心求之。自能辨其輕重也。

胃脘痛

胃脘痛。確是二病。然心痛絕少。而胃痛極多。亦有因胃痛而及心痛者。故此二症。古人不分。一項。醫者細心求之。自能辨其輕重也。

胃脘痛。確是二病。然心痛絕少。而胃痛極多。亦有因胃痛而及心痛者。故此二症。古人不分。一項。醫者細心求之。自能辨其輕重也。

胃脘痛。確是二病。然心痛絕少。而胃痛極多。亦有因胃痛而及心痛者。故此二症。古人不分。一項。醫者細心求之。自能辨其輕重也。

胃脘痛。確是二病。然心痛絕少。而胃痛極多。亦有因胃痛而及心痛者。故此二症。古人不分。一項。醫者細心求之。自能辨其輕重也。

胃脘痛。確是二病。然心痛絕少。而胃痛極多。亦有因胃痛而及心痛者。故此二症。古人不分。一項。醫者細心求之。自能辨其輕重也。

胃脘痛。確是二病。然心痛絕少。而胃痛極多。亦有因胃痛而及心痛者。故此二症。古人不分。一項。醫者細心求之。自能辨其輕重也。

胃脘痛。確是二病。然心痛絕少。而胃痛極多。亦有因胃痛而及心痛者。故此二症。古人不分。一項。醫者細心求之。自能辨其輕重也。

肝犯 胃脘痛 嚴仁 胃脘痛 乾嘔 金鈴子 延胡 半夏 茯苓 山柅 生香附

張衝氣上攻成疝痛嘔痛後則散此厥陰順乘陽明陽明虛筋骨亦掣痛安蛇丸三錢四服椒梅湯送

某丘勞力氣阻胃痛川棟子延胡炒半夏烏藥橘紅生香附汁

陳宿病衝氣胃痛今飽食動悸痛發嘔吐是肝木侵犯胃土濁氣上踞脹痛不休逆亂不已變為先寒後熱煩躁

面赤汗泄此為厥象厥陰肝臟之現症顯然在目夫痛則不通通字須究氣血陰陽便是看診要旨矣議用瀉心

法乾薑川連二味同用則安人參枳實半夏薑汁

吳三食倉痛飲嘔水涎沫六年久病入絡迷大便忽閉忽瀉患處澀澀有聲議通胃陽兼制木侮

此乃款藥淡吳火良薑半夏延胡枳紅杏仁厚樸炮川烏茯苓蒲黃

李氏舌白胸痞脫痛如乾嘔便難氣阻凝痰聚膈當以泄降宣劑者竟致瀉當夏熱土旺傷及太陰恐滋脹滿之

憂醋炒半夏川棟子延胡橘紅杏仁厚樸

王氏氣逆填胸阻咽腕痺而痛病由肝臟厥氣乘胃入膈致陽明經脈失和周身掣痛夜其晝緩者戊亥至陰為肝

旺時候也此症多從驚恐噴鬱所致夫治變為昏厥半夏薑汁金鈴子延胡桃仁歸鬚鬱金白蔻仁瓜蒌皮

又痛緩夜深復熾前後心胸板掣脈左數病在血絡中金鈴子延胡桃仁歸鬚鬱金白蔻仁

董氏產後三年經水不轉胃痛得食必嘔汗出形寒腰左動氣悶燥大便七八日始通脈細弦右澹舌白稍渴腕中响

動下行痛緩病屬厥陰順承陽明胃土久傷肝木愈橫法當辛酸兩和厥陰體用仍參通補陽明之陽俾濁少上僭痛

有緩期人參同煎開口吳萸淡水泡洗生白芍三錢良薑六錢熟半夏一錢雲茯苓切塊

顏氏天癸當絕仍來昔壯年已有頭暈七年前秋起胃痛若嘈今春悲哀先麻木頭眩痛發下部膝脛冷三氏病屬

肝厥胃痛述痛引背腸是久病絡脈空際厥陽熱氣因情志鬱勃拂逆氣攻乘絡內風旋動襲陽明致嘔逆不能

進食九孔石決明病不切清阿膠生地枸杞子茯苓桑寄生川石斛

某腸痛入脘嘔吐黃濁病不切水液因驚動肝肝風震起犯胃平昔液衰難用剛燥議養胃汁以熄風方

人參茯苓半夏廣皮白麥冬白粳米

肝犯胃兼姚胃痛久而屢發必有凝痰聚瘕老年氣衰病發日重乃邪正勢不兩立也今納物嘔吐甚多中月味帶酸苦脈

胃脘痛

上海文益書局石印

此仲聖之法也

此症累非甚明何以時時自發

總宜切胃痛其妙此方則佳為壯陽耳

痰飲胸痺

肝鬱犯火犯胃

鬱傷脾胃陽虛陽虛陽虛

得左大右小蓋肝木必侮胃土胃陽虛而欲出且呃逆法以熱湯不減其胃氣披騰如沸不嗜湯飲飲濁瀰留腕底用藥之理遠矣用剛嘉言謂能變胃而不受胃變開得上關再商治法紫金丹含化一丸日三次議以辛潤苦滑道胸中之陽開滌濁涎結聚古人謂通則不痛胸中部位最高治在氣分

鮮薑白三錢瓜蒌仁炒熟半夏三錢茯苓三錢川桂枝錢主薑汁調分古有蘊露之歌謂蘊最滑露不能留其氣辛則通其體滑則降仲景用以主胸痺不舒之痛瓜蒌苦潤豁痰陷胸湯以之開結半夏自陽以和陰茯苓淡滲桂枝辛甘輕揚載之不急下走以攻病所薑汁生用能通胸中痰沫兼以通神明去穢惡也

某氏胃痛引脇

川棟子

柴胡

黑山梔

鈎藤

半夏

橘紅

朱氏苦寒辛通

川連

主瓜蒌皮

白芥子

茯苓

炒半夏

薑汁

橘紅

竹茹

又肝厥胃痛兼有痰飲只因誤用芪朮人參固守中焦痰氣阻閉致痛結痞脹更醫但知理氣使降不知氣閉熱自內生是不中竅前方昂以苦寒辛通為法已得效驗況酸味亦屬火化議河開法金鈴子 延胡 黑山梔 淡豆豉 炒 黑山梔 橘紅 半夏

張老年鬱勃肝陽直犯胃絡為心下痛久則液枯氣結成格全鈴子延胡黑山梔淡豆豉炒

張壯年面色痿黃脈濡小無力胃脘常痛情志不適即發或飲暖酒暫解食物不易消化脾胃之土受尅却因肝木來乘治情放懷可愈此病人參廣皮半夏茯苓汶仁桑葉丹皮桔梗山梔薑汁水泛丸

某味痰短氣脘中微痛人參淡附子桂枝炒遠志煨薑

某漬滯久著胃腑不宣不時脘痛已經數載陽傷矣疑炒半夏淡乾薑華撥草菓廣皮茯苓

汪五診脈弦濇胃痛繞背穀食漸減病經數載已入胃絡姑與辛通法

甜桂枝分延胡索錢半夏錢茯苓錢良薑錢蜜水煮生薑半錢

張陽微不司外衛脈絡牽掣不和胃痛夏秋不發陰內陽外也當又寒驟加宜急護其陽用桂枝附子湯

桂枝附子炙草煨薑南棗

戴九始於傷陰繼則陽拗脘痛似乎拘束食物通時不運當理中焦健運二陽通補為宜守補則誤

桂枝木

茯苓

生薑渣

炒焦遠志

炒普半夏

生益智仁

余四胃疼發前後心冷嘔吐淡黃芩炒半夏華椒淡乾薑草菓仁厚朴廣皮桂枝木
某中州陽失健運腕中痛食不化益智仁穀芽廣皮炙草茯苓檀香汁半夏麵炒荷葉

營絡
胃虛

顧五清陽失職腕中痺痛得咬曠過當辛以通之薤白半夏桂枝茯苓
顧五營虛胃痛進以辛甘當歸錢甜桂枝錢茯苓錢炙草五分煨薑錢南棗內錢
費九勞力氣泄陽傷胸腕痛發得食自緩已非質滯停蓄然初病氣傷久泄不止營絡亦傷古謂絡虛則痛也攻痰

破氣不去病即傷胃致納食不甘噁噫欲嘔顯見胃傷陽敗當以辛甘溫方人參桂枝茯苓炙草煨薑南棗
某胃痛已久間發風疹此非客氣外感由于情懷鬱勃氣血少於流暢夫思慮鬱結心脾營血暗傷年前主歸脾
一法原有成效今食減形瘦當培中土而理營輔之一異功加歸芍用南棗肉湯泛丸

程氏脈更背寒食入腕痛人參茯苓當歸白芍炙草煨薑南棗
某氏形寒腕痛得食甚手按少緩非有餘客邪病擬進和營衛法歸桂枝去芍加茯苓

將陽微氣阻右腕痛痺據云努力痛起當兩調氣血延胡半夏厚朴橘紅桂枝木良薑瓜薑皮茯苓
某二努力饑飽失時好飲冷酒脈弦硬中腕痛熟半夏錢三雲茯苓錢三桃仁去皮炙炒良薑錢一延胡錢一紅薑翹錢一

方大熟半夏炒三兩雲茯苓兩生厚朴兩小附子一兩草菓仁去味兩高良薑兩老薑汁法丸每三錢
某痛固虛寒吐痰泄氣稍緩當通陽明勿雜多歧人參半夏薑汁淡附子茯苓淡乾薑

某陽微痰滯胃痰痛脹用阿魏丸六分
施六胃痛濁痰上逆代赭石炒半夏淡吳萸淡乾薑茯苓廣皮華椒生益智仁
張四陽微濁凝胃下痛炒黑川椒去目炒黑川烏錢炮黑川附子錢炮淡乾薑錢

高五素多鬱怒陽氣窒痺濁飲凝涎湯飲下咽吐出酸水胃腕痛痺已經三載漸延噎膈先與通陽徹陰俾陽氣
得宣庶可向安半夏枳實皮桂枝木茯苓淡乾薑

又脈右弦不飢納穀不運吞酸濁飲尚阻陽仍不宣半夏良薑桂枝木茯苓延胡淡乾薑

胃腕痛

血絡
痰痺

高脈虛瀉胃痛久治在血分。桃仁 當歸 桂枝 茯神 遠志 艾草

錢六三酒肉滯氣胃痛。鄉人稱為穿心箭。風方書所無。不可稽攷。苦辛泄降可效。延胡 川棟子 桃仁 蒲黃 五靈脂

威六三胃痛。喜得煖食。腸中泄氣則安。數年痛必入絡。治在血中之氣。桂枝木 桃仁 韭白汁 歸鬚 茯苓塊

又陽微胃痛。當歸 桂枝木 桃仁 艾甘草 煨薑 南棗

席經幾年宿病。病必在絡。痛非虛症。因久延體質氣餒。遇食物不適。或情懷鬱勃。疾因氣滯氣阻。血瘀。諸脈逆亂。

頻吐污瀉。而大便反秘。醫見嘔吐肢冷。認為虛脫。以理中和。附子溫裏護陽。夫陽氣皆屬無形。況乎病發有因。決

非陽微欲脫。憶當年病來。宛是肝病。凡疏通氣血。皆效。其病之未得全好。由于性情食物居多。夏季常以太陰陽

明通劑。今痛處在腕。久則痰濁復聚。宜淡味薄味清養。初三竹瀝。泛丸。仍用早上。另立通痰

方法。蘇木 人參 鬱金 桃仁 歸尾 柏子仁 琥珀 荒蔚 紅棗肉丸。早服二錢

秦久有胃痛。更加勞力。致絡中血瘀。經氣逆。其患總在絡脈中。痺室耳。醫藥或攻裏。或攻表。置病不理。宜乎無效。

形瘦清減。用緩逐其痰一法。蛻螂蟲一兩 塵蠹一兩 五靈脂沙一兩 桃仁一兩 川桂枝艾五錢

蜀漆三錢 用老韭根白搗汁。泛丸。每服二錢。滾水下。此是去痰之藥。大醫見其真有積痰。乃可否則有傷腸之害。

潘氏脈弦。瀉經事不至。寒熱胃痛。拒格嘔惡不納。此因久病胃痛。瘀血積於胃絡。誠辛通痰滯法。

川棟子 延胡 桂枝木 五靈脂 蒲黃 香附

吳氏氣火鬱胃痛。川棟子 橘紅 炒香肉 鬱金 黑山梔 香附

江仁胃疼。緩氣逆不降。鮮枇杷葉 杏仁 生香附 降香附 厚朴 橘紅 桔梗 白蔻

范氏諸症。皆能開氣。聚凝為腐。宛是呆滯食物。食已脘痞痛脹。乃清氣之阻。診脈小瀉。舌白粘膩。當理氣以開曠胸

中 杏仁 厚朴 老蘇梗 廣皮白 白蔻仁 枳殼汁 桔梗汁

陽明乃十二經脈之長。其作痛之因甚多。蓋胃者量也。乃衝擊要道。為患甚易。虛邪賊邪之乘機竊發。其開消

方家重損
可厭

待必然之理又如飽食痛甚得食痛緩之類於此有宜補不宜補之分焉若素虛之體時就煩勞水穀之精微不足以供其消磨而營氣日虛脈絡枯澁求助於食者甘溫填補等法所宜頻進也若有形之治堵塞其中容納早已無權得助而為實實攻之逐之等劑又不可緩也寒濕兩法從于喜煖喜涼滋燥之珠詢其便溲便滑至於飲停必吞酸食滯當受腐敗氣乃散漫無形痰傷則定而有象就其動擾當頭痛而吐沫痰溼壅塞必善吐而脈滑營氣兩虛者不難于餽鍊動悸肝陽衝越者定然煩渴而嘔逆陰邪之勢其來必速鬱火之患由漸而劇也邵折甫
治胃腕之方大段亦不以此但痛必有外邪內積不宜輕補而用人參甚多痛久則必熱而用薑附甚多俱為太過

腸痛

肝鬱

張六 腸脹夜甚响動則降七情致傷之病 橘葉 香附子 川棟子 半夏 茯苓 薑渣

陳 氣熱攻沖擾腕入腸 川連 牡蠣 夏枯草 炒半夏 香附 炒白芥子

徐 勞怒陽動左脇閃閃腹中微滿診脈弦搏左甚當先用苦辛 鬱金 山柅 半夏 降香木 橘紅 金石斛

湯 氣逆咳血後腸疼 瘀血 降香汁 川貝 鮮枇杷葉 白冠仁 杏仁 橘紅 當加血藥

丁 由虛理痛起左脇下堅滿脹及臍右大便澀滯不爽用緩攻方法 小温中丸 刺蒺藜 鉤藤

某 痰飲搏擊腸痛 半夏 茯苓 廣皮 甘草 白芥子 刺蒺藜 鉤藤

沈 左脇下痛食入則安 當歸桂枝湯加肉桂

朱 左乳傍痛繞腰腹重按得執少緩此屬陰絡虛痛十年不愈愈亦痼疾矣 當歸錢 肉桂錢 小茴分 丁香皮分 茯苓錢 淡乾薑錢 此非煎方所治

尤 痛從中起繞及右脇胃之絡脈受傷故得食自緩但每痛發必由下午黃昏當陽氣漸衰而來是有取乎辛温通絡矣 內有瘀血 當歸 茯苓 炮薑 肉桂 芫草 大棗

郭 痛必右脇中有形攻心嘔吐清涎 此有 周身寒凜痛止寂然無踪此乃寒入絡脈氣乘填塞阻逆以辛香温通

法 單撥 半夏 川棟子 延胡 吳萸 良薑 蒲黃 茯苓

汪 心嗔怒動肝寒熱旬日左季脇痛難以舒轉此絡脈痰痺防有見紅之事靜調勿勞可愈

寒入 格脈 氣滯 血絡 痰痺

濕熱 痼疾 虛寒

金不 制木

桃仁 歸鬚 五加皮 澤蘭 丹皮 鬱金

又 桃仁 歸鬚 丹皮 桑葉 川棟子皮 黑山梔皮

又 絡虛則熱。液虧則風動。痛減半。有動躍之狀。當甘緩理虛。又甘草湯去薑桂

又 痛止便難。液耗風動。為秘。議用東垣通幽法。當歸 桃仁 柏子霜 火麻仁 郁李仁 松子肉 紅花

凌 肝著脇中痛。勞怒致傷氣血。川棟子皮 炒延胡 歸鬚 桃仁 生牡蠣 桂枝木

沈 初起形寒熱漸。又脇肋腕痛。進食痛加。大便燥結。久病已入血絡。兼之神法瘦損。辛香剛燥。決不可用。

白旋覆花 新絳 青蔥管 桃仁 歸鬚 柏子仁

王 左前後脇板著食後痛脹。今三年矣。久病在絡。氣血皆窒。當辛香緩通。

桃仁 歸鬚 小茴 川棟子 半夏 生牡蠣 橘紅 紫降香 白芥子 水泛丸

汪 痛在脇肋遊走不一。漸至痰多。手足少力。初病兩年。寢食如常。今年入夏病甚。此非臟腑之病。乃由經脈繼及

絡脈。大凡經主氣。絡主血。久病血瘀。痰從便下。諸家不分經絡。但忽寒忽熱。宜手無效。試服新絳一方。小效。乃絡

方耳。議通少陽陽明之絡。通則不痛矣。歸鬚 炒桃仁 澤蘭葉 柏子仁 香附汁 丹皮 穿山甲 沒藥 水逆丸

程 診脈動而虛。左部小弱。左脇疼痛。痛勢上引。得食稍安。此皆操持太甚。損及營絡。五志之陽動擾不息。嗑乾舌

燥。心悸。久痛津液致傷也。症屬虛。但冬未歸。諸方未能治。及絡病內經肝病不越三法。辛散以理肝。酸泄以

體肝。甘緩以益肝。宣辛甘潤溫之補。蓋肝為剛臟。必柔以濟之。自臻效驗耳。

炒桃仁 柏子仁 新絳 歸尾 橘紅 琥珀

又 痛緩時用丸方。真阿膠 小生地 枸杞子 柏子仁 天冬 刺蒺藜 茯神 黃菊花四兩丸 奇好

朱 肝絡凝痰。脇痛須防動怒失血。旋覆花湯加歸鬚桃仁柏仁

李 左脇痠積攻疼。生牡蠣 南山查 炒延胡 川棟子 炒桃仁 歸鬚 丹皮 桂枝木

將 三宿傷。左脇腹背痛。炒桃仁 歸鬚 炒延胡 片薑黃 五加皮 橘紅 桂枝木 炒小茴

沈 暮夜五心熱。嗑乾。左脇痛。肝腎陰虧。人參 生地 天冬 麥冬 柏子霜 生白芍 不切病

北漢語狀

肝腎

肝風 入絡 黃 左腸骨麻易飢驅涎肝風內震入絡 生地 阿膠 生白芍 柏子仁 丹皮 澤蘭

又 照前方去白芍澤蘭加桃仁桑枝

又 肝胃絡虛心嘈如饑左脇痛便燥少血 生地 天冬 枸杞 桂圓 桃仁 柏仁 菽膏加阿膠收

程 脇下痛犯中焦初起上吐下瀉春深寒熱不止病在少陽之絡 青蒿根 歸鬚 丹皮 紅花 鬱金

胡 三診脈右弦左小弱瀉病起積勞傷陽操持索思五志皆逆而肝為將軍之官謀慮出焉故先脇痛痛暮陽不用

事其病漸劇是內傷症乃本氣不足日餌辛燥氣泄血耗六味滋柔膩藥原非止痛之方不過矯前約之謬而已

內經肝病三法治虛亦主甘緩蓋病既久必及陽明胃絡漸歸及右肝胃同病人卧魂藏於肝夢寐紛紜傷及無

形矣議用甘藥少佐攝鎮人參 棗仁 茯神 炙草 柏子仁 當歸 龍骨 金箔 桂圓肉煮濃汁搗丸

脇痛一症多屬少陽厥陰傷寒脇痛皆在少陽膽經以脇居少陽之部雜症脇痛皆屬厥陰肝經以肝脈布於

脇肋故仲景旋覆花湯河間金鈴子散及先生辛溫通絡甘緩理虛溫柔通補辛泄通痰等法皆治肝着脇痛

之劑可謂曲盡病情諸法畢備矣然其症有虛有實有寒有熱不可槩論苟能因此擴充再加詳審則臨症自

有據矣部時來 案中用藥頗能變通心思有不可 及處惟用補之處未免太重耳

腹中 二焦 氣阻 裴氏 脈數按之濡腹痛嘔吐恐痧穢格拒宜宣通氣分 白蔻仁 桔梗 黑山柅 香豉 半夏 廣皮白

某 四腰腹痛得冷愈甚 桂枝木 茯苓 蘄艾 生香附 青皮 炒小茴

吳 五當臍微痛手按則止此絡空冷乘陽氣又盛之質自速戒酒殺增不可因痛再以破泄真氣

茯苓 生薑煨 熟木 肉桂

俞 九十腹痛六七年每發必週身寒凜吐涎沫而痛止 針有 此諸氣鬱痺得瀉則宣之象法當升陽散鬱

半夏 草菓 全鈴子 延胡 厚朴 生薑 蘇梗

穢濁阻遏中焦氣機不宣腹痛腕痺當用芳香逐穢兼以疏泄

藿香 厚朴 杏仁 萊菔子 半夏 廣皮白

白則不香 好奇矣

但如此散 寒足已 此症中有 寒欬成囊

陰濁 內阻 腸陽不通
鄭 脈沉微腹痛欲大便陰濁內凝乃陽氣積衰通陽必以辛熱 生白木 吳萸 良薑 川熟地 茯苓 小茴
某 腑陽不通腹痛用禹餘糧丸暖下通消二便通脈緩腹以此無形之氣未振宜疎補醒中
生白木 厚朴 廣皮 半夏 茯苓 生益智 薑汁

肝氣鬱滯 肝鬱 肝鬱 肝鬱
某 氣結腹痛食少寒熱 逍遙散去木加鬱金香附
某氏 肝鬱腹痛有形經不調 香附 川芎 當歸 肉桂 五靈脂 木香 吳萸 炒白芍

肝鬱 肝鬱 肝鬱 肝鬱
畢 小便自利大便黑色當臍腹痛十五年漸發日甚脈來沈而結澇此鬱勃傷及肝脾之絡致血敗瘀留勞役動
怒宿疴乃發目今冬深閉藏忌用攻下議以辛通潤血所謂通則不痛矣
桃仁 桂枝木 穿山甲 老韭白 煎送阿魏丸一杯

凝痰 絡血 肝鬱 肝鬱
徐 疔發五六年形體畏寒病發身不大熱每大便腹痛裏急此皆氣血凝滯當以鬱病推求
當歸 酒炒大黃 枳實 桂枝 艾草 白芍

勞傷 勞傷 勞傷 勞傷
某 勞力傷氣浮腫食入腹痛姑用戊己調中
白芍 艾草 當歸 炒焦 生益智 研分 廣皮 煨薑 棗肉 三 河水煎

營分 營分 營分 營分
袁 四當臍腹痛發於冬春深漸愈病發發氣過飢勞動亦發宜溫通營分主治
當歸 艾草 肉桂 茯苓 炮薑 南薑

鬱怒 鬱怒 鬱怒 鬱怒
華 腹痛三年時發時止面色明亮是飲邪亦酒濕釀成因怒左脇有形痛繞腹中及胸背諸俞乃絡空飲氣逆攻
入絡食辛熱痛止復痛蓋怒則鬱折肝用淮氣辛辣可解論約必首推氣味
粗桂枝木 天南星 薑汁 漫漶 生左牡蠣 五錢 真橘核 炒香打 川棟子 肉錢 李根東行皮 錢

暑傷 暑傷 暑傷 暑傷
某 長夏腹脹減食微痛是暑傷在氣分東垣每調和脾胃疎泄肝木最屬近理若守中之補及膩滯血藥皆左
人參 廣皮 白芍 茯苓 殺芽 生益智 仁

腹處 腹處 腹處 腹處
腹處于中痛因非一須知其與形及有形之為患而主治之機宜已先得其要矣所謂無形為患者如寒凝火
鬱氣阻營虛及夏秋暑溼痧穢之類是也所謂有形為患者如蓄血食滯癥瘕蟻蟻內疝及平素偏癖成積之

腹痛久者
必用積滯

欲之氣以
愈及病也
藥中用丸
散起妙

痛後

痛脇

類是也。若其痛勢之高下，辨其色脈之衰旺，細究其因，確從何起。大都在脈者，以肝脾胃為主。痛絕不在脈者，以腸胃為先。夫臟有賊尅之情，非比腑病，而以通為用也。此通字，勿執攻下之謂。古之建中湯，理中湯，三物厚樸湯，及厚樸溫中湯，各具正理。考先生用古若通陽而泄濁者，如吳茱萸湯，及四逆湯，清火而泄鬱者，如左金丸，及金鈴散法，開通氣分者，如四七湯，及五磨飲法，宣攻營絡者，如穿山甲，桃仁歸鬚，韭根之劑，及下瘀血湯法，緩而和者，如芍甘湯，加減及甘麥大棗湯法，柔而通者，如旋覆拍子肉桂當歸之劑，及復脈加減法，至於食滯消之增擾安之，癥瘕理之內疝平之，炒穢之候，以考香解之偏積之類，究其原而治之，是皆先生化裁之法也。若夫瘍科內癰，婦科四症，兼患是病者，更於各門兼參其法而用之，則無遺蘊矣。邵新甫

徐 通日天令驟冷，診左脈忽現孔濇，痛時筋掣，繞掣耳後。此營虛脈絡失養，風動筋急。前法清絡涼劑，不應。營虛不受辛寒，做東垣舒筋湯意。當歸 生黃芪 片薑黃 桂枝 防風 生於木 前藥化活絡丹一丸

某 勞倦肩臂疼，川桂枝木 木防己 五加皮 茯苓 生苡仁 炒白蒺 塗六痛起肩胛，漸入環跳髀膝，是為絡虛。黃芪 於木 當歸 茯苓 防己 羌活 防風根 又服前方去防風羌活加杞子沙苑

鄒 五旬又四陽明脈衰，肩胛筋緩不舉而痛，治當通補脈絡，莫進攻風。生黃芪 於木 當歸 防風根 王四陽明氣衰，厥法風動頭眩目昏，右肩痛麻，脇下有聚氣足厥陰主治。枸杞子 歸身 羚羊角 生研

徐五左指脹痛引肩，男子血虛風動，病在肝形脈不足，以柔藥溫養。白蒺 刺梨 嫩黃芪皮 胡天麻 菊花 桑枝 熬汁丸 製首烏 枸杞子 歸身 三角胡麻 菊花炭 柏子仁 刺蒺藜 桑枝膏丸

俞 媪高年陽明氣乏，肩胛痛難屈伸，法當理衛陽通補。黃芪 桂枝 歸身 片薑黃 海桐皮 夏枯草 孫二腎氣攻背項強，溺頻且多，督脈不攝，腰重頭疼，難以轉側，先與通陽宗許學士法。

川椒 沙出汁 川桂枝 川附子 茯苓 生白木 生遠志 凡衝氣攻痛從背而上者，係督

背痛

脈主病治在少陰從腹而上者治在厥陰係衝任主病或填補陽明此治病之宗旨也
汪子肝濁逆攻痛至背淡乾薑分 炒黑川椒三 炒焦烏梅肉五 小川連心 川桂枝木五

陳氏內經論諸痛皆寒時常夏臘口鼻吸受寒冷阻氣隨之流行痛自胸引及背甚則手足厥冷只宜兩通氣血主
北細辛分 黃柏五 川棟子肉錢 生白芍錢 吳萸 烏藥 紅花

沈氏脈汗出失血背痛此為絡虛人參 炒歸身 棗仁 炒白芍 炙草 茯苓
張三腎虛背痛遺洩生毛鹿角 鹿角霜 杞子錢 歸身錢 生杜仲 沙苑子 白龍骨 茯苓 當歸

肺朝百脈肺病則不能管攝一身故肺俞為病即肩背作痛又背為陽明之府陽明有虧不能束筋骨利機
關即肩垂背曲至於臂經絡交會不一而陽明為十二經絡之表臂痛亦當責之陽明但痛有內外兩因虛實
迥異治分氣血二致通補火珠如營虛脈絡失養風動筋急者不受辛寒當做東垣舒筋湯之意佐以活絡丹
勞倦傷陽脈絡凝滯肩臂作痛者以辛甘為君佐以循經入絡之品陽明氣衰厥陰風動右肩痛者用枸杞
歸身黃芪羚羊桑枝膏為陽明厥陰營氣兩虛主治血虛風動者為陽明絡虛受肝臟風陽之擾用首烏枸杞
歸身胡麻柏子仁刺蒺藜等味以柔甘為溫養夫血背痛者其虛亦在陽明之絡用人參歸身棗仁白芍炙草
茯苓神以填補陽明若腎氣上逆則腎虛為主病宜用奇經之藥以峻補真陽敗人奇經何藥能補真陽至於口鼻吸受寒冷阻
鬱氣隧痛自胸引及背者宗內經諸痛皆寒之義以溫藥兩通氣血更有古法如防風湯散肺俞之風指迷丸
治痰迷臂痛控涎丹治流痺牽引此皆從實症而治所謂通則不痛也醫者不拘守一法洞悉病源運巧思以
製方而技於是進冀商年 痛定於肩背此者痺之類必用外治之藥以攻之提之前藥不能取效也

腰腿足痛 木防己 晚蠶沙 飛滑石 茯苓皮 杏仁 厚朴 草薢 草薢
俞五 勞倦疲腰疼 川桂枝尖 木防己 生苡仁 茯苓皮 晚蠶沙 草薢

腰腿足痛 木防己 晚蠶沙 飛滑石 茯苓皮 杏仁 厚朴 草薢 草薢

腰腿足痛 木防己 晚蠶沙 飛滑石 茯苓皮 杏仁 厚朴 草薢 草薢

腰腿足痛 木防己 晚蠶沙 飛滑石 茯苓皮 杏仁 厚朴 草薢 草薢

腰腿足痛 木防己 晚蠶沙 飛滑石 茯苓皮 杏仁 厚朴 草薢 草薢

腰腿足痛 木防己 晚蠶沙 飛滑石 茯苓皮 杏仁 厚朴 草薢 草薢

此等病不可不用也
其治法不必多也

何七腰痛環跳穴痛痺 沙苑 桂枝木 小茴 茯苓 桑寄生 炒杞子

翁三勞力傷腰疼 當歸 生杜仲 當歸 五加皮 炒牛膝 枸杞子 茯苓 青鹽 生羊腰子

吳氏脈虛身熱腰髀皆痛少腹有形攻觸臍陰奇脈交傷不可作外感治 當歸 炒白芍 桂枝 茯苓 炙草 煨薑 大棗

汪三脈瀼腰髀環跳悉痛煩勞即發下焦空虛絡脈不宣所謂絡虛則痛是也 歸身 桂枝木 生杜仲 木防己 沙苑 牛膝 萆薢 小茴

某便澹腰痛無力 木菟丸方 生羊肉腎 當歸 枸杞子 紫衣胡桃 小茴 茯苓

朱脈細色奪肝腎虛腰痛是絡病治法 生羊肉腎 當歸 枸杞子 紫衣胡桃 小茴 茯苓

汪姬老年腰膝久痛牽引少腹兩足不堪步履奇經之脈頽於肝腎為多 鹿角霜 當歸 肉苁蓉 薄桂 小茴 柏子仁

王三脈遲緩飲酒便澹遺精數年不已近日腰髀足膝墜痛麻木此溼凝傷其脾腎之陽滋填固瀼決不應病先議 用芫薑末桂湯驅溼煖土再商後法

吳古日乾涸腕不知飢兩足膝跗筋制牽痛雖有宿病近日痛發必挾時序溫熱溼蒸之氣阻其流行之隧理進 宣通莫以風藥 飛滑石 石膏 寒水石 杏仁 防己 苡仁 威靈仙

蔣七足膝腫疼久不止內熱 生虎骨 炒牛膝 萆薢 金毛狗脊 當歸 仙靈脾

又照前方加生鹿角黃柏 生虎骨 兩當歸 兩五加皮 兩仙靈脾 兩牛膝 兩獨活 兩白朮根 兩金毛狗脊 兩

張四勞力傷左腿骨麻疼 生虎骨 兩當歸 兩五加皮 兩仙靈脾 兩牛膝 兩獨活 兩白朮根 兩金毛狗脊 兩

朱痛著右腿身前肌肉不腫必在筋骨且入夜分勢驚邪留於陰間有偏墜治從肝經 痛著右腿身前肌肉不腫必在筋骨且入夜分勢驚邪留於陰間有偏墜治從肝經

某 此方 生杜仲 兩當歸 錢 穿山甲 炒 錢 小茴 香 炒 錢 北細辛 分 乾地龍 錢

某 嘔逆吐涎衝氣攻心足大拇指硬強而痛 淡吳萸 熟附子 獨活 北細辛 當歸 漢防己

某 兩足皮膜撫之則痛由厥陰犯陽明胃厥所致脈弦而數治當疎泄

膝腿痛

腿膝痛

足痛

腰腿足痛

川棟子

延胡 青皮

黑山梔

歸鬚

桃仁

橘紅

炒里查肉

陸二飽食則噦。是為胃病。兩足骨節皆痛。陽明胃脈不司束筋骨攻痛。議轉旋陽氣法。蒼薑末桂湯。

某右足患處麻木筋強微腫。老人血氣不得宣通。冬病至夏食不加餐。脈小弱。主以溫養。虎膠骨三錢。

淮牛膝錢

歸身炒錢

杞子三錢

生杜仲錢

川斛錢

草薢錢

白茯苓去粗研

虎膠骨三錢

腰者腎之府。腎與膀胱為表裏。在外為太陽。在內屬少陰。又為衝任督帶之要會。則腰痛一症。不得以腎為主病。然有內因外因。不內外因之別。舊有五辨。一曰陽虛不足。少陰腎衰。二曰風痺。風寒溼著。腰痛。三曰勞役傷腎。四曰墜墮損傷。五曰寢臥溼地。其說已詳。而景岳更增入表裏虛實寒熱之論。尤為詳悉。夫內因治法。腎

臟之陽有虧。則益火之本。以消陰翳。腎臟之陰內奪。則壯水之源。以制陽光。外因治法。寒溼傷陽者。用苦辛溫

以通陽。泄濁溼鬱生熱者。用苦辛以勝溼。通氣不內外因。治法。勞役傷腎者。以先後天同治。墜墮損傷者。辨傷

之輕重。與痰之有無。為或通或補。若夫腿足痛外感者。惟寒溼熱溼風之流。經入絡。經云。傷於溼者。下先受

之。故當以治溼為主。其間佐溫佐清佐散。隨症以製方。內傷則不外肝脾腎三者之虛。或補中。或填下。或養肝

隨病以致治。古來治腰腿足痛之法。大略如此也。然舊症。必如燠犀燭。怪用藥尤貴。以芥投針。今閱案中有飲

酒便溏。遺精不已。腰痛麻木者。他人必用滋填固澇等藥。先生斷以溼凝傷脾腎之陽。用蒼桂木薑湯。以驅濕

煖土。有老年腰痛者。他人但撮幾味。通用補腎藥。以治。先生獨想及奇經之脈。隸於肝腎。用血肉有情之品。鹿

角。當歸。茯苓。薄桂。小茴。以溫養下焦。有痛著右腿。肌肉不腫。入夜勢篤者。先生斷其必在筋骨。邪流於陰。用歸

薤。地龍。山甲。細辛。以辛香苦溫。入絡搜邪。有兩足皮膜。撫之則痛者。似乎風溼等症。先生斷其厥陰犯陽。用

川棟。延胡。歸鬚。桃仁。青皮。山梔。以疎泄肝臟。有飽食則噦。兩足骨節皆痛者。人每用疏散攻劫。先生宗陽明虛

不能束筋骨意。用蒼薑末桂湯。以轉旋陽氣。種種治法。非凡手所及。要之治病固當審乎虛實。更當察其虛中

有實。實中有虛。使第虛者補而實者攻。誰不知之。潛玩方案。足以補後人之心智也。豈淺鮮哉。冀同年

凡有著之邪。總以外攻內經。有腰

痛論一篇。亦以服藥不作盡病也。

（皆痛）病在何處。如有本門

血熱
虛痲

陳 久痛必入絡。氣血不行發黃非血也。旋覆花 新鋒 青蔥 炒桃仁 當歸尾
龐 四絡虛則痛。有年色脈衰奪原非香冠劫散可效。醫不明治絡之。

升方中惟有葱管通下。餘俱辛散橫行。則絡中無處不到矣。生鹿角 歸尾 此旋覆花湯之變制也。去覆花之鹹降。加鹿角之上

又 辛潤通絡病愈。念日因勞再發。至於上吐下閉。是關格難治矣。且痛勢復來。姑與通陽。阿魏丸四錢。分四服。

李 四積傷入絡。氣血皆瘀。則流行失司。所謂痛則不通也。久病當以緩攻。不致重損。桃仁 歸鬚 降香末 小茴 穿山甲 白蒺藜 片薑黃 煨木香 韭白汁法丸

楊 三由周身筋痛繞至腹中。遂不食不便。病久入絡。不易除根。歸身 川桂枝 茯苓 柏子仁 遠志 青蔥管

章 痛乃宿病。當治病發之由。今痺塞脈閉。食入不安。得嘔吐之餘。疹形朗發。是陳腐積氣膠結。因吐經氣宣通。倣

仲景胸中懊憹例。用枳子豉湯主之。比議用宣絡之法 歸鬚 降香 青芎瀝 鬱金 新鋒 柏子仁

又 胸中稍舒。臍腹如束。氣隧有欲通之象。而血絡仍然固結。就形體畏寒。法冷乃營衛之氣失司。非陽微惡寒之

黃 痛則氣亂發熱。頭不痛。不渴飲脈不浮。非外感也。暫用金鈴散一劑。金鈴子 炒延胡 炒桃仁 桂圓

又 痛而重按少緩。是為絡虛。一則氣逆紊亂。但辛香破氣忌。進宗仲景肝著之病。用金匱旋覆花湯法。旋覆花 新鋒 青蔥管 桃仁 柏子霜 歸尾

汪 姬脈小澁。久因厄鬱脫痛。引及背脇。病入血絡。經年延綿。更兼如素。陽明虛鉞。肩臂不舉。倉猝難於奏效。是

朱 頭巔至足。麻木刺痛。熱識。滋腎丸。緩調為宜。議通血絡。潤補勿投燥熱劫液 歸鬚 柏子仁 桂枝木 桃仁 生鹿角 片薑黃

張 初受寒溼。久則化熱。深入陰分。必暮夜痛甚。醫用和血驅風。烏能直入陰分。議東垣滋腎丸。搜其深藏伏邪。

王 脈數而細。忽痛必熱。腫且痛來迅速。思五行六氣之流行。最速莫如火。風高年脂液久耗。人身之氣必左升右

肉桂忌見火 黃柏利 知母利 俱鹽水炒 水泛丸

伏熱分

陰分

王

張

朱

既有疼痛
足痛則痛
痛已不一
痛此又痛
諸痛一門
不在諸痛
之中亦不
外前所載
之症何也
編書者之
無識如此
主內經有
集痛一論
則法論人
之所患痛
之法以明
人身氣血
之理非若
此舉指一
病症列出
前案之外
也

肝腎
奇經
脈絡
不和
肝腎
虛痛

降相火寄於肝。龍火起於腎。並從陰發越。本乎根蒂先虧內之藏納之職司矣。每日服東垣滋腎丸三錢。秋石湯送之。瀉陰中伏熱。肉桂非宜

許二痛為脈絡中氣血不和。醫當分經別絡。肝腎下病。必留連及奇經八脈。不知此旨。宜乎無功。

鹿角霜 桑寄生 杞子 當歸 沙苑 白薇 川石斛 生杜仲

病後精米未復。多言傷氣。行走動筋。謂之勞復。當與甘溫和養氣血。下焦痛。肝腎虛也。

人參 小茴香 炒當歸 沙苑 茯苓 茯神 炒杞子 菊花炭

經云：諸痛癢瘡，皆屬於心。夫心主君火，自當從熱而論。然此乃但言瘡耳。若瘍科之或癰或疽，則有陰有陽。不可但執熱而論矣。又如舉痛論中所言十四條，惟熱留小腸一條，則主乎熱。餘皆主乎寒。症故諸痛之症，大凡因乎寒者，十之七八。因於熱者，不過十之二三而已。如欲辨其寒熱，但審其痛處，或喜寒惡熱，或喜熱惡寒，斯可得其情矣。至於氣血虛實之治，古人總以一通字立法。已屬盡善。此通字勿誤認為攻下通利講解。所謂通其氣血，則不痛是也。然必辨其在氣分與血分之殊。在氣分者，但行其氣，不必痛輕藥重。攻動其血，在血分者，則必兼乎氣治。所謂氣行則血隨之是也。若症之實者，氣滯血凝，通其氣而散其血，則愈。症之虛者，氣餒不能充運，血衰不能滋榮，治當養氣補血而兼寓通於補。此乃概言其大綱耳。若夫諸痛之症，頭緒甚繁。內因七情之傷，必先臟腑而後達於肌軀；外因六氣之感，必先肌軀而後入臟腑。此必然之理也。在內者，考內景圖，在外者，觀經絡圖。其十二經遊行之部位，手之三陰從臟走手，手之三陽從手走頭，足之三陽從頭走足，足之三陰從足走腹。凡調治立方，必如引經之藥，或再佐以外治之法，如鍼灸砭刺，或敷貼熨洗，或按摩導引，則尤易奏功。此外更有跌打閉挫，陰疽內癰，積聚癥瘕，蚊蟻疔瘡，痧脹中惡，諸痛，須辨明證端，不可混治。今觀各門痛證，諸案良法儘多，難以概叙。若撮其大旨，則補瀉寒溫，惟用辛潤宣通，不用酸寒收澀，以留邪。此已切中病情。然其獨得之奇，尤在乎治絡一法。蓋久痛必入於絡，絡中氣血虛實寒熱，稍有留邪，皆能致痛。此乃古人所未及詳言，而先生獨能剖析明辨者。以此垂訓後人，真不愧為一代之明醫矣。華玉堂此等議論以為辨別皆浮泛之談，無病不可套去也。而於此症，真詮全未夢得。明之前立齋張景岳終身迷入此中，其說愈繁而去道愈遠。一派浮談，而古昔聖賢治一病必有一主方，千變萬化，不脫根本。此理遂消亡矣。

古吳葉 桂天士先生著

錫山華南田岫雲全較

(耳)

風溫 某 溫邪上鬱。耳聾右脹。薄荷 馬勃 桔梗外治 連翹 杏仁 通草
某二先起咳嗽。繼而耳聾脹痛。延綿百日不愈。此體質陰虧。觸入風溫。未經清理。外因傷及陰分。少陽相火陡起。故入暮厥痛愈劇。當先清降。再議育陰。苦下茶 鮮菊葉 金銀花 生萊豆皮 川貝母 鮮荷葉梗 益元散

某 風溫發熱。左耳後腫痛。惡風外症 乾荷葉 苦下茶 馬勃 連翹 杏仁 黑梔皮
畢三壯年脈來小促。數自春月風溫咳嗽。繼以兩耳失聰。據述苦降滋陰不効。是不明虛實。經絡之內。經以春病在

頭。膏梁之質。厚味酒醴。助上痰火。固非治腎治肝可效。每晚卧時。服茶調散一錢。

又 鮮荷葉汁 羚羊角 石膏末 連翹 元參 鮮菊葉 牛蒡子 干服
又 照前方去牛蒡菊葉。加鮮生地鮮銀花。

暑 葉 火風侵竅耳聾。連翹 薄荷 甘菊 淡黃芩 苦下茶 黑山梔
顧二暑邪竅閉耳失聰。鮮荷葉 鮮菊花葉 苦下茶 夏枯草 蔓荊子 連翹 淡黃芩 黑山梔
某八左耳聾痛。舌白脈數。體質陰虛。挾受暑風。上焦氣熱。宜用辛涼輕藥。鮮菊葉 苦下茶 飛滑石

上 膈火 某五著熱上鬱。耳聾作脹。咳噎。當清氣熱。杏仁 連翹 殺 淡竹葉 川貝 白沙參 六一散
必 頭重耳聾。脹目微赤。必陽相火上鬱。以辛涼清解上焦。連翹 羚羊角 薄荷梗 牛蒡子 桑葉 以上俱當外治
某 風木之鬱。耳脹欲閉。連翹 羚羊角 薄荷梗 苦下茶 夏枯草花 黑山梔皮 小生香附

倪三因大聲喊叫。至右耳失聰。想外觸驚氣。內應肝膽。膽脈絡耳。震動其火風之威。亦能鬱而阻竅。治在少陽。

忌食腥 青蒿葉 青菊葉 薄荷梗 連翹 鮮荷葉汁 苦下茶

汪 耳聾咳嗽。形體日瘦。男子真陰未充。虛陽易升。乘竅。書云。膽絡脈附耳。先議清少陽鬱熱。以左耳為甚故也。

桑葉 藥大 丹皮 連翹 黑山梔 青蒿汁 象貝母

可善
方極清和

腎陽
心腎
上炎
火

丁 腎開竅於耳。心亦寄竅於耳。心腎兩虧。肝陽亢逆。故陰精走洩。陽不外依。是以耳鳴時閉。但病在心腎。其原實由於鬱。鬱則肝陽獨亢。令膽火上炎。清晨服丸藥以補心腎。午服湯藥以清少陽。以膽經亦絡於耳也。

水煮熟地兩 麥冬兩 龜板兩 牡蠣兩 白芍兩 北味兩 建連兩 磁石兩

茯神兩 沉香錢 辰砂五錢 為丸

方顯 夏枯草二 丹皮錢 生地錢 山梳一 女貞子錢 赤苓錢 生甘草四分

姚十氣閉耳鳴 宜外治通竅 鮮荷葉 杏仁 厚朴 廣皮 木通 連翹 苦丁茶 防己

金心下虛耳鳴失聰 磁石六味去芩加川斛龜甲遠志

王 腎竅開耳。膽絡脈亦附於耳。凡本虛失聰。治在腎。邪于竅閉。治在膽。乃定例也。今年已六旬。脈形細數。是皆腎

陰久虧。肝陽內風上旋。蒙竅五行有聲。多動真氣。火風然非苦寒直降可效。填陰重鎮。滋水制木。佐以鹹味入陰。

酸以和陽。藥理當如是議。熟地 龜板 鎖陽 牛膝 遠志 茯神 磁石 秋石 萸肉 五味

某 八十耳聾。乃理之常。蓋老人雖健。下元已怯。是下虛上實。清竅不主流暢。惟固補下焦。使陰火得以潛伏。磁石

六味加龜甲五味遠志

腎開竅於耳。心亦寄竅於耳。膽絡脈附於耳。體虛失聰。治在心腎。邪于竅閉。治在膽經。蓋耳為清竅之竅。清陽

交會流行之所。一受風熱火鬱之邪。與水衰火實。腎虛氣厥者。皆能失聰。故先生治法。不越乎通陽鎮陰。益腎

補心。清膽等法。使清靜靈明之氣。上走空竅。而聰斯聰矣。如溫邪暑熱。火風侵竅。而為耳聾痛脹者。用連翹。山

梳。薄荷。竹葉。滑石。銀花。輕可去實之法。輕清泄降為主。如少陽相火上鬱。耳聾腫脹者。用鮮荷葉。苦丁茶。青菊

葉。夏枯草。蔓荊子。黑山梳。羚羊角。丹皮。辛涼味薄之藥。清少陽鬱熱。兼清氣熱為主。如心腎兩虧。肝陽亢逆。與

內風上旋。蒙竅。而為耳鳴暴聾者。用熟地。磁石。龜甲。沉香。二冬。牛膝。鎖陽。秋石。山萸。白芍。味厚質重之藥。壯水

制陽。填陰。鎮逆。佐以酸味入陰。鹹以和陽為主。因症施治。從虛從實。直如庖丁之導。豈安。邵時乘

耳聾之去 偶然大段不過清上鎮下二條案中
性穩當至於外治之法及虛寒等症則不可不知也

某風溫上鬱。目赤。脈左弦。當用辛以散之。桑葉 夏枯草 連翹 草決明 赤芍

某三失血後復受燥熱。左目赤痛。當以辛涼清之。鮮菊葉 冬桑葉 生甘草 赤苓皮 萊豆皮 稽豆皮

鮑氏秋風化燥。上焦受邪。目赤珠痛。連翹 薄荷 黃芩 山梔 夏枯草 青葙葉 苦丁茶 桑皮

席用淡滲漸安。是暑入氣阻。熱蒸溼鬱。勿取大辛大苦之開泄。做清邪中上治法。
冬桑葉 穀精草 望月砂 汶仁 川通草 萊豆皮 茯苓

顧四頭額悶脹。目赤。羚羊角 夏枯草 草決明 山梔皮 連翹 生香附

潘戒飲濁減十四。略可加穀。近日竟夕無寐。目珠赤痛。陽升不交於陰。暫停炒香散。此症宜養血

陸嶺鬱勃氣火。翳遮目睛。高年苦辛難進。夏枯草 穀精草 草決明 望月砂 生香附 連翹 山梔皮 丹皮 望月砂

某頭面風腫。目起星。是氣中熱。羚羊角 夏枯草 薄荷梗 穀精草 生香附 連翹 山梔 丹皮 望月砂

汪脈左弦。左目赤痛。淚多。桑葉 丹皮 草決明 小胡麻 夏枯草 穀精草 萊豆皮 黑檜豆皮 丹皮

汪目痛偏左。醫服紅綠診脈左弦。瀼。由肝膽氣熱所致。草決明 冬桑葉 夏枯草 穀精草 小胡麻 丹皮 宜用點藥

某十肝火上鬱。目眶紅腫。連翹 赤芍 菊花葉 黑梔皮 苦丁茶 夏枯草

江脈數右大。鬱久熱生。目障心痛。夏枯草 花 小生香附 金石斛 半夏 茯苓 橘紅 通草 錢

某八目胞浮腫。不飢不運。桑皮 茯苓皮 錢 大腹皮 錢 廣皮 錢 萸皮 錢 汶仁 半 錢 通草 錢

王偃高年目暗已久。血絡空虛。氣熱來其空隙。攻觸脈絡。液盡而痛。當夜而甚。乃熟氣由陰而上。想外科用酒調末藥。必係溫散攻堅。因此而痛。虛症可知。羚羊角 連翹 心 夏枯草 青葙葉 全當歸 川桂枝 丹皮

葉微寒。汗大出。下有痔瘡。左眼眶疼痛。此陰傷火鬱。不可作時邪泛治。六味去萸加芍 蔓荊子 丹皮 重用

某三右目多淚。皆脈心嘈雜。陽明空虛。肝陽上擾使然。當調補肝胃。嫩黃芪 錢 當歸 錢 半 白芍 錢 半 茯苓 三 錢 煨薑 一 錢 南棗 一 枚

祝八當夏形懶。不耐大氣發泄。入冬兩目無光。精氣無收藏。凡五臟精華。皆聚於目。失藏失聚。內之生真。不獨一臟之損。當用養營湯。

肝陰 某六 脈澹細左目痛淚熱翳膜此肝陰內虧厥陽上越所致 冬桑葉錢 炒枸杞半 小胡麻錢 望月砂錢

製首烏錢 石決明具 黃菊錢 稽豆皮錢

某六 目痛無光 製首烏六 枸杞子兩 柏子仁兩 細生地兩 石決明四兩 小胡麻兩 望月砂三兩

刺蒺藜兩 冬桑葉半 黃菊花兩 用稽豆皮八兩 穀精珠二兩煎濃汁泛丸每服五錢開水送

某 皆脹目昏心中嘈雜當治肝腎 熟地兩 枸杞子兩 桑椹子兩 沙苑兩 石決明兩 茯神兩

女貞子兩 青鹽兩 黃菊花兩 川斛兩 加蜜九早上開水送四錢

某三 脈澹皆痛右目當風多淚當治肝腎 製首烏 枸杞子 炒歸身 桑椹子 沙苑子 茯神 此當驅風

某五 遺止心嘈目淚仍是陽氣過動當填陰和陽 熟地 杞子 天冬 萸肉 五味 生地 茯苓 菊花 蜜丸

某 腫神散大左偏頭痛先損左目是焦煩鬱勃陽升化風劫傷血液使然法當兼補肝腎

熟地 頭痛指目 不宜此方 枸杞子 山萸肉 五味 茯神 菊花 生神地 穀精草 山藥

眼科一症古有五輪八廓七十二問之辨傅氏又分為一百零八症因名目太多徒滋感亂至於見症楊仁齋

已備論具載景岳但陰陽虛實寒熱標本施治不可紊亂經云五臟六腑之精華皆上注於目又云目者肝之

竅也肝與膽為表裏肝液膽汁充足目乃能遠視故無論外感與內症皆與肝膽有關係焉夫六淫之邪惟風

火燥居多兼寒兼溼者亦間有內起之症肝膽心腎為多他臟亦間有之若夫論治則外感之症必有頭痛寒

熱鼻塞筋骨痠疼脈見緊數或浮洪一切表症方可清散至於內因之症有虛實之殊實者肝膽之風熱盛也

凡暴赤腫痛脹閉難開翳膜膠淚酸澀作癢斑瘡入睛皆實症也當除風散熱虛者腎經之水火衰也凡久痛

昏暗青盲雀目內障昏朦五色花翳迎風淚出皆虛候也治宜壯水益火若陰血雖虧而風熱未盡則當審其

緩急相參而治若久服寒涼虛陽轉盛則當補以甘溫從乎反佐至於紅色淺淡而紫者為虛熱鮮澤而赤者

為實熱腫神內湧白睛帶赤者為熱症腫神青綠白睛枯槁者為寒症腫脹紅赤眼珠刺痛夜則尤甚目不能

開而視物猶見者為邪火熾盛若白翳遮睛珠不甚痛或全不痛目仍能開而視物不見者為真火不足當細

抄錄眼科 通食語以 批書之體

致成外障之鏡受汚垢。必當濯磨。頂用點藥。若但服藥。必不能愈。至於內障之症。但且服藥。倘用點藥。使傷其氣血。必無益。而有損。更當拭目。皆白珠屬陽。故書痛點苦寒藥。則可致腫子。黑睛屬陰。故夜痛點苦寒藥。則反劇。是外治之治。亦當以陰陽區別也。若夫偏正頭風。屬氣虛痛者。朝重暮輕。血虛痛者。朝輕暮重。亦有外感內因之別。此症當以補養正氣為主。略兼治表。倘察以風熱而論。專以表散最易損目。更有肝陰虧耗。木火上炎。頭痛惡心。肩稜骨痛。不欲飲食。眼胞紅腫。睛珠刺痛。眵淚如膿。白睛如絲。目珠上竄不下。不得寤寐。甚至顛頂腦優。如破如裂。此內發之風也。夫肝屬木。木主風。熱盛化風。其體必本陰虧。男子或有遺精白濁。腸風痔瘡。下血等疾。女子或犯淋帶崩漏諸症。此係陰傷陽升。內風沸起。大忌發散。宜用育陰熄風。柔肝滋腎等法。或可救十中之四五。凡羗活防風。川芎。細辛。蔓荊。本升麻等藥。皆不可用。倘或失治。必致膏傷。低陷。青黃。牒出。致成痼疾。而不可救。專是科者。不可不留意焉。葉先生雖非眼科專科。觀其案內諸法。真補前賢之未備。較之慣用苦寒升散。及概用點藥者。不啻如霄壤之殊矣。學者當細心而參玩之。

眼科自有專家。其現症各有主治之方。案中雖未必切中。然清淡和平。無苦寒溫補等弊。反勝于近日之名為眼科者。醫理尚明。則無不通矣。若欲深求。則有專門之書在。

配汁兩三年。鼻塞不聞。清涕由口倉出。而氣室仍然。大凡頭面諸竅。皆清陽交會通行之所。就外邪來乘。亦必露露無質。清邪邪鬱既久。氣血失其流暢。進藥攻治。必不效驗。欲治其病。須查手太陰自少商穴起。藥外治。施鍼刺以泄邪流氣。乃一法也。無方。

徐四頭面諸竅。皆清陽遊行之所。邪處於中。則為堵塞。陽氣不司流行。必畏寒形。種內痺必鬱而成。熱有鼻柱軌。與論理當用通聖散。遠處江外。倉猝就診。不可輕投。用輕可去實。苦丁茶。乾荷葉邊。蔓荊子。連翹心。飛滑石。白芷。

毛四熱壅肺氣。失降鼻柱至痺。宜先治。知母。水梨肉。川貝母。水煎膏。不成方。

梅鹹降滋填鼻淵。止得寐。用虎潛法。減當歸。陳皮。加天冬。淡菜。膠。蒼朮。煎丸。

沈氏素有痰火。氣逆。春令地中陽升。木火化風。上引巔頂。腦熱由清竅以泄起。耳鳴鼻淵。甚於左者。春應肝膽。氣火自左而升也。宜清熱散鬱。辛涼達於頭而主治。羚羊角。黑山柁。苦丁茶。青荊葉。飛滑石。

鼻淵 肺熱 鼻淵

清邪 邪鬱 邪鬱

鼻

另有治法

此等方皆
有專治之
方大抵以
清火驅風
保肺為治
子理無不
而無不中
救所以醫
費博極詳
書也

精虛
兼辨

濕邪
火
陰虛
火
牙痛
後結
痺
風熱

夏枯草花 又 照方去滑石加乾荷葉生石膏

又 性情燥急陽動太過氣火上升鬱於隱竅由春深加病失其調達之性輕言昏厥病在頭也考五形六氣迅速變化莫若火風腦熱暗泄而為鼻淵隧道失和結成癭核夫東垣并陽散人丹溪總治諸鬱咸取苦辛為法然藥

刀片時之效得能久安以怡悅心志為要旨耳 連翹心 土貝母 海藻 昆布 黑山桅 川芎 小生香附 鬱金 羚羊角 夏枯草 乾荷葉邊 生研末青菊葉汁法凡苦丁茶煎湯送二錢五分

汪 形瘦尖長粟乎木火陰精不足腦髓不固鼻淵淋下並不腥穢暖天稍止遇冷更甚其為虛證顯然明白醫者 愈以風寒中腦主治發散滲泄愈耗正氣豈但欲愈勞怯是憂用天真丸 經云肺和則鼻能知香臭矣又云膽移熱於腦令人平額鼻淵傳為齟齬瞼目是知初感風寒之邪久則化熱 熱鬱則氣痺而塞矣治法利於開上宣鬱如蒼耳散防風通聖散川芎茶調散菊花茶調散等類先生則佐以 荷葉邊苦丁茶蔓荊連翹之屬以治之此外感宜辛散也內熱宜清涼者如腦熱鼻淵用羚羊山桅石膏滑石 夏枯草青菊葉苦丁茶等類苦辛涼散鬱之法也久則當用鹹降滋填如虎潛減辛再加鎮攝之品其有精氣 不足腦髓不固淋下無腥穢之氣者此勞怯根萌以天真丸主之此就案中大概而言之也然症候錯雜再當 考前賢之法而治之 華玉堂

牙

某 陰虧體質濕氣上蒸齒痛連及頭顱 用玉女煎

某 火鬱頭頂屬厥陰上結核齩腫 犀角 羚羊角 元參 知母 生甘草 連翹 黑山桅 銀花 夏枯草

王 四酒客牙宣衄血皮血形寒內熱食少陰藥濁味姑緩 小黑豆皮病不中 人白 旱蓮草 川斛 左牡蠣

徐 二脈細數上出體屬陰虛內熱牙癱後 治當外煩車穴閉口不能張其病在絡藥餌難效擬進宣通絡痺方

羚羊角 僵蠶 川桂枝尖 煨明天麻 炒丹皮 黑山桅 鈎藤 雷外治

汪 風熱上蒸齩脹頭痛當用清輕上焦 活水蘆根 圓圖滑石 西瓜翠衣 生萊豆皮 連翹 銀花

牙症不外乎風火虫虛此但言其痛也其他如牙宣牙搖牙菌牙疳牙癱穿牙毒骨槽風走馬牙疳之類皆由

於溼火熱毒蘊結牙床頰分上下二齒辨明手足陽明及少陰之異又當察其專科而任之善五宜

咽喉

風火

陸 風火上鬱項腫咽喉痛 薄荷 連翹 射干 牛蒡子 馬勃 萊豆皮

肺燥

邵 風火土鬱咽痛頭脹宜用辛涼 西瓜翠衣 滑石 連翹 桑皮 射干 杏仁

熱

汪 左脈弦數咽痛腕悶陰虧體質不耐辛溫當以輕藥暫清上焦 桑葉 生萊豆皮 元沙參 川貝母

濕濁

王 勞傷恐有糜腐進辛潤宣血初服身痛繼漸平復但喉間緊痺而呼吸飲食仍不覺其苦服白仍帶黃議清肺

受

徐 老勞咽疼 百部 大沙參 鮮枇杷葉 活水蘆根 川貝 地骨皮 南花粉 苡仁

瘰癧

楊 未病陰氣走泄為虛穢濁上受則實咽喉腫痺上竅邪蒙日暮昏煩陰傷日熾肌膚柔白氣分不足此醫藥雖

瘰癧

宜涼解清上但不可犯及中下 連翹 鬱金 馬勃 牛蒡子 竹葉心 黑山桅 杏仁 橘紅

瘰癧

文 上焦之病都是氣分氣室則上下不通而中宮遂脹熱氣蒸灼喉舌腐蝕清氣之中必佐解毒昏受重藥之暴瘁

瘰癧

銀花錢 川貝錢 馬兜鈴錢 連翹心錢 川通草錢 白金牛汁杯 活水蘆根汁杯

瘰癧

又 餘熱熱痰壅氣當脫膈因咳而痛議以潤降清肅 甜杏仁 花粉 川貝 甘草 桔梗

瘰癧

孫 四腎液不收肝陽上越頭脹流涕咽喉微痛 六味加牛膝車前五味

瘰癧

伍 咽喉痛痺發時如有物阻隔甚至痛連心下每晚加劇是陰液日枯肝臟厥陽化火風上灼法以柔劑做甘以

瘰癧

緩其急耳 此症必咳中有細痰成不 細生地 天冬 阿膠 生雞子黃 元參心 糯稻根鬚

瘰癧

陳 三陰陽交虛營衛欹斜為忽冷忽熱周身骸骨皆痛百脈皆損秋奉天氣已降身中氣反泄越汗出喉痺陽不入

瘰癧

於陰致自為動搏耳夫咽喉之患久則喉痺喉宣妨阻受納最不易治從少陰咽痛例用猪膚湯旬日喉痛得緩

瘰癧

對症轉方

瘰癧

張 三陰損三年不復入夏咽痛拒納寒涼清咽 藥所治 反加泄瀉則知龍相上騰若雷光火灼雖傾盆暴雨不能

瘰癧

撲滅必身中陰陽協和方息此草木無情難效耳從仲景少陰咽痛用猪膚湯主之

瘰癧

陰虛 火炎

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

又陰涸於下。陽熾於上。為少陰喉痛。乃損法之末傳矣。用猪膏甘涼。益坎有情之屬。而效。今肉腠消燂。殆盡下焦。易冷。髓空極矣。何暇以痰救為理。治病無有不順者。議滑瀼之補。味鹹入腎可也。

牛骨髓兩 羊骨髓兩 猪骨髓兩 糜角膠兩 用建連 五兩 山藥五兩 芡實二兩 同搗丸

金四臟液不充。陽氣虛風鼓動。病起喉辣。心震頻頻舉發。多因勞怒。用內經甘緩一法。

人參 炙肉炭 白芍 炙甘草 茯苓 小麥 又 復脈湯去桂

內經云。一陰一陽結謂之喉痺。此一陰者。手少陰君火心之脈氣也。一陽者。手少陽相火三焦之脈氣也。夫二經之脈。并絡於喉。故氣熱則內結。結甚則腫脹。脹甚則痺。痺甚則不通而死矣。即今之所謂喉癰。喉風。喉蛾等類是也。夫推原十二經。惟足太陽別下項。其餘皆湊咽喉。然內經獨言一陰一陽結為喉痺者。何也。蓋以君相二火獨勝。則熱且痛也。愚歷攻咽喉湯方。皆用辛散鹹軟。去風度解熱毒為主。如元參升麻湯。聖濟透關散。及玉鑰匙如聖散。普濟消毒飲子。皆急於治標。而緩於治本。恐緩則傷人。故以治標為急耳。又嘗考仲景傷寒論。咽喉生瘡等症。每用甘草桔梗半夏散。及湯為主。一為少陰水虧不能上濟君火。以致咽喉生瘡。不能出聲。故以半夏之辛滑。佐雞子清利竅通聲。使以苦酒入陰。劫涎斂瘡。桂枝解肌。由經脈而出肌表。悉從太陽開發。而半夏治咽喉。可無燥津涸液之患。一為陰火上結。而為咽喉痛。故用生甘草甘涼泄熱。功在緩腎急。而救陰液。佐以枳椇。開提足少陰之熱邪。如腎液下泄。不能上蒸於肺。致燥燥而為咽喉痛者。仲景又有猪膚一法。潤燥解熱。緩中。使其陰陽協和而後愈。是固本而兼治標者也。如風火上鬱。陰虧脈數。而為咽喉痛者。先生又有辛涼清上諸法。如咽喉緊痺。氣熱而為咽喉痛者。又有清肺中氣熱一法。如情志鬱勃。相火上炎。而為咽喉痛者。則又有降氣開濁一法。如腎液不收。肝陽上越。而為咽喉痛者。宗錢氏六味湯。如陰陽交虛。龍相上灼。而為咽喉痛者。宗仲景猪膚湯法。鄧滋丸。

猪膚湯法 鄧滋丸

凡病屬於經絡。臟腑者。皆煎丸之所能治。一屬形體。乃丸散則屬有形之病。實有邪氣凝結之處。藥入胃中。不遇氣到耳。安能去凝結之邪。故煎丸之功。不過居其半耳。若欲速效。必用外治之法。可以應手而愈。博考方書。廣求秘法。自能得之。此老高未知之也。故其後世針法。不傳於是乎。以藥代針。而多外治之法。若針灸既廢。而術通神入。何必外治。此則外治之最者也。後世針法。不傳於是乎。以藥代針。而多外治之法。若針灸既廢。而外治之法。亦不講。則天下之病。即使用藥。當祇能愈其半耳。其外症。

都是時講

〔瘡瘍〕

楊九瘡瘻四肢偏多長夏入秋懶倦欲眠乾咳無痰頗知味所納已少此陽明胃陰困熱致耗即熱傷元氣之徵當與甘藥養胃陰以供肺加金匱麥門冬湯去半夏加黃芪皮

吳十脈不浮大非關外風初起右掌二指已不屈伸頭面身半以上常有瘡泡之形此乃陽明脈絡內留溼熱若非瀉氣吸入定然食物中毒枯與宣解緩攻連翹犀角赤芍酒煨大黃荊芥片薑黃

又能食二便通調臟腑無病初因膿瘡瘡愈有泡自面及肢體至於右指掌屈伸皆痛為脈絡留邪以致隧道為壅前方平涼入血先升後降已得小效今製清脈絡壅熱藉酒力以引導通後營衛亦一法也

銀花連翹犀角生大黃荊芥丹皮黃芩川芎當歸澤瀉羚羊角
金四血舍空隙內風蠕動外以熱湯泡洗溼熱蒸襲肌表遂有裂膿流水沉周身漸加麻痺陽脈亦衰圖治之法清營以熄內風疎利溼熱以肅隧道平辣腥鮮勿進尚可緩以計功

製首烏鮮生地柏子仁川斛黑檀豆皮虎骨蠶沙黃柏單解熱膏
吳瘡瘻之後溼熱未去壅阻隧道水穀下咽亦化為痰中焦受病故不知飢餓痰氣上干漸至喘悶矣但服藥四十劑純是破氣消疔胃陽受傷痰氣愈不得去矣半夏茯苓紫老薑炒粳米

又瘡瘻大發營衛行動於脈中脈外可免腹滿之累矣第設食尚未安適猶是苦者多進之故胃陽未復仍以通調利溼主之半夏紋仁金石茯苓澤瀉

秦久熱瘡瘻五六年環口燥裂溺瀉莖痛鮮生地熟首烏丹皮丹參羌蔚子銀花地丁紫草
王血熱風動膚癢荊芥防風地膚子赤芍銀花小生地木通甘草共熬膏

張四初因嘔吐是肝胃不和致病故早香剛燥愈劇然久病必入血絡熱則久瘡不愈矣夫火皆令燥液易飢易飽間有嘔逆斯胃病仍在凡呆滯藥味皆非對症三角胡麻冬桑葉生首烏杏仁枇杷仁鬱金佩蘭葉
楊五身瘦久瘡血分有熱精通之年最宜安養脈象非有病生首烏兩三三角胡麻一兩五錢槐碎水洗蜜丸早服

細生地兩有細生地為九何力量地骨皮兩金銀花兩丹皮兩生白芍兩生甘草兩蜜丸早服

增

癩 疔 瘰癧 風熱 疔 癩

王三脈來滑浮。久瘡變幻未罷。是衛陽疎豁。不耐寒。初受客邪不解。混處氣血。浸淫僅在陽分。肌腠之患。議升舉
一法。氣壯斯風溼盡驅。 人參 生黃芪 川芎 當歸 防風 蠶蠶 蟬蛻 炙草 生薑 大棗

將四鼻瘡口瘡。尿黃。膚熱。冬瓜皮 苡仁 不毒病
鄒三痰因於溼。久而變熱。壅於經隧。變現瘡疾疥癬。已釀風溼之毒。混在氣血之中。邪正混處。搜逐難驅。四肢為甚。
姑從陽明升降法。連翹 赤芍 白殭蠶 白鮮皮 防風 升麻 滑石 酒浸大黃

汪氏風熱既久未解。化成瘡癧。當以和血驅風。當歸 赤芍 川芎 夏枯草花 牛蒡子 製殭蠶
金頭巔熱痛。未能泄邪。此身熱皆成膿之象。辛涼兼理氣血可愈。連翹 犀角 銀花 丹皮 元參 生甘草

某風熱毒閉。項後腫。竹葉 滑石 蘆根 牛蒡 馬勃 薄荷葉 黑山梔 連翹 川貝 生甘草
王疔毒略。血失血。都是著入陰傷。竹葉心 元參心 鮮生地 黑稽豆皮 炙冬 知母 當用解毒
屠三秋痢半年未愈。瘰癧硬痛。瘍膿鬱久成熟。腑經病可算其愈。夏枯草 痛不中 香附 茯苓 以仁 丹皮 川貝

歷氏頭項結核。腹膨足腫。肝木犯中。痰凝滯。夏枯草 兩三 牡蠣 兩 澤瀉 兩 茯苓 兩 半夏 炒 兩
厚樸 兩 橘紅 兩 神麴 兩 生香附 一兩 水磨汁 泛丸

某氣鬱痰核。夏枯草 生香附 丹皮 山梔 連翹 鬱金 赤芍 橘紅
王四脈左數右長。頭項結癭。時衄。生地 兩 丹皮 兩 犀角 兩 生夏枯草 兩 生鈎藤 兩

陳躁急善怒。氣火結癭。燥筋為痛。熱鬱化風。氣阻痺塞。則腹鳴脫脹。尚非開懷歡暢。不能向安。
黑山梔 兩 土貝母 兩 生薄荷 錢五 山梔 瓜蒞皮 鬱金 白芥子 海藻 夏枯草 昆布

沈氏肝氣鬱遏宿痞。乳癰。川棟子 夏枯草 薄荷梗 丹皮 黑山梔 瓜蒞實 青橘葉 香附汁
劉氏乳房為少陽脈絡經行之所。此經血氣皆少。由情懷失暢。而氣血鬱痺。有形而痛。當治在絡。恐年歲日加。竟成
沈癰非癰膿之症。乳若。以脈不浮數。在寒熱辨之。柴胡 不去病 夏枯草 歸身 白芍 川貝 茯苓 甘草

某乳房結核。是少陽之結。此經絡氣血皆薄。攻之非易。恐產育有年。釀為癰症耳。

乳 癩 疔 瘰癧 風熱 疔 癩

沈注 孫 因噴忿失血以來致頭項左右筋腫痛連背部此屬鬱傷氣血經脈流行失司已經百日本痊竟有流注潰膿

暑傷 延綿之憂治在少陽陽明 小生香 夏枯草 鮮菊葉 薄荷梗 黑山梔 鈎藤 丹皮 鬱金

陳 脈左數實血絡有熱暑風溼氣外加遂發疹塊壅腫搔癢是屬暑傷 杏仁 連翹 滑石 寒水石 銀花

程 內侵脾胃有煙厥之變昨用宣肺解毒雖與暑邪無益然亦無害若加黃芩又屬相反大凡熱氣蒙閉清竅都令

神昏當以牛黃清心丸清痰氣之阻使其竅開況暑門中大有益法與解毒分符矣

手初病溼熱在經久則癢熱入絡膿瘍日多未已漸至筋骨熱痛全匱云經熱則痺絡熱則癢數年宿病勿事速

攻 犀角 連翹心 元參 丹參 野赤豆皮 細生地 薑黃 桑枝 午服 夜服蒺藜丸

某三瘡瘍服涼藥陽傷氣阻脫悶不運腹膨最怕瘍毒內閉急宜通陽 厚樸 廣皮 薑皮 茯苓皮 連皮杏仁

某服瘍科寒凝之藥以致氣冲作脹喘急不臥無非濁陰上攻議來復丹 桂枝木 澤瀉 大腹皮

顧八脈微小潰瘍半月餘腫未消膿水清稀浮腫汗出嘔惡惡食此胃陽垂敗癰毒內攻欲脫夫陽失敗則陰液不

承元氣撒則毒愈瀰漫清解苦寒究竟斲伐生陽議甘溫胃受培植其本莫險者復振余非瘍醫按色脈以推其

理耳 加桂理中湯 非瘍科方大誤

枕 拒潰瘍久不癒氣血耗盡中宮營液枯涸氣不旋轉得湯飲則痰涎上湧勢如壺膈况又恙若是藥餌難挽勉擬

方 人參 方不成 炒麥冬 代赭石 化橘紅

胡 納食主胃運化主脾癰瘍痛清臥床不得舒展臟腑氣機呆鈍何疑外科守定成方茂木歸地不能補托氣血

反雍滯於裏出納之權又失且是症乃水穀溼氣下垂而致結於足厥陰手陽明之界若溼熱不為盡驅藉補托

以冀生機養賊貽害焉能濟事 金石斛錢 槐米錢 金銀花錢 茯苓錢 晚蠶沙錢 寒水石錢

徐 營傷心辣納食無味此傷痛大虛當調其中 人參 歸身 炒白芍 木瓜 熟朮 廣皮 茯神 炙草

其 膿血去多痛猶未息胃傷不嗜噉口無味左關尺細弱無力正虛之著據理進藥仍宜補托

議論極正 但方不甚 切以此非 瘡科之故 也

癆瘵

人參 熟地 玉竹 柏子仁 歸身 丹參 茯神 黃仁 遠志
某癆瘵損食身熱六味湯加青蒿節
曹因癆瘵過進寒涼遂患腰痛牽引脊脊令晨起周身不得自如乃經脈絡脈之中氣血流行失暢久病諒非攻
遂議兩和方法 於羊角 當歸 黃芪 白蔘 藜蘆

肝癰

顧 潰瘍不合成漏 脂液滲去 必腸路空際 內風暗動 攻胃則嘔逆吞酸 腹痛泄瀉不食 津液不升 古焦黑不渴飲
內外兼病 難治之症 人參 同煎 炒烏梅肉 炒黑川椒 茯苓 生淡薑 炒廣皮 白芍 鐵

腸癰

顧 久損漏瘍胃減腹痛 議用戊己湯意 人參 茯神 白芍 炙草 炒菟絲子
王血痛久屈伸不得自如 經脈絡脈呆鈍 氣痺血聚 鬱蒸上熱 旬日頻頻大便 必有血下 復喘促煩燥 不飢不食 並
無寒熱汗出 全是錮結在裏 欲作內癰之象 部位臍左之上 內應乎肝 癰者壅也 血結必入於絡 吐痰口氣皆臭

疔

內癰已見一斑矣 此是腸癰 炒桃仁 新絳 降香末 野鬱金汁 紫苑 冬瓜子 金銀花
某 臍旁紫黑 先厥後熱 小腹痛 如刀刮 二便皆滯 兩足筋縮 有腸癰之慮 老韭白腸 兩頭尖 小茴香
某 古焦黃 小腹堅滿 小便不利 兩足皆痠 溼熱結聚 六腑不通 有腸癰之慮 川棟子 小茴 丹皮 黑山柈
某 壯熱旬日 周身筋脈牽掣 少腹堅硬 小便淋漓 忽冷忽熱 欲釀膿血 乃腸癰為病 倣孫真人牡丹皮大黃湯主之
戴九疔瘡下血 溼熱居多 今色衰微 顯是虛寒 無速效法 則當補脾胃 因疔瘡猶痛 腫勢尚存 佐以淡滲通腑

生於朮 生菟絲粉 生象牙末 生白蠟
外症本有專科 先生並非瘍醫 然觀其德理立方 已勝專科什伯矣 何以惜其案無多 法亦未備 余不敘迷大
凡瘍症 雖發於表 而病根則在於裏 能明陰陽 虛實寒熱 經絡俞穴 大症化小 小症化無 善於消散者 此為上
工 其次能審明五善七惡 循理用藥 其刀鍼砭割 手法靈活 敷貼薰洗 悉遵古方 雖潰易斂 此為中 工更有不
察症之陰陽虛實 及因勢利導 行下口 凡此皆 醫家之 常務也 然則 疔瘡 但知概用苦寒攻逐 名為清火消毒 實任敗胃

瘡瘍愈後 必當大補

為合度
純正固平
專家則終
無把據耳

脈數言不
宜用桂枝
建中湯為
脈道而設
仲景有明

熱血

後期

傷久
嗽肺
氣虛

肝犯

肝傷
脾傷

狀生迫至胃氣一散則變症蜂起矣。又有藉稱以毒攻毒秘方類取毒藥合就丹丸隨症亂投希冀效於目前。不顧貽禍於後日。及問其經絡部位。症之順逆。概屬茫然。此殆下工之不如也。至於外治之法。場科尤當究心。若其人好學深思。博聞廣記。隨在留心。一有所聞。即筆之於書。更能廣博醫籍。搜採古法。海上實有單方家。傳豈無神。秘其所製。敷貼丹膏。俱臨症。試百治百驗。能隨手應效者。即上工遇之。亦當為之遜一籌矣。華玉堂。凡治病必有專家。一切丸散外治等法。一有不備。即不能建愈。功理雖同。而法各別。如欲治外症。不可不旁有一番功夫也。

調經

張九經。先期。色變。膚腠刺痛。無定所。晨泄不爽。利。從來不生育。由情懷少歡。悅多愁悶。鬱則周行之氣血不通。而脈絡間亦致間斷。蒙痺。例以通劑。川芎。當歸。肉桂。鬱則有大。生艾。小茴。有香附。此。茯苓。生香附。南山查。桃。久。救。背寒。晨汗。右肋咳甚。經事日遲。脈如數而虛。設減不飲食。此情志鬱傷。延成損怯。難治。非清寒肺藥所宜。黃芪。桂枝。白芍。炙草。南棗。飴糖。

肺為氣出入之道。內有所傷。五臟之邪。上逆於肺。則咳嗽。此則久嗽。背寒。晨汗。全是肺氣受傷。而經事日遲。不。但氣血不流行。血枯肝閉。可想而知。脈數虛火也。虛則不可以清寒。况設減不飲食。中氣之餒。已甚。可復以苦寒。損胃乎。與黃芪建中。損其肺者。益其氣。而桂枝。白芍。非欽陰和血之妙品乎。

秦二氣衝心。痛。嘔。逆。氣。逆。少腹為瀉。經來後期。其色或淡或紫。病在衝脈。從厥陰。陽明兩治。不宜用燥藥。川連。小茴。川棟子。歸尾。炒半夏。茯苓。桂枝。橘紅。

華三鬱傷肝脾。是因懷抱不暢。致氣血不和。逍遙散減白朮。加山查香附。不欲其守中。務在宣通氣血耳。今經來日遲。鬱痺宜通。而氣弱不主統。血况春深泄氣之候。必佐益氣之屬。方為合法。歸脾湯。

又。向有鬱傷肝脾。用逍遙散歸脾湯甚合。今因動怒。少腹氣衝。過胃上膈。咽喉腫痺。四肢逆冷。遂令昏迷。此皆肝木拂逆。甚則為厥。夫肝臟相火內寄。病來迅速。皆動極之徵。為肝用太過。宜制其用。前此艾朮守補。不可用矣。

安胃理中丸去黃柏細辛。錢。脈瀆。腕間減食。經水來遲。腹痛墜。用血藥。柴胡。灼白芍。黃芩。鬱金。香附。茯苓。蘇梗。神麩。

婦人全以血為主治法亦當以血為事
慮慮用柴胡而近日自附天士之門者云不用柴明豈非夢境

此蓋理明詞達

血熱 鬱結 腹痛 奇脈 帶虛寒

肝腎 虛寒 衝脈 肝陰 虛

肝腎 奇脈 虛

又諸恙未減腹但痛不墜 逍遙散白朮甘草加鬱金香附神麩

許八經閉寒熱便澹腹痛 加味道遙散去山梔

某血虛內熱經不至 加味道遙散去朮

某經遲腹痛風疹絡血不算久鬱成熱法當通利 涼膈去芒硝加丹皮赤芍

孫九奇脈下損經遲腹痛先用當歸建中湯續尚八脈治法 歸建中湯

又久救過勞寒熱 歸氏建中去薑

謝三能食不運腹泄經事愆期少腹中乾澀而痛下焦麻痺衝心嘔逆腹鳴心辣八脉奇經交病

人參 茯苓 艾葉 製香附 淡從蓉 淡骨脂

王三脈右緩左瀼經水色淡後期嘔吐痰水食物畢咽三載餘不孕此久鬱疑痰滯氣務宜宣通從陽明厥陰立方

半夏 廣皮 茯苓 厚朴 茅朮 淡吳萸 小香附 山查肉 薑汁法丸

又三月中用年溫官鬱方痰厥自下胸次寬嘔逆緩今喜暖食惡寒經遲至五十餘日來必色淡且少議用溫養

衝任栽培生氣方法 八珍去朮草加小茴肉桂斬艾香附紫石英河車膠丸

朱六經水一月兩至或幾月不來五年來孕不孕育下焦肢體常冷 是衝任脈攝無有胎蓄煖益腎肝主之

人參 河車膠 熟地 砂仁製 歸身 白芍 川芎 香附

程七三年不孕育其中幻病非一病人述經期遲至來期預先三日周身筋骨脈絡牽掣痠楚不得舒展凡女人

月水諸絡之血必重集血海而下血海者即衝脈也男子藏精女子繫胞不孕經不調衝脈病也腹為陰陰虛生

熱肢背為陽陽虛生寒究竟全是產後不復之虛損感見病治病之慢有終身不孕淹淹之累肝血陰虛木火內

寄古人溫養下焦必左原肝堅陰勿執經後期為氣滯亂投破氣剛藥劫陰

高當堂 河車膠 生地 枸杞 沙苑 生杜仲 白薇 山查 黃柏 白花益母草

朱經云陽維為病苦寒熱上汗水雪甚少冬失其藏春半潮溼地氣升泄以肝腎血液久虧之質春生力淺八脈根于肝腎一身網維不必云八脈之來固之司陰弱內執陽微外寒交齊脊痛經事愆期血海漸涸久

此老不過一時弄巧以異欺人遂開後人立異之門康醫怪奇入藥之方以爲獨物體別成開生面足授秘傳足微廣博示靈巧此風及今雖謬作備之等馳之近未龍藏真病在因不方施用經希奇怪此一物不香謬治轉可知令人無從以此試月日甚而何苦送三充綠

陰虛 痛經 鬱傷 氣血 滯

延虛怯情景已露局方道遙散固文科聖藥大意重在肝脾二經因影效損木土交傷氣血萍阻和氣血之中依柴胡微升以引少陽生息上中二焦之鬱勃可使條暢今則入暮病劇天曉安然顯是肝腎至陰損傷八脈不高約束故熱無汗至陰深遠古人謂陰病不得有汗也當宗仲景甘樂之例勿取氣早助陽可矣

炙甘草此方 何膠 細生地 生白芍 麥冬 牡蠣 無汗不得用此

某陰虧內熱經事愆期 雄烏骨雞 小生地 何膠 白芍 枸杞 天冬 茯苓 羌活子 女貞子

桂枝 右十味用青蒿汁童便醱酒熬膏加蜜丸

張三寒熱間日經來腹痛 宜再清寒熱之藥古人凡見表症未有先治其表者 小生地 丹皮 知母 花粉 生龜甲 澤蘭

某二先腹痛而後經至氣滯為多晨泄腹鳴亦脾胃之病與下焦腹泄則異

川芎 當歸 香附 煨廣木香 查肉 茯苓

某二寒熱無汗經先腹痛喉中燥癢咳逆食物不思此鬱傷氣血八脈主病姑先與澤蘭湯

歸身 澤蘭 丹參 白芍 柏子仁 茯神 此方無者

周封室女經水不調先後非一來期必先腹痛較之平日為重飲食大減始於初夏入秋下焦常冷腹鳴忽滿忽結

究脈察色是居室易於鬱怒肝氣偏橫胃先受戕而奇經衝任躡維脈皆肝胃屬隸脈不循序流行氣血日加阻

痺失治必結癥聚痞痞之累 南山查 生香附 延胡 當歸 青皮 三枝 蓮木 牛膝 川林子

顧經來筋掣腹痛常有心痛乾嘔此肝氣厥逆衝任皆病務在宣通氣血以調經溫燥忌用自可得效

川棟錢 丹皮錢 炒查錢 胡連錢 延胡錢 澤蘭錢 歸龍錢 生白芍錢

又 柏子仁丸

吳鬱傷絡脈痛經 此衝任脈有寒 川芎 當歸 香附 小茴 烏藥 茯苓 紅棗

費經水紫黑來時嘈雜脈絡收引而痛經過帶下不斷形度日減脈來右大左弱上部火升下焦冷徹骨中陰陽

乘違焉得孕育閱醫都以補血瀉劑宜乎鮮效議通陽攝陰法 宜用溫經法

內經用此 鮑魚 生地 淡茯苓 天冬 當歸 柏子仁 炒山查

克瑞白粉
把核杏核
淡菜豆粉
一本切神靈
書所聖之
物收用不
遺于此醫
道之一變

氣分 熱 食積 滯氣 經閉 鬱火 胃陽 虛 脾胃 陽虛 不運 濕滯 腹脹 氣滯 腫脹 氣血 王三

牛膝 茯苓 紅棗新艾湯法九

朱脈數右肩痛痿經不調經來氣攻觸皆性躁氣分有熱

李酸滯入裏氣血呆鈍痛自心胸脹及少腹昔經行三日今四日猶未已為疑滯所致痛脹何疑讀內經遺意以

平勝酸主洽但平氣最易入表當求其宣絡者宜之 韭白汁 桃仁 延胡 小茴 當歸鬚 川棟子 丹皮 橘葉

王三苦平泄降胸腕脹悶已舒此救血皆肝膽氣火上逆必經來可安 南山查 桃仁 黑山梳 降香末 老韭白汁

朱當節令呵欠煩倦秋深進食微有惡心病起至今月事不來夫衝任血海皆屬陽明主司見症胃弱此陰柔脈

滯當停以理胃陽為務 人參 半夏 麩 廣皮白 茯苓 生益智仁 煨薑 見寒症方可用

某脈數形疲咳經閉半年已經食減便溏浮腫無清救通經之理扶持中土望其加穀 四君子湯 救者不宜

某六經閉兩月皖庫嘔惡此氣室不宣胃陽凝鈍使然當用和中為主 半夏 麩 老蘇梗 茯苓 廣皮 枳殼 川斛

某夏令寒熱經阻少腹痛脹血結澗瀉不爽乃內傷氣血不和兼有特令濕邪 茯苓皮 大腹皮 生益智 厚朴 蓬萊朮 青皮子 煎清湯送

又服五劑後氣已略平 忽白丸 用生新艾 紅棗十五枚 煎清湯送

某脈數經閉腹脹足腫 此為水病名為血分 茯苓皮 大腹皮 青皮 小香附 延胡 炒山查 炒砂仁

顧經停四月腹滿尻脾足肢盡腫食納脹悶不化大便溏瀉不實女科認為胎氣恐未必然方書謂先經斷而後

腫脹者治者血分 大血是病名 生白朮 厚朴 大腹皮 羌蔚子 椒目 小黑糖豆皮

傅大凡唐滿在氣燥實在血腹脹經水仍來大便微溏固是氣分病也下之暫愈氣得泄也繼而腹脹經水不來

氣與血俱病也病非輕渺議中滿分消方法 生於朮 猪苓 澤瀉 椒目 雞內金 青皮汁 厚朴

鄒八腰已下腫經閉四月腹痛瀉不爽議開太陽導其氣阻水濕 牡蠣 澤瀉 猪苓 生白朮 防己 椒目

何經阻腹瀉後變痢 小温中丸

王三居經三月痞悶脹脹無抵脈發現詢知勞碌致病必屬脾胃陽傷中氣愈餒衝脈之血眩注洵有諸矣

氣滯
血滯

大腹皮 半夏 老蘇梗 橘紅 炒山查 羌蔚子
又 經停腹滿便秘 都李仁 冬葵子 柏子仁 當歸 鮮杜牛膝
王叔服阿魏丸高突已平痛未全止經閉已有十餘月腹微膨全屬氣血凝滯若不經通病何以去
川芎 當歸 延胡 桃仁 查肉 香附 青皮 牛膝 益母膏丸

石二入肝必麻木諸厥皆厥陰心痛便燥氣痺血枯乃勞怒情志不遂起見

又 辛潤氣藥病減血虛氣滯當以調經為要見病理病為非 桃仁 當歸 山查 羌蔚子 澤蘭 柏子仁
某二心下有形不飢經水澹少漸閉由氣滯漸至血結左右隧道不行大便堅秘不爽當與通絡

血蠱

炒桃仁 炒五靈脂 延胡 蘇梗 生香附 木香汁 半夏 薑汁
桃 經閉一年腹漸大恐延血蠱沉疴况聚 日久形寒跗腫議用大針砂丸每服一錢二分六服

金 面無華色脈右弦左澹經阻三月衝氣攻左脇而痛腹時脹兩足跗腫是血蠱症勿得小視
桂枝 茯苓 澤瀉 牡蠣 金鈴子 延胡

吳九經阻兩載少腹堅硬大便不爽不時咯出紫血塊此屬血蠱之象 破成血痞不得名蠱
鮮生地汁 熟大黃 澤桂心 老生薑渣 炒桃仁 都李仁 四服

某 經閉腹脹漸成蠱 香附 木香 青皮 烏藥 赤芍 五靈脂 延胡 當歸 鬱金
王仁脈右虛左虛弦數腹痛兩月胸痺咽阻令汗周身刺痛寒慄此屬內損有經閉成勞之事 桂枝湯加茯苓
又 內損情懷少暢非偏寒偏熱可以攻病方中溫養氣血以使條達非因寒投熱之謂開懷安養為宜勿徒恃藥

繼此可進養營法 歸桂枝去薑加茯苓
潘二經水不來少腹刺痛鳴脹大便不爽心中熱痛食辛辣及酒其病更甚不敢通經 與甘緩 甘麥大棗湯
某 陽升風動助暈心悸鼻衄經停兩月 生地 阿膠 麥冬 白芍 柏子仁 棗仁 茯神 艾草

願二病起經阻形容日瘦嘈雜刻飢心腹常熱此乃悲悅離愁內損而勞成陰臟受傷陽脈不流難治之症必得怡
悅情懷經來可挽但通經敗血斷不可用 生地 人參 茯苓 沉香汁 琥珀末 調入

燥燥

鬱損
鬱陰

陰虛
風陽

凡屬此症皆為肺家
有痰及大
建中總屬
不宜此光
慢認仲聖
虛勞用建
中之說害
人甚多余
目擊者數
而終不知
悔余本欲
而指其非
因以不相
止此時退
心也

勞營血動陰或血陰營
血虛勞風虛勞

倒經

陳 自阻經寒熱延及浮腫腹膨小瘦日少入暮心腹中熱此臟陰已涸腑陽日瘳內因怙鬱成勞情志為病當收

肅司令而病日加增料難入冬無成法可邁勉擬回生丹每次服半丸莫過其壅厚氣血漫言治病也

徐二經水久不來寒熱喉痛痺癢藥難取效清阿膠丸雞子湯送

董 脈數色奪久數經閉寒從背起熱過無汗此非瘧邪由于陰陽並損營衛循行失其常度經云陽維為病苦寒

執矣症屬血痺成勞為難治痺阻氣分務宜宣通生鹿用川桂枝木當歸赤芍炙草陰血已虧

仲二先因經阻繼以五心煩熱咳吐涎沫食減微嘔面腫色瘁乃肝陽化風旋動不息乾血勞病醫治無益

阿膠 生地 麥冬 牡蠣 小麥 王 面色晄白脈來細促久數不已減食腹痛便溏經閉半載此三焦臟真皆損乾血勞怯之病極難調治俗醫見

救見熱多投清肺寒涼生氣斷盡何以挽回歸建中湯去薑

尼十少年形色衰奪側眠咳血天柱骨垂經水已閉皆不治見症歸建中湯去薑

某 脈弱無力發熱汗出久咳形冷減食過半頭然內損成勞大忌寒涼清熱治嗽結與建中法冀行加殺經行猶

可調攝桂枝分生白芍半錢炙草分五棗肉錢二飴糖錢歸身半錢

程九乾血勞病百脈枯槁漸至危篤三月間診脈一次當面告辭余非憤憤醫流不肯因循悞事

益母丸早晚服二三錢

某 營虛寒熱咳血經閉當歸炒白芍丹參棗仁遠志茯苓炙草廣皮桂圓肉

顧三潮熱經阻脈來弦數營血被寒熱交蒸斷其流行之機即為乾血勞察非小恙也

桂枝分三白芍錢阿膠半錢生地錢炙草分四麥冬錢大麻仁錢

未女沖年天癸未至春陽升動寒熱衄血平昔溺後腰痛耳目甚聰明先天質薄陰本難充易虧最多倒經之處

雄烏骨雞 生地 生白芍 茯神 天冬 知母 牛膝 羌蔚子 女貞子 阿膠

諸藥除阿膠用水煎汁二次其烏雞去毛及翅足另以童便一碗青蒿汁四碗 醇酒二碗米醋一碗圓氣再 加入煎藥汁收膏入阿膠收燉服五錢

婦人之疾 陰經帶之 外全屬衝 任治衝任 之法全在 養血故古 人立方無 不以益藥 為主者藥 中大段亦 養血為先 而未說 著變化益 未得文科 專門傳授 也

張 又 又

十七歲天癸不至咳嗽失血乃倒經重症先以順氣導血
降香末 鬱金 鉤藤 丹皮 蘇子 炒山查 黑山柅
震動氣衝 咳 噎 失血 雞子黃 阿膠 鮮生地 天冬 生白芍 炒牛膝
脈細數 腹痛 營熱 經不通 人參 天冬 鮮生地 白芍 丹參 調入琥珀末三分

易曰乾道成男坤道成女女子屬陰以血為主故女科治法首重調經經常也如潮汐之有信如月之盈虧不愆其期故曰經水又曰月事又曰月信內經云太衝脈盛月事以時下景岳云衝為五臟六腑之海臟腑之血皆歸衝脈可見衝脈為月經之本也然血氣之化由於水穀水穀盛則血氣亦盛水穀衰則血氣亦衰是水穀之海又在陽明可見衝脈之血又總由陽明水穀所化而陽明胃氣又為衝脈之本也故月經之本所重在衝脈所重在胃氣所重在心脾生化之源耳心主血脾統血肝藏血凡傷心傷脾傷肝者均能為經脈之病內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消其傳為息責者死不治不得隱曲言情欲不遂而病發心脾也風消者發熱消瘦胃主飢肉也息責者喘息上奔胃氣上逆也此雖言病發心脾而實重在胃氣因心為胃之母胃為脾之腑也內經又曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也治之以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之凡以雀卵大如小豆以五丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也此段經文全重在氣竭肝傷四字為通節之綱旨胸脇肝部也支滿肝病也妨於食木邪凌土也病則先聞腥臊臭脾喜芳香今脾土為木邪凌虐病則先聞腥臊乃肝之旺氣也出清液脾虛不能數化水精也先唾血脾傷不能統運營血也四肢清陽衰不能傍達四末也目眩陽不充而水上溢於經也前後血陰受傷而血內溢於絡也血枯內有乾血血不歸經而結胞門也良由年少不禁氣竭肝傷而致月事衰少或不來也治以烏鰂骨四分取其味鹹走腎性溫達肝配以蘆茹一分取其辛散內風溫去惡血二物并合功專破宿生新丸以雀卵取其溫補助陽能調子臟精血以五丸為後飯者先藥後飯使藥徐行下焦力貴專功五丸不為少也飲以鮑魚汁利腸垢和肝傷取其臭穢之味佐烏鰂骨而辟宿積之血也金匱要略言調經之法甚詳後世如黃節齋薛立齋

溫邪 傷陰 胃虛

風動 乘土

液涸 風動 陰虛 陽浮

諸賢論症透徹。用方精切。俱可為程式。茲不具贅。今觀葉先生案。奇經八脈。固屬扼要。其次最重調肝。因女子以肝為先天。陰性凝結。易於拂鬱。鬱則氣滯。血亦滯。木病必妨土。故次重脾胃。餘則血虛者養之。血熱者涼之。血瘀者通之。氣滯者疎之。氣弱者補之。其不治之症。直言以告之。誠一代之良工。女科之明鑑。學者當奉為典型。更能參考內經。仲景及諸賢案論。自然學業日進。登峯造極矣。秦天一

淋帶

某 溫邪劫陰。滯下。火升胸痞。脈小數。生地 阿膠 牡蠣 川斛 小麥 茯苓

某 陽明脈虛。手麻足冷。身動滯下。如注。用通攝方。人參 桂枝木 桑螵蛸 生杜仲 歸身 茯苓

又 胸中似冷。熱飲乃爽。照前方法去杜仲。加白芍炮薑

陳仁 色蒼脈數。是陰不足。心中泛泛。即頭暈腹痛。經水仍來。兼有帶下。肝陽內擾。風木乘土。法當酸以和陽。鹹苦堅

陰 生白芍 細生地 清阿膠 牡蠣 檉根皮 黃柏

又 烏骨雞 生地 阿膠 牡蠣 天冬 白芍 白薇 杜仲 川斷 湖蓮

將 帶下不止。少腹內蹀連痛。至不能伸縮。絡脈不宣。最有結癰綿纏。不可不慮。醫云。肝氣豈有是理。

桂枝 生沙苑 遠志 當歸 鹿角霜 杞子 茯苓 此方不切病

翼 帶淋日久。脂液垂涸。奇脈俱傷。營衛亦偏。內風自動。則中焦氣奪。浮腫腹膨。為寒為熱矣。暫以鹹緩和陰。

阿膠 牡蠣 從蓉 柏子霜 都李仁

袁 舌光赤。頭脹身熱。帶下如注。此五液走泄。陽浮熱蒸。當用攝劑。若與鹿角霜沙苑。仍是升舉動陽。則無效矣。

熟地炭 阿膠 芡實 茯苓 湖蓮肉 炒山藥

又 照前方。去阿膠山藥。加桑螵蛸。萸肉炭。

吳 崩帶淋漓。陰從下走。量厥汗出。陽從上冒。逢穀雨暴山。身中陰陽不相接續。怕延虛脫。成寒時為劇。肝腎病治

人參 阿膠 生龍骨 五味 茯神 生牡蠣

又 血脫去。則臟陰失守。神不內附。致目中妄見。非鬼祟也。當先鎮陽神為主。若驟用陰藥。則有妨胃納矣。

奇效
虛

人參 龍骨 五味 茯苓 芡實 建蓮肉 當用心煎藥 湖蓮肉

又 淋帶黃白未淨五更心悸汗出 人參 炒枸杞 五味 茯苓 芡實

某二脈左細前用通補據述痛起得按痛緩八脈空虛昭然捨此補養恐反增劇矣
當歸 烏賊骨 紫石英 杜仲 杞子 柏子仁 沙苑 茯神

某 女科病多倍於男子而胎產調經為主。要淋帶癥泄奇脈虛空腰背脊脊掣似墜而熱氣反升於上從左而起。女人以肝為先天也。醫人不曉八脈之理。但指其虛。剛如桂附。柔如地味。皆非奇經治法。先以震靈丹固之。每服一錢五分。

服一錢五分

又 淋帶癥泄諸液耗必陰傷。此參附薑桂劫陰不效。而膠地陰柔亦不能效。蓋脈隨氣散不攝。陰藥沉降。徒擾其滑耳。必引之收之固之。震靈丹意通則達下。澆則固下。惟其不受偏寒偏熱。是法致靈矣。後方常用。

人參 鹿角霜 錢 沙苑 桑螵蛸 炒杞子 茯神 炙草 五分

方丸 人參 二兩 隔 麋耳 二兩 切 生鬼絲子 二兩 淡補骨脂 炒 兩半 生紫石英 錢 兩二 生餘糧石 錢 兩二 茯苓 兩

炒黑小茴 錢 炒黑遠志 錢 晚服炒香三錢

姚五 自乳血耗脈絡空輪脊脊椎弊廢。帶下不已。問下部已冷。陰虛及陽。連連斷乳。不致延勢。

人參 鹿角霜 枸杞 桑螵蛸 杜仲 茯苓 沙苑 白薇

徐四 經漏成帶。下焦畏冷。眩暈。肝臟陽升。八脈空乏。

當歸 炒白芍 炒黑枸杞 杜仲 海螵蛸 炒沙苑

楊七 寡居獨陰。自多愁煩。思鬱。加以針箭。目注凝神。陽上巔為眩暈。八脈無氣。自帶下下。高風日動。癩疹麻木。常為隱現。以煖下柔劑。和其陰陽。可得小效。

製首烏 三角胡麻 枸杞 甘菊花炭 用紅棗搗丸。早上服四錢。

王七 產後漏淋成帶。入暮溺頻不爽。驚恐神呆。骨節盡痛。是肝腎內損。漸及奇經。不司束固。是產後虛在下。甘辛潤

補肝腎。不與燥藥。以腎惡燥。肝忌剛也。

陰陽
並虛

某

枸杞子炒黑 鹿角霜 歸身 菟絲子炒香
少腹拘急 大便燥艱 淋帶赤白 此屬液涸

肉苁蓉

枸杞子

河車

當歸

柏子仁

都季仁

生杜仲

炒苑子

茯苓

補骨脂鹽水煎

又

淋帶年久 少腹拘急 脹痛澀不爽 大便艱澇 得泄氣則脹寬 食物少納 腕中不降 必撫摩始下 此病又臟陰腑
陽皆傷 熱藥難受 以通陽固陰 兼之

服早

人參

此為宜通

歸身

炒杞子

茯苓

鹿耳

河車

暮服震靈丹二十粒

帶下者由濕痰流注於帶脈而下濁液故曰帶下。婦女多有之亦者屬熱兼實兼火治之白者屬濕兼虛兼痰治之年久不止補脾腎兼升提大抵畏人多火肥人多痰最要分辨白帶白濁白淫三種三者相似而迥然各別白帶者時常流出清冷稠粘此下元虛損也白濁者濁隨小便而來渾濁如泔此胃中濁氣滲入膀胱也白淫者常在小便之後而來亦不多此男精不攝滑而自出也至於淋症由腎虛膀胱積熱所致腎虛則小便數膀胱熱則小便濇淋有氣血砂膏勞五者之殊皆屬濕熱氣淋為病小便濇滯常有餘瀝不盡血淋為病遇熱即發甚則溺血痛者為血淋不痛者為尿血砂淋為病陰莖中有砂石而痛溺不得卒出砂出痛止是也膏淋為病溺濁如膏敗精結者為砂精結散者為膏又竟海為鹽之義勞淋過勞即發痛引氣衝大約帶病為女子有之淋濁男女俱有景岳云婦人淋帶其因有六一心旌搖心火不靜而帶下者先當清火而砂砂安神丸清心連子飲之類若無邪火但心虛帶下宜秘元煎人參丸茯苓丸之類一欲事過度清泄不固而帶下者宜秘元煎苓朮兔絲丸濟生固精丸之類一人事不暢精道逆而為濁為帶者初宜感喜丸久宜固陰煎之類一濕熱下流而為濁帶脈必滑數煩渴多熱宜保陰煎加味道遙散若熱甚兼淋而赤者宜龍膽瀉肝湯一元氣虛而帶下者宜壽脾煎七福飲十全大補湯若陽氣虛寒脈微濇腹痛多寒宜加薑附家韭子丸一脾腎氣虛下陷多帶者宜歸脾湯補中益氣湯之類以上淋帶辨症論治彷彿已備語云驚養繡出從君看莫把金針度與人若求金針暗度全憑葉葉搜尋 秦天一

崩漏之疾
血海空虛
宜用填補
大劑其法
不一學者
當深考也

肝脾 胃虛 陽熱 奇血 滯虛 衛任 虛胃 衛任 筋痛 衛任 陰虛

徐三肝脾損血崩 人參道遠散去柴九炙草加桑螵蛸杜仲 當用血藥

某經漏不止久風殞淺 大蜈蚣 人參 茯苓 木瓜 炒烏梅 赤石脂 餘糧石

驚脈數寒熱汗出腹脇痛病起經漏崩淋之後是陰傷陽乘消渴喜涼飲不可純以外邪論和營衛調中甘緩主

治當歸 白芍 淮小麥 炙草 南棗 茯神

文五產育頻多衝任脈虛天癸當止之年有紫黑血如豚肝暴下之後黃水綿綿不斷三年來所服歸脾益氣但調

脾胃補虛未嘗齒及奇經為病論女科衝脈即是血海今紫黑成塊幾月一下必積貯之血久而瘀濁有不得不

下之理此屬奇經絡病與臟腑無異考古云久崩久帶宜清宜通做此為法

張十五旬天癸止而經淋周身暈刺右肢漸不能舉不但衝任督帶損傷陽明胃脈衰微少氣乃最難向安之病

人參 生黃芪 炙草 炒沙苑 炒杞子 炒歸身 柏子仁 細生地 青蒿根 淡黃芩 澤蘭 檉根皮 接服斑龍丸

朱崩漏兩年先有帶下始而半月發病今夏季每交申酉其漏必至思下午為陽中之陰陰虛陽動衝任脈皆

動下無隄防約束夫奇經肝腎主司為多而衝脈隸於陽明陽明久虛脈不固攝有開無合矣醫但以瀉劑圍且

夕苟安未及按經論病宜毫無一致 海螵蛸 鮑魚 茜草 生菟絲子 石殼廣蓮肉 按服烏賊魚骨丸

顧髓虛崩淋不止筋掣痛不能行 茯苓 枸杞 柏子仁 茯神 川斛 紫石英 羊肉腎 青鹽

成衝任二脈損傷經漏經年不痊形瘦膚乾畏冷由陰氣走乎陽位益氣以培生陽溫攝以固下真

人參 鹿角霜 歸身 斷文炭 茯神 炮薑 紫石英 桂心

張三經漏十二年五液皆涸衝任不用冬令稍安夏季病加心搖動腹中熱腰膝跗骨皆熱此皆枯槁日著方謂暴

崩宜溫久崩宜清以血去陰耳

人參 生地 阿膠 天冬 人乳粉 柏子仁 茯神 棗仁 白芍 知母 蜜丸

張固補衝任涼肝寧血丸 人參 生地 阿膠 白芍 茯苓 鮮河車膠 石殼建蓮肉

二膠如少可加蒸熟山藥搗碎為丸早服四錢冬湯送晚服二錢

苦寒 傷中 陽

不奇 和 厥

肝腎 虛寒 傷任

夜傷 絡熱 風消

陰虛 陽元

沈 天癸當止之年。經來淋漓不盡。乃陰衰陽動。入秋深夜寐甚少。汗泄四肢胸臆。夫衝脈隸於陽明。其氣行乎身。前陽明脈空。陽越衛疎。陰火升舉。當宗丹溪補陰丸。或虎潛丸之屬。久病投湯太過。恐妨胃耳。每早服丹溪補陰丸四錢十服。

黃 長齋有年。脾胃久虛。瘧由四末。必犯中宮。血海隸於陽明。苦味平散。皆傷胃系。雖天癸久絕。病邪藥味擾動。血絡。是為暴崩欲脫。聞醫重便阿膠。味鹹潤滑。大便溏瀉。宜宜潤下。即熟地五味補飲陰液。咽湯停脫。頃欲吐淨。滋膩酸濁之藥。下焦未得其益。腕中先已受戕。議以仲景理中湯。血脫有營氣之法。不而坤土。陽和旋轉。喜其中流。砥柱。倘得知味納穀。是為轉機重症之尤。勿得忽視理中湯。

某 停經三月。下漏成塊。小腹膨痛。議通和奇脈。鹿角霜 生杜仲 桂枝木 生沙苑 當歸 茯苓 紅棗 製熟地 砂仁製 河車膠 當歸 白芍 人參 茯苓 於朮 炙草 斷文炭

羅 二病屬下焦。肝腎內損。延及衝任奇脈。遂至經漏淋漓。腰脊痠弱。脈絡交空。有終身不得孕育之事。香附 小茴 紫英石 白芍 人參 茯苓 於朮 炙草 斷文炭

陳 十五旬年。歲經漏如崩。繼以白帶綿綿。昔形充令瘦。損當年飲酒濕勝。大便久瀉。自病經年。病乾不火。夜熱多汗。四肢皆冷。氣短腹鳴。上意氣下泄。氣腰足跗酸。更無力。食物日減。不知其味。此陽明脈衰。厥陰風木。由乎血去液。傷衝任交損。內風旋轉。而為風消之象。病在乎絡。故令久延。金匱謂絡熱則痿矣。無此

張 外冷內熱。食過如飢。唇燥裂渴。飲下漏。漏多則陰虛。陽亢便溏不實。不可寒潤。切味 人參 黃芪 苦參 茯神 牡蠣 小麥 瀝清人參湯收

又 消渴心悸 阿膠 炒白芍 湖蓮 檉根皮 茯神 斷文炭 心痛如飢口吐膩涎濁沫。值經來甚多。因驚動肝陽。化內風欲厥之象。治以鹹苦。佐以微辛。使陰入和陽。

胡 阿膠 杜蠟 川棟子 小川連 川芎 當歸 茯神 斷文炭

奇經乃十二
經之餘
二經之
氣治奇經
經則奇經
在內並無
之治約已
經之約也
此老好為
立異故其
說如此但
於理無碍
則亦各成
議論耳
前人所謂
鹿茸治腎
脈應治治
任脈此非
想候其理
耳其資不
必泥也
用約甚有
用思又無
偏結之約
傷整也

入和陽陰諸病大感因經漏陰傷陽易浮越心怔悸肢末痛內風未熄藥以甘柔使胃汁日充則厥柱中流矣

人參 阿膠 麥冬 生白芍 炙草 茯苓

邱四經漏成帶年餘醫療無功乃衝任督帶交病古稱久帶久崩宜清視其體豐慧心陽氣久虧與內經血脫方法

烏鯽魚丸鮑魚汁丸 又照前方加阿膠人中白

某 經漏三年診色脈俱奪面浮跗腫肌之華色納穀日減便堅不爽自脊脊腰脾度處如墮入夏以來月神日羸

思經水必諸路之血貯於血海而下其不致崩厥淋漓者任脈為之擔任帶脈為之約束剛維跨脈之擁護督脈

以總督其統攝今者但以衝脈之動而血下諸脈皆失其司症固是虛日餌補湯不應未達奇經之理耳考內經

於胸脇支滿妨食時時前後血特製烏鯽丸鹹味就下通以濟滯更以穢濁氣味為之導引同氣相需後賢謂暴

崩暴瀉宜溫其補久漏久崩宜清宜通正與聖經相符况乎夜尤皆守不能入奇脈必無病用之誠是好藥藉以

調病烏克有濟夏之月天氣正在泄越脾胃主令歲氣天和保之最要議以早進通陰以理奇經午餘天熱氣泄

必加煩倦隨用清暑益氣之劑以順天氣以扶生生安穩百日秋半收肅令行可望其臟聚氣交而奇絡漸固此

久損難復非伴試速功矣

早上湯藥議以通陰潛陽方法早服

龜甲心秋石水浸 鹿角霜 真阿膠 柏子霜 生牡蠣 鎖陽

另煎清人參湯入清藥煎水五十沸

鹿性陽入督脈龜體陰走任脈阿膠得濟水沉伏味鹹色黑炮肝風養腎水柏子芳香滑潤養血理燥牡蠣去

濕消腫鹹固下仲景云病人腰以下腫者牡蠣澤瀉湯鎮陽固下集之陽氣乃治八脈之大意

烏鯽丸方 烏鯽骨四分末醋炙去甲 蘆茹一分

右為細末用雀卵量搗為丸每服三錢用藥煎先飲淡鮑魚湯一小杯為導引

進潛陽類投但左耳鳴甚腸中亦鳴肝陽內風升動未息減氣剛用柔早服龜甲心照前製

柏子霜 大冬 女貞實 旱蓮草 另煎人參湯二錢加入濾清藥內再煎五十餘沸

真阿膠

月屆

入 兩進柔潤清補。願投詢知病由於悲哀煩勞。調理向愈。繼因目病。服苦辛寒散太過。遂經瀉淋帶。年前七八日始淨。今則兩旬而止。此奇脈內之。前議非誣。據述周身果現癢疹。癢不甯。想脂液久涸。陰不內營。陽氣浮越。衝怯少固。客氣外來。凡六淫邪。無有不從熱化。內經以瘡癘諸病。皆屬於火。然內症為急。正不必以肌腠見病為治。刻下兩三日間。又值經至之期。議進固脈實下。佐以東垣瀉陰火意。經至之先用此方。龜甲心。

又 眞阿膠 人參 桑螵蛸 生白龍骨 旱蓮草 茯神 知母 早上服

又 當經行。周身寒凜。腰痠腿脹。當有邪白疹大發。議用固氣和血方。
非參 人參 熟地 阿膠 川芎 當歸 白芍 南山查 蘄艾 早上服

又 經來腹墜腰痠。疹現肌癢。有風氣鼻孔且竅皆然。想陰血下注。必陽氣鼓動。內風沸起。風非外來。乃陽之化氣耳。昨因經至。用膠艾四物湯和補固經。今午診脈右大而瀼。左小。數中有堅疾如及之象。洵乎液枯風動。初定烏鰂魚丸當進。不切其早上湯藥。凡氣味之辛裁去。雖為補劑。勿取動陽耗液也。早上服

又 人參 生地 天冬 阿膠 生白芍 女貞子 旱蓮膏 地榆 早上服

又 兩日早進清補柔劑。夕用通固下焦衝任。是月經來甚少。起居頗安。與先哲云。暴崩當溫瀼。亦非通論久漏宜宣通。若合符節矣。連次候脈。必小弱為少安。則知陽動不息。內風必旋。茲丸呆守。歸艾辛溫。守則氣壅。辛則陽動。皆不知變化之旨。生失機宜耳。余未能久候。焉有經年經月之病。驟期速愈。故丸藥創自內經。七方之一。世多渺忽。實出軒岐秘笈。再議理陰熄風。早用。諒不致悞。擬長夏調理二法

晚服烏鰂丸三錢。晨進養肝陰和陽熄風以安胃。蓋衝脈即血海。隸於陽明胃脈。乃做經旨立方。
人參 阿膠 白芍 生地 旱蓮膏 女貞子 桑寄生 鹹秋石 細子苓 三角胡麻

又 藥末膠膏再加熟蜜三兩。搗千餘杵。丸宜細光。早上服四錢。小暑至處。暑生脈散送。此番經後帶下。仍有久漏。奇脈少固。前案由說已著。丸劑尚司通攝衝任。恪守定然必效。但外來寒暄易禦。內

因勞嘔難調。余詳詳相告者為此。
人參 生地 阿膠 白芍 茯神 女貞子 旱蓮草 小黑糯米皮 早上服 初十日

又 昨晚煩冤陽動氣升頭額震痛經再下注更足鎮攝一法久後亦可備用

人參 生地 阿膠 生牡蠣 天冬 黑殼建蓮 龜甲心

又 十二日午診脈仍用初十日早服方法去稽豆皮加生牡蠣

交小暑後驟熱午後另煎生脈散微溫服一次

盧 停經半載雨水節後忽然暴崩交春分節血止黃白淋漓自下寒則周身拘束熱時煩燥口乾脯至天明汗出

乃止寐必身麻如蟲行四肢骨節皆痛蓋血既大去衝任之脈傷損而為寒為熱陰損及乎陽位案書云崩中日

久為白帶漏下多時骨髓枯由脂液蕩盡致形骸枯槁延為瘵疾矣天熱氣煖所當謹慎

烏剛骨 阿膠 生地 生白芍 茜草 小麥

陽虛 程 暴冷陽微後崩 附子理中湯

崩如山家萃崩言其血之橫決莫制也漏如漏危難塞言其血之漫無關防也經云陰在內陽之守也氣得之

以和神得之以安毛髮得之以潤經路得之以行身形老中不可斯須離也去血過多則諸病叢生矣原其致

病之由有因衝任不能攝血者有因肝不藏血者有因脾不統血者有因熱在下迫血妄行者有因元氣大

虛不能收斂其血者又有瘀血內阻新血不能歸經而下者醫者依此類推做葉氏用筆靈活於崩漏治法無

餘蘊矣 奉天一

崩漏必用補血大劑而兼黑色之藥大概輕劑不能中病

胎前

惡阻 秦計 經停三月無寒熱診脈大係惡阻減食 細子苓 知母 蘇梗 砂仁 橘紅 當歸 生白芍

方 細子苓兩 蘇梗一兩 砂仁錢五 白芍兩 熟白朮兩 當歸半 青益湯法丸

某 懷妊將三月肝氣攻衝脇痞嘔吐紅痰

細條苓 生白芍 川棟子 瓜蒞皮 半夏麩 橘紅 竹茹 生薑

肝虛 滑胎 程二 頭胎每三月是肝虛 頭胎多在三月是血熱也

熱傷 錢九 上年夏產過月經轉今經停四個月左脉弦滑流動乃為妊象此氣急脫瘡咳嗽熱氣上乘迫肺之微形肉日瘦熱能燥陰耗氣議清金平氣勿碍於下

人參 阿膠 當歸 白芍 川芎 桑寄生
桑葉 川貝 桔梗 廣皮 黑山梔 地骨皮 茯苓 甘草

楊 血液僅僅養胎春陽升舉上焦易燥喉嚨心嘈皆液虧陽亢

鮮生地 茯神 白扁豆 元參心 川斛

謝 始而熱入陰傷少腹痛溺不爽秋暑再傷霍亂繼起今不飢不食全是胃病况懷妊五月胎氣正吸脾胃真氣

津液重傷致令咳逆一人參 知母 炒麥冬 大咽 木瓜 蓮子肉 茯神 此病宜清胃氣

熱邪 傷陰 金 懷妊五月得熱病久傷陰液身中陽氣有升無降耳竅失聰便難報濇議用仲景復脈法以生津液

炙甘草 人參 生地炭 阿膠 天冬 麥冬 生白芍 麻仁

某 懷妊百日丙丁養胎胎熱從戌亥時升耳前赤痛刺痛當養陰制火

不是女 科方 細生地 茯神 生白芍 建蓮 桑葉 胸藤

某 脈右虛左弦身麻肢冷胎冲脹悶五六月當脾胃司胎厥陰內風暗動不飢吞酸全屬中虛

人參 枳殼 半夏 薑汁 桔梗

胡 懷妊六月陽明司胎閃動絡脈環跳痛連腰脊最防胎氣

歸身 桂枝木 炒杞子 炙草 羊脛骨 不入藥 白茯苓

氣逆壅熱於上銀腫喉痺胸悶腹腫七月太陰司胎法宜宣化清上

川貝 牛蒡子 連翹 蘇梗 杏仁 花粉 菊花 橘紅

汪 振八月胎動不安脫悶不飢宜涼血調氣可以安適

黃芩 知母 橘紅 生白芍 當歸 砂仁

血熱 氣滯 上焦 熱壅 閃動 絡脈 胃脾 肝風 犯脾 胃脾 熱邪 傷陰 咳逆 胃虛

句名言
不知何
得此真
然有時
與之相
不知何
反

熱傷
肺陰

勞熱

時邪
發熱

吐瀉
陽熱
泄瀉
寒邪

營虛
火炎

又 肝風眩暈。脈痺少寐。熟首烏非女 炒黑杷子 白芍 女貞子 茯神 黑穠豆皮
王 先寒後熱。咳嗽是春月風溫肺病風為陽邪。溫漸變熱。客氣着人。即日時氣。懷妊九月。足少陰腎脈養胎養胎。上受熱氣。肺痺喘急。消渴胸滿便溺不爽。皆肺與大腸為表裏之現。症狀若繪矣。宜歸辛溫。參朮守補。肉桂沉香。平熱皆胎前忌用。致大熱煩悶。勢屬危殆。議以清肺之急。潤肺之燥。俾胎得涼。則安。去病身安。自為不補之補。古人先治其實者邪也。 泡淡黃芩 知母 鮮生地 花粉 阿膠 天冬

又 喘熱減半。四肢微冷。腹中不和。胎氣有上冲之慮。昨進清潤之方。熱勢有汗。可見辛燥耗血。便是助熱。今煩渴既止。問初病由悲哀驚恐之傷。養肝陰滋腎液為治。穩保胎元。病體可調。 復脈去桂。麻薑棗加天冬。知母子苓。

朱 脈右瀆小數。左弦促。納食脫脹。常有甘酸濁味。微嘔吐清涎。旬朝始一更衣。仍不通爽。詢知病起情懷抑鬱。由氣化熱。如內經五志過極。皆從火化。熱懷妊惡阻。接徐之才。逐月安養。亦在足少陽經。正取清鬱熱養胎。况肝膽相火內寄。非涼劑無以和平。古人治病以偏救偏。幸勿畏虛。以貽惡。

金石斛 黑山梔 茯苓 半夏麴 橘紅 竹茹 枳實

某 惡阻本欲惡心厭食。今夾時邪。頭痛身熱。當先清熱。 竹葉 連翹 生甘草 黃芩 花粉 蘇梗

某 交節上吐下瀉。况胎動不安。脈虛唇白。急用理中法。 附子 人參 於朮 茯苓 白芍

周 病中懷妊泄瀉。佳朮 炒白芍 炒黃芩 炒麩皮
金 懷妊若患時症。古人重在保胎。今者喜暖惡寒。古人無此說。後升則厥痛。墜微使痛。遠腹。暖胎。須避絡傷。以及奇脈。長慮胎墜。難挽。辛香溫柔之補。冀其止歛。

某 固護胎元。諸症俱減。惟心嘈覺甚。陰火上升。營虛之徵。 方不切病非 鹿角霜 淡從蓉 炒杷子 柏子仁 當歸 炒沙苑 炒大茴 茯苓

上吐下瀉
必有邪氣
宜宜滋補
胎前史
平日持論
大相背矣
恐其有邪

劇陽

熱血 傷陰

熱邪 下血

胎漏

下血

殞胎 不下

子腫

此方亦清 無大出入 然非婦科 專門多有 未到之處 當更清本

人參 秦寄生 熟地 宜生 阿膠 絲綿灰 不入煎藥 條苓 白芍 當歸 茯苓 香附

某 懷妊痢滯半月 胃陰既虧 陽氣上逆 咽中阻 飲水欲噦 舌尖紅赤 津液已耗 燥補燥劫 恐陰愈傷 而胎元不保

議益胃和陽生津治之 熟地 烏梅 白芍 山藥 建蓮 茯苓 用川石斛煎湯代水

潘 血夜護胎尚且不固 心中如飢 空洞食不能納 况又戰慄嘔逆 凡內外搖動 都是動胎 從來有胎而病外感 麻

桂硝黃等劑 必加四物 是治病保胎第一要法

方不切病 又無治嘔之藥 小生地 白芍 阿膠 知母 黃芩 青蒿根

王 臨月下痢 膿血色紫 形濃熱伏 陰分議用白頭翁湯 當加阿膠 黃芩 黃柏 炒銀花 茯苓 澤瀉 炒山查

又 苦味見效 知溫熱動血 以小其製為劑可全功矣 黃芩 黃柏 炒銀花 茯苓 澤瀉 炒山查

某 胎漏鼻衄 發疹而喘 不成 淡黃芩 真阿膠 青芩

某 觸胎下血 腹痛而墜 人參 炒白芍 炙草 廣皮 熟地炭 炒砂仁末 加煎銀一二兩 青芩一二兩

又 照前方去熟地 加炮薑熟朮

又 人參 熟地 炒歸身 炒白芍 炙草 茯苓 廣皮 炒砂仁

陸 八形 脈數尺動不食 惡心證象 惡阻腰痛 見紅為胎漏欲墜 茯苓 廣皮 炒砂仁

青 三錢 建蓮錢 紋銀兩 砂仁分 白糯米錢

某 三月胎漏 用固下益氣 人參 熟朮 熟地 阿膠 白芍 炙草 砂仁 艾炭

某 血下殞胎 未下 濁氣擾動 屢嘔逆 腹滿少腹硬 二便塞塞 不通 此皆有形有質之阻 若不急為攻治 濁瘀上

冒 必致敗壞 做子和玉燭散意

川芎 當歸 必與大黃同用 羌蔚子 大腹皮 青皮 黑豆皮 調回生丹

程 懷妊八月 子腫腹漸墜 正氣虛弱 補劑必須理氣 預為臨產之算 砂仁末

人參 茯苓 廣皮 大腹皮 蘇梗

易 曰 大哉乾元 萬物資始 此言氣之始也 又曰 至哉乾元 萬物資生 此言形之始也 人得父母之氣 以生氣生

說得大遠
此趨言之
浮談也

此老每症
有一二高
耳指不全

新產
惡露
瘀滯

體虛
兼瘀

欽

初產汗出眩暈胸痞腹痛宜通惡露

產後

胎即稟此乾坤之氣也兩儀既成五行漸彰故天一生水水屬腎脾臟先生地二生火火屬心心又次生天三生木木屬肝肝又次生地四生金金屬肺肺又次生天五生土土屬脾脾又次生地既以五行生五臟而仁義禮智信之五德亦即寓於其中朱夫子所云天以陰陽五行化生萬物氣以成形而理亦賦焉此之謂也因古人重胎教無所謂所以端其本也而今不復講矣然六淫之感七情之傷妊婦靈氣有強弱小兒胎元有靜躁故安胎之法不可不詳如惡阻胎淋胎暈胎腫胎懸及漏胎等症古人言之甚晰茲不具贅今閱葉先生案胎前大約以涼血順氣為主而脾胃三經尤為所重因肝藏血血以護胎肝血失榮胎無以陰矣肝主升肝氣橫逆胎亦上衝矣胎氣繫於脾如寄生之花於芭蕉萬與女蘿之施於松柏脾氣過虛胎無所附墮胎難免矣至於胃為水穀之海妊婦全賴水穀之精華以養身護胎故胃氣如兵家之餉道不容一刻稍緩也其餘有邪則去邪有人則治火陰虛則清滋陽虛則溫補隨機應變無所執著學者更能引而伸之觸類而通之安胎之法可一以貫之無餘蘊矣秦天一

又

腹痛少緩但胸痞痰多治從上焦 炒山查 鬱金 丹參 橘紅 炒川貝 甜花粉

又

衝脈為病男子內結七疝女子帶下痲聚故奇脈之結實者古人必用苦辛和芳香以通脈絡其虛者必辛甘溫補佐以流行脈絡務在氣血調和病必全愈今產後體虛兼瘀而痛法當益體攻病日期已多緩治為宜

又

生地 生薑 丹皮 琥珀末 調入

又

此苦辛偶方如丹皮以通外琥珀以通內所以取效

又

回生丹 取乎醋煮大黃一味約入病所不礙無痛之所故亦效二法皆入絡藥

又

小生地 歸鬚 紅花 郁李仁 柏子仁 茯神 又照前方去紅花郁李仁加澤蘭

某

二惡露淋漓痛由腰起攻及少腹此督帶空虛奇經氣阻疑奇經為病通因一法為古聖賢之定例

當歸

查肉炭

炒丹皮

澤蘭

川斷

製首烏

唐產後嗽脫參附急救。只可。是挽陽固氣方法。但損在陰分。其頭痛汗出煩渴。乃陽氣上膏。凡開泄。則幾陽。辛熱。則傷陰。俱非新產鬱胃之治。通嘗讀仲景書。明本草。意為是擬方於後。亦非杜撰也。

生左牡蠣錢一

生地錢二

上阿膠錢二

炒黑查肉錢三

羌蔚子錢半

吳

新產陰氣下泄。陽氣上膏。日晡至戌亥。陽明胃衰。厥陰肝橫。肝血無藏氣衝。擾膈。致心下格。拒氣扞膈中。神亂昏譎。若惡露衝心。則死矣。馬有天明再醒之理。輕者亦能漸回。坐丹酸苦。直達下焦血分。用過不應。諒非瘵痺。想初由汗淋發熱。凡外感風邪。邪滯汗解。此熱昏亂。即仲景之新產鬱胃也。倘失治。必四肢牽掣如驚。似風癩。則危。議從亡陽汗出。謔語倒用救逆法。生龍骨錢一。生牡蠣錢一。桂枝錢五分。淮小麥錢一。炙甘草錢一分。南棗錢一。再當加。

又

氣從湧泉小腹中直冲胸臆。而心下痛。巔暈神迷。此肝腎內怯。無以收納自固。每假寐必魂魄飛越。驚恐畏懼。必非一端。救逆法鎮陽頗應。但少補虛再神益之固之耳。

正當加
如藥

人參錢一 龍齒錢三

藜仁錢一

茯神錢三

炒黑杞子錢二

黑殼建蓮錢五

紫石英一兩 搗碎

用水三盞煎減半用以煎藥

又

兩法皆效。下元虛損無疑。八脈無氣把握。帶下淋漓不止。夢魂跌仆。正經盲下。虛則夢墜也。議鎮固奇厥方。

人參錢一

龍齒錢三

藜仁錢一

茯神錢三

桑螵蛸錢二

炒黑遠志錢五分

用紫石英煎湯煎藥

又

昨午憂悲。真怒。大便後。陡然頭暈。繼以嘔逆。胸痞止心。洞嘈。雖仍不能食。子夜寒戰。鼓慄。寅刻津津微熱。神昏妄見。痛乳脹。腹鳴。短氣。阿欠。似乎歎息之聲。此乃下元根蒂未堅。偶觸心機。諸陽神飛。旋動。毋仲景論先厥。伊知飢不能食。乾嘔。列於厥陰篇中。蓋危病初效。未沾水設精華。則胃土大虛。中無砥柱。俾厥陰風木之威。橫衝震蕩。一和釋典。混沌劫於地水。大風平來。莫禦矣。當此醫藥。全以護陽固陰。但血舍耗涸。剛猛及滋膩。總在難施之例。無服理病存體為要。

人參錢一

熟附子錢一

川桂枝木錢一

炮薑炭錢一

炙黑甘草錢五分

茯苓錢三

沈

此產後陰虛。瘧疾。鼻煤。喉燥。舌乾。脫居不飢。大便窒塞不通。乃陽明津枯。不上供。肺下少滋。腸風。陽游行面腫。耳聾。仲景謂陰氣先絕。陽氣獨發。後人以飲食消息。取義甘寒。則知辛溫逐瘀之誤。

連次用藥
而病勢轉
加用血分
能藥及散
內風之品
所以不能
終不有
明報也
沈不用

敗血入絡

營絡寒
惡寒
未清

陰虛
陽虛

又 酸味泄肝。胃氣乃降。大便通復。汗大出。心中刺痛。皆營液內耗。陽氣衝突。仲景三病之鬱。皆見端矣。雖嘔吐各。
人參 炒參冬 麥冬 烏梅肉 麥冬 生白芍 炙草 浮小麥 黑糖豆皮

張 無苦燥耗氣之理。人參 阿膠 生地 炒山查 丹參 茯神 浮小麥 黑糖豆皮
產後鬱胃。汗出潮熱腹痛。炒生地 炒山查 丹參 茯神 浮小麥 黑糖豆皮

吳 產後十二朝。先寒戰。後熱發。少腹痛。痛腹膨滿。下部腰肢不能轉側伸縮。小便澀澹少而痛。此敗血流入經絡。延
及變為癆。症議用艾加散。小生地 生薑 車前 牛膝 五靈脂 炒查肉 調入琥珀末一錢

又 十六朝。諸症稍減。每黃昏成刻。時衝氣自下而上。至胸中即脹悶。肢冷汗出。右腹板實。此厥陰肝臟因驚氣逆。
今惡露未清。重鎮酸敏。均為暫忌。議和血調血為穩。

歸鬚 炒桃仁 延胡 炒查肉 官桂枝 香附 川棟 小茴
人參 當歸 白芍 炙草 茯神 香附 桂心 廣皮 小茴

程 脈濡惡寒紫黑。痛處緊按稍緩。此屬絡虛。治在衝任。以辛甘理陽。
炒歸身 炒白芍 肉桂當辨其有火無火 茯苓 小茴 杜仲 桂心

又 脈濡空大。營絡虛冷。人參 炒歸身 茯苓 炙草 桂心
當歸羊肉湯。加茯苓茴香。

又 產後陰虛。肝風動灼。喉乾。噎咳。晚則頭暈。
阿膠 細生地 天冬 小麥 川斛 茯神 宜略加風藥

程 生薑過勞。肝風陽氣動。面浮氣短。腹膨。惡露未清。不可膩滯。須防溼厥。
小生地 丹參 澤蘭 茯神 黑糖豆皮 琥珀末

又 血分既虧。風陽動泄。汗出心悸。此辛氣走泄。須忌。所慮產厥。如已見端。議靜藥和陽意。
阿膠 雞子黃 細生地 生牡蠣 丹參 茯神

某 產後下焦陰虧。奇缺不固。陽浮乃升。風動則殮泄。嘈雜液損。必消渴骨熱。治在肝腎。靜藥固攝。

陰虛
陽浮
汗泄

血虛
寒滯

氣滯
濕滯
血

氣滯
脹滿
陰虛
夾暑

暑傷
營陰

某 熟地 湖蓮 炙草 五味 芡實 山藥 早蓮 女貞
新產後陰分大虛汗出胸痞潮熱陽浮衛不固雖痰多咳頻忌用苦辛表散恐久延毒勞耳

某 炒生地 炒麥冬 生扁豆 炙草 金石斛 丹參 茯神 甘蔗漿
產後身痛少腹滿

又 當歸 桂心 茴香 香附 紫石英 茯苓 羊肉膠丸
產難傷力驚恐面微浮腹膨小便不爽

孫 腹脹氣滯久瀉產後五日 於鹿 厚朴 茯苓 澤瀉 南山楂 延胡
總宜法以 養血之品 炒黑查肉 大黑豆皮 大腹皮 絨 生香附 茯苓 澤瀉 白花益母草煎湯代水

金 一歲四氣之交夏季發泄為甚凡夏至一陰初復未及充盈恰當產期為陰氣未充先泄暑熱乘隙內侵正如
內經最虛之處便是谷邪之處矣產科未明此旨徒曉產後逐痰成藥苦辛破血津液愈劫所伏暑熱無由可驅

六氣客邪內迫臟腑漸漸昏蒙內閉攻熱害正養正邪留難立方調治幼讀仲景揣摩聖論惟育陰可以除熱
况乎暑必傷氣人參非益氣之聖藥乎大隊陰藥佐以人參誠為陰分益氣之法服之熱痛鬱鬱而起惡露穢穢

而下扶正却邪竝行不悖今穀食已安諒無反覆難成易虧之陰須安養可望圖功倘加情志感觸輕則奇損帶
淋重則髓枯奪損莫道贈言之不詳也 雄烏骨雞一隻 人參二兩 鮮生地三兩 拍子仁半 天冬三兩

項 麥冬二兩 阿膠二兩 建蓮肉三兩 茯神二兩 熟膏
初病舌赤神煩產後陰虧暑熱易深入此亟清營熱所謂產人慮虛其陰

張 竹葉 細生地 銀花 麥冬 玄參 連翹
產後十三朝舌黃邊赤口渴腕中堅閉不食不飢不大便此陰分已虛熱入營中狀如瘧症大忌表散清劑議

滋清營熱救其津液為要 細生地 天冬 生龍甲 丹參 茯神 宜略兼風藥
產後血絡空虛暑邪客氣深入瘧乃間日而發極惡胸滿口渴皆暑熱燥胃津液也此虛人夾雜時氣只宜和

人 產後血絡空虛暑邪客氣深入瘧乃間日而發極惡胸滿口渴皆暑熱燥胃津液也此虛人夾雜時氣只宜和

陽虛 脫

產後 陰虛 陽虛 發厥

衛任 虛氣 上逆 腹痛

陰虛 風陽

解不可發汗脈補 青蒿使脈和 淡黃芩 升皮 鬱金 花粉 川貝 杏仁 橘紅

又 脈緩熱止病減之象但舌色未淨大便未通產後大虛不敢推蕩勿進葷膩恐滯蒸化執蔬粥養胃以滋清潤

燥使通更議補虛 生首烏 蘇仁 麥冬 麥水炒知母 蘇子 花粉

某 濁陰上逆惡心不食冷汗煩燥最防暴脫不可但執惡露滯滿而專瀉氣攻血也此乃七陰之象不得誤認古陽經用黃附

人參 乾薑 附子 澤瀉 入童便

某 脈無神神倦欲昏汗出乃陽氣走泄瀉利係陰氣不守產後見症是屬重虛深恐節間暴脫而寒熱胸痞腹痛

豈違論及標末 人參入心是七陰之病 製附子 人尿 豬膽汁

某 產後驟加驚恐陽上督冒為厥左肢麻木耳竅失殞皆陽挾內風混入清竅以上實下虛鎮陽填陰味厚質靜

之藥 熟地 龜甲心 天冬 萸肉 五味 磁石 茯苓 黑殼建蓮

某 產後去血過多陰虛陽實頭中眩暈汗出肉瞤驚畏身熱等症最易昏厥苦辛氣味宜忌

生地 小麥 炙黑甘草 麥冬 阿膠 茯神 生左牡蠣

顧 產後真陰不復陽越風動四肢麻木先厥後熱

熟地 阿膠 炒杞子 茯苓 菊花炭 生白芍

徐 少腹衝及心下腕中痛而脹滿若云肝氣犯胃必有嘔逆前法益陰和陽不應顯是產後下虛厥氣上攻議用

柔陽之藥 炒歸身 茯苓 炒枸杞 柏子仁 小茴 茯神

又 衝逆震動而痛是產後衝任空乏按定痛滅尤為虛象緣胃弱減設未便湯劑之多防胃倒耳

當歸 茯苓 紫石英 茯苓 河車 鹿角霜

又 衝脈逆則諸脈皆動天朗晴和少安由陰分虛及陽分可徵前法包舉大氣溫養佐通是為格方日來春升略

有衄血然無清寒可投加鹹味佐其入陰從產後下焦先傷耳原方減鹿霜歸身亦恐升陽也加枸杞桂圓以痛

在左故養肝是議

盧 二背寒心熱 天明汗出乃涼產後兩三月若此此屬下焦真陰已虧漸擾陽位二氣交乘並非客症

盧 二背寒心熱

天明汗出乃涼產後兩三月若此此屬下焦真陰已虧漸擾陽位二氣交乘並非客症

天明汗出乃涼產後兩三月若此此屬下焦真陰已虧漸擾陽位二氣交乘並非客症

頭暈耳鳴心悸寒熱後必瀉內風震動當與靜藥六月二

人參 炙草 白芍 麥冬 炒生地 炒烏梅

又前法味甘益陰和陽諸病皆減然此意是產後下焦百脈空乏謂之奪損填陳固髓為正治緣穀食未加沉膩

恐防胃口加餐可用丸藥補三人參 炙草 阿膠 生地 麥冬

又照前方加桂枝木茯苓南棗取七產後都屬下焦先損百脈空陳時序夏秋天暖發泄加病此扶陽益陰得效今諸症向愈寢食已安獨經水未

至而衝任奇脈不振須臾陰沖旺脈中得以游溢耳

熟地水製 人參 阿膠 萸肉 遠志炭 山藥 茯神 建蓮 烏骨雜膏丸初一月

吳生暮過勞驚恐交迫真陰既傷經年不復目暗昏花煩動熱升皆陰腎不得自充何以涵養肝木厥仆眩暈陽

挾肝風直上無制則當靜藥填陰佐酸以收攝

酸鹹之品總非治病之藥惟病後或可用耳 熟地 阿膠 五味 萸肉 北沙參 茯神 黑糖豆皮 秋石二分

陳心寒熱時作經歲不痊且產病後起陽維為病明矣 歸桂枝湯

郭心產後下元陰分先傷而奇經八脈皆麗於下肝腎怯不固八脈咸失職司經旨謂陽維脈病苦寒熱陰維脈病

若心痛下損及胃食物日減然產傷先傷真陰忌用桂附之剛此等藥為入奇經之藥我不知如何本 溫煦陰中之陽能入奇經者宜

之人參 鹿茸此所謂奇經藥也 紫石英 當歸 補骨脂 茯苓

陳四產後兩月腰痛牽引小腹冷汗不食 當歸 羊肉 小茴 桂枝木 茯苓 紫石英

沈產後動怒氣血皆逆痛嘔不卧便不能仰面冷肢冷口鼻氣寒痛必自下衝上此屬病癥厥痛

淡吳萸 韭白 兩頭尖 川棟子 桂枝木 茯苓

吳六產後百日內右脇下少腹痛堅脹絡空無血氣乘於中有結聚癥瘕之累延及變成脹滿經水不轉成大

病矣 當歸 桂心 生桃仁 牛膝 山查 炒黑小茴 產後邪深入陰氣血膠結遂有癥瘕之形身體偃僵乃奇脈綱維不用充形通路可效做仲景當歸羊肉湯意

陽維 病寒 熱損 下及 奇脈 虛弱 營絡 虛寒 腹痛 氣血 結聚

龍骨 兼營衛 虛

陽虛 胃絡 滯

血滯 滯

陰損 肝風 犯

胃虛 下焦 虛寒

某 產後胞損 瀉淋筋絡 牽掣 治當攝下 桑螵蛸 紫石英 羊肉膠丸 炒黃柏 茯神

馮 四產後 兩月汗出身痛 歸芪建中湯

余 產後不復 心悸欲嘔 遇寒腹痛 先議進和營衛 繼當補攝 歸桂枝湯加茯苓

吳 三胃痛 三月不止 茹素面黃 產後吞酸 少食 中焦陽虛 豈宜再加攻泄 與辛補血路方

某 產虛下焦 起病久則延胃 不飢不食 乃陰損及陽 陽明脈空 厥陰風動 掀旋而頭痛 面浮 肢冷指麻 皆亡血家

見象 人參錢一 杞子炒焦 歸身錢一 牛膝鹽水炒 巴戟天錢一 浙江黃甘菊炭五分 茯苓錢一

方 人參另研 茯苓二兩 芫肉炒焦 五味兩 杞子二兩 桑螵蛸殼烘一兩 生白龍骨兩

浙江黃菊花一兩 芫丸早服 四錢開水送

楊 三自幼作勞 即患頭眩 加之刮痧 一月之內 必發數次 前歲產後 體甚不健 右耳日夜响 鳴即頭眩 神色衰奪

唇黃舌白 帶下 手冷 腳腫 脈右大 是陽明空 氣泄不固 煖下 溫中 主之

人參兩 桑螵蛸製 鹿角霜半兩 淡從蓉兩 炒杞子兩 柏子霜半兩 茯苓兩 紫石英兩 醋飛

白龍骨兩 紅棗四兩 蘄艾五錢 水煮 搗丸 服四錢

某 胃痛欲嘔 肢冷 痛引腰背 產後病發 更甚

胃痛欲嘔 肢冷 痛引腰背 產後病發 更甚

方 人參非丸方 鹿茸 生杜仲 炒杞子 當歸 鹿角霜 茯苓 沙苑 小茴 羊腰子蒸熟 搗丸

鄒 三陽不入 陰不寐 汗出 產傷 陰先受損 繼而損至奇 經前主溫養 柔補 謂陰傷 不受桂附 剛猛 開閉 列病 情全是

陰虛 陽浮 漏經 幾一月 尤為急 治夜進局 方振靈丹 五十粒 前方復入 涼肝 益陰 配陽 是兩固法 則

人參 麋茸 枸杞 天冬 茯神 沙苑

某 產後 淋帶 都是衝任 奇脈 內怯 最有崩漏 勞損 淹纏 之慮 但固補 實下 須通奇 經者 宜之

人參 麋茸 枸杞 天冬 茯神 沙苑

桑螵蛸 人參 茯苓 生杜仲 沙苑 芡實 湖蓮

陳 產後百脈空隙腰脊痛漏淋

方切病但 桑螵蛸 鹿角霜

吳 閱病原產後陰虛液虧加以平時嗔怒陽氣暴升絡血不寧奇空衝任少貽帶淋暗泄等症

阿膠 天冬 當歸 白芍 淡黃芩 青高膏 女貞子 茯神 烏骨雞 蜜丸

趙 薄損八脈經水不來帶下頻頻頻多產後下焦先虛繼及中宮乃血液脂膏之涸桂附執燥更助劫燥此溫藥

楊 瘕泄起於產後三年方愈下損已極經水幾月一至來必哀顏如病奇經衝任交空下焦畏冷食冷則瀉心中

金 心經後即背寒不執逾月不愈較瘦有血自秋令產辱屢屢若傷風咳嗽正月至設減而產後不復是下虛形寒

減食先調脾胃即和營衛法 人參建中湯 鹿茸 鹿角霜 熟地炭 當歸 桂枝 五味 茯苓

某 易飢易怒腹瀉氣墜中和和知飢不進食自胎前至今兩月不愈並非客邪用固攝升陽

某 產後十年有十年之後不得作產後治餘病發心頭垂脊痛椎尻氣墜心痛冷汗此督任氣乘躡維皆不用是五液全涸草木

藥餌總屬無情不能治精血之德故無效當以血肉充養取其通補奇經

潘 胎前水溢浮腫喘滿不得卧余用開太陽膀胱獲效既產浮腫自然漸退女科不明產後下虛當以破氣寬脹

百日來腹大且滿按之則痛此皆氣散彌漫丸藥又補潘守中益助其鈍氣血凝滯經候不來為難治之病議腎

氣湯煎藥成炭過取其氣之通勿令味濁兼調琥珀末以調其血潘做古法中之所有非杜撰也

桂七味加車前牛膝炒炭水洗煎臨服調入琥珀末

餘三產後九年心中脹甚則高肌浮足腫食減過半凡脹必有喘產後先傷在下用薛氏濟生丸三錢十服

九年仍

名產後

某 產後血去過多下焦衝任空虛跗腫腹膨形寒面黃脈濡當用濕愈

鹿角霜錢 補骨脂錢 紫石英錢 茯苓錢 桂心四 炒黑小茴香

方三 脈沉濡產虛寒入痛脹腹鳴晨泄病人述心痛嘔逆其實治下為是

熟附子 胡蘆巴 良薑 炒黑茴香 茯苓 廣木香

朱四脈微弱形無華色據說病起產後食減吐瀉是下焦不復中焦又傷漸加浮腫脹滿脛甚急平皆下焦破逆上

衝也下虛於產後剛劑難以希任是病之不易取效者在此

淡菘蓉 炒黑杞子 當歸 小茴 茯苓 沙苑

又 濟生腎氣丸一兩二錢

某五產後未滿百日胸脇骨節收引四肢肌肉麻木浮腫腹脹早輕夜重食減畏寒便澹脈得右遲左弦先與理中

健陽驅濁 人參 炮薑 淡附子 焦白朮 枳實 茯苓

范 病脹起於產後下焦先傷濁陰犯中不可以脹滿為貴症夫腑陽不通腎氣散漫吸氣不入息音如喘此身動

便喘非外客之邪干肺春半溫氣外侵面腫頸項結核曾以夏枯荊葉辛解得效乃一時暴邪治法至於本病之

腹滿洞泄跗腫未經調理且脹勢侵晨至午頓減日暮黃昏脹形漸甚中焦陽微已見一斑愚見脹滿在中而病

根在下仲景於產後失調都從下虛起見 文科湯藥一方殊屬不解思平居咽乾喉痺牙宣肝腎真陰下虧不

敢剛藥宣通做薛氏腎氣法減泄肝如牛膝肉桂之辛不致劫陰仍可通陽為法

六味去萸加芍藥附子牡蠣炒炭煎

又 小滿節古云痛隨利減今便利仍痛非是實症肝失調暢當理用以益水母不取芍藥之和陰加當歸小茴香

拌炒焦黑以通肝臟脈絡之陽又辛散益腎也照前方去芍加茴香拌炒當歸

某 產後腫脹不愈顯是下虛肝腎氣不收攝亦有瘀血不下者形寒痞悶食少瘦多脈細內消治從陰分非分和攻消者濟

生腎氣丸 沉香汁沖開水送 接服金匱腎氣丸

溫熱腫脹

風濕

奇脈

虛腎

氣不

攝腫

脫痞

脹

下焦

寒滯

腫痛

肝腎

虛飲

王 脹滿六年。產後小愈。今脹勢復甚。兼脫肛淋症。大腿熱如滾水。滾凝。食入臍中作痛。議治其脘。

小温中丸三錢六服

風勝為腫濕。甚生熱。乃經脈為病。但產後百日。精神未復。不可過劫。

羚羊角 木防己 片薑黃 川桂枝 大杏仁 以仁

方 產後腹大。半年不愈。近日有形衝突。腸如刀攪。據述坐蓐。產血去盈斗。而腹形即已脹滿。想入脈不用。腎氣

散越不收。非瘀血精氣為病。議用大全方。烏雞煎丸。

攻補兼用 烏骨雞人參 蒼朮 附子 烏藥 肉桂 陳皮 草果 紅花 海桐皮 黃芪 白朮

古方極多 蓬朮 川烏 延胡 白芍 木香 肉果 琥珀 丹皮

即以雞搗去毛頭。嚼瓜腸雜。將藥放雞肚內。貯砂鍋中。以好酒一斗同煮。令乾去雞骨。以油罈盛。焙令乾。為末

蜜丸

范 衝任傷。督帶損。皆由產時勞怖。理難復元。固攝下。真兼理奇脈。治非背謬。但腹滿膨痛。若徒固補。不以通調。恐

滋脹腫。大意陽宜通陰宜固。包舉形骸。和養脈絡。乃正治方法。病樣多端。紛紜纏治。難以立方矣。

人參 鮮河車膠 淡茯苓 砂仁製熟地 鹿角霜 歸身 茯苓 紫石英

小茴香 羊腰子

某 產後下虛。血病為多。今脫中痞。脹減食不適。全是氣分之恙。但調氣寬中。勿動下焦。為穩。

香附 神麩 蘇梗 白蔻仁 茯苓 桔梗

朱 產後冬月。右腿浮腫。按之自。若論敗血。亦有一年。半年已成癱瘓。瘡針刺泄氣。其痛反加。此乃衝任先虛。踰

維脈不為用。溫養下元。須通脈絡。然取效甚遲。恪守可望却病。

終獨有邪 旋蓉 鹿角霜 當歸 肉桂 小茴 牛膝 茯苓 鹿角膠 酒蜜丸

某 產後必病陰虛。可知兩足跗中筋。掣痠痛。不耐走趨。當溫養肝腎。以筋骨。但食後脫中痞阻。按之漉漉有聲。

手麻脇痛。心煩耳目昏眩。宛是陽氣不主流行。痰飲內聚之象。處方難以兼攝。議用分治法。

龍用此奇
方是此老
尚出諸醫
之上不可
但有時遇
此等病仍
不能不用
如何故想
用藥亦有
出入時也

此老欲學
漢人往住
有此人成
方明古此
未明古此
也方之意

燥傷 肺氣 水氣 痰阻 痰飲 不寐 不便 下虛 飲逆 風溫 客邪 飲逆 熱瀉 肺脹 肅降

中焦藥日中服 桂苓六君子竹瀝薑汁法凡 下焦藥侵晨服從四斤丸金剛丸參膏

茯苓 牛膝 虎骨 生杜仲粉 天麻 木瓜 草解 蜜丸

程 脈沉咳喘浮腫鼻竅黑唇古赤渴飲則脹急大便解而不爽此秋風燥化上傷肺氣氣壅不降水殺湯飲之溼痺阻經隧最多生不得臥之慮法宜開通太陽之裏用仲景越婢小青龍合方若畏產後久虛以補溫煖斯客氣

散漫三焦皆累閉塞告危矣 桂枝木 杏仁 生白芍 石羔 茯苓 炙草 乾薑 五味

陳 三夏季坐褥秋月熱病半年來不寐無皮毛焦落之象是痰飲為氣所阻以致升降失常乃痺之甚也議宣肺以通腸 紫苑錢 杏仁錢 枳殼錢 桔梗錢 瓜蒌皮錢 鬱金錢

陸 背寒夜臥氣衝欲坐乃下元虛乏厥瀉飲邪皆令上泛胎前僅僅支撐產後變症蜂起奈何庸庸者流泄肺冀其軟緩宜乎藥增病勢矣 桂枝 茯苓 炙草 五味 淡乾薑

許 實喘屬肺虛喘屬腎產後下虛最多痰飲易於上泛喘救食減有浮腫脹滿不得臥之憂不可小視 茯苓 枳殼 生白芍 乾薑 五味

王 產後未復風溫入肺古白面腫喘咳泄瀉小水漸少必加腫滿不易治之症 蘆根全方未 杏仁 通草 大豆黃卷 蘆根 杏仁 大豆黃卷 木防已 茯苓

又 淡滲通泄氣分肺壅得開而卧再宗前議 通草 成安 蘆根 杏仁 大豆黃卷 木防已 茯苓

又 過投絕產凝寒重藥致濕聚阻痰兩投通泄氣分已效再用暖胃滌飲法 半夏 薑汁 黍米 茯苓

又 支飲未盡溏瀉不渴神氣已虛用澤水湯 生於朮 建澤瀉 茯苓 杏仁

某 脈小左弦咳逆腕問小便不利大便溏瀉不思納穀暖氣臭穢此皆胎前氣上逆衝濁得盤路隔間肺失清肅降令上數痺致下數不利湯食聚濕氣不宣行怕延出浮腫脹滿喘急不卧諸欸不獨以產後通瘀為事

鬱金汁 杏仁 通草 桔梗 所急 茯苓皮 杏仁

沈 產後未復加以暑熱上十暑必傷氣上焦先受頭脹微微嘔惡腕問不曉飢飽暑熱早涼汗泄不已經水連至熱迫血絡妄動蓋陰虛是本病而暑熱係客氣清上勿得礙下便是理邪勿混亂首鼠致延奪損不復矣

熱瀉 肺脹 肅降 沈 產後未復加以暑熱上十暑必傷氣上焦先受頭脹微微嘔惡腕問不曉飢飽暑熱早涼汗泄不已經水連至熱迫血絡妄動蓋陰虛是本病而暑熱係客氣清上勿得礙下便是理邪勿混亂首鼠致延奪損不復矣

暑傷
上焦
氣分

不火
盛心
營熱

暑勞

此是度飲
之症後方
不能中病

捲心竹葉

生地

炒川貝

連翹心

元參

地骨皮

袁二神識不甚靈。陡然狂亂入井。夫暴病痰火風為多。今診視色脈。產後未滿百日。多驚怕。五味皆變。厥陰肝木順乘陽明。古稱一陰一陽變亂為癩。先以清心胞解營熱。食進便通。再酌調理。

犀角

方甚靈
妙可師

生地

當蒲

元參心

羚羊角

鬱金

竹葉心

連翹心

又復脈湯去參薑桂

其五產後不復元。仍自乳撫育。損不能復。即是暑勞。速連斷乳。藥力可扶。凡產必下焦先損。必以形質血氣之屬。莫以心熱再用寒涼伐其生氣。

沈時熱屬上焦病。逾時自解。緣體質素薄。長夏坐蓐。不但肝腎陰傷。諸氣皆為發泄。陰不主懸陽。衝脈上冲。而心

人參

當歸

沙苑

杜仲

補骨脂

茯苓

羊肉腎二枚

熱骨痠。總是陰虧不肯復元。久久延成損症。此與清潤治肺之咳無預法。宜填補下焦。攝之固之。迎養秋收冬藏。胃納有加。庶乎漸安。

鮮紫河車

人參

真秋石

茯苓

水煮熟地

歸身

五味

笑實

山藥

生羯羊肉膠。共河車膠。二共和丸。

桃仁面少華色。脈似數。按之乳濇。產後三年。從未經來。腹中有形。升逆則痛。肩背映脇。卒痛難忍。咳吐都是涎沫。著枕氣衝欲坐。食減便溏。身動語言喘急。此乃暑勞損極不復。諒非草木可以圖倖。由下焦元海少振。驚恐弱。衝脈動斯諸脈動。擬益元氣。充形骸。佐重鎮以理法。護持體質之義。非治病方藥矣。

人參

白龍骨

茯苓

紫石英

羊肉

人參

白龍骨

茯苓

紫石英

羊肉

人參

白龍骨

茯苓

紫石英

羊肉

鄒心產後成勞損。先傷下焦血分。寒熱數發不止。奇經八脈俱傷。欲嘔不飢。肝腎及胃有形凝癥。議柔劑。溫通補下。

人參

當歸

茯苓

沙苑

淡從蓉

杞子

鹿角霜

生紫石英

汪產後百日。寒熱消渴。心痛惡食。澹瀉。此暑勞液涸。已屬痼沉難治。擬酸甘化陰扶胃。望其小安而已。

人參

烏梅

炙草

赤石脂

木瓜

茯神

炒粳米

張二產後下虛。厥氣上衝。犯胃。食入嘔脹。脈絡日空。營衛兩怯。寒熱汗泄。淹淹為暑勞之病。最難調治。

茯苓

桂枝

茯苓

炮薑

炒木瓜

南棗

黃產後徒然驚恐陰虧陽上逆血沸吐反胸背脇下大扁乃八脈空之徵舉勞重延最難全好甚難固一

法 熱地炭 炒杞子

五味

紫石英

茯神

牛膝炭

艾實

茯神

又 脈少欬痛止血

仍用鎮納

熟地

炒杞子

五味

女貞子

艾實

茯神

又 眩暈腹鳴脫痛

熟地

炒杞子

五味

茯神

阿膠

芫花炭

北沙參

又 烏骨雞

阿膠

熟地

杞子

五味

桂圓

茯神

建蓮

又 小產三日

脈數頭痛脫痞小腹墜痛欲飲此屬鬱胃

連翹

鬱金汁

丹皮

鈎藤

茯苓

炒山查

益母草湯煎

某二小產後惡露淋漓營血內虧厥陽由是鼓動頭脹耳鳴心中洞然病在下焦矣

拘杞子錢

拍子仁錢

全當歸錢

白芍錢

稽豆皮錢

茯神錢

朱脈小半產一日舌白頻頻嘔吐青綠水汁涎沫左肢浮腫神迷如寐此胃陽大虛肝風內泛欲脫之象急宜護

陽安胃冀得嘔緩再商治病

半產血脫純用辛熱溫補何可訓也

人參

淡附子

炒焦粳米

煨老薑

又 雖得小效必三陰三陽一周扶過七日庶有愈理

人參

淡附子

熟於朮

炮薑

茯苓

南棗

某小產不及一月忽有厥逆度朝此陰分既虛厥陽上冒今工便已通神志似屬憤散病雖已成癰癩却非度火

有餘肝腎位

治宜鎮補擬陳無擇琥珀散

人參

此必於血脈上攻之症何可用參

白芍

鐵落

辰砂

磁石

遠志

菖蒲

牛黃

孔形畏寒凜凜忽然轟熱腰膝墜脹帶下汗出由半產下焦之損致八脈失其擁護少腹不和通攝脈絡治之

鹿角霜

炒當歸

杜仲

兔絲子

小茴香

桂枝

陳懷妊三月小產半年不復寒從背起熱起心胸經水復期不爽帶下脈脈不斷脊腰膝痠疼膝骨跗脛

易冷無力由衝任督帶傷損致陰陽離隔不用調治非法有終身不肯孕育之累

鹿角霜

炒枸杞

當歸

炒沙苑

桂枝

小茴

奇脈 陽虛 固本 可服 帶淋

陰虛 陽胃 成癰 瀰

風動 嘔吐 脫

營血 虛陽

小產 鬱胃

下虛
上受
風溫

陽氣
虛久

萎弱

肝虛
血帶

液虛
風動

可慮
方之重復

近來諸醫
誤信產後
為寒之說
凡產後無
不用炮薑
執地而柱
人參等約
不亦產後
血氣孤弱

顧 上年小產下虛不復冬令臍聚未固春夏陽升風溫來虛上受清氣不利耳失聰鼻多塞咽燥痰稠悉見上焦不清究竟下虛是本病議食後用清氣早上用鎮納 青菊葉錢 羚羊骨錢 黑椀皮錢 連翹心錢

程 久瀉延虛痛而後瀉氣弱不司運行病因小產而來法當中下兩調 元參心錢 苦丁茶錢 磁石六味加龜膠北味 人參 炒鬼綠子 木香 茯苓 炒白芍 炒補骨脂

汪 小產後氣衝結痼是奇經八脈傷醫謂病尚有形食從瘀血施治半年來肌肉大消內熱略瘳血過脫下軌云腹痛蓋產後下焦真陰大虧攻瘀清熱氣味苦平是重虛其虛藥先入胃既不中病先戕胃口致令飲食廢矣陰虛成熱經訓灼然祇以胃口傷殘難與滋膩之藥此症延成毒勞必得飲食漸和方有調病之理見病治病胎害豈可再循前轍議肝胃兩和方 炒黑杞子錢 雲茯神錢 柏子仁錢 生沙苑錢 焦當歸錢 小茴七分同當 紫石英 五錢先煎 廿溪入藥

某 三次兩月胎漏而下是厥陰失養脈數又大腹痛惡露未盡 柏子仁 炒查肉 丹皮 澤蘭葉 細生地 調入琥珀末

倪 小產半月頗安忽然腰腹大痛或攢膝跖足底或引脇肋肩胛甚至湯飲藥餌嘔吐無存振去液傷絡空風動昔賢謂按之痛緩屬虛勿道諸痛為實 宜兼和血 止痛之藥 艾草 淮小麥 南棗 阿膠 細生地 生白芍

又 往常經候不調乃癥瘕為痛 葱白丸 金匱要略云新產婦人有三病一者病瘕二者病鬱三病大便難新產血虛多汗出善中風故令病瘕亡血復汗寒多故令鬱胃亡津液胃燥故大便難心典云血虛汗出筋脈失養風入而益其勁此筋病也亡陰血虛陽氣遂厥而寒復鬱之則頭眩而目昏此神病也胃藏津液而滲灌諸陽亡津液胃燥則大腸失其潤而大便難此液病也三者不同其亡血傷津則一故皆為產後所有之病即此推之凡產後血虛等諸症可心領而神會矣張璐玉云產後元氣虧損惡露乘虛上攻跟花頭暈或心下滿悶神昏口紫或痰涎壅盛者急用熟童

會矣張璐玉云產後元氣虧損惡露乘虛上攻跟花頭暈或心下滿悶神昏口紫或痰涎壅盛者急用熟童

生竹葉... 用而世... 庸醫反... 辛熱之... 戕其火... 不立我... 見思多... 中絕無... 有湖澆... 善用人... 而少用... 藥消痰... 胃之法... 未見反... 有未到... 胎由管... 大脫不... 有養血... 必去血... 消痰火... 驅風種... 治法皆... 血分中... 出變化... 離本宮... 中諸方... 隨見施... 有似產... 後之方... 此非尋... 之故也

陽維陰維... 陽維陰維... 主之請教

便主之或血下多而暈或神昏煩亂者名歸湯加人參洋蘭童便兼補而散之又敗血上衝有三或歌舞談笑

或怒罵坐臥甚則踰牆上屋此敗血衝心多死用花蕊石散或琥珀黑龍丹如雖悶亂不致顛狂者失笑散加

鬱金若飽悶嘔惡腹滿脹痛者此敗血衝胃五積散或平胃加薑桂不應送來復丹嘔逆脹脈血化為水者全

圍下瘀血湯若面赤嘔逆欲死或喘急者此敗血衝肺人參蘇不甚則加芒硝滌湯之大抵衝心者十難救一

衝胃者五死五生衝肺者十全一二又產後口鼻起黑色而鼻衄者胃氣虛敗而血帶也多用人參蘇木

稍遲不救丹溪云產後當大補血氣大即有雜症以末治之一切病多是血虛皆不可發表景岳云產後既有

表邪不得不解既有火邪不得不清既有內傷停滯不得不開通消導不可偏執如產後外感風寒頭痛身熱

便實中滿脈緊數洪大有力此表邪實症也又火盛者必熱渴煩燥或便結脹脹口鼻古焦黑酷喜冷飲眼眇

呆痛溺亦脈洪滑此內熱實症也又或因產過食至停蓄不散此內傷實症也又或鬱怒動肝胸脇脹痛大便

不利脈弦滑此氣逆實症也又或惡露未盡瘀血上冲心腹脹滿疼痛拒按大便難小便利此血熱實症也遇

此等實症若用大補是養虎為患誤矣以上四家之論俱屬產後治病扼要處學者當細心體察再參觀葉先

生醫案更能博考羣書以治產後諸病易如反掌矣否則如眇能視不足以有明也如跛能履不能與於行也

烏得稱司命哉秦天一婦人善病而病由產後者為更多亦為更劇產後氣血大虧內而七情外而六氣稍有

感觸即足致病使治之失宜為患莫測朱丹溪曰產後以大補氣血為主雖有他症以末治之此語固為產後

症之宗旨而症實多端論其常未盡其變也醫者惟辨乎脈候以明內外之因審乎陰陽以別虛實之異病根

透徹而施治自效慎毋以逐瘡為了事亦毋以溫補為守經今觀先生案中凡內因之實症未嘗不用攻治之

劑然如熱熾昏亂有似惡露衝心者先生則曰陰氣下泄陽氣上胃從亡陽汗出謔語例為救逆法如少腹冲

及心腕痛而脹滿有似肝氣犯胃者先生則曰產後下虛厥氣上攻惟用柔陽之藥如頭痛汗出煩渴有似感

冒風寒者先生則曰開泄則傷陽平熱則傷陰從仲景新產鬱冒之治以立方至於奇經八脈為產後第一要

領蓋八脈麗於下產後陰分一傷而八脈自失所司溫補鎮攝在所必先無奈世人罕知即有一二講論者終

屬影響模糊惟先生於奇經之法條分縷析盡得精微如衝脈為病用紫石英以為治鎮逆任脈為病用龜板

...

...

...

治本病然
項此何藥
方以治百
病者原不
得以簡目
之也

營絡
結聚
之氣

以為靜攝督脈為病用鹿角以為溫煦帶脈為病用當歸以為宣補凡用奇經之藥無不如此外因
為病者風溫入肺用葶藶湯甘寒淡滲以通肺氣遇寒腹痛用當歸桂枝湯辛甘化陽以和營衛暑氣上干則
陰虛是本病暑熱是客氣清上勿致礙下便是理邪如濕傷脾胃而飲邪阻氣用苦溫淡滲之品澤尤湯治之
熱蒸化燥而胃阻腸痺用首烏麻仁麥冬花粉清滋潤燥之劑治之熱乘陰虛而入營中則忌表散清勉惟有
陰可以除熱更如邪入營絡而成瘧症不得發汗脈補當以輕清和解為主要之先生於內因之症一一尋源
探本非同俗手漫謂補虛於外因之端種種審變違權不以產後自為荆棘惟讀書多而胸具靈機故於丹溪
本末二字尤為神化無迹此所謂知其要者一言而終不知其要者流散無形也案中諸症甚多學者果能
悟焉則一以貫之矣 龔商年

癥瘕

張 久痛在絡營中之氣結聚成癥怡而夜發繼而晝夜俱痛陰陽兩傷偏閱醫藥未嘗說及絡病便難液涸香燥
須忌 青葱管 新絳 當歸鬚 桃仁 生鹿角 柏子仁

朱 辛潤通絡成形痰濁吐吐然痰濁必下行為順上湧雖安恐其復聚仍宜緩通以去瘀生新為治無取沉降急
攻謂怒勞多令人傷陽耳 當歸 桃仁 羌蔚子 製蒺藜 生鹿角 茯苓 香附汁法丸
周 三癥聚結左肢節寒冷病在奇脈以辛香治絡

鹿角霜 桂枝木 當歸 小茴 茯苓 香附 葱白

龔 脈症向安辛甘化風方法非謬據云痛時少腹滿脹其有形癥瘕狀亦略小法宜益營之中再佐通泄其氣古
稱通則不痛耳 人參 當歸 肉桂 吳萸 小茴 茯苓 青葱管

欽 疝瘕少腹痛 當歸 生薑 羊肉 桂枝 小茴 茯苓

又 瘕痛已止當和營理虛 歸身 紫石英 白芍 酒炒 小茴 淡菴蓉 肉桂 丸方用養營去氏木桂合杞圓膏

朱 四疝瘕腹痛有形用柔溫平補 當歸 生薑 羊肉

氣血
經絡
阻滯

木火
鬱火
滯血
痰
腎氣
不調
經阻
腹痛
脹
氣
凝
肝
胃
痛

某

右脇攻痛作脹應時而發是濕陰氣聚成癥絡脈病也蓋溫通絡

諱 癥聚有形高突痛在胃脘心下或垂界腰少腹重按既久痛勢稍定經水後期色多黃白此皆衝脈為病絡虛

則脹氣阻則痛非辛香何以入絡苦溫可以通降

延胡 川棟 香附 鬱金 茯苓 降香汁 羌蔚子 炒山查 烏藥

又 癥聚癭結痛脹防食得食不下痛甚今月經阻不至帶淋甚多病由衝任脈絡擾及肝胃之逆亂若不宣暢經

通日久延為癥疾矣 炒桃仁 當歸鬚 延胡 川棟子 青文 小茴 吳茱 紫降香 青葱管

柳 四絡血不注衝脈杜撰則經阻氣攻入絡聚而為癥乃痛衝脈是陽明屬隸痛并於右脹及中脘作嘔清涎濁沫

操家煩怒犯胃莫如肝泄肝正救胃 金鈴子 炒延胡 蓬殺丸 青橘葉 半夏 厚朴

薑汁 茯苓 又葱白丸二錢艾葉湯送

某 臍下癥形漸大氣塞至心胸及咽喉飲不解渴遂氣攻至背部經水百餘日不來小溲得利大便不爽氣滯血

痰皆因情志易鬱肝膽相火內灼衝脈之血欲涸丹溪謂氣有餘便是火口甜食後痞用苦辛清降

胡黃連分八 山梔仁錢 南山查錢 蘆薈錢 雞肫皮不落水去垢 化服回生丹半丸

陸 六經阻半年腹形漸大痛不拒按漫短便通據形色脈象不是用通經丸者下氣還攻於絡有形若癥瘕炒枯腎

氣湯

繆 脈弦左搏數年胃痛不痊發時手不可按脇中拘急少腹左傍素有癥聚之形氣自下焦衝起為脹為嘔此乃

驚憂真怒致動肝木乘其中土胃傷失降脈絡逆併痛執為甚初起或理氣獲效久發中衰辛香氣燥脾胃不勝

克伐矣議疎肝木安土為法冀其漸緩再酌後法

川棟子 川連 乾薑 桂枝 當歸 川椒 生白芍 烏梅

又 少腹癥瘕多年衝起散漫胃脘兩脇痛甚欲嘔手前用安胃泄肝頗效但下焦至陰足跗發癢裂水久留蒸熱

痰留經脈絡中文痰若非宣通氣血壅遏恐非至理

肝逆 犯胃 奇絡 虛滯

鬱傷 液潤 陽升 脹痛

厥陰 寒滯 嘔瀉 肝鬱 犯胃

桃仁 柏子仁 川芎 當歸 小茴 小香附 茯苓 山梔 薑汁

其年數年左脇聚癥發作必嘔吐涎沫酸苦濁水寤不成寐便閉忽瀉始於悒鬱病由肝失暢達木必傳土胃氣受侮病久入絡氣血兼有積滯為宜急攻必變脹病 生牡蠣 川棟子肉 延胡 桃仁 半夏

茯苓 橘紅 白芥子 川連 吳萸 香附汁薑汁法丸

趙 脈小身不發熱非時氣也凡經水之至必由衝脈而始下此脈胃經所管醫無消導寒涼不能中病反傷胃口致衝脈上冲犯胃為嘔攻胸痞塞并巔則脊厥經言衝脈為病男子內疝女子癥聚今小腹有形兼有動氣其病顯然夫曰結曰聚皆奇經中不司宣暢流通之義醫不知絡脈治法所謂愈究愈窮矣

鹿角霜 淡苳蓉 炒當歸 炒小茴 生杜仲 茯苓 用紫石英一兩煎湯煎藥

將四天癸將止之年小腹厥陰部位起癥動則滿腹脹痛形堅或時脊巔刺痛必有穢痰血筋吐此起於鬱傷久則液枯氣結內風陽氣煩蒸則心熱痞結咽阻已屬痼疾治必無效倘腹大中滿則劇矣

牡蠣病不切 生地 阿膠 小胡麻 茯苓 穡豆皮

沈十四 肢冷腹痛有形為癥久瀉 當歸 炒小茴 延胡 上肉桂 山查 炒茯苓 生香附

冷痢有痕遇冷則嘔 吳萸 炒小茴 延胡 茯苓 川棟子

其 脘中癥聚 川棟子 延胡 吳萸 青皮 良薑 茯苓 生香附

林 脈左弦澹少腹攻逆痛即大便肝氣不疎厥陰滯積

香附 雞肫皮 茯苓 香橛皮 青皮 炒查肉 砂仁 殼 苓芽

又 少腹癥聚攻逆身熱或噫或濁氣下泄則諸恙悉舒惱怒病發厥陰肝木鬱遏不疎頭露一班

川棟子 小茴 生牡蠣 桂枝木 葱白 二錢五分紅棗湯送 青皮

程 聚氣疝瘕大便不爽必腹中疝痛當通腑經氣分 葱白 二錢五分紅棗湯送 小茴 香 金鈴子肉

又 做朱肉意以濁攻濁 韭白根 兩頭尖 炒香穡核 小茴 香 金鈴子肉

案中方論
平正清潤
又極和潤
無燥燥但
劑等雖但
有無之疾
多有不破
者而不可
丸煎等
法必則全
少見之
沉痾之病

勞乾食寒腹温
血減熱脹熱
結濕凝痰傷脾得
微熱結氣氣暑就

又 痲聚已解用八珍丸加香附小茴白花益母膏丸

某 痲聚在左脇中肝病 桃仁 川棟子 延胡 當歸 橘紅 香附

王 四痲聚李脇漸加煩倦減食入夏土旺氣泄用泄少陽補太陰方

人參 茯苓 炙草 當歸 丹皮 生地 龍甲 澤蘭膏

周 痛久在絡凝聚成形仍屬經病議用河間法 川棟子 瓜蒌皮 香附汁 延胡 生牡蠣

又 理氣豁痰痛止思食仍以前法參用 半夏 瓜蒌皮 香附汁 生牡蠣 橘紅 香豉

葛 四用丹溪小温中丸脹利自減知腸胃濕熱皆阻腑陽之流暢水殺之氣不主游溢痲屬氣聚痲為血結由無形

釀為有形攻堅過急藥先入胃徒致後天氣之恐脹病必至矣俗有痞散成蠱之說可以治此病之戒律

老韭根 生晒 桃仁 兩 生香附 兩 炒查肉 兩 當歸鬚 兩 山甲片 兩 小茴香 錢 桂枝木 錢

胡 十二少腹聚痲能食便不爽腹微脹 小温中丸

王 二初病寒熱半年經水不來少腹已有痲形食又減半當此年犯乾血勞慮

焦朮 茯苓 廣皮 香附 當歸 南山查 白芍

夫痲者微也血食疑阻有形可徵一定而不移痲者假也臟氣結聚無形成假推之而可動昔有七痲八痲之

說終屬強分名目不若有形無形之辨為明的也二症病在肝脾而胃與八脈亦與有膏治之法即從諸經

再究其氣血之偏勝氣虛則補中以行氣氣滯則開鬱以宣通血衰則養營以通絡血瘀則入絡以攻痺此治

痲痲之大略古方甚多而葱白丸為難前丸尤為神效痲痲之外更有痲痺腸覃石痲內疝等症古人論之已

詳茲不必贅今參先生方案如營傷氣阻者於益營之中佐通泄其氣如絡虛則脹氣阻則痛者以辛香苦溫

入絡通降又如肝胃兩病者以泄肝救胃肝胃脾同病者則扶土制木肝臟之氣獨鬱不宣者辛香常治於氣

血痺絡逆失和者辛香常理其血病由衝任擾及肝胃之逆亂者仍從肝胃兩經主治以疎降溫通凡此悉

靈機法眼藥不妄投總之治痲痲之要用攻法宜緩宜曲用補法忌滯忌呆上逆則想肝臟衝病之源頭下垂

則究中氣陰邪之衰旺吞酸吐水必兼剛藥液枯腸結當祖滋營再辨脈象之神力形色之枯澤致病之因由

則治法自然無誤矣 醫商年

【熱入血室】

熱邪 內陷 液傷 發瘧

沈氏溫邪初發經水即至寒熱耳聾乾嘔煩渴飲見症已屬熱入血室用醫見咳嗽脈數舌白為溫邪在肺用辛涼輕劑而煩渴愈甚拙見熱深十三日不解不獨氣分受病况體質素虛面色黧慘恐其邪陷極厥三日前已經發五液暗耗內風掀旋豈得視為渺小之意議用玉女煎兩清氣血邪熱此清涼劑仍不合仍有救陰之能

玉女煎加竹葉心武火煎五分

又脈數色黯舌上轉紅寒熱消渴俱緩前主兩清氣血伏邪已得效驗大凡體質素虛驅邪及平必兼護養元氣

仍佐清邪腹痛便溏和陰是急服前方而有致必非熱入血室蓋經來而寒熱等症不止不可即名熱入血室也若果熱入血室必謗語此老始未明耳

白芍 炙草 人參 炒麥冬 炒生地

又脈右數左虛臨晚微寒熱 復脈湯去薑桂

此柴胡對症為千古法舍此俱為邪說熱入血室柴胡湯為主方此十老倫不用柴胡湯其治瘧疾亦從不用口聲聲惟柴胡湯則視如仇專與相背真令人不解

吳八熱病十七日脈右長左沉古痿飲冷心煩熱神氣忽清忽亂經來三日病患血舍內之熱氣乘空內陷當以痰

熱在裏論病但病已至危境從善血如狂倒 細生地 丹皮 製大黃 炒桃仁 澤蘭 人中白

攷熱入血室全膺有五法第一條主小柴胡因寒熱而用雖經水通斷急提少陽之邪非勿令下陷為最第二條傷寒發熱經水適來已現晝明夜劇謔語見鬼恐人誤認陽明實病故有無犯胃氣即胡小及上二條之成第三條中風寒熱經水適來七八日脈遲身涼胸脇滿如結胸狀謔語者顯無表症全露熱入血室之候自當急刺期門使人知針力比藥力尤捷第四條陽明病下血謔語但頭汗出可知服藥之方亦為熱入血室亦刺期門汗出而愈仲景無非推廣其義教人當知通變第五條明其一症而有別因為善和痰潮上脫昏冒不知當先化其痰後除其熱等語所謂急者先除也乃今人一遇是症不辨熱入之輕重血室之盈虧遽與小柴胡湯貽害必多要之熱甚而血瘀者與桃仁承氣及山甲歸尾之屬血舌空而熱陷者用犀角地黃湯加丹參木通之屬表邪未盡而表症仍兼者當合乎和解熱輕而清藥過投氣機致鈍者不妨借溫通為使血結胸有桂枝紅花

表邪未盡而表症仍兼者當合乎和解熱輕而清藥過投氣機致鈍者不妨借溫通為使血結胸有桂枝紅花

於花...

傷有育陰養氣之復脈法又有護陰滌熱之緩攻法先聖後賢其治總條分縷析學者審症製方慎毋拘泥乎
茶胡一法也宋氏邵新甫

幼科要畧

按襁褓小兒體屬純陽所患熱病最多世俗醫者固知謂六氣之邪皆從火化飲食停留鬱蒸變熱驚恐內迫五志
動極昏陽奈今時治法初則發散解肌以退表熱仍混入消導繼用清熱苦降或兼下奪再令病家禁絕乳食每
致胃氣索然內風來乘變見驚癇告斃甚多附記世俗通套之方藥於左不可不知不足取法

防風 荊芥 葛根 前胡 桔梗 木通 赤芍 蘆子 厚朴 陳皮 山查

麥芽 枳殼 神麩 鉤藤 夏佐香蒿冬佐麻黃羌活

兩三日熱不解 茶胡 前胡 黃連 黃芩 山梔 連翹 薄荷 葛根 木通

鉤藤 厚朴 枳實 瓜蒌實 凡劑必用大黃必

四五日不解但言食滯未盡表裏不和總以柴芩小陷胸若嘔逆煩渴用竹茹黃連半夏若痰多喘促即用葶藶

杏仁蘇子藟子膽星貝母甚者加牛黃此皆套法所當戒也 屢清消不愈便無方法苟不變驚必曰骨蒸孩

勞所用藥餌不分氣血陰陽但知見症施治如早涼暮熱必用

地骨皮 丹皮 生地 元參 甘草 北沙參 石斛 知母 有炭加 蘇子

杏仁 貝母 橘紅 膽星 桔梗

其鉤藤石斛茯苓設芽之屬每劑必用總之取無故疲藥待其自愈倘有變症希冀掩飾而已今有此人必為良醫矣
愚按嬰兒肌肉柔脆不耐風寒六腑五臟氣弱乳汁難化內外二因之病身多然有非風寒竟致外感不停滯已屬
內傷其故何歟嘗思人在氣交之中春夏地氣之升秋冬天之降呼出吸入與時消息間有穢濁吸入即是三
焦受邪過暴原直行中道必發熱煩燥倘幼醫但執前藥表散消導清火通便病輕或有倖成病重必然顛覆錢
仲陽云喜履不可近襁褓小兒余言非無據矣四十年來治效頗多略述其概云
夫春溫夏熱秋涼冬寒四時之序也春應溫而反大寒夏應熱而反大涼秋應涼而反大熱冬應寒而反大溫皆不

然免深自抱反從此不敗如虎畏不此何矣至然此書親筆醫借偏道之假通達亦有不費事處今所刻諸案不但文理通達兼理通達兼淨明近亦不能望日時文家亦萬一本知原文本編如是以和為之筆削也難不可禁絕然大宜減少佐以未飲不冷生瘕為錄出諸品藥戒人不微用及可後幅所不則此諸味則前後相背矣要知此等藥總在用之

症則用之
有言不必
錄出善人
反敗後人
疑之也

名言

皆止論也

正論

急救非此
不可

正之乘氣也病自外感治從陽分若因口鼻受氣未必恰在足太陽經矣大凡吸入之邪首先犯肺發熱咳喘口鼻均入之邪先上繼中咳喘必兼嘔逆腹脹雖因外邪亦是表中之裏設宗世醫發散陽經雖汗不解幼穉質薄神怯日期多延病變錯綜茲以四氣常法列左

伏氣

春溫一症由冬令收藏未固昔人以冬寒內伏藏於少陰入春發於少陽以春木內應肝膽也寒邪深伏已經化熱首賢以黃芩湯為主方苦寒直清裏熱熱伏於陰苦味堅陰乃正治也知溫邪忌散不與暴感門同法若因外邪先受引動在裏伏熱必先新涼以解新邪繼進苦寒以清裏熱况熱乃無形之氣幼醫多用消滯攻治有形胃汁先涸陰液劫盡者多矣
備用方 黃芩湯 葱豉湯 新邪引動伏邪 涼膈散 清心涼膈散

風溫

春溫者春月受風其氣已溫經謂春氣病在頭治在上焦肺位最高邪必先傷此手太陰氣分先病失治則入手厥陰心胞絡血分亦傷蓋足經順傳如太陽傳陽明人皆知之肺病失治逆傳心胞絡未必幼科多不知者俗醫見身熱咳喘不知肺病在上之旨妄投荆防柴葛加入枳朴杏蘇藟子查麥廣皮之屬軌云解肌消食此亦誤有見痰喘便用大黃礞石滾痰丸大便秘數行上熱愈結幼穉殺少胃薄表裏苦辛化燥胃汁已傷復用大黃天苦沉降丸藥致脾胃陽和傷極陡變驚癇莫救者多矣

按此症風溫肺病治在上焦夫風溫春溫忌汗初病投劑宜用辛凉若雜入消導發散不但與肺病無涉劫盡胃汁肺之津液上供頭目清竅徒為熱氣薰蒸鼻乾如煤目瞑或上竅無淚或熱深肢厥狂躁瀉瀉胸高氣促皆是肺氣不宣化之徵斯時若以肺藥少加一味清降使藥力不致直趨腸中而上痺可開諸竅自爽無如城市庸醫僉云結胸皆用連婁紫枳苦寒直降致閉塞愈甚告斃甚多

按此症初因發熱喘嗽首用辛凉清肅上焦如薄荷連翹牛蒡女貞桑葉沙參梔皮蘘皮花粉若色蒼脈勝煩渴用石膏竹葉辛寒清散痧症亦當宗此若日數漸多邪不得解於連涼膈亦可選用至熱邪逆傳入膈中神昏目瞑鼻衄無涕淚諸般欲閉其勢危急必用至寶丹或牛黃清心丸病減後餘熱只甘寒清春胃陰足矣

大順散乃治暑月傷冷之方也何得連類及之

備用方
葶藶大棗湯
白虎湯
至寶丹
清心牛黃丸
竹葉石膏湯
喻氏清燥救肺湯
清心涼膈散
涼膈散
瀉白散

〔夏熱〕

夏為熱病。然夏至已前。時令未為大熱。經以先夏至病溫。後夏至病暑。溫邪前已由明暑熱一症。幼醫易眩。夏暑發自陽明。古人以白虎湯為主方。後賢劉河間。創議迥出諸家。謂溫熱時邪。當分三焦。投藥以苦辛寒為主。若拘六經分症。並無分六經者。仍是傷寒治法。致誤多矣。蓋傷寒外受之寒。必先從汗解。辛溫散邪是已。口鼻吸入之寒。即為中寒陰病。亦不治。當溫裏分三陰。見症施治。若夫暑病。端方甚少。皆因前人略於暑詳於寒耳。考古如金匱暑暈。因暑病無傳變之。法方亦不必多。而潔古以動靜分中暑中熱。各具至理。茲不槩述。論幼科病暑熱夾雜別病有諸。而時下不外發散消導。加入香薷一味。或六一散一服。考本草香薷辛溫發汗。能泄宿水。夏熱氣閉無汗。渴飲停水。香薷必佐杏仁。以杏仁苦降泄氣。大順散取義若此。此非治暑之方。夾雜不得。長夏濕令。暑必兼濕。暑傷氣分。濕亦傷氣。汗則耗氣。傷陽胃汁。大受劫燬。變病由此甚多。發泄引令裏真。自虛張鳳達云。暑病首用辛涼。繼用甘寒。再用酸泄酸飲。不必用下。可稱要言不煩矣。然幼科因暑熱蔓延。變生他病。茲摘其槩。

受熱厥逆

夏令受熱。昏迷若驚。此為暑厥。即熱氣閉塞孔竅所致。其邪入絡。與中絡同法。牛黃丸至寶丹。芳香利竅。可效。神甦以後。用清涼血分。如連翹心竹葉心玄參細生地鮮生地。二冬之屬。此症初起。大已風藥。初病暑熱傷氣。竹葉石膏湯。亦不一定。或清肺輕劑。大凡熱深厥深。四肢逆冷。但看面垢齒燥。二便不通。或瀉不爽。為是大已。誤認傷寒也。

〔疳〕

幼兒斷乳納食。值夏月脾胃主氣。易於肚膨泄瀉。頭熱手足心熱。形體日瘦。或煩渴善食。漸成五疳積聚。當審體之強弱。病之新久。有餘者當疏胃清熱。食入黃色白或不化。當健脾佐消導清熱。或濕熱內鬱。蟲積腹痛。導滯驅蟲。微下之。最緩調用肥兒丸之屬。

〔口疳〕

夏季秋熱小兒泄瀉或初愈未愈滿口皆生疳蝕嘗有阻塞咽喉致危者此皆在裏濕盛生熱熱氣蒸灼津液不升濕熱偏傷氣分治在上焦總須外治或佐淡滲世俗常刮西瓜翠衣治疳取其輕揚潔利也

(脹)

夏季濕熱鬱蒸脾胃氣弱水穀之氣不運溫着內蘊為熱漸至浮腫腹脹小水不利治之非法水濕久漬逆行犯肺必生咳嗽喘促甚則坐不得卧俯不能仰危期速矣大凡喘必生脹脹必生喘方書以先喘後脹者治在肺先脹後喘者治在脾亦定論也金匱有風水皮水石水正水黃汁以分表裏之治河間有三焦分消子扣有磨積逐水皆有與義學者不可不潛心體認難以驟述閱近代世俗論水濕喘脹之症以內經開鬼門取汗為表治分利小便潔淨府為裏治經旨病能篇謂諸濕腫滿皆屬於脾以健脾燥濕為穩治治之不效枝窮束手矣不知凡病皆本乎陰陽通表利小便乃宣經氣利肺氣是陽病治法暖水臟溫脾腎補方以驅水是陰病治法治肺痺以輕開上治脾必佐濕通若陰陽表裏乘遠臟真日滿陰陽不運亦必作脹治以通陽乃可奏績如局方禹餘糧丸甚至三焦交阻必用分消腸胃壅塞必用下奪然不得與傷寒實熱同例擅投硝磺枳朴擾動陰血若大陰脾臟飲濕阻氣溫之補之不應欲用下法少少甘遂為丸可也亦太峻其治實症選用方法備採 備用方 葶藶大棗湯 瀉白散 大順散 牡蠣澤瀉散 五苓散 越婢湯 甘遂半夏湯 控涎丹 五子五皮湯

諸方亦即
太猛不可
輕用

子和桂苓湯 禹功

茯苓防己湯 中滿分消湯 小青龍丸 木防己湯

附記一徐姓小兒單脹數月幼科百治無功僉用肥兒丸萬安散磨積丸綠礬丸雞肫藥俱不效余謂氣分不效宜治血絡所謂絡瘀則脹也用歸鬚桃仁延胡山甲蟋蟀虻蟲靈脂山查之類為丸雖屬血積亦不宜用蟲類十日全愈

(吐瀉霍亂)

吐瀉一症幼兒脾胃受傷陡變驚搐最多皆因若是不正穢氣觸入或口食寒冷套用正氣散六和湯五積散之類

正氣受傷肢冷呃逆嘔吐目利即用錢氏益黃散有疾用星附六君子湯理中湯等倘熱氣深伏煩渴引飲嘔逆者連香飲黃連竹茹半夏橘皮湯熱閉神昏用至寶丹寒閉用來復丹

食瓜果泄瀉

或古人治瘧
獨中葉胡
此老獨不
用葉胡次
之印亦事
夏此老亦
不用半及
應古相傳
之定法收
於輕毀印
此一端其
問立不可

辨乎夏月食瓜果水寒之濕着於脾胃令人泄瀉其寒濕積聚未能消化熱氣必用辛溫香散之氣古方中消瓜果之積以丁香肉桂或用麝香今七香餅治瀉亦祖此意其于胃散胃苓湯亦可

〔瘧〕

瘧因暑發居多方書雖有疾食寒熱瘧之互異幼穉之瘧都因脾胃受病然氣怯神弱初病驚癇厥逆為多在夏秋之時斷不可認為蕙癩大方瘧症須分十二經與效症相等若幼科庸俗但以小柴胡去參或香薷葛根之屬不知柴胡動肝陰葛根竭胃汁致變屢矣此說何來此老終身與柴胡為仇何也幼科純陽暑為熱氣症必熱多煩渴邪自肺受者桂枝

白虎湯二進必愈其有冷食不運有足太陽脾病是症初用正氣或用辛溫如草果生薑半夏之屬方書謂草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之熱瘧久色奪唇白汗多飲弱必用四獸飲陰虛內熱必用鱉甲首烏知母便漸瘳者忌用久瘧營傷寒勝加桂薑擬初由未瘧門用藥於左

初病暑風濕熱瘧藥何以名為瘧生寒生熱是也脫痞悶 枳殼 桔梗 杏仁 厚朴二味喘 瓜蒌皮 山柰 香豉 頭痛宜辛涼輕劑 連翹 薄荷 赤芍 羚羊角 蔓荊子 消石汝漆清上

重則用石膏 口渴用花粉 煩渴用竹葉石膏湯熱甚則用黃芩黃連山柰

夏季身薄屬濕羌防羊溫宜忌宜用木防己蚕沙

暑熱邪傷初在氣分日多不解漸入血分反渴不多飲唇舌絳赤黃芩膏知不應必用血藥諒佐清氣熱一味足矣

輕則用青蒿 丹皮汗多 犀角 竹葉心 玄參 鮮生地 細生地

木通 亦能發汗 淡竹葉 若熱久痞結瀉心湯選用

又夏月熱久入血最多蓄血一症言語昏狂者法以小便清長者大便必黑為是桃仁承氣湯為要藥幼穉瘧久

面腫腹膨泄瀉不欲食或囊腫或跗腫必用東垣益氣以升陽升麻不可輕用也倘脾陽消傳前方不應理中湯或錢

氏益黃散得效二三日須投五苓散一二日再與異功參冬白朮散之類必全好 徐忠可註金匱有幼兒未

進穀食者患瘧久不止用水糖濃湯余試果驗 瘧多用烏梅以酸泄不安土之意用常山草果乃劫其太陰

之寒兼治以常山極走使二邪不相併之謂用人參生薑日露薑飲一以固元一以散邪取通神明去穢惡之氣

亦一方

卷錄之言

亦一方

亦一方

亦一方

總之久瘧氣餒凡壯騰氣皆可止瘧未必真有瘧鬼又瘧邪既久深入血分或結瘧母驚甲煎丸設用煎方活血通絡可矣

痢

痢疾一症古稱滯下蓋裏有滯濁而後下也但滯在氣滯在血冷傷熱傷而滯非一今人以滯為食但以消食併令禁忌飲食而已夫瘧痢皆起夏秋都因濕熱鬱蒸以致脾胃水穀不運濕熱灼氣血為粘膩先痛後痢則後

不爽若偶食瓜果水寒即病未必即變為熱先宜辛溫疎利之劑若膿血幾十行疴痛後重初用宣通驅熱如今連大黃必加甘草以緩之非如傷寒裏實須用芒硝礮以要堅直走破泄至陰此不過苦能勝濕寒以逐熱足可却病古云行血則便膿愈導氣則後重除行血涼血如丹皮桃仁延胡黑查歸尾紅花之屬導氣如木香枳榔青

皮枳朴廣皮之屬世俗通套不過如此蓋瘧傷於經猶可延換痢關乎臟悞治必危診之大法先明體質強弱肌色蒼嫩更詢起居致病因由初病體堅症實前法可遵久病氣餒神衰雖有腹痛後重亦宜詳審不可槩以攻積清套施治聊附記一治驗備考 施姓子年七歲七月二十三日天久雨陰晦遂發泄瀉數次越日腹痛下痢

紅白延幼科二人調治五六日至初二日余診之嘔逆不食下痢無度都是血水其腹痛晝夜無寧刻兩脈俱細右瀆欲歇坐次鼻聞藥氣乃大黃氣令其勿進施云有二醫在枉先生一商何如余唯之入書室索方一醫曰下

痢已來全無糟粕若非攻蕩去積無別法可投余曰肢冷下血液七八日痛不飲水望面色枯白中極氣黯脈形細矣按之不鼓明是冷濕中於太陰仲景太陰九法示不用下乃急煎人參炙甘草薑歸芍陳皮少佐肉桂二劑

垢滯得下痛痢大減繼以歸芍異功散參苓白朮散半月全安 噤口不納水穀下痢都因熱升瀉攻必用大苦如芩連石蓮清熱人參輔胃益氣熱氣一開即能進食人參同進清熱之藥用便為合度樂宜頻頻進二三口

小兒休息久痢變為善後下血最難速愈有因氣弱下陷者補中益氣瘧寒飲食不化者錢氏益黃散濕熱未淨氣分延虛者清暑益氣湯胃強善食者苦寒清熱更節飲食須善調經月 久瀉久痢必傷及腎以腎司二便

也必肝門後墜不已與初病濕熱裏急下重不同治以攝陰液或佐疎補久則純與攝納亦有外小兒熱病最多者以體屬純陽六氣著人氣血皆化為熱也飲食不化蘊蒸於裏亦從熱化矣然有解表已復熱

此症乃因正氣太虛故爾得脫陽氣欲脫故爾得脫病入於初用此方則大誤矣若一概如此則此老之罪人也

秋燥

攻裏熱已復熱利小便愈後復熱春陰滋清熱亦不除者張李明謂元氣無所歸者陽浮則候熱矣六神湯主之

秋深初涼穉年發熱咳嗽證似春月風溫症但溫乃漸熱之稱涼即漸冷之意春月為病猶冬歲固密之餘秋令感傷恰值夏熱發泄之後其體質之虛實不同但溫自上受燥自上傷理亦相等均是肺氣受病世人悞認暴感風寒混投三陽發散津劫燥甚喘急危若果暴涼外束身熱痰嗽只宜葱豉湯或蘇梗前胡杏仁枳桔之屬僅一二劑亦可更有粗工亦知熱病與瀉白散加芩連之屬不知愈苦助燥必增他變當以辛涼甘潤之方氣燥自平而愈慎勿用苦燥劫燥胃汁秋燥一症氣分先受治肺為急若延綿數十日之久病必入血分又非輕浮肺藥可醫須審體質症端古謂治病當活潑潑地如盤走珠耳

翁姓子方數月秋燥潮熱咳嗽如瘧幼科用發散藥二日不效忙令禁乳更醫用瀉白散更加芩連二日晝夜煩熱喘而不咳下痢粘膩藥後竟痢藥水延余診之余日穉年以乳食為命當少餓則胃虛氣餒肺氣更不爽矣與玉竹甘草炒廣皮竹葉心一劑熱緩繼與香粳米南棗廣皮甘草沙參二錢與乳少進合夜抱勿倒三日全愈

冬寒

深秋入冬暴冷折陽外感發熱頭痛身痛嘔惡必從太陽若渴能飲水者裏熱見症即非純以表散傷寒每以風傷衛用桂枝法寒傷營用麻黃法小兒肌疎易汗難任麻桂辛溫表邪太陽治用輕劑紫蘇防風一二味身痛用羌活然不過一劑傷風症亦肺病為多前杏枳桔之屬辛勝即是汗藥其意豉湯乃通用要方若服冷寒戰嘔吐自痢或身無熱即從中寒裏症三陰須分但小兒科太陰中寒最多厥陰間有若冬令應寒氣候溫煖當藏反泄即能致病名曰冬溫溫為欲熱之漸非寒症得汗而解若涉表邪一二裏熱必兼七八是癰疹丹痧非徒風寒或外受之邪與裏邪相薄亦令鬱於經絡或飲醢厚味裏熱熾烈而胃氣不與營分相和或不正直入內侵即有腹痛下痢諸症其治法按症必以裏症為主稍兼清散有諸設用辛溫禍不旋踵矣至於痧症時癘須分四氣也

看三關法

滑氏云小兒三歲已內看男左女右手虎口三節曰三關紋色紫熱紅傷寒青驚風白疳積黃虛淡乃平常小恙

其筋紋宜癢不宜暴露若見黑色則為危險再脈紋見下截風關為輕中截氣關為重上截命關為尤重耳直透三關為大危

痧屬陽腑經邪初起必從表治症見頭痛喘急咳嗽氣粗嘔惡一日二日即發者輕三五日者重陽病七日外隱伏不透邪反內攻喘不止必腹痛脹秘悶危矣治法宜苦辛清熱涼膈去硝黃

方書謂足陽明胃疹如雲佈密或大顆如痘但無根盤方書謂手太陰肺疹但有點粒無片片者用辛散解肌冬月無汗壯熱喘急用麻杏如華蓋散三孤湯夏月無汗用辛涼解肌葛根前胡薄荷防風香薷茅根枯木通之屬

古人以表邪口渴即加葛根以其升陽明胃津熱甚煩渴用石膏辛寒解肌無汗忌用

凡瘡疹辛涼為宜連翹辛涼翹出眾草能升能清最利幼科能解小兒六經諸熱

春令發痧從風濕濕一夏季從暑風暑必兼熱秋令從熱燥燥氣冬月從風寒

疹宜通泄泄瀉為嘔下痢五色者亦無妨惟二便不利者最多凶症治法大忌止瀉

痧本六氣客邪風寒暑濕必從火化痧既外發世人皆云邪透孰謂出沒之際升必有降勝必有復常有痧外發身熱不除致咽啞齟腐喘急腹脹下痢不食煩燥昏沉竟以告斃者皆屬暑症不清致變須分三焦受邪孰多或兼別病累瘳須細體認上焦藥用辛涼中焦藥用苦辛寒下焦藥用酸寒上焦藥氣味宜以輕肺主氣皮毛屬肺之合外邪宜辛勝甚宜苦勝若不煩渴病日多邪鬱不清可淡滲以洩氣

中焦藥痧火在中為陽明燥化多氣多血用藥氣味苦寒為宜若日多自津消燥苦則助燥劫津甘寒宜用○下焦藥鹹苦為主若熱毒下注成痢不必鹹以夾堅但取苦味堅陰燥濕

古人以痧為經腑之病忌溫燥瀉補所謂痘喜溫暖疹喜清涼也然常有氣弱體虛表散寒涼非法淹淹釀成損怯但陰傷為多救陰必扶持胃汁氣衰者亦有之急當益氣碎年陽體純剛之藥忌用幼科方書歌括曰赤疹遇清涼而消白疹得溫煖而解此溫字即後人酒釀檉木粗草紙木棉紗之屬溫法雖不可不知然近年用者多無益

痧疔濕感熱蒸口舌咽喉疔蝕若不速治有穿腮破頰咽閉喘促告斃矣治之宜早外治亦另有端方若湯藥方法必輕淡能解上病或清散亦可

此老用藥

此語本之

內經即神

震本單亦

首列之但

終當深治

其病各有

功能藥後

再於其中

探氣味之

合者而用

之方得內

經本草之

若徒知

此是秘訣

當用清涼

外邪之法

終無主見

小兒外治之法最多

庸醫惟知此二家

症因時感而變不但

歷代不同

亦有小變

錢仲陽時

所說症症

大不相同

其方亦迥

別神而明
代之必合
參觀之也

痲瘋乃熱毒內陷與傷寒協熱邪盡則刺止同法忌升提忌補瀉輕則分利宣通重則苦寒解毒

痘

論痘首推錢仲陽陳文中二家錢用寒涼陳用溫熱確乎相左丹溪祖錢非陳分解毒和中安表為要以厚用地黃

湯為主方舉世宗之莫敢異議後之萬民以脾胃為主魏氏以保元為主皆從二家脫化費建中救偏悉以石膏

大黃最下胡氏輒投汗下松江東地多宗秦鏡明京口江甯咸推管樞保赤吾蘇悉遵翁仲仁金鏡錄可謂家喻

戶曉者其取長在者不在乎治者法精確確有可以前知之巧妙後之翟氏聶氏深以氣血盈虧解毒化毒分晰闡

揚錢陳底蘊超出諸家因分別太多讀者目眩心憤不若翁仲仁藹藹悅口也然眼目之功須宗翁氏而稟治講

究參之諸家可矣姑舉者法大凡發熱三日而後見標是其常即以熱勢參詳見症定其吉凶翁仲仁金鏡

錄甚明茲不復贅其未刻者行補入傷寒邪由外入痘子熱從內起但時邪引動而出與傷寒兩途

週歲小兒初熱即現驚搐昏迷之狀最多世俗謂驚痘最好此言未必皆然方書云先驚後痘者生先痘後驚者

死頻頻驚厥最多悶痘蓋痘由腎至肝至心脾及肺自裏至外自深及淺未發之前痘熱先已內動目現水晶光

芒腎熱也水生木而入肝不生火而入心火生土而入脾土生金而入肺其先天痘毒從至陰以達陽全藉身中

元氣領載豈可先用惡藥傷元充長以保每為漿必膿厚蒼老而始結痂毒已外洩元氣內返斯無變症週歲已內身小

元弱常有熱一日即出亦有慎痘但須看神氣靜躁熱勢輕重見點徐徐而出既出即長熱緩安乳便是好症若

神氣雖安熱亦不盛痘點雖不多形呆色鈍或作頭垂足落脈懈不束筋骨皆由氣血不足毒氣不能外發之故隱隱歎息或短氣

如喘或嘔或瀉最多悶症若三二日間痘苗已長色亦頗好竟夜終日煩燥不止最防隱處發疔及發斑夾疹等症

一發熱煩燥標點雖見熱躁愈加細詢無忽再參兼症為六氣鬱遏者從時氣治為內傷停滯者從裏症治亦有

表裏兩解治亦有下奪者但下法寒涼之中必須活血理氣防其凝滯水伏初起必三次而出熱止即齊其贈點亦有陸續發出者須看顏色靈活生氣頃刻轉機變化為要察形辨症治法

用藥表藥活血疎肌次則涼血解毒實熱便閉者微下之虛弱氣怯者忌進疎解寒涼間有虛寒弱穉初發身不

此乃痘中兼症非明於內外者不能

大熱四肢皆冷吐乳瀉乳痘點不長聞聲悠悠欲絕望色慘淡無形恰在一二朝間余見程氏女年甫牛齒佈痘極多痘形奕色淡白前症迭見近地幼科僉用荆防芫蟬紅花查肉木通胡蔓筭尖之屬方雖寫而示以凶危延余診視余曰毒重氣虛法在不治但身無熱見症虛寒不因毒氣表邪焉用表藥若萬氏始終以脾胃為主以理中湯加丁桂與服一劑肢暖區止前症皆虛寒之體此等藥其效如神再服利緩痘起再用參歸鹿茸二服以錢氏異功散而愈凡者痘先論兒體強弱辨肌色如色白多氣虛色蒼多血熱形象疔羸有宿病或渴乳肌柔白嫩者痘必鮮明蒼黑皮粗者色必暗晦羸瘦病質色燥形枯必須辨依期長養內症安和病軀出痘即平常無奇亦難調理歌訣云形體羸瘦骨如柴肌肉枯焦神思哀遍體鋪排如此痘縱能漿足亦堪嗟

一初見腰痛足爽不能起立者死此毒伏於腎

一初見目睛呆眩或暗無光或黑白高低皆屬緊閉症

一初見痘不續發斑色深紫漸變藍黑六日內死

一初見痘斑間雜若似洒珠點墨必死

一初見腹脹胸高續增喘噦者死

一初見痘煩躁不止即防疔斑亦必現於隱處多死

一初見痘紫斑漸起痘反隱伏此名紫斑白悶

已上皆論初見着法以定凶危發齊熱退後皆無諸惡症翁仲仁云三日四日痘出當齊點至足心勢方安靜若論幼小之兒氣血易過常有未及三日而發齊者年長之體四日已外猶有贈發者痘子稀少數不盈百不必點至足心仲仁大意謂發齊安靜無慮變然須辨明痘形痘形是何等呈色身體強壯痘屬上中方可許其無慮倘幼小弱質或病後或帶別病而後佈痘未可見痘好浪詐再以冬夏氣候審詳可以百千無誤

今世用方 初見宜解肌疎表通套法十六味 荆芥四日不用 防風三日不用 前胡三日不用 牛蒡四日不用 紫草二三日不用 木通 紅花 甘草 赤芍 天蟲 查肉 川芎 連翹 桔梗 廣皮 蟬蛻三四日不用

方書中未見點用升麻葛根湯此是開示第一方 今人不用伍氏方法見點忌升麻 後人謂葛根表疎亦忌此輕揚升表通套藥若裏症急須兩解

伍氏方一二日羌透肌湯今人不用惡其辛溫氣雄也一二日壯熱氣促煩渴便秘痘粒不發翁仲仁云若非

風寒應過定是氣虛不振愚謂近世佈痘每盛發於君相風木燥金司令蓋非火不發也火鬱發之升陽散火是

必有此二胸腹方可

喉中疔足
聲亦高

已過病所
直傷妙錄
須參之

氣滯正氣加廣皮厚朴 瀉加木香肉果 質弱加坎杰河車 嘔逆加丁香厚朴

參歸鹿茸湯 人參 當歸 鹿茸 黃芪 龍眼肉 炙草

木香散 人參 木香 丁香 大腹皮 桂心 青皮 訶子 半夏 甘草 前胡 赤茯苓

異功散 人參 木香 官桂 廣皮 當歸 茯苓 丁香 白朮 附子 肉桂 厚朴 半夏

荳蔻丸 肉果 木香 砂仁 枯礬 訶子 龍骨 赤石脂

白朮散 四君加藿香木香

七八九日頻用清涼。痘火色既退。漿不能透。或有半漿。頂有箬笠之形。不克充灌。今人多用毒蟲散生用。難冠血

生用同酒漿和服。倘攻起少頃。後呆滯者。須用補託。

伍氏攻發藥用老人牙煨研極細。加麝香少許。每服二三分。名黑靈丹。

右天蟲乃疎表風藥。山甲乃攻經透風藥。一味為末。酒漿服。曰獨勝散。

凡蟲蟻皆攻無血者。走氣有血者。走血飛者。升地行者。降。凡漿足。聲音啞者。不妨。驟喘痰升者。大忌。翁仲仁云。挫

喉聲啞。漿行飽滿。亦無妨。蓋痘漿因熱氣以煉成。必升騰以達頭面。肺位最高。熱上蒸。退肺先受損。是以聲出不

揚。倘喘急扶肚撞胸。乃火毒歸肺。必不治矣。火毒歸肺。幼科每用珠子牛黃膏連之。屬多不效。余遵孫真人

葶藶湯。或仲景葶藶大棗湯。間有效者。肺氣壅遏。苦寒直下。已過病所。故無效。方書以六七日。已前寒戰

屬肺熱。六七日。已後寒戰。屬氣虛。六七日。已前咬牙。屬胃熱。六七日。已後咬牙。屬血虛。亦屬定論。

八九日。瘡塌咬牙。痘不起漿。或灰白。或潤。或癩。危險極矣。速速溫補。亦可望生。翁仲仁云。塌陷咬牙。便實聲清。猶

可治。聲清則上無熱壅。疾聚便實。則腑陽木至盡。所以溫補得效耳。木香散 異功散

八九日。順痘。漿色蒼黃。毒氣惡化。亦云垂成。須謹防護持。挫損流膿。裂血。倘正氣大泄。毒從虛陷。常有不治之患。

斯時預嚼伴母勿懈。使痂壓乾結。肌肉完固。便是全功。若痘已破碎。聲不啞者。毒不陷也。無妨。

伍氏方用芍藥湯 炒白芍 苡仁 茯苓 地骨皮 銀花 百合 山藥 建蓮

十一二日。漸次成痂之際。極好之症。必有咳嗽。或夜暮身熱。世俗幼科。貪云毒氣未盡。緊投苦寒。多有胃減廢食。

釀成痘勞童怯者吾嘗論痘自腎臟骨髓之中由肝主筋心主血脈脾主肌肉肺主皮毛之內外皆由氣血所養
危之時真氣歸裏肺合皮毛是為未傳處位高體清肅從前灌脹成加蒸迫之氣受虧已極氣泄為咳矣况投利
濕下注藥而結痂其上焦已經轉燥若毒仍留伏焉能收靨此斷斷然也再論幼穉陽常有餘陰未克長佈痘至
於結痂一身脂液大損其陰氣告匱可知故暮夜屬陰時為煩為熱者正內經云陰虛生內熱也昔西郊吳氏女
年甫四歲痘係順症幼科調治至漿滿成痂之日忽然煩燥夜熱不寐晨起安然醫用保元及錢氏五味異功加
芍藥與服熱躁益加又更一醫曰毒氣未盡考慎補之故用桑螵蛸暨涼解藥服後躁熱甚而添泄瀉邀余視之
親漿痂形色詢平素起居時日當午即用六味地黃湯一服而安所謂養兵之服此二條人多忽而不究故辨及之
旬朝後嗽大法以甘寒生津胃藥蔗漿麥冬沙參萊豆皮地骨皮甘草玉竹甜杏仁

解餘毒藥全以不傷胃氣為主若用芩連必須酒製翟聶二氏辨之詳矣乎和無奇斷不敗事如三豆飲之屬若
金銀花一味本草稱解毒不寒余見脾胃虛弱者多服即瀉伍氏用連翹飲子亦取平和 痘毒癰瘍熱症十
有七八虛寒者有三甚至骨出腐敗亦有愈者但外科太忌用火煉升藥其診者之法亦如瘍毒須分陰陽耳
瘰癧濕盛生熱強者用苦寒清降以苦能去濕也若阻咽廢食以及穿腮破頰者難治

年長出痘男女慾火已動其初即現膝痛腰痠咽喉室痛欲閉苦辛寒藥必不效驗宜甘鹹寒滋水制火佐以解
毒六七日來痛勢日緩聶氏有參麥清補方余每用錢氏六味加龜膠元參秋石獲效者甚多若敷不肯起頻
吐粘涎者凶 凡惡痘凶危時刻如諸悶症不過三五日已發而縮其危最速總在七日內再若蒙頭鎖喉懸
鏡躑腰紫窠蚕種等為十惡症其袁氏十八惡症今人未嘗齒及如此等痘治之無益徒招怨尤更有糖沙斑
十朝危期又根枝雖好佈於歲內幼小之兒必八九風波不治半漿毒陷之變必斃於十二四之期若能食者
十救一二痘至八九旬日外無漿則裏毒不化必倉啞搔癢痰潮不食眼開條欵難以盡言危期速矣常有忽然

連事片片之痘裂水形如松脂桃膠外露轉眼堆聚內症漸安變凶轉吉更有旬朝內外乾板固如焦鍋巴狀毫
無生氣忽從地角承漿諸處裂縫流臭水漸升頭額堆腫高厚若糊臉名曰發臭毒泄即當補托遲則氣脫
驚

小兒為身
婦所抱則
生機病難
不盡然都
竟有此病

小兒倉猝驟然驚搐古曰陽癇從熱症治古人用涼膈散為主方

按急驚屬陽熱病用涼膈以清膈間無形之熱膈上邪熱逼近膈中絡閉則危殆矣此宜通乃一定之法然必詢
病因察時候治之 幼科以疾熱風驚四治猶可說也吾鄉有高科立方鈎藤連翹木通薄荷前胡枳殼桔梗

加人表散消食多不效驗 驚為七情內應平肝肝病發驚駭木強火熾其病動不能靜且火內寄肝膽火病
來必迅速後世龍膏冬連必加冰麝硝黃取其苦寒直降鹹苦走下辛香通裏斂之閉也如牛黃丸至寶丹紫雪

皆可選用凡熱邪寒竅神迷昏憤者倣此 鈎藤丹皮之屬僅泄少陽膽熱與急驚暴熱內閉之症無益若火
熱劫燥血液苦寒鹹寒不中與也宜用犀角地黃湯之屬 方書有鎮墜金石之藥有攻風劫痰之藥雖非常用

不可不考 驚與厥皆逆亂之象仲景云蛔厥都從驚恐得之 此語凡吐蛔腹痛嘔惡明是肝木犯胃幼醫亂
治束手告罄余宗仲景法每效 慢驚古稱癇其治法多培脾胃理中湯為主方 須辨 有痰嘔吐用南星白附

子六君子湯聲音不出開竅如竹瀝薑汁菖蒲根鬱金之屬 是病皆他病致變其因非一有過飢禁食氣傷有峻藥強灌傷胃有暴吐暴瀉脾胃兩敗其症面青脫身無熱

雖熱不甚短氣骨爽昏倦如寐皆溫補治之惟嘔逆不受乳食溫補反佐薑連 連理湯 錢氏益黃散 錢氏異功散

稱年五角猶大方之五勞雖方書有五臟之分是症夏令為多固從脾胃蓋小兒乳食雜進運化不及切斷乳後果
腥雜進氣傷滯聚致熱蒸於裏肌肉消瘦腹大肢細名曰疳疔或善食或不嗜食或渴飲無度或便瀉白色久延

不已多致凶危宜忌食生冷腥肥凝滯治法初用清熱和中分利次則疎補佐運常有變病治之無效待姪婦
產過自愈者 實有此病 理不可解

夏季霍亂吐瀉通用藿香止氣散 水瀉宜分利四苓散 寒如薑桂 熱用苓連
腹痛宜疎氣調氣用木香青皮有滯加炒香肉厚朴重則加萊菔子枳椇

腹痛有熱用芩芍枳實有寒則用草果砂仁吳萸
吐瀉後能食便反秘結者愈不能食神怯色痿者防慢驚治法調中溫中若有餘熱煩渴甘寒或甘酸殺津故木

瓜之酸制暑通用要藥

春溫風溫

春月暴暖忽冷先受溫邪。繼為冷束。咳救痰喘最多。辛解忌溫。只用一劑。大忌絕穀。若甚者。宜晝夜豎抱。勿倒三四日。夫輕為咳。重為喘。喘急則鼻掀胸挺。

春溫皆久。季伏邪。詳於大方諸書。幼科多有伏邪。治從大方。然暴感為多。如頭痛惡寒。發熱喘促。鼻塞身重。脈浮無汗。原可表散。春令溫舒。辛溫宜少用。陽經表藥。最忌混亂。至若身熱咳嗽。有痰之症。只宜肺藥辛解。瀉白散加前胡。牛蒡薄荷之屬。消食藥只宜一二味。若二便俱通者。消食少用。須將表裏上中下何者為急。施治。

春季溫暖。風溫極多。溫變熱最速。若發散風寒。消食劫傷津液。變症尤速。初起咳嗽喘促。通行用薄荷汁多。連翹。象貝。牛蒡。花粉。桔梗。沙參。木通。枳殼。橘紅。桑皮。甘草。山梔。不用。蘇子。瀉不用。降氣。

表解熱不清用。黃芩。連翹。桑皮。花粉。地骨皮。川貝。知母。山梔。裏熱不清。早上涼。晚暮熱。即當清解血分。久則滋清。養陰。若熱陷神昏。痰升喘促。急用生黃。乃至寶丹之屬。按風

溫乃肺先受邪。遂逆傳心胞。治在上焦。不與清胃攻下同法。吾鄉幼科。當此初投發散。消食不應。改用柴芩瓜。枳實川連。再下奪不應。多致危殆。皆因不明手經之病耳。

若寒疾阻閉。亦有喘急胸高不可。與前法用三白吐之。或妙香丸。

暑熱

暑邪必挾濕。狀如外感風寒。忌用柴葛羌防。如肌表熱無汗。辛涼輕劑。毋誤。香薷。辛溫氣升。熱伏易吐。佐苦降。如杏仁川連黃芩。則不吐。宣通上焦。如杏仁連翹薄荷竹葉。暑熱深入。伏熱煩渴。白虎湯六一散。

暑邪自用辛涼。繼用甘寒。後用酸泄。斂津不必用下。暑病頭脹如蒙。皆濕盛生熱。白虎竹葉。酒濕食滯。加辛溫通裏。

小兒發熱最多。變蒸之熱。頭緒煩不能載。詳於巢氏病源矣。然春溫夏熱。秋涼冬寒。四季中傷為病。當按時論治。其內傷飲食治法。不宜混入表藥。消滯宜用丸藥。潔古東垣已詳悉。

前卷是治法此卷是

溫邪 留肺

熱邪 內陷

毒火 未清

風溫 發疹

見點 悶症

此卷亦是 治痧醫案

痧疹

袁 溫邪痰嗽氣喘肚膨四日不解防發痧 連翹 山梔 牛蒡 杏仁 石膏

汪 痧將退熱未去肺氣不清咳逆無痰 前胡 桑皮 杏仁 橘紅 桔梗 木通 蘇子 象貝

王 痧隱太早咳喘發熱宜開肺氣 薄荷 杏仁 象貝 連翹 桑皮 木通 紫苑 鬱金

某 溫邪發痧不透熱毒內陷深藏上薰肺為喘下攻腸則利皆冬溫火化之症經云火淫於內治以苦寒幼科不

究病本不明藥中氣味愈治愈劇至此為危 川連 黃芩 飛滑石 炒銀花 連翹 甘草 丹皮 地骨皮

將 喘為肺病脹乃肝病因時痧寒熱未解熱邪內陷所致王先生用苦辛酸法極通然浮腫腹痛未減得非經腑

之濕熱留著歟 木防己 石膏 杏仁 大豆黃卷 通草 苡仁 連翹

艾 痧退後伸吟不肯出聲涕淚皆無唇紫肢腫乃毒火未經清解上竅漸閉氣促痰鳴猶是溫邪客氣至此自當

清解務盡其神色自和奈何以畏虛滋肺邪火愈熾矣 川連 元參 杏仁 甘草 黃芩 連翹 桔梗 銀花

王 痧後及暮加喉痛咳 元參 犀角 鮮生地 連翹 花粉 丹皮

邵 咽痛鼻赤唇腫自痢風溫熱化發疹上焦熱熾宜辛涼微苦以泄降 連翹 黃芩 犀角 桔梗 元參 通草

譚 溫邪時癘觸口鼻穢逆進行三焦而為痧疹自赤鼻燥吐蛔瀉蠅津津汗出而喘渴欲飲當與辛苦寒劉河

間法世俗不知愈白發痧但以荆防蟬殼升提火得風颺煽烈莫遏津劫至變矣涼膈去硝黃加石膏牛蒡

張 歲手足煩熱時發赤塊 萊豆殼 捲心竹葉 痘

程 見點若隱若現神倦不寤勢如悶伏表裏俱不宣暢雙解固宜再佐以芳香搜逐使蘊伏之毒透發為主紫

周 熱閉心包絡中目綻口開舌縮兩手撮空發瘧溺通便瀉血分大傷九日險期按法圖倖勉與紫雪丹一錢開

水調緩緩下用茶匙倘得神甦瘧舒方有生機

又 神醒舌絳紫音縮渴飲不已心胞熱閉雖開而在裏脂液已涸古人以心熱消渴多係臟陰現症不可攻奪明

知 鮮生地 竹葉心 元參 和母 銀花露 金汁 先用紫雪一錢

古吳葉 桂天士先生著

錫山華南田岫雲同較

肝腎
濕毒
閉症

蟄初起腰足俱爽。肝腎蠱毒。不得外越。自泛匝舌。繼增喘促。是緊悶不治之症。諸醫僉用石膏大黃等。然則此藥僅通陽明胃腑之壅。未能搜透肝腎至陰之臟。請采醫錢仲陽直訣。毒伏於陰。亦有下奪之法。其製方曰。棗變百祥丸。乃百中望一二生全者。

某毒伏不肯宣透。氣滯血凝。高能起凝成漿。七八險關。診視肉腫瘡枯。神躁不安。議疎利內壅。佐活血透肌法。

○犀角 紫草 炒查 鮮生地 酒浸大黃 紅花 青皮 丹皮 連翹 牛蒡 芽根 笋尖 湯代水

俞發熱五六日。來神煩不寧。腹膨嘔逆。詢知二三日。前眉間見點數粒。狀如麩痞。隨即隱伏不見。乃毒重壅遏。悶

伏景。設或發出。亦屬重險。且甫生六月。胃乏穀食。難進湯藥。擬進紫雪。須少搜其蘊蓄之邪。使其神

高。點雖繁密。根腳綻立。寒涼藥不宜太重。可以維持收功。

龐朝神倦腹痛。點粒繁瑣。地東不清。是時邪毒火兼重。急進雙解法。使大便稍通。六腑氣宣。則痘毒外透。再商

犀角 連翹 牛蒡 酒大黃 紫草 青皮 桃仁 炒查 木通 生石膏 荊芥 笋尖

程成片不立。頂焦黑滯。肝肺毒重。不能起脹。高得化毒。今咳喘交加。九朝難過。

羚羊角 元參 連翹 天蟲 土貝 紫草 丹皮 炒查 銀花地丁湯代水

錢朝雖未發齊。其點形緊密。色澤不潤。重險何疑。今痧未全退。尚宜清解。

犀角 生石膏 炒查 紫草 連翹 牛蒡 赤芍 桔梗 木通

程軀身小氣弱。佈痘繁稠。用藥不宜寒冷。五日後受得補托。可冀有成。

毛身小氣弱。敷發驚風屬虛。人參 炒歸身 炙草 廣皮 炒白芍 炒黃朮

童軀痘形粘着肌肉。不肯起綻高立。兼之繁紅。殼薄。乃時火毒火交熾。而元氣素虧。體質。目今六日前。時癩未徹。宜

先清解。活血提頂。希冀毒毒分成地界再究。犀角 羚羊 元參 丹皮 炒查 秦皮 紫萸草 銀花

鄭痘發猶然身熱。咳嗽。乃風溫入肺未解。診其點粒粘着不爽。溫邪鬱滯。氣血更體質素虛。宜開肺氣以宣之。活

血以疎動之。其形色元長。若一進沉降。恐無好音。連翹 桔梗 紅花 牛蒡 甘草 丹皮 雞冠血

又 昨進輕揚提頂活血。痘形頗長。所嫌色不光潤。逢鬆盤奩。有乾塌無漿之慮。今明時氣將解。氣血用事。况正欲

納穀。苦寒不但冰伏毒氣。更防大傷胃口。古人於重症更加詳慎者為。此 川芎 當歸 天蟲 桔梗 甘草

又六進和氣血法。形色畧潤。究不肥綻。焉得起脹成漿。議進十宣散法。 人參 川芎 當歸 丹皮 桔梗 甘草

張朝船小重載。難許全功。勉議進雞鳴散二分。 天蟲 桔梗 紅花 白芷 甘草

陸軀點雖不密。色滯形痿。痰多嗔逆如嘶。是痘雖發出。毒猶在內。上冲心肺。故有喘咳不甯之象。進涼血透毒法。

朱朝炒黃米 炒山查 紅花 笏火 羚羊 桔梗 甘草 紫草 丹皮 川貝 連翹 元參 射干 天蟲 西牛黃分

又軀身小痘多。元氣最薄。胃腑未納。穀味湯藥太過。須慮嘔泄。宜少少與藥。扶過八九風波。方得平安。

川芎 炒當歸 桔梗 甘草 黃米 雞冠血

又軀薄嫩無漿。仍宜內托。 黃芪 防風 歸身 川芎 紫草茸 丹皮 天蟲 桔梗 甘草 雞冠血

宋軀顧頰形似紅沙。餘痘乾枯不潤。昨進清毒活血。續發點子盈千。仲仁謂毒重難開。氣血乾焦。退縮。今五朝形

象。僅似初齊。痘似十二日為常數。已經壅遏未發三日矣。當此質薄神弱。恐難延多日。即或望其堆沙發臭。然必

在旬日以外。目下總以解毒清涼。八九波濤洶湧。恐難人力穩全。

犀角 羚羊角 川連 炒查 土貝母 紫草茸

吳半朝痘子分顆。原屬純正。所嫌色滯乾枯。防八九癢塌。涼藥兼以活血。是為平準方法。看守勿懈為上。

羚羊角 丹皮 連翹 炒查 紫草茸 黃連 元參 天蟲 生地 雞冠血

孫 肌柔白嫩。體質是虛。但佈痘必由時癘感觸。地中六氣。咸從火化。癘固客氣。相混氣血。若非清解。何以透達。今

視色油紅。按形鬆爽。法再視面部。肌肉先腫。痘形未具。起脹之象。體症未為合局。慮進銳退速。清涼解毒。佐以提

頂在五六日之法。然險症變遷不一。未可以經常定論。 羚羊角 連翹 丹皮 天蟲 生甘草 紫草茸 川連 炒查 桔梗 銀花湯煎和入雞冠血數滴

汪軻痘形發壞成片色紫滯乃火毒重險症藉身大氣旺扶持十日險關其於矣堆沙庶幾可以圖倖

犀角 羚羊角 桔梗 炒查 連翹 天蟲 紫草茸

又軻雖血熱毒重猶幸八齒體堅急清解活血莫令痰阻廢食扶持堆沙可望向安。照前方去石膏地丁天蟲牛旁加川連元參土貝

查 痘子成發濕氣纏於皮毛與熱氣相蒸內應乎肺發出草痘疹宜忌葷腥輕清理肺淡滲消其濕熱驗其體質

最慎慎勿過劑。以仁 茯苓 連翹 地骨皮 通草 桑葉 白沙參 甘草

顧 痘發由絡其毒不化而轉陷亦歸於絡當世畧曉攻補而已讀古人書辛香溫煦乃治毒陷大法

人參 肉桂 炙草 丁香 厚朴 訶子皮 廣皮 木香 前胡 茯苓

徐 未納穀食但以湯藥所以滑泄不止頭仰胸突擁痰身熱肺熱未清不可驟補翁仲仁有泄瀉安甯太虛少毒

之議姑以和中清咽再商 桔梗 甘草 炒歸 川芎 廣皮 炒查 炒黃米湯煎 沖難冠血

又軻身小痘密氣弱難任雖清漿三四防護宜慎八九日不致損破可以有成

人參 黃芪 炙草 紫草 天蟲 廣皮 川芎 歸身 厚朴 炒查 加炒冬米

孫朝七色嬌皮薄漿汁未灌緣身小痘多氣血交虧不能運毒化漿八九日期最有癩塌之慮扶過十二朝無變庶幾

可望有成進參歸鹿茸湯法 人參 歸身 鹿茸 生黃芪 炙草 廣皮 厚朴 煨木香

又軻照前方加肉菓炒冬米

又 漿清四五不能充灌因元氣微弱不振不能煨煉毒氣成漿恐有內陷之慮再進補托莫其堆沙或可回春

人參 黃芪 廣皮 炙草 木香 鹿茸 歸身 肉菓 坎炆 官桂

又軻三營痲甚薄中凝血跡兼之倉逆帶嘔食入使有不化之形此虛中有毒非純補純清之症

炒川貝 炒銀花 茯苓 以仁 甘草 地骨皮 方太輕耳

楊軻關塌瀉陷漿色白滯不凝謂之氣衰毒陷所冀堆沙如食一線機耳 人參 黃芪 炙草 廣皮 歸身 木香

又軻一漿滿堆沙四肢圓綻但氣弱恐其不肯收斂必資脾利水為法 人參 冬木 炙草 茯苓 新會皮 桂心

又軻三已經堆沙如食都是向安之象使溼滑感皆寒涼傷裏腸中脂垢自下當脾胃藥中少佐固陽以久延不已

高胎變症。人參 焦朮 訶子 廣皮 肉果 白芍 木香 炙草 茯苓

又辨六。納食不化。腹脹。便黃白色。要之胃滯當消。脾弱宜補。古稱瘡滿屬氣。氣行滯通。但瘡後虛體。純消蕪惡變症。

○人參 焦朮 炒查 木香 焦麥芽 廣皮 茯苓 澤瀉

鮑叔不外達。毒欲內陷。已經交牙。滑瀉嘔惡。內症諸般。皆屬深畏。二十四總屬險關。瘡子毒氣。元旺莫其

托出。議以陳氏木香散。救裏托毒。人參 木香 丁香 官桂 炒歸身 厚朴 廣皮 肉菓 訶子皮

孫 面腫目溢。頭搖微嘔。肝風離體。乘上逆攻。此乃變驚破展之象。夫相火寄於肝胆。氣斂疽如。宜進涼解毒

倘得微熱。緩仍進穀。方有佳音。羚羊角 川連 鉤藤 石菖蒲 黑山柁 膽星 天麻 連翹

又 肝風熱定。疔蝕亦緩。仍宜清熱解毒。但不可犯胃。羚羊角 連翹 膽星 丹皮 炒銀花 金石斛 茯苓

諸辨三。痘已收靨。然加落太早。恐有餘毒。今瀉止溺短。宜進清涼。佐以分利。生改仁 百合 茯苓 白沙參 炒麥冬

某 已經回加。不宜再進補劑。恐氣血壅滯。致有餘毒變幻。宗翁仲仁清涼以助結毒之法。

黃芩 銀花 川貝 甘草 地骨皮 桔梗 連翹 汶仁

胡辨五。雖然堆沙壓面。咬牙發倉。毒氣未盡。上冲心。肺補清。自在難進。扶過十八日後。難毒尚可療治。若發疔蝕。恐

難全愈。炒麥冬 白沙參 汶仁 川貝 炒銀花 地骨皮

沈辨三。數未元滿。忽然乾涸。即是倒靨。咬牙寒戰。元氣大虧。非峻補難挽。人參 鹿茸 炒當歸 仍當加托藥一二味

程 回加太早。餘毒流走四肢。臂腿腫痛。議活血解毒。連翹 小生地 當歸 赤芍 刺蒺藜 銀花 酒半小杯

吳辨四。嗆咳嘔逆。腹膨。都是餘毒內閉。小便少。大便澀。不得爽。倘再加喘急。便是棘手。必得湯毒外發。可望挽回。

桑白皮 大腹皮 萊豆皮 茯苓皮 飛滑石 生甘草梢

查 疔後發痧。係肺熱未清。宜辛涼佐以解餘毒。連翹 杏仁 桑皮 地骨皮 黃芩 木通 銀花 牛蒡

吳辨四。薄殼回加。毒氣未化。已有疔蝕之患。理進清解餘毒。但勉進稀粥。溼瀉木龍。胃未吐相。脾氣積弱。議以滲利

分清。做古痘毒當利小便意。桑皮 地骨皮 連翹 茯苓 川貝 汶仁 銀花

某 痘未退。加痧火內逼為喘。川連 犀角 連翹 銀花 元參 大貝 丹皮 地骨皮

凡病皆然

諸藥切近
和平之中
又能沉着
變化備前
入之所未
備云其航
而取其純
我即有如
此名家而
不師法偏
拾唐安人
無餘不論
何人不問
盛衰以
石去大黃
種豆毒之
藥大劑灌
死毒當出
症之年狂
死我道全
不知此
等症醫皆
有狗狼之
心也

又 痧火未清 川連 黃芩 山柘 連翹 銀花 杏仁 甘草

沈 薄漿回加毒氣未盡 只宜清肺解毒 炒川貝 茯苓 沒仁 車前 炒澤瀉 炒銀花

徐 謝六疔毒已發 咳哈未止 茄落如麩 肌色晄白 雖屬氣血交虛 但痘後餘毒 未可驟補 議進和脾胃利溼分法 疔

毒宜速調治 恐日久愈虛 致有慢驚之慮 沒仁 川斛 茯苓 百合 廣皮 炒澤瀉

沈 二謝痰喘失音 不嗜食物 晝則稍安 暮夜煩躁 此肺熱未肅 磨耐多日 體氣陽亢陰虧 肝風內熾 突起驚厥 可慮

地骨皮 甘草 生地炭 萊豆皮 炒丹皮 炒川貝 川斛

李 二十納食嘔吐 脾胃不和 肝風內動 肢浮肉腫 治宜培土制木 以緩肝風 莫驚驚疔之患

人參 茯苓 芍藥 生穀芽 藿香 廣皮 半夏麴

馮 二十疔驚粘連 神氣昏昧 元為發泄而之 變幻慢驚 欲脫 此皆穉年陽亢陰虧 蓋明目氣 肝陰之絕 恐難再振

人參 茯苓 歸身 炙草 炒杞子 生白芍 再宜清 芡實 茯苓 建蓮 遠志 炒山藥 五味 木通 丹皮 赤芍 飛滑石

又 三謝陽極則煩 陰涸為躁 皮甚劇 自從陰分設法 血虛和陽為治 人參 熟地 連翹 牛蒡 山柘 甘草

又 點來不爽 頂有水痕 微焦 此時氣傳染 胎毒未發 乃水赤之類 痘耳 連翹 木通 山柘 甘草

印 痘中復感 溫邪口鼻觸入 由中道以佈 及絡脈 目泛失明 左肢不舉 少腹突起 腫滿兩足 皆疾詢知 痘見六日

陡然頭搖煩躁 而得小便淋漓 大便漸塞 乃厥陰肝熱 疔癩 失其疎泄 內風旋轉 腑陽不通 經言暴腫暴脹 皆風

火變動 至於迅速病來 其能食稍運 熱化自可殺 設考古辛散酸泄甘緩三法 難圖腑絡壅結 仲景於厥陰條例

有下之利不止者 死之大戒 議進鹹苦 以通在下 結熱 愚見若此 再與高明商酌 良治

（川棟子 小茴 蘆薈 山柘 橘紅 龍膽草 方諸水七匙 是 不）

自古治痘名家 不啻廿數 各有精確卓識 以補前人之未備 雖各有所偏 實所以相濟也 醫者貴於案詳 書隨 宜施治 安可執偏隅 管見 以應無窮之變 哉 先生治痘 夙稱神奇 觀其案中 寒熱攻補 不膠於一見 如毒水深 伏 氣血壅遏者 藉芳香以搜逐 用紫雪丹 氣滯血凝 毒重火伏者 以酒大黃 石膏 青皮 桃仁 荊芥 犀角 豬尾血 之類 主治 肝肺毒火 不宣 氣血有焦 燔之勢者 用犀角 羚羊 紫草 丹皮 石膏 鮮生地 之類 元氣不支 陽虛獨陷

而見灰白濕爛泄瀉嘔惡等症者用辛香溫煦如陳文仲之法為要氣血極虛而漿清塌瘡全無發症相兼者當峻補氣血用參歸鹿茸湯及坎炁湯之類氣虛莫外乎保元及四君子血虛不離於四物及補血湯又於氣虛血熱者補氣之中兼涼血血虛氣滯者補血之中佐辛香用攻法須分分部位經絡用補法當辨寒熱燥溼過清則有水伏之慮偏熱則有液涸之虞此皆先生採擇先賢之法因人見症而施治可謂善法古者吳夫痘雖以形色辨其吉凶然內症尤為緊要如痘點既起或不慎風寒而營衛凝滯或縱欲飲食而氣機呆鈍以致身熱不食腹膨嘔惡泄瀉漿水不行不究治其病因但執清寒膩補常有凶厄之變亦有痘形雖重若神前安靜飲食二便如常聲音清響調理得宜亦可轉危為安大凡形老而色鮮明者雖甚惡變幻恒少形嫩而色晦滯者雖稀疎變幻恒多表裏相參審症的確然後設法處治方無貽誤至於逆症條款已現雖自昔名醫亦莫能挽救小兒夭枉者不可勝數深可憐憫邇年以來幸有種痘一法盛行於世每員可挽回造化凡有小兒者俟週歲後即可選用種痘之苗引而發之百不失一此誠補痘科之未備而為最上一乘之法也正痘有先賢諸成法避險有種痘之良方痘症於是乎大全矣

陸履安痘之發也一由乎胎毒內伏一由於外感時邪之氣引導而出其症之順逆若內毒輕而外感之氣亦輕者痘必稀疎此為順症若內毒輕而外感之氣重者慮其遏阻不齊不易灌漿若能至灌漿則時邪漸退後易收功此為先重後輕症若內毒重而外感之氣亦重者慮其灌漿已後毒難盡洩不易收斂當加忍發痘毒疔蝕之患此為先輕後重症若內毒重而外感之氣亦重者痘必稠密色不鮮澤發熱見點之後一路踏踉難以收功此為逆症然胎毒之輕重人皆易明若外感之氣人莫能曉夫天地間祇有六氣氣平則為和氣不平則有勝復勝復至極則為癘氣為瘟疫氣瘴氣更有道塗中穢濁氣人若感之不拘老幼俱病今出痘所感之氣則異乎是此氣獨與未洩胎毒之小兒兩相感觸未聞痘症盛行之時已出過痘之兒亦染病患也考是氣自古迄今從未有人申說明白確定為何氣故前賢於痘症一科未嘗不殫心瘁慮立論者方因不明其氣之源不無偏執之弊有言於寒瀉者有言於溫托者有先用寒瀉而後用溫補者有先用溫托而後用清火解毒者更有不審見體之虛實寒熱俱宗費建中救偏瑣言每於發熱見點時緊用大黃石膏黃連犀角羚羊茅根蘆根等不知費氏之書名為救偏乃救慣用執藥

道法使人
人能知之
人人能行
信而為之
全法不少
仁人之言
其利溥哉
然有命焉
信不信之
終不信之

此等嗜利
之徒害人
不少并今
世人進種
痘法亦不
信矣

之偏耳。若不偏而宗其法則不偏者反至偏矣。嬰兒之命其何以堪。幸古有種痘良法相傳至今。其法簡易靈驗。至穩至當。蓋正痘因外感時邪而發。種痘則種於無病之時。故所出稀疎。較輕者不過幾十粒。此豈非避厄就安之妙法乎。倘愚人不信。何不將自出與種出。彼此相較。其理自明。假使一村之中。有百兒出天花。未嘗不延醫服藥。若能八九十收功。人或稱為太平痘矣。其有竭力調治。而損傷幾及一半者。不聞其歸咎於醫生。惟有委命於天而已。今若種百兒之痘。設或損傷四五個。則必責罰種師。并不容其托足於此一村矣。人何篤信醫生。而不相信種師耶。與其委命於天。孰若以人功挽之。以此相較。則當種與不當種。自決矣。至於種法。全在乎好苗。夫苗者即取他兒之痘痂也。必要用種出之痘落下之痂。謂之種苗。此苗之中。毫無天行時毒之氣。在內故放心可用。若自出天花之痂。謂之時苗。此苗之中。有時行之毒。若不辨而用之。名雖為種。實與傳染他兒天行時痘之氣無異。此時苗之不可用也。然種苗之內。尚要揀擇。必取痘粒稀少。其色紅潤。灌漿濃厚所結之痂。厚實光澤。尖圓者。此氣血充足。陰陽合德。上好之苗也。俟痂落下。用紙包好。記明何日收得。收貯新磁瓶內。緊護其口。置清涼之處。勿觸穢熱之氣。其苗在北方天氣涼。春月之苗。一月之內尚可種。冬月之苗。四五十日尚可種。南方氣溫。夏月之苗。四五月。春月之苗。二十日。冬月之苗。三十日。若延日久。則氣薄無力。恐種不出矣。致有此等種苗。先訪有人家正在種痘之際。向彼明言其故。懇求四五粒。即可源源而種。或平日於同道種師內。相與一二位。志誠老實者。議明彼此互借。則苗亦可不斷。亦有膽大種師。於五六月中。覓家貧壯實之兒種之。不惟不索酬謝。反肯津貼銀錢。次遞傳種三四箇兒。延至七月。則苗亦可以不斷矣。近有種師因種苗已斷。權取時苗種之。往往有種出稠密。棘手重痘者。皆時苗之過也。不知時苗之性。即選上好者。亦必要傳種過四五兒。俱各順當者。其苗性始和平。方能與種苗相等。至於下手種法。尤須詳慎。凡種一兒。用痘痂三四粒。兩兒則用六七粒。放於乾淨茶杯中。傾入清水四五茶匙。用小指尖在內三四攪。則痂已溼。急將水傾去。用柳木杵研。其杵約長四寸。粗如筆管。兩頭要光圓。研十數轉足矣。如痂太乾。加入清水一二滴。切不可太潮。只要研如乾漿糊狀。用彈熟新棉花。捏一小團。如棗核大。兩頭要圓。其長短粗細。量兒鼻孔之大小為之。其綿團不可太鬆。軟鬆則苗氣易往外洩。且見涕則縮小。易於脫出。數綿團。口用一頭。蘸痂末。糊於上。塞口鼻中。

男左女右。塞不可太進。太進則兒不適應。亦不可太出。太出則易於脫落。總要寬鬆。淺深適中。為妙。塞後勿放小兒用手拈出。若被噴嚏打出。急將苗仍塞入鼻。下苗後。以六個時長為度。天氣熱。早取出。數刻。天氣寒。多留數刻。痘苗取出之後。其苗氣漸次傳遍五臟。至七日或八九日。始發熱。發熱三日。而見點矣。此誠至穩。至當之種法也。種痘之苗。不過痘痂一味。今各處種師。說稱痘痂之外。尚要加他藥。為引導者。此係惑人。謊語。切勿信之。既種後。將發熱時。小兒頸項內。男左女右。必發一小塊。狀如痰核。此乃毒氣結聚於此。故痘發文稀。疎。此塊不必醫治。待落痂後。則塊亦漸消矣。若用時苗種者。項中無塊。當以此辨之。又間有驚痘。於發熱時。小兒忽然驚搐。手足踏。不語。目上視。有片時。即平復者。有發一二個時。長者。有發二次者。有發兩次者。總屬不妨。斯時切不可擾動。叫喚。待其自平。即已。不必服藥。預對痘家說明。免其憂慮。以上諸論。皆時下種師之秘訣也。若夫辨兒之可種與不可種。須察兒體之虛實。及有無宿病。若調治之法。當節飲食。適寒溫。防驚嚇。此皆種師俱各明悉。茲不重贅。郭望頤

(痘)

脾胃
虛弱
不和

沈 穉年飲乳進穀。脾胃氣餒。少運。腹膨目翳。是為五疳。夏日中土司令。又病投以補氣。恰令調其脾胃。近日嘔吐。泄瀉身熱。乃寒暄失和。飲食不易化。小溲既少。腑氣不和。余幼科父疎。憶錢氏每以調中為主。而驅邪都主輕法。深慮脾土傷。則延驚癇耳。益智仁與目翳不甚切 焦朮 茯苓 廣皮 藿香梗 厚朴 查肉 澤瀉

張四歲 五疳腹脹數月。法當疎補。人參 茯苓 麥芽 炒查肉 廣皮 半夏 湖蓮

內傷
夾帶
五積

又 照前方去半夏。湖蓮。加澤瀉。陳五歲 官人。自汗短氣。咳嗽。風溫見症。肌腠有痊癩之形。與疹瘡疔病不同。但幼穉生陽。充肺。春深入夏。形質日減。色脈是虛。而補脾。辛甘不應。腹滿按之自爽。一便原得通利。腹痛時發。時止痛。已即能飲食。考幼科五疳。與大方五勞相類。疳必因鬱熱為積。為此飲食不充。肌膚也。病來非暴攻之由。漸再論疳熱。蟲積。古人治肝。治胃。恒多而潔。古東垣於內傷夾帶。每製丸劑。以緩治。取義乎渣質有形。與湯飲異。歧刻下溫邪。擾攘之餘。聊以甘涼之屬。清養胃陰。以化肺熱。其辛氣泄表。不宜進。

做治疴熱羸瘦從陽明厥陰疏通消補兼施

九 人參 黃連 蘆薈 川連子 使君子 茯苓 白芍 廣皮 胡黃連 南山楂

某飲食物不節脾胃受戕腹膨大便不調此屬脾疴 焦朮 茯苓 廣皮 益智仁 大腹皮 木瓜 炮薑
吳欬能食色枯形瘦暮熱泄瀉此皆口腹不慎值長夏夏溫熱脾胃受傷將成五疴 炒神麩

青蒿梗 枳實炭 胡黃連 炒穀芽 炒白芍 炒山查 廣皮 茯苓 澤瀉

五 疴已久脾胃受傷食物不運腹膨瀉瀉此積聚未清中焦先餒完穀不化腫脹成疴難治之疴

七香餅

疴者乾也小兒腸胃柔嫩若乳食失調甘肥不節運化不及停積發熱熱又津乾此因積成疴者也或五臟偏熱或因病後或醫藥悞下致亡失津液脾不輸化積滯不行此因乾致積者也故五疴不離乎脾胃其治法胃滯當消脾弱宜補孰者用苦寒清火冷者宜辛溫健運有蟲者兼用殺蟲之品其虛者各隨本臟補其母總宜九劑緩調不能旦夕速功或用雞肝納入治疴藥燉食最為有效 陸履安
此老幼科症不僱名家可稱大家矣敬服敬服

吐瀉

溫邪 吳 身熱吐乳自利溫邪內擾脾胃穉年防驚 藿香葉 飛滑石

王 未到周歲熱犯脾胃嘔逆下利壯熱不已最多慢驚之變 人參 川連 黃芩 藿香梗 廣皮 生白芍 烏梅

暑邪犯肺交土王用事脾胃素弱不運暑溼腹鳴泄瀉惡心露睛相成慢驚 慢驚二字亦有此名

人參 藿香 炒厚朴 木介 川連 茯苓 炒扁豆 澤瀉

胃陽 傷 章 傷食一症考古用五積散之義取煖使其府熱也既上湧頻吐大便溼瀉胃氣益傷陽氣坐困日甚清不升濁不降痰潮乾嘔腹鳴便遺睡則露睛鬚眉蒼紫小溲竟無陽不流行津液自耗有慢驚昏厥之危讓通胃陽讀

錢氏薛氏之書能知此意 人參 鬱金 炒干夏 炒白附子 茯苓 葛蒲 炒廣皮 炒粳米

又 陽明胃陽受傷腑病以通為補若與守中必致壅逆昨日用方通勝於補獲安幼穉非其虛寒之病

人參 茯苓 益智 廣皮 炒荷葉 炒粳米

又 鼻明汗出。跟血陽明虛胃氣不和不宜涼降。六神湯加炒廣皮

又 面色痿黃。脈形弦遲。湯水食物入咽吐出。神氣憊懣。欲如昏寐。此胃陽大乏。風木來乘。漸延厥逆。俗稱慢脾險

症。幼穉弱質。病延半月有餘。豈可再以疲藥玩忽。宗仲景食穀致嘔者。吳茱萸湯主之。

又 昨用泄木救胃土法。安受不見嘔吐。然中焦陽氣大虛。濁氣上僭。則為昏度。津液不升。唇舌乾燥。豈可苦寒再

伐生氣。今如寐神倦。陽陷於陰。何疑。仲景通陽理虛。後賢錢氏薛氏。皆宗其義。

蘇 周歲幼小。強食腥麪。身不大熱。神氣呆鈍。上吐下瀉。最防變出慢驚。此乃食傷脾胃。為有餘。因吐瀉多擾動正

氣致傷耳。廣皮 厚朴 茯苓 廣藿香 生益智 木瓜

陳 涼風外受。內鬱熱伏。身發癢疹。便解血脈。煩渴得汗。僅解外風。在裏熱滯未和。嗽啞似痛。大便仍有積滯。清裏

極是。但半歲未啜穀食。胃弱易變驚症。少與藥。藿香梗 川連 黃芩 生白芍 淡竹葉 廣皮

余 形神衰弱。瀉泄純白。而癰瘍疳蝕未罷。氣喘痰升。總是損極。今胃虛納減。倘內風掀動。驚恐立至。孰不知因虛

變病也。人參 炒粳米 茯神 炒廣皮 炒荷葉蒂 溫膽湯去甘草 加金石斛薑汁皮血

呂 斗痰中帶血。食已嘔吐。因驚仆氣逆。令胃不和。與黃連溫膽湯。因年弱質法。以金石斛代之。

某 嗽久嘔少食。人參 半夏 茯苓 廣皮 薑汁

某 蚊厥少腹痛。欲嘔。安胃丸

王 畎久瀉兼發瘡。瘡是溼勝熱鬱。苦寒必佐風藥。合乎東垣脾宜升。胃宜降之旨。

人參 川連 黃柏 炙草 廣皮 白朮 神麪 麥芽 柴胡 升麻 羌活 防風

何 十身病入冬。仍腹痛下積。穉年不慎食物。腸胃壅滯。痢久陰傷。身熱發瘡。先與理陰。疎腑滯濁。

敦地炭 當歸炭 山查 炮薑 炙草 茯苓 麥芽

世俗所稱慢驚。謂者有慢脾之名。以其病多屬脾虛。遂說成慢驚。風耳。風者不知起於何代。創是名者。其遺禍於嬰孩。已不啻萬倍矣。蓋就其所指之病而論。如吐瀉兼作。氣怯神倦。虛煩搐搦。痰喘不食。脈虛無神。睡則露睛等症。乃與病名毫不相關。且所指之症。是或由外感未清。或諸病誤治。或飲食失調。或因病後而成。以致吐則傷胃。

奈中本無
急慢若急
驚又當用
至其牛黃
等類盡入
心之藥也

執邪
但發

陰風
入脾

邪通
心胞

執邪
傷陰
動肝風

瀉則傷脾上衰則不生金中虛未必乘越是其肝脾肺胃之病治宜急顧本厥狀上生金安胃和肝滋養腎陽
猶慮弗及若就其名而治之醫家胸中先執慢驚風三字之名概用重墜之藥鎮驚定法或散風清火豁痰破
氣其道稿可勝言哉蓋是症因中土已虛風木已動延久必現出似驚之狀耳實則並非因驚而起也奈何竟
以慢驚風名之豈非指鹿為馬乎要之慢字若以急慢而論則凡病之緩者皆可稱為慢惟驚乃屬急症不可
以慢字加之若以傲慢肆慢而講於病名上又甚荒唐惟願觀幼科者當知其背謬不通勿為其所惑則幸
甚今觀先生案中並未嘗用及驚藥風藥是明徵也此症更當兼參東垣立齋景岳諸法則無遺憾矣 華岫雲

〔痲瘋處〕

周 穉年痲瘋病發迅速醒來二便自通此係陽氣拂逆阻其靈竅姑與清熱宣通方法

犀角 遠志 膽星 黑山梔 元參 菖蒲 連翹 竹葉心

唐叶面青脈濡神甚舌縮不伸語寂寂然痲症四肢皆震口吐涎沫此陰風已入脾絡矣

人參 生木 蜈蚣 全蝎 薑汁炒南星 薑汁炒白附

某 伏邪經閉發熱不解唇焦舌渴春夜神識不清慮其邪陷心胞有痲瘋之虞

化熱液枯 生地 竹葉心 丹皮 元參 麥冬 生白芍

吳 冬月伏邪入春病自裏發裏邪原無發散之理更誤於禁絕水穀徒以冷連枳朮布圍清火消食以退其熱殊

不知胃汁再劫肝風放動變幻痲瘋危病診視舌絳鼻竅黑燥肌膚甲錯乾燥渴欲飲水心中疼執何一泄肝腎

陰液之盡引水自救風陽內燥躁亂如狂此皆緣醫者未曾曉得溫邪從陰裏執為痲請執必以存陰為務耳今延

及一月五液告涸病情未為穩當所恃童真食穀多歲錢氏謂幼科易虛易實望其尚有生機而已

阿膠 生地 天冬 川石斛 雞子黃 元參心

又 鹹潤頗安其執邪深入至陰之地古云執深厥深內涸若此陰液何以上承慮其府融阻咽故以解毒佐之

元參心 真阿膠 真金汁 細生地 天冬 銀花露

又 胃未得穀風陽再熾入暮煩躁防其復厥 生地 白芍 麥冬 金汁 阿膠 牡蠣 金銀花露

又神識昏弱常欲煩躁皆是陰液受傷肝風不息議脈陰和陽生地牡蠣阿膠麥冬木瓜生白芍
又臚中熱燥神躁古載痰多咳嗽皆火刑肺金宜用紫雪丹一錢
小兒癩癩厥本屬險症十中每死二三奈今之患者十中常死六七其故何也蓋緣醫者不察病情概以苓連
鉤藤葛蒲橘紅等夾金石之藥投之以冀清火降痰而已此醫之不善治也而最可惡者尤在病家之父母失
於調治有名為愛之實以殺之之故何也小兒諸症如發熱無汗煩躁神昏語語之或戰汗大汗將止之時
或嘔吐泄瀉之後或痘厥漸醒或便父閉而適然大便或灌藥之後斯時正元氣與病邪交戰之際若能養
得元氣一分即退一分病邪此際小兒必有昏昏欲睡懶於言語氣怯神弱身不轉動之狀此正當養其元神
冀其邪退正復乃病家父母偏於此際張惶驚起因其不語而呼之喚之因其耐睡而頻叫醒之因其不動而
搖之拍之或因微有昏睡而又詳詰之或急欲以湯飲進之或屢問其痛癢之處嗟嘆不已使其無片刻安甯
如此必輕變為重重變為死矣更有乘富家延醫數人問候者多人房中聚集者多人或互談病情病狀反
則多燃燈燭以照之或對之哭泣不已或信巫不信醫祈禱疊興舉家紛擾此非愛之實以殺之也試以大人
之病情體貼之抑好安然寂靜乎抑好喧譁動擾乎此理概可知也予曾見一孩兒患暑溼初起半月有餘
病勢甚重醫者投以蒼朮白虎湯夜半發汗黑黃時身體漸涼汗汗不止默默倦睡口不肯言氣息甚微醫云
六脈安靜並不煩躁此病退之象也因戒其父母切勿擾動直至申時汗止聲出而病已霍然矣可見大人與
小兒諸病總宜安然寂靜為至其調養之法有非筆墨所能罄者惟在病家能細心體會醫者能諄諄告戒勿
以余之言為迂拘則幸甚更有幼孩發熱昏迷手足厥冷脈絡阻塞不出聲藥難下咽斯時惟有請善於
推拿者可便立時甦醒然後再議用藥至於治法癩癩厥本屬三症與大方相類茲不重贅華岫雲

小兒無癩症不另立一門
即癩厥亦僅病中之一症耳

(蟲)

濕熱 陳文瀉傷脾胃失調下注小腸蟲從溺竅而出疔瘻瘰癧不可溫補

又蟲自小便而出經月瀉皆粘膩及不欲食物此非虛寒皆溫蠱內蘊運化失司當苦燥勝溼氣理切穉疳積

黃連 黃柏 茅朮 厚朴 澤瀉 槐角子 木通 使君子 淡竹葉三服散 連肥兒丸

龔文溼熱生蟲腹痛便溼惡食 川連 胡連 生白芍 烏梅 枳實 川椒 炒查 青皮 水法丸

許 腸有濕熱生蟲蟲用苦寒引道小腸 苦楝皮 北秦皮 槐角子 胡粉 黃柏 牡蠣生研末猪肚腸

張斗丹溪云小兒盜汗不須醫以體屬純陽此語太過但不可 汗乃陽泄故也至於瘡多溼熱浮腫脹滿得攻下而

消此六腑以通為補也其小腹痛屢發亦由溼熱生蟲生積當以酸苦泄熱

川連 胡連 生白芍 雞肫皮 炒查肉 蘆薈 枳實 苦楝皮 烏梅肉搗丸

陽明汪六肛滿時腫瀉過白蟲手足陽明熱甚 槐角子 黃柏 榧子肉 生茅朮 檉根白皮 小川連 茯苓 炒地榆 法餅為丸

蟲類雖多其由皆有飲食停滯濕熱鬱蒸化變而成者也凡面色痿黃飲食不為肌膚起伏作痛聚散不定痛

止即能飲食者皆有蟲積或從嘔或從小便秘或從大便而出治法當觀其微甚若蟲勢驟急者當用攻逐之劑

如黑且穢柳大黃胡粉山枝朮之類蟲去則調其脾胃緩者用酸苦泄熱躁溼兼以相制相畏之品如川連

胡連蘆薈苦棟烏梅川椒雷丸蕪荑史君樞肉之類脾胃弱者兼運其脾胃滯者兼消其滯蟲症治法大略如此

陸履安 治蟲有緩治之法其病甚輕而日久當用高九等藥兼補兼消之若病勢危

急者又另有峻厲之方并奇藥秘方可殺蟲去積否則元氣消之不可補救矣

案中所用諸方開載於後以便初學之士查閱

桂枝湯 桂枝 白芍 炙草 生薑 大棗 桂枝加附子湯 即桂枝湯加附子 苓桂朮甘湯 茯苓 白

朮 桂枝 炙草 小建中湯 白芍 桂枝 炙草 生薑 大棗 飴糖 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救

逆湯 桂枝 炙草 生薑 大棗 蜀漆 龍骨 牡蠣 生薑 瀉心湯 生薑 乾姜 半夏 黃芩 黃連

甘草 人參 大棗 甘草瀉心湯 甘草 乾姜 半夏 黃芩 黃連 大棗 半夏瀉心湯 半夏 黃

芩 黃連 人參 炙草 乾薑 大棗 附子瀉心湯 附子 黃芩 黃連 大棗 黃芩湯 黃芩 白芍

甘草 大棗 黃連阿膠湯 黃芩 黃連 白芍 阿膠 雞子黃 旋覆花代赭石湯 旋覆花 代赭石

人參 半夏 甘草 生薑 大棗 炙甘草湯又名復脈湯 炙草 桂枝 人參 麻仁 生地 阿膠

麥冬 生薑 大棗 烏梅丸 烏梅 人參 當歸 黃連 黃柏 桂枝 乾姜 蜀椒 附子 細辛 〇〇日

虎湯 石膏 知母 甘草 粳米 白虎加入參湯 即白虎加入參 ○竹葉石膏湯 竹

葉 石膏 人參 麥冬 半夏 甘草 粳米 ○白頭翁湯 白頭翁 秦皮 黃連

黃柏 大黃黃連瀉心湯 大黃 黃連 ○猪膚湯 猪膚 白蜜 白粉 四逆湯 甘

草 乾姜 附子 ○人參四逆湯 ○即四逆湯加入參 通脈四逆湯 即四逆湯加葱白 更

有隨症加法 ○通脈四逆加猪膽汁湯 即四逆湯加猪膽汁 ○白通湯 葱白 乾姜 附子 ○

白通加猪膽汁湯 即白通湯加猪膽汁 人參 ○承附湯 白朮 附子 甘草 生薑 大棗 ○桂枝附子

湯 桂枝 附子 甘草 生薑 大棗 ○理中湯 人參 甘草 白朮 乾薑 吳茱萸湯 吳茱萸 人

參 生薑 大棗 ○真武湯 茯苓 白芍 白朮 附子 生薑 ○桃花湯 赤石脂 乾薑 粳米 ○麻黃杏

仁甘草石膏湯 麻黃 杏仁 甘草 石膏 小青龍湯 麻黃 桂枝 白芍 乾薑 細辛 甘草 五味

子 半夏 梔子豉湯 梔子 香豉 ○桃仁承氣湯 桃仁 桂枝 大黃 芒硝 甘草 四逆湯 紫

胡 枳實 白芍 甘草 ○白散 桔梗 貝母 巴豆 五苓散 ○猪苓 澤瀉 白朮 桂枝

茯苓 ○猪苓湯 猪苓 茯苓 澤瀉 阿膠 滑石 ○牡蠣澤瀉散 牡蠣 澤瀉 海藻 蜀漆 葶藶

商陸根 瓜蒌根 右仲景傷寒中方

蠶甲煎丸 蠶甲 烏扇 黃芩 柴胡 鼠婦 乾姜 大黃 芍藥 桂枝 葶藶 石葦 厚朴 丹皮

瞿麥 紫威 半夏 人參 塵蟲 阿膠 蜂窠 赤硝 蛻螂 桃仁 煨龜下灰 清酒

千金方有海藻大戟無鼠婦赤硝 白虎加桂枝湯 即白虎湯加桂枝 ○崔氏八味丸 乾地黄 山茱萸 山藥 丹皮 茯苓 澤瀉 附子

桂枝 ○桂枝加龍骨牡蠣湯 即桂枝湯加龍骨牡蠣 ○酸棗仁湯 棗仁 甘草 知母 茯苓 川芎 ○

黃芪建中湯 即小建中湯加黃芪 ○皂莢丸 皂莢 密丸棗膏湯送 ○麥門冬湯 麥冬 半夏 人參 甘

草 大棗 粳米 ○葶藶大棗瀉肺湯 葶藶 大棗 ○千金葶藶湯 葶藶 杏仁 桃仁 瓜蒌 ○瓜

養滋白白酒湯 瓜蒌實 雞白 白酒 赤石脂丸 蜀椒 烏頭 附子 炮薑 赤石脂 附子 粳米湯

附子 半夏 甘草 粳米 大棗 當歸生薑羊肉湯 當歸 生薑 羊肉 甘遂半夏湯 甘遂 半夏

芍藥 甘草 一本無 ○木防己湯 木防己 石膏 桂枝 人參 ○小半夏湯 半夏 生薑 外臺茯苓飲

茯苓 人參 白朮 枳實 橘皮 生薑 ○桂苓五味甘草湯 桂枝 茯苓 五味 甘草 ○越婢湯 麻黃

石膏 甘草 生薑 大棗 防己茯苓湯 防己 黃芩 桂枝 茯苓 甘草 ○大半夏湯 半夏 人參

白朮 ○大黃牡丹湯 大黃 丹皮 桃仁 瓜子 芒硝 ○當湯建中湯 即小建中湯加當歸 ○甘草小麥

大棗湯 甘草 小麥 大棗 ○旋覆花湯 旋覆花 葱新絳 ○腎氣丸 與崔氏八味丸同

右金匱要畧中方

六味地黃丸 即八味去桂附 煎服名六味地黃湯 ○都氣丸 即六味丸加北味 再加附子名附都氣丸 ○

還少丹 熟地 山藥 牛膝 枸杞 山萸 茯苓 遠志 杜仲 五味子 楮實 小茴 巴戟 茯苓

石菖蒲 丹溪滋 大補丸 即還少丹去楮實 ○黑地黃丸 蒼朮 熟地 五味 乾薑 虎潛丸 熟地 虎

脛骨 龜板 黃柏 知母 瑣陽 當歸 牛膝 白芍 陳皮 羯羊肉 ○天真丸 精羊肉 肉苁蓉 山

藥 當歸 天冬 黃芪 人參 白朮 ○三才湯 天冬 熟地 人參 ○天造丸 紫河車 龜板 人參

熟地 天冬 麥冬 黃柏 牛膝 杜仲 ○人參固本丸 人參 天冬 麥冬 生地 熟地 ○天王補心丸

生地 人參 元參 丹參 桑仁 遠志 茯神 柏子仁 天冬 麥冬 當歸 五味 桔梗 石菖蒲

長砂 ○孔聖枕中丹 龍骨 龜板 遠志 菖蒲 ○大補陰丸 黃柏 知母 熟地 龜板 楮香髓 ○滋腎丸

黃柏 知母 肉桂 ○斑龍丸 鹿角膠 鹿角霜 熟地 菟絲子 柏子仁 玉真丸 硫黃 硝石 石膏

半夏 羌汁糊丸 ○來復丹 玄精石 硫黃 硝石 五靈脂 青皮 陳皮 牛膝丸 半夏 硫黃 ○黑

錫丹 黑鉛 硫黃 此方藥味尚多 ○二至丸 冬青子 早蓮草 夏至 ○麥冬白朮散 人參 茯苓 白朮

甘草 山藥 扁豆 苡仁 建蓮 砂仁 桔梗 陳皮 ○玉屏風散 黃芪 防風 白朮 ○四君子湯

人參 茯苓 白朮 甘草 ○六君子湯 即四君子湯加陳皮半夏 ○異功散 即四君子湯加陳皮 ○四獸散

即六君子湯加烏梅草果生薑大棗○六神散 即四君子湯加山藥扁豆薑棗煎○補中益氣湯 人參 黃芪

白朮 甘草 陳皮 雷歸 升麻 柴胡 生薑 大棗○三拗湯 麻黃 杏仁 甘草○葱豉湯 葱白

淡豆豉○川芎茶調散 川芎 薄荷 荆芥 羌活 白芷 甘草 防風 細辛 為末茶調服○霞天膏

牛肉熬膏加麵○防風通聖散 防風 荆芥 麻黃 連翹 薄荷 川芎 當歸 白芍 白朮 山柎

大黃 芒硝 黃芩 石膏 桔梗 甘草 滑石 薑 葱○溫膽湯 陳皮 半夏 茯苓 甘草 枳實

竹茹○十味溫膽湯 即溫膽湯加人參遠志棗仁熟地○逍遙散 柴胡 當歸 白芍 白朮 茯苓 甘草

煨薑 薄荷 本方加丹皮山柎名加味道遙散○六和湯 砂仁 藿香 厚朴 杏仁 半夏 扁豆 木瓜

人參 赤茯苓 白朮 甘草 薑 棗○養氣正氣散 藿香 紫蘇 白芷 大腹皮 茯苓 白朮 陳

皮 半夏曲 厚朴 桔梗 甘草 薑 棗○駐車丸 黃連 阿膠 乾薑 當歸○越鞠丸 香附 蒼朮

川芎 神曲 山柎○四物湯 生地 當歸 白芍 川芎○張子和玉燭散 歸尾 生地 川芎 赤芍

大黃 芒硝 甘草○歸脾湯 人參 白朮 茯苓 棗仁 龍眼肉 黃芪 當歸 遠志 木香 炙草

生薑 大棗○人參養榮湯 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 白芍 熟地 黃芪 肉桂 五味 遠

志 陳皮 加薑棗○犀角地黄湯 犀角 生地 白芍 丹皮○地黃散子 熟地 巴戟 山萸 茯苓

附子 官桂 石斛 茯苓 菖蒲 遠志 麥冬 五味 活絡丹 川烏 草烏 此後世之活絡丹也 膽星 地龍

乳香 沒藥○附子理中湯 即理中湯加附子○理中安蛇丸 即理中湯去甘草加茯苓川椒烏梅○連理湯

即理中湯加黃連茯苓○治中湯 即理中湯加青皮陳皮○四神丸 破故紙 五味 肉果 吳茱○清暑

益氣湯 人參 黃芪 白朮 蒼朮 青皮 陳皮 神曲 甘草 麥冬 五味 當歸 黃柏 澤瀉 升

麻 葛根 加薑棗○生脈散 人參 麥冬 五味○益元散 滑石 甘草 辰砂○大順散 乾薑 肉桂

杏仁 甘草○四苓散 猪苓 茯苓 澤瀉 白朮○桂苓丸 肉桂 茯苓 蜜丸○胃苓散 即平胃散

合五苓散○加味腎氣丸 即六味丸加附子肉桂車前牛膝○濟川散 黑牽牛 大黃 甘遂 芒硝 郁李

仁 輕粉○道解分清散 川草薢 石菖蒲 烏藥 益智仁 甘草稍 食鹽 茯苓○禹功散 黑牽牛

尚香 薑子調 或加木香 瓊玉膏 地黄 茯苓 人參 白蜜 臘仙加琥珀沉香 ○通幽湯 當歸 升

麻 桃仁 紅花 甘草 生地 熟地 白虎加蒼朮湯 即白虎湯加蒼朮 ○涼膈散 連翹 大黃 芒硝

甘草 山柰 黃芩 薄荷 ○當歸龍薈丸 當歸 龍膽草 山柰 雷連 黃柏 黃芩 大黃 青黛

蓋香 木香 麝香 蜜丸薑湯下 ○左金丸 黃連 吳萸 水泛丸 ○戊己湯 黃連 吳萸 白芍 ○甘露

飲 生地 熟地 天冬 冬冬 石斛 茵陳 黃芩 枳殼 枇杷葉 甘草 一方加桂苓名桂苓甘露飲

河間桂苓甘露散滑石石膏寒水石甘草白朮茯苓澤瀉猪苓桂肉每服五錢 張子和去猪苓減三石一半加

人參乾葛藿香木香亦名桂苓甘露散 ○瀉白散 桑皮 地骨皮 甘草 粳米 ○導赤散 生地 木通 甘

草梢 淡竹葉 紫雪 黃金 寒水石 石膏 滑石 磁石 升麻 元參 甘草 犀角 羚羊角 沉香

木香 丁香 朴硝 硝石 辰砂 麝香 ○清骨散 銀柴胡 胡黃蓮 秦丸 鱉甲 地骨皮 青蒿

知母 甘草 ○二陳湯 半夏 陳皮 茯苓 甘草 生薑 ○二賢散 陳皮 甘草 ○控涎丹 甘遂 大戟

白芥子 ○滾痰丸 青礞石 沉香 大黃 黃芩 煅硝 白金丸 白礬 鬱金 ○平胃散 蒼朮 厚朴

陳皮 甘草 ○橘半枳朮丸 白朮 枳實 橘皮 半夏 保和丸 山楂 神麩 茯苓 半夏 陳皮

藟子 連翹 ○水陸二仙丹 金櫻膏 艾實 ○桑螵蛸散 人參 茯神 遠志 石菖蒲 桑螵蛸 龍骨

龜板 當歸 ○蠟礬丸 黃蠟 白礬 ○膠艾四物湯 即四物湯加阿膠艾葉 ○柏子仁丸 柏仁 牛膝 卷

柏 澤瀉 續斷 熟地 右汪詒春醫方集解中方 所載古方 ○補陰益氣煎 人參 當歸 山藥 熟地

陳皮 炙草 升麻 柴胡 生薑 ○兩儀膏 人參 熟地 熬膏白蜜收 ○貞元散 熟地 炙草 當歸 ○

玉女煎 生石膏 熟地 麥冬 知母 牛膝 ○理陰煎 熟地 當歸 炙甘草 乾薑 或加肉桂 ○何人

何首烏 人參 當歸 陳皮 煨薑 ○麥附湯 人參 製附子 芪附湯 黃芪 製附子 加生薑 ○青囊

聖龍丸 鹿角膠 鹿角霜 柏子仁 菟絲子 熟地 茯苓 補骨脂 ○聖龍二至百補丸 鹿角 黃精

杞子 熟地 菟絲子 金櫻子 天冬 麥冬 牛膝 楮實子 龍眼肉 已上藥同鹿角熬成膏加入煉蜜

調入後藥末杵合為丸 鹿角霜 人參 黃芪 艾實 茯苓 山藥 知母 熟地 茵肉 五味子 十味

為細末和前膏為丸○梳米半夏湯 梳米 半夏錢氏益黃散 陳皮 青皮 訶子肉 炙草 丁香○和中丸 白朮 厚朴 陳皮 半夏 枳實 炙草 木香○東垣和中丸 人參 白朮 炮薑 炙草 陳皮 木瓜○神保丸 木香 胡椒 乾蝎 巴豆不成方○子和導水丸 大黃 黃芩 滑石 黑豆○脾約丸 大黃 杏仁 厚朴 麻仁 枳實○華蓋散 麻黃 蘇子 桑皮 杏仁 赤苓 橘紅 甘草○石刻安腎丸 附子 肉桂 川烏 川椒 巴戟 羌活 破故 赤石脂 遠志 茯苓 茯苓 蒼朮 山茱萸 杜仲 胡蘆巴 石斛 韭子 小茴 茯苓 鹿茸 柏子仁 川棟子 青鹽 山藥○王荆公妙香散 人參 龍骨 益智仁 茯苓 茯苓 遠志 甘草 硃砂○猪肚丸 白朮 苦參 牡蠣 猪肚一具 劉松石方 威喜丸 茯苓 猪苓 青蠟○交加散 生地 生薑○烏鰂魚骨丸 烏鰂魚骨 蘆花即苦草根 雀卵 鮑魚湯下○三豆飲 大黑豆 赤小豆 綠豆 甘草 水煮萬氏牛黃清心丸 黃連 黃芩 山梔 礞石 辰砂 西牛黃

右景岳全書中方 所載古方及自定之方

已上四部書。諒業醫者必備。故但開藥。品其分量。炮製加減。服法。以及治症。俱未載明。并內有峻利之方。所服不過幾釐幾粒者。須按方查閱。切勿草率。臆度。且不遵古法。不惟無效。反有遺悞。慎之。

清燥救肺湯 經霜桑葉三錢 杏仁七分去皮 麥冬錢二分 石膏二錢 人參七分 阿膠八分 胡麻一錢 甘草一錢 枇杷葉七片去毛 水一碗煎六分食遠服

進退黃連湯 川黃連錢半 乾薑錢半 人參錢半 桂枝錢 半夏錢半 大棗 右進法用本方三味不製水三茶鐘煎減半溫服退法桂枝不用黃連減半或加肉桂五分如上製煎服

當歸桂枝湯 即桂枝加當歸 茯苓桂枝湯 即桂枝湯加茯苓 參歸桂枝湯 即桂枝湯加人參黃芪 人參建中湯 即建中湯加人參黃芪 歸芪建中湯 即建中湯加當歸黃芪

吳茱萸中湯 即理中湯加吳茱萸 人參溫胆湯 即溫胆湯加人參

黃連温膽湯

即温膽湯加黃連

星附六君子湯

即六君子湯加製南星

生脉四君子湯

即生脉散合四君子湯

生脉六味湯

即生脉散合六味湯

養榮湯

即人參養榮湯

六神湯

即陳擇六神散即四君子加山藥扁豆

戊己湯

即四君子湯加陳皮白芍

與前戊己湯各別

苓蘆朮桂湯

只此四味

五子五皮湯

即五皮飲加杏仁蘇子葶藶白芥子藟子

加桂理中湯

即理中湯加桂

子和桂苓湯

即子和桂苓飲

資生丸

人參 白朮 土炒 汶仁 各三

山查 兩

神曲

橘紅 各二

扁豆

蓮肉 厚朴 各一

山藥

茯苓

麥芽 芡實 各兩

桔梗

甘草 炙

藿香 各五

澤瀉

川黃連

白豆蔻 各三

錢半

右製為末煉蜜丸每丸重二錢每服一丸

醉飽後二九細嚼淡薑湯下

聚精丸

黃魚鱈膠 一兩切碎 炒乾

參 八兩馬乳浸隔 湯煮一炷香

右為末煉蜜丸每服八十九白湯下

禹餘糧丸

蛇含石 本草名蛇黃大 者三兩醋煨透

禹餘糧石 三兩醋煨透

鋼銀砂 五兩醋煨透

三物各研極細配入下項藥

羌活

川芎

三稜

蓬朮

白芍

白朮

陳皮

青皮

木香

大茴 炒

牛膝

當歸

炮肉桂 各五

右製為末入前約拌勻神曲糊為丸如桐子大食前或温酒或白湯送下三十九至五十九

最忌鹽一毫不入口否則病發愈甚日三服兼用温和調補藥助之

此方又名大鐵砂丸此方去附子蓬朮

青皮加茯苓葉氏名鐵砂丸

小温中丸

白朮 二 茯苓 兩

並無熱藥 而名温中

陳皮 兩

熟牛夏 兩

甘草 錢

神曲 炒 一

生香附 兩

苦參 炒 五

黃連 炒 五

鐵砂 醋炒 紅研如 飛麩 兩半

為末醋水各半打神曲糊為丸桐子大每服七八十九白朮六錢陳皮二錢生

薑一片煎湯下虛甚者加人參一錢本方去黃連加厚朴半兩忌口病輕服至六七兩小便長甚者服一助始長

繆仲高脾腎雙補丸

人參 蓮肉 炒

山萸 炒

山藥 炒

各一 炒

五味子 炒

各一 炒

橘紅 炒

砂仁 炒 各

車前 炒 洗 巴

戰肉 甘草汁煮

各十二兩肉豆蔻兩補骨脂日炒一助

右為末煉蜜丸如盧而有火者或大感肺熱者去人參肉豆蔻巴

戰補骨脂忌羊肉羊血

阿魏丸 阿魏鐵 鱉甲二兩 黃芪 廣皮 枳實 柴胡 白朮各一 青皮 草果 黃芩 當歸

茯苓各八 白豆蔻鐵 山楂一兩 神曲一兩 延胡 水法丸

又方 阿魏連翹胡黃連山查青皮山稜蓬朮陳皮半夏麥芽厚朴萊菔子甘草

更衣丸 硃砂研 蘆薈研 好酒和丸每服一錢二分

濟生腎氣丸 即八味丸加車前牛膝葉氏用茯苓八兩為君熟地只用四兩 又薛氏濟生丸分量不同

海粉丸 蛤粉 瓜蒌實 杏仁各一 廣皮 紫蘇略二 白朮 土貝母略四 紫苑三兩 木香鐵 煨薑丸

葱白丸 熟地四兩 芍藥 當歸 川棟子 茯苓略二 川芎 枳殼 厚朴 青皮 神曲 麥芽各兩 三稜

蓬朮略一 乾薑 大茴 木香略七 肉桂鐵 用葱白汁丸

又方 人參 阿膠 川芎 當歸 厚朴 用葱白汁丸

安胃丸 烏梅 川椒 附子 桂枝 乾薑各一 廣皮 青皮各二 黃柏兩 黃連鐵 川棟子兩 白芍三兩

人參量加如有邪 再用川椒烏梅湯法丸 一方無廣皮有當歸細辛 輕粉研各三兩 硃砂研飛九兩 真金箔九十片

妙香丸 巴豆三百十五粒 去皮及心膜炒熟研如麩 牛黃 研龍腦 研麝香 研

右各研勻煉黃蠟六兩入白蜜三分同煉勻為丸每兩作三十九

海蛤丸 天冬 瓜蒌霜 海浮石 蛤粉 風化硝 桔梗 橘紅 香附 竹瀝 薑汁 蜜丸

尤菟丸 白朮 羌活 又景岳新方苓朮菟絲丸

局方龍膏丸 即當歸龍膏丸 白蔘黎丸 即一味用山柅湯製為丸用大豆黃卷湯送下

禹餘糧石脂丸 即二味為丸 橘朮丸 即二味為丸 真武丸 即真武湯作丸

歸脾丸 即歸脾湯料作丸 桑麻丸 桑葉 黑芝麻 蜜丸 瀋川丸 即瀋川散

禹功丸 即禹功散 生脈六味丸 即六味丸合生脈散 肥兒丸 景岳全書中有四方 益母丸 此方不一總用益母草膏為君有加四物香附山查者有去山查加阿膠者有加八珍香附砂仁查肉者

山柅 桔梗 甘草 竹葉 水煎服

金鈴子散 全鈴子 延胡索 為木每服三錢酒調服 水煎服亦可

虎杖散 杜牛膝根汁二三兩古方本用虎杖草汁今人當門子麝香研 右將麝香入汁中和勻隔湯燉溫服

葛可父花蓋石散 花蓋石 煨存性研如粉以童便一盞男人入酒少許女人入醋少許煎溫食後調服三錢其

者五錢能使瘀血化為黃水後用獨參湯補之

歸芍異功散 即異功散加當歸白芍 雞鳴散 牛夢子炒香研細臨服加入雞籠冠血五匙狀元紅酒少許調勻以炒荆芥三分煎湯送

通聖散 即防風通聖散 歸芪異功散 即異功散加當歸黃芪

香砂異功散 即異功散加木香砂仁 正氣散 即藿香正氣散

玉壺丹 即扁鵲玉壺丸 治命門火衰 陽氣暴絕 寒水膨脹 却有神效 古吳王晉三先生得異授製法 當宗之 好

硫黃八兩 配真麻油八兩 以硫打碎入冷油內 燉爐上 炭火宜微勿烈 以桑條徐調候 硫溶盡 即傾入大水內 急

掩去上面油水 其色如金 取缺底淨硫 稱見若干兩 仍配香麻油若干兩 照前大候 再浴丹傾 連前共三轉 第四

轉 用真棉花核油配硫若干兩 照前伏候 再浴再傾 入大水內 掩去上面油水 其色如綠 第五轉 用肥皂四兩 水

中同煮六時 第六轉 用皂莢四兩 水中同煮六時 拔淨製硫之油 掩去其水 其色如硫火之紫 第七轉 用爐中炭

灰淋鹽水製六時 第八轉 用水豆腐製六時 拔淨皂鹽之性 第九轉 用田字草出水煎稻田中具葉如田字八月株搗汁 和水煮六

時 臨用研如飛麩 凡淨硫一兩 配炒糯米粉二兩 或水法 或溼搗為丸 每服以硫三分為準 漸加至一錢止開水

同生丹 大黑豆三升用水浸取穀用絹袋盛穀同豆煮熟去豆不用將殼晒乾其汁留用 紅花三兩炒黃色入好酒四兩煎十餘滾去渣存汁聽用 蘇木二兩河水五碗煎汁三碗聽用

大黃為新 陳米醋九斤 右將大黃木一觔入淨鍋下醋三觔微火熬用長木筋不住手攪之將成膏再加醋

三觔熬之又加醋三觔次第加畢然後下黑豆汁三碗次下蘇木汁次下紅花汁熬成大黃膏取入瓦盆盛之大

黃鍋焦亦罐下入後約同磨 人參二兩 川芎 當歸 熟地 茯苓 香附 延胡 蒼朮米泔炒 桃仁

蒲黃略 烏藥二兩 牛膝 地榆 橘紅 白芍 羌活 炙草 五靈脂 山萸 三棱各五錢 良薑

木香各四錢 木瓜 青皮 白木 各三 益母草 兩乳香 沒藥各二錢 馬鞭草 銀秋葵子 錢

右三十味并前黑豆殼共晒乾 木入石臼內下大黃膏再下煉熟蜜一觔共搗千搗為丸每丸重二錢七分

明以前無
水安煎若
木安煎宜
可煎否

靜室陰乾二十餘日不可烘晒乾後止重二錢外以蠟作殼護之用時去蠟調服 一方無毒母草馬鞭草秋葵
子三味并不用蜜醋止用八碗

至寶丹 犀角 鈔 硃砂研水飛

雄黃研水飛 琥珀 玳瑁各一兩

水安息香一兩無灰酒熬成膏如無以早安息香代之

西牛黃五錢

麝香一錢 龍腦一錢

金銀箔各五片

為極細末將安息膏重湯煮入諸藥搜和分作百丸蠟護臨服刮用參湯化下

紫金丹 牛黃 冰片 狗寶 鴉片各六分

廣木香二兩 末人乳丸重五釐金箔為衣

震靈丹 禹糧石 赤石脂 紫石英 代赭石各四兩

上四味作小塊入淨鍋中鹽泥封固候乾用炭十助煨炭盡為度入地出火氣火得二晝夜研細末

乳香二兩 沒藥二兩 硃砂水飛一兩 五靈脂二兩

為末同前四味和勻糯米飯丸宜堅細

四順清涼散 大黃 當歸 芍藥 甘草

各等分水煎服

露蓋散 人參 生姜 水煎

一宿空心隔湯煨溫服 子和桂苓飲 即桂苓甘露飲

七香餅 香附二兩 丁香皮二兩 甘松 鐵益智仁 鐵砂仁 鐵蓬木 鐵廣皮

阿膠 雞子黃湯非黃連向膠湯 河間中滿分消湯 清阿膠丸 蠲痛丹 香連飲 已上五方候考

按先生雖善用古方然但取其法而並不膠柱觀其加減之妙如復脈建中瀉心等類至用牡蠣澤瀉散只取此

二味故茶中有但書用某方而不開明約味者決非盡用板方必有加減之處觀者以意會之可也

論中所述諸方開列於後以便查閱

麻黃人參芍藥湯 桂枝 麻黃 黃芪 炙草 白芍 人參 麥冬 五味 當歸

甘草湯 生甘草 生薑 甘草湯 半夏 人參 甘草 大棗 大棗

調中益氣湯 即補中益氣湯去當歸白朮加木香蒼朮

升陽益胃湯 羌活 防風 獨活 白芍 鉅廣皮 鉅黃芪 二人參 半反 炙甘草 各五錢 柴胡 黃連 各三錢 白朮 茯苓 澤瀉 各三錢 每服三錢 加薑棗煎

桂枝黃連湯 即仲景黃連湯 黃連 桂枝 乾薑 人參 半夏 炙草

溫脾湯 乾薑 肉桂心 熟附子 炙草 枳實 厚朴 各二兩 大黃 錢 用一兩水煎服

橘皮湯 橘皮 半夏 橘皮竹茹湯 橘皮 竹茹 大棗 生薑 甘草 人參

生薑半夏湯 半夏 生薑汁 蒼朮石膏湯 蒼朮 石膏 知母 甘草

滋燥養陰湯 當歸 生地 熟地 白芍 甘草 黃芩 秦艽 防風

蘭草湯 蘭草 即者草頭 水煎服

潔古芍藥湯 芍藥 歸尾 黃芩 黃連 大黃 木香 枳榔 甘草 肉桂

茵根苓連湯 芍根 甘草 黃芩 黃連 芩朮理中湯 即理中湯白朮換芩朮

厚朴三物湯 厚朴 大黃 枳實 厚朴溫中湯 厚朴 陳皮 甘草 木香 草薢 乾薑

茯苓 下瘀血湯 大黃 桃仁 廬蟲 舒筋湯 赤芍 海桐皮 當歸 白朮 各錢 片薑黃 錢

羌活 灸草 錢 水煎薑去渣磨入沉香汁少許食則服

通氣防風湯 柴胡 升麻 黃芪 錢 防風 陳皮 羌活 人參 甘草 各五

元參升麻湯 元參 升麻 殭蚕 牛蒡 連翹 防風 黃芩 黃連 桔梗 甘草

芎歸湯 川芎 當歸 澤朮湯 澤瀉 白朮 首陳四逆湯 附子 乾薑 炙草 首陳

坎炁湯 即坎炁丹 坎炁 人乳粉 熟地 人參 枸杞子 酒釀白蜜同煉搗丸米飲送

補血湯 黃芪 當歸 黃連竹茹橘皮半夏湯 黃連 竹茹 橘皮 半夏

左歸丸 熟地 山藥 枸杞 山萸 牛膝 羌活 鹿角膠 龜膠

右歸丸 熟地 山藥 枸杞 山萸 羌活 杜仲 鹿角膠 當歸 肉桂 附子

金剛丸 草薢 杜仲 肉從蓉 羌活 杜仲 鹿角膠 當歸 肉桂 附子

四斤丸 木瓜 天麻 茯苓 牛膝 附子 虎骨 或加乳香沒藥

柏子仁丸 柏子仁 人參 白朮 半夏 北味 牡蠣 麻黃根 麥麩 棗肉丸

五仁丸 火麻仁 郁李仁 柏子仁 松子仁 桃仁

指迷丸 茯苓 即指迷茯苓丸 清六丸 滑石 甘草 紅曲

藥本 青皮各三分 羌仁二分 黃柏一分

蘇合香丸 蘇合香 安息香 犀角 水片 射香 香付 木香 蕙蔭香 沉香

丁香 白木 煉蜜丸 硃砂為衣 外作蠟丸

五痢丸 硃砂 真珠 雄黃 水銀 黑鉛 煉蜜丸 如麻子大 每服三四丸

硃砂安神丸 硃砂 黃連 生地 當歸 甘草

人參丸 人參 茯苓 茯神 棗仁 遠志 益智仁 牡蠣 硃砂 棗肉丸

茯苓丸 茯苓 芩絲子 建蓮 酒糊丸 或加五味子

芥子丸 芥子 鹿茸 肉桂 牛膝 芩絲子 熟地 當歸 巴戟 杜仲 石斛 肉桂 炮薑

濟生固精丸 牡蠣 芩絲子 韭子 龍骨 北五味 桑螵蛸 白石脂 茯苓 五味 杜仲

烏雞煎丸 烏骨雄雞一隻 烏葯 蛇床子 丹皮 白朮 人參 黃芪 各一茅朮 一兩半 海桐皮 紅花

白芍 肉桂 附子 炮去 川烏 炮 莢朮 陳皮 略二 熟地 洗 炮 延胡 木香 肉蓯 草果 琥珀 各五

右細到以烏雞湯燉去毛及腸雜將上藥納雞肚內用新磁瓶以好酒一斗同煮令乾去雞骨以油單盛焙乾

為末煉蜜和丸如桐子大每服三十九丸隨症用湯引下

公蛇丸 即理中安蛇丸

侯氏黑散 菊花 白朮 防風 桔梗 黃芩 細辛 茯苓 牡蠣 人參 礬石 當歸 乾薑 川芎 桂枝 為散酒服

雞金散 雞內金 沉香 砂仁 陳香 陳皮 天水散 即六一散

本事方神效散 白海浮石 蛤粉 蟬蛻 為細末用大鯽魚膽七箇調服三錢

人參敗毒散 人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 桔梗 茯苓 甘草 枳殼 薄荷 生薑 瓜蒂散 瓜蒂 赤小豆 香豉

蒼耳散 白芷 薄荷 玉莢 蒼耳 為末煎茶湯調服

聖濟透關散 雄黃 猪牙皂莢 藜蘆 等分研末先含水一口用藥吹鼻即吐去水 備急如聖散 有白礬等分

花蕊石散 花蕊石四兩 硫黃一兩 研細泥封瓶赤服一錢重便下 失笑散 蒲黃 五靈脂

五積散 白芷 陳皮 厚朴 當歸 川芎 茯苓 桔梗 蒼朮 芍藥 枳殼

半夏 麻黃 乾薑 肉桂 甘草 薑 葱

牛黃膏 牛黃二錢 硃砂 鬱金 丹皮 錢 三 承 斤 錢 甘草 錢 煉蜜丸如桐子大每服一九新水化下

三才封髓丹 天冬 熟地 人參 黃柏 砂仁 甘草

一炷丹 河車一具 人乳粉四兩 秋石四兩 紅鉛五錢 蜜丸每丸重七釐

琥珀黑龍丹即黑龍丹 當歸 五靈脂 川芎 良薑 熟地各二兩到碎入砂鍋內紙筋益泥封固火煨過

百草霜兩 硫黃 乳香各二錢 琥珀 花蕊石各一錢 右為細末醋糊丸如彈子大每用一二丸炭火煨

紅投入生薑自然汁浸碎以童便合酒調灌下

左歸飲 熟地 山藥 枸杞 炙草 茯苓 山萸

右歸飲 即左歸散去茯苓加杜仲肉桂附子

溫胃飲 人參 白朮 炮薑 扁豆 當歸 陳皮 炙草

歸氣散 熟地 茯苓 扁豆 炮薑 丁香 藿香 炙草 陳皮

大和中散 陳皮 枳實 砂仁 麥芽 厚朴 山查 澤瀉

四柱飲 人參 附子 茯苓 木香 六柱飲 即四柱飲加肉豆蔻訶子

五磨飲子 烏藥 沉香 枳榔 枳實 木香 白酒磨服

生鐵落散 生鐵落 清水浸研澄飲水

普濟消毒散 黃芩 黃連 陳皮 甘草 元參 連翹 板藍根 牛蒡 薄荷 殭蚕 升麻 柴胡

桔梗 馬勃 或加入人參 便閉加大黃 清心蓮子飲 石蓮肉 人參 黃芪 茯苓 柴胡 黃芩 地骨皮 麥冬 車前 甘草

七福飲 人參 熟地 當歸 白朮 棗仁 遠志 炙草

胃關煎 熟地 白朮 山藥 扁豆 炮薑 吳萸 炙草

邪從口鼻而入故曰
 上受但春
 溫多時伏
 陰氣春時
 溫氣而發
 非火上受
 之邪也則
 此所謂溫
 邪乃是溫
 風淫溫之
 發於春木
 夏初者也

補臣言

- | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|------|-----|----|----|-----|-----|
| 二陰煎 | 生地 | 麥冬 | 棗仁 | 甘草 | 元參 | 茯苓 | 黃芩 | 木通 |
| 秘元煎 | 人參 | 茯苓 | 白朮 | 炙草 | 棗仁 | 山藥 | 芩實 | 五味 |
| 固陰煎 | 人參 | 熟地 | 山藥 | 山黃 | 遠志 | 炙草 | 五味 | 芎藭子 |
| 保陰煎 | 生地 | 熟地 | 白芍 | 山藥 | 川斷 | 黃芩 | 黃柏 | 甘草 |
| 壽脾煎 | 人參 | 白朮 | 炙草 | 當歸 | 山藥 | 棗仁 | 炮薑 | 建蓮肉 |
| 玉鑰匙 | 馬牙硝半兩 | 硼砂錢五 | 白僵蚕錢 | 冰片錢 | 棗仁 | 炮薑 | 建蓮肉 | 遠志 |
| 蒲黃酒 | 蒲黃一兩炒 | 清酒十爵次之 | 溫服 | | | | | |

〔溫熱論〕

溫邪上受。首先犯肺。逆傳心胞。肺主氣屬衛。心主血屬營。辨營衛氣血。雖與傷寒同。若論治法。則與傷寒迥異。傷寒之邪。留戀在表。然後化熱入裏。溫邪則執變最速。未傳心胞。邪尚在肺。肺主氣。其合皮毛。故云在表。表初用辛涼輕劑。挾風則加入薄荷牛蒡之屬。挾濕加蘆根滑石之流。或透濕於熱外。或滲濕於熱下。不與熱相搏。勢必孤矣。不爾風挾溫熱而燥。清竅必乾。謂水主之氣不能上榮。兩陽相劫也。溫與溫合。蒸鬱而蒙。乘於上。清竅為之壅塞。濁邪善清也。其病有類傷寒。其驗之之法。傷寒多有變症。溫熱雖久。在一經不移。以此為辨。

前言辛涼散風。甘淡驅溼。若病仍不解。是漸次入營也。營分受熱。則血液受劫。心神不安。反甚無寐。或斑點隱隱。即撤去藥。如從風熱陷入者。用犀角竹葉之屬。如從溼熱陷入者。犀角花露之品。參入涼血清熱方中。若加煩躁大便不通。金汁亦可加入。老年或平素有寒者。以人中黃代之。急急退斑為要。若斑出熱不解者。胃津亡也。主以甘寒重則如玉至煎。輕則如梨皮蔗漿之類。或其人腎水素虧。雖未及下焦。先自傍徨矣。必驗之於舌。如甘寒之中。加入鹹寒。務在先安未受邪之地。恐其陷入。易易耳。若其邪始終在氣分。流連者可冀其戰汗透邪。法宜益胃。令水與汗併熱。達腠開。邪從汗出。解後胃氣空虛。當膚冷一晝夜。待氣還自溫暖如常矣。盡戰汗而解。邪退正虛。陽從寒泄。故漸膚冷。未火即成脫症。此時宜令病者安舒靜臥。以養陽氣來復。旁人切勿驚惶。頻頻呼喚。擾其元神。使其煩躁。但

辛涼則肺
授長汗解
非如傷寒
之用麻桂
辛溫

論舌黃

診其脈若虛軟和緩雖倦臥不語汗出膚冷却非脫症若脈急疾躁擾不臥膚汗大出便為氣脫之症矣更有邪盛
正虛不能一戰而解傳一二日再戰汗而愈者不可不知再論氣病有不傳血分而邪留三焦亦如傷寒中少陽病
也彼則和解表裏之半此則分消上下之勢隨症變法如近時杏朴苓等類或如溫胆湯之走泄因其仍在氣分猶
可望其戰汗之門戶轉瘧之機括大凡看法衛之後方言氣營之後方言血在衛汗之可也到氣纔可清氣入營猶
可透勢轉氣如犀角玄參於辛等物入血就恐耗血動血直須涼血散血如生地丹皮阿膠赤芍等物否則前後不
循緩急之法慮其動手便蹙及至慌張矣且吾吳淫邪害人最廣如面色白者須要顧其陽氣淫勝則陽微也法應
清涼然到十分之六七即不可過於寒涼恐成功反棄何以故耶淫熱一去陽氣亦衰微也面色蒼者須要顧其津
液清涼到十分之六七往往熱減身寒者不可就云虛寒而投補劑恐爐煙雖灰中有火也須細察精詳方少少與
之慎不可直率而往也又有酒客裡溼素盛外邪入裡裡溼為合在陽旺之軀胃溼恒多在陰盛之體脾溼亦不少
然其化熱則一熱病救陰則易通陽最難救陰不在血而在津與汗通陽不在溫而在利小便便然較之雜症則有不
同也

再論三焦不得從外解必致成裡結裡結於何在陽明與胃腸也亦須用下法不可以氣血之分就不可下也但傷
寒熱邪在裡劫燥津液下之而猛此多濕邪內搏下之宜輕傷寒大便溼為邪已盡不可再下濕濕病大便溼為邪
未盡必大便硬慎不可再攻也以尿燥為無濕矣再人之體腕在腹上其地位處於中按之痛或自痛或痞脹當用
苦泄以其入腹近也必驗之於舌或黃或濁可與小陷胸湯或瀉心湯隨症治之或白不燥或黃白相兼或反白不
渴慎不可亂投苦泄其中有外邪未解裡先結者或邪鬱未伸或素屬中冷者雖有腕中痞痛其從開泄宜通氣滯
以達歸於肺如近俗之杏寇橘桔等是輕苦微辛具流動之品可耳

再前云舌黃或濁須要有地之黃若光滑者乃無形溼熱中已虛象大忌前法其臍以上為大腹或滿或脹或痛此
必邪已入裡矣表症必無或十之存一亦要驗之於舌或黃其或如沉香色或如反黃色或者黃色或中有斷紋皆
當下之如小承氣湯用枳櫛青皮枳實玄明粉生白芍等若未現此等舌不宜用此等法恐其中有溼聚太陰為滿
或寒溼錯雜為痛或氣壅為脹又當以別法治之

再黃胎不甚厚而滑者。熱未傷津。猶可清熱透表。若雖薄而乾者。邪雖去而津受傷也。苦重之藥當禁。宜甘寒輕劑可也。

再論其熱傳營。舌色必絳。絳深紅色也。初傳絳色中兼黃白色。此氣分之邪未盡也。泄衛透營。兩和可也。純絳鮮澤者。胞絡受病也。宜犀角餅生地連翹鬱金石膏蒲等。延之數日。或平素心虛有疾。外熱一陷。裡絡就閉。非葛蒲鬱金等所能開。須用牛黃丸至寶丹之類。以開其閉。恐其昏厥為癎也。

再色絳而舌中心乾者。乃心胃火熾。劫燥津液。即黃連石膏亦可加入。若煩渴煩熱。舌心乾。四邊色紅。中心或黃或白者。此非血分也。乃上焦氣熱。燥津急用涼膈散。散其無形之熱。再看其後轉變可也。慎勿用血藥以滋膩難散。至古絳望之。若乾手捫之。原有津液。此津虧溼熱蓄聚。將成瀉痰蒙閉心胞也。

再有執傳營血。其人素有疲傷。宿血在胸膈中。挾熱而搏。其舌色必紫而暗。捫之溼。當加入散血之品。如琥珀丹參桃仁丹皮等。不爾。瘀血與熱為伍。阻遏其氣。遂變如狂發狂之症。若紫而腫大者。乃酒毒衝心。若紫而乾晦者。腎肝色泛也。難治。古色絳而上有粘脈似苔非苔者。中挾穢濁之氣。急加芳香逐之。古絳若伸出口而抵齒難駛。伸者。疾阻舌根有內風也。古絳而光亮胃陰亡也。急用甘涼濡潤之品。若舌絳而乾燥者。火邪劫營。涼血清火為要。舌絳而有碎點白黃者。當生痞也。大紅點者。執毒乘心也。用黃連金汁。其有雖絳而不鮮。乾枯而痿者。此腎陰涸。急以阿膠雞子黃地黃天冬等救之。緩則恐涸極而無救也。其有古獨中心絳乾者。此胃熱心營受灼也。當於清胃方中。加入清心之品。否則延及於火。為津乾火盛。古天絳獨乾。此心火上炎。用導赤赤散瀉其腑。

再古胎白厚而乾燥者。此胃燥風傷也。滋腎自藥中。加甘草。令甘守津還之意。古白而薄者。外感風寒也。當疎散之。若白乾薄者。肺津傷也。加麥冬化露。磨麻仁等。輕清之品。為上者上之也。若白胎絳底者。溼遏熱伏也。當先泄溼透熱。防其就乾也。勿憂之。再從裡透於外。則變潤矣。初病古就乾。神不昏者。急養正微。加透邪之藥。若神已昏。其內陷矣。不可救藥。又不拘何色。舌上生芒刺者。皆是上焦熱極也。當用青布拭。令薄荷水揩之。即去者。輕旋即生者。險矣。舌胎不燥。自覺悶極者。屬脾溼盛也。或有傷痕血跡者。又問曾輕搔挖否。不可以有血而使為枯症。仍從溼治可也。再有神情清爽。舌脹大不能出口者。此脾溼胃熱。鬱極化風而毒延口也。用大黃磨入當用劑內。則舌脹自消矣。

胎不燥。自覺悶極者。屬脾溼盛也。或有傷痕血跡者。又問曾輕搔挖否。不可以有血而使為枯症。仍從溼治可也。再有神情清爽。舌脹大不能出口者。此脾溼胃熱。鬱極化風而毒延口也。用大黃磨入當用劑內。則舌脹自消矣。

論古淡
無色
論古日如
粉

再古上白苔粘膩。吐出濁厚涎沫者。口必甜味也。為脾痺病。乃溼熱氣鬱。阻礙氣相搏。去有餘也。盈滿則上泛。當用醒頭草。芳香辛散以逐之。則退。若古上苔加鹹者。胃中宿滯。被濁穢鬱伏。當急急開泄。否則閉結中焦。不能從募原達出矣。

若古無胎。而有如烟煤隱隱者。不渴肢寒。知挾陰病。如口渴煩熱。平時胃燥舌也。不可攻之。若燥者甘寒益胃。若潤者甘溫扶中。此何故。外露而裡無也。

若古黑而滑者。水未射火。為陰症。當溫之。若見短縮。此腎氣竭也。為難治。欲救之。加入參五味子。勉希萬一。古黑而乾者。津枯火熾。急急瀉南補北。若燥而中心厚痞者。土燥水竭。急以鹹苦下之。

古淡紅無色者。或乾而色不榮者。當是胃津傷而氣無化液也。當用炙甘草湯。不可用寒涼藥。若色白如粉而滑。四邊色紫縹者。溫疫病初入募原。未歸胃腑。急急透解。豈待傳陷而入為險惡之病。且見此古者病必見凶。須要小心。凡斑疹初見。須用紙燃照看。胸背兩脇點大而在皮膚之上者。為癰。或雲頭隱隱。或瑣碎小粒者。為疹。又宜見而不宜見多。按方書謂斑色紅者屬胃熱。紫者熱極。黑者胃爛。然亦必看外症所合。方可斷之。然而春夏之間。溼病俱發。疹為甚。且其黃要辨。如淡紅色。四肢清。不甚渴。脈不洪數。非虛斑即陰斑。或胸微見數點面赤足冷。或下利清穀。此陰盛格陽於上。而見當溫之。若斑色紫小點者。心包熱也。點大而紫。胃中熱也。黑斑而光亮者。熱勝毒盛。雖屬不治。若其人氣血充者。或依法治之。尚可救。若黑而晦者。必死。若黑而隱隱。四旁赤色。火鬱內伏。大用清涼透發。間有轉紅。成可救者。若火斑帶疹。皆是邪之不一。各隨其部而泄。然斑屬血者。恒多疹屬氣者。不少。斑疹皆是邪氣外露之象。發出宜神情清爽。為外解裡和之意。如斑疹出而昏者。正不勝邪。內陷為患。或胃津內涸之故。

再有一種白痞。小粒如水晶色者。此溼熱傷肺。邪雖出而氣液枯也。必得甘藥補之。或未至火起。傷及氣液。乃濕鬱街分。汗出不徹之故。當理氣分之邪。或白枯如骨者。多凶。為氣液竭也。

再溫熱之病。看古之後。亦須驗齒。齒為腎之餘。齦為胃之絡。熱邪不燥胃津。必耗腎液。且二經之血。皆走其地。病深動血。結於上。陽血者色必紫。紫如乾漆。陰血者色必黃。黃如醬。辨陽血若見。安胃為主。陰血若見。救腎為要。然豆

論婦女淫濕病

脾胃虛寒

辨色者多險。若症遠不逆者，尚可治。否則難治矣。何以故耶？蓋陰液竭，陽上厥也。齒若光燥如石者，胃熱甚也。若無汗惡寒，衝偏勝也。羊淫泄胃透汗為要。若如枯骨色者，腎液枯也。為難治。若上平截潤，水不上承，心火炎上也。急急清水救水，俟枯處轉潤為要。若咬牙斷齒者，濕熱化風，痲病但咬牙者，胃熱氣走其絡也。若咬牙而脈症皆衰者，胃虛無穀，以內榮亦咬牙也。何以故耶？虛則喜實也。古本不縮而硬，而牙關咬定難開者，此非風痰阻絡，即欲作痲症，用酸物擦之，即開。酸走筋，木來泄土故也。

若齒垢如灰糕，樣者，胃氣無權，津亡溼濁用事，多死。而初病齒縫清流血痛者，胃火衝激也。不痛者，龍火內燄也。齒焦無垢者，死齒焦有垢者，腎熱胃劫也。當微下之，或玉女煎清胃救腎可也。再婦人病溫與男子同，但多胎前產後以及經水適來適斷，大凡胎前病，古人皆以四物加減用之，謂護胎為要。恐來害妊，如執極用并底泥，藍布浸冷，覆蓋腹上，皆是保護之意。但亦要看其邪之可解處，用血脈之藥不靈，又當審察，不可認板法。然須步步保護胎元，恐損正邪陷也。至於產後之法，按方書謂慎用苦寒藥，恐傷其已亡之陰也。然亦要辨其邪，能從上中解者，稍從症用之，亦無妨也。不過勿犯下焦，且屬虛體，當如虛怯人病邪而治，總之母犯實，實虛虛之際，况產後當氣血沸騰之候，最多實，邪勢必乘虛內陷，虛處受邪為難治也。如經水適來適斷，邪將陷血室，少陽傷寒言之詳悉，不必多贅。但數動與正傷寒不同，仲景立小柴胡湯，提出所陷熱邪，參棗扶胃氣，以衝脈隸屬陽明也。此與虛者為合治。若邪執陷入與血相結者，當示陶氏小柴胡湯，去參棗，加生地、桃仁、查肉、丹皮，為犀角等。若本經血結，自甚，必少腹滿痛，輕者刺期門，重者小柴胡湯，去甘藥，加延胡、歸尾、桃仁，挾寒加肉桂，心氣滯者加香附、陳皮、枳殼等。然熱陷血室之症，多有謔語如狂之象，防是陽明胃實，當辨之。血結者，身體必重，非若陽明之輕旋便旋者。何以故耶？陰主重，濁絡脈被阻，側旁氣癱，連胸背皆拘束不遂，故去邪通絡，正合其病。往往疑又上逆心胞，胸中痛，即陶氏所謂血結胸也。王海藏出一桂枝紅花湯，加海蛤、桃仁，原為表裡上下一齊盡解之理。看此方大有巧手，故錄出以備學者之用。曹四述去冬，因惱怒時食厚味，遂致不飢，愛氣脫痺，食物不下，視舌上佈苔如粉，不渴飲，大便通調，議從太陰脾陽，為寒痰濁氣凝遏，平溫定法。厚朴、草果仁、薑汁、萹殼、生益智仁、麝皮白。

又前因陽結濁聚，舌胎白厚，不渴飲，用茅草手溫得效。近日食物不消，水穀氣衰，清陽再窒，為嘔，舌胎猶未便。

不來上喘

便血腎弱

虛寒

虛弱反胃

陽結

瘡瘍癰毒

腹痛氣滯

吐血中陽

不達

吐血陰虛

陽升

下白膩如凍肺陽亦衰 今丁香柄 藜蘆

茯苓

生薑杏仁

厚朴

生乾薑

胡二疾走作勞。身前腸腹閉氣上下串痛。交正月寒戰氣衝。呼吸皆阻。腹脹劑上橫梗。有形作痛。自痢已兩月。思勞

必傷陽。春令病加。是木旺侮土。中陽困憊。濁氣充塞。正氣全傷。大肉盡削。述食入逾時必加嘔噎。後天生化之源

大因議急理中土之陽。人參 茯苓 公丁香柄 川椒 烏梅肉 炒番乾薑

潘四中年脈垂入尺澤。按之緩濡。腰椎痠痛。形體即欲偃。旬餘大便必下血。此少壯不慎。腎真先奪。腎脈不司。因

東議用青囊斑龍丸

高一老年逆氣右升。腕阻妨食。涎沫上湧。此屬反胃。夫陽氣結閉。為無形之傷。前藥小效。未幾反覆。以老人生陽不

至耳。人參 生淡乾薑 炒黑附子 猪胆汁

沈廿几坐目注針。少陽氣火上升。陽明氣血因熱拂逆。遂有結癭瘰癧之累。前醫不明解鬱。兩和肝胃之治。致病

日加增。今每日寒熱心燥若裂。經水較前已少。須愈熱熾血乾。且納穀大減。難投重劑。清寒

生鱉甲 牡丹皮 川貝母 香附 穀芽 夏枯草花

楊七食入即飢。心空易驚。經水或歇或至。病起產後。逾年不復。自述多食生冷。據理肝陰久損。不宜驟用溫補。

人參 茯苓 炙草 黃精 龍骨 金箔

顧 腹痛氣上下。行動即縴。從腑陽治。人參 生穀芽 茯苓 煨薑 新會皮 砂仁壳

李八哮喘久發。小溲頻利。此腎虛氣不收納。痰飲從氣而上。初病本屬外邪。然數年混處。邪附臟腑之外。廓散遂焉

得中病。宿哮不發。時用腎氣丸三錢。喘哮坐不得卧。議用開太陽之裏。小青龍湯去麻辛

唐五病是勞傷陽氣。陽衰不主流行。清濁升降。不得自如。是為虛痞之結。內經為勞者溫之。此溫字乃溫養之稱。若

吳萸大熱。開泄仍是攻劑。與勞傷原氣相反。苓桂木甘湯

賈二痰血頻發七八次。形寒妨食。無治痰嗽之理。急扶後天生氣。望其知味進穀。戊巳湯

錢冲冲年陰精走泄。陽無依倚。血隨氣升。色紫成塊。此血出於肝絡。法當鎮補。

人參 炒黑棗仁 炒白芍 炙草 青花龍骨 金箔

咽喉濕邪傷陰

古營陰虛

濕著熱

頭痛肝胃傷

虛勞暑熱傷陰

淋帶陰虛

癩肝火

吐血中陽

姚一述四月患喉喉痺。必係溫熱犯上。溫不盡解。肺津劫燥。喉燥痒啞。防有氣損熱失血之累。甘寒潤劑。不致傷胃。

菘豆殼 麥冬 生甘草 連翹 南花粉 金銀花 蔗漿半杯

又 浮熱上炎。精走泄於下。致陰液陽精不肯上供。望色萎瘦。納食不旺。攝陰恐妨胃口。况初夏曾患喉症。大暑熱泄。陰難生復。先議水陸二仙丹。攝固精關。人參 秋石 芡實 金櫻子膏丸

顧三操持無有不動心神。心陽上引相火交并。燔灼營液。舌為心苗。遂起瘡癩。病由情志不通。非湯藥直清直降可治。議天王補心丹。制伏陽道。營液得以升降自如。然必心境怡悅。方能却病。天王補心丹

李泗長夏時令。溫熱內阻氣分。宗內經澤淫於內。治以淡滲。佐以苦溫。

飛滑石 川通草 淡竹葉 杏仁 厚朴

茹三向來無病。因服地黃丸。反左脇腰中膈氣。或作痛。間有遺精。目暗虛花。或起浮翳。據述用細辛桂枝野退。遂加頭痛。此體質陽虛。誤用陰寒膩濁所致。夫肝主疎泄。腎主綏固。肝宜涼。腎宜溫。納腎佐以通肝。溫下仍佐腎陰。以制木火。是為複方。當歸 小茴 補骨脂 胡桃肉 茯苓 穿山甲 炒黃柏 青鹽

林心色蒼形瘦。稟質陰虛火。元津液不充。喜冷飲。夏季熱蒸。須培生氣。順天時以調理。

麥冬 知母 川貝 地骨皮 丹皮 菘豆皮

項心執顛空。交寅卯帶下。向來陰不足。少陽陽動中虛。食減。靜養至秋涼可望陰充。

人參 柏子仁 丹參 天冬 茯苓 建蓮 龍骨 白薇

曹叶笑則癩厥病發。晝少夜多。魚二月起病。春木正旺。內應厥陰肝臟。木火乃陽極之化。其來迅速。由內而升。神明遂亂。口吐涎沫。四肢寒冷。肝病何疑。由春病及長夏。醒則如無。納食如昔。法以純苦直泄厥陰。踏陽

蘆薈 青黛 龍胆草 川棟子 黑山梔 白芍 青皮 歸尾 猪胆汁

又 前方用純苦。直清肝胆。初服即瀉。病久陰分已虛。議理陰和陽。入酸以約束之。

生雞子黃 阿膠 川連 黃柏 生白芍 米醋

徐二胃減。痰血頻發。上年誤服玄參山梔。致便溲瀉。此受苦滑寒涼之累。人參建中湯

哮喘
氣滯血凝

痰陰虛陽

浮

吐血氣分

熱鬱心脾

吐血勞傷
氣逆

喧囂及胃
開格

產後下焦
陰陽並益

淋帶瘡傷
好熱

虛勞陽虛

鄒五酒客食管窄隘。回有脘痛。今多食即胃。氣阻日久。必致癆癯。食物宜淡薄。以上中二焦宜通氣血治。

桃仁 蒲黃 降香末 蘇梗 香附 橘紅

程六形瘦肌削。稟質偏熱。夏秋病甚。是陰虧不耐暑熱。發泄之氣耳。霜降收肅。令行。浮陽潛伏。陰得自守。病覺稍退。

迷食年疎熱燥不安。其臟陰五液為陽症變疾。非如疫飲。可用陽藥溫通者。

人參 黃肉 川石斛 磁石 淡秋石 胡桃肉 女貞子 旱蓮草

和 痰血上干偏多。氣分熱熾。金石斛 川貝母 桑葉 南花粉 大沙參 知母

單七為母表悲泣。淹淹不食。面黃唇淡。情志不適。生陽鬱室。內經謂思為心疾。鬱必傷脾。病屬無形。非傷食惡食之。

比。穉年調理後。天脾胃為要。佐以開益心氣。人參 茯苓 炙甘草 淮小麥 益智仁 石菖蒲

于 馳騎習武。百脈震動。動則絡逆為痛。血沸出口。納食起居無異平日。非虛損也。凡氣為血帥。氣順血自循經。不

必因血用。沉降重藥。枇杷葉 炒鱉子 生苡仁 金石斛 炒桃仁 降香末

王四望五年。真陽已衰。納食逾二三日。反胃湧吐。仍有不化之形。痰涎濁水俱出。大便漸秘。此關格大症。陰枯陽

結使然。人參 半夏 茯苓 泡浸吳萸 生淡乾薑 夜另服半硫丸一錢五分

蔣三長瀉數年。跣踵足冷。長夏土旺初交。知飢痞悶妨食。述兩三次半產不育。下焦氣微不固。任督交空。本病當以

肝腎奇脈設法。今議先以胃藥。以近日雨後暑溼乘隙侵犯耳。

人參 茯苓 益智仁 砂仁殼 炒扁豆 木瓜

又 連年半產不育。瘦泄。足跣浮腫。前用養胃和肝。非治本病。因暑溼傷而設。議固下焦之陰。益中宮之陽。

人參 禹糧石 紫石英 五味子 菟絲餅 砂仁 用蒸餅為丸

邢 暴怒傷肝。白帶下注。繼而間血。人身衝任督帶諸脈。皆麗身半已下。醫用上中二焦疲藥。焉能圖倖。自言月事

來而漏帶息。初起必少腹腰痛。此內熱。是血絡陰液損傷耳。性嗜酒。酒力先入肝胆。急當禁止。議固脈以攝下。

枸杞 炒黑當歸 白薇 桑螵蛸殼 青花龍骨 生紫石英 煎藥送震靈丹

陸二腰冷膝骨痠。淋濁。溺後莖中空痛。少年未婚。此是勉強勞傷精關。且臥床。必要執賣腰背。虛象大者。艾冬病

遺精勞心損神

泄瀉野腸

謂經奇脈陽虛

調經肝胃不和

產後虛傷神法

瘦黃瘦

痰精血損

瘰癧瘰癧

加間食少胃弱非地黃賦滯知柏瀉陽可投

芫絲子 覆盆子 芡實 沙苑 家韭子 補骨脂 舶茴香 金櫻子 線魚膠丸

王二過用心思營氣日瀉心悸眩暈遺精腰膝下部畏冷陰陽造偏心腎交損議鎮法以固攝溫納

桑螵蛸 人參 茯神 青朮龍骨 金箔 瑣陽 蜜丸

顏病已半年夜寐易醒汗泄自覺元海震動腹鳴長瀉年歲望六不僅經營煩勞傷陽腎真亦漸散越仍議固下

一法人參 赤石脂 禹餘糧 五味子 泡淡乾薑

徐三月事將至尻骨脊推痠痛此督脈循行之位况經水之下必由衝脈產育頻多奇脈失固議治陰中之陽

麋茸 人參 歸身 炒黑小茴 茯苓 川斛

唐二經來一日偶食冷物經水即止遂痞悶不食乳旁堅腫痛脹此是肝氣鬱結蓋經水由衝脈而下衝隸陽明胃

中受冷而衝脈血凝理從肝胃同治 青橘葉 香附汁 漏蘆 蒲公英 厚朴 杏仁

徐二產後未經旬長途馳驅以勞形神歸值母喪悲哀哭泣傷及情志迷肉瞶惕驚恐少寐產傷陽分起見肌肉悉

孰如艾乃陰不攝陽 熟地皮 芡肉 龍骨 茯神 淮小麥 南棗肉

何十三無病時形瘦病發時形充古稱入水之物無物不長陰寒襲入右肢肉瞶筋惕而痛指不屈伸法當通痺塞

以逐留者 川烏炮黑 全蝎炙焦 蜂房炙焦 自然銅五錢 麝香五 炒熟大黑豆淋酒汁為丸每服一

錢陳酒下 肺熱膈消熱灼迅速如火臟真之陰日削先議清肺以平氣大法當苦降以輕鹹補以重繼此再商滋養血液

枯黃芩煎 溶入河膠錢

孫二行走閃挫左腿肢筋弛無力亂盤雜技五六年不愈延及精血內損不司束筋充骨矣猶半年壯冀其生真續

旺藥用平補然必絕欲成勞庶克臻效 虎潛去瑣陽加菴蓉精羊肉膠丸 蠲痛丹每服一錢二分

施六陰寒已入陰股道路深遠湯藥過胃其力已薄抑錮仍在議用許學士法 蠲痛丹每服一錢二分 納食不充肌膚陽傷骨痛陰虛水冷經管作勞勞則氣之經言勞者溫之甘溫益氣以養之 歸棗湯

野風下
不攝

勢未上

濕風溫

痰氣大不
降

虛勞陰虛
陽淨

陽虛濕熱

虛勞皆虛
不攝

陳三操勞動如耳鳴筋脈眩肢麻內起火風皆厥陽之化中年以後男子下元先虛處其什中議填鎮固攝以安身

下合乎上病治下之旨 熟地 玄武版 靈磁石 五味子 山萸肉 炒杞子 天冬 牛膝 青鹽

程八操梅逾期。病由精志鬱傷。虛費不究。病因朝暮更方。病延日久。內經謂二陽之病發心脾。蓋思傷心。鬱傷脾。二

臟有病。不司統血。奔年莫重於經水通調。今經閉半載。嘔吐清涎。腹痛泄瀉。心執皮寒。顯是木鬱乘土。胃口漸敗。生氣為振。病成乾血勞法。考古通經等丸。難施於胃德乏穀之體。姑議安胃和肝。俟秋深時再議。

人參 白芍 川棟子 生淡乾薑 川連 烏梅 粗桂枝 炒蕉歸身

董二風溫溼上受。痺阻氣分。上則咳嗽不得臥息。下則溺少便溼。夫肺主一身之氣化。邪壅則升降不得自如。做經

旨溼淫於內。主以淡滲。佐以苦溫為治。 飛滑石 茯苓皮 白薏仁 竹葉 厚朴 杏仁 蘆根

陳三煩勞氣火多升少降。喉中梗阻。疾出噎氣。凡酒肉皆助熱。疾凝氣分上焦痺塞。

枇杷葉 瓜蒌皮 降香木 杜蘇子 黑梔皮 苡仁

宋四精壯年歲。面色萎黃。氣冲逆。又心悸眩暈。問足跗易冷。間有遺洩。此皆煩勞辦事。心陽過用。暗吸腎陰。下元日

虛。虛風挾陽。旋動不息。全是內損之病。治法取質味疑厚以填之。甘酸以緩之。重以鎮怯。補以理虛。方是培本尋

源之治。 熟地兩 黃肉兩 瑣陽炙兩 茯苓兩 五味兩 龜甲心兩 秋石兩

青龍骨二兩 生研 金櫻膏兩 艾實兩 蜜丸

夏三陰肋白宗筋。肝主之。冷則筋縮。熱則弛長。少壯虛癆。起於長夏。天氣已熱。地中溼蒸。內經病機一十九條例。謂

因溼者大筋與短。小筋弛長。與短為拘。弛長為痿。此雖統論痿症而言。非指痿痺立論。然理亦相通。今逾年不愈。

大暑時。人診得脈象。非下焦陽衰。兩目紅赤。想經管頰亢之勞。陽氣文集於上。與暑熱內迫。加以水穀之溼。溼蘊

化熱。而燥筋致痿矣。法當以苦堅陰。燥以勝溼。介以潛陽。溼去執清。自有愈期。

生虎骨 熟地 蒼朮 黃柏 茯苓 龜版 石決明 天冬

鍾四未及五旬。肉消食減。此未老已衰。身動喘急。足跗至晚必腫。皆是腎真不司收攝納氣。根本先撥。草木微功。難

以振復。 坎炁 人乳粉 五味子 胡桃肉 蜜丸人參湯送下

吐血勞傷
心脾

臨瀉瀉
喘血

虛勞陰虛

痰飲中陽
虛

孤肝腎虛
寒
調經陰虛
熱灼
氣血

虛勞奇脈
陽虛腹痛

淋瀝脾腎
陽衰

王三頰勞曲運神思形與補交傷陽氣旋動絡血何以甯靜甘以緩熱補以益虛必佐甯神鎮怯以攝之固之

人參 柏子仁 炒枸杞 焦歸身 桂圓肉 炙甘草 龍骨肉 茯神 金箔

單 因閃挫脇痛久則滄血絡血氣熱內迫新血瘀逆 鮮生地 藕節 生桃仁 新

暑熱入營舌絡煩渴形脈皆不足怕邪陷神昏

犀角尖 南花粉 連翹心 益元散 淡竹葉 細葉葛蒲汁

程二男子思慮未遂陰火內燄五液日奪孤陽升騰薰蒸上竅已失交泰之義此非外來之症凡陰精殘備務在胃

旺納穀生陰今咽喉鼻耳諸竅又遭陰火之迫寒涼清解僅調六氣中之火而臟真陰火乃閃電迅逝莫遏清寒

必不却病良由精血內空草木藥餌不能生精充液耳

細生地 清河膠 猪春筋 天冬 川石斛

姜二父患胸右有形形瘦畏風怕冷卧則咳嗆痰沫凡治痰飲須辨飲食食少已極議治中宮之陽 苓桂木甘湯

徐 狝疝氣墜 鹿茸 大茴 當歸 沙苑 乾菴蓉 生薑 肉桂 羊固丸

徐以經水未來春木夏初痰血形瘦耳鳴食過如飢飢不納食肝陰不生熱自內灼漸成乾血勞症必要經來可愈

但女工繡針凝眸諦視即動陽生火此大忌 細生地 天冬 柏子仁 丹參 澤蘭 知母

曹 辛温芳香開氣舒鬱嘔出血餅嘔吐頻減蓋氣阻血凝堵塞腕中升降之路而痛自服約以來微微欲飲而大

便結燥知不端於辛温矣 青葱 桃仁 歸尾 麻仁 郁李仁 冬葵子

冬 痰盡噎氣聞嘔此陳腐未掃乃無形之聚用辛考涼滑治之 鮮首頭草 滾水泡湯和入竹瀝 分作三次服

孫二遠腰近劑又痛若空秋深屈冬四肢不暖此由幼年精未充旺早洩既損難復八脈司失是陰損及陽約須達

及奇經可冀漸效 鹿茸 淡菴蓉 已戟 當歸 茯苓 虎膝骨 牛膝 大茴 羊肉膠丸

吳四精濁已行步久無力食冷口吐酸水陽氣微弱治在脾腎

益智仁 家韭子 覆盆子 胡蘆巴 遠志 小茴 兔絲子 金櫻骨丸

王四陽結於上陰泄於下長汗多因腎虛陰傷及陽胃口自備苦畏辛燥不受桂附之猛烈虛腫虛脹先宜固劑

遺精陰虛
陽浮

淋濁陰火

痿精血虛

癆瘵肝鬱

虛勞陰陽
兩虛

暑勝脫熱
開

中風水脹
風動

孤陽氣空

目肝虛

人參 烏龍糧 赤石脂 五味子 砂仁末

周三精造越日。陰火忽冲。神亂向。關筋筋。此陰不戀陽。以補虛鎮攝收斂。辛辛壯胃口不敗。可以全愈。

熟地 黃肉 五味 龍骨 湖蓮 茯神 遠志

邵七望七男子。下元必虛。操持緊思。陽墜八陰。精腐即化紫黑之色。宿者出竅。新復癆結。溺出不痛。非又積宿腐。據

述常飲火酒。酒毒辛熱。必先入肝。腎虛宜溫補。肝宜清涼。閱方用歸脾湯。且非嚴氏法。雜處成方。焉能治此大症。

細生地 清阿膠 黑稽蓋皮 赤芍 丹皮 童便一杯冲入

周十五陽維脈循行外踝。遇勞形。辦事環跳跗骨酸麻而痛。丹溪云。麻為氣虛。蓋年力已衰。不得安養。怡悅。痿論云。意

傷肢欲廢矣。且痛處肉形。癢無腫赤之象。此氣血不布。涵濡筋骨。不足之症。此比然。

生精羊肉 虎脰骨 肉從蓉 枸杞子 沙苑 巴戟肉 牛膝 當歸 川石斛

翁四少腹有形。左脇脹。熱發必肌肉麻木。嘔吐痰沫不爽。此屬肝厥。由乎懷抱抑鬱。不得條達。數載病不肯愈者。為

此 淡吳黃 川棟子 生香附 南山查 青橘葉 牡蠣

何二壯年脈。孔少神。色痿肉瘦。食進不充。形骸不耐煩勞。乃內損也。節欲養精。安神養氣。藥用血肉有情。氣血兼補。

年少望其生振 河車 人參 熟地 五味 山藥 茯神 蓮肉 芡實

宋十吸受暑熱。異氣入表中之裡。為淋痛溺赤。形肥。素有溼痰。議通太陽。

桂枝 木猪苓 茯苓 萆薢 海金沙 寒水石

鄭七夏至陰。生烈然。口渴煩斜。耳竅無聞。此非外來之邪。皆由男子望六。下元已空。下虛則上實。水虧風內起。凡腎

以溫為養。肝宜涼。乃平溫養腎精。必佐涼肝。水中有真陽內蓄。是為命根。蓋胆肝相火內寄。性惡熱燥。用七方中

之複方。熟地 磁石 龜板 丹皮 五味 天冬 枸杞 從蓉 菊花炭 川斛

方以高年宿症不愈。入夏陰囊足跗腹大。乃陰臟之真漸竭。腑中陽氣不行。一派濁陰迷漫。迷二便皆不通爽。明知

老弱久虛。然蒸補必助濁壅塞。議通陽一法。白通湯去葱白。

周五正視一物見二。睨視則石。凡積勞氣洩陽傷。當夏熱氣再大泄。雖曰肝竅開目。實臟真精華會聚之處。當甘滋

肺痿勞傷

產後暴赤

淫濕傷腸
氣

咽陰火

痲精血虛

吐血鬱

暑熱傷心
暑熱傷心
脆

清涼散傷

理虛酸收其散大忌苦降辛開 桂圓肉 枸杞子 炙黑甘草 五味子 山萸肉 菊花炭

俞五父嗽失音飲食仍進自覺海濇無力此是內傷勞倦夏月泄利是暑溼氣感不在本病之例食減肉消治嗽無

益以肺痿論 白芨 生黃芪 炙甘草 以仁 黃精

周二暮勞下元无空咳音不轉必致嘔吐是衝脈虛氣逆上攻薰蒸肺臟延及不飢減食腹痛便瀉乃清內熱泄肺

醫救之候 炒當歸 生白芍 炙草 南棗肉

吳五平昔飲酒夏令再受地溼之感內外溼邪傷陽阻遏氣機流行遂致一身盡腫針刺出水消癰復腫皆由陽氣

已衰水溼無以分遂苟非氣雄通陽陰凝何以走泄所服八味湯僅溫煦腎陰與陽維不合

川烏 附子 生白朮 茯苓 木香 黑豉皮

曹八陰火喉痺 滋腎丸 李四勞必疴墜按之有聲而解是虛而氣乘非因寒也問所服之藥牛屬辛熱不知質偏精血內空法當攝固不必

偏熱偏寒 熟地 茯苓 炒遠志 鱈魚膠 柏子仁 五味子 紫胡桃肉 沙苑子

管六少腹有形六七十漸如脹滿迷臨暮納食夜必腹鳴瘕泄蓋老年坎陽日衰劫土不運濁陰下聚凡冷滯肥臍

食物宜忌勿預家務怡悅情懷以為却病之計若徒恃醫藥非養生之法矣 人參 兔絲子 茯苓 胡蘆巴

柏茴香 上肉桂 補骨脂 砂仁 金鈴子 肉果山藥糊楊丸

吳十脇中刺痛血逆心中漾漾隨嗽吐出兼有嘔惡腹痛此奔年情志鬱勃陽氣多升絡血逆行經水不下恐延乾

血重症 山查 桃仁 柏子仁 丹皮 延胡 益母草

張十二暑入心胞煩熱多驚舌胎黃而不渴 連翹 犀角尖 益元散 大竹葉 石菖蒲 川貝

周四先天稟薄壯盛精氣不足形神勞動陽乃浮越精血皆有形非旦夕可生培養無形元炁可生有形之精血勿

誦讀煩心勿搖精動腎靜養百日壯年可以生復 兩儀煎

孔六頭風傷目是內起之風屢投發散清涼藥不對症先傷胃口做內經辛苦急食甘以緩之

枸杞子 桂圓肉 茯苓 炒熟半夏

肝風化胃

暑濕三焦

虛勞煩勞
陽升

遺精陰火
動

病時虛
婦肝腎陰
虛

癱疔陷厥
陰

濕濕熱

目眩虛受
暑熱

脾胃虛弱
內伏

虛勞心腎
不交

楊一肝風化熱犯胃。惡心痞悶。食入作脹。口渴。議養胃制肝。人參 金石斛 烏梅肉 麥冬 新會皮
施 坐不得卧。胸滿氣喘。暑風溼氣。漫處三焦。太陰膀胱不開。邪鬱生熱。氣痺生腫。先議開三焦氣分之室。

杏仁 白蔻仁 滑石 寒水石 猪苓 廣皮 厚朴 茯苓皮
王六枯槁癆形。操持勞神。男子向老。下元精血先虧。陽失交護。浮越上冒。致耳目清空。語寂不與。凡下虛者。必上實。

此風火非由陰不配陽使然。虎潛丸
李寸肌柔色白。形氣不足。當知識年歲。龍雷突起無制。乾嗆咳逆。情萌不遂。有夢遺精。見熱理嗽。清熱胃減。墮入虛
勞能知命靜養。莫其漸次充復。三才湯加蓮肉。芡實。茯苓。神柏子仁。

姜三痢已八月。久痢自必傷腎。下失收納。據述泄氣。黃通稍爽。非寒膩固滯所宜。用景岳理陰煎。
唐二陽浮汗泄。衄血。皆下焦真陰不充。適值乘龍之喜。與病相悖。議填實下元之陰。制伏浮陽。

熟地 芡肉 五味 女貞子 旱蓮草 茯神 秋石 黑殼建蓮 蜜丸
王三癰邪流入肝絡。蓋舉寐中夢擾。執逼筋骨。夜傷痠痛。正虛邪伏。滋養不效。

生鱉甲 生地 胡黃連 丹皮 黑山梔 青黛
計四酒客內有溼熱。瘍膿初愈。精神未復。小暑泛潮。外溼與內溼併合。致傷脾胃之絡。使血繼以吐血。久延肉消神

倦。然脈絡之溼蒸熱。蘊仍在。此病邪為本。虛為標。非補滯滋所宜。
茵陳 茯苓皮 厚朴 廣皮 海金沙 雞肫皮 大腹皮 查肉 砂仁殼
王六目患。其來甚驟。醫投風藥。寒涼。漸起翳障。眇向。欲遺未泄。已見淋漓。陰虛弱質。暑溼熱氣。直入於陰經。非欲速

易愈之症。石蟹 苦丁茶 金石斛 桑白皮 飛滑石 乾荷葉 夏枯草
顧封竅。實聰慧。當此已有知識。勤請夜坐。陽升則上熱下冷。真陰不能生旺。長夏變幻腹疾。以洩濁。瘴熱論之。乃虛

人暑伏脾胃。議用東垣法。人參 煨葛根 廣皮 黃柏 生穀芽 澤瀉 茯苓 川連
胡三形質偉然。吸氣不入。是腎病。自言心緒少適。六七年久。藥無效。近來納食不運。皮必驚惕。而醒先以兩安心腎。

鎮法理虛。人參 茯苓 龍骨 小麥 炙草 金泊

瘧疾熱

宜肺反胃

瘧疾寒熱

瘧疾熱

胃痛氣滯

瘧疾寒熱

瘧疾寒熱

中風陰虛

顧凡寒溼痺。久則變熱。六氣客邪。悉從火化。邪客軀殼節。熱氣遂蒸。諸賢層膠。癢疹。癢痒。心食酒肉。方可向愈。

羚羊角 犀角 僵蠶 粗桂枝 花粉 白茯苓

錢一中年食入涎沫上壅吐食。此屬反胃。姑以淡薄滋味。清肅上氣。平昔飲酒。惡甜。約不宜重。以損胃。

鮮枇杷葉 杜蘇子 降香 橘紅 蘆根 艾仁

張二上年產後。至今夏經轉。寒涼遂結。氣瘕。自少腹攻至胃腕。脘痛氣結。宜開先用金鈴子散。

延胡 金鈴子 青葱管 山查 生香附 蓬莪朮

沈一平素飲食少用。已見脾胃不和。暑溼熱氣。從口鼻入。暮原受邪。邪氣蒸搏。口舌疳蝕。脾胃胃衝。暑氣凌。速為

瘧潮熱。搦質純陽。微冷熱。勝。當以柳清三焦。蘊伏。而脾胃最為衝要。

飛滑石 大竹葉 杏仁 厚朴 廣皮白 茯苓皮 白菴仁

方三正在壯年。交四月陽氣升舉。忽然跌仆。無知。頭眩肢搐。越可又發。問病因。忿怒所致。大凡病來迅速。莫如風火。

鬱怒由肝胆木火生風。從此而發。癩厥。若僅謂痰火。用辛香燥劑。劫痰利氣。宣竅。厥陽不甯。病豈得減。

龍會丸 每服二錢。四服

陳六酒溼執氣。氣先入胆。溼著胃脘。痰聚氣室。絡血瘀痺。痛在腕。忽映少腹。氣血交病。先和少陽陽明之陽。酒客

惡甜。治以苦辛寒。土萹皮 半夏 枳實 川連 生薑

周五陰虛弱。風溫溼溫。皆在氣分。汗散湯液。邪入心營。神識昏昧。肢節微痠。仲景溼瀉。竭辛於一門。小溼不利。

有三焦阻閉之危。飛滑石 鮮薑蒲根 茯苓皮 川通草 寒水石 廣皮 煎藥化服生黃丸

許四暑溼。自氣室成癥。初起舌白嘔吐。乃大陰脾病。誤用寒涼滋柔陰藥。助其溼邪。引邪入營。古亦不喜家。何從

氣分開其結。遂其溼。依古賢治瘧務在通陽。

茯苓一 圓圍厚朴 草果仁 半夏 新會皮 高良薑 沖入薑汁五分

將 上年久暖少寒。冬不藏固。花甲已外。腎真既虧。水不涵木。肝陽之風。勃然上泛。遂令眩暈。三下。虛上實為厥。

乃及小中之根芽也。此非外來心氣所感。由操持禁思。五志之陽。刻升。煩動在裏。營血肢液暗耗。診脈左尺空弦。

泄瀉寒瀉

便血肝胃不和

痲風溼熱

虛勞虛虛

虛勞陰虛陽升

鬱肝火

風溼上焦溼熱壅閉

痲風經閉

望色浮紅光亮。欲使用力。汗洩。發熱。偏滿立起。則足附骨。赤色。脈見。症顯。明彰。若聞所服諸藥。未參內典。聖訓。首劉河間內經。鼻盲。凡上實下虛。耳鳴。足痿。便溺。竅阻。等證。每以濁藥。清投。名曰。飲子。宗長。議主。治。

製熟地 肉蓯蓉 炒遠志 柏子仁 川斛 天冬 五味 淮牛膝

劉山泄瀉二年。食物不減。胃氣未損。脾陽已弱。水溼陰濁。不易輸運。必須慎口。勿用寒滑厚味。議用暖中佐運法。

生芽米 生於木 炒香免綠子 茯苓

張瀉血八年。腹左有形。梗痛。液耗。渴飲。肝風大震。腑氣開闔失司。洩瀉不利。未可遽投固澇。

茯苓 木瓜 炒白木 炒烏梅 澤瀉 炙草

許風溼熱。燦於經脈。右肢牽掣。邪未驅盡。發為瘡痍。有年。陽明脈空。遂致偏痿。

生黃芪 歸身 防風 丹皮 木防己 黃柏 銀花

沈背寒。鼓慄。而後發熱。二使頗利。並不渴飲。入暮倚枕。氣自下衝。嗆咳不已。脈空大。按之不鼓。肌消神鑠。是煩勞。

抑鬱傷陽。寒執成起。且衰。解時無汗。非外感。表病顯然。溫養營分。立方參入奇脈。宗陽維為病。苦寒熱之例。

川桂枝 鹿角霜 當歸 炙草 生薑 南棗

又進通和營分。兼走奇脈。二劑。寒執已止。而操持煩心。皆屬傷營耗氣。未免滋擾。反覆。經謂心營肺衛。虛。都是上。

損。立方不越。益氣養營。人參 茯苓 廣皮 炙草 炒白芍 當歸 棗仁 生薑

龐久損精神。不復。刻下土旺。立春大節。舌碎。齶腐。陽升陰不上承。食不知味。欲吐。下損及胃。最屬不宜。

人參 炒麥冬 紫衣胡桃肉 熟地 雞子黃 茯苓

褚氣鬱肝。不疎泄。神狂譫語。非是外感。乃七情之病。先進滌痰湯法。

川連 膽星 石菖蒲 半夏 鉤藤 山柃 遠志 橘紅

方風溫上受。心營肺衛皆熱。氣不宣降。則痞脹。熱薰。膈中。則神迷。此上焦客邪。想有酒食內因之溼。互相挾持。七八。

日未能清爽。以施豉湯主之。山柃 豉豉 杏仁 鬱金 姜皮 鮮薑蒲

郭診診脈。左勁似數。右寸虛大。中下虛濡。面色既白。少寐。消渴。納穀最少。經候不至。已十四日。上年夏秋間。頭面肢。

便血肝腎

嘔吐胃脘
虛
海勞傷氣
血痺

火音肺熱

體胃發風診。此屬血液內奪。陽動化風。以和肝清熱得安。今患藏血統血。固在肝脾。必得陽明脈絡充旺。斯海流行稱職。議甘補佐以兩和方意。

人參 炙黑甘草 歸身 赤白製首烏 羌蔚子 酒炒白芍 桂圓肉 小黑稽苳皮

潘下血純用苦寒。幸得補陽救正。陰陽造偏。浮腫咳喘。此藏聚失司。當春升發洩之候。宜通補攝納。治其肝腎。若菘木呆補。恐助濁凝。有脹滿之變。

人參 五味 茯苓 車前 熟地炭 炒歸身 巴戟肉

素 脉濡面赤。呃嘔吐自利。此太陰脾陽受傷。濁陰逆侮。高年不可純消。擬用理中法。

人參 炒黃乾薑 厚朴 薑汁炒 炒半夏

又 中下陽微。呃呃下利。溫中不應。恐延衰脫。夫陽宜通。陰宜守。此關開不致潰散。春回寒谷。生氣有以把握。候王

先生主議 人參 附子 炮薑 炒稷米 赤石脂 生白芍

宋四脉帶瀉。減食不運。腕中常痛。糞後血下如線。按經云。陰絡傷則血下溢。閱前方補陰不應。反滋脹悶。蓋因不明

經營操持。多有勞鬱。五志過動。多令化熱。氣鬱血熱。三焦失於宣暢。若非條達氣熱。高望血止。

於朮炭 枳實炭 鬱金 廣皮 炒焦桃仁 炒白芍 炙草 茯苓

褚 晨起未納飲食。吐痰致嘔。減穀胃陽傷也。由多進知相所致。其苦寒胃先受傷矣。先用小半夏湯加黍米。

席 積勞。氣血凝遏。腕間助瘦。食減。治以宣通脈絡。

桃仁 當歸鬚 鬱金 柏子仁 小胡麻 桑葉 桑芽膏丸

施 丘忽然神迷。逾時自醒。病起一年。頻斃漸近。今診脈細弱。必未資熱。此因憂慮。情志受傷。手厥陰膈中之清真。為

濁涎所阻。內因之病。理難速攻。姑以宣通神明。兼理痰氣為治。

服 鮮菖蒲根 天南星 遠志 竹節附子 茯苓 薑汁 夜服白金丸

徐 呬聲音不宣。痰出鼻竅。上焦肺氣壅塞。經營着急。傷肺。酒熱薰蒸。亦主傷肺。宜辛涼以宣之。薄味以清之。每日

此藥宜服一。此記藥 續前藥 桑葉 杏仁 牛蒡子 甘草 午煎服

及清肝風

燥肺胃津

肝風脾虛

眩肝陽升

風熱風陽
上升

燥熱傷肝

勞傷氣喘

徐仁父病氣血膠結絡中不和攻補皆不去病仿古五積治例每以疏通緩遂為法不必峻劑

雖內金 海浮石 蛤粉 歸鬚 桃仁 半夏 瓜蒌實 枳實 山楂

呂 脈動如數按之不鼓便血自去秋大發今春頻發不已凡夜寐夢泄便血隨至平時身動吸促如喘氣衝咳喘心悸耳鳴足肢痿弱不耐步趨種種見症顯然肝腎直陰五液大傷八脈無以攝固陰既虧損陽無有不傷此滋補原得安受嘗請仲景少陰病治例有填塞陽明一法志謂脂液大去關關皆撤而內風虛陽得以做旋內擾屢投補陽暗風隨至聖人每以填塞其空似與內經腑通為補之義相左然關門不固焉有平期既驗之後再以血肉有情另佐東垣升陽之法安養調攝自有成驗先用方

禹糧石 赤石脂 人參 五味 莢肉 木瓜 蒸餅為丸

李先知曰下焦有病入難會須用餘糧赤石脂以土屬外剛內柔味酸質厚能填陽明空瀉人參益氣生津合木

爪以入胃更味酸收斂液固陰以熄肝風蓋陽明陽土宜濟以柔不用剛燥慮其劫液耳前方用二十日後接服

溫肺膈 鹿茸 家韭子 補骨脂 生克絳子粉 赤白茯苓

暮夜兼進東垣升陽法 人參 黃芪 熟朮 廣皮 炙草 炒歸身 防風 羌活 獨活

吳 辛泄太過肺胃津傷咽乾潤出納氣阻蓋肺為出氣之臟姑進滋養上焦以充化源

生雞子白 玉竹 麥冬 甜杏仁 生甘草

嚴 填陰則陽和風熄雖已獲效春分後診左脈垂尺已減右脈弦恐其熱氣泄有減食神煩之慮早上仍用前方

進戊己法做仲景肝病實脾之意 人參 熟朮 茯苓 炙草 廣皮 白朮

方 飢不欲食氣衝咽噎頭眩寒熱汗泄皆肝陽升動太過若加怒勞恐有暴厥之慮

川連 烏梅 人參 牡蠣 生白芍 炙草

包 熱灼耳鼻諸數昏痒浮陽化風上擾汗多不渴飲此非氣分實火鎮固不應法當攝補

三才散合參麥散主之

葉三四鬱怒致病心胸映背痛甚至氣阻咽嗝呼吸有音吐涎沫又不熱渴由肝病蔓延所傷非一經矣光理上焦與

喘急焦陽

嘔肝犯胃

陰虛肝陽動

逐液潤氣

風溫劫頂

胃汁

肺腸不通便難

脾淺熱內

風溫

苦辛輕劑。鮮枇杷葉 有效 苦杏仁 鬱金 瓜蒌皮 黑山柁
何一臍流穢水。咳嗽腹痛欲瀉。詢知勞動太過。陽氣受傷。三年久恙。大忌清寒。治嗽法。當甘溫以治之。

陸五服。腎氣湯得效。是下焦陽微。致神氣昏昧。吸不得入為喘。溫補收納。一定成法。

姚 脈左弦。肝風犯胃。水穀下咽即嘔。經月不愈。胃氣太虛。泄木必兼安胃。

潘 眉心痛。心中熱。腰脊痠痛。五心皆熱。有產後半載。形消食減。乃下焦陰液大耗。而肝風挾陽震動矣。病自內損。

伍 崩淋已久。少腹結癥。液涸氣墜。辛甘溫潤之補。冀得宣通。勿謂崩症。徒以瀉藥。

任 幼風溫及乎。太陰肺病。阻傷寒足。經不同。輕劑恰合。治上無如辛散消劑。苦寒清火。劫損胃汁。致嬌柔臍肺。一傷

於邪。再傷於藥。氣鬱不行。壅塞喘咳。不飢不飽。此胃氣已逆。旬日以外。當甘涼生胃津。少佐宣降。不宜重劑。

方 脈形濡弱。形寒汗出。頻吐涎沫。三日來。粒不能寐。此胃中虛冷。陽氣困憊。法當溫中。佐以運通。宜道。寒涼斷勿

錢 腑陽不通。肝失疏泄。至腹痛便難。咽阻目赤。此酸苦泄熱。以通陽。數位前賢。龍會遺意。陽和風化。腸垢始下。脈

雖小安。而舌乾少寐。陽明胃汁未充。仍宜甘寒為主。以性躁。肝急。脾胃易虧也。

洪 勞心管耗。風火交熾。飲啖酒肉。淫熱內壅。格虛脈實。肉腫如痺。當此小滿。陽氣大泄。一陰未復。致內風。改陽上

歸身

桑子

杞子

杏仁

麻仁

炙草

麥冬

羚羊

角磨汁

歸身

桑子

杞子

杏仁

麻仁

炙草

麥冬

羚羊

角磨汁

歸身

蘇合

瓜蒌

黑山柁

紫衣胡桃肉

車前

茯苓

熟附

川椒

川棟子

桂皮

烏梅

生白芍

麻仁

炒麥冬

生白芍

茯苓

阿膠

麻仁

炒麥冬

苦杏仁

鬱金

瓜蒌皮

黑山柁

紫衣胡桃肉

車前

茯苓

熟附

川椒

川棟子

桂皮

烏梅

生白芍

麻仁

炒麥冬

生白芍

茯苓

阿膠

麻仁

鮮枇杷葉

有效

苦杏仁

鬱金

瓜蒌皮

黑山柁

紫衣胡桃肉

車前

茯苓

熟附

川椒

川棟子

桂皮

烏梅

生白芍

麻仁

炒麥冬

生白芍

茯苓

鮮枇杷葉

有效

苦杏仁

鬱金

瓜蒌皮

黑山柁

紫衣胡桃肉

車前

茯苓

熟附

川椒

川棟子

桂皮

烏梅

生白芍

麻仁

炒麥冬

生白芍

茯苓

王 顛且目孔竅不清古胎黃厚並不大渴雖與客熱不同但口中酸濁吐痰酒客不喜甘藥謹選滋腎丸
風溫上腫氣室不飢仍從上治

李 活水蘆根 兜鈴 白蔻仁 杏仁 大豆黃卷 生苡仁 乾蟾丸五九
溫溼熱蒸傷脾胃身熱泄瀉 黃芩 生白芍 滑石 猪苓

俞 穢濁纏染口鼻吸受時序雨潮之溼亦屬不正異氣此芳香開氣淡滲利溼一定成法
白蔻仁 藿香根 淡竹葉 杏仁 大豆黃卷 厚朴 滑石

廖 脈細自痢瀉血汗出淋漓昏倦如寐古紫絳不嗜湯飲兩月來悠悠頭痛乃久積勞傷入夏季發泄陽氣胃巔
之微內傷誤認外感頻投苦辛消導大劫津液少陰根底欲撤陽從汗出陰從下泄都屬陰陽樞紐失交之象此
皆見病治病貽害不淺讀長沙聖訓脈細如寐列於少陰篇中是攝固補法庶可冀其散而復聚若東垣草木諸
方乃中焦脾胃之治與下焦少陰無預也 人參 禹糧石 赤石脂 五味子 木瓜 芩草

此仲景桃花湯法原治少陰下痢但考諸本草石脂餘糧乃手足陽明固澆之品非少陰本臟之藥然經言腎
為胃關又謂腑絕則下痢不禁今腎中陰陽將離關闕無有所以固胃關即是攝少陰耳

許 痢症腹痛在少腹左旁病傷厥陰絡脈宗仲景法
當歸鐵 生精雄羊肉切片漂去血水 生薑鐵 炒黑小茴香鐵

徐 目黃腕悶汗多嘔吐濕勝症屬脾瘧 厚朴 炒半夏 草菓 藿香根 白蔻仁
表 頭旋目暗心悸不渴不饑勉強進食二便自通不致脹阻病經臥床一月東垣云久病不知饑飽不見皮枯毛
痺乃痰飲為患當陽氣上升時令恐延痰厥 炒焦熟半夏 枳實 高粱米 茯苓 薑汁

華 戊申三月廿一起恙至四月初一日診脈虛促古微腫心悸神恍惚遂肌麻痺遺泄晝夜臥不成寐腰以下痠
痺不勝坐立此屬陰液素虧值春夏之交陽氣發泄陰之戀陽加以步趨嗔怒都令五志中陽大動誠如內經煩
勞則張精絕辟積於夏令人煎厥薄厥之謂蓋張怡陽氣之弛張精絕謂真陰之內奪木失水涵肝風大動皆為
厥之因也法宜味厚固陰甘緩和陽內風熄可冀穩定安寐倘執方書不寐投以溫胆湯或畏虛亂補是不明陰

勞則張精絕辟積於夏令人煎厥薄厥之謂蓋張怡陽氣之弛張精絕謂真陰之內奪木失水涵肝風大動皆為
厥之因也法宜味厚固陰甘緩和陽內風熄可冀穩定安寐倘執方書不寐投以溫胆湯或畏虛亂補是不明陰

勞則張精絕辟積於夏令人煎厥薄厥之謂蓋張怡陽氣之弛張精絕謂真陰之內奪木失水涵肝風大動皆為
厥之因也法宜味厚固陰甘緩和陽內風熄可冀穩定安寐倘執方書不寐投以溫胆湯或畏虛亂補是不明陰

勞則張精絕辟積於夏令人煎厥薄厥之謂蓋張怡陽氣之弛張精絕謂真陰之內奪木失水涵肝風大動皆為
厥之因也法宜味厚固陰甘緩和陽內風熄可冀穩定安寐倘執方書不寐投以溫胆湯或畏虛亂補是不明陰

陽傷便難

足膝失徐

絡

朝澤下痢
湯傷

產後衝任

中惡風穢
高氣

厥風陽上

厥陰頭痛

陽臟腑之先後矣

人參半錢

伏神三

真阿膠錢

麥冬一錢

生牡蠣錢

龍骨錢

生白芍錢

細甘草多黑一錢

覆盆子兩

又 已酉歲正月初九日診。夢寐欲遺丸方。

人參兩

熟地兩

河車膠其

五味兩

覆盆子兩

芫絲子兩

伏神兩

湖蓮肉兩

遠志兩

山藥粉和丸

周 病小愈即食腥滯粘膩之物。胃陽尚弱。穢濁痞結。中焦不運。腸氣不行。大便七八日不更。舌自涎湧。鼻覺氣

穢。清濁混亂。所服之藥。半條平寒。不究陽傷。致纏綿逾月。先用米復升。每服二百粒。薑湯送下。

汪 日前議味淡輕揚。少佐微辛。正合經言。肺欲辛之旨。然發表之辛。則升。開洩之辛。則降。夫肺主一身之氣。清空

之體。表不受濁。前云穢瘴上入肺位最高。受戕最先。因失治而漫漶中下。內經色診。謂從上病者治其上。斯源清

流潔矣。 水蘆根 白通草 山茵陳 生苡仁 浙茯苓 桑皮 研入白菴仁末 卧時服。威喜丸二錢

又 濕阻經絡為痛。初在虛里穴。漸延肋背附骨。日來背脊却發現溼症。微微紅色。此溼邪由氣及於血分。丸約攻滯

僅走腸中。未能引經宣通。所用氣分肺約。哮喘濁痰已緩。今經絡久痛。當以三因痺症參看。

製痰黎 通草 木防己 炒焦半夏 生苡仁 浙茯苓 炒熟石膏

陳 大雨朝溼。下痢都是陰寒。服黃連陽傷腹脹。雖用溫。又是守中。今二便不爽。脹必京痛。腑為陽。陽宜通。通則

濁陰不聚。痛脹自減。 大針砂丸每服一錢二分

金銀少腹疲鬱不和。據述因寒溼而起。緣產後精米未復。衝任已空。躊躇不攝。經言陽微為病。苦寒執矣。若云瘧邪

為有三五日休息而至。蓋脈絡空乏。須填補孔墜。區區滋清之補。與產後奇脈之病迥殊。故不獲效。

人參 紫石英 炒歸身 鹿角霜 炒杞子 茯苓 接服斑龍丸加參

舒 口鼻觸入臭穢。濁氣蒙閉心胞。遂心胸痛嘔瘀血。且欲昏閉。即方書中惡之症。蘇合香丸能辟穢惡之邪。若誤

認陰症。擅投桂附。則抱薪救火矣。 蘇合香丸二丸

張 卽時時驚恐。不食不便。狀如神附。頭面肌浮。舌強唇腫。寤不能寐。夜多妄言。經少紫黑。此五志煎厥。風陽上逆。做

何水治陽年春女。用藥各九二錢

牙痛骨痛

淫房變毒

嘔吐大便不通

腹瀉傷嘔

虛汗出陽

使血枯勞

嘔吐胸膈帶濁

吳 厥陰頭痛。古乾消渴。心下煩。夜無寐。多躁。少腹脹滿。小便澀。瀉瀉。時時惡。最。怕。厥。竭。

阿膠 鮮生地 雞子黃 小黑糖豆皮 前半夏送滋腎丸二錢

顧 幼穉哮喘。由外來風寒。必從肺治。因過食甘膩。必兼理胃。又發不已。病氣蔓延。不獨在肺。胃間矣。故因勞致發。遇冷而發。乃衛陽已虛。煩動火升。面赤。皆腎陰內怯。雖非色感之損。然因病致虛也。須知病是有餘。體屬不足。不可徒用攻疾。遂氣取快。一時當未發之時。病微潛伏。只宜培土以運痰。土旺則肺氣充。壯水納氣。以益腎。子氣充。長母氣自強。此為子母相生之治。守之日久。發作自緩。况宿病無急攻之法。或寓攻於補。或攻補互施。然寒暄。飲食之調攝。於此症尤當加慎。 早上服補納腎氣方

薑汁製熟地 生白芍 懷山藥 丹皮 雲苓 紫衣胡桃肉 鹹秋石 澤瀉 密凡桐子大

午後服健中運溼方 人參 熟半夏 新會皮 茯苓 枳實 地栗粉 金石斛湯法丸

王 濕鬱執熱。必陽氣鼓運。溼邪乃解。是寒戰後身痛已緩。蓋溼從戰而氣舒。戰後陽氣通和。為身執汗出耳。但脉

濡神倦。餘邪未盡。正氣已虛。有轉寒之象。用大半夏湯。通補陽明。 人參 半夏 茯苓 薑汁

蘇 早食暮吐。大便不爽。病在中下。初因勞傷胃痛。疾瘵有形之阻。 桃仁 半夏 韭汁 枳實

姚 老年伏氣。溫邪五十日不解。脫痞不饑。心中脇內。獨執藥下。咽則嘔。痰多呃逆。舌焦微渴。四末微冷。此胃傷已極。又之穀氣。致津液不復。氣機鬱滯。用藥須忌苦燥辛溫。妨胃。先議芳香輕清。兼以穀氣開醒上中。

香梗露 香椽露 玫瑰露 銀花露 木槲

劉 癩聚攻膈中腕。心痛映背。嘔吐涎沫。凡久病。病必在絡。絡空必成脹滿。已經巨食。尚安。暮食痛嘔。其胃中清。陽

又失旋運之司。飲食尙助嘔脹。馬能承受湯藥。病退無期。頗為棘手。聞古人書。於久病有形。通劑是議。先擬通陽。改投小丸。一味阿魏丸。硃砂為衣。服五分。

張 形寒。手足痛。肌肉漸腫。勞力行走。陽氣受傷。客邪內侵。營衛失和。攸局方痺。在四肢。汗出陽虛者。與黃芪五物

湯。黃芪 桂枝 茯苓 炙草 當歸 蝦蟇 南棗

胡 胸膈不爽。食入內脹。蓋後便血。病已二年。診脉左小澀。右微弦。食減形瘦。是內傷罷鬱。初病在氣。久延血絡。而

虎痛喉背
胃氣少降

肝化胃平
肝和

温邪殺傷
津液

厥於傷肝
陰

瘧熱傷陰

營道昏任
二脈失司

痰飲支肺
結氣

瘵腐色鮮。血液宜下。從怒勞血鬱治。 桃仁 杏仁 柏子仁 歸尾 紫苑 久麥子

費 臍下有形。攻觸氣上。則嘔吐。降下則失氣。脹中必有濁滯阻塞。椒附難投。僅能開無形陰濁。老年陽衰。不可遽投攻下。用半硫丸一錢。俾腑腸流通。滯濁自去。

丁 脈右弦。腕痛。背脊得嘔。痛發氣鳴。痛緩。乃胃氣少降。寒暄七情皆令痛發。病屬肝胃。議河間金鈴子散。

杜 酒客胃中醱。或嘔。或赤。亦令肝腸犯胃。今納穀。腕中微痛。乃陽逆失降。酒家忌用甘膩。辛苦清降。平肝和胃治之。

王 清明穀雨。氣候已暖。所感温邪。從口鼻吸受。自上及中。為三焦病。羌防乃散足太陽風寒表邪。温病篇云。慎用手温表散。即為重劫津液。今頭身痛。咽痛。心煩。悶。視其舌心反黃。邊紫。綠。渴飲不能下咽。斑疹隱隱。津涸。呼吸漸閉。所謂一逆尚引日。再逆促命期矣。重症之尤。勿與目下時行各邪同視。

錢 肝藏魂。因怒則諸陽皆動。所見病情。皆屬陽動化風。而為厥。故凡屬厥症。都隸厥陰。考內經治肝之法。不外辛以理用。酸以治體。甘以緩急。今肝陰素虧之體。驟加暴怒。病已決。旬。夜涸。陽元。急急鎮固。收攝。猶慮弗及。閱所服諸方。僅以泄肝。用平肝為事。膏淺庸妄。一至於此。不知補法。都以子母相生同治。蓋壯水則木得滋榮。陰充則風陽自熄。醫不師古。倘敢稱虛道賢耶。

謝 瘧熱傷陰。心腹中執浮。陽升降。鼻衄汗出。遺精便難。此因瘧加病。久臥氣機呆鈍。食入難消。然調脾胃之藥。皆氣勝助燥。施於液虧體質。於理有悖。

服 二劑後接服後方。 穀露 人參 鮮生地 北五味 生雞子黃

汪 父遺遺溺淋瀝。三年。下焦常冷。春腎腰膝痠楚。如墜。此腎臟虛寒。但填精固澁。多進不應。是腎任二脈失司。粘膩滯滯。未能走入奇經。做孫真人九法中米用。 鹿茸 補骨脂 家韭子 蛟床子 生兔絲子 覆盆子

全櫻子 蠟腸 生杜仲 炙甘草 黃精 羊內腎 青益 共為丸

通攝

道精風火
劫傷管陰

冬溫傷肺
胃寒液

腫脹肝犯
陽表

濕熱阻氣

將病已三載仍不能聚能食諒非肺臟虛損自述冷氣或聚胸膈或貫肋膈水飲下咽汨汨有聲氣得下降究若

病去此必支脈結飲又阻遏氣隧流行決非重墜攻逐以及溫補膩濁可治蓋絡脈為病非辛香何以開鬱議

宣通氣血方法 降香 枇杷葉 鬱金 橘紅 蘇子 桔梗 汶仁 桑葉 淡薑渣

金 動氣兼有遺精已是下焦陰陽虛損况又病欲進溫養必須通攝桂附氣雄而剛非下損藥也

淡從蓉 補骨脂 胡桃肉 生兔絲子 覆盆子 家韭子 柏茴香 茯苓

女 脈小數色蒼心痛引背脇肋皆脹早上牙宣銀血夜寐常有遺洩此形質本屬木火加以情性動躁風火內燃

管陰受劫故痛能進食歷來醫藥治痛每用辛溫香氣破世真氣不知執勝液傷通令助其躁執是經年未能痊
期議以柔劑熄其風緩其急與體質病情必有合竅之機

細生地 阿膠 牡蠣 玄參 丹參 白芍 小麥 南棗

季 秋瘧愈未復原冬季連次感觸溫邪老年平素有痰嗽本恙溫動燥肺氣劫胃汁致痰多嗽甚欲嘔脉散條熱

右脇常痛大色升於右頰由胃津漸傷肺不主降而升騰莫制古稱肺乃柔金胃為陽土已經百日纏綿開提半

屬苦辛辛泄肺氣苦再傷胃致不思納食議甘藥濡胃潤肺胃汁自充肺氣自降土旺生金古賢之定法

玉竹 麥冬 乾粉 甜杏仁 橘紅 蔗漿

秦 老年腫脹四肢俱冷皆陽衰氣微濁陰僭踞蓋脾陽主運腎陽司納今食入愈脹二便不爽中下之陽消乏豈

可小視此病 炮里附子 淡乾薑 生白朮 生厚朴 茯苓 澤瀉

尤 由肝氣升舉犯胃胃逆不降幽門不通旁趨為脹數月又延氣分已入血分

桃仁 郁李仁 降香 歸鬚 川棟 山梔

嚴 兩寸脈獨搏不飢不食上焦氣分之阻時當仲夏必有溼熱客氣內伏

半夏麴 瓜蒌皮 滑石 蓄苓 通草 杏仁

〔中風〕

牛黃清心丸 此藥專治疫癘昏暈不醒口噤痰喘及小兒驚風發搐五癩等症極效

膽星一兩 白附子一兩 鬱金五錢 川烏一兩 半夏二兩 右五味共為

細末用臘月黃牛膽三個取汁和藥仍入膽內蒸口掛風簷下。至及年取膽內藥一兩四錢加度過芒硝水飛辰

砂礪砂各一錢水片麝香各一分研極細末。和在一處稀糊為丸如艾膏大金丹為衣。道湯化下。

治暴仆痰涎壅塞 竹瀝一盞薑汁五匙調入白礬末一錢灌下。

治筋骨痠痛如夾板狀不可忍者 用騾子修下蹄爪甲燒灰存性研末。或黃酒或湯調服立愈。

治癱瘓秋方 熟牛骨髓一兩 熟白蜜一兩 炒白麵一兩 炮薑末三兩 右四味和勻如彈丸大每日三四九細

嚼黃酒下大效 又 威靈仙 蒼木 牛膝 桂枝 木通各一兩 右為末黃酒五助煮一炷香早晚服。

治雞腳風 手足及指拳攣如雞腳狀痠痛不時發者。當從鬼眼灸之。左右膝骨蓋下兩邊各有小窩共四穴謂之

鬼眼各將蠟艾多三炷即愈。愚謂以驅寒溼雷火針針四穴亦效。

（補益）

奇想補心丸 柏子仁二兩 白木一兩 生地一兩 紅棗肉三兩 右煉蜜為丸彈子大每日三服百日後

百病消除

棉子丸 烏鬚黑髮。暖腎種子。陽虛人宜服此藥。用棉花子十數助。用滾水泡過。放蒲包內。悶一炷香。取出曬裂

壳。取仁并去外皮用淨仁三助。壓去油用大酒三助泡一夜。取之蒸三炷香曬乾。故紙一助 鹽水一助

杜仲一助 去外麩皮黃酒泡一助 杞子一助 黃酒一助 兔絲子一助 酒煮一助 共為細末蜜丸桐子大每服二三錢

卷元固本暖腰方 廣木香 真川椒 大茴炒 故紙 升麻各一兩 川附子五錢 蕪艾半兩 丁香四錢 上肉桂

川棟子各一兩 先將艾槎較次以各藥為末和勻。用綾絹做暖腰入藥。穿行腰上若肉者神妙。

腰痛神方 雄豬腰子一付 銅刀破開去中一付 青鹽炒 大茴半兩 當歸半兩 杜仲五錢 右為末。入腰子內。放

磁器中過一宿。明日早用韭菜上下鋪蒸數。用火酒洗去藥末。將腰子用銅刀切片。好陳酒空心送下。多年者吃

五六付。乍起者一二付即愈。又 杜仲 補骨脂 牛膝 香附各三錢 青鹽半兩 將雄豬腰二對竹刀刮開

治下部無力 雄豬肚一個 紅棗肉半 蓮肉四兩 沒仁兩 將糯米半升填入肚內好酒一鍾醬油少許煮熟每

日切幾片空心好酒下

長春方 治腎虛精冷之症 魚鱔一助蛤粉炒 棉花子一助取仁去 白蓮須八兩 金櫻子一助 川石

斛八 沙蒺藜兩 杞子兩 兎絲子兩 五味子炒四兩 將鹿角五助鋸薄片河水煮三晝夜去角取汁熬膏

和藥末為丸桐子大每服三錢

歸國酒方 甘菊花兩 杞子助 當歸兩 龍眼肉助 右藥將大酒三助酒釀十助泡二十一日用

二仙酒方 燒酒一鍾十助入龍眼肉一助桂花四兩白糖八兩將泥封固愈久愈佳

〔癆〕

治吐血癆症 桂圓個 紅棗個 蓮子二個 小黑豆四十粒 水二碗煎一碗空心早服連棗吃為妙

治虛勞咳嗽吐血肺癆肺癰吐膿血垂危者服之即愈 用芫白細根約三四兩搗碎將真陳酒煮絞汁每日服一

二次至一二十日即愈

治咯血吐血癆嗽久不止 雪梨六十隻取汁二十杯生地茅根藕各取汁十杯蘿蔔麥冬各取汁五杯將六汁煎

煉入蜜一助飴糖八兩薑汁半杯再熬如稀糊則成膏矣每日用一二匙

治酒癆吐血 用雞距子一兩水二鍾煎一鍾不拘時服渣再煎服服至數十日愈

〔盜汗〕

治盜汗方 蓮子粒 黑棗個 浮麥合 馬料豈合 用水一大碗煎八分服三劑愈

又方 黃芪 馬料豈 二味煎服半月愈

又 五倍子去蛙末炙乾研末男用女唾女用男唾調厚糊填臍中外用舊膏藥貼之勿令泄氣兩次即愈

止汗方 黑豈錢 浮麥錢 烏梅個 煎湯服

〔咳嗽〕

治痰嗽諸虛奇驗方 藕汁 梨汁 蘿蔔汁 人乳 薑汁 白糖 沙糖 童便各四 將八味枚磁瓶內用

炭火熬煎。只刺一助為止。每日空心白滾湯送下。四錢。服完即愈。如能常服。則精神強健。永無虛損。
治小兒吼嗽併大人咳嗽屢驗方。欵冬花錢。晶糖錢。將二味放茶壺內。泡湯當茶吃。自然漸愈。

治小兒天哮一切風溼燥熱咳嗽痰喘。兼治大人。
海浮石淨木四錢。飛滑石淨木四錢。甜杏仁淨木四錢。薄荷淨木四錢。右為極細末。每服二錢。用百步煎湯下。

治痰火骨蒸吐血不止之症。重者十服八服即愈。
人參天冬各錢半。茯苓五。杏仁二粒去皮尖。紅棗二枚。蓮肉六粒。人乳匙。白蜜匙。

大甜梨一枚。將前藥製碎。納梨內。仍以梨蓋蓋之。用綿紙封固。飯上蒸熟。日間吃其藥。臨卧吃此梨。

治痰火方。咳嗽吐痰面鼻發紅者。一服即愈。
青黛水飛極細曬乾。再研用三四錢。蛤粉錢二。味煉蜜為丸。如指頭大。臨卧口噙三九。其效如神。

治痰火神水方。一名玄霜。黑鉛一助。煒成一薄餅。中穿一洞。以繩繫之。將好米醋半甕。即以鉛餅懸甕中。離醋約一寸許。雙口用皮紙塞子。其緊。再以碼石壓之。勿使泄氣。放屋下陰處。待數日。取起鉛餅。上有白霜。拭下。每鉛二助。取白霜二兩為止。其霜滑。置腸。每服五分。噙口內。以白湯送下。若治痰火咳嗽。每服三分。照前法服。

治痰火方。枇杷葉五十葉。去淨毛。水五十杯。煎至五六杯。再重湯燉至三四杯。每藥三茶匙。用薑一茶匙調下。愈。

治老人上氣喘急。嗽不得卧。生薑汁五兩。黑砂糖四兩。用水煎二十沸。時服半匙。漸漸嚥之。

治喘。瓜蒌一個。明礬棗大一塊。同燒存性。研末。以熟蘿蔔醃食。藥盡病除。

〔吐血〕

治吐血不止。用碗盛清水。吐血在內。浮者肺血也。沉者肝血也。半浮半沉。心血也。各隨所見。以羊肺肝心者。孰。蘸白

芩末。日日吃之。或只用白芩為末。米飲調服。亦效。

治吐血方。吐血者。偶吐一二口。或不時吐之。側柏葉濃煎。和童便常服之。

又用藕節為末。入炒蒲黃血餘皮等分。調服之。奇效。

又用雞子一個。打開。三七末一錢。藕汁一小杯。陳酒半小杯。隔湯燉熟。食之。不過兩三枚。自愈。

〔赤白二濁〕

治赤白濁 兼治夢遺 名將軍蛋 生大黃二 生雞子個 將雞子頂尖上敲損一孔入大黃末在內紙糊煮
熟空心吃之四五朝即愈神奇秘方。

治色慾過度精濁白濁小水長而不痛者并治婦人虛寒淋帶崩漏等症 生龍骨飛 生牡蠣飛 生兔絲粉

生韭菜子粉 右四味各等分不見火研末生乾麵冷水調漿為丸每服一錢六七服即愈

治白濁 用頭生雞蛋五枚開一小孔每個入生白菓肉二枚飯上蒸熟每日吃一個即愈

治遺精滑失 白龍骨研細 韭菜子炒 右為末空心陳酒調服二錢

小免絲丸 治女癆夜及遺精白濁崩中帶下諸症 石蓮肉二 白茯苓二兩 兔絲子五兩酒浸研 右為細末山

藥糊為丸桐子大每服五十九加至百丸或溫酒或鹽湯下空心服如腳膝無力木瓜湯下晚食前再服此方治

遺精之聖藥屢用屢效但石蓮子陳久者難得

治精氣虛滑遺不禁 龍骨 蓮鬚 芡實 烏梅肉 各等分為末用山藥丸如小豆大每服三十九空心米飲下

治遺精方 文蛤研細末以女兒津調貼臍內立止

治一切淋閉白濁因火結莖中澇痛 新鮮沒仁根搗爛絞汁一碗或滾酒或滾水沖入空心服二三必效

思仙丹 治陰虛火動夢遺神方 蓮鬚十 石蓮肉十兩去內青 芡實十兩 右為末再以金櫻子三筋去毛

子水淘淨入大鍋內水煎濾過再煎加飴糖和勻煎藥丸如桐子大每服七八十丸

〔蠱〕

治五臟神方 蘿蔔子四兩用巴豆十六粒同炒 牙皂兩五錢 沉香五 枳壳四兩大酒煮切片炒 大黃一兩 琥珀一兩 右共為

末每服一錢隨病輕重加減雞鳴時熱酒送下薑皮湯亦可後服金匱腎氣丸調理收功

治水腫腫胖 輕粉錢 巴豆四錢 生硫黃錢 右研末做成餅先以新棉一片鋪臍上次以藥餅當臍按之外

以帛縛之如人行五六里自然瀉下候五六次除去藥餅以溫粥補之又患者隔日方取去藥餅餅可救二十

其效如神愈後忌飲涼水

治水厥方 陳芭蕉扇去筋燒灰 存性五分 千金子去油壳 二分半 滑石分 共為細末以腐皮色滾水送下十服全愈。

治水厥氣厥方 治黑魚一尾重七八兩去鱗甲將肚剖開去盡腸入好黑礬五分松蘿茶三錢男子用蒜八瓣女

用七瓣共入魚腹內放在磁器中蒸熟令病人吃魚連茶蒜吃更妙此藥從頭吃起病從頭上消起如從尾上吃

起即從腳上消起立效之仙方也

治氣厥方 將大蝦蟇一隻破開用大砂仁填滿腹中黃泥封固炭灰煨紅冷定去泥研末陳皮湯調服放屁即愈。

治氣厥氣厥方 蘿蔔子二兩搗研以水濾汁用砂仁一兩浸一夜炒乾又浸又曬凡七次為末每米湯送下一錢

立效

治厥脹方 四五月將黃牛薑陰乾微炒黃香為末每服一兩煎半時濾清服之不過三服即愈

解脹救膈方 治一切厥肚飽發虛 大田螺一個 雄黃錢 甘遂末錢 麝香分 先將藥末用田螺搗如知泥

以麝置臍放藥臍上以物覆之束好待小便大通去之重者用此相兼小便大通病即解矣

治中滿厥脹 陳葫蘆一個要三五年者佳以糯米一斗作酒待熟用葫蘆瓢於炭火上炙熟入酒浸之如此五六

次將瓢燒存性為末每服三錢酒下神效

治厥脹方 雄豬肚子一個入大蒜頭四兩加小檳榔砂仁末三錢木香二錢砂鍋內河水煮熟空心服豬肚立效

又 取舊葫蘆一個浸黃坑內一月取起掛長流水中三日炒黑為末每兩加木香末二錢每日空心砂仁湯送下

二錢

治肝氣方 烏梅個 鮮橘皮錢 青鹽分 真川椒錢 右藥空心服

〔痞塊〕 治痞塊方 不問男女左右癥瘕積聚瘧疾收取水紅花即水 連葉帶子曬乾不拘多少量用者蒜頭去

皮膜同放石臼內打爛捏成餅曬乾為末每勛入蚶子壳煨及研粉四兩再將老蒜打膏為丸桐子大每服百丸

空心食後白湯下一日三服效

治大人小兒疳積 將水紅花子為細末以麪和作一處少加麝一釐放堊上以熨斗烙之數次即愈

又 水紅花子秋膏入麝少許貼之亦效

治瘡塊 用水紅花新鮮者同老蒜打爛量入皮硝一二兩捏成餅比瘡塊大一圍放瘡上用杖擊透待乾再瘡則

瘡亦消

又 紅芥菜子即結血芥不拘多少生薑汁浸一宿大約芥子一酒杯加麝香一錢阿魏三錢同搗極爛如膏約攤青

布上貼患處外用汗巾緊繫一宵貼過斷無不消

又 名藥豬泡 麝香錢 阿魏錢 水紅花子 大黃 歸尾 甘遂 急性子 甘草各五 右為細末用

豬水胞一個量瘡塊大小用尿胞大小裝入乾燒酒半胞將前藥末放入胞內緊紮住口用白布將胞兜紮於患

處俟塊化盡即去之不可遲也

治瘡地八反膏 鸞頭 莧菜 葱 蜜 甘草 甘遂 芫花 海藻 阿魏 鸞甲 水紅花子 右應為末

者為末應搗爛者搗爛入末再搗如和不勻加燒酒調之先以水調白麵作圈圍瘡上大六七分厚其藥敷在瘡

外用錫法二把放燒酒在內熨瘡上冷則更換至瘡內動痛方止明日大便下膿血即除根

治氣癖在小腹上攻衝心痛 用穿山甲片土炒脆為末砂糖調陳酒送下每服三錢止痛如神如不能飲糖酒調

亦可

化癖膏 治塊如活鸞能行動諸藥不效者 每日空心將龍花三四五匙沖熱陳酒內服至十日即不動服一二

月即消盡矣外用敷之

治大人小兒癖塊方 甘草 甘遂各三 硃砂錢 木鱉子四個 芫菜錢 鸞肉兩 葱頭七 右加蜜少許

搗成膏以狗皮攤貼如藥乾用葱蜜潤之二次即消

治癖塊方 腹中攻痛面黃肌瘦者愈有雁膽 真陳阿膠一兩蛤粉 九製陳膽星五錢人乳浸 川貝母一兩

麝香四分忌 鸞甲三個必要九骨七者骨 以上五味共為細末用無臘真柏油二兩大錠開後入前藥末在

內攪和每服用乾腐衣溫水浸軟取乳腐大一塊包藥約一分五厘不拘滾湯飯湯茶酒送下清晨服三包飯後

服三包不必多服柏油用三兩亦可極重者兩料必愈

治傷寒結胸停食方 陳香糟一 生薑四 水菖蒲根兩 鹽二 右炒熟為餅敷胸前以火熨之內嚮即去如

口渴任吃茶水待大便利下惡物即愈

治腹內虫痛方 烏梅一個 老薑二 榧子粒 花椒十四 右加黑糖少許煎服虫盡出矣

〔膈〕

治膈食膨脹效方 五六月用老生薑二三 助或四五助放在竹篾內或麻布袋浸在糞缸內七日取出洗淨竹刀

刮去皮切片空中吊着陰乾為末每服三錢火酒調下不過三服即愈

治一切痰膈食膈效方 黑砂糖一 連皮老生薑一 將二味共搗如泥成膏入磁罐內封固埋乾燥淨黃土地

內七日取出每日和滾水服之

緣仲高秋傳膈噎膏 人乳 牛乳 蔗漿 梨汁 蓋根汁 龍眼肉濃汁 薑汁 人參濃汁 右七味俱等

分惟薑汁少許隔湯熬成膏子下煉蜜徐徐服之其效如仙丹更須心安氣平勿求速效

又 好陳酒一 米糖兩 貝母錢 砂仁錢 廣木香錢 廣陳皮錢 右咀片入磁瓶內箸葉緊上放米

一撮重湯煮以米熟為度每日清晨服一大杯藥完病痊

又 糖坊內上好糖糟一 助加水薑四 兩先將糟打爛和薑再搗做小餅曬乾放磁瓶內置蠟煙櫃上每日清晨

將餅一枚泡滾水內少停飲湯已經屢試屢驗

治噎食 生藕汁 生薑汁 雪梨汁 蘿蔔汁 甘蔗汁 蜂蜜 白菓汁 竹瀝 右各一盞和勻飯上蒸熟

任意食之

治翻胃膈氣 此症必起於腸枯血燥大便三四日一次糞如馬栗若如羊屎者不治口常吐白沫者不治

牛乳 羊乳 人乳 不拘分量總宜常服生血潤腸之妙藥

又 青州柿餅五六枚飯上蒸熟食之不用湯水常服即愈

治噎膈氣不通方 用雞喙燒研入木香丁香沉香紅棗丸服

治膈氣暫開關方 用荔枝一個去核將蟬蟬一條放在荔枝肉內將水片三四整揀在蟬蟬上即將荔枝肉裏好

仍放在荔枝壳内紫好即令病人含在口内有冷涎水渗出可徐徐咽下俟一時許蟻蚋即化完亦無水滲出令病人連壳吐去只服一次可以立進飲食逾四五月但不可病人知之恐其穢不肯吃也

〔便閉〕

五子丸 治老人大腸燥結等症。火麻仁 紫蘇子 松子肉 杏仁炒去 芝麻炒 共研如泥磁器收貯每服一丸彈子大蜜水化下。

治大便不通 皮硝三錢水 香油一 皂角末五分 右三味入豬胆內在用竹管一頭入胆口內用線紮緊一頭入穀道內用力將豬胆一擠其藥入臟立通治大便燥結用雞子白一二枚生食即愈。

治老人大便艱澀方 熟地錢 山藥分 山萸肉錢 茯苓錢 丹皮錢 澤瀉錢 人乳杯 白蜜匙 先將六位煎湯去渣後入人乳蜜煎一沸空心溫服一二劑愈。

治小便不通 獨囊大蒜個 梔子二十 鹽匙 共搗敷臍中良久即開若不通敷陰囊上立愈。

治中暑大小便不通 用田螺三枚搗爛入青鹽三分攤成膏貼在臍下一寸即愈。

〔風寒溼痺〕

治太陽風寒頭痛及半邊頭痛 生薑三片將桑皮紙好水溼入灰火中煨熟乘熱將印堂兩太陽各貼一片以帶纏之立愈。

治半邊頭痛 因風寒而起者更效 肉桂心分 麝香釐 人言釐 北細辛分 辛夷分 胡椒粒 共為末用桑肉搗丸如豌豆大一粒放膏藥中心貼准太陽穴內一日見效如壯年火盛者愈後服黃芩大黃瀉火即愈。

又 白芷 細辛 石膏 乳香油 沒藥油 右等分為末吹入鼻中左痛吹右右痛吹左。又 此治暑天甚怕風亦欲綿裹頭極重之症 用鷲兒不食草陰乾將上好燒酒浸一宿日間曬乾晚間又浸如此七次若右邊痛將此草塞右鼻左痛塞左鼻約一時許鼻流冷水盡即愈。

治箭風方 俗名鬼箭打或頭項手足筋骨疼痛半身不遂等疾照方一服即愈真仙方也。

山甲一錢 炒研 白薇錢 澤蘭錢 照分量好酒煎服。

治一切麻木痺症痛風屈節 虎骨木通煎湯頻頻多吃即愈

治痛風 屈節四肢疼痛用醋磨硫磺黃蠟之或用葱白杵爛炒熟熨之

又 紅花 白芷 防風各五錢 威靈仙三錢 酒煎服取汁三服全愈

治脚氣 足疾腫痛拘攣 川牛膝 威靈仙 各等分為末蜜丸每服五十九粒空心服

治痺方 真茅山蒼木五筋洗淨泥垢先以米泔水浸三宿用蜜酒浸一宿去皮用黑豆一層拌蒼木一層蒸二次

再用蜜酒蒸一次用河水在砂鍋內熬濃汁去渣隔湯燉滴水成珠為度每膏一筋和煉蜜一筋白湯調服一老

人專用此方壽至八十餘身輕體健甚於少年

治風寒溼痺藥酒方 川羌一錢 川桂枝一錢 歸身半錢 秦朮一錢 金毛狗脊半錢 虎骨半錢 防風一錢 杜仲二錢

川斷錢 川芎八錢 晚蠶沙錢 熟附子一錢 加桑枝三錢生薑一大片大棗二枚陳酒二筋浸煎服

治溼氣初起法 嫩松枝 小松秧不拘多少 將二味入石臼內搗爛傾入陳酒絞取濃汁燉熱隨量飲醉醒時痛即

止多飲幾次更好

七製松香膏 治溼氣第一神方 松香三兩 第一次薑汁煮第二次蔥汁煮第三次白鳳仙汁煮第四次燒酒煮第五次

五次開楊花汁煮第六次商陸根汁煮第七次紅醋煮 桐油三兩 川烏 草烏 蒼木 官桂 乾薑 白芥

子 草麻子以上各四兩 血餘兩 右八味共入桐油熬至藥枯髮消滴水成珠濾去渣入牛皮膏四兩烱化用煎

製過松香漸漸收之離火加樟腦一兩好麝香三錢厚紙攤之貼患處神效

九製松香膏 名九汁膏 上好松片香三筋用清水煮烱拉拔過傾去水再換水煮再拉拔換水如此以十遍為

度將松香研末用薑汁蔥汁白鳳仙汁燒酒開楊花汁商陸根汁韭菜汁童便依次將松香烱浸透曬乾作八次

製過其第九次將好醋少許不可多再拌松香曬乾研極細末 川烏 草烏 蒼木 上商桂 白芥子 乾

薑 草麻子以上各四兩 血餘兩 另用桐油三筋浸藥春夏三秋七又十日熬枯濾去渣再熬先入廣膠四兩

俟溶化後將製過松香末篩入收之離火入樟木一兩待冷入麝香二錢攪勻收貯攤貼神效

見晚膏 專治風寒溼氣骨節痠痛屈節痛風痿痺麻木不仁鶴膝風偏頭風漏肩風等症並治跌撲閃刺等損傷

陰症無名腫毒已破爛者勿貼小兒孕婦勿貼 活短頭髮燥乾二兩用杜 大黃 靈仙 雄鼠各一兩 川

壯年人劑下者

烏草烏 劉寄奴 土鱉虫十個 羌活 獨活 紅花 蛇麻子 蒼木 當歸 生南星 生半

夏白芥子 桃仁各五 右十八味俱切碎 樟木一 甘松 山奈 花椒 豬牙皂 山甲破 華撥

沒藥 以上各三錢不必去油 同 乳香錢 白芷錢 右十味極細末 新鮮烟葉汁一助松香六 新鮮高陸

根汁一助松香 新鮮開楊花汁 半助松香 新鮮艾葉汁 半助松香 白鳳仙花汁 半助松香 老生薑汁 半

松香二 葱汁 半助松香 薑汁 三兩收 大蒜汁 四兩收 用足秤秤麻油二助四兩先將頭髮入油熬

生炷香再將前藥入油熬至焦黃色不可太枯即濾去渣入前松香熬化再將絲棉濾去渣再熬至油面起核挑

花紋先加入極細蜜陀僧四兩再徐徐加入好西硫黃末一助投此二味時務須慢慢灑入不可太多太驟以滴

水成珠離火待溫然後摻入細藥攪勻磁器收貯熬時須用桑枝不住手攪青布攤貼每張淨藥重四錢臨時加

肉桂末五釐細辛末二釐

集寶療癰膏 川烏 草烏 南星 半夏 當歸 紅花 羌活 獨活 大黃 桃仁各四 山甲一 白芷

錢 肉桂一 麻油助 葱汁碗 薑汁碗 松香助 陀僧兩 硫黃助 右收煎好加乳香沒藥血竭胡椒

樟水細辛牙皂末各二錢若加商陸根鳳仙開楊花鮮烟葉鮮蒜鮮布紋等汁更妙

摩腰膏 治老人虛人腰痛婦人帶下清水不臭者虛寒者宜之 附子 川烏 南星路半 川椒 雄黃

樟腦 丁香各錢 乾薑錢 麝香分 右為末蜜丸彈子大用生薑自然汁化開如磨離手掌上烘熱摩腰中

痛處即以暖帛擦之少頃其熱如火每日飯後用一丸

摩風膏 治風毒攻注筋骨痠痛 草麻子一兩研 川烏頭一兩 乳香錢半 右以豬油研成膏烘熱塗患

處以手心摩之覺熱如火效

治寒溼氣方 真白芥子研爛陳甯醋調攤厚雙皮紙上做夾紙膏以針鑿密刺孔先將新棉花薄薄鋪一層放在

患處然後將夾膏貼在棉花上片時即似火燃熱過即揭去棉花以薄為妙 此膏不可預製須要臨時調合攤

就而貼

(針灸)

雷火針 治風寒溼毒留住經絡痛腫不散者 蒼耳子肉油 乳香 沒藥各三 羌活 川烏 穿山甲 土

丁香 麝香 茯苓 黑附子 續苓 澤瀉 大茴香 白芷 獨活 廣木香 肉桂各一 右共研細末

土

和勻先將新文接綿用紙二層鋪於上得薄以藥末搽上要極密外用烏金紙捲緊粘固兩頭用線紮緊用時以手擦患處用黑點記將針在火上燒着用紅布二三層鋪於痛處針之

又 勤艾一兩桂 辰砂錢 乳香 沒藥 雄黃 桃樹皮 川烏 草烏 硫黃 山甲各一 麝香分五

右為細末作針按穴針之忌尻諸神值日

三氣合痺針 乳香 沒藥 牙皂 羌活 獨活 川烏 草烏 白芷 細辛各五 肉桂 蒼木 雄黃

硫黃 山甲 樟冰各一 麝香分三 艾絨半錢 作針

百發神針 治偏正頭風痛肩鶴膝寒溼氣半身不遂手足癱瘓痞塊腰痛小腸疝氣癰疽發背對口瘻核初起不

破爛俱可用各按穴針之 蜈蚣條 木鱉 五靈脂 雄黃 乳香 沒藥 生川附子 血竭 川烏 草

烏 檀香木 降香木 大貝母 麝香各三 母丁香四粒 浮蘄艾綿或一 作針

消癖神火針 蜈蚣條 木鱉 五靈脂 雄黃 乳香 沒藥 阿魏 三稜 蓬朮 甘草 皮硝各 鬧楊

花 硫黃 山甲 牙皂各二 麝香錢 甘遂分五 艾絨二 作針

陰症散 針 乳香 沒藥 羌活 獨活 川烏 草烏 白芷 細辛 牙皂各五 硫黃 山甲 大貝

五靈脂 肉桂 雄黃各三 蟾酥分三 麝香分三 艾絨半 作針

香硫餅 治寒溼氣 麝香錢 辰砂錢 硼砂錢 細辛四錢以上 角刺錢 川烏尖二味俱用黃酒 硫黃

四錢 右先用硫黃角刺川烏入桐杓內火上化開再入前四味末攪勻潑在乾淨土地上候冷取起打碎成黃

豈大用時以乾麵捏成錢大比錢薄些先放在患處置藥一塊在上以香火點着連灸三天即愈

蒸法 腿膝痠痛風寒溼三氣傷於足膝名為足痺 川椒把 葱三大 鹽把 小麥麩麵四五 右用醋和

溼潤得所炒令極執攤卧褥下將所患腿脚就卧薰蒸薄衣被蓋得汗出勻過約半個時長待一兩個時長覺

汗消解勿令見風立效

發寒溼痺痛麻木不仁妙方 川烏 草烏 萹藤 骨松 山柰各五 右為末炒執布包熨痛處神方

肘臂法 治胸背痠痛而悶因風寒溼而起者 肉桂心 附子 羌活 烏頭 細辛 川椒各錢 川芎錢

右共為細末以帛包之微火炙令暖以熨背取瘡止為度

葉桂 天士先生論

全人公較

〔黃疸〕

治疸神飲

將茵陳草煎濃湯。每日以多食數為妙。要忌量腥魚肉。并忌鹽味而淡食。則能速愈。此草真治疸神藥也。若腹中不快。量加神麩麥芽。同煎服之。更無他藥。功能勝此者。若小便不利。或以車前子湯同吃。或用瓜蓼根打汁碗許服。連服更效。

劉黃胆方

雄鯽魚一個去頭骨五

胡椒十粒止研細

麝香分三

右二味同春爛。麝香另加。不必同春。恐粘染

白上

將蛤蚧壳填滿。合於病人臍上。用絹縛緊。一日夜即愈。

〔河白〕

治河白良方

將梔子黃。同雞子白。飛麵搗成餅。貼臍內。再以茵陳草。通草。甘草。燈草。煎湯服之。名四

草湯。

〔中暑霍亂〕

治中暑昏眩。煩悶欲絕。急救方

取田中乾泥。做一團。堆在病人肚上。使少壯人撒尿於泥團肚臍中。片時即得生矣。迨後不可飲冷湯。須進溫米湯。又挖地深三尺。取新汲水。傾入坑內。攪濁。飲數甌即愈。

治中暑注

用大蒜一握。同新黃土研爛。以新汲水和之。濾去渣。灌入即活。凡中暑傷者。不可便與冷物。俟稍甦。方可投冷物。則中氣運動無患也。

治傷暑霍亂神方

綠瓜葉片

白霜梅肉核中仁

右同研極爛。將新汲水調服。入口立瘥。切不可即飲熱湯。

又取扁豆葉搗汁一碗。飲之立愈。

治傷暑急暴霍亂吐瀉方

陳皮 藿香各五

右用土澄清水二杯。煎一杯服之立愈。

急救霍亂吐瀉抽筋危症方

不問轉筋霍亂。令人偃臥。將膝下腕內。以手蘸溫水輕輕急拍。直待紫紅筋現起。用

磁鋒刺出血立愈。此名委中穴。在膝後對面。

治乾霍亂前方 上不得吐下不得瀉 身出冷汗危在頃刻者 食鹽五錢 薑五錢 同炒變色 以水一大碗煎服

吐出自愈不可熱服好後切不可遽吃飯食 俟餓極後方可吃稀粥

治乾霍亂方 只一樣腹痛絞痛不可忍者切不可吃藥并熱湯水 一吃即死 將冷水一碗調入食鹽二三錢吃下

吐則再吃多吃多吐則邪散而愈

消渴

玉泉散 治消渴之神藥也 白粉甘葛 天花粉 麥冬一 生地 五味子 甘草 糯米 右服一劑

還津丸 生津止渴 霜梅 烏梅各二十五 蘇薄荷末一 冰片半 硼砂半 共研極細為丸每含一丸津液

立至

消渴潤燥方 白蜜 人乳酥各一 右溶化一處每日不拘時服 消渴方 用繅絲湯飲之

瘟疫

辟瘟丹方 此藥燒之能令瘟疫不染空房內燒之可辟穢惡 乳香 蒼朮 細辛 川芎 甘草

再加檀香一兩亦可共研細末乘肉為丸如芡實丸

神聖辟瘟丹 蒼朮為君 羌活 獨活 白芷 香附 大黃 甘松 山柰 赤箭 雄黃各等 右為末麵

糊丸如彈子大黃丹為衣曬乾焚之

治大頭瘟方 頭面腮際腫脹極大寒熱交作甚者崩裂出膿不可敷藥恐邪氣入內以至於死

人中白即馬桶底 大椒研末每服二錢白滾湯調服 又 將好青黛末調服二錢

又 只用馬藍頭一把搗汁將搗毛搽上一日五六次熱氣頓出親驗真神方也

治抱頭火丹 即大頭瘟 將扁柏葉搗爛用羅子清調敷神效

治鸚鵡瘟方 兩腮腫脹憎寒惡熱者 外用赤豆半升為末水調敷或用側柏葉搗爛敷之內用薄荷濃湯執服

二抄

治痧脹腹痛方 凡痧脹夏月多患此症面色紫赤腹痛難忍使飲熱湯便不可救即溫湯亦忌如遇此症速取生

黃豆咀嚼下約至數口立刻止痛平人食生豈最引惡心止有痧服人食之凡覺甘甜不知腥酸此方既可療病且可辨症真奇方也

沉香鬱金散 治痧氣寒凝以及腹痛 沉香 木香 鬱金 烏藥 降香 細辛 右忌見火生

研為細末每服三分將砂仁湯稍冷送下

痧藥方 石火龍丹 牛黃 麝香 冰片 硃砂 華撥 真金箔 火鎗硝 礞砂

牙皂 各研極細端午午時合如痧脹腹痛將此藥嗅鼻中并放舌尖上吃下亦可

又 名蟾酥丸 雄黃 麝香 木香 丁香 蒼木 蟾酥 石菖蒲 炒山茨菇

錢右共為末火酒化蟾酥為丸如粟米大硃砂為衣如難丸少加米飲每用二三粒放舌尖上化下加入西牛

黃金箔端午午時合尤妙又 沉香 母丁香 硃砂 雄黃 廣木香 麝香

茅山蒼木 淨末二兩 真蟾酥 右俱忌見火為細末各秤准分量將火酒化蟾酥為丸如丸不就少加

米飲丸如粟米大每服二三丸放舌尖上化下

神妙痧藥方 北細辛 荊芥 降香末 鬱金 右共為末每用一茶匙放舌尖上冷茶送下或津唾嚥下

白痧藥方 白胡椒 牙皂 火硝 檀香末 明礬 丁香 蟾酥 北細辛 冰片 麝香

必五 金箔量加

內消癰癧疫毒方 未穿破者為疫核已穿破者為癰癧三五個連者為串痰用羊角數對以威靈仙四兩共入

瓦罐內加清水煮數沸候用軟取出切薄片用新瓦燒紅將用鋪上焙炒過研細每灰一兩加廣木香一錢白芥

子三錢共為末煉蜜為丸用檳榔煎湯下或夏枯草湯下亦可服至七日後大便下如黑羊屎小便出黑水自消

婦人如爛開兩脰服之亦效忌生冷煎炒房事

內消癰癧應驗方 土貝母 白芷 共為末糖霜調陳酒下三錢重者三服愈

治疫核方 半夏末川貝末各一分用雞蛋大頭穿一孔不破內膜入藥在壳內膜外虛空處如虛人再加入參末

三分和入以紙封固。整飯鍋內。熬熟吃之。每日一個。久之自愈。

又每雞子一個。入貝母末三匙。照上法蒸熟。夏枯草湯。或銀花湯下。

取瘰癧法。名提癧丹。水銀 硃砂 火硝 明礬 皂礬 食鹽 各一 硃砂 錢二 用粗瓦盆。放前藥上。合粗

碗一隻。鹽泥封固。炭火鍊三炷香。先文後武。冷定。取出。昇在粗碗上。藥。白米飯。搗丸。菜豈大。硃砂為衣。每用一丸。

放瘡上。棉紙封二三層。一日夜急揭起。則核隨紙帶出。丸可再用。

治瘰癧方。將胡桃一枚。劈做兩半。將一半挖去肉。以蟬脫塞實。對合。用山泥包好。煨存性。研細。陳酒下。每日服一

枚。一月愈。

治瘰癧結核。九真藤即何首烏藤 洗淨。日日生嚼。并取葉搗塗之。

蝙蝠散。治瘰癧多年不瘥。蝙蝠一個 貓頭一個 右同燒灰。撒上黑豈。煨其灰骨化碎。為細末。濕即乾。搽乾。則油

調敷。內服五香連翹湯效。

治痰核瘰癧方。用鼠糞。揀兩頭尖者為雄。兩頭圓者為雌。揀開各曬乾。研末。男用雌。女用雄。將雞子一個。頂上打

一小洞。傾去白。但存黃。入鼠糞在內。以滿為度。攪勻。用皮紙封固。小洞。飯上蒸熟。去壳。臨睡時。搗碎好酒送下。隔

一日再服。雖連年破爛者。不過三四枚而愈。未破者即消。

燕窩膏。治瘰癧痰核癧疽發背腫毒。全蝎熱水浸透洗 白芷 黃連 黃柏 黃芩 當歸 山甲各一

生地赤芍 各五 官桂二 海藻二兩 五錢洗 番木鱉切碎 用麻油一觔四兩。浸藥五申。熬焦。黑色去

渣。將淨油秤準。每油二兩。用飛淨黃丹一兩。收滴水不散。先入白占一錢五分。黃占三錢。即下黃丹。再下杭粉

一兩。用桑枝不住手攪成膏。候冷。入水浸三四日。再用文火溶化。再入 沒藥三錢 阿魏錢三 麝香錢 血

竭錢二 朝南燕窩泥 雄黃錢一 硃砂錢一 兩頭尖錢七 白昇丹錢四 以上各藥。為極細末。入膏內。攪極勻。

用時。隔湯溶化。攤貼。勿見火。白昇藥方。水銀 皂礬 火硝 白礬 炒熟鹽 共研極細。照昇三白頭

法昇之。

治瘰癧散藥方。瘡已破。膿正多。瘡正腫。用此散之。呼膿退腫。蚯蚓糞吐菜地 細芽余 存性 肥皂核搗核者

螻蛄虫用泥包 壁虎瓦上 貓頭骨炙 雄鼠糞焙 右各等分。共為細末。和生麻油調敷。每日清晨用藥

湯洗淨敷之。一日洗五六次。敷五六次。待膿乾。即用膏藥貼之。

敷痰核瘰癧方。生南星生半夏各三錢 海藻昆布各二錢 麝香冰片各二分 紅花牡蠣各二錢 青鹽六分

右俱生研極細末。另將白芨兩許。切片煎膏。和前藥做成梃子。曬乾。用時磨敷。

又 生南星生半夏各一兩 大貝母昆布 海藻海浮石 銅綠明礬各五分 右用商陸根汁。

葱汁薑汁蜜。四味調敷。

又 用鉛三兩。鐵器中熬。久當有脚。如黑灰。取此灰和脂塗癩上。或用醋調塗。以舊帛貼之。數換舊帛。拭去惡汁。

又 貼。如此半月許。不痛不破。內消為水而愈。

大紅膏。治痰核瘰癧。不分新久未穿破者。南星二兩 銀硃血竭 消石潮腦各三錢 輕粉乳香各二錢

貓頭骨煨一具 石灰一兩 大黃五錢切片同石灰炒 右共為細末。陳醋熬稠。調藥敷核。三日一換。敷後編皮。

核不消者。另換紫雲膏貼之。其核自消。

痰核瘰癧膏。治未穿破者。貼之即消。貓頭骨牙爪一付 火煨存性 螻蛄虫炙 磁石醋煨各五錢 乳香沒藥各一錢

生明礬五錢 煨雄雞脚 海藻一兩 大貝母一兩 草麻子肉錢五 用麻油四兩。同上海貝麻三味。熬至滴水不散。濾去渣。入乳。沒再熬。將稠。離火乘滾入。貓頭骨。螻蛄虫。磁石。飛蟻。攪勻。燉冷水中。出火氣。乘軟。取起。打條。臨用攤貼。

凡去渣後。入細藥時。仍用青州丹。少加松香。黃蠟。看老嫩得宜。方入。貓頭骨等末。始易成膏。如已穿破。再取客廁梁

上塵加入。

瘰癧收口藥方。

龜版煨過 地理中四十九日 青葉陰乾 右同研細末。收口神效。

瘰癧

治三日大瘰神妙方。用活大烏龜一個。連壳左右肩。上各攢一孔。近尾處亦攢一孔。以明雄黃九錢。研細。每孔摻

入三錢。外以磁黃泥包固。勿令泄氣。炭火上煨存性。研細。每服准一錢。空心陳酒送下。二三服即止。

又 用陳香椽一個。去頂皮。大者每隻加透明雄黃三錢。中者二錢。小者一錢。雄黃研細。摻入香椽內。炭火中煨

存性再研極細每服七分用軟爛衣分作六七包乾咽下此日不可吃湯任其嘔去頑痰即愈

截瘧丹 斑猫 巴豆肉 硃砂各一分 麝香二分 雄黃半錢 蟾酥五分 右用黑棗二三個搗丸如菜豆大貼眉心

穴一周時揭下投長流水中

又 只聞香氣不必前食亦可愈瘧 常山 草果 川烏 草烏 陳皮 甘草各一分 右將絹袋盛貼聞於

鼻間即止

貼臍截瘧丸 胡椒 雄精 右二味等分研末將飯研爛為丸如桐子大外以硃砂為衣將一丸放在臍中外以

膏藥貼上瘧即止親驗

治諸瘧代參丸 白朮一斤 生薑一斤 搗出汁拌 右為末將黑棗一觔煮爛去皮核為丸

治瘧方 虛寒瘧更効孕婦忌貼 桂心一分 麝香三分 川椒粒 雄黃錢 共研極細末納臍中外以膏藥貼

治不論雙單瘧方 用大荸薺將好燒酒自春浸至秋間如瘧至不食飲食食則脹滿不下者每日服荸薺兩個三日即愈

日即愈

泄瀉

治老幼脾瀉久不愈神方 飯鍋粳四兩 蓮肉四兩 去 白糖四兩 右共和勻每服三五匙一日三次食遠服

止久瀉丸 治一切久瀉諸藥無效服此一服自愈 黃丹飛 枯礬 黃臘各一分 石榴皮八錢 將臘溶化小

銅杓內再以丹礬二味細末投入乘熱為丸如豆大空心服五丸紅刺清茶下白刺薑湯下

治白痢不止神效方 乾飯鍋粳二兩 松花二兩 臘肉骨頭五錢 共為末砂糖調不拘時服即止

治脾泄方 陳火腿骨研存性 紅麴 松花 右三味各等分砂糖調陳酒送下

痢

治痢初起法 不問男婦室女姪娘小兒皆能治之無有不效 白蘆薈二三觔洗淨連皮放石臼內搗碎絞取濃

汁如十歲以內小兒每日吃一飯碗大人每日吃二三飯碗俱要冷吃不必見火忌葷腥雜味并治疫痢如神

又 水晶糖四兩如赤痢用濃苦茶一杯白痢用薑汁一杯赤白痢用濃茶薑汁各半杯將水晶糖入內燉烱服

見效即愈。吃至二服無不見效。親驗。

治噤口痢。此係元氣虛極者。人參錢三。石蓮肉錢二。黃連錢一。鮮荷葉片一。老黃米撮。水二鍾煎六分。入

木香末三分。和勻服。積未淨者。加山查二錢。枳榔枳殼各七分。

入。米粒不下百藥不效者。用五穀虫焙乾為末。每服二三錢米湯下。

又。不能飲食者。用烏梅肉和蜆蛸搗爛成丸。含口內。片時即能飲食。烏梅渣不宜嚥下。

又。蒼朮。甘草。陳皮。厚朴。右各等分為粗末。用布包之。放在肚上。將熨斗盛火。熨布上。逼藥氣入腹。病

者覺腹中爽快。即將藥放枕頭下。以受藥氣。一日連熨三四五次。痛痢漸止。口中即飲食矣。

治赤白痢并水瀉。車前子炒。紅麴炒。赤石脂。滑石。右各等分為末。砂糖調。每服三錢。滾湯送下。一二服即效。

治赤白痢。不論初起久痢俱可用。柿餅一個。開一口。入白蠟三分。在內。將紙包好。紮佳。以水濕透紙。放在灰火

中煨熟食之。大人兩個。小兒一個即愈。

治赤痢。木耳灰。槐米灰。紅麴灰。砂糖調空心服。

治赤痢久不愈者。初起者宜先服。通利清濕熱之藥。幾劑。然後用此方。用鮮紅菱連殼搗爛。絞自然汁。一飯碗

露一宿。加白糖霜少許。隔湯燉。略溫清。晨空心服。每日一服。兩三服必愈。加糖者恐其味澁也。如不畏澁。即不可加

香參丸。治痢極效。百發百中之藥也。木香四兩。苦參酒炒。右為末。將甘草一觔。熬膏。丸桐子大。每服三錢。白

痢薑湯下。紅痢甘草湯下。噤口痢砂仁蓮肉湯下。水瀉豬苓澤瀉湯下。

治久痢如神。用刀豆莢。飯上蒸熟。洋糖蘸食。一二日即愈。

又。陳火腿骨四錢。黃連薑汁炒。砂糖四錢。烏梅肉五分。右共為末。將烏梅煮爛。搗丸。每服三四十九

空心黃米湯下。治久痢虛滑。不禁可以實腸。裏急後重。腹痛者不可服。用臭椿樹皮根。切碎。酒拌炒為細末。用真阿膠水化開。

和為丸。如桐子大。每服三五十九。空心米湯下。

治久痢。初起者不可服。煨花錢三錢 地榆錢二錢 乾荷葉錢二錢 臭椿樹根皮者去外粗皮 右為細末白痢紅糖

又 烏梅四兩 煨 白滑石二錢 臭椿樹根皮淨取在土者剝 右用陳米飯搗為丸每服四五十九空心

米湯下。

治痢方。不拘赤白泄瀉痢。至八九年者。三四服即愈。 香茹二十兩 藿香十兩 蘇葉七兩 木瓜五兩 檀香半兩

木香二兩 赤苓五兩 甘草兩 厚朴五兩 枳壳五兩 右為末蜜丸彈子大。約重二錢。每服一丸。白痢淡薑湯下。

紅痢木香湯下。其餘開水下。

治久瀉久痢方。陳石榴皮酸者焙乾 研細末。每服三錢。米飲湯下。患二三年。或二三月。百方不效者。服之即止。不

可輕忽。

治休息久痢。但痢而後無重痛者。用壯大豬小腸一條。不落水。將著頂翻。轉出腸中油膩穢濁刮下。但將刮下

之物。在瓦上炙焦。乾存性。研末用沙糖少許。空心調服。一條腸垢大者。分作二分。小者只作一分。若翻轉腸內有

糞。先去其糞。但刮其近腸之血膩油垢。炙用。重者吃兩三條。腸垢必愈。

治赤白久痢。腹中不痛者。桂圓個 粟壳個 荔枝個 建蓮七粒 水二碗。煎八分。空心服。朝服可以一日。

晚服可以一夜。不痢親驗良方。

治毒痢方。下膿血者是。金銀花一兩。煎湯送香連丸三錢。

〔脫肛〕

潤腸散。治痢後脫肛。 鷓鴣頭灰 五倍末 伏龍肝 生礬末 赤石脂 訶子肉各五錢 右為極細末。葱湯

洗淨。揅於腸頭上。頻頻換之。以愈為度。

治脫肛方。名枯礬煎。 五倍子錢 白礬少 右為末。水一碗。煎湯洗之。五效。若婦人產後脫肛。五倍子末揅之。

縮肛散。 鷓鴣頭一個 枯礬分 五倍子分 共研極細。揅之。又用爬牆草煎湯溫洗。肛隨浸隨縮上。

此草上生根一路沿牆而上者。但有二種。一種葉大似絲瓜葉者。不可用。須葉小如茶匙樣光亮者。

痔漏

縮痔秘方 內痔落下。用大團魚頭一個。火煨為末。搭痔上即刻收進親驗。

治外痔疼痛。坐臥不得者。大田螺八九個。將針挑開。置入冰片白礬末少許在內。以螺尖埋土中。令其蓋仰上。

經一夜。去螺水以雞毛搭痔上六七次。即消愈。

黃洗痔方。五倍子三四。皮硝撮。水二碗煎濃。先薰。先後洗一二次即愈。絕妙。

治痔漏丹方。名長明酒。用積年舊硫磺燈。洗淨油膩。火煨研細。以紅酒服四錢。不過七日。其管自去。

點痔方。銀珠三。大雄黑背蜈蚣三。共搗爛。用鹽泥封固。作團要留一孔。火昇煙盡為度。取出用田螺水調搽。

即縮上。不用銀珠。將上好黃丹拌之。亦效。又。蜈蚣一條。通紅土泥。用。硃砂。雄黃。冰片五。胆礬二。和化。蜈蚣水點之。

止痔下血方。蜈蚣一條。用鹽泥裹。硃砂。雄黃。冰片。共為極細末。入龍骨少許更妙。大便時乘其

脫出。以細草紙感藥少許託之。使入大效。

治痔漏方。新象牙屑二。勛為末。每早用熟雞子三個。將牙末和吃。或入稀粥內。吃亦可服盡。一料自愈。

又。露蜂房一大個。每孔內入。蠶蠶二。蟬蛻。木香各三。象牙末。豬胰油打。豬懸蹄蜜炙各。白頭

蚯蚓用石壓去血。陰陽。右共為細末。用黃占半勛。溶化。將藥酒漸入。搗勻為丸。如棗核大。每服一丸。空心好

酒送下。連服三丸。瘡口自消。隔一日。第五日再服一丸。第七日再服一丸。痔管自退出矣。將玉簪花根三段。一日

搗爛。搽上自愈。

又。名蝱蟻丸。蝱蟻十數條。將黃泥做成小管。如筆管大。入蝱蟻在內。上以磁黃泥塗護之。以。蟾酥一

熊胆分。麝香分。冰片分。看漏淺深。用飯粒為條。插入盡頭。欠者五六條。近者二三條。其管為膿水。用洗

藥。洗方。烏柏樹根皮。枸杞根皮。槐花。五味子。水楊樹桿鬚。瓦花。黃柏。荔枝草。右煎湯一

大碗。先薰後洗。再以十寶丹收口。十寶丹方。龍骨八。象皮分。琥珀分。血竭分。黃丹分。冰片分

珍珠二。商者。牛黃二。乳香各錢。沒藥各錢。共為細末。收貯聽用。

-11 133 35 953" data-label="Text">

痔漏退管方。象牙末二。人脚脂甲。錢五。牛骨腮一。豬腳格一。刺蝟皮鍋內。滾乾。右為末。再將地榆

槐角二味 入豬臟內煮熟搗爛。共搗蜜丸。每服三錢。空心滾湯送下。其管自出。半月即愈。

又 白鷄糞一升。放罐內。以滾水沖入。罐中。乘熱病人坐於罐口上薰之。其管自落。數日即收口。要坐久忍痛。

又 用豬臟頭。水煮爛。或鹽或醬油蘸吃。每日吃一個。吃至一二百個必愈。若脾胃畏油膩者。吃近肛門處管一段亦可。再每日切荸薺蒂一片。吃數片。二物常兼吃更妙。

又 金餘即人手 銀餘即人脚指甲 二味不稱 真血餘二兩 血珀五錢 黃牛角四兩 羊角四兩 新

象牙屑三兩 豬懸蹄四兩 蟹爪尖一兩 蜆螂虫十九個 刺猬皮二張 去毛 陳松蘿茶葉 三

穿山甲先用醋炒再 槐角子四兩 青黛潮水 地榆一兩 以上十六味如法煨煉為細末。用黃人大腸

煮爛。加煉老白蜜為丸。如無大腸。以豬臟代之。亦可。空心淡鹽湯送下。三錢。壯盛者加。或至五錢。虛人桂圓湯下。

痔漏插藥方。百草霜 黃連各半 冰片五分 麝香分二 蜆螂虫 旱連草頭五錢 蝸蝗十五條 瓦 共為細

末。丸如粟米大。入管口自進。藥三日後待管自化出。用長肉收功。末藥。

收功末藥方。輕粉 乳香 麝香分二 韶粉 東丹 血竭 共為末。搽之。

又 雄大蠅。不拘多少。陰乾。生研。加冰片少許。將綿紙摺作條。用白灰水蘸曬乾。待硬再蘸。浸藥末於紙

條上。量漏孔深淺。插入。漸漸生肉。其餘自然退出。用剪刀剪去。外一段即滿。壓矣。

治痔漏丸方。刺猬皮新瓦上炙脆為末 象牙屑一兩 菜豆粉一兩 青黛三錢 槐花末兩五 陳細茶五錢

右共為末。用陳糙米煮爛。飯和藥打為丸。每服三錢。金銀花湯送下。一料不效。二料不再發。

治多年頑漏神驗方。用大脚魚一個。再取上好冰片三錢。鍾乳石五錢。俱研極細。放入脚魚口內。放完將脚魚

扣住脚。倒掛三四日。待脚魚頭腫大。取快刀殺下頭。乘用陰陽瓦兩塊。對合將魚頭裝入瓦內。放炭火上。兩頭將

鹽泥封固。瓦上留一小孔。出煙。待煙稍盡。存性。將小孔封固。拿至地上。俟冷打開。研細。用四五分好酒送下。病重

者。兩三服。其管自出。再用長肉藥收功。

治漏疾秘方。香菜油一觔。以三十歲婦人血餘二兩。入油內熬煎去渣。每日用油一鍾。煎雞子三枚。將象牙細末

三錢。修在肉裏。吃連吃三五日。或將元米粉條。象牙屑攤餅。亦可。象牙末吃至一二觔。再無不效。此法不用刀

割。

割。

割。

針掛線有管自然退出屢試屢驗象才要具更要新而雪白者錢碎再用乳鉢細研

腸風

治腸風下血丸方。槐花二兩一半炒一兩半炒 柿餅七個 烏梅十個 共打為丸。桐子大。每日空心滾湯送下。即愈。

又 末藥方 扁柏葉一斤家浸一 青州柿餅一劑炭火 煨過為末 右二味拌勻。每服五錢。空心陳酒送下。極重者五

六服可除根

治血痔腸風方。將豕肉煮爛。吃一碗血即止。其效如神。

治腸風并痔漏。木耳一觔。煮成膏。再入豬肉三觔。煮熟。食盡即愈。漏管自出。

治痔瘡下血方。棉子仁四兩兩 青州柿餅十二兩 百草霜四兩 烏梅肉四兩 共搗為丸。每服三錢。白滾

湯下。或腐漿加青黛少許下更妙。

治腸風下血方。青州柿餅三個 地榆 槐米各五錢 共研末分七服。空心開水調服。忌燒酒椒蒜芥。

又 當歸一懷生地切兩竹刀 芡肉兩 真阿膠一兩將石膏二兩研碎和炒成 棉子仁一斤燎去外面花

至逐粒爆開并 真柿霜即柿餅上白霜也。但假者甚多入口甘而涼 右逐味炒焦。要如墨色。又各要存性。共

研為細末。和入柿霜拌勻。每日空心服藥末四錢。白滾湯一飯碗。沖和將筋調末。即半浮牛沉。連湯飲下。若下血

太甚。臨晚再服三錢。俟糞色變黑。血漸止矣。忌食胡椒燒酒辛辣之物。有此病者。終身宜戒。此方修合之法。不過

極細黑四字。則藥末決洽於臟腑。所以要黑者。血遇黑而止。以水剋火。五行之理也。

治腸風 臭椿樹根皮四兩 大茴香粒一大 木耳四兩 以雄豬肚子一個。將藥俱裝入肚內。紮好煮爛。去椿

皮。但吃木耳。肚子連湯吃。完重者兩料必愈。

治腸風久不愈者 臭椿樹根皮 烏梅 共煎陳酒沖服即愈。

治腸風 青州柿餅一個。內放白蠟六錢。飯鍋上蒸熟。食數次愈。

治大便下膿血。即日夜數次。數年久病皆愈。雄豬大臟一條。洗淨。桂圓肉二兩。新鮮白扁豆花四兩。將二味同

打爛。用白糯米拌和。裝入臟內。兩頭紮住。砂鍋內燒爛。忘見鐵器。然後將人中白炙脆研末。蘸吃。或醬油蘸吃。亦

可。不論吃粥吃飯。空口皆可吃。吃四五條即愈。

治大便下血。茅薺搗汁半鍾。將好酒半鍾沖入。空心溫服。三日即愈。

治大便下血。用涼藥不效者。用歸脾湯。加槐花黃芩治之自愈。

治大便下血虛弱者。早蓮草陰乾為末。以棉花煎湯調炒米粉糊丸。桐子大。每日服五錢。以人參五分煎湯下。二服即愈。

〔瀉血〕

治瀉血者。瀉血者。不痛而小便出血也。痛者為血淋。用頭鬚燒灰研末。每服三錢。空心滾酒調下。或用百草霜酒調服。或用伏龍肝白滾湯調下。夏月水調。痛者車前草絞取濃汁。碗許入糖霜一二匙。燉溫服之。此可多服自愈。

初痛時用韭汁亦好。或將亂髮灰糊丸。桐子大。每服七十九。空心開水下。

治男子莖中痛及婦人血結腹痛。取牛膝一大握。酒煮飲之立愈。

治小便下血。用清利不效者。用補中益氣湯。加車前子治之自愈。

治小便下血立效。旱蓮草 車前子各等分 將二味搗自然汁。每日空心服一茶杯。

種福堂公選良方

葉桂 天士先生論

同人公較

〔疝氣〕

治諸疝海上丹方。雄猪大腰子一對。不落水去膜。併血切作片。以大茴香。小茴香。各一兩。俱炒為粗末。同腰子拌勻。復以猪尿胞一個入拌者在內。紮固用無灰好酒二碗。砂鍋內懸尿胞於其間。煮至酒存半碗。收出一併切碎。

焙乾研細存酒。打糊丸如桐子大。每服空心陳酒送下七十九。一方用生白酒三碗煮。

治响疝并小腸氣。木通 川棟各一 大茴五分 飛鹽三分 右為末。水酒調服。頭服出汗。服七日全愈。如少年者加一倍。俱空心酒下。

治疝氣方 荔枝核兩 橘核打碎炒 小茴炒六 川棟子一兩 酒蒸 蘿巴酒拌炒 吳萸鹽水炒 澤瀉一兩

甘草^五 青皮^兩 山甲^{二兩} 右為末每服一錢升麻一分半黃酒調下。

治濕氣陰丸作痛。新文 紫蘇葉^烘 川椒^{炒熟各} 右三味拌勻乘熱絹袋盛夾囊下勿泄氣。

治陰囊腎子腫大方。竈心土三升砂鍋內炒熟加川椒小茴香末各一兩拌勻將陰囊坐在上面冷則再換如此

三次即愈。

治陰子腫大不消。頂大荔枝核十二三個煨灰存性以火酒調如糊吃下即消若重者再吃一服。

治疝氣偏墜。用肥薑切片鋪湊板上上堆薪艾一尖點火燒之候將完即乘熱帶火連薑并艾搗極爛將鮮菜葉

一大片放手掌內即以薑艾攤勻菜葉上用手向腎囊底下托之初時其冷如冰須更滾熱通身出汗而愈。

心口胃脘痛

治心頭痛欲死不可忍者。良薑 厚朴^{薑汁} 靈脂 右各等分為末每服一錢醋湯下即止。

治心痛方。實胃口痛也若真心痛不治。高良薑^{酒洗} 香附子^{醋炒} 薑末二錢香附末一錢病因怒起者香附末二錢良薑一錢寒怒兼有者各用一錢五分臨時以米湯加入生薑

汁一匙食鹽一捻或二服或三服痛止後用鍬刀挑鹽一撮火上燒紅泡湯服并服大棗數枚約數朝速效。

治心痛方。婦人服之甚效。丹參^兩 檀香^{錢一} 砂仁^{錢一} 共煎八分服之即愈。

治心口胃脘痛。用大黑棗去核每個中開入胡椒七粒仍將棗包好炭火上煨焦黑存性研末每服三四分陳酒

送下三四服必愈加木香枳殼紅花當歸五靈脂少許更妙。

治胃口痛方。手指甲男痛用女右女痛用男左剪下放新瓦上炙脆存性為末約四五分入砂糖少許或湯或酒

調之食遠服。

治胃寒常發惡心嘔吐或痛。用老生薑半觔去皮搗爛絞汁去渣隔湯煮一二十沸停火將上白洋糖半觔攪入

內煎一滾收之時時吃二匙作三四日吃完重者服之兩料必愈。

治胃寒嘔吐。兼治寒瘧。大黑棗七個去核每個內入丁香一隻煮爛去丁香將棗連湯空心服七服見效。

治嘔吐不止。陳梅醬煎成湯如有火加竹茹有寒加豆蔻或砂仁或煨薑如無梅醬以烏梅代之。

治嘔吐方。見食即嘔。或食罷即嘔。初起者易治。此痰在胃口也。生薑二兩。打碎陳皮五六錢。切碎泡湯一碗。慢慢逐口吃下。自安。甚者竹瀝薑汁和勻。逐匙挑在舌上。咽下。若咽急并藥吐出矣。

治感氣或飲食傷脾作痛方。橘皮一把。煎濃汁一碗。打入鹽薑少許。吃下神效。
補脾養胃方。名陽春白雪糕。茯苓 山藥炒 芡實 蓮肉去心各 糯米 黃米各半升 白糖兩

先將藥米粉蒸熟。再入白糖印作餅子。曬乾。每日空心吃幾個。極有益。
治老人脾泄最宜。名玉露霜。白朮炒 陳皮半兩 蓮肉四兩 汶仁烟兩 糯米 菜豆 陳米鍋

佳俱炒一升。共為末。收貯臨用時。糖霜量加。將滾水調服二三兩。
治腫飲。燈草碗煎至二碗。蘿蔔子微炒 砂仁微炒 將二味研末。傾入燈草湯內。畧滾即盛入茶壺內。慢吃下。吃盡不見效。如前再煎一服。俟腹响放屁。小便長而腫即退。

〔效逆〕
治呃逆欲死。半夏錢五 生薑錢二 水煎服即愈。
治病後呃逆不止。刀豆子燒存性。滾水調服二錢。即止神效。

治呃逆不止方。用荔枝七個。連皮燒灰存性。為末。白湯調服立止。

〔效逆〕
治效逆方。明雄黃一錢。酒一杯。煎七分。急令患人嗅其熱氣即止。

又 好硫黃乳香各等分。以酒煎急令患人嗅之。又硫黃 乳香 艾各三錢

治食物醋心。用胡桃嚼爛。生薑下立止。

〔耳〕

治耳暴聾方。菊花 未通 石菖蒲 搗爛酒服之。
治耳聾方。真北細辛研末。溶黃蠟為丸。如鼠糞大。以綿裹塞耳中。二三次即愈。

治耳內出膿方。胭脂 枯礬 釘鑪粉 右各等分為末吹之立效。

又方。羊屎彈鹿灰 枯礬 輕粉各五分 右為末用棉花捲淨耳內膿。將葶管吹之立效。

治耳中膿水不止方。龍骨 枯礬 乾胭脂要產山東濟寧府如銀珠樣紫 海螵蛸各等 麝香少 右為末先以棉紙捲乾輕吹耳內。

治耳中腫痛并出膿血方。黃魚牙齒。瓦上炙存性為末。放土地上退火氣。研末加水片少許。菜油調。雞毛蘸入耳中。如乾胭脂更妙。

又方。用橄欖核燒灰存性每核一枚。入冰片二釐。研極細末吹入耳中即愈。

治耳中常出血方。五色龍骨煨研細末吹入耳中即止。

治出鼻膿方。龍骨煨 五倍子炒 乳香 枯礬 血餘灰 右各等分為末捲淨吹之。

治耳中膿水不乾。石榴花瓣不拘多少。炙脆研末。加些冰片。再研吹耳自愈。

治百蟲入耳方。如蟲入耳不可驚動。在左耳以手緊閉右耳。及兩鼻孔。氣至左耳自出。右耳亦然。

耳

烏羊肝丸。大能烏鬚髮聰耳明目。烏羊肝一具竹刀切片 磁盆內再以羊胆不拘多少塗晒乾。又塗又晒。妙晒時以紗單罩晒極乾。當歸酒浸 白芍酒各四兩 熟地蒸極熟 何首烏蒸 覆盆子炒 山萸炒 去核 早蓮草酒拌 白茯苓乳 血餘 生地酒洗各四兩 右藥不犯鐵器製完共和一處。再用大熟地十二兩酒煮一晝夜。取濃汁一碗拌藥內煉煉蜜為丸。桐子大每服百丸。空心酒下。臨臥亦服一次。

治虛眼方。凡虛人目無病。到點燈時候。即不見物。或羞明。只用羊肝煮食。便效。不必服他藥。

治雀目方。日落不見物也。石決明 夜明砂各二錢 猪肝 白羊肝各一兩 將肝二片。中間盛藥。麻線紮定。淘米泔水一碗。砂罐煮熟。臨臥服。

又方。用鷄羊肝一具。不見水不犯鐵器。以竹刀切開。入谷精草細末。瓦罐內煮熟。不時服之。屢驗。黑羊者佳。

治風火眼洗方。歸尾 胆礬 銅青各一分 防風 荊芥 赤芍 川連各二分 杏仁十四粒 去 右絹包煎洗。

治風火眼洗方。歸尾 胆礬 銅青各一分 防風 荊芥 赤芍 川連各二分 杏仁十四粒 去 右絹包煎洗。

治風火眼洗方。歸尾 胆礬 銅青各一分 防風 荊芥 赤芍 川連各二分 杏仁十四粒 去 右絹包煎洗。

治風火眼洗方。歸尾 胆礬 銅青各一分 防風 荊芥 赤芍 川連各二分 杏仁十四粒 去 右絹包煎洗。

治風火眼洗方。歸尾 胆礬 銅青各一分 防風 荊芥 赤芍 川連各二分 杏仁十四粒 去 右絹包煎洗。

治風火眼洗方。歸尾 胆礬 銅青各一分 防風 荊芥 赤芍 川連各二分 杏仁十四粒 去 右絹包煎洗。

治風火眼洗方。歸尾 胆礬 銅青各一分 防風 荊芥 赤芍 川連各二分 杏仁十四粒 去 右絹包煎洗。

治嘔吐方。見食即嘔或食罷即嘔初起者易治此痰在胃口也。生薑二兩打碎陳皮五六錢切碎泡湯一碗慢

慢逐口吃下自安。甚者竹瀝薑汁和勻。逐匙挑在舌上咽下。若咽急并藥吐出矣。

治感氣或飲食傷脾作痛方。橘皮一把煎濃汁一碗打入鹽薑少許吃下神效。

補脾養胃方。名陽春白雪糕。茯苓 山藥炒 芡實 蓮肉去心各 糯米 黃米各半升 白糖兩

先將藥米粉蒸熟再入白糖印作餅子曬乾每日空心吃幾個極有益。

治老人脾泄最宜。名玉露霜 白朮炒 陳皮半兩 蓮肉去心 苡仁四兩 糯米 菜豆 陳米鍋

焦俱炒 共為末收貯臨用時糖霜量加將滾水調服二三兩。

治腫飲 燈草碗許至二碗 蘿蔔子微炒 砂仁微炒 將二味研末傾入燈草湯內畧滾即盛入茶壺內

慢吃下。吃盡不見效如前再煎一服俟腹响放屁小便長而腫即退。

〔效逆〕 治呃逆欲死。半夏錢五 生薑錢二 水煎服即愈。

治病後呃逆不止。刀豆子燒存性滾水調服二錢即止神效。

治呃逆不止方。用荔枝七個連皮燒灰存性為末白湯調服立止。

〔效逆〕

治效逆方。明雄黃一錢酒一杯煎七分急令患人嗅其熱氣即止。

又 好硫黃乳香各等分以酒煎急令患人嗅之 又硫黃 乳香 艾錢三

治食物醋心。用胡桃嚼爛生薑下立止。

〔耳〕

治耳暴聾方。菊花 木通 石菖蒲 搗爛酒服之。

治耳聾方。真北細辛研末溶黃蠟為丸如鼠糞大以綿裹塞耳中二三次即愈。

又方。老鼠胆汁滴入耳中二三次即愈。

治耳內出膿方。 胭脂 枯礬 釘鏞粉 右各等分為末吹之立效。

又方。 羊屎彈燒灰 枯礬 輕粉各五 右為末用棉花捲淨耳內膿。將葦管吹之立效。

治耳中膿水不止方。 龍骨 枯礬 乾胭脂要產山東濟寧府如銀珠樣紫 海螵蛸各等 右為末先以棉紙捲乾輕吹耳內。

治耳中腫痛并出膿血方。 黃魚牙齒。瓦上炙存性為末。放土地上退火氣。研末加水片少許。菜油調。雞毛蘸入耳中。如乾胭脂更妙。

又方。 用橄欖核燒灰存性每核一枚。入冰片二釐。研極細末吹入耳中即愈。

治耳中常出血方。 五色龍骨煨研細末吹入耳中即止。

治出臭膿方。 龍骨煨 五倍子炒 乳香 枯礬 血餘灰 右各等分為末捲淨吹之。

治耳中膿水不乾。 石榴花瓣不拘多少。炙脆研末。加些冰片。再研吹耳自愈。

治百蟲入耳方。 如蟲入耳不可驚動。在左耳以手繫閉右耳。及兩鼻孔。氣至左耳虫自出。右耳亦然。

耳

烏羊肝丸。 大能為鬚髮聰耳明目。 烏羊肝一具 竹刀切片。放磁盆內。再以羊胆不拘多少塗。晒乾。又塗。又晒。妙晒時以紗單罩晒極乾。 當歸酒浸 白芍酒 川芎各四兩 熟地蒸極熟 何首烏九蒸 覆盆子炒 山萸炒 旱蓮草 茯苓乳 血餘 生地酒洗各四兩 右藥不犯鐵器製完。共和一處。再用大熟地十二兩酒煮一晝夜。取濃汁一碗。拌藥內煉。煉蜜為丸。桐子大。每服百丸。空心酒下。臨臥亦服一次。

治虛眼方。 凡虛人目無病。到點燈時候。即不見物。或羞明。只用羊肝煮食。便效。不必服他藥。

治雀目方。 日落不見物也。 石決明 夜明砂各二錢 猪肝 白羊肝各一兩 將肝二片。中間盛藥。麻線紮定。淘米泔水一碗。砂罐煮熟。臨臥服。

又方。 用鴉羊肝一具。不見水不犯鐵器。以竹刀切開。入谷精草細末。瓦罐內煮熟。不時服之。屢驗。 黑羊者佳。

治風火眼洗方。 歸尾 胆礬 銅青各一分 防風 荆芥 赤芍 川連各二分 杏仁十四粒 去 右絹包煎洗。

治弦爛風赤眼洗方。文蛤 黃連去淨毛 防風 荊芥穗各五錢 苦參四錢 銅綠五分 右為細末以薄荷煎湯丸

彈子大臨用以熱水化開乘熱洗眼每日三次神效。一方有川芎當歸各四錢。

治爛眼皮方。用挂金燈淨壳每壳一個搽入研細透明綠色胆礬末二釐或用壳十個或二十個裝套好外用淨

磁黃泥包裹好勿令泄氣炭火煨至中間壳將成黑灰存性放地上用碗蓋煨火將中間灰研細包好放土地上

一夜出火毒每用灰少許放茶杯內以冷松蘿茶浸之用薄棉紙蓋在茶面上俟茶浸出紙面上將此水洗眼皮

每日五六次二三日即愈。

治火眼執障眼痛不可忍者。用黃連為末入乳拌勻似糊樣攤碗底上用艾如雞子大一塊放地上點着以黃連

碗覆上令艾薰透取起以清水一小杯調濃上覆棉紙一張隔紙透出黃藥汁以簪頻頻點洗即愈。

治眼中努肉方。用蛇退一條將麻油三錢炒黃色不可焦黑菜豆三合炒砂糖一碗水一碗共煎七分食遠服立

退二三年者可治兩服即愈。

治火眼方。用小兒糞中蛔虫一條用水洗淨挂陰處下用磁盆盛其滴下之水入冰片五釐再加入乳一茶匙用

熱水隔湯燉溫以雞毛蘸眼立愈。

治風火眼方。童便煎甘菊湯頻頻洗之。

點眼神方。真川連 川大黃 黃芩 川羌活 甘菊花 龍胆草 薄荷 防風 荊芥 木賊 密蒙花各五

壯細辛 川芎 蟬蛻 青箱子即雞子 黃柏 白蒺 蔓荊子各三 以上諸藥須揀淨用水二大碗熬煎濃

汁成膏去渣一小鐘將上好蘆甘石三兩放銀罐內煨酥研極細末用甜水飛過入冰片三分麝香一分五釐仍

入乳鉢內磨細將前藥汁入內成丸如菜豆大銀珠為衣一時烘乾即收磁瓶內不可見日臨用以水磨化點入

兩眼角內輕者則用半丸重者一二丸即愈。

又方。冬天取淨臘雪將大荸薺同雪水磨粉曬乾加冰片少許入鵝毛管中點眼神效。
又方。名磨光散。野荸薺粉洗淨去皮石臼中搗爛蜜細絞汁蘆甘石再用童便煨一次將藥水飛晒乾
珍珠入豆腐內煮 每荸薺乾粉一兩配製過甘石五錢珠末三錢各將磁瓶收貯臨用漸漸配和加入冰片少

許點之

明目去翳秘方。錦文大黃一兩。北細辛一兩。將二味用上高泉水一百二十兩。將藥入砂鍋煎至二十兩。以細絹

濾去渣。用大銀碗一個。盛藥。碗下以磚三塊放定。碗底下將燈盞注麻油。用燈草七根。燈盞碗底內煎藥成膏。

滴水成珠。每膏一兩。用野葶薺粉五錢。多此亦不妨。冰片三分。和均作餅。如多年的厚翳。每兩加水飛過。蟬蛻末

五分。須要去頭足。搽碎去泥沙。水洗曬乾。為末。水飛三次。用。又治飛絲入目。每兩加銀硃五分。研細末。水飛曬

乾。用。如風寒等翳。每兩加青黛五分。研細水飛曬乾。用。以上諸症。隨症加藥入膏。調均貼之。最良。用頭生小

兒乳蘸點。取葶薺粉法。如取菜豆粉與藕粉同法。須水澄極細。曬乾。再研極細。須忘鐵器。

又方。野葶薺 猪膜 各等分。搗和。用雞子壳半個。放藥在內。臨臥合印堂上。俟水流入目中。翳隨淚出。二十日

即愈。并治田螺頭眼。

又方。將新象牙物件。水磨點翳膜上。即去。又方。用新象牙磨屑。將生男乳浸透點之。即愈。

又方。刮孕婦大指甲末。乳調敷。即愈。又方。枸杞錢三 木賊七根長 桂圓肉七 煎湯服。月餘自效。

治遠年攀睛翳膜。名五退散。人退即指甲末 山甲炒 蟬退洗淨 龍退即蛇 鳳退即雞子壳 右為極

細末。每用三釐。令患人含水一口。患在左眼。吹入右鼻。患在右眼。吹入左鼻。再以錫作眼樣。合患眼上。如此三次。

則翳膜或血絲俱落。

治眼吹鼻散。穿山甲炒 鵝兒不食草入 人金即指甲 刺猬皮三分 蛇退半 蟬退釐 石蟹二分

麝香三釐 桔梗分 右為末。每用三釐。吹入鼻中。其翳即下。

開翳復明方。生地 枸杞 甘菊淨 殺精草不用葉 木賊草如無翳 右藥各四兩。用人乳拌浸一日。曬共

九日。又用童便浸曬。共十八日。倘遇陰天下雨。即將微火烘乾。共研細末。陳米粉調和為丸。清晨白滾水下。三錢。

半月即開光。

治損目破睛方。用牛口涎。每日點兩次。須要避風。黑睛破者亦痊。

治鼻淵腦漏方。用羊卵子一對。去膜切片。頂大者尤妙。醬油陳酒拌之。放碗內。隔湯煮熟。以陳酒送下。飲微醉。三五次即愈。臨午服。

治鼻淵方。用老刀豆文火焙乾為末。酒服三錢。重者不過三服即愈。

治鼻中時時流臭黃水甚者。腦亦時痛。名控腦砂。有虫在腦中。用絲瓜藤近根處三五尺。燒存性為末。酒調服即愈。

治鼻痔方。霜梅一個。草麻仁七粒。生薑許。右三味同打。將絲綿包裹。塞鼻內。一日夜即愈。

又方。輕粉錢。杏仁七粒。白礬錢五。右為末。吹入即化為水。

治鼻內生疔方。爛黃雞屎。荔枝肉。同打爛塗上即愈。

治鼻癢方。七月七日。收甜瓜蒂。陰乾。臨用一分。研末。再用白礬少許。綿裹塞鼻。

又方。瓜蒂五分。研末。麝香少許。含水口中。嗅味自落。

治鼻衄方。麥冬錢五。生地錢五。水煎服立止。又方。菜豆粉兩。細茶錢二。右為末。涼水調服。

又方。梔子炒。百草霜。龍骨煨。京墨。牡蠣煨。血餘煨。存。右為末。用茅花水醱濕。醱藥入鼻孔。如無茅

花。將紙捲水醱藥入鼻孔即止。又方。馬蘭草汁一杯。吃下立止。

又方。大蒜頭搗爛。左鼻衄。將蒜塗左足心。右鼻衄。塗右足心。立止一方。左塗右。右塗左。

又方。用粟牙屑吹入鼻中即愈。又方。胎髮燒灰。烏梅一個。共研吹鼻中。立止。

又方。用生吳茱研末。津調塗足底心。湧泉穴上。用山梔炒黑為末。吹鼻中效。

治赤鼻方。枇杷葉去毛。梔子仁錢五。右為末。每服二三錢。溫酒下。早服去。右邊赤。晚服去。左邊赤。再用。後敷藥。忌食胡椒。生薑。辛辣之物。敷藥方。木鬚子壳。大楓子壳。輕粉。硫黃。共為末。不時以唾調擦。亦治面

瘡風刺。

又方。用極臭鹽蛋一二十個者。熟取黃煎油一小盞。和細辛末。白菊花末各二錢。調勻。常擦患處。每日用鮮枇杷葉刷去毛。蜜炙煎湯服。半月愈。

神效吹口藥方。并治喉症。薄荷葉 殭蠶 青黛 朴硝 白礬 火硝 川連 硼砂各五分 右共為細末

臘月初一收雄猪胆八個。倒出胆汁。以小牛和藥拌勻。復入胆壳。以線紮頭。外用青鋼紙包裹於淨地。挖一大孔。

深澗各尺許。將胆懸空。橫吊於竹竿上。以板鋪上。用泥覆蓋。至立春日取出。挂透風處陰乾。去壳收磁瓶內。每一

兩加冰片三分。同研極細末。吹患處立愈。

又方。兒茶錢一 人中白八分 錫內煨 冰片錢五 硼砂分六 珍珠分一 牛黃錢三 黃柏六分 滴乳石八分 薄

荷分六 甘草五分 先將黃柏薄荷甘草另研篩細。次用兒茶等藥研細篩淨。珍珠另研和。再入冰片牛黃。不

用篩。即小兒痧症症後。俱可用。

又方。薄荷錢六 青黛錢三 黃柏錢三 人中白錢四 兒茶錢四 冰片分五 青果核分十 經霜西瓜皮錢二

又方。燈草灰以青竹管填滿春實燒 大冰片 薄荷葉乾 石膏各等 共為細末。和勻。蘆管吹下。

治口瘡方。用陳白螺蛳壳燒灰。加兒茶少許為末。吹患處。一次即愈。諸世悉治。

(舌)

治舌衄出血。用槐花末敷之。即愈。

治舌腫方。用蒲黃末搽之。即愈。若舌腫出外。或以冰片少許抹上。或以草麻油蘸紙作摺。燒烟薰之。隨即消縮。若

舌忽然腫硬。或出血如泉湧。用烏賊魚骨。蒲黃各等分。為細末。敷舌上。愈。

治重舌方。將蒲黃為細末。敷五六次。即愈。

(牙)

治火牙痛方。并治口舌生熱。瘡腐爛。七八月間。俟西瓜將完時。將瓜剖開去穢。將瓜皮合竹籃內。挂露天。俟其

日曬夜露。經霜取下。止存外面青薄皮。研末。擦牙止痛。或和入吹口藥內。極妙。西瓜在藤上。經霜者更妙。一方加

冰片少許。

治虫牙痛方。名韭子湯。用韭子一撮。將碗底盛之。覆水中。用火燒煙。外用小竹梗將下截劈為四開。以紙糊如

喇叭樣。引烟薰蛀齒如下。牙蛀者。以韭子煎濃湯。漱之。虫自出。

治牙痛方。名一笑散。火硝一錢。冰片一分。明雄黃一分。元明粉五分。右共為細末。擦患處。立愈。

治風火蟲牙痛方。真樟腦一錢。花椒三錢。薄荷葉一錢。先將薄荷花椒用水拌勻。放在磁碗底內。後將潮腦研細。蓋面將碗合住。用紙封好碗口。以炭火昇之。俟青烟出為度。取碗上昇起之藥。將磁瓶收貯。痛時擦一二次。即愈。

神效。取牙方。雄活鯽魚一尾。約四五兩。白砥一錢。將砥末入魚腹中。待其肉爛去砥。不用。只用淨魚骨曬乾為細末。每用米

糶大少許。放患牙根上自落。

治走馬牙疳方。用人龍在瓦上焙乾。研極細末。加青黛少許。冰片少許。研勻吹入即愈。

治牙根出血不止方。甚有成碗成斗。如線索牽拽而出者。大黃二錢。切片生研。若人壯者。或五錢亦可。滾水調

下。按此症乃胃中實熱。非降不可故也。

咽喉

治一切喉症屬火者。用鮮扁柏搗汁。加生白蜜調和。忌見火以茶匙。時時挑嚥之。消腫退火神效。

治喉症屬時邪風火痰潮壅閉。喘急危篤。發來迅速者。先深針委中穴中。出血自愈。其穴在膝蓋對後。大小腿交界

縫中。并治纏喉風急症。

治一切痰火風喉症。用青脆梅子百枚。捉活蛭蚰一二百條。同放瓦罐中。每日將梅取出。曬後仍入罐中。明日再

曬。以收乾汁為度。再用微火烘乾。用則以一個噙化。或炙脆研末。加入諸藥內。

又方。霜梅去核一個。明雄黃一錢。枯礬五分。將二味入梅中。搗爛成膏。丸如菘豆大。磁瓶收貯。每用一丸。放舌底下

噙化。重者二三枚。輕者一枚。或為末吹下亦效。

治喉龍忽脹似喉鵝不能飲食。用草麻子三四兩。杵去壳。搗爛鋪夾在草紙內。將油壓在紙草中。去草麻屑不用。

將草紙捲煤頭點火。俟火熄。令病人將烟吸入。或吹入喉間。自然腫脹漸消。

治急鎖喉風方。其証先一二日。胸膈氣緊。呼吸短促。忽然咽喉腫毒。手足厥冷。氣閉不通。急用巴豆七粒。三粒生

同位熟生者去殼研熟者去殼炒去油存性。將明雄黃五分。鬱金一個。共研末。每用末半茶匙。清茶調下。如口禁

...

...

咽塞用小竹管吹藥喉中須臾吐利即愈。

又方 用生巴豆半粒川貝母一粒去心共研爛燈心湯灌下即愈。

治纏喉風方 此症猝然脹起痰涎壅甚不速救即死急尋野牛膝根草一二兩許此草隨處有之極取根打濃汁

碗許灌下即消如腫痛不能入咽即令其人仰臥滴入鼻中流至咽喉下方能得命再將生韭菜連根打數項下

其效

治喉風舌大如脣即時不救即死 冰片一分 火硝三分 胆礬一分 青黛一分 蠶蠶五分 硼砂一分

右藥共為細末吹之即愈。

治喉風方 用年久夜壺垢瓦上炙研細吹入即愈。

治喉鵝方 人已氣絕心頭微熱者藥入口聽有聲能下最無不活 三九冬天取老猪婆糞放在屋上日曬夜露

七八日取下在炭火上煨至烟盡為度以水調如糊徐徐灌之。

急救乳蛾方 用兩手從臂上抹至大拇指間四五十下以繩繫住男左女右大指甲旁以針刺出血即止愈此少

商穴在大指甲去側去甲韭葉大。

治乳蛾并治喉內一切熱毒 硼砂錢一 膽礬錢一 共為細末入青魚膽內陰乾研末加山豆根一錢磁器收貯吹

患處流涎即愈。

治喉蛾閉結不開 將土牛膝草搗汁滴鼻孔中吐去塞痰即愈。

治喉癰方 喉症惟此最速久則失音不可救。

西牛黃一分 真山羊血一分 川黃連五分 血珀三分 冰片一分 硼砂錢一 青果核灰三分 燈草灰五分 共為細末

每一茶匙藥用一茶匙蜜調之放舌尖上徐徐嚥下。一日五次兩月可愈此方或加入蜈蚣梅灰更妙。

喉症開闔方 牙皂 巴豆 共為末米湯調刷紙上曬乾作捻子點火以烟薰鼻孔立能開口鼻流涕涎專治十

八種喉閉 又方 巴豆四十五粒夾草紙內壓出油搵成油紙條薰鼻孔內。

治咽喉失音方 人乳 白蜜 梨汁 香椿芽汁 乾香椿芽為末亦可 右四味和勻重湯煮熟不拘時服。

癰疽

治肺癰丹方。用尿坑內鑿下坑堵。名坑砂。以草鞋包好。浸長流水中七日。取出。炭火煨紅。醋淬三次。研細同搗。用

乘肉搗丸桐子大。每服二三錢。吐血膿而愈。

又方。大白梨煮四雙調鍋。上白蜜。上洋糖各八兩。同熬將好。下川貝母末四兩收之。

又方。用百年鹹芥菜酒。久窖地中者。服數匙立起。此酒加興府城中大家多藏之。

又方。將汶仁為末。糯米湯調入。或入粥內煮吃。或以水煎服。或將汶仁連根搗汁。沖好酒服。總以當下膿血便愈。

又方。將魚腥草水煮多吃即愈。

治肺家吐臭痰。或吐如魚腥痰要藥。川通草。蘆根。汶仁。桔梗。

治腸癰腹中疔痛。煩躁不安。或脹滿不食。小便澀。婦人產後虛熱。多有此症。縱非癰疑似間亦當服之。

汶仁三錢。瓜萼仁三錢。牡丹皮二錢。桃仁二錢。右水二鍾。煎一鍾。不拘時服。

治腿癰方。木潰前服。歸尾半錢。官桂錢。真漢防己錢。蠶沙錢。川獨活八分。牛膝稍錢。乳香錢。

木瓜八分。并水煎食前服。

治陰癰疽發。艾葉斤。硫黃各五錢。雄黃各五錢。以水同煮。半日搗爛。候溫敷。上再者再易。十餘次知疼者可生。

疔

治疔方。名飛龍奪命丹。蟾酥二錢。麝香五錢。銅綠二錢。寒水石一錢。海羊二十個。天龍一條。沒藥二錢。雄黃三錢。輕粉五分。胆礬一錢。

連壳研為泥。和前藥為丸。如菜豆大。如丸不就。入酒打麵糊為丸。每服二丸。先用葱白三寸。令病人嚼爛吐於手

心。男左女右。將藥丸裹在葱白內。用無灰熱酒三四杯。送於避風處。以衣被覆之。約人行五里之久。再用熱酒數

杯。以助藥力。發出大汗為度。初起者。服二丸。即消。如不出汗。重者。再服二丸。汗出即效。三五日病重者。再進二

丸。即愈。如疔瘡走黃。過心者。難治。汗出冷者。亦死矣。如病人不能嚼葱。搗碎裹藥在內。熱酒送下。瘡在上。食後服

在下。食前服。服後忘冷水。黃瓜茄子猪肉雞魚濕麵。一切發風發瘡毒物。又忌婦人洗換狐臭人觸之。必發此藥。

在下。食前服。服後忘冷水。黃瓜茄子猪肉雞魚濕麵。一切發風發瘡毒物。又忌婦人洗換狐臭人觸之。必發此藥。

活人多矣。按疔毒切忌用風氣藥發散藥。蓋疔毒散則死，聚則生，腐則生，不腐則死。須外敷拔疔，腐藥內服清涼解毒諸藥。凡疔發於頭面者，切不可用冷藥敷之，逼熱毒於喉間，不能生矣。

又方。名追毒丹。取黃土疔頭膿者，蟾酥一錢乾，蜈蚣酒浸炙，硃砂一錢，雄黃二錢，輕粉錢白丁香，無一錢。

未加巴豆七粒去壳，硃砂二錢，右俱為細末，麵調水為丸。如丸不就，用酒打麵糊為丸。如麥大兩頭尖入於針破口內，用水澄膏品之後，用膏藥及生肌散，追出膿血毒物。又如黑陷漏瘡四圍死肉不去，不生肌者，亦用此藥追毒去死肌，生新肉，方愈。小者用一粒，大者加之。病輕者不必用針，只以指甲爬動於瘡上，以藥放好。用水澄膏貼之，其瘡即時紅腫為度，去其敗肉為妙。用之神效立驗。水澄膏方：將白芨末放在盞內，用水澄下去，用紙貼之，以此膏圍貼，則不傷好肉。

治面上生疔腫大。用活蝦蟆一隻，將小刀劃開胸前，露出肝來，取下貼在疔上，即愈。

治疔毒生唇上。在大腿灣中，紫筋上用銀針刺出血來，即愈。此名委中穴。

治紅絲疔。手足間有黃泡，即起紅絲一條，走入心腹，令人悶亂不救，皆因大喜大怒，氣血逆行所致。急用針於紅絲所到之處，刺之擠出惡血，再細嚼浮萍草根敷之，立愈。

拔疔方。荔枝肉二兩，吸鐵石分，雄黃分，右共搗分作三餅，分三次敷之，其疔自落。

又方。荔枝肉個，蝸牛三四個，右和爛雞屎同搗爛，入昇藥少許，刺破皮膚塗上，疔根自出。

又方。將銀簪脚刺破疔頭，用多年露天鐵鏽或水中者更妙，研如飛麵，將四五釐捺入刺孔內，外用膏藥護之，疔根絲絲拔盡愈矣。又方荔枝肉，蝦蟆肝，黃丹，同搗敷之。

治疔方。用患者耳垢，蒸垢手足指甲屑和勻，如豆大，放茶匙內，燈火上炙少頃，取作丸，將銀簪脚挑開疔頭，抹入外用棉紙一層，浸濕覆之，痛立止。內服仙方活命飲二帖，兼可治紅絲疔。

治打膏藥方。乳香粒，麝香米大一粒，黃連末，連翹末，桃仁二個，去皮，右同蝦蟆肝腸肺三味，共一處入乳鉢內，搗如泥，白皮紙一小方，攤膏藥貼患處，三四日連疔揭去。

治疔方。用家園菊花搗爛，取汁一碗，服下即愈。無花根葉搗汁亦可。有此方諸方可廢。

治疔方。用家園菊花搗爛，取汁一碗，服下即愈。無花根葉搗汁亦可。有此方諸方可廢。

治疔方。用家園菊花搗爛，取汁一碗，服下即愈。無花根葉搗汁亦可。有此方諸方可廢。

治疔方。用家園菊花搗爛，取汁一碗，服下即愈。無花根葉搗汁亦可。有此方諸方可廢。

治疔方。用家園菊花搗爛，取汁一碗，服下即愈。無花根葉搗汁亦可。有此方諸方可廢。

治疔方。用家園菊花搗爛，取汁一碗，服下即愈。無花根葉搗汁亦可。有此方諸方可廢。

治疔方。用家園菊花搗爛，取汁一碗，服下即愈。無花根葉搗汁亦可。有此方諸方可廢。

治疔方。用家園菊花搗爛，取汁一碗，服下即愈。無花根葉搗汁亦可。有此方諸方可廢。

廣瘡結毒

治廣瘡結毒神效方。川芎 當歸 金銀花 花粉 防風 生半夏 川貝母 海螵蛸 白芷 兩 南星 兩半 薑汁製 用土茯苓一觔 米泔浸 竹刀去皮搗爛 不犯鐵器 放沙鍋內 用水四碗 將竹著量定 深浸 再加水四碗 煎至四碗 將前末十兩五錢 投入 再加水四碗 煎至四碗 濾去渣 一日內服盡 忌鹽與一切毒 物發物 粥飯只可淡吃 輕者一料 重者兩料 全愈 一方每日調入八寶丹 一分二釐

八寶丹方。真犀黃錢 血珀錢 珍珠錢 冰片錢 滴乳錢 飛麩錢 辰砂錢 飛滑石錢

又方。胡連 宣連 大川芎 牛膝 豬胰脂 皂莢子 先將土茯苓一觔 以石槌碎 用水八碗 煎 至六碗 入前藥煎至五碗 入膜脂再煎至四碗 溫服 仍用水四碗 煎至二碗 服第二次 煎時 用竹箸在罐內 逐碗 量定 水痕 此瘡必先吃毒物發透 然後服此 二三服 瘡熱使覺稍可矣 後劑即加以仁當歸各二錢 於前方內照 法煎之 重者不過四五劑 輕者無出兩三服 遍體貼然 且無結毒之患 脫痂後再服排毒散 數貼尤妙 前藥俱不 可犯鐵器 切忌飲茶

治頭面結毒方。蘄艾 兩 川椒 八錢 麻黃 三錢 川芎 錢 白茯苓 兩 豬頭天靈蓋骨 大瓶存 性五錢 右研極細末 蒸餅丸 如菜豆大 飯後白湯下 三錢 三四日瘡口乾燥不臭 是其驗也 服至瘡平方止

治楊梅瘡方。雄黃 錢 輕粉 錢 杏仁 三十粒 右共為末 用雄豬胆汁調搽 此武定侯府中方也

治楊梅結毒方。殭蠶 蟬蛻 個 豬牙皂 錢 皂角子 七個 土茯苓 錢 生大黃 半錢 甘草 錢 川山甲 三片 右將河水二大碗 酒一大碗 煎一碗 不拘二服 三服 以瀉為度 若腸中一响 欲瀉 可即往高處出恭 不可復聞臭 氣 瀉後若身子壯者 再服一服 弱者不必再服 忌雞鴨魚腥等物

治結毒敷藥秘方。真輕粉 錢 杏仁霜 二十粒 去 番木鱉 火煨 存 兒茶 三錢 火煨 胆礬 分 片腦 分 右共為 極細末 用鵝胆或猪胆調敷 一日一換 數日全愈

治楊梅瘡點藥。兒茶 杏仁霜 輕粉 水片 右用鵝胆調點 一次過夜即脫層

治棉花瘡點藥方。凡棉花瘡毒及下疳 或初感或毒感經久難愈 速用新槐 蓋棟 淨不必炒 每日早午晚 在食前

用清酒吞下三錢許服至二三日則熱毒盡去除根亦無寒涼敗脾之病此經驗神方也如不能飲酒即用滾水湯俱可送下但不能如酒速效耳

治服輕粉毒。名五寶湯。紫草 金銀花 山慈姑各一 乳香 沒藥各五 用新鹽水六碗好陳酒五碗煎

六七碗空心溫服取汗不可見風一二服其毒即從大小便瀉出若結先服五寶湯後用搽藥如有爛去鼻

與陽物等患即能復原應驗如神 搽藥方 輕粉錢一 乳香分六 沒藥分二 血竭分一 兒茶分一 大珍珠分三

紅錫子二分 煨分 文蛤二分 煨分 宮粉六分 麝香分一 冰片分一 蟾骨分五 胎髮二分 煨分 白螺螄壳存性

右十四味共為細末磁器收貯用時先將濃甘草湯洗患處然後搽之 水煎服藥畢即愈

又方 臘猪首骨搥碎 土茯苓各一 金銀花各一 楓子肉四兩 輕粉錢一 草麻仁二兩 蘆甘石錢二 杭粉二兩 花

椒錢五 右共為細末搗加麻油搥成膏用油紙攤貼瘡上其瘡先用花椒甘草煎湯洗淨三日一換五六次即愈

治服霜粉牙根爛爛出血不止 管仲 黃連各五 右二味為末水一鐘煎四五沸入冰片少許攪勻漱口每日

一次忌猪腥油膩一月

下疳

治雞瞪疳魚口下疳方 婦人陰戶臭爛亦用此藥愈 熟乳香 冰片 珍珠末 象牙末 兒茶各三

搽面粉一兩 煨分 紅糖分 黃色 搽上白螺螄壳洗淨入銀罐內 右共研細末磁瓶收固若要上藥先用米泔水煎

深入雄黃三錢於湯內淋洗患處然後上藥不拘男婦三日後立效

治瀉瀉疳 半邊溜爛是也 又名蠟燭疳從內爛出者將人腳根上老皮不拘多少瓦上焙脆為末黃柏末用猪

膽汁拌曬乾再研搽患處烏金紙包頭

治下疳方 土牆上白螺螄壳灰錢 五倍子灰分二 燈草灰分五 甘草灰分五 黃柏灰分五 輕粉分四 牛黃分五

兒茶分五 冰片分五 右為細末先用皮硝湯洗次用土茯苓湯洗後將藥搽患處

又方 大紅絨錢一 冰片分三 鐵鏽分一 鳳凰衣存性 血竭錢一 右研極細末敷患處效

又方 用白鵝一隻以白米養三日後取鵝糞以新瓦焙乾黃為末每服一錢和丹砂一分水片一分共研極細用米泔水洗淨其瘡如瘡乾用雄猪胆潤之以藥敷之如瘡濕則不必用雄猪胆潤之矣

又方 蜜底蠅壳燒紅重便 橄欖核燒灰 冰片五釐 陳鴨蛋壳內衣 共研末疔濕乾搽癩乾唾津調搽

中毒

解百毒 粉甘草二兩 生用 萊豆升 水煎服立效

又方 凡覺腹中不快即以生黃豆試之入口不聞腥氣此真中毒也急以升麻煎汁連連飲之將手探吐自愈或

嚼生礬一塊覺甜而不澀者其毒否則非也

治服截瘧毒藥身體發腫氣喘方 此症因藥內有常山砒信等毒使瘧邪遏抑於內藥毒攻於皮膚頭面故滿身浮腫氣逆發喘煩躁 用生菜豆或一升或半升連皮搗碎深湯泡出濃汁涼服少頃肌膚間有聲一日夜腫消喘止

解砒信毒 急用蜜陀僧一兩或二兩研細冷井水飛徐徐灌下或吐或瀉則砒信裏在藥末內出矣神效無比或

外再以井底泥塗胸前或以生蟹或用田螺搗塗臍四旁更妙

又方 白蠟三錢研末調雞子清三五枚入口即愈

治信毒併治銀匠爐中砒子毒方 錫灰一錢 雞子七個 將二味攪勻吃下即愈 按錫灰即白鐵消後鍋內所遺渣垢也再連鍋燒紅即化成灰研為細末每服二錢若服毒過多加倍用神效誠急救良方也

解食銀硝毒方 將黃泥水服二三茶盃即愈

解斑貓毒方 中其毒者必腹痛嘔吐煩躁欲死 急以生雞子清三四枚灌之即時止痛而愈

解悞服水銀方 在背陰處掘地二三尺取泥為丸如梧子大以冷井水過下碗腹中即瀉水銀隨下矣

解巴豆毒方 若中此毒必口渴面赤五心煩熱泄痢不止用黃連煎湯服

解鹽漬毒方 將豆腐漿灌下或肥皂水皆能令嘔吐切不可飲熱湯飲活羊血尤妙

解燒酒毒方 用鍋蓋上氣水一盆灌下即醒

解中百果毒方。小兒食之過多飽脹欲死。急用白卷頭煎湯頻灌之少頃自定。

解食桐油嘔吐不止方。將乾柿餅食之立解。

解頭狗咬方。即不咬破亦有毒。先用蓑衣草紮住兩頭。以眾人熱小便洗搨去血水。急取斑蝥七個去頭翅足。酒洗和糯米一把水淘趁潮同班蝥炒。以米黃為度。須於銅杓內炒。加六一散二兩。共為細末酒下。或木通燈心煎濃湯下。老少虛弱者。分作四分。壯年者作兩服。當時一服餘明日清晨服。服後本人頭頂心必有紅頭髮一根。要拔去。將草紙攤在灰沙內。撒尿於其上。應有或紅或白惡物如狗形者。如服完即無狗形出亦不妨矣。服後用甘草湯漱口。忌一切葷腥油膩。雞鴨蛋百日内要忌房事。如不忌男女俱傷。小紅赤豆茄子狗肉終身禁食。至茄子并不可相近。邪犬之形尾反舌垂舌吐出黑色者。是宜急避之。

治狗咬方。用木鑿子燒灰存性敷之。

解毒蛇咬方。明雄黃^五靈脂^一。共研細末。每服二錢。陳酒送下。即將此末用麻油調敷患處。隔一時再進一服立愈。亦有加白芷貝母四味等分者。亦每服二錢。

又方。用香白芷為末。每服三錢。麥久煎湯調服。其腥氣黃水從瘡口出而愈。

解蜈蚣咬方。用舊毛竹筋將圓頭寸許燒焦。取下研末。敷患處立愈。又方。取蜒蚰塗上其痛立止。

治截毛刺方。用甘草煎濃湯浸洗。砂糖搽之。糖霜亦可。

治誤吞針方。名吸針丸。用透磁石生研將黃蠟和。燃如針。涼水送下。裏針從大便出。

治誤食銅錢方。胡桃肉^兩。芋薺^一。共搗汁和酒服。其錢即消自大便而出。

治虎瘡方。白雞子油。松香。小兒頭髮。用香油煎油成膏。塗上即愈。

治一切虎瘡。并陰陽頑癬。用不落水猪網油。攤開將松香研細。搽在網油上。捲如煤頭。在燈火上燒著。下用蚌壳內放生礬末少許。受滴下之油。乘熱攪勻。冷定搽在患處。或用攤油紙攤膏貼更好。

治虎瘡方。先用黃蓋汁洗之。醋湯亦可。皂灰^{七個}。洗淨晒乾^{內浸七日}。煨^{火煨}。榆白皮^版。枯礬。牛烟膠。輕粉。霜梅肉。

治虎瘡方。先用黃蓋汁洗之。醋湯亦可。皂灰^{七個}。洗淨晒乾^{內浸七日}。煨^{火煨}。榆白皮^版。枯礬。牛烟膠。輕粉。霜梅肉。

治虎瘡方。先用黃蓋汁洗之。醋湯亦可。皂灰^{七個}。洗淨晒乾^{內浸七日}。煨^{火煨}。榆白皮^版。枯礬。牛烟膠。輕粉。霜梅肉。

治虎瘡方。先用黃蓋汁洗之。醋湯亦可。皂灰^{七個}。洗淨晒乾^{內浸七日}。煨^{火煨}。榆白皮^版。枯礬。牛烟膠。輕粉。霜梅肉。

治虎瘡方。先用黃蓋汁洗之。醋湯亦可。皂灰^{七個}。洗淨晒乾^{內浸七日}。煨^{火煨}。榆白皮^版。枯礬。牛烟膠。輕粉。霜梅肉。

治虎瘡方。先用黃蓋汁洗之。醋湯亦可。皂灰^{七個}。洗淨晒乾^{內浸七日}。煨^{火煨}。榆白皮^版。枯礬。牛烟膠。輕粉。霜梅肉。

治虎瘡方。先用黃蓋汁洗之。醋湯亦可。皂灰^{七個}。洗淨晒乾^{內浸七日}。煨^{火煨}。榆白皮^版。枯礬。牛烟膠。輕粉。霜梅肉。

鉅青 將醋浸調搽之

又方。白松香兩四 肉嫩頭屑三兩燒 碎新青布二兩燒 將多年竹燈炷窩。放松香在內。燒烺連油滴出。以碗

受之。將前三味調勻敷之。四五日後。待其自落即愈。

治對口瘡神效方。用活鯽魚一尾。去腸鱗搗爛。加髮垢四兩。白蜜少許。攪勻。從瘡外圈入裡面敷之。極厚留一孔

出氣。外以紙貼之。一二日即愈。

又方。名蟻蜜膏 飛鹽五分 葱白三 活蝦蟆個三 蜜兩一 共搗一處敷之。

又方。婦人頭上油垢錢三 黑背鯽魚一個約 猪眼稍對 右同搗爛敷之。

又方。將雄猪眼稍肉錢三 剝爛如泥。加滑石末四錢。和勻敷患處頂上。以膏藥蓋之。拔去殭肉。放出黃水即愈。

又方。鮮茄蒂七個 何首烏兩 右用河水三碗。煎一碗。食遠服一服。出膿兩服收口。

治瘰癧方。用陳石灰不拘多少。燒七次。地土窖七次。醋調敷立愈。

又方。山梔末飛麵各等分。猪胆汁好醋各半。薄調敷患處。

治拍蟹毒。即手大指。食指間所生俗名了指。用活蟹打爛塗之。

治指上疔瘡。名天蛇頭。又名雄公蛋。用雞子一枚。頂上敲一小孔。先去其清。放盃內。後去其黃。仍以清入壳。

將蜈蚣一條。煨灰。明雄黃末各一錢二味。共納入壳攪和。以指入壳。周圍以棉紙封固。三四層。候一晝夜。打碎遠

逐拋擲。切不可聞其臭氣。此瘡立愈。一方只用蜈蚣為末。雞子不去黃。套指上候熱。再換一個即愈。

又方。猪胆一個。入雄黃末一分。攪勻套指上。二三時即愈。又方。雄黃細末和蜈蚣搗爛敷之。即愈。

又方。雄黃分 白芷分 共為末。入雄猪胆內。套指上立愈。

治坐板瘡方。生在臀上俗名臀叉瘡。用八九月間的西瓜皮。刮薄存一粒米厚者。日中曬脆。研細。瘡有膿則乾

搽。無膿將自己津涎調末敷上。少頃瘡中即流出水來。敷二次即愈。

治爛腿方。用白芷黃蠟飛丹片粉。各等分。葱頭搗豬髓調敷。油紙紮住。七日一換。二次全愈。

治脚面生瘡不收口。松香 杉木灰各一 右共為末。用麻油調塗數次即愈。

治脫疽方 此症發於腳趾漸上至膝色黑肉痛不可忍遂節脫落而死亦有發於手者 土蜂窠研細醋調搽應手而愈其神方也

治陰濕脚瘡久爛 銅青 膽礬各五分 飛丹二錢 密陀僧 輕粉 石膏一錢 右研末臨臥時搽上痛一夕即愈

結痂或有痒處毒水不乾又搽上痒極搽之

治脚指縫爛 鮮鴉掌黃皮陰乾燒灰存性為末搽之極效

又方 好黃丹一味搽三五次即愈 又方 陳松蘿茶末搽之

治脚指縫爛癢方 用三白頭昇藥底少許和白糖霜打爛敷之

治脚指頭上臭爛瘡方 俗名臭田螺 青石屑用市中多人踏者又要潔淨者須研極細 絲棉灰少許 冰片少許 三共和勻搽上外以膏藥貼之即愈

治行路足腫方 用草鞋浸尿缸內半日以磚一塊燒紅置鞋於上將足踏之令熱氣入足內腫即消

治膿瘡方 陳石灰 坑砂煨 伏龍肝 百草霜各一兩 右共為末先將葱艾煎湯洗之桐油調敷將草紙紮緊

又方 修船舊油灰煨 飛丹 石膏煨 右研極細先將豆腐溫水洗淨患處用麻油調藥敷之極厚三日一洗一換最無不愈

又方 桐油 菜油 蘇油各五分 松香製兩 飛丹三錢 銅綠二錢 白占 黃占各五分 先將三油熬數滾後入松香黃白占再熬數滾後入飛丹銅綠細末收之攤隔紙膏貼之 一方 松香只用三錢銅綠只用一錢五分

治膿瘡久不收口方 杭州破黑傘紙燒灰 飛丹 輕粉各一錢 牛脚脰煨至周圍焦枯以刀刮下再煨 四味與猪油同搗極爛做夾紙膏以針刺孔先以葱椒飛鹽湯洗淨拭乾貼之生肌長肉再貼五六日收口愈

又方 用鮮桑白根皮一觔生猪板油四兩共搗作餅將一餅貼之每日換一餅貼之五六日後換生肌末藥用赤石脂乳香沒藥白占冰片炒黃輕粉煨過狗脛骨以麻油調塗碗內覆定燒蕪艾重熏碗內藥連番十餘次方以此藥做夾紙膏貼之數日即愈

治濕爛膿瘡并一切頑瘡不收口者 蘇油 柏油各二兩半 管仲三錢 象皮五分 血餘一大 同煎至髮枯去髮

再煎滴水成珠下炒飛丹五錢方下後藥 硃砂 兒茶 輕粉 沒藥油 川椒 樟腦各五分 乳香去油三錢半

血竭錢一 共為末攪勻離火候半冷下黃蠟二錢五分杭粉一兩五錢如法熬成膏攤貼患處一日一換神效

治腫瘡久不愈者 秘傳夾紙膏 老松香 樟腦 硃丹炒 水龍骨即舊船底內油石灰 輕粉 共為細末溶化松香

加小清油和之以油紙隨瘡大小作夾紙膏洗淨瘡後貼之二三日一換即愈若不效加白芷川芎蟾蜍於前膏

內若不加入以此三味煎湯洗之亦效 凡腫瘡用夾膏須用舊傘紙以甘草湯煮密刺其孔比他紙尤效如用

尋常油紙須用甘草白芷花椒荊芥煎湯煮過曬乾攤膏則不痛且不生癩

又方 麻油兩九 大活雄鯽魚一個約斤許者 大楓子肉去油 同熬至魚焦枯濾去渣將油再煎滴水不散將油稱見

分量每油一分用飛砂過黃丹半分加銀珠二錢收之攤貼若不能收口用哺胎不出雞子瓦上煨存性研極細

搽上即收口此搽藥方不但治腫瘡凡結毒癰疽久瘡久爛者立能收口生肌

又方 名白玉膏 乳香 沒藥 象皮 白蠟各五錢 輕粉錢四 密陀僧 鉛粉 黃蠟各二兩 以上除蠟俱為

極細末先用真桐油一觔放鍋內火上滾透去沫油先入密陀僧末攪勻取起入二蠟溶盡攪勻待油稍溫方入

細藥攪三百餘遍以大棉紙攤上陰乾隨瘡大小剪成膏貼時瘡中毒水流出膏藥過黑再換新者貼之

又方 名紫脂膏 好麻油兩四 淨花椒錢二 葱頭七個連根寸長 三味同煎至葱焦脆去渣入白色松香五錢黃占

六錢文火煎化去上面浮出渣淨煎至油面上有花紋急離火傾碗內加入好銀珠一錢攪均收之待冷凝將碗

合土地上三日去火毒攤夾紙膏貼之紙只要一面刺孔每膏貼五日一換如痛者用甘草湯先洗瘡者花椒湯

洗若貼一膏即流盡黃水者貼至五六膏即愈若貼至三膏方流盡黃水者須貼至二十膏而愈凡初貼之膏出

水者膏中有毒氣在內揭下則無用水盡後再貼之膏須存之以待後來將長肉結蓋時用此貼過舊膏貼之以

為收功最妙 治濕毒腫瘡方 蘆甘石用童便製八九次猪油調搽神效

又方 伏龍肝 蚌壳灰各一兩 輕粉錢半 右或加蒼朮錢一 黃柏錢一 各炒焦為末和勻用菜油調攤夾紙膏將

針刺孔紫瘡上三日一換先用花椒米泔煎滾洗瘡

治濕瘡方 取桑樹根上土中鮮白皮去粗皮切細同生豬油放石臼內打糝先用冷茶洗瘡拭乾用此藥敷之外

以油紙蓋之將帛紮緊換四五次即愈 加白蠟同搗作餅反覆貼之一日夜再換拔去毒水臭爛生肌收口

濕瘡與膿瘡有別濕瘡有水窠頭不爛而其痒膿瘡必爛而痛 凡治濕瘡切不可用昇藥及冰片非惟不能奏

效反致潰爛難愈 凡遠年濕風瘡痒甚諸藥不效者必有蟲在內須用藥引出其蟲則用藥有效矣 凡治濕

瘡先用鉛打薄片貼之以帛紮住毒水自流流盡然後用藥方易見效

又方 疥瘡白泡亦治 楓子肉一兩 蛇床子炒 烟膠炒 黃柏末 自死龜板五錢 黃丹二錢 紫

真輕粉分五 右為細末 桐油調搽上 以油紙覆蓋五日一換 三次即愈 柏油調藥更妙 一方無灰膠有煨龍骨

用熟桐油調藥 又方 黃柏末 銀硃 飛丹各五 煨石羔 龜板煨 蚌壳灰各一 輕粉二 嫩松脂三 共為細末菜油

調作夾紙膏貼 又方 名葱連膏 飛丹錢 乳香 沒藥 黃連各五 血竭錢 冰片分 松香五 草麻子粒 葱白七 帶鬚

共為末將葱頭打爛和勻以菜油調做夾紙膏貼之

治膿濕瘡方 黃丹 無名異各五 輕粉錢 乳香 沒藥 樟水 水龍骨 百草霜各一 共為細末桐油調

夾紙膏貼之前後翻換神效或加血竭血餘兒茶蟪蛸銀硃銅綠等藥貼過舊膏藥藏好以備日後收瘡口之用

治一切瘡毒隨貼隨愈並治風濕癱疽癩癧鶴膝風等症俱神效 南星 川大黃 桃仁 羌活 半夏 草烏

川烏 紅花 獨活 當歸各四 用真麻油一觔加生薑一兩葱白不拘多少亂頭髮一團入藥內熬焦枯色

用絹濾去渣用上好松香一觔入濾過清油內又熬至胡桃花起先加入密陀僧二兩再徐徐加入硫黃末半觔

投此二味時務須慢慢灑入不可太多太驟以滴水成珠為度將此膏藥噴入水中去火

治熱毒濕瘡遍體生瘡痛而不痒手足尤甚粘着衣被日夜不得眼者用石菖蒲三斗為末鋪席上五六日即愈

治諸瘡弩肉如蛇頭凸出寸許者用烏梅肉煨灰搽上即愈

治膿瘡 名雞黃煎 煨石羔錢 寒水石錢 黃丹 硫黃各一 共研極細末將雞子黃熬出油調敷

又方。大黃^{三錢} 吳萸^{去梗} 共研細末。菜油調搽即效。

治諸瘡搽藥方。煨熟石^{一兩} 松香 白芷^{各三錢} 樟腦^{二錢} 輕粉^{五分} 冰片^{一分} 右為極細末。熬熟猪油調搽。

治白泡瘡更效。

治天泡瘡方。黃柏末^{半錢} 輕粉^{一錢} 雄黃^{一錢} 青黛^{二錢} 滑石^{一錢} 寒水石^{二錢} 銀珠^{半錢} 辰砂^{五分} 鉛粉^{一錢} 側柏葉末^{一錢} 右為細末。絲瓜葉打汁調搽立效。

又方。將菜豆裝入粗瓦瓶內。以毛竹篾一把塞緊瓶口。再用瓦盆一個。底下鑿一孔。將瓶倒插於盆孔內。盆內用

蟹糠炭屑燒之。菜豆油即在箸頭上滴出。下以碗收之。俟出火毒。用油抹點瘡上。二三次立愈。

又方。青黛 滑石 各等分。馬蘭汁調敷。又方。石羔 黃柏 青黛 各等分。為末。扁柏汁調敷。

治癩子方。將臘雪收藏瓶內。封口。至端午日。放黃瓜在瓶內。浸之。封好。遇有癩子敷上即愈。

治癩瘡痒痛方。滑石^{五錢} 菜豆粉^{四兩} 微炒 右研細和勻。以棉撲之。一方有棗葉一兩。

治瘰癧作痒。抓之又痛。難於坐臥者。名苦參湯。用苦參四兩。大芎藭二兩。河水五瓢。同煎數滾。添水二瓢。蓋片

時。臨洗和入雄猪胆汁四五枚。洗之避風甚效。

治一切熱癩。用芙蓉葉菊花葉同煎水頻洗。或搗爛敷之甚效。

治凍瘡久不愈。年年發。先痒後痛。後即腫破。出黃水及出血不止者。名雉腦膏。雄雉腦^{一枚} 黃蠟^{清油} 右

三味。以文火熬成膏。去渣磁器盛用。每日塗瘡上。一方用大蒜梗煎湯洗之。

又方。用白蘿蔔打碎。或切碎內揀大者。切二三寸一段。同用水煮。一二十滾。不可太爛。亦不可太生。以所煮湯薰

洗。浸並將所煮蘿蔔。存瘡上摩搽。一日洗三次。連洗三日。即愈。永不發。

治久月手足開裂方。用清油五錢。文火煎沸。先入黃蠟一塊。煎化。再入光粉五倍子少許。熬令稠。紫色為度。先以

熱湯洗患處。火上烘乾。即用藥敷其上。以紙貼之。其痛立止。入水亦不落。若油中入粉多。則硬而成塊。須以火炙

動挑數亦不妨。一方無五倍子。一方加魚膠白芨末。又方。名油胭脂。用生猪板油。去筋膜一兩。入鍋熬淨。再入黃占五錢。白占三錢。同化清。次入銀珠黃丹各五分。

攪勻以軟能攤開為妙。敷之即愈。

又方。用童子剃下頭髮洗淨。令乾。將一二兩放杓內熬。烱。入羊油再同熬。令其無滓。去火。俟冷。如膏藥。搥成細條。放入縫內。一日夜。即裂縫不痛矣。

治湯火瘡方。當歸 生地各一兩 麻油四兩 黃占一兩 白者五錢 右先將當歸生地入油煎枯去渣。將蠟溶化攪勻。

候冷。即成膏矣。用塗患處。將細紙蓋之。極效。若發背癰疽潰爛者。用之亦甚效。凡死肉潰爛。將脫。止有此些。相連者。宜用剪刀剪去。蓋死肉。有毒。去。遲則傷新肉矣。死肉去盡。尤宜速貼。蓋新肉最畏風寒。切不可忽也。

又方。將猪毛煨存性研末。加輕粉。研砂少許。麻油調和敷之。立效。且無癢痕。

又方。用雞子黃置銀石器中。熬出油。調糊粉敷之。

治湯泡方。將煮熟雞子黃。炒出油一杯。調生大黃末一兩。搽之。

治火燙熱油傷方。用生雞子清。好陳酒沖和調敷。三次必愈。

治火燒爛神方。凡遇此症。切不可浸冷水中。熱毒內攻。必爛至骨。用好陳酒一二十觔。傾入浴缸內。略燒溫。令

患者坐酒中浸之。極重者不死。

治火燙傷方。急使一二歲小兒。不拘男女。撒尿於室中。結實。淨土地上少頃。取地面上浮膩滑濕之土敷之。即日

止痛。解火毒甚妙。

治湯泡火燒方。此症切不可用冷水澆洗。如藥不便。先飲量便一碗。或生蘿蔔汁一碗。再將生大黃細末。或香油

或生桐油調敷。如爛至肌肉者。用山野人家百草霜三錢。輕粉一錢五分。研末香油調敷甚效。

治初盪與潰爛方。名解毒行血膏。當歸 劉寄奴 頭髮淨 生地各一兩 將麻油六兩。銅鍋內煎至髮化藥

黑濾去渣下。白占八錢。不住手攪勻。候藥稍溫。下生寒水石煨。大黃嫩黃柏生礬末各一兩。輕粉末二錢。攪至藥

冷。埋土內出火毒。患者塗之。

治漆咬瘡方。木形人每患此症。用杉皮煎湯洗之。蟹壳湯洗亦可。又方。將活蟹搗爛塗上即愈。

取瘡中多骨方。用烏骨雞脛骨。實以砒石鹽泥封固。煨紅出火毒。研末飯丸粟米大。將白紙摺送入孔中。以拔毒。

貼之其骨自出

諸丹毒

治蛇丹方 刺鱖魚尾血同蜈蚣搗塗

治火丹方 將蜈蚣搗爛磨好京墨汁和塗之

又方 柏葉 蚯蚓泥韭菜地上者尤妙 黃柏 大黃各五錢

流火切不可吃猪肉吃則發腫不消

又方 將艾青樹葉搗爛和入雞子清敷患處以絹縛之一周時即愈

治流火方 鮮紫蘇 鮮鳳仙花 將二味洗淨連根葉搗爛放木盆內以滾水沖入將脚架盆上薰至可洗以軟

棉洗之立愈十餘年者不過洗三四次不發矣

治流火毒方 大黃 山梔 黃柏 雄黃 南星 右為末將瓜花搗汁調敷立效

無名腫毒

治無名腫毒未成初起五天之內照方一服即消如毒旺者接連三服無不消盡真神方也 用雞蛋一個傾在碗

內攪勻入芒硝一錢隔湯燉熟用三白酒照量飲食盡為度

內托護心散 防毒氣攻心 真菜豆粉一兩 乳香五錢 燈心灰 右共為末和勻以生甘草一兩煎濃湯調一錢

時時呷之

治男婦小兒一切無名腫毒 將苦絲瓜連筋帶子燒存性為末每服三錢白蜜湯送下日二服夜一服則腫消毒

散不致內攻真妙方也

治一切無名腫毒魚口便毒楊梅結毒等症即消 名二角消毒散 雄羊角二斤 血餘灰一斤 穿山甲半斤 角刺

灰一斤 右四味俱用文武火煨灰存性每服二錢或三錢酒送下

治一切無名腫毒瘰癧尤效 名四製鯉鱖丸 歸尾五錢 大黃 荊芥 桔梗 乳香各二錢 沒藥各二錢 黃芩 連翹

各三錢 防風 羌活各二錢 全蝎一錢 蟬蛻二十個 僵蠶五十個 牛皮膠土炒 雄黃分 用金頭蜈蚣四條

去頭足分作四樣法製一條用薑汁搗焙乾一條用醋搗焙乾一條用香油搗焙乾一條用酥搗焙乾再用穿山甲四兩亦作四製一兩用紅花五錢煎湯者焙乾一兩用牙皂五錢煎湯者焙乾一兩用紫草節五錢煎湯者焙乾一兩用蘇木五錢煎湯者焙乾右藥共為細末真米醋打糊為丸重二分硃砂一錢五分共為衣磁瓶收貯瓶內放麝香五分以養之每服一丸滾酒送下未成內消已成出膿神效

治諸毒已成未膿之際服此毒不內攻

名琥珀蠟礬丸 白礬二錢 黃蠟一兩 雄黃分錢二 琥珀研極細

硃砂分二

白蜜錢二 右四味先研極細另將蜜與蠟銅杓內溶化離火片時候蠟四邊稍凝方入上藥攪勻共

成一塊一人將藥火上微烘衆手急丸小寒豆大硃砂為衣磁瓶收貯每服二三十丸白湯食後送下病重者早晚日進二次

移毒方 凡毒在緊要處移在閒處可不傷命 用地龍裝在經霜絲瓜內煨枯佳連瓜為末每瓜末三錢入麝香

二分乳香沒藥各五分雄黃一錢蟾酥一分黃蠟一兩共為末蠟丸每服三分上部要處甘草桂枝麻黃煎酒下即移在手上而散如在肩上羌活防風薑煎湯下移在背上如下部木瓜牛膝靈仙陳皮獨活薑煎湯下移在足

上神效

治陰症諸毒膏 附子 肉桂 川烏 草烏 大戟 芫花 甘草 甘遂各七 一方加乾薑一兩四錢

附子 麻油二筋煎

治陽症腫毒膏 馬錢子兩 大黃 生地各二 薄荷 玄參 黃柏 黃芩 梔子 血餘各一 蝸牛個

右用麻油煎去渣滑石研末收

治諸惡瘡腫核赤暈已成膿不肯用針刺以此藥代之但用小針點破瘡頭貼上膏藥膿即自潰此秘妙良方名萬寶代針膏 蓬砂 血竭 輕粉各錢 金頭蜈蚣個 蟾酥分五 雄黃錢一 冰片少 麝香分 右為細末用

蜜和為膏看瘡有頭處用小針挑破以藥少許放紙上封貼次早其膿自出如腋下有要孩兒名暗疔瘡或有走核可於腫處用針挑破如前用之忌雞羊魚酒麵等物吃白粥三日為妙

加味太乙膏 肉桂 白芷 當歸 玄參 赤芍 生地 大黃 土木鱉各二 上阿魏錢二 輕粉四錢 槐枝

柳枝各一段 血餘兩 東丹兩十 沒藥末錢三 乳香錢五 麻油觔五 將藥入油熬熟濾過煉成膏每油一觔加

丹六兩五錢 夏秋再加五錢

治癰疽神應膏 真阿膠錢三 麝香錢二 珠砂錢四 雄黃 五靈脂 甘草各一 川烏 草烏各四 將新鮮開

羊花十觔揀去梗葉打自然汁入瓦器中煎成膏如稠糖為度將藥為細末入羊花膏內攪勻勿令凝底用大磁

幾個每盆將藥攤一薄層置烈日中曬乾取入磁瓶封固如遇腫毒用酒調勻如半乾糊將筆蘸藥先從紅腫上

面畫一圓待藥將乾再畫第二層於圓內與前圓相連即將酒潤舊乾圓上待第二圓將乾再畫第三層於圓內

與第二層相連又將酒潤外邊乾處每乾一層再畫進一層止空當頭如豆大一孔使毒氣從此而出圈完用酒

常潤藥上不可間斷至半日乃止待藥自乾落不必洗去其毒自消一方只用三味新鮮開羊花五十觔打爛

絞汁熬膏川烏草烏末各一兩和入膏內用法同前

八仙膏 龍骨 赤石脂 兒茶 血竭 乳香 沒藥各一 輕粉五分或 冰片二分 用麻油二兩入當歸五

錢煎枯去渣入龍石茶竭四味再煎一二沸次入乳沒略煎勻後入黃占五錢溶化冷定入輕水攤貼

干提膏 松香 銅內溶化傾入清水內 草麻子 淨 柏油二 白蠟二 大黃 銀珠各二 左顧牡蠣用粗

草包好入火 提膏之法在光平青石上先將松香一二兩與草麻一二兩鋪於石上用鐵打碎乾則加草麻濕

內煨存性 則加松香餘藥亦漸漸添入極至極細膩為度遇無名腫毒攤貼用麝香少許初起者一張便效若已潰者用阿

魂少許即止痛且易收口此膏忌見火須隔湯燉軟攤之 密膏 治一切腫瘡癰疽黃瘡下疳久不收斂者 松香一斤四兩醋葱汁煮 黃占 白占各一

乳香 沒藥 樟冰 象牙末 炒 竹蛭屑 龍骨 煨 赤石脂 煨 海螵蛸 去 人中白 煨 面粉 炒 各

兒茶 錢三 血竭 錢六 白蜜 兩一 桐油 兩十三 右十八味先用松香溶化次下桐油次下黃白二占下龍骨等藥

次下輕粉次下象牙末次下乳沒次下樟冰次下白蜜 生肌收口膏 治諸瘡并下疳及輕粉毒 乳香 沒藥 油去 兒茶 血竭 輕粉各一 寒水石 水龍骨 煨 各

韶粉 錢三 髮灰 黃占 白占 錢二 麻油 兩四 將油先熬數沸下蠟後下藥末用槐枝攪勻攤膏先以防風

荆芥苦參黃柏黃連連翹銀花甘草槐花菜豆粉各三錢煎湯洗淨其處然後貼之 一方有鬱金一

跌打損傷

黎洞丹 治一切無名腫毒昏困欲死並跌打損傷瘀血奔心昏暈不醒等症

生黃 冰片各二錢半 阿魏 雄黃各一錢 麝香二錢 生大黃 兒茶 天竺黃 人參三七 乳香油 沒藥

油 血竭 膝黃隔湯煮十數次去沫用于羊血半兩如有山 右共為末將膝黃化開為丸如芩實大若乾少

用白蜜外用蠟皮封固每服一丸用無灰酒送下外敷用兒茶磨成一切生冷發物

紫金酒 治一切風氣跌打損傷寒濕疝氣移傷定痛血滯氣凝此酒善通經絡沉痾久病無不獲效每飲三五杯

立見痛止若預飲之跌傷亦不痛 官桂 明乳香 沒藥 廣木香 羊躑躅 川羌五錢 川芎 玄胡 紫

荆皮 五加皮 丹皮 鬱金 烏藥各一錢 右為粗末將好酒十觔懸胎煮三炷香分作十瓶

治跌打損傷刀箭傷軍中第一仙方 生狗頭一個將肉刮盡露天 人指甲灰 血餘灰各一錢 陳松香五錢

共研極細末摻傷處斷骨即續刀傷即愈以四味等分將酒內服亦可 洗方 防風 荆芥 甘遂共煎湯

治箭鐵木器傷方 用艾綿攤成餅子將火硝細末鋪上再用大蜈蚣搗成末浦火硝上包在傷處一日一夜即出

又方 用陳臘肉去皮取紅活美好者連肥切細將新象牙末及人指甲末拌臘肉內剝合一處厚敷四旁一飯頃

其蠶自出 一方巴豆微炒同蜈蚣虫同研敷之

治金傷箭鐵傷方 真降香兩一錢 五倍子五錢 共為末摻患處紮好即收口加象皮一兩更妙

治金瘡方 用泄青不拘多少為末加响銅屑和勻摻立愈

又方 陳石灰 無毛小鼠 韭菜根 共搗極爛作餅貼在背陰牆上待乾用刀刮下研細末敷之

又方 并治筋骨斷 生半夏 降香節 紅銅屑 五倍子炒 右共等分為末摻上紮好

又方 降香節 製白松香各一兩 血竭半錢 沒藥五分 文蛤炒 共末摻紮 一方用五倍子五錢 不用蛤

又方 五倍子錢 黃丹 血竭 大貝母錢 赤石脂錢 海螵蛸錢 龍骨錢 共為細末摻之

又方 用好雞骨炭擲地有聲者不拘多少與好松香等分搗成一塊用老韭菜汁拌入陰乾如此搗拌三四次方

研細末收貯。每遇金瘡敷之即愈。切不可飲冷水及稀粥。只吃乾飯。

又方。白蠟一兩 騰黃錢三 將麻油四兩煎數滾後下二味再煎數滾塗傷處即愈。此方止痛止血。並治打傷及湯火傷皆妙。一方用白蠟二錢。騰黃一錢。麻油一兩。

治刀斧傷止血定痛生肌。真降香剉碎炒 五倍子微炒 頭髮灰 右各等分。為末。搽之。將乾葉護住。以軟綿紮定。兩日一換敷。

立止血方。並治針灸疤肉發紅出血及一切血管出血不止者。用熟黃牛糞塗之即止。

立止血方。用舊棉絮燒灰掩之。

集靈接骨膏 生地 當歸 大黃 寄奴 雄鼠屎酪 鬧楊花 紅花 上肉桂 川烏 草烏 大戟

芫花 甘草各一兩 甘遂錢五 五靈脂 山甲各一兩 紫荊皮 血餘 地蠶虫各三兩 野苳根四兩 右用麻油

四十四兩桐油二十四兩煎丹收好。加乳香沒藥血竭阿魏各一兩。加桃柳桑槐更妙。另用地蠶末一兩。鬧楊花末五錢收。

接骨丹 將糞窖內多年瓦片洗淨。醋煨九次研末。每末一兩。加五加皮男子髮灰各五錢。好醋調每歲一分好酒送下。再用竹四片。將竹青向內夾定患處。勿動。若皮破者。勿用。搽藥。

又 古銅錢五錢 醋五錢 骨碎補三錢 乳香 沒藥各去 自然銅醋煨 土蠶虫用生半夏 去半夏不用。以上各三錢。血竭錢二 共為末。服一分。加瓜蒌仁七個。同研。放舌上酒送下。頭一次加麝香一盤。

又 用母雞一隻。要一筋重者。殺後連毛骨剝爛如泥。再將雞血和內。再剝。敷于患處。用細包緊。三日即愈。

透骨丹 治跌撲損傷。深入骨髓。或隱隱疼痛。或天陰則痛。或年遠四肢沉重無力。此藥主之。真神方也。

鬧楊花子一兩 童便浸一次 酒浸沙三次 沒藥 乳香油不去 真血竭各三錢 右為末。秤準和勻。再加麝香一分。同研。

磁瓶收貯。封固。每服三分。壯者五六分。不必用夜飯。須睡好方服。酒可盡量送下。服後避風。有微汗出為要。忌房事。酸寒茶醋等物。虛弱者間五日一服。壯實者間三日一服。

桃花散 治跌損刀傷。狗咬爛脚等症。年久風化石灰。十并炒至桃 錦大黃一兩 龍研末。將真麻油調敷。當日敷更妙。

加味鼠灰散 陳石灰^{六兩} 大黃^{一兩} 童子髮灰 乳香 沒藥 蒲黃^{三錢} 右石灰與大黃同炒。至石灰紫

色為度。研細取未開眼小鼠搗爛極和藥。又搗勻為餅。布包懸掛陰處。不拘刀斧等傷。研末用韭汁拌敷之。

治跌打損傷方 閃挫初時。即于無風處將紙摺觸鼻內。用力打噴涕。二三十則氣升而止痛。再用胡桃肉搗爛。傾

熱酒內盡量一醉而愈。

又方。用韭菜汁與童便各半。和熱酒飲醉。或有折傷脫節。外用糟湯浸洗。忍痛揉上。用竹木綁緊。急尋地蠶虫炙

脫為末。酒調服自愈。

又方。骨節跌損脫者。將生蟹一隻。打極爛。用滾熱酒傾入。連飲數碗。即以蟹渣塗患處。半日間瑟瑟有聲。脫處自

合不能飲者。數杯為率。

又方。地蠶虫^{十個} 地蟾乾^{焙乾} 自然銅^{二錢} 骨碎補^{三錢} 乳香^{五分} 右為末。加蘇木三錢酒煎服。

又方。名七厘散 當歸尾 紅花 桃仁 大黃^{酒浸} 自然銅^{七次} 土蠶虫^{去頭足} 黃麻根^{燒灰}

血竭 乳香 沒藥 兒茶 硃砂 雄黃 古銅錢^{上各三錢} 麝香^分 骨碎補^{三錢}

右為末。每服大人一分。二釐小兒七釐。以陳酒送下。出汗為度。

和傷方 用遠年地坑中坑砂。其坑雖不必在露天。却要透風。有日光照着者為妙。其砂取淌水石畔。鑿下厚三四

寸者更佳。放屋中淨瓦溜中。風吹雨洒。日晒夜露。常常及轉四五個月。看兩面俱白。已無臭氣。研極細末。每兩配人

辰砂二三分。每服五六分。空心放舌上。陳酒送下。此方兼治一切虛勞吐血發熱。並婦人一切血瘀乾血癆症。

治青腫不拘破不破。不用開刀。一夜復原不痛。名松肉葱白膏。將不精不肥鮮猪肉二斤。去皮骨。加葱白要一

觔半。再加明松香三兩。研極細末。以篩篩過。方可連葱放在肉內。砒為極細。攤貼患處。以布腳帶裏紮緊。不可寬

至。週時皮肉還原。與不打無異。床上房內最忌放氈皮等物。須切忌。若膿血水任其流。放總不妨。

治週身打傷方 用大生蟹一隻。小者兩三隻。搗極爛。大熱酒冲服。極醉一夜即安。

治頭面跌撲青紫方 用生半夏末醋調敷之神效。

治破傷風久不愈。手背強直。牙關緊閉者。南星^{薑汁製} 防風^{一兩} 蟬蛻^{五錢} 右為細末。每服三錢。滾黃酒一碗。

調服再吃生葱三四根以被蒙頭出汗汗盡為止已燒酒病重者加魚鱉一兩炒存性研末每服三錢黃酒調下其風自退 一方名獨勝散但用蟬蛻五錢去頭足為末好酒煎滾服之

臨杖預服方 自然銅醋煨七次 當歸酒洗 無名異洗去 土蠶去 乳香 沒藥 地龍去土 蘇木 右各等分為末煉蜜丸雞豆大每服三丸開水下

治杖傷方 初杖時甚者即服童便酒紅花酒傷處用熱酒浸搽洗血淨或水淨即用熟豆腐鋪上其氣如蒸則血散矣豆腐連換數次或白蘿蔔者半熟打爛乘熱敷上連換則不至成杖癰傷命亦不至潰爛日久也

又方 用細白礬灰成塊者五錢以泉水或井水入灰于內化碎攪數十下澄清將麻油小半碗亦可以前澄清灰水傾去灰脚不用清者傾入油內以箸攪數十下其油即乾次將大黃細末五錢樟冰五錢同研勻入油入調和然後敷上以皮紙蓋好再加草紙用脚帶紮緊立時黃水血水流盡鬆則再紮腫消痛止而愈

一方加生半夏末五錢白欬二錢尤妙 又方用毛竹節燒灰重者五錢輕者三錢好熱酒送下其痛立止

治棒瘡神膏 用猪板油一觔熬去渣再入黃蠟三兩同熬滴水軟硬得中再下乳香沒藥去油兒茶各一錢二分冰片一錢共為細末即傾入磁器內候溫再加輕粉末三錢布上攤貼三日滿口五日平復

神效打板膏 治死血鬱結呃逆不食並夾棍傷爛 乳香 沒藥各去油 輕粉 血竭各三錢 冰片三錢 麝香一分 樟腦二錢 黃蠟二兩 猪板油煮去渣淨 兒茶二錢 右為細末將油蠟同化成膏貼患處晝夜流出惡水即時蘇甦

治夾打傷痛不可忍者 活鯽魚一個約二兩重者 陳酒糟一錢 銅末五錢 胡桃肉四兩 共搗敷患處 預備夾棍方 並名小金蓮方 乳香 沒藥各去油 草麻仁炒 川烏 草烏各五錢 右共為末將肥皂二十個去弦及內外筋膜同藥搗極爛在夾棍先一日做四餅敷兩拐骨過夜次日洗去任夾無妨如治婦人金蓮敷在足骨上過一夜次日洗去骨軟如綿

又方 肥皂四錢 地蠶虫個二十 銅末錢五 陳糟二兩 共搗敷如前法

治夾棍瘡方 初夾下將猪肉四兩用胡椒照人一歲一粒搗爛敷上紮好不用洗不可解動一夜即愈

治夾棍瘡方 初夾下將猪肉四兩用胡椒照人一歲一粒搗爛敷上紮好不用洗不可解動一夜即愈

又方。一出衙門即用執童使一盆將足浸之。如便冷燒紅磚二塊淬之即熱。童使面上浮起白油。其傷處出
庶不瘡。再把肥皂搗如泥。入雞蛋清和勻。敷傷處。以草紙包裹。用脚條縛緊一夜。不動即效。內服末藥方。
八中白烟一 自然銅錢五 乳香去油 木耳性五錢 牛膝錢三 共為末。再用牛膝三五錢煎酒調服。如無末

藥可用。當歸 川芎 乳香 獨活 薺蠶 胡麻 毛薑 紅花 五加皮各一 將生白酒一壺煎數沸。

隨量飲。風寒厚被蓋出汗即愈。如骨傷加土鱉一枚。

治櫻傷方。指上櫻過有凹痕。用銀硃和酒磨濃。依痕圍之自復。

治自刎斷喉方。自刎者乃迅速之症。須救在早。遲則額冷氣絕。必難救矣。初刎時氣未絕。身未冷。急用執雞皮貼

患處。安穩枕臥。或用絲線縫合刀口。搽上桃花散。多此為要。急以棉紙四五層蓋刀口。以女人舊布裹脚。週圍

連五六轉。緊之。頭項彎而不直。刀口方不開。三日後急手解去。前藥再用桃花散。搽患處。仍急纏紮。過數日。用紅

肉膏敷患處。外用生肌長肉大膏藥貼之。再以絹帛圍裹針線縫緊。俟其長肉收功。桃花散方。石灰升半 大

黃一兩切片 二味同炒。至石灰變紅色為度。去大黃。篩極細末。一切刀瘡出血不止。搽此俱效。

餘糧丸 治脫力勞傷。皂礬八兩用紅醋二茶杯煨至 餘糧石四兩醋煨七次 砂仁四錢薑 枳壳四錢

厚朴四錢炒 真廣皮錢三 乾漆到烟盡 白芷錢二 川貝母錢二 鐵梗茵陳五錢 海金沙錢一 益母花錢五

廣木香錢二 地骨皮錢二 右各為末。煮黑棗為丸。緩症朝服。七分。夜服八分。重症每服一二錢。好酒下。此方不獨

治腫脹。如婦女乾血勞。產後朝涼暮熱。男婦及胃噎隔。腹痛小兒吃泥土生米等物。及積年虛黃脫力。黃疸等症。

極重者。服至六兩全愈。孕婦忌服。此藥者。忌河豚。終身忌蕎麥。

又方。禹釋石四兩醋煨 皂礬四兩浮麥 生地二兩醋炒 熟地二兩酒煮 當歸一兩酒炒 貝母去心 紅花錢五 香附量便浸

生木香兩 陳香櫟兩 白木一兩土炒 茵陳杜仲鹽水 砂仁去衣 寇仁炒 白芷炒 川牛膝酒炒 川椒

陳皮炒 陳松蘿 百草霜炒 枳壳兩 蘇荅草酒拌 益母花兩 右共為末。棗肉二觔。丸。桐子大。

朝服七分。暮服八分。陳酒送下。忌蕎麥。諸豆麵食。魚腥。萱花。糟物。瓜。茄。生冷。產後去皂礬。

圍藥

圍藥

將軍鐵種散 治諸毒瘡紅腫突起用藥四圍種之不令滋蔓走注毒氣 南星 大黃 鹽霜白梅 蒼耳根各一兩

白芨 白欬 防風 川烏各五錢 草烏 雄黃各三錢 右為細末先以蒼耳根霜搗爛拌藥如乾入醋調勻

在瘡四圍用藥作鐵種敷之止留瘡高突處如藥乾以雞毛蘸水潤之日換二三次大妙方內亦可再加陳小粉

五倍 白芷 蝸牛 芙蓉葉薄荷 人中白等藥

又方 白芨 白欬 南星 半夏 劉寄奴各四兩 草烏 五倍子 石膏 大黃各六兩 芙蓉葉八兩 右共為

末毒硬者菜豆粉和醋調敷毒軟者以蜜調敷留頭出氣外以紙貼之神效

又方 五倍子十兩 鳳仙花子三兩 皂莢三兩 大黃 陳小粉各三兩 明礬各三兩 土木鱉炒 人中白如無

代之以上 共為細末醋調敷神效 一方加芙蓉葉三兩

圓藥方 無膿即消有膿即潰 五倍子一兩 白芷一兩 滕黃 百草霜各三錢 生半夏 生南星 白芨 陳小

粉 飛麵各四錢 共為末紅醋調敷

一筆消 治一切癰腫 雄黃 胆礬 硼砂 滕黃 銅綠 皮硝 草烏各一兩 麝香二錢 右為細末和蟾酥

為條如筆管大金錢為衣用時以醋磨濃將新筆蘸藥塗四圍連塗數次即愈

神應圍藥 治氣血不和癰瘻為瘡高腫赤痛又兼治疫鬱寒濕為瘡者用雄小活魚七個鮮山藥四兩大葱

頭連鬚二十一個共搗爛再用千年陳石灰半觔生南星生半夏白芨亦勻細末各一兩和勻陰乾再研為細末

臨用之時蜜水調敷四圍外用綿紙掩之

治一切無名腫毒圍藥 滕黃五錢 五倍子二兩 白蜜 葱頭各一兩 用米醋調圍處留頂勿敷

應手散 金銀花 白芨 白欬 川烏 草烏 芙蓉葉 南星 半夏 大黃 五倍子炒 陳小粉炒

陳石灰用桃桑槐枝拌炒 牙皂二兩 乳香 沒藥 蟾酥各五錢 丁香四錢 共研細末臨用時加麝香一分

毒用醋調敷陰毒燒酒調敷加鮮山藥葱白頭人頭上垢糖霜搗和前藥調敷患處中留一孔出氣

四蟲丹 治諸般疔瘡發背一應惡瘡神效 芙蓉葉 紫地丁各一兩 千金子十兩 桑虫二兩 活桑一兩

或艾乾 薑汁 大蒜汁各半 葱汁五兩 右藥用陰陽水四斤煎至半斤去渣再用江姑三兩麝香三錢雄黃

一兩研蜈蚣一兩研燒酒三兩盛傾銀罐內將鐵油蓋定炭火昇過候酒盡即起再用燒酒一觔并後五味入藥內熬成膏子用磁器收貯臨用時將井水化開圍患處如大之熱其毒即時消退可收下再治後人如不煎膏將前藥晒乾酒燒酒再晒再酒酒盡為度作末收藏臨用時篩細以井水調圍亦妙

立消腫毒方 名五色蟾酥墨 雄黃 銀珠 胆礬 韶粉 騰黃 銅綠 硃砂 麝香
右共為末蟾酥為條如筆管大陰乾水磨塗患處立消

〔提藥〕

治一切陰疽惡瘡毒癰初起白色不甚腫附骨疼痛敷藥提出陽分 生半夏 生山梔 生白芥子 右各等分

飛麵葱汁白蜜調圍頂上留一小孔乾則以葱蜜汁潤之一日兩換自然紅腫高起

治陰疽疔發 艾葉一斤 硫黃各五錢 雄黃各五錢 以水同煮半日搗爛候溫敷上再者再易十餘次知痛者可生

治陰疽敷藥方 山梔 苦杏仁各二十粒 北細辛二錢 青壳鴨蛋清一個 白蘿蔔一個 生葱頭二個 飛麵一

蜜一兩 右藥研末共搗爛寒天隔湯燉溫敷患處每日一換敷三次即消

治陽疽圍藥方 花粉 黃柏 薑黃 薄荷葉 人中白 大貝 五倍子 芙蓉葉各三兩 白芷 南星

白芨 白欬各兩 大黃 小粉各五兩 右共為末敷患處

拔毒異法 以極細鐵屑將好醋煎二三沸撈醋中鐵屑鋪于患處將上好活磁石一大塊頻頻吸之陰症用此其毒自出也

毒自出也

清涼救苦散 治一切天行時疫頭面耳目鼻腮項頸紅黃煎濃汁將甘石放在銀罐內燒極紅收汁約九次以甘

石酥為度晒乾研細加冰片五分治口碎點眼甚妙加珍珠少許治下疳可生肌長肉凡有熱毒配三白頭昇藥

人乳調敷立愈

提藥方 治諸毒不起敷之立起 騰黃各三錢 雄黃各三錢 蟾酥 紅藥各二錢 冰片 麝香各一兩 單麻子肉一兩

先將單麻肉去皮打如魚凍水入諸藥打成膏磁罐收貯勿令泄氣按此方與砂騰散相較斟酌其分量該用

騰黃雄黃各三錢紅藥三錢或四錢冰片蟾酥或不用麝香或三分再宜加辰砂一錢

大提藥方。圍敷初起對口發背惡疽四五日即可消。雄黃 藤黃 真當門子各一錢 硃砂三分 葶麻子肉老不

嫩三錢 紅昇藥一錢五分 如用一先將葶麻子研如泥後和各藥研爛用象牙匣封藏外用虎皮包好則不泄氣

黃提藥方 鬱金 雄黃 藤黃各二錢 牛黃 蟾酥 硃砂 麝香 冰片各五分 巴豆肉八錢 葶麻子肉右各

研細搗碎遇症放膏藥上少許貼之治一切惡毒未成可消已成用之化腐疔毒更妙

白靈藥 蘆甘石兩 黃連錢 黃柏 黃芩各二錢 將三黃煎濃汁將甘石放在銀罐內燒熱紅收汁約九次以

甘酥為度晒乾研細加冰片五分治口碎點甚妙加珍珠少許治下疳可生肌長肉凡有熱毒凡三白朝昇藥人

乳調敷立愈

紅昇丹 名五靈昇藥 水銀 白礬各五錢 硃砂 雄黃各二錢 火硝八錢 右照昇法昇之凡一切無名腫毒

如潰久內敗四邊紫色點色將靈藥水調研稀以雞毛掃于黯肉上立刻紅活死肉脫去再上生肌散即收功凡

通腸痔漏將此藥以紙捲成條插管內七日其管即隨藥條脫去

降藥

白降丹 名夏冰對配丹 水銀 淨火硝 白礬 皂礬 炒白鹽 以上藥各九錢煉法將前藥共研至不見

水銀星盛于新大傾銀罐內以微火溶化火急則水銀上昇走爐須用煇炭為妙熬至罐內無白烟起再以竹木

枝撥之無藥屑撥起為度則藥吸于罐底謂之結胎胎成用大木盆一個盛水水盆內置淨鐵火盆一個以木盆

內水及鐵盆之半腰為度然後將前結就之胎連罐覆於鐵盆內之居中以鹽水和黃土封固罐口勿令出氣出

氣即走爐再用淨灰鋪於鐵盆內灰及半腰將灰按平不可搖動藥罐恐傷封口即要走爐鋪灰畢取燒紅栗炭

攢鋪罐底用扇微扇煉一炷香謂之文火再略重扇煉一炷香謂之武火炭隨少隨添勿令間斷而見罐底再煉

一炷香即退火待次日盆灰冷定用帚掃去盆灰併將封口土去淨開看鐵盆內所有白霜即謂之丹將磁瓶收

貯待用愈陳愈妙其罐內原胎研搗癩瘡神效若恐胎結不老罐覆盆內一遇火煉胎落鐵盆便無丹降亦為走

爐法用鐵絲作一三脚小架頂爐內撐住丹胎再為穩要此丹若遇癰疽發背疔毒一切惡毒用一釐許以津

唾調點毒頂上以膏藥蓋之次日毒根盡拔于毒頂上結成黑肉一塊三四日即脫落再用昇藥數次即收功

此丹用蒸粉糕以水少潤共和極勻為細條晒乾收竹筒內名為錠子凡毒成管即約量管之深淺插入錠子上蓋膏藥次日擠膿如此一二次其管即化為膿管盡再上昇藥數次即收功矣此丹比昇丹功速十倍但性最烈點毒甚痛用生半夏對攪再加冰片少許能令肉麻不痛

又方 水銀一兩 青鹽二兩 皂礬各二兩 火硝二兩 礪砂二兩 雄黃一兩 硃砂各三錢 白砒五分 明礬二兩 右共研勻放

陽城罐內微火煨乾後降三炷香候冷取藥不可放生人雞犬冲破石腫毒未成名件者用醋調點患處頭上看毒大小如桐子大泡起毒即消若已成不肯穿者亦用此丸將膏藥貼頭上半日即穿

又方 水銀 火硝 生礬必五 食鹽必二 右共研末入傾銀罐內放炭火上文火煎滾滾至邊上先起焦黃色

候至滿面俱焦黃米為度將罐離火候冷再用圓正插盆一個裏面須揀光細者將銀罐連藥輕輕倒合在插盆內罐口與插盆縫間須用棉紙調墨水潤濕加鹽泥封固然後將插盆坐于大水中罐底上先加文火用扇扇之先文後武煨至五寸線香為度退去炭火候冷先掃去罐口外鹽泥然後開罐取降于插盆底內之藥藥色以潔白如霜者為上若青黃黑色者不可用或以銀鑿脚與磨亮刀頭略沾微唾藥在上即刻起鏽者為佳每用

用新棉花蘸藥敷此此于膏藥上比昇藥更要少些貼後兩杯熱茶時即發痛半日即止毒重者每日一換膏毒輕者貼兩三日亦不妨若貼大腫膏膏上先放些寸香阿魏然後上此藥少許貼之若要咬頭藥代針丸將麩糊以竹片拌和做成細條切作芝麻粒大放膏心中對腫心貼之此藥不可沾在指頭上沾則要發痛發泡退皮此藥陳久者少痛性和緩却要多用些如第一次降完開出倘藥色不白可將罐內之藥刮盡此藥無所用處

只將降于插盆底內之藥刮出另將水銀火硝生礬各五分食鹽二分並將插盆內降不透之藥與四味頭一併研和從新再入銀罐照依前法降之此藥若一次降不如法不妨兩次三次連降即降至十數次方能降好計算

已有水銀五錢在內矣每次只要將銀罐刷淨或另換新銀罐每次只要水銀火硝生礬各五分食鹽二分直降

到好方止初起前時須要火候得法若火候不及則罐中結胎尚嫩水銀尚活倒合轉來非連胎墮入插盆底內即活水銀先溜入插盆底中若火候太過結胎太老非水銀先已飛去即有降不下之病總以結胎不嫩不老為度用煇炭火最得法凡瘡毒已穿破者忌用

代針點頭

補良言才

卷一

代針點頭

長肉收口 麻藥

二

代針膏 治瘍瘡膿熟不潰 乳香分 白丁香 巴豆炒 碱分五 右為末 熱水調點瘡頭 乾則常以碱水潤之

又方 桑木灰錢七 礦子灰錢五 蒼麥楷灰 茄科灰各一兩 右四味放鍋內 水五碗 滾十數滾 用布袋濾去渣 將水從新用鐵杓熬至一小杯 存用 如腫毒數日內 有膿不得自破 其頭如瘡大者 將此藥在頭上 畫一十字 即破 其膿就出 諸般大瘡 有疔角腐肉 不脫者 用此藥水洗之 即去 又點面上 黑痣 雀神效

透骨丹 蟾酥 硼砂 輕粉 巴豆各五錢 蝸牛二個 麝香一分 先將藥研細 後入巴蝸 再研入磁瓶收貯 每用少許 乳汁化開 將瘡頭輕輕檢破 挑藥如米許 大納于瘡口 外以膏藥蓋之

長肉收口

生肌散 即名海龍粉 龍骨 血竭 紅粉霜 乳香 沒藥 海螵蛸 赤石脂各一分 嫩石膏一分 右為細末 敷上極效 大凡諸生肌散內 要配紅粉霜 若要去腐肉 每生肌散一兩 配入粉霜或三分 或五分 如治下疳 等瘡 每兩只配入一二分

又方 血竭 象皮 味壳灰 大貝母 龍骨各一錢 赤石脂 熟石膏各二錢 兒茶分 乳香分 收口搽藥 龍骨一錢 厚象皮二錢 熟石膏五錢 兒茶 輕粉 乳香 沒藥去油 琥珀各五分 白螺螵壳二錢 右共為細末 搽上即愈

又方 燈草灰 白螺螵壳煨末 舊黑傘紙煨灰 輕粉各三分 冰片 珍珠各五分 血竭分 八寶丹 治腐肉已盡 新肉遲生 搽上立效 乳香 沒藥去油 血竭 輕粉各二分 兒茶 龍骨 鉛粉各一分 冰片五分 共為極細末 用筆管細細紗篩瘡上

潤肌散 治一切瘡癩 結蓋後乾痛 及冬月手足凍裂 並湯火傷 當歸 生地各五分 真麻油兩 將藥入油內 熬數十沸 去渣 加黃蠟一兩 磁瓶收貯 一方 用黃占七錢 白占五錢

麻藥

麻藥方 此係外科動刀針不痛之藥 白芷 製半夏 川芎 木鱉去壳破 烏藥 牙皂 當歸 大茴香

紫金皮兩 木香錢 川烏 草烏各一錢 共為細末每服一錢好酒調下麻木不知疼痛若人昏沉用鹽

水飲之即解

又方 名孫武散 華撥 生半夏 南星 肉桂 乳香 沒藥 胡椒各一錢 川烏 三七 蟾酥 草烏各二

丁香八分 麝香許 花蓋石半錢 風茄子錢 共為細末入磁瓶內臨用敷之

(一) 瘡癰

治血瘤方 用甘草煎膏以筆塗四圍一日上三次又將芫花大戟甘遂各等分為末醋調另以新筆塗甘草圍內

勿近甘草次日縮小再如前塗三四次愈

瘰癧法 兼去鼠癩痔 用芫花根洗淨帶濕不得犯鐵器于木石器中搗取汁用綫一條浸半日或一宿

瘰癧總宿即落如未落再換綫不過兩次自落落後以龍骨詞子末敷瘡口即合瘰癧癩痔依上法累用之極

如無芫花根只用花泡濃水浸綫

消瘤方 用極細生鐵屑醋拌放銅杓內煨乾則再煨如此三四次研極細再用醋調敷使覺患處不甚適意過宿

剝去再敷以平為度

治眼皮生瘤方 用生雞蛋一個頂上敲一小洞入川貝母末仍糊好飯上煮熟食之每日吃三個一月自愈

枯瘤散 灰莧菜即莧菜脂乾 蒼麥燒灰 風化石灰 三味和一處淋汁三碗慢火熬成霜取下配後藥

番木鱉三個搗 巴豆六子 胡椒九粒 明雄錢 人參錢 右共為末入前藥和勻以磁瓶收貯不

可見風以滴醋調勻用新羊毛筆蘸藥點瘰癧當頭瘰癧有梳大則點藥如龍眼核大若茶盃大則點藥如黃豆大乾

則頻頻點之瘰癧自枯落如血瘤破以髮灰摻之粉瘤破以白麻皮燒灰摻之外以膏護好自能飲口收功

飲瘤膏 治瘰癧枯落後用此搽貼生肌收口 海螵蛸 血竭 輕粉 龍骨 象皮 乳香各一錢 雞蛋五個

用黃熬油 右各研細末將蛋油調勻用甘草洗淨患處以雞毛掃敷再將膏藥貼之

治癰氣頭腫方 黃蘗子一觔酒十觔浸之入瓶蒸透常常飲之勿絕酒氣三五日漸消常把鏡照或以綫每日量

之覺消即停飲否則令人項細也

海帶丸 治瘰氣久不消 海帶 海藻 貝母 青皮 陳皮各等分 右共為末蜜丸如彈子大食後噙一九

〔諸風〕

治大麻瘋方 此症全身腫脹頭髮眉毛俱落兩脚臭爛者重將蝦蟆一隻用泥裹之燒熟去泥乘熱放磁碗內以

滾黃酒沖入上用小磁碗蓋之泡半時止服酒取汗為度只用一次三日全愈

治鵝掌瘋方 用白鴿糞為末夜間先用生桐油塗患處將鴿糞燒烟薰之須用舊吊桶去底罩火上以手置桶上

手上用物遮蔽勿使烟氣泄去薰至黃色為度薰後勿洗手須過一夜二三次即愈

又方 用紫背浮萍不拘多少晒乾瓦上燒烟將患處薰之到熟時用扁柏搗汁塗之極重者三次必愈

又方 將稀發草一把藏糟一小塊煎湯洗手將生桐油搽患處用青松毛紮緊炭火上燒烟薰手勿見湯水次日

再搽再薰如此七日全愈指甲壞者俱效屢試屢驗真神方也六月伏中治之更便除根

又方 用大黃鱔一條去腸與頭尾切一寸一段以香油四兩入鍋內將鱔魚豎起煎至將枯去魚留油入磁罐內

將穿山甲燒為末用少許以此油調搽患處將炭火炙

又方 併治一切手足風 用香樟木打碎煎湯每日早晚溫洗三次洗半年必愈

治鶴膝瘋方 此症初起雖用火針及灸及一切敷提之藥皆不能效必要使兩膝眼發泡泡穿出黃水方能奏功

用老虎脚跡草取其根打爛入蜆壳內合膝眼上紮好待發泡挑穿出水俟其結疤即能行矣大約一月全愈

一方用鐵綫帚草根一分石見穿草用根槌俱紅色者佳連根梗葉俱用如秋冬根梗俱老止用其葉半分俱要

當日取新鮮者隔宿勿用同打加飛麵少許亦紮膝眼內

又方 開羊花 蒼木各四兩 將薑便煎數滾貼患處

又方 大肥皂四個 生薑 葱各四兩 大附子錢八 硫磺錢五 將陳米醋一斤煎藥搗如膏加樟冰一兩共研和

敷患處止痛

治白癩瘋方 硫磺 蜜陀僧 輕粉各一錢 麝香五 右共為細末白水加醋蘸藥搽之生薑片亦可糟加葉更妙

治腎囊瘋濕熱疔瘡作痒搽之則痛 名蛇床子湯 蛇床子 歸尾 靈仙 苦參各五 用水五碗煎數滾入

盆內先薰後洗兩三次即愈

治腎囊痒方 用葱三十根胡椒花椒各一兩蛇床子末一兩均作三服煎湯洗之立愈

治腎囊腫內有疥虫 用好花椒烘脆研極細末真柏油調塗外以舊帛包之

治腎囊濕腎子腫大 一名綉毬瘋將雞蛋煮熟去白留黃炒出油再用老杉木燒灰存性調油搽之

治腎子爛出方 用老杉木燒灰存性蘇葉為末各等分敷上仍以蘇葉包之

治腎子腫如水晶陰汗潮濕方 用灶心土三升研碎砂鍋內炒極熱加川椒小茴香于上將陰囊放在上面冷即再炒三次即愈內服除濕湯

治腎濕方 白枯礬^{五錢} 蛇床子錢 黃柏 大黃 石菖蒲^{各一兩} 右為細末和勻河水調敷濕則乾換或用六一散搽之亦效

治男子陽痿囊濕女人陰痒方 用蛇床子煎湯洗之立愈

〔癬疥〕

治各種癬瘡方 用新鮮羊蹄葉不拘多少搗爛加川椒白糖並食鹽少許以布共包之浸好陳醋內半日取布包搽癬三日即愈

治濕癬方 癬成濕瘡浸淫轉甚以至諸藥不效者 用蘆薈二兩炙甘草一兩俱研極細末先以溫漿水將癬洗淨調敷之乾便愈真神方也

治癬方 大露蜂房一個不拘多少以生髮填入孔內用破罐盛之仰口朝上用炭火煨令白礬化盡為度取出共研末搽癬上一二次即除根永不再發

又方 火硝 石灰 輕粉 硫磺 銀珠 右各等分研細用老薑汁谷樹汁大蒜汁蜜汁土大黃汁共和一鐘

將前藥入汁內攪如漿糊先用穿山甲刮破取換榔切斷藥擦五日愈

又方 名丸黃丹 用上好銅青二三兩研細將上好燒酒拌之須不乾不濕塗于粗工碗底內翻轉合地上以磚

墊露一線下以薪艾薰之候乾再拌再薰如此九次少亦要七次約以青色帶黑為度然後再研細將燒酒拌做

成錠子。用時以醋磨搽。每日三五次。三五日後若覺乾裂。以菜油少許潤之。七日可愈。

又方 生半夏粒三 明礬錢一 鳳仙花二十朵 土大黃根不拘 右共搗爛和醋少許。先以穿山甲刮碎患處

擦上即愈。又方 銀珠 勝黃各一 將谷樹汁調搽一二次即愈。

又方 川槿皮 海桐皮 尖槿 樟冰 苦參 黃柏 白芨各二 雷丸五分 楓子 杏仁各二 木鱉個四

用火酒浸七日。將穿山甲刮斷少碎。以酒搽之即愈。

又方 土槿皮兩 苦參兩 斑蝥一錢 土木斃子肉錢三 尖槿榔 生礬 生南星各五 生半夏錢三

用河水并水酒各一碗。將前七味先浸一宿。至臨前時入南星半夏再添河水并水酒各一碗。煎一炷香時

候。去渣存性埋土中七日。出火毒。否則發泡痛甚。不時塗擦。又方 名五黃散 雞脚大黃 硫磺 雄黃 薑黃 藤黃 右各等分為細末。菜油調塗患處。七日勿洗沐

全愈。

又方 硫磺研一兩 蛇床子一兩 枳殼炒取起乘熱 生礬 枯礬 炒過花椒衣 樟腦 冰片各五 銀珠錢三

飛鹽分三 右共為細末。以生豬板油去筋膜。搗如泥。調和少許。先將患處刮碎。以手指染藥擦之。藥不須多。但取

滋潤。浴後擦之。每日三五次。忌浴。三日即愈。或柏油調亦可。并治疥瘡。

治癩疥瘡方 生礬 枯礬 水銀各二 雄黃錢三 尖槿榔五錢 蛇床子五錢 斑蝥七個 用糯米同炒

先將水銀放罐子內。即入青鉛二錢。俟青鉛與水銀烱成一塊。取起。然後將槿榔研細。次將斑蝥研。再將明礬雄

黃研。總以極細為妙。諸藥和勻。方入水銀再研。用無蠟柏油再研。和搽擦一二次即愈。凡男婦並小兒頭上乳

頭上陰囊上。俱忌搽。未出痘小兒忌搽。又方 蛇床子 苦參 蕪荑各一 雄黃錢五 枯礬二兩 礬黃錢五 輕粉錢二 樟腦錢二 大楓子肉 川椒各五

右各為細末。生豬油調搽。

汗斑

治汗斑方 白附子 硫黃 蜜陀僧各一 右俱為末。用生薑蘸搽。三五日即愈。

又方。蜜院僧錢。硫黃一。右研細末。醋調煨薑。蘸搽患處。次日即佳。每日搽一次。七日內須忌洗浴。待其黑色退即愈矣。

退即愈矣。

治夏月汗斑如疹方。蜜院僧八。雄黃四。右研極細。以薑蘸搽之。

治癩子方。菜豆粉一兩。滑石錢。輕粉錢。右為細末。以棉蘸藥。撲于患處。

〔雀斑〕

治雀斑方。名艷容膏。白芷。甘菊花去梗各三錢。白菓二十個。紅棗十五個。珠兒粉五錢。猪胰一個。右將珠粉研

細。餘俱搗爛拌勻。外以蜜拌酒。釀燉化。入前藥。蒸過。每晚搽面。清晨洗去。

又方。名玉容散。白殭蠶。白附子。白芷。三柰。硼砂各三錢。石羔。滑石錢五。白丁香錢。冰片分三。

右為細末。臨睡用少許。水和搽面。人乳調搽更妙。

治雀斑酒刺白屑。瘋皮作癢。名玉肌散。真菜豆粉八兩。滑石兩一。白芷兩一。白附子錢五。右共為細末。每晚用

數錢搽面。

治雀斑亦治瘡疤。將清水調。鷹糞塗之。自愈。

〔疣痣〕

點一切疣痣及瘰癧雞眼方。桑葉灰。風化石灰各一觔。鮮威靈仙六兩。煎濃汁。淋二灰。取汁熬成稀膏。磁器貯

用。點諸患處。不必挑破。應手而除。

治痣方。用水調石灰一盞。如稠粥樣。揀整糯米不破者。半插灰中。半出灰外。經一宿。米色變。如水晶樣。用簪挑少

許。置米於痣上。半日。痣自脫出。不得着水。三二日愈。

〔小兒〕

治小兒初生。下滿身無皮。但是紅肉。用早稻米粉。乾撲至生皮方止。或以伏龍肝。雞子清調塗。

〔小兒初生〕

小兒初生。即服此藥。夜短稀。疏并不生瘡癩。大黃分一。甘草分一。硃砂五厘另研末。將上二味。人乳浸飯上。燉一時。

去渣加入硃砂調勻服之。
凡小兒初生口脣并牙根生白點名馬牙不能食乳急用針挑破出血用好京墨薄荷湯磨以手指蘸墨遍口脣擦之切勿令食乳待睡方可。

〔小兒雪口〕

硃砂七厘 火硝三厘 冰片五厘 銅綠一厘 共研極細末用新羊毫筆蘸桐油潤筆再蘸藥末敷於口舌上半日即愈甚者敷二三次。

〔小兒臍風〕

小兒初生數日內不吃乳舊方用猪婆乳然而難得今即用活蚌剖開取水三四茶匙服之即能吃乳矣神效。

初生後七日或臍口受風令兒生病令乳母每日午時前看小兒上脣牙根但有如粟米白泡隨用手輕磨破可免他疾。

〔臍爛不乾〕

用白鷄子即雞子燒灰敷上即愈或用枯礬龍骨煨過為末敷上。

封臍散 斷臍帶後用 龍骨一錢 紅棉灰一錢 歸頭一錢 右為細末用少許乾摻臍上。

〔小兒無辜卒死〕

取葱白納入下部及兩鼻孔中氣通或嚏即活。

稀痘丹 赤豆小飯 黑豆 綠豆 粉草各 為細末用竹筒刮去皮兩頭留節一頭鑿一孔以藥末入筒中。

用杉木砧塞緊黃蠟封固以小繩繫之投入臘月廁中滿一月即取出洗淨風乾每藥一兩配臘月梅花片三錢和勻若得雪中梅花片落地者不着人手以針刺取者更妙如急用入紙封套內略烘即乾兒大者用一錢小者用五分俱以霜後絲瓜藤上小絲瓜煎湯調空心服湯宜多服服後忌葷腥十二日解出黑糞為驗一次可稀三次不出每年服一次。

稀痘神方 傳方之家已十三算麻子三十六粒去壳揀白色 硃砂一錢須通紅 真麝香五厘 將三味於乳鉢內研爛。

代末出天花矣 者去衣用黃色者不用硃砂砂另研細末 真麝香五厘 將三味於乳鉢內研爛。

如泥每年端午日午時用手蘸藥搽兒頭頂心前心後兩手心兩足心兩手兩腕兩膝兩腋兩下共搽十三處如銀錢大約半分厚搽藥後任其自乾自落不可洗去即端陽前半月初生小兒亦可至期搽用

梅花丸 治小兒痘疹起死回生之病 臘月取梅花不拘多少陰乾有一兩外用 當歸一錢 茯苓一錢 升麻

分五 竹茹八分 甘草三分 用水鍾半煎至八分溫熱時將梅花拌浸一日取出曬乾研極細末如小兒病用雄雞

一隻吊起左足良久將竹鎗入雞喉內取血調梅花末為丸如菜豆大滾水送下二丸即刻見功如小兒病用

老雄雞弗右足如前取血製造曬乾以好磁器收貯不拘遠年近日聽用此方濟人萬無一失小兒臨危任是毒

甚略有微氣用滾水送下不拘時口不宜多服

人牙散 人牙用一兩搗沉性 研極細末每服一枚酒下凡痘密如蠶種皮毛一片無異蠶跡者死症也法取人牙

煨研酒調四五朝時服之痘可立起

換痘丹 犀角兩 梅蕊兩 絲瓜灰兩 雄黃錢 硃砂錢 滑石錢 麝香分 右為末用麻黃膏丸如艾實

大每服一丸酒漿化下凡痘密如蠶種皮毛一片者服此毒使解痘即變另發一層好痘起死回生

紫金錠 治小兒一切危症各照湯引磨服神效

辰砂錢 陳胆星錢 蟬蛻錢 甘草錢 麝香錢 蛇含石兩 一方加殭蠶錢 白附子錢 白茯神錢

白木錢 一方加殭蠶錢 白附子錢 減去甘草錢 共為極細末飯搗丸無錠重五分

救逆痘 痘至七八日或十日灰陷倒塌抓破無血空壳無數目閉不食破損處如焦木灰色危篤垂死 老白雄雞冠血愈

多愈妙白酒釀十匙羌荬汁二十匙三味攪和隔湯燉徐徐熱服少待皮膚紅活即有另發大痘目復閉合面復

腫其內陷之毒皆復發出漸思飲食初與米飲次與黃芪粥飲不必更服他藥也服一次若未全起五更再與一

服倘面紅氣喘不妨

神燈照法 治痘瘡塌之極火到瘡除 川椒 艾葉 紅棗 羌荬 茵陳 乳香 白芷稍 陳香櫟 安息

香 共為末作紙摺薰照

白螺散 治痘抓破 白螺螭不拘 片腦許少 香油調搽患處即愈

治痘後翻疤 膿水潰蔓延 赤石脂兩一 寒水石兩一 大貝母錢七 為末乾搽

象牙散 治痘後翻疤 新象牙錢三 兒茶錢半 殭蠶二錢炒 珍珠三錢 共為極細末 宜用油胭脂調塗毒水

如注漸漸收口

痘瘡餘毒 眼目膜障 用蛇退一具 洗淨焙燥 又用天花粉與蛇退各等分 以羊肝破開入藥在內 麻皮縛定 再用

米泔水煮熟食之 旬餘即愈 再蛇退用潔白色者 若用雜色者有毒

拔毒散 治痘後手足肩背痘毒癰腫 韶粉兩一 大黃五錢 雄黃三錢 五倍子一兩 乳香五錢 沒藥五錢

黃丹錢五 白芨一兩 黃柏錢 白芷一兩 共為細末 蜜水調搽

治痘毒方 用鮮棟樹根皮同菜豆搗爛 厚敷患處立愈

蠶病敷藥方 治小兒痘疹餘毒才破爛出血 或成走馬牙疳者 立效 并治大人牙爛口舌破碎 如神

人中白錢一 銅綠三 麝香分 共為細末 茶洗口牙 淨後用指頭蘸藥末敷上即愈

天花開在眼中 用新象牙磨水 滴入眼 其花即退

痧症發不透 穿山甲五分 末收起 先以西河柳兩一 薄荷分五 水煎濾清 入白酒釀山甲末調和 熱服 暑月不用

酒釀 探生散 治小兒急慢驚風 諸藥不治 以此定其死生 雄黃錢一 沒藥錢一 乳香分五 麝香分二 右為末用少

許吹鼻中 如眼淚鼻涕皆出者可治

青礞石散 治小兒急慢驚風 潮涎壅塞 命在須臾 此藥入口即活 青礞石兩一 入砂鍋內同火硝兩一 用炭火

煨令通紅 以硝盡為度 候冷如金色 研為細末 每服二三分 薄荷湯下

治小兒急慢驚風 五月五日 午時取白頭蚯蚓 不拘多少 去泥活搗爛 加辰砂等分 和勻為丸 如菜豆大 金箔為

衣 每服一丸 白湯送取 蚯蚓時 用竹刀截兩段 看其跳快者 治急驚風 跳慢者 治慢驚風 作二處修合極妙

下兒急驚風

急驚者身熱面紅痰厥忽然手足牽引啼不出聲目睛上視者是取活蚌一個銀簪脚挑開滴入薑汁將蚌仰大
片時即有水出用磁杯受之隔湯煨執灌下立愈神效

小兒急驚風 石莖蒲搗爛絞汁二三十匙老薑汁數匙和均灌下即愈
啞驚風 細葉蒲蒲搗汁和雪梨汁同飲

小兒驚瀾迷悶嚼舌仰目者 犀角尖五分磨滾水冲服

小兒五疳 甘遂末錢 猪心一個外以乾麵糊包在竈火內煨熟去甘遂末連麵食之

秘傳抱龍丸 專治小兒着驚嚇傷心肝二經即唇青四肢搖動起卧不安蓋抱者保也龍者象東方肝木也故此
丸為治驚之要藥也 赤芍一錢 川貝母七錢 防風錢 桔梗錢 明天麻一錢 鈎藤三錢 枳壳錢 薄荷

荷葉錢 胆星錢 陳皮錢 天竺黃錢 茯神錢 共為細末煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服一丸滾湯下有
外邪薑湯化下

諸羊癩瘋 白礬兩 雨茶兩 共為細末蜜和丸桐子大每服五十九食遠陳茶送下小兒二三十丸

猴疔疔 名二粉散 是疔從肛門或陰囊邊紅暈爛起漸至皮膚不結壓或眼梢口旁赤紅若不早治必至爛死
凡見此疔時切忌洗浴只見軟綿帛蘸甘草湯揩淨用藥雖延蔓過身可保立愈此方極秘已救人無算矣 菜

豆粉兩 標硃兩 水片一分或二 輕粉半錢 右為極細末將金汁調鵝毛蘸敷上如無金汁雪水亦可或用
燈心甘草湯亦可 一方輕粉用二錢加牛黃二分內再服化毒丹

乳母煎藥方 小兒患喉疔乳母亦宜服藥量精神強弱服分數不拘 黃連 金銀花 連翹 甘草 赤芍
當歸 牛膝 桔梗 黑山梔 薄荷 木通 右各等分用新汲水煎渣再煎食遠服

頭耳疔瘡 將明松香用草紙捲之浸菜油內半日取出點火將淋下油加飛丹枯礬在內調勻令定擦之
頭面疔瘡 黃丹錢 枯礬錢 黃柏錢 銅綠錢 白芷錢 共研細末菜油調搽一二次必愈

頭上疔瘡 明松香兩 入葱管內煎過待冷乾了同飛丹一兩煨過頭髮三錢研細菜油調搽

治面耳疔瘡下疔諸般惡症 樟腦兩 銅青 輕粉 楓子肉各一 蛇床子兩 雄黃 黃丹 寒水石

硫黃豆腐製石 漏蘆 枯礬各二 共為細末。猪油調搽。

痧痘後走馬牙疳 明礬分五 冰片分半 白礬砂錢二 人中白錢一 皮硝錢一 雄黃牛糞尖一個大燬 共研細末吹入患處立愈。

小兒痘後痧後牙疳方。雄黃牛糞尖。須用經霜者。妙瓦上炒成灰存性。每錢入冰片二分。研細吹患處立愈。

治小兒走馬牙疳方。用女人溺桶中白。以火煨過研末一錢。銅綠三分。麝香一分。共為末。擦患處即愈。

小兒口疳。並治走馬牙疳。冰片分半 甘草分二 兒茶分二 龍骨分二 黃柏分五 薄荷分五 春夏用薄荷五分。兒茶二分。秋冬用薄荷三分。五厘。兒茶一分。五厘。腐爛者方加龍骨。走馬牙疳加珍珠五厘。西牛黃三厘。疔凶者方用上二物。

口疳吹藥 人中白一兩 黃柏末一兩 青黛錢一 枯礬錢三 冰片許少 文蛤錢三 紫甘蔗皮灰五錢 共為細末吹之立愈。

集仙固齒丹 五倍分三 龍骨分二 甘草分三 蔗皮灰分五 人中白分五 黃柏末分三 青黛分一 枯礬分一 冰片分一 薄荷分三 兒茶分三 黃牛糞一個 炙存性。共為細末吹之。

治小兒口瘡并治牙疳 人龍用尿洗淨瓦上焙脆研細和青黛少許。冰片少許。研勻搽之立愈。

珠簪散。治小兒五疳積。執牙疳并化後牙疳。真蘆薈分五 龍腦分五 薄荷葉分五 珍珠四分 真青黛分三 官礬砂分二 大冰片分五 兒茶分五 右為極細末。磁瓶貯好。以蠟塞口。勿令泄氣。臨用吹患處。

治小兒疳疾。用蝦蟆一個。放在瓶內。將紙封口。過七日。再用洗淨。糞中蛆。不拘多少。入瓶中。任蝦蟆食之。用炭火煨存性。為末。蜜丸食之。

治頭面疳瘡。及白泡濕毒等瘡。並治痘後翻疤。婦人蝕瘡神效。五倍子一兩 去蛀 枯礬二錢 沒藥二錢 飛丹五錢 湯 蛇床子七錢 白芷六錢 真輕粉錢三 明雄黃錢一 乳香二錢 去油 共為極細末。將老松香和熟猪油。捲在青容布內。以火燃之。滴油於碗內。待冷。將油調藥搽之即愈。

消疳無價散 治小兒疳積並治疳眼 石決明一兩 半 蘆甘石五錢 童 滑石五錢 雄黃錢二 硃砂錢五 冰片分五

飛丹五錢 湯 蛇床子七錢 白芷六錢 真輕粉錢三 明雄黃錢一 乳香二錢 去油 共為極細末。將老松香和熟猪油。捲在青容布內。以火燃之。滴油於碗內。待冷。將油調藥搽之即愈。

石決明一兩 半 蘆甘石五錢 童 滑石五錢 雄黃錢二 硃砂錢五 冰片分五

海螵蛸去壳 共為細末量兒大小或三分或五六七分用不落水雞肝竹刀切片上開下連搽藥在內將著

包好入砂罐米泔半碗重湯煮熟連湯食盡眼者服四五服即愈

雞肝藥。滑石水飛 雄黃錢二 硃砂三錢水飛 冰片分三 石決明兩半 海螵蛸去壳 蘆甘石六錢童便

赤石脂三錢 共為末每雞肝一具入藥末五分 陳酒米泔各半盞飯上蒸熟食之開翳復明 又方每歲服一分

舟積夜眼方。名五色雞肝散 石決明一兩九孔 蘆甘石六錢 赤石脂五錢 硃砂五錢水飛 海螵蛸四錢

雄黃錢四 白滑石錢八 各研極細末每歲一分用不落水雞肝一具竹刀切開搽藥在內若包於瓦罐內米泔煮

熟食之極重者二三服即愈此藥忌見銅錫鐵器

治小兒夜盲或舟積後目閉翳膜者 羯羊肝一具 設精草一握 瓦罐內煮熟不時食之甚效

小兒咳嗽發喘鼻扇肺脹 名百花卷 透明生白礬錢一 用生白蜜三四錢調和放舌上徐徐吃下即愈

治小兒瘡塊 名三反膏 生甘草 甘遂 芫菜各錢三 蟹肉兩一 硝砂錢一 木鱉子肉細細 加葱白七根入

蜜少許搗成膏攤狗皮上貼之如藥略乾加葱蜜潤下用二次愈

治虫 朝吃樞子三四個下午吃使君子三四個其虫即盡但須兼服補脾胃藥不然虫盡則傷人慎之

治小兒虫積方 樞子二三觔陸續吃完即愈

蒜螺丹 治小兒水腫腹脹小便不利 大田螺個四 大蒜個五 車前錢三 麝香許少 右前三味同研後加麝香再

研為餅每用一個貼臍中將膏護之水從小便而出

兌金丸 有黃黑二種通治小兒百病二種藥共十四兩 白丑亮者用 二兩去 大黃兩二 川連錢三 雄黃兩二

胆星錢五 神麴錢五 黑丑黑者用 二兩去 蝦蟆極大者用 一具須要黃者用銀罐入內用油蓋蓋住鐵絲扎

開如墨黑者良如小者便 青黛兩一 石膏兩一 滑石兩一 胡連錢三 神麴錢五 右二種丸藥俱用生研水法丸

用兩具五月五日中午時煨 如米糲之大每歲各一丸勻服早晚各進一次

陽春白雪糕 補養脾胃 白茯苓兩四 山藥兩四 芡實兩四 蓮肉去心 陳倉米半 糯米半 白糖斤二

先將藥米粉蒸熟再入白糖印作餅子晒乾

錫焦丸 小兒常用。健脾消食。錫焦炒黃 神麩炒四兩 砂仁炒二兩 山查四兩 蓮肉四兩 雞肫皮一兩

共為細末。加白糖米粉。和子焙作餅用。

肥兒丸 常用。可免飲食傷脾之症。山藥炒二兩 茯苓 白扁豆炒 五穀虫淘洗 山查炒 白芍炒 麥芽炒

神麩炒 當歸各兩 白朮炒 陳皮 使君子肉 煨各一兩 生甘草七錢 胡連七錢 蜜丸茶豆大 每服一錢。

小兒胎痰。獨生一個。白色不紅者。南星 半夏 川烏 草烏 俱生用等分研末。或葱蜜或雞鴨蛋清調敷。一切外症。色白者皆可。

胎癩 名粉艾丹。先用猪胆汁浴淨。再用宮粉調塗。碗內晒乾。用艾薰至老黃色。取下。為末。絹袋撲之。

小兒白壳癩瘡。名美首膏。百草霜一兩 雄黃一兩 胆礬錢六 輕粉錢一 榆樹皮錢三 用石灰窰內燒紅。流結土渣。四兩。共為細末。猪胆汁調。剃頭後搽之。神方也。

治白壳頭瘡方。俗稱臘梨頭。用皂礬炒 土棟樹子炒 黃豆炒 川椒一錢 泔水洗之。待燥。用柏油調搽。即愈。

小兒頭上黃水瘡。及壳痴神效。名香粉油。黃丹水飛 無名異炒 宮粉炒 輕粉三分 片松香二兩 為末。入葱管內。用線紮定。水煮融化。去葱。候乾。共為細末。香油調搽。神效。

治黃水瘡。八寶丹 蟬蛻一兩 赤石脂分錢二 文蛤分錢二 白龍骨錢八 兒茶錢一 枯礬錢一 黃丹錢 宮粉分 共為末。搽上神效。

治小兒黃水瘡。不論頭面遍身。俱有水。流濕處。即生。用鉛粉不拘多少。研細。并花水濃調糊乾。大碗內。將艾火薰。烟覆碗內。粉黃至綠色。為度。取下。研細。瘡濕者。乾搽乾者。用麻油調搽。

治黃水瘡方。石膏三錢 龍骨三錢 片松香錢三 白礬煨 右藥共研細末。以雞蛋黃。葱油和前藥敷上。治小兒體肥。耳後腋下。陰間濕癢者。用海螵蛸研末。炒微黃。敷之。甚良。其次用宮粉敷之。亦好。

治小兒瘡癩頭。銅綠八錢 杏仁七十五粒 木別子五個 乳香錢五 沒藥錢五 血竭錢一 輕粉錢一 明松香兩四 草麻子肉 共搗成子。搽膏貼之。

又方。用瓦猫頭一個在瓦上煨焦黑。存性研末。摻在加味太乙膏上貼之即愈。

小兒鼻衄不能吃乳。鮮生地黃搗爛取汁灌之即愈。

小兒瘡疔頭。名綠燕丹。取多年柏油入銅杓內熬滾去渣。再入銅綠生礬。燕窩泥調勻搽。

〔疔小兒丹法〕

小兒頭上生遊丹。欲疔者必令臥在枕上。將腳跟一頭用磚二塊墊起。攪脚以墜毒氣於頭頂。然後用磁鋒疔之。使毒氣皆從頭頂而出。若乳母抱立則毒氣順下。壅塞咽喉必難生矣。慎之慎之。

赤遊丹。青黛一分 雄黃五分 蜈蚣一條 用瓦松一枝同打爛絞汁敷。

又方。活蜈蚣葱頭 飛麩雞子白 調敷。一方加白蜜少許。

小兒遺尿。用不落水雞脬一具雞腸一條猪尿胞一個各炙焦為細末每服一錢黃酒送下。女用雄男用雞。

〔婦人〕

治乾血癆奇方。過三年者不治。用白鴿子一隻去肚腸淨入血竭。一年者一兩。二年者二兩。三年者三兩。用針線縫住。用無灰酒煮數沸。令病人吃之。瘀血即行如心中慌亂者。食白煮肉一塊即止。

治婦人女子帶下虛脫症極效方。艾實粉二兩 白茯苓二兩 赤石脂一兩 牡蠣醋煨一兩 禹餘糧煨一兩 牛角膠一兩 共為末好醋一杯拌和前藥晒乾再搗末打糊為丸每服二錢。

治婦人久積虛寒小便白濁并滑數不禁。用鹿角屑炒黃為末每服二錢溫酒空心下。

治婦人臟燥之症。好哭悲傷頭狂罵人。如有鬼神平時女人好哭自己不知其故服之最妙。

生甘草一兩 小麥一升 紅棗十枚 水六升煮三升分三次服即愈。

經閉。土鷲虫存性一個 上好血珀末五錢 麝香三錢 酒打和為丸每服三分。

血淋。用髮灰二兩 藕汁調服痛甚者三日即愈。

治血崩。大生地一兩 龍骨四錢 研極細。生牡蠣四錢 研極細。石榴皮三錢 烏梅肉三錢 阿膠六錢 蒲陳棕灰。

錢。百草霜三錢 陳京墨三錢 右研極細末用淮山藥五錢研末醋水打糊為丸分作七日服內加入參三錢。

錢。百草霜三錢 陳京墨三錢 右研極細末用淮山藥五錢研末醋水打糊為丸分作七日服內加入參三錢。

尤效或用人參湯送下

血崩方。陳棕灰 百草霜各一 共為末每服一錢陳酒下

治血崩不止。用陳棕棉花子二味燒灰存性黃酒送下即止。月水逆行上出口鼻。薑汁童便溫服。

小便血。鮮地骨皮洗淨搗自然汁無汁以水煎濃汁每服一杯加酒少許食前溫服能清心腎開鬱結兼以分利

若常溫補反生濕熱為害矣

治孕婦痢疾秘傳妙方。用雞蛋一個破一孔如指大以銀簪腳攪勻加入黃丹三錢五分用紙封口在飯鍋上蒸

熟食之即愈

安胎方。胎氣不安或腹痛或飲食不甘俱宜服之或五六個月常服數貼最妙足月亦可服。人參五分 倍白朮一錢 陳皮五分 甘草三分 當歸一錢 川芎八分 白芍一錢 砂仁七分 紫蘇一錢 香附六分 黃芩一錢

腹痛倍加白芍。腰痛加鹽水炒杜仲川斷。內熱口渴去砂仁加麥冬。見紅加酒炒地榆生地以上各一錢

又方。歸身半錢 川芎七分 白芍一錢 熟地一錢 白朮半錢 條芩錢半 砂仁一錢 陳皮一錢 蘇梗五分 炙甘

單四分 如或下血加蒲黃阿膠。腹痛加香附枳壳。如惡阻加竹茹去地黃。

治胎漏方。用炒熟蚕豆壳磨末每服三四錢加沙糖少許調服。

治死胎不下。皮硝二錢壯者三錢寒月加熟附子五分酒半杯童便一杯煎二三沸溫服。

治胎衣不下。用牛膝三錢葵子五錢水煎服。

產後腹脹閉結悶脹氣結坐臥不安。大麥芽炒 為末用一合陳酒調一方 每服三錢

產後面紫。乃惡血上冲氣壅致目不合。山查炒一兩 童便煎服。

產後面黑。乃惡血入肺發喘欲死。蘇木一兩 水三鐘煎至一鐘調人參細末五錢服。

治產後惡露不盡發熱。用童子母雞一隻竹刀殺乾搗去毛破肚將陳酒洗淨用益母草花一二兩裝入雞肚內

加陳酒浸隔湯煮爛去益母草只將雞淡吃連酒汁亦吃留雞骨炙存性研末沙糖調酒過下先吃雞一隻將第

二三隻金茶是單代益母花照前法入雞肚內者吃骨亦吃一二隻即愈

產後血暈。韭菜切入有嘴瓶內將醋三碗煎滾入瓶內將瓶嘴塞產婦鼻孔即醒。

治男婦乳癰秘方無不立愈。鮮橘葉些。夏枯草。香附鹽使。青皮。先將夏枯草切碎。用青皮香附晒乾後

將橘葉放石臼內打爛。同前藥拌勻。再晒極乾。後方上磨為極細末。陳米飯為丸。白湯下。不拘時服。

治乳癰癰潰爛者方可服神效。雄鼠糞三錢兩頭。土棟樹子三錢經霜者。露蜂房錢。俱煨存性為末。約分

為三服酒下。間兩日服一服。痛即止。膿盡收斂奇效。

治乳痛。極凶者不過四貼。炒白芍八分。甘草三分。蘇梗七分。柴胡七分。炒黃芩八分。香附醋炒。當歸酒洗

川芎七分。金銀花錢。貝母錢。連翹八分。瓜蒞霜油淨去。加橘紅葉三十片。水二鍾煎八分。食遠服。無孕加

青皮八分。醋炒。有孕去青皮。加薑汁炒砂仁末五分同煎。一方瓜蒞用一個去油。

海上乳毒奇方。當歸。漏蘆。穿山甲。獨活。乳香。沒藥。桔梗。青皮。水酒煎服立消。

雄黃藜蘆散。治婦人陰中突出。如蛇或雞冠菌樣者。雄黃兩。冰片二分。輕粉錢。驚頭煨黃色。葱管

藜蘆二錢研細如麴。俱為末和勻。再研。磁罐收貯。先用芎歸湯煎洗。隨後搽藥。早晚二次。其患漸收。芎歸湯。川芎

當歸。白芷。甘草。胆草各等。每用五錢。煎湯洗患處。搽藥。

婦人乳腫。不論內外。吹名必消散。取五穀大楊樹上木耳菌。拭淨。瓦上炙焦。存性為末。每服三錢。沙糖調。下即消。

婦人陰戶內生瘡。癢痛難堪。用鮮猪肝切成條。於香油中微過。過抹樟腦川椒末。插入戶內。引蛆虫候一時辰。取

出再換二三條即愈。

婦人陰戶內生瘡作痒。活蚌一個。剖開。將有肉半個。手拿對陰戶一夜。次日又用一個。全安。蚌蛤亦不用。甚大。量陰戶大小用之。

婦人陰瘡如虫咬痒痛者。生搗桃葉綿裹納之。一日三四易。

婦人交接傷陰出血不止者。用五倍子研極細末。搽之。

立消疔瘡外治神效方。

松香廿兩。製法附後。沒藥三兩。研極細末。白蠟二兩。切為粗末。銅綠五兩。研細過羅篩再

黃蠟十兩。刮取粗片。百單霜五兩。研細過羅篩再。明乳香三兩。研極細末。麻油六兩。選吉日淨室。焚香齋戒。虔誠修合。忌婦人雞犬及孝婦人。見用桑柴火。先將麻油入鍋煎滾。次下松香候稍滾。三下

白蠟候稍滾四下黃蠟候稍滾五下乳香候稍滾六下沒藥候稍滾七下銅綠候稍滾八下百草霜滾過數次於鍋內冷透搓成條子丸如桂圓核大藏淨磁瓶內臨用時以一丸可軟捻扁貼患處頃刻止痛次日腫消即愈已走黃者貼之亦無不霍然神速之效百發百中疔瘡藥之至寶也此方法人甚多是當廣為傳揚

貼後忌食葷腥辛辣湯湯大熱食生冷發物麵食豆腐茄子黃瓜酒忌水洗忌惱怒憂悶 大忌房事
製松香法 用桑柴火煎汁澄清入松香煮爛取出納冷水中少時再納灰水中煮以色白如玉為度
取百草霜法 先須刮盡鍋底專燒茅柴稻草取烟煤用如以別種柴烟煤用入則不驗

戒鴉片烟癮方

潞黨參兩一 金櫻子兩一 粟壳錢四 萊服子兩一 韭菜子兩一 半夏兩一 陽春砂仁錢五 廣陳皮錢五 陳酒斤五 倭芙蓉灰錢五 此方將各味煎好搗去渣滓和入陳酒內再煎一沸置蓋鉢中勿令洩氣於應至之時先飲一鍾癮可不至更將淡酒一盃沖入其內每飲一鍾即沖入一鍾藥性冀其漸減而烟癮庶可全消

急救誤食洋烟方

明雄錢 雞蛋清個一 生桐油兩一 調勻河水灌服即吐或吐有未盡用硬雞毛或鴨毛蘸桐油直掃咽喉乃吐若同燒酒誤食者加葛花三錢 調服醒後用生甘草錢五 食鹽分五 明礬分五 金銀花錢五 煎服 又宜多食柿餅以解洋烟并相油之毒如毒重時久萬無生理用艾耳如大黃豆大灸氣海穴在臍下一寸五分 較准後用墨一記即按記處灸之灸時肚腹兩邊即注下推運不可歇手灸到手足能動略知疼痛乃止仍宜照前服藥

急救難產良方

三麻四豆脫衣裳 合研細末加麝香 共成一餅貼交骨 須臾母子兩分張 此方用單麻子個三 巴豆個四 均去皮加麝香分 全研成餅貼產門上交骨其胎立下如月分未足胎或轉動不可輕用若足月臨盆周日下午者用此立驗儀徵張姓婦生產三日不下子死腹中命在呼吸照方配用死胎立下產母保全

治傷方

晉人尚氣每有事甚細微一語不合輒即鬪毆及傷較他省為多又不善於調治動輒斃命今訪有秘方屢試屢驗

神效異常。時行刊發有牧民之責者。並須捐資。慎選真寶藥材。如法製備。一有報傷之案。無論跌打損傷。金刀他物。骨折骨碎。立即給藥。照方醫治。勿臥熱炕。定有奇效。州縣仁心為質。遇有命案。往往執罪。疑惟輕之論。不肯嚴辦。然與其曲為開脫。以致死者含冤。何如速加拯救。俾兩命俱得保全。功德不更大乎。急救方開列於左。

十寶散

水片二分 麝香二分 辰砂錢 乳香去油 子紅花錢 血竭錢 雄黃錢 兒茶分 歸尾一 沒藥錢

以上十味共為細末。貯磁瓶黃蠟封口。勿令走氣。

一治跌打損傷。皮肉青腫未破者。用陳醋調敷患處。腫消即愈。

一治及傷。并各器械傷。皮破血出者。以藥末搽上。包裹。不可見風。血止即愈。

一治內傷骨碎。或骨已斷折。先將骨節湊准。用陳醋調藥末。厚敷患處。以紙裹。外加老棉絮包好。再用薄板片夾護。將繩慢慢細緊。不可移動。藥性一到。骨自接矣。須靜養百日。如犯房事。必成殘疾。

一治及傷深重。未致透膜者。先用桑皮線縫好。多換藥末於上。以活雞皮急急貼護。如前骨損養法。即愈。

一遇跌打昏迷不醒。急用少許。以陳酒冲服。自然醒轉。以便調治。此方神奇。雖遇至重之傷。鮮有不起生者。

張蘭渚中丞。頒發天長縣署。奉到後。即照方修合。用之屢效。因思此種良藥。不特牧民者可以救人。即民間如法製備。取以治傷。亦甚有益。

急救跌打損傷方 並治馬踢刀箭等傷

白附子十二兩 白芷 天麻 生南星 防風 羌活各一兩 就破處敷上。傷重者用黃酒浸服數錢。青腫者水調敷上。

破傷風方

荊芥錢 黃蠟錢 魚鱗五錢炒 艾葉三片 入無灰酒一碗。重湯煮一炷香。熱飲之。汗出愈。惟百日内不可食雞肉。

解砒毒神效方

防風一兩 研細末 又方 石膏研末 水調服。

以上諸方。係百試百驗。具有起死回生之功。勿以尋常方藥視之。還望好善諸君。廣為傳播。造福無量。