

升麻和氣飲

八九

治風癰瘡疥熱結大便不通

當歸

陳皮

各一錢半

枳殼

麩炒

芍藥

酒炒

半夏

製

桔梗

炒

白芷

蒼朮

米泔浸炒

乾葛

白茯苓

甘草

炙各一錢

乾薑

炒

大黃

各五分

升麻

三分

右水煎服

當歸飲

百九十

治風濕血熱癰疹痒痛膿水淋漓瘡疥發熱

等證

當歸

川芎

生地黃

白芍藥

白蒺藜炒

黃芪

何首烏不見鐵
各錢半

防風

荆芥

甘草各一錢

右水煎服

羌活當歸散 一九一

治風毒血熱頭面生瘡或赤腫或成塊

或癰疹搔痒膿水淋漓

羌活

當歸

川芎

升麻

防風

白芷

荆芥

鼠粘子蒸

黃連酒炒

黃芩酒炒

連翹

甘草

右用酒拌晒乾酒煎服

一掃散 一九二

治癬疥

防風

荆芥

苦參

地骨皮

薄荷 等分

甘草 減半

右為末蜜水調服三錢不過三五服可淨○或煉蜜九桐子

大每服五七十九食遠茶清送下

烏金散 一九三

敷腎囊破爛下疳等證

麩炭

紫蘇葉

右等分為末香油調搽用紫蘇葉包裹之

蛇床子散 一九四

治一切風癬疥癩搔痒膿水淋漓

蛇床子

獨活

苦參

防風

荆芥

各三錢

枯礬

銅綠

各一兩二味另為末

右為末麻油調搽

金黃散

一九五

敷天泡濕熱等瘡

滑石

粉甘草

此當半用為是

右等分為末搽敷○此方或加綠豆末以治濕熱肥瘡更妙

○嘗以此方加枯礬少半用治肥瘡大效

白粉散

一九六

治諸疔瘡

海螵蛸

三分

白芨

一分

輕粉

一分

右爲末先用漿水洗拭乾傅

滑石散 一九七

治小兒天泡瘡

好滑石

黃栢

右共爲末傅之○仍內服荆防敗毒散或金銀花散熱甚者宜服大連翹飲○一方名碧玉散以青礬調前二味如泥用皂刺挑破泡水次敷藥神效

秘方仙遺糧湯 一九八

治一切楊梅瘡不拘始終虛實皆可

取效

土茯苓

卽名仙遺根用鮮者二兩洗淨以木石柏槌碎

用水三碗煎二碗去粗入後藥煎服

當歸

生地

防風

木通

薏仁 各八分

金銀花

黃連

連翹 各一錢

白朮

白蘚皮 各七分

皂刺 六分

甘草 四分

加燈心二十根用遺糧湯二碗煎一碗食遠服

土草薺湯 一九九

治楊梅瘡及瘰癧咽喉惡瘡癰漏潰爛筋

骨拘攣疼痛皆妙○

用土草薺即土茯苓二三兩以水三鍾煎二鍾不拘時徐

徐服之○若患久或服攻擊之劑致傷脾胃氣血等證以

此一味為主外加對證之藥無不神效

五加皮飲 二百

治楊梅綿花瘡百發百中亦可煮酒以治結

毒

當歸

木瓜

生地黃

熟地黃

羌活

薏仁

各一錢

防風

荊芥

赤芍

苦參

大楓藤

各七分

五加皮

二錢

甘草

僵蚕

各五分

右每服入土茯苓四兩猪肉四兩用水二大碗煎一碗食前
溫服渣再煎連肉食之忌生冷魚腥沙氣牛肉茶酒醋所用

土茯苓忌鐵器○若治瘋毒口服此藥外以此藥煎膏或丹收或粉收貼之

換肌消毒散

二百一

一名草薺湯○治時瘡不拘初起潰爛

土茯苓

五錢或一二兩

當歸

白芷

皂刺

薏仁

各一錢半

木瓜

不犯鐵器

白蘚皮

木通

金銀花

各一錢

甘草

五分

右水煎服○甚者土茯苓用至四五兩更妙

蠲痺消毒散

二百二

治時瘡肢節筋攣

姜黃

土茯苓

獨活

各五錢

白朮

當歸 各一錢半

芍藥 一錢

白芷 五分

右水煎服

七貼方 二百三

治楊梅綿花瘡

防風

忍冬

皂刺

蟬退 去頭足

連翹

白蘚皮

五加皮

荊芥

穿山甲

炒各一錢

生地

木瓜

去心忌鐵

殭蚕

炒各一錢半

皂子

七個

薏仁

三錢

土茯苓

四兩

右用水四碗煎二碗食遠分二次服之○忌牛羊茶酒醋房

事

茯苓膏 二百四

治楊梅瘡並治瘋毒

當歸

白蒺藜

羌活

生地

熟地

甘草 去皮

連翹

木通 各三錢

土茯苓 半斤

右為粗末用水五六碗熬將半用絹濾去滓再熬成膏晾冷
每服一大酒鐘日三服輕者五六料重者十料全愈熬藥須

用砂鍋○忌房事鷄魚牛肉椒醋等發物

五寶丹 二百五

治九種楊梅結毒並及兒女者

琥珀 透明血色者用甘草水煮過三分半

珍珠 炒過三分半 一方用豆腐包蒸

硃砂 透明者三分半

鍾乳石 用木香甘草各一錢同煮乾用三分半

飛羅麵 炒過三分半

冰片 半分臨時加

右俱爲極細末磁罐收貯聽用○服法每日用土茯苓成塊者一斤洗淨用石敲碎先入水二升煮取汁四碗收磁器內將前槓再入水四五碗煮汁二碗並入前汁內爲一日之用○若病在上者加木香二錢病在下者加牛膝一兩與土茯苓

苓同煎病者不得另飲茶湯但將土茯苓湯時時飲之若飲湯半鍾加五寶丹二釐飲一鍾加四釐體厚者加六七釐一日內服盡此湯為度在上飽服在下饑服忌茶酒並一切發風動氣之物其毒貼清涼膏或加摻藥收口若舊有輕粉等毒服藥後當盡發出無則不發也大忌房事輕者十服重者二七服全愈

醫統

楊梅癰漏方

二百六

不問年深者並效

土茯苓

五兩

金銀花

一兩

皂刺

花椒

牛旁

鬱金

當歸

各五分

黑鉛

三兩

鎔化入水銀五錢乘熱搗爲粉分五分聽臨後

另入煎藥用

右咀分作五貼用水二鍾入葱一根煎至一鍾去粗再入鉛粉一分煎至八分食遠服

右鉛粉煎後仍可取起蓋楊梅癰漏多因服輕粉積毒而成此以水銀花椒黑鉛仍收引輕粉之毒從類而出也○此藥每以五貼爲一料初服一貼要取微汗取汗法先以金銀花一兩或忍冬藤葉尤妙防風荆芥花椒各半兩煎湯二斗於不透風處先薰後洗自然汗出卽患二三十年者只用此四

料四汗之無不全愈忌牛肉燒酒真妙方也世人珍秘不傳

徐春甫得之用以治人一獲效故詳載之以濟人也

會膿散 二百七

治惡毒便毒初起之妙方也

白芷

殭蚕 炒

川山甲 煨各二錢 大黃 四錢

乳香

沒藥 各一錢

右為末以當歸四錢用酒水各一鍾煎一鍾去粗量人強弱

或全用或一半調服之○此藥若嫌太多則咬咀為飲大黃

生加煎服之尤妙

牡蠣散 二百八

治便毒亦名血疔

當歸

酒拌

甘草節

滑石

煨各一錢半

牡蠣

二錢

大黃

三錢

木鱉子

五個杵非有大熱者此味不可用當去之亦不必臚

水二鍾煎一鍾露一宿五更頓服冬月火溫脹無論已未瀆

膿血俱從大便出○此方乃鹹寒導滯之劑若久曠房室犬
小便秘發熱熾痛或交感時強固精氣以致交錯壅滯而結
為腫痛便秘者最宜用之若勞倦虛弱之人不甚熾痛大小
便無熱秘者不宜輕用

牛黃雙解散

二百九

治便癰內蘊熱毒外挾風邪或交感強

忍精氣以致淫精交錯壅結瘡痛或大小便秘先用此藥通

解更用調補之劑

肉桂

大黃炒

芍藥

牽牛杵炒

澤瀉

桃仁

去皮尖炒
各二錢半

炙甘草

乾薑

各一錢

右分二劑水煎空心食前服

內托羌活湯 二百十

治臀癰腫痛兩尺脉緊按之無力者

羌活

黃栢

各二錢

黃芪

鹽水炒

防風

當歸尾

藁本

肉桂

連翹

各一錢

炙甘草

蒼朮

陳皮

各半錢

右水酒煎服

加味瀉肝湯 二一一

治肝經濕熱不利陰囊腫痛或潰爛皮

脫辜丸懸掛或便毒及下疳腫痛或潰爛皆治之

龍膽草 酒炒

當歸稍

車前子 炒

生地黃

芍藥 炒

澤瀉

黃連 炒

黃柏 酒炒

知母 酒炒

防風 各一錢

甘草稍 五分

水二鍾煎八分食前服外敷烏金散

加味托裏散 二一二

治懸癰不消不潰

人參

黃芪 鹽水炒

當歸

川芎

麥門冬

芍藥 炒

黃柏 酒炒

知母 酒炒

金銀花

製甘草

柴胡

各一錢

水二鍾煎八分食前服

加味十全大補湯 二一三

治懸癰潰而不斂或發熱飲食少

思

人參

黃芪

鹽水炒

白朮

炒

熟地黃

當歸

川芎

芍藥

炒

茯苓

各一錢

甘草

炙

肉桂

五味子

搗炒

麥門冬

各五分

水二鍾煎一鍾食前服○莖腫加青皮○小便赤加酒炒黃

栝知母○小便澀加車前子山梔子俱炒用

五味當歸散 二一四

治婦人陰中突出一物長五六寸名陰

挺

當歸

黃芩 各二兩

牡蠣 煨一兩半

蝟皮 炙一兩

赤芍藥 五錢

右爲末每服二錢食前溫酒調下滾湯亦可如不應須以補

中益氣湯倍加柴胡升麻兼服之○又方用當歸川山甲炒

蒲黃炒各半兩辰砂一錢麝香少許俱爲末每服三錢酒調

下尤效

婦人陰瘡 二一五

治婦人陰戶生瘡作痒

杏仁炒

雄黃

白礬各五錢

麝香二分

右為末敷入患處

塌腫湯二一六

治婦人陰戶生瘡或痒痛或膿水淋漓

甘草

乾漆各三錢

生地黄

當歸

黃芩

川芎各二錢

鱉甲五錢

右用水數碗煎數沸去粗當洗患處

白芷升麻湯二一七

治婦人陰內膿水淋漓或痒或痛

白芷

升麻

黃連

木通

當歸

川芎

白朮

茯苓

右水煎服○更用塌腫湯浴洗之

痔漏腸紅方

二一八

其效無比

黃連 去蘆毛淨一兩好酒浸一宿撈起陰乾爲末

百草霜 用草茅燒者松柴者不用一兩研細

烏梅肉 一兩蒸軟卽用前浸黃連酒蒸爛

右以三味同搗一處爲丸桐子大如太乾仍加前酒搗丸之
每空心用酒送下四五十九三日見效十日全愈

地榆散 二一九

治血痔

右用地榆爲細末每服二錢七食前米飲調下日三服

臭樗皮散 二百二十
治痔漏下血及膿不止

臭樗皮 微炒
酸石榴皮
黃連 去鬚
地榆

阿膠 炒珠各一兩
艾葉 三錢微炒

右為細末每服二錢食前粥飲調下

秦艽防風湯 二二一
治痔漏結燥大便作痛

秦艽
防風
當歸 酒拌
白朮

黃栢
陳皮
柴胡
大黃 煨

澤瀉 各一錢
桃仁 去皮尖
紅花
升

甘草 各五分

右水煎空心服

猪臟丸 二二三

治大便痔漏下血

猪大臟

一條
控乾

以槐花炒爲末填入臟內兩頭札定花器內

米醋煮爛

右搗和再加糕糊爲丸桐子大每服五七十九食前米飲或當歸酒下○此方用黃連猪臟二味亦名猪臟丸尤效○一方先用海螵蛸炙黃去殼爲末以木賊草煎湯調下三日即效或後服黃連猪臟丸

痔瘡方 二二三

雄黃 五分

五靈脂 燒斷

五焙子 炒過各一錢

沒藥 三錢半明者

白礬 半生半熟三錢

右為極細末用紙托貼瘡口上

三品錠子 二二四

上品 去十八種痔

白明礬 二兩
白砒 一兩零五分

乳香

沒藥 各三錢半

牛黃 三錢

中品 去五漏及翻花瘤氣核

白明礬 二兩

白砒 一兩三錢

乳香

沒藥 各三錢半

牛黃二錢

下品 治瘰癧氣核疔瘡發背腦疔諸惡證

白明礬二兩

白砒一兩

牛

乳香

沒藥

各二錢半

牛黃三分

右將砒末入紫泥確內次用礬末蓋之以炭火煨令烟盡取出並各藥俱研極細末用糯米糊和為挺子狀如線香陰乾經瘡內三四次年深者五六次其根自腐如瘡露在外更用蜜水調搽乾上亦可○嘗有一老媪用此治瘰癧索重價始肯為治其方法乃是中品錠子經瘡內以膏藥貼之其根自

腐未盡再用去盡更搽生肌藥數日即愈人多異之凡見其
治氣血不虛者果驗惟氣血虛者雖潰去亦不能愈蓋此與
必效散相爲表裏皆攻毒去邪之藥也

羊膽膏 二二五

治痔漏下疳瘡

臘月取羊膽一枚入片腦末一分置風處掛乾用時以涼水
化開頻敷患處內服槐子酒或加味瀉肝湯若得熊膽更佳
如眼痛者點之尤效

水銀燻干膏 二二六

治虫痔痒不止

聚肉 二兩

右和研水銀不見星捻如棗核狀薄綿裹內肛門中明日垂
出若痛加韶粉三分丸內之

熊膽膏 二二七

治痔痛極效

熊膽 五分

冰片 一分

右研細用井花水調鷄翎掃痔上

蝸牛膏 二二八

傳痔痛極效

蝸牛 一枚負殼
有角者

冰片

射香 各少許

右同研爛以磁器盛次早取汁敷痔上

芫花線 二二九

繫痔漏瘤核

用芫花一握洗淨入木杓搗爛加少水絞汁於石器中熨火煎成膏將絲線於膏內度過晾乾以線繫痔當微痛候痔乾落以紙撚蘸膏納竅內去根當永除根也○一方只搗汁浸線一夜用不得使水

枯痔水澄膏 二百三十

治痔護肉

鬱金

白芨

各一兩

一方加黃連

右二味爲細末如患內痔候登廁時翻出在外用溫湯洗淨側臥於床其痔卽出用蜜水調藥得中以篋篋塗穀道四邊好肉上留痔在外以紙蓋藥上良久然後用後枯藥搽痔上

仍用筆蘸溫水於紙上潤之勿令藥乾及四散

好白礬

四兩

生信石

二錢半

硃砂

一錢研極細

右各研爲細末先將砒入紫泥罐底次將礬末蓋之用火煨令烟盡其砒盡從烟去止借砒氣於礬內耳將礬爲極細末看痔頭大小置礬末於掌中乃入硃砂少許以唾調稀用篋篋塗痔上周遍一日三上看痔頭顏色焦黑爲效至夜有黃水出切勿他疑水盡爲妙至中夜上藥一遍來夜依然上藥三次有小痛不妨換藥時以碗盛溫湯用筆輕洗去舊藥更上新藥仍用護肉藥間用荊芥湯洗之三兩日之後黃水出

將盡可於藥中增硃砂減白礬則藥力即緩三兩日即可增
減漸漸取之庶不驚人全在看色增減傳藥厚薄方是活法
此藥只是借砒信之氣又有硃砂能以解之一方士將此二
方在京治人多效致富一富商以百金求得之錄於予予雖
未用傳人無不言效但枯藥則趙宜真煉師已刊於青囊雜
纂如神千金方則未見刊傳大抵今人言能取痔者皆此方
也其有氣血虛或挾內邪者還當兼治其內庶不有失

如神千金方

二三一

治痔無有不效

好信石

黃明者三錢
打如豆粒

明白礬

一兩
為末

好黃丹

飛砂
五錢

賜稍

七個洗淨瓦上焙乾爲末

草烏

光實者去皮生研五錢

右用紫泥確先將炭火煨紅放冷拭淨先下明礬燒令沸次

下信入礬內拌勻文武火煨候沸再攪勻次看確通氣烟起

爲度將確撥下待冷取研爲末方入黃丹草烏賜稍三味再

同研極細以磁確收貯如欲敷藥先煎甘草湯或葱椒湯洗

淨患處然後用生麻油調前藥以鷲毛掃藥痔上每日敷藥

三次必去黃水如膠汁則痔頭漸消其年遠者不出十日可

取盡日近者俱化爲黃水連根去淨更搽生肌之藥凡五痔

皆可去之此乃臨安曹五方爲高宗取痔得效後封曹官至

察使

秘傳正骨丹 二二三二

治跌打損傷骨折血瘀而傷之重者用

此可續筋骨

降真香

乳香

沒藥

蘇木

松節

自然銅

醋煨七次

川烏

炮

真血竭

各一

地龍

去土酒浸烘乾

生龍骨

各一錢

土狗

十個浸油內死烘乾

右十二味共重八兩八錢同為末每服五錢隨病上下酒調

服覺藥自頂門而至遍身搜至病所則颯颯有聲而筋骨漸

愈病人自知之○服藥後仍服人參白朮黃芪當歸川芎肉

桂甘草白芷厚朴以調補元氣

本事接骨方

二二三三

治打折損傷

接骨木 半兩

乳香 半兩

當歸

赤芍藥

川芎

自然銅

炒醋焯
各一兩

右為末用黃蠟四兩溶化入前藥攪勻衆手丸龍眼大如打傷筋骨及閃痛不堪忍者用一丸熱酒浸開兼熱飲之痛即

止

沒藥降聖丹

二三四

治跌打損傷接續筋骨

當歸 酒炒

白芍藥

川芎

生地黃

蘇木

川烏頭炮去骨碎補灸

乳香另研

沒藥另研

自然銅火煨醋淬十次
為末各一兩

右為末生薑汁共蜜和丸每一兩作四丸每服一丸用米酒

各半盞煎至八分空心熱服○立齋曰脾主肉肝主筋若肝

脾氣血虧損或血虛有熱而不愈者當求其本而治之

十味沒藥丸二三五

治打撲損傷筋骨疼痛或氣逆血暈或

瘀血內停肚腹作痛或胸脹悶

沒藥

乳香

川芎

川椒

當歸

芍藥

紅花

桃仁

血竭 各一兩

自然銅 四錢 火煨 七次醋淬

右為末同黃蠟四兩溶化入前末速攪勻參茸丸彈子大每服一丸酒化下○立齋曰按接骨散沒藥丸惟元氣無虧者宜用若腎氣素怯或高年虛弱者必用地黃丸或補中益氣湯以固根本為善

花蕊石散 二 三 六

治打撲損傷腹中瘀血脹痛欲死服之血

化為水其功不能盡述

硫黃 明者 四兩

花蕊石 一兩

右為末和勻先用紙筋和鹽泥固劑瓦罐一箇候乾入藥再

用泥封口安在磚上虛書八卦方位用炭三十斤煨之候罐
冷取出每服一錢童便調下○立齋日前方若被傷已甚元
氣虧損內有瘀血不勝疎導者用前藥一服其血內化又不
動臟腑甚妙甚妙

黑丸子 二三七

一名和血定痛散○治跌打損傷筋骨疼痛

或瘀血壅腫或外感風寒肢體作痛或手足緩弱行步不前
若流注膝風初結服之自消若潰後氣虛發熱與補藥兼服

自欽

百草霜

白芍藥

各一兩

川烏

炮

南星

各三錢

赤小豆 兩半
白欝 一兩
白芨
骨碎補

當歸 各八錢
牛膝 六錢

右各另為末洒糊丸桐子大每服三四十九鹽湯温酒任下

孕婦忌服

封口藥 二三八
凡損傷皮肉破裂者以此封之

牡蠣 煨
赤石脂 生研
紅丹 上好者
等分

右為細末香油調塗瘡口○若欲消腫散血合口加血竭乾

摻之

當歸導滯散 二三九
治跌撲瘀血在內胸腹脹滿或大便不

通或喘咳吐血

大黃

當歸

等分

右為末每服三錢溫酒下陽氣虛者須加肉桂

復元活血湯

二百四十

治跌打損傷瘀血流於脇下作痛或

小腹作痛或痞悶及便毒初起腫痛

柴胡

一錢

天花粉

川山甲

炒各一錢

當歸

酒拌

大黃

酒炒各一錢

紅花

甘草

各七分

桃仁

二十去皮尖研

右水一鍾半加酒半鍾煎八分食前服之以利為度

金瘡方

二四一

凡金瘡出血不止用牛膽石灰摻之卽止其方以臘月牛膽
入風化石灰懸當風候乾用一方單用三七搗爛敷之神效
又方金瘡出血不止以五倍子生爲末乾貼之如不止而血
熱者宜用犀角地黃湯之類○大凡金瘡出血不止若素本
怯弱者當補其氣若陰虛或有熱者當補其血若因怒者當
平肝若煩熱作渴昏憤者當補脾氣若筋攣搐搦者當養肝
血不應用地黃丸以滋腎水

金瘡降真散

二四二

降真香

用節
佳

松香

文蛤

三味等分爲末無論諸傷血出斷折摻破處夾縛定神效

金瘡灰蛋散

二四三

治金瘡出血不止及久年惡瘡

石灰

細研

雞蛋清

以和灰成餅爲度

右將灰蛋餅子煨過候冷研細遇金瘡摻之若多年惡瘡以

薑汁調敷○一方單以石灰摻傷處裹定亦血止而愈

龍骨散

二四四

治金瘡

龍骨

赤石脂

五倍子

黃丹

海鰾鮓

各等分

右各研入麝香少許共研勻搽上如乾先以鹽水洗拭乾摻

損傷敷夾法 二四七

凡損傷骨折者先須整骨使正隨用川烏草烏等分爲末以生薑汁調貼之夾定然後服藥無有不效

菴跌閃腫痛 二四八

用生薑葱白同搗爛和麵炒熱罨之○如熱服而痛者用梔子加麵炒熱罨之

洗損傷方 二四九

凡傷重者用此淋洗然後傳藥

荆芥

土當歸

生葱

切斷一方
用生薑

右同煎湯溫洗或止用葱一味煎洗亦可