

傷寒廣要

傷寒廣要卷第九

東都丹波元堅亦柔撰

德陽蘇榮權矩亭

渝江白昭煌潤生藏書重印

華陽周鳳楷魯東

同叅校

兼證諸證

下

嘔吐

病後嘔吐 乾嘔

嘔者有聲者也吐者吐出其物也故有乾嘔而無乾吐是以於嘔則曰食穀欲嘔及吐則飲食入口即吐則嘔吐之有輕重可知矣傷寒嘔有責爲熱者有責爲寒者至於吐家則悉言虛冷也經曰太陰之爲病腹滿而吐食不下又曰胃中虛冷故吐也嘔家則不然嘔有熱者有寒者有停飲者有胃脘有膿者諸如

此者雖爲殊別大抵傷寒表邪欲傳裏裏氣上逆則爲嘔也是以半表半裏證多云嘔也嘔家之爲病氣逆者必散之痰飲者必下之千金曰嘔家多服生薑此是嘔家聖藥是要散其逆氣也金匱要略曰嘔家用半夏以去其水水去嘔則止是要下其痰飲也嘔多雖有陽明證不可攻者謂其氣逆而未收斂爲實也其嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者已爲難治蓋謂其虛寒之甚也醫者必審其邪氣之虛實疾證之逆順爲施藥圓治則當矣

夏云理嘔○此係節錄案總括亦辨生薑於寒證最便半

若太陽不與少陽陽明合病而獨見太陽證或吐瀉者恐病人膈間素有痰飲停飲傷滯且以二陳湯定之候嘔吐定

恐○此句

徐進解太陽經藥 大凡得之太陽而嘔者必是合病嘔乃病漸入內非正太陽也曾記有人初得病太陽證有嘔吐不住藥投暖劑莫能治之知太陽已汗解固當用冷劑是太陽見嘔非合陽明則合少陽其嘔屬熱用暖劑非矣

嘔見太陽證大嘔因

又記有人初病具太陽證而嘔一家少長患狀悉類與養胃湯八服無不立效此時行之氣適然如此是爲傷寒雜病又非可以正經傷寒律之

訣要

凡嘔而不止者藥內必少加生薑汁一二匙服之最效凡服藥宜徐徐呷下不可急也

薑要

范汪方治傷寒五六日嘔而利者黃芩湯方

黃芩

三兩

半夏

半升

人參

二兩

桂心

兩

干薑

三累

大棗

枚十二

凡六物水七升煮得二升分再服

醫心方附方中據外臺本是仲景此方既出

方景

友人王曉同寓雲中一僕十九歲患傷寒發熱飲食下咽少頃
盡吐喜飲涼水入咽亦吐號叫不定脈洪大浮滑此水逆證江
應宿投五苓散而愈

案類

治傷寒嘔噦心下悸動胸膈有滯水往往頭眩茯苓半夏湯方

赤茯苓

去黑皮二兩

半夏

湯洗乾七三兩遍

陳橘皮

湯浸去白焙一兩

右三味搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分拍碎同

煎至七分去滓溫服晚再服

聖濟○案此即
陳湯○去甘草

大汗下後惡寒厥逆水藥不得入口身痛自利眞武湯加半夏
下黑錫丹與太陽病發汗後水逆之五苓散證不同 嘘吐煩

渴者白虎湯

褚論

曾氏家學治吐逆大小便不通厥逆無脈大承氣下之愈

○治案例

此本出本草衍義云
關格之病極難治

蘆根飲子治傷寒後嘔噦反胃及乾嘔不下食方

生蘆根

切

青竹茹

各一升

粳米

三合

生薑

三兩

右四味以水七升先煮千里鞋底三隻取五升澄清下藥煮
取二升半隨便飲不差重作取瘥千金○案今用伏龍肝以代鞋底爲佳聖

惠治傷寒乾嘔不下食於本方加陳橘皮不用鞋底

治時氣病差後勞復發熱嘔吐不下宜服蘆根飲子方

蘆根

兩二

竹茹

兩二

人參

兩二

陳橘皮

兩一

生薑

兩二

石膏

兩四

右件藥都剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服聖惠 又治時氣十日已上時有嘔逆欲得飲水此胃中伏熱不散宜服犀角散於本方去人參橘皮加犀角麥門冬黃芩川朴消

有陽證病新瘥後見嘔別無所因此餘熱在胃脘也宜竹葉石

膏湯

○人云加生薑於活

或橘皮竹茹湯

訣要

加味竹茹湯治胃中壅熱而嘔嘔者

橘紅

二錢

半夏

二錢

茯苓

二錢

甘草

五錢

竹茹

一團

黃連

一錢

葛根

半錢

右用水二鍾煎至一鍾若心下痞滿加綠枳實炒一錢
熱氣在脾胃也或發汗解後或大下之後胃中不和尚有蓄熱
熱氣上熏則心下否結故乾嘔也

源巢

治傷寒乾嘔不止心胸煩躁四肢熱宜服柴胡散方

柴胡

半兩

黃芩

三分

麥門冬

一兩

半夏

半兩

枳殼

一兩

枇杷葉

三分

甘草

半兩

人參

半兩

右件藥擣麤羅爲散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗

三枚煎至六分去滓不計時候溫服

惠聖

疫邪留於心胸胃口熱甚皆令嘔不止下之嘔當去今反嘔者此屬胃氣虛寒少進粥飲便欲吞酸者宜半夏藿香湯一服嘔立止穀食漸加

論溫疫

半夏藿香湯

半夏

五錢

眞藿香

一錢

乾薑

炒一錢

白茯苓

一錢

廣陳皮

一錢

白朮

錢炒

甘草

五錢

水薑煎服

溫疫

曠

本吃武門方說其云欬逆

並係颶之謬稱

欬逆

欬

嘔

伏熱在胃令人胸滿則氣逆氣逆則曠若大下後胃氣虛冷亦

令致噦也

集源

吃忒有因胃熱失下而作有因胃中有痰飲而作有因寒涼過
多中虛冷而作且其氣皆從胃中起至胸嗌之間而爲吃忒矣
易老治法失下胃熱因實大便鞭者以承氣湯下之便軟者以
瀉心湯主之胃虛有熱者橘皮竹茹湯主之有痰飲者半夏生
薑湯主之或茯苓半夏湯主之若胃冷者橘皮乾薑湯加味理
中湯主之如冷極吃逆不止者或灸期門中脘氣海關元亦佳
但要取手足溫緩脈生陽回陰退則可生矣

人要若服藥不瘥者

灸之必愈其穴
期門當灸

胃氣逆則爲呃逆治法各從其本證而消息之如見白虎證則

投白虎見承氣證則投承氣膈間痰閉則宜導痰如果胃寒丁
香柿蒂散宜之不若四逆湯功效殊捷要之但治本證呃自止
其他可以類推矣

溫疫論○類編云柿蒂治呃寒熱藥中俱可加入猶茵陳之兼治陰陽黃也不可不知

夫傷寒與痢疾至發呃病已篤矣非大溫補不可然而呃有虛
呃有實呃有敗呃虛者溫補之敗呃死實呃者乃氣機不得流
通升降失其常度氣反上衝而兀兀有聲也

直解

打呃一證有虛寒有實火若胃實閉結陽火上冲而打呃者眞
陰立盡之候也法宜急下以救其陰若脾氣虛寒健運無權氣
不調達而打呃者其勢緩非死證法宜溫中散逆

氏舒

傷寒當下失下胃火上冲而呃者其證燥渴內熱大便閉結大

柴胡湯下之便不結瀉心湯主之三陰中寒胃氣欲絕而呃者
其證厥冷惡寒下利清穀附子理中湯合丁香散溫之呃止則
吉不止則凶也

悟心

凡噦而二便不通者屬實熱厥逆自利爲虛寒兼呃逆者爲停
飲

立不此句

設非此三種則爲胃氣垂絕之候多難治若有痛

瘕動氣又當別論不可忽也。有因誤服寒涼或飲冷水水停

心下胃中虛冷而作脈必結代當與溫中利水此爲夾水勿疑

代脈爲死證也。凡久病而見呃逆者此真氣已衰不治呃逆

脈散舌短灰黑反頭汗不得尿與大便自利而腹滿者皆死。

論緒

黃連解毒湯 白虎湯 傷寒熱症醫者誤用薑桂等葉助起

火邪相搏而呃逆者

春回

三黃瀉心湯 小承氣湯 調胃承氣湯 並治實熱發呃

凡咳逆多有先熱而喫生冷或涼藥多相激而成蓋陰陽二氣

相搏林人之僕本發大熱以涼藥下之想大甚欸逆四五日竟
至於服丁香柿蒂而後却以小柴胡之屬解其餘熱遂愈下後
蓋有身熱不解

活人○以
上胃熱

若飲水過多心下否而欬逆者五苓散主之別無惡候是也

有旋復代赭湯證其人或欬逆氣虛者先服四逆湯胃寒者先
服理中湯次服旋復代赭湯爲良

活人○案嘸有宜旋復代赭湯者然不須先服他藥

例略

繩準

半夏生薑湯治噦欲死

生薑

切二兩

半夏

洗一分兩

簡要濟衆治傷寒咳嗽不止及噦逆不定

丁香一兩乾柿蒂一兩焙乾擣羅爲散每服一錢煎人參湯
下無時服

證類

濟生名柿蒂湯每服四錢水一盞半薑五片

煎至七分去滓熱服不拘時服 中藏經治傷寒咳嗽逆噎汗
於本方加甘草良薑爲末用熱湯猛點乘熱一服效

○活人引

乾香散心悟同以
薑代良薑

治傷寒後嘔噦不下食方

半夏一

草荳蔻一

去皮兩

丁香半

兩

右件藥擣細羅爲散每服不計時候以濃生薑湯調下一錢

聖惠○又治產後欬噫丁香散於本方去半夏草蔻加附之
豆蔻伏龍肝愚每治噦於套劑中加伏龍肝得效因附之

治傷寒嘔噦不止柿蒂湯方

乾柿蒂七枚

白梅三枚

右二味薑擣篩只作一服用水一盞煎至半盞去滓溫服
吃逆用乾柿蒂七枚煎湯呷之發厥厥冷脈細氣短即加白沈
濟聖
香散黑錫丹極則臍心著灸

傷寒後咳噫肉豆蔻湯

肉豆蔻一

個

石蓮肉一

炒

茴香一

分各一

丁香半

分

生薑一

人參

各

二

杷葉

五

片

拭

㕮咀水三升煎至一升半分四服空心緩飲之

病總

加味理中湯

即理中加丁香一錢橘紅一錢半夏一錢柿蒂炒五分

加味附子湯

人參

錢二

白朮

錢二

白芍藥

錢炒一

白茯苓

錢二

附子

用

於半

正火

大中

者一

灰火

中一

大一

半一

正一

火一

大一

中一

者一

灰一

火一

大一

中一

乾薑

錢炒

肉桂

錢一

吳茱萸

錢一

茴香

錢炒一

沈香

錢一

丁香

錢一

右用水二鍾煎至一鐘服

出蘊

要病

○後

虛弱

人參

湯

與此

當參

○以上

相

胃

寒錄

自利

滯下 痘後利

傷寒病若表實裏虛熱乘虛而入攻於腸胃則下黃赤汁若濕毒氣盛則腹痛壯熱下膿血如魚腦如爛肉汁若寒毒入胃則腹滿身熱下情

源巢

自利者有不經攻下自然溏泄者謂之自利也傷寒自利多種須知冷熱虛實消息投湯無致失差雜病自利多責爲寒傷寒下利多由協熱其與雜病有以異也表邪傳裏裏虛協熱則利不應下而便攻之內虛協熱遂利是皆協熱也

○案此云協者本於傷寒例熱

藏止利之劑又有腸胃有積結與下焦客邪皆溫利不能止之
乃指熱陷入裏而言以下諸說皆爲然

必也或攻泄之或分利之而後已大抵下利脫氣至急五奪之中此爲甚者其或邪盛正虛邪擁正氣下脫多下利而死

理明

協熱利者臍下必熱大便赤黃色及腸間津汁垢膩

謂之
腸垢

寒毒

入胃則臍下必寒腹脹滿大便或黃白或青黑或下利清穀濕

毒氣盛則下利腹痛大便如膿血或如爛肉汁也寒毒入胃者

四逆湯理中湯白通湯加附子四逆散加薤白主之協熱利者

黃芩湯白頭翁湯三黃熟艾湯薤白圓赤石脂圓濕毒下膿血

者地榆散黃連阿膠散

活人
鑑補○遺案黃連阿膠散不
是仲景黃連阿膠湯仲景從方

大抵陽熱之利與陰寒之利自不同陽利糞色必焦黃熱臭出作聲臍下必熱得涼藥則止得熱藥則愈增陰利必洞下清穀

糞色或白或淡黃臍下多寒宜溫中止瀉之劑此之謂陰利

云云

緣陰中亦有陽利不可因下利便以爲陰也 又有內不太滿

猶生寒熱未可下而便下之內虛熱入挾熱自利臍下必熱大

便赤黃色及下腸間津汁垢膩名曰利腸

○當作
刮腸

宜白頭翁湯

黃芩湯 身熱下利皆屬陽經然陰利有反發熱或初病無熱

利後却熱或初得病即身熱繼而自利寒既在裏爲主則陽氣

必客於外所以外反熱

○十八字依
發熱條補

又有大便祕五六日以

藥利之利遂不止用極熱劑方差陽有利陰有秘當更以他證

別之

訣要

大便瀉利小便清白不澀完穀不化其色不變有如鶯溏或下

利腥穢小便澄澈清冷口無燥渴其脈多沉或細或遲成微而無力或身雖發熱手足逆冷或惡寒踴臥此皆屬寒也凡熱症則口中燥渴小便或赤或黃或澀而不利且所下之物皆如垢膩之狀或黃或赤所去皆熱臭氣其脈多數或浮或滑或弦或大或洪也亦有邪熱不殺穀其物不消化者但脈數而熱也口燥渴小便赤黃以此別之矣

要蘊

凡大柴胡湯小承氣湯大承氣湯皆主下利之藥也蓋傷寒內實腹中有燥屎結滯則稀糞水從溏流下爲利也故其脈則滑數有力或潮熱譫語乃可下之必再以手按臍腹少腹鞭痛者是也三方俱爲通因通用之法妙在能識之矣

上同

手足厥冷惡寒腹痛脈微欲絕下利清穀之類此固陰寒之甚者也其於疑似之間則猶有真辨凡傷寒下利由熱邪者必有煩躁大熱酷欲冷水等證亦必有洪滑強盛數實等脈如果表裏俱熱方可作火證論治若其脈雖數而無力外雖身熱而不惡熱內雖渴而不喜冷此其內本不熱而病爲下利者悉屬胃寒瀉利亡津無有不渴但渴欲飲水愈多愈快者爲陽證若口雖欲水而腹不欲嚥者即非陽證矣此外如渴欲茶湯者乃瀉渴之當然也不得悉認爲陽證

景岳

傷寒熱甚失於汗下脣焦口燥能飲水大便秘鞭小便赤澀時有稀糞水利出者此內有燥屎結聚乃旁漏之物非冷利也再

審有屎氣極臭者是也其脈雖沉切之必滑有力或時躁熱不欲衣被或揚手擲足或譏語有力此陽氣亢極輕者人參白虎湯或小柴胡湯合解毒湯主之內實者須下之有潮熱者大柴

胡加芒消

西塘感症

下利有利膿血者有利稀溏糞者有利清穀者有利清水汁沫者下清穀者爲虛爲寒下清水者爲實爲熱惟膿血稀糖汁沫有寒有熱有虛有實有寒熱相半虛實相兼須要細察病源用藥方無有悞若後重逼迫解後仍不減腹痛喜按作嘔不食心恍惚而煩或動悸或頭暈耳鳴口淡燥而不欲飲脈弦而大或數而虛現此脈證者無論膿血稀糖汁沫皆虛寒也若腹痛後

重解後稍減意欲暢解而不得能食食下即脹腹中有塊按之
痛口苦舌乾渴喜冷飲或熱湯病雖憊而神不減或新病氣實
未經消導即消導亦不甚多脈滑而長或緩而緊反不數無虛
證此實熱也然亦有實寒者又當臨時審證察脈而得之書不
能盡言也

直解總證○以

脈浮表不解自利或小便不利者五苓散一切得痢間作桂苓
甘露飲溫濕內甚而作痢者黃連解毒湯

本標

治傷寒吐熱頭痛四肢煩疼未經發汗下之太早遂令汗出下

痢不止宜服阿膠散方

阿膠

兩一

黃連

三分

葛根

兩一

黃芩

三分

右件藥擣龜羅爲散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓
不計時候溫服

聖惠

治傷寒吐下後毒氣不解致成下痢是陰陽二氣未和宜服黃

連散方

聖惠○案此係乾薑黃連人參湯仍不錄

崔氏療時行數日而大下熱痢時作白通諸藥多不得止吾思
舊方多療傷寒後下痢耳未有尙在數日便兼除熱止下者
也四順湯熱白通苦溫故吾思作此湯以救數十人兼主傷

寒黃連龍骨湯方

黃連

三兩利除熱止

黃蘖

三兩利除熱止

熟艾

如雞子一枚除熱毒止利

龍骨

二兩利除熱止

右四味切以水六升煮取二升半分三服無不斷者忌猪肉

冷水外臺

活人三黃熟艾湯於本方去龍骨加黃芩

集驗療傷寒後下利膿血藥皮湯方

黃藥兩二

黃連兩四

梔子枚十四

阿膠炙一兩

右四味切以水六升煮三味取二升去滓內膠令烊溫分再服忌猪肉冷水范汪同外臺

活人黃連阿膠湯治傷寒熱毒

入胃下利膿血方本

治傷寒煩熱不解下痢困篤宜服大青散方

大青一

甘草兩一

阿膠一兩

赤石脂一兩

梔子人半兩

右件藥擣篩爲散每服五錢以水一大盞入或五十粒薤白

三莖煎至五分去滓不計時候溫服聖惠○案此本出肘後今加梔子入薤白附

治傷寒熱毒入胃大便膿血腹中疔痛宜服此方

黃連

兩半

赤石脂

兩一

當歸

兩半

乾薑

一分

赤芍藥

兩半

右件藥擣篩爲散每服三錢以水一中盞入粳米五十粒煎

至六分去滓不計時候溫服

聖惠

利黃連

此本外

今加芍藥

崔氏療傷

黃芩

粳米

散米用爲

治熱病毒氣攻腸胃大便或時瀉血煩悶妄語升麻散方

川升麻

兩一

川大黃

兩半

地榆

半兩

當歸

三分

赤芍藥

兩半

枳殼

兩半

黃芩

兩半

甘草

兩半

右件藥擣麗羅爲散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓

不計時候溫服

聖惠

下後脈數不退下利不止必協熱而便膿血用犀角地黃湯

條明

○陽證以上

肘後療傷寒若下膿血者赤石脂湯方

赤石脂

碎二兩

乾薑

切二兩

附子

炮破兩

右三味以水五升煮取三升去滓溫分三服後臍下痛者加當歸一兩芍藥二兩用水六升煮忌猪肉范汪張文仲同

臺外

又白通湯療傷寒泄痢不已口渴不得下食虛而煩方

芍藥案聖濟加赤石脂湯歸

大附子

一枚
黑皮破八片去

乾薑

半兩

甘草

半兩

葱白

莖十
四

右四味切以水三升煮取一升二合去滓溫分再服渴微嘔心下停水者一方加犀角半兩大良忌海藻菘菜豬肉范汪同張仲景傷寒論云本無甘草仍不加犀角加犀角外臺案聖惠治上證范汪療傷寒下利脈微足厥冷通草湯方

通草

一兩

乾薑

一兩

枳實

四兩

人參

一兩

附子

一枚

令破炮

右四味切以水六升煮取二升適寒溫飲五合日三不差稍加至七合忌豬肉

四柱散治陰證內寒腹痛泄得不止

人參

木香

據原作白朮
和劑改白朮

白茯苓

錢各二

附子

炮去皮臍一箇
切作八片用

生薑

五片
大棗一枚

右水二鍾煎至一鍾一方加肉豆蔻子一錢五分名六柱散

桂散○濟生本方出
以上和劑證六

下痢膿血更加發熱而渴心腹痞滿嘔而不食此疫痢兼證最爲危急夫疫者胃家事也蓋疫邪傳胃十常八九既傳入胃必從下解疫邪不能自出必藉大便之氣傳送而下而疫方愈夫痢者大腸內事也大腸既病失其傳送以職故正糞不行純乎下痢膿血而已所以向來穀食停積在胃直須大腸邪氣將退胃氣通行正糞方能自此而下今大腸失職正糞尙自不行又

何能與胃載毒而出毒既不前羈留在胃敗壞真氣在胃一日有一日之害一時有一時之害耗氣搏血神脫氣盡而死凡遇疫痢兼證者在痢尤爲喫緊疫痢俱急者宜檳芍順氣湯誠爲一舉兩得

論溫疫

檳芍順氣湯專治下痢頻數裏急後重兼舌胎黃得疫之裏

檳榔 芍藥 枳實 厚朴 大黃

生薑煎服

論溫疫

吳又可用檳芍湯係治瘟疫之裏證而兼痢者若有外證仍當解表必如喻嘉言分三次治法始足以盡其變至表裏俱病者又當表裏分治總宜活變不可膠執

說疫案喻說出法律而不外仲景合三治法

者證

病下利之例○以 上兼滯下案前所錄諸家論方亦概似滯下兼證但其言不了了耳

傷寒病後胃氣不和利候此由初受病時毒熱氣盛多服冷藥以自瀉下病折已後熱勢既退冷氣乃動故使心下幅牢噫噦食臭服內雷鳴而泄利此由脾胃氣虛冷故也
生薑源○案此湯即
傷寒汗下後氣逆利不止者寒也枳實芍藥乾薑甘草湯

芍藥 甘草 枳實 炒 乾薑 炮各半兩

右剉細每服五錢水煎服

雲岐子保命變方○案此四逆散

傷寒後便膿血裏急後重數至圓而不能便或少白膿有似于痢者切不可痢治以內虛而風邪下陷乘虛入客大腸也慎勿利之升舉其陽而陰氣自降矣升陽除濕防風湯蒼朮茯芍

大還子加葛根用效最著

傷寒將退十餘日或二七外或瘥後半月餘忽腹中窘迫疼痛數起後重不快蓋因餘垢未淨重傷飲食新舊相雜變爲積滯當與痢疾同治

條明

治傷寒後一切痢疾無問冷熱腹痛黃連丸方

黃連

去鬚
二兩
炒

木香 吳茱萸

乾湯洗各一兩
偏炒

右三味搗羅爲末麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心食前米飲下

濟聖

傷寒汗下後裏急後重下利者七宣丸

大黃

一兩

桃仁

去皮尖十二個

木香

分五

檳榔

錢五

調子皮

錢五

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服五十九溫水下

保命子雲

胡枳實甘草加檳榔柴

昌福公司代印

溫疫愈後三五日或數日反腹痛裏急者非前病原也此下焦

別有伏邪所發欲作滯下也

句不案此

宜芍藥湯

愈後大便數

日不行別無他證此大腸虛燥不可攻飲食漸加津液流通自

能潤下也覺穀道旁悶宜作蜜煎導甚則宜六成湯

與方案此無類證

此命門真陽不足宜七成湯亦有雜證屬實者宜大黃丸下之

立愈

溫疫論

芍藥湯

存可附存于此

白芍

錢一

當歸

錢一

檳榔

錢二

厚朴

錢一

甘草

分七

水薑煎服裏急後重加大黃三錢

六成湯

當歸

五錢一分

白芍藥

錢一

地黃

錢五

天門冬

錢一

肉蓯蓉

錢三

麥門冬

錢一

照常煎服日後更燥者宜六味丸

七成湯

破故紙

炒
銚
碎

熟附子

錢一

遼五味

分八

白茯苓

錢一

人參

錢一

甘草

照常煎服愈後更發者宜八味丸倍加附子

並溫疫論
上病後論

蛻虫

胃中冷必吐蛻吐蛻人能皆知爲陰也然亦有陽證吐蛻者蓋胃中空虛既無穀氣政蛻上而求食至咽而吐又看別證如何不可專以胃冷爲說曾記一人陽黃吐蛻又大發斑陽毒證口瘡咽痛吐蛻皆以冷劑取效是亦有陽證矣

要訣

蛻上膈煩躁昏亂欲死而手脈沉遲足冷便秘者多難治若蛻色赤而活或更多者屬胃熱猶可治之蛻死色白而扁者屬胃敗必不治也

○此說殆誤舌辦云邪熱過極口閉目開譖語凡

八胃脘忽痛忽止身上乍熱乍涼面上乍赤乍白脈倏亂倏靜口中吐沫不食者便是蛻厥之候

上緒統論○以證

疫邪傳裏胃熱如沸。耽動不安。下既不通。必反於上。耽因嘔出此常事也。但治其胃。耽厥自愈。

溫疫論

馬印麟曰：耽厥有熱渴者，黃連解毒湯有下症者，承氣湯若腹滿不大便，熱甚昏憊而吐耽者，此胃邪薰蒸虫不得安故逆而上，或有大便糞與耽同出者，用大柴胡湯。

明條

清中安耽湯治胃實熱嘔吐長虫

黃連

葛根
三錢
炒

黃柏

酒
半錢
炒

枳實

麸
二錢
炒

烏梅

箇三

川椒

汗去目
三十粒
去

右五味共劑水二鍾加生薑三大片煎八分細口服。如病人胃中虛熱而嘔者去枳實加入參一錢五分。

辨

溫熱病而吐蛦者此胃熱也胃虛有熱虫隨熱氣上行亦吐出
也宜犀角黃連湯

黃連

錢三

犀角

錢四

木香

分五

烏梅

箇三

水一鍾半煎七分服

大還

深師療○案

此本出

醫齋○以上臺

外引

證

如蛦厥胃中有冷飢不能食或食吐虫宜理中湯加烏梅
劉氏曰凡厥陰蛦厥傷寒煩躁吐蛦口燥舌乾但欲涼水浸舌
并口脣時不可離不欲嚥者宜理中加烏梅

錄選

凡蛦厥者輕者吐小虫重者吐長虫舌燥口乾常欲冷水浸口
不欲嚥蛦上煩躁昏亂欲死兩手脈沉遲足冷至膝甚者連蛦
并屎俱出大便秘而不行此症雖出多可救活也宜加味理中

安蛇散并烏梅丸治之

蘿不要切案二說
姑存之

理中安蛇散陶尙文祕方累用之效

人參

三錢

白朮

半錢

白茯苓

半錢

乾薑

半錢

烏梅

三個

右作一服水二錘煎七分服 凡吐蛇未止加黃連黃柏各五分川椒十四粒若足冷甚者必加附子半錢或五錢量病輕重酌量用之也

蘿不要○案原論治蛇不可用甘草并甜物今不具錄先君子曰烏梅丸主胃虛而寒物

虛以偏于寒而動蛇者故藥亦用寒熱錯雜之品治之而有胃虛以偏于熱而動蛇者陶華因立安蛇理中湯主之而有胃各取烏梅丸之半而治蛇者汪琥因製清中安蛇湯主之此

蓋蛇賴食以養若病人日久不食致虫上攻咽胃者謂之虫因

饑起人有病愈方食虫聞食氣亦令上攻咽胃謂之虫因食起
二者皆用理中烏梅丸治之上五法○以陰證○以

傷寒廣要卷第九

終

傷寒廣要卷第十

東都丹波元堅草庭撰

德陽蘇榮權矩亭

同叅校

渝江白昭煌潤生藏書重印

華陽周鳳楷魯東

餘證

餘熱

傷寒病後熱不除候此謂病已間五藏尙虛客邪未散其氣不復故旦暮猶有餘熱如瘧狀此非真實但客熱也

源巢

夫傷寒後氣血未實藏府尙虛餘毒之氣猶存淹延時日不差肌體羸瘦肢節痠痛壯熱增寒心煩盜汗上氣欬嗽嘔逆痰涎飲食不消腹中癰塊口乾舌澀毛折骨痿面色青黃氣力乏弱

此皆由虛損致或夾勞也

聖惠

夫大病新瘥後血氣虛弱餘熱未盡古人所謂如大水浸牆水退則墻蘇不可犯之但宜安臥守靜以養其氣設或早起動勞則血氣沸騰而發熱也

蘊要

傷寒汗下後餘熱未除或失於調攝食不爲肌欬嗽寒熱吐血衄血纏綿日久狀似癆瘵此皆元氣既虛邪氣着而不散例用黃連解毒湯加柴胡枳桔其效如神不效然後用八物湯兼犀角小柴胡前胡石膏等隨證加減無有不愈者切不可純用補劑亦不可誤認爲虛損勞怯輕用杜仲山茱萸破故紙等溫補之藥也

傷寒
綱目

竹葉湯治發汗後表裏虛煩不可攻者但當與此方

千金 即竹葉石膏案

膏湯虛非煩躁之煩

是虛

若傷寒得汗後病解虛羸微熱不去可行竹葉石膏湯

活人

審知是邪熱未解雖經汗下却不可畏虛而養病宜竹葉石膏

湯

訣要

竹葉湯治傷寒大病後心虛煩悶內熱不解

竹葉 麥門冬

去心

人參

茯苓

去皮

小麥

炒

半夏

湯泡各一兩七次

甘草

炙兩半

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓溫服不

拘時候

濟生案此本千金治產後虛渴少氣力方今去大棗後

張文仲療傷寒八九日不差名爲敗傷寒諸藥不能消者方

鼈甲

炙

蜀升麻 前胡

烏梅 枳實

炙

犀角

屑

黃芩

兩各二

甘草

炙一兩

生地黃

八合

右九味切以水七升煮取二升半分五服日三服夜二服

太
忌海藻菘菜莧菜蕪荑備急方同

臺外

聖惠治壞傷寒

支出

經十日已來未解熱在胸膈煩悶不止鼈甲散於本方去前
胡加柴胡

甘草半兩各一

兩

每服五錢以水一大盞煎至五分去滓

入生地黃汁半合更煎一兩沸不計時候分溫二服

治傷寒餘熱不退發渴煩躁胸膈氣滯不思飲食宜服柴胡散

方

柴胡

川大黃

枳殼

鼈甲

檳榔

人參

木香

子芩

赤芍藥

赤苓茯

犀角屑

桑根白皮

甘草

右件藥擣篩爲散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

惠聖

治傷寒後夾勞骨節煩疼時有寒熱欬嗽頭目疼痛宜服柴胡散方

柴胡

兩一

貝母

兩一

知母

兩一

人參

兩一

赤芍藥

兩一

石膏

兩一

黃芩

三分

杏仁

兩一

白朮

兩半

梔子仁

兩半

鼈甲

兩一

右件藥擣篩爲散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至
五分去滓不計時候溫服

惠

治傷寒後夾勞煩熱四肢疼痛不欲飲食宜服犀角散方

犀角屑

三分

赤茯苓

三分

枳殼

三分

柴胡

半兩

白朮

三分

鼈甲

半兩

知母

半兩

赤芍藥

三分

甘草

半兩

右件藥擣篩爲散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至
五分不計時候溫服

惠

治熱病後虛勞煩熱四肢疼痛小便赤黃不欲飲食宜服柴胡

散方

柴胡

一兩

生乾地黃

一兩

黃連

一兩

地骨皮

一兩

枳殼

一分

赤茯苓

兩一

知母

半兩

鼈甲

半分

甘草

半兩

右件藥擣篩爲散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

黑聖

又治時氣餘熱不退發作有時
蒿蘚根散

於本方去地黃黃連甘草加蒿蘚根水煎去滓入生地黃汁半合更煎一兩沸溫服

治熱病後虛勞盜汗口苦不得睡臥四肢煩痛舌乾卷澀宜服人參散方

人參

兩一

麥門冬

半兩

赤芍藥

一兩

甘草

半兩

柴胡

兩一

白茯苓

兩一

牡蠣

一兩

黃耆

兩一

鼈甲

半兩

右件藥擣麩羅爲散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓

傷寒廣要

卷十

昌福公司代印

不計時候溫服

惠聖

治傷寒後煩熱憎寒口苦不思飲食日漸羸瘦羚羊角湯方

羚羊角

燒

茈胡

苗去

鼈甲

醋去

鼈甲

醋去

人參

各分

知母

淡竹茹

黃耆

赤茯苓

皮去

甘草

炙各

天門冬

去一兩心焰

右二十味細剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服日二

濟聖

治傷寒過經潮熱不解或時作寒如瘡狀茈胡鼈湯甲方

茈胡

苗去

鼈甲

去

裙

蠶

蠶

赤茯苓

各去

黑

皮

黃芩

去

黑

知母

焙

桑根白皮

剉各

甘草

炙

半

右七味龜搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分拍碎煎至
七分去滓溫服不拘時

聖濟○此先君子
加胡黃連最效子

聖惠治傷寒後

肺萎勞嗽涕唾稠粘骨節煩悶發渴寒熱籠甲散於本方去

黃芩加款冬花烏梅肉梔子仁

治傷寒後胃熱引飲煩渴不止茯苓地黃湯方

赤茯苓

去皮黑

生乾地黃

焙

括樓根

各一兩

知母

兩半

麥門冬

去心各一兩半

右五味龜搗篩每服五錢匕水一盞半入小麥一百粒淡竹葉三五片棗三枚擘破同煎至八分去滓溫服不拘時

聖濟

治傷寒百合病久不差欲成勞宜服柴胡散方

柴胡

一兩

知母

二兩

黃連

一兩

甘草

三分

百合

二兩

秦艽

一兩

葛蘿根

一兩

右件藥擣篩爲散每服五錢以水一中蓋入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

聖惠○案此方與於次方俱移治餘熱仍效

治傷寒百合病經一月不解變如渴疾宜服百合散方

百合

一兩

葛蘿根

一兩

梔子仁

三分

牡蠣

三分

麥門冬

三分

甘草

半兩

右件藥擣搗羅爲散每服五錢以水一中蓋入生薑半分竹

葉二七片煎至六分不計時候溫服

聖惠

乾地黃湯婦人傷寒差後猶有餘熱不去謂之遺熱

乾地黃 大黃 黃連 黃芩

各一兩

柴胡

去蘆

白芍藥 甘草

各一兩
半炙

右搗爲細末每服抄四錢匕以水一盞半煎至七分去滓溫服取溏利汗出解

病總

歸地養營湯壞證身熱口渴舌胎及舌如煨熟猪腰子

當歸 生地

懷慶各一兩

鼈甲

醋炙研細

麥冬

各五錢錢

芍藥

青蒿 阿膠

各三錢

五味子

一錢五分

右煎成烊化阿膠服日二三劑 甚者人中黃人中白研細各一錢調服 加知母地骨皮苦參亦可 虛人加人參黃芪炙甘草 患人服藥安臥竟日熱除渴止

醫經 卷十

片玉云得汗脈靜身熱不退是發汗太過胃中亡津液故也處以生津液益氣血養胃氣之藥或只用補中益氣湯

治例

若已汗而熱不清身漬漬汗出右寸關雖弦大按之無力心下不痞不飽四肢倦怠屬中氣弱內傷虛熱補中益氣湯主之汗止身涼爲愈

要六

有汗下後陰陽不相入水火不相濟致餘熱未退不可更用冷藥內外俱未可攻宜小建中湯若其人已虛虛能生熱宜小建中湯加當歸一錢或四君子湯加黃芪半錢或十全大補湯調其營衛虛脫此恐字者四柱散真武湯病愈後別無他證只微

熱未盡除其人脾胃久虛欠調理脾主肌肉故生餘熱燥補不

宜用理中湯加蜜一匙許煎。有汗下而熱不退多用涼肌藥而又不退動至半月或兼旬者乃是陽氣離經不能復還客於皮肉之間病此甚衆此當調理收斂之不可用辛熱重劑藥

要訣

遺毒

凡傷寒出汗不徹邪熱結耳後一寸二三分或耳下俱鞕腫者名曰發頤此爲遺熱成毒之所致也宜速消散則可若緩則成膿又爲害也

蘊要

本經云耳前後腫刺之小差即發頤也高腫有膿爲吉如平陷無膿者危然亦有大虛之候微腫而痛只用溫補或少佐以清涼腫自消而頤亦不發若必欲治頤則真氣外脫而死矣

直解

傷寒發頤亦名汗毒此因原受風寒用藥發散未盡日久傳化爲熱不散以致項之前後結腫疼痛初起身熱口渴者用柴胡葛根湯清熱解毒患上紅色熱甚者如意金黃散敷之初起身涼不渴者牛蒡甘桔湯散之患上微熱不紅疼痛者冲和膏和之腫深不退欲作膿者托裏消毒散已潰氣血虛弱食少者補中益氣湯以此治之未成者消已成者潰已潰者斂亦爲平常王道之法也用之最穩

正外科宗

柴胡葛根湯治頤毒表散未盡身熱不解紅腫堅硬作痛者

柴胡 天花粉 乾葛 黃芩 桔梗 連翹

牛蒡子 石膏

各一錢

甘草

五分

升麻

三分

水二鍾煎八分不拘時服

宗正

牛勞甘桔湯治頤毒表邪已盡耳項結腫微熱不紅疼痛者

牛勞子 桔梗 陳皮

天花粉 黃連 川芎

赤芍 甘草 蘇木

錢各一

水二鍾煎八分食後服

正宗

托裏消毒散

人參 川芎 白芍 黃芪 當歸 白朮 茯苓

金銀花

錢各一

白芷

甘草

皂角針

桔梗

各五分

水二鍾煎八分食遠服

正宗

去連

○案此本外科

加皂角針桔梗

要方

虛煩不眠驚悸

此正虛

證自異

傷寒發汗吐下已後府藏俱虛而熱氣不散故虛煩也

巢源

夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰主夜夜主臥謂陽氣盡陰氣盛則目瞑矣今熱氣未散與諸陽并所以陽獨盛陰偏虛雖復病後仍不得眠者陰氣未復於本故也

上同

差後虛煩不得眠眼中痙痛懊憹

○蓋胸案眼謂

黃連四兩芍藥二兩黃芩一兩膠三小挺水六升煮取三升分三服亦可內雞子黃二枚

○時後阿膠此即渴

梔子烏梅湯治傷寒後虛煩不得眠心中懊憹

活人方見少陽病中案以上少

虛煩一證乃是病愈後陰陽未復時發煩熱竹葉石膏湯痰多

以二方猶是梔子之例係病後錄入於茲

睡不寧者溫膽湯

於千金本

有病瘥後自不得眠

宜溫膽湯或眠而精魂散亂異夢驚悸者溫膽湯尤宜

要

溫膽湯治大病後虛煩不得眠此膽寒故也宜服此方

衍

張氏云

寒則厥陰之通稱案巢源虛勞四門云若心煩而不眠者膽冷也

半夏

竹茹

枳實

各二兩

橘皮

三兩

生薑

四兩

甘草

一兩

右以水八升煮取二升分三服

千金

三因溫膽湯於本方加

茯苓一兩半棗一枚 蘿蔴加味溫膽湯於本方加人參黃連柴胡當歸川芎白芍藥生地黃酸棗仁 又加味溫膽湯於本方加人參酸棗仁茯神若心煩內熱者倍加黃連麥門

冬若有熱未清加柴胡若內實心神顛倒者加山梔子 壽
世保元竹茹溫膽湯治傷寒日數過多其熱不退夢寐不寧
心驚恍惚煩躁多痰於本方加茯苓香附人參柴胡麥門冬
桔梗黃連

案竹茹溫膽湯本出補珍祕方名加味溫膽湯不用黃連引

酸棗湯治虛煩勞擾奔氣在胸中不得眠方

酸棗仁

五升

人參

桂心

生薑

各二兩

石膏

四兩

茯苓

知母

各三兩

甘草

一兩

右以水一斗先煮酸棗仁取七升去滓下藥煮取三升分三

服日三

千金案此於仲景方去石膏
菊花人參桂心生薑

深師酸棗湯療傷寒及吐下後心煩乏氣晝夜不眠方

酸棗仁

升四

麥門冬

一升去心

甘草

二兩

蠶母

二兩也

知

茯苓

兩

芎藶

兩

乾薑

兩

右七味切以水一斗六升煮酸棗取一斗去棗內藥煮取三升去滓溫分三服忌海藻菘菜大醋外臺○案此於仲景方加麥門冬乾薑

熟乾地黃

半兩

白芍藥

兩

羚羊角屑

兩

茯神

一兩

黃耆

一兩

麥門冬

一兩

酸棗仁

兩

人參

一兩

右件藥擣篩爲散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓入雞子清一枚攬令勻溫服

惠聖
傷寒壞病久不愈常不得眠或心脾氣血素虧而驚悸不寧不

得眼諸藥不效者大劑獨參湯或歸脾湯並用送下養正丹
歸脾湯

白朮

茯神

木去

黃芪

蘆去

龍眼肉

酸棗仁

各炒去殼

一兩

人參

木香

各半見火

甘草

炙半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片棗子一枚煎至七分
去滓溫服不拘時候

薛氏醫案加當歸遠志

人病傷寒陽證或患熱疾服涼藥而得愈飲食未充夜間便睡
不着是膽冷也若脈細身涼隨其虛實下金液丹一服大冷者
下百粒及五六十粒不甚冷者三二十粒即睡着當以脈證爲
準也脈細微大便不甚實小便清面色青白舌下不紅面帶青

色皆冷證也

醫說○醫餘

大抵傷寒汗吐下之後虛極之人或因事驚恐遂生驚惕者宜養血安神鎮心之劑主之也

要蘊

朱砂安神丸治病後心神不安夜臥不寧或亂夢不得眠

朱砂

另研水飛一
半爲衣

黃連

炒一
錢半

甘草

炙半錢

當歸身

酒浸一錢

生地黃

酒洗一錢半乾

右爲細末湯浸蒸餅糊爲丸如棗豆大朱砂爲衣陰乾每服三十九以口中津液嚥下或燈心湯下蘊要一方去當歸地黃本東方

病後血氣未復精神未全多於夢寐中不覺失聲如麌此不係讖語鄭聲宜溫膽湯去竹茹加入參半錢或用六君子湯要訣

虛汗

夫傷寒差後體氣羸弱藏府猶虛或每因睡中徧身汗出此皆陽氣虛心氣弱陽屬於表主於膚腠開泄故津液妄行心主血心生汗今心虛不足故多盜汗診其脈虛弱微細者是其候也

真聖

論溫疫

大病愈後數日每飲食及驚動即汗此表裏虛怯宜人參養營湯倍黃芪 脈靜身涼數日後反得盜汗及自汗者此屬表虛

治傷寒脈微細汗出不止漸覺虛羸宜服白茯苓散方

白茯苓

兩一

人參

兩一

白朮

三分

白芍藥

三分

麻黃根

兩一

五味子

半兩

牡蠣

一兩

肉蓯蓉

去皮酒浸一宿

右件藥擣篩爲散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

聖惠

○藥麻黃

根

又治虛勞盜汗者

麥門冬

甘草散於本方去

地氣

於本方去

地氣

治傷寒虛汗不止心多煩躁時時驚悸宜服人參散方

人參

半兩

遠志

半兩

白茯苓

半兩

麥門冬

半兩

黃蓍

半兩

柴胡

半兩

甘草

一分

龍骨

兩

右件藥擣篩爲散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚竹茹一分煎至五分去滓不計時候溫服

惠聖

治傷寒後虛羸日夜汗出不止心躁口乾咽喉不利宜服此方

黃雌雞

理如食法胃一隻去腸胃

肉蓯蓉

刮去皮酒浸一宿

麻黃根

兩二

牡蠣

兩二

右件藥先將雞麻黃根以水七大盞煮取汁三大盞去雞麻黃根後却下蕤蓉牡蠣煎取一盞半去滓分爲三服空心午

前夜後臨臥時服

惠聖

陽證身微熱表虛汗出不已或因醫者發汗以致表虛脈不實

治用王海藏黃芪湯

黃芪

人參

白茯苓

白朮

白芍藥

各兩

一

甘草

七錢半

陳皮

五錢

右剉每服酌量多少用水二盞生薑三片煎八分溫服

補實
遺鑑

无○案此方出元戎
陳皮治中喝

陰證身涼額上手背有冷汗治用四逆湯加人參

上同

方脈正宗治陽虛自汗用牡蠣火煅五錢人參三錢麥門冬五
錢北五味二錢煎湯飲立止外再用牡蠣火煅數兩搗細粉

布包撲身上亦可收汗

言葉

大病差後多虛汗及眼中流汗方

醫○原作眼中流汁今據心方引葛氏方改據

龍骨牡蠣麻黃根末雜粉以粉身良

後附

錄驗方治大病之後虛汗不可止方

干薑三分治合以粉大良

醫○見太陽病方互見太陽病方

當歸六黃湯治傷寒新瘥後虛熱盜汗不止

當歸身

酒洗一分

黃柏

炒分七

黃芩

炒分七

黃連

炒分五

黃芪

鹽水 炙
二錢

生地黃

七酒 洗
錢

熟地黃

酒 蒸
一錢

右作一服水二鍾煎至八分食遠溫服

祕藏云此本出蘭室
藥要○此本出蘭室
藥要

虛弱

當與兼變中
誤治虛乏參

其人血氣先虛復爲虛邪所中發汗吐下之後經絡損傷陰陽竭絕熱邪始散真氣尙少五藏猶虛穀神未復無津液以榮養故虛羸而生病焉

巢源

傷寒瘥後虛弱無力者先因汗下過多病久元氣虛弱調養失宜須漸漸進食守靜不可太急治傷寒雖無補法若果病久元氣虛憊或勞力所傷不得不補此合宜則用也宜補中益氣湯

據舊要○案今本脫此條

補大病後不足虛勞方

萬病虛同用

取七歲已下五歲已上黃牛新生者乳一升以水四升煮取
一升如人體溫稍稍飲之不得過多十日服不絕爲佳
十全大補湯病後氣不如舊此藥性溫不熱平補有效

白茯苓

焙

白朮

焙

人參

去蘆

熟乾地黃

蒸洗

焙酒

白芍藥

粉草

炙

黃蓍

去蘆

肉桂

不去

見龜皮

川當歸

洗去蘆

川芎

各等分

右十味剉爲麩散每服二大錢水一盞生薑三片棗子二箇
同煎至七分不拘時候溫服

四君子湯治大人小兒脾胃不和中脘停飲大病之後宜服

人參 茯苓 白朮 各四兩半 甘草 半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑七片棗一個煎至六分去滓不以時候服一方加橘紅等分名異功散尤宜病後調理一方去甘草加木香熟附子等分名加味四柱散薑棗煎服大病之調理尤宜用此

易簡本出小兒方訣異功散

得效六君子湯於本方

加半夏陳皮 小青囊六君子湯於本方加黃芪山藥治傷

寒汗下之後將見平復服此調理俾進食

七珍散去粟米案此係本事

治傷寒後虛羸少氣嘔吐不納飲食宜服陳橘皮散方

陳橘皮

一兩

五味子

一兩

麥門冬

半兩

人參

一兩

半夏

一兩

白朮

半兩

甘草

半兩

白茯苓

三分

黃耆

三分

右擣龜羅爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚
煎至六分去滓不計時候稍熱服

惠聖

治傷寒後服冷藥過多胃寒嘔噦不下飲食人參湯方

人參

白朮

白茯苓

皮去黑

附子

炮裂去皮臍

陳橘皮

炒各一兩去白皮

桂

皮去龜

乾薑

半炮兩各

丁香

一分

右八味龜搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分拍碎粳米
半匙煎至一盞去滓溫服不拘時

濟聖

溫脾圓治久病虛羸脾氣弱食不消善噫方

黃蘖

大麥糵

吳茱萸

桂心

乾薑

細辛

各一兩

附子

當歸

大黃

翹

黃連

各一兩

右十一味爲末蜜丸如梧子每服十五丸空腹酒服日三

金千

用○三因
神麴

加味枳朮丸治病後胃弱食少服此進飲食強胃氣之藥也

枳實炒一兩

白朮一兩

神麴炒一兩

大麥糵炒一兩

陳皮一兩

棠求子一兩

右爲末荷葉燒飯和丸如梧桐子大每服七八十丸白湯下
如有熱加薑炒黃連七錢如氣鬱不舒暢加香附一兩如痰
多加半夏麴一兩九要出於張潔古案枳朮

治傷寒後腎氣虛損夜夢失精口乾心煩兩頰黑色皮膚乾燥
宜服此方

龍骨

一兩

白芍藥

三分

人參

三分

熟乾地黃

三分

磁石

一兩

水淘去

半搗碎

赤汁

右件藥擣麧羅爲散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓食前溫服之

惠聖

水腫

病後水腫身虛胃弱食少者以五苓散加蒼朮陳皮木香砂仁之類主之若人不甚弱者以商陸一味煮粥食之亦佳凡病瘥後足腫者不妨但節飲食胃氣強自消也

要蘊

嚴正甫正年三十時疫後脈證俱平飲食漸進忽然肢體浮腫

別無所苦此即氣復也蓋大病後血未成氣暴復血乃氣之依歸氣無所依故爲浮腫嗣後飲食漸加浮腫漸消若誤投行氣利水藥則謬矣

論溫疫

若大病後三焦受傷不能通調水道下輸膀胱肢體浮腫此水氣也與氣復懸絕宜金匱腎氣丸及腎氣煎若誤用行氣利水藥必劇凡水氣足冷肢體常重氣復足不冷肢體常輕爲異上同治傷寒後身體浮腫喘息促小便不利坐臥不安防己湯方

防己

三分

猪苓

三分

海蛤

一兩

陳橘皮

一兩

木香

半兩

白朮

兩半

桑根白皮

三分

赤茯苓

三分

檳榔

一兩

蘇莖葉紫

兩一

木通

半

兩

右十一味龜擣篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切煎至六分去滓不計時候溫服

濟聖

差後面腫或腰以下腫治用索矩三和湯

○傳案索矩正

橘皮

厚朴

檳榔

白朮

甘草

紫蘇

各二兩去粗梗

木通

海金沙

各一兩

右剉每服五錢水一盞生薑三片煎至八分溫服如鼻上有汗出必氣血和而愈

寶鑑補遺

勞復

自食復

女勞復

傷寒勞復何以明之勞爲勞動之勞復爲再發也是傷寒差後因勞動再發者是也傷寒新差後血氣未平餘熱未盡勞動其

熱熱氣還經絡遂復發也此有二種一者因勞動外傷二者因飲食內傷其勞動外傷者非止強力搖體特重遠行之勞至於梳頭洗面則動氣憂悲思慮則勞神皆能復也况其過用者乎其飲食內傷者爲多食則遺食肉則復者也內經曰熱病已愈而時有遺者何也以熱甚而強食之病已衰而熱有所藏因其穀氣留薄兩陽相合故有所遺經曰病已差尙微煩設不了了者以新虛不勝穀氣故令微煩損穀則愈夫傷寒邪氣之傳自表至裏有次第焉發汗吐下自輕至重有等差焉又其勞復則不然見其邪氣之復來也必迎奪之不待其傳也經曰大病差後勞復者枳實梔子豉湯主之若有宿食加大黃且枳實梔子

鼓湯則吐之豈待虛煩懊惱之證加大黃則下之豈待腹滿讞語之候經曰傷寒差後更發熱者小柴胡湯主之脈浮以汗解之脈沉實者以下解之亦是便要折其邪也蓋傷寒之邪自外入也勞復之邪自內發也發汗吐下隨宜施用焉嗚呼勞復也食復也諸勞皆可及御內則死矣若男女相易則爲陰陽易其不易自病者謂之女勞復以其內損真氣外動邪熱真虛邪盛則不可治矣昔督郵顧士獻不以華敷之診爲信臨死致有出舌數寸之驗由此觀之豈不與後人爲鑒誠哉

案明理有右總詳說

見於後

傷寒病新瘥津液未復血氣尙虛若勞復早更復成病故云復

也若言語思慮則勞神梳頭澡洗則勞力勞則生熱熱氣乘虛還入經絡故復病也其脈緊者宜下之

巢源○案又曰傷寒後多因勞動不節飲食病

過氣病發復候曰發復多重於初病者謂復病如初也又小兒時

許仁則曰此病復發不但起動勞役或因飲食稍多或因言語過分或緣視聽不節或爲動靜不常皆成此復若復甚者乃至不救劇於初得病時不可以復發而云輕易

臺外

新差強人足兩月虛弱人足百日則無復病矣

總病

疫邪已退脈證俱平但元氣未復或因梳洗沐浴或因多言妄動甚至車騎勞頓遂至發熱前證復起惟脈不沉實爲辨此爲勞復蓋氣爲火之舟楫今則真氣方長勞而復折真氣既虧火

亦不前如人欲濟舟楫已壞其可渡乎是火也陷於經絡則爲表熱陷乎藏府則爲裏熱虛甚熱甚虛微熱微治法輕則靜養可復重則大補氣血候真氣一回血脈融和表裏通暢所陷之火隨氣輸泄自然熱退而前證自除矣若誤用承氣及寒涼剝削之劑變證蜂起遂至殞命

溫疫論復中之一案此蓋

蓋勞則生熱熱氣乘虛還入經絡未免再復治宜清熱解勞小柴胡湯麥門冬湯和之熱氣浮者梔豉枳實湯表症多者柴胡桂枝湯汗之裏症多者大柴胡湯下之勞復症久不愈恐成

癆瘍

入門

麥門冬湯治勞復氣欲絕起死人方

麥門冬

一兩

甘草

二兩

京棗

二十枚

竹葉

切一升

右四味㕮咀以水七升煮粳米一升令熟去米內諸藥煎取三升分三服不能服者綿滴湯內口中用之有效

千玉

金函

○勞

復案

發熱者麥門冬湯主之方與金
匱同而先君子以爲仲景舊文

補中益氣湯治勞復發熱氣高而喘身熱而煩四肢怠惰

大病後不宜勞動若勞倦傷氣無力與精神者名曰勞復補中益氣湯主之

悟心

瘥後有勞復者勞則生熱小柴加五味麥冬和之

士業林餘

圖經曰治傷寒勞復身熱大小便赤如血者胡黃連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和炒令微焦二味攜羅爲末用猪

腸汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片烏梅二個童子小便三合浸半日去滓食後緩小便令溫下十九臨臥再服甚效

證類○元戎引孫尚藥
猪腸汁○作猪膽汁宜從

治傷寒差後勞復壯熱頭痛六神湯

鼈甲 柴胡 人參 知母 黃連

各一兩

烏梅肉

半兩

右六味鼈擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎同煎至八分去滓食後溫服

聖濟○上勞復以

凡得溫毒病新瘥脾胃尙虛穀氣未復若食犬豬羊肉并腸血及肥魚炙脂膩食此必下利下利則不可復救

本於肘後案此蓋

又禁

食餅餌炙臘棗栗諸生菓難消物則不能消化停積在於腸胃

便脹滿結實大小便不通因更發熱復成病也非但雜食梳頭洗浴諸勞事皆須慎之

巢源○案傷寒食復候論證殊略今錄雜載中

傷寒新瘥胃氣尙弱若恣飲食不能尅化濁穢藏府依前發熱若用調和脾胃藥胃熱轉增大凡傷寒無和胃之理治須清熱消食輕者胸中微滿謂之遺熱損穀自愈重者胸高喘滿腹脹必須吐下梔豉枳黃湯主之

湯當是枳梔加黃

煩熱甚者竹葉石膏

湯胸痞者生薑瀉心湯 飲酒復者其熱尤甚蓋酒性至熱必

煩躁乾嘔舌胎妄語不寐者解毒湯

入門外臺既抄於前

傷寒纔愈脾胃尙虛雖消中因宜節食若恣食而再熱者名曰食復宜六君子湯一小劑或加神麴麥芽子嘗見食復多死者

蓋以久敝之脾胃不能化驟進之食物也

程氏醫譜

若因飲食所傷者或吞酸作嘔或心腹滿悶而加熱者此名食復輕則損穀自愈重則消導方愈

溫疫論

東口何姓者在濟患傷寒後食肉復醫與利藥下之下後身熱耳聾口乾不渴喜漱水不欲嚥是熱在經予視之曰此誤下亡陰猶有表證與小柴胡去半夏加天花粉山梔麥冬五味歸芍生地一服減半四劑良愈

上食復以

夫傷寒病新瘥未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死也有得此病愈後六十日其人已能行射獵因而房室即吐涎而死病雖云瘥若未平復不可交接必小腹急痛手足拘拳二

時之間亡范汪方云故督郵顧子獻得病已瘥未健詣華萼視脈裏曰雖瘥尙虛未平復陽氣不足勿爲勞事也能勞尙可女勞即死臨死當吐舌數寸獻婦聞其瘥從百餘里來省之住數宿止交接之間三日死婦人傷寒雖瘥未滿百日氣血骨髓未牢實而合陰陽快者當時乃未即覺惡經日則令百節解離經絡緩弱氣血虛骨髓空竭便怳怳吸吸氣力不足著牀不能動搖起居仰人食如故是其證也丈夫亦然其新瘥虛熱未除而快意交接者皆即死

源異

男子房勞復發熱口噤臨死舌出數寸又始得病百節痛如被打渾身沉重恍惚失措脈促而絕不可治或有吐涎不止或有

讖妄煩亂者皆不可治

病總

仲景止言陰陽易而千金復增女勞復證昔賢相傳陰陽易猶可生若女勞復必死者何也愚以復病由病後正氣大虛餘邪不能傳易於人因而自病則多死以其人不堪再病故也易病由病人正氣稍復不病之人正氣反虛餘邪遂至傳易因而忽病然猶可生以其人病尙初發也

注辨

逍遙湯治有患傷寒瘥後血氣未平勞動助熱復還於經絡因與婦人交接搖慾而復發不易有病者謂之勞復

人參 知母 竹青 如卵縮腹痛倍加 黃連

甘草 滑石 生地黃 荏根 柴胡 犀角

昌福公司代印
水二鍾棗一枚薑三片煎之

卷六

若犯內事陰虧者宜六味生乾地黃湯氣少者倍加人參湯主之

復金鑑○案以上諸治法當通用之

嘗治傷寒病未平復犯房室命在須臾用獨參湯調燒梘散凡服參一二斤餘得愈者三四人信哉用藥不可執一也

準繩○案原更

引張兼善論用燒梘散之理文繁不錄又案此證蓋是脫陽當致少陰病四逆變方○以上文勞復

若無故自復者以伏邪未盡此名自復當問前得某證所發亦某證稍與前藥以徹其餘邪自然獲愈

右溫疫論○