

滇南草本



七

0 1cm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

deli

浙字02260122号 No.6230
得力集团有限公司













欽定四庫全書
海宇要文上卷目錄



醫門學要上卷目錄

四診總論

一曰望氣色

二曰聞聲音

三曰問病情

四曰切脈論

浮沉遲數論

脈訣歌

左寸關尺論
右寸關尺論

左手脈部圖說

右手脈部圖說

左寸心脈浮主病論

左關肝脈浮主病論

左尺腎脈浮主病論

右寸肺脈浮主病論

右關胃脈浮主病論

右尺命脈浮主病論



左寸心脉沉論

左關肝脉沉論

左尺腎脉沉論

右寸肺脉沉論

右關胃脉沉論

右尺命脉沉論

左寸心脉遲論

左關肝脉遲論

左尺腎脉遲論

右寸肺脉遲論

右關胃脉遲論

右尺命脉遲論

左寸心脉數論

左關肝脉數論

左尺腎脉數論

右寸肺脉數論

右關胃脉數論

右尺命脉數論

右關胃脉數論

右尺命脉數論

醫門擊要上卷

鄉後學管 暄較

明楊林蘭 茂號止菴手著

鄉後學管 濬訂

四診總論

診法有四望聞問切是也古人四診並用所以知病之真而治之無差世人粗忽自恃所長往往偏執其一以治之輒曰已知之矣此皆苟且粗率之士非聖賢兢業之心夫望色聞聲問病切脉四診皆盡而治之尤有偏害者况不兼而審之乎然或疑其太鎖屑者誠非也病雖危急如能

治愈不在遲延一二時間如在遲延一二時而即死者是其氣數已盡雖聖賢亦不能救矣至或病人之家雖苦其尚遲當為之寬解以細審其病情若粗忽而妄投一藥悔不可及矣况自矜所長而又畏人之笑其迂拙不兼四診以審之則是以人之生死而為釣名之地將所謂仁心者安在耶故必四法兼盡其有不合則深思其故必得其所以不合之由然後對症立方以治之庶不至有事後之悔也且病人之家請人治病而不由人兼盡其四診之法則是猶除賊而開之門也可不悲乎茲故為兩戒之四診之

法條列於後

望氣色

望之而面赤心火盛也其脈左寸浮宏治法宜滋腎水以
平肝木如六味湯加知柏或金匱腎氣湯亦可女子四
物加知柏之類或用補心湯養心湯以滋陰而降火也
望之而面青肝木虛也其脈兩關與左寸俱浮緊宜引火
歸源湯知柏六味湯麥味補中湯之類治之

望之而面黃脾土弱也其脈兩關與右尺俱遲緩治法宜
用香砂六君湯加苡仁治之或十味補中湯之類治之

是猶陰陽而開之門也可不悲乎茲故為兩戒之四診之

再多食健脾之飲食更妙婦人若白帶宜歸脾湯或為
烏雞丸亦可

望之而面白可知其肺虛唇舌淡為金亦寒其脈右寸沉
與右尺遲治法如大補湯之類治之男子多遺精女子
多白帶之症

望之而面黑可知其腎虛眼眶青黑為水尤枯其脈右尺
浮疾左尺浮空左關浮緩若左關浮空即為不治之症
須以大劑救陰湯治之此皆男女多慾之故也

聞聲音

聲為正聲音為餘音聲應六腑音應五臟咽喉有病聲音

聞聲音

聲為正聲音為餘音聲應六腑音應五臟咽喉有病聲音
不明乃其常理喉中無病而亦不明是肺之病也若非肺
病則當辨其所病之臟焉呼而吸者肝之病笑而雄者心
之病歌而漫者脾之病哭而促者肺之病呻吟而低微者
腎之病六腑之病亦各統於其臟之所屬也至於好言為
熱懶言為寒言壯邪實言微正虛大概可知自喉出者為
宮應乎脾自口出者為商應乎肺自唇出者為羽應乎腎
自齒出者為徵應乎心自舌出者為角應乎肝亦可按其
音以知其病矣若為風寒所閉肺火抑遏則其聲音重濁

乃肺之病易治者也若久啞不能大言則肺氣衰而難治矣若因疼痛呼號而微啞者乃肺氣受傷病愈則自復舊矣不須治其啞也

問病情

問病情者問其素習壯弱飲食勞逸喜怒悲憂思恐為何如曾用何藥與否週身疼否之地位寒熱何如大小便之通塞渴不渴之異飲冷飲熱之分也婦人則必問其經期若何孕育產後之異小兒則必問其朝夕提抱之人乃知其得病之由但因人而問各有不同總在臨病之時適其

宜而推測之

其得病之由但因人而問各有不同總在臨病之時適其

宜而推測之

切脈論

凡診脈之道先調自己氣息氣息者自己呼息之氣也必須
平心靜氣不得粗浮方可診視男先左手女先右手下指
必定先尋關脈關脈在高骨之下關前為寸關後為尺尋
定關脈次定寸脈再定尺脈寸關尺三部尋定乃靜審脈
氣先尋寸脈得一息四至診至三四息俱皆四至及診關
尺亦皆如是兼初輕診之三部俱得一息四至又重診之
亦得一息四至更輕重診至三四息俱皆一息四至概無

多少出入在常人則為平脈無病在病人則為瘵兆佳脈若內中或關脈有出入則尋關脈之病寸尺有出入則尋寸尺之病且三部中無論何脈四至少者固屬有病至四至以上者更不待言矣如是靜審潛尋則病在何經與見何情似不能逃矣

一診脈必須清晨之時以平旦之氣未散已之真氣固清病人之血氣亦未亂且無人喧嘩澄心靜氣之時更兼四診以參着未有不中病情者也病情既得而處方亦無偏執皆能合宜者自無不萬病回春大若病情未真且執傲乖

方非圈無益而實害之者矣

皆能合宜者自無不萬病回春矣若病情未真且執傲乖

方非圖無益而實害之者矣

一三指下定若關脈之情既得必復多審寸尺二部其出入一樣無參差者方為心腎交或寸脈出而尺脈不出寸脈入而尺脈不入是為不交亦不可不知也

一脈者血氣之本也血氣盛則脈盛血氣衰則脈衰血弱則脈微氣弱則脈遲長人則脈長短人則脈短長人疏下指短人密下指胖人脈細瘦人脈洪胖人重下指瘦人輕下指性急人脈急性緩人脈緩男子尺脈常弱女子尺脈常盛反之則逆又不可不化裁變通於其間也然此所謂能

與人規矩不能人使巧若至於能巧則俟乎神而明之者

浮沉遲數論

脈有 浮 沉 遲 數 浮數為陽 沉遲為陰

心脈宜洪 肝脈宜長 脾脈宜實 肺脈宜浮 腎脈

宜沉 命脈宜細 當其令而見本脈者固順非其時而

或見者則逆也至與本脈相反者更無論矣

四時主脈

春屬木肝脈為主 夏屬火心脈為主 月季屬土脾胃

為主 秋屬金肺脈為主 冬屬水腎脈為主故春位

夏洪 秋毛 冬石 反之亦逆也

為主 秋屬金肺脉為主 冬屬水腎脉為主故春位

夏洪 秋毛 冬石 反之亦逆也

一初按之而即應指者曰浮 浮有浮洪浮滑浮瀦浮空之

分 浮洪浮瀦為陽 浮滑浮空為陰 浮而有力皆虛

熱 浮而無力是血虛浮緊為數為陽在表宜汗

一重按之而乃應指者曰沉 沉有沉緊沉細沉滑之分

沉緊沉細為陽 沉滑為陰 沉而無力為虛 沉而有

力為實無力宜升提有力宜下古人以沉為陽宜下然沉

不可概言下若遇沉滑而下則氣脫矣學者遇沉滑沉細

之脉祇可從容和解至久病之人脉沉細而不疾不滑者

為佳兆若疾滑則為凶兆矣

一診之一呼息二三至者曰遲 遲有遲緩遲沉遲空之分

遲緩為陰是虛症 遲沉為陽是積滯 遲空則陰陽將

絕矣 遲而無力者不治 遲而有力者可治學者凡遇

遲脈要皆以提補為主

一診之一呼息六七至者曰數數有數洪數滑數緊數沉之分
數洪為陽 數滑為陰 數緊汗在氣分宜用氣藥
表之 數沉汗在血分宜用血藥表之 數在左尺之人
則汗在陰分宜以陰分之藥表之

則汗在陰分宜以陰分之藥表之

脉訣歌

甲胆乙肝丙小腸 丁心戊胃巳脾鄉
庚屬大腸辛屬肺 壬屬膀胱癸腎藏
三焦陽府須歸丙 包絡還從
丁火旁

陰陽脉歌

太陽小腸足膀胱 陽明大腸足胃當
少陽三焦足胆配 太陰手肺足脾鄉
少陰心經足為腎 厥陰包絡
足肝方

陽脉歌

小腸膀胱係太陽 陽明腸胃是他鄉 若問少陽為何
部 三焦與胆是其方

陰脉歌

肺脉同脾屬太陰 少陰心腎漫相尋 厥陰包絡肝居

下 部位分明要細心

妊娠歌

左尺洪疾是男形 兩邊一樣是雙生 左疾是男右是
女 右尺洪疾是女娠

十二經穴起上歌

手肺少商中府起 大腸商陽迎香二 足胃頭維厲兌

十二經穴起上歌

手肺少商中府起 大腸商陽迎香二 足胃頭維厲兌
三 脾部隱白大包四 手心極泉少衝來 小腸少澤
聽宮去 膀胱睛明至陰間 腎經湧泉俞府位 心包
天池中衝隨 三焦關衝耳門繼 胆家童子膠竅陰
厥陰大敦期門至 十二經穴始終歌 學者銘於肺腑

記 各詳圖註

左寸關尺論

一左尺為坎右尺為離坎為水離為火不知坎中有火離中
有水兩尺猶天秤然不可任其偏勝不偏勝為水火既濟

五言直本

之象自無病矣若一偏勝則水火不濟故百病生焉馮
氏錦囊有加減六味湯十法以治兩尺脉偏勝之病為千
古不易之方也

一人之有尺脉如樹之有根本枝葉雖枯能培養其根本則枝
葉自有發榮之日治法必以培根本為主若徒養其枝葉
而尅伐其根本未有根本壞而枝葉不害者也故凡遇虛
癆之症總以六味湯治之蓋壯其水火病未有不癒者也
一浮脉諸病皆責之於腎蓋水為萬物之母水生木木生火
火生土土生金金生水若水虧則不能制火火尅金金尅

木木尅土土尅水故其脉浮然生水又喜之於脾胃蓋脾

火生土土生金金生水若水虧則不能制火火尅金金尅

木木尅土土尅水故其脉浮然生水又善之於脾胃蓋脾胃強盛則飲食消化而津液自生生不息矣故古人云調養脾胃乃醫家王道 氏曰人身病有百種其實不過三者一曰陰虛以六味湯投之二曰陽虛以八味湯投之三曰中氣虛以補中湯投之學者先於此三方體貼去自不誤人切切

三陽脉

太陽經 小腸 膀胱也其脉浮洪 寸關尺俱浮為太

陽病

陽明經 大腸 胃也 陽明脉長

少陽經 三焦 胆也 少陽脉弦胆藏魄

三陰脉

太陰經 肺 脾也 其脉沉細 寸關尺俱沉為太陰

少陰經 心 腎也 少陰脉沉 腎藏魂

厥陰經 包絡 肝也 厥陰脉微緩

一左尺屬陰陰盛則寸關俱緊宜表宜散

寸包絡相火 心訂火 高關 胆甲木 肝木 喜酸

尺小腸丙火 膀胱壬水 腎天 喜鹹

一右尺屬陽陽盛則寸關俱緊宜下宜解

尺小腸丙火

膀胱壬水

腎真天一

一右尺屬陽陽盛則寸關俱緊宜下宜解

寸膈中胸中

肺辛金

高關

胃戊土

脾巳土

尺大腸庚金

三焦相火

命真地二



左手脈圖形



心
丁火
絡
燈
相

寸
心
君
火
命
包
絡

腎
癸水
膀胱
壬水
小腸
丙火
肝
乙木
喜
酸
胆
甲木

高
關
骨
胆
肝

尺
腎
真
水
膀胱
小腸

手少陰
手厥陰

足少陰
足厥陰
足太陽
手太陽


左手圖說

左手圖說


關前一分為人迎脉人迎大於氣口是外感宜表腎為坎
水坎中滿水中有火求水必求於火治之 用八味湯之
類是也 凡三部皆洪緊宜表宜散

右手脈圖形

右手圖說



手太陰
 足陽明
 足太陰
 手陽明
 手少陽



三焦天相 尺三焦
命土喜辛 命地二
一手少陽

右手圖說

關前一分為氣口脉氣口大於人迎是內傷宜解命門為
離火離中虛火中有水求火必求於水治之 用金匱腎
氣湯之屬是也 凡三部皆洪緊宜解宜下

但是病不外陰陽欲知陰陽全以兩尺脉為主何以分之要
體認熱甚則脉疾寒甚則脉遲實則有力虛則無力且陰
盛宜表陽盛宜下陰盛之脉浮陽盛之脉實故

仲景曰陰盛陽虛汗之則宜下之則死陽盛陰虛下之則宜
汗之則死可見陰盛宜汗陽盛宜下學者若遇傷寒汗下

最要小心切不可誤汗誤下致害不淺切切記之

左寸心脉浮主病

主太陽眩暈兩目暈花心神恍惚頭疼室女經閉頭暈風痰症中風不語顛狂二症

浮宏 主太陽眩暈兩目昏花心神恍惚經閉頭暈

浮滑

主風痰症中風不語顛狂症

浮宏 主太陽眩暈兩目昏花心神恍惚經閉頭暈

浮滑 主風痰症中風不語顛狂症

浮沉 主頭疼

左寸心脈浮病源

太陽眩暈兩目昏花心神恍惚經閉頭暈四症由心血虧而虛火妄動也

一中風不語痰症此症平日多算多謀之人多得此症

痰在包絡也經曰見痰休治痰氣盛痰自化見風休治風血足風自滅見血休治血氣足血自安觀此而知中風不語一症因氣血兩虧心不能生血肝不能藏血脾不能統

血肝無血養則肝枯而生風脾無血養則脾濕而不舒夫
至脾濕而不舒則不能消化飲食將糟粕不能化為津液
而化為痰又遇肝風挾攻遂成風痰之症此病係正氣脫
而邪氣盛凡治此症祇可補正攻邪不可獨攻其邪氣蓋
養正則邪氣自除理之所有伐正而能保身理之所無

顛狂症痰症

由肝脾二家逼起心家之火心為二家所逼則心火亦不
甯而妄動矣所以風因痰生痰隨風甚均成顛狂然顛為
陰狂為陽顛宜補狂宜下不可不知

頭痛

陰狂為陽顛宜補狂宜下不可不知

頭痛

心家虛火上炎也

左寸心脉浮治法

太陽眩暈兩目昏花心神恍惚

男子年少者因色慾過度 六味湯主之

年老者因思慮過度 金匱腎氣湯主之

婦人多鬱 逍遙湯主之

婦人年老者因氣血兩虧而脾不舒暢 歸脾湯主之

室女經閉頭暈 逍遙湯加紅花續斷砂仁治之或桃仁

承氣湯亦可

中風不語 十全大補湯八珍湯之類治之或蘇合丸獨
參湯亦可再用如意丹吹入鼻內有涕者生無涕者死
用頂上肉桂研末開水調服

顛狂症

宜先吐之即用生菜菹子或酸漿或花椒目研末冷水
調服以吐為度後以四君湯加桂附紅花半夏克絲治
頭疼 六味湯加川芎白芷之類治之

顛狂症治法甚多 此處不詳合古方上詳之可也

經曰心兮本虛應物無迹虛靈之象多生虛火蓋心火生於

顛狂症治法甚多 此處不詳合古方上詳之可也

經曰心兮本虛應物無迹虛靈之象多生虛火蓋心火生於
肝木心火之動還因肝火之動而肝火之動又因腎水虧
不能養肝木也故治法用六味逍遙二湯主之然亦有實
火乃上焦包絡之火也故治法用苓連之屬瀉之夫心為
君象日處深宮寂然不動包絡為輔治之臣包絡受別經
之侮則包絡不甯而心亦因之不甯矣

左關肝脈浮主病

主好怒火眼疼背疼脇疼跌打損傷咳嗽吐血羊癇症癆
熱瘧疾濕癰癩袋耳鳴大便不通疝氣膀胱疼

浮宏

主火眼疼背疼脇疼好怒瘧疾跌打損傷癩癭耳鳴癭袋

浮沉

主癆熱大便不通

浮緊

主咳嗽吐血

浮緊而下墜

主疝氣膀胱疼

浮滑

主羊癩症

浮宏而弦

主瘧疾

左關肝脈浮病源

火眼疼好怒咳嗽吐血癩癭癭袋耳鳴

肝氣上冲而肝

火動也

火眼疼好怒咳嗽吐血瘰癧癭袋耳鳴 肝氣上冲而肝

火動也

背疼脇疼 肝氣鬱也

跌打損傷 肝血動也

瘧疾 由中氣虛而脾土濕又兼外感風寒暑熱胃家痰食
相搏冲動肝經故肝為之不甯而作瘧也所以兩關脉弦
者為瘧疾

羊癇症 仆地不省人事目瞪口流白沫多出羊馬之聲由
肝血虛木枯而生風風生火風火相搏故見此症及至風
息火滅而人自省按古人治此症多為痰症治之則左矣

惟石頑老人治法責之於肝風用逍遙湯加劑治之為聖
古之神方也

癆熱 肝血弱也肝血弱由腎水虧

疝氣膀胱疼 肝氣下墜也

大便不通 肝司大便肝氣鬱則不能送之下

肝屬木而藏血血虧則不能養肝而肝氣鬱矣遂至木枯
生火皆由腎水不足之故也

左關肝脈浮治法

火眼疼 歸芍六味湯加柴菊治之婦人有因白帶而疼

者八珍湯加劑治之亦有川四物探雲散

左陽肝肺注

火眼疼 歸芍六味湯加柴菊治之 婦人有因白帶而疼

者八珍湯加劑治之 亦有川四物探雲散

好怒 逍遙越鞠二湯主之

背疼 逍遙倍加杭芍治之

脇疼 逍遙湯加木香萊菔治之

咳嗽 十味補中湯加桑皮貝母治之 如腎脈又洪即以

此藥送六味丸 又久服八仙長壽湯更好

吐血 男子吐血起於腎六味湯 女子吐血起於肝四

物湯二方中各加萸芩貝母浙冬五味紅花治之

瘰癧 逍遙湯加紫背天葵夏枯草治之外擦金果欄帖

觀音膏

瘦袋 海白菜海螵蛸麥芽 各一两生黃豆四十粒去皮

分十付服

耳鳴 補湯中加廣子姜皮治之 金匱湯更好

跌打損傷 生地四物湯加五靈脂我朮血竭紅花乳香

沒藥大黃治之或芋薯或酸漿草搗汁點水酒服將渣

敷患處

瘧疾 未分者柴平湯下如面色青黃者補中湯加白烏

鱉甲常山廿一菓廣子姜棗 治之

癆熱 四物湯加鱉甲龜板 丹皮骨皮治之

驚甲常山苦十菓廣子姜棗 治之

癆熱 四物湯加驚甲龜板 丹皮骨皮治之

疝氣膀胱疼 逍遙湯大加升麻治之

大便不通 六味湯加葎蓉 秦歸火麻杏仁治之

羊癩症早服定子藥午服九藥晚服湯藥 逍遙湯加黃

丹鬱金白礬治之

九藥方

人參四兩 白朮三兩 黑姜一兩 黑附一兩 玉金一兩

炙草一兩 蜜丸開水服

定子藥方

王金 黃丹 白礬 各二兩 研末入瓦罐內用泥封口煨

香一炷取出猪心血為丸開水服

又方用百草霜鮮猪血調熱服

左尺腎脉浮主病

主頭疼眉骨疼額經疼眼疼牙疼喉疼唇焦口乾舌燥腎管疼陰戶疼滑精淋症小便淋瀝婦人血枯經水不調

浮宏 主唇焦舌燥口乾

浮緊 主頭疼眉骨疼額頸疼眼疼喉疼腎管疼陰戶疼耳

浮疾 主小便淋瀝症月經在前

浮緩 主月經在後

浮疾 主小便淋瀝症 月經在前

浮緩 主月經在後

浮滑 主滑精

左尺腎脉浮病源

唇焦口乾舌燥 虛火上炎也是因水虧不能制火

頭疼眼疼眉骨疼頸頸疼喉疼牙疼 虛火上炎也

月經不調 在前為血枯而熱在後為血枯而弱皆水火

不濟之症

淋症小便淋漓 由腎伏邪火水虧不能制之故邪火妄

動也

滑精 腎水虧陰虛火動也

腎管陰戶疼 此症體實者多在浮脈體虛者多在沉脈由

腎伏邪火水虧不能制之故虛火動也

左尺腎脈浮治法

唇焦口乾舌燥

八仙長壽湯加鹿茸龜板治之加知柏

亦可

頭疼眉骨疼 六味湯加川芎白芷治之

眼疼 歸芍六味湯加柴菊治之

牙疼喉疼耳疼 六味湯加元參桔梗治之

頰頸疼 六味湯加麻黃桂枝羌活白芷治之

牙疼喉疼耳疼 六味湯加元參桔梗治之

頸頸疼 六味湯加麻黃桂枝羌活白芷治之

月經不調 在前道遙湯加紅花續斷砂仁治之 在後黃

芪補血湯加紅花阿膠治之 或八珍湯加黃芪阿膠紅

花亦可 有行經肚疼者用生山查肉桂黑姜沙糖水煎

服愈

淋症小便淋漓 麥冬淮膝各一兩開水泡服 又方用

五葉草水煎點水酒服 或芭蕉根搗汁點酒服 亦可 或

草薺分清飲八正散治之 通利後服金匱腎氣湯

滑精 熟地棗皮淮葯芡實蓮鬚鱉甲瑣陽浙冬金櫻桑

螺苡仁治之或歸脾湯加桑螵蛸柏仁蓮鬚亦可

腎管陰戶疼 先用草薢分清飲分利之後用腎氣湯加

琥珀治之體實者即用草薢首烏銀花甘草煎服亦可

不愈加木通車前猪鬃草

右寸肺脉浮主病

肺脉浮本脉也但浮宜和平若浮緊而散主傷風咳嗽痰

癧水癧吼喘鼻塞淵鼻糟疼

浮緊而散 主傷風咳嗽

浮緊 主鼻塞淵鼻疼鼻糟

浮滑 主痰癧水癧吼病喘病

浮緊 主鼻塞鼻淵鼻衄鼻齩

浮滑 主痰癰水癰吼病喘病

右寸肺脉浮病源

傷風 肺主皮毛故風邪之感在於肺家

咳嗽 肺為金主氣外感風邪入肺肺氣閉塞而不通則

咳矣

痰癰水癰 肺為清虛之府不容一物痰積於肺則為痰

癰水積於肺則為水癰

吼喘 肺氣塞而不通故肺脹而氣粗也

鼻塞鼻疼 風邪入肺也

鼻淵糟鼻 肺家大傷也

右寸肺脉浮治法

傷風 人迎大於氣口為外感症人參敗毒散九味羌

湯 氣口大於人迎為內傷疝麥味補中湯

咳嗽 只桔二陳湯

痰癆 酸礬飯糊為丸治之

水癭 四君湯加大劑香附治之 白朮生用

吼喘 生脉散定喘湯金匱腎氣湯治之大便秘不利下之

鼻塞鼻疼鼻淵鼻糟 四症治法九味羌活湯加辛夷生

蘇飲亦可 或六味湯加元參桔梗倍加澤瀉 或蘇

鼻塞鼻疼鼻淵鼻槽 四症治法九味羌活湯加辛夷生

蘇飲亦可 或六味湯加元參桔梗倍加澤瀉 或蘇
子降氣湯 或獨用澤瀉一劑鼻槽用黃柏泡水擦於
鼻上四症吹鼻之法用鷺不食草晒乾為末入青黛撫
芎少許吹入鼻中 或用生蘿蔔搗汁吹入鼻中又用
者烏煎湯沖松蘿茶服頭風服此更妙

右關胃脉浮主病

主胃脘疼兩脇疼停食不安 食反胃噎食噎食吞酸痰症
癰疾

浮宏 主胃疼火症不容揉

浮緩 主胃疼寒症喜揉

浮宏而有力 主停食

浮宏而無力 主反胃噎食噎食

浮緩 主不安食

浮宏而弦 主瘧疾

浮滑 主吞酸痰症

右關胃脉浮病源

胃脘疼由人好食酸冷又兼氣性不平者多有此症其症
有二一曰寒症胃氣寒也一曰火症胃火盛也寒症舌

白火症舌紅寒症容揉火症不容揉揉之更痛然舌白

有二一曰寒症胃氣寒也一曰火症胃火盛也寒症舌

白火症舌紅寒症容揉火症不容揉揉之更痛然舌白
亦有火症須以冷水滾水試之喜啣冷水而痛減者是
火症喜飲滾水而痛減者是寒症再不容揉不容揉分
之則寒熱之症無差已若又兼肝脉浮洪而痛者為挾
氣疼兩脇上揍而痛者為挾痰此症最易誤人宜小心

兩脇疼 痰與食結也

停食 胃中有積食也

不安食 胃火盛也

吞酸 胃火盛也亦有胃寒者

反胃即食即吐 咽食哽食 三焦水乾而邪火妄動故食不安

痰症 好食厚味又飲冷水故糲化為痰也
瘧疾 好食酸冷致內傷飲食外感風寒也

右關胃脉浮治法

火症胃脘疼 杭芍炒梔香附神糲舌黃者加只壳大黃
治之

寒症胃脘疼 良姜香附只實神糲法夏台烏砂仁舌白
者加黑姜治之白厚者加黑附

酒寒痛 杭靈脂木香為末冷氣酒送

胃脘痛 良姜香附只實神和法夏台烏砂仁舌白者加黑姜治之白厚者加黑附

酒寒痛 杭靈脂木香為末冷氣酒送

挾氣痛 胃脘疼二方中各加元胡一劑

挾痰痛 胃脘疼二方中各加萊菔一劑

反胃咽食哽食 金匱腎氣湯主之五香散送麝香一分

停食舌黃者平胃散加山查麥芽神糶大黃下之如人弱

去大黃加豬皮雞羊骨糊飯各灰調湯服

吞酸 香砂六君湯加烏梅杭芍治之

不安食六部俱宏而本脉更宏是火症

香砂六君湯加

大劑炒杭黃連瀉之

痰症 生菜菴子研末冷水調服吐之白礬飯為丸亦可

瘧疾 柴平湯主之 小兒平胃散寸金丹姜湯主之

如久瘧不止 加味補中湯主之 再不止用大補湯提之

再不止用十棗生姜湯主之 再不止加蜜陀僧一錢煨

十棗生姜湯方

大棗十枚 生姜一片 枳榔二錢 草菓子二十一粒

水煎透露一夜次早又煎用桃尖三個或麻尖三個

蜜陀僧末一錢冲服 又方太乙紫金錠冲服亦可

右尺命脉浮主病

主眼疼牙疼背疼腰疼脚疼腹疼熱痢暑瀉大便不通

右尺命脉浮主病

主眼疼牙疼背疼腰疼脚疼腹疼热痢暑瀉大便不通
带吞酸咳嗽不能卧 结胸慾淋

浮宏 主眼疼牙疼吞酸

浮紧 主背疼腰疼脚疼腹疼热痢大便不通
结胸咳嗽不能卧

浮滑 主暑瀉肚瀉

浮宏而有力 主慾带淋症

右尺命脉浮病源

眼疼牙疼 虚火上炎也

背腰脚疼 火爍金而大腸乾燥不能利大便為大便所阻滯而疼也

咳嗽不能卧 由大便不利火爍金大腸生火庚金尅辛金故卧時咳愈甚

熱痢腹疼 由胃家虛熱積於大腸裏急後重之症也
暑瀉肚瀉 由相火弱而大腸寒濕又兼外感暑濕也
吞酸相火盛也 又有相火弱者

慾淋慾帶 相火動也
大便不通 火爍金而大腸乾燥不制大便也

結胸 由相火尅君火也絡結住將胃口閉塞也 此症

大便不通 火爍金而大腸乾燥不制大便也

結胸 由相火尅君火也絡結住將胃口閉塞也 此症

左尺亦浮緊 此症宜下有下至數次自汗而愈者邪

氣盡也如不下而悞汗則去死不遠矣

右尺命脈浮治法

眼疼 歸芍六味湯加知柏治之

牙疼 六味湯加元參桔梗治之

背腰脚疼大便不通 平胃湯加只壳山查麥芽大黃下

熱痢 秦歸杭芍車前木香廣子萊菔甘草如腹疼加厚

朴大黃暑濕加烏梅治之

暑瀉 烏梅廣子煎服

肚久瀉 羌防建中湯 或參苓白朮散去滑石黃連

吞酸 香砂六君湯加 枳芍烏梅治之如腎脉又浮宏而

大吐者腎氣湯加鹿茸龜板沉香香附烏梅治之

咳嗽不能卧 平胃散加 山查麥芽只壳只寔神糶大黃

下之年少者服蒙石滾痰丸

結胸 大柴胡湯治之

肚疼 理中湯加 枳芍如不愈加元胡亦有用大將軍湯

慾淋 知柏六味湯主之如不愈加車前木通

慾帶 知柏四物湯主之或用白 蓮花加蜜焙乾為末開

慾淋 知柏六味湯主之如不愈加車前木通

慾帶 知柏四物湯主之或用白豆蓮花加蜜焙乾為末開

水送下

左寸心脉沉主病

主懶惰呵欠冷淚倦忘心顫驚悸夜夢顛倒

沉細 主懶惰呵欠冷淚倦忘

沉疾 主悸症

沉滑 主心顫驚症夜夢顛倒

左寸心脉沉病源

懶惰呵欠冷淚倦忘 心血虧而神氣不足也

顛驚症及夜夢顛倒 氣不運痰痰積於包絡也

悸症 心血虧不能制火虛火妄動其見症吵鬧罵人舌

紅面紅

驚悸夜夢顛倒三症腎脈必沉浮肝脈必沉遲心腎亦不

交矣

左寸心脈沉治法

懶惰呵欠倦忘 十全大補湯主之柏子養心湯主之

冷淚 十全大補湯加益母草夏枯草治之少者以益母

草夏草煎服

顛症發馬症夜夢顛倒 先吐之即用生萊菔子方後用定

草夏草煎服

顛症驚症夜夢顛倒 先吐之即用生萊菔子方後用定

心湯治之 顛症由肝膽虛切忌發散之藥

悸症 先用小麥甘早湯後以補心血之劑治之

附定心湯方

神砂一錢 琥珀二錢 乳香一錢 木香一錢

白蜡五錢 上桂一錢去皮 金箔小五張

共為細末先化白蜡後入合藥末拌勻空心白湯

下一錢

左關肝脉沉主病

共百壹 卷四

主雀蒙眼腰疼不能直脚疼四肢無力肌肉消瘦吞酸癰

疥痞疼血塊症大便不利月經不調不孕室女經閉

沉疾 主痞疼血塊疼

沉緩 主雀蒙眼癰疥腰疼脚疼四肢無力大便不通吞酸

沉細而緩 主經水不調不孕室女經閉肌肉消瘦此數症

若脉沉疾則為癆症矣

左關肝脉沉病源

雀蒙眼 肝血枯而生虫也

腰疼不能直 庚金無水不能利大便為大便阻滯而也

四肢無力脚疼 經曰足得血而能行血虧則不能運行

腰疼不能直 庚金無水不能利大便為大便阻滯而也

四肢無刀脚疼 經曰足得血而能行血虧則不能運行

之故也

肌肉消瘦 氣不能生血血虧則不能養肌肉也

痞疼血塊疼 肝氣鬱不能藏血血結而疼也經曰氣乃

無形血乃有形無形之氣能生有形之血氣虛不能行

血故積為血塊治法不可不去其積又不可不養其血

吞酸 肝氣本順血不養肝則肝氣鬱而上逆也

癩疥 肝血虧不能食皮膚也

大便不利 肝氣鬱也

月經不調不孕室女經閉 肝血虧也

左關肝脉沉治法

雀蒙眼 羊連貼水 紅花子青鹽蒸服湯藥方用紅花益
母草夏枯草煎服

腰疼不能直脚 舒肝和血散主之然肝為腎之子養肝
莫妙於滋水取氣湯治之尤多腰疼燒腰散治之亦可或
白朮杜仲二味煎服更好

四肢無力 十全大補湯加鹿茸龜膠虎骨紅花治之
肌肉消瘦 十四味建中湯加鹿茸龜膠治之或龜鹿二

肌肉消瘦 十四味建中湯加鹿茸龜膠治之或龜鹿二

仙丸

痞疾血塊疼 八珍湯主之所以養其血也用午連貼皮

硝礬乾礬瓦灰水紅花子研末調服所以去其積也

吞酸 香砂六君湯加歸芍烏梅大棗治之婦人八珍湯

或十全大補各加烏梅治之

大便不利 補中湯主之

月經不調不孕 八珍湯加黃芪阿膠紅花砂仁治之不

孕加益母草吳萸治之或用大劑秦歸黃芪阿膠治之

室女經閉 調經卷 血湯主之至脉不沉桃仁承氣湯

癬疥 十全大補湯 去肉桂加銀花牛旁虫退骨皮加皮

治之

外治方 蜜陀僧五錢 硫黃五錢 花椒二錢 茜查五錢

耳粉 五錢 飛

共為末 蓖麻子半斤 研末加香油四兩 拌勻擺在草
紙上捲筒點火 滴油用瀉出之 油拌藥末擦之

左尺腎脈沉主病

沉腎之本脈也 但沉宜得中 若沉緊主肌肉消瘦淋症小
便短 月經在前不 孕沉疾 腎管疼沉緩主白帶青蒙眼

沉滑主遺精

便短月經在前不
孕沉疾腎管疼沉緩主白帶青蒙眼

沉滑主遺精

沉緊 主肌肉消瘦淋澀小便短月經在前不孕

沉疾 主腎管疼

沉緩 主白帶青蒙眼

沉滑 主遺精此症體是者多在浮脈體虛者方在沉脈

左尺腎脈沉病源治法

肌肉消瘦 乃腎水不能養肝木肝血虧則不能養肌肉

治法用十四味建中湯加鹿茸龜膠治之或龜鹿二

淋症 乃濕熱所致宜分利之而後補但淋症皆由腎虛

雖有虛實二症均宜補腎為主虛者右尺必浮疾分利
之後宜急補之 治法先用草薢飲後用金匱腎氣湯
小便短 乃腎家有濕熱也古人以小便責之於肺小便
短宜順肺氣不知腎為肺之子補腎即所以補肺故經
曰治小便當治本位故也 治法用大劑六味湯主之
加車前水通

月經在前 此腎水不能養肝水肝血枯而熱也 治法
用逍遙湯加紅花續斷 砂仁治之
不孕 由腎水不能養肝水肝血虧而不能受孕也 治

法用八珍湯加黃芪阿膠紅花砂仁益母草治之或黃

不孕 由腎水不能養肝 木肝血虧而不能受孕也 治

法用八珍湯加黃芪阿膠紅花砂仁益母草治之或黃芪補血湯加阿膠亦可或加吳萸

白帶青蒙眼 經曰目得血而能視腎水虧則目昏也

治法用八珍湯加黃芪海螵紅花虫退肉桂菊花治之
腎管疼 腎伏邪火水虧則邪火妄動也 治法同浮脉

外治白帶方

炙芪二錢

秦歸三錢

砂仁一錢

同煮烏骨雞者煖去藥加鹽食留雞骨打碎入藥渣
再煖煎煎取汁用汁煎蘆子三錢空心用湯送下

鹿角霜三錢神效

右寸肺脉沉主病

主頭疼目乾疼鼻不通背疼虛咳小便不利結痰

沉緊 主頭疼目乾疼背疼結痰

沉緩 主鼻息不通虛咳小便不利

右寸肺脉沉病源治法

頭疼目乾疼、由腎水虧不能養母所以肺氣上冲故頭
目作疼然不用治肺之藥經曰肺為清虛之府藥力不
能到凡治肺病皆當責之於腎故肺病總以滋水為王

治法

六味湯加風散之劑眼疼忌白芷

能到凡治肺病皆當責之於腎故肺病總以滋水為王

治法 六味湯加風散之劑眼疼忌白芷

鼻息不通 由腎氣不能上升肺竅壅塞又兼外感風邪

腠理閉塞以致肺氣無出之路蓋鼻通肺竅肺氣不行

故閉塞而不通也治法 六味湯加細辛辛夷麻黃發

散之外治方以蘿蔔搗汁滴入鼻孔即通男先灌左孔女先灌右孔

小便不利 小便診脈皆在腎今何在肺不知肺屬金主

氣氣行小便行今肺脈沉緩肺氣不行小便何由利乎

治法 大劑六味湯主之再加車前木通尤妥

背疼 肺主皮毛皮毛之氣不舒故疼治法 用姜葱搗

汁敷之或用大麻子葉火烘貼之

虛咳 由腎虛不能養母經所謂水涸金鑠之症也其咳
出之痰皆是白沫名曰腎咳亦名癆瘵治法搃以泔水
為主切不可用肺家之藥治之亦不可用抽薪之藥
治法用長壽湯主之或補中加麥冬五味送下六味丸
尤妥

結痰 脾濕不能養金金聚頑痰日久則乾故結 治法
用酸礬飯糊為丸治之再服香砂六君湯枳桔二陳湯

外方

鼻息不通不聞香臭神方用

外方

鼻息不通不聞香臭神方用

鴛不食方此方在右寸脉浮治法上

右關胃脉沉主病

主腰疼四肢無力臍下疼食不消化不思飲食吞酸反胃
噎食唾食停食虛汗乍寒乍熱大便結澁胃脘疼

沉緊

主腰疼臍下疼停食乍寒乍熱虛汗大便不利四肢疼而
無力火症胃脘疼

沉緩

主不思飲食食不消化反胃噎食哽食吞酸四肢無力不
疼寒症胃脘疼

右關胃脉沉病源治法

腰疼四肢疼而無力 由庚金無水火糞乾燥阻滯於大

腸氣觸中宮故腰痛不能直四肢疼而無力也 腰疼

一症左關必沉緩 治法補中湯加杜仲治之或用白

朮杜仲二劑煎服亦可

四肢無力不疼 由胃家寒濕不能生津液也疼者以大

劑熟地秦歸火麻桃仁治之如面色黑者微加紅花若

再大便不利即用礞瓦灰赤飛細早服一二不如年老

劑熟地秦歸火麻桃仁治之如面色黑者微加紅花若

再大便不利即用礞瓦灰末飛細早服一二不如年老
者上方潤之不下用生蘇仁生杏仁生芝蘇研末冷水
調去渣和蜜調服不疼者用養臟湯或十四味建中
湯加虎骨鹿茸龜膠治之

臍下疼胃家停食重而成積也重者是痞症治法理

中湯主之體寔者用平胃散加推食之劑

食不消化由命門火弱不能燠蒸脾胃故飲食不化也

治法八味湯加鹿茸龜膠治之或香砂六君湯

不思飲食乃胃家潮濕不能受食也此症面食不消化治之

吞酸 由胃家潮濕脾不能運動糟粕所飲之水皆停積
於胃而變為酸水也治法 用香砂六君湯加杭芍烏
梅白蔻黑姜治之重者金匱腎氣湯加烏梅治之如不
愈加麝香

反胃 胃家潮濕不能安食也又因大腸乾枯大便不利
又噎食哽食停食由相火衰弱不能燻蒸脾胃而化食
也治法 均用八味湯重加鹿茸龜膠治之或金匱腎
氣湯

虛汗 由食不消化津液枯竭腎虛火動也治法 用歸

芍六味湯主之

虛汗 由食不消化津液枯竭腎虛火動也治法 用歸

芍六味湯主之

乍寒乍熱 由傷食日久大便乾燥結在大腸燻蒸胃家
將所食之物蒸乾而變為痞邪氣發時乍熱邪氣敗時
乍寒或潤或下俱要將燥糞去盡病方得愈治法 同
四肢疲而無力若大便不能下即用牛連貼方治之体
實者大將軍湯下之舌白者挾黃者加附片

大便結澁 庚金無水不能涿潤故乾燥而結也治法
用平胃散加消食之劑治之或養臟湯亦可

胃脘疼 治法同胃浮脉

右尺命脉沉主病

主痿症悸症驚症不思飲食食不消化 寒痢大便結澁小

腹疼白帶

沉緩

主痿症不思飲食食不消化寒痢白帶 大便結澁

沉緊

主驚症悸症小腹疼

疼不拘脉之 緊緩俱以寒症論

右尺命脉沉病源治法

痿症 水火不濟也血氣兩虧 用腎氣湯大補湯十四

味建中湯加鹿茸虎骨龜膠治之

痿症 水火不濟也血氣兩虧 用腎氣湯大補湯十四

味建中湯加鹿茸虎骨龜膠治之

驚症悸症 由腎虛火炎相火上冲而尅動君火也 用

知柏六味湯主之再悸症甘麥湯主之

不思飲食食不消化 由相火衰弱不能燠蒸脾胃胃家

潮濕不能受食故飲食不化 用八味湯重加鹿茸龜

膠治之

寒痢 相火衰而大腸寒濕也 用四君湯加山藥澤瀉

黑姜木香共為末白糖調服 又以烏梅廣子粟壳杭芍

煎服重者桂附養臟湯治之

白帶 相火衰也 用八珍湯加鱘海螵蛸紅花治之

大便結澁 由庚金無水不能滋潤故結澁如脈沉緩者

附子理中湯脈沉緊者用熟地秦歸火蘇桃仁治之或

養臟湯亦可

小腹疼 疼在臍上為胃脘疼 臍下為寒食疼疼在小肚

為海底疼指甲辰青者即陰症 用附子理中湯治之

若人六脈俱沉者不緊不疾則為佳脈

左寸心脈遲主病

與左寸沉其病相同但遲要有力部數有準若一息一至

或二息一至是為代脈即為不治之症若兩尺有力猶

力寸心肝主症
與左寸沉其病相同但遲要有
力部數有準若一息一至

或二息一至是為代脈即為
不治之症若兩尺有力猶
可治當以大劑獨參湯主之
切不可見剋伐之藥

左關肝脈遲主病

主目乾疼目昏背疼冷淚腹寒
疼吞酸食不消化肌肉消
瘦病臥不起冷痢便血驚症
顫症

遲疾 主目乾疼背腹疼

遲緩 主吞酸肌肉消瘦冷淚目
昏食不消化病臥不起

遲緊 主驚症顫症

遲滑 主冷痢便血

左關肝脈遲病源治法

目乾疼目昏冷淚 目為肝竅 肝血虧則不養目也治

法四物湯八珍湯腎氣湯各加虫退紅花白菊還少丹

亦可腎氣丸亦可或用十全大補湯或六味湯各加夏

枯益母草治之年少者即以夏枯益母並白菊花紅花

煎服

背疼腹疼 中氣大虛也 用理中湯大加杭芍治之

吞酸 肝氣不舒而尅脾土也 此病面色必黑 治法男

子香砂六君湯加烏梅杭芍 秦歸大棗治之 婦人八珍

湯大補湯各加香附烏梅治之

子香砂六君湯加烏梅杭芍 秦歸大棗治之 婦人八珍

湯大補湯各加香附烏梅治之

食不消化 由肝木不能生心火心火不能生脾土也

故治法用香砂六君湯燥起肝木以生心火而生脾土

肌肉消瘦 由肝血虧而不能養肌肉也 用龜鹿二仙

湯四物湯加炙芪紅花主之

病臥不起 有二症有中氣大虛而病臥不起者蓋肝木

為人身之中柱血虧不能養肝木則木枯不能立也有

瘳憊而不能起者經曰筋乃肝之餘肝氣不舒則筋不

活動也 如中氣虛者十四味建中湯加虎骨鹿茸龜

膠治之 外治方以大麻子葉火烘貼之服久方有功

瘰癧症用大補湯加風散之劑治之外用透骨草煎洗

便血 肝不藏血血滴於大腸也 治法男子大補湯

婦人補血湯各加紅花炒荆芥秦荒地榆治之以補氣
血為主切不可濫歸脾湯亦可

驚症顫症 經曰胆藏魄胆氣虛則不藏魄而主驚顫也

用十全大補湯歸脾湯主之二方中各加琥珀

冷痢 肝不藏血血滴於大腸腐濕也此由肝氣不舒之

甚 治法用附子理中湯主之或養臟湯亦可切不可

甚 治法用附子理中湯主之或養臟湯亦可切不可

左尺腎脈遲主病

主反胃吞酸不思飲食小便多滑精淋症腎管疼經水退後不孕血崩白帶昏昧陰戶疼血淋血帶咳嗽失音大便如羊糞倦忘驚症顫症肚腹鼓脹

遲滑 主滑精小便多經水退後

遲緊 主淋症腎管陰戶疼

遲緩 主反胃吞酸不思飲食不孕白帶血崩

大便如羊糞倦忘驚症顫症

遲疾 主咳嗽血淋血帶肚腹膨脹失音

左尺腎脈遲病源治法

反胃吞酸 三焦水乾也 用腎氣湯加鹿茸龜膠香附

沉香治之反胃加烏梅麝香

不思飲食 此腎水不能養脾也用八味湯重加鹿茸龜

膠治之

小便多 火不能制水也 用腎氣湯加白果益智仁治

滑精 此脉名曰漏精由玉關不緊或由心腎不交其病

最重方前有

淋症 由腎伏邪火水虧不能制之故邪火妄動而淋精

也此脈不必分利即以金匱腎氣湯加琥珀治之

腎管陰戶疼 用腎氣湯加琥珀治之因腎家虛火動也

此此脈不必分利即以金匱腎氣湯加琥珀治之

腎管陰戶疼 用腎氣湯加琥珀治之因腎家虛火動也

經水退後 腎水不能養肝木肝血枯而弱也 用八珍

湯加黃芪紅花阿膠砂仁治之

不孕 腎水虧極而肝血枯故不能受孕也 用八珍湯

加黃芪紅花砂仁益母草又加茱萸燒姜少許亦可或

黃芪補血湯加阿膠治之

白帶 腎水不能養脾又有心腎不交而帶者 用八珍

湯加黃芪海螵蛸紅花治之或歸脾湯去木香加海螵

蛸亦可烏骨雞方尤妙

咳嗽 由腎虛不能養母經所謂水涸金燥之病也其咳

出痰皆是白沫名曰腎咳亦名勞瘵 用大劑八仙長

壽湯主之

失音 腎絕也為不治之症 用八仙長壽湯加石菖蒲

訶子治之服十服不愈不治

肝腹鼓脹 腎虛而滿也腫症有三有氣腫水腫濕腫按

即浮氣腫也按之有窩水腫也按之如石濕腫也此皆

由腎虛中滿中滿者膀胱水滿也女子濕腫則為血入

子宮名曰血腫其症最重 治法用腎氣湯加香附沉

香鹿茸龜板倍加車前澤瀉茯苓治之 又方火硝煮

子宮名曰血腫其疾最重 治法用腎氣湯加香附沉

香鹿茸龜板倍加車前澤瀉茯苓治之 又方火硝煮

蘿蔔晒乾滾水服此方是腫症俱治之

大便如羊糞 腎水不能養庚金大腸枯燥故大便乾而

如羊糞也 用養臟湯長壽湯通幽湯主之 不愈不治

血淋血帶 腎水不能養肝木肝血弱而下滲也 用六

味湯加淮膝琥珀治之或用淮膝浙冬泡開水服

再血帶 用腎氣湯歸脾湯主之早服生白菓研末冲豆

漿服

昏時倦忘驚症顛症 腎虛不能藏魂也 用十四味建

中湯還少湯主之或獨參湯更妙養心湯亦可

以上諸症皆水虧火敗為不治之症若脉息和緩猶

為可治倘見疾脉須以大劑八仙長壽湯治之

亦或能救人詳之

右寸肺脉遲王病

遲疾 主肺癰

遲緩 主肺痿皮肉乾枯皮膚瘙癢皮起白屑

遲滑 主痰癆水癥

右寸肺脉遲病源治法

肺癰 肺大傷有毒而生瘡也 用神仙活命飲臭靈丹

右寸肺脉遲病源治法

肺癰 肺大傷有毒而生瘰也 用神仙活命飲臭靈丹

治之生脉湯加白菓

肺痿 肺縮也 用六味湯主之加麻黃枳壳阿膠

皮膚燥癢起白麤皮肉乾枯 肺主皮毛肺氣虛不能行

血以養皮膚則皮肉乾枯燥癢白麤皮枯生風也 用

大補湯去肉桂加銀花虫退骨皮加皮治之用渣加錢

麻煎湯洗之

又皮肉乾枯 用大補湯主之龜鹿二仙丸十味補中湯

送六味丸

痰癥 肺為清虛之府痰積於肺則為痰癥 用香砂六

君湯白朮生用

水癥 由水積於肺則為水癥 用四君湯加大劑香附

治之白朮生用

以上諸症皆以補脾為主年少者香砂六君湯年老

者歸脾養心湯

右關胃脉遲主病

主反胃吞酸不思飲食噎食哽食痞疼冷痢腹寒疼遺精
食不消化冷瀉

遲緩 主反胃越時方吐吞酸不思飲食食不消化噎食食哽

食不消化冷瀉

遲緩

主反胃越時方吐吞酸不思飲食食不消化噎食食

遲緊

主腹寒疼痞疼

遲滑

主冷痢冷瀉遺精

右關胃脉遲病源治法

反胃

或早服晚吐或晚服早吐

由脾胃潮濕不納飲食而化食

也 用腎氣湯加鹿茸 龜膠沉香香附治之

吞酸

由胃家潮濕脾不能運動糟粕所飲之水皆停積

於胃而變為酸水也

用香砂六君湯加梳芎香附砂

仁烏梅治之或補中湯 腎氣湯加劑亦可

不思飲食 由脾胃潮濕不能受食也其食不消化 由
相火衰弱不能燻蒸脾胃故飲食不化也 俱用八味
湯加鹿茸龜膠香附砂仁治之

噎食哽食 由相火衰弱不能燻蒸脾胃而化食 用腎
氣湯加沉香香附鹿茸龜膠治之

痞疼 由脾胃不能消化不化之物皆變為痞也 用香
砂六君湯大加杭芍治之或牛瀉貼方治之

腹寒疼 乃脾不能運糟粕故寒濕於胃而作疼也 用
桂附理中湯主之

冷痢冷瀉 由胃家潮濕不能消化飲食將所食者俱寒

桂附理中湯主之

冷痢冷瀉 由胃家潮濕不能消化飲食將所食者俱寒
冷於胃於是糟粕不化為津液而化為惡濁以傳入大
腸也 用四君湯加山藥澤瀉廣皮肉菹共焙為末白
糖調服或用理中湯四神丸亦可外治方以新瓦數片
火烘熱醮醋上覆薄棉坐其上燻之立愈

滑精 由脾胃潮濕糟粕不化為津液而化為痰下滲於
膀胱腎本清虛之府為痰所凌故不甯靜而滑也 用
香砂六君湯主之或歸脾湯去木香加廣皮治之

右尺命脈遲主病

主目冷疼不思飲食食不消化四肢無力膀胱疼小腹疼
大便數白帶脫肛冷瀉腎瀉

遲緩 主目冷疼不思飲食食不消化四肢無力大便數脫

肛冷瀉

遲緊 主膀胱疼小腹疼

遲滑 主白帶腎瀉

右尺命脈遲病源治法

目冷疼 眼光屬火相火衰弱故冷疼 用八味湯主之
還少丹亦可

不思飲食食不消化 命門火衰不能燻蒸脾胃故食不

還少丹亦可

不思飲食食不消化 命門火衰不能燻蒸脾胃故食不
消化也 用八味湯加鹿茸龜膠沉香香附治之製硫
磺亦可

四肢無力 相火不能運動也 用大補湯加鹿茸龜膠
虎骨紅花治之或十四味建中湯亦可

膀胱疼小腹疼脫肛白帶大便數 均皆命門大衰也

脫肛 補中湯加山藥苡仁茯苓升麻倍加治之

小腹疼 桂附理中湯主之不愈加吳萸

大便數 桂附理中湯主之數在早晨者四神丸主之

膀胱疼 腎氣湯主之

白帶 八珍湯加黃芪海螵蛸紅花治之或歸脾湯加

上三劑亦可烏骨雞方更好

六脈俱遲細而無力為不治之症但遲緩猶為可治久病
之人得遲細之脈為佳北經曰久病無邪宜補而不宜
尅學者慎之六脈遲疾為不治之症

左寸心脈數主病

主目乾疼心神恍惚坐卧不甯多見鬼神夜多不寐夢掩
多夢好怒顛狂症頭疼

數宏 主目乾疼頭疼好怒

多夢好怒顛狂症頭疼

數宏 主目乾疼頭疼好怒

數緊 主心神恍惚坐臥不甯多見鬼神夜多不寐夢掩多

夢顛狂症

左寸心脉數病源治法

目乾疼頭疼好怒此三症 由心血虧而虛火妄動也

以滋陰降火為主男子六味湯女子四物湯各加知柏

治之

心神恍惚坐臥不甯多見鬼神夜多不寐夢掩多夢心血

虧而神氣不足又兼有邪熱也 治以安神定志為主

安神丸補心丹柏子養心湯治之

顛狂症說見浮脈 宜先吐之後以定心湯主之

經曰實火可瀉黃苓之屬虛火可補參芪之屬蓋心為君火其火最弱宜補而不宜尅學者記之

此數症多由相火逼起包絡之火也故用尋陰降火湯至脈一平急宜補之

左關肝脈數主病

主眼疼脇疼吐血便血疝氣疼瘧疾

數宏 主眼疼脇疼瘧疾

數緊 主吐血便血疝氣

數宏 主眼疼脇疼瘧疾

數緊 主吐血便血疝氣

左關肝脈數病源治法

眼疼 由肝氣上冲肝火動也 用歸芍六味湯加柴胡

治之

吐血 肝氣冲而肝火動也 治男子六味湯女子四物

湯各加秦芫浙冬浙貝紅花五味治之

脇疼 肝氣鬱也 用逍遙湯加元胡治之

便血 肝不能藏血血滴於大腸也用平胃散加槐角麩

軍杭芍治之又用生四物湯加槐角地榆紅花 十全

大補湯加炒荆茶紅花阿膠秦芫地榆槐花治之

又方用草菓麵沙糖煎湯者雞子服 又用生苡麵沙

糖開水調服或楊梅根水酒煎服或柿餅焙乾研末開

水調服

疝氣疼 肝氣下墜也 用逍遙湯加升麻鬱金治之

癰疾 說見浮脉 治法未分者柴平湯如已分而面色

青黃者補中湯加首烏鱉甲常山草菓麩子姜棗治之

此部治法同翮浮但浮中多有實症而數則無實症經曰

虛陽鼓指陽洩於外剛則折之謂也治之最宜小心切

不可用尅伐之劑

虛陽鼓指陽洩於外剛則折之謂也治之最宜小心切

不可用剋伐之劑

左尺腎脈數主病

主眼疼頭疼耳疼耳鳴牙疼口乾舌燥咳嗽多疼乍寒乍熱自汗虛汗遺精白帶淋症血崩不孕血帶肌肉消疼

數宏

主眼疼頭疼耳疼耳鳴牙疼口乾舌燥虛汗乍寒乍熱血崩咳嗽多痰自汗盜汗

數緩而無力 主白帶不孕飢肉消瘦

數滑 主滑精血帶

數疾 主淋症

左尺腎脈數病源治法

眼疼頭疼耳疼耳鳴牙疼口乾舌燥 皆腎家虛火上炎

也治眼疼歸芍六味湯加柴胡菊花治之又加夏枯草

益母草 頭疼六味湯加川芎白芷治之 耳疼耳鳴

牙疼六味湯加元參桔梗治之 口乾舌燥六味湯加

花粉浙冬五味或少加知柏甘葛亦可

咳嗽多痰 乃水涸而金燥也 用補中湯加浙冬五味

貝母桑皮治之或十味補中湯送六味丸尤妥

乍寒乍熱 陰虛勞熱也 用蠶甲六味湯加骨皮治之

貝母桑皮治之或十味補中湯送六味丸尤妥

乍寒乍熱 陰虛勞熱也 用礬甲六味湯加骨皮治之

虛汗 津液枯竭陰虛火動也 用歸芍六味湯王之或

四君湯加黃芪杭芍麻黃根元眼浮麥凡漢不止者此方極妙

遺精 水虧不能制火故虛火妄動也 用歸脾湯去木

香加桑蛸柏仁蓮鬚治之

自汗盜汗 陰大虛也

白帶 腎水不能養脾也 用八珍湯加黃芪紅花海蛸

治之

血崩血帶 腎水不能養肝木肝血虛而下帶也 治血

崩用黃芪補血湯加阿膠炒荆芥紅花鹿角霜治之或
以鹿角霜開水調服或用芭蕉根煮猪蹄服或歸脾湯
加劑治之如數而有力少壯者即用麻黃桂枝湯發汗
即愈 如血帶用歸脾逍遙二湯主之

不孕 腎水不能養肝水肝血枯而不能受孕也 用八
珍湯加黃芪阿膠紅花砂仁益母草治之或黃芪補血
湯加阿膠亦可

肌肉消瘦 腎水不能養肝木肝血枯而不能養肌肉也
用十全大補湯加減

淋症 腎伏邪火水虧不能制之故邪火妄動也 先用

用十全大補湯加減

淋症 腎伏邪火水虧 不能制之故邪火妄動也 先用

草薢分清飲或八正散或用浙冬淮夕泡開水服或用

五葉草水酒煎服或芭蕉根搗汁點酒服後用腎氣湯

治之

右寸肺脉數主病

主鼻疼鼻血喉疼喉乾 胸前骨疼火咳虛咳氣喘乳窩喘

數緊 主鼻疼鼻血氣喘 喉疼喉乾胸前骨疼乳窩

數緩而無力 主虛咳

數緊而有力 主火咳

數緩 主哮喘

右寸肺脈數病源治法

鼻疼 肺氣不能上升肝火上炎也 用知柏六味湯倍

加澤瀉治之

鼻血 鼻通肺竅空而妄行也 用生四物湯加紅花貝

母側柏葉治之

喉乾喉疼 腎水不能養金虛火上炎也 用六味湯加

元參桔梗治之又有感寒暑而疼者人參敗毒散去沙

參加元參牛膝治之若服而不愈加升麻川黃只壳發散之

咽喉骨疼 肺氣閉塞故作疼 用越菊湯或麻黃桔枝

參加元參牛膝治之若服而不愈加升麻川黃只壳發散之

心前骨疼 肺氣閉塞故作疼 用越菊湯或麻黃桔枝湯發散之

火咳 胃火盛而尅金也 用只桔二陳湯加貝母桑皮

治之

皮咳 水涸而金燥也 用八仙長壽湯六味湯保元湯

各加貝母桑皮治之

氣喘哮喘 肺家有痰有火也 用生脈散保元湯定喘

湯治之或酸礬研末飯糊為丸治之或金匱腎氣湯腎

氣丸亦可

乳窩 腎水虧而虛火炎也 用六味湯加元參桔梗治

之或用指甲焙研末吹之或用附子片噙之此症頭頂

上必有紅泡須摘泡上頭髮以血出即愈如無泡用針

刺出血又方用人參敗毒散去沙參用元參加牛蒡之

右關胃脈數主病

主背疼胃脘疼反胃吞酸即食即餓咳嗽瘧疾痰症顛症

痢疾肚瀉肚疼遺精呃逆

數緩 主背疼肚疼即食即吐寒症胃脘疼呃逆

數宏 主吞酸咳嗽即食即餓瘧症火症胃脘疼反胃

數滑 主痰症顛症痢疾肚瀉遺精痰症胃脘疼

數宏 主吞酸咳嗽即食即餓瘧症火症胃脘疼反胃

數滑 主痰症顛症痢疾肚瀉遺精痰症胃脘疼

右關胃脈數病源治法

背疼 痰與食結也 用歸芍六君湯加丁香沉香治之

胃脘疼 說見前 治法同浮脈

反胃即吐者吞酸 皆胃火盛也 用腎氣湯加沉香

附治之

吞酸 用香砂六君湯加烏梅杭芍治之

咳嗽 即食即餓 胃太盛也 如氣實者用青龍石羔

湯氣虛者歸芍六君湯加炒梔治之

咳嗽 只桔工陳湯致青龍石羔湯亦可

顛症痰症 胃家有痰也 宜先吐之後以四君湯加桂

附紅花半夏兔絲治之或以石羔知母各一兩用鉄燒

水煎服

瘧疾 說見前未分者柴平湯已分者補中湯加劑如氣

虛不能分出者太稠湯提之

痢疾 說在前 若 數滑而有力為有食用平胃散加只

壳大黃木香治之 數滑而無力為寒痢四君湯加山

藥澤瀉故仁黑姜木香杭芍共焙研末白糖調服又以

廣子栗壳烏梅木香共煎服重者桂附養臟湯治之

藥澤瀉故仁黑姜木香杭芍共焙研末白糖調服又以

廣子栗壳烏梅木香共煎服重者桂附養臟湯治之

滑精 說見前 用之砂六君湯加故仁倍加半夏治之

或歸脾湯去木香加鎖陽金櫻蓮鬚治之

肚疼 脾不能運運於胃而作疼也 用理中

湯加廣子治之

肚瀉 說見前 吳茱萸中湯如久瀉服之更妙

呃逆 四石湯黃芩二陳湯或補中湯加杭芍二方引俱

用補中湯

漢南草本
卷四

















