

吳衛爾著

中華新藥物學大辭典


辛
以業預
印

中華新藥物學大辭典序

吾國藥物之源，由來久矣。始於神農，昌於漢唐，迄今垂數千年，皆宗而崇之；顧僅知就天然之產物，參雜宗教之學說，稍加煎浸配製，即行服用。法雖簡便，借用量不準，學理不確，以致功效不能全顯。後代固不乏關於藥理之著作，然皆本乎五行生剋，陰陽氣化之說，反覆辨論，儘爲玄奧之理，雖其書多至萬卷，不過空想揣測之辭，舞文弄墨之舉耳。邇來歐美日本諸國，其藥品之所以進步者，皆賴於對天然之原料，施以科學之技術，分析其成分，拋去其渣滓，故量確質純，效力宏大。吾國墨守舊法，不知研究改良，闡明原理，利用原有產物，不惟利權外溢，長此以往，則吾國藥物，行將受天演之公例，若然，而醫療藥品應用器械及衛生材料，勢須一一仰給於外人，設一旦運轉不便，輸入困難，中藥不能用於新醫處方，而西藥又無處購得，其害影響於國家社會者，概可想見。余感於此，十年前，即認爲中華新藥物學大辭典之編輯，實不可稍緩。故於民國十年即開始工作，採擇吾國神農本草經以後數十種之本草學說，更搜集歐美日本書報所載之新藥植物，加以個人平日在各處之調查，凡各藥物之產地生活狀態，培植及移植方法，採製時期及其程序，皆逐項列明；此外並以顯微鏡檢查其內部構造，分析其主要成分之含量，測算用量，試驗其功效。攝影繪圖，鑑製標本。考察學名，審定科屬。日

夕工作，不遺餘力，至今十有三載，始得粗具眉目，與世相見。謬誤之處，實所難免，尙望海內外學者，不吝賜教，則幸甚焉。

中華民國二十三年，七月，二十日。



——吳衛爾序於天津市——

凡例

一：本辭典編輯之目的，約分下列數項：

1 欲使舊醫學者，有藥物實際之研究，得治療確驗之效果。以洗滌陳腐之觀念，改換舊日之想像；致為產除五行生剋之謬說，陰陽消長之茫論；

2 採取吾國有科學研究之藥物，及其民間用藥。編入辭典內，以便學者之瀏覽；

3 搜集歐美日本諸國藥用植物，礦物等學，以供學者之參証；

4 提示吾國之民間藥（即秘傳藥），使學者能得特別效驗藥物之智識；

5 詳述各種藥物之成分，及其最新製劑方法，以為新醫學者研究中藥之門徑，而代用西藥之指南。

二：本辭典詳載各種藥用植物，動物，礦物，及其人工製造物，共一千四百餘種，大有超過吾國本草綱目藥物之勢。

三：本辭典各種藥物，不分門類，均照藥物學名之頭一字筆畫排印，俾閱者易於尋檢。（其目錄亦然，並註明頁數，一望即知。）

四：本辭典各種藥物之學名，係普通者及最新考查審定者。並附以拉丁文學名，及其異名與俗名。

五：本辭典各種藥物之基本，所載藥物，皆審定其科屬，並調查其產地生活狀況，栽培方法，及繁殖方法。採製時期，及其供藥部分，皆有正確之學理。

六：本辭典各種藥物之成分，以化學方法，研究生藥，檢明其生藥所含之成分，皆詳細記述，以備學者之參考。

七：本辭典各種藥物之功效，以生藥研究，檢定其成分，再行動物試驗，而後舉述其所得效果，並說明其在生理上有何作用，及其副作用。

八：本辭典各種藥物之用量，所有藥物均行規定一用量，一日量，中毒量，致死量；例如阿片用少量則興奮，多量則麻痺，更多量則致死。此種用量，吾國本草尙未言及，而本辭典皆詳明之。

九：本辭典各種藥物之製劑，係採取草根樹皮，枝梢莖葉，花果子實，選擇供藥部分，提其精華，廢棄渣滓，使其粉碎，陰乾，曬乾，酒製，浸製，油製，煎製，及其各種方法。

十：本辭典所用之度量衡，均照民國四年通令，採用法國克蘭姆量之新制。（另編度量衡詳細對照表，及其說明。）

十一：本辭典爲余個人十三年餘之心血結晶，然爲吾國一種藥物辭典創始之作，譚陋恐多，遺誤難免，幸閱者諒之。

中華新藥物學大辭典目錄

名稱	頁數
▲第二畫	三七
三白草	六
山豆根	一三
山茱萸	一三
山薑	一三
山慈姑	一四
山檉子	一四
山櫻桃	一四
千歲草	一五
千金藤	一五
人面子	二八
人中白	二八
人中黃	二八
八中白	二八
八參	二七
人胞	二七
丁香	二七
▲第三畫	二六
土茯苓	二六
土荊芥	二六
土骨皮	二七
土馬騮	二七
土常山	二七
土殷孽	二八
土當歸	二八
土撥鼠	二八
女青	二九
女貞	二九
女萎	三〇
女苑	三〇
▲第四畫	三〇
不灰木	三〇
不凋木	三一
丹砂	三一
丹參	三一
▲第五畫	三一
大麥	一九
大黃	一八
大蓰	一八
大青	一七
大空	一七
小葉麥門冬	一六
小薺	一六
小蘗	一六
小麥	一五
小青	一五
大黃蜂	二二
大楓子	二二
大腹子	二三
大荳黃卷	二三
大葉麥門冬	二三
土參	二四
土黃	二四
土菌	二五
土蜂	二五
土木香	二五

五加皮	三二	太乙除穢	四〇	水楊梅	五四	木藜蘆	六一
五辛菜	三二	天牛	四〇	水銀粉	五四	木蠶蟲	六一
五味子	三二	天雄	四一	水松	四八	木鱉子	六一
五倍子	三三	天仙藤	四一	水英	四八	牛	六二
五釵子	三四	天名精	四二	水蛇	四八	牛扁	六二
五靈脂	三四	天花草	四二	水蛭	四八	牛黃	六二
五色石脂	三五	天門冬	四二	水萍	四九	牛膝	六三
五倍子內蟲	三五	天南星	四三	水楊	四九	王瓜	六四
井中苔	三六	天靈蓋	四四	水精	五〇	王孫	六五
井泉石	三六	毛萆	四四	水蓼	五〇	王不留行	六五
井口邊草	三六	毛蓼	四四	水銀	五〇	▲第五畫	
元寶草	三六	爪甲	四四	水蕨	五一	仙茅	六六
升麻	三七	方解石	四五	水類	五一	仙茅	六六
及己	三八	比目魚	四五	水藻	五二	仙人杖	六六
巴豆	三八	月桂	四五	水蘇	五二	仙人草	六六
巴旦杏	三八	月季花	四六	水龜	五二	仙人掌	六七
巴戟天	三九	文蛤	四六	水薑	五三	仙半夏	六七
孔雀	三九	文鱈魚	四六	水竹葉	五三	代赭石	六八
孔公孽	四〇	火炭母草	四七	水苦苣	五三	加密列	六八

中華新藥物學大辭典

玄胡索	七五	石斛	八二	石胡荽	八八	白前	九三	白石英	一〇〇
玄參	七五	石菖	八二	石刺木	八七	白苣	九三	白玉髓	一〇〇
玄石	七四	石韋	八一	石花菜	八七	白青	九三	白丁香	九九
必粟香	七四	石荆	八一	石長生	八七	白芨	九三	白鵬	九九
巧婦烏	七四	石炭	八一	石決明	八六	白芷	九二	白蘇	九九
奴柘	七四	石南	八〇	石髓	八六	白朮	九二	白蠟	九九
可可樹	七三	石松	八〇	石蠶	八六	白朮	九一	白薇	九八
古魯理鴉	七三	石芝	七九	石髓	八六	石鐘乳	九一	白鮮	九八
古倫僕	七二	石帆	七九	石鹼	八五	石龍芻	九〇	白膠	九七
古文錢	七二	石耳	七九	石鹽	八五	石龍芮	九〇	白蔞	九七
古加	七二	石灰	七九	石膽	八五	石鱈魚	九〇	白蜜	九七
冬葵	七一	石瓜	七八	石蕊	八五	石腦油	九〇	白楊	九六
冬青	七一	玉蘭花	七八	石燕	八四	石硫黃	八九	白棘	九六
冬瓜	七〇	玉蜀黍	七八	石野	八四	石硫青	八九	白葛	九六
占斯	七〇	玉簪	七七	石葶	八四	石硫赤	八九	白堊	九五
半邊蓮	七〇	玉柏	七七	石蒜	八三	石菖蒲	八九	白魚	九五
半夏	六九	玉	七七	石芥	八三	石斑魚	八八	白苳	九五
加斯加刺	六九	玄精石	七六	石蜜	八二	石首魚	八八	白茅	九四
加耶布的	六八	玄胡索	七六	石樹	八二	石香薷	八八	白英	九四

田父	生瓜菜	生薑	白蘊薑	白藥子	白檀香	白龍鬚	白頭翁	白芷冠	白茅香	白胡椒	白兔菴	白附子	白屈菜	白花蛇	白花藤	白花菜	白辛石	白冬瓜	
一〇六	一〇六	一〇六	一〇五	一〇五	一〇四	一〇四	一〇四	一〇三	一〇三	一〇三	一〇二	一〇二	一〇二	一〇一	一〇一	一〇一	一〇一	一〇〇	
伏龍肝	伏牛草	伏翼	▲第六畫		甘菊花	甘扁桃	甘松香	甘露	甘藤	甘藍	甘蔗	甘藷	甘蔗	甘遂	甘草	甘松	甲煎	山跋	田螺
一一四	一一三	一一三			一一二	一一二	一一一	一一一	一一一	一一〇	一一〇	一〇九	一〇九	一〇八	一〇八	一〇七	一〇七	一〇七	一〇七
地膽	地龍	地膚	地榆	地椒	地筋	地黃	地骨	地耳	安息香	安石榴	守宮	吐根	吉祥草	吉祥草	合歡	列當	光明鹽	伏鷄子根	
一一一	一一一	一一〇	一一〇	一一〇	一一九	一一八	一一八	一一八	一一七	一一七	一一六	一一六	一一五	一一五	一一四	一一四	一一四	一一四	
肉苳蔻	肉桂	百露拔爾撒謨		百稜藤	百脈根	百草霜	百兩金	百部	百舌	百合	朴硝	灰菴	戎鹽	有加利	曲節草	地錦草	地楊梅	地蜈蚣	地衣草
一一七	一一六	一一六	一一六	一一六	一一六	一一五	一一五	一一五	一一四	一一四	一一四	一一三	一一三	一一三	一一二	一一二	一一二	一一一	一一一
艾納香	艾	竹蠶蟲	竹轔	竹瀝	竹蠶	竹蓐	竹蜂	竹筍	竹魚	竹黃	竹茹	羊躑躅	羊蹄	羊桃	羊	自然銅	血竭	肉蓯蓉	
一一三	一一三	一一三	一一三	一一二	一一二	一一二	一一二	一一一	一一一	一一一	一一〇	一一〇	一一〇	一一九	一一九	一一九	一一八	一一八	

中華新藥物學大辭典

沈香	決明	忍冬	扶芳藤	扶桑	扶移	坐墊草	吳茱萸	含水藤	君遷子	君影草	別刺敦燕	佛甲草	何首烏	伯勞	西洋參	西瓜	衣魚
一四〇	一三九	一三九	一三九	一三八	一三八	一三八	一三七	一三七	一三六	一三六	一三六	一三五	一三五	一三四	一三四	一三四	一三四
皂莢葶	皂莢	牡蠣	牡蒿	牡荊	牡丹	杉	杜父魚	杜蘭	杜衡	杜若	杜松	杜仲	杏	李	沙棠果	沙糖	沒藥
一四九	一四九	一四八	一四七	一四七	一四六	一四五	一四五	一四五	一四四	一四四	一四四	一四三	一四三	一四二	一四二	一四一	一四〇
赤石脂	赤小豆	赤箭	赤銅	邪蒿	辛夷	車盤	車渠	車前	見腫消	角蒿	貝母	貝子	芎藭	芒硝	芒	芍藥	芋
一五六	一五六	一五五	一五五	一五五	一五四	一五四	一五四	一五三	一五三	一五三	一五二	一五一	一五一	一五一	一五〇	一四九	一四九
兒茶	兔	兩頭蛇	使君子	亞拉毗亞護謨	亞克沙阿仙藥	亞爾答亞	亞兒尼加	亞麻	乳蠱	乳香	乳汁	防葵	防風	防己	赤車使者	赤翅蜂	赤地利
一六四	一六三	一六三	一六二	一六二	一六一	一六一	一六〇	一六〇	一六〇	一五九	一五九	一五九	一五八	一五七	一五七	一五七	一五七
林檎	松蘿	松楊	松茸	松	東風菜	東洋參	東臍	波羅蜜	河豚魚	河砂	放杖木	昆布	於朮	忽布	委陵菜	宜母果	卷柏
一七一	一七〇	一七〇	一七〇	一六九	一六八	一六八	一六八	一六七	一六七	一六七	一六七	一六六	一六六	一六五	一六五	一六四	一六四

▲第七畫

▲第八畫

枇杷	一七一	芭蕉	一七九	金雀花	一八六	青黛	一九三	昭麥	二〇〇
狗	一七二	芫花	一七九	金絲草	一八六	青黴	一九四	枳	二〇一
狗脊	一七二	芫青	一八〇	金盞草	一八六	青琅玕	一九四	枳椇	二〇一
狗寶	一七三	茵草	一八〇	金銀木	一八六	青箱子	一九四	枸杞	二〇二
狗舌草	一七三	芫寶	一八一	金蓮花	一八七	青葙蠶蟲	一九五	枸骨	二〇二
狗尾草	一七三	花乳石	一八一	金雞勒	一八七	青鹽陳皮	一九五	枸橘	二〇三
狐	一七三	芸香	一八一	金櫻子	一八八	▲第九畫	枸櫞	二〇三	
空青	一七四	茨	一八一	金瘡小草	一八八	刺賢堉爾	枸杞蟲	二〇四	
玫瑰	一七四	迎春花	一八二	長石	一八八	前胡	柏	二〇四	
知母	一七四	返魂香	一八二	長松	一八九	厚朴	柑	二〇五	
稗米	一七五	金松	一八三	阿膠	一八九	南瓜	柘木	二〇五	
肥皂莢	一七五	金屑	一八三	阿魏	一九〇	南燭	柚	二〇五	
虎	一七六	金魚	一八三	阿列布	一九〇	南藤	柯樹	二〇六	
虎杖	一七六	金蛇	一八三	阿月渾子	一九一	威靈仙	柰	二〇六	
虎耳草	一七六	金橘	一八四	附子	一九一	垣衣	柳	二〇七	
虎掌天南星	一七七	金牙石	一八四	青玉	一九二	括矢亞	柳寄生	二〇七	
羌活	一七七	金星石	一八四	青皮	一九二	扁青	柳蠹蟲	二〇七	
芝	一七八	金星草	一八五	青魚	一九二	毗藜勒	柴胡	二〇七	
芥菜	一七八	金剛石	一八五	青蒿	一九三	昨葉何草	柿	二〇八	

胡黃連	胡桐淚	胡葱	胡椒	胡荽	胡麻	胡桃	胡瓜	禹餘糧	省藤	相思子	秋海棠	砒	珊瑚	玻璃	珍珠菜	珂	突厥雀	柞木	
二二五	二二五	二二五	二二四	二二四	二二三	二二二	二二二	二二二	二二二	二二一	二二一	二二一	二二〇	二二〇	二二〇	二〇九	二〇九	二〇九	
韭菜	郁李	紅藍花	茉莉	茅香	茄	苧麻	苦楝	苦瓠	苦菜	苦草	苦參	苦艾	苦竹	苦瓜	苜蓿	胡蘿蔔	胡蘆巴	胡頹子	
二二三	二二三	二二二	二二二	二二一	二二一	二二一	二二〇	二二〇	二二〇	二一九	二一九	二二八	二二八	二二八	二二七	二二七	二二六	二二六	
烏韭	烏芋	烏木	殷孽	旃那	拳參	徐長卿	夏枯草	射干	原蠶	▲第十畫		飛廉	食茱萸	食鹽	香薷	香薷	香蒲	香附	降真香
二三〇	二二九	二二九	二二九	二二八	二二八	二二七	二二七	二二七	二二七	二二六	二二六	二二六	二二五	二二五	二二五	二二五	二二四	二二四	二二四
海帶	海桐	海馬	海紅	海根	海松	海芋	海月	浮石	烏華烏爾矢	烏欬莓	烏賊魚	烏金紙	烏白木	烏藥	烏鴉	烏頭	烏蛇	烏梅	
二三七	二三七	二二六	二二六	二二五	二二五	二二五	二二五	二二五	二二四	二二四	二二三	二二三	二二二	二二二	二二一	二二一	二二〇	二二〇	
格注草	栝樓	栗	消石	海鰩魚	海螵蛸	海豚魚	海金砂	海江荳	海蠶	海蠶	海鯢	海藻	海蘊	海獺	海燕	海葱	海蛤	海參	
二四四	二四三	二四三	二四三	二四二	二四二	二四二	二四一	二四一	二四〇	二四〇	二四〇	二四〇	二三九	二三九	二三八	二三八	二三八	二三八	

狼牙	狼	桔梗	桑蠶蟲	桑螵蛸	桑寄生	菜屬	菜苴	桑花	桑	桐	枕櫛子	桃蠶蟲	桃寄生	桃金娘	桃花石	桃	桂蠶蟲	桂
二五一	二五〇	二五〇	二四九	二四九	二四九	二四九	二四八	二四八	二四七	二四七	二四六	二四六	二四六	二四六	二四五	二四五	二四四	二四四
茗	蚤休	蛻	蚌	蚊母鳥	益智	眞珠	秫米	秦藜藜	秦龜	秦椒	秦朮	秦皮	秧雞	神麴	矽石	狼尾草	狼把草	狼毒
二五八	二五七	二五七	二五七	二五七	二五六	二五五	二五五	二五五	二五四	二五三	二五三	二五二	二五二	二五二	二五一	二五一	二五一	二五一
在	草蘭茄	草蜘蛛	草烏頭	草草薺	草石蠶	草蒿	草犀	草綿	草跋	荆瀝	荆三稜	荆芥	茶蛙蟲	茺蔚	茵陳蒿	茵芋	茯苓	蒺藜
二六七	二六六	二六六	二六六	二六五	二六五	二六四	二六四	二六四	二六三	二六三	二六二	二六二	二六一	二六〇	二六〇	二五九	二五八	二五八
馬刀	馬	鬼督郵	鬼針草	鬼齒	鬼臼	骨碎波樹	骨碎補	陟釐	釜臍墨	豇豆	鄧君子	迷迭香	豺	豹	粉霜	粉錫	荷蒿	茜草
二七四	二七三	二七三	二七三	二七二	二七二	二七一	二七一	二七〇	二七〇	二七〇	二七〇	二六九	二六九	二六九	二六八	二六八	二六八	二六七
健質亞那	側柏	側子	▲第十一畫	高麗參	高良薑	馬檳榔	馬鞭草	馬錢子	馬齒莧	馬鈴薯	馬兜鈴	馬先蒿	馬牙硝	馬蘭	馬騮	馬羆	馬陸	馬勃
二八一	二八一	二八〇		二八〇	二七九	二七九	二七八	二七八	二七七	二七七	二七六	二七六	二七五	二七五	二七五	二七五	二七四	二七四

中華新藥物學大辭典

兜納香	二八二	曼陀羅花	二九〇	甜瓜	二九八	蔞麻	三〇六	紫花地丁	三二三
剪草	二八二	欸冬花	二九〇	眼子菜	二九八	蒼朮	三〇六	紫背金盤	三三四
剪春羅	二八二	敗蘗	二九一	蚌蟻	二九九	船底苔	三〇七	細辛	三三四
勒魚	二八三	敗葶	二九一	蚌蟬	二九九	紫貝	三〇七	貫衆	三三五
隊木鳥	二八三	淡竹	二九一	蛇床	二九九	紫荊	三〇七	透骨草	三三五
商陸	二八三	淡菜	二九二	蛇合	三〇〇	紫草	三〇八	通草	三三五
密兒拉	二八四	淫羊霍	二九二	蛇蛻	三〇〇	紫葦	三〇八	通脫木	三三六
密陀僧	二八五	清風藤	二九三	蛇毒	三〇一	紫參	三〇八	連翹	三三七
密蒙花	二八五	梅	二九三	蛇黃	三〇一	紫菜	三〇九	連錢草	三三七
崖椒	二八六	梓	二九四	蛇婆	三〇一	紫薺	三〇九	野馬	三三七
崖椴	二八六	梔子	二九四	蛇爾草	三〇一	紫葳	三一〇	野菊	三三八
常山	二八六	梧桐	二九五	蚯蚓	三〇二	紫藤	三一〇	野豬	三三八
常春藤	二八七	椴木	二九五	轉蛇	三〇二	紫蘇	三一〇	野薔薇	三三八
婆娑石	二八七	牽牛子	二九六	羚羊角	三〇二	紫蘇	三一〇	釣樟	三三九
婆羅得	二八八	章魚	二九六	莎草香附子	三〇三	紫鑛	三一〇	釵子股	三三九
排草香	二八八	理石	二九七	莢蓬	三〇三	紫石英	三一〇	雪蠶	三三九
接骨木	二八八	硃砂根	二九七	莢	三〇四	紫金牛	三一〇	陰地蕨	三三九
旋花	二八九	琉璃	二九七	莢碧	三〇四	紫金藤	三一〇	陸英	三三〇
旋覆花	二八九	琉璃草	二九七	莢蓬	三〇五	紫茉莉	三一三	雀	三三一

雀麥	三二一	乾苔	三一九	樑子	三三七	菰	三四五	越瓜	三五五
雀薹	三二一	乾漆	三三〇	犀角	三三八	菰米	三四六	越砥	三五五
魚狗	三二一	乾糞	三三〇	猬	三三八	菲沃斯	三四六	越王餘算	三五五
鹿	三三二	惡質	三三一	琥珀	三三九	菴圃	三四七	訶梨勒	三五六
鹿角	三三三	景天	三三一	番紅花	三三九	菴摩勒	三四七	酢漿草	三五六
鹿茸	三三三	骨青	三三一	皇虛	三四〇	菴解	三四八	郁念子	三五七
鹿梨	三三四	斑鳩	三三一	蛟龍	三四〇	蕨服	三四八	郁成子	三五七
鹿藥	三三四	斑蝥	三三一	蛤蚧	三四〇	洋蓬草	三四九	郁梛子	三五七
鹿茸	三三四	斑蝥	三三一	蛤蚧	三四〇	菴菜	三四九	郁管草	三五七
鹿角菜	三三五	無花果	三三四	蛞蝓	三四一	菴蕪	三五〇	雲母	三五八
鹿角膠	三三五	無食子	三三四	荇草	三四一	菴菜	三五〇	雲質	三五八
鹿蹄草	三三六	無患子	三三五	荇草	三四一	菴菜	三五〇	陽鳥	三五八
麥角	三三六	無漏子	三三五	菊花參	三四二	菴菜	三五〇	陽起石	三五八
麥芽	三三七	洩硫	三三六	荇草	三四二	菴菜	三五〇	雁	三五九
麥門冬	三三八	藜	三三六	菴葵	三四三	補骨脂	三五二	雁來紅	三五九
麥飯石	三三八	藜	三三六	菴葵	三四三	補骨脂	三五二	雁來紅	三五九
鹼鹹	三三九	藜貓	三三七	菴絲子	三四四	絲瓜	三五三	雄黃	三五九
麻黃	三三九	藜貓	三三七	菴蕪	三四四	絲瓜	三五三	黃芩	三六〇
		藜貓	三三七	菴石	三四五	解毒子	三五四	黃連	三六〇
		藜貓	三三七	象	三四五	解毒子	三五四	黃鼠	三六一

中華新藥物學大辭典

黃精	三六一	▲第十三畫	獅	三七五	落葵	三八三	蔗糖香	三九二
黃耆	三六一	亂髮	瑞珩	三七六	落花生	三八四	辟瘟雷	三九二
黃環	三六二	廉薺	瑞香	三七六	落雁木	三八四	鉛	三九二
黃藤	三六三	槌胡根	硼砂	三七六	萬荳	三八四	鉛丹	三九三
黃礬	三六三	煙草	稗	三七七	葡萄	三八五	鉛糖	三九三
黃櫨	三六三	滑石	當歸	三七七	葛	三八五	鉛霜	三九四
黃蘗	三六三	檉柳	當藥	三七七	葛花榮	三八六	鉤吻	三九四
黃大茸	三六四	楊梅	睡菜	三七八	葛上亭長	三八六	鉤栗	三九四
黃瓜菜	三六四	楊糧	睡蓮	三七八	葫蘆	三八七	鉤藤	三九五
黃花蒿	三六五	棟	蜀葵	三七九	葱	三八七	零餘子	三九五
黃明膠	三六五	楡	蜀椒	三七九	萱草	三八八	零餘子	三九六
黃楊木	三六六	楮	蜀黍	三八〇	葛藤	三八八	雷丸	三九六
黃蜀葵	三六六	楸	蜀漆	三八〇	葎草	三八九	雷墨	三九六
黃領蛇	三六六	椰子	蜀羊泉	三八一	葎藤	三八九	雄	三九六
黃藥子	三六七	楸	蜂蜜	三八一	葎草	三九〇	雌黃	三九七
黃類魚	三六七	楓	靛	三八二	葎耳	三九〇	預知子	三九七
黃鱈魚	三六七	楓柳	蝟蟻	三八二	梁	三九一	鹿	三九七
黍	三六七	楸木	蜈蚣	三八二	櫻	三九一	鹿	三九八
		楠	萬年青	三八三	貉	三九二	鹿目	三九八

槐茸	槐	槐藤子	榴梿	榛	漏蘆子	漏蘆	漆樹	熊	慈姑	慈烏	慈石	寶菱谷里斯	嘉魚	▲第十四畫		鼠尾草	鼠婦	鼠李	鼠
四〇七	四〇六	四〇六	四〇五	四〇五	四〇五	四〇四	四〇四	四〇三	四〇三	四〇二	四〇二	四〇一	四〇〇	四〇〇	四〇〇	四〇〇	三九九	三九九	三九八
蒜	蒜薹	蓖麻	蜘蛛香	蜘蛛	蜥蜴	蜻蛉	蟻蟻	蜜栗子	蜜蟻	蜜蜂	蜜香	蜚蠊	蜚蠊	醫腦獸	腐婢	瑪瑙	椴樹	椴樹	樺
四一四	四一三	四一二	四一二	四一二	四一二	四一一	四一一	四一一	四一〇	四一〇	四〇九	四〇九	四〇九	四〇八	四〇八	四〇八	四〇七	四〇七	四〇七
豬鬃	縷木	綠攀	綠鹽	綠青	綠豆	莎木薊	薊草	薊草	蕓蓼	薊雀	蒼耳蠶蟲	蒼耳	蒼朮	蒟蒻	蒲公英	蒲黃	蕪菁	蕪菁	蕪菁
四二〇	四二〇	四二〇	四一九	四一九	四一八	四一八	四一八	四一七	四一七	四一七	四一六	四一六	四一五	四一五	四一五	四一四	四一四	四一四	四一四
槲	摩厨子	劉寄奴草	▲第十五畫		鹿尾	鳳仙花	鳩鳩	怡糖	韶子	銅綠	銀珠	銀杏	銀	酸漿	酸模	酸漿	遠志	狸	豪豬
四二七	四二七	四二六	四二六	四二六	四二六	四二五	四二五	四二五	四二五	四二四	四二四	四二四	四二三	四二三	四二三	四二二	四二二	四二一	四二一
蓬莖茂	蓬莖子	蓬莖	箭	蝦蟇	蝮蛇	蝮蠶	蝮牛	蝮蝟	蝮蝟	蝮蝟	蝮蝟	蝮蝟	蝮蝟	蝮蝟	蝮蝟	蝮蝟	蝮蝟	蝮蝟	蝮蝟
四三五	四三四	四三四	四三四	四三三	四三三	四三二	四三二	四三二	四三一	四三一	四三一	四三〇	四三〇	四三〇	四三〇	四二九	四二九	四二八	四二八

中華新藥物學大辭典

鴉	鴉魚	鴉鳥	鴉豆	鴉林子	鴉	醉魚草	質汗	賣子木	練鶴	線香	蕪草	蔞菜	蔞椒	蔞荊	華澄茄	華撥	蔞菜	蓮
四四二	四四二	四四二	四四一	四四一	四四〇	四四〇	四四〇	四三九	四三九	四三九	四三九	四三八	四三八	四三八	四三七	四三七	四三六	四三五
獨脚蜂	獨活	橙	橄欖	橡	橘	樟木	澤蘭	澤瀉	澤漆	燕窩	燕脂	燕	燈心草	壁錢	凝水石	▲第十六畫	藜蘆	鴉
四五一	四五〇	四四九	四四九	四四八	四四七	四四七	四四六	四四五	四四五	四四五	四四五	四四四	四四四	四四三	四四三	四四三	四四三	四四三
菝葜香	菝花	菝葇	菝麻	菝	菝麥	菝	蕪菁	蕪莢	蕪核	篤稽香	篤留樹	燈火蟲	稔	積雪草	礞砂	墜珀	獨用將軍	獨脚蓮
四五七	四五七	四五六	四五六	四五六	四五五	四五五	四五四	四五四	四五四	四五三	四五三	四五三	四五二	四五二	四五二	四五二	四五二	四五二
鴨拓草	鴨鴉	鴨	鴨	鮮荅	鮑魚	駱駝	錫椽脂	錫	錫地羅	鋼鐵	醃醃菜	赫魁	貓	貓	豬腰子	豬芥	豬	衛矛
四六三	四六三	四六三	四六三	四六二	四六二	四六二	四六二	四六一	四六一	四六一	四六一	四六〇	四六〇	四六〇	四六〇	四五九	四五八	四五七
螺歷草	螻蛄	檉柳	檉桓	檉	營實檉藤	龜	龍鬚菜	龍腦香	龍常草	龍舌草	龍膽	龍葵	龍眼	龍珠	龍骨	龍筋	鴉	鴉
四七〇	四七〇	四七〇	四六九	四六九	四六八	四六八	四六八	四六七	四六七	四六七	四六六	四六五	四六五	四六四	四六四	四六四	四六四	四六四

▲第十七畫

鮎魚	鱈魚	鮫魚	鱘鼠	縮砂蜜	繁縷	蘿菜	薏苡	蕪荳	蕪荳	薇荷	薇	蕪荳	蕪荳	薄荷	廣蟲	蟋蟀	螳螂	螞蟥
四七八	四七八	四七七	四七七	四七六	四七六	四七五	四七五	四七四	四七四	四七三	四七三	四七三	四七三	四七二	四七一	四七一	四七一	四七一
蟹本	藍澱	藍汁	藍	薯蕷	翻白草	翹搖	蟲白蠟	蟬蛻	蟬花	瞿麥	瘡疥木	檳榔	符牒	▲第十八畫	竜	麋	鴿鷓	鴿
四八五	四八四	四八四	四八四	四八三	四八三	四八二	四八二	四八二	四八二	四八一	四八一	四八〇	四八〇		四七九	四七九	四七八	四七八
鮎魚	鮫魚	鯉	鯊魚	驢驘蹄	雞腸草	雞冠花	雞血藤	雞瘕	雞	菘菌	鎖陽	獐	覆盆子	菹荳	菹荳	菹菜	菹菜	蓋草
四九四	四九四	四九四	四九三	四九三	四九二	四九二	四九二	四九一	四八九	四八九	四八八	四八八	四八七	四八七	四八六	四八六	四八五	四八五
藜	蟾蜍	蟾酥	蟹	蛭	蠍	蟻	欄木	礬石	礬石	琴倒甌	▲第十九畫	鼯鼠	鼯鼠	鴉鴉	鶻	鶻	鶻抱	鶻
五〇〇	五〇〇	四九九	四九九	四九九	四九八	四九八	四九七	四九七	四九七	四九七		四九六	四九六	四九六	四九五	四九五	四九五	四九五
寶石	▲第二十畫	麴菌	麗春花	鶉	鶉	鶉	鯨魚	鯨魚	鯨魚	鯨魚	鯨魚	離留草	鬚菜	羅漢松	羅望子	羅勒	藤黃	麥蘆
五〇六		五〇六	五〇五	五〇五	五〇五	五〇五	五〇四	五〇四	五〇三	五〇三	五〇三	五〇二	五〇二	五〇二	五〇一	五〇一	五〇一	五〇〇

中華新藥物學大辭典

藤菴	蕪	蘇合香	蘇方木	蘇鐵	蘆葦	蘆薈	蘆	葶香	蟾蜍	藜麥	稗豆	礬石	獼猴桃	獼猴	樹	檀香	爐甘石	懸鉤子
五二四	五二三	五二三	五二三	五二二	五二二	五一一	五一一	五一〇	五一〇	五一〇	五一〇	五〇九	五〇八	五〇八	五〇八	五〇七	五〇七	五〇七
蠟梅	蠶質	穉	樟	櫻桃	攝度瓦	▲第廿一畫	鴉	鸚鵡	鴛	鱈魚	鰕	鱈魚	鯽魚	鯽魚	露蚌	櫻子桐	墨聚	藤蒿
五二〇	五一九	五一九	五一九	五一八	五一八		五一八	五一七	五一七	五一七	五一七	五一六	五一六	五一六	五一五	五一五	五一四	五一四
蠟膠	鰻鱺魚	鰻魚	▲第廿二畫	麝	鸚鵡	鶴	鶴	鱒魚	騾	鐵線蓮	鐵華粉	鐵色箭	鐵樹	續隨子	續斷	藥莢	藥荷	蘭草
五二六	五二五	五二五		五二五	五二五	五二四	五二四	五二四	五二三	五二三	五二三	五二三	五二三	五二二	五二二	五二二	五二二	五二〇
鰻魚	鱈魚	鱗蛇	鱈魚	鱈魚	粟米	檀香	檀香	羅羅	蠟蝟	藥華	藥劑	▲第廿三畫	藥鼠	藥	鸚鵡菜	鸚鵡	鸚	鱈魚
五三一	五三一	五三一	五三一	五三〇	五三〇	五三〇	五二九	五二九	五二九	五二八	五二八		五二七	五二七	五二七	五二七	五二六	五二六
麩	鱈腸	鱈	鱈魚	鱈魚	鱈殘魚	鱈魚	靈壽木	靈壽香	靈貓	靈砂	靈龜	靈草	靈豆	▲第廿四畫	鱈	鱈	鱈雞	鱈魚
五三七	五三六	五三六	五三六	五三六	五三五	五三五	五三五	五三五	五三四	五三四	五三四	五三三	五三三		五三二	五三二	五三二	五三二

中華新藥物學大辭典

第二畫

丁香

(桃金娘科)

〔學名〕 *Jambosa Caryophyllus, Nitz.*

〔產地〕產於廣東，廣西，及蘇門答臘等地；而日本不產。

〔基本〕為常綠喬木，其幹高二丈餘，葉對生，為長卵圓形

，先端甚尖，具有全邊。春間開花四瓣，色呈淡紫

或紅白，有多數雄蕊，及一雌蕊；花簇生於新芽之

頂端，花芽具有芳香氣味，可供藥用之。

〔成分〕含有 *Caryophyllin*，及揮發油，護謨，樹脂，單寧

，萜酸，撒里矢爾酸等。

〔功效〕為健胃藥，及芳香與衍藥，昔時每採其實而服用；

但近來多以其油而代用之。

〔藥用資本草云〕其氣味辛溫，無毒。能燥脾，暖胃

，沒脂，溫腎，壯元陽，暖腰膝，殺蟲，辟惡，止

霍亂，治冷氣，與風毒諸腫，牙槽癆臭，以及小兒

吐瀉，痘瘡灰白不發等。

〔用量〕一回〇・二——〇・五為粉劑，煎劑，浸劑等服

用之。

〔製劑〕丁香油 *Ol. Caryophylli.*

此為丁香浸於食鹽水中，而後蒸餾所得之輕油；

(每百分丁香中，約含有十八分油)呈微黃色澄明

之液體。可應用於齒痛，口腔炎等之消毒含嗽料。

或一回〇・〇三——〇・〇五和於白糖，單用於消

化不良等；

2 芳香丁幾 *Tinctura anoniata*

此即以丁香，桂皮，小荳蔻各二〇，生薑五〇〇

浸於稀酒精一〇〇〇中，取其應濾之液，再加入

枸橼精五〇即得赤褐色透明之液體，一回一〇〇

——二〇為健胃驅風藥服用之。

〔禁忌〕忌火，畏鬱金。

〔採製〕於二月，八月採取之。

〔別稱〕名見開資本草，又稱為丁香香；其實稍大者，名為

雞舌香，又稱母丁香。

人胞 (*Palaeonin*)

〔基本〕此俗稱胞衣，為連胎兒與母體之媒介物，密着於母

體之子宮部，(胎兒在母體內，時藉胎盤「即胞衣」由母體攝取營養物，而排泄自己老廢物，以營新陳代謝之作用)分娩後而脫落之。

〔成分〕含有刺戟素。

〔功效〕邇來據佛郎克(Fell)氏之實驗，證明胎盤有促進子宮發育之功能，故氏先將動物之兩個卵巢摘出，免受卵巢之影響，然後再用胎盤之乳劑，或抽出物，注射於該動物之皮下，則注射後一星期左右，見其子宮增大數倍，其肌層及黏膜層亦均肥厚焉！

據云：其氣味甘鹹而溫，無毒。主治血氣羸瘦，婦人勞傷，面皮墨灰，腹內諸病，及男女一切虛損，勞極，癩癩，失志，恍惚，且能安心，養血，益氣，補精等。

〔學說〕李時珍曰：人胞，雖載于陳氏本草，昔人用者尤少。近因丹溪朱氏言其功，遂為時用，而括著吳球始創大造丸一方，尤為世行；其方藥味平補，雖無人胞，亦可服餌！

〔別稱〕又名胞衣，胎衣，紫河車，混沌衣，混元母，佛裝袋，仙人衣。

人參 (五加科)

〔學名〕*Panax ginseng* C. A. Mey.

〔產地〕產於中國遼寧，吉林，黑龍江，山西各地，以及朝鮮等。多栽培於園圃，或自生於山野。

〔基本〕為多年生草，通常下種至三年，始着花實。初年莖高三四寸，生一莖五葉。二年生二莖。三年生三莖。每增一年，輒增一數，至四五年之後，莖高二尺餘。其葉為掌狀複葉，多出五小葉而成，邊緣具有小鋸齒。秋日開花甚小，花瓣五枚，呈白色，為繖形花序。其根肥大多肉，每與人形相似，可取為藥用；但其全草，皆可供藥用之。

〔成分〕含有配糖體(Glycoside)，皂素(Saponin)，及黏液質(Basminin)，揮發性油狀物及其混合物等。

〔功效〕為強壯興奮藥，有祛痰，利尿之功，實用於衰弱，肺癆，虛脫，盜汗等症。

據云：氣味甘苦，微寒無毒。能補五臟，安精神，定魂魄，止驚悸，除邪，辟惡，明目，開心，益智，強身，消食，開胃；並療胃腸中冷，心腹鼓痛，胸膈逆滿，霍亂吐逆，止消渴，通血脈，五勞七傷

；虛損癆弱，發熱，自汗，眩暈，頭痛，反胃，吐食，泄瀉，久痢，小便頻數，勞倦內傷，中風，中暑，痿痺，與吐血，嗽血，便血，淋血，及子宮出血，胎前產後諸病。

【用量】一回一〇——三〇——八〇服用之。

【製劑】1. 複方人參越幾斯 *Radix Ginseng compositus*

此即以人參一〇〇，天門冬，麥門冬，熟地黃，生地黃各三〇〇，浸於水五〇〇〇中，經二週後，濾過之，而蒸發製成稠厚之越幾斯，一日三回，一回三〇——五〇為水劑，可應用於肺癆，咳嗽，虛熱，衰弱等。

【禁忌】與寒度相反；並畏五靈脂，惡皂莢，黑豆。

【採製】於二月，四月，八月之上旬，採取其根，以竹刀刮之，而暴乾，勿令見風，嚴密貯藏。

【別稱】名見本草經，又名為黃參，血參，人街，鬼蓋，神草，土精，地精，海腴，皺面還丹。

人中白

【基本】為多年排尿之尿壺，其中自然沈澱，固著之灰白色物即是。可採取之，而供藥用。

【成分】含有尿酸石灰。

【功效】每用為強壯藥，加以人參濃煎，而服用之。

據云：其氣味鹹平，無毒。能安五臟，養丹田，滋腎水，潤三焦，降火，消熱，治虛癆，咳嗽等。

【用量】一回一〇——三〇服用之。

【採製】據李時珍曰：此乃人溺滲下白澱也，以風日久乾者為良，入藥並以瓦煨適用之。

【別稱】又名為溺白澱。

人中黃

【基本】通常以人糞，甘草末，及米糠，調和納於竹筒內，使其兩端固封，再置於沸湯中，經過數時間後，剖開竹筒，取其內中之塊狀物，即為人中黃，可供藥用之。

【功效】為解熱藥，對於流行性感冒，咳嗽，痘瘡，血熱，實熱等皆可用之；並有清痰，消食，解熱，去毒之功。

據云：其氣味苦寒，無毒。主治骨蒸，勞復，癰疽，發背，痘瘡不起，天行熱狂，及惡瘡，熱毒等。

【用量】一回一〇〇——二〇〇服用之。

〔學說〕朱寔亨曰：人中黃，以竹筒納入甘草末，用竹木塞

其兩頭。冬月浸於糞中，立春取出，懸於風處，陰

乾。而後破竹取草，晒乾用之。汪機曰：用棕皮綿

紙，上鋪黃土澆煎汁，淋土濾取清汁，入新甕內，

以棊覆定，埋土中二年，取出清若泉水，全無穢氣

，年久者彌佳，比竹筒滲法更妙。

〔別稱〕日本稱為馬子藤，金汁等。

人面子

(漆樹科)

〔學名〕*Swintonia alata* Port.

〔產地〕多產於臺灣，福建，廣東各處。

〔基本〕為落葉喬木，高達三丈，葉為羽狀複葉，小葉全邊

○春天開小黃花，為圓錐花序。夏日結扁平果實，

內中有核，兩邊具有人面之口，鼻，二目等，民間

多採食之。

〔成分〕內含林檎酸，糖分等。

〔功效〕有清涼解熱之作用。

其味甘，性平，無毒。能醒酒，解毒；並治濕氣，

風疹，遍身成疔，或痛，或癢，食之即愈。

〔用量〕四。○——八。○食服。

八仙花

(虎耳草科)

〔學名〕*Hydrangea hortensis* Des. var. *Asaii* Y. Et.

〔產地〕多栽培於庭園中。

〔基本〕為落葉小灌木，高約四五尺，葉對生，呈卵圓形而

平滑，邊緣有粗鋸齒。六七月間開花，多數集成圓

錐花序。每出白色，而漸漸變成碧色，或紅色，非

常美麗。採取其花晒乾後，而供藥用之。

〔功效〕為解熱藥。

〔用量〕一回二。○——四。○為煎劑，茶劑等，服用之。

〔別稱〕又名紫陽花。

八角金盤

(五加科)

〔學名〕*Fatsia Japonica* Dene. et Planch.

〔產地〕多生於溫暖之地。

〔基本〕為常綠灌木，高七八尺，葉為掌狀分裂，具長葉柄

，葉質較厚，而有光澤。冬月開小花白色，為繖形

花序。採取其近根之皮，供藥用之。

〔功效〕可用於麻痺風毒，淋病，及打撲之溢血停積等。

其氣味苦辛，平而有毒。據云：此植物之氣，能開

通塞塞；但因其猛悍之故，體弱者，不可用之。

【用量】一·五——二·〇服用之。

【別稱】又名金盤草。

八角茴香

(木蘭科)

【學名】*Illicium Verum, Hook. f.*

【基本】為常綠喬木，幹高二十餘尺，其實類似莽草之質，

為蒴果，成熟時，呈小艇狀，每裂開而散出種子，

為褐色，而有光澤，可供藥用之。

【成分】含揮發油，樹脂，澱粉，林檎酸，單寧，石灰，糖

分等。

【功效】為興奮驅風藥，又為健胃藥。

【用量】一〇〇·五——二〇〇服用之。

九牛草

【功效】為驅風鎮痛藥，其味微苦，而少有毒性；故專與甘

草配伍，而服用之。

【用量】三〇——七〇服用。

【學說】森頌曰：生筠州山岡，二月生苗，獨莖，高一尺，

葉似艾，圓而長，背有白毛，而面青，五月採苗用

之。李時珍曰：陳嘉謨本草蒙筌，以為芹艾者，誤

矣。

九仙子

【功效】為外用消毒藥，可作咽喉炎，扁桃腺炎之含嗽劑。

【學說】李時珍曰：九仙子，出筠州太和县，一根連綴九枚

，大者如雞子，小者如半夏，白色。二月生苗，莖

高六七尺，莖細而光，葉如烏白葉，而短扁不圓，

每葉極生子枝，或一，或二，與莖下垂，六七月開

碎青黃色花，隨即結實，碎子叢簇，如葎精草子狀

。九月採根，以供藥用。

【別稱】又名仙女嬌。

九香蟲

【功效】可為神經衰弱，及胃腸衰弱藥；有用於陰莖勃起不

能等症。

其氣味鹹溫無毒。主治脾胃虧損；並能壯陽，及益

腎。

【用量】一〇三·五——七〇〇為丸劑等。

【學說】李時珍曰：九香蟲，產于貴州永寧衛，（即今關嶺

縣）赤水河中，大如小指頭，狀如水龜，身青黑色

，至冬伏於石下，土人多取之為藥。

【別稱】又名黑兜蟲。

九龍蟲

【功效】民間多用此蟲，治療各種重症；但未見有何特效。

其性溫，行血分，暖脾胃，和五臟，健筋骨，去濕，搜風，壯陽道，治性弱；並治感冒寒熱等。

【用量】七個乃至二十個，可爲煎劑等服用之。

【學說】據云：此蟲於明末年，始傳入吾國。又云：於康熙初年，始有。考其山來，實出於外洋，故又名曰：

洋蟲；此蟲形如米蟬子，初生如小蠶，久則變黑如豆瓣，有雌雄，今人用竹筒置穀花筒之，性極畏寒，天冷須藏之懷袖中，夜則置衾褥間，否則凍死，得人氣則生，且極易繁衍。又有飼以茯苓屑，紅花，交桂末者，則色紅而光澤可愛，入藥尤良。

【別稱】又名洋蟲。

刀豆

(豆科)

【學名】*Canavalia casiformis*, The.

【產地】多栽培於園圃間。

【基本】爲一年生之蔓草，常纏繞於他物之上，葉爲複葉，自三小葉而成。花爲蝶形，花冠呈青紫色。果實爲莢果，長大而扁平，如牛刀形，內含較大種子；其

種子有紅白二色，多取白色者，爲藥用之。

【成分】含有植物油，及來過明 (Lecithin) 之豆素，澱粉等。

【功效】爲健胃，及祛痰藥；每有用其炭末，爲止吐劑等。

據云：氣味甘平，無毒。主治溫中下氣，利腸胃，止呃逆，益腎，補元等。

【用量】三〇——七〇。

【別稱】又名狹劍豆。

第三畫

三七

(菊科)

【學名】*Cynura jamaicensis*, DC.

【產地】庭園之間，多栽培之。

【基本】爲多年生草，莖高三尺許，葉爲羽狀分裂，秋間開黃褐色花，成爲頭狀花序；其根，葉，皆可供藥用之。

【功效】爲收斂藥，可服用於吐血，衄血，便血，及惡露不止等。更有採取其根葉搗汁，貼敷患處，而作消腫，止血，鎮痛，驅毒藥；故每外用於癰腫，蛇傷，及一切打撲，銹創等。

其味甘，微苦，無毒。能止血，散血，金刃，箭傷，血出不止，虎蛇咬傷諸病。

【用量】三·五——七·〇——一〇·〇服用之。

【製劑】止血散 *Pulvis Atyphaem*

此以三七一〇·〇研為細末，即妥。可應用於胃腸出血，及痰血等。每服三·〇，米湯吞服；但外用於一般創傷等之出血，亦頗有效。

【採製】曬乾，割用

【學說】李時珍曰：生廣西南丹諸州，番禺深山中，採根暴乾，黃黑色團結者，狀略似白及，長如老乾地黃，有節，味微甘而苦，頗似人參之味。或云：試法以末擦猪血，血化為水者，乃真。近傳一種草，春夏生苗，高三四尺，葉似菊艾而較厚，有歧尖，莖有赤稜。夏秋開黃花，蕊如金綿盤紐，可愛，而氣不香，花乾則吐絮，如苦蕒絮，根葉味甘，治金瘡，折傷，出血，及上下血病甚效云。是三七，而根大，如牛蒡根，與前中來者不類，恐是剝寄奴之屬，甚易繁衍。

【別稱】又名山漆，金不換。

三白草

(三白草科)

【學名】*Saururus Laurenti*, Poir.

【產地】生於水田池沼之邊。

【基本】為一種宿根草，莖高二尺，葉長卵圓形，基脚呈心臟形，葉柄之基部，抱擁於莖外。夏日莖梢，生出一葉，變為白色，其葉腋綴以穗狀花，帶淡黃色。採其根，花，供藥用之。

【功效】為利尿藥，可應用於腳氣，水腫，及小兒腹脹等。

其味甘，辛寒，而有小毒。主治水腫，腳氣，利大小便，消痰，破癍，除積聚，消疔腫。

【用量】三·〇——七·〇為煎劑，服用之。

【採製】五月採取其根，花，全草，曬乾備用。

【學說】李時珍曰：三白草，生田澤畔。八月生苗，高三三尺，莖如蘆，葉如草陸，及青箱。四月其顛三葉，面上三次變為白色，餘葉仍青不變。俗云：一葉白食小麥，二葉白食梅杏，三葉白食黍子。五月開花，成穗，如蓂花狀，而色白，微香。

【學名】*Compananea Plicatila*

上黨參

(五加科)

「功效」爲祛痰，滋養藥。

其味甘，性平。治肺虛，能益肺氣。

「用量」三。〇——七。〇爲煎劑，丸劑等，服用之。

「學說」百草錄云：黨參，一名黃參，黃潤者良，出山西潞

安，太原等處。有白色者，總以淨軟，壯實，味甜

者佳。嫩而小枝者，名上黨參，老而大者，名防黨

參。

千年艾

(菊科)

「學名」*Chrysanthemum Denticatum*, Maxim.

「基本」爲一種菊蒿屬之植物，莖高尺許，葉之外面青色，

裏面白色，而長。秋日開花，雌雄異株，雄花之頭

狀花序，皆爲舌狀花。雌花之頭狀花序，爲筒狀花

；雌花成熟，則結實，形作舟狀，或扁平狀。可採

其葉，供藥用之。

「功效」爲婦人經痛等之效藥。

其氣味辛微苦溫，無毒。主治男子虛寒，及婦人血

氣諸病。

「用量」三。〇——七。〇爲水煎劑等，服用之。

「採製」八月採葉，曬乾。

千里及

「產地」多生於田野，道傍之間。

「基本」爲一種蒿草，莖圓而青，葉爲細長，葉背有毛。秋

月開花，黃色。可取全草，供藥用之。

「功效」民間有以其煮汁，而治麻拉里亞，黃疸等；又有外

用於蛇犬之咬傷等。

按本草拾遺云：其氣味苦平，而有小毒。蘇頌云：

其味苦甘寒，無毒。能退熱，明目，治時疫，結毒

等。

「用量」三。〇——九。〇煎汁服之。

「學說」陳藏器曰：千里及，藤生道旁蕪落間，葉細而厚，

宜湖間有之。蘇頌曰：千里及，生天台山中，春生

苗，秋有花，土人采花，葉，入藥。又筠州有千里

光，生淺山及路旁，葉似菊而長，背有毛，枝幹圓

而青，春生苗，秋有黃花不結實。采葉葉入藥，名

黃花漬蓋一物也。

千金藤

(防己科)

「學名」*Stephania hernandifolia*, Walp.

「產地」生於暖地之間。

【基本】爲綠灌木，葉平滑互生，長柄卵形，而作柄狀，

長二三寸，闊一二寸，下面呈白色，莖上升，花淡綠色，爲繖形花序。核果平滑，內果皮扁平，作蹄瓣形，側面凹入成孔，種子如環形，子葉細長。可取其根，供藥用之。

【功效】爲解毒藥，可用於虎列拉，麻拉里亞，丹毒，瘰癧，及藥石中毒等。

【學說】陳憲器曰：千金藤，有數種，南北名模不同，大略主爲相似，或是皆近於藤也，生北地者，根大如指，生南土者，黃赤如細辛。舒蔭間，有一種藤，似木薯。又有烏虎藤，繞樹生，冬青，亦名千金藤。一種似荷葉，只大如錢許，亦呼爲千金藤。又云：古毒，主痢，及小兒大腹。千金者，以貴爲名，豈供一物，亦狀異而名同耶！

【產地】多生於山野之中。

【基本】爲一種蔓生植物，莖攀援木上，折斷而有白汁。葉爲小葉，如葡萄葉狀，夏月開花，秋月結子，呈赤褐色。可採其根，供藥用之。

【功效】爲強壯藥，有續骨，長肌之效。

據名醫別錄云：其氣味甘平，無毒。能補五臟，益氣血，續筋骨，長肌肉，去諸痺，久服輕身，不飢耐老，通神明。

【別稱】又名羸蕪，荳瓜。

山丹

(百合科)

【學名】*Lilium concolor*, Saliba.

【產地】生於山地之間。

【基本】爲多年生草，高一二尺，地下有鱗莖，與百合相似，而較小。葉呈披針形，互生。夏日莖稍着花，紅色。可採其根，花，供藥用之。

【功效】爲驅毒藥，有用於癰腫，惡毒等。

據日華本草云：其根氣味甘涼，無毒。能治瘡腫，驚邪，婦人崩中。其花同，能活血，療疔等。

【學說】李時珍曰：山丹，根似百合，小而瓣少，莖亦短小，其葉狹長而尖，頗似柳葉，與百合迥別。四月開紅花，六瓣不四垂，亦結小子。燕齊人，採其花附未開者，乾而貨之，名紅花菜。

【別稱】又名紅百合，連珠，川強壘，紅花菜。

山柰

(薑荷科亦作薑科)

【學名】 *Xanthoxia Galanga*, L.

【產地】產於福建，四川各省為最多。

【基本】為一種草本植物，根形與鬱金相似，葉亦似鬱金，

卵圓而尖，柄短。秋間自兩葉之中央，生披針形之

苞數片，苞中出一花，全花白色；惟帽瓣之中心，

見淡紫色，其花天曉開放，日沒凋萎，次日更自他

苞中出一花，連續十餘日而終。可採其地下莖，供

藥用之。

【功效】為芳香性之消化藥；更有以其粉末，為香料等。

其氣味辛溫，無毒。能暖中，辟瘴，治寒溼，惡氣

，霍亂，腹痛。

【用量】一。○——三。○服用之。

【學說】李時珍曰：山柰，生廣中，人家栽之，根葉皆如生

薑，作樟木香氣。土人食其根，如食薑，切斷暴乾

，則皮赤黃色，肉白色。古之所謂廉薑，恐其類也

。段成式酉陽雜俎云：柰祇出佛林國，長三四尺，

根大如鵝卵，葉似蒜，中心抽條甚長，莖端有花，

六出，紅白色，花心黃赤，不結子。其草冬生，夏

死，取花壓油，塗身去風氣，按此說頗似山柰，故

附之。

【別稱】又名山辣，三奈。

山茶

(山茶科亦作茶科)

【學名】 *Thea japonica* Noid.

【產地】生於海邊之暖地。

【基本】為常綠喬木，高二十餘尺，葉長卵圓形而尖，質較

厚且少有光澤，互生。春日開花，紅白色。果實為

蒴果，成熟則裂開，散出種子二三粒，呈淡褐色。

通常採取其花，供藥用之。

【成分】種子，含多量揮發油。

【功效】為收斂藥，對於吐血，衄血，及便血，皆可服用。

其氣味苦溫，「或甘寒」無毒。能涼血，止血，治腸

風，下血。

【用量】三。○——七。○為粉劑，煎劑等。

山蛤

【學名】 *Rana temporaria*, L.

【基本】為蛙之一種，胸部略長，體為赭色，背上雜以暗褐

色之斑，後肢略長，趾間有蹼，跳躍頗巧，肉可供

食。

【功效】民間有食此，以療小兒勞疾等。

【學說】蘇頌曰：山蛤在山石中藏殼，似蝦蟆而大，黃色，能吞氣，飲風露，不食雜蟲，山人亦食之。

山葱

(百合科)

【學名】*Allium Victoriae*, L.

【產地】山地多自生之。

【基本】為多年生草，莖高二三尺，呈青紫色，葉狹長，有平行脈。春間開花，紫黑甚小。其根，入藥用之。

【成分】含有 Jalwin, Yonkolin, Yonmethin, Cevadin 及澱粉等。

【功效】為催吐藥，殺蟲藥；但多外用於疥癬等。

其味辛，微溫，無毒。除瘴氣，惡毒，久食強志，

益胆氣。

【用量】一回〇・二——〇・二五服用之。

【學說】李時珍曰：此葱，野葱也。山原平地皆有之，生沙

地者，名沙葱。生水澤者，名水葱。野人皆食之。

開白花，結子，如小葱頭。世俗不察，胡葱，即蒜

葱，誤指此為胡葱。

【別稱】又名蒼葱。

山蒜

(百合科)

【學名】*Allium nipponicum*, Fr. et Sav.

【產地】生於山野中。

【基本】為多年生草，高至一二尺許，地下有鱗莖，白色。大如棗葉，細長而尖。夏月葉間抽莖，莖頂開花，

花小白色，或淡紫色。採其鱗莖，供藥用之。

【成分】含有硫油，及揮發油。

【功效】用治子宮血腫，血塊等。又和米粉貼敷於癰疔，及打撲傷，能鎮痛，消腫。

本草拾遺云：其氣味辛溫，無毒。治婦人血瘕，積塊甚效。

【學說】李時珍曰：山蒜，澤蒜，石蒜，同一物也；但分生

於山澤石間不同耳！人間栽時，小蒜始有三種移成，故猶有澤蒜之稱。

【別稱】又名薑，澤蒜。

山薑

(藥荷科亦作薑科)

【學名】*Alpinia japonica*, Miq.

【產地】生於暖帶之山麓。

「基本」爲多年生草，高一尺許，葉似薄荷而小，每株着四

五葉，互生，葉背有軟毛，撫之如絨狀。夏月開白

花，爲穗狀花序，又類總狀花序，花後結實，大如

豆粒，熟則赤色。可採取地下莖根，入藥用之。

「功效」可用於寒性腹痛，腸痛，疝痛，及虎列拉之腸痙攣

等，皆有鎮痛之功能。

藥性本草云：其氣味辛熱，無毒。治腹中冷痛，甚

效。

「用量」一。〇——三。〇服用之。

「學說」甄權曰：山薑根及苗，並如薑而大，作樟木臭，兩

人食之。又有種子薑，黃色而緊，辛辣，破血氣，

殊強於此薑。李時珍曰：山薑生南方，葉似薑，花

赤色，甚辛，子似草薑，根如杜若，及高良薑，

今人以其僞充草薑，然其氣甚猛烈。

「別稱」又名美草。

山薑

(百合科)

「學名」*Allium japonicum*, Rgl.

「產地」生於水濕之地。

「基本」爲多年生草，葉細長，有三稜，秋間抽花軸，高一

尺餘，軸頂着以紫色之繖形小花。可採其全草，供藥用之。

「功效」爲鎮痛藥，常用於寒性腹痛等。

其氣味辛溫，無毒。治腹滿，腹脹，寒冷，霍亂，

及婦女產後血攻，胸膈刺痛等。

「別稱」又名薺，蕺。

山獺

「產地」吾國兩廣之野山，多產生之。

「基本」此爲獺之一種，其性最爲淫毒，山有此獸，凡牝類

動物，皆避去之；故其無偶則抱木而枯，土人婦女

成羣入山，此獸聞氣必來抱之，緊束女骨，牢不可

脫，因扼殺之。其骨及陰莖，皆可供藥用之。

「功效」民間用爲陰痿之效藥，以酒少許磨服，即能使陰莖

勃起；而骨有外用爲解毒消腫藥等。

本草綱目云：其氣味甘溫，無毒。治陽虛陰痿，精

冷而清。

山鵲

「學名」*Pyrula Eschscholtzii* Lark.

「產地」山野處處有之。

【基本】爲鴨舌類，雄者，頭部黑色，咀圓錐狀，亦呈黑色

，而有光澤。自頰至喉側，則呈深赤色，而背面青

灰，兩腹赤紅。其翼與尾，又呈黑色。雌者，色淡

，而頰與喉側，亦非紅色也。取其肉，供藥用之。

【功效】用於植物之水果中毒。

其氣味甘溫，無毒。能解諸果毒。

【別稱】又名鶯，雞，山鷓，赤嘴鳥。

山荳根

(豆科)

【學名】*Dalrymplea japonica*, Benth.

【產地】在於暖帶山野之陰地。

【基本】爲常綠蔓狀亞灌木，高一二尺，莖柔軟易傾側。夏

月自葉腋出穗，開白色蝶形花；花後結實，熟則呈

黑色。採取其根，而供藥用之。

【功效】爲解毒藥，對於喉頭，喉頭發炎，腫脹，疹痛，含

之嚙汁，均有特效。

開寶本草云：其氣味甘寒，無毒。能解諸藥毒，止

痛，消腫，去熱，殺蟲，及婦人氣血腹脹等。

【用量】一回二〇——五〇服用之。

【採製】八月採取其根，以水洗淨，晒乾，貯藏備用。

【別稱】又名解毒，黃結，中藥。

山茱萸

(山茱萸科)

【學名】*Cornus officinalis*, S. et Z.

【基本】爲落葉小喬木，高丈餘，葉長卵圓形，其端尖銳。

春日開小黃花數朵，集生，葉遲於花。實呈卵圓形

，赤色，可供藥用之。

【功效】爲強壯藥，可用於遺精，健忘，及一切虛損，瘵傷

等。

神農本草經云：其氣味酸平，無毒。能壯陽，強陰

，溫肝，補腎，固精，秘氣，除風，逐寒，發汗，

通竅，久服能輕身明目。

【用量】二〇——六〇服用之。

【採製】熟果，可用酒煮，去核。

【別稱】又名蜀椒，肉桂，魅實，雞足，鼠矢。

山蛭蟲 Tulin

【基本】屬於馬陸類，除近於頭部數環節外，皆以二環節，

密合成爲一環節；每環節，有脚二對。頭部之背側

，有觸鬚二枚。每遇其他，則將觸鬚卷曲不動；並

由開口於體側之腺，放出臭氣，以防禦之。

「功效」民間有取該蟲一節，以作慢性酒精中毒之禁忌品；

但多食，則毒人。

本草拾遺云：此蟲有大毒，常用其燒黑，敷惡瘡。

山楮子

(薔薇科)

「學名」*Xepilus cuneatus*, S. et Z.

「產地」庭園中，多種植之。

「基本」爲落葉灌木，初栽高約五六尺，枝有多棘，葉形似

楔，邊有鋸齒。春開小白花，實作紅黃色，呈圓

球形，核堅硬而爲黑色。其果可供藥用。

「功效」爲健胃藥，對於消化不良，及腹痛，脹滿等，皆可

服用。

其氣味酸冷，無毒。能破氣，消食，磨積，化痰，

補脾，健胃，活血，散瘀；並治淡飲，痞滿，癰疽

，肉積，吞酸，瀉痢，及疝氣，腰痛等。

「用量」二〇——五〇爲煎劑等。

「採製」採實，除去核仁，微焙用之。

「別稱」又名赤瓜子，山裏果，俗稱山查。

山慈姑

(百合科)

「學名」*Tulipa edulis*, Bink.

「產地」山野多自生之。

「基本」爲多年生草，高尺許，葉細長如韭，莖自地下莖之

中央生出，頂端開一花，色白略紫。其地下莖，狀

如慈姑，可供藥用之。

「功效」爲解熱，消腫藥。

其味甘，微辛，而有小毒。能治癰腫，疔毒，癩癧

結核，以及毒蛇咬傷，皆可用之。

「用量」三〇——七〇服用之。

「採製」取根，去皮，曬乾，到用。

「學說」李時珍曰：山慈姑，處處有之，冬月生葉，如水仙

花之葉而狹，二月中枯一莖，如箭桿，高尺許，莖

端開花白色，亦有紅色，黃色，上有黑點；其花乃

衆花簇成一朵，如絲紐成，可愛。三月結子。有三

稜。四月初苗枯，即濕取。其根狀如慈姑，及小蒜

，遲則苗腐難尋矣，根苗與老鴉蒜極相類；但老鴉

蒜無毛，慈姑有毛壳包裹，爲異耳！用之去毛壳。

「稱別」又名金燈，鬼燈藥，朱姑，鹿蹄草，無義草。

山櫻桃

(薔薇科)

「學名」*Prunus tomentosa*, Thunb.

〔產地〕產於山地，亦有栽培於庭園之間者。

〔基本〕爲落葉灌木，高至七八尺，葉卵形，互生，有鋸齒

。其嫩莖，及葉之下面，生毛甚密。春月開花，白色。果實爲核果，呈小球形，成熟則爲深紅色，而有光澤，大約四分許，可採取而爲藥用。

〔功效〕爲解熱，止瀉藥。

其氣味辛平，無毒。能止洩，腸癰，除熱，調中，益脾，澆精。

〔學說〕李時珍曰：樹如朱櫻，但葉長尖不圓，子小而尖，

生青，熟黃赤，不光澤，而味惡，不堪食。

〔別稱〕又名朱桃，麥櫻，英豆，李桃。

小青

〔產地〕多產於水濕之地。

〔基本〕此爲 *Scaris tinctoria* L. 之一種較小者，葉短小，

而莖多。開花成簇，兩瓣紅色。可取其全草，供藥

用之。

〔功效〕爲解熱藥。

其味苦，大寒。能治傷寒熱證，目赤腫痛，翳障初

發，黃盲，夜盲。每與酒漿同雞肝或羊肝煮用之。

此外尚有一種，產於福建，三月開花，土人當月採

其葉，而應用於腹痛，血痢，及蛇咬傷中毒，均可

研汁服用；又可生搗貼敷癰腫，癰瘍等甚效。此性

溫，無毒，卽小青葉也。

〔用量〕小青二·五——五·〇服用；小青菜七·〇——

〇·〇服用。

小麥

(禾本科)

〔學名〕*Triticum Sativum*, Linn. var. *vulgare*, Hack.

〔產地〕各地田園中，多栽植之。

〔基本〕爲穀類植物，越年生草，莖高三四尺，中空有節，

葉細長，有平行脈。初夏開小花，實爲穎果，其芒

甚短，子粉甚多，體重較輕。入水浮者，爲浮小麥

，多供藥用之。

〔成分〕含多量之蛋白質，澱粉，麥芽糖，及其他。

〔功效〕其味甘寒。能止盜汗，自汗，虛癆，骨熱等。

〔用量〕七·〇——一二·〇服用之。

〔學說〕蘇頌曰：大小麥，秋種，冬長，春秀，夏實，其四

中和之氣，故爲五穀之貴。李時珍曰：北人種麥，

漫撒；南人種麥，撮撒。北麥，皮薄，麩多；南麥

，反此。

〔別稱〕又名曰：來。

小薊

〔學名〕*Christia japonicum*, DC.

(菊科)

〔產地〕多產於水濕之地。

〔基本〕為多年生草，莖高尺餘，葉有多刺，而葉背更有毛，如蛛網然。夏日開淡紫色花，為頭狀花序；惟較大極而小。其根入藥用之。

〔功效〕為止血藥。

其氣味甘溫，無毒。能治吐血，衄血，及下血；並能補虛，養精，開胃，下食，止吐，解熱等。

〔用量〕五·五——八·〇服用之。

小蘗

(小蘗科)

〔學名〕*Berberis thunbergii*, DC.

〔產地〕生於山野之間。

〔基本〕為落葉小灌木，高至五六尺，葉小而卵形。春夏之間，開小黃色花，果實為漿果，呈長卵圓形，赤色，後變黑色。其皮外白，裏黃而薄，可供藥用之。

〔功效〕為解熱，止血藥。

其果實，味甘，性平。能治嘔吐，泄瀉，痢疾，疝氣，目赤。

〔學說〕蘇恭曰：小蘗，生山石間，所在皆有，襄陽嶺山東

者為良。一名：山石榴，其樹枝葉，與石榴無別；

但花異，子細，黑圓如牛李子，及女貞子耳！其樹

皮白。陶弘景云：皮黃，恐謬矣。今太常所貯，乃

小樹多刺，而葉細者，名刺蘗，非小蘗也。

〔別稱〕又名子蘗，山石榴。

小荳蔻

(薑荷科)

〔學名〕*Zingiber carthagenum*, White, et Watson.

〔產地〕原產於印度之海岸。

〔基本〕為多年生草，高至十尺許，葉與花之構造，頗似薑荷。其果實，供藥用之。

〔成分〕含有揮發油等。

〔功效〕為健胃藥，有驅風止瀉之能，芳香嬌味之功。

〔用量〕二〇〇·一——〇·三——一·〇服用。

小葉麥門冬

(心蘭科)

〔學名〕*Ophiopogon japonicus*, Kar.

〔產地〕多自生於山野之樹陰，或栽種於庭園之陰地。

「基本」爲一種陸草，根莖中部肥厚，而兩端細長，具多數

之鬚，外部呈黃白色，有橫皺紋。採取根莖，而爲

藥用。

「功效」爲祛痰，鎮咳藥。有解熱，消炎之功；並能退面部

浮腫。

「用量」一回〇・五——五。〇服用之。

大空

「產地」山谷中，多產生之。

「基本」爲灌木之植物，高六七尺，其樹略小，葉大而厚，

呈爲圓形。其根皮赤色，質甚虛軟，可供藥用之。

「功效」爲殺蟲藥。

其氣味苦平，而有小毒。能殺三蟲，蠟虱。每取其

研末和油，塗於患處。

大青

(十字花科)

「學名」*Isatis tinctoria*, L.

「產地」原產於歐羅巴洲。

「基本」爲越年生草，高三三尺，下部之葉，倒卵形，有葉

柄；上部之葉，披針形，無葉柄。春日開花，黃色

，四瓣，爲總狀花序。夏日採其根莖，入藥用之。

「功效」爲清涼解熱藥。

其味苦，大寒，無毒。(李時珍曰：味甘。微鹹，

不苦。)能治時氣，頭痛，毒熱，口瘡。有瀉心胃

熱毒之功。

「用量」二。〇——八。〇服用。

大荳

(荳科)

「學名」*Glycine hispida*, Maxim.

「產地」多栽種於陸田中；吾國北方多種之。

「基本」爲一年生草，高二尺餘，葉爲羽狀複葉，密生毛茸

。秋間開小花，白色，或淡紫色。結夾長寸餘，有

毛。質呈圓形，色黑者，供藥用之。

「成分」含荳油極多；且有蛋白質，澱粉等。

「功效」爲解毒藥；並有滋養之功。

其氣味甘寒，無毒。能健胃，解毒，補腎，利水，

調中，下氣，除熱，祛風。外用可將生黑荳研爲粉

末，混於適量之水，爲貼布用；能治癰瘍，疥腫；

有鎮痛，消腫之效。

「用量」一。〇——一五。〇爲煎劑，服用之。

「採製」取黑色大豆，炒過，去殼皮用。

〔別稱〕俗稱黑大豆，黑豆等；又名：菽。

大棗

(鼠李科)

〔學名〕 *Zizyphus vulgaris* Lam var *lucumina* Bge.

〔產地〕多產生於庭園之中。

〔基本〕爲落葉亞喬木，高三丈許，葉爲卵形，互生。花小而色黃。實呈卵圓形，初青，熟紅，肉多，有核，可採取之，而爲藥用。

〔成分〕含有砂糖，黏液質等。

〔功效〕爲緩和藥。

其氣味甘平，無毒。吾國常爲調味，配合藥；但目的在理胃，和血，補中，益氣；且能滋脾，潤肺，生津液，悅顏色，通九竅，助經絡，和百藥，故補劑中，多加用之。

〔用量〕三〇——九〇——一二〇服用之。

〔別稱〕俗稱乾棗，良棗，丹棗等。

大黃

(蓼科)

〔學名〕 *Rheum officinale* Baill.

〔產地〕吾國西北各省，皆有產生；惟四川產者，紫地綿紋，用之量良。

〔基本〕爲多年生草，高四五尺，地下有多肉根。葉互生，甚大，爲掌狀，有淺裂，具長柄。夏秋之交，開淡黃色之小花，爲多數繖狀花序。採其肉根，供藥用之。

〔成分〕含有 Chrysophanic acid $C_{14}H_8O_8(OH)_2O_2$ Emodin, $C_{14}H_8O_8(OH)_2O_2$ 與二種樹脂質，如：Aporphin, Erythronin, 及苦味質，單寧，沒食子酸，揮發油，鞣酸，澱粉，石灰等。

〔功效〕爲健胃藥，及緩下藥。對於消化不良，宿食便秘，胸滿腹脹，水腫下痢，及一切實熱等，皆可服用。

其氣味苦寒，無毒。(或作大寒，有毒。)能瀉瘡血，祛實熱，破癰癢，積聚，留飲，宿食；瀉滯腸胃，推陳致新，通利水穀，調中化食，安和五臟。

〔用量〕一回〇・五——一・五爲健胃藥；二〇——四〇爲緩下藥。用以煎劑，粉劑等，皆可服用之。

〔製劑〕大黃越幾斯 Extract Rhai.

此即以大黃一〇〇，酒精及水一〇〇〇，浸製而成之乾燥越幾斯；用於健胃者，一回〇・三——〇・五；用於瀉下者一〇——二〇〇。爲水劑，粉劑

等而服之。

2 大黃丁幾 *Tinct. Rhai.*

此即以大黃一〇・〇，桂皮，小黃蘗各一・〇，酒精與水各五〇・〇，冷浸二週而壓濾之，即成爲黃褐色澄明之液體。用於健胃者，一回四・〇——一〇・〇爲水劑而服之。

3 大黃舍利別 *Stirpus, Rhai.*

此即以大黃丁幾五・〇混和於舍利別五〇・〇中即成。每以其單味五・〇——一〇・〇爲小兒下藥。

〔禁忌〕忌冷水，忌乾漆。

〔採製〕於二月，八月採根；以火磚烤乾之即妥。

〔別稱〕名見本草經，又稱爲黃良，將軍，火參，膚如。

大麥

(禾本科)

〔學名〕*Triticum sativum, Des. var. vulgare, L.*

〔產地〕田園中，多栽種之。

〔基本〕爲越年生草，高三四尺，莖中空，有明瞭之節。葉狹長，有平行脈，下部成鞘狀，包圍莖幹，爲穗狀花序；一小穗上，只有一花。各外面有二個狹長之穎，外殼上，通常有長芒。結實較小麥爲大，可入

藥用之。

〔成分〕含有蛋白質，澱粉，及麥芽糖等。

〔功效〕爲健胃藥，有滋養，助消化之能。

其氣味鹹溫，無毒。能消渴，除熱，益氣，補中。

凡米麩諸果食積，皆能消導之。

〔用量〕一回八・〇——一四・〇服用之。

〔採製〕取大麥浸於水中，至軟爲度，復取出而去水分，使

其堆積一週，則漸次鬱蒸，而生幼根及芽，即爲麥

芽 (Malt) 也；又稱；麥藥也。

〔別稱〕又名牟麥。

大麻

(桑科)

〔學名〕*Cannabis sativa, L.*

〔產地〕庭園及田地之中，多栽種之。

〔基本〕爲一年生草，高八九尺，莖方形。葉爲掌狀複葉，小葉五片，或七片，有鋸齒；花爲單性。其結成之種子，可供藥用。

〔成分〕含多量之植物油等。

〔功效〕爲緩和藥，有潤腸之功。

其氣味甘平，無毒。能補中，益氣，潤臟，滑腸，

逐水飲，破血積。

【用量】六〇——八〇——一二〇服用。

【禁忌】畏生薑，自微，伏苓。

【學說】李時珍曰：大麻，即今大麻，亦曰：黃麻，處處種

之，剝麻，收子，有雌雄，雄者為菜，雌者為苧。

大科如油麻，葉狹而長，狀如益母草葉，一枝七葉

，或九葉。五六月開細黃花，成穗；遂即結實，大

如胡荽子，可取油。剝其皮，作麻。其摺白而有稜

，輕虛可為燭心。齊民要術云：麻子放勃時，拔去

雄者，若未放勃，先拔之，不成子也。其子黑而重

，可搗治為燭，即此也。

【別稱】又名大麻，黃麻，漢麻；雄者名梟麻，雌者名苧麻

，苧麻；花名麻實，麻勃。

大戟

(大戟科)

【學名】*Euphorbia pokiensis*, Kunz.

【產地】生於山野中。

【基本】為多年生草，莖高三尺餘，葉如箭鏃，互生，有細

鋸齒。夏季之間，開花甚小，而呈褐色。雌雄同株

，有苞四片，圍繞如萼。可採其根，入藥用之。

【功效】為瀉下藥，並有利尿，消腫之功。對於閉尿，腹水

，及一切浮腫，滿脹，積聚，閉經，與癰腫等，均

能有效。

其氣味苦寒，有毒。能祛濕，行血，瀉毒，發汗，

利大小便。治諸臟腑水，心腹急痛，積聚，癰結。

又可消癰腫，下惡血。

【用量】一四一。〇——三。〇——六。〇服用之。

【禁忌】據云：反甘草。

【採製】二月，八月，採根，去蘆頭，(或用水煮軟)除去木

心，對晒而用。

【學說】李時珍曰：大戟，生平澤甚多，直莖高三三尺，中

空，折之有白漿。葉狹長，如柳葉，而不圓；其稍

葉密攢而上。杭州，紫大戟，為上。江南，土大戟

，次之。北地，綿大戟，色白；其根皮，柔韌如綿

，甚峻利，能傷人，弱者服之，或至吐血，不可不

知。

【別稱】又名甲鉅，下馬仙。

大蒜

(百合科)

【學名】*Allium scorodoprasum*, L.

【產地】多栽培於園圃中。

【基本】為多年生草，高三尺餘，地下有鱗莖。葉枚長而扁

；花帶紫色，為繖形花序，花間有珠。可採其鱗莖等，供藥用之。

【成分】含有揮發性硫油，及大蒜油 $(C_3H_5)_2S$ 等。

【功效】為利尿藥，祛痰藥，及殺蟲藥。

其氣味辛溫，有毒。能止霍亂，轉筋，腹痛。除邪，解溫，下氣，消殺，去風濕，破冷氣。

【用量】一河〇〇五——一〇〇服用。

【製劑】1 大蒜丁堯 Tinct. Allii.

此即以大蒜頭二〇〇，去皮，浸於酒精一〇〇〇中，經二週後，濾過之，為一種淡黃色之液體；其功效相同，一日三〇〇——五〇〇服用之。

【處方】肺壞疽藥水

此即以大蒜丁堯三〇〇，拘攪油二滴，冰糖五〇〇，水一〇〇〇〇，共為水劑，一日三回分服。

【學說】李時珍曰：大小二蒜，皆八月種，春食苗，夏初食莖，五月食根，秋月收穫。北人，不可一日無此物者也。

【別稱】又名胡，葦菜。

大薹 (毛茛科)

【學名】*Clamatis Fench. L. var. Panchakta. Thunb.*

【產地】多自生於山野之濕地。

【基本】為多年生莖狀灌木，長達丈餘，葉對生，為羽狀複葉，多自三葉，或七葉而成；呈心臟形，表面為深綠色，裏面為淡綠色。每以葉柄，纏繞於木上。秋月開花，白色，四瓣，成聚繖花序排列，後結瘦果。取其葉，花，供藥用之。

【成分】含有 *Ol. Anemom.* 及 *Acid. Anemom.* 等。

【功效】為發泡藥，有引赤之作用。

【用量】僅可外用，為局部少許之適宜量。

【別稱】俗名仙人掌。

大薹 (菊科)

【學名】*Cichium spicatum. Maxim.*

【產地】多生於山野之濕地。

【基本】為多年生草，高四五尺，葉呈羽狀，具有深裂，邊緣多刺。秋間開紅紫色花，為頭狀花序，長而下垂。其根，及葉，皆供藥用之。

【功效】爲止血藥，及消腫藥。

其氣味甘溫，無毒。能破血，止血，衄血，下血，崩中；並治癰疽，腫毒。

【用量】二。〇——六。〇搗其根汁，或煎服等。

【製劑】1 大錫丁棧 Tinctura Cistii sphenulata.

此即以大錫四〇。〇浸於酒精，及水各五〇。〇中，製成液體，爲收斂止血藥。一日三四回，每回二。

〇——四。〇服用之。

2 大錫煎 Decoctum Cistii sphenulata.

此以大錫根(洗)，犀角，升麻，桑白皮(去皮炙)，蒲黃(炒)，苦杏仁(去皮尖)，各七。五。甘草(炙)

，桔梗(炒)，各三。七。生薑五。〇，水二五〇。

〇，煎至一〇〇。〇，頓服，爲肺壞疽之效藥。

【別稱】又名虎滿，馬滿，貓滿，刺滿，山牛勞，雞頂草，

千針草，野紅花。

大黃蜂

【學名】*Vespa erabro*.

【產地】多寄生於地窟，或空樹幹內，及他有庇蔭之所。

【基本】爲黃蜂之一種，雖具薄翼，而飛行異常靈敏。後腿

無細毛，不能採集花粉；但以蜜蜂，蒼蠅，及果實，花朵等，爲食料。其體部黑色，上具黃斑痕，舌針最短，而鋒利，爲人所畏。可取其蜂子，入藥用之。

【功效】據云：其氣味甘涼，有而小毒。治心腹脹滿，疼痛，乾嘔。又外用，能治面上雀斑，而脫等。

【別稱】又名：黑色者名胡蜂，壺蜂，蠅蠟蜂，玄蠶蜂。

大楓子

(槲科)

【學名】*Gynocortia odorata*, L. B.

【產地】產於柬埔寨，暹羅，馬來等處。

【基本】爲大楓子植物之種子，呈卵圓形，略扁，外面爲灰

褐色，可供藥用之；或壓取其油，而用之。

【成分】含有多量大楓子油，及大楓子酸。

【功效】爲癩病(即麻風)之特效藥；並有用於濕疹，瘰癧，

疽疔等。

其氣味辛熱，有毒。能治風癱，疥癩，楊梅諸瘡。

【用量】一回〇。三——〇。八服用。

【學說】李時珍曰：大楓子，今海南諸番國皆有之。按周達

觀異職記云：大楓乃大樹之子，狀如椰子而圓；其

中有核數十枚，大如雷九子，中有仁，白色，久則黃而澁，不堪入藥。

大腹子

(棕櫚科)

【學名】*Arcaea Diaksonii*, Roach. (*Pinnanga Diaksonii*, Bl.)

【基本】為檳榔一種較大之子，而子實亦類似檳榔，呈扁圓形。其子皮外部為褐黑色，內部有纖維之網羅，皆可供藥用之。其子實，名為大腹子；子皮，名為大腹皮。

【功效】為利尿藥；可用於水腫，腳氣等。

其味辛，微溫，無毒。治霍亂，中暑，痞脹，痰痛。能健脾，下氣，行水，通便；但氣虛者，禁忌服用。

【用量】二·七——五·〇服用。

【禁忌】惡火。

【採製】取子，先浸於酒中洗之，次浸於黑豆之煎汁中洗之，而後曬乾，到用。

【學說】李時珍曰：大腹子，出嶺表，嶺南，即檳榔中一種腹大，形扁，而味澀者；不似檳榔尖長，而味良耳！所謂：豬檳榔者，是也。蓋亦土產之異，今人不

甚分別。陶氏：分陰陽之說；亦是臆見。按劉涓子表錄云：交廣生者，非船上檳榔，皆大腹子也。彼中悉呼為檳榔。自嫩，及老，採實啖之。以扶留藤，瓦屋灰同食之，以祛瘴癘。收其皮入藥，皮外黑色，皮內皆筋絲，如椰子皮。

【別稱】又名大腹檳榔，豬榔檳。

大葷黃卷

【基本】為 *Cyperus Hirtellus* Maxim. 之發芽者，即用黑大葷，浸於水中，使其生芽，去皮，陰乾。又有用黑大葷，浸水中一晝夜，用稿包裹，使之生芽，而曬乾之。用時去皮，及芽，炒過為藥。

【功效】為清涼藥；有解胃熱，祛水腫之能。

其氣味甘平，無毒。除胃中積熱，治水病，腫脹，濕痺，筋羸，膝痛，破惡血，療口瘡。

【用量】六·〇——一四·〇服用。

【禁忌】惡海藻，龍膽。

【別稱】又名葷蕪，大葷卷，黃卷皮。

大葉麥門冬

(心蘭科)

【學名】*Taripeta stipitata*, Lour.

【產地】多自生於山野之陰地，或庭園之樹陰。

【基本】為一種溫草，根之中部肥厚，兩端細長，外部呈黃

白色，具有橫皺紋。其葉較小葉麥門冬，為闊而大

。所結果實，頗似紫金牛之果實，呈圓球形，為紫

黑色。採其根莖，及果實，供藥用之。

【功效】根莖：為鎮咳祛痰藥；並可應用於口渴，灼熱，及

顏面浮腫等。果實：為強壯藥；有滋養緩和之功。

【用量】一回。五——五。○服用。

土華

【學名】*Dioscorea Sutchiva* L.

【產地】生於山野之中，或栽培於園圃之間。

【基本】為多年生之纏繞植物，葉甚闊大，呈心臟形，互生

。夏日，葉腋綴以小花，帶淡黃色，為穗狀花序。

其根球形，直徑約二三寸，此植物全形，與薯蕷相

似；惟其莖，左旋為異。採其根，而為藥用。

【成分】含有多量之澱粉，及蛋白質，脂肪，炭水化合物。

【功效】為滋潤藥。

其氣味甘辛，微寒；能解諸藥毒，去熱，止嗽。食

之甘美，不飢，厚人腸胃。

【用量】四。○——二。○——二四。○服用。

【別稱】又名土卵，黃獨，土豆。

土參

(五加科)

【學名】*Adiantum japonicum* Maxim.

【產地】多生於深山之陰地。

【基本】為多年生草，春日萌出，三年者，夏月莖高至二尺

餘，地下有根莖，略與竹類之根相似。葉為掌狀複

葉，花細小，白色；花瓣五枚，為繖形花序；花後

結實，大如小豆，秋日成熟，呈赤色。採其根莖，

供藥用之。

【成分】含有一種糖原質。

【功效】為健胃藥，解熱藥。因似有 *galeolite* 之成分，又可

為祛痰藥。

【用量】一回。○——三。○為煎劑，浸劑服用之。

【別稱】又名竹節人參，佛掌參，竹鞭人參。

土黃

【基本】據李時珍曰：用磁石二兩，木鼈子仁，巴豆仁，各

半兩，礱砂二錢，為末，用木鼈子油，石腦油，和

成一塊，用油紙包裹，埋在土坑內，四十九日，取

出，分作小塊，盜器收貯，備用。
【功效】爲腐蝕藥；又可爲變質藥。

其氣味辛酸，大溫，有毒。治諸瘡惡肉，贅殖，痔瘡，乳癰。

【用量】一回〇〇一——〇〇三用之。

土菌

【基本】爲地衣體 (Lichenbody) 類之一種。據陳藏器曰：凡從地生田者，爲菌；木生田者，爲蕈。此類形多種

，皆一屬也。

【成分】含有 Lichenes 之類。

【功效】據云：其氣味甘寒，有毒。主療瘡疥，下疳，須取其曬乾爲末和油，塗敷之。

【別稱】又名杜草，地草，蕈子，地雞，獐頭。

土蜂

【學名】*Dielis vitifrons*, sch.

【產地】多生於水池，及河邊之中。

【基本】此屬於膜翅類之有刺類，黑色，小形，每營巢於水中。可取其蟲之子，及巢，而爲藥用。

【功效】民間多爲癰疽，癰痔之消腫藥。

據云：其氣味甘平，有毒。主療癰腫，以其末和醋，調敷，甚效。

【學說】陳藏器曰：土蜂，穴居作房，赤黑色。最大者，螫人至死；亦能釀蜜。其子亦大，而白。蘇頌曰：土蜂子，江東人，亦啖之。又有木蜂，似土蜂，人亦食其子；然則蜜蜂，土蜂，木蜂，黃蜂子俱可食。大抵蜂類，同科，其性效，不相遠矣。

【別稱】又名蜚零，蠶蜂，馬蜂。

土木香

(菊科)

【學名】*Inula Heleum*, L.

【產地】多自生於山野，或栽植於庭園之中。

【基本】爲宿根草，莖高五六尺，葉下部爲長卵圓形，有長柄，上部者細小，有茸毛，邊緣有粗鋸齒。夏月在莖上分數枝；頂上開花，黃色，爲頭狀花序；而後結實，呈淡褐色。其根，可採取，而爲藥用。

【成分】根含多量之菊糖 (Inulin) 物質，及 Heleum，與樹脂，揮發油等。

【功效】爲健胃藥；又可作爲肺病藥。

其性溫，味苦，而有芳香之氣。能祛痰，鎮咳，平

胃，療脾。

【用量】一回二〇——一〇〇〇服用之。

【製劑】土木香越幾斯 *Extratum Inula Helatum*。

此即以土木香一〇〇〇，浸於酒精一〇〇〇〇中，而製成之一種褐色越幾斯。每與礮砂配伍，為祛痰，鎮咳藥。一日三回，每回二〇〇——五〇〇服用之。

【採製】擇其年老(約三年)之根，採掘之，晒乾，備用。

土茯苓

【百合科】

【學名】*Heterosmilax japonica* Kih.

【產地】多生於山谷之中。

【基本】為常綠攀登植物，有雄本，雌本。春月延蔓，每葉下有卷鬚，葉腋出花梗，開十餘花，色紅綠不一。

秋後結實，圓形，熟則黑色。其根如鴨卵，連綴而生，遠者離尺許，近者數寸，肉多而軟，有赤白二色；取其白者，入藥用之。

【功效】為變質藥；有清血，解毒之作用，可為梅毒之驅毒

藥。

其味甘，淡平，無毒。能健脾胃，強筋骨，去風濕

，利關節，止泄瀉。治拘攣，骨痛，惡瘡，癰腫；

解毒類毒。

【用量】六〇——一二〇〇服用。

【製劑】土茯苓丁酸 *Tinctura Heterosmilax*。

此即以土茯苓一〇〇〇，浸於酒精五〇〇〇，水五〇〇〇中，經一週後，而壓濾之，所得液體，即是。為梅毒性骨膜炎，及筋肉炎之效藥。一日六〇〇——一四〇〇，分三回服用。

【禁忌】忌茶。

【別稱】又名土萆薢，刺猪苓，山豬糞，草萬餘糧，仙道糧，冷飯團，硬飯，山地粟。

土荊芥

(藥科)

【學名】*Onopordium umbrosidea* L.

【產地】自生於田野，或栽植於庭園，皆有之。

【基本】為一年生草，莖高一二尺，柔而有綠稜，呈淡綠色。葉為披針狀，邊有鋸齒，互生。夏日葉腋開花，甚小，為綠色。可取其葉，莖，供藥用之。

【成分】含有揮發油，樹脂，及鹽類等；並具有樟腦樣之臭

氣。

「功效」爲健胃藥，通經藥，及神經藥，強壯藥；但外用，

以其葉貼於患處，可治毒蟲刺傷。

「用量」一四〇・三——一〇服用。

「製採」八月，採取葉莖，晒乾，備用。

「別稱」又名鵝腳草。

土骨皮

(殼斗科)

「學名」*Quercus serrata*, Thunb.

「產地」山野中，多自生之。

「基本」爲落葉喬木，高達二三丈，酷似栗樹。葉披針狀，

邊緣有鋸齒；而新葉爲倒卵圓形，具有毛茸。開花

爲單性，雌雄同株，結實爲堅果，外殼呈碗狀形。

採取其幹皮，供藥用之。

「成分」含有單寧酸類之物質。

「功效」爲收斂藥；可應用於赤痢，及便血等。

其氣味溫苦。能止赤白痢疾，腸風，下血；而外用

以其煎汁，洗惡瘡。

「用量」一・五——一七・五服用。

「採取」採取外面蒼白，裏面褐色之幹皮，備藥用之。

「別稱」又名赤龍皮，國木皮，櫻皮，皂斗皮。

土馬蹄

(土馬蹄科)

「學名」*Polygonum commune*, L.

「產地」生於山野陰溼之地。

「基本」爲常綠隱花植物，多年生草，莖高四五寸，細長而

直立。葉小披針形，常密生，有長柄，生於莖頂。

子囊方形，白色，附生長毛。可取其全草，而爲藥

用。

「成分」含有 Tannins 之類。

「功效」爲收斂藥；有止血之能。

其氣味甘酸，微寒，無毒。治骨熱，敗煩，九竅出

血，二便不通。

「用量」二・〇——六・〇服用。

「學說」掌禹錫曰：所在背陰古牆垣上有之，歲多雨，則茂

盛，或以爲垣衣非也。垣衣，生牆垣之側，此生牆

垣之上，比垣衣更長，故謂之土馬蹄；亦苔衣之類

也。李時珍曰：垣衣，乃磚牆上苔衣，此乃牆上之

烏韭也。

土當山

(虎耳草科)

「學名」*Hymenogon Thunbergii*, Steud.

「產地」生於山地，亦有栽培於庭園者。

「基本」爲落葉灌木，春間出長，葉爲廣披針形，長約三四寸，對生。夏月開花，如繖形，外面之花，大五六分，中心之花，大三分，初青，後變紅色，亦有白色者。可取其嫩葉，供藥用之。

「成分」含有 Hydruin 之成分。

「功效」民間多採取其新葉，除去其綠汁，使之乾燥，以供

飲料。

其味甘，無毒。似有清涼健胃之能。

「用量」一回二〇——五〇服用。

「採製」採取嫩葉，榨去綠汁，晒乾，（或炒乾）備用。

「別稱」日本名爲甘茶。

土殿薯

「基本」此爲右鐘乳 (Balata) 之一屬；但產生於土中者是。其色白如脂，光澤可愛，故人多琢爲假山，以充玩物貨之。昔時，亦取爲藥用。

「成分」含有碳酸石灰等。

「功效」據名醫別錄云：其氣味鹹平，無毒。能治大熱，乾癆，及婦人陰蝕。

「學說」李時珍曰：此卽鐘乳之生於崖土中者；南方名山多有之。人亦掘爲石山貨之，充玩，不知其爲土中乳也。

也。

「別稱」又名土乳。

土當歸

(五加皮科)

「學名」*Amlia coriata*, Thunb.

「產地」生於山野，或栽培於園圃之間。

「基本」爲多年生草，高至五六尺，葉大，爲二回羽狀複葉；其小葉爲卵圓形，而尖。夏秋之間，開小白花，爲繖形花序。果實，呈紫黑色。採取其根，供藥用之。

「功效」爲驅風藥。

本草綱目云：其氣味辛溫，無毒。能除風，和血。

外用治手足閃掣，和荆芥，葱白，煎汁洗之。

「用量」三〇——一〇〇和酒煎服。

土撥鼠

「產地」吾國東三省，以及蒙古各地，皆產生之；故蒙古語，稱爲容刺不花，卽黑牝牛之義。

「基本」此種動物，穴土而居，其形如獾，皮可爲裘，肉可

爲藥。

【功效】民間，每食其肉，以治瘰癧等。

【別稱】又名答刺不花。

女青

(羅摩科)

【學名】*Gymnethum oandatum*, Maxim.

【產地】吾國北方之濕地，最多產生。

【基本】爲多年生之一種蔓草，葉對生，而尖，爲心臟形；

葉腋內生花，色白，形小，爲繖形花序。雄蕊，有

花粉塊。果實爲紡錘狀之乾果，成熟後，則裂開，

散出種子，有白色長毛。其地下莖，可供藥用之。

【成分】含有安母尼亞之臭氣。

【功效】爲刺戟藥。

神農本草經云：其氣味辛平，有毒。能逐惡氣，辟

瘟疫，殺鬼崇，除蠱毒。

【別稱】又名雀瓢。

女貞

(木犀科亦作枸骨科)

【學名】*Ligustrum japonicum*, Thunb.

【產地】多生於山野之中。

【基本】爲常綠灌木，高至十尺餘，葉對生，呈卵形，似山

茶之葉。夏月枝梢開花，花小，色白，雄蕊二枚，

爲圓錐花序。結成果實，形小，黑色，長卵圓狀，

具有尖頭。可取其子實，及葉，供藥用之。

【功效】子實：爲強壯藥；民間有以其子炒之，而代咖啡飲

用。葉：爲諸癆消毒，鎮痛藥，皆可服用。

其味甘，苦平，無毒。能補中，安五臟，養精神，

除百病。久服肥健，輕身，不老。

【用量】三〇——六〇煎服。

【學說】李時珍曰：女貞，冬青，枸骨三樹也。女貞，即今

俗呼蠟樹者。冬青，即今俗呼凍青樹者。枸骨，即

今俗呼貓兒刺者。東人因女貞茂盛，亦呼爲冬青，

其與冬青，同名異物；蓋一類二種耳！二種皆因子

自生最易。其葉長厚而柔，爲綠色。面青，背淡。

女貞葉長者，四五寸；子黑色。凍青葉，微圓；子

紅色，爲異。其花皆繁子，並繁葉滿樹。冬月，鸚

鵡，喜食之。木肌，皆白膩。今人不知女貞，但呼

爲蠟樹。立夏前後，取蠟蟲之種子，裏置枝上，半

月；其蟲化出。延緣而上，造成白蠟，民間大得其

利！

〔別稱〕又名貞光，冬青，蠟樹。

女萎

(毛茛科)

〔學名〕 *Clematis aptifolia* De.

〔產地〕山野中，多自生之。

〔基本〕為多年生之蔓草，莖甚細長，以葉柄卷絡於他物上，葉為複葉，自三小葉而成，邊緣，有三缺裂，對生。夏月莖端，開白色小花，果實為閉果，密生毛茸。採取其莖，供藥用之。

〔功效〕為收斂藥。有消化，止瀉之作用。

其氣味辛溫，無毒。治風寒酒酒，寒熱百病，驚癇，出汗，霍亂，下痢，腸鳴遊氣。

〔用量〕三。〇——六。〇服用。

〔學說〕蘇恭曰：女萎，葉似白欒，蔓生，花白，子細。荆襄之間，名為女萎；亦名蔓楚。用苗，不用根，與萎蕤全別。今太常，誤以為白頭翁者是也。

女苑

(菊科)

〔學名〕 *Aster foeniculatus* Fisch. et Mey.

〔產地〕生於原野之溼地。

〔基本〕為一種宿根草，莖高一二尺，有細長之葉，互生。

夏日開白黃色之小頭狀花，如傘形。採取其根，供藥用之。

〔功效〕為祛痰藥，及收斂藥。

本草經云：其氣味辛溫，無毒。能止霍亂，下痢。

治肺傷，噎逆，出汗，久寒。

〔用量〕二。〇——八。〇服用。

〔別稱〕又名白苑，女復，柳。

第四畫

不灰木 *Alchor*

〔產地〕常產於岩石之間。

〔基本〕亦角閃石之一種，其狀如絲，有彈力，質脆弱，而易碎，白色，或灰綠色，光澤如絹，狀軟如綿。昔時，亦常為藥用。

〔功效〕據開寶本草云：其味甘，大寒，無毒。有用於肺熱，咳嗽，咽喉腫痛等。又有以其和棗葉，石灰，為瘡疔之粉藥，有效。

〔學說〕李時珍曰：不灰木，有木石二種，石類者，其體堅重；或以紙裏蘸石腦油，然燈燉一夜，不成灰。

〔別稱〕又名無灰木；通稱有綿也。

不開木

【基本】為灌木植物，高二三尺，莖赤有毛，如棠梨狀。葉似槐葉。四時不凋，故有斯名，亦為藥用之。

【功效】據本草拾遺云，其氣味苦溫，無毒。能調中，補衰，治腰脚，祛風氣，却老變白。

丹砂

【學名】Hydrargyrum sulfuratum Rubrum.

【產地】湖南辰州，產生最多。

【基本】為水銀，硫黃之天然化合物；呈塊形，或六角形之結晶。色甚鮮紅，即俗稱之朱砂也。但近來每以水

銀；及硫黃華之混合物，納入於輕養化鉀之水溶液

中，而製成之。為鮮赤色之重粉末，在空氣中不變

化，亦不溶解於水，及酒精中；惟浸於酸類，及亞

爾加里類（即鹼類），則能溶解；故王水（Aqua

Nitro-Hydrochloricum）頗易溶解之。

【成分】含硫化汞 Hg_2S 之成分。

【功效】昔時常用為鎮痙靜藥，服之能養精安神，清熱解

毒等；但今因其所含成分已明，決不可盲從其理，

現有以其為熏烟藥者，用於梅毒性，及寄生蟲性之

皮膚病。或為吸入藥者，用於梅毒性之咽喉，喉頭

，及鼻腔發炎等，然用之者亦少；惟用為丸藥之衣等。以其鮮美赤紅，亦有用於粉粧之製藥上耳。

【用量】一回五〇——三〇。〇為皮膚病外用熏烟藥；又

以其一〇——三〇飽充於烟草之內，為吸入藥

等。

【別稱】名見本草經，又稱朱砂；俗稱辰砂等。

丹參

（唇形科）

【學名】*Scutellaria indica*, L. var. *japonica* Maxim.

【產地】多自生於山野之間。

【基本】為一年生草，莖高二尺許，葉為奇數羽狀複葉，呈

心臟形，對生。秋初開淡紫色小唇形花，成為長穗

。根長尺餘，皮丹，肉紫，可作藥用。

【功效】為強壯藥，及通經藥。有破宿血，養新血之能；調

經，生胎之功，為婦科之要藥。

其味苦，微寒，無毒。治心腹邪氣，腸鳴幽幽如走

水，寒熱積聚，破癥除瘕，止煩滿，益氣。

【用量】三〇——九〇煎服。

【學說】李時珍曰：處處山中有之，一枝五葉，葉如野蘇而

尖，青色，絨毛。小花，成穗，如蟻形，中有細子。其根皮丹，而肉紫。

〔別稱〕又名赤參，山參，絳蟬草，木羊乳，逐馬，奔馬草等。

五加皮

(五加科)

〔學名〕 *Acanthopanax rhinosum*, Miq.

〔產地〕多自生於山野之間。

〔基本〕為落葉灌木，幹高六七尺，有刺。葉為掌狀複葉，

一枝有大葉五枚。春日開黃綠色小花，為繖形花序。

○實如豆，而熟則紫黑，皮輕而脆。可採其根皮，

供藥用之。

〔功效〕為鎮痛藥，有用於腹痛，疝氣等；又作為強壯藥。

其氣味辛溫，無毒。能補中，益精，強骨，健筋。

治腰痛，腳疼，腹痛，疝氣；並可順氣，化痰，祛

風，勝濕。逐皮膚之瘀血，療筋骨之拘攣。

〔用量〕一、七—五。○煎服。

〔禁忌〕惡玄參，蛇皮。

〔採製〕採根皮，以米泔水洗去泥土，除去粗皮及木心，剖

焙，燻藥。

〔學說〕名醫別錄曰：五加皮，五葉者良，生漢中，及宛句

○五月，七月，采莖，十月，采根，陰乾。李時珍

曰：春日於舊枝上抽條葉，山人採為蔬茹，正如枸

杞。生北方沙地者，皆木類，南方墜地者，如草類

也。唐時惟取陝川者，充貢。雷氏言：葉如蒲者，

非也。

〔別稱〕又名五佳，五花，文章草，白刺，追風使，金鹽，

木骨，豺漆，豺節。

五辛菜

〔基本〕據李時珍曰：五辛菜，乃元旦立春以蔥，蒜，韭，

薤，蒿，芥等，辛嫩之菜，雜和食之。取迎新之義

，謂之五辛盤。杜甫詩所謂：春日春盤細生菜，是

矣。

〔功效〕民間多於歲朝食之，據云：能發五臟。

其氣味辛溫，無毒。能助五臟，補中，除惡，消食

，下氣。

五味子

(木蘭科)

〔學名〕 *Schisandra chinensis*, H. Bn.

〔產地〕吾國南方，北方，皆有之。

基本 爲落葉纏繞之植物，葉生後，出細梗，通常倒卵形

，亦有作橢圓形，及卵形者；有銳端之淺齒，或全邊，凹凸作波狀。上面平滑，下面脈有短毛，長二至三寸。花開後，下垂，作小穗狀，呈淡黃白色，或略帶淡紅色，花瓣九枚，在外部者，較小，漸至內部，則漸大。實如小球，供藥用之。

「功效」爲祛痰鎮咳藥，可專應用於肺癆，喘息。又爲強壯藥，可用於衰弱者。對於腸癆病者之早晨下痢，尤效。

其氣味酸溫，無毒。能斂肺氣，滋腎水，強陰，澀精，益氣，生津，補虛，明目，退熱，斂汗，止嘔，止瀉，寧咳，定喘。

「用量」同之用量一。〇——二。〇——五。〇煎服。

「禁忌」惡寒藥，忌鐵；故剉劈須用銅刀爲妙。

「採製」採實，酒浸，晒乾，炒用；或蜜浸至黃熟，乾用；或生用。（止咳多生用）

「學說」名醫別錄曰：五味子，生齊山山谷，及代郡。八月採實，陰乾。李時珍曰：五味，今有南北之分，南產者，色紅；北產者，色黑。入滋補藥，必用北產

者，乃良。亦可取根種之，當年就旺；於二月種子，次年乃旺，須以架引之。

「別稱」又名葶藶，玄及，會及。

五倍子

（漆樹科）

「學名」*Rhus semihirtata* Merr. var. *obovata* Pe

「產地」自生於山野之間；但日本最多。

「基本」爲落葉喬木，莖高三丈，葉爲奇數羽狀複葉，長尺餘，有柄。小葉無柄，長卵形。葉端尖，邊緣有鋸齒，面綠色，有毛；背淡綠色。夏月梢頭開花，爲圓錐花序。花小，綠白色；花後結小核果，蜜生紫色，及白色之短毛。至成熟時，則蜷曲聚集。每由此蟲刺傷其嫩枝，或葉柄；由其生卵，自然膨脹，爲囊狀之蟲瘤，呈卵形，或不正球形；並有多數突起物。皮爲灰褐色，甚爲堅脆，中藏小蟲之卵，及死蟲。可取其囊皮，供藥用之。

「成分」含有單酸，樹脂，澱粉，糖等。

「功效」爲收斂藥；有止血之特能，可用於下痢，及出血；並亦可外用爲收斂藥。

其氣味酸平，無毒。治腸虛，泄瀉，五痔，下血，

脫肛，腸墜；並能生津，化痰，止咳，止血。又外用於風濕，疥癬，膿毒，疔瘡。

【用量】一·五——三·五服用。

【製精】五倍子丁幾 *Tinctura Gallarum*

此即以五倍子一〇〇，浸於稀酒精五〇〇中，而製成。可內服，為收斂藥。用於出血及下痢等。一日數回，與以二十滴至四十滴；但近來多外用，為凍傷等之塗擦料。

【禁忌】忌鐵。

【採製】取其蟲囊，宜炒焦，備用。

【學說】李時珍曰：五倍子，雖知生於楮木之上，而不知其乃蟲所造也。楮木，即鹽楮子木也。此木生叢林處者，五六月有如蟻食其汁，老則遺種，結小球於葉間，正如粘蠟之作雀窠，蠟蟲之作蠟子也。初起甚小，漸漸長堅，其大如拳，或小如菱，形狀圓長不等。初時青綠，久則細黃，綴於枝葉，宛若結成，其殼堅脆，其中空虛，內有小蟲。山人霜降前採取，蒸殺貨之；否則蟲必穿窺，而殼薄，且腐矣。皮工造為百藥煎，以染皂色，大為時用。他樹亦有此

蟲球，不入藥用，水性殊也。

【別稱】又名文蛤，百蟲倉；法釀過名百藥煎。

五欲子

(酢漿草科)

【學名】*Averrhoa Carimbola*, L.

【產地】原產於東印度等地。

【基本】為常綠灌木，高十尺餘，葉為羽狀複葉，自許多小葉而成。其花，與酢漿草花相似，係完全花。所結果實，可供藥用。

【成分】含有檸檬酸，酒石酸等。

【功效】為清涼解熱藥。

其味酸甘，澀平，無毒。治風熱，能生津，止渴。【學說】李時珍曰：五欲子，出嶺南，及閩中，閩人呼為陽桃。其大如拳，其色青黃，有五稜如劍，起作劍脊形，皮肉脆軟。其味初酸，久甘。其核如奈，五月熟，一樹可得數石，十月再熟，以蜜漬之，甘酢而美，俗亦晒乾，以充果食。

【別稱】又名五稜子，陽桃。

五靈脂

【產地】多產於熱帶之地方。

【基本】此爲寒號蟲 (*Troglodytes*) 之糞；該蟲爲蝙蝠中之最大者，古與蝙蝠，同入於鳥類，其尾甚小，頭及腹部帶赤色，餘皆墨色。體長尺餘，展翅可達二尺以外。其糞，即爲五靈脂，可供藥用。

【功效】爲收斂藥。

其氣味甘溫，無毒。主治婦人經水過多，赤帶不絕，胎前，產後，氣血諸病，及一切腹痛，疝痛，腸風，血痢；並能除風，化痰，殺菌，消積；又可用於蛇蠍蜈蚣之咬傷。

【用量】三〇——六〇服用。

【禁忌】惡人參。

【採製】取糞，研爲細末，酒飛過炒用。(止血用炒。行血用生。)

【學說】蘇頌曰：今惟河東郡州有之，五靈脂，色黑如鐵，采無時。李時珍曰：鷓鴣，乃候時之鳥也。五靈諸山，甚多。其狀如小雞，四足，而有肉翅。夏月，毛彩五色，自鳴若曰：鳳凰不如我。至冬，毛落如烏雞，忍寒而號曰：待過且過。其糞恒集一處，氣甚腥惡，粒大如豆，采之。有如糊者，有黏塊如糖

者，人亦以砂石雜而貨之。凡用以糖心潤澤者，爲真。

【別稱】又稱爲五靈芝，丹芝，白芝，藥本，生常山。

五色石脂

【基本】據名醫別錄云：五色石脂，生南山之陽山谷中。又

曰：青石脂，生齊區山及海涯。黃石脂，生嵩山，色如蒼蠟。黑石脂，生潁川陽城。白石脂，生太山之陰。赤石脂，生濟南射陽，及太山之陰。皆采無時。蘇頌云：白石脂，赤石脂，今惟潯州出之；潯州，與慈州相近。李時珍云：蒼之疑者，曰：脂。此物性黏，固濟爐鼎甚良。昔時，亦常供藥用。

【功效】據本草經云：五色石脂，性皆甘平。能止吐血，下血，及洩痢，血崩；治瘰癧，惡腫。久服補髓，益氣。

【禁忌】畏黃芩，大黃，官桂。

五倍子內蟲

【基本】此即五倍子內產生之 (*Aphid chinensis*, T. Bell.) 小蟲也。昔時，亦有用爲藥者。

【功效】據本草綱目云：每與爐甘石末，研爲乳狀物，點眼

，以治赤眼爛弦。

井中苔

【基本】此即廢井中所生之苔也。

【功效】據云：其味甘，大寒，無毒。能治水腫；療熱痞，

漆瘡，及湯火傷。

井泉石

【基本】據掌禹錫云：井泉石，近道處處有之，以饒陽郡者

為勝。生田野之中，穿地深丈餘得之。形如土色，

圓方，長短，大小不等，內實，而外圓。重重相疊

，采無時。又一種如盤石，時人多指為井泉石，非

是。昔時，亦常用之為藥。

【功效】據云其味甘，大寒，無毒。能消腫，止痛，解除一

切實熱。

井口邊草

（水龍骨科亦作羊齒科）

【學名】*Pteris Serrulata*, L. F.

【產地】多生於山麓石砌等處。

【基本】為常綠草本，根莖生毛頗密，為濃褐色，質硬而短

。葉長一尺許，叢生，有裸葉，實葉之別；為羽狀

分裂，皆一回，或二回，常作雞足狀裂片線形。裸

葉，邊緣有微鋸齒；實葉，在初夏時，沿葉緣而生
子囊羣。其子散落，而能繁殖。

【功效】據本草拾遺謂：有取此草私着席下，以定小兒夜啼

云。

元寶草

（金絲桃科）

【學名】*Hypericum Scarpsonii*, Heu.

【產地】多生於山野之陰土處。

【基本】為一種草本之植物，莖高尺許，葉無柄，對生。花

小而黃，集生於莖頂。萼五片，長卵圓形；花瓣，

亦五片，而卵圓形。花後，結為蒴果。有取其全草

，供藥用之。

【功效】據本草綱目云：能治吐血，衄血，跌撲，閃腰，挫

疼，瘰癧。

【學說】百草鏡云：元寶草，多於陰土，及近水處產生之。

發雨後，生苗。其葉中闊，而兩頭尖，如梭子形，

穿莖直上，或五六層或六七層。小滿後，開花，黃

色。

升麻

（毛茛科）

【學名】*Cimicifuga foetida*, L. var. *Stimpfers*, Hutch.

『產地』多自生於溪間之陰地，以蜀中出者為勝。

『基本』為多年生草，莖高二三尺，葉為複葉，小葉有缺刻，及鋸齒。夏月開白花，成總狀花序。其地下莖，為數塊連生而成，外部呈青黑色，內部呈青綠色，可採取之，而為藥用。

『功效』為解熱藥；能消除咽痛，麻疹，痘瘡，霍亂斯之熱，及諸瘡之毒。

其氣味甘苦，平微，無毒。能安魂，定魄，補脾胃，發浮汗，解百毒，辟瘟疫；並治寒熱風腫，咽痛，喉痛，肺痿，嗜睡等。

『用量』一。○——三。○煎服。

『製劑』升麻丁幾 *Tinctura Tilioma (China) foehnia*.

此即以升麻一。○。○，浸於稀酒精五。○。○中，而製成一種液體。功用相同，一日三回，○。五——

一。○為水劑，服用之。

『禁忌』忌火。

『採製』採取其根，以米泔水浸之，去其黑皮，及鬚根，到用。

『學說』據名醫別錄云：升麻，生益州山谷，二月，八月采

根，日乾。蘇頌云：今蜀漢，陝西，淮南州郡，皆有之，以蜀川者為勝，春生苗，高三尺以來。葉似麻葉，並青色。四月，五月着花似粟穗，白色。六月以後結實，黑色。根如蒿，紫黑色，多鬚。

『別稱』又名周麻。

及己

(金粟蘭科)

『學名』*Chloranthus serratus*, R. et S.

『產地』生於山野之陰地。

『基本』為多年生草，高至一尺許，葉有顯明之節，不分枝；其上部之節上，則生四葉為常，葉呈卵圓形，而尖，有鋸齒，互生。春夏之交，開細小之白花，為穗狀花序。可採其根，入藥用之。

『功效』為外用驅毒消腫藥。

其氣味苦平，有毒。能治惡瘡，疥毒，頭禿白癬，皆可以煎汁洗之。

『用量』僅須外用，煎汁，為洗滌料。

『學名』蘇恭云：及己，生山谷陰虛軟地，其草一莖，莖端四葉，隨着白花。根似細辛，而黑，有毒。今人以當杜衡，非也。二月采根，日乾。

「別稱」又名菴耳細辛。

巴豆

(大戟科)

【學名】*Croton Tiglium, L.*

【產地】吾國，及錫蘭，馬路古，麻刺拔爾各地皆產，惟日本不產。

【基本】為常綠灌木，高丈許，葉為卵形，端尖；葉腳有蜜腺二花，小花叢之上部，為雄花；下部，為雌花。色呈淡黃，實成房，其殼脆薄，熟則分裂，子出，即巴豆子，可榨出油。其子及油，皆可入藥。

【成分】含有脂肪油，及揮發油，樹脂等。

【功效】為峻下藥。

其氣味辛溫，有毒。能殺蟲，解毒，開通閉塞，利水殺菌。破癰癤，結聚，墜積，留飲，痰癖等。且治瀉痢，驚癇，心腹痛，疝痛。更能開胃，健脾，消痰，破血。療一切惡瘡，疥癩。

【用量】〇．一——〇．一五服用。

【製劑】巴豆油 *Oleum Crotonis.*

此即以巴豆壓榨而得之黃褐色，濃稠，透明之油液。有特異之臭氣。其功用相同，一回與以〇．〇一

——〇．〇五為粉劑，丸劑，服用之。

【禁忌】畏大黃，黃連，藜蘆，牽牛，及冷水。

【採製】採實，去子皮及心，用紙包裹，壓榨取油，再易紙，用細竹榨，至油盡為度。炒過，備用。

【學說】李時珍曰：巴豆房，似大風子殼而脆薄；子及仁，皆似海松子。所云：似白豆蔻者，殊不類。

【別稱】又名豆菴，剛子，老陽子。

巴旦杏

(薔薇科)

【學名】*Prunus Amygdalus Socke.*

【產地】原產於亞細亞之中部。

【基本】為落葉樹木，高至十五尺許，葉披針形，與桃葉相似。花無梗，雄蕊，多於花瓣，雌蕊，一枝常二花，相聚而生。通常者取其仁，供藥用之。

【成分】含有酒石酸，草蓼酸等。

【功效】民間每以其為清涼解熱用之藥。

其氣味甘溫，無毒。能清肺，潤燥，止咳，通氣；消除一切心腹之逆悶。

【用量】六．〇——九．〇——一二．〇服用。

【學說】李時珍曰：巴旦杏，出回回舊地，今關西諸土亦有

，樹如杏，而葉差小。寔亦尖小，而肉薄。具核，如梅核，殼薄，而仁甘美，點茶食之，味如榛子，西人以充方物。

【別稱】又名八擔杏，忽鹿麻。

巴戟天

(茜草科)

【學名】*Dioscorea oppositifolia*, Gaertn. var. *gigantea*, Makino (D. major, B. et Z.)

【產地】多生於山林之內；以蜀中產者，為最佳。

【基本】為常綠草，葉厚而大，至秋開花，結實。根如連珠，可供藥用。

【功效】為強壯藥；可用於陰萎，遺精等。

其氣味辛甘，微溫，無毒。能補中，益氣，滋精，培志，安五臟，調血脈，強筋骨，利男子。治五勞七傷，頭面遊風，腳氣，水腫，小腹及陰中相引痛，陰萎，洩精。

【用量】一回五〇——一〇〇。

【採製】去心，取皮，焙之。或浸酒中一宿，到焙入藥。

【學名】名醫別錄曰：巴戟天，生巴郡下郡及山谷。二月，八月，採根，陰乾。陶弘景曰：今亦用建平，宜都

者，根狀如牡丹而細，外赤，內黑，用之打去心。蘇恭曰：其苗，俗名三莖草，葉似茗，經冬不枯。根如連珠，宿根青色，嫩根白紫，用之亦同；以連珠多肉厚者，為勝。

【別稱】又名不凋草，三莖草。

孔雀

【學名】*Pavo cristatus* L.

【產地】多產於印度各地。

【基本】為屬雞類之動物，體似雉而大。雌雉頭上，戴有紅青色之毛冠。雄較雌壯麗，由背部生長羽。本為金色，或綠青色，雜以斑點，為眼球形，排列於上，如寶珠懸於錦繡也。真尾甚短。背上之長羽。以尾羽支攤之。擴為扇形。雌羽色較遠。亦雌雄淘汰之結果也。時昔，以其肉，血，及糞等，皆有用為藥者。

【功效】據云：肉味鹹涼，略有小毒。能解藥毒，蝨毒。其生血，亦然。其糞能治婦女帶下，及小便利；又可外用於惡瘡等。

【別稱】又名越鳥。

孔公孽 *Malachite*

「產地」湖南綏寧縣，四川璧源縣，洪雅縣，最多產生。

「基本」此結晶屬一斜晶系，甚為罕見，常見者呈扁菊狀，鐘乳狀。其集合體則為纖維狀塊。據名醫別錄云：

此即般孽根也。青黃色，生梁山山谷。陶弘景云：

此即今鍾乳狀也。亦出始興，皆大塊打破之。凡鍾乳之類，有三種，同一體，從石室上汗溜積久盤結者，為鍾乳狀，即孔公孽也。其以大小蕞蕪者，為

般孽。大如牛羊角，長一二尺，今人呼此為孔公孽也。般孽復溜輕好者，為鍾乳。雖同一類，而療體

各異，貴賤懸殊，三種同根而所生，各處當隨其土地為勝耳！李時珍云：以靈石，通石，二石而推之

，則似附石生而粗者，為般孽；接般孽而生，以斷

空通者，為孔公孽；接孔公孽而生者，為鍾乳。蓋般孽，如人之乳根；孔公孽，如乳房；鍾乳，如乳

頭也。

「成分」含有碳酸銅之成分。

「功效」據云：其氣味辛溫，無毒。能治傷食不化，以及惡瘡癩痔，與男子陰瘡，女子陰蝕。

「別稱」又名孔公石，通石，俗稱孔雀石。

太乙餘糧

「產地」各處鐵礦，最多產生之。

「基本」此為赤鐵礦之與粘土混合者也；呈赤色之石。

「成分」含有養化鐵之成分。

「功效」為收斂藥，止血藥；可用於貧血之患者。

據云：其氣味甘平，無毒。能治噎逆，上氣，癩癩，血閉，漏下。久服耐寒暑，不饑，輕身，飛行千里。

「用量」一。〇——三。〇用之。

「別稱」又名石腦，禹袁。

天牛

「學名」*Atrium nigriceps*, Chev.

「基本」此屬鞘翅類之隱五節類，體長圓筒狀。頭部，方形。複眼，蠶豆形，黑色。觸角，鞭狀，較體稍長。

大腮，尖銳。前胸背，多橫綫，兩側有一個之棘狀突起。前翅革質，為暗綠色。基部，有黑色之小突起，為顆粒狀。後翅膜質，透明。腹部，黃褐。脚

細長，被灰色之短毛。幼蟲，謂之鐵砲蟲，體圓柱

狀，被乳白黃褐之短毛。頭部扁平，長方形。具尖銳之大腮。體之第一節膨大，第二，第三兩節細；由是至尾部，漸大。腹，背均富於顆狀突起。脚缺。

○七八月頃，桑，楮，蜜柑，無花果等之近旁甚多。○以大腮穿孔於樹幹，產卵於其內，幼蟲，最初食樹皮下之形成層，旋蝨入木質部，作卵形之孔，蝨化於其內，集木屑，以覆其體軀。通常除治之法，以黏土密封其孔，或以紙捻附著石炭酸以殺之；但昔時亦常取之為藥。

【功效】據本草綱目云：此蟲，有毒。能治瘰癧寒熱，小兒急驚，及疔腫，箭毒。

【別稱】又名天水牛，八角兒；其一角者，名為獨角仙。

天雄

【產地】山野多自生之。

【基本】此為附子之不生種根者，採取之，而為藥用。

【功效】據云：其氣味辛溫，而有大毒。（陶弘景曰：味甘，大溫。）能發汗，明目，通九竅，暖腎臟，助陰道，調血脈，強筋骨，利皮膚，益志，強精；並治頭風；面腫，心腹積聚，霍亂轉筋；又能排膿止痛。

，治癰結，金瘡。

【用量】一。○——三。○煎服。

【禁忌】惡腐婢，惡葷汁。

【採製】采得，以生熟湯浸半日，勿令成氣，取出，以白灰裹之，數易，使乾，備用。

【學說】李時珍曰：天雄，有二種。一種是蜀人種附子，而生出長者，或種附子，而盡變成長者，即如種芋，形狀不一之類。一種是他處草烏頭之類，自生成者，故名醫別錄註烏喙云：長三寸以上者，為天雄是也。入藥，須用蜀產，曾經釀制者。或云：須重一兩半，有象眼者，乃佳。

【別稱】又名白蒜。

天仙藤

【基本】據蘇頌云：此生江淮，及浙東山中，春生苗，莖作藤，葉似葛葉，圓而小，有白毛，四時不凋。根有鬚。夏月採取根苗，南人多用之。

【功效】其氣味苦溫，無毒。能活血，舒氣，消腫，解風勞。每同麻黃而治傷寒無汗；又同大黃能墮胎。

【用量】二。○——五。○——一〇。○煎服。

天名精

(菊科)

【學名】*Crithmum abrotanoides*, L.

【產地】生於山野中。

【基本】為根生葉之植物，就地叢生，葉與烟草之葉相似，而稍小，有鋸齒，絨毛。夏秋之際，抽莖三尺許，自莖分枝，葉腋出短梗之頭狀花序，呈黃綠色。通常取其根及葉，供藥用之。

【功效】為清涼解熱藥。

其氣味甘苦，無毒。(李時珍云：有小毒，因生汁服用，能使人吐)。能瀉熱，吐痰，破癥，逐水，殺蟲，解毒。並治口乾，舌燥，煩渴，衄血。療諸腫惡毒。

【用量】六。○——二。○煎服。

【學說】李時珍曰：天名精，嫩苗，綠色，似皺葉蕪芥，微有孤氣，淘淨燥之，亦可食。長則起莖，開小黃花，如小野菊花。

天花草

【產地】多生於山中。

【基本】為薔薇類之植物，形如松花，而大。色白，氣香。可

取其全草，而供藥用。

【功效】據云：其氣味甘平，無毒。(又作有毒)能益氣，殺蟲。

【學說】真瑞曰：天花草，出山西五百山，形如松花，而大

，香氣如薔，白色，食之甚美。

【別稱】又名天花菜。

天門冬

(百合科)

【學名】*Asparagus lucidus*, Lindl.

【產地】生於海邊；亦有栽培於庭園者。

【基本】為多年生蔓草，其莖纏繞他物，葉作鱗片狀，由葉腋生綠色小枝，彎曲如針，俗誤為葉。夏開細白花，亦有黃紫者。其根中部肥厚，而兩端尖，為不整之塊，以數個相連，外面灰褐色，內裏類白色，可採取之，而供藥用。

【成分】根含有亞斯巴拉金；而種子含有麻爾歐再之成分。

【功效】為祛痰鎮咳藥；又可作為強壯藥。

其氣味苦平，無毒。能保肺氣，定喘息，去寒熱，利小便，養肌膚，強筋骨。並治五勞七傷，吐血，咯膿。又能止咳，消痰。

【用量】四。〇——八。〇——一二。〇服用。

【製劑】「天門冬丁幾 *Tinctura Radix Asparagus Indicus*。

此即以天門冬根五。〇，浸於酒精及水各二五。〇中，經三日後，壓濾之，所得液體即是。一日三。〇——六。〇服用，為祛痰鎮咳藥。

【禁忌】忌鯉魚。

【採製】取根，剝其根皮，切開，去心，焙用。

【學說】名醫別錄曰：天門冬，生奉高山谷。二月，三月，

七月，八月採根，曬乾。陶弘景曰：奉高，即泰山下縣名，今處處有之，以高地，大根，味甘者，為好。

【別稱】又名葇冬，顛勒，顛棘，天棘，萬歲藤。

天南星 (天南星科)

【學名】*Arisaema japonicum*, Bl.

【產地】多產於山野之陰濕處。

【基本】為多年生草，高三四尺，葉為複葉，夏間開花，草性黃色，列為肉穗花序，有苞覆之。根似芋，而圓扁，外面為灰褐色，內面呈白色之粉狀物。採取其根，供藥用之。

【功效】為祛痰，鎮靜藥，有緩解小兒急劇癲癇之能。又可用為健胃，發汗，驅蟲藥。

其氣味苦溫，有毒。主治中風，麻痺，除痰，下氣，驚風，急癇，口眼喎斜；並治癰腫，惡毒。

【用量】一回一。〇——三。〇——五。〇服用。

【製劑】「天南星丁幾 *Tinctura Tubera Arisaema*

此即以天南星根粗末一〇。〇，浸於稀酒精五〇。〇中，而製成一種液體。其功效相同，一日三回，與以一。〇——二。〇為水劑服用之。

2 牛胆南星

此即十二月割取黃牯牛胆，入天南星末，風乾，陳久者良。

【禁忌】忌鐵。

【採製】取根，以紙包之，埋於熟灰中炮，銅刀剉碎，以生薑汁，或明礬水，浸之一時，取出，曬乾，焙用。

【學說】李時珍曰：大者，為虎掌南星；小者，為山慈，乃一種也。今俗又言：大者，為鬼臼；小者，為南星，殊為誤謬。

【別稱】又名虎掌，虎骨，鬼齒菌。

天靈蓋

Cranial bones.

「基本」此即人之頭蓋骨，埋於土中數年者。擇其年限愈久者，入藥愈佳。

「功效」民間有用於肺癆，瘵疾等。

據云：其氣味鹹平，無毒。主治尸疰，鬼氣，傳尸，久瘵，勞瘵，寒熱無時者。可燒令黑，研末，白飲。又有用於肺痿，乏力，羸瘦，骨蒸，盜汗等。

「別稱」又名腦蓋骨，仙人蓋，頭顱骨。

毛茛

(毛茛科)

「學名」*Thamnochilus acor*. L. var. *japonica*. Maxim.

「產地」生於山野之間。

「基本」為多年生草，高二三尺許，葉為掌狀分裂。夏月開

花於莖頂，黃色，或白色，花瓣五片，亦有複瓣者。其雄蕊，有多數排列，成為頭狀。果實為乾果，多而且小，集成球形。多取其子及葉，而為藥用。

「成分」含有黃色素之乳樣液體。

「功效」為苛烈刺激性之引赤藥。

其氣味辛溫，有毒。能外用於惡瘡，癰腫之疼痛，而未潰者，可以其葉搗爛貼敷之；但已潰者，不可

用。

「學說」李時珍曰：毛茛，毛茛，即今毛茛也。下濕者即多

。夏生苗，高者尺餘，一枝三葉，葉有三尖及細缺，與石龍芮莖葉一樣；但有細毛為別。四五月開小黃花。

「別稱」又名毛建草，水茛，毛葦，猴蒜。

毛茛

(藜科)

「學名」*Polygonum barbatum*, L.

「基本」本植物，為藜屬之一種。據陳澹器云：毛茛生山足，似馬藜，葉上有毛，冬根不死。李時珍云：此即藜之生於山麓者，非澤濕之藜也。通常取其莖葉，而為藥用。

「功效」為防癆消腫藥。

其氣味辛溫，有毒。每用其煎汁，以為癰腫惡瘡之湯洗藥；兼瀉足，治腳氣。

爪甲

「基本」此即人之指甲遊離端，以剪刀剪去之，而備藥用。

「功效」民間多用之為止血藥。

其氣味甘鹹，無毒。鼻衄，以末吹之，立止。並能

催生，下胞衣，利小便，治尿血，及陰陽易病，破傷，中風，去目翳。

〔別稱〕又名筋退。

方解石 *Calcite*

〔產地〕江蘇溇鄉縣，安徽貴池縣，四川瀘縣，以及浙江錢塘，均有產者。

〔基本〕為灰石之透明而結晶者，呈菱狀六方結晶系，硬度甚底，極易破裂，無論小至何狀，仍不失原形，有白色者，亦有褐青灰色者，可為藥用。

〔成分〕含有碳酸石灰，及苦土亞鉛等。

〔功效〕為制酸藥。

其氣味苦辛，大寒，無毒。治胸中留熱，結氣，黃疸。通血脈，去蠱毒。

〔用量〕三。○——二。○煎服。

〔禁忌〕惡巴豆。

〔學說〕李時珍曰：方解石。與硬石膏相似，皆光潔如白石矣；但以辭之段段片碎者，為硬石膏；塊塊方稜者，為方解石。蓋二種，亦可通用。唐宋諸方，以此為石膏。今人又以為寒水石。雖俱不是，而其性寒

，治熱之功，大抵不相遠；惟解肌，發汗，不能如硬石膏，為異耳。

〔別稱〕又名黃石。

比目魚

〔學名〕*Pleuronichthys shirocaudus* T. et S.

〔產地〕多產於近海之砂底。

〔基本〕此屬於軟鱧類，體側扁。右側面，呈白色。左側面，呈砂色。兩眼皆生在此面。蓋幼魚之眼，雖與普通魚類相同，在頭之兩側對生，然由習性上漸轉其位置，而至側面矣。可取其肉，而食之。

〔成分〕含多量之蛋白質，及脂肪。

〔功效〕為強壯藥。

其氣味甘平，無毒。能補虛，益氣，強骨，增髓。

〔用量〕三。○——二。○——二。四。○食服。

〔別稱〕又名鞋底魚。

月桂

(樟科)

〔學名〕*Cinnamomum pekinesehutum* Nees

〔產地〕生於暖帶之地。

〔基本〕為常綠喬木，高三、四丈許。夏月自枝梢葉腋，出分

莖之長硬，開淡黃花。至秋則實熟，成黑色，可取之爲藥。

〔成分〕含有樟油。

〔功效〕據云，其氣味辛溫，無毒。能治小兒耳後月蝕瘡，

可以其粉末敷之。

〔別稱〕又名天竺桂。

月季花

(薔薇科)

〔學名〕*Rosa indica* L.

〔產地〕產於東南亞細亞，或栽培於庭園之間。

〔基本〕爲一種灌木，高至五六尺許，其嫩莖有刺。葉爲複

葉，其小葉三五枚，平滑而有光澤。開花，呈淡紅

色，大如壺狀，採取之，而供藥用。

〔成分〕含有少量薔薇油。

〔功效〕民間多用爲活血消腫藥；亦有用爲香料者。

其氣味甘溫，無毒。可貼用惡毒，血腫。

〔學說〕李時珍曰：處處人家多栽培之，亦薔薇類也。青莖

，長莖，硬刺，葉小于薔薇，而花深紅，千葉，厚

瓣，逐月開放，不結子也。

〔別稱〕又名月月紅，勝春，瘦客，鬪雪紅。

文蛤

〔學名〕*Chamaea fasciata* L.

〔產地〕多產於濕地之砂土中。

〔基本〕此屬瓣鰓類中之同柱類，介殼略呈三角形，表面灰

白色，具有光澤，並有二三列之放射狀暗色斑，足

力甚強，可取之，曬乾，爲末，備用。

〔功效〕據云：其氣味鹹平，無毒。能解煩渴，利小便，化

痰，定咳，並治惡瘡，五痔。

〔用量〕文蛤粉三。〇——九。〇服用。

〔別稱〕又名花蛤。

文鱈魚

〔學名〕*Chelodactylus japonicus*

〔產地〕多生於山海之間。

〔基本〕此屬鰩類之海魚也。背部與臀部雖小；而胸部頗

長，爲避敵難。能出海面飛行。尾歪，下葉大於上

葉。肉供食用。

〔功效〕據云：其氣甘酸，無毒。每有取其肉燒灰服用，以

治婦女難產等。

〔別稱〕又名飛魚。

火炭母草

「基本」據蘇頌云：生恩州原野中。莖赤而柔，似細蓼葉，端尖，近梗方形。夏有白花，秋實如椒，青黑色，味甘，可食，亦可供藥用之。

「功效」民間有用為消炎，消腫藥者。

其氣味酸平，有毒。能去皮腐風熱，流注，骨節痠腫疼痛，可取其子實搗爛，以鹽和酒炒過，貼敷腫痛之處，甚有效驗。

水仙

(石蒜科)

「學名」*Narcissus Tazetta*, L. var. *obliquus*, Kuhn.

「產地」產於暖地之海邊；但近來庭園中，亦多培養之。

「基本」為多年生草，高尺餘，葉狹長而扁平，有平行脈，叢生。冬月自葉叢之中心，生花莖，高約尺許，上有苞，苞開則出數花，如繖形。花白色帶黃，有香氣。其地下莖，為重疊之鱗莖，頗為肥大，呈圓球形，或卵圓形。可採取之，而為藥用。

「成分」含有 *Colchicine* 之有機鹼質，花含芳香油等。

「功效」民間每採其鮮根，碎之，貼布於瘰癧，癰疽，更有採取其花油，而為香料。如誤食其根，則發中毒，

而現吐瀉等。

其氣味苦微而辛，滑寒，無毒。能治瘰癧。其花，可用於婦人五心發熱。

「用量」花一。〇——三。〇服用。

「別稱」李時珍曰：水仙花，生下濕處。其根似蒜，及薤，而長，外有赤皮裹之。冬月生葉似薤，及蒜。春初抽莖，如葱頭；莖頭開花數朵，大如蒜頭狀，如酒盃，五尖，上承黃心，宛然薤樣。其花粲然，其香清幽。一種千葉者，花瓣下輕黃，而上滾白，不作盃狀，人重之，指為真水仙；蓋不然，乃一物二種爾！

「別稱」又名金盞銀盞。

水芹

(繖形科)

「學名」*Oenanthe silaolifera*, DC.

「產地」多生於水田濕地之間。

「基本」為蕪類植物，莖有稜，中空。葉為羽狀複葉，互生。夏月開小白花，做藥可食。其莖亦供藥用。

「功效」為收斂藥，及解熱藥。

據云：其氣味甘平，無毒。能止血，養精，生血脈

，益志氣；又可去伏熱，殺石藥；並治小兒暴熱，口鼻乾燥，煩渴。

【用量】三〇——九〇服用。

【學說】李時珍曰：芹，有水芹，旱芹。水芹，生江湖陂澤之涯。旱芹，生平地，有赤白二種。二月生苗，其葉對節而生，似芎藭。其根有節稜，而中空。其氣芬芳，五月開細白花，如蛇床花。

【別稱】又名芹菜，水英，楚葵。

水松

【學名】*Cedrus mucronatum*, Ag.

【基本】為綠色之藻類，生於淺海中，或淡水中，附着岩礁上，體樹枝狀，即可採之為藥。

【功效】其味甘，鹹寒，無毒。能治水毒，水腫；並能催生，下胞衣。

水英

【基本】據蘇頌云：唐天寶單方圖言：此草原生永陽池澤，及河海邊。臨汝人呼為牛紅草，河北信都人名水節，河內連內黃呼為水桂，劍南遂寧等郡名龍移草，淮南諸郡名海茛，嶺南亦有，土地尤宜，而莖葉肥

大，名海精木，亦名魚津草。李時珍云：此草不著形狀，氣味無以考證；芹菜亦名水英，不知是此否也。

【功效】蘇頌曰：能治骨風。

【別稱】又名魚津草。

水蛇

【產地】淡水中，最多產生之。

【基本】此為蛇類 (Ophidia) 之一種，體為繩狀，背腹被鱗，四肢全缺，爬蟲類也。其形如鱷，為黃黑，色有細紋。嚼人不甚毒者，用之為藥。

【功效】據云：其肉氣味甘鹹，無毒而性寒。能消渴，治煩熱，毒痢。

【別稱】又名公蠶蛇。

水蛭

【學名】*Hirudo nipponia* Whittem.

【產地】多產於水池及小河中。

【基本】此屬於環蟲類，體為黃褐色，有黑綠色，形略似蚯蚓，有輪紋甚多。口腔緣有如鋸齒，好吸附人畜皮膚，而吮其血。故取之，可為藥用。

【功效】爲消炎，消腫，止痛之外用貼布藥。

其氣味鹹平，有毒。能逐惡血，瘀血，破血癰積聚，可利水道，墜胎。治癰腫，惡毒。

【用量】一。〇——二。五服用。

【學說】名醫別錄曰：水蛭生雷澤，池澤，五月，六月採，暴乾。

【別稱】又名至掌，馬蛭，馬鼈。

水萍

(浮萍科亦作眼子科)

【學名】*Spirodela polyrrhiza* solent.

【產地】多生於溝池之間，而現於水面之上。

【基本】爲一種小植物，葉狀扁平而小，面背俱青，有一鬚根下垂，名爲浮萍。又有一種葉狀較大，面青，而背紫，下垂多數鬚根，名爲紫萍。

【功效】爲解熱藥，較麻黃之發汗，尤爲有力。

其氣味辛寒，無毒。能治暴熱，身癢。止消渴，下水氣，解熱毒，止衄血。

【用量】三。〇——六。〇服用。

【採製】七月，八月，採取紫背浮萍，揀淨，以竹篩攤晒，下置水一盆映之，易乾。

【學說】李時珍曰：本草所用水萍，乃小浮萍，非大蘋也。

陶蘇俱以大蘋註之，誤矣。萍之與蘋音雖相近，字却不同，形亦迥別。今釐正之，互見蘋下。浮萍，處處池澤，止水中，甚多，季春始生。或云：楊花所化，一葉經宿即生數葉，葉下有微鬚，即其根也。

○一種背面皆綠者，一種面背皆紫赤若血者，謂之紫萍，入藥爲良，七月采之。

水楊

(楊柳科)

【學名】*Salix Fraxillifolia* Mill. (S. Thunbergiana, M.)

【產地】多產生於山野中。

【基本】爲落葉木本，雖爲喬木性者，常呈灌木狀。葉長橢圓形，而稍厚，緣邊有微細鋸齒。葉端尖銳，有毛茸，裏面灰白色。春間開花，有白毛。其木白皮及根與枝葉，皆可入藥用之。

【成分】皮含鞣酸，及配糖體，撒里珍。由其分解，而生撒里給寧，再酸化而生撒里夫爾酸，即俗稱之水楊酸也。

【功效】爲解熱藥；又有健胃苦味藥之作用。

其枝葉氣味苦平，無毒。治久痢赤白，可搗汁服之。

○其木白皮及根，性味亦同。能治金瘡，乳癰，諸腫，瘡疥。

【用量】多外用為湯洗料。

【學說】蘇恭曰：水楊，葉圓闊而尖，枝條短硬，與柳全別。

○柳葉狹長，枝條長軟。李時珍曰：按陸璣詩疏云

：蒲柳有二種，一種皮正青，一種正白，可為矢。

北土尤多，花與柳同。

【別稱】又名青楊，蒲柳，蒲楊，雀荷。

水精 *Quercus*

【產地】多生於山野，羣集於花崗岩，片麻岩之裂罅中。

【基本】為石英之結晶，而透明者也。呈六角狀之結晶。中

部稍較寬闊，兩端稍為狹尖，然兩柱面所夾之角，

恒為一百二十度；柱面上多橫紋；質純者，為無色

透明，有玻璃樣之光澤。斷口介殼狀，或參差狀。

劈開不完全。以舌試之，則有冷感；以水試之，反

光甚強，為異。

【成分】含有酸化硅 SiO_2 之成分。

【功效】據云：其氣味辛寒，無毒。能除熱淚，亦入點眼藥

中。

【別稱】又名水晶，水玉，石英。

水蓼

(蓼科)

【學名】*Polysorum taceatum*, Roeh.

【產地】多生於淺水澤中。

【基本】為一年生草，莖有結米，葉長互生，有鞘狀之托；

葉包圍莖外。花蓋三片，至六片。雄蕊數同，而與

花蓋之各片對生。子房上位二室，果實為瘦果，成

三角形，內含一種子，有胚乳。可採取莖葉，供藥

用之。

【功效】為消毒鎮痛藥。

其味辛，無毒。能治蛇傷，及腳氣，水腫。可搗汁

敷之。

【學說】李時珍曰：此乃水陸所生之蓼，葉長五六寸，比水

紅葉稍狹，比家蓼葉稍大，而功用彷彿。故寇氏謂

：蓼實，即水蓼之子者，以此故。

【別稱】又名虞蓼，澤蓼。

水銀 *Hydrargyrum*

【產地】產於吾國東南各省，為天然產。

【基本】本品如水滴散狀，嵌於鑛石中，然甚罕見。大都用

朱砂製成，色白如錫。在冷至零下三十九度，則凝結為整正八面形。熱至三百五十七度，則沸而化氣。在尋常溫度，能保持其流動狀，為白色無味無臭之重液體。可取之，而為藥。

【功效】昔時雖屢內服，而用於頑固之便秘；但近來已廢棄矣。

其氣味辛寒，有毒。能治疥癬，惡瘡，痲皮，白禿，又云：能安神，鎮心，除熱，利水，催生，墮胎等。

【製劑】1. 水銀丸 *Plumbae Hydrargyri*.

此即以水銀三〇，白糖五〇，精蜜一〇，徐徐研和之，至不見水銀為度。而後加入甘草末二〇，水二滴或二滴，作為〇〇二量之丸藥。專為瀉下藥，一回二——三丸服用。

2. 水銀軟膏 *Unguentum Hydrargyri*.

此即以水銀三〇，豚脂一〇，牛脂二〇，徐徐研和，即是。可外用為驅毒殺蟲消炎藥。

3. 水銀硬膏 *Emplastrum Hydrargyri*.

此即以水銀二〇，的列並帝那一〇，再加少許

的列並油，親密研和之外，尚須加入單鉛膏六。〇，黃蠟一〇，混和為灰色之硬膏。專用於梅毒性潰瘍等，為貼布料。

【禁忌】畏磁石，砒霜。

【別稱】又名汞，靈液。

水蕨

(水蕨科)

【學名】*Charitophis thalictroides* Brongn.

【產地】自生於濕地，或水中；而地生者小，水生者大。

【基本】為菜類植物之一，春夏之間，採葉，煮食，其質柔脆。據李時珍云：水蕨，似蕨，生水中。呂氏春秋

云：菜之美者，有雲臺之臺，即此菜也。

【功效】據云：其氣味甘苦而寒，無毒。淡煮食之，能治腹中痞積。一二日間，惡物即下；但須忌雜食月餘。

水獺

【學名】*Lutra vulpina* Erxl.

【產地】河流沿岸，多穴居之。

【基本】此屬鼬鼠科，頭部扁平，耳殼甚小，其尾尖長如錐，毛暗褐色，柔軟且密。四肢短小，趾間有蹼，便於游泳滑行。夜出捕食魚類，可能得之。昔時有劑

取其肝腎及肉，供藥用之。

【功效】據云：其肝氣味甘溫，有毒。治虛勞，咳嗽。除鬼
疰，蟲毒。其腎及肉味甘，鹹而寒，無毒。能益氣
，補精。

【別稱】又名水狗。

水藻

【基本】李時珍云：藻有二種，可以熟食。水藻，葉長二三
寸，兩兩對生，即馬藻也。聚藻，葉細如絲及魚鱗
狀，節節連生，即水蘊也。俗名顯草，又名牛尾蘊
是矣。爾雅云：蒼牛蘊也。郭璞註云：細葉，蓬茸
如絲，可愛。一節長數寸，長者二三十節，即蘊也
。二藻，皆可食，亦可入藥。

【功效】民間有用為清涼解熱者。

其氣味甘寒，無毒。能去口渴，暴熱，可搗汁服之
。又能治遊毒，熱疔，可搗爛敷之。

水蘇

(唇形科)

【學名】*Stachys aspera*, Michx. var. *japonica*, Maxim.

【產地】生於山野之間。

【基本】為一種之雜草，高至二三尺，葉方形，直立，不分

岐，密生粗毛。葉亦粗糙，多毛，披針形，生皺紋

，有鋸齒；葉柄短，對生。夏月開花，花冠唇形，
呈淡紅紫色。可採其莖葉，供藥用之。

【成分】含有薄荷腦之成分。

【功效】為解熱藥。有驅風，發汗之作用。

其氣味辛溫，無毒。能清肺，下氣，解熱，消穀，
散風，止血。

【用量】三。〇——九。〇煎服。

【學說】李時珍曰：水蘇，蒼葍，一類二種爾。水蘇，氣香

。蒼葍，氣臭，為異。水蘇，三月生苗，方莖，中
虛，葉似蘇而微長，密齒，面皺，色青，對節生，
氣甚辛烈。六七月開花成穗，如蘇穗，水紅色，穗
中有細子，狀如荊芥子。可種，易生。宿根自生於
沃地者，苗高四五尺。

【別稱】又名雞蘇，香蘇，諸腦薄荷，芥真。

水龜

【學名】*Clemmys japonica* Schleg.

【產地】多棲息於池沼之中。

【基本】此龜形小，背甲扁平，呈暗褐色。腹甲黑色。雌之

背甲後部，具有隆起，得與雄而區別之。多取其甲板（即龜板），供藥用之。

【成分】含有磷酸碳酸與石灰，及膠樣質。

【功效】為強壯藥。

其氣味甘平，有毒。能補心，益腎，滋陰，增智。

治陰虛不足，骨蒸勞熱，腰脚痠痛，久瀉，久痢，

久嗽，癩癩，崩漏，五痔，難產，血弱。

【用量】甲板用三〇——九。〇煎服。

【禁忌】惡人參，沙參。

【採製】取龜甲，鋸去四邊，石上磨淨，更以灰火炮過，塗

酥炙黃。（亦可酒炙，醋炙，脂炙。）備用。

【別稱】又名玄衣符郵；其甲又名神屋，敗將，漏天棧。

水甘草

（夾竹桃科）

【學名】*Antonia aliphica*, T. et G.

【產地】多生於原野之水濕地。

【基本】為一種草本之植物，莖高一尺五寸許，葉披針形，

互生。夏月頂端分枝，開花，作濃桔梗色，為聚繖

花序，花後結莢。採取全草，供藥用之。

【功效】為解熱藥。

其氣味甘寒，無毒。每與甘草同煎，而治小兒風熱及丹毒。

【用量】三〇——九。〇為煎劑，單服。

【學說】蘇頌曰：生筠州，多在水旁。春生苗，莖青，葉如

柳，無花。土人十月，八月采，單用，不入衆藥。

水竹葉

（鴨跖草科）

【學名】*Amiloma Kothak*, Hance.

【產地】生於水田，及池沼之雜草中。

【基本】本植物之莖，長約二三尺，葉披針形，細長而尖，

有平行脈，互生。花二三枚，生於莖，及枝之上端

。其花冠，由不等形之花瓣而成；花瓣三枚，淡紅

紫色。萼片三枚，呈為綠色。

【功效】據云：生食能殺蠱蟲。

水苦蕒

（元參科）

【學名】*Voronia Amudalis*, T.

【產地】生於水田，及小川等處。

【基本】為越年生草，莖甚柔軟，高至一尺餘，葉與莖皆平

滑，葉廣披針形，長二三寸許，有鋸齒，無柄，對

生。初夏開小花，白色，有淡紅紫之線。其根似白

寒而軟，可採取之，而為藥用。

【功效】民間用為消炎，消腫藥。

其氣味微苦而寒，無毒。能治風熱上壅，咽喉腫痛，及項上風癰，可以酒磨服。

【別稱】又名謝婆菜，半邊山。

水楊梅

(薔薇科)

【學名】*Cornus japonicum, Thunb.*

【產地】生於山野之中。

【基本】為多年生草，高至二三尺。春日敷地叢生，下部之葉，為羽狀複葉，形似菜菔之葉。夏日葉間抽莖梢，開一花，花瓣五片，呈深黃色。結實為小乾果，球形，大三四分。其地下莖，斜走或直走，形如圓柱，叢生肥大之鬚根。可採取之，而供藥用。

【成分】似含有揮發油，鞣酸，樹脂等。

【功效】為強壯藥。又為利尿藥，及解熱藥。

本草綱目云：其氣味辛溫，無毒。能治疔瘡，腫毒

等。

【用量】二〇——六〇服用。

【學說】李時珍曰：生水邊，條葉甚多，生子如梅毒狀。庚

辛玉冊云：地椒，一名水梅毒，多生近道陰濕處，

荒田野中亦有之，叢生，苗葉似菊，莖端開黃花。

實類椒而不赤也。

【別稱】又名地椒。

水銀粉

Hydrargyrum chloratum

【基本】此粉之製法不一，通常以硫酸酸化水銀三分，水銀一分，食鹽一分，密和，熱灼，而得之白色粉末，即是。

據李時珍曰：升鍊輕粉之法，用水銀一兩，白礬二兩，食鹽一兩，同研不見星。鋪于鐵器內，以小烏盆覆之，篩盡灰和鹽水封固盆口，以炭打二炷香，取開則粉升於盆上矣，其白如雪，輕盈可愛。一兩汞，可升粉八錢。又法：水銀一兩，皂礬七錢，白鹽五錢，同研，如上升鍊。又法：先以皂礬四兩，鹽一兩，煅硝五錢，共炒黃為麩，水銀一兩，又麩二兩，白礬一錢，研勻。如上升鍊。海客論云：諸礬不與水銀相合，而綠礬和鹽，能制水銀成粉。何也？蓋水銀者，金之魂魄。綠礬者，鐵之精華。二氣同根，是以暫制成粉，無鹽，則色不白。

【功效】爲瀉下藥，可用於傳染病之熱性病，能掃蕩腸管之

毒。又爲利尿藥，可用於水腫病等。又有爲驅毒藥

，可用於梅毒病等。此外更常外用爲潰瘍等之撒布

藥。

其氣味辛冷，無毒。(李時珍曰：溫燥，有毒。)能

殺蟲，治疥癬，切痰涎，消積滯。治水腫，濕熱，

風痰，毒瘡。

【用量】一回〇・五，爲瀉下藥。一回〇・二，爲利尿藥，

照用之。

【禁忌】畏蒸石，石黃。

【別稱】又名赤粉，輕粉。

水中白石

【基本】據李時珍云：此石處處溪澗中有之，大者如雞子，

小者如指頭，有黑白二種。入藥用其白而小者，甚

佳。

【功效】據陳藏器云：此石能治食鱸魚而發脹滿，成癰痛悶

，出漸羸弱，取數十枚燒赤，投五升水中，七遍熱

飲。如此三五度，當利出癩也。又燒淨水中，納鹽

三合，洗風癩瘰癧。

木瓜

(善微科)

【學名】*Cyclonia japonica*, Pers.

【產地】吾國庭園中，多栽培之。

【基本】爲落葉灌木，幹高六七尺餘，葉爲橢圓形。至春先

葉，後花，分紅白色，頗美豔。實爲漿果，長二三

寸，呈橢圓形，色黃，香氣頗佳，可供藥用之。

【功效】爲鎮痙藥，可用於虎列拉，日射病等。

其氣味酸溫，無毒。治濕痺，脚氣，霍亂吐瀉，轉

筋不止。並能和胃，滋脾，調營養，助發氣。治腹

脹善噫，心下煩痞。

【用量】一〇——六〇煎服。

【採製】採取果實，須年久者，去核，剉焙用之。

【學說】李時珍曰：木瓜，可種，可接，可以枝壓。其葉光

而厚；其實如小瓜，而有鼻。津潤味不木者，爲木

瓜。圓小於木瓜，味木而酢澀者，爲木桃。似木瓜

，而無鼻，大於木桃味澀者，爲木李；亦曰木梨，

即檳榔，及和圓子也。鼻乃花脫處，非瓣帶也。木

瓜性脆，可蜜漬之爲果。去子蒸熟，搗泥，入蜜，

與薑作煎，冬月飲尤佳。

木耳

(菌類)

「學名」*Hirneola Polytrocha*, Fr. Schrot. (*Auricularia*, Au-
ricula Judae, Schrot.)

「產地」多產於山中之朽木處。

「基本」為一種菌類植物，其體生長後，則生子實。體為茶
褐色，膠質，耳狀，約二三寸，其外面有絨狀毛。

可採取之，而供藥用。

「成分」含有苦味性之樹脂，及有機酸，護謨，蛋白質等。

「功效」為制汗藥。

其氣味甘平，而有小毒。能益氣不餓，輕身強志。

「用量」二。〇——六。〇服用。

「學說」李時珍曰：木耳，生於朽木之上，無枝葉，乃濕熱

餘氣所生，曰耳，曰蛾，象形也。曰繡，以軟濕者

也。曰雞，曰蠶，因味似也。南楚人謂雞，為蠶

。曰菌，猶蠶也，亦象形也。

「別稱」又名木菌，木蠟，樹雞，木蛾。

木狗

「基本」據熊太古翼越集云：木狗，生廣東左右江山中，形
如黑狗，能登木。其皮為衣褥，能運動血氣。元世

祖有足疾，取以為袴，人遂貴重之。又聞蜀人言：

西川有木狗，大如狗，黑色，尾亦如狗。其皮作裘
褥甚暖，冬月遠行，用其皮，包肉食數次，猶溫，

彼土亦珍貴之。此亦木狗之類也。

「功效」據云：其皮能除脚痺，風濕氣。活血脈，暖腰膝。

木香

(蒿薇科)

「學名」*Rosa Bunkiana*, R. Br.

「產地」庭園中多栽種之。

「基本」為蔓生植物，莖長，常攀附他木。葉為羽狀複葉。

小葉之數，凡五，有細鋸齒。春暮開花，小而色白

，香甜可愛；花大而黃者，香味微遜。

吾國本草所載之木香，頗近於此；但據小川七郎謂

此不堪入藥。凡選為藥用之木香，須形如枯骨，味

濃苦，黏牙者，為妙。

「功效」為健胃藥，有助消化，及發汗，收斂之作用；又可

作防生蠶害之料。

其氣味辛苦而溫，無毒。能升降諸氣，滯肺氣，疏

肝氣，和胃氣，故為三焦氣分之藥。並治嘔逆，反
胃，霍亂，瀉痢，痰壅，氣結，癰塊，腫毒，及一

切心氣痛。

【用量】一。五——六。○服用。

【製劑】木香丸

此即以木香五。○，黃蘗六。○，胡黃連三。○。

○，香附子九。○。○，共為細末，以面粉為丸。專

治傷食，腹痛，氣鬱作痛，及諸蟲痛。

【禁忌】忌火。

【採製】除去蘆頭，剉用。

【學說】李時珍曰：木香，南番諸國皆有，一統志云：葉類

絲瓜，冬月取根，晒乾。

【別稱】又名蜜香，青木香，五木香，南木香。

木虱

【基本】此為雷 (Adonis vernalis) 之一種，體軀肥大，

頭寬，眼大，觸角大形。胸扁而有黃線，腹有粗縱

線。每以強銳之口吻，刺食動物之血。昔時亦有用

為藥者。

【功效】據云：其氣味苦平，有毒。治目赤痛，皆傷淚出，

寒熱，癩血。

【別稱】又名魂常。

木通

(木犀科一作通草科)

【學名】*Akebia quinata*, Decne.

【產地】多產生於山野中。

【基本】為一種蔓生之落葉灌木，每纏繞於他物之上。葉互

生，呈掌狀複葉。夏秋之間，開淡紫色花，花後，

結二寸長橢圓形之漿果。其根，梗，及實，皆供藥

用之。

【功效】與通草相同，可參考之。

木犀

(木犀科亦作柗骨科)

【學名】*Osmanthus fragrans*, Loug.

【產地】多栽培於庭園之間。

【基本】為常綠亞喬木，高至十尺餘。葉為長橢圓形，而尖

，對生。秋末開花，形小，黃色。其花，及幹皮，

可供藥用之。

【功效】其花氣味辛溫，無毒。每同百藥煎，孩兒茶，作餅

噉。能生津，止渴，化痰，辟臭，治風蟲牙痛。同

麻油蒸熱，能潤髮。其皮氣味，相同。治百病，養

精神，久服反童。

【學說】李時珍曰：木犀，葉似柿葉者是。名醫別錄所謂正

圓如竹者，謂皮卷如竹筒。陶氏誤疑似木形如竹，反謂卷成圓者，非真也。今人所栽巖桂，亦似菌桂之類，而稍異其葉，不似柿葉，亦有鋸齒，如枇杷葉，而粗澀者。有無鋸齒，如梔子葉，而光潔者。叢生巖嶺間，謂之巖桂。俗呼爲木犀。其花白者，名銀桂；黃者，名金桂；紅者，名丹桂；有秋花者，春花者，四季花者，逐月花者。其皮薄，而不辣，不堪入藥。

〔別稱〕又名菌桂，荷桂，小桂。

木賊

(木賊科)

〔學名〕*Equisetum hiemale*, L. var. *japonica*, Miide.

〔產地〕多自生於山野之間。

〔基本〕爲常綠灌木，多年生之隱花植物。高二尺許，莖中空，每寸許結節，節間生退化之葉。夏秋之交，莖頂生卵圓形短穗，爲絲褐色，如筆頭。莖粗糙者，入藥用之。

〔成分〕含有硅酸，及木賊酸等。

〔功效〕爲利尿藥，發汗藥。

其味甘，微苦，無毒。主治目疾，能退翳膜，消積

塊，益肝胆，療腸風，止瀉痢，及婦人月經不斷，崩中赤白帶下。又能解肌，止淚，止血，去風。治痢痛，脫肛。

〔用量〕一〇——五。〇煎服。

〔採製〕採莖，去節，水濕，剉焙之。

木綿

(木綿科)

〔學名〕*Gossypium peruvianum*, Jacq.

〔產地〕多產於田園，及庭院之中。

〔基本〕爲常綠樹木，高百尺許，莖有刺。葉爲掌狀複葉，

小葉五片。花呈紅色，果實長形，種子生長毛，質

甚柔軟。可取其綿，及子，供藥用之。

〔成分〕含多量綿子油。

〔功效〕其綿氣味甘溫，無毒。能治血崩，金瘡。其子氣味辛熱，微毒。能治惡瘡，疥癬。

〔學說〕李時珍曰：木綿，有草木二種，交廣木綿，樹大如抱。其枝似桐；其葉大如胡桃葉。入秋開花，紅如山茶花，黃蕊，花片極厚，爲房甚繁，短側相比，果實大如拳；實中有白綿，綿中有子。

〔別稱〕又名古貝，古穆。

木薑

【基本】蘇陳藏器云：生於江南山谷林澤，葉似胡麻，相對

。山人取以釀酒飲之。

【功效】其氣味甘溫，無毒。主治老血，婦人月閉，風氣弱

瘦，癩癩，久服令人有子。

木蓮

【基本】據李時珍云：木蓮，延樹木垣牆而生，四時不凋，

厚葉堅強，大于絳石。不花，而實，實大如盃，微

似蓮蓬而稍長，正如無花果之生者。六七月，實內

空，而紅。八月後，則滿腹細子，大如稗子，一子

一殼，其味微澀，其殼虛輕，烏，烏，小兒，皆

食之。昔時有採其葉，供藥用之。

【功效】其葉氣味酸平，無毒。主治背癱。乾末服之，下痢

即愈。

【別稱】又名薛荔，木馒头，鬼傀儡。

木槿

(錦葵科)

【學名】*Hibiscus syriacus*, L.

【產地】中國，印度，及小亞細亞，皆有產生，多栽培於庭

園之間。

【基本】為落葉小灌木，高七八尺許，葉為卵形，三裂，互

生。夏秋之交，開花，五瓣，短柄如蜀葵。色紅紫

白，皆備。其根，皮，花，子，皆供藥用。

【功效】其氣味甘平，不溫，無毒。其根，皮，主治腸風瀉

血，痢後熱渴，婦人赤白帶下。並能瀉熱，潤燥，

明目，活血。其花，能除濕熱，利小便，祛風，消

腫。並治赤白痢疾。其子，能治偏正頭風，療黃水

膿瘡。

【別稱】又名日及，朝開暮落花，錦雞花，花奴玉蒸。

木蘭

(木蘭科)

【學名】*Magnolia obovata*, Thunb.

【產地】多栽培於庭園之間。

【基本】為落葉喬木，高至十餘尺，葉大，倒卵形，互生。

晚春新葉之先，枝梢苞開而出花，花大，外面暗紫

色，內面淡紫色；花瓣長，倒卵形，殆如直立者。

可採其皮，供藥用之。

【功效】其氣味苦寒，無毒。治中風，傷寒，癰疽，水腫，

及面赤，身熱。並能利小便，下濕氣，明耳目，療

重舌。

【學說】李時珍曰：木蘭枝葉俱疎；其花內白，外紫，亦有

四季開者。深山生者，尤大，可以爲舟。

【別稱】又名杜蘭，林蘭，木迷，黃心。

木天蓼 (繡猴科亦作厚皮香科及本科)

【學名】*Achillea Polygama*, Mill.

【產地】多生於山地之中。

【基本】爲落葉攀登植物，木質如蔓狀，葉互生，卵圓形，

而尖。梢葉在夏間。往往變爲白色。夏月開花，白

色，外形略似梅花，花瓣五片。果實如指頭大，而

尖，內含多數細小種子。其枝葉及子，供藥用之。

【成分】含多量之植物油等。

【功效】爲鎮痛藥，每用以治療疝氣等。

其枝葉氣味辛溫，而有小毒。能治癰結，積聚，風

勞，虛冷。其子氣味苦辛，微溫。能治邪風，氣塊

，口面囁斜，女子虛勞。

【用量】二〇——六〇煎服。

【學說】李時珍曰：天蓼雖有三種，而功用彷彿，蓋一類也

。其子，可爲燭。其芽，可食。故陸機云：木蓼爲

藹。明如胡麻。

【別稱】又名天蓼，木蓼，南扶留。

木芙蓉

【學名】*Etiosus mutabilis*, L.

【產地】多生於山野之中。

【基本】爲落葉灌木，高至丈許。在寒地者，每年枯萎，自

宿根叢生，高僅三四尺。葉呈心臟形，爲掌狀淺裂

，有葉柄，互生。秋冬之際，梢頭開花，紅色，或

白色，單瓣，或複瓣。果實爲蒴果，種子有纖毛，

易於飛散。採取其花葉，供藥用之。

【功效】爲解熱藥，有清涼解毒之作用。

其氣味微辛而平，無毒。能清肺，涼血，散熱，解

毒；治一切癰疽，腫毒，惡瘡，癩癧。可以消腫，

排膿，止痛。

【用量】二〇——八〇煎服。

【學說】李時珍曰：木芙蓉，處處皆有之，插條即生，小木

也。其幹叢生，如荆。高者丈許，其葉大如桐，有

五尖，及七尖者。冬凋，夏茂，秋半始着花；花類

牡丹，芍藥，有紅者，白者，黃者，千紫者，最耐

寒，而不落，不結實。山人取其皮，爲索。川廣有

深色拒霜花，初開白色，次日霜紅，又明日則深紅，先後相間如數色。霜時采花，霜後采葉，陰乾，入藥。

〔別稱〕又名地芙蓉，木蓮，華木，柞木，拒霜。

木威子

(橄欖科)

〔學名〕 *Quararum Pinola*, Koenig.

〔產地〕山野中，多自生之。

〔基本〕本植物為橄欖之一種。據陳憲器云：木威，生嶺南山谷，樹高丈餘，葉似樟葉，子如橄欖，而堅，亦似棗。削去其皮，可為糗食；亦可為藥。

〔功效〕其氣味酸辛，無毒。能治心中惡水，水氣。

〔學說〕李時珍曰：木威子，橄欖之類也。陳氏說：出順德廣州記中。而梁元帝金樓子云：橄欖樹之南向者，為橄欖；東向者，為木威。此亦傳聞謬說也。

木藜蘆

(石南科)

〔學名〕 *Leucothoe swayana*, Maxim.

〔產地〕多生於山野之中。

〔基本〕為落葉灌木，高三四尺。葉為長卵形，端尖，互生。夏月開花合瓣，花冠壺狀，呈黃白色，為總狀花

序。五月結子，狀如小豆。

〔功效〕其氣味苦辛而溫，有毒。能殺蟲，治疥癬。

〔學說〕李時珍曰：此又稱鹿驢，俚人呼為黃藜蘆，小樹也。葉如櫻桃，狹而長，多皺文，四月開細黃色，五月結小長子，如小豆大。

木蠹蟲

〔基本〕此為天牛 (*Aptonia nigricollis chev.*) 類之幼蟲也。

體圓柱狀，被乳白黃褐色之短毛。頭部扁平，長方形。腹背皆有顆狀突起。腳缺。多寄生於腐木之上，可取之為藥。

〔功效〕據云：其氣味辛平，而有小毒。能治血瘕，勞損，月閉不調，腰痛，脊痛。

木鼈子

(葫蘆科)

〔學名〕 *Momovita Cochinchinensis*, Spreng.

〔產地〕吾國湖廣各處，多產生之。

〔基本〕為多年生之蔓草，春生苗作藤，生葉有五裂，狀如山藥，又似葡萄，面光青色。夏開黃花。秋結實似栝樓而大，生青，熟則紅黃，肉上有軟刺。每一實，具核三四十粒，如棋子大而扁，頗似鼈狀，故名。

也。可採取之，而為藥用。

【成分】含有脂肪油。

【功效】為衝動藥，可用為治疥等。

其氣味甘溫，無毒。主治折傷，結腫，惡瘡。並能生肌，止痛。又能去疔積，痞塊。治大腸瀉痢，痔瘡，瘰癧。

【用量】一。〇——五。〇為粉劑，丸劑，煎劑，服用之。

【採製】除去發皮，剉焙用之。

【別稱】又名木蟹，土木鼈，漏籃子。

牛

【學名】*Bosaurus Taurin*

【基本】此體肥大，四肢短小，各肢有二蹄。（原有四蹄，

其二蹄，變為懸蹄。）雌雄均有角，其角由前頭骨

突出之骨心而成。上顎缺少門齒，及犬齒，僅以白

齒咀嚼。體面被以短毛，尾之末端，具有長毛。胃

由四囊而成，腸亦頗長。為一食草之動物。用於醫

藥者，多選黃色之牛。其各臟器，及各組織，在本

草上，雖載有各所不同之作用；但實際上，亦不過

與牛乳相同之功效而已。

牛扁

(毛薑科)

【學名】*Aconitum Jyocouanum* L.

【產地】生於山野之地。

【基本】為宿根草，莖長約二尺，根葉，多五裂，為掌狀；莖葉，互生。開小花，呈淡紫色，或綠黃白色，為總狀花序。可取其根。為藥用之。

【功效】其味苦微寒，無毒。多為熱疔，皮疹，浴湯用之。

【學說】蘇恭曰：此藥似薰草，石龍芮輩，根如秦艽，而細

○生平澤下地，田野人名為牛扁，療牛風甚效。太

常名扁特，或扁毒。韓保昇曰：今出寧州，葉似石

龍芮，附子等。二月，八月采根，日乾。蘇頌曰：

今潯州一種便特，六月有花，八月結實，采其根苗

，搗末，油調，殺蠱虱。主疥大疔相似，疑即扁特

也；但聲近，而字訛也。

【別稱】又名扁特，扁毒。

牛魚

【基本】據陳藏器云：生東海，其頭似牛。李時珍云：按一

統志云：牛魚，出女直混同江，大者長丈餘，重三

百斤，無鱗骨；其肉脂相間食之，味長。又異物志

云：南海，有牛魚，一名引魚，重三四百斤，狀如鱧，無鱗骨。背有斑文，腹下青色。知海潮，肉味頗長。○觀二說，則此亦鱧屬也；鱧引聲亦相近。

【功效】據云：其肉無毒。主治六畜疫疾，作乾脯，為末，以水和灌，鼻即流出黃涕；亦可膏病牛處，令氣相

感。

牛黃

【基本】此多於病牛胆中取出之，為肝膽間之凝結物。據陶

弘景云：病牛出入鳴吼者，有之，夜視有光，走入牛角中，以盆水承而吐之，即墮落水中。今人多就

膽中得之，一子大如雞子黃，相重疊，藥中之貴，

莫復過此。○又蘇恭云：牛黃，今出萊州，蜜州，淄

州，青州，德州，戎州，牛有黃者，必多吼喚。喝

迫而得者，謂之生黃，最佳。黃有三種，散黃，粒

如麻豆；漫黃，若雞卵中黃漿，在肝膽間；圓黃，

為塊形，有大小，並在肝膽中。○又有犀牛黃，堅而

不香；又有駱駝黃，極易得，亦能相亂，不可不審

之。

【功效】為清涼藥。

其味苦平（或甘寒）。○治驚癇，寒熱，熱盛，狂癲。

除邪，逐鬼，療小兒百病，諸癇，大人狂癲，亦可

墮胎。○主療中風，失音，口噤，驚悸，天行時疾。

又能安魂，定魄，益肝膽，養精神，清心，化熱，

利痰，涼驚；而痘瘡紫色，發狂，謔語者，可用。

【用量】○。二——○。五服用。

【禁忌】惡龍骨，龍膽，地黃，當山，葶藶；並畏牛膝，乾

漆。

牛膝

（蓼科）

【學名】*Achyranthes bidentata* Bl. var. *japonica* Miq.

【產地】多生於山野之路旁，隨處皆有之。

【基本】為多年生草，莖高二尺許，葉呈橢圓形，而尖。夏

月開花，綠色，五瓣，甚小，為穗狀花序。實有小

刺，常黏着人衣。其地下莖，細長而直，可取之，

而為藥用。

【功效】為鎮痛藥，可治優麻質斯性關節炎之疼痛，淋病性

關節炎，及痛風等。

其味苦酸平，無毒。能治寒濕痿痺，四肢拘攣，膝

痛不可伸屈；並除腦中痛，腰脊痛，產後痛，心腹

痛。又能益精，補腎，生新血，逐瘀血。療金傷，
癰腫。

【用量】一。〇——六。〇服用。

【製劑】牛膝丁幾 *Tinctura Achyranthes bidentata*.

此即以牛膝根五。〇，浸於酒精及水各二五。〇中，
而製成一種液體，即是。一日三回，與以三。〇
服用，為關節炎，及關節痛等之鎮痛藥。

【採製】除去虛頭，水洗，曬乾。據云：上行滋補，酒浸，
焙用。下行酒浸，乾生用。

【學說】名醫別錄云：牛膝，生河內川谷，及臨朐。二月，

八月，十月采根，陰乾。吳普曰：葉如夏藍，莖本
亦。陶弘景曰：今出近道蔡州者，最長大柔潤。其

莖有節，莖紫節大者，為雄；青細者，為雌，以雄
為勝。李時珍曰：牛膝處處有之，謂之土牛膝，不

堪服食；惟北土，及川中人家栽蒔者，為良。秋間
收子，至春種之。其苗方莖暴節，葉多對生，頗似

草葉，而長，且尖。秋月開花，作穗，結子，狀如
小鼠，負蟲，有毳毛皆貼莖，倒生。九月末取根，
水中浸兩宿，削去皮，囊紫，曬乾，雖白直可貴。

而削去白汁入藥，不如留皮者力大也。嫩苗，可作
菜茹。

【別稱】又名牛莖，百倍，山莧菜，對節菜。

王瓜 (葫蘆科)

【學名】*Trichosanthes Quamocitica Maxim.*

【產地】田園中，多培養之。

【基本】為多年生之蔓草，以卷鬚攀附他物。葉如掌狀，淺
裂，背面皆粗糙。花為單性，雌雄異株。夏開白花
，下為管狀，上作五瓣，邊緣分裂如絲。實卵圓形
而長，似瓜，皮亦粗澀。其根味如薯蕷，可採取之
，而為藥用。

【成分】含多量之澱粉。

【功效】民間常用其為解熱，利尿藥。

其氣味苦寒，無毒。能治天行熱疾，煩悶，熱勞，
癰腫，惡瘡。其子味酸苦平，無毒。生用能潤心肺
，治黃病。炒用治肺痿，吐血，腸風，瀉血，以及
反胃，吐食。

【用量】二。〇——六。〇服用。

【學說】李時珍曰：王瓜，三月生苗，其莖多鬚，嫩時可茹

。其葉圓如馬蹄，而有尖，面青，背淡澀而不光。六七月開小黃花，成簇，結子紫紫。熟時，有紅黃二色，皮亦粗澀。根不似葛，但如枯樓根之小者，澄粉甚白膩。須深掘二三尺，乃得正根。江西人栽之沃土，取根作蔬食，味如山藥。

【別稱】又名土瓜，鉤藤，老鴉瓜，馬爬瓜，師姑草，公公頭。

王孫

(百合科)

【學名】*Paris tetraphylla*, A. Gr.

【產地】多產於深山之間。

【基本】為多年生草，莖高四五寸，莖之中部生葉，約四片輪生，形橢圓而長。夏月莖頂着一花，雄蕊八枚，雌蕊一枚。可取其根莖，供藥用之。

【功效】其氣味苦平，無毒。能益氣，烏髮，除邪氣，寒濕；並治四肢痠痛，膝部冷痛。

【學說】李時珍曰：王孫，葉生顛頂，似紫河車葉。按神農本草及吳普本草，紫參，一名牡蒙。陶弘景亦曰：今方家呼紫參，為牡蒙。其王孫，並無牡蒙之名。而陶氏于王孫下方云：又名牡蒙，且無形狀。唐蘇

恭始以紫參，牡蒙為二物。謂紫參，葉似羊蹄；王孫，葉似及己；但古方所用牡蒙，皆為紫參，後人所用牡蒙，乃王孫，非紫參也。

【別稱】又名牡蒙，黃孫，黃昏，旱藕。

王不留行

(石竹科)

【學名】*Veronica filiformis*, Hook.

【產地】山野及庭園中，皆有產生。

【基本】為越年生草，莖高二尺許，葉形如箭鏃，對生，腳抱莖，無柄。春夏之間，開淡紅花，成聚繖花序，萼為筒狀，瓣端有凹形。結子如豆，熟則黑色，可供藥用之。

【功效】民間有用為通經藥者；亦有用作，癰疽，瀉毒者。其氣味苦平，無毒。能除風，去痺，止血，定痛，通經，利便，催生，下乳。

【用量】三。〇——六。〇服用。

【採製】水浸一夜，炒乾，備用。

【學說】名醫別錄曰：王不留行，生太山山谷。二月，八月采。李時珍曰：多生麥地中，苗高者一二尺。三月月開小花，如鈴鈴狀，紅白色。結實如燈籠葦子，

殼有五稜，殼內包一實，大如豆，實內細子，大如
蒜子，生白，熟黑，正圓，如細珠，可愛。

〔別稱〕又名蔡宮花，剪金花，金盞銀臺。

第五畫

仙茅

(石蒜科)

〔學名〕*Curatlio unifolia* R. Br.

〔產地〕多自產於山野之間。

〔基本〕為一種宿根草，春初一根，數葉叢生，高達尺許，

葉似藜蘆，而脊小，面有直脈。春夏之交，近根之

部，出小莖，而開六瓣黃色之花。夏末結實，黑色

。根直生，而有橫紋，大如小指，旁增多根，外皮

褐色，內面黃色，可供藥用之。

〔功效〕為強壯藥。

其氣味辛溫，有毒。能治一切風氣，補腰腳，清

安五臟，助筋骨，益肌膚，補精神，明目；又治

虛弱無子，心腹冷氣不能食。

〔用量〕一·五——四·〇服用。

〔禁忌〕忌鐵器，及牛肉，牛乳。

〔採製〕採取地下莖，以糯米醋汁浸之，而後割用。

〔學說〕李珣曰：仙茅，生西域，葉似茅。其根粗細有節，

或如筆管有節，文理黃色。今大膽嶺，蜀川，江湖

，兩浙，諸州亦有之，葉青如茅，而軟；且略闊，

而有縱文，又似初生棕櫚。秧高尺許，至冬盡枯。

春初乃生，三月有花，如梔子花，黃色，不結實。

其根獨莖而直，大如小指，下有短肉根相附，外皮

稍粗，褐色，肉肉黃白色。二月，八月採根，暴乾

用。衡山出者，花碧。五月結黑子。

〔別稱〕獨茅，茅瓜子，婆羅門參。

仙人杖

〔基本〕據陳藏器云：此是筍欲成竹時，立死者，色黑如漆

。五六月收之，苦竹，桂竹多生此。可取之為藥。

〔功效〕其氣味鹹平，無毒。治嘔逆，噎氣，吐食，反胃，

水腫，腹脹，以及小兒驚癇，夜啼，吐乳。

〔禁忌〕忌牛肉

仙人草

(毛茛科)

〔學名〕*Oenanthe pinnatifida* Thunb.

〔產地〕山野多自生之。

〔基本〕為多年生之莖生植物，有奇數羽狀複葉，對生，小

葉卵形，葉柄，能卷絡他物。秋間開白花。可採其全草，供藥用之。

【成分】含有 Anemon 油之成分。

【功效】爲發泡藥。因其具有毒性，僅供外用之消炎，鎮痛

等。

仙人掌

(仙人掌科)

【學名】Opuntia ficus

【產地】庭院多栽培之。吾國滇粵各省，最多。

【基本】爲常綠灌木，莖扁闊，多腋，外面有刺，長尺許，

幅二三寸，互相層疊，至高丈餘，無葉。夏月開黃

赤色，複瓣之花。實之形色，頗似蜜果，外面多毛

刺，熟則可食，亦可爲藥。

【成分】含有葉綠質。

【功效】其氣味甘平，無毒。能補脾，健胃，益脚力，除久

瀉，久服延年。

【別稱】其子又名仙人掌子

仙半夏

【基本】據本草綱目載云：近日諸醫皆用之，藥肆亦多製備

。相傳製法，係仙人所傳，故名仙半夏。能化痰如

神，若不信，將半夏七八粒，研入痰盞內，卽化爲清水。其法，用大半夏一斤，石灰一斤，滾水七八盞，入盆內攪涼，澄清去渣，將半夏入盆內，手攪之，日晒，夜露，七日足，撈出控乾，用井花水洗淨三四次，泡三日，每日換水三次，撈起控乾，用白礬八兩，皮硝一斤，滾水七八盞，將礬硝共入盆內，攪涼，溫將半夏入內，浸七日，日晒，夜露，足，取出清水洗三四次，泡三日，每日換水三次，取出控乾，入甘草，南薄荷各四兩，丁香五錢，白芷三錢，沉香一錢，枳實，木香，川芎，肉桂各三錢，陳皮，枳殼，五味子，青皮，砂仁各五錢，右共十四味，切片，滾水十五碗，晾涼，將半夏同藥入盆內，泡二七日，足，日晒，夜露，攪之，將藥取出，與半夏同，白布包住，放在甕坑，用器壓扣住，三炷香時，藥與半夏分胎，半夏乾收用，有痰火者服之，一日大便出，似魚膠，一宿盡除痰根，永生也。法製半夏，其製法，與此不同，今藥肆所收仙半夏，惟將半夏浸泡，盡去其汁味，然後以甘草浸晒，入口淡而微甘，全失本性。

【功效】為祛痰藥，凡壯年痰火有餘之徵，最宜服之；然則

體質衰弱者，可禁忌用之。

代赭石 *Haematite*

【產地】產於山西代縣，故名也。

【基本】為天然產生之赤鐵礦石，如土而易碎，其色殷紅，

呈半結晶樣，可用之為藥。

【成分】含氧化鐵，及粘土等。

【功效】為收斂藥。

其氣味苦寒，無毒。能養氣血，除血熱，止瀉，止血；並治小兒慢驚。

【用量】二〇——六〇——八〇煎服。

【採製】宜用火煅，醋淬；或研末數次，以水飛洗用之。

【學說】李時珍曰：赭石，處處山中皆有之，以西北產者為

良。宋時虔州歲貢萬斤。外丹本草云：代赭：陽石

也。與太乙餘糧，並生山峽中。研之作朱色，可點

畫。

【別稱】又名須丸，血師，土朱，鐵朱。

加密列

(菊科)

【學名】*Matricaria chamomilla*, L.

【產地】產於歐羅巴全部。

【基本】為一年生草，葉細分裂，花皆有毛，舌狀花冠白色

，筒狀花冠黃色，此花晒乾，可供藥用之。

【成分】含有揮發油，及苦味質。

【功效】為驅風發汗藥，可用於感冒等。

【用量】五〇——一五〇為浸劑，茶劑服用之。

【製劑】I 加密爾列花浸劑 *Infusum Flores Chamomillae*

此即以加密爾列花五〇，浸於水一〇〇〇中，

而後濾出液體，即是，為發汗之頓服料。

【別稱】日本稱為加密爾列，西洋稱為甘菊。

加耶布的

(桃金娘科)

【學名】*Myrtus javanica* Benth.

【產地】產於東印度，及馬來地方。

【基本】為常綠樹木，高至十五尺許，葉披針形，互生。開

花白色，為穗狀花序。其葉，及枝，蒸溜所得之油

，供藥用之。

【成分】含有多量 *Oil Cajuputi* 之成分。

【功效】為興奮藥，驅蟲藥。

【製劑】I 加耶布的油 *Oilum Cajuputi*

此即以加耶布的之枝葉，蒸溜所得之淡黃色，或淡綠色之揮發油，為外用之風濕藥。

加斯加刺

(鼠李科)

【學名】 *Rhamnus Purshiana*, De.

【產地】多產生於美國之各地。

【基本】為落葉灌木，高十尺餘，葉橢圓形，開小花。其幹皮多為管狀，外部褐色，內部黑色，可取之為藥。

【成分】含有 Cathartin，及糖質。

【功效】為緩下藥，可用於常習性便秘等。

【製劑】1. 加斯加刺越幾斯 *Extractum Cascaris Sagrada*

此以加斯加刺幹皮，及枝皮，浸製而成之越幾斯。

通常有流動越幾斯，(三滴至十五滴，服用。)及乾燥越幾斯，(一回〇〇六——〇一二為緩下；

又〇〇二——〇〇五為瀉下，服用。)之不同，可

為丸劑等用之。

半夏

(天南星科)

【學名】 *Pinellia tuberifera*, Ten.

【產地】平野多自生之。

【基本】為多年生草，高七八寸，葉為複葉，以三小葉合成

，葉柄生肉芽，花單性，為肉穗花序。雌花在下，雄花在上，花序以大苞包之。花軸之上部，伸長如線，突出苞外，其地下之塊狀莖，皮黃，肉白，可入藥用之。

【功效】為鎮靜藥。有鎮咳，祛痰，以及鎮嘔，鎮痛之效。

其氣味辛平，有毒。能和胃，健脾，止煩吐，下逆氣，消胸痞，利水道。治咳逆，頭眩，咽腫，胸痞，痰癆，失眠，反胃，吐食。

【用量】一〇——四〇——八〇為煎劑等，服用之。

【製劑】1. 半夏煎 *Decoction Tuberos Pinellia Tuberifera*

此即以半夏一五〇，水三〇〇，煎湯煎之。所得液體，再加生薑二〇〇，作一日三回，二日分服之用量。專為鎮咳藥，對於腳氣，慢性胃炎，肝臟腫瘍，胃加答兒等所發之頑固嘔吐，及胃潰瘍，而起之嘔吐，均有特效。

2. 半夏糖

此即以半夏研末，用生薑汁，白礬湯，混合作塊，栝葉包置籠中，待其發生黃衣，移於日光中晒乾，備用。

半夏餅

此即以半夏研末，用薑汁作爲餅狀，晒乾備用。

【禁忌】惡臭痰。畏雄黃，生薑，乾薑，秦皮，龜甲，烏頭。忌海藻，怡糖。

【學說】據名醫別錄云：半夏，生槐里川谷。五月，八月採根，暴乾。吳普曰：生微丘，或生野中。二月始生葉，三三相偶，白花圓上。陶弘景曰：槐屬扶風，今第一出青州吳中，以肉白者佳，不厭陳久。蘇恭曰：所在皆有，生平澤中者，名羊眼半夏，圓白爲勝；然江南者大，乃徑寸許。南人持重之。頃來互用，功效殊異。其苗似是油跋，誤以爲半夏也。

【別稱】又名守田，水玉，地文，和姑。

半邊蓮

(桔梗科)

【學名】*Lobelia radicans*, Thunb. (*Lobelia radicans*, A. Tie.)

【產地】多密生於淺水，及溝池中。

【基本】爲一種小草，莖就地延長，自莖節出線根，深入地中。葉披針形，而有鋸齒，互生，秋自莖梢葉腋出長梗，每梗開一淡紅色花，或淡紫色花，僅有半邊如蓮花狀，故名也。可採之，而爲藥用。

【功效】其氣味辛平，無毒。主治蛇虻咬傷，可搗其汁飲之

，以其餘滓，再溫塗於患處，甚效。又能治寒胸，氣喘，及瘵疾寒熱，可用雄黃各二錢，搗泥，待其變青，以面糊爲丸，梧子大，每服九丸，用鹽湯空腹服用。

【用量】一。〇——三。〇服用。

占斯

【基本】此爲一種寄生植物，古多寄生於樟樹之上。其皮如厚朴狀，而色與桂相似。具有縱橫紋理。昔時有採爲藥用者。

【功效】其氣味苦溫，(或爲辛平)無毒。能除水，消積，辟邪氣。治寒熱，濕痺，腰痛，脾熱，婦人血癥，經閉，小兒疳不能行。並療癰疽，惡腫。

【別稱】又名炭皮，良無極。

冬瓜

(葫蘆科)

【學名】*Burmannia orientalis*, Sw.

【產地】多產生於田園之中。

【基本】爲一年生之蔓草，莖有卷鬚。葉呈心臟形，具有淺裂。夏月開花，黃色，單性，雌雄同株，合瓣花冠

。果實爲長橢圓形，長約一二尺。每爲食用，亦可爲藥。

【功效】民間常用爲止渴，消水腫，利小便之效藥。

其味甘，微寒。能清熱利濕，通小水，祛水腫。治

頭面發熱，心煩，消渴。

【用量】六。〇——八。〇。煎服。

冬青

(冬青科)

【學名】*Ilex pedunculosa*, Miq.

【產地】閩西之間，多栽種之。

【基本】爲常綠喬木，高至二三十尺，葉互生，卵形，全邊

而尖。其質厚，而有光澤。夏月開花，黃色，白色

。果實圓形，如赤豆大，赤色。其子，皮，葉，皆

供藥用之。

【功效】其子及皮氣味苦寒，無毒。能去風，補虛，益肌，

增骨；但須浸酒服之有功。其葉每燒灰入面膏，而

治瘡疽有效。

【學說】李時珍曰：凍青，亦女貞別種也。山中時有之；但

以微團，而子赤者，爲凍青。葉長，而子黑者，爲

女貞。

【別稱】又名凍青。

冬葵

(錦葵科)

【學名】*Malva verticillata* L. (*M. patuhella*, Benth)

【產地】近於海濱之處，多栽種之。

【基本】爲越年生草，莖高三五尺，葉有細毛，成爲掌狀，

緣邊有鈍齒。冬月至春月，常自葉腋簇生小花，淡

紫白色。結爲蒴果，內藏種子，爲扁圓形，小粒，

黑色，可取之，爲藥。

【功效】爲利尿藥，對於小便困難，妊娠水腫，及淋病皆效

；並有催乳之功。而胎盤不脫者，服之亦能剝離。

其氣味甘寒，滑而無毒，能滑尿竅，利濕熱，潤燥

，通腸，行津液，利二便，消水腫，催乳，滑胎。

【用量】二。〇——五。〇。煎服。

【學說】李時珍曰：葵菜，古人種爲常食。今之種者，頗鮮

。有紫莖，白莖二種；以白莖爲勝，大葉，小花，

花紫黃色。其最小者，名鴨腳葵，實大如指頂，皮

薄而扁，實內子輕虛，如榆莢仁，四五月種者，可

留子。六七月種者，爲秋葵。八九月種者，爲冬葵

，經年收採。正月復種者，爲春葵；然宿根至春，

亦生。

【別稱】又名麥，露麥，沿麥。

古加

(古加科)

【學名】*Psychorhizon* (Coca Lami).

【產地】南美洲之各地，多產生之。

【基本】為灌木植物，高至六七尺許，葉互生，長橢圓形，

開小花，淡黃色，雌雄花異株。可採其葉，供藥用之。

【成分】葉含多量古加因 (Cocain) 等類之鹽基。

【功效】古加葉，在昔時常為嗜好品，亦用為鎮痛麻痺藥；

但近來科學進步，多以其葉製成古加因之製劑，而應用之。

【用量】葉一回〇.三——一.〇為浸劑，粉劑等服用之。

【製劑】鹽酸古加因 *Cocainum hydrochloricum*

此即由古加葉而製出之鹽基，呈無色柱狀之結晶，稍能溶於熱水，而易溶於酒精，依的兒，及硫化炭等，呈鹼性反應，具鹽基之特性，通常溶解於稀酸類，而生結晶鹽，即為本品。有局部麻醉之能，故外科手術之際，有以其百分之二——五水溶液，注

射於局部之皮下，經數分時之後，用刀剪切開或割

除，全無痛苦。此外亦可用於胃痛，腹痛，疝疔痛

吐，頑固嘔吐，以及船暈，痲咳，酒精與阿片慢性

中毒，和精神病等。一回以〇.〇三——〇.〇

三為水劑，丸劑，錠劑而服用之。

古文錢

【基本】此即古代之錢幣也。據云：在五百年以外者，即可入藥。

【功效】據云：其氣味辛平，有毒。能明目，去翳。治時氣

濕病，心腹痛，以及五淋，便血，婦人逆產。

【別稱】又名泉，孔方兄，上清童子。

古倫僕

(防己科)

【學名】*Jatropha palmata*, Miers.

【基本】多產於亞非利加之東岸。

【產地】為多年生之蔓草，莖細，藉以纏繞於他物之上。葉

為掌狀分裂，互生。花小，單性，雌雄花異株。其

根供藥用之。

【成分】含有古倫僕並 (Columbin) $C_{24}H_{32}O_7$ 古倫僕酸，及

倍爾別林 (Berberin) $C_{20}H_{17}N_4O$ 與多量澱粉等。

【功效】為苦味健胃藥；又可用於消化不良之慢性下痢，及赤痢，有止瀉之作用。

【用量】五〇——一〇〇〇煎服，或為丸劑，粉劑，服用之。

【製劑】古倫僕丁幾 *Tinctum Colombo.*

此即以古倫僕根一〇〇，浸於稀酒精一〇〇〇中，而製成黃褐色之液體，即是。以十滴至三十滴，為止瀉藥。

②古倫僕越幾斯 *Extractum Colombo.*

此即以古倫僕，及水，與酒精，而製成乾燥越幾斯。其功效相同，一日數回，與以〇・二——〇・五——一〇為丸劑，水溶液服用。

古魯聖篤

(葫蘆科)

【學名】*Citrullus colocynthis*, Schrad.

【產地】產於阿拉伯，小亞細亞，及非洲北部之各地。

【基本】為一種蔓草，有卷鬚，藉以卷絡於他物之上。葉及花，酷似西瓜。果實球形，黃色，乾之可供藥用。

【成分】含有 *Colocynthin*, *Citrullin* 等之成分。

【功效】為劇烈之瀉下藥。

【用量】〇・〇三——〇・三為丸劑，粉劑等，服用之。

【製劑】古魯聖篤丁幾 *Tinctum Colocynthis*

此即以古魯聖篤實末一〇〇，浸於稀酒精一〇〇〇中，而製成黃色之液體者是。一回〇・二——一〇〇服用。

②古魯聖篤越幾斯 *Extractum Colocynthis.*

此即以古魯聖篤實，除去種子，而用其末，與水及酒精而製成。一回〇・〇五服用，為瀉下藥。

可可樹

(梧桐科)

【學名】*Theobroma Cacao*, L.

【產地】多生於熱帶亞美利加；其餘熱帶地方，亦有栽種之者。

【基本】為常綠木本，幹高十六尺餘，葉橢圓形，而尖。花

呈赤色。果實為長橢圓形，長三寸許，果皮外部有肉質，內含多數種子，可採取之，為藥。

【成分】含有多量之可可油。

【功效】為健胃藥，有清涼，口香之作用，故能補血健胃。

【用量】一〇〇——三〇〇——六〇〇服用。

【製劑】諸果力 *Chocolato.*

此即以可種子，去皮，炒過，研為細末，加以同量之糖及膏漿，與黃色素少許，製成者是。以佐食品或溶於湯，而為飲料。

奴栢

(桑科)

【學名】*Udmania triloba*, Eeo.

【基本】據藤露器云：生江南山野，似栢，節有刺，冬不凋。又據李時珍云：此樹似栢，而小，有刺。葉亦如柘葉，而小，可飼蠶。

【功效】其味苦，小溫，無毒。能治老婦血癩，男子桂癩，可取三稜草，馬鞭草，煎如稠糖，其病在心，食後服用；其病在脾，空腹服用。

巧婦鳥

【學名】*Yogodytes fumigatus*, Temm.

【基本】為鳴禽類，其體頗小，呈茶褐色；翼及他部，更雜有細灰白色之斑條。此鳥動作敏捷，鳴聲甚高。青時有取其肉，而用之；亦有取其窠，而用之者。

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。炙食甚美，能令人聰明。其窠能治瘴疾腦氣，以一枚燒灰，用酒吞用，甚效。

【別稱】又名桃蟲，蒙鳩，女匠，黃豆雀。

必栗香

(胡桃科)

【學名】*Platanus strobilacea* S. et Z.

【產地】多自生於山野之中。

【基本】為一種木本植物，葉為羽狀複葉，有鋸齒。開單性花，為柔荑花序。果實，呈為球狀，可取之，而供藥用。

【功效】其氣味辛溫，無毒。治一切惡氣，心氣鬼疰，可以煮汁服之。

【別稱】又名花木香，詹香。

玄石

(Beryl)

【基本】為火成岩之一，其質緻密堅牢，呈黑色，因含有橄欖石，及磁鐵礦之故，每為大塊。

【功效】其氣味鹹溫，無毒。能治大人小兒驚癇，女子絕孕，小腹冷痛。精少，身重服之，能令人有子。

【用量】四。○——八。○煎用。

【學說】李時珍曰：蒸石，生山之陰，有鐵處。玄石，生山之陽，有銅處。雖形相似，性則不同。故玄石，不能似蒸石之吸鐵。

【別稱】又名玄武岩，玄水石，處石。

玄參

(元參科)

【學名】Scrophularia oldhami Oliv.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為多年生草，葉呈方形，高五六尺許，葉長卵形，

端尖，有鋸齒，對生。夏秋之間，莖端開小唇形花

，淡黃綠色，為圓錐花序。其根，可入藥用之。

【功效】為清涼消炎藥，可用於癰腫，癰瘍，結核等。

其氣味苦鹹微寒，無毒。能益精，明目，利咽喉，

通二便。治骨蒸，傳屍，癰疽，癩癧，溫瘧，傷寒

，心驚，煩熱；但脾虛泄瀉者，禁忌服用。

【用量】四〇——八〇——一五〇為浸劑，煎劑，服

用之。

【製法】玄參散 Pulvis Scrophularia oldhami

此即以玄參，芒硝，大黃，犀角，羚羊角，沉香，

木香，黃耆各三五〇，甘草一〇〇，共為細末。

每次服用三〇。五，溫水吞服，為癰疽消炎，鎮痛之

效藥。對於煩渴，燒熱，亦可用之。

【禁忌】忌銅，火，惡黃耆，秦艽，葶藶，反藜蘆。

【學說】李時珍曰：今用玄參，正如蘇頌所說：其根有腥氣

，故蘇恭以為臭也。宿根，多為地蠶食之，故其中
空。花有紫，白二種。

【別稱】又名黑參，玄臺，重臺，鹿腸，正馬，逐馬，覆草

，野脂麻，鬼賊。

玄明粉

【基本】此以朴硝，和蘿蔔，甘草，同煎，入砂罐煨煉而成

，為白色之結晶粉末，呈半透明體，即可用為藥。

據李時珍云：此之治法，用白淨朴消十斤，長流水

一石，煎化，去滓。星月下露一夜，去水，取出。

每一斗，用蘿蔔一斤，切片，同煎蒸，濾汁，再露

一夜，取出。每消一斤，用甘草一兩，同煎，去滓

。再露一夜，取出，以大沙罐一個，築實盛之，鹽

泥固封，厚半寸，不蓋口，置爐中，以炭火十斤，

從文至武煨之，待沸定，以瓦一片，蓋口，仍前同

濟。再以十五斤，頂火煨之，放冷，一伏時，取出

。臨紙安地上，盆覆三日，出火毒，研末。每一斤

，入生甘草末一兩，炙甘草末一兩，相併和勻，瓶

收用，即玄明粉也。

【成分】含有硝酸加個鹽等之成分。

【功效】為解熱，利尿藥，有消腫消炎之作用。

其氣味辛甘而冷，無毒。治心熱，煩燥，並五臟宿滯，癥結。又能明目，退熱，消腫，去毒。

【用量】二〇——八〇煎服。

【別稱】又名白龍粉。

玄胡索

(玄胡索科亦作罌粟科)

【學名】*Corydalis anibirica*, (Ch. et Zoll.)

【產地】山野多自生，或栽培之。

【基本】為一種宿根草，有大葉，小葉二種。春月生苗，高

五寸許，三四月開花，呈碧紫色，為總狀花序。至

五月葉枯，其地下之莖，外皮黃褐色，內肉白色，

供藥用之。

【成分】含有 *Protopin* 及 *Bulboquinin* 二種植物鹽基。

【功效】為鎮痛藥，凡攝取冰冷之食物及飲料，而發之腹痛

，痲痛，與分娩後之後陣痛等，皆能緩解之。此外

並有調止出血，及吸收滲血之功。對於子宮出血，

尿血，衄血，與皮下溢血等。均可服用之。

其氣味辛溫，無毒。能治月經不調，腹中結塊，崩

中，淋瀝，產後諸血病；並能除風，和氣，暖腰膝

，止暴痛，破癥癖，損瘀血。又治心氣小腹痛等，有效。

【用量】一回二〇——四〇——六〇為水劑，煎劑等服之。

【製劑】玄胡索丁糖 *Tinctura Radix Corydalis Yeringi*.

此即以玄胡索五〇，浸於稀酒精，及水各二五。

〇中，經二星期後濾過之，為鎮痛止血藥，一回三

〇——六〇——一〇〇為水劑服用之。

【採製】於四月間採取之。

【學說】陳藏器曰：延胡索生奚國，從安東來，根如半夏，

色黃。李時珍曰：奚乃東北夷人也，今二茅山西上

龍洞種之。每年寒露後栽時，立春後生苗，葉如竹

葉樣。三月長三寸高，根叢生，如芋胡樣。立夏掘

起。

【別稱】王好古曰：玄胡索乃其本名，因避宋真宗諱，改玄

為延；故又名延胡索也。

玄精石

【基本】此為鹽鹵滲透於土中，經過長久期限，即結成青白

色，甲殼樣之片狀石，昔時每取之為藥。

【功效】據云：其氣味鹹溫，無毒。能除風冷，邪氣，溫癰

○治心腹積聚，頭痛，婦人冷漏；並能止虛汗，煩渴，咽腫，咽痛。

【學說】蘇頌曰：玄精石，出解州，解池，及通秦州，積鹽倉中，亦有之。其色青白而龜背者，爲佳，採取無時。又解池，有鹽精石，味更鹹苦，亦玄精石之類也。

【別稱】又名太乙玄精石，陰精石，玄英石。

玉

【學名】Jadeite, Nephrite.

【產地】中國西北各省，及遼東半島多產之。

【基本】通常分爲軟硬二種，軟玉，概呈灰白色，爲輝石之一種。硬玉，概呈淡綠色，爲角閃石之一種。俗稱之玉，即軟玉也。

【功效】據云：其氣味甘平，無毒。能治五臟百病。柔筋，強骨，安魂魄，長肌肉，益氣，利血，久服能明耳

目。

【禁忌】畏敗冬瓜，青竹。

【別稱】又名玄真。

玉柏 (石松科)

【學名】*Lycopodium obscurum*, L.

【產地】多自生於山野；而庭院中，亦有栽培之者。

【基本】爲常綠草本，莖爲地上地下兩部，地下莖，匍匐地中，處處抽莖，地上莖而直立，體高三四寸。其莖枝多密生鱗片狀之小葉，至秋梢頭爲穗狀，而生包子莖。多採取其莖葉，供藥用之。

【成分】含有列並油等。

【功效】其氣味酸溫，無毒。能益氣，止渴。

【學說】名醫別錄云：生石上如松，高五六寸，紫花，用莖葉。李時珍曰：此即石松之小者也。人皆采置盆中，養數年不死，呼爲千年柏，萬年松。

【別稱】又名玉筍。

玉簪 (百合科)

【學名】*Hosta Strobilata*, Burgh.

【產地】多栽培於庭園之間；而山野自生者，亦不少。

【基本】爲多年生草，莖高四五尺餘，葉大，綠色，卵形，有長葉柄，叢生。葉面有白粉，蠟質。夏日葉間抽圓莖，上部開花，白色，亦有淡紫色者，爲總狀花

用之。每採其根，供藥用之。

【功效】其氣味甘辛而寒，有毒。以其搗汁服之，能解一切毒下骨硬；又可塗治癩腫。

【學說】李時珍曰：玉簪處處人家栽為花草，二月生苗，成莖，高尺許，柔莖，如白松。其葉大如掌圍，而有尖。葉上形，如車前葉，青白色，頗嬌瑩。六七月抽莖，莖上有細葉，中出花十數枚，長二三寸，本小末大，開時，正如白玉搔頭簪形，又如羊肚藤菇之狀。開時微綻四出，中吐黃蕊，頗香，不結子。其根連生如鬼臼，射干，生姜輩，有鬚毛。舊莖死，則莖有一白，新芽生，則舊根腐；亦有莖花者，葉微軟，皆鬼臼，射干之屬。

【別稱】又名白鶴仙

玉蜀黍

(禾本科)

【學名】*Zea mays* L.

【產地】原產於北亞美利加；而吾國近多栽種於陸田之中。【基本】為一年生草，高至七八尺許，葉長，而大，為披針形；有平行脈。雄花開於莖上，雌花生於葉腋。果實為穎果，種子甚多。其根，葉，及種子，皆供藥

用之。

【功效】其子氣味甘平，無毒。能調中，開胃。其根葉能治小便淋瀝，沙石痛淋，甚效。

【別稱】又名玉高粱。

玉蘭花

(木蘭科)

【學名】*Magnolia conspicua* Salisb.

【產地】庭園及寺院中，多栽種之。

【基本】為落葉喬木，高至二十尺許，葉大倒卵形，全邊，互生。花大，花蓋九片，倒卵形，白色，而厚，微帶綠色，可採取之為藥。

【功效】其性溫而滑。能消痰，益肺，和氣，清涼，與蜜服用尤良。

石瓜

【基本】據李時珍曰：石瓜，出四川峨眉中，及芒部地方，其樹修幹，樹端捉，葉肥滑，如冬青狀，似桑；其花淺黃色，結實，如綫長而不圓，壳裂，則子見。其形似瓜，其堅如石，煮液黃色。可用之為藥。【功效】其氣味苦平，無毒。能治心痛；亦可煎汁，洗濕風痺。

石灰

「基本」此亦名養化鈣，由灰煉燒而成，熟石灰，即輕養化鈣；以石灰加水，即得。可用為藥者，須將石灰浸於水中濾淨之，而後入胃無害。

「功效」最近學說：有用為滅酸藥者，可治胃酸過多，消化不良；並能止津液，泄瀉等。

昔時常用治癰疽，疥癬，金瘡，惡腫。能生肌，長肉，散血，止痛。其功效是否顯着，須視其秘方，而判定之。

石耳

「別稱」又名石莖，墨灰，銀石，白虎，磷灰，希灰。

「學名」*Gyrophora esculenta Miyoshi.*

「產地」自生於高山岩石之上。

「基本」為葉狀地衣，全體扁平，呈不規則之橢圓形，周圍略向內方卷縮，表面灰色，光滑；裏面黑色，粗糙；中央有柄，用以固着於岩石之上。

「功效」據日用本草云：其氣味甘平，無毒。久食益色，至老不改，令人不飢，大小便少。又李時珍云：能明目，益精。

「別稱」又名靈芝。

石帆 *Mariposa*

「產地」多生於海底之岩礁上。

「基本」為八出珊瑚類，平面分歧，呈樹枝狀，恰如團扇，故又名海團扇，出羽狀之八觸手，骨節為角質，有取之而為藥用者。

「功效」據陶弘景云：其氣味甜鹹而平，無毒。能治石淋。

又陳藏器云：有用其養汁，而治婦人月經閉止等。

「學說」陳藏器曰：石帆，生海底，高尺餘，根如漆色，至梢上，漸軟，作交羅紋。大明曰：石帆，紫色，大者如筋，見風漸硬，色如漆，人以飾作珊瑚裝。

石芝 *Fungia*

「產地」多產於溫帶之海岸。

「基本」此屬多出珊瑚類，骨節，成多數之裙襖，如菌類之菌褶，各裙襖與一個隔膜相當。

「功效」據本草綱目云：若服之，能輕身不老。

「學說」李時珍按圖，及抱樸子說：此乃石桂之也。海邊有石梅，枝幹橫斜；石柏，葉如側柏，亦是石桂之類云！

石松

(石松科)

〔學名〕 *Lycopodium clavatum*, L.

〔產地〕多自生於山地之間。

〔基本〕為多年生常綠隱花植物，有蔓性匍匐於地上，處處生根，長至數尺，有許多之枝，分歧為數條。葉小細長，而尖，如鱗片狀，密生於莖上，其繁殖器，生於直立之特別枝。孢子熟時，呈黃色，或白色，其胞中之子，即石松子也。吾國多採其根，以供藥用之。

〔成分〕子含多量之脂肪。

〔功效〕石松子，在新醫方面，雖有內服，而用於尿道加答兒等，及外用於濕疹等；但最多應用，以其為丸藥之粉衣耳。

其根莖氣味苦辛而溫，無毒。能治久患風痺，腳膝痛，皮膚不仁，氣力衰弱。若久服之，去風濕，止癢，能增顏增色。

〔學說〕陳靈器曰：生天台山上，似松，高一二尺，山人取根煎用。李時珍曰：此即玉柏之長者也，名山皆有之。

石南

(石南科)

〔學名〕 *Rhododendron Metternichii* G. & Z.

〔產地〕江南人多植之墓上；而山地亦多產生之。

〔基本〕為常綠灌木，高七八尺，葉卵圓形，甚厚，面甚滑澤，背為褐色。初夏開淡紅花，為合瓣花冠狀，類杜鵑。秋結細實，色呈紅色。多採其葉，以供藥用之。

〔功效〕民間常為內傷藥，服之能強健身體。

其氣味辛苦而平，有毒。能養腎氣，內傷，陰衰；並利筋骨皮毛。療脚弱，五臟邪氣，除熱。女子不可久服，恐令思男。

〔用量〕一·五——五·〇煎服。

〔禁忌〕惡五加皮。

〔採製〕取葉，曬乾，到用。

〔學說〕本草衍義云：石南，葉似枇杷葉之小者，而背無毛光，並不皺正。二月間開花，冬有二葉，為花苞，苞既開，中有十五餘花，大小如棉花，甚細碎，一苞約彈許大，成一球，一花六葉，一朶有七八球，淡白綠色，葉末微淡，赤色。花既開，蕊滿，花但

莖葉，不見花。花穗罷，去年綠葉，盡脫落，漸生新葉。

【別稱】又名風藥。

石炭 Carbon

【基本】為宇宙間存在最多之元質，不惟為動植物體之主要成分，即石灰石油中莫不含之。又纖維質，蠟燭質，脂肪質，以及糖分，澱粉等之有機化合物的組成，為炭輕質。動物所得各物質之組成，為炭輕養，加以蛋白質，膠樣物等，又成二養化炭存在空氣中；其出生物之呼吸，有機物之腐敗燃燒，或火山噴出發生，與石灰等化合而成，亦為天然產出之純粹炭質也。近來由是產生之製劑甚多，昔時亦有用為藥者。

【功效】據本草綱目云：其氣味甘辛，有毒。主治婦人血氣痛，及諸瘡出血，小兒痰癆；但外用最多。

【別稱】又名煤，石墨，烏金石，焦石。

石荊

【基本】據陳藏器云：石荊，似荊而小，生水旁。廣濟方，一水荊，是也。蘇頌言：洛人以當礬荊者，非也。

【功效】陳氏言其燒灰淋汁，浴頭，生髮，令長。

石葦 (水龍骨科)

【學名】*Polypodium himala. Sw.*

【產地】山地多自生之。

【基本】為隱花植物，其地下莖，有茶褐色之鱗片。葉為深綠，闊寸餘，長六七寸。其質勁厚，背面密布濃褐色之粉末，並生子囊羣，葉柄甚長，可栽於盆中。採其葉莖，陰乾入藥。

【功效】為利尿藥。

其氣味辛平，無毒。主治勞熱，邪氣，五癆閉不通，利小便水道，並止煩，下氣，通膀胱滿，補五勞，安五臟。能治淋瀝，遺尿。

【用量】一·五——五·〇煎服。

【採製】除去葉背子囊，微炙，備用。

【說學】李時珍曰：多生陰崖陰澗處，其葉長近尺，闊寸餘，柔輒如皮，背有黃毛，亦有金星者，名金星草。此凌冬不凋。又一種如杏葉者，亦生石上，其性相同。

【別稱】又名石皮，石蘭。

石莧

【基本】為一種河岸砂石上之生草，春日生苗，莖高尺餘，

呈青色。葉如水柳，而稍短，可用為藥。

【功效】其氣味辛苦，而有小毒。同甘草煎服，治胸膈，吐

涎。

石斛

(蘭科)

【學名】*Dactyloctenium moniliforme*, Sw.

【產地】多生於山中之岩石上，或古木上。

【基本】為多年生草，莖高五六寸，有節稍，類木賊，而中

實。每節生葉一片，葉狹而厚，有平行脈。夏月開

花，色淡紅或白。拔其根，以砂石栽之，或盛一籃

，挂屋下，頻澆水，經年不死，莖可入藥。舊稱蜀

產者，為勝，亦稱金釵石斛，以其狀如金釵股也。

又一種木斛，莖鬆軟，色深黃，有光澤，亦稱金釵

石斛，不堪入藥，故用為藥者，須慎重選擇云。

【功效】為健胃強壯藥。

其氣味甘平，無毒。能益精，強陰，暖水臟，平胃

氣，補虛勞，壯筋骨。療風痺，脚弱，自汗，發熱

等。

【用量】一回〇.五——二.〇——五.〇服用。

【禁忌】惡巴豆，畏蠶豆。

【採製】取頭根，酒洗，焙用。

【別稱】石蓬，金釵，禁生，林蘭，杜蘭。

石斛

【學名】*Polypodium nuttallii*, Darwin.

【產地】多產生於東南海中。

【基本】此屬蔓腳類肉柄有鱗片，其先端有爪狀之介殼，如

龜手然，故有斯名。介殼由大小不同之數片而成。

相集而抱。其體蔓腳六對。各有分枝，潮來則由殼

口伸出之。常固著於岩石之間隙。

【功效】其氣味甘鹹而平，無毒。能利小便。

石蜜

【產地】吾國川浙各省，製造最多。

【基本】此即俗稱之砂糖，呈白色之結晶性塊，可作調味藥

等。

【成分】含多量之蔗糖。

【功效】其氣味甘寒，冷利，無毒。主治心腹熱脹，口唇乾

渴；並能消痰，祛咳，解酒，和中，助脾，緩肝。

【用量】二。〇——五。〇——一〇。〇服用。

【別稱】又名白沙糖。

石膏 Gypsum

【產地】產於山西，浙江，雲南各省，為最多。

【基本】為天然產出物，其結晶，成菱狀，有不等之色澤。

使其入甕中，徐徐燒之，成粉，曰煨蓋，亦有黃黑青紅等色者，多作肥料。選其白色無形之粉末，為藥用之。

【成分】含有硫酸加爾叟謨 ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 硫酸礬土，酸化

鐵等。

【功效】為清涼解熱藥。

其氣味甘辛，大寒，無毒。能緩脾，益氣，生津，止渴。治傷寒，時氣，頭痛身熱，三焦大熱，小便赤濁，中暑自汗。

【用量】六。〇——二〇。〇煎服。

【禁忌】惡莽草，巴豆，馬目，毒公。畏鐵。

【採製】取之打碎，入土器，置炭火上，四面燒一時許，取出，紙裹，埋土中一宿，去火毒用，或將石膏研末，生甘草湯浸，水飛曬乾，炒過，備用。

【別稱】又名細理石，寒水石。

石蒜

(石蒜科)

【學名】*Lycoris radiata*, Herb.

【產地】多自生於山野之陰濕向陽處。

【基本】為多年生草，高至一尺餘，葉叢生，細長，寬二三分，長一尺餘，如線狀，有平行脈。冬季生莖，至夏則枯腐。秋月開花，莖在葉枯後生長，頂上著花數枚，有柄，如繖形花，紅色。花蓋六片，深裂，各裂片開出，而反卷，有蕊突出花外。地下之莖，及其他之形狀，與水仙相似，皮外灰黑色，內裏為白色之鱗片，可採取之，而供藥用。

【成分】含有 Lycorin $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{NO}_4$ 及 Galactarin $\text{C}_{12}\text{H}_{21}\text{NO}_6$ 之二種植物鹽基。

【功效】為催吐藥，及外用治瘡藥。

其根氣味辛甘而溫，有毒。能治無名腫毒，疔瘡，惡核，用其根搗爛塗之，甚效。若毒大甚者，洗淨，以生白酒煎服，令吐或汗，即愈。

【用量】一回一。〇——三。〇取根，煎服，為催吐藥。

【學說】李時珍曰：石蒜處處濕地下有之。古謂之烏蒜。俗

謂之老鴉蒜，一枝箭，是也。春初生葉，如蒜秧，及出莖葉，葉背有劍脊，四散布地。七月苗枯，乃于平地抽出一莖，如箭幹，長約尺許；莖端開花，四五朵，六出，紅色，如山丹花狀，而瓣長，黃蕊，長鬚。其根如蒜，皮色紫赤，肉為白色，而有小毒。

「別稱」鴉蒜，老鴉蒜，蒜頭草，連連酸，一枝箭，水麻。

石葷

(石葷科)

「學名」*Uva Ursaria* L. var. *Joli*.

「產地」多生於淺海中之木石上。

「基本」為一種藻類植物，高二三寸，至七八寸，形如一葉，呈平面狀，係二層細胞所成，扁闊如紙，可取為藥用。

「功效」其氣味甘平，無毒。能下水，利小便。治風秘不通，五膈氣，並臍下結氣，疝疾，可煮汁飲之。

石麩

「基本」據李時珍云：石麩，不長生，亦瑞物也。或曰：饑荒，則生之。唐玄宗天寶三載，武威番禾縣，醴泉涌出，石化為麩，貧民取食之。憲宗元和四年，山

西雲雷代三州，山谷間，石化為麩，人取食之。宋真宗祥符五年，四月，慈州民饑，鄉寧縣，山生石脂如麩，可作餅餌，仁宗嘉祐七年，三月彭城地生麩。五月鍾離縣，地生麩。哲宗元豐三年，五月青州，臨陶益都，石皆化麩，人取食之。搜集於此，以備食者考求云。

「功效」其氣味甘平，無毒。能益氣，調中，食之止饑。

石燕

「基本」據李時珍云：石燕，有二。一種是此，乃石類也。狀類燕而有紋。圓大者，為雄，長小者，為雌。一種，是鍾乳穴中石燕，似蝙蝠者，食乳汁，能飛，乃禽類也。

「功效」其石類之石燕，氣味甘涼，無毒。能治淋疾，痔瘻，腸風，頻瀉，及婦人赤白帶下等。

其禽類之石燕，又名土燕。肉之氣味甘暖，無毒。能壯陽，暖腰，補精，增髓，益氣，潤膚；並治風寒，溫疫。

「用量」土燕，可取一二隻之肉，煮食之。石燕可用三。

六。○煮汁，或磨汁服之。

石蕊

【學名】 *Cladonia rangiferina*.

【基本】此屬樹枝狀之地衣，呈紅色之部分，為生殖部，產

於寒地，種類甚多，亦可取之為藥。

【功效】其氣味甘溫，無毒。能明目，益精，解熱，化痰，

生津，潤咽。

【別稱】又名石滿，石芥，雲茶，蒙頂茶。

石膽

【學名】 *Chrysom. Sulfuratum*.

【基本】此即膽礬，為硫酸銅之俗稱。以養化銅，溶於稀硫

酸中而製之，為深藍色，透明之結晶。天然產者，

結晶甚少，且多不透明，為塊狀物，可用之為藥。

【成分】含有硫酸銅之成分。

【功效】硫酸銅（新藥房出售者，質純，可用。）為收斂藥，

可用於慢性下痢。又為催吐藥，可用於燒（火柴）類

中毒。更常用為腐蝕藥，或收斂藥。

據云：其氣味酸辛而寒，有毒。能治目痛，金瘡，

諸癩癩，及女子陰蝕，崩中，下血。

【用量】硫酸銅以〇.五——一。〇為催吐藥。以〇.〇一

——〇.一為收斂藥，可作水劑，丸劑等服用之。

外用以其百分之〇.一——〇.二為塗布料，點眼

料，含嗽料等。

【禁忌】石膽畏牡桂，茵桂，莞花，辛夷，白薇。

【別稱】又名膽礬，墨石，畢石，君石，銅勒，立制石。

石蟹

【基本】為蟹生溪澗石穴中，小而殼堅，赤色。廣東崖州榆

林港內半里許，土極細，性寒，蟹入其中，即不能

出，久之成石。相傳置於几上，能明目，亦有人藥

用之者。

【功效】據云：其氣味鹹寒，無毒。能解一切藥毒，及蠱毒

。治天行熱疾。催生，落胎。又可以醋磨而敷癰腫

有效。

【學說】馬志曰：石蟹，生南海云。是尋常蟹爾！年月深久

，水沫相作，因化成石。每遇海潮，即漂出。又有

一種，入洞穴年深者，亦然，皆細研，水飛，入諸

藥，相助用之。

石鹼

【基本】據李時珍云：石鹼，出山東濟寧諸處，彼人采蓋鹽

之風，開容浸水濕起，晒乾，燒灰，以原水淋汁，每百引入粉麩，二、三斤，久則凝澆，如石連汁，貨之四方辦衣，發麵，甚獲利也。他處以磁灰淋澆汁，亦去垢，發麵。用為藥者，亦是此也。

「功效」其氣味辛苦，而溫，微毒。能去心熱，止心痛，消痰；磨積塊，去食滯，洗滌垢膩，並殺菌蟲，去目翳；治疔隔，反胃。同石灰爛肌肉，潰癰疽，去疣贅；甚效。

「別種」又名灰險，花險。

石髓

「基本」據陳藏器云：石髓，生臨海華蓋山石窟中。土人采取，澄淘如泥，作丸，如彈子，有白有黃，彌佳。

「功效」其氣味甘溫，無毒。能潤皮膚，悅顏色。治寒熱，羸瘦，積聚，心腹脹滿，飲食不化，瘦塊，腸鳴，下痢，以及內傷，折骨，腰脚痛，皆可以酒研服。

石蠶

「基本」為多出珊瑚類之一種，呈塊狀，或樹枝狀。分泌石灰質之骨軸，存於各骨軸之各突出物，即個體之附著處也。

「功效」其氣味苦熱，無毒（或有毒）。能治金瘡，止血，生肌，破石淋，血結，磨服當下碎石。

此外另有一種石蠶，生於池澤石上，形狀似蠶，作繭如紋股，色如泥，長寸許，以蔽其身，春夏羽化，出蟻飛於水面者是。其性鹹寒，有毒。能除熱，解結氣，利水道。治石淋，尿秘，可除皮殼用之。

石髓

「學名」*Talophora japonica* Tschile.

「基本」此體扁橢圓形，無頭胸之區別，缺觸角及眼，背面具八枚之板狀殼，軟體動物也。

「功效」其氣味甘涼，無毒。能治淋疾，血病等，可磨水服之。

「學說」李時珍曰：石髓，生海邊，形狀大小，儼然蠶蟲，蓋亦化成者，此蠶俗名土蠶。

石決明

「學名」*Fallosis signata* Chan.

「基本」為軟體動物，長約六寸餘，殼卵圓形，中央略高，背面有吸孔九排，故又名九孔螺。殼外褐色，甚粗糙，密生線狀突起物，內帶真珠色肉，可食，即鮑

魚。其小者，名鱖魚。取其貝殼，供藥用之。

【功效】其作用與真珠相同，故多為眼科藥。其氣味鹹平，無毒。能除肺肝風熱，治青盲，內障，水飛點眼。外障亦治。兼治骨蒸，勞熱；並通五淋。

【用量】二。〇——六。〇煎服。

【禁忌】惡旋覆花。

【別稱】又名九孔螺，殼名千重光。

石長生

(水龍骨科亦作羊齒科)

【學名】*Adiantum monochlamys*, Fret.

【產地】生於深山幽谷之懸崖上。

【基本】為一種四時不凋之草本植物，春季新葉，帶有紅色

。根莖密生毛茸，作黑褐色。葉長尺許，一株生數

葉，全部卵狀，為披針形。葉柄細長，質硬，而有

光澤，呈紫黑褐色。葉在羽狀分枝之枝柄上，排列

許多小葉，呈倒心臟形。常有一子囊羣，附着於小

葉上。

【功效】其味鹹微寒，有毒。治寒熱，惡瘡，疥癬，蟲毒；

並能逐諸風，辟百邪。

【別稱】又名丹草，丹沙草。

石花菜

(紅色藻類)

【學名】*Gelidium crinale*, Griseb.

【產地】生於海中之石上。

【基本】為一種隱花植物，略呈灌木狀，高至四五寸，帶紫紅色。採取後乾燥之，即變成黃色。

【成分】含多量之膠樣質。

【功效】據食鑑本草云：其氣味甘鹹，大寒而滑，無毒。能去上焦浮熱，發下部虛寒。

【用量】二。〇——四。〇煎服。

【學說】李時珍曰：石花菜，生南海沙中，高二三寸許，狀

如珊瑚，有紅白二色。枝上有細齒，以沸湯泡去砂

屑，沃以薑醋食之。

【別稱】又名珊瑚枝。

石刺木

【產地】吾國南省多有之。

【基本】據陳藏器云：石刺木，乃木上寄生也。生南方林藪間，其樹江西人呼為斬刺，亦種為離院；樹似棘而

大，枝上有逆鉤。取其根皮，供藥用之。

【功效】其氣味苦平，無毒。能破血，治產後餘血結類。

石胡荽

(菊科)

【學名】 *Achyrocline minima* Less.

【產地】生於路旁，或庭園雜草之間。

【基本】為隨處生根之植物，其根簇生數莖，高二三寸，平

臥於地。葉本狹，末廣，有鋸齒三五枚。夏日葉腋

兩無數細花，相集成為頭狀，呈綠色。結實扁平，

集為毬形，極易繁衍，可為藥用。

【成分】含多量之脂肪樣質。

【功效】據西醫本草載：其氣味辛寒，無毒。(李時珍曰：

辛溫。)能通鼻氣，利九竅。治風痰，痰瘧，頭痛

腦脹，耳聾，目翳，目腫。療痔瘡，散惡腫。

【別稱】又名天胡荽，野園荽，鵝不食草，雞腸草。

石香薷

【基本】據李時珍云：香薷，石香薷，一物；但隨所生而名

爾。生平地者葉大；崖石者，葉細，可通用之。

【功效】據南齊本草云：其氣味辛溫，無毒。能調中，溫胃

更勝。止霍亂吐瀉，心腹脹滿，腹痛，腸鳴，比香薷，

【用量】一。〇——一六。〇煎服。

【別稱】又名石薺。

石首魚

【學名】 *Carrialla eschscholtz* Bleek.

【產地】多產於近海之泥底。

【基本】此屬硬鱗類，體側扁，呈灰綠色。顯蓋之後方，有

一條斑紋。脊鱗，分前後二部，頭部有二個游離之

耳骨，白色，如石狀。其肉味甚美，鱗乾製，堪為

食用，名魚肚。亦可為藥用之。

【功效】據云：其肉，氣味甘平，無毒。能開胃，益氣，補

中。其鱗氣味鹹寒，無毒。治頭痛，利小便，下石

淋，解破毒。其鱗氣味，亦為鹹寒。能澀精，暖精

種子。治破傷，風濕，痔疾，以及產後風搖。

【別稱】又名石頭魚，江魚，黃花魚。乾者名鯊魚。

石斑魚

【學名】 *Neoharboonius ha-nuensis* Gilh.

【產地】南方溪澗水石處，多生之

【基本】此屬喉鱗類，體側扁長形，頭部圓錐形，吻端尖，

上顎被下顎。背部，呈淡綠色，有淡黑色之斑紋。

腹部，紅色，亦可為藥用之。

「功效」據本草綱目云：其子及腸，有毒。能令人吐瀉。

「別稱」石葵魚，高魚。

石菖蒲

(天南星科)

「學名」*Acorus gramineus*, Ait.

「產地」多生於水石之間。

「基本」為多年生草，類葡萄莖，葉劍狀而細，無中肋，長一尺餘。花小，淡黃色。花蓋六片，雄蕊六枝，肉

穗花序，如圓柱狀。其莖，供藥用之。

「成分」含有揮發油，樹脂，澱粉，及苦味質等。

「功效」為強壯藥。

其氣味辛苦，而溫。能開心竅，祛痰濕。外用有消

腫，止痛之功。

「用量」二・〇——八・〇煎服。

「禁忌」忌鐵，餛飩，羊肉。

石硫黃

「基本」此即硫黃之色赤者，據李時珍云：硫黃之多赤者，

名石亭脂；而近世通呼硫黃，為石亭脂，亦未考此

也。按抱朴子云：石硫丹，石之赤精，石硫黃之類

也。

「功效」近多外用，為殺蟲治疥癬之藥。

其氣味苦溫，無毒。主治婦人帶下，血崩；並能壯

陽，除冷，亦治鼻赤作痛。

「別稱」又名石亭脂，石硫丹，石硫芝。

石硫青

「基本」據李時珍云：此硫黃之多青色者。蘇頌圖經言：石

亭脂，冬結石，並不堪入藥，未深考此也。

「功效」其氣味酸溫，無毒。能益肝，明目。外用治疥，殺

蟲。

「別稱」又名冬結石。

石硫黃 *Sulfur*

「產地」多產於意大利，及日本之火山附近。

「基本」為溫泉中之結晶，或在硫氣孔之周圍。其結晶在常

溫為斜方八面體，屬斜方晶系；然溶解後，使之徐

徐冷却，則結成針狀之晶形，屬單斜晶系。若驟投

於水中，則成黑色之非晶體，故硫黃一質，具有三

種形態。其化學成分為純硫。元素黃色，呈半透明

體，有脂肪樣光澤。放出臭氣，可為藥用。

「功效」近來多外用於疥癬，濕疹等。

其氣味酸溫，有毒。治婦人陰蝕，疽痔，惡血。能
堅筋骨，補精氣。療心腹積聚，邪氣冷痛；並可止
血痢，殺疥蟲。

【用量】〇·五——一·〇——二·五服用，有瀉下作用。

【製劑】丁硫黃軟膏 Ung. Sulfur.

此即以硫黃一〇，〇豚脂二〇，〇配伍而成，為外
用疥癬，濕疹，膿泡疹，鱗屑癬藥。

【別稱】俗稱硫磺。

石腦油 Petrolem

【產地】吾國四川，陝西等省，均產出之。

【基本】為一種流質礦物，呈黃褐色，而帶綠色閃光，入器
蒸溜之。即得點燈用之煤油也。

【功效】其氣味辛溫，有毒。能塗瘡癬蟲癩。治小兒驚風，
瘰癧，可和諸藥作丸散。

【別稱】又名石油，石漆，猛火油，雄黃油，硫黃油。

石鮫魚

【基本】據陳藏器云：生南方溪澗中，長一寸。背裏，腹下
均赤。商人以作鮭，甚美。

【功效】其氣味甘平，而有小毒。能治疥，疥，鮮。

石龍芮

(毛茛科)

【學名】*Ranunculus sceleratus* L.

【產地】多生於淺水，及水邊中。

【基本】為一年生草，或越年生草，莖粗而中空洞，高至二
三尺。葉互生，為掌狀分裂，呈黃綠色。葉面，有
光澤。自春至秋，開小花，五瓣，黃色。果實為乾
果，多而小，呈橢圓形。可採取其根，皮，及子，
葉，皆供藥用之。

【功效】其根皮及子，氣味苦平，無毒。治風寒，濕痺，心
腹邪氣。利關節，止煩滿，逐諸風，除心熱，平腎
，健胃，助精，補氣。其葉氣味甘寒，無毒。能除
寒熱。止霍亂，下瘡血，治結核，癩癧腫。

【禁忌】畏菜莢，蛇虺皮。

【別稱】又名地樵，天豆，石龍，魯果能，水葦，苦葦，葦
麥，胡椒菜，彭根。

石龍芻

(燈心草科)

【學名】*Juncus balticus* Wild. var. *japonicus*, F. Buch.

【產地】多生於水田之中。

【基本】為一種宿根草，莖細長，而綠色。其橫斷面，為圓

形，無尋常葉。夏日梢頭二三寸下，歧出花梗，開小花，花被為雙額狀。其莖，可為藥用。

【功效】其味苦微寒，無毒。能治心腹邪氣，小便利，風濕，鬼狂，惡腫，蠱毒。補虛，明目。

【學說】李時珍曰：龍鬚，叢生，狀如燈心草，及葛此，苗直上。夏月莖端，開小穗花。結細實，並無枝葉。

【別稱】又名龍鬚，龍修，龍華，龍珠，龍莞，草續斷，方貢，西王母符。

石鐘乳 *Sialakia*.

【產地】產於廣東乳源縣，乳巖者良。

【基本】此為泉水含有碳酸石灰者，由巖隙下滴。其石灰質，日久凝積，凝結下垂，狀如鐘之乳，故名也。可取之，為藥用。

【成分】含有碳酸加爾叟誤 CaCO_3 之成分。

【功效】為強壯藥。

其氣味甘溫，無毒。(或云：有毒。)能安五臟，明目，益精，補氣，開聲，利九竅，通關節。治五勞七傷，肺損吐血，精泄，陽痿，以及婦人乳脈不通等。

【用量】一·五—三·五煎服。

【禁忌】惡牡丹，畏紫石英，忌參，朮，羊血，葱，蒜，胡椒。

【採製】選其白色冰柱狀石，以甘草湯洗淨，研為細末，水飛，備用。

【別稱】又名留公乳，虛中，虛石，鵝管石，夏石，黃沙石；俗稱鐘乳石。

白朮

(菊科)

【學名】*Atractylis lancea*, *Thunb* var. *orientalis*, *Forma*

kyrma, *Malino*.

【產地】多產生於鄭州之山谷中。

【基本】為多年生草，莖高三尺餘，葉呈大卵圓狀披針形。

其莖下之葉，更有深缺裂；葉質頗硬，邊緣略具鋸齒。秋間開花，紅色，為頭狀花序。採其根莖，刮去褐色之表皮，而用黃白色之內塊，供藥用之。

【成分】含有龍腦樣之物質，及菊糖 (*Inulin*) 等。

【功效】為利尿藥，及健胃藥；可應用於水腫，小便利，及胃與腸加答兒等。

其氣味甘溫，無毒。主治風寒，濕痺。能燥腸胃，

止瀉瀉，和尿道。止自汗，盜汗，傷食吐瀉，心腹脹滿；並可生津，止渴，消痰，逐水。

【用量】一回為一。〇——三。〇服用。

【禁忌】豇桃，李，荔枝，雀肉，青魚。

【採製】三月，八月採根，以米泔浸，曬乾，細切。

【別稱】又名山薤，楊袍，袍薤，馬薤，山薤。

白芨

(蘭科)

【學名】*Bellula haemithia*, Rehd. f.

【產地】自生於山野，或栽培於庭園之中。

【基本】為多年生草，高一二尺，葉長寬寸許，有平行脈。

夏月開花，色紅紫或白。取其塊根，入藥用之。

【成分】含有黏液質，澱粉等。

【功效】為止血藥。對於癆瘵，潰瘍，有鎮痛，及促進肉芽發生之效；更有與油類煉合，而為火傷之塗布藥。

其根氣味苦平，無毒。主治癰疽，惡瘡。除白癬，疥癩。能止痛，止血。療風痺，癰結，溫熱，瘧疾等。

【用量】一回與以一。〇——三。〇內服，並有以其粉末，或一二糊樣劑，外用之。

【製劑】白芨散 *Pulvis Tubera Bellulae Haemithia*.

此即以白芨及根二〇。〇研為細末，分作十包。一日

三回，每回一包，為多年咳嗽，肺痿，咯血之特效藥。

藥。

【禁忌】忌烏頭。

【採製】採取生根，水洗，剉用。

【別稱】又名連及草，甘根，白芨。

白芷

(繖形科)

【學名】*Angelica anomala*, Pall.

【產地】多培養於庭園之中，而亦有野生者。

【基本】為一年生草，莖頭成為傘形，高五寸許。葉卵圓，對生。花色白，而微黃。其根，可入藥用之。

【成分】含有揮發油，樹脂，*Angelica* 酸，*Angelican*，及鞣酸，蠟質，苦味質，澱粉，糖分等。

【功效】為興奮藥，及鎮痙藥。其氣味辛溫，無毒。能祛風，燥濕，發表，補血，破瘀，排膿，止痛。治頭風，中風，面痛，目赤，寒熱，燥癢，嘔吐，久渴，鼻淵，口臭。

【用量】一回〇。五——三。〇服用。

「禁忌」忌火。

「採製」取根，除去虛頭及皮，微焙用之。

「學說」名醫別錄曰：白芷，生河東川谷下澤。春生葉，相

對，婆娑紫色，關三指許。花白，微黃。入伏後，

結子。立秋後，苗枯。二月，八月采根，暴乾。以

黃澤者，為佳。

「別稱」又名白芷，芳香，澤芬，莖，苻離等；葉名藥，蒿

麻。

白芨

(鴨跖草科)

「學名」*Pollia japonica*, Hornem.

「基本」為陰濕之宿根草，春月抽莖，一二尺，上部生葉八

九，如披針形，略似藥荷。夏月莖頂開花，為圓錐

花序；花瓣白色。

「功效」可參考杜若條。

白青

「基本」據李時珍云：此即石青之屬，色深者，為石青，淡

者，為碧青也。今繪彩家，亦用。范子計然云：白

青，出弘農豫章，新漆青色者，善。淮南萬畢術云

：白青，得鐵，即化為銅也。

「功效」其氣味甘酸鹹平，無毒。能明目，利九竅。治耳聾，心下邪氣。令人吐，殺諸毒。

「別稱」又名碧青，魚目青。

白芨

「基本」此即 *Tactusa* 也。據陳藏器云：白芨，似萹苳葉，

有白毛。李時珍云：處處有之，似萹苳，而葉色白

，拆之有白汁。正二月下種，四月開黃花如苦蕒；

結子亦同。八月，十月，可再種，故諺云：生菜不

離園。可採其菜，供藥用之。

「功效」為解熱藥。

其氣味苦寒，無毒。能補筋骨，利五臟，開胸膈擁

氣，通經脈，止脾氣，令人聰明。解熱毒，酒毒。

定消渴，利腸胃。

「用量」二〇——八〇煎服。

「別稱」又名石苳，生菜。

白前

(蘿藦科亦作白前科)

「學名」*Vincetoxicum japonicum* Morr. et Diels, var. *purpur-*

scens, Maxim. (*Vincetoxicum purpurascens*, Morr. et

Dome) (V. Yomiji, Jr. et Saw.)

「基本」為多年生草，莖高一二尺，葉有短柄，倒卵狀之橢

圓形，或長橢圓形。葉尖頗銳，葉底鈍形，或銳形

。夏秋之間，葉腋出花莖，分為數枝，攢簇多花，

花有淡紅色，或白色等。其根可採取之，為藥用。

「功效」為祛痰藥。對於咳嗽，咯痰，咯血，皆有特效。

其味甘，微溫，無毒。能治降氣，下痰，安肺，定

咳，及一切氣悶，煩悶。

「用量」一回一〇——五〇煎服。

「別稱」又名石藍，嗽藥。

白英

(茄科)

「學名」*Solanum Dulcamara*, L. var. *ortutum*, Donal.

「產地」多生於山地之間。

「基本」為一種草本之植物，莖蔓性，常纏繞於他物之上。

葉不分裂，亦無深刻。莖葉皆平滑，無毛。夏秋之

間，開總狀花，紫色。花後，結實，為紅色之果。

可採其根苗等，供藥用之。

「功效」其根苗氣味甘寒，無毒。能補中，益氣，去煩熱，

止消渴。治風疹，丹毒，癩瘡，結熱。其子名曰鬼

目，氣味酸平，無毒。專治明目。

「別稱」又名發菜，白草，白幕，排風。

白茅

(禾本科)

「學名」*Imperata arundinacea*, Cyr. var. *Koongjit*, Hack.

「產地」多生於原野之路傍。

「基本」為多年生草，高一二尺，苗如針。葉細長而尖，有

平行脈。春間開花，集生於莖頂之部。根有結節，

甚長而白。莖每匍匐於地中，莖頂有白毛，密生。

長二寸許，採其根針，花等，供藥用之。

「功效」為止血藥，及利尿，發汗藥。對於吐血，衄血，胃

腸出血，以及小便不通，諸種水腫等，皆可服用。

其根氣味甘寒，無毒。治勞傷，虛羸。能補中，益

氣，除瘀血，寒熱，利小便，下五淋，去胃腸熱，

止衄血，崩中。治婦人月經不調，肺喘，水腫。其

針氣味甘平。能下水，破血，通小腸，止鼻衄。治

蜜腫，惡瘡未潰者。其花氣味甘溫。能止吐血，衄

血；又外用於金瘡，止血，止痛。

「用量」一回五〇——三〇〇煎服。

「禁忌」忌鐵。

「採製」取根，洗淨其泥及毛根，到用。

【學說】李時珍曰：茅有白，菅，黃，香等數種，葉皆相似

。白茅，短小，三四月開白花，成穗，結細實。其根甚長，白軟如筋，而有節，味甘，俗呼絲茅。可以苦蓋，及供祭祀之用，苞苴之用，本經所用茅根，是也。其根乾之，夜視有光，故腐則變為螢火。管茅，只生山上，似白茅而長，入秋抽莖開花，成穗，如蕪火。結實，尖黑，長分許，黏衣刺人。其根短硬，如細竹絲，無節，而微甘，亦可入藥，功不及白茅。

【別稱】根名茹根，蘭根，地筋。

白芫

(豆科)

【學名】*Phaseolus radiatus* L. var.

【產地】園圃間多栽培之。

【基本】為一年生草，葉為複葉，而有三小葉。其總葉柄頗長，開淡黃色花，亦頗大，呈鐘骨瓣向旋狀。結細長之莢果，種子甚小，為橢圓形，多赤色；但有白色者，可供藥用。

【功效】其氣味甘平（或鹹平），無毒。能暖胃腸，殺鬼氣，補五臟，調中，通十二經脈。

【學說】李時珍曰：飯豆，小豆之白色者也。亦有土黃色者

，豆大，如綠豆，而長。四五月種之，苗葉似赤小豆，而略大，可食。莢亦似小豆。一種衰豆，葉大如豆。可作飯，作腐，亦其類也。

【別稱】又名飯豆。

白魚

【學名】*Lophium szechuanum* L.

【產地】多產生於淡水之中。

【基本】此屬於彈尾類，體扁長，被銀色之鱗，具長觸角與尾。其性最忌日光，有取其肉，供為藥用。

【功效】其氣味甘平，無毒。能利水，下氣，補肝，明目，開胃，健脾。

【禁忌】忌與棗同食。

白堊

【基本】為石灰岩之一種，質軟色白，呈土狀，多山有孔蟲

之遺殼，堆積而成，亦可取之為藥。

【功效】近來齒科醫多用之。

其氣味苦溫（或辛甘），無毒。能燥濕，溫水臟，治頭痛，和王瓜為湯，食之頗驗。又治女子寒熱，積

癖，月閉，積聚；並能瀉腸，止痢。

【用量】二〇——五〇煎服。

【別稱】又名白善土，白土粉，黃粉。

白苣

(天南星科)

【學名】*Aconitum alkalms. L.*

【產地】多生於池澤之中。

【基本】為多年生草，莖及根甚長，呈淡紅色。葉狹扁而長，

有平行脈。夏月葉腋出穗，開花，花細小頗多，

帶淡黃色，為肉穗花序。其根，可為藥用。

【功效】其氣味甘辛，無毒。能殺蟲，去風濕。以其研末，

調油，塗疥。

【學說】李時珍曰：此有二種，一種根大，而肥白，節疎者

，白苣也。俗謂之泥苣蒲。一種根瘦，而赤，節稍

密者，溪孫也。俗謂水苣蒲。葉俱無劍脊。溪孫，

氣味勝似白苣，並可殺蟲，不可服食。

【別稱】又名水苣蒲，水宿，莖蒲，苣陽，溪孫，蘭孫。

白棘

【基本】據名醫別錄云：白棘，生雍州川谷。棘刺花，生道

旁。冬至後，百廿日采之，四月采實。李當之云：

白棘，是酸棗樹針。今人用天門冬苗代之，非真也

。蘇恭云：棘有赤白二種，白棘，莖白如粉，子葉

與赤棘同，棘中時復有之，亦為難得。其刺當用白

者，為佳；然刺有鈎直二種，直者，宜入補益。鈎

者，宜用療瘡腫。花即其花，更無別物。天門冬，

一名頭棘。南人以代棘針，非矣。韓保昇云：棘有

赤白二種，切韻云：棘小棗也。田野間多有之，叢

高三尺，花葉莖實，俱似棗也。

【功效】其氣味辛寒，無毒。治心腹痛，癰腫痛。療虛損，

陰痿，漏精。能補中，益氣，小便尿血。

【別稱】又名棘刺，棘針，赤龍爪，花名刺原，荊葵，馬胸

等。

白楊

(楊柳科)

【學名】*Populus balsamifera. L. var. sinuata. Toul. (Po-*

ulus alba, L.) (Populus tremula, L. var. villosa,

Wam.)

【基本】為落葉喬木，高至數十尺，葉互生，卵形，或長橢

圓形，而尖，有鈍鋸齒，面青，背白。春月開花，

色深紫，單性花，雌雄異株，悉排列為穗狀花序。

其果實着生於花輪上，熟則四裂散出，如棉子。樹皮，呈暗灰色，初平滑，後生裂紋，可供藥用。

〔功效〕其木皮氣味苦寒，無毒。能治毒風，腳氣，水腫，以及撲傷，瘀血。其枝能消腹痛，並治疔疔。其葉可治齒齦，煎水，含嗽。又治骨疽久發，可搗而敷之。

〔學說〕李時珍曰：白楊木高大，葉圓似梨而肥大，有尖，面青而光，背呈白色，有鋸齒，木肌細白，性堅直，用為梁拱，終不撓曲，與杉楊乃一類二種也。治病之功，大抵彷彿。嫩葉亦可救荒，老葉可作酒麴料。

〔別稱〕又名獨搖。

白蜜

Mel.

〔基本〕為蜜蜂 *Apis mellifera* Linn. 採取花中甘露，所釀

成。藏於蜂房，人收取之，可入藥用。

〔成分〕含有多量葡萄糖之結晶。

〔功效〕為緩下藥，及調味藥，賦形藥。又可外於安瓿那，咽頭加答兒之含嗽，及阿布答，鴉口瘡，之塗敷。

〔用量〕五〇・〇頓服，為下劑。

白蒿

(菊科)

〔學名〕 *Atractylodes chinensis* Desv.

〔產地〕多自生於田野之水邊。

〔基本〕為多年生草，葉如羽狀分裂，略似青蒿而粗。葉背稔生白毛，自初生至秋，白於葉背故，花為小頭狀花序。可採取根苗及子，供藥用之。

〔功效〕其根苗氣味甘平，無毒。治風寒，濕痺。能補中，益氣，利膈，開胃。以其燒灰，淋汁煎服，能治淋瀝。以其搗汁食服，能去心熱，而治暴痢。

〔學說〕李時珍曰：白蒿，處處有之。有水陸二種，本草所用，蓋取水生者。故曰：生中山川澤，不曰山谷平地也。二種形狀相似，但陸生辛薰，不及水生者，香美。

〔別稱〕又名藥，由胡，葉蒿，蒿。

白膠

Colatium album

〔基本〕此山動物之骨質，而得之骨膠也。為白色透明之片狀，無臭味，極易溶解於水，冷後則成凝膠，可為藥用。

〔功效〕用於奇烈性物質之中毒，而發胃腸炎症，可溶於牛

乳等食服。又用於熱性病，及小兒虛弱，可為膠漿

服之。此外常用於表皮剝脫等。更有以其製成膠

囊，坐藥等，為賦形藥。

「用量」一〇——五〇為水劑，乳劑，服用。

白鮮 (芸香科)

「學名」*Dicentra alba*, L.

「產地」山野及田野多自生之。

「基本」為亞灌木，莖高二尺許，下部木質，葉為羽狀複葉

。夏開白花，或淡紅色花，香氣強烈。其根皮，可

取之為藥。

「功效」其氣味苦寒(或作鹹)，無毒。能除風，去熱，通關

節，利九竅，和血脈，利小腸。並治天行時氣，壯

熱，惡寒，頭風，頭痛，心熱，肺嗽，及婦人陰中

酸痛，產後餘痛。

「禁忌」惡蟪蝥，桔梗，茯苓，葶藶。

「學說」陶弘景曰：俗呼為白羊鮮，氣息正似羊羶，故又名

白羶。李時珍曰：鮮者，羊之氣也。此草根白色，

作羊羶氣，其子紫紫，如椒，故有諸名。

「別稱」又名白羶，白羊鮮，地羊鮮，金雀兒椒。

白薇 (蘿藦科亦作白前科)

「學名」*Veratrum album*, Bge. (*Vincetoxicum album*,

Four. et Dene)

「產地」多自生於山野之間。

「基本」為多年生草，莖高一二尺，葉為橢圓形，背有白毛

。夏月開小花，五瓣，深紫色，花序為穗。結莢，

長二寸許。其根，可入藥用之。

「功效」其味苦，鹹平(或大寒)，無毒。能瀉血熱，去邪

氣，下水，止血，利氣，益精。治風濕，寒熱，溫

瘧，驚悸，風狂，多眠，身熱，遺尿，熱淋，婦人

傷中，產後虛吐。療金瘡，止血。

「用量」一回一〇——五〇煎服。

「禁忌」惡黃耆，大黃，大戟。反乾薑，大棗，乾漆，山茱

萸。

「學說」名醫別錄曰：白薇。生平原川谷，三月三日采根陰

乾。蘇頌曰：今陝西諸郡，及舒澠潯遼州亦有之。

莖葉俱青，頗類柳葉。六七月開紅花，八月結實。

其根黃白色，類牛膝，而短小，今人八月采之。

「別稱」又名薇草，白薇，春草。

白蠟 *Cera alba*

【產地】產於四川，貴州，浙江等處。

【基本】為漆樹科植物之果實，所取出之蠟質，呈白色光澤脂肪樣之固塊。又有從黃蠟煉出而得之者，皆可為藥用。

【成分】含有 Palmitin 等。

【功效】為賦形藥，可為軟膏藥，丸藥等之基礎料。

白藜

(葡萄科)

【學名】*Amelopsys serjunicifolia*, Engl. (*Vitis serjunicifolia*, Bge.)

【基本】為多年生草，狀如小灌木，葉為掌狀複葉。春夏之交，開黃綠色小花。質圓，多漿。其根皮黑，肉白，可取之入藥。

【功效】為鎮痛藥，可用於癆瘵，膿瘍等。

其氣味苦平，無毒。主治癰腫，疔瘡。散結氣，止痛，除熱；並治小兒驚癇，女子陰中腫痛，赤白帶下。

【用量】一·五——四·〇服用。

【禁忌】反烏頭。

【學說】蘇頌曰：今江淮及荆襄懷孟商齊諸州，皆有之。二

月生苗，多在林中，作蔓，赤莖，葉如小桑。五月開花，七月結實，根如雞鴨卵而長，三五枚同一窠；皮黑，肉白。一種赤飲，花實功用皆同，但表裏俱赤耳！

【別稱】又名白草，白根，兔核，貓兒卵，崑崙。

白鷓

【基本】據李時珍云：鷓，似山雞而色白，有黑文，如澁澹，尾長三四尺，體備冠距，紅頰，赤嘴，丹爪，其性耿介。李太白言：其卵，可以雞伏，亦有黑鷓。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。能解毒，補中。

【別稱】又名白鷓，閑客。

白丁香

【基本】為鳴禽類雉雀 (*Tringa montana*, L.) 之糞。五月，或十二月拾收之，為藥。

【成分】含有窒素有機物，尿酸安母尼亞，及磷酸鹽類等。【功效】其氣味苦溫，微毒。療目痛，治癰疽。止痛，癩癧，積聚，脹滿，目翳，贅肉。

【採製】於五月採取雄雀之糞，研為細末，以甘草湯煎，晒

乾，備用。

「別稱」本草綱目名曰：維雀屎；本草拾遺名曰：青丹；炮

炙論曰：雀蘇。

白玉髓 (Archeuthin)。

「產地」多產於岩石之空洞，及裂縫中。

「基本」此乃水晶之爲隱微晶質，有脂肪樣之色澤，不透明

者也。

「成分」含有硅之酸化物。

「功效」據名醫別錄云：其氣味甘平，無毒。能治婦人無子

，不老延年。

「別稱」又名玉脂，玉膏，玉液。

白石英 Quartz

「基本」此爲硅之酸化物，或爲花崗岩等之主成分。常自爲

大塊，或散見於砂礫之中，概呈白色，有玻璃樣光

澤，質堅而脆。和以硼砂曹達，加熱則漸漸熔解，

變成玻璃。

「成分」含多量無水硅酸。

「功效」因其所含成分之故，以致功效尚有疑問。

據云：其味甘，微溫，無毒。能治消渴，陰痿，肺

痿，瘖瘖。

「禁忌」惡馬目，毒公。

「學說」名醫別錄曰：白石英，生華陰山谷，及太山，大如

指長二三寸，六面如削，白澈有光，長五六寸者，

細佳。其黃端白稜，名黃石英。赤端白稜，名赤石

英。青端赤稜，名青石英。黑澤有光，名黑石英。

二月采亦無時。

白冬瓜

(葫蘆科)

「學名」*Trichosanthes ovifera* Grev.

「產地」原產於亞細亞諸國，及亞非利加；近來各田園皆栽

種之。

「基本」爲蔬類植物，春暮生苗，引蔓，葉如掌狀分裂，莖

葉皆有毛刺。夏月開黃白花，結實大者，徑尺餘，

長二三尺。瓜皮堅厚，嫩時，色綠有毛。老則蒼色

，上浮白霜。其瓜實子仁，皆供藥用之。

「功效」其瓜味甘微寒，無毒。治小腹水脹，可利小便，止

渴。搗汁服能解毒，止煩悶。其瓜煉氣味甘平，無

毒。絞汁服，止煩燥，熱渴。利小腸，治五淋。其

瓜子能悅顏色，益氣，亦可除煩解悶。

【用量】二・〇——八・〇服用。

【別稱】又名白瓜，水芝，地芝。

白羊石

【學說】蘇蘇頌云：生登州白羊山，春中掘地採之，以白堊者為良。又有黑羊石，生登州宮山之西，亦春中掘地採之，以黑色有瑤壁光瑩者，為良。

【功效】據云：味淡，生涼，熟熱，無毒。能解藥毒。

白花菜

(白花菜科)

【學名】*Polylethra Yessia Makamura*

【產地】多生於暖地之間，而園圃中，多栽種之。

【基本】為一年生草，莖一二尺餘，葉為掌狀複葉，小葉五片，倒卵形，全邊，或有微鋸齒。夏月莖頭開花，白色，或紫色。

【功效】其氣味苦辛，微毒。能下氣，止癢。治風濕，痺痛。又搗汁可洗痔疾。

【學說】李時珍曰：白花菜，三月種之，柔莖，延蔓，一枝五葉，葉大如拇指，秋間開小白花，長蕊。結小角，長二三寸。其子黑色，而細，狀如初眠蠶沙，不光澤，菜氣羶身，惟宜蠶類食之。

【別稱】又名羊角菜。

白花藤

【基本】據蘇恭云：生嶺南交州廣州平澤，苗似野葛，葉似女貞，莖葉俱無毛，而白花。其根似葛，而骨柔。皮厚，肉白，大療毒用根，不用苗。韓保昇云：蔓生，白花，葉有細毛，根似牡丹骨柔，皮白而厚，凌冬不凋。其根，可為藥用。

【功效】其氣味苦寒，無毒。能治虛勞，風熱。解諸藥菜肉之毒。

白花蛇

【基本】據本草綱目李時珍云：花蛇，湖蜀皆有，今惟以蕘蛇擅名，然得市肆所貨，官司所取者，皆自江南興國州諸山中來。其蛇龍頭虎口，黑質白花，脇有二十四個方勝文，腹有念珠斑，口有四長牙，尾上有一佛指甲，長一二分。卵形如連珠，多在石南藤上。食其花葉。人以此尋獲，先撒沙土一把，則蟠而不動，以叉取之，用繩懸起，剖刀破腹，去腸物，則反尾，洗滌其腹，蓋護劍爾，乃以竹支定，屈曲盤起，繫縛炕乾，出僻地者雖乾枯，而眼光不陷。

他處者，則否矣。故羅願爾雅云：蛇死目皆閉，惟蕪州花蛇，目開如生。舒蕪兩界者，則一開一閉，故人以此驗之。

【功效】其肉甘鹹而溫，有毒。作為風藥，較諸蛇為速。治中風濕痺，筋脈拘急，口噤，半身不遂，小兒急驚風，及痘疔黑陷。

【用量】四〇——一二〇服用。

【採製】取蛇，宜用中段，頭尾皆有毒，不可用。乾者，宜用酒浸去皮肉，而骨刺尤有毒，用者能令人死。

【別稱】又名蕪蛇，寒鼻蛇。

白屈菜

(罂粟科)

【學名】*Chelidonium Majus* L.

【產地】多自生於原野之路傍。

【基本】為多年生草，葉為羽狀複葉，小葉有缺刻，互生。

其色上面黃綠，下面帶白色，有毛。花有長柄，為繖形花序。莖脆弱，約二三尺高，斷之則有黃色之汁液。其地下部，或全草，供藥用之。

【成分】含有 Chelidonium, Sanguinarine, Chelidonium, 及黃色素等。

【功效】為腐蝕藥，可外用於乳疽之腐蝕，及癰腫等之內服。民間更有以其生汁，塗布於創傷，及毒蟲螫傷，而為鎮痛，消毒藥。

【用量】一回〇・八——一・六服用。

白附子

【產地】濕地自生，以高麗新羅產生為最多。

【基本】本植物之莖，類似鼠尾草，並無旁枝，細葉叢生，開花以穗。根長寸許，與附子相似，故名也。大約其根，入藥用之。

【功效】其氣味辛甘，大溫，而有小毒。主治諸風冷氣，心痛，血痺，中風，失音，面上百病。補肝虛，祛風痰。並治疥癬風疔，陰下濕癢。

【用量】〇・五——一・五服用。

【採製】名醫別錄曰：白附子，生蜀郡，三月采。李時珍曰：根如草烏頭之小者，長寸許，乾者，皺紋有節。可焙，對，用之。

白兔藿

【基本】據蘇恭云：荆襄山谷今有之，蔓生，山南人謂之白葛。苗似蘿藦，葉圓厚，莖有白毛，與柔草異。用

霍亂毒有效，而交廣，又有白花藤，亦解毒用根，不用苗。

【功效】其氣味苦平，無毒。除蠱毒，鬼疰，以及蛇蜂諸大毒，不可入口者，皆消除之。又去血，用末着痛上，立清。若有毒入腹者，煮汁飲之，即解。

【採製】五月六月採之，日乾，備用。

【別稱】又名白葛。

白胡椒

【基本】據通雅云：廣舶胡椒，有一種玉椒，色白，味獨辛於他椒。今寧波貨之頗多，其色如雪，以內外通白者，爲上。白皮內黃者，劣。解魚蝦毒，入房術用。

○又蓬萊，李金什言：洋舶帶來白胡椒。據彼中人云：即用胡椒之嫩者，生去皮，曬乾，卽如白玉色。

，非別有他種。物理小識，胡椒，出番國，亦是蔓生，有白色者，或曰畢澄茄。按畢澄茄，非白色，乃黑褐色也。恐另有一種，姑記之，以待證明。

【功效】據本草綱目所載：能治胃痛，及一般心痛。又可製爲白粉藥，以白胡椒一兩，牙皂一錢，火硝，檀香末，明礬，丁香，蟾酥各三錢，北細辛二錢，冰片

，麝香各五分，金箔量加，共研細末。鼻間，或內服均可。

白茅香

【基本】據陳藏器云：白茅香，生安南，如茅根，道家用作浴湯。李珣云：廣志云生廣南山谷，合諸名香甚奇妙，尤勝舶上來者，李時珍云：此乃南海白茅香，亦今排香之類，非近道中白茅，及白土茅香花也。其根，可爲藥用。

【功效】其氣味甘平，無毒。治惡氣，令人身香。煮湯服之，能治腹冷。合桃葉煎湯，能浴洗小兒遍身瘡泡，甚效。

白荳蔻

(薔荷科)

【學名】*Alibum Cardamum*, L.

【產地】多產於新嘉坡，馬刺巴爾地方。

【基本】爲類於縮砂之果實，呈圓形，或稍帶三稜狀，爲灰白色，而有短毛，極易破碎。內有三房，藏九至十二個種子，呈淡黃色，有爽快之溫氣，及辛辣之香氣，可爲藥用。

【成分】含有揮發油等。

【功效】爲芳香健胃藥。

其氣味辛而大溫，無毒。能止吐逆，冷氣，可以補

肺，益脾，去寒熱，解酒毒。治反胃，噎膈。

【用量】一回〇・四——一〇・二服用。

【學說】據開寶本草所載：白芷莖，出伽古羅國，呼爲多骨

。其草形如芭蕉，葉似杜若，長八九尺，而光滑。

冬夏不凋，花淺黃色。子作柔如菊菊，初則微青，

熟則變白，七月採之。李時珍云：白芷莖，子圓大

如白牽牛子。其殼白厚，其仁如縮砂仁。

【別稱】又名多骨。

白頭翁

(毛茛科)

【學名】*Anemone cernua* Thunb.

【產地】河洛洛陽最多產生之。

【基本】爲多年生草，全部密生白毛，高至一尺許，葉爲羽

狀複葉，簇生，於地下莖，自其中部出花莖。春月

開花，單性，生於花莖之頂，與總苞接近。萼片六

枚，頗大，內面呈濃紫色。結實甚多，有長鬚，至

成熟，呈白色，恰似老翁之頭，故名也。其根，供

藥用之。

【功效】爲收斂，止痛藥。於赤痢、腹痛等，皆可服用；並

有外用於疔瘡，痔瘡，及疥癬等症。

其氣味苦溫，無毒。治溫瘧，痰熱，癩癬，積聚。

並能定腹痛，療金瘡，止鼻衄，治赤痢，暖腰膝，

明耳目。

【用量】一回一〇・五——五〇・〇煎服。

【學說】名醫別錄曰：白頭翁，生高山山谷，及田野，四月

採。蘇恭曰：其葉似芍藥而大，抽一莖，莖頭一花

，紫色，似木棉花。實大者，如雞蛋，白毛寸餘，

皆披下，似白頭老翁，故名也。

【別稱】又名野丈人，胡王使者，奈何草。

白龍鬚

【基本】據李時珍云：劉松石，保壽堂方云：白龍鬚，生近

水旁有石處，寄生，搜風樹節，乃樹之餘精也。細

如棕絲，直起無枝，葉最難。真者一種，方纒，草

生於白線樹根，細絲相類，但有枝莖稍粗爲異，誤

用不淺。愚按所云：二樹名用隱語，均無考證。

【功效】據云：能治婦人風濕，腰腿疼痛，左癱右瘓，口目

喎斜，及產後氣血流散，頭目昏暗，腰腿疼痛不可

忍。

【用量】一〇——二〇〇服用。

白檀香

(檀香科)

【學名】Santalum album, L.

【產地】多產於廣東，雲南等地。

【基本】為常綠灌木，葉為長卵形，端尖，無花瓣，萼裂為四片，實為核果。其木堅重，清香，可為藥用，或為香料用。

【成分】含有揮發油，樹脂等。

【功效】為衝動藥，有香竇之作用。

其氣味辛溫，無毒。能調脾肺，利胸膈，去邪惡，散冷氣，引胃氣上升，進飲食。並止心腹痛，霍亂，消風熱腫毒。又治中惡，鬼氣，殺蟲。

【用量】一回〇・四——〇・八服用。

【禁忌】忌火。

【別稱】又名旂檀，真檀。

白藥子

【基本】據蘇恭云：白藥子。出原州，三月生苗，葉似苦苣，四月抽赤莖，長似靈蘆莖。六月開白花，八月結

子，亦名瓜萎。九月，葉落，枝折，采根，洗切，暴乾。根皮黃色，名白藥子，可供藥用。

【功效】其氣味辛溫，無毒。能消痰，止嗽。治腫毒，惡血，咽中腫痛，喉中熱痛；並能止渴，鎮吐血。又解野葛，生金，巴豆，藥毒。刀釜折傷，以乾末敷之，止血，定痛，對於金瘡，能生肌去毒。療一切天行熱疾。

【用量】二〇——六〇〇服用。

白殭蠶 *White worm thread*

【基本】此即蠶之患白殭病而死者，由一種菌類，寄生蠶體，吸取精液，致蠶殭死，死後其體硬直，而外面生白粉，即是。其菌之孢子，有傳染性。可取其為藥用之。

【功效】民間多用於中風，失音，喉痺，癩症，諸疔等。

其氣味辛鹹，微溫。能治風，化痰，散結，行經。喉痺，咽腫，丹毒，瘰癧，並療中風，失音，小兒驚癇，婦女崩中，帶下。

【用量】一回一〇——五〇〇服用。

【禁忌】忌桑螵蛸，結梗，茯苓，茯神，葶藶。

生薑

(薑科或作薑科)

【學名】Zingiber officinale, Rose.

【產地】園圃間多栽培之。

【基本】為薑類植物，苗高二尺許，葉狀如箭鏃，對生。花被大小不整，色淡黃。其地下莖，色黃，味辛。秋初，出新芽，尤嫩美，可食。採取根莖，而供藥用之。

【成分】含有百分之一——二揮發油。

【功效】為芳香性刺激藥，有驅風及健胃之功。

其氣味辛而微溫，無毒。能歸五臟，除風邪寒熱，傷寒頭痛，散煩悶，開胃氣，止嘔，去痰，破血，調中。治咳嗽，服滿，霍亂不止，腹痛冷痢。

【用量】一回〇・二——一。〇為粉劑，丸劑，水劑等，服用之。

【製劑】1 生薑丁幾 Tinctura Zingiberis

此即以薑根粗末五・〇，浸於酒精五・〇中，經五日後，濾過之，而得微黃色之液體。用為健胃藥，與以〇・五——一。〇為水劑服用之。

2 生薑舍利別 Sirupus Zingiberis

此即以生薑丁幾一。〇，混於單舍利別九。〇中，即成。為芳香調味藥，以其一五。〇，加入其他水劑服用之。

【禁忌】惡黃芩，黃連，天鼠糞。

【學說】李時珍曰：薑，宜原隰沙地。四月取母薑，種之。五月生苗，如初生嫩蘆，而葉稍潤似竹葉，對生；葉亦辛香。秋社前後，新芽頓長，如列指狀，采食。無筋，謂之子薑。秋分後者，次之，霜後，則老矣。

生瓜菜

【基本】據蘇頌云：生瓜菜，生齊州平田陰畦間。春生苗，長三四寸，作叢生。葉青，而圓，似白莧菜，夏開紫白色花，結細實，黑色。其味作生瓜氣，故以為名。

【功效】其氣味甘而微寒，無毒。治虛邪。賊風走攻頭面四肢，陽毒傷寒，壯熱頭痛，心神煩燥；並能消腫，利胸膈。

田父

【基本】據云：此種之動物，較蝦蟇為大，能傷食蛇類，遇

蛇輒銜其尾，蛇死，則食其肉，僅遺尾後寸餘之皮不損。

【功效】其毒最劇，能治蠶咬傷，可以其脊背上之白汁，和蟻子灰炭塗之。

田螺 *Viviparus*

【產地】多產於淡水之中。

【基本】為前類之一種，狀似蝸牛，而尖長殼高，呈青黃色。其肉可食，又可為藥。

【功效】其肉味甘，大寒，無毒。治目熱赤痛，消渴，黃疸。能解酒，清熱，下水氣，利二便，去腹中結熱。

由跋 (天南星科)

【學名】*Arisaema ringens*, Schott. var. *Sieboldii*, Engl.

【產地】多生於山間之陰濕地。

【基本】為多年生草，地下莖球形。葉為掌狀複葉，小葉三片。春日開花，單性，為肉穗花序。表面暗黃綠色；裏面帶紫色。其根及草，可供藥用。

【功效】其氣味辛苦而溫，有毒。能治毒腫，結熱。

【學說】李時珍曰：此即天南星之小者，其氣未足，不堪服食，故醫方罕用。

甲煎

【基本】據陳藏器云：甲煎，以諸藥及美果花燒灰，和蠟成

口脂，所主與甲香略同，三年者良。李時珍云：甲煎，以甲香同沉麝諸藥花物製成，可作口脂及焚香

也。唐李義山詩所謂：沉香甲煎為廷燎者，即此。

【功效】其氣味辛溫，無毒。主治甲疽，小兒頭疔，吻瘡，口旁癰疔，耳後月蝕疔，蜂蛇蟻之瘡，並傳之。

甘松 (敗醬科)

【學名】*Valeriana officinalis*, L.

【產地】產於亞細亞，及歐羅巴等地。

【基本】為多年生草，春日抽莖，高至一二尺許。葉為羽狀複葉，對生，小葉有鋸齒。四月間，莖頭分細梗，簇生，各花如繖狀，花小，淡紅色，形似敗醬。雄蕊三枚，著生於花冠之筒部，莖葉頗柔軟，中含水

液甚多。可採其根，供藥用之。

【成分】含有 $\text{Valeron C}_{10}\text{H}_{16}$ 及 $\text{Baldankampher C}_{17}\text{H}_{20}\text{O}$ 之揮發油也。

【功效】為神經病之鎮痙藥，可用於癲癇，舞蹈病等；又為興奮藥，可用於急性病，及熱性病之虛脫狀態時。

【用量】二回〇・五——二〇〇爲丸劑，粉劑，浸劑等，服用之。

【製劑】丁甘松丁幾 *Thimara Valenciæ*。

此即以甘松根一〇〇，浸於稀酒精五〇〇中，製成爲澄明帶黃褐色之液體。其功用與甘松同，一

回一〇〇——二〇〇服用。

【別稱】又名穿心排草，鹿子草，蠟草。

甘草

(豆科)

【學名】*Glycyrrhiza glabra*, L.

【產地】產於川陝各省爲最多。

【基本】爲多年生之草本，春月生新芽，高至二三尺。葉爲

羽狀複葉，通常由十餘片小葉而成，小葉長卵形。

夏秋之際，葉腋生花，花呈蝶形，花冠淡紅。此植

物之地下莖根，色黃，有特殊之甘味，採掘，而乾

貯之，爲藥。

【成分】含有 $C_{15}H_{16}O_5$ 及 $Amurensin$ 與膠質。

【功效】近來多用爲丸劑等之賦形藥，或爲調味藥。

其氣味甘平，無毒。生用氣平，補脾胃不足，而瀉

心火。炙用氣溫，補三焦元氣，而散惡寒。除邪熱

，去咽痛，緩正氣，養陰血。並能潤肺，止咳，通九竅，利百脈。調和百藥，解百藥毒，故有國老之名。

【用量】一〇——六〇服用。

【禁忌】與海藻，大戟，甘遂，芫花，皆反。

【別稱】又名密甘，密草，美草，路草，靈通，國老。

甘遂

(大戟科)

【學名】*Euphorbia sibiriana*, Morr. et Dene.

【產地】多自生於山野之間。

【基本】爲多年生草，莖高尺許，葉爲長橢圓形。春春開花

，褐色，花後結實，黏滑。其根皮赤，肉白，可供

藥用之。

【功效】爲瀉下藥，專能消除水腫等。

其氣味苦寒，有毒。能瀉水，去痰，消面目浮腫，

留飲，宿食。破癥堅積聚，利水殺道。治痰迷，癩

癩，疔瘡，痔瘻。

【用量】一〇——三〇服用。

【禁忌】惡遠志，反甘草。

【學說】名醫別錄曰：甘遂，生中山川谷，二月採根陰乾。

蘇頌曰：今陝西，山西，江東亦有之，苗似澤漆，短小，而葉有汁，根皮赤，肉白，作連珠，大如指頭。

【別稱】又名甘臺，陵稿，陵澤，甘澤，重澤，苦澤，白澤，主田，鬼醜。

甘蔗

(禾本科)

【學名】*Saccharum officinarum*, L.

【產地】多栽種於園圃之中。

【基本】為多年生之大草，本能直立，莖高十餘尺，徑約寸許。葉狹而尖，線狀，披針形，長至二三尺。開花，為圓錐花序，果實為穎果。其莖外形似竹，惟花實不空。秋冬之際，取莖用之。

【成分】含有多量蔗糖屬 $C_{12}H_{22}O_{11}$ 等之成分。

【功效】其味甘平澀，無毒。能下氣，和中，助脾氣，利大腸，消痰，止渴。除心熱，解酒毒，寬胸，止嘔。

【用量】一〇〇——二〇〇服用。

【製劑】1. 蔗糖 *Saccharose*.

此即由甘蔗製出之緻密乾燥純白色之結晶粉。除用於營養品及嗜好品之外，每用於熱性病者，為止渴

之飲料。又有以其為緩和，及祛痰藥，而用之者。更常用為賦形藥，調味藥等。

2. 單含利別 *Syrupus simplex*.

此即以蔗糖六五。○溶解於蒸溜水三五。○中而製成之。以為配伍含利別劑，或作調味藥等。

【學說】李時珍曰：蔗皆畦種，叢生最困，地下莖似竹而肉實，大者，圍數寸，長六七尺，根下節密，以漸而疏抽。葉似蘆葉而大，長三四尺，扶疏四垂。八九月收莖，可留過春，克果食。

【別稱】又名竿蔗，語。

甘藷

(旋花科)

【學名】*Ipomoea batatas*, Lam.

【產地】生於暖地，原為中央亞美利加之所產。

【基本】為多年生之生草，莖細長，匍匐於地上，葉卵形，或心臟形，有長柄，互生。花為合瓣，花冠紫色，如漏斗狀，與牽牛子之花相似。其根塊多肉，可供藥用之。

【成分】含有澱粉，及蔗糖等。

【功效】其氣味甘平，無毒。能補虛乏，益氣力，健脾胃，

強腎陰。

【用量】二。〇——八。〇服用。

【學說】李時珍曰：按陳祈暢異物志云：甘藷，出於交廣南方，民家以二月種，十月收之。其根似芋，亦有巨魁大者如鴉卵，小者，如雞鴨卵。剝去紫皮，肌肉正白如肌。南人用當米穀，果質蒸炙，皆香美。初時甚甜，經久得風稍淡也。

甘蔗

(芭蕉科)

【學名】*Musa sapientum*, L.

【產地】多栽培園圃中，而熱帶地方有之。

【基本】為一種樹木，高至二十尺餘。其全形與芭蕉相似，頂上叢生大葉，有八片至十片。又自其中央出花叢，形大，花呈紫色。果實長四五寸許，直徑寸餘，為黃色柔果。可採其根，果，花，油，供為藥用。

【成分】含多量之蕉油，及葡萄糖，澱粉等。

【功效】其果味甘大寒，無毒。生食止渴，潤肺。熟食通血，增髓。其根味同，能療癰腫，結熱，搗汁服之，去煩渴，解肌毒。治天行熱狂，風熱頭痛。其油氣味甘冷，無毒。治頭風，去煩渴。又可敷用湯火傷

。花能治心痺痛，燒存性用鹽湯服之。

【學說】李時珍曰：按萬震南川異物志云：甘蔗，即芭蕉，乃草類也。望之如樹株，大者一圍餘，葉長丈許，廣尺餘至二尺。莖虛軟如芋，皆重皮相葉。根如芋魁，青色，大者如車殼，花着莖末，大如酒盃，形色如蓮花。子各為房，實隨花長。每花一圍，各有六子，先後相次，子不俱生，花不俱落也。蕉子凡三種，未熟時皆苦澀，熟時皆甜而脆，味如葡萄，可以療飢。一種大如姆指，長六七寸，銳似羊角，兩兩相抱者，名羊角蕉。剝其皮，黃白色，味最甘美。一種子大如雞卵，有類牛乳者，名牛乳蕉，味微酸。一種子大如蓮子，長四五寸，形正方者，味最弱也，並可密藏為果。

【別稱】又名芭蕉，天苴，芭苴。

甘藷

(十字花科)

【學名】*Brassica oleracea*, L.

【產地】多產於亞細亞之海邊。

【基本】為越年生草，高至二尺餘，葉平滑白色，嫩時聚成球形。花大於芸薹之花。花瓣四枚，呈淡黃色，為

總狀花序。其莖莖，為藥用之。

【功效】其氣味甘平，無毒。能益腎，填髓，安五臟六腑，

利關節，通經絡，下結氣，明耳目，健人，少睡，

益心力，壯筋骨。作菹，經宿色黃，和鹽食，治黃

毒，

【學說】陳藏器曰：此即西土藍也，葉闊，可食。李時珍曰

：此亦大葉冬藍之類也。按胡洽居士云：河東隴西

羌胡多種食之，漢地少有。其葉長大而厚，莖食甘

美。經冬不死，春亦有英。其花黃，生角結子。其

功與藍相近也。

【別稱】又名藍菜。

甘藤

【基本】據陳藏器云：生江南山谷，其藤大如雞卵，狀如木

防己，祈踏吹之，氣出一頭，其汁甘美，如蜜。可

取其汁，供藥用之。

【成分】含有糖液質，及黏液質等。

【功效】其氣味甘平，無毒。能調中，益氣，通血脈，解諸

熱，陰煩，止渴。

【別稱】又名甜藤，成藤。

甘露 *Honigtau*

【基本】此之甘露，在夏令庭園之樹葉上，常常有甘味之汁

降下，以潤其樹下之地面，或植物。自古謂甘露，

有種種之臆說。其實為蚜蟲之分泌物，蓋是蟲以口

咀刺葉，吸收細胞內含水炭素，蛋白質等，於體內

成多量之汁汁，自肛門漏泄。於一日間，能分泌四

十八滴；若有多數此虫，其分泌量，當亦不少，故

可取之為藥。

【成分】含有多量葡萄糖質，及含水炭素。

【功效】可用為清涼止渴料，或為緩下藥等。

其味甘，大寒，無毒。食之能潤五臟，長年不飢。

【用量】五〇——一〇〇服用。

【別稱】又名香露，瑞露，天酒，神漿。

甘松香

(敗醬科)

【學名】*Nardosichys jatamansi*, Royle.

【產地】吾國四川，最多產生。

【基本】為多年生草，二葉對生。地下莖為灰褐色，長約三

四寸，徑約二三分，可採取之，而供藥用。

【成分】含有 *Sequitripenon* $C_{15}H_{24}$ 之揮發油。

【功效】為芳香料，似有健胃之作用。

其氣味甘溫，無毒。能理元氣，去鬱氣。治心腹痛滿，脚氣，膝腫。外用能殺蟲，止痛。

【用量】一回一〇——三〇服用。

【禁忌】忌火。

【學說】馬志曰：廣志云：甘松出姑臧涼州諸山，細葉，引蔓，叢生。可合諸香，及袞衣。蘇頌曰：今黔州州郡，及遂州亦有之，叢生山野，葉細如茅草，根極繁密。八月采之，作湯浴，令人身香。

【別稱】又名苦繭膠。

甘扁桃

(薔薇科)

【學名】*Prunus Amygdalus Stokes, var. dulcis* Baill.

【產地】園圃之間，多栽培之；以歐洲各地，為最多。

【基本】為落葉灌木，高四五尺許，莖上有刺。葉為羽狀複葉，平滑而光澤。開花，呈紅白各色。結實，呈橢圓形，多尖而扁，子皮為桂褐色，有縱皺，浸於水中，則易剝離，而內有二枚之油性肉質狀白色之子葉，可取之為藥。

【成分】含有多量脂肪油，扁桃油，及蛋白質，糖質，護膜

，亞斯排拉根等。

【功效】多為脂肪性緩和藥，可用為乳劑而內服之。又有以其十倍至二十倍水，研為乳白液，加白糖而用為賦形藥等。

【用量】一五〇——二〇〇服用。

【製劑】扁桃油 *Oleum Amygdalium*。

此即以甘扁桃而製出之脂肪樣乳白色油，可為小兒之緩下藥，一回與以五〇——一〇〇服用。對於奇烈性物質之中毒，可與以三〇〇服用，或稍大量亦可。

甘菊花

(菊科)

【學名】*Chrysanthemum sinense* Sieb.

【產地】吾國庭院及園圃之間，多栽培之。

【基本】為多年生之木本草，於春月由宿根生出，夏至後，分植，深秋開花。莖略帶木質，葉有缺刻，花冠周圍為舌狀，中部呈管狀，為頭狀花序。種類至繁，須採其白色而味甘者，入藥用之。

【功效】為清涼藥，有解熱止渴之功。

其氣味甘苦，無毒。能治頭目風熱，眩暈。散濕痺

游風，除胸中煩熱。能補肺，益腎，養目，去翳。
療疔腫，惡毒。

【用量】一·五——三。○為葯劑，煎劑等服用之。

第六畫

伏翼

【學名】*Noctua auritus*.

【基本】為翼肢類之動物，其體形與鼠相似，而指間與前後肢以及尾部，連結成爲一種皮膜（即翼），傍晚飛出，遍翔空中，有食蟲，食果之不同，皆可爲藥用之。

【功效】其氣味鹹平，無毒。治目眩痠痛，能明目有光。療五淋，利水道。治婦人帶下，小兒驚風。

其莖即爲天鼠屎，又名夜明砂。氣味辛寒，無毒。

主療癰腫，瘰癧，能破寒熱積聚，除驚悸。並治目。

盲，障翳。

【採製】據李時珍云：近用者，多假存性耳。

【別稱】又名蝠蝠，天鼠，仙鼠，飛鼠。

伏牛草

【學名】*Darnocanthus indicus*, Gaertn.

（茜草科）

【產地】生於山中之暖地。

【基本】爲常綠亞灌木，莖高二三尺許。其枝繁茂，密生細針，與葉同長。葉小卵形，質頗堅硬。初夏枝梢開花，形小，白花。果實爲小漿果，圓形，赤色。採其花，供藥用之。

【成分】含有 *Roberts* 之成分。

【功效】爲苦味健胃藥，對於胃液分泌機能沈衰，而起之消化不良諸症，服之，即能振起食慾，恢復營養；惟有胃痛者，則宜禁忌之。

其氣味苦甘而平，無毒。治久風濕痺，四肢拘攣，骨肉疼痛，風眩，頭痛，五痔下血。

【用量】一回○·五——一·〇——四·〇爲煎劑服用之。

【製劑】伏牛花浸 *Infusum Flores Darnocanthus*

此即以伏牛花頭二·〇，浸於溫湯一〇〇·〇中，而後濾過。一日三四分服，爲健胃藥。

【採製】三月採花，陰乾，貯藏而用之。

【學說】蘇恭曰：伏牛花生蜀地，所在皆有。今惟益州蜀地有之，多生川澤中。葉青細似黃蘗葉，而不光。莖亦有刺，開花淡黃色，作穗，似杏花而小。

「別稱」又名隔虎刺花。

伏龍肝

「基本」據陶弘景云：此竈中對釜月下黃土也。以竈有神，

故號為伏龍肝；并以迂隱其名耳。今人又用廣州鹽城屑，以療漏血，瘡血，亦是近月之士，蓋得火燒之義也。此確係竈心土，以年久者佳，可為藥用。

「成分」含有碳酸曹達及炭末等。

「功效」民間多用為止嘔藥，或為收斂藥。

其味幸微溫，無毒。主治婦人崩中，吐血，咳逆，反胃，遺精，尿血。能去溫，消腫，催生，下胞，止心驚，安狂癲，除風邪，去蠱毒。又和醋敷癩癧腫，惡毒。

「用量」三。〇——六。〇服用。

「別稱」又名竈心土。

伏雞子根

「基本」據陳藏器云：生四明天台山，蔓延生。葉圓薄，似

錢。根似烏形者，佳良。

「功效」其氣味苦寒，無毒。能治天行黃疸，癩瘕，中惡，寒熱煩痛。解百藥毒，諸熱煩悶。療癰腫，疽瘡，

黃牛疔。

「別稱」又名承露仙。

光明鹽

「基本」此即鹽泉 (Gallipotrin) 產生之精鹽，選其色白光

澤而透明者，為藥用之。

「成分」含鹽酸加里，及鹽酸曹達等之成分。

「功效」民間多用為消炎，消毒之洗滌藥。

其氣味鹹而甘平，無毒。主治頭痛，諸風，目赤，腫痛，多淚。

列當

(列當科)

「學名」*Orobanchae corymbosum*, Siegh. var. *lythrae*, Boed.

「產地」多生於海濱之沙塢。

「基本」為一種寄生之植物，莖肉質，高五六寸。葉為鱗片狀，呈黃褐色。夏秋之間，開小花，排列作穗狀，球形，花冠上部之花，略帶紫色。其根可採取之，而為藥用。

「功效」為強壯藥。

其氣味甘溫，無毒。主治男子五勞七傷，陽事不興。能補腰，利腎。

【用量】三。〇——六。〇。服用。

【學說】馬志曰：列當，生於山巖石之上，如藕根。初生掘取，陰乾用之。韓保昇曰：原州秦州涇州靈州皆有

之，暮春抽苗，四月中旬採取，長五六寸，至一尺以來，莖圓，白色，採取壓扁，日乾。蘇頌曰：草莖密根，與肉蓯蓉根極相類，刮去花，壓扁，以代肉者，功力殊劣，即列當也。

【別稱】又名粟當，草蓯蓉，花蓯蓉。

合歡

(荳科)

【學名】*Albizia julibrissin* Boiv.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為落葉喬木，高至十尺餘，葉為羽狀複葉，自許多小葉而成，小葉形小，夜間閉合。夏月梢頭開小紅

花，甚美。其根皮，可供藥用。

【功效】為鎮痛藥，多用於打撲骨折等傷。

其氣味甘平，無毒。能安五臟，和心志，強身，明目，治癰腫，殺蠱毒，和血，止痛。

【用量】一。五——六。〇。服用。

【採製】取根，去皮，剉炒，備用。

【學說】蘇頌曰：今汴洛間，皆有之，人家多種於庭除間。

木似梧桐，枝甚柔弱，葉似皂角，極細而繁密，互相交接。每一風來，輒自相解了，不相牽綴。采皮即葉用，不拘時月。

【別稱】又名合昏，夜合，青囊，萌葛，烏賴樹。

吉利草

【基本】此草，莖如金釵股，根類芍藥，可取其根，供藥用之。

【功效】其氣味甘平，無毒。能解蠱毒

吉祥草

(百合科)

【學名】*Isotriaenon curruca*, Kth.

【產地】多生於暖帶之濕地。

【基本】為多年生草，莖匍匐於地下及地上，處處生葉，葉之下部，生出叢根。葉細長而尖，有平行脈，長約尺餘。葉中叢生花莖，着許多之花，呈淡紫色。其根及根下子，皆供藥用之。

【功效】其味甘涼，無毒。能清肺，理血，明目，補心。

解熱毒，消咽喉。治小兒急驚，可搗汁，加冰片少許服之。婦人願產子者，忌服用。

吐根

(茜草科)

【學名】 *Urceola Tremenouha*, J. Baill.

【產地】產於西部巴西者，為最多。

【基本】為小灌木，高尺許，葉橢圓形，對生。花小而白，

集於多數總苞之上。實為漿果，色青黑。其根製為粉末，或其他製劑，供藥用之。

【成分】含有 $\text{Cinethin } (C_{20}H_{30}NO_6)$ 之鹽基。

【功效】為催吐藥，或為祛痰藥，可用於氣管枝加答兒等。

又每與阿片配伍，而用於急性慢性腸加答兒；並有裏急後重，及腹痛者，甚效。

【用量】以〇・五——一・五為催吐藥；又以〇・〇——

〇・〇六為祛痰藥等。

【製劑】吐根丁幾 *Tremouha Tremenouhae*

此即以吐根一〇〇冷浸稀酒精一〇〇〇中，經五日而製成之，為黃褐色之液體。以二〇〇——四〇〇

為催吐藥；又以〇・五——一・五為祛痰藥。

吐根舍利別 *Stipulus Tremenouhae*

此即以吐根丁幾一〇〇單舍利別九〇〇混合而成。一日一〇〇〇——三〇〇〇配伍其他水劑服用之。

吐根酒 *Vinum Tremenouhae*

此即以吐根末一〇〇冷浸設里酒一〇〇〇中，經十日後而成。其用量與吐根丁幾相同。

吐根錠 *Trechidol Tremenouhae*

此即以吐根粉末一〇〇白糖九〇〇而製成〇・〇一之上根錠。專用為小兒祛痰藥，一日一——三個服用之。

守宮

【學名】 *Gekko japonicus*, D. et B.

【基本】此屬於蜥蜴類，體較蛇身女大，呈灰色，略扁。四肢有五趾，其趾裏面有鉤，供吸盤之用，故得自由步行於直立壁板之上。

【功效】據本草綱目云：其氣味鹹寒，而有小毒。能治中風，癱瘓，手足不舉，或歷節氣痛，風痺，驚癇，小兒疳積，血積成痞。並療蝎螫。

【學說】李時珍曰：守宮，處處人家墻壁有之，狀如蛇降，而灰黑色，扁首，長頸，細鱗，四足，長者六七寸

，亦不開噉人。南方，有十二時蟲，即守宮之五色者。

「別稱」又名壁宮，壁虎，蝎虎，蜈蚣。

安石榴 (安石榴科)

「學名」 Punica Granatum, L.

「產地」庭園間多栽培之。

「基本」爲落葉灌木，高八九尺許，葉平滑，爲長橢圓形，

或倒卵形，對生，或散生。花大，萼赤色，花瓣深

紅色。子房下位，有橫室。果實球形，大而鮮紅。

上部存萼，熟則裂開，現出種子，肉多，紅色。其

果皮，及枝幹根皮，皆供藥用之。

「成分」果皮含有鞣酸，護謨，越幾斯質等。石榴根皮，及

其枝幹皮中含有 Tannin (C₁₂H₁₆O₆) 又名 Punin

之植物鹽基。

「功效」爲收斂藥，及清涼藥。其根皮等，爲驅蟲藥。

其果皮氣味酸而溫澀，無毒。能止下痢，下血，脫

肛，尚中，帶下。治筋骨風濕，腰脚不遂，行走艱

急疼痛。其根皮，以東行者爲佳，味同，能治寸白

蟲。

「用法」二〇——九。〇煎服。

「製劑」石榴皮越幾斯 Extractum Granati.

此即以石榴皮浸於水中，而製成之。爲粉劑，紙劑等，小兒服之甚易。

「學說」李時珍曰：榴，五月開花，有紅，黃，白三色。單

葉者，結實；千葉者，不結實，或結亦無子也。實

有甜，酸，苦三種。抱朴子言：苦者，出積石山，

或云：卽山石榴也。西陽雜俎言：南詔石榴，皮薄

如紙。瑣碎錄言：河陰石榴，名三十八者，其中只

三十八子也。又南中有四季榴，四時開花，秋月結

實，實方綻，隨復閉花。有火石榴，赤色如火，海

石榴，高一二尺，卽結實，皆異種也。按事類合璧

云：榴大如盃，赤色，有黑斑點，皮中如蜂巢，有

黃膜隔之，其子形如人齒，淡紅色，亦有潔白如雪

者。

「別稱」又名若榴，丹若，金櫻。

安息香

(齊墩果科)

「學名」 Styrax Benzoin, Dryand.

「產地」產於蘇門答臘，暹羅等處。

「基本」爲落葉亞喬木，幹高二三丈，呈灰褐色。葉爲卵形

，端尖，互生。春開小黃花，赤色，爲圓錐花序。

果實球形，灰色，堅硬。其樹皮有膠流出，如餡，至夏墜，色黃，即安息香，可取之，為藥用。

【成分】含有安息香酸 C_6H_5COOH 及三三樹樹脂。

【功效】為產後血暈之芳香性與香藥。

其氣味辛苦而平，無毒。能治心腹惡氣，霍亂，風痛，邪氣翹翹，鬼胎。男子遺精，能暖腎。女子血滯，產後血暈。小兒腹痛，屈足啼泣。

【用量】一。〇——三。〇服用。

【採製】用香為末，入酒中煮，一沸即下，棄酒，取沈降物之入水凝塊者，晒乾，研為細末，備用。

【學說】李時珍曰：今安南，三佛齊諸番，皆有之。一統志云：樹如苦棟，大而直，葉似羊桃而長，木心有脂，作香葉。廷珪香譜云：此乃樹脂，形色類胡桃，不宜於燒，而能發衆香，故人取以和香。今人和有如錫者，謂之安息油。

地耳 *Tichou*

【基本】為菌類及藻類共生之植物，無莖葉之區別。通常為線狀，或葉狀，或枝狀等。據李時珍云：地耳亦石耳之屬，生於地者也。狀如木耳。春夏生，雨中，

雨後採之。見日，即不堪。

【成分】含有 *Tichouin* 之成分等。

【功效】其氣味甘寒，無毒。能明目，益氣，令人有子。

【別稱】又名地踏蕪。

地骨

(茄科)

【學名】*Tycium chinense*, Mill.

【產地】多自生於原野中。

【基本】為落葉灌木，高約丈許，莖呈灰色，而有針，葉為橢圓形。夏開白花，結實，採其黃褐色之筒卷狀的根皮，即地骨皮，可為藥用之。

【功效】為清涼解熱藥，對於氣管枝炎，口腔炎，及咽喉炎，神經炎等，皆可服之。

其氣味甘淡，而寒。治五臟邪熱，吐血，咳嗽，消渴，除頭痛及胸膈痛。並能涼血，補氣。

【用量】二。五——七。〇服用。

【採製】除去木心，浸於甘草湯(或水)一夜，洗之，剉焙用之。

地黃

(玄參科)

【學名】*Rehmannia Inter. Maxim.*

「產地」園圃中多栽植之，而隨處亦有自生者。

「基本」為多年生草，高六七寸，葉為長橢圓形，邊緣有鋸齒，面有皺紋毛茸，互生。花黃白略紫，花冠為唇形。實類小麥。根長三四寸，細如手指，皮赤黃色，曬乾或經久，則變為黑色，故地黃用為藥者，約分三種，舉述於左：

生地黃○此為尚未曬乾，而將活根貯藏備用者是；

乾地黃○此為冬季採掘而晒乾者是；

熟地黃○此為蒸乾者是。

「功效」可用為強壯藥，或為通經藥。

其生者氣味大寒，無毒。主治婦人崩中血不止，產後血上薄，心悶，或傷身動胎，下血不落胎，或瘀血，留血，閉血，吐血，皆可搗汁服之。能解熱，通經，利水。

其乾者氣味甘寒，無毒。能治傷中，逐血痺，增骨髓，長肌肉，除寒熱，積聚，療折跌絕筋。並治男子五勞七傷，女子傷中，胞漏下血，產後血虛。能破瘀血，利大小腸，去胃中宿食，通血，益血。

其熟者氣味微溫，無毒。能填骨髓，長肌膚，生精

，補血，烏髮，黑鬚。治男子五勞七傷，女子傷中胞漏。並能通血脈，利耳目。

「用量」三。○——八。○煎服。

「禁忌」忌銅，鐵。惡貝母。畏蕪荑仁。

「學說」李時珍曰：今人惟以懷慶地黃為上，亦各處隨時興廢不同爾。其苗初生塌地，葉如山白菜，而毛澀，葉面深青色，又似小芥葉，而頗厚不叉了，葉中綴莖，上有細毛。莖稍開小筒子花，紅黃色。結實，如小麥粒。根長四五寸，細如手指，皮赤黃色，如羊蹄根，及蒟蘿根，曬乾乃黑，生食作土氣，俗呼其苗，為婆婆奶。

「別稱」又名地髓，地精。

地筋

「基本」據名醫別錄云：地筋，生漢中。根有毛，三月生，四月實白，三月三日采根。又據李時珍云：此乃黃管毛之根也，功與白茅根，相同。

「功效」其氣味苦平，無毒。能益氣，止渴，除熱在腹臍，利筋。

「別稱」又名管根，土筋。

地椒

〔基本〕據李時珍云：地椒，出北地，卽蔓椒之小者，貼地生，葉形小，味微辛。土人以煮羊肉食，香美。其實，可爲藥用。

〔功效〕其氣味辛溫，而有小毒。主治淋疾腫痛，可爲殺蛙蟲藥。

地榆

〔苦葷科〕

〔學名〕 *Sanguisorba officinalis*, L.

〔產地〕多生於山野之中。

〔基本〕爲多年生草，莖高三四尺，數十葉自根叢生，爲羽狀複葉。秋間起花莖，莖頂開花，色紫或紅白，列爲穗狀花序，其嫩葉，可食。其根可採取之，而爲藥用。

〔功效〕爲收斂藥。

其氣味苦酸，微寒，無毒。能止衄血，吐血及膀胱子宮出血。並治諸疔，惡腫，能止膿血。

〔用量〕三〇——六〇服用。

〔禁忌〕要麥門冬。

〔採製〕二月，八月採根，暴乾，去蘆頭，剉用。

〔學說〕李時珍曰：按外丹方言，地榆一名酸緒。其味酸，

其色緒，故也。今贛州俚人呼地榆，爲酸緒；又說緒爲蟲，則地榆，酸緒，爲一物甚明。其主治之功，亦同，因併別錄有名，未用酸緒爲一云。

〔別稱〕又名玉鼓，酸緒。

地膚

〔藜科〕

〔學名〕 *Koehlii-Senariaria*, Schradl.

〔產地〕多栽培於園圃之中。

〔基本〕爲一年生草，莖高三尺許。葉狹細，呈披針形，互生。夏日於葉腋，着帶綠白色之穗狀花。果實外面呈青白色，乾燥之，則爲綠褐色，甚爲細小，如種子狀，卽地膚子，可取爲藥用。

〔功效〕爲利尿藥。

其子氣味苦寒，無毒。治膀胱熱，利小便，補中，益氣，去熱，通淋。洗眼除雀盲澀痛。其苗葉氣味相同，可搗汁服之，治赤白痢，亦可煎湯洗眼。

〔用量〕一・五——四・五服用。

〔採製〕十月採取，陰乾，水洗，去砂，浸酒，焙用。

〔學說〕李時珍曰：地膚嫩苗，可作蔬茹，一科數十枝，攢

莖圍圍直上，性最柔弱，故將老時，可作帚，頗耐用。

【別稱】又名地葵，地麥，落帚，獨帚，王簪，掃帚，益明，涎衣草，白地草，鴨舌草，千心妓女。

地龍

【學名】*Porehnaia scholarii* Horst.

【產地】田園中，隨處皆有之。

【基本】爲蠕行動物，體圓，細長，有環節甚多，紫黑色。

近前端處，有一紅色肉帶，平廣無節，名曰環帶。

腹面列生小刺，後向，以防體之退後，而助其前進。

雌雄同體，常吞食泥土，穿地爲穴，故能使地中空氣流通，植物易於生長，爲農家間接之益。

【功效】可參考蚯蚓條。

【別稱】俗稱蚯蚓。

地膽

【學名】*Meloe canalicatus* Moth.

【產地】多棲息於山野石木之間。

【基本】此屬鞘翅類之異節類，體長寸許，闊三四分，全身

呈黑藍色。腹部肥大。翅稍短小。可取之爲藥。

【成分】含有斑毛酸。

【功效】爲發泡藥。可用於關節炎，齒痛，眼炎等之引赤。

又爲生毛藥。

其氣味辛寒，有毒。治鬼疔，寒熱，鼠瘻，惡瘡，

死肌。破癩癩，能墮胎，散結氣，去石淋，治癩積

疼痛，腐蝕惡瘡爛肉。

【採製】二月，三月，八月，九月，於草木上取蟲，浸於糶

米泔汁，去翅足，或與米同炒，去米用之。

【別稱】又名羌青。

地衣草

【基本】爲「Meliaceae」菌類之植物，無莖葉之分，大抵成爲

線狀，葉狀，枝狀類。據日華本草云：此乃陰濕地

，被日晒起苔蘚也。又陳藏器云：卽濕土苔衣，如

草狀者耳。

【成分】含有特異之有機地衣酸，呈美麗之結晶。

【功效】其氣味苦冷，微毒。治心痛，中惡。又和油調敷馬

地蜈蚣

【學名】*Cassiope stellataria*, Dc.

(石南科)

〔產地〕多生於高山之上。

〔基本〕爲密生小灌木，狀如草本，莖匍匐於地，密生鱗片

小葉，其先端斜上。秋間枝頭抽小花梗，開一花，萼爲綠色，花冠呈淡紅色。取其根苗，供藥用之。

〔功效〕其氣味苦寒，無毒。能解諸毒，及大便不通，搗汁服。療癰腫，搗汁並末服，能消腫，排膿。如受蜈蚣傷者，入鹽少許搗塗或敷之。

〔學說〕李時珍曰：生村落園野間，左蔓延右，右蔓延左，其葉密而對生，如蜈蚣形。其穗亦長，俗呼過路蜈蚣。其延上樹者，呼飛天蜈蚣。

地楊梅

(燈心科)

〔學名〕*Taxula campocaria* De. var. *carinata*, Ait.

〔產地〕多生於山野之中。

〔基本〕爲多年生草，高六七寸許，葉叢生，細長而尖，生長毛。莖自葉叢而出，花小，有花被六片，雄蕊六枚。其花密生，如頭狀。其莖及子，供藥用之。

〔功效〕其氣味辛平，無毒。主治赤白痢疾。

〔學說〕陳藏器曰：生江東濕地，苗如沙草，四五月有子，

似楊梅也。

地錦草

(大戟科)

〔學名〕*Euphorbia humifusa*, Willd.

〔產地〕生於田野及庭園之間。

〔基本〕爲一種小草，自根際分爲多枝，平臥於地。葉對生，小瓣圓形。夏秋之間，各葉腋出小花，作黃褐色。取其根及全草，供藥用之。

〔成分〕含有地錦草酸之結晶，及單寧等。

〔功效〕爲收斂止血藥。

其氣味辛平，無毒。能通血脈，治氣結，止陰疝，療癰腫惡瘡，金刃撲損出血。並治吐血，下血，崩中，血崩。能散血，止血，利小便。

〔用量〕三〇——九〇。煎服。

〔別稱〕又名地錦，夜光，承夜，草血竭，血見愁，血風草，雀兒臥單，凝瓣草。

曲節草

〔基本〕據蘇頌云：曲節草，生筠州，四月生苗，莖方，色青，有節葉，似劉寄奴而青軟。七八月着花，似薄荷結子，無用。五月，六月採莖葉陰乾，入藥。

〔功效〕其氣味甘平，無毒。治發背疔，消癰腫，拔毒，同

甘草作末，米汁調服。

〔別稱〕又名六月凌，六月新，綠豆青，蛇藍。

有利。

(桃金娘科)

〔學名〕 *Stenlypus Stobilus, Lab*

〔產地〕原產於澳洲東南部。

〔基本〕為常綠喬木，高至三百尺許，葉卵形，或被針形，

有小點。花生於上部之葉腋，每葉腋生一花。其葉

可採之，而供藥用。

〔成分〕含有 Olean Eucalypti 及 $\text{Eucalyptol C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$ 之成

分。

〔功效〕為麻拉里亞之預防藥；又用於諸種腸加答兒，下痢

等；又為發汗藥等；但近來多用其油，以代之。

〔用量〕二日五。〇——一五。〇為浸劑等服之。

〔製劑〕有加里油 Oleum Eucalypti 。

此即由有加里布去斯葉，與水蒸溜而得之，呈澄明

無色或微黃色之稀薄芳香油。一回以二三滴和白糖

裝於膠囊，或為酒精溶液，為內服防腐及祛痰藥。

更有以大量，一日二。〇——四。〇用於麻拉里亞

等。外用可為殺菌，防腐，鎮痛藥等。

戎鹽

〔產地〕吾國甘肅，寧夏，以及蒙古最多產生。

〔基本〕此為天然產之鹽，非海濱煎煉而成者。有青紅二色

，皎潔如石，味甚甘美，可取之，為藥用。

〔功效〕其氣味鹹寒(或甘平)，無毒。能明目，益氣，助水

臟，強筋骨，去毒蠱，消癰癤。治積聚，心腹痛。

療疥癬，解斑毛毒，又能止吐血，齒舌出血。

〔別稱〕又名胡鹽，羌鹽，青鹽，禿登鹽，陰土鹽。

灰藿

(黎科)

〔學名〕 *Chepochium album, L.*

〔產地〕多自生於田野之中。

〔基本〕為一年生之草本，莖高四五尺，葉呈卵形，邊有波

狀，葉面具有白色之粉狀物。夏日開綠黃色之小花

，嫩葉可食。其莖葉子仁，可供藥用之。

〔功效〕其莖葉氣味甘平，無毒。能治惡疥，蟲，蠶，蜘蛛

咬傷，可搗爛和油敷之。其子仁氣味相同。炊飯，

或磨麩食之，能殺三蟲。

〔學說〕李時珍曰：灰藿，處處原野有之，四月生苗，莖有

紫紅線稜，葉尖，有刺，面青，背白，莖心嫩，葉

背面皆有白灰，為蔬亦佳。○五月漸老，高者數尺。七八月開細白花，結實簇簇，如球中有細子。○蒸暴取仁。○可炊飯，及磨粉食。

〔別稱〕又名灰蒞菜，金鎖天，俗稱紫。

朴硝

〔基本〕此即有用動物之皮骨，堆於土中，使受變化而生者。○有用智利酸與綠化加里製成者，為針狀之塊末，可為藥用。

〔成分〕含有硝酸加雷謨 NO_3 及硝酸那篤雷謨 NO_2 之成分。

〔功效〕為瀉下藥，及利尿藥。

其氣味苦寒，無毒。能除熱，治陽強之病，傷寒，痢疾，積聚，結癖，留血，停痰，痞滿，有推陳致新之功。又能消瘡腫，目赤，障翳，通經，墮胎。

〔用量〕四。○——八。○服用。

〔別稱〕又名消石朴，鹽消，皮消，俗稱火硝。

百合

(百合科)

〔學名〕*Lilium japonicum*, Thunb.

〔產地〕生於山地，亦有栽培於庭園者。

〔基本〕為多年生草，高二三尺，葉短而闊，似竹葉形，互生。夏日開花，色白，而無斑點。其紅黃色有斑點者，謂之卷丹，俗通謂之百合。其地下之鱗莖，皆可食。採其白花者，可供藥用。

〔成分〕含有多量之澱粉粒。

〔功效〕為強壯藥，有滋養之能。又可為鎮咳祛痰藥。

其氣味甘平，無毒。能安心，潤肺，清熱，止嗽，補中，益氣，除邪氣，消腹脹，通二便，治浮腫。

〔用量〕三。○——九。○服用。

〔學說〕李時珍曰：百合，一莖直上，四向生葉，葉似短竹葉，不似柳葉。五六月莖端開大白花，長五寸，六出，紅莖四垂，向下色亦不紅，紅者葉似柳，乃山丹也。百合結實，乃似馬兜鈴，其內子，亦似之。其瓣種之，如種蒜法。山中者宿根，年年自生，未必盡是蚯蚓化成也。蚯蚓多處，不開盡有百合，其說恐亦浪傳耳。

〔別稱〕又名強羅，蒜腦蒜。

百合

〔學名〕*Taraxacum hupehense* T. et G.

「基本」爲鴉片類之一種，體小略長，呈灰褐色，而有斑點。每待其捕食昆蟲時，可取其窠及糞，供藥用之。

「功效」民間每採取其窠，或其糞，研末塗布，而治蟲之咬傷。

「別稱」又名反舌。

百部

(百部科)

「學名」*Stemona sessilifolia*, Miq.

「產地」廣東廣州產生最多。

「基本」爲多年生草，高二尺餘，葉卵形，有平行脈，四葉或三葉輪生。夏日葉腋開花一二朵，淡綠色。根如塊，數十相聯綴，似天門冬。可取之，而供藥用。

「成分」含有 $\text{Theobromin } C_{19}H_{21}O_3$ 之一種植物鹽基。

「功效」爲鎮咳藥，及皮膚殺蟲藥。

其氣味甘苦微溫，無毒。治肺熱，咳嗽，骨蒸，勞傷，能潤肺，祛痰。殺寸白蟲，及一切樹木蛀蟲。

「用量」一·五——四·五服用。

「採製」用竹刀去粗皮，酒浸，剉焙。

「學說」李時珍曰：百部，亦有細葉，如尚香者。其莖青肥

嫩時，亦可養食。其根長者，近尺，新時，亦肥實

，但乾，則虛瘦無脂潤爾。生時，壁開，去心，曝之。鄭樵密志言：葉如薯蕷者，謬矣。

「別稱」又名婆娑草，野天門冬。

百兩金

(紫金牛科)

「學名」*Aydia hortorum*, Maxim.

「產地」多產於暖地。

「基本」爲常綠亞灌木，莖高尺餘，葉廣披針形，長者達五寸許，互生，呈深綠色。夏月葉腋出花梗，着生繖形數小花，帶白綠色。果實，似南天竹之實，熟紅。其根，可取之爲藥。

「功效」其氣味苦平，無毒。主治藥熱，咽喉腫痛。

「學說」蘇頌曰：百兩金，生戎州雲安軍，苗高二三尺，有幹如木。葉似荔枝，初生背面俱青，結花實後，背紫，面青，至冬不凋。初秋開花，青紫色。結實大如豆，生青，熟赤。采根入藥。

百草霜

「基本」據李時珍云：此乃竈額，及烟爐中黑烟也，其質輕細，故謂之霜，可爲藥用。

「功效」其氣味辛溫，無毒。能消食，化積，止上下諸血，

並治婦人崩中，帶下，胎前產後諸病，傷寒，陽毒，發狂，黃疸，瘧疾，痢疾，噎膈，及口舌一切諸瘡。

【別稱】又名竈突墨。

百脈根

(豆科)

【學名】*Lotus corniculatus*, L. var. *japonicus*, Rgl.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為多年生草，高至一尺餘，莖細長而傾斜，葉為羽狀複葉，自五小葉成。其基部二小葉，宛如托葉。

花呈蝶形，花冠黃金色。果實為莢，細長寸餘。採其白色之根。而為藥用。

【功效】為解熱藥，有止渴，消炎之效；又為強壯藥。其味苦，微寒，無毒。能下氣，止渴，去熱，除虛勞，補不足。

【別稱】又名白靈藤。

【基本】據蘇頌云：生台州山中，春生苗，蔓延木上，無花葉。冬采皮，入藥。

【功效】民間多以此止盜汗，及治一切風痛，風癢等。

【別稱】又名白靈藤。

【學名】*Myroxylon peruvianum*, Klotzsch.

【產地】產生於中美州為最多。

【基本】為一種喬木，高至十五尺。葉為羽狀複葉，小葉七片，至十一片。為總狀花序，金白色。採取其木，及樹枝，敲打碎軟，而取其滲流物；或烘焦之，使布條吸於該部，而吸取其滲流物，即為藥用百露拔爾撒謨 (*Balsamum Peruvianum*) 也。

【成分】含有桂皮酸，安息香，蘇合香等之樹脂。

【功效】昔時有用於內服者，為慢性氣管加答兒之分泌限制藥；但近來多外用，為疥癬之效藥。又為潰瘍，痔瘡，火傷，濕疹，癩疹，以及皮膚病等之應用藥。更有因其具芳香性，而配伍於其他軟膏，及化粧料等。

百露拔爾撒謨

(豆科)

【學名】*Myroxylon peruvianum*, Klotzsch.

【產地】產生於中美州為最多。

【基本】為一種喬木，高至十五尺。葉為羽狀複葉，小葉七片，至十一片。為總狀花序，金白色。採取其木，及樹枝，敲打碎軟，而取其滲流物；或烘焦之，使布條吸於該部，而吸取其滲流物，即為藥用百露拔爾撒謨 (*Balsamum Peruvianum*) 也。

【成分】含有桂皮酸，安息香，蘇合香等之樹脂。

【功效】昔時有用於內服者，為慢性氣管加答兒之分泌限制藥；但近來多外用，為疥癬之效藥。又為潰瘍，痔瘡，火傷，濕疹，癩疹，以及皮膚病等之應用藥。更有因其具芳香性，而配伍於其他軟膏，及化粧料等。

【用量】內服，一日數回，以〇.五——一.〇為丸劑，膠囊劑等。外用，作為五十分之一，或十分之一含量之軟膏，或擦劑等。

【別稱】又名白靈藤。

【學名】*Cinnamomum Loureirii*, Nees.

【別稱】又名白靈藤。

【產地】產於中國廣東，安南，印度，日本等處。

【基本】爲常綠喬木，高至數十尺，葉厚革質，長橢圓形而

尖，有大脈三條。夏月開花，甚小，呈淡黃色。其

根皮，及莖皮，可供藥用之。

【成分】含有揮發油，樹脂，澱粉，單寧等。

【功效】爲強壯健胃藥，常用於腹部之冷痛，或由衰弱而發

之寒感，及貧血等。

其氣味甘辛，大熱，而有小毒。利肝肺氣，治心腹

寒熱冷痰，霍亂轉筋，頭痛，腰痛。能止煩，止渴

，發汗，通脈，理氣不足，宜導百藥。治沈寒病冷

之病，去營衛中風寒，補命門不足，益火消陰。

【用量】一。〇——五。〇服用之；妊婦忌服，恐有流產之

害。

【禁忌】忌火。

【學說】李時珍曰：桂有數種，以今參訪，牡桂，葉長如桃

杷葉，堅硬有毛，及錫齒。其花，白色。其皮，多

脂。茵桂，葉如柿葉，而尖狹光淨，有三皺文，而

無錫齒。其花，有黃，有白。其皮，薄而卷。今商

人所貨，皆此二桂；但以卷者，爲菌桂；半卷，及

板者爲牡桂。

【別稱】又名梭。

肉荳蔻

【學名】*Myristica fragrans* Houtt.

【產地】近時南洋羣島等處，多栽培之。

【基本】爲常綠喬木，高至三十尺，葉長橢圓形，而尖。夏

月開花，花單性白色。所結果實，被洋紅色之子衣

。除去其子衣，及暗褐色之子殼，浸於石灰食鹽水

中，徐徐乾燥，出貨之。其爲純卵圓形，或短卵圓

形，長約一寸，徑六七分，外面類褐色，有白色之

粉，更有走於縱徑之廣淺溝，與緻密之網紋，如石

紋狀，可用之爲藥。

【成分】含有揮發油，脂肪油，及澱粉。

【功效】爲健胃驅風藥。

其氣味辛溫，無毒。能消食，止洩，調中，下氣，

開胃，解酒。治積冷，心腹脹痛，霍亂中惡，鬼氣

冷疝，宿食，痰飲，以及心腹蟲痛。

【用量】〇。五——二。〇服用。

【製劑】肉荳蔻油 *Oilum Macilla*.

此即由肉蓯蓉之子實，製出之油，每以一二滴，加於白糖，作成蓯蓉油糖，為調味藥之用。

【禁忌】忌銅，鐵。

【學說】李時珍曰：肉蓯蓉，花及質狀雖似草豆蔻，而皮肉之類則不同類，外有皺紋，而內有斑，縷紋如檳榔紋，最易生蛀，惟烘乾，密封，則稍可留。

【別稱】又名肉果，迎拘勒。

肉蓯蓉

(列當科)

【學名】*Boechinkia glandulosa* C. A. Mey.

【產地】生於高山上，常常寄生於深山赤楊之根上。

【基本】為一種寄生植物，莖黃褐色，肉質如短柱狀，長約

一尺，葉黃褐色，鱗狀，互生。夏日莖之上部，生

花，相集成穗狀。花與莖葉同色，為唇形花。於六

七月間，選擇長七八寸者晒乾，或漬鹽藏於壺中，

以為藥用。

【功效】用為強壯藥。

其味甘微溫，無毒。治五勞七傷，絕陽不興，腰膝

冷痛，遺精，帶下。能滋潤五臟，益髓強骨。

【用量】一〇——一三〇服用。

【禁忌】忌鐵氣。

【學說】名醫別錄曰：肉蓯蓉，生河西山谷，及代郡雁門。

五月五日，采乾。吳普曰：生河山陰地，叢生。二月至八月采。陶弘景曰：代郡雁門屬并州，多馬處便生之，言是野馬精落地，所生；生時似肉，以作

羊肉羹，補虛乏極佳，亦可生噉。河南間至多，今

第一出隴西，形屬黃柔潤，多花而味甘。次出北國

者，形短而少花，巴東建平間，亦有，而不嘉也。

蘇恭曰：此乃論草蓯蓉也。陶未見肉者，今人所用

，亦草蓯蓉，刮去花，代肉蓯蓉。功力稍劣。

【別稱】又名肉松容，黑河命。

血竭

Sanguis draconis, Resina Draconis.

【產地】產於廣東各地，而近來多由新嘉坡輸入之。

【基本】為一種樹木，高數丈，葉似櫻桃，而有

三角。其脂液，從木中流出，滴下，如膠餒狀，久

而堅凝，乃成褐赤之色血塊。可取之，為藥用。

【功效】為收斂止血藥，可用於下痢，或衰弱性盜汗等。

其氣味甘鹹，色赤，入血分。補心包肝血不足，能

除血毒，散瘀血，生新血，為和血之要藥。治內傷

血聚，金瘡，跌損，瘡口不收，能止痛，生肌。
【用量】〇・三——〇・五服用。

自然銅 Native copper

【產地】四川榮經縣，雲南太和縣，各處皆產之。

【基本】爲鑛中所產之純銅，常雜於他銅之鑛脈產出者，狀

類苦蘇，片塊或八角結晶體，色赤，可爲藥用。

【功效】其氣味辛平，無毒。治折傷，治散血止痛，破積聚

，消瘀血，排膿，續筋骨。治產後血邪，能安心，

止驚悸，以酒磨服。

【學說】李時珍曰：按寶藏論云：自然銅，生會稽，石綠穴

中，狀如塞林草根，色紅膩，亦有峭壁。又一類似

丹砂，光明堅硬，有稜，中含銅脈，尤佳。又一類

似本根，不紅膩，隨手碎爲粉，至爲精明。近銅之

山，有之。今俗中所用自然銅，皆非也。

【別稱】又名石髓鉛。

羊

【學名】Capra hircus, L.

【產地】吾國各地皆有產生；惟西北各省爲最多。

【基本】此屬偶蹄類之反芻類。牝牡有角（山羊類）；亦有牡

生角而牝無角（綿羊類）者。其肉與乳，皆供食用。
【功效】吾時多有割制其各臟器，及各組織，而供醫療品；
但實際上，亦與牛同。可取其肉與乳，爲強壯滋養
品耳。

其肉氣味苦甘大熱，無毒。能滋氣，益血，補中，
補氣，開胃，增食。其心甘溫。能補心，散心氣鬱
結。其肝苦寒。能補肝，治肝風虛熱，肝虛目赤熱
痛。其胃甘溫。能治中風虛熱。其髓及腎甘溫。能
補腎，益精。其膽及膽汁苦寒。能療目赤熱痛。其
肪甘溫。補肺，止咳。其血鹹平。能止出血。以上
所記，未必可能，其他更無試驗之必要。

羊桃

【基本】據李時珍云：羊桃，莖大如指，似樹而弱，如蔓。
春長嫩條，柔軟，葉大如掌，上綠，下白，有毛，
狀如苧麻，而圓；其條浸水，而涎滑。其莖根，有
爲藥用者。

【功效】其氣味苦寒，無毒。能益氣，利小便。治風熱麻老
，可浸酒服之。傷寒毒熱攻手足腫脹，可煮汁入少
鹽漬之。小兒熱風，水積聚，瘰癧瘡腫，可煎湯洗

之。

【別稱】又名鬼桃，羊腸，細子。

羊蹄

(麥科)

【學名】*Rumex japonicus*, Meisn.

【產地】多產生於水濕之地。

【基本】為越年生草，高三四尺，莖有縱條溝。春初叢生，

大葉長尺許，形如牛舌，故又名牛舌菜。春末抽花

莖，開淡綠色小花，成叢，下垂結子，如蕎麥，謂

之金蕎麥。根長尺許，紅黃色。春至即枯，秋深復

生，經冬不死。其根葉及實，皆供藥用之。

【成分】含有 *Crysin*, *Linocidin* 及 *Apocetin*, *Erythrocin* 之

樹脂，與其揮發油，沒食子酸，單寧，苦味質，萜

酸，澱粉，石灰等。

【功效】其根氣味苦寒，無毒。治頭禿白屑，祛風，殺蟲，

除熱，消毒。其葉味甘滑寒，無毒。治小兒疳蟲，

惡癬舌腫，腸風下血，能消腫，止癢。其實味苦澀

平，無毒。治赤白痢疾，婦人血氣。

【用量】一。〇——二。〇——八。〇服用。

【學說】李時珍曰：羊蹄，以根名。牛舌，以葉形名。禿菜

，以治禿瘡名也。近水及濕地極多，葉長尺許，似

牛舌之形，不似菠薐。入夏起莖，開花，結子，花

葉一色。夏至即枯，秋深即生，凌冬不死，根長近

尺，赤黃色，如大黃胡蘿蔔形。

【別稱】又名蕎，禿菜，敗毒菜，牛舌菜，羊蹄大黃，鬼目

，東方宿，連蟲陸，水黃芹，子名金蕎麥。

羊躑躅

(石南科)

【學名】*Rhododendron sinense*, Sw.

【產地】多生於山野之間。

【基本】為落葉灌木，高五六尺，葉長二寸許，有多毛，為

倒卵形。春日先出新葉，開花，為漏斗狀，花冠色

黃，為短總狀花序。其花可採取之，而供藥用。

【成分】含有亞芫羅並等之鹽基。

【功效】為鎮痙痛藥，可用於神經痛，咳嗽刺戟，不眠，

癩癩等。

其氣味苦溫(或辛溫)，有毒。治風寒濕痺，撲損疼

痛，能活血，疏風。驅除邪氣，鬼疰，蠱毒。

【用量】三。〇——六。〇為浸劑，煎劑等服用。

【禁忌】畏梔子。

【學說】李時珍曰：韓保昇所說：似桃葉者，最的，其花五

出，蕊瓣皆黃，氣味皆惡。蘇恭所謂：深紅色者，

卽山石榴，名紅躑躅者，無毒，與此別類。張揖廣

雅謂：躑躅，一名決光者，誤矣。決光，決明也。

按唐李紳文集言：駱谷多山枇杷，毒能殺人。其花

明艷，與杜鵑花相似，樵者識之，其說似羊躑躅，

未知是否？要亦其類耳。

【別稱】又名黃躑躅，黃杜鵑，羊不食草，鬧羊花，驚羊花

，老虎花，玉枝。

竹茹

【基本】此爲淡竹 (*Lophatherum olatum*, solt.) 之幹莖也。

淡竹爲常綠多年生之草本，春月從宿根生苗，初時

類竹，莖高二三尺，有顯明之突節。葉爲披針形，

約六七寸長，端尖，互生。其地下莖，可採取之，

而爲藥用。

【功效】爲收斂藥，有治吐血，衄血，及肺痿之能。

其味甘，微寒，無毒。治消渴，利水道，除熱，冷

血，止嘔，去煩，消食，開胃，止吐血，衄血。

【用量】三〇——九〇煎服。

竹黃 *Calamite*

【基本】爲禾本科植物之苦竹，淡竹等，因病之故，其節孔

中，化生有如石之塊，卽是，可供藥用。

【成分】含有硅酸加里，及石灰，錳，有機物，水分等。

【功效】爲神經痛，及腦充血之效藥。

其氣味甘寒，無毒。治小兒驚風，天吊。去諸風熱

，鎮心，明目，滋五臟，療金瘡。並治中風痰壅，

失音不語。

【用量】〇・五——二〇服用。

竹魚

【基本】據李時珍云：出桂林湘灘諸江中，狀似青魚，大而

少骨刺，色如竹色，青翠可愛，鱗下間，以朱點。

、味如鮫魚肉，爲廣南珍品。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。能和中，益氣，除風濕。

竹筍 (竹類)

【學名】*Bambusa* (*Bambusa purpurata*)

【基本】本品爲竹類之嫩幹，各種皆可食，尤以江南竹味爲

佳，苦竹，及人面竹，次之。

【功效】其味甘，微寒，無毒。能消痰利水，除熱，下氣，

止渴，去煩，消食，開胃。

「別稱」又名竹芽，竹胎，竹子。

竹蜂

「基本」據陳藏器云：方言云：竹蜂，留師也。蜂如小指大

，正黑色，嚼竹而窠，蜜如稠糖，酸甜好食。又據

李時珍云：六古云：竹蜜蜂，出蜀中，于野竹上結

窠，紺色，大如錢子，長寸許，有蒂，窠有蜜，甘

倍當蜜，即此也。按今人家，一種黑蜂，大如指頭

，能穴竹木而居，腹中有蜜，小兒撲殺取蜜，亦此

類也。又有刺蜜，木蜜，多生草木之上。

「功效」其蜜名為留師蜜，味甘酸寒，無毒。能治口瘡，及

齒牙蟲痛，均可含之。

「別稱」又名留師。

竹蕁

(竹菌類)

「學名」*Puccinia orientalis*, Berl. et Bro.

「基本」本品為一種菌類之植物。據李時珍云：草更生，曰

蕁，得海濕之氣而成也。又據陳藏器本草，作竹肉

，因其味也。李時珍云：此即竹蕁也。生朽竹根節

上，狀如木耳，紅色。陳藏器云：竹肉，生苦竹枝

上，如錢子，似肉櫛，有大毒等語。

「功效」據云：其氣味甘鹹，而寒，無毒。能治一切赤白痢

疾，加薑符食之。又云：其苦竹肉灰汁鍊過食，殺

三蟲，邪氣，破老血。

竹蟲

「基本」據李時珍云：此蟲，生諸竹，及草木上，皆有之。

初生如粉點，久便能動，百十成簇，形大如蠶，蒼

灰色。或云：濕熱氣化。或云：蟲卵所化。古方未

有用者，惟南從句婁神書云：江南巴邱吳越荆楚之

間，春秋竹內有蟲，似蠶，而蒼，取之，陰乾，可

治中風此即也。

「功效」據云：此蟲有毒。治中風，半身不遂，能透經絡追

涎，

「別稱」又名竹佛子，天厭子。

竹瀝

「基本」此為淡竹突出之液體。其法：用鮮淡竹截成尺許之

塊，再從縱面破成四條，架火上炙之，使兩端截口

之液體，流於瓶中，收藏備藥用之。

「功效」為祛痰藥。

其氣味甘寒而滑，無毒。能潤燥行痰，消風降火，益陰養血，利竅明目。並治中風，口噤，痰逆，大熱，煩悶，消渴，血虛，自汗。

〔用量〕二五・〇——三〇・〇服用。

竹麗

〔基本〕據李時珍云：此為食竹根之鼠也。出於南方，居士穴中，大如兔。人多食之，味如鴨肉。

〔功效〕其肉氣味甘平，無毒。能補中，益氣，解毒。

〔別稱〕又名竹竈。

竹蠶蟲

〔基本〕據李時珍云：竹蠶蟲，古方未見用者；惟袖珍方，治小兒蠟梨用之。按淮南萬畢術云：竹蟲飲，人自言其識。高誘註云：以竹蠶三枚，竹黃十枚，和勻，每用一大豆許，燒入酒中，令人飲之，勿至大醉，叩問其事，必得其識也。此法傳自古典，未試出果驗否，姑載之。

〔功效〕本草綱目載：主治小兒蠟梨頭疔。

艾

〔學名〕*Artemisia vulgaris*, L. var. *indica*, Maxim.

(菊科)

〔產地〕多自生於野地，或栽種於園圃之間。

〔基本〕為多年生草，莖白色，高四五尺，葉互生，長卵形，為羽狀分裂，背生白毛，甚密。夏秋之交，開小花，淡黃色，為小頭狀花序。全部皆筒狀花冠。結實纒纒，嫩葉可食。通常其葉及實，皆供藥用之。

〔成分〕其根含有樹脂，揮發油，單寧等。

〔功效〕其根在西洋有用為藥者，可治精神病之癲癩及舞蹈病等。其用量為一・五——三・〇服用。

其葉，有為緩和性通經藥者。

其葉味苦微溫，無毒。理氣血，逐毒氣，暖子宮，解鬱，調經，安胎。止吐血，衄血，崩中，腹痛，冷痢，治霍亂轉筋。灸之，能透諸經，而治百病。其實味苦辛煖，無毒。能明目，助腎，壯陽，暖子宮。

〔用量〕葉三・〇——六・〇服用；實二・〇——四・〇服用。

〔別稱〕又名冰臺，醫草，黃草，艾蒿。

艾納香

〔基本〕據馬志云：廣州云：艾納，出西國，似細艾。又有

松樹皮上綠衣，亦名艾納。可以合諸香燒之，能聚其烟，青白不散，而與此不同。

「功效」其味甘溫平，無毒。能去惡氣，治傷寒，痘疫，心腹注氣。止腸鳴，驅寸白蟲，治五瀉。

衣魚

「學名」*Leptisa saccharum*, L.

「基本」此屬彈尾類，體長三四分，呈長橢圓形，全身具有白色之鱗。觸角，與尾甚長。專蝕害衣服書籍，俗稱爲蠹魚，碎之如銀，有粉者是。

「功效」其氣味鹹溫，無毒。治小兒中風，項強背起摩之。婦人痲瘋，小便不利，轉胞，尿血。

「別稱」又名白魚，壁魚，蠹魚。

西瓜

(葫蘆科)

「學名」*Citrullus vulgaris*, Schrad.

「產地」田園中多栽種之。

「基本」爲一年生之草本，有卷鬚，常攀登於他物上。葉三裂，至七裂，稍類羽狀複葉。夏月開花，花單性，合瓣，花冠黃色，雌雄同殊者也。其瓜皮，仁，皆供應用之。

「功效」其瓜瓤氣味甘淡而寒，無毒。能消煩，止渴，寬中

，下氣，解暑熱，療喉痺，利小水，治血痢。其皮

甘涼，無毒。治口舌唇內生瘡，可燒灰研末噙之。

其仁甘寒，無毒。能清肺，潤腸，和中，止渴，補

中，宜人，能治口臭。

「別稱」又名寒瓜。

西洋參

(五加科)

「學名」*Panax quinquefolius*.

「產地」最多產生於美洲。

「基本」此參長約二寸許，色白而帶黃，皮細，中實，似遼寧糙米參，蒸之不香。可採取之，而供藥用。

「成分」似含有配糖體等之成分。

「功效」其氣味甘寒微苦，無毒。能滋肺胃，養血氣，止渴，生津，祛痰，鎮咳。治肺虛，胃弱。

「用量」三〇——六〇煎服。

「禁忌」反藜蘆。忌鐵，火。

第七畫

伯勞

「學名」*Lanius borealis*, T. S.

「基本」爲鳴禽類之一種，其咀甚爲強壯而尖硬，側緣具有

齒狀缺刻，鳴聲頗噪。捕食蛙類，及昆蟲，小鳥等

。每提其動物。先插貯於樹枝，而後食之。此爲其

特奇之性質。有取其毛，供藥用之者。

「功效」其毛有毒。能治小兒癩病，可取其毛帶之即愈。

「別稱」又名伯康，博勞，伯趙。

何首烏

(蓼科)

「學名」*Polygonum multiflorum, Thunb.*

「產地」多生於山野之中。

「基本」爲多年生之蔓草，春日從宿根抽莖，纏繞他物，長

及丈餘。葉爲心臟形，頂端尖銳，互生。秋日有花

莖，出自葉腋，多數小白花成穗，根作大塊相連，

可採取之，而供藥用。

「功效」爲強壯藥，有滋補之作用。

其氣味苦澁，微溫，無毒。治癩瘰，消癰腫，療頭

面風疔，治五痔，止心痛，益血氣，長筋骨，增精

髓，烏髮，悅色。治婦人產後諸病，及帶下。

「用量」二〇——八〇爲浸劑，煎劑等服用。

「禁忌」忌鐵，諸血，無鱗魚，蘿蔔，蒜，葱。

「採製」春秋夏季，皆可採根，浸於米泔汁中，削去稍，焙用。

「學說」蘇頌曰：何首烏，本出順州南河縣，今隨處有之。

嶺外江南諸州，皆有。以西洛嵩山，及河南柏城縣

者爲勝。春生苗，莖延竹木牆壁間。莖紫色，葉葉

相對，如鸞翼而不光澤。夏秋開黃白色花，如芍勒

花，結子有稜，似蕎麥而雜小纒，如粟大。秋冬取

根，大者如拳，各有五稜，瓣似小甜瓜，有赤白二

種，赤者雄，白者雌。一云：春采根，秋采花，九

蒸，九晒，乃可服。此藥本名交藤，因何首烏服而

得名也。

「別稱」又名交藤，夜合，地精，陳知白，馬肝石，桃柳藤

，九真藤，赤葛，疔帶，內消。

佛甲草

(景天科)

「學名」*Sedum lineare, Thunb.*

「產地」生於山野之間。

「基本」爲多年生草，莖肉質，多汁，高六七寸許，多數叢

生，傾臥於地之部分，節節生根。葉亦多肉，爲線

狀，呈綠色，三片，輪生。初夏枝梢開花，花小，

而色黃。取其全草，供藥用之。

【功效】其氣味甘寒，微毒。治湯火灼瘡，可搗爛，或研末貼之。

【學說】李時珍曰：二月生苗成莖，高四五寸，脆莖，細葉

柔澤，如馬齒莧，尖長而小。夏開黃花，經霜則枯

。人多栽於石山瓦墻上，呼為佛指甲。

別刺敦那

(茄科)

【學名】*Atropa Belladonna*, L.

【產地】產於歐羅巴，及亞細亞等處。

【基本】為多年生草，葉卵形，互生。花自葉腋生出，呈暗

紫色。果實為漿果，黑色。此植物之葉，與根，皆

供藥用之。

【成分】含有亞篤羅並等之植物鹽基。

【功效】為鎮咳藥，可應用於咳嗽，喘息，疫咳等；又為鎮

痛藥，可用於胃痛，神經痛等。

【製劑】1. 別刺敦那丁幾 Tincture Belladonnae.

此即以別刺敦那葉二〇〇，浸於稀酒精五〇〇，

中，而製成之液體。其功效相同，一回〇〇・五——

一。〇為水劑等服用之。

2. 別刺敦那搗劑 Tinctum Belladonnae.

此即以別刺敦那丁幾二〇〇，樟腦一〇〇，稀酒精

三〇〇混和而成，為使麻質斯及疼痛之塗搽劑。

君影草

(百合科)

【學名】*Convallaria majalis*, L.

【產地】生亞細亞，及歐羅巴之山地。

【基本】為多年生草，地下有根莖，高至尺餘，葉皆自地下

莖生出，約二三枚，長橢圓形，全邊，有平行脈，

長四五寸。六七月間，抽花莖，其上部生花，花呈

鐘狀，向下垂，花被白色，為總狀花序。可取其全

草，供藥用之。

【成分】含有昆瓦兒刺麻林，及昆瓦兒刺林之植物鹽基。

【功效】為強心利尿藥，可用於心臟衰弱，及水腫等。有毛

地黃同等之作用。

【用量】一日五〇。浸於水二〇〇〇中，分服。

【別稱】俗稱鈴蘭。

君遷子

(柿樹科)

【學名】*Diospyros Lotus*, L.

【產地】生於山地之間。

【基本】爲落葉樹木，高至二十餘尺，葉長橢圓形，上面暗

綠色，下面灰白色。葉柄殆平滑，長約五分許，互生。花合瓣，花冠如壺狀。爲淡黃色。

【成分】含有樹膠，漆樣之汁液。

【功效】其氣味甘而澀平，無毒。能去煩熱，止消渴，滋潤

身體，悅人顏色，鎮心，安神。

【學說】李時珍曰：君遷，卽軟棗。其木類柿，而葉長；但

結實，小而長，狀如牛奶，乾熟則紫黑色。一種小

圓，如指頭大者，名丁香柿，味尤美。

【別稱】又名軟棗，櫻棗，牛奶柿，丁香柿，紅藍棗。

含水藤

【基本】據陳藏器云：安南朱崖澹耳，無水之處，皆種大瓠

藤，取汁用之，樣狀如瓠，斷之水出，飲之清美。

又李時珍云：顧微廣州記云：水藤，去地一次，斷

之更生，根至地水不絕。山行，口渴，斷取汁，飲

之，適口。

【功效】其藤中水，氣味甘平，無毒。能解煩渴，心躁，瘧

疾，丹石發動，亦宜服之。並潤五臟，去濕痺，治

天行時氣，利小便。其葉搗爛，可貼破皮瘡。

【別稱】又名大氣藤。

吳茱萸

(芸香科)

【學名】*Evodia nitida* (Roxb.) Benth.

【產地】多自生於暖地，園圃亦栽種之。

【基本】爲落葉亞喬木，高丈餘，葉爲羽狀複葉，卵圓而厚

，對生。夏秋開小花，呈淡綠色，爲短圓錐花序。

結實紫紫，爲小蒴果，帶紫赤色，乾則變爲黑色，

可取之，爲藥用。

【成分】含有一種揮發油。

【功效】爲刺激性驅風藥，並有收斂，殺蟲之效。

其氣味辛溫，而有小毒。能溫中，下氣，止痛，除

濕，逐風邪，開腠理。並治飲食不消，心腹諸冷絞

痛，以及霍亂轉筋，胃冷吐瀉，產後心痛，惡心腹

痛，嘔逆吞酸，痞脹。更能利大腸寒氣，去

產後餘血。

【用量】一。五——四。○服用。

【學說】李時珍曰：茱萸，枝柔而肥，葉長而嫩。其實結於

梢頭，紫紫成簇，而無核，與椒不同。一種粒大，

一種粒小，小者入藥，爲勝。

坐拿草

【基本】據蘇頌云：生江西，及滁州，六月開紫花，結實，

采其苗，入藥，甚易得，後因人用有效，今頗貴重

。李時珍云：按一總志云：出吉安永豐縣。

【功效】其氣味辛熱，有毒。能去風痺，壯筋骨；兼治打撲

損傷。

扶杉

(蒿蕨科)

【學名】*Amelanchier asiatica*, C. Koch.

【產地】多生於山地。

【基本】爲落葉喬木，高至三十尺。春末生新葉，葉卵圓

形，有鋸齒。嫩時，具白毛。花呈短穗狀，細長，

白色。果實，似小豆，熟時，赤色。其木皮，可供

藥用之。

【功效】其氣味甘平，而有小毒，能去風血，腳氣痛痺，跌

損瘀血，痛不可忍，取白色皮炙之，酒浸服用。

【學說】李時珍曰：扶杉，與白楊是同類二種。今南人呼爲

白楊，故俚人有白楊葉，有風掣無風掣之語。其入

藥之功，大抵相近。

【別稱】又名移楊，唐棣，高飛，獨搖。

扶桑

(錦葵科)

【學名】*Ehretia coromandelica*, L.

【產地】生於山野；以南方爲最多。

【基本】爲落葉小灌木，高至十尺許，葉卵形，而尖，有銳

頭之粗齒，開紅花，頗大。果爲蒴果，略似球形。

其葉及花，皆供藥用之。

【功效】其氣味甘平，無毒。主治癰疽，腮腫等。取葉，或

花，同白芙蓉葉，及牛旁葉，和白蜜，研膏敷之，

卽散。

【學說】李時珍曰：扶桑，產南方，乃木槿別種。二枝柯柔

弱，葉深綠，微遶如桑。其花有紅，黃，白三色。

紅者，尤貴，呼爲朱槿。稽含草木狀云：朱槿，一

名赤槿，一名日及，出南涼郡，花，莖，葉，皆如

桑。其葉光而厚，木高四五尺，而枝葉婆娑，其花

深紅色，五出，大如蜀葵，重複柔澤，有蕊一條，

長如花葉上綴金屑。日光所燦，疑若焰生。一叢之

上，日開數百朵，朝開，暮落。自五月始，至中冬

乃歇，插樹，卽活。

【別稱】又名佛桑，朱槿，赤槿，日及。

扶芳藤

(衛矛科)

「學名」*Euonymus japonicus*, Thunb. var. *ruficus*, Miq.

「產地」多生於山野之中。

「基本」為常綠蔓生木本，莖有氣，根細而短，藉以纏繞於

他物上。葉卵圓形，有鋸齒，對生。秋間開小花，

呈黃綠色，為聚繖花序。花後，結為蒴果，熟則裂

開。其莖葉，可供藥用之。

「功效」其味苦，小溫，無毒。能治一切血，一切氣，一切

冷。大主風血腰痛，去百病，久服延年。劉細浸酒

飲之。

「學說」陳藏器曰：生吳郡，藤苗小時如絳石，蔓延樹木。

山人取楓樹上者用，亦如桑上寄生之意。忌采塚墓

間者，隋朝禪師作青飲，進場常止渴者，即此。

「別稱」又名滂藤。

忍冬

(忍冬科)

「學名」*Lonicera japonica*, Thunb.

「產地」多生於山野中，亦有栽培於庭園中者。

「基本」為蔓生之小灌木，葉為橢圓形，凌冬不枯，故有此

稱。初夏，腋開白色花，如喇叭形，經二三日，則

黃白相映，故又名金銀花，可採取之，為藥用。

「功效」為解毒藥，可服用於惡毒，癰腫等。

其氣味甘溫，無毒。治寒熱身腫，一切風濕氣，及

諸腫毒，瘰癧疥癬，梅毒惡瘡，淋疾。能散熱，解

毒。

「用量」二〇——八。〇服用。

「學說」李時珍曰：其花長瓣，垂鬚，黃白相半，而藤左纏

，故有金銀符莖，以下諸名金銀股，貴其功也。土

宿真君云：蜜桶藤，陰草也。取汁，能代硫制汞，

故有通靈之稱。

「別稱」又名金銀藤，符莖藤，寶莖藤，老翁鬚，左纏藤，

金銀股，通靈草，蜜桶藤。

決明

(荳科)

「學名」*Cassia Toria*, L.

「產地」多自生於山地。

「基本」為多年生之莖草，莖高三三尺，葉為羽狀複葉。秋

間開碟形花，色淡黃，列為穗狀花序。實成莢，略似

豇豆，長五六寸，子綠如馬蹄，故亦稱馬蹄決明。

一種花深黃，莢長寸許，子扁色褐，嫩莢葉及莢，

皆可食。其子可採取之，而供藥用。

〔成分〕含有植物油，及依摩金之成分。

〔功效〕其氣味鹹平，無毒。能瀉肝，明目，助肝氣，益腎

，治風熱頭痛，眼赤腫痛，青盲，目淫，膚赤，白膜，內障，外翳，遮睛，失明。並解蛇毒，消腫毒

等。

〔用量〕一·五——三·〇服用。

〔採製〕十月採取，陰乾，收貯備用。

〔學說〕李時珍曰：決明有二種，一種馬蹄決明，莖高三四

尺，葉大于苜蓿，而本小，末多，共開夜合，兩兩

相結。秋開淡黃色花，五出，結角如初生細豇豆，

長五六寸，角中子數十粒，參差相連狀，如馬蹄，

青綠色，入眼目藥，最良。一種莖芒決明。

沈香

(瑞香科)

〔學名〕*Agilaria Aquiloia, Roxb.*

〔產地〕原產於東印度，近吾國粵桂各省皆有之。

〔基本〕為常綠亞喬木，高數十尺，葉披針形，或倒披針形

，互生。花白色，為繖形花序。秋日結實，大似檳

榔。土人斷其木根，以其材浸於水中，經久皮幹皆

腐，而木心與枝節不壞，質堅色黑，入水即沈，故名也，可取之而為藥用。

〔成分〕含有芳香性之膠核脂。

〔功效〕其氣味辛(或甘苦)，微溫，無毒。主治心腹疼痛，

霍亂中惡，能和精神，益精，補五臟，壯筋骨，暖腰膝，止轉筋，破癰癤。能下氣而除痰涎，雖能降亦

能升。因香氣入脾，能理諸氣而調中。並治冷風麻

痺，骨節不仁，風濕，皮膚瘙癢。

〔用量〕〇·五——二·〇服用。

〔學說〕李時珍曰：按李珣海藥本草謂：沈者，為沈香；浮

者，為檀。梁元帝金樓子謂：一木五香，根為檀，

節為沈，花為雞舌，膠為薰陸，葉為蜜香，並誤也

。按五香各是一種，所謂五香一木者，即前蘇恭所

言：沈，棧，青桂，馬蹄，雞骨者，是也。

〔別稱〕又名沈水香，蜜香。

沒藥

Myrrh

〔產地〕阿剌伯等國，最多產生之。

〔基本〕為植物之脂，乃一種灌木，葉為複葉，花冠四片，

實為核果，兩端甚尖。其莖中滲出黃汁，如乳乾之

赤褐色塊，內面類白色，微有光澤，具有特異之香氣，可取之，為藥。

〔成分〕含有密兒拉之成分。

〔功效〕為收斂藥，可用於泌尿生殖器之分泌過多等。

其氣味苦平，無毒。能散血，止痛，消腫，生肌。

療金瘡，杖疔，諸惡瘡，痔漏，下血。更能破癥癥

宿血，損傷瘀血。治心腫虛弱，肝血不足。

〔用量〕〇.三——一.〇服用。

〔製劑〕沒藥丁幾 *Tinctum Myrrha*

此即以沒藥一〇.〇稀酒精五〇.〇溶製而成一種

液體，一日數回，以〇.五——一.〇服用。近來

多用為口腔病，及咽喉疾病之塗布料，或含嗽料。

〔學說〕李時珍曰：按一統志云：沒藥樹，高大如松，皮厚

一、二寸。采時，掘樹下為坎，用斧伐其皮，脂流於

坎，旬餘方取之。

〔別稱〕又名末藥。

沙參

(桔梗科)

〔學名〕*Adenophora verticillata*, Fisch. var. *verticillata*, Fr. et

Sav.

〔產地〕多自生於山野之中。

〔基本〕為多年生草，莖高二三尺，葉長卵形，端尖，有鋸

齒，輪生。秋時葉腋開小紫花，花冠為鐘狀，五瓣

。根似人參。產於南者，根小，曰南沙參。產於北

者，根粗大，曰北沙參。

〔功效〕為祛痰藥。

其味苦微寒，無毒。能益肺氣，補脾腎。治肺痿，

久嗽，胸痺，以及心腹痛，頭腫痛。並能除寒熱，

解血結，去邪氣，止驚煩。療一切惡瘡，疥癬，可

排膿，消毒。

〔用量〕一.五——四.五服用。

〔製劑〕I 沙參越幾斯 *Extractum Adenophora verticillata*

此即以沙參根，浸於水中，所得濾液，蒸發而製成

水製越幾斯。一日一.〇——三.〇為水劑等，可

用作祛痰鎮咳藥。

〔禁忌〕惡防己。反藜蘆。

〔採製〕八九月間採根，剉用，或剉焙用。

〔學說〕李時珍曰：沙參，處處山原有之，二月生葉，如初

生小莖葉，而團扁不光。八九月抽莖，高一二尺，

莖上之葉，則尖長，如枸杞葉而小，有細齒。秋月葉間開小紫花，長二三分，狀如鈴鐸，五出，白蕊；亦有白花者；並結實，大如冬青實，中有細子，霜後苗枯。其根生沙地者，長尺餘，大如虎口。黃土地者，則短而小，根莖皆有白汁。八九月采者，白而實。春月采者，微黃而虛。小人亦往往蒸熟壓實，以亂人參；但體輕鬆，味淡，而短耳！

〔別稱〕又名白參，知母，羊乳，羊婆奶，鈴兒草，虎鬚，苦心。

沙糖 Saccharum

〔基本〕此多由甘蔗而製出，為一種緻密乾燥白色之結晶性粉末。其味甚甘，觸於空氣，不起變化，和以半量之水，而全能溶解。其溶液呈中性反應，為一種無色之含利別。通常由此溶液，使其徐徐結晶，則生一斜系統狀較大之結晶體，即為冰糖。其粉末及結晶，皆可用之。

〔成分〕含有多量蔗糖屬 $C_{12}H_{22}O_{11}$ 之成分。

〔功效〕多用為調味及賦形藥；但亦用作熱性病者之止渴性飲料等。

其氣味甘寒，無毒。治心腹熱脹，口唇乾渴，能解熱，解酒，潤心肺，利大小腸，和中，助脾，暖肝氣。

〔用量〕二日八。○為調味藥，其他均可適量。

沙棠果

〔基本〕據李時珍云：按呂氏春秋云：果之美者，沙棠之實也。今嶺外寧鄉瀧水羅浮山中，皆有之，木狀，如棠，黃色，赤實；其味如李，而無核。昔時有取其實，而用之者。

〔功效〕其氣味甘平，無毒。食之，能却水病。

李 (薔薇科)

〔學名〕*Prunus communis, Fruct.*

〔產地〕多栽培於庭園之間。

〔基本〕為落葉喬木，高至十尺餘，葉卵圓而略長。春月開花，色白，五瓣。雄蕊比花瓣多，雌蕊一枚，常三花相集而生。果實為核果，球形，至夏成熟，呈赤色而光澤。其皮根莖實，皆供藥用之。

〔功效〕其質氣味苦酸，微溫，無毒。曬食去病熱，調中，去骨節間勞熱。其仁苦平，無毒。能治跌撲瘀血骨

痛，婦女小腹脹滿，利小腸，下水氣，除浮腫。其

根白皮氣味大寒。煎汁服之，治赤白痢，去消渴，

止心煩。其花氣味苦香，無毒。多為面粉，令人面

澤。其葉氣味甘酸，無毒。治小兒壯熱，驚癇。其

樹膠氣味苦寒，無毒。主治目翳，止痛，消腫。

【學說】李時珍曰：李，綠葉，白花，樹能耐久。其種近有

，其子大者，如杯，如卵，小者，如彈，如櫻。其

味有甘，酸，苦，澀數種。其色有青，綠，紫，朱

，黃，赤，標綺，胭脂，青皮，紫灰之殊。其形有

牛心，馬肝，柰李，杏李，水李，離核，合核，無

核，異縫之異。其產有武陵，房陵。諸李，早則麥

李；御李，四月熟。遲則晚李，冬李，十一月熟。

又有季春李，冬花，春實。

【別稱】又名嘉慶子。

杏

(蔷薇科)

【學名】*Prunus Amoenus* L. var. *Amygd. Maxim.*

【產地】原產於蒙古，近時各省栽培甚多。

【基本】為密葉亞喬木，高丈餘，葉廣橢圓形，或卵形而尖

。春日開花，花五瓣，帶紅白色。果實為核果，圓

形，熟則呈黃色。其核仁等，供藥用之。

【成分】其仁含有 Amygdalin $C_{10}H_{17}NO_{11}$ 及 Emulin 之卵

白性醱酵素，脂肪油，護膜，糖質等。

【功效】其實酸熱，而有小毒。多食能強筋骨，曝肺食，止

渴，去冷熱毒。其仁氣味甘苦，溫冷利有小毒。能

瀉肺，解肌，潤燥，降氣，行痰，除風，散寒，發

汗，消積，消腫，殺蟲，潤心肺，可同天門冬煎服

。能治溫病，驚癇，肺熱，頭痛。

【用量】仁用一，五——三。○煎服，但近來多以其油，而

醫用之。

【學說】李時珍曰：諸杏葉，皆圓而有尖。二月開紅花，亦

有千葉者，不結實。甘而有沙者，為沙杏。黃而帶

酢者，為梅杏。青而帶黃者，為棠杏。其金杏大如

梨，黃如橘。西京雜記載：蓬萊杏花五色，蓋異種

也。

【別稱】又名甜梅。

杜仲

(大戟科)

【學名】*Elaeagnus alnifolia*, Oliv.

【產地】多生於深山大谷間，以川陝各省為最多。

【基本】為一種幹高之植物，約達數丈，葉作卵形，端尖，

其樹皮細膩，有黃白斑文，折之白絲相連，入藥用之。昔有杜仲一人，服此得道，故名。

【功效】為強壯藥。

其氣味辛平，無毒。能補中，益氣，潤肝，滋腎，堅骨，強志。治腰膝痛，陰除下痿。

【用量】一。〇——三。〇服用。

【禁忌】惡玄參，蛇退皮。

【採製】五月，六月，九月採皮，削去粗皮，每一斤用酥一兩，蜜三兩和塗，火炙，以盡為度。

【學說】蘇頌曰：今出商州，成州，峽州，近處大山中，葉亦類和，其皮折之白絲相連。

【別稱】又名思仲，思仙，木綿。

杜松

(松杉科亦作松柏科)

【學名】*Juniperus rigida*, S. et Z.

【產地】多生於山野之暖地。

【基本】為常綠喬木，幹直立，高約數十尺，葉細長而尖，略似針狀，質強硬，每節三葉，輪生。夏月葉間開

花，花小，單性。其子實，可供藥用之。

【成分】子含有揮發油，樹脂，護謨，糖分等。

【功效】為發汗利尿藥。但近來多用其木蒸溜，而製成黑褐色之油樣液體，即通常所稱：杜松木蓍兒之藥品，專為疥癬，濕疹等之軟膏。

【用量】子以一。〇——三。〇服用。

杜若

(鴨跖草科)

【學名】*Pollia japonica*, Hornet.

【產地】多生於野林之陰地。

【基本】為一種之宿根草，春日抽莖，一二尺，上部生七八葉，葉披針形，略似蕹荷。夏日莖頂開花，花瓣白色，萼片綠色，為圓錐花序。採其根，供藥用之。

【功效】其味辛，微溫，無毒。能溫中，下氣，明目，止痛等。治暴冷，霍亂，腹痛，胃中逆冷，腦風頭腫，

目眩，淚涕，並除口中臭氣。

【學說】李時珍曰：杜若，人無識者。今楚地山谷中，時有

之。山人亦呼為良薑，根似薑，味亦辛。

【別稱】又名杜衡，杜蓮，若芝，楚衡，山薑。

杜衡

(馬兜鈴科)

【學名】*Asarum Blumei*, Duch.

「產地」生於山地者爲最多。

「基本」爲多年生之常綠草，根莖皆有葉，爲心臟形，無光

澤；有長葉柄，花暗紫色。其根莖可採取之，而爲

藥用。

「功效」爲催吐藥；又有發汗，通經，利尿之作用。

其氣味辛溫，無毒。主治風寒咳嗽，能定喘，消痰，下氣，行水，破留血，殺蟲毒。

「用量」○。五——一。五服用。

「學說」蘇恭曰：杜衡，葉似葵，形似馬蹄，故俗又名：馬

蹄香。蘇頌曰：爾雅杜衡，又名土鹵，然杜若亦杜

衡名，或疑是杜若；而郭璞注云：似葵，當似杜衡也。

「別稱」又名杜葵，馬蹄香，土鹵，土細辛。

杜鵑

「學名」*Chama poliocephala*, Takah.

「基本」爲攀禽類之一種，體呈灰黑色，胸腹部有黑色短橫

條。其喙短；而頭尖。舌短，而扁平。尾羽，似鷹而柔軟。不自營巢，故每產卵於地上，啣之而入於

他鳥之巢，令其孵育之，此爲該鳥之特性。民間有

取其肉，而用之者。

「功效」其肉氣味甘平，無毒。主治瘡癩，可薄切，炙熱貼

之，能殺蟲，甚驗。

「別稱」又名杜宇，子規，催歸，陽雀。

杜交魚

「基本」據陳藏器云：杜交魚，生溪澗中，長二三寸，狀如

吹沙而短，其尾歧，大頭，闊口，其色黃黑，有斑

。脊背上有鬚刺，螫人。

「功效」其氣味甘溫，無毒。能補脾胃，壯陽道。治水腫，

濕氣，及小兒差類。

杉

(松杉科亦作松栢科)

「學名」*Cryphonema japonica*, Don.

「產地」山野間，產生爲最多。

「基本」爲常綠喬木，高至數十尺，葉小，如針狀，向上彎

曲。夏月開花，花單性，雄花內生黃粉。至秋結成

果實，爲毬形，中有帶暗黑色之子。其木皮子油，

皆供藥用之。

「成分」含有多量植物油，及其他。

「功效」其木味辛微溫，無毒。治霍亂上氣，心腹脹滿，脚

氣腫毒。能除風毒，散腫脹，療毒瘡，漆瘡。其皮

主治金瘡出血，湯火灼傷。其子主治疔氣疼痛，一

歲一粒，燒研，酒服。其油能治一切頑癬，疥瘡。

【學說】李時珍曰：杉木，葉硬微扁，如刺。結實，如楓實

。江南人以鶩蒸前後取枝插種。出倭國者，謂之倭

木；並不及蜀黔，諸國所產者，尤良。其木有赤白

二種，赤杉，質而多油；白杉，虛而乾燥。有斑紋

如鱗者，謂之野雞斑。

牡丹

(毛茛科)

【學名】*Paeonia moutan*, Ait.

【產地】產於中國東南各省，多栽培於庭園中。

【基本】為落葉灌木，吾國之特產。莖高二三尺許，葉為複

葉，分裂甚深。夏初開花，徑三四寸，有重瓣，單

瓣之別。色有紅，白，紫等諸種。在花中，為最艷

美。古無牡丹，統稱芍藥。自唐以來，始分為二，

現多採其根皮，供藥用之。

【成分】含有 Paeonol 針狀結晶，及安息香酸，脂肪酸等。

【功效】為月經不調，及痔疾等之效藥。能除婦人下腹之硬

塊；且能鎮止頭痛，腰痛，及痛風，與挫打外傷之

疼痛等。

其氣味辛寒，無毒。(或作味苦，微寒，有毒。)能

生血，和血，冷血，止血，安五臟，通血脈，利關

竅，通腠理，強筋，壯骨。治寒熱，冷氣，風痺，

驚癇，煩熱，不安，五勞，吐血，衄血，癰堅，惡

血，婦人腰痛，經脈不通，產後冷熱，胞衣不下。

又療癰腫，金瘡，能排膿，止痛。

【用量】一回一〇——四〇為煎劑服用之。

【處方】1 牡丹湯 *Decoctum Paeonia Moutan composita*.

此即以牡丹皮，當歸各五〇，芍藥，生地黃，陳

皮，白朮，香附子各三〇，柴胡，黃芩各二〇。

甘草一〇，用水煎服，為月經閉止，咳嗽，發

熱等之效藥。

2 牡丹散 *Pulvis Paeonia Moutan composita*

此即以牡丹皮，桂心，當歸，玄胡索各三〇〇。

莖朮，牛膝，赤芍藥各六〇〇。〇，荆三稜四五

〇。〇，共為粗末，每服一〇〇。〇，和水一〇。

〇，酒五〇煎服。

【禁忌】忌鐵。畏貝母，大黃，菟絲子。

「採製」二月，八月採取根皮，剖去用之；或其僅用之。

「學說」李時珍曰：牡丹，惟取紅白單瓣者，入藥。其千葉

異品，皆人巧所致。氣味不純，不可用。花譜載：

丹州，延州以西，及褒斜道中最多；與荆棘無異，

土人取以爲薪。其根入藥尤妙。凡栽花者，根下着

白然末，辟蟲穴中，點硫黃殺蠹。以烏賊骨針其樹

，必枯；此物性亦不可不知也。

「別稱」名見本草經，又稱鼠姑，鹿非，百兩金，木芍藥，

花玉。

牡丹

(馬鞭草科)

「學名」*Paeonia Moutan* L.

「產地」原產於印度者，近山野亦有之。

「基本」爲一種落葉灌木，高至四五尺，葉爲掌狀複葉，小

葉有鋸齒，長柄，互生。秋間開小花，青色，或紫

色，爲圓錐花序。其根莖葉實，皆供藥用之。

「功效」其根氣味甘苦(或爲微辛)而平，無毒。治心風，頭

風，肢體諸風。能發汗解肌。其莖治風蟲牙痛，可

和刺芥，煎水嗽之。其莖氣味苦寒，無毒。治

霍亂轉筋，久痢，血淋，下部濕癢，腳氣腫脹。其

質氣味苦溫，無毒。能利胃，止咳，下氣，化痰。

除骨間寒熱。治心痛，痲痛，婦人白帶。

「學說」李時珍曰：牡丹，處處山野多有，樵采爲薪，年久

不樵者，其樹大如盆也。其木心方，其枝對生，一

枝五葉，或七葉，葉如榆葉長而尖，有鋸齒。五月

杪間開花，成穗，紅紫色。其子，大如胡荽子，而

有白膜皮裹之。

「別稱」又名黃荆，小荆，楚。

牡蒿

(菊科)

「學名」*Artemisia japonica* Thunb.

「產地」多自生於山野之間。

「基本」爲一種之雜草，高至二三尺許，葉楔形，上部有缺

刻，頗尖銳，互生。夏日枝梢上點綴小花，帶淡靛

色，略呈穗狀，花形酷似艾；惟比艾較小。結實球

形，而有光澤，內有子微細。其苗可採取之，爲藥

用。

「功效」其味苦，微甘而溫，無毒。能益氣，充肌，令人暴

肥，血液滿盛，不可久服。搗汁服用，可治陰腫。

「學說」李時珍曰：春頭蒿，三月，四月生苗，其葉扁，而

本狀，末麥有歪歧。嫩時，可茹。鹿食九草，此其一也。秋開細黃花，結實，大如車前實，而內子微細，不可見，故人以為無子也。

【別稱】又名齊頭蒿。

牡蠣

(處方類之單柱類)

【學名】*Osstra talinwanensis*, *Crosse*.

【產地】產於淺河泥沙中。

【基本】為軟體動物，右殼小而薄，左殼大而凸，外面硬硬不平，腹緣為波狀屈折，色淡黃，內面白而滑潤。

足漸退化，而失其用，常以左殼附着于岩石，取其貝殼，供藥用之；而其肉，民間亦多食之。

【成分】含有碳酸石灰，磷酸石灰，珪酸，動物質等。

【功效】為制酸之健胃藥，對於酸性，加答兒性胃液分泌過多，一時性之消化不良，輕度之胃擴張，及慢性之胃炎等；與胃酸過多，時發吞酸，嗜噯，嘔吐等，而需要鹼性中和者，可服用之。

其殼氣味鹹平，微寒，無毒。能益腎，滋水，清熱，解渴，除濕，化痰，破積，軟堅，止汗，瀉腸。治傷寒，溫瘧，虛勞，氣結，寒熱，盜汗，四肢拘

緩，關節留熱，胸腹氣痛，癩瘰癧塊；男子虛勞，能補腎，安神；小兒驚癇，婦人崩中，赤白帶下。

療一切瘰癧，癩癧。其肉氣味甘溫，無毒。能止渴，調中，解酒熱，除丹毒。治虛損，婦人血氣。和薑糖生食，令人肌細，膚美。

【用量】一回三〇——一〇〇。為粉劑，丸劑，煎劑等服用之；亦有外用，以其和醋，而治瘰癧；又有以其和胡麻油，而治凍傷等。

【製劑】1.複方牡蠣散 *Pulvis Ostrea testae compositus*.

此即以牡蠣，黃耆，麻黃各三〇，共研為粉末，分作十包，用於病後衰弱，體常自汗，及食慾不振等。一日三回，每回一包，以米汁服用之。

2.制酸散 *Pulvis antacidus*.

此即以牡蠣研為粉末，加以少許茴香油糖，一日三回，一回〇・五——二〇服用，為胃中胃酸過多之效藥。

【禁忌】惡麻黃，辛夷，吳茱萸。

【採製】採取無時，以其燒成粉末，或直研為粉末。

【別稱】名見本草經，又稱牡蛤，蠣蛤，古質，鱉等。

皂莢

(葇科)

〔學名〕 *Gillichia japonica*, Miq.

〔產地〕山野有自生者，園圃亦有培植者。

〔基本〕爲落葉喬木，高四五丈，圍三尺許，呈赭黑色，初

爲平滑，後乃粗糙，終至裂開。幹枝多刺，長三四

寸許，刺上分歧，更生小刺，堅銳鋒利。葉似槐葉

，爲羽狀複葉。夏開綠黃花，小蝶形。結實成莢，

長扁如刀，內有小扁子，子甚堅硬，稍扁平，呈褐

色，而有光澤。其莢刺及種子，皆供藥用。

〔功效〕其莢味辛，鹹溫，而有小毒(或爲無毒)。能瀉肝，

利肺，明目，開胃，消痰，化食，殺蟲，拔毒，通

九竅，搜經絡，辟瘴疫，去邪氣。治傷寒，霍亂轉

筋，可吹鼻取嚏，中風口噤，胸痺，喉痺。其刺與

莢，大略相同。其子能通風熱，治療瘰，疥瘡。

〔用量〕莢，刺，子，皆一。五——四。五服用。

〔學說〕李時珍曰：皂樹，高大，葉如槐葉，瘦長而尖，枝

間，多刺。夏開細黃花。結實，有三種，一種小如

豬牙，一種長而肥厚，多脂而黏，一種長而瘦薄，

枯燥不黏，以多脂者，爲佳。其樹多刺，頗難上，

采時，以蔑箍其樹，一夜自落，亦一異也。有不結

實者，樹鑿一孔，孔入生鐵三五斤，泥封之，即結

莢。人以鐵砧槌皂莢，即自損；鐵礮槌之，久則成

孔；鐵錫鑿之，多爆炸落。豈皂莢與鐵有感召之情

耶！

〔別稱〕又名皂角，雞棲子，烏蓮，懸刀。其刺又名天丁，

角針。

皂莢葦

〔基本〕據李時珍云：生皂莢樹上木耳也。不可食，采得，

焙乾，備用。

〔功效〕其味辛，有毒。治積垢作痛，可泡湯飲之。又治癩

毒初起，可磨酒服之。

皂莢蠹蟲

〔基本〕此爲生於皂莢中之蠹蟲也。

〔功效〕民間有取其研爛，和鱈魚血點耳，以驅耳中之蠅蟲

，爲最妙。

芋

(天南星科)

〔學名〕 *Colocasia antiquorum*, Schott.

〔產地〕田園中多栽種之。

【基本】爲蕓類植物，其地下莖，多肉，供食。葉似荷葉而長，一端有大缺刻，葉柄肥大。花爲肉穗花序，有巨苞包之。葉柄色綠者，爲青芋。色紅紫者，爲紫芋。其子及葉莖，供藥用之。

【功效】其子味辛平滑，而有小毒。能寬胃，通腸，調中，下氣，補氣，解渴。治虛勞，破宿血，去死肌，生新肉。其葉莖味辛，冷滑，無毒。除煩，止瀉。治疔瘡。心煩迷悶，胎動不安。並療癰腫惡毒，蛇蟲咬傷。

【學說】李時珍曰：芋屬雖多，有水旱二種，旱芋，山地可種，水芋，水田蒔之，葉皆相似；但水芋味勝，莖亦可食。不開花，或七八月之間，有開者，抽莖生花，黃色。旁有一長萼護之。如半透蓮花之狀也。

荷葉

(毛茛科)

【學名】*Nicotiana glauca*, Pall.

【產地】多栽培於庭園間，亦有自生於山野者。

【基本】爲多年生草，高一二尺，葉爲複葉，小葉往往爲極深之三裂。初夏開花，大而美艷，色有紅白紫數種。

。其根爲紡錘形，長四五寸，徑三四分餘，外部暗褐色，有皺紋，破折面爲粉狀。其破折面之皮部，薄而帶黃色。木部，淡紅白色，有紫紅色之綫，共有二種，以日光乾燥者，名爲赤芍；刮去其皮部，而蒸乾者，名爲白芍，皆供藥用。

【成分】含有安息香酸，樹脂，葡萄糖等。

【功效】爲鎮痙，鎮痛，通經，止瀉藥。對於腹痛下痢，月經不調，身體之知覺減少，皆可服用。又於腹痛，有熱感而疼者，或由寄生蟲及寒冷之氣，而起腹痛，均可應用之。

其氣味苦平，無毒。(或作酸寒，而有小毒。)能瀉肝，安脾，斂陰，養血，散瘀，清熱，通膀胱，利大小腸。治虛勞，寒熱，中惡，癡狂，可爲末，水服。又能治頭痛，目赤鼻衄，血痺，肺氣急脹，肝血不足，脾虛中滿，疝瘕，腹痛，腸風，瀉痢，以及癰疽，惡疔，小兒痘疹，產後諸病。據云：白芍，入脾經血分，並瀉肝火。赤芍，專入肝經血分，能清血熱。

【用量】二〇——六〇。煎服。

【禁忌】忌鐵。

【別稱】又名將離，梨食，餘容，白者名金芍藥，赤者名木芍藥。

芒

(禾本科)

【學名】*Miscanthus sinensis*, Anders.

【產地】多自生於山野。

【基本】為多年生草，高至五六尺許，葉細長而尖，有平行脈。秋月開花，多集成長穗狀，呈黃褐色。果實多纖毛，熟則飛散。其莖可採之，而為藥用。

【功效】其氣味甘平，無毒。人類被蛇咬傷後，恐毒入內，故可取莖雜葛根煎汁服之；或取生汁服之，亦可。

【學說】李時珍曰：芒有三種，皆叢，全葉者，皆如茅而大，長四五尺，甚快利，傷人如鋒刃。七月抽長莖，開白花成穗，如蘆葦者，芒也。花五月抽短莖，開花如芒者，石芒也。並於花將放時，剝其外皮，可為繩，箔，草履諸物。其根穗，可以為掃帚也。

【別稱】又名杜榮，芭芒，芭茅。

芒硝

Potassium Sulfurium.

【基本】此為一種硫酸那篤留誤，以食鹽，加硫酸製之，為

無色稜柱形之結晶，或粉末，可取之為藥。

【成分】含有硫酸那篤留誤，及食鹽等。

【功效】為瀉下藥，兼有清涼之作用，於常習性便秘及自心肺各臟疾患之下腹臟器滯脈鬱積，胆汁分泌障礙，脾臟腫大，肝臟硬結，脂肪過多，慢性胃炎等，皆可應用。

其氣味辛苦，大寒，無毒。治五臟積聚，久熱，胃閉。能破留血，除邪氣，通經脈，利大小便及月水，有推陳致新之功。

【用量】一〇。〇——二〇。〇為瀉下劑。一日二三回，以二。〇——五。〇為解凝劑，單味服用之。

芎藭

(繖形科)

【學名】*Conioselinum umbellatum*, Turcz.

【產地】有自生於山地者，亦有栽培於園圃者。產於蜀中者，稱為川芎。

【基本】為越年生草，莖高一二尺許，葉為細羽狀複葉，互生。秋間開細白花，五瓣，為複繖形花序。全體芬馥。其根堅瘦，而色黃黑，可供藥用之。

【成分】含有 (Limon) 揮發油之成分。

【功效】其氣味辛溫(或酸)，無毒。能通經絡，開血鬱，散

疝邪，疏氣滯，排膿，止痛。治五勞，風濕，風虛

；風痰，可作蜜丸服用。中風入腦，半身不遂，冷

氣，中惡，頭風，目淚，齒根出血，衄血，吐血，

心腹疼痛，癰結，脇痛，腰脚軟弱，尿血，瀉痢，

婦人經閉，崩中，無子，胞衣不下。並療腦癰，發

背，療瘰，痔疾，疥瘡。

【用量】二〇——六〇服用。

【製劑】丁川芎丁幾 *Tinctura Radix Corniculini*.

此即以川芎根五〇，浸於酒精一〇〇中，經五

日濾過之，所得液體，即是。為清血活血之效藥，

一日三回，與以二〇——八〇服用之。

【禁忌】與黃連，硝石，滑石。惡黃耆，山茱萸。

【採製】十二月抄掘根，削去鬚尾，曬乾，或蒸熟備用。

【別稱】又名胡窮，川芎，香果，山鞠窮。

貝子 Shell

【基本】為介殼類，體呈白色，長約寸許。殼稍作三角形，

甚厚。殼口縱裂多缺刻，如齒狀。殼頂隆起，而有

光澤。貝之種類雖多，皆可供藥。

【成分】含有炭酸石灰，磷酸石灰，及動物膠等。

【功效】其氣味鹹平，有毒。治目翳，五癰，溫疔，浮腫，

傷寒，腹痛，下血，瀉痢。能散結熱，利水道。療

鼻淵出膿出血，男子陰疔，小兒疳蝕。解蟲毒，藥

箭諸毒。

【用量】四〇——六〇服用。

【學說】李時珍曰：貝字象形，其中二點，象其齒刻。其下

二點，象其垂尾。古者貨貝，為寶龜，用為交易，

以二為朋。

【別稱】又名貝齒，白貝。

貝母

(百合科)

【學名】*Fritillaria verticillata*, Willd.

【產地】庭園中多栽培之。

【基本】為多年生草，莖高尺許，葉狹長，莖頂三葉，尤小

，末卷曲。三四月開花，花蓋六斤，淡黃，微綠，

內面有綠線，並雜紫點甚細。其地下莖，如小貝羣

聚，色白，可入藥用之。

【成分】含有 *Alkaloid* 之植物鹽基。

【功效】為祛痰，鎮咳藥。

其氣味辛平（或味苦微寒），無毒。主治傷寒，煩熱，虛勞，咳嗽，喉痺，目眩，肺癰，肺痿，吐血。能清虛痰，潤心肺，瀉心火，散肺鬱。

【用量】四。〇——六。〇服用。

【製劑】貝母越幾斯 *Extractum Radicis Anemarrhenae siphoides*。

此即以貝母根浸於水及酒精，而製成一種稀薄越幾斯。一日三。〇——六。〇為祛痰鎮咳藥。

【禁忌】反烏頭。畏秦艽，莽草，礬石。惡桃花。

【採製】四月，八月，採根，收晒，剝去米粒狀心，剉細，浸生薑汁，再晒，再焙乾，或與糯米拌炒至黃，去米用之。

【學說】李時珍曰：詩云：言采其菑，即此。一作菑，謂：

根狀如菑也。苦菜，藥實，與野苦蕒，黃藥子同名者也。

【別稱】又名菑，勒貝，苦菜，苦花，空草，藥實。

角蒿 （紫葳科）

【學名】*Thaun-tilia chinensis*, Lam.

【基本】本植物為紫葳之一種。據蘇恭云：角蒿，似白蒿，

花如瞿麥，紅赤可愛。子似王不留行，黑色，作角，七月，八月采之，可為藥用。

【功效】其氣味辛苦，而有小毒。治小兒月蝕耳癩，齒根宣露，可燒灰搽塗。

【學說】韓保昇曰：葉似蛇床青蒿子，角似蔓菁，黑而細，秋熟，所在皆有之。

兒腫消

【基本】據蘇頌云：生荊州，春生苗，葉莖紫色，高一二尺，葉似桑而光，面青紫赤色，采無時。

【功效】其氣味酸澀，而有微毒。能消腫，而治狗咬傷，可搗葉貼之。

車前

（車前科）

【學名】*Plantago major*, L. var. *asiatica*, Don.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為多年生草，葉廣卵形，有五肋，或七肋，具有長葉柄，自宿根叢生；花莖自葉叢之中央而生，長至七八寸許。夏月開淡紫色花，花小，而為多穗狀花序。其果實為蒴果，內有種子，可採取之，而供藥用。

【功效】爲利尿藥。

其種子氣味甘寒，無毒。能除濕，利水，解熱，涼血，止吐血，消癥瘕，通小便，治五淋，養肺，強陰。並治男子傷中，女子淋瀝。

【用量】二〇——六〇服用。

【採製】五月採葉，七月，八月收子陰乾，炒用。

【別稱】又名當道，禾苧，馬瀉，牛遺，牛舌，車輪菜，地衣，蝦蟆衣。

車渠

【學名】*Pecten yessoensis*, Jay.

【基本】爲單柱類之一種，右殼白色，扁平。左殼膨脹，呈淡紫色，大及六七寸。開閉左右之介殼，以排水，

(水由其狀突起之兩側排出)因其反動游泳。足小，

肉柱大，介殼圓，由殼頂射出放射狀之隆起線，約三十餘。外套膜之緣邊，具多數之眼。其殼可取收之，爲藥用。

【功效】其氣味甘鹹，大寒，無毒。能安神，解毒及蟲螫，

可以人乳磨服。

【別稱】又名海扇。

車螯

【基本】爲介類動物之一，殼色紫，瑣鑿如玉，斑點如花，以火炙之，則殼開，可取其肉食。

【功效】其殼及肉氣味甘鹹而冷，無毒。能解酒毒，消積塊，療癰疽發背，疔瘡惡毒。

辛夷

(木犀科)

【學名】*Magnolia Kobus*, De.

【產地】多生於山野之間。

【基本】爲落葉喬木，高二三十尺許，葉倒卵形。其花初出，尖銳如筆，故名木筆，葉似柿葉而狹長。春初開花，紫白二色，大如蓮花，可採取，供藥用之。

【功效】爲刺激性驅風藥。

其氣味辛溫，無毒。治頭風，腦痛，面腫，齒痛，

五臟身體寒熱。能溫中，解肌，利九竅，通鼻塞。

【用量】一〇——二〇服用。

【禁忌】惡赤石脂。畏高蒲，黃耆，石膏。

【採製】去皮毛，茸毛，及蕊，水炙，沸過，曬乾，微炒，備用。

【學說】李時珍曰：辛夷初出，枝頭苞長半寸，而尖銳，斂

如筆頭，重重有青黃茸。毛頗綿長半分许，及開則似蓮花而小，如蕊，紫苞紅焰作蓮，及開花香，亦有白色者，人呼爲玉蘭。又有一種千葉者，諸家皆言似小桃者，比類欠當。

〔別稱〕又名辛雉，候桃，房木，木筆，迎春。

邪蒿

(繖形科)

〔學名〕*Fossil Tibonowia Koch. var. amurensis*, De.

〔產地〕多生於山野之間。

〔基本〕爲一種雜草之植物，高至二三尺，葉爲二四羽狀複葉，大小不整，開小白花，爲複繖形花序。其全草，可供藥用之。

〔功效〕其味辛，溫平，無毒。能利腸胃，通血脈。治五臟

惡邪，胸膈臭爛，大渴，暴熱，惡瘡。

〔學說〕陳藏器曰：邪蒿，根莖似青蒿，而細軟。李時珍曰

：三四月生苗，葉似青蒿，色淺，不臭，根莖皆可

茹。

赤銅

〔基本〕爲天然產於赤銅礦，通常取其赤銅落下之細屑，爲藥用之。

〔成分〕含有氧化銅(Cu₂O)之成分。

〔功效〕其氣味苦平，微毒。能明目，接骨。治賊風反折，

可燒熟投於酒內服用。

〔別稱〕又名紅銅，赤金；屑名銅落，銅末，銅花，銅粉，

銅砂。

赤箔

(蘭科)

〔學名〕*Cuscutaria elata*, Bl.

〔產地〕多產生於山野之間。

〔基本〕爲寄生植物，初覓出一直莖，生出極速，高至四五尺，圓柱形，中空，呈淡黃赤色。其莖有節，每節有小薄皮，色黑。初出時，此皮相抱如筒，莖高二尺，時開序狀花，作黃赤色。至秋苗根俱枯；根爲長塊，而橫行，能取之，供藥；或採其幼莖，亦可供藥用之。

〔功效〕爲鎮痛藥，對於頭痛，四肢筋肉痛，均有特效；或因卒中而發之四肢知覺鈍麻，及言語障害，皆能緩解。

其氣味辛溫，無毒。能補陰，益氣，通血脈，利九竅，強筋骨，利腰膝，助陽道。治寒証，五勞七傷

，諸風溫痺，冷氣，拘攣，小兒驚癇。癩癧腫，殺蟲毒。

【用量】同一。○——五。○服用。

【製劑】赤箭丁幾 *Tinctura Radix Costodiola*。

此即以赤箭根五。○浸於稀酒精二。○中，經五日後濾過之，而製成一種液體。一日三回，與以六。

○服用，為筋肉痠麻質斯等之效藥。

【學說】李時珍曰：赤箭以狀，而名獨搖，定風；以性異，而名離母，合離；以根異，而名神草，鬼督郵；以功，而名天麻，即赤箭之根。

【別稱】又名天麻，赤箭芝，獨搖芝，離母，合離草，神草，鬼督郵。

赤小豆

(豆科)

【學名】*Phaseolus Mungo*, L. var. *Subtrilobata*, Fr. et Sav.

【產地】多栽種於陸田之間。

【基本】為一年生之穀類植物，莖高二尺餘，葉為複葉。夏

秋葉脫開花，色黃，花瓣為蝶形。實成莢，長二三寸，子亦，可食，亦供藥用之。

【成分】含有脂肪，纖維，含窒素物，無窒素物，及灰分。

【功效】為利尿藥，及腫瘍藥。

其氣味甘酸而平，無毒。治熱毒，散惡血，除煩滿，健脾胃，去消渴，止洩痢，通小便，下水腫，排膿血。能縮氣，行風，堅筋骨，抽肌肉。癩癧腫，惡毒，小兒黃水瘡。

【用量】六。○——一〇。○服用。

【學說】李時珍曰：按詩云：黍稷稻粱，禾麻菽麥，此即八穀也。董仲舒云：菽是大豆，有兩種。小豆名菽，有三四種。王禎云：今之赤豆，白豆，綠豆，蒼豆，皆小豆也。此則入藥用，赤小者也。

【別稱】又名赤豆，紅豆，蒼，菽名菽。

赤石脂

Lithomarge

【基本】據云：產濟南吳郡等處，為石之風化者，鮮紅可愛，隨采，隨生，細膩黏舌者，佳良，可為藥用。

【成分】含有碳酸加里等之成分。

【功效】其味甘酸而辛，大溫，無毒。能養心氣，明目，益精，補心血，生肌肉，除水濕，止洩痢，收肛門。癩癧疽，痔瘡，及女子崩中，漏下，難產，胞衣不出，久服增聰。

「用量」四。○——一。○。○服用。

「禁忌」畏堇花。惡大黃，松脂。

赤地利

(蓼科)

「學名」*Polygonum chinense*, L. var. *Thunbergianum*, Meisn.

「產地」多自生於山野之中。

「基本」為一種蔓草，莖甚長，每纏繞於他物之上。葉似蘿藦，開小白花。其根外部赤黑，內部黃赤。根與莖葉，皆可供藥用之。

「功效」其根苦平(或酸)，無毒。治赤白冷熱諸痢，赤白帶下。能斷血，破血。主療癰疽，惡瘡，毒腫，蛇犬咬傷，可以醋磨敷之。其莖葉氣味，及功效相同。

「學說」陳藏器曰：五毒草，生江東平地。花葉並如蕎麥，根堅硬似狗脊，亦曰蛇齒，名同物異。李時珍曰：五毒草，即赤地利，今併為一。

「別稱」又名赤鮮蒲，五毒草，五葦，山蕎麥。

赤翅蜂

「基本」據陳藏器云：出嶺南，狀如土蜂，翅赤，頭黑，大如螳蟻，穿土為窠，食蜘蛛；蜘蛛遙知蜂來，皆狼狽。蜂以預知其處，食之無遺。

「功效」其蟲有毒，治蜘蛛瘡，及行腫，可取蟲燒灰，和油塗之。

赤車使者

(蕁麻科)

「學名」*Urticaeum umbellatum*, Bl. var. *major*, Maxim.

「產地」生於溪谷之陰地。

「基本」為一種草本，莖高一尺許，通常斜上，無直立者，葉互生，淡綠色。夏間葉腋開花，淡黃綠色，至秋葉脫，則生肉芽。其根，可為藥用。

「功效」其氣味辛苦，溫而有毒。主治風冷，邪疰，蠱毒，積癥，五臟積氣。

「學說」蘇恭曰：赤車使者，苗似香薷蘭香，葉莖赤色，根紫赤色。八月，九月采根，日乾。韓保昇曰：生荊州，襄州，根紫，如舊根，二月，八月采。李時珍曰：此與爵牀相類，但以根色紫赤為別爾！

「別稱」又名小錦枝。

防己

(防己科)

「學名」*Cocculus Thunbergii*, De

「產地」山野中多產生之。

「基本」為一種蔓草，因略帶木質，故又稱：木防己。莖細

，葉爲卵形，端尖，互生。夏日葉腋開小花，花單性。呈淡綠色，作圓錐狀花序。其根可採取之，而供藥用。

【功效】爲利尿藥，可用於水腫及淋病等。

其氣味辛平，無毒。治風寒，濕熱，諸痢。除邪氣，利大小便，療水腫，風腫，去膀胱熱，通脛理，利九竅，散鬱腥惡結。治中風，口面喎斜，手足拘痛，肺氣喘嗽，留痰。能下濕熱，瀉腳氣腫，行十二經。

【用量】四。○——一。○。○服用。

【禁忌】惡細辛。畏葶藶，女苑。

【採製】取根，浸於米泔汁中，或浸於酒中，去皮，剉細，備用。

【學說】名醫別錄曰：防己，生漢中川谷。二月，八月采根；陰乾。李當之曰：其莖如葛，蔓延。其根外白，內黃，如桔梗，內有黑紋，如車輻解者良。

【別稱】又名解離，石解。

防風

(繖形科)

【學名】Siler divaricatum, B. et H.

【產地】海濱，砂地，山野，園圃，皆有所生。

【基本】爲多年生草，似青蒿而短小。夏初發嫩葉，呈紫紅色，可採作茱萸，葉羽狀，三裂。夏秋之間，開花，呈細白色，五瓣，作複繖形花序。實似胡荽子，而大，根土黃色。二月，十月採之，可療頭風，故名防風。又有石防風，生於石間，採嫩苗，作菜，辛甘而香，呼爲珊瑚菜。白居易在翰林時，賜防風粥一甌，舍之曰香七日，卽此。

【功效】爲解熱藥，對於感冒，及風痛等，均有效。

其氣味甘溫，無毒。治大風，頭眩，風邪，惡風，五勞，七傷，頭目滯氣，頭痛，目赤，上部出血，上焦風寒，肺氣壅實，心胸煩滿，骨節風痛，四肢痲急。能散內外諸風，疏通經絡，安神，定志。

【用量】三。○——六。○服用。

【禁忌】畏葶藶。惡藜蘆，白欬，乾薑，芫花。

【採製】二月，十月採掘其根，洗去土質，剉細，焙用。

【學說】李時珍曰：江淮所產者，多是石防風。生于山石之間，二月采嫩苗，作菜，辛甘而香，呼爲珊瑚菜。其根粗醜，其子亦可種。

【別稱】又名對雲，回雲，回草，屏風，蘭根，百枝，白雲，石防風，珊瑚菜。

防葵

(繖形科)

【學名】*Renoumulus japonicum*, Thunb.

【產地】生於海邊向陽之地。

【基本】為多年生草，莖高二尺許，葉為分裂不整之羽狀複葉，質厚而硬。夏日開小花，白色，為複繖形花序。其根可採取之，供為藥用。

【功效】其氣味辛寒，無毒。能強志，通氣，殺鬼蟲，除百邪。治癰癩，驚狂，口乾，咳逆，腹滿，腸洩，腎邪，瀉閉，痲癩，疥癬，疥癬，氣塊，膀胱宿水，血氣，故為治風虛，通血脈之要藥。

【學說】陶弘景曰：防葵，今用建平者，本與狼毒同，根猶如三逆。其形亦相似；但置水中不沉耳！而狼毒陳久者，亦不能沉矣。

【別稱】又名房苑，梨蓋，利茹。

第八畫

乳汁

【學名】*Lac* (Milk)

【基本】以初產男孩，母子俱屬健康，而無遺傳病等，所擠之乳液，為佳。其色乳白，濃稠，而不透明。其味緩和，微甘，可取供食用，亦可供藥用。

【成分】由人之營養，及靜動，含有不同量之蛋白質，脂肪，糖分，及鹽類。

【功效】為滋養緩和劑。

其氣味甘鹹而平，無毒。能補五臟，令人肥白。療目赤疼痛，多淚。和雀屎，去目中贅肉。

【別稱】又名奶汁，仙人酒。

乳香

(漆樹科)

【學名】*Frankia leucophaea*, L.

【產地】原產於南部歐羅巴，近於江河沿岸，多產生之。

【基本】為常綠喬木，葉為羽狀複葉，長卵形。花小，色白。由其幹浸出樹脂之凝固者，呈黃白色，或灰白色，多為圓球形等。其破碎面有蠟樣之光澤，咬之黏牙。涎液成爲乳狀，氣香而味苦。燒之，則發出香烟，即爲乳香，可取之，爲藥。

【成分】含有揮發油，樹脂，膠質等。

【功效】為鎮痛藥，可用於瘧疾，癆瘵，心腹痛等。

其氣味微溫，無毒。能治耳聾，中風，口喎不語。

婦人血氣，止大腸洩，療諸瘡，令內消，生肌，止痛。能下氣，益氣，補腰膝，治腎氣。止霍亂，邪

氣，疰氣，心腹痛。

【用量】〇·八——三·二服用。

【學說】李時珍曰：乳香，今人多以楓香雜之；惟燒之，可

辨。南番諸國皆有，宋史，言：乳香，有一十二等

。按葉廷珪香錄云：乳香，亦名薰陸香，出大食國

南。其樹類松，以斤斫樹，脂溢於外，結而成香，

聚而成塊。

【別稱】又名熏陸香，馬尾香，天澤香，摩勒香，多伽羅香

等。

乳燕

【基本】據云：廣東韶州府境內，有種乳田法，掘地成窖，

以粳米粉鋪入窖中，蓋之以草，棄之以糞。候雨過

，氣蒸，則發開，而米粉皆化成糖，如鱗鱗狀，取

蠶作汁，和粳米蒸成乳食，味甚甘美也。

【功效】其氣味甘溫，無毒。能補虛羸，益胃氣，溫中，明

目。

【別稱】又名土麵。

亞麻

【學名】*Linum catharticum*, L.

【產地】山野及園圃之間，皆產生之。

【基本】為一年生草，高至三尺餘，葉細披針形，互生。初

夏開花，呈紫碧色，為繖房狀花序。花後結實，直

徑二三分，為扁圓形，可取之，為藥。

【成分】含有多量亞麻仁油，及黏液質之成分。

【功效】昔時有用於尿道炎，及肺病等；但近來僅供為外用

矣。

其味甘微溫，無毒。主治大風，疥癬。

【製劑】亞麻仁粉 *Praksa Semen Lini*

此即以亞麻仁研為光澤樣之褐色粉。專為毛布劑用

之，即以其粉，與湯共攪和為粥狀，用布或紙包裹

之，置於患處，能保持濕溫，而具緩和之作用。

2 亞麻仁餅 *Snoeks Samen Lini*

此即以亞麻仁粉，與湯混和而製成；其功用相同。

3 亞麻仁油 *Oleum Semen Lini*

此即以亞麻仁，壓榨而出之油。可為軟膏料，或以

此油而製成油氣，專作外科繃帶之材料。

【學說】李時珍曰：今陝西人亦種之，即壁虱胡麻也。其實

亦可榨油，點燈，氣惡不堪食。其莖穗，頗似菟耳

，子不同。

【別稱】又名壁虱胡麻。

亞克尼加

(菊科)

【學名】*Arctium montanum*, L.

【產地】產於歐羅巴之中部。

【基本】為多年生草，高至一尺許，葉卵形，全邊；其在花

莖者，對生。此植物之花等，可供藥用之。

【成分】含有亞克尼加之成分。

【功效】為切控制之外用藥，或為興奮之內服藥。

亞爾答亞

(錦葵科)

【學名】*Achaea officinalis*, L.

【產地】產於歐羅巴，及亞細亞之北部。

【基本】為多年生草，高三三尺，全部有粗毛，葉卵形，互

生。常常三裂，或五裂。開花甚大，呈淡紅色。其

根肥大，可採取之，而供藥用。

【成分】含黏液質，及澱粉等。

【功效】善時常用於氣管之炎症及刺戟作用。其他多為緩和性懸布，或為賦形藥等。

【用量】根葉皆用五。○——一○。○為煎劑，水劑，粉劑

等服之。

【製劑】丁亞爾答亞含利別 *Syrupus Achaeae*

此即以亞爾答亞根八。○，用水洗之，注以酒精四

●。○溜水二○○。○靜置冷浸，而後濾之，所得液

體，加以適量之白糖，而製成之。作為緩和藥，或

祛痰藥，或祛痰之調味藥，以八。○為水劑等服用

之。

亞克沙阿仙藥

(苣荬科)

【學名】*Achillea millefolium*, Willd.

【產地】產於東部阿非利加等處。

【基本】為常綠樹木，高三四丈許，葉為羽狀複葉。開花黃

色，雄蕊之數甚多。果實為莢，含數種子。採其植

物煎之，濾汁，使其乾燥為褐色之塊，即阿仙藥，

可供藥用之。

【功效】為收斂藥，可用於慢性下痢，及赤痢等。外用於齒

齦之潰瘍等，為含嗽料。用於淋病等，為尿道注射

料。又用於慢性赤痢等，為灌腸料。

【用量】〇·五——一·〇——一·五為粉劑，丸劑服用。

【製劑】阿仙藥丁幾 Tinctura Calceolae

此即以阿仙藥二·〇，稀酒精一〇·〇，製成澄明暗褐色之液體。一日數回，以其一·〇——三·〇

為小劑，而服用之。又外用於慢性咽喉口腔黏膜之疾病，以其百分之一·〇——二·〇為含嗽劑等。

【別稱】俗稱阿仙藥，吾國稱為孩兒茶。

亞拉毗亞護謨

(豆科)

【學名】*Arnica montana*, Willd.

【產地】產於阿非利加之北帶。

【基本】為常綠樹木，高至二十尺許，有向下之刺。葉為二

羽狀複葉，自葉腋出花軸，花呈黃色。果實為莢，含有數粒種子。此植物之莖上，常於乾燥時，自

其皮部之裂孔中，出倍狀之樹脂；其凝乾燥之物，

可供藥用。

【功效】為賦形藥，因其黏着性最大，故為丸劑，錠劑之黏

合料。

【製劑】亞拉毗亞護謨漿 *Mucilage Gummi arabici*.

此即以亞拉毗亞護謨五·〇用冷水急洗之後，注入一〇·〇——二〇·〇熱水中，溶解而濾過之。對於胃腸加答兒之內服，或灌腸，或含嗽等，皆可用之。

2 護謨散 *Tulsi's Gummisus*.

此即以亞拉毗亞護謨五·〇，白糖一〇·〇，甘草末一五·〇混和而製成之。可用為緩和藥等；但亦有用為賦形藥等。

使君子

(使君子科)

【學名】*Quisqualis indica*, L.

【產地】福建，四川各地，皆產生之。

【基本】為常綠蔓生植物，長二丈許，葉為卵形，對生。夏

秋之交，花軸出自莖頂，及葉腋，開黃綠花，成穗，實長寸許，有稜，可供藥用之。

【成分】含有軟脂酸，油酸，及蔗糖等。

【功效】為驅蟲藥，對於小兒之蛔蟲，蟯蟲等之寄生蟲病，

皆有殺除之功能。

其氣味甘溫，無毒。主治小兒五疳，小兒百病，小便白濁，瀉痢。並能殺毒蟲，療疥瘡，健脾胃，除

處執。

【用量】一回三。〇——六。〇——一〇。〇爲紙劑，丸劑等，空腹服之。

【製劑】一使君子紙劑 *Elicurarium Quinqualis*。

此卽以使君子仁，及蜂蜜各一〇。〇，投入乳鉢中，研和成爲密蓋狀，卽妥。可應用於小兒之蛔蟲病等，一日三回，在空腹時，以舌舐之。

【採製】七月採其有稜之實，除去青黑色之外壳，而取其白色之內仁，貯藏備用。

【學說】李時珍曰：原出海南交址，今閩之紹武，蜀之眉州，皆栽植之，亦易生。其藤如葛，繞樹而上，葉青，如五加葉，五月開花，一簇一二十葩，紅色，輕盈如海棠，其實長寸許，五瓣合成，有稜。先時半黃，老則紫黑，其中仁，長如腰仁，色味如栗，久則油黑，不可用。

【別稱】又名留求子。

兩頭蛇

【基本】據陳藏器云：兩頭蛇，大如指，一頭無口目，兩頭俱能行云；見之不幸，故孫叔敖埋之，恐後人見之

必死也，李時珍云：按爾雅中央有積首蛇，中國之

異氣也。劉向續表錄云：嶺外極多，長尺餘，大如小指。背有錦文，腹下鮮紅。人視爲常，不以爲異。

○經爾雅翼云：寧國甚多，數十同穴，黑鱗白草。又一種，夏月雨後出，如蚯蚓大，有鱗。其尾如首，亦名兩頭蛇。又張來雜志云：黃州兩頭蛇，一名山蛭云。是老蛭所化，行不類蛇，宛轉甚鈍，此卽羅氏所云者也。

【功效】其肉能治瘰癧，山人收取之，佩於項上。

【別稱】又名積首蛇，越王蛇。

兔

【學名】*Lepus orientalis* (*Lepus europaeus*)

【產地】田野中，處處產生之。

【基本】此屬於啮齒類，體長二尺許，腹毛白色，兩側淡褐色。頭頂凸圓，耳長，眼大，前後四肢不同，分野兔，家兔二種。家兔生殖極繁，每年產子六十餘，可爲食料，其肉，及臟等之各臟器，可供藥用之。

【功效】其肉氣味辛平，無毒。能補中，益氣，解熱，止渴，涼血，去毒，健脾胃，利大腸。其血鹹寒，無毒

○能涼血，活血，解胎中熱毒，催生易產。其腦能催生，滑胎。同體治耳聾，癢凍瘡。其骨治熱中，消渴。其頂骨甘酸而平，無毒。治頭眩，頭痛，顛疾。連毛燒灰酒服，治難產及產後餘血。其肝能明目，補勞，治頭旋，眼眩。其皮毛燒灰酒服，治難產，馳衣不下。其尿又稱：明月砂。治目中浮翳，勞瘵，五疳，痔瘻。能殺蟲，解毒。

兒茶

【基本】吾國多以茶末納入竹筒內，埋於土中，日久取出其汁，熬成小塊，潤澤者上，大塊而枯者次，可為藥用之。

【成分】含有阿仙藥，單寧等。

【功效】其氣味苦澀而平，無毒。能化痰，生津，止血，去濕，清上焦熱。療一切瘡毒，及鼻漏，可以塗之。

【用量】五。○——九。○服用。

【別稱】又名孩兒茶。

卷柏

(卷柏科或石松科)

【學名】*Selaginella involvens* Sp. hu

【產地】多生於山地之巖石上。

【基本】為隱花植物，常綠不凋，葉高尺餘，生枝甚多。葉小，呈鱗狀，略與扁柏之葉相似，其數亦多。此植物過乾，則卷於內，遇濕，則開展。

【功效】為收斂藥，可用於下血，脫肛。

其氣味辛平，無毒。能破血，通經。治腸風，脫肛。

○生用破血；炙用止血。

【用量】三。○——九。○服用。

【採製】五月，七月，採收，陰乾，到碎，備用。或用以鹽水煮半日，再以井水煮半日，晒乾，焙用。

【學說】名醫別錄曰：卷柏，生常山山谷石間，五月，七月

采，陰乾。陶弘景曰：今出近道，叢生石上，細葉

似柏，屈處如雞足，青黃色，用之去下近沙石處。

【別稱】又名萬歲，長生不死草，豹足，求股，交時。

咖啡 (茜草科)

咖啡

(茜草科)

【學名】*Coffea arabica*, L.

【產地】產於阿非利加東部，及熱帶各地。

【基本】為常綠小灌木，高至二十尺許，葉長卵形，而尖，對生。花生於葉腋，台瓣，花冠五裂，色白。其種

子，供藥用之。

【成分】含有咖啡精之植物鹽基。

【功效】平時有用於神經病，及心臟病者，而今多供為茶料，間有用於阿片等急性中毒之虛脫，為回蘇藥，與解毒藥。

【製劑】咖啡精 Coffeinum.

此即由咖啡之種子(莖)中，提出亞爾加魯乙度(即鹽基)之白色針狀結晶，為藥用之。其味甚苦，可與他藥配伍，而服用之。對於神經痛之偏頭痛，以及歇私的里，舞蹈病等之神經病，皆可一回○。○三——○。二為鎮痛藥等。又於心臟病之水腫等，可一回○。一——○。二為利尿藥。更於阿片等之中毒，而起之虛脫等，可為回蘇藥，及解毒藥。

宜母果

(芸香科)

【學名】*Citrus medica*, L. var. *Limonum*, Thook.

【產地】庭院及園圃之間，有栽培之者。

【基本】為常綠灌木，葉及花與柑柚相類。果實為橢圓形，而端尖，黃色。其果可採取之，而供藥用。

【成分】含有枸橼酸，及葡萄糖之成分。

【功效】為清涼解熱藥，有止渴去暑之功，故多取其果壓

汁，加以適量之糖，及沸水作為飲料。

【學說】粵語：宜母子，似橙而小。二三月，黃色，味極酸。孕婦肝虛嗜之，故曰：宜母。元時，於廣州荔枝潤，作御果園，栽種果木樹，大小八百株，以作渴水；里木，即宜母子也。

【別稱】又名宜母子。

委陵菜

(薔薇科)

【學名】*Potentilla chinensis*, Ser.

【產地】生於原野之中。

【基本】為一種雜草，莖伏臥於地上，葉為羽狀複葉，自多數小葉而成。小葉羽狀分裂，下面有白毛，互生。開花，黃色。可採取全草，供藥用之。

【功效】為止血藥，對於胃腸出血，子宮出血，均可服之。

其他皆殺翻白草條，可參考之。

【學說】李時珍曰：雞退兒，生近澤田地，高不盈尺。春生弱莖，一莖三葉，尖長而厚，有皺紋，及鋸齒，面青，背白。四月開小黃花，結子如胡荽子，中有細子。其根狀如小白龍頭，剝去赤皮，其肉白色，如雞肉，食之有粉。

【別稱】又名翻白草，雞腿根，天藕。

忽布

(桑科)

【學名】*Bumulus Impatiens*, L.

【產地】產於歐羅巴亞美利加，及西部亞細亞。

【基本】為一種蔓草，長十五尺許，葉卵形，有不分裂，又有三裂，或五裂者。開花單性。果實卵形，以釀造麥酒為最常用。又於秋月之間，乘其稔熟時，與他部分益分而採取之，製成忽布腺，而用於苦味健胃藥。

【成分】含有忽布苦味酸 $C_{20}H_{30}O_{10}$ 之結晶性苦味質，蠟

質，樹脂，揮發油等，

【功效】昔時有用為藥者；但近來多用忽布腺矣。

【製劑】1. 忽布腺 *Glandulae Impati.*

此即以忽布之果實，而製出黃褐色粗細不同之粉末。可以增進食慾，故用為健胃藥。一日數回，以○
• 二——○。五，為粉劑，丸劑等服用之。此外因其有麻醉性之作用，故可用於神經興奮症，酒客譫妄等，為鎮靜藥及催眠藥。又可用於生殖機亢進，淋病之勃起等，為制淫藥。更可用於月經痛，尿道

閉止，膀胱刺戟症等。通常一回大量○。五——一
• ○服用之。

於朮

【基本】此即白朮 (*Atractylis Lanous*) 產於浙江於潛縣者。

據茅翼云：產徽州者，皆種朮，俗稱黃朮，乃藥力澆灌。大者，肥而無鶴頸。野生者，名天生朮，形小，有鶴頸甚長，內有礫砂點。朮上有報者，尤佳，以得土氣厚也。於朮，亦野生，出於潛產縣治龍脈土上者，其內點真，似礫砂猩紅，如洗血鶴頸，肉質乾之，清香。產他處，內或無點，純白，或有黃點，總不及龍脈土上產者，為上品。冬月採取，形味方全，可供藥用之。

【功效】與白朮大略相同，可參考本條。

昆布

(昆布科)

【學名】*Laminaria japonica*, Hervey.

【產地】多產生於南海之中。

【基本】為褐藻類，其體為草質，褐色，如長布帶狀，長約數十尺，下部有柄，附着於礁石上。此植物帶狀之部，可取供藥用之。

〔成分〕含有沃茂，膠質等之成分。

〔功效〕爲髮質藥，可用於癩病，水腫等。

其味鹹，寒滑，無毒。治諸種水腫，癩癧，惡核。

能利水道，去浮腫。

〔用量〕四。〇——六。〇服用。

〔學說〕李時珍曰：昆布生登萊者，搓如繩索之狀。出閩浙

者，大葉似菜。蓋海中之菜，性味相近，生療一致

；雖稍有不同，亦無大異也。

〔別稱〕又名縮布。

放杖木

〔基本〕據陳藏器云：生溫括睦黎諸州山中，樹如木天鰲。

老人服之一月，放杖，故以爲名。

〔功效〕其氣味甘溫，無毒。主治一切風血，理腰腳，輕身

，變白，不老，可以酒浸服之。

河砂

〔基本〕此即河中之細白石屑，昔時有取收而用爲藥者。

〔功效〕其性質微寒，無毒。能治絞腸痧痛，可取河砂炒紅

，以冷水淬之，澄清服用。又治石淋，可取砂三升

，炒熱，以酒三升淋汁，服一合，日再服。又主風

濕頭瘖不仁，筋骨攣縮，血脈斷絕。六月取河砂，烈日暴，令極熱，伏坐其中，冷即易之，不數次即效。

河豚魚

〔學名〕*Fabroides oenichlanth*, T. et S.

〔產地〕多產於淡水及鹹水之交界處。

〔基本〕此屬於圓頭類，大腹，小口，背淡蒼白色，無鱗，

有黑色斑。腹白色，能吸入空氣，而使食道一部膨

脹之特性。其卵巢，及肝臟等，皆有劇烈之毒性，

食之，往往令人死。其目，肉，肝，子，皆能供藥

用之。

〔功效〕其肉氣味甘溫，無毒。能補虛，殺蟲，去溫氣，理

腰腳。其目治雞眼，可和輕粉埋於地中，使其化水

，擦之。其肝及子，皆有大毒。能治疥癬，蟲瘡，

可同蜈蚣燒灰，和香油調敷。

〔禁忌〕其肉雖可服食；但毒性頗大，須除去目、嘴子、肝，及

周身膜脂，惡血爲宜。忌火。反荊芥，桔梗，菊花

，甘草，附子，烏頭。

〔別稱〕又名屯魚，吹肚魚，氣包魚。

波羅蜜

(桑科亦作慧麻科)

【學名】Artocarpus Integrifolia, Forst.

【產地】產於印度，及中國之南方。

【基本】爲常綠樹木，高至二十尺許，葉爲倒卵形，不分裂

。花小，單性，有許多之花，集於長橢圓形之花托

，肥大，而成假果。此果，亦爲長橢圓形，呈黃綠

色，有多數之柔軟突起。其果瓢，及仁，皆供藥用

之。

【功效】其瓢氣味甘香，微酸而平，無毒。能解去煩，清涼

，止渴，醒酒，益氣。其仁氣味相同。能補中，益

氣，令人健身。

【學說】李時珍曰：波羅蜜，生交趾南番諸國。今嶺南，滇

南亦有之，樹高五六丈，樹類冬青，而黑潤倍之。

葉極光淨，冬夏不凋。樹至斗大，方結實，不花，

而實出於枝間，多者十數枚，小者五六枚，大如冬

瓜，外有厚皮裹之。若栗毬，上有軟刺，及凸凹隆

起。五六月熟時，顆重五六斤，剝去外皮殼，內肉

解，暈如橘囊，食之味至甜美。

【別稱】又名藥伽結。

東牆

【基本】爲一種葎類植物，苗似蓬，秋月結子，似麥，爲青

黑色。九月十月熟，可作飯食，亦有供藥用之者。

【功效】其子氣味甘平，無毒。能堅筋骨，益氣血。久食輕

身不懶，可以救荒。

東洋參

【產地】日本藥園中，多栽種之；並無野生者。

【基本】本植物，大抵於蒔種五年，待秋涼採掘其參根，用

清淨流水洗滌。參根甚脆弱，可將土徐徐去之。宜

先用竹刀削去參尾間之泥，須勿傷根，再用水洗淨

，而後晒於日光中，約一二日間，去其水氣，使之

乾燥，備藥用之。

【成分】含有澱粉及糖質等。

【功效】其氣味溫平，無毒。主治小兒溫疫，痘瘡。能助藥

，解毒。產婦亦可服用之，有遼寧參之功用。

【用量】二〇——六〇服用。

【學說】汪玉子言：東洋參，出日本東倭地。其參外皮糙，

而中油，熟蒸之，亦清香；與遼參同，微帶羊膻氣

味。

東風菜

(菊科)

【學名】 *Aster scaber*, Thunb.

【產地】生於山野中，或田野中。

【基本】為多年生草，高至四五尺，上部之葉，長卵形；下

部之葉，大心臟形，俱有尖，而互生。莖及梢之上

部，開花，呈白色。周圍花冠，舌狀；中部花冠，

筒狀。可採取之，供為藥用。

【功效】其氣味甘寒，無毒。治風毒，瘰癧，頭疔，目眩，

肝熱眼赤。

【學說】李時珍曰：按蕪湖廣州記云：東風菜，花葉似落，

莖莖且肥，肉作羹食，香氣似馬蘭，味如醋。

【別稱】又名東風。

松

(松柏科)

【學名】 *Pinus densata* S. & Z.

【產地】在暖帶之海岸地方，產生為最多，而庭園，寺院，

亦有植種之者。

【基本】為常綠高木，幹聳直，多節皮，或粗厚裂為龜甲狀

，或光滑。葉如針，花單性，雌雄同株，雌花叢生

於枝頂，下有多數黃花粉之雄花，叢結成球果，經

一二年始熟。每取其滲出之松節油，受空氣而化為脂，是為松脂。其他皮節花葉等，皆供藥用之。

【成分】松脂含有 Acetyl Abietin $C_{44}H_{64}O_2$ Acetyl Pinar. C_{30}

$H_{30}O_2$ Acid Salvin $C_{20}H_{30}O_2$ 以及無水物與酸化

物等。

【功效】其脂氣味甘而溫，無毒。治癰疽，惡瘡，化毒，

殺蟲，多為醫藥之原料。又能清熱，祛風，除濕，

生肌，止痛。其節氣味苦溫，無毒，能祛風，化濕，

治骨節風濕。其葉苦溫，無毒，治風濕疔，生毛

髮。其花氣味甘溫，無毒。能潤心肺，益氣，除風

，止血。其根白皮氣味苦溫，無毒。能補勞，益氣

。其木皮能治癩疽，瘡口不合，能生肌止血。並療

白禿，杖疔，湯火傷。

【學說】李時珍曰：松樹，環柯修幹，多節。其皮粗厚，有

鱗形。其葉後凋，二三月抽葉生花，長四五寸。采

其花蕊，為松黃。結實，狀如猪心，壘成鱗樹，秋

老則子長鱗裂；然葉有二針，三針，五針之別。三

針者，為栝子松，五針者，為松子松。其子大如栝

子，惟遠海，及雲南者，子大如巴豆，可食，謂之

海松子。

【別稱】松脂又名：松香，松膏，松膠，瀝青。松節又名：

松明。松葉又名：松毛。松花又名：松黃。木皮又名：赤龍皮。

松茸

(菌蕈科)

【學名】*Armillaria colodes* Berk.

【產地】多生於赤松之樹下，性好高燥，秋末甚盛。

【基本】為隱花植物，大者傘徑四五寸，高與傘徑相等。其傘裏面生許多放射狀之髮，髮面生細微之芽胞柄，則接續於傘下面之中央。此植物之子實體，稱為松茸，可供藥用之。

【成分】含有苦味性之樹脂，及有機酸，蛋白質等。

【功效】為補汗藥。

據本草綱目云：能治洩瀉不禁。

松楊

(紫草科)

【學名】*Ethiopia ocanintha*, P. Br. (*E. serrata* Roxb.)

【基本】為苦蕒喬木，高三十尺餘，周圍約三尺，樹皮呈紫黑色。葉為橢圓形，互生，如柿子之葉，質厚有毛，而粗糙，緣邊有鋸齒。秋間枝梢開白花，為圓錐

花序。果實圓形而小，生青，熟黑。其木及皮，皆供藥用之。

【功效】其木氣味甘鹹而平，無毒。能安胎，和血，生肌，止痛，破惡血，治折傷。其皮氣味苦辛，無毒。能治冷熱水痢，煎濃令黑服之。

【學說】李時珍曰：其材如松；其身如楊，故名：松楊。

松蘿

(松蘿科)

【學名】*Usnea plicata* Hoffm. var. *Annulata* Muhl.

【產地】多寄生於松杉類之樹梢。

【基本】為隱花類植物，常自松梢懸垂，全體絲狀，作黃綠色，分段為多數枝條，長達尺餘。可採取之，為藥用。

【成分】含有 $\text{Acid. Barbatin } \text{C}_{19}\text{H}_{29}\text{O}_7$ 與 $\text{Acid. Usnin } \text{C}_{18}\text{H}_{27}\text{O}_7$ 等越巽斯，水分，及礦物性物質之磷酸，加里等。

【功效】為祛痰藥，及利尿藥。

其氣味甘平，無毒。能導痰，平肝，去濕熱，利水道，辟邪氣。治頭風，虛汗，溫痞，疫熱。女子陰寒腫痛。頭疔，頑疔，湯火灼傷，以及毒蛇咬傷。

【用量】一。〇——三。〇服用。

【學說】名醫別錄曰：松蘿生熊耳山谷，松樹上。五月采，

陰乾。

【別稱】又名女蘿，松上寄生。

林檎

(薔薇科)

【學名】*Pyrus malus*, L. var. *komonous*, Koeh.

【產地】吾國南方庭園之間，為最多。

【基本】為落葉亞喬木，高丈餘，葉橢圓形，有鋸齒。春暮

開花，五瓣，色白，有紅暈。夏末果熟，形圓，而

略扁，大約寸許，向陽之方，呈鮮紅色，味甘酸。

其實及根，供藥用之。

【成分】含有多量酒石酸，及芳香揮發油等。

【功效】為清涼藥，有解熱，止渴之功。

其實氣味甘而溫，無毒。能生津，祛痰，下氣。

治霍亂腹痛，水痢不止，洩精，小兒閃癩，小兒下

痢。消渴者，宜食之。其根治白蟲，蟻蟲，消渴，

好睡。

【別稱】又名來檣，文林郎果。其根東行者，為藥，故又名

：東行根。

枇杷

(薔薇科)

【學名】*Eriobotrya japonica*, Thunb.

【產地】產於暖帶之庭園，人家多種之。

【基本】為常綠亞喬木，高二丈餘，葉長橢圓形，有鋸齒，

甚細，互生，背有褐色毛，甚密。冬月開小白花，

五瓣。夏初實熟，形圓，色黃，皮有細毛茸，含大

種子，約二三粒，尤為甘美。其葉多為藥用，而核

間有用之者。

【成分】核含有青酸之物質，似與杏仁相同。

【功效】為清涼藥，有解暑去熱之能。

其葉苦平，無毒。能清熱，消痰，解暑，降火，瀉

肺，和胃。治嘔逆，消渴，肺嗽，衄血。其核氣味

大寒，無毒。能化痰，止咳，治肝腎有餘諸証。

【用量】二。五——七。〇服用。

【採製】四月，五月採葉晒乾，炙去毛，除筋，剉用。

【學說】李時珍曰：按郭義恭廣志云：枇杷易種，葉微似栗

，冬花，春實。其子簇結，有毛。四月熟，大者如

雞蛋，小者如龍眼；白者為上，黃者次之；無核者

名焦子，出廣州。

狗

〔學名〕*Canis familiaris*.

〔基本〕為各種狼類之所變得，體毛黑灰黃白色不一。鼻孔闊大，嗅覺最敏，口吻突出，就中犬齒最銳，為禦敵之利器也。口吻有多數小突起，能咀嚼碎骨之用。耳長，有半垂者；耳短，有直立者，為可動性，便於收音。四肢細強，行走不倦，亦屬於肉食類之動物也。其各臟器及組織，皆能供藥用之。

〔功效〕其肉氣味鹹酸而溫，無毒。能壯陽，益氣，補腎，填髓，厚腸胃，實下焦，利血脈，暖腰膝。其血氣味，與肉相同。能安五臟，補虛勞，治癩疾。其頭骨甘酸而平。能壯陽，治久痢，虛勞，瘧疾，其腦治頭風痺，療眉髮火癩。其陰莖鹹平。能補髓，壯陽，婦女陰痿，帶下。其骨甘平。補虛勞，治久痢。其齒治癩病，寒熱，痘瘡，發背。其肝治下痢，腹痛。其心治憂慮，邪氣，風痺，衄血。其腎平而微毒。治婦人體冷，產後腎勞。其膽苦平，小毒。能明目，治消渴，血積，血痛。

〔別稱〕又名犬，地羊。

狗脊

(水龍骨科)

〔學名〕*Woodwardia radicans*, Sm. var. *japonica* Litse. (W. japonica Sw.)

〔產地〕山野中，處處有之。

〔基本〕為多年生草，葉叢生，為羽狀複葉，質厚，色淡綠；葉面有齒，為無芽性，背生子囊羣。地下根莖，色黑，如狗脊骨，有黃毛，如黃狗形，俗稱金毛狗脊，皆可入藥用之。

〔功效〕為驅風藥，可用於關節痛風等。

其氣味苦平，無毒。能健脊骨，養氣血，補腎，強肝。治風邪，風虛，脚痛，膝軟，男子諸風，女子傷中。凡腎虛熱，小水不利，口苦舌乾者，皆禁忌服之。

〔用量〕四。○——一〇。○服用。

〔禁忌〕惡敗符，莎草。

〔學說〕李時珍曰：狗脊有二種，一種根黑色，如狗脊骨；一種有金黃毛，如狗形，皆可入藥。其莖細，而葉花兩兩對生，正是大葉蕨，比貫衆葉有齒，面背皆光。其根大如搨指，有硬黑髮簇之。

「別稱」又名靈壽，扶筋，百枝，狗青。

狗寶

「基本」據李時珍云：狗寶，生癩狗腹中，狀如白石，帶青色。其理層疊，亦難得之物也。

「功效」其氣味甘鹹而平，無毒。能祛痰，治噎膈，反胃。

療癰疽，疔瘡，惡瘍。

狗舌草

(菊科)

「學名」*Sanvitalia campestris*, DC.

「產地」多產生於水濕之地。

「基本」為多年生草，葉草質，深綠色，密生白毛。根生葉

，比莖生葉為大，全邊，或微有齒牙。秋間抽莖二

三尺，中空，外多白毛。至夏莖頭分枝，着數個之

頭狀花序。外圍為舌狀，花冠呈長卵圓形，中部為

筒狀，花冠帶黃色，或白色冠毛。可採其莖，供藥

用之。

「功效」其氣味苦寒，而有小毒。能殺蟲，去毒。治疥瘡，

癩瘡，可研末調敷。

「學說」蘇恭曰：狗舌，生渠壑濕地，初生葉，似車前，而

無文理，抽莖，開花，黃白色。四月，五月採莖，

晒乾。

狗尾草

(禾本科)

「學名」*Setaria viridis*, Beauv.

「產地」多生於山野之中。

「基本」為一年生草，高至一二尺餘，莖葉穗，均似粟，而

小，有綠色之芒。至秋種子成熟，其形似狗尾，故

名也。其莖可取之，為藥。

「功效」據云：以莖蘸水塗擦眼皮內面，能除惡血。治目赤

，睫毛倒植。

「學說」李時珍曰：原野垣墻多生之，苗葉似粟而小。其穗

亦似粟，黃白色，而無實。採莖筒，盛以治目病。

惡莖之亂苗，即此也。

「別稱」又名秀，光明草，阿羅漢草。

狐

「學名」*Vulpes japonicus*, Gray.

「產地」山野及原野皆有之；但常穴居人家附近之山林中。

「基本」此屬於食肉類之犬科動物，體大似犬，口吻尖，毛

路呈黃赤色，密生。耳長，直立。尾長，而大，為

總狀。有一肛門腺，常放出臭氣，以供避敵之用。

其性發瘡，多疑，喜食較小之獸鳥等。昔時常割割其臟器及組織等，供藥用之。

「功效」其肉氣味甘溫，無毒。能安五臟，補虛勞，暖中，去風，治寒熱，蠱毒，療疥癩。其陰莖味甘微寒，有毒。治婦人陰脫，陰癢。其目能治破傷風，可於冬月割取收乾，火燒存性，研末，酒服。其肝味苦微寒，有毒。治疫傷癰腫，緊口強拘，風癩，癆瘵。其膽味苦，治卒中，暴亡，能辟邪瘴，解酒毒。其他各臟，大略與肝相同。能治虛勞，寒熱，蠱毒，小兒驚癇。療惡瘡，疥癬。

空青

「基本」據李時珍云：張果玉洞要訣云：空青，似楊梅，受赤金之精，甲乙陰靈之氣，近泉而生，久而合潤，新從坎中出，鎖破中有水，久即乾，如珠金星燦燦。選其中空，內有青綠如珠者，為真。

「功效」其味甘酸寒，無毒。能通血脈，利九竅，養神，益氣。治多年青盲，可破空取漿點眼。並療目赤，腫入損破，內障翳膜，耳聾，頭風，中風口喎，可以少許含之。

「別稱」又名楊梅青。

玫瑰

「學名」*Rosa rugosa, Thunb.*

「產地」多生於北國海濱之各地。

「基本」為一種灌木，莖高二三尺餘，有刺，密生。葉為奇數羽狀複葉，有短毛；小葉卵圓形，托葉着於葉柄上。花大，重瓣，多白色，紅色；花托為壺狀，外面有刺，內藏多蕊。結果實，可食，亦有供藥用之者。

「成分」含有玫瑰油，揮發油等。

「功效」據云：其氣香，性溫，味甘微苦。入脾肝經，和血，行血，理氣，治風痺。又據性考云：其性溫，行血，破積，去癥瘕，浸酒，宜飲。

「禁忌」忌火。

「採製」夏月採含苞未放者，陰乾，備用。

知母

(百合科)

「學名」*Anemarrhena asphodeloides, Bge.*

「產地」多栽植於園圃之間。

「基本」為多年生草，葉細長，叢生。夏月花莖，高尺許，

頭圓淡紫花，成穗。質細小，莢內有三稜黑子。可採其根，供藥用之。

【功效】為解熱藥。

其氣味苦寒，無毒。能清肺，滋腎，去熱，瀉火。

治咳嗽，煩渴。

【用量】一·五——四·五服用。

【製劑】知母丁液 Tinctura Anemurthum aphloakolition.

此即以知母根二〇〇浸於稀酒精一〇〇〇中，經十日後，而濾過之，所得液體即是。一日三次，與以

二〇〇——四〇〇為解熱藥。

【禁忌】忌鐵。

【採製】二月，八月採根，暴乾。據云：上行，則浸酒焙乾

。下行，則浸鹽水焙乾。

【別稱】又名蓮母，貨母，地參，水參，苦心，兒草。

補米

(禾本科)

【學名】*Oryza sativa* L.

【產地】濕地及緩地之間，多產生之。

【基本】為一年生草，高四五尺，莖中空虛，有明瞭之節。

葉狹長，而尖，具平行脈，互生。開花甚小，結為

穎果(即穀)，內含種子，即為吾人所食之米，有時亦為藥用之。

【成分】含有蛋白質，脂肪，澱粉，糖分，灰分等。

【功效】其氣味甘溫，無毒。能溫中，益氣，養胃，和脾，

除濕，止洩。其稈主治反胃，燒灰淋汁，溫服，令

吐，蓋胃中有蟲，能殺之者也。

【學說】李時珍曰：此似稷而粒小，始自閩人，得種於占城

國，宋真宗遣使就閩取三萬斛，分給諸道為種，故

今各處皆有之。高仰處，俱可種。其熟最早，六七

月可收，品類亦多，有赤白二色，稈梗大同小異。

【別稱】又名占稻，早稻。

肥皂莢

(豆科)

【學名】*Gymnocladus chinensis* H. Hsu.

【基本】據李時珍云：肥皂莢，生高山中，其樹高大，葉如

椴，及皂莢葉。五六月開白花，結莢，長三四寸，

狀如雲實之莢，而肥厚多肉；內有黑子數顆，大如

指頭，不正圓。其色如漆，而甚堅，中有白仁，如

粟。煨熟，可食，亦可種之。十月採莢，煮熟，搗

爛，和白芨，及諸香作丸，溼身面，去垢而膩潤，

勝於皂莢也。其莢可採取之，而供藥用。

【功效】其氣味辛溫，微毒。能去風濕，瀉毒熱。治下痢便血，疔瘡腫毒。

【用量】四〇——一〇〇服用。

虎

【學名】*Felis tigris* L.

【產地】產於亞洲熱帶一帶，以至接近寒帶之地方。

【基本】此屬於食肉類之貓科，全身黃褐色，具黑色波紋。

雄者體長五六尺，體高三尺餘；雌者稍小，尾長殆三尺。面圓，耳亦圓，直立，性質與貓相近。每潛匿草叢中，頗難鑑別，故獵者不易捕得。吾國每剖其殘器，及筋骨，而供藥用。

【功效】其骨味辛，微熱，無毒。能健骨，止痛，去風，除邪，治傷寒，溫氣，濕痹，風痺，惡氣，驚悸，癩病，久痢，腹痛。其肉鹹平，無毒。治瘧疾，瘧氣，脾胃虛弱，惡心嘔吐。能辟邪，益氣。其血能壯神，強志。其胃能治反胃吐食。其腎能治癩癧。其膽能治小兒驚癇，小兒疳積，神驚不安。其爪能辟邪，殺鬼，治小兒惡魅。其牙能殺勞蟲，治犬咬傷。

發狂。療男子疽瘻，陰疔。

虎杖

(蓼科)

【學名】*Polygonum cuspidatum*, S. et Z.

【產地】多自生於山野之中。

【基本】為多年生草，高一二尺，至四五尺，葉闊，端尖，有淡黑斑，基部方，如刀切。夏日葉腋抽花軸，開淡紅小花，成穗，實三角形。其根可入藥用之。

【功效】為通經藥，及淋病藥。

其味甘，微溫，無毒。能通月經，除癰瘕，破留血，去骨間風，解熱毒，止乾渴。治產後血速，惡血不下，心腹脹滿。療疔瘡，排膿，驅毒。

【用量】二〇——六〇服用。

【採製】八月採根，水洗，曬乾，剉細，備用。

【學說】李時珍曰：其莖似紅蓼，其葉似似杏，其枝黃似柳，其花狀似菊，其色似桃花，合而觀之，未嘗不同也。

【別稱】又名苦杖，大蟲杖，斑杖，酸。

虎耳草

(虎耳草科)

【學名】*Saxifraga sarniifolia*, L.

〔產地〕生於山地，亦有自生於庭院之石間者。

〔基本〕為多年生之常綠草，高至一尺許，生長匍匐，枝似

線狀，赤紫色。葉為腎形，或圓心臟形，有剛毛，

下面帶有赤色。夏秋之間，自葉間生花莖，開小白

花，五瓣，大小不整。採其全草，供藥用之。

〔功效〕其氣味微苦，辛寒，小毒。治瘧疾，搗酒服。生用

，令人吐。熟用，止人吐。又治耳底子，可搗汁滴

之。療痔瘡腫痛，可令陰乾燒燻，以桶熏之。

〔學說〕李時珍曰：虎耳，生陰濕處，人亦栽於山石上，莖

高五六寸，有細毛，一莖一葉，如荷，蓋狀，人呼

為石荷葉，葉大如錢，狀似初生小莖葉，及虎之耳

形。夏開小花，為淡紅色。

〔別稱〕又名石荷葉。

虎掌天南星

(天南星科)

〔學名〕*Arisaema Thunbergii*, Bl.

〔產地〕多生於山野之中。

〔基本〕為多年生草，高二三尺許，葉為掌狀分裂，有長葉

柄。花與天南星相似；惟此植物之肉穗花序，上部

甚長，延成纖維狀，呈紫黑色。天南星之肉穗花序

，上部不延長，而有鏡頭，是其異色。其根，亦供藥用之。

〔功效〕其作用與天南星相同，可參考本條。

羌活

(繖形科)

〔學名〕*Artemisia polyvalaris*, Franch.

〔產地〕多自生於山野之中。

〔基本〕為越年生草，高六七尺，形似獨活。葉數回分岐，

為大形之羽狀複葉，葉背微白，莖葉無毛茸，莖帶

赤色。夏月開花，細小，白色。可採取其根，供藥

用之。

〔功效〕為鎮痛藥，可用於頭痛，及痛風等。

其氣味辛苦而溫，無毒。能發表，去濕。治一切風

氣，遊風，頭痛，目赤，中風不語，口面嚙斜，手

足不遂，筋骨掣拳，百節痠痛，肌膚不仁，週身作

癢，五勞七傷，產後諸風。並能搜肝風，瀉肝氣，

小無不入，大無不通，使風濕相搏。

〔用量〕一。五——四。五服用。

〔採製〕二月，八月採取，洗去土氣，對乾，焙用。

〔學說〕據蘇頌云：獨活，羌活，今出蜀漢者佳。春生苗，

葉如青麻。六月開花，作叢，或黃，或紫。結實時，葉黃者，是夾石上所生；葉青者，是土脈中所生。○本經云：「二物同一類，今人以紫色而節密者，為光活，黃色而作塊者，為獨活。而陶隱居言：獨活，色微白，形虛大，用與光活相似。今蜀中乃有大獨活，類桔梗而大，氣味亦不與光相類，用之微寒，而少效。今又有獨活，亦自西中來，類光活，微黃而極大，收時寸解，乾之，氣味亦芳烈，小類光活。又有槐葉氣者，今京下多用之，極效驗，意此為真者，而市人或擇光活之大者，為獨活，殊未為當。大抵此物有兩種，西蜀者，黃色，香如蜜。隴西者，紫色，秦隴人呼為山前獨活。古方但用獨活；今方既用獨活，而又用光活，茲為謬矣。而李時珍云：獨活，光活，乃一類二種，以中國者，為獨活；西羌者，為光活。蘇頌所說：頗明。

〔別稱〕又名獨活，光青，獨搖草，謾光使者，胡王使者，長生草。

芝

〔產地〕多寄生於已枯之樹木上。

〔基本〕為菌類植物之一種，體亦似菌狀，上面有黑褐色之雲紋，下面淡褐色，有細孔。其質堅硬光滑，昔時稱為瑞草，種類甚多，有青黃白黑等之不同，皆可供藥用之。

〔功效〕其青芝氣味酸平，無毒。能安魂，益氣，明目，補肝。其赤芝氣味苦平，無毒。能補中，益氣，解胸中結。其黃芝氣味甘平，無毒。能安神忠信，益脾氣。治心腹五邪。其黑芝氣味鹹平，無毒。能益腎，利水。其紫芝氣味甘溫，無毒。能保神，益精，堅筋骨，好顏色，治耳聾，利關節。

〔學說〕李時珍曰：芝類甚多，亦有花實者。本草惟以六芝標名，然其種類，不可不識。神農經：生山川，得雲雨，四時，五行，陰陽，晝夜之精，以生五色神芝。

芥菜

(十字花科)

〔學名〕*Brassica oleracea*, Linn.

〔產地〕田園及原野中，多栽植之。

〔基本〕為蔬類植物，乃一年生草，或越年生草，莖高四五尺，葉長六七寸，頗似油菜，而有缺刻；葉面常載

結，粗糲。秋末下種，冬時可食。春深開小黃花，結實成莢，子如粟粒。可採取之，而供藥用。

【成分】含有黏液質，酸性芥子油等。

【功效】近來多用其作爲芥子泥之黏劑等。

其氣味辛溫，無毒。能除腎經邪氣，利九竅，明目，止咳嗽，上氣，除冷氣，去頭風，通肺，豁痰，利膈，開胃。

【製劑】1. 芥子油

此即以芥子壓榨，而取出之油，作外用引赤藥。

2. 芥子泥

此即以芥子末，加以適量之水而製成。用一〇〇。

〇——三〇〇。〇爲黏布料。

【學說】李時珍曰：芥有數種，青芥又名刺芥，似白菘，有柔毛。有大芥，亦名皺葉芥，大葉皺紋，色尤深綠，味更辛辣，二芥宜入藥用。有馬芥，葉如青芥。有花芥，葉多缺刻，如蘿蔔英。有紫芥，莖葉皆紫，如蘇。有石芥，低小，皆以八九月下種。冬月食者，俗呼：臘菜。春月食者，俗呼：春菜。四月食者：謂之夏芥。芥心嫩齜，謂之芥藍漬，食脆美。

其花，三月間黃花，四出。莢長一二寸，子大如蘇子，而色紫，味辛。研末泡過，爲芥醬，以佐肉食，辛香，可愛。

芭蕉

(芭蕉科)

【學名】*Musa sapientum*, Linn.

【產地】庭園之間，多栽培之。

【基本】爲多年生植物，高八九尺，莖軟，重皮相裹。外青，裏白。葉最長大，中肋之兩側，有平行脈。三年以上着花，自葉心出花梗，花瓣大小不整，色淡黃，簇生於巨苞之腋間。實肉質，而長；非生於熱帶者，不熟。其莖葉果實，皆供藥用之。

【成分】含有琥珀酸，澱粉，蔗糖，果糖等。

【功效】爲利尿藥。可用於水腫，及腳氣等。

【用量】其根用五。〇——八。〇煎服。

芫花

(瑞香科)

【學名】*Daphne genkwa*, S. & Z.

【產地】多栽培於庭園中。

【基本】爲落葉灌木，莖高三四尺，葉卵圓形。春月先開管狀小紫花，節節密生，後乃發葉。可於春月採取花

毒，供藥用之。

【功效】為瀉下藥，有瀉水腫之效。又為祛痰藥。

其氣味苦溫，而有小毒。能去水氣，療癰，療五水
在五臟皮膚，脹滿喘急，痛引胸脇，咳嗽，療癰。

治上氣，去下氣，咽腫，腹脹。

【用量】一。五，——四。五服用。

【禁忌】反甘草。

【學說】名醫別錄曰：莖花，生淮源川谷，三月三日采花，

陰乾。

【別稱】又名杜若，赤芫，去水，毒魚，頭痛花，兒草，敗

華，根名黃大戟。

芫青

【學名】*Lytta vesicatoria*, Fabr.

【產地】原產於歐洲之南部。

【基本】此屬於甲翅類異節科，長約十五密迷，幅約六至八

密迷。頭為鈍三角形，胸略為四角形，甲翅有兩條

之縱線，全體呈顯明而有光澤之金綠色。其刺戟性

甚為劇烈，可研為粉末，供藥用之。

【成分】含有鴉容利質 $C_{10}H_{12}O_4$ 等之結晶。

【功效】為引赤藥。

其味辛微溫，有毒。治瘡氣，利小水，消癰癰，下

痰結。療耳聾，目翳，犬咬毒傷。其他功效，與斑

蝥相同。

【用量】一回〇。〇——〇。〇五服用。

【禁忌】與斑蝥相同。

【學說】蘇頌曰：處處有之，形似斑蝥，但色純青綠，背上

一道黃文，尖喙。三四月莖花發時乃生，多就莖花

上采之，暴乾。

【別稱】又名青娘子。

茵草

(禾本科)

【學名】*Ischaemum chinensis*, Horne.

【產地】生於水田，或池沼中。

【基本】為越年生草，苗似小麥而小，秆高尺許，斜登於水

面。子粒成熟，可供藥用。

【成分】含有脂肪，澱粉，灰分等。

【功效】其氣味甘寒，無毒。能去熱，利腸胃，益氣力。

【學說】據本草拾遺載：此草，生水田中，苗似小麥而小，

四月熟，可作飯。李時珍曰：此草，見爾雅皋守田

。新語云：亦名守氣，生廢田中，似麥，子如周胡，可食。

【別稱】又名守田，守氣。

芨芨

(芨科亦作柳葉草科)

【學名】*Trapa natans*, L. (*Trapa chinensis*, Tonk.)

【產地】多生於暖地之池沼中。

【基本】為一年生草，根生土中，水中莖，則長達水面。莖

及細裂之根狀葉，漂於水中。葉略作三角形，有鋸

齒；葉柄長浮於水面，中部膨大，為浮囊。夏月開

花，白色。其實，可採取之，為藥用。

【功效】其氣味甘平，無毒。能解暑，去熱，止渴，消酒。

治傷寒，積熱。

【別稱】又名菱，水栗，沙角。

花乳石

【基本】李時珍云：玉冊云：花乳石，陰石也。生代州山

谷中，有五色，可代丹砂服藥。蜀中汝山彭縣，亦

有之。

【功效】其味酸平澀，無毒。治金鎗出血，可刮末敷之，即

合，仍不作膿。又療婦人血運，惡血；並一切失血

，損傷。

芸香

(芸香科)

【學名】*Ruta graveolens*, L.

【產地】原產於歐羅巴，現山野及原野之間，皆有之。

【基本】為多年生之植物，莖高三尺許，葉互生，為複葉。

開花，呈黃綠色；可採其葉，供藥用之。

【成分】含有 *Joann Ruta* 之芳香揮發油。

【功效】為鎮痙藥，有驅風及通經之作用。

其氣味酸澀微甘，無毒。能止渴，殺蟲，治久痢。

【用量】○·八——三·二服用。

【採製】須在開花以前，採取其葉，陰乾，到用。

【學說】李時珍曰：芸盛多也。老子云：方物芸芸是也。此

物山野叢雜甚多，而花繁香馥，故名。

【別稱】又名山攀，柘花，春桂，七里香。

茨

(睡蓮科)

【學名】*Fairie faex*, Salik.

【產地】多生於水池之中。

【基本】為果類植物，乃一年生之水草，花莖及葉皆有刺，

葉大而圓，平貼水面；面青，背紫。夏日莖端開花

，結實如栗毬，莢實紫紫，可採取之，而供藥用。
【功效】爲強壯藥，可用於風濕作痛等。

其氣味甘平而澀，無毒。治濕痺，腰脊膝痛。能補中，益氣，強精神，聰耳目，開胃，助氣，止渴，益腎。溲小便不禁，遺精，白濁，帶下。

【用量】二〇——六〇服用。

【學說】李時珍曰：芙蓉，三月生葉，貼水，大於荷葉，皺紋如殼，感朔如沸。面青，背紫，莖葉皆有刺。其莖長丈餘，中有孔，有絲。嫩者，剝皮，可食。五六月生紫花，花開向日。結苞，外有青刺如蝟刺，及栗毬之形。花在苞頂，如雞喙，及蠅喙，剝開，內有斑紋軟肉，裹子紫紫，如珠璣，殼內白米，狀如魚目。深秋老時，澤農廣收。夾子，藏至困石，而似以備救荒。其根狀如三稜，煮食如芋。

【別稱】又名雞頭，鴻頭，雞雞，卵麥，水流黃。
迎春花
(素馨科亦作木犀科)

【學名】*Jasminum nudiflorum, Lindl.*

【產地】多栽培於庭院之間。

【基本】爲落葉小灌木，高至數尺，上部之莖，略似蔓狀；

嫩莖呈綠色，葉爲複葉，自三小葉而成，對生。春間開花，花單性，合瓣；花冠六裂，黃色，萼亦六裂，綠色。可採取其葉，供藥用之。

【功效】其味苦溫平，無毒。主治瘰癧，惡毒，可酒服之。

【用量】三〇——六〇頓服。爲粉劑，酒用之。

【學說】李時珍曰：處處人家栽培之，叢生，高者三三尺，方莖，厚葉；葉如初生小椒葉，而無齒。面青，背淡，對節生小枝，一枝三葉。正月初開小花，狀如瑞香花，黃色，不結實。

返魂香

【基本】據云：爲一種香木類植物。其形似楓柏樹，花葉皆香，採取其木煎汁，而後煉成膠狀，卽是。又據李時珍云：張華博物志云：武帝時，西域月氏國度弱水，貢此香三枚，大如燕卵，黑如桑椹。值長安大疫，西使請燒一枚辟之，宮中病者聞之卽起。香聞百里，數日不歇，疫死未三日者，魂之皆活，乃返生神藥也。此說雖涉譌怪，然理外之事，容或有之，未可便指爲謬也。

【功效】據海藥本草云：能辟瘴毒，殺疫氣，有起死回生之

可能。

金松

(松杉科)

〔學名〕 *Sceloporus ventralis* S. et N.

〔產地〕生於山地中，亦有栽培於庭園者。

〔基本〕為常綠喬木，葉線形而扁平，多數輪生。夏日開花

，單性。其所結成之果實，為球形果，可採之，而

為藥用。

〔功效〕據本草綱目云：專治腸風。

〔學說〕物理小識云：出台州，垂條，結子如碧珠，三年子

乃一熟。每歲生者，相續，瑣瑣其間。

金屑

〔基本〕產于金鑛之黃金，經人工鍊熟，成箔，或屑，其色

黃光，可用之。

〔功效〕近來有作丸藥之衣而用之者。

其氣味辛平，有毒。能安魂魄，鎮心肝，堅筋骨，

破冷氣，除邪氣。治傷寒，癩癩，風熱上氣，肺損

吐血，骨勞蒸熱，止渴，定嗽，皆以製薄，入丸散

服之。

〔別稱〕黃牙，太真。

金魚

〔學名〕 *Carrasius auratus*, L.

〔基本〕此屬硬骨類之淡水魚，即鮪之變種也。飼養之結果

，至生出多種變化，有體肥而短尾，亦有長尾者。

又頭生肉質之凸凹，如獅子頭者。又兩眼凸出，如

眼鏡者。其體色，有黑，白，紅等之雜斑。昔時有

用其肉，而為藥者。

〔功效〕其氣味甘鹹而平，無毒。能治久痢。

金蛇

〔基本〕據蘇頌云：金蛇，生賓州，澄州，大如中指，長尺

許。常登木飲露，體作金色，照日有光。白者，名

銀蛇，近皆少捕。信州上饒縣靈山鄉，出一種金星

地鱉，酷似此蛇。冬月收捕，亦能解毒。又據李時

珍云：按劉珣嶺表錄異云：金蛇，一名地鱉，白者

，名錫蛇，出黔州。出桂州者，次之。大如搗指，

長尺許，鱗甲上分金銀，解毒之功。據此則地鱉，

即金蛇，非二種矣。

〔功效〕其肉氣味鹹平，無毒。能解中金藥毒，令人肉作雞

腳裂，夜合銀至曉，變為金色者是也。取蛇四寸，

多黃，蔗汁，頻飲，以差爲度。銀蛇，解銀藥毒，

又解藥毒，止洩瀉，除邪熱，療久痢。

〔別稱〕又名金星地鱧。附銀蛇；又名錫蛇。

金橘

（芸香科亦作橙橘科）

〔學名〕*Chrys nobilis*, Lour. var. *nanoanapa*, Hance.

〔產地〕多栽培於暖地之庭園間。

〔基本〕爲常綠灌木，高至六七尺，葉卵形，或橢圓形，有

透明之小點。其葉柄之先端，有關節。夏月開花，

花瓣五片，呈白色。果實成熟時爲球形，帶黃色，

大如拇指頭，外有皮，多汁，多肉，可爲藥用之。

〔成分〕含有枸橼酸，果糖，及芳香性揮發油等。

〔功效〕爲清涼藥，有解熱，止渴之功。

其氣味酸甘而溫，無毒。能下氣，快膈，止渴，解

酒。

〔別稱〕又名金柑，給客橙。

金牙石

〔基本〕據李時珍云：崔昉本草云：金牙石，陽石也。生川

陝山中，似蜜菓子，有金點形者妙。聖濟經治厲風

大方中，用金牙石，銀牙石；銀牙，恐卽金牙石之

白色者。爾方書並無言及者，姑闕以誌之耳！

〔功效〕名醫別錄云：其氣味鹹平，無毒。主治鬼疰，毒蟲

，諸冷風氣，筋骨痠急，腰膝不遂，用燒酒浸服。

〔別稱〕又名黃牙石。

金星石

〔基本〕據蘇頌云：金星石，銀星石，並出漳州，并州，采

無時。二石主療，大體相似。寇氏云：二石治大風

疾，別有法，須燒用。金星石，生於蒼石內，外有

金色玃片，銀星石，有銀色玃片。又一種深青色，

堅潤，守有金色，如玃片者，不入藥用，工人碾爲

器，或婦人首飾用。又據李時珍云：金星有數種，

蘇頌所說：二石，武當山亦有之。或云：金星出膠

東，銀星出雁門，蓋亦礫石之類也。寇氏所說：二

石治大風者，今考聖惠方，大風門，皆作金星礫石

，銀星礫石，則似是礫石之類。丹方鑑源，礫石篇

中，亦載二石，名似，與蘇說者不同；且金星，銀

星，無毒，主熱凝血病。礫石則有毒，主風癩疾。

觀此則金星，銀星，入藥名有二種矣。又歙州礫石

，亦有金星，銀星者，瑯州亦出金星石，皆可作礫

也。青翠石，能屑金，亦名金星石，此皆名同物異也。劉河間宣明方，點眼藥方中，用金精石，銀精石，不知卽此金星，銀星否也？

【功效】其氣味甘寒，無毒。主治脾肺壅毒，及肺損吐血，嗽血。下熱涎，解衆毒。水磨少許服，鎮心神不寧，亦治骨硬。

金星草

（水龍骨科亦作羊齒科）

【學名】*Polypodium Inaeclatum, Thunb.*

【產地】多生於巖石之上。

【基本】爲常綠植物，根莖橫臥，有褐綠色之毛茸。葉生於根莖，長二三尺，不分裂，亦有分裂者。子囊羣着生於葉背，排列如星點，呈金黃色。其根可採取之，而供藥用。

【功效】其氣味苦寒，無毒。主治發背，瘰癧，結核。解黃丹石毒。能去熱，涼血，通五淋。取根，用油浸，塗頭，可能生毛髮。

【學說】寧禹錫曰：金星草，西南州郡多有之，以戎州者爲上。喜生背陰石上淨處，及竹菁中少日色處，或生大木下，及背陰古瓦屋上。初出深綠色，葉長二三

尺，至深冬，背生黃星點子，兩兩相對，色如金，因得金星之名。無花實，凌冬不凋。其根盤屈，如竹根而細，折之有筋，如猪馬鬃。五月和根采之，風乾用。

【別稱】又名金川草，鳳尾草，七星草。

金剛石 Diamond

【基本】此結晶屬等軸晶系，常爲八面體，及斜方十二面體，各面時爲彎曲形。多產於深成岩，結晶片岩，及沖積時代之砂礫中。其成分爲純粹之炭素，在養氣中燒之，則燃燒而發生炭酸氣。其質純者，爲無色透明體，有金剛光澤，甚艷美；然亦有呈綠，黃，紅，黑等色，昔時有用爲藥者。

【功效】據本草綱目云：解惡毒，辟邪氣，治湯火傷，可以磨水塗之。

【學說】李時珍曰：金剛石，出西番天竺諸國。葛洪抱朴子云：扶南出金剛，生水底石上，如鍾乳狀體，似紫石英，可以刻玉人，沒水取之，雖鐵錐擊之，亦不能傷。

【別稱】又名金剛鑽。

金雀花

(豆科)

〔學名〕 *Cytisus scoparius*, Link.

〔產地〕 原產於歐羅巴。

〔基本〕 爲常綠灌木，高至四五尺，嫩莖平滑，帶綠色。葉爲掌狀複葉，自二小葉而成。夏間開花，花冠蝶形，呈黃金色，果實爲莢。其根及花，皆供藥用之。

〔功效〕 其根性平，無毒。通血脈，消結毒，追風，活血，暖筋骨。治風痛，跌打損傷，可以搗汁，和酒服之；並以渣敷之。其花味同。能發痘瘡，治跌撲損傷，可取乾者，研碎酒服。

〔學說〕 百草鏡云：金雀花，生山土中，雨水時，開花，色黃而香，形酷似雀。白色者，名銀雀，最難得。其莖有白點，花後發葉，碎小；葉下有軟刺。取根入藥，去外黑皮及內骨用。別有霞雀花，更不可得。

金絲草

〔基本〕 據李時珍云：金絲草，出慶陽山谷，苗狀當歸，訪問？

〔功效〕 其氣味苦寒，無毒。主治吐血，咳血，衄血，下血，血崩，瘵氣。解諸藥毒，癩癰疽，疔腫，惡瘡，

能涼血，散熱。

金盞草

(菊科)

〔學名〕 *Calendula arvensis*, L.

〔產地〕 多自生於原野之間。

〔基本〕 爲一年生草，或二年生草，高至一尺餘，葉廣披針形，互生。其一年生者，在秋冬開花。二年生者，在春夏開花，呈赤黃色，爲頭狀花序。果實爲小乾果。有刺，多彎曲。其花可採取之，爲藥用。

〔功效〕 其氣味酸寒，無毒。主治腸痔，下血不止。

〔學說〕 蘇頌曰：香葉草，一名金盞草，生常州，蔓延離下。葉葉相對，秋後有子，如雞頭實。其中變生一小蟲，脫而能行，中夏采花。

〔別稱〕 又名香葉草，長春花。

金銀木

(忍冬科)

〔學名〕 *Lonicera Morrowii*, A. Gr.

〔產地〕 多自生於山野之中。

〔基本〕 爲落葉木本，莖高六七尺，葉爲卵形，對生。花作合瓣，花冠稍不整齊，常二花相集而生。花冠始則白色，後則變爲黃色。果實爲漿果，略與蒲蘆之形

相似。採取其木，供藥用之。

【功效】據救荒本草云：其氣味甘溫，無毒。治經絡濕熱，筋骨痠痛，為最效驗。

金蓮花

(金蓮花科)

【學名】*Tropaeolum Majus*, L.

【產地】原產於南美利加。

【基本】為一年生草，莖柔軟多肉，有蔓；惟匍匐於地上，又有纏繞於他物上者。葉圓形有淺缺刻，下面之中部，著以長葉柄，略與蓮葉相類似。夏月開花，自春至秋，亦常見之。花瓣五片，甚大，有黃赤色，鮮紅色。

【功效】其氣味苦寒，無毒。能解風療，去浮熱，益人，明目。治諸風，喉腫，牙宣，耳疼，目痛，口瘡。

【用量】一〇。〇——二〇。〇為茶劑服之。

金雞勒

(茜草科)

【學名】*Cinchona Succirubra*, Pav.

【產地】原產於熱帶之亞美利加。

【基本】為常綠木本，莖高七八十尺，葉卵形，或橢圓形，有光澤，對生。開小花，白色，合瓣；花冠筒狀。

其樹外皮，有赤色黃色之不同。通常取其赤色者，(日本名曰：規那皮。)為藥用之。

【成分】含有 Chinin et Chinidin $C_{20}H_{24}N_2O_2$ Cinchonin, et Cinchonidin $C_{16}H_{18}N_2O_2$ 之亞爾加魯乙度等。

【功效】昔時多用於麻拉里亞，今因析出之鹽基製劑，而代之，故僅用為苦味藥及收斂藥；間有用為防腐藥者，對於熱性病及赤痢等之回復期，與一切衰弱之善後，皆能應用。

【用量】一日數回，以其〇。三——〇。五——一。〇為粉劑，丸劑，煎劑等服用之。

【製劑】1 規那皮丁幾 *Tinctura Chinæ*.

此即以規那皮(即金雞勒皮)末一〇。〇稀酒精五〇

〇。〇浸製，而成澄明赤色之液體。其功效相同，一日數回，以一。〇——三。〇和與他劑等服用之。

2 複方規那皮丁幾 *Tinctura Chinæ Composita*.

此即以規那皮六。〇 橙皮二。〇 桂皮一。〇 龍胆一。〇 浸於酒精五〇。〇中，而製成之一種赤褐色芳香液體。其味較苦，可用為強壯健胃藥。一日數回，與以一。〇——五。〇服用之。

3 思那皮越幾斯 *Extractum Chinae*

此即以規那皮一〇・〇〇浸於稀酒精五〇・〇中，蒸溜而製成赤褐色乾燥之越幾斯，以代規那皮之應用。一日數回，與以〇・二——一〇爲粉劑，丸劑等服用之。

金櫻子

(薔薇科)

【學名】 *Rosa laevigata, Michx.*

【產地】庭園及寺院之間，皆有栽培之。

【基本】爲木本攀緣植物；其莖甚長，多刺，複葉，小葉三個，或五個，而有光澤。夏月開花，白色，或淡紅色，單瓣，或重瓣。枝有寄生之刺，萼筒呈壺狀，亦有刺。其根葉花子，皆供藥用之。

【成分】根似含有 $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ 之鹽基。

【功效】其根味酸澀平，無毒。能驅寸白蟲，須空心服用，而後更以瀉下藥服之，甚驗。其葉能治癩疽，可搗爛煎之。其花味酸澀平。能止冷熱痢，殺寸白蟲。其子氣味相同。治脾洩，下痢，能澀精，斂氣，固腸。

【用量】子以三・〇——九・〇服用。其根一日以三〇・〇

——五〇・〇服用。

【學說】李時珍曰：金櫻，當作金器，謂其子形如黃器也。石榴，雞頭，皆象形。又杜鵑花，小葉，並名山石榴，非一物也。

【別稱】又名刺梨子，山石榴，山雞頭子。

金瘡小草

(唇形科)

【學名】 *Ajuga reptans, A. Gr.*

【產地】生於山野之間。

【基本】爲一種雜草，莖長二三寸，布地生長，不能直立。葉有缺刻，呈深綠色，略帶紫色，對生。莖與葉，皆有毛。初夏開花，生於莖之頂端，及葉腋，爲唇形花冠，呈青紫色。其葉可採之，而供藥用。

【功效】其氣味甘平，無毒。能止血，生肌，治鼻衄，可搗其汁敷之，亦可煮汁服之。又治瘀血，下血，瘰癧。

長石 *Felspar*

【基本】爲地殼構成最要之岩石，屬單斜晶系，或三斜晶系，色白，有光。劈開完全，具有兩種方向，斷口介殼狀，或參差狀，在酸類中能溶解，吹管亦能溶之。

。經久風雨，則漸漸溶化，變成黏土矣。

「成分」含有石灰，加里，曹達，礬土等之含水矽酸化合物等。

「功效」可用爲石膏糊帶，以代附木之用。

其氣味辛苦而寒，無毒。治身熱，通血脈，止消渴，利小便，殺三蟲，解蠱毒。能明目，去翳，除胸肺，及肺間邪氣。

「學說」李時珍曰：長石，卽俗呼硬石膏者，狀似軟石膏，而塊不扁，性堅硬，潔白，有粗理，起齒稜，擊之則片片橫碎，光瑩如雲母。白石英，亦有峭壁，似方解石；但不作方塊爾！燒之，亦不粉爛，而易散，方解燒之，亦然；但其燒聲爲異爾！

「別稱」又名方石，直石，硬石膏。

長松

「基本」據李時珍云：長松，生古松下，根色如蒼茈，長三五寸。味甘，微苦，類人參，清香，可愛。其根可採取之，而供藥用。

「功效」其氣味甘溫，無毒。能溫中，益氣，去濕，解毒。治風血冷氣，宿疾。每取一兩，加甘草少許，水煎。

，服用。

阿膠 *Asses Gluc.*

「基本」吾國所用之阿膠，係山東東阿縣，以阿井水煎黑驢皮而製成之者，爲帶琥珀色透映之根狀片，並無臭味。其面上印有製造者之牌號，雖在炎熱之暑期，亦不變化，可爲藥用。

「成分」含有生膠組織之軟骨膠質等。

「功效」爲強壯藥，有滋養，潤補之功，故可用於虛脫者。其氣味甘平，無毒。治虛勞羸瘦，陰氣不足，腳酸不能久立。腰腹疼痛，四肢痠痛。能堅筋骨，益氣，止痛。療吐血，衄血，尿血，腸風下痢；女人血痛，血枯，經水不調，無子崩中，帶下，胎前產後諸疾，男女一切風病，骨節疼痛，水氣浮腫，肺痿，咳嗽，喘急，吐膿，咯血，及癰疽，腫毒。能和血，滋養，除風，潤燥，化痰，清肺，利小便，調大腸。

「用量」三〇——九〇。服用。

「禁忌」畏大黃。

「採製」取膠，剉炒成珠，或龜炒，蛤粉炒，化痰用。又以

蒲黃炒，出血用。

【學說】據李時珍曰：阿井在今山東兗州府，陽穀縣，東北

六十里，即古之東阿縣也。有官舍禁止之。酈道元

水經注曰：東阿有井，大如輪，深六七丈，歲常煮

膠，以貢天府者，即此也。其井乃濟水所注，取井

水煮膠，用攪濁水則清，故人服之，能下膈，疎痰

，止吐。

【別稱】又名傅致膠。

阿魏

(繖形科)

【學名】Ferula Scorodanina, B. et H.

【產地】原產於波斯，及北印度。

【基本】為多年生草，高二三尺，葉柄扁平，包莖有刻。葉

類胡蘿蔔，花小而黃，聚如繖形。截其根，流白汁

如乳，俟乾，刮取，經年凝集成塊，有臭味是也。

舊時云：有草木二種，草本者，出西域，苗葉根莖

似白芷，搗根汁曬之如膠。木本者，出南番。據蘇

頌云：今廣州亦有之者，八九尺，皮色青黃。三月

生葉，似鼠耳。其枝汁出如飴，久乃堅凝，亦名阿

魏。可採取之，而供藥用。

【成分】含有硫性揮發油，及樹脂之。Vol. Ferula C₁₀H₁₀O₄

Umbelliferon C₉H₈O₃ 等。

【功效】常用於慢性氣管加答兒等，更有用於月經閉止，痛

痛等。

其氣味辛平，無毒。能殺諸蟲，止臭氣，破癥積，

下惡氣，除邪鬼，去蠱毒。治風邪，鬼狂，心腹中

冷與疼痛，霍亂，瘧瘵，一切蠱毒。

【用量】一日數回，與以○。二——○。五為丸劑等，服用

之。

【製劑】1 阿魏丁凝。Tinctura assae foetida.

此即以阿魏粗末一。○酒精五。○，浸製而成澄明

之黃赤褐色液體。其應用相同，一日數回，以一。

○——三。○服用之。

【別稱】又名阿虞，惹渠，哈昔泥。

阿列布

(木犀科)

【學名】Olea europaea L.

【產地】原產於歐羅巴。

【基本】為常綠小灌木，或喬木，高至十五尺許，葉長橢圓

形，如披針狀，全邊，微尖，外面淡綠色，裏面灰

白色。夏秋之際，開花，白色，為總狀花序。果實長橢圓形，綠色，熟則青黑色，核堅細長內，含一種子。多取其油，為藥用之。

【成分】含有多量阿列布油等之成分。

【製劑】丁阿列布油 Oleum Olivae.

此即以阿列布之熟果內，壓榨而取之脂肪油也。其油色淡黃，無臭，無味。民間有為緩瀉藥者，一回五。〇——一五。〇；又有用於腐蝕性，及苛烈性物質之中毒，為解毒藥。至於近時，對於膽石病，有以其一五。〇——二〇。〇於數時間分服。其他即為注射料，軟膏料，及擦劑等。

阿月渾子

(漆樹科)

【學名】*Pithecellobium* I.

【基本】據陳藏器云：阿月渾子，生西國諸番，與胡榛子同樹，一歲胡榛子，二歲阿月渾子也。其仁可採取之，而供藥用。

【功效】其味辛，溫澀，無毒。主治諸痢，腰冷，腎虛。能

補中，益氣，強陽，去濕。

【別稱】又名胡榛子，無名子。

附子

(毛茛科)

【學名】*Aconitum Fischei*, Reiche.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為多年生草，莖高二三尺，根多肉，略似烏頭，故名烏頭。四圍附之而生者，稱為附子。葉互生，為掌狀分裂，有光澤。秋時開花，紫藍色，或白色。其狀如帽，質小而黑。根可入藥用之。

【成分】含有 $\text{Fajconitin, C}_{28}\text{H}_{36}\text{N}_2\text{O}_7$ 之成分。

【功效】為刺戟藥，可用於風痛，癱瘓，及瘡腫等。

其氣味辛溫(或甘熱)，而有大毒。能通行十二經絡，無微不至，逐風寒，開腠理，回陽，退陰，溫中，補虛，祛邪，辟鬼，暖脾胃，堅筋骨。治三陰傷寒，三陽厥逆，寒癱，瘧氣，中風，中寒，痰厥，頭痛，頭風，霍亂轉筋，風痺，拘攣，半身不遂，胃冷，嘔噦，眩暈，反胃，心腹冷痛，五臟沈寒，脫肛，疝痛，暴瀉，久痢，及婦女閉經，小兒慢驚；並療癰疽，疔瘡。

【用量】二日二。〇——六。〇——九。〇服用。

【製劑】丁附子丁 *Finatura Aconitum Fischei*.

此即以附子粗末五〇〇，浸於酒精五〇〇中，而製成液體。一日二〇——一〇〇服用，為風痛，痛痛之效藥。

【禁忌】惡蜈蚣。畏防風，黑豆，甘草，人參，黃耆。據李時珍曰：畏綠豆，烏韭，童溲，犀角。忌鼓汁。

【學說】李時珍曰：複種為烏頭，像烏之頭也。附烏而生者，為附子，如子附母也。烏頭，如芋魁；附子，如芋子，蓋一物也。別有草烏頭，白附子，故俗呼此為黑附子，川烏頭，以別之。諸家不分烏頭者，川草兩種，皆混雜注解，今悉正之。

【別稱】其母名曰：烏頭。

青玉 Sapphiric

【基本】為碧玉之青色透明者，甚為美麗，即俗稱之青寶石也。

【功效】據云：其氣味甘平，無毒。治婦人無子，久服輕身，不老延年。

【學說】李時珍曰：按格古論云：古玉，以青玉為上。其色淡青，而帶黃色。綠玉，深綠色者佳，淡者次之。翠玉，非青，非綠，如菜色，此玉之最低者。

青皮

(冬青科)

【學名】*Illex maeripoda* Miq.

【產地】生於山野中，而庭園亦有栽培之者。

【基本】為落葉喬木，高達三四十尺，樹皮灰白色，而帶綠色，故有此名。葉為廣卵形，邊緣有尖銳之鋸齒，多叢生於枝梢上。初夏葉腋簇生小花，帶白色。果實為球形，有凸頭，熟則呈紅色。取其果皮，供藥用之。

【成分】含有揮發性芳香油等。

【功效】為清涼藥，有解熱，止渴之效。

其味苦辛溫，無毒。治傷寒呃逆，久癆。瀉腸氣，疏肝膽，發汗，散痞，破滯，消痰。並治婦人乳腫，小兒食積，男子胸膈氣逆，氣滯，肝氣鬱積，小腸疝氣。

【用量】二〇——一六〇服用。

青魚

【學名】*Scomber japonicus* Temm. et Schl.

【產地】多產於淡水之中。

【基本】此屬硬鱗類之海魚也，體長筒狀，尾鱗小，分叉，

背部青綠色。其肉骨等，皆供藥用之。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。能補肝，逐水，益氣，去濕，可用非白煮食。其後頭骨，能平水氣，解蠱毒。其腦汁苦寒，無毒。治目暗，障翳，赤熱，腫痛。其乳汁，亦能點眼，明目。

青蒿

(菊科)

【學名】*Artemisia alba* Boerh.

【產地】多生於河岸，海邊，及水濕之地。

【基本】為一種就地叢生之植物，形似蘿蔔。春日抽莖，三四尺，梢上之葉，細裂如絲；葉腋出枝，枝有小頭狀花，列作穗狀，呈綠黃色。結實如大麻子，中含細子。其莖根子葉，皆可供藥，但以葉用之為多。

【功效】為解熱藥，可用於虛勞骨熱等。

其氣味苦寒，無毒。治骨蒸勞熱，產褥虛熱，風毒，熱毒，久瘧，疥癬，惡瘡。並能補中，益氣。其根莖子葉氣味，及功效相同；但不須合併用之。

【用量】三、〇——六、〇服用。

【學說】李時珍曰：青蒿，二月生苗，莖粗如指，而肥軟，

莖葉色並深青。其葉微似茵陳，而面背俱青。其根白硬，七八月間，開細花，頗香，結實大如麻子，中有細子。

【別稱】又名方濱，香蒿。

青黛

Indigo.

【基本】為藍藻葉，曬乾揉軟，加以適量之水，令其起醱酵作用，經過數週後，更加以少許之水，盡力搗爛之，而後捏成團塊。又將其破碎之，和木炭，麩末，石灰同納甕中。再加以溫水攪拌，且令其微溫，經一二週後，亦令其醱酵，遂得藍色之汁。又將其汁攪動，有氣沫甚多，可取之使其乾燥成塊，以供藥用之。

【成分】含有藍素 Indigothm $C_{12}H_{10}N_2O_2$ 及蛋白質，膠質，無機質等。

【功效】為清涼藥，可用於小兒驚癇，咬傷；又常用為外科之療瘡藥。

其氣味鹹寒，無毒。解諸藥毒，治小兒諸熱，驚癇。能瀉肝，散鬱，解熱，去煩，消食，破積。療陰瘡，惡毒，天行時疫，頭痛寒熱。

「用量」：○—三·○服用。

「學說」李時珍曰：波斯青黛，亦是外國藍靛花，既不可得，則中國靛花，亦可用，或不得已，用青布浸汁代之，貨者復以乾靛充之。

「別稱」又名靛花，青蛤粉。

青黛

「基本」爲堇類(Columbine)之一種。據李時珍云：堇有白堇，紫堇。今夏月出一種雜堇，微帶紅色，小而成羣。掌禹錫所謂：黃芩侯，秋化斑雀，恐卽此也。好食桑椹，及半夏苗等。

「功效」民間有取其肉食，以療瘰癧等。

其氣味甘平，無毒。能補虛，助氣，排膿，活血。治一切瘡癤，癰癧等。

「別稱」又名黃芩侯。

青琅玕

「基本」據李時珍云：按許慎說文云：是石之似玉者。孔安國云：石之似珠者。總龜云：生南海石崖間，狀如筍，質似玉。玉冊云：生南海崖石內，自然成陰陽之氣而成，似珠而赤。列子云：蓬萊之山，朱干之

樹叢生。據諸說：則此石生于西北山中，及海崖間。

○其云：生于海底網取者，是珊瑚，非此石也。在山爲是石，在水爲珊瑚；珊瑚亦有碧色者。今回回地方出一種青珠，與碧靛相似，恐是此所作者也。

「功效」其味辛平，無毒。能破血，治身瘰，石淋，婦人產後惡血。療手足逆腫，火瘡，癰癧。

「別稱」又名石珠，青珠。

青箱子

(葯科)

「學名」Cochin argentea, L.

「產地」生於野地，亦有栽種於庭園者。

「基本」爲一年生草，與雞冠同類異種。莖高一二尺，與葉皆紅。花實絕類雞冠；惟花穗尖長，約高四五寸，亦有紅黃白等色。其莖葉及子，皆供藥用之。

「功效」民間多爲眼科藥而用之。

其莖葉氣味，苦而微寒，無毒。去皮膚中風熱，風癢，殺三蟲，辟邪氣。用以搗汁服之，能治大瘧。其子氣味相同，能明目，增腦髓，堅筋骨，去風寒濕痺。治眼赤，障翳，盲翳，及惡腫。

「用量」子用以一·五——七·五服用。

【學說】李時珍曰：青葙，生田野間，嫩苗，似莧，可食。

長則高三四尺，苗葉花質，與雞冠花一樣無別；但雞冠花穗，或有大而扁，或圓者。此則稍間出花穗

，尖長四五寸，狀如鬼尾，水紅色，亦有黃白色者

，子在穗中，與雞冠子，及莧子一樣。

【別稱】又名草蒿，崑崙草，野雞冠，雞冠莧，子名：草決明。

青蒿蠹蟲

【基本】據李時珍云：此青蒿間蟲也。狀如小蠶，久則亦成蛾也。

【功效】據云：主治小兒急慢驚風，用蟲搗爛，和硃砂，水銀粉各五分，作為粟粒大丸，一歲一丸用乳服之。

青鹽陳皮

【基本】據百草鏡云：製青鹽陳皮，即蘇州宋公祠之遺法也

○陳皮二觔，河水浸一日，竹刀輕刮，去渣白，貯竹篋內，沸湯淋三四次，用冷水洗淨，不苦為度

，晒至半乾，可得淨皮一觔。初次用甘草，烏梅肉各四兩，煎濃汁拌晒，夜露，俟酥捺碎，如大豆，再用川貝母，心去四兩，青鹽三兩，研為細末，拌

均，晒露，乾收，貯用。

【功效】其氣味，與陳皮相同。能消痰，降氣，生津，開鬱，運脾，調胃，解毒，安神。

第九畫

刺賢堦爾

(唇形科)

【學名】*Taraxidula vert. D. C.*

【產地】多生於地中海之地方的沿岸。

【基本】為常綠小灌木，葉狹，披針形，對生。開花青色，

甚小，集為穗狀；花冠唇形。可採蒸取油，供藥用之。

【成分】含有 *Oil Taraxidula* 之成分。

【功效】昔時有用於傷風質斯等，今每以其製劑而代之；但應用亦少，不過為一芳香料耳！

前胡

(繖形科)

【學名】*Panacolum decurivum, Maxim. Angelica decuriva*

Miq.

【產地】多自生於山野之間。

【基本】為多年生草，莖高四五尺，葉分裂，為羽狀葉，腳略闊，圍抱莖。秋月開小花，為複繖形花序。其

根外面色污黑，內部白色，質柔，氣香，可採取之，而供藥用。

【功效】為祛痰藥。

其氣味苦而微寒，無毒。能益精，明目，開胃，下氣，化痰熱，散風邪，消宿食，通五臟，清肺熱。並治傷寒，實熱，霍亂轉筋，氣喘，上氣，咳嗽，反胃，嘔逆，癩結，心腹結氣，骨間煩熱，小兒疳氣。

【用量】二·五——八·〇服用。

【製劑】1.前胡丁幾 Tinctura Radix Angelicae anomala.

此即以前胡根五。〇酒精一〇。〇浸製而成之一種液體，為祛痰藥，一日數回，與以二·〇——四。〇服用之。

【禁忌】忌皂莢。畏葶藶。

【採製】取根，削去皮頭，洗去泥土，剉焙用之，或浸於竹漚，焙乾用之。

【學說】李時珍曰：前胡有數種，惟以苗高一尺，色似斜蒿，葉如野菊，而細瘦，嫩時，可食。秋月開雜白色類紫點子花。

【別稱】又名全胡，血蔘，射香葉。

厚朴

(木蘭科)

【學名】Magnolia hypoleuca, S. et Z.

【產地】多自生於山谷中。

【基本】為落葉喬木，高四五丈，葉作倒卵形，而長，互生。初夏開花，甚大，九瓣，呈淡黃色。其皮花，皆供藥用；皮以厚而色紫者，為佳。

【成分】似含有 Anemolisin 之揮發性芳香結晶，

【功效】為健胃藥，又可用於虎列拉之搖擧，日射病，及嘔吐，與下痢；並能緩解腹痛等。

其皮氣味苦溫，無毒。主治中風，傷寒，頭痛寒熱，驚悸。能溫中，益氣，消痰，下氣。療霍亂，腹痛，脹滿，胃冷，嘔吐，瀉痢。除煩，去熱，健脾，利胃，破宿食，消宿食，並能止咳，去喘，肺氣脹滿，婦人產前產後臍膈不安。殺腸蟲，明耳目。

【用量】二·〇——八·〇服用。

【禁忌】忌澤瀉，硝石，寒水石，黑豆。

【學說】李時珍曰：朴樹，膚白，肉紫，葉如檉葉。五六月開細花，結實如冬青子，生青，熟赤，有核。七八

月采之，味甘美，用酥四兩炙，熟用。若入湯飲，用自然薑汁八兩，炙盡爲度。

〔別稱〕又名葱朴，赤朴，厚皮，重皮。樹名樸；子名：遂折。

南瓜

(葫蘆科)

〔學名〕*Cucurbita pepo* L.

〔產地〕多栽種於田園之間。

〔基本〕爲一年生攀登植物，莖蔓性，有卷鬚，葉呈圓心臟形，有五深裂。夏月葉腋開合瓣單性花，黃色，頗大，花後，結果，可爲藥用之。

〔功效〕其氣味甘溫，無毒。能補中，益氣。

〔學說〕李時珍曰：南瓜種，出南番，轉入閩浙；今燕京諸處，亦有之矣。二月下種，宜沙沃地。四月生苗，引蔓甚繁，一蔓可延十餘丈，節節有根，近地即着。其莖中空，其葉狀如蜀葵，而大如荷葉。八九月開黃花，如西瓜花，結瓜正圓，大如西瓜，皮上有稜如甜瓜，一本可結數十顆。其色或綠，或黃，或紅。經霜收置暖處，可留至春。其子，如冬瓜子。其肉厚色黃，不可生食；惟去皮瓢瀹食，味如山藥。

。同豬肉煮食，更佳。

南燭

(小蘗科)

〔學名〕*Nandina domestica* Thunb.

〔產地〕多栽培於庭園之中。

〔基本〕爲常綠灌木，由數多小葉而成複葉，互生；小葉呈披針形。初夏開花，白色，甚小，爲圓錐花序。果實爲小球形，熟則呈赤紅色。其枝葉及子，皆供藥用之。

〔功效〕爲強壯藥。

其枝葉氣味苦平(或酸澀)，無毒。能止瀉，消腫，強筋，益氣。其子氣味酸平而甘，無毒。能強筋骨，益氣力，固精，駐顏。

〔用量〕三。〇——九。〇——一二。〇服用。

〔學說〕李時珍曰：南燭，吳楚山中甚多，葉似山檉光滑，而味酸澀，七月開小白花，結實如朴樹子，成簇，生青，九月熟，則子包內有細子。其味甘酸，小兒食之。按古今詩語云：卽楊桐也。葉似冬青而小，臨水生者，尤茂。寒食採其葉，漬水染飯，色青，而光，能資陽氣。

【別稱】又名兩天燭，兩燭草木，男續，染菽，猴菽草，草木之王，惟那木，牛筋，烏飯草，墨飯草，楊桐，赤者名：文燭。

南藤

【基本】據蘇頌云：南藤，即丁公藤也。生南山山谷，今泉州，榮州有之。生依南，木莖，如馬鞭，有節，紫褐色。葉如杏葉而尖，采無時。又曰：天台石南藤，四時不凋。土人採葉，治腰痛。又李時珍云：今江南，湖南諸大山有之，細藤圓膩，紫綠色，一莖一葉，葉深綠色，似杏葉而微短厚。其莖貼樹處，有小紫瘡疔，中有小孔，四時不凋。莖葉皆臭，而極辣，白花蛇食其葉。其莖葉，皆供藥用之。

【功效】其氣味辛溫，無毒。治風血，上氣，咳嗽。除痺，強腰脚，補衰老，起陽，排風邪，逐冷氣。

【別稱】又名石南藤，丁公藤，丁公寄，丁父，風藤。

威靈仙

(玄參科)

【學名】*Veronica Virginica, L.*

【產地】多自生於山野之中。

【基本】為多年生草，莖高三四尺，葉作闊箭鏃形，輪生。

夏開合瓣花，紫藍色，為長總狀花序。其根每年旁引一根，並數數百條，乾則深黑，俗名鐵脚威靈仙。可採取之，而供藥用。

【功效】為鎮痛藥，又為利尿藥，通經藥。

其氣味苦溫，無毒。能行氣，祛風，通五臟，散皮膚大腸風邪。治中風，黃疸，頭痛，風濕，嗜睡，久積，冷痛。大小腸閉，腎臟風壅，膀胱宿脹。

【用量】一·五——一〇〇服用。

【禁忌】忌火。

【採製】採根，去蘆頭，到用。

【學說】李時珍曰：其根每年旁引，年深轉茂，一根叢數百條，長者二尺許，初時黃黑色，乾則深黑，俗稱鐵脚威靈仙，以此別有數種，根鬚一樣；但色或黃，或白，皆不可用。

垣衣 [lichenbody]

【基本】為隱花植物，由菌類，藻類共生結合，而藻類在內部，從菌絲吸收水分，菌類在外部，從藻類之同化物質，攝取養料。生於土，或他物上，有木狀，草狀，莖狀，葉狀之不同，統為苔類，亦名苔衣。生於

石者，曰：石脂；生於瓦者，曰：屋遊；生於牆者，曰：垣衣；生於地土者，曰：地衣。○生於水者，曰：陟釐，共五類。生於石者，曰：鳥韭；生於屋者，曰：瓦松；生於牆者，曰：土馬騾，生於山者，曰：卷柏；生於水者，曰：蘊也。垣衣，亦為其一種，可為藥用之。

【成分】含有地衣酸等之成分。

【功效】其氣味酸冷，無毒。治咳嗽，吐血，可以搗汁服之。

○又治暴風口疳，腸胃暴熱，心煩，黃疸。並療金瘡；湯火傷，可燒灰和油敷之。

【學說】名醫別錄曰：垣衣，生古垣墻陰，或屋上。三月三

日采，乾陰。李時珍曰：此乃磚墻城垣上，苔衣也

○生瓦屋上者，即名為屋遊。

【別稱】又名垣羸，天韭，鼠韭，昔耶。

括矢亞

(黃棟樹科)

【學名】*Quercus acutata*, L.

【產地】原產於印度之西部。

【基本】為常綠樹木，高至二十尺許，葉為羽狀複葉。其總

葉柄，有刺，花呈赤色，為繖狀花序。此植物之材

，稱為括矢亞木，供藥用之。

【成分】含有 $Quercetin\ C_{10}H_{12}O_3$ 之中性結晶，及苦味質。

【功效】為苦味健胃藥，對於消化不良等，皆可應用；但多與其他配伍，而服用之。

【用量】二·〇——五·〇為浸劑等服用。

【製劑】1 括矢亞丁酸 *Tricetate Quercetin*

此即以括矢亞木一·〇，浸於稀酒精五·〇而製成之，一日數回，以一·〇——一·五為健胃藥。

2 括矢亞越幾斯 *Extractum Quercinae*

此即以括矢亞木浸於水中，而製成乾燥之越幾斯也

○一日數回，以一·〇——一·五為水劑，九劑服用之。

扁青

【基本】據蘇頌云：此即綠青也。朱崖已南，及林邑扶南船

上來者，形塊大如拳；其色又青，腹中亦有空者

○武昌者，片塊小，而色更佳。簡州，梓州，形扁

作片，而色淺。李時珍云：蘇頌言：即綠青者，非

也。今之石青，是矣。繪畫家用之，其色青翠不淪

，俗呼為大青，宛蜀諸處，亦有之；而今貨石青者

，有天青，大青。西夷回回青，佛頭青，種種不同；而回回青尤貴。本草所載之扁青，屠青，碧青，白青等，皆其類耳。

〔功效〕其氣味甘平，無毒。治目痛，折跌，瘰癧，金瘡。能破積聚，解毒氣，利精神，明目。去寒熱，風痺，百病。

〔別稱〕又名石青，大青。

毗梨勒

〔基本〕據森恭云：毗梨勒，出西域，及南海諸國，嶺南交愛等州。戎人謂之三果樹，似胡桃，子形亦似胡桃，核似阿梨勒，而圓短，無稜，用亦同法。番人以此作漿，甚熱。

〔功效〕其實氣味苦寒，無毒。能暖腸腹，去一切冷氣。治風虛，熱氣，瀉痢，下氣；並可作漿，染髮。

〔別稱〕又名三果。

昨葉何草

(景天科)

〔學名〕*Calypsohon japonica*, Maxim.

〔基本〕爲石花之植物，葉多肉，多汁，長橢圓狀之線形，而有尖頭，下部之葉密生，呈覆瓦狀。夏月自葉心

抽莖，高四五寸，開白色小花，作穗狀花瓣，互相結合。可取其全草，供藥用之。

〔功效〕其氣味酸平，無毒。主治口中乾痛，血竅，血痢。並能止血，行女子經絡；又爲生眉髮之要藥。用於

大腸下血，可取燒灰，服用一錢；又塗諸瘡不斂。

〔學說〕蘇恭曰：昨葉何草，生上黨屋上，如蓬，初生高尺餘，遠望如松栽。

〔別稱〕又名瓦松，瓦花，向天草，赤者名：鐵腳婆羅門草，天王鐵塔草。

昭參

〔基本〕據云：卽人參三七也，形似人參，肉厚而明潤，中油。產於雲南昭通，故名昭參，可取爲藥用。

〔成分〕含有苦味質，及糖分，澱粉等。

〔功效〕爲健胃藥，可用於胃衰弱，及病後之衰弱等。

其氣味微苦而甘，無毒。能補血，生津。治虛勞，衰弱，可以同雞肉煮食；但以老人爲最宜。

〔用量〕二〇——八〇。爲浸劑，煎劑服用之。

〔學說〕劉仲旭少府云：昭通出一種，名蘇家三七，儼如人參，明潤，紅熟。壯少者，服之，作脹；惟六十以

外人服，則不服服。

枳

(芸香科)

〔學名〕 *Citrus bignonioides*, DuRoi.

〔產地〕多產於溫帶之各地。

〔基本〕為常綠喬木，高約丈餘，葉為卵形，互生，有透明之點，葉柄具翼。初夏開花，白色，秋間實熟。初採者，為枳實，皮厚而中實；晚採者，為枳殼，皮薄而中虛，皆供藥用之。

〔功效〕為苦味健胃藥，有催進食慾及消化之功。

其質氣味苦寒，無毒。能消食，破結，瀉下，行痰，散敗血，逐水腫，安胃氣，利五臟。治傷寒結胸，上氣喘咳，皮膚癢疹，婦人陰腫，卒胸痺痛，胸脇痰痺，小兒五疳。其殼氣味苦酸微寒，無毒。能健脾，開胃，消痰，化食，除風，下氣，通關節，利五臟。治霍亂，風痛，水腫，麻痺，吐逆，反胃，心腹氣結，腸風，下痢，淋閉，痔腫，風疹，惡瘡等。

〔用量〕實用一〇——五。〇服之。殼用二〇——八。〇服之。

〔採製〕取實，去蘊核，以小麥麸炒，少焦，去麸用之。
〔別稱〕又名枳實，枳殼。

枳椇

(鼠李科)

〔學名〕 *Eurotia tatarica*, Thunb.

〔產地〕生於山野之中。

〔基本〕為落葉喬木，高至數十尺，葉卵形，有三大脈，互生。夏間枝梢分枝，開花，花小，白色。果實圓形，而小，有柄，肉質呈紫褐色，屈曲而肥大。其子皮等，皆供藥用之。

〔功效〕其子氣味甘平，無毒。能解酒，止渴，除煩，潤五臟。治頭風，醫熱，嘔逆，小腹痛急，利大小便，辟毒，殺蟲。其木皮甘溫，無毒。能和五臟，治五疳。

〔學說〕李時珍曰：木高三四丈，葉圓大，如桑柘。夏月開花，枝頭結實，如雞爪形，長約寸許，紐曲開作二三歧盡，儼若雞之足距。嫩時青色，經霜乃黃，嚼之味甘，如蜜。每開歧盡處，結一二小子，狀如薔荊子，內有扁核，赤色，如酸棗仁形，飛鳥喜巢其上。

〔別稱〕又名蜜扇律，木蜜，木珊瑚，鷄距子，鷄瓜子。木

名：白石木，金鈎木。

枸杞

(茄科)

〔學名〕*Lycium chinense*, Mill.

〔產地〕山野及田野，皆有產生之。

〔基本〕爲落葉小灌木，高至三四尺餘，葉爲長橢圓形，互生。春月葉腋開小花，花冠淡紫。實卵形而尖，色紅，入藥用之；而葉亦有用之者。

〔功效〕爲強壯藥。

其子氣味苦寒(或甘平)，無毒。能明目，安神，益精，強陰，清肝，調腎。治五勞七傷，陰虛目赤生翳，可搗汁點眼。又治消渴，消中，咳嗽，吐血，心痛，腰痛。其葉甘苦而涼，無毒。能除百病，清上焦熱，治消渴，癆毒瘡。

〔用量〕子，用二〇——六〇；葉，用三〇——八〇。服之。

〔採製〕浸酒一宿，搗爛夾用。

〔學說〕李時珍曰：古者枸杞地骨取常山者，爲上；其他即陝阪岸者，皆可用。後世惟取陝西者良；而又以甘

州者，爲極品。今陝之蘭州，靈州，九原以西，枸杞並是大樹，其葉厚，根粗；河西，及甘州者，其子圓如櫻桃，暴乾，緊小，少核，乾亦紅潤，甘美，味如葡萄，可作果食。

〔別稱〕又名枸櫞，枸杞，甜菜，天精，地骨，地節，地仙，却老，羊乳，仙人掌，西王母杖。

枸骨

(木犀科亦作柃骨科)

〔學名〕*Ornithoglossum aquifolium*, L. et H.

〔產地〕生于暖地之山林。

〔基本〕爲常綠喬木，高至十尺餘，葉對生，卵形，有針狀銳鋸齒，質厚，有光澤。秋冬之際，開花，花小，白色；花後結實，呈長橢圓形，熟則紫碧色。其枝葉木皮，皆供藥用之。

〔成分〕含多量澱粉，樹脂，黏液質等。

〔功效〕其枝氣味微苦而涼，無毒。能安五臟，養精神，堅筋骨，除百病，祛痰，活血，散瘀，補中，填髓，固斂精血，治白癩瘋。其葉氣味，與枝相同。能生津，止渴。其木皮氣味亦同。能滋陰，益肝，補腎，助腰脚，令人健步，可用酒浸服之。

【用量】按用三。〇——一。〇。〇服之。

【學說】李時珍曰：枸骨樹，如女貞子，肌理甚白，葉長二

三寸；青翠而厚硬，有五刺稜角，四時不凋。五月

開細白花，結實如女貞，及菴蓰子。九月熟時，絳

紅，皮薄，味甘，核有四瓣。人采其木皮煎膏，以

黏鳥，謂之黏構。

【別稱】又名貓兒刺。

枸橘

（芸香科亦作橙橘科）

【學名】*Aegle marmelos*, D. C.

【產地】多栽培於庭園之中。

【基本】為一種灌木，高至丈許，常帶綠色，多枝。葉為掌

狀樹葉，自三小葉而成。春夏之際，枝梢開花，花

瓣五片，呈白色。果實球形，黃色，味苦酸，不可

食。其葉枝等，常供藥用之。

【成分】含有林檢酸，揮發油等。

【功效】其葉氣味辛溫，無毒。主治痢疾，下膿，下血，寒

急後重，同草薢炒存性，研末，取二錢服之。又治

瘧疾，消腫導毒。其枝主治中風強直，不得屈伸，

浸酒服之。其橘核治腸風下血，同櫻根白皮等分，

炒過，加糖，每服一錢，皂莢湯調服。其實氣味辛
溫。能解酒毒，治胃脘結痛，疝氣。

【用量】葉用一。〇——三。〇服之。

【學說】李時珍曰：枸橘處處有之，樹葉並與橘同；但幹多

刺。二月開白花，青蕊，不香。結實，大如彈丸，

形如枳實，而殼薄，不香。人家多收種，為蠲腫，

亦或收小實，偽充枳實，及青橘售之，不可不辨。

【別稱】又名臭橘。

枸櫞

（橙橘科）

【學名】*Citrus medica*, L.

【產地】產於亞細亞之暖帶各地。

【基本】為常綠亞喬木，枝間有長刺，葉倒卵形，微有鋸齒

，葉柄無翼。結實圓形，徑三四寸，皮厚，色黃。

其根葉及實，雖供藥用；但以實為最通常。

【成分】含有枸橼酸，及其芳香性揮發油，果糖等。

【功效】其實氣味辛酸，無毒。能理氣，止嘔，健脾，進食

，下氣。治欬嗽，痰氣，可煮酒服。心下氣痛，可

煎湯服。其根葉氣味，及功效相同。

【用量】實用二。〇——六。〇服之。

【學說】李時珍曰：枸櫞，產園廣間，木似朱槿，而葉尖長

。枝間有刺，植之近水乃生。其質狀如人手，有指

，俗呼爲佛手柑，有長一尺四五寸者，皮如橙柚而

厚，皺而光澤。其色如瓜，生綠，熟黃。其核細；

其味不甚佳，而清香襲人。

【別稱】又名香櫞，佛手柑。

枸杞蟲

【基本】極陳藏器云：此蟲生枸杞上，食枸杞葉，狀如蠶，

作繭，爲蛹時，取之，曝乾，收用。李時珍云：此

蟲雅所謂：狀如蠶，亦有五色者，老則作繭，化蛾

，孕子。諸草木上，皆有之，亦各隨所產草木之性

爲異耳！

【功效】其氣味鹹溫，無毒。能益陽道，令人悅澤，有子。

柔黃，和地黃末爲丸，服之，能起陽益精。治腎家

風虛。

【別稱】又名蠶。

柏

(松柏科)

【學名】*Thuja orientalis*, L.

【產地】多生於山地；而庭院及園圃間，亦有栽植之者。

【基本】爲常綠喬木，高者丈餘，柏類最普通者，葉小如鱗

，與莖密接，全可舒放。花單性，雌雄同株，結實

如毬，質理緻密。其實，即柏子仁，可供藥用之。

【成分】含有柏子仁油，及的列並油等。

【功效】爲強壯藥，有滋養之可能。

其實氣味甘平，無毒。能益氣，養心，除風濕，安

五臟，潤皮膚，聰耳目，止驚悸，去百邪。治頭風

，腰腎中冷，小兒驚癇。其葉氣味苦而微溫，無毒

。能治吐血，衄血，血痢，血崩。赤白帶下。療湯

火灼傷，能止痛，生肌。其根白皮苦平，無毒。治

火灼爛瘡，能令生毛髮。

【用量】子仁用二〇——六〇——一〇〇服之。

【禁忌】畏菊花，羊蹄草。

【採製】取實，蒸熟，曬乾，去殼，炒過，備用。

【學說】李時珍曰：史記言：松柏爲百木之長，其樹聳直，

其皮薄，其肌膩，其花細瑣，其實成球，狀如小鈴

，霜後四裂，中有數子，大如麥粒，芬香可愛。柏

葉，松身者，檜也；其葉尖硬，亦謂之栝。今人名

圓柏，以別側柏。松葉，柏身者，縱也。松檜相半

者，檜柏也。峨眉山中，一種竹葉柏身者，今謂之竹柏也。

【別稱】又名檜，側柏。

柑

(芸香科)

【學名】*Citrus Nobilis*, Lour.

【產地】產於亞細亞之東南部，而庭園間多栽培之。

【基本】為常綠喬木，高至十尺餘，葉長卵形，互生；葉柄之上端，有節。初夏開花，五瓣，色白，花後結果

。其實及其皮，核，與葉，皆供藥用之。

【成分】含有枸橼酸，芳香性揮發油，果糖等。

【功效】為清涼藥，及健胃藥。

其實氣味甘而大寒，無毒。能止暴瀉，利腸胃，除熱毒，解丹石毒。治小便利，婦人難產，可燒存性，研末，酒服。其實皮氣味辛甘而寒，無毒。能下氣，調中，治傷寒，飲食勞復，可澆煎服用。又治酒痛，婦人產後肌浮，可研末酒服。其核，可為塗面藥。其葉治耳內流膿，流水，可搗汁點之。

【學說】李時珍曰：柑，南方之果也；而閩廣溫臺蘇撫荊州，為盛；川蜀雖有，不及之。其樹無異於橘，但刺

少耳！柑皮，比橘色黃，而稍厚，理稍粗，而味不苦。橘可久留，柑易腐敗；柑樹畏冰雪，而橘樹略能耐，此柑橘之異也。柑橘皮，今人多混用，不可不辨之。

【別稱】又名木奴。

柏木

【基本】為落葉灌木，幹疏而直，木裏有紋。葉厚而尖，稍硬。質如桑椹，而圓。其樹皮煎汁，可以染黃。每選其東行樹根之木白皮，而供藥用之。

【功效】其氣味甘溫，無毒。治婦人崩中，血結，瘧疾。能

補虛勞，暖腰腎，止夢遺，澀精。

【學說】李時珍曰：處處山中有之，喜叢生，幹疎而直，葉豐而厚，圓而有尖。其葉飼蠶，取絲，作琴，瑟，清響勝常。

柚

(芸香科亦作橙橘科)

【學名】*Citrus Madia*, L. var. *achin*, Hook.

【產地】多栽培於庭園之中。

【基本】為常綠喬木，高至十尺餘，葉長卵形，互生。葉柄有刺，上端生節。初夏開花，花瓣五片，白色。果

實爲漿果，呈扁圓形，熟時大如兒頭，爲鮮黃色，

多肉，多汁。其實及其皮，與花葉，皆供藥用之。

【功效】其實氣味酸寒，無毒。能消食，解酒。治腸胃惡氣

，口中酒臭，姪婦口淡，不思飲食。其實皮甘辛而

平，無毒。能利胸膈，散積氣，消食，化痰。其花

能潤面，長髮。其葉能治頭風，可和葱白搗爛，貼

太陽處。

【學說】李時珍曰：柚樹葉，皆似橙；其實有大小二種；小

者如柑，大者如瓜，如升，有圍及尺餘者，亦橙之

類也。

【別稱】又名條，壺柑，臭橙，朱欖。

柯樹

(殼斗科亦作柔荑科)

【學名】*Pasania cuspidata*, Oort.

【產地】暖地栽種之者，爲甚多。

【基本】爲常綠喬木，高至三四尺餘，葉長橢圓形而厚，

有粗鋸齒，下面呈灰褐色。夏月開花，成穗狀花序

。果實爲堅果，呈橢圓形；殼斗，如囊狀，初包果

實，成熟則裂開，而果實出。其樹皮，有用之爲藥

者。

【功效】其氣味辛平，而有小毒。治大腹水腫，可去皮，煮

汁煎濃，去滓，作丸，如梧子大，平且空腹服用三

丸，須臾又服一丸。

【學說】李珣曰：按廣志云：生廣南山谷，波斯家用木，爲

船舫者也。

【別稱】又名木奴。

柰

(薔薇科)

【學名】*Pyrus Malus* L.

【產地】多生於山地間；而庭園亦有栽培者。

【基本】爲落葉喬木，形似林檎，樹幹鋒直。葉青，亦似林

檎而大。果實爲漿果，圓形如梨，而滑；生青，熟

則半青，半紅，或全紅，多肉，多汁，可爲藥用。

【功效】其氣味苦寒，而有小毒。能止渴，生津，耐肌，和

脾，益心氣，補中氣不足。治卒食飽氣壅塞，可搗

汁服之。

【學說】李時珍曰：柰，與林檎，一類二種也。樹實，皆似

林檎，而大，西土最多，或栽，或壓，有白，赤，

青三色；白者，爲素柰；赤者，爲丹柰，亦曰；朱

柰；青者，爲綠柰，皆夏熟。涼州有冬柰，冬熟，

子帶碧色。

〔別稱〕又名類婆。

柳

(楊柳科亦作柔荑科)

〔學名〕*Salix babingtonii* L.

〔產地〕多栽於庭園，或路傍等處。

〔基本〕爲落葉喬木，高三四丈餘，枝梢細長，而下垂。葉爲披針形，如線狀，有鋸齒，互生。春月先行開花，花單性，皆排列成穗狀花序。其根皮花葉等，皆供藥用之。

〔功效〕其枝及根白皮氣味苦寒，無毒。治黃疸，白濁，可煎服。能去風，消腫，止痛，可酒煮用之。其花味同。能止血，去面黑熱。治濕痺，風水，黃疸，四肢癱急，膝痛。其蕊味亦同。能驅風，明目，聰耳，堅齒。其實能止渴，逐膿血。治癰腫，潰爛。其葉氣味相同。能生肌，止痛，下水氣，解丹毒。治天行熱疾，傳尸骨蒸。療惡疥，漆疔。

〔學證〕李時珍曰：楊柳，縱橫倒順，插之皆生。春初生柔荑，即開黃蕊花。至春晚葉長成後，花中結細實，子蕊落，而絮出，如白絨，因風而飛。子着衣物，

能生蟲，入沼池，即化爲浮萍。古者，春取榆柳之火。陶朱公言：種柳千樹，可足柴炭。其嫩芽，可作飲湯。

〔別稱〕又名小楊，楊柳。

柳寄生

〔基本〕據李時珍云：此即寄生之生柳上者。

〔功效〕其氣味苦平，無毒。治腦氣刺痛，可搗汁服之。

柳蠹蟲

〔基本〕據李時珍云：柳蠹，生柳木中，甚多，內外潔白。

至春夏化爲天牛。諸家註：蟬蟪多取之，亦誤矣。

〔功效〕其蟲氣味甘辛而平，並有小毒。主治療血，腰脊痛，心腹血痛，風毒，目翳。其糞治腸風，下血，產後下痢，口瘡，耳腫，齒齕風毒。

柴胡

(繖形科)

〔學名〕*Bupleurum falcatum*, (北柴胡) *Uncaria toosani-*

nosum, (南柴胡)

〔基本〕爲多年生草，有南北二種：北柴胡，莖高二尺許，葉狹長，互生。南柴胡，高四五尺，葉狀如箭鏃，無柄，葉腳頗闊，圍抱其莖。皆於夏日開小黃花，

五痔。其根入藥；以北柴胡為效。

【功效】為解熱藥。

其氣味苦平，無毒。主治心腹腸胃中結氣，飲食積聚，寒熱邪氣。能推陳致新，明目，益精。除傷寒心下煩熱，諸痰，熱結，大腸停積，水脹，濕痺，拘攣，亦可作浴湯。治熱勞，骨節煩疼熱氣，肩背疼痛，勞乏，羸瘦，下氣，消食。補五勞七傷，除煩，止驚，益氣，消痰，止咳，潤心肺，添精髓，健忘。除虛勞，散肌熱。去早晨潮熱，婦人產前產後諸熱，心下痞，胸脇痛。治頭痛，眩運，目昏，赤痛，障翳，耳聾，經水不調，小兒痘疹，餘熱，五疳積熱。

【用量】一。五——四。五服用。

【製劑】柴胡丁幾 *Fincham's Tincture* *Paul's Euphorium* *Falatum*。

此即以柴胡根五。○浸於稀酒精一。○。○中，而製成之液體，一日三回，與以一。○。一二。○為解熱藥。

【禁忌】惡皂莢。畏女苑，藜蘆。忌火。

【採製】取根，去鬚，及頭，用銀刀削去赤薄皮少許，以粗

布拭淨，到用，勿令犯火。

【學說】李時珍曰：銀州，即今延安府，神木縣，五原城，

是其廢蹟。所產柴胡，長尺餘。而微白，且軟，不易得也。北地所產者，亦如前胡，而軟。今人謂之北柴胡，是也，入藥亦良。南土所產者，不似前胡，正如蒿根，強硬，不堪使用。其苗有如蕪葉者，竹葉者；以竹葉為勝。其如邪蒿者，最下也。按夏小正月令云：仲春芸始生。倉頡解詁云：芸蒿也。似邪蒿，可食，亦前胡之類，入藥不甚良，故蘇恭以為非柴胡云。近時有一種，根似桔梗沙參，白色而大。市人以為充銀柴胡，殊無氣味，不可不辨。

【別稱】又名地薰，芸蒿，山菜，茹草。
(柿樹科)

【學名】*Diospyros Kaki*, L. f.

【產地】中國庭院及田園多栽種之。

【基本】為落葉喬木，高二三十尺，春末生枝葉，葉橢圓形，或卵形，而外面淡綠色，互生；葉柄約三分，內外帶毛。初夏開花，黃色，單性，雄花較小。結實扁圓，徑二寸許，八九月成熟，紅色。其根皮等，

皆供藥用。其柿日晒，夜露，而乾者，謂之柿霜，亦供藥用之。

「功效」其蒂氣味澀平，無毒。能治欬逆，噯氣，可煮汁服之。其根治血痢，血崩。其木皮治下血，可焙乾，研末，湯服。其柿霜甘平而澀，無毒。能生津，化痰，清肺熱。療咽痛，腸癰，痔疾，下血。

「用量」將用一。五——四。五服之。霜用四。〇——一。〇。〇服用。

「學說」李時珍曰：柿樹高大，葉圓而光滑。四月開小花，呈黃白色。結實，青綠色；八九月乃熟。生柿置器中，自紅者，謂之烘柿；日乾者，謂之白柿；火乾者，謂之烏柿；水浸藏者，謂之酥柿；其核形扁，狀如木籃子仁，而硬堅。其根甚固，謂之柿盤。

柞木

(椅科)

「學名」*Myrsinylon inermosum*, O. Kuntze.

「產地」多生于暖帶之山野。

「基本」為一種灌木，高六七尺，或有一丈者，莖有銳刺，葉帶紫色，革質，呈卵形，緣邊有鋸齒。秋間開小花，帶黃白色，花後結實，球形，多漿。其木皮及

葉，皆供藥用之。

「功效」其木皮氣味苦平，無毒。能治黃疸，可燒末，水服方寸。又治鼠瘻，難產。能催生，利竅。其葉治癩疽，發背，惡腫。

「學說」陳藏器曰：柞木生南方，細葉，今之作梳者是也。別稱又名鑿子木。

突厥雀

「基本」據云：此鳥出突厥國，故名也。體大如鴿，形狀似雀，全身赤色，腳無後趾。昔時有食其肉，而滋養者。

「功效」其氣味甘熱，無毒。能補虛，暖中。

珂

「基本」據名醫別錄云：珂，生南海，采無時，白如蚌。蘇頌云：珂，貝類也。大如錢，皮黃黑，而骨白，堪以為飾。李時珍云：按徐表異物志云：馬珂螺，大者，圍九寸；細者，圍七八寸，長三四寸。

「功效」其氣味鹹平，無毒。能止血，生肌，去面黑，治目翳膜，赤筋，胥肉，可用銅刀刮之，研細，點服。別稱又名馬珂螺。

珍珠菜

(櫻草科)

「學名」 *Valeriana clethroides*, Dudy.

「產地」生于山野之中。

「基本」為多年生草，高至二三尺，葉廣披針形，葉柄甚短，互生。開白花，為繖狀花序。有取其全草，而煎服之者。

「功效」據云：能利水，通淋結，消腫脹。

「學說」黃山志云：真珠菜，藤本，蔓生。暮春發芽，每芽端綴一二莖，圓如白珠。葉紫綠，如茶，逆蓋臘之，香甘鮮滑，他蔬讓美。

玻璃

「基本」玻璃之種類甚多，各隨其需要而製造。如化學器械所用之玻璃，多由碳酸加里，石灰，白砂等而製成，故質堅韌。又如光學器械所用之玻璃，多由碳酸曹達，鉛丹，石灰，白砂等而製成，故折光力頗強。其他多由碳酸曹達，碳酸，石灰，白砂等而製成，以作普通平板之玻璃。昔時所謂玻璃者，非此人工製造品，當另有一種。

「功效」其氣味辛寒，無毒。能明目，安心。治赤眼，目熱

，翳膜，驚悸，心熱。

「學說」李時珍曰：出南番，有酒色，紫色，白色，皆微與水精相似，展開有雨點花者，為真。列丹家，亦用之藥燒者，有氣眼而輕。

「別稱」又名顏黎，水玉。

珊瑚 *Anthozoa*

「產地」多生於南海之海底。

「基本」此種類最多，體為水螅形，有短食道，腔內具有隔膜，乃腔腸動物也。多為羣體，且分泌石灰質之骨軸。其骨軸由外層分泌而成，連結羣體之柔軟部，(即共肉)而連各個體管之內壁，即內層也。存於腔腸內隔膜緣，腫起而成皺襞，為隔膜絲。此絲之下部，更生絲狀物，每由體壁之小孔伸出，分為二目，即八出或多出之珊瑚也。

「功效」其氣味甘平，無毒。治驚癇，能明目，鎮心，去目翳，清宿血，止鼻衄，可用末吹之。

「學說」李時珍曰：珊瑚，生海底，五七株成林，謂之珊瑚林。居水中，直而軟；見風日，則曲而硬，變紅色者，為上。

「別稱」又名蘇羅麥福羅。

砒 Arsenicum

「基本」為非金屬原質之一，其形多種，自然產出之純砒石，為灰色之結晶，或黑色水晶樣之塊，多為鐵硫等化合物。其煉過者，名為砒霜；未煉過者，名為砒黃，皆供藥用之。

「成分」含有 Fe S As 與 As₂S₃ 和 As₂S₅ 等之成分。

「功效」其毒氣味苦酸而暖，有毒。治諸瘡，風痰，婦人血氣衝心，療癰疽，痔瘡，殺疥蟲，去敗肉。其黃氣味相同，能益腎氣，解毒熱，治痰瘡，療癰癤，腐爛肉，殺疥蟲。

「別稱」又名信石，人言，生者名砒黃；鍊者名砒霜。

秋海棠

(秋海棠科)

「學名」Begonia ovata, Andr.

「產地」多栽培於庭園間之陰濕地。

「基本」為多年生草，莖紅色有汁，高至二尺餘，葉圓錐形而尖，中肋之兩側，成不等形，色綠如翠羽，背面多紅絲紋。秋月莖梢葉腋中開花，單性，呈粉紅色；其莖呈倒卵形。可採取梗葉花等，供藥用之。

「功效」其花與葉氣味酸寒，無毒。能潤肌，澤膚，可和油

擦面；又能殺蟲，治疥癬。其梗能治咽喉疼痛，可搗汁含嗽之。據云：其根及心中黃蕊，皆有毒性，食之能令人死。

相思子

(荳科)

「學名」Abrus precatorius, L.

「產地」原產於東印度。

「基本」為一種蔓生木質之植物，葉偶數羽狀複葉，自許多小葉而成，開花小蝶形，花冠，呈白色，或紅色，為總狀花序。果實為莢，種子大如豌豆，鮮紅色，黑色，或帶白色，可取之為藥。

「成分」含有類似蛋白質，及黃褐色之 Abrin, Tetrinon 可溶性粉末。

「功效」其氣味苦平，而有小毒。能通九竅，殺三蟲。治蠱毒，頭痛，風痰，熱閉，癩瘡，寒熱，心腹邪氣。李時珍曰：相思子，生嶺南，樹高丈餘，白色。其葉似槐，其花似皂莢，其莢似扁豆，其子大如小豆，半截紅色，半截黑色。

「別稱」又名紅豆。

省藤

(棕桐科)

【學名】 *Calamus polang*, L.

【產地】多產於亞細亞帶之地方。

【基本】為常綠木本，莖細長有刺，倚於他木上，可能生長

至數百尺；但其周圍不過四五寸。葉長大，而互生

，為羽狀複葉。

【功效】其氣味苦平，無毒。治諸風，大癩風，牛肢風，可

以無灰酒服之。又治腦漏，可燒過存性，研末，用

酒服之。

【別稱】又名赤藤，紅藤。

再除糧

【基本】此係岩石之屬，為大小岩石片，或砂粒，常膠附礫

巖上，中有空處，含黏土。相傳大禹戰勝，而棄

餘糧，化而為石，故名。石中黏土均細，清潔，色

黃。

【成分】含有變化鐵等之成分。

【功效】為止血藥。

其氣味甘寒，無毒。主治欬逆，寒熱煩滿，赤白帶

下，崩中，小腹結痛，骨筋痛，四肢不仁，痔瘻。

【學說】李時珍曰：禹餘糧，乃石中黃粉，生于池澤；其生

山谷者，為太乙餘糧。

【別稱】又名白餘糧。

胡瓜

(葫蘆科)

【學名】 *Cucumis sativus*, L.

【產地】多耕種于田圃之間。

【基本】為蔬類植物，有卷鬚，葉作掌狀淺裂，粗糙，而有

毛。夏開黃花，雌雄同株，實長數寸，色黃綠，有

刺，可食，亦可為藥用之。

【功效】其氣味甘寒，而有小毒。能清熱，解渴，利水道，

治熱痢。

【學說】李時珍曰：胡瓜，處處有之。正二月下種，三月生

苗，引蔓，葉如冬瓜葉，亦有毛。四五月開黃花，

結瓜，圍二三寸，長者至尺許，青色，皮上有瘡瘡

，如瘡子，至老則黃赤色。其子，與菜瓜子同。一

種五月種者，霜時結瓜，色白而短，生熟皆可食。

【別稱】又名黃瓜。

胡桃

(胡桃科)

【學名】 *Juglans regia*, L. var. *Sinensis*, Cav.

〔產地〕產於中國西北之山野，亦有栽培於園圃者。

〔基本〕爲落葉亞喬木，高二三次，葉爲奇數羽狀複葉。夏

初開花，雌雄花皆下垂，呈淡黃綠色。秋間結實，如青桃，熟後溼爛皮肉，取核而食。其仁及皮，殼，與油，樹皮，皆供藥用之。

〔成分〕其仁含有脂肪油，糖分，及單鞣等。其葉含有鞣酸等。

〔功效〕其仁氣味甘平而溫，無毒。能益氣，養血，溫肺，助腎，潤燥，化痰，利三焦，潤腸胃，和血脈，悅肌膚。治虛寒，喘嗽，心腹痠痛，腰脚重痛，腸風，血痢。其仁外皮，苦澀，無毒。能染鬚髮。其仁外殼，能治崩中，下血。其油有毒，不可食。能補火；但近來有用爲下劑，及驅蟲劑者。其樹皮可以煎汁，能染黑髮。

〔學說〕李時珍曰：胡桃樹，高丈許，春初生葉，長四五寸，覆似大青葉，兩兩相對，頗作惡氣。三月開花，如采花穗，蒼黃色。結實至秋，如青桃狀，熟時溼爛皮肉，取核爲果，人多以櫻桃接之。

〔別稱〕又名羌桃，核桃。

胡麻 (胡麻科亦作紫葳科)

〔學名〕*Sesamum indicum*, L.

〔產地〕田園及園圃間，皆有栽培之者。

〔基本〕爲一年生草，莖方，高至三四尺，葉長橢圓形，又有卵形者，對生，或互生。秋間開花，如筒狀，白色，或紫紅色，或黃色。其莖葉花子等，皆供藥用之。

〔成分〕含有胡麻油 (Oleum Sesami) 及脂肪油等。

〔功效〕其子仁有白，赤，黑三種：白者，氣味甘而大寒，無毒。能通脈，滑腸，潤肺，除燥。治虛勞，頭上浮風，頭上諸瘡。赤者，能治疔瘡變黑，可煎湯服之。黑者，氣味甘平，無毒。能補中，益氣，潤五臟，補肺氣，止心驚，利大小腸，耐寒暑，逐風濕。治頭風，勞氣。療金瘡，能止痛。其葉氣味甘寒，無毒。能祛風，解毒。補腦，益氣，散風，除濕。其莖能點痣，去惡肉。其花能潤大腸，治頭禿。其油能止痛，消腫。治頭面遊風，鼻明，耳聾。

〔用量〕白仁用二。○——四。○服之。黑仁用六。○——九。○服之。

【學說】李時珍曰：胡麻，卽脂麻也。有遲早二種，黑白赤

三色。其莖皆方，秋開白花，亦有帶紫艷者，節節

結角，長者寸許，有四稜，六稜者，房小，而子少

；七稜，八稜者，房大，而子多，皆隨土地肥瘠而

然。

【別稱】又名巨勝，方莖，狗蝨，油麻，脂麻；葉名青蕒，

莖名麻稽。

胡葵

(繖形科)

【學名】*Coriandrum sativum* L.

【產地】田園中多栽種之。

【基本】爲一年生草，莖高尺許，葉爲羽狀複葉，細裂，有

鋸齒。冬春採食，夏秋開稍頭圓細花，簇聚如繖，

實圓無翅。其根莖及子，皆可爲藥用。

【成分】含有多量胡荽子油 (Oil Coriandi) 及揮發油，脂肪

油，蛋白質，單寧酸等。

【功效】爲健胃藥，祛痰藥。

其根莖氣味辛溫，微毒。能消穀，治五臟，補不足

，利大小腸，通小腹氣，除四肢熱，止頭痛。透達

痘疹，可煎汁外敷尤佳。其子氣味辛酸而平，無毒

。能消穀，進食。治蠱毒，五痔，食肉中毒。吐血，下血，可以煎汁服之。

【用量】一·五——四。○服用。

【學說】李時珍曰：胡葵，處處種之，八月下種，晦日尤良

。初生柔莖，圓葉，葉有花枝，根軟而白。冬春采

之，香美可食，亦可作種。道家五葷之一，立夏後

，開細花，成簇，如芹菜花，淡紫色。五月收子，

如大麻子，亦辛香。

【別稱】又名香葵，胡菜，原葵。

胡椒

(胡椒科)

【學名】*Piper nigrum* L.

【產地】原產於南洋各島，及南美等處；近來各田園及原野

間，皆有之。

【基本】爲蔓生灌木，長丈餘，葉爲心臟形，互生。夏開小

白花，成長穗。實圓，生青，熟紅，乾則皮皺，色

黑，名黑胡椒；去黑皮者，名白胡椒，皆供藥用。

【成分】含有樹脂，揮發油，及 Piperin 等。

【功效】爲健胃驅風藥。

其氣味辛而大溫，無毒。能暖腸胃，壯腎氣，溫中

，快膈，消痰，下氣。治膈膈風冷，寒濕冷氣，霍亂氣逆，冷積，腹痛，胃寒吐水，宿食不化，二便不通。

【用量】○五——一。○服用。

【學說】李時珍曰：胡椒，今南番諸國，及交趾瀕南海南諸地，皆有之。蔓生，附樹，及作棚引之。葉如扁豆，山藥葦。正月開黃白花，結椒紫紫，纏藤而生，狀如梧桐子，亦無核，生青，熟紅；青者，更辣，四月熟，五月采收，曬乾乃藏。今遍中國食品，為日用之物也。

【別稱】又名味履支。

胡椒

(百合科)

【學名】*Alliaria fishloana*, L.

【產地】人家田園中，多栽種之。

【基本】為多年生草，莖高二尺餘，下部呈白色，葉中空管狀，新葉每穿莖葉，而伸出，叢生。初夏開花，為繖形花序，如球狀，白色。可採取子，而為藥用。

【功效】其氣味辛溫，無毒。能溫中，下氣，消穀，進食，殺諸蟲，療腫毒。其子能解諸毒，止吐血。

【別稱】又名蒜葱，回回葱。

胡桐淚

【基本】本品為胡桐 (*Calophyllum inophyllum*, L.) 之寄生蟲，食其植物，滲出之樹脂；其下流於土中，而結成塊者，可取為藥用。

【功效】其氣味苦而大寒，無毒。能解諸毒熱，心腹煩滿。治風勞，風疔，濕熱牙痛，牙齦出血，咽喉熱痛。

【學說】李時珍曰：木淚，乃樹脂流出者，其狀如蒼油，石淚，乃脂入土石間者，其狀成塊，以其得處斥之氣，故入藥為勝。

【別稱】又名胡桐鹼，胡桐律。

胡黃連

(玄參科)

【學名】*Pterorhiza kurroa*, Royle.

【產地】原產波斯沿海地方；現廣東南海，及陝甘各省，皆產之。

【基本】為多年生草，初生似葎，葉為複葉，似芹。春初開花，結實。其根及黃，心黑，可取為藥用。

【功效】為健胃殺蟲藥。

其氣味苦平，無毒。補肝膽，厚腸胃，理腰腎，治

傷寒，欬嗽，溫瘧，骨蒸，勞熱，發熱，霍亂，下痢，冷熱痢疾，婦人胎蒸，小兒目赤，潮熱，驚癇，癰疽，五痔。解烟毒，及巴豆毒。

【用量】二。〇——五。〇服用。

【禁忌】惡芫花，玄參，蠶蠶，白鮮皮。畏款冬，牛膝。忌

諸肉。

【學說】蘇頌曰：胡黃連，出波斯國，生海畔陸地，苗若夏枯草，根頭似鳥嘴，折之內似鸚鵡眼者良，八月下旬采之。

【別稱】又名割孤露澤。

胡頹子

(胡頹子科)

【學名】*Thuacynus purgens* Thunb

【產地】多栽培於庭園之間。

【基本】為常綠灌木，高至十尺餘，葉橢圓形，密生褐色，及銀色之鱗。冬間開花，白色，至翌年初夏，果實成熟，長橢圓形，赤色，大約五分許。其根葉及子，皆供藥用之。

【功效】其氣味皆為酸澀，無毒。其根治吐血不止，可水煎服。又能治喉痺痛塞，瘰癧腫，疥瘡。其葉能飲肺

氣，治肺虛，短氣，喘欬。其子能治水痢，有寒熱者禁忌服之。

【學說】李時珍曰：胡頹子，即盧榔子也。其樹高六七尺，其枝柔軟，如蠶，其葉微似棠梨，長狹而尖，面青，背白，有細點，如星，老則星起如狀。經冬不凋。春前生花朵，如丁香，蒂極細，倒垂，正月乃敷白花，結實，小長，儼如山茱萸，上亦有細星斑點，生青，結紅，立夏前採食。

【別稱】又名蒲頹子，盧榔子，雀兒酥，半合春，黃婆欄。

胡蘆巴

(豇科)

【學名】*Trichelia foeniculaceum* L.

【產地】生於園圃中；以廣州為最多。

【基本】為一年生草，莖高二三尺。夏月開花，呈白色小蛾形，花後結細莢，長二三寸，熟而根枯。採取莢內之子仁，供藥用之。

【成分】含有黏液質，脂肪油，揮發油，苦味質，單寧酸，黃色素等。

【功效】為滋養緩和藥，對於身體衰弱，精神倦怠，食思不振等，皆可服用；並能鎮止寒性腹痛，痲痛等。

其氣味苦而大溫，無毒。能散寒，除濕，補右腎，暖丹田，壯元陽。治腎虛，冷氣，寒濕，疝瘕，久痢，腳氣，陰腫。

【用量】一回一〇——四〇——八〇。爲丸劑，煎劑等服用之。

【製劑】1. 胡蘆巴丸 *Trihalae Trigonalla Koonnungweil.*

此即以胡蘆巴，小茴香各一〇〇。〇，木香，沉香各二五。〇，供研細末，以酒糊爲丸，作梧桐子大。每服五〇——七〇丸，以鹽酒水吞服。專爲歇兒尼亞（即吾國俗稱偏墜，或小腸疝氣等。）之特效藥。

【採製】秋間採取之。李時珍曰：用爲藥時，須洗淨，以酒浸一宿，晒乾，蒸熟，或炒過亦可。

【別稱】又名苦豆。

胡蘆蘆苗

（楸形科）

【學名】*Daucus carota*, L.

【產地】人家菜園中，多種植之。

【基本】爲越年生草，高四五尺，葉大而細裂，有長葉柄。

夏月開花，花小，白色，雄蕊五枚，與花瓣同數，

互生，爲複繖形花序。其根及子，皆供藥用。

【功效】其根氣味甘辛微溫，無毒。能下氣，補中，利胸膈，厚腸胃，安五臟，令人健食，有益無損。其子主治久痢，與胡蘆巴子相同。

【學說】李時珍曰：按周憲王，救荒本草云：野胡蘆苗，苗葉花色，皆同家胡蘆苗；但根細小，味甘，生食，蒸食皆宜。花子皆大於蛇牀。

苜蓿

（苜蓿科）

【學名】*Medicago sativata*, Willd.

【產地】多自生於原野之中。

【基本】爲二年生草，平臥於地上，長二尺餘，葉爲羽狀複葉，自三小葉而成，無卷鬚；托葉細裂，葉腋出花軸，生三五花，色黃，而小，爲蝶形花序。果實爲莢，呈螺旋狀，有刺，頗尖銳。其根及全草，可供藥用之。

【功效】其氣味甘平而澀，無毒。能安中，利五臟，通大小腸諸熱毒，洗去脾胃間邪熱，可養之和脾胃。其根性寒，無毒。能去煩滿，治熱病，黃疸，目黃，小便黃，可搗汁服之，令人吐，即愈。又治砂石淋

痛，可搗汁煎服。

【學說】李時珍曰：雜記言：苜蓿，原出大宛，漢使張騫帶歸中國；然今處處田野有之。

【別稱】又名木粟，光風草。

苦瓜

(葫蘆科)

【學名】*Momordica charantia*, L.

【產地】家庭園圃間，多栽培之。

【基本】為一年生蔓草，莖細長，由卷鬚而上昇，葉為掌狀，有深裂。夏月開花，單性，黃色。結果細長，徑二寸許，長約三寸，外面有許多疣狀突起，初呈綠色，熟則變為黃色，裂開現出種子；其種子，被以紅色之肉。其瓜及子，皆供藥用。

【功效】其瓜氣味苦寒，無毒。能除邪熱，解勞乏，清心，明目。其子氣味甘，無毒。能益氣，壯陽。

【學說】李時珍曰：苦瓜，原出南番。今閩廣皆種之，五月下子，生苗，引蔓，莖葉鬚卷，並如葡萄而小。七八月開小黃花，五瓣，如碗形。結瓜長者四五寸，短者二三寸，青色，皮上癢癢，如癩，及紡枝殼狀，別黃色自裂，內有紅瓢裹子，氣味甘，可食。其

子形扁，如瓜子，亦有癢癢；兩人以膏皮蒸肉，及鹽醬充蔬，苦澀有青氣。

【別稱】又名錦荔枝，爛葡萄。

苦竹

(禾本科)

【學名】*Phyllostachys quilloi*, Riv.

【產地】吾國寺院及庭園之間，多栽種之。

【基本】為多年生木本狀之植物，地下有粗根，莖橫臥，莖延，幹高五六丈，周圍達一尺三寸，節間頗長。初夏生筍，葉披針形，或作細長之卵形，常綠不凋。通常不開花，有時於六七月之候，枝端出多數之穎花，形小，而密。其根，葉，茹，漚，皆供藥用。

【功效】其葉氣味苦冷，無毒。治口瘡，目痛。能明目，利九竅，止消渴，解酒毒，除煩熱，療中風。又治小兒頭瘡，耳瘡，疥癬，可燒灰，和鷄卵白塗之。其根能下心肺五臟熱毒，可煎服之。其茹能下熱毒。其漚能治口瘡，目痛，及牙痛。能利竅，明目。

苦菜

(菊科)

【學名】*Cirsium ovalifolium*, Fr. et Sav.

【產地】多自生於山野之間。

「基本」為一種宿根草，莖高二三尺，葉長橢圓形，緣邊，有鋸齒。秋月開花，呈淡紫色。其苗可取之，而供藥用。

「功效」其氣味苦而微寒，無毒。主治面目通身漆瘡，可燒灰敷之，或生食之。其他丹毒，金瘡，亦可用之。

又治痔疾，煎湯洗之。

「學說」李時珍曰：爾雅鈎茨，即此也。其大如姆指，中空，莖頭有蠶，似繭，初生可食。

「別稱」又名鈎茨，苦板。

苦參

(苦科)

「學名」*Sophora flavescens*, Alt. var. *Gallegoides*, Flourel.

「產地」多生於山野之中；以河南，四川，為最多。

「基本」為多年生草，高三四尺，葉為羽狀複葉，互生。夏月開黃花，成長穗，實為細長之莢，子如小豆。其根及莖，可供藥用之。

「成分」含有 $\text{Marin, C}_{15}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}$ 之植物鹽基。

「功效」為健胃驅蟲藥。

其根苦寒，無毒。治心腹結氣，癰癧，積聚，黃疸。能除癰腫，逐水，止渴，醒酒，補中，明目，強

身，益志，利九竅，去伏熱，除腸風，殺疥蟲，療熱毒惡瘡。其子氣味相同。能強身，明目。

「用量」三。〇——六。〇服用。

「禁忌」惡貝母，菟絲子，漏蘆，及藜蘆。

「學說」名醫別錄曰：苦參，生汝南山谷，及田野。三月，

八月，十月采根，暴乾。陶弘景曰：近邇處處有之，葉極似槐葉，花黃色，子作莢，根味至苦惡。

「別稱」又名苦骨，地槐，水槐，菟槐，驢槐，白莖。

苦草

(水龍科)

「學名」*Valisneria spiralis*, L.

「產地」多生於水沼中。

「基本」為多年生草，高至一二尺許，葉細長，有平行脈，叢生。開花，單性；其雌花，自長花梗突出於水面，受粉後，花梗卷縮，如螺旋狀，降於水中；雄花

成熟，則脫落，而浮於水面。通常採取之，而供藥用之。

「功效」其氣味苦溫，無毒。治婦人白帶，能通產後惡露。

「用量」六。〇——一〇。〇服用。

「學說」李時珍曰：生湖澤中，長二三尺，狀如茅蒲之類。

苦菜

(菊科)

【學名】*Seneciois officinalis*, L.

【產地】多生於路傍，及荒地等處。

【基本】為蕓類植物，莖高三四尺，中空，而有稜條。葉闊

而黃，柔軟，鋸齒甚深。莖葉皆有白汁，與苦苣同

；惟春夏之間，開黃花，花期不同，以此而別，嫩

莖可食。其菜根及花子，皆供藥用之。

【功效】其葉氣味苦寒，無毒。除五臟邪氣，胃痺，腸癰。

能安心，益氣，止渴，去熱，療惡瘡，通經絡。治

霍亂後胃虛，煩逆。其根主治赤白痢疾，骨蒸，血

淋，煎汁服之。其花子氣味甘平，無毒。去中熱，

安心神。治黃疸，可連花子研細二錢，用水煎服。

【別稱】又名茶，苦苣，苦蕒，游冬，天香菜。

苦蕒

(葫蘆科)

【學名】*Taegomaria trifoliata*, Sw.

【產地】多栽種於園圃，或庭院中。

【基本】為一年生蔓草，莖細而長，葉為掌狀，而有淺裂。

夏日開花，白色，而大；花冠較深，五裂。每結成

長形，或圓形之果實，甚大。其瓢及子花，皆供藥

用。

【功效】其瓢與子氣味苦寒，有毒。主治水腫，面目四肢浮

腫，能下水，令人吐。又治石淋，小便不通。療癰

疽，惡瘡，疥癬，齧齒有蟲。其花治一切癰疽，可

曬乾，研末敷之。其蔓能治麻痺，小兒白禿，可煎

汁洗之。

【學說】李時珍曰：詩云：匏有苦蕒。國語云：苦匏不材，

於人共濟而已；皆指苦蕒而言；即苦瓠也。

【別稱】又名苦匏，苦壺盧。

苦棟

(楝科)

【學名】*Melia totonia*, Don.

【產地】山野多自生之；但以四川產者，為最佳。

【基本】為落葉喬木，高二三丈，乃至五丈，為二重三重之

羽狀複葉，小葉作長卵形，前端尖。開花，五瓣，

呈淡紫色，為圓錐花序，排列作穗狀。結實為橢圓

形，或球形，初綠，熟黃，可採取之，而為藥用。

【功效】為驅蟲藥。

其氣味苦寒，而有小毒。能導膀胱之熱，通小便。

治傷寒，熱狂，腹痛，痲瘋。殺三蟲，療疥癬。

【用量】二。〇——六。〇服用。

【採製】取果，去核及果皮，將果肉浸酒，稍焙用之。

苧麻

(蕁麻科)

【學名】Boehmeria nivea, Bl.

【產地】生於山野；多產於江西各處。

【基本】為多年生草，莖高三四尺，葉卵形而尖，邊有鋸齒

，背生白毛，花單性，淡黃綠色。其根採取之，而

供藥用。

【功效】其氣味甘寒，無毒。能補陰，潤燥，安胎，涼血，

止瀉瀉，去熱毒。治天行熱疾，大瀉，大狂，漏胎

，下血，產後心煩，隔熱。療箭毒，咬傷。

【用量】四。〇——一〇。〇服用。

【學說】李時珍曰：苧，家苧也。又有山苧，野苧也。有紫

苧；葉面紫；白苧，葉面青；其背皆白。可刮洗裘

貧，救荒，味甘美。其子茶褐色，九月收之，二月

可種，宿根亦自生。

茄

(茄科)

【學名】Solanum melongena, L.

【產地】多栽種於田園之間。

【基本】為莖類植物，一年生草，莖高二三尺，葉呈卵形，或橢圓形，互生。果實為大漿果，有扁圓，卵圓，長圓等形，呈暗紫色，間或白色者。其蒂及花實，皆供藥用之。

【功效】其實氣味甘寒，無毒。治寒熱，五勞，溫疫，傳尸，血淋，血痢，下血，婦人陰挺。能消腫，散血，止痛，可醋磨敷之。其蒂能治腸風，下血，血痔，可燒灰服用。其花可治牙痛，金瘡。其根及枯莖葉，能治凍瘡，可煎湯洗之。

【學說】李時珍曰：茄種，宜於九月，熟時收取，洗淨，曬乾。至二月下種，移栽，株高二三尺。其葉大如掌，自夏至秋開紫花，五瓣相連五稜如繡，黃蕊，綠蒂，蒂包其茄，茄中有瓢，瓢中有子，子如脂麻。其茄有圓如栝樓者，長四五寸者。有青茄，紫茄，白茄，亦名銀茄，更勝青者。諸茄，至老皆黃。【別稱】又名落蘇，鼠茄瓜，草豔甲。

茅香

(禾本科)

【學名】Hierodochloa borealis, R. et S.

【產地】多生於水濕之原野。

「基本」為一種草本，葉短，夏月葉間生細花莖，長七八寸，莖上成穗，穗左右生小梗，於前端着短梗。花全體略呈三角狀，作黃綠色，而滑澤。其花及苗葉，供藥用之。

「功效」其花氣味苦溫，無毒。能溫胃，止嘔，治心腹冷痛。

○其苗葉能辟邪氣，令人身香，可煎湯浴之。

「學說」李時珍曰：茅香，凡有二，此是一種香茅也。其白

茅香，別是兩番一種香草。

「別稱」又名香麻。

茉莉 (素馨科亦作木犀科)

「學名」Jasminum sambac, Ait.

「基本」據李時珍云：末利，原出波斯，移植南海，今瀕廣

人栽蒔之。其性畏寒，不宜中土。弱莖，繁枝，綠

葉圓尖。初夏開小白花，重瓣，無蕊，秋盡乃止，

不結實。有千葉者，紅色者，蔓生者，其花皆夜開

，芬香可愛。女人穿為首飾，或合面脂，亦可熏茶

，或蒸取液以代薔薇水。

「成分」含有芳香性揮發油等。

「功效」其花氣味辛熱，無毒。能蒸油取液，作面脂，頭澤

長髮。其根氣味辛熱，無毒。據汪機云：以酒水一寸服，則昏迷一日乃醒，二寸二日，三寸三日。凡跌損，骨節脫臼，接骨者，用此則不知痛也。

「別稱」又名素花。

紅藍花 (菊科)

「學名」Carthamus tinctorius, L.

「產地」產於中國之西北各省，而閩粵間多栽培之。

「基本」為越年生草，莖高四五尺，葉狀如箭簇，邊緣有鋸

齒。夏日開紅花，黃花，花冠呈管狀列，為頭狀花

序，可採其花，供藥用之。

「成分」含有紅色素 Carthamin，及黃色素 Safrorygob 等。

「功效」為通經藥，與番藥，祛痰藥。對於月經閉止，與困

難，及歇斯的里，(即婦女癡躁及神經衰弱症。)和

咳嗽等，皆能發效。

其花氣味辛溫，無毒。李時珍云：能活血，潤燥，

止痛，散腫，通經，以為婦科之要藥；而朱震亨云

：多用破血，少用養血。又治產後血運，口噤，腹

內惡血，不盡絞痛，胎死腹中。並酒煮服，亦主蟲

毒。其子能治天行痘瘡，似有與花相同之功效。其

苗能治遊腫，疔瘡不出，可生搗塗之。

【用量】一回〇・二——一・〇——二・〇爲丸劑，粉劑，

浸劑，煎劑等服用之。

【製劑】「紅藍花」丁幾 *Tinct. Carthamus. tinctorius*

此即以紅藍花一・〇，稀酒精一〇・〇，浸而製之

。其功效相同，一回二十滴，乃至三十滴，爲水劑等服用之。

【學說】李時珍曰：紅花二月，八月，十二月，皆可以下種

。苗後布子，如種麻法。初生嫩葉苗亦可食。其葉

如小薔薇，至五月開花，如大薔薇，而紅色。侵晨

采花，搗爛，以水淘，用布袋絞去黃汁，又搗，以

酸粟米泔清又淘，又絞袋去汁，以青蓋覆一宿，晒

乾，或捏成薄餅，陰乾，收之入藥。

【別稱】又名爲紅花，黃藍。

郁李 (薔薇科)

【學名】*Prunus japonica*, Thunb.

【產地】多栽培於庭園之中。

【基本】爲薔薇灌木，高五六尺，葉爲箭鏃形，有鋸齒；嫩

時，帶有白毛。春月先葉，開花，五瓣，花淡紅色。

。夏月結實，爲核果，形小而圓，熟則紫赤色。其根及核仁，可供藥用之。

【功效】其核仁氣味酸平，無毒。治大腹水腫，面目四肢浮

腫，能利小便，通水道，滯五臟膀胱急痛，消宿食

，下氣，破血，潤燥。並治大腸氣滯，燥濕不通。

更能和龍腦點眼，以療赤眼。其根氣味酸冷，無毒

。治齩齒，去白蟲，療風蟲牙痛，可濃煎含嗽。又

治小兒身熱，作湯浴之。

【用量】核仁用四・〇——一〇・〇服之。

【採製】取仁，先以湯浸，去皮尖，用生蜜浸一宿，濾出，

陰乾，研如膏狀，備用。

【別稱】又名鬱車下李，鬱李，棠棣。

韭菜 (百合科)

【學名】*Allium olerum*, L.

【產地】多栽培於田園之間。

【基本】爲多年生草，春月其苗叢生，高至一尺，葉狹長而

扁。秋月莖頂開小白花，成叢。根莖肥白，而嫩，

可供藥用。

【成分】含有脂肪油，蛋白質，炭水化合物等。

「功效」民間多用其地下莖，爲止吐血及衄血藥。

其根莖氣味微辛，酸溫而澀，無毒。能溫中下氣，補虛，益陽，調和臟腑，令人能食，止洩血濃。治腹中冷痛，胸膈噎氣，可搗汁服之。能止消渴，盜汗，吐血，衄血，唾血，尿血，婦人逆經，腸痔，脫肛。其子氣味辛而甘溫，無毒。主治夢中洩精，溺血，暖腰膝。治遺精，赤白帶下，小便頻數。

「禁忌」不可與蜜，及牛肉同食。

「學說」李時珍曰：韭叢生，叢本，長葉青翠，可以根分，可以子種。其性內生，不得外長，葉高三寸，便剪，剪忌日中，一歲不過五剪；收子者，只可一剪。八月開花，成叢，收取醃藏共饌，謂之長生韭，言剪而復生，久而不乏也。九月收子，其子黑色，而扁，須風處陰乾。

「別稱」又名草鍾乳，起陽草。

降香蘇合

「基本」據李珣云：生南海山中，及大秦國。其香似蘇方木，燒之初不甚香，得諸香和之，則特美；入藥，以番降，紫而潤者，爲良。又據李時珍云：今廣東，

安南，暹羅，渤泥，琉球諸番，皆有之。朱輔山溪蠻叢語云：雞骨香，卽降香，本出海南；今溪峒僻處所出者，似是而非，勁瘦不甚香。

「功效」其氣味辛溫，無毒。燒之，辟天行時氣，宅舍怪異。小兒帶之，辟邪惡氣。療折傷，金瘡。能止血，消腫，生肌。

「別稱」又名紫香，雞骨香。

香附

(莎草科)

「學名」*Cyperus rotundus*, L.

「產地」多生於原野或砂地之間。

「基本」爲多年生草，莖高尺許，葉似莎草而較闊，苞頗長，爲小穗狀花序，呈赤褐色，而具銳尖頭。其地下莖，卽香附子，可供藥用之。

「成分」含有揮發油等之成分。

「功效」爲通經藥。

其根氣味甘辛微寒，無毒。能平肝，調氣，解鬱，和三焦，止諸痛。治多怒，腹痛，痞滿，積聚，霍亂吐瀉，腎氣，脚氣，吐血，便血，崩中，帶下，月經不調。療癰疽，疔瘡。

【用量】四・〇……一〇・〇服用。

【禁忌】忌鐵。

【採製】去皮毛，炒黑用，或童便，酒，醃製，炒用。

香薷 (香薷科亦作天南星科)

【學名】*Thym. japonica*, Miq.

【產地】多生於池沼之中。

【基本】為多年生草，高五六尺，葉細長而尖，有平行脈。

開花，單性，花序如錫狀，雌花在下，雄花在上，

花蕊如金粉狀，即蒲黃也。其根可採取之，而為藥

用。

【功效】其氣味甘平，無毒。能補中，益氣，和血脈，止消

渴，去熱燥，利小便，明目，聰耳。能治五臟心下

氣氣，口中爛臭；並治妊婦勞熱，煩躁，動胎，下

血。

【學說】李時珍曰：蒲葢生水際，似莞而扁，有脊而柔，二

三月苗，采其嫩根，瀹過作餅，一宿便可食。

【別稱】又名甘蒲，醴石；花上黃粉名曰：蒲黃。

香薷 (蘭葶科)

【學名】*Cordia lutea*, Lamour.

【產地】多寄生於柯樹，及櫟樹之枯木皮部。

【基本】為一種寄生菌類之植物也。其菌絲體上，生筭與柄

，即為子實體；筭之裏面，有許多環紋，於此環紋

，著生芽胞。可採取其全體，而為藥用。

【功效】其氣味甘平，無毒。能益氣，不飢，散風，破血，

助痘疹之透發。

【用量】通常用一只，乃至四只。

【學說】汪穎曰：香薷，生深山爛楓木上，小於菌而薄，黃

黑色，味甚香美，最為佳品。

香薷 (唇形科)

【學說】*Malabarica parviflora*

【產地】多自生於山野路傍等處。

【基本】為一種野生草，莖方，葉為長卵形，有鋸齒。秋開

白花，略帶紅紫色，叢集成穗，香氣頗烈。其梗及

葉，皆供藥用之。

【功效】其梗與葉氣味辛而微溫，無毒。主治霍亂腹痛，止

吐下，散水腫，去風熱，止鼻衄，下氣，除煩，療

嘔逆，冷氣，能調中，溫胃，去口臭，治腳氣寒冷

等。

【學說】李時珍曰：香薷，有野生，有家蒔，中州人三月種之，呼爲香菜，以充蔬品。

【別稱】又名香柔，香葺，香菜，蜜綠草。

食鹽 Sodium chloratum.

【基本】爲氯化鈉，乃綠與鈉化合物，常作塊狀，砂狀，

色白，味鹹；以海水蒸者，或由礦內採得者。可取

其純白者，爲藥用之。

【功效】爲鈉質藥，可用於肺出血等；但外用最廣。

其氣味甘鹹而寒，無毒。治胃腸結熱，喘逆，傷寒

，寒熱，胸中痰癖。能止心腹卒痛，殺鬼蠱，去邪

氣，解毒，涼血，潤燥，止痛。治霍亂腹痛，一切

時氣。

【用量】二。〇——八。〇服用。

食茱萸

(芸香科)

【學名】*Zanthoxylum armaholides*, S. et Z.

【產地】產於暖地之間。

【基本】爲落葉亞喬木，高丈餘，枝多刺，葉爲羽狀複葉，

端尖，鋸齒甚細。夏開淡綠色細花，實圓而黃黑。

【成分】含有多量辣子油等。

【功效】其氣味辛苦大熱，無毒。能暖胃，溫中，燥濕，去

水。治效逆，中惡，心腹冷痛，冷痢，其功效與吳

茱萸相同，亦應用於霍亂，中暑，傷食諸症。

【用量】一。五——四。五服用。

【採製】取實，去梗，浸於熱湯取出，對炒備用。

【學說】李時珍曰：食茱萸，檓子，辣子一物也。高木，長

葉，黃花，綠子，叢簇枝上，味辛而苦。土人八月

采，搗濃取汁，入石灰攪成，名曰：艾油；亦曰：

辣米油。

【別稱】又名艾子，越椒，檓子，辣子。

飛廉

(菊科)

【學名】*Carduus crispus*, L.

【產地】多自生於原野之間。

【基本】爲宿根草，形類似薊；惟莖上有翼狀之薄膜，與莖

皆有刺，密生其上。六月間開小頭狀花，呈淡紅色

。其根及花，供藥用之。

【功效】其根花氣味苦平，無毒。治骨節熱，脛重酸痛，頭

眩頂重，皮間邪風，如蜂蟻，針刺而起熱瘡，癩疽

，濕痺。能益氣，明目，破留血，殺疳蟲，治小兒

疥癩。

〔採製〕用根先刮去粗皮，作細，以苦酒拌一宿，漚出，日乾，細碎，備用。

〔別稱〕又名兩盧，水禾，飛雉，伏兔，伏猪，天養。

第十畫

原蠶

〔基本〕此為一桑二化之蠶也。其蠶(即原蠶沙)，及雄原蠶蛾，皆有用為藥者。

〔功效〕其雄原蠶氣味鹹溫，而有小毒。能益精氣，強陽道，交接不倦，能澀精，止尿血，暖水臟。治暴風燥熱，去風，除濕，治爛弦風眼，消渴，熱中，癰結，勝鳴，心痛，頭風，半身不遂，婦人閉經。

射干

(薺尾科)

〔學名〕*Platanus chinensis*, Tom.

〔產地〕多自生於山野之中。

〔基本〕為多年生草，高二三尺，葉狀如劍而闊，有平行脈。六月開花，紅黃色，瓣上有深紫色細點。結實成房，子黑色。又有一種二月開白花，瓣有黃點，名

曰：白花射干。其根皆為藥用之。

〔功效〕為瀉下藥。

其氣味苦平，有毒。能瀉火，解毒，散血，消腫，開胃，利腸，鎮肝明目。治喉痺，咽痛，欬嗽，氣逆，胸熱胸滿，腹中邪氣，積氣，水蠱，二便不通，療胃瘕，瘕母，癥瘕。

〔用量〕二。〇——五。〇服用。

〔採製〕採根，先以米泔水，浸一宿，漚出，然後以薑竹葉裹之，從午至亥，日乾用之。

〔學說〕李時珍曰：射干，即今扁竹也。今人所種，多是紫花者，呼為紫蝴蝶。其花三四月開，六出，大如荳花，結房大如擗指，頗似泡桐子，一房四隔，一隔十餘子，子大如胡椒，而色紫，極硬，咬之不破，七月始枯。

〔別稱〕又名烏扇，烏吹，烏蒲，風翼，鬼扇，扁竹，仙人掌，紫金牛，野荳花，草萎，黃遠。

夏枯草

(唇形科)

〔學名〕*Prunella Vulgaris*, L.

〔產地〕山野自生之草。

【基本】為多年生草，莖方，高尺餘，葉作長卵形，端尖，

莖葉皆有毛。夏初莖端開唇形花，列為穗狀花序，

色淡紫，或白。至夏後即枯，故名也。其莖葉，入

藥用之。

【功效】為解熱藥。

其氣味苦辛而寒，無毒。主治寒熱，瘧疾，鼠瘻，

頭瘡。破癰，散結。療腳氣腫，濕痺。

【用量】三。〇——五。〇服用。

【學說】李時珍曰：原野間，甚多，苗高一二尺許，其莖微

方，葉對生，似旋覆而長大，有細齒，背多白，

故莖端作穗，長一二寸，穗中間淡紫小花，一穗有

細子四粒。

【別稱】又名夕句，乃東，燕面，鐵色草。

徐長卿

(蘿藦科亦作白前科)

【學名】*Pyrola elma* (Thunberg) Bore.

【產地】多生於林野之間。

【基本】為一種草本，莖高三三尺，細而剛，葉線狀，披針

形，全邊，對生。夏日自稍端，及葉腋抽枝，開花

形小，五片，呈淡黃綠色。其根，可供藥用之。

【功效】其氣味辛溫，無毒。能除鬼疰，百精，蠱毒，疫疾

，惡氣，治溫瘧。

【學說】李時珍曰：鬼督郵，及己之亂杜衡，其功不同，苗

亦不同也。徐長卿之亂鬼督郵，其苗不同，其功同

也。杜衡之亂細辛，則根苗功用皆彷彿，乃彌近，

而大亂也；不可不審。

【別稱】又名鬼督郵，別仙蹤。

拳參

(薯蕷科)

【學名】*Polygonum heterophyllum* L.

【產地】多自生於山地中。

【基本】為多年生草，夏月抽莖，高一二尺許，葉廣披針形

，互生。開小花，而多，呈淡紅白色，為穗狀花序

。其根莖，供藥用之。

【成分】含有一種單萜酸，及澱粉等。

【功效】為收斂藥，對於慢性痔疾，下痢，出血，消腫，淋

疾等，皆可用之。

【用量】一回二。〇——六。〇服用。

【學說】蘇頌曰：生澤州田野，葉如羊蹄，根似海蝦，黑色

；土人五月采之。

旃那

(荳科)

「學名」 *Cassia munitifolia*, Dal.

「產地」產於熱帶亞非利加等處。

「基本」為灌木狀之植物，葉為羽狀複葉，小葉長卵形，而尖。花五瓣，不甚整齊，黃色。果實為莢，扁平。

此植物之葉，供藥用之。

「成分」含有苦味質，加答爾精酸，黃色素，糖質等。

「功效」為瀉下藥，凡可促腸排滯之諸病，除腸管發炎之外

，皆可服用。

「用量」二日二。〇——五。〇為注射劑，紙劑，粉劑等服用之。

「製劑」旃那舍利別 *Sirupus Scamne*.

此即以旃那葉一〇。〇，單舍利別一〇〇。〇浸製而成。多加與其他下劑而用之。

殷孽

「基本」據蘇恭云：此即孔公孽根也。盤結如蕒，故名：莖

石；俗名：乃以孔公孽為之，誤矣。

「功效」其氣味辛溫，無毒。主治爛傷，瘀血，洩痢，寒熱

，鼠瘻，癩癧，結氣，脚冷，筋痛，骨弱，並療痔

瘻，能下乳汁。

「別稱」又名菝石。

烏木

(柿樹科)

「學名」 *Diospyros Pregrina*, Gorko.

「產地」產於東印度，及馬來半島。

「基本」為常綠喬木，高至二十尺餘，葉長橢圓形，平滑，

互生。開花，呈淡黃色。果實球形，呈赤黃色。其

木，可為藥用。

「功效」其氣味甘鹹而平，無毒。能解毒，治霍亂吐痢，可

取屑，研末，溫酒服之。

「學說」李時珍曰：烏木出海南，雲南，南番，葉似棕櫚；

其木黑漆，體重，堅緻。

「別稱」又名烏文木。

烏芋

(莎草科)

「學名」 *Heterochaeta plantaginifolia*, K. Br.

「產地」生於池沼；亦有栽種於水田者。

「基本」為多年生草，莖高二三尺，管狀，色綠，花穗聚於

莖端，頗似筆頭。地下之球莖，形圓，色黑，可食

。浙人稱：地栗；兩廣稱：馬蹄古堯莖，或烏芋。

即今寧壽也。其根可採取之，而供藥用。

【成分】含多量澱粉，及糖分等。

【功效】其氣味甘微滑寒，無毒。治消渴，痺熱，能溫中，益氣。下丹石，消風毒，除胸中實熱，可作粉食之。又能明目耳，消黃疸，開胃，下食，厚人腸胃，療五種弱氣，消宿食，飯後宜食之。治誤吞銅物，止血痢，下血，血崩，辟蠱毒。

【學說】李時珍曰：烏韭，生淺水田中，其苗三四月出土，一莖直上，無枝葉，狀如龍鬚。肥田栽者，粗近葱，高二三尺。其根白麩，秋後結顆，大如山查栗子，而澀有聚毛，紫紫下生，入泥底。野生者，黑而小，食之多滓；種出者，紫大，而食之多毛。

【別稱】又名長此，烏茨，物躄，黑三稜，芍，地栗。

烏韭

(水龍骨科)

【學名】*Juncus tenuifolia*, Sw.

【產地】生於山麓之向陽乾地間。

【基本】為常綠草本，根莖堅硬，橫臥地下，自此生葉；葉柄堅硬，而滑澤，呈圓柱狀；葉身稍帶革質，較長於葉柄，全部為橢圓狀，披針形，裂片少細，略呈

四回羽狀，至生殖時期，則細裂片之末端，有一二細小子囊羣。可採取之，而供藥用。

【成分】含有地衣酸之成分。

【功效】其氣味甘寒，無毒。去皮膚往來寒熱，利小腸膀胱氣。療黃疸，金瘡。能補中，益氣，燒灰沐頭，長髮令黑；並治腰脚風冷。

【學說】李時珍曰：別錄主療之證，與垣衣相同；則其為一類，通名烏韭，亦無害也；但石髮，與陟釐同名，則有水陸之性，稍有不同耳！

【別稱】又名石髮，石衣，石苔，石花，石馬鞭。

烏梅

【基本】為薔薇科梅樹 (*Prunus Mume* S. & Z.) 未熟之實，剝去其核，入籠於稿火煤烟中薰乾者，為藥用之。

【功效】民間有用於解熱，發汗，健胃，下痢等。其氣味酸澀而溫，無毒。能解熱，清毒，生津，止渴，殺蟲。治久嗽，瀉痢，反胃，骨蒸，勞熱。

【用量】三〇——一〇〇服用。

烏蛇

【基本】據李時珍云：烏蛇，有二種：一種劍脊細尾者，為

上；一種長大無劍脊，而尾稍粗者，名風稍蛇，亦可治風，而力不及。昔時有取其肉，而用之者。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。主治諸風，頑痺，皮膚不仁，風癢，癩疹，疥癬，熱毒，疥瘡。其功與白花蛇

同，而性善，無毒也。

【用量】二〇——三〇〇服用。

【別稱】又名烏稍蛇，黑花蛇。

烏頭

(毛茛科)

【學名】*Aconitum Fischeri* Reiche.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為多年生草，莖高三二尺，根多肉，略似烏頭狀，

故名烏頭。葉互生，為掌狀分裂，有光澤。秋時開

花，紫藍色，或白色；其狀如帽。質小，而黑。其

根可採取之，而供藥用。

【成分】含有 $\text{C}_{27}\text{H}_{45}\text{NO}_{11}$ 之成分。

【功效】為刺戟藥，可用於風痛，癩癧，及癩腫等。

其氣味辛溫(或甘平)，而有大有毒，能通行十二經絡

，無微不至，逐風寒，開腠理，回陽，退陰，溫中

，補虛，祛邪，辟鬼，暖脾胃，堅筋骨。治三陰傷

寒，三陽厥逆，寒症，瘧氣，中風，中寒，痰厥，頭痛，頭風，霍亂轉筋，風痺，拘攣，半身不遂，胃冷，嘔噦，噎膈，反胃，心腹冷痛，五臟沈寒，脫肛，痿痛，暴瀉，久痢，及婦女閉經，小兒慢驚；並療癰疽，疔瘡。

【用量】二〇——一〇〇服用。

【製劑】烏頭丁錢 *Thunberg Radix Aconitum Fischeri*.

此即以烏頭根五。〇浸於稀酒精五〇。〇中，而製

成之。一日三回，二〇——六〇，為風痛藥。

【禁忌】惡蜈蚣。畏防風，黑豆，甘草，人參，黃耆。據李

時珍曰：畏綠豆，烏韭，童便，犀角。忌豉汁。

【學說】李時珍曰：處處有之，根苗花質，並與川烏頭相同

；但此係野生，又無釀製之法。其根外黑，內白，

皺而枯燥，為異耳！然毒則甚。

【別稱】又名烏喙，草烏頭，土附子，奚毒，耿子。毒公，

金鴉，苗名：瓦，葦，獨白草，鴛鴦菊；汁煎名：

射罔。

烏鴉

【學名】*Corvus frugilegus*.

「基本」爲鳥類，最喜結巢於平原樹上，以小木枝築之。

孵卵時，鳴聲嘈雜，不堪聽聞。每至田間掏覓土內

穀粒，或最小動物，而食之。口喙長而尖，具銳邊

。尾爪甲更銳而有力，故善於掏索泥土，緊握樹枝

。其種別不一，大抵羽毛黑色，冬季每向南遷徙。

昔時有取其心磨目肉等，而爲藥用之者。

「功效」其肉氣味酸澀而平，無毒。治瘦病，欬嗽，骨蒸，

勞疾，瘰癧以瓦瓶，泥固，燒之存性，研末，每服

一錢服用。又治小兒痢疾，及鬼魅，五勞，七傷，

吐血。其心能治欬嗽，可炙熟食之。其膽點眼，可

治風眼紅爛。其目吞之，能令人見諸魅。

「別稱」又名鴉鳥，老鴉，楚鳥。大嘴鳥。

鳥藥

(樟科)

「學名」*Tournefortia*, *Strychnifolia*, Vill. (*Daphnidium* *Strychnifolium*, S. et Z.)

「產地」多產於江蘇，浙江之各田野。

「基本」爲常綠灌木，幹高八九尺，葉橢圓，端尖，質厚，

有光，常下垂。夏初開淡黃綠色之小花，秋月結小

圓實，生青，熟紫。其根似芍藥，外褐，內白，可

入藥用之。

「功效」爲刺戟藥，可用於霍亂，中風等。

其氣味辛溫，無毒。治中惡，心腹疼痛，蠱毒，鬼

氣，宿食不消，天行時疫，膀胱腎間冷氣，婦人血

氣，小兒腹中諸蟲，霍亂，吐食，反胃，瀉痢。療

瘰癧，疥瘡，解冷熱，理无氣，中氣，治脚氣，疝

氣，氣厥，頭痛，腫脹，喘急，能止小便頻數，及

白濁。

「用量」二〇—六〇服用。

「採製」取根，除去粗皮，稍焙用之，或生用。

「學說」李時珍曰：吳楚山中，極多，人以爲薪，根葉皆有

香氣；但根不甚大，纔如芍藥爾！嫩者，肉白，老

者，肉褐色。其子如冬青子，生青，熟紫，核殼極

薄；其仁亦香，而苦。

「別稱」又名旁其，矮樟。

烏臼木

(大戟科)

「學名」*Sapindus sebiferum*, Koch.

「產地」原產於熱帶之亞細亞等處。

「基本」爲落葉喬木，高至二十尺許，葉廣卵形，而尖。夏

月開花，花單性，形小，黃色。秋末實熟，大三分許，內藏三子。其種子之皮部，被以白粉。採其根白皮，供藥用之。

〔成分〕仁皮含有多量烏臼油等之成分。

〔功效〕爲利尿藥。

其根白皮氣味微苦而溫，有毒。主治暴水，癰結，積聚。癩頭風，通大小便，解蛇毒及砒石毒。

〔用量〕一·五——四·五服用。

〔藥劑〕烏臼油 *Oleum Sapindi Sibirici*。

此部以烏白仁皮部，而製出之脂肪油，可作烏髮藥，能使白髮，變爲黑髮。又可作爲腫毒，疥癬之塗布藥。

〔學說〕李時珍曰：南方平澤甚多，今江西人種植，采子蒸灸，取脂，澆燭貨之；子上皮脂，勝於仁也。

烏金紙

〔基本〕據云：浙江造紙處多有，兩面油黑如漆，光滑脆薄，不中書畫；惟市舖用以裹珍寶，及藥物等，作襯紙。

〔功效〕其紙能治下疳，用銅杓內炒末，加冰片少許塗之。

烏賊魚

〔學名〕*Sepia owstonia Hoyle*。

〔產地〕吾國福建，浙江，及江蘇南部之海灣，皆產生之。

〔基本〕體軀卵圓，而扁平。外套膜厚，肉鱗而狹，夾於體之兩側。甲如浮石，呈舟狀，先端現於胴外。體爲蒼白色，密散以紫褐色之斑點，外套腔中，有羽狀顯二個，又近後端，有銀白色之小囊，內貯墨汁甚多，遇敵而排出，使水混墨，以防之。可取其甲等，供藥用之。

〔成分〕甲含有磷酸石灰，碳酸石灰，膠質等。

〔功效〕甲爲止血藥。昔時內服，有用於吐血，便血，尿血，及月經過多等；而今僅有外用，爲一般皮膚切創等之止血藥，或爲磨齒牙粉料，或爲濕疹，糜爛之乾燥藥。

現因其含有磷酸，及碳酸之加爾叟，故有用於骨弱症，及胃酸過多等，而爲變質健胃藥。

其肉氣味酸平，無毒。能強志，益人，通氣。治婦人經閉。其甲氣味微鹹而溫，無毒。能止血，殺蟲，通血脈，去寒濕，治瘧疾，衄血，吐血，喉痺，

目翳淚出，耳聾舌腫，可用末塗之。又治腸風，下痢，小便淋血，婦女崩中，赤白帶下，閉經，陰中腫痛。其血能治耳聾。

【用量】一回〇・五——二・〇為粉劑，丸劑等服用之。或以其粉末，為外用之止血藥，及乾燥性之撒布粉。

【製劑】「強壯變質散」Pain's Allomonia.

此即以烏魚骨一〇・〇，還元鐵〇・三，白糖五・〇，共研為粉末，分作十包，一日三回，各服一包，為骨質衰弱，及身體不健之效藥。

【禁忌】惡白朮，白欬，附子等。

【別稱】又名魚甲，俗稱海螺蝟，又稱烏魚骨等。

烏魚欬莓 (葡萄科)

【學名】*Gisnera japonica* Willd.

【產地】多自生於山野中。

【基本】為蔓生之雜草，莖有卷鬚，常纏絡於他物之上。葉為掌狀複葉，每自五小葉成，互生。夏秋之間，開小花，呈黃綠色，為聚繖花序。其根可採取之，為藥用。

【功效】其氣味酸苦而寒，無毒。主治癰疽，癩癧，蟲蛇咬

傷，可搗汁塗敷之。

【學說】李時珍曰：榛葉間甚多，其藤柔而有稜，一枝，一鬚，凡五葉；葉長而光，有疏齒，而青，背淡。七八月結苞成簇，青白色；花大如粟，黃色，四出。結實大如棗子，生青，熟紫，內有細子。其根白色，大者，如指，長一二尺，搗之多涎滑。

【別稱】又名五葉葇，龍草，拔，龍葛，赤葛，五爪龍，赤潑藤。

烏華烏爾矢 (石南科)

【學名】*Arctostaphylosuva-urusi* sp.

【產地】產于北半球之各地。

【基本】為常綠小灌木，莖匍匐，長至三尺餘，葉厚倒卵形，全邊；短狀花序，花冠壺狀，白色，或淡紅色。可採其葉，供藥用之。

【成分】含有軟酸，及苦味質等。

【功效】為利尿藥，對於腎臟炎，血尿，結石，膀胱加答兒，及水腫病，皆可服用。

【用量】一日數回，以其一〇・〇——一五・〇——三〇・〇為煎劑服用。

浮石 *Pumice*

【基本】為多孔狀之岩石也。形如海綿，由細玻璃絲，及玻璃膠合成；比水尤輕，故能浮於水面，有灰白色，及淺墨色等。

【成分】含有硅酸，礬土，石灰，苦土，養化鐵，及鈣，鎂等。

【功效】為祛痰藥。

其氣味鹹平，無毒。能止渴，治淋，可煮汁服之。又能清肺，下氣，止咳，降火，除積塊，化老痰，消癥瘕，結核，疝氣。療瘡腫。

【用量】六。〇——一五。〇服用。

【採製】取石，洗淨，碾細用之。

【學說】李時珍曰：浮石，乃江海間細沙水沫凝聚，日久結成者，狀如水沫，及鐘乳石，有細孔，如蚌窠，白色，體虛而輕。今之皮作家，用磨皮垢，甚妙。

【別稱】又名海石，海浮石，水花。

海月

【基本】據李時珍云：劉伯嶺表錄云：海月，大如鏡，白色，正圓，常死海旁。其柱如搔頭尖，其甲美如玉。

段成式雜俎云：玉瑤形似蚌，長二三寸，廣五寸，上大，下小，殼中柱，炙食，味如牛。

【功效】其氣味甘辛而平，無毒。去消渴，下氣，能調中，利五臟，止小便，消腹中宿物。

【別稱】又名玉瑤，江瑤，馬類，馬甲。

海芋

(天南星科)

【學名】*Alocasia macrorrhiza*, Schott.

【基本】據李時珍云：海芋，生蜀中，今亦處處有之。春月生苗，高至四五尺許，大葉如芋葉，而有幹。夏秋之間，抽莖開花，如一瓣蓮花，碧色，花中有蕊，長作穗狀。

【功效】其味辛，而有大毒。治瘧疾，瘴氣，毒腫，風癩。

【別稱】又名觀音蓮，養天草，天荷，臨河仙。

海松

(松杉科亦作松柏科)

【學名】*Pinus koraiensis*, G. & N.

【產地】多產於寒帶之地。

【基本】為常綠喬木，高至數十尺，葉長針狀，往往五葉相叢生。開花，單性，雌花與雄花同株。果實長卵形，約長六七寸，各鱗片間有二子，長五分許，可採

取之，爲藥用。

〔成分〕含多量松子油等。

〔功效〕其氣味甘而小溫，無毒。能潤肺，治燥結，欬嗽。

同柏子仁，治虛秘。逐風痺，寒氣。補不足，潤皮膚，肥五臟。並治諸風，骨節風，頭眩。去死肌，

變白，散水氣。

〔用量〕四。○——一。○。○服用。

〔學說〕李時珍曰：海松子，出遼東，及雲南。其樹與中國

松樹同，惟五葉一叢者，隸內結子，大如巴豆，而

有三稜，一頭尖爾！久收，亦油。馬志謂：似小栗

，殊失本體。中國松子，大如柏子，亦可入藥。

〔別稱〕又名新羅松子，海松子。

海根

〔基本〕據陳燕器云：生會稽海畔山谷，莖赤，葉似馬藪，

根似披蕩而小，胡人蒸而用之也。其根可採取之，

而爲藥用。

〔功效〕其氣味苦而小溫，無毒。治霍亂，中惡，心腹痛，

喉痺，蠱毒。療瘰癧，惡腫，蛇咬毒傷，可用酒及

水磨服，並敷之。

海紅

(薔薇科)

〔學名〕*Prunus speciosa*, Ait.

〔產地〕庭園中多栽培之。

〔基本〕爲薔薇喬木，高至十尺餘，葉長橢圓形，而尖，有

鋸齒，帶紅色。春間開花，半紅，半白，結小圓實

，較南天竹爲大。其子實，可供藥用。

〔功效〕其氣味酸甘而平，無毒。能治洩痢。

〔學說〕李時珍曰：飲饑正要：果類，有海紅，不知出處，

此卽海棠梨之實也。狀如木瓜，而小，二月間紅花

，實至八月乃熟。

〔別稱〕又名海棠梨。

海馬

〔學名〕*Hippocampus carnatus*, T. et S.

〔基本〕此屬硬骨魚之總類，體長一二寸，至三四寸之小

魚也。被甲板狀之鱗類，口吻突出，自側面視之，

頭略似馬，故名海馬。體褐色，或銀白色，腹部少

粗，尾細而長，僅有脊鰭，與胸鰭，用脊鰭爲直立

游泳，休息時，以尾端纏絡海藻，體仍直立。雌腹

側有皮囊，容卵使孵化於其內。此動物，有取爲藥

用者。

【功效】其氣味甘溫而平，無毒。主治婦人難產，帶之於身，甚驗。或臨時燒末，服用；並手握之，即易產。

能除水腫，壯陽道，消癪塊，治疔瘡。

【學說】李時珍曰：按聖濟總錄云：海馬雌者，黃色；雄者

青色。又徐表南方異物志云：海中有魚，狀如馬頭

；其喙垂下，或黃，或黑，海人捕得，不以啖食，

暴乾燒之，以備產患，即此也。

【別稱】又名水馬。

海桐

【產地】多產於福建之各地。

【基本】為莖葉喬木，枝幹皆有刺，葉圓大，稍似梧桐，甚

繁密，春暮色深紅。其實如楓，又名刺桐。可採其

木皮，供藥用之。

【功效】其氣味苦平，無毒。行經絡，祛風濕。治霍亂，中

惡，赤白痢疾。除疔蟲，疥癬蟲。治牙齒蟲痛，可

煎服及含嗽。又治腰脚不遂，血脈頑痺，腿膝疼痛

，赤白瀉痢。去風，殺蟲；並可煎湯洗赤目。

【用量】四。○——八。○服用。

【學說】李時珍曰：海桐，皮有巨刺，如蠶甲之刺；或云：

即刺桐皮也。按稽含南方草木狀云：九真有刺桐，

布葉繁密，三月開花，赤色，照映。三五房潤，則

三五復發。陳藏器譜云：赤桐，生山谷中，文理細

緊，而性喜折裂，體有巨刺，如檣樹，其實如楓。

植桐身青，葉圓大而長，高三四尺，便有成花朵，

而繁，紅色如火，為夏秋榮觀。

【別稱】又名刺桐。

海帶 *Fanhiaria*

(藻類)

【基本】本品為褐色藻類，昆布屬，比昆布略小，而味劣。

可採取之，而為藥用。

【成分】含有沃度等之成分。

【功效】為變質藥。

其氣味鹹寒，無毒。能瀉熱，化痰，除風，下水。

治水病，瘰癧，可以催生，治婦人諸病。

【用量】四。○——一二。○服用。

【學說】掌禹錫曰：海帶，出東海水中石上，似海藻而粗，

柔艱而長。今登州人乾之，以束器物；醫家用以下

水，勝於海藻，昆布。

海參

〔基本〕據閩小記云：閩中海參，色獨白類，揀以竹簽，大如掌，與膠州遼東所出，異味，亦淡劣。入藥，以產遼海者良，紅旗街出者，更勝於綠旗街。有刺者，名刺參。無刺者，名光參。入藥，用大而有刺者佳，一名海男子，有纒纒二種，而黑膩者，尤佳。人以腎為海，此種生北海鹹水中，色又黑，以滋腎水，求其類也。

〔功效〕其氣味鹹寒，無毒。能降火，滋腎，通腸，潤燥，益精，填髓，壯陽，療痿。

海蛤

〔基本〕據李時珍云：按沈存中筆談云：海蛤，即海邊沙泥中得之，大者如棗子，小者如油麻粒，黃白色，或黃赤相雜，蓋非一類，乃諸蛤之殼，為海水潤曬，日久光瑩，都無質質。蛤類至多，不能分別其為何蛤，故通謂之海蛤也。其蛤殼，可取之研為粉末，而供藥用。

〔功效〕為祛痰藥，有清肺，利尿之作用。其氣味苦鹹而平，無毒。能治欬逆，上氣，喘息，

煩滿，胸痛，寒熱。療陰痿，除十二水滿，急痛，

利膀胱大小腸。治水氣浮腫，項下癭瘤。療癰逆，

胸膈脹急，腰痛，五痔，婦人胎中，帶下。止消渴

，潤五臟，清熱，利濕，化痰，消積，除血痢，止

瘡漏。並治中風，癱瘓。

〔用量〕三〇——一五〇服用。

海葱

(百合科)

〔學名〕*Scilla maritima*, L.

〔產地〕生於海沿岸，及地中。

〔基本〕為多年生草，高至三尺餘，葉披針形，有平行脈。

花莖出自葉叢之中央，其上部着以小花，白色，為

總狀花序。其莖供藥用之。

〔功效〕為利尿藥，可用於水腫病之利尿瀉水尤佳，故多伍

用於他種利尿藥，而對於貧血性惡液質之水腫，可

伍用於鐵劑，或規尼溼等，間有用於呼吸器官之疾

病等。

〔用量〕一日數回，與以〇・〇三——〇・三為浸劑，煎劑

等服用之。

〔製劑〕海葱越健斯 Extractum Scillae

此即以海葱二〇〇，浸於水七二五〇中，使其製成稠厚越幾斯也。一日數回，與以〇〇二——〇〇五——〇〇一，為丸劑，合劑等。其極量：一日一〇〇；一回〇〇二服用之。

2 海葱丁幾 Tinctura Scillae

此即以海葱一〇〇〇，浸於稀酒精五〇〇〇，而製成爲黃色之液。一日數回，用十滴（〇〇五），乃至二十滴（一〇〇），服用之。

3 海葱醋 Aetium Scillae

此即以海葱五〇〇，酒精五〇〇，藥用醋酸九〇〇，水三六〇〇，冷浸而成，爲黃色酸性之液體。一日數回，用二十至六十滴，爲滴劑，合劑，及飽和劑服之。

4 海葱醋蜜 Oxyneel Scillae

此即以海葱醋一〇〇〇，蜂蜜二〇〇〇，混和而製成之。一日數回，與以二〇五——六〇〇用之。

海燕

【學名】 *Pterodroma furcata*, Gm.

【基本】此屬長翼類之海鳥，體似燕形，故名也。體呈蒼灰

色，喙上面隆起，先端鈎曲，鼻爲管狀，尾呈叉狀，趾有蹼也。

【功效】其氣味鹹溫，無毒。凡陰雨時而發損痛者，可煮汁服，取汗，即解；亦可入滋陽藥也。

【學說】李時珍云：海燕，出東海，大一寸，狀扁，面圓，背上青色，腹下白脆，似海螵蛸，有紋，如鰓齒。口在腹下，食細沙，口旁有五路正勾，即其足也。臨海水土記云，陽遂足生海中，色青黑，腹白，有五足，不知頭尾，生時體軟，死即乾脆，即此物也。臨海異物志載：燕魚長五寸，陰雨則飛起丈餘，此或同名者也。

海獺

【學名】 *Enhydra lutris*, Linn.

【產地】多產於太平洋之沿岸。

【基本】此屬食肉類之鼬鼠科，形似鼬鼠，而肥大。體長三尺餘，前肢殊小，指肥而短，爪亦短小；且隱於毛中，後肢大，向後方伸出，作鱗狀，趾間有蹼。陸上運動，極拙；而水中游泳，特巧。體毛柔軟，滑澤，如天鵝絨，故毛皮貴重。

【功效】其皮毛，可作風領；其肉，可煮食。

海藻

(海藻科)

【學名】 *Alseodictyon dichotomum*, Sims.

【基本】為寄生於馬尾藻類之藻，枝多，細長，而柔滑，有

取用為藥者。

【成分】含有沃度等之成分。

【功效】其氣味鹹寒，無毒。治瘰癧，結氣在喉，能下水。

海藻

【學名】 *Cladophora furcata*, var. *intricata*, et W. F.

【基本】為紅色藻類，呈樹枝狀，先端分岐，而成不規則之

形狀。可採取之，而供藥用。

【成分】含有沃度等之成分。

【功效】為發汗藥，有解熱，祛痰，軟堅之效。

其氣味苦鹹而寒，無毒。能治瘰癧，結氣，頸下硬

核；癰腫，癩癩，堅氣，腹中上下雷鳴，可下十二

水。○瘰癧，癩癩，聚，暴潰，瘡氣，結熱。利小便，

辟百邪，鬼魅。治氣急，心滿，疝氣，下墜，疼痛

，勞腫。○去腹中幽幽作聲。治脚氣，水氣，浮腫，

宿食不消，五疳，痰壅。

【用量】四。○——一〇。○服用。

【學說】李時珍曰：海藻，諸地採取，亦作海菜。

【別稱】又名落首，海蘆。

海蝦

【基本】據陳器云：海中紅蝦，長一尺，蟹可為膏。崔豹

古今注云：遼海間有飛蟲，如蜻蛉，名蟠緇。七月

羣飛，聞天夷人食之，云蝦所化也。李時珍云：按

段公路北戶錄云：海中大紅蝦，長二尺餘，頭可作

盃，鬚可作棹杖。其肉可為鱸，甚美。○又劉侗續表

錄云：海蝦，皮殼嫩紅色，前足有鉗者，色如朱，

最大者，長七八寸，至一尺也。閩中有五色蝦，亦

長尺餘，彼人兩兩乾之，謂之對蝦，以充土饌。

【功效】其氣味甘平，而有小毒。能治飛尸，疔蟲，口中甘

蟲，齲齒，頑瘡。去疥瘡，風癢，身癢。

【別稱】又名紅蝦。

海蠶

【基本】據蘇頌云：海螺，即流螺，摩曰甲香，生南海。今

嶺外閩中近海州郡，及明州，皆有之；或只以台州

，小者為佳。其螺大如小拳，青黃色，長四五寸。

諸藥之中，此肉最厚，而人食之。前朝異物志云：

甲香，大者如瓠，面前一邊直棧，長數寸，圍殼，
蛆暗有刺。其罽羅衆香燒之，益芳；獨燒，則臭。
罽羅香用；惟合香者，用之。又有小甲香，狀若螺
子，取其蒂修合成也。海中螺類，絕有大者，硃螺
，瑩潔如珠；鸚鵡螺，形如鸚鵡，頭並可作杯；梭
屎螺，形如梭，今釋子所吹者，皆不入藥。

〔功效〕其肉氣味甘冷，無毒。治目痛，累年，或三四十
年，生蠹，取汁，洗之，或入黃連末，在內取汁，點
之。其罽羅氣味鹹平，無毒。治心腹滿痛，氣急。止
痢，下淋，和氣，清神。療腸風，痔瘻，癩疥，疥
癬，頭瘡，疔瘡，甲疽，蛇蝎蜂螫。

〔別稱〕又名流螺，假豬螺；罽名：甲香。
海蠶

〔基本〕據李珣云：按南州記云：海蠶，生南海山石間，狀
如蠶，大如拇指。其沙甚白，如玉粉狀，每有節，
雖得真者。彼人以水搜葛粉，石灰，以梳齒印成，
僞充之。經服無益，反能損人，宜慎之。

〔功效〕其沙氣味鹹而大溫，無毒。治虛勞，冷氣，諸風不

遂，久服，補虛羸，令人充澤，輕身。

海江壹

〔基本〕據李時珍云：樹高二三丈，葉似藜葉而圓。按宋勗
益部方物圖云：紅豆，葉如冬青，而圓澤。春開花
，白色，結莢枝間。其子累累而綴珠，若大紅豆，
而扁，皮紅，肉白，以似得名；蜀人用爲果釘。其
豆可取之，爲藥用。

〔功效〕其氣味微寒，而有小毒。能治面黑，花癩，頭面遊
風，可入面藥用之。

海金砂

(海金砂科亦作羊齒科)

〔學名〕*Tyrrhium japonicum* Sie.

〔產地〕多自生於山野之中，吾國各省皆有之。

〔基本〕爲多年生隱花植物，莖細，纏絡於他物，質硬有光
，葉爲羽狀複葉。夏生子囊，子囊之一端，具彈
性，環絡如帽狀，熟則黃褐色，散砂狀之細子，即
海金砂，可供藥用之。

〔功效〕爲利尿爲。

其氣味甘寒，無毒。能通利小腸，得卮子馬牙消，
逐沙。療傷寒，熱狂。治濕熱，腫滿，小便熱淋，

管淋，血淋，石淋，莖痛。又能解熱，去毒。

【用量】二·五——七·〇服用。

【學說】李時珍曰：江浙湖海川陔皆有之，生山林下，莖細

如絲，引於竹木上，高尺許。其葉細如園荻葉，而

甚薄，背面皆青，上多皺紋，皺紋處有沙子，狀如

蒲黃粉，黃赤色，不開花，細根堅強。其花，及草

，皆可入藥。

【別稱】又名竹園荻。

海勝魚

【學名】*Proelaphinus longirostris* (Cuv.)

【基本】此屬鯨類之有齒類，體長紡錘狀，口吻狀，上下顎

均列生小圓錐形之齒；其數達五六十枚。外聽道甚

小，耳殼缺。鼻孔內有一個瓣狀之附屬物，作新月

狀。背面，及體側均暗色，腹部白，背高達七八寸

。有背鰭，前肢變為鰭狀，後肢缺。尾水平，有半

月形之尾鰭，體長一丈內外，游泳甚巧，捕食魚類

，或頭足類，甲殼類等。其肉供食用；其皮供製靴

用。由脂肪製出之油，供器械用。

【功效】其肉氣味鹹腥，味如水牛肉，無毒。能治飛尸，蠱

毒，癩瘡，作脯食之。其脂肪能治惡疥，疥癬，痔
瘻，可以殺疥蟲。

【別稱】生江中者，名：江豚，江豬，水豬。

海蠟鮐 *Oreolobata*

【基本】此即烏賊魚之甲，存於體壁內之舟狀物。

【成分】含有磷酸及碳酸之石灰質等。

【功效】為齒粉料，及止血藥；其他可參考烏賊魚條。

海鶴魚

【基本】據陳藏器云：生東海，形似鵠，有肉羽，能飛上石

，頭齒如石版，尾有大毒，逢物以尾撥而食之，其

尾刺人，甚者至死，候人尿處釘之，令人陰腫痛，

拔去乃愈。海人被刺毒者，以魚尾竹，及海獺皮解

之。又有鼠尾魚，地青魚，並出南海，總有肉翅，

刺在尾中，食肉，去刺。李時珍云：海中頗多，江

湖亦時有之，狀如盤，及荷葉，大者圍七八尺，無

足，無鱗，背青，腹白，口在腹下，目在額上，尾

長有節，整人甚毒。皮色肉味俱同鮎魚，肉內皆骨

，節節聯比，脆軟可食。

【功效】其肉氣味甘鹹而平，無毒。能治男子白濁，苔淋，

玉容錠痛。其齒無毒，主治瘡癤，可燒黑，研末，酒服二錢七。其尾有毒，主治齒痛。

【別稱】又名邵陽魚，荷魚，石蠟。

消石 *Natrium Nitrum*

【基本】此為一種硝酸那篤留漢，以食鹽，加硝酸製之，為無色稜柱形之結晶，或粉末，可取之為藥。

【成分】含有硝酸那篤留漢等。

【功效】為清涼利尿藥。

其氣味苦寒，無毒。去五臟積熱，胃脹，結飲，能祛陳致新。除邪氣，療五臟諸經脈中之疾病，傷寒，腹中大熱。治煩滿，消渴。利小便，破積，散堅，治腹脹，破留血，下瘰癧。治伏暑，傷冷，霍亂吐瀉，五種淋疾，女勞，赤眼，頭痛，牙痛，耳聾，口瘡，喉痺，咽塞，牙頰腫痛。

【用量】一〇・〇——三〇・〇服用。

【別稱】又名芒硝，苦硝，焰硝，火硝，地霜，生消，北帝

女球。

栗 (殼斗科亦作柔荑科)

【學名】*Castanea vulgari*, Lam. var. *japonica*, De.

【產地】多生於山野之陰處。

【基本】為落葉喬木，幹高四五丈，葉如箭鏃。初夏開花，

花小，單性。實有殼斗，甚大，刺如蝦毛，霜降後

熟，外有硬殼，紫黑色，一苞內或單，或雙，或三

四仁，為淡黃色。其根皮花實，皆供藥用。

【功效】其實氣味鹹溫，無毒。能益氣，補腎，厚腸胃。生食，治腰脚不遂，筋骨斷碎，腫痛，瘡血。其殼氣味甘平而澀，無毒。治反胃，消渴。其花治瘰癧。

其樹皮能治瘡腫，丹毒。其根治傷腎氣，可酒煎服之。

【學說】李時珍曰：按事類彙編云：栗木，高二三丈，苞生多刺，如蝦毛。每枝不下四五個苞，有青，黃，赤三色，中子或單，或雙，或三，或四。其殼生黃，熟紫，殼內有膜裏仁，九月霜降，乃熟。其苞自裂，而子墜者，乃可久藏。

栝樓 (葫蘆科)

【學名】*Tribesantides japonica*, Rpe.

【產地】多自生於山野之各地。

【基本】為一種宿根攀援植物，其形狀略與王瓜相似，莖面

光滑，缺刻稍深。夏月開花，白色，果實較王瓜爲大，熟時呈黃色。其根及子仁，皆供藥用之。

【成分】含有植物油，及白色澱粉等之成分。

【功效】爲祛痰藥。

其根氣味苦寒，無毒。能治消渴，身熱，煩渴，大熱。能補虛，安中，除腸胃中痼熱，面黃，昏乾，口燥，短氣，止小便，通月水。治熱狂，時疾，利小腸，消腫毒，乳癰，發背，痔瘻，疔瘡，可以排膿，生肌，長肉，消瘰癧瘰癧血。其子仁氣味苦寒，無毒。潤肺，降火。治欬嗽，痰癆結，利咽喉，止消渴，利大腸，消癭腫，瘡毒。子炒可用補虛勞，去口乾，潤心肺，治吐血，腸風，瀉血，赤白痢。

【用量】二〇——六〇服用。

【禁忌】其仁忌鐵。

【學說】李時珍曰：其根直下，生年久者，長數尺，秋後掘者，結實有粉；夏月掘者，有莖無粉，不堪用。其實圓長，青時如瓜，黃時如熟柿。山家小兒亦食之；內有扁子，大如絲瓜子，殼色褐，仁色綠。

【別稱】又名瓜蒌，天瓜，黃瓜，地樓，澤如；根名：白藥。

天花粉，瑞雪。

格注草

【基本】藥錄云：出齊魯山澤間，莖紫。根紫色，若紫草根，一株有二十許。二月，八月采根；五月，六月采葉，日乾用。

【功效】其氣味辛苦而溫，並有大毒。主治癰疽，諸毒，痔瘡。

桂

(樟科)

【學名】*Cinnamomum Cava. Bl.*

【產地】產於中國南部，及東印度。

【基本】爲常綠喬木，高至五十尺餘，葉廣披針形，有三條大脈，花小，黃色。其根皮枝葉等，皆供藥用。吾國通常用者，去其外面粗皮，名曰：肉桂；去其內外皮者，名曰：桂心；其頂生細枝，名曰：桂枝；其他皆以物質，而命名也。

【成分】含有桂皮油，樹脂，護護，黏液質，糖質，單寧酸等。

【功效】爲強壯藥；又爲健脾胃，矯味，矯臭藥。

其枝心氣味苦辛，無毒。能補陽，活血，明目，益

精，通九竅，利關節，暖腰膝，續筋骨。治一切風氣，五勞七傷，陽虛，失血，頭風，虛寒，心痛，腹痛，腹內冷氣，癩癢，婦女閉經，血崩不止。療瘰癧，疥瘡，能生肌肉，消癰血。殺三蟲，去蛇毒。其枝氣味辛甘而溫，無毒。能溫經，通脈發汗，解肌，止煩，去唾，利肺氣，調營衛。治傷寒自汗，傷風頭痛，中風自汗，表虛自汗，骨節痠痛，風痺，咳嗽，手足痠風，胎風。其根皮能治牙痛。其藥治頭風，去髮垢。

【用量】枝用二。〇——六。〇服之；枝心用〇。五——二。〇服之。

桂蠹蟲

【基本】據陳藏器云：此桂樹中蟲，辛美，可啖。又據李時珍云：大葉拾遺錄云：隋時始安獻桂蠹四瓶，以蜜漬之，紫色，辛香，有味，啖之去痰飲之疾。

【功效】其氣味辛溫，無毒。去冷氣，除寒痰，癩飲，冷痛。其養治獸骨哽，煎醋漱唾之。

桃

(落葉科)

【學名】*Prunus Persica* S. et Z. var. *vulgaris* Maxim

【產地】產於中國之北方；而各國栽培亦甚廣。

【基本】為落葉亞喬木，高丈餘，葉橢圓而長。春時開花，有紅，紫，白色。其果夏日熟，內有核，核中有仁，外面生青，熟帶紅色，形大，自寸許至二寸許。其核仁及花葉等，皆供藥用之。

【成分】其仁含有扁桃油類；其葉含有 $C_{10}H_{12}O_2$

NO_2 單寧酸等。

【功效】其核仁氣味苦甘而平，無毒。能除瘀血，血閉，癰瘕，邪氣。殺三蟲，止欬逆，去上氣，消堅硬，除暴卒，通月水，止心腹痛。治血結，血秘，血燥。通瀆大便，破畜血。治血滯，風痺，骨蒸，肝瘕，寒熱，鬼注，疼痛，產後血病。其桃毛氣味辛平，無毒。能殺血閉，下血癥，寒熱，積聚，無子，帶下，諸疾。癩崩中，破癩氣，治惡鬼，邪氣。其花氣味苦平，無毒。殺疰惡，令人好顏，悅澤，除水氣，破石淋，利大小便，下三蟲，消腫滿，下惡氣。治心腹痛，及禿瘡，利宿水，痰飲，積滯。其葉氣味苦平，無毒。除尸蟲，出瘡中小蟲，治惡氣，小兒寒熱，癩傷寒，時氣，風痺，無汗，治頭風，

通大小便，止霍亂，腹痛。

【用量】仁用四。○——一○。○服之。

【學說】李時珍曰：桃品甚多，易於栽種，且早結實。五年宜以刀割其皮，出其脂液，則多延數年。花有紅紫白千葉二色之殊。實有紅桃，絳桃，碧桃，細桃，白桃，烏桃，金桃，銀桃，胭脂桃；皆以色名也。

桃花石

【基本】慈蘇恭云：桃花石，出中州鍾山縣，似赤石脂；但紙之不着舌者是也。

【功效】其氣味甘溫，無毒。治大腸中冷，膿血痢。久服令人肥悅，能食。

桃金蟻

（桃金蟻科亦作安石榴科）

【學名】*Rhodomyrtus tomentosa*, Wright.

【產地】多產生於暖帶之各地。

【基本】為常綠灌木，葉橢圓形，有三大脈，下面密生細毛，對生；其質甚厚。夏月枝梢葉腋出小梗，開花。常自一花，至三花，呈淡紅色。可採取其花子，供

藥用之。

【功效】其花能行血；其子味甘，能養血，明目。

【學說】粵志：草花之以蟻名者，有桃金蟻，叢生野間，似

梅，而未微銳，似桃，而色倍頹，中莖純紫，絲綴深黃如金粟，名桃金蟻。八九月實熟，青紺若牛乳狀，產桂林，今廣州亦多有之。

桃寄生

【基本】此即桃樹之寄生植物也；昔時有取其研為粉末，如茶飲之，可治腹蟲之疼痛等。

【功效】其氣味辛苦，無毒。治小兒蠱毒，腹內堅痛，面目青黃，淋瀝，骨立，取二兩研末，如茶點用，每日四五服。

桃蠹蟲

【基本】據名醫別錄載：為食桃樹蟲也。又陳藏器云：桃蠹，辟鬼，皆隨出而各有功也。昔時有取其蟲及糞，而為藥用者。

【功效】其氣味辛溫，無毒。能殺鬼，去邪。久食，肥人，悅顏。其糞辟溫疫，令不相染，可研為末，水服方寸。

桃椰子

（棕櫚科）

【學名】*Avicennia tocharica*, Labill.

「產地」多生於亞細亞之暖帶各地。

「基本」本植物形似椰子，高至四十尺許，葉羽狀複葉，自許多小葉而成；小葉細而長。花小，單性，為肉穗花序。結子，狀如青珠，可供藥用。

「成分」含多量澱粉，及植物油等。

「功效」其子氣味苦平，無毒。能破宿血。其鈣氣味甘平，無毒。可以作餅，炙食，服美，令人不餓。補虛益氣。治腰脚無力。

「學說」李時珍曰：「梳榔，二廣交蜀皆有之。按郭義恭廣志云：木大者，四五圍，高五六丈，拱直無旁枝，頂生葉數十，頗似棕葉。其木肌堅，斫入數寸，得粉，亦黃色，可食。」

「別稱」木名：姑榔木，鈣木，董棕，鐵木。

桐

(女參科)

「學名」*Tillandsia comensolei*, H. J. H.

「產地」吾國栽培者，為最廣。

「基本」為落葉喬木，皮色粗白，高約三丈，葉圓，大如掌狀，分裂，有長柄。春暮開扇形花，色白，或紫，成大圓錐花序，萼黃褐色。實為兩房之蒴果，長寸

餘，如莢狀。其木皮花葉，可供藥用之。

「成分」含有樹脂，及桐油等。

「功效」其木皮療五痔，殺三蟲，除五淋，沐髮去頭風，能生髮滋潤。治惡瘡，小兒丹毒，可以煎汁塗之。其花數豬瘡，飼豬肥大三倍。其葉氣味苦寒，無毒。治惡瘡，消腫毒，能生髮。

「學說」李時珍曰：「陶注：桐有四種，以無子者，為青桐，崗桐；有子者，為青桐，白桐。寇注：言白桐，崗桐，皆無子。蘇注：以崗桐，為油桐。」

「別稱」又名白桐，黃桐，泡桐，椅桐，榮桐。

桑

(桑科)

「學名」*Morus alba*, L.

「產地」為東亞細亞之原產，生於山中，或栽培於園圃。

「基本」為落葉喬木，葉呈卵形，具鋸齒，有分裂者，有不分裂者。雌雄花，皆成穗，呈淡黃綠色，單性，而小。果實長橢圓形，略與懸鈎子類之果實相似。其根皮葉實等，皆供藥用之。

「功效」其根皮氣味甘寒，無毒。治傷中，五勞，六極，羸瘦，崩中，絕脈。補虛，益氣，去肺中水氣，唾

血，熱渴，水腫，腹滿，臃脹。利水道，殺寸白蟲，可以縫金瘡。治疝喘，虛勞，客熱，頭痛，一切風氣，水氣。能調中，下氣，消痰，止渴，開胃，下食，殺腹蟻蟲，止霍亂吐瀉。研汁治小兒天疳，驚癇，客忤。敷鵝口瘡，瀉肺，利大小腸，降氣，散血。其桑椹單食止消渴，利五臟，除關節痛，下氣，安魂，鎮神。持汁飲，解中酒毒。釀酒服，利水氣，消腫。其葉氣味苦甘，寒有小毒。除寒熱，出汗，解蜈蚣毒，除腳氣，水腫，利大小腸。炙熟煎飲代茶，止渴，利五臟，通關節，下氣。治一切風熱，風痛，出汗，並撲損瘀血，塗蛇蟲傷，小兒吻疳。煎汁服，止霍亂腹痛，吐下，亦可以乾葉煮之。熬膏服，去老風，及宿血，治勞熱，咳嗽，明目，長髮。其枝氣味苦平。主治偏體風癢，乾燥，水氣，腳氣，風氣，四肢拘攣，上氣，眼連，肺氣咳嗽，消食，利小便。療口乾，及癰疽，偏風。

【用量】其根白皮用四。○——一。○。○服之，為祛痰解熱劑。其椹用量相同，為清涼利尿劑。其枝用一。○。○——三。○。○服之。其葉用五。○——一。○。○

服之。

【學說】李時珍曰：桑數種，有白桑者，葉大如掌而厚；雞桑，葉花而薄；子桑先椹，而後葉；山桑葉尖而長，以子種者，不若壓條而分者。桑生黃衣，謂之金桑，其木必將槁矣。

【別稱】子名：楮。

桑花

【基本】據日華本草云：生桑樹上白繭，如地錢花樣，刀割取，炒用；不是桑椹花也。

【功效】其氣味苦暖，無毒。能健脾，瀉腸，止鼻衄，吐血，腸風，崩中，帶下，治熱欬。

【別稱】又名桑繭，桑錢。

桑葚

【學名】*Morus polytricha*, Fr. Solms.

【基本】為菌類植物，寄生桑類之旁，則生子實體，茶褐色，膠質，耳狀，大二三寸；其外面有毛，如剪絨。

【功效】其氣味甘平，有毒。能益氣，利五臟，宣腸胃，治癖飲，腹痛。除積聚，排毒氣，止血衄，療腸風，瀉血。

桑屬

【學名】*Fojihoma persouria*, T. & S.

【基本】爲鳴禽類，頭部，尾部，及翼端，皆呈黑色；其他部，爲灰褐色，而喙，與足，又呈淡黃色。民間多畜其雛，以供作戲。昔時有割其肉，而醫病者。

【功效】其氣味甘溫，無毒。治肌肉虛羸，能益皮膚。

【別稱】又名鷦脂，青雀，鷦嘴雀。

桑寄生

【基本】爲落葉小灌木，寄生於桑樹，葉長卵形，厚而有光，背紫有毛茸。夏開淡黃色小花，秋初結實，如小豆，黃綠色。吸取被寄生之養分，多致枯死。

【功效】爲強壯藥；多用於婦科之疾病。

其氣味苦平，無毒。治腰痛，小兒背強，癰腫。能充肌膚，堅髮肉，助筋骨，益血脈。治懷妊漏血不止，令胎牢固。療金瘡，女子崩中，內傷不足，產後諸病。其質氣味甘平，無毒。能明目，輕身，通神。治胎動腹痛。

【用量】一。五——四。五服用。

【禁忌】忌火。

【學說】李時珍曰：桑寄生，高者二三尺，其葉圓而微尖，厚而柔，面青而光澤，背淡紫而有茸。

【別稱】又名寄屑，寓木，宛童。

桑蠶蛸 *Manduca*

【基本】此爲螻蛄之窠，形如笮紙之塊，體性極輕，長約寸許，爲黑褐色，可取之爲藥用。

【功效】爲強壯藥；可用於遺精，遺尿，及陰痿等。

其氣味甘鹹，無毒。治虛損，陰痿，遺精，血濁，血閉，癩病，傷中，腰痛。通五淋，縮小便，療小兒夜尿。

【用量】一。五——三。〇服用。

【禁忌】畏旋覆花；反葶藶。

桑蠶蟲

【基本】此即食桑樹之蟲，亦常取其蟲及糞，而爲藥用之。

【功效】其氣味微甘，無毒。治暴痛，金瘡，肉生不足，胸下堅滿，障翳，癩腫；並治小兒乳疝，驚風，口瘡風，疳風，婦人崩中，漏下，墜胎，下血，產後下痢。其糞主治腸風，下血，婦人崩中，產痢，小兒驚風，胎鮮，咽喉骨哽。

驚風，胎鮮，咽喉骨哽。

【別稱】又名桑蠟。

桔梗

(桔梗科)

【學名】*Platycodon grandiflorum*, Dc.

【產地】多自生於山野之間。

【基本】為多年生草，高尺餘，葉橢圓形，有細鋸齒。秋初開花，五瓣，頗大，色紫，或白。根如牛蒡，可採

取之，而供藥用。

【成分】似含有撒波寧等之成分。

【功效】為祛痰藥。

其氣味辛而微溫，並有小毒。治胸脇刺痛，腹滿遊鳴。能利腸胃，補血氣，除寒熱，風痺，溫中，消

積。療喉咽痛，下蠱毒。治下痢，破血，積氣。消

聚痰涎，去肺熱，止嗽逆，除腹中冷痛，中惡。治

小兒驚癇，霍亂轉筋，心腹脹痛。補勞，養氣，除

邪，辟溫，破癥癥，療肺癆，養血，排膿，止內漏

，去喉痺，利竅，除肺部風熱，清利頭目，去胸膈

滯氣，除鼻塞，止寒嘔。療口舌生瘡，赤目腫痛。

【用量】二〇——六〇。服用。

【製劑】桔梗丁糖 *Thincora Platycodon grandiflorum*

此即以桔梗五〇。〇，浸於稀酒精二〇。〇中，而製

成一種液體。一日數回，與以二〇。〇——四〇。〇服

用，為祛痰藥。

【學說】蘇頌曰：今處處有之，根如指大，黃白色。春生苗

，莖高尺餘，葉似杏葉而長，隨四葉相對而生。嫩

時，亦可煮食。

【別稱】又名白藥，梗草，蒼芎。

狼

【學名】*Canis lupus*, L.

【產地】多棲息於亞細亞之北部，歐羅巴，北美等地。

【基本】此屬食肉類之犬科，其形似狐，毛黃灰色；又兼生

黑色毛。頗有小白斑，尾常下垂，為最猛烈之野獸

也。迫於飢餓，則食同類，或及於人畜。其種類最

多，因地而異。昔時有割其肉等，而供藥者。

【功效】其肉氣味鹹熱，無毒。補五臟，厚腸胃，填骨髓。

腹有冷積者，宜食之。其皮暖人，辟邪，去風，止

痛。其喉磨治噎病，用乾末，服半錢，入飯內食之

。其牙佩之，辟邪惡氣。刮末水服，治犬傷。燒灰

，水服方寸，治食牛中毒。其尿治瘰癧，燒灰，油

調。又治骨硬不下，燒灰水服之。其屎中骨。治小兒夜啼，燒灰水服。其尾繫馬胸前，辟邪氣，令馬不驚。

〔別稱〕又名毛狗。

狼牙

(薔薇科)

〔學名〕*Tortillia Gynochromae*, Maxim.

〔產地〕多自生於山野之川谷。

〔基本〕為多年生草，莖頗長，質硬而直立，上部之葉，每

葉皆有三小葉。開花，黃色，花序由數花而成；花

後結乾果。其根可採取之，以供藥用。

〔功效〕其氣味苦寒，有毒。去邪氣，熱氣，疥癬，惡瘡，

疔腫，痔疾。治浮風，癩瘰，可煎汁洗惡瘡。殺腹

臟諸蟲，寸白蟲，止赤白痢，可以煎服。

〔學說〕李時珍曰：狼牙，生淮南山谷及宛甸，八月采根，

暴乾。中濕腐爛，生衣者，殺人。吳普曰：葉青，

根黃赤，六七月花，八月實黑，正月，八月采根。

〔別稱〕又名牙子，狼齒，狼子，犬牙，抱牙，支蘭。

狼毒

〔基本〕為一種野生植物，葉為卵形，葉莖有毛。其根可採

取之，而供藥用。

〔功效〕其氣味辛平，而有大有毒。止欬逆，上氣，破積聚。

治飲食寒熱，水氣，惡瘡，鼠瘻。除胸下積癰，治

痰飲，癰癧。合野葛納耳中，治耳聾。

〔學說〕李時珍曰：狼毒，出秦晉地。今人往往以草蘭茹，

為之誤矣。

狼把草

(菊科)

〔學名〕*Bidens tripartita*, L.

〔產地〕生於水田，及濕地之間；但以閩省為最多產。

〔基本〕為一年生草，高至二三尺，下部之葉，三五分裂，

有鋸齒；上部之葉，廣披針形，亦有粗鋸齒。開黃

色花，花冠筒狀，為頭狀花序。採其莖葉，供藥用

之。

〔成分〕含有揮發油，蠟質，樹脂，單寧酸，黏液質，苦味

質等。

〔功效〕民間有用於肺癆病者：能止盜汗，及出血；但亦有

用為健胃藥，及利尿藥等。

其氣味苦平，無毒。治赤白久痢，小兒大腹，痞滿

，丹毒，蜜熟，可取根莖煮汁服之。又治男子血痢

積年疔瘡，可染發髮，癢經久疥癬，凡天陰卽癢，搽而出黃水者，搗末搽之。

【用量】一回五。〇——一〇。〇——一五。〇爲煎劑服用之。

【製劑】1. 狼把草紙劑 *Phenanthium Bifidum tripartita*.

卽以狼把草莖葉，搗爲細末，和蜂蜜製成硬羔。每回服用一方寸，專治男子慢性便血等。

【採製】五月，六月，七月採取全草，陰乾，而備用之。

【學說】李時珍曰：此卽陳藏器本草拾遺，所載之郎耶草也。閩人呼爲狼罷，則狼把當作郎罷乃通。又方士言：此草卽鼠尾草，功用亦近之，但無的據耳。

【別稱】又名郎耶草。

狼尾草

【基本】據李時珍云：狼尾，莖葉穗粒，並如粟，而穗色紫黃，有毛，荒年亦可采食之。許慎說文云：禾粟之穗，生而不成者，謂之葦藎；其秀而不實者，名狗尾草。

【功效】其氣味甘平，無毒。能補中，益氣，作飯食，令人不飢。

【別稱】又名狼，狼茅，孟，宿田翁，守田。

矽石

【基本】據李時珍云：按東山經云：高氏之山，麋鹿之山，皆多矽石。郭璞註云：可爲矽鐵；素問異法方且論云：東方之域，魚鹽之地，海濱傍水，其病爲瘡瘍，其治宜矽石，亦從東方來。王冰注云：矽石如玉，可以爲鐵，蓋古者以石爲鐵；季世以鐵代石，今人又以瓷鐵刺病，亦矽之遺意也。

【功效】其石能刺百病，瘰癧。

【別稱】又名鐵石。

神麴

【基本】此於盛夏時，以小麥，赤小豆，杏仁等，各研爲粉末，和入青蒿葉茸等汁，製成磚塊，俟生黴後，曬乾之，而爲藥用。

【功效】其氣味甘辛而溫，無毒。能行氣，去濕，化水穀，宿食，繼結，積滯，健脾，暖胃，治赤白痢疾，能消食，下氣，除痰逆，止霍亂泄痢，脹滿諸病。凡閔挫腰痛者，煨過，滓酒，溫服，有效。婦人產後欲回乳者，炒研，酒服二錢，日二卽止，甚驗。

【用量】二〇・〇——一五・〇服用。

【學說】李時珍曰：昔人用麴，多是造酒之麴，後醫乃造神麴，專以供藥，力更勝之，蓋取諸神聚會之日造之，故得神名。

秧雞

【學名】*Talys arnauticus, nitens, Blyth.*

【基本】此屬涉禽類，全身淡褐色，散有黑斑。眼上及喉部

白色，後腹部有黑白之橫紋，嘴趾均長。張翼疾走，而飛力較弱，鳴聲即叩戶然。

【功效】其肉氣味苦溫，無毒。能治瘰癧。

【學說】李時珍曰：秧雞，大如小雞，白頰，長嘴，短尾，背有白斑，多居田澤畔。夏至後，夜鳴達旦，秋後即止。一種鸚雞，亦秧雞之類也。大如雞，而長脚，紅冠。雉者大而色褐，雉者稍小，而色斑。秋月即無，其聲甚大，人並食之。

秦皮

(木犀科)

【學名】*Fraxinus Bungeana, De var. puberula, Wg.*

【基本】為落葉喬木，高二丈餘，枝幹皆青，葉為羽狀複葉，長橢圓形，或卵形，對生，有鋸齒。初夏開細花

，四瓣，色淡綠。其皮可採取之，而供藥用。

【功效】為解熱藥：有消除目赤之效。

其皮氣味苦而微寒，無毒。能去風寒，濕痺，除熱，目中青翳，白膜。療男子少精，婦人帶下，小兒急痢，身熱。能明目，去目赤腫痛，風淚不止。治熱痢，下焦虛熱。同葉煮湯，能洗蛇咬，並研末敷之。

【用量】二〇——一五・〇服用。

【製劑】1. 秦皮丁糖 *Tinctura Fraxinus Bungeana.*

此即以秦皮五・〇浸於稀酒精五〇・〇中，經五日後而過濾之，製成一種液體。一日三回，與以二〇——四・〇服用，為解熱藥。

【禁忌】忌火。

【學說】名醫別錄曰：秦皮生盧江川谷，及宛甸水邊，二月，八月採皮，陰乾。蘇頌曰：今陝西亦有之。其木大都似檉，枝幹皆青綠色。

【別稱】又名檉皮，擇木，石檉，盆桂，苦樹，苦檉。

秦光

【基本】產於甘肅之涇川，陝西之鄜縣者，為良，故名。莖

高五六寸，葉闊而長。夏開紫花，根黃，長尺許，入藥用之。

【功效】爲解熱藥。

其氣味苦平，無毒。去寒熱，邪氣，寒濕，風痺，四肢節痛，下小水。療諸風，全身緩急，傳尸，骨蒸。治疳疾，時氣；利大小便。療酒黃，黃疸，解酒毒，去頭風。除陽明風濕，及手足不遂，口瘡，牙痛，口疳，腸風，瀉血。能養血，榮筋。泄熱，益膽。又治胃熱，虛勞，發熱。

【用量】四・〇——八・〇服用。

【禁忌】畏牛乳。

【學說】名醫別錄曰：秦艽，生飛鳥山谷，二月，八月采根，暴乾。蘇頌曰：今河陝州郡多有之，其根土黃色，而相交科，長一尺以來，粗細不等，幹高五六寸，葉婆娑，莖梗俱青色，如萵苣葉。六月中開花，紫色，似葛花；當月結子，每於春秋采根，陰乾。

【別稱】又名秦紉，秦瓜。

秦椒

(芸香科)

【學名】Zanthoxylum piperitum, Do.

【產地】生於山野之中，或栽培於園圃之間。

【基本】爲落葉灌木，莖高十尺許，葉爲一回羽狀複葉，自許多小葉而成，互生；葉柄之傍，有二刺。夏月開花，單性。結成乾果，圓形，赤色，熟則裂開，現出黑色之種子。吾國除去果殼之內皮，卽爲藥用之椒紅。

【成分】含有揮發油，脂肪油，及 $Zanthoxylol\ C_{10}H_{12}O_4$ 之成分。

【功效】爲解熱殺蟲藥。

其氣味辛溫，有毒。能除風邪氣，可以溫中，去寒痺，堅齒髮，明目，療喉痺，止吐逆，疝瘕，去老血，產後除疾，腹痛，出汗，利五臟，去上氣，咳嗽，久風濕痺。惡風遍身四肢，口齒服腫搖動，女人月閉不通，產後惡血，多年老痢，療腹中冷痛，生毛髮，滅癩痕，能下腫，去濕氣。

【用量】一・〇——三・〇服用。

【禁忌】惡苦薑，防葵。畏雌黃。

【學說】李時珍曰：秦椒也。始產於秦，今處處可種，最易蕃衍。其葉對生，尖而有刺，四月生細花，

五月結實，生青，熟紅，大於蜀椒；其目，亦不及蜀椒目光黑也。

〔別稱〕又名大椒，花椒，山椒。

秦龜

〔基本〕為 *Carthoum* 之一種，其甲殼等，可為藥用之。

〔功效〕其甲氣味辛溫，無毒。能除濕痺，治身重，四肢關節不可動搖，頑風，冷痺，關節氣塞，婦人赤白帶下。破積癰，補心血，療鼠癩。其頭陰乾，炙研服之，令人長遠，入山不迷。

〔別稱〕又名山龜。

秦萩藜

〔基本〕據蘇恭云：秦萩藜，生下濕地，所在有之，人所噉者。按此物於生菓中，最為香美。

〔功效〕其氣味辛溫，無毒。治心腹冷脹，下氣，消食，破氣，甚良。又研末，和酒服，療心痛，塞滿。其子治腫毒，搗末，和醋封之，一日三易。

稗米

(禾本科)

〔學名〕 *Panicum latifolium*, L. var. *glutinosa*.

〔產地〕田園中多栽培之。

〔基本〕為穀類植物，莖高丈許，莖狹而長。結實成穗，有紅白二種，可取為藥用。

〔成分〕含有蛋白質，澱粉，多量麥芽糖等。

〔功效〕為滋養藥，有催眠之效。

其氣味甘而微寒，無毒。去寒熱，利大腸，療漆瘡，治筋骨燥急，殺疥疥，毒熱，毒腫，可生搗，和雞子白敷之。又治犬咬，凍痛，肺癆，及陽登陰虛，夜不得眠，或食鵝鴨成癩，妊娠下黃汁。

〔用量〕六。○——一。○。○服用。

〔學說〕李時珍曰：稗即梁米，粟米之黏者，有赤，白，黃三色，皆可釀酒，熬糖，作饜糕食之。

〔別稱〕又名黍，糲糲，糲粟，黃糯。

真珠 *Margarita*

〔基本〕為蚌殼內所生之物，其始因有砂粒等物，竄入蚌體，其刺殼常以腺緣摩擦，消除其圭角，其所分泌之真珠質，即附加於物體之面，久之，圭角消平，物體漸大，光潤滑澤，遂成真珠。吾國常為藥，而用之。

〔成分〕含有碳酸鈣 $CaCO_3$ 之成分。

【功效】其氣味鹹甘而寒，無毒。能鎮心；點目，去腐醫障

膜；塗面，令人潤澤好顏；塗手足，去皮腐逆臍；

綿裹塞耳，治耳聾。合知母，療煩熱，消渴。合左

纏根，治小兒疳入眼。除小兒驚熱，安魂魄，止

遺精，白濁，解痘疔毒，治難產，下死胎胞衣。

【用量】○。一——○。三服用。

【學說】李珣曰：真珠，出南海石決明產也。蜀中西路女瓜

出者；是蚌蛤產，光白甚好；但不及船上者，采羅

欲穿，須得金剛鑽也。蘇頌曰：今出廉州，北海亦

有之；生於珠牡，亦曰：珠母蚌類也。按嶺表錄異

云：廉州邊海中，有洲島，島上有大池，謂之珠池

，每歲刺史親監珠戶入池，採老蚌，剖取珠，以充

貢。○池雖在海上，而人疑其底與海通，池水乃淡，

不可潤也。土人採小蚌肉，作脯食，亦往往得細珠

，如米，乃知此池之蚌，大小皆有珠也。

【別稱】又名珍珠，蚌珠。

益智

(無患子科)

【學名】Kaphalim Tongam, Cinnh.

【產地】原產馬來拔爾地方。

【基本】為常綠喬木，莖高十五尺許，葉為羽狀複葉，無尖

端。花冠五瓣，萼之裂片，排列如覆瓦樣。雄蕊，

比花瓣多，雌蕊，一枚。結為蒴果，而橢圓形，或

卵圓形，頂端截小嘴，外部呈暗灰色，現多數之縱

脈，其內部藏多角性之多數種子，氣味類於沒藥，

不佳快而苦，可為藥用之。

【功效】為強壯藥：能治排尿頻數，遺精，遺尿等；又止神

經性心悸亢進，及腹痛等。

其氣味辛溫，無毒。治遺精，虛瀉，小便餘瀝，能

益氣，安神，補不足，利三焦，調諸氣。○，凡夜多

小便者，取二十四枚，碎之與鹽同煎，服用。治客

寒，犯胃，多唾。益脾胃，理元氣，補腎虛，止滑

瀉。治冷氣腹痛，心氣不足，夢洩，赤濁，吐血，

血崩諸證。

【用量】一。○——三。○服用。

【採製】取實去皮，留仁，炒用。

【學說】李時珍曰：按稽含南方草木狀云：益智，二月連着

，五六月熟，其子如筆頭，而兩頭尖，長七八分，

雜五味中，飲酒芬芳。

蚊母鳥

【學名】 *Cremiphys jataka* T. & S.

【基本】為鳴禽類中之母禽也。體暗褐色，有細斑紋，嘴廣闊，略呈三角狀。口裂亦甚寬，且有鬚髯。飛翔時

，能掃蚊。其翼大，足小，行步甚難。

【功效】據本草拾遺云：其翅羽，能辟蚊。

【學說】陳藏器曰：此鳥大如鷄，黑色，生南方池澤菴中

，江東亦多。其聲如人嘔吐，每吐出蚊一二升。夫

蚊乃惡水中蟲，羽化所生；而江東有蚊母鳥，塞北

有蚊母樹，嶺南有蚊母草，此三物異類而同功也。

【別稱】又名吐蚊鳥，鵝。

【別稱】又名吐蚊鳥，鵝。

蚌

【學名】 *Amegdonia japonica* Martz.

【產地】多產於池沼等之淺泥中。

【基本】此屬同柱類，介殼橢圓形，殼頂甚高。於前後張以

耳，外面黑色，螺紋無齒，惟後方有側齒一枚，內刃

頗強。其肉及殼粉，皆供藥用之。

【成分】含有碳酸石灰，磷酸石灰等之成分。

【功效】其肉氣味甘鹹而冷，無毒。能止渴，除熱，解酒毒

，去眼赤，明目，除濕。治婦人勞損下血，煩悶，

熱毒，血崩，帶下，痔瘻。用黃連末，納入取汁，

點赤眼，眼暗。其蚌粉氣味鹹寒，無毒。治諸疔，

瀉痢，并嘔逆；又可用醋調塗癰腫。其爛殼粉，治

反胃，心膈痰飲，可用米汁飲服。又能燥濕，化痰

，消積。止白濁，帶下，痢疾。除濕腫，水嗽，明

目。擦陰疔，濕疔，癩瘡。

蚌

【基本】為蚌 (*Triglocephalus bomhofreni* Bole) 之一類也。

【功效】據名醫別錄云：可能療痺，內漏。李時珍云：能治

破傷，中風，大風，惡疔。

蛭

【基本】據李時珍云：重樓金線，處處有之，生于深山陰濕

之地。一莖獨上，莖當葉心，葉綠色，似芍藥，凡

二三層，每一層七葉；莖頭夏月開花，一花七瓣，

有金線蕊，長三四寸。王屋山產者，至五七層，根

如鬼臼蒼朮狀，外紫，中白，有黏糯二種。

【功效】其根氣味苦而微寒，有毒。治驚癇，搐頭，弄舌，

熱氣在腹，癩疾，癰疔。除蝕，下三蟲，去蛇毒。

生食能利水。治胎風，手足痿痺，吐泄，癩癧。去
瘡痰，寒熱。

【用量】〇.三——一。五服用。

【別稱】又名蚩休，螭休，紫河車，重臺，重樓金線，三
層草，七葉一枝花，草甘遂，白甘遂。

茗 (山茶科亦作厚皮香科)

【學名】Thea sinensis, L. (野生者) Thea Dinensis, L. var.
macrophylla, Sieb. (野生者)

【產地】中國，日本，以及東印度，皆栽培之。

【基本】為常綠灌木，高六尺餘，葉長橢圓形，有鋸齒。秋

末，葉間開花，色白，五瓣，雄蕊甚多。果實扁圓

三角形，熟則裂開，散出種子三粒。春季採嫩葉，

可為藥用之。

【成分】含有咖啡鹼 $C_8H_{10}N_2O_2 + H_2O$ 及茶素

(Thein) 單寧 (Tannin) 芳香油，蛋白質，及灰分
等。

【功效】為興奮藥，及利尿藥；可用於阿片等之中毒。

其葉氣味苦甘，微寒，無毒。治癰瘡，利小便，去
痰熱，止煩渴。令人少睡，有悅志，能下氣，消食

，破熱氣，除瘴氣，利大小腸，清頭目。治中風，
傷暑，泄痢，可和醋煎服，甚效。頭痛者，和川芎
，葱白煎服。其子氣味苦寒，有毒。治喘急，咳嗽
，去痰垢。搗仁，洗衣，除油膩。

【禁忌】據李時珍曰：服威靈仙，土茯苓者，忌飲茶。

【學說】李時珍曰：茶有野生，種生者，用子，其子大如指

頂，正圓，黑色。其仁入口，初甘，後苦，最殺人
喉；而閩人以榨油，食用。二月下種，一坎須百顆

，乃生一株，蓋空殼者多，故也。畏水，與日，最

宜坡地，蔭處。清明前采者，上；發雨前者，次之

；此後皆老者爾！

【別稱】又名苦槎，櫻，葢，葢。

荔枝

(無患樹科)

【學名】Nephelium Litchi Camb.

【產地】閩粵四川之田野間，多栽植之。

【基本】為常綠喬木，其形似龍眼，而較大，幹高十五尺，

葉為羽狀複葉，小葉有尖，頭有透明之小點，開花

無花瓣，萼之裂片，排列如鱗合樣。其實及其核殼
等，皆供藥用之。

「功效」其實氣味甘平，無毒。能止煩渴，去頭重，心躁，

背脊勞悶。可以通神，益智，健氣。治瘰癧，黧黃

，赤腫，疔腫，小兒痘瘡。其核氣味甘溫而澀，無

毒。治心痛，小腸氣痛，可以一枝煨存性，研末，

新酒調服。又治癩疔氣痛，婦人血氣刺痛。其殼治

疔瘡出不爽快，可煎湯飲之。其花及皮根治喉痺腫

痛，用水煮汁，細細含嚥，取瘰而止。

「用量」核用四。○——一。○。○服之。

「學說」李時珍曰：荔枝，乃炎方之果，性最畏寒，易種，

而根浮。其木甚耐久，而經數百年後，猶結實者。

其實生時肉白，乾時肉紅，日晒，火烘，鹵浸，蜜

煎，皆可。

「別稱」又名離枝，丹荔。

伏苓

(菌類)

「學名」*Trichyina coocis*, Fr.

「產地」多生於山野之松林間。

「基本」為菌類之一種，其狀似塊，大如拳形，皮黑而皺，

肉白微赤；其包根而質鬆者，別為伏神，皆供藥用

之。

「成分」含有皮克寧之成分。

「功效」為利尿藥：可用於水腫，腳氣病等。

其氣味甘平，無毒。治胸脇逆氣，憂悲，驚邪，惡

悸，心下結痛，寒熱，煩滿，欬逆，口焦，舌乾。

利小便，止消渴，安魂，養神。去大腹淋漓，腸中

痰水，水腫，淋結。開胸膈，調臟氣，伐腎邪，益

神氣，開胃，止嘔。治肺痿，痰壅，心腹脹滿，小

兒驚癇，女人熱淋。補五勞七傷，開心，益志，強

健忘，暖腰膝，安胎，除濕，益燥，和中，益氣，

逐水，煖脾，生津，導氣，平火，止瀉，除虛熱，

開腠理，瀉膀胱，益脾胃，治腎積，奔豚。其伏神

氣味甘平，無毒。能辟邪氣，療風眩，風虛，五勞

，口乾。止驚悸，能開心，益智，安魂魄，養精神

，補勞乏，治心下急痛，堅滿，人虛；而小腸不利

者，加而用之。其神木治偏風，口面喎斜，毒風，

筋攣不語，心神驚掣，虛而健忘。治腳氣，痺痛，

諸筋牽縮。其赤茯苓破結氣，瀉心小腸膀胱濕熱

，利尿，行水。其伏苓皮治水腫，崩服，通水道，

開腠理。

【用量】八。〇——一五。〇服用。

【禁忌】惡白斂。畏牡蒙，地榆，雄黃，秦朮，龜甲。忌米醋，及酸物。

【學說】李時珍曰：下有茯苓，則上有靈氣，如絲之狀。山人亦時見之，非兔絲子之兔絲也。注淮南子者，以兔絲子，及女羅為說誤矣。茯苓有大如斗者，有堅如石者，絕勝；其輕虛者，不佳，蓋年淺，未堅，故爾！

【別稱】又名伏靈，伏兔，松腴，不死疔；抱根者，名：伏神。其心內之木，名：神木；又稱：黃松節。

茵芋

(苦香科)

【學名】*Scimmia japonica*, Thunb.

【產地】多生于深山幽陰之地。

【基本】為一種小灌木，莖略平滑，葉長橢圓形，互生。其

頂端着綠白色之花，花瓣四枚，核果肉質，熟則赤色。其莖葉可取之，為藥用。

【成分】含有 *Mirmanekin* 之毒質。

【功效】其莖葉氣味苦溫，有毒。去五臟邪氣，心腹寒熱，鼠瘻，如瘡狀發作，有時諸關節風濕，痺痛。療風

濕，四肢腳弱。治男女軟脚，毒風，拘急，癱瘓，一切冷風，筋骨怯弱，可灸用之。

【學說】蘇頌曰：今雍州，絳州，華州，杭州亦有之，春生苗，高三四尺，莖赤，葉似石榴而短厚；又似石南葉。四月開細白花，五月結實，三月，四月，七月采莖葉，日乾。

茵陳蒿

(菊科)

【學名】*Artemisia capillaris*, Thunb.

【產地】田野，河邊，及砂地間，多產生之。

【基本】為多年生草，葉似胡蘿蔔，有白毛，密生。枝梢之葉，細裂，如絲。夏日抽莖，二尺許，開小頭狀花，綠色，排列如穗。其莖葉，可入藥用之。其苗經冬不死而生，故名茵陳。

【功效】為利尿藥；乃治黃疸之特效藥。

其莖葉氣味苦平微寒，無毒。去風濕，寒熱，邪氣，熱結。治黃疸，小便不利。除頭熱，去伏瘕，通關節，去滯熱；傷寒亦可用之。石茵陳，治天行時疾，熱狂，頭痛，頭風，眼疹，瘡癤，女人癩癧，

，並開積之能。

【用量】四。○——二。○服用。

【製劑】1 茵陳丁幾 *Tinctura Artemisiae caudatae*。

此即以茵陳莖葉一〇。○浸於稀酒精五〇。○中，經旬日後，而濃過之，製成一種液體。一日三回，與以五。○——一〇。○服用，為利尿藥。

【禁忌】忌火。

【學說】李時珍曰：茵陳，昔人多許為菘，故入藥用；山茵陳，所以別家茵陳也。

羌蔚

(唇形科)

【學名】*Teucrium shibatae* T.

【產地】多野生於路傍，及田野之間。

【基本】為越年生草，莖高四五尺許，葉呈圓形，略似艾葉，有三裂，或五裂。夏初開淡紫花，又名：益母草；(另有一種白花者，其類不同，名曰：蓬菜，亦可食。○) 其子名曰：羌蔚子，皆供藥用之。

【功效】為通經藥，收斂藥。

其莖氣味辛甘微溫，無毒。能活血，破血，調經，解毒。治胎漏，產難，胎衣不下，血暈，血風疼痛

，閉中，瀉下，尿血，瀉血，疔瘡，痔疾，打撲內損瘀血，大小便不通，去浮腫，下水腫，消惡毒，疔腫，乳癰，丹遊等毒，皆可敷之。○凡子死腹中，產後血脹，悶滿，皆可搗汁服之。○又可滴汁入耳中，療膿耳。○更可加入面藥，令人光澤，治粉刺，癬疹。○其子氣味相同，能明目，益精，除水氣，療血逆，大熱，頭痛，心煩，產後血脹。○春仁生食，能補中，益氣，通血脈，填精髓，止渴，潤肺，治風，解熱，順氣，活血，養肝，益心，安魂，調女人經脈，崩中，帶下，產後胎前諸病。○

【用量】二。○——六。○服用。

【製劑】1 益母草丁幾 *Tinctura Teucrium shibatae*。

此即以羌蔚莖葉五。○，浸於稀酒精一〇。○中，經五日後，而濃過之，製成一種液體，一日三回，與以二。○——四。○服用，為通經藥。

【禁忌】忌火，及銅鐵器。

【學說】李時珍曰：羌蔚，近水濕處，甚繁。春初生苗，如嫩蒿，入夏長三四尺，莖方，如黃麻莖。其葉如艾葉，而背青。一梗三葉，葉有尖歧，寸許一節，節

生穗，叢簇抱莖。四五月間，穗內開小花，紅紫色，亦有微白色，每穗內有細子四粒，粒大如同苦子，有二稜，褐色。

【別稱】谷母，益明，頑蔚，雅，野天麻，豬麻，火秋，鬱泉草，苦低草，夏枯草，土質汗。

茶蛙蟲

【基本】據李時珍云：此裝茶籠內蛙虫也。取其屎用為藥。

【功效】其蛙屎可治耳流惡水，研末，日日繳淨，搽之。

荆芥

(唇形科)

【學名】*Nyctea japonica* Maxim.

【產地】多栽培於園圃中；但亦有野生者。

【基本】為一年生草，莖柔軟，高尺許，葉為箭鏃形，淡黃綠色，秋開小唇形花，色綠，為總狀花序，略如紫蘇，故又名假蘇。實中有細子，黃赤色。其莖穗可採取，而入藥用之。

【成分】含有揮發油，及樹脂等。

【功效】為解熱藥；有驅風，發汗之作用。

其氣味辛溫，無毒。能治寒熱，鼠瘻，瘰癧，生瘡。破結聚，下瘀血，除濕疸，去邪氣，除勞渴，冷

風，出汗，可養汁，服之。療疔腫，顧毒，可搗爛和醋敷之。單用治惡風，賊風，口面喎斜，遍身麻痺，心虛，忘事。並能益力，添精，辟邪，去毒，通血脈，助脾胃。治血勞，風氣，瘰癧，背脊疼痛，虛汗，脚氣，筋骨煩疼，傷寒，頭痛，頭旋，目眩，手足筋急。利五臟，消食，下氣，醒酒，可煎茶，飲之。又治暴傷寒，能發汗。治婦人血風，疥疥，為要藥。產後中風，強直，可研末，酒服。又散風熱，清頭目，利咽喉，消瘡腫。止吐血，衄血，下血，血痢，崩中，痔漏。

【用量】一。五——四。五服用。

【製劑】1 荆芥丁棧 *Tripolium Nipponae*

此即以荆芥五。○浸於稀酒精一〇。○中，經旬日後，而濾過之，製成一種液體。一日三回，與以一。○——三。○服用，為解熱驅風藥。

【禁忌】忌火。反魚，蟹，河豚，驢肉。

【採製】去枝取花穗，晒乾，備用。

【學說】李時珍曰：荆芥，原是野生，今為世用，遂多栽培。二月布子，生苗，炒食，辛香。方壘，細葉，似

獨莖葉，而狹小，淡黃綠色。八月開小花，作穗，成房，房如紫蘇，房內有細子，如紫蘇子狀，黃赤色，連穗收採用之。

【別稱】又名假蘇，蕓芥，鼠葵。

荆蒞

【基本】此為牡荆 (Vicia Negundo, L.) 之製出品。據李時珍云：其法可用新採之莖。截成一尺五寸長，架於兩磚上，中間燒火炙之。兩頭以器承取，熱服，或入於藥中。又法截二尺四寸長，束入瓶中，仍以一瓶合住，嚴密固封，以糠火煨燒，其汁瀝入下瓶之中，亦妙。

【功效】為解熱藥：有散風，清涼之作用。

其氣味甘平，無毒。以瀝飲之，去心煩，悶熱，除頭風，目眩，吐逆。治小兒驚癇，止消渴，除痰熱，開經絡，導痰涎，行血氣，解熱痢。

【用量】一五〇——三〇〇——六〇〇。可和生薑汁五〇——一〇〇服用之。

荆三稜

(莎草科)

【學名】Scirpus maritimus, L.

【產地】多生於沼澤，或水邊。

【基本】為多年生草，春時叢生，葉似蒲而狹。夏秋抽莖，高四五尺，莖端開花，六七枚，雄花在上，雌花在下，皆細碎成穗，黃紫色，結子甚細。其葉莖花實俱有三稜，故名。莖中有白穰，剖之織物，柔韌如藤。其根呈橢圓形，稍壓扁之塊根，三四個連生，外皮為黑褐色，多密生毛茸，市間悉削去之，至有稜角，內部為淡褐色，緻密而堅硬，可取為藥用。

【功效】其氣味苦平，無毒。去老癬，癩癧，積聚，結塊，產後惡血，血結。通月水，墮胎，止痛，利氣。治氣脹，破積氣，消撲損瘀血，婦人血脈不調，心腹

痛。產後腹痛，血逆，心膈痛，飲食不消，通肝經積血。癩疥腫，堅硬，可下乳汁。

【用量】一回二〇——四〇服用。

【採製】取根須用醋浸一日，炒，或煮熟，焙乾，入藥。

【學說】李時珍曰：三稜，多生荒廢陂池，濕地，春時叢生，夏秋抽高莖，莖端復生數葉，開花六七枚，花皆細碎，成穗，黃紫色，中有細子。其葉莖花實，俱有三稜，並與香附苗葉花實一樣，但長大爾！

〔別稱〕又名京三稜，雞爪三稜，黑三稜，石三稜。

草鼓

〔基本〕據陳藏器云：生巴西諸國，草似非狀，歧出花中，

彼人食之。

〔功效〕其氣味辛平，無毒。除惡氣，可以調中，益五臟，

開胃，令人能食。

草綿

(錦葵科)

〔學名〕*Tosyphim herbaceum, L.*

〔產地〕原產於東印度，及亞刺比亞；近來中國各處，皆有

栽種之。

〔基本〕為一年生草，莖高三四尺，葉為掌狀分裂，葉柄甚

長，互生，托葉二片，形狹而尖，秋月葉腋開花，

花冠五瓣，呈黃色。果實為蒴果，形略如桃，熟則

裂開。其種子被白毛，即棉花等，可用為藥。

〔成分〕含有脂肪，纖維素，及棉子油等。

〔功效〕其氣味辛熱，無毒。治腸風，便血，瀉痢，赤白帶

下，可燒灰存性，或瓦焙少焦，服用之。

草犀

〔基本〕據陳藏器云：草犀，生衡婁洪饒間，苗高二三尺，

獨生，根如細辛；生水者，名水犀。李珣云：廣

州記云：生嶺南，及海中，獨莖，對葉而生，如燈

臺草，根若細辛，可採取之，而為藥用。

〔功效〕其氣味辛平，無毒。解一切毒氣，虎狼毒蟲咬傷，

宜燒，服之；臨死者，亦得活。治天行瘧瘵，欸嗽

，痰壅，飛尸，喉痺，疔腫，小兒寒熱，丹毒，中

惡，血痢等，可以痰汁，服之。

草蒿

(菊科)

〔學名〕*Artemisia annua, L.*

〔產地〕多自生於水濕之地。

〔基本〕為一年生草，高至三四尺。葉為複葉，細裂，花小

，筒狀；花冠帶黃色，為頭狀花序。其莖根子葉，

皆供藥之。

〔功效〕為解熱藥，可用於虛勞骨熱等。

其氣味苦寒，無毒。治骨蒸勞熱，產褥虛熱，風毒

，熱毒，久瘧，久痢，疥癬，惡瘡。並能補中，益

氣。其根莖子葉氣味，及功效相同；但不可合併用

之。

〔用量〕三〇——六〇服用。

草石蠶

(唇形科)

【學名】Stachys Sieboldi, Miq.

【產地】多栽培於園圃之間。

【基本】為多年生草，莖方形，高三尺許；莖與葉皆密生毛

茸，葉對生，有鋸齒；下部之葉，長心臟形；上部之葉，長卵形。秋日花生於上部之葉腋中，連綴如

穗形，唇形，花冠呈淡紅紫色。其生於地下之莖，先端肥大，肉質，呈連珠狀，白色，大如小指頭者，頗多；可採取之，而供藥用。

【功效】其氣味甘平，無毒。能除風，破血；治溪毒，可灸食之。又能和五臟，下氣，清神，散血，止痛，可焙乾，或搗末，用酒服之。

【學說】李時珍曰：草石蠶，即今甘露子也。荆湘江淮以南

野中有之，人亦栽蒔，二月生苗，長者近尺，方莖，對節，狹葉，有齒，並如雞蘇；但葉皺，而有毛茸，四月開小花成穗，一如紫蘇花穗，結子如荊芥

子。其根連珠狀，如老蠶。五月掘，蒸熟食之，味如百合，或以蘿蔔瀉，及鹽菹水收之，則不黑。

【別稱】又名地蠶，土蠶，甘露子，滴露，地瓜兒。

草薺

(蕁荷科)

【學名】Ammannium costatum, Roxb.

【產地】產於亞洲之東印度羣島，及非洲熱帶之地方。

【基本】為多年生草，根似高良薑，葉尖而長。春日開花，呈黃白色，成穗狀，實稍小於龍眼，尖端銳，皮光滑。可取其仁，供藥用之。

【功效】為健胃藥，解毒藥。

其仁氣味辛溫而澀，無毒。能溫中，治心腹痛，止嘔吐，去口臭，又治下氣，霍亂，一切冷氣，消酒毒。可以調中，補胃，健脾，消食，去客寒，心與胃痛。瘰癧，寒瘡，傷暑，吐下，洩痢，噎膈，反胃，痞滿，吐酸，痰飲，積聚，婦人惡阻，帶下。除寒，燥濕，開鬱，破氣，殺魚肉毒。其花氣味辛熱，無毒。除下氣，止嘔逆，霍亂，能調中，補胃氣，消酒毒。

【用量】一。五——四。〇服用。

【禁忌】忌鐵。

【採製】運殼以鈣堊，糖火煨熟，去皮用之。

【學說】李時珍曰：草薺，草果，雖似一物；然微有不同

。今健葦所產葦莖，大如龍眼，而形微長；其皮黃白，薄而殘峭；其仁大如縮砂仁，而辛香，氣和。當廬所產草果，長大如訶子；其皮黑厚，而穢密；其子粗，而辛臭，正如斑蝥之氣，彼人皆用筆茶，及作食料。

【別稱】又名豆蔻，漏蔻，草果。

草烏頭

(毛茛科)

【學名】*Aconitum fischeri* Reiche.

【產地】多自生於山野，及原野之間。

【基本】為多年生草，形狀與烏頭相似，莖高三四尺，花色

濃紫，或紫碧色。其根可採取之，而供藥用。

【功效】為祛痰藥。

其氣味辛溫，而有大毒。能搜風，勝溫，除頑痰，

去寒濕。治頭痛，目痛，耳鳴，耳癢，喉痺，齒痛

，上氣，欬逆，胸膈痰冷，飲食不下。去腹痛，積

塊，水洩，寒痢。癩破傷，癰腫，疔毒。

【用量】二〇—三〇五服用。

草蜘蛛

【基本】為蜘蛛類 (*Arachnida*) 之一種。其腹稍長，恒於草木

枝葉之間，有取為藥用者。

【功效】據本草拾遺云：能治疔毒，可搗膏敷之。其網能治

瘡疾，瘤贅，疣子。

草蘭茹

(大戟科)

【學名】*Euphorbia albobothrya* Morr. et Dene. (*E. Roeburnum*,

Fr. et Sav.)

【產地】生於陰濕之地。

【基本】為一年生草，莖高二尺許，葉為卵形，莖葉中皆有

白汁；春間開淡黃色之小花。其根可採取之，而供

藥用。

【成分】含有白色膠樣液，及漆樣之黏液。

【功效】其氣味辛寒，而有小毒。能蝕惡肉，去死肌，除熱

痺，破癰瘰，排膿血，殺疥蟲。治大風，熱氣。

【禁忌】惡門冬。

【學說】李時珍曰：范子計然云：蘆茹，出武都，黃色者，

善。草蘭茹，出健康，色白，今處處有之，生山原

中。春初生苗，高二三尺，根長大，如蘿蔔蔓薯狀

，或有歧出，皮黃赤，肉白色，破之有黃漿汁。莖

葉如大戟，而葉長微闊，不甚尖，折之有白汁。抱

莖有短葉，相對，圓錐狀，葉中出莖，莖中分二小枝。二三月開細紫花，結實如豆大，一顆三粒相合，生青，熟黑，中有白仁，如續隨子之狀。

〔別稱〕又名蘭茹，離婁，掘掘。

苳

(脣形科)

〔學名〕*Furilia oenoides*, L.

〔產地〕多栽種於園圃間。

〔基本〕為一年生草，春末下種，而生，莖高二尺餘，枝梢出長穗，開脣形之小白花；至秋間種子成熟，可取之，為藥用。

〔成分〕含有甾子油，護謨等。

〔功效〕其氣味辛溫，無毒。能除寒，降氣，溫中，化痰，利膈，瀉腸胃，潤心肺，通二便。治上氣，欬逆，喘急，虛勞，霍亂嘔吐，反胃，癥結，風結。

〔用量〕四〇——八〇服用。

〔別稱〕又名白慈。

茜草

(茜草科)

〔學名〕*Indigo caribolica*, L. var. *mongiata*, Miq.

〔產地〕南歐及東歐，栽種者為最多。

〔基本〕為多年生之宿草，莖方，中空，有向下之刺，葉四片，輪生，長卵形，有葉柄，柄有刺。夏月開小花，呈淡黃白色，花冠五裂，筒甚短，果實有漿質，色黑，如球。其根可採取之，而供藥用。

〔成分〕含有 Alizarin $C_{14}H_8O_4$ 及 Purpurin $C_{11}H_8O_5H_2O$ 之成分。

〔功效〕為通經藥。對於血液，有新陳代謝之機能。

其氣味苦寒，無毒。去寒濕，風痺，黃疸，能補中，止血，治內崩，下血，膀胱不足，除蠱毒，久服益精，輕身。治六極，傷心肺，吐血，瀉血，又止鼻洪，尿血，產後血暈，月經不止，帶下，撲損瘀血，泄精，痔瘻，疥癬，排膿，可用酒煎服。更能通經脈，治骨節風痛，活血，行血。

〔用量〕三〇——六〇服用。

〔製劑〕茜草根丁糖 *Tinctura Radix Indigae*.

此即以茜草根五〇〇浸於稀酒精二〇〇中，經五日後，而濾過之，製成一種液體。一日三回，與以二〇——六〇，為通經藥。

〔禁忌〕忌鐵，鉛；畏鼠姑汁。

【學說】李時珍曰：此草於十二月生苗，蔓延數尺，方莖，

中空，有筋，外有細刺，數寸一節，每節五葉，葉

如鳥藥葉，而糙澀，面青，背綠。七八月開花，結

實如小椒而大，中有細子。

【別稱】又名蒔，菜菔，茹蕨，地血，染絳草，血見愁，風

車草，過山龍，牛蔓。

蒔蒿

(菊科)

【學名】*Chrysanthemum Coronarium*, L.

【產地】多栽種於園圃之間。

【基本】為一年生草，或越年生草，高至二三尺，葉為二回

羽狀，有深裂，互生。莖頂着花，黃色，或白色。

其花周圍，為舌狀花冠，中部為筒狀花冠。

【成分】含有菊糖之澱粉樣物質。

【功效】其氣味辛而微平，無毒。能利腸胃，通血脈。治五

臟惡邪，胸膈臭爛，大渴，暴熱，惡瘡。

【學說】李時珍曰：蒔蒿，八九月下種，冬春采食。肥莖，

花葉微似白蒿。其味辛甘，作蒿氣。四月起稿，高

二尺餘，開淡黃色花，狀如單瓣菊花，一花結子近

百，成球，如地菘，及苦蕒子，最易繁茂，此菜自

古已有。

【別稱】又名蓬蒿。

粉錫

Zincum oxydatum.

【基本】此為酸化亞鉛，呈白色細微無晶形，無臭，無味之

粉末，多供外用藥，而用之。

【成分】含有 ZnO 之成分。

【功效】為乾燥藥，收斂藥，可用於濕疹，皮疹，裂傷，潰

瘍，作外用之撒布粉等。

其氣味辛寒，無毒。能除伏尸，毒蠱，殺三蟲，去

蠶癩，消惡瘡，止小便，能墮胎，除積聚不消；炒

焦服用，可止小兒疳痢。治癰腫，癩爛，嘔逆，癩

癩，小兒疳氣，止泄痢，久積痢，食復，勞復，墜

痰，腫脹，瘰癧，狐臭，黑鬚髮。

【製劑】粉錫膏 *Ung. Zinc. oxydati*.

此即以粉錫五。○豚脂四五。○作成軟膏，為外

用乾燥之軟膏料。

【學說】陶弘景曰：即今化鉛，所作胡粉也。

【別稱】又名解錫，鉛粉，鉛華，胡粉，定粉，瓦粉，光粉

，白粉，水粉，宮粉。

粉霜 *Hydrogenium Chloratum.*

【基本】為氯化第一水銀，呈微帶黃色之白色結晶狀粉末，可為藥用之。

【成分】含有 $\text{Cl}^{\ominus}\text{Hg}^{\oplus}$ 之成分。

【功效】為瀉下藥，或為利尿藥。

其氣味辛溫，有毒。能下痰涎，消積滯，利水，與

輕粉功用相同。

【用量】〇・〇五——〇・一——〇・五服用。

【禁忌】畏蕪麥，稗灰，硫黃。

【學說】李時珍曰：以汞粉，轉生成霜，故曰：粉霜。

【別稱】又名水氣霜，白雪，白霜砂。

豹

【學名】*Felis pardus.*

【產地】多產於非洲，及亞洲。

【基本】為肉食類之貓類，體大為污黃色，具有黑斑，多作

圓形，故俗有金錢豹之名。昔時有取其肉脂等，而

為藥用者。

【功效】其肉氣味酸平，無毒。能安五臟，補絕傷，輕身，

益氣，冬食，利人。壯筋骨，強志氣，耐寒暑，令

人猛健。辟鬼魅，神邪，宜腎。其脂合生髮膏，朝

塗，暮生；亦入面脂而用之。其鼻除狐魅，可同狐

鼻，水煎服之。其頭骨燒灰，淋汁，去頭風，白屑

。作枕用，能辟邪。

【別稱】又名程，失刺孫。

豺

【學名】*Canis hodophilax, Temm.*

【產地】多產於亞細亞洲之東部。

【基本】為食肉類之豺類，體較狼稍小，較犬則口大，而耳

小，習性與狼相近。更有長斑豺及圓斑豺之二種，

大抵因其體毛之色澤與形狀，而命名也。

【功效】其肉氣味酸熱，有毒。食之無益，能損人精血。其

皮能療諸疥癩，腹中諸瘡，可煮汁飲之，或燒灰，

酒服之。

【別稱】豺狗。

迷迭香

(唇形科)

【學名】*Teucrium officinale, L.*

【產地】多產於地中海之地方。

【基本】為常綠小灌木，葉線狀，草質，花淡藍色，生於其

莖上部之葉腋。其葉有時亦供藥用之。

【成分】含有多量迷迭香油。

【功效】民間：有用為與奮驅風藥者；但近來多用其油。

其氣味辛溫，無毒。除惡氣，令人衣香，燒之去鬼；和差活作丸，燒之，辟蚊。

【用量】一日五〇——一〇〇為浸劑等服用之。

【製劑】1. 迷迭香油 *Oleum Rosmarini*;

此即以迷迭枝葉，而蒸發之油，以供外用，而為毛虱，疥癬等之擦料；但近來多作為化妝品之香料。

【學說】李時珍曰：魏文帝時，自西域移植庭中，時曹植等各有所賦，大意其草修幹，柔莖，細枝，弱根，繁花，結實，嚴霜弗凋，收采幽殺，摘去其葉，入袋佩之，芳香甚烈，與今之排香同氣。

郎君子

【基本】據李珣云：郎君子，生南海，有雌雄，狀似杏仁，呈青碧色。欲驗真假，口內含熟，放醋中，雌雄相逐，遂巡便合，即下卵，如粟狀者真也；亦難得之物。李時珍云：顧玠海槎錄云：相思子，狀如螺中實，如石大，如豆藏篋筒，積歲不壞，若置醋中，

即盤旋不已。案此郎君子也。

【功效】據海藥本草云：專治婦人難產，以手把之，便生，

極驗。

豇豆

(豆科)

【學名】*Vigna sinensis*, *Lamark.*

【產地】庭園間多栽培之。

【基本】為一年生草，莢有莖性，能纏繞於他物上，葉為羽狀複葉，自三小葉而成。夏日開花，蝶形，花冠色淡青，帶紫。結實成莢，長二尺許，中含帶紫黑色之豆粒，可為藥用之。

【功效】其氣味甘鹹而平，無毒。能理中，益氣，補腎，健胃，和五臟，調營衛，生精髓，止消渴，吐逆，泄痢，小便頻數，解毒，消腫，散血。

【學說】李時珍曰：豇豆，處處三四月種之，一種蔓生，丈餘，一種蔓短。其葉俱本大，末尖，嫩時可茹。其花有紅白二色；莢有紅白，紫赤斑駁數色，長者至二尺，嫩時充菜，老則收子；此豆可菜，可果。

釜臍墨

【基本】此即鍋底之黑灰也。

【功效】其氣味辛溫，無毒。除中惡，療蠱毒，止吐血，血運，可以酒，或水，溫服二錢。又可塗金瘡，能止血，生肌，消食積，退舌腫。治喉痺，口瘡，陽毒發疔。

【別稱】又名釜月中墨，鑿墨，釜煤，釜焰，鍋底墨。

陟釐

【基本】據郭璞云：釐，水草也。一名：石髮，江東食之。

按石髮，有二；生水中者，為陟釐；陸地者，為烏韭。

【功效】其氣味甘而大溫，無毒。除心腹大寒，能溫中，消穀，強胃氣，止洩痢，治天行痘病，心悶，可搗汁服用。又療丹毒，赤遊，可搗汁塗之。

【別稱】又名側梨，水苔，石髮，石衣，水綿，蘊。

骨碎補

(水龍骨科)

【學名】*Davallia bullata*, Wall.

【基本】為多年生之隱花植物，根莖細長，延繞於樹上，或岩石上，密生黑褐色之鱗毛，葉為三出羽狀複葉。夏日背生多數子囊羣，有包被如殼斗，其根可採取之，而為藥用。

【功效】其氣味苦溫，無毒。能破血，止血，補腎，積骨，去骨中毒氣，風血疼痛，五勞六極，手足不收，上熱下冷，腐蝕爛肉，殺蟲，可研末，用豬腎夾煨，空心食之，能治耳鳴，腎虛，久泄，牙疼。

【用量】五。○——一。○。○服用。

【採製】採根。用銅刀刮去黃赤毛，細切，蜜拌潤，甑蒸一日，曬乾用之。如急用只焙乾，不蒸，亦得也。

【學說】馬志曰：骨碎補，生江南，根寄樹石上，有毛，葉如蕁蘭。李時珍曰：其根扁長，略似鷲形。其葉有極缺，頗似蕁葉；謂葉如蕁蘭者，殊謬；如石葦者，亦差。

【別稱】又名猴囊，胡猴蕈，石毛蕈，石蕁蘭。

骨泔波樹

(蕁科)

【學名】*Capparis officinalis*, L.

【產地】原產於南亞美利加之地方。

【基本】為常綠樹木，高至二十尺，葉為羽狀複葉，小葉卵形，約四片，乃至十片。花有四萼片，無花冠，果實為莢，略帶圓形。其樹幹流出之樹脂，可為藥用。

【成分】含有 Yell Copalva 等之成分。

【功效】近來多用其揮發油等之製劑。

【製劑】1. 昔非波拔爾撒談 Balsanum Copalva

此為昔非波之樹幹傷痕，而流出之拔爾撒談，即揮發油之樹脂液也。專為淋病之內服藥；但常在急性炎症發作後，而用之。一日三四回，用其〇・五——二・〇，作為膠囊劑，丸劑，乳劑等。此外又有用於慢性膀胱加答兒，慢性氣管枝加答兒，肺黏液漏，咯血等。更有外用為尿道注射料，直腸灌腸料；及坐藥料等。

鬼臼

(小蘗科)

【學名】Podophyllum peltatum, Hoo.

【基本】據黃山谷集云：唐婆鏡，葉底開花，俗名羞天花，即鬼臼也。歲生一白，滿十二歲，則可為藥。又鄭樵通志云：鬼臼葉，如小荷，形如烏掌，年長一莖，莖枯，則根為一白，亦名：八角盤，以其葉似之也。今人所謂：獨脚蓮者也。又名：山荷葉，獨脚草，旱荷葉，八角鏡。南方深山陰密處有之，北方則惟諸門山，王屋山有之，一莖獨上，莖生葉，心

而中空。一莖七葉，圓如初生小荷葉，面青，背紫，揉其葉，作瓜李香，開花在葉下，亦有無花者；其根全似蒼朮，紫河車。又唐獨孤浴丹房鏡源云：

尤律草，有二種，根皆似南星，赤莖直上，莖端生葉，一種葉凡七瓣，一種葉作數層，葉似蓖麻，面青，背紫，而有細毛。葉下附莖，開一花，狀如鈴鐸，倒垂，青白色，黃蕊中空，結黃子，風吹不動，無風自搖，可制砂疝。按此即鬼臼之二種也。

【功效】其根氣味辛溫，有毒。能殺蟲，避邪，解百毒，去大毒，療欬嗽，喉結，風邪，除目中膚翳，不入湯。○又能下死胎，治邪瘧，癰疽，蛇毒。

【禁忌】畏垣衣。

【別稱】又名九白，天白，鬼藥，解毒，爵犀，馬目毒公，害母草，羞天花，尤律草，瑤田草，獨脚蓮，獨脚草，山荷葉，旱荷，八角盤，唐婆鏡。

鬼齒

【基本】據陳藏器云：此即廬竹根，先入地者。

【功效】其氣味苦平，無毒。治中惡，注忤，心腹痛，可煮汁，服之。又用其汁服之，能下骨硬。更可燒灰，

存性，加入輕粉少許，油調，塗擦小兒頭疔。

〔別稱〕又名鬼鍼。

鬼針草

(菊科)

〔學名〕*Bidens bipinnata*, L.

〔產地〕多生於原野之間。

〔基本〕爲一種草本，莖高二三尺，葉爲三出之二回羽狀複葉，對生。秋末各枝梢着頭狀花，黃色；花後結實；其果實長五六分，頂上有刺毛；可採取之，而供應用。

〔功效〕其氣味苦平，無毒。治蜘蛛及蛇等咬傷，可搗汁服之，並可塗之。

〔學說〕陳藏器曰：生池畔，方莖，莖有極，子作釵腳，著人衣，如針。北人謂之鬼針；南人謂之鬼釵。

鬼督郵

〔學名〕*Glehnia littoralis*, R. et S.

〔基本〕據李時珍云：鬼督郵，與及己同類，根苗皆相似；但以根如細辛，而色黑者，爲及己。根如細辛，而色黃白者，爲鬼督郵。其根可採取之，而供藥用。

〔功效〕其氣味辛苦而平，無毒。除鬼疔，卒忤，中惡，心

腹邪氣，百毒，溫瘧，疫疾。能強腰腳，益智力。

〔採製〕取根，細到，用生甘草水煮，經一伏時，日乾，用之。

馬

〔學名〕*Equus caballus*, Linn.

〔基本〕此屬奇蹄類，體質堅實，軀格亦高，頸長有鬃，尾叢生長毛。頸長，適於食地面之草。尾毛長，適於拂去蚋蠅等害蟲。耳殼直立，能自由運動，以測取音之方面。各股有一蹄，(其祖先原有五趾)門齒，(上下頰各六枚)與臼齒(上下頰各十二枚)之間。有空隙。牡有犬齒四枚，而牝無之。臼齒面有珠璣質之突起，適於磨碎植物質也。年老則此突起，漸次磨滅，故檢視其齒，可判定其年齡也。昔時有割割其臟器，而藥用者。

〔功效〕其肉氣味辛苦，冷而有毒。止傷中，除寒熱，下氣，長筋骨，強腰脊，壯健，強志。治頭白禿，可煮汁洗之。其肺治寒熱，小兒莖萎。其頭骨氣味微甘，寒有小毒。治齒痛，頭疔，燒灰敷之。其骨氣味有毒，燒灰和醋，塗敷小兒頭疔，耳疔。其脛骨氣

味甘寒，無毒。煨存性，能降陰火，凡中氣不足者

，用之，可代黃芩，黃連。其懸蹄氣味甘平，無毒

。止驚邪，癩癧，辟惡氣，鬼毒，蠱毒，止痢，內

齒，齲齒，治婦人崩中，癩癧，齒痛，腹痛，療腸癰，下

瘀血，帶下，殺蟲。又燒灰，入鹽少許，搽走馬疳

蝕，甚良。其皮能催生，治小兒赤痢。其鬣毛有毒

，治小兒驚癇，女人崩中，燒灰服之，能止血，塗

惡瘡。其尾治女人崩中，小兒客忤。其腦有毒，能

墮酒。其血有大毒，如入人肉中，一二日便腫起，

逆心，即死。昔有人刺馬傷手，血入肉中，一夜致

死。其眼無毒，治驚癇，腹滿，瘡疾，小兒癩病，

與母帶之。其牙齒氣味甘平，而有小毒。治小兒馬

癩，水磨服之。又治癰疽，疔腫，可燒灰塗之。其

乳氣味甘冷，無毒。止渴，解熱，作酪飲之。

馬刀

【學名】*Solanum candu, coumudi.*

【基本】爲同柱類之一種，體呈長筒狀，外套有膜，於前後

兩端開通。前方伸出足端，且爲導入食餌之開口，

後方爲水管，在泥沙中穿孔直立，受驚時直入砂中

。其殼等，供藥用之。

【功效】其殼氣味辛而微寒，有毒。能補中，去煩滿。治婦

人漏下赤白，寒熱，破石淋，殺禽獸，能除五臟間

熱。

【別稱】又名馬蛤，齊蛤，單母。

馬勃

(菌類)

【學名】*Lyophorodon bovista, L. (Trematumum Batsch)*

【產地】生於山林之陰地；惟蒙古之樹木腐敗，多生此物。

【基本】爲一種菌類之植物，狀似小球，長者大如頭，其色

暗褐，其質如綿，中含無數之孢子，熟則乾燥，自

頂端之孔中飛散，可採取之，而供藥用。

【功效】爲止血藥。

其氣味辛平，無毒。治惡瘡，疥癬。又可去膜，以

蜜拌揉，少以水調呷，治喉痺，咽痛。又清肺，散

血熱，解毒。

【用量】二〇——三〇。五服用。

【採製】用以生布張開，將馬勃於上摩擦，下以盤承取其末

，而用之。

【別稱】又名馬花，馬蒙，灰菰，牛屎菰。

馬陸 *Julia*

【基本】此屬馬陸類，除近於頭部數環節外，皆以二環節密合而成一環節，每環有脚二對。頭部之背面有觸鬚一對，觸之則卷曲不動。用時由開口於體側之腺放

出惡臭，以防禦之。昔時亦有取斯蟲，而為藥者。

，惡折，白禿。療寒熱，痞結，脇滿，能辟邪瘴。

【探製】凡收得馬陸，以鐵頭炒，至糠焦黑，取出，去糠，用竹刀刮去頭足，研末用之。

【別稱】又名白足，百節，千足，刀環蟲。

馬藜

(藜科)

【學名】*Polygonum Posumbu*, Huan. var. *blunoi*, Matsum

【產地】多生於原野之間。

【基本】為一種之雜草，莖高至一二尺，葉長橢圓形而尖，

互生。其鞘狀托葉之邊緣，有細長之剛毛甚多。初

夏開花，呈淡紅色，為穗狀花序。其莖葉等，可為

藥用之。

【功效】其氣味辛溫，無毒。能除腸中蛭蟲，輕身，伏丹砂

，雌黃。

【別稱】又名大藜，黑記草。

馬薊

【基本】據李時珍云：凡物大者，多以馬名；此草似芹，而大故也。俗稱野茴香，以其氣味子形微似也。馬薊與芹同類，而異種，處處卑濕地有之。三四月生苗，一本叢生，如蒿，白毛叢茸，嫩時，可茹。葉似水芹，而微小，似青薺葉，而色深。五六月開碎花，攢簇如蛇床，及薔薇花，青白色。結實亦似薔蘿子；但色黑，而重爾！其根白色，長者尺許，氣亦香，而堅硬，不可食。

【功效】其苗氣味甘辛而溫，無毒。能益脾胃，利胸膈，去冷氣，作茹食。其子氣味相同，能治心腹脹滿，開胃，下氣，消食，調味用之。治卒心痛，可炒研，醋服。又能溫中，暖脾，治反胃。

【別稱】又名牛薊，胡芹，野茴香。

馬蘭

(菊科)

【學名】*Aster tinctorius*, Koch. var. *aluticus*, Maxim.

【產地】生於山野中，為最多。

【基本】為多年生草，高至二三尺，葉長卵形而尖，粗糙，

有三大脈，鋸齒甚深。秋月莖頭枝梢開花，呈深紫色。其根葉可採之，而為藥用。

【功效】其氣味辛平，無毒。能破宿血，養新血，止鼻衄，吐血，合金疔，腫血疔，解酒疸，及諸菌毒，蠱毒，生搗塗蛇咬。又治諸瘡，及腹中急痛，痔瘡。

【用量】六〇——一〇〇服用。

【學說】李時珍曰：馬蘭，湖澤卑濕處甚多。二月生苗，赤

莖，白根，長葉，有刻齒，狀似澤蘭；但不香爾！

【別稱】又名紫菊。

馬牙硝

【基本】為朴硝之結於上，而生牙如圭角，作六稜形，玲瓏

洞澈可愛者，為藥用之。

【成分】含有硝酸加留誤之 NO_3 及硫酸那窩留誤之 NO_3 之

成分。

【功效】為瀉下藥，及利尿藥。

其氣味甘寒，無毒。能除熱，治陽強之病，傷寒，

痢疾，積聚，結癖，留血，停痰，痞滿，有推陳致

新之功。又能消疔腫，目赤，障翳，通經，墮胎。

【用量】四〇——八〇服用。

馬先蒿

(玄參科)

【學名】*Pedicularis resupinata*, L.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為多年生草，高至二三尺，葉長卵形，互生，或對

生。秋月開花，唇形，花冠呈紅紫色，或黃白色。

可取其全草，供藥用之。

【功效】其氣味苦平，無毒。治寒熱，鬼疰，中風，濕痺，

女子帶下，破石淋，膀胱中結氣，利大小便，療惡

瘡。

【學說】李時珍曰：別錄載：牡蒿，馬先蒿，原是二條。陸

機所謂：有子者，乃馬先蒿，而復引無子之牡蒿，

釋之，誤矣。

【別稱】又名馬新蒿，馬矢蒿，練石草，爛石草，虎麻。

馬兜鈴

(馬兜鈴科)

【學名】*Arctostaphylos debilis*, S. et Z.

【產地】山野及原野，多自生之。

【基本】為多年生之蔓草，葉為長心臟形，似薯蕷葉，而厚

大，端鈍。夏日開花，黃紫色，花冠作管狀，而不

整。其根及莖等，可供藥用之。

「功效」爲祛痰藥。

其質氣味苦寒，無毒。治肺熱，咳嗽，痰結，喘促，血痔，癰瘡，肺氣上急，坐息不得，效逆連連不止。又能清肺，補肺，去肺中濕熱。其獨行根氣味辛苦，冷而有毒。能除鬼疰，積聚，諸毒，熱腫，蛇毒，可用水磨，爲泥封之，一日三四次。又治血氣，利大腸，去頭風，癢癢，疥癬。

「用量」二〇——六〇服用。

「學說」蘇頌曰：馬兜鈴，今關中河東河北，淮襄浙州郡皆有之，春生苗，作蔓，繞樹而生，葉如山穞葉，而厚大，背白。六月開黃紫色花，頗類枸杞花。七月結實，如大棗狀，似鈴，作四五瓣。其根名雲南根，微似木香，大如小指，赤黃色，七八月採實，暴乾。

「別稱」又名郁泄藤，獨行根，土青木香，雲南根，三百兩銀藥。

馬鈴薯

(茄科)

「學名」*Solanum tuberosum*, L.

「產地」原產於南美智利國，近時圍圃間，多栽種之。

「基本」爲多年生草，高至二三尺，其塊莖，生於地中，外皮有白，與淡紅二色。葉爲羽狀複葉，有大小二種，小葉所成，花爲合瓣，花冠白色，或青紫色，集生於莖之上部。其塊莖等，可供藥用之。

「成分」含有多量澱粉，蛋白質，糖分等。

「功效」爲健胃藥，滋養藥。

民間多採取其塊莖，製造澱粉，以供酒精之原料。
馬齒莧 (馬齒莧科)

「學名」*Portulaca oleracea*, L.

「產地」園野各地，多自生之。

「基本」爲一年生草，莖微赤，平臥地上，葉形如倒卵，質厚而軟。花小，五瓣，色黃。莖葉嫩時，可煮曬爲蔬。其全草可採取之，而供藥用。

「功效」爲解毒藥，對淋病，及婦人陰部之黏液性分泌物，可內服之；又能貼布於諸疔。

其氣味酸寒，無毒。能破癥癖，止消渴，治女人赤白帶下，反胃，諸淋，金瘡，流血，陰腫。作膏塗濕癬，白禿，杖瘡；又止疔痢，腸痛；療癰疔，殺諸蟲，散血，消腫，利腸，滑胎，解毒，通淋；治

產後虛汗。

【學說】李時珍曰：馬齒莧，處處園野生之，柔莖，布地，

細細對生。六七月開細花，結小尖實，實中細子，

如芝麻子狀。人多采苗，蒸晒為蔬。

【別稱】又名馬莧，五行草，五方草，長命菜，及九頭獅子

草。

馬錢子

(馬錢子科)

【學名】*Strychnos nux vomica*, L.

【產地】多生於野地之中。

【基本】為常綠樹木，高十五尺許，葉卵形，有三肋，或五

肋，對生。花細小，花冠呈長筒狀，頂端五裂。雄

蕊着生於花冠之上，雌蕊之花柱頗長。其果實為漿

果，黃色；大如林檎，種子扁圓，有密毛，直徑約

五六分，可取為藥用。

【成分】含有 *Strychnin* 及 *Brucine* 之成分。

【功效】為苦味健胃藥，可用於慢性胃加答兒，胃痛，及其

消化不良，下痢等。

其氣味苦寒，無毒。治傷寒，熱病，咽喉痺痛，消

痰塊，並含之咽汁，成磨水塗咽。

【用量】一日數回，以〇・〇二五——〇・〇五服用之。

【製劑】馬錢子越幾斯 *Extractum strychni*.

此即以馬錢子粗末四〇・〇，浸於稀酒精七五〇・

〇，及水二五〇・〇中，所得液體，蒸發而為乾燥

褐色之越幾斯。一日數回，以〇・〇一——〇・〇

五為粉劑，丸劑，合劑等服用之。

2 馬錢子丁幾 *Tinctura Strychni*.

此即以馬錢子粗末一〇・〇，浸於稀酒精一〇〇・

〇中，而製成黃色苦味液體。一日二三回，以〇・

一——〇・五，每與阿片丁幾，大黃丁幾配伍，而

服用之。

【學說】李時珍曰：番木鱉，生回回國，今西土印州諸處皆

有之，蔓生。夏開黃花，七八月結實，如栝樓，生

青，熟赤，亦如木鱉，其核小於木鱉，而白色。

【別稱】又名番木鱉，苦實把豆，火尖刺把都。

馬鞭草

(馬鞭草科)

【學名】*Verbena officinalis*, L.

【產地】多生於原野之間。

【基本】為多年生草，莖高三三尺，分枝甚多，葉呈深綠

色，三裂，其裂片更有齒裂，如羽狀，對生，無托葉。夏秋之間，開小花，花冠唇形，淡紫色，爲長穗狀花序。其苗葉及根，皆供藥用之。

【功效】爲通經藥，有清血之作用。

其苗葉氣味苦微而寒，無毒。除癰疽，血癥，久瘕，破血，殺蟲，搗爛，煎取汁熬如飴，每空心酒服一匕。治婦人血氣肚脹，月候不均，能通月經，療金瘡，行血，活血，又搗塗癰腫，陰腫。其根氣味辛澀而溫，無毒。治赤白下痢，初起焙搗，羅末，每米飲服一錢。

【用量】一。五——四。五服用。

【禁忌】忌火。

【學說】李時珍曰：馬鞭，下地甚多。春月生苗，方莖，葉似益母，對生。夏秋開細紫花，作穗，如車前穗，其子如蓬蒿子，而細，根白，而小。

【別稱】又名羅牙草，鳳頭草。

馬鞭樹

【基本】據李時珍曰：馬鞭樹，生嶺南金齒沅江諸夷地，蔓生，結實大如葡萄，紫色，味甘，內有核，頗似大

椰子，而殼稍薄，因長斜扁不等，核內有仁，亦甜。其核內之仁，可取爲藥用。

【功效】其實及仁氣味苦甘而寒，無毒。能治難產，臨時嚼嚼數枚，并華水送下，須臾立產；再以四枚，去殼，兩手各握二枚，惡水自下也。欲斷產者，常嚼二枚，水下，久則子宮冷，自不孕矣。對於傷寒，熱病，可食數枚，冷水下；又治惡瘡，腫毒，內食一枚，冷水下，外嚼塗之，即愈。

【別稱】又名馬金蠶，馬金南，紫檳榔。

高良薑

(薑科)

【學名】*Alpinia chinensis*, Roseos.

【產地】原出高涼郡，故名，惟說涼爲良，近爲廣東茂名電白等縣。

【基本】爲多年生草，高三四尺，葉爲長橢圓形。春開白花，有紅斑，及黃紫，爲圓錐花序。其根可採取之，而爲藥用。

【成分】含有 *Kamferol* 之黃色扁平結晶體，*Calanone* 之淡黃色稜柱狀結晶體，*Alpinin* 之粒狀結晶；與樹脂，澱粉，護膜，揮發油等。

【功效】爲芳香性健胃藥。

其氣味辛而大溫，無毒。治暴冷，胃中冷逆，霍亂腹痛。能下氣，止痢，去風，破氣，除腹部久冷，氣痛，風冷，痺弱，轉筋，瀉痢，反胃，解酒毒，消宿食，健脾胃，寬哮喘，破冷癰，除痔瘡。

【用量】一·五——三·〇——八·〇服用。

【製劑】良薑丁糖 *Tinctura Galanga*

此即以高良薑五·〇，浸於稀酒精二〇·〇中，經五日後，而濾過之，製成一種芳香液體。一日三回，與以二·〇——六·〇服用，爲健胃藥，對於胃寒之腹痛，嘔吐，及腸內寄生蟲等，皆可服之。

【學說】李時珍曰：出高良郡，二月三月采根，形氣與杜若相似，而葉如山薑。

【別稱】又名薑黃；子名：紅豆蔻。

高麗參

(五加科)

【學名】*Ginseng, Korean.*

【基本】爲人參產於朝鮮者，其形狀及用藥部分，大略相同；但其作用較吉林人參爲遜。

【成分】含有 Panaxinon $C_{27}H_{42}O_{11}$ 之成分。

【功效】爲強壯與奮藥，有祛痰，利尿之功，每用於衰弱，肺癆，虛脫，盜汗等症。

據云：氣味甘苦，微寒無毒。能補五臟，安精神，定魂魄，止驚悸，除邪，辟惡，明目，開心，益智，強身，消食，開胃；並療胃腸中冷，心腹鼓痛，胸脇逆滿，霍亂吐逆，止消渴，通血脈，五勞七傷，頭痛，眩暈，反胃，吐食，久痢，頻尿，中風，中暑，吐血，咳血，便血，淋血，胎前產後諸病。

【用量】一·五——一〇·〇服用。

【禁忌】反藜蘆；畏五靈脂；惡皂莢，黑豆。

第十一畫

側子

【基本】據蘇恭云：側子，附子，皆是烏頭下旁出者，以小者，爲側子；大者爲附子。今以附子角，爲側子，理必不然，若當陽以下，江左，山南，嵩高，齊魯間，附子時復有角，如大豆許。蔓州以上，劍南所出者，附子之角，但如黍粟，豈可充用。比來都下，皆用細附子，有效，未嘗取角也。韓保昇云：今附子邊，果有角，如大棗核，及檳榔，以來者形狀

，自是一類，且不小，乃烏頭旁出附子，附子旁出側子，甚明。李時珍云：側子，乃附子旁結連小者爾！

【功效】其氣味辛而大熱，並有大毒。能治癰腫，風痺，麻節，腰脚疼痛，寒熱，鼠瘻。又能墮胎，療腳氣，冷風，濕痺，大風，筋骨痠急。治遍身風疹，用冷酒調服。

【用量】一·五——六·〇服用。

【禁忌】惡蜈蚣。畏防風，黑豆，甘草，人參，黃耆。據李時珍曰：畏綠豆，烏韭，童溲，犀角。忌豉汁。

側柏

(松杉科)

【學名】*Thuja orientalis*, L.

【產地】原野及庭院中，多栽種之。

【基本】為常綠灌木，高至十尺餘，全形如圓錐狀，枝葉整列，葉小鱗狀，略與扁柏之葉相類，其葉無面背，常時立。花單性，雌花與雄花同株，其果實為毬形，果鱗六片，背部之尖端銳，而卷曲，在外部之果鱗，有胚珠二粒。其側柏仁(又稱柏子仁)，及其側柏葉，皆供藥用之。

【成分】含有樹脂，揮發油等。

【功效】柏子仁：為祛痰鎮咳藥，可用於氣管枝加答兒，及喘息等。側柏葉：為止血藥，可用於吐血，吐血，腸出血，及子宮出血等。

其仁氣味甘平，無毒。能補心脾，滋肝腎，潤大腸。其葉氣味苦澀微溫，無毒。能清血，涼血，止血，吐血，崩中。

【用量】其仁一回用，一·〇——四·〇服之；其葉一回用，二·〇——六·〇服之。

【禁忌】畏菊花，及石類；忌麩。

健質亞那

(龍胆科)

【學名】*Gentiana lutea*, L.

【產地】產於歐羅巴南部之高山。

【基本】為多年生草，高至三四尺，葉橢圓形，帶青綠色。花為合瓣，花冠裂五片，黃色，雄蕊與花冠裂片之數同，雌蕊一枚，子房上位柱頭二裂。其根可採取之，而供藥用。

【功效】為健胃藥，可用於一般消化不良之諸症。

【用量】二·〇——一〇·〇為浸劑等，服用之。

【製劑】1 健質亞那越幾斯 *Extractum Gentianae*

此即以健質亞那根三〇〇〇，酒精五〇〇，溜水五〇〇〇，共浸而製成褐色之越幾斯，於水中溶解之，則澄明。一日數回，以〇・五——二・〇爲丸劑，或溶液服用之。

2 健質亞那丁幾 *Tinctura Gentianae*

此即以健質亞那根一〇〇〇，稀酒精五〇〇〇，浸而壓濾之，即得澄明赤褐色之液體。一日二三回，以一〇〇——二〇〇，用於消化不良等；又有以五〇〇——一〇〇〇，加於其他種水劑一五〇〇〇——二〇〇〇，而服者。

3 複方健質亞那丁幾 *Tinctura gentianae composita*

此即以健質亞那根五〇〇，橙皮三七〇，小豆蔻一二〇〇，酒精四一六〇〇，溜水五〇〇〇〇，共浸而壓濾之，製成爲帶赤黃褐色之液體。一日數回，一回十滴，乃至三十滴服用之。

兜兜剪香

【基本】據李珣云：案廣志云：出西海剌國諸山；魏略云：

出大秦國，草類也。

【功效】其氣味辛平，無毒。能溫中，除暴冷，治惡疔，腫

癰，可以止痛，生肌，作膏藥用之。若燒之，能辟遠近惡氣。帶之夜行，壯膽，安神。與茅香，柳枝煎湯，浴小兒，能易長。

剪草

(茜草科)

【學名】*Rubia cordifolia* L. var. *nunguisia* Miq.

【基本】爲多年生之莖草，莖方，中空，有向下之刺，葉四片，輪生，長卵形，有葉柄，柄有刺。夏月開小花，呈淡黃白色，花冠五裂，筒甚短，果實有發質，色黑，如球。其根可採取之，而供藥用。

【功效】其氣味苦涼，無毒。療諸惡瘡，疥癬，風癢，蠱蝕，毒蟲，可浸酒服之；並治一切失血。

【用量】三〇——六〇服用。

【禁忌】忌鐵。

【學說】李時珍曰：按許叔微本事方言：剪草，狀如茜草，又如細辛。黎台二州，皆有；惟黎州者，可用。其說殊詳，今遍詢訪，無識者；或云：即茜草也。

剪春羅

(石竹科)

【學名】*Typha fulgens* Fisch. var. *cognata*

〔產地〕生於山野之間，亦有培養於庭園中者。

〔基本〕為一種宿根植物，莖高二三尺，肥者達五六尺，多

毛茸。葉卵形，披針形，無柄，微有毛。夏間莖梢

開花，呈紅白等色。其花莖等，可為藥用之。

〔功效〕其氣味甘寒，無毒。能治火帶疔，癰腫者，可採花

，或葉，搗爛蜜調，塗之；為末，亦可。

〔學說〕李時珍曰：剪春羅，三月生苗，高尺許，柔莖，綠

葉，對生，抱莖。入夏開花，深紅色，大如錢。凡

六出，周迴如剪成者，可愛。結實大如豆，內有細

子，人家多種之，為玩。

〔別稱〕又名剪紅羅。

勒魚

〔基本〕據李時珍云：勒魚，出東南海中，以四月至漁人設

網候之，聽水中有聲，則魚至矣。有一次，二次，

三次乃止。狀如鯢魚，小首，細鱗，腹下有硬刺，

如鯢腹之刺。頭上有骨，合之如鶴膝形。乾者，謂

之勒發，吳人嗜之。甜瓜生者，用勒發骨插蒂上，

一夜便熟；石首魚，亦然。

〔功效〕其肉氣味甘平，無毒。能開胃，暖中。其鱠能治瘧

疾。

喙木鳥

〔學名〕*Picus trichardi*. P.

〔基本〕為攀禽類，有赤綠，及黑灰色之不同，體大如雀。

其咀堅直，能敲擊樹枝，察找蟲之寄生處，而穿孔

。舌頗細長，可繞頭部一週，而舌根生於口蓋，能

屈曲外伸，穿入樹孔，舌端具有逆鈎，將潛伏之蟲

蟲引而出之。趾有四枚，二趾向前，二趾向後，各

趾皆有銳爪，能攀直立之樹幹而行。

〔功效〕其肉氣味甘酸而平，無毒。治痔瘡，及牙齒疔腫，

蟲牙，燒灰，存性，研末，納於孔中，不過三次，

即愈。又能追勞蟲，治風痛。其舌治齲齒作痛，以

綿裹尖，咬之。

商陸

(商陸科)

〔學名〕*Phytolacca heterophylla*, Roxb. var. *esculentia*, Maxim.

〔產地〕產於山野之陰地，亦有栽培於園圃之濕地者。

〔基本〕為多年生草，莖高三四尺，葉互生，如卵形，而大

。夏月開花，小而色白，為穗狀花序。實為肉果，

赤黑色。其根肥而長，外面類白色，性柔韌，而易

破碎，內部呈白色，為粉質狀。其橫斷面，現同心性之紋層；縱斷面，略呈平行排列之綫狀。多切為薄片，而供藥用之。

【成分】含有 $\text{Mycobacterin C}_{21}\text{H}_{30}\text{O}_8$ 之結晶。

【功效】為利尿藥，可用於水腫病等。其新鮮之根汁，有梅毒，宜注意；誤食用之，往往中毒，或致死。

其氣味辛平，有毒。能治水腫，疝癩，胸中邪氣，痿痺，腹瀉。能疏五臟，散水氣，消諸種水病，喉痺不通，可薄切，醋炒，塗喉。又通大小腸，消蟲毒，墮胎，消腫毒，瘰癧，惡物。

【用量】〇。三——一。五服用。

【製劑】「商陸」*Tinctura Pivotheae aquosa.*

此即以商陸根二。〇，浸於稀酒精一〇。〇中，經五日後，而濾過之，製成一種液體。一日三回，與以〇。五——二。〇為腹水等水腫病之內服藥。

【禁忌】忌鐵。

【採製】取花白之根，銅刀刮去皮，薄切，以東流水浸兩宿，酒出架飯蒸，以黑豆葉一重，商陸一重，如此蒸之，經十二時，取出，去豆葉，暴乾，剉用。無豆

葉，以豆代之。

【學說】李時珍曰：商陸，昔人亦種之，為蔬，取白根，及紫色者，擘破作畦栽之，亦可種子。根苗莖等，並可蒸食。

可蒸食。

【別稱】又名當陸，章柳，白昌，馬尼，夜呼。

密兒拉

(橄欖科)

【學名】*Holmskioldia Myrica, Nees.*

【產地】原產於阿拉伯南部。

【基本】為一種灌木，葉為複葉，常自三小葉而成。花小，萼與花冠各四片，子房二室，或三室，結核果，有尖端。其植物流出之脂，外面呈類黃色，或赤褐色，內面類白色，微有光澤，有特異之香氣，可供藥用之。

【成分】含有護膜，樹脂，及揮發油等。

【功效】可用於泌尿生殖器之分泌過多等；而今多用其為牙粉料，或含嗽料等，故於口腔黏膜之疾病，皆稱有效。

【用量】一回〇。三——一。〇為丸劑，粉劑，而服之。

【製劑】「密兒拉」*Tinct. Myrica.*

此即以蜜兒括店現一〇・〇，稀酒精五〇・〇，溶解而製成液體。一日數回，以其〇・五——一・〇而服之；但今則專用於口腔疾病，及咽喉疾病，用其單味，或和其他水劑，為塗布料，含嗽料等。

【別稱】浴粉沒藥。

密陀僧 *Lythargrum*.

【基本】此為酸化鉛，以鉛在空氣中，燃燒，而製成之；又有用硝酸鉛，或炭酸鉛，煨之，而成黃色粉末，可為藥用之。

【功效】近來多用為收斂藥之軟膏料等。

據云：其氣味鹹辛而平，並有小毒。能治久痢，五痔，金瘡，面上瘡點，故多為面膏藥而用之。能鎮心，補五臟，治癆痢，欬嗽，嘔逆，吐痰，反胃，消渴，瘵疾，下痢；又可止血，殺蟲，消積，療諸瘡，消腫毒，除狐臭，染髮髮。

【用量】六・〇——一〇・〇服用。

【製劑】單鉛硬膏 *Emplastrum Lythargrum*

此即以密陀僧一〇・〇，阿列布油一〇・〇，豚脂一〇・〇，混和，以少許溫湯煮沸之，為梘子狀之

軟膏塊，可作種種硬膏，及軟膏之基礎藥也。

2 黏着硬膏 *Emplastrum Resinosum*

此即以單鉛硬膏，八〇・〇，松脂一四・〇，黃蠟六・〇，混和，為軟膏料。

3 複鉛硬膏 *Emplastrum Lythargri*

此即以單鉛硬膏二五・〇，黃蠟三・〇，安母紐誤三・〇，瓦爾拔奴誤，三・〇，的列並底那三・〇，混和為硬膏，有刺戟催膿之作用。

4 歇脫拉硬膏 *Unguentum Hebræo*

此即以單鉛硬膏二〇・〇，亞麻仁油二〇・〇，混和，作成軟膏，為製造之原料。

5 質亞希倫軟膏 *Ung. Diachylon*

此即以單鉛硬膏五〇・〇，亞麻仁油五〇・〇，混和相溶，為軟膏，亦作原料之用。

【別稱】又名沒多倍，爐底。

密蒙花 (馬錢子科)

【學名】*Buddleia officinalis Maxim.*

【產地】山野多自生之。

【基本】為常綠灌木，幹高丈餘，葉似冬青而厚，背白，有

細毛，花色微紫，繁密叢茸，如簇錦，可採此花，供為藥用。

「功效」其氣味甘平微寒，無毒。治青盲，膚癩，赤腫，多淚，消目中赤脈，小兒黠豆，及疳氣攻眼，羞明，怕日，皆可服用。

「用量」一·五——四·五服用。

「採製」取花用揀淨酒，浸一宿，濾出，候乾，拌蜜令潤蒸之，經十二時，日乾，再拌蒸，如此三度，日乾，用之。每一兩，用酒八兩，蜜半兩。

「學說」蘇頌曰：密蒙花，蜀中州郡有之，樹高丈餘，葉似冬青葉而厚，背白，有細毛；又似橘葉，花微紫色。○二月三月采花，暴乾用之。

「別稱」又名水錦花。

崖椒

(芸香科)

「學名」Zanthoxylum Schimifolium, S. et Z.

「產地」多生於山野之間。

「基本」為落葉灌木，莖高五六尺，有刺，葉為羽狀複葉，類似山椒之葉，惟崖椒之小葉，多鋸齒，較小；而山椒之葉，少鋸齒，較大，故可辨別。又花與果實

，亦似山椒；但崖椒有一種臭氣，而山椒有一種香氣，其差異尤顯。

「功效」其氣味辛熱，無毒。治肺氣，上喘，兼嗽痰，同野薑為末，酒服一錢。

「用量」四·〇——八·〇服用。

「學說」李時珍曰：此即俗名：野椒也。不甚香，而子灰色，不黑，無光。野人用炒雞鴨，食之。

「別稱」又名野椒。

崖櫻

「基本」據蘇頌云：生施州石崖上，苗高一尺以來，其狀如

棕，四季有葉，無花。土人采根，去粗皮，入藥。○「功效」其氣味甘辛而溫，無毒。治婦人血氣，五勞七傷，以根同半天回，雞翁藤，野蘭根，四味洗焙為末，

每服二錢，溫酒服用，男子無所忌，婦人忌雞，魚，溼麪。

常山

(芸香科)

「學名」Oxiza japonica, Thunb.

「產地」多生於山野之間。

「基本」為落葉灌木，高五六尺，葉橢圓光滑，有透明小點

，臭氣甚烈。未葇開小花，色淡黃，為總狀花序。雌雄異株，結實成爲蒴果，形小，而乾燥，在樹上裂開時，藉果皮之彈力，其種子飛散甚遠。其根屈曲而分歧，着多數之細根，新鮮時，為黃色，乾燥則成黃褐色，可為藥用之。

〔成分〕含有 *Reserin* 之成分。

〔功效〕為驅蟲藥，可應用於麻拉里亞之疾病。

其氣味苦寒，有毒。能治傷寒，溫瘧，胸中痰結，吐逆。療鬼蠱，水脹，惡寒，鼠瘻，項下瘤癭。

〔用量〕一·五——三·〇服用。

〔製劑〕丁常山丁幾 *Tinctura Radix Orixi*。

此即以常山根五·〇，浸於稀酒精五〇·〇中，經五日後，而濾過之，製成一種液體。一日三回，與以二·〇——四·〇為麻拉里亞之效藥。

〔禁忌〕惡葱菜，及葱菜。

〔學說〕蘇恭曰：常山，生山谷間，莖圓有節，高者不過三四尺，葉似茗，而狹長，兩兩相當。二月生白花，

青葇；五月結實，青圓，三子為房。

〔別稱〕又名桓山，互草，鴉屎草，鴨屎草；其葉名曰，蜀

漆。

常春藤

。(五加科)

〔學名〕*Hedera Helix*, L. var. *colchica*, G. Koch.

〔產地〕多生於山野之中。

〔基本〕為常綠樹木，由細小之根攀緣於木石，其大者，幹徑約二三寸，葉卵形，全邊，或掌狀分裂。冬月開

花，小而黃綠，為繖形花序。其果實之形色，類似金剛蓂而較小。其莖葉等，可供藥用之。

〔功效〕其氣味甘溫，無毒。治腹內諸冷，血痢不止，及一切瘧疽，腫毒，凡初起者，可取莖葉一握，研汁，和酒溫服。

〔學說〕陳藏器曰：生林薄間，作蔓，繞草木上。其葉頭尖，結子正圓，熟時如珠，碧色。

〔別稱〕又名土鼓藤，龍鱗辟荔。

婆娑石

〔基本〕據馬志云：婆娑石，生南海，胡人采得之，石綠色，無斑點，有金星，磨成乳汁者，為上。又有豆斑石，雖亦解毒，而功力不及；復有鄂綠，有文理，磨鐵成銅色，人多以為之非真也。驗法：以水磨，

點塗冠熱病，當化咸水也。

【功效】其氣味甘淡而寒，無毒。能解一切藥毒，瘰癧，心

熱發悶，頭痛。

【別稱】又名摩凌石。

婆羅得

【基本】據李珣云：婆羅得，生西海，波斯國，樹似中華柳

樹，子如蓖麻子，方家多用之。李時珍云：按王藻

外臺秘要云：婆羅得，子狀如前，但以指甲瓜子，

即有汁出，卽此物也。

【功效】其子氣味辛溫，無毒。治冷氣結塊，能溫中，補腰

腎，破瘰癧，可染髮，能令黑之。

【別稱】又名婆羅勒。

排草香

【基本】據李時珍云：排草香，出交趾，今嶺南亦或詩之草

根也，白色，狀細如柳根，人多僞雜之。案范成大

桂海志云：排草香，狀如白茅香，芬烈如麝香，人

亦用以合香，諸香無及之者。又有麝香木，出于占

城，乃老朽樹心節氣，頗類麝香。

【功效】其根氣味辛溫，無毒。能辟臭，去邪惡氣。

接骨木

(忍冬科)

【學名】*Sambucus racemosa* L.

【產地】多生於山野之中。

【基本】爲落葉灌木，莖高十尺餘，葉對生，爲奇數羽狀複

葉，小葉長卵形，有鋸齒。早春抽新芽，而開花，

爲圓錐花序；花小，綠白色，花柱，及柱頭，呈黑

紫色。果實小，紅白色，如球狀。其根莖及花，皆

供藥用。

【成分】花含有揮發油，鞣酸，樹脂等。

【功效】其花爲刺戟藥，有發汗之作用。

其木氣味甘苦而平，無毒。治折傷，續筋骨，除風

痺，齲齒，可作浴湯。其根皮除痰飲，下水腫，及

瘰癧，可煮汁服之；當痢下，及吐出，不可多服。

又療打傷瘀血，及產婦惡血，一切血不行，或不止

，並煮汁服之。其葉治瘰癧，大人七葉，小兒三葉

，生搗汁服之，取吐。

【用量】五。○——一〇。○爲浸劑等服用之。

【學說】蘇恭曰：所在皆有之，葉如陸英，花亦相似；但作

樹一二丈許，木體輕虛無心。

〔別稱〕又名結骨木，木薊蕒。

旋花

(旋花科)

〔學名〕*Calyptegia sepium*, R. Br. var. *Japanica*, Makino.

〔產地〕多生於山野之中。

〔基本〕為多年生蔓草，莖細長，纏繞於他物，葉狀如戟，

有長柄，互生。春夏之交，開花，淡紅白色。花冠

下部，連合如漏斗狀，頗似牽牛而稍大，開於日中

。其花可採取之，而為藥用。

〔功效〕為利尿藥。

其花氣味甘溫，無毒。治腹中寒熱，邪氣，能利小

便，積筋骨，合金瘡，療丹毒，補勞損，益精氣。

其散氣味辛溫，無毒。功效相同。

〔用量〕一。五——四。五服用。

〔學說〕李時珍曰：旋花，田野墟墘，皆生有之，逐節蔓延

，葉如菠菜葉，而小。至秋時開花，狀如白牽牛之

花，呈粉紅色，亦有千葉者，其根白色，大如筋，

不結子。

〔別稱〕又名鹿舌，筋根，續筋根，鼓子花，豬腸草，美草

，天欒草，轉枝牡丹。

旋覆花

(菊科)

〔學名〕*Inula britannica*, L.

〔產地〕多生於山野之水溼地，故河南，山西各省，多產生

之。

〔基本〕為多年生草，莖高二尺許，葉圓形，互生。夏開

深黃花，如菊列，為頭狀花序。其花葉等，皆供藥

用之。

〔功效〕其花氣味鹹溫，而有小毒。治結氣，脇滿，驚悸，

除水，去五臟間寒熱，能補中，下氣，消胸上痰結

，唾如膠漆，心胸痰水，膀胱留飲，風氣，濕痺，

利大腸，通血脈，益色澤，下水腫，逐大腹，開胃

，止嘔，行痰，去頭目風，消堅，軟痞，治噎氣。

其葉治金瘡，止血，療疔瘡，腫毒。其根治風濕。

〔用量〕四。〇——一〇。〇服用。

〔採製〕採花，去蕊，並壳皮，及蒂子，蒸之，經二小時，

熬乾，用之。

〔學說〕寇氏曰：旋覆，葉如大菊，又如艾蒿。秋開花，如

梧桐子花，淡黃色，其香適于菊。

〔別稱〕又名金沸草，金錢花，滴滴金，盜庚，夏菊，及戴



樞等。

曼陀羅花

(茄科)

〔學名〕 *Datura stramonium*.

〔產地〕多栽培於庭園之間。

〔基本〕為一年生草，莖高三四尺，葉為卵形，常有缺刻。

秋月葉腋生花，花大，合瓣，花冠白色，呈漏斗形，有五尖起。其裂片排列，如摺扇狀。果實卵形，外面有刺，甚多。其花子及葉等，皆供藥用之。

〔成分〕含有 Hyoscyamine $C_{17}H_{23}NO_3$ 之成分。

〔功效〕為鎮痙藥。其葉及子皆可用於喘息及痙攣性咳嗽，與神經病，梅毒，癩腫，痛風等。

其花氣味辛溫，有毒。治諸風，及寒濕，腳氣，可煎湯洗之。又治驚癇，及脫肛，并入麻藥。

〔用量〕葉用〇・〇三服之；子用〇・〇二服之。

〔學說〕李時珍曰：曼陀羅，生北土；人家亦栽之。春生，夏長，獨莖直上，高四五尺，生不旁引，綠莖，碧葉，葉如茄葉。八月開白花，凡六瓣，狀如牽牛花，而大，攢花中折翳葉外包，而朝開夜合。結實圓，而有丁拐，中有小子。八月采花，九月采實。

〔別稱〕又名風茄兒，山茄子。

款冬花

(菊科)

〔學名〕 *Pulsatilla japonica*, Sibth.

〔產地〕生於山野，亦有栽培於園圃者。

〔基本〕為多年生草，高二尺餘，葉圓大，基部缺刻甚深，柄長二寸許。花莖別有小葉，長卵形。春初莖端開白花，為頭狀花序。百草中，此為最先；春雖冰雪下，亦生芽，故名。其花可採取之，而供藥用。

〔功效〕為祛痰藥。

其氣味辛溫，無毒。能治欬逆，喘息，上氣，喉痺，諸驚癇，寒熱，邪氣，消渴，肺氣，心促，急熱，勞欬連連不絕，涕唾稠黏，肺痿，肺癰，吐膿，吐血。能潤心肺，益五臟，除煩，消痰，洗肝，明目，以及中風等。

〔用量〕二〇——八〇服用。

〔禁忌〕惡皂莢，消石，玄參，貝貝母，辛夷，麻黃，黃耆，黃芩，連翹，青葙。

〔採製〕採得須去向裏花蕊，殼，並向裏實，如粟殼者，並枝葉，以甘草水浸一宿，却取款冬葉，相拌逆

一夜，晒乾，去葉，用之。

〔學說〕李時珍曰：按述征記云：洛水至歲末凝厲時，欸冬生於草水之中，則類凍之名，以此而得。後人誤為欸冬，即欸凍爾！欸者，至也；至冬，而花也。

〔別稱〕又名欸凍，類凍，氏冬，鑽凍，菟奚，寒香，及虎鬚等。

敗醬

〔基本〕據李時珍云：蘘乃匏瓠，破開為之者，近世方藥，亦時用之。當以苦瓠者，為佳；年久者，尤妙。

〔功效〕其氣味苦平，無毒。能消脹，殺蟲，治痔漏，下血，崩中，赤白帶下。

敗醬

(敗醬科)

〔學名〕*Turritia senhousae* folia, Link.

〔產地〕多生於山野之中。

〔基本〕為多年生草，葉羽狀複葉，狹長，互生。莖高四五尺許，為紫色。夏秋之間，莖頭開花，黃色，花冠裂片五枚。其根可採取之，而為藥用。

〔功效〕其氣味苦平，無毒。能去暴熱，火瘡，赤氣，疥癬，疔瘡，馬鞍熱氣；除癰腫，浮腫，結熱，風痺，

產後疼痛，破久年凝血，能化膿為水，產後諸病，止腹痛，煩渴，治血氣，心腹痛，破癰結，催生，落胎，血暈，鼻衄，吐血，赤白帶下，赤眼，障膜，贅肉，疔瘡，疥癬，疥癬，丹毒，排膿，補癰。

〔採製〕取根，便粗杵，入甘草葉相拌，對蒸，經四小時，去甘草葉，焙乾，用之。

〔學說〕李時珍曰：處處原野有之，俗名苦菜，野人食之；

江東人，每采收儲焉！春初生苗，深冬始凋，初時葉布地生，似菘菜葉而狹長，有鋸齒，綠色，面深背淺。夏秋莖高二三尺，而弱柔，數寸一節，節間生葉，四散如楸，類頂開白花成簇，如芹花，蛇床子花狀，結小實成簇，其根白紫，頗似柴胡。

〔別稱〕又名苦菜，苦蕒，澤敗，鹿腸，鹿首，馬草。

淡竹

(禾本科)

〔學名〕*Lophatherum gracile*, Brongn. var. *elatum* Trach.

〔產地〕多生於暖帶之原野，及田圃中。

〔基本〕為草本植物，莖高二三尺，葉廣披針形，葉端尖，闊七八分，長五六寸。夏秋間梢上抽疎大之穗，分為數歧，疎生長形之小花，綠色。其葉，即為藥用

之淡竹葉；其根，亦可為藥用之。

【功效】葉為利尿藥。

據云：其氣味甘寒，無毒。葉能去煩熱，利小便，清心。根能墮胎，催生。

【用量】三。〇——二。〇服用。

【學說】李時珍曰：處處原野有之。春生苗，高數寸，細莖，綠葉，儼如竹米，落地所生細竹之莖葉。其根一窠，數十鬚，鬚上結子，與麥門冬一樣；但堅硬耳。隨時採之，八九月抽莖，結小長穗。俚人采其根苗，搗之，和米作酒麴，甚芳烈。

【別稱】其根又名：碎骨子。

淡菜

【基本】據陳藏器云：東海夫人，生東南海中，似珠母一頭小，中脚少毛，味甘美，南人好食之。孟誥云：常時燒食，即苦，不宜人，與少米先煮熟，後除去毛，再入蘿蔔，或紫蘇，或冬瓜同煮，即更妙。日華本草云：雖形狀不與，而甚益人。李時珍云：按阮氏云：淡菜，生海藻上，故治瘰，與海藻同功。

【成分】含有沃度，膠樣質等。

【功效】其氣味甘溫，無毒。能治虛勞，傷風，精血衰少，

吐血，久痢，腸鳴，腰痛，疝瘕，婦人帶下，產後瘦瘠，產後血結，腹內冷痛，瘰癧，崩中，帶下。能潤毛髮，補五臟，益陽事，理腰腳，消宿食，除腹中冷氣，瘵癯，可燒汁沸出食之，或煮熟食之。又能消瘴氣。

【用量】四。〇——二。〇服用。

【別稱】又名殼菜，海蝶。東海夫人。

淫羊藿 (小蘗科)

【學名】*Epimedium maceratum*, Moer. et Dana.

【產地】多生於山野之間。

【基本】為多年生草，一根數莖，高尺許，葉為再出掌狀複葉，有長柄，中肋，左右不相等；邊緣，有微刺。花紫，或白，狀如船鑑。其根葉採之，可供藥用。

【成分】含有愛皮質訂 (Saponin) 之成分。

【功效】為強壯藥。可用於陰萎，健忘等。

其氣味辛寒，無毒。治陰痿，絕傷，莖痛，利小便，益氣，強志，堅筋骨，消瘰癧，赤癰，疥癩。瘵一切冷風，勞氣，筋骨暴急，四肢不仁，補腰膝，

強心方。

【用量】一回一〇——二〇服用。

【學說】名醫別錄曰：淫羊霍，生上郡陽山山谷。李時珍曰

：生大山中，一根數莖，莖粗如線，高一二尺，一莖二莖，一椹三葉，葉長二三寸，如杏葉，及豆蔻，而光，背淡，甚薄，且具細齒，有微刺。

【別稱】又名仙靈牌，放杖草，葉杖草，千兩金，乾雞肋，黃連祖，三枝九葉草，剛前。

清風藤

(清風藤科)

【學名】*Stahn japonica* Maxim.

【基本】為纏繞灌木，嫩莖，綠色，葉卵形，有尖端，草質

，滑澤，綠色。於秋間脫落，葉柄仍為針狀。夏間

花生於葉腋，花瓣五片，黃色；雄蕊，與花瓣同數

。果實球形，熟則呈深碧色。其根莖，可為藥用。

【功效】據云：能治風濕，流注，歷節，鶴膝，麻痺，癢癢

，損傷，疔腫，及一切風疾。

【學說】蘇頌曰：生台州，天台山中，其苗蔓延木上，四時

常青，土人采莖用。

【別稱】又名青藤，尋風藤。

梅

(蔷薇科)

【學名】*Prunus Mume*, S. et Z.

【產地】多栽植於庭園中，亦有自生於山野者。

【基本】為落葉喬木，莖高三三十尺，葉廣橢圓形，或卵形

，有尖端，緣邊多鋸齒。早春先葉，開花紫綠色，

下部連合如筒，上部五裂，花冠五瓣，色有白，淡

紅，紅等之別，亦有重瓣者。果實為核果，其肉部

密着於核，可採取之，而製成烏梅與白梅二種，以

供藥用。

【功效】其烏梅氣味酸澀而溫，無毒。能解熱；清毒，生津

，止渴，殺蟲。治久嗽，反胃，骨蒸，勞熱。其白

梅氣味酸鹹而平，無毒。能和藥點誌，腐蝕惡肉。

凡刺在肉中者，嚼敷之，即出。治刀箭傷，可以止

血，研爛敷之。乳癰，腫毒，杵爛，貼之。又除痰

，治中風，驚癇，喉痺，痰厥，牙關緊閉者，取梅

肉，揩擦牙齦，涎出，即開。又治瀉痢，煩渴，霍

亂，吐血，下血，血崩，其他功同烏梅。

【用量】一〇——五〇服用。

【採製】可取大青梅，以鹽汁漬之，日晒，夜漬，十日成矣

。久乃上指，爲白梅。又取大青梅，剝皮去核，入籠，於稿火煤烟中薰乾者，爲烏梅。

【別稱】白梅又名：鹽梅，箱梅；烏梅又名：蠶梅。

梓 (紫葳科)

【學名】*Catalpa Kaempferi* G. & Z.

【產地】多栽培於庭園之間。

【基本】爲落葉喬木，高至二十尺許，葉略呈卵形，掌狀深裂。夏日開花，脣形，花冠淡黃色，帶有紫色之斑紋，萼亦脣形，有二深裂。果實細長，略似豇豆之莢。其根白皮及葉，皆供藥用之。

【功效】其根白皮氣味苦寒，無毒。去熱毒，殺三蟲，療目疾，治吐逆，反胃，小兒熱疳，蝕瘡，可煎湯浴之，并搗敷之。又可煎湯洗小兒壯熱，一切疔疥，皮膚癢癢，治溫病，復感，寒邪，可委汁飲之。其葉可以搗敷瘡疔，飼豬肥大三倍。療手脚湯火爛瘡。

【學說】李時珍曰，梓木處處有之，有三種，木理白者，爲梓；赤者，爲楸；梓之美文者，爲椅；楸之小者，爲榿。

【別稱】又名木王。

梔子 (茜草科)

【學名】*Cardamum floribundum* L.

【產地】多生於暖帶之各地。

【基本】爲常綠灌木，莖高丈餘，葉橢圓形，而厚，有光澤，全邊，對生。夏月枝梢開花，花大，白色。果實橢圓形，兩頭有尖，色黃，有縱稜五六，可爲藥用之。

【成分】含有 $\text{Aethium kinkwehori C}_{14}\text{H}_{11}\text{O}_9$ 之成分。

【功效】爲解熱藥。

其氣味苦寒，無毒。可除五內邪氣，胃中熱氣，面赤，酒隨，鼾鼻，白癩，赤癩，瘡瘍。療目赤，熱疔，胸熱，煩悶，去熱毒，消時疾，解黃病，利五淋，通小便，止消渴，下血滯，瀉三焦火，清胃脫血，治熱厥，心痛，解熱鬱，行結氣。治吐血，衄血，下指，下血，血淋，損傷，瘀血，及傷寒，勞復，頭痛，疝氣，湯火傷。

【用量】三〇——一〇〇服用。

【採製】可削去果實之兩端及其稜，剝用，或炒，或酒製，或蜜汁製。

【學說】李時珍曰：梔子，葉如兔耳，厚而深綠。春榮，秋瘁，入夏開花，大如酒盃，白色，黃蕊，隨即結實，薄皮，細子，有殼，稍後收之。蜀中有紅梔，花爛紅色，其實染物，則赭紅色。

【別稱】又名木丹，越桃，鮮支。

梧桐

(梧桐科)

【學名】*Bispeelia palmifolia*, L.

【產地】多培養於庭園之間。

【基本】爲落葉喬木，有綠色之枝幹，葉如梓葉相似，而較大，爲掌狀分裂，其腳呈心臟形，葉之裏面，有毛茸。其葉脈之分歧點，有褐色之斑紋，是爲蜜腺，柄長，互生。夏月開小花，單性，爲圓錐花序。果實爲莢果，熟則裂開，如葉狀，種子附於其緣邊。其木莖子實，皆可供藥用之。

【成分】含有樹脂，植物油等。

【功效】其木去皮燒之研末，和乳汁塗鬚髮能變黃赤，又治腸痔。其葉能治發背，可炙焦研末，以蜜調敷，乾之即易。其子氣味甘平，無毒。可搗汁，塗之，拔去白髮，根下必生黑者，又治小兒口疳，和雞子，

燒之存性，研搗。

【學說】李時珍曰：梧桐，處處有之，樹似桐，而皮青不皺。其木無節，通常直生，理細而性堅。葉似桐，而稍小，光滑，有尖。其花細蕊墜下，如釀，其莢長三寸許，五片合成，老則裂開，如箕，謂之窠鄂；其子縱於窠鄂上，多者五六，少或二三，子大如胡椒。

【別稱】又名榧。

榧木

(石南科)

【學名】*Aufornetia japonica* Thunb.

【產地】生於山地，亦有栽培於庭園者。

【基本】爲常綠灌木，莖高四五尺，亦有二十餘尺者，葉草質，光澤，長卵形，有尖端，緣邊有小鋸齒。春初開小白花，下垂，呈壺形，爲總狀花序。其木莖等，可爲藥用。

【功效】爲皮膚殺蟲驅毒藥，對疥癬，及毒蛇之咬傷，僅可外用；內服有毒，足能致死。

據云：其木氣味苦平，無毒。能破產後血，可煮汁服之。其葉可以煎汁，洗瘡癬，或搗碎而敷蛇咬毒

荷。

【用量】算用以其粉末撒布之；或以其煎汁，洗滌之。

【學說】李時珍曰：此木，今無識者，其狀頗近山藥，恐古

今稱謂不同耳！

【別稱】俗稱：馬醉木。

牽牛子

（旋花科）

【學名】*Thurhilla Indurata*, L.

【產地】人家多栽植之，以供玩賞。

【基本】為一年生之纏繞草本，葉為心臟形，常有三裂，互

生。夏日葉腋生花，花大，花冠為漏斗狀，其色不

一，朝開，及日中而閉。果實球形，三室，各室含

兩種子，可採取之，而供藥用。

【成分】含有 $C_{21}H_{31}O_7$ 之無色結晶物質。

【功效】為瀉下藥。

其氣味苦寒，有毒。能下氣，去水腫，除風毒，利

大小便，治癰癤，氣塊，除虛腫，瀉蟲毒，及一切

氣滯。消氣分濕熱，三焦壅結，逐痰，消飲，通大

腸，去水氣。

【用量】一。〇——三。〇服用。

【採製】採子，晒乾，水淘，去浮土，再晒，拌酒蒸之，經

四小時，晒乾，收之，臨用，舂去黑皮。今多只碾

去頭末，除去皮膜，不用，亦有半生半熟用者。

【學說】李時珍曰：牽牛，有黑白二種：黑者，處處野生，

尤多，其蔓，有白毛，斷之有白汁。葉有三尖，如

楓葉，花不作瓣，如旋花，而大。其實有蒂裹之，

生青，枯白，其核與棠棣子核一樣；但色淺黑爾！

白者，人多種之，其蔓微紅，無毛，有柔刺，斷之

有濃汁。葉間有斜尖，並如山藥莖葉，其花小於黑

牽牛花，淺碧帶紅色。其實蒂長寸許，生青，枯白

；其核白色，稍粗，人亦采嫩實，蜜煎為果食，呼

為天茄，因其蒂似茄也。

【別稱】又名黑丑，草金鈴，盆瓶草，狗耳草。

章魚

【學名】*Octopus Octopollia*, L.

【基本】為頭足之二頭類，大抵足為八本，其部有薄膜，吸

盤無柄，無角環，胴部較小，無肉鱗與甲，是其特

別耳！

【功效】其氣味甘鹹而寒，無毒。能養血，益氣。

理石 *Marble*

【基本】為結晶質之石灰岩，具有美麗之光澤者也。粒狀密緻；通常白色，然亦有帶灰，褐，黑色等。昔時常為藥用。

【成分】含有矽酸石灰，硅酸礬土等。

【功效】為解熱藥。

其氣味甘寒，無毒。能去身熱，利胃，解煩，益精，明目，破積聚，殺三蟲，除結熱，解煩毒，止痛，治中風，痿痺。

【用量】五〇——一五〇服用。

【禁忌】惡麻黃。

【學說】李時珍曰：理石，即石羔中之長文細直如絲，而明潔，色帶微青者。唐人以石羔，為寒水石；長石為石羔，故蘇恭言其不似石羔也。此石與獸石羔一類，二色，亦可通用。

【別稱】又名肌石，立制石。

硃砂根

(紫金牛科)

【學名】*Orchis eremita*, Sims.

【產地】生於山中之陰地，或暖地。

【基本】為常綠亞灌木，莖高二三尺；其生於暖地者，則高至七八尺，葉長橢圓形，有尖端，草質，而光澤，緣邊有鈍鋸齒，互生。夏月莖梢抽出小花，花冠白色，有暗色之小點，為繖形花序。果實赤色，圓形，大似豌豆，或白，或黃。其根可採取之，而供藥用。

【功效】其氣味苦涼，無毒。治咽喉腫痛，可磨水，或醋嚥之，甚良。

【學說】李時珍曰：硃砂根，生深山中；今惟太和山人采之。苗高尺許，葉似冬青葉，背甚赤，夏月長茂，根大如筋，赤色，此與百兩筋彷彿。

琉璃

【基本】此係鋁與矽之矽酸化合物，有玻璃樣，而微透明，昔時亦有用為藥者。

【功效】據云：能治身熱，目赤，以水浸冷製之。

琉璃草

(紫草科)

【學名】*Omphalodes krameri*, Fr. et Sav.

【產地】生於山野之路傍。

【基本】為多年生草，莖高七八寸餘，葉卵圓，披針形，莖

葉皆有毛。夏月開花，呈翠藍色。

【功效】據云：能治風病，與一般風藥之功效，相同。

甜瓜

(葫蘆科)

【學名】*Cucumis Melo, L.*

【產地】產於亞細亞，及亞非利加之熱帶地方；但亦常栽培於園圃中。

【基本】為果類植物。一年生草，莖細長有卷鬚，每纏絡於他物。葉圓心臟形，有掌狀淺裂。夏日開黃花，雌雄同株，實橢圓，有縱路，長三四寸，有青黃白等色，其味甜美，而有香氣，可為藥用。

【成分】含有多量糖分，水分，纖維，脂肪等。

【功效】其氣味甘寒而滑，並有小毒。能止渴，除煩熱，利小便，通三焦，治口疳，鼻疔。暑月食之，永不中暑。其仁氣味甘寒，無毒。除腹內結聚，破潰膿血，更為腸脾內藥之要藥。又止血，研末去油，炒食，能補中，宜人，清肺，潤腸，和中，止渴。其蒂氣味苦寒，有毒。能治大水，身面四肢浮腫，下水，殺蟲毒，止效逆，上氣，及食諸果，病在胸腹中，皆吐下之。又去鼻中瘰肉，療黃疸，腦寒熱

，眼昏，風痰，熱涎，風眩，頭痛，癩痢，喉痺，頭目有濕氣。得麝香，細辛，治鼻不聞香臭。

【用量】常用三。〇——五。〇服用。

【採製】取仁曬乾，拌細，用馬尾篩篩過，成粉，以紙三重，裏壓，去油用；不去油，其力短也。其蒂，去瓜皮，用蒂，約半寸許，日曬極乾，臨時研用。

【學說】李時珍曰：甜瓜，北土中州，種蒔甚多。二三月種下，延蔓而生；葉大數寸，五六月花開，黃色；六月瓜熟，其類最繁。

【別稱】又名甜瓜，果瓜；瓜蒂又名瓜丁，苦丁香。

眼子菜

(眼子菜科)

【學名】*Potamogeton polygonifolius, Pourr.*

【產地】多生於水田之中。

【基本】為多年生之雜草，根着於水底之泥中。其在水面之葉，橢圓形，草質，有光澤，呈深綠色；在水中之葉，披針形。夏日葉腋抽出花軸，二三寸，梢上綴以多數穗狀之花，帶黃綠色。採其根，供藥用之。

【功效】為解毒藥。可用於酒類中毒，獸類肉之中毒，以水煎茶，可多飲其汁。

蚌蟻

【基本】爲益新類 (Orthoptera) 之一種，口能嚼噬，胸部第

一節環分腫，後翼爲薄膜形，舉指如扇，以前翼遮蔽之。按蚌蟻，初夏大火始有，得秋金之氣，而繁；性宜烈，能開關，透竅。一種灰色而小者，名土瘿，不入藥用。大而青黃色者，入藥。有尖頭，方頭二種。

【功效】據發生苦海載：五虎丹中，用之，治暴疾，氣閉；大抵取其竅捷之功爲引也。其味辛平，微毒，性宜，而不守。治咳嗽，驚風，破傷，癩折損，凍瘡，斑疹不出。

蚱蟬

【基本】爲蟬類 (Homoptera) 之一種，體長一寸四分許，色

黑頭短，口爲長吻，有複眼二，單眼三。胸背有灰黃短毛密生，四翅膜質，大部透明，外緣黑，前翅較大。雄者胸腹交界處，有發聲器，具小皺膜，並有大筋肉連接之。收縮振動，以發高聲，交尾後即死。雌者產卵後，不過數日亦死。

【功效】其氣味鹹甘而寒，無毒。治小兒驚癇，夜啼，癩病

，寒熱，驚悸，婦人乳癰，脫衣不出。能墮胎，殺疳蟲，去壯熱，療腸中幽幽作聲。

【別稱】蠶，齊女。

蛇床

(繖形科)

【學名】*Selinum japonicum* Miq.

【產地】生於海邊沙石之地。

【基本】爲多年生草，莖初臥地，後昂起，高尺餘，葉作羽狀分裂，互生。夏月開小花，白色，五瓣，爲複繖形花序。花瓣尖端微曲，子黃褐色，如黍米。其子可採取之，而供藥用。

【成分】含有揮發油之左旋性加謨芬，及異性癩草酸薄爾尼

愛斯崔兒。

【功效】爲強壯藥，可應用於陰痿，及婦人陰腫等。

其氣味苦平，無毒。治男子陰痿，濕癢，婦人陰中腫痛，除痺氣，利關節，癩癩，惡瘡，能溫中，下氣，令婦人子宮暖熱，男子陰強，又治濕痺，毒風，腰痛，四肢頑痺，縮小便，去陰汗，濕癬，齒痛，赤白帶下，小兒驚癇，撲損瘀血，又可煎湯浴大風身癢。

【用量】二。〇——六。〇服用。

【禁忌】惡牡丹，貝母，巴豆。

【學說】名醫別錄曰：蛇床，生臨淄川谷，及田野。五月采實，陰乾。

【別稱】又名蛇粟，蛇米，虺牀，馬牀，塙蘼。

蛇台 (舊微科)

【學名】*Potentilla Kieniana*, W. et A.

【產地】生於原野之溼地。

【基本】為多年生草，莖長而質軟，常伏臥於地上。葉為掌狀複葉，呈濃綠色；葉柄較長，在莖之下部者，有五小葉，至上部，則有二小葉。春夏之間，梢上分歧多數之花梗，着以黃色之小花瓣。可取其全草，供藥用之。

【功效】其氣味苦而微寒，無毒。治驚癇，寒熱，邪氣，金瘡，疔痔，鼠癩，疥癬，心腹邪氣，腹痛，去濕痺，止血，養胎，療小兒寒熱，丹疹，風毒，癰腫，赤眼，蜂毒，蛇毒，咽喉中痛。

【學說】陶弘景曰：蛇銜，處處有之，有兩種並生石上，亦生黃土地，常用細葉，有黃花者。

【別稱】又名蛇銜，威蛇，小龍牙，紫背龍牙。

蛇蛻

【基本】為蛇類 (Serpentes) 之爬蟲，體呈長圓筒狀，條尾，無足，以肋骨自由伸縮，而全體有鱗，透明之表皮，年年更脫，即是，可取為藥用。

【功效】其氣味鹹甘而平，無毒。治小兒諸種驚癇，蛇瘡，癩疾，癢癢，弄舌，搖頭，寒熱，腸痔，蠱毒，大人五邪，言語僻越，止嘔逆，明目。燒之，療諸惡瘡，喉痺，百鬼魅。炙用，辟惡，止小兒驚悸，客熱。煎汁，敷癩瘡，白癬風，催生，安胎，止癩，辟惡，去風，殺蟲。燒末服之，治婦人吹奶，大人喉風，退目翳，消木舌，敷小兒重舌，重齶，唇緊，解頰面瘡，月蝕，天泡瘡，大人疔腫，漏瘡，腫毒，可煮湯，洗諸惡毒，蟲瘡。

【用量】三。〇——六。〇服用。

【禁忌】畏磁石，及酒；孕婦忌用。

【採製】據李時珍曰：今人用蛇蛻，先以皂莢水洗淨，經行土，或酒，或醋，或蜜浸，炙黃，用之；或燒存性，或鹽泥固煨，各隨方法。

〔別稱〕又名蛇皮，蛇殼，龍退，龍子衣，龍子皮，弓皮，

蛇符，蛇筋。

蛇毒

(毒液科)

〔學名〕 *Duchenna indica* Foek.

〔產地〕多生於山野中，而田野中，亦有自生者。

〔基本〕為多年生草，莖匍匐於地上，葉以三小葉合成，互生，有長柄。夏初每葉腋間，各生一花，色黃，五瓣，實細小，色鮮紅，花托肥大，狀略似覆盆。可取其草汁，供藥用之。

〔功效〕其汁氣味甘酸，大寒，有毒。治胸腹大熱，傷寒大熱，及溪毒。能通月經，消痞腫，敷蛇傷。又治小孩口瘡，以汁灌之，亦可敷湯火傷痛。

〔學說〕陶弘景曰：蛇毒，園野多有之，子赤色，極似毒子，而不堪喫，亦無以此為藥者。

〔別稱〕又名蛇苞，地莓，蠶莓。

蛇黃

〔基本〕據李時珍云：蛇黃，生腹中，正如牛黃之意。世人

因其難得，遂以蛇含石代之；以其同出于蛇故耳！

廣西平南縣，有蛇黃岡，土人九月掘下七八尺，始

得蛇黃，大者如雞子；小者如彈丸，其色紫。

〔功效〕其氣味冷而無毒，治心痛，疰忤，石淋，小兒驚癇

，婦人難產，以水炙研，服汁。又能鎮心；亦可磨

汁，塗腫毒。

〔採製〕可燒赤，醋淬三四次，研末，水飛，用之。

蛇婆

〔基本〕據陳藏器云：生東海水中，一如蛇，常自浮游，採取無時。又李時珍云：按此所言形狀，功用，似是水蛇；然無考證，姑記之。

〔功效〕其氣味鹹平，無毒。治赤白毒痢，蠱毒，下血，惡瘡，可炙食，或燒末，用米汁飲服二錢。

蛇蘭草

〔基本〕據陳藏器云：生平原之地，葉似苦枝而小，節赤，高至一二尺許，種之辟蛇。又有一種草莖，圓似芋，亦敷蛇毒。唐慎微云：按百一方云：關東有草，狀如芋，莖方，節赤，按敷蛇毒，如摘却，然名蛇蘭草。

〔功效〕據本草拾遺云：能治毒蟲螫痛，可取根葉搗敷咬處，當下黃水。

蛇蛻

【學名】Parichthys sibiricus, Temm.

【基本】此屬鱗蟲類，體圓筒狀，前端較後端細，缺疣足，剛毛短小，其數少，皮膚較以薄而無色之玻璃膜，富於黏液腺，頭部之近旁有帶狀之異狀部分。即為肉帶，乃許多之環節膨脹者也。選其白頸者，可為藥用之。

【功效】其氣味鹹寒，無毒。治蛇瘡，殺三蟲，消蟲毒，療傷寒，伏熱，黃疸，溫病，大熱狂言，去魃蟲，除諸熱，小兒熱病，癩病，塗丹毒，敷膝疔。葱化為汁，療耳聾。治中風，癱疾，喉痺，解蛇毒，治腳氣，瘧疾，利小便，療小兒急慢驚風，歷節風痛，頭風，齒痛，風熱，赤眼，木舌，喉痺，鼻齧，痔耳，疥瘡，癩瘡，卵腫，脫肛，解蜘蛛毒疔，軸癭入耳。

【禁忌】畏葱，鹽。

【別稱】又名堅蠶，土龍，地龍子，寒蚓，附蚓，歌女。

蝮蛇

【基本】漢李時珍云：按劉珣錄異記云：蝮蛇，大者五六丈

，圍四五尺，小者不下三四丈，身有斑紋，如故錦縹。春夏千山林中，同鹿吞之，蛇遂羸瘦，待鹿消，乃肥壯也。或言一年，食一鹿也。

【功效】其皮能治風毒，眼翳，唇緊，唇疔。其卵能治大風，癩疾。

【別稱】又名南蛇，埋頭蛇。

羚羊角 Hirudigehorn.

【產地】產於歐洲，及亞洲之各處；而吾國蒙古之深山，為最多。

【基本】為羚羊 (Antelope Gaurax) 之角，其狀頗似山羊，背高，角短而直，角端後而有白毛雜生。足底上凸，故行能其痕於地，嗅覺銳敏。

【功效】為鎮經藥，通經藥。

其角氣味鹹寒，無毒。能明目，益氣，起陰，去惡血，辟蠱毒，除邪氣，治傷寒，時氣，寒熱，熱在肌膚，濕風注毒，伏在骨間，食噎不通，中風，筋攣，附骨疼痛，熱悶，熱毒，痢血，疝氣，腫毒，一切產後惡血衝心，小兒驚癇，山瘴，瘴寒，驚悸，煩悶，心胸惡氣，癩瘡，惡疔，深毒，又能平肝

，筍筒，完底，安胎，散血，下氣，辟惡，解毒，
治子癩瘰癧。

【用量】〇・五——二・〇服用。

莎草香附子

(莎草科)

【學名】*Cyperus polyanthus*, L.

【產地】生於原野，近海之砂地尤多。

【基本】為一年生草，莖三角形，高尺許，葉細長，而硬，

多由根出。夏日莖頂別生三葉，開黃褐色小花，成

穗。其根入藥用之，即為香附子也。

【成分】含有揮發油等。

【功效】為通經藥。

其氣味甘微而寒，無毒。治霍亂吐瀉，腹痛，腎氣

，膀胱冷氣，散時氣，寒疫，利三焦，解六鬱，消

飲食，積聚，痰飲，痞滿，跗腫，腹脹，腳氣，止

心腹，肢體，頭目，齒耳諸痛。療癰疽，瘡瘍，吐

血，下血，尿血，婦人崩漏，帶下，月候不調，胎

前產後諸病。

【用量】一・五——四・〇服用。

【禁忌】忌鐵。

【學說】李時珍曰：莎草，如老韭葉，而硬，光澤，有龜脊
稜。五六月中，抽一莖，三稜，中空，莖端復出數

葉，開青花，成穗，如黍中有細子。其根有鬚，鬚

下結子一二枚，轉相延生，子上有黑細毛，大者如

羊鬚，而兩頭尖。采得燎去毛，暴乾，貨之。

【別稱】又名雀頭香，草附子，水香稜，水巴戟，水莎，侯

莎，莎結，夫須，續根草，地藕根，地毛。

茨菰

(忍冬科)

【學名】*Viburnum dilatatum*, Thunb.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為落葉灌木，莖高一二丈，葉廣卵圓形，頭有短尖

，緣邊有鋸齒，面甚粗糙，對生。初夏開小白花，

為聚繖花序。果實形小，有漿，赤色。其枝葉可採

取之，而供藥用。

【功效】其枝葉氣味甘苦而平，無毒。殺三蟲，下氣，消穀

，可養汁，和米。作粥餉之，甚美。

【學說】蘇頌曰：茨菰葉，似木樨，及榆，作小樹，其子如

疏漫，兩兩相對，味甘。

【別稱】又名擊迷，擊先。

莧

(莧科)

【學名】*Amaranthus Mangostanus*, L.

【產地】多栽種於田園之間。

【基本】為莧類植物，一年生草，莖高三三尺，葉卵圓形，

有青赤二色，嫩時，供食。夏秋之際，開細花，成

穗，色黃綠。一種柔莖，細葉者，謂之野莧，亦可

食。其莖根實等，皆供藥用。

【功效】其莖氣味甘冷，無毒。白莧能補氣，除熱，通九竅

。赤莧能治赤痢，沙虱。紫莧能殺蟲毒，治氣痢。

六莧並者，能利大小腸，治初痢，滑胎。其莖氣味

甘寒，無毒。治青盲，明目，除邪，利大小便，去

寒熱，益氣力，治白翳，殺蝨蟲，益精，明目。其

根治陰下冷痛，入腹，則腫滿殺人，搗爛敷之。

【學說】李時珍曰：莧並，三月撒種，六月以後，不堪食，

老則抽莖，如人長，開細花，成穗，穗中細子，扁

而光黑，與青種子，雜冠子無別，九月收之。細莧

，即野莧也。

莧

(茄科)

【學名】*Scepolia japonica*, Maxim.

【產地】多生於深山幽谷中。

【基本】為多年生草，莖高一尺許，根莖橫行於地中。早春

抽莖，色紫黑，長則莖葉變為淡綠，葉長卵圓形，

端尖，互生。夏初葉腋開鐘狀花，黃褐色，微紫，

為合瓣花冠；花後結實，圓形，綠色，如豆。其根

莖子葉，皆供藥用之。

【成分】含有 Atropine $C_{17}H_{23}NO_3$ 及 Hyoscyamine 之鹽基

成分。

【功效】可用於咳嗽，喘息，痙攣等，為鎮咳劑，又於胃痛

，神經痛等，為鎮痛劑。亦可外用為鎮痙性軟膏，

或灌腸，洗眼等。

其子氣味苦寒，無毒。治齒痛，出蟲，肉痺，拘急

，能強志，益力，通神，見鬼，癡顛狂，風癩，顛

倒，拘攣，又能安心，定志，聰明耳目，除邪，逐

風，止股肛，冷痢。

【用量】根之極量，一回〇.〇七；一日〇.三。草之極量

，一回〇.二；一日〇.六服之。

【製劑】莧莖越巽斯 *Extractum Scopoline*

此即以莧莖根浸於酒精，及莧莖草浸於水之等分，

混合液，製造而成爲褐色之稠厚液，雖能溶解於水；但略呈混濁。通常於氮管喘息，胆石痛等之癱瘓，及疼痛性疾病，或因腸弛緩而發之便秘，以及鉛類中毒，痲痛，裏急後重，夜尿症等，一回以○。○二——○。○二——○。○五爲丸劑，粉劑，及合劑；但多伍以阿片，或杏仁水等而服用之。此外又常外用，以其(0.2—0.5:15.0)爲塗擦料，灌腸料，及軟膏等，或以其(0.05—0.1:50.0)爲注射料，及坐藥等。

2 莨菪丁堊 Tinctura Scopoliae

此卽以莨菪草一○。○，稀酒精五○。○，浸而製之，爲澄明帶褐綠色之液體。其功效，如莨菪越，一回○。五——一。○混於舍利別，或水溶液等，而服之。

3 莨菪擦劑 Tinctum Scopoliae

此卽以莨菪越四○。○，樟腦一○。○，稀酒精一五○。○，混和而製成一種液體，於僕麻質斯，及疼痛等，塗擦外用之。

4 莨菪軟膏 Unguentum Scopoliae

此卽以莨菪越一○。○，溶和於水中，至稠厚液動性爲度，更以豚脂九○。○，混和而製成一種鎮痛之藥膏。

5 莨菪硬膏 Emplictrum Scopoliae

此卽以莨菪越一○。○，松脂九○。○，混和而成之，亦作爲鎮痲痛之貼布藥。

6 莨菪坐藥 Suppositoria Scopoliae

此卽以莨菪越幾斯○。○五，柯柯阿脂一。五，混和之，製成一個坐藥，可用於肛門等之疼痛。

〔學說〕李時珍曰：張仲景金匱要略言：藥中有水莨菪，葉圓而光，有毒，誤食，令人狂亂，狀如中風，或吐血；須以甘草汁解之。

〔別稱〕又名天仙子，橫唐，行唐。

我述

(藥荷科)

〔學名〕Cicutaria Zedoaria, Roscoe.

〔基本〕爲多年生草，莖高二尺許，葉爲卵圓形，與鬱金頗相似。其地下莖，爲芋狀，圓球形，乾者外皮呈黃褐色，內部呈暗色，長二寸許，中有著大之粉質塊，可供藥用之。

【成分】含有淡黃色濃厚之揮發油，樹脂，及味似樟腦之鹽粉。

【功效】為健胃，消化，鎮痙，通經藥。對於急性及慢性胃加答兒，月經閉止，子宮痙攣等，皆可服用之。

其氣味辛苦，無毒。能消痰，通經，開胃，化食，解毒；止痛，治心腹諸痛。

【用量】一回二〇——六〇服用。

【別稱】苦味丁幾 *Tinctura amara*

此即以莪述二〇〇，龍胆五〇〇，橙皮五〇〇。

〇，稀酒精一〇〇〇〇，其浸出而製成澄明黃褐色之液體，乃苦味健胃藥中之普通用品也。一日數

回，以〇・五——二・〇，與他合劑，服用之。

茵麻 (錦葵科)

【學名】*Abutilon vitifolium*, Gaertn.

【產地】產於熱帶之園圃中。

【基本】為一年生草，莖高五六尺，葉圓心臟形。夏月莖梢

之葉綻開花，花小，黃色。果實熟則乾燥，裂開，現有帶毛種子。其根及實，可供藥用之。

【功效】其質氣味苦平，無毒。治赤白冷熱痢疾，可炒過，

研末，用蜜湯，服一錢。凡癰腫無頭者，可吞一枚；又治一切眼疾。其根能治痢疾。

【學說】李時珍曰：茵麻，今之白麻也。多生卑溼處，人亦種之，葉大如桐葉，圓而有尖。六七月開黃花，結實如半磨形，有齒，嫩青，老黑；中子，扁黑，狀如黃葵子。其莖輕虛，潔白。北人取皮，作麻，以

蒸醃硫黃，作炸燈，引火甚速也。其嫩子，小兒亦食之。

【別稱】又名白麻。

蓉菜

【學名】*Immuthanum nymphaeoides*, Link. var. *japonicum*

Miq.

【產地】生於池沼之水中。

【基本】為多年生草，其葉浮於水上，形為圓心臟，周圍稍呈波狀，表面綠色，裏面紫色，類似蕹菜；惟近葉柄，有缺刻為異耳！夏日葉腋抽花莖，伸出水面，

花冠五裂，帶深黃色；其緣邊有多數似毛狀之突起。取其全草，供藥用之。

【功效】其氣味甘冷，無毒。止消渴，去熱，利小便。搗汁

服之，能療寒熱；又可搗敷諸腫毒，火丹，遊腫。

【學說】李時珍曰：蒼，與葦，一類二種也。並根連水底，

葉浮水上。其葉似馬蹄，而圓者，葦也。葉似葦，

而微尖長者，蒼也。夏月俱開黃花，亦有白花者；

結實大如棠梨，中有細子。

【別稱】又名鳧葵，水葵，水鏡草，鷹子菜，金蓮子接余。

船底苔

【基本】此即木船船底所生之綠苔，昔時雖有用於流行性感

冒等，而為解毒，解熱藥者；但未見有何功效。

【功效】據云：其氣味甘冷，無毒。止鼻衄，吐血，淋疾。

可同炙甘草，或汁，濃煎湯，呷之。又能解天行熱

病諸毒，伏熱，頭目不清，神志昏塞。

紫貝

【基本】為貝類(软体动物)之一種，其形態不一。據蘇恭云：紫

貝，出東南海中，形似貝子，而大，二三寸，皆有

紫斑，而骨白。南夷采，以為貨市。李時珍云：按

陸機詩疏云：紫貝質白，如玉，紫點為文，皆行列

相當，大者徑一尺七八寸，交趾九真，以為杯盤。

【功效】其氣味鹹平，無毒。能明目，去熱毒，治小兒斑疹

，除目翳。

【用量】六。〇——一。〇。〇服用。

【別稱】又名文貝，呀螺。

紫荊

【學名】Cordia allamanda, Poe.

【產地】多栽培於庭園之間。

【基本】為落葉喬木，高至十尺許，葉互生，呈圓心臟形，

有尖，而光滑。春間先葉，節節攢簇生花，花冠蝶

形，帶紅紫色。果實為莢，扁平，長二寸餘，闊四

五分。其木皮，可供藥用。

【功效】其氣味苦平，無毒。能破宿血，下五淋，可濃煎汁

服之。又通小腸，解諸毒，治癰疽，喉痺，飛尸，

蠱毒，腫毒，蛇蟲諸毒，可煮汁服之；亦可以汁洗

之，能療疔腫。又除血，長膚，活血，行氣，消腫

，解毒。治婦人血氣，疼痛，經水凝滯。

【用量】三。〇——一。〇。〇服用。

【學說】蘇頌曰：紫荊，處處有之，人多種於庭院間，木似

黃荊，葉小無極，花深紫，可愛。

【別稱】又名紫珠；皮名：肉紅，內消。

紫草

(紫草科)

【學名】*Lithospermum officinale* L.

【產地】生於山野中，亦有栽培於園圃者。

【基本】為多年生草，莖高二尺餘，而直立，葉為橢圓形，

或長卵形，互生。葉面粗糙，莖葉皆有小毛。花小

，白色，生於莖之上部，花後結實，形小而圓，微

尖。其根之皮部，呈深紫色，可取之，而供藥用。

【成分】根含有 $\text{Lithospermum-root } \text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_5$ 及 Shikonic

$\text{C}_{16}\text{H}_{10}\text{O}_5$ 之成分。

【功效】為變質藥，對於惡癰，癰瘍，皆可服用，有清血，

瀉毒之功。

其氣味苦寒，無毒。治心腹邪氣，五疳，能補中，

益氣，利九竅，通水道，療腫脹，滿痛，又療小兒

疳毒，及面黧，惡瘡，頑癬，斑疹，痘毒，可以活

血，涼血，利大腸。

【用量】二·五——五·〇服用。

【採製】其根每一斤，用蠟二兩，溶水拌蒸之，待水乾燥，

取去其頭，並兩畔髭，細切，用之。

【學說】李時珍曰：此草花紫根紫，可以染紫，故名紫草。

三月逐穗下子，九月子熟時刈草，春社前後采根。

【別稱】又名紫丹，紫葑，葑，地血，鴉衝草。

紫堇

(罌粟科)

【學名】*Corydalis flavida* Pers.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為越年生草，莖高五六寸，乃至一二尺許，葉二，

三，四分裂，有缺刻，銳頭剪狀，互生。春夏之間

，開花，呈紫紅色，為總狀花序。果實為蒴果，作

線形。其苗及花，可供藥用。

【功效】其苗氣味酸平，微毒。其花氣味酸而微溫，無毒。

專治男女小兒脫肛。

【學說】李時珍曰：蘇頌之說：出於唐玄宗，天寶單方中，

不具紫堇形狀。今按軒轅述寶藏論云：赤芹，即紫

芹也。生水濱，葉形如赤芍藥，青色，長三寸許，

葉上有黃斑。

【別稱】又名赤芹，蜀芹，楚葵，苦菜，水菊菜。

紫參

(蓼科)

【學名】*Polygonum tenuicaulis* Hsiao et Ma.

【產地】生於深山之陰地。

「基本」爲一種野生草本，根有節，黑褐色，長延地上，葉

之形狀，種種不一。夏間根頭先出花莖，開花，成穗，花瓣六片，白色，而帶粉紅。其根可取之。而供藥用。

「功效」爲通經藥。

其氣味苦寒，無毒。去心腹積聚，寒熱，邪氣，通九竅，利大小便。療腸胃大熱，唾血，衄血，腸中聚血，瘰癧，諸瘡。能止渴，益精，除腹脹，散瘀血。治婦人血閉不通，狂瘵，瘧瘧，血痢。能破血，生肌，止痛，補虛，益氣，除腳腫，發陰陽。

「用量」一·五——五·〇服用。

「禁忌」畏辛夷。

「別稱」又名牡蒙，童腸，馬行，衆戎，五鳥花。

紫菜

(江藻類)

「學名」*Torphyma tenera*, K. Jellm.

「產地」生於淺海岩石之上。

「基本」爲一種藻類，全體扁平，呈廣披針形，或橢圓形，稍帶分歧。色有紅紫，綠紫，黑紫等，長約一二寸許，闊二三分。冬春之際，採之，製爲疊紙狀，亦

可供藥用之。

「功效」其氣味甘寒，無毒。能去熱氣，煩鬱，咽喉腫痛，可煮汁飲之。又治癩瘡，腳氣，宜常食之。

「學說」李時珍曰：閩越海邊，悉有之，大葉，而薄。

紫菀

(菊科)

「學名」*Aster tataricus*, L.

「產地」庭園間，多栽培之。

「基本」爲多年生草，高六七尺，葉長橢圓形，有鋸齒，葉面粗糙。秋日開花，爲頭狀花序。周圍爲舌狀花冠，淡紫花；中部管狀花冠，黃色。其根紫而柔軟，可爲藥用之。

「功效」爲祛痰藥，鎮咳藥。

其氣味苦溫，無毒。止咳逆，上氣，胸中寒熱，結氣，去蟲毒，安五臟，療效唾膿血，止喘悸，五勞，體虛，補不足，治小兒驚癇，勞氣，虛熱，百邪鬼魅。又能調中，消痰，止渴，潤肌膚，添骨髓，益肺氣，治息賁。

「用量」一·五——五·〇服用。

「禁忌」惡天雄，瞿麥，稿本，雷丸，遠志；畏茵陳。

〔採製〕取根先去鬚，有白如練色者，號白羊鬚草，自然不

同。去頭，及土，用東流水洗淨，以蜜浸一宿，至

明，於火上焙乾用之，其根一兩，用蜜二分。

〔學說〕李時珍曰：按陳自明云：紫菀，以牢山所出，根如

北細辛者，為良。

〔別稱〕又名青菀，紫菀，返魂草，夜牽牛。

紫菀

(葡萄科)

〔學名〕*Vitis Colquhounii* Pull.

〔產地〕多產於深山之中。

〔基本〕為一種蔓生之灌木，葉圓形，頗大，基脚作心臟形

，掌狀分裂，裂痕較淺，呈稜角狀，邊緣有大小鋸

齒。上面平滑，下面密生褐色似綿之毛。夏秋之際

，莖梢着花，花冠五瓣，呈黃綠色。其基部常有卷

鬚，頂上略結合，開放即脫落，為圓錐花序。果實

為漿果，作圓球形，熟則成紫黑色。其根可取之，

而為藥用。

〔成分〕果實含有葡萄糖，及葡萄糖等。

〔功效〕其根皮氣味甘而苦寒，無毒。治癰腫，惡瘡，可搗

末和醋封之。又治癰緩，瘰癧，解熱，止痛風，通

小腸，生肌，散血，除產後煩渴，療金瘡，傷損。

〔用量〕三〇——一〇〇服用。

〔學說〕蘇頌曰：今惟江寧府，及台州生之。春生，冬枯，

似葡萄，而紫色。

紫葳

(紫葳科)

〔學名〕*Tournefortia grandiflora* L'airch.

〔產地〕多栽培於庭園間。

〔基本〕為蔓生之木本，莖出氣根甚多，攀緣他物，高達數

丈。葉為羽狀複葉，有鋸齒。夏秋之間，開花，赭

黃色，瓣之下部連合成管狀。其根花，及其莖葉，

皆供藥用之。

〔功效〕花為通經藥。

其花及根氣味酸微而寒，無毒。能治婦人產乳餘疾

，崩中，癰癩，血閉，寒熱，鼠疫，養胎，產後奔

血，淋瀝，熱風，風癩，大小便不利，腸中結實，

酒醱，熱毒，風刺，婦人血膈，遊風，帶下。其莖

葉氣味苦平，無毒。能益氣，除熱風，身癢，遊風

，風疹，癢血，帶下，其他與花功同。治喉痺，熱

痛，能涼血，生肌。

「用量」花用三。〇——六。〇服之。

「禁忌」畏鹵鹹。

「學說」李時珍曰：凌霄，野生，莖繞數尺，得木而上，即

高數丈，年久者，藤大如杯。春初生枝，一枝數葉

，尖長，有齒，深青色。自夏至秋開花，一枝十餘

朵，大如牽牛花，而頭開五瓣，赭黃色，有細點，

秋深更赤。

「別稱」又名凌霄，陵苻，陵時，女葳，凌霄，武威，羸陵

，鬼目。

紫藤

(豆科)

「學名」*Wanhsia floribunda*, Saub.

「產地」生於山野之中。

「基本」爲落葉木質植物，莖卷繞於他物之上，葉爲羽狀複

葉，小葉長卵形。開紫色，或白色之蝶形花，果實

爲長莢，有毛，短而密生。其莖，可供藥用。

「功效」其氣味甘而微溫，並有小毒。可以濃煎，和糖服用

之，而治下水腫病。

「學說」陳藏器曰：藤皮着樹，從心重重有皮，四月生紫花

，可愛。

紫蘇

(唇形科)

「學名」*Perilla frutescens*, Donn.

「產地」多栽培於園圃之間。

「基本」爲一年生草，莖方，高二尺餘，葉卵形，端尖，有

鋸齒，對生，背紫色。夏日出長花莖，開小唇形花

，花白，或淡紅，爲總狀花序；實如芥子。可取其

子實，及莖葉，供藥用之。

「功效」其莖葉氣味辛溫，無毒。能下氣，除寒熱，治一切

冷氣，又補中，益氣，治心腹脹滿，霍亂轉筋，開

胃，下食，止脚氣，利大小腸，通心經，益脾胃，

養飲尤勝；與橘皮相宜。能解肌，發表，散風寒，

行氣，寬中，消痰，利肺，和血，溫中，止痛，定

喘，安胎，解魚蟹毒，治蛇犬傷，以葉生食，作羹

，殺一切魚肉毒。其子氣味辛溫，無毒。能下氣，

除寒，溫中，治上氣，欬逆，冷氣，濕氣，結氣。

亦能調中，益五臟，止霍亂嘔吐，反胃，補虛勞，

健肌膚，利大小便，破癰結，消五癰，去瘡，止嗽

，潤心肺。又治肺氣，喘急，風疾，可以順氣，利

膈，寬腸，解魚蟹毒。

【用量】四。○——二。○服用。

【學說】李時珍曰：紫蘇，白蘇，皆以二三月下種，或宿子

在地自生。其莖方，其葉圓，而有尖，四圍有鋸齒

。肥地者，面背皆紫；瘠地者，面青，背紫。其面背皆白者，即白蘇，乃佳也。

【別稱】又名蘇，赤蘇，桂花。

紫蠟

【基本】據李時珍云：紫蠟，出南番，乃細蟲如蟻虱，緣樹

枝造成，正如今之冬青樹上小蟲，造白蠟一盤，故

人多搖枝造之，今吳人用造胭脂。按張勃吳錄曰：

九真移風縣有土，赤色如膠，人視土，知其有蟻，

因絮發，以木枝插其上，則蟻緣而上，生漆凝結，

如蠶繭蟬蛸子之狀。人折漆以染絮物，其色正赤，

謂之蟻漆赤絮，此即紫蠟也。血竭乃其樹之脂膏。

【功效】其氣味甘鹹而平，並有小毒。去五臟邪氣，治金瘡

，帶下，破積血，生肌，止痛，與麒麟竭，大同小

異。又治濕癩，疥疥，宜入膏用，且能益陽精，去

陰氣。

【別稱】又名赤膠，紫梗。

紫石英 Anthracite

【產地】多產於山東萊縣之煤山。

【基本】為屬於六角系柱狀結晶之礦石，色紫，或青紫，

或灰褐，但色深淺不一，質極透明，非常堅硬，諸

酸皆不能溶解，可為藥用之。

【成分】紫色者，含有無水珪酸 SiO_2 之成分。

【功效】民間多用為妊娠藥。

其氣味甘溫，無毒。能去心腹欬逆，邪氣，補不足

，女子風寒，子宮絕孕，十年無子，亦可久服。能

溫中，治上氣，心腹痛，寒熱，邪氣，結氣，補心

氣不足，定驚悸，安魂魄，填下焦，止消渴，除胃

寒，散癰腫，養肺氣，止驚癇。

【用量】四。○——一。○。○服用。

【禁忌】畏扁青，附子；惡蛇甲，黃連，麥句；忌火。

【採製】凡用於丸散者，以火煨，醋淬七次，碾末，用水飛

過，曬乾入藥。

紫金牛

(紫金牛科)

【學名】Ardisia japonica, Bl.

【產地】多自生於山野之中。

「基本」爲常綠小灌木，如草木狀，高約七八寸許，葉長卵形，有鋸齒，互生。夏月莖梢葉間開花，花小，合瓣，青白色，着以赤色之小點。果實小，而圓，熟則呈紅色，或白色。可採取之，而供藥用。

「功效」其氣味辛平，無毒。治時疾，膈氣。能去風痰，解毒，破血。

「學說」蘇頌曰：生福州，葉如茶葉，上綠，下紫。結實圓紅，色如丹朱，根微紫色。八月采根，去心，暴乾，頗似巴戟。

紫金藤

「基本」據蘇頌云：生福州山中，春初單生，莖青色，至冬凋落。其藤似枯條，采皮，晒乾。

「功效」據云：能補腎氣，消損傷，療血；亦可搗敷惡瘡，腫毒。

「別稱」又名山甘草。

紫茉莉

(紫茉莉科)

「學名」Mirabilis jalapa, L.

「產地」原產於西印度。

「基本」爲多年生草，或一年生草，莖高二三尺，葉圓錐形

而尖，葉柄較長，對生。夏月每月開花，一夜凋落，有合片，萼如漏斗狀，呈白色，紅色，或黃色；種子有粉狀之胚乳。其根等，有爲藥用者。

「功效」其根能治乳癰，白濁。其花可浸製狀元紅之酒。其子可取其粉，去面上斑痣，粉刺。

「禁忌」忌鐵。

「學說」陳扶搖花鏡：紫茉莉，一名狀元紅，本不甚高；但婆娑，而蔓衍易生。葉似蔓菁。

紫花地丁

(堇菜科)

「學名」Viola palmata, De. var. chinensis, Ging.

「產地」生於山野之中。

「基本」爲多年生草，高至三四尺，葉長橢圓形，或長卵形，互生。春夏之際，出花莖，自葉叢之間抽出；其頂着一花，花有五瓣。果實爲蒴果，有銳頭，常裂開，而散布種子。其根可採取之，而供藥用。

「功效」其氣味苦辛而寒，無毒。治一切癰疽，發背，疔腫，癩瘡，無名腫毒，惡瘡。

「學說」李時珍曰：處處有之，其葉似柳，而微細。夏開紫花，結角。平地生者，起莖；擊溝邊生者，起蔓。

〔別稱〕又名箭頭草，獨行虎，羊角子，米布袋。

紫背金盤

〔基本〕據李時珍云：湖湘水石處，皆有之，名金盤，藤似醋筒草，而葉小，背微紫，軟莖引蔓，似黃絲，搓之即斷，無汁。可見方士，用以制汞；他處少有醋筒草，葉似木芙蓉，而偏，莖空，而脆，味酸，開白花。廣人以鹽醋，又食之。

〔功效〕其氣味辛澀而熱，無毒。治婦人血氣痛，洗焙，研末；酒服半錢。孕婦勿服，能消胎氣。

〔禁忌〕忌雞，魚，羊血，溼麪。

細辛

(馬兜鈴科)

〔學名〕*Asarum sieboldii* Miq.

〔產地〕多生於山中之陰地。

〔基本〕為多年生草，春月自地下莖，發出新葉，呈心臟形，末端尖狹，有長葉柄，直於根莖。開花三瓣，為紫藍約二三分，外呈淡褐色，內部白色，可採取之，而供約用。

〔功效〕為發痛藥。

其氣味辛溫，無毒。能止欬逆，上氣，頭痛，腦痛

，百節拘攣，風濕痺痛，死肌，可明目，利九竅，溫中，下氣，破痰，通水道，開胸中滯結，除喉痺，鬚鼻，風癩，癩疾，下乳結，汗不出，血不行，安五臟，益肝膽，通精氣，添膽氣，治嗽，去皮風，濕癢，風眼，淚下，除肉痛，血閉，婦人血澀，腰痛。含之可去口臭，又治口舌生瘡，大便燥結，目中倒睫。

〔用量〕○。六，——二。○服用。

〔製劑〕1 細辛丁幾 *Tinctura Radix Asari.*

此即以細辛根一。○，浸於稀酒精一○。○中，經五日後，而濾過之，製成一種液體。一日三回，與以○。五——二。○，為鎮痛藥。

〔禁忌〕惡黃耆，狼毒，茱萸；忌生菜，狸肉；畏消石，滑石；反藜蘆。

〔採製〕可取細辛，切去頭子，以瓜水浸一宿，暴乾用之。〔學說〕李時珍曰：博物志言：杜衡，亂細辛，自古已然矣。沈氏所說：甚詳，大抵能亂細辛者，不止杜衡，皆當以根苗，色味，細辨之。葉似小葵，柔莖，細根，直而色紫，味極辛者，細辛也。

【別稱】又名小辛，少辛。

貫衆

(水龍骨科)

【學名】*Aspidium foliatum*, Sw.

【產地】生於山林之陰地。

【基本】為隱花植物，高二尺許，葉為羽狀複葉，互生。於

中軸葉，背有圓形不規則之子囊羣，簇生其上。地

下莖，彎曲，有毛茸覆之，可採取而供藥用。

【成分】含有似鞣酸之物質。

【功效】為止血藥，可用於胃腸出血，子宮出血，衄血，及

創傷出血；並可用為解毒藥，於汞毒性口腔炎等，

作為含嗽料。

其根氣味苦微而寒，有毒。能去腹中邪熱，諸毒，

殺三蟲，去寸白，破癰癤，除頭風，止金瘡。為末

，水服一錢，止鼻血有效；又治下血，崩中，帶下

，產後血氣脹痛，斑疹，漆毒，骨哽，解豬病。

【用量】一回一〇——四〇之內服，或以百分之一——

三水煎汁，而外用之。

【製劑】貫衆丁幾 *Tinctura Aspidium foliatum*.

此即以貫衆五〇〇，浸於稀酒精一〇〇〇中，經五

日後，而濾過之，製成一種丁幾。一日三四，與以
二〇〇——四〇〇服用，為止血藥。

【學說】李時珍曰：多生於山陰近水處，數根叢生。一根數

莖，莖大如筋。其涎滑，其葉兩兩對生，如狗脊之

葉，而無鋸齒，青黃色；面深，背淺。其根曲，而

有尖嘴，黑鬚，叢簇，亦似狗脊根，而小，狀如伏

鳩。

【別稱】又名貫節，貫葉，百頭，草鴉頭，黑狗脊，及鳳尾

草等。

透骨草

【基本】為一種雜草類之植物，其形頗似牛膝草，或馬鞭草

，可採取之，而供藥用。

【功效】據云：能軟堅，補髓。治風氣疼痛，痞滿，腳氣，

反胃，吐食，筋骨痠痛，婦女難產，及一切腫毒。

通草

(通草科)

【學名】*Alstonia chinensis*, Donn.

【產地】多自生於山野之中。

【基本】為蔓生之落葉灌木，常纏繞於他物之上。葉呈掌狀

複葉，互生。夏秋之際，開淡紫色花；結長橢圓形

之莖果，約二寸長，具有白蠟，食之甚美。其木及根等，皆供藥用之。

〔成分〕種子含有多量之植物油等。

〔功效〕為利尿藥，可用於水腫，秘尿等。其他疥癬，諸瘡，有消炎，消腫之可能，亦可內服之。

其枝木氣味辛平，無毒。能除脾胃寒熱，通九竅，利血脈，關節，去惡蟲，心煩，治耳聾，散癰腫，諸結不消，及金瘡，惡瘡，鼠瘻，臁鼻息肉，五淋，利小便，去水腫，通諸經絡，寒熱不通之氣。又理風熱，小便數痛，小腹虛滿，又能安心，除煩，止渴，退熱，明耳目，治鼻塞，通小腸，下水，破積聚，血塊，排膿，治瘡癤，止痛，下胞，女人血閉，月候不均，天行時疾，頭痛，目眩，乳結，癩諸癰瘡，喉痺，咽痛，可濃煎含咽。其根能治項下癰瘤。其子氣味甘寒，無毒。厚腸胃，下三焦，去惡氣，續五臟，通十二經脈，可與核食之。又除三焦客熱，胃口熱閉，胃不下食，能止渴，利小便。

〔用量〕一回一〇——二〇——四〇服用。

〔學說〕李時珍曰：今之木通，有紫白二色；紫者，皮厚，

味辛；白者，皮薄，味淡。

〔別稱〕又名木通，附支，下翁，萬年藤；子名：燕覆。

通脫木 (五加科)

〔學名〕*Tetrapanax papyrifer* R. Kooh.

〔產地〕多產於暖帶之各地。

〔基本〕為落葉灌木，莖實不堅，折之內有白色髓樣物質。葉為掌狀分裂，有長柄，集生於莖之頂端。開花甚小，白色，為繖形花序。其莖中之髓，切成薄片，以供藥用。近來所用之通草，即為本品也。

〔功效〕其氣味甘淡而寒，無毒。能利陰竅，治五淋，陰水腫，瀉肺，解毒，殺蟲，止痛，明目，退熱，下乳，催生。其花上粉能治諸蟲癭，惡瘡，痔疾，癩瘻，胸中伏氣攻胃咽。

〔用量〕三〇——四〇服用。

〔學說〕陳藏器曰：通脫木，生山側，葉似蓖麻，其莖空心，中有白髓，輕白可愛。女人取以飾物，俗名：通草。蘇頌曰：郭璞言：生江南，高丈許，大葉似荷，而肥，莖中髓，正白，今園圃亦有種蒔者，或作蜜煎，充果食之，甘美。李時珍曰：蔓生山中，莖

大者，圍數寸。

〔別稱〕又名通草，活菴，睡南。

連翹

(木犀科一作柃骨科)

〔學名〕*Forcytia sinensis*, Yahl.

〔產地〕多栽培於庭園之間。

〔基本〕為莖葉灌木，枝條稍蔓生，葉為複葉，時亦成卵形之單葉。早春開黃花，甚美，合瓣；花冠呈筒狀，有四深裂。先葉，而後花；花冠下部，連合為心臟形。果實為蒴果，呈黃褐色。其子實，及根莖，皆供藥用。

〔功效〕為發汗藥，可用於疥癬，諸瘡之內服。

其子實氣味苦平，無毒。能治寒熱，鼠瘻，癰瘰，癰腫，惡瘡，癰瘤，結熱，蠱毒，去白蟲，通五淋，小便不通，除心家客熱，利小腸，排膿，止痛，通月經，散諸經血結，氣聚，消腫，瀉心火，除脾胃濕熱，治中部血證，其莖葉能治心肺積熱。其根氣味甘寒而平，並有小毒。下熱氣，益陰精，明目，健身，治傷寒，瘵熱。

〔用量〕八〇——一五〇服用。

〔禁忌〕忌火。

〔別稱〕又名連，異翹，旱蓮子，蘭華，三廬；根名：連翹

，竹根。

連錢草

(唇形科)

〔學名〕*Nepta (Liedoma) Benth.*

〔產地〕多自生於平野之中。

〔基本〕為多年生草，莖方形，而長，花後則匍匐於地上。至春月自舊莖出芽，直立，高五六寸；葉圓心臟形，有鈍齒，葉柄甚長，對生。夏初開花，花冠唇形，呈青紫色，其莖葉等，可供藥用。

〔成分〕含有揮發油，及單寧等。

〔功效〕為強壯藥。

其氣味苦平，無毒。能治大熱，惡瘡，癰疽，丹毒，可搗汁敷之。又治小兒寒熱，積疾，腹內熱結，可搗汁服之。

〔用量〕二〇——一五〇服用。

野馬

〔基本〕為馬類 (*Equidae*) 之一種。據李時珍云：按郭璞云：野馬，似馬而小，出塞外；今西夏，甘肅，及遼

東山中，亦有之。取其皮爲裘，食其肉，如家馬肉；但落地不沾沙耳！

【功效】其肉氣味甘平，而有小毒。治人病馬癩，筋脈不能自收，周痺，肌肉不仁。其陰莖氣味酸鹹而溫，無毒。治男子陰痿，能縮精。

野菊

(菊科)

【學名】*Chrysanthemum indicum*, L.

【產地】多產於原野之間。

【基本】爲多年生草，莖多分枝，高三四尺，葉似菊葉，缺刻甚深；但比菊較小。秋晚枝梢開花，爲頭狀花序。花黃色，外圍之花，舌狀花冠；中部之花，筒狀花冠。其根莖花葉，皆供藥用。

【功效】其根莖花葉，氣味皆苦辛而溫，具有小毒。能調中，止洩，破血，婦人腹內宿血，宜用之。治癰腫，疔毒，瘰癧。

【學說】李時珍曰：苦蕒，處處原野極多，與菊無異；但葉薄小，而多尖。花小，而蕊多，如蜂窠狀，氣味苦辛，強烈。

【別稱】又名苦蕒。

野豬

【學名】*Sus leuconystax*, Temm.

【產地】多棲息於深山之中。

【基本】此屬偶蹄類之反芻類，其下頰之犬齒長，伸於口外，鼻屈曲自由，且以表皮硬變，適於掘地。沿背面之中央線生長毛。其肉可食，亦供藥用。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。治癰癩，補肌脂，益五臟，除風虛，炙食，治腸風，瀉血，不過十頓。其脂鍊淨，和酒一日三服，令婦人多乳，十日後，可供三四兒；素無乳者，亦下。又除風腫毒，治疥癬。其黃氣味甘平，無毒。治金瘡，止血，生肉，療癩癧，水研，如粟核許服之，日二服；又研水服，治血痢，疰病，惡毒風，小兒肝氣，客忤，天弔。其膽除惡熱毒氣，鬼疰，癩癧，小兒諸疳，亦可水研漿許服。其齒燒灰水服，治蛇咬毒。其頭骨治邪癘。其外腎連皮燒，存性研末，飲服，治崩中，帶下，及腸風，瀉血，血痢。其皮燒灰，塗鼠瘻，惡瘡。

野薔薇

(薔薇科)

【學名】*Rosa Multiflora*, Thunb.

「產地」生於原野，或栽於庭園之間。

「基本」爲落葉灌木，莖細有刺，高至三四尺，葉爲奇數羽

狀複葉，橢圓形，略有毛。初夏枝梢着花，花冠五

瓣，白色，或紅色，爲圓錐花序。其根花等，皆供

藥用。

「成分」含有芳香性揮發油等。

「功效」其花治瘧，據云：取野薔薇花拌茶煎服，可驅瘧鬼

。又治婦人鬱結，吐血。其根治肺癆，吐膿，以酒

煎服。對於口瘡，亦可煎湯嗽口。婦人禿髮，可用

薔薇嫩枝，同猴薑煎汁，刷之。

「學說」百花鏡：山野，與家種無異；但形不大，花皆粉紅

，花單瓣，無千葉者。春月山人，采其花，售與粉

店，蒸粉貨售，爲婦女面藥云。

「別稱」又名雪客；子名：石珊瑚。

釣樟

(樟科)

「學名」*Lindera kerriana*, Bl.

「產地」生於暖帶之山地；以日本爲最多。

「基本」爲落葉灌木，幹高八九尺許，樹皮平滑，具有黑色

之斑紋，常放出香氣。葉長橢圓形，背有絹絲狀之

毛。初春先葉，開花，花小，黃色，爲繖形花序。

果實黑色，球形，大如豌豆。可取其根皮，供藥用

之。

「成分」含有揮發性之釣樟油。

「功效」爲收斂藥，有止血之功，可以根皮刮屑，止血瘡出

血，最效。

「別稱」又名烏樟。

釵子股

(蘭科)

「學名」*Trichostema*, Th.

「產地」熱帶地方，產生爲最多。

「基本」爲常綠草本，多寄生於老樹之上，莖高尺許，葉形

如著。夏月葉腋開花，淡黃綠色，著有暗紅色之斑

點。其根可採取之，而供藥用。

「功效」爲催吐藥。

其氣味苦平，無毒。能解毒，消瘰疬，以水煎服。

願消諸藥毒，可煮汁服之，或生研服之，必大吐下

。如無毒亦吐，去熱痰，瘰癧，天行時疾，蠱毒，

喉痺。

「學說」李時珍曰：按嶺表錄云：廣中，多蠱毒；彼人以草

藥金釵股治之，十救八七。其狀如石斛也。又忍冬
蕚解毒，亦號：金釵股，與此同名云。

【別稱】又名金釵股。

雪竊

【基本】據李時珍云：按葉子奇草木子云：雪竊，生陰山以

北，及蛾峭山。北人謂之雪蛆，二山積雪，歷世不
消。其中生此，大如瓠味，及甘美。又王子年拾遺

記云：員嶠之山，有水竊，長六七寸，黑色，有鱗
角。以霜雪覆之，則作齒，長一尺。抽五色絲，織

爲文錦，入水不濡，投火不燎。堯時海人獻之，其
質輕暖，柔滑。按此，亦雪竊之類也。

【功效】其氣味甘寒，無毒。解內熱，消渴疾。

【別稱】又名雪蛆。

陰地蕨

(瓶爾小草科)

【學名】*Beyrichium fernatum*, Sw.

【產地】多生於山野間之陰濕地。

【基本】爲一種宿根草，莖高五六寸，葉數回羽狀分裂，呈

黃綠色。每一葉，則抽一穗，着生多數子囊羣。其
根苗可採之，而供藥用。

【功效】其氣味甘苦微寒，無毒。能消腫毒，去風熱。

【學說】羅頌曰：生鄂州，順陽縣內鄉山谷，葉似青蒿，莖

青紫色；花作小穗，微黃，根似細辛。七月采根，
用之。

陸英

(忍冬科)

【學名】*Sambucus javanica*, Bl.

【產地】生於山野路旁之間。

【基本】爲多年生草，莖高三四尺，葉呈羽狀，對生。夏日
開花，白色，甚小，結粒狀之實。可取其草，以供

藥用。

【功效】其氣味苦寒，無毒。治骨間諸痺，四肢拘攣，膝酸
，寒痛，陰痿，短氣不足，腳腫。能除風毒，腳氣
上衝，心煩，悶絕，水氣，虛腫，風癩皮肌，惡瘡
。可煎湯，入酒浴之，爲妙。

【學說】名醫別錄曰：陸英生熊耳山谷，及宛句，立秋采。

蘇恭曰：此卽蒨葎也，古方無蒨葎；惟言陸英，後
人不識，浪出蒨葎條。此葉似芹，及接骨花，三物
亦同一類，故芹名：水英；此名：陸英；接骨名：
木英樹。此三英也，花葉並相似。

雀

【學名】 *Passer montanus*, L.

【基本】此屬於鳴禽類之留鳥也。體大，頰有黑斑，翼有二條白斑。通常於秋間，食稻；平時，則捕食蟲類。

其肉等，有用為藥者。

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。於多月食之，起陽道，令人有子。壯陽，益氣，暖腰膝，縮小便。治血崩，帶下。又能益精髓，縮五臟，凡氣不足者，宜常食之，不可停輟。其卵氣味酸溫，無毒。五月取之治下氣，男子陰痿。和天雄，兔絲子末，為丸，空心酒服五丸，治男子陰痿不起，女子帶下便溺。其頭血治雀盲。其腦用綿裹，塞耳，治聾，又可塗凍瘡。其膝，與脚，脛骨，治小兒乳癰，每用一具，煮汁服之，或燒灰，米飲調服。

【別稱】又名瓦雀，賓雀。

雀麥

(禾本科)

【學名】 *Bromus japonicus*, Thunb.

【產地】多栽種於陸田之中。

【基本】為一年生草，葉細而尖，有平行脈，葉柄作鞘狀。

花有小芒，為穗狀花序，往往自二三花成。結實成穗，細長而疏。其實及苗，皆供藥用。

【功效】其實氣味甘平，無毒。能充饑，滑腸。其苗氣味甘平，無毒。能治女人產生不出，可煮汁飲之。凡胎死腹中，胞衣不下，皆可用之。

【學說】蘇恭曰：雀麥，在處有之，生故墟野林下，苗葉似小麥，而弱。其實似穞麥，而細。

【別稱】又名燕麥，蕎，杜老草，牛星草。

雀麥

【基本】據蘇恭云：雀麥，在樹間，似蠶蛹蟲。此物紫白潤斑，狀似稊稊文，可愛也。李時珍云：結蠶，處處樹上有之；牡丹上尤多。入藥，惟取榴棘上房內有蛹者，正如蠶蛹，取桑上者。

【功效】其氣味甘平，無毒。去寒熱，結氣，蟲毒，鬼疰，小兒驚癇。

【別稱】又名雀兒飯甍，躑舍，天漿子，棘剛子，紅姑娘，

毛蟲。

魚狗。

【學名】 *Alcedo bengalensis*, Gm.

「產地」多產於水邊。

「基本」爲何魚類，其背面綠青色，腹面赤褐色，嘴暗黑色，尾短。其基部略呈橙黃色，羽色美麗，脚小而赤。

○肉具異臭，亦有爲藥用之者。

「功效」其肉氣味鹹平，無毒。治魚哽，及魚骨入肉不出，痛甚者，燒研，飲服，或煮汁，飲之，亦佳。

「學說」陳澹器曰：此即翠鳥也，穴土爲巢，大者，名翠鳥；小者，名魚狗，青色似翠。其尾可爲飾，亦有斑白者，俱能水上取魚。李時珍曰：魚狗，處處水涯有之，大如燕，喙尖而長，尾紅而短，背毛翠色，帶碧；翅毛黑色，楊青。可飾女人首物，亦翳翠之類。

「別稱」又名鵠，天狗，水狗，魚虎，魚師，翠碧鳥。

鹿

「學名」Cervus sika Temm.

「基本」此爲鹿蹄類之反芻類，性溫和馴人，四肢長，有懸蹄二個，走行頗巧，皮膚茶褐色，雜以白斑。角惟牡有之，缺骨軸，（鹿角，與洞角異，乃真皮化骨而成。其初當其前頭部，於皮下生一對突起，上生

軟骨，外面被以天鵝絨狀之軟皮，如羣之衆未開狀，謂之鹿茸，成長甚熟，數日後破皮，呈露，試以手觸，其熱如火，蓋此部血液循環最盛者也。迨次第成長，毛皮自然剝落，遂成堅角。○鹿二年，有角無枝；三年，生一枝；四年，生二枝；五年，生三枝；六年，生四枝；六年以上，增加靡定；但必同形之角。（鹿角甚昂，市上有用牛角，而充貨之，故與牛角（洞角）作以比較。）1 鹿，惟牡有角，牛牝牡共有之。2 鹿角，每年更脫，牛角終生，不脫落。3 鹿角中實，無骨軸，牛角中空，有骨軸。4 鹿角爲骨質，牛角爲角質。5 鹿角生枝；牛角不生枝。其角及茸等，於醫療上，異常重要，故另條述之。其他肉等，亦供藥用之。

「功效」其肉氣味甘味，無毒。能補中，益氣，強五臟。生者，療中風，口僻，割片貼之。補虛弱，調血脈，養血，生容。治產後風虛，邪僻。其腦可入面脂，令人悅澤。凡刺入肉內不出，以腦敷之，約半日自出。其精能補虛羸，勞損。其血治陰痿，補虛，止腰痛，鼻衄，折傷，狂犬傷。和酒服之，能治肺痿

，吐血，及崩中，帶下。諸氣痛欲危者，飲之立愈。又大補虛損，益精血，解痘毒，藥毒。其髓氣味甘溫，無毒。治男女傷中，絕脈，筋急疼痛欬逆，可以酒和服之。若同蜜蒸服，壯陽道，令有子。同地黃汁煎服之，能填骨髓，壯筋骨，治嘔吐，補陰，強陽，生精，益髓，潤燥，澤肌。其脂消癰腫，死肌，能溫中。治四肢不隨，除頭風，通膝理。其骨治鼠癩，留血，心腹痛。其骨氣味甘而微熱，無毒。能安胎，下氣，殺鬼，除風，補內虛，續絕傷，治小兒洞疰，下痢。其腎氣味甘平，無毒。補腎氣，安五臟，壯陽氣，作酒，及煮粥，食之。其膽氣味苦寒，無毒。消腫，散毒。其筋治勞損，續絕。凡塵沙眯目者，嚼爛投入目中，則黏出。其頭肉味平，治消渴，夢鬼，可煎汁，服之。其蹄肉味平，治諸風脚膝骨中疼痛，不能踐地，同豉汁五味煮食之。

鹿角 *Coru cervi*

〔基本〕為牡鹿之角，於七月采角，以鹿年久者，或鹿角黃色，而緊重尖好者。據云：此鹿食靈草，所以與衆

鹿不同，可採之，可為藥用。

〔成分〕含有磷酸鈣，碳酸鈣，膠質，軟骨質等。

〔功效〕為強壯藥。

其氣味鹹溫，無毒。能治惡瘡，癰腫，逐邪惡氣，除少腹血痛，腰脊痛，折傷，惡血，能滋補，益氣，以水磨汁服之，治脫精，尿血，夜夢鬼交。醋磨汁塗，疥瘡，癩腫，熱毒，小兒重舌，鵝口瘡。蜜炙研末，酒服，能強骨髓，補陽道，又治婦人夢與鬼交者，清酒服一撮，即出鬼精。燒灰服之，治婦人胞中餘血不盡。

〔用量〕三〇——一〇〇服用。

〔採製〕每取角到屑為細末用之，故方家多以鹿角屑，而命名之。

歐洲亦有以角製成鹿角油 *Oleum animalis nupatum* 鹿角炭 *Coru cervi nigrum* 鹿角鹽 *Sal. volatile coru cervi* 鹿角灰 *Coru cervi album* 等，而為醫藥之藥品。

鹿茸

〔基本〕為鹿之雄者，生有枝之角，每年脫換，年增一枝，

既老則否！壯時毛呈茶褐色，有白星，俗曰：梅花鹿。雌者，無角。鹿角初生如芽，有皮覆之，皮上有腫處，狀如翼之未開者，即是鹿茸，可採取之，陰乾，而為藥用。

【功效】為強壯藥，可用於衰弱之神經病，及一般虛勞之徵候。

其氣味甘溫，無毒。治瀉下，惡血，寒熱，驚癇，能益氣，強志，療虛勞酒洩如瘵，羸瘦，四肢酸疼，腰脊痛，小便數利，洩精，溺血，破瘀血，散石淋，變腫，骨熱，能安胎，下氣，補男子腰腎虛冷，脚膝無力，夜夢鬼交，精溢自出，女人崩中，漏血，赤白帶下；能生精，補髓，養血，益陽，強筋，健骨。治一切虛損，耳聾，目暗，眩運，虛癩。

【用量】三。〇——一〇。〇服用。

【採製】薄剝，刺串，塗蘇油，火炙，燻去毛，為末用之；或塗酒炙，或用酒蒸炙用之。

【別稱】又名斑龍。

鹿梨

【學名】*Prunella callosyana*, Dorn.

(薔薇科)

【產地】生於山野之中，處處有之。

【基本】為落葉喬木，莖高二三丈，枝有針刺。葉大橢圓形，或卵形，緣邊有細微之鋸齒；葉背，及葉柄，皆生軟毛。春間枝梢葉腋散生白色之花，類似梨花，果實球形，大約五六分，頗似杏狀。其根皮及實，可供藥用之。

【功效】其根皮氣味酸澀而寒，無毒。能治疥癬，可煎汁洗之。其實氣味相同，能治痢疾，可煨食之。

【別稱】又名鼠梨，山梨，陽櫻，羅。

鹿藥

(百合科)

【學名】*Shiitake japonica* A. Gr.

【產地】多生於山地之中。

【基本】為多年生草，莖高五六寸，葉長橢圓形，有尖齒，邊緣呈波狀。莖與葉，皆生毛茸。秋間開小白花，花蓋六片，為圓錐花序。可採取之，而供藥用。

【功效】其氣味甘溫，無毒。能去冷氣，治風血，陽痿，可酒浸服之。

鹿藿

(豆科)

【學名】*Rhynchosia volubilis*, Lam.

「產地」多生於山野之中。

「基本」爲多年生草，莖細長，蔓生，常纏結於他物之上。

葉自二小葉而成，葉柄頗長。夏日葉腋着以數花，花冠碟形，呈淡紫色。果實爲莢，長五六分，闊三分許，常含二扁圓黑色之種子，可爲藥用之。

「功效」其氣味苦平，無毒。除蠱毒，女子腰腹痛，腸癰，癩瘡，疔氣。

「學說」李時珍曰：鹿豆，卽野綠豆；又名：蠶豆，多生麥地田野中。苗葉似綠豆，而小，引蔓生，生熟皆可食。二月開淡粉紫花，結小莢；其子大如椒子，黑色，可煮食。

「別稱」又名鹿豆，蠶豆，野綠豆。

鹿角菜

(江藻類)

「學名」Chondrus Ocellatus, Holmæ.

「產地」生於乾潤附近之岩石上。

「基本」爲一種藻類之植物，根狀略似圓盤，葉常分歧如叉狀，各片之末端，有鈍頭，呈褐紫色。其大者，爲複叉狀，長一寸至三四寸，闊至二三寸。可取其全草，供藥用之。

「功效」其氣味甘大寒，無毒。能下熱，去風，療小兒骨蒸熱勞。服丹石人，食之，能下石力。

「學說」李時珍曰：鹿角菜，生東南海中石崖間，長三四寸，大如鐵線分了，如鹿角狀，紫黃色。

「別稱」又名猴菜。

鹿角膠 Colatina Cornu ovini.

「基本」據李時珍云：今人呼煑爛成粉者，爲鹿角霜；取粉熬成膠，或只以濃汁熬成膏者，爲鹿角膠。按胡璣衛生方云：以米汁浸鹿角七日，令軟，投入急流水中，浸七日，去粗皮，再以東流水，桑柴火，煮七日，旋旋添水，入醋少許，搗成霜，用其汁，加無灰酒，熬成膠用。又邵以正濟急方云：用新角三對，寸截，盛於長流水，浸三日，刮淨，入椿實子，桑白皮，黃蘗各二兩，置於鐵鍋中，火煮三日，夜不可少停，水少卽添湯，日足取出，刮淨，晒研爲霜。韓懋醫通云：以竹鹿角，寸截，置盛於流水中，浸七日，以瓦甌入水，桑柴火煮，每一斤，入黃蠟半斤，以壺掩住，水少旋添，其角軟，以竹刀刮淨，搗爲霜用之。其膠，及霜，皆供藥用之。

【成分】含有膠素 (Glutin) 軟骨素 (Chondrin) 等。

【功效】爲強壯藥，可用於病後之衰弱，以供滋養之用。

其氣味甘平，無毒。能治傷中，勞絕，腰痛，羸瘦，又補中，益氣，婦人血閉，漏下，赤白，能止痛，安胎，療吐血，下血，崩中不止，四肢作痛，多汗泄瀉，折跌傷損，男子勞損，吐血。凡炙搗酒服，可能補虛勞，長肌，益髓。又治勞嗽，尿精，尿血，疔瘍，腫毒。

【用量】三、〇——一〇、〇服用。

【禁忌】畏大黃。

【別稱】又名白膠；粉名：鹿角霜。

鹿蹄草

(鹿蹄草科)

【學名】*Pheila olibipha*, Nutt.

【產地】多生於山野之陰地。

【基本】爲多年生之常綠草，葉卵圓形，質厚，帶深綠色；

葉脈呈綠白色，有長葉柄，自地下部叢生。夏月自

葉叢之中央，生出花莖，長約七八寸許；上部綴以

數花，花冠白色，常向下方，花瓣五片，爲繖狀花

序。可採取之，而供藥用。

【成分】含有揮發性冬青油等。

【功效】爲收斂藥，可爲外用止血藥。

據云：能治金瘡，出血，搗塗，卽止。又塗一切蛇

蟲及犬咬毒傷。

【學說】李時珍曰：按軒轅述寶藏論云：鹿蹄，多生江廣平陸，及寺院荒處，淮北絕少，川陝亦有。苗似葦葉，而葉頗大，背紫色。春生紫花，結青實，如天茄子。

【別稱】又名小秦玉草，秦王試劍草。

麥角 *Acid. cornutum*

【基本】爲麥穗變成黑色，堅硬如角者，謂之麥角。由一種

麥角菌 (*Claviceps purpurea*, Tul.)，寄生而起，甚爲

麥害。若既發生，宜速拔去燒棄之；但今可入藥用

宜選取稜麥，及小麥者。外面呈暗紫色，略爲屈曲

，而有鈍稜三四個。內部白色，臭氣特異。

【成分】含有 *Cornutin* 之一種鹽基，與 *Acid. Sphaecoth. et*

Acid. Ergotin. 之二種酸質。

【功效】爲催產藥；又爲止血藥。近來爲應用上之便利，多

用其提煉精等之製劑，而代之；但其功效作用，亦

無絲毫之異。

「用量」○。五爲催產藥，每隔十五分時服用之。又一日用
二。五爲止血藥，分三回服用之。

「製劑」丁麥角越幾斯 *Extractum Secale cornutum*.

此即以麥角一〇・〇，冷浸於溜水四〇・〇中，須
分二次浸濾，而後蒸發成爲六・〇，再混和稀酒精
四・〇，更行蒸發之，卽爲稠厚越幾斯也。其色赤
褐，能溶於水，可專用爲催產藥。能與舊子宮，增
強陣痛，使胎兒速爲落生；但須用於分娩時之陣痛
微弱者，尤不可過早；否則一危險甚大。現今又多
用於內障，及各腔出血，爲止血藥；然其奏效亦不
確實，因其收縮血管之作用，現於全身之脈管，故
雖起出一血局部之脈管收縮，而一切血壓亦同時增高
，及有促起出血之慮。

此外尚可用於大動脈瓣閉鎖不全，動脈瘤，靜脈瘤
，子宮纖維肉腫，慢性子宮炎，以及膀胱與膠黏膜
之加窄兒，間或用於脈管運動性神經病，癩病病，
舞蹈病，及膀胱麻痺，脫肛，遺尿等。一回以〇・
〇五——〇・一——〇・三爲丸劑，水劑，亦可作

爲皮下注射劑。

2 滲別製麥角越幾斯 *Ext. Secale cornut. diluatum*

此卽以其量，先用依的兒，及酒精豫浸，而後再用
滲別法冷却，成爲一種水製之越幾斯，以供注射之
用，可避免刺戟之苦。其功效及用量，完全相同。

3 麥角流動越幾斯 *Ext. Secale cornut. fluidum*

此爲一種水製赤褐色之液體，混於水中，不發混濁
，故多用於注射時。其一切應用無異，而用量一回
十滴，乃至二十滴。

麥芽 *Malt*

「基本」爲麥粒初生之細芽也。其製造方法：可取大麥浸於
水中，至軟爲度，復取出，而去其水分，再使其堆
積一週，則漸次發蒸，而生幼根及芽，卽是，可爲
藥用之。

「成分」含有多量之麥芽糖，及其他。

「功效」爲健胃藥，有滋養，助消化之能。

其氣味鹹溫，無毒。能消渴，去熱，益氣，補中。
除冷氣，血滯，治霍亂，腹痛，宜瀉，下氣，開胃
，消食，除煩，化痰，催生，落胞。凡妊婦，及脾

胃無損者，宜禁忌服用。

【用量】一〇。〇——一五。〇服用。

【別稱】又名麥傑。

麥門冬

(百合科)

【學名】*Liriope remotifolia* (Link) var. *densiflora* (Maxim)

【產地】多產於陰濕之處。

【基本】為常綠多年生草，地下有根，如連珠狀；葉長二尺許。夏間開稀疎之穗狀花，為淡紫色，結實黑色。

其地下根，可採取之，而供藥用。

【功效】為祛痰藥，及滋養藥。

其氣味甘平，無毒。能治心腹結氣，胸中伏火，羸瘦，短氣，身重，目黃，虛勞，客熱，口乾，燥渴。止嘔吐，愈接斷，強陰，益精，消穀，調中，保神，定肺氣，安五臟，去心熱，止煩熱，下痰，消飲，治五勞，七傷，安魂。治肺痿，吐膿，時疾，熱狂，頭痛，咳嗽，面目肢節浮腫，下水，滯積，心氣不足，經水及乳汁不下，久服能輕身，明目。又和革前，地黃丸服之，可去濕痺，變白，夜視有光。

【用量】五。〇——一〇。〇服用。

【禁忌】惡款冬，苦瓠，苦茶。畏苦參，青蘘，木耳；伏石

鍾乳。

【採製】擇選其肥大者，須湯澤，抽去心；不爾，令人煩。

大抵一斤，須減去四五兩也。凡入湯液，以滾水調

濕，少頃抽去心，或以瓦焙軟，乘熱去心。若入丸

散，須瓦焙熟，即于風中吹冷，如此三四次，即易

燥；且不損藥力。

【學說】名醫別錄曰：麥門冬，葉如韭。冬夏長生，生函谷

，川谷，及堤阪肥土石間，久廢處。二月，八月，

十月采根，陰乾。

【別稱】又名覺冬；秦名：烏韭；齊名：愛韭；楚名：馬韭

；越名：羊韭；禹韭，禹餘糧，忍冬，忍凌，不死

草，階前草。

麥飯石

【基本】據李時珍云：按李迅云：麥飯石，處處山溪中有之

。其石大小不等，或如拳，或如鵝卵，或如菱，或

如餅，大略狀如提漿一團。麥飯有粒點，如豆，如

米，其色黃白；但于溪間麻石中，尋有此狀者，即

是。

【功效】其氣味甘溫，無毒。治一切瘰癧，發背。

國藥 *Saraken*.

【基本】據李時珍云：山西諸州平野，及大谷榆次高元處，秋間皆生齒，望之如水，近之如積雪。土人刮而煎之，爲鹽；微有蒼黃色者，卽齒鹽也。

【功效】其氣味苦寒，無毒。除大熱，止消渴，○狂煩，除邪；下蠱毒，柔肌膚。消五臟腸胃留熱，結氣，堅食；嘔逆，喘滿。能明目，去目痛。

【別稱】又名齒鹽，寒石，石鹹。

麻黃

(麻黃科)

【學名】*Ephedra villoides* Rich. var. *halimifolia*, II. et T.

【產地】產於中國，印度，亞伯利亞，南非洲等。

【基本】爲小灌木，莖高二三尺許，形狀與木賊稍類；並有節，節甚顯，節間有小葉，如鱗片，並生小枝。夏日開花，單性。其莖可採取之，而供藥用。

【成分】含有 $\text{Phthalin C}_{10}\text{H}_{12}\text{NO}$ 之鹹質成分。

【功效】爲解熱藥，鎮咳藥，祛痰藥，對於氣管枝喘息，及加發兒等，均有特效。

其氣味苦溫，無毒。治中風，傷寒，頭痛，溫熱

，能發表，出汗，去邪熱，止欬逆，上氣，除寒熱，破癰堅，積聚，除五臟邪氣，緩急風，腸痛，止

好睡，通腠理，解肌，洩邪惡氣，消赤黑斑毒。治身上毒風，疹痺，皮肉不仁，壯熱，溫疫，山嵐，瘴氣。通九竅，調血脈。開毛孔，皮膚，去營中寒

邪，洩衛中風熱，散赤目，腫痛，水腫，風腫，產後血滯。其根節氣味甘平，無毒。能止汗，可於夏月雜粉撲之。

【用量】一回一〇——二〇服用。

【禁忌】惡辛夷，石草。

【別稱】又名龍沙，卑相，卑鹽。

第十一畫

乾苔

(石薺科)

【學名】*Dactyloctenium aegyptium*, J. G. A. B.

【產地】產於淺海中，多着生於木石等物之上。

【基本】爲一種真正藻類之植物，呈細長之管狀，體形似絲棉，長約數寸。冬春之際，採其長者，乾燥之，而供藥用。

【成分】含有地衣酸，及似糖等之成分。

【功效】其氣味鹹寒，無毒。能治癰瘤，結氣，痔疾，及雀

鼠嘔吐不止，可煮汁服之。心腹煩悶者，以冷水研

如泥狀，飲之，即止。又能殺蟲，下一切丹石諸藥

毒。亦可燒末，吹入鼻孔內，止衄血。又可湯浸，

搗敷手足腫痛。

【學說】李時珍曰：此海苔也。彼人乾之，爲脯；海水鹹，

故與陸葷不同。

乾漆

【基本】爲漆樹 (*Rhus Vernifera*, De.) 樹幹之鋸痕，而流

出之暗褐色濃稠液體，即爲漆液。使其貯置器內，

漸次乾涸，而爲硬塊，以供藥用之。

【成分】含有漆酸 $C_{14}H_{18}O_2$ 及膠質，蛋白質等。

【功效】爲通經藥，又有用於疥癬，喉頭癆等。

其氣味辛溫，有毒。能行血，殺蟲，削年深堅結之

積滯，破日久凝結之瘀血。治傳尸，勞瘵，癩疽，

寸白蟲等。

【用量】二·〇——四·〇服用。

【禁忌】畏用椒，紫蘇，雞子，蟹油。

【採製】取漆敲碎，入土器中，置於炭火上燒之，至無烟爲

乾薑

(薑科)

【學名】*Zingiber officinale*, Rose

【產地】園圃間，多栽培之。

【基本】爲薑類植物，苗高二尺許。葉狀如箭鏃，對生。花

被大小不整，色淡黃。其地下莖，色黃，味辛，秋

初，出新芽，尤嫩美，可食。採取根莖，而乾燥之

，以備藥用。

【成分】含有揮發油等。

【功效】爲芳香性刺激藥，有驅風及健胃之功。

其氣味辛溫，無毒。能宣結，燥濕，發表，通脈，

下氣，止血，去滯，歸五臟，除風邪寒熱，傷寒頭

痛，散煩悶，開胃氣，止嘔，去痰，破血，調中。

治咳嗽，脹滿，霍亂不止，腹痛冷痢。

【用量】〇·五——一·〇服用。

【禁忌】惡黃芩，黃連，天鼠羶。

【採製】取生薑根水浸三日，除去外皮，再置於水中，經五

日後，更將皮刮去，晒乾，貯藏，備用。

惡實

(菊科)

【學名】 *Arctium Lappul. L.*

【產地】於野地，及田園，多自生之。

【基本】為越年生草，春發苗，發莖高者，三四尺；葉為大心臟形，有長柄，背生白毛。夏初開管狀花，色紫；並有鱗片，結成之總苞，質多細刺。其實及根等；皆供藥用。

【成分】根含有黏液質，菊糖 (Inulin)，單寧酸等。

【功效】其子氣味辛平，無毒。能明目，補中，除風，去風毒；諸獲。研末泛酒，每日服三五盞，除諸風，去丹毒，利腰腳，散結節，去筋骨煩熱，消癰疽。炒研煎飲，通利小便，潤肺，散氣，利咽喉，去膚風，通十二經，消斑疹毒。其根莖氣味苦寒，無毒。能治傷寒，寒熱，中風，面腫，消渴，熱中，逐水，輕身耐老。其根治齒痛，勞瘵，諸風，腳氣，緩弱，風毒，癰疽，欬嗽。傷肺，肺壅，疝瘕，冷氣，積血。可浸酒服，去風，及惡瘡，和葉搗碎，敷杖疔，金瘡，永不畏風。治面目煩悶，四肢不健，通十二經脈，洗五臟惡氣。莖葉蒸汁，可作浴湯，

去皮開胃如蟲行；又入鹽花生搗，搗一切毒腫。

【用量】六。〇——一二。〇服用。

【採製】取子揀淨，以酒拌蒸，待有白霜重出，以布拭去，焙乾，搗粉，用之。其根須蒸熟，暴乾，用之；不爾，令人欲吐。

【學說】李時珍曰：牛蒡子，古人種子，以肥壤栽之。剪苗洵淘為蔬；取根煮曬為脯，甚益於人；今人亦罕食之。

【別稱】又名鼠黏，牛蒡，大力子，莠箭菜，便牽牛，蝙蝠刺。

景天

(景天科)

【學名】 *Sedum Purpureum, Link.*

【產地】多栽養於庭園之中。

【基本】為多年生草，莖高二尺許，葉橢圓而厚，無柄，互生，有細鋸齒。夏月開花，五瓣，色淡紅，或黃，叢生莖頂，為繖形花序。可取其全草，及花，供藥用之。

【功效】其草氣味苦甘，無毒。能治大熱，火瘡，身熱，煩邪，惡氣，諸蟲毒，寒熱，風痺，補諸不足，療金

疥，止血。可煎水浴小兒，去煩熱，蕪氣。又治風疹，惡瘡，小兒丹毒，及發熱，熱狂，赤眼，頭痛，寒熱，遊風，婦人帶下。其花治婦人漏下，赤白，能強身，明目。

〔學說〕李時珍曰：景天，人多栽於石山上。二月生苗，莖，微帶赤黃也。高一二尺，折之有汁，葉淡綠色，光澤柔厚，狀似長匙頭，及胡豆葉而不尖。夏開小白花，結實如蓮翹而小，中有黑子，如粟粒。其葉味微苦，煉熟，水淘，可食。

〔別稱〕又名慎火，戒火，救火，撲火，護火，辟火，及火母等。

曾青

〔基本〕據李時珍云：但出銅處，年古即生，形如黃連，相綴；又如蚯蚓屎，方稜，色深，如波斯青代，層層而生，打之如金聲者，為真。

〔功效〕其氣味酸小而寒，無毒。治目痛，止流淚，除風痺，利關節，通九竅，破癥瘕，積聚，養肝膽，除寒熱，殺白蟲，療頭風，腦中寒，止煩渴，補不足，廣陰氣。

〔採製〕凡使勿用夾石，及銅青，每一兩要紫背天葵，甘草，青芝草三件，乾溼各一盞，細剉，放瓷鍋內，安青於中，東流水二盞，緩緩煮之，五晝夜，勿令水火失時，取出，以東流水浴過，研乳如粉，用之。

斑鳩

〔學名〕*Turdus chinensis* L.

〔基本〕為鳩之一種，羽色淡白，頭及體之下面，色灰白微紅，自肩脊至尾，皆灰褐色。後頸有黑色之輪紋。

〔功效〕其肉氣味甘平，無毒。能明目，多食，益氣，助陰陽，補虛損，食之令人不噁。其血治熱飲，解蠱毒。其尿治聾耳，出膿，疼痛，及耳中生疔腫，同夜明砂末，而用之。

〔別稱〕又名錦鳩，鶉鳩。

斑蝥

〔學名〕*Ichneumon chinensis* Deg.

〔產地〕田園中之荳葉上，多寄生之。

〔基本〕此屬於鞘翅類之五節類，體長寸許，翅鞘作紫綠色，帶金屬光澤，具強大之上顎。此蟲喜飛行人前，故又有鄉導蟲之稱。其全蟲有毒，可入藥用之。

「成分」含有 $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_4$ 之結晶體。

「功效」為發泡藥。外用，對於漿液膜炎，關節僵硬質斯，神經痛等，作為誘導之皮膚刺激藥。

其氣味辛寒，有毒。除寒熱，鬼疔，蠱毒，鼠蠱，瘡疽。腐蝕死肌，破石癩，治疥癬，癩瘰，可似墮胎，利水道。淋淋疾，敷惡瘡，癩爛，除痛癢，解行毒，大毒，沙蟲蠱毒，輕粉毒。

「製劑」1. 發泡古魯胃膜 *Colloidum epigastrium*

此即以斑蝥蟲末六〇，與依的兒九〇，冷浸三日而濾過之。取其液六〇，再混和古魯胃膜六〇，即成，為皮膚之發泡藥。

2. 強發泡膏 *Tingentium vesicans forthor*

此即以斑蝥蟲末一〇，與阿列布油九〇，溫浸於重湯煎上；再溶化黃蠟七〇，的列並帝油三〇，即成，亦為劇烈之發泡藥。

3. 弱發泡膏 *Tingentium vesicans mitius*

此即以強發泡膏減少斑蝥蟲末五〇，而製成。對於神經性齒痛，眼炎等，如願持久時間貼布，及其作用緩徐者，可貼於耳後部而用之。

「引赤紙」*Charta rubra/rostrata*

此即以斑蝥蟲末六〇，溜水六〇，的列並帝油六〇，阿列布油二四〇，黃蠟四八〇，鯨蠟一八〇，共為拌攪之，煮沸二時間後，濾過之。置於重湯煎上，乘溫之際，塗布於紙片上，而為持久貼用之皮膚刺激藥。

5. 斑蝥丁幾 *Tinctura cantharidinum*

此即以斑蝥蟲粗末三〇，酒精三〇〇，浸裂而成。間有一日一回，乃至三回，以其〇〇五〇〇二，用為內服者。又有外用，為軟膏料，及禿頭等之塗布料。

「禁忌」畏巴豆，丹參，空青，惡膚青，甘草，豆花。

「別稱」又名斑蝥，盤蝥蟲，斑刺。

無名異 *Tamoxite*

「產地」吾國廣東，河南，陝西各省，皆產生之。

「基本」為褐鐵礦之天然產出品，多附着石上，有光澤，呈黑褐色之球形塊，大者，徑約一分，小者如黍粟粒。若研磨成粉，則為茶褐色，可用之為藥。

「成分」含有水養化鐵等。

【功效】為收斂藥，有止血之作用。

其氣味甘平，無毒。治金瘡，折傷，內損，止痛，生肌肉，消腫毒，癰疽，醋磨敷之；又能收濕氣。

【用量】一·五——四·五服用。

無花果

(桑科一作蓴麻科)

【學名】*Ficus carica*, L.

【產地】多栽培於暖地之庭園間。

【基本】為落葉灌木，莖高十尺餘，葉大而粗糙，有三裂，或五裂。夏月開花，單性，淡紅。果實為肉果，倒

卵形，長寸許；外部為花托，花多隱於其中，熟則外皮暗紫色，內部赤紫色。其質及葉，皆供藥用。

【成分】含有葡萄糖，護膜質，脂肪等。

【功效】為緩和滋養藥，能令胃內之蛋白質，變化為有布頓，以助消化之功。

其質氣味甘平，無毒。能開胃，止洩痢，治五痔，咽喉痛。其葉氣味甘微辛平，而有小毒。亦治五痔，腫痛，可煎湯頻熏洗之，取效。

【用量】二·〇——六·〇服用。

【學說】李時珍曰：無花果，出揚州，及雲南。今吳楚閩越

人家，亦或折枝，插枝。柯如枇杷樹，三月發葉，

如花構葉，五月內不花，而實。

【別稱】又名映日果，優曇鉢，阿朶。

無食子

(楝科)

【學名】*Quercus lusitanica*, Willd.

【產地】多生於小亞細亞一帶。

【基本】為一種植物之小枝，由沒食子蟲，刺蝨而生之球狀病的贅生物也。可採取之，而供藥用。

【成分】含有沒食子酸，及單羧酸，樹脂，糖分等。

【功效】為收斂藥。

其子氣味苦溫，無毒。治赤痢，腸滑，能生肌肉，止腸虛冷痢，益血，生精，和氣，安神，烏髭髮，治陰痿，燒灰用，又能溫中，治陰疔，陰汗，小兒疳蠱，冷滑不禁。

【用量】一·五——三·〇服用。

【學說】李時珍曰：按方輿志云：大食國有樹，一年如栗子大，而長，名曰：蒲盧子，可食。次年則生麻茶澤，即沒石子也。間歲互生，一根異產，如此。一統志云：沒石子，出大食諸番，樹如樟，實如中國茶

藥。

〔別稱〕又名夜石子，黑石子，麻茶澤。

無患子

(無患子科)

〔學名〕*Egindia Mukurosi*, Gaertn.

〔產地〕庭園間多栽培之，亦有自生於山野者。

〔基本〕爲落葉喬木，莖高二丈許，葉爲羽狀複葉。其小葉

皆爲長卵形，互生。夏間開小花，黃色，爲圓錐花

序。果實球形，徑約六七分，中含一子，圓形，色

黑，而堅，可作念珠。其子皮，及核仁等，皆供藥

用之。

〔成分〕含有石鹼等之成分。

〔功效〕其子皮氣味微苦而平，並有小毒。除皮垢，去面黴

，治痰癆，研納喉中，立開。又治飛尸，能洗頭，

去風。其子仁氣味辛平，無毒。燒之，辟邪惡氣。

煨食，辟惡，去口臭。

〔學說〕李時珍曰：生高山中，樹甚高大，枝葉皆如梧，特

其葉，對生。五六月開白花，結實，大如彈丸，狀

如銀杏，及苦楝子，生青，熟黃。

〔別稱〕又名栴，木患子，擘婁，肥珠子，油珠子，菩提子

，鬼見愁。

無漏子

(鳳尾松科)

〔學名〕*Cycas revoluta*, Thunb.

〔產地〕多生於暖地。

〔基本〕爲常綠木本，幹粗大，高至十尺餘，外面被以鱗片

狀之葉痕，葉長大，集生莖頂，爲羽狀複葉；小葉

甚多，形細而長，有光澤，質硬。夏日開花，單性

；其實如桃，外皮光滑，呈朱赤色，可供藥用之。

〔成分〕含有黃色素，及樹脂，糖分等。

〔功效〕爲健胃，強壯，止瀉藥等；又有用爲鎮咳，祛痰藥

者。

其實氣味甘溫，無毒。能補中，益氣，除痰嗽，補

虛損，好顏色，令肥健，消食，止咳，治虛鼠，衰

弱，久服無損。

〔用量〕一〇——三〇——一〇〇服用。

〔學說〕李時珍曰：千年棗，雖有棗名，別是一物，南番諸

國皆有之，卽杜甫所賦海棕也。

〔別稱〕又名千年棗，萬歲棗，海棗，波斯棗，番棗，金果

；木名：海棕，鳳尾蕉。

洩疏

(虎耳草科)

【學名】*Theutzia scabra*, Thunb.

【產地】多生於原野之間。

【基本】爲落葉灌木，莖高五六尺，乃至十尺許，葉長橢圓形，而尖，緣邊有細鋸齒；裏面骨粗糙，對生，葉柄甚短。秋間開白花，花冠五瓣，爲圓錐花序。可採取之，而供藥用。

【功效】其氣味辛寒，無毒。去皮屑中熱，除邪氣，止遺溺，利水道，消胃中熱，下氣，亦可作浴湯用之。

【學說】汪機曰：按李當之，但言：洩疏子似枸杞，不曾言：樹相似。馬志因其子相似，遂謂：樹亦相似，以有刺；無刺爲別。蘇頌又因巨骨，地骨之名，疑其相類；殊不知枸杞，未嘗無刺；但小則棘多，大則棘少耳！本草中異物同名甚多，况一骨字之同耶！以此爲言，尤見穿鑿。

【別稱】又名巨骨。

梨

(蔷薇科)

【學名】*Pyrus Sinensis*, Lindl.

【產地】多栽培於園圃之中。

【基本】爲落葉喬木，莖高三十尺許，葉卵形，有尖端，緣邊，生纒細之鋸齒，如毛狀；葉柄長，互生。春間隨新葉而開花，花瓣五片，白色，結實可爲藥用。

【功效】其質氣味甘微酸寒，無毒。治熱嗽，止乾渴，又可切片，貼湯火傷，止痛不爛。又治客熱，中風不語，傷寒，發熱，解丹石，熱毒，驚邪，利大小便，除賊風，止心煩，氣喘，熱狂，風痰。凡暗風不語者，可生搗汁，頓服；胸中痞塞熱結者，宜多食之。又能潤肺，涼心，消痰，降火，解瘡毒，酒毒。其花能去面黑，粉刺。其葉治霍亂吐瀉不止，煮汁服之，或作煎服，治風疾，小兒寒疝。若搗汁服之，能解中酒毒。其木皮能解傷寒，時氣。

【學說】李時珍曰：梨樹，高二三丈，尖葉，光膩，有細齒。二月開白花，如雪，六出。上已無風，則結實，必佳。

棗

(鼠李科)

【學名】*Zyglis vulgaris*, Lam. var. *Inermis*, Bge.

【產地】北方各地皆產生，多栽培於園圃中。

【基本】爲落葉亞喬木，高二丈餘，葉卵形，互生，邊有鋸齒，具三條肋。夏日葉腋開花，甚小，呈黃綠色，果實爲橢圓形，內中有核，外部多肉，初青，熟紅，可採取之，而供藥用。

【成分】含有沙糖，黏液質等。

【功效】爲緩和藥。

其氣味甘平，無毒。吾國常爲調味，配合藥；但目的在理胃，和血，補中，益氣；且能滋脾，潤肺，生津液，悅顏色，通九竅，助經絡，和百藥，故補劑中，多加用之。

【用量】三〇——九〇——一二〇服用之。

【別稱】又名乾棗，良棗，丹棗，大棗。

棗貓

【基本】據李時珍云：棗貓，古方無考，近世方廣，丹溪心法附餘，治小兒方用之，註云：生棗樹上，飛蟲也。大如棗子，青灰色，兩角。采得，陰乾，用之。

【功效】據云：能治小兒脾風。

棗蠹蟲

【產地】多寄生於棗樹，或桑樹之木幹中。

【基本】此爲天牛 (*Arytona nigrifolia* Chev.) 之幼蟲，即蝨蟥也。乳白色，無脚，有黃褐色之短毛，被覆全體。背有顆粒狀突起之物，能支其體以覆行。其屎可拾起之，而供藥用。

【功效】其尿治聾耳，出膿，或水研末，同麝香少許吹之。

棠梨

(薔薇科)

【學名】*Prinus betulaefolia* Bge.

【基本】據李時珍云：棠梨，野梨也。處處山林，有之，樹似梨而小；葉似蒼朮葉，亦有闕者，三叉者；葉邊皆有鋸齒，色頗黧白。二月開白花，結實如小棗子。大。霜後，可食。其樹接梨，甚佳，有甘酢，赤白二種。其實及枝葉，可供藥用之。

【功效】其實氣味酸甘澀寒，無毒。燒食之，可止滑痢。其枝葉氣味相同，能治霍亂吐瀉不止，轉筋，腹痛，可取一握，同木瓜二兩，煎汁細呷之。

椶子

【基本】據李時珍云：椶，留，二果名。按薛登刺鴉異物志云：椶子樹，南越，丹陽諸郡，山中皆有之。其實如梨，冬熟，味酢。留子樹，生交廣，武平，與古

諸郡，出中。三月着花，結實，如梨；七八月熟，色黃，味甘酢，而核甚堅。

【功效】其質氣味甘溫而平，無毒。生食之，能止水痢；熟和蜜食之，可止咳嗽。

犀角

【產地】多產於吾國，及印度，亞非利加等。

【基本】爲犀牛 *Rhinocerotidae* 之角，角生鼻端。印度犀，

一角；非洲犀，二角。縱列，一前，一後，角質堅緻，微彎曲，有剛毛。大抵壯者，爲短；牝者，爲長。最長者，亦不過二三尺，普通皆爲七八寸，或尺餘，底部闊五六寸。其色不等，或外部呈淡褐綠色，內爲黃色，中央黑色，或爲黑白二色。總之，用爲藥者，宜選黑色者，爲最佳良。

【功效】爲解熱，解毒藥。

其氣味苦酸而鹹，無毒。除百毒，鬼疰，邪鬼，瘰癧，殺鈎吻，鳩羽，蛇毒。傷寒，溫疫，頭痛，寒熱，辟中惡，毒氣，鎮心神，解大熱，散風毒，治發背，癰疽，疔腫，化膿，去心煩，止驚，鑲肝，明目，安五臟，補虛勞，退熱，消痰，解山瘴，深

毒。去風毒攻心，匪甦，熱悶，赤痢，小兒蘇豆，風熱，驚癇，燒灰水服，治卒中，心痛，飲食中毒

，藥毒，熱毒，筋骨中風，心風，煩悶，中風失音，皆瘥以水磨服。又治小兒驚熱。按山犀，水犀，功用相同。磨汁服之，治吐血，衄血，下血，及傷寒，畜血，發狂，譫語，發黃，發斑，痘瘡稠密，內熱黑陷，或不結痂，瀉肝，涼心，清胃，解毒。凡妊婦勿服，能消胎氣。

【用量】小兒用〇·一——〇·二服之；大人用一·五——

四·五服之。

【禁忌】惡雷丸，蘿蔔，烏頭，烏喙。忌鹽。

【採製】角能入藥者，惟雄犀生者，爲佳。若犀片，及見成器物，皆被蒸燻，不堪用。犀角有黑，白二種：以黑者，爲勝；角尖，又勝生犀不獨未經水火者，蓋犀有捕得，殺取者，爲上；脫角者，次之。

【別稱】又名兕。

狷

【學名】*Trinacrus carolinianus*。

【產地】山野及田野間，多有之。

【基本】爲膏楮類之藥物，體大，鼻短，被覆薄毛，堅硬如刺，色似泥土。頭足及腹部不具刺毛，遇險相逼，則滾成團團，以背刺毛抵抗。以六足蟲類，及小脊椎動物爲食料。其皮等，可爲藥用之。

【功效】其皮氣味苦平，無毒。治五痔，陰蝕，下血，赤白五色，血汗不止，陰腫痛疼，而牽引腰背亦發疼痛，可酒煮殺之。療腹痛，疝積，燒灰，酒服。又治腸風，瀉血，痔瘡，可炙末飲服。燒灰吹鼻，能止衄血，甚效，解一切藥力。其肉氣味甘平，無毒。能治反胃，炙黃金食之，亦蒸汁飲之。又治癰瘡。炙食，肥下焦，理胃氣，令人能食。其脂氣味同肉，治腸風，瀉血，浴滴耳中，治聾，又塗禿疔，疥癬，殺蟲。其腦治癩癧。其心肝治蠱癘，蜂蠆，瘰癧，惡瘡，燒灰，酒服一錢。其膽點目，止淚，化水，塗痔瘡。

【用量】一。〇——三。〇服用。

【禁忌】畏桔梗，麥門冬。

【採製】取其皮，炒至微黑色，研爲粉末，用之。

【別稱】又名橐，毛刺，蝟鼠。

琥珀

【學名】Amber (Strassum)

【產地】產於南海，及印度洋各島。

【基本】爲松楓植物，埋入地中，歷久遂成琥珀，色黃，或褐，透明，內含昆蟲，木皮之類。磨擦之，能發電。其色紅，名：血珀，色黃，名：蠟珀，可供藥用之。

【成分】含有樹脂，揮發油，珀琥酸，斯可企遼，硫黃等。

【功效】爲利尿，通經藥。

其氣味甘平，無毒。能安五臟，定魂魄，殺精魅，去邪鬼，消瘀血，通五淋，壯心，明目，磨翳，止心痛，除瘴邪，療蠱毒，破結癥，治產後血枕痛，止血，生肌，合金瘡，清肺，利小腸。

【用量】一。〇——三。〇服用。

【別稱】又名江珠。

番紅花 (鳶尾科)

【學名】Crocus Sativus, L.

【產地】產於吾國西北之各省，而圍圃間多栽培之。

【基本】爲多年生草，高至四五寸；地下部，與水仙之鱗莖

相似。葉較水仙，細長。夏月採取花柱，及柱頭，供藥用之。

【成分】含有紅色素 (Carthamin)，及黃色素 (Safforidin) 等。

【功效】其花氣味甘平，無毒。除心憂，鬱積，氣悶不散，活血，久服，令人心喜，又治驚悸。

【用量】〇·五——一〇服用。

【學說】李時珍曰：番紅花，出西番回回地面，及天方國，即彼地紅藍花也。元時，以入食饌用。

【別稱】又名泊夫藍，撒法郎。

阜蘆

(山茶科亦作厚皮香科)

【學名】*Thea Dinensis*, L. var. *macrophylla*, Sieb.

【產地】多生於山地之間。

【基本】為常綠灌木，莖狀與茶樹相似，而較粗；葉肥大，而厚，長三四寸。秋末葉腋生花，比茶花，亦略大，白色。其葉可採取之，而供藥用。

【功效】其氣味苦平，無毒。煮飲之，能止渴，明目，除煩，消痰，痢水，通小腸，治五淋，止頭痛，去煩熱，噙嚙之，清上膈，利咽喉。

【學說】李時珍曰：阜蘆，葉狀如茗，而大如手掌，按碎泡

飲最苦，而色濁，風味比茶不及遠矣。

【別稱】又名瓜蘆，苦登。

蛟龍

【基本】據云：蛟為龍屬，長丈餘，似蛇，無鱗甲，頭有軟角，牙出唇外，有四足，形廣如楮，小頭，細頸；頸有白髮，胸前赭色，背上青斑，脇邊若錦，尾有肉環，大者數圍。其卵亦大。

【功效】據云：其髓可以敷面，令人好顏，又能易產。

蛤蚧

【基本】為蜥蜴類 (*Sauria*) 之爬蟲類，體長四五寸，頭如蝦蟆，背綠色，有白點，或鮮紅點之斑紋，鱗如粟粒。雄者，為蛤；雌者，為蚧。雄之身小尾短，皮粗口大；雌之身大尾小，皮細口尖。雌雄相呼，累日相交，兩兩相抱。捕者孽之，雖死不開，即為是蟲，昔時亦為藥用之。

【功效】其氣味鹹平，而有小毒。治咳嗽，肺勞，傳尸，殺鬼，辟邪，下淋瀝，通水道，下石淋，通月經，治肺氣，療欬血，肺痿，咯血，久日欬嗽，上氣，又治折傷。消肺氣，益精血，定喘，止咳，療肺癆，

消渴，助陽道。

【別稱】又名蛤蟹，僂蟻。

蛤蜊

【學名】*Mytilus venetianus*, Dech.

【產地】多棲近海之淺砂中。

【基本】爲同柱類之一種，與蚌相似；惟介殼較高，且外部

呈淡褐色，內面白色，邊緣淡紫色，是其異耳！

【功效】其肉氣味鹹冷，無毒。能潤五臟，止消渴，開胃，

治老癩，去寒熱，婦人血塊，宜煮食之。其蛤蜊粉

，即海蛤粉也。氣味鹹寒，無毒。治熱痰，濕痰，

老痰，頑痰，疝氣，白濁，帶下；同香附末，薑汁

，調服，治心痛。又能清熱，利濕，化痰，定喘。敵

，止墮透，消浮腫，利小便，止遺精，白濁，心脾

疼痛，化積塊，解結氣，消癭核，散腫毒；治婦人

血病；油調塗湯火傷。

蛞蝓

【學名】*Limax*

【基本】此爲無頭類(Amphioxus)之一種有肺類，似蝸牛，

而缺介殼。背面有淡紫色之縱線體，右側前方，有

生類孔，移動時，由體面分泌黏液，以助其滑，液乾，呈銀白色。

【功效】其氣味鹹寒，無毒。治賊風，喘僻，軟筋，及脫肛

，驚癇孿縮。又解蜈蚣蠍毒，腫毒，瘡熱，熱疔，

腫痛。

【稱別】又名陵蠶，附蝸，土蝸，托胎蟲，鼻涕蟲，及蛞蝓

螺。

芥草

(木蘭科)

【學名】*Thalictrum aquilegifolium*, L.

【產地】多生於山西，湖南之曠地。

【基本】爲常綠灌木，莖高十尺餘，葉長橢圓形，全邊，平

滑，有透明之細點，互生。春秋之間，花生於葉腋

，有短梗，花瓣細長，呈黃白色。果實爲蓇葖，集

成輪狀，熟則現出種子。其葉等，皆供藥用之。

【功效】其葉氣味辛溫，有毒。治頭風，癰腫，乳癰，疔癩

，除結氣，疥癩，殺魚蟲，療喉痺不通，乳癰，風

癩，風疽，疝氣，腫瘰，凝血，又治癩瘡，除濕風

，不入湯服，治頭疔，白禿，殺蟲，與白欬，赤小

豆，爲末，雞子白調如糊狀，可塗毒腫。又治皮膚

麻痺，可煎濃湯，洗風蟲牙痛。

【學說】李時珍曰：花子計然云：莽草，出三輔，青色者，善。

【別稱】又名齒草，芒草，鼠莽。

菊

(菊科)

【學名】*Chrysanthemum sinense* Gdb.

【產地】庭園間，多栽培之。

【基本】為多年生草，莖下部，略帶木質，葉卵形，有缺刻，及鋸齒，互生。葉柄較長。秋末開花，周圍舌狀花冠，中部為筒狀花冠，或全為舌狀花冠，其形不一。其花等，可供藥用之。

【成分】根含多量澱粉樣之菊糖等。

【功效】其花氣味苦平，無毒。治諸風，頭眩，腫痛，目脫，淚出，皮膚死肌，惡風，濕痺，久服利血，增氣，療腰間疼痛，除胸中煩熱，安腸胃，利五臟，調四肢。又治頭目風熱，風旋倒地，腦骨疼痛，身上一切游風，令消散，利血脈，並無所忌。作枕，明目；葉亦明目，生熟並可食。養目血，去翳膜，助肝氣不足。其白菊氣味苦辛而平，無毒。治風眩，

能令頭髮不白。其花上水能益色，壯陽，治一切風

疾。

【用量】四。○——八。○服用。

【學說】李時珍曰：菊之品，凡百種，宿根自生，莖葉花色，品品不同。

【別稱】又名節華，女節，女華，女莖，日精，更生，傳延年，治齋，金蕊，陰成，周盈。

菊花參 *Ginseng Yamana*

【產地】吾國雲南巧家縣之江邊，產生為最多。

【基本】此參葉似菊花，根似人參。其功效，與人參亦略相同，而力較遜。

【功效】為強壯與奮藥，有祛痰，利尿之功，當用於衰弱，肺癆，虛脫，盜汗等症。

據云：氣味甘苦，微寒無毒。能補五臟，安精神，安魂魄，止驚悸，除邪，辟惡，明目，開心，益智，強身，消食，開胃，並療胃腸中冷，心腹鼓痛，胸脇逆滿，霍亂吐逆，止消渴，通血脈，五勞七傷，頭痛，眩暈，反胃，吐食，久痢，頻尿，中風，中暑，吐血，咳血，便血，淋血，胎前產後諸病。

【用量】一・五——一〇・〇服用。

【禁忌】反藜蘆；畏五靈脂；惡皂莢，黑豆。

菖蒲

(天南星科)

【學名】*Acorus chinensis* L.

【產地】多產於水沼，及地邊之各處。

【基本】為多年生草，葉有平行脈，花小，色淡黃，為肉穗

花序。有大小二種：大者，長三四尺，氣味香烈，

葉上有脊，如劍狀，亦曰：白菖，泥菖蒲。小者；

高尺餘，葉纖細，無中肋，曰：細葉菖蒲；亦曰：

石菖蒲。葉長，僅三四寸。其根入藥用之，以一寸

九節者，為最佳良。

【成分】含有澱粉，鞣酸，及揮發油等。

【功效】為清涼健胃藥；歐西產者，為健胃驅風藥。又可外

用，為齒痛，齒齦出血，或為浴湯等用之。

其根氣味辛溫，無毒。能去風寒，溼痺，欬逆，上

氣，開心孔，補五臟，通九竅，明耳目，出音聲，

治耳聾，癰疽，溫腸胃，止小使，利血脈，益心智

，四肢濕痺，不得屈伸，小兒濕癩，身積熱不解，

可作浴湯。又治耳鳴，頭風，淚下，鬼氣，殺諸蟲

，惡瘡，疥癩，除風，下氣，男子腎冷，去頑肉，

止心腹痛，霍亂轉筋，及耳痛。又治中惡，卒死，

客忤，癩痢，下血，崩中，能安胎，散癰腫；搗汁

服之，解巴豆，大戟毒。

【用量】〇・五——二・〇服用。

【禁忌】惡地膽，麻黃，忌餵糖，羊肉，勿犯鐵器。

【學說】李時珍曰：菖蒲，凡五種，生於池澤，蒲葉，肥根

，高二三尺者，泥菖蒲，白菖也。生於溪澗，蒲葉

，瘦根，高二三尺者，水菖蒲，溪菖也。生於水石

之間，葉有劍脊，瘦根，蜜節，高尺餘者，石菖蒲

也。人家以砂栽之，一年至春剪細，愈剪，愈細，

高四五寸，葉如韭，根如匙，柄粗者，亦石菖蒲也

。甚則根長二三寸，葉長寸許，謂之錢蒲是矣。服

食，入藥，須用二種，石菖蒲，餘皆不堪。此草新

舊相代，四時常青。

【別稱】又名昌陽，堯韭，水劍草。

菟葵

(毛茛科)

【學名】*Erythraea pinnatifida* Maxim.

【產地】多生於山地之樹陰處。

「基本」為多年生草，莖高三寸，乃至五寸，總苞之裂片，

分裂為羽狀。夏月開花，白色。其苗，可供藥用。

「功效」其苗氣味甘寒，無毒。能下諸石五淋，止虎蛇毒諸

瘡，可搗汁，飲之。塗瘡能解毒，止痛。

「學說」李時珍曰：按鄭樵通志云：菟葵，天葵也。狀如葵

菜，葉大如錢，而厚，面青，背微紫，生于崖石。

「別稱」又名天葵，蒔，雷丸草。

菟絲子 (旋花科亦作菟絲子科)

「學名」*Cuscuta japonica* Choisy var. *hypoglauca* Engelm.

「產地」多生於原野之間。

「基本」為蔓其寄生於野薔薇，及其他之植物上。無葉，綠

體，有吸盤，能吸取母樹之營養分，藉以生活。莖

細長，帶黃色。即纏絡於宿主之周圍，葉小如鱗狀

。夏末開花，甚小，呈紅白色。採取其種子，可供

藥用之。

「功效」其子氣味辛甘而平，無毒。續絕傷，補不足，益氣

力，肥健人，養肌，強陰，堅筋骨，莖葉精液自出

，溜有於瀝，口苦，躁渴，寒血，治男女虛冷，添

精，益髓，去腰疼，膝冷，消渴，熱中，去面許，

悅顏色。又治五癆七傷，鬼交泄精，尿血，調心肺

，補肝虛。其苗氣味甘平，無毒。研汁塗面，去面

野。按碎煎湯，浴小兒，療肺熱。

「用量」一。〇——三。〇服用。

「學說」李時珍曰：按寧獻王庚辛玉冊云：火線，即菟絲子

，陽草也。多生荒園古道，其子入地，初生有根，

長延草物。其根自斷，無葉有花，白色微紅，香亦

襲人，結實如粒豆，而細，色黃，生于梗上，尤佳

；惟懷孟林中，多有之。

「別稱」又名菟縷，菟藟，菟蘆，菟邱，赤網，玉女，唐蒙

，火線草，野狐絲，金線草。

菝葜 (百合科)

「學名」*Berberis chinensis* L.

「產地」多生於山野之中。

「基本」為多年生之上昇灌木，莖高二三尺，乃至六七尺，

有刺而外曲。葉橢圓形，或卵形，互生；其托葉，

變為卷鬚，能纏絡於他物之上。初夏葉腋抽出花軸

，花被六片，呈黃綠色，為繖形花序。果實赤色，

多漿。其地下根部，可供藥用之。

「成分」含有 *Starch* 及樹脂，單寧，澱粉等。

「功效」為發汗藥，對於筋肉痠痛，及痛風等之徵候，皆可應用。

其氣味甘酸平溫，無毒。治腰背疼痛，風痺，益血氣，止小便，治時疾，瘧瘧，能補肝經風虛，止痛，丹崩，下痢。

「用量」六。〇——二。〇服用。

「學說」李時珍曰：菝葜，山野中甚多。其莖似蔓，而堅強，植生有刺。其葉圓大，狀如馬蹄，光澤，似柿葉，不類冬青。秋開黃花，結紅子。其根甚硬，有硬鬚如刺；其葉煎飲，酸澀。野人採其根葉，入染家用，名：鐵菱角。

「別稱」又名金剛根，鐵菱角，王瓜草。

菩薩石

「基本」為石英 (*Quartz*) 類，據李時珍云：出峨嵋五臺，巨巖若寶；其質六稜，或大如棗栗，其色澄澈映日，則光采微芒，有小如櫻珠，則五色粲然，可喜。

「功效」其氣味甘平，無毒。解藥毒，蠱毒，及金石藥毒，治癩疽，渴疾，消撲損瘀血，止熱狂驚癇，通月經

，解風腫，除淋疾，利小水，可磨服之。凡蛇蟲蜂蝎，狼犬毒箭等傷，用末敷之；又能明目，去翳。

「別稱」又名放光石，陰精石。

堇菜

(堇菜科)

「學名」*Viola Patrinii*, *De var. chinensis*, Ging.

「產地」多生於山野之路旁。

「基本」為宿根草本，莖高三四尺，葉自根際叢生，長橢圓形，有長葉柄。春日發生花軸，頂端開一花，為青紫色，萼五片，綠色，花瓣五片，其中一片，有細長之距，內貯蜜。雄蕊五個，雌蕊一個，子房上生，結為蒴果。初夏有在地下生閉花者，至結實後，始挺出地面，而後裂開。其全草，可供藥用之。

「功效」其氣味甘寒，無毒。可以搗汁，洗馬毒瘡，并服之；又塗蛇蝎毒，及癰腫，除心下煩熱，寒熱，瘰癧，癰癧，瘡腫，結核，聚氣，下瘡血，止霍亂。

「別稱」又名苦蓋，堇菜，旱芹。

菰

(禾本科)

「學名」*Zizania aquatica*, L.

「產地」多生於淺水之中。

【基本】爲蕪類植物，高五六尺，葉如蒲葉。春秋兩季，中心生白莖，狀如藕而軟，曰菰菜。秋間開花成穗，結實如米，曰菰米。又曰雕胡米，色白，而滑膩，昔時有供爲藥用者。

【功效】其荷氣味甘冷而滑，無毒。能利五臟，去邪氣，治酒醴，面赤，白癩，癩癆，目赤，熱毒，風氣，卒心痛，可鹽醋煮食之。去煩熱，止渴，除目黃，利大小便，止熱痢，雜鯽魚，爲羹食，開胃口，解酒毒，壓丹石毒。其手氣味相同。除心胸中浮熱，風氣，衰食，止渴，治小兒水痢。其根氣味甘而大寒，無毒。治腸胃痲熱，消渴。其葉能止小便，可搗汁，飲之。燒灰，和雞子白，塗火燒瘡。

【學說】寇宗奭曰：菰，乃蒲類，河朔邊人，止以飼馬，作薦。八月開花，如葦，結青子，合衆爲粥，食之。

【別稱又名】交草，蔣草。

菰米

【基本】爲菰 (*Zizania aquatica* L.) 所結之實也。可取之，爲藥用。

【功效】其米氣味甘冷，無毒。能止渴，解煩熱，調腸胃。

【別稱又名】麥米，彫蓬，彫菰，彫胡。

菲沃斯

(茄科)

【學名】*Hyoscyamus niger* L.

【產地】原產於歐羅巴。

【基本】爲越年生草，全部有毛，高至三尺許，葉邊緣有缺刻，基部抱於莖上。花爲花梗，花冠黃色，生紫色之腺。其子有胞衣，多衣，多刺，具有臭味。可採取之，而爲藥用。

【成分】 $\text{Hyoscyaminum sulfuricum}$ ($\text{C}_{17}\text{H}_{23}\text{NO}_3$)₂ • H_2SO_4 之白色結晶， $\text{Hyoscyaminum hydrobromicum}$ $\text{C}_{17}\text{H}_{23}\text{NO}_3$ • H Br 之無色堅硬結晶。

【功效】爲鎮痛藥，可用於神經痛，咳嗽刺戟，不眠症，癩癆等。

【用量】一回〇・〇五——〇・二爲粉劑，丸劑，浸劑等服用之。

【製劑】菲沃斯越幾斯 *Extractum hyoscyami*

此即以菲沃斯草，浸於酒精，及水等分之混和液；並蒸發爲帶綠褐色之稠厚體。其功效與菲沃斯相同，而用於咳嗽刺戟尤佳。一回以〇・〇二——〇・

○五。○一。○二，多伍於其他麻醉性藥品爲丸劑，粉劑等；但亦有外用以其百分之一二，爲軟膏，坐藥等。

2. 菲沃斯油浸 Oleum Hyoscyami. indinum

此即以菲沃斯草四○。○，冷浸於酒精三○。○，加阿列布油四○。○，溫浸於重湯煎上而製之，呈褐綠色之脂肪油，爲鎮痛性之塗擦劑，灌腸劑，點耳劑等，亦有一回與以一○。○——二○。○爲乳劑內服，但較稀少耳！

菴藎

(菊科)

〔學名〕 *Artemisia Koiskakana*, Ait.

〔產地〕多自生於山地之間。

〔基本〕爲多年生草，莖高一二尺，葉質厚而粗糙，略似菊葉，而有缺刻，不深。夏秋之間，開細小頭狀花，排列作穗狀，色淡黃；結細實，如艾。其子可採取之，而供藥用。

〔功效〕其子氣味苦而微寒，無毒。能除五臟瘀血，腹中水氣，臃脹，留熱，風寒，濕痺，身體諸痛，心下堅隔，中寒，婦人月水不通，消食，明目，益氣，增

食，男子陰痿不起，心腹脹滿。腰脚重痛，筋骨痛，及骨節煩痛。搗酒飲之，治閃挫腰痛，及婦人產後血氣痛。

〔用量〕三○。○——六○。○服用。

〔學說〕李時珍曰：菴藎，葉不似艾，似菊葉，而薄，多細子。面背皆青，高者四五尺。其莖白色，如艾，實中有細子，極易條衍，莖花者，以之接菊。

〔別稱〕又名覆蘭。

菴摩勒

(大戟科)

〔學名〕 *Phyllanthus Indicus*, L.

〔產地〕產生於印度，馬來半島，及馬來羣島，中國南部等處。

〔基本〕爲落葉喬木，呈線狀圓形，長約五六分，對生。花黃而細小；果實爲肉質，圓而稍帶六稜，直徑四分，乃至八分。其實，可供藥用。

〔功效〕其實氣味甘寒，無毒。治風虛，熱氣，合鐵粉一比用之，可以強健身體。取子壓汁，和油塗頭，生髮，去風癢，能令髮生如漆黑。又治傷肺，上氣，咳嗽，可研爲粉末，點湯服之，解金石毒。

【學說】李時珍曰：餘甘泉州山中，亦有之，狀如川棗子，味類橄欖，亦可密漬，鹽藏。

【別稱】又名餘甘子，花摩落迦果。

草薺

(薺積科)

【學名】*Polygonum Takewii* Makino.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為多年生草，莖引蔓上昇，葉大如心臟形，邊緣有缺刻，柄長。夏日開花，淡黃綠色，單性，成穗狀，其根長而硬，狀如山藥，可為藥用之。

【功效】為鎮痛藥，可用於風痛，寒濕，及諸瘡。

其根氣味苦平，無毒。能治腰痛，骨節風，寒濕，周痺，惡瘡，熱氣，傷中，陰痿，腰脚癱瘓不遂，手足驚掣，膀胱宿水，頭旋，痛疾，補水臟，堅筋骨，暖腎，益精，治中風，補肝虛，療白濁，莖痛，痔瘻，瘰癧。

【用量】二。〇——六。〇服用。

【禁忌】畏寒根，大黃，柴胡，前胡；忌茶，醋。

【學說】李時珍曰：草薺，蔓生，葉似菝葜，而大，如葱。其根硬大者，如商陸，而堅。今人皆以土茯苓，為

草薺，誤矣。莖葉，根苗，皆不同。

【別稱】又名赤節，百枝，竹木，白菝葜。

菜菔

(十字花科)

【學名】*Raphanus Sativus*, L.

【產地】多栽種於田園中。

【基本】為蕪類植物，一年生草，莖高三四尺餘，葉為羽狀分裂。春日開花，四瓣，色淡紫，或白，為總狀花序。實為莢形之閉果，長約二三寸許，且有多數之結節，中藏種子，即菜菔子，呈黃赤色，為小圓粒而稍扁平，壓碎所得之油分，名曰：菜油，或菜菔油，皆供藥用之。

【成分】含有脂肪，及菜菔油等。

【功效】為健胃藥，又為祛痰藥。

其根辛甘，葉辛苦而溫，無毒。以散服，及泡煮食服，能下氣，消穀，和中，去痰。生搗汁服，止消渴，利關節，理顏色，斂腸胃，去惡氣，制鈣毒，行風氣，去邪熱，利五臟，消痰，止咳。治肺痿，吐血，溫中，補不足；同羊肉，銀魚煮食，治勞瘵，效驗；同猪肉食，益人；生搗服，治禁口疳，能

寬胸膈，利大小便，止渴，寬中，化痰，消導，止

香酸，化積滯，解酒毒，散瘀血，治五淋，白濁，

下痢，可煎湯，洗腳氣，又生搗，塗打撲燙傷。其

子氣味甘而平，無毒。研汁服之，吐風痰，同醋

研，消腫毒，下氣，定喘，治痰，消食，除脹，利

大小便，止氣痛，下痢，療疥疹。

【用量】子用二。○——五。○服之。

【學說】李時珍曰：萊菔，今天下通有之。六月下種，秋採

苗，冬掘根，春末抽高莖，開小花，紫碧色。夏初

結角，其子如大麻子，圓長不等，黃赤色，五月亦

可再種。

【別稱】又名菔蔬，蘿菔，雹突，紫花菔，溫菔，土酥。

萍蓬草

(陸蓮科)

【學名】*Nigella japonicum, The*

【產地】生於庭園，池沼，及河流等。

【基本】為多年生草，根莖甚大，葉有二種：水中之葉，大

而柔薄，色較淺。其伸長出於水面之葉，箭形而厚

；其長自三四寸，至一尺許。夏秋之際，花莖亦抽

出於水面，着以小花，黃色。其所結之子及根，可

供藥用之。

【功效】其子氣味甘濕而平，無毒。能助脾，厚腸，令人不

饑。其根氣味甘寒，無毒。養食，能補虛，益氣，

久食不肌，厚人腸胃。

【學說】李時珍曰：水梨，三月出水，莖大如指，葉似荇葉

，而大，徑四五寸，初生如荷葉。六七月，開黃花

，結實如角黍，長二寸許；內有細子一包，如罌粟

子。

【別稱】又名水梨，水栗子。

黍菜

(藜科)

【學名】*Peta. vulgaris, L.*

【產地】原產於歐羅巴，近來亦有栽培於園圃中者。

【基本】為一年生草，或越年生草，莖肥大，高三尺許，呈

赤色，黃色，或白色。葉闊大，而厚，互生，長卵

形。微帶紫色。花小，成穗，黃綠色。結實，呈淡

黃色，內含有種子。其菜及子根，皆可為藥用。

【成分】根含有糖分；子含有植物脂肪油等。

【功效】其菜氣味甘苦，大寒而滑，無毒。除時疾壯熱，解

風熱毒，搗汁飲之，便瘥。夏月以菜作粥食之，能

解毒，止熱，治毒痢；痔爛敷灸瘡，止痛易癒。搗

汁服之，治冷熱痢，又止血，生肌，及諸畜獸傷，

敷之立愈。煎湯飲之，開胃，通膈，補中，下氣，

理脾氣，去頭風，利五臟。其根氣味甘平，無毒。

通經脈，下氣，開胸膈，其子莖半生搗汁服之，治

小兒熱痰。又醋浸搗面，去粉滓，潤澤有光。

【學說】李時珍曰：葶菜，正二月下種，宿根亦自生。其葉

青白色，似白菘菜，葉大而短，莖亦相類；但差小

耳！生熟皆可食，微作土氣，四月開細白花。結實

，狀如茱萸，抹而輕虛，土黃色，內有細子，根白

色。

【別稱】又名葶蓬菜。

萎蕤

〔百合科亦作土茯苓科〕

【學名】*Polygonatum officinale*, All.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為多年生草，莖方柱狀，縱部有稜狀，高至一二尺

；地下有根莖，肉質。葉長卵形，有平行脈，互生

。初夏開花，花下垂，帶白色，筒狀。每自葉腋生

一二花，或有生二三花者。其根莖可採取之，而供

藥用。

【成分】含有多量黏液，及澱粉，糖質等。

【功效】為強壯滋養藥，對於身體衰弱者之自汗，或頻尿，

遺精等，均有制止之功能。

其根氣味甘平，無毒，能治陰萎，中風，暴熱，不

能動搖，跌筋，結肉，補諸不足，去面黧黯，好顏

潤澤，除心腹結氣，虛熱濕毒，腰痛，莖寒，及目

痛，背爛，時疾寒熱，內補不足，去虛勞客熱，頭

痛不安，補中，益氣，除煩悶，止消渴，潤心肺，

補五勞，七傷，虛損，腰脚疼痛，天行熱狂，服食

無忌。又去風溫自汗，灼熱，勞瘵，寒熱，脾胃虛

乏，男子小便頻數，失精，及一切虛損。

【用量】一回一〇——二〇——五〇服用。

【禁忌】畏鹵鹹。

【採製】黃精，鈎吻二物相似，用時，須注意之。萎蕤，節

上有鬚毛，莖斑，葉尖，處有小黃點，為不同。采

得，以竹刀刮去節皮，洗淨，以蜜水浸一宿，蒸之

，焙乾，用之。

【學說】李時珍曰：處處山中，皆有之。其根橫生，似黃精

，葉小，黃白色，性柔多鬚，最難燥。其葉如竹，兩兩相植，亦可采根種之，極易繁也。如嫩葉，及根，並可煮淘食茹。

〔別稱〕又名女萎，葳蕤，萎移，萎萎，萎香，葑，玉竹，地節。

菘菜

(十字花科)

〔學名〕*Brassica chinensis*, L. var.

〔產地〕多種種於田園之間。

〔基本〕木植物有二種：一種莖圓厚，微青；一種莖扁薄，而白。其葉皆淡青白色，大者，一本有重十餘斤者。

○南方之菘，畦內過冬，北方者，多人窖內。其莖

葉及子，亦可為藥用之。

〔成分〕子含有植物脂肪油等。

〔功效〕其莖葉氣味甘溫，無毒。能通利腸胃，除胸中煩悶，解酒，消食，下氣，治瘴氣，止熱氣，和中，利大小便。其子氣味甘平，無毒。作油塗頭，長髮。

〔學說〕李時珍曰：菘，即今人呼為白菜者，有二種：一種莖圓厚，微青；一種莖扁薄，而白；其葉皆淡青白色。

〔別稱〕又名白菜。

菘菜

(十字花科)

〔學名〕*Capsella Bursa-pastoris*, Moench.

〔產地〕多種種於田園之間。

〔基本〕為蔬類植物，葉生於下部者，呈羽狀分裂；生於上部者，具有缺刻。嫩時可食，老後，莖高尺餘，四瓣，色白；實扁平，三角形。其苗及子，皆可為藥用之。

〔功效〕其苗氣味甘平，無毒。能和中，益氣，和肝，明目。其子氣味辛而微溫，無毒。能明目，止目痛，流淚，除痺，補五臟，益精血，治心腹腰痛，除肝家積聚，消眼目赤腫。

〔禁忌〕惡乾薑，苦參；又云：苦參，為之使。

〔學說〕李時珍曰：菘，與菘菜，一物也；但分大小二種耳。小者，為菘；大者，為菘菜；菘菜有毛，故其子功用相同。

〔別稱〕又名大菘，大菘，馬辛。

菠薐

(藜科)

〔學名〕*Spinacea oleracea*, Hill.

〔產地〕多栽培於田園之中。

〔基本〕為蕪類植物，莖高尺許，葉互生，略如三角形，而

尖。花小，而黃綠色。其根色赤，味甜，嫩時，可

食。亦可供藥用之。

〔功效〕其莖及根氣味甘冷而滑，無毒。能利五臟，去腸胃

熱，解酒毒，丹石毒，通血脈，開胸膈，下氣，調

中，止渴，潤燥。

〔學說〕李時珍曰：波稜，八月，九月種者，可備冬食。正

月，二月種者，可備春蔬。其莖柔脆，中空，其葉

綠膩，柔厚，直出一尖，旁出兩尖，似鼓子花葉之

狀，而長大。其根長數寸，大如桔梗，而色赤，味

更甘美。

〔別稱〕又名波菜，波斯草，赤根菜。

補骨脂

(荳科)

〔學名〕*Psoralea corylifolia*, L.

〔產地〕兩粵之原野，多產生之。

〔基本〕為一年生草，莖高三四尺，葉似胡麻狀。夏秋之交

，開淡紫色蝶形小花，如球狀，其所結之實，呈球

形，經約一分，成熟後，則外皮變為黑色，內有扁

圓形黑褐色之種子，可供藥用之。

〔功效〕為強壯藥。

其子氣味辛而大溫，無毒。能治五勞七傷，風虛寒

冷，骨體傷敗，腎冷精流，及婦人血氣，墮胎，男

子腰疼，膝冷，蟲濕，逐諸冷痺，止小便，去腹中

冷。能與陽事，明耳目，治腎泄，通命門，煖丹田

，斂精神。

〔用量〕五〇——一〇〇

〔禁忌〕惡甘草；忌雲薹，及諸血；得胡桃，胡麻良。

〔採製〕此性燥毒，須用酒浸一宿，瀝出，以東流水浸三日

夜，蒸之，日乾，用之。

〔學說〕李時珍曰：補骨脂，言其功也。胡人呼為婆固脂，

而俗訛，為破故紙也，胡非子，因其子之狀相似，

非胡地之非子也。

〔別稱〕又名破故紙，婆固脂，胡非子。

絡石

(夾竹桃科)

〔學名〕*Trachelospermum jasminoides*, Lamair.

〔產地〕多生於山野，而庭院中亦多栽植之。

〔基本〕為蔓生之木本植物，莖以氣根援他物上昇，葉長綠

質厚，爲橢圓形，對生。初夏開白花，花冠下部，連合列爲聚繖花序。結實成莢，小而甚長，多絡於庭院墻之上，故名也。其莖葉可採之，爲藥用。

【功效】其莖葉氣味苦溫，無毒。能治風熱，死肌，瘡傷，口乾，舌焦，癰腫不消，喉舌腫閉，水漿不下，大驚入腹，除邪，養腎，止腰髓痛，墜筋，利關節，明耳目，通神志，治一切風疾，蝮蛇疔毒，心悶，可搗汁服之，并洗之，而療刀斧傷瘡。

【用量】三。〇——六。〇服用。

【禁忌】惡蠶毒；畏貝母，茵蒲。

【採製】采得，用粗布揩去毛子，以熟甘草水，浸一伏時，切晒用之。

【學說】李時珍曰：蝮石，貼石而生，其莖折之，有白汁。

其葉小於指頭，厚實，木強，面青，背淡，澀而不光，有尖葉，圓葉二種。

【別稱】又名石蒲，石龍藤，懸石，耐冬，雲花，雲莢，雲丹，石血，雲珠。

絲瓜

(葫蘆科)

【學名】*Luffa cylindrica*, Room.

【產地】多栽植於園圃之中。

【基本】爲一年生之蔓草，莖甚細長，而有卷鬚，可纏繞於他物之上。其葉爲掌狀分裂，而裂片端尖。夏日開花，黃色，雌雄同株，結果長者，約一二尺，至果熟，肉內有強韌之纖維，如網，卽俗稱：絲瓜絡也。其瓜葉根藤，皆供藥用之。

【功效】爲解熱藥。

其瓜氣味甘平，無毒。治葷瘡不快，枯者，燒之存性，入朱砂研末，蜜水調服，甚妙。又煮食，能除熱，利腸，老者，燒之存性，服用，去風，化痰，涼血，解毒，殺蟲，通經絡，行血脈，下乳汁。治大小便下血，痔漏，崩中，黃積，癰痛，卵腫，血氣作痛，瘰癧，疔腫，齒齲，痘疹，胎毒，暖胃，補陽，固氣，和胎。其葉治癩瘡，可頻按搽之，療瘰癧，疔腫，卵腫。其藤根治蠱齒，腦漏，殺蟲，解毒。

【用量】五。〇——一〇。〇服用。

【學說】李時珍曰：絲瓜，唐宋以前，無聞。今南北皆有之，以爲常蔬。

〔別稱〕又名天絲瓜，天羅，布瓜，蠻瓜，魚鮓。

粟 (禾本科)

〔學名〕*Scleria italica*, Kth. var. *germanica*, Trin.

〔產地〕庭園之間，皆栽培之。

〔基本〕為一年生草，高至四五尺，葉似玉蜀黍。花小，密

集，為圓錐花序。果實為穎果，小粒狀，黃色，可

為藥用之。

〔成分〕含有蛋白質，澱粉，脂肪，灰分等之生理上成分。

〔功效〕其米氣味鹹而微寒，無毒。能養腎氣，去脾胃中熱

，益氣。陳者，苦寒，治胃熱，消渴，利小便。又

能止痢，去腹痛，治鼻衄，為粉和水濕汁，解諸毒

，瘧霍亂轉筋，去小麥毒，發熱，反胃，熱痢，炎

弱食之，益丹田，補虛損，開腸胃。其米泔汁能治

霍亂，卒熱，心煩，渴飲，可以洗皮膚癩疥，能殺

蟲。飲之，治五痔，和臭樗皮煎服，治小兒疳痢。

其米糠治痔漏，脫肛，和諸藥煮之。其奴利小腸，

除煩懣。

〔禁忌〕與杏仁同食，令人嘔吐。

〔學說〕李時珍曰：粟，卽梁也。穗大；而毛長；粒粗者，

為梁。穗小，而毛短；粒細者，為粟。苗俱似茅，種類凡數十，有青，赤，黃，白，黑諸色。

〔別稱〕又名稊粟。

解毒子

〔基本〕據李時珍云：四川志云：苦藥子，出忠州，性寒，

解一切毒。川蜀諸處，皆有，卽解毒子也。或云：

邛州苦藥子，卽黃藥子也。方言稱呼不同耳！理亦

近之。

〔功效〕其根氣味苦而大寒，無毒。解蠱毒，止煩熱，辟瘴

瘴，利喉閉，及痰毒。治五癘，邪氣，清肺，壓熱

，消痰，降火，利咽喉，退目赤。

〔別稱〕又名皂不容，苦藥子。

象

〔學名〕*Elephas asiaticus* (C. F. Triantaf)

〔產地〕多產印度，及非洲之林野。

〔基本〕為長鼻類 (*Proboscidea*) 之一種。體偉大無毛，四

肢有五趾，鼻長大，且伸屈自由。牡之門齒，長大

出口；化之門齒，短小不出口。其齒牙及肉等，可

供藥用之。

「功效」其牙氣味甘寒，無毒。凡鐵器雜物入肉，刮牙屑和

水敷之，立出。又治癩病，刮齒屑炒黃，研末飲服

；諸物刺胸中，磨水服之，又治風癩，驚悸，一切邪熱精物，熱疾，骨蒸，及諸瘡，並宜生屑入藥用之。其肉氣味甘淡而平，無毒。燒灰，和油塗疥瘡

，以生蒸汁，服之，治小便利；燒灰飲服，治小便頻多。其麩氣味苦寒，微毒。能明目，治疳疾，

疔瘡，以水化塗之；又治口臭，以綿裹少許，貼齒

根，平且漱去，數度，即痊。其睛治目疾，和人乳，滴目中。其皮箔下疳，燒灰和油敷之，又治金瘡

不合。其骨能解毒。

「別稱」又名伽耶。

越瓜

(葫蘆科)

「學名」*Chemnis* Carmon, Thunb.

「產地」多栽種於田園之中。

「基本」為一年生之攀援草本，全體與甜瓜相似，花期，花色，亦皆相同。

「功效」其氣味甘寒，無毒。能利腸胃，止煩渴，利小便，

去煩熱，解酒毒，宣洩熱氣；燒灰敷口吻瘡，及陰

莖熱疔。

「學說」李時珍曰：越瓜，南北皆有，二三月下種，生苗，

就地引蔓，青葉，黃花，並如冬瓜花葉，而小。夏秋之間，結實，有青，白二色，大如瓠子，一種長者，至二尺許，俗呼羊角瓜。

「別稱」又名稍瓜，菜瓜。

越砥

「基本」據李時珍云：尚書荊州厥貢砥礪注云：砥以緇密為

名，磨以粗礪為稱，俗稱者，為羊肝石，因形色也。陶弘景云：越砥之名，今細礪石之名也。其石，出於臨平。

出於臨平。

「功效」其味甘，無毒。治目盲，止痛，除熱癢，亦可磨汁

，點目，除障翳。燒赤酒飲之，能破宿血，下石淋，除結癥，伏鬼物，惡氣。

「別稱」又名磨刀石，羊肝石，礪石。

越王餘算 / Tridactyl

「基本」此屬於八出珊瑚類，體形略似海葵，然中軸部略長，右左之枝狀物短，以便區別之也。其下緣所有之水螅，各出八觸手，骨節角質，色白。其沙管者，

可為藥用之。

【功效】其氣味鹹溫，無毒。治水腫，浮氣，結聚，宿滯，不消，腹中虛鳴，並煮服之。

【學說】李珣曰：越王餘算，生南海水中，如珠算子，長尺許。劉敬叔異苑云：昔晉安越王渡南海，將墨角白骨作算籌，其有餘者，棄於水中，而生此，故葉白者，似骨；黑者，似角，遂名之。

訶藜勒

(使君子科)

【學名】Terminalia obobula, Retz.

【基本】此樹似木槿，開花，白色，子似榧子，皮肉相着。

秋後實熟，為六稜黑色，肉厚者良。可採取其子及核等，供藥用之。

【成分】含有沒食子酸，及其鞣酸等。

【功效】為收斂藥。

其子氣味苦溫，無毒。能除冷氣，心腹脹滿，破胸膈結氣，通利津液，止水道，黑髮，下宿物，止腸游久洩，赤白痢，消痰，下氣，化食，開胃；能除煩，治水，調中，止嘔吐，霍亂，心腹虛痛，奔豚，腎氣，肺氣，喘息，五疝氣，腸風，瀉血，崩

中，帶下，懷孕漏胎，及胎動欲生，服悶氣喘；並

患痢人肛門急痛，產婦陰痛，和蠟燒烟薰之，及煎湯垂洗。治痰嗽，咽喉不利，含三數枚，殊勝。又能實大腸，欲肺，降火。其核磨白蜜，注目，去風赤痛，神良。又能止血，止痢。其葉能下氣，消痰

止渴，洩痢，其他煎服功效，同訶子。

【用量】三。○——六。○服用。

【採製】凡用訶藜勒，酒蒸後，浸一伏時，刀削去皮，取肉，到焙，用之，如用核，則去肉。

【別稱】又名訶子。

酢漿草

(酢漿草科)

【學名】Oxalis corniculata, L.

【產地】多生於原野之間。

【基本】為多年生之雜草，莖傾臥於地上；葉為掌狀複葉，小葉成三角形，有長柄。夏日抽花莖，開五瓣淡黃花；結為蒴實，熟則綻裂，飛散種子。可採取之，而為藥用。

【功效】其氣味酸寒，無毒。殺諸小蟲，惡瘡，癩癬，可搗敷之。食之，能解熱，止渴，治小便諸淋，赤白帶

下，同地龍，地錢，治沙石淋，煎湯洗痔瘡，脫肛，甚效。又可搗塗燙火蛇蟻諸傷。又治婦人血結，用一搗洗過，以燉酒服之。

【學說】蘇恭曰：酢漿，生道旁陰濕處，叢生，莖頭有三葉，葉如細萍。四月，五月采，陰乾。

【別稱】又名酸漿，三葉酸，三角酸，酸母，醋母，酸箕，鳩毒，雀兒酸，雀林草，小酸茅，赤孫施。

都念子

【基本】據李時珍云：按劉恂嶺表錄云：倒捻，窠叢不大，葉如苦李，花似蜀葵，小而深紫，南中婦女多用染色，子如軟柿，外紫，肉赤，無核。頭上有四葉，如柿蒂，食之必捻其蒂，故謂之倒捻子，訛而爲都捻子也。

【功效】其質氣味甘鹹小溫，無毒。治痰嗽，噁氣，暖腹臍，益肌肉。

【別稱】又名倒捻子。

都咸子

【基本】據李時珍云：按稽含南方草木狀載：都咸樹，出日南。三月生花，仍連着，質大如指，長三寸。七八

月熟，其色正黑。

【功效】其子及皮葉氣味甘平，無毒。能止渴，潤肺，去煩除痰，去傷寒清涕，效逆，上氣，宜煎服之。

都梔子

【基本】據李時珍云：按魏王花木志載：都梔樹，出九真交趾，野生。二三月開花，赤色，子似木瓜，八九月熟。

【功效】其質氣味酸濕而平，無毒。能益氣，止洩，安神，溫腸；治痔疾，解酒毒，止煩渴。

【別稱】又名構子。

都管草

【基本】據蘇頌云：都管草，生宜州田野，根似羌活，頭處長一節，苗高一尺許，葉似土當歸，有重莖。二月，八月采根，陰乾。施州生者，作莖，又名：香菴，莖長丈餘，赤色。秋結紅實，四時皆有。李時珍云：按范成大桂海志載：廣西出之，一莖，六葉。【功效】其根氣味苦平，無毒。消風腫，癰毒，赤疣，以醋摩塗之，亦治咽喉腫痛，切片含之，立愈；又解蜈蚣蛇毒。

雲母 Mica

【基本】爲花崗岩中之主要成分，亦雜於各岩石，與細砂中，裂紋完全，壁之片如紙，性柔有彈力，折之至有痕，而不斷，色白有光，爲白雲母，入藥用之。此外又有黑紅二色，名爲黑紅雲母也。

【功效】據云：其氣味甘平，無毒。能治中風，寒熱，除邪氣，安五臟，益神志，明耳目，下氣，堅肌，續絕，補中，療五癆七傷，虛損，止下痢，補腎冷。

【禁忌】忌羊血；惡徐長卿，畏蛇甲，及流水。

【別稱】又名雲華，雲珠，雲英，雲液，雲砂，礪石。

雲實

(豆科)

【學名】*Ocotea pinnatifida* Roxb.

【產地】多生於山野之中。

【基本】爲落葉樹木，莖葉皆有刺，高至十尺許，葉爲二回羽狀複葉，小葉形小，而質薄；花黃色，爲總狀花序；果實爲莢。其根實及花，皆可爲藥用之。

【功效】其實氣味辛溫，無毒。止泄痢，腸癰，殺蟲毒，去邪惡，消結氣，止疼痛，除寒熱，去消渴，治瘧疾，下膿血。其花多食，能令人狂走。其根治骨哽，

及咽喉痛，可研汁咽之。

【學說】李時珍曰：此草山原甚多，俗名黏刺，赤莖，中空，有刺，高者如蔓，其葉如槐，三月開黃花。

【別稱】又名員實，雲英，天豆，馬豆，羊石子，苗名：草雲母，臭草，黏刺。

陽起石

【基本】據陳藏器云：陽鳥，出建州，似鶴而殊小，身黑，頸長，面白。

【功效】其嚼燒灰，酒服，能治惡蟲咬瘡。

【別稱】又名陽鵝。

陽起石 Actinolite

【基本】爲角內岩，及角內剝岩中，天然產出之結晶，成針柱狀，常爲纖維狀，凝聚一處。其色綠，而灰，有光澤，卽爲是石，亦可爲藥用之。

【成分】含有鈣，鎂，鐵等之硅酸鹽 $Ca(Mg, Fe)_2Si_4O_{12}$ 之成分。

【功效】爲強壯藥，變質藥，及收斂藥。其氣味鹹而微溫，無毒。治崩中，漏下，子宮癰癢，結氣，寒熱，腹痛，陰痿，除濕疹，去汗臭，消

水腫，補腎氣，治腰痛，膝冷，濕痺，子宮久冷，月水不定，帶下，瘰癧，冷氣，補五勞七傷，命門不足，散諸熱腫。

【用量】一〇——一〇〇〇服用。

【禁忌】惡澤瀉，茵桂，雷丸，石葵，蛇脫皮；畏兔絲子，

忌羊血，不入湯。

【別稱】又名羊起石，白石，石生。

雁

【學名】Anser albifrons, Geop.

【基本】此屬於游禽類，體茶褐色，腹部白色，翼長於尾，

嘴扁而柔軟，外緣有鋸齒。其肉可食，亦供藥用。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。治風痺，筋骨，利臟腑，解

石毒。其骨，燒灰，和米泔沐頭，長髮。其毛，治

喉下白毛，療小兒痢疾，似之，辟驚癇。其屎白，

治灸瘡，腫痛。

【別稱】又名鴻。

雁來紅

【學名】Amaranthus Caerulescens, L.

【產地】多栽培於庭園之間。

(見科)

【基本】為一種草本，高至二尺餘；葉長橢圓形，兩端尖，

葉柄長，葉葉積聚，狀以花菜，呈紅色。其小花，

單性，集生於葉腋。昔時亦採取之，而為藥用。

【功效】據急救方云：能治腦漏，可煎湯，以鼻吸之。又據

眼科要覽云：能治遠年近日之目中星翳。

雄黃 Realgar, Orpiment

【基本】此即三硫化砷，於無水亞硫酸溶液中，通入硫化氫

氣，或與硫黃同溶，皆可製之為非結晶性粉末。天

然產者，即為雄黃，可供藥用之。

【成分】含有三硫化砷 As_2S_3 之成分。

【功效】其氣味苦平而寒，有毒。治寒熱，鼠瘻，惡瘡，疽

痔，殺惡鬼，邪氣，百蟲毒，療疥瘡，蠱瘡，目痛

，鼻中息肉，及絕筋，破骨，百節中風，積聚，癰

氣，中惡，腹痛，鬼疰，殺諸蛇虺毒，解黎蘆毒。

一切風邪，癩病，風痺，及蟲獸咬傷，搜肝氣，瀉

肝風，消涎積，治瘡疾，寒熱，伏暑，泄痢，酒飲

成癰，癩瘡，頭風，眩運，化腹中瘀血，殺勞蟲，

疳蟲。

【用量】一〇——三〇〇服用。

【禁忌】忌鐵，及火。

【採製】通常於未醋中，入蘿蔔汁，蒸乾，搗碎，以水飛過，用之。

【別稱】又名黃金石，石黃，垂黃。

黃芩

(唇形科)

【學名】*Scutellaria baicalensis* George (S. Maroutia, Presb.)

【產地】多生於園圃之中。

【基本】為多年生草，莖高二尺餘，葉鐮形，略似柳無柄，

對生。夏日開花，成穗，有紫白等色。根長四五寸

，色深黃，曬乾入藥。其宿根外黃，內黑者，曰：

片芩；新根內黃者，曰：條芩。皆供藥用。

【成分】含有一種植物鹽基，為 $Scutellarin C_{10}H_{18}O_8$ ；黃色

針狀，或板狀之結晶體。

【功效】為清涼解熱藥。

其根氣味苦平，無毒。能解諸熱，治黃疸，腸瀉，

洩瀉，逐水，下血，閉惡，瘡疽，火瘍，痰熱，胃

中熱，小腹絞痛，消穀，利小腸，女子血閉，淋瀝

，尿血，小兒腹痛，熱毒，骨蒸，寒熱往來，腸胃

不利，破瘻氣，治五淋，去煩悶，解熱渴，下氣，

治天行熱疾，疔瘡，膿腫，乳癰，發背，涼心，去

肺中濕熱，瀉肺火上逆，消日中腫赤，瘀血癥瘕，

上部積血，補膀胱寒水，安胎，養陰，退陽，止頭

疼，奔豚，熱痛，火效，肺痿，失血。

【用量】一回二〇——六〇。服用。

【禁忌】畏丹砂，牡丹皮，葶藶。

【別稱】又名腐腸，空腸，內虛，妬婦，經芩，黃文，印頭

，苦行郵，內質者名：子芩，條芩，獨尾芩，鼠尾

芩。

黃連

(毛茛科)

【學名】*Coptis japonica* Makino.

【產地】多生於山地，亦有栽培於藥圃者。

【基本】為多年生草，葉為複葉，呈羽狀。早春出花莖，高

三四寸，至一尺許。春日莖梢開小白花，結實，黃

色。其根可採取之，而供藥用。

【成分】含有 $Alkaloid$ 之成分。

【功效】為苦味健胃藥，用於消化不良，腸加答兒，虎列拉

，及加答兒性黃疸，與發熱，惡心，嘔吐，煩渴，

食氣不進，腹部膨滿等。

其根氣味苦寒，無毒。治驚疾，目赤疼痛，腸澀，

腸痛，下痢，婦人陰腫，五臟冷熱，久洩膿血，止

消渴，大驚，除水，堅骨，調胃，厚腸，益膽，療

口瘡，五癆，七傷，益氣，止心腹痛，驚悸，煩躁

，潤心肺，長肌肉，止血，天行熱疾，止盜汗，並

療瘡疔。豬肚蒸爲丸，治小兒疳氣，蟲疾，羸瘦，

氣急，鬱熱，煩躁，惡心，痞滿，通心竅，去惡血

，解服藥中毒，煩悶，及巴豆，輕粉毒。

【用量】一回一〇——三〇服用。

【製劑】丁黃連越幾斯 *Extratum Copides*

此即以黃連根四〇。浸於水，及酒精一〇〇。〇中

，經五日後，而製成褐色越幾斯也。以〇。二——

〇。五——一〇。〇，爲丸劑，水劑等，而服用之。

其功效及作用，與黃連相同。

2 黃連丁幾 *Tinctum Copides*

此即以黃連根一〇〇。〇，浸於稀酒精一〇〇。〇中

，而製成黃褐色之液體也。以十滴，乃至二十滴，

服用之。

【禁忌】惡菊花，女參，白鮮皮，芫花，白殭蠶；畏款冬，

牛膝；忌豬肉。

【採製】取根以布拭去鬚毛，用沸水浸二伏時，濾出，於磚

木火上，焙乾，用之。

【別稱】又名王連，支連。

黃鼠

【學名】*Arctos melampus bedfordi* Thos.

【基本】此屬於食肉類之鼯鼠科，體似鼯稍大，毛呈黃色，

好吸溫血動物之血。昔時亦有取其肉，而爲藥者。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。能潤肺，生津，又可煎膏，

貼疔腫，能解毒，止痛。

【別稱】又名禮鼠，拱鼠。

黃精

(百合科)

【學名】*Polysantonum giganteum*, Dietr.

【產地】多生於山野之中。

【基本】爲多年生草，莖高三尺許，葉似百合。夏初葉腋開

花，下垂，如小鈴，色淡綠；花後結實，如豆大，

色黑，圓形。其根爲管狀，色白，而青，可入藥用

之。

【功效】爲滋養強壯藥，對於身體及病後衰弱，皆可服用。

其根氣味甘平，無毒。能補中，益氣，除風濕，安五臟，治五勞七傷，助筋骨，耐寒暑，益脾胃，潤心肺，補諸虛，止寒熱，填精髓，下三蟲。

【用量】一回。五——四。○服用。

【禁忌】忌梅實，花，葉，子，並同。

【學說】李時珍曰：黃精，野生山中，亦可劈根，長二寸。

種種之，一年後極稠，子亦可種。

【別稱】又名黃芝，戊巳芝，菴竹，鹿竹，仙人除糶，救窮

草，采儲，野生蕞，重樓，雞格，龍御，垂珠。

黃耆

(豆科)

【學名】*Herbarium scutellum, Lenth.*

【產地】多產於綿上，(即今山西，沁源縣。)山地自生之。

【基本】為多年生草，莖多臥地成蔓，狀有高達四五寸者。

葉為羽狀複葉，有毛，呈長橢圓形。夏日間開淡紅色花，花冠為蝶形，結莢似赤豆狀。其根肥大，可供藥用之。

【功效】為緩和強壯藥。

其根氣味甘而微溫，無毒。治癰疽，敗疔，能排膿

；止痛，除大風，癩疾，五痔，鼠瘻，療小兒百病

，婦人子腹風邪，逐五臟間惡血，補男子虛損，五

勞羸瘦，止渴，腹痛，洩痢，益氣，利陰，治虛喘

，腎衰，耳聾，寒熱，發背，助氣，壯筋骨，長肌

肉，破癰癤，治癩癧，癆瘵，腸風，血崩，帶下，

赤痢，產前後一切疾病，月候不均，痰嗽，頭風，

熱毒，赤目，虛勞自汗，補肺氣，瀉肺火，心火，

生皮毛，益胃氣，去肌熱，及諸經之痛。

【用量】一回三。○——八。○服用。

【禁忌】忌龜甲，白鮮皮。

【探製】取根槌扁，以蜜水塗炙數次，至熟為度，或以鹽湯

潤透，器盛，備用。

【學說】李時珍曰：黃耆，葉似槐葉，而微尖小；又似蒺藜

葉，而微闊大，青白色。開黃紫花，大如槐花，結

小尖角，長寸許。根長二三尺，以緊實如箭筈者，

為良。

【別稱】又名黃芪，戴椹，戴椹，莖草，百本，王孫。

【基本】據吳普云：蜀黃環，一名生芎，二月生苗，莖赤，

黃環

高二尺，葉黃圓，端大，經日，葉有汁，黃白。五

...

月質圓，三月采根，黃色。又據李時珍云：吳普所說：甚詳，而唐宋本草，不收，何也？范子計然云：黃瑱，出魏郡，以黃色者，為善。

【功效】其根氣味苦平，無毒。除蟲毒，鬼魅，鬼魅，邪氣，治欬逆，寒熱，上氣，百邪，痰嗽，消水腫，利小便。其子氣味苦寒，而有小毒。治惡瘡，蝨疥，殺蟲，或酒磨之，塗疥瘡等。

【禁忌】惡茯苓，防己，乾姜。

【別稱】又名滾泉，大就，就葛，生芻，根非，實名：狼跋子，度穀。

黃藤

【基本】據李時珍云：黃藤，生嶺南，狀若防己。俚人常服此藤，縱飲食有毒，亦自然不發。

【功效】其氣味甘苦而平，無毒。治飲食中毒，利小便，可煮汁頻服，即解。

黃礬

【基本】據李時珍云：黃礬，去陝西瓜州，沙州，及船上來者，為上。黃色，狀如胡桐淚，入於礬礬中，揀出黃色者，充之，非真也。

【功效】據云：其氣味酸澀而鹹，有毒。能療瘡，生肌，治瘰癧，惡瘡，疥癬，風熱牙疼。

黃櫨

(漆樹科)

【學名】*Rhus chinensis*, L.

【產地】多生於山野之間，或栽培於庭園中。

【基本】為落葉喬木，高一二丈許，葉圓形。夏日枝梢着小花，為圓錐花序。其木可取之，而為藥用。

黃花，為圓錐花序。其木可取之，而為藥用。

【功效】其木氣味苦寒，無毒。能除煩熱，解酒疸，目黃，可以水煮，服之。又洗赤眼，及燙傷，漆瘡，風癩等。

【學說】陳藏器曰：黃櫨，生商洛山谷，四川界，多有之，葉圓，木黃。

葉圓，木黃。

黃蠟

Cera larva

【基本】為蜜蜂 (*Apis mellifera*, Linn.) 之巢，而製取之蠟也。

蜜蜂，由腹部出蠟，和唾為巢。製時取其巢，煎而

溶之，其上浮如油者，凝固即成，初時色黃，可為

藥用之。

【成分】含有 Acidi Caroin $C_{27}H_{46}O_2$ 之黃色塊，及派爾米

輕酸 $C_{16}H_{32}O_2$ 與 Methylalkohol $C_{30}H_{60}O_2$ (OH)

等之成分。

「功效」每爲賦形藥，軟膏料等。

其氣味甘淡微溫，無毒。治呃逆不止，可燒烟薰之。又治破傷風溼，妊娠胎漏，可用熱酒溶化服之。療凍瘡，爛疔，煎濃，或煎膏塗貼之。

黃蘗

(芸香科亦作秦椒科)

「學名」*Phellodendron amurense*, Rupr.

「產地」多自生於山地。

「基本」爲落葉喬木，幹高三四丈，葉爲奇數羽狀複葉，小葉下面帶白色。夏月枝梢開繡黃花，雌雄異株。實色黑，大如黃豆。幹之內皮，色黃，與實，俱入藥用之。

「成分」含有 *Berberin* 之成分。

「功效」爲健胃藥，解熱藥，及收斂藥。

其氣味苦寒，無毒。能除五臟腸胃中結熱，黃疸，腸痔，洩痢，女子赤白濁下，陰陽蝕瘡，驚氣，目熱，赤痛，口瘡，熱疔，蟲疔，血痢，止消渴，殺蛙蟲，男子陰痿，及莖疔，安心，除勞。治骨蒸，勞熱，明目，多淚，口乾，心熱，殺疔蟲，止心痛。

鼻衄，腸風，下血，急熱，腰痛，瀉膀胱，補腰腎，壯骨髓，療諸痿，癰疽，利竅，除熱，通小便，止痛。療口舌生疔，小兒頭疔。

「用量」四。〇——一二。〇服用。

「禁忌」憂鬱漆。

「採製」取藥皮，削去粗皮，用生蜜水浸半日，漚出，晒乾，用蜜塗，微火炙之，以蜜盡爲度，每五兩，用蜜三兩。

「學說」掌禹錫曰：按蜀本圖經云：黃蘗，樹高數丈，葉似吳茱萸，亦如紫椿，經冬不凋。

「別稱」又名藥木，根名：檳榔。

黃大葷

(葷科)

「學名」*Hyacinth. Maxim.*

「產地」多栽種於田園之中。

「基本」爲一年生草，莖高一二尺許，葉互生，複葉自三小葉而成；小葉橢圓形，緣邊，無鋸齒；莖葉皆有毛茸。夏秋之間，開小花，花冠蝶形，呈白色，或紫色。果實爲莢，內有種子，圓形，黃色，可採取之，而爲藥用。

「成分」含有多量植物油，及其蛋白質，澱粉等。

「功效」其質氣味甘溫，無毒。能寬中，下氣，利大腸，消

水腫，毒腫，可研末以熱水塗，能治痘瘡。其豆油氣味辛甘而熱，微毒。能塗疥癬，解髮腫。其舊燒

灰，為點痣，去惡肉藥。

「學說」李時珍曰：大豆，有黑，青，黃，白斑數色；惟黑者，入藥。

黃瓜菜

(菊科)

「學名」*Trachua Thunbergiana, Maxim.*

「產地」生於山野之間。

「基本」為一種雜草，高一二尺，葉之形狀，常變不一。大

抵細長披針形，有缺刻，不整齊。根葉有長柄，莖葉常無柄。初夏開黃花，為頭狀花序。果實小而平滑，如種子狀。其莖可採之，而為藥用。

「功效」其氣味甘微，若微而寒，無毒。通結氣，利腸胃。

「學說」李時珍曰：此菜，二月生苗，田野徧有；小科如薺，三四五月開黃花，花，與莖，葉，並同地丁；但

差小耳！

「別稱」又名黃花菜。

黃花蒿

(菊科)

「學名」*Artemisia annua, L.*

「產地」生於原野之間。

「基本」為一年生草，高三四尺餘，葉為複葉，有細裂；開小花，花冠筒狀，呈黃色，甚圓，為頭狀花序。其

葉及子，可供藥用之。

「功效」其葉氣味辛苦而涼，無毒。治小兒風寒，驚熱。其子氣味辛涼，無毒。治虛勞，下氣，開胃，止盜汗，去邪氣，鬼毒。

「學說」李時珍曰：香蒿，臭蒿，通可名為草蒿。此蒿與青蒿相似；但青色，綠帶淡黃。

「別稱」又名臭蒿。

黃明膠

Celastrum flavum

「基本」據李時珍云：按本經白膠，一名：鹿角膠，煮鹿角作之；阿膠，一名：傅致膠，煮牛皮作之，其說甚明。黃明膠，即今水膠，乃牛皮所作，其色黃明，非白膠也。

「功效」其氣味甘平，無毒。治吐血，衄血，下血，血淋，下痢，妊婦胎動，血淋，風濕，走注，疼痛，打撲

損傷，燙傷，灼瘡，一切癰疽，腫毒，消瘰癧，止痛，潤燥，利大小腸。

〔別稱〕又名牛皮膠，水膠，海犀膏。

黃楊木

(黃楊科)

〔學名〕*Buxus sempervirens* L. var. *microphylla* Hk. f.

〔產地〕多生於山野，而人家亦有栽種之。

〔基本〕為常綠小灌木，幹高二尺；其年久者，則達數丈餘。

○葉卵形，對生；枝條繁茂，頗似錦熟黃楊。春間

枝梢，綴小花，單性，呈黃色。其葉可採之，而供

藥用。

〔功效〕其葉氣味苦平，無毒。治婦人難產。人達生散中用

○又治暑月生瘡，搗爛塗之。

〔學說〕李時珍曰：黃楊，生諸山野中，人家多栽種之。枝

葉攢簇上聳，葉似初生槐芽，而長厚，不花，不實

，四時不凋。

黃蜀葵

(錦葵科)

〔學名〕*Hibiscus Maudslayi*

〔產地〕多栽培於園圃之間。

〔基本〕為一年生草，莖高三四尺許，亦有不及一尺者，根

長而肥大；葉為掌狀分裂。秋間開大花，五瓣，黃色，下部帶有紅色。其花及子根，皆供藥用之。

〔功效〕其花氣味甘寒而滑，無毒。止小便淋瀝，能催生，

治諸惡瘡，膿腫，研為末敷之，即愈，為疔家消癰

腫之要藥。○又浸油，塗燙傷。其子及根氣味甘寒而

滑，無毒。亦能治癰腫，利小便，五淋，水腫，產

難，通乳汁。

〔學說〕李時珍曰：黃葵，二月下種，或宿子，在土自生，

至夏始長。葉大如蓖麻葉，深綠色，開歧了，有五

尖，如人爪形，旁有小尖。六月開花，大如椀鴉，

黃色，紫心，六瓣，而側且開，午收，暮落。

黃頰蛇

〔學名〕*Erythra chimacophora* Boie.

〔基本〕為一種無毒蛇，體長達五尺，頭青綠色，背上有淡

黑色之條紋，腹面白色。好食鼠蛙鳥卵，故每至屋

梁盜食。

〔功效〕其肉氣味甘溫，而有小毒。能釀酒，或入丸散，治

風癩，頑癬，惡瘡，自死蛇漬汁，塗瘡疥；煮汁，

洗沒骨脫作痛；燒灰同豬脂，塗風癬，漏瘡，婦人

妬乳，獺犬咬傷。其頭燒灰治久瘡，及小腸瘻，入丸散用之。其骨治久瘡，勞瘵，炙入丸用之。其香鼠治鼠瘻，蟻瘻，有細孔如鍼者，以臘月豬脂，煎焦，去滓，塗之。其吞蛙治疔腦，勞嗽，蛇瘻。

〔別稱〕又名黃喉蛇。

黃藥子

〔基本〕據李時珍云：黃藥子，今處處栽之。其莖高二三尺，柔而有節，似藤質，非藤也。葉大如拳，長三寸許，亦不似桑。其根長者尺許，大者圍二三寸，外褐，內黃，亦有黃赤色者，肉色頗似羊蹄根，人皆搗其根，而染藍用之。

〔功效〕其根氣味苦平，無毒。治諸惡腫，疔瘻，喉痺，蛇犬咬毒，研水，服之；亦含，亦塗。又能涼血，降火，消瘰，解毒。

〔別稱〕又名木藥子，大苦，赤藥，紅藥子。

黃頰魚

〔基本〕據李時珍云：黃頰，無鱗魚也。身尾俱似小鮎，腹下黃，背上青，黃腮，下有二橫骨，兩鬚，有胃。羣游作聲，如札札，性最難死，陸佃云：其胆春夏

近上，秋冬近下，亦一異也。

〔功效〕其肉氣味甘平，微毒。能醒酒，祛風，養食之，消水腫，利小便；燒灰，治癩瘡久潰，不收斂者，及諸惡瘡。其頰骨治喉痺腫痛，燒研，茶服三錢。

〔別稱〕又名黃頰魚，黃頰魚。

黃鯛魚

〔基本〕據李時珍云：生江湖中，小魚也。狀似白魚，而頭尾不昂，扁身細鱗，白色，闊不踰寸，長不近尺，可作炸鱸，煎炙甚美。

〔功效〕其肉氣味甘溫，無毒。用白水煮汁，飲之，能止胃寒，洩瀉。其油治疔瘡，有蟲。

〔別稱〕又名黃骨魚。

黍

(黍本科)

〔學名〕*Panicum mihneunum*, L.

〔產地〕多栽種於田園中。

〔基本〕為稷之一種，其性糯，可做酒，及糖等；形態頗似稷。其米可食，亦供藥用。

〔功效〕其米氣味甘溫，無毒。久食，令人熱煩，能益氣，補中。燒灰，和油塗杖疔，止痛，不作癩。其種莖

並根，氣味辛熱，而有小毒。煮汁飲之，解苦鹹毒，浴身，去浮腫，和小豆莢汁，服之，能下小便。燒灰，酒服，治妊娠尿血。

第十三畫

亂髮

【基本】為人之頭髮，須擇選健康者，而翦用之。通常取用剃髮，先以苦參水浸之，而後洗淨，晒乾，入罐燒焦為炭，以供藥用。

【功效】為收斂藥，有止血之作用。

其氣味苦而微溫，無毒。治欬嗽，五淋，大小便不通，小兒驚癇，止血；鼻衄者，可燒灰吹之，立已。又燒灰，療轉胞，小便不通，赤白痢疾，嘔噎，瘰癧；疔腫，骨疽，雜疔，消瘀血，補陰，甚捷。

【別稱】又名血餘，人髮。

廉薑

【基本】據李時珍云：按異物志云：生砂石中，似薑，大如蕪，氣猛近於臭。南人以爲齋，其法陳皮以黑梅，及鹽汁漬之，乃成也。

【功效】其氣味辛熱，無毒。治胃冷，嘔吐，不食，能溫中

，下氣，消食，益智。

【別稱】又名薯蕷。

槿胡根

【基本】據陳藏器云：生江南川谷之陰地，苗如葦草。其根似天門冬，凡用者，抽去心。

【功效】其氣味甘寒，無毒。潤五臟，止消渴，除煩，去熱，明目，功如麥門冬。

煙草

(茄科)

【學名】Nicotiana glauca, L.

【產地】多栽種於園圃者，各地皆有之。

【基本】爲一年生草，莖高四五尺，葉大卵形，而尖，互生。花爲合瓣，花冠如漏斗狀，淡紅紫色，爲圓錐花序。其葉及梗，可供藥用。

【成分】含有 Nicotin 與 Nicotinic 及 Calcium Calcium 等之灰分。

【功效】其葉氣味辛溫，微毒。能流通，疏散，辟穢，殺蟲，興奮精神，排除百病。治一切陰虛惡邪，胸脹，腹滿等。其梗氣味，及功效相同。

【用量】〇・〇三——〇・一服用。

滑石 Talc

【基本】爲岩中硬度最低者，觸之滑膩，色淡綠，或白，有光，呈片狀，纖維狀，塊狀之無晶形，可爲藥用。

【成分】含有含水硅酸鎂 $H_2Mg_3Si_4O_{12}$ 等之成分。

【功效】爲利尿藥。

其氣味甘寒，無毒。治身熱，洩瀉，女子乳難，經閉，利小便，瀉胃中積聚，寒熱，能益精氣，通九竅，生津液，去留結，止渴，利中，化食，解毒，行積滯，逐凝血，解燥渴，補脾胃，降心火，止石淋。療黃疸，水腫，腳氣，吐血，衄血，金瘡血出，諸瘡腫毒。

【用量】三〇——二〇〇服用。

【禁忌】惡竹青。

【採製】凡用白滑石，先以刀刮盡，研粉，以牡丹皮同煮一伏時，去牡丹皮，取滑石，以東流水淘過，曬乾，用之。

【別稱】又名畫石，液石，脫石，冷石，番石，共石。

櫻櫚

(櫻櫚科)

【學名】*Tachycarpus excelsa*, Wendl.

【產地】生於暖地之間。

【基本】爲常綠喬木，幹似圓柱，高二丈許；葉作掌狀分裂

，有長柄，叢生幹端；花小，色淡黃，有苞包之。

葉之根部，包幹之毛，呈褐色。其子花及皮等，皆

供藥用之。

【成分】含有鞣酸等之成分。

【功效】爲收斂藥，止血藥。

其筴及子花氣味苦澀而平，無毒。能養血，瀉腸，止瀉痢，腸風，崩中，帶下，及大腸下血。其皮氣味相同，專能止鼻衄，吐血，破癩，治腸風，赤白痢，崩中，帶下，可燒灰存性，用之。又療金瘡，疥癬，能生肌，止血。

【用量】皮用一〇〇——一五〇服之。

【學說】李時珍曰：櫻櫚，川廣甚多；今江南亦種之。最難，初生葉如白芨葉，高三三尺，則末端數葉，大如扇狀，上聳，四散歧裂，其莖三稜，四時不凋。

【別稱】又名栴櫚。

楊梅

(楊梅科亦作菜蕒科)

【學名】*Myrica rubra*, S. et Z.

〔產地〕生於暖帶之各地。

〔基本〕爲常綠喬木，高至二十尺許，葉革質，平滑，長橢圓形，如倒卵狀，全邊，互生。春月開小花，單性；果實爲核果，球形，有許多乳狀突起，熟時呈深綠色，又有白色，黃色者。

〔成分〕含有楊梅酸，及糖分等。

〔功效〕其實氣味酸而甘溫，無毒。以鹽藏食之，去痰，止嘔，消食，下酒，止渴，和五臟，能滌腸胃，除煩憎惡氣；燒灰服之，治下痢，甚驗。鹽者，常含一枚，兩汁，利五臟，下氣，療下痢不止。其核仁能治腳氣。其樹皮及核煎湯能洗惡瘡，疥癬；煎水，能嗽牙痛；服之，解砒毒；燒灰油調，塗燙傷。

〔用量〕皮用二。〇——四。〇服之。

〔學說〕李時珍曰：楊梅，樹葉如龍眼，及紫瑞香，冬月不凋。二月開花，結實，形如楮實子，五月熟，有紅白，紫三種。

〔別稱〕又名柘子。

楊榿

(忍冬科)

〔學名〕*Myrica japonica*, De.

〔產地〕生於山林野地之間。

〔基本〕爲落葉灌木，高至六七尺許；葉大，對生，卵形，而尖，有鋸齒，下面生毛。夏秋之際，開花，紫色，合瓣；花冠上部膨大，甚長。其葉可採之，而供藥用。

〔功效〕其氣味苦寒，無毒。治瘰癧，惡瘡，以水煮汁，洗之，能去毒，消腫。

〔學說〕蘇恭曰：楊榿，一名：空疏，所在皆有，多在鹽垣間；其子爲葵。

棟

(棟科)

〔學名〕*Melia japonica*, Don.

〔產地〕多產於熱帶地方。

〔基本〕爲落葉喬木，高至三十尺；葉小，甚多，爲羽狀複葉，長卵形，有鋸齒。夏月枝梢分極，開花，淡紫色，長形，爲圓錐花序。果實橢圓形，長五六分，冬月成熟，則黃色。其實及根皮，皆供藥用之。

〔功效〕爲驅蟲藥。

其實氣味苦寒，而有小毒。治瘧疾，傷寒，大熱，煩狂，殺三蟲，療疥瘡，利小便，去心躁，止腹痛。

，消腫，治諸痛，惡痔，其根及木皮氣味苦而微寒，微毒。能殺蠅蟲，利大腸；苦酒和塗疥癬，甚良；治遊風，熱毒，風疹，惡瘡，疥癩，小兒壯熱，並煎湯浸洗之。其花治熱癩，焙末搽之；鋪席下，殺蚤虱。其葉治痲痛，臨時煎之，酒飲。

【用量】子用二。〇——六。〇服之。

【採製】取質熬乾，酒拌令透，捺待皮軟，刮去皮，取肉，去核，用之。凡使肉，不使核；使核，不使肉。如使核，搗碎，用漿水煮一伏時，晒乾。

【學說】李時珍曰：楸，長甚速，三五年，即可作楸；其子正如圓棗，以川中者，為良。

【別稱】又名苦楸，實名：金鈴子。

楸

(楸科)

【學名】*Thuus campestris*, Sm. var. *laevis* Planch.

【產地】多生於寒帶之各地。

【基本】為落葉喬木，高八九丈，皮褐色，有扁平之裂痕，可剝脫。葉橢圓而大，有鋸齒；花淡紫色，花後結實，周圍果皮伸長，如鳥翅。其根及皮葉，皆供藥用之。

【功效】為利尿藥。

其白皮氣味甘平，滑利，無毒。治大小便不通，利水道，除邪氣，療腸胃邪熱，消除毒腫，治小兒頭瘡，通經脈，去五淋，利九竅，滲濕熱，行津液，消腫。其葉氣味，以嫩葉作藥，及糜食，消水腫，利小便，下石淋，壓丹石。其花治小兒痲疾，小便不利，傷熱。其莢仁氣味微辛而平，無毒。作糜食，令人多睡。治婦人帶下，可和牛肉作糜食之。又能助肺，殺蟲，下氣，消心腹間惡氣，治卒心疼痛。又塗諸瘡癬，以陳者良。

【用量】其白皮用二。〇——五。〇服之。

【學說】蘇頌曰：楸，處處有之；三月生莢，古人采仁，以糜羹。今復無食者，惟用陳老實，作醬耳！

【別稱】又名苦楸，白者名：枌。

楸

(桑科)

【學名】*Broussonetia Katsurada*, Sieb.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為落葉亞喬木，高丈餘，葉類桑，而粗糙。花單性，雌雄同株，雌雄花，皆類穀，而較小，皮有斑紋。

，實如楊梅。其枝莖皮葉果實等，皆供藥用之。

【成分】含有澱粉，黏液質等。

【功效】為強壯藥。

其實氣味甘寒，無毒。治陰痿，水腫，能益氣，充肌，明目，壯筋骨，助陽氣，補虛勞，健腰膝，益顏色。其葉氣味甘涼，無毒。治小兒身熱，食不生肌，可作浴湯。又治惡瘡，腐肉，風刺，身癢。凡鼻翳數升不斷者，搗汁三升，再三服之，良久即止。○嫩葉之，去四肢風痺，赤白下痢。炒研食之，治水痢；又利小便，去風濕，腫脹，白濁，疝氣，癰瘡。其枝莖治癩疹，煮湯洗浴。搗濃汁飲之，治小便不通。其樹白皮氣味甘平，無毒。逐水，利小便，治水腫，氣滿，喉痺，短氣，欬嗽，以及下血，血崩，腸風，血痢。其皮間白汁甘平，無毒。療疥癬，殺蛇蟲，蜂蝎，犬咬諸傷。

【用量】字用三。○——六。○服用。

【別稱】又名檉，殺桑，楮實又名：殺實，楮桃。

楸

(大戟科)

【學名】*Mallotus japonicus*, Muell. Arg.

【產地】多生於山野中。

【基本】為落葉喬木，莖高三十尺許，葉大，約三四寸，圓形，或廣卵形，有掌狀淺裂，與桐相似。嫩葉，及葉柄，帶赤色。夏月開花，細小，黃綠色，為穗狀花序。結實成莢，長尺餘，下垂，外面多軟刺，熟則裂開，吐出種子。其皮葉等，皆供藥用之。

【功效】其木白皮氣味苦而小寒，無毒。止吐逆，殺三蟲，及皮膚蟲。又可煎膏貼敷惡瘡，疔癩，癰腫，疔痔；除膿血，生肌膚，長筋骨，又能消食，瀉腸，下氣，治上氣，欬嗽。口吻生瘡，貼之頗易，取效。其葉氣味相同，可搗敷瘡腫，煮湯洗膿血。又於冬取乾葉用之，治諸癩，腫潰。

【學說】李時珍曰：楸，有行列莖幹，直聳可愛，至上垂條如線，謂之楸線。其木濕時，脆燥，則堅。

【別稱】又名楸。

椰子

(棕櫚科)

【學名】*Cocos nucifera* L.

【產地】原產於亞非利加，及東印度各地。

【基本】為常綠喬木，高五十尺，乃至一百尺餘，周圍三尺

以內。葉大羽狀分裂，叢生於樹幹之頂上。花單性，雌花，與雄花同株，果實長形，有三稜，長八九寸，徑四五寸，皮外之纖維，甚強韌，內圍之一層，亦甚堅牢。此層之內圍，又有堅胚乳，堅胚乳之內，有汁液，如乳樣者，可能製油，又可為藥用之。

【成分】含有 Acetyl Caproic 與 Acetyl Caprylic 和 Acetyl Lauric 同 Acetyl Myristic 及 Acetyl Palmitic 之諸成分。

【功效】其子類氣味甘平，無毒。能益氣，治風，食之不飽，令人面澤。其子類氣味甘溫，無毒。能止消渴，去水腫，治吐血，風熱。其子及苦平，無毒。止鼻衄，吐逆，治霍亂，可煮汁飲之。又鎮心痛，燒灰存性，研服一錢，極驗。其殼治楊梅瘡，筋骨痛，燒灰存性，臨時炒熟，以滾酒泡服二三錢，暖酒取汗，其痛即止。

【製劑】椰子油 Oleum Cocoi

此即由椰子之果核，而取出之脂肪油，為軟膏等之基礎料。

【學說】李時珍曰：椰子，乃果中之大者，其樹初栽時，用

鹽置根，則易發，木至斗大，方結實。大者三四圍，高五六丈，木似檉榔，檉榔之屬，通身無枝。其葉在木頂，長四五尺，直聳指天，狀如棕櫚，勢如鳳尾。二月開花，成穗，出於葉間，長二三尺，大如五斗器，仍連着實，一穗數枚，小者如栝樓，大者如寒瓜，長七八寸，徑四五寸，懸着樹端。六七月初，有粗皮包之，皮內有核，圓而黑潤，甚堅硬，厚二三分，殼內有白肉，如凝雪，味甘美，如牛乳。

【別稱】又名越王頭，蒼餘。

椿

(椿科亦作椿科)

【學名】(Chinese chinensis, Juss.)

【產地】庭園間多栽培之。

【基本】為落葉喬木，高至三四十尺，葉為羽狀複葉，嫩時呈紅色。初夏枝梢開小白花，成穗，花後結實，至秋成熟，則裂開，種子有翅，飛散於他處。其葉等，可供藥用之。

【功效】為收斂藥。

其葉氣味苦溫，而有小毒。煮水能洗瘡疥，風疽。

凡白禿不生髮，取椿，桃，欵葉心，搗汁，類塗之。瘡疥瀉食，消風，祛毒。其白皮，及根皮氣味苦溫，無毒。治疳蟲，去口臭疳蟲，殺魃蟲，介蠱，鬼疰，傳尸，蠱毒，下血，赤白久痢。得地檢，止疳痢，女子血崩，產後出血不止，腸風，瀉血，腸滑，縮小便，治白濁，赤白帶下，溼氣，下痢，精滑，夢遺。其莢治大便下血。

【用量】三〇——一〇〇服用。

【學說】李時珍曰：椿樗，乃一木三種也。椿木，皮細，肌實，而赤，嫩葉香甘，可茹；樗木，皮粗，肌虛，而白。其葉臭惡，獸年人，或採食之。栲木，即樗之生山中者，木亦虛大，梓人亦或用之；然爪之，如腐朽，故古人以爲不材之木。

【別稱】香者名：椿，臭者名：樗，山樗名：栲，虎目樹，大眼桐。

楓

(金縷梅科)

【學名】*Tiquidambar formosana* Hoo.

【產地】生於山野之間。

【基本】爲落葉喬木，幹高三三丈，葉掌狀分裂，緣邊，有

細鋸齒。秋間變紅色，春月隨新葉而生花，呈黃褐色。果實圓球形，有軟刺。其樹皮汁液，供藥用之，名曰：楓香脂；又曰：白膠香。

【成分】含有多量之 $\text{C}_{15}\text{H}_{16}\text{O}_2$ 其脂可代蘇合香之用。

【功效】爲拔毒撤膿藥。可用於氣管枝黏液瀰等之徵候。

其香脂氣味辛苦而平，無毒。治癩疹，風癢，浮腫，可灸水浴之。又治齒痛，癰疽，疥瘡，金瘡，吐血，衄血，咯血，能活血，生肌，止痛，解毒。若燒過措牙，永無牙疾。其木皮氣味辛平，而有小毒。治水腫，下水氣，可灸汁用之。若煎飲，能止水痢；又治霍亂，刺風，冷風，煎湯浴之。其根葉治癰疽，可搗酒飲之，以滓貼之。

【用量】脂用〇・二——一〇服用。

【採製】取香脂用以澀水，煮二十沸，入冷水中，揉扯數十次，曬乾，用之。

【學說】李時珍曰：楓木枝幹，修聳，大者達數圍。其木甚堅，共有赤，白二種；白者，細膩。其實成後，有柔刺。

【別稱】又名榲香脂，膠香。

楓柳

【基本】據李時珍云：按蘇公言：楓柳有毒，出原州。陳藏器駁之，以為楓柳皮，即今楓樹皮，性澀，能止水

痢。按斗門方言：即今楓樹上寄生，其葉亦可製粉霜，此說是也。若是楓樹，則處處甚多，何必專出原州耶？陳說：誤矣！

【功效】其皮氣味辛而大熱，有毒。治風濕，齒痛，積年痛風，不可忍者，或久治無效者，細剉焙之，不限多少，入腦麝浸酒，常服，以醉為度。

槲木

(五加皮科)

【學名】*Amalia sikkimensis*, L.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為落葉灌木，高至十尺餘。其莖，及葉有銳刺，葉小，甚多，為羽狀複葉，卵形，開小花，白色，花瓣五片，為圓錐花序。其根白皮，可供藥用之。

【功效】其根白皮氣味辛平，而有小毒。治水腫，可煮汁服一盞，當下水。如病已困，取根搗汁，坐之取氣，水亦自下。凡齒牙有蟲者，取片許，置於牙中，當

自爛落。

【學說】李時珍曰：辛山中，亦有之。齒頂生葉，山人采食，謂之鵲不踏，以其多刺，而無枝，故也。

楠

(樟科)

【學名】*Macchilus Nannum*, Ebenl.

【基本】據李時珍云：楠木生南方，而黔蜀諸山尤多。其樹直上童童，若纒蓋之狀，枝葉不相礙茂，似豫章而大，如牛耳，一頭尖，經歲不凋，新陳相換。其花赤黃色，實似丁香，色青，不可食。幹甚端偉，高

者十餘丈，巨者數十圍，氣甚芬芳。

【功效】其材氣味辛而微溫，無毒。治霍亂吐下不止，可煮汁服之。或煎湯洗轉筋，及足腫。其皮氣味苦溫，無毒。治霍亂吐瀉。

【別稱】又名栴。

獅 *Felis leo*

【產地】產於全非洲，及亞洲西南平原。

【基本】為食肉類之貓類。其形狀極威嚴，巨頭闊胸，軀部瘦健，具大力，故有獸王之稱。體毛頗短，作污黃色。鬃毛色微暗，牡獅之肩部及胸部發生之，尾部具小毛叢。民間有拾其尿，而用之者。

「功效」其尿服之，能破宿血，殺百蟲；燒之，能去鬼氣。

璿玕

「學名」*Chelonia imbricata*

「產地」多產於熱帶之海洋。

「基本」爲魚鱗類之動物。據李時珍云：按范成大虞衡志云

：玳瑁，生海洋深處，狀如龜殼，而殼稍長，背有甲十二斤，黑白斑文相錯而成。其裙邊缺，如鋸齒

，無足，而有四鬣，前長，後短，皆有鱗斑文，如

甲。海人養以鹽水，飼以小魚，又顧玠海槎錄云：

大者難得，小者時時有之，但老者甲厚，而色明，

小者甲薄，而色暗。取時必倒懸其身，用滾醋潑之

，則甲逐片，應手落下，可爲藥用。

「功效」爲解毒解熱藥，有犀角同樣之功能。

其甲氣味甘寒，無毒。能解嶺南百藥毒，破癰結，

消痔毒，止驚癇，療心風，解煩熱，行氣血，利大

小腸，其功與肉相同，磨汁服之，解蠱毒。生佩之

，避蠱毒。又解痘毒，鎮心神，急驚，客忤，傷寒

，熱結，狂言。其肉氣味甘平，無毒。治諸風毒，

逐邪熱，去風腦，風熱，行氣血，鎮心神，利大小

腸，通婦人經脈。其血能解諸藥毒，可刺血飲之。

「別稱」又名玳瑁。

瑞香

(瑞香科)

「學名」*Daphne odora*, Thunb.

「產地」寺院及庭園多培養之，而山野亦產生之。

「基本」爲常綠小灌木，高至四五尺；葉長橢圓形，質厚，

光滑。冬月葉間撒出花蕾，至春分時，開放團繖花

序，內面白色，外面紅紫色。其根，可取爲藥用。

「功效」其根氣味甘鹹，無毒。治急喉風，用白花者，研水

，灌之。

「用量」○·三——一·○服用。

「學說」李時珍曰：南土處處山中有之，枝幹婆娑，柔條，

厚葉，四時不凋。冬春之交，開花成簇，長三四分

，如丁香狀，有黃，白，紫三色。

硼砂 Borax

「基本」爲天然產生者，或加碳酸鈣，於硼酸溶液中，亦可

製成，爲白色斜方柱形之結晶，可爲藥用之。

「成分」含有 $B_2O_3 \cdot 2Na_2O$ 之成分。

「功效」爲外用消毒藥。

其氣味苦辛而緩，無毒。能消痰，止咳，破癥結，喉痺，去上焦痰熱，生津液，除口臭，消瘴翳，治噎膈，反胃，積結，瘰癧，瘰癧，惡瘡，及口齒諸病。

【用量】○：五——三。○服用。

【別稱】又名蓬砂，鬮砂，益砂。

稗

(禾本科)

【學名】*Panicum crus Gallo* L.

【產地】多栽培於田園之中。

【基本】為一年生草，高三四尺；葉細長而尖，有平行脈。

開花，頗小，為圓錐花序。其花序之枝上部，略為彎曲，種子可供食用。

【功效】其米氣味辛甘而苦，微寒，無毒。作飯食，益氣，

宜脾，故曹植有芳菰精神之稱。其苗根治金瘡，及

傷損，血出不已，搗敷，或研末，摻之，即止。

【學說】李時珍曰：稗，處處野生，最能亂苗。其莖，葉，

穗粒，並如黍稷，一斗可得米三升，故曰：五穀不

熟，不如稗稗，苗似稗，而穗如粟，有紫毛，即烏

禾也。

當歸

(繖形科)

【學名】*Ligusticum sinense* O. & N.

【產地】多生於山野，或栽培於庭園。

【基本】為多年生草，莖高二三尺，葉為羽狀複葉，質厚，

深綠，有光澤。夏秋之交，開小白花，為複繖形花

序。其根可採取之，而供藥用。

【成分】含有當歸精 (Anemonin) 及多量之蔗糖，澱粉等。

【功效】為通經藥，又為清涼藥。

其根氣味苦溫，無毒。能治欬逆，上氣，溫瘧，寒

熱，婦人漏下，絕子，諸惡瘡瘍，金瘡，可煮汁飲

之。又能溫中，止痛，除客血，內寒，中風，瘧汗

不出，濕痺，中惡，客氣，虛冷，補五臟，生肌肉

止，墮逆，虛勞，寒熱，下痢，腹痛，齒痛，女人

瀝血，腰痛，崩中。治一切風，一切氣，補一切勞

，破惡血，養新血，除癰癤，腸胃冷，頭痛，心腹

諸痛，潤腸胃，強筋骨，滋皮膚，治癰疽，能排膿

，止痛，和血，補血。

【用量】三。○——二。○服用。

【禁忌】惡菌茹，濕麪；畏苜蓿，海藻，牡蠣，生薑。

【採製】據云：頭止血，尾破血，身和血，全用即一破，一止也。先以水淨洗，治上，酒浸，治外，酒洗過，或火乾，日乾，入藥用之。

【學說】李時珍曰：今陝蜀，秦州，汝州諸處，人多栽蒔為貨；以秦歸頭圓，尾多，色紫，氣香，肥潤者，名馬尾歸，最勝。他處頭大，尾粗，色白，堅枯者，為鐵頭歸，僅宜入發汗藥。

【別稱】又名乾歸，山歸，文無。

當歸菜

(龍膽科)

【學名】*Geordia chinensis* Franch.

【產地】多生於田野之中。

【基本】為一年生草，莖高六七寸，至一尺許，呈暗紫色。

葉披針形，狹而長，約一寸餘，對生；或有大葉者。

○秋間開花，生於莖頭，及枝梢之上，白色，帶紅

紫色之暈。其莖葉等，可採取之，而供藥用。

【成分】含有結晶體之 *Erythrocinarin* 及凝液狀之 *Acid.*

Ophelin, Chirstein

【功效】為健胃藥。

其氣味苦寒，無毒。能殺諸蟲，止腹疼，健脾胃，

化積聚，避邪，解熱，進食，益氣。

【用量】三。○——一〇。○服用。

睡菜

(龍胆科)

【學名】*Morantilus tetralita*, L.

【產地】多生於池溝，沼澤等處。

【基本】為一種水草，夏月自根葉間抽莖，高尺餘；葉自三小葉而成，小葉有鈍鋸齒，開花，白色，花內面，亦有白茸。

【功效】其氣味甘微，苦寒，無毒。能除心腦邪熱，不得睡

眠。

【學說】李時珍曰：按稽含南方草木狀云：葶菜，夏生池沼間，葉類慈姑，根如藕條。南海人食之，能令人思睡。

【別稱】又名眠菜，葶菜，醉草，爛歸菜。

睡蓮

(睡蓮科)

【學名】*Nymphaea tetragona*, Georg. var. *Augustata*, Cuvr.

【產地】生於池沼，及河流之水中。

【基本】為多年生草，根莖在水底之泥內，無刺。葉心臟形，如橢圓狀，全邊，其脚缺刻甚深，浮於水面。花

白色，花瓣，在八片以上，帶綠黑色。夏月每於未刻開放，亦浮在於水面之上，徑約寸許。

【功效】據嶺南雜記載：清香爽脆，消夏，解醒。又據廣志

載：佩之，多好眠。

【學說】廣志：睡蓮，布葉數重，葉如荇而大。花有五色，

常夏黃開，夜縮入水底，晝復出，與夢草，蓋人地，夜即復出，相反。廣州有之諺曰：毋佩睡蓮，使人好眠。

蜀葵

(錦葵科)

【學名】*Alliaria* Korea, var.

【產地】多栽培於庭園之中。

【基本】為多年生草，莖高六七尺，葉略帶心臟形，五裂，

至七裂。夏日葉腋着花，頗大，有紅色，紫色，白色。其根苗花子，皆供藥用。

【成分】含有黏液澱粉及 *Asparagin* 之成分。

【功效】其苗氣味甘而微寒，性滑，無毒。除客熱，利腸胃

。養食，治丹石發熱，大人，小兒熱毒下痢。作蔬食，通竅，治淋，潤燥，易產，亦可搗爛，塗火瘡，或燒研，敷金瘡。其根莖治客熱，利小便，散濃

血，惡汗。其花氣味鹹寒，無毒。理心氣不足，治小兒風疹，瘡癩，婦女帶下，目中溜火，能和血，潤燥，通竅，利大小腸。其子氣味甘冷，無毒。治淋澀，通小腸，催生，落胎，療水腫，治一切瘡疥，並疥癬，赤癩。

【用量】一·五——四·五服用。

【學說】李時珍曰：蜀葵，處處人家植之。夏初種子，冬月宿根亦自生，苗嫩時，亦可茹食。

【別稱】又名戎葵，吳葵。

蜀椒

(芸香科)

【學名】*Zanthoxylum piperitum*, DC.

【產地】生於山野之中，或栽培於園圃之間。

【基本】為落葉灌木，莖高十尺許，葉為一回羽狀複葉，自許多小葉而成，互生；葉柄之傍，有二刺。夏月開

花，單性。結成乾果，圓形，赤色，熟則裂開，現出黑色之種子。吾國除去果殼之內皮，即為藥用之

椒紅。

【成分】含有揮發油，脂肪油，及 *Zanthoxyle C₁₀H₁₂O₄* 之成分。

【功效】其椒紅氣味辛溫，有毒。除邪氣，欬逆，溫中，逐

骨節，皮膚，死肌寒熱，痺痛，下氣。○除六腑寒冷

，傷寒，溫痞，大風，汗不出，心腹留飲，宿食，

腸澼，下痢，洩精，女子餘痰，散風邪，癯結，水

腫，黃疸，鬼疰，蠱毒，殺蟲，魚毒，開腠理，通

血脈，堅齒髮，明目，調關節，耐寒暑，可作膏藥

。○又治頭風，下淚，腰脚不遂，虛損，留結，破血

，止欬嗽，腹內冷痛，齒痛，破癥結，開胸，治天

行時氣，產後宿血，壯陽，療陰汗，暖腰膝，縮小

便，止嘔逆，通神，益血，利五臟，下乳汁，散寒

，除濕，解鬱結，消宿食，通三焦，溫脾胃，補右

腎命門，殺蛇蟲，止泄瀉。○其葉氣味辛熱，無毒。

治霍亂轉筋，殺蟲，洗腳氣，及漆瘡。○其根氣味辛

熱，微毒。○治腎與膀胱虛冷，血淋，色瘕者，煎湯

細飲，色鮮者，勿服。○其椒目氣味苦寒，無毒。○治

水腫脹滿，利小便，十二種水氣，及腎虛，耳鳴，

勝躁急，止氣喘。

【用量】一。○——三。○服用。

【禁忌】畏身金花，防風，附子，雄黃。

【學說】李時珍曰：蜀椒，肉厚，皮皺。其子光黑，如人之

睡人，故謂之椒目；他椒子，雖光黑，亦不似之。

若土椒，則子無光彩矣。

【別稱】又名巴椒，漢椒，川椒，南椒，點椒。

蜀黍 (禾本科)

【學名】*Zea Mays* L.

【產地】多栽種於田園中。

【基本】為一年生草，莖實而有節，高約六七尺。葉大，而

為披針形，有平行脈。夏月開花，單性。其所結之

種子，可供食用。

【功效】其米氣味甘澀而溫，無毒。能溫中，澀腸胃，止霍

亂。黏者，與黍同功。○其根煮汁服之，利小便，止

嗜滿。○燒灰，酒服，治產難，有效。

【別稱】又名蜀稬，庶稬，庶粟，木稷，荻稬，高粱。

蜀漆

【基本】為芸香科，常山 (*Cinchona* Thunb.) 之葉，可

採取之，而為藥用。

【功效】為解熱藥，殺蟲藥，可用於麻拉里亞等。

其氣味辛平，有毒。治瘧疾，欬逆，寒熱，腸瘕，

堅痞；積聚，邪氣，蠱毒，鬼疰，療胸中邪結，鬼瘡，溫瘧，又能下氣，破血。

【用量】三。〇——五。〇服用。

【禁忌】惡貫衆。

蜀羊泉

(茄科)

【學名】*Solanum lyratum*, Thunb.

【產地】多生於原野之中。

【基本】為多年生蔓草，莖細長，有毛卷絡於他物之上。葉長卵形，基部有大缺刻。夏月葉腋抽出花莖，分蘗，開花，花小，白色。果實球形，有漿，赤色。可取之，而為藥用。

【功效】為驅毒藥。

其氣味苦而微寒，無毒。治禿疥，惡瘡，疥癩，癩蟲；癩齒，女子陰中內傷，皮間質積，小兒驚癇，能生毛髮，又可搗塗漆瘡。

【學說】李時珍曰：漆姑，有二種。蘇恭所說：是羊泉；陶隱居所說：是小草；蘇頌所說：老鴉眼睛草，乃龍葵也。又黃蜂作窠，啣漆姑草汁，為蒂，即此草也。【別稱】又名羊泉，羊脰，漆姑草。

蜂蜜 Mel.

【基本】為蜜蜂 (*Apis mellifica* Linn) 取自植物之花，而貯蓄於蜂巢中之糖質也。採之加溫，而壓搾製成，可為藥用。

【成分】含有葡萄糖 ($C_6H_{12}O_6 + H_2O$) 之結晶等。

【功效】為緩下藥，亦可用於安魏那，及咽喉加答兒之含嗽料。此外最多用於賦形藥，調味藥。

其氣味甘平，無毒。去心腹邪氣，諸驚癇，安五臟，補不足，益氣，和中，止痛，解毒，養脾氣，除心煩，飲食不下，止腸澼，肌痛，口瘡，牙齒疳，疔瘡，目膚赤障，殺諸種蟲，治卒心痛，赤白痢疾。

【用量】每有用五〇。〇為緩下劑，而服用之。

【製劑】1 精製蜂蜜 *Mel depuratum*

此即以蜂蜜一〇。〇，溜水二〇。〇，混和，加熱，至沸點，乘溫以絨布濾過製成，而供應用。

2 單醋蜜 *Oxymel simplex*

此即以藥用醋酸一。〇，精蜜四〇。〇，混和，加熱，濾過，使之製成。每附加於含嗽料，以其十分

之一含量，而用之；又有用爲清涼性矯味藥等。

3 薔薇蜜 *Nol rosatum*

此即以乾燥之薔薇花五·〇，稀酒精二五·〇，浸之，經過一日間，而濾過之，取其濾液，再混以精蜜四五·〇，甘油五·〇，蒸發製成，亦有有用爲合嗽料等。

蜆

【學名】*Corbicula leana Prime*

【產地】吾國沿海皆產之。

【基本】爲蚌蛤類 (*Tanellidranella*) 之一種。介殼心臟形，表面有刻紋，現種種之彩色。其肉可供食用。亦供藥用。

【成分】殼含有碳酸石灰，磷酸石灰之成分。

【功效】其肉氣味甘而寒冷，無毒。能治時氣，開胃，解毒，下濕，通氣，去暴熱，明耳目，利小便，下熱氣，腳氣，濕毒，解酒毒，止消渴。生靛浸水，洗痘瘰，無痕痕。其爛殼氣味鹹溫，無毒。止痢疾，治陰疔。燒灰飲服，治反胃，吐食，除心胸痰水，能化痰；止嘔，治吞酸，心痛。燒灰塗之，療一切濕

疥，與蚌粉同功。

【別稱】又名扁蝶。

蛺蝶

【學名】*Vanessa xanthonotus, Esp.*

【基本】此屬鱗翅類，體長形，具灰黃褐色之複眼，觸角呈棍棒狀，翅赤黃色，翅緣有角狀，或波狀之凸凹。前翅有大小七個黑紋，沿外緣而見有波狀之黑紋。其外側有藍褐等彩色；後翅接於前緣，有一個大黑紋。幼蟲名：刺蟲，體圓筒狀，灰黑，略帶綠色，有濃黑之背線，每體節生有枝之棘。幼蟲，五月頃，生於柳朴等，食害其葉，至五月下旬，及六月上旬成熟。以尾端倒懸樹枝，或屋角牆垣後，脫皮蛹化，數日後成蝶。

【功效】據云：能治小兒脫肛，可使其陰乾，研末，唾調半錢，塗手心，以瘥爲度。

【別稱】又名蠶蝶，蝴蝶。

蜈蚣

【學名】*Scoropendru*

【基本】爲節足動物，以扁平之環節合成，共有二十二節。

第一節，黃褐色，其餘各節，背面深藍色，腹面黃色。每節有脚一對，生口邊者變形成顴。脚鈞爪甚銳，端有小孔，內通毒腺，能注射毒汁，以爲防敵之具也。常棲於朽木內石垣間，或落葉之下，有取爲藥用者。

【功效】據云：其氣味辛溫，有毒。能除鬼疰，蠱毒，治溫瘧，去三蟲，療心腹寒熱，積聚，能墮胎，去惡血，治癰癤，小兒驚癇，風搖，疝風，口瘡，丹毒，禿疔，癩瘡，便毒，痔漏，蛇瘡，蛇瘻，蛇傷。

【禁忌】畏蜈蚣，蜘蛛，雞屎，桑皮，白鹽。

【別稱】又名蠱螭，蜈蚣，天龍。

萬年青

【學名】*Rhodod. japonica*, Koch.

【產地】生於暖地之山中，或栽培於庭園間。

【基本】爲多年生常綠草，無地上莖，葉自地下莖，叢生披針形，呈深綠色，長一二尺餘。春夏之間，自葉叢之中央，抽出花莖，長四五寸，開穗狀之細花，呈淡綠白色。果實球形，如豆大，冬季熟時，赤色，或黃色。亦可採取之，而供藥用。

【功效】據藥性考云：其味苦，微甘，解毒，清胃，降火；能止吐血，同紅棗七枚，劈開煎飲，用嫩葉，陰乾。其根療喉痺，能養心，葉短，尾圓者，佳良。

【學說】本草綱目載：又名：千年蓋，潤葉叢生，每枝獨無枝，梗葉頗青厚。夏則生蕊，如玉黍狀，開小花，叢綴蕊上。入冬則結子，紅色，性善，山上土人家，多植之。

落葵

(落葵科)

【學名】*Basella alba*, L.

【產地】多栽培於庭園之中。

【基本】爲一年生草，莖葉皆柔軟，葉卵形，互生。夏冬之際，開花，先白，後紅。花後結實，圓形，而小，呈深紫色。其葉及子，皆供藥用。

【功效】其葉氣味鹹寒而滑，無毒。能滑中，散熱，利大小腸。其子能悅澤人面，可作面脂；其法：取子，蒸過，烈日中暴乾，按去皮，取仁，細研，和白蜜塗面，而用之。

【學說】李時珍曰：落葵，三月種之，嫩苗可食。五月蔓延，其葉似杏葉，而肥厚，軟滑，作蔬，和肉皆宜。

【別稱】又名藤葵，藤菜，天葵，繁露，御菜，燕脂菜。

落花生

(豆科)

【學名】*Arachis hypogaea, L.*

【產地】多栽於陸田之間。

【基本】為一年生草，莖蔓延於地上；葉為偶數羽狀複葉，小葉四片。夏秋之間，開花，花小，黃色；花後子房入於地中，生長而結實，可採之，而供藥用。

【成分】含有 Acid Arachidic, $C_{20}H_{40}O_2$, Acid. Linnoic $C_{17}H_{34}O_2$, 脂肪油，蛋白質，炭水化物，纖維，灰分等。

【功效】為滋養強壯藥。

其氣味甘辛，無毒。能潤肺，舒脾，滑腸，下積。每取其油，而代橄欖油用之。

【學說】福青縣志：出外國，昔年無之，莖生園中，花謝時，其中心有絲，垂入地，結實，故名。一房可二三粒，炒食，味甚香美。

【別稱】又名長生菜。

落雁木

【基本】據云：為藤類之植物，四圍如刀削，莖纏於木上。

其葉似茶，無花，無實。又李珣云：按徐表南州記

云：落雁木，生南海山野中，莖生。四邊如刀削，

代州雁門亦有之，蜀中雅州亦有。

【功效】其莖葉氣味甘而平溫，無毒。治風痛，折傷，腳氣腫，腹滿脹，以粉木皮，同煮汁，洗之，立效。又治婦人陰疝，浮泡，以落木皮，同煮汁，洗之。對於產後血氣痛，並折傷內損諸疾，可煮汁服之。

萬音

(菊科)

【學名】*Tachusa Sativa, Benth.*

【產地】多栽培於庭園之中。

【基本】為一年，或越年生草，莖高三尺；葉由根生者，尖闊，山莖生者，為心臟形，皆無柄，抱莖。春暮開黃花，列為頭狀花序。其葉及子，皆可供藥用之。

【成分】含有菊糖等之成分。

【功效】其葉氣味苦冷，無毒。能利五臟，通經脈，開胸膈，利氣血，堅筋骨，去口氣，健齒牙，明耳目，通乳汁，通小便，殺蟲蛇毒。其子亦能下乳汁，通小便，治陰腫，痔漏，下血，損傷作痛。

【學說】李時珍曰：萬音，正月，二月下種，最宜肥地。葉

似白蒼，而尖，色稍青。折之，有白汁，黏手，四月抽莖，高三四尺，剝皮生食，味如胡瓜。

【別稱】又名萹菜，千金菜。

葡萄

(葡萄科)

【學名】*Vitis vinifera*, L.

【產地】多栽培於園圃，或庭院間，中國北方多有之。

【基本】為蔓生之落葉木本植物，有卷鬚，藉以攀登他物之上。葉掌狀分裂，嫩時，有毛；老則似平滑。夏初

葉腋抽花穗，簇生小花，色黃綠，為長圓錐花序。

至秋實熟，成為漿果，橢圓形，或圓形，約七八分

，多肉，外皮綠色，生紫暈，別為紫色，白色者。

可採取之，而供食用，亦供藥用。

【成分】含有葡萄糖 $C_6H_{12}O_6$ 及蔗糖之成分。

【功效】其質氣味甘平而澀，無毒。治筋骨濕痺，能益氣，

強志，逐水腫，利小便，調中，止淋，治時氣，痘

疔不出，食之，或研酒飲之，甚效。其根及藤葉氣

味相同，可煮濃汁，細飲，止嘔噦，及霍亂。凡惡

心，孕婦子上，銜心，飲之，即下，能安胎，治屢

脚肢腫疼痛，煎湯洗之；又飲其汁，利小便，通小

腸，消腹滿。

【學說】李時珍曰：葡萄折藤，壓之最易生。春月萌苞，生

葉頗似栝樓葉，而有五尖，生鬚延蔓，引數十丈。

三月開小花，成穗，黃白色，仍連着實，星編珠聚

。七八月熟，有紫白二色。

【別稱】又名蒲桃，草龍珠。

葛

(荳科)

【學名】*Pueraria Thunbergiana*, Benth.

【產地】多生於山野之各地。

【基本】為多年生草，莖細長蔓生，約二三丈，常纏繞於他

物之上。葉為複葉，闊大，有三小葉，互生。秋日

開花，紫赤色，花冠蝶形；結實成扁莢。其根外紫

，內白，可供藥用之。

【成分】含多量澱粉(即為藥用之葛粉)之成分。

【功效】為清涼解熱藥。

其根氣味甘辛而平，無毒。能去消渴，大熱，嘔吐

，諸痺，解諸毒，治傷寒，中風，頭痛，解肌，發

表，出汗，開腠理，療金瘡，止脇風痛；治天行上

氣，嘔逆，開胃，下食，解酒毒，去胸膈煩熱，發

狂，止血痢，通小便，排膿，破血，敷蛇蠱瘡毒，
箭傷，殺野葛，巴豆百藥毒。生者，墮胎；蒸食，
消酒毒；作粉，止渴，利大小便，解酒，去煩熱，
壓丹石，敷小兒熱疔。搗汁飲之，治小兒熱痞，
狗傷，並可敷之。其葛殼氣味甘平，無毒。治下痢
，用於十歲以上；又能解酒毒。其葛花氣味相同，
能消酒。其葉治金瘡，止血。其蔓治喉痺，燒研水
服，亦可消腫。

〔用量〕根用三。〇——六。〇服之。

〔學說〕李時珍曰：葛，有野生，有家種，其蔓延，常取治
，可作繡紵。其根外紫，內白，長者七八尺。其葉
有三尖，如楓葉，而長，面青，背淡。其花成穗，
累累相綴，紅紫色。其莢如小黃豆莢，亦有毛。其
子綠色，扁扁如鹽梅。

〔別稱〕又名鶴齊，鹿藿，黃斤。

葛花菜

〔基本〕據李時珍云：諸名山皆有之，惟太和山採取，乃葛
之精華也。秋霜浮空，如芝菌，涌生地上。其色赤
脆，蒼蠶類也。

〔功效〕其氣味苦甘，無毒。能醒酒，治酒積。
〔別稱〕又名葛乳。

葛上亭長

〔學名〕*Pycnantha gohanii* Max.

〔基本〕此屬於鞘翅類之異節類，頭部赤褐色，翅鞘黑色，
兩緣黃白色。最食害豆糧，產卵於地中，幼蟲索食
蠶斯皇之卵塊。其蟲可研為粉末，供藥用之。

〔成分〕含有 $C_{10}H_{12}O_4$ 之結晶體。

〔功效〕為發泡藥，及生毛藥。

其氣味辛而微溫，有毒。治蠱毒，鬼挂；破淋結，
積聚，能墮胎，通血閉。

〔製劑〕1 葛上亭長丁幾 *Tinctura Pycnantha gohanii*.

此即以葛上亭長蟲粗末三。〇，酒精三〇。〇，浸
製而成。間有一日一回。乃至三回，以其〇。〇五
——〇。二，用為內服。又有外用，為軟膏料，及
禿頭等之塗布料。

2 強發泡膏 *Unguentum vesicans Fortior*

此即以葛上亭長蟲末一〇。〇，和阿列布油九〇。
〇，溫浸於重湯煎上；再溶化黃蠟七〇。〇，的列

並帶油二〇。〇即成，亦爲劇烈之發泡藥。

3 弱發泡膏 *Unguentum vesicans nitrus*

此卽以強發泡膏減少爲上亭長蟲末五。〇，而製成之。對於神經性齒痛，眼炎等，如願持久時間，及作用緩徐者，可貼於耳後部，而用之。

〔禁忌〕畏巴豆，丹參，空青；惡膚青；甘草，豆花。

葫蘆

（葫蘆科）

〔學名〕*Laguraria vulgaris*, Des.

〔產地〕多栽培於庭園之間。

〔基本〕爲一年生蔓草，莖細長，以卷鬚絡於他物。葉圓心臟形，有柔毛。初夏開花，夕開，朝萎；至秋實熟，如棗，大小二圓球，乾者鬆之，爲玩。別有一種身長，而首尾爲一，亦是。又曰：俗罵蒲。

〔功效〕其瓠氣味甘平而滑，無毒。除消渴，惡瘡，鼻口中肉爛，利水道，消熱解毒，除煩燥，去心熱，利小腸，潤心肺，治五淋。其葉氣味甘平，無毒。爲茹，耐饑。其蔓鬚及花能解毒。去胎毒。其子治齒腫，或露齒搖痛，用八兩，同牛膝四兩，每服五錢，煎水含漱，一日三四次。

〔別稱〕又名壺盧，瓠瓜，匏瓜。

葱

（百合科）

〔學名〕*Allium fistulosum*, L.

〔產地〕多栽培於田園之間。

〔基本〕爲蔬類植物，葉中空成管，高二尺許，有平行脈，四時可食。葉之下部，色白，卽是。初夏開白花，爲繖形花序；莖葉如球。其莖白，可爲藥用。

〔功效〕其莖白氣味辛平，無毒，作湯用之，治傷寒，寒熱，中風，面目浮腫，骨肉碎痛，喉痺不通，除肝中邪氣，安中，利五臟，殺百藥毒。其根能治傷寒，頭痛，天行時疾，熱狂，霍亂轉筋，及奔豚，腳氣，心腹痛，目眩，止心迷悶，通關節，止衄血，利大小便，治下痢，下血，和裏，止血，除風溼，身痛，麻痺，蟲積，心痛，止大人陽脫，陰毒，腹痛，小兒盤腸內釣，婦人妊娠滑血，通乳汁，散乳癰，利耳鳴，塗樹犬傷，殺蝨蝎毒及一切魚肉毒。

〔禁忌〕忌地黃，常山。

〔學說〕李時珍曰：冬葱，卽蒔葱，或名大官葱。其莖柔細，而香，可以經冬，大官上供宜之，故有數名。漢

葱，一名：木葱，其莖粗硬，故有木名。冬葱，無子；漢葱，春末開花，成簇，青白色。其子味辛，色黑。

【別稱】又名乳，萊伯，和事草，鹿胎。

萱草

(百合科)

【學名】*Funeraria flava*, L.

【產地】多生於山野之間。

【基本】為多年生草，莖高二尺許；葉似菖蒲，而柔狹。夏

月莖梢，着以數花，花蓋六片，紅黃色。朝開，夕

萎，花稍類百合，有紅黃等色，及單瓣，重瓣之別

。花莖，及單瓣之花，曬乾，為蔬，俗稱金針菜。

其根及苗花，皆可供藥用之。

【功效】其苗花氣味甘涼，無毒。熟食之，能治小便赤澀，

身體煩熱，除酒疸，消宿食，利濕熱，通胸膈，安

五臟，健身，明目。其根治沙淋，下水氣。凡酒疸

，黃色遍身者，可搗汁服之。能解大熱，止衄血，

研汁一大盞，和生姜汁半盞，細呷之。又能吹乳，

治乳癰，腫痛，可搗酒服之，以滓封之。

【學說】李時珍曰：黃，宜下濕地，冬月叢生。葉如蒲葦，

背面柔弱，新陳相代，四時青翠。五月抽莖，開花，六出，四垂，朝開，暮萎，至秋深乃盡。其花有紅，黃，紫三色，結實三角，內有子，大如梧子，黑而光澤。其根與麥門冬相似，最易繁衍。

【別稱】又名療愁，丹棘，鹿葱，鹿劍，妓女，宜男。

蕭蓄

(蓼科)

【學名】*Polygonum aviculare*, L.

【產地】產於溫帶，多生於原野之路旁。

【基本】為一年生草，莖高尺許；葉為長橢圓形，質厚，綠色，略似竹葉，故亦名蕭竹。夏月葉腋開穗狀之小

花，為白色，先端呈紅色；結實為黑色，成小三角

形。其開花時，採集全草乾燥之，而為藥用。

【功效】為利尿，止瀉，驅蟲藥，對黃疸，腹痛，下痢，蛔

蟲等。皆可用之。

其氣味苦平，無毒。治浸淫，疥癩，疔痔，殺三蟲

，療女子陰蝕，煮汁飲之，治小兒蝨蟲；又治霍亂

吐瀉，黃疸，能利小便。

【用量】三。〇——八。〇。服用。

【學說】李時珍曰：其葉似落蒂葉，而不尖，弱莖，引蔓，

促節。三月間細紅花，如藜藍花，結細子。

【別稱】又名扁竹，扁瓣，扁豆，粉節草，道生草。

葶草

(蓼科)

【學名】*Polygonum orientale*, L. var. *pliosum* Niesan.

【產地】多生於水邊，及濕地。

【基本】為一年生草，莖高五六尺；葉長卵形，端尖，有長柄；莖葉密生淡紅色之毛。秋日莖頭，與梢頭開花

，紅色，成穗狀。其所結之實及其花，可供藥用。

【功效】其質氣味鹹而微寒，無毒。止消渴，去熱，明目，

益氣。其花能散血，消積，止痛。

【學說】李時珍曰：其莖粗，如拇指，有毛，其葉大如商陸

葉，色淡紅，成穗。秋深子成，扁如酸棗仁而小；

其色赤黑，而肉白。

【別稱】又名鴻鵠，龍古，游龍，石龍，天參，大參。

葶藶

(十字花科)

【學名】*Dianthus nemorosus*, L. var. *holoserotus*, Ledeb.

【產地】多生於原野之路旁。

【基本】為二年生草，高七八寸，莖葉皆有細毛。葉呈長卵

形，無柄，互生。春日開小花，微黃，結角子，扁

小，如黍粒，熟則裂開，有甜苦二種，選其甜者，為藥用之。

【功效】為利尿藥，用於水腫；又為祛痰藥，用於咳嗽，及呼吸困難，均能有效。

其實氣味辛寒，無毒。除癰瘰，積聚，結氣，飲食寒熱，破堅結，逐邪氣，通利水道，下膀胱水，除去留熱，皮間邪水，面目浮腫，身暴中風，熱癩瘡疹。療肺壅上氣，效嗽，止喘促，除胸中痰飲，能通月經。

【用量】一回一·五——三。○服用。

【禁忌】惡白蠶蠶，石龍芮。

【採製】取實，以糯米相合，置於灶上，微焙，待米熟，去米，搗用。

米，搗用。

【學說】名醫別錄曰：葶藶，生稿城平澤，及田野。立夏後，采實陰乾。蘇頌曰：今汴東，陝西，河北州郡皆有之；曹州者，尤佳，初春，生苗葉，高六七寸，似葶根，白色，枝莖俱青。三月間花，微黃，結角子，扁小，如黍粒，微長，黃色。

【別稱】又名丁藶，葶藶，大室，大適，狗養。

葎草

(桑科亦作葎麻科)

【學名】Humulus japonicus, S. et Z.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為多年生草，莖及葉柄有細刺向下；其莖纏繞於他物之上；葉為掌狀分裂，多細齒。秋開小花，雄花成簇；雌草成短穗，色黃綠，下垂。結實，狀似松毬。其根草，可供藥用。

【成分】含有揮發油，單寧，樹脂質等。

【功效】為苦味健胃藥。

其氣味苦寒，無毒。除瘀血，療五淋，利小便，治水痢，瘧疾，虛熱，消渴，可麥汁，或生搗汁，服之。又治傷寒，及其發汗後虛熱，膏淋，久痢，疥癬。能潤三焦，消五穀，益五臟，除九蟲，癰疽疫，又敷蛇蝎毒傷。

【用量】一。五——二。〇服用。

【學說】李時珍曰：二月生苗，莖有細刺；葉對節生，一葉五尖，微似蓖麻，而有細齒。八九月開細紫花，成簇，結子。狀如黃麻子。

【別稱】又名勒草，葛勒蔓，麥葎草。

菓耳

(菊科)

【學名】Xanthium strumarium, L.

【產地】多生於原野之間。

【基本】為一年生草，莖高四五尺，葉呈卵形，而尖，有缺刻，及鋸齒，互生。夏自梢上著花，帶綠色；花單性，雌雄同株；花後結實，長四五分，硬刺甚多。其實及莖葉，可供藥用。

【成分】含有揮發油等成分。

【功效】其實氣味甘溫，而有小毒。能治頭風，寒痛，風濕

，周痺，四肢拘攣，疼痛。除惡肉。去死肌，能益氣，補肝，明目，去一切風氣，填髓，暖腰脚，治癩癧，疥疥，及癢癩。炒香浸酒服之，去風，補益。其莖葉氣味苦平，微寒，而有小毒。除溪毒，治中風，傷寒，頭痛，大風，癩痢，頭風，濕痺，毒在骨髓，腰膝風毒，夏月采曝為末，水服一二匕；冬月酒服，或丸服，三三十九，一日三服。除諸毒螫，殺蟲疳，濕醫，益耳，明目，健身，強志。又療疔腫。狂犬咬毒。其花治白痢，頭瘰。

【用量】二。〇——五。〇服用。

「禁忌」忌猪肉，馬肉，米泔害人。

「採製」其莖炒熟，搗去刺用，或酒拌蒸過，用之。其莖葉

採取，去心，用黃精，以竹刀細切，拌之，蒸一日

後，取出，去黃精，陰乾，用之。

「學說」李時珍曰：按周憲王救荒本草云：蒼耳，葉青白；

類黏稠菜葉。秋間結實，比桑椹短小，有多刺。

「別稱」又名胡蔓，常思，蒼耳，卷耳，爵耳，猪耳，耳環

，造麥，施，羊負來，道人頭，進賢菜，喝起草，

野茄，繡絲草。

粱

(禾本科)

「學名」*Setaria italica*, var. *gortiniana*.

「產地」北方田園中，多栽培之。

「基本」為一年生草，莖高五六尺，外有明瞭之節。葉長，

而狹尖。六月之際，開花，結子，有青，白，黃各

色之不同，可供食料。

「功效」其黃粱米氣味甘平，無毒。能益氣，和中，止洩，

去客風，頑痺，止霍亂，下痢，利小便，除煩熱。

其白粱米氣味甘而微寒，無毒。能除熱，益氣，去

胸膈中客熱，除五臟邪氣，緩筋骨。凡患胃虛，並

嘔吐食物，及水者，以米泔二合，糞汁一合，和服

之，最佳。炊飯食之，能和中，止煩渴。其青粱米

氣味甘而微寒，無毒。治胃痺，熱中，消渴，止洩

痢，利小便，能益氣，補中，健脾，止洩精。

粳

(禾本科)

「學名」*Oryza sativa*, L.

「產地」多栽植於水田之中。

「基本」為一年生草，莖高三四尺，圓柱直立，而中空，有

節。葉狹長，有尖端，平行脈；葉柄包圍於葉外，

如鞘狀，互生。秋月之間，莖梢抽穗，而著花，花

小無萼，及花冠；果實為穎果。其米，謂之粳米；

其米泔，可取其第二次者，清而可用，故曰泔二泔

，亦供藥用。

「功效」其米氣味甘而平，無毒。能益氣，止煩，止渴，

止洩，溫中，和胃氣，長肌肉，補中，壯筋骨，益

腸胃。煮汁用之，又治心痛，去熱毒，下痢。和突

實作粥食之，能益精，強志，聰耳，明目，通血脈

，和五臟，好顏色。其泔二泔，又名：米泔，氣味

甘寒，無毒。清熱，止煩渴，利小便，涼血。其炒

米湯，能益胃，除溼。其殺奴，治走馬喉痺，可燒研，酒服。其禾稈能解砒毒，燒灰新汲水淋汁，溫清，冷服一椀，砒毒當下。

〔學說〕李時珍曰：粳，有水旱二稻，南方土下泥塗多，宜水稻。北方地平，惟澤土，宜旱稻。西南夷亦有燒山地，爲畚田，種旱稻者，謂之火米。

〔別稱〕又名稊。
貉

〔基本〕爲狸類 (Mustelidae) 之一種。據李時珍云：貉，生山野間，狀如狸，頭銳，鼻尖，斑色。其毛深厚，溫滑，可爲裘服，與獾同穴，而異處，日伏，夜出，捕食蟲物，出則獲隨之。其性好睡，人或著之，以竹叩醒，已而復寐，故人好睡者，謂之貉睡，俗作馮睡，謬矣。俚人又言：其非好睡，乃耳聾也，故見人，乃知趨走。

〔功效〕其氣味甘溫，無毒。補五臟虛勞，及女子虛德。

蔗糖香

〔基本〕據蘇恭云：蔗糖樹，似橘，煎枝葉爲香，似沙糖而黑，出交廣以南之晉安，近方多用之。李時珍云：

其花亦香，如茉莉花香氣。

〔功效〕其氣味苦而微溫，無毒。除風水毒腫，去惡氣，伏尸，治惡核，惡瘡。和胡桃，青皮，搗爛如泥，塗髮，令黑，如漆。

辟虺雷

〔產地〕自生於山野，吾國四川爲最多。

〔基本〕據蘇恭云：辟虺雷，狀如粗塊蒼朮，節中有眼。李時珍云：今川中峨眉鶴鳴諸山，皆有之。根狀如蒼朮，大者若拳。彼人以充方物，苗狀當俟訪問。

〔功效〕其根氣味苦而大寒，無毒。能解百毒，消痰，祛熱，治頭痛，辟瘴疫。又治咽喉痛痺，解虺蛇毒。

鉛

Pb

〔基本〕爲鉛礦之天然產，其種類甚多，通常帶有灰白色，其美麗光澤樣，質較柔軟。可以爪傷。在空氣中，氧化甚速；但僅於外面，不蝕及裏面。對於鹽酸等，作用極大。吾國昔時有取用爲藥者，據本草綱目載：凡用鉛者，須以鐵銹溶化，瀉瓦上，濾去渣脚，如此數次，收用。另有黑錫灰一種，則以鉛沙取黑灰，亦入藥用之。

「功效」其氣味甘寒，無毒。(鉛質，確有劇毒。)能鎮心，

安神，治傷寒，毒氣，反胃，嘔噦，蛇蝎咬傷，癩

瘡，瘰癧，鬼氣，疰忤。又錯爲末，和青木香，敷疔腫

，惡毒，消癰瘰，癰腫，明目，固牙，烏鬚髮，治

實女，殺蟲，除痰，治疔腫。消渴，風癩，金石藥

毒。其黑錫灰，除積聚，殺蟲，同檳榔末等分，五

更米湯服之。

「別稱」又名青金，黑錫，金公，水中金。

鉛丹 *Pb₃O₄*

「基本」爲養化鉛，與過養化鉛之混合物，呈美麗之赤色粉

末，可爲藥用之。

「成分」含有過酸化鉛 Pb_3O_4 之成分。

「功效」其氣味辛而微寒，無毒。治吐逆，反胃，瘡癩，癩

疾，除熱，下氣，止小便，除毒熱，療金瘡，血溢

，驚悸，狂走，消渴。煎羔用之，能止痛，生肌，

又能鎮心，安神，止吐血，咳嗽，敷燙火瘡。能除

痰，殺蟲，除忤惡，止痢，明目。

「製劑」一 錫鉛硬膏 *Empistrum fixum*

此即以鉛丹三·二，阿列布油六·四，黃蠟一·六

，混和而製成之，爲收斂性之軟膏。

「別稱」又名黃丹，丹粉，朱粉，鉛華。

鉛糖 *Pb₂O₃·Acetum*

「基本」爲養化鉛，溶解於醋酸中，而製成之，呈白色結晶

性之塊，或無色略有光澤之結晶，具有醋酸之臭味

，於水及酒精中，皆可溶解之。此爲最新之製劑，

可供藥用之。

「成分」含有醋酸鉛 $(C_2H_3O_2)_2Pb + 2H_2O$ 之結晶。

「功效」爲收斂藥，及乾燥藥。

可用於肺胃，以及膀胱等之出血，或於頑固之加答

兒性，或潰瘍性下痢，及氣管支黏液漏，肺結核之

咯痰過多，或盜汗等，多伍阿片拈氏散等，而服用

之。又對於諸黏膜腔之分泌過多等，亦可用之。又

於火傷，外傷，皮膚及鼠蹊腺之炎性，與疼痛性疾

病，爲糊帶料等，而外用之。

「用量」一日二三回，以〇·〇五——〇·一——〇·三服

用之；又以其百分之〇·二——〇·五——一·〇

之溶水漿，而外用之。

「別稱」又名醋酸鉛。

鉛霜 *Plumbum carbonicum*

〔基本〕為天然產於白鉛礦之一種，或於硝酸鉛溶液中，加碳酸鈣，亦可製成，為白色之粉末，以供藥用。

〔成分〕含有碳酸鉛 $\frac{1}{2}PbCO_3 + \frac{1}{2}Pb(OH)_2$ 之成分。

〔功效〕其氣味甘酸而冷，無毒。能消痰，止驚悸，解酒毒，去胸膈煩悶，中風痰實，止消渴，去腐熱，除涎塞，治吐逆，鎮驚，去怯。又能黑髮髮。

〔製劑〕1 鉛白軟膏 *Unguentum Cerussae*

此即以鉛霜三〇，華士林七〇，混和而製成，專供保護之目的。

2 鉛白樟腦軟膏 *Ung. Cerussae camphoratum*

此即以鉛白軟膏九〇五，精製樟腦〇〇五，混和而製成，其應用目的，亦相同。

〔別稱〕又名鉛白霜；新名炭酸鉛，鉛白。

鉤吻 (漆樹科)

〔學名〕*Thuja Toxicodendron*, L. var. *nudicaulis*, Miq.

〔產地〕多產於山地之間。

〔基本〕為落葉灌木，莖蔓延，細長，旁生氣根，如鬚狀，變綠於他木石之上。葉自三小葉而成，小葉卵形，

全邊，葉柄赤色，互生。至秋葉呈紅色；初夏葉腋着花，花小，黃綠色；果實之表面，有毛茸。可採取其莖，而供藥用。

〔成分〕含有護膜，黏液質等。

〔功效〕為引赤藥。

其氣味辛溫，而大有毒。治金疔，乳癰，中惡，風欬，逆上，水腫，殺鬼疰，蠱毒，破癰積，除腳膝痺痛，四肢拘攣，惡瘡，疥蟲，可搗汁，入膏中，不入湯飲。

〔禁忌〕惡黃芥。

〔學說〕李時珍曰：神農本草，鉤吻，一名：野葛，一句，已明草木狀；又名：胡蔓草，顯是藤生。

〔別稱〕又名野葛，毒根，胡蔓，斷腸草，黃藤，火把花。

鉤粟 (殼斗科)

〔學名〕*Quercus pauciflora*, Thunb.

〔產地〕多生於山野之曠地。

〔基本〕為常綠喬木，甚高；葉呈長圓形，邊有鋸齒。春夏開花，結實小而圓形，黑色，如雀子狀，可採取，而為藥用之。

「功效」其仁氣味甘平，無毒。食之不服，厚腸胃，令人肥健。

「學說」陳藏器曰：鈎粟，生江南山谷，木大數圍，冬月不凋。其子似栗，而圓小，又有雀子相似，而圓黑。

「別稱」又名異鈎子，甜櫟子。

鈎藤

(茜草科)

「學名」Uncaria hynodophylla, Miq.

「產地」生於暖地之山中。

「基本」爲常綠蔓草，莖細長，節間有刺，若鈎。葉卵形，有尖端，對生；葉腋有二曲鈎，藉以攀緣於他物之上。夏秋之際，梢頭開花，爲球形花序，呈黃褐色，其藤及鈎，皆供藥用。

「功效」爲鎮痛藥。

其氣味甘而微寒，無毒。治小兒寒熱，諸種驚癇，小兒驚啼，痲癩，熱瘡，客忤，胎風，男子頭旋，目眩，平肝風，除心熱，小兒鈎腹痛，發斑疹。

「用量」二〇——五〇服用。

「學說」李時珍曰：狀如薄荷藤，而有鈎，紫色。古方多用皮，後世多用鈎，取其力銳耳！

零陵香

(豆科)

「學名」Commersonia odorata, Aubl.

「產地」湖南零陵縣之濕地，產生最多，故名也。

「基本」爲多年生之一種香草，狀似菲蕪。其莖葉名曰：蕪；其根名曰：蕪，皆可採取之，而供藥用。

「功效」爲清涼藥，又可配伍芳香料。

其莖草氣味甘平，無毒。能明目，止淚，療洩精，去臭惡，治傷寒，頭痛，上氣，腰痛，鼻中息肉，鼻癰，心腹痛滿，下氣，風邪，衍心，虛勞，疔瘻。得升麻，細辛，煎飲，治牙齒腫痛。又治血氣腹脹，以莖葉煎，酒服。其蕪質氣味辛平，無毒。能明目，補中。其根莖中涕，能治傷寒，寒熱，盜汗，中風。又能除面腫，消渴，熱中，逐水，五痔，脫肛，有蟲。

「用量」六〇——一二〇服用。

「禁忌」忌火。

「學說」蘇頌曰：零陵香，今湖廣諸州，皆有之，多生下濕地。葉如麻，兩兩相對，莖方，常以七月中旬，開花，至香。古云蕪草，是也。

「別稱」又名薰草，蕙草，香草，燕草，黃零草。

零餘子

「基本」爲薯蕷 (*Dioscorea, J. Thunb.*) 所生之肉芽，卽零餘子。其芽多肉，表面有小凹處，與節眼，常供食用。

「功效」其氣味甘溫，無毒。能補虛損，強腰脚，益腎，食之不膩。

「學說」據陳澧器曰：零餘子，大者，如雞子；小者，如彈丸。在葉下生之，晒乾，功用強於薯蕷，薯蕷有數種，此其一也。

雷丸

「基本」爲竹根所生之菌，大小如栗，略似豬苓，而圓；皮黑，肉白，堅實，可入藥用之。

「功效」爲驅蟲藥。

其氣味甘寒，而有小毒。殺三蟲，逐毒氣，除胃熱，利丈夫，不利女子，作摩膏，除小兒百病，逐邪氣，惡風，除皮中熱，結積，蟲毒，蟲寸蟲，自出不止。久服，令人陰痿。又治癩癩，狂走。

「用量」三〇——一〇〇服用。

「禁忌」忌火，惡葯根。

「別稱」又名雷質，雷矢，竹苓。

雷墨

「基本」據李時珍云：按雷書云：凡雷書木石，謂木札，入

二三分，青黃色。或云：雄黃，青黛，丹砂合成，

以雷楔書之，或云：蓬萊山，石脂所書。雷州，每

雷雨大作，飛下如砂石，大者如塊，小者如指，堅

硬如石，黑色光豔，至重。劉向嶺表錄云：雷州，

驟雨後，入于野中，得石，形小而黑之石，謂之雷

公墨。扣之鏗然，光豔可愛。又李肇國史補云：雷

州，多雷，秋則伏蟄，狀如人，掘取食之，觀此則

雷果，神物矣。

「功效」據云：能治小兒驚癇，邪魔諸病；以桃符湯，磨服，卽安。

雉

「學名」*Phasianus versicolor* Vieill.

「基本」此屬雞類，雉羽毛美麗，尾長而尖，且有距，雌則否。多於山野，找食果實。其肉等，有用爲藥者。

「功效」其肉氣味酸而微寒，無毒。能補中，益氣。止洩痢

，除蟻蟻。其腦能塗凍疥。其嘴能治蟻癩。其尾燒灰，和麻油，敷天火，丹毒。其尿治久瘡。

【別稱】又名野雞。

雌黃

【學名】Opuntia

【產地】多產於黏土，或噴火山之附近。

【基本】此為三硫化砷 As_2S_3 素之一種，呈橙黃色之小板狀

結晶礫石，時或作粒狀，或鐘乳狀，有玻璃之光澤

，可為藥用。

【成分】含有砷素，及硫黃之成分。

【功效】為皮膚殺蟲藥，腐蝕藥。

其氣味辛平，有毒。治惡瘡，頭禿，疥疥，殺毒蟲，止身癢，除邪氣，消諸毒，蝕鼻內息肉，下部醫瘡，又治恍惚，去邪氣，除蜂蛇毒。冷痰，勞嗽，血氣，蟲積，心腹痛，頭痛，解毒。

【用量】一。〇——三。〇服用。

【禁忌】忌鐵，及火。

【採製】取石，於米醋中，入蘿蔔汁，煮乾，搗碎，以水飛過，用之。

【別稱】又名黃砒。

預知子

【基本】據馬志云：預知子，有皮殼；其實如皂莢子。蘇頌

云：舊不著；所出州土，今淮，蜀，黔，壁諸州，

皆有之，作蔓生，依大木上。葉綠，有三角，面深

，背淺。七八月有實作房，生青，熟者，四面皆深

紅色。每房有子五七枚，如皂莢子，斑褐色，光潤

，如飛蛾。今蜀人，極貴重之，云亦難得，采無時

。其根冬月采之，陰乾，治蠱；其功勝於子也。

【功效】其子仁氣味苦寒，無毒。能殺虫，療蠱，治諸毒，

去皮，研服，有效。又治一切風疾，補五勞七傷，

其功不可備述。治癆癖，氣塊，消宿食，止煩悶，

利小便，催生，中惡，失音，髮落，天行溫疾；塗

一切蝨虫蠶咬。其根氣味苦冷，無毒。能解蠱毒，

用石臼搗碎，每用三錢，溫水服之，即效。

【別稱】又名聖知子，聖先子，盞合子，仙沼子。
鳧

【學名】Anas boschas, L.

【產地】夏間多在北地產卵，秋來，春去。

【基本】爲膜陸禽類，雄之頭部，與頭部，爲淡紫色，而帶綠色；頸之後部，有白輪。雌爲褐色，不及雄美，尾羽較短，故不能急變方向。雄之尾羽，中央四枚，爲空羽。飛時，每作螺旋形；但亦可潛水遊行。人最喜獵，故多射捕，而食之。

【功效】其肉氣味甘涼，無毒。能補中，益氣，平胃，消食，除諸蟲，及身上諸種熱瘡；凡年久不愈者，但多食之，即癒。能治熱毒風，及惡瘡癩癬，又殺腹臟一切蟲疾。

【別稱】又名野鴨，野鶩，鴈，沈鹿。

麀

【基本】據李時珍云：麀居大山中，似鹿而小。牡者，有短角，鬃色，豹脚，脚矮而力勁，善跳越。其行草莽，但循一徑，皮極細膩，靴襪珍之。或云：亦好食蛇。符瑞志有狼麀，白色。今施州山中，出一種紅麀，紅色。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。治五痔，以薑醋並食之，大有效。其頭骨氣味辛平，無毒。燒灰飲服，能治飛尸。其皮能除濕氣，去脚痺，可作靴襪用之。

麀目

【基本】據李時珍云：鬼目，有草木二種，此乃木生者。其草鬼目，別見白英之下；又羊蹄菜，亦名：鬼目，並物異，名同。按劉欣期交州記云：鬼目，出交趾，九真，武平，與古諸處，樹高大，似棠梨；葉似楮，而皮白。二月生花，仍連着，子大者，如木瓜，小者，如梅李，而小斜，不周正。七八月熟，色黃，味酸，以蜜浸食之，佳美。

【功效】其氣味酸甘，微冷，無毒。多食，則發冷痰。

【別稱】又名鬼目。

鼠

【學名】Musorvegicus Pakl.

【基本】此屬啮齒類，體鼠灰色，腹部稍帶灰色，爲一種之保護色也，前肢四指，後肢五趾，尾長，超於軀幹，代手之用；又以保護之平均也。視聽兩覺甚銳，且口齶能觸知物之性質。一年三四回產子，生後，百日，即產子。昔時多選割其牡鼠之各臟器，而爲藥用之。

【功效】其牡鼠氣味甘而微溫，無毒。撥陸折，敲筋骨，可

生搗，敷之，三日一易。又與豬脂煎膏，治打撲折傷，凍瘡，燙傷，又煎油，治小兒驚癇，五、五、五日，同石灰搗取，敷金瘡，神效。更煎膏，治諸瘡癰，臘月搗之，辟惡血。其肉氣味甘熱，無毒。治小兒疳積，大腹，小兒疳疾，可炙食之。黃泥裹之，燒熟，去骨，取肉，和五味鼓汁，作羹，食之。又骨蒸，勞熱，四肢勞瘦，殺蟲，及小兒疳瘦，酒熬入藥。其脂治目暗，可以點目，又治青盲，雀目。滴耳，能治耳聾。其肝治筋脈不出，可搗塗之。聽耳聾，其腦用於針棘竹木，刺存肉中不出，持爛塗之，即出；又箭鏑針刃在咽喉，胸膈諸部者，同肝持塗之；又塗小兒解顛，以綿裹塞耳，治聾。其頭治癰疽，鼻鼈，燙傷。其脊骨治齒折，多年不生者，研末，日日搗之，甚効，其四足，及尾，能墮胎易出，燒服，催生。其皮燒灰，能合癰疽，口冷不合者，生剝，貼附骨疽，即能追膿。其氣味味甘而微寒，無毒。治小兒疳疾，大腹，葱豉同煎服，治時疾，勞復，痢疾，明目。蒸服，治傷寒勞復，發熱

，男子陰易，腹痛，通女子月經，下死胎。研末服之，療乳癰，解馬肝毒，塗鼠癰疽，燒灰存性，敷折傷，疔腫，諸瘡，貓犬傷。

【用量】黃用三、〇——六。〇服之。

【別稱】又名腰鼠，老鼠，首鼠，家鹿。

鼠李

(鼠李科)

【學名】*Rhamnus japonicus* Maxim. var. *Gumulus* Maxim.

【產地】生於山野之中。

【基本】爲落葉灌木，高至十尺餘，枝梢有針，葉倒卵形，或橢圓形，有鋸齒，對生。夏末開小花，淡黃綠色。其所結果實，爲漿果，球形，黑色，可採取之，而供藥用。

【成分】含有 *Rhamnocatharine* 之成分。

【功效】爲下藥。

其子氣味苦涼，微毒。能治寒熱，癰癤，膿疔，水腫，腹脹，下血，疝癰，痘疔黑陷，及疥癬有蟲。其皮氣味苦而微寒，無毒。治身皮熱毒，風痺，諸瘡，寒熱，口疳，齲齒，及疳蟲。

【用量】〇·三——一。〇服用。

【禁忌】忌鐵。

【學說】李時珍曰：生道路邊，其實附枝，如穗。人采其嫩者，取汁，刷染綠色。

【別稱】又名指李，鼠梓，山李子，牛李，皂李，趙李，牛

皂子，烏樣子，烏菓子，梓。

鼠婦

【學名】Porellis.

【基本】此屬節甲類之等脚類，體小形，二三分，呈灰白色

，觸角長，為食動植物之一種小蟲。

【成分】似含蟻酸等之成分。

【功效】為引赤藥。

其氣味酸溫，無毒。治氣癢，不得小便，婦人月閉，血癥，癩瘡，寒熱，利水道，能墮胎，治久癩，風蟲牙齒疼痛，小兒撮口，驚風，鵝口瘡，痘瘡倒

歷，解射工毒，蜘蛛毒，及軸疑入耳。

鼠尾草

【學名】*Salvia japonica*, Thunb. var. *bjpinata*, Fr. et Sav.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為多年生草，莖方形，高至二三尺許；葉為羽狀複

葉，小葉五片，乃至七片，對生。秋初開小花，花

冠唇形，呈淡紫色，為穗狀花序。其花可採取之，

而供藥用。

【功效】其花葉氣味苦而微寒，無毒。治鼠瘻，寒熱，下痢

，膿血不止。白花者，治白下；赤花者，治赤下。

又治瘧疾，水蠱。

【學說】陶弘景曰：田野甚多，人采，作滋，染皂。

【別稱】又名藟，山陵翹，烏草，水青。

第十四畫

嘉魚

【基本】據任豫益州記云：嘉魚，蜀郡處處有之，狀似鯉，

而鱗細，如鱗，肉肥而美，大者五六斤。食乳泉，

出兩穴，二三月隨水，出穴；八九月逆水，入穴。

又魏州志云：嘉魚，春社前出，秋社後歸。首有黑

點，長身，細鱗，肉白如玉，味頗鹹，食鹽泉，故

也。又范成大虞衡志云：嘉魚，狀如鱗，而多脂，

味極美。又劉恂嶺表錄云：蒼梧戎縣，江水日出，

嘉魚，似鱗而肥美，衆魚莫及，每炙食，以芭蕉隔

火，恐脂清火中也。

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。食之，令人肥健，悅澤。莖食之，能治腎虛，消渴，勞瘦，虛損。

【別稱】又名酥魚，抽魚，丙穴魚。

質芩答里斯

(玄參科)

【學名】*Digitalis purpurea* L.

【產地】產於歐羅巴之各地。

【基本】為越年生草，高至三四尺許，下部之葉，卵形，或廣披針形，有長葉柄；上部之葉，無柄，或有短葉柄。夏日自中央，抽出花軸，花大唇形；花冠白色，或紅紫色。其葉，當生花蕾之際，擇晴天採收，而陰乾之，以供藥用。

【成分】普時 Nalivolle 氏分析，含有 Digitalin, Digitalein

Digitin 其後據 Schmiedberg 氏之檢查，更分析為四種。如 (1) $C_{27}H_{44}O_{12}$ (2) $Digitalein$ (3) $Digitulin$ ($C_{27}H_{42}O_{12}$) × (4) $Digitoxin$ $C_{21}H_{33}O_7$ 之配糖體與結晶等。

【功效】為瓣膜疾病，(瓣口狹窄，及閉鎖不全。)不可缺少之藥品。於心臟脂肪變性，及其動作過度，或內服

發炎，血管攣縮，皆能奏效。凡代謝機能衰弱而起全身水腫之徵候，呈閉尿，及高度呼吸困難，食思缺乏，脈搏頻數不整；同時動脈容積，及緊張力減少者，用之能速而消退，故常為利尿藥。此外又於急性熱性病之脈搏頻數，體溫昇騰者，可為消滅，及解熱藥；因其能改良脈搏，使體溫略為下降；但有虛脫危險，故今多棄之，而不用矣。

【用量】其極量一回〇・二，一日一・〇，但多間歇服用，不可連續與之。通常多為浸劑，服用之，或以其製劑，而代用之。

【製劑】質芩答里斯越幾斯 *Ext. Digitalis*

此即以質芩答里斯葉六・〇，浸於酒精，及水各五〇・〇中，使之濕過蒸發而成稠厚褐色之越幾斯。其功效作用，與質芩答里斯葉相同，一回以〇・〇三——〇・一，一日極量，為一・〇，為丸劑，水劑，及軟膏等。

2 質芩答里斯丁幾 *Tinct. Digitalis*

此即以質芩答里斯葉一〇・〇，浸於稀酒精一〇〇〇，而製成之褐綠色液體。其主治應用相同，一

回用。〇。五——一。〇，一日極量，爲五。〇，服用之。

3 質麥答利斯醋 Aconium Digifalins

此即以質麥答利斯葉，及酒精各五。〇，藥用醋酸六。〇，水三六。〇，冷浸一週，而製成黃褐色之液體。功效亦同，一日數回，以〇。五——一。〇爲劑，合劑，一日極量，一〇。〇，但有配伍於海葱醋，以治水腫者；又有外用於癱瘓質斯，及腺腫等。

4 質麥答利斯軟膏 Unguentum Digitalis

此即以質麥答利斯越發斯一。〇，膠軟膏九。〇，混和而成，專貼於腺腫等。

慈石 Magnochain

〔產地〕爲吾國慈縣之特產，故名也。

〔基本〕爲慈鐵礦之天然產出品，呈粒狀或塊狀。其成結晶者，爲八面體，或斜方形十二面體，具有鐵樣黑色，不透明，而質脆堅硬，諸酸不能溶解之。

〔成分〕含有酸化亞酸化鐵 Fe_3O_4 等。

〔功效〕爲鐵質強壯藥。

其氣味辛寒，無毒。治周痺，風濕，肢節中痛，不可持物。又能除大熱，煩滿，及耳聾，養腎虛，強骨氣，益精，陰煩，通關節，消癰腫，鼠癩，頸核，喉痛，小兒驚癇，鍊水飲之，亦令人有子。補男子腎虛，風虛，身弱，腰中不利，加而用之。又治筋骨羸瘦，五勞七傷，去眼昏，除煩燥。凡小兒誤吞針鐵等，即研細末，以筋肉莫斷，與末同吞下之。又明目，聰耳，止金瘡出血。

〔用量〕〇。二——〇。八服用。

〔禁忌〕惡牡丹，葑草；畏黃石脂。

〔採製〕取石，須用火燒，醋淬，研末，水飛，或醋煮，經

三日夜後，而用之。

〔別稱〕又名玄石，處石，吸鐵石。

慈鳥

〔基本〕據李時珍云：鳥有四種，小而純黑，小嘴反哺者，慈鳥也。似慈鳥，而大嘴，腹下白不反哺者，鴉鳥也。似鴉鳥而大，白項者，燕鳥也。似鴉鳥而小，赤嘴，穴居者，山鳥也。山鳥一名：鷓，出西方；燕鳥一名：白雁，一名：鬼雀，一名：鷓鴣。

「功效」其肉氣味酸鹹而平，無毒。能補勞，補瘦，助氣，止咳嗽。凡骨蒸，羸弱者，和五味淹炙，食之，最為佳良。

「別稱」又名慈鴉，孝鳥，寒鴉。

慈姑

(澤瀉科)

「學名」*Sagittaria Sagittifolia*, L.

「產地」多生於水地，亦有栽培於水田中者。

「基本」為多年生草，高至三四尺許，盛夏自地下莖，抽出莖葉。其末端，各生球莖，至冬發育長一寸餘，或有更大者。葉呈戟形，或箭形，有肥大之長葉柄。其水中葉，與水上葉相異。秋日自葉間抽出花莖，花白色，三片，為圓錐花序。其花根可採取之，而為藥用之。

「功效」其根氣味苦而甘微，無毒。除百蟲，產後血悶，攻心欲死，產難，胞衣不出，可搗汁服之；又能下石淋。其葉治諸惡瘡腫，小兒遊瘤，丹毒，可搗爛塗之，即便消退，甚佳。又能治蛇蟲咬傷，搗爛封之。又調蚌粉，塗癩瘋。

「學說」蘇李時珍曰：慈姑，生淺水中，人亦種之。三月生

苗，青莖，中空。其外有稜，葉如燕尾，前尖，後歧。霜後葉枯，根乃練結，冬及春初掘以為果。

「別稱」又名藉姑，水萍，河烏菰，白地梨，苗名：剪刀草，箭搭草，撻了草，燕尾草。

熊

「學名」*Ursus mandchuricus Schinz var. japonicus Schleg.*

「基本」此屬食肉類熊科，全體黑色，行時用全體，喉下有白色部，名曰：月輪。熊膽為貴重之健胃藥，宜於夏時取之，為最上品，其他臟器，亦為藥用之。

「功效」其脂氣味甘而微寒，無毒。治風痺不仁，筋急，腹中積聚，寒熱，羸瘦，頭禿，面皯，強志，健身，止嘔吐，去風痰，補虛損，殺勞蟲，酒鍊服之。又長髮令黑，悅澤人面。其肉氣味甘平，無毒。治風痺，筋骨不仁，功與脂同。其掌食之，可禦風寒，益氣力。其膽氣味苦寒，無毒。能治天行時氣，熱盛，黃疸，暑月久痢，疳蠱，心痛，狂忤，諸疔疾，耳鼻瘡，殺蟲，又能治小兒驚癇，癩癧。能退熱，清心，平肝，明目。去翳，殺諸蠱蟲。其腦髓，治諸聾，療頭旋，摩頂，去白禿，風屑，生髮。其

血，治小兒客忤。其骨作湯，能治歷節風，及小兒客忤。

【禁忌】其脂：惡防已，地黃。

【別稱】其脂又名：熊白。

漆樹

(漆樹科)

【學名】*Tinus vernicifera*, De.

【產地】多栽於寒帶之各地。

【基本】爲落葉喬木，高三十尺許，葉羽狀複葉。其小葉甚

多，卵形，或橢圓形，而尖。夏日開小黃花，花瓣五片，爲圓錐花序。果實小，而扁圓，平滑，無毛。其樹皮以刀尖刺之，採取樹脂；其樹脂觸空氣，則酸化，而呈黑色，即爲乾漆。其他花葉及子，亦供藥用之。

【成分】漆之成分，爲漆酸；水分，護膜質，蛋白質等。

【功效】其葉能除五尸，勞疾，殺蟲，可暴乾，研末，酒服

一錢。其子能治下血。其花治小兒解顛，腹脹，交

脛不行，方中用之。其乾漆已另有專條備載，故不

再行贅述；其他功效，可參考乾漆條。

【學說】李時珍曰：漆樹，人多種之；春分前移栽，易成。

有刺，其身如柿；其葉如楮，以金州者爲佳。

【別稱】又名秦。

漏蘆

(菊科)

【學名】*Gnaphalium Chrysops* L.

【產地】吾國山東舊單州，產生爲最多，且爲最良。

【基本】爲多年生草，莖似菊，無刺；葉厚大者，長尺餘，

背白色。夏秋之交，葉間出花莖，開藍紫色小花，

攢簇成穗。其根可採取，而入藥用。

【功效】其根苗氣味鹹寒，無毒。治皮膚熱毒，惡瘡，疽痔，濕痺，能下乳，益氣，明目，止遺溺，熱氣，疥癩，通小腸，泄精，尿血。腸風，赤眼，小兒壯熱，扑損，積筋骨，乳癰，癰癤，金瘡，止血，排膿，補血，長肉，通經脈。

【用量】三〇——一〇〇服用。

【採製】取根細剉，以生甘草相對，拌蒸之，經一日後，揀出，晒乾，用之。

【學說】李時珍曰：按沈存中筆談云：今方家所用漏蘆，乃真飛廉也，飛廉一名：漏蘆。苗似苦艾，根如牛蒡，縮頭者是也，采時用根。

【別稱】又名野蘭，萊蕪，皂油麻。

漏藍子

【基本】據本草綱目，李時珍云：此乃附子瑣細未成者，小而漏藍，故名。南星之最小者，名虎掌，此物類之，故亦同名。

【功效】其氣味苦辛，有毒。治惡痢，冷痢，瀉痢，惡瘡，瘋風。

【別稱】又名木鼈子，虎掌。

榛

(華木科亦作莖莢科或斗殼科)

【學名】*Corylus heterophylla*, Fisch.

【產地】多產於山野之間。

【基本】爲落葉喬木，高六七尺，乃至三十尺；葉互生，呈圓心臟形，尖端，有齒。早春開花，單性，爲長穗狀花序。果實爲堅果，圓形，有殼斗以包被之，內含有種子。

【成分】含有脂肪油，蛋白質，澱粉，糖分等。

【功效】爲強健藥。

其仁氣味甘平，無毒。能益氣力，實腸胃，調中，開胃。

【學說】李時珍曰：榛樹，低小如荆，叢生。冬末開花，如

栗花，成條，下垂，長二三寸。二月生葉，如初生

櫻桃葉，多皺文，而有細葉，及尖。其實作色，三

五相黏。一苞，一實，實如櫟實，下壯，上銳，生

青，熟褐。其壳厚，而堅；其仁白，而圓大，如杏

仁；亦有皮尖，然多空者。

榧棹

(薔薇科)

【學名】*Cytisus villosus*, Pers.

【產地】多產於歐羅巴之南部各地。

【基本】爲落葉木本之植物，高七八尺許，枝多而叢生。葉互生，卵形，或橢圓形，下面有密毛。開花，大有寸半；花瓣白色，微帶淡紅；萼有毛，生於枝之頂端。果實爲漿果，圓形，外面有毛。多凸凹，大二寸餘。其木皮及實，可供藥用之。

【功效】其實氣味酸甘，微溫，無毒。能溫中，下氣，消食殺，止吞酸，去口臭，開胸膈，化食積，止消渴，除鬱悶，可於臨臥時，噉一兩枚，生熟皆宜。又治水瀉，腸虛，解煩熱，散酒毒，宜生食。其木皮可以搗末，敷疔。

「學說」李時珍曰：榿藤，蓋楨櫚之類，生於北土者，故其形狀，功用，皆相彷彿。

榿藤子

(豆科)

「學名」*Paracalix scandens*, L.

「基本」據陳藏器云：按廣州云：榿藤子，生廣南山林間，作藤着樹，如通草藤。其實三年方熟，角如弓袋，子若雞卵。其外紫黑色，其殼用貯丹藥，經年不壞。取其中仁，入藥炙用。李時珍云：子紫黑色，微光，大一二寸，圓而扁。人多剔去肉，作藥瓢，垂于懸間也。

「功效」其仁氣味澀甘而平，無毒。治五痔，蠱毒，飛尸，喉痺，以仁爲粉，微熬，水服一二匕。又和大豆，漂洗去訃。又治小兒脫肛，血痢，瀉血，並燒灰服之；或以一枚，割瓢，熬研，空腹，熱酒服二錢，不過三服，必效；並解諸藥毒。

「別稱」又名象豆，榿子，合子。

槐

(豆科)

「學名」*Sophora japonica*, L.

「產地」產於亞細亞之東部，多栽培於庭園之間。

「基本」爲落葉喬木，高二三丈，葉爲羽狀複葉。初夏開花，如蝶形，色黃白。實爲長莢，狀如連球，中有黑子。其根木花葉，皆入藥用之。

「功效」其實氣味苦寒，無毒。除五內邪氣，解風熱，止涎唾，補絕傷，去乳癥，治子臟急痛，能明目，益氣，療五痔，疔癰，大熱，難產，殺蟲，去風，合房陰乾，養飲，除熱淚，清頭腦，心胸開熱風，煩悶，風眩，男子女人陰疔，淫接，可以催生，疏導風熱，去齒臭，涼大腸，潤肝燥。其根花氣味苦平，無毒。治五痔，心痛，眼赤，除腹臟諸蟲，及皮膚風熱，腸風，瀉血，赤白痢，可炒研服之。又涼大腸，治喉痺，吐血，衄血，崩中，漏下。其葉氣味苦平，無毒。煎湯，治小兒驚癇，壯熱，疥癬，及疔腫。其皮葶味同，去邪氣，治產難，絕傷，及癩疹，牙齒諸風，可採嫩葉，食之。其枝洗疔，及陰囊下溼癢。八月斷大枝，候生嫩葉，蒸汁，釀酒，療大風，痿痺，甚效。炮熱，熨蠱毒。青枝燒煙，塗瘡，煨黑，揩牙，去蟲，煎湯，洗痔核。又燒灰，沐頭，長髮，治赤目，崩漏。其木皮及根白皮，

氣味苦平，無毒。治爛疔，喉痺，寒熱。灸汁淋之

，治陰囊墜腫，氣痛。灸漿淋汁，嗽口齒，風疖，

膿血。治中風，皮膚不仁。浴男子陰疝，卵腫。浸

洗五痔，一切惡疔，婦人產門癢痛，及燙火瘡。煎

膏，止痛，長肉，消癰腫。灸汁服之，治下血。

【用量】實用四。○——一二。○服之；花用二。○——六

。○服之。

【採製】取實去單子，並五子者，只取兩子，三子者，以銅

鏈，鏈破，以烏牛乳，浸一宿，蒸過，用之。取葉

，於未開時，採收，陳久者良，入藥炒用，染家以

水煮一沸，出之，其稠滓，為餅藥色，更鮮也。

【別稱】又名棧。

槐葦

(菌類)

【學名】*Hiraoxa Polyrhiza*, Fr. *Sahnoc*. (*Auricularia*, *Auri-*

olla-*Judas*, *Sahnoc*.)

【基本】為菌類之植物，每寄生於槐類之旁。可採取之，而

供藥用。

【功效】其氣味辛苦而平，無毒。能破血，去風，治心痛，

五痔，脫肛，便血，婦女陰痛。

榧 (松柏科亦作紫杉科)

【學名】*Torreya nucifera*, S. et Z.

【產地】生於山地，或栽培於庭園之間。

【基本】為常綠喬木，幹高數丈，略似杉葉，濃綠色，線針

形，扁平。春夏間開花，雌花，雄花異株。種子大

如棗核，兩端皆尖，長七八分，外部多脂，肉仁，

可食，亦供藥用。

【成分】含有多量植物之脂肪油等。

【功效】其質氣味甘平而澀，無毒。常食之，治五痔，去三

蟲，蠱蟲，鬼疰，惡毒。寸白蟲，消五穀，助筋骨

，行營衛，明目，強身。多食滑腸，故患五痔人，

宜食之。又治咳嗽，白濁，能助陽道。

【用量】子用四。○——一二。○服之。

【學說】李時珍曰：榧，生深山中，人呼為野杉。

【別稱】又名榧子，赤果，玉榧，王山果。

榧榧

(薔薇科)

【學名】*Cydonia sinensis*, Thoun.

【產地】多栽培於園圃之間。

【基本】為落葉喬木，高二三十尺許，樹皮每年剝脫，痕如

雲紋。莖呈卵形，而尖，互生，春末隨葉開花，生於枝頭端；花冠五瓣，紅色。果實橢圓形，尖頭凸凹不整，黃色，大如甜瓜，亦可採之，而供藥用。

【功效】其氣味酸平，無毒。能解酒，去痰，除惡心，止吞酸。煨食之，能止痢疾；又浸油梳頭，治髮白，髮赤；煮汁服之，治霍亂轉筋。

【學說】李時珍曰：椶櫚，乃木瓜之大，而黃色，無重蒂者也。檳子，乃木瓜之短小，而味醇澀者也。椶櫚，則檳類之生於北土者也。三物，與木瓜，皆是一類，各種，故其形狀，功用，不甚相遠；但木瓜得木之正氣，為可貴耳！

【別稱】又名盤櫚，瘡櫚，木李，木梨。

瑪瑙 *Agnate*

【基本】此自含矽酸之液，逐漸沉澱而生，故呈層狀，各層相重，恆為波折紋，赤色，及橙赤色者，稱：紅瑪瑙。白黑相間，或紅白相間者，稱：縞瑪瑙。多供裝飾品之用，如簪珠，鈕扣，文房具等類，但吾國亦有用為藥者。

【功效】其氣味辛寒，無毒。能避惡，熨目赤爛。凡目生障

翳，可為末，點眼。
【別稱】又名文石。摩羅迦蘇。

腐婢

(馬鞭草科)

【學名】*Pyrenna Microphylla* Turcz. (P. japonica, Max.)

【基本】據名醫別錄載：腐婢，生漢中，小豆花也。七月採之，陰乾四十日。陶弘景云：花，與實異用，故不同品，方家不用，未解何故？有腐婢之名，本經不言：是小豆花。

【功效】其氣味辛平，無毒。治痰癆，寒熱，邪氣，洩痢，陰痿，止消渴，去頭痛，可同腹汁，五味，煮藥食之。又能消酒毒，明耳目，下水氣，治小兒丹毒，熱核，散氣滿，不能食，煮一頓，服之。又治積熱，下血。

臘肭獸

【學名】*Arcti urhina* L.

【產地】產於白令海中。

【基本】此屬於食肉類之鱗足類，頭部圓形，口吻短，有數莖粗剛之觸鬚。耳殼形小，生向後方。體圓筒狀，向後方漸細。肢為棹形，前肢能步行，亦能游泳；

後肢游泳時，向後伸，可作槳用。其尾短小，存後肢之間。全體茶褐色，密生光澤之軟毛。可剖割其陰囊，辜丸，及睪之連着部，而供藥用，即為膠腦，俗稱：海狗腎也。

【功效】為強壯藥，有滋補之作用。

其氣味鹹而大熱，無毒。治鬼氣，尸疰，夢與鬼交，鬼魅，狐魅，心腹痛，中惡。邪氣，宿血結塊，瘰癧，羸瘦，男子宿癰，氣塊，積冷，勞氣，腎精衰損，多色成勞，瘦悴。能補中，益腎氣，暖腰膝，助陽氣，破癥結，療驚狂，癩疾，五勞七傷，陰痿，少力。腎虛，背膈勞悶，面黑，精冷，最良。

【別稱】又名骨豹，海狗。

蜚蠊

【學名】*Blattis trigronus* corp.

【基本】此屬雙翅類，體軀肥滿，頭寬，眼大，觸角大形。第三節有輪環，胸扁，腹由七節而成。雌者，以強銳口吻，刺食獸類之血，雄者，飛舞花間，吸食花粉，及花蜜，體灰色，胸背有三條之黃線；腹面有一條粗縱線。

【功效】其氣味苦而微寒，有毒。逐瘀血，破血積，腎積，癰癧，寒熱，通血脈，利九竅，治女子月水不通，積聚，除賊血，在胸腹五臟者，及喉痺結塞，又能破癥結，消積腫，墮胎。

【禁忌】惡麻黃。

【採製】捕蟲，入丸散，去翅，足，炒熟，用之。

蜚蠊

【學名】*Blattella germanica* Linn.

【基本】此屬直翅類，體軀褐色，腿節之內方，與腿節有多數之刺毛。頭部小，而觸角則呈鞭狀，頗長，後翅較前翅大，尾端有一對突起。步行極速，觸之則放惡臭。常往來廚房爐邊，以害食品。

【功效】其氣味鹹寒，有毒。能除癩血，癰堅，寒熱，積積聚，喉咽閉，內寒無子。又通利血脈，食之下氣。

【別稱】又名石莖，盧蜚，負盤，滑蟲，茶婆蟲，香娘子。

蜜香

【基本】據李時珍云：按魏王花木志云：木蜜，號千歲樹，根本甚大，伐之四五歲不腐者，為香。觀此，則陳

藏器所謂：生千歲，乃斫者，蓋誤說也。晉書云：

大康五年，大秦國，獻蜜香樹皮紙，微褐色，有紋，如魚子，極香，而堅韌。觀此數說，則蜜，亦沉香之類，故形狀功用，兩相彷彿。

【功效】其氣味辛溫，無毒。能去臭，除鬼，辟惡，驅邪。

【別稱】又名木蜜，沒香，多香木。

【學名】*Apis mellifica* L.

【基本】此屬膜質類之有劍類，多數集合，營社會生活。一社會有一匹雌蜂，即女王。若干雄蜂，多數職蜂。雌蜂，由受精之卵而生，以富於養分食物養之。體在三種中為最大，腹部細長。較頭部，與胸部之長，尤長；有曲刺，可產卵也。精子，貯於貯精囊中，得自由使其受精。新生雌雄蜂時，舊雌蜂，即與少數之職蜂，共營別巢，謂之分封。職蜂，由受精之卵而生，以不富於養分食物養之，腹部最短，生殖器不發達，具真刺，食道內有蜜蠟，脛節有花粉蓋，取蜜，與花粉，從事於養育事業。由後腹部下面之蜜節，分泌蜜蠟以作巢。後肢集蠟，移於前肢，嚼之，成糊狀物。雄蜂，由不受精之卵而生，

腹部短而大，無花粉蓋及刺，頭扁平，複眼大，交尾後死，或被職蜂嚼殺。其巢之實質，為木質；木皮，蜜蠟，樹脂等質。房室分大，即雌蜂室；中即，雄蜂貯蜜用室；小即職蜂室之三種。

【功效】其蜂子氣味甘平，微寒，無毒。去頭風，除蠱毒，補虛羸，傷中，能益氣，治心腹痛，面目黃疸，凡大人小兒腹中五蠱，從口吐者，可服用之。又治丹毒，風疹，腹內留熱，利大小便，澀去浮血，下乳汁，止帶下。

【禁忌】畏黃茶，芍藥，牡蠣，白朮。

【別稱】又名蠟蜂，蜜。

蜜蠟 *Cera flava*

【基本】此為蜜蜂 *Apis mellifica* Linn 之分泌物，採取蜂室後，煉過，濾入水中，候凝取之。其色黃者，俗名：黃蠟 (*Cera flava*) 煎煉極淨，色白者，為白蠟 (*Cera alba*) 非新則白，而久則黃也。皆可取之，以供藥用。

【成分】含有 Melivyalcohol $C_{30}H_{50}O_2$ 及派爾米輕酸 $C_{16}H_{32}O_2$ 與複性依的兒等。又含有 Acrid. Carotin.

$C_{21}H_{16}O_2$ 之黃色塊狀物。

【功效】爲賦形藥，及軟膏料等。

其氣味甘而微溫，無毒。蜜蠟，能治下痢，膿血，補中，續絕，外傷，金瘡，又益氣，強身。白蠟，療洩痢，裏急後重，能補絕傷，利小兒。凡孕婦胎動，下血不絕，可以雞子大煎三五沸，投美酒半升，服之，立瘥。又治白髮，燻去，消蠟點孔，卽生黑髮。

【禁忌】惡芫花，齊蛤。

蜜栗子

【基本】據李時珍云：蜜栗子，生川廣，江浙金坑中。狀如

蛇黃，而有刺，上有金線纏之，色紫褐，亦無名異之類也。

【功效】據本草綱目載：能治金瘡，折傷。

蜚蠊

【學名】*Geotrupes levinianus* Mots.

【基本】此屬金龜子科，體長六七分，呈橢圓形，複黑色。

吾國多捕貯之，以備藥用。

【功效】爲藥劑藥。

其氣味鹹寒，有毒。治小兒驚刺，痲癩，腹脹，寒熱，大人癩疾，狂陽，手足端寒，肢滿，賁脈。又可搗丸，塞下部，引痔蟲，出盡，永瘥。又治小兒疳蝕，能墮胎，除疰忤。又和乾薑，敷惡瘡。又燒末，和醋，敷蜂漏。能去大腸風熱，治大小便不通，下痢，赤白，脫肛，一切痔瘻，疔腫，附骨疽，瘡瘍，出血不止，鼻中息肉，小兒重舌。

【用量】○。五——二。○服用。

【禁忌】畏羊角，羊肉，石膏。

【採製】五月五日，採取，蒸滅之。臨用去尾，火炙，勿置水中，令人吐嘔。

【別稱】又名推丸，推車客，黑牛兒，鐵甲將軍。

蜻蛉

【學名】*Tibellidae*

【基本】此屬擬脈翅類，幼蟲，水棲，有長鉤之下唇，中央有關節，好捕食孑孓，及其他幼蟲，名水蠹。直腸內有氣管顯，直腸有如唧筒之動作，使水之出入，以行呼吸。又因其反動力，助其運動。成蟲，有大複眼，與三個單眼。腹部伸長，以雄之生殖門，存於

腹部前端。雌則在腹部後端，故交尾之狀，甚奇。翅透明，亦一種保護色也。翅大，且質輕而堅，腳短小，故飛行迅速，有時來水邊，而以尾端觸水面者，為產卵水中也。

【功效】其氣味微寒，無毒。能強陰，止精，壯陽道，暖水。

【別稱】又名蜻蛉，負勞，諸乘，紗羊，赤者名：赤卒。

蜥蜴

【學名】*Lacerta latimanus* Fall.

【基本】此屬蜥蜴類，雄體略小，背面黑色，且有青色線五

條。雌體大，背面呈茶褐色，有暗色二線條，鱗背

腹同形，覆瓦狀排列，每年二三四脫皮，尾易切斷

，捨體之一部，免身之受大害也。尾有再生力，捕

食蟲類，有益，無毒。

【功效】其氣味鹹寒，小毒。能破血，滑竅，利小便，治水

飲，去邪氣，下五淋，治癩結，水腫，五癆。

蜘蛛

Aranea thalonnata.

【基本】此屬蜘蛛類，雄蟲之體長，較短於雌蟲，呈褐黃色

，至微黑色，腹背具白點。頭胸連合，以肺呼吸，

且有顎一雙，足四雙，腹下無足。每依所居之屋角，及樹木，張網以捕蚊蠅等，而供其食料。

【功效】其蟲氣味微寒，而有小毒。治大人小兒瘡，及小兒大腹，蛇毒，濕癩，止腫逆，霍亂。又取汁塗蛇傷；燒咳，治小兒腹疝，口疳，脫肛，疔腫，胡臭，齒齲，瘡疾，疔腫。其乾殼治蟲牙，牙疳。其網據云：治喜忌，七月七日，取置衣領中，勿令人知。以糝糞，七日，消落有驗。又療疔毒，止金瘡出血。炒黃研末，酒服，治吐血。

【禁忌】畏蔓青，雄黃。

蜘蛛香

【基本】李時珍云：蜘蛛香，出蜀西，茂州，松潘山中，草

根也。黑色，有粗鬚，狀如蜘蛛，及稿本，莖竊，

氣味芳香。彼人亦重之，或云：貓喜食之。

【功效】其根氣味辛溫，無毒。能辟瘴疫，除中惡，邪精，

鬼氣，尸疰。

蓖麻

(大戟科)

【學名】*Ricinus communis* L.

【產地】多栽培於園圃之間。

【基本】為一年生草，莖高六七尺，中空；葉如竹葉，而較大，為掌狀深裂，有長柄。秋開單性花，為圓錐花序；雌花在上，色淡紅；雄花在下，色淡黃。質熟則裂開，子有白黑色斑，可以榨油，果實為裂果，大如指頭，種子橢圓形，而稍扁，可為藥用之。

【成分】含有 Oleum Ricini 及其 Acid Ricinol $C_{18}H_{34}O_2$ 之成分。

【功效】其子氣味甘辛而平，並有小毒。主治水癰，風虛，寒熱，身體瘡癩，浮腫，尸疰，惡氣，偏風不遂，口眼喎斜，失音，口噤，頭風，耳聾，舌脹，喉痺，駒疔，腳氣，毒腫，丹瘤，燙火傷，鍼刺入肉，女人胎衣不下，子腸挺出。通關竅，開經絡，能止諸痛，消腫，追膿，拔毒。其葉有毒，能治腳氣，風腫不仁，可蒸搗裹之，日二三易，即消。又止鼻衄，治痰喘，效驗。

【用量】子用六。○——一二。○服之。

【製劑】1. 蓖麻子油 Oleum Ricini

此即以蓖麻子製出之無色，或淡黃色稠流性之脂肪油。可為瀉下藥，其作用，對於刺戟腸管雖少，而

瀉下作用確實，故應用上最廣。無論若何症候，欲促腸管內物之充分排瀉者，皆適於內服之；故於消化不良之腸加答兒，及下痢等，用之無有不應。既於妊娠產婦等，亦無所忌之。又於外用瀉下，可為直腸之灌腸，亦為最效。其用量每回由一五。○，至於三〇。○，間有與以六〇。○者，多浮於水面，而顯服之；亦有為丸劑，蠟劑，糕劑等。外服以一五。○，乃至三〇。○，為灌腸料。

2. 彈力古魯胃護 Colloidium alantium

此即以蓖麻子油一。○，古魯胃護三〇。○，混和而製成之，為一種保護皮膚之外用藥。

【禁忌】據李時珍云：凡服蓖麻者，一生不得食炒豆，犯之必服死，其油能伏丹砂，粉霜。

【學說】李時珍曰：其莖有赤，有白，中空。葉大如紙葉，每葉凡五尖。夏秋間，極裏抽出花穗繁榮，黃色。每枝結實數十顆，上有刺，攢簇，如錫毛，而軟。

蒺藜

(繖形科)

【學名】Touocclanum graveolens, B. et H.

【產地】多栽培於園圃之間。

【基本】爲越年生草，高二三尺許，其形狀酷似薄荷。夏月開花，花瓣色黃，而內曲。其果實長圓柱形，爲綠黃色，有特異之香味，即小茴香，而供藥用之。

【成分】含有 Anethol $C_{10}H_{12}O$ 之茴香油等。

【功效】爲刺激性之神經藥。

其苦氣味辛溫，無毒。能下氣，利膈。其子氣味辛溫；無毒。治小兒氣脹，霍亂，嘔逆，腹冷，肋滿，能健脾，開胃，溫腸，殺魚肉毒，補水臟，治腎氣；壯筋骨，去腦氣，消食。

【用量】○＝五——二。○爲粉劑，浸劑等，服用之。

【製劑】1. 茴香油 Oleanum Foeniculi.

此即以薛蘿子壓搾而製出之揮發油也。其功用相同，但多配伍爲調味料。

【學說】蘇頌曰：今嶺南，及近道皆有之。三四月生苗，花實大類蛇床，而簇生。辛香，六七月採實。

【別稱】又名慈謀勒，小茴香。

荜

(百合科)

【學名】Allium Scodoprasum, L.

【產地】多栽培於園圃之中。

【基本】爲一年生草，高一尺許，地下有鱗莖；葉軟而長；花帶紫色，爲繖形花序。其莖，可供藥用。

【功效】與大蒜相同，可參考該條。

【別稱】又名小蒜，蒴蒜，菜菜。

蒴蒻

(天南星科)

【學名】Typhonium Klivioides, Blume.

【產地】多栽培於園圃之中。

【基本】爲多年生草，高二尺許，葉爲掌狀複葉，自羽狀之裂片，而成，葉柄長。夏間開單性花，肉質甚長，爲穗狀花序。其根，可供藥用。

【功效】其根氣味辛寒，有毒。能治瘰癧，風毒。

【學說】李時珍曰：蒴蒻，出蜀中，施州亦有之，呼爲鬼頭。

○園中人，亦種之。

【別稱】又名蒜頭，鬼芋，鬼頭。

蒴醬

(胡椒科)

【學名】Piper Bardo, L.

【基本】據李時珍云：蒴醬，今兩廣，嶺南，及川南諸州，皆有之。其苗，謂之蔓，葉叢生，依樹，根大如筋。彼人食極多者，以此菜，及蚌灰少許，同嚼食之。

，云辟瘴病，去胸中惡氣，故諺曰：柘柘浮留，可以忘憂。其花實，即莠子也。

【功效】其根葉及子氣味辛溫，無毒。能去下氣，溫中，破痰，止咳逆，上氣，心腹脹痛，胃弱虛瀉，霍亂吐逆，解酒毒，散結氣，又治心腹冷痛，消殺，解瘴瘡，去胸中惡邪，能溫脾，燥濕。

【採製】採後，以刀刮上粗皮。搗細，每五錢，用生薑自然汁五兩，拌之，蒸一日，曬乾，用之。

【別稱】又名莠子，土葦茨，苗名：扶惡士莠藤。

蒲黃 (香蒲科)

【基本】此為花蕊之粉末。其香蒲 (*Typha japonica*, Mir.) 之花軸，為褐色之圓柱形，恰如蠟燭，夏時開花之際採之，敲打花粉，乾燥之，即為稍黃褐色粉末之蒲黃，以供藥用。

【功效】為止血，利尿藥，對於子宮出血，腸出血，血尿，吐血，衄血，及小便不利，皆可服用。又可外用，撒布於溼疹，或口瘡等。

其氣味甘平，無毒。能活血，除瘀，利尿，止血。治衄血，吐血，便血，崩中，尿血。

【用量】一回一〇——二〇——八〇。服用。

蒲公英 (菊科)

【學名】*Taraxacum officinale*, Willd. var. *Chalcosense* Koch. 【產地】多生於山野之間。

【基本】為多年生草，莖高七八寸許，葉由根叢生，為羽狀分裂，有大鋸齒，向下。早春葉叢抽花莖，斷之有白汁，頂上開黃花，花冠有冠毛；果實為瘦果。其苗及葉，可採取之，而供藥用。

【成分】含有 *Taraxacin* 及苦味質，與謔謔，糖分，鈣，鈣，鹽類等。

【功效】為健胃藥，變質藥，利尿藥。

其氣味甘平，無毒。治婦人乳癰，水腫，可煮汁飲之，立消。又去食毒，散滯氣，化熱毒，消惡腫，結核，疔腫，又能搽牙，烏鬚髮，壯筋骨。其白汁，可塗惡瘡，即愈。

【用量】四〇——一二〇。服用。

【別稱】又名蔣薺草，金簪草，黃花地丁。

蒴藿 (忍冬科)

【學名】*Sambucus japonica*, Bl.

「產地」多生於山野之間。

「基本」為多年生草，類接骨木，莖高四五尺；葉對生，為

羽狀複葉，小葉大，廣披針形，有鋸齒。夏開小白花，嫩房花序；實如小粒形。其莖葉，皆可入藥。

「功效」其氣味酸溫，有毒。治風瘙，癢疹，身癢，濕痺，可作浴湯，而用之。

「學說」寇宗奭曰：薊，花白，子初青如綠豆類，每朵如盞，面大，又平生有一二百子，十月方熟，紅色。

「別稱」又名董草，薊，接骨草。

蒼朮

(菊科)

「學名」*Atractylis ovata*, Thunb.

「產地」多生於山野之中。

「基本」為多年生草，春間自舊根出芽苗，多被白色之軟毛

。至秋莖高二三尺，下部為木質；葉為單葉，橢圓形，亦有三裂，頗深，多自三五枚小葉而成。秋月

梢頭開花，白色，或淡紅色，為頭狀花序。其根肥大，多鬚，可採之，而供藥用。

「成分」根含有澱粉樣之菊糖，及芳香性之揮發油等。

「功效」為利尿藥，發汗藥，健胃藥，故用於小便困難，水

腫病，及慢性胃腸加答兒，與感冒等，均有效；並能興奮精神，制止頭痛藥。

其氣味辛溫，無毒。能發汗，燥濕，健胃，養脾，溫中，利尿，治胃寒，吐逆。

「用量」一回一〇——三〇服用。

蒼耳

(菊科)

「學名」*Xanthoxylum*, L.

「產地」多生於原野之間。

「基本」為一年生草，莖高四五尺，葉呈卵形，而尖，有缺刻，及鋸齒，互生。夏日梢上著花，帶綠色；花單性，雌雄同株；花後結實，長四五分，硬刺甚多。

其質及莖葉，可供藥用。

「功效」與蒼耳名異，物同。故其功效作用，無絲毫之別，可參考該條。

蒼耳蠹蟲

「基本」據李時珍云：蒼耳蠹蟲，生蒼耳梗中，狀如小蠶。

取之，但看梗有大蛀眼者，以刀截去兩頭。不蛀梗，多取，線縛，掛簷下。其蟲在內，經年不死，用

時取出。細者，以三條當一，用之。

【功效】據云：能治疔腫。燒存性，研末，油調塗之，卽效，或以麻油浸死，收貯，每用二三枚，搗敷，卽時毒散，大有神效。

【別稱】又名麻蟲。

蒿雀

【學名】*Tribleria persicata*, Temm.

【基本】此屬鳴禽類，體大如雀，頭部與背部，呈褐綠色，腹部青黃色。雌則於腹部有褐色之條紋。

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。食之，益陽道，補精髓。其膜能塗凍瘡，手足不裂。

蒺藜

(蒺藜科)

【學名】*Tribulus terrestris* L.

【產地】多生於海邊之砂地。

【基本】爲一年，或二年生草，莖平臥，葉爲偶數羽狀複葉。夏日開小花，五瓣，色黃；果實大約三四分許，有刺狀。一種白蒺藜，出於陝西之沙苑者，莢長寸許，子大如脂麻，謂之沙苑蒺藜，皆入藥用之。

【功效】其子氣味苦溫，無毒。除惡血，破癥結聚，喉痺，乳癰，身體風癢，頭痛，欬逆，傷肺，肺痿，止煩

，下氣，小兒頭疔，癰腫，陰癩，諸風癱瘓；痰吐，去燥熱；治奔豚，腎氣，肺氣，胸膈脹滿，能催生，墮胎，益精，療水瀉，冷小使，止遺瀉，泄精，瀉血，腫痛，痔漏，陰汗；婦人發乳，帶下，風秘，及蟻蟲，心腹痛。

白蒺藜：氣味甘溫，無毒。能補腎，治腰痛，泄精，虛損，勞乏。其花陰乾，研末，溫酒服二三錢，治白瘡風。其苗煮湯，洗疥癬，風疔，作瘡。

【用量】二〇——五〇服用。

【採製】取子揀淨，蒸之，經半日後，用乾木臼舂，令刺除盡，用酒拌，再蒸半日，乾用。

【學說】李時珍曰：此葉如初生皂莢葉，整齊，可愛。另有
一種刺者，狀如赤根菜子，有細菱三角四刺，內有仁。又有一種白者，結莢寸許，內子大如脂麻，狀如羊腎而帶綠色，今人謂之沙苑蒺藜，以此分別。

蒼草

(菊科)

【學名】*Achillea sibthorpi*, Ledeb.

【產地】多生於山野之中。

【基本】爲多年生草，高至二三尺，葉細長，爲羽狀分裂，互生。秋月莖頭着花，白色，或淡紅色，甚小，周圍花冠舌狀；中部花冠筒狀，爲頭狀花序。其實及葉，皆供藥用。

【成分】含有 Aethlerin 配糖體，及 Cineol，與 Chamaenolan 之成分。

【功效】爲強壯藥。

其實氣味苦酸而平，無毒。能益氣血，生肌膚，明目，聰慧。其葉能治瘧疾。

【用量】二・〇——六・〇——八・〇服用。

【學說】李時珍曰：蒼，乃蒿屬神草也。故易曰：蒼之德圓，而神天子。蒼長九尺，諸侯七尺，大夫五尺，士三尺。

蒴草

(莎草科)

【學名】*Carex macrocephala*, Willd.

【產地】多生於海邊之砂地。

【基本】爲一年生草，春夏抽莖，高約五六寸，頂上生一寸許之穗，密着黃褐之藥。可採取之，而爲藥用之。

【成分】含有蛋白質，澱粉，及灰分等。

【功效】爲強壯藥，及健胃藥。

其子氣味甘平，無毒。補虛羸，勞損，溫腸胃，止嘔逆，久食健身，強志。

【用量】三・〇——一〇・〇服用。

【別稱】又名自然穀，禹餘糧。

莎木麩

【基本】據李時珍云：莎字，韻書不載；惟孫愔唐韻，莎字註云：樹似檉榔，則字當作莎衣之莎。其葉離枝，如莎衣之狀，故謂之莎也。張勃吳錄地理志言：交趾，穰木皮中有白粉，如米粉，乾之搗末，以水淋過，似麩，可作餅食者，卽此木也。後人訛積，爲莎，音相近爾！

【功效】其麩氣味甘平而溫，無毒。補血，益氣，止虛冷，消食，溫中。久食亦能強健。

【別稱】又名穰木。

綠豆

(豆科)

【學名】*Phaseolus mungo*, L. var. *radiatus*, Bak.

【產地】人家菜園中，多種之。

【基本】爲一年生草，莖高尺餘，葉以三小葉而成，多毛。

秋開小花，黃色，為蝶形花冠；果實為莢，細長，無節，種子綠色，可取之，以供藥用。

〔成分〕含有多量之澱粉，糖分，及其他。

〔功效〕其氣味甘寒，無毒。煮食之，能消腫，下氣，壓熱，解毒。生研絞汁服之，治丹毒，煩熱，風疹，藥石發動，熱氣，奔豚，寒熱，熱中，又能止泄痢，利小便，去脹滿，厚腸胃；作枕，明目，治頭風，頭痛。又能補益元氣，調和五臟，安精神，行經脈，去浮風，潤皮膚；宜常食之，能止消渴，解一切藥毒，牛馬，金石諸毒，痘毒，消腫脹，止吐逆。其豆粉氣味甘涼，無毒。能解諸熱，益氣，除酒食諸毒，治發背，癰疽，疔腫，及燙火灼傷，痘瘡，浮爛不結痂者，可乾撲之。又治霍亂轉筋，能解諸藥毒。其豆皮氣味甘寒，無毒。解熱毒，退目翳。其豆莢治赤痢；經年不愈者，可蒸熟，隨意食之。其豆花解酒毒。其豆芽氣味甘平，無毒。亦能解酒毒，熱毒。其豆莢治霍亂，吐下，可絞汁，和醋少許，溫服。

〔學說〕李時珍曰：綠豆，處處種之。三四月下種，苗高尺

許，葉小而毛。至秋開小花，莢如赤豆莢，粒粗而色鮮者，為官綠，皮薄而粉多，粒小而色深者，為油綠。

綠青 Aurum.

〔基本〕據李時珍云：色綠，陰石也。生銅坑中，乃銅之祖氣也。銅得紫陽之氣，而生綠，綠久則成石，謂之石綠；而銅生于中，與空青，會青，同一根源也。

〔成分〕含有鹽基性醋酸銅，並稍有亞砷酸之毒物。

〔功效〕為驅蟲藥，可作皮膚病之塗布藥。

據云：能益氣，止洩痢，療鼠鼻，吐風痰，甚效。

〔別稱〕又名石綠，大綠。

綠鹽

〔基本〕據李時珍云：方家言：波斯綠鹽，色青，陰雨中乾而不濕者，為真。又造綠鹽法：用熟銅器，盛取漿水一升，投青鹽一兩在內，浸七日取出，即綠色，以物刮末，入漿水再浸一七，或二七取出，此非真綠鹽也。

〔功效〕其氣味鹹苦，辛平，無毒。治目赤，淚出，腐翳，眇暗，可以點眼，明目，消翳，療小兒無辜疳氣。

【別稱】又名鹽綠，石綠。

綠礬 *Green sulphate.*

【基本】為天然礦物，與黃鐵礦同產。或溶鐵屑於硫酸，於空氣中養化，得硫酸第一鐵。蒸發其水溶液，則生淡綠色之結晶，或成鐘乳顆粒狀，色綠，有微光。即為綠礬，可為藥用之。

【成分】含有含水硫酸鐵 Fe_2O_4 之成分。

【功效】為腐蝕藥，及止血藥。

其氣味酸涼，無毒。治疔疾，諸瘡，喉痺，蟲牙，口疳，惡瘡，疥癬。又燒灰服之，療腸風，瀉血。能消積滯，燥脾濕，化痰涎，除脹滿，黃露，利風。眼口齒諸病。

【別稱】又名皂礬，青礬，煨赤者名：綠礬，礬紅。

緞木 (石南科)

【學名】*Andromeda ovalifolia*, Wall. (*Tyrohia ovalifolia*, Don.)

(*Tieris ovalifolia*, D. Don.)

【產地】多生於山野之林木中。

【基本】為一種亞喬木，新枝，呈赤色；葉卵形，互生，裏面之脈上多毛茸。秋間新枝梢抽花軸，長二寸許，

下垂穗狀花，似筒狀，白色。其木材，可為藥用。

【功效】其氣味甘溫，無毒。治風血，羸瘦，補腰腳，益陽道，宜浸酒，飲之。

【學說】陳藏器曰：生林澤山谷，木文側戾，故曰緞木。

豬苓 (菊科)

【學名】*Stegochloa orientalis*, L.

【產地】山野中，多自生之。

【基本】為一年生草，莖方，高二三尺；葉有毛茸，而圓，端尖，對生。秋月枝梢開小黃花，有黏毛，可採取之，而入藥用。

【功效】其穉莖氣味苦寒，而有小毒。又曰：豬苓毋辛苦而平，無毒。豬苓能治熱蠱，煩滿，不食。生搗汁，服之，能催吐。豬苓毋能治金瘡，止痛，斷血，生肉，除諸惡瘡，消浮腫，可搗封之。又治久瘡，痰癭，搗汁，服之，取吐。又搗敷虎傷，狗咬，蜘蛛咬瘡。又能治肝腎風氣，四肢麻痺，骨痛，膝弱，風濕，諸瘡。

【用量】二〇——五〇服用。

【採製】採取嫩葉，用酒蒸九次，晒乾，用之。

〔學說〕蘇恭曰：豬裘，田野皆食之，一名：火杖，葉似酸漿，而較長；花黃白色。三月，四月采苗葉，暴乾

，又曰：豬膏母，生平澤下濕地，所在皆有。

〔別稱〕又名希仙，火杖草，豬膏母，狗膏，黏糊菜。

豪豬

〔學名〕*Typhrix rubrostrata Swinhoo.*

〔產地〕產於西南歐洲，及北亞非利加。

〔基本〕爲啮齒類之一種，體野兔大，尾短，體面生長大之棘，棘毛之變形物也，頗堅，平時令其伏於後方，遇敵則忽令聳立，以避免其難。棘中空，兩端尖，黑白相交，甚美，年年更脫。前肢具強大之四趾，後肢五趾，便於掘地，性溫和，多食植物質。

〔功效〕其肉氣味甘而大寒，有毒。能管利大腸。其肚及尿味寒，無毒。治水病，熱風，鼓脹，同燒存性，空心，溫酒，服二錢；又乾燒服之，治黃疸，連屎燒，研酒服之，治水腫，腳氣，奔豚。

〔別稱〕又名山豬，獾豬，豨豬。

狸

〔基本〕爲狸類 (*Mustelidae*) 據李時珍云：狸有數種，大小

如狐，毛雜黃色，有斑，如貓，而圓頭，大尾者，爲貓狸，善竊雞鴨；其氣臭，肉不可食。有斑如狸虎，而尖頭，方口者，爲虎狸，善食蟲鼠，果實；其肉不臭，可食。似虎狸，而尾有黑錢白文相間者，爲九節狸，皮可供裘領。宋史安陸州，貢野狸，花貓，卽此二種也。有文如豹，而作麝香氣者，爲香狸，卽靈貓也。南方有白面，而尾似牛者，爲牛尾狸，亦曰玉面狸；專上樹木，食百果；冬月極肥，人多積爲珍品，大能醒酒。張揖廣雅云：玉面狸，人捕蓄之，鼠皆帖伏，不敢出也。一種似貓狸，而絕小，黃斑色，居澤中，食蟲鼠，及草根者，名豹。又登州島上，有海狸，狸頭，而魚尾也。

〔功效〕其肉氣味甘平，無毒。治諸疰，溫鬼，毒氣，皮中如鍼刺，痔疾，及鼠蟻。又能補中，益氣，去遊風。其膏能治鬣鼠咬人成瘡，用此摩之，並食狸肉。其肝治鬼瘧。其陰莖治女人月水不通，男子陰癩，燒灰，東流水服。其骨氣味甘溫，無毒。治風疰，尸疰，鬼疰，毒氣，在皮中，淫濕如鍼刺，苦心腹痛，走無常處，鼠瘻，惡瘡，燒灰，酒服，治一切

遊風。又炒末，治噎不通飲食。燒灰，水服，治食野鳥肉中毒。其頭骨炙研，或燒灰，酒服二錢，治尸注，邪氣，腹痛，及痔瘻，十服後，見驗；又能殺蟲，治疳，瘰癧。其屎燒灰，水服，治鬼瘧。

【別稱】又名野貓。

遠志

(遠志科)

【學名】*Polypodium japonicum* Houtt.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為常綠草，莖高七八寸，甚細，葉長卵形，或橢圓形。夏開蝶形花，色紫，花後結實，扁圓形，大二三分。其根可採取之，而供藥用。

【成分】含有酒愛咖(Sanguin)之配糖體，及皂素(Saponin)並樹脂等之物質。

【功效】為祛痰藥，可用於氣管枝加答兒，及喘息等。

其根辛苦而溫，無毒。治欬逆，傷中，補不足，除邪氣，利九竅，益智慧，聰明耳目，安心氣，止驚悸，益精，去心下膈氣，皮膚中熱，面目黃疸，殺天雄，附子，烏頭毒，可煎汁飲之。又能治健忘，安魂魄，壯陽道，長肌肉，助筋骨，婦人血噤，失

音，小兒客忤，腎積奔豚，及一切癰疽。其葉，能益精，補陰氣，止虛損，夢洩。

【用量】一。〇——二。〇服用。

【禁忌】忌鐵；畏真珠，葶藶。

【採製】取根須去心，否則，令人煩悶，用甘草湯浸一宿，暴乾，或焙乾，用之。

【學說】李時珍曰：遠志，有大小葉二種。陶弘景所說者，

小葉也；馬志所說者，大葉也；大葉者，花紅。

【別稱】苗名：小草，細草，棘菀，葶藶。

酸棗

(鼠李科)

【學名】*Zizyphus vulgaris*, Lam. var. *Spinosus*, Bge.

【產地】多生於山野中，今陝西臨潼所產者，亦不少。

【基本】為落葉亞喬木，乃叢之變種，幹高丈餘，有刺針；葉長卵形，有三大脈。花小而黃綠，實圓，形小，熟則紅紫，味酸可食，其仁可採之，而供藥用。

【功效】為鎮靜藥，又為滋養，健胃藥。

其氣味酸平，無毒。去心腹寒熱，邪結氣聚，四肢酸痛，濕痺。又能安五臟，強身神。止久洩，虛汗，煩渴。又補中，益肝氣，堅筋骨，助陰，肥健，

療筋骨風疾，炒仁，研湯，服之。

【用量】四·〇——六·〇——一二·〇服用。

【禁忌】惡防己。

【採製】取仁，用其葉拌蒸半日，去皮尖，用之。

【別稱】又名山棗。

酸模

(藜科)

【學名】*Rumex acetosa*, L.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為多年生草，高二尺許，莖葉常帶赤色；葉為長卵

形，而尖基部囊莖。夏月開花，花小，而淡紅色。

其根莖，可採取之，而為藥用。

【成分】含有鞣酸鹽類，及 Glynnic 酸，與單寧酸等。

【功效】為驅蟲藥，可用於惡疔，疥癬等。

其氣味酸寒，無毒。能除暴熱，腹脹，生搗汁服之

，治下痢，殺皮膚小蟲，療疥癬。又能去汗斑，同

紫洋，搗擦數日，即消。

【用量】一·五——四·五服用。

【學說】李時珍曰：平地亦有，根葉花形，並同羊蹄，但葉

小，味酸，為異。其根，赤黃色。

【別稱】又名山羊蹄，山大黃，酸母，當藥。

酸漿

(茄科)

【學名】*Physalis Alkekengi*, L.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為多年生草，高二三尺，葉為卵形，端尖。秋月開

花，白色，為合瓣花冠；花後其萼增大，包肉質之

果實，熟則萼實皆紅。其根莖花實，皆入藥用之。

【功效】其苗葉莖根氣味苦寒，無毒。能解熱，去煩滿，安

志，益氣，利水道。又搗汁服之，治黃病，多效。

其子氣味酸平，無毒。與其苗葉等，功效相同。食

之，除熱，治黃病，尤益小兒。又治骨蒸，勞熱，

尸疰，疔瘦，痰癖，熱結。

【學說】名醫別錄曰：酸漿，生荆楚川澤，及人家田園中，

五月采，陰乾。

【別稱】又名醋漿，苦葳，苦耽，燈籠草，皮弁草，天泡草

，王母珠，洛神珠，小者名：苦蕒。

銀

Argentum

【基本】為化學 (Ag) 原質之一，多產於銀礦石中；但亦有

混於其他金屬中者。其天然單體，呈塊狀，白色，

有美麗之光泽，富於延展性，能導熱及電，多製爲貨幣及裝飾品；昔時亦有用爲藥者。

【功效】據云：其銀屑氣味辛平，有毒。能安五臟，定心神，止驚悸，除邪氣。治小兒驚癇，小兒癩疾，狂走；又被冷，除風。其銀薄，堅膏，鎮心，明目，去風熱，癩癩，入丸散用。其生銀氣味辛寒，无毒。能止熱狂，驚悸，發癩，恍惚，夜臥不安，譫語，邪氣，鬼祟；服之，明目，鎮心，安神，定志，治小兒諸熱，丹毒，並以水磨服之，功勝紫雪。又小兒中惡，熱毒，煩悶，亦可水磨，服之。又煮水，入葱白，粳米，作粥，食之，治胎動不安，漏血。其銀屑氣味辛而大寒，有毒。治熱風，心虛，驚悸，恍惚，狂走，脛上熱風，頭面熱風，衝心上下；亦能安神，定志，鎮心，明目，利水道，去心風，健忘，亦補牙齒缺落。

【別稱】又名白金。

銀杏

（松柏科亦作公孫樹科）

【學名】*Ginkgo biloba*, L.

【產地】屬字及庭園間，多栽之

【基本】爲落葉喬木，幹端直挺，高約五六丈；葉爲扇面式，秋深則黃落。其果核，俗稱：白果，爲球形肉質，內有仁，即種子，有二稜，或三稜，色白，堅硬，核內有仁，亦爲白色，可供食用，亦供藥用。

【成分】含有蛋白質，脂肪油，炭水化合物，纖維，灰分，及其他多量之有機酸性鹽基，亞爾基寧。

【功效】爲祛痰鎮咳藥，及解毒藥。

其核仁氣味甘苦，平澀，無毒。熟食，益人，益氣溫肺，定喘嗽，縮小便，止白濁。生食，降痰，消毒，殺蟲。又能噴漿，塗鼻面，手足，去面黴，崩裂；療疥癬，疔瘰，陰蝨。

【用量】一。〇——六。〇服用。

【學說】李時珍曰：銀杏，生江南，以宣城者，爲勝。樹高二三丈，葉薄經理，儼如鴨掌形，有刻缺；面綠背淡。二月開花簇，青白色，二更開花，隨即卸落，人罕見之，一枝結子百十，狀如棗子，經霜乃熟。

【別稱】又名白果，鴨腳子。

銀硃

Erythargyrum sulfuratum Rubrum.

【基本】爲硫黃，及水銀製造而成，呈赤色結晶性之粉末，

可為藥用之。

【成分】含硫化汞 S_2Hg 之成分。

【功效】其氣味辛溫。有無。能破積滯，切痰涎，散結胸，療疥癬，惡瘡，殺蟲，及虱，功同粉霜。

【別稱】又名猩紅，紫粉霜。

銅綠
Crispanum

【基本】為銅含炭氣之潮濕，即腐蝕變為綠色之炭酸銅，可為藥用之。

【成分】含有炭酸銅 $\text{CO}_2\text{Cu}(\text{HO})_2\text{Cu}$ 之成分。

【功效】其氣味酸平，微毒。治婦人血氣心痛，能合金瘡，止血，明目，去膚赤，息肉；又治風眼，爛眼，淚出，粟瘡，疔瘡；又能吐風痰，殺蟲。

【別稱】又名銅青。

韶子

【基本】據李時珍云：按范成大廣衍志云：廣南有山韶子，夏熟，色紅，肉如荔枝。又有藤韶子，秋熟，大如堯卵，姊也。

【功效】其質氣味甘溫，無毒。治暴痢，暴瀉，心腹冷氣，及寒瘡；又能暖胃，溫腸。

飴糖
Maltose

【基本】據韓保昇曰：飴，即軟糖，北人謂之饴，糯米，粳米，秫米，蜀米，蜀米，大麻子，枳椇子，黃精，白糖，並堪熬造，惟以糯米作者，入藥，粟米者，次之，餘但可食耳！李時珍曰：飴饴，用麥蘗，或穀芽，同諸米熬煎而成。古人寒食，多食饴，故醫方，亦取用之。

【成分】含有麥芽糖，糊精，及蛋白質，脂肪，鹽質等。

【功效】其氣味甘而大溫，無毒。能補虛冷，益氣力，止腸鳴，咽痛，去唾血，消痰，潤肺，止嗽，健脾胃，補中。治吐血，打損，瘀血，熬焦酒服，能下惡血；又能健脾，和胃。

【別稱】又名饴。

鴈鳩

【學名】*Quailus semorus* L.

【基本】此屬鵪鶉類，與杜鵑類似；惟鳥體較大，存於胸腹部之黑色橫紋較細，僅晝間飛行，及鳴聲，與杜鵑異耳！

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。能安神，定志，令人少睡。

其脚評骨據云：令人夫妻相愛，五月五日收帶之，各一，男左，女右。若置水中，自能相隨也。

【別稱】又名布穀，鵲鶴，護殺，郭公。

鳳仙花

(鳳仙花科)

【學名】*Impatiens Balsamina* L.

【產地】原產於東印度，近來園圃中皆栽之。

【基本】為一年生草，莖粗，高尺餘，葉如箭鏃，有鋸齒。

夏日開花，於葉腋有紅白等色。實橢圓稍尖，熟則自裂，女子多取花，染指甲，又名：金風花。其花及子。皆供藥用之。

【功效】其子氣味微苦而溫，並有小毒。治產難，積塊，噎膈，下骨哽，透骨，通竅。其花氣味甘滑而溫，無毒。治蛇傷，可搗酒服，即解；又治腰脇引痛，不可忍者，做餅晒乾，為末，空心酒服三錢。其根葉氣味甘苦而辛，並有小毒。治鷄魚骨哽，誤吞銅鐵，枕扑腫痛，散血，通經，軟堅，透骨。

【學說】李時珍曰：鳳仙，人家多種之，極易生。二月下子，五月可再種，苗高二三尺，莖有紅白二色。其大如照，中空，而脆，葉長而尖，似桃柳葉，而有鋸

齒；極間開花，或黃，或白，或紅，或紫，或碧，或雜色。

【別稱】又名急性子，旱珍珠，金風花，小桃紅，夾竹桃，染指甲草，菊婢。

鳶尾

(鳶尾科)

【學名】*Iris tectorum*, Maxim.

【產地】多栽培於庭園之中。

【基本】為多年生草，高至一二尺，葉劍狀，淡綠色，互生。初夏之際，花軸自葉間生出，花大，淡青紫色。可採收之，而供藥用。

【功效】其氣味苦平，無毒。能除蠱毒，邪氣，鬼疰，諸毒，破癰癩，積聚，去水，下蟲，殺鬼魅，療頭眩。【學說】李時珍曰：此即射干之苗，非別一種也。肥地者，莖長，根粗，瘠地者，莖短，根瘦。其花，自有數色。

【別稱】又名烏園；根名：蒼頭。

第十五畫

劉寄奴草

(菊科)

【學名】*Saniclo palmatus*, Pall.

〔產地〕多生於山地之間。

〔基本〕為多年生草，莖高三四尺，葉呈羽狀深裂，有五六片，尖銳，有鋸齒。秋間開花，黃色，為頭狀花序。子細長，亦入藥用之。宋高祖劉裕，小字寄奴，首得此草，敷金瘡有效，故名。

〔功效〕其子氣味苦溫，無毒。能破血、下血，治下痢，下血、疼痛，產後餘疾；又止血瘡出血，極效；又去心腹痛，下氣，水脹，血氣，通婦人經脈，除癥結，止霍亂，水瀉，小兒尿血。

〔用量〕四、〇——二、〇服用。

〔採製〕凡採得去莖葉，只用實，以布拭去薄殼，令淨，拌酒，蒸半日，暴乾用之。

〔學說〕蘇恭曰：劉寄奴草，生江南，莖似艾蒿，長三四尺許；葉似山園草，而尖長。一莖直上，有穗，葉互生。其子似稗，而細。

摩廚子

〔基本〕據陳嘉器云：摩廚子，生西域，及南海，並斯調園，如爪，可為茹。其汁香美，如中國用油。陳祈暢

異物志贊云：木有摩廚，生自斯調，厥汁，肥潤，

其澤如膏，馨香馥郁，可以煎熬。彼州之人，以為

嘉穀。

〔功效〕其氣味甘平，無毒。能益氣、潤五臟，安神，養血，久服強健。

榭

(殼斗科亦作柔荑科)

〔學名〕*Quercus dumata* Thunb.

〔產地〕產於山野間，為甚多。

〔基本〕為落葉喬木，高至三十尺餘，葉長卵形，大約四五寸，緣邊，有波狀之鋸齒，下面有褐色之毛，互生，葉柄甚短。春間開花，花單性，常下垂，為穗狀花序。果實為堅果，圓形，大如拇指，有椗狀之殼斗，其仁及木皮，可供藥用。

〔成分〕含有百分之四至十的鞣酸，澱粉，砂糖，脂肪等。

〔功效〕為收斂藥，每以內服其煎劑，而代單寧酸；外用以收斂之目的，為含嗽，罌劑，及浴湯。

其仁氣味苦澀而平，無毒。蒸煮作粉，澀腸，止痢。其櫟若氣味甘苦而平，無毒。能療痔，止血，及血痢，止渴，活血，利小便。其木皮氣味苦澀，無

毒。煎服殺蟲，治漏，甚效；又煎湯，洗惡瘡，療癩；又澀五臟，止赤白痢，腸風，下血。

【用量】三。○——四。○服用。

【學說】羅頌曰：樹，處處山林皆有之。木高丈餘，與檉相類，亦有斗，但小，不中用耳！不拘時采，其皮葉

入藥。

【別稱】又名檉櫟，大葉檉，；木皮俗稱：赤龍皮。

樗

(苦木科或稱黃楝科)

【學名】*Alantulus planifolius* Desf.

【產地】產於野地，亦有栽培於園圃者。

【基本】為落葉喬木，高數丈，皮粗，色似漆，質鬆而白。

葉為羽狀複葉，長二三尺，小葉甚多，為卵狀披針

形。夏月開花，大圓錐花序，花小，白色。果實為

翅果，膜質線狀，中含一種子，有臭氣，故又名臭

樗。

【功效】為收斂藥。

其葉氣味苦溫，而有小毒。煮水能洗疥癬，風疽。

凡白髮不生髮，取樗，桃，楸葉心，搗汁，頻塗之

。嫩芽論食，消風，祛毒。其白皮，及根皮氣味苦

溫，無毒。治疳積，去口臭疳蟲，殺蠹蟲，介蠱，

鬼狂，傳尸，蠱毒，下血，赤白久痢。得地檢，止

疳積，女子血崩，產後出血不止，腸風，瀉血，腸

滑，縮小便；治白濁，赤白帶下，溼氣，下痢，精

滑，夢遺。其莢治大便下血。

【用量】三。○——一。○服用。

【學說】李時珍曰：樗樗，乃一木三種也。樗本，皮細，肌

質，而赤，嫩葉香甘，可茹；樗木，皮粗，肌虛，

而白。其葉惡臭，數年人，或採食之。樗木，即樗

之生山中者，木亦虛大。梓入亦或用之；然瓜之，

如腐朽，故古人為不材之木。

【別稱】香者名：樗，臭者名：樗，山樗名：樗，虎目樹，

大眼樹。

樗雞

【基本】據李時珍云：樗，即臭樗也。此物初生頭方，而扁

，尖隊向下，六足，重翼，黑色，而長，則能飛。

外翼灰黃，有斑點；內翅五色，相間。其居樹上，

布置成行；秋深生子，在樗皮上。

【功效】其氣味苦平，而有小毒。不可近目。治心腹邪氣，

陰痿。能益精，強志，生子，好色，補中，輕身，療腰痛，下氣，強陰，多精；又能通血閉，行瘀血，消癰瘰，散目中結翳，辟邪氣，療癩犬傷。

【採製】取蟲，去翅足，以糯米，或用麩炒黃色，去米麩，用之。

【別稱】又名紅娘，灰花蛾。

檀子

(薔薇科)

【學名】*Cydonia japonica*, Pers. var. *pyramida*, Maxim.

【產地】多生於山野之中。

【基本】爲落葉小灌木，高一二尺，枝有刺；葉小，倒卵形，有托葉。早春隨葉開花，花黃赤色，或白色。其形頗似木瓜之花，果實亦類木瓜，圓形，有凸凹。可取之，而爲藥用。

【功效】爲健胃藥。

其氣味酸澀而平，無毒。能斷痢，去惡心，咽酸，止酒痰，黃水。煮汁飲之，能治霍亂轉筋，功與木瓜相近。

【用量】二・〇——六・〇服用。

【採製】取實，去核，微焙，用之。

【學說】李時珍曰：檀子，乃木瓜之酢澀者，小於木瓜，色微黃，蒂，核皆粗，核中之子，小圓也。

【別稱】又名木桃，和圓子。

樟

(樟科)

【學名】*Cinnamomum camphora*, Nees.

【產地】多生於暖帶，吾國閩廣等處，皆有之。

【基本】爲常綠喬木，五六丈，大者，有十圍；葉卵形，有葉脈三條，質硬，有光。初夏葉腋抽出長軸，綴以小花，黃白色。果實大如豌豆，黑色，球形。其木質細白；老者，則堅硬，帶綠色，可採取之，而供藥用。

【成分】含有 Camphora 之揮發油等。

【功效】爲興奮藥。

其材氣味辛溫，無毒。除惡氣，止中惡，心腹痛，鬼疰，霍亂，服腹，宿食不消，常吐酸水，用酒煮服。又可煎湯，浴腳氣，疥癬，風癩。其癢節能除風疰，鬼邪。

【學說】李時珍曰：西南處處，山谷有之，木高丈餘，小葉似楠而尖長，背有黃赤茸毛。四時不凋，夏開細花

，結小子。

樟腦 Camphora

【基本】此為樟樹之樹幹及其根，細切為木片，而後蒸之，俟水蒸氣蒸發，即有一種凝固之揮發油，合併昇華。此揮發油，即為樟腦也。

【成分】含有 $C_{10}H_{16}O$ 之結晶性，而有脂肪樣，色白粗粉，或塊片等。

【功效】為回春藥，與奮藥，及神經藥。又外用於侵蝕質新，齒痛，神經痛等。

其氣味辛熱，無毒。能通開竅，利滯氣，治中惡，邪氣，霍亂心腹痛，寒濕腳氣，疥癬，風瘙，齧齒，殺蟲，辟蠱；着鞋中，去腳氣。

【用量】一回〇〇五——〇〇三為粉劑，丸劑，酒精溶劑等，服用之。

【別稱】又名雷腦。

犛牛

【學名】Bison grunniens, Linn.

【基本】此屬偶蹄類，形狀大小類似小牛。角長，呈圓筒狀，有一種特殊之彎曲。背部被有長而柔軟之綿毛，

在肩部者呈總狀，四肢比較的短。體色黑，間有白色者；尾有總狀之長毛，幼獸，殆通全身被一樣之短綿毛。

【功效】其角氣味酸鹹而涼，無毒。治驚癇，熱疾，諸血病，毒病。其黃氣味苦平，能治驚癇，癲狂。

【別稱】又名毛犀，貓牛，竹牛。

稷

(禾本科)

【學名】Panicum nitidum, L.

【產地】北方園圃間，多栽培之。

【基本】為一年生草，呈小穗狀花序，排列而成開出之圓錐花序，常向下垂；小穗梗長，為穎果，淡黃白色，而有光澤。其性粳，可做餅食，亦為藥用。

【功效】其米氣味甘寒，無毒。能益氣，補不足，治熱疾，去丹毒發熱，解苦瓠毒。又安中，利胃，宜脾，涼血。其根治心氣痛，產難。

稻

(禾本科)

【學名】Oryza sativa, L.

【產地】多生於濕地，及暖地。

【基本】為一年生草，莖空有節，高四五尺；葉狹長而尖；

開花，甚小，結為穎果，即吾人所食之米也。

〔成分〕含有蛋白質，脂肪油，炭水化合物，纖維，灰分，及其他多量之有機鹽類。

〔功效〕其米氣味苦溫，無毒。能行榮衛中血積，解完毒，斑蝥毒。又益氣，止泄，補中，止霍亂後吐逆不止。

○據云：以駱駝脂作煎餅食之，治痔疾。又作糜食之，止消渴，暖脾胃，止虛寒，洩痢，縮小便，收自汗，發痘瘡。其米甜氣味甘平，無毒。能益氣，

止煩渴，治霍亂，解毒。其糯稻花陰乾措牙，烏鬚

○其糯氣味辛甘而熱，無毒。治黃病，可煮汁，浸之，仍以穀芒炒黃，為末，服之；又燒灰，治墜撲

傷損。其穀類治黃病，為末，酒服；又解蠱毒，煎汁飲。其種治齒黃，燒取白灰，且且擦之。

穀精草

(穀精草科)

〔學名〕*Yriocaulon Saxungularae, L. (Yriocaulon Strobiliferum,*

Steud.)

〔產地〕生於水田池澤之近傍。

〔基本〕為一年生草，葉細長，一株叢生數十葉。秋日葉間抽莖，莖由多數鱗片結成小球，一每鱗片中，輒藏

一花，點點如亂星，故有戴星，流星之別名。

〔功效〕為眼科藥，有消除翳膜之可能。

其花氣味辛溫，無毒。治喉痺，風齒痛，諸瘡疥，頑風痛，目盲，翳膜，痘後生翳，止血。

〔用量〕二〇——一六〇服用。

〔學說〕李時珍曰：此草，收穀後，荒田中，生之。

〔別稱〕又名戴星草，文星草，流星草。

〔產地〕多產於北海道之淡水中。

〔基本〕屬於胸甲類之十脚類，其腹部較長，外形似蝦，而第一對步，特發達，而成大螯，似蟹。生於胃內石質之突起，即為珊瑚石。可採取之，而供藥用。

〔成分〕珊瑚石：含有燒酸鈣，炭酸鈣，燒酸鎂，鈉鹽類，及膠質等。

〔功效〕為利尿藥，健胃藥，制酸藥。其氣味鹹澀，無毒。能治吞酸，嗜噉，胸膈心腹刺痛，小兒疳積諸症。又能利小便，止嘔吐，止瀉痢，發汗。

【用量】二回〇・四——一・五爲粉劑，水劑等，服用之。

【別稱】體中之小石，名曰：蠟蛭石。

蛭蚪

【學名】Tarpole

【基本】此爲無尾兩棲類之幼蟲也。體橢圓形，有側扁之大尾，如杓狀；掉尾游泳水中。隨其成長先生後肢，尋生前肢，尾漸縮小，終至不留痕跡，於是蛭蚪，變爲蛙形。

【功效】據云：能治燙火熱疔，及疥疔，並搗碎敷之。又染鬚髮，取青胡桃子上皮，和搗爲泥，染之；一染，不變也。其卵能明目。

【別稱】又名活師，活東，玄魚，懸針，水仙子，蝦蟆臺，蝸牛

【學名】*Palaia callizoma nartima* G. et P.

【基本】此屬於腹足類之有肺類；但種類頗多。介殼左旋，或右旋；其內面缺真珠層，破裂後，仍能以修復之。觸角二對，長觸角之頂端，有眼，兼營嗅覺。體伸出殼外時，對於殼口緣之一側，有一小孔，即呼吸孔也。其內腔爲外套腔，外套腔營肺之作用；

又受排泄物，生殖物等。頸板，與舌齒，能食害植物；竹之表面，每有斑紋，即其紙痕也。皮膚常排黏液，黏着他物，以助匍行者也。

【功效】爲利尿藥，並有治痔漏，脫肛之效。

其氣味鹹寒，而有小毒。能治賊風，嘔僻，大腸脫肛，筋急，痔漏。又生研汁，飲之，能止消渴；又治小兒疳風，撮口，利小便，消喉痺，止鼻衄，通耳聾，消諸腫毒，痔漏，又制蜈蚣，蝎蟲毒，研爛塗之。

【別稱】又名蠶牛，土牛兒。

蝸蠹

【學名】*Helix hibernica* (H. nemoralis) (H. arbustorum)

【產地】多產生於淡水中。

【基本】爲肺螺蛭類，形狀有大，有小，外殼堅硬，邊緣有白色，或黑色。

【成分】殼含有碳酸石灰，磷酸石灰，及膠質等。

【功效】其肉氣味甘寒，無毒。能明目，下水，止渴，醒酒，解熱，利大小便，消黃疸，水腫；又治反胃，痢疾，脫肛，痔漏。其蠹殼宜選泥中，及牆壁上，年

久者，佳良；用火煨過，用之。氣味亦同，能消痰飲，積聚，胃脘疼痛。又治反胃，嘔氣，痰嗽，鼻淵，脫肛，痔疾，瘡癤，下疳，燙傷。

【別稱】又名蜈蚣，爛殼名：鬼眼睛。

【學名】*Chironomophila bambusifera* Boie

【產地】多棲息於山野，或樹林之陰處。

【基本】爲管牙類之毒蛇也。頭三角形，背面灰褐色，散有環狀之花紋，一種警戒色也。卵在胎內孵化，比無毒蛇爲小，體粗，長約一尺五六寸。一旦張口，即突出其兩毒牙，兩出毒腺，排出毒液，用以毒人。抽得後，宜去其皮腸，風乾爲藥。

【成分】含有 $\text{Tham. C. H. O. S}_2$ 及脂肪等。

【功效】爲強壯藥。

其腥氣味苦而微寒，有毒。治惡瘡，殺下部蟲，療諸漏，可研敷之；若作痛疔，杏仁仁之。其肉氣味甘溫，有毒。能釀作酒，療癩疾，諸癰，心腹痛，下結氣，除蠱毒，五痔，腸風，瀉血，大風，諸惡風，惡瘡，癩癧，皮膚頑痺，半身枯死，手足臃腫。

間重瘰。其屑給裏塞耳聾，亦敷腫毒。其皮燒灰，療疔腫，惡瘡，骨疽。其蟻治身癢，疥癬，癩瘡。其骨治赤痢，燒灰，飲服三錢。其尿器中養取之者，能治痔瘻。其腹中死鼠，而有小毒。治良藥。

【用量】一·五——四·五服用。

【別稱】又名反鼻蛇。

蝦蟆

【學名】*Rana rugosa* Tem.

【產地】常棲息沼池，或溼地。

【基本】此爲無尾類之一種，體中形，呈泥色；皮面多疣狀突起。因其外貌醜惡，及有惡臭，人多忌之。

【功效】其氣味辛寒，有毒。能去邪氣，破癰堅，變腫，陰瘡；服之不患熱病，能除百邪，鬼魅；又塗癰腫，及熱結腫，惡瘡；又解煩熱，治犬咬傷。其肝治蛇螫；凡人牙入肉中，痛不可堪者，搗敷之，立出。其膽治小兒失音，不語，取汁點舌上，立愈。其腦能清盲，明目。

【採製】通常使蝦蟆，先去皮，并腸，及瓜子，陰乾。每個用真牛酥一分，塗炙，乾之，若使黑虎，連頭尾。

皮爪，或陰乾，酒浸三日，濾出，焙用。

薯 (禾本科)

【學名】 *Bambusa Vetchii*, Carr.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為多年生常綠苞木，高至三四尺，莖中空，細長，

有節；葉大廣披針形，緣邊，帶白色，可採之，而

供藥用。

【成分】含有單寧酸，黏液質等。

【功效】為收斂藥，有止血之可能。

其葉氣味甘寒，無毒。治男女吐血，衄血，嘔血，

咯血，下血；並燒存性，溫湯服之。又通小便，利

肺氣；喉痺，消瘰癧，及一切眼疾。

【用量】一、〇——三、〇服用。

【學說】李時珍曰：薯，生南方平澤。其根，與莖，皆似小

竹；其節籜，與葉，皆似蘆荻，而葉之面青，背淡

柔而韌。新舊相代，四時常青。

【別稱】又名薯，蕒菜。

蓬蘽 (薔薇科)

【學名】 *Rubus Thunbergi*, S. et Z.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為一種草本，莖呈蔓狀，葉有三小葉，橢圓形，有

缺刻。莖與葉，皆生細長之軟毛。夏秋之際，開白

花；花後結實。

【成分】含有多量植物性脂肪油，及檸檬酸，果糖類等。

【功效】其氣味酸平，無毒。能安五臟，益精氣，長陰，強

志，療暴中，風疾，身熱，大驚，又益顏色，長鬚

髮，耐寒濕。

【學說】李時珍曰：蓬蘽，與覆盆同類，故別錄謂：一名覆

盆。此種生於丘陵之間，藤葉，緣衍蓬蓬紫莖，異

于覆盆，故曰蓬蘽，陵藜，即藤也。其實八月始熟

，俚人名割田藤。

蓬草子

【基本】據李時珍曰：按名醫別錄載：蓬草子，不具形狀。

查蓬類不一，有潤蓬，即菰蓬也。又有黍蓬，即青

科也。又有黃蓬，草飛蓬草，不識。陳氏所指，果

何蓬也？以理推之，非黃蓬草，即青科也。黃蓬草

，生湖澤中，葉如菰蒲。秋月結實，成穗，子細，

形如潤胡米。飢年人采食之，須浸洗，曬舂，乃不

苦澀。青科西南夷人種之，葉如菱莖。秋月結實成穗，有之如赤黍，而細。其籽甚薄，曬春，炊食。

【功效】其子氣味酸澀而平，無毒。能益氣，補中；與梗無異。

蓬莖莖

(實科)

【學名】*Arumum*.

【產地】多生於山野之間。

【基本】爲宿根草，莖高二三尺；葉長，色綠，微灰白。夏

初間抽花，作黃紅色。根形似薑，黃色，有圓形物，聯綴如雞卵，採而乾之，以供藥用。

【功效】爲通經藥。

其根氣味苦辛而溫，無毒。治心腹痛，中惡，疰忤，鬼氣，霍亂，冷氣，吐酸，解毒，以酒研服之。

又療婦人血氣結積，男子奔豚，破痰癖，冷氣，以酒醋磨服。又能開胃，消食，通月經，消瘀血，止撲損痛，下血，及內損羸血，通肝經聚血。

【用量】三〇——六〇服用。

【採製】此根極堅硬，難搗。用時以熱灰火中，煨透，乘熱搗之，即碎如粉。今人多以醋炒，或炙熟，入藥，

取其引入血分也。

【學說】蘇頌曰：今浙江，或有之。三月生苗，在田野中。

其莖如錢大，高三三尺；葉青白色，長一二尺，大五寸以來，頗類蠶荷。五月有花，作穗，黃色，頭微紫。根如生薑，而茂，在根下似雞鴨卵，大小不一。等。九月采，削去粗皮，蒸熟，暴乾用。

【別稱】又名連葯。

蓮

(睡蓮科)

【學名】*Nelumbo macleodii* Gaertn.

【產地】多生於水池河沼之中。

【基本】爲多年生草，地下之莖，肥大而長，有節，多毛，中空；葉圓如楯形，其下面之中央，著以葉柄，甚長而細。夏月開花，或紅，或白，果實橢圓，色白，多肉。可採取之，而供藥用。

【功效】其實氣味甘平而澀，無毒。能補中，養神，益氣血，除百疾，止渴，去熱，安心，止痢，鎮腰痛，止泄精，厚腸胃，固精氣，強筋骨，補虛損，利耳目，除寒濕，止脾泄，久痢，赤白濁，女人帶下，崩中，諸血病。其藕氣味甘平，無毒。去熱渴，散留

血，消食積，解酒毒，止病後乾渴。又搗汁服之，止悶，除煩，開胃。治霍亂，產後血閉。其藕節氣味澀平，無毒。搗汁飲之，止吐血不止，及口鼻出血；又消瘀血，解熱毒，產後血閉，並止瘀血，唾血，血淋，溺血，下血，血痢，血崩。其藕膏氣味甘平，無毒。生食治霍亂後虛渴，煩悶，不能食，解酒毒，功與藕同。又解煩毒，下瘀血。其蓮莖氣味苦寒無毒。止血渴，產後渴，生研末，米飲服二錢，立愈。又能止霍亂，清心，去熱。其蓮蕊氣味甘澀而溫，無毒。能清心，通腎，固精，益血，止血前，吐血。其蓮花氣味甘而溫，無毒。能鎮心，益色。其蓮房氣味苦澀而溫，無毒。止破血，治血脹，腹痛，及產後胎衣不下，酒煮服之，或水煮服之。亦能止血崩，下血，溺血。其荷葉及蒂又名：荷鼻。氣味苦平，無毒。止渴，落胞，破血，治產後口乾，心膈躁煩，血脹，腹痛，產後胎衣不下，酒煮服之。荷鼻能安胎，去惡血，留好血，止血痢，殺菌毒，可煮水服之。又能助脾胃，散瘀血，消水腫，癰腫，發痘疹；治吐血，咯血，衄血，

下血，溺血，血淋。

【用量】實用一〇〇——一五〇服之；花蕊藥用二〇

——三〇服之。

【別稱】又名蓮藕，其根，藕；其腎，蓮；其莖葉，荷。

專藥

(睡蓮科)

【學名】*Pisentia Purpurea*, Carp

【產地】多生於江浙湖澤中。

【基本】為多年生草，葉橢圓形，有長柄；莖及葉背，皆有

黏液被之。夏日開花，紫色。可採之，而為藥用。

【功效】其氣味甘寒，無毒。止消渴，熱痺；和鱒魚作藥，

食之，能下氣，止嘔，多食之，能壓丹石，補大小

腸虛氣，不宜過多。又治熱疽，厚腸胃，安下焦，

逐水腫，解百藥毒。

【學說】李時珍曰：藕，生南方湖澤中；惟吳越人，喜食之

。葉如荇菜，而差圓，形似馬蹄。其莖紫色，大如

筋，柔滑，可羹。夏日開黃花；結實，青紫色，大

如棠梨，中有細子。春夏之際，嫩莖未葉者，名稚

藕，稚者小也。

【別稱】又名芡，水葵，落葵，馬蹄草。

華撥

(胡椒科)

【學名】*Piper longum*, L.

【產地】多產於嶺南一帶。

【基本】為一種木本植物，莖高三尺四；葉闊厚，而有光。

春夏之際，開花，色白；花後結子，長約二寸許，

形似桑椹。可為藥用。

【成分】含有 Piperin ($C_{17}H_{25}NO_3$) 之成分。

【功效】為鎮痛藥。

其氣味辛而大溫，無毒。能溫中，下氣，補腰腳，殺腥氣，消食，除胃冷，疝氣，霍亂冷氣，心痛，血氣，水瀉，虛痢，嘔逆，吞酸，產後洩痢，以及臟腑虛冷，腸鳴；又治頭痛，鼻淵，牙痛。其藥物沒氣味辛溫，無毒。治五勞七傷，冷氣，嘔逆，心腹脹滿，食不消化，陰汗，寒疝，核腫，婦人內冷無子，腰腎寒冷，又除血氣。

【用量】一·五——四·五服用。

【採製】用頭，以醋浸二宿，焙乾，以刀刮去皮，栗子，令淨，乃用。

【學說】李時珍曰：段成式言，青州防風子，可亂華撥，蓋

亦不然。華撥氣味，正如胡椒，其形長一二寸；防風子，圓如胡荽子，大不相伴也。

【別稱】又名華撥。

華澄茄

(胡椒科)

【學名】*Piper cubaba*, L.

【產地】多產於東印度等處。

【基本】為蔓生植物，葉長卵形，而尖，平滑。春開白花，

為穗狀花序。夏日結實，為漿果，大如豌豆，黑褐色，入藥用之。

【成分】含有 Chubabin ($C_{10}H_{16}O_3$) 及華澄茄酸，與其揮發油

($C_{10}H_{16}$) 等。

【功效】為淋病之特效藥。

其質氣味辛溫，無毒。治下氣，消食殺，去腐風，及心腹間氣脹；又療鬼氣，一切冷氣，疥癬，並霍亂吐瀉，肚腹痛，腎氣，膀胱冷；又能暖脾胃，止嘔吐，噎逆。

【用量】〇·一——一·〇——三·〇服用。

【製劑】「畢澄茄越幾斯」 *Extractum Chubabarum*。

此即以畢澄茄，浸於酒精及依的兒中，而製成褐色

之稀薄越發斯。每配伍於骨海波爾撒謨，為膠囊藥，專用於淋病等。

【採製】採實去柄，及嫩皮，用酒浸，蒸五時後，杵細，晒乾，入藥用之。

【學說】李時珍曰：海南諸國，皆有之，蔓生。春開白花；

夏結黑實，與胡椒一類，二種，正如大腹子，與檳榔相近耳！

【別稱】又名畢澄茄，毗陵茄子。

蔓荊

(馬鞭草科)

【學名】*Vitex trifolia* L. var. *unifoliolata*, Schauer.

【產地】多生於海邊之砂地。

【基本】為一種木本植物，莖約有三四尺許，蔓性，匍匐地上，着各處皆生鬚根。單葉，對生，橢圓形，約寸餘；表面深綠色，裏面淡白色。夏月梢頭抽穗，緋花，呈深綠色；花後結實，圓形，而小，可採取，而供藥用。

【功效】為強壯清涼藥。

其質氣味苦而微寒，無毒。去筋骨間寒熱，濕痺，拘攣；又能明目，堅齒，利九竅，殺白蟲，腦鳴，

目淚，除賊風，長髮髮，利關節；治癩疾，赤目，頭痛，頭沉，昏悶，散風邪，涼諸經血，止目睛內痛，搜肝風。

【用量】二〇——八〇服用。

【禁忌】惡烏頭，石苔。

【採製】取實，除去蒂子下白膜一重，以酒浸蒸過，用之。或只去膜，打碎，用之。

蔓椒

【基本】據李時珍曰：蔓椒，野生林菁間，枝軟，如蔓，子葉皆似椒；山人亦食之。

【功效】其實及根莖氣味苦溫，無毒。治風寒，濕痺，歷節痛，除四肢厥氣，膝痛，煎湯蒸浴，取汗。其根治痔，燒末，並煮汁服之。又治賊風，攣急，通身水腫，用枝葉煎如汁，熬如餛狀，每空心服一匙，一日三服。

【別稱】又名豬椒，豕椒，狗椒，金椒。

焯菜

(十字花科)

【學名】*Asaridium montanum*, Wall.

【產地】生於陸田，及庭園之間。

【基本】爲一種雜草，根深入於地，妻除頗難，蔓隨土地之

肥瘠；大小不一，高至二三寸，乃至一二尺。葉長

橢圓形，羽狀分裂，亦有不分裂者，緣邊，有不整

之缺刻，及鋸齒。春間開小黃花，四瓣，爲總狀花

序；果實爲乾果，線形，而細長約五六分。

【功效】其氣味辛溫，無毒。能去冷氣，腹內久寒，飲食不

消，令人能食。又利胸膈，豁冷痰，心腹痛。

【學說】李時珍曰：蔞菜，生南地田園間，小草也。冬月布

地叢生，長二三寸，柔根，細葉。二月間細花，黃

色；結細角，長一二分，角內有細子。野人連根葉

拔，而食之。

【別稱】又名辣米菜。

蔞草

【基本】據蘇恭曰：蔞菜，所在有之，生於水傍；葉似澤瀉

而小，花青白色，亦堪蒸啖。江南人，用蔞魚食，

甚美。五六月采莖，暴乾，用之。

【功效】其氣味甘寒，無毒。能治暴熱，喘息，咳嗽，小兒

丹腫。

【別稱】又名櫻菜。

線香

【基本】據李時珍曰：今人合香之法，甚多；惟線香，可入

瘡科用，其料加減不等，大抵多用白芷，芎藭，獨

活，甘松，三奈，丁香，藿香，藁本，高良薑，角

茴香，連翹，大黃，黃芩，柏木，兜蘘香末之類，

爲末，以榆皮麩作糊，和劑，以唧筒竿成線香，成

條如線也；亦或盤成物象字形，用鐵銅絲懸蒸者，

名龍排香。

【功效】其氣味辛溫，無毒。能靈諸瘡癤，及楊梅毒瘡。

練鵲

【基本】爲鵲類（*Turdus*）之一種。據李禹錫曰：練鵲，似

鵲而小，黑褐色。食槐子者佳；冬春間采之。

【功效】其氣味甘溫而平，無毒。能益氣，治風疾，細剉，

炒香，以袋盛，浸酒中，每日取酒，溫服之。

賣子木

（黃草科）

【學名】*Xora chinensis* Lam.

【產地】多產於暖帶之各地。

【基本】爲常綠灌木，莖高五六尺，枝梢呈淡紫色。葉尖，

長約一二寸，帶青綠色。秋間開花，紅色；花後結

實，如椒。其木可取之，而為藥用。

【功效】其氣味甘而微鹹，平而無毒。治內傷出血，續絕，

補骨髓，止痛，安胎。

【採製】取木，粗搗，每兩用酥五錢，同炒乾，入藥用之。

【學說】蘇恭曰：賣子木，生嶺南印州，山谷中。其葉，似
柿。

【別稱】又名買子木。

質汗

【基本】陳藏器曰：質汗，出西番，煎煙乳，松淚，甘草，

地黃，并熱血成之。番人試藥，以小兒斷一足，以

藥納口中，將足踞之，當時能走者，為良。

【功效】其氣味甘溫，無毒。治金瘡，傷折，瘀血，內損，

補肌肉，消惡血，下血氣，婦人產後諸血結，腹痛

，內冷，不下食，並以酒少服之，亦敷病處。

酢魚草

(馬錢科)

【學名】*Buddleia japonica*, Thunb.

【產地】生於山野，或河邊。

【基本】為落葉灌木，高三四尺許，略呈草本狀。其節節有

縱行之翅；葉對生，廣披針形，有鋸齒。夏日莖梢

抽穗着花，花冠筒狀，呈紫色。其花及葉，可為藥

用之。

【功效】其花葉氣味辛苦，溫有小毒。治痰飲成衄，可取花

研末，和米粉煮熟食之，即效。又治誤食石斑魚子

中毒，吐不止，及諸魚骨哽者，搗汁，和冷水少許
，嚥之，吐即止，骨即化也。久瘰成癬者，以花填

鯽魚腹中，煨熟空心食之；並以花，和海粉搗貼，

便消。

【學說】李時珍曰：酢魚草，南方處處有之。多在嶺岸邊，

作小生株，高者三四尺。根狀如枸杞；莖似黃荊，

有微稜，外薄黃皮；枝易鱗衍，葉似水楊，對節而

生，經冬不凋。七八月開花，成穗，紅紫色。

【別稱】又名闊魚花，魚尾草。

醋

【基本】醋之種類雖多，而製造方法，大略相同。據李時珍

云：米醋，三伏時，用倉米一斗，淘淨，蒸飯，搗

冷，餾黃，晒乾，水淋淨。別以倉米二斗，蒸飯和

勻，入甕，以水淹過，密封甕處，三七日成矣。糯

米醋，秋社日，用糯米一斗淘蒸，用六月六日造成

小麥大粒，和勻，用水二斗，入甕封釀，三七日成矣。粟米醋，用陳粟米一斗，淘浸，七日再蒸，淘熟，入甕密封，日夕攪之，七日成矣。小麥醋，用小麥米，浸三日蒸熟，舍黃，入甕，水淹，七七，成矣。大麥醋，用大麥米一斗，水浸蒸飯，舍黃，晒乾，水淋過，再以麥飯二斗，和勻，入水封閉，三七日成矣。醋醋，用饅一斤，水三升，煎化，入白麴末二兩，瓶封，晒成。其餘精糖等醋，皆不入藥；不能盡紀也。

【功效】其米醋氣味酸苦而溫，無毒；惟大麥醋，微寒，能消癰腫，膿腫；散水腫，浮腫，去邪毒，理諸藥。治產後血逆，除癰塊堅積，消食穀，殺惡毒，破結氣，心中酸水，痰飲，下氣，除煩。治婦人心痛，結氣；並產後，及傷損，金瘡出血，昏運，殺一切魚肉菜毒。又以醋磨青木香，止卒心痛，血氣痛；浸黃藥，舍之，治口疳，又調大黃末，塗腫毒。凡煎生大黃服之，治痔瘡，甚良。又散瘀血，治黃疸，黃汗。

【別稱】又名酢，苦酒。

醋林子

【基本】據蘇頌云：醋林子，生四川邛州，山野林箐中；木高丈餘，枝葉繁茂。三月開白花。四出；九月，十月子熟，葉繁數十枚，成葉。生青，熟赤，略類櫻桃，而蒂短。霜時采之，陰乾，連核用。土人以鹽醋收藏，充果食。其葉味醋，夷獠人采得，入鹽，和魚鮓食，云勝用醋。

【功效】其質氣味酸溫，無毒。治久損不瘥，痔漏下血，蚊咬心痛，小兒疳蚘，心痛脹滿，黃瘦，下寸白蟲，單搗為末，酒服一錢，甚效。鹽醋藏者，食之，生津液，醒酒，止渴，多食，令人口舌粗拆也。

豌豆

(豆科)

【學名】*Pisum sativum*, L.

【產地】多栽培於園圃之間，各處皆有之。

【基本】為一種蔓生之植物，葉為羽狀複葉，端有卷鬚，基部有托葉，甚大。夏初開小花，如蝶形，淡紫色；果實成莢，長寸許，子可食。亦供藥用之。

【成分】含有蛋白質，脂肪，及多量澱粉，與灰分等。

【功效】其氣味甘平，無毒。能止消渴，淡蘆食之，最良。

能治寒熱，熱中，除吐逆，止泄痢，通小便，去腹脹，調榮衛，益中，平氣；燻食之，能下乳汁，殺鬼毒，解乳石毒；又研末，塗癰腫，惡毒，痘瘡，則止痛，即消。

【學說】李時珍曰：豌豆，種出西湖，今北土甚多。八九月下種；苗生，柔弱如莢，有鬚；葉似荻藜葉，兩兩對生。嫩時，可食。

【別稱】又名胡豆，戎菽，畢豆，青小豆，青斑豆，麻累。
駝鳥

【學名】Struthio camelus Temminck.

【基本】此屬走禽類，為鳥類中之最大者；身長達七八尺，亞非利加駝鳥，產於亞非利加洲，亞細亞洲等，體大，具二趾，僅內趾有爪。亞美利加駝鳥，產於南美，體較前種略小，有三趾，三趾均有爪。卵大如椰子實，日中以太陽熟暖之，夜則雌雄交互抱卵。尼與其所生之羽毛，供婦人之帽，頸套等之裝飾用品，價值頗貴。

【功效】其屎無毒，能治人誤吞鐵石入腹，食之，立消。
【別稱】又名駝蹄鷄，食火鷄，骨托禽。

魴魚

【學名】Carichthys Kunu Lesson & Garnot.

【基本】此屬硬鱗類，背部淡黑色，胸鰭紫藍色；山胸鰭出三本鱗棘，富於神經，感覺敏銳，以之步行海底，索食。鱗，富於筋肉，因伸縮作用，可以發音。

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。能調胃氣，利五臟；和芥食之，能助肺氣，去胃風，消食穀；作醃食之，助脾氣，健胃氣。其功與鯽，相同；疴痢人，勿食。

鳩

【基本】據爾雅翼云：鳩似鴿，而大，狀如鴿，為紫黑色。赤鳩，黑目，頸長七八寸。雄名：運日；雌名：陰諧。運日鳴，則晴；陰諧鳴，則雨。食蛇，及橡實；能知木石中有蛇，即為禹步，以禁之，須臾木倒石崩，而蛇出也。蛇入口，即爛。其屎溺着石，石皆黃爛。飲水之處，百蟲吸之，皆死；惟得犀角，即可解其毒也。

【功效】其毛具有大毒，入五臟即爛，能殺人。其屎帶之，能殺蝮蛇毒。

【別稱】又名鴿口，同力鳥。

鴉

【基本】據云：鴉，水鳥也。似雁，而斑文，無後趾，性不

木止。閩語曰：鴉無舌，兔無脾。或云：純雌，無

雄，與他鳥合。或云：鴉，見鴛鳥，激蕪射之，其

毛自脫也。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。能補益虛人，去風，除痺。

其脂能長毛髮，澤肌膚，塗瘰癧。

【別稱】又名獨豹。

黎豈

(荳科)

【學名】*Mitrium cyprian* W. et A.

【產地】多生於山野，亦有栽培於陸田者。

【基本】為一年生之纏繞草本，葉似豇豆；但葉脈偏針。夏

秋之間，開花，成簇，花大，紫色；常五六莢，同

生一處；長三四寸，種子，細長。

【功效】其氣味甘而微苦，溫有小毒。能溫中，益氣。多食

之，令人發悶。

【學說】辭雅所謂：虎藜，即狸豆也。古人謂藤，為藜；後

人訛藜，為狸矣。

【別稱】又名狸豆，虎豆。

第十六畫

凝水石 (Lithium Spar.)

【基本】此屬於方解石，或礬石之一種礬石。產于常山之谷

中，名：凌水石，色如雲母，良鹽之精也。通常呈

白色，堅硬之固塊，或粗糙之細粒。

【成分】含有結晶性之碳酸鈣等。

【功效】民間多為眼科用藥。

其氣味辛溫而寒，無毒。能去身熱，腹中積聚，邪

氣，皮燒，煩滿，以水飲之。又除時氣熱盛，五臟

伏熱，能止瀉，消水腫，壓丹石毒，解傷寒勞復，

治小便白濁，可以涼血，降火，止牙疼，明目目。

【用量】一·五——三·五服用。

【禁忌】畏地榆。

【採製】取石用生薑自然汁，煮乾，研粉，每用十兩，用生

薑一鎰也。

【別稱】又名白水石，寒水石，凌水石，鹽精石，泥精，鹽

杜，鹽根。

壁錢

【學名】*Tegularia domestica* L.

「基本」爲真正蜘蛛類之一種，體扁平，褐色。腹部之腹側，有白色花紋。夜間徘徊壁上，捕食蟲類。雌蟲於壁上，作白色，圓巢，產卵。

「功效」據云：此蟲無毒，能治鼻衄，及金瘡出血不止，搽取蟲汁，注鼻中，或點瘡上，亦療五野癩病下血。

又治男子小兒急疔，牙蝕腐臭，以壁蟲，同人中白等分，燒研貼之；又治喉痺。其窠幕能治小兒嘔逆，取二七枚，煮汁，飲之。又產後效逆，三五日不止，欲死者，取三五個，煎汁，呷之，最良。又止金瘡，諸瘡出血不止。又治瘡口不斂，取兩貼之，可止蟲牙疼痛。

「別稱」又名壁鏡。

燈心草

(燈心草科)

「學名」*Juncus effusus*, L. var. *deplanis* F. Buch.

「產地」多生於山野之溼地，或栽於水田中。

「基本」爲多年生草，莖圓，而細長，高三四尺，色綠。夏日莖之上部，開黃褐色，細花。莖中有白髓，可爲

燈心，俗稱：燈草。

「功效」爲利尿藥。

其莖及根氣味甘寒，無毒。能通淋，瀉肺，行水，消腫，治喉痺，燒灰，吹之，甚捷；亦可燒灰塗乳上，飼小兒，止夜啼。又降心火，止血，通氣，散腫，止渴；又可燒灰加入輕粉，麝香，治陰瘡。

「用量」一。五——四。五服用。

「採製」燈心，難研，以粳米粉漿染過，曬乾，研末，入水澄之；浮者，是燈心也。曬乾，用之。

「學說」馬志曰：燈心草，生江南澤地，叢生。莖圓，細而長直，人將爲席。

「別稱」又名虎鬚草，碧玉草。

燕

「學名」*Hirundo rustica gutturalis* Scop.

「基本」此屬鳴禽類，口闊大，適於捕食蟲類也。翼之長，

與尾之長，而分歧，適於飛翔，且轉淚自如也。脚短小，故步行頗拙。春來，秋去。赤腰燕，腰部，與頭側部，赤茶色；背部，黑色；腹部，有多數黑斑。普通燕，喉部，焦茶色，腹部，白色。琉球燕，喉部，焦茶色；後腹部，灰色。岩燕，頭部，與背部，黑色；腰部，與後腹部，白色。

【功效】其肉氣味酸平，有毒。能除痔蟲，疥蟲。其胡燕卵

黃，能治卒水浮腫，每吞十枚。其秦燕毛，能解諸藥毒，取二七枚，燒灰，水服。其尿氣味甘平，有毒。能治蠱毒，鬼疰，逐邪氣，破五癘，利小便，熬膏，用之。又療痔，殺蟲，去目翳，治口疳，瘰疾。又作湯浴，小兒驚癇。

【別稱】又名乙鳥，玄鳥，鴛鳥，游波，天女。

燕脂 Carthaminum.

【基本】此以紅藍花汁染粉而成，為婦人染面之燕脂也。據李時珍曰：燕脂有四種：一種以紅藍花汁，染胡粉而成。乃蘇鵝演義所謂：燕脂，葉似蒲，花似蒲，出西方。中國謂之紅藍以染粉，為婦人面色者也。一種以山燕支花汁，染粉而成。乃段公路比戶錄所謂：端州山間有花，叢生，葉類藍。正月開花，似蔥，土人采，含苞者，為燕脂粉，亦可染帛，如紅藍者也。一種以山榴花汁，作成者，鄭虔胡本草中載之。一種以紫鑛染粉而成者，謂之胡燕脂；李珣南海藥譜載之。今南人多用紫鑛燕脂，俗呼紫梗是也。大抵皆可入血病藥用。又落葵子，亦可取汁，

和粉，助面，亦謂之胡燕脂。

【功效】為收斂藥，可為活血，及止血藥。

其氣味甘平，無毒。能治小兒聾耳，浸汁滴之。又

能活血，解痘毒。

【基本】據本草從新云：出漳泉，沿海處有之，乃燕啣小魚

，春蟲之窩中，人取之。閩小記云：燕取小魚，黏之於石，久而成窩，有烏，白，紅三色。烏色品，最下；紅色，最難，能益小兒疳疹，白色，能愈痰疾。

【功效】按食物宜忌云：能壯陽，益氣，和中，開胃，添精

，補髓，潤肺，止久瀉，消痰涎。又嶺南雜記云：

紅色者，治血痢，入梨，加冰糖，蒸食，治腦痰。

何愚川云：翻胃久吐，有服人乳，多吃燕窩，而愈者，老年咳嗽。文堂集驗方云：用秋白梨一個，去心，入燕窠一錢，先用滾水泡，再入冰糖一錢，蒸熟，每日早晨，服下，勿間斷，神效。

澤膝

(大戟科)

【學名】Euphorbia halloweighii, L.

【產地】隨地皆自生，於道傍尤多。

【基本】為一年生草，莖高七八寸；葉為倒卵形，互生。春
暮莖頂生五葉，分五枝，開淡褐色，小花，其莖葉

，皆入藥用之。

【功效】為利尿藥。

其莖葉氣味苦而微寒，無毒。能治皮膚灼熱，大腹
水氣，四肢面目浮腫，丈夫陰氣不足，又利大小腸
，除蟲毒，止癢疾，消痰。

【用量】三。〇——一。〇。〇服用。

【禁忌】惡蠶蠶。

【學說】名醫別錄曰：澤漆，大戟苗也。生太山川澤；三月
三日，七月七日，采莖葉，陰乾。

【別稱】又名漆莖，貓兒眼睛草，綠葉蕙花草，五風草。

澤瀉 (澤瀉科)

【學名】*Alisma Plantago, L. var. parviflorum, Torr.*

【產地】自生於池沼水澤。

【基本】為宿根植物，葉為匙形；葉柄長，叢生。夏日自葉
間抽出花莖，高二三尺，每節分三枝，更分枝，而
着花，白色，果實為瘦果。其根稍為球圓形，外部

呈黃褐色，平滑，下面處處存鬚根，橫斷面為淡褐
白色，為粉質狀，可採取之，而為藥用。

【功效】為利尿清涼藥，用於水腫，淋病，糖尿病，又於眩
暈，亦有效。

其根氣味甘鹹，無毒。能治風寒，濕痺，乳難，可
養五臟，益氣力，肥健，消水，聰耳目，補虛損，
消痞滿，止洩精，消渴，淋瀝，逐膀胱三焦停水。

又治腎虛，精自出，五淋，頭旋，耳虛鳴，筋骨痠
縮，通小腸，止尿血。又入腎經，去舊水，養新水
，利小便，消腫脹。滲洩，止渴，去胛中留垢，心
下水痞，滲濕熱，行痰飲，止嘔吐，瀉痢，疝痛脚
氣。其葉氣味鹹平，無毒。治大風，乳汁不出，產
難，強陰氣，壯水臟，通五淋。其實氣味甘平，無
毒。治風痺，消渴，益腎氣，強陰，補不足，除邪
澤。

【用量】三。〇——一。〇。〇服用。

【採製】於秋末之際，採掘球根，曬乾，臨時浸酒一宿，晒
焙，為藥。

【學說】蘇頌曰：今山東，河陝，江淮亦有之；漢中者，為

佳。春生苗，多在淺水中；葉似牛舌，獨莖而長。秋時開白花，作叢，似穀精草；秋末采根，暴乾。

〔別稱〕又名水瀉，鵲瀉，及瀉，芒芋，禹孫。

澤蘭

(蘭科)

〔學名〕*Dianthorum Kirilowii, Turcz.*

〔產地〕生於溪間之澤地。

〔基本〕為多年生草，海莖一葉，箭鏃形，基脚抱莖。夏日

葉間抽花莖，莖端着一花，紫紅色。其葉等，皆供

藥用。

〔功效〕為利尿藥。

其葉氣味苦而微溫，無毒。治金瘡，癰腫，疔膿，

產後腹痛，頻產，血氣寒冷，成勞，瘦羸，婦人血

滯腰痛，產前產後百病，通九竅，利關節，養血氣

，破宿血，癰癢，通小腸，長肌肉，消撲損瘀血，

止鼻血。治頭風，目痛，婦人勞瘦，男子面黃。其

地笋氣味甘而辛溫，無毒。能利九竅，通血脈，排

膿，止鼻洪，吐血，產後心腹痛。產婦可作蔬菜食

，最佳。其子能治婦科諸病。

〔用量〕三〇——一〇〇服用。

〔採製〕凡用大小澤蘭，細制，以絹袋盛，懸於屋南畔角上，令乾，用之。

〔別稱〕又名水香，都梁香，虎蘭，虎蒲，龍葉，孩兒菊，

風藥，根名地笋。

樺木

(樺木科亦作柔荑科)

〔學名〕*Betula alba, L. var. vulgaris, Da.*

〔產地〕多產於遼東，及西北等處之山地。

〔基本〕為落葉喬木，高三四丈，皮白，易剝脫，葉作卵形

而尖，花雌雄同株。夏月開花，為穗狀花序；花後

結實，球形，鱗間多細子，色白。其皮而輕軟。具

有紫斑，可供藥用。

〔功效〕其木皮氣味苦平，無毒。治諸黃疸，可濃煮汁，飲

食之，為最良。又煮汁冷飲，能治傷寒時疾，熱毒

疔，特良。又燒灰，合他藥，治肺風毒，乳癰，其

脂燒之，辟鬼邪。

〔學說〕李時珍曰：樺木，生於遼東，及薩洮河州西北諸地

。其木色黃，有小斑點，紅色。

橘

(芸香科)

〔學名〕*Citrus nobilis, Lour. (日本產) Citrus bigaradia, Du-*

ham, var. *Shumoo*, Gull. (中國欖欖)

【產地】多產生於慶帶，吾國廣東，及日本，皆有之。

【基本】為常綠灌木，高丈餘；葉長卵形。六月間，開花，白色，頗有香氣；果實為扁圓形之漿果。其味甚甘美，可供食用；其果皮，多拾聚之，而為藥用。

【成分】果皮中，含有 *Hesperidin* 之中性結晶物，及糖質。

【功效】其實氣味甘酸而溫，無毒。甘者，潤肺；酸者，聚

痰。又能止消渴，開胃，除胸中膈氣。其黃皮氣味

苦辛而溫，無毒。治胸中瘴熱，逆氣，利水穀，去

臭氣，通神志，去下氣，止嘔欬，治吐逆，霍亂，

脾不能消穀，止洩，除膀胱留熱，停水，去寸白蟲

，清痰涎，治上氣欬嗽，開胃，破癥瘕，痰癰。又

療嘔噦，反胃，嗜雜，時吐清水，痰痞，瘰癧，大

腸閉塞，婦人乳癰；入食料，解魚腥毒。其青皮氣

味苦辛而溫，無毒。破堅癥，散滯氣，去下焦諸濕

，治右腸肝經積氣，胸膈氣逆，脇痛，小腹疝氣，

消乳腫，流肝胆，瀉肺氣。其瓢上筋膜治口渴，吐

酒，炒熟煎湯，飲之，甚效。其核氣味苦平，無毒

。治腎注，腰痛，膀胱氣痛，腎冷，炒研，用酒溫

服一錢；或酒煎服之。又治酒毒風，鼻赤，炒研，

每服一錢。胡桃肉一個，搗酒服，以知為度。又治

小腸疝氣，及陰核腫痛，炒研用五錢，老酒煎服；

或酒糊為丸服之。其葉氣味苦平，無毒。能導胸膈

逆氣，入厥陰，行肝氣，消腫，散毒；療乳癰，脇

痛，用之，亦能行經。

【用量】二〇——五〇服用。

【別稱】其皮又名陳皮，橘紅，青皮，紅皮。

椹 (殼斗科)

【學名】*Quercus serrata* Thunb.

【產地】吾國北方多產之，尤以山東為最廣。

【基本】為落葉亞喬木，高三丈餘，葉狹長，有鋸齒，類栗

花，黃褐色，單性，雌雄同株。實圓，而端尖，有

殼斗，如碗。其實，即椹實；斗，即殼斗，皆供藥

用之。

【功效】其實氣味苦而微溫，無毒。止下痢，厚腸胃。其斗

殼氣味溫，無毒。為散用之，或煮汁服之，能治

腸風，崩中，帶下，冷熱瀉痢，並染鬚髮。其木皮

及根皮氣味苦平，無毒。治惡疔，毒腫，可煎汁，

洗之，能消腫，去膿血。又能止水劫，消瘰癧。

橄欖

(橄欖科)

〔學名〕 *Olea europaea*.

〔產地〕多產於園廣之各省。

〔基本〕為一種之喬木，葉為奇數羽狀複葉，小葉五對，至六對，長橢圓狀，披針形，長二三寸，闊一二分。葉脈細密，而不顯；葉柄，及小葉柄，為淡黃色總狀花序。結為核果，長橢圓形，或卵形，無柄，外部多肉，內部有核，堅硬，有木質性。其實等，可供藥用之。

〔功效〕其實氣味酸而甘溫，無毒。生食，煮飲，能消酒毒，解毒，開胃，下氣，止瀉，生津液，止煩渴；治咽喉痛，咀嚼唾汁，能解一切魚蟹毒。其攪仁氣味甘平，無毒。凡唇吻燥痛，可研爛敷之。其核氣味甘溫而溫，無毒。磨汁服之，治諸魚骨鯁，及食積成積；又治小兒痘瘡。燒研，服之，治腸風，下血。

〔學說〕李時珍曰：橄欖，樹高，將熟時，以木釘釘之，或

稍重少許，於皮內。其實，一夕自落，亦物理之妙也。

〔別稱〕又名青果，忠果，諫果。

橙

(芸香科)

〔學名〕 *Citrus Aurantium*, *L. Subsp. amara*, *L. var. Kunop.*

Mark.

〔產地〕產於暖地，多栽培於園圃中。

〔基本〕為常綠喬木，莖上有針，高十尺餘，葉橢圓形，全邊，互生，葉柄生翼。初夏開花，花瓣帶白色，頗有香氣。結果實甚大，至翌年成熟；其果皮，及花，皆可供藥用之。

〔成分〕含有揮發油，及苦味；越幾斯質等。

〔功效〕為健胃藥。

其實氣味酸寒，無毒。洗去酸汁，切片，和鹽蜜煎成，貯食，止惡心，去胃中浮風，惡氣，行風氣，療瘰癧，發瘰癧，殺魚蟹毒。其皮氣味苦辛而溫，無毒。能散腸胃惡氣，消胃中浮風，亦可和鹽貯食，止惡心，解酒毒，消痰，下氣，利膈，寬中，解酒。其核能治面皰，粉刺，可研末塗之。

【用量】一。○——三。○服用。

【製劑】1 橙皮油 *Oleum Aurantii Coriata*

此即以新鮮橙皮，壓取而得之揮發油，呈透明微黃色，而稀薄流動，有特異之芳香苦味，為調味健胃藥。

2 橙皮越幾斯 *Extractum Aurantii Corticis*

此即以橙皮四。○。○，浸於酒精六。○。○，及溜水三。○。○中，經五日後，濾過之，而製成越幾斯也。

3 橙皮丁幾 *Tinctura Aurantii Corticis*

此即以橙皮末一。○。○，浸於稀酒精五。○。○中，浸漬而製成澄明褐色之液體也。一日三回，以二。○——六。○，多於他劑配伍用之。

4 橙皮舍利別 *Syrupus Aurantii Corticis*

此即以橙皮丁幾一五。○，與舍利別八五。○，混和而製成澄明黃褐色之舍利別也。以一五。○，乃至三。○。○，加於水劑二。○。○，服用之。

5 複方橙皮酒 *Vinum Aurantii Compositum*

此即以橙皮粗末二。○。○，桂皮粗末四。○，炭酸

加里一。○，龍胆越幾斯二。○，苦艾越幾斯二。

○，唯萊越幾斯二。○，加斯加拉越幾斯二。○，設里酒一。○。○，混和而浸製之。其法：先以橙皮，桂皮，及炭酸加里，浸於設里酒，濾過之；再加入各越幾斯，即成。

【學說】馬志曰：橙樹，似橘，而葉大。其形圓，大於橘，而香；皮厚，而酸，八月熟。

【別稱】又名金毯，餉殼。

獨活

(繖形科)

【學名】*Archangelica gnethif. DC.*

【產地】多自生於山野之中。

【基本】為越年生草，高六七尺，形似羌活。葉數回分枝，為大形之羽狀複葉；葉背微白，莖葉無毛茸，莖帶赤色。夏月開花，細小，白色。可採取其根，供為藥用之。

【功效】為鎮痛藥，可用於頭痛，及痛風等。

其氣味辛苦而溫，無毒。能發表，去溫。治一切風氣，遊風，頭痛，目赤，中風不語，口面喎斜，手足不遂，筋骨痠疼，百節痠痛，肌膚不仁，週身作

瘰，五勞七傷，產後諸風。並能瘦肝風，瀉肝氣，小無不入，大無不通，使風濕相搏。

【用量】一·五——四·五服用。

【採製】二月，八月採取，洗去土氣，剉乾，焙用。

獨脚蜂

【學名】*Sitta japonica*, Sin.

【基本】此屬膜翅類之有錐類，大形之蜂也。雌蜂之尾端，

有一劍狀突起，與長產卵管，產卵於樹木之枝葉上

。幼蟲，用銳顎，入植物之材質中，而食害之。

【功效】蠶云：能治疔腫，癰疽，可燒研和油塗之。

【學說】陳藏器曰：出嶺南，似小蜂，黑色。一足連樹根，

不得去，不能動搖，五月采之。又有獨脚蟻，亦連

樹根，不能動搖，功用，與蜂相同。

獨脚蓮

【基本】據百草鏡載：此藥，產廣東，根大如拳。春月發苗

，經霜雪則死。若善藏過冬，則來年宿根復發，苗

高丈許；葉大如杯，宛似荷葉，色綠，柔厚，莖有

細毛。六七月起莖，莖有白毛，開花，微垂，似山

蘭而小；其色微紅。

【功效】蠶云：能治疔腫，癰疽，以根，或醋酒磨塗；葉貼癰腫，能消。又治蛇蟲咬傷。

獨用將軍

【基本】據蘇恭云：生林野中，節節穿葉，心生，苗其葉似

楠，不時采根，葉，用之。

【功效】其味辛無毒。能消毒腫，乳癰，解毒，破惡血。

豎珀

【基本】爲琥珀 (Amber) 之黑色者，或因土色薰染，或

是一種木質結成，未必是千年琥珀復化也。

【成分】含有樹脂，揮發油，琥珀酸，硫黃，斯可企溼等。

【功效】其味甘，能補心，安神，破血，生肌；能治婦人癩

癩，小兒疳之，辟惡，磨滴，治目翳，赤障。

【別稱】又名堅。

硼砂 *Sal ammoniac*

【基本】爲一種鹽化銣，尋常無色，有特別之鹹味。銅之表

面，塗以硼砂，可止酸化。此外尚可供醫藥之用。

【成分】含有鹽化安母尼亞 $H_2N_2O_4$ 之成分。

【功效】爲祛痰藥。

其氣味鹹苦辛溫，有毒。能除積聚，破結血，止痛

，下血，療欬嗽，宿冷，去惡肉，生好肌。又治婦人男子羸瘦，積病，血氣不調，腸鳴，食飲不消，腰腳冷，痲痺，痰飲，喉中結氣，反胃，吐水。又能即健，除冷病，益陽事，補水臙，煖子宮，消瘀血，宿食不消，食肉飽脹，夜多小便，腰膝酸重，四肢不任，婦人血氣，疼痛，氣塊，痲痺，及血崩，帶下，惡疔；又去息肉；敷金疔，生肉，去目翳，贅肉，消內積，治疔腦，癩癩，積痢，骨哽，除痔瘡，疔贅。

【用量】〇・三——一。〇服用。

【別稱】又名欬鹽，北庭砂，氣砂，透骨將軍。

積雪草

(繖形科)

【學名】*Hypochaeris asiatica* L.

【產地】多自生於原野之間。

【基本】為一種小草，莖細，匍匐於地上，葉互生，形圓如錢狀，有長葉柄；開花頗小。其莖葉，可為藥用。

【成分】含有芳香性涼爽之揮發油，單寧等。

【功效】為強壯藥。

其莖葉氣味苦寒，無毒。能治大熱，惡疔，癰疽，

熱腫，丹毒，暴熱，小兒寒熱，腹內熱結，搗汁，服之。單用治癩癩，鼠漏，寒熱來往。又以鹽按貼腫毒，並風疹，疥癬，又可研汁，點滴赤眼腫。

【用量】一、五——四、五服用。

【學說】李時珍曰：按蘇恭注：薄荷，云一種蔓生，功用相似。蘇頌云：胡薄荷，與薄荷相類，但味少甘。

【別稱】又名胡薄荷，地錢草，連錢草，海蘇。

稔

(禾本科)

【學名】*Panicum eris-Galli*, var. *frumentaceum*.

【產地】多栽培於田圃之中。

【基本】為一年生草，莖高四尺餘，葉細長而尖；開花，甚小，種子，可供食料，亦供藥用。

【功效】其氣味甘澀，無毒。能補中，益氣，厚腸胃，健肌肉。

【學說】李時珍曰：稔子，山東，河南皆有。五月種之，苗如芟黍；八九月抽莖，有三稜，如水中蘆葦之莖，開細花，簇簇結穗，如粟穗，而分數歧，如鷹爪之狀，內有細子，如黍粒而細。其色赤；其稔甚薄；其味粗澀。

其味粗澀。

【別稱】又名龍爪葉，鴨爪草。

螢火蟲

【學名】*Luciola vithellus*, Linn.

【產地】多產於水邊之草上。

【基本】此屬鞘翅類之五節類，卵，幼蟲，成蟲，均有放光

性。卵形小，幼蟲蛆狀，放惡臭，以防敵。入於土

中，至翌春生長；再入土中，蛹化，因捕食小蟲，

為益蟲也。成蟲，長橢圓形，翅鞘略柔；頭與翅鞘

黑色，前胸之背面赤色；其中央稍有黑色部分，後

腹部之一二環節，有發光組織，夜間放光，是蓋氣

管內之酵素，在發光組織內，起化學作用也。其加

減呼吸，得令光，現其強弱。是光非獨供雌雄相索

之用，且為一種警戒色也。

【功效】其氣味辛而微溫，無毒。能明目，療青盲；治小兒

漫傷，熱氣，蟲毒，鬼疰；又通神精。

【別稱】又名夜光，即爛，夜爛，景天，救火，據火，撲火

，宵燭，丹鳥。

篤耨樹

【學名】*Toulicora Balsanum*, L.

(豆科)

【產地】多產於南美洲之原野。

【基本】為一種喬木，高七八丈許；葉為奇數羽狀複葉，互

生。開白花，花冠不整，為總狀花序，果實為莢。

此植物之莖幹，可能製取樹脂，即為篤耨拔樹膠

(*Balsamum toluianum*)可供藥用之。

【成分】含有篤耨拔樹膠、鞣質、硬黃褐色之塊。

【功效】為祛痰藥，常用為氣管過量之分泌；又有用於肺癆

，而配伍與結列阿曹篤等，服用之。

【用量】0.3—1.0為丸劑，膠囊劑等，服用之。

【製劑】篤耨拔樹膠、鞣質、硬黃褐色之塊。

此即以篤耨拔樹膠、鞣質、硬黃褐色之塊，

加水三五〇〇，混和而製成澄明微黃色，佳香味

之含利別，亦用為祛痰藥等；每日五〇—一三〇

〇分服之。

篤耨香

【基本】據李時珍云：篤耨香，出真臘國，樹之脂也。樹如

松形，其香，老則溢，色白，而透明者，名：白

篤耨。盛夏不融，香氣清遠。土人取後，夏月以火

炙樹，令脂液再溢，至冬乃凝，復收之。其香夏融

，冬結，以瓠瓢盛，置陰涼處，乃得不澀。難以樹皮者，則黑色，名黑駕糖，皆可供藥用之。

〔成分〕含有樹脂，澱粉，膠樣質等。

〔功效〕據云：能治面黑黧黯，同白附子，冬瓜子，白芨，石榴皮等分，研為細末，酒浸三日，洗面後，敷之，久則面瑩如玉。

蕤核

〔基本〕據韓保昇云：今出秦州，樹生，葉細似枸杞，而莢長，花白，子附。莖生紫赤色，大如五味子；莖多細刺。五月，六月熟，采實，日乾。蘇頌云：今河東，并州，亦有之。木高五七尺，莖間有刺。又據郭璞云：白接，小木也。叢生，有刺，實如耳環，紫赤，可食，即此也。

〔功效〕其仁氣味甘溫，無毒。能去心腹邪熱，結氣，可以明目。治目赤，痛傷，淚出，目腫，皆爛；又能益氣，強志，明耳目，破痰結，痞氣，鼽鼻，止鼻衄，凡不眠者，亦可食之。

〔採製〕取仁，以湯浸之，除去皮尖，擘作兩片，每四兩，用芒硝一兩，水通草七兩，同水煎之，經一伏時，

取仁，研膏，入藥用之。

〔別稱〕又名白接，

蕤蕒

〔基本〕據李時珍云：蕤蕒，有大小兩種：小者，即檢莢也。揉取仁，置為膏，味尤辛。人多以外物相和，不可不擇去之。入藥，皆用大蕤蕒，別有一種。

〔功效〕其氣味辛平，無毒。除五內邪氣，殺三蟲，化食穀，逐寸白蟲，止嗜息，消積冷，止心腹癢痛，除肌膚中風，肢節邪氣。治五痔，中惡，蟲毒，腸風，痔瘻，惡瘡，疥癬。又治婦人子宮風虛，小孩疳瀉，冷痢，得訶子，豆寇，最良。又和豬脂，持塗熱瘡；又和蜜，治濕癬；又和馬酪，治一切疥。

燕青

(十字花科)

〔學名〕*Barbarea caninifolia*, L.

〔產地〕庭園間，多栽培之。

〔基本〕為一年生草，或二年生草，根多肉，扁圓；葉大，略成葉匙狀，邊有細齒。春日開黃花，為總狀花序；果實成長角。其根葉及子，皆供藥用之。

〔功效〕其根葉氣味苦溫，無毒。能消食，下氣，治咳嗽，

止消渴，去心腹冷痛，及熱毒，風腫，乳癰。其子氣味苦辛而平，無毒。能明目，療黃疸，利小便，用水煮汁服之，治癰癤，積聚，雀亂，心腹膨脹。又入面膏，去黑黴，皺文；又和油敷蜘蛛咬傷。其花氣味辛平，無毒。治虛勞，眼暗，久服，夜間可以讀書。三月三日采花，陰乾，爲末，每服二錢，空心服用之。

【別稱】又名蔓菁，九莢菘，諸菘菜。

蕎

(馬鞭草科)

【學名】*Caryophyllis divaricata*, Maxim.

【產地】多生於山野之中。

【基本】爲一種臭性雜草，莖方形，高至三四尺；葉卵形，而尖，有鋸齒，對生。秋日枝梢分叉，開花；花冠唇形，呈青紫色。其根葉等，供藥用之。

【功效】其氣味甘寒，無毒。能調中，明目耳，煎汁服之，能明目，潤肺；又能消水氣，去濕痺，腳氣，頑痺，虛腫，小腹急，小便赤澀；並合赤小豆，煮食，勿與鹽絞汁服之，止消渴。又搗葉，敷毒腫。

【學說】陳藏器曰：生南方，廢稻田中。節節有根，着土，

如結縷草，堪飼馬，又曰：蕎生水田中，狀如結縷草，而葉長，馬食之。

【別稱】又名馬唐，馬飯，羊麻，羊粟，莛子，軒子。

蕎麥

(麥科)

【學名】*Polygonum esculentum* Moench.

【產地】多栽培於陸田之中，以北方爲最廣。

【基本】爲一年，或二年生草，高一二尺，莖赤；葉爲三角形，有長柄，互生。春夏開花，花小而白，列爲圓錐花序；實有三稜形，老則黑色。其實及莖葉，可供藥用之。

【功效】其實氣味甘平，無毒。能厚腸胃，益氣力，續精神，鍊五臟。用醋磨粉，塗治小兒丹毒，赤腫，熱瘡。又能降氣，寬胸，磨積滯，消熱腫，風痛，除白濁，白帶。以炒棗水調，炒鈔二錢，服之，治痢疾；炒焦熱水服之，治絞腸痧痛。其葉氣味相同，可作茹食，下氣，利耳目。其莖氣味相同，可燒灰，淋汁，取餘熬乾，同石灰等分，密收，能爛癬疽，蝕惡肉，去腐毒，最良。

【別稱】又名烏麥，花蕎。

蕨

(羊齒科亦作水龍骨科)

【學名】 *Pteridium aquilinum*, Kuhn.

【產地】多生於山野之間。

【基本】為多年生草，莖長，匍匐於地中，隨處生葉；葉大

為數回複葉，長三四尺，小葉有缺刻，其苗根可採

之，而供藥用。

【功效】其苗氣味甘寒而滑，無毒。能去暴熱，利水道，補

五臟不足，氣塞，經絡，筋骨間毒氣。其根可燒炭

，油調，救蛇傷。

【學說】李時珍曰：蕨，處處山中有之。二三月生芽，拳曲

狀，如小兒拳；長則展開，如鳳尾，高三四尺，其

莖嫩時，采取。

蕁麻

(蕁麻科)

【學名】 *Urtica Thunbergiana*, S. et Z.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為多年生草，春月抽莖，高二三尺，至秋則上部枯

死。其莖與葉，皆生毛，有刺戟性，觸之即自毛端

分泌液汁，能傷筋肉。葉卵形，端尖，緣邊有鋸齒

，葉柄較長，對生。夏秋之間，葉腋綴以穗狀花，

其皮多白色，有絲性纖維，而其稍光。其葉可採取之，而為藥用。

【功效】其氣味辛苦而寒，並有大毒。能治蛇毒，可搗塗之

。又治風疹，以此點之，一夜皆失。

【學說】李時珍曰：川，黔諸處，甚多。其莖有刺，高三三

尺；葉似花桑，或青，或紫者，入藥。

藜蘆

(十字花科)

【學名】 *Erythronium amurense*, L.

【產地】多栽培於田圃之中。

【基本】為二年生草，秋末生苗，塌於地面；翌春抽莖，高

三四尺；葉大，淡綠色，無葉柄，及托葉；葉身之

基部包圍於莖上。夏初莖梢着花，為總狀花序，呈

黃綠色。果實為長角，成熟則裂開，散出種子，紫

黑色，或黃色。其莖葉及子，皆供藥用之。

【成分】含有多量萊子油等。

【功效】為通經藥。

其莖葉氣味辛溫，無毒。治風遊，丹腫，乳癰，破

癰癩，結血。又治產後血風，瘡血，癩疽，痘疔，

又散血，消腫。其子氣味辛溫，無毒。能止夢中洩

糖，與皂交，又行滯血，破冷氣，消腫，散結，治難產，產後心腹諸疾，赤丹，熱腫，金瘡，血痔。

【用量】三〇——一〇〇服用。

【學說】李時珍曰：芸薹，方藥多用。諸家註，亦不明。今人不識為何菜，珍訪考之，乃今油菜也。

【別稱】又名寒菜，胡菜，葶菜，葶芥，油菜。

蕘花

(瑞香科)

【學名】*Wikstroemia japonica*, Miq.

【產地】多產於山地之間。

【基本】為落葉小灌木，幹高三四尺，枝葉俱對生。葉橢圓形，或卵狀橢圓形，葉端尖，全邊，長七八分許。

冬開枝梢着花，黃色，呈筒狀，可採取之，而供藥用之。

【功效】其氣味苦寒，有毒。治傷寒，溫瘧，下諸水，破積聚，堅硬，癩癩；又溲滋胸中留滯，飲食寒熱，邪氣，利水道，療痰飲，欬嗽，上氣，喉中腫滿，疰氣，蠱毒，瘡癬，氣塊。

【學說】李時珍曰：按蘇頌《經本草》言：絳州所出，莢花，黃色，謂之黃蕘花。其圖小株，花成簇生，恐即此

也。生時，色黃，乾則，如白。

搗車香

【基本】為一種芳香草類，生海南山谷。莖高數尺，葉黃，

花白，可為藥用。

【功效】其氣味辛溫，無毒。能辟鬼氣，去惡臭，及蠱魚，蛙蠱。又治霍亂，除惡氣。

衛矛

(衛矛科)

【學名】*Euonymus alata*, K. Koch.

【產地】多生於山野之間。

【基本】為落葉灌木，幹高六七尺餘，枝幹皆有突起，狀如剪刀。葉卵圓形，有鋸齒。夏開細花，淡黃綠色，

實扁而尖，熟則微黃，自裂，現紅肉，中有白色種子，結為蒴果。可採之，而供藥用。

【功效】其氣味苦寒，無毒。治女子崩中，下血，腹滿，汗出，除邪，殺鬼毒，蠱疰，中惡；去寸白蟲，消皮膚風毒，腫脹。療婦人血氣，破陳血，能落胎，去百邪，鬼魅，通月經，破癥結，止血崩，帶下，殺腹臟蟲，產後血咬腹痛。

【別稱】又名鬼箭，神箭。

豬

〔學名〕 *Sus Scrofa domestica*.

〔基本〕此屬有蹄類之不反芻類，體肥而大，富於脂肪，脚短，故運動不甚敏捷。齒完備，除金石外，無論新麩，均食之。鼻圓筒狀，突出前方，運動自由，適於掘土。肉富於滋養，可供食用，恐有鈎蠶蟲，旋毛蟲等之寄生，宜煮食之。其毛，可製刷，毛筆等。其脂肪供石鹼，蠟燭製造之用。昔時吾國多剖割其臟器，及各部組織，以供藥用之。

〔功效〕其肉苦而微寒，並有小毒。療病狂，久而不愈，又壓丹石，解熱毒，又能補腎氣虛竭。其脂肪，無毒。煎膏藥，解斑蝥，芫青毒；又解地膽毒長，野葛，硫黃毒，諸肝毒；又利腸胃，通小便，除五疳水腫，生毛髮，破冷結，散宿血，利血脈，散風熱，潤肺；又入膏藥，治諸疔，殺蟲，塗皮膚惡疔，瘰癧。其髓氣味甘寒，無毒。治撲損惡疔，塗小兒解頰，頭疔，及臍腫，眉疔，癩疥，服之補骨髓，益虛勞。其血氣味鹹平，無毒。生血，療貧血，暴氣，及海外瘴氣，中風，絕傷，頭風，眩暈，及淋瀝

，下血，以清酒和炒食之。又清油炒食，治疳雜，有蟲，壓丹石，解諸毒。其心血調朱砂末，服之，治驚癇，癩疾，惡死，及疔瘡倒靨。其心氣味甘鹹而平，無毒。治驚邪，憂恚，虛悸，氣逆，婦人產後中風，血氣，驚恐，補血不足，虛勞，小兒驚癇。其尾血治疔瘡倒靨，用一匙，調龍腦少許，新汲水服之；又治卒中，惡死。其肝氣味苦溫，無毒。治小兒驚癇，腳氣，冷勞，虛洩，久滑，赤白帶下。又補肝，明目，療肝虛，浮腫。其脾氣味澀平，無毒。去脾胃虛熱，同陳橘紅，人參，生薑，葱白，陳米，煮羹食之。其肺氣味甘而微寒，無毒。能補肺，療肺虛，欬嗽，以一具，竹刀切片，麻油炒熟，同粥食之。又治肺虛，嗽血，煮薑，蔥白仁末，食之。其腎氣味鹹冷，無毒。理腎氣，通膀胱，利水臟，暖腳膝，治耳聾，補虛，壯氣，消積滯，除冷痢，止消渴，治產勞虛汗，下痢，崩中。其脛氣味甘平，無毒。治肺痿欬嗽，和棗肉，浸酒服之，亦治痲痺，羸瘦，又療肺氣，乾脹，喘急，潤五臟，野薑，殺斑蝥，地膽毒，治冷痢成虛，一切肺

病欬嗽，膿血不止，以薄竹筒，盛於糖火中，煨熟食之。其肚氣味甘而微溫，無毒。補中，益氣，止渴，斷痢，補虛損，殺勞蟲，治小兒疳積，黃瘦病，骨蒸，熱勞，血脈不行，補氣，助氣，四季宜食。又消積聚，癰疽，治惡疔。其腸氣味甘而微寒，無毒。止虛渴，利小便，補下焦，能去大小腸風熱。其脬氣味甘鹹而寒，無毒。治夢中遺溺，疝氣，墜痛，陰囊濕癢，玉莖生疔。其膽氣味苦寒，無毒。治傷寒，熱渴，骨熱，勞熱，消渴，小兒五疳，殺蟲，通小便，敷惡疔，殺疳蠱，治目赤。其膽皮治目翳，如重者，取皮曬乾，作兩股繩，如筋，可燒灰，出火毒，點之，即效。其膚氣味甘寒，無毒。治下痢，咽痛。其耳垢治蛇傷，狗咬，塗之。其鼻唇能治凍疔，痛癢。其鬚治項下癭氣。其齒治小兒驚癇，五月五日，取之燒灰，服用。又治蛇咬，疔疔倒陷。其骨燒灰治瘡陷，煎汁服之，解丹藥毒。其卵氣味甘溫，無毒。治驚癇，癩疾，鬼疔，蟲毒，禁縮，陰痛。其乳氣味甘鹹而寒，無毒。治小兒疳積，去來寒熱。其蹄煮汁服之，能下乳汁，解

百藥毒。煮清汁能洗瘡疽，熱毒可消毒氣，去惡肉。其懸蹄治五痔，腸癰，煉之，能辟一切惡疔。其尾治喉痺，和豬脂，塗赤禿，髮落。其毛燒灰，麻油調塗燙傷。其尿治寒熱，黃疸，濕痺，除蠱毒，天行熱病，痘疔，疔癩，又能除熱，解毒，治瘡，止血。

【別稱】又名豚，豕，豕，豕，豕。

豬脊 *Pig. ribs*

【基本】據李時珍云：豬脊，亦是木之餘氣所結，如松之餘氣結茯苓之義，他木皆有，楓木爲多耳！此呈不正圓塊，外面黑色，內面白色，可供藥用之。

【功效】爲利尿藥。

其氣味甘平，無毒。治痰癆，解毒，蠱毒，利水道，消腫脹，解傷寒溫疫，大熱，發汗，急痛，又除濕，去心中懊惱，瀉膀胱，開腠理，治淋腫，腳氣，白濁，帶下，妊娠子淋，胎腫，小便不利。

【用量】二。〇——四。〇服之。

【採製】採得，削去粗皮，薄切，以水浸一夜，至明濾出，細切，以升麻葉對蒸一日，去葉，晒乾，用之。

「別稱」又名柔豕，地烏桃。

豬腰子

「基本」據李時珍云：豬腰子，生柳州，蔓生。結莢，內子大若猪之內腎，狀酷似之，長三四寸，色紫，而肉堅，亦有為藥用之者。

「功效」其氣味甘而微辛，無毒。治一切瘡毒，箭傷，可研細末，用酒服一二錢，並可塗之。

獾

「基本」據李時珍云：獾，即今豬權也；處處山野間有之，穴居。狀似小豬狷形，體肥，而行鈍。其耳聾，見人乃走，短尾，短足，尖喙，褐毛，能孔地食蟲蟻，瓜果。其肉帶土氣，皮毛不如狗獾。

「功效」其肉氣味甘酸而平，無毒。治水脹，可作羹食之。又治下痢，赤白，可灸肉露一宿，空腹和醬食，一頓即瘥。又治上氣，虛乏，欬逆，勞熱，利五味羹食。其膏治蜂蟻蟲毒，胸中哽噎，休休如蟲行，欬血，以酒和服之，或下，或吐，或自消也。其胞治蟲毒，以臘月乾者，湯厚如雞子許，空腹服之。其骨治上氣，欬嗽，多研酒服之。

貓

「學名」*Felis domesticus* Briss.

「基本」此屬食肉類之貓科，性好潔而惡寒，常被飼於人，而捕家鼠，趾之表面，具有柔肉，故行走並不發音；又由高處轉落時，亦不感激動。晝間瞳孔縮小，為「」字形，至夜則瞳孔散大，為圓形。耳能前後搖動，得知音來之方向，聽覺，視覺均甚敏銳，鬚鬚觸覺作用，可知通過隙間之大小。

「功效」其肉氣味甘酸而溫，無毒。治勞疰，鼠癘，蟲毒。其頭骨氣味甘溫，無毒。治鬼疰，蠱毒，心腹痛，殺蟲，治疳，及疔疔變黑，癩瘰，鼠癘，惡瘡。其腦之功效，與肉相同。其眼睛治癩癧，鼠癘，可燒灰服之，其牙，舌，涎之功效，與肉相同。其肝治癆瘵，殺蟲，取黑貓肝一具，生曬研末，每劑望，五更酒調服之。其胞衣治反胃，吐食，燒灰入硃砂末少許，壓於舌下，甚效。其皮毛之功效，亦與肉相同。其尿治蟻蝨諸蟲入耳，滴入，即出。其屎之功效，與肉亦大略相同。

「別稱」又名家狸。

赭魁

「基本」據李時珍云：赭魁，閩人用之，染青腫中，云易上色。沈括筆談云：本草所謂赭魁，皆未詳審，今南中極多，膚黑，肉赤，似何首烏，切破，中有赤理，如檳榔，有汁，赤如赭。彼人以染皮，製靴。閩人謂之餘糧；本草石部禹餘糧，陶氏所引，乃此物也。謹按沈氏所說：赭魁甚明，但謂是禹餘糧者非矣。禹餘糧，乃今之土茯苓，可食，故得糧名；赭魁不可食，豈得稱糧耶！土卵，即土芋也。

「功效」其根氣味甘平，無毒。能除心腹積聚，硬結，殺三蟲，療疥癬。

醒醋菜

「基本」據李時珍云：按唐慎微，證類本草，收此，而形狀莫考；惟雷斅炮炙論云：形似牛皮，蔓指之，有乳汁出，香甜。入頂采得，以苦竹刀細切，入砂盆中，研如膏，用生絹按汁出，暖飲；然亦不云，治何病也。

「功效」其氣味甘溫，無毒。治風水不利，痔瘻，絞汁，和酒，蒸服一盞。

銅鐵 Ferrum

「基本」據云：銅鐵，有三種：有生鐵，夾熟鐵煉成者；有精鐵，百煉出銅者，有西南海山中生成，狀如紫石英者。凡刀劍斧鑿諸刃，皆是銅鐵。其針砂，鐵粉，鐵精，亦皆用銅鐵者。

「功效」其氣味甘平，無毒。治金瘡，煩滿，熱中，胸膈氣塞，食不消化。其鐵粉氣味鹹平，無毒。能安心神，堅骨髓，除百病，潤肌膚，化痰，鎮心，抑肝邪特異。其鐵砂之功效相同，和沒食子，染鬚，至黑。又能消積聚，腫滿，黃疸，平肝氣，散癥。

「用量」鐵粉之用量，一日二三回，以〇・〇一—〇・〇五—〇・一為粉劑，丸劑等服用之。

「別稱」又名跳鐵。

錦地羅

「基本」據李時珍云：錦地羅，生廣西慶雲山岩間，鎮安，歸順，柳州皆有之。根似葶藶，及栝樓根狀；彼人頗重之，以充方物。

「功效」其根氣味微苦而平，無毒。治山嵐，瘴毒，疔毒，並諸毒，以根研之，用酒服一錢。

錫 Stannum

「基本」爲化學原質⁸²之一，天然存在者，爲二硫化錫，即錫石金礦中，亦有存在者，然其量甚微。呈青白色，頗具延展性。

「功效」其氣味甘寒，微毒。治惡毒，風疔。

錫樣脂

「基本」據李時珍云：此乃波斯國，銀礦。一作：悉蘭脂。「功效」據云：能治目生翳膜，用火燒銅鐵輕點，乃敷之。痛。又治一切風氣，及三焦消渴，能入丸藥用之。

駱駝脂 Camelina

「基本」此屬有蹄類之反芻類，頭部，頸部，背部生長毛，各肢有二蹄，牝牡均缺角，亞弗利加產，及亞利比亞者，體略小，有一峰，名曰：單峰駱駝。中央亞細亞，體大，有二峰，名曰：雙峰駱駝。肉峰者，方脂肪堆積，所謂養分之貯藏部分是也。其性溫柔，貨物時跪而受之。

「功效」其脂氣味甘溫，無毒。能治頑痺，風癢，惡瘡，毒腫，死肌，筋皮攣縮，跌損筋骨，以火炙摩之，取熱，又和粉米作煎餅，食之，療痔，治一切風疾，

皮膚急痺，及虛勞，而有冷積者，以燒酒服之。其肉氣味甘溫，無毒。治諸風，下氣，壯筋骨，潤肌膚，治惡瘡。其乳氣味甘冷，無毒。能補中，益氣，壯筋骨。其黃氣味苦平，微毒。治風熱，驚疾。其毛治婦人赤白帶下。

「別稱」又名駝，袁駝。

鮑魚 Aetolopne

「產地」多生於海水之中。「基本」爲鮑魚類 (Polyplouduana) 之一種，體呈灰色，微紅色，及綠色不等，而形狀亦各異。

「功效」其肉氣味辛溫，無毒。能治跌折，墜落，瘀血，血痺，在四肢不散者。女子崩中，血不止者，可煮汁食之。又治女子血枯。

鮐魚

「基本」據云：鮐魚，生走獸，及牛馬諸畜肝膽之間，有肉囊裹之，多至升許。大者，如雞子；小者，如栗，如棗。其狀白色，似石，非石；似骨，非骨，即打破解聲，而備用之。

「功效」其氣味甘鹹而平，無毒。能治驚癇，毒瘡。

鴉

【學名】*Strix uralensis* Pallus

【基本】此屬猛禽之鳥類，雖與鴉鵂相似，而比較之，異點甚多。鴉之體大，呈黑褐色。頭側並無毛角，是其不同耳！

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。治鼠瘻，可炙食之。又治風癩，噉食。其頭治瘡瘡黑陷，用臘月者，一二枚燒灰，酒服之，當起。其目吞之，能令人夜見鬼物。

鴉

【學名】*Milvius ater* molanatus T. & S.

【基本】此屬猛禽類鷹科，擴張長翼，與大尾作輪狀高飛，徐索地下之食。視力銳，黑烟野火時，能拾蟲類。

【功效】其頭氣味鹹平，無毒。能治頭風，目眩，顛倒，癩疾，癩癩，癩癩。其肉食之，能治癩癩。其骨能治鼻閉不止，取老鴉翅關大骨，微炙，研末，吹之。

【別稱】又名雀鷹，鳶，隼，鵟。

鴉

【學名】*Scozia caudifurca* T. & S.

【基本】此屬鴉類，頭部圓形，上嘴鈎曲，先端銳，以覆下

嘴。眼大而圓，周圍有毛圈。頭之兩側，突出角羽，狀恰如耳，故一名耳木兔。體色淡褐，多黑色之斑紋，後頸有青色之條帶。腳強壯，至足之趾部，被以羽毛，爪銳。

【功效】其肉能治瘧疾，用一隻，去毛，腸，油燻食之。

鴨跖草

(鴨跖草科)

【學名】*Commelinum communis* L.

【產地】多生於山野，亦有生於路傍，及旱田者。

【基本】為多年生草，莖高一尺許，質柔，常傾臥於地面。葉為廣披針形，與竹相似，較厚而柔；葉柄如鞘狀，圍包於莖上，互生。夏日莖梢着花，花冠藍色。其苗，可為藥用之。

【功效】其苗氣味苦而大寒，無毒。治寒熱，瘧疾，痲疾，疔腫，肉癢，澀滯，小兒丹毒，發熱，狂癩，大腹疝滿，身面氣腫，熱痢，蛇犬咬傷，癰疽。又和赤小豆，煮食能下水氣，濕痺，利小便，消癰痺。

【學說】李時珍曰：竹葉菜，處處平地有之。三四月生苗，紫莖，竹葉，嫩時，可食。四五月開花，如蟻形，兩葉如翅，碧色，可愛。

〔別稱〕又名冬鷄舌草，碧竹子，竹鷄草，竹葉菜，淡竹葉

，耳環草，碧輝花，藍姑草。

鴛鴦

〔學名〕*Ax. galericulata*, L.

〔基本〕此屬游禽類，秋來春去，候鳥也。雄有各色之羽毛

，頗美麗。臂翼有一對直立，左右相對；其下部，

呈琉璃色，後側稍有黑色部。雌之臂翼亦稍有琉璃

色之部分；但不似雄之直立。雌雄之外觀，均有銀

灰色之部分，雌雄雙棲，極為親睦。

〔功效〕其肉氣味鹹平，而有小毒。能治諸癰，疥癬，以酒

浸炙，令熱，敷貼瘡上，冷即易。又以清酒炙食，

治瘰癧。

〔別稱〕又名黃鴨，匹鳥。

龍荔

〔基本〕據范成大桂海志云：龍荔，出嶺南，狀如小荔枝，

而肉味如龍眼。其木之身葉，亦似二果，故名曰：

龍荔。三月開小白花，與荔枝同時熟，不可生噉；

但可蒸食。

〔功效〕其實氣味甘溫，而有小毒。生食之，能令人發癩，

或見鬼物。

龍骨

〔基本〕為象類動物 (*Mastodon*) 之骨，埋沒於土中，年久即

化為石，每於地下掘出，而供藥用之。

〔功效〕為強壯藥。

其氣味甘平，無毒。能治心腹鬼疰，欬逆，洩痢，

膿血，女子漏下，癰癧，堅結，小兒熱氣，驚癇，

心腹煩滿，恚怒，腸癰，內疽，陰蝕，四肢痿枯，

夜臥自驚，汗出，溺血，養精神，定魂魄，止洩精

，縮小便，逐邪氣，止夜夢，去冷痢，下膿血，女

子崩中，帶下，懷孕，漏胎，止腸風，下血，鼻洪

，吐血，止瀉，消渴，健脾，澀腸胃，益腎，鎮驚

，止陰瘡，收濕氣，脫肛，能生肌，斂瘡。

〔用量〕一。〇——五。〇服用。

〔禁忌〕忌鐵；畏石苔。

龍珠

〔學名〕*Capitium anomalum*, Fr. et Sav.

〔產地〕多生於山野之間。

〔基本〕為一種有毒之植物，葉長卵形。夏日開花，有花柄

(茄科)

，常二花叢生於葉腋，亦有二花以上者，花冠淡黃色；果實多汁，球形，紅色，其苗，可爲藥用之。

【功效】其苗氣味苦寒，無毒。能治諸熱毒，石氣發動，可

以調中，解煩。其子能治疔腫。

【學說】李時珍曰：龍球，龍葵，雖以子之黑，亦分別；其

實一物，二色，強分爲二者也。

【別稱】又名赤珠。

龍眼

(無患子科)

【學名】*Nephelium longana*, Camb.

【產地】吾國福建，廣東各省，爲最多。

【基本】爲常綠喬木，莖高十五尺許，葉爲羽狀複葉，小葉

無坐端，開花五瓣，萼之裂片，排列如覆瓦樣；果

實圓形，被以剛毛，種子有假種，皮肉質，可爲藥

用之。

【成分】含有葡萄糖，蔗糖，澱粉，堊基斯篤林，及酸類。

【功效】爲滋養強壯藥，對於健忘，神經性心悸亢進，神經

衰弱之失眠等，皆可服用之。

其實氣味甘平，無毒。除五臟邪氣，安志，厭食，

除蓋毒，去三蟲，久服，強魂，聰明，開胃，益脾

，補虛，長智。其核治胡臭，以六枚，同胡椒二七枚，研末，遇汗時用之。

【用量】二〇——八〇服用。

【別稱】又名龍目，圓眼，益智，亞荔枝，荔枝奴，驢珠，

燕卵，蜜脾，酸淚，川彈子。

龍葵

(茄科)

【學名】*Solanum nigra*, L.

【產地】多生於原野之間。

【基本】爲一年生草，高三三尺許，葉卵形，全邊。夏月梢

葉之中間，抽出花莖，花小，白色，爲繖形花序；

果實爲漿果，大似豌豆之種子，球形，黑色。其苗

葉等，皆供藥用之。

【功效】其苗氣味苦微，甘而滑寒，無毒。食之，解勞，少

睡，去虛熱腫，治風疾，益男子元氣，女子敗血，

消熱，散血，壓丹石毒，皆宜食之。其根氣味相同

，搗爛，和土，敷疔腫，丹疥，癰疽，腫毒，跌撲

損傷，能消腫，散血。用根與木通胡荽煎湯，服之

，通小便。其子治疔腫，能明目，亦益男子元氣，

婦人敗血，又治風疾。

〔學說〕李時珍曰：龍葵龍珠，一類二種也；皆處處有之。

〔別稱〕又名苦葵，苦菜，天茄子，水茄，天泡草，老鴨酸

漿草，老鴨眼睛草。

龍膽

(龍膽科)

〔學名〕*Gentiana scabra*, Bge. var. *Bungei* Maxim.

〔產地〕多生於山野，及原野之間。

〔基本〕為多年生草，高一二尺許，葉對生，廣披針形，或

長卵形而尖，無葉柄。秋月莖頂常有數花，叢生，

或生於上部之葉腋，合瓣花冠，青色。其根可採取

之，而為藥用。

〔成分〕含有苦味越巂斯質，黃色素，脂肪油等

〔功效〕為健胃藥。

其根氣味苦澀大寒，無毒。能治骨間寒熱，驚癇，

邪氣，續絕傷，定五臟，殺蠱毒，除胃中伏熱，時

氣，溫熱，熱泄，下痢，去腸中小蟲，益肝膽氣，

止驚傷；又治小兒壯熱，骨熱，驚癇，天行時疾，

熱黃，瘰癧，口乾，客忤，疰氣，熱狂；又能明目

，止煩；去目黃，及睛赤，腫脹，癬肉高起疼痛，

退肝經邪熱，除下焦濕熱，瀉膀胱火，療咽喉痛，

風熱，盜汗。

〔用量〕一回〇・五——一・五服用。

〔製劑〕1 龍胆越巂斯 Extractum *Gentiana scabrae*

此即以龍胆根三〇〇，酒精五〇〇，溜水五〇

〇，其浸而製成褐色之越巂斯，於水中溶解之，

則澄明。一日數回，以〇・五——二・〇為九劑，

或溶液服用之。

2 龍胆丁幾 Tinctura *Gentiana scabrae*

此即以龍胆根一〇〇，稀酒精五〇〇〇，浸而

壓濾之，即得澄明赤褐色之液體。一日二三回，以

一〇〇——二〇〇，用於消化不良等；又有以五〇

〇——一〇〇〇，加於其他種水劑一五〇〇〇——

二〇〇〇，而服者。

3 複方龍胆丁幾 Tinctura *Gentiana scabrae* composita

此即以龍胆根五〇，橙皮三七〇，小豆蔻一二

〇〇，酒精四一六〇，溜水五〇〇〇，供浸而

壓濾之，製成帶赤黃褐色之液。一日數回，一回

十滴，乃至三十滴服用之。

〔禁忌〕惡地黃，防麥。

「採製」取根陰乾，用時，銅刀切去鬚及頭子，剖細，以甘草湯浸一宿，漚出，暴乾，用之。

「學說」名醫別錄曰：龍膽，生齊胸山谷，及兔句。二月，八月，十一月，十二月采根，陰乾。

「別稱」又名陵游。

龍舌草

「基本」據李時珍云：龍舌，生南方迪澤湖泊中，葉如大葉蕨葉，及芋莖狀。根生水底，抽莖出水，開白花；根似胡蘿蔔根而香，榨汁，能軟鴉鴨卵。其全草，可爲藥用之。

「功效」其氣味甘鹹而寒，無毒。能治癰疽，燙火灼傷，可搗塗之，卽愈。

龍常草

(禾本科)

「學名」*Dianthem japonica*, Cyr. var. *Koeningii*, Thunb.

「產地」多生於山地之間。

「基本」爲多年生草，莖初略臥於地，自下部之節生根，高二三尺；葉頗長，闊亦四五分；葉端尖銳。秋月稍端，抽穗疎，着長形之小穗花，呈綠色。其莖可採之，而供藥用。

「成分」含有少量沃度，及澱粉等。

「功效」其莖氣味鹹溫，無毒。能益陰氣。療痺寒，濕氣。

「學說」李時珍曰：生河水旁，狀如龍鶴；冬夏生。又郭璞云：纖細似龍鬚，可爲席。蜀中出者好，恐卽此龍常草也。

常草也。

「別稱」又名蘇心草。

龍腦香

(龍腦樹科)

「學名」*Dryobalanus Cuneiformis*, Colub.

「產地」多產於東印度之湖泥，蘇門答臘之南岸。

「基本」爲常綠喬木，高十丈餘，葉爲卵形；花爲合瓣花冠。

○其香芬郁，以幹中樹脂，製成一種白色結晶體之塊末，現多以樟腦溶解於酒精中，加餉而製成之。

「成分」含有揮發油等。

「功效」爲興奮藥，祛痰藥。

其氣味辛苦微寒，無毒。治婦人產難，研末少許，新汲水服之，立下。又去心腹邪氣，風濕積聚，耳聾，明目；又療目赤膚癢，內外障眼，能鎮心，秘精，殺三蟲，去五痔，散心熱，治骨痛，療癩痺，腦痛，鼻痛，齒痛，傷寒，舌腫，小兒疳陷，通諸

竅，散鬱火。其子氣味辛溫，氣似龍腦，能下惡氣，消食，散脹滿。

【用量】〇·一五——〇·四五服用之。

【採製】取龍腦香，合糯米炭，相思子，貯之，則不耗。又言：以雞毛，相思子，同入小盂罐，密收之，佳。又有以杉木炭，養之，更良，不耗。今人多以樟腦升打亂之，不可不辨也。

【學說】李時珍曰：龍腦香，南番諸國，皆有之。葉廷珪香錄云：乃深山窮谷中，千年老杉樹，其枝幹不曾損動者，則有香。

【別稱】又名片腦，舊名：婆律香。

龍鬚菜

(百合科)

【學名】*Asparagus officinalis*, L.

【產地】多生於海邊之岸石上。

【基本】爲宿根草，高三四尺；葉小而不顯着，爲鱗片形；

葉腋所生之枝，綠色細長，而成葉狀。六月間開小

白花，花梗頗長；花後結實，爲紅色漿果，嫩莖，

可食，亦供藥用。

【功效】其氣味甘寒，無毒。治癰結，執氣，利小便。

【學說】李時珍曰：龍鬚菜，生東南海邊石上。叢生，無枝葉，狀如柳，根鬚長者，尺餘，白色，以醋浸食之，和肉蒸食，亦佳。博物志，一種石髮，似指此物，與石衣之石髮，同名也。

龜

【學名】*Chelonia japonica* Gehrig.

【產地】多棲息於池沼之中。

【基本】此龜形小，背甲扁平，呈暗褐色。腹甲黑色。雌之背甲後部，具有隆起，得與雄而區別之。多取其甲板(即龜板)，供藥用之。

【成分】含有磷酸鈣，與碳酸鈣，及膠樣質。

【功效】爲強壯藥。

其氣味甘平，有毒。能補心，益腎，滋陰，增智。治陰血不足，骨蒸勞熱，腰脚痠痛，久瀉，久痢，久嗽，癩瘡，崩漏，五痔，難產，血弱。

【用量】甲板用三。〇——九。〇煎服。

【禁忌】惡人參，沙參。

【採製】取龜甲，鋸去四邊，石上磨淨，更以灰火炮過，塗酥炙黃。(亦可酒炙，醋炙，脂炙。)備用。

〔別稱〕又名玄衣督郵；其甲又名牌屋，敗將，漏天棧。

第十七畫

營實 牆靡

(薔薇科)

〔學名〕*Rosa Multiflora*, Thunb.

〔產地〕多生於原野，或栽培於庭園之內。

〔基本〕爲落葉灌木，有刺，莖細，高三四尺許；葉爲奇數羽狀複葉，略有毛。初夏枝梢着花，爲圓錐花序，色白，或淡紅。結實成簇，生青，熟紅，有白毛，如金櫻子核狀，可取爲藥用，卽爲營實也；其根亦供藥用之。

〔功效〕實爲瀉下藥，利尿藥。

其營實氣味酸溫，無毒。治癰疽，惡瘡，結肉，跌筋，敗疔，熱氣，陰蝕，利關節，益氣血，治上焦有熱。其根氣味苦澀而冷，無毒。能止洩痢，腹痛，五臟客熱，除邪逆氣，治諸惡疔，金瘡，又能生肉，復肌，治熱毒風，除邪氣，止赤白痢，腸風，瀉血，通結血，治牙齒痛，小兒疳蟲，肚痛，癩疽，疥癬，頭疔，白禿，除風熱，濕熱，縮小便，止消渴。

〔用量〕實用二·五——七·〇服用。

〔學說〕李時珍曰：薔薇，野生林壑間。春抽嫩棘，小兒拾

去皮刺，食之。旣長成叢，似蔓而莖硬，多刺。小葉尖薄，有細齒。四五月開花，四出，黃心，有白色，粉紅色二者，結子成簇，生青，熟紅。其核有毛，如金櫻子核，八月採之；根采，無時。

〔別稱〕又名薔薇，山棘，牛棘，牛勒，刺花。

檀

〔基本〕據李時珍云：檀有黃，白二種；葉皆如槐，皮青而澤，肌細而膩；體重而堅，狀與梓榆，莢蓬相似。

〔功效〕其皮及根皮氣味辛平，而有毒。皮和榆皮爲粉，食之，可斷穀，救荒。根皮，能塗疔疥，殺蟲。

檀栢

〔基本〕據陳藏器云：檀栢，乃百歲藥之根，如天門冬，長三四尺，別在一旁，以小根綴之。一名檀栢芝，出靈寶方。李時珍云：本經但言：黃蘗根，名曰：檀栢，陳氏所說：乃藥旁所生檀栢芝也；與肉苁蓉所說：相同。

〔功效〕其氣味苦寒，無毒。能治心腹百病，安魂魄，通神

志，去百病；為散，飲服，有驗。

檉柳 (西河柳科)

【學名】*Tamarix chinensis* Lour.

【產地】多生於原野之濕地。

【基本】為落葉喬木，莖高十尺許，枝細長，密生小葉，如鱗狀。夏月自枝梢抽出花軸，似穗狀小花；萼片五枚，綠色；花瓣五枚，紫紅色，為總狀花序。其木及枝葉等，可供藥用。

【成分】含有多樹脂，及膠樣質等。

【功效】其木氣味甘鹹而溫，無毒。能剝膿馬血入肉中毒，取木片，火炙熨之，並煮汁，浸之。其枝葉能消痞，解酒毒，利小便。其乳合質汗藥，能治金瘡。

【用量】一。五——四。五服用。

【學說】李時珍曰：檉柳，小幹，弱枝，插之易生；赤皮，細葉，如絲，阿娜可愛，一年三次作花。

【別稱】又名赤檉，赤楊，河柳，甯柳，垂絲柳，三眠柳，

觀音柳。

螳螂

【學名】*Tenodera arifolia* Stål

【基本】此屬直翅類，頭部三角形，前胸細長，腹部肥而長

，複眼頗大，觸角鞭狀。其著明之特徵，在前腳之大變為鎌狀是也。前腳之股節有溝，脛節有齒狀突起，互相適合，便於捕蟲之用。卵塊產附樹枝，初為白色，次第變為褐色。

【功效】據云：此蟲能治小兒急驚，搖搦，又出箭鏃；生者可食拭目。其子房名曰：桑螵蛸，已另條記載，可參考之。

【別稱】又名刀螳，拒斧，不過；其子房名，標蝟。

螺曆草 (水龍骨科)

【學名】*Drymoglossum Sibiricum*, Koz.

【產地】多產生於岸石之上。

【基本】為一種蔓生草，根莖為絲狀，而匍匐，時有長達數尺者。莖面有鱗片狀之暗褐色毛；且各處發根。葉有裸葉，質葉之別。裸葉卵形；質葉狹長。其質皆厚，表面滑澤。可採取之，而供藥用。

【功效】其味辛，能治癰腫，風疹，腳氣，腫脹，可搗爛敷之，亦煮湯，洗腫處。又治小便出血，吐血，衄血，齒痛。

【學說】陳澂器曰：蔓生石上，葉狀如蝶，微帶赤色；面
光如鏡，背有少毛，小草也。

【別稱】又名錢面草。

蟻姑

【學名】*Gryllotalpa atrivittata*, Pall.

【基本】此屬直翅類，前胸橢圓形，翅短小，腹末有一對尾
狀之附屬物。前脚之股節，與脛節之幅寬，且附節
非常發達，適於掘地。棲息土中，害作植物之根。
其性忌臭氣，以油類得驅除之。

【功效】其氣味鹹寒，無毒。能治產難，肉中刺潰，癰腫，
又能下痢噎，解毒，除惡疔，消水腫，面腫，利大
小便，通石淋，治瘰癧，骨哽，口瘡，甚效。

【別稱】又名蟻姑，天蟻，仙姑，石鼠，梧鼠，土狗。

蟻蟻

Alysius

【基本】為真正蜘蛛類之一種，體黑褐色，於樹木石垣之根
部，作長囊，伏居其囊底。其囊底埋沒於地中，以
上端附着他物，捕食觸囊之蟲，或夜出索食。

【功效】據云：此蟲有毒，能治一切疔腫，附骨疽，使瘡，
宿肉，贅瘤，可燒末，和臘月豬脂，敷之，亦可同

諸藥，敷疔腫。

【別稱】又名顏當蟲，土蜘蛛。

蟋蟀

【學名】*Gryllodes hortellus* Sauss

【基本】此屬直翅類，全身黑褐色，有二本尾角，觸角鞭狀
，頗長。前翅狹長，後翅寬，後腳長大，便於跳行
。雌蟲體大，前翅有網狀之脈，且腹末具產卵管；
產卵管愈長者，產卵於土中愈深。雄蟲體小，前翅
有波狀線，使前翅斜向摩擦，可以發音，為葷類，
葷類等之害蟲也。又油葫蘆，頭部大，呈三角形，
較普通種體大，食葷類，烟草，粟草，棉等。又
三稜蟋蟀，較普通種稍小，呈暗褐色，頭部之前方
為截形。又有草蟋蟀，為最小之蟲也。

【功效】據藥性考載：此蟲辛鹹而溫，能發痘，勝於桑蟲，
又治跌撲傷，小肚尿閉，用蟋蟀一枚，煎服之，立
驗；又治小兒遺尿，男婦小水不通，痛脹不止。

廣蟲

【學名】*Manuifera brancata* L.

【基本】據名醫別錄云：生河東川澤，及沙中，人家牆壁下

，土中濕處。十月采之，暴乾。陶弘景云：形扁如鼈，有甲，不能飛，小有臭氣。蘇頌云：此物好生鼠壤土中，及屋壁下；狀似鼠婦，而大者，寸餘，形小，似鼈，無甲，而有鱗。小兒多捕，以負物爲戲。李時珍云：處處有之，與燈蛾，相牝牡。

【功效】其氣味鹹寒，有毒。能去心腹寒熱，血積，癰瘕，破堅硬，下血閉，通月水，破留血，積聚，利乳脈；又行產後血積，折傷瘀血；又治重舌，木舌，口疳，小兒腹痛，夜啼。

【用量】一。〇——一。五服用。

【禁忌】畏皂莢，萹蒲，犀遊。

【別稱】又名地鼈，土鼈，地蟬蟲，窠箕蟲，過街。

薄荷

(唇形科)

【學名】*Mentha arvensis*, L. var. *pipermint*; *Peppermint*.

【產地】多生於山野之中，或栽培於園圃之間。

【基本】爲多年生草，莖方形，高二尺許；葉爲卵形，端尖，有鋸齒。秋月開淡紫花，花冠作唇形，叢生於葉腋。其莖葉，有特別香氣，可供藥用之。

【成分】含有一種揮發油，及單寧等。

【功效】爲興奮藥，健胃藥，又爲通經藥等。

其莖葉氣味辛溫，無毒。能治賊風，傷寒，發汗，惡氣，心腹脹滿，霍亂，宿食不消，下氣；煮汁服之，發汗，大解勞乏，亦堪生食。作菜久食，却腎氣，辟邪毒，除勞氣，令人口气香潔。又煎湯，能洗漆瘡。通關節，發毒汗，去積氣，破血，止痢；療頭痛，中風，失音，吐痰，及小兒風涎，爲要藥。榨汁服之，去心臟風熱。清頭目，除風熱，利咽喉，口齒諸病。治癩癧，疥疥，風瘙，癩疹；搗汁含漱，去舌苔，語塞；可採葉塞鼻，止衄血，又塗蜂螫，蛇傷。

【用量】〇。六——三。〇服用。

【製劑】薄荷油 *Oleum menthae*

此即由薄荷葉與水，蒸溜而得之芳香涼爽性之揮發油，呈淡黃色之稍帶綠色液體。其功效作用，具有殺菌力；並用爲鎮痙藥，驅風藥，及衝動藥；可用〇。〇五——〇。一五爲內服量。

2 薄荷霜 *Menthol*

此亦薄荷之製劑，爲無色針狀結晶體。其功效，及

用甚，與油相同。

【學說】李時珍曰：薄荷，人多栽蒔，二月宿根生苗，清明

前後分之，方莖，赤色。其莖對生，初蒔形長，而

頭圓，及長則尖。吳越川湖人，多以代茶。

【別稱】又名蒔蒻，蕃荷菜，南薄荷，金錢薄荷。

薑石

【基本】據蘇恭云：薑石，所在有之，生土石間。狀如薑，

有五種，以色石而爛不瘞者，為良。齊城，歷城東

者最好，采取無時。

【功效】其氣味鹹寒，無毒。能治熱疾，瘰癧，痘疔，疔毒

，惡腫。

薑黃

(薑荷科亦作薑科)

【學名】*Curcuma longa*, L.

【產地】吾國原野最多，亦有栽種者。

【基本】為多年生草，葉為長橢圓形，背有軟毛。夏初發芽

，並抽花莖，高六七寸，有二小葉包之。莖上端，

生繖狀苞；每苞開二花，瓣為漏斗形，色黃。其根

入藥，並為黃色染料。通常用以染紙，遇碳酸鈉之

鹼性物，則變為紅色，以作試驗紙之用。

【成分】含有揮發油，脂肪，黃色素等。

【功效】為通經藥。

其根氣味辛苦，大寒，無毒。治心腹積結，痞忤，

下氣，又能破血，除風熱，消癰腫，功力烈於鬱金

。又消癰癥，血塊，通月經，去積損瘀血，止暴風

痛，冷氣。又能祛邪，辟惡，治氣脹，產後敗血，

攻心，風痺，臂痛。

【用量】一。〇——三。〇服用。

【學說】蘇恭曰：薑黃，根葉都似鬱金。其花春生於根，與

苗並出入夏。花爛，無子，根有黃，青，白三色。

其作用之方法，與鬱金相同。

【別稱】又名薑，寶鼎香。

薇

(薇科)

【學名】*Osmunda vesicata*, L. var. *japonica*, Miq.

【產地】多自生於水濕之地。

【基本】為一種草本之植物，高三三尺，無地上莖葉，自地

下莖叢生，約有二種：一綠色，二回羽狀複葉，由

長卵形之小葉而成；一褐色，由細長小葉而成。可

採取之，而供藥用。

【功效】其氣味甘寒，無毒。能調中，利大小腸，通水道，

下浮腫，潤大腸。

【學說】李時珍曰：薇，生瘞田中，原澤亦有。

【別稱】又名垂水，野豌豆，大巢菜。

薇

【基本】據名醫別錄載：薇，生漢中川澤，及宛旬，邯鄲

。七月采莖葉，陰乾。蘇恭云：此草叢生，似茺蔚

，及白頭翁。其莖有毛，赤莖；又有大小二種。楚

人謂：大者，為大吳風草；小者，為小吳風草。韓

保昇云：葉似茺蔚，叢生，有毛。其花黃色；其根

赤黑色。

【功效】其莖葉氣味苦平，無毒。治風疾，濕痺，瀝節疼痛

，瘡癩，吐舌，悸氣，賊風，鼠瘻，癰腫，暴癩，

逐水，療痿躄，明耳目。婦人服之，絕產，無子。

又煎水洗癩疽，甲疽，惡瘡。

【別稱】又名糜衍，鹿衍，吳風草，無心，無顛，承管，承

肌。

蕪菜

【學名】*Houttuynia cordata*, Thunb.

(三白草科)

【產地】多生於山野之濕地，或路傍；而庭園，旱田之間，

亦有之。

【基本】為多年生草，莖高七八寸許，細長，往往匍匐於地

上，及地下。葉卵形，互生。夏月莖梢分枝，着花

於頂端，為穗狀花序，花小，綠色。採其地下之根

，供藥用之。

【功效】為變質藥，解蕪藥。

其葉氣味辛而微溫，並有小毒。可於淡竹筒內，煨

熟，敷惡瘡，白禿。又能散熱毒，癰腫，瘡痔，脫

肛，又斷疝疾，解蠱毒。

【用量】三〇——一〇〇服用。

【學說】蘇恭曰：蕪菜，生溼地山谷陰處，亦能蔓生。葉似

蕎麥，而肥，莖紫赤色。

【別稱】又名蕪菜，魚腥草。

蕪

(百合科)

【學名】*Allium Bakeri*, Berl.

【產地】多栽培於園圃之間。

【基本】為多年生草，葉細長，自地下之鱗莖叢生。夏秋之

間，開花，紫色。其鱗莖，與小蒜相似。可採其莖

白，供藥用之。

【功效】其白氣味辛苦，溫滑，無毒。除寒熱，去水氣，止

久痢，散結氣，消諸疔。治中風濕寒，水氣腫痛，可換塗之。又痰食之，能耐寒，調中，補不足，止

腸風冷瀉，下重，能泄下焦氣滯。又治胸脾刺痛，

下氣，散血，安胎。凡心病，宜食之。又治女人帶

下，赤白，作羹食之。骨哽在咽，不去者，食之，

即下。又能補虛，解毒。其白者，補益；赤者，療

金瘡，及風疾，能生肌肉。又與蜜同搗，塗燙傷。

【用量】二、〇——三、〇服用。

【學說】李時珍曰：薤，八月栽根，正月分蒔，宜肥壤。數

枚一本，則茂，而根大，葉壯，似韭。韭葉中實，

而扁，有劍脊。薤葉中空，似細葱葉，而有稜，氣

亦如葱。二月開細花，紫白色，根如小蒜。

【別稱】又名火葱，菜芝，鴻香。

薤苡

(禾本科)

【學名】*Coxia latifolia*, L.

【產地】多栽培於園圃之間。

【基本】為一年生草，高四五尺。葉狹長，有平行脈，花生

於葉腋。質圓形，仁白色，可為食物，亦可入藥用之。

【成分】含有多量之蛋白質，及 *Casein*。與脂肪，灰分等。【功效】為強壯藥，有滋養，助消化之功。

其仁氣味甘而微寒，無毒。能治筋骨拘攣，不可屈

伸，久風濕痺，下氣。又除筋骨中邪氣不仁，利腸

胃，消水腫，止消渴，殺蚊蟲。又治肺痿，肺氣，

積膿，血嗽，涕唾，上氣。煎服之，破毒腫，去乾

濕脚氣，健脾，益胃，補肺，清熱，去風，勝溼。

炊飯食之，去冷氣；煎飲之，利小便，熱淋。

【用量】六、〇——二五、〇服之。

【採製】採仁一兩，以糯米二兩，同炒熟，去糯米，用之，

亦有更以鹽湯炙過，而用之。

【學說】李時珍曰：薤苡，人多種之；二三月宿根自生。葉

如初生荳芽；五六月抽莖，開花，結實，有二種：

一種黏牙者，尖而殼薄，即薤苡也。

【別稱】又名解蠶，芭質，鬻米，回回米，蠶球米。

薤菜

(旋花科)

【學名】*Ipomoea ajacitana*, Forst.

「基本」據李時珍云：蕹菜，今金陵，及江夏人，多嗜之。

性宜濕地，畏霜雪。九月藏入土窖中，三四月取出。

○葉以糞土，即節節生芽，一本可成一畦也。幹柔

如蔓，而中空，葉似菠薐，及藜頭形，味短，須同

猪肉煮，令肉色紫，乃佳。段公路北戶錄言：其葉

如柳者，誤矣。按稻含草木狀云：蕹菜，葉如落葵

，而小。兩人編菜爲筏，作小孔，浮水上。種子於

水中，則如萍，根浮水面，及長成莖葉，皆出于莖

筏孔中，隨水上下，南方之奇蔬也；則此菜，水陸

皆可生之也。

「功效」其氣味甘平，無毒。能解胡蔓草毒，即野葛毒，可

煮食之；亦可生搗服之，又搗汁，和酒服之，能治

產難。

繁縷

（石竹科亦作繁縷科）

「學名」*Stellaria media*, Vill.

「產地」山野多自生之。

「基本」爲一年，或越年生草，引蔓於地上。莖細長，節間

有毛，下向，中空，斷之有一縷，如絲，作疏，甘

脆。葉爲卵形，對生。春夏之間，開花，花小，而

白，五瓣；每瓣二裂，甚深。其莖葉，可採取之，而供藥用。

「功效」爲清血藥，能除分娩後之腹部硬塊，又促乳汁之分

泌，能治諸疔。

其氣味酸平，無毒。能治積年惡疔，痔疾，不愈，

又破血，下乳，故產婦，宜食之。凡產後腹有硬塊

癢痛，以酒炒過，絞汁，溫服。又暴乾，爲末，隨

糊和丸，空腹服五十九，取下惡血。

「用量」一。〇——三。〇——六。〇服用。

「學說」李時珍曰：繁縷，即鵝腸，非雞腸也。下濕地極多

，正月生苗，葉大如指頭，細莖，引蔓。斷有一縷

，如絲，作疏，甘脆。三月之後，漸老，開細瓣白

花；結小實，大如稗粒，中有細子。

「別稱」又名葶縷，滋草，鵝腸菜。

縮砂蜜

（藥荷科）

「學名」*Anomum xanthoides*, Wall.

「產地」多產於嶺南一帶。

「基本」爲一種草本植物，高三四尺，葉狹長。春夏之交，

開花；實紫紫如穗狀，皮厚而皺，黃赤色，中有仁

，數十；外褐，內白，辛香如白豆蔻仁，名曰：砂仁，可以入藥用之。

【成分】含有少量之揮發油，及龍腦樣之物質。

【功效】爲健胃，止瀉藥，又爲刺戟藥，可用于由寒冷而發之腹痛；下痢等。

其仁氣味辛溫，無毒。能治虛勞，冷瀉，宿食不消，赤白洩痢，腹中虛痛；除下氣，冷氣；又能消化水穀，溫暖肝腎，止上氣，欬嗽，奔豚，鬼疰，驚癩，邪氣，一切氣，霍亂轉筋；能和中，行氣，止痛，安胎。又治脾胃之氣，結滯不散；又補肺，醒脾，養胃，益腎，理元氣，通滯氣，散寒飲，脹痞，噎膈，嘔吐，止女子崩中，除咽喉口齒浮熱，化銅鐵骨哽。

【用量】一回一〇——三〇服用。

【學說】馬志曰：生南地，苗似麻藍，子形如白荳蔻。其皮緊厚，而皺，黃赤色。八月，采之。

隱鼠

【學名】*Alsepsis wagneri*, Tomlin

【基本】爲食蟲類之一種。體圓錐形，密生軟毛，適滑行於

地中，能預防溫氣。眼小，無耳殼，尾亦短小。聽嗅二覺，皆甚銳敏，而視覺甚鈍。前肢大，有強爪，能以掘土，及運土於後也。

【功效】據陶宏景云：其膏能治痔瘻，惡瘡。

【別稱】又名鼯鼠，偃鼠，鼠母。

鮫魚

【學名】*Squaloides*

【基本】此屬橫口類，體略扁平，圓錐形。頭部因種類而異其形狀，脊鱗由前後二鱗而成；胸腹兩鱗大形，尾鰭刃狀，口橫裂於頭之下面，生數列銳齒。鼻孔開於前方，咽喉部之兩側，有五，乃至七對之鰓孔，頭上有一個噴水孔。皮膚有顆粒狀之鱗，或骨板，昔時，吾國有用其肉，而爲藥者。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。作鱸，能補五臟，功亞於鱈；亦可作鱠鮓，甚益於人。其皮氣味甘鹹而平，無毒。能治心氣，鬼疰，蠱毒，吐血。又可燒灰，水服，去食魚中毒。又燒研，水服，解鱈魚毒，又治食魚成積，不消。其膽能治喉痺，江白礬灰，爲丸，綿裹，納入喉中，吐去惡涎，卽愈。

〔別稱〕又名沙魚，魷魚，溜魚。

鮪魚

〔基本〕為一種無鱗魚，亦 *Alopiurus melanocephalus* 屬也。

頭尾身鬚，俱是鬚狀；惟鼻短爾！口亦在頷下，骨不柔脆，腹似鮐魚，背有肉鬚。郭璞云：鮪魚，似鮐，而大，白色者，是矣。

〔功效〕其肉氣味甘平，無毒。能開胃，消食，下膀胱水，通利小便。

鮫魚

〔學名〕*Isurus paucus makhi* J. et S.

〔產地〕多棲息於近海之岩礁上。

〔基本〕此屬於硬骨魚類之棘鱗類，體形與鱈魚類似，藍黑色。胸鰭大，腹鰭小，體側有黑斑，脊鰭前後相連，殆達於尾。側線有數對，肉味甚美。

〔功效〕其肉氣味甘溫，無毒。能療水腫，利小便。又治口

眼瞶斜，以活鮫，切去尾尖，朝吻貼之，即正。又治五痔，下血，肛痛，同葱熨，食之。其目能治刺傷作痛，可燒灰塗之。其肝治骨硬，在喉者，可用栗子肉上皮半兩，研末，乳香，鮫魚肝各一分，同

搗為丸，梧桐子大，以綿裹一丸，吞下，鈞出。

鴿

〔學名〕*Columba livia*

〔產地〕各處人家，多畜養之。

〔基本〕為鴿類之一種，口喙尖鉤而彎，喙根甚軟，鼻孔為窄縫狀，旁有軟骨鱗，以司其閉縮之作用。上喙旁不遮蔽下喙，足爪同高，雛體須母飼養之。吾國用為藥者，多選白鴿。

〔功效〕其白鴿肉氣味鹹平，無毒。能解諸藥毒，可以調精，益氣。又治惡疥，疥癬，風疔，白癩，癰瘍，風痧。其血能解諸藥，百蟲毒。其卵亦解疥癬毒，痘毒。其屎名：左盤龍，氣味辛溫，微毒。能消腫，去腹中痞塊，療瘰癧，諸疔，破傷風，及陰毒垂死者，又可殺蟲。

〔別稱〕又名鴿鴿，飛奴。

鵲

〔學名〕*Yucoloxus yucolanus* Linn.

〔基本〕為鴿之一種，嘴彎曲，體上面綠黑色。頭頂有數條之白羽，長而細，下面白色，略雜以淡灰色。

「功效」其肉氣味甘鹹而平，無毒。炙食之，能解諸魚毒，及蝦蟹毒。

藥

【學名】Ranipitor larundus.

「產地」吾國西北各省，產生為最多。

「基本」為具枝角之返嚼獸類，牝牡皆有角，體較粗大，而項較短，夏季毛輕，作暗黑色；冬季毛長，呈灰白色。蹄圓，縫痕甚深，行時二後趾，亦能及地，以便履行澤地，及冰雪之上。其肉可食，其血，及乳可飲；其舌，及髓，尤為食中之寶品。

「功效」其脂氣味辛溫，無毒。治瘰癧，惡瘡，死肌，寒熱，風寒，濕痺，四肢拘攣，頭腫；又通腠理，柔皮膚。其肉氣味甘溫，無毒。能益氣，補中，治腰脚，及五臟不足。其茸氣味甘溫，無毒。治陰虛，勞損，一切血病，筋骨腰膝痠痛；又滋陰，益腎。其角氣味甘熱，無毒。治風痺，益氣力，補虛勞，添精，益髓，益血脈，暖腰膝，壯陽，悅色，療風氣，筋骨疼痛；若卒心痛，一服立瘥。以漿水磨泥，塗面；能赤白如玉，可愛；又滋陰，養血，功與茸

同。其骨治虛勞，至良，炙汁，釀酒飲之，令人肥白，美顏。其皮作靴襪，能除腳氣。

【用量】茸用一·五——三·〇服之；角用六·〇——一〇〇服之。

「禁忌」其脂忌桃，李；畏大黃。

龍

【學名】Catalpa myrian.

「基本」為海龜類，常居水內；惟產卵時，乃至陸地。足形變為與鱉相似，軀部平扁。雖體量甚重，而亦善游泳。其肉味甚美，卵亦可食。

「成分」甲含有磷酸石灰，及碳酸石灰，與膠質等。

「功效」其甲氣味甘平，無毒。炙黃，酒浸，治瘰癧，殺蟲，逐風；療惡瘡，痔瘻，風頑，疥癩，功同鼈甲。又去五臟邪氣，殺百蟲毒，百藥毒，續筋骨，治婦人血熱。其肉氣味甘平，微毒。去溼氣，邪氣，諸蟲；食之，補益。其脂能摩風疾，惡瘡。其膽氣味苦寒，有毒。治喉痺，以生姜，薄荷汁，化少許，服之取吐。

【用量】甲用三·〇——六·〇服用。

第十八畫

爵牀

(爵牀科)

〔學名〕 *Jussiaea procumbens*, L.

〔產地〕多生於山野之中。

〔基本〕為一年生雜草，莖高一尺餘，節稍膨大；葉長橢圓

形，或廣披針形，對生，葉與莖微有毛。夏月開花

，花小，集合如穗狀，長一寸許。其莖與葉，皆可

供藥用之。

〔功效〕其莖葉氣味鹹寒，無毒。治腰脊痛，不得擣牀，俛

仰艱難，又除熱，可作浴湯。又療血脹，下氣，搗

汁塗之，可治杖瘡。

〔學說〕李時珍曰：原野甚多，方莖，對節，與大葉香薷一

樣；但薈樣之氣香，而爵牀樣之不香，微臭，以此

為別。

〔別稱〕又名爵麻，香蘇，赤眼老母草。

檳榔

(棕櫚科)

〔學名〕 *Arcua catechu*, L.

〔產地〕多產於印度，馬來半島等處。

〔基本〕為一種常綠喬木，高三十尺許；葉為羽狀複葉，小

葉之上端，形狀宛如嚼而嚼之者。其幹似椰子，而細；每一幹，有三四穗；每一穗，結實三四百顆；其實，可供藥用之。

〔成分〕含有 $\text{Arceoin } C_8H_{13}NO_2$ 及 $\text{Arceatin } C_7H_{11}NO_2 + H_2O$ 二種植物鹽基。

〔功效〕為驅蟲藥，及健胃藥。

其子氣味苦辛，溫澀，無毒。能消穀，逐水，除痰

澀，殺三蟲，又治腹脹。生搗末服之，利水發道，

敷瘡，能生肌，止痛，又燒灰敷口吻，白疔。又宜

利五臟，六腑滯，破胸中氣，下水腫，去心痛，

積聚，除一切風，下一切氣，通關節，利九竅，補

五勞七傷，健脾，調中，除煩，破癰結，消賁脈，

膀胱諸氣，五隔氣，風冷氣，腳氣，宿食不消。又

治氣逆，裏急，瀉痢，後重，心腹諸痛，大小便氣

秘，痰氣，喘急，瘵諸瘵，禦瘴癘。

〔用量〕一·五——四·〇服用。

〔學說〕李時珍曰：檳榔，初生若筍竿積硬，引莖直上。莖

幹頭似梳榔，椰子，而有節，旁無枝柯條，從心生

，端頂有葉，如甘蔗，條派開披，風至，則如羽扇

枯天之狀。三月葉間歷起一房，因自折裂，出穢，

凡數百顆，大如桃李。又生刺，重累於下，以護術

其莖。五月成熟，剝去其皮，煮其肉，而乾之。皮

皆筋絲，與大腹皮同也。

〔別稱〕又名官門，仁頻，洗瘰癧。

癒瘡木

〔莨菪科〕

〔學名〕 *Quajamon officinale, L.*

〔產地〕原產於西印度一帶。

〔基本〕為常綠喬木，葉為羽狀複葉，自二對，或三對小葉

而成。花帶紫藍色，簇生於枝之頂端。此植物之木

材，帶藕綠色，緻密堅韌，可供藥用之。

〔成分〕含有愈瘡木脂。稍帶綠色，或赤褐色之塊。

〔功效〕為利尿藥，發汗藥，常用於慢性癱瘓質斯之疼痛，

慢性皮膚病，肺膿瘍，水腫病等。

〔用量〕日一五〇——三〇〇為煎劑，服用之。

〔製劑〕愈瘡木丁幾 *Tinctura Quajaci.*

此即以愈瘡木一〇〇，冷浸於酒精五〇中，而製

成一種赤褐色液體。一日數回，與以〇・五——一

・五為滴劑等，服用之。

崖麥

〔石竹科〕

〔學名〕 *Dianthus suspensus, L.*

〔產地〕多生於山野，或栽培於庭園。

〔基本〕為多年生草，莖高二三尺，葉線狀，披針形，對生

。夏秋之交，枝梢抽出花軸，常以二花集生，呈白

色，或淡紅色。果實為蒴果，熟則於頂端裂開。其

穗莖等，可為藥用之。

〔功效〕為利尿藥，又為通經藥。

其穗氣味苦寒，無毒。能治諸瘕，小便不通，消癭

腫，明耳目，去目翳，破胎，墮子，通閉血，養腎

氣，逐膀胱邪逆，止霍亂，長毛髮；又治五淋，月

經不調，破血塊，排膿，其葉治痔瘡，並消血，作

湯粥食之，又治小兒蛔蟲，及丹石藥發，並眼目腫

痛，及腫毒；又搗敷之，又治淫瘡，並婦人陰瘡。

〔用量〕二〇——五〇服用。

〔禁忌〕惡燥蝕。

〔採製〕只用莖殼，不用莖葉，若一時同使，即空心，令人

氣噎，小便不禁也，用時，以葦竹瀝，浸一伏時，

溫服。

【學說】李時珍曰：石竹葉，似地膚葉，而尖小；又似初生

小竹葉，而細窄。其莖纖細，有節，高尺餘，梢間開花。田野生者，花大，如錢，紫紅色。

【別稱】又名巨勾麥，大菊，大蘭，石竹，南天竹草。

蟬花

【基本】為蟬類 (*Tomoptera*) 之一種動物。據李時珍云：蟬

花，即冠蟬也。禮記所謂：鑽則冠，而蟬有綬者，是矣；綬音綬，冠纓也。陸雲雲蟬賦云：蟬有五德

：頭上有情，文也；含氣吸露，清也；黍稷不享，應也；處不巢居，儉也；應候有常，信也。

【功效】其氣味甘寒，無毒。治小兒天疳，驚癇，瘰癧，夜啼，心悸；功同蟬蛻，又能止瘧。

【別稱】又名冠蟬，胡蟬，蟬蠟。

蟬蛻 Cicada-shell

【基本】為有吻類之蟬 (*Cicadidae*)，在其幼蟲出地中，而變

為成蟲之時，脫去其皮殼，即為是品，可供藥用。

【功效】為解熱藥，多用於小兒熱性病之痲痺等。

其氣味鹹甘而寒，無毒。治小兒驚癇，婦人難產，

燒灰水服，又治久痢，小兒壯熱，痘疹不出，並消

渴。又研末一錢，井華水服，治喉病。又除目昏，

障翳，能去頭風，眩暈，皮膚風熱，痘疹作瘡，破傷風，及疔腫，毒瘡，失音，小兒哮喘，天疳，驚

哭，夜啼，陰腫。

【用量】三〇——七〇服用。

【採製】拾取殼殼，以沸湯洗去泥土，除去翅足；再以鹽水

煮過，晒乾，用之。

【別稱】又名蟬殼，枯蟬，腹蟬，金牛兒。

蟲白蠟

【基本】為水蠟蟲 (*Ericerus pela cillanurata*) 自腹部分泌白

色之絲狀物，謂之蟲白蠟，於攝氏八十度，即能熔解，多製成蠟燭之用，而亦常為藥用之。

【成分】含多量脂肪油質，及糖質。

【功效】其氣味甘溫，無毒。能生肌，止血，定痛，補虛，

續筋，接骨。入丸散服之，能殺癬蟲。

翹搖 (蠟科)

【學名】*Astragalus sinicus*, L.

【產地】多自生於田野之間。

【基本】為越年生草，莖莖於地上；葉為掌狀複葉，小葉全

邊。夏月抽出長花軸，翹然直立，頂端着以短總狀花序，呈紅紫色；果實爲莢，帶黑色。可採取之，而供應用。

「功效」其氣味辛平，無毒。能破血，止血，生肌；搗汁服之，可以療五種黃病，以瘥爲度。又利五臟，明目；去熱風，止熱痞，活血，平胃。

「學說」李時珍曰：處處皆有，蜀人秋種，春采。

「別稱」又名控車，野蠶豆，小巢菜。

翻白草

(薔薇科)

「學名」*Potentilla chinensis*, Ser.

「產地」多生於原野之中。

「基本」爲一種雜草，莖伏臥於地上；葉爲羽狀複葉，自多數小葉而成。小葉羽狀分裂，下面有白毛，互生；開花，黃色。其根，可爲藥用。

「成分」含有多量澱粉，及灰分等。

「功效」其根氣味甘微，苦平，無毒。能治吐血，下血，崩中，瘧疾，瘰癧。

「學說」李時珍曰：鷄腿兒，生近澤田地，高不盈尺。春生弱莖，一莖三葉，尖長而厚，有皺紋鋸齒；面青，

背白。四月開小黃花，結子，如胡荽子，中有細子。其根狀如小白虎頭，剝去赤皮；其肉白色，如雞肉，食之有粉。

「別稱」又名鷄腿根，天藕。

薯蕷

(薯蕷科)

「學名」*Dioscorea japonica* Thunb.

「產地」自生於山野中，或栽培於園圃中；而產於河南之舊懷慶府者，尤良，故名曰：懷山藥。

「基本」爲多年生蔓草，莖皆細長，纏繞於他物。葉爲心臟形，有長柄。夏月開花，色淡紅；實爲裂果，三稜形。其地下莖，多肉，長者，至數尺。家種者，供食用；野生者，入藥用。

「成分」含有一種 *Diogenin* 之成分。

「功效」爲強壯滋養藥，對於身體之衰弱者，及發生腸加容兒者，皆可服用之。

其根氣味甘溫而平，無毒。治傷中，補虛羸，除寒熱，邪氣；又補中，益氣，長肌，強陰，聰明耳目，去頭面遊風，頭痛，眼眩，下氣，止腰痛，去煩熱，補五勞七傷，去冷風，鎮心神，安魂魄，補心

氣不足，開達心竅，強筋骨，止洩精，益腎氣，健脾胃，止洩痢，化痰涎，潤皮毛。生搗貼腫硬毒，能消散。

【用量】一·五——三·〇——一〇·〇服用。

【禁忌】惡甘遂。

【採製】採根，刮去黃皮，以水浸之，糝白礬末少許，入於水中，經宿，洗淨，去涎，焙乾，用之。

【別稱】又名諸與，土蕪，山蕪，山芋，山藥，玉延。

藍

(蓼科)

【學名】*Polygonum tinctorium*, Lour.

【產地】多栽培於園圃之間。

【基本】為一年生草，莖高三三尺；葉卵形，或橢圓形，互生。葉柄之基部，有鞘狀之托葉，包被於莖。冬月

開花，為總狀花序；花小，無瓣，僅有紅色之萼；花後結實，形小，而光，呈赭褐色，可為藥用。

【成分】含有 Indigoin $C_{16}H_{14}N_2O_2$ 之成分。

【功效】為解毒藥。

其質氣味苦寒，無毒。能解諸毒，殺蠱毒，疰鬼。又能填骨髓，明耳目，利五臟，調六腑，通關節，

除經絡中結氣，使人少睡，益心力，療毒腫。

【用量】三·〇——一〇·〇服用。

【學說】李時珍曰：藍，凡五種，各有主治；惟藍實，專取蓼藍者；蓼藍，葉如蓼。五六月開花，成穗，細小，淺紅色，子亦如蓼。

藍汁

【基本】為蓼科屬，藍 (*Polygonum tinctorium*, Lour.) 之生葉，搗爛，而壓搾流出之汁，可為藥用之。

【功效】其氣味苦甘而寒，無毒。能殺百藥毒，解狼毒，射罔毒。又止煩悶，療蜂螫毒，斑蝥，堇青毒，櫻雞毒，朱砂，砒石毒。

【用量】一五·〇——三〇·〇服用之。

藍澱

【基本】此為藍 (*Polygonum tinctorium*, Lour.) 草之葉，晒乾後，澆水少許，使其起發酵作用，將葉內所含之糖原質分解，而現 Indigo 素。置於白中，搗成餅狀；更將石灰，木炭，麩及水，共加入之，再移入甕中。又使其起乳酸發酵，而其還元作用，變成稍帶白色之藍團，以之溶解於鹼液中。其浮於水面之

上者，即是，可為藥用之。

【功效】其氣味辛苦而寒，無毒。能解諸毒，敷熱瘡，小兒疥瘡，熱腫，又能止血，殺蟲，治疔瘡。

藥木

(繖形科)

【學名】*Noddymyrium japonica*, Miq.

【產地】多生於原野之間。

【基本】為一種野生之植物，高三四尺，莖葉有疎，細毛，葉具葉柄，三回羽狀分裂，裂片卵形。夏月開花，白色。其根可採取之，而供藥用。

【功效】為鎮痛藥。

其根氣味辛溫，無毒。治婦人痛癢，陰中寒腫，腹中急痛；除風疾，止頭痛，長肌膚，悅顏色，去風邪，惡氣，鬼疰，能通小便，去酒毒，粉刺；治癩疾，腦痛，連及齒類。又除頭面身體皮膚風濕，消瘰癧，排膿，去內塞。其實能治風邪流入四肢。

【用量】二〇——五〇服用。

【禁忌】惡菌茹；畏青箱子。

【採製】春初之際，掘根，去皮頭，洗去泥土，晒乾，焙用之。

【學說】李時珍曰：江南深山中，皆有之。根似青蘗，而輕虛，味麻，不堪作飲也。

【別稱】又名聚友，鬼卿，鬼新，微莖。

蓋草

(禾本科)

【學名】*Arthraxon affine*, Beauv.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為越年生草，莖高一二尺，堅立，葉廣披針形，或卵形，有尖端。秋冬之間，開小花，成穗，約一寸許，呈褐紫色。可採取全草，供藥用之。

【成分】含有黃色素之成分。

【功效】其氣味苦平，無毒。治久欬，上氣，喘逆，久寒，驚悸，疝疥，白禿，疔風；又殺皮膚小蟲，除身熱邪氣，小兒身熱；又洗一切惡瘡，有效。

【禁忌】畏鼠負。

【別稱】又名黃草，綠竹，綠蔴，蘆草，王芻，鴉脚沙。

薺草

(桔梗科)

【學名】*Adephiona tenuiflora*, Miq.

【產地】多生於山野之中。

【基本】為多年生草，高三尺許；葉為橢圓形，端尖，有鋸

樹，互生。秋開淡紫花，花冠爲鐘狀，根形似人參，味甜，俗稱甜桔梗，可爲藥用之。

【功效】爲解毒藥。

其根氣味甘寒，無毒。能解百藥毒，殺蠱毒，治蛇蟲咬傷，熱狂，溫疾；又利肺氣，和中，明目，止痛；又治欬嗽，消渴，疔毒，疔腫，辟沙蟲，短狐毒。其性忍及葉氣味甘苦而寒，無毒。能除蠱毒，止痛，治面目青黃，可煮汁飲之；又去腹臟風寒，欬嗽，上氣。

【學說】李時珍曰：薺萐，苗似桔梗；根似沙參，故奸商往往以沙參，薺萐，通亂人參。

【別稱】又名杏參，杏葉沙參，薺萐，甜桔梗，白麴根；苗名：隱忍。

薺菜

(十字花科)

【學名】*Capsella Bursa pastoris*, Moench.

【產地】多生於原野，亦有栽培於田地者。

【基本】爲一年，或越年生草，莖高四五寸，乃至一尺五六寸許。下部之葉，爲羽狀分裂；上部之葉，具有缺刻，或有鋸齒。春月開花，花小，色白；果實爲裂

果，扁平三角形；中有細子。其全草及實，可採取之，而供藥用。

【功效】其氣味甘溫，無毒。能利肝，和中。根治目痛，能明目，益胃。根葉可燒灰，治赤白痢疾，極效。其實氣味甘平，無毒。能明目，止痛，去青盲，補五臟不足，消腹脹，去風毒，邪氣，消目翳，解熱毒。其花布席下，辟蟲，又辟蚊蛾。若使陰乾，研末，泔湯，日服一錢，治久痢。

【用量】三〇——六〇服用。

【學說】李時珍曰：薺，有大小數種：小薺，葉花莖扁，味美。其最細小者，名：沙薺也。大薺，科葉皆大，而味不及。

【別稱】又名護生草。

薺葶

(唇形科)

【學名】*Moeha Grosserrata*, Maxim.

【產地】多生於林野之間。

【基本】爲一種草本之植物，莖高一尺許，單葉，對生，有柄，葉身略呈斜方形。秋日梢上開唇形花，綴成穗狀，帶淡紅色。其莖葉，皆供藥用。

【成分】含有揮發油，具特異之臭味。

【功效】其莖葉氣味辛溫，無毒。治冷氣，洩痢。生食之，能除胸間酸水；按碎，可敷蟻瘻。

【學說】李時珍曰：薺藜，處處平地有之。葉似野薺，而稍

長，有毛，氣臭。

【別稱】又名臭薺，青白薺。

薺藜

(薺科)

【學名】*Dolichos Labrad, L.*

【產地】多栽種於田園之中。

【基本】為一年生草，莖呈蔓狀，卷繞於他物之上。葉為複

葉，頗闊，有細毛，為蝶形花冠。夏間結實成莢，

形扁，而闊。子有白，黑，褐色；黑者，別為鵲豆

，亦可食。白者，多為藥用。

【成分】於生理上，含有蛋白質，脂肪，澱粉，灰分等。

【功效】為解毒藥，可用於虎列刺之吐瀉等。

其白扁豆氣味甘而微溫，無毒。能和中，下氣，補

五臟，止嘔逆，療霍亂吐瀉不止，可研末，和醋服

之。又能行風氣，治女子帶下，解酒毒，河豚魚諸

毒，一切草木毒，生嚼，或煮汁，飲之。又能止瀉

痢，消暑，緩脾胃，除溼熱，止消渴。其花治女子

赤白帶下，乾末，米飲服之。多焙研服，治崩中，

帶下，泄痢，搗水飲之，解一切藥毒，功同扁豆。

其藥治霍亂吐瀉不止，或吐瀉後轉筋，生搗一把，

入少酢，絞汁，服之，立瘥。又醋炙研服，治瘰癧

，亦可搗敷蛇咬傷。其藤治霍亂，同蘆薈，人參，

倉米等分，煎服。

【用量】二〇——五〇服用。

【採製】用時，宜取硬殼扁豆子，連皮炒熟，入藥。亦有水

浸，去皮，及生用者。

【學說】李時珍曰：扁豆，二月下種，蔓生，延纏；葉大如

盃子，有黑，白，赤斑四色。

【別稱】又名沿籬豆，蛾眉豆。

覆盆子

(薇薔科)

【學名】*Rubus Tokuro, Gr. L.*

【產地】多自生於山野向陽之林中。

【基本】為多年生草，長莖臥地；葉為掌狀複葉，小葉大，

而平滑，質硬。春日抽花軸，花五瓣，白色；實為

細粒，色紫赤，花托肥大。採其綠色未熟之果實，

供藥用之。

「成分」含有覆盆子酸，酒石酸，及葡萄糖，揮發油等。

「功效」為強壯藥，清涼藥。

其子氣味甘平，無毒。能益氣，溫中，補虛，續絕，強陰，健陽，澤悅肌膚，安和五臟，療勞損，風虛，補肝，明目，並宜搗篩，每旦水服三錢。又治男子腎精虛弱，陰痿，縮小便。又取汁，同蜜煎為稀膏，點服，治肺氣虛寒。其葉氣味微酸，鹹平，無毒。按絞取汁，滴目中，去府赤。

「用量」一。五——四。五服用。

「採製」取覆盆子，五月采之，烈日曬乾，不然，易爛。臨時時；以水淘去黃葉，并皮，蒂，取子，以酒拌蒸一宿；以水淘兩遍，又晒乾，方用。或采後，搗作薄餅，晒乾，密貯。臨時以酒拌蒸，尤妙。

「別稱」又名伏盆，西國草，畢楞伽，大麥莓，烏蘆子。

獐

「學名」*Capreolus*

「產地」產於我國，及南美印度馬來半島之大澤，或淺河。

「基本」此屬有蹄類，其形似豬，前肢四蹄，後肢三蹄。體

黑褐色，口唇延長，屈伸自由。耳殼與眼均小，尾短。頭圓錐形，肩與頭之皮膚特厚，適於突進於森林中，以植物為食料。

「功效」其皮製之，可驅溫病，辟濕氣，邪氣。其膏治癰腫，能透肌膚。其尿治吞食銅鐵，和水服之，即化。

鎖陽

「基本」多寄生棗木 *Alnus viridis*, DC var. *Sibirica* 之根。

高六七寸，乃至尺餘，呈肉質狀。據李時珍云：鎖陽，出肅州。按陶九成輟耕錄云：鎖陽，生韃靼田地。野馬，或與駝龍遺精，入地，久之發起，如笋，上豐下儉，鱗甲節比，筋脈連絡，絕類男陽，即肉蓯蓉之類，或謂：里之淫婦，就而合之，一得陰氣，勃然怒長。土人掘取，洗滌，去皮，薄切，晒乾，以充藥用。

「功效」為強壯藥。

其氣味甘溫，無毒。能大補陰氣。益精血，利大便，凡虛弱之人，大便燥結者，啖之；不燥結者，勿用，故能潤燥，養筋，治痿弱。

「用量」一。〇——三。〇服用。

蕈菌

「基本」名醫別錄載：蕈菌，生東海池澤，及渤海章武；八月采，陰乾。陶弘景云：出北來，此亦無有形狀，

似菌，云鶴屎所化生，一名：鶴菌。蘇恭云：蕈菌

，今出渤海蘆葦澤中，鹹鹵地，自然有此菌爾！非

鶴屎所化生也。其菌色白，輕虛，表裏相似，與衆

菌不同。韓保昇云：今出滄州，秋雨以時，即有天

旱，久霖即稀，日乾者，良。

「功效」其氣味鹹平，而有小毒。能治心痛，溫中，去長蟲，

，蠶蟲，蛇蟄毒，癩癧，諸蟲，惡疔。又除腹內冷

痛，治白禿。

雞

「別稱」又名雀廬。

「學名」*Ca. lins hankiana*, Temm.

「產地」各處人家，多畜養之。

「基本」此屬雞類，體肥大，翼不甚發達，飛翔力弱。雄之肉冠，存於頭上之紅色肉突起，肉瓣垂於喉下之肉突起，俱大；羽毛美，後股生距。未墮即鳴，由產於爪哇，印度等之野雞變化者也。肉及卵，富於滋

養分，且其味美。每年三月前後，或十月頃，皆為最良之孵卵期。大概經三週間孵化，雛強壯，出卵殼，即步而索食。羽蟲寄生之時，則自行沙浴，而驅除之。

「功效」其丹雉雞肉，氣味甘而微溫，無毒。能治女人崩中，赤白濁下，又通神，殺惡毒，辟邪氣，補虛，溫中，止血，能愈久傷。其白雉雞肉，氣味酸而微溫，無毒。除下氣，狂邪，安五臟，止消渴，調中，除邪，利小便，去丹毒，風疾。其烏雄雞肉，氣味甘而微溫，無毒。能補中，止痛，除心腹惡氣，風濕麻痺，諸虛羸弱，能安胎，治折傷，並瘡疽，生搗塗之。其黑雌雞肉，氣味甘酸，溫平，無毒。作羹食之，治風寒濕痺，五緩，六急。能安心，定志，除邪，辟惡。治血邪，破心中宿血，雞疔，排膿，補新血，及產後虛羸，益色，助氣，去反胃，及腹痛，跣折骨痛，乳癰。其黃雌雞肉，氣味甘酸，鹹平，無毒。能治傷中，消渴，小便不禁，腸澼，洩痢。又補益五臟，絕傷，疲五勞，益氣力，添髓，補精，助陽氣，暖小腸，止洩精，補水氣，煑食

能補益；又治產後虛羸，煮汁，煎藥，均佳。其烏骨雞，氣味甘平，無毒。能補虛勞，羸弱，治消渴，中惡，鬼擊，心腹痛，婦人崩中，帶下，一切虛損諸病，小兒下痢，禁口，並素食，飲汁，亦可搗和丸藥。其反毛雞能治反胃，以一隻煮爛，去骨，入人參，當歸，食鹽各半兩，再同煮爛，食之，至盡。其秦和老雞氣味甘辛而熱，無毒。能內托小兒疔疳。其雞頭能治蠱毒，複惡，辟瘴。其雞冠血，氣味鹹平，無毒。烏雞者，治乳癰，目淚不止，日點三次，最良；亦點鼻赤目痛。丹雞者，治白癩風，及經絡間風熱；又塗頰，治口喎不正；塗面，治中惡卒死；飲之，治經死欲絕，及小兒卒驚，客忤；又塗諸瘡癬，蜈蚣，蜘蛛毒，馬嚼瘡，百蟲入耳。其雞血氣味鹹平，無毒。治腰折骨痛，及接痺，中惡，腹痛，乳癰。凡白癩風，癩疔風，以雞雞翅下之血，塗之，以熱血服之，治小兒下血，及驚風；又解丹毒，蠱毒，陰毒，能安神，定志。其肪氣味甘寒，無毒。治耳聾，頭禿，髮落。其腦治小兒驚癇，燒灰，酒服，治難產。其心能除五邪。其

肝氣味甘苦而溫，無毒。能起陰，補腎，治心腹痛，安漏胎，下血，以一具，切片，和酒服之，又療風疾。其膽氣味苦而微寒，無毒。治目暗，肌瘡，月蝕瘡，遠耳根，日三塗之。又燈心煎點，胎赤眼，甚良，水化，療痔瘡，亦效。其腎治鼯鼻作臭，用一對，與臍前肉等分，入豉七粒，新瓦焙研，以雞子清和，作餅，安臍前，引蟲出，忌陰。其味治小便不禁，及氣噎，食不消。其臍腫，卽裏黃皮，一名：雞內金，氣味甘平，無毒。治洩痢，小便頻尿，除熱，止煩，並止泄精，尿血，崩中，帶下，腸風，消血。又治小兒食癥，療大人淋漓，反胃，消酒積，喉閉，乳蛾，一切口瘡。其腸，男用唾，女用雄，治遺溺，小便不禁，燒存性，每服三指，酒下。又止遺精，白濁，消渴。其肋骨治小兒羸瘦，食不生肌。其距治產難，燒研，酒服。又下骨哽，以雞足一雙，燒灰，水服。其滿翎能下血閉，婦人小便，不禁，消陰積，療骨哽，蝕癰疽。又止小兒夜啼，安席下，勿令母知。其尾毛能治刺入肉中，以二七枚，和男子乳，封之，當出。又解蜀椒毒

，燒爛，吸之，並以水調灰服之。又治小兒痘毒後生瘰，燒灰，和水，敷之。其尿白氣味微寒，無毒。○治消渴，傷寒，寒熱，破石淋，及轉筋，利小便，止遺尿，滅瘡痕。又治中風，失音，痰迷，小兒客管，蠱毒，風痛，賊風，風痺，破血，和黑豆炒過；酒浸，服之，亦治蟲咬毒傷，能下氣，通大小便；止心腹鼓脹，消癥瘕，療破傷中風，小兒驚啼。○以水淋沖，服之，解金銀毒，以醋和塗蜈蚣，蚯蚓咬毒。其卵氣味甘平，無毒。能除火灼爛瘡，又能鎮心，安五臟，止驚，安胎，治妊娠天行熱疾，狂走，男子陰囊濕癢，及喉聲失音，醋煮食之，治赤白久痢，及產後虛痢，賊風麻痺，又止產後血運，暖水臟，縮小便，止耳鳴，又和蠟炒，治耳鳴，耳聾，及疳痢。○若以濁水煮一枚，連水服之，治產後痢，和蠟煎服，止小兒痢，又小兒發熱，以白蜜一合，和三枚攪服，立痊。其卵白氣味甘而微寒，無毒。能治目熱赤痛，除心下伏熱，止煩滿，效逆，小兒下泄，婦人產難，胞衣不下，以生吞之。○醋浮一宿，療黃疸，破煩熱。產後血閉不下，取白一

枚，入醋一半，攪服。和赤小豆末，塗一切熱毒，丹腫，頭痛。其卵黃氣味甘溫，無毒。醋煮，治產後虛痢，小兒發熱；煎食，除煩熱；鍊過，治嘔逆；和常山末，爲丸，竹葉湯服之，治久瘧。又炒過取油，和粉敷頭疔。乾曬者，生吞數枚，最良。○小便不通者，亦生吞之數次。又補陰血，解熱毒。研末，能磨障翳，又治傷寒，勞復，熬令黃黑，爲末，熱湯服之，取汗，即愈。又小兒頭身諸疔，酒服二錢，治反胃。其卵殼中白皮，治久欬，氣結，得麻黃，紫苑，服之，立效。其窠中草治頭疔，白朮，和白頭翁草燒灰，豬脂調敷。其母雞湯能止消渴，飲水無度，用其雄雞水，瀝澄，服之，不過二雞之水，即愈。

雞壘

〔基本〕據李時珍云：雞壘，產於雲南，生沙地之間，丁單也。高脚，繖頭；土人采煨，以充食物，點茶，烹肉，皆宜。氣味皆似香薷，而不及，其風韻也。

〔功效〕其氣味甘平，無毒。能益胃，清神，治痔。

〔別稱〕又名鷄菌。

雞血藤

【產地】生於山巒之間，以雲南順寧一帶產生者，為最佳。

【基本】為一種蔓生藤類，莖長有達十數里者，其圍大者，五六寸粗；小者，一二寸細。折斷有汁，如血，故名也。其皮細潔，呈淡黃色，割斷之，有六稜形，中心紅色，外圍白色；乾之，其紅處輒突出二三分许，類似菊花狀。可採取其藤汁，蒸煎為膏，即雞血藤膠，以供藥用。

【成分】含有多量之膠樣質。

【功效】據云：能生血，和血，破血，壯筋骨，暖腰膝，通竅，宣經。又治百病，胃寒疼痛，筋骨痠痛，遺精，白濁，便血，老人血衰，手足麻木，婦女勞傷，血乾，帶下，子宮寒冷，月經不調，跌打損傷。

【用量】三〇——一〇〇服用。

雞冠花

(莧科)

【學名】*Cocksia cretaria*, L.

【產地】原產於東印度，近時庭園間，亦有栽培者。

【基本】為一年生草，莖高三三尺，葉為長橢圓形，尖端甚銳。互生。夏秋開花，花小，有紅，黃，白數種；

花後結實，狀如雞冠，故名。子黑，細光，而滑，及其苗，皆供藥用。

【功效】為收斂藥，可用於赤痢，便血等。

其苗氣味甘涼，無毒。能治痔瘡，及血病。其子氣味相同，能止腸風，瀉血，赤白痢疾，可炒過，服用。其花氣味亦同。能治痔漏。下血，赤白下痢，崩中，赤白帶下。

【用量】花及子用三〇——六〇服用之。

【禁忌】忌豬肉，魚腥。

【學說】李時珍曰：雞冠花，處處有之。三月生苗，入夏，高者，五六尺。其葉青柔，而窄，稍有赤脈。其莖赤色，或圓，或扁，有筋起，六七月間，稍開花，有紅，白二色。

雞腸草

(紫草科)

【學名】*Trigonotis pedunculata*, Trev.

【產地】多生於路旁，及田野之中。

【基本】為越年生草，高七八寸，葉倒卵形，互生，葉面粗糙。春夏之間，開小花，有藍色之合瓣花冠，花軸之上部，卷成螺旋狀，為卷繖花序。其全草，可為

藥用。

【功效】其氣味微辛，苦平，無毒。治毒腫，止小便，遺溺，又煎湯，洗手足傷水潰爛。五月五日，作灰，和鹽，療一切惡瘡，及風丹遍身癢痛。亦可搗封，一日五六易之。又作菜食之，能益人，去脂，除毒氣；又燒敷疔腫，又取汁和蜜，服之，療小兒赤白痢疾，甚良。又研末，或燒灰，揩齒去宜露。

【學說】李時珍曰：鷄腸草，生下濕地。三月生苗，葉似鵝腸，而色微深；莖帶紫，中不空，無縷。四月有小莖，兩五出小紫花，結小實，中有細子。

麒麟竭 *Sanguis draconis, Resina Draconis.*

【產地】多產亞州，及非州與美州之熱帶地方。

【基本】為麒麟血樹 (*Calamus Tokous, T.*) 之脂也。其樹上所結之果實，自然滴出樹脂，即為是品。此外又有於其樹幹鑽刻，亦有如是之樹脂，使其乾燥凝滷為不等形之塊狀，以供藥用之。

【功效】為收斂藥。有止血，止汗之功。

其氣味甘鹹而平，無毒。治心腹卒痛，金瘡出血，破積血，止痛，生肉，去五臟邪氣，定傷折打損

一切疼痛，血氣，內傷血聚，宜酒服之。又補心包絡，肝血不足，能益陽精，消陰滯。又敷一切惡瘡，疥癬，又治婦人血氣，小兒痲癩。

【用量】○。三——○。五服用。

【採製】臨時先研作粉，篩過，入丸散中用之，若同衆藥持之；則化作塵，飛也。

【學說】李時珍曰：血竭，是樹脂；紫蠟，是蟲造。按一統志云：血竭，樹略如沒藥樹，其肌赤色，采法，亦於樹下掘坎，斧伐其樹脂，流於坎，旬日取之，多出大食諸國。今人試之，以透指甲者，為真。

【別稱】又名血竭。

鯨魚

【學名】*Acanthopogon flavimanus T. & G.*

【基本】此屬硬鬚類，頭部略扁，兩眼，並列上面，背面呈沙色，有鬚二個。吸盤，乃腹鰭之變化者也。供吸着岩石木材等之用。常任水底，肉供食用。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。能暖中，益氣。

【別稱】又名駝魚，吹沙，沙溝魚，沙鰻。

鯉

【學名】*Cyprinus carpio*, L.

【產地】多存生於淡水之河及池中。

【基本】此屬硬骨類，形態似鱈，而口緣有二對之鬚，且側線上之鱗，常為三十六，或三十二，乃至三十九枚，肉可供食用。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。煮食之，能治欬逆，上氣，黃疸，止渴。又治水腫，脚氣，懷妊身腫，胎氣不安。又能下水氣，利小便，去冷氣，痲痺，氣塊。燒末，能發汗，定氣喘，欬嗽，下乳汁，止反胃，及惡風入腹。其鱗氣味鹹平，無毒。能殺蟲。其膽氣味苦寒，無毒。治目熱，赤痛，青盲，明目，益志。點眼，治赤腫，翳痛，塗小兒熱腫；又點雀目，燥痛，即明。又滴耳，治聾。其脂食之，治小兒驚忤，諸痢。其腦髓治諸癩。煮粥食之，治暴聲，和脂點目皆，治青盲。其血治小兒火瘡，丹腫，疥毒，塗之，立瘥。其腸治小兒肌疔，疔耳有蟲，同鮮搗爛，帛裹塞之。痔瘻有蟲，切斷，炙熟，帛裹之，坐俱，以蟲盡，為度。其目治刺瘡，傷風，

傷水，作腫，燒灰，敷之，汗出即愈。其齒治石淋。

○其骨治女子赤白帶下，陰瘡，魚鱗不出。其皮治癩疹，燒灰，水服，治魚鱗。六七日，不出者，一日二服，即效。其鱗治產婦血滯，腹痛，燒灰，酒服，亦治血氣，又燒灰，治吐血，崩中，漏下，帶下，痔瘻，魚鱗。

鮠魚

【學名】*Salus perryi*

【產地】多棲息湖水，或深水之中。

【基本】此形與鱧相似，於十一月頃，產卵，經五，六十日後，孵化，至春季四，五月頃，幼魚羣游於附近之水中，捕食小蟲。

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。能暖胃，和中。其膽氣味苦寒，無毒。治喉痺，飛尸，和水攪服。又治一切骨鯁，竹木刺在喉中，以酒化二枚，溫呷取吐。

【別稱】又名鱖魚，草魚。

鮡魚

【學名】*Clypeaster japonicus*, Doi.

【基本】此為海膽類之一種，體略扁平，不整形，棘短小如

毛，口開於腹之中央，肛門位於背面之步帶為花狀，由是而出管足。

【功效】其氣味甘平，無毒。治五痔，下血，瘀血，在腹。

鵝 (Goose) Anser

【產地】人家多畜養之。

【基本】此為雁之變種也，體白色，或灰褐色。頸長，尾與脚均短，嘴大，呈黃色。其上基部，呈黃色者，為雄；褐色者，為雌之瘤。陸上，水上，均得飼養之。肉，及卵可供食用，且聽覺銳敏，堪以守夜。

【功效】其白鵝膏氣味甘而微寒，無毒。灌耳，治卒聾。又

能潤皮膚，合面脂，塗手足皸裂，消癰腫，解暑石毒。其肉氣味甘平，無毒。利五臟，解暑熱。煮汁食之，止消渴。其血氣味鹹平，微毒。凡中射日毒者，飲之，並塗其身，又解藥毒。其膽氣味苦寒，無毒。能解熱毒，及痔瘡初起，頻塗抹之，自消。其卵氣味甘溫，無毒。能補中，益氣，多食，發病疾。其涎治咽喉發賊。其毛治小兒驚癇，又燒灰酒服，治疔疾。其掌上黃皮，燒灰，擦腳趾縫濕爛，疥癬，油調，塗凍瘡，最良。

【別稱】又名家鴈，舒鴈。

鵝抱

【基本】據蘇頌云：生宜州山林下，附石而生，作蔓，似大豆。其根，形似菜菔；大者，如三升器；小者，如

拳。二月，八月采根，切片，陰乾，用之。

【功效】其氣味苦寒，無毒。治風熱，上塗，咽喉腫痛，可搗末，酒服；亦消風熱，結毒，以酒厚之，立愈。

鵝

【學名】*Cygnus leucola*, Yarrall

【產地】多棲息於寒帶。

【基本】此為涉禽中之大者，羽毛純白。頸長，上嘴之基部，有赤黃色之瘤，脚黑。體長三尺六七寸，翼長一尺六七寸，常捕食鳥類。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。隨炙食之，益氣力，利臟腑

。其油能塗癰腫，又治小兒疳疾。其絨毛治刀杖，金瘡，貼之，止愈。

【別稱】又名天鵝。

鵝鵝

【學名】*Polysterna*

「產地」多產於南洋諸島。

「基本」此屬游禽類，形似鶉，而嘴尤長大，且下嘴之下方，有大皮囊，即喉囊，得以區別之也。皮囊之用在食魚，先連水吞入，貯於囊內，後乃搾水而出，嚥下其魚。四趾具蹼，游泳頗巧。

「功效」其脂氣味鹹而溫滑，無毒。塗癰腫，治風痺，透經絡，通耳聾。其嘴氣味鹹平，無毒。治赤白久痢，成疖，燒存性，研末，水服。其舌治疔疔。其毛皮治反胃，吐食，燒之存性，每用酒服二錢。

鷓鴣

「基本」據李時珍云：雉，水鳥之大者也；出南方，有大湖泊處。其狀如鶉，而大，青蒼色，張翼，廣五六尺，舉頭，高六七尺，長頸，赤目，頭項皆無毛，其頂皮方二寸許，紅色，如鶉頂。其喙，深黃色，而偏直，長尺餘。其喙下亦有胡袋，如鶉喙狀，其足爪，如鶉，黑者，性極貪惡，能與人鬪，好咬魚蛇，及鳥雛，詩云：有鷓在梁，即此。自元入我朝常賦，曾有鷓鴣之供獻。案飲膳正要云：鷓鴣有三種，有白者，黑色，花者，名爲胡鷓鴣。其肉色，

亦不同。

「功效」其肉氣味鹹而微寒，無毒。能除中蠱，魚毒；可以補中，益氣。其髓氣味甘溫，無毒。能補精髓。其膠能治魚骨硬。其毛能解水蟲毒。

「別稱」又名扶老，鷓鴣。

鼯鼠

「學名」*Opodisma taiwanense* Temm.

「基本」此屬食蟲類，似家鼠，而口吻特尖，伸屈自由。尾生粗毛，脰，脰之兩骨相合，而爲單骨，是其異點，因有臭氣，而貓不捕食。

「功效」其肚氣味甘寒，無毒。能治咽喉疼痛，一切熱氣，研末含嚥，神效。

「別稱」又名碩鼠，鼯鼠，雀鼠，鼯鼠。

鼯鼠

「學名」*Petaurista lateralis* Pallas

「基本」此屬食肉類之鼯鼠科，體細長，四肢短。全身呈黃褐色，性狡猾，運動輕快，食小獸鳥類等之血，或鳥卵等。被敵迫時，則由肛門腺分泌臭液，以防禦之。

「功效」其肉氣味甘臭而溫，並有小毒。煎油，塗瘡疥，殺蟲。其心肝味臭，微毒。能治心腹腫痛，殺蟲毒。

第十九畫

攀倒甍

(薯科)

「學名」*Polygonum cuspidatum*, S. et Z.

「產地」多生於山野之間。

「基本」為一種宿根之草本植物，莖高一二尺，乃至四五許尺，葉卵形，互生，而先端甚尖。夏月葉腋生出花軸，開淡紅色小花，為總狀花序。嫩莖，可食；亦供藥用之。

「成分」含有酸味素等之物質。

「功效」其氣味苦寒，無毒。能解風熱，煩渴，狂躁，搗汁服之，甚效。

「學說」蘇頌曰：生宜州郊野，莖葉如薄荷，一名：班杖；一名：接骨。李時珍曰：班杖，名同虎杖；接骨，名同蒟蒻，不知是一類否？

礞石

「基本」據李時珍云：礞石，江南諸山，往往有之；以盱山

出者，為佳。有青，白色二種；以青者，為佳，堅細，而青黑；打開，中有白星點；煨後，則星黃如鈇金；其無星點者，不入藥用之。

「功效」其氣味甘鹹而平，無毒。治食積不消，留滯，臌脹宿食，癰塊，久而不瘥。小兒食積，羸瘦，婦人積久食積，攻刺心腹，得巴豆，礞砂，大黃，荆三稜作丸服之，最良。又治積痰，驚癇，咳嗽，喘急。

「用量」六〇——一二〇服用。

「採製」天竺鍋一個，以礞石打碎四兩，加入硝石四兩，拌均，灰火十五斤，簇定，煨至硝盡，其石色如金，為度；取出研末，水飛，去硝毒，曬乾，用之。

「別稱」又名青礞石。

礞石 *Arsenopyrites*

「基本」為砷硫化鐵之礞石，多生於岩石間，為銀色，或灰褐色之樹枝狀，粒狀之塊，質堅硬而脆，煨之，則發惡臭，可為藥用之。

「成分」含有十分之二砷黃，十分之三四砷素，及十分之四六鐵質等。

「功效」為殺蟲藥。

其氣味辛而大熱，有毒。能治寒熱，鼠癩，死肌，

風痺，腹中堅癖，邪氣，解熱，明目，下氣，除腦

中熱，止消渴，益肝氣，破積聚，痲冷腹痛，去鼻

中息肉。又除胸膈間積氣，去冷濕，風痺，癩瘡。

〔禁忌〕畏馬目；毒公，蒼屎，虎掌，細辛；畏水。

〔學說〕李時珍曰：礬石，有數種：卽白，蒼，紫，皮，桃

花，金星，銀星，特生各礬石，俱是一物；但以形

色立名。其性皆熱毒，並可毒鼠；惟蒼白二色，入

藥。語畧，生于山，則草木不生，霜雪不積；生于

水，則水不冰凍，或有溫泉，其氣之熱，可知。

〔別稱〕又名太白石，立制石，青介石，固羊石，石鹽，澤

乳，鼠癩。

欄木

〔產地〕多產於安南，及南海各處。

〔基本〕據李時珍云：木性堅，紫紅色；亦有花紋者，謂之

花欄木，可作器皿，扇骨諸物；俗作花梨，誤矣。

〔功效〕其氣味辛溫，無毒。治產後惡露，衝心，癩癧，結

氣，赤白瀉下，並倒煎服。又能破血塊，止冷嗽，

可煮汁，熱服。

蟻

〔學名〕*Formica rufa*.

〔基本〕此屬膜翅類之有吻類，據李時珍云：蟻，處處有之

，有大小，黑白，黃赤數種，穴居，卵生。其居有

等，其行有隊，能知雨候。春出冬蟄，壅土成封，

曰：蟻封；又曰：蟻垤。昔時亦有掘取其封土，而

爲藥者。

〔功效〕其蟻垤土，能治疔腫，疽毒，可搗塗之。

蠍

〔學名〕*Scorpion*.

〔基本〕此屬蜘蛛類之蠍類，體似壓扁之蠶蛹，而附着以尾

者，頭胸部之背面，有大單眼一對，小單眼數對，

腹部由十三環節而成，其前部幅寬之七環節，稱前

腹。後部幅狹之六環節，稱後腹；後腹部，常反轉

至於背上；且末端具有毒鉤，以之供防敵，捕食之

用，以肺囊呼吸。氣門，於前腹之第三，乃至第六

環節，各有一對。前腹部之腹面，有生殖口，又由

其左右生一對筒狀器，卽感覺器，胎生，貪食幼蟲

，又捕食蜘蛛類，昆蟲類。

【功效】其氣味甘辛而平，有毒。治諸風，癩疹，及中風，

半身不遂，口眼喎斜，語澀，手足抽掣，小兒驚癇

，風搖，大人痰瘧，耳聾，疝氣，諸風疔。女人帶

下，陰脫。

【別稱】又名蚌蝟，主簿蟲，杜白，蠶尾蟲。

煙

【學名】*Salicentrus constrictus* Lam. and.

【產地】多棲息於鹹水，及淡水相混之泥沙中。

【基本】為向柱類之一種，介殼為長方形，水管，及足，皆

露殼外，故殼之前後兩端，常開不閉。表皮淺薄，

而在前後兩端者，稍有褶褶。殼頂，在殼三分之一處

，主齒，右殼二個，左殼三個，右殼前齒長而彎曲

，左殼中齒分叉，無側齒。殼外面淡茶褐色，內面

白色，長二三寸，高一寸。其肉，有用為藥者。

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。能補虛，止冷痢，養食，去

胸中邪熱，煩悶，飯後食之，能治婦人產後虛損。

蟹

【學名】*Brachyura*

【基本】此屬甲殼類之短尾類，雄，腹部狹小，其基部，有

棒狀之生殖器。雌，腹部大，其裏面有卵之附着器，且被覆於腹部之胸部後方，具一對生殖門，每年夏期脫換甲殼。

【功效】其氣味鹹寒，而有小毒。能除胸中邪氣，熱結，癆

痛，噎噎，面腫，又能除敗漆，解結聚，活血，養

筋，益氣，散諸熱，治胃氣，理經脈，消食，以醋

食之，又利五臟，去煩悶。治產後腹痛，血不下者

，以酒食之。又筋骨折傷者，生搗炒罌之，能續斷

絕筋骨，去殼同黃，搗爛，微炒，納入疔中，筋即

連結。小兒解頤不合者，可同白芨末，搗塗，以合

為度。又殺貫穿毒，解蠆魚毒，漆毒，治瘡，及黃

疸；又搗落塗疥瘡，癬疔，搗汁，滴耳聾。其殼燒

之存性，蜜調塗凍瘡，及蜂蠶傷，酒服，治婦人兒

枕痛，及血崩，腹痛，消積。

【別稱】又名螃蟹，郭索，橫行介士，無腸公子，雄曰：蟬

蟻，雌曰：博帶。

蟾酥

【產地】吾國四川及江蘇各地，產生為最多。

【基本】為蟾蜍 (*Bufo bufo japonicus* Schlegel) 之表皮腺，分

泌乳白色之毒質，與野粉混和煉製，而成一種塊狀物，即為本品，可供藥用之。

【功效】為刺戟藥。

其氣味辛溫，有毒。能助陽氣，治癰疽，發背，疔毒，惡腫，為疔科之要藥。又治小兒疳疾等。

【用量】〇・六一——一・二服用。

蟾蜍

【學名】*Bufo hufio japonicus* Schlegel.

【基本】此為大形之蛙也，全形為土塊狀，生活於陸上，至產卵期，則入水中，性遲鈍，然以有保護色，與由皮膚之黏液腺分泌乳狀之毒液，得避敵難。舌長，運動迅速，捕食物頗巧，卵塊為長紐狀。

【功效】為驅蟲藥。

其氣味辛涼，微毒。治陰蝕，疽癩，惡瘡，割犬傷，能合玉石；燒灰，敷疔，立驗。又治溫病發斑，因篤者，去腸，生搗，食一二枚，無不痊者。又殺疥蟲，治鼠漏，惡瘡，燒灰，敷一切有蟲惡瘡。又治疳氣，小兒面黃，癯氣，癰結，小兒勞瘦，最良。故治一切五疳，八痢，腫毒，破傷風病，脫肛，

皆有效。

【採製】於五月，五日，取得日乾，或烘乾，用之。又有去皮，腸，爪，酒浸一宿；又用黃精自然汁，浸一宿，塗酥，炙乾，用之。

藜

(藜科)

【學名】*Chenopodium album*, L.

【產地】多生於田野之間。

【基本】為一年生草，高五六尺，葉質柔，而形闊，緣邊有少數之缺刻，及鋸齒；葉面具粉狀之小體。初夏開花，黃色。其莖及葉，皆供藥用。

【功效】其葉氣味甘平。微毒。能殺蟲，又可煎湯，洗蟲瘡，漱齒齦；又可搗爛，塗諸蟲傷，去癩風。其莖燒灰，和荻灰，蒿灰等分，和水蒸之，取汁，煎膏，點疣贅，惡肉。

【學說】李時珍曰：藜，處處有之，即灰藜之紅心，莖葉稍大者。

【別稱】又名萊，紅心灰藜，鶴頂草，胭脂菜。

藜蘆

(百合科)

【學名】*Veratrum nigrum*, L.

「產地」多自生於山地之間。

「基本」為多年生草，莖呈青紫色，高三三尺，葉狹長，有平行脈。春日開花，小而紫黑；根莖皆有毛，入藥用之。

「成分」含有 *Yavin* 及 *Yavinolinn* 與 *Yavinachin* 並 *Cavanthine* 澱粉等之成分。

「功效」為催吐藥，及皮膚殺蟲藥。

其根氣味辛寒，有毒。除蠱毒，去欬逆，洩痢，腸澀，頭瘍，疥癩，惡瘡，殺諸蟲毒，去死肌，又療噤逆，喉痺不通，鼻中息肉，馬刀爛瘡，疥癬，不入湯用。又能去積年膿血泄痢。

「用量」一回〇〇八——〇〇二五服用。

「禁忌」反細辛，芍藥，人參，沙參，紫參，丹參，苦參；

惡大黃；畏葱白。

「採製」採根，去頭，用糯米泔汁，煮之，經三四時間，而後曬乾，用之。

「學說」據名醫別錄曰：葶藶，生太山，山谷；三月采根，

陰乾。

「別稱」又名山葱，葱葍，葱葵，葱蘆，葱葱，鹿葱。

藤黃

(金絲桃科)

「學名」*Garcinia morella*, Desv.

「產地」多產於東印度，及暹羅等處。

「基本」為一種喬木，高五六十尺，葉呈橢圓形，對生。開花，單性；果實為漿果。其樹脂為乳液，取而乾涸之，即成圓柱狀，橙黃褐色之塊，可供藥用之。

「成分」含有 *Andi Cambogia* 之樹脂，及護謨等。

「功效」為瀉下性刺戟藥。

其氣味酸澀，有毒。主治轉牙，蛀齒，點之便落。
「用量」一日數回，以〇〇一——〇〇五——〇〇三為丸劑，粉劑等，服用之。

「別稱」樹名：海藤。

羅勒

(唇形科)

「學名」*Ocimum basilicum*, L.

「基本」據掌禹錫云：羅勒，處處有之；有三種：一種似紫蘇葉；一種葉大，二十步內即聞香；一種堪作生菜；冬月用乾者。子可安入目中，去翳，少頃濕服，與物俱出也。李時珍云：香菜，須三月聚葉生時，種之乃生；否則不生。常以魚腥水，米泔水，泥溝

水澆之，則香而茂，不宜糞水。

【功效】其氣味辛溫，微毒。能調中，消食，去惡氣，消水氣，宜生食，療齒根爛疔，用之，甚良。凡患瘰癧者，取汁，服之；冬月用乾者，煮汁。其根燒灰，敷小兒黃爛疔，又辟飛尸，鬼疰，蠱毒。其子治目翳，及塵物入目，以三五顆，安目中，少頃，當濕服，與物俱出；又治風赤，眵淚。

【別稱】又名雷香，香菜，翳子草。

羅望子

(荳科)

【學名】*Tamarindus indica*, L.

【基本】為一種喬木，葉互生，為偶數羽狀複葉，自許多小葉而成；開花，白色，有赤色之線條，為總狀花序。果實為莢，長約二尺，中有間隔，內各具一子，大如指頭，赤色，至堅硬後，變為墨色，可食，亦供藥用。

【功效】為清涼緩下藥。

其子氣味苦而大寒，無毒。能除心膈間熱風，心黃，骨蒸寒熱，殺三蟲；又炙黃，能治熱病，下痰，通經絡，療小兒疳氣。

【用量】三〇——六〇——一二〇〇服用。

【學說】李時珍曰：此即波斯皂莢也。

【別稱】又名阿勃勒，婆羅門皂莢，波斯皂莢。

羅漢松

(松柏科)

【學名】*Plectanopus chinensis*, Wall.

【產地】多生於山地，亦有栽培於寺院，及庭園者。

【基本】為常綠木本之植物，高至丈許，葉細長二三寸，闊三分餘，中有一肋，端略尖；表面綠色，裏面青白色，革質，互生。夏月開花，單性，呈淡黃色，果實肉質，熟則呈赤色，可為藥用之。

【成分】含有的列並底油等。

【功效】其味甘，無毒。能補腎，益肺，治心胃痛。其皮能

治一切血症，殺蟲，療癬，合蘆薈，香油，調擦。

【學說】物理小識：羅漢松，闊瓣，厚葉；樹老，結實，長四五分，底平，上銳，色紫黑，乾之，可入藥用。

薔菜

(唇形科)

【學名】*Leonurus sibiricus*, Maxim.

【產地】多生於山麓原野之間。

【基本】為一種草本之植物，莖高二三尺，夏秋之際，梢上

各葉腋生多花，呈穗狀，唇形花冠，白色，微帶淡紅者也。其苗可採之，而供藥用。

〔成分〕含有益母草素。

〔功效〕其苗氣味辛平，無毒。能破血，又治產後腹痛，多汗，服之。

〔用量〕四。〇——一二。〇服用。

〔學說〕李時珍曰：此即益母之白花者。

離高草

〔基本〕陳藏器云：生人家階庭濕處，高三二寸，苗葉似葶藶，江東有之，北土無也。

〔功效〕其氣味辛寒，而有小毒。能治瘰癧，丹毒，小兒無辜寒熱，大腹痞滿，痰飲，膈上熱，可生研汁，服之。

鱈魚

〔學名〕*Mugil cephalus*, Linn.

〔產地〕多於淡水，及鹹水之混合水處而產生之。

〔基本〕此硬鱈類之一種，體灰色，有淡黑色之縱線；體長達二尺。其肉可食，亦供藥用。

〔功效〕其肉氣味甘平，無毒。能開胃，利五臟，令人肥健。

，與百藥無忌。

〔別稱〕又名子魚。

鮠魚

〔學名〕*Cyrtopoma japonicus* V. D. How.

〔基本〕此為有尾類之一種，有山椒之香，故又名：山椒魚。

。兩棲中之最大者，長達四五尺。頭部扁平，眼小，皮膚似山椒之樹皮，多疣狀突起；由突起分泌黏液。幼時，具有小鰓，至肺成長時，則失去。前肢，有四趾；後肢，有五趾，卵呈念珠狀。

〔功效〕其味甘，有毒。食之，已疫疾。

〔別稱〕又名山椒魚，人魚，鰻魚，鮠魚；大者，名：鮠。

鮫鯉

〔學名〕*Mura*.

〔產地〕產於亞細亞，及亞非利加之熱帶地方。

〔基本〕此屬貧齒類，其潛匿水中，被以山上皮化生之鱗。其形狀，及排列法，類似魚鱗；但魚鱗，由其皮生之，為動物之保護器也。逢敵，則尾由腹面捲於頭上，令體為球形，同時使鱗聳立，以避其難。舌細長，伸縮自由，且有黏質，由其下腺，分泌黏質之

唾液，適於紙食蟻也。其甲，即為穿山甲，可供藥用之。

「功效」為刺戟藥。

其甲氣味鹹而微寒，有毒。去五邪，驚喘，悲傷，燒灰，酒服；又治小兒驚邪，婦人鬼魅，悲泣，及疥癬，痔漏，蟻癩，疔癩，及諸瘡疾；又燒灰，敷惡瘡；又去山嵐，瘴癘，除痰瘧，寒熱，風痺，強直，疼痛，能通經脈，下乳汁，消癰腫，排膿血，通竅，殺蟲。

「用量」一·五——四·五服用。

「採製」據李時珍曰：方用，或炮，或燒，或酥炙，醋炙，童便炙，或油煎，土炒，蛤粉炒，當各隨本方；未用生用者，仍以尾甲，乃力勝。

「別稱」又名龍鯉，穿山甲，石鱗魚。

鯢魚

「基本」據陳藏器云：鯢魚，生南海，狀如鱗，身正圓，無硬骨，作炙食，至美。李時珍云：閩浙廣南海中，四五月出之。嶺表錄云：形似鱣魚，腦上突起，連背，身圓，肉厚白，如鯢，肉只有一脊骨。治之，

以葱薑，侑去，以粳米，其骨亦軟，而可食。

「功效」其肉氣味甘平，無毒。食之，能令人肥健，益氣力。其腹中子，有毒，令人下痢。

鯨魚

「學名」*Physeter macrocephalus* Linna.

「產地」羣棲於寒帶，或溫帶地方。

「基本」為鯨類 (*Cetacea*) 體魚形，前肢變為鰭狀，尾為水平擴張，水棲之哺乳類也。體面無毛，頭不分明，後肢全退化。急行時，使頭浮上。體面無毛，幼時有毛，皮下有厚脂肪層，以保其體溫，且減其體重，永沈水中。肺臟特大，鼻孔位於頭上，一名噴水孔。眼小，耳殼缺，適於水棲。肛門附近有一對乳腺，每年產一兒。其頭蓋骨，前部有巨大之腔隙，內含半流動之蠟質物，即為鯨蠟，可供藥用之。

「成分」含有 $C_{16}H_{31}O_2$ 之成分。

「功效」為緩和性之軟骨料等。

「製劑」—鯨蠟膏 *Cetinum catenae*

此即以鯨蠟，白蠟，扁桃油各五〇。〇，溶化而成，為緩和性軟骨料等。更有加以薔薇油二滴，為粉

性之軟音，用於顏面之小瘡疔，及口唇之小裂傷。

鵲

【學名】*Agoutia imperialis*, L.

【基本】此屬猛禽類之鷹類，習性與感無異；尾羽無斑，此異於鷹者也。

【功效】其骨能治折傷，斷骨，可燒灰，無服二錢，酒下；在上食後，在下食前，骨即接如初。其尿治諸鳥獸骨硬，燒灰，酒服，方寸。

鵲

【學名】*Petau pterica*, Gould.

【基本】此屬鳴禽類，體大似鳥，上部褐黑色，肩部白色，褐黑部，略雜以青紫色；白色部，由肩，至腹，與脊，及鬮之中央。黑冠毛之後，有白色如頸之部分。○翅與紫黑色；尾羽有黑青銅色之光澤。

【功效】其雄鵲肉，氣味甘寒，無毒。治石淋，消結熱，可燒作灰，以石投中，解散者，是雄也。○又治消渴，去風，及大小腸澀，並四肢煩熱，胸膈痰結，婦人不可食。○冬至埋鵲於園，辟時疾，溫氣。其巢以多年者，燒之，水服，瘰癧狂，鬼魅，及蠱毒，亦效。

瘦瘠。

【別稱】又名飛駝馬，喜鵲，乾鵲。

鵲

【學名】*Columba communis*, Bonn.

【產地】吾國北方，春季時多有；南方，秋季時多有；而繁殖多在黑龍江省，且於夏季之時。

【基本】此屬雞類，全體茶褐色，而雜以黑白之小斑。嘴短小，尾亦短，脚小無距。晝間潛伏草間，夜出來食。○每年產卵二回，其肉味美，有用為藥者。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。能補五臟，益中，續氣，實筋骨，耐寒暑，消結氣；和小豆，生薑，煑食，能止洩痢。○又治小兒患疳，及下痢，食之，有效。

麗春花

(罌粟科)

【學名】*Papaver Rhoeas*, L.

【產地】原產於歐羅巴，近來吾國各處庭園，多栽培之。

【基本】為一年，或越年生草，莖高一二尺許，葉為羽狀分裂，互生。春夏之際，開花，花瓣四枚，紅紫白色；果實為蒴果，似壺狀。其花及根，可為藥用。

【成分】含有麗春花素，麗春花酸。林檢酸，樹脂，脂肪。

【功效】爲緩和之鎮痛藥，催眠藥。

其花及根能治癰黃，及黃疸。

【用量】一。〇——三。〇服用。

【學說】李時珍曰：此草有殊功，而不著其形狀。今蕎粟，

亦名：壓春草；九仙子亦名：仙女嬌，與此同名，

恐非一物也；當俟博訪。

【別稱】又名齒女蒿，定參草，壓春草。

麴菌

【學名】*Aspergillus Oryzae*, Waha.

【基本】此爲黴類一種孢子黃綠色，多數重疊，生於稻之先

端，全體成球狀。此之麴菌，寄生於蒸米，即成爲

麴，故吾國有大小麥麴之別，皆供藥用之。

【功效】其小麥麴，氣味甘溫，無毒。能消殺，止痢，去小

兒食積；又能調中，下氣，開胃，療臟腑中風，寒

熱。又治霍亂，心膈氣逆，除煩悶，破癥結，補虛

，去冷氣，除腸胃中寒。其大麥麴，氣味與前相同

，能消食，和中，下胎，破血。其麴麴，及米麴，

氣味亦同，能消食積，酒積，以糯米研末，酒服，

立愈。其餘功同小麥麴。

【採製】據李時珍曰：麴有麥，麴，米造者不一，皆酒醱所

須，俱能消導，功不甚遠。造大小麥麴法：用大麥

米，或小麥米，連皮，井水淘淨，晒乾。六月，六

日，磨碎，以淘麥水，和作塊狀，糝葉包緊，懸於

風處；七十日，可用矣。

【別稱】又名酒母。

第二十畫

寶石

【學名】*Precious stone*

【產地】吾國西北，及東北各省，最多產出之。

【基本】此種硬度，在七以上，具有美麗之色澤，受大氣，

溫熱，藥品之作用，而不變。產出甚稀，極可寶貴

，故稱爲寶石。

【功效】據李時珍云：其石能去翳，明目，入點眼藥，用之

。凡塵入目，以珠拭拂，即去。

【學說】據李時珍曰：寶石，出西番回鹘地方，講坑井內；

雲南，遼東，亦有之。有紅，綠，碧，紫數色；紅

者，名刺子；碧者，名靛子；翠者，名馬價珠；黃

者，名木難珠；碧者，名蠟子；又有鴉膽石，貓精

石，石榴子，紅扁豆等，名色皆其類也。

懸鈎子

(薔薇科)

【學名】*Rhus palmatus*, Thunb.

【產地】多生於山野者。

【基本】為莖葉灌木，莖與葉皆有刺，高四五尺許。葉掌狀

分裂，約三五片，均有缺刻狀之鋸齒，互生。初夏

開花，白色；果實為肉果，紅色，其子可為藥用。

【功效】其子氣味酸平，無毒。能醒酒，止渴，除痰，去酒

毒；搗汁，服之，解射工，沙虱毒。其葉燒研，水

服；治喉中塞。其根皮氣味苦平，無毒。治子死腹

中不下，又能破血，婦人赤帶，赤白痢疾，膿血，

腹痛，殺蟲毒，下血，並遠煮汁，飲之。

【學說】李時珍曰：懸鈎樹，生高四五尺。其莖白色，有倒

刺；其葉有細齒，青色，無毛，背面淡青，頗似櫻

桃葉，而狹長；又似地棠花葉。四月開小白花；結

實，色紅，今人亦通呼為藤子。

【別稱】又名沿鈎子，箭，山莓，木莓，樹莓。

爐甘石 *Calamina*

【產地】多產於硫化亞鉛礦，及銅脈礦中，以雲南為最多。

【基本】此之種類頗多，通常為白色長方形，或六面形之鐘

石，每具玻璃樣，或真珠樣之有光骰子形，塊狀形

。又有褐色，青色者。用為藥者，多取白色微紅之

石。

【成分】含有碳酸亞鉛，鐵，鈣，鎂等。

【功效】民間多用為眼科藥。

其氣味甘溫，無毒。能止血，消腫毒，生肌，明目

，去翳，退赤，收濕，除爛，同龍腦點眼，治目中

一切諸病。

【採製】取石，以炭火煨紅，童子小便，淬七次，水洗淨，

研粉，水飛過，晒用。

【學說】李時珍曰：此金銀之苗也，其塊大小不一，狀似羊

腦，鬆如石脂，亦黏舌，產于金坑者，其色微黃，

為上；產于銀坑者，其色白，或帶青，或帶綠，或

粉紅。赤銅得之，即變為黃。今之黃銅，皆此物點

化也。

【別稱】又名爐先生。

檀香

【基本】據李時珍云：檀香，江淮，湖嶺山中皆有之。木大

者，近丈許；小者，多被樵采。葉青，而長，有鋸齒，狀如小荊葉，而香，對節生。其根，狀如枸杞根，而大。煨之，甚香。

【功效】其氣味苦澀而平，無毒。能治頭痛，腫毒，瘰癧，麻脂調塗，七月腐落。

【別稱】又名兜婁香。

【諸】

(殺斗科)

【學名】*Quercus favena*, Thunb.

【產地】多生於暖帶之間。

【基本】爲常綠喬木，高三四十尺餘，葉呈長橢圓形，或廣披針形；緣邊，有鋸齒，或無之。春夏之間，開花，爲總狀花序。果實爲堅果，有柄狀之殼斗。其甜者，細白，粒小；苦者，赤色，粗大。可採取其皮葉，及仁，皆供藥用之。

【功效】爲清涼藥，止血藥。

其仁氣味苦濕而平，無毒。食之，能止洩痢，破惡血，除消渴。其皮葉煮汁，飲之，止產婦出血。嫩葉，可以貼腫瘡，一日三換，最良。

【用量】三〇——一〇〇。服用。

【學說】陳藏器曰：櫛子，處處山谷有之。其木大者，藥數抱，高二三丈；葉長大，如栗葉，稍尖而厚堅，光澤，鋸齒峭利，凌冬不凋。三四月開白花，成穗，如栗花；結實，大如櫛子。

獼猴

【學名】*Macacus fasciatus*, Blyth.

【基本】此屬於狹鼻類，爲猿類中之分布最廣者。其面呈赤色，體毛爲灰褐色，性極伶俐，富於模倣，頗能馴良。齒式與人相同；惟犬齒較長耳！

【功效】其肉氣味酸平，無毒。治諸風勞，釀酒，彌佳。又能治久瘡。食之，辟瘴疫。其頭骨治瘰癧，作湯，浴小兒驚癇，鬼魅，寒熱。其手治小兒驚癇，口禁。其尿能塗蜘蛛咬傷；又治小兒疳風，撮口，及急驚風，燒末，和生蜜少許，灌之。

【別稱】又名沐猴，爲猴，胡孫，王孫，馬留。

獼猴桃

(獼猴桃科亦作木天蓼科)

【學名】*Actinidia arguta*, Pl.

【產地】多生於山地之間。

【基本】爲落葉灌木，呈蔓狀，能攀緣於他物之上，其幹大

者，圍過尺半；葉橢圓形，或心臟形，緣邊，有刺狀之鋸齒，互生。夏秋之間，自葉腋出數花，徑五六分，爲聚繖花序；花瓣五片，呈綠白色，藥帶黑色，子房球形，而平滑，柱頭開張，如星散狀。果實爲漿果，橢圓形，外皮褐色，可爲藥用之。

〔成分〕含有脂肪，酸味質，糖分等。

〔功效〕爲清涼藥。

其實氣味酸甘而寒，無毒。能止暴渴，解煩熱，壓丹石，下淋石，去熱瘰；又調中，下氣，治骨節風，痺痿，不隨。其藤中汁氣味甘滑而寒，無毒。治反胃，和生薑汁，服之，又下石淋。其枝葉能殺蟲，療癩疥。

〔學說〕李時珍曰：其形如梨；其色如桃，而獼猴，喜食，故有諸名；閩人呼爲陽桃。

〔別稱〕又名獼猴梨，藤梨，陽桃，木子。

礬石

Alunon.

〔產地〕吾國浙江平陽縣，爲著名之產地。

〔基本〕此多產於火山附近之地方，常在他岩石上，結成白皮，呈土狀，塊狀，纖維狀，結晶屬等，軸晶系，

常爲八面體，有玻璃光澤。劈開不完全，斷口介殼狀。純粹者，無色透明；含雜質者，呈種種之色。硬度二——二。五，比重一。八，極易溶解於水；

加熱則失去結晶水，變爲白色之粉末，名煇明礬，以吹火吹之，焰呈紫色，卽爲鉀。可供醫藥之用。

〔成分〕含有硫酸鉀，及硫酸鋁， $K_2(SO_4)_3 + 2Al_2O_3$ 此外尚含鈉，鉀，鐵，鎂，錳等。

〔功效〕爲收斂藥，止血藥。

其氣味酸鹹而寒，無毒。能去寒熱，止洩痢，治陰蝕，惡瘡，目痛，鼻中息肉。又除風，去熱，消痰，止渴，暖水臟，治中風失音，和桃仁，葱湯浴，可出汗。生含礬津，治急喉痺，療鼻衄，鼷鼻，鼠漏，癩癧，疥癬。枯礬，貼齒牙縫中，能止出血；又可燥濕，解毒，追涎，上血，定痛，蝕惡肉，生好肉，治瘰癧，疔腫，惡瘡，癩癧，痘疾，通大小便，去口齒，眼目，諸病。

〔用量〕〇。四——一。二服用。

〔禁忌〕惡牡蠣；畏麻黃。

〔別稱〕又名涅石，羽涅，羽澤；煇結者名：巴石輕；白者

名：柳絮礬；俗稱：白礬，明礬。

稽豆

「基本」此即黑小豆之小科，而細粒者，霜後乃熟，可為藥用。

「成分」含有蛋白質，脂肪，無氮素物，纖維，灰分等。

「功效」其氣味甘溫，無毒。能去賊風，風痺，婦人產後冷血，炒令焦黑，及熟，投酒中，漸漸飲之。又能開胃，消食，健脾，利水。

「用量」六〇——一二〇服用。

穠麥

「基本」此即大麥 (*Hordeum sativum, L.*) 之一種皮厚者。

「功效」其氣味甘而微寒，無毒。能溫中，消食，補中，益氣，健脾，養胃。

蠶蟄

「學名」*Thuraxera brassicae* L.

「基本」此屬鱗翅類之蛾類，卵產於葉之裏面，始為白色，

後變為紫黑色。幼蟲，呈圓柱狀，背上有三條白線，頭部暗褐色，食害菘類，蔬菜類之葉。幼蟲，入地中，化為蛹，赤褐色，長不過六七分。成蟲，長

六七分，褐色，前翅灰褐色，有種種斑紋，後翅褐色，近於外緣者，其色淡。

「功效」其氣味鹹而微溫，有毒。能除惡血，血瘕，痺氣，破折血，疼痛；又治目中淫屑，青翳，白膜，癩吐血，血結，金瘡，內塞，產後中寒；又敷惡瘡。遊疹。

「用量」二〇五——三〇服用。

「禁忌」忌附子。

「採製」取後，陰乾，與糯米同炒，至米焦黑，取出，除去糯米，及身上口畔肉毛，並黑塵子，作三四截，研粉，用之。諸方亦有乾研，及生取汁者。

「別稱」又名蠶蟄，蟹蟄，乳齊，地蠶，應條。

藿香

(唇形科)

「學名」*Euphorbia rugosa*, Fisch. et Mey.

「產地」多生於山野水濕之地，亦有栽培於庭院者。

「基本」為多年生草，莖方有節，中空，高約三四尺，葉長卵形，端尖，有缺刻；自莖端，至下部，對生，甚密。夏秋之間，開花；花冠唇形，排成大穗狀，呈淡紅色，或青紫色。其枝葉，皆可供藥用之。

【功效】其枝葉氣味辛而微溫，無毒。能治霍亂，心腹痛，

脾胃吐逆。又能助胃氣，開胃口，進飲食，溫中，

快氣，肺虛，有寒，上焦寒熱，飲酒口臭，可煎湯

漱口。

【用量】二·五——七·五服用。

【學說】蘇李時珍曰：莖香，方莖，有節，中虛，葉微似茄

葉。潔若，東園，惟用其葉，不用枝梗，今人併枝

梗用之。

【別稱】又名兜重婆香。

蘆

(禾本科)

【學名】*Phragmites communis*, Trin. var. *longicaulis*, Miq.

【產地】多生於濕地，或淺水中。

【基本】為多年生草，莖高丈許，中空；葉細長而尖，有平

行脈。秋開細花，甚為繁密，成大圓錐花序。其根

處處有結節，採集白色之地下莖，除去其纖維根，

長有二尺許，稍帶甘味者；乾燥之，則為淡黃色，

皆可供藥用之。

【成分】根含有糖質，澱粉質，蛋白質，及中性鹽基等。

【功效】為清涼解毒藥，用於口渴，熱候，魚肉之中毒等。

其根氣味甘寒，無毒。去消渴，客熱，止瀉痢，療

反胃，嘔逆，不食，胃熱，傷寒，時疫，內熱；又

解大熱，煩悶，久渴，孕婦心熱。其莖氣味小苦寒

冷，無毒。能去臨間客熱，止消渴，利小便，去河

豚，及諸蟹毒；又解諸肉毒。其葉氣味甘寒，無

毒。治霍亂，嘔逆，肺癰，煩熱，癰疽，燒灰淋汁

，煎膏蝕惡肉，去黑子。澤治金瘡，生肉滅癩。

【用量】一〇〇——二〇〇服用。

【禁忌】惡巴豆。

【採製】取蘆根，須要逆水生，並黃泡肥厚者，去鬚節，並

赤黃皮，用之。

【學說】李時珍曰：蘆有數種，其長丈許，中空，皮薄，白

色。

【別稱】又名葦，葭。

蘆薈

(百合科)

【學名】*Alou Vera*, L.

【產地】產於熱帶地方，或栽培於地中海岸等。

【基本】為常綠植物，葉大而尖，肉質，有銳鋸齒；開花，

成爲穗狀，集生於莖上。其葉肥厚，分泌之汁，黑

色，有光，取而乾潤之，以供藥用。

【成分】含有 $\text{Alum} \text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{O}_7$ 之微黑色無臭針狀結晶。

【功效】為峻下藥，健胃藥；又為通經藥。

其氣味苦寒，無毒。能去熱風，煩悶，胸膈熱氣；又能明目，鎮心，治小兒癩癩，驚風，五疳，除三蟲，及痔漏，疔癰，解巴豆毒，去小兒諸疳熱；又單用，殺疥蟻；又吹鼻，殺腦疳，除鼻瘰；又研末，煮醫齒，甚妙。

【用量】二日數回。○。一——○。三為緩下藥；○。三——○。五——一。○。○為峻下藥；○。○。二——○。○。

三為健胃藥。

【製劑】丁蘆音丁蘆 Tinctura Aloes

此即以蘆音粉末一○。○，酒精五○。○，浸成爲一種暗褐色，而有苦味之液。一日數回，以○。二五——○。五爲健胃，及通經藥，而不適宜爲瀉下藥也。

2 複方蘆音丁蘆 Tinctura Aloes Composita

此即以蘆音，大黃，莪朮，紅花，龍胆各五。○，稀酒精二○。○，浸而製之，一回，與以二。五

——五。○爲健胃藥。

3 蘆音越幾斯 Euxinum Aloes

此即以蘆音，溜水各五○。○。○混和，煮沸，而溶解之，靜置百餘小時，待其析出樹脂後，乃蒸發其上面之溶液，乾燥之，即成黃褐色乾燥之越幾斯也。其刺激胃臟之作用較少，故多以此代之，以○。○。二——○。○。○三為緩下藥；以○。○。五——○。○。二為峻下藥。

【別稱】又名奴會，訶會，象脂。

蘆蠹蟲

【基本】此蟲出於蘆節中；其狀亦如小蠶也。

【功效】其氣味甘寒，無毒。能治小兒飲乳後吐逆，不入腹，取蟲二枚，煮汁，飲之，即止。按喉逆，與吸乳不同，乳飽後眼出者，爲吸乳也。

蘇鐵

(蘇鐵科)

【學名】Cycas Revoluta, Thunb.

【產地】多栽植於庭園之間，以琉球產生爲最廣。

【基本】爲常綠木本之植物，高約丈許，莖多直立，全體有鱗片樣，爲葉痕所掩。葉叢生於莖頂，呈長大之羽

狀複葉，質硬，光澤，小葉細長。開花，單性，多呈淡褐色；結如桃類而扁平之子實，外面赤色，具有薄皮，內面白色，有厚皮，可採取，而為藥用。

【功效】為通經藥，又為收斂藥。

【用量】三〇——一〇〇〇服用。

蘇方木

(荳科)

【學名】*Caesalpinia Sappan*, L.

【產地】多產於印度各處。

【基本】為常綠喬木，莖高五六丈，有刺。葉為羽狀複葉，以多數小葉合成，略帶革質。開花，色黃，甚美，花後結實，黑色。其木質部，可為藥用之。

【成分】含有紅色素等。

【功效】為變質藥，有清血，解毒之可能。

其氣味甘鹹而平，無毒。能破血，去產後血脹，可以水煮五兩，取濃汁，服之。又治婦人血氣，心腹痛，月候不調，及痔瘡；又能排膿，止痛，消癰腫，撲傷瘀血。凡女人失音，血嘔，赤白痢疾，並虛勞，血癆，氣塞，產後惡露不止，心腹攪痛，及經絡不通，男女中風，口噤不語，皆可煎服。又治瘡

亂嘔逆，及常久嘔吐，用水煎服。又能破瘡毒死血，產後敗血。

【用量】三〇——一二〇〇服用。

【別稱】又名蘇木。

蘇合香

(金縷梅科)

【學名】*Styraciflua orientalis*, Mill.

【產地】多產於小亞細亞。

【基本】為落葉喬木，葉作掌狀分裂，有長柄，互生。花小而單性，叢聚為頭狀，雌雄同株。由其皮中，取得樹脂，即為本品，可供藥用。

【成分】含有 *styracene* 及 *styracine* 桂皮酸，樹脂等。

【功效】為刺激性祛痰藥，及皮膚殺蟲藥。

其氣味甘溫，無毒。能辟惡，殺蟲，去濕癢，蠱毒，癩瘡，又能除邪。

【用量】〇・三——一〇服用。

蘋

(蘋科)

【學名】*Marattia quadrifolia*, L.

【產地】多生於淺水中。

【基本】為多年生草，莖細長，柔軟，匍匐於泥下；莖之上

方，抽出長柄之葉；其下方，生變形之根狀體。夏秋之候，葉柄下部，特歧出小枝，着以子囊。可採取之，而供藥用。

〔功效〕其氣味甘寒而滑，無毒。能去暴熱，止消渴，下水氣，利小便；又搗塗熱疔。搗汁飲之，能治蛇傷。

〔學說〕李時珍曰：蕈，乃四葉菜也。葉浮水面，根連水底。其莖細如蕪荳，其葉大如指頭。面青，背紫，有細紋，頗似馬蹄決明之葉，四葉合成，中折十字，夏秋開小白花。

〔別稱〕又名芥菜，四葉菜，田字草。

蕈菰葎

〔基本〕據李時珍云：麝菰，出山東淮北諸處，埋桑，楮諸木於土中，澆以米泔，待菰生，采之。長二三寸，本小，末大，白色，柔軟。其中空虛，狀如未開玉簪花，俗名：雞腿麝菰，謂其味如雞也。一種狀如羊肚，有蛛網眼者，名：羊肚菜。

〔功效〕其氣味甘寒，無毒。能利五臟，益腸胃，化痰，理氣；清涼，止渴。

〔別稱〕又名肉蕈。

蕨蒿

〔基本〕為多年生草，二月間，生莖葉，頗似蕪蒿。嫩者，可蒸食。開花，黃綠色，為小頭狀花序，排列如穗。

○其莖可為藥用。

〔功效〕其氣味辛溫，無毒。能破血，下氣，可蒸食之。

〔別稱〕又名蕪蒿，蕪蒿，抱娘蒿。

罌粟

(罌粟科)

〔學名〕*Papaver somniferum*, L. var. *nigrum*, DC.

〔產地〕原產於歐羅巴之南部，近時吉，黑，川，雲，各省，以及西北各地方，多栽培之。

〔基本〕為越年生草，莖高四五尺，葉白綠色，長橢圓形，

有深刻鋸齒，平滑，無葉柄。初夏莖頭開花，大而美艷，色紅紫粉白不等。果實為乾果，以其未熟果實之周圍，截一小口，使滲出白漿，而乾燥之，成為褐色之塊，即為阿片；其殼及子，皆供藥用。

〔成分〕含有 Morphine $C_{17}H_{19}NO_3 \cdot H_2O$ 與 Codein $C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_2O$ 並 Thebain $C_{19}H_{21}NO_3$ 及 Papaverin $C_{21}H_{21}NO_3$ 等之二十餘種植物鹽基，及其雜質，樹脂，蠟質，糖質，灰分。

【功效】爲祛痰藥，鎮痛藥。

其米氣味甘平，無毒。能行風氣，逐邪熱，治反胃，胸中痰滯，瀉痢，潤燥。其殺氣味酸澀，微寒，無毒。能止瀉痢，固脫肛，治遺精，久效，斂肺，瀉腸，止心腹筋骨諸痛。其嫩苗氣味甘平，無毒。作蔬食之，除熱，潤燥，開胃，厚腸。

【用量】殼用六。○——一二。○服之；米用六。○——一八。○服之。

【採製】凡用：以水洗潤，去蒂，及筋脈，取外薄皮，陰乾，細切，以米醋拌炒，入藥；亦有蜜炒，蜜炙者。

【別稱】又名米囊子，米，象穀。

（大戟科）

【學名】*Aleurites carinata*, Muell.

【產地】生於暖帶之山中，或栽培於園林之間。

【基本】爲落葉喬木，高二丈許，雌雄異株。雌株之葉，似

秋葉；雄株之葉，有二尖，或四五尖。夏月開花，淡紅色，集於梢上；果實球形，內含種子三四粒，

可製成桐子油，而供藥用之。

【成分】含有多量膠質樣之桐子油等。

【功效】其油氣味甘而微辛，有大毒。能摩疥癬，蟲瘡，

毒腫；又敷惡瘡，疥瘡，燙瘡。又吐風痰，喉痺，及一切諸疾，以水和油，掃入喉中，探吐，或以子研末，吹入喉中，取吐。又點風熱爛眼，亦妙。

【學說】李時珍曰：桐桐，即白桐之紫花者；油桐，枝幹花

葉並類桐樹，而小。

【別稱】又名虎子桐，荏桐，油桐。

露蜂 *Bienenkorn*

【基本】此即蜂類 (*Imenopodum*) 之窠，大小皆可採取，而供藥用。通常取蜂巢，先以鴉豆杖等同拌，蒸四五小時，取出鴉豆杖，晒乾，入藥用之。

【功效】其氣味甘平，有毒。能治驚癇，瘰癧，寒熱，邪氣，癩疾，鬼精，蠱毒，腸痔，蜂毒，毒腫。又合亂髮，蛇皮燒灰，酒服，治惡疽，附骨癰，濕節腫，消疔腫，惡脈諸毒，皆瘥。又去上氣，赤白痢，遺尿，失禁。燒灰，酒服，治陰痿；水煮，洗狐尿刺瘡；服汁，下乳石毒；煎水，洗熱病後毒氣銜目；炙研，和豬脂，塗癩癬成癰；又煎水，漱牙齒，止風蟲，疹痛，又洗乳癰，蜂疔，惡瘡。

【用量】三〇——一〇〇服用。

【禁忌】忌飲葷，丹參，黃芩，藥芍，杜鵑。

【別稱】又名蜂勝，百穿，紫金沙。

鯪魚

【基本】據李時珍云：鯪，生江湖中，體圓厚，而長，似鱖

魚，而腹稍起，扁額，長喙，口在頰下，細鱗，腹

白，背微黃色，亦能噉魚，大者，二三十斤。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。補五臟，益筋骨，和脾胃。

鯽魚

【學名】*Amuratus muratus* Linn.

【產地】多產生於淡水之中。

【基本】為喉鱈類之一種，似鯉而口邊無鬚，鱗之縱列數，

三十九枚，背部稍為隆起，是其異點，肉供食用。

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。用五味煮食，補虛羸，溫中

下氣，止下痢，腸痔。又合蔥作羹，治胃弱，不

食，能調中，益五臟。生痔，塗惡核，腫毒不散，

及瘡疥；同小豆搗，塗丹毒；燒灰，和醬汁塗諸瘡

。又以豬脂，煎灰服，治腸癰。又合小豆煮汁，服

之，治水腫。又炙油，塗婦人陰疝，諸瘡，殺蟲，

止痛。曬白礬燒研，飲服，治腸風，血痢。曬硫黃

，煨研，及曬五倍子，煨研，酒服，並治下血。曬

茗葉，煨服，治消渴。曬胡蒜，煨研，飲服，治隔

氣。曬綠礬，煨研，飲服，治反胃。曬鹽花，燒研

，搽齒疼。曬當歸，燒研，搗牙，烏髭，止血。曬

礞，燒研，治急疳疔。曬白鹽，煨研，擦骨疽。曬

附子，炙焦，同油塗頭疔，白禿。其鱈能治久痢赤

白，腸澼，痔疾，丹毒，風眩。又能溫脾胃，去寒

結。其鮓治癩疔，批片，貼之，或同樛葉，搗敷，

殺其蟲。其頭治小兒頭疔，口疔，重舌，目翳。燒

研，飲服，療效嗽，下痢；酒服，治脫肛，女人陰

脫。又油調擦小兒面上黃水疔。其子能調中，益肝

氣。其骨治醫疔，燒灰，敷數次，即愈。其膽取汁

塗疳疔，陰蝕疔，殺蟲，止痛。點喉中，治骨膿。

其腦治耳聾，以竹筒蒸過，滴之。

【別稱】又名鮓魚。

鱖魚

【學名】*Anguirus anguillanatus* Cantor.

【基本】此屬喉鱈類，淡水魚也，棲居泥中，時來水面，吸

入空氣，爲腸呼吸。鱗埋沒於皮膚內，皮膚富於黏腺。雄背鰭之兩側，有疣狀突起，肉供食用。

【功效】其氣味甘平，無毒。能暖中，益氣，醒酒，解滑渴。

○同米粉煮羹，食之，調中，收痔。

【別稱】又名泥鰍。

鰕

【學名】*Micerna*

【基本】此屬於甲殼類之長尾類，由十二環節而成；腹部發達，比較胸部爲長。

【功效】其氣味甘溫，而有小毒。能治小兒赤白遊腫，搗碎

，敷之。作羹，治瘰癧，托痘瘡，下乳汁，又能壯

陽道。煮汁，吐風痰；搗膏，敷蟲疽。

鱒魚

【學名】*Halibute*

【基本】此屬於海牛類，體似海牛，而尾呈新月形，以海藻

爲食物；臼齒面有多數之凸凹。其游泳之時，將頭

部現於水面之上，而軀者，每以其前肢，攜抱幼兒

耳！

【功效】其味甘，有毒。食之，療癩疾。

【別稱】又名人魚，孩兒魚，俗稱儒艮。

鰲

【學名】*Amis boeinas L.*

【基本】此屬海牛類，爲鴨之經飼養，而變化者也。體肥大

，頭長，脚與尾極短。嘴軟，而觸覺銳，由泥中獲

取食物頗巧，因被飼於人，飛力退化。肉，及卵，

皆供食用之。

【功效】其筋氣味甘而大寒，無毒。能治風虛，寒熱，水腫

。其肉氣味甘冷，微毒。能補虛，除客熱，和癆肺

，及水道，療小兒驚癇，解丹毒，止頭生疔腫。和

葱，鼓煮汁，飲之，去卒然煩熱。其頭煮服，治水

腫，通小便。其腦治凍瘡，取塗之。其血氣味鹹冷

，無毒。能解諸毒，熱飲，野葛毒，已死者，入咽

，即活。除熱血，解中生金，生銀，丹石，砒霜諸

毒，射工毒；又治中惡，及溺水死者，即灌之，亦

活。蚯蚓咬疔，塗之，即愈。其舌治痔瘡，殺蟲。

其涎治小兒瘡風，陰腫，取雞鴨抹之，即消。其膽

氣味苦辛而寒，無毒。能塗痔核，又點赤目，初起

，亦效。其脰衣治諸骨硬，炙研水服。其卵氣味甘

而微寒，無毒。治心腹胸膈灼熱。其白鴨通，即鴨屎。氣冷，無毒。能殺石瘰毒，解結縛，散毒熱，熱毒，毒痢，又和雞子白，塗熱瘡，腫毒，即消。塗蚯蚓咬傷，亦效。絞汁服之，解金銀銅鐵毒。

〔別稱〕又名鴨，舒鳧，家鳧。

鵝雞

〔基本〕據李時珍云：鵝，狀類雉而大，黃黑色。首有毛，角如冠，性愛其黨。有被侵者，直往赴鬪；雖死猶不置，故古者虎賁戴鵝冠。雉云：鵝，鵝鳥也；鵝不知死，是矣。性復粗暴，每有所擾，應手撮碎。

〔功效〕其肉氣味甘平，無毒。炙食之，能令人勇健，美顏，及肥潤。

鵝

〔學名〕 *Pardalis balachis* Temm.

〔基本〕此鳥猛禽類之鷹類，背面黑褐色，腹面白色，喉部，有褐色之斑，飛游海上，捕食魚類。

〔功效〕其骨，可用為接骨藥。其嘴治蛇咬傷，可燒存性，研末，一半酒服，一半塗之。

〔別稱〕又名魚鷹，鵝鷄，鵝鷄，王鵝，鴻波，下窺鳥。

第廿一畫

攝涅瓦

〔學名〕 *Polygonum Saugya*, L.

〔產地〕產於北亞美利加。

〔基本〕為多年生草，高至一尺許，葉長卵形，或被針形；花小，白色，為穗狀花序。其地下之根部，可供藥用之。

〔成分〕含有 *cinchon* 及 *stannin* 並樹脂等。

〔功效〕為祛痰藥，可用於氣管枝加答兒，及喘息等。

〔用量〕一。〇——二。〇服用。

櫻桃

(薔薇科)

〔學名〕 *Prunus Pseudo-cerasus*, Lindl. var. *spontanea*, Maxim.

〔產地〕生於山地，亦有栽培於庭園之間者。

〔基本〕其落葉喬木，高者二三十尺，葉橢圓形，而闊，有鋸齒。嫩莖，及葉之背面，生毛，甚密。春夏之交，開淡紅白色之小花。果實為球形，初呈綠色，而後漸漸變黃，成熟則色紅。其花葉等，皆供藥用之。

〔功效〕其氣味甘熱而澀，無毒。能調中，益脾，好顏，美志；又止洩精水，殺痢。其葉氣味甘平，無毒。治

碎咬傷，搗汁，飲之，並敷之。其東行根煮汁服之

，能下寸白蚘蟲。其枝能治斑點，同紫萍，牙皂，

白梅肉研和，日用洗面。其花能去面黑粉滓。

【用量】其核用四。○——八。○服用。

【學說】李時珍曰：櫻桃樹，不甚高。春初開白色，繁莢如

雪；葉間有堅，及細齒，結子。

【別稱】又名鵝桃，合桃，刺桃。

櫻

（棕科亦作蕁麻科）

【學名】*Malvora acuminata*, L.

【產地】生於山野之間。

【基本】爲落葉喬木，高至數十尺，樹皮堅硬，灰褐色，有

粗縱紋，與許多細小之突起。其樹皮老者，則如鱗

片狀；葉長卵形，而尖，有鋸齒，互生。春月開淡

黃綠色之小花，雌雄同株。其木皮及葉，皆可供藥

用之。

【功效】其木皮氣味苦而大寒，無毒。能治時行頭痛，熱結

在腸胃。夏日煎飲，去熱。又煮汁服，療水氣，斷

痢，安胎，止妊婦腹痛。山檀皮性平，治熱毒，腫

毒。其葉氣味苦冷，無毒。按貼火爛疔，有效。又

治腫爛，惡瘡，鹽搗，罨之。

【採製】採時，勿取三四年者，無力；用二十年以來者，心

空。其樹只有半邊，向西生者，良。剝下，去粗皮

，細剝，蒸之，經四五小時，取出。焙乾，用之。

【學說】李時珍曰：樟材，紅紫，作箱案之類，甚佳。

【別稱】又名樟柳，鬼莖。

獾

【基本】據注類云：狗獾，處處山野有之；穴土，而居。形

如家狗，而足短。食果實，有數種相似。其肉味甚

甘美，皮可爲裘。李時珍云：獾，豬獾也；獾，狗

獾也；二種相似，而略殊。狗獾，似小狗，而肥。

尖際，矮足，短尾，深毛，褐色皮，可爲裘領。

【功效】其肉氣味甘酸而平，無毒。能補中，益氣，治小兒

疳瘦，殺蝨蟲，宜噉之。

【別稱】又名狗獾，天狗。

蟲實

（薺尾科）

【學名】*Tris ovata*, Thunb. var. *Chinensis*, Maxim.

【產地】庭院間多栽培之。

【基本】爲一種之草本，葉線形，無劍脊。常有，嫩二扭三

度者。春日開花，白色，有淡紫之線條。果實爲繭果，長寸許，闊三四分。可採取之，而供藥用。

【功效】其質氣味甘平，無毒。能除皮膚寒熱，胃中熱氣，風寒，濕痺，堅筋骨，長肌膚，止心煩，利大小便。○療金疔癰腫，有效。又婦人血氣，煩悶，產後血暈，並腦中，帶下，消一切疔瘡，止鼻衄，吐血，通小腸，消酒毒，治黃病，殺蠱毒，救蛇蟲咬傷。又治小腹痛，腹內冷積，水瀉諸病。其花質，及根葉能去百蟲，療喉痺，癩疽，惡瘡。

【用量】三。〇——六。〇服用。

【採製】採實炒過，用之。治疔，則以醋拌，炒之。

【學說】李時珍曰：蠶草，生野中，就地叢生；一本二二三寸，莖，苗高三四尺。葉中抽莖，開花，又能結實也。

【別稱】又名螻蛄，馬蘭子，馬棟子，馬雞，馬帶，鐵掃帚，刺草，早蒲，冢首，三堅。

蠟梅

(蠟梅科)

【學名】*Calycanthus praecox* L.

【產地】多栽培於庭院之間。

【基本】爲落葉灌木，高七八尺，乃至丈餘，葉對生，卵形

，有尖端，全邊。冬月枝梢出花蕾；自十二月開放，可至翌年二月之末。花被，自許多片數而成，內層各片，較外圍之各片短，呈紫色，外圍各片，黃蠟色；花後，花托成熟，結卵形之果實。其花可爲藥用。

【功效】其花氣味辛溫，無毒。能解暑，生津。

【學說】李時珍曰：蠟梅小樹，叢枝，尖葉。種凡三種，以子種出，不經接者，臘月開小花，而香。

【別稱】又名黃梅花。

蘭草

(菊科)

【學名】*Eupatorium chinense* L.

【產地】生於山野中，或庭院栽植之。

【基本】爲多年生草，高二三尺許；葉平滑，有光澤，緣邊具鋸齒，甚細；下部之葉三裂；上部之葉尖長，呈廣披針形，莖葉皆略帶紅紫色，秋末莖頭枝梢開花，花冠筒狀，細小，淡紫色，列爲頭狀花序。其葉，可供藥用。

【功效】其葉氣味辛平，無毒。能利水道，殺蠱毒，辟邪氣，除胸中痰癖。又能調氣，養營，生津，止渴，潤

肌肉，除消渴。煮水，能治風病。又消癭腫，調月經。

【用量】三。〇——六。〇服用。

【別稱】又名蘭，水香，香水蘭，女蘭，香草，燕尾香，大澤蘭，蘭澤草，煎澤草，省頭草，都梁香，孩兒菊，千金草。

蕤荷

(蕤荷科亦作薑科)

【學名】Zingiber Miqoa, Korea.

【產地】生於山野中，或栽培於園圃間。

【基本】為多年生草，高二三尺；葉呈長橢圓形，而尖長，絕類薑葉。夏月開花，花較大小不整，色淡黃，由地下莖而生。其根，可供藥用之。

【功效】其根氣味辛溫，而有小毒。能除中蠱，及瘡，可搗汁，服之。又去溪毒，沙蟲，蛇毒及諸惡瘡。凡稻麥芒，入目不出，以汁注目，即出。又治赤眼，澀痛，搗汁，點之。

【別稱】又名覆菴，蕤草，菴草，嘉草。

蕤蕒

(葡萄科)

【學名】Vitis Timbengii, S et Z.

【產地】多生於山野，及原野之間。

【基本】為一種灌木狀之蔓草，莖有卷鬚，常攀緣於他物之上。葉為掌狀淺裂，有鋸齒；基腳呈圓錐形，表面平滑，裏面密生淡褐色，似綿狀之毛。夏月開小黃綠花，為複總狀花序；果實為漿果，球形，紫黑色，可採之，而供藥用。

【成分】含有葡萄糖，及葡萄糖等。

【功效】為清涼藥。

其實氣味甘酸，無毒。能止渴，益氣。其藤氣味甘平，無毒。止嘔逆，及傷寒後嘔嘔，搗汁，飲之，最良；亦能止渴，利小便。其根氣味甘平，無毒。能除下焦熱痛，淋瀝，又消腫毒。

【用量】三。〇——八。〇服用。

【學說】李時珍曰：蕤蕒，野生林野間，亦可插植，莖葉，花實，與葡萄無異。其實小，而圓，色不甚紫也。

【別稱】又名蕤蕒，嬰舌，山葡萄，野葡萄；藤名：木龍。

續斷

(菊科)

【學名】Scolobus asper, Vill.

【產地】多生於原野之間。

「基本」為多年生草，春季自宿根抽出方莖，高三四尺，中空，有稜。葉羽狀深裂，春夏之交，開花，紫色，為唇形花冠。其根可採取之，而供藥用。

「功效」為鎮痛藥。

其根氣味苦而微溫，無毒。能治傷寒，補不足，金疰，癆瘵，折跌，續筋骨，又治婦人乳難，婦人胎中，漏血；又能止痛，生肌，去惡血，腹痛，關節緩急，諸溫毒，通血脈，助氣，補五勞，七傷，破癥結，瘀血，消腫毒，腸風，痔瘻，乳癰，癩癧，婦人產前後一切疾病，胎漏，子宮冷，面黃虛腫，縮小便，止泄精，尿血。

「用量」二・〇——六・〇服用。

「禁忌」惡雷丸。

「採製」取根，須橫切剉之；又去向裏硬筋，以酒浸一伏時，始乾，入藥用之。

「別稱」又名塵折，接骨，龍豆，南草。

續隨子

(大戟科)

「學名」*Euphorbia Lathyris* L.

「產地」多栽培於庭園之間。

「基本」為二年生草，莖圓而粗，高三四尺，斷之有白汁滲出。葉箭鏃形，對生。夏月開花，四瓣，褐綠色。結實大如指頭，圓形，中藏褐色種子。可採取之，而供藥用。

「成分」含有 $\text{Asenolcin C}_9\text{H}_{16}\text{O}_4$ 之無色結晶等。

「功效」為瀉下藥，與大戟，甘遂瀉水之功相同。

其氣味辛溫，有毒。治婦人血結，月閉，瘀血癥瘕，瘕癖，除蠱毒，鬼疰，心腹痛，冷氣脹滿，利大小腸，下惡滯，積聚，痰飲，不食，嘔逆，及腹內諸疾，碎研，酒服，不過三顆，當下惡物。又宜一切宿滯，肺氣，水氣，日服十粒，即瀉，多以酸漿水，或薄醋粥食之，即止。又塗惡疥，癬疥。其藥痔；又搗葉，敷蠱螫，立止。

「用量」二・〇——六・〇服用。

「採製」取子，去殼，取色白者，以紙包壓，去油，取霜，用之。

「學說」馬志曰：續隨子，生蜀郡，今處處亦有之，苗如大戟。

〔別稱〕又名千金子，千兩金，苦薩豆，拒冬，聯步。

鐵樹 (百合科)

〔學名〕 *Oryphia terminalis*, Kth. var. *torra*, Bak.

〔基本〕據云：亦名鐵連草，生於鐵山銅壁之上，又鐵石之上亦生；並非草本，形如屏風，狀如孔雀尾分張，黑色，細枝，刀砍不斷，斧之乃折。其葉，可爲藥用。

〔功效〕近來民間多用其葉，以治吐血，便血等，之胃腸出血。

鐵色箭 (石蒜科)

〔學名〕 *Tyococh marginatum*, Maxim.

〔產地〕多生於山野之間。

〔基本〕爲多年生草，地下有鱗莖；葉扁平，細長，呈白綠色，與石蒜相似。春月自鱗莖叢生，至初夏則葉枯死。夏末花莖，高一尺許，頂端開四五花，呈繖形，花被黃赤色。

〔功效〕與石蒜相同，可參考石蒜條。

鐵華粉 *Ferrum Pulveratum*

〔基本〕爲銅鐵之銹屑，呈灰黑色之粉樣，或粒樣之物質，

如遇磁鐵，能被吸引，卽爲是品，可供藥用。

〔功效〕爲強壯藥。

其氣味鹹平，無毒。能安心神，堅骨髓，強志力，除風邪，養血氣，去百病，止驚悸，虛癩，鎮五臟，去邪氣。治健忘，冷氣，心痛，痲癩，癰結，脫肛，痔瘻，宿食等。

〔用量〕一日二三回，以〇・〇一——〇・〇五服用。

〔別稱〕又名鐵胤粉，鐵脆粉，鐵霜。

鐵線蓮 (毛茛科)

〔學名〕 *Clematis florida*, Thunb.

〔產地〕庭園間多栽培之。

〔基本〕爲多年生草，有蔓性，作灌木狀；常以葉柄卷繞於他物之上。葉對生，多二回三出之複葉，小葉九片，卵形。夏月開花，青紫色，或白色。可採之，而供藥用。

〔功效〕其氣味微苦而平，無毒。治諸風，消腫毒，有效。

〔別稱〕又名鐵線草。

騾

〔學名〕 *Equus mulus*

【基本】此屬馬類 (Equidae) 之一種，爲馬母，驢父之所產也。其肉等，可供藥用。

【功效】其肉氣味辛苦而溫，並有小毒。性最頑劣，肉不益人，孕婦食之，難產。其蹄治難產，燒灰，入麝香少許，酒煎一錢。其尿治打損諸疔，破傷，中風，腫痛，炒焦，裏熨之。

鱒魚

【基本】據李時珍云：鱒魚，形秀而扁，微似魴而長，白色如銀，肉中多細刺，如毛。其子甚細膩，故何景明稱：其銀鱗，細骨。彭澗材恨其美，而多刺也。大者不過三尺，腹下有三角硬鱗，如甲。其肪亦在鱗甲中，自甚惜之。其性浮游，漁人以絲網沉水數寸取之。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。能補虛勞。蒸下其油，以瓶盛之，埋於土中，取塗燙傷，甚效。

鷓鴣

【學名】*Coturnix japonica*, Mull.

【基本】此屬涉禽類，嘴頸脚均長，飛翔頗巧，鳴聲甚高，因氣管長，而有曲折也。丹頂鷓，頭頂赤色，喉部

，及翼端黑色，餘則純白。黑鷓，全身呈灰黑色，頭頂赤色，嘴黃綠色，腳黑色。鍋鷓，頭，及前胸部白，上嘴之基部少黑，餘則灰黑色。黑袖鷓，翼之後端黑，頭頂，及眼之周圍無羽毛，呈赤色，餘爲白色。

【功效】其白鷓血氣味鹹平，無毒。能益氣力，補虛乏，去風，益肺。其腦和天雄，葱實，服之，令人目明，夜能書字。其卵氣味甘鹹而平，無毒。預解痘毒，多者令少，少者令不出，每用一枚，煮與小兒食之。其骨酥炙，入滋補藥。其胗中砂石子，可以磨水服之，解蠱毒。

鷓鴣

(菊科)

【學名】*Curcuma zanzibarica*, L.

【產地】山野多自生之。

【基本】爲一種宿根草，莖高二尺餘，根生葉，叢生地上，形似烟草葉，緣邊，有鋸齒。夏月於葉腋開花，如菊花狀。花後結實，爲黑褐色。可採其菊狀花頭，而供藥用之。

〔功效〕爲驅蟲藥。

其氣味苦辛，而有小毒。能治蚊蠅蟲，爲散，以肥肉醃汁，服之，亦入丸散用之。凡蟲心痛，以淡醋和半匕服之立瘥。又能殺五臟蟲，止瘡，敷瘰癧。

〔用量〕二。〇——六。〇服用。

鵲嘯

〔基本〕據李時珍云：鵲嘯，南北總有，似山鵲，而小，短尾，有青毛，冠多聲，青黑色，在深林間，飛翔不造；北人呼爲鵲鷓鳥。

〔功效〕其肉氣味鹹平，無毒。能助氣，益脾胃，去頭風，目眩，煮炙食之，頓盡一枚，至驗。

麝

〔學名〕 *Moschus moschiferus*, L.

〔基本〕此屬有蹄類之反芻類，體形似鹿，而小，牝牡均缺角。牡之上頸之犬齒，彎曲而長，伸於口外。牡之腹部有腺二個，名麝囊。麝香，即其分泌物也。有特異之香，用作香料，或供藥用之。

〔功效〕其麝香氣味甘溫，無毒。能辟惡氣，殺鬼精，去三蟲，蠱毒，溫瘧，驚癇。療諸凶邪，鬼氣，中惡，

心腹暴痛，眼急，痞滿，風毒；去目中腐翳，婦人

產難，墮胎。佩服，及置枕間，辟惡夢，及尸疰，

鬼氣，又療蛇毒。治瘧疾，吐風痰，療一切虛損，

惡病，納子宮，暖水臟，止冷帶下。用熱水研服，

治小兒驚癇，客忤，能鎮心，安神，止小便，又能

蝕一切癰瘡，膿水；除百病，治一切惡氣，及驚怖

，恍惚；又能通諸竅，開經絡，透肌骨，解酒毒，

消瓜果食積；治中風，中氣，中惡，痰厥，積聚，

癰癧。其肉氣味甘溫，無毒。能治腹中癰病。

〔用量〕麝香用〇。一——〇。二服之。

〔別稱〕又名射父，香麝。

第廿二畫

鱖魚

〔基本〕據李時珍云：鱖，生江湖中，小魚，長僅數寸，形狹而扁，狀如柳葉，鱗細，而整，潔白可愛。

〔功效〕其氣味甘溫，無毒。煮食之，能暖胃，止冷瀉。

鰻鱺魚

〔學名〕 *Anguilla japonica*, T. & S.

〔基本〕此屬喉鱚類，體延長爲圓柱狀，皮膚富於黏液，鱗

埋沒於皮膚內，口深裂，後角達於眼下，唇甚厚，下頰比上頰為突，齒細小為鎌狀。鼻為管狀，與上唇相接。鱗條有彈性之軟刺，惟脊鱗，及胸鱗之前條，往往堅硬，無腹鱗；脊鱗自脊之中部而起，脊鱗之起點較後，皆延行至尾，與尾鱗連合，而包圍於尾端。尾形尖圓，而不分歧。體色隨棲處而異，背有暗綠，蒼黑，茶褐等色，體側淡色，腹白色，又帶淡黃金色，雌雄異棲。

【功效】其肉氣味甘平，有毒。治五痔，癰疽，殺諸蟲，治惡疔，女人陰疔，蟲癢，傳尸，疰氣，勞損，暖腰膝，起陽氣，去濕，腳氣，風痺。又治小兒疳勞，及蟲心痛，婦人帶下，一切風症，如蟲行。又壓諸草石藥毒，不能為害。其膏治諸癰疽，耳中蟲痛。其膏及頭炙研入藥，治疔痢，腸風，崩帶，又燒灰敷惡瘡；並燒薰痔瘻，殺諸蟲。其血治療疹入眼生翳，以少許，點之。

【別稱】又名白蟬，蛇魚，乾者名風鰓。

鱧膠 *Colla plicatum*

【基本】為鱧魚 *Acipenser Huso Linn* 等之魚鱧製造而成之

膠，黏着力，甚為強大，多為工業接合之用。亦有，用為藥者。

【功效】其氣味甘鹹而平，無毒。可燒存性，治婦人產難，產後風搖，破傷風，癩癩；又止嘔血，散瘀血，消腫毒，伏硝砂。

鱧魚

【基本】據李時珍云：處處江湖有之，狀似鱧，而色黑。其頭最大，有至四五十斤者，味亞於鱧，鱧之美，在腹；鱧之美，在頭，或以鱧，鱧為一物，誤矣。首之大小，色之黑白，大不相同。山海經云：鱧魚，似鯉，大者食之，已瘡是也。

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。能暖胃，益人，食之，已瘡。多食動氣，發疔疥。

【別稱】又名鱧魚。

鰓

【學名】*Larus canus* L.

【基本】此屬游禽類，體概灰白色，嘴之先端，曲為鈎狀，甚長，而翼亦長，腳淡紅色。每飛翔河海上，捕食魚類。

「功效」其肉之功能，與鴉大略相同。

「別稱」又名：豎水鴉。

鷓鴣

「基本」爲一種原禽類，體似鴉稍大，翼圓而短，尾亦較短

，惟趾甚長。背灰蒼色，有紫赤之斑點。腹灰色，

胸前有圓點，似真珠樣之白色，每捕食蟲類。

「功效」其肉氣味甘溫，無毒。能治嶺南野葛菌子毒，及溫

瘡，久病欲死者，合毛熬酒，服之，或生搗汁，服

之。又能利五臟，益心力，聰明耳目。其脂膏能塗

手皸瘃，合不龜裂。

「別稱」又名越雉。

鷓鴣菜

(紅藻類)

「學名」*Digenea simplex* Willd.

「產地」生於海底之岩石上。

「基本」爲圓柱狀之體，細長而堅韌，分枝無規則，或呈複

叉狀。各支之全部，以無數之細短小枝被之，狀類

狐尾，全長三四寸，乃至六七寸，黑紫色，乾則褐

色。可採取之，而供藥用。

「成分」含有黏液素，食鹽，苦鹽，及礫砂等。

「功效」爲驅蟲藥，及解毒藥。對於胃腸等之寄生蟲，以

及胎毒等，皆有特效。

「用量」一回一〇——三〇——六〇服用。

「學說」漳州府志：鷓鴣菜，散碎花，微黑，出漳浦。

「別稱」俗稱：海人草。

麋

「基本」據蘇頌云：麋，今陂澤淺草中，多有之，其類甚多

，麋乃總名也。有有牙者，有無牙者，其牙不能噬

嚼。李時珍云：麋，秋冬居山，春夏居澤，似鹿而

小，無角，黃黑色。大者不過二三十斤，雄者有牙

，出口外，俗稱牙麋。其皮細軟，勝於鹿皮。夏月

毛毳而皮厚，冬月毛多而皮薄也。

「功效」其肉氣味甘溫，無毒。補五臟，益氣力，又釀酒，

有祛風之功。其髓亦能益氣力，治虛風。其骨氣

味甘而微溫，無毒。能治虛損，洩精，又益精髓，

悅顏色。

「別稱」又名麋。

鼯鼠

「學名」*Mogera Vogera* Temm.

「基本」爲食蟲類之一種，體圓錐形，適潛行於地中也。體

面密生軟毛，防溼氣，保體溫，且適於潛行，時防

與土相摩擦也。眼極小，缺耳殼，尾短小，因營地

中生活故也。聽嗅兩覺銳敏，以補視覺之不足也。

前肢大，具強爪，且體面向外，既能掘土，又能送

土於後方。

「功效」其肉氣味鹹寒，無毒。燻之，療癰疽，諸癩蝕，惡

瘡，陰惡，爛瘡。久食之，能去風，治瘡疥，痔瘻

，風熱久積，血脈不行，結成癰疽。小兒食之，殺

蚊蟲。其膏能厚諸瘡。其莖治蛇虺，螫傷，腫痛，

可研末，豬脂調塗。

「別稱」又名田鼠，鼯鼠，隱鼠。

第廿三畫

藥劑

(馬鞭草科)

「學名」*Yucca agavinifolia* L.

「基本」爲落葉灌木，高四五尺，葉對生，掌狀複葉，小葉

有鋸齒。七八月間開小花，青紫色，爲圓錐花序。

結子，狀似大麻，可爲藥用。

「功效」其子氣味辛苦而溫，並有小毒。能治大風，頭面手

足諸風，癱瘓，狂癡，濕痺，寒冷，疼痛，四肢不

遂，通血脈，明目，益精。又合柏油同熬，塗人畜

疥疥。

「禁忌」惡石膏。

「別稱」又名頑劑。

藥華

(無患子科)

「學名」*Koeleria paniculata*, Lam.

「產地」多自生於山谷之間。

「基本」爲一種木本之植物，高達丈餘，葉奇數羽狀複葉，

互生，有不整齊之缺刻，及重複之鋸齒。上面平滑

，下面有毛。夏秋之際，開小黃花，爲圓錐花序。

果實爲蒴果，如膀胱狀，種子黑色。其木，可爲藥

用之。

「成分」含有黃色素等。

「功效」其氣味苦寒，無毒。治目痛，淚出，傷臂，能消目

腫。合黃連作煎，療目赤腫爛。

「學說」蘇恭曰：此樹，葉似木槿，而薄細，花黃似槐，而

稍長大。子殼似酸漿，中有實，如熟豌豆，黑圓堅

硬，堪爲數珠者是也。

蠟蝟

【學名】 *Amnophilus infectus* Sm.

【基本】此屬炭翅類之有劍類，體中形，頭部及腹部黑色，前腹部赤色。捕食蜘蛛類，昆蟲類等之幼蟲。

【功效】其氣味辛平，無毒。治久痢，欬逆，毒氣，嘔逆，

生研，能醫竹木刺。

【別稱】又名土蜂，細腰蜂，螺虱，蒲盧。

蘿摩

(羅摩科)

【學名】 *Metaphysis Stauntoni* R. et S.

【產地】多生於山野之間。

【基本】為多年生草，有蔓性，常纏絡於他物上。葉為心臟

形，端尖；葉柄甚長，對生。夏間葉腋抽花軸，開

小白花，花瓣之內面，淡紫色，有白毛。結實為蒴

果，長二三寸，內多生種子，亦附有毛絨之長毛。

可取其子及葉，供藥用之。

【功效】為強壯藥。

其子及葉氣味甘辛而溫，無毒。能治虛勞，補益精

氣，強陰道；而養素食，亦能同功。又搗子，敷金

瘡；生膚，止血；搗葉，敷腫毒；取汁，敷丹毒，

赤腫，及蛇蟲毒，即消蜘蛛傷；頻治不愈者，搗封二三度，能爛絲毒，即化作膿也。

【用量】三〇—九〇。服用。

【學說】據李時珍曰：研合子，即羅摩子也。三月生苗，蔓

延藤垣，極易繁衍。其根白軟，其葉長，而後大，

前尖。根與莖葉斷之，皆有白乳，如構汁。六七月

開花，結實。

【別稱】又名菴，芫蘭，白瓊藤，實名：雀瓢，研合子，羊

婆奶，婆婆鹹絲包。

懷香

(楸形科)

【學名】 *Pometium officinale* All.

【產地】中國園圃間，多栽培之。

【基本】為多年生草，莖高五六尺，分枝，繁茂。葉大分裂

，為絲狀之細片，與莖皆帶白色。夏月開小花，黃

色，為楸形花序。其果實為長橢圓形，較薔蘿之果

實為大，俗稱大茴香，可供藥用之。

【成分】含有揮發油，綠性固油，樹脂，越縷斯質，護謨，

林檎酸，單寧，石灰，糖分等。

【功效】為興奮，驅風藥。

其子氣味辛平，無毒。治諸癰，霍亂，及蛇傷。凡
勝脾胃間冷氣，可服之。又能調中，止痛，嘔吐。
又治乾濕腳氣，腎勞，癩疔，陰疹，亦能開胃，下
氣。其莖葉氣味與子相同。煮食之，能治卒惡，心
腹疼痛，氣衝胸脇，如刀刺痛，喘息不得，可生搗
汁，投熱酒和服。

〔用量〕一回〇・五——二〇服用。

〔學說〕李時珍曰：茴香宿根，深冬生苗，作叢，肥莖，細
葉。五六月開花，如蛇床花，而色黃。結子大如麥
粒，輕而有細稜，俗呼為大茴香。今惟以寧夏出者
為第一；其他處小者，謂之小茴香。

〔別稱〕又名茴香，八月珠。

懷香蟲

〔學名〕*Promyphila aculeata*, etc.

〔基本〕為蟻類之幼蟲，多生於茴香枝葉，種類頗多，以方
脚著柄枝，使體之前部左右動搖，以探其前進之腹
向，方向定，則以胸脚著適當之處，然後使腹部前
進，食害植物之葉。

〔功效〕據云：能治小腸疝氣。

藥米

(禾本科)

〔學名〕*Scaevola indica* L.f. var. *serotina*, Trin.

〔產地〕吾國北方，多栽培之。

〔基本〕為一年生草，莖高三四尺，葉狹長，花排列成圓錐
花序，果粒帶黃色。通常取其米，浸於水中，使其
發生米芽，曬乾而後，去殼，取米，炒過，研粉，
可用之為藥。

〔功效〕其氣味苦溫，無毒。治寒中，下氣，解熱，除煩，
消宿食，開胃，為末和脂，敷面，令皮膚悅澤。

〔用量〕八〇——九〇服用。

鱈魚

〔基本〕據李時珍云：按段公路北戶錄云：廣之恩州，出鰵
毛鮠，用鹽藏之。其細如毛，其味絕美。郭義公所
謂：武陽小魚，大如針，一斤千頭，蜀人以為符者
也。又一梳志云：廣東陽江縣出之，即鱈魚兒是也
；然今與國州諸處，亦有之。彼人呼為春魚，云春
月自岩穴中，隨水流出，狀似初化魚苗，土人取收
，曬乾，為鮠，以充苞苴，食以糞醋，味同蝦米，
或云：即鱈魚苗也。

「功效」其氣味甘平，無毒。能和中，益氣，令人喜悅。

「別稱」又名春魚。

鱒魚

「學名」Barbus.

「基本」此屬收鰓類之橫口類，體扁平，為菱形，或圓扇形。

。腮孔與口共開於腹面，胸鰭擴張，經體之側面而

達頭之前端。尾甚上，具有銳棘，用以護身。臀鰭

缺，移動專賴胸鰭。其動作不甚輕捷，常潛海底，

食軟體動物，及甲殼類。

「功效」其肉氣味甘而大溫，無毒。能益血，補虛損，婦人

產後惡露淋瀝，血氣不調，羸瘦，又能止血，除腹

中冷氣，腸鳴，及濕痺氣，又逐諸風邪，濕風惡氣，

。又專貼一切冷滯，痔瘻，腫瘡，引蟲。其血能塗

疥癩，及癩瘡。療口眼喎斜，同麝香少許，左囑塗

右，右囑塗左，正即洗去。又治耳痛，滴數點入耳

。又治鼻動，滴數點入鼻。又治疹後生翳，點少許

入目。又治赤疵，同蒜汁，墨汁，頻塗之，又塗赤

遊風。其頭氣味甘平，無毒。燒服，止痢，消渴，

去冷氣，除疥癩。

鱗蛇

「基本」據李時珍云：按方輿勝覽云：鱗蛇，出安南，雲南

，鎮康州，臨安，沅江，孟養諸處，巨蟒也。長丈

餘，有四足，有黃鱗，黑鱗二色，能食麋鹿。春冬

居山，夏秋居水，能傷人。土人殺而食之，取膽治

疾，以黃鱗者，為上，甚貴重之珍。按此亦鱗蛇之

類；但多足耳！

「功效」其膽氣味苦寒，而有小毒。能解藥毒；治惡疾，及

牙疼。

鱒魚

「學名」Onorhynchus masoni. Bennett.

「基本」此屬喉鱒類，與鮭類似，而口端少鈍，鱗細小，是

其異點。習性，效用，與鮭同。

「功效」其肉氣味甘溫，無毒。能暖胃，和中。多食動風熱

，發疥癩。

「別稱」又名鮭魚，赤眼魚。

鱒魚

「基本」據李時珍云：鱒，生江湖中，扁形闊腹，大口，細

鱗，有黑斑，采斑。色明者，為雄；稍晦者，為雌

，皆有蠶絲，刺人。厚皮，緊肉，肉中無細骨，有肚，能嚼，亦吸小魚。夏月居石穴，冬月慣泥窟，魚之沉下者也，小者，味佳，至三五斤者，不美。李廷飛延壽書云：既製刺，凡十二，以應十二月，誤傷害人，惟橄欖核，磨水，可解，蓋魚畏橄欖核也。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。治腹內惡血，去腹內小蟲，補虛勞，益脾胃，又治腸風，瀉血。其尾治小兒軟癆，貼之，最良。其膽氣味苦寒，無毒。治骨哽，不拘久近。

【別稱】又名鱖魚，石柱魚，水豚。

鱖魚

【學名】*Aotomus nikatoji* Hilleb.

【基本】此屬硬鱗類，長有達七八尺者，體紡錘形，頭部突出，伸為吻，吻之下面，有鬚二對。口小，菱形之大鱗，縱列五行，背上左右兩側，兩腹側。小鱗散布全面，至產期，則溯河流而上。頸之軟骨，最良之明骨也，鱠，可以製上等之魚鱠。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。能補虛，益氣，令人肥健。

可煮汁，飲之，治血淋。其鼻肉作脯，名鹿頭，亦名：鹿肉，言其美也。能補虛，下氣。其子食之肥美，殺腹內小蟲。

【別稱】又名鱧魚，鮓魚，碧魚。

鱧雉

【學名】*Phasianus colchicus*

【基本】為家雞所自來，雄體羽毛，較雌體美麗，與家雞相同，具藍綠色，及紅褐色；雌體多具灰褐色。

【功效】其肉氣味甘溫，微毒。食之，令人聰慧。

【別稱】又名山雞，錦雞，金雞，采雞。

鷓鴣

【學名】*Gallinago caelantia* Fenzl

【基本】此屬涉禽類，嘴，脚，前趾長而後趾短，且後向。

棲息沼澤，捕食魚類小蟲等，肉味甚美。

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。能補虛，暖人。

鷺

【學名】*Ardeidae*

【基本】此屬涉禽類，種類頗多，白鷺，全身純白色，頭背胸等生有蒼毛，脚黑色，趾黃色，常眠樹枝上。大

鷲，體大，嘴至秋則變為黃色，夏黑色。五位位，背蒼黑，腹黃白，頭上有毛冠，常棲樹上，夜出索食。籠鷲，嘴匙狀，羽毛淡灰色，腹白。蒼鷲，體大，嘴直，呈黃色，頸帶黑色，背部淡青色，翼端黑，頸與腹俱白。

【功效】其肉氣味鹹平，無毒。治虛瘦，能益脾，補味，可炙熟，食之。其頭治破傷風，肢強，口緊，連尾燒研，以蠟豬脂，調敷疔口。

【別稱】又名鷲鷲，絲禽，雪客，蒼鷲，白鳥。

第廿四畫

蠶豆

(荳科)

【學名】*Vicia Faba*, L.

【產地】多栽種於陸田之中。

【基本】為越年生草，莖方形，中空，高至二三尺許；葉為羽狀複葉，小葉長橢圓形，自二片，至六片，有托葉；葉與莖皆柔軟，有汁。春間開花，花冠蝶形，白色帶紅，有紫黑斑紋，為總狀花序。果實為莢，向於上面。其實與苗，可為藥用。

【成分】含有脂肪，蛋白質，及澱粉，灰分等。

【功效】其氣味甘而微辛，平而無毒。能快胃，和五臟。其苗氣味苦微，甘溫。能治酒醉不醒，以油鹽炒熟，煮湯服之。

【學說】李時珍曰：蠶豆，南土種之，蜀中尤多。八月下種，冬下嫩苗，可茹。方莖，中空；葉狀如匙，葉頭本圓，未尖，面綠，背白，柔而厚；一枝三葉。二月開花，如蝶狀，紫白色，又如豇豆花；結角連綴如大豆，其形頗似蠶。

【別稱】又名胡豆。

蠶繭草

(蓼科)

【學名】*Polygonum japonicus*, Makau.

【產地】多生於原野之濕地。

【基本】為多年生草。莖高三三尺，葉披針形，長而稍厚，互生。有鞘狀之托葉，上緣生長剛毛。秋月開穗狀花，呈白色，或紅色。可取其全草，供藥用之。【功效】其氣味辛平，無毒。俗諸蟲，如蠶類咬人，恐毒入腹，可煮服之，亦搗敷諸疔。

【學說】陳藏器曰：生濕地，如麥大，莖赤，花白，東土，亦有之。

鱈

【學名】*Talasseichthys carotta* Jimm. (*Chaloum mydas*, L.)

【產地】多產於淡水，或鹹水，以魚介植物為食。

【基本】為魚類，體扁闊，腹背被有堅甲，趾間有蹼，亦爬蟲類也，兩顎以角成嘴狀，無齒，方骨不動，背甲乃真皮中所生之骨板，與脊椎，及肋骨密合而成。

區分為脊骨板，肋骨板，緣板。腹甲概屬真皮之化骨也。區分為上腹板，中腹板，下腹板，劍狀腹板，而其表面，覆以油表皮角質所化之鱗。

【功效】其甲能治傷中，益氣，補不足，去熱氣，溼痺，腹中激熱；又五味養食，當微泄；又於婦人漏下，羸瘦，宜當食之。又治婦人帶下，血癥，腰痛，去血熱，久痢，長鬚鬚；作丸服之，治虛勞，痲痺，脚氣。其脂能拔白髮，取脂塗孔中，即不生；欲再生，以白犬乳汁塗之。其頭燒灰，療小兒諸疾，婦人產後，陰脫，下墜，尸疰，心腹痛，又敷歷年脫肛，不愈。其頭血塗脫肛，能去風，口噤眼僻，小兒疳勞，潮熱。其卵鹽藏，煨食，止小兒下痢。

【別稱】又名靈鱈，靈龜，皮名：鱈筒。

靈砂

【基本】此即化學上之赤色硫化汞也。按胡黃丹藥秘訣云：

升鍊靈砂之法，須用新鍋，置於道遙爐上，蜜摺鍋底，文火下燒，入硫黃二兩，溶化，投水銀半斤，以鐵匙急攪，作青砂頭。如有焰起，噴醋解之，待汞不見星，取出，細研；盛入水火鼎內，以鹽泥固濟，下以自然火升之，乾水，十二晝為度，取出如束鐵紋者，成矣。

【功效】其氣味甘溫，無毒。能去百病，養神，安魂，益氣，明目，通血脈，止煩滿，益精神，殺精魅，辟鬼氣，通神明，下虛痰，除瘰癧，頭旋，吐逆；又治霍亂，反胃，心腹冷痛，又調和五臟，補助元氣，研末，糯米糊為丸，滾湯服，最能鎮墜；神丹也。

【用量】〇·三——一〇服用。

靈貓

【學名】*Pardofurca larvata* Temm.

【產地】產於亞細亞之南部，及墨西哥等處。

【基本】此屬食肉類之貓科，雄者，生殖器之兩側，各具一

個小蟲，生黃色半流動體，具脂肪樣之物質，有異香，故名。靈貓。其肉等，可供藥用之。

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。其陰氣味辛溫，無毒。能治中惡，殺尸，蠱疰，心腹卒痛，狂邪，瘧疫，夢寐邪魔。又能鎮心，安神。

【別稱】又名靈狸，香狸，神狸，類。

靈貓香 *Zibohum*

【基本】爲靈貓 (*Paradoxurus larvatus* Tunm) 肛門與生殖器間開口腺，而分泌之液汁。通常用以小匙徐徐刮取其液，而備藥用。

【成分】含有揮發油，脂肪等。

【功效】爲興奮藥，與麝香性質無異。

【用量】〇·三——〇·六服用。

靈壽木

【基本】據李時珍云：陸氏詩疏云：楛，卽楛也。節中腫，似老杖，卽今靈壽也。人以作杖，及馬鞭。弘農郡北山，有之。

【功效】其根皮氣味苦平，能治水腫等。

【別稱】又名扶老杖，楛。

鱧魚

【基本】爲硬鱗魚類 (*Chanos*) 一種之無鱗大魚也。其狀似鱒，其色灰白，其背有骨甲三行，其魚長有鬚，其口近頰下，其尾歧。其出也，以三月洩水而生。其居也，在礫石湍流之間。其食也，張口接物，聽其自入食，而不飲，蟹魚多誤入之。

【功效】其肉氣味甘平，而有小毒。能利五臟，肥美，人多食，難消化。其肝無毒，能治惡血，疥癬，勿以鹽炙食之。

【別稱】又名黃魚，鱸魚，玉版魚。

鱧殘魚

【學名】*Amphioxus lanceolatus* *Brunneostoma lanceolatum*

【產地】多居於海底沙地上。

【基本】爲管心魚類，大者，長四五寸，身圓如筋，潔白如銀，無鱗，若已胎之魚，但目有兩黑點爾！小者，曝乾，以貨四方，清明前有子，食之甚美。清明後子散，而瘦，但可作鮓臛耳！

【功效】其氣味甘平，無毒。作羹食之，能寬中，健胃。

【別稱】又名玉餘魚，銀魚。

鯢魚

〔基本〕據李時珍云：鯢狀如惠文冠，及鬚斗之形，廣尺餘。其甲堅滑，青黑色。鰓背，骨眼，眼在背上，口在腹下。頭如蚌蟬，十二足似蟹，在腹兩旁，長如六尺。尾長一二尺，有三稜，如棕莖。背上有骨如角，高七八寸，如石珊瑚狀。每過海相負示，背乘風而游，俗呼鸞帆，亦曰鸞繒。其血碧色，腹有子，如黍粟米，可爲醴醬，尾有珠如粟。其行也，雌常負雄，失其雌，則雄即不動。漁人取之，必得其雙，雄小，雌大，置之水中，雄浮，雌沉。

〔功效〕其肉氣味辛鹹而平，微毒。能治痔疾，殺蟲。其尾燒焦，治腸風，瀉血，崩中，帶下，及產後痢疾。其膽治大風，癩疾，殺蟲。其殼治積年呷嗽。

鰕魚

〔基本〕據李時珍云：鰕，生江湖中，體似鯨，而腹平，頭似蛇，而口大；類似魴，而色黃；鱗似鱖，而稍細。大者，三四十斤，鰕魚，最毒，池中有此，不能畜魚。

〔功效〕其肉氣味甘平，無毒。食之，已嘔；又能暖中，益

脾胃。

〔別稱〕又名黃頰魚。

鰾魚

〔學名〕*Murambaia chinensis* Parik.

〔產地〕多棲息於近海之泥沙中。

〔基本〕爲喉鱧類之一種，似鰻，而下頰不突出；脊鰭生於鰓孔之直上；鰓孔較長，是其異點。其肉可食，亦供藥用。

〔功效〕其肉氣味甘寒，無毒。能治療五痔，濕痺，面目浮腫，又下大小便，壅塞，腳氣，風氣，及妊娠之水氣。其腸及肝能治敗疔中生蟲。腸以五味炙香，能貼痔瘻，及蛙疔，以引蟲盡，爲度。其膽氣味甘平，治喉痺，將死者，點入少許，即達，病深者，水調灌之。

〔別稱〕又名鱖魚，黑鱖，文魚。

鰾腸

(菊科)

〔學名〕*Folipia alba* Hassk.

〔產地〕多生於水邊，池沼之間。

〔基本〕爲一年生草，莖高二尺許，葉對生，粗厚有毛，爲

披針形，有鋸齒。秋日開小頭狀花，色白，而細；果實成熟，呈黑色，稍似小蓮房。可取其全草，供藥用之。

【功效】其氣味甘酸而平，無毒。治血痢，鍼灸瘡，發洪，血不可止者，敷之立已。其汁塗眉髮，生速而繁；且能烏髭髮，益腎陰，止血，排膿，通小腸，敷一切疔，並蠶癩，又可膏點鼻中，添腦。

【學說】李時珍曰：旱蓮，有二種：一種苗似旋覆，而花白細者，是體腸。一種花黃紫，而結房如蓮房者，乃是小蓮超也。

【別稱】又名蓮子草，旱蓮草，金陵草，墨頭草，墨菜，糊頭，豬牙草。

麩

【基本】為麩類 (Falconine) 之一種動物。其形狀及顏色，各具其異，多以較小之動物，為食料。

【功效】其肉食之，治野狐，邪魅。其頭治五痔，燒灰，飲服；或燒灰，入麝香少許，酥酒服之。又治頭風，眩暈，一枚燒灰，酒服。其嘴及爪治五痔，狐魅，燒灰，水服。其骨治傷損，能接骨，燒灰，每服二

錢，酒服，隨病上下，食前，食後。其毛能斷酒，水煮汁，飲之，卽止酒也。其屎白氣味微寒，而有小毒。能消虛積，殺勞蟲，去面皴，野鷄。

鷓鴣

【學名】 *Podiceps himantus philippensis* Temm.

【基本】此屬游禽類，體甚小，嘴尾均短，脚赤色，位於後方，裂有小瓣，所謂裂泳足是也。善於潛水，能捕食魚類；翼短，不能遠飛。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。能補中，益氣，五味炙食，甚美。其腎滴耳，能治耳聾。

【別稱】又名須靈，水鷄，刁鴨，油鴨。

鸚鵡

【學名】 *Cacatua alba*

【基本】為高足禽類，全體白色，狀似白鸚，長喙，高脚，能捕食蟲類，且善行走。

【功效】其毛及屎燒灰，水服，能解溪鳥毒。

鵝鶩

【基本】據陳藏器云：鵝鶩，南方有短狐處，多有之，性食短狐也。所居處，無復毒氣。人家宜畜之，形如小

鴨，毛有五彩，首有櫻，尾有毛，如船舵形。

「功效」其肉氣味甘平，無毒。食之，去驚邪，及短狐毒。

「別稱」又名溪鴨；紫鴛鴦。

鹽麩

「基本」據陳藏器云：生海西南雷羅諸州山谷，似芒硝，末

細，入口極冷。南人少有服者，恐極冷，入腹，傷

人，宜慎之。

「功效」其氣味鹹冷，無毒。能治赤眼，皆爛，風赤，可細

研，和水，點之。又水研，服之，能去熱煩，痰滿

，頭痛；又能明目，鎮心，除蛇虺，惡蟲毒，藥箭

鏃毒，疥癬，癰腫，瘰癧，並摩敷之；甚者，水化

，服之；又解獨自草箭毒。

鹽膚子

(漆樹科)

「學名」*Rhus Soulatina*, Marr. var. *osbeckii*, DC.

「產地」自生於山野之間，但日本最多。

「基本」為落葉喬木，莖高三丈，葉為奇數羽狀複葉，長尺

餘，有柄；小葉無柄，長卵形，葉端尖，邊緣有鋸

齒；面綠色，有毛，背淡綠色。夏月梢頭開花，為

圓錐花序；花小，綠白色；花後結小核果，蜜生紫

色，及白色之短毛。至成熟時，則蜂蟲聚集。每由

此蟲刺傷其嫩枝，或葉柄；由其生卵，自然膨脹，

為囊狀之蟲瘤，呈卵形，或不正球形；並有多數突

起物。皮為灰褐色，甚為堅脆，中藏小蟲之卵，及

死蟲。可取其囊皮，供藥用之。

「成分」含有單寧酸，樹脂，護謨，越嶺斯，糖分等。

「功效」為收斂藥；有止血之特能，可用於下痢，及出血；

並可外用，為收斂藥。

其氣味酸平，無毒。治腸虛，泄痢，五痔，下血，

脫肛，腸墜；並能生津，化痰，止咳，止血。又外

用於風濕，疥癬，膿毒，疔瘡。

「用量」一·五——三·五服用。

鼈

「學名」*Trionyx japonicus*, Schleg.

「產地」多產於暖帶之川澤湖沼中。

「基本」此屬龜類，體大於水龜，背甲灰橙色，中央部甚堅

，而緣邊較軟；背腹之兩甲，以軟骨連接之。頭與

頸長，而尾短，四肢不能縮入甲內。其肉，可供食

用，其甲，即鼈甲，又可供藥用之。

【功效】爲強壯藥，常用於女子虛勞，及血病。

其甲氣味鹹平，無毒。能除心腹癥瘕，堅積，寒熱；去痞痰，息肉，陰蝕，痔核，惡肉。治溫瘧，腰痛，宿食，瘰癧，冷瘰，勞瘦；又除骨熱，結實，婦人漏下，瘀血，血氣，惡血；又能墮胎，消瘡腫，腸癰，並撲損瘀血。又能補陰，補氣，除老瘡，當母，陰毒，腹痛，勞復，食復，斑痘，煩喘，小兒發痢，婦人經脈不通，產難，產後陰脫，男子陰疝，石淋，能飲潰癰。

【用量】六〇——一〇〇。〇服用。

【禁忌】惡礬石，理石。

【採製】籠甲，以煨燼灰，酒浸一夜，蒸爛，如膠，用之。或浸童便，或浸醋，炙之則自碎，乃入石臼搗末，用之。

【別稱】又名團魚，神守。

第廿五畫

鱖魚

【基本】據李時珍云：鱖生江湖中，常以三月始出，狀狹，而長薄如削木片，亦如長薄尖刀形，細鱗白色，吻

上有二硬鬚，腮下有長鬚，如麥芒。腹下有硬角刺，快利若刀，腹後近尾，有短鬚。肉中多細刺，煎炙，或作炸鱖食，皆美。

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。發疥，不可多食，能助火，動痰，發痰。其鮮能貼痔瘻。

【別稱】又名鱖魚，魴魚，望魚。

鱖魚

【學名】*Achilopterus limbutus* T. & S.

【基本】此屬硬鱖之淡水魚也，外形似鮭，而體幅較寬，且有光澤之美；至產卵期，則帶紅色。其肉可食，亦供藥用。

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。能溫中，益氣，多食，冷人熱中，發渴，又發疔疥。

【別稱】又名鱖魚。

鵝雉

【學名】*Thasius Schistilus* Conr.

【產地】多棲息於山林之原野間。

【基本】爲雞類之一種，羽毛美麗，尾羽頗長。頭部銅赤色，距頗發達。尋常鵝雉之雛，全身有白斑，尾羽上

下兩面，均黑褐色。赤鸚雉之雉，全身無白斑，尾羽諸色，互相橫列。其肉亦可食。

【功效】其肉甘平，而有毒。治五臟氣喘，不得息者，作羹醃食之；又炙食之，能補中，益氣。

【別稱】又名鸚鷁，山雉，山雉。

鸞

【學名】*Lanius lucophylus* T. & S.

【基本】為鳴禽類之一種，嘴強壯，略類於猛禽類之嘴；側緣有齒狀缺刻，鳴聲頗噪，捕食蛙昆蟲小鳥等。

【功效】其肉氣味甘溫，無毒。能補益陽氣，助脾，食之，不妬。

【別稱】又名黃鳥，黃鸝，鷺黃，倉庚，青鳥，黃伯勞。

第廿六畫

驢

【學名】*Equus asinus*.

【基本】為馬類之一種，體之構造，與馬略相等；惟體格較小，毛色不同。耳長，尾闊，是為異點。

【功效】其肉氣味甘涼，無毒。能解心煩，止風狂；釀酒，治一切風狂，憂愁，不樂，能安心氣。同五味炙食

，或以汁作粥食，補血，益氣，治遠年勞損。煮汁空心，飲之，療痔，引蟲。其頭肉煮汁，能治多年消渴，無不差者，又以漬麴，釀酒，服之，去大風，頭風。又同葷，齏，煮汁，日服，治黃疸，百藥不治者。其脂能敷惡瘡，疥癬，及風腫。又和酒服之，治狂癲，不能語，不識人；和烏梅為丸，治多年瘡疹，於未發時，服二十九。又以生脂，和生椒，搗爛，綿裹塞耳，治積年聾疾。又和酒等分，服之，治卒欬嗽；和鹽，塗身體，手足風腫。其髓氣味甘溫，無毒。治耳聾。其血氣味鹹涼，無毒，利大小腸，潤燥結，下熱氣。其乳氣味甘冷，無毒。治小兒急熱，驚邪，赤痢，癩疾，客忤，天疳風疾；又卒心痛，連腰胛者，熱服，三升。又蜘蛛咬瘡，器盛，浸之。又蜘蛛，及飛蟲入耳，滴之，當化成水。又頻熱飲之，治氣鬱，解小兒熱毒，不生痘疹，浸黃連取汁，點風熱赤眼。其陰莖氣味甘溫，無毒。能強陰，壯筋。其刷衣能斷酒，煨研酒服。其皮煎膠，食之，治一切風毒，骨節痛，呻吟不止，和酒服，更良。又以膠食之，治鼻洪，吐血，腸

風，血痢，崩中，帶下。其毛治骨節中一切風病，炒黃，投酒中，空心細飲，令醉，蹶臥取汗，明日更飲，如前，忌陳倉米麪。其骨煮湯，浴濕節風。其懸蹄燒灰，敷癰疽，散膿水；和油，敷小兒解額，以瘥爲度。其溺氣味辛寒，而有小毒。浸治蜘蛛咬瘡；又治反胃，噎病，狂犬咬傷，癰瘍，惡瘡，並多飲，取瘥；風蟲牙痛，頻含嗽之，最良。其屎熬之，製風腫，漏瘡；絞汁，治心腹疼痛，諸疰忤，癰癩，反胃不止，牙齒痛，水腫；又可燒灰，吹鼻，止痢，甚效；又和油，塗惡瘡，濕癬。

鱧魚

【學名】*Hyporhamphus sajoi* T. & S.

【基本】此屬喉鱧類之海魚也。體細長，背部淡黑，側面有縱線；腹面銀白，下顎突出頗長；脊鱗小形，與背鰭相對；尾鰭叉形，下葉稍長。其肉，亦供食用。

【功效】其氣味甘平，無毒。食之，無疫。

【別稱】又名姜公魚，銅兜魚。

鸚鼠

【學名】*Pteronys momonga* Tamm.

【基本】此屬鸚鼠類，體側張皮膜，飛躍樹間，較鸚鼠體稍小；但其尾短大耳！

【功效】其氣味微溫，無毒。能墮胎，令易產子。

【別稱】又名耳鼠，夷山，鸚，飛生鳥。

第廿七畫

鱸魚

【學名】*Lateolabrax japonicus* C. & V.

【基本】爲硬鱧類之一種，體側扁而長，口與眼比較爲大；背面淡蒼色，腹部淡白色；肉味甚美，亦可食用。

【功效】其肉氣味甘平，而有小毒。補五臟，益筋骨，和腸胃，治水氣，多食，宜人；作鮓，尤良；曬乾，甚爲香美；又能益肝腎，安胎，補中；作鱸，尤佳。

【別稱】又名四腮魚。

鸚鵡

【學名】*Pterocarpus onocrotatus*

【產地】產於歐洲，亞洲之南，及非洲，多居於淺水上。

【基本】爲鬚足類，體形似鵝；惟口喙特異，而較長，下顎有鬚膜下垂，能延長，以便捕魚之用；上喙尖，微細，作鈞狀；食管甚闊，爲捕魚最便利之動物。

「功效」其肉氣味酸鹹，而冷，微毒。治大腹，鼓脹，又利

水道。其頭氣味微寒，治硬，及噎，燒研，酒服。

其骨燒灰，水服，下魚骨硬。其際治噎，病發即隨

之，便安。其味治魚硬，吞之，最效。其翅羽燒灰

，水服半錢，治魚硬，噎，即愈。

「別稱」又名鵝，水老鴉。

第廿八畫

鸚鵡

「學名」*Psittacus erithacus*, L.

「產地」美洲，澳洲，皆產；吾國秦隴間，亦多產生之。

「基本」此屬鸚鵡類，嘴大而短，嘴根有蠟膜。上嘴彎曲，

覆其下嘴，故為可動性，有強力，能與足協助攀援

。羽毛，因種類而異；綠色者，最美；鳴聲清脆，

可聽，人多飼之。

「功效」其肉氣味甘鹹，溫而無毒。食之，已虛嗽。

「別稱」又名鸚哥，乾翠。

第廿九畫

鬱金

(薑科亦作薑科)

「學名」*Curcuma longa*, L. var. *macrophylla*, Miq.

「產地」產於中國，及東印度之暹地。

「基本」為多年生草，高二尺許，葉為橢圓形。夏秋之間，

自葉叢之中心，抽出花穗，簇生球果狀之花叢。秋

冬之際，採取地下之莖，供藥用之。

「成分」含有多量之黃色素 Curcumin C₂₁H₃₃O₆及揮發油，

澱粉等。

「功效」為收斂藥。

其根氣味辛苦而寒，無毒。能治血積，下氣；又能

生肌，止血，破惡血，止血淋，尿血，和金疔。單

用治女人宿血，心痛，冷氣，結聚，用溫醋，摩敷

之；亦治陽毒入胃，下血，頭痛。又治血氣，心腹

痛，產後敗血，衝心，欲死，癲狂，蠱毒。

「用量」一。〇——三。〇服用。

「別稱」又名馬蓬。

鬱金香

(百合科)

「學名」*Tulipa Gesneriana*, L.

「產地」多產於小亞細亞。

「基本」為多年生草，高一尺餘；葉廣披針形，帶白色。夏

秋之交，開花，大而美麗，黃色，或紅色，或白色

。可採取其花，而供藥用之。

【成分】含有芳香性揮發油等。

【功效】其氣味苦溫，無毒。能除蠶野諸毒，心腹間惡氣，

鬼疰，鴛鴦等，一切臭，又入諸香藥，用之。

【學說】陳藏器曰：鬱金香，生大秦國。二月，三月，有花

，狀如紅藍；四月，五月，朵花，即香也。

【別稱】又名鬱香，紅藍花，紫逸香，草麝香，茶短摩。

鸚

【學名】*Ciconia boyciana Swinhoe.*

【基本】此屬涉禽類，翼端黑色，其餘白色。腳為淡紅色，

形似鶴，而眼之周圍裸出；氣管短，而鳴聲低；後

趾頗發達，是其異耳！

【功效】其骨氣味甘而大寒，無毒。能除疔毒，五尸，心腹

痛。其脚骨及嘴治喉痺，飛尸，蛇虺咬，及小兒閃

癆，大腹，痞滿，可煮汁，服之，亦燒灰，飲服。

其卵能預解痘毒，水煮一枚，與小兒啖之，令不出

痘，或出亦稀。其尿治小兒天吊，驚風，炒研半錢

，入牛黃，麝香各半錢，炒蠟五枚，為末，每服半

錢，新汲水服。

【別稱】又名皂君，負釜，黑尻。

鸚鵡

【學名】*Sturnus vulgaris.*

【基本】為雀哥類，全體羽毛黑色，在日光下，則現綠紫色

彩，脫毛後每具白尖。鳴聲不佳，但能效鳥歌，燕

聲，又能學人語，故人多畜之。

【功效】其肉氣味甘平，無毒。能治五痔，下血，炙食，或

為散，飲服。又炙食一枚，能治吃噎，下氣，通神

志，止老嗽。臘月，臘日，取得，五味醃炙食之，


作羹食之；或搗散，蜜丸，服之。非臘日者，不可

用。其目睛和乳汁，研滴目中，令人目明，能見霄

外之物。

【別稱】又名鸚鵡，嘲嘲鳥，八哥，寒皋。

終



本辭典應用之度量衡

吾國之度量衡，向多參差，雖於滿清時代，定有庫平，而各省仍多沿用舊例，不能劃一。故吾國政府於民國四年一月六日公佈，採取萬國權度通制。(即法國之克爾姆量等。)克爾姆重量之單位，非常確實，因其為一立方生米的突之純水，在百度寒暑表四度時之重量也。而本辭典藥物之用量，為質量準確起見，故亦採用此之新制，茲列表舉述於後：

一：法國之克爾姆(即吾國採用之新衡制)

國名	簡稱	原文	譯名	略號	進位	吾國之舊制量
公絲	越	Milligramme	蜜理克爾姆	mg	○·○·○一	○·二六八毫
公毫	越	Centigramme	生的克爾姆	cg	○·○·一	○·二六八厘
公厘	越	Decigramme	特西克爾姆	dg	○·○·一	○·二六八分
公分	克	Gramme	克爾姆	g	一·○·○	○·二六八錢
公錢	尅	Decigramme	特卡克爾姆	Dg	一·○·○	○·二六八兩
公兩	瓩	Decogramme	海克脫克爾姆	Hg	一·○·○	二·六八一兩
公斤	尅	Kilogramme	啟羅克爾姆	Kg	一·○·○·○	一·六七六斤

前記之一克爾姆，等餘吾國二分六厘八毫零八九，其他進退，由是類推。本辭典藥物之用量，每有一瓦之稱，或有一·○之記號，以及通常所用一克之名詞，均與克爾姆相同。如「五·○——一·○·○」，即為五瓦至十瓦之記號；而其中之「——」，又為至字之記號也。

二：法國之液量（即吾國採用之新量制）

國名	簡稱	原	文	譯	名	略號	進	位	吾國之舊制量
公撮	鈺	Millier		蜜理立脫爾	Millier	ml	0.0001	0.0001	0.009666勾
公勺	煙	Coullier		生的立脫爾	Coullier	cl	0.001	0.001	0.9666勾
公合	鈞	Deallier		特西立脫爾	Deallier	dl	0.01	0.01	0.9666合
公升	訶	Liter		立脫爾	Liter	l	1.00	1.00	0.9666升
公斗	鈞	Deallier		特卡立脫爾	Deallier	dl	1.000	1.000	0.9666斗
公石	鈞	Heclolier		海克脫立脫爾	Heclolier	hl	1.0000	1.0000	0.9666石
公秉	鈞	Kilolier		啟羅立脫爾	Kilolier	kl	1.0000	1.0000	0.9666石

通常以克爾姆量，專秤固體之藥物，而用天秤以記其量。至於立特爾量，專量流動液體之藥物，而用量杯以記其量。此外尚有滴量，亦常用於處方箋上；但其每滴之重量，隨其體質之輕重，而有不同。茲將一瓦之滴數，合併記明於左。

- 1 水劑——大約二十滴為一瓦，每滴○.○五。
- 2 丁酸及油類——大約二十五滴為一瓦，每滴○.○四。
- 3 酒精劑——大約三十滴為一瓦，每滴○.○三。
- 4 依的兒——大約五十滴為一瓦，每滴○.○二。
- 5 舍利別及拔爾撒謨——大約十二滴為一瓦，每滴○.○八。
- 6 硫酸類——大約十滴為一瓦，每滴○.一。

本辭典編輯引用之參考書籍

神農	本草經	大明	日華本草	小泉次郎	和漢藥考
陶弘景	名醫別錄	唐微慎	證類本草	松村任三	植物名彙
李當之	藥錄	寇宗奭	本草衍義	牧野富太郎	植物圖鑑
吳普	本草	李杲	用藥法象	松田秀雄	新藥植物栽培
雷斅	炮炙論	朱震亨	本草補遺	安本義久	植物實驗指鑑
蘇恭	唐本草	吳瑞	日用本草	下山順一郎	藥用植物學
甄權	藥性本草	周憲王	救荒本草	日本藥學研究會	生藥學粹
孫思邈	千金食治	汪穎	食物本草	窪美溫	植物化學分析法
孟詵	食療本草	竇原	食鑑本草	松井元興	分析化學
陳藏器	本草拾遺	汪機	本草會編	井上寬一郎	近世製藥化學
李珣	海藥本草	陳嘉謨	本草蒙筌	松泉七郎	植物學大全
蕭炳	四聲本草	李時珍	本草綱目	佐藤敬次	高等動物學
陳士良	食性本草	多記鶴郎	補註本草綱目	松田五七郎	高等礦物學講義
韓保昇	蜀本草	日野五七郎	最新和漢藥物學	平野一貫	藥學辭典
馬志	開寶本草	湯本求真	臨床漢方醫藥解說	平野一貫	歐米買藥集珍
掌禹錫	嘉祐本草	野津猛男	漢方醫典	池口慶三	飲食物鑑定法
蘇頌	圖經本草	沖秀秋	藥草栽培及利用法	鈴木幸太郎	藥物學提綱



本辭典應用之新醫病名解釋表

新、醫病名 舊 醫 解 釋

腸窒扶斯 吾國稱傷寒，痘疹，內傷外感，及

熱病等。

百斯萬 又稱鼠疫，黑死病，及核子痘等。

巴拉窒扶斯 與腸窒扶斯相同；但症狀較輕耳。

赤痢 卽痢疾。吾國稱爲毒痢，冷痢，熱痢，瘴痢，風痢，噤口痢等。

俗稱霍亂，或稱瘟毒痢，瓜痧痘，

亞細亞虎列拉 蕃痧，痧病，暴瀉等。

與亞細亞者相同。

歐羅巴虎列拉 卽傷風時症，或稱瘴氣，及天行中

風，與瘧等。

卽瘧疾，瘧病。又稱瘟瘧，風瘧，

寒瘧，濕瘧等。

與痘疫論所謂之痘疹等相類。

發疹窒扶斯 爲一種傳染病，亦差後勞復之類。

俗稱破皮風，口禁，驚風，牙關緊

破傷風

恐水病

麻疹

風疹

猩紅熱

流行性耳下腺炎

水痘

百日咳

痘瘡

實扶的里

丹毒

脾脫疽

馬鼻疽

甲狀腺腫

癩病

閉等。

卽狂犬瘋，瘋犬咬傷等。

卽赤瘡，麻子熱，糠疹等。

卽風氣紅疹等。

古稱隱疹，赤疹，丹疹等。俗稱發

疹子，痘毒痧等。

俗稱疔腮，又稱蝦蟆瘡，或時毒。

卽風痘，紅斑痘等。

卽疫咳，瘧咳，頓咳等。

卽天花，天然痘，天行痘，真痘。

卽白喉，鎖喉風，爛喉痧，馬脾風

等類。

卽大頭痘，赤遊風，赤丹，火丹。

卽瘰癧，紫泡，黑泡，疔毒等。

卽馬疫，馬病；古名：內勞。

俗稱山癩，又稱惡帶。

與吾國麻瘋，癩瘋，大麻瘋相同。

淋病

即白濁，色淋，及五淋，白帶等。

軟性下疳

即下疳瘡，陰疳，陰頭瘡，恥疳。

梅毒

俗稱楊梅，勝病等。

安魏那

此即急性咽喉加答兒之別稱。古時

以喉風，脾風之類汎稱之。

盧度烏氏安魏那

此即口腔基底面發生蜂窩織炎。

溫商氏安魏那

此即扁桃腺膜發生壞爛。

扁桃腺炎

與吾國喉蛾，乳蛾相同。

鵝口疳

俗稱口疳，鵝口，及白球子等。

亞布答

與鵝口疳相同；但發於三歲小兒。

水瘡

即走馬牙疳之類。

加答兒性口內炎

即口糜之類，「按加答兒，原為流出之意。凡身體各部黏膜，發生炎症；(即赤腫疼痛)且有分泌物(即水液流出)者是。」

潰瘍性口內炎

即馬牙疳等。

舌炎

即舌脹，舌腫，及木舌之類。

懸壘垂炎

即懸壘，及懸壘腫痛等。

頸骨潰瘍

俗稱骨槽風等。

齒齦炎

即牙齦腫痛等。

齒齦潰瘍

即牙齦風，牙痕風，角架風之類。

齒牙加里愛斯

即牙痛，齲齒等。

齒齦出血

即齒齲，牙槽流血等。

鼻腔出血

即鼻衄，鼻孔流血，鼻紅等。

惡臭鼻

即鼻淵，及腦漏等。

急性鼻加答兒

俗稱傷風感冒等。

慢性鼻加答兒

即頭風，鼻鼈等。

格魯布性喉頭炎

即馬脾風等。「雖同為白喉菌之原因，如侵入咽喉，而發炎時謂之實扶的里性咽喉炎；如侵入喉頭而發炎時，謂之格魯布性喉頭炎。」

咽喉加答兒

即脾風，喉風之類。「因其症候不同，而更分為急性，及慢性之咽喉加答兒。」

喉頭加答兒

即喉頭喉腫。「為喉頭黏膜發炎之類，亦有急性，及慢性之稱。」

聲門麻痺

與失聲相同。

流行性腦脊髓膜炎

俗稱瘧痘等。

急性氣管枝炎

慢性氣管枝炎

氣管枝出血

氣管枝擴張

氣管枝狹窄

氣管枝喘息

纖維素性氣管枝炎

肺出血

肺氣腫

肺水腫

肺結核

加答兒性肺炎

格魯布性肺炎

肺充血

肺膿瘍

俗稱傷風咳嗽等。

即久咳之類。

即咳血等之類。

即氣管膨大等症；為老人痲咳等，最多發生之。

即氣管狹小等症。

與吾國喘息，喘促，喘急，及痰喘等相同。

即格魯布性氣管枝炎也；與吾國咯膿等相同。

即咯血等。

俗稱肺脹，胸脹等。

即金匱之肺水也。

俗稱肺癆，勞瘵；而婦女雜疾病等亦多屬之。

即肺炎，肺熱等。

即膿咳等。

即心胸痛，或胸脇苦悶等症。

即肺癰之類。

肺壞疽

肺臟膨脹不全

肺二口蟲病

肺癆

肋膜炎

胸氣腫

胸膿腫

胸水腫

食道狹窄

急性胃加答兒

慢性胃加答兒

胃衰弱症

胃擴張症

胃圓形潰瘍

胃出血

胃痛

胃下垂症

亦肺癰之類；但較劇烈耳。

即肺萎縮等。

為一種寄生蟲之疾病，日本最多發生，且為其特有。

即肺疽之類。

與吾國胸膈痛等相同。

俗稱氣胸，胸風，及肺胞氣脹等。即胸痛，胸癰等。

為吾國飲證之類。

即噎膈，廢食等。

吾國稱為傷食等。

即古書所謂淡飲，癆囊之類。

與吾國脾胃虛衰相同。

即胃大之症。

即胃腕癰等。

即吐血也。

亦胃癰之一種，古稱脾氣擴張，或稱飲癆等。

即胃變位等。

神經性胃痛

即胃腕痛，胃氣痛，癢痛，心下絞痛等。

神經性噁氣

即常發噁氣等。

神經性嘔吐

即嘔逆，吐逆等。

神經性消化不良

亦胃虛，脾虛之類。

急性腸加答兒

與吾國泄瀉相同。

慢性腸加答兒

即久泄瀉也。

盲腸炎及蟲樣垂炎

即腸癰之類。

S 狀部結腸及周圍炎

同前。

腸潰瘍

同前。

腸瘻

同前；但較為劇烈耳。

腸結核

即腸癆類。吾國俗稱瘵腎瀉，五更瀉，雞鳴瀉等。

常習性便秘

即大便秘結，及大便不通等。

下痢

俗稱便瀉，或泄瀉，或大便自利，大便失禁等。

腸閉塞及腸絞窄症

即吐糞，或吐屎等，病中常見之。

腸重疊症

同前。

腸神經痛

即抽氣，痲痛等。

腸出血

即便血，或下血等。

腸歇爾尼亞

與吾國小腸疝氣等相同。

直腸脫

即脫肛也。

痔疾

即痔瘡之類。

直腸瘻

即痔漏也。

直腸癆

即痔癰之類。

肛門皸裂

即肛門裂瘡等。

蟻蟲

即寸白蟲之病。

蛔蟲

即蛔蟲，長蟲，食蟲，圓蟲等。

蟯蟲

即白坐蟲，小白蟲，短蟲，線蟲，蟯蟲等。

十二指腸蟲

亦腸中之寄生蟲病。

鬱血肝

即肝血鬱滯等。

充血肝

即肝積血，肝血多證等類。

加答兒性黃疸

俗稱黃病者是。

急性傳染性黃疸

同前，而新醫所稱之懷伊爾氏病，亦係此病。

小兒加答兒性黃疸

即胎黃之類。

肝臟腫瀉

即肝癰之類。

肝病

肝臟二口蟲病

肝臟包蟲腫

膽石病

脾臟充血

脾臟肥大

腹水

急性腹膜炎

慢性腹膜炎

腹膜癆

急性心腦內膜炎

慢性心腦內膜炎

心臟肥大

心臟擴張

心臟肉質炎

心臟破裂

心囊炎

心囊水腫

心囊氣腫

亦肝癰之類，但較劇耳。

此為肝臟中之寄生蟲病。

同前。

黃病類中包含之。

即疝痛症之類。

即癆母，脾癰，脾積，塊癰等。

俗稱水膨症，古名脹滿。

即衝痛，或卒痙之類。

同前。

為水膨之重症；但多續發胃腸癆。

即心痛，胸痛，熱心痛等皆屬之。

同前。

吾國胸痺症包含之。

即心膨大症。

亦胸痛，熱心痛中，包混之。

吾國真心痛類包含之。

亦心痛，或熱心痛等包含之。

吾國胸水症中包含之。

即心包氣腫，心衣氣等。

神經性心悸亢進

狹心症

動脈硬化

大動脈瘤

貧血

萎黃病

進行性惡性貧血

白血病

壞血病

敗血病

血友病

紫斑病

白塞氏病

糖尿病

脂肪過多症

尿酸性關節炎

腺病

即心跳，心忪等。

即真心痛，或癆瘵，卒痛等。

吾國以血瘤概稱之。

同前。

即血虛，或血乏等。

俗稱乾血癆等。古名黃胖，綠病，食勞黃疸等。

亦血虛之類；但較為劇烈耳。

即脾瘕之類，為白血球增多之病。

即牙疳，牙宣，及牙縫出血之類。

同前。

古名易衄病；亦稱血證等。

此為皮膚及胃腸膜有點狀之溢血，或出血；但不侵犯齒齦。

此為血虛脾大之症。

即消渴之類。

即肥胖病，或色肥，及閃胸等稱。

俗稱痛風者是。

即癩癧等；而通俗亦稱老鼠瘡等。

尿管閉

浮腫

尿毒症

急性腎臟炎

慢性腎臟炎

腎瘻

腎臟包蟲腫

腎孟炎

腎臟水腫

腎臟結石症

膀胱加答兒

膀胱病

膀胱結石

遺尿症

膀胱癱瘓

膀胱麻痺

安寶博氏病

即尿瀉之病。

即水氣病，或水證等。

此即尿毒入血之病。

吾國腎消之一種；而新醫所稱武雷

篤氏病，亦係此病。

同前。

腎石症等包含之。

此即腎臟寄生蟲之病。

多尿症中包含之。

與吾國腎虛等相似。

腎石症，及石淋等包含之。

即便瀉等。

即膀胱毒癩之類。

同前。

即遺溺，或夜尿失禁等。

五淋症中，亦包含之。

即小便不通等。

此為青銅色皮病，吾國消渴之類，

亦包含之。

遺精

陰萎

三叉神經痛

坐骨神經痛

頭痛

腦腫瘍

腦膿瘍

腦充血

腦出血

腦膜炎

腦水腫

腦梅毒

日射病

脊髓炎

脊髓充血

脊髓出血

脊髓癆

半身麻痺

即失精，夢遺等。

為陰莖勃起不能，或勃起缺乏。

即頭痛，牙痛，眼痛等多包含之。

俗稱腰痛等。

即受風頭痛等。

即腦內生瘤等。

即腦內變等。

即血虛頭眩等。

即頭痛，或逆上等之類。

即卒中風，卒中，及中風之類。

即真頭痛，及熱病譫妄等。

即解顛之類。

俗稱楊梅開窗等。

即中暑，中暑，中陽等。

即背脊痛等。

即裸腿風，酒腫腿症之類。

即髓病，癱軟，背脊痛等。

即裸腿風，及中風類包含之。

即偏枯，偏癱，半身不遂等。

橫紋麻痺

即截癱，癱軟，腳軟等。

神經衰弱

即健忘，易怒等症。

歇私的里

即婦人藏躁等。

依卜昆望里

即心風，心思病。(神經過敏者，最易罹之)

帝答尼

即手抽筋等。

排在獨氏痲

古時所謂肝厥，蟹睛，即兩眼球突出之症。

舞蹈病

即顫振，吾國亦包含癩症之類。

癩癩

俗稱羊角瘋，羊癩瘋等。

幼兒急癩

即急驚風等。

振顫麻痺

即癱瘓振動等。

亞台篤設

即手足每起連續動作之病。

麻痺狂

亦癱瘓之類，即每說謊言，或講大話之神經病。

倍里倍里

即脚氣病。

神經麻痺

即麻木，不仁等。

顏面神經麻痺

口眼喎斜包含之；中風中亦有之。

眼筋神經麻痺

即眼珠不動症。

嗅神經麻痺

即失嗅等。

味神經麻痺

即風舌強，及嘗吃等。

顏面筋痿痺

即口眼喎斜，面隔，喎斜等。

橫隔膜痙攣

即吃逆，逆呃，噎噎等。

指端痙攣

即指痺，及書痙等。

筋肉局部痙攣

即轉筋等。

急性關節痙攣質斯

即白虎風痛，白虎瀝節風等。

慢性關節痙攣質斯

即風溼，中溼，溼痺，及遊走痛，瀝節風等。

筋肉痙攣質斯

即肉痺，筋痺，及肉痛，筋痛等。

佝僂病

即龜胸，龜背等；而新醫又稱英吉利斯病，亦爲此病。

骨質軟化症

即骨軟畸形樣之類。

創傷

即挫，刺，割，銼之外傷。

瘰癧

即指頭瘰癧等。

熱性膿瘍

即無名腫毒，及腫瘍之類。

寒性膿瘍

即流注等。

癰瘍

即癰疽，疔腫等，如痔瘻之類。

潰瘍

即潰瘡，及潰爛瘡面之稱。

狼瘡

卽皮膚結核病。

癰疽

卽發背，頭癰等。

瘰癧

卽翻花瘡等包含之。

淋巴管炎

卽紅絲瘡等。

淋巴腺炎

隨其部位，而定名稱，如鼠蹊淋巴腺發炎，卽俗稱橫痃者是；如耳下淋巴腺發炎，卽俗稱疔腮者是。

皮下蜂窩織炎

卽皮下膿滲潤之症。

筋肉炎

卽筋腫，筋痛等包含之。

靜脈炎

卽紅絲疔類。

靜脈瘤

卽筋瘤之類。

動脈炎

亦稱筋瘤等。

動脈瘤

卽血瘤等包含之。

黏液囊炎

卽腫瘤之類。

關節炎

卽鶴膝風等之類。

骨炎

卽骨痛，風溼，中溼等包含之。

骨膜炎

同前。

骨髓炎

亦附髓病，骨痛等包含之。

骨壞疽

卽附骨疽等。

膿泡疹

卽膿瘡，腫瘡等。

濕疹

卽膿泡，水泡等。

汗泡疹

俗稱痱子，痱瘡等。

水泡疹

卽黃水瘡等。

疥癬

俗稱疥瘡等。

頭虱

卽髮內生虱等。

衣虱

卽衣被生虱等。

毛虱

卽陰蝨，八腳蟲等。

頑癬

卽鱗甲瘡之類。

鱗屑癬

卽乾癬，牛皮癬等；如發生手掌，又稱鵝掌風等。

頭部鱗屑癬

卽白禿風等。

頭部匍行疹

卽禿瘡等。

陰部匍行疹

卽腎囊風，俗稱繡球風等。

帶狀匍行疹

卽火帶瘡，纏腰丹等。

寄生性匍行疹

亦癬瘡之類。

蕁麻疹

卽癩疹類包含之。

蕁麻疹

同前。

蕁麻疹

卽蛇皮癬等。

糠枇疹

同前。

丘疹
 瘰癧
 瘰癧
 酒皸鼻
 凍傷
 火傷
 紅色苔癬
 瘰癧
 漆毒疹
 羅斯
 紫斑病
 面皰
 夏日斑
 多汗症
 腋臭
 皸裂
 疣贅
 力士耳
 外聽道炎

即尖頭疹等。
 即風癬，瘰癧等。
 即粉刺，穀疳疔等。
 即酒精鼻等。
 俗稱凍瘡等。
 俗稱凍瘡等。
 即燙瘡等。
 亦蛇皮癬之類。
 即白癜風等。
 即漆瘡等。
 即丹毒，火流，火丹等。
 即肌蛆，膚血，汗血，墨斑等。
 俗稱粉刺。
 俗稱汗斑等。
 即自汗，手汗，足汗等。
 即狐臭等。
 即手足破裂，及裂紋等。
 即膚疣，肌疣，水疣等。
 此即耳翼軟骨膜之發炎也。
 即耳瘡，耳疳等。

外聽道出血
 中耳炎
 鼓膜炎
 內耳炎
 聽覺神經亡失
 歐氏管狹窄
 眼瞼濕疹
 眼瞼潰瘍
 眼瞼浮腫
 眼瞼蠅綠
 眼瞼麻痺
 眼瞼充血
 眼瞼綠炎
 睫毛亂生症
 麥粒腫
 淚腺炎
 淚囊炎
 結膜充血
 加答兒性結膜炎

即耳蛆也。
 即耳漏，耳痛等。
 通常稱為耳痛等，又稱腦裏虛癆。
 同前。
 即耳聾也。
 即耳氣不通。
 即眼皮瘡之類。
 同前。
 即眼胞腫等。
 即風牽瞷僻等。
 即瞼風，侵風，眼胞餘皮等。
 即眼邊流血等。
 即爛弦風等。
 即眼毛亂生或倒插等。
 即眼丹，針眼等。
 俗稱迎風流淚等。
 即淚漏，大眦漏等。
 即眼睛紅脹等。
 即暴發火眼，及風熱眼之類。

篤拉仿誤

結膜翼狀贅片

膿漏性結膜炎

角膜炎

角膜盤奴斯

鞏膜炎

虹彩炎

毛樣體炎

全眼球炎

脈絡膜炎

網膜炎

網膜充血

夜盲症

晝盲症

墨內障

色盲

硝子體濁濁

綠內障

即沙眼之類，俗稱臉生風粟者是；

而新醫又稱顆粒性結膜炎也。

即努肉攀睛等。

即膿漏眼，淋眼等。

即深根釘翳等。

即星翳等。

即白睛炊銜等。

亦白眼痛之類。

同前。

即暗腫暴發眼之類。

亦白眼痛之類。

同前。

即血灌瞳人之症。

俗稱雀目眼等。

同前；但發於晝間。

即失明之類。

即不能視色之症。

即眼見飛蚊之類。

即青盲之類。

白內障

妊娠嘔吐

妊娠水腫

妊娠瘧疾

陣痛

產褥熱

月經失調

月經困難

月經過多

無月經

乳瘡

乳房腫脹

乳房神經痛

乳頭破裂

陰脫

陰囊腫

子宮出血

子宮腫瘤

子宮潰瘍

同前。

即亞阻等。

即胎水病等。

即子嗣，子盲等。

即分娩時所發之三次疼痛。

即產後病等。

即經行不順等。

即經行腰痛，腹痛等。

即經行過溢等。

即月經不通等。

即乳巖之類。

即乳癰，妬乳等。

即乳疔等。

即乳疳等。

即陰挺下股等類。

即陰疔等。

即崩漏，崩中等。

即瘰癧，陰臭等。

即赤白帶下之類。

本辭典最新藥物配劑及製劑方法之解釋

第一 丁幾劑 Tinctura

丁幾，與吾國藥酒類之製劑，大略相同；如紅花藥酒，亦可稱為紅花丁幾也。其製造方法，除特別規定，而有製法者外，多採用冷浸方法。即將應用藥品，銼成粗末，投入適當之容器中，而後注入其水及酒精等之液體，密封，置於冷靜之處；但須常常振盪，約浸至一週，乃至三週後，而濾過之。（遇必要時，加以壓迫濾之。）取其濾液，更置於冷靜之處，俟其渣滓沉底，用濾紙置於玻璃漏斗中，再行濾過。所得濾液，即為丁幾。茲舉其數例於左：

- (一) 虎列刺丁幾 Tinct. Anticholeric
阿片 二〇〇
丁香 二〇〇

桂皮 二〇〇

小荳蔻 二〇〇

薑根 五〇〇

酒精 七〇〇〇

溜水 三〇〇〇

薄荷油 二〇〇

法先將阿片，丁香等，銼成粗末，投入玻璃容器中，而後注入酒精及溜水等，嚴密封藏；置於冷靜之處，浸至一星期後，濾過之。取其濾液，再加薄荷油，即成爲褐色之液體。一四十滴乃至三十滴，服用之，爲治虎列刺（即霍亂）之十滴藥水也。

- (二) 阿片丁幾 Tinctura Opium
阿片末 一〇〇〇
稀酒精 五〇〇〇
右混和冷浸，經五日後，壓榨而濾過

之，即成赤褐色之液。其功效與阿片相同，一回極量，一。五，一日極重，五。〇；但亦可外用，爲含嗽，點眼，及灌腸等。

按阿片 (Opium) 爲罌粟之未熟果，切之，即流出白色乳狀液，使其乾潤而成暗赤褐色之團塊，通常製成膏類，以供鴉片慢性中毒者之吸食；但亦多爲藥用。其功效之範圍甚廣，雖有鎮痛鎮痙之可能；但少微量，又有興奮之作用。凡由精神與筋所發之疼痛，若癢，咳嗽之不服等，皆有催眠之作用。又於精神病等，有鎮靜之作用，於胃腸等之痛痛，有鎮痛之作用。此外對於痙攣症，呼吸困難，咳嗽，嘔吐，下痢，及一般胃腸出血等，皆有應用之必要。其末，一回以〇。〇〇

五——〇・〇——〇・一爲丸劑，粉劑，錠劑等，而服用之，一日〇・五之極量，一回〇・一五之極量。如過極量，足能致死。

(三)阿片安息香丁幾 *Tinctura opium benzoina*

阿片末 一〇〇〇

安息香 四〇〇

樟腦 二〇〇

茴香 一〇〇

稀酒精 一九二〇

右混和冷浸，經五日後，壓榨而過濾之，即成澄明淡黃褐色之液體。對於氣管加答兒，有鎮咳，及去痰之效。一日與以二十滴，至六十滴，(即二〇——三〇)服用之。

(四)芳香阿片丁幾 *Tinctura opium aromaticum*

紅花 一〇〇

桂皮 一〇〇

丁香 一〇〇

稀酒精 一五〇

右混和冷浸，經五日後，亦按前法壓榨過濾，取其所得濾液一〇〇，再加以阿片五〇，復冷浸五日，再壓榨而過濾之，即成暗褐色澄明芳香之液體。其用量，及功效，與阿片丁幾相同。

第二 越幾斯劑 *Extractum*

越幾斯雖有乾燥及流動之別，但多與吾國二冬膏之類相同。其製劑方法，多用以酒精，或稀酒精，或水與酒精，或水與醋酸，照處方擬定之量，混和其他藥品，仍按丁幾製劑之浸濾，取其浸出濾過之液，而後置於重疊煎上，蒸發其液，至一程度，而得乾燥，或流動之越幾斯也。

(一)葷澄茄越幾斯 *Ext. Culeharum*

葷澄茄粗末 二〇〇

酒精 五〇〇

溜水 五〇〇

法先取葷澄茄，加以酒精及水各三〇〇混和，置於攝氏一五——二〇之溫度，時時振盪，浸三日後，而壓榨之。將其剩渣，再加以酒精及水各二〇〇，仍按前法浸製。更將先後所得之濾液，混和置於重湯煎上，蒸發至稍濃爲度，即爲越幾斯也。

(二)龍膽越幾斯 *Ext. Goshinnu*

龍膽根末 一〇〇

酒精 一〇〇

水 八〇〇

法先取龍膽，加以水五〇〇。冷浸一日，壓榨濾之。再將其剩渣，加以水三〇〇，亦冷浸一日，壓榨濾之。而後將其兩液混和，加溫，蒸發至全量剩三〇〇時，遂加酒精

一〇〇〇〇置於冷靜之處，經二日後，再行蒸發，至濃厚為度，即為越幾斯也。

(二)阿片越幾斯 *Extractum Opium*

阿片

一〇〇〇

水

六〇〇〇

法取阿片末全量，以一回注水四〇〇，一回注水二〇〇〇，各浸一日後，而濾過之。再將二回所濾之液，混和，而蒸發之，即成為赤褐色之乾燥越幾斯也。

(四)烏頭越幾斯 *Extractum Aconiti*

烏頭根

六〇〇〇

酒精

七五〇〇

水

一五〇〇〇

法先取烏頭，冷浸於酒精及水中，仍按其兩浸方法，蒸發而製成之稠厚體也，呈黃褐色，能溶於水。其功效與烏頭相同，一日二三回，以一〇〇〇

五——〇〇〇——〇〇一五為九劑，水劑等；又可以其十分之一量，為軟膏，及擦劑。可外用於使麻質病，神經痛之局部等。

第三浸劑 *Tinctura*

適用於浸劑者，為植物性之生藥，但多因其有效成分之易溶於水者，或經過長久煮沸，使其揮發性成分之逸出者，而選為浸劑服用之。其製方法，通常宜將所用之藥物，必須細切，放入容器中，而注以沸湯，時時振盪之。再置於重湯煎上，經五分鐘間，使其冷後，而濾過之；其所得之濾液，即為浸劑也。

(一)遠志浸 *Infusum Sappan*

遠志根

四〇〇〇

沸水

一〇〇〇〇

法先取遠志根切碎，投入浸劑器中，而後加以沸水，時時振盪。再置於重

湯煎上，加熱，至五分鐘，放冷後，而濾過之，即可服用矣。

第四煎劑 *Decocta*

煎劑之製法，殆與浸劑相同，不過加熱之時間較長耳！蓋因其有效成分之溶出於水者，比較的困難也；且為由熱逃逸，或不分解之植物性生藥適應之劑也。其製為煎劑之時，所用之藥物，則必細切，而注以水，時時振盪之。其熱於重湯煎上之時間，通常以三十分時，至六十分時為度，更須乘其溫，而壓濾之，即為煎劑也。

(一)金雞勒煎 *Decoctum Chinua*

金雞勒皮

一五〇〇

水

一五〇〇〇

法取金雞勒皮切成均勻粗末，投於煎鍋中，注加冷水，時時攪拌。再置於重湯煎上，加熱，至三十分時，而壓濾之，即得其溶液也。

第五 丸劑 *Pillule*

丸劑者，以粉末狀之藥物，與液狀，半液狀，或柔軟黏韌性之物質，密和為柔軟之塊。以一定之方法，製成小球形，或卵形之丸子也。一個重量，大約由〇・〇五，至〇・二；服用之後，至胃腸管，始能融解。通常製造丸劑軟塊之方法，即以有力之主藥，與適當之賦形藥，同置於乳鉢中，搗和極密。宜先製成細索狀之條，次由此索狀之條，作成丸子。

丸劑在吾國最為廣用，因科學尚在幼稚時代，缺少化學品之故。其製丸之方法，亦為手工業，多以手指團成丸劑，或以篩子滾成丸劑。故近來因其形狀大小不等，質量不確，每以丸劑器，而製造之。其法亦極簡單，宜先於平板上，分作丸劑塊，再以長形之板，延轉為若干索條，置於鐵製之細

溝板上，以長形而有細溝之鐵板，壓於其上，則得截取均勻之小塊。更以此小塊，載於轉丸器之扁板上，將圓轉板加輕壓之，然後迴轉，而閉圓之，以為整形之丸子。防其交互黏着，則撒布石松子，或甘草末等。其所製成之丸子數，可就裁切丸劑塊之鐵板細溝數計之。

(一) 無痛阿片丸 *Pillule anodynæ*

(Opium)

阿片趁凝餅

五・〇

甘草根末

五・〇

亞拉庇亞護謨漿

適宜

右混和，按法分製百丸，每夜一丸，服用，為鎮痛藥。

第六 錠劑 *Tabletæ*

錠劑之起源，初為清涼，口香劑之一種，取放口中，微舐之，藉唾液之溶化，呼吸間覺有清香涼爽之味，不過

為一種口香糖耳。後來逐漸進步，乃用以為藥，故近多以乳糖，或白糖為基礎之賦形藥。有時加少量之亞拉庇亞護謨，為結合藥，包含種種之藥末者也。常有甘味，頗易融解之。其錠劑之重量，大約一・〇，厚二密迷，至五密迷，為扁板狀之片。通常製錠劑之法，先取主藥，預定錠劑一個所含之量，及其個數。測其一個，大約可為一瓦之重，則和以白糖等之賦形藥，更濕以稀酒精，及甘油，而搗捏之，為適宜軟塊。若結合力不足，則加少量之黏漿，而延展其軟塊於平板上，使為適當之厚薄。以所謂錠劑裁切器，將錠子切而拔之。其至要者，印藥名等於其上也。

(一) 矢音錠 *Tabletæ Aphoniae*

龍腦

一・〇

兒茶

〇・五

甘草 四・〇
薄荷 〇・五

法先將諸藥，研為細末，以甘油濕潤之，再以亞拉脫亞護膜黏着，而後製成錠劑。

第七 散劑 Pulvis

散劑者，即俗稱之藥粉也；為微細平均乾燥性藥物之碎粉也。隨其微細之度，有粗末，及細末之分，而處方上之散劑，皆以細末為主。通常製散劑之法，大抵皆用乳鉢，乳棒搗碎，研磨，與篩過，而製成者也。

(1)健胃散 *Pulvis stomachicus*
牡蠣末 一〇・〇
薄荷末 一〇・〇
天南星末 一〇・〇
桂皮末 五・〇
龍腦末 一〇・〇

右混和，研為細末，用於消化不良，

一日三四回，每回五・〇服用。

第八 祇劑 Emulsion

祇劑，乃糊泥狀，或粥狀之混和劑，多由植物粉末，含利別，蜂蜜，拔爾撒謨，果泥等而製成。此多用於小兒，因其味較甘，而易服之故。其祇劑，在處方上，每舉其一定時日中，可服一定量之主藥。但含利別，蜂蜜，果泥等之賦形藥量，可任調劑者適宜用之可也。

(1)複方大黃祇劑 *Emulsion Jalap.*
Compositum
大黃末 五・〇
小茴香末 五・〇
甘草末 一〇・〇
旃那末 一〇・〇
白糖 二〇・〇
蜜蜂 適量

右混和，煉成羔狀，即為祇劑，而食

用之。

第九 茶劑 Symples

茶劑，為粗到植物性之生藥，而煎之，或浸之，加以適當之法，始可取用。其主要目的，則在製成所謂藥茶，故名茶劑。其調製及用量，須特別注意。凡效力峻烈之藥物，不可與此劑形之處方。因此茶劑，每多授與病者，使病家自行以熱湯泛出，或煎出，而服用之。

(1)鎮咳茶劑 *Symples Jervoise*
蜀茶根 四・五
甘草根 四・五
茴香 一・〇
右混和搗碎，為茶劑，服用之。
(1)神經茶劑 *Symples neritine*
甘松根 一〇・〇
薄荷葉 一〇・〇

右混和到載，為茶劑。

第十 含利別劑 Syrupus

含利別，爲俗稱糖漿之譯音也。其製造方法，非常簡單，以白糖投入於水，或芳香水，及酒精之混和溶液中，溶化而成之濃厚液者是也。

(一) 芳香含利別 Syrupus Aromatizans

陳皮 一〇〇〇

桂皮 一〇〇〇

水 一〇〇〇

白糖 一五〇〇

法先將陳皮等，浸於水中，經三日後，而取其濾液，再加以白糖，即成。

(二) 單含利別 Syrupus Simplex

白糖 六五〇〇

溜水 三五〇〇

右混和溶解之，即成。

(三) 遠志含利別 Syrupus Senggwai

遠志根 一〇〇〇

稀酒精 一〇〇〇

濃溜水 九〇〇〇

白糖 一二〇〇〇

法先取遠志根，粉碎之，投於酒精，及水中，置於攝氏十五度，或二十度之溫度，冷浸二日後，壓榨濾之。取其濾液八〇〇〇，加入白糖全量，使其溶化之，即成。

第十一 乳劑 Emulsion

乳劑者，乃以水，或水性液，製出透明之乳狀液劑。使其不溶於水之油性，或樹脂性物質，藉黏滯性結合物之介助，爲顯微鏡的微細之小球形物，以浮游散布於水中者也。故乳劑因此關係，頗似振盪合劑，然經時之後，不分離爲二層，此爲與彼相異之點。

通常乳劑分爲溶解藥，乳化藥，及被乳化藥之三種。其溶解之賦形藥者，多爲水，間或爲其浸劑。而被乳化之主藥者，大抵爲脂肪油，如扁桃油

，罌粟油，亞麻仁油，蓖麻子油，肝油等。其他爲揮發油，樹脂，護膜樹脂，拔爾撒談，樟腦，麝香等。而乳化藥，即結合藥，爲麥芽越幾斯，動物性，及植物性蛋白質，乾酪素，亞拉毗亞護膜等。

乳劑在吾國藥物之應用上，範圍最爲狹窄，故記之，以待將來之研究。

第十二 甘油劑 Glycerinum

甘油劑之製造法，甚爲簡單，僅將原料藥品，投入於甘油中，使其溶化，即成。

(一) 硼砂甘油 Glycerinum Boraxatum

硼砂 二〇〇〇

甘油 八〇〇〇

右混和，加熱，溶化，即成。

第十三 酒精劑 Spiritus

酒精劑，亦係原料藥品，或芳香油類，投入酒精中，溶化以製之。

(一)肥皂精 Spiritus Saponatum

椰子油 六〇・〇

石鹼 七〇・〇

酒精 三〇〇・〇

溜水 一七〇・〇

法先取椰子油，投入於瓶中，再加石鹼，酒精，及溜水各二分之一，密封，時時振盪，至全溶化，更加其他二分之一混合，而後濾之，即成。

(二)芥子精 Spiritus Sinapis

芥子油 一〇・〇

稀酒精 五〇・〇

法將上列二種藥物混合，使其溶化，即成。

第十四 藥酒劑 Tinctura

藥酒劑，即新醫所稱之超里幾夫兒劑也；在吾國藥物製劑上，最為應用。凡配有數種藥物，與芳香性之甘味性質，及含有酒精等而製成之藥劑，即

藥酒劑。其製劑方法，與丁幾劑大略相同。而應用之藥物，亦多為植物性之生藥也。

(一)芳香藥酒 Elixir Aromatica

陳皮 四〇・〇

桂皮 五〇・〇

小荳蔻 一〇〇・〇

茴香 一〇〇・〇

酒精 一五〇・〇

法將陳皮諸藥，銼成碎末，投入酒精中，浸至十日後，而壓榨濾過之，即成。

第十五 藥露劑 Cordiales

藥露之性狀，與藥酒相類，惟含有酒精之成分較少，而糖分則較多，芳香氣則較烈耳！其製劑之方法，大略如左。

(一)強壯藥露 Cordial Tonikum

金雞勒皮 四〇・〇

陳皮 四〇・〇

桂皮 二〇・〇

薜蘿 〇・五

丁香 〇・〇

荳蔻 〇・〇

酒精 二〇〇・〇

白糖 一〇〇・〇

水 五〇〇・〇

法先將植物生藥，銼成粗末，投入容器中，加酒精浸一日，而後傾出其酒精浸液，將藥品裝入浸出器中，加以輕壓，再注入其傾出之酒精浸之，俟酒精浸出液瀝盡，再將其先後壓出之浸液混和，更加以白糖，及水，使其溶化濾過之，即成。

以上所記載之諸種製劑，為植物性之生藥，直接可能配製；惟對於醫療應用之含敵，洗滌，以及瀉腸等劑，因吾國科學幼稚，化學藥品尚未普及，

故亦宜先製成浸劑，或煎劑，而後溶解於水，方可作成諸種水劑。其製劑處方，舉述於左。

(一)貫衆含嗽劑 *Collutori. Aspidi.*

foliant.

貫衆

三〇〇

水

一〇〇〇

法將貫衆銼為粗末，投於水中煎之，而後取其溫液，即可作為含嗽料，有消炎，解毒，止血之功，對於汞毒性口腔炎等，皆可用之。

(二)鹿梨洗滌劑 *Lotiones Prunae*

calleryanae

鹿梨

五〇〇

水

一〇〇〇

法將鹿梨銼成粗末，按法煎濾，所得液體，可作疥癬洗滌料。

(三)雞腸草洗滌料 *Lotiones Triptonidis*

pedunculatae

雞腸草

五〇〇

水

一〇〇〇

法將雞腸草切碎，投於煎鍋中，加全量之水煎之；所得煎濾液體，可為手足潰爛，及濕疹等之洗滌料。

(四)楊梅洗滌液 *Lotiones Dierthillae*

楊梅

四〇〇

水

一〇〇〇

法如前述，所得煎濾之液體，可為瘰癧，癰瘍之洗滌料，有消腫，鎮痛，防腐，解毒之效。

(五)陸英溶劑 *Balnea Sambucus*

陸英

四〇〇

酒

四〇〇

水

五〇〇〇

法將陸英銼成粗末，投於水中煎之，而後煎取濾液，加以全量之酒，作為足浴湯料，可用於腳氣等，有消腫，鎮痛之功。

(六)牛扁溶劑 *Balnea Aconiti*

lycoctomi.

牛扁

五〇〇

水

八〇〇〇

法將牛扁切碎，投於水中煎濾之，而後取其溫液，以作浴湯，可用於全身濕疹，風疹，汗疹等之皮膚病。

(七)楠溶劑 *Balnea Machilif. Kammi.*

楠木

五〇〇

水

一〇〇〇

法將楠木投於水中煎濾，而壓濾之，所得液體，可作下肢浴，專治虎列拉性之腓腸筋痙攣，以及腳氣性水腫。

(八)胡麻瀉腸劑 *Clysmata Sesamum*

oriental

胡麻子煎

一〇〇〇

樟腦

〇〇

麝香

〇〇

雞蛋黃

二個

法先將胡麻子煎過，而後取其濃液，再混和其他極細等，製成乳樣劑，以作興奮性之瀉腸料。

按照劑或浸劑之處方式，皆按以上胡麻所舉列之方式相同。其胡麻以下之

(100)量，為胡麻量；又下之二〇〇
●〇量，為作煎劑時，所用之水量，其他可效做如是之法。

(九) 礪砂罌劑 *Ephedra Borax*

礪砂 八〇〇

杏仁煎(200) 二〇〇〇

法先將杏仁作成煎液，而後溶化礪砂，即可用之。(按罌劑之用法，即以布片或綿紗浸藥液，貼於皮膚者是；但此法隨其局部之需要，可分為涼罌及熱罌之二法。)

(十) 樹膠膏 *Mythana Glycerus dentata*

樹皮煎(200) 一〇〇〇

右按前法，作成煎液，而後浸漬於棉

布，即可用為罌法，有止血，收斂，殺菌之功能。

(十一) 芥子巴布劑 *Cataplasmat Sinapi*

sinapis

芥子末 三〇〇

胡麻子末 三〇〇

法將芥子末等混和，加以熱湯拌攪之，至成濃粥為度，乘溫之際，用紙包裹之，貼於患處，有引赤，消炎之功效。

(十二) 單軟膏 *Unguentum Simplex*

黃蠟 五〇〇

胡麻子油 一〇〇〇

法取黃蠟及胡麻子油，投入蒸發皿器中，置於重湯煎上，加熱溶化之，而後拌攪至冷度為止，即成軟膏樣之膏劑，可用為軟膏之基礎料。

(十三) 羊蹄鬪軟膏 *Unguentum*

Hyoscyami.

羊蹄鬪越幾斯 一〇〇〇

甘油 五〇〇

單軟膏 八五〇


右混和製為軟膏劑，有麻痺，鎮痛之功效。

(十四) 莨菪軟膏 *Unguentum Scopoliae*

莨菪越幾斯 一〇〇〇

豬脂 九〇〇

法先將莨菪越幾斯投於乳鉢中，加水少許，使其溶化之，而後加以豬脂煉合之，即成為軟膏也。



本辭典藥物性質分類索引

第一強壯藥		巴戟天	三九	肉蓯蓉	一二八	海參	二三八	麥芽	三二七
名稱	頁數	天門冬	四二	西洋參	一三四	桂	二四四	麥門冬	三二八
人胞	一	天靈蓋	四四	何首烏	一三五	桑寄生	二四九	無漏子	三三五
人參	二	比目魚	四五	沙參	一四一	桑螵蛸	二四九	蛤蚧	三四〇
人中白	三	水楊梅	五四	杜仲	一四三	秫米	二五五	菊花參	三四二
九香蟲	五	仙茅	六六	芍藥	一五〇	益智	二五六	菟絲子	三四四
上黨參	七	石南	八〇	乳汁	一五九	骨碎補	二七一	菴摩勒	三四七
千歲蘿	九	石斛	八二	東牆	一六八	馬鈴薯	二七七	萎蕤	三五〇
山茱萸	一三	石菖蒲	八九	糯米	一七五	高麗參	二八〇	補骨脂	三五二
大棗	一八	石鐘乳	九一	次	一八一	淡菜	二九二	絳石	三五二
大麥	一九	白朮	九一	阿膠	一八九	淫羊藿	二九二	陽起石	三五八
土茯苓	二六	甘藍	一〇	南燭	一九七	蛇床	二九九	陽起石	三五八
土荆芥	二六	列當	一四	枸杞	二〇二	紫石英	三一二	黃耆	三六一
女貞	二九	地黃	一八	柏	二〇四	連錢草	三一七	楮	三七一
丹參	三一	百合	二四	胡桃	二一二	鹿角	三二三	當歸	三七七
五加皮	三三	百脈根	二六	胡麻	二二三	鹿茸	三二三	落花生	三八四
五味子	三三	肉桂	二六	胡蘆巴	二二六	鹿角膠	三二五	零餘子	三九六

藜蘆	薏苡	龜	龍眼	龍骨	穆	積雪草	燕窩	蔓荊	蓮	蜈蚣	楞雞	饴糖	酸棗	蘇草	蒼草	鹽朮	榛	慈石	
四八三	四七五	四六八	四六五	四六四	四五二	四五二	四四五	四三八	四三五	四三三	四二八	四二五	四二二	四一八	四一七	四〇八	四〇五	四〇二	
土常山	土荆芥	土木香	土參	大麥	大黃	小薺	山檀子	山柰	刀豆	八角茴香	丁香	第二健胃藥		薤	蘿藦	鐵華粉	雞	鎮陽	覆盆子
二七	二六	二五	二四	一九	一八	一六	一四	一〇	六	五	一		五三八	五二九	五二三	四八九	四八八	四八七	
金雞勒	忽布	牡蠣	竹筍	肉蓯蓉	肉桂	伏牛草	甘藷	生薑	白薺	白朮	石斛	玉蜀黍	可樹	古倫僕	木香	水楊	方解石	天南星	
一八七	一六六	一四八	一三一	一二七	一二六	一一三	一〇九	一〇六	一〇三	九一	八二	七八	七三	七二	五六	四九	四五	四三	
馬錢子	馬鈴薯	馬藜	草薺	神麩	桂	烏梅	烏芋	苦參	胡黃連	胡椒	胡荽	柑	枸櫞	枳	昭參	括矢亞	厚朴	青鹽陳皮	
二七八	二七七	二七五	二六五	二五二	二四四	二三〇	二二九	二一九	二二五	二二四	二一四	二〇五	二〇三	二〇一	二〇〇	一九九	一九六	一九五	
檳子	酸棗	蒺藜	蒼朮	蒲公英	檳榔	葎草	當藥	黃蘗	黃連	萊菔	菖蒲	無漏子	無花果	乾薑	麥芽	菝葜	健質亞那	高良薑	
四二九	四二二	四一八	四一六	四一五	四〇五	三九〇	三七八	三六四	三六〇	三四八	三四三	三三五	三三四	三三〇	三二七	三〇五	二八一	二七九	

中華新藥物學大辭典

橘	四四七	芒硝	一五一	續隨子	五二二	朴硝	一二四	烏白木	一三二
橙	四四九	防己	一七五	第四利尿藥		西瓜	一三四	烏華烏爾矢	一三四
龍膽	四六六	羌花	一七九	三白草	七	君影草	一三六	海蛤	一三八
薄荷	四七二	胡桃	二二二	大戟	二〇	李	一四二	海葱	一三八
縮砂蜜	四七六	郁李	二二三	大蒜	二〇	杜松	一四四	海金沙	二四一
檳榔	四八〇	射干	二二七	大腹子	三三	杜衡	一四四	消石	二四三
蘆薈	五一一	旃那	二二九	水楊梅	五四	貝子	一五二	桑	二四七
第三瀉下藥									
大黃	一八	枳椇	二四三	木通	五七	車前	一五三	狼把草	二五一
大戟	二〇	粉霜	二六九	木賊	五八	赤小豆	一五六	茗	二五八
巴豆	三八	商陸	二八三	王瓜	六四	防己	一五七	茯苓	二五九
水銀粉	五四	牽牛子	二九六	冬葵	七一	松蘿	一七〇	茵陳蒿	二六〇
加斯加刺	六九	雲實	三五八	玄明粉	七五	芭蕉	一七九	粉霜	二六九
古魯聖篤	七三	蜂蜜	三八一	石葦	八一	威靈仙	一九八	馬先蒿	二七六
玄明粉	七五	鼠李	三九九	石蠅	八二	枳椇	二〇一	商陸	二八三
白蜜	九七	苳麻	四一二	石葦	八四	珍珠菜	二一〇	旋花	二八九
甘遂	一〇八	替實墻藤	四六九	白朮	九一	胡瓜	二一二	淡竹	二九一
甘露	一一一	藤黃	五〇一	白茅	九四	苦瓠	二二〇	甜瓜	二九八
朴硝	一二四	羅望子	五〇二	白冬瓜	一〇〇	郁李	二二三	蒼朮	三〇六
		蘆薈	五一一	地膚	一二〇	香蒲	二二五	通脫木	三二六

惡質	三三一	鱧站	四三一	覆麥	四八一	瓜甲	四四	地錦草	一一二
沒硫	三三六	蝸牛	四三二	蕨	五二三	水芹	四七	血竭	一一八
琥珀	三三九	蝸蠶	四三二	蠶寶	五一九	木耳	五六	羊蹄	一一〇
蘇菜	三五五	凝水石	四四三	蘭草	五二〇	木香	五六	竹茹	一一一
越瓜	三五五	燈心草	四四四	第五	收斂藥	木桂	五八	艾	一一三
越王餘算	三五五	澤漆	四四五	三七	六	木槿	五九	沒藥	一一〇
黃蜀葵	三六六	澤瀉	四四六	山茶	一〇	代赭石	六八	牡藥	一四〇
滑石	三六九	澤蘭	四四七	山櫻桃	一四	玄胡索	七六	牡蠣	一四七
檉	三七一	蕪菁	四五四	小薊	一六	石灰	七九	貝子	一五二
萹蓄	三八四	蕨	四五五	小蘗	一六	石炭	八一	赤石脂	一五六
葡萄	三八五	蕪	四五六	大薊	二一	石膽	八五	赤地利	一五七
葶草	三八八	蕪花	四五七	土骨皮	二七	白芨	九二	兒茶	一六四
菴苳	三八八	豬苓	四五九	土馬騮	二七	白芨	九四	卷柏	一六四
葶藶	三八九	龍鬚菜	四六八	女萎	三〇	白膠	九七	委陵菜	一六五
竹麥答里斯	四〇一	營實堵麻	四六九	女薊	三〇	白頭翁	一〇四	松茸	一七〇
蟾蜍	四一二	檀柳	四七〇	五倍子	三三	伏龍肝	一一四	玫瑰	一七四
蒲黃	四一五	螻蛄	四七一	五靈脂	三四	安石榴	一一七	金松	一八三
蒼朮	四一六	薇	四七三	元寶草	三六	地榆	一二〇	金魚	一八三
酸漿	四二三	鹽析木	四八一	太乙餘糧	四〇	地楊梅	一二二	金絲草	一八六

中華新藥學大辭典

桑蠶蟲	二四九	麥角	三二六	鼠尾草	四〇〇	縞砂蜜	四七六	白殭蠶	一〇五
桑茸	二四八	鹿蹄草	三三六	鉛霜	三九四	螺螄草	四七〇	白檀香	一〇五
桑花	二四八	釣樟	三一九	鉛丹	三九三	銜矛	四五七	白丁香	九九
海蟾蜍	二四二	貫衆	三一五	菖蒲	三八八	椽	四四八	木鼈子	六一
海紅	二三六	苜蓿	三〇六	楓	三七四	燕脂	四四五	水蘇	五二
烏芋	二二九	梔子	二九四	椿	三七三	醋林子	四四一	天南星	四三
拳參	二二八	梅	二九三	櫻欄	三六九	華澄茄	四三七	女青	二九
韭菜	二二三	淡菜	二九二	亂髮	三六八	箬	四三四	山蒜	一一
茄	二二一	常春藤	二八七	黃明膠	三六五	檉	四二八	鬱金	五四二
胡頹子	二一六	密陀僧	二八五	黃蘗	三六四	劉寄奴草	四二七	鐵樹	五二三
胡桃	二二二	側柏	二八一	陽起石	三五八	謁子	四二六	蠶質	五二九
禹餘糧	二二二	馬蘭	二七五	雲實	三五八	謁子	四二五	羆糞	五二四
柿	二〇八	馬勃	二七四	訶藜勒	三五六	銅綠	四二五	蘇鐵	五二二
枸橘	二〇三	骨洩波樹	二七一	猬	三三八	綠礬	四二〇	礬石	五〇九
昨葉何草	二〇〇	釜臍墨	二七〇	棠梨	三三七	蒲黃	四一五	礬石	五〇九
阿月渾子	一九一	粉錫	二六八	無漏子	三三五	蜻蛉	四一一	糖	五〇八
阿膠	一八九	草綿	二六四	無食子	三三四	椴櫚	四〇七	爐甘石	五〇七
金瘡小草	一八八	芫蕪	二六一	無花果	三三四	槐茸	四〇七	雞冠花	四九二
金蓮草	一八六	眞珠	二五五	無名異	三三三	漏蘆	四〇四	翻白草	四八三

第六刺戟藥

中華新藥學大辭典

吳茱萸	一三七	紫蘇	三二一	白芷	二九	八仙花	四	水楊梅	五四
沈香	一四〇	乾薑	三三〇	甘松	一〇七	山豆根	一三	木賊	五八
皂莢	一四九	罌粟	三三一	安息香	一一七	山慈姑	一四	木蘭	五九
芎藭	一五一	斑蝥	三三二	紅藍花	二二二	山櫻桃	一四	木芙蓉	六〇
辛夷	一五四	棠梨	三三七	茗	二五八	小蘗	一六	王瓜	六四
芥菜	一七八	煙草	三六八	馬錢子	二七八	大葷黃卷	二三	加密列	六八
附子	一九一	蜈蚣	三八二	菖蒲	三四三	五釵子	三四	玄參	七五
紅藍花	二二二	葱	三八七	煙草	三六八	升麻	三六	玄明粉	七五
韭菜	二二三	漏蘆	四〇四	葱	三八七	巴旦杏	三八	石膏	八三
食茱萸	二二六	薜蘿	四一三	樟	四二九	天雄	四一	石蕊	八五
烏頭	二三一	蒺藜	四一七	樟腦	四三〇	天仙藤	四一	石決明	八六
烏藥	二三二	豬苓	四二〇	龍腦香	四六七	天名精	四二	石龍芮	九〇
烏蘇莓	二三四	縮砂蜜	四七六	薄荷	四七二	方解石	四五	白芷	九三
桃	二四五	蟾酥	四九九	藿香	五一〇	水芹	四七	白英	九四
神麴	二五二	藤黃	五〇一	麝	五二五	水萍	四九	白鮮	九八
茗	二五八	鼓鯉	五〇三	藜香	五二九	水楊	四九	白薇	九八
桂	二六七	菴香	五一〇	靈貓香	五三五	水藻	五二	白頭翁	一〇四
側子	二八〇	蘇合香	五二三	人中黃	三	水蘇	五二	生瓜菜	一〇六
接骨木	二八八	第七興奮藥		第八解熱藥		水甘草	五三	田螺	一〇七

中華新藥物學大辭典

甘蔗	一〇九	蔞草	一八〇	烏梅	二三〇	景天	三三一	蘘菜	四三六
甘蔗	一一〇	芡實	一八一	桑	二四七	梨	三三六	蕨	四五六
甘菊花	一一二	金橘	一八四	秦皮	二五三	犀角	三三八	蠟蚧	四八二
吉祥草	一一五	金蓮花	一八七	秦艽	二五三	蒺藜	三四四	攀倒甌	四九七
地骨	一一八	金雞勒	一八七	秦椒	二五四	秦菜	三四九	蘆	五一一
地龍	一二一	青皮	一九二	荔枝	二五八	絲瓜	三五三	檉	五二九
百脈根	一二六	青蒿	一九三	刺芥	二六二	酢漿草	三五六	第九 解毒藥	
羊蹄	一三〇	青黛	一九三	刺澀	二六三	黃芩	三六〇	千金藤	八
竹筍	一三一	青葙子	一九四	草蒿	二六四	黃連	三六〇	山丹	九
西瓜	一三四	枳椇	二〇一	商蒿	二六八	黃蘗	三六四	山柰	一〇
君遷子	一三六	柴胡	二〇七	接骨木	二八八	瑤瑁	三七六	山豆根	一三
決明	一三九	柿	二〇八	梔子	二九四	蜀漆	三八〇	山慈姑	一四
防風	一五八	苦竹	二一八	甜瓜	二九八	葛	三八五	大荳	一七
宜母果	一六五	苦菜	二二〇	蛇毒	三〇一	葫蘆	三八七	大蒜	二〇
波羅蜜	一六八	苧麻	二二一	蓉菜	三〇六	葶草	三八九	土蜂	二五
東風菜	一六九	香薷	二二五	紫葳	三一〇	鉤藤	三五九	土茯苓	二六
林檎	一七一	飛廉	二二六	貫衆	三一五	槐	四〇六	女貞	二九
枇杷	一七一	夏枯草	二二七	連翹	三一七	綠豆	四一八	及己	三七
知母	一七四	烏芋	二二九	麻黃	三二九	酸漿	四二三	月季花	四六

水仙	四七	甘菊花	一一二	虎杖	一七六	鬼臼	二七二	菴萎	三四三
水蛭	四八	光明鹽	一一四	虎耳草	一七六	鬼針草	二七三	蕪菜	三四五
水銀	五〇	地蜈蚣	一一一	迎春花	一八二	馬勃	二七四	絲瓜	三五三
水苔寶	五三	灰蕪	一一三	金星草	一八五	馬齒莧	二七七	雲實	三五八
木蘭	五九	百兩金	一二五	青箱子	一九四	剪草	二八二	雄黃	三五九
木芙蓉	六〇	自然銅	一二九	枳椇	二〇一	常春藤	二八七	楊糧	三七〇
牛扁	六二	羊蹄	一三〇	柳	二〇七	硃砂根	二九七	礬砂	三七六
牛黃	六三	扶桑	一三八	柞木	二〇九	眼子菜	二九八	蜀羊泉	三八一
王不留行	六五	忍冬	一三九	秋海棠	二一一	紫荊	三〇七	萬年青	三八三
半邊蓮	七〇	決明	一三九	胡葱	二二五	紫草	三〇八	葫蘆	三八七
玄參	七五	杉	一四五	胡桐淚	二二五	紫葛	三一〇	漏蘆	四〇四
玉簪	七七	貝子	一五二	苜蓿	二二七	紫蘇	三一一	綠豆	四一八
石長生	八七	車渠	一五四	苦竹	二二八	紫金牛	三一二	銀杏	四二四
石胡荽	八八	邪蒿	一五五	苧麻	二二二	紫花地丁	三二三	鳳仙花	四二六
石龍芮	九〇	赤小豆	一五六	烏木	二二九	貫衆	三一五	蕊尾	四二六
白丁香	九九	赤地利	一五七	烏蘇莓	二三四	芫實	三三一	葦菜	四三六
白屈菜	一〇二	東風菜	一六九	狼牙	二五一	景天	三三一	樺木	四四七
白蘆葦	一〇五	松	一六九	荔枝	二五八	犀角	三三八	橄欖	四四九
甘蕉	一一〇	肥皂莢	一七五	葦葦莖	二六五	葦草	三四一	獨腳蜂	四五一

中華新藥學大辭典

燕窩	四五四	女寢	三〇	松蘿	一七〇	高麗參	二八〇	山茶	一〇
蕎麥	四五五	五味子	三二	枇杷	一七一	側柏	二八一	大豆黃卷	三三
蕁麻	四五六	天門冬	四二	芫花	一七九	旋覆花	二八九	五釵子	三四
鴨跖草	四六三	天南星	四三	前胡	一九五	款冬花	二九〇	巴旦香	三八
龍珠	四六四	仙半夏	六七	枳	二〇一	紫菀	三〇九	天名精	四二
龍葵	四六五	半夏	六九	枸櫞	二〇三	紫金牛	三一二	水藻	五二
薑黃	四七三	玉蘭花	七八	柿	二〇八	麥門冬	三二八	木芙蓉	六〇
藍靛	四八四	石蕊	八五	胡荽	二一四	麻黃	三二九	牛黃	六三
蓋草	四八五	石長生	八七	浮石	二三五	無漏子	三三五	玄參	七五
薺芩	四八五	白前	九三	海松	二三五	菊花參	三四二	石菖	八三
菴苳	四八七	甘草	一〇八	海蛤	二三八	萊菔	三四八	甘蔗	一一〇
雞腸草	四九二	吐根	一六	海藻	二四〇	葶藶	三四八	甘露	一一一
懸鉤子	五〇七	百合	一四	栝樓	二四三	遠志	四二二	甘菊	一一二
蘆	五一一	百部	二五	桑	二四七	銀杏	四二四	地骨	一一八
蘇方木	五二三	羊蹄	一三〇	桔梗	二五〇	礞砂	四五二	百合	一二四
鐵線蓮	五二三	竹瀝	一三二	狼把草	二五一	篤留樹	四五三	竹筴	一三一
第十祛痰藥		西洋參	一三四	荆瀝	二六三	蘇合香	五一一	西瓜	一三四
刀豆	六	沙參	一四一	草烏頭	二六六	瞿麥	五一四	宜母果	一六五
土木香	二五	貝母	一五二	馬兜鈴	二七六	第十一涼清藥		波羅蜜	一六八

枇杷	一七一	葛	三八五	海帶	二三七	奴栢	七四	馬蘭	二七五
金橘	一八四	零陵香	三九五	海藻	二四〇	地黃	八二	馬鞭草	二七八
青皮	一九二	澤瀉	四四六	荔枝	二五八	艾	一三三	莢蒾	三〇五
青蒿	一九三	橘	四四七	馬鞭草	二七八	杜衡	一四四	紫參	三〇八
青黛	一九三	橄欖	四四九	淡菜	二九二	牡丹	一四六	紫葳	三一〇
枳椇	二〇一	覆盆子	四八七	紫草	三〇八	芍藥	一五〇	乾漆	三三〇
枸橼	二〇三	羅望子	五〇二	連翹	三一七	芍藥	一五一	琥珀	三三九
枸橼	二〇三	榿桃	五〇八	洋蓬草	三四九	防葵	一五九	當歸	三七七
柑	二〇五	蘆	五一一	陽起石	三五八	玫瑰	一七四	蜚蠊	四〇九
素	二〇六	蠟梅	五二〇	瑞香	三七六	虎杖	一七六	蜚蠊	四〇九
胡瓜	二二二	瘦黃	五二一	蒲公英	四一五	芸香	一八一	鳳仙花	四二六
苧麻	二二二	第十二變質藥		蝮蛇	四三三	威靈仙	一九八	蓬莖茂	四三五
消石	二四三	土伏苓	二六	蕪菜	四七四	藍紅花	二二二	望雲	四五六
荆瀝	二六三	水銀粉	五四	繁縷	四七六	香附	二三四	麝香	四七一
羚羊角	三〇二	昆布	一六六	蘇方木	五二三	桃	二四五	薑黃	四七三
犀角	三三八	砒	二二一	第十三通經藥		桃榔子	二四六	瞿麥	四八一
菊	三四二	食鹽	二二六	土荆芥	二六	莖蔚	二六一	莖菜	五〇二
黃芩	三六〇	夏枯草	二二七	丹參	三一	刺三稜	二六三	蘆薈	五二二
瑤瑁	三七六	烏蛇	二三〇	王不留行	六五	青草	二六七	蘇鐵	五二二

使君子	羊蹄	百部	安石榴	白菖	石硫黃	大楓子	大蒜	第十五驅蟲藥		罌子桐	藜蘆	菴藎	銀子股	杜衡	吐根	石膽	石蒜	山慈	第十四催吐藥		狗香草	馬藜	綠香	雌黃
一六二	一三〇	二二五	一一七	九六	八九	二二	二〇	二〇	五二五	五〇〇	四二〇	三一九	一四四	一六	八五	八三	一一	一一	一一	一七三	二七五	四一九	三九七	
鬼白	秦椒	狼牙	桐	海桐	烏梅	飛廉	郁李	苦楝	苦參	胡黃連	胡葱	胡桃	相思子	砒	南瓜	阿魏	金櫻子	一八八	一八八	一七三	二八三	二八三	二八三	
二七二	二五四	二五一	二四七	二三七	二三〇	二二六	二二三	二二〇	二一九	二二五	二二五	二二二	二二一	二一一	一九七	一九〇	一八八	一八八	一八八	二二一	二二一	二二一	二二一	
樞	槿藤子	慈姑	雌黃	雷丸	鉛丹	薑蓄	蜀漆	楸	棟	雄黃	乾漆	萊蓬	蛇蛻	棧	梓	常山	藤木鳥	藤木鳥	藤木鳥	二八三	二八三	二八三	二八三	
四〇七	四〇六	四〇三	三九七	三九六	三九三	三八八	三八〇	三七二	三七〇	三五九	三三〇	三〇三	三〇〇	二九五	二九四	二八六	二八三	二八三	二八三	二八三	二八三	二八三	二八三	
雄黃	草薺茹	白屈菜	石膽	第十六腐蝕藥		鶴蝨	薤荷	櫻桃	露蜂	蘇合香	藜蘆	蟾蜍	礬石	檳榔	繁縷	術牙	蕪荑	酸模	酸模	四二二	四二二	四二二	四二二	
三五九	二六六	一〇二	八五	五二四	五二四	五二二	五一八	五一五	五一三	五〇〇	五〇〇	四九七	四八〇	四七六	四七六	四五七	四五四	四二二	四二二	四二二	四二二	四二二	四二二	
山慈	山慈	山慈	千年艾	第十八鎮痛藥		鼠婦	錦吻	葛上亭長	斑蝥	芫青	芥菜	地膽	水蛭	毛茛	大蓼	第十七引赤藥		藜	綠礬	四二〇	四二〇	四二〇	四二〇	
一一	一一	一一	八	四〇〇	四〇〇	三九四	三九四	三八六	三三二	一八〇	一七八	一一一	四八	四四	二一	五〇〇	五〇〇	四二〇	四二〇	四二〇	四二〇	四二〇	四二〇	

木天蓼	六〇	突	一八一	罌粟	五一四	曼陀羅花	二九〇	丁香	一
牛膝	六三	金雀花	一八六	續斷	五二一	蚌蟬	二九九	山柰	一〇
玉孫	六五	金銀木	一八六	第十九 鎮痙藥		蛇含	三〇〇	白芷	一〇三
古加	七二	阿魏	一九〇	天南星	四三	蛇蛻	三〇〇	白檀香	一〇五
玄胡索	七六	狼毒	二五一	木瓜	五五	羚羊角	三〇二	甘松香	一一一
白芨	九二	茵芋	二六〇	半夏	六九	貫荊	三〇四	安息香	一一七
白朮	九九	細辛	三一四	玄石	七四	菝葜	三〇五	肉桂	一二六
白屈菜	一〇二	陸英	三二〇	白芷	九二	紫石英	三一二	肉苁蓉	一二七
白頭翁	一〇四	蛞蝓	三四一	甘松	一〇七	陸英	三二〇	沈香	一四〇
合歡	一一五	蒺藜	三四四	守宮	一一六	蜈蚣	三八二	玫瑰	一七四
羊躑躅	一三〇	菴蘭	三四七	羊躑躅	一三〇	鈎藤	三九五	芸香	一八一
竹黃	一三一	葶藶	三四八	艾	一三三	蜚蠊	四一一	茉莉	二二二
決明	一三九	萎蕤	三五〇	君遷子	一三六	蒼耳	四一六	迷迭香	二六九
杜若	一四四	鈎藤	三九五	杏	一四三	銀杏	四二四	野薔薇	三八一
牡荊	一四七	葶藶	四三七	芍藥	一五〇	犛牛	四三〇	楓	三七四
赤箭	一五五	蔓椒	四三八	赤箭	一五五	蟬花	四八二	睡蓮	三七八
乳香	一五九	獨活	四五〇	忽布	一六六	蠟	四九八	薄荷	四七二
狗脊	一七二	符牀	四八〇	芸香	一八一	麗春花	五〇五	鬱金香	五四二
羌活	一七七	藥本	四八五	荆三稜	二六三	第二十 芳香藥			

