

新萬國藥方

新萬國藥方

第一編 呼吸器系諸病

第一節 鼻腔病

急性鼻加答兒 Rhinitis acuta Coryza

鼻邪、鼻塞、鼻膜加多兒、舊譯作頭風鼻塞、右有傷風感冒等名、
處置 溫保、發汗、喫烟禁止、塵埃豫防、體質療法(結核、梅毒)

一 耶僕蘭日葉 二、〇〇

● 煎煎劑
沸湯適宜浸出臨臥頓服

二 耶僕蘭日葉 五、〇〇

白葡萄酒適宜浸出八日間

濾液 二五〇、〇〇

白糖 三〇〇、〇〇

右混和每服二三食匙和溫湯服用

三 接骨木花浸(一五、〇二五〇、〇〇)

醋酸安母紐謨液 二五〇、〇〇

單舍利別 二五〇、〇〇

右每二時服一食匙

四 接骨木花浸(一〇、〇二〇〇、〇〇)

炭酸安母紐謨 一〇〇、〇〇

單舍利別 一〇〇、〇〇

右混和一日三回分服

五 接骨木花醋(一〇、〇二〇〇、〇〇)

右十日間浸出濾過每服一小

兒匙溫糖水調和服用

六 加密列花 五、〇〇

薄荷葉 五、〇〇

右浸出濾液 一五〇、〇〇

重碳酸那篤留謨 三〇〇、〇〇

右一日數回分服

● 水劑

七 撒里矢爾酸那篤留謨 二、〇〇

苦味丁幾 八滴

水 三〇〇、〇〇

右頓服

八 ● 散劑
挖汾兒氏散 〇、五〇

右臨臥頓服

九 撒里矢爾酸那篤留謨 三、〇〇

右包於「オブラート」服用

一〇 安知歇貌林 〇、二〇

乳糖 〇、五〇

右臨臥頓服

一一 安知歇貌林 一、〇〇

右臨臥頓服

急性鼻加答兒

圖書錄

| | | | | |
|-------|-----|-------------|--------|---------|
| 一六 | 一五 | 一四 | 一三 | 一二 |
| 乳糖 | 單寧酸 | ●丸劑 | 樟腦 | 安息香酸 |
| 右混和吹入 | 吹入劑 | 右爲散臨臥溫茶調和服用 | 實麥答利斯末 | 右一日六回分服 |
| 二、〇 | 五、〇 | 〇、〇、〇、〇、一 | 〇、〇、一 | 〇、五、一、〇 |
| 一五、〇 | 五、〇 | 〇、〇、一 | 〇、〇、三 | 〇、〇、三 |
| | | 〇、〇、三 | 〇、〇、三 | 〇、〇、三 |
| | | 八、〇 | | |

| | | | | | |
|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 二二 | 二一 | 二〇 | 一九 | 一八 | 一七 |
| 鹽酸古加乙澀 | 鹽酸古加乙澀 | 撒魯兒 | 次硝酸蒼鉛 | 次硝酸蒼鉛 | 咖啡末 |
| 右吹入 | 右半日間吹入 | 右混和吹入 | 單寧酸 | 亞拉比亞護謨 | 右混和吹入 |
| 〇、一 | 〇、二 | 一、〇 | 三、〇 | 一五、〇 | 〇、一 |
| 〇、二 | 五、〇 | 〇、二 | 三、〇 | 二、〇 | 五、〇 |
| | 五、〇 | 〇、一 | 〇、〇、一 | | 五、〇 |

| | | | | | |
|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------|
| 二七 | 二六 | 二五 | 二四 | 二三 | 一二 |
| 鹽酸古加乙澀 | 格魯兒酸加微謨 | 鹽酸莫兒比澀 | 鹽酸莫兒比澀 | 鹽酸古加乙澀 | 咖啡末、白糖 |
| 右吸入 | ●吸入劑 | 右二十四時間吹入 | 右混和每回吹入少量 | 右一日五回乃至十回吹入 | 右研和吹入 |
| 二〇、〇 | 五、〇 | 〇、〇、一 | 一、五 | 〇、二、五 | 各五、〇 |
| 〇、〇、〇 | 五、〇 | 四、〇 | | 〇、二、五 | |
| | 三滴 | | | 二、〇 | |

右誇十九丸每三時服一九

散劑

四五 加糖沃度鐵 五、〇

白糖

右分十包朝夕一包、癩癩葉

梅毒性

水劑

四六 沃度鐵舍利別 七、〇

單舍利別

醋酸依的兒 〇、五

右混和一日三回每回半茶匙

乃至一茶匙癩癩性

吸入劑

四七 炭酸安母緞讀 一五、〇

薄荷油

加耶布的油 十二滴

右吸入

四八 石炭酸 五、〇

酒精

安母尼亞水 一五、〇

水

右吸入

四九 石炭酸 一〇、〇

有加里油 五、〇

酒精

安母尼亞水 二〇、〇

右吸入

五〇 石炭酸 一〇、〇

的列並油

酒精 二〇、〇

安母尼亞水 一二、〇

右吸入

五一 純イヒチヲール 五、〇

依的兒、酒精

右每十分乃至十五分吸入

總球劑

五二 偏里設林 二五、〇

水

右蘸於綿球栓塞一時間

五三 ベタナフイ、ル 六、〇

クイルラヤド幾

水 二〇、〇

右液蘸於綿球插入十五分時

間

五四 ナフタリン 五、〇

スイルラヤド幾 五、〇

水 二〇、〇

右合於綿球插入十五分時

●ブージョー劑

五五 硫酸銅 〇、一〇

膠

右混和調製桿子十個為鼻

ブージョー

五六 結晶硝酸銀 〇、一〇

膠、白陶土

右混和調製桿子十個為鼻

ブージョー

五七 ●煙草劑 〇、一〇

赤硫化水銀

右和煙草吃煙

●吹入劑

五八 明礬 五、〇

亞拉比亞護讀

右混和一日二回吹入

五九 明礬 二、〇

白糖 二、〇

右一日二回吹入

六〇 格魯兒酸加留讀 二、〇

白糖 二、〇

右研和細末一日二回吹入
 但本藥研和之際違調劑法則
 有爆裂之大危險

六一 樟腦末 一〇、〇
 白糖 一〇、〇

六二 次硝酸蒼鉛 一〇、〇
 炭酸麻僂涅失亞 一〇、〇
 右研和吹入

六三 硝酸銀 〇、一、一、〇
 炭酸麻僂涅失亞 五、〇
 右研和吹入

六四 硝酸銀 〇、一、〇、五
 白陶土 一〇、〇
 右研和一日一回吹入

六五 甘汞 五、〇
 澱粉 二〇、〇
 右吹入

六六 甘汞 二、〇
 赤降汞 一、〇
 白糖 一五、〇
 右混和吹入

六七 白降汞 〇、二、五

白糖 一五、〇
 右研和吹入

六八 沃度 〇、五
 メントール 〇、五
 硼酸 二五、〇
 右吹入

六九 沃度 〇、五
 單寧酸 五、〇
 硼酸 五、〇
 右一日三回乃至六回吹入

七〇 沃度仿謨 〇、二
 亞拉比亞護謨末 一〇、〇
 右研和一日三回至五回吹入

七一 沃度仿謨 一〇、〇
 亞拉比亞護謨末 一〇、〇
 右吹入

七十二 沃度仿謨 五、〇
 安息香酸那篤留謨 五、〇
 精製的列並油 五滴
 右吹入

七三 沃度兒 一〇、〇
 右吹入

七四 撒魯兒 一、〇

撒里矢爾酸 〇、二
 單寧酸 〇、一
 硼酸 四、〇
 右吹入

七五 クレチリン 〇、一、〇、五
 硼酸 一〇、〇
 薄荷油 二十滴
 右吹入

七六 アリストール 五、〇
 右吹入

七七 タンナール 一〇、〇
 右吹入

七八 ●吸入劑 四、〇、一、〇、〇
 クレチリン 二〇〇、〇
 水 二〇〇、〇
 右吸入

七九 昇汞水 (〇、一) 一〇〇、〇
 硼酸 五、〇
 杏仁水 五、〇
 水 二五〇、〇
 右吸入

八〇 ●洗滌劑 五、〇
 格魯兒酸加留謨

| | | |
|----|---------------------------------|-------------------------------|
| 八一 | 右洗滌 格魯兒酸加留謨 偏里設林 | 五〇〇、〇 四、〇 二〇、〇 二〇〇、〇 |
| 八二 | 右混和洗滌 硼酸 格魯兒那篤留謨 | 二、五 一〇、〇 五〇〇、〇 |
| 八三 | 右洗滌 重碳酸那篤留謨水 | (一、〇)(二〇〇、〇) |
| 八四 | 右微溫洗滌 重碳酸那篤留謨 格魯兒那篤留謨 | 五、〇 一〇、〇 五〇〇、〇 |
| 八五 | 右洗滌 ● 注入劑 格魯兒酸加留謨水 | (五、〇)(五〇〇、〇) |
| 八六 | 右注入 格魯兒石灰(晒粉) | 五、〇 五〇〇、〇 |
| 八七 | 右注入 沃度 沃度加留謨 | 〇、一 二、〇 五〇〇、〇 |
| 八八 | 沃度 沃度加留謨 右注入(ルゴール氏溶液) | 〇、五 〇、一 〇、一〇、一五 |
| 八九 | 右注入 昇汞水 | (〇、一五)(三〇〇、〇) |
| 九〇 | 右注入 昇汞 偏里設林 | 〇、〇一 一〇〇、〇 一〇〇、〇 |
| 九一 | 右注入 硅酸那篤留謨(水硝子)* | 二、〇 一〇〇、〇 |
| 九二 | 右注入 蒸餾水 過滿俺酸加留謨 | 〇、二 五〇〇、〇 |
| 九三 | 右注入 醋酸羣士液(二%) | 五〇〇、〇 |
| 九四 | 右注入 格魯兒安母紐謨 炭酸那篤留謨 石炭酸 | 一〇、〇 一五、〇 六滴 |
| 九五 | 右為一分以五分之微溫湯和而注入之 抱水格魯刺兒 | 一、〇 一〇〇、〇 |
| 九六 | 右注入 撒里矢爾酸 重碳酸那篤留謨 偏里設林 | 二、〇 三、〇 七〇、〇 七〇〇、〇 |
| 九七 | 右注入 撒里矢爾酸 硼酸那篤留謨 偏里設林 | 四、〇 六、〇 七五、〇 二〇〇、〇 |
| 九八 | 右混和每回一茶匙和一杯之水注入 知母爾 | 〇、二五 一〇〇〇、〇 |

九九 クレチリン

酒精

右以二茶匙溶於水五〇〇、〇

一、〇
一、二〇、〇

注入

●塗布劑

格魯兒酸加留謨

水 三〇、〇

右以毛筆塗布

格魯兒化亞鉛

蒸餾水 一五、〇

偏里設林

右塗布 一五、〇

昇汞 五〇、〇

右塗布

硝酸銀 二、〇

蒸餾水

右塗布 二〇、〇

硝酸銀水 (〇、六) 一〇、〇

右塗布

甘汞 一、〇

白糖

二、〇 一〇、〇

右塗布

二五 硼酸那篤留謨

偏里設林

右塗布

石炭酸

沃度丁幾

右塗布

石炭酸

レゾルチン

偏里設林

水

右塗布

ゾゾヨドル化亞鉛

蒸餾水

偏里設林

右塗布

沃度仿謨

華攝林

右爲軟膏塗布

右吹入

イヒチチール

五、〇

二五、〇

三、〇

三、〇

二〇、〇

三、〇

五〇、〇

三〇〇、〇

一、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

三〇、〇

三〇、〇

五、〇

二〇 沃度仿謨

百露拔爾撒謨

刺乃林

右塗布

三十倍硝酸銀軟膏

右塗布

炭酸安母紐謨

樟腦

刺乃林

右爲軟膏塗布

結麗阿篤曹

偏里設林軟膏*

右塗布

鹽酸古加乙涅水

右塗布

鹽酸古加乙涅

刺乃林

右爲軟膏每時塗布

蓖麻子油

酒精

五、〇

一、〇

〇、五

一〇、〇

二五、〇

五、〇

一、〇

三〇、〇

一、〇

二五、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

梅毒性鼻炎 Rhinitis syphilitica

二六 吸入其蒸氣
沃度 〇、〇五
沃度加留謨 〇、一
蒸餾水 一〇〇、〇
右注入

二九 沃度加留謨 二、五
沃度丁幾 一〇、〇
蒸餾水 一〇〇、〇
右洗滌 二、〇
沃度加留謨

蒸餾水 一、〇
豚脂 二、〇
刺乃林 一五、〇
右塗擦鼻粘膜

衄血 Epistaxis

鼻出血、古名鼻衄、又名鼻孔流血、又名鼻紅

三 處置 頭部安靜、鼻翼壓定、止血劑內服、冷水注射、收斂藥液注入、醋水注入、後鼻孔栓塞
●浸劑 (三、〇) 一〇、〇
麥角浸 一五、〇
單舍利別 右每二時服一食匙

水 右注入 五〇、〇
三 硫酸亞鉛 一、〇
明礬 二、〇
水 五〇、〇

阿仙藥丁幾 五、〇
右注入
稀醋酸 * 三〇、〇
右注入
過酸化水素水 * 一五、〇
水 一〇〇、〇

三 麥角越幾斯 〇、五
甘草蒸、甘草末 各適宜
右爲十九一日五回每回二粒

三六 硫酸亞鉛 一、〇
明礬 四、〇
水 一〇〇、〇

三三 三十倍トリアセチールクロリ ット液 三〇、〇
右注入

三三 鉛糖 〇、五
白糖 五、〇
右分十包每三時服一包

三七 明礬 二〇、〇
水 五〇、〇
右注入

三三 明礬 五、〇
●吹入劑
阿仙藥 五、〇
右混和吹入

三三 過格魯兒鐵液 五、〇
●注入劑

二六 沒食子丁幾 五、〇
右注入

三三 阿仙藥 五、〇
右混和吹入

一三

明礬

一〇、〇

右混和吹入

蒸餾水

一〇〇、〇

コロホニウム
亞拉比亞護謨

一〇、〇
一〇、〇

●塗布劑
フエリピリン一八、〇—二〇、〇

右浸於綿球鼻粘膜塗布

第一節 喉頭病

急性喉頭加答兒

Laryngitis catarrhalis acuta

氣喉炎、喉頭粘膜炎、加答兒性喉頭炎、一作急性喉頭炎、舊譯作聲脂新炎

處置

安臥、室溫調劑、輕發汗、催吐、鎮咳、蒸氣吸入、頸部卷法、水蛭貼用、賊風冷飲喫烟及發聲禁止、冰片
嚥下、溫飲料攝取

一三

●丸劑

二、〇

一三

右爲一包臨臥頓服

一四

安知歇貌林

一、〇

吐根末

一、二

重碳酸那篤留謨

二、〇

乳糖

〇、五

鹽酸莫兒比涅

〇、六

一元

右分六包一日三回每回一包

一四

精製硫黃

〇、五

兒三粒

二、五

重碳酸那篤留謨

一、〇

樟腦

〇、五

硫酸ヒニジン

二、五

白糖

一、〇

白糖

七、五

鹽酸莫兒比涅

〇、一

右分十包一日三回每回一包

一四

白糖

七、五

睡菜葉越幾斯

三、〇

重碳酸那篤留謨

〇、六

別拉敦那越幾斯

〇、一

佩里設林

五滴

白糖

〇、六

白糖

二、〇

亞爾答根末

適宜

重碳酸那篤留謨

〇、六

右分十包一日三回每回一包

二、〇

右爲五十九朝夕各二九

●散劑

〇、五

撒里矢爾酸那篤留謨

一四

重碳酸那篤留謨

二、〇

挖淘兒氏散

〇、五

右分三包一日三回每回一包

一四

重碳酸那篤留謨

〇、二

●散劑

〇、五

撒里矢爾酸那篤留謨

三、〇

重碳酸那篤留謨

〇、二

急性喉頭加答兒

| | |
|----|--|
| 一四 | 右分十包一日三回每回一包 鹽酸亞刺莫兒比涅 〇、〇一五 鹽酸莫兒比涅 〇、〇三〇 |
| 一四 | 右分三包每二時服一包 人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇 右早晨微溫湯溶解頓服 |
| 一四 | 硫酸麻個涅叟謨 一五、〇 右水適宜溶解頓服 |
| 一四 | ●吐劑 硫酸銅 〇、五 蒸餾水 六〇、〇 |
| 一四 | 單舍利別 一五、〇 右每十分時服半食匙、催吐 |
| 一五 | 連用 硫酸銅 〇、五 蒸餾水 五〇、〇 |
| 一五 | 單舍利別 二〇、〇 右每十分時服一茶匙、催吐 |
| 一五 | 連用 吐根酒 一五、〇 海葱醋蜜 * 一五、〇 |
| 一五 | 右每十分時服一茶匙、催吐 連用(乳兒) |

| | |
|----|---|
| 一五 | 吐根末 一、〇一二、〇 吐酒石 〇、〇三一〇、〇五 海葱醋蜜 * 一五、〇 |
| 一五 | 水 三〇、〇 右震盪每十分服一小兒匙 吐根浸 (〇、四)九〇、〇 |
| 一五 | 每十分時服半食匙(小兒假 性格魯布催吐藥) |
| 一五 | ●水劑 撒里矢爾酸那篤留謨 八、〇 薄荷水 六〇、〇 |
| 一五 | 水 一四〇、〇 右一日三回二日分服 |
| 一五 | 撒里矢爾酸那篤留謨 五、〇 苦味丁幾 三、〇 |
| 一五 | 水 一〇〇、〇 右每二時服一食匙 |
| 一五 | 撒里矢爾酸那篤留謨 八、〇 苦味丁幾 五、〇 |
| 一五 | ●水 ホルト酒 三〇、〇 水 二〇〇、〇 |
| 一五 | 右一日三回二日分服 亞拉比亞護謨漿 * |

| | |
|----|---|
| 一六 | 單舍利別 各一五、〇 蒸餾水 六〇、〇 |
| 一六 | 右一日六回分服 格魯兒安母紐謨 五、〇 甘草羔 五、〇 |
| 一六 | 鹽酸莫兒比涅 〇、〇三 水 一二〇、〇 |
| 一六 | 右每二時服一食匙 格魯兒安母紐謨 五、〇 吐酒石 〇、〇三一〇、〇五 |
| 一六 | 甘草羔 八、〇 茴香水 * 一五〇、〇 |
| 一六 | 右每二時服一食匙 安思香酸丁幾 五滴—三十 吐根舍利別 五、〇一八、〇 |
| 一六 | 水 一〇〇、〇 右每時服一茶匙(小兒) |
| 一六 | 菲沃斯越幾斯 〇、二 亞拉比亞護謨漿 * 二〇、〇 |
| 一六 | 杏仁水 五、〇 單舍利別 三〇、〇 |
| 一六 | 右每二時服一茶匙 菲沃斯越幾斯 〇、二 |

| | |
|--------------|------|
| 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇五 |
| 亞拉比亞護謨漿 * | 七、〇〇 |
| 扁桃舍利別 * | 二、〇〇 |
| 右每二時服一茶匙、咳嗽 | |
| 鹽酸亞刺莫兒比涅 | 〇、〇五 |
| 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇三 |
| 水 | 二、〇〇 |
| 稀鹽酸 | 〇、〇五 |
| 亞爾答舍利別 | 三、〇〇 |
| 右每二時服一食匙 | |
| 貌魯謨加僧謨 | 二、〇〇 |
| 鹽酸規尼涅 | 〇、〇三 |
| 單舍利別 | 一、〇〇 |
| 水 | 一、〇〇 |
| 右一日三回分服 | |
| 重碳酸那篤僧謨 | 二、〇〇 |
| 沃度加僧謨 | 一、〇〇 |
| 苦味丁幾 | 二、〇〇 |
| 水 | 一、〇〇 |
| 右一日三回分服 | |
| 硼酸那篤僧謨 | 一、五〇 |
| 單舍利別 | 三、〇〇 |
| 右每時服一食匙水適宜調和 | |

| | |
|-----------------|--------------|
| 服用 | |
| ● 浸煎劑 | |
| 耶僕蘭日葉浸(三、〇)五〇、〇 | |
| 右頓服 | |
| 接骨木花浸 | (二、〇、〇)一五〇、〇 |
| 醋酸安母紐謨液 | 二五、〇 |
| 橙皮舍利別 | 二五、〇 |
| 右每二時服一食匙 | |
| 亞兒答煎 * | 一五〇、〇 |
| 格魯兒安母紐謨 | 五、〇 |
| 阿片丁幾 | 〇、〇五 |
| 橙皮舍利別 | 二〇、〇 |
| 右每二時服一食匙、咳嗽 | |
| 亞爾答根煎 * | 一〇〇、〇 |
| 格魯兒安母紐謨 | 一、〇 |
| 單舍利別 | 一〇、〇 |
| 右每時服一茶匙 | |
| 亞爾答根煎 | (一〇、〇)二〇〇、〇 |
| 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇三 |
| 單舍利別 | 一五、〇 |
| 右每二時服一食匙 | |

| | |
|-------------|-------------|
| 攝涅瓦浸 | (八、〇)二〇〇、〇 |
| 杏仁水 | 八、〇〇 |
| 單舍利別 | 一五、〇 |
| 右一日六回二日分服 | |
| 吐根浸 | (〇、三)一八〇、〇 |
| 阿片丁幾 | 五、〇 |
| 單舍利別 | 一〇、〇 |
| 右每二時服一食匙 | |
| 吐根浸 | (〇、五)一五〇、〇 |
| 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇三 |
| 茴香舍利別 * | 三〇、〇 |
| 右每二時服一食匙、咳嗽 | |
| 吐根浸 | (〇、一五)一〇〇、〇 |
| 炭酸加僧謨 | 〇、五十一、〇 |
| 單舍利別 | 一五、〇 |
| 右每二時服一茶匙 | |
| 吐根浸 | (一、〇)二〇〇、〇 |
| 覆盆子舍利別 * | 二、〇〇 |
| 右每二時服一食匙 | |
| 吐根浸 | (〇、六)一八〇、〇 |
| 單舍利別 | 一五、〇 |
| 安母尼亞茴香精 | 四、〇 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 二支 | 右每二時服一食匙、祛痰 吐根浸 (〇、六) 一八〇、〇 重炭酸那篤留謨 四、〇 單舍利別 一五、〇 右每二時服一食匙、祛痰 | 安母尼亞茴香精 二、〇 鹽酸亞刺莫兒比涅 〇、〇三 鹽酸 〇、〇二 亞爾答舍利別 二〇、〇 右每二時服一茶匙(小兒) | 右為乳劑每一時服一食匙 自鑿粟子乳劑 二〇、〇 鹽酸莫爾比涅 〇、〇三 扁桃舍利別 二〇、〇 右每二時服一食匙 |
| 二五 | 吐根浸 (〇、三) 一〇〇、〇 菲沃斯越幾斯 〇、一 覆盆子舍利別 一〇、〇 右每時服一小兒匙(小兒) | ●乳劑 一二〇、〇 扁桃乳劑 * 四、〇 杏仁水 〇、二 菲沃斯越幾斯 三〇、〇 扁桃舍利別 * 一〇、〇 右每二時服一食匙 | ●滴劑 〇、〇五 鹽酸莫兒比涅 一〇、〇 杏仁水 一〇、〇 右每二時服十滴 |
| 二八 | 吐根浸 (〇、三) 一〇〇、〇 菲沃斯越幾斯 〇、二 單舍利別 一〇、〇 右混和一日三回分服 | 扁桃乳劑 * 一〇〇、〇 杏仁水 二十滴 吐根舍利別 一〇、〇 右每時服一茶匙 | 鹽酸莫兒比涅 〇、一 杏仁水、蒸餾水 各二五、〇 右每服十五滴乃至二十滴 |
| 二二 | 吐根浸 (〇、三) 一〇〇、〇 印度大麻越幾斯 * 〇、一 亞爾答舍利別 一〇、〇 右每時服一小兒匙(小兒) | 扁桃乳劑 * 九〇、〇 吐酒石 〇、〇四 單舍利別 一〇、〇 右服一茶匙至吐休止 | 鹽酸莫兒比涅 〇、一 杏仁水、蒸餾水 各一〇、〇 右一日三回每回十滴—二十滴 |
| 二五 | 吐根浸 (〇、二) 一〇〇、〇 | 甘扁桃油 一〇、〇 亞拉比亞謨謨 五、〇 單舍利別 一五、〇 水 二〇、〇 | 別拉敦那越幾斯 〇、二五 杏仁水 一五、〇 右一日三回每回二十滴—三十滴 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|------------------|----------|------------|----|--------------|----------------|
| 一五 | 菲沃斯越幾斯 | 一、〇 | 薄荷油 | 三滴 | 二〇 | 硝酸銀 | 〇、〇二一、〇 |
| | 佩里設林 | 五、〇 | 水 | 二五〇、〇 | 二〇 | 蒸餾水 | 一〇〇、〇 |
| | 安母尼亞茴香精 | 一〇、〇 | 右吸入 | | 二〇 | 右吸入 | |
| | 右一日四回每回十五滴 | | 醋酸安母紐謨 | 〇、六一六、〇 | 二〇 | 昇汞水 | (〇、二一〇、二)一〇〇、〇 |
| | ●吸入劑 | | 水 | 二〇〇、〇 | 二〇 | 右吸入 | |
| 一五 | 重碳酸那篤留謨水 | (〇、五)一〇〇、〇 | 右吸入 | | 二〇 | 單寧酸 | 五、〇一、〇〇、〇 |
| | 右吸入 | | 格魯兒安母紐謨 | 〇、三一三、〇 | 二〇 | 佩里設林 | 五〇〇、〇 |
| 一六 | 重碳酸那篤留謨二、〇一六、〇 | 二〇〇、〇 | 水 | 一〇〇、〇 | 二〇 | 右一回吸入十滴乃至二十滴 | |
| | 蒸餾水 | 二〇〇、〇 | 右吸入 | | 二〇 | 亞爾答根煎 | (二〇、〇)一五〇、〇 |
| 一七 | 食鹽、重碳酸那篤留謨各二、〇 | 三〇〇、〇 | 醋酸礬土水 | (一、〇)三〇〇、〇 | 二〇 | 右吸入 | |
| | 蒸餾水 | 三〇〇、〇 | 右吸入 | | 二〇 | 的列並油 | 〇、五一二、〇 |
| 一八 | 食鹽水 | (一、〇一六、〇)(二〇〇、〇) | 硼酸那篤留謨 | 五、〇 | 二〇 | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 右吸入 | | 撒里矢爾酸 | 〇、五 | 二〇 | 右振盪吸入 | |
| 一九 | 格魯兒酸加留謨水 | (二、〇)二〇〇、〇 | 水 | 二〇〇、〇 | 二〇 | メントール | 二、〇一五〇、〇 |
| | 右吸入 | | 右吸入 | | 二〇 | 佩里設林 | 一〇〇〇、〇 |
| 二〇 | 格魯兒酸加留謨 | 五、〇 | 過格魯兒鐵液 | 〇、〇三一〇、三 | 二〇 | 右シユライメル氏裝置吸入 | |
| | 杏仁水 | 五、〇 | 水 | 一〇〇、〇 | 二〇 | 鹽酸古加乙涅 | 〇、二一〇、四 |
| | 鹽酸古加乙涅 | 〇、二五 | 右吸入、血性喀痰 | 一〇〇、〇 | 二〇 | 水 | 一〇〇〇、〇 |
| | | | | | 二〇 | 右吸入 | |
| | | | | | 二〇 | 鹽酸古加乙涅 | 〇、二五一〇、五 |
| | | | | | 二〇 | 蒸餾水 | 二五〇、〇 |

急性喉頭加答兒

| | | | |
|----|---------|--------------|---------------|
| 二六 | 杏仁水 | 右吸入 | 三、〇 |
| | 水 | 右吸入 | 一〇〇、〇 |
| 二七 | 鹽酸莫兒比涅 | 〇、一、〇、五 | 一五、〇 |
| | 偪里設林 | 右一回吸入十滴乃至二十滴 | 〇、五、一、〇 |
| 二八 | 阿片丁幾 | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 右吸入 | 阿片越幾斯 | 〇、〇、一、〇、一 |
| 二九 | 阿片越幾斯 | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 右吸入 | 菲沃斯越幾斯 | 〇、〇、五、一、〇、二 |
| 三〇 | 菲沃斯越幾斯 | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 右吸入 | 別拉敦那越幾斯 | 〇、〇、一、〇、〇、五 |
| 三一 | 別拉敦那越幾斯 | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 右吸入 | 葛陀羅華越幾斯 | 〇、〇、一、〇、一、〇、一 |
| 三三 | 葛陀羅華越幾斯 | 水 | 一〇〇、〇 |

| | | | |
|----|---------|---------------|-------------|
| 三三 | 貌魯謨加留謨 | 右吸入 | 一、〇、一、五、〇 |
| | 水 | 右吸入 | 一〇〇、〇 |
| 三四 | 貌魯謨 | 〇、二 | 〇、二 |
| | 貌魯謨加留謨 | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 右吸入 | 貌魯謨那篤留謨 | 〇、五、一、五、〇 |
| 三五 | 貌魯謨那篤留謨 | 水 | 〇、一 |
| | 鹽酸莫兒比涅 | 右吸入、歇私的里性聲帶麻痺 | 二〇〇、〇 |
| 三六 | 石炭酸水 | 右吸入 | 〇、〇、五、一、〇、〇 |
| | 石炭酸 | 右吸入 | 一、〇 |
| 三七 | 石炭酸 | 貌魯謨加留謨 | 二、五 |
| | 水 | 右吸入 | 五〇〇、〇 |
| 三八 | 鹽酸莫兒比涅 | 吹入劑 | 〇、二 |
| | 明礬 | 白糖 | 二、〇 |
| | 白糖 | | 一五、〇 |

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 三九 | 鹽酸莫兒比涅 | 右研和吹入 | 〇、二 |
| | 鹽酸古加乙涅 | 白糖 | 〇、二 |
| | 白糖 | 右吸入 | 一〇、〇 |
| 四〇 | 鹽酸莫兒比涅 | 鹽酸古加乙涅 | 〇、二 |
| | 次硝酸蒼鉛 | 白糖 | 〇、二 |
| | 白糖 | 右吸入 | 〇、二 |
| 四一 | 塗布劑 | 硝酸銀水 | 〇、二、一、〇、五 |
| | 塗布劑 | 右喉頭塗布 | 〇、二、一、〇、〇、〇 |
| 四二 | 檀里設林 | 右塗布 | 二、〇、〇 |
| | 豆油 | 右塗布 | 八、〇、〇 |
| 四三 | 豆油 | 右塗布 | 一、〇、一、二、〇 |
| | 蓖麻子油 | 右頸部塗布 | 五、〇、一、〇、〇 |
| 四四 | 阿列布油 | 右三滴點入喉頭 | 四、〇 |
| | 阿列布油 | | 二、〇、〇 |

二三 貌魯謨加留謨 〇、〇一五
 鹽酸莫兒比涅 〇、〇一五
 達拉侃篤護謨末、白糖 各適宜
 右爲錠劑十個每時一個
 菲沃斯越幾斯 〇、〇二

慢性喉頭加答兒

Laryngitis catarrhalis chronica

一作慢性喉頭炎、舊譯作聲脰久炎、

二三 處置 禁止高聲長談冷飲喫烟酒類香料等其他室內清潔、頸部按摩、麻醉鎮咳、吹入、吸入或塗布
 ●散劑
 鹽酸莫兒比涅 〇、〇一
 吐根末 〇、〇二
 白糖 二、〇

乳糖 〇、〇三
 右分二包臨時服一包、鎮咳
 ●水煎劑
 人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇
 右水適宜溶解早起頓服、瀉下

單舍利別 七、五
 右一日六回分服
 芍藥根煎(一〇、〇) 一〇、〇
 格魯兒安母紐謨 二、五
 甘草羔 二、五
 右一日六回分服

二三 白糖 二、〇
 右分十包朝夕各服一包
 ユデイン 〇、一
 白糖 二、〇
 右分十包朝夕各服一包

二四 硫酸麻個涅叟謨 一五、〇
 稀鹽酸 二、〇
 水 二〇〇、〇
 右一日三回二分服、瀉下

二四 杏仁水 一〇、〇
 鹽酸莫兒比涅 〇、〇一
 右五滴乃至十五滴一回服用
 抱水格魯拉爾 二、〇
 水 六〇、〇
 單舍利別 三〇、〇
 右三回分服、催眠

二四 別拉敦那越幾斯 〇、〇一
 白糖 二、〇
 右分十包朝夕各服一包

二五 貌羅謨加留謨 一、〇
 水 一〇〇、〇
 右每二時一食匙、咽喉銳感

二五 芍藥根煎(一〇、〇) 一〇、〇
 稀鹽酸 一、五

二四 白糖 〇、〇五
 ズルフオナール 一、〇
 右臨臥頓服

二四 芍藥根煎(一〇、〇) 一〇、〇
 稀鹽酸 一、五

二四 鹽酸ヘロイン 〇、〇一

二四 芍藥根煎(一〇、〇) 一〇、〇
 稀鹽酸 一、五

二五 ナルセイ 〇、五
 稀醋酸 二十滴

慢性喉頭加答兒

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------|----|------------------------|---------------------|----|----------------------------|-------------------|----|---------------------|--------------|----|--------------------|---------------------|----|----------------------------|-------------------|----|--------------------|-----------------------|
| 二五 | 蒸餾水 亞爾答舍利別 ●吹入劑 右一日三回每服一茶匙 | 七〇、〇 三〇、〇 | 二五 | 單寧酸 乳糖 右吹入 | 一、〇—一、〇〇、〇 一〇〇、〇 | 二五 | 單寧酸 鹽酸莫爾比涅 白糖 右吹入 | 五、〇 〇、一 五、〇 | 二五 | 硫酸亞鉛 明礬 右吹入 | 〇、一 一、〇 | 二五 | 明礬 乳糖 右吹入 | 一、〇—一、〇〇、〇 一〇〇、〇 | 二五 | 明礬 別拉敦那越幾斯 白糖 右吹入 | 五、〇 〇、五 五、〇 | 二五 | 醋酸鉛 白糖 | 一、〇—一、〇〇、〇 一〇〇、〇 |
| 二五 | 硝酸銀 滑石 右研和吹入 | 〇、〇五—〇、五 一〇〇、〇 | 二五 | 亞拉比亞護謨 右吹入、梅毒性喉頭加答兒 | 一、〇 五、〇 | 二五 | 硼酸 白糖 右研和吹入 | 一〇〇、〇 一〇〇、〇 | 二五 | 貌魯謨加留謨 澱粉 右吹入 | 一、〇 一〇〇、〇 | 二五 | 托沕兒氏散 白糖 右吹入 | 二、五 二、五 | 二五 | 薄荷油 右研和吹入 | 十滴 | 二五 | クレチリン 單寧酸 白糖 | 〇、一—〇、二 五、〇 五、〇 |
| 二五 | 白糖 薄荷油 右研和吹入 | 五、〇 十滴 | 二五 | 右吹入 | 一〇〇、〇 | 二五 | 食鹽水 右吸入 | (一、〇)一〇〇、〇 | 二五 | 薄荷油 右研和吹入 | 二十滴 | 二五 | 食鹽水 右吸入 | (一、〇)二〇〇、〇 | 二五 | 薄荷油 右研和吹入 | 〇、一—〇、五 | 二五 | 薄荷油 右吸入 | 一〇〇、〇 |
| 二五 | 阿片丁幾 | 十滴—三十滴 | 二五 | 明礬 右吸入 | 〇、五—一、〇 | 二五 | 明礬水 右吸入 | (二、〇)二〇〇、〇 | 二五 | 明礬 右吸入 | 〇、五—一、〇 | 二五 | 明礬水 右吸入 | (二、〇)二〇〇、〇 | 二五 | 明礬 右吸入 | 〇、五—一、〇 | 二五 | 明礬 右吸入 | 〇、五—一、〇 |

水 右吸入 五〇、〇

二三 硫酸亞鉛 〇、〇五—〇、二五

水 右吸入 五〇、〇

二三 石炭酸水 (〇、五)二〇〇、〇

右吸入 右吸入 (一〇、〇)五〇〇、〇

二三 單寧酸水 (二、〇)二〇〇、〇

右吸入 單寧酸水 (一〇、〇)五〇〇、〇

二三 單寧酸水 (二、〇)二〇〇、〇

右吸入 單寧酸水 (一〇、〇)五〇〇、〇

二三 單寧酸水 (二、〇)二〇〇、〇

右吸入 單寧酸水 (一〇、〇)五〇〇、〇

二三 單寧酸水 (二、〇)二〇〇、〇

右吸入 單寧酸水 (一〇、〇)五〇〇、〇

二三 單寧酸水 (二、〇)二〇〇、〇

右吸入 單寧酸水 (一〇、〇)五〇〇、〇

二三 單寧酸水 (二、〇)二〇〇、〇

右吸入 單寧酸水 (一〇、〇)五〇〇、〇

二三 單寧酸水 (二、〇)二〇〇、〇

右吸入 單寧酸水 (一〇、〇)五〇〇、〇

二三 單寧酸水 (二、〇)二〇〇、〇

右吸入 單寧酸水 (一〇、〇)五〇〇、〇

二三 單寧酸水 (二、〇)二〇〇、〇

右吸入 單寧酸水 (一〇、〇)五〇〇、〇

沃度加留謨 〇、五—一、〇

水 右吸入、梅毒性喉頭加魯兒

二六 右吸入、梅毒性喉頭加魯兒

水 右吸入、梅毒性喉頭加魯兒

薄荷油 〇、一—〇、五

右吸入 薄荷油 五〇〇、〇

右吸入 薄荷油 十滴

右吸入 薄荷油 十滴

右吸入 薄荷油 十滴

右吸入 薄荷油 十滴

右吸入 薄荷油 十滴

右吸入 薄荷油 十滴

右吸入 薄荷油 十滴

右吸入 薄荷油 十滴

右吸入 薄荷油 十滴

右吸入 薄荷油 十滴

右吸入 薄荷油 十滴

右吸入 薄荷油 十滴

右吸入 薄荷油 十滴

右吸入 薄荷油 十滴

右吸入 薄荷油 十滴

右吸入 薄荷油 十滴

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

喉頭結核 喉頭勞 Tuberculosis seu Phthisis laryngitis.

處置 全身療法、攝生、藥物之吸入塗布吹入、麻酔鎮咳、咯痰檢查

吸入劑 一、〇—一、五、〇

明礬* 一〇〇、〇

水 右吸入 一〇〇、〇

水 右吸入 一〇〇、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右塗布 三、〇

二六 右吸入
格魯兒酸加留謨

水 五、〇
杏仁水 五、〇
水 二〇〇、〇

二五 右吸入
硫酸亞鉛

水 〇、二
杏仁水 五、〇
水 二〇〇、〇

二四 右吸入
硼酸那篤留謨

水 一、〇
杏仁水 五、〇
水 二〇〇、〇

二三 右吸入
重碳酸那篤留謨

水 四、〇
鹽酸莫爾比涅 〇、〇四
水 二〇〇、〇

二二 右一回吸入半量
クレチリン

水 〇、一〇、五
の列並油 五〇〇、〇
右吸入 十滴—二十滴

二一 右吸入
クレチリン

水 〇、一〇、二五
クレチリン 二〇〇、〇

薄荷水* 五〇、〇
右吸入

●吹入劑
クレチリン 〇、一—〇二、五

明礬 五、〇
白糖 五、〇

薄荷油 十滴—二十滴
右吸入

クレチリン 〇、三
次硝酸蒼鉛 五、〇
白糖 五、〇

薄荷油 十五滴
右吸入

クレチリン 〇、三
單寧酸 五、〇
白糖 五、〇

薄荷油 十五滴
右吸入

クレチリン 〇、一—〇、五
磷酸石灰 一〇、〇
右吸入

鹽酸莫兒比涅 〇、二五
硼酸 三〇、〇

三二 右吸入
鹽酸莫兒比涅 〇、一
硼酸 一、〇
乳糖 一〇、〇

右吸入
鹽酸莫兒比涅 〇、一
醋酸鉛 一〇、〇
乳糖 一〇、〇

三三 右吸入
鹽酸古加乙涅 〇、三
醋酸鉛 二、〇
白糖 八、〇

三二 右吸入
鹽酸古加乙涅 〇、一
醋酸鉛 一〇、〇
乳糖 一〇、〇

三四 右吸入
鹽酸古加乙涅 〇、二五
次硝酸蒼鉛 二、五
白糖 二、五

三五 右吸入
沃度仿謨 二、〇
硼酸 二、〇

三六 右吸入
沃度仿謨 二、〇
炭酸麻個叟謨 一〇、〇
薄荷油 三滴

右研和吹入

三七 沃度仿謨(又沃度兒) 一〇、〇
クマリレ[※] 〇、二一、一、〇

右吹入

三〇八 ●塗布劑
二十乃至九十%乳酸
右喉頭塗布、有卓效

三〇九 乳酸^{*} 二〇、〇一、五〇、〇
クンナリン 〇、二五、一〇、五
儼里設林 一〇、〇〇

水 一〇、〇〇
薄荷油 十滴—二十滴
右塗布

三〇 鹽酸莫兒比涅 〇、二五
儼里設林 一〇、〇〇
右塗布

三二 鹽酸古加乙涅 〇、二一〇、五
鹽酸莫兒比涅 〇、二一〇、二

儼里設林

水 五、〇
右塗布 五、〇

三三 鹽酸古加乙涅 五、〇
酒精、百露拔爾撒謨各 一〇、〇
薄荷油 五滴

三三 硼酸 一〇、〇
儼里設林 三〇、〇
右塗布

三四 撒里矢爾酸 一、〇
儼里設林 三〇、〇
右塗布

三五 桂皮酸[※] 一、〇
儼里設林 一〇、〇
右塗布

三六 桂皮酸[※] 一、〇
酒精 二〇、〇

右塗布

三七 沃度仿謨 二、〇
依的兒 一〇、〇
儼里設林 一〇、〇

薄荷油 十滴
右塗布

三八 石炭酸 三、〇
儼里設林 一〇〇、〇
右塗布

三九 結麗阿曹篤 〇、五一、〇
酒精 一〇、〇
儼里設林 四〇、〇
右塗布

三〇 メントール 二、〇
酒精(儼里設林、阿列布油) 二〇、〇
水 八〇、〇
右塗布

急性喉頭軟骨膜炎

Perichondritis acuta

聲門水腫

Oedema glottidis

舊譯作聲脂口腫脹、一作聲門浮腫

喉頭焮腫

Laryngitis phlegmonosa.

聲隙水腫、喉頭粘膜炎、喉頭浮腫、聲門浮腫、喉頭水腫

急性喉頭軟膏膜炎

聲門水腫

喉頭焮腫

| | | |
|------------------|--------------------------------------|-----|
| 處置 | 水塊銜合、冷水含嗽浮腫部亂戩、頸部水卷法、峻下劑投與、水蛭貼用、喉頭塗藥 | 二、〇 |
| ●下劑 | | |
| 巴豆油 | 一滴 | |
| 薄荷油糖* | 四、〇 | |
| 右分四包每二時服一包 | | |
| 巴豆油 | 一滴 | |
| 罌粟油** | 三、〇、〇 | |
| 右每服一食匙、至瀉下 | | |
| 甘汞 | 〇、二、一〇、一五 | |
| 白糖 | 一、〇 | |
| 右分三包每時服一包 | | |
| 複方旃那浸 | 九〇、〇 | |
| 硫酸那篤留謨 | 一〇、〇 | |
| 右每二時服一食匙 | | |
| 旃那葉浸(一〇、〇)一五〇、〇 | | |
| 重酒石酸加留謨 | 一〇、〇 | |
| 覆盆子舍利別** | 二〇、〇 | |
| 右隔一時間二回分服 | | |
| エラテリン** | 〇、〇五 | |
| 酒精 | 三〇、〇 | |
| 硝酸 | 〇、〇二 | |
| 右每回三十滴—四十滴糖水 | | |
| 調和服用 | | |
| 人工加兒爾斯泉鹽 | 一五、〇 | |
| 右水適宜溶解頓服、瀉下誘導 | | |
| 硫酸麻留溫叟謨 | 一五、〇 | |
| 右水適宜溶解頓服、瀉下誘導 | | |
| 藥巴爾末、甘汞 | 各〇、五 | |
| 右爲一包頓服、峻下誘導 | | |
| 藥刺巴脂、亞拉比亞護謨 | 各〇、四 | |
| 白糖 | 一、五 | |
| 右分三包每三十分服一包、峻下誘導 | | |
| ●吐劑 | | |
| 吐根浸 | (三、〇)六〇、〇 | |
| 每十分時服一食匙、催吐 | | |
| 吐根浸 | (二、〇)八〇、〇 | |
| 吐酒石 | 〇、〇二 | |
| 覆盆子舍利別** | 二〇、〇 | |
| 右每十五分服一食匙催吐連用 | | |
| 鹽酸亞刺莫兒比溫 | 〇、〇二 | |
| 蒸餾水 | 二、〇 | |
| 右半筒皮下注射、催吐 | | |
| 鹽酸亞刺莫兒比溫 | 〇、一 | |
| 水 | 八、〇 | |
| 右一筒皮下注射 | | |
| 鹽酸亞刺莫兒比溫 | 〇、一 | |
| 偏里設林 | 二、〇 | |
| 蒸餾水 | 八、〇 | |
| 右一筒皮下注射 | | |
| 鹽酸亞刺莫兒比溫 | 〇、〇五 | |
| 白糖 | 五、〇 | |
| 右分五包每十五分時服一包、催吐 | | |
| ●含嗽劑 | | |
| 杏仁水 | 六、〇 | |
| 右含嗽 | | |
| 貌魯謨加留謨 | 二〇〇、〇 | |
| 單寧酸 | 六、〇 | |
| 硼酸 | 二、〇 | |
| 鹽酸古加乙溫 | 四、〇 | |
| 偏里設林 | 〇、八 | |
| | 六〇、〇 | |

亞爾答煎 三〇〇、〇

右舍嗽

●吸入劑

食鹽水 (三、〇一五、〇)一〇〇、〇

右吸入

●吸入劑 軟酸水 (一、〇)二〇〇、〇

右吸入

單寧酸水 (一、〇)一〇〇、〇

右吸入

重曹水

(一、〇一三、〇)一〇〇、〇

右吸入

●塗布劑

硝酸銀 二、〇一三、〇

蒸餾水

右塗布

●塗擦劑

水銀軟膏 一〇、〇

別拉敦那越幾斯

右膏塗擦前頸部

沃度仿謨 二、〇

華攝林 二〇、〇

咖啡末

右塗擦喉頭外部覆以謨謨紙

巴豆油 * 一、〇

彈力古魯胃謨 *

五〇、一〇〇、〇

右塗擦喉頭外部

●腳湯劑

芥子末 五〇、〇一〇〇、〇

右調和為腳湯

格魯布性喉頭炎 *Laryngitis crouposa* Croup

馬脾風、喉頭格魯布、義膜性喉炎、喉頭義膜炎、格魯布、格羅布、喉頭實布埤里亞
處置 安臥、頸部冰卷法、小冰塊嚥下、熱蒸氣吸入、刺戟浣腸、病室換氣、食物攝生、解熱、催吐、カテーテ
ル挿入、氣管切開

●水性吐劑

硫酸銅 〇、五一、〇

水 五〇、〇

海蔥蜜 * 三〇、〇

右每十分時服一茶匙催吐連

用 硫酸亞鉛 〇、五

吐根末 一、〇

蒸餾水 九〇、〇

右振盪每十分時服一小匙

催吐連用

吐根浸 (四、〇)一〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每十五分時間服一小兒匙

催吐連用

吐酒石 〇、〇六

吐根末 二、〇

單舍利別 二五、〇

水 二五、〇

右每十分時服一茶匙催吐連

用

三五

吐酒石
亞拉比亞護膜漿

〇、二
三〇、〇

單舍利別

三〇、〇

右混 每十分時服一小兒匙

催吐連

三五

安質母尼酒

三〇、〇

右每十分時服一茶匙、一歲

小兒、催吐連用

●粉狀吐劑

三五

硫酸銅
白糖、澱粉

一、〇
各五、〇

右分十包每十分時服一包、

催吐連用

二五

硫酸銅
乳糖

〇、五
三、〇

右分五包每十分時服一包、

催吐連用

三五

吐酒石

〇、二

吐根末

三五

澱粉

一、〇
二、〇

右分四包每十分時服一包、

催吐連用

三五

吐酒石

〇、一

催吐連用

三五

吐酒石

〇、一

催吐連用

吐根末

一、五

右混和分三包每十五分時服

一包、催吐連用

三六

鹽酸亞刺莫兒比涅

〇、〇五
二、五

右分五包每十五分服一包、

白糖

催吐連用

●浸煎水劑

三五

貌魯謨加留謨

四、〇

亞兒答煎

單舍利別

一、二〇、〇
三、〇、〇

右每二時服一小兒匙

貌魯謨加留謨

三〇

貌魯謨加留謨

〇、一、一、三
四、〇

亞兒答煎

單舍利別

右每二時服一小兒匙

三一

沃度加留謨

一、五

水

單舍利別

一〇〇、〇
二〇、〇

右每二時服一小兒匙

格魯兒酸加留謨

三一

格魯水

二、〇
一五〇、〇

單舍利別

二〇、〇

右每二時服一小兒匙

三三

格魯兒酸加留謨

一〇一、三、〇
一〇〇、〇
二〇、〇

水

右每三時服一小兒匙

三四

撒里矢爾酸

一、〇
二〇、〇

水

單舍利別

二〇、〇
二〇、〇

右每一時服一小兒匙

三五

撒里矢爾酸那篤留謨

二〇一、四、〇
一〇〇、〇
二〇、〇

水

單舍利別

右每三時服一茶匙

三六

昇素

〇、〇一、〇、〇五
一〇〇、〇
一〇、〇

水

單舍利別

三七

鹽酸里母奈堙*

〇〇〇、〇一、二〇〇、〇
五、〇一、三〇、〇

酒

三一六 右一日六回二日分服
吐根浸(〇、〇五—〇、六)

杏仁水 一、〇〇—〇、〇六、〇
ポルト酒 五、〇—三、〇、〇

三九 右一日六回二日分服
勝那浸 (二、〇)—一五、〇、〇
格魯兒酸加留謨 五、〇、〇
滿那舍利別* 二、〇、〇

●散劑
沃度加留謨 〇、六—〇、六
甘汞 〇、六—〇、六
乳糖 三、〇—三、〇

三七〇 右分十包、吐後每一時服一
包
硫酸規尼涅 一、〇—二、〇
白糖 五、〇—五、〇

三七二 右分十包每二時服一包
鹽酸規尼涅 一、〇—三、〇
白糖 三、〇—三、〇

三七三 右分十包一日三回每服一包
鹽酸必魯加兒必涅 〇、〇—二、〇

白糖 〇、五
右分三包一日三回每服一包

三三四 甘汞 〇、〇—一、〇、一
乳糖 〇、五—〇、五
右混和頓服瀉下

三三五 麝香 〇、二
乳糖 一、五—一、五
右混和分五包每二時服一包

三三六 興奮
百倍鹽酸亞鉈莫兒比涅水
右半筒至一筒皮下注射、催

三三七 吐
●吸入劑
乳酸水 (三、〇)—二〇〇、〇
右吸入

三三八 吸入劑
乳酸水 (二、〇、〇)—一八〇、〇
右吸入

三三九 パパヨチン 三、〇—一五、〇
水 一〇〇、〇—一〇〇、〇
右吸入

三四〇 石水 一二、〇—一二、〇
新製蒸餾水 一〇〇、〇—一〇〇、〇
右吸入

三一 炭酸利丟謨水 (一、五)—二〇〇、〇
右吸入

三二 炭酸利丟謨水 (二、〇)—一八〇、〇
右吸入

三三 炭酸加留謨水 (二、五)—二〇〇、〇
右吸入

三四 食鹽水 (二、五)—二〇〇、〇
右吸入

三五 硼酸水(二、一四、〇)—二〇〇、〇
右吸入

三六 貌魯謨加留謨水 (二、〇)—一〇〇、〇
右吸入

三七 格魯兒安母紐謨水 一、五—一〇〇、〇
右吸入

三八 昇汞水 (〇、一)—二〇〇、〇
右吸入

三九 撒矢里爾酸 一、〇—一二、〇
水 一〇〇、〇—一〇〇、〇

格魯布性喉頭炎

| | | | | | |
|----|--|----|---|----|---|
| 三〇 | 右吸入 石炭酸水 (〇、五)一〇〇、〇 | 三六 | 右含嗽 格魯兒酸加留謨水 (八、〇)二〇〇、〇 | 四一 | 右吹入 ●吸入劑 貌魯謨加留謨、貌魯謨各〇、四 蒸餾水 一八〇、〇 右含於海綿每五分乃至十分 |
| 三一 | 右吸入 知母爾水 (一、五)一〇〇、〇 | 三七 | 右含嗽 格魯兒酸加留謨水 (一〇、〇)五〇〇、〇 | 四二 | ●塗布劑 間嗅入 乳酸 十滴—二十滴 水 一五、〇 |
| 三二 | 右吸入 メントール水 (二、五)一〇〇、〇 | 三八 | 單含 右每半時含嗽 明礬水 (二、〇)二〇〇、〇 | 四三 | 右塗布 ババヨチン 二、五 蒸餾水 五〇、〇 |
| 三三 | 右吸入 有加里油 五、〇 再餾酒精 二〇、〇 | 三九 | 右含嗽料 石炭酸 二〇、〇 再餾酒精 二〇、〇 偏里設林 五〇、〇 | 四四 | 右塗布 硝酸銀水 (一、〇)一〇、〇 右塗布 |
| 三四 | ●含嗽劑 右振盪吸入(但十四分間) 格魯兒酸加留謨水 (四、〇)二〇〇、〇 | 四〇 | 右含嗽 ●吹入劑 沃度仿謨 三、〇 乳糖 三、〇 | 四五 | 右塗布 水銀軟膏 三〇、〇—四〇、〇 |
| 三五 | 右含嗽 格魯兒酸加留謨水 (五、〇)二〇〇、〇 | | | | |

聲門痙攣 Spasmus glottidis.

胸腺喘、喉頭喘、聲門痙、聲帶筋痙、密兒刺爾喘息、小兒五痙、舊譯作聲暗口扯筋、又名小兒傷風痰喘作聲、一作哮喘、

處置 醋水拭擦、麻藥吸入、芥子精塗擦、嗅入劑、灌腸通利、冷水灌注、食事攝生、換氣保溫、湯氣發生、原因

療法(欵私的里、貧血)

●散劑

| | | |
|----|--------------|-----|
| 四〇 | 加糖沃度鐵 | 一、〇 |
| 四〇 | 白糖 | 二、〇 |
| 四〇 | 右分十包一日三回每回一包 | 〇、〇 |
| 四〇 | 加糖沃度鐵 | 一、〇 |
| 四〇 | 大黃根末 | 〇、五 |
| 四〇 | 白糖 | 二、〇 |
| 四〇 | 右分十包一日三回每回一包 | 〇、〇 |
| 四〇 | 含糖炭酸鐵 | 一、〇 |
| 四〇 | 鹽酸規尼涅 | 〇、一 |
| 四〇 | 白糖 | 五、〇 |
| 四〇 | 右分十包一日三回每回一包 | 〇、〇 |
| 四〇 | (小兒) | 〇、一 |
| 四〇 | 酸化亞鉛 | 〇、一 |
| 四〇 | 貌兒加留謨 | 一、二 |
| 四〇 | 白糖 | 一、〇 |
| 四〇 | 右分三包一日三回每服一包 | 〇、〇 |
| 四〇 | (小兒) | 〇、〇 |
| 四〇 | 貌魯謨加留謨 | 四、〇 |
| 四〇 | 鹽酸規尼涅 | 〇、三 |
| 四〇 | 白糖 | 三、〇 |
| 四〇 | 右分十包一日三回每回一包 | 〇、〇 |

| | | |
|----|------------|-------|
| 四二 | 青酸亞鉛 | 〇、〇〇五 |
| 四二 | 乳糖 | 五、〇 |
| 四二 | 右分十包每三時服一包 | 〇、〇 |

| | | |
|----|-----|---------|
| 四二 | 珊篤寧 | 〇、〇一〇〇五 |
| 四二 | 甘汞 | 〇、〇三〇〇五 |
| 四二 | 右頓服 | 〇、〇 |

| | | |
|----|--------------|---------|
| 四三 | 麝香 | 〇、二一〇〇五 |
| 四三 | 白糖 | 一、〇〇〇 |
| 四三 | 右分十包一日三回每回一包 | 〇、〇 |

| | | |
|----|---------|--------|
| 四四 | ●水劑 | 〇、五 |
| 四四 | 麝香 | 〇、五 |
| 四四 | 亞拉比亞護謨漿 | 一〇〇〇、〇 |
| 四四 | 右每時一小兒匙 | 〇、〇 |

| | | |
|----|----------|-------|
| 四五 | 麝香 | 〇、二 |
| 四五 | 亞拉比亞護謨末 | 二、〇 |
| 四五 | 荷香水 | 三〇〇、〇 |
| 四五 | 單舍利別 | 三〇〇、〇 |
| 四五 | 右每二時服一茶匙 | 〇、〇 |

| | | |
|----|-----------|---------|
| 四六 | 麝香 | 〇、一〇〇、二 |
| 四六 | 亞拉比亞護謨 | 二、〇 |
| 四六 | 單舍利別、荷香水 | 各三〇〇、〇 |
| 四六 | 琥珀酸、安母紐謨液 | 一、〇 |

| | | |
|----|---------------|----------|
| 四七 | 右混和每二時一茶匙(小兒) | 〇、二一〇、二五 |
| 四七 | 別刺敦那越幾斯 | 二五、〇 |

| | | |
|----|-------------|------|
| 四七 | 水 | 二五、〇 |
| 四七 | 亞爾答舍利別 | 二五、〇 |
| 四七 | 右一日三回每回服一茶匙 | 〇、〇 |

| | | |
|----|----------------|-------|
| 四八 | 貌魯謨加留謨 | 九〇〇、〇 |
| 四八 | 水 | 二、〇 |
| 四八 | 右一日三回每回半食匙(小兒) | 〇、〇 |

| | | |
|----|----------|-------|
| 四九 | 貌魯謨加留謨 | 三、〇 |
| 四九 | 水 | 九〇〇、〇 |
| 四九 | 覆盆子舍利別 | 一〇〇、〇 |
| 四九 | 右每三時服一茶匙 | 〇、〇 |

| | | |
|----|---------------|---------|
| 四〇 | 貌魯謨加留謨 | 二、〇一三、〇 |
| 四〇 | 水 | 一〇〇〇、〇 |
| 四〇 | 麝香丁幾 | 一、〇一〇、〇 |
| 四〇 | 右每二時服一小兒匙(小兒) | 〇、〇 |

| | | |
|----|-----------|---------|
| 四一 | 貌魯謨加留謨 | 一、五一三、〇 |
| 四一 | 水 | 一〇〇〇、〇 |
| 四一 | 右每二時服一小兒匙 | 〇、〇 |

| | | |
|----|--------|--------|
| 四二 | 抱水格魯刺爾 | 一〇〇〇、〇 |
| 四二 | 水 | 一〇〇〇、〇 |

四三

抱水格魯刺爾 〇、五
單舍利別 三〇、〇
右一日三回每回半食匙(小兒)

四四

貌魯謨加僧謨 四、〇
抱水格魯刺爾 一、〇
水 六〇、〇
單舍利別 二〇、〇
右一日三回每回一茶匙

四五

沃度化鐵舍利別 一、〇
蒸餾水 三〇、〇
右一日三回分服(小兒)

四六

沃度鐵舍利別 五、〇
單舍利別 五〇、〇
醋酸依的兒 〇、五
右一日三回每回半茶匙乃至一茶匙

四七

沃度加僧謨 一、〇
水 九〇、〇
單舍利別 一〇、〇
右一日三回每回一茶匙

四八

アンチバスマン 一、〇

酒精* 四〇、〇
佩里設林 二〇、〇
薄荷水 四〇、〇
右每三時服一食匙

四九

●乳劑
肝油乳劑 (一〇、〇—二〇、〇) 一〇〇、〇
右一日二回每回一小兒匙

五〇

燐 八〇、〇
甘扁桃乳劑* 〇、〇一
右一日二回每回一小兒匙

五一

甘扁桃乳劑* 一二〇、〇
杏仁水 四、〇
菲沃斯越幾斯* 〇、二
扁桃舍利別 三〇、〇
右每二時服一食匙

五二

肝油 三〇、〇
右一日三回每回一茶匙

五三

肝油 一〇〇、〇
燐 〇、〇一
右一日二回每回一茶匙

五四

●丸劑
鱗草酸亞鉛 一、〇

阿魏

右爲二十九朝夕各一九、歇私的里 一、〇

四六

●滴劑
鹽酸古加乙涅 一〇、一
杏仁水 一〇、〇
右十滴乃至二十滴

四七

麝香丁幾 一〇、〇
右每二時服十滴

四八

●注射劑
鹽酸亞刺莫兒比涅 〇、〇九
稀鹽酸 五滴
蒸餾水 一〇、〇
右下注射

四九

●浣腸劑
抱水格魯刺爾 〇、二一〇、五
水 五〇、〇
右浣腸

五〇

鱗草根浸 (一〇、〇—二〇、〇) 二〇〇、〇
右灌腸

五一

鱗草根浸 (三〇、〇) 一〇〇、〇
阿魏 一、〇

四二 右洗腸

蘇草根浸 (五、〇)一〇〇、〇

阿魏 雞卵黃

〇、八 一個

右灌腸

阿魏 二、〇

加密列花浸

二、〇

四一 加密列花浸

(二、〇)一〇〇、〇

阿魏丁凝

二、〇

四〇 右灌腸(小兒)

加密列花浸

●吸入劑 右二回分洗腸

三七 鹽酸古加乙涅

水 〇、五—二、〇

喉頭潰瘍

Ulcera laryngis

四八 處置

原因檢索(梅毒、結核)吸入、吹入、塗布、腐蝕、全身療法、

右吸入

格魯兒酸加留謨水 (一、〇)〇二〇〇、〇

四九 硝酸銀水 右塗布

〇、一

啞嘶

Aphonia

失聲、失音、聲焦

聲門麻痺

失音

Aphonia paralytica

處置

電氣療法、斯篤里幾尼涅皮下注射、

喉頭微毒

Syphilis Colttidis

(一、〇—四、〇)一〇〇、〇

●吸入劑 右每次吸入一二滴

二、〇

●塗布劑

〇、五—二、〇

右塗布

右塗布

沃度加留謨

一、〇

右塗布

二、〇

嬰一

昇汞 〇、一
酒精 五〇、〇
水 二〇〇、〇

嬰二 沃度

〇、二

沃度加留謨 二、〇
佩里設林 一〇、〇
右塗布

百日咳

Tussis convulsiva Pertussis

處置 癩聲咳、癩咳、瘦咳、頓嗽、舊譯作哮喘嗽、又名時行咳嗽、又名小兒咳嗽作聲、又名連聲咳
病室南向、清氣呼吸、健兒隔離、鎮咳劑、寒冒豫防、室溫均等、滋養物、健胃強壯劑、酒精飲料

●水劑

嬰三

貌魯謨加留謨 一、〇
單舍利別 一〇、〇
水 一〇〇、〇

嬰六

貌魯謨加留謨

八、〇

印度大麻丁幾

四、〇

單舍利別

一五、〇

水

一五〇、〇

右一日三回分服

嬰四

貌魯謨加留謨 五、〇
抱水格魯刺爾 一〇、一三、〇
水 七〇、〇

嬰七

貌魯謨那篤留謨

一、〇

水

一〇〇、〇

單舍利別

一五、〇

橙皮舍利別

一〇、〇

右每二時服一茶匙

嬰八

貌魯謨那篤留謨

四、〇

貌羅謨加留謨

一、〇

抱水格魯刺爾

〇、三

杏仁水

一、〇

單舍利別

七、〇

水

一〇〇、〇

右混和每三時服一小兒匙

嬰九

貌魯謨安母紐謨

二一〇、五

水

三〇〇、〇

右每回吸入十分一乃至五分

嬰〇

別拉敦那丁幾

二〇、〇

水

五〇、〇

橙皮舍利別

一〇、〇

右每三時服一茶匙

嬰一

別拉敦那丁幾 二滴—六滴
亞拉比亞護謨漿 七〇、〇
單舍利別 一〇、〇

右每二時服一茶匙

嬰二

沃度水素酸ヒヨスチアミン

〇、〇一

水

七〇、〇

橙皮舍利別

三〇、〇

右一日一二回每回一茶匙

嬰三

鹽酸必魯加爾必涅 〇、〇二

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------------|---------|-----------|---------|
| 武蘭堉酒 | 水 | 七〇、〇 | 右一日一回乃至三回每回一茶匙 | 嬰九 | クロトンクロチアルヒドラ | 〇、二五、一〇、五 | 右一日六回乃至八回每回一茶匙乃至半食匙 | 嬰五 | 鹽酸規尼涅 | 〇、三一、一〇 |
| 橙皮舍利別 | 右每一時服一茶匙 | 二五、〇 | | 水 | 八〇、〇 | | 單舍利別、水 | 各三〇、〇 | 右一日六回二日分服 | |
| 杏仁水 | | 二、〇 | | 單舍 | 二〇、〇 | | 右一日六回二日分服 | | | |
| 亞爾答舍利別 | 右每二三時服一茶匙 | 六〇、〇 | | 水 | 〇、五 | | 硫酸規尼涅 | 〇、五一、一〇 | | |
| 苦扁桃 | | 二、〇 | | 嘔囉仿謨 | 一〇〇、〇 | | 稀硫酸 | 二、〇 | | |
| 亞爾答舍利別 | | 二五、〇 | | 水 | 二〇、〇 | | 桂皮水 | 五〇、〇 | | |
| 橙皮水 | | 一〇〇、〇 | | 單舍利別 | 二〇、〇 | | 水 | 一〇〇、〇 | | |
| 右爲乳劑每一時一食匙 | | | | 右每二時服一小兒匙 | | | 右每二時服一茶匙 | | | |
| ナルセイ | | 〇、一二 | | プロモホルム | 二十滴 | | 石炭酸 | 一、〇 | | |
| 醋酸 | | 二三滴 | | 酒精 | 一〇、〇 | | 酒精 | 一、〇 | | |
| 咖啡浸 | | 一二五、〇 | | 亞拉比亞護謨漿、單舍利別 | 各六〇、〇 | | 沃度丁幾 | 十滴 | | |
| 單舍利別 | | 二五、〇 | | 右混和每時服一茶匙 | | | 莫嚨丁幾 | 二、〇 | | |
| 右一口數回每回一茶匙 | | | | 安息香酸那篤留謨 | 二、〇 | | 阿片舍利別 | 一〇、〇 | | |
| 抱水格魯刺爾 | 〇、二五、一〇、五 | | | 水 | 一〇〇、〇 | | 薄荷水 | 五〇、〇 | | |
| 單舍利別 | | 二〇、〇 | | 右每二時服一小兒匙 | | | 右每二時乃至三時服一茶匙 | | | |
| 水 | | 三〇、〇 | | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 一、〇 | | 石炭酸 | 〇、五 | | |
| 右每二時服一小兒匙 | | | | 水 | 一〇〇、〇 | | 酒精 | 〇、五 | | |
| 抱水格魯刺爾 | | 三、〇 | | 右每二時服一小兒匙 | | | 沃度丁幾 | 十滴 | | |
| 水 | | 一〇〇、〇 | | 鹽酸規尼涅 | 一、〇 | | 雙鸚菊丁幾 | 一、〇 | | |
| 橙皮舍利別 | | 一五、〇 | | | | | 薄荷水 | 一〇〇、〇 | | |

四七九 橙皮舍利別 一五、〇
 右每二時乃至三時服一茶匙
 レゾルチン 二、〇
 水 一〇〇、〇
 單舍利別 一五、〇
 右每三時服一小兒匙

四八〇 明礬 二、〇
 水 一〇〇、〇
 單舍利別 二〇、〇
 右每二時服一小兒匙

四八一 明礬 〇、二
 水 五〇、〇
 橙皮舍利別 五〇、〇
 右一日四回每回一小兒匙

四八二 明礬 一、五
 失鳩答越幾斯[※] 〇、六
 單舍利別 一〇、〇
 茴香水 九〇、〇
 右每六時服一小兒匙

四八三 單寧酸 一、〇
 番木鱈丁幾 一、〇
 水 一〇〇、〇
 亞爾答舍利別 二〇、〇

四八四 右每二時服一茶匙
 酒石酸ヒノリン 一、〇
 水 七五、〇
 單舍利別 七五、〇
 右每三時服一食匙

四八五 ビクリン酸安母尼亞[※] 〇、〇六
 礪砂 一、五
 水 一〇〇、〇
 右每三時服一茶匙

四八六 ツッソール(扁桃酸安知必林) 二、五
 蒸餾水 八〇、〇
 橙皮舍利別 二〇、〇
 右一日一茶匙乃至二茶匙

四八七 安知必林 一、〇
 トカイ酒[※] 二五、〇
 水 二五、〇
 橙皮舍利別 五〇、〇
 右每二時服一食匙

四八九 安質母尼酒 二〇、〇
 吐根舍利別 五、〇
 右每一時服十滴

四九〇 ブロピールアミン 四、〇
 薄荷水 四五、〇
 單舍利別 一五、〇
 右一日三回每回一茶匙

四九一 プッチールクロチール[※] 〇、三
 酒精 五、〇
 酒里設林 一五、〇
 水 六〇、〇
 單舍利別 一〇、〇
 右一日三回二日分服

四九二 有加里丁幾[※] 三、〇
 酒里設林、單舍利別各一五、〇
 水 一〇〇、〇
 右每三時服一小兒匙

四九三 カスタチヤ越幾斯[※] 一〇、〇
 滿那舍利別 一〇、〇
 右每日三茶匙乃至四茶匙

四九四 硫酸銅 〇、五
 水 五〇、〇
 亞兒答舍利別 二〇、〇
 右每十五分時服一茶匙

●乳劑

四九五 重碳酸那篤留謨 一、〇

杏仁水 三、〇

扁桃乳劑* 五〇、〇

右一日二回每回一茶匙

●散劑

四九六 鹽酸規尼涅 〇、五

乳糖 〇、五

右混和分三包一日二回乃至

三回每回一包

四九七 鹽酸規尼涅 〇、五

重碳酸那篤留謨 一、五

乳糖 一、五

四九八 右分十包一日三回每回一包

鹽酸規尼涅、重碳酸那篤留謨、

乳糖 各一、〇

四九九 右混和分十包每二時服一包

鞣酸規尼涅 一、〇

安知必林 一、〇

乳糖 一、〇

五〇〇 右分十包一日三回每回一包

別拉敦那根末 〇、一

乳糖 五、〇

五〇一 別拉敦那根末 〇、一

鹽酸規尼涅 一、〇

乳糖 一〇、〇

右分二十包一日二回每回一

包

五〇二 別拉敦那根末 〇、一

硫酸規尼涅 〇、五

乳糖 五、〇

五〇三 右分十包一日三回每回一包

別拉敦那根末 〇、〇二一〇、〇六

硫酸規尼涅 〇、一

乳糖 一、〇

五〇四 右分三包一日三回每回一包

別拉敦那根末 〇、一

重碳酸那篤留謨 〇、四一、五

乳糖 二、〇一三、〇

右分八包乃至十包每三時服

一包

五〇五 別拉敦那根末 〇、〇六

吐根末 〇、〇六

乳糖 三、〇

右分六包朝夕各一包

五〇六 別刺敦那越幾斯 〇、〇三一〇、一

乳糖 三、〇

右分十包一日二回乃至三回

每回一包

五〇七 別拉敦那越幾斯 〇、〇二五

鹽酸規尼涅 〇、〇三

乳糖 三、〇

五〇八 右分三包一日三回每回一包

別刺敦那越幾斯 〇、一

亞鉛花 〇、一

五〇九 右分六包一日三回每回一包

乳糖 一、五

非沃斯越幾斯 〇、〇二

酸化亞鉛 〇、一二

乳糖 一、五

五〇〇 右分四包一日四回每回一包

印度大麻越幾斯 〇、一

吐根末 〇、〇五

乳糖 一、五

右分六包一日三回每回一包

金硫黃 〇、〇六一〇、二五

乳糖 一、〇

五元 右爲五十九一日三粒
菲沃斯越幾斯 一、〇
阿片、吐根 各〇、五

五元 甘草羔 適宜
右爲五十九一日三回每回三粒

五元 稀酒精 一〇、〇
ヒヨスチアミン 一〇、〇

五元 右發作時服五滴乃至十滴
硫酸亞篤魯必涅 〇、〇五

五元 右朝三滴夕四滴糖水點服
別拉敦那越幾斯 〇、二五
杏仁水 一五、〇

五元 右一日三回乃至四回每回五滴乃至十滴
別拉敦那丁幾 五、〇

五元 右每三時服一滴乃至三滴
麝香丁幾 三、〇

五元 右每時一滴乃至三滴
鹽酸莫爾比涅 〇、〇五

五元 杏仁水 一〇、〇
右一日數回每回二滴（一歲乃至二歲）

五元 古加丁幾 四滴乃至十五滴
右加糖水每二時一回

五元 アンチスバスマン 〇、五
杏仁水 一〇、〇
右一日三回每回二滴乃至二十滴

五元 密爾拉丁幾 五、〇
右每時五滴乃至十滴和機那酒一兒匙服用

五元 偏陣 二十滴
俾里設林 五〇、〇
薄荷油 五滴

五元 單舍利別 二〇、〇
右一日三回乃至四回每回五滴

五元 吹入劑 一〇、〇
單寧酸 一〇、〇
右吹入鼻中

五元 硝酸銀 一、〇

五元 煨性麻僱涅叟謨 一〇、〇
右研和吹入鼻中

五元 安息香酸 一〇、〇
右一日一回吹入鼻中

五元 安息香酸 二、〇
次硝酸蒼鉛 四、〇
右研和一日二回吹入鼻中

五元 安息香酸、撒里矢爾酸蒼鉛 各五、〇
硫酸規尼涅 一、〇
右一日二回吹入鼻腔內

五元 撒里矢爾酸 二、〇
鹽酸規尼涅 一、〇
白糖、重碳酸那篤留謨各〇、五

五元 右朝夕各〇、二瓦吹入咽頭
撒里矢爾酸那篤留謨 五、〇

五元 安息香酸 五、〇
硫酸規尼涅 一、〇
右研和一日二回吹入鼻中

五元 撒里矢爾酸蒼鉛 五、〇
右吹入鼻中
撒里矢爾酸蒼鉛 五、〇
滑石 二、〇

五五九 右研和吹入鼻中
鹽酸莫爾比涅 〇、〇一〇、〇一五

重炭酸那篤留謨 一五、〇

亞拉比亞護謨 〇、二五

右研和吹入

五五〇 フェナツェチン 二、〇

安知必林 二、〇

ザロール 二、〇

右一日二回吹入鼻中

五五一 硼酸末 二、〇

右每三時吹入鼻中

五五二 安息香末 二、〇

右吹入鼻腔中

●吸入劑

五五三 石炭酸 〇、五

水 一〇〇、〇

右吸入

五五四 石炭酸 一、〇一、二、〇

水 一〇〇、〇

右吸入

五五五 的列並油 二、〇

水 一〇〇、〇

五五六 右吸入
貌魯謨加留謨 三、〇

水 一〇〇、〇

右吸入

五五七 麥兒水 五〇、〇

水 五〇、〇

右吸入

五五八 硫酸規尼涅 三、〇

稀硫酸 適宜

水 一〇〇、〇

右吸入

五五九 レゾルチン 二、〇

水 一〇〇、〇

右每二時吸入

●吸入劑

五六〇 亞硝酸亞密爾 五、〇

右一乃至二滴含於布帕嗅入

五六二 貌魯謨 〇、二

貌魯謨加留謨 〇、二

水 一〇〇、〇

右含於海綿嗅入

五六三 嘔囉仿謨 三〇、〇

依的兒 六〇、〇

精製的列並油 一〇、〇

右一二茶匙含於布帕嗅入

●蒸化劑

五六一 硫黃 三〇、〇

右薰蒸用

五六四 偏陣 一五〇、〇

右一食匙灌於地板上

五六五 知母爾 一〇、〇

酒精 二五〇、〇

水 七五〇、〇

右置於磁皿熱之吸入其蒸氣

五六六 ナフタリン 二〇、〇

右炭火上一日一回蒸發

五六七 石炭酸 五、〇

酒精 五、〇

右含於海綿懸垂病室

●塗布劑

五六八 レゾルチン 二、〇

水 一〇〇、〇

右塗布咽頭

五六九 鹽酸古加乙涅 〇、六一、一、五

水 三〇、〇

右塗布咽頭

五七〇 石腦油 二〇、〇

右朝夕各半茶匙乃至一茶匙

塗布胸背

●洗腸劑

五七一 綱草浸 (五、〇)二二〇、〇

阿魏 二、〇

五七二 鷄卵黃 一個

右為乳劑二回灌腸料

●糕劑

五七三 菲沃斯越幾斯 〇、〇五

柯柯阿脂 五、〇

右為糕劑十個一日三個

五七五 ●皮下注射劑

鹽酸必普加兒必連 〇、〇〇一〇、〇一

右注射皮下

第三節 氣管枝病

急性氣管枝加答兒 Bronchitis (catarrhalis) acuta

處置 急性氣管枝炎、加答兒性氣管枝炎、舊譯作新氣管炎、又名風寒咳嗽、一作肺氣管內皮發炎 就褥安臥、暖氣攝養、防寒避塵、催吐祛痰、發汗緩下、煎藥溫服、鹽類吸入、頸部纏包、胸部溫罨、高熱則灌水、難息則芥子、虛脫則充奮

五七四 ●吐劑 吐根浸 (四、〇)六〇、〇

右每十五分時服一食匙

五七五 吐根末 三、〇

吐酒石 〇、二

右分三包每十五分時服一包

五七六 吐根末 三、〇

吐酒石 〇、三

右分三包每十分時服一包

五七七 吐根末 五、〇

吐酒石 〇、一五

右分三包為吐劑

五七八 吐根末 〇、五

吐根舍利別 五〇、〇

右每十分時服一茶匙

五七九 ●浸煎劑 耶僕蘭日葉浸(四、〇)三〇、〇

單舍利別 三、〇

右頓服

五八〇 接骨木花浸

醋酸安母尼亞液 二五、〇

橙皮舍利別 二五、〇

右每時服一食匙

五八一 亞爾答煎(一〇、〇)一〇〇、〇

吐根舍利別 二〇、〇

右每二時服一小兒匙

五八二 亞爾答煎(一〇、〇)二〇〇、〇

阿片丁幾 十滴

吐根舍利別 二〇、〇

急性氣管枝加答兒

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <p>五三 右每二時服一食匙 亞爾答煎(一〇、〇)二五〇、〇 重碳酸那篤留謨 四、〇 鹽酸莫兒比涅 〇、〇三 單舍利別 三〇、〇 每二時服一食匙</p> | <p>五四 亞兒答煎(一〇、〇)二五〇、〇 格魯兒安母紐謨 五、〇 阿片丁幾 〇、五 橙皮舍利別 三〇、〇 右每二時服一食匙</p> | <p>五五 亞爾答煎(一〇、〇)一五〇、〇 安母尼亞茴香精 六、〇 嬰粟舍利別 三〇、〇 右每二時服一食匙</p> | <p>五六 亞爾答煎(一〇、〇)一五〇、〇 安母尼亞茴香精 六、〇 安質母尼母酒 六、〇 嬰粟舍利別 三〇、〇 右每二時服一食匙</p> | <p>五七 亞兒答煎 二〇〇、〇 吐酒石 〇、〇四 單舍利別 二〇、〇</p> |
| <p>五六 右每二時服一食匙 亞兒答煎(二〇、〇)七〇、〇 ナルセイ 〇、五 稀醋酸 十滴 單舍利別 三、〇 右一日三回每回一茶匙</p> | <p>五九 攝涅瓦浸(一〇、〇)二〇〇、〇 亞爾答舍利別 二〇、〇 右每二時服一食匙</p> | <p>五九 攝涅瓦浸(二〇、〇)二〇〇、〇 亞兒答舍利別 二〇、〇 鹿角精(炭酸安門) 二、〇 右每時一食匙</p> | <p>五一 攝涅瓦浸(一〇、〇)一八〇、〇 海葱醋 一五、〇 水 二〇、〇 右每二時一食匙</p> | <p>五二 攝涅瓦浸(一五、〇)一五〇、〇 格魯兒安母紐謨 五、〇 海葱醋蜜 五〇、〇 右每二時一食匙</p> |
| <p>五四 安母尼亞茴香精 二十滴 攝涅瓦浸(五、〇)二〇、〇 安母尼亞茴香精 一、〇 單舍利別 三〇、〇 右每二時一食匙</p> | <p>五五 攝涅瓦浸(五、〇)一〇〇、〇 安母尼亞茴香精 三、〇 茴香舍利別 二五、〇 右一日三回分服</p> | <p>五六 攝涅瓦浸(五、〇)一〇〇、〇 重碳酸那篤留謨 三、〇 杏仁水 三、〇 單舍利別 一〇、〇 右一日六回分服</p> | <p>五七 攝涅瓦浸(三、〇)一五〇、〇 鹽酸亞刺莫兒比涅 〇、〇一 橙皮舍利別 一〇、〇 右每二時一食匙</p> | <p>五八 攝涅瓦浸(五、〇)一〇〇、〇 杏仁水 四、〇 稀鹽酸 一、〇</p> |

六五 吐根浸 (〇、一五)七〇、〇

ラタニヤ丁幾二十滴—三十滴

單舍利別 一〇、〇

右每二時一茶匙

六六 吐根浸 (〇、一五)七〇、〇

依的兒性格魯兒鐵丁幾

十五滴—二十滴

單舍利別 一〇、〇

右每二時一茶匙

六七 吐根浸 (〇、五)一八〇、〇

金硫黃 〇、五

單舍利別 二〇、〇

右爲振盪合劑每二時服一食匙

六八 寶麥答利斯葉浸

(〇、一〇、三)二二〇、〇

硝酸那篤留謨 二、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時服一小兒匙

六九 機那煎 (一〇、〇)一八〇、〇

格魯兒安母紐謨 六、〇

單舍利別 二〇、〇

右一日六回二日分服

六〇 クウヰルラヤ皮煎

(五、〇)一八〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每二時服一食匙

六一 クウヰルラヤ皮煎

(一、〇)一〇〇、〇

護謨舍利別 * 二〇、〇

右每二時一茶匙

●乳劑

六二 扁桃油乳劑 * 一〇〇、〇

吐根舍利別 一〇、〇

杏仁水 十五滴

右每二時一茶匙

六三 百露拔爾撒謨 五、〇

右乳劑 * 一六〇、〇

攝淨瓦舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

六四 百露拔爾撒謨 五、〇

甘扁桃油 一五、〇

亞拉比亞護謨 一〇、〇

單舍利別 五〇、〇

右水適宜爲乳劑一日數回每

回一食匙

六五 呀囉仿謨

二十滴

甘扁桃油 六〇、〇

墨粟舍利別 三〇、〇

薄荷舍利別 一五、〇

右服一茶匙

六六 ●水劑

撒里矢爾酸那篤留謨 八、〇

薄荷水 六〇、〇

水 一四〇、〇

右一日三回二日分服

六七 撒里矢爾酸那篤留謨 八、〇

水 一〇〇、〇

橙皮舍利別 一五、〇

右一日四回每回一食匙

六八 鹽酸必魯加爾必涅 〇、〇三

稀鹽酸 二滴

水 一〇〇、〇

右每時一食匙

六九 格魯兒安母紐謨 五、〇

甘草羔 二〇、〇

水 二〇〇、〇

右每二時一食匙

七〇 格魯兒安母紐謨一、〇—二、〇

| | |
|----------------|-----------|
| 水 | 一〇〇、〇 |
| 甘草羔 | 三、〇 |
| 右每二時一小兒匙(小兒) | |
| 格魯兒安母紐謨 | 三、〇 |
| 吐酒石 | 〇、〇三一〇、〇五 |
| 甘草羔 | 二、〇 |
| 水 | 二〇〇、〇 |
| 右每二時一食匙 | |
| 炭酸安母紐謨 | 一、〇一二、〇 |
| 水 | 一〇〇〇、〇 |
| 亞兒答舍利別 | 二〇〇、〇 |
| 右每二時一小兒匙(小兒) | |
| 炭酸安母紐謨 | 二、〇 |
| 吐根酒 | 二、〇 |
| 水 | 一〇〇〇、〇 |
| 單舍利別 | 二五、〇 |
| 右加稀醋水少許每時服一小兒匙 | |
| 安息香酸安母紐謨 | 五、〇 |
| 水 | 一二〇、〇 |
| 安母尼亞茴香精 | 五、〇 |
| 亞兒答舍利別 | 三〇、〇 |
| 右每時一食匙 | |

| | |
|--------------|--------|
| 琥珀酸安母紐謨液 | 一、〇 |
| メリツサ水 | 八〇、〇 |
| 單舍利別 | 二〇、〇 |
| 右每二時一食匙 | |
| 阿片安息香丁幾 | 三、〇 |
| 茴香水 | 五〇、〇 |
| 單舍利別 | 二〇、〇 |
| 右一日三回每回一茶匙 | |
| 鹽酸莫爾比涅 | 〇、〇五 |
| 蒸餾水 | 一、〇 |
| 單舍利別 | 一〇〇〇、〇 |
| 右以一茶匙加一碗水而用之 | |
| 亞拉比亞護謨漿 | 七〇、〇 |
| 鹽酸莫爾比涅 | 〇、〇〇五 |
| 右每二時一茶匙(小兒) | |
| 亞拉比亞護謨漿 | 一〇〇、〇 |
| 印度大麻越幾斯 | 〇、〇五 |
| 白糖 | 一〇、〇 |
| 右咳嗽頻發時服一茶匙 | |
| 亞拉比亞護謨漿 | 七〇、〇 |
| 杏仁水 | 十滴 |
| 單舍利別 | 一〇、〇 |

| | |
|--------------|-----------|
| 右每二時服一茶匙(小兒) | |
| 菲沃斯越幾斯 | 〇、〇八一〇、一二 |
| 水 | 七〇、〇 |
| 單舍利別 | 一〇、〇 |
| 右每二時一茶匙(小兒) | |
| 菲沃斯越幾斯 | 〇、五 |
| 杏仁水 | 四、〇 |
| 重碳酸那篤留謨 | 二、〇 |
| 礆砂加茴香精 | 二、〇 |
| 單舍利別 | 七、〇 |
| 水 | 一〇〇、〇 |
| 右一日三回分服 | |
| 鹽酸亞剎莫兒比涅 | 〇、〇五 |
| 水 | 二〇〇、〇 |
| 稀鹽酸 | 五滴 |
| 右每二時服一食匙 | |
| 鹽酸亞剎莫兒比涅 | 〇、〇一 |
| 稀鹽酸 | 一、〇 |
| 單舍利別 | 三〇、〇 |
| 水 | 一二〇、〇 |
| 右每二時一食匙 | |
| 鹽酸亞剎莫兒比涅 | 一〇、〇 |

| | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| 六〇 | 三十滴 別拉敦那越幾斯 安母尼亞茴香精 | 〇、三 二、五 一五、〇 |
| 六一 | 右每三時服十滴乃至二十滴 別刺敦那越幾斯 杏仁水 | 〇、一 五、〇 〇、〇五 |
| 六二 | 鹽酸莫兒比涅 右一日三回咳嗽時服十五滴 杏仁水 | 〇、〇五 一〇、〇 |
| 六三 | 右每二時服十滴 菲沃斯越幾斯 杏仁水 | 〇、五 一五、〇 |
| 六四 | 右每二、三時服五滴乃至十滴 菲沃斯越幾斯 安母尼亞茴香精 | 一、〇 一五、〇 |
| 六五 | 右一日四回每回五滴乃至十滴 吐根丁幾 安母尼亞茴香精 | 一〇、〇 五、〇 |

| | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|
| 六六 | 吐根丁幾 阿片丁幾 右每二時服十二滴乃至十五滴 | 一〇、〇 一五、〇 二、〇 一三、〇 |
| 六七 | 吐酒石酒 右一日三回每回二滴乃至六滴和水服 | 五、〇 |
| 六八 | 鹽酸亞剎莫兒比涅 水 亞爾答舍利別 | 〇、〇一 一五、〇 一五、〇 |
| 六九 | 右每一時二十滴 燐酸コデイン 蒸餾水 | 〇、二五 二〇、〇 |
| 七〇 | 右一日二回每回二十滴或一筒注射皮下 麝香 炭酸安母紐謨 | 二、〇 一、〇 一〇、〇 |
| 七一 | 水 酒精 薄荷油 | 三〇、〇 二滴 |
| 七二 | 右每二時十滴和葡萄酒服 烏頭丁幾 杏仁水 | 二、〇 八、〇 |

| | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| 七三 | 右一日三回每回十滴(十歲小兒) ●散劑 撒里矢爾酸那篤留謨 | 三、〇 |
| 七四 | 右頓服 撒里矢爾酸那篤留謨 右分三包每時一包 | 四、〇 |
| 七五 | 右分十包一日三回每回一包 托勃兒氏散 白糖 | 〇、〇五 一〇、〇 二、五 |
| 七六 | 右分十包一日服二、三回 托勃兒氏散 重炭酸那篤留謨 | 二、〇 四、〇 |
| 七七 | 右分十包一日三回每回一包 安知必林 | 一、五 |
| 七八 | 右分三包一日三回每回一包 安知歇貌林 | 一、〇 |
| 七九 | 右分三包一日三回每回一包 安知歇貌林 白糖 | 〇、五 〇、三 |
| 八〇 | 右頓服 鹽酸規尼涅 右分三包一日二回每回一包 | 三、〇 |

六〇 硫酸規尼涅 〇、四一、〇

白糖 〇、〇、八

右分四包一日二回每回一包

六二 單寧酸規尼涅 〇、一五、〇、二五

右分三包一日三回每回一包

六三 金硫黃 〇、〇、一五

甘汞 〇、〇、一五

白糖 一、〇、五

右分三包每三時服一包

六四 阿片 〇、〇、三

樟腦 二、〇、〇

硝酸加價謨 五、〇、〇

右分十包一日三回每回一包

六五 菲沃斯越幾斯 〇、〇、二

白糖 三、〇、〇

右分十包每二時服一包

六六 吐根末 一、〇、〇

菲沃斯葉末 〇、〇、三

重碳酸那篤價謨 二、〇、五

茴香油糖 五、〇、〇

右分十包每三時服一包

六七 菲沃斯越幾斯 〇、〇、五

或別拉敦那越幾斯 〇、〇、三

吐根末 〇、〇、三

白糖 〇、〇、三

金硫黃 〇、〇、三

右為一包分十包每三時服一

六八 別拉敦那根末 〇、〇、五

白糖 二、〇、〇

右分五包朝晝夕三回各一包

六九 安息香酸 一、〇、五

白糖 二、〇、〇

右分十包每三時服一包

七〇 護謨散* 一、〇、〇

安息香酸 二、〇、〇

右分五包每三時服一包

七一 安息香酸 〇、〇、三

金硫黃 〇、〇、五

白糖 一、〇、〇

右分三包每三時服一包

七二 安息香酸、樟腦 各〇、一、〇、五

白糖 三、〇、〇

七三 右分十包每二時服一包 各〇、一

安息香酸、樟腦 〇、一、五

金硫黃 三、〇、〇

白糖 三、〇、〇

右分十包每二時乃至三時服

七四 安息香酸 〇、〇、三

樟腦 〇、〇、五

金硫黃 〇、〇、五

茴香油糖* 五、〇、〇

右分十包每二時服一包

七五 安息香酸 〇、〇、一

金硫黃 〇、一、五

白糖 三、〇、〇

右分十包每二時乃至三時服

七六 安息香酸 一、〇、〇

別拉敦那越幾斯 一、〇、〇

白糖 五、〇、〇

右分十包每三時服一包

七七 抱水レレピン 二、〇、〇

白糖 二、〇、〇

右分十包每二時乃至四時服

六一〇 一包
 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五
 白糖 二、〇
 右分五包每三時服一包
 六九六 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五
 白糖 二、五
 右分十包一日二回乃至三回
 每回一包(小兒)
 六九五 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五
 白糖 五、〇
 右分六包每三時乃至四時服
 一包
 七〇〇 鹽酸莫兒比涅 〇、一
 吐根末 〇、二
 重碳酸那篤留謨、白糖各五、〇
 右分十五包每三時服一包
 七〇一 燐酸コデイン 〇、〇〇〇二
 白糖 五、〇
 右分十包一日三回每回一包
 (十週小兒)
 和胸茶劑* 三〇、〇
 右朝夕二回各一椀
 ●丸劑

七〇二 吐根末 〇、二
 金硫黃 〇、三
 鹽酸莫兒比涅 〇、〇六
 右甘草羔甘草末適宜爲三十
 丸每二時服一粒
 七〇三 金硫黃 〇、二
 阿片越幾斯 〇、三
 右甘草越幾斯及白糖適宜爲
 二十九一日三回每回一九
 七〇四 鹽酸亞剎莫兒比涅 〇、〇五
 甘草末 三、〇
 甘草羔 三、〇
 右爲五十九丸每一時乃至二時
 服一丸乃至三丸
 七〇五 菲沃斯越幾斯 二、〇
 菲沃斯葉末 二、〇
 右爲三十九丸每二時服一九
 七〇六 硫酸亞篤魯比涅 〇、〇〇一
 右甘草羔適宜爲丸臨臥頓服
 安息香酸 四、〇
 土木香* 八、〇
 右甘草羔適宜爲百五十九丸
 日三回每回十九

七〇七 格魯兒安母紐謨 一、〇
 炭酸安母紐謨 一、〇
 吐根末 〇、三
 鹽酸莫兒比涅 〇、一
 右護謨藥適宜爲十九朝夕各
 一九
 七〇八 百露拔爾撒藏 六、〇
 沒藥 一、二、〇
 阿片越幾斯 二、〇
 右爲百五十九丸每二時服二丸
 コデイン 一、〇
 右甘草末及甘草越幾斯各適
 宜爲三十九丸每日服二粒乃至
 三粒
 七〇九 コデイン 〇、五一一、〇
 右亞爾答根末及單舍適宜爲
 二十九每夕服一二丸
 七一〇 燐酸コデイン 〇、二一〇、五
 右甘草末及甘草羔合爲十九丸
 一日一回每回一九
 ●錠劑
 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五
 白糖 一、〇、〇

| | | | | | |
|----|--|----|---|----|-----------------------------------|
| 七五 | 右篤拉侃篤護膜漿適宜爲錠劑十個每夕二個 硫化安質母紐膜 吐根末 白糖 右亞拉比亞護膜、橙花水適宜爲錠劑十個一日三個乃至四個 ●吸入劑 食鹽水 （一、〇、一、二、〇）一〇〇、〇 | 七二 | 右吸入 食鹽水 鹽酸莫兒比涅 右吸入料（鎮咳） 阿片丁幾水（一、〇）五〇〇、〇 | 七九 | 單寧酸水 （一、〇、一、二、〇）二〇〇、〇 |
| 七六 | 右吸入 重碳酸曹達水 （〇、五、一、一、〇）一〇〇、〇 | 七三 | 右吸入 杏仁水 水 （二、五、〇、〇） | 七八 | 右吸入 知母爾水（〇、〇、五）一〇〇、〇 |
| 七七 | 右吸入 硼酸那篤留膜水 （一、五、五、〇、〇） | 七四 | 右吸入 別拉敦那越幾斯水 （〇、一、五、〇、〇） | 七九 | 右吸入（小兒） ピリジン水 （一、〇、〇、一、〇、〇） |
| 七八 | 右吸入 安息香酸那篤留膜 水 五〇〇、〇 | 七五 | 右吸入 安母尼亞水 水 五〇〇、〇 | 八〇 | 右吸入（小兒） 右エカリーブートル 五滴 |
| 七九 | 右吸入 格魯兒安母紐膜水 （二、〇、二、〇、〇） | 七六 | 右吸入 石灰水 杏仁水 右吸入 （二、五、〇、〇） | | |
| | | 七七 | 右吸入 乳酸 水 （二、五、〇、〇） | | |
| | | 七八 | 右吸入 明礬水 （二、〇、二、〇、〇） | | |
| | | 七九 | 右吸入 右散霧吸入 （五、〇、一、〇、〇） | | |
| | | 八〇 | 右吸入 右散霧吸入 （〇、五、一、二、〇）一〇〇、〇 | | |

右合於布片吸入
薄荷油 五滴
水 一〇〇、〇
右吸入
七〇 安知必林 二、〇一四、〇
水 五、〇〇
七二 右洗腸(解熱) 十滴
的列並油
右入膠囊與五十個一日四個

慢性氣管枝加答兒
Bronchitis (catarrhalis) chronica.

舊譯作久氣管炎、又名久嗽

處置 避塵禁烟、胸部冷擦、食餌攝生、暖地靜遊、藥劑吸入、祛痰、鎮咳、誘導、健胃、強心等其他牛乳、乳清、赤酒之諸療法

●催吐劑

七三 吐根浸 (四、〇)六、〇
右每十五分時服一食匙

●浸煎劑

七四 攝涅瓦浸 (二、〇)一〇〇、〇
單舍利別 一〇、〇
右每時服一茶匙(小兒)

七五 攝涅瓦浸 (一〇、〇)七五、〇
安母尼亞茴香精 五、〇
單(亞爾答)舍利別 二〇、〇
右每二時服一食匙

七六 攝涅瓦浸(一〇、〇)二〇〇、〇
海葱醋蜜 五、〇
單舍利別 一五、〇
右每二時一食匙

七七 吐根浸 (〇、三)一〇〇、〇

七八 杏仁水 四、〇
攝涅瓦舍利別 一〇、〇
右一日三回分服

七九 吐根浸 (一、〇)一五〇、〇
杏仁水 五、〇
攝涅瓦舍利別 二〇、〇
右每二時一食匙

八〇 吐根浸 (〇、二)七〇、〇
重碳酸那篤留謨 〇、五
單舍利別 五、〇
右一日三回分服(小兒)

八一 吐根浸 (〇、五)一五〇、〇
礪砂 五、〇
安母尼亞茴香精 五、〇
單舍利別 三〇、〇
右每二時一食匙

七二 亞爾答煎(一五、〇)一五〇、〇
安質母紐謨酒 六、〇
安母尼亞茴香精 六、〇
罌粟舍利別 三〇、〇
右每二時一食匙

七三 實麥答利斯浸 (一、五)一二〇、〇
單舍利別 三〇、〇
右每二時一食匙

七四 機那煎 (二〇、〇)一八〇、〇
格魯兒安母紐謨 六、〇
單舍利別 二〇、〇
右一日六回二日分服

七五 右一日六回二日分服
クイルラヤ皮煎 (一〇、〇)一〇〇、〇
單舍利別 一〇、〇

右一日三回分服

●水劑

七五 安息香酸那篤留謨

水

薄荷水

橙皮舍利別

右每時一茶匙

七五 安息香酸安母紐謨*

水

安母尼亞尚香精

亞兒答舍利別

右每二時一食匙

七五 安息香酸那篤留謨

水

鹽酸莫兒比涅

薄荷舍利別

右每二時一食匙

七五 貌魯謨加留謨

水

安母尼亞尚香精

橙皮舍利別

五、〇

四〇、〇

四〇、〇

一〇、〇

五、〇

一、二〇、〇

五、〇

三〇、〇

四、〇

二、〇

〇、〇、三

二〇〇、〇

一五、〇

二、〇

二、〇

三、〇

一〇、〇

一〇〇、〇

七五

沃度加留謨

右每二時一茶匙

食匙溫牛乳調和服用

七五 沃度加留謨

別拉敦那越幾斯

右每二時一食匙(梅毒)

七五 沃度加留謨

阿片越幾斯

右每二時一食匙(梅毒)

七五 抱水テレンピン

酒精、薄荷舍利別、水

右一日三回每回一食匙

七五 抱水テレンピン

酒精

右一日三回每回一食匙

七五 設里酒

水

右一日三回每回一食匙

三、〇一五、〇

一五〇、〇

〇、二

六、〇一八、〇

二〇〇、〇

六、〇一八、〇

二〇〇、〇

〇、二

二〇〇、〇

二、〇

各五〇、〇

一〇、〇

一五、〇

一〇〇、〇

三〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

七五

炭酸安母紐謨

右一日三回分服

水

橙皮舍利別

右每二時一食匙

七五 吐酒石

尚香水

單舍利別

右每二時一食匙

七五 鹽酸亞刺莫兒比涅

稀鹽酸

右每二時一食匙

七五 ●乳劑

骨湃巴拔爾撒謨乳劑*

薄荷舍利別

右朝夕每二食匙

七五 油製乳劑*

印度大麻越幾斯

●散劑

別拉敦那越幾斯

二、〇

一、二〇、〇

三〇、〇

〇、一

一、二〇、〇

三〇、〇

〇、〇、六

〇、〇、五

一〇〇、〇

二、〇

(一〇、〇)二五〇、〇

二、〇

二〇〇、〇

〇、五

〇、五

〇、五

〇、五

〇、五

〇、五

〇、五

| | |
|---------------|-------|
| 金硫黃 | 〇、三 |
| 白糖 | 五、〇 |
| 右分十包一日三回每回一包 | |
| 別拉敦那越幾斯 | 〇、〇、一 |
| 金硫黃 | 〇、一 |
| 右甘草末適宜分六包二日分服 | |
| 菲沃斯越幾斯 | 〇、〇、一 |
| 乳糖 | 五、〇 |
| 右分十包一日三回每回一包 | |
| (小兒) | |
| 菲沃斯越幾斯 | 〇、〇、五 |
| 金硫黃 | 〇、五 |
| 白糖 | 五、〇 |
| 右分十五包一日三回每回一包 | |
| 菲沃斯越幾斯 | 〇、一、五 |
| 金硫黃 | 〇、一、五 |
| 乳糖 | 一、五 |
| 右分六包一日三回每回一包 | |
| 安息香酸 | 〇、〇、五 |
| 別拉敦那越幾斯 | 〇、〇、一 |
| 鹽酸莫兒比連 | 〇、〇、五 |

| | | |
|----------------|----------|-------|
| 重碳酸那篤留謨、白糖各二、〇 | 右分十包每日三包 | 一、〇 |
| 單寧酸規尼涅 | | 〇、五 |
| 安息香酸 | | 〇、二、〇 |
| 重碳酸那篤留謨、白糖各二、〇 | 右分十包一日四包 | 一、〇、〇 |
| 沒藥 | | 五、〇、〇 |
| 白糖 | | 五、〇 |
| 右爲散每三時一茶匙 | | 五、〇 |
| ナフタリン | | 五、〇 |
| 白糖 | | 一滴 |
| ベルガモツト油 | | 各五、〇 |
| 右分二十包一日五包乃至十包 | | 各三、〇 |
| 加糖碳酸鐵、白糖 | | 〇、一、二 |
| 重碳酸那篤留謨 | | 五、〇 |
| 沒藥、大黃 | | 〇、一 |
| 右一日三回每回一小刀尖 | | 〇、二 |
| 重碳酸那篤留謨 | | 〇、一 |
| 白糖 | | 〇、一 |
| 右分六包朝夕右一包 | | 〇、一 |
| 陀沕兒氏散 | | 〇、一 |
| 印度大麻越幾斯 | | 〇、一 |

| | |
|--------------------------|-------|
| 白糖 | 五、〇 |
| 右分十包一日三回每回一包 | |
| (小兒) | |
| タルピノール | 〇、〇、三 |
| 安息酸那篤留謨 | 〇、〇、三 |
| 白糖 | 一、五 |
| 右分三包每二時服一包 | |
| 磷酸コデイン | 〇、〇、二 |
| 白糖 | 三、〇 |
| 右分六包二日分服(小兒) | |
| ●丸劑 | |
| 流動麥兒 | 四、〇 |
| 黃蠟、白糖 | 各四、〇 |
| 右爲百九一日四回每回二粒 | |
| 流動麥兒 | 一、〇、〇 |
| 右尚香末碳酸麻瘋濕叟謨適宜爲百九一日一九乃至二九 | |
| 碳酸安母紐謨 | 一、五 |
| 海葱末 | 一、五 |
| 吐根末 | 四、五 |
| 右單舍利別適宜爲四十九一回二九乃至四九 | |
| 的列並的油 | 二、〇 |

炭酸麻傭涅叟謨

二、〇

右爲十九以桂皮末爲衣一日

三回每回二粒

七六

抱水テレピン

三、〇

右甘草末甘草羔適宜爲三十

丸一日三回每回二丸

七五

抱水テレピン

三、〇

右護謨末適宜爲三十九丸一日

三回每回一丸乃至四丸

七四

百露拔爾撒謨

二、〇

沒藥

四、〇

阿片越幾斯

〇、六

右爲五十九每二時服一粒

七三

攝涅瓦根末

四、〇

吐根末

〇、五

的列並油

四、〇

右亞爾答根末、亞拉比亞護

謨漿適宜爲五十九一日三回

每回一粒

七二

鹽酸アポコデイン*

〇、〇二一〇、〇六

右爲丸一日三回每回四粒

七三

ミルトール

〇、一一〇、一五

右包於膠囊作五十個每時二

個乃至三個

七三

吐酒石、阿片末

各〇、一五

右篤拉侃篤護謨及玫瑰油糖

適宜百五十九朝夕各二粒

七四

●吸入劑

一五、〇

炭酸安母紐謨

十二滴

薄荷油

十二滴

加耶布的油

十二滴

右吸入

七五

丁香油

〇、二

ラベンデル油

〇、四

ベルガモット油

一、〇

安母尼亞水

三、〇

右吸入

七六

的列並油

二、〇

右注熱湯吸入其蒸氣

七七

有加里油

一〇、〇

プミリオソ油

一〇、〇

ラベンデル油

七滴

右十二滴加熱水吸入

七八

●吸入劑

二〇〇、〇

石灰水*

右吸入

七九 重碳酸那篤留謨水

(一、〇)二〇〇、〇

右吸入

八〇 重碳酸那篤留謨

各二、〇

格魯兒那篤留謨

三〇〇、〇

水

右吸入

八一 鞣酸水 (一、〇)二〇〇、〇

右吸入

八二 明礬水 (一、〇)二〇〇、〇

右吸入

八三 明礬水 (一、〇)二五〇、〇

阿片丁幾

數滴

右吸入

八四 乳酸 二〇、〇

水 四〇〇、〇

右吸入 六、〇

八五 苦扁桃水 二〇〇、〇

水 二〇〇、〇

右吸入

八六 的列並油 五、〇

格魯兒安母紐謨 五、〇

水 五〇〇、〇

右吸入

●滴劑

的列並油

右一日三回每回十五滴和牛

乳服用

菲沃斯越幾斯

杏仁水

右每三時服十滴

曼陀羅華丁幾

硝砂加荷香精

阿片丁幾

右一日二回至三回每回十五

滴

鹽酸アボコデイン * 〇、一

水

右一日三回每回三十滴

篤留拔爾撒謨 一〇、〇

酒精 一〇〇、〇

右浸出六時間濾過一日服二

十滴乃至四十滴

骨海巴拔爾撒謨、芳香丁幾

右一日三回每回二十滴乃至

四十滴

イヒチナル

水

右一日二三回每回十五滴乃

至三十滴

●錠劑

金硫黃

右爲百個錠一日三回每回二

個

硫黃華 一〇〇、〇

白糖

九〇、〇

右篤留篤護謨適宜爲錠劑

十個一日用十個

●膠囊劑

炭酸アアペコール

右入於膠囊十個一日服四個

白糖

乃至八個

結麗阿曹篤

ミロリン

右入膠囊與二十個朝夕各一

個

ミルトール

右入膠囊朝夕各一個

●塗布劑

沃度丁幾

右塗布胸部 一五〇、〇

氣管枝膿漏 Bronchitis blennorrhoeica. Broncho-blennorrhoe.

膿漏性氣管支炎、腐敗性氣管支炎

●吸入劑

石炭酸水

右一日吸入數回

八三

結列阿曹篤

的列並油 一〇、〇

| | | | |
|--------------|------------|--------------|----------|
| 薄荷水 | 五〇〇、〇 | 沒藥 | 四、〇 |
| 右一日吸入二回 | | 單舍利別 | 一五、〇 |
| 八三 精製的列並油 | 二、〇 | 右一日四回每回一二食匙 | |
| 水 | 二〇〇、〇 | 八三 杜松質油 | 一、〇 |
| 右吸入 | | ガウルテリヤ油 | 〇、一 |
| 八三 鞣酸水 | (二、〇)二〇〇、〇 | 茴香油 | 〇、一 |
| 右吸入 | | 酒精 | 三〇〇、〇 |
| 八四 單寧酸 | 五、〇 | 水 | 二〇〇、〇 |
| 麥兒水* | 一〇〇、〇 | 右每服一茶匙乃至一食匙 | |
| 水 | 五〇〇、〇 | 八元 的列並油 | 三十滴 |
| 右吸入 | | 重碳酸那篤留謨 | 三、〇 |
| 八五 有加里油 | 一五、〇 | 赤葡萄酒 | 五〇、〇 |
| 精製的列並油 | 五、〇 | 單舍利別 | 三〇、〇 |
| ラベンデル油 | 十滴 | 水 | 一五〇、〇 |
| 右十二滴加熱水吸入 | | 右一日六回分服 | |
| ●水劑 | | 散劑 | |
| 八六 鉛糖水 | (〇、三)三〇〇、〇 | 八三 蜜兒拉 | 一〇、〇 |
| 右每二時一食匙 | | 白糖 | 五〇、〇 |
| 八七 硫酸鐵 | 一、二五 | 右每三時半食匙 | |
| 炭酸加留謨 | 一、五 | 八三 ミルトール | 〇、二一〇、一五 |
| 薄荷水 | 二五〇、〇 | 白糖 | 適宜 |
| 八三 ●丸劑 | 右一日數回分服 | 八三 鞣酸 | 三、〇 |
| 右為百丸一日三回每回七粒 | | 右葛斯加利刺越幾斯適宜為 | |
| 八四 硫酸酸化鐵 | 一五、〇 | 三十九每一時服一粒 | |
| 炭酸加留謨 | 一五、〇 | 護謨安母尼亞幾、大黃末 | 各五、〇 |
| 右篤拉侃篤護謨適宜為百丸 | | 八三 精製的列並油 | 一、五 |
| 以桂皮末為衣一日三回每回 | | 右入膠囊一日三回分服 | |
| 三丸 | | 八六 嬰菓子乳劑* | 二二〇、〇 |
| 八五 百露拔爾撒謨 | 四、〇 | 右每三時振盪服一食匙 | |

膿潰性氣管枝炎

Bronchitis putrida

八毫 過滿倫酸加儲護水

(一、〇)二〇〇、〇

右吸入

八毫 精製的列並油

二、〇〇、〇

右吸入

八毫 鹽酸規尼涅

右甘草蒸適宜為三十九丸一日
三回每回一粒

三回每回一粒

八毫 醋酸鉛

〇、一二
二、〇〇

白糖
右分四包一日四回每回一包

八毫 石炭酸

二、〇〇

亞拉比亞護膜漿、單舍利別
各五〇、〇

卵黃

右為乳劑一日三回每回半食
匙

格魯布性氣管枝炎

纖維性氣管枝炎

Bronchitis crouposa seu fibrinosa

八毫 石炭酸水

(一、〇)一〇〇、〇

右吸入

八毫 明礬水

(一、〇)二〇〇、〇

右吸入

八毫 鞣酸水

(一、〇)二〇〇、〇

右吸入

八毫 乳酸

二〇〇、〇

右吸入

八毫 炭酸利丟謨

一、〇〇、〇

水

八毫 攝涅瓦浸

(八、〇)一五〇、〇

安母尼亞尚香精

四、〇〇

橙皮舍利別
右每二時服一食匙

三〇、〇〇

吐根浸

(〇、五)一五〇、〇

杏仁水
單舍利別
右每二時服一食匙

三〇、〇〇

吐根浸
每十分時服一食匙(催吐)

(四、〇)六〇、〇

八毫

八毫 鹽酸必魯加兒必涅

〇、〇二

水
右每一時服一食匙

沃度加儲謨

四、〇〇

單舍利別
右每二時服一食匙

二〇〇、〇

水
鹽酸亞刺莫兒比涅

〇、〇五

水
右以半筒乃至二筒注射皮下

五、〇〇

毛細氣管枝炎

Bronchitis capillaris Pneumonia catarrhalis.

加答兒性肺炎、肺臟小葉炎、小葉肺炎、舊譯作微氣管炎

處置 祛痰催吐、有熱則水治、虛脫則亢奮、胸部用罨法芥子泥、飲料用清涼、滋養用強壯、牛乳酒類、或變體

格魯布性氣管枝炎 毛細氣管枝炎

位、或轉居所

八五三 ●催吐劑
鹽酸亞剎莫兒比涅 〇、〇、一
水 五、〇

右半筒乃至一筒注射皮下（催吐、小兒）

八五四 吐根末 三、〇
吐酒石 〇、〇、五
右分五包每十分時服一包（催吐、小兒）

八五五 吐根浸（四、〇）一〇〇、〇
單舍利別 二〇、〇
右每十分服一茶匙（催吐、小兒）

八五六 硫酸銅 〇、〇、五
水 四〇、〇
單舍利別 二〇、〇
右每十五分服一茶匙（催吐、小兒）

八五七 ●浸煎劑
吐根浸
（〇、一五—〇、三）一〇〇、〇
單舍利別 二〇、〇

八五六 右每二時服一茶匙（小兒）
吐根浸（〇、三）一〇〇、〇
杏仁水 四、〇

攝涅瓦舍利別 一〇、〇
右一日三回分服

八五七 吐根浸（〇、一五—〇、三）一〇〇、〇
杏仁水 一〇、〇
覆盆子舍利別 一〇、〇

右每二時服一小兒匙（小兒）
攝涅瓦浸（二、〇）六〇、〇
阿片丁幾 一五、〇

單舍利別 一五、〇
每二時服一食匙（小兒）
吐根浸（〇、二）七〇、〇
依的兒性鐵丁幾 二十滴

單舍利別 一〇、〇
右每二時服一茶匙（大兒）
吐根浸（〇、一五—〇、三）一〇〇、〇
安母尼亞茴香精 一〇、〇

單舍利別 二〇、〇

八五三 右每二時服一小兒匙（小兒）
吐根浸（〇、一五）七〇、〇
重碳酸那篤儻謨 〇、五

安母尼亞茴香精 二十滴
橙皮舍利別 一〇、〇
右每二時服一茶匙（小兒）

八五四 吐根浸（〇、二—〇、四）六〇、〇
安母尼亞茴香精 一〇、〇
鹽酸亞剎莫兒比涅 〇、〇、三

鹽酸 〇、〇、二
亞兒答舍利別 二〇、〇
右每三時服一茶匙（小兒）

亞爾答煎（一〇、〇）一五〇、〇
安質母尼酒 六、〇
安母尼亞茴香精 六、〇

單舍利別 三〇、〇
右每二時服一二食匙
攝涅瓦浸（一、五—五、〇）一〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇
右每二時服一小兒匙（小兒）

單舍利別 二〇、〇

單舍利別 二〇、〇

單舍利別 二〇、〇

單舍利別 二〇、〇

八六七

攝涅瓦根浸 (五、〇)七〇、〇
安母尼亞苗香精 一〇〇、〇

右每二時一茶匙(大兒)

八六六

攝涅瓦浸 (一、〇)一〇〇、〇
安母尼亞苗香精 一、〇
茴香舍利利 * 二五、〇

右混和每一時一小兒匙(小兒)

八六五

攝涅瓦浸 (二、〇)一〇〇、〇
杏仁水 一、〇一〇、〇

吐根舍利利 一〇〇、〇

八六四

右每三時一茶匙(小兒)
亞兒尼花浸(七、〇)一〇〇、〇
安母尼亞苗香精 二〇、〇

單舍利利 二〇、〇

右一日六回分服

八六三

亞兒尼加花浸 (七、五)一五〇、〇
安母尼亞苗香精 二、五
橙皮舍利利 一五、〇

右每時一食匙

八六二

機那煎 (八、〇)二〇〇、〇
吐根丁幾 四、〇

八六三

安母尼亞苗香精 四、〇
單舍利利 二〇、〇

右一日三回二日分服

八六二

機那煎 (三、〇)七〇、〇
吐根丁幾 十五滴
安母尼亞苗香精 十五滴

單舍利利 一〇、〇

八六一

實麥答利斯浸 (二、〇)一八〇、〇
右每二時一茶匙(小兒)

單舍利利 二〇、〇

八六〇

●水劑
格魯兒安母紐謨一、〇一三、〇
水 一〇〇、〇

單舍利利 二〇、〇

右每二時一小兒匙(小兒)

八五九

格魯兒安母紐謨 五、〇
吐酒石 〇、〇五
甘草羔 二、〇

水 二〇〇、〇

八五八

右每二時一食匙
碳酸安母紐謨 〇、五

八六六

水 八〇、〇
單舍利利 二〇、〇

右每二時一小兒匙(小兒)

八六五

碳酸安母紐謨 五、〇一八、〇
水 二〇〇、〇

亞爾答舍利利 三〇、〇一五〇、〇

八六四

右每一時半食匙乃至一食匙
吐酒石 〇、一〇〇、三
水 三〇〇、〇

海葱醋 一〇〇、〇

八六三

攝涅瓦舍利利 一五〇、〇
右每服一食匙
重碳酸那篤儲謨 〇、五

水 七〇〇、〇

安母尼亞苗香精 二十滴

八六二

吐根舍利利 一〇〇、〇
右每二時一茶匙(小兒)

安知必林 〇、五一二、〇

八六一

單舍利利 一〇〇、〇
右每三時一小兒匙(小兒) 二〇〇、〇
鹽酸規尼迨 〇、五十一、〇

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------|-----|---------------------|----------|
| 八六三 | 水 單舍利別 右每三時一小兒匙(小兒) | 一〇〇、〇 二〇、〇 | 八六六 | ●散劑 安知歇貌林 | 〇、一五—〇、三 | 八五二 | 阿片末 右篤拉侃拉護謨適宜爲五十 | 〇、一五 |
| 八六三 | パンクレアチン 酸那篤留謨 | 〇、一〇〇、二 | 八六七 | 白糖 右分三包每三時一包(小兒) | 一、〇 | 八五二 | 結麗阿曹篤 | 一、二、〇 |
| 八六三 | 阿片丁幾 | 三滴 | 樟腦 | 〇、〇六一〇、一五 | 〇、三 | 八五二 | 護謨末 | 二、〇 |
| 八六三 | 武蘭坪酒 | 一五、〇 | 白糖 | 右爲一包每二時一包(小兒) | 〇、一五 | 八五二 | 稀酒精 | 二、〇 |
| 八六三 | 護謨舍利別 * | 五、〇 | 樟腦 | 〇、一五 | 二、〇 | 八五二 | 右甘草羔甘草末各適宜爲百 | 二、〇 |
| 八六四 | 水 | 二五、〇 | 安息香酸 | 二、〇 | 二、〇 | 八五三 | 九一日三粒乃至六粒 | 各六、〇 |
| 八六四 | 右每二時一食匙 | | 茴香油糖 | 二、〇 | | 八五三 | 安母尼亞茴茴香精、依的兒 | 各六、〇 |
| 八六四 | ストロファンツス丁幾 | 一、〇—二、〇 | 右分六包每二時一包 | 〇、〇六 | | 八五四 | 右每一時六滴糖水調和服用 | (小兒) |
| 八六五 | 橙皮舍利別 | 二〇、〇 | 甘汞 | 〇、〇六 | | 八五四 | 樟腦阿列布油(二十%) | 右一二筒注射皮下 |
| 八六五 | 水 | 一八〇、〇 | 金硫黃 | 〇、〇三 | | 八五五 | 的列並油 | 一〇〇、〇 |
| 八六五 | 右一日三回每回一食匙 | | 白糖 | 一、〇 | | 八五五 | 醋酸 | 二〇、〇 |
| 八六五 | 麝香 | 一、〇 | 右分三包每二時一包 | 〇、一—一、五 | | 八五五 | 蓄微水 | 八〇、〇 |
| 八六五 | 樟腦 | 一、〇 | パンクレアチン 酸那篤留謨 | 〇、一—一、五 | | 八五五 | 枸櫞油 | 五、〇 |
| 八六五 | 薄荷水 | 一五〇、〇 | 右微溫湯溶解爲一回量(大兒) | | | 八五五 | 卵黃 | 一個 |
| 八六五 | 白糖 | 一〇〇、〇 | ●丸劑 | | | 八五五 | 右爲擦劑 | |
| 八六五 | 右以亞拉比亞護謨爲乳劑每時一食匙 | | 吐酒石 | 〇、一五 | | | | |

氣管枝喘息

Asthma bronchiae Asthma

喘急、喘促、痰喘、氣管枝痙攣、喘病、舊譯作氣喘、又名微絲氣管閉縮而喘、周禮金匱謂之上氣、素問謂之喘息

處置 投以沃度加里、鹽酸規尼涅、別拉敦那、格魯刺爾、貌魯謨加里等、其他胸部芥子泥、脚湯、亞硝酸アミール、的列並油等之吸入、曼陀羅華葉印度大麻等之煙草、豫防則禁刺戟性飲食物香料等室外散步、轉地療養等

●水劑

八六

沃度加留謨
單舍利別

水

四、〇
一六、〇
二〇〇、〇

八七

沃度加留謨
橙皮舍利別

水

五、〇
一五、〇
一五〇、〇

八八

沃度那篤留謨
橙皮舍利別

水

三、〇
二〇、〇
二〇〇、〇

八九

沃度加留謨
苦味丁幾

水

三、〇
四、〇
二〇〇、〇

九〇

沃度加留謨
右每二時一食匙

三、〇

苦味丁幾

單舍利別

水

三、〇
一五、〇
二〇〇、〇

九一

沃度加留謨
薄荷水

水

一〇、〇
一三〇、〇
二〇〇、〇

九二

沃度加留謨
貌魯謨加留謨

水

三、〇
五、〇
一〇、〇

右一日三回每回二十滴和水

或牛乳服用

沃度化加留謨

貌魯謨加留謨

杏仁水

苦味丁幾

二、〇
四、〇
二〇〇、〇

水

右一日三回分服

九四

沃度加留謨
魯別里亞丁幾

攝涅瓦丁幾

阿片越幾斯

水

一〇〇、〇
一〇、〇
一〇、〇
一〇、〇
三〇〇、〇

九五

抱水格魯刺爾 二、〇 一三、〇
蒸餾水、橙皮舍利別各二〇、〇
右隔一時乃至二時間二回分服、發作時

服、發作時

抱水格魯刺兒

沙列布煎 (三、〇) 三〇、〇

又亞拉比亞護謨漿

右發作劇時分服

抱水格魯刺兒

橙皮舍利別

九六
九七

一、〇
三、〇
三〇、〇
三、〇
二〇、〇

水 一三〇、〇

右發作時半量頓服、有效則

隔四十五分間以殘半量頓服

九六

抱水格魯刺爾 二、〇

貌魯謨加留謨 五、〇

單舍利別 一〇、〇

水 一〇〇、〇

九七

右一日三回分服

抱水格魯刺爾 〇、五—一、〇

貌魯謨加留謨 一、〇—二、〇

苦味丁幾 〇、五—一、〇

單舍利別 一〇、〇

水 一〇〇、〇

九八

右頓服

抱水格魯刺爾 一、五

沃度加留謨 一、五

水 一〇〇、〇

單舍利別 五、〇

九九

右每回分服四分一量

抱水格魯刺爾 一、〇—三、〇

沃度加留謨 一、〇—三、〇

水 三〇、〇

單舍利別 一五、〇

一〇〇

右每半時一食匙

抱水格魯刺爾 一、〇

沃度加留謨 一、〇

貌魯謨加留謨 三、〇

番木甞丁幾 十滴

單舍利別 二〇、〇

蒸餾水 一〇〇、〇

一〇一

右一日三回分服

抱水格魯刺爾 一〇、〇

亞硝酸那篤留謨 三、〇

曼陀羅華丁幾 一〇、〇

單舍利別 六〇、〇

右每四時服一茶匙和一盞之

水服用但一書作硝酸那篤留謨

一〇二

亞硝酸那篤留謨 〇、五

水 一五〇、〇

右一日三回每回一食匙

一〇三

硝酸那篤留謨 二、〇

水 一、二—二、〇

右一日四回每回一茶匙

バラアルデヒド 二、〇—四、〇

一〇四

單舍利別 一〇〇、〇

右隔二十分時作二回分服

一〇五

魯別利亞丁幾 二、〇—三、〇

水 一五、〇

一〇六

右每二時一食匙

魯別里亞丁幾 五、〇

亞爾答煎 一八〇、〇

一〇七

右每二時一食匙

沃度鐵舍別別 五、〇

水 一五〇、〇

右一日三回分服、貧血兼喘

一〇八

鹽酸莫兒比涅 〇、〇—三

クエブラホ越幾斯 四、〇

メリッサ水 一〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右一日三回每回一食匙

一〇九

貌魯謨加留謨 一、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇—三

橙花水 二〇、〇

嚼囉仿謨水 一〇〇、〇

右一日數回每回半食匙乃至

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|----|--|----------------------------|----|-----------------------------------|---------------------|----|---|-----------------------------------|----|--------------------|------|----|--|---------------------------------|----|--|---|----|---|---|-----|---|------------------------|-----|---|---------------------|-----|--|---|
| 九三 | 一食匙 貌魯謨加留謨 別刺敦那越幾斯 杏仁水 單舍利別 水 | 四、〇 〇、〇二 四、〇 一〇〇、〇 一〇〇、〇 | 九三 | 右一日三回分服 貌魯謨加留謨 別拉敦那丁幾 機那丁幾 水 | 八、〇 二、〇 八、〇 二〇〇、〇 | 九四 | 右一日三回二日分服 貌魯謨加留謨 菲沃斯丁幾 水 | 一、〇 八、〇 二〇〇、〇 | 九五 | 右一日三回二日分服 貌魯謨加留謨 貌魯謨安母紐謨 番木甞丁幾 橙皮舍利別 水 | 四、〇 一、〇 十滴 二〇、〇 一〇〇、〇 | 九六 | 右每二時一食匙 貌魯謨水素酸* | 六〇、〇 | 九七 | 番木甞丁幾 桂皮水 右一日三回乃至六回每回半 茶匙 貌羅謨水素酸古坭乙涅 | 一、〇 一、二〇、〇 一、二〇、〇 〇、〇二 | 九八 | 薄荷水 單舍利別 水 右一日三回每回一食匙 格魯兒化貌魯謨* 尚香水 單舍利別 右每二時服一小兒匙入黑色 瓶(小兒) | 二、五〇 二、五〇 一〇〇、〇 三〇、〇 三〇、〇 三〇、〇 三滴 | 九九 | 炭酸安母紐謨 水 壘粟舍利別 右每十分時服一食匙 安息香酸安母紐謨 水 安母尼亞茴香精 亞爾答舍利別 | 五、〇 二、五〇、〇 五〇、〇 五、〇 一、二〇、〇 五、〇 三〇、〇 | 一〇〇 | 右每二時服一食匙 レゾルチン 水 橙皮舍利別 右每半時服一食匙 有加利布丟斯葉浸 | 一、〇 一〇〇、〇 一、五〇、〇 | 一〇一 | 橙皮舍利別 右每時服一小兒匙(小兒) 吐根浸 安母尼亞茴香精 亞爾答舍利別 右每二時乃至三時服一茶匙 (小兒) | 二〇、〇 一、〇 二〇、〇 | 一〇二 | 吐根浸 吐酒石酒 橙皮舍利別 右每時服一食匙 別拉敦那越幾斯 依的兒 杏仁水 橙皮舍利別 水 | 〇、〇八 一六〇、〇 八、〇 二〇、〇 〇、〇五 二、〇 五、〇 一五、〇 一〇〇、〇 |
|----|--|--------------------------------------|----|--|----------------------------|----|-----------------------------------|---------------------|----|---|-----------------------------------|----|--------------------|------|----|--|---------------------------------|----|--|---|----|---|---|-----|---|------------------------|-----|---|---------------------|-----|--|---|

氣管枝喘息

右每時服一食匙
曼陀羅華越幾斯 〇、一
依的兒製實麥答利斯丁幾 四、〇

癩草水 三〇、〇
右發作時服一茶匙

九七
クエブラッホ丁幾 六〇、〇
右一日三回每回一二茶匙、

氣腫性喘息

九六
流動グリーンデリア越幾斯 六、〇—一〇、〇

俪里設林 二〇、〇
右一日三四回每回一茶匙

●滴劑

九五
魯別里亞丁幾 五、〇

阿片安息香丁幾 五、〇
右每一時乃至二時服十五滴

九四
魯別里亞丁幾 五、〇
杏仁水 一五、〇

右每時服十滴乃至十五滴

九三
魯別里亞丁幾、醋酸依的兒 各五、〇

右每半時服十滴、神經性喘

九二
息
別刺敦那丁幾 三十滴
水 五〇、〇
右一日二回分服腫孔散大則

休藥

九一
別拉敦那越幾斯 〇、三
或非沃斯越幾斯 一、〇

俪里設林 五、〇

安母尼亞茴香水 一〇、〇

九〇
右每三時服十滴乃至十五滴
コデイン 〇、〇—一、〇

酒精 一、〇

水 二〇、〇
右一日三回每回十滴乃至二十滴

九五
亞砒酸加留謨液 八、〇

苦味丁幾 三〇、〇
右每回十滴一日三回服用但

漸次增量一回至三十滴

九四
亞砒酸加留謨液 四、〇

薄荷水 四、〇
右一日三回每回一滴乃至三滴(小兒)

九七
亞砒酸加留謨液 五、〇
桂皮水 二五、〇
右一日二回乃至三回最初五

滴漸次增量至三十滴

九六
亞砒酸加留謨水、杏仁水 各七、五

右一日三回每回二滴乃至八滴、神經性喘息

九五
亞硝酸アミール 二、〇

酒精 八、〇
右二滴乃至五滴和糖水服用

九四
アンチスバズミン水 (一、〇)一〇、〇

右一日三回每回十五滴

●散劑

九五
鹽酸莫兒比涅 〇、一

白糖 二、〇
右分五包發作時服一包

九三
鹽酸規尼涅 〇、五

右頓服

九二
鹽酸規尼涅 〇、三
乳糖 〇、六
右分二包一日二回分服

| | | | | | | | |
|----|----------------|------|---------------|----|-----------------------------|---------|-------------------|
| 九四 | 鹽酸フェノコールム | 一、五 | 右包於オブラート發作前頓服 | 九六 | 安知必林 | 〇、三一〇、五 | 右爲丸一日三回每食後服用 |
| | 白糖 | 一、五 | | | 乳糖 | 〇、五 | 別刺敦那越幾斯 |
| | 右分三包一日三回每回一包 | | | | 右頓服 | | 根末 |
| 九五 | コヂイチ | 〇、〇三 | | 九三 | 吐根末 | 一、五 | 右蒲公英越幾斯適宜爲二十丸一日五粒 |
| | 金硫黃 | 〇、〇五 | | | 右分三包隨發作每十五分服一包、得吐即止 | | 別刺敦那越幾斯 |
| | 白糖 | 一、五 | | 九三 | ●丸劑 | | 印度大麻越幾斯 |
| | 右分五包每三時服一包(小兒) | | | | コペリン | 〇、〇一 | 右爲丸一日三回分服 |
| 九二 | 吐根末 | 〇、〇二 | | 九三 | 右甘草越幾斯適宜爲五丸每二時服一粒漸次增加一日至〇、二 | | 別刺敦那越幾斯 |
| | 菲沃斯越幾斯 | 〇、〇二 | | | アトロピチ | 〇、〇〇〇五 | 阿片 |
| | 硫酸規尼涅 | 一、〇 | | 九六 | 右爲丸發作時頓服 | | 吐根末 |
| | 白糖 | 二、〇 | | | 硫酸亞篤魯比涅 | 〇、〇〇三 | 沒藥 |
| | 右分十包每三時服一包 | | | | 亞砒酸 | 〇、〇六 | 右爲百丸一日三回每回一粒 |
| 九五 | ズルフオナル | 二、〇 | | 九七 | 硫酸規尼涅 | 四、〇 | 菲沃斯越幾斯 |
| | 右發作時頓服 | | | | 右龍膽越幾斯適宜爲六十九丸一日一丸增加至四粒神經喘息 | | 吐根末 |
| 九四 | 安知歇貌林 | 〇、〇五 | | | 亞砒酸 | 〇、〇三 | 實麥答利斯末 |
| | 乳糖 | 〇、〇五 | | | 鹽酸規尼涅 | 〇、〇三 | 阿片 |
| | 右發作時頓服 | | | | 亞砒酸 | 〇、〇〇三 | 右爲五十九丸每三時服一粒 |
| 九三 | 安知歇貌林 | 一、〇 | | 九七 | ヒヨスチアミン | 〇、〇二五 | 右亞爾答根末適宜爲五十九丸 |
| | 乳糖 | 一、〇 | | | ニトログリセリン | 〇、〇一 | 一日服三丸乃至四丸 |
| | 右分三包一日三回每回一包 | | | | | | |
| 九二 | 安知歇貌林 | 〇、〇四 | | | | | |
| | 鹽酸規尼涅 | 〇、〇五 | | | | | |

右甘草越幾斯及甘草末爲二
十九一日三粒

●吸入劑

九七三 亞硝酸アミール

右吸入二滴至五滴

九七四 亞硝酸アミール

茴香油

右吸入二滴乃至五滴

九七五 ビリヂン

右一回十滴乃至十五滴蒸於
布片吸入

●吸入劑

九七六 重碳酸那篤留謨水

(二、〇)一八〇、〇

右吸入

九七七 格魯兒那篤留謨一、〇一六、〇

炭酸那篤留謨 〇、二一四、〇

水 二〇〇、〇

右吸入

九七八 貌魯謨 〇、五

貌魯謨加留謨 一、〇

水 二五〇、〇

右三分乃至五分時吸入一回

九七九 一日數回
ビリヂン水

(〇、五)一、〇)五〇、〇

右吸入

九八〇 老利兒水

(〇、三)一三、〇)一〇〇、〇

右吸入

九八一 杏仁水

八、〇)一〇〇、〇

水 二〇〇、〇

九八二 右分一回乃至二回吸入

嚼囉仿謨 二〇、〇

九八三 右發作時含布吸入

鹽酸古加乙涅水 (二、〇)二〇〇、〇

右一回乃至二回吸入

九八四 鹽酸莫兒比涅水

(〇、二)一〇、五)一〇〇、〇

右吸入

九八五 阿片越幾斯水

(〇、〇)一〇、二)一〇〇、〇

右吸入

九八六 阿片丁幾水

(〇、〇)五、一、〇)一〇〇、〇

九八七 右吸入
菲沃斯越幾斯 〇、〇五、一〇、二

水 一〇〇、〇

右吸入

九八八 曼陀羅華越幾斯

水 〇、〇)一〇、一

一〇〇、〇

右吸入

九八九 別拉敦那越幾斯

水 〇、〇)一〇、〇五

一〇〇、〇

右吸入

九九〇 抱水沃度エチール

右一日六回乃至八回每回吸
入五滴 五、〇

九九一 酸索瓦斯

右吸入

●吸烟劑

九九二 印度麻大烟草

右吸烟

九九三 硝石紙

右發作時吸烟

九九四 曼陀羅華葉末、硝石各一五、〇

右發作時吸烟

●塗布劑

九九五 鹽酸古加乙涅水

(一、〇)二〇、〇

右塗布粘鼻膜

●注射劑

九九六 鹽酸莫兒比涅水(一%—二%)

右發作時一筒乃至半筒注射皮下

九九七 鹽酸莫兒比涅

佩里設林

蒸餾水

右注射皮下

九九八 コテイ子

酒精

水

九九九 鹽酸ヒヨスチン
右以半筒乃至一筒注射皮下

〇、五

五、〇

五、〇

〇、〇一

一、〇

一〇、〇

〇、〇〇五

水 一〇、〇
右以四分之一乃至半筒注射皮下

皮

九〇〇 撒里矢爾酸那篤留謨

咖啡涅

水

水

右以半筒注射皮下心臟喘息

一〇、〇

三、〇

四、〇

一〇、〇

第四節 肺臟織質諸病

肺氣腫 Emphysema pulmonum, Lungemphysem.

肺臟氣脹、肺氣脹、肺房氣腫、肺脹、舊譯作肺胞變大積氣、

處置

呼吸困難、用吐劑、又洗腸、氣管支之加答兒、用吸入、水腫之併發、用利尿劑、喘息、用胸部按摩、氣管誘導法、其他空氣療法、松林中之遊息、飲食之攝生、橫隔膜用感傳電氣等

●浸煎劑

一〇〇一 杜松子浸

(八、〇—一二、〇)二〇〇、〇

醋酸加留謨液 * 二〇、〇

海葱醋蜜 * 二〇、〇

右每二時服一食匙(利水)

一〇〇二 烏華烏兒矢葉浸

(八、〇)二〇〇、〇

醋酸加留謨液 * 二〇、〇

海葱醋蜜 * 二〇、〇

右每二時服一食匙(利水)

一〇〇三 オノニージス根煎 (二〇、〇)二〇〇、〇

醋酸加留謨液 * 二〇、〇

二〇、〇

海葱醋蜜 * 二〇、〇

右每二時服一食匙

一〇〇四 吐根浸 (〇、五)一八〇、〇

杏仁水 八、〇

單舍利別 二〇、〇

右一日六回二日分服

一〇〇五 吐根浸

(〇、二一〇、三)六〇、〇
 安母尼亞苗香精 一、〇
 阿片丁幾 五滴
 亞兒答舍利別 二〇、〇
 右每三時服一茶匙(小兒)
 吐根浸 (〇、三)六〇、〇
 安母尼亞苗香精 一、〇
 鹽酸亞剎莫兒比涅 〇、〇二一〇、〇四
 稀鹽酸 〇、〇二
 亞兒答舍利別 二〇、〇
 右每三時服一茶匙、祛痰(小兒)
 耶蘭日葉浸(五、〇)一〇〇、〇
 右頓服
 クエブラホ末 四、〇
 再餾酒精(三日間浸出) 四〇〇、〇
 水 八〇、〇
 桂皮舍利別 二〇、〇
 右一日三回每回一茶匙乃至二茶匙
 ●水劑

一〇〇元 醋酸加留謨 四、〇
 重酒石酸加留謨 六、〇
 咖啡涅 〇、五
 單舍利別 七、〇
 水 一〇〇、〇
 右混和一日三回分服
 一〇一〇 醋、海葱醋 各二五、〇
 炭酸加留謨(飽和) 適宜
 薄荷水* 一五〇、〇
 鹽粟舍利別 二〇、〇
 右每二時服一食匙(利水)
 一〇二 海葱酸 四〇、〇
 炭酸加留謨(飽和) 適宜
 洋芹水* 八〇、〇
 薄荷舍利別* 二〇、〇
 右每二時服一食匙(利水)
 一〇三 沃度化加留謨 三、〇
 苦味丁幾 二、〇
 單舍利別 七、〇
 水 一〇〇、〇
 右一日三回分服
 一〇三 沃度加留謨 三、〇
 薄荷水 一五〇、〇

單舍利別 一五、〇
 右混和每三時間一食匙
 一〇四 クエブラホ末 三〇、〇
 右一日三回每回一乃至二茶匙
 一〇五 水製クエブラホ越幾斯* 五、〇
 水 二五、〇
 右每三時服一茶匙、呼吸困難
 一〇六 阿片丁幾 五、〇
 曼陀羅華丁幾 五、〇
 安母尼亞苗香精 五、〇
 右一日三回每回五滴至十滴
 一〇七 阿片泊芙藍丁幾 一〇、〇
 依的兒、礮苗精 各一〇、〇
 杏仁水 二、〇
 右每一時服半茶匙乃至一茶匙
 喘息發作時
 一〇八 阿片安息香丁幾 五、〇
 安母尼亞苗香精 五、〇
 魯別亞里丁幾* 五、〇
 亞兒答舍利別 五〇、〇

1019 硝酸斯篤利規尼涅
右每服一茶匙

單舍利別 〇、〇〇五—〇、〇一
水 一〇、〇〇
右每二時服一食匙、氣管支

加答兒 二〇〇〇、〇〇
抱水格魯刺兒 一、〇〇

1020 貌魯謨加留謨 三、〇一五、〇〇
單舍利別 二〇〇、〇〇
水 六〇、〇〇

●丸劑
右每三時服一茶匙(小兒)

1021 枸橼酸化鐵 二、五〇
硫酸篤斯里幾尼涅 〇、〇五

單舍利別 〇、〇五
右亞爾答根末適宜為五十九

一日三回每回一丸利尿兼強壯

1022 水素還元鐵 五、〇〇
硫酸規尼涅 一、五〇

右龍膽越幾斯適宜為六十九
晝夕各一二粒

1023 答艾答利斯葉 一、五〇

藤黃、金硫黃 各一、五〇

海葱醋 一、五〇

ビンピテルラ越幾斯 適宜

右為六十九每三時服二丸

1024 クエブラチン 〇、五〇

右甘草越幾斯適宜為十九一

日四粒乃至九粒

1025 鹽酸亞刺莫兒比涅 〇、〇五

右甘草末及甘草越幾斯適宜

為五十九一日一粒乃至三粒

1026 格魯兒安母紐謨 四、〇〇

右甘草越幾斯及水適宜為六

十九朝夕各四粒、氣管支加

●散劑

答兒 四、〇〇

1027 複方甘草散 四、〇〇

右分三包一日三回每回一包

1028 金硫黃 〇、〇六

阿片 〇、〇一

白糖 三、〇〇

右分十包每二三時服一包

1029 別拉敦那越幾斯 〇、〇一

吐根末 〇、二一〇、三〇

白糖 五、〇〇

右分七包乃至十五包一日三

回每回一包

1030 菲沃斯越幾斯、金硫黃各〇、二〇

重碳酸那篤留謨 三、〇〇

右分十二包一日三回每回一

1031 菲沃斯越幾斯 〇、〇一

吐根末 〇、〇一

亞拉比亞護謨末 二、〇〇

白糖 二、〇〇

右分六包朝夕各一包

1032 菲沃斯越幾斯 〇、〇一

吐根末 〇、〇一

乳糖 一、五〇

右分六包一日三回每回一包

●吸入劑

1033 沃度加留謨水 〇、〇〇

(一、〇一、五)五〇〇、〇〇

右吸入

1034 亞砒酸加留謨液 〇、〇五

水 二五〇、〇〇

一〇五 右吸入
石灰水 *

八、〇
五〇、〇

右吸入(小兒)

一〇六 石灰酸水 (〇、五)一〇〇、〇

右吸入

一〇七 的列並油

右每回五滴乃至八滴點滴熱湯吸入

●注射劑

一〇八 鹽酸必魯加兒必涅

水

二〇、〇
〇、二
一〇、〇

右以半筒注射皮下

一〇九 硫酸アスピトスベルミン **

〇、五

右以一筒注射皮下喘息劇發時

一〇、〇

格魯布性肺炎 Pneumonia crouposa. Croupöse Pneumonie. Fibrinöse pneumonia.

義膜性肺炎、肺結組織炎、纖維索性肺炎

處置 安臥靜息、室溫調均、飲食攝生、高熱用頭部胸部之冰卷法、內服用解熱劑止渴劑及下劑、呼吸促迫胸部疼痛用局所射血及芥子泥、虛脫用亢奮劑等

●浸煎劑

一〇〇 實麥答利斯浸 (四、〇)一〇〇、〇

右一日四回分服

一〇一 實麥答利斯浸 (一、〇)二〇〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右一日六回二日分服

一〇二 實麥答利斯葉浸 (四、〇)二〇〇、〇

橙皮舍利別 四〇、〇

右每三時服一食匙四五日間

一〇三 實麥答利斯浸 (〇、二五)九〇、〇

覆盆子舍利別 * 一〇、〇

右一日四回分服、脉搏頻數

一〇四 實麥答利斯浸 (〇、一)一〇〇、〇

亞爾答舍利別 二〇、〇

右每二時一小兒匙、小兒

一〇五 實麥答利斯浸 (〇、三)一〇〇、〇

硝酸加留謨 二〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每三時一小兒匙、小兒

一〇六 實麥答利斯浸 (二、〇)一五〇、〇

硝酸加留謨 六、〇

單舍利別 三〇、〇

右混和每二時一食匙(脉搏亢進)

一〇七 實麥答利斯浸 (〇、二)一〇〇、〇

硝酸加留謨 三〇、〇

芳香舍利別 * 二〇、〇

右每二時一小兒匙、六歲小兒

一〇四 實麥答利斯浸

(〇、二)一〇〇、〇

醋酸加留謨

單舍利別 一〇〇、〇

右一日六回分服

一〇四 實麥答利斯浸

(〇、二)一〇〇、〇

醋酸加留謨液 *

覆盆子舍利別 * 二十滴

右每二時一小兒匙、小兒

一〇五 實麥答利斯浸

(一、〇)一〇〇、〇

ストロファンツス丁幾三十滴

赤葡萄酒 三〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙心臟衰弱

一〇五 實麥答利斯葉

吐根 〇、八

右浸出 二〇〇、〇

杏仁水 五、〇

橙皮舍利別 四〇、〇

右每時一食匙

一〇五 攝涅瓦浸

(一、五)一〇〇、〇

安母尼亞茴香精

亞爾答舍利別 一〇〇、〇

右一日六回二日分服、小兒

一〇五 攝涅瓦浸 (八、〇)二〇〇、〇

安母尼亞茴香精

單舍利別 一五、〇

右混和每一時一食匙(祛痰)

一〇五 攝涅瓦浸 (一〇、〇)一八〇、〇

安母尼亞茴香精

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

一〇五 攝涅瓦浸

(八、〇)一〇〇、〇

安質母尼酒

攝涅瓦舍利別 一〇〇、〇

右每二時一食匙

一〇五 攝涅瓦浸 (一〇、〇)一〇〇、〇

礮砂加茴香精

單舍利別 一〇〇、〇

右一日六回二日分服、小兒

一〇五 攝涅瓦浸 (一〇、〇)一〇〇、〇

安母尼亞茴香精

橙皮舍利別 一〇〇、〇

右每二匙一小兒匙、小兒

一〇五 攝涅瓦浸 (一〇、〇)一〇〇、〇

(亞爾答煎)一〇〇、〇

安母尼亞茴香精

墨粟舍利別 * 三〇、〇

右每二時一食匙

一〇五 攝涅瓦浸 (一〇、〇)一八〇、〇

鹽酸莫兒比涅

亞兒答舍利別 二〇〇、〇

右每二時一食匙

一〇六 樟腦 〇、二

再留酒精、亞拉比亞護謨

攝涅瓦浸 (一〇、〇)一〇〇、〇 各適宜

單舍利別 一〇〇、〇

右為乳劑每時一食匙

一〇六 吐根浸 (〇、三)一〇〇、〇

安母尼亞茴香精

單舍利別 二〇、〇

右一日六回二日分服

1062 吐根浸 (一、〇—二、〇) 二〇〇、〇

安母尼亞茴香精 二、〇
攝涅瓦舍利別 二、〇、〇

右每半時一食匙

1063 吐根浸 (〇、三) 六〇、〇

安母尼亞茴香精 一、〇
阿片丁幾 三滴

亞兒答舍利別 二〇、〇
右每二時一茶匙、小兒

1064 吐根浸(〇、五)
(攝涅瓦浸一〇、〇) 一〇〇、〇

安母尼亞茴香精 二、〇
鹽酸必魯加爾兒必涅 〇、〇三

武蘭坪酒 五〇、〇
右每二時一食匙

1065 吐根浸 (〇、一五) 七〇、〇

依的兒性格魯兒鐵丁幾十五滴
橙皮舍利別 一〇、〇

1066 吐根浸 (〇、三) 八〇、〇

炭酸安母紐謨 〇、五—一、〇
單舍利別 二〇、〇

1067 吐根浸 (〇、六) 二〇〇、〇

重炭酸那篤留謨 四、〇
單舍利別 一五、〇

右混和每二時一食匙(祛痰)

1068 芍藥根煎(一〇、〇) 一〇〇、〇

格魯兒安母紐謨 二、五
甘草羔 二、五

右每二時一食匙

1069 芍藥根煎(一〇、〇) 一〇〇、〇

稀鹽酸 〇、〇二
單舍利別 一、五

右每二時一食匙

1070 機那煎 (五、〇) 七〇、〇

橙皮舍利別 一〇、〇
右每二時一茶匙、小兒

1071 機那煎 (六、〇) 一〇〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇
右每三時一小兒匙、小兒

1072 機那煎 (三、〇) 七〇、〇

安母尼亞茴香精 二十滴
單舍利別 一〇、〇

1073 右每二時一茶匙、小兒

1074 亞爾答煎(二〇、〇) 二〇〇、〇

覆盆子舍利別 二〇、〇
右飲料

1075 亞兒答煎 一五〇、〇

硝酸加留謨 八、〇
吐酒石 〇、〇三

單舍利別 一〇、〇
右每二時一食匙

1076 安知必林 二、〇

單舍利別 二〇、〇
蒸餾水 一〇〇、〇

1077 安知必林 〇、五一—

橙皮舍利別 二〇、〇
水 一〇〇、〇

1078 安知必林 五、〇
右每二時一茶匙、小兒

橙皮舍利別 二五、〇
 水 五〇、〇
 右每服一食匙
 一〇七九 安知必林 三、〇—四、〇
 微溫湯 五〇、〇
 右洗腸
 一〇八〇 安知必林 一〇、〇
 水 一五〇、〇
 右一回二食匙加半蓋水洗腸
 一〇八一 撒里矢爾酸那篤留謨 一、〇—二、〇
 水 九〇、〇
 單舍利別 一〇、〇
 右每二時一食匙、小兒
 一〇八二 撒里矢爾酸那篤留謨 五、〇
 水 二〇〇、〇
 單舍利別 一五、〇
 右每時一食匙
 一〇八三 撒里矢爾酸那篤留謨 一〇、〇
 水 二〇〇、〇
 橙皮丁幾 五〇、〇
 右每二時一食匙
 一〇八四 撒里矢爾酸那篤留謨 二、五

薄荷水 五、〇
 單舍利別 八、〇
 水 一〇〇、〇
 右一日三回分服
 一〇八五 硫酸規尼涅 二、〇
 稀鹽酸 二滴
 水 一〇、〇
 右頓服
 一〇八六 酒石酸 一〇、〇
 白糖 四〇、〇
 水 六〇〇、〇
 右飲料
 一〇八七 稀鹽酸 一、〇
 橙皮丁幾 五、〇
 單舍利別 二〇、〇
 水 二〇〇、〇
 右每二時一食匙
 一〇八八 硫酸合劑* 一〇、〇
 單舍利別 九〇、〇
 右一日四回每回一茶匙溶解
 於一盞之水中服用
 一〇八九 稀鹽酸 六滴
 水 八〇、〇

橙皮舍利別 一〇、〇
 右每二時一茶匙、小兒
 一〇九〇 磷酸里母那埤* 一〇〇、〇
 右一日數回二日分服
 一〇九一 磷酸* 一〇、〇
 覆盆子舍利別 五〇、〇
 右飲料
 一〇九二 山慈姑煎* 二〇〇、〇
 杏仁水 五〇、〇
 醋蜜* 五〇、〇
 右飲料
 一〇九三 山慈姑煎* 四五〇、〇
 的列並油 三〇、〇
 右洗腸
 一〇九四 抱水格魯刺兒 二、〇
 橙皮舍利別 一五、〇
 水 二五、〇
 右頓服
 一〇九五 抱水格魯刺兒 二、〇—四、〇
 右護謨漿適宜溶解臨臥頓服
 一〇九六 抱水格魯刺兒 二、〇—三、〇
 亞拉比亞護謨漿 五〇、〇
 水 五〇、〇

一〇七 右洗腸
鹽酸亞刺莫兒比涅 〇、〇、三

水
單舍利別 一〇〇、〇
右每時一食匙 二〇、〇

一〇九 亞拉比亞護謨漿 一〇〇、〇
杏仁水 二十滴
單舍利別 一〇、〇
右每二時一茶匙、小兒

一〇九 重碳酸那篤留謨 一、〇
吐根丁幾 十二滴
機那丁幾 十二滴
水 七〇、〇
吐根舍利別 一五、〇

二〇〇 沃度加留謨 八、〇
水 二〇〇、〇
右一日三回每回一食匙

二〇二 沃度丁幾 五滴
水 一〇〇、〇
單舍利別 三〇、〇
右每時一食匙、有頓挫之効

二〇三 鹽酸莫兒比涅 〇、〇、二

重碳酸那篤留謨 一、〇

水 一五〇、〇
甘草舍利別 二〇、〇
右每二時一食匙

二〇三 ストロファンツース丁幾 二、〇
單舍利別 二〇、〇

水 一八〇〇、〇
右一日三回二日分服

二〇四 メリッサ水 * 單舍利別 各二五、〇
安母尼亞茴香精 一、〇一二、〇
魯別里亞丁幾 一、〇一二、〇
橙皮舍利別 五、〇
右每時一茶匙

二〇五 醋酸依的兒 十滴
橙皮舍利別 二〇、〇
武蘭埕酒 二〇、〇
茴香水 六〇、〇
右每半時一茶匙

二〇六 卵黃 二個
武蘭埕酒 三〇、〇
單舍利別 二〇、〇

水 一二〇、〇

右一日六回二日分服(卵ツ
ラン酒) 六、〇

二〇七 硫酸依的兒 六、〇
安母尼亞茴香精 六、〇
右每二時服六滴乃至十滴、
小兒

二〇八 麝香 一、〇
樟腦 一、〇
亞拉比亞護謨 一〇、〇
薄荷水 一五〇、〇
單舍利別 一〇、〇
右爲乳劑每一時乃至二時一
食匙

二〇九 酒精 二五、〇
芳香丁幾 * 二、〇
複方橙皮醋蜜 * 二、〇
水 二〇〇、〇
右每二時一食匙

二一〇 海葱醋 一〇、〇
攝涅瓦舍利別 一五〇、〇
右每次一食匙

二一一 吐根末 一、〇
海葱醋蜜 * 一五、〇

吐酒石酒 一五、〇

右振盪每十分時服一食匙、

催吐連用

二三 安母尼亞水 五滴

水 一五〇、〇

橙皮舍利別 一五、〇

右每時一食匙

二三 格魯兒安母紐護四、〇一五、〇

甘草羔 一〇〇、〇

水 一八〇、〇

右每二時一食匙

二四 菲沃斯越幾斯〇、〇八一〇、一

水 八〇、〇

單舍利別 一〇〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

二五 印度大麻越幾斯 〇、〇五

亞拉比亞護謨漿 一〇〇、〇

單舍利別 一〇〇、〇

右咳嗽劇甚時服一茶匙

二六 蕃椒丁幾 五、〇

水 一八〇、〇

單舍利別 一〇〇、〇

右每三時一食匙

二二七 バラアルデヒド 三、〇一五、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 一〇〇、〇

右頓服

二二八 バラクレンソチレ酸那篤留謨 〇、一〇〇、一

阿片丁幾 〇、二五

ブランデー酒 五、〇

單舍利別 二五、〇

水 五〇、〇

右一日六回二分服(小兒量)

二二九 プロピールアミン 〇、五一〇、三

水 二〇、〇

薄荷油糖 五、〇

右頓服

二三〇 硫酸タルリン 〇、一〇〇、五

水 一〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時乃至三時服一小兒匙、小兒

二三一 的列並油 十二滴

右和牛乳一〇〇、〇一

二〇〇、〇服用

●滴劑

二三二 鹽酸莫兒比涅 〇、一

杏仁水 一〇〇、〇

右每二時服五滴

二三三 別拉敦那越幾斯 〇、二五

杏仁水 一五、〇

右一日三回每回二十滴

二三四 菲沃斯越幾斯 〇、二

杏仁水 五、〇

水 五、〇

右每二時十滴

二三五 十倍樟腦依的兒精 〇、二

右每二時服十滴乃至二十滴

二三六 安母尼亞茴香精 五、〇

右每半時五滴糖水調和服用

二三七 安母尼亞茴香精 一〇、〇

依的兒精 一〇、〇

右每三十分時五滴乃至九滴

小兒

二三八 ナレガミア丁幾 二、〇

水 二、〇

右每二時一食匙

二三九 ナレガミア丁幾 二、〇

水 二、〇

右每二時一食匙

杏仁水 一五、〇

右每時十滴

●散劑

二三九 撒里矢爾酸那篤留謨 〇、五—三、〇

右爲一包頓服、解熱

二三〇 撒里矢爾酸那篤留謨 五、〇

右分五包包於オブラート每三時一包

二三一 安知必林 一、〇

右頓服(體溫三十九度以上)

二三二 安知安林 三、〇—五、〇

右分十包每一時一包、解熱

二三三 鹽酸規尼涅 〇、二—一、〇

右頓服、解熱

二三四 鹽酸規尼涅 〇、四

右分四包包於オブラート一日三包乃至四包

二三五 硫酸規尼涅 二、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇—五

白糖 三、〇
右分十包一日三包乃至四包 一、〇
安知歇貌林

白糖 二、〇

右分四包隔一時乃至二時間服一包

二二七 安知歇貌林 〇、二

乳糖 一、〇

二二八 安知歇貌林 〇、一—〇、三

白糖 一、〇

右分三包一日三回每回一包

二二九 樟腦 〇、一

安息酸 〇、六

右分十包每二時一包、小兒

二三〇 樟腦 〇、〇—三

安息香酸 〇、二—五

乳糖 一、〇

二三一 樟腦 〇、一

安息酸 〇、五

右混和爲三包每三時一包

二三二 樟腦 〇、二

安息香酸 一、〇

白糖 二、〇

右分五包每三時一包

二三三 樟腦 〇、二—五

安息香酸 二、〇

茴香油糖 * 二、〇

右分六包每二時一包

二三四 安息香酸 一、〇—二、〇

茴香油糖 * 五、〇

右分十包每二時一包

二三五 安息香酸 三、〇

樟腦、金硫黃 各〇、五

茴香油糖 * 五、〇

右分十包每二時一包

二三六 甘汞 〇、六

白糖 二、〇

右分四包每三時一包、初期

二三七 甘汞 〇、三五

阿片 〇、一—五

白糖 八、〇

右分六包每二時一包

二三八 甘汞 〇、四

阿片末 〇、二

白糖 一、〇—〇

右分十包每二時一包

二四 兒 甘汞 〇、〇六

金硫黃 〇、〇三

乳糖 一、〇

右分十包每三時一包

二五 阿片 〇、二一〇、四

白糖 五、〇

右分七包每二時一包

二五 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

硫黃 二、〇

白糖 三、〇

右分十包一日三包乃至四包

二五 ズルフォナルル 〇、五一、〇

右頓服

二五 フエナツエチン 〇、六一、二、〇

白糖 一、〇

右分三包一日三回每回一包

小兒

二五 フエナセチン 五、〇

右分五包隔一時乃至二時間

服一包

二五 硝酸加留謨 四、〇

重酒石酸加留謨 四、〇

甘汞 〇、一

吐酒石 〇、一

右分八包每二時乃至三時服

一包

二五 撒里矢爾酸那篤留謨咖啡涅 二、四

白糖 三、〇

右分六包一日一包乃至六包

二五 レゾルチン 一、五一、二、〇

右臨臥頓服

丸劑

二五 實麥答利斯葉末 〇、五

吐根末 〇、五

阿片 〇、三

右越幾斯適宜爲三十九丸每二

時二粒

二五 實麥答利斯末 五、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、三

樟腦 二、〇

右爲四十九一日二回每回一

粒乃至二粒

二六 汾粒篤利涅 〇、一五

右甘草末甘草越幾斯適宜爲

三十九丸每二三時服一粒

二六 汾粒篤里涅 〇、〇六

阿片越幾斯 〇、〇六

右亞拉比亞護謨適宜爲二十

丸一日三回每回二粒

二六 鹽酸莫兒比涅 〇、〇六

吐根 〇、二

金硫黃 〇、三

白糖 一、五

甘草根末 一、五

右和水適宜爲三十九丸每二時

一粒

二六 水素還元鐵 八、〇

水製機那越幾斯

右爲百丸食後十分時服一粒

乃至三粒

●注射劑

二六 十倍腦油

右以四分一乃至半筒注射皮

下、小兒

二六 五倍樟腦阿別布油

右以一二筒注射皮下

二六 安息香酸 一、五

樟腦

酒精

右以一筒注射皮下

一、〇、〇

右以一筒注射皮下

四、〇、〇

水

右頻回含嗽

二〇〇、〇

二二五 鹽酸亞剎莫兒比涅

蒸餾水

右以半筒乃至一筒注射皮下

〇、〇、一

咖啡涅

右以一筒注射皮下

三、〇、〇

芥子油

依的兒性瑞香越幾斯

一、〇、〇

二二六 デキタリン

蒸餾水

〇、〇、四乃至〇、〇、六

右吸入

二二七 格魯兒酸加留謨一、五一二、五

蓖麻子油

右塗擦胸部

三〇〇、〇

下垂性肺炎 Hypostasis pulmonum.

二二五 安息香酸

乳糖

〇、一、二

右作十包每二時服用一包 (心臟機能催進)

肺壞疽 Gangraena pulmonum

肺臟壞疽、肺疽、肺臟寒壞疽、舊譯作肺腐症、又名肺體變死

處置

●散劑

二二五 撒里矢爾酸那篤留謨

右分四包一日四回每回一包

二二五 硫酸規尼涅

白糖

右分三包一日三回每回一包

二二六 醋酸鉛

白糖

右分十包每二時服一包

二二七 沒劑

白糖

五〇、〇

●丸劑

二二六 硫酸規尼涅

乳酸滅

右甘草末甘草蒸適宜爲六十

丸朝夕各四粒

右一日四回每回一茶匙

二二七 硫酸規尼涅、單寧酸 各五、〇
 結列阿曹篤 一、〇
 阿片 〇、五
 右甘草羔適宜爲八十九丸每二
 時服二粒
 二二八 石炭酸 〇、五
 右酒精少許亞爾答根末、龍
 膽越幾斯各適宜爲百丸每二
 時服一二丸
 二二九 格魯兒加爾基 一、〇
 阿片 〇、五
 右甘草末甘草羔各適宜爲二
 十九丸一日三回每回二粒
 二二三 沒藥 一、五
 右龍膽越幾斯適宜爲丸一日
 三回分服
 二二三 マントール 二、〇
 白糖 一、〇
 亞拉比亞護謨 一、〇
 右爲二十九丸一日服三四粒
 二二四 マントール 一、五
 右分包裝十個一日服二個
 乃至四個

二二五 醋酸鉛 〇、三
 結列阿曹篤 〇、五
 的列並油 〇、五
 マントール 〇、〇一
 右甘草末甘草越幾斯適宜爲
 丸一日三回分服
 ●水劑
 二二六 吐根浸 (一、〇)二〇〇、〇
 單舍利別 一五、〇
 右每二時一食匙
 二二七 吐根浸 (〇、五)一〇〇、〇
 杏仁水 四、〇
 右一日三回分服
 二二八 杏仁水 一五、〇
 鹽酸莫兒比涅 〇、一
 水 一五、〇
 右咳嗽發作時服用二十滴
 二二九 的列並油 三〇、〇
 右每服十二滴加以一椀糖水
 二二九 的列並油、扁桃油 各四、〇
 右爲乳劑 * 一八〇、〇
 單舍利別 二〇、〇
 右每時一食匙

二二九 百露拔兒撒謨 一、五
 甘扁桃油 一〇、〇
 亞拉比亞護謨末 一〇、〇
 右爲乳劑 * 一五〇、〇
 單舍利別 一五、〇
 右每二時一茶匙
 二三〇 百露拔爾撒謨 〇、一
 右爲乳劑 * 二〇〇、〇
 單舍利別 五〇、〇
 右每二時一食匙
 二三一 抱水格魯刺兒 一、〇
 水 六〇、〇
 貌魯謨加留謨 三〇、一五、〇
 單舍利別 一〇、〇
 右一日三回每回一茶匙、小
 兒
 二三四 機那煎 (二〇、〇)二〇〇、〇
 稀鹽酸 二〇、〇
 橙皮舍利別 二〇、〇
 右每二時一食匙
 二三五 機那煎 一〇〇、〇
 安母尼亞茴香精 四、〇
 杏仁水 五、〇

肺環疽

二六 複方機那丁幾 右一日三回分服 二〇〇、〇

白葡萄酒 一八〇、〇

依的兒性格魯兒鐵丁幾 二〇〇、〇

桂皮水、橙皮舍利別各二〇〇、〇

右每二時一食匙

二七 結列阿曹篤 一、五

偏里設林、薄荷水各一〇〇、〇

右一日三回每回一茶匙

二八 結列阿曹篤 二〇〇、〇

健質亞那丁幾 五〇、〇

酒精 五〇〇、〇

設里酒 一五〇〇、〇

右一日二回乃至三回每回一

茶匙乃至一食匙

二九 結列阿曹篤 二〇〇、〇

複方白蘇丁幾 * 六〇、〇

武蘭垓酒 五〇〇、〇

設里酒 一五〇〇、〇

右振蕩一日三回每回一食匙

和於糖水服用

三〇 格魯兒加兒基(晒粉) 二〇〇、〇

水 一五〇、〇

單舍利別 三〇〇、〇

右入黑色瓶每二時一食匙

三二 石炭酸水 (〇、一五) 八〇、〇

亞爾答舍利別 二〇〇、〇

右一日三回每回一茶匙小兒

三三 石炭酸水 (〇、二) 一三〇、〇

薄荷水 五〇〇、〇

右每二時一食匙

三四 石炭酸水 (〇、五) 一八〇、〇

薄荷油糖 一〇〇、〇

沙列布漿 二〇〇、〇

右每二時一食匙

三五 石炭酸 一〇、〇

沃度丁幾 十五滴

雙蘭荷丁幾 一、五

薄荷水 一五〇〇、〇

橙皮舍利別 一〇〇、〇

薄荷油 二滴

右每三時一食匙

三六 有加里丁幾 * 五〇〇、〇

右每三時半茶匙

三七 有加里丁幾 二〇〇、〇

醫藥舍利別 一、二〇〇、〇

右二十四時間分服

●吸入劑 二〇〇、〇

三七 石炭酸水 (四、〇) 二〇〇、〇

右吸入 一、五

三八 石炭酸 一〇〇、〇

薄荷水 * 一〇〇、〇

右吸入 〇、五

三九 石炭酸 〇、五

酒精 二〇〇、〇

偏里設林 二〇〇、〇

水 一〇〇、〇

右吸入 一〇〇、〇

四〇 石炭酸 一、五

酒精、偏里設林 各一五、〇

右吸入 五〇〇、〇

四一 石炭酸 一〇〇、〇

水 一〇〇、〇

右吸入 一〇〇、〇

四二 貌魯謨 〇、四

貌魯謨加儂謨 〇、四

水 二〇〇、〇

右吸入 二〇〇、〇

三三 過滿俺駿加留謀水
(〇、一〇、五)一〇〇、〇

右吸入

三四 撒里矢爾酸水(〇、三)二〇〇、〇

右吸入

三五 撒里矢爾酸
礬酸 一、〇
五、〇

水

右吸入

三六 安息香酸那篤儻謨

五、〇一〇、〇

水

右吸入

肺充血

Hyperaemia pulmonum, Lungenhyperaemie.

肺臟充血、肺臟多血、舊譯作吐體、血、又名肺血痰

●丸劑

三三 鹽酸亞剎莫兒比涅 〇、〇五

右爲五十九丸 每一二時服一丸

乃至三丸

三七 ハルレル氏炭酸鐵丸*六十粒

右早晚三四粒

三七 硫酸規尼涅水

(〇、五)一〇〇、〇

右吸入、小兒

三八 知母爾水 (〇、二)一〇〇、〇

右吸入

三九 松芽浸 (一五、〇)二〇〇、〇

右吸入

四〇 的列並油水(二、〇)二〇〇、〇

右吸入

四一 結列阿曹篤水

(二、〇)二〇〇、〇

右吸入

四二 結列阿曹篤

一〇、〇

右十滴合於綿以「タルツシ
ヤン」氏裝置而吸入 一〇、〇

四三 有加里油

右每回二三滴點於吸入裝置
吸入 一〇、〇

四四 有加里油

精製的列並油 一五、〇

刺賢採爾油 十滴

右十二滴點於熱湯吸入

四五 百露拔爾撒謨

酒精 一〇、〇

右每回十滴乃至二十滴加沸
湯加密列水一日二回吸入 五、〇

●散劑

三三 吐酒石 〇、一五

吐根末 三、〇

澱粉 一、五

右分三包每十分時一包、催
吐連用

三三 安息香酸

樟腦 二、〇

白糖 一、〇

右分十包每時一包 五、〇

三三 甘朮

藥刺巴末 一、二

二、四

右分四包每三時一包

二三 醋酸鉛 〇、五

白糖 五、〇

右分十包每半時乃至一時一包

●水劑

二三 稀鹽酸 二、〇

單舍利別 三、〇

水 一五、〇

右混和每二時一食匙

二三 亞兒尼加花浸 (八、〇) 二五〇、〇

安母尼亞尚香精 二、五

橙皮舍利別 一五、〇

右每時一食匙

二三 攝涅瓦浸(一一、〇) 一八〇、〇

安母尼亞尚香精 四、〇

肺水腫 (急性) Oedema pulmonum (acutum), Lungenoedem.

肺臟浮腫肺浮腫肺臟水腫肺水之類、舊譯作肺積血兼水、金匱有肺水之名、而未詳病狀、未知是此症否

亞爾答舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙

三三 實麥答利斯浸(二、〇) 一五、〇

赤葡萄酒 四〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙、心臟衰弱

三三 實麥答利斯浸 (一、〇) 一五〇、〇

醋酸加留漢水* 一五、〇

海葱醋蜜 一五、〇

右每三時一食匙

三三 人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇

右微溫湯適宜溶解每朝食前頓服

三三 人工加兒爾斯泉鹽 三〇、〇

水 二〇〇、〇

右一日三四回二分服

三三 旃那葉浸 (八、〇) 二〇〇、〇

硫酸麻僱涅聖叟謨 三〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙

三三 依的兒 八、〇

阿片丁幾 四、〇

右每回一茶匙注於沸湯吸入

三三 安忌香酸 一、〇

依的兒 一〇、〇

右以一筒注射皮下

三三 芥子末 五〇、〇

右一回腳湯料

三三 芥子泥 三〇、〇

右胸部貼用

三三 發泡膏(方二寸) 三〇、〇

右胸部貼用

●散劑 處置 澆湯下劑之誘導法、胸部全面之芥子泥貼攤、祛痰、利水、充奮等、

二三 鹽吐酒石

〇、一五

吐俱末

一、〇

| | | | |
|-----|------|-------------------------------|-------|
| 二三二 | 安香息酸 | 右分十包一日五回每回一包 祛痰 | 三、〇 |
| 二三三 | 安香息酸 | 右分十包每時一包 | 五、〇 |
| 二三四 | 醋酸鉛 | 右分五包每二時一包 | 〇、三 |
| 二三五 | 藥刺巴脂 | 藥刺巴根末 右分五包每二時一包 | 一、〇、〇 |
| 二三六 | 藥刺巴脂 | 藥刺巴根末 右分五包每十五分時一包、 催吐連用 | 二、〇、〇 |
| 二三七 | 吐酒石 | 吐酒石 吐根末 | 〇、二 |
| 二三八 | 吐酒石 | 吐酒石 吐根末 | 三、〇、〇 |
| 二三九 | 白糖 | 右分四包每十五分時一包、 催吐連用 | 二、〇、〇 |
| 三三〇 | 白糖 | 右分四包每十五分時一包、 催吐連用 | 三、〇、〇 |

| | | | |
|-----|-------------|-----------|---------|
| 三三一 | 樟腦 | 右分十包每時一包 | 〇、三 |
| 三三二 | 安香息酸 | 右分十包每時一包 | 一、五 |
| 三三三 | 樟腦 | 右分十包每時一包 | 〇、二、五 |
| 三三四 | 硫化安質母尼 | 右分十包每時一包 | 〇、二、五 |
| 三三五 | 乳糖 | 右分五包每二時一包 | 二、五 |
| 三三六 | 安香息酸 | 右分五包每二時一包 | 三、〇 |
| 三三七 | 樟腦、金硫黃 | 各 | 〇、五 |
| 三三八 | 茵香油糖 | 右分十包每二時一包 | 五、〇 |
| 三三九 | 樟腦 | 右分十包每二時一包 | 〇、四、〇、八 |
| 三四〇 | 白糖 | 右分六包每時一包 | 五、〇 |
| 三四一 | 麝香 | 右分五包每時一包 | 〇、五 |
| 三四二 | 白糖 | 右分五包每時一包 | 二、〇 |
| 三四三 | 麝香 | 右分五包每時一包 | 〇、五 |
| 三四四 | 樟腦 | 右分五包每時一包 | 〇、五 |
| 三四五 | 乳糖 | 右分五包每時一包 | 二、〇 |
| 三四六 | 安香息酸那篤留謨咖啡涅 | 右分五包每時一包 | 〇、〇、一 |

| | | | |
|-----|---------|--------------------------|-------------|
| 三三六 | 安香息酸 | 右分十包每三時一包、小兒 | 〇、〇、三 |
| 三三七 | 醋酸鉛 | 右分十包每三時一包、小兒 | 〇、〇、三 |
| 三三八 | 白糖 | 右分十包每三時一包、小兒 | 三、〇 |
| 三三九 | 實麥答利斯 | 右分十包每三時一包、小兒 | 一、二 |
| 三四〇 | 樟腦 | 右分十包每三時一包、小兒 | 一、〇 |
| 三四一 | 乳糖 | 右分十包一日四回每回一包 (潛行性肺水腫) | 六、〇 |
| 三四二 | 水劑 | 右分十包一日四回每回一包 (潛行性肺水腫) | 六、〇 |
| 三四三 | 亞兒尼加花浸 | 右分十包一日四回每回一包 (潛行性肺水腫) | 六、〇 |
| 三四四 | 醋酸依的兒 | 右分十包一日四回每回一包 (潛行性肺水腫) | 二、〇 |
| 三四五 | 樟皮舍利別 | 右分十包一日四回每回一包 (潛行性肺水腫) | 一、五、〇 |
| 三四六 | 亞兒尼加花浸 | 右分十包一日四回每回一包 (潛行性肺水腫) | 一、五、〇 |
| 三四七 | 安母尼亞齒香精 | 右分十包一日四回每回一包 (潛行性肺水腫) | (七、五) 一五〇、〇 |
| 三四八 | 樟皮舍利別 | 右分十包一日四回每回一包 (潛行性肺水腫) | 二、五 |
| 三四九 | 炭酸安母紐謨 | 右分十包一日四回每回一包 (潛行性肺水腫) | 一五、〇 |
| 三四〇 | 桂皮水 | 右分十包一日四回每回一包 (潛行性肺水腫) | 四、〇 |

亞拉比亞護謨漿 一五、〇
蜀舍舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙

二六二 攝涅瓦精(一〇、〇)二〇〇、〇

安母尼亞茴香精 五、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

二六三 攝涅瓦浸(八、〇)一五〇、〇

安母尼亞茴香精 五、〇

吐根舍利別 五、〇

右每二時服一食匙(充奮性祛痰)

二六四 吐根浸(四、〇)七五、〇

右每十五分時服用一食匙催吐

二六五 吐根浸(〇、八)二〇〇、〇

安母尼亞茴香精 三、〇

吐酒石酒 五、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每時一食匙

二六六 吐根浸(一、〇)二〇〇、〇

稱砂加茴香精 三、〇

吐酒石酒 一〇、〇

單舍 一五、〇

右每二時一食匙

二六七 吐根浸(〇、八)八〇、〇

安母尼亞茴香精 二、〇

實麥答利斯丁幾 一、〇

攝涅瓦舍利別 二〇、〇

右每半時一食匙

二六八 ストロファンツス丁幾 十滴

水 九〇、〇

覆盆子舍利別 一〇、〇

右每三時一小兒匙、小兒

二六九 實麥答利斯浸(一、〇)二〇〇、〇

重碳酸那篤儻謨 四、〇

單舍利別 一〇、〇

右每二時一食匙

二七〇 實麥答利斯浸(一、五)二〇〇、〇

重碳酸那篤儻謨 五、〇

枸橼酸 適宜

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

二七一 實麥答利斯(一、五)二〇〇、〇

醋酸加里 六、〇
單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙(利尿)

二七二 實麥答利斯(〇、五)二二〇、〇

醋酸加儻謨液* 一五、〇

海葱醋蜜* 一五、〇

右每二時二食匙

二七三 實麥答利斯浸(〇、八)一六〇、〇

醋酸加儻謨液* 二〇、〇

安母尼亞茴香精 一〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

二七四 醋酸加儻謨 八、〇

水 二〇〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙(利尿)

二七五 旃那葉 一五、〇

茴香 五、〇

右沸湯浸出 一五〇、〇

硫酸那篤儻謨 三〇、〇

右每二時一食匙、峻下

二七六 古魯聖篤實浸

(二、〇) 三〇、〇

橙皮舍利別

二〇、〇

依的兒精

二、〇

右每二時一食匙

三七

樟腦乳劑 (〇、〇五) 八〇、〇

白糖

一〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

三六

依的兒、酒精

各五、〇

水

一五〇、〇

覆盆子舍利別

一五、〇

右每時一食匙

● 滴劑

三七

醋酸依的兒

一〇、〇

右每半時服十滴

二六〇 醋酸依的兒

一〇、〇

安母尼亞茴香精

一〇、〇

右每十五分乃至半時服五滴

小兒

二六一 依的兒性實艾答利斯丁幾

一〇、〇

右每三時服六滴乃至十滴

二六二 實艾答利斯丁幾

一、〇

海葱醋

一五、〇

右每三時服十滴乃至二十滴

二六三 ストロファンツス丁幾

二〇、〇

右一日三回每服五滴乃至十滴

● 注射劑

二六四 安息香酸

一、五

樟腦

一、〇

酒精

二、〇

右每回一筒注射皮下

二六五 鹽酸必魯加兒必涅

二、〇

水

一〇、〇

右以半筒乃至一筒注射皮下

二六六 撒里矢兒酸那篤留謨咖啡涅

二、〇—五、〇

水

一〇、〇

右一日二回乃至四回每回半筒乃至一筒注入皮下

楔狀肺出血

Hämoptischer Infarkt, Infarctus haemorrhagicus.

肺臟出血性梗塞、楔狀出血、咯血性血塞、肺質出血、肺臟凝血

二六七

鹽酸莫兒比涅

〇、〇三

白糖

一、五

右分三包每回一包(鎮咳)

肺臟萎縮

Atelectasis pulmonum.

肺胞膨脹不全、舊譯作肺缺舒張、古名肺痿

處置 深呼吸、口內粘液除清、溫湯入浴、浴後皮膚摩擦、輕度催吐等

● 水劑

一 二六八 硫酸銅

〇、五一

蒸餾水

四〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每十分時一茶匙催吐連用

二九六 吐酒石 〇、〇、一

亞拉比亞護膜漿 三〇、〇

右每十五分時一小兒匙、催

吐連用

二九〇 吐酒石酒

海葱醋蜜各一五、〇—二〇、〇

右每十分時一小兒匙

二九二 吐酒石酒 五、〇

水 七、〇

吐根舍利別 七、〇

右每一二時一茶匙

二九三 吐根末 一、〇—二、〇

水 〇、〇、三

海葱醋蜜 三〇、〇

右每十分時一小兒匙、小兒

二九三 吐根舍利別 一〇、〇

亞兒答舍利別 二〇、〇

右每回一茶匙

咯血 Haemoptoe

二九四 吐根浸 (〇、五) 二〇、〇、〇

覆盆子舍利別 一五、〇

右每半時一小兒匙

二九五 吐根浸 (〇、二) 二〇、〇、〇

滿那舍利別 三〇、〇

右每二時一小兒匙

二九六 吐根浸 (〇、四) 六〇、〇

安母尼亞茴香精 一〇、〇

亞兒答舍利別 二〇、〇

右每半時一小兒匙

二九七 安母尼亞茴香精 二〇、〇

右每回服二滴乃至五滴

二九八 炭酸加留讓 一、二

枸櫞汁 適宜

メリッサ水 三〇、〇

旃那加滿那舍利別 三〇、〇

右每二時一茶匙

二九九 沃度化鐵舍利別 一五、〇

單舍利別 一五、〇

右一日三回每回十滴乃至十

五滴

三〇〇 石灰水、蒸餾水 各三〇、〇

右每日混乳汁中服用

三〇一 肝油 八〇、〇

右一日二回乃至三回每回一

茶匙

三〇二 依的兒 一〇、〇

右每回一滴乃至二滴和常水

服用

●丸劑

三〇三 鹽酸規尼涅、還元鐵 各〇、一

白糖 三〇、〇

右分十包一日三回每回一包

三〇四 樟腦 〇、三

護膜砥劑*

右每服一茶匙 五〇、〇

一〇五 鹽酸亞刺莫兒比涅 〇、〇五

蒸餾水 一〇、〇

右以四分一乃至半筒注射皮

下

咳血、肺出血

處置 地平的嚴正安臥、胸部冰卷法、麻酔收斂止血藥等之吸入或皮下注射、嚴溫食物投水塊アイスクリー

△嚴禁酒色與喫烟、又戒談話

●水劑

| | | | | | |
|-----------------|------------|-------------------------|------------|------------|--------------|
| 一三〇六 麥角越幾斯 | 一、五、一三、〇 | 阿片越幾斯 | 〇、〇六 | 一三五 實艾答利斯浸 | 右每二時一食匙 |
| 常水 | 一〇〇、〇 | 覆盆子舍利別 <small>※</small> | 三〇、〇 | 一三六 實艾答利斯浸 | 右每二時一食匙 |
| 橙皮舍利別 | 三〇、〇 | 右每一時一食匙 | 〇、〇六 | 硝酸加留謨 | 單舍利別 |
| 右每二時一食匙 | | 麥角浸 | (二、〇)一五〇、〇 | 單舍利別 | 右每二時一食匙 |
| 一三〇七 水製麥角越幾斯 | 一〇〇、〇 | 阿片丁幾 | 五滴 | 一三六 實艾答利斯浸 | 右每二時一食匙 |
| 水 | 一〇〇、〇 | 單舍利別 | 二〇、〇 | 一三七 實艾答利斯浸 | 右每三時一食匙 |
| 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇五 | 右每半時一食匙 | 二〇、〇 | ラタニヤ越幾斯 | (二、〇)一八〇、〇 |
| 右一時乃至二時服十滴乃至十五滴 | | 一三二 麥角浸 | (二、〇)一四〇、〇 | 一三八 過格魯兒鐵液 | 右混和一日二回每回一食匙 |
| 一三〇八 麥角浸 | (五、〇)一五〇、〇 | 阿片丁幾 | 二滴—四滴 | 一三九 過格魯鐵液 | 右每回以四滴乃至十滴和燕 |
| 鉛糖 | 〇、三 | 桂皮舍利別 <small>※</small> | 二〇、〇 | | |
| 單舍利別 | 三〇、〇 | 右每二時一茶匙 | 二〇、〇 | | |
| 一三〇九 麥角浸 | (五、〇)二〇〇、〇 | 一三三 實艾答利斯浸 | (二、五)二〇〇、〇 | | |
| 稀硫酸 | 四、〇 | 麥角越幾斯 | 二、〇 | | |
| 單舍利別 | 三〇、〇 | 右每二時一食匙 | 二、〇 | | |
| 一三一〇 麥角浸 | (八、〇)二二〇、〇 | 一三四 實艾答利斯浸 | (二、〇)一六〇、〇 | | |
| 明礬 | 四、〇 | 阿片丁幾 | 二、〇 | | |
| | | 單舍利別 | 二〇、〇 | | |

阿片丁幾 十滴

桂皮舍利別 三〇、〇

水 一八〇、〇

右每一時一食匙

一三〇 單寧酸 四、〇

再留酒精 八、〇

水 一八〇、〇

右每十分時一食匙

一三二 的列並油 一、〇一二、〇

薄荷水 一五〇、〇

沙列布凝* 三〇、〇

右每二時一食匙

一三三 的列並油 五、〇

右為乳劑* 二〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每半時一食匙

一三三 的列並油 一、〇一五、〇

枸橼油 二滴

卵黃 一個

護謨舍利別 二〇、〇

水 一五〇、〇

右每二時一食匙

一三四 稀硫酸 二五、〇

的列並油、酒精 各一〇、〇

右每時四十滴加糖水

一三五 骨湃波拔爾撒謨 三〇、〇

篤留拔爾撒謨舍利別*

酒精 三〇、〇

荷薄水 三〇、〇

甘硝石精 六〇、〇

右一日三回每回一食匙

一三六 硫酸リモナーデ* 一〇〇、〇

ピトラスチーヌ越幾斯 二〇、〇

右一日六回分服

一三七 鹽酸莫兒比涅 〇、〇三

杏仁水 一〇、〇

右咳嗽發作時服十滴乃至十

五滴和一盞之水

一三八 醋酸莫兒比涅 〇、〇五

杏仁水 二〇、〇

右一日三回每回二十滴

一三九 ストロファンツス丁幾 各一〇、〇

杏仁水 各一〇、〇

右每日二回每回二十滴心悸

充進

一三〇 安知必林 二、〇

水 一〇〇、〇

薄荷油 五滴

右每二時一食匙

●丸劑

一三一 鹽酸ピドラスチン 〇、二五

右為十九一日服三粒至四粒

一三二 醋酸鉛 二、四

阿片 〇、四

荷香油糖 〇、四

右為三十九一日三回每回一

粒

一三三 麥角越幾斯、鞣酸 各一、五

水製阿片越幾斯 〇、〇五

右甘草越幾斯適宜為二十九

每時一粒

一三四 麥角末 二、〇

實麥答利斯末 〇、五

阿片越幾斯 〇、三

右甘草越幾斯適宜為二十九

每二時乃至三時一粒

一三五 實麥答利斯末 〇、五

麥角末 三、〇

ラタニヤ越幾斯 四、〇

菲沃斯越幾斯 〇、二五

右爲二十九一日四粒乃至六粒

二三六 沃度仿謨 〇、五

單寧酸 一、〇

右龍膽越幾斯適宜爲十九一日三回每回一粒乃至二粒

二三七 乳酸鐵 四、〇

著草越幾斯 * 適宜

右爲六十九朝夕四粒、貧血

二三八 的列並油 十滴

右入膠囊與十個每二時二個

二三九 醋酸鉛 〇、三

阿片 〇、三

白糖 二、〇

右分十二包朝夕一包

三四〇 醋酸鉛 〇、三

阿片 〇、二五

乳糖 六、〇

右分十包一日四包

三四一 醋酸鉛 〇、二

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

單寧酸 〇、五

白糖 三、〇

右分十包每二時一包

三四二 醋酸鉛 〇、二

實麥答利斯末 〇、二

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

白糖 五、〇

右分十包每二時一包

三四三 明礬 一、〇

挖沕兒氏散 〇、三

白糖 一、〇

右分五包每二時一包

三四四 明礬 二、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

白糖 五、〇

右分五包每三時乃至四時服一包

三四五 明礬 二、〇

實麥答利斯末 〇、二

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

白糖 二、〇

右分五包每二時一包

三四六 單寧酸 〇、四一〇、八

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

白糖 五、〇

右分十包每時一包

三四七 別拉敦那越幾斯 一、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、一

尚香油糖 * 二、〇

右分十包每二時一包

三四八 吐根末 〇、三

單寧酸 一、五

白糖 五、〇

右分十包每一時一包

三四九 還元鐵 一、五

薄荷油糖 五、〇

右分十包朝夕一包、貧血

三四〇 食鹽 五、〇

右一食匙乃至二食匙溶於水

適宜服用

三四一 過格魯兒鐵液 一、〇一四、〇

水 一〇〇、〇

右吸入

三四二 的列並油水 一、〇一〇〇、〇

咯血

八十三

右吸入

●注射劑

一三五 麥角越幾斯

水 一〇、〇

右皮下注射

一三五 麥角越幾斯

儂里設林 一〇、〇

右皮下注射

一三五 麥角越幾斯

儂里設林、蒸餾水 各四、〇

一三五 麥角越幾斯

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

蒸餾水 一〇、〇

右以五分一筒乃至半筒注射

一三五 スクレロチン酸 兼

皮下出血 一、〇

水 二五、〇

右二十四時間內以二筒乃至三筒皮下注射

一三五 硫酸亞篤魯比涅

蒸餾水 〇、〇一

右每回四分一乃至半筒注射

皮下 一〇、〇

一三五 鹽酸莫兒比涅

硫酸亞篤魯必涅 〇、〇〇五

蒸餾水 一〇、〇

右以半筒乃至一筒注射皮下

一三五 芥子末 若干

右溫湯調和施行手浴

肺勞 Phthisis pulmonum

肺結核、勞瘵、勞瘵、勞瘵、舊譯作內傷瘵症、肺體生米粒瘡、虛瘵、傳屍瘵

(附) 紅顏肺勞 Phthisis florida

花顏勞、奔馬勞、桃花蛀

●散藥

一三一 炭酸クワセコール 一、〇

乳糖 二、〇

右分六包一日三回每回一包

一三一 阿片 〇、三

醋酸鉛 〇、三

白糖 二、〇

廣分十二包朝夕一包、盜汗 一、〇

一三五 單寧酸規尼涅

一三五 單寧酸規尼涅 二、〇

白糖 二、〇

右分十包臨臥時服一包、盜汗

一三五 單寧酸規尼涅 〇、二

加糖柯柯阿脂 〇、三

右爲一包就寢前頓服、盜汗 〇、八

一三五 アガリチン 兼

白糖 五、〇

右分六包臨臥服一包乃至二包、盜汗

一三七 單寧酸カンナビン 一、〇

白糖 二、〇

右分四包每夕一二包

一三六 印度大麻越幾斯 〇、五

白糖 五、〇

右分十包朝夕一包

一三六 落葉松菌 〇、〇、三
 醋酸鉛 〇、〇、一
 右分二包每夜一包乃至二包
 頓服、盜汗
 一三七 撒里比亞葉末 五、〇
 單寧酸 一、〇
 白糖 一〇、〇
 右分十包每夜一包臨臥頓服
 盜汗
 一三七 樟腦 一、〇、一、二、〇
 右包於オブラート頓服、盜汗
 一三二 鹽酸規尼涅 〇、五、一、一、〇
 右爲一包頓服、日哺潮熱
 一三七 安知歇貌林 〇、二、一、〇、五
 右一包頓服、日哺潮熱
 一三四 安知必林 〇、五
 右爲一包頓服、日哺潮熱
 一三五 安知必林 三、〇、一、〇、〇
 白糖 三、〇、〇
 右分十包發熱前服一包乃至二包
 一三五 安知必林 〇、五

鹽酸莫爾比涅 〇、〇、一
 右夜間頓服
 一三七 安知必林 〇、〇、三
 貌魯謨化那篤留謨 〇、〇、五
 右頓服、催眠
 一三五 フェナツエチン 五、〇
 右分十包發熱前二包至三包
 一三五 撒里矢爾酸那篤留謨 二、〇、一、三、〇
 右包於オブラート早朝無熱時頓服
 一三〇 安知歇貌林、白糖 各二、〇
 右分十包每夕服一乃至二包
 一三一 ズルフオナルル 〇、一、二、〇
 右爲一包就眠二時乃至三時
 間前一包頓服
 一三二 トリオナルル 〇、一、一、五
 右午後七時頓服
 一三三 ヨデイン 〇、〇、三
 乳糖 〇、〇、三
 右頓服、鎮咳
 一三四 挖洵兒氏散、醋酸鉛 各二、〇
 白糖 三、〇、〇

右分十包一日三回每回一包
 小兒
 一三五 阿片 〇、〇、三
 醋酸鉛 〇、〇、一
 乳糖 一、〇、五
 右分三包每二時服一包、咯血
 一三六 挖洵兒氏散 〇、二、一、〇、五
 醋酸鉛 〇、〇、二
 乳糖 二、〇、〇
 右分十包一日三回每回一包
 咯血
 一三七 挖洵兒氏散 一、〇、一、一、五
 右分三包一日三回每回一包
 下痢
 一三八 阿片 〇、二、五
 單寧酸 〇、〇、五
 乳糖 五、〇、〇
 右分十包一日三包、下痢
 一三九 阿片 〇、〇、二
 單寧酸 一、〇、〇
 格倫僕末 二、〇、〇
 右分十包每時一包

三〇 醋酸鉛 ○、三一〇、五

白糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包

三一 次硝酸銻鉛 三、〇

鞣酸 〇、三

阿片 〇、一

乳糖 一、五

右分三包一日三回每回一包

下痢

三二 デルマトール 五、〇

右分十包一日四包乃至八包

三三 撒里失爾酸蒼鉛 一、五

デルマトール 一、五

結晶重碳酸那篤留謨 一、五

右分三包一日三回每回一包

下痢

三四 チナボルム 一、五

阿片 〇、二五

單寧酸 一、〇

右分十包一日三回乃至四回

每回一包、下痢

三五 ナフタリン、白糖 各五、〇

ベルガモット油 二滴

右分二十包一日五包乃至十

包、下痢

三六 コトイン 一、〇

白糖 三、〇

右分五包每二時一包、下痢

三七 乳酸鐵 〇、四

白糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

小兒

三八 硫酸規尼涅 一、〇

白糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包

三九 硫酸規尼涅 〇、五

枸橼酸鐵 〇、五

泥蒿根油糖 二、〇

右分十包一日二回每回一包

四〇 硫酸規尼涅 〇、二

實麥谷利斯末 〇、三

阿片越幾斯 〇、〇八

白糖 四、〇

右分十包每四時一包、小兒

四二 硫酸規尼涅 一、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

重碳酸那篤留謨 二、〇

白糖 二、〇

右分十包一日三回每回一包

四三 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

亞拉比亞謨末 五、〇

右分十包一日一包乃至三包

四四 メントール 一、〇一〇、五

右包於「オプラー」一日六

包乃至九包

四五 菲沃斯越幾斯 〇、五

白糖 五、〇

右分十五包一日三回每回一

包、咳嗽劇甚之症

四六 菲沃斯越幾斯 〇、五

乳糖 五、〇

右為十五包一日三回每回一

包、咳嗽劇甚之症

四七 鹽酸亞剎莫兒比涅 〇、〇二一〇、一

鹽酸莫兒比涅 〇、〇三一〇、〇五

白糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

白糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

略炭困難

一四七 ベンツォゾール

〇、二五、一、〇

右一日三回每食後分服

一四八 乳酸鐵

重碳酸那篤留謨

酒石酸

白糖

一、二、〇

九、〇

四、〇

右一日二回每回半茶匙乃至

一四九 格魯兒加爾基

一茶匙投於糖水乘沸騰時服

右分十包一日一包食前和牛

乳服用

●水劑

一五〇 結列阿曹篤

水

單舍利別

右每二時一茶匙、小兒

一五一 結列阿曹篤

佩里設林

フルメント精

右每三時一食匙和水服用

一五二 結列阿曹篤(或グワメコール)

健質亞那丁幾

酒精

設里酒

右一日二三回每回一茶匙和

水服用

一五三 結列阿曹篤

健質亞那丁幾

酒精

マラガ酒

右一日二三回每回一食匙和

水服用

一五四 結列阿曹篤

再留酒精

桂皮舍利別

水

右一日三回每回一食匙但漸

次増量

一五五 結列阿曹篤

亞砒酸加留謨液

設里酒

右每食時用二小酒杯

一五六 結列阿曹篤

亞砒酸那篤留謨

マラガ酒

右一日二回每回一酒杯食時

伍用

一四七 肝油

右一日二回食後一食匙初期

消化器健全者

一四八 肝油

薄荷油

一日間分服

一四九 肝油

橙皮丁幾

右一日三回每回一食匙

一五〇 肝油

薄荷油

ルーム酒

右每食後一食匙

一五一 肝油

結列阿曹篤

右每食三十分前服一二茶匙

一五二 肝油

結列阿曹篤

ザッカリン

一四三 肝油 右一日三回每回一食匙 一五〇、〇

クワセコール 右一日三回每回一食匙 二、〇

一四四 肝油 メントール 一〇〇、〇
沃度兒 〇、六
右每食前一食匙

一四五 無嗅肝油 一五〇、〇
炭酸グアセコール 二、〇
右一日三回二日分服但炭酸

グアセコール當漸次増量
一四六 炭酸グアセコール 一、〇一、二、〇

酒精 二〇、〇
蒸餾水 一八〇、〇
右入黒瓶一日二回乃至三回

毎回一茶匙乃至一食匙和一
椀之糖水食後服

一四七 グアセコール 一、〇
機那丁幾 二、〇
マラガ酒 一〇〇、〇
右一日三回二日分服但グア

一四八 ヤセコール漸次増量達於三、〇
グワセコール 三、〇
機那丁幾 一〇、〇

マラカ酒 五〇〇、〇
右一日三回每回一食匙乃至

三食匙
一四九 グソヤコール 一五、〇
龍膽丁幾 三〇、〇
酒精 二五〇、〇

設里酒 七五〇、〇
右一日三回每回一食匙和一

蓋之水服用
一五〇 グソヤコール 一五、〇
健質亞那丁幾 三〇、〇

白葡萄酒 二五〇、〇
設里酒 七五〇、〇
右一日三回每回一茶匙和水

食後服用
一五一 炭酸クレオソート 二〇、〇
加糖牛乳 二〇〇、〇

右一日二回乃至三回每回一
茶匙漸次増量終則一日間以
本劑服完爲度

一五二 グワセコール 二、〇一、五、〇
酒精、薄荷水 各五〇、〇
肝油 三〇、〇一、五〇、〇

右一日二三回每回一食匙

一五三 抱水格魯刺爾 一、〇
護謨漿、單舍利別 各一五、〇
右臨臥頓服

一五四 貌魯謨化加留謨 一、〇
鹽酸莫兒比涅 〇、〇〇、五
水 二五、〇
右頓服

一五五 バラ、アルデヒード* 二、〇一、四、〇
亞拉比亞護謨漿 六〇、〇
單舍利別 三〇、〇

右頓服、催眠
一五六 ウンタン* 四、〇
水 四〇、〇

一五七 橙皮舍利別 二〇、〇
右每服一食匙當就眠

一五八 バラ、アルデヒード 一、〇一、二、〇
亞拉比亞護謨漿 六〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右頓服、盜汗

一四二 硫酸規尼涅 〇、一、〇、五

稀硫酸 三、〇

カスカリヲ浸 一〇〇、〇

菲沃斯丁幾 五、〇

又菲沃斯越幾斯 〇、五

單舍利別 三〇、〇

右一日三回每回一食匙、盜汗

一四三 エルゴチン 一、〇

蒸餾水 七〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每一時乃至二時一茶匙、略血

一四四 撒里矢爾酸那篤留謨 二、五

水 五〇、〇

薄荷水 一五、〇

右頓服

一四二 撒里矢爾酸那篤留謨 二、五

水 六〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右一日一小兒匙乃至二小兒匙、小兒

一四二 撒里矢爾酸那篤留謨 二、〇

重碳酸那篤留謨 二、〇

苦味丁幾 三、〇

水 二〇〇、〇

右每二時一食匙

一四三 安知必林 一、〇、一、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇

武爾坪酒 一、〇

右每二時一小兒匙、小兒

一四四 稀鹽酸 二、〇

水 一八〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右一日數回分服

一四五 乳酸 二、〇、一、八、〇

水 一、二〇、〇、一、四〇〇、〇

右二十四時間數回分服、下痢

一四六 沃度鐵舍利別 一〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右朝夕一茶匙

一四七 沃度加留謨 一〇、〇

別拉敦那越幾斯 〇、二

水 二〇〇、〇

右一日三回每食後一食匙骨

關節結核

一四八 石灰水、蒸餾水 各四〇、〇

右和牛乳一日數回分服、小兒

一四九 過格魯兒鐵液 一、〇

水 六〇、〇

桂皮舍利別 二〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

一五〇 結晶硫酸鐵 一、〇、一、二、〇

炭酸加留謨 一、五、一、二、〇

薄荷水 二〇〇、〇

密兒拉 五、〇

白糖 二〇、〇

右振蕩一日三回每回一食匙

貧血

一五一 結晶硫酸鐵 二、〇

沃度加留謨 二、〇

水 五〇、〇

單舍利別 五〇、〇

右一日一回乃至二回一茶匙
小兒

一四三 亞燐酸那篤留謨 三、〇

水 二〇〇、〇

右每二時一食匙

一四三 格魯兒那篤留謨 一〇、〇

貌魯謨那篤留謨 五、〇

沃度那篤留謨 一、〇

水 一〇〇、〇

右朝夕一茶匙和牛乳服用、

骨關節結核

一四四 アツエトン 二、五

亞拉比亞護謨漿 二五、〇

墨粟舍利別 二五、〇

水 一五〇、〇

右每二時一食匙

一四五 ベプシチ酒 一〇〇、〇

右食事前後各一食匙消化不

良

一四六 機那舍利別 一五、〇

單舍利別 一五、〇

右一日三回乃至四回每回一

茶匙、小兒

一四七 復方幾那丁幾 八、〇

稀鹽酸 一、〇

橙皮舍利別 一五、〇

水 一八〇、〇

右一日三回每回二食匙、食

後服用

一四八 林檎酸鐵丁幾 一五、〇

苦味丁幾 一五、〇

右每回半茶匙乃至一茶匙

一四九 林檎鐵酸丁幾 三〇、〇

橙皮舍利別 一〇、〇

右一日三回每回一茶匙和水

或酒服用

一五〇 機那越幾斯 二、〇一四、〇

橙花水 一〇〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右一日三回乃至四回每回一

小兒匙、小兒

一五一 水製菱角越幾斯 一、〇

水 一〇〇、〇

桂皮舍利別 二〇、〇

右每二時一小兒匙、小兒

一五二 蘇木越幾斯 五、〇

阿片泊芙蓉藍丁幾 一、〇

薄荷水 一五〇、〇

橙皮舍利別 一〇、〇

右每二時一食匙、下痢

一五三 林檎酸鐵越幾斯 二、〇

設里酒 二〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右一日三回每回一食匙、貧

血 一〇、〇

一五四 格倫僕越幾斯 一〇、〇

ラタニヤ丁幾 一〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右一日三回每回一茶匙、下

痢 〇、二

一五五 コデイン 五、〇

亞爾個保兒 一〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右一日一二食匙

一五六 コトイン 一、〇

水 一〇〇、〇

稀酒精 一〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右每一時一食匙、下痢

一四七 アミーレンピドラート 七、〇
 橙花水 五〇、〇
 橙皮含利別 三〇、〇
 右日夕半量
 一四六 醋酸莫兒比涅 〇、〇五
 茴香水 * 三〇、〇
 亞兒答含利別 三〇、〇
 右一日三回每回一茶匙
 一四五 鐵飴煎 * 一〇〇、〇
 右一日三回每回一食匙
 一四四 鹽酸莫兒比涅 〇、〇三
 扁桃乳劑 二〇〇、〇
 橙花水 五〇、〇
 右每二時一食匙
 一四三 馬乳酒 * *
 右每日一盪乃至數盪服用
 ●藥用洗腸劑
 一四二 グワヤコール 二、〇一四、〇
 右爲乳劑洗腸
 一四一 結列阿曹篤 二、〇一四、〇
 甘扁桃油 二五、〇
 卵黃 一個
 水 二〇〇、〇

一四四 右爲乳劑洗腸
 アミーレンピドラート 五、〇
 水 五〇、〇
 亞拉比亞護膜漿 二〇、〇
 右微溫注腸、不眠
 ●浸煎劑
 一四三 麥角浸 (六、〇)二〇〇、〇
 右一日六回二分服、咯血
 一四二 麥角浸 (五、〇)二二〇、〇
 鉛糖 〇、三
 單含利別 三〇、〇
 右一日六回二分服、咯血
 一四一 實麥答利斯浸 (二、〇)一〇〇、〇
 ラタニヤ丁幾 二、〇
 阿片越幾斯 〇、〇五
 單含利別 一〇、〇
 右每二時一食匙、咯血
 一四〇 實麥答利斯浸 (二、〇)二〇〇、〇
 重碳酸那篤留謨 五、〇
 黑粟含利別 * 三〇、〇
 右每二時一食匙

一四九 亞兒答煎 * 二〇〇、〇
 阿片越幾斯 〇、〇一
 薄荷含利別 二〇、〇
 右每二時一食匙
 一四八 吐根浸 (〇、五)一、〇)二〇〇、〇
 杏仁水 八、〇
 單含利別 一五、〇
 右每二時一食匙
 一四七 吐根浸 (〇、三)一〇〇、〇
 杏仁水 四、〇
 燐酸ゴヂイン 〇、〇一
 單含利別 七、〇
 右一日三回分服
 一四六 規那煎 (八、〇)二〇〇、〇
 稀鹽酸 二、〇
 單含利別 一五、〇
 右一日六回二分服
 一四五 機那煎 (六、〇)一〇〇、〇
 橙皮含利別 二〇、〇
 右每三時一小兒匙、小兒
 一四四 機那煎 (五、〇)一〇〇、〇
 稀鹽酸 二、〇

百布聖瀉

單舍利別

二、〇
一〇、〇

右一日三回分服

一四四

機那煎

(四、〇)一〇〇、〇

次硝酸蒼鉛

單舍利別

三、〇
八、〇

右爲振盪合劑一日三回分服

下痢

一四六

機那煎

(四、〇)一〇〇、〇

吐根丁幾

安母尼亞茴香精

單舍利別

二、〇
二、〇
一〇、〇

右一日三回分服

一四七

龍膽浸

(二〇、〇)一五〇、〇

橙皮舍利別

二〇、〇

右每二時一食匙

一四八

健質亞那根

一五、〇

稀酒精

赤葡萄酒

三〇、〇
五〇〇、〇

右八日間浸出瀝過每食時服

一酒盞、消化不良

一四九

格倫僕煎

(一〇、〇)二〇〇、〇

沙列布漿

一〇、〇

阿片丁幾

橙皮舍利別

〇、一
二〇、〇

右每二時一食匙、下痢

一四〇

蘇木煎

(五、〇)一五〇、〇

單寧酸

單舍利別

一、〇
五〇、〇

右每二時一食匙、下痢

一四二

蘇木煎

(二〇、〇)一〇〇、〇

阿片消芙蓉丁幾

橙皮舍利別

一〇、〇

右每三時一食匙、下痢

一四三

コンチランゴ皮煎

(一五、〇)一五〇、〇

稀鹽酸

沙列布漿*

二、〇
一五、〇

右一日三回每回一食匙食慾

缺乏

一四三

サルヒヤ葉浸

(一、五〇)一五〇、〇

赤葡萄酒

白糖

五〇、〇
二〇、〇

右每二時一食匙

滴劑

一四四 結列阿曹篤

健質亞那丁幾

三、〇
一三、〇

右一日五滴乃至十滴漸次增

一四五

量自二十滴乃至三十滴

アシエトン**

五、〇

右一日三回每回十五滴乃至

二十滴

一四六 ビクロトキシソ

〇、〇一〇〇、〇二

水 右臨臥服十滴、盜汗

一四七

沃度鐵舍利別

一五、〇

單舍利別 右一日二回乃至三回每回十

滴乃至十五滴、小兒

一四九 イヒチオール

一〇、〇

水 右一日二回乃至三回每回十

五滴乃至三十滴

一四九 百露拔爾撒謨

二〇、〇

的列並油 右一日三回每回十滴和水服

用、咯痰多量

一五〇 嬌 〇、〇〇五

肝油 三〇、〇

薄荷油 〇〇、〇五

一五一 亞砷酸加留謨、薄荷水各五、〇

右一日數回每回二滴至四滴

一五二 亞砷酸加留謨、薄荷水各五、〇

右一日三回每回二滴乃至四滴、小兒

一五三 亞砷酸加留謨液 五、〇

林檎酸鐵丁幾 二〇、〇

一五三 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

右一日三回每回十五滴(禁忌消化不良及熱症)

一五四 鹽酸莫兒比涅 〇、〇三

右咳嗽時服二十滴

一五五 鹽酸莫兒比涅 〇、〇一

右每次服八滴乃至二十滴、

一五六 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

不眠症

一五〇 杏仁水 一五、〇

復方規那丁幾 一〇、〇

一五一 苦味丁幾 一〇、〇

右混和一日三回每回五滴服用、ベンベルグ氏

一五二 甘草羔 二、〇

安母尼亞尚香精 一〇、〇

一五三 鹽酸莫兒比涅 〇、〇一

右每二時十滴乃至十五滴

一五〇 杏仁水 一五、〇

復方規那丁幾 一〇、〇

苦味丁幾 一〇、〇

右混和一日三回每回五滴服用

一五二 甘草羔 二、〇

安母尼亞尚香精 一〇、〇

一五三 鹽酸莫兒比涅 〇、〇一

右每二時十滴乃至十五滴

一五四 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

右每次十滴乃至二十滴

一五五 杏仁水 一五、〇

阿片安息香丁幾 一五、〇

杏仁水 一五、〇

右一日三回每回二十滴乃至二十五滴

一五〇 杏仁水 一〇、〇

苦味丁幾 二〇、〇

右每食後十五滴

一五一 苦味丁幾 二〇、〇

右每食後十五滴

一五二 苦味丁幾 五、〇

苦味丁幾 五、〇

復方機那丁幾 五、〇

右每次五滴乃至十滴每食前

一五三 菲沃斯越幾斯 一、〇

半時服用

一五二 菲沃斯越幾斯 二〇、〇

杏仁水 二〇、〇

右每二時十五滴乃至二十滴

一五三 菲沃斯越幾斯 〇、〇三

咳嗽劇甚時

一五三 菲沃斯越幾斯 〇、〇三

杏仁水、水 各五、〇

右每回十五滴和一盞之水咳嗽時頓服

一五四 別拉頓那越幾斯 〇、〇三

水 一五、〇

安母尼亞尚香精 二、〇五

右每三時服十滴乃至十五滴

一五五 サルヒヤ油 * 〇、〇一

硫酸合劑 * 一〇、〇

右每次十二滴和糖水日哺一回乃至數回服用、盜汗

一五六 炭酸グアヤコイル 一、〇

右入膠囊一口三回分服但增

至一日之量達於二〇、〇

九刻

九刻

九刻

九刻

九刻

九刻

一五七 結麗阿曹篤 二、五

右爲百丸每食後三粒

一五八 結列阿曹篤 〇、一

右入膠囊一個一日三回每回一個、但漸次增量一日十個乃至二十個

一五九 結麗阿曹篤 〇、五

亞兒答根末、甘草羔 各〇、六

右爲二十九一日三回每回一粒乃至二粒

一五〇 結列阿曹篤 一、五

大黃末 一、〇

右甘草越幾斯、甘草末各適宜爲五十九一日三回每回五粒

一五二 結列阿曹篤 一〇、〇

右黃蠟、柯柯阿略各適宜爲百丸一日五粒乃至十粒

一五三 結列阿曹篤 二、五

メントール 二、五

右黃蠟、甘草末各適宜爲百丸每食後二丸但漸次增量

一五三 結麗阿曹篤 三、〇

メントール 三、〇

右甘草羔甘草末各適宜爲百丸一日三回每回五粒

一五五 結列阿曹篤 〇、三

鹽酸規尼涅 三、〇

一五七 結列阿曹篤 一、〇

亞砒酸 〇、〇五

一五九 結列阿曹篤 五滴

メントール 三、〇
樟腦 一〇、〇
右混和入膠囊百個每食後二個

一五四 結麗阿曹篤 〇、三

還元鐵 〇、〇一

一五五 結列阿曹篤 〇、二

右爲丸一日三回每食後分服

一五六 結列阿曹篤 〇、三

右爲丸一日三回分服

一五七 結列阿曹篤 一、〇

右爲丸一日三回分服

一五八 結列阿曹篤 二、〇

右甘草羔甘草末各適宜爲五十九一日三回每回一粒

一五九 結列阿曹篤 五滴

阿片 〇、六

右甘草羔甘草末各適宜爲百丸一日三回每回五粒

沃度仿謨 〇、〇六

篤留拔爾撒謨 三滴

的列並油 三滴

阿片越幾斯 〇、〇三

右爲十九一日四粒乃至十粒

一五〇 結列阿曹篤 五、〇

沃度仿謨、安息香末 各五、〇

篤留拔爾撒謨 五、〇

右爲百丸一日二丸乃至四丸漸次增量

一五二 結列阿曹篤 〇、〇五

篤留拔爾撒謨 〇、〇二

沃度仿謨 〇、〇六

篤留拔爾撒謨 三滴

的列並油 三滴

阿片越幾斯 〇、〇三

右爲十九一日四粒乃至十粒

一五〇 結列阿曹篤 五、〇

沃度仿謨、安息香末 各五、〇

篤留拔爾撒謨 五、〇

右爲百丸一日二丸乃至四丸漸次增量

一五二 結列阿曹篤 〇、〇五

篤留拔爾撒謨 〇、〇二

右入膠囊一個最初一日一個漸次增量二個月後一日九個服用

一五三 結列阿曹篤 〇、〇一

肝油 〇、〇四

右入膠囊爲一回量漸次增量一日結列阿曹篤之量可至二

一五三 林檎酸鐵越幾斯 五、〇

睡菜葉末 二、〇

右爲六十九朝夕二粒、養血

一五四 林檎酸鐵越幾斯 五、〇

右蒲公英越幾斯適宜爲五十

粒朝夕二粒

一五三 菲沃斯越幾斯、菲沃斯葉末、 各二、〇

右爲三十九丸每二三時一丸

一五二 菲沃斯越幾斯 三、〇

吐根末、實麥答利斯末各〇、五

阿片 〇、二

右亞兒答根末適宜爲三十九

每三時一粒

一五七 ヘレニ一越幾斯 三、〇

吐根、實麥答利斯末 各五、〇

阿片 〇、三

右爲三十九丸每三時一粒

一五六 印度大麻越幾斯 一、五

印度大麻草

右爲六十九丸每夕四粒

一五九 ラクツカリウム、五、一、三、〇

右甘草蒸適宜爲三十九丸每三

時一丸

一五〇 鹽酸規尼涅、還元鐵 各〇、五

右偲里設林適宜爲十九一日

三回每回一粒禁忌消化不良及熱症

一五一 硫酸規尼涅 一、〇、一、二、〇

實麥答利斯末 〇、一

吐根末、阿片 各〇、五

右甘草越幾斯適宜爲五十粒

一日三回每回一粒

一五二 硫酸ヒニジン 二、五

鹽酸莫兒比涅

睡菜葉越幾斯 三、〇

偲里設林

右亞兒答根末適宜爲五十九

朝夕二三丸

一五三 實麥答利斯葉末 〇、五

吐根末、阿片 各〇、二、五

右亞拉比亞護謨漿適宜爲二

十九一日三回每回一粒

一五四 實麥答利斯末 〇、五

吐根末 〇、二、五

阿片末 〇、二、五

鹽酸規尼涅 一、〇

右甘草蒸、甘草末適宜爲二

十九一日三回每回一粒

一、五 (イール氏丸)

一五五 麥角越幾斯 二、五

右甘草末甘草越幾斯適宜爲五

十九一日五粒至十粒、咯血

一五六 麥角越幾斯 二、五

鞣酸 二、五

阿片 〇、六

右爲四十粒每三時二粒、咯

血

一五七 麥角越幾斯 〇、八

鉛糖 〇、一

右爲丸一日三回分服(咯血)

一五八 亞篤魯必涅 〇、〇、二

右爲二十九丸每夕一粒、盜汗

一五九 硫酸亞篤魯必涅 〇、〇、五

右甘草蒸、甘草末各適宜爲

十九臨臥服一二粒、盜汗

一五〇 沃度化ヒヨスチン 〇、〇、一

白陶土 適宜

右爲二十九丸每夕一粒

一五一 アガリチン酸 〇、五

右泥葛根末適宜爲五十九臨

臥服一粒乃至三粒

一五三 アガリチン 〇、一〇、二〇

一五二 捻沔兒氏散 一、五、一〇、二〇

一五一 亞兒答根末 一、〇、一〇

一五〇 護謨末 一、〇、一〇

右爲二十九每夕一二粒、盜汗

一四九 亞砒酸 〇、一〇、一〇

一四八 甘草末 四、〇、一〇

一四七 右蜂蜜適宜爲百九一日服五粒乃至十粒

一四六 亞砒酸 〇、〇、五〇

一四五 枸橼酸鐵規尼涅 二、〇、〇、一〇

一四四 甘草羔 六、〇、一〇

一四三 亞拉比亞護謨漿 適宜

一四二 右爲百九一日三回每回二粒

一四一 クレナリン 五、〇、一〇

一四〇 右黃蠟、柯柯阿脂各適宜爲五十九一日五粒乃至十粒

一三九 クレナリン 〇、一〇、一〇

一三八 重碳酸那篤留謨 〇、一〇、一〇

一三六 肝油 〇、〇、二〇

一三五 右入膠囊一個、一日服五個乃至十個

一五七 醋酸鉛 二、〇、四〇

一五六 阿片 〇、〇、四〇

一五五 茴香油糖* 〇、〇、四〇

一五四 右爲三十九一日三粒乃至四粒、盜汗

一五三 樟腦酸 一、〇、一〇

一五二 右入膠囊臨臥服用二三個盜汗

一五一 ナフタリン 一、〇、一〇

一五〇 右入膠囊三個一日三回每回一個分服、下痢

一四九 硝酸銀 〇、五〇、一〇

一四八 阿片 一、〇、一〇

一四七 白陶土 五、〇、一〇

一四六 右爲五十九一日三回每回一粒乃至三粒、下痢

一四五 メントール 二、〇、一〇

一四四 白糖 一、〇、一〇

一四三 亞拉比亞護謨 一、〇、一〇

一四二 右二十九一日數回每回一粒

一四一 テルピノール 五、〇、一〇

一四〇 安息酸那篤留謨 五、〇、一〇

一三九 右爲五十九一日六粒乃至十粒

●注射劑 五、〇〇

一五三 グワヤコール 一、〇〇

一五二 沃度仿謨 一、〇〇

一五一 阿列布油 一、〇〇

一五〇 硫動バラフィン 一、〇〇

一四九 右皮下注射 一、〇〇

一四八 エウカリプトール 一、〇〇

一四七 クワヤコール 一、〇〇

一四六 沃度仿謨 一、〇〇

一四五 阿列布油 一、〇〇

一四四 右每二日三回以十分一乃至十分二箇注射皮下結組織內

一四三 桂皮酸 五、〇〇

一四二 水 一、〇〇

一四一 右每二日一回以十分一至十分二箇注射皮下結組織內

一四〇 知母爾水銀 一、〇〇

一三九 硫動バラフィン 一、〇〇

一三八 右一周一回以半箇乃至一箇注射訪問

一三七 麥角越幾斯 二、〇〇

一三六 水 一、〇〇

石炭酸 ○、一

右以半筒乃至一筒注射皮下

咯血

一五九 エルゴチン 三、〇

稀酒精、僱里設林、水 各五、〇

右臨臥以一筒注射皮下、盜汗

一五六 硫酸亞篤魯比涅 〇、〇一

蒸餾水 二、〇〇

右每回十滴乃至二十滴和水服用

又每回四分一乃至半筒注射皮下、盜汗

一五七 鹽酸ホモアトロピチ 〇、〇一

水 二、〇〇

右臨臥注射一筒於皮下、盜汗

一五七 貌魯談化ホモアトロピン 〇、〇一

蒸餾水 〇、〇一

右半筒乃至一筒注射皮下

一五三 硫酸ジユホイジン 〇、〇五

水 二、〇〇

右以十分四乃至半筒注射皮下、盜汗

●吸入劑

一五三 結列阿曹篤 一〇、〇

右每次十滴用クルツシユマ

ン氏裝置而吸入

一五四 結列阿曹篤 四滴

有加里油 八滴

嘔囉仿謨 二、〇〇

沃度仿謨 一、〇〇

亞爾側保兒、依的兒各一五、〇

一五五 石炭酸水 (〇、五) 一〇〇、〇

右吸入、小兒

一五六 硫酸規尼涅水 (〇、五) 一〇〇、〇

右吸入、小兒

一五七 過格魯兒鐵液 五、〇〇

右每半時一二分時間吸入

一五六 赤色沃度水銀 一、〇〇

沃度加留謨 一、〇〇

水 一〇〇〇、〇〇

右吸入最初一日一回自二〇、〇漸次增量至二〇、〇〇

一五六 鹽酸古加乙涅 〇、二五

抱水格魯刺兒 二、〇一三、〇〇

貌魯謨加留謨 二、〇一四、〇〇

僱里設林 五、〇〇

水 三〇〇、〇〇

右一日三四回每回二十瓦蒸氣吸入

一五六 爹兒水 二〇、〇一〇〇、〇〇

苛性那篤留謨液 一滴一二滴

右加蒸餾水全量爲二〇〇、〇〇吸入

一五八 明礬水 (二、〇) 二〇〇、〇〇

右吸入

一五九 鞣酸水 (二、〇) 二〇〇、〇〇

右吸入

一五三 重碳酸那篤留謨、食鹽各一、〇〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇三

水 二〇〇、〇〇

右吸入

一五四 結晶石炭酸 五、〇〇

酒精 二五、〇〇

鞣酸 二〇、〇
蒸餾水 一〇〇、〇
右每回一二食匙和三〇〇、〇
〇之水吸入

一五五 的列並油 一〇〇、〇
右每回一茶匙點加熱湯吸入

一五六 的列並油水 一〇〇、〇
右吸入

〇、五一〇、〇 一〇〇、〇
右吸入

●外用劑 二〇〇、〇
一五七 醋水 二〇〇、〇
右冷拭皮膚、盜汗

一五六 亞爾爾保兒 五〇、〇

第五節 胸膜諸病

胸膜炎 Pleuritis

肋膜炎、脇痛、舊譯作肺胞膜炎、又名肺衣炎
處置 患部寒濕法、酸性飲料、水蛭芥子泥貼用、末期則用吸收催進藥、滋養物、鐵劑、高度之呼吸困難滲出物之久時滯留等則用手術

一五九 右臨臥擦拭身體上部、盜汗
チモール 〇、二
酒精 二〇〇、〇
右塗布、盜汗

一五〇 撒里矢爾酸 五、〇
滑石 五〇、〇
右混和盜汗濕潤之際撒布身體

一五一 撒里矢爾酸 五、〇
滑石粉 一〇〇、〇
澱粉 一〇〇、〇
泥葛根末 一〇、〇
右撒布、盜汗

一五二 肝油 八〇、〇
流動蘇合香 二〇、〇
右腹部塗擦料

一五三 炭酸グアヤコール 二、〇
肝油 一〇、〇
右塗擦腹部

一五四 砒酸那篤留謨 一、〇
水 三〇、〇
右注於二立方仙米之紙一葉
乾而分截為二十片作煙草捲
吸煙

●浸煎劑
一五五 實麥答利斯浸 (一、五) 一八〇、〇
醋酸加留謨 五、〇

單舍利別 一五、〇
右每二時一食匙

醋酸加留謨 一五、〇
或硝酸加留謨 八、〇
薄荷舍利別 二〇、〇
右每二時乃至四時服一食匙

一五六 實麥答利斯浸 (一、〇) 一五〇、〇

一五六 實麥答利斯浸 (一、〇) 一五〇、〇

一五六 實麥答利斯浸 (一、〇) 一五〇、〇

一五七 實艾答利斯葉浸

(〇、六一〇、八)二〇〇、〇

重酒石酸加留謨

二〇〇、〇

海葱醋蜜

二〇〇、〇

一五九 實艾答利斯葉浸

(〇、四)一〇〇、〇

鹽酸規尼涅

〇〇、三

海葱丁幾

二〇〇、〇

醋酸加里

五〇〇、〇

一五九 實艾答利斯浸

(〇、四)一〇〇、〇

撒里矢爾酸那篤留謨

三〇〇、〇

一六〇 實艾答利斯浸

(一、五)一五〇、〇

重碳酸那篤留謨

五〇〇、〇

枸橼酸

適宜

單舍利別

右每二時一食匙

一六一 海葱浸

(二、〇)一五〇、〇

單舍利別

一五〇、〇

右每二時一食匙

一六二 吐根浸

(〇、三)一〇〇、〇

硝酸加留謨

四〇〇、〇

杏仁水

四〇〇、〇

一六三 吐根浸

(〇、三)一〇〇、〇

甘硝石精

二〇〇、〇

杏仁水

二〇〇、〇

一六四 吐根、實艾答利斯葉浸

(各〇、八)二〇〇、〇

醋酸加留謨液*

二〇〇、〇

海葱醋

二〇〇、〇

一六五 吐根浸

(〇、三)一〇〇、〇

重碳酸曹達

二〇〇、〇

機那丁幾

三〇〇、〇

單舍利別

八〇〇、〇

一六六 吐根

(〇、三)一〇〇、〇

撒里矢爾酸那篤留謨

三〇〇、〇

鹽酸莫兒比涅

〇〇、二

單舍利別

八〇〇、〇

一六七 規那煎

(一五、〇)二〇〇、〇

海葱醋

三〇〇、〇

一六八 規那煎

(八、〇)二〇〇、〇

醋酸加留謨

八〇〇、〇

單舍利別

一五〇、〇

一六九 機那煎

(四、〇)一〇〇、〇

醋酸加留謨

四〇〇、〇

沃度加留謨

一〇〇、五

單舍利別

八〇〇、〇

一七〇 機那煎

(一〇、〇)一〇〇、〇

沃度加留謨

〇〇、八

格魯矢鳩母丁幾

單舍利別

二〇〇、〇

一七一 機那煎

(一〇、〇)一〇〇、〇

沃度加留謨

一〇〇、〇

赤葡萄酒

五〇〇、〇

胸膜炎

九十九

單舍利別

右一日三回分服

一五、〇

二六二 機那煎

稀鹽酸

實麥答利斯丁幾

單舍利別

右一日三回分服

二六三 攝涅瓦浸

沃鐵舍利別

杏仁水

右一日六回分服

二六四 杜松質浸

醋酸加留謨液

海葱酸

右一日三回每回二食匙

二六五 旃那葉浸

酒石酸加留謨

滿那舍利別

右每二時一茶匙乃至二食匙

二六六 木賊煎

杜松子舍利別

右每二時一食匙

二六七 オノニース根煎

(四、〇)一〇〇、〇

醋酸加留謨

杏仁水

單舍利別

右每二時一茶匙(二日分服)

二六八

フラクター、オリエンタリス煎(五、〇)一〇〇、〇(二五、〇)

單舍利別

橙皮丁幾

右一日三回每回一食匙

●水劑

二六九 沃度加留謨

水

單舍利別

右每二時一食匙

二七〇 沃度加留謨

苦味丁幾

單舍利別

水

右一日三回分服

二七一 海葱丁幾、實麥答利斯丁幾

各十滴

海葱醋蜜

菩提樹水

右每時一茶匙

二七二 醋酸加留謨液

海葱醋蜜

單舍利別

薄荷水

右每二時一食匙

二七三 醋酸加留謨

沃度加留謨

杏仁水

單舍利別

水

右一日三回分服

二七四 醋酸加留謨

重酒石酸加留謨

咖啡涅

單舍利別

水

右一日三回分服

二七五 海葱醋

右以碳酸安母紐謨爲飽和

洋芹水

甘硝石精

一〇〇、〇

一八、〇

一八、〇

三〇、〇

一五〇、〇

四、〇

一、〇

四、〇

七、〇

一〇〇、〇

四、〇

六、〇

〇、五

七、〇

一〇〇、〇

三〇、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

四、〇

| | | |
|-----|--------------|---------|
| 一六六 | 杜松質油糖 | 二〇、〇 |
| | 右每一時一食匙 | |
| 一六六 | 海葱醋 | 二五、〇 |
| | 醋 | 二五、〇 |
| | 右飽和炭酸加留謨 | |
| | 薄荷水 | 一五〇、〇 |
| | 嬰粟舍利別 * | 二〇、〇 |
| | 右每二時一食匙 | |
| 一六七 | ヂウレチン | 五、〇一七、〇 |
| | 水 | 九〇、〇 |
| | 薄荷水 | 一〇〇、〇 |
| | 單舍利別 | 一〇、〇 |
| | 右每一時乃至二時服一食匙 | |
| 一六八 | 硝酸那篤留謨 | 八、〇 |
| | 水 | 二〇〇、〇 |
| | 右每二時一食匙 | |
| 一六九 | 格魯兒那篤留謨 | 三、〇一八、〇 |
| | 格魯兒化利丟謨 | 一、〇 |
| | 洋芹水 * | 一三〇、〇 |
| | 薄荷舍利別 | 二〇、〇 |
| | 右每二時一食匙 | |
| 一七〇 | ストロファンツス丁 | 一、〇一二、〇 |

| | | |
|-----|--------------------|----------|
| | 水 | 一五〇、〇 |
| | 橙皮舍利別 | 二〇、〇 |
| | 右一日三回乃至四回每回一食匙(利尿) | |
| 一七一 | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 一、〇一二、〇 |
| | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 橙皮舍利別 | 二〇、〇 |
| | 右每三時一小兒匙(小兒) | |
| 一七二 | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 五、〇一一〇、〇 |
| | 水 | 一八〇、〇 |
| | 甘草舍利別 * | 二〇、〇 |
| | 右每二時一食匙 | |
| 一七三 | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 一〇、〇 |
| | 水 | 一八五、〇 |
| | 橙皮丁幾 | 五、〇 |
| | 右每一時乃至二時一食匙 | |
| 一七四 | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 六、〇 |
| | 苦味丁幾 | 三、〇 |
| | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 右每二時一食匙 | |
| 一七五 | 安知必林 | 〇、五一二、〇 |

| | | |
|-----|------------------------|-------|
| | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 單舍利別 | 二〇、〇 |
| | 右每三時一小兒匙(小兒) | |
| 一七六 | 稀鹽酸 | 〇、五 |
| | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 橙皮舍利別 | 二〇、〇 |
| | 右每二時一小兒匙(小兒) | |
| 一七七 | 林檎酸鐵丁幾 | 五、〇 |
| | 苦味丁幾 | 五、〇 |
| | 橙皮舍利別 | 五〇、〇 |
| | 右一日三回每回一茶匙 | |
| ●丸劑 | | |
| 一七八 | 實麥答利斯末 | 一、五 |
| | 海葱末 | 一、五 |
| | 杜松質末 | 適宜 |
| | 右爲三十九一日三回乃至四回每回一丸 | |
| 一七九 | 實麥答利斯末 | 〇、五 |
| | 海葱末 | 〇、五 |
| | 甘汞 | 〇、五 |
| | 右亞拉比亞護謨漿適宜爲二十九一日二丸乃至四丸 | |
| 一八〇 | 海葱、實麥答利斯、スカンス | 一 |

單占利別

各五、〇

右爲百九一日二九乃至十九

一六四 藤黃、實支答利斯葉末各一、四

海葱末、金硫黃、

ビンピチルラ越幾斯各一、四

右亞拉比亞護謨漿適宜爲六

十九每二時乃至三時一丸乃

至二丸

一六三 磷酸古埵乙涅 〇、二一〇、五

右甘草末、甘草蒸各適宜爲

十九一日一回乃至三回每回

一丸

一六二 結麗阿曹篤

〇、〇二五一〇、〇二八

右爲丸每食後服用

一六一 鹽酸規尼涅

右爲丸一日三回分服 一、〇

一六五 チウレチン

右分十包每日三回每回一包 二、〇

一六四 實支答利斯葉末、甘朮

各〇、〇五

乳糖

右爲一包一日五回每回一包 適宜

一六七 重酒石酸加留謨

五〇、〇

右一日三回每回一茶匙

一六八 硝酸加留謨

四、〇

重石酒酸加留謨

三、七

甘朮 〇、二

吐酒石 〇、一

右分三包每二時乃至三時服

一食匙

一六九 硝酸加留謨

〇、三

樟腦 〇、一

阿片 〇、〇三

白糖 八、〇

右混和爲茶劑臨臥頓服

一七〇 菲沃斯越幾斯

〇、一

重碳酸那篤留謨

二、〇

次硝酸芥鉛 一、五

白糖 一、〇

一七一 撒里矢爾酸那篤留謨

三、〇

右頓服

一七二 撒里矢爾酸那篤留謨

二、〇一四、〇

右分四包一日四回分服

一七三 撒里矢爾酸那篤留謨

各二、〇一四、〇

右分四包一日四回分服

一七四 撒里矢爾酸那篤留謨

三、〇

右頓服

一七五 安知歇貌林

一、〇

白糖 一、〇

一七六 鹽酸必魯加兒比涅

〇、〇二

右一日一回一包

一七七 鹽酸莫兒比涅

〇、〇三

白糖 三、〇

一七八 鹽酸莫兒比涅

〇、一

右分十包臨時頓服

一七九 硫酸規尼涅

〇、八

白糖 五、〇

一八〇 右分十包每三時乃至四時一

一六〇 包
鹽酸規尼涅
白糖 一、〇
右分五包一日五回分服 五、〇

一六一
硫酸規尼涅 〇、八
加糖炭酸鐵 〇、八
重炭酸那篤留謨 五、〇
白糖 五、〇

一六二
阿片末 〇、一五
甘汞 〇、三五
白糖 八、〇
右分七包一日三回每回一包

一六三
托勃兒氏散 〇、六
甘汞 〇、一
乳糖 一、〇
右分二包每二時一包

一六四
オノニチス根 一五、〇
レウヒスチー根 一五、〇
杜松實 一五、〇
甘草根 一五、〇

一六五
右混和爲茶劑每回服一食匙
プラッター、オリエンタリス

五、〇—一〇、〇
右分十包一日三回乃至四回
每回一包和糖水服用

一六六
加兒爾斯泉鹽 一五、〇
右微溫湯適宜溶解每朝頓服

一六七
●塗擦劑
イヒチオール 適宜
右塗布

一六八
イヒチオール 一、〇
格魯胃謨 一〇、〇
右塗布

一六九
沃度化加留謨 二、〇
沃度 〇、五
偏里設林 二〇、〇
右塗布

一七〇
沃度加留謨 二、〇
沃度 〇、五
偏里設林 一、〇
酒精 四〇、〇
右塗擦

一七一
沃度加留謨 二、〇
沃度 〇、五
實麥答利斯軟膏*

一七二
右塗布患部被護謨紙
沃度加留謨 二、五
沃度 〇、五

水 二、〇
豚脂 二五、〇
右塗擦

一七三
沃度丁幾 一五、〇
沒食子丁幾 一五、〇
右塗布

一七四
實麥答利越幾斯 二、〇
水銀軟膏 八、〇
右塗擦

一七五
沃度仿謨 一、〇
華攝林 一五、〇
右塗擦

一七六
沃度仿謨 三、〇
刺納林 二五、〇
豚脂 二五、〇
右塗擦患部

一七七
沃度仿謨 一、〇
百露拔爾撒謨 三、〇
古魯胃謨 一、〇
右塗擦

一六八 沃度仿謨 五、〇—一〇、〇

粘着硬膏 二〇、〇—三〇、〇

或亞鉛硬膏二〇、〇—三〇、〇

右爲膏藥貼用

一六九 嘔囉仿謨、菲沃斯油各一〇、〇

右塗布、被護謨紙

一七〇 嘔囉仿謨 二〇、〇

安母尼亞擦劑

右塗擦 八〇、〇

一七一 古魯胃謨 三〇、〇

的列並油 二〇、〇

蓖麻子油 〇、五

右塗擦

一七二 芥子精、樟腦精 各二五、〇

右塗擦

一七三 依的兒性瑞香越幾斯 一〇、〇

樟腦 〇、七五

鹽麻子油 二、二五

酒精 五、〇

酒精 三二、〇

胸痛 Pleurodynie.

一六四 安知必林

一、五

一六四 右塗擦 的列並油 一〇〇、〇

醋酸 二〇、〇

蒸微水 八〇、〇

枸櫞油 一〇、〇

卵黃 一個

右塗擦

●滴劑

一六五 ストロファンツス丁幾二〇、〇

右一日三回每回五滴乃至十

五滴

一六六 質麥答利斯丁幾 一〇、〇

古魯矢屈謨丁幾 一〇、〇

甘硝石精 二〇、〇

右每三時乃至四時服二十滴

一六七 質麥答利斯越幾斯 一〇、〇

海葱醋 一五、〇

右每三時服十滴乃至二十滴

一六八 鹽酸莫兒比涅 一〇、〇

杏仁水 一〇、〇

白糖

一〇、〇

右一日三回每回服十滴乃至十五滴

●注射劑

一六九 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

蒸餾水 五、〇

右一筒注射皮下

一七〇 鹽酸必魯加兒必涅 〇、一

水 一〇、〇

右一筒注射皮下但注射前與

以赤酒一盞

●洗滌劑

一七一 撒里矢兒酸水 (〇、二%) 一〇〇〇、〇

右手術後洗滌劑

一七二 千倍過滿俺酸加留謨水 二〇〇、〇

右手術後洗滌劑

一七三 稀薄格魯兒水 二〇〇〇、〇

右手術後洗滌劑

一七四 稀薄格魯兒水 二〇〇〇、〇

右手術後洗滌劑

右混和分三包一日三回每回

一包

一六五 撒里矢爾酸那篤留謨 八、〇

薄荷水 六〇、〇

水 一四〇、〇

右一日三回二分服

一六六 燬製麻偏涅失亞

蒸餾水 一五〇、〇

皮水 五〇、〇

白糖 一五〇、〇

右混和振盪每一時一食匙

一六七 (瀉下藥) 五十倍鹽酸莫兒比涅水

右半筒注射皮下

胸水 Hydrothorax.

欲證、胸水腫、胸水病、一作水胸、舊譯作肺膜積水、又名水結胸

一六八 實麥答利斯葉浸

(一、〇) 一二〇、〇

醋酸加留謨 五〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

一六九 實麥答利斯葉浸

(一、五) 一二〇、〇

ストロファンツス丁幾 五〇、〇

硝酸加留謨 五〇、〇

單舍利別 一〇、〇

胸氣症及胸膿症

Pneumothorax Iyo(pneumo)thorax.

胸氣腫、胸風、氣胸、膿胸、舊譯作肺膜積膿與水

一七〇 鹽酸莫兒比涅

水 〇、〇五

右一筒注射皮下(呼吸困難及疼痛)

一七五 硝酸加留謨

水 二〇〇、〇

右每二時一食匙

一七〇 實麥答利斯葉

海葱 一〇、〇

右沸騰水浸出 二〇、〇

杜松子舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

一七一 デウレチン 五〇、〇

水 一〇、〇

右一日三回分服

一七三 安息香酸那篤留謨咖啡涅

實麥答利斯末

白糖 〇、〇五

右爲一包每二時一包

一七三 甘水 一、〇

白糖 一、五

右分五包一日三回乃至五回分服

單舍利別

一五、〇

右每二時一食匙(消炎)

第二篇 消化器系諸病

第一節 口腔咽頭之諸病

口腔加答兒 Stomatitis catarrhalis.

口內加答兒、加答兒性口內炎、口糜

●水劑

一七六

大黃浸

(四、〇)一五〇、〇

重碳酸那篤留謨

五、〇

單舍利別

一五、〇

右每二時一食匙

●含嗽劑

一七七

格魯兒酸加留謨水

(二、〇)一〇〇、〇

右含嗽料

一七八

格魯兒酸加留謨

(四、〇)一〇〇、〇

水

二〇〇、〇

右含嗽

一七九

過滿俺酸加留謨水

(〇、五)五〇〇、〇

右含嗽

一七〇

過滿俺酸加留謨水

| | |
|-------------|------------|
| 右含嗽 | (二、〇)五〇〇、〇 |
| 一七一 硼酸水 | (二、〇)二〇〇、〇 |
| 右含嗽 | (一、〇)一〇〇、〇 |
| 一七二 明礬水 | (二、〇)一〇〇、〇 |
| 右含嗽 | (二、〇)一〇〇、〇 |
| 一七三 鞣酸水 | (四、〇)二〇〇、〇 |
| 右含嗽 | (二、〇)一〇〇、〇 |
| 一七四 硼酸那篤留謨水 | (一、〇)四〇〇、〇 |
| 右含嗽 | (一、〇)四〇〇、〇 |
| 一七五 石炭酸水 | 五、〇 |
| 右含嗽 | 四、五 |
| 一七六 貌魯謨加留謨 | 三、〇 |
| 俾里設林 | 三、〇 |
| 煮沸水 | 三、〇 |
| 右含嗽 | 三、〇 |

| | |
|-------------|------------|
| 一七七 格魯兒安母紐謨 | 五、〇 |
| 水 | 一五〇、〇 |
| 醋蜜 | 五〇、〇 |
| 右含嗽 | 二、〇 |
| 一七八 過酸化水素溶液 | 一〇〇、〇 |
| 水 | 一〇〇、〇 |
| 右含嗽 | 一〇〇、〇 |
| 一七九 格魯兒水 | 一五〇、〇 |
| 水 | 一五〇、〇 |
| 右含嗽 | (五、〇)二〇〇、〇 |
| 一七〇 格魯兒石灰水 | 六、〇 |
| 右濾過含嗽 | 一〇〇、〇 |
| 一七一 サロール | 一〇〇、〇 |
| 酒精 | 一〇〇、〇 |
| 右水適宜調和含嗽 | 一〇〇、〇 |
| 一七二 サロール | 一〇〇、〇 |
| 酒精 | 一〇〇、〇 |
| 右水適宜調和含嗽 | 一〇〇、〇 |

| | | |
|-----|---------------------|-------|
| 一七三 | 稀酒精 | 一〇〇、〇 |
| | 呀囉虫丁幾 | 五、〇 |
| | 薄荷油 | 二滴 |
| | 薔薇油 | 三滴 |
| | 右一茶匙加一碗之水含嗽 | |
| 一七三 | 硼酸 | 五、〇 |
| | 酒精 | 九〇、〇 |
| | 芳香丁幾 | 一〇、〇 |
| | 薄荷油 | 十滴 |
| | 右每回半茶匙乃至一茶匙調和二盞之水含嗽 | |
| 一七四 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 |
| | 酒精 | 一〇〇、〇 |
| | 薄荷油 | 一、〇 |
| | 尚香油 | 一、〇 |
| | 右每回一茶匙調和一盞之水含嗽 | |
| 一七五 | 知母爾 | 〇、五 |
| | 酒精 | 五、〇 |
| | 佛里設林 | 一〇、〇 |
| | 溫水 | 五〇〇、〇 |
| | 右含嗽 | |
| 一七六 | 知母爾 | 〇、一五 |

| | | |
|-----|-------------|-------------|
| | 安息香酸 | 三、〇 |
| | 有加里丁幾 | 一五、〇 |
| | 昇汞 | 〇、一〇、八 |
| | 薄荷油 | 〇、七五 |
| | 酒精 | 一〇〇、〇 |
| | 右數滴和一酒盞之水含嗽 | |
| 一七七 | 有加里油 | 二、〇 |
| | 碳酸麻佛涅叟謨 | 四、〇 |
| | 硼酸那篤留謨 | (一五、〇)一〇〇、〇 |
| | 右濾過含嗽 | |
| 一七八 | ラタニヤ越幾斯 | 五、〇 |
| | 明礬 | 五、〇 |
| | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 蜂蜜 | 三〇、〇 |
| | 右加水含嗽 | |
| 一七九 | 大麥煎 | 二〇〇、〇 |
| | 明礬 | 二、〇 |
| | 蜂蜜 | 四〇、〇 |
| | 右含嗽 | |
| 一七〇 | 燕麥煎 | 二五〇、〇 |
| | 硫酸エリキシール | 二、〇 |
| | 蜂蜜 | 六〇、〇 |

| | | |
|-----|---------|-------------|
| | 右含嗽 | |
| 一七三 | 亞麻仁煎 | (二〇、〇)三〇〇、〇 |
| | 格魯兒酸加留謨 | 八、〇 |
| | 右含嗽 | |
| 一七三 | 亞爾答煎 | (三〇、〇)三〇〇、〇 |
| | 格魯兒酸加留謨 | 八、〇 |
| | 右含嗽 | |
| 一七三 | 撒爾比亞浸 | (二五、〇)二〇〇、〇 |
| | 薔薇蜜 | 一〇、〇 |
| | 右含嗽 | |
| 一七四 | 撒爾比亞浸 | (一〇、〇)二〇〇、〇 |
| | 明礬 | 五、〇 |
| | 右含嗽 | |
| 一七五 | 撒爾比亞浸 | (二五、〇)二〇〇、〇 |
| | 稀鹽酸 | 四、〇 |
| | 沒藥丁幾 | 八、〇 |
| | 右含嗽 | |
| 一七六 | 精製木醋 | 三〇、〇 |
| | 酒精 | 六〇、〇 |
| | 沒藥丁幾 | 一〇、〇 |

| | |
|--------------|--------|
| 薄荷油 | 十滴 |
| 尚香油 | 十滴 |
| 石炭酸 | 二、〇 |
| 複方機那丁幾 | 五、〇 |
| 沒藥丁幾 | 五、〇 |
| 酒精 | 一〇〇、〇 |
| 薄荷油 | 一、〇 |
| 右四滴乃至五滴加一碗之水 | 五、〇 |
| 含嗽 | 一、〇 |
| 沒藥 | 一〇、〇 |
| 桂皮 | 一〇、〇 |
| 角尚香 | 一〇、〇 |
| 酒精 | 一〇〇〇、〇 |
| 呀囉虫末 | 五、〇 |
| 右浸出八日間濾過 | 二五、〇 |
| ザロール | 二五、〇 |
| 右一茶匙加一碗之水含嗽 | 各五、〇 |
| 阿仙藥丁幾、溫藥丁幾 | 八五、〇 |
| 芳香丁幾 | 〇、五 |
| 酒精 | |
| 薄荷油 | |

| | |
|------------|------------|
| 尚香油 | 〇、五 |
| 右一茶匙加一碗水含嗽 | |
| ●塗布藥 | |
| 格魯兒加留謨 | 一、〇 |
| 硼酸 | 一、〇 |
| 儂里設林 | 一〇、〇 |
| 枸橼汁 | 一五、〇 |
| 右塗布 | 二、〇 |
| 格魯兒加留謨 | 二〇、〇 |
| 儂里設林 | |
| 右塗布 | (一、五)五〇、〇 |
| 格魯兒加留謨水 | |
| 右塗布 | (一、〇)三〇、〇 |
| 硝酸銀水 | (一、〇)三〇、〇 |
| 右塗布 | (一、〇)三〇、〇 |
| 硫酸亞鉛水 | 二〇、〇 |
| 右塗布 | 一、〇 |
| 撒里矢爾酸 | 二〇、〇 |
| 儂里設林 | |
| 右塗布 | (〇、一)五〇〇、〇 |
| 昇汞水 | |

| | |
|----------|-----------|
| 右塗布(慢性症) | 〇、五 |
| 昇汞 | 二五、〇 |
| 儂里設林 | 〇、五 |
| 右塗布 | 一、五 |
| 次醋酸鉛水 | 三〇、〇 |
| 亞拉比亞護謨 | 一五、〇 |
| 單舍利別 | |
| 水 | |
| 右塗布 | (四、〇)三〇、〇 |
| 單寧酸水 | 五、〇 |
| 右塗布 | 二〇、〇 |
| 單寧酸 | 一、〇 |
| 儂里設林 | 三〇、〇 |
| 右塗布 | 一、〇 |
| 單寧酸 | 一、〇 |
| 明礬 | 一、〇 |
| 蕎薇蜜 | 一、〇 |
| 右塗布 | 一五、〇 |
| 蜜兒拉了幾 | |
| 右塗布 | 各一、〇 |
| 蜜兒拉了幾 | |
| 拉答尼亞丁幾 | |
| 右塗布 | |

一七四 ラクニヤ丁幾、沒藥丁幾 各五、〇

右塗布

一七五 硼酸那篤留謨水

(五、〇)二五、〇

右塗布

一七六 硼酸那篤留謨

蜂蜜

三、〇一六、〇

三、〇、〇

右塗布

一七七 硼酸那篤留謨

一五、〇

阿布答性口腔炎

Stomatitis aphthosa, Aphthae.

亞布答、阿布答性口腔炎、口內格魯布、濕泡口內炎、右書皆包括於鵝口瘡中

●水劑

一七五 格魯兒酸加留謨一、〇一、二、〇

水

一、二〇、〇

右每時一小兒匙

●含嗽劑

一七六 格魯兒酸加留謨水

(一、〇)二〇〇、〇

單舍利別

右每二時一茶匙(小兒)

二〇、〇

一五、〇 適宜

水

右塗布

一七六 硼酸那篤留謨

薔薇水、沒藥丁幾

薔薇蜜

右塗布

一七五 硼酸那篤留謨

薔薇蜜

薔薇水

各二〇、〇

四〇、〇

五、〇

二〇、〇

一〇、〇

右塗布、乳兒

一七六 重碳酸那篤留謨

貌留謨加留謨

右塗布

一七二 ソゾヨドル水

(五、〇)一〇〇、〇

右塗布

一七三 硝酸銀水 (一、〇)三〇、〇

右塗布(慢性症)

一七五 格魯兒酸加留謨水

覆盆子舍利別

(一、〇)二〇〇、〇

右含嗽

一七六 硼酸那篤留謨水

(五、〇)五〇〇、〇

右含嗽

一七七 撒里矢爾酸水

(一、〇)二〇〇、〇

右含嗽

一七六 昇汞水 (〇、〇六)三〇〇、〇

右含嗽

一七九 沙列布煎 二〇〇、〇

阿片丁幾

單舍利別

右含嗽

●塗布劑

一七三 格魯兒酸加留謨水

(二、〇)五〇、〇

右塗布

一七二 過俺酸加留謨水

(〇、二)二〇〇、〇

右塗布

一七三 硝酸銀水

(〇、五)一五、〇

右塗布

一七三 硫酸亞鉛水

(一、〇)二〇、〇

右塗布

一七四 硫酸亞鉛水

(〇、八)一〇、〇

右塗布

一七五 稀鹽酸

二、〇

右塗布

一〇〇、〇

●水劑

一七四 格魯兒酸加留謨

六、〇

右每二時一食匙

一七五 格魯兒酸加留謨

二、〇

一七六 單寧酸

五、〇

右塗布

一七七 撒里矢爾酸

二〇、〇

右塗布

一七六 硼酸那篤留謨水

一、〇

右塗布

一七九 硼酸那篤留謨

三〇、〇

右塗布

一七八 硼酸那篤留謨

五、〇

右塗布

一七八 硼酸那篤留謨

二五、〇

右塗布

一〇〇、〇

單舍利別

右每二時半食匙、小兒

一七八 沃度

沃度加留謨

〇、一

一七八 右塗布

三、〇一六、〇

一七八 硼酸那篤留謨

右塗布

一八二 硼酸那篤留謨

右塗布

一八三 硼酸那篤留謨

右塗布

一八三 枸櫞汁、覆盆子舍利別

右塗布

一八三 枸櫞汁、覆盆子舍利別

右塗布

各一〇、〇

一八三 薄荷水

右一日二三回每回一小兒匙

●含嗽劑

一八三 格魯兒酸加留謨水

乃至一食匙

一八三 薄荷水

右一日二三回每回一小兒匙

●含嗽劑

一八三 格魯兒酸加留謨水

乃至一食匙

汞毒性口內炎 Stomatitis mercurialis.

口中腐爛

處置 格魯兒酸加里、含嗽內服等

右含嗽 (五、〇)二〇〇、〇

一七九 硼酸水 右含嗽 (四、〇)二〇〇、〇

一七九 明礬水 右含嗽 (二、〇)二〇〇、〇

一七九 鞣酸水 右含嗽 (二、〇)二〇〇、〇

一七九 過滿倫酸加留謨水 右含嗽 (二、〇)五〇〇、〇

一七九 石炭酸水 右含嗽 (一、〇)四〇〇、〇

矢荷兒陪克性口腔炎

Stomatitis scorbutica

一八〇 ●含嗽劑 格魯兒酸加留謨水 (五、〇)二〇〇、〇

一八〇 明礬水 右含嗽 (二、〇)二〇〇、〇

一八〇 撒爾比亞浸 右含嗽 (二、五、〇)二〇〇、〇

「コクレアリヤ」精 五〇、〇

右含嗽 一七九 二%石灰水 二〇〇、〇

一七九 沃度加留謨 右含嗽 二、〇—一〇、〇

薄荷水 水 一五〇、〇

一七五 右含嗽 メチレンブラウ溶液

●塗布劑 一七六 百露拔爾撒謨 右塗布 一〇、〇

一八〇 右含嗽 拉答尼亞煎 (一、五、〇)二〇〇、〇

一八〇 蜜兒拉丁幾 右含嗽 五、〇

一八〇 右含嗽 コクレアリヤ精 二五、〇

●塗布劑 一八四 二十倍硝酸銀水 右塗布(潰瘍性) 一五、〇

一七九 石炭酸 二、五

酒精 五、〇

亞拉比亞謨謨漿 四、〇

一七六 右塗布 二十五%貌魯謨水素酸水 五、〇

一七九 單寧酸 二、〇

明礬 一、〇

薄荷油 三滴

阿仙藥機那皮末 各一五、〇

右齒磨粉用

一八〇 蜜兒拉丁幾、酒精 各一〇、〇

一八〇 右塗布 格魯兒石灰水(一、〇)三〇、〇

一八〇 阿仙藥、蜜兒拉 各五、〇

百露拔爾撒謨 〇、六

「コクレアリヤ」精、稀酒精 各一五、〇

右浸出濾過每回以二三滴塗

布

潰瘍性口内炎

Stomatitis ulceroza.

●水劑

一八〇 格魯兒酸加留謨

水 一〇〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

●含嗽劑

一八〇 格魯兒酸加留謨水

(五、〇)五〇〇、〇

右含嗽

一八〇 撒里矢爾酸水

(五、〇)五〇〇、〇

右含嗽

一八二 過滿俺酸加留謨水

(二、〇)五〇〇、〇

右含嗽

一八三 阿片丁幾

水 五〇〇、〇

右含嗽

一八三 機那煎

鵝口瘡

Soor Aphthae infantum.

二五〇、〇

一八七 センツォドル水

格魯兒加留謨

酒精 三〇、〇

單舍利別 六〇、〇

右含嗽 〇、一五

一八四 知比爾

安息香酸 三、〇

右加里丁幾 一五、〇

昇求 〇、八

酒精 一〇〇、〇

薄荷油 五滴

右滴注於一盞之水以溷濁爲

度含嗽

●塗布劑

一八五 醋酸礬土水

(一、〇—三、〇)一〇〇、〇

右塗布

一八六 知母爾水 (〇、一)三〇〇、〇

右塗布

右塗布

一八八 クローム酸

水 五、〇

右注意塗布

一八九 ラタニヤ丁幾、沒食子丁幾

各五、〇

右塗布

一八〇 スピランチス丁幾

五、〇

沒食子丁幾

一〇、〇

阿片丁幾

一、〇

右塗布

一八二 結晶硼酸

右附於銀消息子溶解於酒精

盤上面磨蝕之

一八三 菩提樹炭

右細研爲齒磨粉

(五、〇)一〇〇、〇

二〇、〇

寄生性口內炎、鵝口、雪口、白珠子、一名寄生性口內炎、舊作口瘡又名口内生白點紅點、重者爲口瘡

●水劑

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| 一八三 格魯兒酸加留謨水 | 三、〇 六〇、〇 一五、〇 | 一八六 レゾルチン水 | 右每二時一茶匙 〇、五一、〇 一〇〇、〇 | 一八五 稀鹽酸水 | 右含嗽 一、〇 三、〇 二〇〇、〇 |
| 單舍利別 | | 右每二時一小匙 | | 一八四 稀鹽酸水 | 右含嗽 一、〇 三、〇 二〇〇、〇 |
| 右每一時一茶匙 | | ●含嗽劑 | | 一八三 過滿俺酸加留謨水 | 右含嗽 〇、〇五、〇 二〇〇、〇 |
| 一八四 格魯兒酸加留謨水 | 一、〇 一〇〇、〇 二〇〇、〇 | 一八三 重碳酸那篤留謨水 | 右含嗽 〇、〇五、〇 二〇〇、〇 | 一八二 重碳酸那篤留謨水 | 右含嗽 〇、〇五、〇 二〇〇、〇 |
| 覆盆子舍利別 | | 一八三 重碳酸那篤留謨水 | 右含嗽 〇、〇五、〇 二〇〇、〇 | 一八一 硼酸那篤留謨水 | 右含嗽 一、〇 三、〇 二〇〇、〇 |
| 右每一時一小兒匙 | | 一八三 重碳酸那篤留謨水 | 右含嗽 〇、〇五、〇 二〇〇、〇 | 一八〇 硼酸那篤留謨水 | 右含嗽 一、〇 三、〇 二〇〇、〇 |
| 一八五 格魯兒酸加留謨水 | 〇、二五、〇 一〇〇、〇 一〇〇、〇 | 一八三 重碳酸那篤留謨水 | 右含嗽 〇、〇五、〇 二〇〇、〇 | 一七九 撒爾比亞浸 | 右含嗽 一、八〇、〇 八、〇 三〇、〇 |
| 覆盆子舍利別 | | 一八三 重碳酸那篤留謨水 | 右含嗽 〇、〇五、〇 二〇〇、〇 | 一七八 玫瑰蜜 | 右含嗽 三〇、〇 |
| 右每一時一茶匙 | | 一八三 重碳酸那篤留謨水 | 右含嗽 〇、〇五、〇 二〇〇、〇 | 一七七 食鹽水 | 右含嗽 二、〇一五、〇 一〇〇、〇 |
| 一八六 接骨木花浸 | 一八〇、〇 五、〇 三〇、〇 | 一八三 重碳酸那篤留謨水 | 右含嗽 〇、〇五、〇 二〇〇、〇 | | |
| 炭酸加留謨 | | 一八三 重碳酸那篤留謨水 | 右含嗽 〇、〇五、〇 二〇〇、〇 | | |
| 亞爾答舍利別 | | 一八三 重碳酸那篤留謨水 | 右含嗽 〇、〇五、〇 二〇〇、〇 | | |
| 右每一時一食匙 | | 一八三 重碳酸那篤留謨水 | 右含嗽 〇、〇五、〇 二〇〇、〇 | | |
| 一八七 硫基石炭酸那篤留謨水 | 三、四、〇 五〇、〇 二〇、〇 | 一八三 重碳酸那篤留謨水 | 右含嗽 〇、〇五、〇 二〇〇、〇 | | |
| 單舍利別 | | 一八三 重碳酸那篤留謨水 | 右含嗽 〇、〇五、〇 二〇〇、〇 | | |

一八四二 右含嗽
知母爾水(〇、五)一〇〇〇、〇
右含嗽

一八四三 安息香酸曹達水
(五、〇—一〇、〇)一〇〇〇、〇
右含嗽

一八四四 安息香酸水(一、〇)一〇〇〇、〇
右消毒的洗滌

●塗布劑

一八四四 硼酸水 (四、〇)一〇〇〇、〇
右一日二三回塗布

一八四五 過滿俺酸加留謨水
(一、〇)二〇〇〇、〇
右塗布

一八四六 稀鹽酸
玫瑰蜜
右塗布

一八四七 玫瑰蜜
右塗布

唾液漏

Salivatio, Pyralismus.

流涎、

●水劑
一八五〇 格魯兒酸加留謨
水
四、〇
二〇〇、〇

一八四七 硼酸那篤留謨水
(四、〇)一〇〇〇、〇
右塗布

一八四八 硼酸那篤留謨水
(五、〇—一〇、〇)一〇〇〇、〇
右塗布

一八四九 硼酸那篤留謨
亞拉比亞護謨漿
右塗布

一八五〇 硼酸那篤留謨
玫瑰蜜
右塗布

一八五一 硼酸那篤留謨
薔薇水
玫瑰蜜
沒藥丁幾
右塗布

一八五二 薔薇水
玫瑰蜜
沒藥丁幾
右塗布

一八五三 沒藥丁幾
右塗布

一八五三 明礬
玫瑰蜜
阿仙藥丁幾
右塗布

一八五三 硝酸銀水
(〇、五—一、〇)五〇〇、〇
右塗布

一八五四 昇汞水 (〇、一)一〇〇〇、〇
右一日二三回塗布

一八五五 黃金水
(昇汞一分、石灰水三百分)

一八五六 儼里設林
右塗布

一八五六 ザカリン
酒精
右一日數回塗布

一八五六 ザカリン
酒精
右一日數回塗布

一八五六 右每二時一食匙
大黃浸 (六、〇)二〇〇、〇
燉製麻儼涅矢亞
八、〇

●散劑
滿那舍利別
右振盪每時一食匙
二五、〇

一八九 阿片 〇、三

白糖 五、〇

右混和分十包一日三回每回一包

一八〇 鹽酸莫兒比涅 〇、〇二一〇、二

白糖 三、〇
右分十包隨時一包
丸劑

齒痛 Odontalgie.

風牙、牙痛、

一八六 格魯兒酸加留謨水

●含嗽劑
右含嗽 (四、〇)一二〇、〇

一八七 ラタニヤ越幾斯 五、〇

明礬 五、〇
水 一〇〇、〇
蜂蜜 三〇、〇

一八八 重碳酸那篤留謨 五、〇

サツカリソ 〇、五
撒里矢爾酸 一、五

一八三 複方大黃越幾斯 〇、五一一、〇

右爲丸頓服

一八四 硫酸亞篤魯必涅 〇、〇〇一五

右甘草末各適宜爲三丸、一日二回每回一丸

一八五 硫酸亞篤魯必涅 〇、〇〇五
右白陶土適宜爲十九一日三回乃至四回每回一丸

酒精 一五〇、〇
右一茶匙加一碗之水含嗽

一八六 薄荷油 三、〇

アニス油 二、〇
ベルガモット油 〇、二

石鹼精 三〇、〇
酒精 五〇〇、〇

右稀釋於五〇〇、〇之水含嗽

一八七 石鹼精 三〇、〇

酒精 二〇〇、〇
薄荷水 三〇〇、〇

一八四 號譽漢化ヒヨスチン 〇、〇一

右甘草末、甘草蒸各適宜爲二十九一日三回乃至四回每回一丸

●含嗽劑 回一丸

一八五 鞣酸水 (二、〇)二〇〇、〇
右含嗽

石炭酸 五、〇

ベルガモット油 三、〇

丁香油、アニス油 各二、〇

右含嗽

一八七 吉納 一、〇

再留酒精 六〇、〇

薄荷油 十五滴

樟皮油、肉豆蔻油 各五滴

丁香油 二、〇
右三十滴和半盞之水含嗽
ザロール 二、〇
薄荷油 一、〇

丁香油、桂皮油、アニス油 各〇、五

酒精 二〇〇、〇

右一茶匙加一酒盞之水合嗽

一八七 知母爾 〇、二五

安息香酸 三、〇

有加里丁幾 一五、〇

ガウルテリヤ油 一、〇

酒精 一〇〇、〇

右一茶匙點滴於一碗之水合嗽

一八七 知母爾 〇、三

山番菜精、メリツサ精 各三〇、〇

ラタニヤ丁幾 一〇、〇

薄荷油 〇、五

丁香油 一、〇

右每回十滴和一盞之水合嗽

一八五 癩疥木丁幾 一五、〇

癩草丁幾 三〇、〇

複方安息香丁幾 各五、〇

山番菜精 各五、〇

芳香阿片酒 二、〇

右一茶匙加一碗之微溫湯合嗽

一八七 菲沃斯葉、錦葵葉 各二〇、〇

右四分之一以一碗之熱沸湯浸出合嗽

●固封劑

一八七 サンダラツク 五、〇

依的兒 一〇、〇

右齒窩封鎖液

一八七 サンダラツク、乳香 各五、〇

酒精 三〇、〇

右濕過二〇、〇封鎖液

一八七 亞砒酸 五、〇

醋酸莫兒比涅 〇、五

右結麗阿曹篤適宜爲糕填入

齒窩封鎖液

一八〇 石炭酸 二〇、〇

或沃度仿謨 一〇、〇

酸化亞鉛 一〇、〇

白蠟 一〇、〇

右佩里設林、薄荷油適宜爲

糕充填齒窩中封鎖二週間

●鎮痛劑

一八二 ザローフェン 一、〇

右一日一二回(鎮痛)

一八三 撒里矢爾酸 六、〇

右分六包(屢麻質斯性齒痛)

一八二 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

安知必林 五、〇

酒石酸 二、五

重碳酸那篤僧謨 三、五

枸橼油糖 五、〇

右分十包每回投與一包(鎮痛)

一八四 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

鹽酸亞刺莫兒比涅 〇、〇五

鹽酸 十滴

薄荷水 一五、〇

右一日三回每服十滴(鎮痛)

●填入劑

一八五 抱水格魯刺爾 五、〇

右小片填入齶窩

一八六 抱水格魯刺兒 五、〇

樟腦 五、〇

右充填齒窩中

一八七 クロトントンクロラールヒドラー

石炭酸 二、〇
右浸含綿球插入齒窩 二、〇

一八六 薄荷油 十滴

右浸綿球插入齒窩

一八八 石炭酸、沃度丁幾 各等分

右浸綿絮填入齒空洞中(齒根膜炎)

一八九 石炭酸 五、〇

偏里設林 五、〇

一八九 石炭酸 五、〇

右浸含綿球插入齒窩

一八九 古管胃謨 五、〇

右浸含綿球插入

一八九 石炭酸 一、〇

嚼囉仿謨 三、〇

一八九 石炭酸 一、〇

抱水格魯刺兒 五、〇

一八九 石炭酸、嚼囉仿謨、依的兒、酒精 各一、〇

一八九 石炭酸、嚼囉仿謨、依的兒、酒精 各一、〇

一八九 石炭酸、嚼囉仿謨、依的兒、酒精 各一、〇

一八九 石炭酸、嚼囉仿謨、依的兒、酒精 各一、〇

右浸小綿球填入齶窩中 各三、〇

一八九 石炭酸、丁香油 〇、三

鹽酸莫兒比涅 〇、三

右齶窩綿球插入 〇、五

一八八 鹽酸莫兒比涅 〇、五

結麗阿曹篤 〇、一

亞砒酸 〇、一

右浸小綿球填入齶窩 〇、一五

一八七 鹽酸莫兒比涅 二、〇

酒精 一、〇

嚼囉仿謨 一、〇

右一滴浸含綿花插入 各二、〇

一八九 阿片泊美蘭丁、依的兒精 各二、〇

薄荷油 各二、〇

右綿球浸含插入齶窩 一、〇

一八九 鹽酸古加乙涅 各二、五

薄荷水、酒精 〇、〇五

石炭酸 〇、〇五

右浸含綿球填入齶窩 〇、四一、〇

一八九 鹽酸古加乙涅 二、〇

水 三滴

石炭酸 三滴

右蘸綿球插入

一八九 鹽酸古加乙涅 〇、二五

メントール、石炭酸各 〇、二五

偏里斯林 五、〇

右綿球插入 二、五

一八九 樟腦 二、〇

嚼囉仿謨 二、〇

右浸綿球填入齶窩 二、〇

一八九 樟腦 二、〇

加耶布的油 五、〇

丁香油 二滴

嚼囉仿謨 一、〇

右含綿球插入齶窩 〇、四

一八九 樟腦 〇、四

丁香油、的列並油、加耶布的油 各一、〇

右一滴浸含綿球插入 五、〇

一八九 密兒拉丁幾 各一、〇

阿片丁幾、丁香油 各一、〇

右浸含綿球插入齶窩 各二、〇

一八九 乳香、安母尼亞水、的列並油 各二、〇

嚼囉仿謨 各二、〇

右浸含綿球插入齶窩 一五、〇

一九〇七 ピントリ―根

癩疥木脂

赤檀

沒藥

樟腦、阿片

酒精

右八日間浸出、一二滴浸合

綿球插入齒窩

一九〇八 昇汞

石炭酸

水

酒精

右龔窩消毒用

一九〇九 醋酸莫兒比涅

亞砒酸加留謨液

右一滴點入齒窩中（齒齦骨

瘍性齒痛）

一九一〇 鹽酸莫兒比涅

石炭酸、偏里設林

酒精、薄荷水

右消毒點入露出齒髓部

一九一二 阿片越幾斯、樟腦

百靈拔爾撒謨

六、〇

三二、〇

四、〇

二、〇

各二、〇

一〇〇、〇

二、〇

五、〇

二五、〇

七五、〇

一、〇

八、〇

〇、五

各五、〇

各〇、五

乳香

嗎囉仿謨

右二三滴點入

一九一三 結列阿曹篤

薄荷油

右滴入齒窩

一九一三 結列阿曹篤、薄荷油、樟腦油

鹽酸古加乙涅

嗎囉仿謨

右二三滴點入

一九一四 樟腦

加耶布的油

丁香油

嗎囉仿謨

右二三滴點入

一九一五 加耶布的油、嗎囉仿謨各五、〇

右一滴點入

一九一六 乳香、的列並油、

安母尼亞水

嗎囉仿謨

右二三滴點入

一九一七 嗎囉仿謨

嗎囉仿謨

一、〇

一〇、〇

〇、三

一五、〇

各二滴

〇、一五

五、〇

二、〇

五、〇

二、〇

五、〇

二滴

一〇、〇

各五、〇

各二、〇

一、五

七、〇

乳香

百靈拔爾撒謨

右二三滴點入

一九一八 石炭酸

沃度仿謨

樟腦

依的兒

右消毒點入露出之齒髓部

一九一九 石炭酸、嗎囉仿謨

薄荷油

右一滴取細管點入齦齒中

一九二〇 昇汞、甘水

石炭酸

鹽酸莫兒比涅

右酸化亞鉛、沈澱碳酸石灰、

偏里設林、薄荷油各適宜爲

藥劑填入齦窩中

一九二一 亞砒酸、石炭酸、鹽酸莫兒比涅

昇水

右偏里設林、薄荷油各適宜

爲藥劑充填

昇水

爲藥劑充填

四、〇

二、五

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一、〇

一九三 沃度仿謨、白陶土 各四、〇

石炭酸 〇、五

一九三 知母爾 右脩里設林適宜爲糕 三、〇

沃度加留謨或沃度仿謨 三、〇

石炭酸 五、〇

鹽酸莫兒比涅 一、〇

右白堊及脩里設林各適宜爲糕劑填入

一九四 鹽酸亞鉛 一〇、〇

沃度兒 一、〇

一九五 嘒囉仿謨、樟腦油 各一、五

●塗布劑 右丁香油適宜爲糕填入齒窩

一九六 結列阿曹寫 〇、三

薄荷精 一五、〇

一九七 阿片泊夫藍丁幾 二、〇

依的兒精、薄荷油 各二、〇

一九八 阿片丁幾、依的兒、薄荷油 各二、〇

右浸綿球送入齶窩又齒齦塗

一九九 雙蘭菊丁幾 四、〇

拔爾撒謨合劑 二、〇

一九〇 嘒囉仿謨 一、〇

右塗布齒齦部 一五、〇

一九一 沃度丁幾 一五、〇

右塗布齒齦(齒根膜炎)

一九二 沃度丁幾、脩里設林各二〇、〇

右塗布患齒齦

一九三 沃度丁幾、阿片丁幾、 各五、〇

石炭酸 〇、五

右一日二回塗布齒齦

一九三 沃度丁幾 二、五

菲沃斯丁幾、雙蘭菊丁幾、 各一、〇

別拉敦那丁幾 一、五

阿片丁幾 一、〇

右塗布齒齦部 二〇、〇

一九四 樟腦丁幾 一、〇

右塗布患側頰部 一、〇

一九五 莫若越幾斯 九、〇

華設林

右塗布頰部 一〇、〇

一九六 嘒囉仿謨 〇、一

右塗擦患側頰部

一九七 勃拉篤里涅 二〇、〇

加耶布的油 一〇、〇

一九八 樟腦 五、〇

丁香油 三滴

一九九 右塗布頰部

二〇〇 勃拉篤里涅、阿片越幾斯 各一、〇

二〇一 豚脂 二〇、〇

右爲軟膏塗布患部之皮膚

二〇二 芥子油 一、〇

依的兒性瑞香越幾斯 一、〇

二〇三 樟腦 二、〇

二〇四 蓖麻子油 五、〇

二〇五 酒精 三〇、〇

右塗布 二二三條

一九四 水蛭 二二三條

右貼布齒齦

一九五 ●注射劑

鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

一九六 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

一九七 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

一九八 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

一九九 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

二〇〇 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

二〇一 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

二〇二 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

二〇三 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

二〇四 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

二〇五 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

二〇六 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

二〇七 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

二〇八 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

二〇九 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

二一〇 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

二一一 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

二一二 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

二一三 鹽酸莫兒比涅水(二%) 五、〇

右半筒注射皮下

●齒磨劑

一九四二 精製炭酸石灰

依里斯根

薄荷油

右齒磨粉

一九四三 精製炭酸石灰

依里斯根末

烏賊骨末、白糖

重碳酸那篤留謨

蕎麥油

右齒磨粉

一九四四 沈降性炭酸石灰

黃色規那皮、精製牡蠣

各六〇、〇

密兒拉末

丁香末

桂皮油

右齒磨粉

一九四五 精製烏賊骨末

依里斯末、炭酸麻僱涅叟謨

各三〇、〇

薄荷油

右齒磨粉

一九四六 沈降炭酸石灰

依里斯根末

烏賊骨末

白糖、密兒拉末

蜂蜜及僱里設林

右齒牙泥劑

一九四七

炭酸麻僱涅叟謨、僱里斯根、

滑石末、藥用石鹼

薄荷油

亞拉比亞護謨漿

右齒磨石鹼

一〇〇、〇

五、〇

四、〇

各二、〇

各適宜

各五、〇

十滴

適宜

齒齦炎 Gingivitis.

牙齦腫痛、齦肉實質炎、

處置 口內攝生、齒齦清潔、含嗽洗滌

●水劑

一九四八

機那煎

格魯兒加酸留謨

單含利別

右一日三回每回一食匙

一九四九 格魯兒加酸加里水

右含嗽

一九五〇 格魯兒加酸加里

二〇、〇

三、〇

(六、〇)一〇〇、〇

(五、〇)五〇〇、〇

右含嗽

一九五一 格魯兒加酸留謨

單寧酸

水 右含嗽

一九五二 格魯兒石灰

水

アノジン丁幾

右含嗽

一九五三 撒里矢爾酸

三〇〇、〇

一、〇—二、〇

四〇〇、〇

二十滴

一、〇

酒精 一〇〇、〇
薄荷油、茴香油 各〇、五
右一茶匙加一碗之水合嗽

一九四 石炭酸 二、〇
複方機那丁幾、沒藥丁幾五、〇

酒精 一〇〇、〇
薄荷油 一、〇
右一二滴加一碗之水合嗽

一九五 撒爾比亞葉浸 一〇〇、〇
赤酒 五〇、〇
右合嗽

稀硫酸 八、〇
舊微蜜 三〇、〇
右合嗽

一九六 撒爾比亞葉浸 八、〇
稀硫酸 八、〇
舊微蜜 三〇、〇
右合嗽

一九七 撒爾比亞葉浸 五、〇
硫酸銅 〇、五
適宜

一九八 撒爾比亞葉浸 三〇〇、〇
右合嗽

一九九 撒爾比亞葉浸 三〇〇、〇
右合嗽

ラタニヤ越幾斯 一〇〇、〇
モロルム舍利別 五〇、〇
右合嗽

一九九 沒藥丁幾 八、〇
水 三〇〇、〇
右合嗽

二〇〇 沒藥丁幾 一〇〇、〇
沃度丁幾 一〇、〇
右二十滴加一盞之水合嗽

二〇一 阿仙藥丁幾、密兒拉丁幾 各五、〇
芳香丁幾 一〇〇、〇
稀酒精 一〇〇、〇

二〇二 薄荷油、茴香油 各〇、五
右一茶匙和一盞之水合嗽

二〇三 知母爾 〇、二五
安息香丁幾 三、〇
有加里丁幾 一五、〇
酒精 一〇〇、〇

ガウルテリヤ油 二十五滴
薄荷油 一、〇
右數滴乃至一茶匙加一碗之水合嗽

●塗布劑

二〇三 硫酸亞鉛水 一、〇
右塗布

二〇四 硫酸銅水 〇、二
右塗布

二〇五 格魯兒酸加留謨 一、〇
硼酸 一、〇
儂里設林 二〇、〇

二〇六 石炭酸 三、〇
沃度丁幾 三、〇
右塗布

二〇七 硼酸那篤留謨 二、〇
モロルム舍利別 四〇、〇
(或蜂蜜)

二〇八 右塗布 五、〇
硼酸那篤留謨 五、〇
舊微蜜 五〇、〇

二〇九 右塗布 五、〇
硼酸那篤留謨 五、〇
舊微水 二〇、〇
舊微蜜 四〇、〇
沒藥丁幾 二〇、〇

右塗布

一九七〇 ザロール

酒精

一〇〇、〇

薄荷油

二滴

右塗布

一九七一 ラタニヤ丁幾

薄荷油

三〇〇、〇

右塗布

一九七二 ラタニヤ丁幾

沒食子丁幾

各一〇〇、〇

一九七三 ラタニヤ丁幾

右塗布

齒齦息肉 Epulis.

齦贅

一九七四 結晶硝酸銀

蒸餾水

一〇〇、〇

右塗布

一九七五 過格魯兒鐵液

五、〇

水癌 Noma.

沒食子丁幾

各一〇〇、〇

阿片丁幾

一、〇

右塗布

一九七六 沒藥、阿仙藥

蜂蜜

各五、〇

右塗布齒齦

一九七五 沒藥丁幾、桂皮丁幾

癩瘡木丁幾

各五、〇

山薔菜舍利別

一五、〇

百露拔爾撒謨

六〇、〇

右塗布齒齦

二、〇

一九七六 沒藥丁幾、阿仙藥丁幾各五、〇

ラタニヤ丁幾

一、〇

明礬

二、〇

山薔菜舍利別

一五、〇

亞拉比亞護膜漿

一五、〇

右塗布齒齦

一九七七 沒藥、麒麟血

重酒石酸加留謨

各四、〇

泥蒿根末

一五、〇

丁香油

八、〇

右齒磨粉

四滴

一九七八 沃度丁幾、酒精 各一〇〇、〇

右塗布

一九七九 沃度丁幾、沒食子丁幾各五、〇

右塗布

處置 口腔瘻疽、口疽、走馬疳、走馬牙疳、齒腐、走馬者急速之裁也
電氣燒灼、撒里矢爾酸等之消毒的含嗽、滋養強壯、解熱藥尤奮劑等

●水劑

一九八〇 機那煎 (一〇〇、〇) 一〇〇、〇

橙皮舍利別

一〇〇、〇

一九四 右每二時一小兒匙

機那煎 (五、〇)一〇〇、〇

依的兒性鐵丁幾 二十滴

橙皮舍利別 一〇、〇

右每二時一茶匙

●洗滌劑

一九五 石炭酸水 (三、〇)三〇〇、〇

右洗滌

一九六 石炭酸水 (四、〇)二〇〇、〇

右洗滌

一九七 撒里矢爾酸水

舌結締織炎

Glossitis parenchymatosa.

處置 頸及頸下水壘法、水塊嚙下、舌背縱切、氣管切開、防腐的含嗽劑、下劑等

●下劑

一九四 甘汞 〇、五

藥刺巴末 〇、六

白糖 〇、五

右頓服

●水劑

一九五 稀鹽酸 二、〇

水 二〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇

(一、〇)三〇〇、〇

右洗滌

一九六 格魯兒石灰水 (五、〇)三〇〇、〇

右洗滌

●含嗽劑

一九九 格魯兒酸加留謨二、〇一五、〇

水 三〇〇、〇

右含嗽

一九〇 過滿俺酸加留謨水 (〇、一)二〇〇、〇

右含嗽

●塗布劑

一九二 石炭酸 一、〇

阿列布油 二〇、〇

右塗布

一九三 鹽酸 一、〇

薔薇蜜 * 二〇、〇

右塗布

一九三 次硝酸蒼鉛 一〇〇、〇

右撒布

右每二時一食匙

一九六 大黃浸 (五、〇)一〇〇、〇

硫酸那篤留謨 一五、〇

右每三時二食匙

一九七 旃那葉浸(一〇、〇)一五〇、〇

硫酸麻偏溼叟謨 三〇、〇

右每一時一食匙

●含嗽劑

一九六 格魯兒加里水(三、〇)三〇〇、〇

四滴

二〇、〇

二〇〇、〇

(一、〇)三〇〇、〇

右含嗽

二〇〇 撒里矢兒酸水

右含嗽

一九九 石炭酸水 (一、〇)一三〇、〇

右含嗽

二〇〇 撒里矢兒酸水 (一、〇)三〇〇、〇

右含嗽

二〇一 沃度丁幾

水 一〇〇、〇

右含嗽 五、〇

加答兒性安魏那

Angina catarrhalis

水 二〇〇、〇
薄荷油 一滴

右含嗽

●含嗽劑

二〇三 格魯兒酸加留謨水

アノジン丁幾 * 二〇、〇
蜂蜜 二〇、〇

二〇四 撒爾比亞葉酸

格魯兒酸加留謨 一、〇
重碳酸那篤留謨 二、〇

右含嗽

(五、〇)二〇〇、〇

二〇九 明礬水

阿片丁幾 一、〇
右含嗽 二〇、〇

二〇五 硼酸水

右含嗽 (五、〇)三〇〇、〇

二〇四 格魯兒酸加留謨水

右含嗽

(五、〇)三〇〇、〇

右含嗽

二〇六 硼酸

酒精 一〇〇、〇
丁香丁幾 * 一〇、〇

二〇五 格魯兒酸加留謨水

薄荷水

(五、〇)三〇〇、〇

二〇一 硼酸那篤留謨水

右含嗽 (二、〇)三〇〇、〇

薄荷油 一滴
右每回半茶匙乃至一茶匙加

右含嗽

二滴

二〇二 過飽酸加留謨

水 一、〇

二〇七 撒爾比亞葉浸

右含嗽 (一、〇)一〇〇、〇

二〇六 格魯兒酸加留謨

水

一五〇、〇

二〇三 過滿飽酸加留謨水

右含嗽 (〇、二)一〇〇、四

二〇八 撒爾比亞葉浸

右含嗽 (一、〇)一〇〇、〇

瘡瘡木丁幾

一〇〇、〇

右含嗽

二〇二 撒里矢爾酸水

二〇九 撒爾比亞葉浸

右含嗽 (二、〇)一〇〇、〇

二〇七 明礬水

(二、〇)二〇〇、〇

二〇三 撒里矢爾酸水

右含嗽 (一、〇)三〇〇、〇

二〇八 撒爾比亞葉浸

右含嗽 (二、〇)二〇〇、〇

二〇八 明礬水

(五、〇)二〇〇、〇

右含嗽

二〇九 撒爾比亞葉浸

毛ルム合利別 * 二〇、〇

二〇九 右合嗽
撒爾比亞葉浸 (八、〇)五〇〇、〇

稀硫酸 八、〇

蜂蜜 三〇、〇

右合嗽

二〇〇 撒爾比亞葉浸 (二〇、〇)二〇〇、〇

阿片越幾斯 一、〇—二、〇

硼酸那篤留謨 五、〇

精製蜂蜜 四〇、〇

右合嗽

二〇二 亞兒答根煎 (一〇、〇)二〇〇、〇

阿片丁幾 十五滴

右合嗽(甚疼痛)

二〇三 亞爾答根煎 (一〇、〇)二〇〇、〇

阿片丁幾 十五滴

モロルム舍利別 * 二〇、〇

右合嗽

二〇三 亞爾答根煎 (一〇、〇)二〇〇、〇

阿片丁幾 五、〇—一〇、〇
罌粟舍利別 * 二〇、〇
右合嗽

二〇四 亞爾答根煎 (一五、〇)三〇〇、〇

薔薇蜜 四〇、〇

スウヰーテン氏末液 * 二〇、〇

右一日五回乃至六回合嗽

二〇五 ウヰスキ一酒、嚼囉仿謨 各四〇、〇

阿片丁幾 一、〇

右一茶匙加一碗之水合嗽

二〇六 ウヰスキ一酒 * 二〇、〇

單寧酸 二、〇

或阿片丁幾 五、〇

水 二〇〇、〇

罌粟舍利別 二〇、〇

二〇七 右合嗽

石炭酸 二、〇

複方機那丁幾 五、〇

沒藥丁幾 五、〇

酒精 一〇〇、〇

薄荷油 一、〇

二〇八 右四五滴加一碗之水合嗽
石炭酸、酒精 各一、〇
沃度丁幾 〇、五

二〇九 衛里設林 一、五

水 二、五

右四十滴加一盞之水合嗽

二一〇 ザロール 一、〇

酒精 一〇〇、〇

コレニール丁幾 * 五、〇

薄荷油 二滴

薔薇油 三滴

右一茶匙和一碗之水合嗽

二一一 ●吸入劑 〇、〇五

水 二〇、〇

右五滴乃至十五滴加水二〇

〇、〇吸入

二一二 鹽酸古加乙涅水 (〇、二)一〇〇、〇

右吸入

單寧酸水 一、〇

右吸入 (一、〇—二、〇)二〇〇、〇

右吸入

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------|-----------------|-----|-----|-----|----------------|------------|
| 二〇三 | 單寧酸 | 一〇、〇—二〇、〇 | (〇、五—一〇、二五)五〇、〇 | 右塗布 | 一、〇 | 二〇七 | 單寧酸 | 一五、〇 |
| | 偏里設林 | 一〇〇、〇 | | | | | 右塗布 | 五、〇 |
| | 右十滴乃至二十滴加水五十 | | | | | | 水 | 二五、〇 |
| | 瓦吸入 | | | | | | 偏里設林 | 二〇、〇 |
| 二〇四 | アンナル水* | (二〇、〇)—一〇〇、〇 | | | | | 右塗布 | 二、〇 |
| | 右吸入 | | | | | | 單寧酸 | 二、〇 |
| 二〇五 | 格魯兒酸加留謨水 | (〇、四—一四、〇)—二〇〇、〇 | | | | | 稀酒精或阿片丁幾、水各五、〇 | 一〇、〇 |
| | 右吸入 | | | | | | 偏里設林 | 一〇、〇 |
| 二〇六 | 格魯兒酸加留謨 | 一、五 | | | | | 右塗布 | 〇、二五—一、二、〇 |
| | 格魯兒鐵液 | 二十四滴 | | | | | 沃度 | 〇、二—一、〇 |
| | 薄荷水 | 二〇〇、〇 | | | | | 偏里設林 | 一〇、〇 |
| | 右吸入 | | | | | | 右塗布 | 一〇、〇 |
| 二〇七 | 明礬水 | (一、〇—一四、〇)—二〇〇、〇 | | | | | 沃度加留謨 | 四、〇—八、〇 |
| | 右吸入 | | | | | | 石炭酸、沃度丁幾 | 四、〇—八、〇 |
| 二〇八 | 樟腦 | 一、〇 | | | | | 偏里設林 | 各二、〇—四、〇 |
| | 吹入劑 | | | | | | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 二〇九 | 白糖 | 一二、〇 | | | | | 鹽酸古加乙涅 | 〇、一—〇、五 |
| | 右吸入 | | | | | | 水 | 八、〇 |
| 二一〇 | 塗布劑 | | | | | | 偏里設林 | 二、〇 |
| | 硝酸銀水 | | | | | | 右塗布 | 二、〇 |
| 二一〇 | 右塗布 | | | | | | 水、酒精 | 各二五、〇 |
| 二一一 | 昇汞 | 〇、〇五—一、〇 | | | | | 昇汞 | 〇、〇五 |
| 二一二 | 格魯兒亞鉛 | 一、〇 | | | | | 矢鳩答越幾斯 | 四、〇 |
| | 偏里設林、水 | 各一五、〇 | | | | | 加密刺越幾斯 | 四、〇 |
| | 右塗布 | | | | | | 阿片丁幾 | 二、〇 |
| 二一三 | 格魯兒酸加留謨 | 五、〇 | | | | | | |
| | 偏里設林 | 四五、〇 | | | | | | |
| | 右塗布 | | | | | | | |
| 二一四 | 格魯兒酸加留謨 | 二、〇—六、〇 | | | | | | |
| | 右塗布兼腐蝕 | | | | | | | |
| 二一五 | 格魯兒酸加留謨 | 一、〇 | | | | | | |
| | 偏里設林 | 各一五、〇 | | | | | | |
| | 右塗布 | | | | | | | |
| 二一六 | 格魯兒酸加留謨 | 一、〇 | | | | | | |
| | 偏里設林 | 各一五、〇 | | | | | | |
| | 右塗布 | | | | | | | |
| 二一七 | 單寧酸 | 二、〇 | | | | | | |
| | 右塗布 | | | | | | | |
| 二一八 | 單寧酸 | 二、〇 | | | | | | |
| | 右塗布 | | | | | | | |
| 二一九 | 單寧酸 | 二、〇 | | | | | | |
| | 右塗布 | | | | | | | |
| 二二〇 | 單寧酸 | 二、〇 | | | | | | |
| | 右塗布 | | | | | | | |
| 二二一 | 單寧酸 | 二、〇 | | | | | | |
| | 右塗布 | | | | | | | |
| 二二二 | 單寧酸 | 二、〇 | | | | | | |
| | 右塗布 | | | | | | | |
| 二二三 | 單寧酸 | 二、〇 | | | | | | |
| | 右塗布 | | | | | | | |
| 二二四 | 單寧酸 | 二、〇 | | | | | | |
| | 右塗布 | | | | | | | |
| 二二五 | 單寧酸 | 二、〇 | | | | | | |
| | 右塗布 | | | | | | | |

二五二 鹽酸古加乙涅、石炭酸各〇、二
水 一〇、〇

二五三 硼酸那篤留謨 一〇、〇
杏仁水 二五、〇

二五四 硼酸那篤留謨 二五、〇
右塗布 一五、〇

二五五 硼酸那篤留謨 五、〇

ルードウ井ヒ氏安魏那 Angina Ludovici

咽頭結締織炎、頸膈下凝性羅斯

二五六 水蛭二十條患部周圍貼用

二五九 人工加兒爾斯爾鹽 二一〇、〇

結組織性安魏那 Angina parenhyratosa

扁桃腺炎 Angina tonsillaris parenhyratosa.

●水劑
二六〇 エキサルギン 二、五

薄荷精 五、〇

菩提樹花水 一、〇

橙花含利別 三〇、〇

右朝夕一食匙 二、五

二六一 エギサルギン 二、五

薔薇水 二〇、〇
薔薇蜜 四〇、〇

沒藥丁幾 二〇、〇
右塗布 二〇、〇

二六五 ゴゾヨドル亞鉛 一、〇
佩里設林、水 各一〇、〇
右塗布 各一〇、〇

二六六 トリアセチールコロリッド 二、〇

微溫湯 適宜
溶解每朝頓服

橙皮丁幾 五、〇
水 二一〇、〇

橙皮含利別 三〇、〇
右朝夕一食匙 三〇、〇

●丸劑
二六二 結晶アコニチン 〇、〇一

酒精 適宜

沃度 〇、一五
沃度加留謨 〇、二

佩里設林 三〇、〇
右塗布 三〇、〇

●散劑
二六七 撒里矢兒酸那篤留謨 一、〇
右分六包一日二三包

二六八 亞爾答根煎 二〇〇、〇

乳糖 二、〇
右亞拉比亞護謨適宜爲五十
九一日三回每回一粒

●含嗽劑
二六三 蜀葵根煎(一〇、〇)一〇〇、〇
右含嗽 一〇〇、〇

二六四 亞爾答根煎 二〇〇、〇

二六五 亞爾答根煎 二〇〇、〇

別拉敦那丁幾 二、〇〇
儂里設林 一〇、〇〇
右含嗽

二〇五 撒爾亞比葉 五〇、〇〇
右一食匙以一碗之水煎出含嗽

二〇六 撒爾比亞葉煎 (八、〇)五〇〇、〇〇

稀硫酸 五、〇〇
薔薇蜜 三〇、〇〇
右含嗽

二〇七 撒爾比亞葉浸 (二〇、〇)二〇〇、〇〇
明礬 五、〇〇
右含嗽

二〇六 格魯兒酸加留謨 五、〇〇
水 二〇〇、〇〇
右含嗽

二〇九 鹽酸加里水 (三、〇—四、〇)二〇〇、〇〇
右含嗽

二〇七 撒里矢爾酸 四、〇〇
水 二〇〇、〇〇

二〇七 格魯兒酸加留謨 五、〇〇
或撒里矢爾酸 〇、五〇
薄荷油 二滴

二〇七 撒里矢爾酸 三〇〇、〇〇
右含嗽

二〇七 撒里矢爾酸 三、〇〇
硼酸那篤留謨 五、〇〇
水 二〇〇、〇〇
右含嗽

二〇七 撒里矢爾酸 一、〇—二、〇〇
儂里設林 三〇〇、〇〇
水 一五、〇〇
右切開後含嗽

二〇七 明礬水 (二、〇)二〇〇、〇〇
右含嗽

二〇五 石灰水 五〇、〇〇
水 二〇〇、〇〇
右含嗽

二〇六 重碳酸那篤留謨水 (四、〇—一〇、〇)二〇〇、〇〇
右含嗽

二〇七 過滿俺酸加留謨水

二〇六 硼酸那篤留謨水 (〇、二)五〇〇、〇〇
右含嗽

二〇六 硼酸那篤留謨水 (二、〇—一〇、〇)二〇〇、〇〇
右含嗽

二〇九 硼酸 五、〇〇
酒精 一〇〇、〇〇
丁香丁幾 一〇、〇〇
薄荷油 十滴
右每回半茶匙乃至一茶匙加一碗之水含嗽

二〇八 沃度水素酸水 〇、一—〇、二
水 二〇〇、〇〇
右含嗽

二〇八 醋酸礬土液 五、〇—一五、〇
水 五〇〇、〇〇
右含嗽

二〇八 單寧酸 二、〇〇
赤葡萄酒 二〇〇、〇〇
右含嗽

二〇八 貌羅謨加留謨 五、〇〇
儂里設林 四〇、〇〇
水 三〇〇、〇〇

右含嗽

二〇八四 撒里矢爾酸 二、〇

二〇八五 硼酸那篤留謨 二、五

水 一〇〇、〇

杏仁水 二、五

二〇八六 右切開後含嗽 六、〇

酒精 一〇〇、〇

右每回一二茶匙加一碗之水

●塗布劑 含嗽

二〇八七 硝酸銀水 (二、〇)五〇、〇

二〇八八 右塗布 二〇、〇

二〇八九 沃度丁幾 一五、〇

二〇九〇 單寧酸 五、〇

二〇九一 僱里設林 二〇、〇

二〇九二 右塗布 二〇、〇

二〇九三 沃度加留謨 〇、三

二〇九四 僱里設林 〇、二

二〇九五 右塗布 三〇、〇

二〇九六 沃度加留謨 〇、一五

二〇九七 僱里設林 〇、二

二〇九八 右塗布 三〇、〇

二〇九九 沃度加留謨 〇、一五

二〇九〇 單寧酸 二、〇

二〇九一 稀酒精、水 各五、〇

二〇九二 僱里設林 一〇、〇

二〇九三 右塗布 〇、三

二〇九四 單寧酸 〇、一五

二〇九五 沃度加留謨 〇、二

二〇九六 僱里設林 三〇、〇

二〇九七 右塗布 一、〇

二〇九八 麥角越幾斯 三〇、〇

二〇九九 僱里設林 四、〇

二〇一〇 沃度丁幾 〇、一五

二〇一一 右塗布 三〇、〇

二〇一二 トリアセチルクロリッド 〇、三

二〇一三 沃度 〇、一五

二〇一四 沃度加留謨 〇、二

二〇一五 僱里設林 三〇、〇

二〇一六 右塗布 三〇、〇

二〇一七 ●注射劑 〇、一五

二〇一八 沃度加留謨 〇、二

二〇一九 僱里設林 三〇、〇

二〇二〇 右塗布 三〇、〇

(一〇、〇—三〇、〇)一〇〇、〇

右注射組織間

二〇二一 鹽酸古加乙濕 〇、二—一、〇

二〇二二 石炭酸 〇、二

二〇二三 蒸餾水 一〇、〇

右注射皮下

二〇二四 鹽酸古加乙濕 〇、五—一、〇

二〇二五 蒸餾水 五、〇

二〇二六 石炭酸 一滴

右注入粘膜下以一分注於

三處乃至五處

●吸入劑

二〇二七 格魯兒鐵液 (三、〇)二〇〇、〇

過格魯兒鐵液 二十五滴

右吸入

二〇二八 ●吹入劑 二、〇

二〇二九 甘朮 一〇、〇

二〇三〇 白糖 一〇、〇

右吹入

フングモ一ホ安魏那 Angina phlegmonosa

扁桃腺炎 フングモ一ホ安魏那

二〇九 鹽酸莫兒比涅 〇〇三三 白糖 一五二 右分三包一日數回每回一包

梅毒性安魏那 *Angina syphilitica*

二一〇 沃度化加留謨 一〇一、二〇〇 右含嗽 一〇〇、〇〇〇
 水 二〇二 沃度化加留謨 一〇〇、〇〇〇 右含嗽或吸入 二〇四 鞣酸水 (二、五)二五〇、〇〇〇
 右含嗽 二〇〇、〇〇〇 右吸入 二〇〇、〇〇〇

二〇一 格魯兒酸加留謨水 (五、〇)二〇〇、〇〇〇 右吸入 (〇、一)二五〇、〇〇〇
 二〇三 昇汞水 二〇三 昇汞水 (〇、一)二五〇、〇〇〇

慢性扁桃腺組織炎 *Angina tonsillaris parenchymatosa chronica*

處置 扁桃腺炎、加答兒性扁桃腺炎、慢性扁桃腺炎、扁桃腺肥大、喉痺、古比、頸部周圍毒法、含嗽、冰塊嚥下、硝酸銀等之塗布、扁桃腺切除、

二〇五 沃度加留謨 ●水劑 (一、〇)二〇〇、〇〇〇 水 二〇〇、〇〇〇
 苦味丁幾 二〇六 硼酸水 (四、〇)二〇〇、〇〇〇 右含嗽 一、〇〇〇
 水 二〇七 單寧酸水 (一、〇)三〇〇、〇〇〇 右含嗽 二〇〇、〇〇〇

二〇八 沃度鐵舍利別 二〇九 單寧酸水 (一、〇)三〇〇、〇〇〇 右含嗽 二〇〇、〇〇〇
 單舍利別 二一〇 格魯兒酸加留謨水 (五、〇)三〇〇、〇〇〇 右含嗽 二〇〇、〇〇〇
 水 二一一 薄荷油 二滴 阿片丁幾 一、〇〇〇
 右一日三回分服 二一二 撒里矢爾酸 一、〇〇〇
 右含嗽 二一三 明礬水 (五、〇)一〇〇、〇〇〇
 右一日三回分服 二一四 蓋微蜜 一、〇〇〇
 ●含嗽劑 二一五 右含嗽 二〇〇、〇〇〇

二一七 過滿俺酸加留謨水 二一八 撒里矢爾酸 一、〇〇〇
 二一九 薄荷油 二滴 阿片丁幾 一、〇〇〇
 右含嗽 二二〇 蓋微蜜 一、〇〇〇
 右含嗽 二二一 右含嗽 二〇〇、〇〇〇

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 三二四 石灰水 | 二〇〇、〇 | 三二九 明礬水 | (一、〇)一〇、〇 | 右塗布口蓋及扁桃腺 |
| 右含嗽 | | 右塗布 | | |
| 三二五 撒里比亞葉 | 三〇〇、〇 | 單寧酸 | 二、〇 | ●散布劑 |
| 右為茶劑含嗽 | | 沃度丁幾 | 五、〇 | 甘朮 |
| 三二六 亞爾答根煎 | 二〇〇、〇 | 佛里設林 | 一〇、〇 | 白糖 |
| 阿片丁幾 | 十五滴 | 水 | 五〇、〇 | 右散布口蓋 |
| 單舍利別 | 二〇、〇 | 右塗布 | | 桔礬 |
| 右含嗽 | | 三三三 麥角越幾斯 | 一、〇 | 泊芙藍末 |
| ●塗布劑 | | 沃度丁幾 | 四、〇 | 白糖 |
| 三二七 硝酸銀水 | (一、〇)一〇、〇 | 佛里設林 | 三〇、〇 | 右散布 |
| 右塗布 | | 右每朝塗布 | | 三五 重碳酸那篤留謨 |
| 三二八 硝酸銀水 | (一、五)三〇、〇 | 三三三 鹽酸古加乙涅水 | (二、五)五〇、〇 | 右吹付 |

耳下腺炎 Parotitis

蝦蟇瘟臘腮、舊譯作腮核炎腫、又名時行腮腫、耳下核發炎、古名疔腮、又有發頤、魚腮風、領腮、蝦蟇瘟之名

急性耳下腺炎 Parotitis acuta

特發性耳下腺炎 Parotitis idiopathica

移轉性耳下腺炎 Parotitis deuteropathica

處置 溫罨法或冷罨法、酸性飲料、下劑、切開及石炭酸罨法等、

●下劑

三三八 人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇

右每朝頓服

三三七 瀉利鹽 一五、〇

右頓服

三二六 蓖麻子油 二〇、〇

右頓服

三二五 蓖麻子油 二五、〇

薄荷水 五、〇

右頓服

●塗布劑

三二〇 樟腦油 三〇、〇

右塗布

三二三 阿列布油 一五、〇

右塗布

三二三 石炭酸 一、〇

阿列布油 五〇、〇

右塗布

三二二 阿列布油、加密列油

菲沃斯油

各三〇、〇

三二四 華攝林 一五、〇

右塗布

三二五 硼酸軟膏 三〇、〇

右塗布

三二六 刺乃林製水銀軟膏 一〇、〇

右塗布

三二七 石鹼硬膏 一〇、〇

右塗布

三二八 沃度加留謨 二〇、〇

沃度

水

豚脂

右塗布

三二九 沃度加留謨 一〇、〇

沃度

單軟膏

右塗布

三三〇 沃度加留謨 四、〇

炭酸加留謨

水

拉乃林

右塗布

三三一 沃度仿謨 一〇、〇

華攝林

薄荷油

三三二 沃度仿謨 二、五

右塗布

粘着硬膏、單鉛硬膏各一〇、〇

右塗布革皮貼用放置數日

三三三 樟腦 〇、一

水銀軟膏、拉乃林 各五、〇

三三四 水銀硬膏 一〇、〇

右塗布

三三五 水銀硬膏 六、〇

石鹼硬膏

三三六 阿片越幾斯 一〇、〇

右攤於麻布塗布

三三七 阿片越幾斯 一〇、〇

右為軟膏塗布

三三八 石炭酸 一〇、〇

無水刺乃林 三〇、〇

三三九 白陶土、阿列布油 各一五、〇

右纏帶軟膏用

三四〇 次醋酸鉛液 一〇、〇

沃度仿謨 四、〇

三四一 沃度仿謨 二、五

右為彩爛攤附於護謨紙貼用

三四二 華攝林 二五、〇

右附石綿插入

● 卷法劑

三四 石炭酸水 (五、〇)二〇〇、〇

右卷法

二五〇 石炭酸 二、〇

醋酸鉛 一〇〇、〇

水 一〇〇、〇

右卷法

● 含嗽劑

二五二 石炭酸水 (一、〇)三〇〇、〇

右含嗽

二五三 格魯兒酸加里水 (六、〇)三〇〇、〇

右含嗽

二五三 過滿俺酸加價謨水 (〇、五)三〇〇、〇

右含嗽

二五四 醋酸鉛 二、〇

蒸餾水 三〇〇、〇

右含嗽

二五五 枯礬、乳糖 各五、〇

右吹付

急性鼻咽頭加答兒

Catarrhus retronasalis acutus

● 水劑

二五五 沃度加價謨 五、〇

蒸餾水 一五〇、〇

薄荷水 四〇、〇

右一日三四回每回一食匙

二五五 耶僕蘭日葉 二、〇

沸湯 六〇、〇

右浸出頓服

二五五 耶僕蘭日葉浸 (三、〇)一六〇、〇

右頓服

二五五 醋酸安母紐謨液 二〇、〇

桂皮水 一〇〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右每時一食匙

二五五 石炭酸 〇、五

硫酸規尼涅 二、〇

撒里矢爾酸 二、〇

「ルーム」酒 一〇〇、〇

二五五 單寧酸、白糖 各五、〇

右吹付

右每二時一食匙

二五六 撒里矢爾酸那篤留謨 四、〇

苦味丁幾 二、〇

水 二〇〇、〇

右每二時一食匙

● 散劑

二五六 安知撒布林 一、〇

乳糖 一、〇

右分三包每三時一包

二五六 甘水 一、五

白糖 一、〇

右分三包每三時一包

二五六 甘水 〇、二

スカンモニウム脂 〇、一

白糖 二、〇

右分四包每時一包

二五六 石炭酸水 (三、〇)五〇〇、〇

● 洗滌劑

右切開後洗滌

二五七 硝酸銀水(三%) 各五、〇

右塗布

三六 硫酸亞鉛水(三%)

右塗布

水

二〇〇〇〇

鹽酸莫兒比涅

〇〇〇三

三六 硫酸亞鉛

〇〇〇二

三七〇 食鹽、重碳酸那篤留謨各一〇〇

水 右吸入

二〇〇〇〇

慢性鼻咽頭加答兒

Catarrhus retronasalis chronicus

三七二 沃度化加留謨

二〇〇

三七二 重碳酸那篤留謨、食鹽各一〇〇

亞拉比亞護謨

一〇〇〇

苦味丁幾

三〇〇

水 右洗滌

二〇〇〇〇

右混和為粉末吸入鼻中

水

二〇〇〇〇

三七三 明礬

三〇〇

右一日六回二分服

急性咽喉頭加答兒

Pharyngitis catarrhalis acuta

急性加答兒性咽喉炎、咽喉頭加答兒、咽喉炎、脾風、喉風之類

顆粒性咽喉頭加答兒

Pharyngitis granulosa.

處置

溫罨法、含嗽、硝酸銀塗布、鹽酸規尼涅、撒里矢爾酸那篤留謨、安知必林、安知歇貌林等之解熱劑、禁止酒類喫烟

●散劑

二七四 安知必林

〇〇二一〇七

三七七 鹽酸必魯加兒必涅

〇〇二一

右臨時頓服

白糖 右為一包頓服

〇〇五

二七五 安知歇貌林

〇〇五一一〇二

三七八 甘朮、乳糖

〇〇五

右分三包一日三回每回一包

右頓服

三六〇 撒里矢爾酸那篤留謨

六〇〇

二七六 鹽酸規尼涅

〇〇五

三七九 接骨木花浸

〇〇五

右分六包一日三回每回一包

薄荷水

一一〇〇〇

(一〇〇〇)一〇〇〇〇

杏仁水

四〇〇

單舍利別

八〇〇

右一日三回分服

水

一四〇〇

右混和一日三回分服

三八一 安知歌脫林 一、五

水 一〇〇、〇

單舍利別 八、〇

右一日三回分服

三八二 貌魯謨加留謨 二、〇

苦味丁幾 二、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 八、〇

右一日三回分服

三八三 亞爾答根煎(八、〇)一〇〇、〇

貌魯謨加留謨 二、〇

單舍利別 八、〇

右一日三回分服

三八四 莨菪丁幾 一、〇

水 一二〇、〇

右每一二時服一食匙

三八五 鹽酸規尼涅 〇、八

水、覆盆子舍利別 各一〇、〇

右隔三十分時分服

三八六 機那煎 (八、〇)一〇〇、〇

杏仁水 四、〇

單舍利別 八、〇

右一日三回分服

●塗布劑 一〇、〇

三二七 貌魯謨加留謨 五〇、〇

偏里設林 右塗布

三二八 鹽酸古加乙涅 〇、二

偏里設林 二、〇

蒸餾水 八〇、〇

右塗布(甚疼痛)

三二九 單寧酸 一〇、〇

偏里設林 二〇、〇

沃度丁幾 一〇、〇

水 二〇、〇

右塗布 若干

三三〇 硫酸依的兒 若干

右點布

●含嗽劑 五、〇

三三二 格魯兒酸加留謨 五〇〇、〇

水 右含嗽

三三三 格魯兒酸加留謨 六、〇

薄荷水 一八〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右含嗽

三三三 格魯兒酸加留謨 一、〇一三、〇

水 二二〇、〇

覆盆子舍利別 二〇、〇

右每回一小兒匙含嗽兼嘔服

三三四 醋酸鉛水 (一、五)一〇〇、〇

右含嗽 二、五

三三五 硫酸亞鉛 五〇〇、〇

薄荷水 右含嗽

三三六 亞兒答根煎 (三〇、〇)三〇〇、〇

格魯兒酸加留謨 六、〇

右含嗽 一、〇

三三七 撒里矢爾酸 二、〇

格魯兒酸加留謨 三〇〇、〇

水 右含嗽 三十滴

三三九 ラタニヤ丁幾 三十滴

右加一碗之水含嗽或塗布

三三九 ラタニヤ根煎 (一五〇)二〇〇、〇

密兒拉丁幾 三、〇

山蕎菜精 * *

右含嗽

二〇、〇

三〇二 硼酸那篤留謨水

單舍利別

(五、〇)五〇〇、〇

三〇五 硝酸加留謨水

右含嗽

一、〇一、二、〇

三〇〇 撒爾比亞浸

右含嗽料

(一五、〇)二〇〇、〇

三〇三 明礬末

水 一〇、〇

三〇六 鉛醋

蒸餾水

〇、五一、二、〇

三〇一 撒爾比亞浸

阿片越幾斯

一五〇、〇

水 五〇〇、〇

三〇七 知母爾水

右含嗽

〇、五一、〇〇〇、〇

精製蜜

右含嗽

二五、〇

三〇四 硝酸加留謨水

(一、〇一、二、〇)二〇〇、〇

慢性咽喉加答兒(顆粒性)

Pharyngitis catarrhalis chronica (Granulosa)

舊譯作咽喉久炎、古名慢喉風、久喉痺、

●合嗽劑

三〇八 昇末水

(〇、一)二五〇、〇

(一、〇一、二、〇)二〇〇、〇

三〇四 硫酸亞鉛

薄荷水

二、五〇〇、〇

右含嗽

三〇三 醋酸礬土水

(一、〇一、二、〇)一〇〇、〇

三〇五 右含嗽

水 一〇、〇

五〇〇、〇

三〇九 格魯兒酸加留謨水

(五、〇)二〇〇、〇

右含嗽

〇、三一〇、六

三〇六 格魯兒安母紐謨

水 二、〇

二〇〇、〇

右含嗽

三〇〇 明礬水

(一、〇一、二、〇)二〇〇、〇

蒸餾水 五、〇

亞拉比亞護謨漿 一五、〇

水 二〇〇、〇

三〇七 阿片丁幾

右含嗽

單舍利別

三〇〇、〇

右含嗽

十五滴

三〇一 單寧酸水

三三七 撒爾比亞浸

(一五、〇)二〇〇、〇

右含嗽

●塗布劑

三三八 乳酸水

(一%)五〇、〇

右塗布

三三九 ゴゾヨドール

二、五
五〇、〇

右塗布

三三〇 硝酸銀水

(〇、二—一、〇)二〇、〇

右塗布

三三一 鹽酸古加乙澄

〇、二
二、〇

水

右塗布、鎮痛

三三二 沃度加留膜

二、〇
〇、二

第二節 食道之諸病

食道狹窄

Stenosis oesophagi.

舊譯作食脰變窄、又名噎隔拒食、古名膈症

三三三 佛里設林

一〇、〇

右塗布

三三三 沃度化加留膜

二、〇
〇、三五

沃度

三三四 佛里設林

一五、〇
〇、二
〇、四

右塗布患部

沃度

沃度加留膜

佛里設林

石炭酸

薄荷油

右咽頭塗布

沃度

沃度化加留膜

石炭酸

佛里設林

右一日二回塗布患部

單寧酸

單舍利別

右一日三回分服

沃度丁幾(或稀酒精)

各五、〇

蒸餾水

佛里設林

右塗布

昇汞

水、酒精

右塗布

●吹入劑

單寧酸水

右吸入

右吸入

右吸入

右吹入

甘汞

白糖

右撒布口蓋

三三三 沙列布煎 (三、〇)一〇〇、〇

蕃木釐丁幾

一、〇

八、〇

三三三 單寧酸

白粉

〇、三
一、〇

右三包一日三回每回一包

水

一〇〇、〇

單舍利別

八、〇

三三四

稀鹽酸

二〇〇

三三五

右一日三回分服
機那煎 (八、〇) 一〇〇、〇

一〇〇、〇

右一日三回分服

八、〇

百弗聖

一〇〇

三三五

機那煎

(八、〇) 一〇〇、〇

單舍利別

八、〇

單舍利別

八〇〇

三三五

稀鹽酸

二〇〇

單舍利別

八、〇

食道炎 Oesophagitis.

食道變廣 Tectasia oesophagi.

食道癌 Carcinoma oesophagi.

是等諸病唯待外科的治法者則不見於處方

第三節 胃之諸病

急性胃加答兒 Catarrhus gastricus acutus

急性胃炎、急性加多兒性胃炎、舊譯作胃新炎、古謂之食傷、或名大食傷、處置 嚴重注意於食物、胃腑清洗、洗腸下劑等

●水劑

二〇〇

三三六

重碳酸那篤留謨

五〇〇

右一日三四二分服

五〇〇

三三五 重碳酸那篤留謨

二五〇、〇

三三六

重碳酸那篤留謨

二〇〇、〇

三四〇

重碳酸那篤留謨

五〇〇

水 單舍利別

一一五、〇

三四〇

龍膽越幾斯

一〇〇

水 苦味丁幾

二〇〇、〇

右每一時一食匙

一一五、〇

三三六

重碳酸那篤留謨

五〇〇

三四二

重碳酸那篤留謨

六〇〇

三三七 重碳酸那篤留謨

五〇〇

三三六

重碳酸那篤留謨

五〇〇

三四二

重碳酸那篤留謨

六〇〇

水 龍膽越幾斯

一一五〇、〇

三三六

重碳酸那篤留謨

五〇〇

三四二

水 苦味丁幾

四〇〇

佛里設林

一〇〇、〇

三三六

重碳酸那篤留謨

一〇〇、〇

三四二

水 單舍利別

一五〇、〇

檸檬皮丁幾

五〇、〇

三三六

重碳酸那篤留謨

二〇〇、〇

三四二

水 單舍利別

一五〇、〇

右一日六回二日分服

三四 重碳酸那篤留謨 二、〇

杏仁水 二、〇

水 一五〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

三四 重碳酸那篤留謨 二、〇

水 一〇〇、〇

杏仁水 一〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每時一小兒匙、小兒

三四 重碳酸那篤留謨 二、〇

水 一〇〇、〇

杏仁水 一〇、〇

覆盆子舍利別 一〇、〇

右每時一小兒匙、小兒

三四 重碳酸那篤留謨 二、〇

貌魯謨加留謨 二、〇

苦味丁幾 二、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 八、〇

右一日三四回分服

三四 重碳酸那篤留謨 二、〇

蕃木釐丁幾 二滴

水 一〇〇、〇

橙皮舍利別 一〇、〇

右每時一小兒匙、小兒

三五 重碳酸那篤留謨 二、〇

蕃木釐丁幾 十滴

水 一五〇、〇

橙皮舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

三五 重碳酸那篤留謨 二、〇

蕃木釐丁幾 一〇、〇

單舍利別 一〇、〇

水 一〇〇、〇

右混和一日三回分服

三五 重碳酸那篤留謨 二、〇

蕃木釐丁幾 〇、五

水 一五〇、〇

橙皮舍利別 一五、〇

右每三時一食匙

三五 重碳酸那篤留謨 四、〇

蕃木釐丁幾 一、〇

水 一五〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙 二、〇

レゾルチン 二、〇

蕃木釐丁幾 二、〇

右每二時一食匙 一、〇

レゾルチン 一、〇

苦味丁幾 二、〇

阿片丁幾 一、〇

單舍利別 一〇、〇

水 一〇、〇

右一日三回分服 二、〇

レゾルチン 五、〇

苦味丁幾 二、〇

阿片丁幾 二、〇

單舍利別 一八〇、〇

水 一八〇、〇

右每二時一食匙 〇、五

稀鹽酸 〇、五

水 一〇〇、〇

右一日三回每回一食匙 六滴

稀鹽酸 六滴

水 八〇、〇

右一日三回每回一小兒匙、

小兒

三二五 稀鹽酸

水

單舍利別

右每食後二匙

二、〇
一五〇、〇
三三〇、〇

三二七 稀鹽酸

水

單舍利別

右每二時一小兒匙、小兒

五滴—十滴
一〇〇、〇
一〇〇、〇

三二九 稀鹽酸

水

單舍利別

右每二時一食匙

一、〇
五、〇
二〇〇、〇
一八〇、〇

三三〇 稀鹽酸

水

橙皮舍利別

右每食後一食匙

一、五
一八〇、〇
二〇〇、〇

三三一 稀鹽酸

水

橙皮舍利別

右一日數回分服

二、〇
二五〇、〇
二〇〇、〇

三三二 稀鹽酸

亞爾答舍利別

水

食匙

右一日四回乃至六回每回一

三三〇、〇
一五〇、〇

三三三 稀鹽酸

水

苦味丁幾

右一日三回食後分服

一、〇
一〇〇、〇

三三三 稀鹽酸

水

レゾルチン

右每二時一食匙

二、〇
二〇〇、〇
二〇〇、〇

三三四 合糖白弗聖

稀鹽酸

橙皮丁幾

單舍利別

右每二時又食後一食匙

五、〇
二、〇
五、〇
二〇〇、〇

三三五 稀鹽酸

鹽酸莫兒比涅

單舍利別

水

二、〇
〇、〇二五
一〇〇、〇
一〇〇、〇

右一日三回分服

三三六 稀鹽酸

水

硫酸麻僱涅叟謨

右一日三回分服

二、〇
一五〇、〇
一〇〇、〇

三三七 稀鹽酸

水

ブランヂイ酒

單舍利別

右每二時一小兒匙、小兒

十滴
一〇〇、〇
十滴

三三八 稀鹽酸

水

ブランヂイ酒

合糖白弗聖

レゾルチン

單舍利別

右一日三回分服小兒量

〇、〇五
〇、〇六
三、〇
八、〇
五〇、〇

三三九 別拉敦那丁幾

水

右每時一茶匙

六、〇
六〇、〇

三四〇 結列阿曹篤

水、薄荷水

單舍利別

五滴
各五〇、〇
一〇、〇

三七二 右每二時一茶匙、小兒
結列阿曹篤 二十滴

醋酸 二、〇
硫酸莫兒比涅 〇、〇六
水 六〇、〇

三七三 右每回一茶匙
燬製麻佃涅失亞 一五、〇
水 二五〇、〇

右每一時乃至二時服一食匙
(醋酸)

三七四 燬製麻佃涅失亞 七、五
杏仁水 一五〇、〇

單舍利別 一五、〇
右每時一食匙

三七五 納維緩下劑* 五〇、〇
黑櫻質水* 一五、〇

覆盆子舍利別* 一五、〇
右每二時一小兒匙、小兒

三七六 鹽酸規尼涅 〇、三
稀鹽酸 六滴

單舍利別 五〇、〇
右每二時一茶匙、小兒

三七七 杏仁水 五、〇
水 一二〇、〇

別拉敦那越幾斯 〇、一
單舍利別 二五、〇

依的兒 二、〇
右每二時一食匙

三七七 酒石酸 一、〇
水 一五〇、〇

杏仁水 十滴—二十滴
覆盆子舍利別 一〇、〇

右每二時一小兒匙、小兒
龍膽越幾斯 二、〇

薄荷油糖 〇、五
水 一〇〇、〇

三七八 右一日三回每回二食匙
複方白蘇根丁幾* 各二〇、〇

苦味丁幾 各二〇、〇
右一日三回每食前一茶匙

三七九 貌魯謨斯篤倫胃謨 五、〇
水 一五〇、〇

右一日數回每回一食匙
二八二 硝酸銀 〇、〇三一〇、〇五
蒸餾水 一〇〇、〇

單舍利別 一〇、〇
右每二時一小兒匙、小兒

二八三 嚼囉仿謨水* 一〇〇、〇
右每回一二茶匙

二八三 炭酸水 三〇〇、〇
右數回分服

二八四 草麻子油 二〇、〇
右頓服

二八五 小水塊 二〇〇、〇
右嚥下

●散劑
二八六 吐根末 三、〇
吐酒石 〇、三

右分十包每十分時一包(催吐)

二八七 吐根末 一、〇
吐酒石 〇、〇五

右一回或二回分服(催吐)

二八八 吐根末 二、〇
吐酒石 〇、一

右分二包每十分時一包、催吐

二八九 吐根末 一、五

白糖

右分五包每十分時一包、催

五、〇

吐

三九〇 吐根末

白糖

亞拉比亞護謨末

右分五包每半時一包、催吐

三九一 甘末

白糖

右為一包一日二回乃至三回

三九二 甘末

乳糖

右為一包一日三回每回一包

三九三 甘末、藥刺巴

右頓服

三九四 甘末、藥刺巴根末、乳糖

右頓服

三九五 甘末

右頓服

大黃末

藥刺巴末

〇、五

右頓服

三九六 挖勿兒氏散

右臨臥頓服

〇、五

三九七 重碳酸那篤留謨

右分十包一日數回每回一包

三九八 重碳酸那篤留謨

尚香油糖

三九九 重碳酸那篤留謨

番木鱉越幾斯

右混分三包一日三回每回一包

四、〇

一、〇

〇、五

二、〇

一、〇

二、〇

三、〇

〇、六

三、〇

三、〇

五、〇

五、〇

レゾルチン

右分十包每二時一包

一、〇

三〇四 重碳酸那篤留謨

次硝酸蒼鉛

レゾルチン

右分三包一日三回每回一包

三〇五 重碳酸那篤留謨

煨性麻偏遑叟謨

右每食後一刀尖

三〇六 重碳酸那篤留謨

ベトール、サロール 各三、〇

右分十包一日三回食後一包

三〇七 重碳酸那篤留謨

次硝酸蒼鉛

硝酸銀

右一日數回每回一小刀尖

三〇八 重碳酸那篤留謨

薄荷油糖

右分六包一日三回每回一包

三〇九 重碳酸那篤留謨

次硝酸蒼鉛

番木鱉越幾斯

〇、〇六

| | | | |
|-----|-------------------------|--------------|-----|
| 二三〇 | 重碳酸那篤留謨 | 右分三包一日三回每回一包 | 二、〇 |
| | 次硝酸蒼鉛 | 〇、〇六 | |
| | 別刺敦那越幾斯 | 〇、〇六 | |
| | 右分三包一日三回每回一包 | 〇、〇六 | |
| 三三一 | 重碳酸那篤留謨 | 〇、〇六 | |
| | 次硝酸蒼鉛 | 一、五 | |
| | 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇二五 | |
| | 右分三包一日三回每回一包 | 〇、〇二五 | |
| 三三二 | 重碳酸那篤留謨 | 二、〇 | |
| | 次硝酸蒼鉛 | 五、〇 | |
| | 鹽酸莫兒比涅 | 〇、一 | |
| | 右分十包一日三回每回一包 | 〇、一 | |
| | (釀酸及疼痛) | | |
| 三三三 | 重碳酸那篤留謨 | 四、〇 | |
| | 次硝酸蒼鉛 | 一、〇 | |
| | 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇二 | |
| | 健質亞那末 | 〇、〇二 | |
| | 右分三包一日三回每回一包 | 〇、〇二 | |
| 三三四 | 次硝酸蒼鉛 | 〇、一 | |
| | 白糖 | 〇、六 | |
| | 右分三包一日三回每回一包 | 〇、六 | |
| 小兒 | | | |
| 三三五 | 次硝酸蒼鉛 | 〇、二一〇、八 | |
| | 乳糖 | 〇、八 | |
| | 右分四包每二時一包、小兒 | | |
| 三三六 | 次硝酸蒼鉛 | 〇、五 | |
| | 挖洵兒散 | 〇、〇五 | |
| | 白糖 | 二、〇 | |
| | 右爲一包一日二回每回一包 | 二、〇 | |
| 三三七 | 次硝酸蒼鉛 | 一、〇 | |
| | 挖洵兒氏散 | 〇、一 | |
| | 白糖 | 二、〇 | |
| | 右分十包一日服二包乃至三包、小兒 | 二、〇 | |
| 三三八 | 次硝酸蒼鉛、大黃末 | 各五、〇 | |
| | 重碳酸那篤留謨 | 二、〇、〇 | |
| | 右一日三回每回一刀尖 | | |
| 三三九 | 番木甙越幾斯 | 〇、〇六 | |
| | 礮酸攝留謨 | 〇、〇三 | |
| | 次硝酸蒼鉛、乳糖 | 各一、五 | |
| | 右分三包一日三回每回一包 | 各一、五 | |
| 三三〇 | バイン | 五、〇 | |
| | 右分十包一日三回每回一包 | 五、〇 | |
| 三三一 | 鹽酸オレキシン | 〇、三一〇、五 | |
| | 白糖 | 〇、三一〇、五 | |
| 三三二 | 人工加爾兒斯泉鹽 | 二、〇、〇 | |
| | 右每回一茶匙頓服 | | |
| 三三三 | 人工加爾兒斯泉鹽 | 一五、〇 | |
| | 右頓服 | | |
| | ●丸劑 | | |
| 三三四 | 大黃越幾斯 | 一、〇 | |
| | 右爲丸頓服 | | |
| 三三五 | 硝酸銀 | 〇、〇〇五、〇、〇五 | |
| | 右白陶土爲一九乃至三九一日三回每回一九、胃潰瘍 | | |
| 三三六 | 鹽酸オレキシン | 二、〇 | |
| | 右龍膽越幾斯及亞爾答根末 | | |
| | 適宜爲二十九一日二回每回 | | |
| | 三九乃至五九 | | |
| 三三七 | 結麗阿曹篤 | 十二滴 | |
| | 右甘草羔甘草末各適宜爲三 | | |
| | 十九一日三粒(嘔吐) | | |
| | ●浸煎劑 | | |
| 三三八 | 吐根浸 | (四、〇)六〇、〇 | |
| | 右每十分時一食匙(催吐) | | |
| 三三九 | 耶僕蘭日葉浸 | (三、〇)五〇、〇 | |
| | 右頓服 | | |

二三〇 麥角浸

(二、〇—五、〇)一〇〇、〇

桂皮舍利別

二〇、〇

右半時乃至一時服一茶匙、

胃出血

二三三 沙列布煎 (五、〇)一〇〇、〇

稀鹽酸

一、五

杏仁水

四、〇

單舍利別

一〇、〇

右一日三回分服

二三二 古魯聖篤實煎

(二、〇)一八〇、〇

旃那舍利別

二〇、〇

右每二時一食匙

二三三 旃那浸 (二〇、〇)一五〇、〇

硫酸麻僱涅叟謨

二〇、〇

單舍利別

二〇、〇

右每二時一食匙

二三四 旃那葉浸 (二二、〇)一〇〇、〇

單舍利別

一〇、〇

右一回乃至二回分服

二三五 旃那葉浸 (一〇、〇)一八〇、〇

滿那舍利別

二〇、〇

二三六 亞爾答根煎

右每二時一食匙 (一五、〇)三〇〇、〇

右一日六回二分服

二三七 白鮮葉浸 (一〇、〇)一八〇、〇

右每二時一食匙

二三八 大黃浸 (六、〇—八、〇)一八〇、〇

レゾルチン

重碳酸那篤留謨

薄荷舍利別

右每二時一食匙(便秘)

●注射劑

二三九 鹽酸亞剎莫兒比涅

水 〇、〇二

右一筒注射皮下

三四〇 鹽酸亞剎莫兒比涅

蒸餾水 〇、〇五

右半筒注射皮下(催吐)

三四一 鹽酸亞剎莫兒比涅

水 〇、一〇、二

右以四分之一乃至一筒注射

皮下

●滴劑

三四二 杏仁水 五、〇

右每三時服五滴

三四三 杏仁水 五、〇

替木釐丁幾 〇、五

右朝夕各十滴

三四四 杏仁水 一〇、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、一

右每回五滴

三四五 水製大黃丁幾 二〇、〇

右一日十滴乃至二十滴(嬰兒)或二茶匙乃至三茶匙

三四六 苦味丁幾 二〇、〇

稀鹽酸 五、〇

右每食後二十滴

三四七 苦味丁幾 三〇、〇

替木釐丁幾 十滴

右一日四回乃至五回每回十

三四八 複方規那丁幾 各一〇、〇

泥蒿根丁幾

各一〇、〇

右每食前十滴
三三九 結列阿曹篤
龍膽丁幾

一三〇〇、〇

右最初一日每服五滴乃至十滴其後則二十滴乃至三十滴

●洗滌劑

三三五〇 重碳酸那篤留謨

一〇〇、〇

慢性胃加答兒

Catarrhus Gastricus chronicus.

慢性加答兒性胃炎、慢性胃炎、炎飲、留飲、舊譯作胃久炎、古有淡飲、痰飲、懸飲、溢飲、支飲等名、千金方謂之癥囊

處置

節制食物、禁脂肪香料酒類豆類、攝取半熟卵牛乳等之易消化性之物、又施戶外運動、便通調制、胃洗滌按摩等、內服稀鹽酸、吞酸則重碳酸那篤留謨、惡心噯氣則次硝酸蒼鉛、疼痛則鹽酸莫兒比涅等

●浸煎劑

三三五 昆儒蘭格皮煎

(三〇〇、〇)二五〇、〇

稀鹽酸

生姜舍利別

三五六 昆儒蘭格煎

(一五〇、〇)一五〇、〇

橙皮舍利別

右一日三回二分服

水 一〇〇〇、〇

右洗滌

三三五 撒里矢爾酸

水 一〇〇〇、〇

右洗滌

●洗腸劑

三三五 硫酸麻僱涅叟謨

二五〇、〇

亞拉比亞護謨漿 適宜

右洗腸 二〇〇、〇

三三五 加里石礮水 三〇〇、〇

右洗腸

三五四 溫琶布

右胃部貼糊

三三七 昆儒蘭格煎

(一〇〇、〇)一〇〇、〇

稀鹽酸 一、〇

薄荷油 二滴—三滴

右一日三回每食後一時分服

三五六 昆儒蘭格皮煎

(四〇〇、〇)一〇〇、〇

重碳酸那篤留謨 一、〇、〇

單舍利別 一、〇、〇

右一日三回分服

二〇〇、〇

三〇〇、〇

三〇〇、〇

三三五 昆儒蘭格皮煎

右 (四〇〇、〇)一〇〇、〇

蕃木甞丁幾 一、〇

稀鹽酸 一、〇

單舍利別 一、〇、〇

右一日三回分服

三五六 括失亞浸 (五〇〇、〇)二〇〇、〇

忽布滿精 三、〇

單舍利別 三、〇、〇

右每二時一食匙

二二六一 括失亞浸(一〇、〇)二〇〇、〇

蒲公英越幾斯

複方機那丁幾

橙皮舍利別

右每二時一食匙

二二六二 沙列布煎*

稀鹽酸

格倫僕越幾斯

單舍利別

右一日三回分服

二二六三 沙列布煎

阿片丁幾

單舍利別

右一日六回分服(下痢)

二二六四 沙列布煎

古倫僕越幾斯

稀鹽酸

橙皮舍利別

右每二時一食匙

二二六五 古倫僕根煎

(一〇、〇)一五〇、〇

ゲラニウム越幾斯

單舍利別

二二六六 古倫僕根煎

右一日三回二日分服

橙皮舍利別

右每二時一食匙

二二六七 古倫僕根煎(五、〇)一〇〇、〇

沙列布漿

阿片丁幾

橙皮舍利別

右每三時一小兒匙、小兒

二二六八 龍膽浸(五、〇)一五〇、〇

橙皮舍利別、單舍利別

各一五、〇

右每二時一食匙

二二六九 健質亞那浸(四、〇)一〇〇、〇

薈木甌丁幾

單舍利別

右一日三回分服

二二七〇 健質亞那浸(四、〇)一〇〇、〇

薈木甌丁幾

重碳酸那篤留謨

單舍利別

右一日三回分服

二二七一 健質亞那浸(五、〇)二五〇、〇

健質亞那丁幾

稀鹽酸

橙皮舍利別

右一日數回每回一食匙

二二七二 健質亞那根

橙皮

枸橼皮

鹽酸浸出三〇〇、〇一日數回

每回二食匙乃至四食匙

二二七三 大黃浸(三、〇)一〇〇、〇

レゾルチン

重碳酸那篤留謨

單舍利別

右一日三回分服

二二七四 大黃浸(六、〇)一八〇、〇

レゾルチン

重碳酸那篤留謨

薄荷油糖

右每二時一食匙

二二七五 大黃浸(五、〇)一八〇、〇

酒石酸加留謨

一〇、〇

薄荷油糖 五、〇

右每二時一食匙

二三五 大黃浸 (六、〇)一八〇、〇

レゾルチン 二、〇

重碳酸那篤留漢 八、〇

單舍利別 一〇、〇

右每二時一食匙

二三七 大黃浸 (五、〇)一八〇、〇

重碳酸曹達 五、〇

薄荷油精 二、〇

右每二時一食匙

二三八 機那煎 (五、〇)一〇〇、〇

稀鹽酸 〇、五

赤葡萄酒 一〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

二三九 機那煎 (五、〇)一〇〇、〇

稀鹽酸 一、〇

單舍利別 一〇、〇

右一日三回每食後三十分分

二三〇 機那煎 (八、〇)一五〇、〇

重碳酸那篤留漢 二、〇

單舍利別 八、〇

右一日三回分服

二六一 蜀葵根煎(一〇、〇)一五〇、〇

稀鹽酸 三、〇

單舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙

二六二 加斯加利刺皮煎 (一五、〇)二〇〇、〇

水製機那越幾斯 四、〇

桂皮舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

二六三 吐根浸 (四、〇)六〇、〇

單舍利別 一五、〇

水 一五〇、〇

右每十分時間一食匙(快吐

休藥)

二六四 實麥答利斯浸(二、〇)二〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

二六五 薄荷葉浸 (二、〇)一五〇、〇

大黃舍利別 一五、〇

右每三時一食匙

二六六 半夏浸 (一〇、〇)一八〇、〇

生姜舍利別 二〇、〇

右一日六回二日分服

二六七 菖蒲根浸(一〇、〇)一八〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

二六八 菖蒲根浸(一五、〇)二〇〇、〇

忽布滿精 四、〇

機那舍利別 三〇、〇

右每三時一食匙

二六九 菖蒲根、白芷 各一二、〇

右浸出 二〇〇、〇

依的兒 二、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右每時一食匙

二七〇 睡菜葉浸 (五、〇)一八〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

二七一 睡菜葉精 (二、〇)二〇〇、〇

健質亞那越幾斯 八、〇

單舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙

二七二 生姜根、桂皮

加斯加利刺根 各五、〇

右浸出 一〇〇、〇

桂皮舍利別 三〇、〇

右每三時一食匙

古倫僕根 三、〇

加斯加利刺皮 八、〇

右浸出 一八〇、〇

橙皮丁幾 八、〇

桂皮舍利別 三〇、〇

右每三時一食匙

古倫僕根、生姜根 各一〇、〇

旃那葉 二、五

右煎出濾液四〇〇、〇一日

三回每回一酒盃

大黃末 五〇、〇

桂皮末 五、〇

設林酒 六〇〇、〇

右浸出三日間濾過每回半茶

匙乃至一茶匙

大黃 八、〇

甘草根、茴香 各四、〇

益智 一、〇

右酒浸一日濾液一〇〇、〇

生薑 每回一二茶匙 一五、〇

赤葡萄酒 二〇〇、〇

右浸出二時間濾過

甘硝石精 三三、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右一日四回每回一食匙

健質亞那根 九、〇

橙皮 三〇、〇

大黃 二〇、〇

生薑 一、五

沸湯 一〇〇〇、〇

右浸出三時間濾過一日數回

每回二食匙乃至四食匙、健

胃合劑

●水劑

硝酸銀 〇、〇二

蒸餾水 四〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右一日六回分服、小兒

硝酸銀 〇、〇五

蒸餾水 一二〇、〇

俚里設林 三〇、〇

結晶硝酸銀 右一日三回每回一食匙 〇、〇五

蒸餾水 一〇〇、〇

俚里設林 五、〇

右一日三回空腹時分服

硝酸銀 〇、〇二

蒸餾水 五〇、〇

右一日三回分服、小兒

稀鹽酸 一、五

水 一七〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右一日三回服於食後二日分

服 〇、〇三

稀鹽酸 一〇〇、〇

水 一〇〇、〇

橙皮舍利別 一〇〇、〇

右一日四回分服、小兒

稀鹽酸 三、〇

蕃木釐丁幾 三、〇

單舍利別 一五、〇

水 二〇〇、〇

右一日三回二日分服

稀鹽酸 一、五

二四〇六

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 二四〇 稀鹽酸 | 水 右一日三回二日分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二四九 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右一日三回二日分服 | 一五〇、〇 一、〇〇、〇 |
| 二四〇 稀鹽酸 | 水 右一日三回二日分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二四一 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右一日三回二日分服 | 一五〇、〇 一、〇〇、〇 |
| 二四二 稀鹽酸 | 水 右一日三回二日分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二四三 稀鹽酸 | 水 右一日三回二日分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二四四 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右一日三回二日分服 | 一五〇、〇 一、〇〇、〇 |
| 二四五 稀鹽酸 | 水 右一日三回二日分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二四六 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右一日三回二日分服 | 一五〇、〇 一、〇〇、〇 |
| 二四七 稀鹽酸 | 水 右一日三回二日分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二四八 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右一日三回二日分服 | 一五〇、〇 一、〇〇、〇 |

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 二四二 稀鹽酸 | 水 右一日三回分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二四三 稀鹽酸 | 水 右一日三回分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二四四 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右每食後一食匙 | 一〇〇、〇 一、〇 |
| 二四五 稀鹽酸 | 水 右一日三回分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二四六 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右每食後一食匙 | 一〇〇、〇 一、〇 |
| 二四七 稀鹽酸 | 水 右一日三回分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二四八 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右每食後一食匙 | 一〇〇、〇 一、〇 |

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 二四九 昆儒蘭格酒 | 水 右每食前一茶匙 | 一〇〇、〇 一、〇 |
| 二五〇 硫酸亞鉛 | 水 右每食前一茶匙 | 一〇〇、〇 一、〇 |
| 二五一 稀鹽酸 | 水 右一日三回分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二五二 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右每食後一食匙 | 一〇〇、〇 一、〇 |
| 二五三 稀鹽酸 | 水 右一日三回分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二五四 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右每食後一食匙 | 一〇〇、〇 一、〇 |
| 二五五 稀鹽酸 | 水 右一日三回分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二五六 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右每食後一食匙 | 一〇〇、〇 一、〇 |
| 二五七 龍膽越幾斯 | 水 右一日三回分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二五八 葛縷子水 | 水 右每食後一食匙 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二五九 昆儒蘭格酒 | 水 右每食前一茶匙 | 一〇〇、〇 一、〇 |
| 二六〇 稀鹽酸 | 水 右一日三回分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二六一 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右每食後一食匙 | 一〇〇、〇 一、〇 |
| 二六二 稀鹽酸 | 水 右一日三回分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二六三 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右每食後一食匙 | 一〇〇、〇 一、〇 |
| 二六四 稀鹽酸 | 水 右一日三回分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二六五 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右每食後一食匙 | 一〇〇、〇 一、〇 |
| 二六六 稀鹽酸 | 水 右一日三回分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二六七 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右每食後一食匙 | 一〇〇、〇 一、〇 |
| 二六八 稀鹽酸 | 水 右一日三回分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |
| 二六九 機那丁幾 稀鹽酸 單舍利別 | 水 右每食後一食匙 | 一〇〇、〇 一、〇 |
| 二七〇 稀鹽酸 | 水 右一日三回分服 | 二〇〇、〇 二、〇 |

覆盆子舍利別 二〇、〇

右一日三回每回一食匙

二四二 カスカラサクラダ越幾斯

四、〇一五、〇

單舍利別 二〇、〇

水 二〇〇、〇

右一日三回二日分服

二四三 カスカラサクラダ越幾斯

四、〇一五、〇

蒸木藍丁幾 三、〇

單舍利別 二〇、〇

水 二〇〇、〇

右一日三回二日分服

二四三 人工加兒爾斯泉鹽

一五、〇

水 二〇〇、〇

二四四 加兒爾斯泉鹽

二〇、〇

重碳酸那篤留謨 二、〇

苦味丁幾 一、五

單舍利別 一〇〇、〇

水 二〇〇、〇

二四五 結列阿曹篤水(一%)

右一日三回分服

一〇〇、〇

右一日三回每回一茶匙乃至

半食匙、調和牛乳服用

二四六 結麗阿曹篤 五滴

水 一五、〇

右每二時一食匙、制酸

二四七 嚼囉仿謨水 *

一五〇、〇

水 五〇、〇

右一日三回每回半茶匙乃至

一小兒匙 一〇〇、〇

二四八 嚼囉仿謨水 *

一〇〇、〇

薄荷水 二〇、〇

單舍利別 三〇、〇

撒里矢爾酸那篤留謨

四、〇一八、〇

右每時一食匙

二四九 レゾルチン水

(二、一〇) 一八〇、〇

苦味丁幾 五、〇

阿片丁幾 二、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

二四〇 炭酸石灰、亞拉比亞謨

各五、〇

桂皮水 一五〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右一日二三回每回一二食匙

二四一 偏里設林 五〇、〇

右每食後一二茶匙

二四二 格魯兒安母紐謨一、〇一三、〇

水 一〇〇、〇

大黃丁幾 二、〇一五、〇

右每二時一小兒匙

二四三 含糖百弗聖 三、〇

水 二〇〇、〇

稀鹽酸 二、〇

單舍利別 一五、〇

右一日三回二日分服

二四四 百弗聖酒 二〇〇、〇

或昆儒蘭格酒 二〇〇、〇

右每食前或食後一食匙

二四五 健質亞那越幾斯 二〇〇、〇

或加斯加利刺越幾斯

或睡菜葉越幾斯

二〇一五、〇
水
橙皮舍利別 二〇〇、〇
右每食前一食匙 二〇、〇
二四二 複方機那丁幾 二〇、〇
橙皮丁幾 四〇、〇
右每回一茶匙
二四七 百弗聖 三〇、〇
橙皮舍利別 * 一〇〇、〇
右每食後一食匙
二四六 水製大黃丁幾 二〇、〇
橙皮舍利別 三〇、〇
右一日三回每回一茶匙
二四九 水製大黃丁幾 三〇、〇
薄荷水 * 一〇〇、〇
右一日三回每回一食匙
二四四 加斯加利刺越幾斯 二〇〇、〇
睡菜越幾斯 各二、〇一四、〇
水 二〇〇、〇
橙皮舍利別 二〇、〇
右每食前一食匙
二四二 知母爾 〇、〇五一〇、一
一〇〇、〇

橙花水 * 五〇、〇
右一日數回每回一食匙
二四三 レゾルチン 三、〇一五、〇
橙皮舍利別 三〇、〇
水 一二〇、〇
右每三時一食匙
二四五 含鐵麥芽越幾斯(〇、五%) 一〇〇、〇
水 一〇〇、〇
苦味丁幾 三〇、〇
右一日三回二日分服
二四四 重碳酸那篤留謨 三、〇
苦味丁幾 二、〇
或蕃木酸丁幾 一、五
水 一〇〇、〇
單舍利別 八、〇
右一日三回分服
二四五 重碳酸那篤留謨 八、〇
結列阿曹篤 十滴
水 一四〇、〇
亞拉比亞護謨漿 一〇、〇
右每食後一茶匙
二四六 重碳酸那篤留謨 三、五

苦味丁幾 二、〇
桂皮水 五、〇
水 一〇〇、〇
右一日三回分服
二四七 重碳酸那篤留謨 二、〇
水製大黃丁幾 八、〇
單舍利別 一〇〇、〇
水 一〇〇、〇
右一日三回每回二食匙
二四八 重碳酸那篤留謨 二、〇
水製大黃丁幾 二、〇
林檎酸鐵丁幾 二、〇
水 一〇〇、〇
右一日三回每回一食匙
二四九 レゾルチン 二、〇
水 一八〇、〇
單舍利別 二〇、〇
右每二時一食匙
二五〇 苦味丁幾、複方規那丁幾 各六、〇
水 一八〇、〇
右一日三回二日分服
二五一 苦味丁幾、複方機那丁幾

右每食前一茶匙 各二〇、〇

二四五 複方機那丁幾、複方橙皮丁幾 酒製大黃丁幾 各一五、〇

右一日三回每回半茶匙乃至一茶匙

二四三 大黃丁幾 五〇、〇 右一日三回每回一茶匙

●散劑 二四四 重碳酸那篤留謨 大黃末、橙皮末 各五、〇

右分六包一日三回每回一包

二四五 重碳酸那篤留謨 次硝酸蒼鉛 二、〇

右分六包一日三回每回一包

二四五 重碳酸那篤留謨 次硝酸蒼鉛 四、〇

右分三包每食後一包

二四七 重碳酸那篤留謨 次硝酸蒼鉛 六、〇

右分六包一日三回乃至六回 每回一包 一、五

二四九 重碳酸那篤留謨 三、〇

次硝酸蒼鉛 一、〇一三、〇 白糖 五、〇

二五九 重碳酸那篤留謨 右分十包一日三回每回一包 二、五

次硝酸蒼鉛 一、五 百弗聖涅 二、〇

右分六包每食後二十分時一包

二四〇 重碳酸那篤留謨 次硝酸蒼鉛 三、〇

健質亞那末或大黃末 一、〇 右分三包一日三回每回一包 〇、三

二四一 重碳酸那篤留謨、大黃末 各一、〇

白糖 二、〇 右分四包一日三回每回一包

二四二 重碳酸那篤留謨 蕃木甞越幾斯 五、〇

右分十包一日三回每回一包

二四三 重碳酸那篤留謨 蕃木甞越幾斯 五、〇

右分十包一日三回每回一包 〇、二

二四四 重碳酸那篤留謨 二、〇

蕃木甞越幾斯 〇、一五 白糖 二、〇

二四六 重碳酸那篤留謨 右分六包一日三回每回一包 二、〇

蕃木甞越幾斯 〇、一 鹽酸規尼涅 〇、三

白糖 一、〇 右分三包一日三回每回一包

二四六 重碳酸那篤留謨 デルマトール 四、〇

次硝酸蒼鉛 三、〇 右分三包一日三回每回一包 三、〇

二四七 重碳酸那篤留謨 次硝酸蒼鉛 二、〇

硝酸銀 五、〇 右一日三回每回一小刀尖 〇、一

二四八 重碳酸那篤留謨 次硝酸蒼鉛 二、〇

大黃末 五、〇 右一日三回每回一小刀尖 三、〇

二四九 重碳酸那篤留謨 次硝酸蒼鉛 二、〇

阿片末 一、〇一、二、〇 〇、三一〇、六

右分六包一日六回每回一包

二四七 重碳酸那篤留謨 一、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇二

次硝酸蒼鉛 一、〇

乳糖 一、〇

二四二 重碳酸那篤留謨 二、〇

右分五包朝夕各一包

次硝酸蒼鉛 五、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

二四三 重碳酸那篤留謨 二、〇

右分十包每二時一包

次硝酸蒼鉛 一、〇

別拉敦那越幾斯 〇、〇六一〇、一

或 莫 比涅 〇、〇一〇〇、〇一五

二四三 重碳酸那篤留謨 二、〇

右分三包每食三十分後一包

煨性麻僱涅叟謨 一〇、〇

二四七 重碳酸那篤留謨 一〇、〇

右每回一小刀尖每食後半時

二四四 重碳酸那篤留謨 三、〇

煨性麻僱涅叟謨 一、五

右分三包一日三回每食四十分後一包

二四五 重碳酸那篤留謨 三、〇

煨性麻僱涅叟謨 一、五

別拉敦那越幾斯 〇、〇六

右分三包一日三回每食四十分後一包

二四六 重碳酸那篤留謨 一〇、〇

煨性麻僱涅叟謨 一〇、〇

薄荷油糖 二〇、〇

右每回一小刀尖

二四七 重碳酸那篤留謨 五、〇

煨性麻僱涅矢亞 五、〇

茴香油糖 一〇、〇

右分二十包每食後一包

二四八 重碳酸那篤留謨 一〇、〇

煨性麻僱涅叟謨 一〇、〇

大黃末 一〇、〇

茴香油糖 二〇、〇

二四九 重碳酸那篤留謨 一二、〇

右一日三回食後一刀尖

撒里矢爾酸那篤留謨 二、〇

二四〇 撒里矢爾酸蒼鉛、硫酸麻僱涅叟謨、重碳酸那篤留謨 各一〇、〇

右分十包每食後一包

二四一 重碳酸那篤留謨 一、五

右分三包一日三回每回一包

二四二 重碳酸那篤留謨 二、〇

右分六包一日二三回每回一包

二四三 重碳酸那篤留謨 五、〇

右分六包朝夕各一包

二四四 重碳酸那篤留謨、白糖 各一〇、〇

右每食後半時一刀尖

二四五 重碳酸那篤留謨 六、〇

枸橀油糖 四、〇

白糖 一八〇、〇

右每三時一茶匙

二四六 重碳酸那篤留謨 二〇、〇

大黃末 五、〇

茴香油糖 一五、〇

右一日三回每回一小刀尖

二四七 重碳酸那篤留謨 一五、〇

右一日三回每回一小刀尖

慢性胃加答兒

| | | | | | | | | |
|------|--------------|---------|------|---------------|------|------|--------------|-------|
| 二四八七 | 重碳酸那篤留謨 | 五、〇 | 二四九三 | 次硝酸蒼鉛 | 五、〇 | 二四九八 | 含糖百弗聖涅、白糖 | 各二、〇 |
| | 木炭末 | 五、〇 | | 別拉敦那越幾斯 | 〇、〇五 | | 右分五包一日三回每回一包 | 一、五 |
| | 薄荷油糖 | 五、〇 | | 右分十包每二時一包 | 四、〇 | 二五〇〇 | 百弗聖 | 〇、二 |
| 二四八八 | 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇五 | 二四九四 | 次硝酸蒼鉛 | 四、〇 | | 蕃木籃越幾斯 | 〇、二 |
| | 白糖 | 二、五 | | 百弗聖 | 四、〇 | | 硫酸亞鉛 | 〇、二 |
| 二四八九 | 次硝酸蒼鉛 | 〇、五 | | 結列阿曹篤 | 十滴 | | 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇五 |
| | 白糖 | 三、〇 | | 薄荷油 | 二滴 | | 乳糖 | 四、〇 |
| | 右分十包一日數回每回一包 | | | 右每食後一小刀尖 | | 二五〇一 | 含糖百弗聖涅 | 四、〇 |
| 二四九〇 | 次硝酸蒼鉛 | 〇、五 | 二四九五 | 百弗聖 | 四、〇 | | 白糖 | 二、〇 |
| | 白糖 | 一、〇 | | 乳糖 | 八、〇 | | 右分五包每食十五分前一包 | 一、〇 |
| 二四九一 | 次硝酸蒼鉛 | 〇、〇五 | | 右分二十包每食後直服一包 | 二、五 | | 但當兼用左方 | 二〇〇、〇 |
| | 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇一五 | 二四九六 | 百弗聖 | 〇、二五 | | 稀鹽酸 | 一、〇 |
| | 白糖 | 一、五 | | 乳酸 | 〇、二五 | | 水 | 二〇〇、〇 |
| | 右分三包一日三回每回一包 | | | 澱粉 | 三、〇 | | 右每回一食匙 | 〇、二 |
| 二四九二 | 次硝酸蒼鉛 | 一、〇 | 二四九七 | 百弗聖 | 三、〇 | 二五〇二 | 硫酸亞鉛 | 三、〇 |
| | 重碳酸曹達、白糖 | 各一、〇 | | 乳糖 | 五、〇 | | 白糖 | 三、〇 |
| | 右分五包朝夕各一包 | | | 右分十包一日三回每食後一包 | | 二五〇三 | 撒里矢爾酸 | 三、〇 |
| 二四九三 | 次硝酸蒼鉛 | 三、〇 | | 包 | | | 右分六包每食三十分前一包 | 五、〇 |
| | 吐根 | 〇、二一〇、六 | 二四九八 | 百弗聖涅 | 〇、三 | 二五〇四 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 |
| | 炭酸麻偏涅叟謨 | 三、〇 | | 白糖 | 〇、六 | | 右分十包包於オブラート一 | |
| | 茴香油糖 | 六、〇 | | 右分三包一日三回每回一包 | | | 日三回每回一包 | |
| | 右分十包一日四回每回一包 | | | 小兒 | | | | |

二五〇五 蕃木甃越幾斯 〇、一

白糖 二、〇

右分五包朝夕一包

二五〇六 酒製蕃木甃越幾斯 〇、一五

大黃根末 一、五

芳香散 三、〇

右分十包一日三回每回一包

二五〇七 硫酸規尼涅 〇、二

硫酸亞鉛 〇、一

白糖 三、〇一六、〇

右分十包一日三回每食時一包

二五〇八 煨性麻掘涅叟謨 一〇、〇

尚香油糖 一〇、〇

右一日二三回每回一小刀尖

二五〇九 煨性麻掘涅叟謨 一〇、〇

大黃末 四、〇

生姜末 二、〇

右每回一茶匙或一小刀尖一日數回分服

二五〇 沈降製炭酸石灰 一五、〇

尚香油糖 一五、〇

右一日數回每回一小刀尖

二五一一 沈降製炭酸石灰 一〇、〇

梓皮末 四、〇

肉豆蔻 三、〇

丁香 一、五

益智 一、〇

泊美藍 二、〇

白糖 二五、〇

右一日數回每回一小刀尖

二五一二 炭酸麻掘涅叟謨 一五、〇

甘草末 二〇、〇

大黃末 一〇、〇

繡草根末 五、〇

泊美藍末 一、〇

尚香末 一五、〇

右一日三回每回一小刀尖糖

水調和服用

二五一三 硫酸那篤留謨 九〇、〇

重碳酸那篤留謨 六、〇

格魯兒那篤留謨 三、〇

右每回一茶匙乃至三茶匙每朝一回頓服

二五一四 貌魯謨加留謨 一、〇

鹽酸規尼涅 〇、一

白糖 一、〇

右分三包一日三回每回一包

小兒

二五一五 睡菜葉、苦草葉、小矢車葉 各二、〇

薄荷葉、尚香 各二、〇

右為茶劑一二食匙浸出五〇〇、〇為一日量

二五一六 レゾルチン 三、〇一〇、〇

右分十包一日三回每回一包

二五一七 蕃木甃越幾斯 〇、一

白糖 適宜

右分六包朝夕一包

二五一八 礞酸攝留謨 〇、三一、五

右分六包一日二包乃至四包

二五一九 胡安子 一五、〇

邊泥子、尚香 各五、〇

肉荳蔻 二、〇

梓皮、水楊梅皮 各一、五

蜀葵 〇、五

砂糖 三、〇

右分六十包每食後一包

二五二〇 木炭末 二五、〇

括矢亞末 四、〇

炭酸麻偏涅矢亞 四、〇

右一日數回每回一茶匙

二五二 人工加爾爾斯泉鹽 五、〇、〇

右每朝二茶匙頓服

二五三 人工加爾爾斯泉鹽 一五、〇

右每朝頓服

二五三 硫酸麻偏涅涅 一五、〇

右頓服

●丸劑

二五四 硝酸銀 〇、五

右以白陶土為五十九朝夕各

二粒

二五五 硝酸銀 〇、二

右白礬土(白陶土)適宜為十

丸一日一粒乃至二粒

二五五 硝酸銀 〇、五

右泥葛根末、泥葛根越幾斯

各適宜為五十九朝夕各二粒

二五七 硝酸銀 一、〇

右以白陶土為五十九一日三

回乃至四回每回一粒

二五八 硝酸銀、長若越幾斯 各〇、四

亞兒答末 五、〇

大黃越幾斯 三、〇

右為六十九一日三回每食前

二粒

二五九 健質亞那越幾斯 各二、〇

大黃越幾斯

右為四十九一日三回每回二

粒

二五〇 蕃木鼈越幾斯 一、〇

大黃越幾斯

大黃末

右為三十九一日三回每回一

粒

二五三 蘆薈越幾斯、藥刺巴石鹼 各一、五

右為三十九一日一粒乃至四

粒

二五三 蘆薈 五、〇

機那越幾斯

桂皮末

右為五十九每食後二粒

二五三 古魯聖篤越幾斯 〇、〇三

右甘草羔甘草末各適宜為十

丸一日二粒乃至三粒

二五四 複方大黃越幾斯 一、〇

右甘草羔甘草末各適宜為二

丸一粒乃至二粒頓服

二五五 蕃木鼈越幾斯 〇、三

龍膽越幾斯

機那越幾斯

右為四十五丸一日三四每回

五粒

二五六 蘆薈越幾斯 三、〇

複方大黃越幾斯

或蕃木鼈越幾斯

右甘草羔甘草末各適宜為三

十九朝夕各一粒

二五七 乳酸鐵 三、〇

硫酸規尼涅

右甘草末甘草羔各適宜為六

十九每朝每夕四粒

二五八 還元鐵 四、〇

水製機那越幾斯

右為六十九朝夕各三粒

二五九 炭酸鐵 〇、三

亞砒酸

右為丸一日三回每食後分服

二五四 格魯兒安母紐讚 八、〇

右蒲公英越幾斯、大黃末各適宜爲三十九朝夕四粒乃至六粒

二五四 百弗聖 一五、〇

硫酸規尼涅 五、〇

健質亞那根、亞兒答根

稀鹽酸、備里設林 各三、〇

右篤拉侃篤護適宜爲三百

二五四 大黃 〇、五

丸每食後二三粒

鹽酸規尼涅 〇、二

蕃木甞越幾斯 〇、〇五

蘆薈 〇、一

乳酸鐵 〇、一

二五四 右爲丸一日三回分服

カスカリルナ皮末 二〇、〇

蕃木甞越幾斯 〇二、五

大黃末 二、〇

芳香散* 三、五

右亞拉比亞護漿適宜爲五

二五四 結麗阿曹篤 一、〇

右爲四十九每食後一粒

二五五 結麗阿曹篤 〇、〇六

右入膠囊一日三回每食後服用

二五五 結麗阿曹篤 一、〇

右甘草羔甘草末各適宜爲十

丸每食後一粒乃至二粒(制

二五七 結麗阿曹篤 六、〇

右龍膽末龍膽越幾斯各適宜

爲三十九每食後一

二五八 結麗阿曹篤 〇、三

右爲十五丸一日三回每回一

粒乃至五粒

二五九 結麗阿曹篤 一、〇

右麵包心適宜爲四十九每食

後一粒乃至二粒

二五六 結麗阿曹篤 五滴

右甘草羔甘草末各適宜爲十

五丸一日三回每回一丸

二五五 結麗阿曹篤 一、五

右分入膠囊三十個每食後一

二五五 イヒチチール 一〇、〇

右分入膠囊三十個一日二回

每回一個乃至二個

二五五 クレチリン 五、〇

黃蠟、柯柯阿脂 各適宜

右爲五十九一日五粒乃至十

二五五 石炭酸 一、〇

大黃末 五、〇

右亞拉比亞護漿適宜爲五十

丸食後一粒

二五五 蕃木甞丁幾 一〇、〇

●滴劑

二五五 蕃木甞丁幾 二〇、〇

苦味丁幾 一〇、〇

右一日三回每回十五滴

二五六 蕃木甞丁幾 一〇、〇

苦味丁幾 一〇、〇

杏仁水 五、〇

右一日三回每食後十五滴

二五五 稀鹽酸 二五、〇

水 二五、〇

右每食後半時十五滴

二五五 稀鹽酸 五、〇

二五五 稀鹽酸 五、〇

苦味丁幾

右每食後十五滴

二〇、〇

二五五 稀鹽酸

苦味丁幾

右每食後十五滴(貧血)

二〇、〇

二五六

稀鹽酸、蕃木鼈丁幾各一五、〇

右每食後半時十五滴乃至二十滴

二五六一 稀鹽酸

蕃木鼈丁幾

健質亞那丁幾

右每食前十滴乃至十五滴

二五六二

稀鹽酸

橙皮含利別

右每食後十滴乃至十五滴

二五六三 稀鹽酸

覆盆子含利別

右每食後十滴乃至十五滴

二五六四 稀鹽酸

含糖百布聖

機那丁幾 右一日三回每回二十滴乃至

二五五五 杏仁水

三十滴和糖水服用

別拉敦那丁幾

右一日三回每回五滴

二五六六 杏仁水

別拉敦那丁幾

右一日三回每回十滴

二五六七 杏仁水

蕃木鼈丁幾

右朝夕各十滴

二五六八 杏仁水

蕃木鼈丁幾

右朝夕五滴乃至十滴

二五六九 杏仁水

蕃木鼈丁幾

右一日二回乃至三回每回十滴

二五七〇 杏仁水

蕃木鼈丁幾

右一日三回每回八滴乃至十滴、小兒

二五七一 杏仁水

鹽酸莫兒比涅

二五七二 杏仁水

右一日數回每回十滴乃至十五滴

二五七三 蕃木鼈丁幾

苦味丁幾

右一日三回每回十五滴

二五七四 複方機那丁幾

蕃木鼈丁幾

右一日三回每回二十滴乃至三十滴

二五七五 酒製大黃丁幾、苦味丁幾

右一日三回每回十滴、小兒

二五七六 葛蒲根丁幾、機那丁幾

右一日三回每回二十滴乃至三十滴

二五七七 苦味丁幾、桂皮丁幾各一五、〇

右一日三回每回三十滴

二五七八 苦味丁幾

複方機那丁幾

蕃木鼈丁幾

右每食前三十分服十五滴

二五八 枸橼油 一、〇

刺賢碎爾油 〇、一

耶麻依加胡椒油 〇、一

酒精 七、〇

炭酸安母紐謨 四、〇

安母尼亞水 一〇、〇

右水適宜全量爲一〇〇、〇

一日數回每回二十滴乃至四

十滴

●錠劑

二五九 百非聖 五、〇

乳酸 一、〇

篤拉侃篤謨 一、〇

白糖 二〇、〇

右爲二十五錠每食後一二個

二六〇 炭酸麻僱涅叟謨 二〇、〇

白糖 八〇、〇

篤拉侃篤漿 適宜

右爲百錠、一日三四回每回

一二個

二六一 大黃末、生姜末 各一〇、〇

白糖 八〇、〇

右亞拉比亞謨漿適宜爲百

二六二 錠一日三四回每回一個

二六三 沈降製炭酸加爾叟謨 四五、〇

炭酸麻僱涅叟亞 三〇、〇

肉荳蔻末 二、〇

白糖 九〇、〇

亞拉比亞謨 一五、〇

右蒸餾水適宜爲二百錠一日

數回每回四錠乃至十錠

二六四 次硝酸蒼鉛 六、〇

機那越幾斯 六、〇

阿片越幾斯 三、〇

右單舍利別適宜爲三十錠一

日二回食後一錠

●含嗽劑

二六五 重炭酸曹洋水 (四、〇) 二〇〇、〇

右含嗽、口中酸味

二六六 稀鹽酸水 (一、五) 二〇〇、〇

右含嗽、口中苦味

●洗滌劑

二六七 重炭酸那篤留謨 五、〇

水 五〇〇、〇

右胃洗滌

二六八 加爾爾斯泉鹽 一〇、〇

水 五〇〇、〇

右胃洗滌

二六九 チモール 一、〇

水 一〇〇〇、〇

右胃洗滌

二七〇 レゾルチン 三〇、〇

水 一〇〇〇、〇

右胃洗滌

二七一 撒里矢爾酸 〇、二

水 二〇〇、〇

右胃洗滌

二七二 鹽酸亞刺莫兒比涅 〇、一

蒸餾水 二、〇

右一筒注射皮下(催吐)

二七三 牛肉(細挫) 一五〇、〇

臍(細挫) 五〇、〇

微溫湯 一〇〇、〇

右混和爲粥狀、注入腸內ラ

イブ氏肉臍洗腸法

二七四 忽布滿氏拔爾撒謨 二〇、〇

ケルン香水 * 二〇、〇

右胃部塗擦

中毒性胃炎 Gastritis toxica

中毒胃痙攣、中毒、

二五四 沙列布煎 (二、〇)一八〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

二九五 亞拉比亞護膜漿

單舍利別 各二五、〇

蒸餾水 一〇〇、〇

右每二時一食匙

二五六 阿片 〇、一

乳糖 一、〇

右分二包一日一包乃至二包

二五七 鹽酸莫兒比涅 〇、〇三

白糖 一、五

右分三包一日一包乃至三包

二五九 鹽酸里母奈堉 二〇〇、〇

右每二時一食匙

消化不良 Dyspepsia

處置 實私百布矢亞、胃弱、虛性胃弱、飲食不化、古醫書謂之脾胃虛損、整理生活法、攝取滋養食、與良性母乳、限哺乳時間、又投消化藥、兼與健胃劑

● 浸劑煎

二五九 大黃浸 (二、〇)八〇、〇

重碳酸那篤留謨 三、〇

單舍利別 二〇、〇

右一日三回每回一小兒匙、

小兒

二六〇 大黃浸 (二、〇)一五〇、〇

重碳酸那篤留謨 五、〇

薄荷舍利別 * 一〇、〇

右每二時一食匙

二六一 大黃浸 (二、〇)一三〇、〇

重碳酸那篤留謨 五、〇

苦味丁幾 五、〇

生姜舍利別 * 二〇、〇

右一日三回每回一食匙

二六二 大黃浸 (六、〇)一八〇、〇

レゾルチン 二、〇

重碳酸那篤留謨 八、〇

薄荷油糖 一〇、〇

右每二時一食匙

二六三 大黃 四、五

桂皮 四、〇

設利酒 六〇〇、〇

右浸出一日二三回每回半茶匙乃至一茶匙

二六四 大黃 二〇、〇

桂皮、丁香 各四、〇

肉荳蔻 二、〇

酒精 一〇〇、〇

右浸出一日二三回每回二十滴乃至四十滴

二六五 大黃 八、〇

甘草根、茴香 各四、〇

益智 一、〇

酒精 一〇〇、〇

右浸出一日三四回每回一二匙

二六六 機那煎 (一、〇—三、〇) 一〇〇、〇

橙皮舍利別 二〇〇、〇

右一日四回每回一小兒匙、小兒

二六七 昆儒蘭格煎 (一〇、〇) 一〇〇、〇

橙皮舍利別 二〇〇、〇

右一日三回每回一小兒匙、小兒

二六八 加斯加利刺皮 一五、〇

橙皮 三〇〇、〇

桂皮 一〇〇、〇

マラガ酒 一碗

二六九 加斯加利刺皮煎 (一〇、〇) 一〇〇、〇

甘硝石精 五、〇

橙皮舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

二七〇 古倫僕根煎 (二〇、〇) 一〇〇、〇

橙皮舍利別 三〇〇、〇

右每三時一食匙

二七一 古倫僕根 一〇〇、〇

生薑根 一〇〇、〇

二七二 扇那葉 二、五

右浸出 四〇〇、〇

二七三 泥苜根浸 (一、〇) 一〇〇、〇

亞拉比亞護膜漿 四、〇

白糖 八、〇

二七四 蒲公英根煎 (三、〇) 六〇〇、〇

右朝夕各六〇、〇乃至一二〇、〇

二七五 沙列布漿 一、二〇、〇

結列阿曹篤 二滴

二七六 メリツツ葉 九〇〇、〇

枸櫞皮 一五〇、〇

機那皮、丁香、肉荳蔻 各八〇、〇

胡荽子、白芷 各四〇、〇

酒精 五〇〇、〇

右五日間浸出每服半食匙乃至一食匙

二七七 吐根浸 (〇、五) 一五〇、〇

民埤別里精 一五、〇

接骨木花絞汁 二五、〇

右每二時一食匙

二七八 吐根浸 (五、〇) 七五、〇

吐酒石酒 二五、〇

右每十分時一食匙、催吐

二七九 水劑 二〇〇、〇

右每食後一食匙

二八〇 百弗聖 一〇〇、〇

鹽酸

水

十五滴
一八〇、〇

單舍利別

一五、〇

右每二時一食匙

二六二

百弗聖

一、〇

稀鹽酸

一、五

薄荷油糖

三〇、〇

水

一二〇、〇

二六三

百弗聖

一、〇

稀鹽酸

八〇、〇

偏里設林

十滴

二六四

百弗聖

一〇、〇

稀鹽酸

五、〇

橙皮丁幾

五、〇

單舍利別

二〇、〇

水

一八〇、〇

右每二時一食匙

二六五

百弗聖

五、〇

乳酸

〇、五

單舍利別

一〇、〇

水

一〇〇、〇

右每食前一茶匙

二六五

稀鹽酸

二滴一六滴

水

一〇〇、〇

右每食後一食匙、小兒

二六六

稀鹽酸

〇、二一〇、三

水

六〇、〇

覆盆子舍利別 * *

二〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

二六七

稀鹽酸

四滴一六滴

水

八〇、〇

單舍利別

一〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

二六八

稀鹽酸

十滴

水

一六〇、〇

單舍利別

一〇、〇

右每服一二茶匙

二六九

稀鹽酸

二、〇

蕃木釐丁幾

一、〇

苦味丁幾

二、〇

單舍利別

一〇、〇

蒸餾水

一〇〇、〇

右一日三四分服

二七〇

乳酸

二滴一六滴

水

一〇〇、〇

右每食後一食匙、小兒

二七一

乳酸

二、〇

水

一〇〇、〇

單舍利別

一〇、〇

右每二時一小兒匙、小兒

二七二

磷酸

一、〇

水

五〇、〇

覆盆子舍利別

二〇、〇

右每三時一茶匙、小兒

二七三

酒石酸

一〇〇、〇

單舍利別

一〇、〇

右每食後一小兒匙、小兒

二七四

石灰水

三〇、〇

單舍利別

一〇、〇

右二時一茶匙、小兒

二天五 石灰水 五〇、〇

水 右每回一食匙點加飲料、小兒

二天七 重碳酸那篤留謨 一〇、一二、五

水 右每回一小兒匙乃至二小兒匙、小兒

二天六 炭重酸那篤留謨 〇、三

水 單舍利別 八〇、〇

二天三 重碳酸那篤留謨 五、〇、一〇、〇

水 龍膽越幾斯 〇、五、一、五

二天四 重碳酸那篤留謨 一、〇、一、二、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇、一、〇、〇、二

水 橙皮舍利別 一五〇、〇

右每二時一食匙 一五、〇

二天四 撒里矢爾酸 〇、五、一、一、〇

水 重碳酸那篤留謨 一、〇、〇、〇

二天五 安息香酸那篤留謨 五、〇

水 單舍利別 一〇〇、〇

二天五 炭酸麻偏涅曳謨 〇、二

水 右每二時一食匙、小兒

二天四 結列阿曹篤 二滴、四滴

水 單舍利別 三五、〇

二天五 結列阿曹篤 一五、〇

水 橙皮舍利別 一八〇、〇

二天四 レゾルチン 〇、五

水 單舍利別 八〇、〇

二天五 大黃丁幾 三〇、〇

水 右一日二回每回一茶匙乃至二茶匙

二天四 大黃丁幾 十滴

水 單舍利別 一〇〇、〇

二天五 大黃丁幾 六、〇

水 單舍利別 四、〇

二天五 大黃越幾斯 一、五

水 單舍利別 二〇〇、〇

二天五 大黃越幾斯 九〇、〇

水 單舍利別 一〇、〇

二天五 加斯加利刺丁幾 二十滴

水 右每二時一食匙、小兒 一〇〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

二六五 加斯加利刺丁幾 二十滴

水 八〇、〇

覆盆子舍利別 二〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

二六四 ラタニヤ丁幾 一〇、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

二六三 ラタニヤ丁幾 十滴

加斯加利刺丁幾 十滴

尚香油 一滴十二滴

水 七〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每二時一小兒匙、小兒

二六二 亞爾蘇越幾斯 一五、〇

薄荷水 一二、〇

橙皮丁幾 八〇、〇

右一日三四每回一茶匙乃至

二六一 加密列水 三〇、〇

水 三〇、〇

橙皮舍利別 一〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

二六〇 芳香丁幾、依的兒精 各十滴

水 五〇、〇

阿片丁幾 一滴十二滴

右每二時一茶匙、小兒

二五九 昆儒蘭格酒 二〇、〇

右一日三四每食前一小兒匙

小兒

二五八 嘔吐劑 二、五

吐根末 〇、一

吐酒石 二、〇

澱粉 二、〇

右分四包每十五分時一包、

催吐

●下劑

二五七 蓖麻子油 一五、〇

右頓服

二五六 人工加爾爾斯泉鹽 一五、〇

右早晨頓服

二五五 甘汞 〇、〇三一〇、〇六

白糖 〇、〇六
右分三包每三時一包、小兒

急性

二五四 甘汞 〇、五

白糖 二、〇

右分六包一日一包、小兒

●散劑

二五三 含糖百弗聖 一、〇

乳糖 二、〇

右分十包每食後五分時一包

小兒

二五二 含糖百弗聖 〇、三

白糖 〇、六

右分三包一日三四每回一包

小兒

二五一 含糖百弗聖 〇、二

白糖 五、〇

右分十包每食前一包

二五〇 百弗聖 三、〇

鹽酸規尼涅 一、〇

亞拉比亞護謨 二、〇

甘草末 二、〇

右分十包每食前一包

二四九 重碳酸那篤留謨 五、〇
右分十包一日三四每回一包

二六七〇 重碳酸那篤留謨 一、〇
白糖 一、〇
右分十包一日三回每回一包
小兒

二六七二 重碳酸那篤留謨 一〇、〇
茴香油糖 五、〇
右每食後一小刀尖、小兒

二六七三 重碳酸那篤留謨 五、〇
茴香油 三滴
乳糖 三、〇
右一日三回每回一小刀尖、小兒

二六七四 重碳酸那篤留謨 一〇、〇
大黃末、橙皮末 各一〇、〇
右一日二回乃至三回每回半茶匙

二六七五 重碳酸那篤留謨 一二、五
茴香油糖 一二、五
大黃末、生姜末 各二、五
右一日三回每回一小刀尖

二六七六 重碳酸那篤留謨 二〇、〇
薄荷油糖 五、〇
右一日三回每回一小刀尖、

鹽酸過多

二六七七 重碳酸那篤留謨 一、五
木炭末 一、五
薄荷油糖 三、〇
右分三包每食後一包

二六七八 重碳酸那篤留謨 二〇、〇
炭酸麻僱涅叟謨 五、〇
右每食後一小刀尖

二七一九 重碳酸那篤留謨 一〇、〇
吐根末 〇、三
右分十包每食後一包

二七八〇 重碳酸那篤留謨 一〇、〇
酒石酸 九、〇
白糖 二〇、〇
右每回一茶匙

二七八一 蝦性麻僱涅叟謨 一〇、〇
茴香油 五滴
右一日二回每回一小刀尖、小兒

二七八二 蝦性麻僱涅叟謨 一〇、〇
ガウルテリヤ油糖 一〇、〇
右一日三回每回一小刀尖

二七八三 蝦性麻僱涅叟謨 一五、〇
炭酸那篤留謨 五、〇
別拉敦那越幾斯 〇、一
水製蕃木甞越幾斯 〇、一
右一日三回每食後一茶匙

二七八四 蝦性麻僱涅叟謨 一五、〇
炭酸蒼鉛、炭酸那篤留謨 各五、〇

二七八五 別拉敦那越幾斯 〇、一
水製蕃木甞越幾斯 〇、一
右一日四回每回一茶匙

二七八六 炭酸麻僱涅叟謨 五、〇
大黃末 一、五
茴香油糖 一〇、〇
右一日三回每回一小刀尖、小兒

二七八七 大黃末 〇、三
白糖 三、〇
右分十包一日三回每回三包乃至四包、小兒

二七八八 加斯加利刺丁幾 各二十滴
ラタニヤ丁幾 各五、〇
肉寇豆糖、乳糖 各五、〇

二六七 安息香酸那篤留謨 右每回一刀尖

〇、五、一、〇

白糖

右分十包一日三回每回一包

二六八 撒里矢爾酸那篤留謨

薄荷油糖

右分三包一日三回每回一包

二六九 撒里矢爾酸那篤留謨

重碳酸那篤留謨

右每食後一刀尖

二七〇 撒里矢爾酸

重碳酸那篤留謨

右食後一刀尖

二七一 撒里矢爾酸蒼鉛

白糖

右分三包一日三回每回一包

二七二 次硝酸蒼鉛、乳糖

右分十包一日三回每回一包

二七三 石炭酸

大黃末

一、〇
五、〇

二七四 結列阿曹篤 右甘草末、亞拉比亞護謨各適宜為五十九丸每食後一粒

一、〇

二七五 バンクレアチン 右為五十九丸每食後一粒

二、〇

二七六 麥芽越幾斯 右亞爾答根末適宜為十九丸、每食前一粒 適宜

二、〇

二七七 鹽酸オレキシン 右健質亞那越幾斯、亞爾答根末各適宜為膠衣二十九丸一日三回每回三粒乃至五粒

一、一、五

二七八 薔木鼈越幾斯 大黃末

一、五

二七九 芳香散 右亞拉比亞護謨適宜為三十九丸一日三回每回一粒乃至二粒

三、〇

二八〇 吐根 大黃末 右為一丸每食前一粒

〇、一、五、一、〇、二

二八一 加斯加利刺皮末

五、〇

二八二 蘆薈 右為五十九丸一日四回每回五粒

三、〇

二八三 幾那越幾斯 桂皮末

一、五

二八四 橙皮舍利別 右為三十九丸每食前一粒乃至二粒

〇、六

二八五 稀鹽酸 古倫僕越幾斯

三、〇

二八六 古倫僕根末 沙列布根末

四、〇

二八七 薄荷油 右為八十九丸一日四回每回十丸

四、〇

二八八 白糖 右為百錠一日二個乃至三個

一、〇

二八九 次硝酸蒼鉛 沈降製炭酸石灰

八、〇

二九〇 炭酸麻佩涅叟謨 白糖

一、〇

二九一 亞拉比亞護謨 亞拉比亞護謨

一、〇

二九二 亞拉比亞護謨

一、〇

右薔薇水適宜爲十錠一日一
個乃至六個

二〇四

百非聖

一〇、〇

乳酸

二、〇

篤拉侃篤護謨

二、〇

白糖

四〇、〇

餾水

適宜

右爲十糕每食後一二片

●滴劑

二〇五

百非聖

二、〇

稀鹽酸

二、〇

機那丁幾

二〇、〇

右一日三回每回二十滴

二〇六

稀鹽酸

二〇、〇

右每食後二滴

二〇七

稀鹽酸

五、〇

酒製大黃丁幾

一〇、〇

桂皮舍利別

一五、〇

右一日三回每回三滴乃至十

五滴

二〇八

蕃木鼈丁幾、機那丁幾各五、〇

二〇九

右每食前五滴乃至十滴

二一〇

蕃木鼈丁幾

二、〇

苦味丁幾

八、〇

右一日三回每回五滴乃至八

滴、小兒

二一〇

蕃木鼈丁幾

一〇、〇

苦味丁幾

二〇、〇

右每食後十五滴

二一一

蕃木鼈丁幾

二、〇

阿片丁幾

三、〇

加斯加利刺丁幾

一〇、〇

右一日三回每回十五滴

二一二

芳香丁幾、依的兒精各二〇、〇

二一三

複方椿皮エリキシル

二一四

酒製大黃丁幾

二四、〇

二一五

酒製大黃丁幾

八、〇

右一日二回每回四十滴乃至

二一四

依的兒性續草丁幾

一八、〇

葛縷子油

二、〇

右每服十滴

二一五

抱水格魯刺兒

一、〇

水

貌魯謨加留謨

六〇、〇

單舍利別

二〇、〇

右每三時一茶匙、小兒

二一六

肉荳蔻油

十滴

芳香軟膏

三〇、〇

右塗擦腹部

二一七

殿製麻偏涅叟謨

五、〇

滑石末

二〇、〇

撒里矢爾酸

〇、〇

イヒチナール

〇、二

披爾撒謨合劑

十滴

右撒布肛門周圍之糜爛

嘔吐 Vomitus (gravidarum)

妊婦嘔吐又名神經性嘔吐

●散劑

一七六 沸騰散

三〇一

右頓服

嘔吐

一百六十七

二七九 鹽酸莫兒比涅 〇、一

重碳酸那篤留謨 一、〇

右分十包朝晝夕三回每回一包

二七〇 鹽酸莫兒比涅 〇、〇三

鹽酸古加乙涅 〇、〇三

乳糖 一、〇

右分三包一日三回每回一包

二七一 鹽酸莫兒比涅 〇、〇三

鹽酸古加乙涅 〇、〇六

乳糖 一、五

右分三包一日三回每回一包

二七二 鹽酸攝留謨 〇、一二

乳糖 二、〇

右為四包一日四回每回一包

二七三 鹽酸攝留謨 〇、五

乳糖 一、五

右為五包一日三回每回一包

二七四 鹽酸攝留謨 二、〇

乳糖 四、〇

右分十包朝晝夕各一包

二七五 鹽酸攝留謨 〇、二五

薄荷油糖 二、〇

二七六 重碳酸那篤留謨 〇、八

次硝酸蒼鉛 〇、三

乳糖 二、〇

右分三包一日三回每回一包

二七七 枸橼酸咖啡涅 〇、一五

乳糖 一、〇

右分三包一日三回每回一包

二七八 小水塊 若干

●水劑

二七九 セルテール水 * 一五〇、〇

右每時一食匙

二八〇 セルテール水 * 一五〇、〇

鹽酸古加乙涅 〇、〇三一〇、〇五

右每時一食匙

二八一 貌魯謨加留謨 一、三

重碳酸那篤留謨 〇、八

生姜舍利別 四、〇

水 六〇、〇

右頓服

二八二 貌魯謨化加留謨 八、〇

水 一八〇、〇

苦味丁幾 四、〇

右每二時一食匙

二八三 貌魯謨加留謨六、〇 一、二、〇

鹽酸古加乙涅 〇、〇六一〇、一二

苦味丁幾 三、〇

單舍利別 一五、〇

水 二〇〇、〇

右一日三回二日分服

二八四 貌魯謨加留謨 五、〇

鹽酸古加乙涅 〇、〇六一〇、〇一

龍膽丁幾 二〇、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右一日三回分服

二八五 小半夏煎 一五、〇 一〇〇、〇

生姜舍利別 六、〇

右一日三回分服

二八六 沙列布煎 一三、〇 一二〇、〇

結列阿費篤 〇、〇五

稀酒精 〇、二

二七〇 右每二時一食匙

三〇〇

沙列布煎
結列阿曹篤

一八〇〇

二七一 右每二時一食匙

〇〇一

薄荷水
右每二時一食匙

〇〇二

二七二 依的兒性醋酸鐵丁幾

六〇〇

二七三 依的兒、橙皮舍利別

各二〇〇

二七四 右每二時一小兒匙

二〇〇

二七五 阿片丁幾

四〇〇

二七六 單舍利別

一〇〇〇

二七七 右一日數回分服

一〇〇〇

二七八 阿片丁幾

一〇〇〇

二七九 機那丁幾

一五〇〇

二八〇 葡萄酒精

一〇〇〇

單舍利別
右每二時一食匙

二〇〇〇

二八二 沃度丁幾

十滴

二八三 右一日三回分服

五〇〇

二八四 沃度丁幾

五滴

二八五 單舍利別

三〇〇〇

二八六 沃度加留謨

一〇〇〇

二八七 沃度

〇〇五

二八八 單舍利別

三〇〇〇

二八九 右每二時乃至三時一茶匙、
頑固之神經性嘔吐

一二〇〇

二九〇 鹽酸莫兒比涅

〇〇五

二九一 右一日三回每回十五滴

一〇〇〇

二九二 鹽酸莫爾比涅
白糖
杏仁水
右一日四回乃至五回每回十
五滴乃至二十滴

〇〇五
二〇〇
一五〇〇

二九三 鹽酸莫爾比涅

〇〇一

水醋
嘔囉仿謨
無水亞兒個保兒

適宜
五〇〇

二九四 右每服五滴

一五〇〇

二九五 鹽酸古加乙涅

〇〇一

二九六 杏仁水

一〇〇〇

二九七 右一日數回每回十滴乃至十
五滴

五滴

二九八 嘔囉仿謨

五滴

二九九 右嘔吐後每服十滴乃至二十
滴

五〇〇

三〇〇 硝酸銀
別拉敦那越幾斯
蒸餾水
右一日三回每回十五滴乃至
二十滴

〇〇三
〇〇三
三〇〇〇

三〇一 沃度加留謨

四〇〇

三〇二 龍膽丁幾
右每三時服十五滴乃至二十
滴

三五〇〇

●九劑

二七五 結列阿曹篤 〇、三

右爲五十九日三回每回一粒

二七五 硝酸銀 〇、五

右白陶土適宜爲三十九日二回乃至三回每回三粒

二七五 マントール 〇、八

白糖 一、〇

右入膠囊六個一日三回每回

胃壁擴張 Dilatatis ventriculi Gasteroektasie.

二個 ●皮下注射劑

二七五 硫酸莫兒比涅 〇、一

硫酸亞篤魯比涅 〇、〇一

水 右每次以半筒乃至一筒注射皮下

●洗腸劑 二、〇

二七五 抱水格魯刺爾 二、〇

二七三 人工加爾爾斯泉鹽 二、〇、〇

水 右每二時一食匙

二七三 人工加爾爾斯泉鹽 三、〇、〇

水 右一日三回二分服

二七五 人工加爾爾斯泉鹽 一、〇、〇

苦味丁幾 二、〇、〇

水 右一日三回分服 一、〇、〇

二七五 蕃木釐丁幾 一、〇、〇

重碳酸那篤留謨 二、〇、〇

水 亞拉比亞護謨漿 * 三、〇、〇 適宜

二七五 貌魯謨加留謨 二、〇一四、〇

水 亞拉比亞護謨漿 三、〇、〇 適宜

右一日分二回洗腸

水 單舍利別 一、〇、〇、〇

右一日三回分服

二七六 蕃木釐丁幾 一、〇、〇

武蘭垓酒 二五、〇

水 單舍利別 八、〇

右一日三回分服

二七七 蕃木釐丁幾 一、〇、〇

水 單舍利別 八、〇

水 水製大黃丁幾 三、〇、〇

●水劑 一、〇、〇

二七五 稀鹽酸 一、〇、〇

右每食後服八滴

二七五 苦味丁幾 二、〇、〇

蕃木釐丁幾 一、〇、〇

二七六 蕃木釐丁幾 一、〇、〇

複方機那丁幾 二、〇、〇

二七六 稀鹽酸 一、〇、〇

覆盆子舍利別 二、〇、〇

右每食後一時間服十滴

二七六 右一日三回分服
含糖百弗聖
稀鹽酸

一、〇
〇、三
八〇、〇
二〇、〇

水
橙皮舍利別
右一日三回每回一小兒匙、

小兒

二七五 稀鹽酸
赤葡萄酒

二、〇
二、五
二〇、〇
二〇〇、〇

單舍利別

右每時二食匙

二七四 稀鹽酸

蕃木蠶丁幾

單舍利別

蒸餾水

右每二時一食匙

二七三 硝酸銀

偏里設林

單舍利別

蒸餾水

右每二時一食匙

●丸劑

二七二 硝酸銀
右白礬土適宜為百九一日一
粒乃至三粒

一、〇
〇、五
二、〇

二七〇 石炭酸
右亞爾答根木適宜為二十九
一日三回每回一粒

二、〇
〇、五
各一、五

二七四 蘆薈越幾斯、藥刺巴石礮

右為三十九一日二粒乃至三
粒

〇、五
一、〇
〇、二五

二七五 古魯聖篤越幾斯
蘆薈越幾斯

〇、二五
一、二五

二七六 大黃末
右為三十九一日一粒乃至三
粒

一、〇
〇、二五
一、五

●散劑

二七六 人工加兒爾斯泉鹽

右早晨頓服

一五、〇
〇、〇六
〇、〇六

二七七 甘朮
白糖

右分三包一日三回每回一包

〇、一

二七六 蕃木蠶越幾斯

白糖
右分六包一日三包

二、〇
三、〇
三、〇

二七九 撒里矢爾酸
白糖

右分六包每食前一時間服一
包

三、〇
〇、三
〇、六

二八〇 次硝酸蒼鉛
白糖

右分三包一日三回分服

〇、六
五、〇
二、〇

二八一 次硝酸蒼鉛
右一日三回每回一小刀尖

二、〇
一、〇
二、〇

二八二 重碳酸那篤留謨
別拉致耶越幾斯

甘草末

右一日三回分服

〇、一
適宜

●洗滌劑

二八三 人工加爾爾斯泉鹽水

右胃洗滌

二〇〇、〇
五〇〇、〇

二八四 重碳酸那篤留謨水

(五、〇)五〇〇、〇

右胃洗滌

二七五 撒里矢爾酸水

(一〇〇)三〇〇〇

二七六 レゾルチン水

(一〇〇)五〇〇〇

右胃洗滌

胃痛 Cardialgie, Gastralgie, Gastrodynie.

胃神經痛、胃痙、痔譯作胃腸筋疼、古謂之胃氣痛、伏梁、癥瘕、心下絞痛、胃脘痛

●注射劑

二七六 鹽酸莫兒比涅

蒸餾水

一〇、〇

右發作時注射皮下

二七六 鹽酸莫兒比涅

水

〇、三

偏里設林

五、〇

石炭酸

一滴—二滴

右半筒注射皮下

二七九 醋酸莫兒比涅

醋酸

〇、一

水

一滴

右注射皮下四分之一乃至半筒

二七〇 脫魯謨水素酸コデイン

水

〇、〇二

一〇、〇

右胃洗滌

二七六 レゾルチン水

(一〇〇)五〇〇〇

●水劑

二七九 亞砒酸加留謨液

水

十滴

單舍利別

六〇、〇

右一日三四分服

二七九 結列阿曹篤

沙列布漿

〇、五

白糖

一〇〇、〇

右一日三四回每回一食匙

二七九 硝酸銀

蒸餾水

〇、〇五

右一日六回二日分服

二七四 撒里矢爾酸那篤留謨

嘔囉仿謨水

四、〇—八、〇

薄荷水

一〇〇、〇

二〇〇、〇

右胃洗滌

二七五 撒里矢爾酸水

二七六 レゾルチン水

二七九 結列阿曹篤

二七九 亞砒酸加留謨液

二七九 硝酸銀

二七九 撒里矢爾酸那篤留謨

嘔囉仿謨水

薄荷水

別拉敦那越幾斯

菲沃斯越幾斯

扁桃舍利別

扁桃乳劑

杏仁水

單舍利別

右每時一食匙

右每二時一食匙

右每二時一食匙

右每二時一食匙

右每二時一食匙

右每二時一食匙

右每二時一食匙

右每二時一食匙

右每二時一食匙

右每二時一食匙

右每二時一食匙

三〇、〇

一〇〇、〇

五〇、〇

二〇、〇

一〇〇、〇

〇、二

四、〇

三〇、〇

一、五

四、〇

一五〇、〇

三〇、〇

〇、一

〇、一

〇、一

〇、一

〇、一

〇、一

〇、一

杏仁水 五、〇
 水 一、二〇、〇
 橙皮舍利別 二、五、〇
 依的兒 二、〇、〇
 右每二時一食匙
 二七九 別拉敦那越幾斯 〇、一五
 炭酸加留謨 四、〇
 薄荷水 一五〇、〇
 大黃丁幾 三〇〇、〇
 覆盆子舍利別 三〇〇、〇
 右每二時一食匙
 二八〇 昆儒蘭格越幾斯 二、〇
 抱水格魯刺兒 五、〇
 橙皮舍利別 二〇〇、〇
 水 一八〇、〇
 右每二三時一食匙
 二八二 亞爾答煎(一〇、〇)一五〇、〇
 貌魯謨加留謨 六、〇
 大麻丁幾 六、〇
 橙皮舍利別 一五、〇
 右每二三時一食匙(ステリ)
 二八三 吐根浸 (四、〇)七五、〇

右每十分時一食匙、催吐
 二八四 蓖麻子油 一五、〇
 右頓服
 滴劑
 二八五 蕃木鼈丁幾 一〇、〇
 苦味丁幾 二〇、〇
 右一日三回每回十滴
 二八六 蕃木鼈丁幾、海狸丁幾各〇、五
 右發作時十滴
 二八七 蕃木鼈丁幾 三、〇
 阿片丁幾 三、〇
 依的兒性繡草丁幾 三、〇
 右一日三回每回十五滴
 二八八 蕃木鼈丁幾 三、〇
 酒製大黃丁幾 三、〇
 海狸香丁幾 三、〇
 右一日三回每回十五滴
 二八九 阿片泊美藍丁幾 五、〇
 海狸丁幾 一〇、〇
 依的兒製繡草丁幾 一五、〇
 右一日三回乃至四回每回十滴
 滴乃至二十滴
 二九〇 鹽酸莫兒比涅 〇、〇三

杏仁水 一〇、〇
 右每二時十滴
 二九一 鹽酸莫兒比涅 一〇、〇
 杏仁水 一〇、〇
 右一日三回每回十五滴
 二九二 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五
 噶囉仿謨 八〇、〇
 醋 二〇、〇
 亞兒個保兒 二〇、〇
 右一日三四回每回五滴乃至二十滴
 二九三 鹽酸莫兒比涅 〇、一二
 稀鹽酸 四滴
 酒精 三、〇
 水 九、〇
 右每回十滴乃至三十滴
 二九四 鹽酸古加乙涅 〇、一
 杏仁水 一〇、〇
 右一日數回每回十滴乃至十五滴
 二九五 別拉敦那越幾斯 〇、二
 安母尼亞茴香精 二〇、〇
 水 一〇、〇

二元五 別拉敦那越幾斯 〇、三
安母尼亞尚香精 二、〇
水、伽里設林 各七、五
右一日三回每回十滴乃至二十滴

二元六 菲沃斯越幾斯 〇、二
杏仁水 五、〇
水 五、〇
右每二時十滴乃至二十滴

二元七 依的兒性繡草丁幾 八、〇
加耶布的油 十滴
右每三時三十滴

二元八 依的兒性繡草丁幾 一八、〇
葛縷子精 二、〇
右每服二十滴乃至四十滴

二元九 依的兒性繡草丁幾 一四、〇
薄荷油 一、〇
右每服二十滴乃至三十滴

二元〇 額草丁幾 一五、〇
一半格魯兒鐵液 五、〇
右一日三回每回二十滴

二元一 亞吡酸加留誤水 五、〇

水 一五、〇
右一日二回每回五滴乃至三十滴

二元三 メントール 一、〇
酒精 一〇、〇
右每服一二滴

二元四 鹽酸規尼涅 〇、五
右為丸每朝頓服

二元五 鹽酸規尼涅 〇、五
右為丸每朝頓服

二元六 鹽酸規尼涅 〇、五
右為丸每朝頓服

二元七 鹽酸規尼涅 〇、五
右為丸每朝頓服

二元八 鹽酸規尼涅 〇、五
右為丸每朝頓服

二元九 鹽酸規尼涅 〇、五
右為丸每朝頓服

二元〇 鹽酸規尼涅 〇、五
右為丸每朝頓服

二元一 龍膽越幾斯、龍膽末 各適宜
右為二十九一日三回每回三粒乃至五粒

二元二 鹽酸ゴアイン 〇、五
右亞爾答根大、單舍利別各

二元六 メントール 二、〇
白糖 一、〇
酒精 二滴
右亞拉比亞護謨適宜為二十丸每二時二粒

二元七 鹽酸古加乙涅 〇、一
別拉敦那越幾斯 〇、五
右大黃末、大黃越幾斯各適宜為二十九一日三回每回一粒

二元八 阿片越幾斯 〇、三
加糖炭酸鐵 〇、五
炭酸麻備涅矢亞 一、〇
右護謨癩適宜為五十九朝夕食前各一粒

二元九 複方大黃越幾斯 四、〇
蘆香 三、〇
藏粉 一、〇
右為六十九一日二回每回一粒

二元〇 複方大黃越幾斯 五、〇
古魯聖驚越幾斯 一、〇

蕃木甞越幾斯 ○、五

右為五十九丸每夜一粒乃至二粒

二元三 次硝酸蒼鉛 三、〇

緬草越幾斯 * 三、〇

右為五十九丸一日三回每回五粒へステリ性

二元四 次硝酸蒼鉛 五、〇

緬草發蒼鉛 二、五

別拉敦那越幾斯 〇、五

右緬草越幾斯適宜為百丸每三時服二粒乃至三粒

二元五 阿魏 〇、〇

茴香油 六滴

右為百丸一日三回每回二粒乃至十粒、歇私的里性

二元六 鹽酸莫兒比涅 〇、〇三

茴香油糖 一、五

二元七 阿片越幾斯 〇、〇五

亞拉比亞護謨末 〇、一

格倫僕末 二、〇

白糖 五、〇

薄荷油 一滴

二元八 鉛糖 〇、二

右分十包朝夕各一包

二元九 重碳酸那篤留謨 二、〇

次硝酸蒼鉛 二、〇一五、〇

別拉敦那越幾斯 〇、一

白糖 二、〇

二元〇 右分十包一日三回每回一包

二元一 重碳酸那篤留謨 二、〇

次硝酸蒼鉛 一、五

別拉敦那越幾斯 〇、一

二元二 白糖 一、〇

右分三包一日三回每回一包

二元三 重碳酸那篤留謨 二、〇

次硝酸蒼鉛 一、五

非沃斯越幾斯 〇、一

二元四 別拉敦那越幾斯 〇、〇六

右分三包一日三回每回一包

二元五 重碳酸那篤留謨 二、〇

次硝酸蒼鉛 一、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇二

二元六 酒製蕃木甞越幾斯 〇、〇三

右分四包一日四回每回一包

二元七 重碳酸那篤留謨 一、〇

次硝酸蒼鉛 一、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇二

二元八 乳糖 二、〇

右分六包一日三回每回一包

二元九 重碳酸那篤留謨 二、〇

次硝酸蒼鉛 二、〇一五、〇

二元〇 鹽酸莫兒比涅 〇、一

乳糖 二、〇

二元一 右分十包朝夕各一包

二元二 重碳酸那篤留謨 三、〇

次硝酸蒼鉛 三、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

二元三 乳糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包

二元四 重碳酸那篤留謨 三、〇

次硝酸蒼鉛 三、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

二元五 乳糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包

二元六 重碳酸那篤留謨 三、〇

次硝酸蒼鉛 三、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

二元七 乳糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包

二元八 重碳酸那篤留謨 三、〇

別拉敦那越幾斯

〇、一二

健質亞那末

〇、五

右分三包一日三回每回一包

二元四 鹽酸莫兒比涅

〇、〇一

次硝酸蒼鉛

〇、二五

乳糖

〇、五

二元四 右頓服

次硝酸蒼鉛

一、五

鹽酸莫兒比涅

〇、〇五

白糖

五、〇

二元五 右分十包一日三回每回一包

次硝酸蒼鉛

一、〇

醋酸莫兒比涅

〇、〇二

薄荷油糖

二、〇

右分四包一日三回每食後半

二元五 時間一包

次硝酸蒼鉛

三、〇

阿片末

〇、二

薄荷油糖

五、〇

二元五 右分十包一日三回每回一包

次硝酸蒼鉛

一、〇

阿片

〇、〇三

茴香油糖

二、五

二元五 右分三包一日三回每回一包

次硝酸蒼鉛

一、〇

菲沃斯越幾斯

〇、二

白糖

五、〇

右分十包一日三回每回一包

二元五 次硝酸蒼鉛

〇、六

菲沃斯越幾斯

〇、〇六

乳糖

一、五

右分六包一日三回每回一包

二元五 次硝酸蒼鉛

三、〇

別拉敦那末

〇、五

加密列油糖

五、〇

右分十包每三時一包

二元五 次硝酸蒼鉛

二、〇

別拉敦那越幾斯

〇、二

炭酸麻備涅叟謨

四、〇

薄荷油

六滴

右分十包一日三回每回一包

二元五 次硝酸蒼鉛

〇、三

炭酸麻備涅叟亞

二、〇

蕃木鼈越幾斯

〇、三

薄荷油糖

六、〇

右分十包每三時一包

二元五 次硝酸蒼鉛

蕃木鼈越幾斯

二、〇

蝦製麻備涅叟謨

〇、一

薄荷油

六滴

右分十包一日三回乃至四回

二元五 每回一包

炭酸麻備涅叟亞

五、〇

桂皮末

〇、二

阿片末

〇、〇五

右分十包一日二回食前一包

二元五 炭酸麻備涅叟亞

八、〇

吐根末

〇、一

次硝酸蒼鉛

〇、三一〇、六

右分十二包一日三回每回一包

二元五 炭酸蒼鉛

〇、三

白糖

一、五

右分十包一日二回每回一包

二元五 鹽酸古加乙涅

〇、一

白糖

三、〇

右分十包一日三回每回一包

二元五 古塔乙涅

〇、一〇、五

白糖

二、〇

二六四 薄荷腦 右分五包發作時一包 一、〇

酒精 右一日數回分服 一〇、〇

二六五 貌羅謨化那篤留謨 安知必林 〇、五

二六六 酸化亞鉛 右頓服 〇、三

白糖 右分十包每二時一包 〇、五

胃潰瘍 *Ulcus ventriculi (simplex, rotundum.)*

胃圓形潰瘍、慢性胃潰瘍、穿孔性胃潰瘍、胃癱、胃腕癱、胃皮內生潰瘍
 處置 安臥、鹽類下劑、滋養性食物、消化催進劑、疼痛則用冷罨法、氈布、芥子泥等、重症則用滋養洗腸、液
 狀滋養食物等

二六七 藏酸鐵亞鉛 ※ 白糖 〇、二

右分六包每二時一包 四、〇

二六八 加糖炭酸鐵 重碳酸那篤留謨 〇、二五

二六九 水素還元鐵 硫酸規尼涅 〇、二五

白糖 右分三包一日三回每回一包 〇、五

二七〇 鈹劑 沃度仿謨 白糖 五、〇

薄荷油 右為百鈹一日五個乃至六個 一〇、〇

二七一 鹽酸莫兒比涅 白糖 〇、〇五

右篤拉侃篤護謨適宜為十鈹 每夕二個 一〇、〇

二七二 過格魯兒鐵液 ●水劑 五、〇

右一日數回每回五滴乃至十滴

二七三 過格魯兒鐵液 桂皮水 三、〇

二七四 過格魯兒鐵液 右每服五滴乃至十滴 一、五

水 橙皮舍利別 八〇、〇

右每二時一小兒匙、小兒 二〇、〇

二七五 過格魯兒鐵液 水 二、〇

阿片丁幾 橙皮舍利別 三〇、〇

二七六 蛋白化鐵液 一〇〇、〇

右一日三回每回半茶匙乃至一茶匙

二七七 沃度丁幾 水 六滴

二七八 沃度丁幾 水 右一日三回每回一食匙 一〇、〇

胃潰瘍

右每二時一食匙

二六九 麥角越幾斯 一、〇、一、二、〇

水 一〇〇〇、〇

橙皮舍利別 * 三〇〇、〇

右每二時一食匙、出血

二六八 麥角越幾斯 二、〇

稀硫酸、桂皮丁幾 各二、〇

右每半時乃至一時服十五滴

乃至三十滴、出血

二六六 鹽酸莫兒比涅 〇、一

別拉敦那越幾斯 〇、一

杏仁水 一〇〇、〇

右每回五滴

二六二 鹽酸莫兒比涅 〇、一

硫酸亞篤魯比涅 〇、〇、一

蒸餾水 一〇〇、〇

右一日數回每回八滴乃至十

二六三 硝酸銀 〇、〇、五、一、〇、一

水 一、二、〇、〇

備里設林 三〇〇、〇

右一日三回每回一食匙

二六四 次硝酸蒼鉛 一〇、〇、一、二、〇、〇

二〇〇、〇

二六五 稀硫酸 二、〇

水 一、二、〇、〇

覆盆子舍利別 * 三〇〇、〇

右每一時乃至三時服一食匙

出血

二六六 嚼囉仿謨 一、〇

蒸餾水 一、二、〇、〇

右一日數回每回一食匙

二六七 抱水格魯拉爾 三、〇

水 五〇〇、〇

亞拉比亞護謨漿 五〇〇、〇

右夜間每二時三回分服

二六八 抱水格魯刺兒 二、〇、一、三、〇

亞拉比亞護謨漿 * 二〇〇、〇

水 一〇〇〇、〇

右每夕二時間內三回分服

二六九 抱水格魯刺兒 一、〇、一、三、〇

水 六〇〇、〇

貌魯謨加僧謨 五、〇

桂皮舍利別 * 二〇〇、〇

右每二時一小兒匙、小兒

〇、五

二六〇 結列阿曹篤 一〇〇〇、〇

水 〇、〇、〇

右每二時一食匙

二六一 結列阿曹篤 二十滴

硫酸莫兒比涅 〇、〇、六

水 六〇〇、〇

二六二 結列阿曹篤 〇、一、一〇、二

薄荷水 一八〇〇、〇

沙列布漿 * 二〇〇、〇

右每二時一食匙

二六三 的列並油 一〇〇、〇

右二時乃至三時服五滴乃至

十五滴、出血

二六四 人工加兒爾斯泉鹽 一〇〇〇、〇

右每回一茶匙、分服

二六五 石灰水 五〇〇〇、〇

右每回一食匙牛乳點和服用

●丸劑 〇、〇、三

二六六 硝酸銀 〇、〇、三

右白礬土備里設林各適宜為

三九一日三粒 〇、一

二六七 硝酸銀 〇、一

白陶土 二、五

右為二十九一日三回每回一

二元九 硝酸銀 〇、二五—〇、五

白陶土 五、〇

右為五十九一日三回每回一

粒乃至二粒

二元九 硝酸銀 〇、三五

別拉敦那越幾斯 〇、五

丁香油 六滴

右為百二十九一日三回每回

二粒乃至三粒

二元〇 次硝酸蒼鉛 六、〇

失鳩容越幾斯 一、〇

右藥用石鹼適宜為百九一日

三回每回一粒乃至二粒

●散劑

二元二 重碳酸那篤留謨 五、〇

鉛糖 〇、五

右分十包每二時一包

二元二 重碳酸那篤留謨 一五、〇

次硝酸蒼鉛 一五、〇

薄荷油糖 五、〇

二元三 重碳酸那篤留謨 一、〇

次硝酸蒼鉛 二、〇

非沃斯越幾斯 〇、三

白糖 二、〇

右分十包一日三回每回一包

二元四 重碳酸那篤留謨 四、〇

次硝酸蒼鉛 二、〇

別拉敦那越幾斯 一、二

右混和分六包一日三回每回

一包

二元五 重碳酸那篤留謨 五、〇

次硝酸蒼鉛 五、〇

安知必林 五、〇

白糖 五、〇

右分十包每食前一包

二元六 重碳酸那篤留謨 〇、二五

次硝酸蒼鉛 二、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇〇五

乳糖 〇、五

右作十包一日三回每回一包

二元七 重碳酸那篤留謨 三、〇

次硝酸蒼鉛 三、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

白糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包

二元八 次硝酸蒼鉛 六、〇

重碳酸那篤留謨、白糖各三、〇

右分六包每食十五分前一包

二元九 次硝酸蒼鉛 一、〇

別拉敦那越幾斯 〇、一

尚香油糖 三、〇

右分十包朝夕各一包

二元〇 次硝酸蒼鉛 二、〇

別敦那越幾斯 〇、一

右分六包朝夕各一包

二元二 次硝酸蒼鉛 一、〇

非沃斯越幾斯 〇、二

白糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包

二元三 次硝酸蒼鉛 〇、三

挖勿兒氏散 〇、三

白糖 一、〇

右分三包每三時一包、小兒

二元三 次硝酸蒼鉛 一、〇

阿片末 〇、一

白糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

二元四 次硝酸蒼鉛 一、〇

阿片 〇、一

乳糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

二元五 次硝酸蒼鉛 二、五

鹽酸莫兒比涅 〇、一

白糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

二元六 次硝酸蒼鉛 五、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

右分十包一日三回每回一包

二元七 次硝酸蒼鉛 一、五

鹽酸莫兒比涅 〇、〇一五

別刺敦那越幾斯 〇、〇三

右分三包一日三回每回一包

二元八 醋酸鉛 〇、二

醋酸莫兒比涅 〇、一

白糖 五、〇

右分十包每二時一包、出血

二元九 單寧酸 〇、三一、〇

白糖 五、〇

二元〇 單寧酸 〇、五

阿片 〇、一五

白糖 二、〇

右分五包每二時一包

二元二 單寧酸 〇、五

阿片 〇、一〇、一五

白糖 五、〇

右分六包每二時一包、出血

二元三 單寧酸 〇、五

阿片 〇、二五

乳糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包

二元三 明礬 四、〇

白糖 二、〇

右分四包每三時一包、出血

二元四 明礬 一、〇

阿片越幾斯 〇、二

薄荷油糖 三、〇

右分十包每三時一包

二元五 鹽酸古加乙涅 〇、〇一〇、〇五

乳糖 〇、五

右頓服 〇、〇五

二元六 蔞酸攝留謨 〇、五

乳糖 〇、五

右頓服 〇、二五

二元七 古埤乙涅 〇、二五

白糖 二、〇

右分五包一日三回每回一包

二元八 人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇

右頓服 〇、〇五

●注射劑 一、〇

二元九 麥角越幾斯 五、〇

蒸餾水 〇、一

石炭酸 〇、一

右一日數回每回半筒乃至一

筒皮下注射

二元〇 流動麥角越幾斯 五、〇

水 〇、五

右每回半筒注射皮下

二元一 鹽酸莫兒比涅 〇、五

備里設林 五、〇

蒸餾水 五、〇

右注射皮下

二元三 鹽酸莫兒比涅 〇、一
 硫酸亞篤魯比涅 〇、〇一
 水 二〇、〇
 二元三 右注射皮下 格魯兒那篤留謨 四、〇
 重碳酸那篤留謨 五、〇

胃出血 Hemorrhagia ventriculi. Haematemesis.

吐血、胃血、嘔血、
 處置 安靜就褥、地平仰臥、運動戒禁、飲食禁制、冷乳冰片、胃部冰冷、失神則用顏面灌水、樟腦依的兒注射
 嘔吐則用莫比注射、其他滋養灌腸等

●注射劑
 二元高 エルゴチン 〇、〇三一〇、一
 右蒸餾水適宜注射皮下
 二元五 麥角越幾斯、蒸餾水 各五、〇
 右五分一筒乃至半筒注射皮下
 二元六 麥角越幾斯 二、〇
 亞爾個保兒、儂里設林各六、〇
 右半筒乃至一筒注射皮下
 二元七 格魯兒那篤留謨 四、〇
 碳酸那篤留謨 五、〇
 水 五〇〇、〇
 右注射靜脈內
 ●水劑
 二元六 麥角越幾斯、芳香硫酸

各一〇、〇
 二元九 右每回十滴乃至三十滴 麥角越幾斯 二、〇
 桂皮水 一八〇、〇
 右每二時一食匙
 二元四 麥角浸 (五、〇) 二〇、〇
 阿片丁幾 一、〇
 單舍利別 一〇、〇
 右每二時一食匙
 二元四 過格魯兒鐵液 一〇、〇
 右每回五滴
 二元四 過格魯兒鐵液 一、〇
 水 五〇、〇
 橙皮舍利別 一五、〇
 右每半時一小兒匙

水 五〇〇、〇
 右注射上肢靜脈內
 二元四 過格魯兒化鐵液 一、五
 阿片丁幾 〇、〇六
 水 一五〇、〇
 橙皮舍利別 三〇、〇
 右每半時一食匙
 二元四 過格魯兒鐵液 二、〇
 水 二〇〇、〇
 阿片丁幾 十滴
 器藥舍利別 三〇、〇
 右每半時一食匙
 二元四 單寧酸 四、〇
 酒精 八、〇
 水 一八〇、〇
 右每十分時一食匙
 二元四 明礬 〇、五

水 五〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每五分時一茶匙

二元四七 明礬 二、〇

沙利布漿* 八〇、〇

阿片丁幾 三滴

二元四七 精製的列並油 一〇、〇

右每三時一茶匙、小兒

二元四七 稀硫酸 二五、〇

精製的列並油、酒精各一〇、〇

二元五〇 丸散劑 各一、〇

水製麥角越幾斯、單寧酸

二元五〇 阿片木 〇、二

右為二十九每二時乃至三時

二元五二 明礬 五、〇

一粒

二元五二 麒麟血 二、〇

二、〇

二元五二 蜂蜜 二、〇

右為四十五丸每回一粒乃至

二元五二 五粒

二元五三 ●散劑 〇、五

醋酸鉛 五、〇

右分十包一日三回每回一包

二元五三 單寧酸 〇、一

白糖 一、五

二元五三 醋酸鉛 〇、二

右分五包每二時一包

二元五三 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

白糖 三、〇

二元五三 醋酸鉛 〇、二

右分十包每二時一包

二元五三 鹽酸莫兒比涅 〇、一

白糖 二、〇

二元五三 醋酸鉛 〇、一五

右分十包每二時一包

二元五三 阿片 〇、〇五

〇、〇一

二元五三 右分五包每時一包 〇、二五

醋酸鉛 〇、一

二元五三 阿片 二、五

乳糖 二、五

二元五三 右分五包每二時一包 〇、八

二元五三 醋酸鉛、托湧兒散 各〇、〇八

白糖 一、二

右分四包一日四回每回一包

二元五三 明礬 四、〇

二元五三 托湧兒散 〇、三

乳糖 一、〇

二元五三 右分五包每二時一包 〇、三

二元五三 單寧酸 〇、三

白糖 三、〇

二元五三 右分十包每二時一包 〇、三

二元五三 鞣酸 〇、六

阿片 〇、五

二元五三 乳糖 〇、五

二元五三 右分三包每二時一包 〇、三

二元五三 單寧酸規尼涅 一、五

白糖 〇、三

二元五三 右分三包一日三回每回一包 〇、三

二元五三 小兒 二、〇

二元五三 明礬 四、〇

二元五三 亞拉比亞護謨 二、〇

二元五三 右分四包每三時一包 二、〇

二九四 明礬

一、〇一五、〇

二九五

次硝酸蒼鉛

一、〇

二九六

貌魯謨加留謨、白糖 各二、〇

阿片末
桂皮末

〇、三
二、五

重碳酸那篤留謨

二、〇

右分五包一日三回每回一包
小兒

右分五包每四時一包

潰瘍

胃癆 Carcinoma ventriculi.

處置 外科手術、其他用滋養攝生、以水塊鎮嘔吐、又與生肉、赤酒、酪乳等、行滋養灌腸以助榮養、其他施對症之處置

● 浸煎藥

二九七 昆儒蘭格煎

(一五、〇)一八〇、〇

右一日二回乃至三回每回一食匙

食匙

二九八 昆儒蘭格皮煎

(一〇、〇)一八〇、〇

椀皮舍利別

二〇、〇

右每二時一食匙

二九九 昆儒蘭格皮煎

(一五、〇)一八〇、〇

單舍利別

二〇、〇

右一日二食匙乃至三食匙

三〇〇 昆儒蘭格皮煎

二九五

次硝酸蒼鉛

一、〇

二九六

貌魯謨加留謨、白糖 各二、〇

重碳酸那篤留謨

二、〇

右分五包一日三回每回一包
小兒

潰瘍

胃癆 Carcinoma ventriculi.

處置 外科手術、其他用滋養攝生、以水塊鎮嘔吐、又與生肉、赤酒、酪乳等、行滋養灌腸以助榮養、其他施對症之處置

(一五、〇)一七〇、〇

稀鹽酸

〇、五

單舍利別

三〇、〇

右每二時一食匙

二九七 昆儒蘭格煎

(一〇、〇)一八〇、〇

稀鹽酸

二〇、〇

單舍利別

二〇、〇

右一日三回二日分服

二九七 昆儒蘭格皮煎

(六、〇)一〇〇、〇

稀鹽酸

二〇、〇

含糖百弗聖

一、〇

單舍利別

一〇、〇

右每食後一二食匙

二九七

昆儒蘭格煎(五、〇)一〇〇、〇

稀鹽酸

一、〇

含糖百弗聖

一、〇

單舍利別

一〇、〇

右一日三回食後分用

二九八

昆儒蘭格煎

(一〇、〇)一〇〇、〇

レゾルチン

一、〇

大黃丁幾

三、〇

右一日三回分服

二九五

昆儒蘭格皮煎

(一五、〇)一八〇、〇

酒精大黃丁幾

五、〇

| | |
|---------------|--------|
| レゾルチン | 二、〇 |
| 橙皮舍利別 | 二〇、〇 |
| 右每二時一食匙 | |
| 二九六 | |
| 沙列布煎 | 一、二〇、〇 |
| 結麗阿曹篤 | 二滴 |
| 單舍利別 | 一五、〇 |
| 右一日三回二日分服用於食後 | |
| ●水劑 | |
| 二九七 | |
| 稀鹽酸 | 二、〇 |
| 百弗聖酒 | 一〇、〇 |
| 亞爾答舍利別 | 二〇、〇 |
| 水 | 一八〇、〇 |
| 右一日六回二日分服 | |
| 二九八 | |
| レゾルチン | 二、〇 |
| 水 | 一八〇、〇 |
| 苦味丁幾 | 五、〇 |
| 阿片丁幾 | 二、〇 |
| 單舍利別 | 二〇、〇 |
| 右每二時一食匙 | |
| 二九五 | |
| 硝酸銀 | 〇、〇五 |
| 蒸餾水 | 二〇、〇 |
| 別拉敦那越幾斯 | 〇、〇五 |

| | |
|-----------------------|-------|
| 偏里設林 | 三、〇 |
| 右一日三回每回一食匙 | |
| 二九〇 | |
| 流動昆儒蘭格越幾斯 | 一五、〇 |
| 稀鹽酸 | 一、〇 |
| 單舍利別 | 一〇、〇 |
| 水 | 一五〇、〇 |
| 右一日三回分服 | |
| 二九一 | |
| 流動昆儒蘭格越幾斯 | 二、〇 |
| 抱水格魯刺爾 | 一、〇 |
| 單舍 | 二〇、〇 |
| 水 | 一五〇、〇 |
| 右一日三回乃至六回分服 | |
| 二九二 | |
| 昆儒蘭格酒 | 一〇〇、〇 |
| 右每時一食匙 | |
| 二九三 | |
| コニイ子 <small>茶</small> | 一滴 |
| 炭酸那篤留謨 | 五、〇 |
| 薄荷水 | 二〇〇、〇 |
| 右每三時一食匙 | |
| 二九四 | |
| 稀鹽酸 | 二〇、〇 |
| 右每食後十五滴 | |
| 二九五 | |
| 流動昆儒蘭格越幾斯 | 五〇、〇 |
| 右一日三回每回二十滴乃至四十滴 | |

| | |
|-----------------|------|
| 二九六 | |
| 別拉敦那越幾斯 | 〇、三 |
| 硝砂加尚香精 | 二、五 |
| 水 | 一五、〇 |
| 右每二時十滴乃至二十滴 | |
| 二九七 | |
| 沃度丁幾 | 一〇、〇 |
| 右一日三回每回三滴 | |
| 二九八 | |
| 硝酸銀、別刺敦那越幾斯 | 各〇、五 |
| 蒸餾水 | 三〇、〇 |
| 右一日三回每回十五滴乃至二十滴 | |
| 二九九 | |
| 鹽酸古加乙澀 | 〇、一 |
| 杏仁水 | 一〇、〇 |
| 右一日三回每回十滴乃至二十滴 | |
| 三〇〇 | |
| 安母尼亞尚香精 | 一〇、〇 |
| 右一日三回每回五滴乃至十滴 | |
| 三〇一 | |
| 加那布的油 | 五、〇 |
| 右一日數回每回三滴、胃風丸散劑 | |
| 三〇二 | |
| 結列阿曹篤 | 一、〇 |
| 右為三十九一日三四每回一 | |

二粒

三九三 鹽酸莫兒比涅

乳糖

右頓服、疼痛

三九四 鹽酸莫兒比涅

乳糖

右分十包一日數回每回一包

三九五 鹽酸莫兒比涅

次硝酸銻鉛

第四節 腸管之諸病

急性腸加兒 *Enteritis catarrhalis acuta.*

最急性胃腸炎、霍亂、歐洲虎刺拉、舊譯作肚腸炎、又名大小腸內皮發炎、古名泄瀉
處置 安靜擄臥、下腹溫包、湯婆溫浴、粘滑飲料、宿便排除、收斂諸藥其他疼痛則用莫兒比冷器法等

菲沃斯越幾斯

白糖

右分十包一日三回每回一包

三九六 次硝酸銻鉛

菲沃斯越幾斯

白糖

右分十包一日三回每回一包

三九七 阿片、醋酸銻

乳糖

右分五包一日三回每回一包

三九八 撒里矢爾酸那篤留謨

重碳酸那篤留謨

右每食後一刀尖

三九九 蝦製麻偏濕矢亞

重碳酸那篤留謨

右一日三回每回一刀尖

三〇〇 甘汞

右頓服

三〇一 甘汞

白糖

右頓服

三〇二 甘汞

藥刺巴根

右頓服

三〇三 甘汞、藥刺巴、白糖 各三、〇

三〇四 甘汞 一、〇一、二、〇

三〇五 甘汞 〇、〇〇七、〇、〇六

乳糖

右為一包每二時一包、小兒

三〇六 甘汞

白糖

〇、〇六 〇、〇六 〇、〇六

三〇七 甘汞 〇、〇一

乳糖 二、〇

右分五包一日三回每回一包

三〇八 甘汞

乳糖

〇、〇二 〇、〇二 〇、〇二

右分十包一日三回每回一包

小兒

急性腸加答兒

一百八十五

三〇九 甘草 一、〇—一、五

白糖 一、五

右分三包每半時一包

三〇〇 甘草 〇、〇三一〇、一五

甘草末 〇、三

右分三包一日二回乃至三回

每回一包、小兒

三〇一 甘汞 〇、一

重碳酸那篤儻謨

右分十包每二時一包 二、〇

三〇二 大黃末 〇、一

掬湧兒氏散 〇、一

白糖 三、〇

三〇三 大黃末 〇、二

掬湧兒氏散 〇、二

白糖 三、〇

三〇四 掬湧兒氏散 〇、五

右分十包每二時一包、小兒

右頓服

三〇五 掬湧兒氏散 〇、〇六一〇、一

白糖 一、〇

右分三包一日三回每回一包

三〇六 小兒 〇、一

掬湧兒氏散 一、〇

白糖 一、〇

右分五包一日五回每回一包

三〇七 小兒 〇、一—〇、五

掬湧兒氏散 二、五

白糖 二、五

右分十包一日二三回每回一包、小兒

三〇八 掬湧兒氏散 一、〇

白糖 一、〇

右分四包一日四回每回一包

三〇九 掬湧兒氏散 一、〇

古倫僕越幾斯、白糖 各二、〇

右分十包每二時一包

三〇〇 掬湧兒氏散 一、〇

格倫僕越幾斯 二、五—五、〇

白糖 五、〇

右分五包乃至十包每三時一包

三〇一 掬湧兒氏散 一、〇

古倫僕越幾斯 〇、五

單寧酸 〇、五

三〇二 右分五包每時一包 一、〇

掬湧兒氏散 〇、五

單寧酸 〇、五

格倫僕越幾斯 〇、五

乳糖 二、〇

右分五包乃至六包一日三回

三〇三 阿片 〇、二

白糖 二、〇

右分五包每時一包

三〇四 阿片 〇、二—五、〇

白糖 五、〇

右分十包一日二回乃至三回

三〇五 阿片 〇、三

白糖 三、〇

右分十包每二三時一包

三〇六 阿片 〇、一—〇、二五

薄荷油糖 二、五

右分五包一日三回乃至五回

三〇七 阿片末、吐根末 各〇、一

白糖 二、五

右分五包每二時一包

三〇六

阿片末

〇、一五

單寧酸

〇、二五

白糖

二、五

右分五包每二時一包

三〇九

阿片

〇、二

單寧酸、白糖

各二、〇

右分十包每時一包

三〇〇

阿片末

〇、二五

單寧酸

〇、五

乳糖

五、〇

右分十包一日三回每回一包

三〇三

阿片

〇、一〇〇、二

單寧酸

一、〇

蘇木越幾斯

二、〇

右分十包一日三回每回一包

三〇三

阿片、醋酸鉛

各〇、三

右分六包一日三回每回一包

三〇三

阿片

〇、二

醋酸鉛

〇、二

亞拉比亞護膜末

二、〇

右分六包每時一包

三〇四

阿片、醋酸鉛

各〇、二

護膜散*

右分五包每二時一包

三〇五

阿片

〇、〇六

單寧酸

〇、五

次硝酸蒼鉛

一、〇

重碳酸那篤留膜

二、〇

右分四包一日四回分服

三〇六

阿片末

四、五

黑胡椒末

六、〇

生姜末

一五、〇

葛縷子末

一八、〇

篤拉侃篤末

一、五

右一回〇、一乃至〇、三

三〇七

單寧酸

〇、五

阿片

〇、三

白糖

五、〇

右分十包一日三回每回一包

三〇六

單寧酸

〇、六

阿片

〇、三

乳糖

五、〇

右分十包一日三回每回一包

三〇九

單寧酸

一、〇

鹽酸莫兒比涅

〇、一

白糖

右分十包一日三回每回一包

三〇四

單寧酸

〇、二五

格倫僕越幾斯

二、五、一五、〇

白糖

五、〇

右分五包乃至十包每三時一包

三〇一

單寧酸

〇、三

挖勿兒氏散

〇、一

白糖

三、〇

右分十包每三時一包、小兒

三〇三

單寧酸キニジ一子

五、〇

炭酸麻備涅叟膜

〇、五

白糖

二、〇、〇

尚香油糖

一、〇、〇

右每一二時一小刀尖

三〇四

單寧酸規尼涅

〇、五、一二、五

右分十包一日三回每回一包

三〇四

單寧酸規尼涅

〇、五

甘草末

〇、五

小兒

右分十包一日三回每回一包

小兒

小兒

三〇五 單寧酸規尼涅 〇、三

挖沕兒氏散 〇、一

右分五包一日三回每回一包

小兒

三〇四 單寧酸規尼涅 一、五

阿片 〇、一

白糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

三〇三 次硝酸蒼鉛 〇、一五、〇、六

護謨散* 一、五

右分三包一日三回每回一包

三〇二 次硝酸蒼鉛 一、〇、一、二、〇

亞拉比亞護謨末 五、〇

右分十包每二時一包、小兒

三〇一 次硝酸蒼鉛 〇、〇、三

白糖 〇、〇、六

右分三包一日三回每回一包

小兒

三〇〇 次硝酸蒼鉛 一、〇

乳糖 一、〇

右分十包每三時一包、小兒

三〇九 次硝酸蒼鉛 一五、〇

乳糖 五、〇

三〇五 右分十包每三時一包 一、〇

次硝酸蒼鉛 〇、一

挖沕兒氏散 二、〇

白糖 二、〇

右分十包一日二回乃至三回

三〇五 次硝酸蒼鉛 〇、三

每回一包 〇、一

挖沕兒氏散 三、〇

白糖 三、〇

右分十包每三時一包、小兒

三〇四 次硝酸蒼鉛 五、〇

挖沕兒氏散 二、〇

白糖 三、〇

右分十包每三時一包

三〇五 次硝酸蒼鉛 一、〇

挖沕兒氏散 〇、七

乳糖 〇、七

右分三包一日三回每回一包

三〇六 次硝酸蒼鉛 二、〇

阿片 〇、一

白糖 二、〇

右分十包每二時一包

三〇七 次硝酸蒼鉛 五、〇

阿片 〇、三

白糖 三、〇

右分十包每三時一包

三〇五 次硝酸蒼鉛 五、〇

阿片末 〇、三

乳糖 三、〇

右分十包每三四時一包

三〇九 次硝酸蒼鉛 一、〇

阿片末、醋酸鉛 各〇、一二

白糖 一、二

右分四包一日三回每回一包

三〇六 次硝酸蒼鉛 一、〇

重碳酸那篤留謨 二、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇、二、五

右分三包一日三回每回一包

三〇六 次硝酸蒼鉛 三、〇

單寧酸 〇、三

阿片 〇、一

右分三包一日三回每回一包

三〇三 次硝酸蒼鉛 五、〇

炭酸加爾叟謨 五、〇

白糖 三、〇

右分十包每三時一包

三〇六三 次硝酸蒼鉛 一、五

炭酸加爾叟謨 一、五

挖湧兒氏散 一、五

乳糖 一、五

右分三包一日三回每回一包

三〇六四 撒里矢爾酸蒼鉛 〇、三

白糖 〇、六

右分三包一日三回每回一包

小兒

三〇六五 撒里矢爾酸蒼鉛 一、五

乳糖 一、五

右分三包一日三回分服

三〇六六 撒里矢爾酸蒼鉛 二、〇

乳糖 二、五

右分十包二時一包

三〇六七 撒里矢爾酸蒼鉛 一五、〇

乳糖 五、〇

右分十包每三時一包

三〇六八 撒里矢爾酸蒼鉛 三、〇

阿片 〇、三

乳糖 三、〇

右分十包每三時一包

三〇六九 撒里矢爾酸蒼鉛 二、〇

挖湧兒氏散 二、〇

乳糖 三、〇

右分十包每三時一包

三〇七〇 撒里矢爾酸蒼鉛 二、〇

炭酸石灰 五、〇

白糖 三、〇

右分十包每三時一包

三〇七一 ザロール 五、〇

撒里矢爾酸蒼鉛 五、〇

結晶重碳酸那篤留謨 五、〇

右分十五包朝夕二回每食前

一包

三〇七二 ザロール、撒里矢爾酸蒼鉛

重碳酸那篤留謨 各一〇、〇

右分三十包一日三回每食前

三〇七三 デルマトール 三、〇

炭酸蒼鉛 三、〇

右分三包一日三回分服

三〇七四 タンニゲン 一、二一三、〇

右分六包一日三回每回一包

三〇七五 明礬 二、〇一三、〇

阿片末 〇、二

白糖 一、〇

右分十包一日三回每回一包

三〇七六 明礬 五、〇

阿片 〇、二五

亞拉比亞護謨 五、〇

右分十包一日三回每回一包

三〇七七 醋酸鉛 〇、〇三一〇、一

白糖 〇、六

右分三包一日三回每回一包

小兒

三〇七八 醋酸鉛 〇、三

白糖 三、〇

右分六包每二時一包

三〇七九 醋酸鉛 〇、三

阿片 〇、一〇、二

白糖 三、〇

右分十包每二時一包

三〇八〇 醋酸鉛、阿片 各〇、三

亞拉比亞護謨末 二、〇

右分五包每二時一包

三〇八一 古倫僕末 三、〇

阿片末 〇、一

三〇二 古倫僕越幾斯 〇、六

三〇三 抱湧兒氏散 〇、三

三〇四 白糖 三、〇

三〇五 右分十包每二時一包、小兒 五、〇

三〇六 吐根末、阿片末 各〇、三

三〇七 白糖 五、〇

三〇八 右分十包每二三時一包 〇、五

三〇九 吐根末、阿片 各〇、五

三一〇 乳糖 五、〇

三一〇 右分十包一日三回每回一包 各〇、三

三一〇 叶根末、阿片末 各〇、三

三一〇 加斯加利刺皮末 三、〇

三一〇 右分五包一日三回每回一包 五、〇

三一〇 硫酸鐵 一、〇

三一〇 萬蒲油糖 五、〇

三一〇 右分十包一日三回每回一包 三、五

三一〇 亞鉛華 〇、五

三一〇 重碳酸那篤留謨 〇、五

三一〇 右分四包每三時一包 五、〇

三一〇 阿仙藥 〇、一〇

三一〇 阿片 〇、一〇

三一〇 白糖 三、〇

三一〇 吉納 六、〇

三一〇 白糖 三、〇

三一〇 右分六包一日三回每回一包 五、〇

三一〇 加斯加利刺皮末 五、〇

三一〇 阿片末、吐根末 各〇、三

三一〇 右分十包一日三回每回一包 〇、一〇

三一〇 グアラナ茶 一、〇

三一〇 抱湧兒氏散 〇、五

三一〇 白糖 二、〇

三一〇 右分十包每二三時一包、小兒 一、五

三一〇 樟腦、安息香酸 各〇、六

三一〇 白糖 一、五

三一〇 右分六包每二時一包、小兒 五、〇

三一〇 安息香酸那篤留謨 一、〇

三一〇 水 〇、〇

三一〇 右每二時一小兒匙、小兒 〇、五

三一〇 サリチン 〇、五

三一〇 亞拉比亞護謨末 六、〇

三一〇 白糖 四、〇

三一〇 右分十包每時一包 〇、二五

三一〇 コトイン 〇、二五

三一〇 〇、二五

三一〇 白糖 一、五

三一〇 右分五包每二三時一包 三、〇

三一〇 ベトール 三、〇

三一〇 右分六包一日三回每回一包 五、〇

三一〇 ナフタリン 五、〇

三一〇 ベルガモット油糖 五、〇

三一〇 右分二十包一日五回乃至十回每回一包 〇、六

三一〇 沃度仿謨 〇、六

三一〇 抱湧兒氏散 〇、三

三一〇 乳糖 四、〇

三一〇 右分十包每二時一包、一歲兒 一、〇

三一〇 煨製麻僱涅矢亞、白糖各二、〇 一、〇

三一〇 大黃末 一、〇

三一〇 右分十包一日三回每回一包 三、〇

三一〇 加爾爾斯泉鹽 三、〇

三一〇 右每回一茶匙、小兒 〇、五

三一〇 浸煎劑 〇、五

三一〇 耶僕蘭日葉浸(二、〇)五、〇

三一〇 右頓服 〇、五

三一〇 吐根浸 (〇、五)二〇〇、〇

三一〇 阿片丁幾 十五滴

亞拉比亞護謨漿 一〇〇、〇
 右每二時一食匙
 三〇三 吐根浸 (〇、三)一五〇、〇
 阿片丁幾 一〇、〇
 單舍利別 一〇、〇
 右每二時一食匙
 三〇四 吐根浸 (〇、二)一〇〇、〇
 亞拉比亞護謨漿 各一〇、〇
 單舍利別 各一〇、〇
 阿片丁幾 二滴—四滴
 右每二時一小兒匙、小兒
 三〇五 亞爾答煎(二五、〇)二〇〇、〇
 右一日數回二日分服
 三〇六 沙列布煎* 一〇〇、〇
 右一日數回每回一小兒匙、
 小兒
 三〇七 沙列布煎*(一、〇)一〇〇、〇
 阿片丁幾 一滴—四滴
 右每二時一小兒匙、小兒
 三〇八 沙列布煎* 六〇、〇
 阿片丁幾 二滴—四滴
 單舍利別 一〇、〇
 右每三時一茶匙、小兒

三〇九 沙列布煎*(一、〇)一〇〇、〇
 阿片丁幾 一滴—二滴
 單舍利別 一〇、〇
 右每三時一茶匙、小兒
 三一〇 沙列布煎*(二、〇)一〇〇、〇
 阿片丁幾 〇、六
 橙皮舍利別 八、〇
 右每二時一食匙
 三一一 沙列布煎*(二、〇)一五〇、〇
 阿片丁幾 一〇、〇
 單舍利別 一五、〇
 右一日六回二日分服
 三一二 沙列布煎*(二、〇)一〇〇、〇
 阿片丁幾 一、五
 單舍利別 八、〇
 右一日三回分服
 三二三 沙列布煎*(三、〇)三〇〇、〇
 水製阿片丁幾 二、〇
 單舍利別 二〇、〇
 右每二時二食匙
 三二四 沙列布煎*(八、〇)一五〇、〇
 水製阿片丁幾 一、〇
 罌粟舍利別** 二〇、〇

右每二時一食匙
 三二五 沙列布尖*(一、五)二五〇、〇
 水製阿片越幾斯 〇、二五
 單舍利別 二〇、〇
 右一日六時二日分服
 三二六 沙列布煎* 一三〇、〇
 阿片泊美蘭丁幾 一〇、〇
 桂皮丁幾 一〇、〇
 單舍利別 二〇、〇
 右每二時一食匙
 三二七 沙列布煎* 一五〇、〇
 阿片 一〇、〇
 單舍利別 二〇、〇
 右每時一食匙
 三二八 沙列布煎* 一〇〇、〇
 古倫僕越幾斯 四、〇
 茴香油糖 一五、〇
 右每時一茶匙
 三二九 沙列布煎*(五、〇)一〇〇、〇
 格倫僕越幾斯 四、〇
 單舍利別 一五、〇
 右一日三回二日分服
 三三〇 沙列布煎* (〇、八)八〇、〇

ラタニヤ丁幾 二十滴

阿片丁幾 一滴、二滴

單舍利別 一〇、〇

右每時一小兒匙、小兒

三三三 沙列布煎* (二、〇) 一〇〇、〇

水製大黃丁幾 二、〇

稀鹽酸 一、〇

右每二時一食匙

三三三 沙列布煎* (一、〇) 一〇〇、〇

次硝酸蒼鉛 一、五

單舍利別 八、〇

右一日三回分服

三三三 沙列布煎* 八〇、〇

撒里矢爾酸蒼鉛 三、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

三三四 沙列布煎* (二、〇) 一〇〇、〇

結麗阿曹篤 〇、五

稀薄酒精 一、〇

右每二時一茶匙、嘔吐

三三五 古倫僕根煎 (二〇、〇) 一五〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

三三六 古倫僕根 一、五

加斯加利刺皮 八、〇

右煎出 二〇〇、〇

橙皮丁幾 八、〇

桂皮舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙

三三七 古倫僕根煎 (三、〇) 一〇〇、〇

阿片丁幾 十滴

右每二時一小兒匙、小兒

三三八 古倫僕根煎 (二〇、〇) 一八〇、〇

阿片丁幾 三、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

三三九 古倫僕根煎 (二五、〇) 一八〇、〇

阿片越幾斯 〇、一

橙皮舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

三三〇 古倫僕根煎 (二〇、〇) 一〇〇、〇

泊芙藍阿片丁幾 一、〇

單舍利別 一〇、〇

右一日三回分服

三三三 古倫僕根煎 (五、〇) 一〇〇、〇

阿片泊芙藍丁幾 一、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右每一時乃至二時每回一食匙

三三三 古倫僕根煎 (二〇、〇) 一八〇、〇

稀鹽酸 二、〇

單舍利別 二〇、〇

右一日六回二分服

三三三 蘇木煎 (一、〇) 一五〇、〇

橙皮舍利別 一〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

三三四 蘇木煎 (二〇、〇) 二〇〇、〇

阿片丁幾 一、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙二分服

三三五 蘇木煎 (三〇、〇) 二〇〇、〇

阿片丁幾 十五滴

蘇木煎 (三〇、〇) 二〇〇、〇

阿片丁幾

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 三三六 蘇木煎 (二〇、〇)二〇〇、〇 | 三三四 加斯加利刺皮 右每二時一食匙 | 三三二 蘇木煎 (二一、〇)五〇、〇 | 三三〇 阿片安息香丁幾 一、〇 | 三二八 亞爾答舍利別 二〇、〇 | 三二六 ラタニヤ根煎 (二五、〇)一五〇、〇 | 三二四 阿片丁幾 一、〇 | 三二二 阿片舍利別 一五、〇 | 三二〇 ラタニヤ根煎 右每二時一食匙 | 三一八 ラタニヤ根煎 右每二時一食匙 | 三一六 阿片丁幾 一、〇 | 三一四 阿片舍利別 一五、〇 | 三一二 阿片丁幾 一、〇 | 三一〇 阿片舍利別 一五、〇 | 三〇八 阿片丁幾 一、〇 | 三〇六 阿片舍利別 一五、〇 | 三〇四 阿片丁幾 一、〇 | 三〇二 阿片舍利別 一五、〇 | 三〇〇 阿片丁幾 一、〇 | 二九八 阿片舍利別 一五、〇 | 二九六 阿片丁幾 一、〇 | 二九四 阿片舍利別 一五、〇 | 二九二 阿片丁幾 一、〇 | 二九〇 阿片舍利別 一五、〇 | 二八八 阿片丁幾 一、〇 | 二八六 阿片舍利別 一五、〇 | 二八四 阿片丁幾 一、〇 | 二八二 阿片舍利別 一五、〇 | 二八〇 阿片丁幾 一、〇 | 二七八 阿片舍利別 一五、〇 | 二七六 阿片丁幾 一、〇 | 二七四 阿片舍利別 一五、〇 | 二七二 阿片丁幾 一、〇 | 二七〇 阿片舍利別 一五、〇 | 二六八 阿片丁幾 一、〇 | 二六六 阿片舍利別 一五、〇 | 二六四 阿片丁幾 一、〇 | 二六二 阿片舍利別 一五、〇 | 二六〇 阿片丁幾 一、〇 | 二五八 阿片舍利別 一五、〇 | 二五六 阿片丁幾 一、〇 | 二五四 阿片舍利別 一五、〇 | 二五二 阿片丁幾 一、〇 | 二五〇 阿片舍利別 一五、〇 | 二四八 阿片丁幾 一、〇 | 二四六 阿片舍利別 一五、〇 | 二四四 阿片丁幾 一、〇 | 二四二 阿片舍利別 一五、〇 | 二四〇 阿片丁幾 一、〇 | 二三八 阿片舍利別 一五、〇 | 二三六 阿片丁幾 一、〇 | 二三四 阿片舍利別 一五、〇 | 二三二 阿片丁幾 一、〇 | 二三〇 阿片舍利別 一五、〇 | 二二八 阿片丁幾 一、〇 | 二二六 阿片舍利別 一五、〇 | 二二四 阿片丁幾 一、〇 | 二二二 阿片舍利別 一五、〇 | 二二〇 阿片丁幾 一、〇 | 二一八 阿片舍利別 一五、〇 | 二一六 阿片丁幾 一、〇 | 二一四 阿片舍利別 一五、〇 | 二一二 阿片丁幾 一、〇 | 二一〇 阿片舍利別 一五、〇 | 二〇八 阿片丁幾 一、〇 | 二〇六 阿片舍利別 一五、〇 | 二〇四 阿片丁幾 一、〇 | 二〇二 阿片舍利別 一五、〇 | 二〇〇 阿片丁幾 一、〇 | 一九八 阿片舍利別 一五、〇 | 一九六 阿片丁幾 一、〇 | 一九四 阿片舍利別 一五、〇 | 一九二 阿片丁幾 一、〇 | 一九〇 阿片舍利別 一五、〇 | 一八八 阿片丁幾 一、〇 | 一八六 阿片舍利別 一五、〇 | 一八四 阿片丁幾 一、〇 | 一八二 阿片舍利別 一五、〇 | 一八〇 阿片丁幾 一、〇 | 一七八 阿片舍利別 一五、〇 | 一七六 阿片丁幾 一、〇 | 一七四 阿片舍利別 一五、〇 | 一七二 阿片丁幾 一、〇 | 一七〇 阿片舍利別 一五、〇 | 一六八 阿片丁幾 一、〇 | 一六六 阿片舍利別 一五、〇 | 一六四 阿片丁幾 一、〇 | 一六二 阿片舍利別 一五、〇 | 一六〇 阿片丁幾 一、〇 | 一五八 阿片舍利別 一五、〇 | 一五六 阿片丁幾 一、〇 | 一五四 阿片舍利別 一五、〇 | 一五二 阿片丁幾 一、〇 | 一五〇 阿片舍利別 一五、〇 | 一四八 阿片丁幾 一、〇 | 一四六 阿片舍利別 一五、〇 | 一四四 阿片丁幾 一、〇 | 一四二 阿片舍利別 一五、〇 | 一四〇 阿片丁幾 一、〇 | 一三八 阿片舍利別 一五、〇 | 一三六 阿片丁幾 一、〇 | 一三四 阿片舍利別 一五、〇 | 一三二 阿片丁幾 一、〇 | 一三〇 阿片舍利別 一五、〇 | 一二八 阿片丁幾 一、〇 | 一二六 阿片舍利別 一五、〇 | 一二四 阿片丁幾 一、〇 | 一二二 阿片舍利別 一五、〇 | 一二〇 阿片丁幾 一、〇 | 一一八 阿片舍利別 一五、〇 | 一一六 阿片丁幾 一、〇 | 一一四 阿片舍利別 一五、〇 | 一一二 阿片丁幾 一、〇 | 一一〇 阿片舍利別 一五、〇 | 一〇八 阿片丁幾 一、〇 | 一〇六 阿片舍利別 一五、〇 | 一〇四 阿片丁幾 一、〇 | 一〇二 阿片舍利別 一五、〇 | 一〇〇 阿片丁幾 一、〇 | 九八 阿片舍利別 一五、〇 | 九六 阿片丁幾 一、〇 | 九四 阿片舍利別 一五、〇 | 九二 阿片丁幾 一、〇 | 九〇 阿片舍利別 一五、〇 | 八八 阿片丁幾 一、〇 | 八六 阿片舍利別 一五、〇 | 八四 阿片丁幾 一、〇 | 八二 阿片舍利別 一五、〇 | 八〇 阿片丁幾 一、〇 | 七八 阿片舍利別 一五、〇 | 七六 阿片丁幾 一、〇 | 七四 阿片舍利別 一五、〇 | 七二 阿片丁幾 一、〇 | 七〇 阿片舍利別 一五、〇 | 六八 阿片丁幾 一、〇 | 六六 阿片舍利別 一五、〇 | 六四 阿片丁幾 一、〇 | 六二 阿片舍利別 一五、〇 | 六〇 阿片丁幾 一、〇 | 五八 阿片舍利別 一五、〇 | 五六 阿片丁幾 一、〇 | 五四 阿片舍利別 一五、〇 | 五二 阿片丁幾 一、〇 | 五〇 阿片舍利別 一五、〇 | 四八 阿片丁幾 一、〇 | 四六 阿片舍利別 一五、〇 | 四四 阿片丁幾 一、〇 | 四二 阿片舍利別 一五、〇 | 四〇 阿片丁幾 一、〇 | 三八 阿片舍利別 一五、〇 | 三六 阿片丁幾 一、〇 | 三四 阿片舍利別 一五、〇 | 三二 阿片丁幾 一、〇 | 三〇 阿片舍利別 一五、〇 | 二八 阿片丁幾 一、〇 | 二六 阿片舍利別 一五、〇 | 二四 阿片丁幾 一、〇 | 二二 阿片舍利別 一五、〇 | 二〇 阿片丁幾 一、〇 | 一八 阿片舍利別 一五、〇 | 一六 阿片丁幾 一、〇 | 一四 阿片舍利別 一五、〇 | 一二 阿片丁幾 一、〇 | 一〇 阿片舍利別 一五、〇 | 〇八 阿片丁幾 一、〇 | 〇六 阿片舍利別 一五、〇 | 〇四 阿片丁幾 一、〇 | 〇二 阿片舍利別 一五、〇 | 〇〇 阿片丁幾 一、〇 |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|

急性腸加答兒

一百九十三

三五 單寧酸

阿片丁幾

水

單舍利別

右每時一食匙

一、〇

一、〇

二〇〇、〇

八、〇

三五 單寧酸

阿片丁幾

薄荷水

單舍利別

右每二時一食匙

二、五

一、〇

一五〇、〇

二五、〇

三五 單寧酸

阿片丁幾

蒸餾水

佩里設林、單舍利別各一五、〇

右每一時乃至二時一小兒匙

〇、二一〇、五

二滴一六滴

八〇、〇

三五 稀鹽酸

蒸餾水

右一日三四回每回一小兒匙、

六滴一八滴

八〇、〇

三五 稀鹽酸

水

阿片丁幾

單舍利別

二滴一四滴

七〇、〇

三六一

阿片丁幾

右每二時一食匙

二、〇

三五 稀鹽酸

阿片丁幾

橋皮舍利別

水

右一日數回分服

右每二時一茶匙、小兒

二、〇

一、五

一五〇、〇

二〇〇、〇

三五 蕃木龍越幾斯

桂皮水

亞拉比亞護膜漿

單舍利別

右每二時一食匙

〇、五

一五〇、〇

各三〇、〇

二五、〇

三五 阿仙藥越幾斯

礫砂

水

亞拉比亞護膜

右每一二時一食匙

二五、〇

一二、〇

二〇〇、〇

二五、〇

三六 加斯加刺越幾斯

古倫僕越幾斯

薄荷水

桂皮丁幾

橋皮舍利別

右每二時一食匙

各五、〇

一五〇、〇

七、五

三〇、〇

二、〇

三六 右一日三四回每回一茶匙

水

阿片丁幾

單舍利別

右每二時一小兒匙、小兒

二、〇

一〇〇、〇

一滴一二滴

一〇、〇

三六 右每二時一食匙

水

阿片丁幾

單舍利別

右每二時一小兒匙、小兒

一〇〇、〇

一滴

一〇、〇

三六 右每二時一食匙

水

阿片丁幾

單舍利別

右每二時一茶匙、小兒

七〇、〇

一〇、〇

三、〇

二滴一五滴

五〇、〇

二〇、〇

小兒

| | | | | | | | | |
|----|---------|-------|----|-------------|--------|-----|--------------|-----------|
| 三六 | 亞拉比亞護漿 | 二〇、〇 | 三七 | 護護合劑* | 一五〇、〇 | 三六 | 單舍利別 | 二〇、〇 |
| | 單舍利別 | 二〇、〇 | | 水製阿片越幾斯 | 一、〇 | 三七 | 右每二時一小兒匙、四歲兒 | 〇、〇五、一〇、一 |
| | 右每二時一食匙 | 一六〇、〇 | | 右每時一食匙 | 二個 | 三七九 | 稀酒精 | 一〇、〇 |
| 三七 | 亞拉比亞護漿 | 一五〇、〇 | 三七 | 明白 | 適宜 | | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 阿片丁幾 | 〇、五 | | 白糖 | 一〇〇〇、〇 | | 單舍利別 | 三〇、〇 |
| | 單舍利別 | 七、〇 | | 右飲料、小兒 | | | 右每二時一食匙 | |
| 三六 | 亞拉比亞護漿 | 一八〇、〇 | 三七 | 重碳酸那篤留謨 | 二、〇 | 三八〇 | 扁桃乳劑* | 五〇、〇 |
| | 阿片丁幾 | 二、〇 | | 鹽酸莫兒比連 | 〇、〇二五 | | コトイン | 一、〇 |
| | 右每時一食匙 | | | 水 | 一〇〇、〇 | | 右每十五分乃至三十分時服 | |
| 三六 | 亞拉比亞護漿 | 二〇〇、〇 | 三七 | 重碳酸那篤留謨 | 〇、五 | 三八一 | 明礬 | 〇、四 |
| | 阿片泊美蘭丁幾 | 一、〇 | | 水 | 一〇〇、〇 | | 荷香水 | 一〇〇、〇 |
| | 右每時一食匙 | | | 單舍利別 | 一〇、〇 | | 右每時一小兒匙、小兒 | |
| 三七 | 亞拉比亞護漿* | 二〇〇、〇 | | 阿片丁幾 | 一滴 | 三八二 | 次硝酸蒼鉛 | 〇、四 |
| | 阿片越幾斯 | 〇、一 | | 右每二時一小兒匙、小兒 | | | 桂皮水、蒸餾水 | |
| 三七 | 亞拉比亞護漿 | 一五〇、〇 | 三七 | コトイン | 〇、一五 | | 扁桃舍利別 | 各二五、〇 |
| | 阿片越幾斯 | 〇、一 | | 酒精 | 一〇、〇 | | 右每時一小兒匙、小兒 | |
| | 右每時一食匙 | | | 水 | 一五〇、〇 | 三八三 | 過格魯兒鐵液 | 〇、五 |
| 三七 | 護護合劑* | 一五〇、〇 | 三七 | コトイン | 〇、〇一 | | 水 | 七〇、〇 |
| | 阿片丁幾 | 二、〇 | | 右每二三時一食匙 | | | 偏里設林 | 一〇、〇 |
| | 右每時一食匙 | | | 酒精 | 五、〇 | | 右每時一茶匙、小兒 | |
| | | | | 水 | 八〇、〇 | 三八四 | 硫酸亞鉛 | 〇、一 |

水 七〇、〇

阿片丁幾 一滴、二滴

右每二時一茶匙、小兒 〇、一五

知母爾 一〇〇、〇

武蘭坪酒 十滴

右每二時一小兒匙、小兒 〇、二一〇、四

レゾルチン 一〇〇、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 一〇〇、〇

右每二時一小兒匙、小兒 五、〇

レゾルチン 一八〇、〇

水 二〇、〇

桂皮水 二〇、〇

右每二時一食匙 一、五

安息香酸那篤留談 八〇、〇

水 一〇、〇

單舍利別 一滴、四滴

阿片丁幾 一滴、四滴

右每二時一茶匙、小兒 十五滴

芳香丁幾 二滴、三滴

阿片 五〇、〇

右每二時一茶匙、小兒 二滴

三九〇 結列阿曹篤 一〇〇、〇

桂皮水 一〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每二時一小兒匙、小兒 一〇、〇

三九一 醋酸那篤留談 一五〇、〇

メリツサ水 一五〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙 一、〇

●滴劑 一六、〇

三九二 阿片越幾斯 四、〇

酒精 四、〇

右每回十滴乃至四十滴 五、〇

三九三 阿片丁幾 五、〇

右一日三四回每回十五滴 各三、〇

三九四 阿片丁幾 各三、〇

依的兒性纈草丁幾 各三、〇

右一日三四回每回十五滴 五、〇

三九五 阿片泊芙蘭丁幾 五、〇

芳香丁幾 一〇、〇

依的兒性纈草丁幾 一〇、〇

薄荷油 一滴

右每半時十滴乃至二十滴 七、〇

三九六 阿片泊芙蘭丁幾 五、〇

吐根酒 一五、〇

依的兒性纈草丁幾 一五、〇

薄荷油 一、〇

右一日數回每回十五滴乃至二十滴 一、〇

三九七 蕃木髓丁幾 三、〇

阿片丁幾 三、〇

桂皮丁幾 三、〇

右每回五滴乃至十滴 二、〇

三九八 蕃木髓丁幾 三、〇

阿片丁幾 三、〇

加斯加利刺丁幾 一〇、〇

右一日三四回每回十五滴 一、五

三九九 蕃木髓丁幾 一、五

纈草丁幾 七、五

薄荷油 一滴

右一日三四回每回十二滴 一五、〇

四〇〇 過格魯兒鐵液 一五、〇

右一日三四回每回五滴乃至六滴

三〇一 依的兒精 五、〇
 安母尼亞茴香精 五、〇
 右每半時十滴、小兒
 三〇二 ラタニヤ丁幾、桂皮丁幾 各一〇、〇
 苦味丁幾 各一〇、〇
 右每二時十滴乃至十五滴
 三〇三 ●丸劑 一、〇
 硝酸銀 一、〇
 右以白陶土爲百九一日三回
 三〇四 阿片末 〇、一
 龍腦 〇、一
 右爲三九每時一粒
 三〇五 阿片越幾斯 各〇、二五
 蕃木鼈越幾斯 各〇、二五
 格倫僕越幾斯 二、〇
 右爲二十九朝夕各一粒
 三〇六 單寧酸 一、五
 右甘草末、甘草羔各適宜爲
 三十九每時二粒
 三〇七 單寧酸 一、〇
 阿片末 〇、五
 蕃木鼈越幾斯 〇、一五

三〇八 單寧酸 二、五
 阿片 一、五
 右加斯加利刺越幾斯適宜爲
 二十九一日二回每回二粒
 三〇九 蕃木鼈越幾斯 〇、五
 右カスカリヲ越幾斯適宜爲
 五十九一日二回每回一粒
 三一一 古倫僕越幾斯 二、〇
 番木鼈越幾斯 〇、二
 阿片越幾斯 〇、二
 右爲二十九朝夕各一粒
 三一二 古倫僕越幾斯、大黃末各五、〇
 右爲百九一日三回每回二粒
 三二一 加斯加利刺越幾斯 各三、〇
 古倫僕越幾斯 各三、〇
 右爲五十九一日三回每回四
 粒
 三二三 ●洗腸劑 〇、〇五
 硝酸銀 〇、〇五
 水 一五〇、〇
 右洗腸
 三二三 單寧酸 一、〇
 水 一〇〇、〇

三二四 鞣酸 一、〇
 右洗腸 一五〇、〇
 右每回以三分之一灌腸、六
 個月小兒
 三二五 單寧酸 二、〇一三、〇
 水 二〇〇、〇一三〇〇、〇
 右每回以三分之一灌腸、小
 兒
 三二六 醋酸鉛 〇、五
 蒸餾水 一〇〇、〇
 右每回以三分之一灌腸、小
 兒
 三二七 亞拉比亞護膜漿 五〇、〇
 水 三〇〇、〇
 阿片丁幾 三、〇
 右洗腸
 三二八 阿片丁幾 一、〇
 亞拉比亞護膜漿、水各五〇、〇
 右洗腸
 三二九 石炭酸、亞爾個保兒 各一、〇
 水 五〇、〇
 右洗腸

三三〇 沙列布煎 (三、〇)二〇〇、〇

阿片丁幾 二、〇

右灌腸

三三二 大麥粉 二〇〇、〇

右腹部溫器法

三三三 依的兒 一〇、〇

右每回以十分之一乃至半筒

皮下注射

三三三 樟腦

依的兒

阿列布油

右每回以十分之一乃至半筒

皮下注射

三三四 阿片越幾斯

柯柯阿脂

右為坐藥

三三五 阿片

醋酸鉛、安息香酸

白蠟

柯柯阿脂

右為坐藥十個朝夕各一個

三三六 薄荷葉

纈草根

右為茶劑

慢性腸加答兒

Enteritis catarrhalis chronica, Catarrhus intestinalis chronicus.

即久泄瀉、又名慢性腸粘膜加多兒、腸粘膜炎、泄瀉

處置 食物之節制、禁止刺戟飲料、藥用收斂劑、緩下劑、制腐劑、其他冷水療法、電氣療法、按摩法等

●散劑

三三七 陀洵兒氏散 一、〇—二、〇

白糖

右分十包二時一包

三三八 陀洵兒氏散 一、〇

古倫僕越幾斯、白糖 各二、〇

右分十包每二時一包

三三九 陀洵兒氏散 一、〇—二、〇

古倫僕越幾斯

白糖

右分十包每二時一包

三三〇 陀洵兒氏散 一、〇

格倫僕越幾斯

桂皮油糖

右分十包一日三回每回一包

三三一 陀洵兒氏散 一、五

格倫僕越幾斯

尚香油糖

右分十包一日三回每回一包

三三二 陀洵兒氏散 二、〇

單寧酸規尼涅

白糖

二、〇

三三三 陀洵兒氏散 〇、二

次硝酸蒼鉛

白糖

右分十包一日三回每回一包

三三四 陀洵兒氏散 〇、一

小兒

加糖炭酸鐵

白糖

右分十包一日三回每回一包

小兒

〇、一

三三五 托勃兒氏散 ○、一五、一〇、二

加糖炭酸鐵 ○、一五、一〇、二

泥葛根油糖[※] 二、〇

右分六包一日三回每回一包

小兒

三三六 阿片 ○、二

白糖 二、〇

右分五包每一時一包

三三七 阿片 ○、二

單寧酸、白糖 各二、〇

右分十包每一時一包

三三八 阿片 ○、一

單寧酸 一、〇

格倫僕越幾斯 一、〇

白糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

三三九 阿片、醋酸鉛 各〇、二

護謨散 二、〇

右分五包每二時一包

三四〇 阿片末 ○、〇、三

次硝酸蒼鉛 一、〇

重碳酸那篤留謨 二、〇

菲沃斯越幾斯 〇、一

白糖 一、〇

右分三包一日三回每回一包

三四一 阿片末 ○、五

吉納末 一、〇

桂皮末 二、〇

右分二十包一日三四回每回

一二包

三四二 タンナルピン 二、〇、一三、〇

右分三包一日一回一包

三四三 タンニンゲン 一、五

乳糖 一、〇

右分三包一日三回每回一包

三四四 ベトール 五、〇

右分六包一日三回每回一包

三四五 ナフタリン、白糖 各三、〇

右分十包一日四回每回一包

三四六 ナフタリン 五、〇

ベルガモット油糖 五、〇

右分二十包一日五包乃至二

十包

三四七 次硝酸蒼鉛、白糖 各一五、〇

右分十包每三時一包

三四八 次硝酸蒼鉛 〇、三一、二

護謨散 二、〇

右分六包一日三回每回一包

三四九 單寧酸蒼鉛 一、〇、一、五

右分五包一日數回每回一包

三五〇 撒里矢爾酸蒼鉛、乳糖 各一五、〇

右分十包每二時一包

三五一 ノゾフェーン蒼鉛 五、〇

右分十包一日三回每回一包

三五二 ザロール 三、〇、一六、〇

右分三包一日三回每回一包

三五三 ザロール 三、〇

撒里矢爾酸蒼鉛 三、〇

重碳酸那篤留謨 三、〇

右分十包一日二回每食前一

包乃至二包

三五四 ザロール 一、〇、〇

撒里矢爾酸蒼鉛 一、〇、〇

重碳酸那篤留謨 一、〇、〇

右分三十包朝夕各一包

三五五 燻性麻僱涅矢亞 二、〇

白糖 二、〇

大黃末 一、〇

三五五 重碳酸那篤留謨 二、〇
右分十包一日三回每回一包

蕃木魁越幾斯 〇、一
白糖 一、〇

右分三包一日三回每回一包

三五七 重碳酸那篤留謨 四、〇
蕃木魁越幾斯 〇、一
次硝酸若鉛 二、〇

右分六包一日三回每回一包

三五六 醋酸鉛 〇、〇三五、一
護謨散 三、〇

右分十包一日三回每回一包

三五九 明礬 〇、〇三一〇、三
乳糖 二、〇

右分三包一日三回每回一包

三六〇 單寧酸 一〇、〇
右一日三回每回一小刀尖

一歲至十歲兒

三六一 單寧酸 〇、〇三一〇、一二
白糖 二、〇

右分六包一日三回每回一包

三六二 單寧酸 〇、〇六

右分六包一日三回每回一包

三六三 單寧酸 〇、〇六

鹽酸莫爾比涅 〇、〇六
白糖 三、〇

右分六包一日三回每回一包

右倫僕越幾斯、白糖 各二、〇

右分十包每二時一包

三六四 阿仙藥 〇、六一二、五
白糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

三六五 阿仙藥 一二、〇
吉納、フタニヤ根 各六、〇

桂皮、肉豆蔻 各三、〇

右一日三四回每回一小刀尖

三六六 炭酸麻催涅叟謨 一五、〇
甘草末 二〇、〇

大黃末 一〇、〇

緬草根末 五、〇

泊芙藍末 一、〇

荷香末 一五、〇

右一日三回每回一小刀尖

三六七 加糖炭酸鐵、白糖 各五、〇
重碳酸那篤留謨 各三、〇
沒藥末、大黃末 各三、〇

三六八 鹽酸規尼涅 〇、三
加糖炭酸鐵 〇、三

白糖 一、二

右分六包一日一回乃至二回

每回一包、小兒 一五、〇

三六九 人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇

右每朝頓眼

三七〇 阿片丁幾 〇、一
●水劑

ラタニヤ丁幾 〇、三一、一
單舍利別 二〇、〇

水 五〇、〇

右每二時一茶匙

三七二 阿片丁幾 四滴

加斯加利刺丁幾一、〇一、五

亞爾答舍利別 二〇、〇

水 一〇〇、〇

右每二時一小兒匙

三七三 鹽酸莫兒比涅 〇、〇二
蘇木越幾斯 四、〇
大黃舍利別 二〇、〇
水 一五〇、〇

右每二時一食匙

| | |
|-------------|-------|
| 三七三 鹽酸真兒比連 | 〇、〇二 |
| 稀薄荷水、尚香水 | 各七五、〇 |
| 大黃舍利別 | 二〇、〇 |
| 右每二時一食匙 | |
| 三七四 重碳酸那篤留謨 | 二、〇 |
| 水製大黃丁幾 | 三、〇 |
| 苦味丁幾 | 一、五 |
| 單舍利別 | 八、〇 |
| 水 | 一〇〇、〇 |
| 右一日三回分服 | |
| 三七五 重碳酸那篤留謨 | 五、〇 |
| 蕃木籃丁幾 | 二、〇 |
| 水 | 一〇〇、〇 |
| 單舍利別 | 三〇、〇 |
| 右每二時一食匙 | |
| 三七六 重碳酸那篤留謨 | 二、〇 |
| 蕃木籃丁幾 | 一、〇 |
| 單舍利別 | 八、〇 |
| 水 | 一〇〇、〇 |
| 右一日三回分服 | |
| 三七七 蕃木籃越幾斯 | 〇、〇六 |
| 桂皮水 | 一五〇、〇 |
| 亞拉比亞護謨漿 | |

| | |
|-------------|----------|
| 單舍利別 | 各三〇、〇 |
| 右每二時一食匙 | |
| 三七八 單寧酸 | 〇、二一〇、五 |
| 水 | 九〇、〇 |
| 阿片丁幾 | 二滴—六滴 |
| 卜力ヤ酒 | 一五、〇 |
| 僱里設林 | 一〇、〇 |
| 右每二時一茶匙 | |
| 三七九 格魯兒鐵丁幾 | 十滴 |
| 僱里設林 | 十滴 |
| 水 | 八〇、〇 |
| 單舍利別 | 二〇、〇 |
| 右每二時一小兒匙、小兒 | |
| 三八〇 過格魯兒鐵液 | 十滴 |
| 單舍利別 | 一〇、〇 |
| 水 | 八〇、〇 |
| 右每二時一小兒匙 | |
| 三八一 過格魯兒鐵液 | 五滴—十滴 |
| 桂皮水 | 一〇〇、〇 |
| 右每二時一小兒匙、小兒 | |
| 三八二 一半格魯兒鐵液 | 〇、二五—〇、五 |
| 桂皮水 | 五〇、〇 |

| | |
|--------------------|-------|
| 右每二時一小兒匙、小兒 | |
| 三八三 一半格魯兒鐵液 | 八滴—十滴 |
| 亞拉比亞護謨漿 | 一〇〇、〇 |
| 薄荷水 | 五、〇 |
| 單舍利別 | 五、〇 |
| 右一日三回每回一茶匙、小兒 | |
| 三八四 醋酸礬土 | 〇、三 |
| 水 | 七〇、〇 |
| 橙皮舍利別 | 二〇、〇 |
| 右每三時一茶匙、小兒 | |
| 三八五 明礬 | 〇、一 |
| 阿片丁幾 | 二滴—五滴 |
| 亞兒答舍利別 | 二〇、〇 |
| 水 | 五〇、〇 |
| 右每三時一茶匙、小兒 | |
| 三八六 硝酸銀水(〇、〇五)—〇、〇 | |
| 右一日六回二日分服 | |
| 三八七 硝酸銀 | 〇、五 |
| 蒸餾水 | 一五〇、〇 |
| 右一日三回每回一食匙 | |
| 三八八 生石灰 | 五、〇 |
| 白糖 | 一〇、〇 |

水 一〇〇、〇

右六時間浸漬濾過每回十五滴乃至六十滴糖水調和服用

三九六 乳酸 二、〇一八、〇

水 一二〇、〇

右每二時一食匙

三九七 乳酸 二、〇

水 八〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右一日三回每回一食匙

三九八 乳酸 八、〇

水 四〇〇、〇一七〇〇、〇

單舍利別 六〇、〇

右四回分服

三九九 レゾルチン水 (五、〇)一八〇、〇

桂皮水 二〇、〇

右每二時一食匙

四〇〇 フェルリピリン 一五〇、〇

水 一五〇、〇

右一日三回每回一食匙

四〇一 ナフタリン 〇、三一、〇

亞拉比亞護謨 四〇、〇

加密列水 四〇、〇

右一日四回每回一小兒匙、

小兒

三九五 コトイソ 〇、〇五

アルコール 一〇、〇

單舍利別 三〇、〇

水 一二〇、〇

右每二時一食匙

三九六 流動ヒドラスチス越幾斯 一五、〇

右一日三回每回十滴

三九七 阿仙藥丁幾 五、〇

桂皮舍利別 四五、〇

右每二時一二茶匙

三九八 苦味丁幾、ラタニヤ丁幾 各一〇、〇

桂皮丁幾 各一〇、〇

右每回數滴

三九九 菲沃斯丁幾 八滴

芳香丁幾 二、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

四〇〇 鹽酸ベルベリン 一、〇

溫水 二〇、〇

マラガ酒、桂皮舍利別各五、〇

右每二時乃至四時二十滴乃至三十滴

四〇一 斯篤里規尼涅 〇、一

稀鹽酸 〇、二

酒精 三、〇

水 一〇、〇

右一日二三回每回五滴乃至十滴

四〇二 格魯兒酸加留謨 二、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 五〇、〇

右每一時乃至二時一小兒匙

四〇三 碳酸安母紐謨 一、〇

薄荷水 一〇〇、〇

善微舍利別 * 一〇、〇

右一日二回乃至三回分服

●浸煎劑

四〇四 古倫僕根煎 (二〇、〇)一八〇、〇

阿片丁幾 二、〇

單舍利別 二〇、〇

右一日六回二日分服

三三五 格倫僕根煎(五、〇)一〇〇、〇

阿片丁幾 一、〇

橙皮舍利別 一五、〇

右一日三回分服

三三六 古倫僕根煎

(一、〇)一五、〇)一〇〇、〇

阿片丁幾 四滴

亞爾答舍利別 二〇、〇

右每二時一小兒匙

三三七 格倫僕根煎

(一〇、〇)一五、〇、〇

阿片丁幾 十滴

桂皮舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

三三八 古倫僕根煎

(二五、〇)一八〇、〇

阿片越幾斯 〇、一

橙皮舍利別 二〇、〇

右一日六回二日分服

三三九 古倫僕根煎

(一〇、〇)一八〇、〇

稀鹽酸 二〇、〇

單舍利別 二〇、〇

三三〇 古倫僕根煎 右一日六回二日分服

(二五、〇)一八〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右一日六回二日分服

三三一 古倫僕根煎

(一、〇)一五、〇)一〇〇、〇

亞爾答舍利別 二〇、〇

右每二時一小兒匙

三三二 古倫僕根煎(一〇、〇)八〇、〇

覆盆子舍利別 一〇、〇

右每二時一小兒匙

三三三 沙列布煎*

可溶性酸化鐵 五滴—十滴

單舍利別 一〇、〇

右一日三回每回一茶匙、小兒

三三四 沙列布煎

古倫僕越幾斯 一〇〇、〇

尚香油糖 四、〇

右每時一茶匙

三三五 沙列布煎

蕃木釐越幾斯 一〇〇、〇

〇、三

稀鹽酸 二、〇

生姜舍利別 三〇、〇

右每二每一食匙

三三六 蘇木煎 (二、〇)六〇、〇

阿片安息香丁幾 一、〇

橙皮舍利別 一〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

三三七 蘇木煎 (二〇、〇)五〇、〇

阿仙藥丁幾 十五滴

右每時一茶匙

三三八 蘇木煎 (一〇、〇)一〇〇、〇

阿仙藥 一、〇

右每二時一茶匙

三三九 ラタニヤ根煎

(二五、〇)一八〇、〇

阿片丁幾 一、〇

橙皮舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

三三〇 ラタニヤ根煎

(二〇、〇)二〇〇、〇

阿片泊美蘭丁幾 一、〇

桂皮舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

三三二 機那煎 (八、〇)一〇〇、〇

重碳酸那篤留漢 二、〇

阿片丁幾 〇、四

右一日三回分服

三三三 大黃浸 (三、〇)一五〇、〇

重碳酸那篤留漢 五、〇

薄荷油 〇、二五

橙皮舍利別 二五、〇

右每二時一食匙

三三三 健質亞那浸(二、〇)一〇〇、〇

稀鹽酸 二、〇

單舍利別 八、〇

右一日三回分服

三三四 加斯加利刺浸 (二〇、〇)八〇、〇

加密列舍利別 * 一〇、〇

右每二時一小兒匙

三三五 阿仙藥 五、〇

桂皮 一、〇

水 一〇〇、〇

右浸出一日三回分服

三三六 阿片越幾斯 三、〇

桂皮、丁香 各四、五

設里酒 六〇〇、〇

右八日間浸出濾過一日五滴

乃至十滴

三三七 吐根末 一〇〇、〇

酒精 五〇〇、〇

右十日間浸出濾過一日數回

每回五滴乃至十滴

三三八 ●丸劑 二、五

阿片越幾斯 〇、二五

蕃木鼈越幾斯 二、〇

格倫僕越幾斯 二、〇

右為二十九朝夕各一粒

三三九 單寧酸 二、五

阿片 一、五

蕃木鼈越幾斯 〇、五

右カスカリヲ越幾斯適宜為

五十九朝夕二粒

三三〇 單寧酸 一、〇

阿片末 〇、五

蕃木鼈越幾斯 〇、一五

右カスカリヲ越幾斯適宜為

三十九一日二回每回一粒

三三一 蘆薈、複方大黃越幾斯各一、五

右甘艸羔甘草末各適宜為三

十九每夕二粒乃至四粒

三三二 蘆薈、複方大黃越幾斯 各一、〇

藥刺巴根 各一、〇

右甘草羔甘草末各適宜為三

十九每夕二粒乃至四粒

三三三 蘆薈越幾斯 一、〇

沒藥越幾斯、泊美蘭末各四、〇

枸橼酸鐵安母紐漢 二、五

乳香 二、〇

右為六十五丸朝夕各五粒

三三四 阿魏、乳香、沒藥 各三、〇

單舍利別 一、五

右為七十九一日數回每二粒

乃至四粒

三三五 阿仙藥 一〇〇、〇

白糖 四〇〇、〇

右篤拉侃篤護漿適宜為五

十錠一日四個乃至八個

三三六 加刺投兒豆越幾斯 〇、一

右甘草末甘草羔各適宜為二

十九一日三四回每回一二粒

三三七 加糖炭酸鐵 五、〇

重碳酸那篤留謨 五、〇

右爲十九

酒石酸

枸橼油糖

右爲十九

右前方一丸溶於水加入後方

一丸振盪服用

●洗腸劑

三三三

阿片末

阿列布油

卵黃

三三三

單寧酸水

右水適宜爲乳劑灌腸

右分三回洗腸、小兒

三四〇 醋酸鉛水 (一、〇)二〇〇、〇

右洗腸、小兒

三四二 硝酸銀

蒸餾水

右分三回洗腸、半歲兒

三四三 安息香酸那篤留謨

水

右洗腸分三回小兒

三四四

安息香酸那篤留謨

水

右洗腸、小兒

三四四 嘔囉仿謨

卵黃

水 一〇〇〇、〇

右爲乳劑灌腸、裏急後重

三四五 レゾルチレ水

(〇、二—〇、五)一〇〇〇、〇

右洗腸分三回、小兒

●坐藥

三三三 阿片末

醋酸鉛、安息香脂

白臘

柯柯阿脂

右爲肛門坐藥十個朝夕各一個

三四五 別拉敦那越幾斯

柯柯阿脂

右爲肛門坐藥、裏急後重

腸間膜勞 *Tabes mesarica (Enteritis follicularis infantum)*

小兒腸濾胞炎、小兒瘦削病

三三三

人工乳

(卵黃一分、乳糖六分水分)

右混和牛乳十分一乃至三分一

適宜

三四九

卵白半個、牛乳二食匙、乳糖一食匙

水 右混和

三三三

鹽酸規尼涅

右爲一包一日投與二回(有熱者)

小兒霍亂 Cholera infantilis

小兒吐瀉病、小兒腸加答兒、小兒慢性消化不良、小兒下利、小兒慢性腸加答兒等
處置 安臥靜息、飲食嚴慎、下腹溫包、粘滑劑浣腸、止瀉劑投與、嘔吐則用胃洗滌、內服蛋白水、厥冷期則用芥子浴、武蘭坪酒等

●水劑

三五二 阿片丁幾 二滴—四滴

稀鹽酸 〇、五

單舍利別 一〇、〇

水 一〇〇、〇

右一日六回二日分服

三五二 阿片丁幾 五滴

ヲタニヤ丁幾 三、〇

單舍利別 二〇、〇

水 五〇、〇

右每二時一茶匙

三五三 阿片丁幾 三滴—六滴

ヲタニヤ丁幾 二十滴

水 七〇、〇

桂皮舍利別 六、〇

單舍利別 六、〇

右每時一小兒匙

三五四 阿片丁幾 一滴—二滴

ヲタニヤ丁幾 二、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每二時一小兒匙

三五五 亞拉比亞護膜漿 一〇〇、〇

結列阿曹篤 一滴—二滴

薄荷水 一二、〇

單舍利別 一二、〇

右每時一食匙

三五五 亞拉比亞護膜漿 七〇、〇

硫酸依的兒 五滴—十滴

覆盆子舍利別 二〇、〇

右每二時一茶匙

三五五 亞拉比亞護膜漿 七〇、〇

「コト」丁幾 一滴—五滴

右每二時一茶匙

三五五 亞拉比亞護膜漿 二〇、〇

次硝酸銻 一、〇

水 五〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右振蕩每一時一茶匙

三五九 亞拉比亞護膜漿 四〇、〇

ナフタリン 〇、五—一、〇

水 四〇、〇

薄荷油 一滴

右每二時一小兒匙

三五〇 安息香酸那篤留膜 五、〇

水 七〇、〇

右每二時一茶匙

三五二 安息香酸那篤留膜 五、〇

水 八〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

三五三 安息香酸那篤留膜 五、〇

水 八〇、〇

單舍利別 二〇、〇

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|----------------------|----------------------------|--------------|---|--------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--|------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 水 單舍利別 右每三時一茶匙 | 一〇〇、〇 二五、〇 | 三六四 單寧酸水 （〇、五）八〇、〇 替木鼈丁幾 單舍利別 右每二時一茶匙 | 一〇〇、〇 一、〇 二〇、〇 | 三六五 明礬末 水 右每二時一茶匙 | 一〇〇、〇 〇、五 | 三六六 ラタニヤ丁幾二十滴—三十滴 結列阿曹篤 水 單舍利別 右每二時一茶匙 | 七〇、〇 一滴 一〇、〇 | 三六七 ラタニヤ丁幾 水 結列阿曹篤 阿片丁幾 單舍利別 右每三時一茶匙 | 六〇、〇 二滴 二滴 三滴 二〇、〇 | 三六八 古倫僕越幾斯 尚香水 右每二時一小兒匙 | 一〇〇、〇 一〇〇、〇 | 三六九 依的兒 護謨合劑* | 二〇、〇 一〇〇、〇 | 三七〇 硝酸銀 蒸餾水 偏里設林 右每二時一茶匙、半歲小兒 | 〇、〇五 四〇、〇 一〇、〇 | 三七〇 硝酸銀 蒸餾水 偏里設林 右每二時一茶匙 | 〇、〇五 四〇、〇 一〇、〇 | 三七二 麥角越幾斯 阿片安息香丁幾 薄荷水 橙皮舍利別 右每二時一茶匙 | 五〇、〇 五、〇 一〇〇、〇 二〇、〇 | 三七三 碳酸麻偏涅矢亞 滿那舍利別 右每二時一茶匙 | 一〇〇、〇 二五、〇 | 三七四 石灰水 水 右每二時一食匙 | 五〇、〇 五〇、〇 | 三七五 次硝酸蒼鉛 石灰水 | 三〇、〇 六〇、〇 | 三七六 硝酸銀 蒸餾水 偏里設林 右每二時一茶匙 | 〇、〇五 一〇〇、〇 | 三七六 硝酸銀 蒸餾水 偏里設林 右每二時一茶匙 | 〇、〇五 一〇〇、〇 | 三七七 硝酸銀 蒸餾水 右每二時一茶匙 | 〇、〇五 一二〇、〇 | 三八〇 硝酸銀 蒸餾水 右每二時一茶匙 | 〇、〇五 一二〇、〇 | 三八一 硝酸銀 蒸餾水 護謨漿、單舍利別 右一日六回二日分服 | 〇、〇五 一〇〇、〇 各一〇、〇 | 三八二 硝酸銀 偏里設林 單舍利別 右每二時一茶匙 | 〇、〇五 二〇、〇 二〇、〇 | 三八三 單寧酸、蕃木鼈丁幾 水 單舍利別 右一日六回二日分服 | 各一、〇 一〇〇、〇 一〇、〇 |
|----------------------|---------------|--|----------------------|----------------------------|--------------|---|--------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--|------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|

荷香水

橙皮舍利別

右每二時一茶匙

七五、〇
一五、〇

三六六

水

單舍利別

右一日五回乃至六回每回一茶匙

二、〇
八〇、〇
二〇、〇

三七九

水

右每二時一茶匙

〇、五
一〇〇、〇

三六九

水

右弗聖

單舍利別

右每三時一小兒匙

〇、四
八〇、〇
一〇、〇
二〇、〇

三九〇

水

阿片丁幾

右每二時一小兒匙

〇、五
一〇〇、〇
一〇〇、〇

三九〇

水

亞拉比亞護謨

〇、四
八〇、〇
一〇、〇

阿片丁幾

亞兒答舍利別

右每二時乃至三時一小兒匙

一滴一三滴
二〇、〇

三四二

阿片丁幾

武蘭坪酒

水

甘草蒸

右每二時一茶匙

〇、一
二〇、〇
二五、〇
一〇、〇

● 浸煎粥

大黃浸

沙列布根末

炭酸麻留濕矢亞

桂皮舍利別

右每二時一茶匙

二〇、〇
一〇〇、〇
〇、五
二、五
二五、〇

三四三

加密列浸

右每二時一食匙

六〇、〇
〇、一

三四四

加密列浸

阿片丁幾

右每二時一茶匙

六〇、〇
〇、一
〇、二
二滴

三四五

加密列浸

薄荷水、單舍利別

右每時一食匙

一〇〇、〇
一〇、〇
各五、〇

三四六

沙列布煎

撒里矢兒酸蒼鉛

單舍利別

右每二時一茶匙

八〇、〇
三〇、〇
二〇、〇

三四七

沙列布煎

阿片丁幾

單舍利別

右每時一小兒匙

一滴一三滴
八〇、〇
一〇、〇

三四八

沙列布煎

阿片丁幾

橙皮舍利別

右每二時一茶匙

二滴一五滴
一〇、〇

三四九

沙列布煎

ラタニヤ丁幾

單舍利別

右每二時一小兒匙

十滴
一〇、〇

三四〇

沙列布煎

ラタニヤ丁幾

八〇、〇
二十滴
一滴一二滴

- 單舍利別 二〇、〇
- 右每二時一小兒匙
- 三四一 沙列布煎* 一二〇、〇
- 結列阿曹篤 〇〇、〇五
- 酒精 〇〇、二五
- 右每半時乃至二時一茶匙
- 三四二 沙列布煎 (二、〇)一〇〇、〇
- 水製大黃丁幾 一、〇
- 單舍利別 一〇、〇
- 右每二時一茶匙
- 三四三 沙列布煎 七〇、〇
- 硫酸依的兒 十滴
- 薄荷水 一二、〇
- 單舍利別 一二、〇
- 右每一時一小兒匙
- 三四四 沙列布煎 一〇〇、〇
- 結列阿曹篤 〇〇、〇五
- 酒精 〇〇、五
- 右每二時一茶匙
- 三四五 古倫僕根煎(一〇、〇)八〇、〇
- 覆盆子舍利別 一〇、〇
- 右每二時一小兒匙
- 三四六 古倫僕根煎

- (五、〇一八、〇)一〇〇、〇
- 單舍利別 一〇、〇
- 阿片丁幾 四滴
- 右一日六回二日分服
- 三四七 古倫僕根煎(五、〇)一〇〇、〇
- 阿片丁幾 四滴
- 亞兒答舍利別 二〇、〇
- 右每二時一食匙
- 三四八 加斯加利刺皮煎 (五、〇一八、〇)一〇〇、〇
- 阿片丁幾 四滴
- 單舍利別 二〇、〇
- 右一日六回二日分服
- 三四九 加斯加利刺煎 (五、〇)一〇〇、〇
- 阿片丁幾 四滴
- 亞兒答舍利別 二〇、〇
- 右每二時一食匙
- 三四〇 阿仙藥煎 (二、〇)一〇〇、〇
- 阿片丁幾 三滴一五滴
- 單舍利別 二〇、〇
- 右每二時一食匙
- 三四一 吐根浸 (〇、二)一〇〇、〇

- 護謨漿、單舍利別 各一〇、〇
- 阿片丁幾 二滴一四滴
- 右一日六回二日分服
- 散劑
- 三四二 陀沕兒氏散 〇、二一〇、二
- 古倫僕越幾斯 〇〇、二
- 白糖 三、〇
- 右分十包每二時一包
- 三四三 陀沕兒氏散 〇、二
- 單寧酸規尼涅 一、〇
- 白糖 二、〇
- 右分十包每三時一包
- 三四四 甘汞 〇、〇一〇、一
- 白糖 〇、〇三
- 右分三包一日三回每回一包
- 三四五 甘汞 〇、一
- 白糖 二、〇
- 右分十包每二時乃至三時一包
- 三四六 甘汞 〇、〇五一〇、三
- 乳糖 三、〇
- 右分十包一日三回每回一包
- 三四七 甘末 〇、〇五

亞拉比亞護謨末 五、〇

右分十包每二時乃至三時一
包

三四元 甘朮 〇、〇七五—〇、二五

乳糖 〇、五

右分五包每二時一包

三四元 甘朮 〇、〇一

阿片越幾斯 〇、〇二

亞拉比亞護謨末 〇、〇三

三四元 樟腦、安息香酸 各〇、四

白糖 三、〇

右分十包每二時一包

三四元 次硝酸蒼鉛 一、〇—三、〇

護謨末 三、〇

右分十包一日三回乃至六回

三四元 醋酸鉛 〇、一—〇、一五

每回一包

三四元 亞拉比亞護謨末 三、〇

阿片越幾斯 〇、一—〇、三

右分十包一日三回每回一包

三四元 ナフタリン 〇、三

白糖 一、五

三四元 單寧酸 〇、〇三一—〇、一五

白糖 一、〇

右分三包一日三回每回一包

三四元 醋酸鉛 〇、〇三一—〇、〇六

亞拉比亞護謨、白糖 各適宜

右分三包一日三回每回一包

三四元 阿片 〇、〇三

次硝酸蒼鉛 一、〇

白糖 二、〇

右分十包每二時一包

三四元 陀沕兒氏散 〇、二—〇、三

單寧酸規尼涅 〇、〇三

白糖 二、〇

右分十包每二時一包

三四元 ナフタリン 一、〇

白糖 四、〇

右分十包每三時一包

三四元 麝香 〇、一—〇、三

白糖 二、〇

右分十包每二時一包

三四元 甘朮 〇、〇五—〇、三

乳糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

三四元 ●乳劑 樟腦乳劑* (〇、一) 一〇〇、〇

右每半時一小兒匙

三四元 樟腦乳劑 (〇、〇五—〇、一) 七〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

三四元 樟腦乳劑* (〇、二) 二〇〇、〇

桂皮舍利別 一、二〇、〇

右每時一茶匙

三四元 蓖麻子油 三〇、〇

亞拉比亞護謨末 一、〇

水 七五、〇

單舍利別 一五、〇

右爲乳劑每二時一小兒匙

三四元 ●滴劑 安母尼亞茴香精 各一〇、〇

依的兒精 右每半時三滴乃至七滴

三四元 礮砂加茴香精 五、〇

醋酸依的兒 五、〇

右每十五分三滴乃至五滴

三四元 醋酸依的兒 五、〇

右每十五分三滴乃至五滴

三四七 礮砂加茴香精 二、〇

桂皮水 一〇、〇

水 一〇、〇

右每二時二十滴

●注射劑 一〇、〇

三四八 依的兒 一〇、〇

右每回一筒注射皮下

三四九 硫酸依的兒 一〇、〇

樟腦 一〇、〇

右每回一筒乃至二筒注射皮下

三四〇 樟腦 〇、五

酒精、蒸餾水 各五、〇

右每回一筒注射皮下

三四一 食鹽水 (〇、七五) 一〇〇、〇

右爲攝氏四十度之溫每回以

三〇、〇乃至四〇、〇注入皮下

三四二 食鹽水 (〇、三一〇、六)

五〇、〇一〇〇、〇

三四三 格魯兒那篤留謨 四、〇

右於二十四時間內注入皮下

三四四 格魯兒那篤留謨 四、〇

重碳酸那篤留謨 三、〇

煮沸水 一〇〇〇、〇

右注入皮下

●洗滌劑

レゾルチン水 (〇、五十一、〇) 一〇〇〇、〇

右胃洗滌 (三、〇) 二〇〇、〇

三四五 硼酸水 二〇〇、〇

右胃洗滌

三四六 格魯兒那篤留謨 四、〇

重碳酸那篤留謨 三、〇

水 一〇〇〇、〇

右胃洗滌

三四七 安息香酸水 (二、〇) 一〇〇〇、〇

右胃洗滌

●洗腸劑

食鹽水 (五〇、〇) 一〇〇〇、〇

結列阿曹篤 六滴

右腸洗滌

三四八 食鹽水 (五〇、〇) 一〇〇〇、〇

安息香酸那篤留謨

右腸洗滌 五〇、〇一〇〇〇、〇

三四九 食鹽水 (五〇、〇) 一〇〇〇、〇

單寧酸 一〇、〇一〇〇、〇

右腸洗滌

三四〇 撒里矢爾酸 一、〇

酒精 一、〇

三四一 沙列布鹽 五〇、〇

結品硝酸銀 〇、一

右分二回灌腸

三四二 過格魯兒液 十滴

三四三 結列阿曹篤 六滴

右洗腸 一〇〇〇、〇

三四四 芥子末 一、〇一五、〇

溫湯 二五〇〇〇、〇

右浴用

腸蜂巢織炎、實扶的里亞性腸炎 *Enteritis phlegmonosa et diphterica.*

三國六 蓖麻子油

右頓服、糞尿膏積

一五、〇

三國六 阿片丁幾

一、五

三國六 明礬、白糖

各三、〇

亞拉比亞護藥

三〇、〇

阿片末

〇、一

單舍利別

三〇、〇

疝痛 *Colica, Enteralgie.*

腸神經痛、疝氣、腸痛、舊譯作肚腹絞痛、又名疝肚疼、古名疝氣、俗名小腸氣
處置 洗腸、下劑、器腹、快通後大量之阿片劑

三國六 甘汞

白糖

〇、〇三

三國七 阿片

〇、二

右分三包一日三回每回一包

右分五包每半時一包

二、〇

小兒

三國七 阿片

〇、五

三國七 挖物兒氏散

〇、〇六

三國七 別拉敦那越幾斯

〇、一

右分三包一日三回每回一包

右分十包每二時一包

〇、一

小兒

三國七 甘草末適宜分三包一日三

回每回一包

三國七 阿片丁幾

一〇、〇

重碳酸那篤雷謨、茴香油糖

各二、〇

加密列油、茴香油

各三滴

三國七 乳糖

一〇、〇

三國七 百弗聖

一、〇

右每二時一刀尖

右分十包每食後一時間服一

水

右每二時一食匙

一五〇、〇

三國六 依的兒

麝香

一、〇

右頓服

〇、一

三國七 水劑

五〇、〇

三國七 蓖麻子油

二滴

三國七 巴豆油

〇、三

右每二時一食匙

三國六 稀鹽酸

六〇、〇

三國六 蒸餾水

三滴

三國六 阿片丁幾

二〇、〇

三國六 覆盆子舍利別

二〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

三四七
メリツサ水 一五〇、〇

蘇木越幾斯 五、〇

複方阿片丁幾 十五滴

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

三四八
硫酸依的兒 二、〇

阿片泊美藍丁幾 十滴

薄荷水 一〇〇、〇

菩提樹水 五〇、〇

右每時一食匙

三四九
水製大黃丁幾 二五、〇

滿那舍利別 二五、〇

右每回一茶匙、小兒

三四三
カスカラ、サゲラダ越幾斯 一〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右一日三回每回一茶匙

三四三
嚼囉仿謨 十二滴

菩提樹花水 五〇、〇

右每十五時一食匙

三四四
芳香丁幾、依的兒精 各二十滴

蒸餾水 五〇、〇

阿片丁幾 一滴—三滴

右每二時一茶匙

三四五
蝦製麻備涅矢亞 七、〇

蒸餾水 一五〇、〇

橙花水 五、〇

白糖 一五、〇

右振盪每一時一食匙

三四六
●滴劑 〇、〇五

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

杏仁水 一〇、〇

右爲滴劑

三四七
鹽酸莫兒比涅 〇、〇一

硫酸亞篤魯比涅 〇、〇一

杏仁水 一〇、〇

右每回十滴乃至二十滴

三四八
阿片丁幾 一〇、〇

葛斯篤僕謨丁幾 五、〇

依的兒製緬草丁幾 一〇、〇

右一日三回乃至四回每回十

三四九
五滴

緬草丁幾 五、〇

薄荷油 四滴

右每二時二十滴

三四〇
緬草丁幾、加耶布的油

各一〇、〇

三四一
右每二時十五滴

葛縷子油 二、〇

依的兒性緬草丁幾 一八、〇

右每服二十滴乃至四十滴

三四二
別刺敦那越幾斯 〇、〇五

杏仁水 五、〇—一〇、〇

右每三時乃至四時服十滴乃

至二十滴

三四三
別刺敦那越幾斯 〇、〇一

杏仁水 四、〇

右每一二時十滴、小兒

三四四
薄荷油 一、〇

酒精 五〇、〇

右一回每回三十滴乃至六十

三四五
滴

嚼囉仿謨 三、〇

酒精 一二、〇

芳香丁幾 一五、〇

右一回二十滴乃至六十滴

三四六
嚼囉仿謨 三、〇

依的兒 四、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

| | |
|-----------------------|--------------|
| 杏仁水 | 二、〇 |
| 薄荷油 | 一滴 |
| 流動甘草越幾斯 | 三、〇、〇 |
| 單舍利別 | 適宜 |
| 右每回五滴乃至十滴 (ゴロ ズイン) | |
| 麝香丁幾 | 五、〇 |
| 右每半時二滴乃至五滴、小 兒 | |
| ●浸劑 | |
| 加密爾列浸 | (一〇、〇)(二〇、〇) |
| 右頓服(發汗) | |
| 旃那浸葉(一五、〇)(二〇、〇) | |
| 右每二時一食匙 | |
| ●複方旃那浸* | 一二〇、〇 |
| 薄荷水 | 三〇、〇 |
| 忽布滿精 | 十滴 |
| 橙皮舍利別 | 一五、〇 |
| 右每半時一食匙 | |
| ●丸劑 | |
| 硫酸亞篤魯必涅 | 〇、〇、一 |
| 硫酸莫兒比涅 | 〇、〇、三 |

| | |
|----------------------------|----------|
| 右爲二十九日三回每回 一粒 | |
| 別刺敦那越幾斯 | 〇、二一〇、三 |
| 芥木暨越幾斯 | 〇、二一〇、一五 |
| 阿片越幾斯 | 〇、二一〇、三 |
| 右甘草末甘草蓋各適宜爲三 十九一日三回每回一粒 | |
| 大黃末 | 三、〇 |
| 別刺敦那根末 | 二、〇 |
| 右蒲公英越幾斯適宜爲五十 丸朝夕各二粒 | |
| コデイン | 〇、五 |
| 亞兒答根末 | 二、〇 |
| 右單舍適宜爲二十九每夕一 粒乃至二粒 | |
| ●浣腸劑 | |
| 蓖麻子油 | 三〇、〇 |
| 亞拉比亞護謨 | 七、五 |
| 蒸餾水 | 一二〇、〇 |
| 右爲乳劑浣腸 | |
| 加密爾列浸 | 三〇〇、〇 |
| 加耶布的油 | 四滴 |
| 甘硝石精 | 二、五 |

| | |
|-----------|---------------|
| 右浣腸 | |
| 亞兒答煎* | 九〇、〇 |
| 阿魏 | 五、〇一八、〇 |
| 阿列布油 | 八〇、〇 |
| 右灌腸 | |
| 加密爾列浸 | (一〇、〇)(一二〇、〇) |
| 阿魏丁幾 | 五、〇 |
| 右浣腸 | |
| 繡草浸 | (一〇、〇)(二〇、〇) |
| 右浣腸 | |
| 繡草浸 | (二〇、〇)(二五〇、〇) |
| 阿魏 | 三、〇 |
| 卵黃 | 一棚 |
| 右爲乳劑分二回灌腸 | |
| 抱水格魯刺兒 | 〇、五一、〇 |
| 水 | 六〇、〇 |
| 右灌腸、小兒 | |
| ●下劑 | |
| 蓖麻子油 | 一五、〇 |
| 右頓服 | |
| 蓖麻子油 | 一五、〇 |
| 薄荷水 | 一五、〇 |

右頓服

●茶劑

三五四 薄荷葉、縹草根

各三〇、〇

右爲茶劑

三五五 薄荷葉

六〇、〇

睡菜葉

三〇、〇

鉛毒痛

Colica saturnina.

●下劑

壹九 蓖麻子油

二〇、〇

右頓服

壹〇 硫酸麻偏涅伊謨

一五、〇

右頓服

壹二 硫酸麻偏涅伊謨

四〇、〇

水

二〇〇、〇

稀鹽酸

二〇、〇

右一日三回二日分服

壹三 硫酸那篤留謨

五〇、〇

右每半時乃至一時一食匙

壹三 巴豆油

一滴—三滴

蓖麻子油

五〇、〇

右先服用一食匙若無効則數時間後更服用一食匙

縹草

一五、〇

右茶劑(驅風藥)

三五六 菩提樹化、加密列花、橙花

各五、〇

右爲茶劑

三五七 鹽酸莫兒比涅水

巴豆油

一滴

廿禾

〇、五

乳糖

四、五

右分四包每三時一包、瀉下

後休藥

三五五 旃那葉浸(一〇、〇)一二〇、〇

硫酸那篤留謨

二〇、〇

右分三回服用

三五六 旃那葉

一五、〇

茴香

五、〇

沸湯

一五〇、〇

浸出濾過添加硫酸那篤留謨三

〇、〇

右每一時一食匙、瀉下後休

藥

(〇、〇五)五、〇

右一筒注射皮下

三五八 溫石

一個

右肚腹溫法

●鎮痛劑

三五七 鹽酸莫兒比涅

〇、〇五

白糖

二、五

右分五包一日數回每回一包

三五八 阿片

〇、二

白糖

二、〇

右分五包每半時一包

三五九 阿片越幾斯

〇、五

乳糖

五、〇

右分十包每二時一包、疼痛

消散休藥

三五〇 蜀葵根煎

一五〇、〇

抱水格魯刺爾

一〇、〇

鹽酸莫兒比涅

〇、〇五

甘草越幾斯

一〇、〇

右每二時一食匙、疼痛消散
休息

三五三 別拉敦那越幾斯 〇、〇、五

杏仁水 一〇、〇

右每服二滴乃至五滴

便秘 *Obstipatio alvi, Obstructio habitualis.*

一時性便秘、常習便秘、大便秘結、秘結等

處置 飲食節制、腹部冷洗、下腹按摩、鑛泉療法、無水偏里設林注腸等

●九劑 盧薈越幾斯、蒲公英越幾斯 各五、〇

三五五 右為五十九朝夕二粒

三五六 盧薈越幾斯 二、〇

三五七 古魯聖篤越幾斯 一、〇

三五八 菲沃斯越幾斯 〇、五

三五九 右為三十九一日一粒

三六〇 盧薈越幾斯、藥刺巴石礮 各一、五

右甘草羔甘草末各適宜為三十九一日一粒乃至三粒

三六一 盧薈越幾斯、大黃末 各五、〇

三六二 蒲公英越幾斯 各五、〇

三五三 抱水格魯拉爾 〇、三一、〇

阿片 右分三包每時一包 〇、一

●吐劑 鹽酸亞刺莫兒比涅一、〇

三五五 右為五十九每朝四粒

三五六 盧薈越幾斯、大黃越幾斯 各一、〇

三五七 大黃末 右為十九每夕臨臥一粒 各一、〇

三五八 盧薈越幾斯 一〇、〇

三五九 大黃越幾斯 一〇、〇

三六〇 大黃末 右為百九每夜臨臥一粒 一〇、〇

三六一 盧薈越幾斯 一、五

三六二 複方大黃越幾斯 一、五

右甘草末及甘草羔適宜為三十九朝夕二粒

三六三 盧薈越幾斯 二、〇

三六四 複方大黃越幾斯 三、〇

一〇、〇 蒸餾水 右每回四分三乃至一筒注射

皮下、催吐

三五四 亞硝酸亞密爾 右一二滴噴入

三五五 右酒精適宜為四十九每夜一粒乃至三粒 七、二

三五六 盧薈越幾斯 一、八

三五七 複方大黃越幾斯 一、八

三五八 複方古魯聖篤越幾斯 一、八

三五九 鐵粉 右為百二十九隨時一粒乃至二粒 二、〇

三六〇 盧薈越幾斯 五、〇

三六一 大黃末 古魯聖篤越幾斯 〇、五

三六二 大黃越幾斯 適宜

三六三 右為五十粒每朝夕二粒

三六四 盧薈越幾斯、藥刺巴越幾斯

三五五 盧薈越幾斯、藥刺巴越幾斯

三五六 盧薈越幾斯、藥刺巴越幾斯

三五七 盧薈越幾斯、藥刺巴越幾斯

三五八 盧薈越幾斯、藥刺巴越幾斯

三五九 盧薈越幾斯、藥刺巴越幾斯

三六〇 盧薈越幾斯、藥刺巴越幾斯

三六一 盧薈越幾斯、藥刺巴越幾斯

三六二 盧薈越幾斯、藥刺巴越幾斯

三六三 盧薈越幾斯、藥刺巴越幾斯

藥用石鹼 各五、〇

右大黃及大黃越幾斯各適宜
為五十九每朝四粒

三五四 蘆薈越幾斯 一〇、〇

藥刺巴越幾斯 一〇、〇

藥用石鹼 一〇、〇

右大黃越幾斯、大黃末各適宜
宜為百丸每朝空腹時四粒

三五七 蒼苔末 四、〇

藥用石鹼 二、〇

右為六十九朝夕一二粒

三五八 蘆薈 二、五

藤黃 二、〇

茴香末 二、〇

藥用石鹼 五、〇

右為百丸一日二粒乃至四粒

三五九 蘆薈 三、〇

藤黃 三、〇

芳香散 三、〇

藥用石鹼 六、〇

右甘草羔甘草末各適宜為百丸
一日二粒乃至四粒

三六〇 蘆薈 二、五

藥刺巴脂 二、五

格魯聖篤越幾斯 二、五

右為五十九一日一粒乃至四粒

三五二 蘆薈、藤黃、芳香散 各一、八

藥用石鹼 三、六

右單含適宜為六十九一回二粒乃至四粒

藥刺巴末 各一、二

薄荷油 一滴

藥刺巴末 各一、二

フラングラ越幾斯 適宜

右為六十九一回三粒乃至六粒

三五三 蘆薈 六、〇

藥用石鹼 三、〇

肉豆蔻油 〇、三

茴香油糖 三、〇

右為百二十九朝夕三粒乃至六粒

三五四 蘆薈、藥用石鹼 各六、〇

別拉敦那越幾斯 〇、三

右為百二十九一日三回每回

四粒乃至六粒 一、〇

三五五 古魯聖篤越幾斯 各一、〇

藤黃、藥刺巴 各一、〇

右為三十九每朝一粒

三五六 古魯聖篤末 〇、五

蘆薈 五、〇

スカンモニウム 〇、五

丁香油 〇、〇一

右蜂蜜適宜為十九一日一粒
乃至四粒

三五七 古魯聖篤越幾斯 〇、五

複方大黃越幾斯 三、〇

右亞拉比亞護謨漿適宜為二
十九每夕一粒乃至三粒

三五八 複方古魯聖篤越幾斯 一、五

藥用石鹼 一、五

右酒精適宜為三十九每回一
二粒

三五九 古魯聖篤越幾斯 〇、二五

蘆薈越幾斯 二、五

藥刺巴石鹼 二、五

右酒精適宜為三十九每朝一
二粒

三五〇 古魯聖篤越幾斯 一、〇

大黃越幾斯 三、〇

右爲三十九丸每朝一粒

三五二 古魯聖篤越幾斯、大黃末

蘆薈末、藥刺巴脂、藤黃

各一、〇

密兒拉

右爲五十九丸每日一粒乃至四

粒

三五三 古魯聖篤越幾斯

蘆薈越幾斯

菲沃斯越幾斯

三五四 剝度比爾林

右廿草末、甘草羔各適宜爲

三十九丸每夕一二粒

三五五 剝度比爾林、藥用石鹼各〇、二

蜂蜜 適宜

右爲二十九一日一粒乃至三

粒

三五六 ホドフイリン

菲沃斯越幾斯

右爲二十九一粒乃至二粒

三五六 剝度比爾林 〇、五

菲沃斯越幾斯 〇、三

右爲三十九丸每夕一二粒

三五七 オドフイリン 一、〇

別刺敦那越幾斯

右健質亞那越幾斯適宜爲百

丸每朝二粒乃至三粒

三五八 剝度比爾林 〇、五

別刺敦那越幾斯

右睡菜葉末、龍膽越幾斯各

適宜爲五十九丸每朝一粒乃至

三粒

三五九 剝度比爾林 〇、三

大黃越幾斯、蘆薈越幾斯

各三、〇

右蒲公英越幾斯適宜爲四十

丸每夕一粒乃至二粒

三六〇 剝度比爾林 〇、四

藥刺巴根末、大黃末 各一、〇

別刺敦那越幾斯 〇、二

蒲公英越幾斯 適宜

右爲四十九一日二粒乃至三

三六一 藥刺巴末 各二、〇

スカンモニウム末 各二、〇

右龍膽越幾斯適宜爲十九每

服二粒乃至五粒

三五二 大黃末 五、〇

右睡菜越幾斯適宜爲五十九

每朝五粒

三五三 大黃末 五、〇

複方大黃越幾斯

重碳酸那篤留謨

右蒲公英越幾斯適宜爲六十

丸朝夕三粒

三五四 巴豆油 五滴

右菖蒲末及菖蒲越幾斯各適

宜爲十九每朝三粒

三五五 甘汞 六、〇

藥刺巴 六、五

複方古魯聖篤越幾斯 八、四

藤黃 一、六

右水適宜爲百九一回一粒乃

至三粒

三五六 別刺敦那越幾斯 〇、五

右健質亞那越幾斯適宜爲五

十九日一回每回一粒乃至四粒

三五七 旃那葉末 四、〇

右蒲公英越幾斯適宜爲三十丸一日五丸乃至八丸

三五八 藥刺巴丸 (獨逸局方) 三十粒

右一回二粒乃至十粒

三五九 散劑
フイトラクチン 一、〇

右分十包一回一包

三五〇 複方甘草散 * 五、〇

右每夕一二茶匙

三五二 人工加兒爾斯泉鹽 五、〇、〇、〇、〇

右每回一二茶匙

三五三 硫酸麻僞溼叟謨 各三、〇、〇

脫水硫酸那篤留謨
格魯兒那篤留謨

三五四 甘汞 〇、三
乳糖 三、〇

右分六包每二時一包

三五五 甘汞、藥刺巴根末 各〇、二

白糖 二、〇

三五六 大兒 右分十包一日三回每回一包

三五七 甘汞 一、三
藥刺巴 一、五

三五八 乳糖 一、五
右分三包一日三回分服

三五九 硫酸麻僞溼叟謨 三、〇、〇

右二回分服

三五〇 硫酸那篤留謨 一、五、〇

三五二 大黃末 三、〇、〇
重碳酸那篤留謨 一、〇、〇

右每夕一刀尖

三五三 硫酸麻僞溼叟謨 一、〇、〇

重碳酸那篤留謨 三、〇、〇

右爲五包
酒石酸 二、〇

三五四 旗那葉末 一、〇、〇
フラングラ皮末 * 二、〇、〇

白糖 一、五、〇

薄荷油 四滴

右爲散一日二三回每回一茶匙

三五九 フランクラ皮末 * 四、〇、〇

旗那葉、芒硝 各一、〇、〇

三五〇 大黃末 五、〇
重碳酸那篤留謨 一、〇、〇

白糖 三、〇、〇

右朝夕一茶匙
三滴

三五二 大黃末、碳酸麻僞溼叟謨 各一、〇、〇

右一日一回乃至二回每回一刀尖

三五三 純精酒石 一、五、〇
精製硫黃 一、五、〇

右朝夕一茶匙

三五四 重酒石酸加留謨、沈降硫黃 各五、〇

尚香油糖 二、〇、〇

右一日三回每回一茶匙

三五五 純精酒石 一、五、〇
碳酸麻僞溼叟謨 〇、五

白糖 三〇、〇

右朝夕每一茶匙

三五六 純精酒石 一五、〇

旃那葉 一、〇

白糖 三〇、〇

右朝夕每一食匙

三五七 純精酒石、硫酸加留謨 各一五、〇

白糖 三〇、〇

右朝夕每一食匙

三五八 純精酒石 二〇、〇

蝦性麻留涅叟謨 四、〇

茴香油糖 二〇、〇

右每服一茶匙

三五九 格魯兒安母紐謨 二、〇

吐酒石 〇、五

甘草末 二〇、〇

右朝夕一刀尖

三六〇 蕃木鼈越幾斯 〇、一〇、二

乳糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包

三六一 旃那浸 (三、〇)五〇、〇

●浸煎劑

滿那舍利別 二〇、〇

右每一時一食匙、大兒

三六二 旃那浸 (一〇、〇)一〇〇、〇

硫酸麻留涅叟謨 三〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

三六三 旃那浸 (二〇、〇)一五〇、〇

硫酸麻留涅叟謨 三〇、〇

覆盆子舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

三六四 複方旃那浸 五〇、〇

覆盆子舍利別 一〇、〇

杏仁水 五、〇

右一日數回每回一食匙

三五五 複方旃那浸 三〇、〇

覆盆子舍利別 三〇、〇

杏仁水 二〇、〇

右每服一食匙乃至二食匙、

小兒

三六六 答麻林度煎 (二〇、〇)二〇〇、〇

枸橼酸麻留涅叟謨 二〇、〇

滿那舍利別 二〇、〇

三六七 答麻林度煎 (二五、〇)一五〇、〇

右每二時一食匙

硫酸麻留涅叟謨 一〇、〇

滿那舍利別 一五、〇

右每二時一小兒匙

三六八 答麻林度煎 (二五、〇)一五〇、〇

燐酸那篤留謨 一〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙乃至二食匙

大兒

三六九 多滿林度煎 二〇〇、〇

重酒石酸加留謨 二〇、〇

右一日數回分服

三七〇 多滿林度煎 一五、〇

旃那葉 五、〇

右浸出 一〇〇、〇

硫酸麻留涅叟謨 一五、〇

單舍利別 一〇、〇

右一日三回分服

三七二 鼠李皮煎 (二〇、〇)二〇〇、〇

フランデー酒 一〇、〇

右一日一回一食匙
三二 大黃浸 (二、〇)五〇、〇

滿那舍利別 二〇、〇

右每時一茶匙、小兒

●水劑

三三 蓖麻子油 三〇、〇

右每服一茶匙乃至一食匙

三四 蓖麻子油 三〇、〇

巴豆油 三滴

右每二時一食匙

三五 蓖麻子油 三〇、〇

亞拉比亞護謨末 一〇、〇

水 一五〇、〇

滿那舍利別 一五、〇

右每時一食匙

三六 蓖麻子油 三〇、〇

加里石鹼 二〇、〇

水 一〇、〇

薄荷油 六滴

右爲乳劑每朝一回頓服

三七 巴豆油 二滴一五滴

亞拉比亞護謨漿 一五、〇

水 五〇、〇

亞爾答舍利別 一〇、〇

右每服一食匙

三八 剝度比爾林 〇、一

酒精 一〇、一

覆盆子舍利別 五〇、〇

右每回一食匙乃至二食匙、小兒

三九 重酒石酸加留謨 二五、〇

硫酸那篤留謨 一〇、〇

右每服一二茶匙

四〇 酒石酸加留謨那篤留謨 二〇、〇

葛縷子水 五〇、〇

滿那舍利別 二〇、〇

右每二時一小兒匙

四一 硫酸麻僱涅叟謨 二〇、〇

水 二〇、〇

稀硫酸 二〇、〇

右每時一食匙

四二 硫酸那篤留謨 一五、〇

覆盆子舍利別 一〇、〇

大黃舍利別 一五、〇

右每二時一小兒匙、小兒

四三 硫酸那篤留謨 一〇、〇

水 五〇、〇

單舍利別、武蘭坪酒各五〇、〇

右每回一酒盞

四四 硫酸那篤留謨 一〇、〇

燐酸那篤留謨 一〇、〇

橙花水 一二〇、〇

俚里設林 五〇、〇

四五 硫酸那篤留謨 一〇、〇

重碳酸那篤留謨 八〇、〇

格魯兒那篤留謨 四〇、〇

硫酸加留謨 〇、五

右每服一茶匙乃至二茶匙

四六 燐酸那篤留謨 四〇、〇

重碳酸那篤留謨 四〇、〇

水 六二五、〇

枸橼實 一〇、〇

右密栓貯瓶每回服用一盞

四七 滿那 一〇、〇

水 五〇、〇

右每時一茶匙、乳兒

四八 滿那 五〇、〇

薄荷水 一五〇、〇

右每回一食匙

三三三 滿那舍利別、大黃丁幾 各二〇、〇

右每服一小兒匙、小兒

三三三 滿那舍利別 三〇、〇

水製大黃丁幾 一〇、〇

右每服一小兒匙

三三三 流動カスカラサクラダ越幾斯 二〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每夕一茶匙

三三三 流動カスカラサクラダ越幾斯 二〇、〇

單舍利別 二〇、〇

水 一〇〇、〇

三三三 右朝夕一茶匙 一〇〇、〇

流動フラングラ越幾斯 一〇〇、〇

下痢 Diarrhoea

●散劑

三三三 阿片 〇、一

白糖 三〇、〇

右每回一茶匙

三三四 古魯聖篤丁幾 五、〇

阿魏丁幾 一〇、〇

右朝夕十五滴乃至二十滴

三三五 藥刺巴脂 〇、五

卵黃 一個

橙花水 三〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每時一茶匙

●煉劑

三三六 重酒石酸加留謨 一五、〇

硫黃華 三〇、〇

答滿林度 九〇、〇

右為煉藥一日三回每回一茶匙

三三七 硫黃華 二〇、〇

重酒石酸加留謨 一〇、〇

生姜舍利別、橙皮舍利別

各一五、〇

右為煉劑每回一茶匙

三三六 滿那、硫謨加留謨

硝酸那篤留謨、硫黃華 各一〇、〇

右蜂蜜適宜調和一回一茶匙

乃至一食匙

三三九 旃那砥劑 五〇、〇

右二回分服

三四〇 緩下茶劑* 五〇、〇

右每回一二匙

三四一 剝度比爾林 〇、〇五、〇、二

水 一〇、〇

安母尼亞水 五滴

右皮下注射用

三四二 古魯聖篤丁幾 一〇、〇

蓖麻子油 三〇、〇

右朝夕一茶匙腹部塗擦

白糖

三三五 阿片末 三〇、〇

右分六包每三時一包 〇、一

明礬 〇、五
 白糖 二、〇
 右分五包每二時一包
 三六一 阿片末 〇、〇六
 單寧酸 〇、〇六
 白糖 二、五
 右分六包每二時一包
 三六四 阿片末 〇、二
 吐根末 〇、三
 白糖 適宜
 右分十包每三時一包
 三六五 阿片末、吐根末 各〇、六
 加斯加利刺皮末 六、〇
 右分十包一日三四回每回一包
 三六六 阿片 〇、一
 阿仙藥 五、〇
 白糖 三、〇
 右分十包每三時一包
 三六七 複方吐根散* 〇、〇〇五
 〇、〇〇五
 〇、〇五
 適宜
 乳糖 右爲一回量一歲乃至十五歲
 兒

三六八 醋酸鉛 〇、〇一五
 挖物兒氏散 〇、〇二
 白糖 〇、〇四
 右分十包每二時一包、五歲
 三六九 小兒 四、〇
 次硝酸蒼鉛 一、〇
 挖物兒氏散 五、〇
 亞拉比亞護謨末 〇、二五
 右分十包每三時一包
 三七〇 阿仙藥 〇、〇六
 〇、二五
 乳糖 〇、二
 右分三包一日三四回每回一包
 三七二 小兒 一、〇
 硫酸鐵 〇、一
 阿片越幾斯 〇、一
 桂皮末 一、〇
 右分六包每二時一包
 三七三 亞鉛華 一、〇
 重碳酸那篤留謨 〇、五
 右分三包一日三四回每回一包
 三七四 コトイン 〇、〇二五
 一、五
 乳糖 右分五包每二時乃至三時每

三七五 一回一包 〇、三
 三三七 バラコトイン 三、〇
 白糖 〇、三
 右分六包每二時一包
 三七六 甘水 〇、三
 藥刺巴、白糖 各一、五
 右分四包每一時乃至二時一
 包
 三七七 ●水劑 〇、一
 阿片丁幾 一、〇一三、〇
 ラタニヤ丁幾 一、〇一三、〇
 水 五、〇
 單舍利別 二、〇
 右每二時一茶匙、小兒
 三七八 阿片丁幾 〇、五
 一半過格魯兒鐵液 一、五
 水 一五〇、〇
 單舍利別 一五〇、〇
 右每二時一食匙
 三三九 阿片丁幾 一、〇
 撒里矢爾酸那篤留謨 二、〇
 苦味丁幾 二、〇
 水 一〇〇、〇

| | | |
|-----|-------------|-------|
| 三六三 | 右每二時一食匙 | 五、〇 |
| 三六三 | 阿片泊美藍丁幾 | 一〇、〇 |
| | 苦味丁幾 | 〇、二五 |
| | 薄荷油 | 〇、二五 |
| 三六三 | 右每二時十滴乃至十五滴 | 二、〇 |
| 三六三 | 阿片泊美藍丁幾 | 八、〇 |
| | 芳香丁幾 | 五、〇 |
| | 桂皮丁幾 | 〇、二 |
| 三六四 | 右半時乃至一時半茶匙 | 〇、二 |
| 三六四 | 硝酸銀 | 〇、〇 |
| | 茴香水 | 一〇〇、〇 |
| 三六五 | 右每三時一茶匙 | 〇、三 |
| 三六五 | 單寧酸 | 二〇、〇 |
| | 茴香水 | 二五、〇 |
| | 護謨漿 | 二五、〇 |
| | 單舍利別 | 二五、〇 |
| 三六六 | 右每二時一茶匙 | 〇、六 |
| 三六六 | 過格魯兒鐵液 | 〇、〇 |
| | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 單舍利別 | 一〇〇、〇 |
| 三六七 | 右每一時一食匙 | 一、八 |
| 三六七 | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 〇、六 |
| | 炭酸石灰 | |

| | | |
|-----|------------------|-------|
| 三六八 | 單舍利別 | 八、〇 |
| | 水 | 六〇、〇 |
| 三六八 | 右一日三回每回一茶匙、小兒 | 〇、〇八 |
| 三六八 | コトイン | 一〇、〇 |
| | 稀酒精 | 二〇、〇 |
| | 水 | 三〇、〇 |
| | 單舍利別 | 一五、〇 |
| 三六九 | 右每一時一食匙 | 一五、〇 |
| 三六九 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 |
| | 白糖 | 一五〇、〇 |
| 三七〇 | 右每二時一食匙 | 三、〇 |
| 三七〇 | 蘇木藍丁幾 | 二、〇 |
| | 阿片丁幾 | 一五、〇 |
| | 酒製大黃丁幾 | 一五、〇 |
| 三七二 | 右每二時三十滴 | 一五、〇 |
| 三七二 | 蓖麻子油 | 一五、〇 |
| | 薄荷油 | 一滴 |
| | 水 | 一五、〇 |
| 三七三 | 右頓服 | 二、〇 |
| 三七三 | 沙列布煎 (二、〇) 一〇〇、〇 | 二、〇 |
| | 阿片丁幾 | |

| | | |
|-----|-------------------|-------|
| 三七四 | 右半時乃至一時一食匙 | 五〇、〇 |
| 三七四 | 桂皮水 | 二、五 |
| | 阿片丁幾 | 一〇、〇 |
| 三七五 | 右每一時一食匙 | 二〇、〇 |
| 三七五 | 沙列布煎 (二、〇) 一二〇、〇 | 二〇、〇 |
| | 單舍利別 | 一〇、〇 |
| 三七六 | 右每二時一食匙 | 八〇、〇 |
| 三七六 | 沙列布煎 | 三〇、〇 |
| | 撒里矢爾酸蒼鉛 | 二〇、〇 |
| | 單舍利別 | 二〇、〇 |
| 三七七 | 右每二時一茶匙、小兒 | 三、〇 |
| 三七七 | 古倫僕越幾斯 | 一〇〇、〇 |
| | 茴香水 | 一〇〇、〇 |
| 三七七 | 右每二時一小兒匙、小兒 | 一〇〇、〇 |
| 三七七 | 格倫僕根煎 (三、〇) 一〇〇、〇 | 一〇〇、〇 |
| | 阿片丁幾 | 一〇〇、〇 |
| | 右一日四回分服 | 一〇〇、〇 |
| 三七八 | 右每二時一小兒匙、小兒 | 二〇、〇 |
| 三七八 | 古倫僕根煎 (三、〇) 一〇〇、〇 | 二〇、〇 |
| | 護謨舍利別 | 二〇、〇 |

下痢

三七九 蘇木煎 (五、〇)一〇〇、〇

阿片安息香丁幾 一、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

三六〇 ラタニヤ根煎

(五、〇)一〇〇、〇

阿片丁幾

單舍利別 二〇、〇

右每二時一小兒匙、小兒

●丸劑 〇、一五

三六一 硝酸銀 右甘草末、甘草羔各適宜爲

五十九一日三回每回二粒

三六二 硝酸銀

阿片末 〇、一

次硝酸砒鉛 〇、二

右爲五十九每三時二粒 三、〇

三六三 阿片末、吐根末 各〇、三

加斯加利刺皮末 五、〇

阿仙藥 右爲五十九一日三回每回二

丸 適宜

●洗腸劑

三六四 硝酸銀 〇、一五

蒸餾水 一八〇、〇

右分三回洗腸

鼓腸、腹部氣膨 Tympanitis, Meteorismus.

腹腔膨脹、氣腹、腹腔氣腫

三六五 複方旂那浸 一、二〇、〇

薄荷水 三〇、〇

依的兒 十滴

橙皮舍利別 一五、〇

右每半時一食匙

三六六 大黃浸 (三、〇)一五〇、〇

重碳酸那篤留謨 五、〇

薄荷油 〇、二五

橙皮舍利別 二五、〇

右每二時一食匙

三六七 依的兒精 一〇、〇

右一日數回每回十五滴

三六八 硝酸斯篤里幾尼涅 〇、〇五

稀酒精 二五、〇

右一日二回每回二十滴乃至

三十滴

三六九 烟艸浸 (一、〇)一二〇、〇

洗腸

腸管潰瘍 Enterohelkosis.

三七九 次硝酸砒鉛 五、〇

重碳酸那篤留謨 二〇、〇

右混和一日三回每回一小刀

三六九 沙列布浸 (二、〇)一五〇、〇

單舍利別 一五、〇

尖

鹽酸莫兒比涅 〇、〇二

右每二時一食匙

三七九 阿片丁幾 五、〇

右一日三回每回十滴和水服
 用 散劑 二〇〇

腸結核 Tuberculosis intestini Darmtuberculose.

腸癆、結核性腸潰瘍、鷄鳴下痢、五更下痢、脾腎瀉、五更瀉
 體力輔養、轉地休療、礦泉浴養、肝油療法、腸加答兒處置等

水 一五〇、〇
 橙皮舍利別 二五〇、〇
 右每二時一食匙

三六五 阿片 〇、二

明礬 二、〇—三、〇

白糖 二、〇

三六六 阿片 〇、三

醋酸鉛 〇、三

三六七 阿片 〇、一

單寧酸規尼涅 一、五

白糖 三、〇

三六八 阿片 〇、三

右分十包一日三四包

三六九 古倫僕越幾斯 〇、三

右倫僕越幾斯 二、〇

菖蒲根油糖 二、〇

三七〇 右分六包每二時一包

三七四 硝酸銀 〇、五

右以白陶土爲十九一日三粒

水製阿片越幾斯 〇、一

右分十包每二時一包

三七五 次硝酸蒼鉛 〇、三

沈降碳酸石灰 〇、五

阿片末 〇、〇二

白糖 〇、三

三七六 右分十包一日四回每回一包

ベンツオナフトール 〇、六一—二

右分三包一日三回每回一包

小兒

三七七 ベンツオナフトール 一、五

右分三包一日三回每回一包

三七八 ナフタリン、白糖 各五、〇

ベルガモット油 〇、〇五

右分二十包一日三回每回一

腸結核

三七〇 包
チヲホルム 〇、三
沈降炭酸石灰 〇、五
阿片末 〇、〇、二
白糖 〇、〇、三

三七〇 右分十包一日四回每回一包

ザロール、ナフタロール、撒里
矢爾酸蒼鉛、沈降炭酸石灰 各一〇、〇

右分三十包一日三回每回一

三七二 ●丸劑
阿片末 〇、〇、三
吐根末 〇、〇、三
加斯加利刺越幾斯 四、〇
阿仙藥 適宜

右爲六十九一日三回每回二

三七三 次硝酸蒼鉛 二、〇
白糖 一八、〇

右駕拉侃篤漿適宜爲二十錠
一日五個乃至十個

三七三 單寧酸 一、五

三七四 右爲三十九每時二粒
ナフタリン 五、〇
右入膠囊十個一日三個乃至

五個 ●水劑

三七五 阿片越幾斯 一、〇

水 一六、〇
酒精 四、〇

三七六 右每服十滴乃至四十滴
機那煎 (八、〇)一〇、〇
赤葡萄酒 五、〇
杏仁水 四、〇
單舍利別 一〇、〇

右一日三回分服

三七七 古倫僕根煎 (一〇、〇)一二、〇

橙皮舍利別 三〇、〇
右每二時一食匙

三七八 古倫僕根 一五、〇
加斯加利刺皮 八、〇

水 三〇、〇
右浸出濾液 一八〇、〇
橙皮丁幾 八、〇

桂皮舍利別 三〇、〇
右每三時一食匙

三七九 蘇木煎 (二〇、〇)二〇、〇
阿片泊美藍丁幾 二十滴
罌粟舍利別 二〇、〇

右每三時一食匙

三七〇 沙列布煎 二〇、〇
結列阿曹篤 〇、五
白糖 一〇、〇

右一日三回每回一食匙

三七三 沃度鐵舍利別 四、〇
水 一〇〇、〇
右一日三回分服

三七三 稀鹽酸 一、〇
阿片丁幾 〇、六
橙皮舍利別 八、〇
水 一〇〇、〇

右一日三回分服

三七三 乳酸 二、〇
水 一六、〇
單舍利別 一〇〇、〇

右一日數回分服

三七四 コトイン 〇、〇五
一〇、〇八

酒精 一〇〇〇
水 一、二〇〇
單舍利別 三〇〇〇
右每一時乃至二時一食匙
肝油 一五〇〇
亞拉比亞護膜漿 一〇〇〇〇
右一日三四回分服
薄荷油 六滴
右腹部塗擦

腸出血 Enterorrhagie.

便血、下血、腸血

●散劑 〇、〇三
阿片 〇、〇五
乳糖 〇、〇五
右爲一包一日數回每回一包
●丸劑 二、〇〇
過格魯兒鐵液 一五〇〇〇
メリツサ水 二〇〇〇
橙皮舍利別 二〇〇〇
右每二時一食匙
●注射劑 各二、五
鱈鱗血、蜂蜜 右爲五十九粒每服三粒乃至五粒
鹽酸莫兒比涅 〇、〇五
水 五、〇

●水劑 二、〇〇
過格魯兒鐵液 五、〇
右每時二滴乃至五滴
●丸劑 二、〇〇
結晶硫酸鐵 二、〇〇
右甘草越幾斯適宜爲三十九粒
一日二三回每回一二粒
●水劑 二、〇〇
水製蘆薈越幾斯 二、〇〇
右爲三十九朝夕二粒
明礬 五、〇

●水劑 一、〇〇
過格魯兒鐵液 五、〇
右每時二滴乃至五滴
●水劑 一、〇〇
蒸餾水 一、〇〇
右每半時半筒注射皮下

盲腸炎、盲腸外膜炎、盲腸周圍炎 Typhlitis, Perityphlitis, Paratyphlitis.

古名腸癰、又名內癰

●水劑 一、五
右頓服

腸出血 盲腸炎、盲腸外膜炎、盲腸周圍炎 二百二十九

三七〇 蓖麻子油、偈里設林各一五、〇

薄荷油 一滴

右振盪每回一二食匙

三七六 蓖麻子油乳劑*

(三〇、〇)一〇〇、〇

薄荷舍利別 一五、〇

右每時一食匙

三七九 單阿片丁幾

二十滴

扁桃乳劑*

三七〇 阿片越幾斯 〇、五

蒸餾水、酒精 各八、〇

右一日二回每回十滴

三七一 阿片丁幾

二滴一五滴

酒石酸 一、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每二時一小兒匙

三七三 甘朮、乳糖

各〇、五

直腸炎 Proctitis.

直腸加答兒

右頓服

三七四 甘朮 一、〇

乳糖 二、五

右分五包每二時一包

三七五 阿片 〇、一

白糖 一、五

右分三包一日三回每回一包

三七六 阿片 〇、五

白糖 三、〇

右分十包每三時一包

三七七 阿片越幾斯 〇、〇三一〇、六

白糖 五、〇

右分十包每二時一包

三七八 阿片末 〇、〇五一〇、二

阿列布油 五、〇

亞拉比亞護謨末 二、五

右為乳劑一〇〇、〇

三七九 澱粉劑 五、〇

樟腦精、安息香酸丁幾各八、〇

水 一〇〇〇、〇

三七〇 右洗腸 二五、〇

亞麻仁油 一個

卵黃 一〇〇、〇

右乳劑 一〇〇、〇

硫酸那篤留謨 一〇〇、〇

右洗腸 二五〇、〇

三七五 維納緩下水 二五〇、〇

水 二五〇、〇

右灌腸 二五〇、〇

●外用劑 五、〇

三七五 水銀軟膏 一、〇

別拉敦那越幾斯 右塗擦

三七五 別拉敦那越幾斯 各四、〇

沃度加留謨 三〇、〇

巴刺賓軟膏 三十條

右為軟膏患部貼用

三七五 水蛭 三十條

右患部貼用

●散劑

三七四 甘汞 〇、三一〇、五

白糖 三、〇

三七五 右爲一包頓服、初期 二、〇

次硝酸銻鉛 〇、四

鞣酸 二、〇

三七六 右分四包一日四回每回一包 三、〇

重碳酸銻鉛 二、〇

右分六包一日三回每回一包 五〇、〇

●水劑

三七七 蓖麻子油 五〇、〇

右每回二食匙

三七八 蓖麻子油乳劑 (四〇、〇)一八〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每時一食匙

三七九 蓖麻子油乳劑 (三〇、〇)七五、〇

薄荷舍利別 三〇、〇

右每時一食匙

三七八 蓖麻子油、備里設林各一五、〇

薄荷油 一滴

右每回一二食匙

三七六 繡草丁幾、阿片丁幾 各三、〇

右一日三回每回十五滴

三七七 阿片泊美藍丁幾 一、〇

亞拉比亞護膜漿 一五〇、〇

右每二時一食匙

三七八 格魯倫僕根煎 (五、〇)一二〇、〇

阿片泊美藍丁幾 一、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙

●洗腸劑

三七九 山慈姑煎 五〇〇、〇

阿片丁幾 二、〇

右分二回洗腸

三七八 亞兒答煎 三〇〇、〇

阿片丁幾 二、〇

右分二回洗腸

三七八 阿片丁幾 一、〇

鉛糖 〇、五

蒸餾水 一〇〇、〇

右洗腸

三七七 亞拉比亞護膜漿 一〇〇、〇

阿片丁幾 一、〇

沒食子丁幾 五、〇

右洗腸料

三七八 沙列布煎 (五、〇)五〇〇、〇

阿片丁幾、單寧酸 各二、〇

右分二回洗腸

三七九 單寧酸水 (一、〇)一五〇、〇

右洗腸

三七八 單寧酸 五、〇

亞拉比亞護膜末 一〇〇〇、〇

加密列茶 五〇〇、〇

阿片丁幾 二十滴—三十滴

右洗腸

三七八 次硝酸銻鉛 五、〇

亞拉比亞護膜漿 五、〇

水 八〇、〇

右一二回洗腸

三七八 沙列布煎 一三〇、〇

次硝酸銻鉛 四、〇

右分二回洗腸

三七八 檫皮煎 (二〇、〇)二〇〇、〇

明礬 二、〇

右分二回洗腸

三七四 皓礬水 (一、〇)二五〇、〇

右洗腸

三七五 醋酸鉛 一、〇—一、五

右分五包以一包加一里坪兒

之溫水灌腸於清潔洗腸後

三七六 硝酸銀 〇、〇五—〇、二

水

右洗腸

三七七 硝酸銀 〇、二—二、〇

蒸餾水 二、〇〇、〇

右每回以半量洗腸

三七八 硫酸那篤留謨 五〇、〇

右每回一食匙溶解於水洗腸

三七九 嚼囉仿漢 二一、〇

卵黃 一個

直腸蜂窠織炎 Periproctitis

直腸脫 Prolapsus recti(ser. ani.)

脫肛、脫腸

●注射劑

三七七 硝酸ストロキニーチ

〇、〇—一〇、〇二

水

右爲乳劑灌腸

●坐藥

三七〇 阿片越幾斯

柯柯阿脂

右坐藥送入肛門

三七二 別刺敦那越幾斯

柯柯阿脂

右坐藥送入肛門

三七三 別刺敦那越幾斯

鹽酸莫爾比涅

柯柯阿脂

右壓擦爲坐藥三個一日二三

回每回一個

三七四 別刺敦那越幾斯

鹽酸古加乙涅

一〇〇、〇

膠

右偏里設林及水各適宜爲坐藥十個一日一二個

●外用劑

三七四 別刺敦那越幾斯

豚脂

右軟膏外用

三七五 嚼囉仿漢

亞鉛華

阿列布油

白蠟

右爲軟膏塗擦患部

三七六 鹽酸古加乙涅

石炭酸

水

右塗布直腸粘膜

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

蒸餾水

右每回一筒注射圍肛皮下、

小兒

三七六 流動麥角越幾斯

水、偏里設林

右一日一筒注射皮下、小兒

一〇、〇

各五〇、〇

三七九 麥角越幾斯 一、〇

蒸餾水、備里設林 各六、〇

右一日一回一箇注射皮下

●水劑

三七九 蕃木鼈丁幾 一〇、〇

苦味丁幾 二〇、〇

右一日三回每回十五滴

三七九 蕃木鼈越幾斯 〇、〇五

水 七〇、〇

橙皮舍利別 一〇、〇

右一日一茶匙、小兒

三七九 酒製蕃木鼈越幾斯

〇、〇一〇、〇五

蒸餾水 二〇〇、〇

單舍利別 八、〇

右一日三回分服

三七九 機那丁幾 三、〇

蕃木鼈丁幾 一、〇

肛門皸裂 Fissura ani

三六〇 棒硝酸銀

右腐蝕患部

三六〇 十倍硝酸銀水 一〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右一日三回分服

三七九 機那煎 (六、〇) 一〇〇、〇

蕃木鼈丁幾 一、〇

單舍利別 二〇、〇

右一日三回分服

三七九 ラタニヤ丁幾 二十滴

阿片丁幾 一滴—二滴

水 七〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

三七九 維納緩下水 三〇、〇—五〇、〇

黑櫻實水 三〇、〇—五〇、〇

覆盆子舍利別 三〇、〇—五〇、〇

右每二時一食匙、小兒

●散劑

三七九 蕃木鼈越幾斯 〇、〇三

加糖炭酸鐵 一、〇

白糖 三、〇

右分十包每日一包、小兒

三七九 大黃末、炭酸麻偏涅聖藥 各一、〇

乳糖 右一日三回每回一小刀尖、

小兒

三七九 グアラナ茶 * 〇、二五

乳糖 右分十包一日三回每回一包

小兒 〇、二五

三七九 麥角越幾斯 五、〇

柯柯阿脂 二、〇

右爲肛門坐藥一日一個、小

兒

右爲軟膏塗布患部

三六〇 沃度仿謨 適宜

右每二日一回散布患部貼蓋

含備里設林之布片

元〇五 阿片越幾斯

豚脂

一、〇
一〇、〇

元〇六 別刺敦那越幾斯

鉛糖

三、〇
五、〇

右為軟膏塗布患部

豚脂

右為軟膏塗布患部

三、〇

痔疾 Haemorrhoides

盲痔、痔核、結核痔、又名腸痔、古名酒痔、痔瘡

處置 通利、復位、消炎、禁酒、冰器法、坐藥、直腸內溫湯注入等

●塗布劑

元〇七 單寧酸

備里設林

五、〇
二〇、〇

刺乃林、華設林

右為軟膏塗布

各七、五
〇、二五

元〇八 單寧酸

右二日間塗布

一、〇
二、〇

元〇八 單寧酸

備里設林軟膏

〇、七一、〇
二〇、〇

次硝酸蒼鉛、華設林各二五、〇

備里設林

八、〇

元〇七 グリサロピン

右為軟膏塗布

二、〇

單軟膏

二五、〇

元〇九 阿片越幾斯

刺乃林

〇、二
一六、〇

元〇三 鹽酸古加乙涅

刺乃林、華設林

〇、三一〇、五
各五〇、〇

元〇八 苦利沙羅並

沃度仿謨

〇、八
〇、三

華設林

右為軟膏、塗布

四、〇

元〇四 鹽酸古加乙涅

刺乃林

〇、五
一八、〇

華設林

〇、六
二五、〇

沒藥

安息香脂

二、〇
四、〇

阿列布油

二、〇

元〇九 石炭酸

華設林

一、〇
二〇、〇

元〇二 鹽酸莫兒比涅

右為軟膏塗布

二六、〇
〇、五

元〇五 沃度仿謨

單軟膏

二〇、〇

右為軟膏塗布

三〇 刺乃林 一〇、〇

安息香脂 二〇、〇

薔薇水 三〇、〇

三二 右為軟膏塗布 〇、二

流動ハママリス越幾斯 一〇、〇

柯柯阿脂 七、〇

扁桃油 右為軟膏塗布 〇、〇

●坐藥 〇、〇五

三三 阿片末 適宜

柯柯阿脂 右為坐藥一個 〇、一五

三三 阿片越幾斯 一〇、〇

柯柯阿脂 右為坐藥五個一日二個 〇、六

三四 阿片末 各二、〇

醋酸鉛、安息香酸 〇、五

白蠟 四、〇

柯柯阿脂 右為坐藥十個朝夕一個 〇、〇三

三五 醋酸莫兒比涅 〇、〇三

右柯柯阿脂適宜為坐藥十個 〇、〇三

三六 鹽酸莫兒比涅 〇、〇三

柯柯阿脂 右為坐藥三個一日一個 六、〇

三七 鹽酸莫兒比涅 〇、三

柯柯阿脂 右為坐藥十二個每回插入一 〇、二

二個 〇、〇三

三六 別拉敦那越幾斯 六、〇

柯柯阿脂 右為坐藥三個一日一個 〇、五

三六 別拉敦那越幾斯 〇、五

三六 鹽酸古加乙涅 一〇、〇

膠 右以僱里設林為坐藥十個 〇、〇一

日一二個 〇、〇〇一

三七 硫酸アトルヒチ 二、〇

柯柯阿脂 右為坐藥一個 一、〇

三三 單寧酸 右柯柯阿脂適宜為坐藥二個 各一〇、〇

單寧酸、明礬 適宜

三三 單寧酸、明礬 各一〇、〇

柯柯阿脂 右為坐藥十個 〇、一

三三 硝酸銀 〇、一

柯柯阿脂 右為坐藥十個 一〇、〇

三六 硝酸銀 〇、一

別刺敦那越幾斯 〇、三

柯柯阿脂 右為坐藥十個 一〇、〇

三三 麥角越幾斯 〇、二五

柯柯阿脂 右為坐藥 〇、五

三五 麥角越幾斯 〇、五

柯柯阿脂 僱里設林 八、〇

三五 麥角越幾斯 適宜

三三 僱里設林 適宜

ゲラチン 右為坐藥三個一日一個 二、〇

三三 沃度仿誤 二、〇

柯柯阿脂 右為坐藥十個 二、〇

三三 沃度仿誤 二、〇

百露拔兒撒誤 四、〇

燬製麻僱涅矢亞 一、〇

白蠟 〇、三

柯柯阿脂 右為坐藥十個 〇、一

三三 イヒチオール 〇、一

柯柯阿脂 右為坐藥十個 〇、一

三三 イヒチオール 〇、一

柯柯阿脂 右為坐藥十個 〇、一

三三 イヒチオール 〇、一

柯柯阿脂 右為坐藥十個 〇、一

三三 イヒチオール 〇、一

答滿林度 九〇、〇

右爲煉藥一日二三回每回一茶匙

三六三 孕礪酒石 一五、〇—一三〇、〇

水 四五〇、〇

單舍利別 五〇、〇

右午前四回分服

三六三 精製硫黃、純酒石 各一五、〇

枸橈油糖、白糖 各一〇、〇

右每晚一茶匙

三六三 精製硫黃、純酒石 各一五、〇

泥葛根末、生姜末 各五、〇

右每夕一茶匙

三六三 沈降硫黃、煨製苦土

純酒石 各一五、〇

尚香油糖 二〇、〇

右一日三回每回一茶匙

腸管疊嵌 Intussusception, Volvulus, Ileus, Invagination.

腸管重疊、腸狹窄、腸閉塞、吐糞、腸嵌頓、又名口中轉屎、舊譯作腹腸類套、又名腸摺疊

三六四 阿片丁幾

水、單舍利別 各一五、〇

三六六 精製硫黃 二〇、〇

重酒石酸加留謨 一〇、〇

生姜舍利別、榕皮舍利別 各一五、〇

右爲砥劑每回一茶匙

三六七 硫黃華 二〇、〇

蝦性麻僱涅叟謨 二〇、〇

白糖、尚香油糖 各一〇、〇

右一日二回每回一茶匙調和牛乳服用

三六八 蒲公英根煎 (三〇、〇)六〇〇、〇

右朝夕六〇、〇乃至一二〇、〇

三六九 蒲公英根煎 (二〇、〇)三〇〇、〇

重酒石酸加留謨 五、〇

右朝夕二回分服

●水劑 三六五 重碳酸那篤留謨 一〇、〇

大黃末 五、〇

尚香油糖 三〇、〇

右朝夕一茶匙

三六七 流動ヒドスチス越幾斯 一五、〇

右一日三回每回二十滴

三六七 流動ハマメリス越幾斯 二〇、〇

右每回一二茶匙

三六七 流動加斯加里刺越幾斯 二〇、〇

右一日二三回每回四分一乃至一茶匙

●水劑

二十滴

三六五 抱水格魯刺兒 一、〇—一三、〇

水 六〇、〇

右頓服

貌魯謨加留謨 三、〇—六、〇

單舍利別 二〇、〇

右每時一茶匙、小兒

●散劑

㊦ 阿片 〇、五

乳糖 五、〇

右分十包一日數回每回一包

㊦ 阿片越幾斯 〇、三

白糖 二、〇

右分十包每二時一包、吐糞

嵌頓腸脫 *Hernia incarcerata.*

㊦ 咖啡涅 〇、三

白糖 一、五

右分五包每半時間一包

㊦ 抱水格魯刺爾 三、〇

亞拉比亞護膜漿、單舍

腸瘤及腸膜瘤 *Carcinoma intestinale et Peritoneum.*

●浣腸劑

㊦ 抱水格魯刺爾 〇、三一〇、五

水 五〇、〇

右浣腸、小兒

㊦ 硫酸麻偏涅叟護 一五〇、〇

水 五〇〇、〇

右溶於二〇〇〇、〇立方仙

各二五、〇

右每回半食匙乃至一食匙

㊦ 蕃木籃越幾斯 〇、二

羯答利斯丁幾 六、〇

右一日三回每回十滴乃至十

米之水浣腸、吐糞

㊦ 麥角越幾斯 二、〇

酒精、偏里設林 各六、〇

右每三日一筒注射皮下、直

腸疊嵌

㊦ 純水銀一〇〇、〇一三〇〇、〇

右嚥下最後之療法

五滴

㊦ 鹽酸莫兒比涅水

(〇、一)一〇、〇

右一筒注射皮下

㊦ 別拉敦那越幾斯 〇、〇三

柯柯阿脂 二、〇

右為坐藥送入直腸

●水丸劑

㊦ 鹽酸莫兒比涅 〇、一

杏仁水 一〇、〇

右一日三回每回十二滴

㊦ 複方大黃越幾斯 三、〇

古魯聖篤越幾斯 〇、五

右為三十九夜間一粒乃至三

粒

㊦ 別拉敦那越幾斯 〇、三

ボトヒルリン 一、〇

蘆苻越幾斯 三、〇

㊦ 鹽酸莫兒比涅 〇、〇一

柯柯阿脂 二、〇

右為坐藥送入直腸

㊦ 阿片越幾斯 〇、〇三

柯柯阿脂 二、〇

右坐藥送入直腸

右爲三十九夜間二粒

大腸炎 (Enteritis acuta et chronica). Enteritis follicularis.

大腸加答兒、瀉囊性腸炎等

| | | |
|---|--|---|
| <p>●水劑</p> <p>三九二 硝酸銀 〇、〇五</p> <p>蒸餾水 五〇、〇</p> <p>偏里設林 一〇、〇</p> <p>右每二時一茶匙、小兒</p> <p>三九三 硝酸銀 〇、〇五</p> <p>蒸餾水 一二〇、〇</p> <p>右每二時一茶匙、半歲小兒</p> <p>三九四 過格魯兒鐵液 五、〇</p> <p>右一日二三回每回三滴乃至五滴、小兒</p> <p>三九五 醋酸礬土水 三〇、〇</p> <p>水 五〇、〇</p> <p>單舍利別 二〇、〇</p> <p>右每二時一茶匙、小兒</p> <p>三九六 阿片丁幾 三滴—五滴</p> <p>水 一〇〇、〇</p> <p>亞兒答舍利別 二〇、〇</p> <p>右每二時一小兒匙、小兒</p> | <p>三九七 亞拉比亞護膜漿 一〇〇、〇</p> <p>阿片丁幾 三滴</p> <p>右每二時一茶匙、小兒</p> <p>三九八 單寧酸規尼涅 一、〇—一、五</p> <p>阿片丁幾 一滴—二滴</p> <p>水 四〇、〇</p> <p>覆盆子舍利別 四〇、〇</p> <p>右每二時一茶匙、小兒</p> <p>三九九 次硝酸蒼鉛 一、五</p> <p>水 七〇、〇</p> <p>阿片丁幾 二滴—四滴</p> <p>單舍利別 一〇、〇</p> <p>右每二時一茶匙、小兒</p> <p>三九〇 單寧酸 〇、二—〇、五</p> <p>水 九〇、〇</p> <p>トカヤ酒 一五、〇</p> <p>偏里設林 一〇、〇</p> <p>阿片丁幾 二滴—五滴</p> <p>右每三時一小兒匙、小兒</p> | <p>三九一 蘇木越幾斯 一、〇</p> <p>赤葡萄酒 六〇、〇</p> <p>右每二時一茶匙、小兒</p> <p>●散劑</p> <p>三九二 阿片越幾斯 〇、〇五</p> <p>白糖 一、〇</p> <p>右分五包一日三回每回一包</p> <p>三九三 單寧酸規尼涅 〇、一—〇、二五</p> <p>小兒 一、〇</p> <p>白糖 一、〇</p> <p>右分五包一日三回每回一包</p> <p>三九四 單寧酸規尼涅 〇、〇三</p> <p>阿片越幾斯 〇、〇三</p> <p>白糖 三、〇</p> <p>右分十包每二時一包、小兒</p> <p>三九五 單寧酸規尼涅 〇、四—一、〇</p> <p>挖勿兒氏散 〇、七—一、〇</p> <p>白糖 二、〇</p> |
|---|--|---|

三九六 單寧酸規尼涅
右分十包每二時一包、小兒
一、〇

托沕兒氏散

白糖

右分十包一日四回每回一包

小兒

三九七 次硝酸蒼鉛

白糖

右爲一包一日三四回每回一包、小兒

三九八 次硝酸蒼鉛

阿片越幾斯

蕃木盤越幾斯

重碳酸那篤留謨

白糖

右分十包一日三包、小兒

三九九 大黃末、碳酸麻佃涅矢亞

白糖

右分三包每二時一包、小兒

四〇〇 グアラナ茶、乳糖

右分六包一日三回每回一包

小兒

● 淀粉劑

三〇一 單寧酸水
(一〇、〇一、二〇、〇)一〇〇〇、〇

右灌腸

三〇二 單寧酸水
(一、〇)一〇〇、〇

右分三回注腸、六個月小兒

三〇三 單寧酸

水

阿片丁幾
右分二回注腸
三滴—四滴

三〇四 硝酸銀水

右分四回洗腸、小兒

三〇五 結晶硝酸銀

沙列布煎*
右分二回洗腸

三〇六 石灰水

水
右灌腸
四〇〇、〇
六〇〇、〇

三〇七 石炭酸水

右分三回洗腸、小兒

三〇八 硼酸水

(一〇、〇一、二〇、〇)一〇〇〇、〇

右灌腸

三〇九 格魯兒酸加里水

右灌腸

三〇九 撒里矢爾酸水
(四、〇)三〇〇、〇

右分三回洗腸、小兒

三一〇 レゾルチン水

右分三回洗腸、小兒

三一〇 レゾルチン水

右灌腸
(〇、五)一〇〇〇、〇

三一〇 レゾルチン水

右灌腸

三一〇 レゾルチン水

右分三回洗腸、小兒

三一〇 醋酸鉛水

右分三回乃至四回洗腸、二歲兒

三一〇 明礬水

(一、〇一、二〇)二〇〇〇、〇

三一〇 醋酸礬土水

右分三回注腸、小兒

三一〇 沙列布煎

右分三回洗腸、小兒

三一〇 沙列布煎

右分二回洗腸、小兒

三一〇 沙列布煎*

二五〇、〇

阿片丁幾

五滴

右分二回浣腸、小兒

三五六 撒里矢爾酸

一二、〇

重碳酸那篤留謨

一〇、〇

右分四包每回一包溶於水一〇〇〇、〇浣腸、小兒

三五九 撒里矢爾酸那篤留謨 二〇、〇

水 一〇〇〇、〇

右灌腸

三六〇 安息香酸那篤留謨 三〇、〇

水 一〇〇〇、〇
右浣腸

三六三 別拉敦那越幾斯 〇、〇一〇、〇三

柯柯阿脂 二、〇

右為坐藥插入肛門一歲至三歲小兒

〇〇〇、〇浣腸、小兒

十一指腸蟲

Anchylostomum duodenale.

●綿馬劑

三六三 綿馬越幾斯一〇、〇一五、〇

右入膠囊二日間分服、服了後投與甘汞

三六四 綿馬越幾斯、蓖麻子油 各二〇、〇

右頓服

三六五 綿馬越幾斯 八、〇

甘汞 〇、八

右入膠囊十六個每十分時二個

三六六 綿馬越幾斯 八、〇一〇、〇

旃那舍利別 三〇、〇

右隔三十分二日分服

三六六 綿馬根、支奈花、繡草根 各二、〇

藥刺巴根 〇、七五

單舍利別 二〇、〇

右為煉藥一日三回每回一茶匙

●知母爾劑

三六七 知母爾 三、〇

右包於オブラート頓服

三六八 知母爾 六、〇

右入膠囊一日三回分服

三六九 知母爾 二、〇

右分入膠囊三個一日三回每回一個

三七〇 知母爾 八、〇

右分十二包每十五分一包、其後投與蓖麻子油一食匙

三七二 知母爾、ナフタリン 各〇、五一一、〇

右入膠囊服用

三七三 知母爾 一、〇一二、〇

ナフタリン 〇、五一一、〇

右入膠囊隔一時間分服

三七四 珊篤寧、甘汞 各一、〇

右分三包一日一包

三七五 蓖麻子油 二〇、〇

薄荷油 十滴

右頓服

薄荷油

右頓服

蛔蟲 *Ascaris lumbricoides.*

舊譯作圓蟲、古名蛭蟲、又名食蟲、又名長蟲、案神農本草所稱之三蟲、即指蛭蟲、寸白蟲、蟯蟲而言、至隋巢氏病源始論九蟲、其說乃泛濫而不可靠

● 珊篤寧劑

三九四 珊篤寧 ○、〇六一〇、二五

茴香油糖 一、五

右分三包一日三回分服

三九五 珊篤寧 ○、一

甘汞 一、〇

乳糖 一、五

右分六包一日二回每回一包

三九七 珊篤寧 ○、二一〇、五

甘汞 ○、三一〇

乳糖 四、〇

右分五包一日二回每回半包

三九八 珊篤寧 ○、五

大黃末、白糖 各五、〇

右分十包一日三回每回一包

三九〇 珊篤寧 ○、〇〇三

甘末 ○、〇〇二

大黃末 ○、〇〇二

白糖 ○、〇〇三

右分十包一日三回每回一包

三九五 珊篤寧 小兒

蓖麻子油 二〇、〇一六〇、〇

右一日二回每回一食匙

三九五 支奈花末 四、〇

藥刺巴根末 〇、二

右分六包每朝一包

三九五 支奈花末 三、〇

甘汞 〇、〇三

白糖 二、〇

右分三包一日三回每回一食匙

三九五 支奈花越幾斯 一、五

支奈花末 三、〇

右為三十九大人每回十粒小兒每回五粒

三九五 支奈花末 一、〇〇

甘末 五、〇

右白蘇越幾斯適宜為七十五丸小兒服二粒大人服十粒每回景

三九五 支奈花末 五、〇

藥刺巴根末 〇、五

單舍利別 二、〇

右為煉劑三回分服 一、〇

三九五 支奈花末 一、〇

藥刺巴根末 一、五

蜂蜜 二、〇

右為煉劑一日三回分服 五、〇

三九五 支奈花末 一、〇

藥刺巴 一、〇

蜂蜜 二、五

右為煉劑一日三回分服 一、〇

三九五 支奈花末 一、〇

旃那砥劑、蜂蜜 各五、〇

右為煉劑每日早朝一茶匙

三九五 支奈花末、綿馬根末

繡草根末 各二、〇
藥刺巴根末 〇、七五
單舍利別 二二〇、〇

右爲煉劑一日三回每回一茶匙

三九六 支奈花浸(一五、〇)一〇〇、〇

右每夕浣腸

三九六 支奈花浸 (六、〇)九〇、〇

橙皮舍利別 一〇、〇

右每二時一食匙

三九六 支奈花末 一〇、〇

旃那葉 五、〇

蟻蟲 *Oxyuris vermicularis.*

舊譯作線蟲、又名寸白蟲、古時亦名蟻蟲、出史記倉公傳、又有短蟲穀道蟲大孔蟲等名、若在婦人陰道中、則謂之陰痒蟲

右沸騰 適宜
浸出濾過液 一〇〇、〇
滿那 一〇、〇
右半時一小兒匙、小兒

●浣腸劑

三九三 的列並油 三〇、〇

山慈姑煎 四五〇、〇

右灌腸 五、〇—一五、〇

三九四 的列並油 一個

卵黃 二〇〇、〇

右爲乳劑、浣腸

三九五 硫酸規尼涅 〇、五
稀硫酸 適宜

水 一〇〇、〇

右浣腸 八、〇

三九六 石灰水 一〇〇、〇

水 一〇〇、〇

右浣腸 〇、〇—

三九七 昇汞 一〇〇、〇

蒸餾水 〇、〇—

右浣腸

●浣腸劑

三九六 鹽酸規尼涅 一、〇

水 一〇〇、〇

右分二回浣腸

三九六 硫酸規尼涅 〇、八

水 二〇〇、〇

右浣腸

三九七 珊瑚尼寧 〇、〇五—〇、一五

阿列布油 五〇、〇

右灌腸 〇、一五

三九七 珊瑚寧 五〇、〇

罌粟油 五〇、〇

右浣腸 八、〇

三九七 ベンチン

溫湯 一〇〇〇、〇

右浣腸 一、二

三九七 ベンチン 一個

卵黃 一〇〇、〇

水 一〇〇、〇

右爲乳劑二回浣腸

三九七 ナフタリン水

三九七 右浣腸 (五、〇)二〇〇、〇
ナフタリン 一、〇一五、〇
水 一〇〇〇、〇

亞爾答根煎 五〇〇、〇
右灌腸

三九七 撒里矢爾酸 一、〇
水 二〇〇、〇

三九七 右浣腸 右浣腸 (〇、〇)一五〇、〇
昇汞水

三九七 昇汞 〇、〇、一
水 一〇〇〇、〇

三九七 右浣腸或洗滌腔內 〇、〇、一
昇汞 一〇〇〇、〇

三九七 右分二回浣腸 一〇〇〇、〇
水

三九〇 石灰水 二四〇、〇
過格魯兒化鐵液 二十滴

三九一 藥用石鹼 二、〇一五、〇
右朝夕分二回浣腸

三九一 溫湯 一〇〇〇、〇
右浣腸

三九二 偏里設林 一、六
水 二〇〇、〇

三九三 右浣腸 右浣腸 十滴—二十滴
依的兒 一〇〇、〇

三九四 右浣腸 右浣腸 五、〇
的列並油 一〇〇、〇

三九五 右浣腸 右浣腸 一五、〇—三〇、〇
肝油

三九六 肝油 五〇、〇
卵黃 一個

三九七 右分二回浣腸 一、二〇、〇
醋水 (一〇〇〇、〇)三〇〇、〇

三九八 右灌腸 右灌腸 (二、〇)一五〇、〇
繡草浸 一〇、〇

三九八 阿魏 一〇、〇
右浣腸

三九九 大蒜根 一〇〇、〇
右加水搗碎灌腸

●內服劑

三九〇 精製硫黃花 八、〇
白糖 八、〇

三九一 右一日三回每回一茶匙 右一日三回每回一茶匙
旃那葉浸 (五、〇)一八、〇)一〇〇、〇

三九二 單舍利別 一、二、〇
右一日數回分服、小兒

三九三 硫酸麻偏涅叟謨 二〇、〇
右早朝服用半量

三九四 水素還元鐵、白糖 各二五、〇
右一日三回每回一小刀尖

三九五 珊瑚寧 〇、五
蓖麻子油 二〇、〇

三九六 覆盆子舍利別 五〇、〇
噶囉仿謨 一、〇

三九五 右振盪每夕一二食匙 (小兒 一二茶匙)

三九五 水銀軟膏 一、〇
常用石鹼末 三、〇

三九六 右混和爲坐藥十個 六、〇—一、〇
水銀軟膏 右插入直腸內

三九七 右插入直腸內 六、〇—一、〇

絛蟲 Taenia Botrioccephalus.

分無鈎有鈎及廣節裂頭三種、無鈎絛蟲、舊譯作三管絛蟲、又名牛肉絛蟲、又名扁蟲、古名寸白蟲、其蟲寸寸有節色白、故名寸白蟲、有鈎絛蟲、舊譯作瘡蟲、又作猪肉絛蟲、此外之異名全上、廣節裂頭絛蟲、異名亦全上

●噶囉仿謨劑

三九七 噶囉仿謨 三、〇

偏里設林 三〇、〇

巴豆油 一滴

右隔三十分時二回分服

三九六 噶囉仿謨 四、〇

單舍利別 三六、〇

右二時間三回分服、但經一

時間與蓖麻子油

三九九 噶囉仿謨 四、〇

綿馬越幾斯 四、〇

蓖麻子油 一五、〇

右爲乳劑一〇〇、〇 右斷食

二十四時間後空腹頓服

四〇〇 柘榴根皮劑

柘榴根皮 一〇、〇—四〇、〇

右爲煎劑投與、小兒

四〇一 柘榴根皮煎

生姜舍利別 三〇、〇

右於半時間內二回分服

四〇二 柘榴根皮煎 (五〇、〇)二〇〇、〇

生姜舍利別 三〇、〇

右於早朝一時間半內三回分服

四〇三 柘榴根皮煎 (五〇、〇)二〇〇、〇

滿那 二〇、〇

右早朝食前三回分服

四〇四 柘榴根皮煎 (五〇、〇)二〇〇、〇

綿馬越幾斯 四〇、〇—八〇、〇

右早朝食前三回分服

四〇五 柘榴根皮煎 (二〇、〇)一八〇、〇

綿馬越幾斯 二〇、〇

右分三回每半時間服了、小兒

四〇六 柘榴根皮 五〇、〇

水 一〇〇〇、〇

浸蘸十二時乃至二十四時間更煎煮爲半量

右四分之一量一時間內服用少時之後頓服蓖麻子油二五、〇 (此藥方頗確實且防嘔吐有加綿馬越幾斯一、〇 生姜舍利別三〇、〇者)

四〇七 柘榴根皮 六〇、〇—九〇、〇

水 四〇〇、〇

右二十四時間浸出 二一〇〇、〇

綿馬越幾斯 二、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右分三回每半時間服了、小兒

四〇八 柘榴根皮 五〇、〇

水 一〇〇〇、〇

浸蘸十二時乃至二十四時間更煎煮爲半量

右四分之一量一時間內服用少時之後頓服蓖麻子油二五、〇 (此藥方頗確實且防嘔吐有加綿馬越幾斯一、〇 生姜舍利別三〇、〇者)

四〇九 柘榴根皮 六〇、〇—九〇、〇

水 四〇〇、〇

右二十四時間浸出 二一〇〇、〇

綿馬越幾斯 二、〇

水 二、〇

右二十四時間浸出 二一〇〇、〇

綿馬越幾斯 二、〇

水 二、〇

右二十四時間浸出 二一〇〇、〇

綿馬越幾斯 二、〇

水 二、〇

右二十四時間浸出 二一〇〇、〇

綿馬越幾斯 二、〇

水 二、〇

四〇八

右爲三分早晨每半時一分但前夜宜投蓖麻子油或那旋浸

沸湯

右取浸出二十四時間濾過四〇〇、〇

亞爾個保兒

三〇〇、〇

〇〇、〇 之液加蓖麻子油三〇〇、〇

〇、〇 亞拉比亞護謨一五、〇

右一時間內二回分服（ハ一

ゲル氏）

四〇九 右取浸出二十四時間濾過四〇〇、〇

蓖麻子油

亞拉比亞護謨

薄荷水

右二回分服、小兒

四一〇 右取浸出二十四時間濾過四〇〇、〇

薄荷舍利別

蜂蜜

右分三回服了、小兒

四一一 右取浸出二十四時間濾過四〇〇、〇

新鮮柘榴根皮越幾斯

綿馬越幾斯

右柘榴根皮末適宜爲四十九先以十粒和一碗之溫牛乳服

四一三

之半時之後再服十粒更半時之後服二十粒、小兒

單寧酸

水

右半時間內二回分服、小兒

四一四 右取浸出二十四時間濾過四〇〇、〇

鞣酸ペルレチエリン

白糖

右分二包半時間服完

四一五 右取浸出二十四時間濾過四〇〇、〇

綿馬根

右分四包每十五分時一包但經一時間必服甘朮或藥刺巴

四一六 右取浸出二十四時間濾過四〇〇、〇

綿馬越幾斯

右爲丸頓服

四一七 右取浸出二十四時間濾過四〇〇、〇

綿馬越幾斯

右入膠囊隔十五分五回分服

四一八 右取浸出二十四時間濾過四〇〇、〇

綿馬越幾斯

右入膠囊隔十五分五回分服

四一九

右入膠囊隔三十分時二回分服

甘朮

右入膠囊十六個每五分時一個

四二〇 右取浸出二十四時間濾過四〇〇、〇

綿馬越幾斯

蓖麻子油

右頓服

四二一 右取浸出二十四時間濾過四〇〇、〇

綿馬越幾斯

加麻刺

右入膠囊十五個隔十五分時分服

四二二 右取浸出二十四時間濾過四〇〇、〇

綿馬越幾斯、綿馬根末各四、五回分服

四二三 右取浸出二十四時間濾過四〇〇、〇

綿馬越幾斯

依的兒製柘榴根皮越幾斯

藥刺巴根末

右爲七十九前夜十五粒乃至二十粒翌朝頓服殘餘

四〇四 綿馬越幾斯 一、五二、〇

甘朮 〇、〇、四

橙皮舍利別 三〇、〇

右早朝頓服、但前日兼牛乳

食行洗腸、六歲小兒

四〇五 綿馬越幾斯 四、〇

護謨舍利別 二〇、〇

右每十五分時一小兒匙、服

後投與甘朮、八歲小兒

四〇六 ●苦蘇花劑 二、〇一、〇、〇

旃那砥劑、蜂蜜 各五、〇

右早朝空腹時二回分服、五

四〇七 苦蘇花 二〇、〇

蓖麻子油 二〇、〇

篤拉侃篤護謨 適宜

右為二十錠每半時四回分服

四〇八 苦蘇花 一〇、〇一、二〇、〇

右蜂蜜適宜調和為砥劑一時

間內二回分服、小兒

四〇九 苦蘇花 二、〇一、〇、〇

綿馬越幾斯 二、〇

蜂蜜 適宜

右為煉藥入膠囊每時三回分

服、大兒 一五、〇

四〇〇 苦蘇花 五、〇

綿馬越幾斯

右蜂蜜適宜為煉藥一時間內

三回分服 一〇、〇

四〇一 苦蘇花 五、〇

綿馬越幾斯

右水適宜或蜂蜜適宜為百五

十九每時十粒 二〇、〇

四〇二 苦蘇花末 二〇、〇

右入膠囊二十個早晨十個後

更十個服用 一六、〇

四〇三 苦蘇花末 三二、〇

白糖

右為丸頓服經一二時與以蓖

麻子油二食匙 二、〇

四〇四 クツン 二、〇

右分四包每十五分時一包

四〇五 苦蘇花浸(一五、〇)二四〇、〇

右早晨隔半時間分服

四〇六 苦蘇花浸(二〇、〇)二八〇、〇

枸櫞汁 二、〇

右早晨頓服

四〇七 苦蘇花浸(一五、〇)一二〇、〇

苦蘇花末 二五、〇

加馬拉 一〇、〇

右早晨二回分服後經二時間

下緘蟲頭則與蓖麻子油二食

匙 ●加麻刺劑 一〇、〇

四〇八 加麻刺 一〇、〇

右水適宜為砥劑二回分服

四〇九 加麻拉 一、五一三、〇

薔薇蜜 二〇、〇一、二五、〇

右每回一茶匙、小兒

四〇〇 加麻拉末 四、〇

綿馬越幾斯 二、〇

薄荷水 二〇、〇

右每半時三回分服、小兒

四〇一 加麻拉了幾 二、〇一、四、〇

橙皮舍利別 五、〇

亞拉比亞護謨漿 五、〇

右頓服但須追服蓖麻子油一

四〇四二 二茶匙、小兒 一滴

巴豆油 三、〇
嘔囉仿謨 二〇、〇
儼里設林 右一日二食匙、五日間連用 八、〇

四〇四三 チモール 右分十二包每十五分時一包 但前夜及本劑服了後須與麗 麻子油一食匙 二、〇

四〇四四 チモール 二、〇

旋毛蟲病、トリモ一子病 Trichinosis.

舊譯作似髮蟲、一名米心蟲、又名卷髮蟲

四〇五一 甘末、藥刺巴 各〇、五

右頓服 二〇、〇

四〇五二 麗麻子油 一五、〇

右頓服 四、〇

四〇五三 儼里設林 右頓服 一五、〇

右頓服 四、〇

四〇五四 ベンチン 右入膠囊一日間服了 六、〇

ベンチン 六、〇

四〇五五 亞拉比亞護謨漿

ナフタリン 一、〇
右早晨頓服一時間之後與麗

麻子油 五、〇—二〇、〇

四〇四五 的列並油 右甘草末及蜂蜜適宜為煉藥 二回分服

四〇四六 的列並油 一〇、〇—二〇、〇 右蜂蜜適宜為煉藥二回分服

四〇四七 加爾爾斯泉鹽 一五、〇 右頓服

單舍利別 各二五、〇
薄荷水 一〇〇、〇
右每二時一食匙

Trichinosis.

抱水格魯刺爾 二、〇

亞拉比亞護謨漿 各一五、〇

單舍利別 右二回分服 〇、一—〇、三

四〇五七 ビクリン酸 〇、一—〇、三 右龍膽越幾斯適宜為丸頓服

四〇五八 ビクリン酸 二、〇 加留謨

四〇四八 複方旃那浸 三〇、〇 右頓服

四〇四九 南瓜實 一〇〇、〇—二〇〇、〇 右和砂糖擦潰一日中服了、 小兒

四〇五〇 乳酸ストロンノム 二〇、〇 小兒

儼里設林 二五、〇

水 一〇〇、〇 右朝夕一食匙

藥刺巴根末 四、〇 右甘草煮適宜為三十九一日 三回每回五粒

四〇五九 撒里矢爾酸那篤留謨 二、〇—四、〇 水 八〇、〇 阿片丁幾 三滴 單舍利別 二〇、〇 右每二時一茶匙、小兒

四〇六〇 五十倍鹽酸莫兒比涅水

貌魯謨加留謨 三、〇一五、〇

單舍利別 二〇〇、〇

水 六〇〇、〇

右每二時乃至三時一茶匙、

小兒

四〇七五 實艾答利斯 一、〇一二、〇

海葱根 一、〇

右浸出 一五〇、〇

醋酸加留謨液 *

杜松實精 各二五、〇

右每二時一食匙、水腫

四〇七六 機那煎 (五、〇)七〇、〇

醋酸加留謨 二〇、〇

橙皮舍利別 一〇〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

四〇七七 機那煎 (五、〇)七〇、〇

依的兒性鐵丁幾 二十滴

橙皮舍利別 一〇〇、〇

右每二時一食匙、小兒

四〇七八 機那煎 (八、〇)一五、〇(二〇〇、〇)

沃度加留謨 二〇、〇

或純酒石 二〇、〇一三〇、〇

單舍利別 一五、〇

右一日三回乃至六回二日分

服

四〇七九 機那煎 (八、〇)一〇〇、〇

沃度加留謨 一、〇

單舍利別 八、〇

右一日三回分服

四〇八〇 沃度加留謨 二〇、〇

水 二〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

四〇八一 沃度化加留謨 二〇、〇

水 一八〇、〇

單舍利別 一五、〇

醋酸加留謨 六、〇

右每二時一食匙

四〇八二 沃度加留謨 二〇、〇

林檢酸鐵丁幾 六、〇

苦味丁幾 三、〇

單舍利別 一五、〇

水 二〇、〇

右每食後二日分服、結核性

橙皮舍利別 一〇〇、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

四〇八四 重碳酸那篤留謨水 (二、〇)二〇〇、〇

右數回分服、嘔吐

四〇八五 稀鹽酸 二〇、〇

百布聖 一〇〇、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 八、〇

右一日三回分服

四〇八六 甘扁桃油 三〇、〇

結脆阿曹篤 二〇、〇

右一日三回分服、結核性

四〇八七 蓖麻子油 一五、〇

右頓服

●散劑

四〇八八 甘水 〇、三

白糖 〇、五

右頓服

四〇八九 甘末 〇、五

乳糖 〇、五

右頓服

右頓服

| | | | | | | |
|------|--------------|---------|--------------|---------|------------------|--------|
| 四〇九〇 | 甘末 | 一、〇 | 格倫僕末 | 〇、五 | 白糖 | 二、〇 |
| | 乳糖 | 一、五 | 右分三包一日三回分服 | 〇、五 | 右分十包朝夕一包、小兒 | 一〇、〇 |
| 四〇九一 | 阿片 | 〇、三 | 四〇九七 阿片越幾斯 | 〇、五 | 四〇九四 石灰水 | 一〇、〇 |
| | 乳糖 | 一、五 | 白糖 | 五、〇 | 尚香油糖 | 一〇、〇 |
| | 右分六包一日六回分服 | | 右分十包每二時一包 | | 右一日三回每回一小刀尖 | 一〇、〇 |
| 四〇九二 | 阿片 | 〇、三 | 四〇九八 阿片越幾斯 | 〇、〇六 | 四〇九五 蝦性麻僱涅叟謨 | 一〇、〇 |
| | 白糖 | 五、〇 | 白糖 | 二、〇 | 尚香油糖 | 一〇、〇 |
| | 右分十包每二時一包 | | 右分十包一日三回每回一包 | | 右一日三回每回一小刀尖 | |
| 四〇九三 | 阿片 | 〇、一 | 四〇九九 阿片越幾斯 | 〇、一二 | ●丸劑 | |
| | 白糖 | 五、〇 | 白糖 | 二、〇 | 鹽酸規尼涅 | 〇、五 |
| | 右分十包每時一包 | | 右分六包一日三回每回一包 | | 右爲丸頓服 | |
| 四〇九四 | 阿片 | 〇、一〇、三 | 小兒 | | ●注射劑 | |
| | 白糖 | 二、〇一三、〇 | 鹽酸古加乙涅 | 〇、三 | 四〇二七 鹽酸莫兒比涅 | 〇、二 |
| | 右分十包最初每時一包其後 | | 白糖 | 三、〇 | 水 | 五、〇 |
| | 每二時一包 | | 右分十包每二時一包 | | 僱里設林 | 五、〇 |
| 四〇九五 | 阿片 | 〇、三 | 四〇二一 硫酸タルリン | 一、五一二、五 | 右四分一乃至半筒注射皮下 | |
| | 甘露 | 〇、〇三 | 右分十包每二時一包 | | 四〇二八 鹽酸莫兒比涅水 | 〇、一〇、〇 |
| | 乳糖 | 一、五 | 四〇二二 アンチヘブリン | 一、〇 | 右注射皮下 | |
| | 右爲六包每二時一包 | | 白糖 | 〇、五 | ●充劑 | |
| 四〇九六 | 阿片 | 〇、〇八 | 右分三包三回分服 | | 四〇二九 依的兒 | 一〇、〇 |
| | 重碳酸那篤留謨 | 二、〇 | 加糖炭酸鐵 | 〇、五 | 右一回半筒乃至一筒注射皮下、虛脫 | |
| | 次硝酸蒼鉛 | 一、〇 | 硫酸規尼涅 | 〇、五 | | |

急性腹膜炎

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|-----|--------------|------|-----|--------------|---------|
| 四二〇 | 保布滿精 | 一〇、〇 | 四二七 | 水銀軟膏 | 一〇、〇 | 四三五 | 肝油 | 二〇、〇 |
| | 芳香丁幾 | 一〇、〇 | | 右塗布 | | | 流動蘇合香 | 一〇、〇 |
| | 右每時十五滴乃至二十滴、 | | 四二八 | 水銀軟膏 | 五、〇 | | 或亞爾個保兒 | 三、〇 |
| | 虛脫 | | | 右一日數回每回〇、二五塗 | | | 薄荷油 | 三、〇 |
| 四二二 | 樟腦阿列布油 | (一〇、〇)四〇、〇 | 四二九 | 別拉敦那越幾斯 | 三、〇 | 四三二 | 彈力古魯胃謨 | 五〇、〇 |
| | 右一回一筒注射皮下、虛脫 | | | 水銀軟膏 | 五〇、〇 | | 右塗布 | |
| 四二二 | 麝香 | 〇、三 | 四三〇 | 沃度丁幾 | 一五、〇 | 四三七 | ●浣腸劑 | |
| | 炭酸安母紐謨 | 一、五 | | 右塗布 | | | 阿片丁幾 | 一〇、〇 |
| | 繡草油糖 | 三、〇 | 四三一 | 沃度丁幾 | 一〇、〇 | 四三六 | 右二滴乃至六滴浣腸、小兒 | 〇、二一〇、五 |
| | 右分五包每時一包、虛脫 | | | 沒食子丁幾 | 五、〇 | | 水 | 五〇、〇 |
| 四二三 | 安息香酸 | 一、五 | 四三三 | 沃度 | 〇、五 | 四三九 | 安知必林 | 三、〇一五、〇 |
| | 樟腦 | 一、〇 | | 沃度加留謨 | 二、五 | | 水 | 三〇〇、〇 |
| | 亞爾個保兒 | 一、二、〇 | 四三四 | 沃度 | 〇、五 | | ●坐藥 | |
| | 右一日一筒注射皮下、虛脫 | | | 沃度加留謨 | 〇、五 | 四三〇 | 鹽酸莫兒比溫 | 〇、一 |
| | ●墨法劑 | | | 右塗布、小兒 | 五〇、〇 | | 水銀軟膏 | 一、〇 |
| 四二四 | 水囊 | 若干 | 四三三 | 沃度 | 〇、五 | | 柯柯阿脂 | 一五、〇 |
| | 右腹部墨法 | | | 沃度加留謨 | 二、〇 | | 右為坐藥六個每日三個、婦 | |
| 四二五 | 依的兒精 | 一〇〇、〇 | 四三四 | 大楓子油 | 五〇、〇 | 四三一 | 鹽酸莫兒比溫 | 〇、一 |
| | 右墨法 | | | 右塗布 | | | 人骨盤腹膜炎 | |
| 四二六 | 的列並油 | 一〇〇、〇 | | 右塗布 | | | | |
| | ●塗布劑 | | | | | | | |

藥用石鹼
白膠

〇、一
適宜

右爲腫球十個每日一個、婦
人骨盤腹膜炎

慢性腹膜炎

Peritonitis chronica.

結核性腹膜炎、慢性化膿性腹膜炎等

處置

嚴正安臥、滋養食餌、強壯諸劑、對症療法、沃度劑、水銀軟膏塗布、熱浴、發汗療法、利尿劑等

●水劑

四三三 沃度加留謨

二、〇

四三三 機那煎

(五、〇)七、〇

依的兒性鐵丁幾

二十滴

水

四三三 沃度加留謨

二、〇

右每二時一食匙

四三七 機那煎

(五、〇)七、〇

四三三 沃度加留謨

二、〇

水

亞兒答舍利別

二、〇

右一日三回每回一小兒匙、

四三三 實艾答利斯浸

(〇、三)一八〇、〇

小兒

四三四 沃度鐵舍利別

一〇、〇

右一日三回每回三滴乃至五

醋酸加留謨液 *

一〇、〇

滴、小兒

四三五 沃度鐵舍利別

七、五

單舍利別

六〇、〇

右一日三回每回半小兒匙乃

水

一五〇、〇

至一小兒匙

四三三 醋酸加留謨

三、〇

單舍利別

一〇、〇

安母尼亞荷香精

二十滴

水

八〇、〇

一〇、〇

白糖

(二、〇)一〇〇、〇

水

一〇〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

四三三 安息香酸那篤留謨

一〇、〇

水

一〇、〇

阿片丁幾

二滴—五滴

單舍利別

一〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

四三三 安息香酸那篤留謨

一〇、〇

水

一〇、〇

安母尼亞荷香精

二十滴

水

八〇、〇

單舍利別

一〇、〇

慢性腹膜炎

四四四 鹽酸リモナーデ 右每二時一茶匙、小兒 五〇、〇
安知必林 〇、五

四四五 鹽酸必魯加兒必涅 右一日三回分服 〇、〇二
武蘭埜酒 五、〇

水 七〇、〇

橙皮舍利別 二五、〇
右每時一小兒匙、小兒

四四六 阿片丁幾 〇、五
單舍利別 一〇、〇
水 三〇、〇
右一日三回分服

四四七 鹽酸古加乙涅 〇、〇二
鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

杏仁水 一、〇

單舍利別 五、〇

水 一〇、〇
右臨時二回分服

四四八 林檎酸鐵丁幾 一〇、〇
苦味丁幾 一〇、〇

復方機那丁幾 一〇、〇
右一日三回每回十滴、小兒

●散劑
四四九 硫酸規尼涅 〇、三一〇、五
右一日二回分服、小兒

四五〇 硫酸規尼涅 〇、五
加糖炭酸鐵 〇、五

葛蒲根末 二、〇
右分十包朝夕一包、小兒

四五五 單寧酸規尼涅 〇、六一一、五
右一日三回二日分服、小兒

四五三 單寧酸規尼涅 一、〇
挖勿兒氏散 〇、〇五、一〇、一

白糖 二、〇
右分五包一日三回每回一包
小兒

四五三 重炭酸那篤留謨 一、〇
次硝酸蒼鉛 〇、五

右分三包一日三回分服

四五四 重炭酸那篤留謨 一、〇
次硝酸蒼鉛 一、〇

泥苺根油糖 二、〇
右分十包一日三回每回一包
小兒

四五五 重炭酸那篤留謨 一、〇

次硝酸蒼鉛 〇、五
甘汞 〇、二
右分三包一日三回分服

四五五 重炭酸那篤留謨 一、〇
次硝酸蒼鉛 〇、五

鹽酸古加乙涅 〇、〇三
右分三包一日三回分服

四五五 重炭酸那篤留謨 〇、五
次硝酸蒼鉛 〇、五

碳酸セリウム 〇、一
乳糖 〇、五

右分三包一日三回分服、持重

四五五 甘汞 〇、二五、一〇、五
精製硫黃 〇、二五、一〇、四

白糖 二、五
右分五包朝夕一包

四五五 加糖沃度鐵 二、〇
乳糖 八、〇

右分十包一日二回每回一包

●丸劑
四五六 沃度鐵、乳糖 各五、〇
右亞拉比亞護謨漿適宜為百

四六 阿片末 九一日三回每回五粒
〇、〇五

單寧酸 右爲丸三回分服
〇、一

四三 沃度丁幾 〇、〇
●塗布劑 一、〇
沒食子丁幾 五、〇

四二 沃度 〇、一
右塗布 一、〇

四一 格魯胃謨 一、〇
右塗布 〇、〇

四〇 沃度加留謨 一、〇

腹水 Ascites.

舊譯作腹腔水腫、脹滿、水腫、水腫、水腫、水腫、腹脹、古名脹滿

處置 滋養食餌、強壯劑、牛乳攝生法、穿刺、利尿、發汗、瀉下等

四七 實麥答利斯浸 〇、〇
●浸煎劑 二、〇

單舍利別 右每二時一食匙 二、〇

四六 實麥答利斯浸 〇、〇
右每二時一食匙 一、五

沃度 〇、五
偏利設林 五、〇
右塗布 〇、〇

四五 沃度 〇、五
沃度加留謨 二、五

水 二、〇
豚脂 二、五
右塗布 〇、〇

四四 肝油 三、〇
右塗布 〇、〇

四三 軟石鹼 一、〇
右塗布 〇、〇

四六 杜松實軟膏 三、〇
右一日三回每回以豌豆大塗布、小兒

四九 鹽酸必魯加兒必涅 〇、〇
右溶解於水注射皮下(一回量)小兒 〇、〇

四七 沃度加留謨 三、〇
貌魯謨加留謨 二、五
別拉敦那越幾斯 〇、三

水 一、〇
右每回二十滴澆腸

四八 實麥答利斯浸 〇、〇
醋酸加留謨 一、五

四九 海葱醋 三、〇
右一日六回二日分服

四五 實麥答利斯浸 〇、〇
右每二時一食匙

甘硝石精 四、〇
 醋酸加留謨 四、〇
 右一日三回分服
 四七 實麥答利斯浸 (一、〇) 一、二〇、〇
 醋酸加留謨 五、〇
 ストロファンツス丁幾 五、〇
 單舍利別 二〇、〇
 右一日三回每回一食匙
 四七 實麥答利斯浸 (〇、三) 一〇〇、〇
 孕礪酒石 一〇、〇
 單舍利別 一〇、〇
 右一日六回二日分服
 四七 實麥答利斯浸 (〇、六) 一三〇、〇
 孕礪酒石 一〇、〇
 單舍利別 二〇、〇
 右每二時一食匙
 四七 實麥答利斯浸 (〇、七) 一五〇、〇
 孕礪酒石 一五、〇
 甘硝石精 六、〇

甘草舍利別[※] 一五、〇
 右一日六回二日分服
 四八 杜松質浸(一〇、〇) 一五〇、〇
 醋酸加留謨 五、〇
 單舍利別 七、〇
 右一日六回二日分服
 四八 杜松質浸(二五、〇) 一八〇、〇
 醋酸加留謨 一五、〇
 海葱醋蜜 一五、〇
 右一日六回二日分服
 四八 杜松質浸(一〇、〇) 一五〇、〇
 海葱越幾斯[※] 〇、二
 右每二時一食匙
 四八 杜松質浸(一〇、〇) 一八〇、〇
 海葱醋蜜 一五、〇
 醋酸加留謨 一五、〇
 右每二時一食匙
 四八 海葱浸 (二、〇) 八〇、〇
 杜松子舍利別[※] 二〇、〇
 右每二時一茶匙、小兒
 四八 機那煎 (一〇、〇) 一五〇、〇
 海葱丁幾 八、〇
 單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙
 四八 機那煎 (八、〇) 一〇〇、〇
 甘硝石精 四、〇
 單舍利別 一〇、〇
 右一日三回分服
 四七 旃那葉 一五、〇
 生姜根 二〇、〇
 右浸出 一五〇、〇
 硫酸那篤留謨 二〇、〇
 單舍利別 二〇、〇
 右一二時一食匙
 四八 木賊煎 (一〇、〇) 一五〇、〇
 海葱醋蜜 三〇、〇
 右每二時一食匙
 四八 オノニス根煎 (一〇、〇) 一五〇、〇
 海葱醋 二五、〇
 右一日六回二日分服
 四八 プラツター、オリエンタリス 一五〇、〇
 煎(五、〇) 一〇、〇(二五〇、〇)
 橙皮舍利別 一五、〇
 右一日三回每回一食匙
 ●水劑

四九二 チウレチン 五、〇一七、〇

水 一〇〇、〇

右一日數回分服

四九三 チウレチン 五、〇

單舍利別 七、〇

水 一〇〇、〇

四九四 チウレチン 五、〇一七、〇

水 九〇、〇

薄荷水 一〇〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每一時乃至二時一食匙

四九五 撒里矢爾酸那篤留謨咖啡涅

〇、三

橙皮舍利別 二〇、〇

水 八〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

四九六 ストロファンツス丁幾 一、〇一二、〇

單舍利別 一〇〇、〇

水 一二〇、〇

右一日四回每回一食匙

四九七 ストロファンツス丁幾

一、〇一二、〇

水 一三〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右一日三回每回一食匙

四九八 實麥答利斯丁幾 七、五

海葱丁幾 七、五

右一日三四回每回二十滴

四九九 重酒石酸加留謨 三、〇

單舍利別 一五、〇

水 二〇〇、〇

右一日三四回二分服

五〇〇 重酒石酸加留謨 一五、〇

醋酸加留謨 四、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 八、〇

右一日三回分服

五〇一 醋酸加留謨 一五、〇

杜松實越幾斯 三〇、〇

水 二〇〇、〇

右一日六回二分服

五〇二 醋酸加留謨 四、〇

巴豆油 半滴

亞拉比亞護謨漿 一〇〇、〇

右一日三回分服

五〇三 醋酸加留謨 六、〇

大黃丁幾 六、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

五〇四 醋酸加留謨 一五、〇

吐酒石酒 七、〇

海葱醋蜜 一五、〇

洋芹水 一五、〇

右一日六回二分服

五〇五 常醋、海葱醋 各二五、〇

炭酸加留謨(飽和) 適宜

薄荷水 一五〇、〇

罌粟舍利別 二五、〇

右每二時一食匙

五〇六 海葱醋 三〇、〇

炭酸安母紐謨(飽和) 適宜

洋芹水 一〇〇、〇

甘硝石精 四、〇

杜松子油糖 二〇、〇

右每二時一食匙

五〇七 杜松子油 一、〇

葛縷子油 一〇、一

海葱末 ○、二五
桂皮、孕礪酒石、甘草末 各五、〇

杜松實油 二滴
右分五包一日三回每回一包

四三五 當歸根、洋芹實、茴香實 各一〇、〇
杜松子 右每回一茶匙投於一碗乃至二碗之水服用

四三六 撒里矢爾酸那篤留謨 五、〇
右分十包每時一包

四三七 機那皮末 三、〇
孕礪酒石 六、〇
茴香油糖 三、〇

●丸劑
右分十包一日三回每回一包

四三八 海葱末 一、〇
實麥答利斯末 〇、五
甘末 〇、五

右亞拉比亞護謨藥適宜爲二十九一日二粒乃至四粒

四三九 實麥答利斯末 二、〇
藤黃 二、〇

海葱末 二、〇
金硫黃 二、〇
右爲百九每二時一粒

四四〇 實麥答利斯末 一、〇
硫化安質母尼(金硫黃) 一、〇
海葱末 二、〇
格魯魯篤末 二、〇
艾根越幾斯 二、〇
右爲百九一日三回每回二粒乃至三粒

四四一 藤黃、實麥答利斯末、海葱末 各一、〇
金硫黃、地榆越幾斯 各一、〇
右亞拉比亞護謨適宜爲五十九一日三回每回一丸

四四二 蘆薈末、藤黃末 各二、〇
藥刺巴石鹼 右爲五十九一日三回每回二粒

四四三 イチニミン 一、五
別拉敦那越幾斯 〇、二
右甘草末及甘草羔各適宜爲三十九一日三回每回二粒

四四四 イチニミン 一、五
藤黃 一、五
右爲三十九一日三回每回二粒

菲沃斯越幾斯 〇、三
右爲三十九一日三回每回二粒

●注射劑
鹽酸必魯加兒必涅 〇、一〇、二〇
水 〇、一〇、二〇
右半筒乃至一筒注射皮下

四四五 酸鹽必魯加兒必涅 〇、〇〇、一〇、〇〇
右注射皮下一回量、小兒

四四六 樟腦 二、〇
海葱末 二、五
別刺敦那越幾斯 一、〇
水銀軟膏 五、〇
華攝林 一五、〇
右一日三回塗布

四四七 底列並油、藥用石鹼 各三、〇
大黃末 右單舍適宜爲祇劑一日三回每回一茶匙

四四八 咖啡涅 五、〇

●塗布劑
右注射皮下一回量、小兒

腹水

右爲錠劑十個每回五個乃至一

十個

第五節 肝臟、膽管及門脉諸病

加答兒性黃疸 Jeterus catarrhalis.

膽道シンキング、加答兒性膽道炎、素靈難經金匱等書、謂之黃疸、景岳全書、謂之黃瘰、腸管胃十

二指腸加答兒、急性熱性黃疸、ワイル氏病、黃疸氣

●浸煎劑

處置

原因療法、安臥休養、飲食攝生、肝部溫濕法、通利、利尿劑、皮膚癢痒則溫浴、下劑兼冷水洗腸等

四四〇 大黃浸 (一〇、〇)一二〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每三時一食匙

四四一 大黃浸 (四、〇)一五〇、〇

重碳酸那篤留謨 五、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

四四二 大黃浸 (二〇、〇)一二〇、〇

硫酸那篤留謨 二五、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

四四三 答麻林度煎 (二〇、〇)一五〇、〇

酒石酸 二〇、〇

滿那舍利別 二〇、〇

四四四 複方旂那浸 一五〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右一日三回每回一食匙

四四五 吐根浸 (五、〇)七五、〇

吐酒石酒 二五、〇

右每十分時一食匙、快吐休藥

四四六 健質亞那根浸 (四、〇)一五〇、〇

依的兒精 一、五

橙皮舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙

四四七 人工加兒爾斯泉鹽 三〇、〇一四〇、〇

●水劑

右一日三回分服

水 二〇〇、〇一三〇〇、〇

右一日三回分服

四四八 硫酸麻僱涅矢亞 一五、〇

稀硫酸 一、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

四四九 硫酸麻僱涅叟謨 二〇、〇

苦味丁幾 三、〇

水 二〇〇、〇

右一日二回二日分服

四五〇 硫酸麻僱涅矢亞 二〇、〇

重碳酸那篤留謨 四、〇

蕃木釐丁幾 一、〇

薄荷油 二滴

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

四二五 硫酸那篤留謨 二五、〇
 重碳酸那篤留謨 六、〇
 水 一五〇、〇
 白糖 二五、〇
 右每二時一食匙
 四二五 純精酒石 一五、〇
 水 一二〇、〇
 滿那舍利別 * 三〇、〇
 右每二時一食匙
 四二五 水製大黃丁幾 五〇、〇
 右一日三食匙乃至四食匙、
 通利
 四二五 水製大黃丁幾 八、〇
 重碳酸那篤留謨 四、〇
 水 二〇〇、〇
 右一日三回二日分服
 四二五 醋酸加留謨 三〇、〇
 單舍利別 一〇、〇
 水 一五〇、〇
 右每二時一食匙
 四二五 醋酸加留謨 八、〇
 水 二〇〇、〇
 單舍利別 一五、〇

四二五 炭酸加留謨 五、〇
 醋(飽和) 適宜
 單舍利別 二〇、〇
 右每二時一食匙
 四二五 枸橼汁 五〇、〇—一〇〇、〇
 右一日數回分服
 四二五 枸橼酸 五、〇
 重碳酸那篤留謨 五、〇
 水 二〇〇、〇
 單舍利別 二〇、〇
 右每二時一食匙
 四二五 フランツヨセフ鑛泉* 一五、〇
 右頓服
 四二五 硝酸 二、〇
 水 一五〇、〇
 單舍利別 二五、〇
 右一日三回每回一食匙
 四二五 稀硝酸 一、〇
 稀鹽酸 二、〇
 水 一五〇、〇
 單舍利別 二〇、〇
 右一日三回每回一食匙、血

性黃疸
 四二五 王水 二、〇—三、〇
 亞兒答根煎 一五〇、〇
 右每二時一食匙
 四二五 硝石 六、〇
 稀硝酸 三、〇
 大麥煎* 三〇〇、〇
 甘硝石精 六、〇
 右每二時一食匙
 四二五 稀鹽酸 二、〇
 單舍利別 二〇、〇
 水 一八〇、〇
 右一日數回二日分服
 四二五 稀鹽酸 一、〇—二、〇
 亞爾答舍利別 二〇、〇
 水 一八〇、〇
 右每三時一食匙
 四二五 燐酸 四、〇
 覆盆子舍利別 四〇、〇
 右一日數回分服
 四二五 燐酸那篤留謨 四〇、〇
 重碳酸那篤留謨 四〇、〇
 枸橼酸 一〇〇、〇

水 六二五、〇

右一日三回每回一匙

四六九 撒里矢爾酸那篤留謨 五、〇

水 六〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右每二時一茶匙、初生兒黃疸

四七〇 硝酸鹽 十五滴

水 二、〇

百弗聖 一八、〇

單舍利別 一五、〇

右一日三回二日分服(但食後)

●滴劑

四七一 流動ヒドラスチー 越幾斯 一〇、〇

右一日三回每回二十滴

四七二 苦味丁幾 二〇、〇

蕃木甞丁幾 一〇、〇

稀鹽酸 五、〇

右每食後十五滴

四七三 安母尼亞茴香精 五、〇

硫酸依的兒 五、〇

右每時十滴、初生兒黃疸

四七四 ホトヒリーチ 〇、三

酒精 一〇、〇

右每夕十滴乃至二十滴入葡

萄酒中服用

四七五 甘露 一、〇

●散劑

乳糖 二、五

右五分包一日三回每回一包

四七六 甘末、重碳酸曹達 各一、五

白糖 三、〇

右分六包每時一包

四七七 人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇

●右頓服

四七八 人工加兒爾斯泉鹽 五〇、〇

右早朝一二茶匙

四七九 純精酒石 二五、〇

重碳酸那篤留謨、酒石酸 各八、〇

右一日數回每回一茶匙

四八〇 硫酸那篤留謨 五〇、〇

右早朝半茶匙乃至一茶匙

四八一 ホドヒルリン 〇、二

白糖 五、〇

右分十包一日四回每回一包

四八二 剝度比爾林 〇、一

菲沃斯越幾斯 〇、一

茴香油糖 五、〇

四八三 重碳酸那篤留謨 三〇、〇

右分十包一日二回每回一包

四八四 重碳酸那篤留謨、白糖各五、〇

右每二時一刃尖

四八五 重碳酸那篤留謨、大黃末 各一〇、〇

右每食後一刃尖

四八六 重碳酸那篤留謨 一〇、〇

大黃末 五、〇

白糖 三〇、〇

茴香油 三滴

右朝夕一茶匙

四八七 蕃木甞越幾斯 〇、〇

大黃末 二、〇

白糖 三、〇

右分十包一日三包

四八八 蕃木甞越幾斯 〇、〇

大黃末

乳糖

右分六包一日三回每回一包

四九八

吐根

阿片

白糖

四九〇

吐根末

吐酒石

澱粉

快吐休藥

四九二

撒里矢爾酸那篤留謨、硫酸那篤留謨、重碳酸那篤留謨

各一五、〇

四九二

安息香酸

樟腦

白糖

右分六包每二時一包

四九三

安息香酸

龍腦

一、〇
一、五

〇、一五
〇、〇六
三、〇

二、五
〇、一
二、〇

二、〇
二、〇

二、〇
二、〇

二、〇
二、〇

一、八
〇、三
三、〇

一、五
〇、二五

白糖

右分五包每二時一包、胆毒

●丸劑

蘆薈越幾斯

重碳酸那篤留謨

右蒲公英越幾斯適宜為六十丸朝夕二粒

蘆薈越幾斯

大黃越幾斯

右為五十九丸每朝夕三粒

蘆薈越幾斯

複方大黃越幾斯

右蒲公英越幾斯適宜為六十丸朝夕三粒

蘆薈

藥用石鹼、大黃末

右蒲公英越幾斯適宜為六十丸朝夕六粒乃至七粒

蘆薈越幾斯

濃厚牛胆

右為五十九丸一日三回每回三粒、胆汁欠乏

濃厚牛胆

粒、胆汁欠乏

四九九

大黃末

藥用石鹼 右甘草羔適宜為二十九丸每夕二粒乃至五粒

●注射劑

鹽酸必智加兒必涅水

右一日半筒注射皮下

樟腦

甘扁桃油

右一日二三回注射皮下、胆毒

●外用劑

醋

右皮膚洗滌、癢痒

薄荷腦

或撒里矢爾酸

酒精

右外用、皮膚癢痒

沃度仿謨末

右外用

右外用

右外用

五、〇
五、〇

〇、〇
〇、〇
〇、〇

一、〇
一、〇
一、〇

一、〇
一、〇
一、〇

一、〇
一、〇
一、〇

二、〇
二、〇
二、〇

二、〇
二、〇
二、〇

二、〇
二、〇
二、〇

二、〇
二、〇
二、〇

一、五、〇
一、五、〇
一、五、〇

膽石 Cholelithiasis, Colica hepatica, Calculus biliaris.

處置 膽結石、膽石痛、膽石疝痛、舊譯作膽淋症、又名膽囊生質、又名膽囊生絨管、古時包括於黃疸症中、疼痛用鹽莫、使秘用旃那大黃等、無脂肪之肉類、淡泊之野菜果物、嚴禁油類酒類、新鮮氣中之運動、胆石溶解性之鐵泉服用等

●水劑

四三〇 旃那浸 (一〇、〇)一〇〇、〇

硫酸麻僱涅叟謨 一五、〇

滿那舍利別 一五、〇

右一日三回分服

四三一 大黃浸 (四、〇)一二〇、〇

重碳酸那篤留謨 四、〇

桂皮水 一五、〇

右一日三回分服

四三二 硫酸麻僱涅叟謨 一五、〇

稀硫酸 一、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

四三三 維納緩下水 * 五〇、〇

覆盆子舍利別 ** 三〇、〇

杏仁水 五滴

右數回分服

四三九 阿列布油 二〇〇、〇

右早朝一二食匙

四三〇 阿列布油 二〇〇、〇

薄荷腦 〇、五

武蘭碎酒 二〇、〇

卵黃 二個

右一日三回每回一食匙

四三一 僱里設林 一〇〇、〇

右發作時一食匙其他一日一茶匙

四三二 嚼囉仿謨 五、〇

亞拉比亞護謨漿 一五〇、〇

右一日三回二日分服

四三三 嚼囉仿謨 二、〇

亞拉比亞護謨漿 一〇〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙、發作時

四三四 嚼囉仿謨 五、〇

強酒精 四〇、〇

護謨合劑 一五〇、〇

右一日三回每回一食匙

四三五 抱水格魯刺兒 二、〇

水 一五、〇

單舍利別 一〇、〇

右發作時頓服

四三六 抱水格魯刺兒 八、〇

亞兒答根煎

(一〇、〇)一五〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙

四三七 撒里矢爾酸那篤留謨 一〇、〇

水 一四〇、〇

甘草舍利別 ** 一〇、〇

右每一二時一食匙

●滴劑 五、〇

四三八 的列並油 一八、〇

依的兒 二〇、〇

右一日四回每回十五滴乃至三十滴

四三九 的列並油 一〇、〇

依的兒 一五、〇

右一日三回每回十五滴

四三〇 的列並油 二、五

忽布滿精 三〇、〇

右一日二回乃至三回每回十滴乃至十五滴

四三一 呀囉仿談 三、〇

酒精 一二、〇

芳香丁幾 一五、〇

右每回二十滴乃至四十滴

四三二 イヒチオール 一〇、〇

水 二〇、〇

右一日二三回每回十五滴乃至二十滴

四三三 阿片丁幾 一〇、〇

右每一二時十滴

●散劑

四三四 人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇

右每朝頓服

四三五 人工加兒爾斯泉鹽 五〇、〇

右每朝一二茶匙

四三六 ホトフイルリン 〇、一〇、三

別刺敦那越幾斯 〇、一

白糖 五、〇

右分十包一日一二包

四三七 大黃根末、安息香酸那篤留謨 各三、〇

撒里矢爾酸那篤留謨 各三、〇

蒼木髓子末 〇、三

右分六包一日三回每回半包

四三八 安知必林 二、〇

右分二包每回一包加赤酒服

四三九 撒里矢爾酸那篤留謨 各五、〇

白糖 各五、〇

右分十包每一二時一包

四四〇 別拉敦那越幾斯 〇、三

白糖 〇、三

右分十包每二時一包

四四一 阿片末 〇、五

白糖 五、〇

右分十包每一二時一包

右分十包每二時一包

四四二 鹽酸莫兒比涅 〇、〇、五

白糖 二、五

右分五包每一時乃至二時一包

四四三 ザロール 一、二

右分六包一日三回每回一包

四四四 撒里矢爾酸 六、〇

右分六包一日三回每回一包

●丸劑

四四五 ホドフイルリン 〇、八

別刺敦那越幾斯 〇、二五

甘草羔、甘草末 各適宜

右為三十粒一日三回每回一粒

四四六 ホドヒルリン 〇、三

貴碧越幾斯 〇、二五

泥莖根末 二、〇

右龍膽越幾斯適宜為三十九

一日三回每回一二粒

四四七 ホドヒルリン 〇、五

鹽酸莫兒比涅 〇、一

右甘草羔及甘草末各適宜為

三十九一日三回每回二粒、
發作緩解後

四三九 依的兒 六滴—八滴
精製的列並油 四滴—五滴

四四〇 右入膠囊與一個每日五個

四四一 依的兒 五、〇
的列並油 三、五

四四二 右入膠囊九個一日五個

四四三 エキサルギン〇、二五—一〇、四
●注射劑

四四四 鹽酸莫兒比涅 〇、二

肝臟充血(實性及虛性) Hyperaemia hepatis (activa et passiva)

肝臟多血、肝臟積血、肝臟鬱血、肉荳蔻肝、鬱血肝、舊譯作肝內積血、又名肝內血瘀

四五〇 複方旃那浸 二〇〇、〇
右一日三回每回一食匙

四五二 旃那葉浸(一〇、〇)二二〇、〇
重碳酸那篤留謨 五、〇

四五三 水製大黃丁幾 一五、〇
甘草合利別 二〇、〇

右每二時一食匙

僱里設林 五、〇
水 五、〇

四五五 右半筒注射膽囊部皮下

四五六 鹽酸莫兒比涅 〇、二
硫酸亞篤比涅 〇、〇一

四五七 杏仁水 二〇、〇
右每回一筒注射皮下

四五八 ●浣腸劑
阿列布油 三〇〇、〇
右浣腸 三〇、〇

四五九 抱水格魯刺兒 三〇、〇
右溶解於微溫湯灌腸

四六〇 抱水格魯刺兒 二、〇
護謨漿 一〇〇、〇

四六一 右浣腸 一〇〇、〇
●外用劑

四六二 嚼嚙仿謨、阿列布油 一〇、〇
右調和塗布

四六三 嚼嚙仿謨 一〇、〇
右含海綿吸入

四六四 別拉敦那越幾斯 各一、〇
阿片越幾斯 右為坐藥五個每時一個

四六五 大黃煎(一〇、〇)一二〇、〇
硫酸那篤留謨 二〇、〇

四六六 橙皮合利別 一〇、〇
右每二時一食匙

四六七 大黃煎(一五、〇)二〇〇、〇
單合利別 一五、〇
右一日三回乃至四回每回一食匙

四六八 格魯魯篤浸(一〇、〇)二〇〇、〇
橙皮合利別 一五、〇
右一日三回每回一食匙

四六九 單合利別 一五、〇
右一日三回乃至四回每回一食匙

四七〇 人王別兒爾斯泉鹽 一五、〇

四三〇 右頓服 硫酸麻備涅叟謨 一五、〇

四三一 右頓服 硫酸麻備涅叟謨 二〇、〇

四三二 稀鹽酸 二〇、〇

四三三 單舍利別 一〇、〇

四三四 水 一〇、〇

四三五 右一日三四分服 答麻林度 三〇、〇

四三六 硫酸那篤留謨 一五、〇

四三七 覆盆子水 一二〇、〇

四三八 右每二時一食匙 硫酸那篤留謨 五〇、〇

四三九 格魯兒那篤留謨 三〇、〇

四四〇 重碳酸那篤留謨 六〇、〇

四四一 單舍利別 二〇、〇

四四二 右每十五分時一茶匙 ●散劑 甘汞 〇、五

四四三 大黃 〇、四

四四四 白糖 〇、五

四四五 右頓服 重酒石酸加留謨 五、〇

四四六 蒲公英末 二〇、〇

四四七 右朝夕二回分服 ●丸劑 九劑 〇、三

四四八 ホドヒルリン 〇、三

四四九 大黃末 三〇、〇

四五〇 右為三十九丸每晚一粒乃至三粒 格魯聖篤 一〇、〇

四五一 蘆薈 二〇、〇

四五二 スカンモニウム 二〇、〇

四五三 硫酸加留謨 〇、二五

四五四 丁子油 〇、一五

四五五 水 適宜

四五六 右為三十九丸一日三回每回二粒乃至三粒 蘆薈、藥刺巴、複方大黃越幾斯 各一、〇

四五七 蘆薈末 四、〇

四五八 藥用石鹼 二〇、〇

四五九 右為五十九丸每日一粒乃至三粒服用 粒服用

肝臟硬變症 Cirrhosis hepatitis, Hepatitisinterstitialis.

肝臟間質炎、肝臟組織間炎、肝臟顆粒變性、又名肝臟硬化症、舊譯作肝變質、又名肝體發炎縮質
原因療法、酒客則漸次禁酒、間歇熱則與規尼涅、梅毒則用驅梅法、攝生專一、其次用下劑、沃剎等
處置
●水劑
右一日六回二分服
滿那舍利別 二〇、〇

四三六 旃那浸 (一〇、〇)一〇〇、〇

四三七 硫酸麻備涅叟謨 三〇、〇

四三八 單舍利別 二〇、〇

四三九 答滿林度煎

四四〇 枸橼酸麻備涅叟謨 二〇、〇

四四一 答滿林度煎 (二〇、〇)二〇〇、〇

四五九 答麻林度煎

四六〇 右每二時一食匙 (一〇、〇)一〇〇、〇

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------|-----|---------------------------|----------------------|-----|------------------|-------------------|
| 四七〇 | 硫酸麻備溫叟謨 旃那舍利別 右每二時一小兒匙 | 一〇、〇 一五、〇 | 四七五 | ヂウレチン 水 右一日三回分服 | 五、〇 一〇、〇 一七、〇 | 四八〇 | 苦味丁幾 單舍利別 | 二、〇 一〇、〇 |
| 四七一 | 杜松實液(二五、〇)二五、〇 醋酸加留謨液* | 二五、〇 | 四七六 | 重酒石酸加留謨 蒸餾水 右每二時一食匙 | 一五、〇 二〇、〇 | 四八一 | 右一日三回分服 | 一〇、〇 |
| 四七二 | 海葱醋蜜 右每二時一食匙 | 各一五、〇 | 四七七 | 重酒石酸那篤留謨 沃度加留謨 單舍利別 | 一六、〇 二、〇 一五、〇 | 四八二 | 沃度加留謨 | 二、〇 |
| 四七三 | 蒲公英根煎 (二〇、〇)三〇〇、〇 | 三〇〇、〇 | 四七八 | 單舍利別 右一日六回二日分服 | 二〇〇、〇 | 四八三 | 沃度鐵舍利別 | 一〇〇、〇 |
| 四七四 | 重酒石酸加留謨 右朝夕半量 | 五、〇 | 四七九 | 醋酸加留謨 水 單舍利別 | 八、〇 二〇〇、〇 一五、〇 | 四八四 | 硝酸 鹽酸 單舍利別 | 一、〇 二、〇 三、〇 |
| 四七五 | 機那煎 (八、〇)一〇〇、〇 | 一〇〇、〇 | 四八〇 | 沃度加留謨 水 右混和每二時一食匙 | 一五〇、〇 五、〇 | 四八五 | 右每三時一食匙 | 一五〇、〇 |
| 四七六 | 硫酸那篤留謨 重炭酸那篤留謨 水 | 一五、〇 二、〇 一〇〇、〇 | 四八一 | 右一日三回每回一食匙 | 一五〇、〇 | 四八六 | 亞砒酸加留謨水 | 五、〇 |
| 四七七 | 右一、三、三回分服 | 二〇〇、〇 | 四八二 | 沃度加留謨 水 | 二、〇 一三、〇 | 四八七 | 薄荷水 | 一五、〇 |
| 四七八 | 硫酸麻備溫叟謨 重炭酸那篤留謨 水 | 二〇〇、〇 二、〇 一〇〇、〇 | 四八三 | 苦味丁幾 右每二時一食匙 | 二〇〇、〇 四、〇 | 四八八 | 右一日三回每回八滴 | 一五、〇 |
| 四七九 | 右一日三回分服 | 一〇〇、〇 | 四八四 | 沃度加留謨 | 二、〇 | 四八九 | 散劑 | 〇、四 |
| 四八〇 | 沃度加留謨 | 二、〇 | 四八五 | 單舍利別 | 二、〇 | 四九〇 | 甘菜 | 〇、四 |
| 四八一 | 沃度加留謨 | 二、〇 | 四九一 | 單舍利別 | 二、〇 | 四九二 | 乳糖 | 三、〇 |
| 四八二 | 沃度加留謨 | 二、〇 | 四九三 | 單舍利別 | 二、〇 | 四九四 | 乳糖 | 三、〇 |
| 四八三 | 沃度加留謨 | 二、〇 | 四九五 | 單舍利別 | 二、〇 | 四九六 | 乳糖 | 三、〇 |
| 四八四 | 沃度加留謨 | 二、〇 | 四九七 | 單舍利別 | 二、〇 | 四九八 | 乳糖 | 三、〇 |
| 四八五 | 沃度加留謨 | 二、〇 | 四九九 | 單舍利別 | 二、〇 | 五〇〇 | 乳糖 | 三、〇 |

四三六 右分四包一日四回每回一包
四三七 甘末 〇、三
藥刺巴根末 〇、三

四三八 右分十包一日一包
甘末 〇、六一、二
藥刺巴、白糖 各三、〇

四三九 右分六包一日三回每回一包
重酒石酸加留謨 一〇、〇、一五、〇

四四〇 右一日三回分服
人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇
右頓服

四四一 人工加兒爾斯泉鹽 五〇、〇
右每朝二茶匙乃至一食匙

四四二 鹽酸規尼涅 〇、五
右一日一回頓服

四四三 重碳酸那篤留謨 各一〇、〇
右分三十包一日三包乃至四包

四四四 重碳酸那篤留謨 各一〇、〇
右分三十包一日三包乃至四包

●丸劑
四四五 蘆薈越幾斯、硫酸規尼涅 各一、五
右為三十九粒

四四六 蘆薈越幾斯 二、〇
大黃末 八、〇
古魯聖篤越幾斯 〇、四

四四七 右大黃末及大黃越幾斯適宜
為六十九一日二回每回二粒

四四八 別拉敦那越幾斯 各〇、三
複方大黃越幾斯 四、〇
甘草末 五、〇
右為六十九一日三回每回二粒

四四九 旃那葉 四、〇

蒲公英越幾斯 適宜
右為三十九一日五粒乃至八粒

四五〇 藤黃、實艾末、古魯聖篤越幾斯 各一、五
金硫黃 〇、五
右ビンヒチルラ越幾斯適宜
為六十九每二時三粒

四五一 複方大黃越幾斯 二、〇
大黃末、藥刺巴石鹼 各二、〇
右為五十九朝夕二粒

四五二 骨湃拔爾撒謨 〇、五
右入膠囊一個一日三回每回一個

●外用劑
四五三 水銀軟膏 二、〇
右一日一回塗布

四五四 鹽酸 五〇、〇
硝酸 二五、〇
右注和一浴湯

梅毒性肝臟炎 Hepatitis syphilitica.

肝臟梅毒、舊譯作肝受楊梅毒壞症、又名楊梅毒結毒於肝

肝臟硬變症 梅毒性肝臟炎

●水劑

圖四 沃度加留謨

一、五

水

亞兒答舍利別

五〇、〇

右一日二三回每回一茶匙、

小兒

圖五 沃度加留謨

五、〇

水

單舍利別

二〇〇、〇

右一日二回每回一食匙

圖六 沃度加留謨

一、〇

苦味丁幾

二、〇

化膿性肝臟炎(外傷性)

Hepatitis suppurativa (traumatica)

膿膿性肝臟炎、膿潰性肝炎、肝臟膿瘍、舊譯作肝癰、又名肝體生膿瘡

圖三 蓖麻子油

一五、〇

右頓服

圖四

複方大黃越幾斯〇、五一、〇

圖五 鹽酸規尼涅

〇、五

急性變黃肝臟瘦削症

Hepatitis parenchymatosa diffusa.

肝臟腺肉炎、急黃肝臟萎縮、急性肝臟黃色萎縮、汎發肝臟嫩衝、急黃

●水劑

圖二六 巴豆油

一滴

單舍利別

二〇、〇

水

右一日三回分服

圖七

沃度加留謨

一、五

耶僕蘭日葉浸

(三、〇) 一〇〇、〇

單合

右每二時一食匙

圖八

沃度化鐵舍利別

單舍利別

各二五、〇

右一日三回每回一茶匙

●丸劑

圖九

黃色沃度化末

〇、五

右甘草羔甘草末適宜爲三十九一日三回每回一粒

●散劑

圖一〇 甘末

〇、一五

挖勿兒氏散

白糖

右分五包一日三回每回一包

●外用劑

圖二 灰白水銀軟膏

〇、五一、〇

右塗布、小兒

圖三 昇汞

一、五一、二、〇

右投和一浴湯

圖六 右臨臥一食匙
抱水格魯刺兒

亞拉比亞護謨漿

右二回分服

圖九 抱水格魯刺兒

亞拉比亞護謨漿

右洗腸

圖一〇 麝香、樟腦

卵黃

亞麻仁煎*

右洗腸

圖三 赤葡萄酒

水

單舍利別

右一日六回每回二茶匙

●注射劑

圖三 鹽酸莫兒比涅

蒸餾水

右一筒注射皮下

圖三 樟腦

安息香酸

酒精

右一筒至二筒注射皮下

圖四 樟腦

甘扁桃油

右一筒至二筒注射皮下

●散劑

圖五 麝香

白糖

右分五包每三時一包

圖六 甘末

右分三包每四時一包

豚脂肝 Speckleber.

脂肪肝臟、肝臟豚肉變質、肝臟粉質變性、肝臟脂肪變性、粉質肝、舊譯作肝體變脂、又名肝體變壞成膏、一作肝脂化

圖七 沃度加留謨

水

單舍利別

肝臟ヂストマ(特效藥無之) Leberdistoma.

圖九 硫酸規尼涅、還元鐵

白糖

右一日二回每回一小兒匙、

小兒

圖八 沃度鐵舍利別、單舍利別

右一分十包一日四回每回一包

小兒

各一五、〇

右一日三回每回十五滴、小兒

豚脂肝 肝臟ヂストマ

第六節 脾臟諸病

慢性脾臟腫瘍 Tumor splenis chronica.

圖一 鹽酸規尼涅 〇、五

華列氏鐵丸劑塊 * 五、〇

圖四 孕鐵礪砂、健質亞那越幾斯 大黃根末 各二、〇

右頓服、數日間持重

右為六十九一日三回每回一

右為五十九一日三回每回二

圖三 鹽酸規尼涅、還元鐵 各〇、五

亞砒酸加留謨液

五、〇

右廿艸越幾斯適宜為十九一日三回每回一粒

林榆酸鐵丁幾

二〇、〇

右三回每回一粒

圖二 鹽酸規尼涅 一、〇

右每食後十五滴

脾臟膿瘍 Abscessus splenis.

圖五 鹽酸規尼涅 〇、三

右一日三回每回一包

第三篇 循環(血行)器系諸病

心外膜炎 Pericarditis

心囊炎、心包炎、心胞炎、心痛、熱心痛、心包絡生炎、心外衣發炎、古時以此症包括於心痛、或熱心痛等之症狀

處置 靜止安息、心部冷卷、使通整理、滋養鐵劑、心悸亢進則用實麥等、劇痛則用莫比等、滲出物則用穿刺術

● 浸煎劑

圖六 機那煎 (一〇〇、〇) 一〇〇、〇

圖七 機那煎 (八、〇) 二〇〇、〇

圖八 實麥答利斯浸

醋酸加留謨

八、〇

醋酸加留謨

八、〇

單舍利別

一〇、〇

單舍利別

一五、〇

醋酸加留謨

六、〇

右一日三回分服

右每二時一食匙

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

四四〇 實麥答利斯葉浸

硝酸加留謨 (一、五)一五〇、〇

單舍利別 八、〇

右每二時乃至四時一食匙 二〇〇、〇

四四〇 實麥答利斯葉浸

硝酸加留謨 (二、〇)一八〇、〇

單舍利別 一〇〇、〇

右每二時一食匙 二〇〇、〇

四四二 實麥答利斯葉浸

硝酸加留謨 (二、〇)二〇〇、〇

古魯矢備謨丁幾 四、〇

單舍利別 五、〇

右每二時一食匙 三〇〇、〇

四四三 實麥答利斯葉浸

重酒石酸加留謨 (二、〇)一八〇、〇

單舍利別 各二〇〇、〇

右每二時一食匙

四四三 實麥答利斯葉浸

(〇、六)二三〇、〇

孕礪酒石

單舍利別 一〇〇、〇

右每二時一食匙 二〇〇、〇

四四四 實麥答利斯葉浸

(〇、五)一〇(一)一五〇、〇

碳酸加留謨 二、〇一五、〇

枸橼酸 二、〇一五、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

四四五 實麥答利斯葉浸

(一、五)一五〇、〇

重碳酸那篤留謨 五、〇

枸橼酸 二、五

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

四四六 木賊煎

(二、〇)一〇〇、〇

醋酸加留謨 一五、〇

海葱醋蜜 一五、〇

四四七 杜松實浸

(二、〇)二〇〇、〇

醋酸加留謨液 二〇〇、〇

海葱醋 二〇〇、〇

右每二時一食匙

四四八 アドニスツエルナリス草浸

(四、〇)一五〇、〇

橙皮舍利別 三〇〇、〇

右每二時一食匙

四四九 耶僕蘭日葉浸

(二、〇)一〇〇、〇

右頓服

●滴劑

四五〇 鹽酸莫兒比澄

一〇〇、〇

●滴水 一〇〇、〇

右每回五滴乃至十滴

四五二 杏仁水 一〇〇、〇

實麥答利斯丁幾 二、〇

四五三 ストロファンツス丁幾 五、〇

右一日三回每回五滴乃至十滴

四五四 醋酸依的兒 二、五

酒精 七、七

●水劑 右每回一滴乃至三十滴

●水劑

圖五 撒里矢爾酸那篤留謨 八、〇

水 一五〇、〇

薄荷水 三〇、〇

右每二時一食匙

圖五 撒里矢爾酸那篤留謨 五、〇

水 一五〇、〇

覆盆子舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

圖五 磷酸里母奈坪 * 二〇〇、〇

右每一時一食匙

圖五 酒石酸里母奈坪 * 二〇〇、〇

右每一時一食匙

圖五 設里酒 一〇〇、〇

右每十五分時一食匙

圖五 安知必林 五、〇

橙皮舍利別 二五、〇

水 五〇、〇

右每時一食匙

圖六 貌魯謨加留謨 六、〇

苦味丁幾 三、〇

安知必林 一、〇

水 二〇〇、〇

單舍利別 一五、〇

圖六 右一日三回分服 貌兒謨加留謨 六、〇

苦味丁幾 三、〇

單舍利別 一五、〇

水 二〇〇、〇

圖六 右一日三回分服 機那丁幾 三、〇

沃度加留謨 一、〇

橙皮舍利別 三、〇

水 一〇〇、〇

圖六 右一日三回分服 單舍利別 二〇、〇

酒精 二五、〇

苦味丁幾、芳香丁幾 各二、〇

圖六 右每十五分乃至半時一食匙 炭酸加留謨液 * 一五、〇

醋 七五、〇

單舍利別 一五、〇

餾水 九〇、〇

右為飽和水每二時一食匙

圖六 散劑 〇、五

圖七 乳糖 〇、三

圖八 鹽酸必魯加兒必涅 〇、〇二

圖九 右一日一回頓服 白糖 〇、五

圖十 硫酸規尼涅 〇、四一〇、一二

圖十一 白糖 五、〇

圖十二 右分六包每三時一包 咖啡涅 〇、三

圖十三 右分三包一日三回每回一包 乳糖 一、五

圖十四 右分六包一日三回每回一包 枸橼酸咖啡涅 〇、六

圖十五 右分六包一日六回每回一包 乳糖 三、〇

圖十六 實麥答利斯末 一、二

圖十七 樟腦 〇、六

圖十八 右分六包每時一包 實麥答利斯末 〇、二

圖十九 硝酸加留謨 二、〇

圖二十 白糖 五、〇

圖二十一 右分六包一日三回每回一包 實麥答利斯末 〇、三

圖二十二 鹽酸規尼涅 二、五

甘末 〇、六
白糖 三、〇

四七三 實麥答利斯葉末 〇、二
硫酸規尼涅 〇、四

白糖 五、〇
右分六包一日三回每回一包

四七四 純精洒石 二〇、〇
枸橼油糖 二〇、〇

右每回一茶匙
四七五 硝酸加留謨 四、〇
重酒石酸加留謨 三、七

甘末 〇、二
吐洒石 〇、一

右分八包每二時乃至三時一包

四七六 硫酸スバルテイン 〇、一
乳糖 二、五

右分五包一日三回每回一包

●丸劑 〇、一
鹽酸規尼涅

四七六 實麥答利斯末 一、五
右爲丸三回分服

右爲三十九一日三回每回二粒

四七九 實麥答利斯末 一、五
鹽酸規尼涅 〇、三

右爲三十九一日三回每回二粒

四八〇 沃度加留謨 三、〇
實麥答利斯葉末 〇、五

右甘草羔、甘草末各適宜爲三十九一日三回每回一粒乃至二粒

四八一 結晶「アコニチン」 〇、〇五
右以甘草末及甘草羔爲十九

一日二粒乃至三粒

●塗布劑
四八二 沃度加留謨 一、〇
豚脂 一五、〇

右爲軟膏塗布

四八三 沃度仿謨 二、五
百露拔爾撒謨 二、〇

豚脂 二五、〇
右塗布心臟部

四八四 單軟膏 一〇、〇

阿片末 二〇、〇
沒食子丁幾 三〇、〇

四八五 水銀軟膏 適宜
右塗布

四八六 芥子泥 適宜
右貼布

四八七 芫青膏 適宜
右貼布

四八八 水蛭 數條
右貼布

●注射劑
四八九 樟腦油(一〇%) 二〇、〇
右每回一筒乃至二筒注射皮下

四九〇 鹽酸ピロカルピン 〇、一
蒸餾水 一〇、〇

右半筒乃至一筒注射皮下

四九一 撒里矢兒酸ナトリウム咖啡涅 二、〇一五、〇
水 一〇、〇

右一日二回乃至四回每回半筒乃至一筒注射皮下

右一日二回乃至四回每回半筒乃至一筒注射皮下

圖九二 安知必林

三、〇一五、〇一

水

二〇〇、〇一

右灌腸

心內膜炎(急性及亞急性) *Endocarditis. (acuta et subacuta)*

心臟內膜炎、心內衣嫩衝、舊譯作心房炎、又名心肉皮炎、又名心襯衣生炎、古時以此症包括於心痛、胸痛、或熱心痛之症狀中
處置 心部水浴法、芥子泥貼用、乾性吸角、實麥答利斯、硝酸加里、葡萄酒、依的兒樟腦等之充奮藥、刺絡等

● 浸煎劑

圖九三 實麥答利斯浸

(二、〇)二二〇、〇

覆盆子舍利別

三〇、〇

右每二時一食匙

圖九四 實麥答利斯葉浸

(〇、六)一一〇、〇一八〇、〇

橙皮舍利別

二〇、〇

右每二時一食匙

圖九五 實麥答利斯浸

(〇、五)一一〇、〇一〇〇、〇

單舍利別

七、〇

ストロファンソス丁幾

一、〇一、二、〇

右一日數回分服

圖九六 實麥答利斯浸

(一、〇)一五〇、〇

醋酸加爾謨

二、〇

單舍利別

一五、〇

右每二時一食匙

圖九七 實麥答利斯浸

(〇、三)一二〇、〇

杏仁水

三、〇

單舍利別

三〇、〇

右每三時一茶匙、小兒

圖九八 實麥答利斯浸

(〇、三)一〇〇、〇

鹽酸規尼理

〇、三

單舍利別

八、〇

右一日三四分服

圖九九 實麥答利斯浸

緋草丁幾

三、〇

右一日三四分服

圖一〇〇 實麥答利斯葉浸

(二、〇)二〇〇、〇

硝酸加爾謨

古魯矢伽謨丁幾

四、〇

單舍利別

五、〇

右每二時一食匙

圖一〇一 機那煎 (二〇、〇)一八〇、〇

フランデー酒

四〇、〇

單舍利別

二〇、〇

右一日六回二日分服

圖一〇二 亞爾答亞根煎 二五〇、〇

硝酸加爾謨

八、〇

吐酒石

〇、〇三

白糖

一〇、〇

右每二時一食匙

●水劑

四五〇三 ストロファンツス丁幾

右一日三回每回十滴乃至二十滴

十滴

四五〇四 沃度加留謨

寶麥答利斯丁幾

亞拉比亞護謨漿

右一日數回分服

四五〇五 硝酸加留謨

單舍利別

水

右每二時一食匙

四五〇六 硝酸加留謨

單舍利別

右每二時一食匙

四五〇七 撒里矢爾酸那篤留謨

水

單舍利別

右每三時一小兒匙、小兒

四五〇八 撒里矢爾酸那篤留謨咖啡混

水

右一日二回每回半筒乃至一筒注射皮下

筒注射皮下

四五〇九 磷酸

水

單舍利別

右每二時一小兒匙、小兒

五〇一〇 ポルト酒

右每三時半食匙乃至一食匙

五〇一一 卵黃

武蘭埕酒

單舍利別

水

右一日六回二分服

五〇一二 安知必林

右分三包一日三回每回一包

五〇一三 寶麥答利斯末

白糖

右分六包一日三回每回一包

五〇一四 寶麥答利斯葉末

〇、二

硫酸規尼混

右分六包一日三回每回一包

五〇一五 硝酸加留謨

重酒石酸加留謨

甘末

吐酒石

右分八包每二時乃至三時一包

五〇一六 樟腦

乳糖

右分十包一日三回每回一包

五〇一七 樟膠

亞拉比亞護謨

右分十包一日三回每回一包

五〇一八 硫酸規尼混

白糖

右分三包一日三回每回一包

小兒

●丸劑

鹽酸規尼混

昇汞

右亞爾答根末適宜爲二十九

一日三回每回一粒

四三〇 實麥答利斯葉末

五、〇

鹽酸莫兒比涅

〇、三

樟腦

二、〇

右爲四十九一日二回每回一

四三二 粒乃至二粒
樟腦、阿列布油

(一、〇)一〇、〇
右一筒乃至二筒注射皮下

四三三 重碳酸那篤留漢水

右吸入

(一、五)一〇〇、〇

瓣膜異常 *Angebildete Klappenfehler, Vitium earidis, Herzfehler.*

心臟膜病、心欠、心臟瓣膜障害、僧帽瓣閉鎖不全、僧帽瓣孔狹窄、大動脈瓣閉鎖不全、大動脈瓣孔狹窄、三尖瓣閉鎖不全、三尖瓣孔狹窄、肺動脈瓣閉鎖不全、肺動脈瓣孔狹窄、左靜脈孔狹窄、右靜脈孔狹窄、ボタリ一氏管之開放、卵圓孔之開放

處置 慎過度之勞働、避精神之興奮、禁溫浴、整通便、宜飲食攝生轉地靜養等

● 浸煎水劑

四三三 實麥答利斯浸

(一、〇)一、五)二五〇、〇

單舍利別

三〇、〇

右每二時一食匙

四三四 實麥答利斯葉浸

(〇、五)一、二)二〇〇、〇

覆盆子舍利別

二〇、〇

右每二時二食匙

四三五 實麥答利斯葉浸

(一、五)一、八)〇、〇

麥角越幾斯

二、〇

右每二時一食匙

四三六 實麥答利斯浸

(一、〇)一、五)〇、〇

硫酸アトロピチ化(〇、三%)

一、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

四三七 實麥答利斯浸

(一、〇)一、五)〇、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

杜松實舍利別 一五、〇

右一日三回二日分服

四三八 實麥答利斯葉浸

(〇、七)一、五)〇、〇

甘硝石精

二、〇一五、〇

海葱醋蜜

二〇、〇

右每三時一食匙

四三九 實麥答利斯葉浸

(一、〇)一、八)〇、〇

醋酸加留漢

六、〇

單舍利別

一五、〇

右每二時一食匙

四五〇 實麥答利斯浸

(〇、四)一〇〇、〇

醋酸加留漢

三、〇

橙皮舍利別

二〇、〇

右一日四回每回一小兒匙、

小兒
望三 實麥答利斯葉浸

(一、二)二二〇、〇

醋酸加儂液

海葱醋蜜

右每二時一食匙

望三 實麥答利斯浸

(二、〇)二〇〇、〇

硝酸加儂液

古魯矢備護丁幾

單舍利別

右每二時一食匙

望三 實麥答利斯浸

(〇、三)一〇〇、〇

杏仁水

單舍利別

右一日三回乃至四回每回一

望三 實麥答利斯浸

小兒匙、小兒

(一、五)二二〇、〇

孕礪酒石

右每二時一食匙

望三 實麥答利斯葉浸

(二、〇)一八〇、〇
枸橼酸咖啡涅

ストロファンツト丁幾

醋酸加儂液

甘草羔

右每二時一食匙

望三 實麥答利斯

吐根

右浸出

鹽酸規尼涅

醋酸加儂液

攝涅瓦舍利別

右一日六回分服

望三 實麥答利斯

吐根

右浸出

礮砂加荷香精

杏仁水

單舍利別

右一日六回分服

望三 吐根、實麥答利斯葉浸

醋酸加儂液

(各一、〇)二〇〇、〇

一〇、〇
海葱醋

望三 實麥答利斯、吐根

右浸出

鹽酸規尼涅

單舍利別

右一日六回分服

望三 實麥答利斯葉末

海葱

野薔薇實

杜松實

右浸漬於白酒二時間後濾過

一日二回每回一食匙

望三 海葱浸

醋酸加儂液、單舍利別

各二五、〇

右每二時一食匙

望三 海葱浸

(二、〇)一五〇、〇
重碳酸那篤儂液

枸橼酸(飽和)

橙皮舍利別

右每二時一食匙

望三 杜松實浸(一五、〇)一八〇、〇

醋酸加留謨液、海葱醋蜜

各一五、〇

右每時一食匙

四五四 纈草根浸(一〇、〇)二〇〇、〇

依的兒

二〇、〇

橙皮舍利別

二〇、〇

右每時一食匙

四五五 亞爾尼加花浸

(七、五)一五〇、〇

安母尼亞茴香精

二、五

橙皮舍利別

一五、〇

右每時一食匙

四五六 機那皮

一五、〇

纈草根

一〇、〇

右浸出

一五〇、〇

依的兒

二〇、〇

桂皮舍利別

二〇、〇

右每二時一食匙

四五七 烏頭浸 (六、〇)一八〇、〇

硝酸加留謨

四、〇

杜松實蜜

二〇、〇

右每二時一食匙

四五八 鈴蘭葉浸(一〇、〇)一七〇、〇

亞拉比亞護謨漿

三〇、〇

右每二時一食匙

四五九 實麥答利斯丁幾

十滴

杏仁水

一〇、〇

右一日三回每回十滴

四六〇 杏仁水

一〇、〇

鹽酸莫爾比涅

〇、一

右一日二回乃至四回每回五滴

四六一 杏仁水

一〇、〇

實麥答利斯丁幾

五、〇

魯別里亞丁幾

一、五

右每回四滴乃至五滴

四六二 硫酸スバルテイン

〇、二

水

一〇、〇

右一日二回乃至四回每回二十滴

四六三 ニトログリセリン酒精液(一%)

五、〇

十滴

右一日三回每回二滴乃至十滴

四六四 依的兒性格魯兒鐵丁幾

一〇、〇

滴

四六五 魯別刺亞丁幾

五、〇

右每時十滴乃至十五滴

四六六 コセニルラ丁幾

三〇、〇

右一日三回每回十滴

四六七 實麥答利斯丁幾

五、〇

杏仁水

一〇、〇

右每時十滴乃至十五滴

四六八 實麥答利斯丁幾

五、〇

魯別刺亞丁幾

一〇、〇

右每時四滴乃至五滴

四六九 實麥答利斯丁幾

四、〇

杏仁水

一〇、〇

右一日二回乃至四回每回五滴乃至二十滴

四七〇 實麥答利斯丁幾

二、〇

纈草丁幾

四、〇

林檎酸鐵丁幾

二、〇

杏仁水

四、〇

單舍利別

八、〇

水

一〇、〇

右一日三回分服

四七一 實麥答利斯丁幾

二、〇

水

二、〇

重碳酸那篤留謨

二、〇〇

機那丁幾

四、〇〇

水

一〇〇、〇〇

右一日三回分服

四五六

實支答利斯丁幾

二、〇〇

蕃木甃丁幾

二、〇〇

林檎酸鐵丁幾

二、〇〇

單舍利別

一〇〇、〇〇

水

一〇〇、〇〇

右一日三回分服

四五六

實支答利斯加海葱醋

一五、〇一三〇、〇〇

炭酸加留謨液(飽和)

一五〇、〇〇

單舍利別

二〇〇、〇〇

右每二時一食匙

四五六

ストロファンツス丁幾

一、〇一五、〇〇

水

一三〇、〇〇

橙皮舍利別

二〇〇、〇〇

右一日三回每回一食匙

四五六

醋酸加留謨水*

二五、〇〇

單舍利別

二五、〇〇

杜松子水

一〇〇、〇〇

右每二時一食匙

四五六

撒里矢爾酸那篤留謨咖啡涅

二、〇一二、五〇

水

一二〇、〇〇

薄荷水

三〇〇、〇〇

右一日三回每回一食匙

四五六

安息香酸那篤留謨咖啡涅

一、五〇

水

一五〇、〇〇

單舍利別

一五、〇〇

右每二時一食匙

四五六

薄荷水

一〇〇、〇〇

右一日數回分服

四五六

チウレチン

五、〇一七、〇〇

水

一〇〇、〇〇

單舍利別

一〇〇、〇〇

薄荷水

一〇〇、〇〇

右每二時一食匙

四五六

硫酸スバルテイン

〇、〇三

水

三〇〇、〇〇

單舍利別

三〇〇、〇〇

右一日三回每回一食匙

四五六

二、〇〇

貌魯謨加留謨

〇、一五

單舍利別

八、〇〇

右一日三回分服

四五六

沃度加留謨

一、〇〇

亞硫酸加留謨水

六滴

林檎酸鐵丁幾

三、〇〇

苦味丁幾

二、〇〇

單舍利別

七、〇〇

水

一〇〇、〇〇

右一日三回食後分服

四五六

苦味丁幾

二二〇、〇〇

蕃木甃丁幾

一〇〇、〇〇

右每食後十五滴

四五六

健質亞那越幾斯

六、〇〇

桂皮水

一五〇、〇〇

依的兒精

五、〇〇

右每二時一食匙

四五六

加爾兒斯泉鹽

一五、〇〇

苦味丁幾

二、〇〇

水

一〇〇、〇〇

右一日三回分服

四七五 百露拔爾撒謨

二、〇

滿那舍利別

八〇、〇

右每回一茶匙

四七六 薄荷水

一〇〇、〇

安母尼亞茴香精

二、〇

右每時一食匙

●散劑

四七七 咖啡澀

〇、六一、〇

乳糖

三、〇

右分六包一日六回每回一包

四七八 咖啡澀

〇、六

薄荷油糖

一、五

右分六包一日三回每回一包

四七九 枸橼酸咖啡澀

〇、五一、〇

枸橼油糖

三、〇

右分六包一日三回每回一包

四八〇 撒里矢爾酸那篤留謨咖啡澀

三、〇

右分十包一日四包乃至六包

四八一 撒里矢爾酸那篤留謨咖啡澀

各二、五

枸橼油糖

各二、五

右分十包一日四回每回一包

四八二 安息香酸那篤留謨咖啡澀

二、〇

右分十包一日四包乃至八包

四八三 實艾答利斯葉末

〇、一一、〇

右分十包每二時一包

四八四 實艾答利斯末

〇、六

鹽酸規尼澀

〇、二五

白糖

一、〇

右分三包一日三回每回一包

四八五 實艾答利斯末

小兒

〇、三

咖啡澀

一、二

右分四包一日四包

四八六 實艾答利斯葉末

〇、五

甘末

一、〇

藥刺巴根末

五、〇

右分十包每三時一包

四八七 硫酸規尼澀

一、〇

白糖

二、〇

右分十包朝夕一包

四八八 硫酸規尼澀

一、〇

鹽酸莫兒比澀

〇、〇五

白糖

二、〇

四八九 硫酸規尼澀

〇、四

實艾答利斯葉末

〇、二

白糖

四、〇

右分六包一日三回每回一包

四九〇 硫酸規尼澀

〇、五

安息香酸

〇、二

白糖

五、〇

右分六包一日三回每回一包

四九一 安息香酸

二、〇

樟腦

〇、六

白糖

三、〇

右分十二包每三時一包

四九二 樟腦、金硫黃

各〇、五

安息香酸

三、〇

茴香油糖

〇、五

右分十包每二時一包

四九三 甘末

二、〇

右分十包一日四回乃至五回

四九四 甘末

二、〇

白糖

三、〇

右分十包一日二包

四 鈴蘭越幾斯 五、〇
杜松實越幾斯 二、五
右甘草末適宜爲五十九一日
三粒乃至五粒

五 子リ、オンアンデル越幾斯 一、五
玫瑰精 適宜
右爲三十九一日一粒乃至三
粒

六 複方大黃越幾斯〇、五一一、〇
右爲三九頓服

●注射劑

心臟肥大 Hypertrophia cordis.

心肥大、特發性心臟肥大、舊譯作心體變大

三 實麥答利斯浸 (二、〇)一五〇、〇

單舍利別 一五、〇
右每二時一食匙

四 實麥答利斯浸 (〇、三)一〇〇、〇

七 咖啡涅 一、五
安息香酸那篤留謨 一、五
水 一〇、〇

右每回一筒注射皮下

八 咖啡涅 四、〇
撒里矢爾酸那篤留謨 三、〇
水 一〇、〇

右每回半筒乃至一筒注射皮下

九 咖啡涅 二、五
安息香酸那篤留謨 三、〇
縮水 一〇、〇

右一日三回每回一筒注射皮下

一〇 「コロール」咖啡涅水 一、四
右一日二筒乃至四筒注射皮下

二 安息香酸 一、五
樟腦 一、〇
酒精 一二、〇

右每回一筒注射皮下

三 實麥答利斯浸(一、〇)八〇、〇
亞拉比亞護謨藥 三〇、〇
右浣腸

沃度加留謨 一、〇
右一日三回分服

五 實麥答利斯丁幾 一〇、〇
右一日三回每回二十滴

六 ストロファンツス丁幾 五、〇
右一日數回每回五滴乃至十

七 沃度加留謨 一、〇
還元鐵 〇、六
右爲丸一日三回分服

心悸動 Palpitatio cordis. Cardiopalmsus.

Hyperkinesis cordis. Nervöse Palpitation.

神經性心悸、心悸亢進、神經性心機亢盛、心動疾速症、心下悸、心悸、神經性心悸亢進、發作性心悸、急速症、急脈症、舊譯作心跳症、古名怔忡
處置 嚴正安臥、心部冷法、其他避心身之過勞、投與鐵劑規尼涅劑

● 浸煎劑

四六元 機那煎 (一〇、〇) 一〇〇、〇

貌魯謨加留謨

椴皮舍利別

右每二時一食匙

四三元 實麥答利斯浸

ポルト酒

右每二時一食匙

四三〇 實麥答利斯浸

纈草丁幾

杏仁水

右每二時一食匙

四二三 實麥答利斯浸

單舍利別

● 硝酸加留謨

右每二時一食匙

● 水劑

四三三 實麥答利斯丁幾

貌羅謨加留謨

餽水

右一日一食匙乃至三食匙

四三三 實麥答利斯丁幾

貌羅謨加留謨

林檎酸鐵丁幾

杏仁水

右一日三回分服

四三四 貌羅謨那篤留謨

苦味丁幾

單舍利別

右一日六回分服

四六五 貌羅謨化加留謨

水

單舍利別

右每二時一食匙

四六五 貌羅謨加留謨

健質亞那丁幾

水

右一日六回二日分服

四六七 貌羅謨加留謨

苦味丁幾

水

單舍利別

右一日三回分服

四六八 沃度加留謨

實麥答利斯丁幾

水

右每二時一食匙

四六元 硝酸那篤留謨

水

右每三時一茶匙

二、〇
三、〇

四六〇 鹽酸莫兒比涅

水

亞爾答舍利別

右一日二三回每回一茶匙、小兒

〇、〇二
四、〇〇
二、〇〇

四六一 抱水格魯刺爾

貌羅謨化加留謨

亞拉比亞謨謨

單舍利別

水

右一日三回二日分服

各三、〇〇
一、〇〇〇

四六二 勃拉篤利涅

水

橙皮舍利別

右一日三回每回一食匙

一、〇〇〇
二、〇〇〇

四六三 亞砒酸加留謨

水

苦味丁幾

右一日三回二日分服

二十滴
一、〇〇〇
三、〇〇

四六四 鈴蘭越幾斯

五、〇一〇〇

橙皮舍利別

右一日三回每回一食匙

七、五〇

●滴劑

四六五 實麥答利斯丁幾

杏仁水

右一日三回每回八滴、小兒

三、〇〇
一、〇〇

四六六 實麥答利斯丁幾

杏仁水

右一日三回每回十五滴

二、五〇
七、五〇

四六七 實麥答利斯丁幾

杏仁水

阿片丁幾

右每三時十滴

各一、〇〇
五、〇〇

四六八 葛私篤僕謨丁幾

●丸劑

右一日數回每回十滴

二、〇〇
一、〇〇

四六九 硫酸規尼涅、麥角越幾斯

●丸劑

水製落木甌越幾斯

右為三十九一日二回每回二三粒

各二、五〇
〇、五〇

四七〇 鈴蘭越幾斯

五、〇〇

杜松子越幾斯

右甘草末甘草蒸適宜為五十九一日二三粒

二、五〇

四七一 炭酸鐵

●散劑

右為丸一日三回食後分服

〇、〇三

四七二 鹽酸規尼涅

●散劑

右頓服

〇、五〇

四七三 別刺敦那越幾斯

●散劑

右分四包一日四回每回一包

〇、三〇
一、五〇

四七四 貌羅謨加留謨

●散劑

右分十包一日二三回每回一包

一、〇〇〇
一、〇〇〇

四七五 貌羅謨加留謨

●散劑

右分十包每時一包、小兒

四、〇〇
〇、四〇
二、〇〇

四七六 鹽酸莫兒比涅水

●散劑

右一筒注射皮下

〇、一〇〇〇

嬰五七 樟腦阿列油(二%)

右注射液下

嬰五九 貌魯謨化樟腦

白糖

一、〇
九、〇

右爲錠劑十個一日四個

心臟神經痛

Angina pectoris, Stenocardia.

絞心症、心臟痙攣、心胸神經痛、胞內逼壓、胸控、狹心症、疥癩、卒痛、真心痛、肩項卒痛、舊譯作心疝、又名胸痛急症、

●水劑

嬰五八 實艾答利斯浸

(〇、三)八〇〇、〇

鹽酸莫兒比涅

單舍利別

〇、〇五
二、〇〇

嬰六〇 顯草根

機那皮

右沙出

一〇、〇〇
一〇、〇〇
二〇〇、〇〇

設里酒

單舍利別

五〇〇、〇〇
三〇〇、〇〇

右每二時一食匙

嬰六一 貌魯謨加留謨

水

八、〇〇
二〇〇、〇〇

苦味丁幾

右每二時一食匙

嬰六二 貌魯謨加留謨

水

二、〇〇

橙皮舍利別

五、〇〇
一〇〇、〇〇

右一日三四分服

嬰六三 貌魯謨加留謨

鹽酸莫兒比涅

三、〇〇
〇、〇三

單舍利別

右一日三四分服

嬰六四 貌魯謨加留謨

抱水格魯刺兒

三、〇一六、〇〇
一、〇一二、〇〇

水

單舍利別

六〇〇、〇〇
二〇〇、〇〇

右每時一茶匙、小兒

嬰六五 嚼囉仿謨水*

橙花水

一〇〇、〇〇
二〇〇、〇〇

單舍利別

鹽酸莫爾比涅

三〇〇、〇〇
〇、〇三

或撒里矢爾酸那篤留謨

貌羅謨加留謨

四、〇一八、〇〇
一、〇〇

右一日數回每回一小兒匙乃

至一食匙

嬰六六 エキサルギン

橙皮丁幾

二、五〇
一五、〇〇

留水

橙花舍利別

一三〇、〇〇
二〇、〇〇

右每朝夕一食匙

嬰六七 エキサルギン

薄荷精

二、五〇
五、〇〇

水

橙皮舍利別

一〇〇、〇〇
三〇、〇〇

右朝夕一食匙

嬰六八 硝酸那篤留謨

水

一五〇、〇〇
〇、〇五

右一日三食匙乃至四食匙

●滴劑

嬰六九 鹽酸莫兒比涅

杏仁水

右每十五分十滴

〇、〇五
一〇、〇

嬰七〇 亞硝酸アミール

餾水

右每回二滴乃至五滴

二、〇
八、〇

嬰七一 ニトログリセリン

薄荷水

右每回二滴乃至十滴

八、〇
二、〇

嬰七二 ニトログリセリン

酒精

右一日二回每回一二滴

一〇、〇
一〇、〇

嬰七三 古坪乙涅

酒精

餾水

右一日三回每回十滴乃至二十滴

〇、〇一
一、〇
一九、〇

嬰七四 緬草丁幾

過格魯兒鐵液

右一日二回每回二十滴

一五、〇
五、〇

嬰七五 緬草丁幾

右一日二回每回二十滴

五、〇

海狸丁幾

右每十五分十滴

一、五

嬰七六 阿魏丁幾

右一日三回每回二滴乃至三十滴

一〇、〇

嬰七七 海狸香丁幾

右一日數回每回十五滴乃至二十五滴

一〇、〇

嬰七八 杏仁水

吐根丁幾

安母尼亞茴香精

右每十分十滴乃至十二滴

一〇、〇
二、五

嬰七九 沃度加留謨

右每回二十滴乃至四十滴

五、〇
二〇、〇

嬰八〇 亞砒酸加留謨液

林檎酸鐵丁幾

右一日三回每回十五滴

五、〇
二〇、〇

嬰八一 亞砒酸加留謨液

桂皮水

右一日二回每回二滴乃至五滴

二、〇
一五、〇

嬰八二 林檎酸鐵丁幾

右一日二回每回二滴乃至五滴

二〇、〇

嬰八三 菲沃斯越幾斯

杏仁水

右一日三回每回二十滴

〇、五
一五、〇

嬰八四 芳香阿片酒、吐根酒

或吐根丁幾

安母尼亞茴香精 各五、〇

右一日三回每回十滴乃至十五滴

五滴

●散劑

嬰八五 鹽酸規尼涅

右頓服

〇、五

嬰八六 鹽酸規尼涅

還元鐵

〇、四
〇、五

白糖

右分十包一日三回每回一包

三、〇

嬰八七 撒里失爾酸那篤留謨咖啡涅

乳酸鐵

茴香油糖

右分十包一日三包

一、〇
五、〇
四、〇

嬰八八 貌魯謨加留謨

緬草亞鉛

〇、二一〇、五
〇、〇三

白糖 〇、三
右爲一包每時一包、小兒

四六九 酸化亞鉛 一、〇
白糖 三、〇

右混和分十包一日三回每回一包

四六九 酸化亞鉛 〇、〇六
菲沃斯越幾斯 〇、〇六

續草根末 二、〇
續草油 一滴

右分十包一日三回每回一包

四六一 硝酸銀 〇、〇五
右甘草羔甘草末各適宜爲十

四六二 硝酸銀 〇、一
右白礬土適宜爲二十九一日

三回每回一粒

四六三 酸化亞鉛、菲沃斯越幾斯 各二、〇
續草越幾斯 各二、〇

右蜀葵根末適宜爲四十九一日

四六四 酸化亞鉛 一、五
日三回每回一粒

樟腦、別拉敦那越幾斯各〇、九
右爲三十九朝夕一粒

四六五 硫酸亞錳魯比涅 〇、〇〇一
右爲丸

四六六 菲沃斯越幾斯 二、〇
菲沃斯葉末 二、〇

右爲二十九每二時一粒

四六七 ニトログリセリン 〇、〇一
右睡菜葉末健質亞那末各適

宜爲二十九朝夕各一粒

四六八 白糖 二、〇
亞拉比亞護謨 一、〇

右二十丸一日數回分服

四六九 古埤乙涅 〇、五
亞兒答根末 二、〇

右單舍利別適宜爲二十九每

夕一二粒

四七〇 ニトログリセリン 〇、〇五
亞硝酸アミール 二十五滴
メントール 〇、〇三
カプシチン 〇、〇六
右以白糖及亞拉比亞護謨混

爲錠五十個一日二回朝夕各一個

●注射劑 四、〇
咖啡涅 三、〇

撒里矢爾酸那篤留謨 一、〇、〇
糖水 〇、〇

右每回一筒注射皮下

四七二 咖啡涅 二、五
安息香酸那篤留謨 二、九五

糖水 一、〇、〇
右注射皮下每回一二筒

四七三 安息香酸那篤留謨咖啡涅 二、〇
糖水 一、〇、〇

右二分一筒至一筒注射皮下

四七四 古埤乙涅 〇、〇一
酒精 一、〇
糖水 九、〇

右半筒至一筒注射皮下

四七五 磷酸古埤乙涅 〇、〇五
糖水 一、〇、〇

右每回半筒乃至一筒注射皮下

四七〇六 磷酸古坪乙滯

水 〇、五

石炭酸 〇、〇一

右每回一二筒注射皮下

四七七 安知必林

鹽酸古加乙滯 五、〇

右每回一筒注射皮下 〇、五

四七〇八 鹽酸莫爾比滯

石炭酸水 * 〇、一 〇、三 一、〇〇

動脈瘤 Aneurysma.

動脈膨大、跳血管、血管瘤、又名脈管生跳血管

四七四 貌魯謨加留謨

重碳酸那篤留謨 二、〇

苦味丁幾 二、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

四七五 沃度加留謨

單舍利別 二、〇 八、〇

靜脈怒張、靜脈腫

Aneurysm varicosum. Varice, Phlebektasie.

右四分一筒至一筒注射皮下

● 嗅入劑

四七〇九 醋酸依的兒

或依的兒

或嚼嚙仿謨

右每回一茶匙嗅入

四七一〇 亞硝酸亞密爾 五滴

右嗅入

四七一 亞硝酸亞密爾 五、〇

尚香油 一、〇〇

四七三 嚼嚙仿謨 五、〇

右嗅入

四七三 沃度加留謨 三、〇

貌羅謨加留謨 二、五 一、三、〇

別拉敦那越幾斯 〇、一 〇、二

水 二〇、〇

右一回十分一和水灌腸

水 一〇〇、〇

右每二時一食匙

四七六 沃度化加留謨 二、〇 一、四、〇

苦味丁幾 四、〇

水 二〇〇、〇

右每二時一食匙

四七七 單寧酸 一、〇

● 散劑

四七九 麥角越幾斯 二、〇

酒精、僱里設林 各六、〇

白糖 一、五

右分五包每二時一包

四七六 醋酸鉛 〇、三 一、〇、六

乳糖 一、〇

右分六包一日六回每回一包

四七九 麥角越幾斯 二、〇

酒精、僱里設林 各六、〇

右半筒注射皮下

靜脈瘤、靜脈腫、靜脈擴張症、筋瘤
 四七〇 人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇 右頰服

四七二 硫酸麻僱涅叟謨 一五、〇 右頰服
 四七三 麥角越幾斯 一、〇 偏里設林、水 各五、〇

毛細管擴張 Telangiectasie.

四七三 三倍吐酒石軟膏 二〇、〇 右母斑腐蝕

バセト一氏病 Morbus Basedowii.

●水劑
 四七四 機那煎 (一〇、〇)一五〇、〇 杏仁水 四〇、〇
 赤葡萄酒 六〇、〇 水 一〇〇、〇
 單舍利別 三〇、〇 右一日六回分服

四七五 實艾答利斯浸 (〇、三)一〇〇、〇 水 一〇〇、〇
 右每二時一食匙 單舍利別 八、〇
 沃度加留謨 一、〇 右一日三回分服

四七六 沃度鐵舍利別 四、〇 水 一〇〇、〇
 單舍利別 八、〇 右一日三回分服
 右一日三回分服 苦味丁幾 一、〇
 實艾答利斯丁幾 二、〇 單舍利別 八、〇
 貌魯謨加留謨 二、〇 水 一〇〇、〇
 蕃木籠丁幾 一、〇 右一日三回分服

四七九 林檎酸鐵丁幾 四、〇 水 一〇〇、〇
 右一日三回分服

四七〇 亞砒酸加留謨液 四、〇
 右每食後五滴乃至十滴

右半筒注射皮下

●丸劑
 四七〇 亞砒酸 〇、三一〇、五
 胡椒末、亞兒答根末 各五、〇
 右爲九十九一日二回每回一
 粒乃至三粒

四七二 麥角越幾斯 五、〇
 右爲九十九一日三回每回一
 粒乃至三粒

四七三 鹽酸規尼遑 〇、三
 阿片 〇、三
 右爲丸一日三回分服

四七三 乳酸鐵 五、〇

毛細管擴張 バセト一氏病

鹽酸規尼涅 一、〇

右爲九十九一日三回每回二粒

四七四 炭酸鐵丸*

右一日三回每回三粒

四七五 鹽酸規尼涅

〇、一
〇、一
〇、一

乳酸鐵
芥木驚越幾斯 〇、〇、五

ウエルホーフ氏斑點病

Morbus maculosus Verlhofii.

蘆苻 〇、〇、一

右爲丸一日三回分服

四七六 カンナピン

〇、三
右乳糖適宜爲丸一日數回分服

四七七 鹽酸規尼涅

散劑
右分十包一日三回每回一包

四七八 枸橼酸咖啡涅

一、二
白糖 右分十包一日三回每回一包

四七九 硫酸ヂュボアシン

〇、〇、一
杏仁水 右四分一筒乃至半筒注入皮下

〇、〇、一
〇、〇、一

四七〇 ●水劑
規那煎 (一〇、〇)一五〇、〇

稀硫酸 五、〇

單舍利別 三〇、〇

四七一 右每二時一食匙

四七二 機那煎 (一〇、〇)一五〇、〇

稀硫酸 五、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

四七三 ハルレル氏酸性越歷矢兒

五、〇

覆盆子舍利別 三〇、〇

水 二〇〇、〇

四七四 右每二時一食匙
麥角越幾斯

水 二〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一小兒匙

四七五 水製麥角越幾斯

水 二〇、〇

覆盆子舍利別 二〇、〇

右每二時一小兒匙

四七六 過格魯兒鐵液

桂皮水 一〇、〇

右一日三回每回一食匙

四七七 單寧酸 二、五

水 一五〇、〇

橙皮舍利別 二五、〇

右每三時一食匙、血尿

四七八 過格魯兒化鐵液 一〇、〇

右每二時乃至三時二滴乃至五滴

四七九 稀硫酸 一五、〇

右每二時十滴和糖水服用

●散劑

四八〇 鉛糖 〇、〇、五

白糖 〇、〇、五

右爲一包一日四回每回一包

四八一 枸橼酸鐵規尼涅 一、〇

麥角越幾斯 〇、三一〇、五
白糖 二、〇
四七五 複方大黃越幾斯 〇、五

心囊水腫 Hydropericardium.

心衣水、心囊蓄水、心包水腫、當作心胞絡積水

● 浸煎劑

四七三 實麥答利斯浸

(一〇、五) 一五〇、〇

海葱丁幾

四、〇

單舍利別

二〇、〇

四七三 實麥答利斯浸

(一、〇) 一五〇、〇

海葱醋蜜

二〇、〇

醋酸加留謨

八、〇

單舍利別

一五、〇

四七五 海葱浸

(二、〇) 一二〇、〇

孕礪酒石

一五、〇

杜松子油糖

一、〇

四七五 海葱浸

(二、〇) 一二〇、〇

海葱醋蜜

三〇、〇

右爲一丸頓服

海葱丁幾

右每三時二十滴

● 丸劑

四六一 實麥末、海葱末、非沃斯越幾斯 各〇、六

右爲三十九丸每一時一粒

四六一 實麥答利斯末、海葱末各二、〇

杜松子油

健質亞那越幾斯 〇、四

右爲三十九丸每三時一粒乃至二粒

四六三 實麥答利斯末、海葱末各〇、五

桂皮末、孕礪酒石、甘草末 各一、〇

杜松子油 一、〇

右分五包一日三回每回一包

杜松子油 一、〇

右每二三時一食匙

四七五 杜松實浸 (二、五) 一八〇、〇

醋酸加留謨 一五、〇

四七五 杜松實浸 (二、五) 一八〇、〇

海葱醋蜜 一五、〇

四七五 杜松實浸 (二、五) 一八〇、〇

海葱醋蜜 一五、〇

心臟實質炎 Myocarditis.

心臟肌肉嫩衝、心筋質炎、心肉炎、心炎、心痛

●水劑

四七四

實麥答利斯浸

〇、五

撒里矢爾酸那篤留謨

三、〇

水

一〇〇、〇

右每二時一食匙

四七五

實麥答利斯浸

(一、五)一五〇、〇

格魯兒矢鳩母酒

八、〇

硝酸加留謨

八、〇

單舍利別

三〇、〇

右每二時一食匙

四七六

實麥答利斯丁幾

二、〇

重酒石酸加留謨

一〇〇、〇

水

一〇〇、〇

右每二時一食匙

四七七

鹽酸規尼涅

一、〇

稀鹽酸

一、〇

單舍利別

一五、〇

水

一〇〇、〇

右每二時一食匙

●散劑

四七六

實麥答利斯末

〇、三

甘末

〇、五

白糖

三、〇

右爲十包每二時一包

四七九

亞沃度末

〇、五

右爲五十九一日三回每回一

粒

第四編 神經系統諸病

第一節 腦及腦膜諸病

腦貧血 Anæmia cerebri. Gehirnämie.

腦髓乏血、腦髓血虛、血虛頭眩、又名腦脈缺血

處置

頭部低下、下肢高舉、解衣平臥、頭部及胸部冷卷、以嗅入藥及酒類使心氣亢奮

●散劑

四七七

阿片

〇、三

鹽酸規尼涅

〇、五

白糖

一、五

右一日一回

右分三包一日三回每回一包

四七三

還元鐵

〇、四

鹽酸規尼涅

〇、四

三、〇

右分十包一日三回每回一包

小兒

四七三 加糖酸化鐵 二〇、〇

右每回一刀尖、小兒

四七四 樟腦、安息香酸

各〇、一〇、五

白糖

右分十包每二時一包、小兒

四七五 麝香

白糖

右分十包每二時乃至三時一包

四七七 バラアルデヒド 五、〇

右數回分服

●水劑

四七七 依的兒性纈草丁幾 一〇、〇

右每十分十滴

四七六 海狸香丁幾 一〇、〇

右每十分時一滴

四七九 格魯兒鐵丁幾 二〇、〇

右一日三回每回八滴乃至十滴、小兒

四八〇 抱水格魯刺兒 二、〇

水

右一回乃至二回服用 一五、〇

四八一 赤葡萄酒 三〇、〇

水

右每時一食匙 六〇、〇

四八二 格魯兒化那篤留漢 二、〇

●注入劑

右注入靜脈內、小兒 三〇、〇

四八三 樟腦

安息香酸 一、五

酒精 二、〇

右注射皮下 一、〇

四八四 龍腦

阿列布油 四、〇

右一筒注射皮下 一〇、〇

四八五 依的兒

右半筒乃至一筒注射皮下 一〇、〇

●嗅入劑

四八六 醋酸 一滴

右嗅入

四八七 芥子精 五、〇

右嗅入

四八八 安母尼亞茴香精 二、〇

右嗅入

腦充血 Hyperemia cerebri.

舊譯作腦脈積血、又名腦血瘀、古醫書所謂頭痛、或上逆等病

腦膜充血 Hyperemia meningum.

處置 頭部高舉、安臥靜養、病室避明、顳額部之水埤、頭部及心臟部施冷濕法、四肢之溫包及熱浴、峻下劑、芥子泥、瀉血、灌腸

腦充血 腦膜充血

●浸煎劑

| | | |
|-----|----------|------------|
| 四七九 | 實麥答利斯浸 | (二、〇)二〇〇、〇 |
| | 單舍利別 | 一五、〇 |
| | 右每二時一食匙 | |
| 四七九 | 實麥答利斯浸 | (〇、三)一〇〇、〇 |
| | 硝酸加留謨 | 五、〇 |
| | 單舍利別 | 八、〇 |
| | 右一日三回分服 | |
| 四七九 | 實麥答利斯浸 | (〇、四)一二〇、〇 |
| | 重酒石酸加留謨 | 一〇、〇 |
| | 單舍利別 | 八、〇 |
| | 右每二時一食匙 | |
| 四七九 | 實麥答利斯浸 | (〇、三)一〇〇、〇 |
| | 人工加爾爾斯泉鹽 | 二五、〇 |
| | 右一日三回分服 | |
| 四七九 | 機那煎 | (八、〇)一〇〇、〇 |
| | 貌魯謨加留謨 | 三、〇 |
| | 單舍利別 | 一〇、〇 |
| | 右一日三回分服 | |

| | | |
|-----|----------|----------------|
| 四七九 | 麥角浸 | (二、〇)一四、〇)八〇、〇 |
| | 醋酸加留謨 | 三、〇 |
| | 杜松實舍利別 | 二〇、〇 |
| | 右每二時一二茶匙 | |
| 四七九 | 旃那浸 | (六、〇)一〇〇、〇 |
| | 硫酸麻佃涅叟謨 | 一二、〇 |
| | 單舍利別 | 一〇、〇 |
| | 右每二時一食匙 | |
| 四七九 | 旃那浸 | (二、五、〇)一五〇、〇 |
| | 硫酸麻佃涅叟謨 | 四五、〇 |
| | 水劑 | |
| | 右每二時一食匙 | |
| 四七九 | 鹽酸里母奈埤 | 二〇〇、〇 |
| | 水 | |
| | 右一日數回分服 | |
| 四七九 | 磷酸 | 三、〇 |
| | 單舍利別 | 二五〇、〇 |
| | 右一日數回分服 | |
| 四七九 | 人工加爾爾斯泉鹽 | 三〇、〇 |
| | 水 | |
| | 右一日三回分服 | |
| 四八〇 | 人工加爾爾斯泉鹽 | 二〇、〇 |

| | | |
|-----|-----------|-------|
| 四八〇 | 貌魯謨加留謨 | 二〇、〇 |
| | 水 | |
| | 右一日三回分服 | |
| 四八〇 | 枸橼酸麻佃涅叟謨 | 三五、〇 |
| | 單舍利別 | 八、〇 |
| | 水 | |
| | 右一日三回分服 | |
| 四八〇 | 硫酸麻佃涅叟謨 | 五〇、〇 |
| | 稀鹽酸 | 二〇、〇 |
| | 水 | |
| | 右一日三回二日分服 | |
| 四八〇 | 硫酸那篤留謨 | 二〇、〇 |
| | 稀硫酸 | 一〇、〇 |
| | 水 | |
| | 單舍利別 | 一二〇、〇 |
| | 右每一二時一食匙 | |
| 四八〇 | 巴豆油 | 一滴 |
| | 蓖麻子油 | 二〇、〇 |
| | 亞拉比亞護謨 | 一〇、〇 |
| | 右乳劑 | |
| | 薄荷油糖 | 一五〇、〇 |
| | 右每時一食匙 | |
| 四八〇 | 沃度那篤留謨 | 八、〇 |

水 二二〇、〇
單舍利別 三〇〇、〇
右一日三回每回一食匙

嬰六 貌羅謨化樟腦 二〇、〇
阿列布油 二〇〇、〇
亞拉昆亞護謨 一〇、〇

白糖 一〇〇、〇
右薄荷水適宜爲乳劑一日三
四回每回一食匙

嬰七 實麥答利斯丁幾 二十滴
貌魯謨加留謨 二〇〇、〇
水 二〇〇、〇

右一日二三食匙

嬰八 貌魯謨加留謨 二〇、〇
沃度加留謨 一〇、〇
苦味丁幾 二〇、〇

水 一〇〇、〇
右一日三回分服

嬰九 貌魯謨加留謨 二〇、〇
重碳酸那篤留謨 二〇、〇
苦味丁幾 二〇、〇

水 一〇〇、〇
右一日三回分服

嬰十 沃度加留謨 一〇、〇
蕃木盤丁幾 一〇、〇

水 一〇〇、〇
右一日三回分服

嬰〇 沃度加留謨 一〇、〇
蕃木盤丁幾 一〇、〇
水 一〇〇、〇
右一日三回分服、發作經過

●散劑 一〇〇、〇
人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇

嬰二 右每朝頓服

嬰三 甘草 〇、五
白糖 三〇、〇
右分十包一日三回每回一包

嬰四 甘草 〇、五
藥刺巴根末 一〇、〇
右一日一回

嬰五 藥刺巴末 五〇、〇
重酒石酸加留謨 九〇、〇
生薑末 一〇、〇
右分十包每夕一包

嬰六 酸化亞鉛 〇、三
貌魯謨加留謨 二〇、〇
白糖 二〇、〇

右分十包一日三回每回一包
小兒

嬰七 貌羅謨加留謨 五〇、〇
右分十包一日三回每回一包

嬰八 貌羅謨樟腦 一〇、〇
白糖 九〇、〇
右爲糕十個一日四回每回一
個

嬰九 フェナツエチン 五〇、〇
右分十包臨臥一包

●丸劑 六〇、〇
甘草 六〇、〇
藥刺巴根末 八、四
複方古魯聖篤越幾斯 一、六
藤黃 一〇、〇
右爲百九一回一粒乃至二粒

嬰三 藤黃 一〇、〇
藥刺巴脂 一〇、〇
古魯聖篤越幾斯 一〇、〇
右爲三十九每朝一粒

嬰三 沃度那篤留謨 六〇、〇
鹽酸莫兒比涅 〇、一〇〇、二五

二百九十七

右甘草越幾斯甘草末適宜爲
六十九朝四粒夕六粒

●洗腸劑

哭三 巴豆油

的列並底油

右加於石鹼液灌腸

哭四 巴豆油

蓖麻子油

亞拉比亞護謨

水

右灌腸

哭五 巴豆油

亞拉比亞護謨

水

右灌腸

右爲乳劑洗腸

哭六 的列並底油

右一茶匙加石鹼漿或加卵黃

水灌腸

哭七 抱水格魯拉兒

亞拉比亞護謨漿

右洗腸、痙攣

●注射劑

哭六 樟腦油(10%)

右一筒注射皮下

哭九 昇汞

沃度那篤留謨

水

右注射皮下

哭三 嚼囉仿謨

右嗅入、痙攣

哭三 水蛭

右左右耳後貼用

哭三 芥子末

右一回腳浴量

哭三 芥子泥

右塗擦四肢

哭四 芥子末

右每回三食匙加沸湯足浴

哭五 芥子泥

右腓腸部貼用

哭六 平流電氣

四電氣

右二分時間頭部貼用、發作
四週以後

舟暈 Nausea. Morbus nauticus.

注船病、船暈症、海上病、苦澀、紅暈

●水劑

哭七 古加葉浸

阿片安息香丁幾

右每回一茶匙

哭六 碳酸加留謨

枸櫞汁

水

橙皮舍利別

右每時一食匙

哭九 芳香丁幾

二十條

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

適宜

一五〇、〇

三〇〇、〇

六〇〇、〇

六〇〇、〇

一五、〇

八〇、〇

〇、一

〇、六

一〇〇、〇

五、〇

〇、一

〇、六

一〇〇、〇

五、〇

〇、一

〇、六

一〇〇、〇

五、〇

〇、一

〇、六

一〇〇、〇

五、〇

〇、一

〇、六

一〇〇、〇

五、〇

單舍利別 各二〇、〇

右二回分服

哭四 百弗聖

稀鹽酸

橙皮丁幾

單舍利別

露水

右每三時一食匙

哭四二 メントール

酒精

單舍利別

右每時一茶匙

哭四 鹽酸古加乙涅

苦扁桃水

右一日三四回每回十滴乃至十五滴

哭四 呀囉仿謨 三、〇

酒精

芳香丁幾

右每回二十滴乃至六十滴

哭四 依的兒精

額草丁幾

右一日數回每回二十滴乃至四十滴

哭四 番椒丁幾

右每回五滴乃至十五滴

哭四 嚼囉仿謨水

橙花水

單舍利別

鹽酸莫爾比涅

貌羅謨加儂謨

右一日數回每回一小兒匙乃

哭四 至一食匙 結麗阿曹篤 二、五

醋酸依的兒

桂皮丁幾

右每二時五滴

散劑

哭四 沸騰散

右每回一小兒匙

哭四 硫酸規尼涅

右二回分服

哭四 亞硝酸亞密爾

右二三滴嗅入

哭四 五十倍鹽酸莫爾比涅水

右半筒注射皮下

腦出血 Apoplexia, Haemorrhagia cerebri.

腦溢血、腦卒中、腦中風、不全中風、全發卒中、卒中、不全卒中、中氣、卒中風、類中風、血中風、古名中風、真中風

處置 嚴禁暴飲熱浴劇動、整使通以防侵襲、已發則解衣帶露於清氣、或瀉血、或貼芥子泥、以頭部常高置、與水囊、投峻下劑、行灌腸、人工的排出尿、暗室安臥靜息

● 浸煎水劑

哭五 機那煎 (一〇、〇)一〇〇、〇

沃度加儂謨

一、〇

蕃木甃丁幾

單舍利別

右一日三回分服

二〇〇
八〇〇

嬰五

機那煎

沃度加留謨

格魯矢鳩謨丁幾

單舍利別

嬰五

大黃浸

單舍利別

嬰五

大黃浸

硫酸麻僱溼叟謨

覆盆子舍利別

嬰五

大黃浸

右二回灌腸

嬰五

機那煎

硫酸麻僱溼叟謨

覆盆子舍利別

嬰五

沃度加留謨

水

單舍利別

右一日四回每回一食匙

二〇〇〇
一五〇〇

嬰六

沃度加留謨

單舍利別

水

右一日三回二日分服、一週後

嬰六

沃度加留謨

水

右每回一茶匙和二食匙之

葡萄酒一日三回服用

嬰六

抱水格魯拉兒

護謨漿

嬰六

抱水格魯拉兒

護謨漿、單舍利別 各一五〇〇

右頓服

嬰六

抱水格魯拉兒

沙列布漿

覆盆子舍利別

嬰六

抱水格魯拉兒

貌魯謨加留謨

水

右每三時一小兒匙、小兒

一〇〇〇
二〇一五〇
二〇〇〇
六〇〇〇

嬰六

散劑

右頓服

嬰六

白糖

右分十包一日三回每回一包

嬰六

麝香

炭酸安母尼亞

繡草油糖

右分五包每二時一包

嬰七

丸劑

沃度化鐵丸

右一日數回每回一粒

嬰七

蘆薈越幾斯

複方大黃越幾斯

右甘艸蒸、甘艸末各適宜爲

三十九朝夕二粒

●注射劑

吳七三 樟腦油(一、〇%) 一〇、〇

右一筒注射皮下

吳七三 依的兒 二〇、〇

右一筒乃至三筒注射皮下

吳七三 樟腦 一、〇

依的兒 五、〇

右一日數回每回一筒注射皮下

吳七五 鹽酸莫兒比涅水 (〇、一)一〇、〇

右一筒注射皮下

吳七五 硝酸斯篤利規尼涅 〇、〇〇五

水 一〇、〇

右注射皮下、半身不遂

吳七五 麥角越幾斯 一、〇

水、備里設林 各五、〇

右每回一二筒注射皮下

●塗布劑

吳七五 的列並油 二五、〇

鴉答利斯丁幾 五、〇

右塗布

吳七九 石鹼精 一五〇、〇

芥子精 一〇〇、〇

右塗布

吳八〇 鴉答利斯格魯胃膜 一五、〇

右塗布於前額、後頭及頸部

吳八一 芥子紙 五枚

右貼用於心部及脾腸部

●浣腸劑

吳八二 醋 一〇〇、〇

右每回一二食匙灌腸

吳八三 巴豆油 一滴一二滴

右爲乳劑灌腸

吳八四 麝香、樟腦 各一、〇

卵黃 一個

亞麻仁漿 二五〇、〇

右灌腸

吳八五 纈草根浸(一五、〇)二〇〇、〇

麝香 〇、五

澱粉 二、〇

右浣腸

腦膜炎 Meningitis, Encephal meningitis.

小兒腦膜炎、結核性腦膜炎、急性腦水腫 Leptomeningitis infantum.

Meningi is tuberculosa

急性單純腦膜炎、結核性腦膜炎、流行性腦脊髓膜炎 Meningitis simplex.

Meningitis cerebrospinalis epidemica. Meningitis tuberculosa.

處置 暗病室、靜周圍、頭部水罨法、冷布纏絡法或水銀軟膏塗布、耳後水蛭貼用、其他規尼涅、沃度加里、滋

養物強壯劑等

● 浸煎水劑

| | | |
|--------------|------------------|-------|
| 嬰六六 | 複方旃那浸 | 一〇〇、〇 |
| | 單舍利別 | 二〇、〇 |
| 右每二時二茶匙 | | |
| 嬰六七 | 旃那浸 (一五、〇) 一五〇、〇 | |
| | 硫酸麻偏濕叟謨 | 一二、〇 |
| | 蜂蜜 | 一五、〇 |
| 右每半時一食匙乃至二食匙 | | |
| 嬰六八 | 機那煎 (八、〇) 一〇〇、〇 | |
| | 沃度加留謨 | 一、〇 |
| | 單舍利別 | 一五、〇 |
| 右一日三回分服 | | |
| 嬰六九 | 貌魯謨加留謨 | 三、〇 |
| | 橙皮舍利別 | 一〇、〇 |
| | 水 | 一〇〇、〇 |
| 右一日三四回分服 | | |
| 嬰七〇 | 貌魯謨加留謨 | 八、〇 |
| | 水 | 二〇〇、〇 |
| | 苦味丁幾 | 四、〇 |
| 右每二時一食匙 | | |
| 嬰七一 | 貌魯謨加留謨 | 四、〇 |
| | 沃度加留謨 | 二、〇 |

| | | |
|-----------------|--------|----------|
| 單舍利別 | 一五、〇 | |
| 水 | 一二〇、〇 | |
| 右每二時一食匙 | | |
| 嬰七二 | 沃度加留謨 | 〇、三 |
| | 水 | 一〇〇、〇 |
| 單舍利別 | 一五、〇 | |
| 右一日六回二日分服、二三歲小兒 | | |
| 嬰七三 | 沃度加留謨 | 一、〇 一二、〇 |
| | 水 | 六〇、〇 |
| 單舍利別 | 三〇、〇 | |
| 右一日三回每回一小兒匙 | | |
| 嬰七四 | 沃度加留謨 | 二、〇 |
| | 水 | 一五〇、〇 |
| 單舍利別 | 三〇、〇 | |
| 右每二時一食匙 | | |
| 嬰七五 | 沃度加留謨 | 一、〇 一二、〇 |
| | 水 | 一五〇、〇 |
| | 覆盆子舍利別 | 二〇、〇 |
| 右每二時一食匙 | | |
| 嬰七六 | 抱水格魯刺爾 | 〇、一 |
| 亞拉比亞護謨漿 | | |

| | | |
|-----------|--------|----------|
| 單舍利別 | 各一〇、〇 | |
| 右頓服、二三歲小兒 | | |
| 嬰七七 | 抱水格魯刺爾 | 一、〇 一二、〇 |
| | 水 | 一〇〇、〇 |
| 橙皮舍利別 | 二〇、〇 | |
| 右每二時一小兒匙 | | |
| 嬰七八 | 抱水格魯刺爾 | 一、五 |
| | 貌魯謨加留謨 | 五、〇 |
| | 水 | 六〇、〇 |
| 單舍利別 | 二〇、〇 | |
| 右每三時一小兒匙 | | |
| 嬰七九 | 抱水格魯刺爾 | 一、〇 一三、〇 |
| | 貌魯謨加留謨 | 三、〇 一五、〇 |
| | 單舍利別 | 二〇、〇 |
| 右每三時一小兒匙 | | |
| 嬰八〇 | 抱水格魯刺爾 | 三、〇 |
| | 貌魯謨加留謨 | 六、〇 |
| | 水 | 一八〇、〇 |
| 單舍利別 | 三〇、〇 | |
| 右每二時一食匙 | | |
| 嬰八一 | ズルフオナル | 一五〇、〇 |
| | 水 | 三、〇 |

單舍利別 一五、〇

右三回分服

四九〇二 ズルフオナルル 三、〇

水 一五〇、〇

阿片舍利別 二〇、〇

右一時間内分服

四九〇三 アミーレンヒドラート 二〇、〇

右每回一茶匙和於麥酒服用

四九〇四 アミーレンヒドラート 七、〇

橙花水 五〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右臨臥時服半量

四九〇五 麝香丁幾 二、五

橙花水 四〇、〇

罌粟舍利別 二〇、〇

右每二時一茶匙

四九〇六 安知必林 二〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

水 五〇、〇

右每二時一食匙

四九〇七 撒里矢兒酸那篤留謨 二〇、〇

水 二〇、〇

水 一二〇、〇

右每二時一茶匙

四九〇八 撒里矢兒酸那篤留謨 五、〇

水 六〇、〇

阿片丁幾 二滴一四滴

單舍利別 二〇、〇

右每三時一小兒匙

四九〇九 撒里矢兒酸那篤留謨 二〇、〇

水 八〇、〇

阿片丁幾 二滴一七滴

橙皮舍利別 二〇、〇

右每三時一小兒匙

四九一〇 阿片越幾斯 〇、二一〇、〇六

甘扁桃乳劑 八〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一小兒匙

四九一一 巴豆油 二滴

益智丁幾 二〇、〇

亞拉比亞護謨漿 二〇、〇

單舍利別 八、〇

水 六〇、〇

右一日四回每回一食匙

四九一二 鹽酸莫兒比澄 〇、〇三

水 五、〇

右一日數回每回五滴乃至八

滴 〇、〇一

四九一三 鹽酸古加乙澄 一〇、〇

杏仁水 一〇、〇

右一回十滴乃至十五滴、嘔

吐 〇、〇一

●散劑 〇、〇一〇、〇六

四九一四 甘末 〇、〇一〇、〇六

乳糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

分量從年齡、小兒

四九一五 甘末 〇、二

藥刺巴末 一、二

白糖 一、二

右分二包一日二回每回一包

四九一六 甘末 〇、二一〇、〇六

實麥答利斯末 〇、三

重碳酸那篤留謨 〇、三

右分十包每二時一包

四九一七 甘末、藥刺巴 各〇、五

右頓服

四九八 甘末

藥刺巴

〇、五
一、〇
〇、三

白糖

右頓服

四九九 甘末

藥刺巴根末

〇、五
〇、一
〇、二
〇、八

白糖

右分六包每時一包

四九〇 甘末

大黃末

〇、六
〇、一
〇、一
〇、〇

白糖

右分十包每二時一包

四九二 甘末

白糖

〇、六
〇、一
〇、二
〇、〇

右分十包每時一包

四九三 拖沓兒氏散

乳糖

〇、〇
〇、五
〇、五

右頓服、二三歲小兒量

四九三 拖沓兒氏散

右分十包

〇、三
〇、〇

一日二回乃至三回

四九四 拖沓兒氏散

白糖

一、五
一、〇

頭痛

右分三包一日三回每回一包

四九五 鹽酸莫兒比涅

白糖

〇、〇
〇、〇
〇、二
〇、五

右頓服、二三歲小兒

四九六 鹽酸莫兒比涅

白糖

〇、〇
〇、五
〇、五

右分五包每三時一包

四九七 鹽酸規尼涅

右頓服

〇、五

四九八 鹽酸規尼涅

白糖

〇、五
一、五

右分五包一日三回每回一包

四九九 安知歇貌林

白糖

〇、六
〇、一
〇、五
一、〇

右分三包三時一包

四九〇 撒里矢爾酸那篤留謨

右頓服

〇、三
〇、〇

四九三 カイリン

白糖

〇、一
〇、五
〇、三

右爲一包一日數回每回一包

四九三 樟腦、安息香酸

白糖

各〇、五
三、〇

四九三 ズルフォナル 〇、三一六、〇

乳糖

右分六包每三時一包

四九四 實麥谷利斯

亞鉛華

〇、三
〇、〇

甘末

白糖

〇、六
五、〇

右分十包每時一包

四九五 麝香

白糖

〇、一
〇、二
三、〇

右分三包每二時一包

四九六 海狸香

白糖

〇、四
一、〇
三、〇

右分十包每三時一包

四九七 硫酸麻佃叟謨

重碳酸那篤留謨

一、〇
〇、〇
三、〇

右(甲)分十包

酒石酸

二、〇

右(乙)分十包

每回各一包和水服用

●丸劑

四九六 鹽酸規尼涅 〇、三一〇、五

四九三 右爲丸頓服
廣奇越幾斯、藥刺巴

石鹼 各五〇、〇
右爲百丸每回三丸頓服

●注射劑

四九四 鹽酸莫兒比涅水
(〇、一)一〇、〇

右每回一筒注射皮下

四九五 鹽酸莫兒比涅水
〇、二

水 八、〇
備註認林 二、〇

右每回四分之一乃至半筒注射皮下、譚語

四九六 樟腦依的兒 (一、〇)一〇、〇

右每回一筒注射皮下

四九七 樟腦 一、〇
依的兒 二、〇

阿列布油 八、〇
右每回半筒乃至一筒數回注射

射 一〇、〇

四九八 麝香丁幾 一〇、〇

右每回四分之一乃至半筒注射皮下

●浣腸劑
四九九 抱水格魯拉兒 〇、一〇一、五
水 五〇、〇

右浣腸 〇、二

四一〇 抱水格魯刺兒 三〇、〇

亞拉比亞護膜漿 三〇、〇

四一一 右浣腸料、二三歲小兒 五〇、〇

水 アミイレンヒドライト 二〇、〇

四一二 亞拉比亞護膜漿 〇、五

右灌腸 〇、五

四一三 樟腦 〇、五

右爲乳劑三〇、〇半量浣腸

四一四 繡草浸 (一〇、〇)二〇、〇

樟腦 一、〇

亞拉比亞護膜漿 二〇、〇

右分二回浣腸 二〇、〇

四一五 砒酸麻備涅更漿 一五、〇

亞拉比亞護膜漿 一〇〇、〇

水 一〇〇、〇

右浣腸 一五、〇

●塗布劑

四一六 水銀軟膏 一五、〇

右塗布頭部 六〇、一、二、〇

四一七 水銀軟膏 二四、〇

刺納林 右每三時以六分之一塗布頭項上肢 二〇〇、〇

四一八 芥子末 二〇〇、〇

右塗布腓腸部 二〇、〇

四一九 吐酒石軟膏 二〇、〇

右塗布頭部 一〇、〇

四二〇 吐酒石 一〇、〇

華設林 右塗布 一〇、〇

四二一 獨答利斯 〇、一

格魯肖謨 右以毛筆塗布頭部 五〇、〇

四二二 發泡古魯肖謨 三〇、〇

右剃毛髮塗布、大人 二、〇

四二三 沃度仿謨 二、〇

彈力古魯肖謨 右塗布額頭部及項 三〇、〇

四二四 水蛭 五條

右耳後貼用、強實小兒 十條—二十條

四二五 水蛭 十條—二十條

四二六 水蛭 十條—二十條

四二七 水蛭 十條—二十條

四二八 水蛭 十條—二十條

四二九 水蛭 十條—二十條

右耳後貼用、強實大人

日射病 *Insolatio, Sonnenstich.*

中熱、暑熱、中風、中噁

處置 解衣服、移冷所、注冷水、與冷酒、兼服清涼飲料

●散劑

四九二 甘汞、藥刺巴

各〇、三

四九五 旃那葉浸

(三、〇)五〇、〇

●水劑

右頓服

滿那舍利別

二〇、〇

右隔三十分時二回分服

四九五 鹽酸里母奈坪

二〇〇、〇

四九二

白糖

〇、三一〇、六

四九四 武蘭坪酒

單舍利別

三〇、〇

四九六 樟腦阿列油(一〇%) 一〇〇、〇

右每回一二筒注射皮下

小兒

右分十包一日三回每回一包

一五、〇

腦水腫 *Hydrocephalus (acutus, chronicus, congenitus.)*

水頭症、腦水、頭水、濕性腦癱衝、舊譯作腦積水、又名腦胞膜積水、俗名腫頭癰、古名解顛、解顛者頭縫解開、內含液體也、

●水劑

四九七 沃度加留謨

一、〇一二、〇

四九六 沃度加留謨

右每時一小兒匙

一五、〇

單舍利別

二、〇

水

四九六 沃度加留謨

水

二、〇

右每二時一食匙

六〇、〇

單舍利別

四九七 沃度加留謨

水

七〇、〇

四九七 沃度鐵舍利別、單舍各二〇、〇

右一日三回每回一食匙

橙皮舍利別

二〇、〇

右一日三回每回十滴乃至十五滴

四九六

沃度加留謨

一〇〇、〇

四九七 沃度鐵舍利別

右每二時一茶匙

二、〇

四九七 大黃浸

(五、〇)二〇〇、〇

水

硫酸那篤留謨 一五、〇

滿那舍利別 一〇、〇

右一日三回每回一食匙

四九七三 寶芝答利斯浸

(〇、一〇〇、三)一〇〇、〇

醋酸加留謨 二、〇一六、〇

單舍利別 八、〇

右每二時二茶匙

四九七四 肝油

薄荷水 一五、〇

右一日二三回分服

●散劑

硬腦膜竇血塞

Thrombosis sinuum dura matris.

四九五 甘水 一、〇

白糖 五、〇

右分十包一日三包乃至四包

四九五 加糖炭酸鐵 〇、五

白糖 二、〇

右分十包朝夕一包

四九七 加糖炭酸鐵 〇、五

硫酸規尼涅 〇、三

白糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

●溶劑

四九六 食鹽溶

四九七 沃度仿謨 右一日一回

四九八 海水浴 右一日一回

四九二 鹽酸必魯加兒必涅水 右一日一回

(〇、五—一、〇%)

四九三 沃度仿謨 右注射皮下

四九六 依的兒 右注射皮下

四九六 依的兒 右每時六滴、小兒

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九六 依的兒 一〇、〇

四九七 貌魯謨加留謨 二、〇—三、〇

●水劑

硬腦膜竇血塞 腦炎

腦髓炎、腦髓燼衝、腦城衝、眞頭痛

水 一〇〇、〇

單舍利別 一〇〇、〇

四九六 沃度加留謨 右一日三回分服

四九六 沃度加留謨 三、〇

水 一〇〇、〇〇
單舍 一〇、〇〇

右每二時一食匙

四九六 抱水格魯刺兒 一、〇一三、〇〇

水 一〇〇、〇〇
橙皮舍利別 二〇、〇〇

右每二時一食匙

四九七 抱水格魯刺兒 一、〇一二、〇〇

水 六〇、〇〇

貌魯謨加留謨 三、〇一五、〇〇

單舍利別 二〇、〇〇

右每三時一茶匙、小兒

●丸劑 〇〇、〇一
鱗* 〇〇、〇一

右爲十九一日二回每回一粒

四九二 沃度加留謨 一〇、〇〇

乳酸鐵 一〇、〇〇

鹽酸規尼涅 一〇、〇〇

右甘草蒸適宜爲百九一日三回每食後三粒

●散劑 〇、五

甘末 〇、五

大黃 一〇、〇〇

白糖 一、五

●洗腸劑 右分五包每二時一包

四九四 抱水格魯刺兒 一、〇一二、〇〇

水 一〇〇、〇〇

右分二回洗腸

四九五 抱水格魯刺兒 〇、五

水 六〇、〇〇

右分二回洗腸、小兒

四九六 水銀軟膏 二、〇一三、〇〇

右塗布

第二節 脊髓及脊髓膜諸病

脊髓炎 Myelitis.

急性脊髓炎 Myelitis acuta.

慢性脊髓炎 Myelitis chronica.

舊譯作脊髓發炎、又名腦根體發炎、古醫書謂之背脊痛、

右每二時一食匙

●水劑 四九七 沃度加留謨 一、〇〇

水 一〇〇、〇〇

單舍利別 八、〇〇

四九八 沃度加留謨 一、五

苦味丁幾 一、五

水 一〇〇、〇〇

四九九 沃度加留謨 二、〇〇

水 六〇、〇〇

單舍利別 三〇、〇〇

右一日三回分服

右一日三回每回一小兒匙、

五〇〇 沃度化加留謨

水

二、〇〇〇
三、〇〇〇

苦味丁幾

右每二時一食匙

五〇一

水

五、〇一八、〇〇〇
二、〇〇〇、〇〇〇

右一日三回每回一食匙

五〇二

沃度加留謨

右一日三回每回一食匙

單舍利別

右一日三回分服

五〇三

沃度那篤留謨

右一日數回分服

五〇四

沃度那篤留謨

水

一、〇〇〇、〇〇〇
一、五〇〇、〇〇〇

橙皮舍利別

右每二時一食匙

五〇五

沃度那篤留謨

五、〇〇〇

水 一三〇、〇〇〇
薄荷水 二〇、〇〇〇
右一日三回每回半食匙乃至二食匙

五〇六

亞砒酸加留謨液

水

二十滴

苦味丁幾

右一日三回二日分服

五〇七

抱水格魯刺兒

單舍利別

右頓服

五〇八

安質歇貌林

橙皮舍利別

水

五〇九

別拉敦那越幾斯

麥角越幾斯

メリツサ水

桂皮舍利別

右每二時一食匙

五〇〇

蓖麻子油

右每三時乃至四時頓服

五〇一 機那煎 一〇〇、〇〇〇
沃度加留謨 一、〇〇〇
單舍利別 八、〇〇〇
右一日三回分服

五〇二

機那煎 (一〇、〇〇) 一五〇、〇〇〇

沃度加留謨

單舍利別

右每二時一食匙

五〇三

亞砒酸加留謨液

杏仁水

右一日三回每回五滴

五〇四

亞砒酸加留謨液、薄荷水

右一日三回每回二滴乃至四滴 各四、〇〇〇

五〇五

亞砒酸加留謨液

稀酒精

阿片丁幾

水

右一日三回每回十二滴

五〇六

亞砒酸加留謨液

林檢酸鐵丁幾

右一日三回每回五滴漸次增

量至三十滴

●丸劑

五〇七 硝酸銀 〇、三
右白礬土適宜爲三十九一日
三回每回一九

五〇八 硝酸銀 一、〇
莨菪越幾斯 〇、五
右爲百九一日三回每回一粒
乃至三粒

五〇九 硝酸ストリキニール 〇、〇六一〇、一五
右白陶土適宜爲三十九一日
二、三回每回一粒

五〇〇 硝酸ストリキニール 〇、一
右甘草末適宜爲三十九一日
三回每回一粒

五〇一 蕃木薔越幾斯 一、〇
右以甘草羔爲五十九一日三
回每回一粒

五〇二 蕃木薔越幾斯 六、〇
右爲百九朝夕一粒

五〇三 麥角越幾斯 〇、五
右爲十九一日三回每回一粒

五〇四 硫酸規尼涅 〇、五
乃至二粒
右爲丸頓服

五〇五 蘆苻越幾斯、藥巴石鹼各五、〇
右爲百九一日二粒乃至三粒

五〇六 燐* 〇、〇一
右爲十九一日二粒乃至三粒

五〇七 散劑 〇、五
甘汞 一、五
右分五包每時一包

五〇八 甘汞 〇、五
右分十包每二三時半包

五〇九 乳糖 六、〇
右分十包一週間一日二回乃
至三回每回一包

五〇〇 甘汞、藥刺巴 各五、〇
右分十包一週間一日二回乃
至三回每回一包

五〇一 甘汞 〇、五
藥刺巴 一、〇
白糖 〇、三
右頓服

五〇二 硫酸麻偏涅叟謨 一五、〇
右頓服

五〇三 鹽酸莫兒必涅 〇、〇三
乳糖 〇、五
右分三包一回一包

五〇四 ナフタリン 〇、五
白糖 一、五
右分五包每二時一包

五〇五 加糖沃度鐵 二、〇
白糖 三、〇
右分十包一日三回每回一包

五〇六 加糖沃度鐵 一、〇
乳糖 一〇、〇
右分十二包一日三回一回一
包

五〇七 撒里矢爾酸那篤留謨 二、〇一四、〇
右頓服

五〇八 沃度 五、〇
蠟硬膏 二〇、〇
右塗布

五〇九 沃度 一、〇
沃度仿謨

華設林

八、〇

五〇四三

嘔囉仿謨軟膏

一〇、〇

華攝林

五〇、〇

右塗布

右塗布

右塗布

五〇四〇 沃度加留謨軟膏

一〇、〇

五〇四四

嘔囉仿謨

一〇、〇

五〇四六

硝酸斯篤里幾尼涅水

(二%)一〇、〇

右塗布

安母尼亞擦劑

四〇、〇

右每回四分之一乃至一筒注

五〇四一 沃度加留謨

四、〇

五〇四五

複方アングリカ精

一〇、〇

五〇四九

平流電氣

射皮下

水

二、〇

五〇四七

硫酸亞鉛

二、五

五〇五〇

感傳電氣

右一日一回流通於麻痺之肢

豚脂

四、〇

五〇四八

芥子精

一〇、〇

五〇四九

平流電氣

右一日一回三分乃至五分時

右塗布

三〇、〇

五〇四六

右塗布

二、五

五〇五〇

感傳電氣

右一日一回流通於麻痺之肢

右塗布

一、〇

五〇四七

硫酸亞鉛

五、〇

五〇五〇

感傳電氣

右一日一回流通於麻痺之肢

五〇四二 水銀軟膏

一、二、〇

五〇四七

硫酸亞鉛

二、五

五〇五〇

感傳電氣

右一日一回流通於麻痺之肢

右一日塗布六分之一

二、四、〇

五〇四七

硫酸亞鉛

一、〇

五〇五〇

感傳電氣

右一日一回流通於麻痺之肢

脊髓勞 Tabes dorsalis.

脊髓後條灰白變性、腰腿風、中風、奮譯作脊根後柱結硬、

●水劑

驅梅療法、電氣法、水治法、溫泉療法、內服硝酸銀、エルゴチン、斯篤里幾尼涅、磷、砒石等

大黃浸

(一〇、〇)一、二〇、〇

五〇五三

答麻林度浸

(三〇、〇)一、五〇、〇

薄荷油

〇、二

五〇五三

硫酸麻脩涅叟謨

三〇、〇

單舍利別

一〇、〇

五〇五三

單舍利別

一、八〇、〇

右每二三時一食匙

一〇、〇

五〇五三

右每二時一食匙

三〇、〇

右每二三時一食匙

一〇、〇

五〇五三

右每二時一食匙

三〇、〇

五〇五二 麥角浸

(〇、四)一、五〇、〇

五〇五三

亞砒酸加留謨液

五、〇

橙皮舍利別

一〇、〇

五〇五三

桂皮水

二、五、〇

五〇五三

沃度加留謨

二、〇

五〇五三

貌羅謨加留謨

六、〇

水 一八〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

五〇七 磷乳劑*(〇、〇三)二〇〇、〇

右一日一食匙

五〇六 撒里矢爾酸那篤留謨

二、〇一三、〇

貌魯謨加留謨 三、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

五〇九 硫酸麻留濕叟謨 三〇〇、〇

酒石酸 〇〇、三

橙皮舍利別 二二〇、〇

水 一〇〇、〇

右每二時一食匙

五〇八 抱水格魯刺兒 一、〇一二、〇

護謨漿 三〇〇、〇

右頓服

●丸劑

五〇六 硝酸銀 〇、三

右白陶土適宜為百九一日三

粒乃至九粒

五〇二 硝酸銀 〇、一五一〇、三

右白陶土適宜為三十九一日
三回每食前一粒

五〇三 硝酸銀 一、〇

白陶土 一、〇

右為百九一日三回每回一粒

乃至三粒

五〇四 格魯胃銀 五、〇

右為五十九一日一粒

五〇五 硝酸銀 〇、五

右泥蒿根末及泥蒿根越幾斯

適宜為三十九一日一二粒

五〇六 格魯兒那篤留謨白金 〇、六

右白陶土適宜為三十九一日

二粒乃至五粒

五〇七 燐 〇、〇一

右為十九一日一粒乃至二粒

五〇八 亞砒酸 〇、四

右為百二十九一日三回每回

一粒乃至二粒

五〇九 抱水貌羅謨 一、五

甘草羔 一、五

右為二十九一日二三回每回

一粒乃至三粒

五〇七 樟腦 二、五

阿片越幾斯 〇、五

右護謨漿適宜為十六九每夕

二三粒

五〇七 麥角越幾斯 〇、五

右甘草末適宜為十九一日三

回乃至六回每回一粒

五〇七 麥角越幾斯 五、〇

右為九十九一日三回每回一

粒乃至三粒

五〇七 加刺拔兒豆越幾斯 二、〇

右甘草末及甘草越幾斯適宜

為五十九一日三回每回一粒

五〇四 蕃木藍越幾斯 〇、四一〇、六

金硫黃 〇、三

亞爾答根末 四、〇

甘草羔 適宜

右為五十九一日三回每回一

粒

●散劑

五〇五 安知必林 五、〇

白糖 二、五

右分五包每朝夕一包

五〇六 麥角末、茴香油糖 各五、〇
右分十包 一日三回 每回一包

五〇七 麥角越幾斯 三、〇
白糖 五、〇
右分六包 一日三回 每回一包

五〇八 樟腦 一、〇
白糖 二、〇
右分十包 一日二回 每回一包

五〇九 鹽酸莫兒比涅水
●注射劑

(一、五%) 一〇、〇
右注射皮下

五〇〇 安知必林、水 各五、〇
右每回一筒注射疼痛部皮下

五〇一 格魯兒銀 〇、〇五
次亞硫酸那篤留謨 〇、〇三
水 一〇、〇
右一日一回半筒注射皮下

五〇二 塗布劑
●嘔囉仿謨 二〇、〇

安母尼亞石鹼 三〇、〇
右塗布

五〇三 水銀軟膏 二〇、〇—四〇、〇
右塗布

五〇四 灼刺篤里涅 〇、〇三
嘔囉仿謨 一五、〇
拔爾撒謨合劑 三〇、〇
右塗布

小兒脊髓麻痺 Polymyelitis anterior acutainfantum et adultorum, Kinderlähmung.

痙攣性脊髓麻痺

處置 機那劑、鐵劑、麥角劑等之強壯諸藥、水銀膏、平流電氣、感傳電氣、食鹽浴、冷水浴、鐵浴、松葉浴等

●水劑

五〇五 機那煎 (六、〇) 一〇〇、〇
橙皮舍利別 二〇、〇
右一日四回 每回一小兒匙

五〇六 沃度加留謨 〇、三一三、〇
水 一〇〇、〇
單舍 一〇、〇
右每二時二茶匙

五〇七 沃度加留謨 〇、六

水 一〇〇、〇
單舍舍利別 二〇、〇
右一日六回 每回一小兒匙、
一二歲之小兒

五〇八 沃度鐵舍利別、單舍各二〇、〇
右一日三回 每回二十滴

五〇九 貌魯謨加留謨 三、〇—五、〇
苦味丁幾 三〇、〇
水 一〇〇、〇

右一日三分服

五〇六 麥角越幾斯 一〇、〇
水 一〇〇、〇
單舍舍利別 二〇、〇
右一日四回 每回一小兒匙

●丸劑

五〇九 硝酸銀 〇、〇三
右爲丸 一日三分服
五〇三 麥角越幾斯 〇、五一、〇

五〇九三 右爲丸一日三回分服
甘肅 〇、二一〇、六
大黃 〇、〇六
白糖 二、〇

●注射劑
右分十包每二時一包

五〇九四 水製麥角越幾斯 一、〇〇
水 右一日一二筒注射皮下 〇、〇一
五〇九五 蕃木髓越幾斯 一、〇〇
水 右一日一筒乃至二筒注射皮

右一日一筒乃至二筒注射皮

下
五〇九六 硝酸ストリキニチ水 (〇、一—〇、二%)
右注射皮下

脊髓充血 Rückenmarkshyperämie.

脊髓及脊髓膜充血 Hyperaemia medullae spinalis et meningium.

五〇九七 ●散劑
甘肅 〇、〇五
藥刺巴末、白糖 各二、〇
右分五包每三時一包

鼠李舍利別 三〇、〇
右每三時一茶匙、小兒 三、〇
五〇九八 沃度加留謨 一〇〇、〇
水 單舍利別 二〇、〇
右一日三回每回一小兒匙、

小兒
五〇九九 抱水格魯刺兒 一、〇一三、〇
水 六〇、〇
貌魯謨加留謨 三、〇一五、〇
單舍利別 二〇、〇
右每三時一小兒匙、小兒

五〇九八 ●水劑
複方旃那浸 三〇、〇

脊髓膜炎 Meningitis spinalis.

急性脊髓膜炎、舊譯作脊胞膜新炎、慢性脊髓膜炎、舊譯作脊胞膜舊炎

五〇一〇 ●水劑
機那煎 (八、〇)一〇〇、〇
沃度加留謨 一、〇
蕃木髓丁幾 一、五
單舍利別 一〇、〇

五〇一一 機那煎 (八、〇)一〇〇、〇
貌魯謨加留謨 二、〇
單舍利別 一〇、〇
右一日三回分服

五〇一二 沃度鐵舍利別 四、〇
單舍利別 四、〇
右一日十五滴乃至二十滴

五〇一三 沃度加留謨 一、〇
蕃木髓丁幾 一、五
單舍利別 一〇、〇

五〇一四 沃度加留謨 一、〇
單舍利別 一〇、〇
右一日三回分服

五〇一五 沃度加留謨 二、〇
重炭酸那篤留謨 二、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

五〇九 貌魯謨加留謨 五、〇

蕃木鼈丁幾 一、五

單舍利別 一〇〇、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

五〇八 貌魯謨加留謨 三、〇

抱水格魯刺兒 二、〇

水 六〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一小兒匙

五〇七 抱水格魯刺兒 一、〇

單舍利別 五、〇

水 三〇、〇

右頓服

五〇六 格魯兒酸加留謨 二、〇

單舍利別 一〇、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服、膀胱炎

●散劑

五〇五 人工加爾爾斯泉鹽 二五、〇

右頓服

五二〇 甘末 〇、五

藥刺巴 〇、五

大黃 〇、三

白糖 〇、三

右頓服

五二一 安知歇貌林 一、〇

白糖 〇、五

右分三包每三時一包

五二二 撒里失兒酸那篤留謨 三、〇

白糖 一、〇

右分三包每三時一包

五二三 鹽酸莫兒比涅 〇、〇、三

別拉致那越幾斯 〇、一、五

乳糖 〇、五

右分三包一日三回每回一包

●丸劑

五二四 硝酸銀 一、〇

右白陶土適宜為百九一日三回每回一粒乃至三粒

五二五 麥角越幾斯 一、〇

右為二十九每二三時一粒

五二六 鹽酸規尼涅 一、〇

右為丸一日三回分服

五二七 麥角越幾斯 一、〇

●注射劑

水 一〇、〇

右每回一筒注射皮下

五二八 硝酸ストリキニチ水(〇、一%) 〇、一

右每回四分之一至一筒注射皮下

五二九 鹽酸必魯加兒必涅水(一%—二%) 一、〇

皮下

五三〇 亞爾個保兒 三〇、〇

●塗布劑

右塗布痔瘡

五三一 嘔囉仿謨、非沃斯油各四〇、〇

右塗布

五三二 沃度仿謨軟膏(一、〇%) 〇、五

右塗布痔瘡

五三三 官粉軟膏 一〇、〇

樟腦

五三四 百露拔爾撒謨 一〇、〇

單軟膏

五三五 單軟膏 三〇、〇

右塗布痔瘡

五三六 單軟膏 三〇、〇

右塗布痔瘡

五三五 醋酸鉛 右塗布痔瘡 1.0
 水 右洗滌膀胱 1.000.0

麻痺 Paralysis, P. agitans, P. progressiva. Hemiplegia, Paraplegia.

振顫麻痺、進行性麻痺、半身麻痺、半身不遂、偏癱、偏枯、橫截麻痺、半體麻痺、兩脚麻痺、痿軟、脚軟、軟脚等

進行性舌唇咽頭麻痺 Paralysis glosso-labio-pharyngla progressiva.

處置 溫浴、蒸氣浴、冷水療法、電氣療法、按摩法、其他飲食攝養、亞砒酸、勃拉篤里涅等

●注射劑

五二六 ヒヨスチン液(0.5%)

1.0.0

右每回四分之一乃至半筒注射皮下

五二七 沃度水素酸ヒヨスチン

0.0.1

●丸劑
 五二五 菲沃斯矢亞密涅 0.0.2
 右爲二十九日二回每回一粒乃至二粒

●水
 五二六 ツポイチン 0.0.4
 右每回半筒乃至一筒注射皮下

五二六 ツポイチン 0.0.4
 右每回半筒乃至一筒注射皮下

五二五 亞砒酸加留漢液(0.1%)
 右隔日一筒注射皮下、小兒
 四.0

五二九 ヴエラトリン

酒精、留水

右每回半筒乃至一筒注射皮下

五三〇 硫酸亞篤羅必涅水 0.0.1

右一日一回半筒注射皮下

五三一 硫酸亞篤密必涅水 0.0.5

右每日一筒注射皮下

五三二 硝酸ストリキニーチ 0.0.5

右注射皮下

五三三 硫酸ストリキニーチ水(1%)

五二四 亞砒酸加留漢液(0.1%)
 右隔日一筒注射皮下、小兒
 四.0

●丸劑
 五二五 菲沃斯矢亞密涅 0.0.2
 右爲二十九日二回每回一粒乃至二粒

●水
 五二六 ツポイチン 0.0.4
 右每回半筒乃至一筒注射皮下

五二七 勃拉篤里涅 0.0.2
 右爲四十九朝夕二粒

五二八 硫酸亞篤密必涅 0.0.5
 右爲一丸一日一粒乃至三粒
 (吐涎過多)

五二九 ヴエラトリン 0.0.2
 右爲四十九朝夕二粒

五三〇 硫酸亞篤羅必涅水 0.0.1
 右一日一回半筒注射皮下

五三一 硫酸亞篤密必涅水 0.0.5
 右每日一筒注射皮下

五三〇 硝酸銀 〇、〇一

右以白陶土爲一九一日三回

每回一粒

五二九 蕃木髓越幾斯 〇、二

右爲二十九一日三回每回一

粒

●水劑

五二四〇 ヒヨスチン

鹽硫スコボラミン

各〇、〇〇五

梣皮舍利別

三〇、〇

留水 七〇、〇

右每回一茶匙

五二四一 沃度加留謨

水

單舍利別

右一日二回一回一小兒匙、

小兒

五二四二 沃度加留謨

貌羅謨加留謨

水

單舍利別

一八〇、〇

一五〇、〇

二〇〇

六〇〇

五二四三 硝酸斯篤里幾尼涅

白糖

右分十包一日三回每回一包

〇、一

三〇、〇

脊椎破裂、脊髓水腫

Spina bifida Hydrocephalus.

五二四 沃度 〇、六

沃度加留謨 二、〇

備里設林

右注入

三〇、〇

進行性肌肉萎縮

Atrophia musculorum progressiva.

五二四 沃度加留謨 二、〇

水 二〇〇、〇

單舍利別

右每二時一食匙

一五〇、〇

第三節 神經諸病

神經炎 Neuritis.

原發性多發性神經炎

五二四 安知必林 〇、五一、〇

右一日數回分服

五二四 撒里矢兒酸那篤留謨 一〇、〇

脊椎破裂、脊髓水腫

進行性肌肉萎縮

神經炎

五二〇 ザリピリン 右分五包每回一包 一五〇

右爲錠十五個一日三回每回一個

頭痛 (Cephalgia, Cephalaea) 頭風、常習頭痛

處置 貧血家則用鐵、與砒石劑、多血家宜運動、與下劑等、神經衰弱家施冷水療法、電氣療法、其他一般食物養生、清氣安遊、禁酒制慾等

●水劑 依的兒 一〇、〇
右一日三回每回十五滴

五二二 人工加爾爾斯泉鹽 二〇、〇
水 一〇〇、〇

●丸劑 九劑 一、〇
右分三包一日三回每回一包

五二二 貌羅謨加留謨 八、〇
水 二〇〇、〇

苦味丁幾 七、五
右入黑狀一日數回每回十五滴

五二二 貌魯謨加留謨 二、〇
水 一〇〇、〇

右每三時一食匙 七、五
滴乃至二十滴

五二二 苦味丁幾 一、五
水 一〇〇、〇

●散劑 鹽酸規尼涅 〇、五
實麥答利斯葉末 〇、五
右每夕頓服

五二四 蕃木籠越幾斯 一、〇
重碳酸那篤留謨 二、〇

右一日三回分服 五、〇
撒里矢兒酸 五、〇
重碳酸那篤留謨 五、〇

五二四 重碳酸那篤留謨 一〇〇、〇
水 一〇〇、〇

右一日三回分服 〇、一
印度大麻越幾斯 〇、一
重碳酸那篤留謨 二、〇

五二六 鹽酸規尼涅 〇、五
實麥答利斯葉末 〇、五

●丸劑 九劑 一、〇
右分三包一日三回每回一包

五二六 阿魏 一〇、〇
尚香油 六、〇
右酒精適宜爲百丸一日三回
每回二粒乃至十粒

五二六 重碳酸那篤留謨 二、〇

偏頭痛 Heriarania, Migräne. 偏頭神經痛、偏頭風、半頭風

●散劑

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|-----|--------------|----------|-----|---------------|---------|
| 五三三 | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 二、〇 | 白糖 | 右分十包朝夕一包 | 二、〇 | 五七五 | フェナセチン | 一、〇一、五 |
| | 右爲一包發作初起頓服 | | | | | | 白糖 | 〇、五 |
| 五六四 | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 三、〇 | 五七〇 | 貌羅謨咖啡涅 | 一、〇 | 五二六 | フェナセチン | 五、〇一〇、〇 |
| | 乳糖 | 二、〇 | | 硫酸規尼涅 | 一、五 | | 右分十包每服一包 | |
| | 右分六包發作每時一包 | | 五七二 | 薄荷油糖 | 二、〇 | 五七〇 | オイフォルン | 四、〇 |
| 五二五 | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 三、〇 | | 右分十包一日三回每回一包 | | | 右分十包一日三回乃至五回 | |
| | 薄荷油糖 | 三、〇 | 五七二 | 枸橼酸咖啡涅 | 一、〇 | 五七〇 | アンチテルヴヰン、白糖 | 各一、五 |
| | 右分三包發作每時一包 | | | 右分十包一日三回每回一包 | | | | |
| 五二六 | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 一、〇、〇一、五、〇 | 五七三 | 枸橼酸咖啡涅 | 一、〇 | 五七九 | ラクトフェニン | 一、五一三、〇 |
| | 貌羅謨加留謨 | 〇、一、五、〇 | | フエナセチン | 二、〇 | | 右分三包一日三回每回一包 | |
| | 右分十包朝夕半包乃至一包 | | | 乳糖 | 三、〇 | 五八〇 | ザロノエー | 一、五十三、〇 |
| 五七〇 | 咖啡涅 | 〇、五 | 五七三 | 撒里矢爾酸那篤留謨咖啡涅 | 二、五 | | 右分三包一日三回每回一包 | |
| | 白糖 | 五、〇 | | 白糖 | 二、五 | 五八二 | 安知必林 | 五、〇 |
| | 右分十包發作中服數回每回一包 | | | 右分十包發作中用三包 | | | 右分五包發作前一包 | |
| 五二六 | 咖啡涅 | 〇、五 | 五七四 | 安息香酸那篤留謨咖啡涅 | 一、〇一、二、五 | 五八三 | 安知必林、咖啡涅 | 各五、〇 |
| | 乳糖 | 一、五 | | 白糖 | 一、五 | | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 二、〇 |
| | 右分五包一日三回一回一包 | | | 右分五包一日三回一回一包 | | | 右分二十包一日一包乃至三包 | |
| 五二六 | 貌羅謨咖啡涅 | 一、〇 | | | | | | |

五八三 鹽酸規尼涅 二、五、一五、〇

右分五包發作前或發作中一回或二回每回一包

五八四 硫酸規尼涅 〇、五

白糖 二、〇

右分三包發作前十五分時一包

五八五 硫酸規尼涅 〇、五

枸橼酸咖啡涅 〇、五

白糖 二、〇

右分五包每二時一包

五八六 硫酸規尼涅 〇、五

コソフイーチ 〇、五

白糖 五、〇

右分六包發作前一時間二包

發作後每時一包

五八七 硫酸規尼涅 一、五

咖啡涅、酒石酸 各一、〇

白糖 一、〇、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇、五

右分十包朝夕一包

五八八 貌魯謨加留謨 二、〇、〇

右分二十包發作間歇時一包

●水劑 五八九 抱水格魯刺爾 一、〇

護謨漿、單舍利別 各一、〇

右頓服 八、〇

五九〇 貌羅謨加留謨 二〇〇、〇

水 一五、〇

單舍利別 二、〇

右每二時一食匙 二、〇

五九一 貌羅謨樟腦 三、〇

阿列布油 一〇、〇

亞拉昆亞護謨 一五〇、〇

右爲乳劑 一〇、〇

薄荷油糖 一〇、〇

右一日三回每回一食匙

五九二 沃度加留謨 三、〇

貌魯謨加留謨 五、〇

水 一〇、〇

右一日三回每回二十滴

五九三 亞砒酸加留謨液 二、〇

水 二〇、〇

右一日三回每回十五滴

五九四 亞砒酸加留謨液 十二滴

水飴 一〇〇、〇

五九五 硫酸規尼涅 〇、三

稀硫酸 二滴

水 六〇、〇

右一時間內分服

五九六 撒里矢爾酸那篤留謨 二、〇、一三、〇

濃咖啡煎 五〇、〇

右數回連服 三、〇

五九七 嚼囉仿謨 一、二、〇

酒精 一五、〇

苦味丁幾 二、五

右每回二十滴乃至三十滴

五九八 エキザルギン 二、五

薄荷油糖 五、〇

菩提樹花水 一、二〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右朝夕一食匙

五九九 エトキシコソフエイン 〇、二五

撒里矢爾酸那篤留謨 〇、二五

鹽酸古加乙涅 〇、〇、二

菩提樹水 三〇、〇

| | | |
|-----|--------------------------------|---------|
| 五〇四 | 重舍利別 右頓服 | 一〇、〇 |
| 五〇三 | クロトンクローラル | 三、〇—二、〇 |
| 五〇二 | 水 右每回一食匙 | 五〇、〇 |
| 五〇一 | ニトログリセリン水(一%) 右一日三回每回二滴乃至十滴 | 五、〇 |
| 五〇〇 | 亞硝酸亞密兒 酒精 | 二、〇 |
| 四九九 | 右每回二滴乃至十滴 | 一〇、〇 |
| 四九八 | 麥角越幾斯 | 二、〇 |
| 四九七 | 橙皮水 | 一八〇、〇 |
| 四九六 | 右每二時一食匙 | |
| 四九五 | 古加葉浸 | |
| 四九四 | (五、〇—一、〇、〇)一八〇、〇 | |
| 四九三 | 重炭酸那篤留謨 | 一、〇 |
| 四九二 | 橙皮舍利別 | 二〇、〇 |
| 四九一 | 右每一時一食匙 | |
| 四九〇 | 流動古加越幾斯 | 三〇、〇 |
| 四八九 | 重炭酸那篤留謨 | 二、五 |

| | | |
|-----|-------------------------|-----------|
| 五〇六 | 水 右一日一二回每回一茶匙 | 三〇、〇—五〇、〇 |
| 五〇五 | コロダイン | 二〇、〇 |
| 五〇四 | 右一回五滴乃至十滴 | |
| 五〇三 | ●丸糕劑 | |
| 五〇二 | 麥角越幾斯 | 一、〇 |
| 五〇一 | 右甘草末適宜爲二十九丸一日十回每回一粒乃至二粒 | |
| 五〇〇 | 印度大麻越幾斯 | 〇、五 |
| 四九九 | 右爲二十五粒每食前三粒 | |
| 四九八 | 麥角末 | 五、〇 |
| 四九七 | 菲沃斯越、印度大麻越各一、〇 | |
| 四九六 | 硫酸規尼涅 | 三、五 |
| 四九五 | 右爲六十九丸每三時一粒 | |
| 四九四 | 纈草酸規尼涅 | 二、〇 |
| 四九三 | 右杜松子越幾斯適宜爲二十丸一日五粒乃至十粒 | |
| 四九二 | 咖啡涅 | 五、〇 |
| 四九一 | 柯柯阿脂 | 五〇、〇 |
| 四九〇 | 右爲錠劑十個每時一個 | |
| 四八九 | 貌羅謨樟腦 | 一、〇 |
| 四八八 | 白糖 | 九、〇 |
| 四八七 | 右爲糕十個一日四回每回一 | |

| | | |
|-----|---------------|------|
| 五三三 | ●塗布劑 メチラール | 一五、〇 |
| 五三二 | 甘扁桃油 | 八〇、〇 |
| 五三一 | 右塗布 | |
| 五二四 | メチラール | 一〇、〇 |
| 五二三 | 酒精 | 八五、〇 |
| 五二二 | 刺賢瑛兒油 | 五、〇 |
| 五二一 | 右塗布 | |
| 五二〇 | メントール | 一〇、〇 |
| 五一九 | 阿列布油 | 〇、五 |
| 五一八 | 刺乃林 | 一〇、〇 |
| 五一七 | 右爲軟膏塗布顫顫部 | |
| 五一六 | メントール | 四、〇 |
| 五一五 | 鹽酸古加乙涅 | 一、五 |
| 五一四 | 抱水格魯刺兒 | 〇、七五 |
| 五一三 | 華搦林 | 二、〇 |
| 五一二 | ラノリン | 二〇、〇 |
| 五一一 | 右塗布 | |
| 五一〇 | メントール | 一、〇 |
| 五〇九 | 鹽酸古加乙涅 | 〇、二五 |
| 五〇八 | 阿列布油 | 〇、五 |
| 五〇七 | ラノリン | 八、五 |

右爲軟膏塗布前額顳顬部

●嗅入劑

五二八 亞硝酸亞密爾 二滴—三滴

右嗅入

五三〇 麥角越幾斯

一、〇

五二九 亞硝酸亞密兒

茴香油

一〇、〇

右嗅入

偏里設林、水

右一筒注射皮下

各六、〇

神經衰弱 Neurasthenia.

處置 休養精神、專力遊息、若就業節其度、其他正運動、定食時、攝肉類滋養物、禁酒類煙草咖啡、兼可整便通、療法主用威傳電氣、按摩法、冷水法等

●水劑

五二二 ウレタン 四、〇

水 四〇〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每半時乃至一時間一食匙

五三三 ウレタン 一〇、〇

赤葡萄酒 一九〇、〇

右每日一食匙乃至四食匙

五三三 ガロプロモール 一〇、〇

武蘭淫酒 二〇、〇

リビウム舍利別 三〇、〇

右一日二三食匙

五三四 亞硫酸加留謨液 六滴

林檎酸鐵丁幾 一、〇

苦味丁幾 一、五

水 一〇〇、〇

五三五 枸橼酸安母尼亞鐵

右一日三四分服

右加一壺之設里酒一日三回

每回半酒蓋乃至一酒蓋

五三六 枸橼酸安母尼亞燐酸鐵

酒製機那越幾斯 二、五

白葡萄酒 五〇〇、〇

右一日三回每回一食匙

五三七 貌羅謨水素酸(十%)

右一日三回每回二十滴乃至四十滴

五三六 貌羅謨水素酸(十%)

六〇、〇

水 六〇、〇

五三九 繡草丁幾、海狸香丁幾

依的兒精 各五、〇

右每回數滴

五三〇 チリ—水 一四〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

古坪乙涅舍利別 (〇、〇六)三〇、〇

抱水格魯刺兒 (〇、〇六)三〇、〇

貌羅謨加留謨 四、〇

右一日三回二日分服 六、〇

●散劑

貌羅謨加留謨 五、〇—一〇、〇

右分十包一日三包

五三三

五三三 貌羅謨那篤留謨 四、〇

貌羅謨加留謨 八、〇

貌羅謨安母紐謨 四、〇

貌羅謨里丟謨 四、〇

右一日二三回每回一小刀尖

五三三 ズルホナール 一、五—二、〇

右分三包或頓服

五三四 ズルフォナール 三、〇

右分三包就褥前三時間一包

五三五 ナフトール 各四、〇

蒸木鼈子末 〇、四

バンクレアチン 各四、〇

五三六 ザロール、ナフトール 各一〇、〇

硫酸麻僱涅叟謨 各一〇、〇

右分三十包一日三回每回一包

五三七 トリオナール 〇一、二、〇

或テトロナール 〇一、二、〇

右分三包一日三回每回一包

五三八 ルプリン、加糖炭酸鐵 各六、〇

白糖 各六、〇

五三三 右一日三回每回一小刀尖

撒里矢爾酸麻僱涅叟謨 一〇、〇

ナフトール 四、〇

白堊 三、〇

右分二十包每食前一包

五三三 撒里矢爾酸蒼鉛 各一〇、〇

炭酸麻僱涅叟謨 各一〇、〇

重炭酸那篤留謨 各一〇、〇

右三十包朝晝食後各一包

五三四 撒里矢爾酸蒼鉛 各五、〇

アルハアーナフトール、白堊

燐酸加爾叟謨 各五、〇

右分二十包食後一包

五三四 撒里矢爾酸蒼鉛、ザロール 各一〇、〇

或ナフトール、木炭末

或重炭酸那篤留謨 各一〇、〇

右分三十包朝晝食後一包

五三四 炭酸麻僱涅叟謨 九、〇

甘草根末 一二、〇

大黃末 六、〇

纈草根末 三、〇

泊芙蘭末 〇、六

過尼子末 九、〇

右一日三回每回一小刀尖

五三四 ●丸劑 一〇、〇

乳酸鐵 一〇、〇

右爲九十九一日三回每回二

五三五 鹽酸規尼涅 一〇、〇

右爲九十九一日三回每回二

五三四 炭酸鐵 〇、六

亞砒酸 〇、〇〇六

右爲九一日三回二日分服

五三五 麥角越幾斯 五、〇

右甘草末甘草蒸各適宜爲九

十九一日三回每回一粒乃至

三粒

五三四 溶製スベルミン 〇、〇〇六

右一立方仙迷注射皮下

麻痺 Paralysis.

末梢性神經麻痺

其類甚繁、不勝備載、茲舉其二種、顏面神經麻痺、古謂之口眼喎斜、舌下神經麻痺、又曰舌麻痺、舊譯作舌硬、又名癱換舌硬、統言之、末梢神經麻痺、古人以為中風之一病狀、

●水劑

五三〇 機那煎 (一〇〇) 一〇〇、〇

沃度加留謨 一、〇

單舍利別 八、〇

五二〇 機那煎 (一〇〇) 一〇〇、〇

沃度加留謨 一、五

蕃木鼈越幾斯 〇、一

五二一 沃度加留謨

或沃度ルビチウム 五、〇

縮水 一五〇、〇

五二二 右一日三回每回一食匙

沃度加留謨、抱水格魯刺兒

五二三 縮水 各三、〇

單舍利別 三〇、〇

右一日三回每回一食匙 一五、〇

五三三 貌羅謨加留謨 八、〇

貌羅謨那篤留謨 各四、〇

貌羅謨安母羅謨 二〇〇、〇

水 右一日三回每回一食匙

五三四 硝酸ストリキニール 〇、一

稀鹽酸 〇、二

酒精 二、四

縮水 七、三

右一日三回每回五滴至十滴

五三五 鹽酸スコボラミン 〇、〇五

縮水 七〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右一日一二回每回一茶匙

五三六 加拉爾拔豆越幾斯 〇、一

儂里設林 三〇、〇

右一日三四回每回十滴 九、〇

五三九 硝酸ストリキニール 〇、〇六

右甘草蒸適宜為三十九朝夕

一粒漸次增至六粒 一、〇

五三〇 蕃木鼈越幾斯 〇、〇五

右以甘草蒸為五十九一日三回每回一粒 〇、一

五三一 蕃木鼈越幾斯 〇、〇五

鹽酸規尼涅 〇、〇五

還元鐵 〇、〇五

右為丸一日三回二分服

五三七 抱水格魯刺兒 九、〇

五二二 ヲルチン 〇、三

右甘草末甘草羔適宜爲三十

丸朝夕一粒

五二三 硫酸亞篤魯必涅 〇、〇一

右甘草末甘草羔適宜爲二十

丸一日一粒

五二四 鹽酸ヒヨスチン 〇、〇〇五

右白礬土適宜爲二十九一日

二回每回一二粒

五二五 加拉拔爾豆越幾斯 〇、一

右甘草末甘草羔適宜爲三十

丸一日三回每回一二粒

五二六 嘔囉仿謨 二、〇

右偏里設林、亞爾答亞根末、

亞拉昆亞護謨、餽水各適宜

爲百九一日三回每回一粒

●散劑

五二七 撒里矢爾酸 五、〇

右分五包每時一包

五二八 貌羅謨加儲謨 一、二、〇

右分十二包一日二三回每回

一包

五二九 單寧酸カンナゼン 一、〇

白糖

右分四包一日二回每回一包

●塗布劑

五三〇 豚脂 〇、一

ベルガモット油

二滴

五三一 的列並底油 二五、〇

樟腦石鹼擦劑

右塗布 二五、〇

五三二 的列並底油 三〇、〇

亞麻仁油

琥珀油、杜松實油 各一五、〇

右塗布

五三三 菲沃斯油 一〇、〇

格魯胃謨 一〇、〇

右塗布

●注射皮下劑

五三四 硝酸斯篤里幾尼涅 〇、〇五

餽水

右三分之一至一筒注射皮下

五三五 麥角越幾斯 二、〇

稀酒精、個里設林 各六、〇

右每回半筒注射皮下

五三七 抱水貌羅謨化ヒヨスチン 〇、〇〇五

餽水

右四分之一至一筒注射皮下

五三六 抱水格魯刺兒 四、〇

藥用石鹼

右以蜂蜜爲坐藥二個 二、五

五三七 抱水格魯刺兒 二、五

右加餽水及亞拉昆護謨總其

全量爲五〇、〇 灌腸 二、五

神經痛 Neuralgie.
知覺過敏 Hyperaesthesia.

麻痺

三叉神經痛 Prospalgia. Neuralgia trigemina. 顏面痛、面痛、顏面神經痛

乳房神經痛 Mastodymie 乳腺神經痛、乳痛、乳房痛

肋間神經痛 Neuralgia intercostalis.

舊譯作脇縫腦筋痛、又名脇中刺疼、古謂之脇筋痛、或謂之懸癖

坐骨神經痛 Ischiasis.

舊譯作坐骨痛、古謂之腰痛、或尻痛、或股痛、因其部位不同、而異其名

腰痛 Neuralgia lumbalis. 一名腰腹神經痛、一作腰神經痛

胯神經痛 一名股神經痛、舊譯作股痛

處置 蒸氣浴、局處刺戟、灸點、發泡管、イヒチチール塗布、按摩、電氣等有效

●塗布劑

五七九 沃度丁幾 二〇、〇

右塗布 僱里設林、加里石鹼各二〇、〇 右一日三回塗布

五八〇 イヒチチール、水 各一〇、〇 五八三 獨答利斯軟膏 一〇、〇

右塗布 ラノリン 三〇、〇 右塗布 五八四 芫菁硬膏 方四寸

五八一 イヒチチール 一〇、〇 右局部貼用

酒精 一〇〇、〇 五八五 アコニチン 〇、〇五

右塗布 單軟膏 二〇、〇

五八二 イヒチチール 二〇、〇 右塗布

五八六 アコニチン 〇、二

右酒精適宜溶解 一〇、〇

官粉軟膏 右塗布 一〇、〇

五八七 結晶アコニチン 〇、一—〇、二

酒精 右塗布 十滴

ラノリン 一〇、〇—二〇、〇

右塗布 五八八 鹽酸莫兒比涅 〇、一—〇、三

ラノリン 一〇、〇

神經痛

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 五九四 安知必林 右塗布 | 五九三 依的兒 右塗布 | 五九二 抱水格魯爾 樟腦 阿列布油 右塗布 | 五九一 的列並油 樟腦 加里石鹼 右塗布 | 五九〇 的列並油 水 卵黃 亞麻仁油 右塗布 | 五八九 巴豆油 古魯胃謨 右塗布 | 五八八 メチラール 豚脂 右塗布 | 五八七 メントール 阿列布油 刺乃林 右塗布 | 五八六 メントール 石灰水 阿列布油 右塗布 | 五八五 メチラール 豚脂 黃蠟 右塗布 |
| 二五、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 五〇、〇 | 一〇、〇 | 三〇、〇 | 一〇、〇 | 五〇、〇 | 三〇、〇 |
| 五二四 ラノリン 右塗布 | 五二三 嘒囉仿謨 右塗布 | 五二二 嘒囉仿謨 右塗布 | 五二一 芳香精 右塗布 | 五二〇 メントール 芳香精 右塗布 | 五一九 メントール 阿列布油 刺乃林 右塗布 | 五一八 メントール 石灰水 阿列布油 右塗布 | 五一七 メントール 阿列布油 刺乃林 右塗布 | 五一六 メントール 石灰水 阿列布油 右塗布 | 五一五 メントール 阿列布油 刺乃林 右塗布 |
| 二五、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 |
| 五二〇 嘒囉仿謨 右塗布 | 五一九 嘒囉仿謨 右塗布 | 五一八 嘒囉仿謨 右塗布 | 五一七 嘒囉仿謨 右塗布 | 五一六 嘒囉仿謨 右塗布 | 五一五 嘒囉仿謨 右塗布 | 五一四 嘒囉仿謨 右塗布 | 五一三 嘒囉仿謨 右塗布 | 五一二 嘒囉仿謨 右塗布 | 五一一 嘒囉仿謨 右塗布 |
| 二〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 |
| 五〇七 阿片越幾斯 右塗布 | 五〇六 阿片越幾斯 單軟膏 右塗布 | 五〇五 阿片越幾斯 薄荷油 右塗布 | 五〇四 阿片越幾斯 複方石鹼拔爾撒謨 右朝夕塗布 | 五〇三 阿片越幾斯 單阿片丁幾 樟腦擦劑* | 五〇二 阿片越幾斯 的列並油 阿列布油 阿片丁幾 右一日四回塗布 | 五〇一 阿片越幾斯 的列並油 阿列布油 阿片丁幾 右一日四回塗布 | 五〇〇 阿片越幾斯 的列並油 阿列布油 阿片丁幾 右一日四回塗布 | 四九九 阿片越幾斯 的列並油 阿列布油 阿片丁幾 右一日四回塗布 | 四九八 阿片越幾斯 的列並油 阿列布油 阿片丁幾 右一日四回塗布 |
| 二〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 | 一〇、〇 |

豚脂

右塗布

五、〇

五〇八

阿片越幾斯
樟腦石鹼擦劑

一、〇
五〇、〇

右朝夕塗布

五〇九 阿片越幾斯、洸拉篤里涅

單軟膏

右塗布

各一、〇
二〇、〇

五二〇 別拉敦那越幾斯、石鹼硬膏

右塗布

各五、〇

五二一 別拉敦那越幾斯

石鹼硬膏

二、〇
二〇、〇

右塗布患部

五二二 別拉敦那越幾斯、水

右塗布

各一、〇
八、〇

右塗布

五二三 別拉敦那丁幾

杏仁水

五、〇
二〇、〇

依的兒精

右塗布

五、〇

五三四 藜蘆丁幾

三〇、〇

右塗布

五二五 洸拉篤里涅

豚脂

右塗布

一、〇
四〇、〇

五二六 洸拉篤里涅

華攝林

右塗布

一、〇
三〇、〇

五二七 洸拉篤利涅

華攝林

右塗布

二〇、〇
〇、五

五二八 洸拉篤里涅

パラフィン軟膏

右塗布

〇、一
三〇、〇

五二九 洸刺篤里涅

嗎囉仿謨

右塗布

一〇、〇
一〇、〇

五三〇 洸拉篤里涅

嗎囉仿謨

酒精

右塗布

〇、五
一〇、〇
五〇、〇

五三一 洸拉篤里涅

嗎囉仿謨

阿列布油

〇、三一〇、五
五、〇
二五、〇

右塗布

五三三 洸拉篤利涅

嗎囉仿謨

安母尼亞擦劑

〇、五
五、〇
二〇、〇

右塗布

五三三 洸拉篤利涅

酒精

豚脂

〇、一
一〇、五
二滴—三滴
一〇、〇

右塗布

五三四 洸拉篤里涅

右阿列布油豚脂各適宜爲二

五、〇塗布

〇、二五

五三五 洸拉篤利涅

嗎囉仿謨

拔爾撒謨油混和劑 * 三〇、〇

右塗布

五三六 洸拉篤里涅、鹽酸莫兒比涅

軟膏

右塗布

各〇、一
一〇、〇

五三七 洸拉篤里涅

鹽酸莫兒比涅

單軟膏

〇、三
〇、一
一〇、〇

右塗布
五三六 洑刺篤里溫、鹽酸莫兒比溫
各〇、一

華樹林
一〇、〇

右塗布

●浸煎劑

五三元 機那煎 (八、〇) 一〇〇、〇

格魯鳩謨丁幾 二、〇

單舍利別 一〇、〇

右一日三回分服

五三〇 吐根浸 (〇、三) 一〇〇、〇

格魯鳩謨丁幾 二、〇

杏仁水 四、〇

右一日三回分服

五三二 纈草根浸(一〇、〇) 二〇〇、〇

芳香丁幾 六、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

五三三 接骨木花浸 (二〇、〇) 一三〇、〇

醋酸亞母尼亞液 二五、〇

橙皮舍利別 二五、〇

右每時一食匙

五三三 健質亞那浸(四、〇) 一〇〇、〇

重碳酸那篤留謨 二、〇

單舍利別 八、〇

右一日三回分服

●水劑

五三四 撒里矢爾酸那篤留謨 五、〇

苦味丁幾 二、〇

水 一〇〇、〇

右每二時一食匙

五三五 撒里矢爾酸那篤留謨 五、〇

餾水 一五〇、〇

甘草煮 五、〇

右每一時乃至二時一食匙

五三六 撒里矢爾酸那篤留謨 一二、〇

沃度加留謨 四、〇

水 一二〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右一日三回每回一食匙

五三七 沃度加留謨 五、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右一日三回每回一食匙

五三八 沃度加留謨 二、〇

水 二〇〇、〇

苦味丁幾 三、〇

右每二時一食匙

五三九 沃度加留謨 〇、六一、五

苦味丁幾 二、〇

單舍利別 八、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

五四〇 沃度加留謨 八、〇 一〇〇、〇

薄荷水 一九〇、〇

右一日三回每回一食匙

五四一 沃度加留謨 一〇、〇

或沃度那篤留謨 四、〇

阿片越幾斯 〇、二

水 二〇〇、〇

右一日三回每回一食匙

五四二 沃度加留謨 一、〇

格魯失鳩丁幾 二、〇

單舍利別 八、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

五四三 沃度加留謨 一、〇

格魯失鳩母丁幾 二、〇

雙蘭菊丁幾 二、〇〇

單舍利別 八、〇〇

水 一〇〇、〇〇

右一日三回分服

五三四 貌羅謨加留謨 二、〇〇

苦味丁幾 二、〇〇

單舍利別 八、〇〇

水 一〇〇、〇〇

右一日三回分服

五四五 貌羅謨加留謨 六、〇〇

沃度加留謨 二、〇〇

水 二〇〇、〇〇

苦味丁幾 三、〇〇

右每二時一食匙

五四六 貌羅謨加留謨 二、〇〇

沃度加留謨 二、〇〇

苦味丁幾 二、〇〇

單舍利別 八、〇〇

水 一〇〇、〇〇

右一日三回分服

五三七 亞砒酸加留謨液 三〇、〇〇

右每回三滴乃至五滴、逐次

增量

五三六 亞砒酸加留謨液 五、〇〇

林檎酸鐵丁幾 二〇、〇〇

右混和一日三回每回十五滴

五三九 亞砒酸加留謨液、杏仁水 各五、〇〇

右一日三回每食後半時四滴

五三〇 亞砒酸加留謨液 四、〇〇

稀酒精 六、〇〇

水 六、〇〇

單阿片丁幾 二、〇〇

右一日三回食後十五分乃至

二十分二滴

五五一 亞砒酸 〇、〇一

炭酸加留謨 〇、〇一

水 一〇、〇〇

貌羅謨 〇、〇二

右一日二回每回三四滴

五三二 鹽酸莫兒比涅水(〇、一)五、〇〇

右每夕十滴乃至二十滴

五三三 硝酸斯篤里幾尼涅 〇、〇五

稀酒精 二五、〇〇

右一日二回每回二十滴但漸

次增至五十滴

五三四 鹽酸ヒヨスチン 〇、〇〇五一〇、〇一

水 七〇、〇〇

橙皮舍利別 三〇、〇〇

右一日一二回每回一茶匙

五三五 鹽酸規尼涅 〇、〇五

稀鹽酸 二、〇〇

桂皮水 五〇、〇〇

水 一〇〇、〇〇

右一日三回分服

五三六 抱水格魯刺兒 九、〇〇

醋酸莫兒比涅 〇、〇五

水 八〇、〇〇

右每回一茶匙乃至一食匙

五三七 エキサルギン 二、〇五

橙皮丁幾 五、〇〇

水 二〇、〇〇

橙皮舍利別 二〇、〇〇

右朝夕一食匙

五三六 エキサルギン 二、〇五

薄荷精 五、〇〇

菩提樹水 * 一二〇、〇〇

橙皮舍利別 三〇、〇〇

右朝夕一食匙

五五九 安知必林 五、〇

水 一五〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

五六一 古坪乙澁 〇、〇一

酒精 一、〇

水 一九、〇

右一日三回每回十滴乃至二十滴

五六一 貌羅謨水素酸古坪乙澁 〇、〇二

單舍利別 一〇〇、〇

右一日三回每回一茶匙

五六一 貌羅謨水素酸古坪乙澁 〇、〇二

水 一〇〇、〇

薄荷水 二五、〇

單舍利別 二五、〇

右一日三回每回一食匙

五六一 プツチアルクロラル 三、〇

酒精 一〇、〇

偏里設林 二〇、〇

水 一二〇、〇

五六一 右一回三四食匙

五六一 プチアルコラルヒドラー 五、〇一

ト 二〇、〇

偏里設林 二〇、〇

水 一三〇、〇

右每回一食匙

五六一 抱水亞蜜兒 六、〇一七、〇

鹽酸莫兒比澁 〇、〇二一〇、〇三

水 六〇、〇

甘草越幾斯 一〇、〇

右臨臥時服三分之一

五六一 呀囉仿謨水 * 一〇〇、〇

橙花水 * 二〇、〇

單舍利別 三〇、〇

鹽酸莫兒比澁 〇、〇三

貌羅謨加留謨 一、〇

右一日數回每回一小兒匙乃至一食匙

五六一 貌羅謨加留謨 五、〇一〇、〇

五六一 黃素馨丁幾 * 二、五

水 一五〇、〇

右一日三回每回一食匙

五六一 格魯矢屈謨丁幾 各五、〇

五六一 黃素馨丁幾 * 各五、〇

右一日三回每回十滴

五六一 格魯矢屈謨丁幾 一〇、〇

雙蘭菊丁幾 五、〇

右一日三回每回一滴

五六一 ゲルセミー丁幾 五、〇

右每半時間二十滴

五六一 的列並油、依的兒 各七、五

右一日三回每回五滴乃至十五滴

五六一 的列並油 二、〇一五、〇

五六一 鷄卵黃 一個

右為乳劑一〇〇、〇一日三回分服

五六一 的列並油 五、〇

五六一 蜂蜜 三〇、〇

右朝夕一茶匙

五六一 的列並油 五、〇

五六一 蜂蜜 五〇、〇

右每二時一茶匙

五六一 橙皮舍利別 二〇、〇

五六一 的列並油 二〇、〇

五三七 蓖麻子油

五〇〇

巴豆油

三滴

右每二時一食匙

●丸劑

五三六 硫酸亞錫魯必涅

〇、〇〇五

甘草羔、甘草末

各適宜

右為十九日一粒乃至三粒

五三七 結晶アコニチン

〇、〇〇二

右甘草末甘草羔各適宜為二十九日二粒乃至五粒

五三六 結晶アコニチン

〇、〇二五

菲沃斯越幾斯

一、〇〇

右以甘草末甘草越幾斯為五

五三七 コルヒチン

〇、〇五

右為百九一日三回每回一粒

五三六 繡草酸規尼涅

二、〇〇

右以杜松實越幾斯為二十九

五三六 鹽酸規尼涅

一、五〇

一日五粒乃至十九

阿片

〇、一〇

右甘草羔、亞拉比亞護謨適

宜為十九每二時一粒

五三六 古坪乙涅

〇、五〇

右以亞爾答亞根末、單舍利

五三六 メントール

二、〇〇

別為二十九每夕一二粒

五三六 亞砒酸

〇、一〇

宜為二十九分服

五三六 乳糖

四、〇〇

亞拉比亞護謨

五三六 亞拉比亞護謨

一、〇〇

右以蜂蜜為百九一日三回自

五三六 磷

〇、〇〇一

一二粒漸次增量

五三六 クロトンコロラールヒドラー

右為一九一日三回每回一粒

五三六 右甘草末亞拉比亞護謨適

宜為三十九每二時二粒乃至

五三六 的列並油

五、〇〇

石炭酸麻屈涅西亞適宜為五

五三六 蘆薈、菲沃斯越幾斯

十九朝夕五粒

五三六 芥木髓越幾斯 各〇、一〇

右甘草羔適宜為九一日三回

分服 〇、〇一

五三六 乳酸亞鉛

右為五十九一日數回每回五

五三六 酸化亞鉛、繡草越幾斯各二、〇〇

右為二十九發作前三粒

五三六 酸化亞鉛、菲沃斯越幾斯

右為四十九朝夕一粒

五三六 酸化亞鉛、曼陀羅華越幾斯

阿片越幾斯 各一、〇〇

右為六十九一日數回每回一

五三六 酸化亞鉛

二、〇〇

或乳酸亞鉛

〇、四〇

右繡草越幾斯適宜為二十九

每發作時三粒

●散劑

五三六 人工加爾爾斯泉鹽

右頓服 一五、〇〇

五三六 鹽酸莫兒比涅 〇、〇一
白糖 〇、〇五

右類服

五五六 鹽酸規尼澀 一、二、〇
右分五包每發作前二包

五五七 鹽酸規尼澀 三、〇
白糖 二、〇
右分六包發作一時間前二包

五五八 鹽酸規尼澀 三、〇
阿片 〇、一、八
白糖 三、〇
右分六包一日三四每回一包

五五九 鹽酸規尼澀 〇、五
鹽酸莫兒比澀 〇、〇、五
右一日一回頓服

五〇〇 咖啡澀 〇、三
白糖 一、五
右分五包每三時一包

五〇一 貌魯謨加留謨 五、〇一、二、〇、〇
右分十包一日三四每回一包

五〇二 貌魯謨加留謨 三、〇
安知歇貌林 一、〇
乳糖 一、五
右分三包一日三回分服

五四三 安知歇貌林 一、〇一、二、〇
白糖 一、二
右分四包一日三四每回一包

五四四 安知必林 二、〇
右分六包發作時一包至四包

五四五 安知必林 一、〇、〇
右分十包一日三四每回一包

五四六 安知必林 二、〇
白糖 一、〇
右分二包朝夕一包

五四七 安知必林 一、二、一、二、〇
白糖 一、〇
右分三包一日三四分服

五四八 安知必林 一、五、一、二、〇
鹽酸莫兒比澀 〇、〇一、五、〇、〇、二
白糖 一、〇
右分三包一日三四分服

五四九 撒里矢爾酸 五、〇一、〇、〇
右分十包一日三四每回一包

五四〇 撒里矢爾酸那篤留謨 一、〇、〇一、二、〇、〇
右分十包每時或朝夕一包

五四一 メチーレンブラウ 一、〇一、二、〇
右分十包一日三四每回一包

五四二 ザリピン 一、〇一、二、〇
右一日數回分服

五四三 ラクトフェニン 〇、五、一、〇、〇
右分三包一日三四每回一包

五四四 オイフサリン 〇、五
右分三包一日三四每回一包

五四五 アナルゲン 〇、五、一、〇、〇
右分三包一日三四每回一包

五四六 フェナツエチン 三、〇一、六、〇
右分六包臨時一包

五四七 エキサルギン 一、〇
右分四包一日一二回每回一包

五四八 菲沃斯越幾斯 〇、〇、二
鹽酸莫兒比澀 〇、〇、一、五
白糖 〇、五
右分三包一日三四每回一包

五四九 加糖炭酸鐵、乳糖 各一、五
右分三包一日三四每回一包

海麝香 〇、〇、六

右分六包一日三四每回一包

●注射皮下劑

五四三 沃度那篤留謨水(5%—10%) 一〇、〇

右一二筒注射皮下

五四三 鹽酸莫兒比涅水(1%—2%) 〇、〇、一

右注射皮下四分之一至半筒

五四三 鹽酸規尼涅 〇、〇、一

鹽酸 二滴

アコニチン 〇、〇、一

水 一〇、〇

右四分之一乃至一筒注射皮下、小兒

五四四 硫酸亞篤魯必涅 〇、〇、一

水 一〇、〇

右四分之一乃至半筒注射皮下

五四五 咖啡涅 〇、〇、一

撒里矢爾酸那篤留謨 一、〇

水 二〇、〇

右半筒乃至一筒注射皮下

五四六 エトキシコッフエイン 〇、〇、二

撒里矢爾酸那篤留謨 〇、〇、二

水 一〇、〇

右一筒注射皮下

五四七 オスミニウム酸水(1%) 一〇、〇

右五分之一乃至半筒注射皮下

五四六 亞硝酸亞密兒酒精(10%) 一〇、〇

右每回十滴注射皮下

五四九 勃拉篤里涅 〇、〇、二

酒精 五、〇

水 五、〇

右半筒乃至一筒注射皮下

五四〇 安息香酸那篤留謨水 (二、〇) 一〇、〇

右二分一乃至一筒注射皮下

五四一 燐酸古埤乙涅 〇、〇、五

水 一〇、〇

右半筒乃至一筒注射皮下

五四二 古埤乙涅 〇、〇、一

酒精 一、〇

水 九、〇

右半筒乃至一筒注射皮下

五四三 貌羅謨水素酸古埤乙涅水

右注射皮下半筒乃至一筒

五四四 嚼囉仿謨 六、〇

射 八、〇

五四五 安知必林 五、〇

蒸餾水 五、〇

右每回一筒注射皮下

五四六 安知必林 〇、五

水 一、〇

右注射皮下

五四七 メチレンブラウ(2%) 一〇、〇

右一筒乃至四筒注射皮下

五四八 メチレンブラウ 一、〇、一、〇

右爲膠囊十個一日三四每回一個

五四九 フェナセチン 五、〇

右爲膠囊十個一日一個

五四〇 別拉敦那葉、矢鳩答葉、菲沃斯葉、綿葵葉、煙草葉

白器粟葉 各六、〇
水 右浸出、罌法 一一〇、〇

五四一 芥子精 一五、〇—二〇、〇
右蘸濾紙貼用
五四二 平流電氣 十二源

右上行線應用

痙攣 Spasmus. Convulsion. Tétanospia. Hyperkinesie, Morigraphia. etc.

搖擗、搖掣、急痙、顏面痙攣、指端痙攣、筆痙、書痙等

●水劑

五四四 コロ、ダイン 二〇、〇

右每回五滴乃至十滴

五四四 琥珀酸安母尼亞鹽 一〇、〇

依的兒精 一〇、〇

右每二時十滴乃至二十滴

五四五 嘔囉仿謨 一、〇

依的兒製續草丁幾 一〇、〇

右每半時十滴乃至二十滴

五四四 貌羅謨加留謨 八、〇

水 二〇、〇

單舍利別 一一、〇

右每二時一食匙

五四四 抱水格魯刺爾 二、五

亞拉比亞護謨漿

單舍利別 各三〇、〇

右一日數回每回一食匙

五四六 抱水格魯刺爾 九、〇

醋酸莫兒比涅 〇、〇五

水 八〇、〇

五四六 抱水格魯刺爾 一〇、〇

醋酸莫兒比涅 〇、〇一

亞爾答亞根煎 一五〇、〇

甘草蒸 一〇、〇

右每一時乃至二時一食匙

五四五 抱水貌羅謨水素酸ヒヨスチン 〇、〇〇五—〇、〇一

水 七〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右一日一二回每回一茶匙

五四五 貌羅謨水素酸古坪乙涅 〇、〇二

水 一〇〇、〇

薄荷水 二五、〇

單舍利別 二五、〇

右一日三回每回一食匙

五四五 嘔囉仿謨水 * 一〇、〇

橙花水 * 一〇、〇

嬰粟舍利別 * 三〇、〇

貌羅謨加留謨 一、〇

右一口數回每回一小兒匙

五四五 嘔囉仿謨水 一〇〇、〇

橙花水 二〇、〇

單舍利別 三〇、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇三

貌羅謨加留謨 一、〇

右一日數回每回一小兒匙乃

至一食匙

●丸劑 硫酸亞篤魯必涅 〇、〇〇〇五

右爲一丸一日一粒乃至二粒

●注射劑

五西五 抱水貌羅漢化ヒヨスチン

〇、〇〇五

水

右以四分之一乃至一筒注射

皮下

五西六 鹽酸莫兒必遑

蒸餾水

右以一筒注射皮下

五西七 貌羅漢水素酸古坪乙遑

破傷風、牙關緊急

Tetanus und Trismus.

強直症、強瘻、瘻病、咀嚼筋痙攣、口噤、驚風蟲、舊作牙關緊閉、又名發瘻、又名剛瘻

●水劑

五西三 貌羅漢加留漢

一〇、〇一二〇、〇

單舍利別

一五、〇 一八〇、〇

右每二時一食匙

五西四 貌羅漢加留漢五、〇一〇、〇

抱水格魯刺兒 二、〇一三、〇

亞拉比亞護漢漿 一〇〇、〇

水

右以半筒乃至一筒注射皮下

●洗腸劑

五西六 抱水格魯刺兒

水

亞拉比亞護漢漿

五西九

アミーレンヒドラード 五、〇

水

亞拉比亞護漢漿

二五、〇

●坐藥

右灌腸

五西八 抱水格魯刺兒

藥用石鹼

右以蜂蜜爲坐藥二個

五西二 黃蠟

柯柯阿脂

抱水格魯刺兒

右爲坐藥三個

五西三 亞硝酸亞密爾

右噴入二三滴

右每二時一食匙

五西五 貌羅漢加留漢

鹽酸莫兒比遑

一〇〇、〇 一〇〇、〇

右一日三四分服

五西六 抱水格魯刺兒

水

椽皮舍利別 一〇〇、〇 二〇、〇

右每十五分時一食匙

五西七 抱水格魯刺兒

水

亞拉比亞護漢漿

單舍利別

右每二時一食匙

五西八 加拉拔兒豆越幾斯

薄荷水

依的兒精

右一日三四回每回八滴至十滴

一〇〇、〇 一五〇、〇

各三〇、〇

〇、五

二〇、〇 六、〇

●散劑

五四九 撒里矢爾酸那篤留謨 三、〇

右頓服

五四七 撒里矢爾酸那篤留謨 四、〇

白糖

適宜

右頓服

五四七

阿片

五、〇

白糖

五四七

鹽酸必魯加爾必涅

〇、〇二

小兒子痲、搐搦

Eclampsia infantum, Convulsio.

小兒搐搦、小兒搐掣、小兒急痲、驚風、古名急驚風

●水劑

五四九

硫酸銅

〇、五

蒸餾水

五四八

抱水格魯刺爾

〇、二一〇、六

亞拉比亞護謨漿

單舍利別

各一〇、〇

右頓服

五四三 加刺拔兒豆越幾斯 〇、〇三

乳糖

右分三包一日三回每回一包 一、五

●注射劑

五四七 鹽酸莫兒比涅

蒸餾水

右每回半筒至一筒注射皮下 〇、二

五四五 クラール

右每回半筒注射皮下 一〇、〇

水 右每回半筒注射皮下 一〇、〇

五四六 撒里矢爾酸(硫酸)比蘇斯知儷

密涅

〇、二一〇、三

右每回一筒注射皮下 一〇〇、〇

五四七 鹽酸規尼涅

偏里設林

水 右注射皮下 二、五

五四六 亞硝酸亞密爾

右吸入五滴 二、五

單舍利別 右每半時一小兒匙 二〇、〇

五四三 貌羅謨加留謨

水 右每二時一小兒匙 二〇、〇

五四四 貌魯謨加留謨

單舍利別 右每二時一小兒匙 一五、〇

五四四 貌魯謨加留謨

水 右每二時一小兒匙 二〇、〇

覆盆子舍利別

各一〇、〇

五四八五 右每時一小兒匙
貌魯謨加留謨 二、〇
貌魯謨安母紐謨 一、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 三二〇、〇

右一日三四回每回一小兒匙

五四八六 沃度加留謨 一、〇

蒸餾水 八〇、〇

桑實舍利別 二〇〇、〇

右每時一小兒匙

五四八七 沃度加留謨 一、〇

水 八〇、〇

覆盆子舍利別 二〇〇、〇

五四八八 燐酸 二、〇

覆盆子舍利別 一〇〇、〇

水 一〇〇、〇

右每半時一食匙

五四八九 麝香 〇、三

亞拉比亞護謨漿 六〇〇、〇

右十五分乃至三十分一小兒匙

五四九〇 硫酸アトロヒチ 〇、〇一

稀硫酸 〇、〇五
水 一〇〇、〇
右一日二三回每回十滴

●散劑
五四九一 ウレタン 〇、五一一、五

右分五包一日三回每回一包

五四九二 麝香 〇、三

白糖 一、〇

右分五包每二三時一包、小兒

五四九三 酸化亞鉛 〇、二

貌魯謨加留謨 二、〇一四、〇

白糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

五四九四 乳酸亞鉛 〇、一

白糖 二、〇

右分十包每二三時一包、小兒

五四九五 繡草酸亞鉛 〇、一

白糖 二、〇

右分十包每二三時一包、小兒

五五〇〇 阿魏 〇、五

右為乳劑一二〇、〇浣腸

五五〇一 繡草浸 (一〇〇、〇)一〇〇、〇

右浣腸

五五〇二 硫酸亞篤魯比涅 〇、〇〇〇一

右注射皮下、四歲以下之小兒

五四九六 繡草酸亞鉛 〇、一一〇、三

白糖 五、〇

右分十包每二時一包

五四九七 硫酸銅 〇、五

白糖、澱粉 各一、五

右分五包每十分時一包、得吐休藥

五四九八 甘汞 〇、〇一五一〇、〇九

乳糖 一、五

右分三包每四時一包、快通休藥

●浣腸劑

五四九九 抱水格魯拉爾 〇、二五

水 五〇、〇

右浣腸

五五〇〇 阿魏 〇、五

右為乳劑一二〇、〇浣腸

五五〇一 繡草浸 (一〇〇、〇)一〇〇、〇

右浣腸

五五〇二 硫酸亞篤魯比涅 〇、〇〇〇一

右注射皮下、四歲以下之小兒

五五〇三 嚼囉仿謨 一〇、〇

右吸入

五五〇 百倍硫酸亞錫篤魯比涅液 一滴

右點滴結膜、幼穉乳兒

夜驚 Pavor nocturnus.

五五五 硫酸規尼涅 〇、四

貌魯謨加留謨 三、〇一五、〇

白糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包

定期性夜間咳嗽

Tussis periodica nocturna.

小兒 二、〇

五五〇 抱水格魯刺兒 六、〇

貌魯謨加留謨 三、〇一五、〇

橙皮舍利別 三、〇

右每三時一茶匙、小兒

●水劑

五五七 嚼嚙仿謨 三滴一四滴

水 八、〇

單舍利別 二、〇

右每回一茶匙、小兒

五五八 貌魯謨加留謨 二、〇一六、〇

吃逆 Singultus.

間代性橫膈膜痙攣、噯逆、噯噎、呃逆、

水 六、〇

單舍利別 二、〇

右每四時一小兒匙、小兒

五五九 油乳劑 一、〇

阿片越幾斯 〇、〇六

右一日四回每回一茶匙、小

稀鹽酸 四滴

酒精 三、〇

縮水 九、〇

右每回十滴乃至三十滴

五五四 杏仁水 五、〇

鹽酸莫爾比涅 〇、〇五

白糖 三、〇

右每三時三滴

五五五 緬草酸 一、五

水 五、〇

炭酸安母尼亞(至飽和) 適宜

緬草越幾斯 一、〇

●滴劑 二、〇

五五二 緬草丁幾 二、〇

五五三 鹽酸莫爾比涅水(二%) 五、〇

五五三 鹽酸莫爾比涅 〇、一二

夜驚 定期性夜間咳嗽 吃逆

右每回六滴乃至三十滴

●水劑

五五八 抱水營刺兒

一〇、〇

右每回一茶匙

五五七 嚼囉仿謨水

一〇〇、〇

單舍利別

二〇〇、〇

鹽酸莫爾比涅

三〇〇、〇

貌羅謨加留謨

〇、〇三

右一日數回每回一茶匙乃至

一小兒匙

五五八 結麗阿曹篤

二十滴

五五八 醋酸

二、〇

五五八 硫酸莫爾比涅

〇、〇六

五五八 餽水

六〇、〇

五五九 耶僕蘭日葉煎

(四、〇)一五〇、〇

右一回至二回分服

五五〇 油製乳劑

五〇〇、〇

結列阿曹篤

一滴一二滴

薄荷油

二滴

右每時一食匙

●丸劑

五五二 莫碧越幾斯、莫碧末 各一、〇

右蒲公莢越幾斯及蒲蒲根末

各適宜為百丸一日二粒乃至

三粒

●散劑

五五三 硫酸規尼涅

一、〇

別拉敦那越幾斯

〇、一

白糖

五、〇

右分三包一日三回每回一包

五五三 貌羅謨加留謨

二〇、〇

包

右分二十包一日二回每回一

●吸入劑

五五四 亞硝酸亞密兒

二、五

酒精

五、〇

右每回六滴乃至十二滴吸入

五五五 亞硝酸亞密兒、嚼囉仿謨

各五、〇

右每回五滴吸入

五五六 鹽酸必魯加兒必涅水(一%)

一〇、〇

右半筒注射皮下

五五七 依的兒

五〇、〇

右以發霧器十分時間撒布心

窩

五五九 亞砒酸加留謨液

各五、〇

林檎酸鐵丁幾

舞蹈病 Chorea.

又名舞蹈病、舊譯作跳舞風、又名四肢癱瘓、又名運動不自主症、古人以為癩之一病狀、若在婦女、則謂之臟躁

●滴劑

五五元 硼銅察

二、〇

水

右一日三回每回五滴至八滴

五〇、〇

五五元

亞砒酸加留謨液

各五、〇

右一日五滴漸次增量至二十滴

五五三 亞砒酸加留謨液、水 各五、〇

右一日三回每回六滴

五五三 亞砒酸加留謨液 一〇、〇

右一日三回每回五滴漸次增量至二十五滴

五五三 加拉拔兒豆越幾斯

薄荷水 〇、五

忽布滿鎮痛液 三〇、〇

右一日三回每回八滴 六、〇

●水劑

五五三 貌羅謨加留謨 七、〇

水 一八〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每三時一食匙

五五三 貌羅謨加留謨 一、五、三、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服 一〇〇、〇

五五三 プロピールアミン

薄荷水 四、〇

單舍利別 四五、〇

一五、〇

右一日三回每回一茶匙 五五六 プロピールアミン 一、〇

蒸餾水 一五〇、〇

右每時一食匙 一五、〇

五五七 硝酸斯篤里幾尼涅

單舍利別 〇、〇六

水 一〇、〇

右一日三回每回一茶匙 一〇〇、〇

五五八 亞砒酸加留謨液 十五滴

水 一〇〇、〇

右一日三回分服漸次增量一

日至三十滴

五五九 亞砒酸加留謨液 十滴

阿片丁幾 五滴

薄荷水 五〇、〇

水 五〇、〇

右一日三回每回二茶匙 五〇、〇

五五四 抱水格魯刺爾

亞拉昆亞護謨漿 一、〇

單舍利別 各一五、〇

右頓服

五五四 抱水格魯拉爾 五、〇

水 一五〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右每時一食匙 〇、〇一

五五二 貌魯謨化ヒヨスチン

水 七〇、〇

右一日一二回每回一茶匙 三〇、〇

五五四 安知必林

水 五〇、〇

五五五 散劑 三五、〇

●散劑

五五四 酸化亞鉛 〇、五

白糖 三〇、〇

右分五包一日三回每回一包 一、〇

五五五 酸化亞鉛 五、〇

白糖 一、〇

右分十包一日五回每回一包 一、〇

五五六 酸化亞鉛 一、〇

加糖炭酸鐵 二、〇

白糖 一〇、〇

右每一日三回每回一刀尖 〇、五

五五七 纈草酸亞鉛 〇、五

白糖 三、〇

右分五包一日三四每回一包

五五〇 エキサルギン 二、〇

右分十包一日三包

五五〇 安知必林 一、〇

右分四包一日二包

五五〇 安知必林 二、〇

右分六包一日三包乃至四包

五五〇 枸橼酸鐵規尼涅 一、〇

五五〇 萬蒲油糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

五五二 ●丸劑 五、〇

五五二 阿魏 五、〇

右爲五十九一日三粒至五粒

五五二 阿魏 五、〇

五五二 緬草根末 五、〇

大舞踏病 Chorea major.

右爲五十九一日三回每回三粒乃至五粒 〇、三

五五四 硫酸亞鉛 〇、三

右甘草末、護謨漿適宜爲丸

五五五 緬草酸亞鉛、緬草根末各五、〇

一日三回分服

五五五 右亞拉比亞護謨適宜爲百丸

一日三回每回二粒乃至三粒

五五五 亞砒酸 〇、三一〇、五

右以胡椒末、蜀葵根末各五、〇爲丸

〇爲丸九十九一日三回每回一粒

五五七 加拉拔兒豆越幾斯 〇、一

右甘草末甘草羔適宜爲六十丸

丸一日三回每回三粒

●注射劑

五五五 鹽酸ヒヨスチーチ 〇、〇一

水 右半筒乃至三筒注射皮下 一〇、〇

五五九 エゼリン 〇、〇〇一五〇、〇〇二

右一回注射皮下

五五六 硫酸フイソスチグミーチ 〇、〇一

水 右半筒乃至二筒注射皮下 二〇、〇

五五六 撒里矢爾酸ヒソスチグミーチ 〇、〇〇六

水 右一筒注射皮下 四、〇

五五三 亞砒酸加體護液、水各一〇、〇

右注射皮下

五五五 抱水格魯刺兒 一、〇一三、〇

水 貌魯謨加留謨 六〇、〇

五五五 貌魯謨加留謨 三、〇一五、〇

單舍利別 三〇、〇

五五五 散劑 〇、三

五五三 酸化亞鉛 〇、三

五五三 貌魯謨加留謨 二、〇一四、〇

白糖 三、〇

右分十包一日三四回每回一包

五五四 酸化亞鉛 〇、三

五五四 乳酸鐵 〇、四

白糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

右每三時一茶匙、小兒

小舞踏病 Chorea minor.

●水劑

五五七 亞砒酸加留謨液、薄荷水

各五、〇

右一日三回每回三滴至六滴

小兒

五五七 亞砒酸加留謨液

阿片丁幾

薄荷水、蒸餾水

右一日四回每回一小兒匙、

小兒

五五七 プロピールアミン

水 一、〇〇、〇

妊婦急癇 Eklampsia parturientium.

子癇、急癇、妊婦搖擲、子冒

處置

●滴劑

五五七 鹽酸莫兒比涅

杏仁水

右十五分時十五滴

五五七 硫酸亞篤魯必涅

〇、〇一

單舍利別

右每二時一小兒匙、小兒

二〇、〇

●散劑

五五七 酸化亞鉛

白糖

右分十包一日三回每回一包

小兒

五五七 安知必林

白糖

右分十包一日三回每回一包

小兒

五五七 貌魯謨加留謨

乳酸鐵

白糖

右分十包一日四包、小兒

五五七 エゼリン

水

右每回一筒注射皮下

五五七 抱水格魯刺兒

水

右澆腸、小兒

〇、三〇、〇

右一日數回每回十滴乃至十

三滴、虛脫

●水劑

五五七 抱水格魯刺兒

水

五〇、〇

| | |
|------------|-------|
| 單舍利別 | 三〇、〇 |
| 右每一二時一食匙 | |
| 五五七 抱水格魯拉爾 | 一、〇 |
| 沙列布漿 | 一〇〇、〇 |
| 覆盆子舍利別 | 二〇、〇 |
| 右每半時一小兒匙 | |
| 五五九 抱水格魯拉爾 | 〇、五 |
| 〇、五 | 一、〇 |
| 貌魯謨安母紐謨 | 一〇〇、〇 |
| 水 | 二〇、〇 |
| 單舍利別 | 一〇〇、〇 |
| 右每半時一小兒匙 | |
| 五六一 貌魯謨加留謨 | 三〇、〇 |
| 三、〇 | 一〇、〇 |
| 單舍利別 | 一〇〇、〇 |
| 水 | 一〇〇、〇 |
| 右一日三回分服 | |
| 五五二 貌魯謨加留謨 | 二、〇 |
| 覆盆子舍利別 | 一〇〇、〇 |
| 右每時一小兒匙 | |
| 五五三 貌魯謨加留謨 | 二〇、〇 |
| 苦味丁幾 | 一〇、〇 |
| 水 | 三、〇 |
| 右每二時一食匙 | |
| | 一八〇、〇 |

| | |
|--------------|-------|
| 五五三 沃度加留謨 | 一、〇 |
| 水 | 八〇、〇 |
| 覆盆子舍利別 | 二〇、〇 |
| 右每二時一小兒匙 | |
| 五五四 七ニエツト氏鹽 | 二〇、〇 |
| 水 | 一五〇、〇 |
| 滿那舍利別 | 二〇、〇 |
| 右每半時一食匙 | |
| 五五五 大黃浸 | 一〇〇、〇 |
| 薄荷水 | 一〇、〇 |
| 橙皮舍利別 | 一〇、〇 |
| 右一日三回分服 | |
| ●散劑 | |
| 五五六 阿片 | 〇、二 |
| 白糖 | 五、〇 |
| 右分十包每半時一包 | |
| 五五七 鹽酸必魯加兒必涅 | 〇、〇二 |
| 白糖 | 〇、五 |
| 右一日一回一包 | |
| 五五八 麝香、龍腦 | 各〇、一 |
| 白糖 | 適宜 |
| 五五九 乳酸亞鉛 | 〇、一五 |

| | |
|--------------|-------|
| 白糖 | 三、〇 |
| 右分十包每三時一包 | |
| 五五九 酸化亞鉛 | 〇、一 |
| 甘朮 | 〇、〇五 |
| 白糖 | 〇、五 |
| 右分四包一日四回每回一包 | |
| 五六一 甘朮 | 〇、〇二 |
| 白糖 | 〇、〇一 |
| 右分三包一日三回每回一包 | |
| 五五二 抱水格魯拉爾 | 二、五 |
| ●澱腸劑 | |
| 水、護謨漿 | 各五〇、〇 |
| 右澆腸 | |
| 五五三 阿片丁幾 | 一〇、〇 |
| 右添加澱腸料 | |
| 五五四 抱水格魯拉爾 | 六、〇 |
| 護謨合劑 | 一〇〇、〇 |
| 右澆腸 | |
| 五五五 抱水格魯拉爾 | 二、〇 |
| 水 | 二〇〇、〇 |
| 右澆腸 | |
| 五五六 樟腦 | 〇、〇五 |
| 卵黃 | 一個 |
| 右澆腸 | |

水 四〇、〇

右洗腸、虛脫

五九七 亞麻仁煎* 一〇〇、〇

麝香 〇、五

龍腦 〇、五

卵黃 一個

右產腸

癲癩 Epilepsia.

癩疾、癲癩、陽癩、舊作羊癩風、又名羊癩風、又名羊吊、俗名羊羔風、千金方巢氏病源、皆以為成人謂之癩、小兒謂之癩

●瀉劑 一、五

五〇三 碓銅礬 二五、〇

蒸溜水 右一日二回每回五滴

五〇四 格魯兒金那篤留漢 〇、二五

水 右入黑瓶一日三回每回五滴

五〇五 貌羅漢水素酸(十%) 六〇、〇

右一日三回每回二十滴乃至

五〇六 プローム、エチレイン 各四、五

酒精

五〇七 薄荷油 二滴

右一日三回每回五滴乃至十

五〇八 亞硝酸亞密劑 三滴

水 右發作時洗腸 二五、〇

●嗅入劑 右嗅入 五〇、〇

五〇九 亞硝酸亞密劑 三滴

右嗅入

五〇一 亞硝酸アミール 五、〇

右每回二滴乃至五滴嗅入

五〇二 硝酸莫兒比選 〇、五

水 右每回一筒注射皮下

五〇三 硝酸銀 〇、一

右朝夕十五滴

五〇四 硫酸アトロヒチ 一〇〇、〇

水 右朝夕十五滴

五〇五 硝酸銀 〇、一

右朝夕十五滴

五〇六 貌魯漢加僧漢 一、五

卵黃 一個

五〇七 硫酸アトロヒチ 一〇〇、〇

水 右朝夕十五滴

五〇八 硝酸銀 一、五

右朝夕十五滴

五〇九 硫酸アトロヒチ 〇、三

水 右一日一二回每回十滴

五〇一〇 硫酸アトロヒチ 〇、三

右一日三回每回十滴乃至十

五滴

癩草酸

水

三、〇
九五、〇

炭酸安母紐謨(飽和)

癩草越幾斯

二、〇

右一日六滴乃至三十滴

●水劑

癩水格魯刺兒

一、〇一二、五
六〇、〇

水

癩魯謨加留謨

四、〇一六、〇

單舍利別

二〇、〇

右每三時一茶匙、小兒

癩水抱水貌魯謨

一、〇
一〇〇、〇

水

亞拉昆亞護謨漿

五〇、〇

覆盆子舍利別

五〇、〇

右一日三回每回一食匙

癩貌魯謨加留謨

一〇、〇一二五、〇

水

右一日三回乃至五回每回一食匙

癩貌魯謨加留謨

八、〇

水

單舍利別

一八〇、〇
一五、〇

右每二時一食匙

癩貌魯謨加留謨

一〇、〇
一五〇、〇

水

橙皮舍利別

一五、〇

右每二時一食匙

癩貌魯謨加留謨

各〇、五

癩貌魯謨那篤留謨

各〇、五

亞砒酸加留謨液

一滴一二滴
二〇、〇

水

單舍利別

五、〇

右一日三回分服、小兒

癩貌魯謨加留謨

八、〇

癩貌魯謨那篤留謨

各四、〇

癩貌魯謨安母紐謨

二〇〇、〇

水

右一日三四回每回一食匙

癩貌魯謨加留謨

各一、五

癩貌魯謨那篤留謨

〇、七五

癩貌魯謨安母紐謨

一五〇、〇

癩貌魯謨加留謨

右一日三回每食後一回

癩貌魯謨那篤留謨

各二、五

癩貌魯謨安母紐謨

一、〇

水

癩貌魯謨加留謨

二五〇、〇

右一日三回每食後一回

癩貌魯謨加留謨

各二、五

癩貌魯謨那篤留謨

一、二

癩貌魯謨安母紐謨

一五〇、〇

水

癩貌羅謨加留謨

右一日三回每食後一回

癩貌羅謨那篤留謨

各三、〇

癩貌羅謨安母紐謨

一、五

水

癩貌魯謨加留謨

一五〇、〇

癩貌魯謨加留謨

〇一、〇

癩硼酸那篤留謨

〇一二〇、〇

右分十包一日二包

癩貌魯謨加留謨

二〇、〇

癩加拉拔兒豆丁幾

六、〇

水

癩貌魯謨加留謨

一〇〇、〇

右一日三回每回一二茶匙

五七〇 貌魯謨加留謨 一二、〇

蕃木甃丁幾 一、〇

橙皮舍利別 二五、〇

水 一五〇、〇

右一日三回每回二食匙

五七二 貌魯謨那篤留謨 五、〇

貌魯謨安母紐謨 五、〇

薄荷水 一五〇、〇

右每朝夕一食匙

五七三 貌魯謨安母紐謨 各一〇、〇

レゾルチン 二〇、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回每回一食匙

五七四 貌魯謨化亞鉛 六、〇

橙皮舍利別 一〇、〇

水 一五〇、〇

右一日一食匙乃至五食匙

五七五 貌魯謨化樟腦 二、〇

阿列布油 二〇、〇

亞拉比亞護謨 一〇、〇

薄荷油糖 一〇、〇

右爲乳劑一〇〇、〇一日三

回每回一食匙

五七六 貌魯謨水素酸(10%) 六〇、〇

蕃木甃丁幾 一、〇

桂皮水 一二〇、〇

右一日三回乃至六回每回半

五七七 亞砒酸加留謨液 三滴

水 五〇、〇

單舍利別 五、〇

右一日三回分服、小兒

五七八 硼酸那篤留謨 一、〇一四、〇

水 一〇〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右朝夕二回分服

五七九 硼酸那篤留謨 一〇、〇

偏里設林 六、〇

橙皮舍利別 九〇、〇

右一日一二回每回一食匙

五八〇 機那煎 一〇〇、〇

貌魯謨加留謨 二〇、〇

單舍利別 八、〇

右一日三回分服

五八一 機那煎 一〇〇、〇

貌魯謨加留謨 二、〇

沃度加留謨 一、五

單舍利別 八、〇

右一日三回分服

五八二 亞爾答根煎 一五〇、〇

貌魯謨加留謨 五〇、〇

右一日三回每回一食匙

五八三 纈草浸 一五〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

五八四 硝酸銀 〇、一

偏里設林 二五、〇

水 一五〇、〇

右一日三回每回一食匙

五八五 沃度加留謨 二、〇

水 一八〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

●丸劑

右以亞爾答根末爲五十九一

五八六 ヒヨスチアミン 〇、〇二五

右以亞爾答根末爲五十九一

五三四 日三回每回一粒
貌魯漢化ヒヨスチン 〇、〇一
右爲二十九一日一二回每回

一粒乃至四粒

五三四 抱水貌魯漢 一、五
甘草羔 一、五
右爲二十九一日二三回每回

一二粒

五三三 格魯兒銀 五、〇
右賦形藥適宜爲五十九一日

一粒乃至十粒

五三三 硫酸アトロヒチ 〇、〇五
右爲百九一日三粒乃至五粒

〇、〇五

五三三 硫酸アトロヒチ 〇、〇五
右爲五十九每晚一粒

〇、〇一五

五三三 右以泥蒿根末及精製蜂蜜爲
三十九朝夕一粒乃至二粒

〇、〇五

五三三 硫酸アトロヒチ 〇、〇五
右ヨスチアミン 〇、〇二

〇、〇二

五三三 右甘草末及甘草羔適宜爲六
十九朝夕每一粒

〇、〇一

五三三 加刺拔兒豆越幾斯 〇、〇一

〇、〇一

五三五 右以甘草末甘草羔爲三十九
一日三四回每回一二粒

五、〇

五三五 別拉敦那越幾斯 二、〇
右繡草根末適宜爲百九一日

三回每回二粒

五三五 酸化亞鉛 一、五
樟腦 〇、九
別拉敦那越幾斯 〇、九
右爲三十九朝夕一粒

五三五 酸化亞鉛、阿魏 各五、〇
繡草越幾斯 各五、〇
右爲百九一日三回每回二粒

五三五 乃至四粒 各二、〇
酸化亞鉛、菲沃斯越幾斯 各二、〇
繡草越幾斯 各二、〇
右繡草根末及備里設林適宜

五三五 爲四十九一日三回每回一粒
乃至二粒 〇、一五
硝酸銀 〇、一五
右白礬七、備里設林適宜爲

五三五 五十九一日三回食後五粒 〇、二

五三五 硝酸銀 一、〇
右白陶土、適宜爲十二九每
三時一粒

五三五 右白礬土、備里設林適宜爲
百九一日二回每回一粒 〇、二
硝酸銀 〇、一
古坪乙涅 〇、一
右甘草越幾斯適宜爲五十九
一日三回每回二粒、小兒 〇、六

五三五 硝酸銀 〇、六
阿魏 五、〇
矢鳩容越幾斯 六、〇
右甘草羔適宜爲九十九朝夕
二粒乃至三粒 〇、六

五三〇 硝酸銀 〇、二
硫酸銅 〇、二
繡草酸亞鉛 〇、三
別拉敦那越幾斯 〇、三
右以甘草末及甘草羔爲三十
九一日三回每食後一粒 〇、一五

五三〇 別拉敦那越幾斯 各一、〇
別拉敦那葉末 各一、〇
右爲百九每夕一粒漸次增量

至六七粒

●散劑

五六一 酸化亞鉛 〇、四一〇、八

白糖 五、〇

五分六包朝夕一包

五六一 酸化亞鉛 〇、〇五一〇、五

白糖 〇、五

右頓服

五六一 酸化亞鉛 三、〇

或酸化亞鉛(小兒)

白糖 一、〇

糖皮末 一、〇

右分二十包每食後隔一時間

一包 〇、五

五六一 酸化亞鉛 〇、五

白糖 二、〇

右分五包朝夕每一包

五六一 酸化亞鉛、真替越幾斯各〇、三

編草根末 六、〇

右分六包一日三回每回一包

五六一 酸化亞鉛 〇、五

別拉敦那越幾斯

加密列油糖 五、〇

右分五包朝夕一包

五六一 編草酸亞鉛 〇、〇五一〇、二

白糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

五六一 硫酸亞鉛 一、〇

白糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包

五六一 貌魯謨加留謨 二、〇一六〇、〇

右分二十包朝夕一包

五六一 貌魯謨加留謨 一〇、〇一二〇、〇

白糖 五、〇

右分十包包於蠟紙一日三回

每回一包 五、〇

五六一 貌魯謨加留謨 五、〇

編草根末 五、〇

白糖 五、〇

右分十二包一日三回每回一包

五六一 貌魯謨加留謨 四、〇

編草酸亞鉛 〇、三

白糖 五、〇

右分十包一日四回每回一包

小兒 〇、五

五七四 鹽酸尼尼瀝

右頓服

五七五 編草根末、艾根末各一〇、〇

右分十包每四時一包

●錠劑

五七六 貌魯謨極腦 一、〇

白糖 九、〇

右為糕十個一日四回每回一個

●注射劑

五七七 硫酸アトロヒ子 〇、〇〇一

右注射皮下

五七八 硫酸アトロヒ子 〇、〇〇二

水 二〇〇、〇

右半筒乃至一筒注射皮下

五七九 硫酸アトロヒ子 〇、〇〇一

水 一〇〇、〇

右四分之一至一筒注射皮下

五八〇 クラール 〇、〇一

水 一〇〇、〇

右每週三回每回四分一筒乃

五六二 至半筒注射頸部
鹽酸亞剎莫兒比涅

〇、一

水
右注射皮下

一〇、〇

五六三 抱水格魯拉爾 二、〇一三、〇
右洗腸

歌私的里 Hysterie

氣鬱、鬱症、癩症、因循病、血勞、心風、子宮病、一作比斯的里、舊譯作煩惋善怒、又名藏躁、金匱曰
婦人藏躁者、喜悲傷欲哭、象如神靈所作、數欠伸、甘麥大棗湯主之、藏字或以為子宮、或以為心臟
有二說焉

●浸煎劑

五六三 緬草浸 (一〇、〇)一〇〇、〇

阿魏 二、〇

右一日三回每回一茶匙

五六四 緬草根浸(一〇、〇)二〇〇、〇

加密列花舍利別 二〇〇、〇

右一日數回分服

五六五 緬草浸 (三〇、〇)一五〇、〇

亞兒尼加花浸

(二五、〇)一五〇、〇

桂皮舍利別 三〇〇、〇

右每二時二食匙

五六六 緬草浸 (四、〇)一〇〇、〇

貌魯謨加留謨

重碳酸那篤留謨 二、〇

阿魏丁幾 〇、五

五六七 緬草浸 (四、〇)一〇〇、〇

貌魯謨加留謨 二、〇

重碳酸那篤留謨 二、〇

單舍利別 一〇、〇

右一日三回分服

五六八 緬草浸 (二〇、〇)一八〇、〇

貌魯謨加留謨 八、〇

單舍利別 二〇、〇

右一日六回二日分服

五六九 緬草浸 (四、〇)一八〇、〇

貌魯謨加留謨 八、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

五六〇 緬草浸 (五〇、〇)五〇〇、〇

貌魯謨加留謨

貌魯謨那篤留謨 各三〇、〇

貌魯謨安母紐謨 三〇、〇

右一日一回乃至三回每回一食匙

五六一 亞兒答煎(一〇、〇)一〇〇、〇

貌魯謨加留謨 八、〇

大麻丁幾 二、〇

右每二三時一食匙

●滴劑

五六二 海狸香丁幾、緬草丁幾 各二〇、〇

阿魏丁幾 一〇、〇

右一日三回每回六滴、小兒

五六三 海狸香丁幾、緬草丁幾各二、〇

阿魏丁幾 五、〇

泊芙蘭阿片丁幾 一、〇

右一日三回每回十滴

五九四

海狸香丁幾

五、〇

依的兒性繡草丁幾

一〇、〇

右每二時十滴

五九五

依的兒製繡草丁幾

六、〇

阿片泊芙蘭丁幾

三、〇

加拿陀海狸香丁幾

五、〇

右一日三回每回十五滴乃至三十滴

五九六

依的兒性繡草丁幾

一五、〇

甘硝石精

一〇、〇

右一日三回每回十五滴

五九七

繡草丁幾

二〇、〇

依的兒精

二五、〇

右一日數回每回二十滴乃至四十滴

五九八

繡草丁幾

一五、〇

過格魯兒鐵液

五、〇

右一日三回每回二十滴

五九九

醋酸鐵丁幾

二、〇

海狸香丁幾

十滴

杏仁水

五、〇

右朝夕每五滴

五〇〇 阿魏丁幾、繡草丁幾各一〇、〇

薄荷油

十滴

右一日三回每回二十滴

五〇一

古魯聖篤丁幾

五、〇

阿魏丁幾

一〇、〇

右朝夕十五滴乃至二十滴

五〇二

嗎囉仿談

八〇、〇

醋酸莫兒比涅

一、〇

醋

二、〇

亞爾個保兒

二〇、〇

右一日三回每回五滴乃至二十滴

五〇三

繡草酸

三、〇

水

九五、〇

炭酸安母紐謨(飽和)

繡草越幾斯

二、〇

右每回六滴乃至三十滴

五〇四

杏仁水

五、〇

醋酸鐵丁幾

一〇、〇

海狸香丁幾

十滴

右朝夕五滴

五〇五

杏仁水

一〇、〇

蕃木甞丁幾

十滴

五〇六 右朝夕五滴乃至十滴

杏仁水

一〇、〇

別拉敦那丁幾

十滴

海狸香丁幾

一〇、〇

右一日四回每回五滴

五〇七

古加乙涅

〇、一

杏仁水

一〇、〇

右一日四回每回十滴

五〇八

素馨丁幾

一〇、〇

古魯矢屈謨丁幾

一〇、〇

右一日三回每回十滴

五〇九

阿魏

四五、〇

酒精

四〇〇、〇

右浸出

苛性安母尼亞液

六〇、〇

右加酒精為五〇〇、〇每回三十滴乃至六十滴

●水劑

五〇〇

貌魯謨化樟腦

二、〇

阿列布油

二〇、〇

右為乳劑一五〇、〇一日三四回每回一食匙

五〇一

貌魯謨化樟腦

二、〇

四回每回一食匙

二、〇

阿列布油 二〇、〇

亞拉昆亞護謨 一〇、〇

白糖 一〇、〇

薄荷水 一五〇、〇

右爲乳劑一日三四回每回一食匙

五七二 貌魯謨加儻謨 八、〇

水 一八〇、〇

單舍利別 一五、〇

五七三 貌魯謨加儻謨 六、〇

龍腦丁幾 二〇、〇

水 二〇〇、〇

右一日六回分服

五七四 貌魯謨加儻謨 八、〇

貌魯謨那篤儻謨 各四、〇

貌魯謨安母紐謨 各四、〇

纈草根浸(二八、〇)一八四、〇

五七五 依的兒 五、〇

硫酸萇兒比涅 〇、〇六

杏仁水 一〇、〇

橙皮水 三〇、〇

右每半時一茶匙

五七六 結麗阿曹篤 一滴

水 五〇、〇

加密列花舍利別 二〇、〇

五七七 撒里矢爾酸那篤儻謨 四、〇一八、〇

嚼囉仿謨水 一〇〇、〇

薄荷水 二〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右每時一食匙

五七八 安息香酸那篤儻謨咖啡涅 一、〇

水 一五〇、〇

覆盆子舍利別 三五、〇

右一日三回每回一食匙

五七九 バラアルデヒド 二、〇一三、〇

橙皮舍利別 一〇、〇

右頓服

五七〇 ズムナール 一〇、〇

水 五〇、〇

覆盆子舍利別 二〇、〇

右每夕一食匙

五七二 ズルフオナール 四、〇

或ハトリユオナール 四、〇

常水 一二〇、〇

疊製舍利別 一五、〇

右臨臥前二時間服四分一乃至半量

五七三 メチラール 一、五

單舍利別 一〇〇、〇

右數回分服

●散劑

五七三 重碳酸那篤儻謨 一〇、〇

酒石酸 九、〇

白糖 一九、〇

薄荷油糖 三〇、〇

右每回一茶匙乃至二茶匙

五七四 礪砂 一〇、〇

純精酒石 二五、〇

五七五 貌魯謨化樟腦 一、〇

白糖 五、〇

五七六 貌魯謨加儻謨 三、〇

右分十包一日四回每回一包

酸化亞鉛 〇、三
白糖 三、〇
右分十包一日三回每回一包

五七〇 麝香 一、〇
小兒 〇、三
右分十包一日三回每回一包

五七〇 酸化亞鉛 〇、三
白糖 三、〇
右分十包一日三回每回一包

五七六 麝香 〇、三
炭酸安母尼亞 一、五
緬草油糖 三、〇
右分五包每一時一包

五七九 モスコイ海狸香 一、〇
白糖 五、〇
右分五包朝夕一包

五七〇 緬草根末 一、〇
加拿陀海狸香 二、〇
右作十包一日三回每回一包

五七三 トリオナル 五、〇
右分五包就眼前一包至二包

五七三 緬草酸化亞鉛 〇、三
白糖 三、〇
右分十包一日三回每回一包

五七三 小兒 〇、五
菲沃斯越幾斯 〇、六
酸化亞鉛 〇、六
緬草根末 二、〇
緬草油糖 五、〇
右分十包一日三回每回一包

五七四 百布聖 一、五
蕃木甞越幾斯 各〇、〇五
鹽酸莫兒比涅 〇、二
硫酸亞鉛 四、〇
乳糖 四、〇
右分十包一日三回每食前一包

五七五 次硝酸蒼鉛 五、〇
枸橼油糖 一、〇
右分十包每一時一包

五七五 次硝酸蒼鉛 一、〇
鹽酸莫兒比涅 〇、〇五
白糖 三、〇
右分六包一日三回每回一包

五七七 加糖炭酸鐵 〇、五
白糖 五、〇
右分六包朝夕一包

五七六 沸騰散 三、〇
薄荷油糖 一、〇
生姜根末 五、〇
右每回半茶匙乃至一茶匙

五七九 阿魏 五、〇
右甘草煮適宜爲五十九丸一日三回每回三粒乃至九粒

五七四 阿魏、蘆管、藥用石鹼 各三、〇
玫瑰糖劑* 各三、〇
右爲二百丸一日數回每回二丸乃至四丸

五七四 阿魏 四、〇
藥用石鹼 二、〇
茴香油 二滴
右甘草末適宜爲五十九丸一日三回每回二粒

五七三 阿魏 八、〇
藥用石鹼 四、〇
茴香油 〇、三
右爲九十九丸一日三回每回五粒乃至十粒

五七四 阿魏 八、〇
藥用石鹼 四、〇
茴香油 〇、三
右爲九十九丸一日三回每回五粒乃至十粒

五七四 阿魏 八、〇
藥用石鹼 四、〇
茴香油 〇、三
右爲九十九丸一日三回每回五粒乃至十粒

五七四 阿魏 八、〇
藥用石鹼 四、〇
茴香油 〇、三
右爲九十九丸一日三回每回五粒乃至十粒

五七四 阿魏 八、〇
藥用石鹼 四、〇
茴香油 〇、三
右爲九十九丸一日三回每回五粒乃至十粒

五七四 阿魏 八、〇
藥用石鹼 四、〇
茴香油 〇、三
右爲九十九丸一日三回每回五粒乃至十粒

五七四 阿魏 八、〇
藥用石鹼 四、〇
茴香油 〇、三
右爲九十九丸一日三回每回五粒乃至十粒

五七四 阿魏 八、〇
藥用石鹼 四、〇
茴香油 〇、三
右爲九十九丸一日三回每回五粒乃至十粒

還元鐵 二、五
加奈大海狸香 二、五
右龍膽越幾斯適宜為百五十
丸每二時三四粒

五七四 阿魏 五、〇
纈草越幾斯 一、〇一、二、〇
右以蒲公英越幾斯為六十九
丸一日二粒

五七四 阿魏 五、〇
纈草根末 五、〇
右亞拉比亞護謨適宜為五十
丸一日三回每回二粒至五粒

五七四 阿魏 五、〇
纈草根末 五、〇
右亞拉比亞護謨適宜為五十
丸一日三回每回二粒至五粒

五七四 阿魏 五、〇
纈草根末 五、〇
右亞拉比亞護謨適宜為五十
丸一日三回每回二粒至五粒

五七四 阿魏 五、〇
纈草根末 五、〇
右亞拉比亞護謨適宜為五十
丸一日三回每回二粒至五粒

五七四 阿魏 五、〇
纈草根末 五、〇
右亞拉比亞護謨適宜為五十
丸一日三回每回二粒至五粒

五七四 阿魏 五、〇
纈草根末 五、〇
右亞拉比亞護謨適宜為五十
丸一日三回每回二粒至五粒

五七四 阿魏 五、〇
纈草根末 五、〇
右亞拉比亞護謨適宜為五十
丸一日三回每回二粒至五粒

五七四 阿魏 五、〇
纈草根末 五、〇
右亞拉比亞護謨適宜為五十
丸一日三回每回二粒至五粒

五七四 阿魏 五、〇
纈草根末 五、〇
右亞拉比亞護謨適宜為五十
丸一日三回每回二粒至五粒

五七四 阿魏 五、〇
纈草根末 五、〇
右亞拉比亞護謨適宜為五十
丸一日三回每回二粒至五粒

沒藥 九、〇
阿魏 三、〇
右以單舍利別為百丸一日三
回每回二粒乃至四粒

五七九 纈草酸亞鉛 一、〇
別拉敦那越幾斯 〇、一
右以龍膽根末龍膽越幾斯為
二十九朝夕一丸

五七五 次硝酸蒼鉛、纈草酸亞鉛 各二、〇
菲沃斯越幾斯 〇、四
右為四十九丸一日三回每回四
粒

五七五 海狸香 一、〇
炭酸安母紐謨 〇、四
單舍利別 適宜

五七五 纈草根末、纈草越幾斯各六、〇
右為百丸一日三回每回五粒
乃至十粒

五七五 別拉敦那越幾斯 一、〇
酸化亞鉛 五、〇
右為百丸一日一粒乃至三粒

五七五 印度大麻越幾斯 三、〇
右大麻葉末三、〇為五十九
丸一日四回每回一粒

五七五 鹽酸古加乙涅 一、〇
右白礬土佛里設林適宜為二
十九丸一日三回每回一丸

五七五 枸橼酸鐵規尼涅 五、〇
右泥蒿根越幾斯適宜為十九
丸一日三粒乃至十粒

五七五 枸橼酸鐵規尼涅 六、〇
右以甘草末甘草羔為六十九
丸一日三回每回一粒至三粒

五七五 乳酸鐵、大黃末 各五、〇
右龍膽越幾斯適宜為六十九
丸一日三回每回二粒至三粒

五七五 酒石酸鐵 一、〇、〇
大黃越幾斯、龍膽越幾斯 各五、〇
蕃木髓末 一、〇
右為百丸每食前二丸

五七六 硫酸鐵 五、〇
重碳酸那篤留謨 五、〇
右以蒲公英越幾斯為六十九
丸

五七六 硫酸鐵 五、〇
重碳酸那篤留謨 五、〇
右以蒲公英越幾斯為六十九
丸

五七六 硫酸鐵 五、〇
重碳酸那篤留謨 五、〇
右以蒲公英越幾斯為六十九
丸

五七六 硫酸鐵 五、〇
重碳酸那篤留謨 五、〇
右以蒲公英越幾斯為六十九
丸

五七六 硫酸鐵 五、〇
重碳酸那篤留謨 五、〇
右以蒲公英越幾斯為六十九
丸

五七六 硫酸鐵 五、〇
重碳酸那篤留謨 五、〇
右以蒲公英越幾斯為六十九
丸

朝夕一丸

●注射劑

五七二 鹽酸莫兒比滯

水 〇、〇五

右一筒注射皮下

五七三 咖啡滯

水 四、〇

撒里矢爾酸那篤留謨

五七六 安忌香酸那篤留謨咖啡滯

水 一、〇〇

右一筒注射皮下

五七四 硫酸ズボイジン

水 一、〇〇

右二分之一至一筒注射皮下

依卜昆的里

Hypochondriasis.

ヒポコンデル、精神系知覺過敏、心風、氣病

●水劑

五七三 機那煎 (一〇、〇)一〇〇、〇

貌魯謨加留謨

苦味丁幾 二、〇〇

單舍利別 八、〇〇

右一日三回分服

右發作時半筒乃至一筒注射皮下

●洗腸劑

五七五 緬草浸 (二〇、〇)二五〇、〇

阿魏 五、〇〇

卵黃 一個

右爲乳劑分二回洗腸

五七六 海狸香丁幾 一、〇〇

阿魏 四、〇〇

卵黃 一個

加密列花浸 一二〇、〇〇

右爲乳劑灌腸

五七七 アミーレンヒドレート 三、〇〇

沙列布漿 六〇、〇〇

右灌腸

●嗅入劑

五七六 嚼囉仿謨 二、〇一五、〇

右嗅入 二〇、〇〇

五七九 貌魯謨依的泉 二〇、〇〇

右嗅入 二〇、〇〇

五七〇 プローム化エチール 四、〇一六、〇

右嗅入

五七一 貌魯謨化樟腦 一、〇〇

白糖 九、〇〇

右爲糕十個一日四回每回一個

五七二 薄荷葉 三〇、〇〇

蘊草根 三〇、〇〇

右茶劑

●還元鐵

五七三 蘆薈 〇、〇一

右爲丸一日三回分服

五七四 人工加爾斯泉鹽 二五、〇〇

水 一〇〇、〇〇

右一日三回分服

五七五 鹽酸規尼滯 〇、〇三

右一日三回分服

鬱憂病 Melancholia.

鬱憂狂、黑液病、膽液敗黑病、黑膽病、鬱症

五七七 ●散劑
吐酒石

〇、〇二

苦味丁幾

一五、〇〇

●丸劑
右一日四回每回一食匙

阿片

〇、〇一

右一日三回分服

五七四 吐酒石

〇、〇五

五七六 乳糖
右分六包一日三回每回一包

二、〇〇

五六一 貌魯謨加留謨
印度大麻丁幾

二、〇〇

五七五 蘆苈
右爲六十九一日二粒至三粒

〇、〇五

白糖

五、〇〇

右一日三回分服

五七六 古魯聖篤越幾斯
複方大黃越幾斯

三、〇〇

五七九 人工加爾兒斯泉鹽
右一回頓服

一五、〇〇

五八二 バラアルデヒド
右一日三回分服

三、〇一六、〇〇

五七八 鹽酸莫兒比涅
右亞拉比亞護謨漿適宜爲二十九每夕二粒乃至三粒

〇、〇一

●水劑
貌魯謨加留謨

四、〇〇

五八三 複方機那丁幾
右頓服

一〇、〇〇

五八六 鹽酸莫兒比涅
右注射皮下

二、〇五

沃度加留謨

一、〇〇

設里酒

一四〇、〇〇

譫語

Delirium (tremens) 酒客譫妄、譫語、識語、沈飲譫語等

五七八 ●水劑
實麥答利斯浸

(二、〇)一八〇、〇〇

五八八 抱水格魯刺爾
水、橙皮舍利別
右頓服

二、〇〇

五九〇 抱水格魯刺爾
鹽酸莫兒比涅
右一二時內二三回分服

二、〇〇

吐酒石

〇、〇一

五八九 抱水格魯刺兒
亞拉比亞護謨漿

二、〇一四、〇〇

單舍利別

〇、〇一

單舍利別
右每二時一食匙

三〇〇、〇〇

橙皮舍利別

二五、〇〇

單舍利別
右頓服

各一五、〇〇

五七九 嘔囉仿謨水* 一五〇、〇

橙花水 一〇〇、〇

水 一〇〇、〇

右每回一食匙乃至二食匙

五七二 貌魯謨加留謨

貌魯謨安母紐謨 各一〇、〇

水 五〇、〇

右每時一茶匙

五七三 貌魯謨水素酸スコホトミン

水 〇、〇〇五、〇〇一

橙皮舍利別 三〇、〇

右每回一茶匙

五七四 吐酒石 〇、三

阿片越幾斯 〇、一五

水 一五〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右每一時乃至二時一食匙

五七五 吐酒石 〇、二五

阿片丁幾 五、〇

樟腦混和劑* 一〇〇、〇

右每二時一食匙

五七六 バラアルデヒド

二、〇一四、〇

水 七〇、〇

單舍利別 三〇、〇

華尼爾刺丁幾 三十滴

右一二時間内二回分服

五七七 クロラーミド 二、〇

水 一二〇、〇

稀鹽酸 四滴

覆盆子舍利別 一五、〇

右每夕頓服

五七八 アミイレンヒドレート 七、〇

水 六〇、〇

甘草越幾斯 一〇、〇

右每夕半量

五七九 ヒヨスチン 〇、一〇〇、〇二

水 一五、〇

橙皮舍利別 一五、〇

右每夕一食匙

五八〇 ストロファントス丁幾

苦扁桃水 一〇、〇

右一日三回每回十五滴

五八一 寶菱答利斯葉浸

(二、〇)一〇〇、〇

阿片丁幾 二、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

五八二 寶菱答利斯葉浸 (二、〇)一八〇、〇

吐酒石 〇、一

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

●散劑

五八三 阿片 〇、一

白糖 〇、五

右頓服

五八四 阿片 〇、二

白糖 五、〇

右分五包每時一包

五八五 阿片 〇、五一二、〇

吐酒石 〇、〇五

白糖 三、〇

右分十包每二時一包

五八六 スルフォナール 六、〇

右分六包每夕一包

●注射劑

其七 阿片

偏里設林、水

各五、〇

水

右一筒乃至四筒注射皮下

其二〇 硝酸斯篤里幾規尼涅 〇、〇四

右一日一筒注射皮下

其九 鹽酸ヒヨスチン

〇、〇一

右每日一二筒注射皮下

其〇八 安息香酸那篤留謨

珈球涅

三、〇
二、〇

水

右半筒乃至一筒注射皮下

第五編 泌尿器諸病

第一節 腎臟及腎盂諸病

急性腎臟炎 *Nephritis acuta. Morbus Brightii Nephritis diffusa.*

汎發性腎臟炎、急性ブライト病、武雷篤病、蛋白尿病、第一腎臟炎、舊譯作尿遺血精新症、又名內腎新患、古醫書所謂腎涓之一種

急性腎臟實質炎 *Nephritis parenchymatosa acuta.*

處置

就靜安靜、唯牛乳食、全身熱浴兼頭部灌水及浴後全身纏包、尿蛋白檢查、內服發汗劑、皮下注射用比魯加爾必涅等、嚴禁強酸濃茶酒類

● 浸煎劑

其二 實麥答利斯浸

(〇、三)一〇〇、〇

醋酸加留謨 四、〇

オノニイチス舍利別 * 二〇、〇

硝酸加留謨

單舍利別

三、〇
八、〇

右一日三四分服

其三 實麥答利斯浸

(〇、五)一〇〇、〇

醋酸加留謨 一〇、〇

覆盆子舍利別 * 一五、〇

其四 實麥答利斯浸

(〇、五)一〇〇、〇

醋酸加留謨

ストロファンツス丁幾二十滴 五、〇

| | | |
|--|---|--|
| 單舍利別 右一日三分服 一〇、〇 | 苦味丁幾 右每二時一食匙 四、〇 | 古魯聖篤實煎 (三、〇)一五〇、〇 |
| 實菱答利斯浸 (一、〇)一八〇、〇 | 杜松實浸(二〇、〇)二〇〇、〇 醋酸加留謨、海葱醋蜜 各二〇、〇 | 水製大黃丁幾 單舍利別 右每三時一食匙 五、〇 八、〇 |
| 硝酸加留謨 單舍利別 右每二時一食匙 二〇、〇 | 右每二時一食匙 五三 ヲノニードス根煎 (一〇、〇)二〇〇、〇 | 烏華烏爾矢葉煎 (八、〇)一〇〇、〇 |
| 實菱答利斯浸 (二、〇)二〇〇、〇 | 醋酸加留謨 海葱醋 右一日三分服 五三 オノニードス根煎 (二〇、〇)二〇〇、〇 | 硝酸加留謨 朴松子舍利別 右每時一茶匙、小兒 二〇、〇 |
| 醋酸加留謨 單舍利別 右每二時一食匙 一五、〇 | 醋酸加留謨 杜松實舍利別 右每二時一食匙 各二〇、〇 | 單舍利別 右每二時一食匙 一五、〇 |
| 杜松實浸(二〇、〇)一〇〇、〇 | 木賊煎(一〇、〇)一五〇、〇 杜松實舍利別 右每二時一食匙 二〇、〇 | 耶僕蘭日葉浸 右一日一回頓服 五二 耶僕蘭日葉浸 (三、〇)五〇、〇 |
| 醋酸加留謨 杜松實舍利別 右一日三分服(バンベル ゲル氏) | 古魯聖篤實煎 右每二時一食匙 五四 | 耶僕蘭日葉浸 右一日數回分服 五三 耶僕蘭日葉浸 (一〇、〇)一〇〇、〇 |
| 杜松實浸(二〇、〇)一八〇、〇 | 枳皮舍利別 右每二時一食匙 三〇、〇 | 醋酸安母尼亞液 一五、〇 |
| 醋酸加留謨 單舍利別 右一日六回二日分服 二〇、〇 | | |
| 杜松實浸(二〇、〇)二〇〇、〇 | | |
| 醋酸加留謨 八、〇 | | |

急性腎臟炎

右一日三回分服

五三 旃那浸 (一〇、〇) 一二〇、〇
單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

五三 旃那葉浸(一五、〇) 一五〇、〇
茴香 五〇、〇

單舍利別

一五、〇
右每二時一食匙

五三 機那煎 (六、〇) 一〇〇、〇
醋酸加留謨 三〇、〇

橙皮舍利別

三〇、〇
右每二時一小兒匙、小兒

五三 接骨木花浸 (一〇、〇) 一〇〇、〇
醋酸安母尼亞液 一五、〇

右一日三回分服

五三 吐根浸 (〇、三) 一〇〇、〇
醋酸安母尼亞 一五、〇

右一日三回分服

●水劑
五三 碳酸泉 五〇〇、〇

右二日間分服

五三 フランツヨセーフ泉 五〇〇、〇

右二日間分服

五三 醋酸加留謨 八、〇
硝酸加留謨 六、〇

水

二〇〇、〇
苦味丁幾 三〇、〇

右每二時一食匙

五三 醋酸那篤留謨 一五、〇
苦味丁幾 二〇、〇

水

二〇〇、〇
右每二時一食匙

五三 テルペンヒドレート 二、〇
酒精 五、〇

薄荷舍利別

五〇、〇
右一日三回乃至六回每回一食匙

五三 チウレチン 五、〇
單舍利別 七、〇

水

一〇〇、〇
右一日三回分服

五三 チウレチン 五、〇

九〇、〇

薄荷水

一〇〇、〇
單舍利別 一〇、〇

右每二時一食匙

五三 單寧酸 一、〇
醋酸加留謨 五、〇

水

一〇〇、〇
單舍利別 一〇、〇

右每一時一食匙

五三 單寧酸 一、〇
水 一五〇、〇

重碳酸那篤留謨

適宜
右一日三回二日分服

五三 重酒石酸加留謨 二〇、〇

醋酸那篤留謨

一五、〇
苦味丁幾 二〇、〇

水 二〇〇、〇
右每二時一食匙

五三 海葱越幾斯* 洋芹水* 一五、〇
醋酸加留謨水 二〇、〇

杜松質羔**

右每二時一食匙 二〇、〇

五三 明礬 二、〇

水 單舍利別 一〇〇、〇
右每二時一食匙 一五、〇

其五 硫酸規尼涅 一、〇
稀鹽酸 十滴

水 杜松實羔 一五〇、〇
右每二時一食匙 一五、〇

其五 沃度加留謨 二、〇
單舍利別 二〇、〇

水 右一日三回分服 一〇〇、〇

其五 沃度加留謨 五、〇
水 一五〇、〇

水 橙皮舍利別 一五、〇

其五 過格魯兒鐵液 一、〇
右每三時一食匙 一〇〇、〇

水 單舍利別 二〇、〇

其五 過格魯兒鐵液 二、〇
右一日三回每回一小兒匙、 一五〇、〇

其五 過格魯兒鐵液 二、〇
メリツサ水* 一五〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇
右每二時一食匙

其五 過格魯兒鐵液 二、〇
桂皮水 一五〇、〇

桂皮舍利別* 二〇、〇
右每二時一食匙

其五 パラアルデヒド 四、〇
沙列布漿、橙皮舍利別 各二〇、〇

水 右每二時一食匙 一〇〇、〇

其五 抱水格魯刺兒 一、〇
貌羅謨加留謨 三、〇

水 單舍利別 六〇、〇

單舍利別 二〇、〇
右每三時一茶匙、小兒

其五 麥角越幾斯 二、〇
水 一〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇
右每三時一小兒匙、小兒

其五 稀鹽酸 一〇、〇
●滴劑 右一日數回每回五滴至十滴

其五六 過格魯兒鐵液 五、〇
水 五、〇

其五九 林檎酸鐵丁幾 三、〇
右一日三回每回十五滴乃至

二十滴 ●散劑

其六〇 挖勿兒氏散 〇、三一〇、五
乳糖 適宜

其六一 單寧酸 〇、二
白糖 〇、五

其六二 單寧酸 〇、五
白糖 〇、五

其六三 單寧酸 〇、五
白糖 二、〇

其六四 單寧酸 〇、四
實麥答利斯末 〇、二

白糖 五、〇
右分十包一日三回每回一包

其六五 明礬 四、〇
小兒 〇、一

其六六 阿片末 〇、一

規那皮末

右分四包每四時一包

二、〇

其六 醋酸鉛

白糖

右分十包一日四包乃至五包

五、〇

其六 醋酸

枸橼油糖

右分五包每二時一包

〇、二

其七 醋酸鉛

鹽酸莫兒比涅

枸橼油糖

右分五包每二時一包

〇、二

其六 安息香酸

白糖

右分五包每二時一包

〇、四

其六 安息香酸

枸橼油糖*

右分五包每二時一包

〇、五

其七 昇華安息香酸、白糖

各二、〇

其七 安息香酸

乳糖

右分六包每三時一包

二、〇

其七 單寧酸規尼涅

乳糖

右分三包一日三回分服

〇、六

其七 單寧酸規尼涅

白糖

右分十包每二時一包、小兒

一、〇

其七 吐酒石

樟腦

亞拉比亞護謨

白糖

右分十包每二時一包

〇、二

其七 鹽酸規尼涅

右頓服

〇、五

其七 鹽酸莫兒比涅

白糖

右分十包臨時一包

〇、二

其七 鹽酸必魯加兒必涅

白糖

右為一包一日一回每回一包

〇、三

其七 蕃木甞越幾斯

大黃末

右分六包一日三回每回一包

〇、一

其七 麥角越幾斯

薄荷油糖

右分五包每三時一包

一、〇

其八 テナブロミン

右分十包一日六包乃至十包

二、〇

其八 重酒石酸加留謨

右分六包一日三回每回一包

五、〇

其八 藤黃

藥刺巴根、白糖

右分五包每二時一包

二、〇

其八 炭酸リチウム

右分三包一日三回每回一包

〇、四

其八 古魯聖甞越幾斯

蘆薈

右為四十九一日四粒至六粒

一、〇

其八 單寧酸

右以亞拉比亞護謨為十九一

二時一粒

〇、八

其八 單寧酸

右以亞拉比亞護謨為十九一

二時一粒

二、〇

其八 單寧酸

右以亞拉比亞護謨為十九一

二、〇

蘆薈越幾斯

一、〇

右甘草越幾斯適宜爲百九一

日三回每回四粒

五六七 單寧酸

五、〇

蘆薈越幾斯

二、〇

右蒲公英越幾斯適宜爲五十

丸一日三回每回三粒

五七八 テルペンビトラート

一、〇

白糖

一、〇

亞拉比亞護謨

一、〇

右爲三十九丸一日三回每回一

粒乃至五粒

五八九 含糖炭酸鐵

二、五

硫酸規尼涅

二、五

右甘草羔甘草末適宜爲五十

丸一日三回每回二丸

五九〇 明礬

五、〇

麒麟血

二、五

蜂蜜

二、五

右爲五十九丸一日三粒至五粒

●注射劑

五九一 鹽酸必魯加兒必涅

〇、〇五

右一日一回一筒乃至二筒注

射皮下、小兒

五九二 鹽酸必魯加兒必涅水

(〇、一、〇、二)一〇、〇

右每回半筒至一筒注射皮下

五九三 撒里矢爾酸曹達咖啡涅

二、〇一五、〇

右一日二回乃至四回每回半

筒乃至一筒注射皮下

五九四 麥角越幾斯

〇、二

水 右一回一筒注射皮下 一〇、〇

樟腦 右一回一筒注射皮下 一〇、〇

扁桃油 右每回一筒注射皮下 一〇、〇

樟腦 阿列布油 一、〇

●澆腸劑 右每回一筒至二筒注射皮下 九、〇

五九七 抱水格魯刺兒 〇、五一一、〇

五九八 抱水格魯刺兒 五〇、〇

右一回澆腸、小兒

五九九 抱水格魯刺兒 二、〇一六、〇

右澆腸 二五〇、〇

水

水

水

水

水

慢性腎臟炎

Nephritis chronica (diffusa.)

汎發慢性腎臟炎、慢性武雷篤病

慢性腎臟實質炎

Nephritis parenchymatosa chronica

腎腫脹、第二期腎炎

慢性腎臟組織間炎(萎縮腎) Nephritis interstitialis.

慢性腎臟間質炎、腎硬結症、腎硬變、第三期腎炎

處置 避溫度激變、遷高燥住所、禁刺戟飲食兼節其量、卜地南方、專令攝牛乳投強壯諸劑、宜治尿閉水腫

●水劑

五九〇 沃度加留謨 一、〇—二、〇

苦味丁幾 一、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

五九〇 沃度加留謨 二、〇—三、〇

苦味丁幾 四、〇

水 二〇〇、〇

右每二時一食匙

五九二 沃度加留謨 二〇〇、〇

水 五、〇

右每三時一食匙

五九二 沃度加留謨 三、〇—四、〇

水 二〇〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

五九三 沃度加留謨 一、〇

林綸酸鐵丁幾 二、〇

單舍利別 一〇、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

五九四 沃度鐵舍利別 四、〇

水 一〇〇、〇

橙皮舍利別 八、〇

右一日三回分服

五九五 重酒石酸加留謨 一、〇—三、〇

水 一〇〇、〇

覆盆子舍利別 二〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

五九六 重酒石酸加留謨 四、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 七、〇

右一日三回分服

五九七 重酒石酸加留謨 五、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 八、〇

右一日三回分服

五九八 重酒石酸加留謨 八、〇

水 四〇〇、〇

覆盆子舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

五九九 ストロファンツス丁幾 〇、五

水 八〇、〇

覆盆子舍利別 一〇、〇

右一日六回每回一小兒匙、

十歲小兒

五九〇 デウレチン 五、〇—七、〇

水 九〇、〇

薄荷水 一〇〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每一時乃至二時一食匙

五九二 安息香酸曹達 一〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

水 一八〇、〇

右每二時一食匙

五九三 安息香酸安母紐謨 〇、五

甘硝石精 一、五

篤留拔爾撒謨舍利別 *

二〇、〇

護謨合劑 *

四〇、〇

右一日三回分服

五三 實麥答利斯葉末

一〇、〇

海葱

一〇、〇

野薔薇實

三〇、〇

杜松實

三〇、〇

白葡萄酒

一〇〇〇、〇

右浸出二日間濾過一日二回

五四 ウロフェリン

三、〇一四、〇

水

一〇〇、〇

五五 醋酸加留謨液

一〇、〇

水

八〇、〇

五六 覆盆子舍利別

一〇、〇

右每二時一小兒匙、小兒

五六 醋酸加留謨

一〇、〇

單寧酸

一〇、〇

阿片丁幾

一〇、〇

水

二〇〇、〇

單舍利別

二〇、〇

五七 海葱醋

二五、〇

右每二時一食匙

常醋

二五、〇

炭酸加留謨(飽和)

適宜

薄荷水

一五〇、〇

罌粟舍利別 *

二〇、〇

右每二時一食匙

五八 海葱醋

三〇、〇

炭酸安母紐謨(飽和)

適宜

洋芹水 *

一二〇、〇

甘硝石精

四〇、〇

杜松實油糖

二〇、〇

右每二時一食匙

五九 撒里矢爾酸那篤留謨

六〇、〇

單舍利別

八〇、〇

右每二時二食匙

五〇 格魯兒那篤留謨

六〇、〇

沃度加留謨

二〇、〇

水

一〇〇、〇

右一日數回分服

五二 麥角越幾斯

一〇、〇

水

一〇〇、〇

橙花舍利別 *

三〇、〇

右每二時一食匙

五三 百弗聖

三〇、〇

稀鹽酸

一、五

單舍利別

二〇〇、〇

右每二時一食匙

五三 鐵條煎 *

一〇〇、〇

水

二五、〇

右一日三回分服

五四 赤葡萄酒

四〇、〇

稀鹽酸

三十滴

單舍利別

六〇、〇

右一日三回分服

五五 嗎囉仿謨水(1%)

一〇〇、〇

右每二時一食匙

五六 結麗阿曹篤

四滴

橙皮水

六〇、〇

單舍利別

一〇〇、〇

右每二時一茶匙

五七 洋芹水 *

一〇〇、〇

右一日數回每回一小兒匙、

小兒

五九六

明礬

沙列布漿

單舍利別

右每二時一食匙

五九七

抱水格魯刺爾

亞拉比亞護謨漿

單舍利別

右臨臥頓服

五九八

● 浸煎劑

五九九

實麥答利斯浸

醋酸加留謨

重酒石酸加留謨

單舍利別

右一日三回分服

五九〇

實麥答利斯浸

醋酸加留謨液

覆盆子舍利別

右每二時一食匙

五九一

實麥答利斯浸

右每二時一食匙

(〇、八)一五〇、〇

醋酸加留謨

單舍利別

右每二時一食匙

五九二 實麥答利斯浸

醋酸加留謨

單舍利別

右每二時一食匙

五九三 實麥答利斯浸

醋酸加留謨

單舍利別

右每二時一食匙(心力急弱)

五九四 機那煎

醋酸加留謨

重酒石酸加留謨

安母尼亞茴香精

單舍利別

右一日三回分服

五九五 規那煎

醋酸加留謨

苦味丁幾

右一日三回分服

右混和每二時一食匙

五九六

機那煎

重酒石酸加留謨

安母尼亞茴香精

單舍利別

五九七 機那煎

沃度加留謨

單舍利別

右一日三回分服

五九八 烏華烏爾尖葉煎

單舍利別

右一日三回每回一小兒匙、

五九九 杜松實浸

醋酸加留謨液

海葱醋蜜

右每二時一小兒匙、小兒

五〇〇 杜松實浸

醋酸加留謨液*

海葱醋蜜

右每二時小兒匙、小兒

五〇一 杜松實浸

醋酸加留謨液

海葱醋蜜

五九四三 杜松實浸(二〇、〇)二〇〇、〇

醋酸加留謨液 二〇、〇

杜松實舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

五九四三 オノニチス根煎 (二〇、〇)二〇〇、〇

醋酸加留謨液 二〇、〇

海葱醋 二〇、〇

右每二時一食匙

五九四四 麥角浸 (二、〇)一五、〇)一〇〇、〇

桂皮舍利別 二〇、〇

右每半時一茶匙、小兒

五九四五 ラタニヤ根煎 (三、〇)一五、〇)一〇〇、〇

阿片丁幾 〇、二五

單舍利別 二〇、〇

右每二時一小兒匙、小兒

●滴劑

五九四六 實麥答利斯特幾 七、五

海葱丁幾 七、五

右一日三回每回二十滴

五九四七 ストロフアントス丁幾

一滴十三滴

右一日三回乃至四回五歲至十五歲小兒

五九四八 醋酸加留謨液 二〇、〇

右一日三回每回十滴、小兒

五九四九 杏仁水 一〇、〇

右每半時五滴與冰塊伍用

五九五〇 沃度丁幾 一〇、〇

右一日數回每回二三滴

●散劑

五九五二 安息香酸 〇、五

白糖 五、〇

右分六包每二時一包

五九五三 安息香酸 二、〇

白糖 五、〇

右分六包每四時一包

五九五四 礞石攪留謨 〇、二

白糖 二、〇

右分四包一日四回每回一包

五九五五 礞石攪留謨 五、〇

右分十包一日三回每回一包

五九五六 貌魯謨斯篤倫丟謨 八、〇

右一日六回分服 〇、一〇、〇

五九五七 甘露 〇、六

白糖 一、五

右分三包一日一回每回一包

五九五八 甘露 一、〇

海葱 〇、五

實麥答利斯特末 〇、五

荷香油糖 一〇、〇

右分十包一日三回每回一包

五九五九 商陸越幾斯 〇、八

乳糖 適宜

右分六包一日三回每回一包

五六〇 吐根阿片散 一、五

右分三包一日一包

五六二 薔木鼈越幾斯 〇、一

大黃末 二、〇

白糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包

五六三 安知歇貌林 一、〇

白糖 〇、五

五九三 右分三包一日三回每回一包
鹽酸莫兒比涅 〇、〇一

白糖 〇、五

五九四 右爲一包臨臥頓服
海葱根末 〇、一〇、六

乳糖 三、〇

五九五 エラテリン 〇、二
重酒石酸加留謨 四〇、〇

右分十包一日數回、小兒
一包 右分六十包每一時乃至三時

五九六 プラツタ、オリエンタリス
荷香油糖 二、〇
三、〇

●丸劑
右分十二包每三時一包

五九七 單寧酸 一、五
右甘草末及甘草羔適宜爲三
十九每時二粒

化膿性腎間質炎

Nephritis inter-tibialis suppurativa.

化膿性腎臟炎、舊譯作腎膿炎

五九五 蜀葵根煎(一〇、〇)一八〇、〇
單舍利別 一五、〇

五九六 單寧酸 二、〇
蘆薈越幾斯 六、〇

尿毒症、尿毒熱

Uraemia, Febris uraemia

舊譯作尿毒入血

五九七 右每二時一食匙
沙列布煎(二、五)一八〇、〇

五九八 橙皮舍利別 一五、〇
右每二時一食匙

處置 利尿催進、皮膚誘導、溫包熱浴、發汗緩下、刺絡灌水等

五九七 硫酸鐵 五、〇
重碳酸那篤留謨 五、〇

蒲公英越幾斯 適宜
右爲六十九朝夕三粒

五九三 合糖炭酸鐵 一、五
硫酸規尼涅 一、五

右甘草末及甘草越幾斯適宜
爲三十九一日一二粒

五九三 フクツン 〇、〇五、〇、二
右入膠囊一日三回每回一二
粒

五七〇 實麥答利斯末 一、五
海葱 一、五
杜松實末 適宜

五七〇 右爲百九一日三回每回四粒
蘆薈越幾斯 一〇、〇
適宜

五七〇 實麥答利斯末 一、五
海葱 一、五
杜松實末 適宜

五七〇 實麥答利斯末 一、五
海葱 一、五
杜松實末 適宜

五七〇 實麥答利斯末 一、五
海葱 一、五
杜松實末 適宜

五七〇 實麥答利斯末 一、五
海葱 一、五
杜松實末 適宜

五七〇 實麥答利斯末 一、五
海葱 一、五
杜松實末 適宜

● 浸煎劑
五九七 寶麥答利斯浸

(一、〇) 一五〇、〇

醋酸加留謨

單舍利別

一五〇、〇
二〇〇、〇

右每二時一食匙

五九八 寶麥答利斯浸

(一、〇) 一八〇、〇

醋酸加留謨

單舍利別

三〇〇、〇
二〇〇、〇

右每二時一食匙

五九九 寶麥答利斯浸

(一、〇) 一〇〇、〇

ストロファンツス丁幾三十滴

單舍利別

一〇〇、〇

右一日六回分服

五九〇 古魯聖篤浸(一、五) 一八〇、〇

旃那舍利別 差

二〇〇、〇 一二五、〇

右每三時一食匙

五九一

複方旃那浸

一八〇、〇

硫酸那篤留謨二、〇 一三〇、〇

右每二時一食匙

五九二 旃那浸 (一五、〇) 一五〇、〇

硫酸那篤留謨、單舍利別

各一五、〇

右混和每二時一食匙

● 水劑

五九三 沃度加留謨

水

五、〇

右每三時一食匙

五九四 枸橼酸

水

一、〇

單舍利別

右一日數回分服

五九五 抱水格魯刺爾

單舍利別

二五〇、〇

水

右發作時服

五九六 抱水格魯刺兒

亞拉比亞護謨漿

單舍利別

二、〇

右頓服(發作時)

五九七 抱水格魯刺兒

貌魯謨加留謨

水

三、〇
六、〇
一〇〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每三時二食匙

五九八 嚼囉仿謨水(一、〇) 一〇〇、〇

右每二時一食匙

五九九 杏仁水 一〇、〇

右每半時五滴

● 丸劑

五九〇 古魯聖篤越幾斯 〇、二五

蘆薈越幾斯、藥刺巴石鹼

各二、五

右為三十九丸每回一二個

● 散劑
五九一 安息香酸 〇、一

白糖 四、〇

右分六回每二時一包

五九二 安息香酸 〇、一

亞拉比亞護謨 〇、一

白糖 〇、一

右分十包每二時一包

五九三 安息香酸 〇、五

白糖 五、〇

右分六包每時一包

五九四 安息香酸 二、〇

白糖 五、〇

右分六包每四時一包

五九五 安息香酸 〇、三

樟腦 〇、〇三

白糖 〇、五

右爲一包每二時一包

五九六 安息香酸 一、〇—三、〇

樟腦 〇、五

高香油精 五、〇

右分十包每二時一包

五九七 鹽酸必魯加爾必濕 〇、〇五

蘇甘母尼根末、藥刺巴根末 各〇、五

海葱越幾斯 各〇、五

右分十包一日四回

五九八 撒里矢爾酸 三、〇

腎盂炎 Pyelitis, Pyelonephritis.

急性腎盂炎、慢性腎盂炎、多濁、消渴等、舊譯作腐孟炎、又名腎穴炎、又名腎穴發炎、又名腎漏生炎、微脂脫薄皮、古時以此症包括於腹痛、或淋病、血淋及多濁等症中

禁刺戟食物、攝牛乳滋養、兼善通利、藥劑即鹽莫、鹽規、利水諸藥、

處置

六〇六 鞣酸

白糖

白糖 二、〇

右分六包每時一包

五九九 撒里矢爾酸 五、〇

右分十包每一時一包

六〇〇 抱水格魯刺兒 一、〇

乳糖 一、〇

右頓服 一、〇

六〇一 甘末 〇、二

藥刺巴根末、白糖 各一、二

右二回分服 〇、二

●注射劑 〇、二

六〇二 鹽酸ピロカルピン水 (〇、一)一〇、〇

右一筒注射皮下 〇、一

六〇三 鹽酸莫兒比涅 〇、一

右一筒注射皮下 〇、一

蒸餾水 五、〇—一〇、〇

右半筒乃至一筒注射皮下

六〇四 樟腦阿列布油 (一、〇—二、〇)一〇、〇

右一筒注射皮下

六〇五 安息香酸 一、五

樟腦 一、〇

酒精 一、〇

右一筒注射皮下 一、〇

六〇六 麥角越幾斯 二、〇

水 八、〇

右一二回注射皮下 二、〇

六〇七 嚼囉仿謨 一、五、〇

右極緩時吸入 一、五、〇

六、〇

一、五

六〇九 單寧酸、ルブリン

各〇、五

六〇〇 單寧酸

一、〇

右分三包一日三四乃至四回

每回一包

白糖 二、〇

右分十包一日三四每回一包

白糖 二、〇

右分六包一日三回

六〇二 單寧酸 〇、六一、〇

白糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

六〇三 單寧酸 一、〇一、五

ルプリン 一、〇一、三、〇

白糖 五、〇

右分十包一日三回

六〇四 單寧酸 二、〇

醋酸鉛 〇、三

白糖 三、〇

右分十包一日數回每回一包

六〇五 單寧酸 一、〇

阿片 〇、二

白糖 三、〇

右分十包每三時一包

六〇六 單寧酸 三、〇

阿片 〇、二

白糖 三、〇

右分十包每三時一包

六〇七 單寧酸 一、〇

白糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包

六〇七 アルブチン 一、〇、〇

白糖 五、〇

右爲十包一日三回

六〇八 炭酸リナウム 〇、二一〇、五

白糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

六〇九 ザロール 五、〇

白糖 五、〇

右分十包每二時一包

六〇〇 ザロール 五、〇

澱粉 一、〇

右爲十包每二時一包

六〇一 明礬、白糖 各二、〇

右分十包一日數回每回一包

六〇二 人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇

右頓服

六〇三 單寧酸規尼涅 〇、二

合糖柯柯阿脂 〇、三

右分十包一日三回每回一包

六〇四 醋酸鉛 〇、一

白糖 一、〇

六〇五 阿片 〇、三

白糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包

六〇六 的列並底油 一、〇一五、〇

●水劑 二滴

枸橼油 一個

卵黃 二、〇

護謨舍利別 適宜

水 右爲乳劑每二時一食匙

六〇七 篤留拔爾撒謨丁幾 一、〇

ザロール 五、〇

篤拉侃篤護謨 〇、二

水 一、二〇、〇

單舍利別 三、〇

右一日五食匙乃至十食匙

六〇八 ルプリン麥芽越幾斯(二%) 一〇〇、〇

右一日三回每回一食匙

六〇九 烏華烏兒矢葉 二、〇

橙皮 八、〇

右煎出 三〇〇、〇

亞爾答舍利別 四〇、〇

右每三時半碗
人工加爾爾斯泉鹽

二〇〇〇

醋酸莫兒比涅

〇〇三

水

一〇〇〇〇

右一日三回分服

石灰水*

一〇〇〇〇

右和牛乳一日三回分服

乳清

五〇〇〇〇

明礬末

一〇〇

右一日服用

芫菁丁幾

五〇〇

的列並油、骨海拔爾撒謨

的列並油

四〇〇

右一日二十五滴

各二五〇

●丸劑

的列並底油

グリジユンバルサム 各四〇

沒食子酸

ラタニヤ越幾斯

右為四十九一日八丸 各一〇

●膠囊劑

骨海拔爾撒謨

右入膠囊十個一日三四個

的列並油

四〇〇

右為囊十個一日三個

右為膠囊十個一日三個

依的兒性サンレリー油 二、五

右為膠囊十個一日三個

●注射劑

鹽酸莫兒比涅

右半筒注射皮下

〇、一

五、〇

結石性腎盂炎 Pyelitis calculosa.

尿結石 Concremente

腎石 Nephrolithiasis.

處置 戒肉類多食、禁酸味飲食、努身體運動、引礦泉曹達水

●散劑

炭酸里丟謨 〇、五一〇、三

右分十包一日數回分服

炭酸利丟謨 〇、三一〇、〇

白糖 三、〇

炭酸里丟謨 〇、五一〇、三

右分十包一日三回每回一包

炭酸利丟謨 〇、三一〇、〇

白糖 四、〇

重碳酸那篤留謨

三〇〇、〇

酒石酸 二〇〇、〇

白糖 四〇〇、〇

右每回一茶匙 二、五

炭酸利丟謨

二、五

重碳酸那篤留謨 五、〇
枸橼酸加留謨 一〇、〇

六〇四 安息香酸 二、〇
右分十包一日三回每回一包

六〇五 茴香油糖 一、〇
右分六包一日三回

六〇六 磷酸那篤留謨 三〇、〇
重碳酸那篤留謨 六〇、〇
炭酸里去謨 一〇、〇

六〇七 磷酸那篤留謨 四五、〇
重碳酸那篤留謨 四五、〇
炭酸利去謨 一〇、〇

右一日二回每回一茶匙

六〇八 ●水劑
セルテルス水 * 五〇〇、〇

六〇九 乳酸 五、〇
水 二〇〇、〇

單舍利別 三〇、〇
右每二時一食匙

六〇五 乳酸 二、〇
水 二〇〇、〇

高香水 五〇、〇
右每二時二食匙

六〇一 磷酸 一〇、〇
覆盆子舍利別 * 五〇、〇
右一日數回分服

六〇二 酒石酸 四、〇
單舍利別 三〇、〇
二〇〇、〇

六〇三 枸橼酸 五、〇
水 二五〇、〇
右每一時乃至二時一食匙

六〇四 橙皮舍利別 五〇、〇
右一日數回二分服

六〇五 炭酸加留謨 一〇、〇
水 八〇、〇
單舍利別 二〇、〇

六〇六 炭酸加留謨 二、〇
水 一〇〇、〇
右每時一茶匙乃至一小兒匙

六〇七 炭酸加留謨 四、〇
薄荷水 一五〇、〇
橙皮舍利別 五〇、〇

右每二時一食匙

六〇七 重碳酸那篤留謨 一〇、〇
水 八〇、〇
單舍利別 二〇、〇

六〇八 重碳酸那篤留謨 三〇、〇
水 一〇〇、〇
右每三時一小兒匙、小兒

六〇九 重碳酸那篤留謨 〇、六
炭酸里去謨 〇、三
炭酸水 一〇〇、〇

六〇〇 重碳酸那篤留謨 二、〇
桂皮丁幾 一、〇
ソニラ丁幾 一、〇

六〇一 單舍利別 一〇〇〇、〇
右一日一立得耳至三立得耳

六〇二 枸橼酸麻留謨 三〇、〇
白糖 六〇、〇
右一日三回每回一茶匙

六〇三 磷酸那篤留謨 四、〇

重碳酸那篤留謨 水 四、〇〇

單舍利別 右一日四回分服 三〇、〇〇

乳酸 二、〇〇
篤拉侃篤護謨 二、〇〇
白糖 四〇、〇〇

六〇三 燐酸那篤留謨 水 五、〇〇

六〇五 稀鹽酸 右一日三回每回十五滴乃至二十滴 三〇、〇〇

右爲錠劑五十個每食後一個乃至二個

六〇四 燐酸那篤留謨 水 一五〇、〇〇

六〇六 乳酸 右一日三回 十滴—二十滴

六〇六 ビペラチン 五、〇〇—一〇、〇〇

六〇四 燐酸那篤留謨 水 八、〇〇

●錠劑 右注入膀胱 一〇、〇〇

腎痲痛 Colica renalis.

六〇九 鹽酸莫兒比涅 水 〇、一〇

白糖 右作十包每時一包 〇、五〇

亞拉比亞護謨漿 各五〇、〇〇

六〇七 阿片 〇、三〇—〇、六〇

六〇七 抱水格魯刺爾 單舍利別 六、〇〇

右每二時一食匙

腎臟性血尿 Haematuria renalis. Nephritis haemorrhagica. 出血性腎臟炎

血尿 Haematurie 舊譯作血淋，又名尿管帶血，又名小便出血，古名溺血，尿血，澁血，莖衄

血色素尿 Haemoglobinurie.

●浸煎劑

六〇三 麥角浸 (二、〇〇)二〇〇、〇〇

六〇三 麥角浸 (三、〇〇)一五〇、〇〇

六〇四 麥角 右每二時一食匙

右一日二回二日分服

阿片丁幾 單舍利別

一〇、〇〇

機那皮

一〇、〇〇

| | | | | | |
|----------------|-------|-------------|-------|--------------------|------|
| 右煎出 | 一五、〇 | 六〇九 過格魯兒鐵液 | 一三、〇 | 單舍利別 | 一〇、〇 |
| 孕礪酒石 | 一〇、〇 | 桂皮水 | 一〇、〇 | 右每三時一茶匙、小兒 | |
| 單舍 | 二〇、〇 | 右每回一食匙 | | 六〇六 流動ヒドラチース越幾斯* | 三〇、〇 |
| 右每二時一食匙 | | 六〇八 過格魯兒鐵液 | 一、〇 | マラセン(セリ)酒* | 三〇、〇 |
| 六〇五 機那煎 (一〇、〇) | 一〇〇、〇 | 水 | 七〇、〇 | 桂皮舍利別* | 一五、〇 |
| 蘇木越幾斯 | 一、〇 | 桂皮舍利別 | 二〇、〇 | 右每二時乃至五時一茶匙 | |
| 桂皮舍利別 | 二〇、〇 | 右每一二時一茶匙、小兒 | | 六〇七 癒瘡木丁幾 | 二〇、〇 |
| ●水劑 | | 六〇二 過格魯兒鐵液 | 二、〇 | 右一日三回每回六十滴 | |
| 麥角越幾斯 | 〇、五 | 桂皮水 | 二〇〇、〇 | 六〇八 麥角越幾斯 | 一、〇 |
| 水 | 八〇、〇 | 桂皮舍利別 | 二〇、〇 | 白糖 | 二、〇 |
| 覆盆子舍利別* | 二、〇 | 右每二時一食匙 | | 右分五包每三時一包 | |
| 六〇七 麥角越幾斯 | 一、〇 | 六〇三 單寧酸 | 四、〇 | 六〇九 麥角越幾斯 | 一、〇 |
| 單寧酸 | 二、〇 | 酒精 | 八、〇 | 亞拉比亞護膜末 | 二、〇 |
| 水 | 二〇〇、〇 | 水 | 一八〇、〇 | 右分六包每三時一包 | |
| 單舍利別 | 三〇、〇 | 右每一時一食匙 | | 六〇六 麥角越幾斯 | 一、〇 |
| 右每時一食匙 | | 六〇三 硝酸銀 | 一、〇 | 阿片末 | 〇、一 |
| 六〇六 麥角越幾斯 | 一、〇 | 餾水 | 五〇〇、〇 | 白糖 | 二、〇 |
| 單寧酸 | 一、〇 | 右注入 | | 右分五包每三時一包 | |
| 水 | 一、〇 | 六〇四 阿片丁幾 | 二滴 | 六〇九 麥角越幾斯、單寧酸 各〇、五 | |
| 橙花舍利別 | 一八〇、〇 | 單舍利別 | 一〇、〇 | 白糖 | 二、〇 |
| 右每一時乃至二時一食匙 | | 右每二時一茶匙、小兒 | | 右分五包一日三回每回一包 | |
| | 一八、〇 | 六〇五 明礬 | 三、〇 | | |
| | | 沙列布煎* | 八〇、〇 | | |

腎臟性血尿

| | | |
|------|--------------|-----|
| 六〇九 | 單寧酸 | 二、〇 |
| | 醋酸鉛 | 〇、三 |
| | 白糖 | 一、〇 |
| | 右分六包每二時一包 | |
| 六〇九三 | 單寧酸 | 〇、六 |
| | 醋酸鉛 | 〇、三 |
| | 白糖 | 五、〇 |
| | 右分十包每二時一食匙 | |
| 六〇九五 | 單寧酸規尼涅 | 三、〇 |
| | 右分三包一日三回每回一包 | |
| 六〇九五 | 醋酸鉛 | 〇、一 |
| | 阿片 | 〇、一 |
| | 樟腦 | 〇、五 |
| | 白糖 | 五、〇 |
| | 右分十包每時乃至二時一包 | |
| 六〇九六 | 明礬 | 三、〇 |
| | 白糖 | 三、〇 |
| | 右分六包每時一包 | |
| 六〇九七 | 磷酸石灰 | 一、〇 |

第二節 膀胱諸病

急性膀胱加答兒 Cystitis (catarrhalis) acuta.

白濁、便濁、膀胱炎、舊譯作睪炎、膀胱熱症、膀胱發炎、

| | | |
|------|---|------|
| 六〇九八 | 結晶硫酸鐵、重碳酸曹達 | 各三、〇 |
| | 右入膠囊十個一日六個乃至十個 | |
| 六〇九八 | ●膠囊劑 エルゴチン | 二、五 |
| | 右入膠囊十個一日六個乃至十個 | |
| 六〇九九 | ●注射劑 右著草(睡菜)越幾斯 ^{各三、〇} 宜爲六十九一日三回每回三粒 | 〇、一 |
| 六〇一〇 | ●注射劑 麥角越幾斯 | 〇、一 |
| | 右一筒注射皮下、小兒 | |
| 六〇一一 | ●注射劑 麥角越幾斯 | 五、〇 |
| | 右每回三分一筒一日三回注射皮下 | |

| | | |
|------|--------------------|------|
| 六〇一二 | 麥角越幾斯 | 二、五 |
| | 酒精、佩里設林 | 各七、五 |
| | 右半筒乃至一筒注射皮下 | |
| 六〇一三 | ●注射劑 單寧酸 | 一、〇 |
| | 右注入膀胱 | |
| 六〇一四 | 過格魯兒鐵液 | 〇、一 |
| | 右注入膀胱 | |
| 六〇一五 | ●注射劑 硫酸亞鉛 | 〇、二 |
| | 右注入膀胱 | |
| 六〇一六 | ●注射劑 麥角越幾斯 | 三、〇 |
| | 右爲坐藥六個一日二個乃至四個插入尿道 | |

處置 嚴正安靜、淡泊食物、禁香料酒類、內服鹽劑、揚曹等、外用諸種之注入洗滌劑

● 浸煎劑

六〇七 亞麻仁煎 四〇〇〇、〇

單舍利別 二〇〇、〇

六〇八 亞麻仁煎(一〇、〇)一〇〇、〇

右飲料 四、〇

六〇九 亞麻仁煎(一五、〇)二〇〇、〇

右一日三回分服 五、〇

六一〇 亞麻仁煎(一〇、〇)一〇〇、〇

杏仁水 四、〇

六一一 亞麻仁煎(一〇、〇)一〇〇、〇

阿片越幾斯 一、〇

六一二 亞麻仁煎(一〇、〇)二〇〇、〇

杏仁水 四、〇

六一三 亞麻仁煎(一〇、〇)二〇〇、〇

單舍利別 八、〇

六一四 亞麻仁煎(一〇、〇)二〇〇、〇

阿片丁幾 十五滴

六一五 亞麻仁煎(一〇、〇)二〇〇、〇

杏仁水 一〇、〇

六一六 亞麻仁煎(一〇、〇)二〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇

罌粟殼舍利別 ** 三〇、〇

六二三 烏華烏兒矢葉浸 右每二時一小兒匙、小兒

六二四 烏華烏爾矢浸 右一日三回分服

六二五 烏華烏爾矢葉浸 右一日三回分服

六二六 烏華烏爾矢浸 右每二時二食匙

六二七 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六二八 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六二九 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六三〇 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六三一 烏華烏爾矢浸 右每三時半碗

六三二 烏華烏兒矢葉浸 右每一時一食匙

六三三 烏華烏兒矢葉浸 右每一時一食匙

六三四 烏華烏兒矢葉浸 右每一時一食匙

六三五 烏華烏兒矢葉浸 右每一時一食匙

六三六 烏華烏兒矢葉浸 右每一時一食匙

六三七 烏華烏兒矢葉浸 右每一時一食匙

六三八 烏華烏兒矢葉浸 右每一時一食匙

六三九 烏華烏兒矢葉浸 右每一時一食匙

六四〇 烏華烏兒矢葉浸 右每一時一食匙

六四一 烏華烏兒矢葉浸 右每一時一食匙

六四二 烏華烏兒矢葉浸 右每一時一食匙

杏仁水 一、〇

單舍利別 八、〇

六二七 烏華烏爾矢葉浸 右每二時一食匙

六二八 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六二九 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六三〇 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六三一 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六三二 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六三三 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六三四 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六三五 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六三六 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六三七 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六三八 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六三九 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六四〇 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六四一 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六四二 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六四三 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六四四 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

六四五 烏華烏爾矢浸 右每二時一食匙

阿片丁幾
單舍利別
三十滴
二〇、〇

右一日六回分服

六二三 沙列布煎 (二、五) 一五〇、〇
橙皮舍利別
三〇、〇

右每二時一食匙

六二三 蜀葵根煎 (一〇、〇) 一五〇、〇
單舍利別
三〇、〇

右每二時一食匙

●水劑
六三四 格魯兒酸加留謨水
(一、〇、一、〇) 一〇〇、〇

右一日六回分服

六三五 格魯兒酸加留謨水
三〇〇、〇

杏仁水
一、〇

六三六 格魯兒酸加留謨水
右一日數回每回一食匙
八〇、〇
三、〇

罌粟舍利別 *
右每三時一小兒匙、小兒
四〇、〇

六三七 格魯兒酸加留謨
嬰粟舍利別 *
五〇、〇

水
右每二時一茶匙
一二〇、〇

六三六 格魯兒酸加留謨水

一八〇、〇
一八〇、〇
二〇、〇

六三六 撒里矢兒酸那篤留謨
單舍利別
二〇、〇

水
右每二時一食匙
一八〇、〇

六三六 撒里矢兒酸那篤留謨
阿片丁幾
五、〇
一、〇

甘草羔
五、〇

六三三 撒里矢兒酸那篤留謨
右每二時一食匙
一八〇、〇

苦味丁幾
八、〇
三、〇

六三三 橙皮舍利別
水
一五〇、〇
二〇〇、〇

六三三 撒里矢兒酸那篤留謨
橙皮舍利別
六、〇
四〇、〇

薄荷水
二〇、〇

六三三 安息香酸
右一日三回分服
一、〇
一〇〇、〇

六三三 橙皮舍利別
右每二時一小兒匙、小兒
二〇、〇

六三三 安息香酸
水
三〇〇、〇
二〇、〇

六三五、アルプチン
水
一五〇、〇
一五、〇

六三三 橙皮舍利別
右一日數回分服
五、〇
一〇〇、〇

六三七 竹淋拔爾撒謨
右為乳劑
一七〇、〇
一〇、〇

六三七 阿片越幾斯
單舍利別
一五、〇

六三三 撒里矢兒酸
水
一八〇、〇

六三三 撒里矢兒酸
水
一八〇、〇

| | | | | | |
|-------------|--------|------------------|-----------|------------------|-------|
| 阿片丁幾 | 五滴 | 單舍利別 | 一、五、〇 | 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇、五 |
| 單舍利別 | 一〇、〇 | 右一日三回每回二茶匙漸次增加 | 〇、〇、五 | 單寧酸 | 一、〇、二 |
| 右每三時一小兒匙、小兒 | 四、〇 | トリアセチルコロリド | 一、〇、一、二、〇 | 白糖 | 五、〇 |
| 六三〇 重碳酸那篤留謨 | 二、〇 | 水 | 一、五〇、〇 | 六三〇 單寧酸 | 〇、〇、五 |
| 六三〇 貌魯謨加留謨 | 〇、五 | 右每二時一食匙 | 一〇〇、〇 | 六三〇 蘆薈越幾斯 | 〇、二、五 |
| 六三〇 菲沃斯越幾斯 | 四、〇 | 六四〇 石灰水* | 一〇〇、〇 | 六三〇 乳糖 | 一、〇 |
| 杏仁水 | 一〇〇、〇 | 右一日三回加牛乳分服 | 一、〇 | 六三〇 單寧酸 | 〇、〇、五 |
| 水 | 一、〇 | 六四〇 明礬 | 一、〇 | 六三〇 蘆薈越幾斯 | 〇、〇、五 |
| 六四〇 レゾルチン | 一、〇 | 乳清 | 二〇〇、〇 | 白糖 | 〇、〇、五 |
| 水 | 一、五〇、〇 | 右一日數回分服 | 〇、〇、〇 | 六三〇 單寧酸 | 一、〇 |
| 橙皮舍利別 | 三〇〇、〇 | ●散劑 | 三、〇 | 六三〇 樟腦 | 〇、〇、五 |
| 右每二時一食匙 | 一、〇 | 六四〇 撒里矢爾酸 | 各五、〇 | 白糖 | 二、〇 |
| 六四〇 阿片丁幾 | 一滴—三滴 | 右分六包一日三回每回一包 | 一〇、〇 | 六三〇 忽布腺 | 〇、〇、四 |
| 六四〇 甘扁桃乳劑* | 八〇、〇 | 六四〇 撒里矢爾酸、白糖 | 各五、〇 | 六三〇 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇、二 |
| 右每時一茶匙、小兒 | 一、〇 | 右分十包每二時一包 | 各五、〇 | 六三〇 乳糖 | 一、五 |
| 六四〇 阿片丁幾 | 一〇〇、〇 | 六四〇 撒里矢爾酸那篤留謨 | 一〇、〇 | 六三〇 右分三包一日三回每回一包 | 〇、〇、五 |
| 護謨合劑* | 一〇〇、〇 | 右分十包每三時一包 | 各五、〇 | 六三〇 忽布腺 | 一、〇 |
| 右一日三回分服 | 三、〇 | 六四〇 撒里矢爾酸那篤留謨、白糖 | 各五、〇 | 六三〇 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇、五 |
| 六四〇 印度大麻丁幾 | 三、〇 | 右分十包每一時一包 | 一〇、〇 | 六三〇 鹽酸莫兒比涅 | 〇、〇、五 |
| 六四〇 別刺敦那丁幾 | 三、〇 | 六五〇 撒里矢爾酸那篤留謨 | 一〇、〇 | | |
| 六四〇 阿片丁幾 | 三、〇 | | | | |
| 六四〇 尚香水 | 二五、〇 | | | | |

急性膀胱加答兒

白糖

右分三包一日三包乃至五包

三、〇

六二五 安息香酸

薄荷油糖

〇、二

六二五 安息香酸

右分六包每二時一包

三、〇

薄荷油糖

六二五 安息香酸

右分十包每二時一包

一、〇

六二六 エルゴチン

白糖

五、〇

六二六 抱水テルピン

右分六包一日三回每回一包

一、〇

六二六 抱水テルピン

乳糖

一、五

六二六 抱水テルピン

右分三包一日三回每回一包

一、〇

六二六 抱水テルピン

白糖

三、〇

六二六 抱水テルピン

右分十二包一日三包

三、〇

六二六 菲沃斯越幾斯

白糖

五、〇

六二六 菲沃斯越幾斯

右分十包每三時一包

〇、二

六二六 別刺敦那越幾斯

白糖

〇、二

六二五 印度大麻越幾斯

乳糖

〇、一

右分三包一日三回每回一包

六二六 印度大麻越幾斯

白糖

〇、三

右分十包每三時一包

六二六 印度大麻越幾斯

白糖

〇、四

右分十二包一日三回每回一包

六二六 印度大麻越幾斯

乳糖

各〇、一

六二六 印度大麻越幾斯

白糖

一、五

右分三包一日三回分服

六二六 印度大麻越幾斯

白糖

各〇、三

六二六 菲沃斯越幾斯

白糖

五、〇

右分十包三時一包

六二七 アルブチン

乳糖

三、〇

右分三包一日三回每回一包

六二七 アルブチン

白糖

二、〇

右分三包一日三回每回一包

右分三包一日三回每回一包

六二七 貌魯漢化樟腦

乳糖

〇、三

右分三包一日三回分服

六二七 貌羅漢化樟腦

白糖

一、〇

右為錠十個一日四回每回一個

六二七 ザロール

白糖

九、〇

右分六包一日三回每回一包

六二七 ザロール

乳糖

六、〇

右為六包一日三回分服

六二七 ザロール

薄荷油

一、〇、〇

右分十包每二時一包

六二七 ナフタリン

乳糖

〇、七五

右分三包一日三回每回一包

六二七 ナフタリン

白糖

二、〇

右分八包一日二包乃至四包

六二七 ナフタリン

白糖

四、〇

六七九 ベトール ○、二一〇、四

右分十包一日四回每回一包

六八〇 甘朮、藥刺巴 各〇、五

白糖 〇、三

右頓服

六八一 甘朮 〇、二

阿片 〇、〇五

白糖 五、〇

右分五包一日三回每回一包

六八二 托沕兒氏散 〇、三

右分十包一日三回每回二包

六八三 單寧酸規尼涅 〇、三

白糖 一、五

右分五包一日三回每回一包

小兒

六八四 鹽酸莫兒比涅 〇、〇二

白糖 二、〇

右分四包每三時一包

六八五 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

蘆薈越幾斯 〇、〇六

白糖 二、〇

右分十包一日三包

六八六 安知歇貌林 〇、六

咖啡涅 ○、三

右分三包一日三回分服

六八七 格魯兒酸加留謨 一〇、〇

白糖 九〇、〇

篤留拔爾撒謨丁幾 九、〇

右以篤拉侃篤護謨爲錠劑百

個一日二十個

六八八 メチーレンブラウ ○、六一一、二

右分六包一日三回每回一包

入膠囊與之

六八九 烏華烏兒矢葉、土荊芥草 **

ヘルニアリア草 ** 各一〇、〇

右分十包爲茶劑

六九〇 烏華烏兒矢葉

ヘルニアリア草 ** 各三〇、〇

右朝夕一碗爲茶劑

六九一 蕁麻草、大麻草 各一〇、〇

右分十包爲茶劑

●丸劑

六九二 的列並油 三、〇

龍膽越幾斯 二、〇

右爲三十九一日三回每回一

六九三 的列並油 四、〇

右龍膽末、龍膽越幾斯各適

宜爲五十九一日三回每食後

分服

六九四 クレタリン 五、〇

右黃蠟、柯柯阿脂各適宜爲

五十九一日五粒至十粒

六九五 安息香酸 五、〇

右伽里設林適宜爲二十粒一

日五粒乃至十粒

六九六 骨湃波拔爾撒謨、的列並油 各五、〇

適宜

右爲五十九一日二粒至四粒

六九七 樟腦 二、五

阿片越幾斯 〇、五

右謨謨漿適宜爲十六丸每回

二三粒

●滴劑

六九八 的列並油 一〇、〇

右一日一回六滴

六九九 印度大麻丁幾 一〇、〇

右一日三回每回十五滴

●洗滌劑

六二〇 撒里矢爾酸

水

〇、四
二〇〇、〇

右洗滌

六二一 撒里矢兒酸

水 硼酸那篤留謨

五、〇
一〇〇〇、〇

右洗滌

六二二 沃度仿謨

水 僱利設林

一、〇
五〇〇、〇

右洗滌

六二三 ビナクタン

水 右洗滌

一、〇
五〇〇、〇

右洗滌

六二四 石炭酸水

水 右洗滌

〇、三、三、〇、二五〇、〇

右洗滌

六二五 石炭酸

水 右洗滌

一、〇
五〇〇、〇

右洗滌

六二六 硝酸銀水

水 右洗滌

〇、二、一、〇、五〇〇、〇

右洗滌

右洗滌

六二七 醋酸鉛

水

一、〇
一〇〇〇、〇

右洗滌

六二八 鹽酸

水

〇、五、一、〇
五〇〇、〇

右洗滌

六二九 石灰水

水

一〇〇〇、〇
一〇〇〇、〇

右洗滌

●注入劑

六三〇 硼酸水

水 右注入

(三、〇)二〇〇、〇

六三一 昇汞水

水 右注入

(〇、〇五)五〇〇、〇

六三二 レゾルチン水

水 右注入

(三、〇一五)一〇〇〇、〇

右注入

六三三 硼酸那篤留謨

水

五、〇
二〇〇、〇

右注入

六三四 石炭酸水

水 右注入

(一、〇)二〇〇、〇

右注入

六三五 過滿俺酸加留謨水

水 右注入小兒

(〇、二、一〇、二)二〇〇、〇

六三六 硝酸銀

水

〇、二、一〇、四
四〇〇、〇

六三七 硫酸規尼涅

水 右注入

〇、二、五
二〇〇、〇

六三八 格魯兒酸加留謨

水 右注入、小兒

〇、五
二〇〇、〇

六三九 稀鹽酸

水 右注入、小兒

二、五
二〇〇、〇

六四〇 加密列水

水 右注入

二、五
五〇〇、〇

六四一 阿片丁幾

水 右注入

各〇、五
五〇〇、〇

六四二 硫酸亞鉛、明礬、石炭酸

水 右注入、小兒

五〇〇、〇

六四三 沃度仿謨

水 僱里設林

五〇〇、〇

六四四 僱里設林

水 僱里設林

四〇〇、〇

水 一〇、〇
達拉侃篤護謨 一、〇〇
右每回二食匙加溫湯五〇〇
●注入

●坐劑

六三三 鹽酸古加乙滯 〇、一
右柯柯阿脂適宜為坐藥三個

乃至五個

六三三 古加乙滯 〇、一
柯柯阿脂 一、二、〇

右為坐藥六個一日二個乃至

三個 〇、〇五

六三四 古加乙滯 〇、〇五
別刺敦那越幾斯 〇、〇六

慢性膀胱加答兒

六三三 ●水劑 烏華烏爾矢浸

(一五、〇) 一五〇、〇

單舍利別 二〇、〇
別刺敦那越幾斯 〇、二

右每二時一食匙

六三四 的列並油 五、〇

柯柯阿脂 二、〇
右為坐藥一個

六三五 別拉敦那越幾斯 〇、二
鹽酸莫兒比滯 〇、〇五

柯柯阿脂 一〇、〇
右為坐藥五個一日一二個

六三五 鹽酸莫兒比滯 〇、一
柯柯阿脂 一、二、〇

右為坐藥六個一日二三個

六三七 鹽酸莫兒比滯 〇、〇五
右柯柯阿脂適宜為坐藥三個

六三六 阿片越幾斯 〇、〇三
柯柯阿脂 二、〇
右坐藥

Cystitis (catarrhalis) chronica.

卵黃 一個
薄荷水 一、二〇、〇
右為乳劑一日三四回每回一

食匙

六三五 的列並底油 一、〇
枸櫞油 二滴

卵黃 一個

六三元 硝酸銀 〇、一
右柯柯阿脂適宜為坐藥五個

一日一個

●膠囊劑 二、五
六三〇 白檀油

右為膠囊十個一日六個乃至

九個

六三三 阿片丁幾 一、〇
水 一〇〇、〇
右洗腸

六三三 水蛭 三十條
會陰部(婦人陰唇)貼用

(參看急性膀胱加答兒)

護謨舍利別 二〇、〇
水 一五〇、〇
右為乳劑每二時一食匙

六三六 杜松子油 一、〇
葛縷子油 〇、一

茴香油 〇、一

酒精 三〇〇、〇

水 一〇〇〇、〇

右每回一茶匙乃至一食匙

六三七 百露拔爾撒謨 三三〇

扁桃油 二〇〇、〇

亞拉昆亞護謨末 一〇〇、〇

單舍 三〇〇、〇

右爲乳劑一五〇、〇 每二時

一食匙 八、〇

六三八 ザロール 適宜

亞拉亞護謨末 三六〇、〇

桂皮水 九〇、〇

六三九 磷酸 一〇〇、〇

覆盆子舍利別 九〇、〇

右每時一茶匙

六四〇 格魯兒酸加留謨 四、〇

水 二〇〇、〇

覆盆子舍利別 二〇〇、〇

右每二時一食匙

六四二 三百倍撒里矢爾酸水 五〇〇、〇

右一日數回分服

六四三 イヒオール 一五、〇

水 三〇〇、〇

右一日三回每回十五滴乃至

三十滴

六四四 散劑 一、二

單寧酸 五、〇

白糖 五、〇

右分十包每二時一包

六四五 安息香酸 一、〇

茴香油糖 五、〇

右分十包每二時一包

六四六 撒里矢爾酸那篤留謨 一〇〇、〇

右分十包一日三包乃至五包

六四七 ザロール 一〇〇、〇

右分十包每日三包乃至五包

六四八 ナフタリン、白糖 各二、五

ベルガモット油 〇、〇二

右分十包一日五包乃至十包

六四九 ●丸劑 各二、〇

骨淋波拔爾撒謨 各二、〇

的列並油 適宜

蝦性麻僱涅矢亞 適宜

右爲三十九一日三回每回三粒乃至五粒

六五〇 的列並底油、機那越幾斯 各五、〇

炭酸麻僱涅曳謨 各五、〇

右爲五十九一日四九至五九

六五一 的列並油、安母尼亞護謨 五、〇

黃臘 二、五

篤留拔爾撒謨 二、〇

阿片越幾斯 〇、五

右爲百丸每三時一丸

六五二 百露拔爾撒謨 六、〇

沒藥末 二、〇

阿片越幾斯 二、〇

右爲百五十九每二時二粒乃至四粒

六五三 ●洗滌劑 至四粒

六五三 單寧酸水 (五、〇) 五〇〇、〇

右洗滌料

六五三 皓礬水 (二、五) 五〇〇、〇

右洗滌料

六五四 明礬水 (一、五) 五〇〇、〇

右洗滌料

六五五 明礬、硫酸亞鉛 各〇、五一、〇

石炭酸 各〇、五一、〇

水 五〇〇、〇

右洗滌
アンチノジン
水
一、〇
四〇〇、〇

● 右洗滌
● 注入劑
二〇〇、〇

微溫湯
右注入
二〇〇、〇

微溫湯
阿片丁幾
右注入
十滴—十五滴

微溫湯
亞硝酸アミール
右注入
五〇〇、〇
三滴—五滴

單寧酸水
右注入
（〇、二—〇、四）二〇〇、〇

單寧酸水
右注入
（一、〇—一、四）二〇〇、〇

稀鹽酸
石炭酸
水
右注入
〇、一
〇、一
二〇〇、〇

硼酸水
右注入
（六、〇）二〇〇、〇

撒里矢爾酸水
右注入
（一、〇）二〇〇、〇

石炭酸水
右注入
（〇、三—〇、五）二〇〇、〇

石炭酸亞鉛水
右注入
（〇、五—一、〇）二〇〇、〇

過滿俺酸加留謨水
右注入
（〇、一—四—〇、二）二〇〇、〇

硝酸銀水
右注入
（〇、二—一、〇）二〇〇、〇

明礬水
右注入
（一、〇）二〇〇、〇

格魯兒那篤留謨水
右注入
（一、〇）二〇〇、〇

硫酸偏麻涅叟謨水
右注入
（一、〇、〇）二〇〇、〇

結列阿曹篤水
右注入
（一、〇）二〇〇、〇

レゾルチン水
右注入
（一、〇—一、二）二〇〇、〇

レゾルチン水
右注入
（四、〇—一、〇、〇）二〇〇、〇

鹽酸古加乙涅水
右注入
（〇、五）二〇〇、〇

鹽酸古加乙涅
右注入
一、〇

重碳酸那篤留謨
右一週一二回注入
各五、〇

重碳酸那篤留謨
右一週一二回注入
三〇、〇
六、〇
七、〇

右每回一食匙注入

六五九 クレオリン(〇、五)四〇〇、〇

右注入

六六〇 沃度仿謨 五、〇

利尿設林

水 四〇〇、〇
一〇〇、〇

膀胱痙攣

Cystospasmus. 五淋病一種

膀胱麻痺

Cystoplegia, Paralysis vesicae.

痙攣性利尿困難

Dysuria spastica

尿閉、小便閉

Ischuria Retentio urinae.

膀胱排尿管筋麻痺

篤拉侃篤護謨漿

右一日三回注入

六六一 麥角越幾斯

酒精、備里設林

右每回半筒乃至一筒注射皮下

〇、二五

六六二 骨湃波拔爾撒謨

柯柯阿脂

黃蠟

阿片

右為坐藥六個朝夕一個

各三〇、〇

六、〇

〇、二二

●水劑

六六三 烏華烏爾矢浸

(五、〇)一二〇、〇

罌粟舍利別

右每三時一小兒匙、小兒

六六四 貌魯謨加留謨

水 一八〇、〇

單舍利別

右每二時一食匙

六六五 鹽酸莫兒比涅

杏仁水 〇、〇六
七、〇

●草劑

右每十五分時六滴乃至十滴

六六六 安息香酸那篤留謨

水 一〇〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每三時一小兒匙、小兒

六六七 重碳酸那篤留謨

水 一〇〇、〇

阿片丁幾 二滴—四滴

單舍利別 二〇、〇

右每三時一小兒匙、小兒

六六八 格魯兒酸加留謨

水 八〇、〇

罌粟舍利別 三〇、〇

右每三時一小兒匙、小兒

六六九 硼酸那篤留謨

阿片丁幾 二滴—四滴

水 一〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右一日三回每回一小兒匙、

六七〇 印度大麻丁幾

小兒 二、〇

單舍利別 一〇〇、〇〇

水 右一日三回分服

●滴劑

六五二 鹽酸莫兒比涅 〇、〇六

苦扁桃水 一〇、〇〇

六五三 番木鱉越幾斯 右十五分時八滴乃至十二滴 〇、〇一

六五四 芫菁丁幾 一、〇〇

六五五 芫菁根丁幾 四、〇一五、〇〇

六五六 右一日三回每回十滴乃至十五滴精滑液稠和服用

六五七 硝酸斯篤里規尼涅 一、〇〇

六五八 稀鹽酸 二、〇〇

六五九 酒精 二四、〇〇

六六〇 水 七、三〇

六六一 右一日二三回每回五滴乃至十滴

六六二 ●散劑

六六三 硫酸ストリキニ一、〇〇二

六六四 白糖 三、〇〇

六六五 右分六包一日一包

六六六 麥角越幾斯 一、二〇

六六七 白糖 三、〇〇

六六八 右分六包朝夕一包

六六九 挖汾兒氏散 〇、〇二

六七〇 白糖 二、〇〇

六七〇 右分十包一日三回每回一包

六七二 小兒 一、〇〇

六七三 鹽酸規尼涅 二、〇〇

六七四 白糖 二、〇〇

六七五 右分六包一日三包

六七六 貌羅漢加留謨 一〇、〇〇

六七七 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

六七八 右分十包朝夕一包

六七九 別刺敦那越幾斯 〇、一二

七八〇 白糖 二、〇〇

七八〇 右分四包一日四回每回一包

七八一 ●丸劑

七八二 番木鱉越幾斯 〇、三〇

七八三 右甘草蓋甘草末各適宜爲十丸一日三回每回一粒

七八四 番木鱉越幾斯 一、〇〇

七八五 甘草蓋 四、〇〇

七八六 右爲五十九丸一日三回每回一丸

七八七 別拉敦那越幾斯 〇、一〇

七八八 繡草酸亞鉛 〇、〇三

七八九 右爲丸一日三回分服

七九〇 芫菁木 〇、〇一

七九一 樟腦 〇、〇三

七九二 藥用石鹼 二、〇〇

七九三 右爲十二丸一日三回每回一粒乃至二粒

七九四 甘扁桃油 八滴

七九五 芫菁丁幾 一滴一四滴

七九六 右入膠囊一日二三回

七九七 骨淋巴拔爾撒謨 三、〇〇

七九八 右入膠囊五個一日三回每回一個

七九九 ●注射皮下劑

八〇〇 麥角越幾斯 一、〇〇

八〇一 水 一〇、〇〇

八〇二 右每回一筒乃至二筒注射皮下、小兒

八〇三 麥角越幾斯 二、〇〇

八〇四 稀酒精、俾里設林 各五、〇〇

八〇五 右每回半筒至一筒注射皮下

八〇六 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

水 右每回一筒注射皮下 五、〇

六三〇 硝酸ストリキニーチ 〇、〇五

水 右每回半筒乃至一筒膀胱部注射皮下 一〇、〇

六三〇 硝酸ストリキニーチ 〇、〇一—〇、〇二

水 右每回一筒注射皮下、小兒坐藥 一〇、〇

六三一 阿片越幾斯 〇、一五

柯柯阿脂 右爲坐藥又爲膿球子 二、〇

六三二 別拉敦那越幾斯 〇、〇五

柯柯阿脂 右爲坐藥又爲膿球子 二、〇

膀胱結石

Cystolithiasis.

舊譯作砂淋症、又名膀胱砂淋、又名石淋

六三三 別拉敦那越幾斯 〇、一

柯柯阿脂 右爲座藥插入肛門 二、〇

六三四 阿片丁幾 一、〇

加密爾列花浸 右灌腸 一五〇、〇

六三五 阿片丁幾 一、〇

水 右洗腸料 一五〇、〇

六三六 別刺敦那越幾斯 〇、一

加密爾列浸 右洗腸 一二〇、〇

六三七 阿片 塗布劑 二、〇

別拉敦那越幾斯 水銀軟膏 一、〇

六三八 樟腦 右塗布膀胱部 一、〇

阿列布油 安母尼亞水 三〇、〇

六三九 硝酸銀水(三—五%) 右外用 八、〇

六四〇 格魯兒酸加留謨 洗滌劑 〇、五

水 右洗滌、小兒 二〇〇、〇

六四一 石炭酸 右洗滌、小兒 〇、五

六四二 硫酸銅水(三%—五%) 右洗滌、小兒 二〇〇、〇

六四三 硫酸銅水(三%—五%) 右注入 一〇〇、〇

六三三 散劑 炭酸利去謨 一、〇

白糖 右分十包一日三回每回一包 一〇、〇

六三四 單寧酸 挖勿兒氏散 〇、二

白糖 右分五包每三時一包、小兒 一、五

六三五 單寧酸 挖勿兒氏散 〇、三

白糖 右分十包一日三回每回一包 三、〇

六三六 甘草

藥刺巴

一〇、〇

白糖

〇、三

右頓服

六三七 托沕兒氏散

白糖

〇、三

右分十包每二三時一包、小兒

●水劑

六三八 碳酸利去謨

碳酸曹達水

〇、一〇、三

右一日數回分服

六三九 碳酸那篤留謨

重碳酸那篤留謨

五、〇

水

右一日數回分服

一、二〇、〇

六四〇 安息香酸

一、五

重碳酸那篤留謨

碳酸那篤留謨

桂皮水

菲沃斯丁幾

右每二時一食匙

六三三 乳酸

水

右一日三回分服

六三三 醋酸

水

單舍利別

右每二時一食匙

六三三 酒石酸里母奈埤*

右每三時一食匙

六三三 磷酸里母奈埤*

右一日三四二分服

六三五 人工加爾爾斯泉鹽

水

右一日三回分服

六三六 重碳酸那篤留謨

水

右一日三回分服

六三七 抱水格魯拉兒

亞拉比亞護謨漿

右頓服

六三八 油乳劑*

杏仁水

阿片越幾斯

右每二時一小兒匙、小兒

六三九 鹽酸莫兒比涅

杏仁水

右注射皮下

小便失禁 *Enuresia.*

膀胱括約筋痙攣

Spasmus Sphincteris Vesic.

膀胱頸筋麻痺、小便失禁

遺尿 *Enuresis nocturna.*

夜尿失禁、寢小便、又名小便自利、又名小便不禁、又名遺溺

痙攣性遺尿 *Enuresia spastica.*

膀胱結石 小便失禁

三百八十九

●水劑

六三四 機那煎 (一〇、〇)一〇〇、〇

蕃木鼈丁幾 一、五

單舍利別 一五、〇

右一日三回分服

六三四 硫酸アトロヒチ 〇、〇一

水 一〇、〇

右每回五滴乃至十滴

六三四 林檎酸鐵丁幾 一〇、〇

苦味丁幾 一〇、〇

右一日三回每回十滴

六三四 獨答利斯丁幾 二滴

右一日三回糖水調和服用、

年長小兒

六三四 別拉敦那丁幾 各五、〇

菓溶茄丁幾 各五、〇

蕃木鼈丁幾

芳香ロイス丁幾 各二、五

加斯加里刺丁幾 四、〇

右每夕十滴

六三四 沃度鐵舍利別 一、〇一三、〇

水 六〇、〇

右一日三回分服

六三五 沃度鐵舍利別 一三、〇

單舍利別 一〇、〇

右一日數回分服、小兒

六三五 沃度鐵舍利別 各二五、〇

單舍利別 各二五、〇

右一日三回每回一茶匙

六三五 硫酸亞馬魯比涅 〇、〇六

水 三〇、〇

右每夕一回一滴

六三四 蕃木鼈丁幾 一、〇

林檎酸鐵丁幾 二、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

六三五 硝酸斯篤里規尼涅 〇、〇三

水 五〇、〇

橙皮舍利別 五、〇

右每夕一茶匙(五歲小兒)

六三五 貌羅謨加留謨 一、五

水 二〇〇、〇

右一日三回(大人)每回一二

食匙(小兒)每回一小兒匙

六三五 貌魯謨加留謨 三、〇

苦味丁幾 一、五

單舍利別 一〇、〇

水 一〇〇、〇

右一日六回二日分服

六五三 エルゴチン 十五滴—二十滴

水 七〇、〇

橙皮舍利別 一〇、〇

右每二時一茶匙

六五三 抱水格魯刺爾 〇、一—〇、二

水、單舍利別 各一〇、〇

右每夜頓服、小兒

六五三 抱水格魯刺兒 一、〇

水 六〇、〇

貌羅謨加留謨 四、〇

單舍利別 一〇、〇

右每三時一茶匙

六五三 別拉敦那越幾斯 〇、〇五—〇、一

散劑 〇、〇五—〇、一

白糖 二、〇

右分五包每夜一包

六五七 別拉敦那越幾斯 〇、〇五—〇、一

還元鐵 〇、四

白糖 三、〇
右分十包一日三回每回一包

白糖 〇、五
右為一包每夜頓服、小兒

白糖 三、〇
右分十包每夕一包

六三六 別拉敦那越幾斯 〇、〇四

六三六 蕃木鼈越幾斯 〇、〇二一〇、〇五

六三五 硫酸規尼涅 〇、五
加糖炭酸鐵 〇、五

六三五 乳糖 二、〇
右分十包每夕一包

六三五 乳糖鐵 三、〇
右分十包一日二回每回一包

六三七 忽布腺 〇、五
白糖 五、〇
右分十包每朝夕一包

六三五 別拉敦那越幾斯 〇、〇〇五

六三五 蕃木鼈越幾斯 〇、〇二一〇、〇五

六三六 單寧酸、硫酸鐵 各五、〇
右以龍膽越幾斯為五十九一
日三粒

甘草末 適宜

六三六 乳糖鐵 三、〇
右分十包一日三回每回一包

六三六 硝酸斯篤里幾尼涅 〇、〇〇五
水 五、〇
右每回半筒乃至一筒注射皮
下、小兒

六三六 別拉敦那越幾斯 一、〇

六三四 蕃木鼈越幾斯 〇、一

樟腦 〇、四

加糖酸化鐵 五、〇

白糖 三、〇
右分十包一日三回每回一包

六三六 白糖 三、〇
右分十包一日三回每回一包

六三一 別刺敦那葉末、別拉敦那越幾斯 各〇、〇一〇、〇二

六三五 蕃木鼈越幾斯 〇、〇三
加糖炭酸鐵 一、〇

第六編 生殖器諸病

第一節 男子生殖器諸病

淋疾 Gonorrhoea. Urethritis. Blennorrhoea urethrae. Morbi gonorrhoeica. Tripper.

淋、尿道炎、尿道加答兒、傳染性尿管粘膜炎

六三七 水劑
●骨湃波拔爾撒謨 三〇、〇
亞拉比亞護謨 五、〇
柱皮水 適宜

右爲乳劑一八〇、〇 一日三回每回一食匙

六三六 骨湃波拔爾撒謨 四〇、〇
右廿扁桃油、亞拉比亞護謨、單舍利別各適宜爲乳劑三〇〇、〇 一日二茶食至六茶匙

●散劑
六三七 貌魯謨加留謨 五、〇
右分五包每夕一包

六三三 貌魯謨加留謨 五、〇
安知必林 二、五
右分五包每夕一包

六三四 貌魯謨加留謨 二、〇
ルプリン 〇、〇、二
鹽酸莫兒比涅 〇、〇、二

六三五 貌魯謨加留謨 二、〇
ルプリン 〇、〇、五
樟腦 〇、〇、五

鹽酸莫兒比涅 〇、〇、一
甘草末 〇、五
右分二包臨臥前一包

六三六 貌魯謨加留謨 一〇、〇、一、二〇、〇
印度大麻越幾斯 〇、五、一、〇
右分十包臨臥一包

六三七 ルプリン 二、五
樟腦 二、〇、〇
ジキタリン 〇、〇、一
右分十包每夕一包

六三八 葦澄茄末 三〇、〇
右一日四回乃至五回分服

六三九 葦澄茄末 三〇、〇
龍膽越幾斯 二、〇、〇
右一日三回每回一小刀尖

六四〇 甘朮、藥刺巴根末 各〇、三
右頓服

●丸劑
六六一 骨湃波拔爾撒謨膠囊 五十個
右一日三回每回一個至三個

六六二 骨湃波拔爾撒謨、葦澄茄末 各三、〇

右爲三十九一日三回每回三粒

六六三 骨湃波拔爾撒謨 八、〇
葦澄茄末 一五、〇
右蜂蜜適宜爲百二十九初期一日三回後則四回每回十粒

六六四 葦澄茄末 二〇、〇
骨湃波拔爾撒謨 一〇、〇
右炭酸麻爾濕度謨適宜爲大九子三十個一日四個至六個

六六五 葦澄茄末 五、〇、一、〇、〇
酒精製葦澄茄越幾斯 五、〇
右爲五十九一日三回每回三粒

六六六 樟腦 〇、四
葦澄茄末、葦澄茄越幾斯 各六、〇
右爲六十九一日四粒乃至十二粒

六六七 樟腦 二、〇
阿片越幾斯 〇、五
右爲十六丸每夕二三丸

六六八 葦澄茄越幾斯 五、〇

骨湃波拔爾撒謨 各二、五
炭酸麻僱涅叟謨 七、五

寧澄茄末 右爲百九一日三回每回五粒 五、〇

亞拉昆亞護謨末 二、〇
骨湃波拔爾撒謨 四、〇

炭酸麻僱涅叟謨 六、〇
右爲百九一日三回每回十粒 五、〇

亞拉昆亞護謨 二、五
炭酸麻僱涅叟謨 〇、五

丸 右爲十六九一日四回每回二

●滴劑 骨湃波拔爾撒謨 一、五、〇

右一日三回每回十五滴

骨湃波拔爾撒謨 一、二、〇
酸性芳香丁幾 * 四、〇

右一日四回每回五滴乃至二

十滴 骨湃波拔爾撒謨 一、五、〇
芳香丁幾 五、〇

右一日三回每回十五滴乃至二十滴

骨湃波拔爾撒謨 各七、五
苦味丁幾 右一日三回每回十五滴

●注入劑 硫酸銅 〇、〇二一〇、〇三

明礬 〇、五
右注入尿道 二、〇、〇

硫酸銅水(〇、一—〇、二%) 二、〇、〇

右注入尿道 〇、二

硫酸銅 〇、二
明礬 二、〇、〇

水 二、〇、〇
右注入尿道 一、〇〇、〇

硫酸銅水(三%—五%) 一、〇〇、〇

稀硫酸 五滴
右每二日一回注入尿道

硫酸銅水(一%—十%) 一、〇〇、〇

右注入尿道 次硝酸蒼鉛水(〇、一—一%) 二、〇〇、〇

右振蕩注入尿道 次硝酸蒼鉛水(二、五%) 二、〇〇、〇

右振蕩注入尿道 次硝酸蒼鉛水(五、〇%) 二、〇〇、〇

右振蕩注入尿道 次硝酸蒼鉛水(一〇、〇%) 二、〇〇、〇

右注入尿道 明礬水 (〇、五—一、〇) 二、〇〇、〇

右注入尿道 明礬、硫酸亞鉛、石炭酸 各〇、三

右排尿後注入尿道 單寧酸 一、〇

單寧酸 一、〇、五

單寧酸 一、〇、五

右注入尿道

六四七 明礬

〇、五十一、〇

餾水

一〇〇、〇

阿片丁幾

二、〇

右注入尿道

六四八 明礬

一、〇

茴香水

二〇〇、〇

右注入尿道

六四九 單寧酸水

(一、〇—二、〇)二〇〇、〇

右注入尿道

六五〇 單寧酸

〇、五十一、〇

沃度丁幾

一、〇

餾水

一五〇、〇

右一日三回注入尿道

六五一 單寧酸

〇、四十一、〇

赤酒

一〇〇、〇

右一日三回注入尿道

六五二 單寧酸水

(二、〇—四、〇)二〇〇、〇

右注入尿道

六五三 單寧酸

三、〇

備里設林

一〇、〇

水

右一日三回注入尿道

六五四 單寧酸

一五〇、〇

硫酸亞鉛

二、〇

水

一、〇

右一日三回注入尿道

六五五 格魯兒石灰水

二二〇、〇

右注入尿道

六五六 硝酸銀

(〇、一—二〇〇、〇)

過滿俺酸加留膜

〇、〇—一〇、〇

水

〇、〇—三

右注入尿道

六五七 硝酸銀

〇、〇—一〇、〇

水

二〇〇、〇

右注入尿道

六五八 硝酸銀

〇、一—一、〇

水

五〇〇、〇

右注入尿道

六五九 硝酸銀

〇、五—一三、〇

水

五〇、〇

右注入尿道

六六〇 硝酸銀水

(一、〇—五〇〇、〇)

右五〇、〇加微溫湯一五〇、〇

〇—二〇〇、〇注入尿道

六六二 千倍硝酸銀水

五〇、〇

右入黑色瓶一日三回注入尿道

六六三 醋酸鉛

一、〇

水

一〇〇、〇

右一日三回注入尿道

六六四 次醋酸鉛水、明礬

各一、〇

餾水

二〇〇、〇

右注入尿道

六六五 次醋酸鉛水

一、〇

阿片丁幾

一、〇

餾水

一〇〇、〇

右注入尿道

六六六 醋酸鉛

〇、七—一、〇

水

二〇〇、〇

或阿片丁幾

二、〇

右注入尿道

六六七 次醋酸鉛水

一、〇—二、〇

餾水

二〇〇、〇

右注入尿道

六六八 硫酸亞鉛

〇、一

水 一〇〇、〇

右一日三回注入尿道

六四六 硫酸亞鉛 〇、二二

水 一〇〇、〇

右一日三回注入尿道

六四九 醋酸亞鉛 〇、二一〇、三

水 一〇〇、〇

右注入尿道

六四〇 硫酸亞鉛 一、〇一、二、〇

水 一〇〇、〇

右注入尿道

六四三 硫酸亞鉛 〇、五一、一、〇

水 二〇〇、〇

泊美蘭阿片丁幾

水 一、〇

六四三 硫酸亞鉛 〇、二二

醋酸鉛 〇、五

水 一〇〇、〇

右一日三回注入尿道

六四三 硫酸亞鉛 〇、三一、一、〇

醋酸鉛 一、〇

水 二〇〇、〇

右注入尿道

六四四 硫酸亞鉛 〇、五十三、〇

硝酸鉛 〇、五十三、〇

阿仙藥丁幾 二、五

阿片丁幾 一、〇

水 二〇〇、〇

右振盪注入尿道

六四五 硫酸亞鉛 〇、三一〇、六

明礬 〇、三一〇、六

水 二〇〇、〇

右注入尿道

六四六 硫酸亞鉛 〇、四

沃度仿謨 三、〇

水 二〇〇、〇

右振盪每二時注入尿道

六四七 硫酸亞鉛 〇、一〇、一、〇、三

水 一〇〇、〇

右注入尿道

六四八 ズゾヨドル亞鉛 一、〇一、二、〇

阿片丁幾 五、〇

水 二〇〇、〇

右注入尿道

六四九 ズゾヨドル亞鉛 二〇〇、〇

一、五一、二、五

撒里美爾酸蒼鉛 二、〇

水 二〇〇、〇

右注入尿道

六四〇 過滿俺酸加留謨 〇、〇二一、〇、八

水 二〇〇、〇

右注入尿道

六四二 過滿俺酸加留謨 〇、〇三一、〇、一八

水 三〇〇、〇

右注入尿道

六四三 過滿俺酸加留謨 〇、〇五

硫酸亞鉛 〇、〇五

水 二〇〇、〇

右注入尿道

六四三 過滿俺酸加留謨 〇、〇一

水 二〇〇、〇

右一日三回注入尿道

六四四 湯二〇〇、〇 注入 〇、二一〇、五

水 五〇〇、〇

右注入尿道

六四四 過滿俺酸加留謨 〇、二一〇、五

水 五〇〇、〇

右注入尿道

六四四五 撒里矢爾酸水銀 〇、一

六四四六 撒里矢爾酸水銀 二五〇、〇

六四四七 炭酸那篤留謨 一、〇一三、〇

六四四八 撒里矢爾酸水銀 右注入尿道

六四四九 炭酸加留謨 各〇、一、〇一〇、三

六四五〇 昇汞 〇、〇一〇、〇五

六四五一 阿片丁幾 四〇〇、〇

六四五二 右注入尿道 一、〇

六四五三 硼酸水 (六、〇) 二〇〇、〇

六四五四 右注入尿道

六四五五 撒里矢爾酸水 (一、〇一、二、〇) 二〇〇、〇

六四五六 右注入尿道

六四五七 硼酸 二、五

六四五八 撒里矢爾酸那篤留謨 〇、五

六四五九 右注入尿道 一〇〇、〇

六四六〇 阿仙藥丁幾 二、〇一、二〇〇、〇

六四六一 右注入尿道 二〇〇、〇

六四六二 右注入尿道

六四六三 右注入尿道

六四六四 阿仙藥丁幾 二、〇一、二〇〇、〇

六四六五 右注入尿道 二〇〇、〇

六四六六 右注入尿道

六四六七 レゾルチン水 (四、〇一六、〇) 二〇〇、〇

六四六八 右注入尿道

六四六九 鞣液茄末 二五、〇一五〇、〇

六四七〇 熱水 五〇〇、〇

六四七一 右浸出濾過注入尿道

六四七二 骨湃波拔爾撒謨 二、〇

六四七三 炭酸那篤留謨 一、〇

六四七四 阿片丁幾 二〇〇、〇

六四七五 右注入尿道 一、〇

六四七六 硫酸規尼涅 一、〇

六四七七 右注入尿道

六四七八 僱里設林 七五、〇

六四七九 右注入尿道 二五、〇

六四八〇 沃度仿謨、僱里設林(十%) 一〇〇、〇

六四八一 右注入尿道

六四八二 硫酸カドミウム 〇、三一〇、四

六四八三 右注入尿道 二〇〇、〇

六四八四 水 右注入尿道

六四八五 水 右注入尿道

六四八六 石灰水 四〇、〇

六四八七 鉛水 一六〇、〇

六四八八 或ハイヒチナル水*

六四八九 右注入尿道 一〇〇、〇

六四九〇 沃度酸水(〇、〇五—〇、一%) 右注入尿道

六四九一 右注入尿道

六四九二 ロレチン酸那篤留謨水 (四、〇) 二〇〇、〇

六四九三 右注入尿道

六四九四 オイルフエン 一、〇一五、〇

六四九五 阿列布油 一〇、〇

六四九六 亞拉昆亞謨末 五、〇

六四九七 僱里設林 二〇〇、〇

六四九八 右為乳劑注入尿道

六四九九 フェルリピリン水 (二、〇一三、〇) 二〇〇、〇

六五〇〇 右注入尿道

六五〇一 安知必林 二、〇

六五〇二 昇汞 〇、〇二

六五〇三 右注入尿道 二〇〇、〇

六五〇四 水 右注入尿道

六五〇五 水 右注入尿道

六四四 撒魯兒

餾水

一〇〇、〇
二五〇、〇

亞拉昆亞護謨漿

五、〇

右注入尿道

六四五

アイロール

二、〇
五、〇

餾水

僱里設林

一五、〇

右注入尿道

六四六

アルゴニン

四、〇
一四、〇

水

二〇〇、〇

右注入尿道

六四七

イトロール

〇、〇
二五〇、〇

水

二〇〇、〇

右注入尿道

六四八

アルムノール水

(二、〇)二〇〇、〇

右注入尿道

六四九

ガロプロモール

二、〇
一四、〇

水

二〇〇、〇

右注入尿道

六五〇

タルリン水

(二、〇)二〇〇、〇

右注入尿道

六五一

硫酸タルリン水

(三、〇一八、〇)二〇〇、〇
右注入尿道

六五二

レゾルチン水

(六、〇一〇、〇)二〇〇、〇

右注入尿道

六五三

クレオリン水

(〇、六)二〇〇、〇

右注入尿道

六五四

クレチリン水

(〇、二一一、〇)一五〇、〇

右注入尿道

六五五

アルゲタミン

〇、二
一〇、四

右注入尿道

六五七

●坐藥

〇、二
二〇〇、〇

右注入尿道

六五八

鹽酸莫兒比涅

〇、〇
五

●坐藥

六五九

柯柯阿脂

五、〇

右爲坐藥一個

六六〇

單寧酸

一、〇

右以白膠爲坐藥五個插入尿道

六六一

單寧酸

五、〇

右以白膠爲坐藥二個插入尿道

六六二

柯柯阿脂

六、〇

右以白膠爲坐藥二個插入尿道

右爲尿道坐藥六個

六五九 單寧酸

五、〇

阿片末

〇、三

右以僱里設林爲桿十個送入尿道

六六〇 單寧酸、阿片丁幾

各三、五

骨湃波拔爾撒謨

一、五

亞拉昆亞護謨末

一、五

右爲長錠子十二個一日二個插入尿道

六六一 骨湃波拔爾撒謨

五、〇

柯柯阿脂

五、〇

黃蠟

一、〇

阿片越幾斯

〇、〇
二

右爲坐藥六個朝夕一個插入尿道

六六二 硫酸亞鉛

〇、一

柯柯阿脂

一、〇

右爲尿道坐藥

六六三 硫酸亞鉛

四、〇

右以白膠爲坐藥二個插入尿道

六六四 硝酸銀

〇、五

右以白膠爲坐藥十筒插入尿道

六四八 硝酸銀

柯柯阿脂

右爲尿道坐藥五個

六四六 次硝酸蒼鉛

柯柯阿脂

右爲桿插入尿道

六四七 沃度仿謨

右以白膠爲坐藥五個插入尿道

六四八 明礬

柯柯阿脂

右爲坐藥五個一日一個送入尿道

六四九 菲沃斯越幾斯

柯柯阿脂

右爲坐藥六個一日一二個

六四九 莫若越幾斯

柯柯阿脂

右爲坐藥三個

● 塗布劑

六四九 水銀軟膏

莫若越幾斯

右一日三回塗布尿道

六四九 硝酸銀

刺乃林

右每二三日用消息子塗布尿道

六四九 硝酸銀

刺乃林

阿列布油

右塗布尿道

六四九 硝酸銀

餽水

竹淇波拔爾撒謨

華攝林

流勁巴刺賓

右塗布尿道

六四九 赤降求

華攝林

右塗布尿道

六四九 沃度

沃度加留謨

單軟膏

右一日三回塗布尿道

● 浣腸劑

六四七 骨淇波拔爾撒謨

卵黃

餽水

阿片越幾斯

右爲乳劑灌腸

六四九 華澄茄末

亞麻仁煎*

右灌腸

六四九 樟腦

卵黃

餽水

阿片越幾斯

右爲乳劑灌腸

● 洗滌劑

六五〇 石炭酸、硫酸亞鉛

餽水

右洗滌

六五一 石炭酸

餽水

右微溫洗滌

六五二 鹽酸古加溫水(二%—三%)

右一日三回塗布尿道

一、〇

〇、二一〇、四

二〇〇、〇

〇、二五—〇、三

二〇〇、〇

五、〇

〇、五

六滴

一、〇

四〇〇、〇

五、〇

〇〇、〇

一〇〇、〇

〇〇、〇

〇〇、〇

〇〇、〇

一〇〇、〇

〇〇、〇

〇〇、〇

〇〇、〇

三〇〇、〇

三〇〇、〇

三〇〇、〇

二〇〇、〇

一個

二〇〇、〇

二〇〇、〇

〇〇、〇

二五、〇

三〇〇、〇

〇、五

一個

二〇〇、〇

〇〇、〇

〇〇、〇

〇〇、〇

各一、〇

五〇〇、〇

五〇〇、〇

二、〇

四五〇〇、〇

〇〇、〇

〇〇、〇

〇〇、〇

〇〇、〇

〇〇、〇

六五〇三 右每回一筒注射皮下

骨湃波拔爾撒謨

五〇、〇
二五、〇

薄荷油

右爲煉藥一日三回每回一茶匙

六五〇四 プロー氏液 *

右器法

三〇〇、〇

副睪丸炎

Epididymitis.

睪丸炎 Orchitis.

睪丸炎等

●塗布劑

六五〇五 沃度丁幾、五倍子丁幾各五、〇

右塗布

沃度丁幾

七、〇—一五、〇

六五〇六 プロー氏液 *

右器法

三〇〇、〇

六五〇六 沃度加留謨

純沃度

六五〇一 沃度化鉛

單軟膏

二、〇

六五〇七 石炭酸

蒸餾水

三、〇

單軟膏

〇、一

六五〇二 水銀軟膏

右塗布

一〇、〇

六五〇八 次醋酸鉛水

右器法

五、〇

六五〇七 沃度仿謨

單軟膏

一〇、〇

六五〇三 醋酸鉛

單軟膏

二、〇

六五〇九 鹽酸莫兒比涅

右爲坐藥

〇、〇—二

六五〇八 沃度仿謨

華攝林

〇、五

六五〇四 別刺敦那越幾斯

右塗布

二、〇

六五〇〇 鹽酸莫兒比涅

乳糖

〇、〇—三

六五〇九 沃度仿謨

華攝林

一、〇

六五〇五 別刺敦那越幾斯

單軟膏

五、〇

六五〇二 沃度加留謨

水

二、〇

六五〇〇 個里設林

右塗布陰囊

三〇、〇

●番法劑

右塗布陰囊

三〇、〇

苦味丁幾

四、〇

右每二時一食匙

六五三 水蛭

數條

右鼠蹊部貼用

淋性副睪丸炎

Epididymitis gonorrhoeica.

●塗布劑

六五三 格魯胃謨

二〇、〇

水銀軟膏

二〇、〇

六五九 沃度仿謨

沃度仿謨

三、〇

右塗布

六五四 醋酸鉛軟膏*

一五、〇

六五七 沃度仿謨

一、〇

六五三 沃度丁幾

沃度丁幾

一〇、〇

●坐藥

六五五 單軟膏

二〇、〇

彈力格魯胃謨

一、二、〇

六五三 沒食子丁幾

沒食子丁幾

一〇、〇

●坐藥

六五五 阿片越幾斯

三〇、〇

六五八 沃度仿謨

一、〇

六五三 沃度仿謨

沃度仿謨

五、〇

●坐藥

六五五 單軟膏

二〇、〇

百露拔爾撒謨

二、〇

六五三 粘著硬膏*

粘著硬膏

二〇、〇

●坐藥

六五五 單軟膏

二〇、〇

刺納林

八、〇

六五三 單鉛硬膏

單鉛硬膏

二〇、〇

攝護腺炎

Prostatitis.

Prostatitis gonorrhoeica.

●注射劑

六五三 鹽酸莫兒比涅

〇、一

右為坐藥插入直腸

〇、〇三

六五三 鹽酸莫兒比涅

鹽酸莫兒比涅

〇、〇五

●坐藥

六五三 蒸餾水

五、〇

右為坐藥插入直腸

二、〇

六五三 或莫若越幾斯

或莫若越幾斯

〇、〇五

●坐藥

六五三 鹽酸莫兒比涅

〇、〇一

六五五 別刺敦越幾斯

〇、〇三

六五三 柯柯阿脂

柯柯阿脂

一、五

●坐藥

六五三 柯柯阿脂

二、〇

右為坐藥插入直腸

二、〇

六五三 沃度

沃度

〇、五

二、〇

莫若越幾斯

〇、一五

貌囉謨加留謨

二、五

貌囉謨加留謨

二、五、一三、〇

柯柯阿脂

一五、〇

柯柯阿脂

一五、〇

莫若越幾斯

〇、三

右爲坐藥十個朝夕一個插入

右爲坐藥十個一日一個插入

二〇〇、〇

肝門

二、五

肝門

三、〇

右二〇、〇和五〇、〇乃至一〇〇、〇之微溫湯灌腸

六五六 沃度加留謨

二、五

六五元 沃度加留謨

三、〇

攝護腺肥大

Hypertrophia prostatae.

六五四 人工加兒爾斯泉鹽

一五、〇

六五二 沃度加留謨

二、〇

六五三 麥角越幾斯

一、〇

右早晨頓服、初期

水

二〇〇、〇

侷里設林、蒸餾水

各五、〇

六五一 蓖麻子油

一五、〇

單舍利別

一五、〇

右每回一筒每日注射皮下

右頓服

右每二時一食匙

龜頭炎 *Balanitis.*

龜頭包皮炎 *Balanoposthitis.*

●洗滌劑

蒸餾水

六〇、〇

水

一五〇、〇

六五四 格魯兒酸加留謨

二、〇一〇〇、〇

六五七 石炭酸水(1%)

二〇〇、〇

●塗布劑

六五〇 沃度侷利設林(5、0%)

水

二〇〇、〇

六五八 硫酸亞鉛、明礬、石炭酸

各一、〇

六五二 右塗布

右洗滌及罨法

右洗滌及罨法

各一、〇

六五五 石炭酸

〇、五

六五五 鉛糖水(1-2%)

二〇〇、〇

六五九 過滿俺酸加留謨

〇、四

右洗滌及罨法

水

二〇〇、〇

六五三 昇末格魯兒酸

一、〇(%)

六五四 石炭酸

一、〇

右洗滌

二〇〇、〇

六五五 侷里設林

四〇、〇

鉛糖水

三、〇

六五三 昇末格魯兒酸

〇、四

六五五三 右塗布 一〇、〇
 トリアセチールクロリッド 〇、三
 沃度 〇、二五
 沃度加留設 〇、二
 偏里設林 一五、〇—三〇、〇
 右塗布 〇、一

六五五七 右撒布 一、〇
 撒里矢爾酸 五〇、〇
 雲母粉 〇、〇
 右撒布 各三〇、〇
 單寧酸、小麥粉 五、〇
 右撒布 〇、二
 沃度仿膜 一滴
 石炭酸 〇、二
 薄荷油 一滴

六五六一 撒里矢爾酸 各三、〇
 亞拉昆亞護膜末 八、〇
 枯礬 八、〇
 右撒布 八、〇
 レゾルチン 一、〇
 乳糖 一、〇
 右一日一回撒布 〇、二
 亞碲酸、鹽酸莫兒比涅各 〇、二
 甘末 一〇、〇
 亞拉昆亞護膜末 一〇、〇
 右一日一回撒布 〇、五—一、〇
 クレナリン 二〇〇、〇
 水 二〇〇、〇
 右注入包皮間

六五五〇 硝酸銀 〇、一
 蒸餾水 適宜
 亞鉛華軟膏 一五、〇
 右塗布 〇、〇
 撒布劑 五〇、〇
 小麥粉 六五五〇 薩昆那末 一〇、〇

六五五九 右撒布 各二〇、〇
 薩昆那末、枯礬 一、〇
 硫酸銅 〇、〇
 右一日二回撒布 一〇、〇

六五五三 失精、夢精、夢遺失精、夢洩精、精液漏、精漏、滑精、
 Pollutio. P. nimiae. P. nocturna. 強中病
 男子淫欲亢進 Scurviusis. 強中病
 遺精 失精、夢精、夢遺失精、夢洩精、精液漏、精漏、滑精、

處置 戒手淫、正品行、節飲食、減晚餐、若夫已病者、避鄰聲與淫靡、就田舍與山地、乳療法、冷水浴、強壯劑、電氣等
 散劑
 六五五四 貌魯護加留設 一〇、〇
 右分十包一日三回每回一包 六五五六 貌魯護那篤留設 四、〇
 六五五五 貌魯護加留設 二〇、〇
 右分二包朝夕一包 六五五七 貌魯護化樟腦 〇、一—〇、三
 白糖 〇、五
 右分十包一日三回每回一包 六五五八 ルプリン 〇、三

六五五四 貌魯護加留設 一〇、〇
 右分十包一日三回每回一包 六五五六 貌魯護那篤留設 四、〇
 六五五五 貌魯護加留設 二〇、〇
 右分二包朝夕一包 六五五七 貌魯護化樟腦 〇、一—〇、三
 白糖 〇、五
 右分十包一日三回每回一包 六五五八 ルプリン 〇、三

樟腦 〇、〇一
白糖 〇、五
右每夜頓服
六五九 忽布腺(ルプリン) 〇、六
樟腦 〇、一
白糖 三、〇
右分八包一日二包臨床一包
六五七〇 ルプリン 一、〇
樟腦 〇、一
白糖 二、〇
右分十包朝夕一包
六五七一 ルプリン、樟腦 各二、五
デキタリン 〇、〇一
右分十包每夕一包
六五七二 ルプリン 〇、五
樟腦 〇、一
蕃木龍越幾斯 〇、〇五
右分五包一日二回每回一包
六五七三 ルプリン、加糖炭酸鐵 各六、〇
白糖 各六、〇
右一日三回每回一小刀尖
六五七四 麥角末 一、〇
白糖 五、〇

右分十包一日三包乃至五包
六五七五 硫酸規尼涅、加糖炭酸鐵 各一、〇
白糖 各一、〇
右分十包一日三回每回一包
六五七六 單寧酸規尼涅 五、〇
炭酸麻備運叟謨 〇、五
炭酸鐵 五、〇
白糖 三、〇
桂皮油 五滴
右一日三回每回一小刀尖
六五七七 ●水劑
硫酸亞篤魯比涅水(〇、一%) 一〇、〇
右每晚一滴
六五七八 亞砒酸加留謨液 五滴十滴
右臨臥頓服
六五七九 抱水格魯刺爾 一、〇
單舍利別 各一五、〇
亞拉比亞護謨漿 各一五、〇
右臨臥頓服
六五八〇 貌羅謨加留謨 八、〇
水 一八〇、〇
單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙
六五八二 ルプリン 麥芽越幾斯(二%) 一〇〇、〇
右一日三回每回一食匙
六五八三 琥珀 一、〇
依的兒精 五〇、〇
右浸漬八日間濾過一日三回
每回十滴至二十滴
六五八四 ●丸劑
硝酸ストリキニチ 〇、〇二
右以甘草蒸爲十九每食後一
粒 〇、三
六五八五 貌魯謨化樟腦 〇、三
右爲丸一日三回分服
六五八六 樟腦 〇、五
葛澄茄末
酒精蘆澄茄越幾斯 各七、五
右爲六十九一日四粒乃至十
二粒
六五八七 枸橼酸コルヒチン 〇、〇六
右爲二十九一日二回每回一
粒
六五八八 格魯兒鐵安母紐謨 二、〇

硫酸規尼涅 二、五
蘆薈越幾斯 一、五

右甘草羔適宜爲六十丸一日
三回每回四粒乃至六粒

精漏 Spermatorrhoea.

六五八 蕃木甃越幾斯 五、〇
甘草羔 七、五

六五九 麥角越幾斯 〇、四
右爲八九一日四回每回二丸

水 一八〇、〇
單舍利別 一五、〇

右爲百丸初時一日一丸漸次
增量終爲一丸至五丸

六五九〇 貌羅謨加留謨 六、〇
分服

右一日三回二日分服

陰痿 Impotentia.

男性陰萎症、陽痿、腎虛、萎瘁、陽精無力、媾合不能、勃起欠乏

處置 カテーテル插入、冷水洗通等、又恩田重信所著之新藥主治精塞陰萎之部所載之諸機械應用

六五九一 貌魯謨化樟腦 〇、三
乳糖 一、〇

六五九二 單寧酸 〇、五
柯柯阿脂 適宜

六五九三 亞爾答亞根末 五、二
右爲百丸一日三粒

●散劑
右分三包一日三回每回一包

六五九四 單寧酸 五、〇
柯柯阿酪 適宜

六五九五 亞拉昆亞護謨 〇、〇六
嬌 〇、〇六

六五九二 貌魯謨加留謨 六、〇
龍膽丁幾 二、〇

六五九六 嬌酸亞鉛 〇、六
右爲坐藥十個插入尿道

六五九七 硝酸銀水(5%) 一、三
右爲百丸一日三回每回一粒

●水劑
右一日六回二日分服

六五九八 蕃木甃越幾斯 二、〇
泥苜根越幾斯 適宜

●坐劑

包莖 Phimosiis.

六五九九 蕃木甃越幾斯 二、〇
泥苜根越幾斯 適宜

六五九九 硝酸銀水(5%) 一、三
右爲百丸一日三回每回一粒

箝頓包莖 Paraphimosis.

●注入劑

六九丸 格魯兒酸加留謨

水 二〇〇、〇

右注入包皮囊中

六九丸 石炭酸 鉛糖水 二〇〇、〇

水

右注入包皮囊中

六〇三 格魯兒石灰 二、〇

●洗滌劑

六〇〇 醋酸鉛 五、〇

水 二〇〇、〇

右洗滌

六〇一 過滿俺酸加留謨

水 一、〇

右洗滌

六〇三 格魯兒石灰 二、〇

水 二〇〇、〇

●右洗滌

塗布劑

石炭酸

阿列布油

右塗布

一、〇

四〇〇、〇

翠丸莢膜水腫 Hydrocele processus vaginalis.

六〇四 沃度丁幾、酒精 各二〇、〇

右塗布

六〇五 沃度丁幾、沒食子丁幾一〇、〇

右塗布

六〇六 沃度

沃度加留謨

備里設林

右塗布

六〇七 實斐答利斯軟膏

沃度加留謨

右爲軟膏塗布

一〇〇、〇

一、五

第一二節 兩性生殖器諸病

軟下疳 Ulcus venereum, Ulcus molle.

橫痃 Bubones. 擬梅毒性潰瘍、軟性梅毒潰瘍、軟疳瘡、類下疳等、

●散布劑

六〇八 甘汞

五、〇

六〇九 甘汞、澱粉

各五、〇

六〇〇 赤降汞

一、〇

右散布、頑性潰瘍

右散布

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------|-----|----------------|-----|-----|----------------|------|-----|------------------|-----|-----|-------------------|-------|---------------------|---------------|-----|
| 六二七 | 沃度仿謨 或次硝着鉛 | 五、〇 | 六二五 | 沃度仿謨 白陶土 | 二、〇 | 六二四 | 沃度仿謨、澱粉 右撒布 | 各五、〇 | 六二二 | 沃度仿謨末 右撒布潰瘍面 | 五、〇 | 六二一 | 沃度仿謨末 右撒布潰瘍面 | 五、〇 | 白糖 右撒布 | 一五、〇 | |
| 六二六 | 沃度仿謨 結晶石炭酸 薄荷油 | 四、〇 | 六二三 | 沃度仿謨 阿列布油 | 三、〇 | 六二〇 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 五、〇 | 六一九 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 二、〇 | 六一八 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 二、〇 | 硼酸末 クレオリン 右撒布 | 一、〇 | |
| 六二五 | 沃度仿謨 薄荷油 | 三、〇 | 六二四 | 沃度仿謨、澱粉 右撒布 | 適宜 | 六一九 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六一八 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六一七 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 六二〇 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 三、〇 |
| 六二四 | 沃度仿謨、澱粉 右撒布 | 各五、〇 | 六一八 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六一七 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六一六 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 六一五 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 五、〇 | 六一四 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六二三 | 沃度仿謨 クマリン | 〇、〇二 | 六一七 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六一六 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六一五 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 六一四 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 六一三 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六二二 | 沃度仿謨 右一日三回撒布 | 〇、〇二 | 六一六 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六一五 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六一四 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 六一三 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 六一二 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六二一 | 沃度仿謨末 右撒布潰瘍面 | 五、〇 | 六一五 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六一四 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六一三 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 六一二 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 六一一 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六二〇 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 二、〇 | 六一四 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六一三 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六一二 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 六一一 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 六一〇 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六一九 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 三、〇 | 六一三 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六一二 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六一一 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 六一〇 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 六〇九 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六一八 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 二、〇 | 六一二 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六一一 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六〇八 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 六〇七 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 六〇六 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六一七 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 三、〇 | 六一一 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六〇九 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六〇八 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 六〇七 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 六〇六 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六一六 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 二、〇 | 六〇九 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六〇八 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六〇七 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 六〇六 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 六〇五 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六一五 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 一、〇 | 六〇八 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六〇七 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六〇六 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 六〇五 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 六〇四 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六一四 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 〇、二 | 六〇七 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六〇六 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六〇五 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 六〇四 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 六〇三 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六一三 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 一、〇 | 六〇六 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六〇五 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六〇四 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 六〇三 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 六〇二 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六一二 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 二、〇 | 六〇五 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六〇四 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六〇三 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 六〇二 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 六〇一 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六一一 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 三、〇 | 六〇四 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六〇三 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六〇二 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 六〇一 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 六〇〇 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六〇九 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 二、〇 | 六〇三 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六〇二 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 六〇一 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 六〇〇 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 五九九 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六〇八 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 一、〇 | 六〇二 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 六〇一 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 五九九 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 五九八 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 五九七 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六〇七 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 〇、二 | 六〇一 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 五九九 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 五九八 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 五九七 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 五九六 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六〇六 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 一、〇 | 五九九 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 五九八 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 五九七 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 五九六 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 五九五 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六〇五 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 二、〇 | 五九八 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 五九七 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 五九六 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 五九五 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 五九四 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六〇四 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 三、〇 | 五九七 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 五九六 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 五九五 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 五九四 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 五九三 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六〇三 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 二、〇 | 五九六 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 五九四 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 五九三 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 五九二 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 五九一 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六〇二 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 一、〇 | 五九五 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 五九二 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 五九〇 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 五八九 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 五八八 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六〇一 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 〇、二 | 五九四 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 五八九 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 五八八 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 五八七 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 五八六 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |
| 六〇〇 | 沃度兒 右撒布潰瘍面 | 一、〇 | 五九三 | 沃度兒 白糖 | 一、〇 | 五八八 | 沃度兒 白糖 | 五、〇 | 五八七 | 沃度仿謨格魯胃謨 右外塗布 | 五、〇 | 五八六 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 右塗布 | 各一五、〇 | 五八五 | 沃度仿謨 右塗布 | 五、〇 |

鉛硬膏 二〇、〇
越列密軟膏 適宜
右為硬膏貼用

六六四 硝酸銀 一、〇一五、〇
右塗布 一〇、〇

六六五 硝酸銀 一、〇一四、〇
單軟膏 一〇、〇
右塗布

六六六 硝酸銀 一、〇
華攝林 一〇、〇
右塗布

六六七 水銀軟膏 八、〇一、二、〇
石鹼硬膏 二、〇一三、〇
右塗布

六六八 黃色沃度末 〇、一〇、三
刺納林 一〇、〇
右塗布

六六九 赤降末 〇、二
華設林 二〇、〇
右塗布

六七〇 赤色沃度末、醋酸鉛 各〇、五
樟腦 〇、〇五

華攝林或刺納林 九、〇
右塗布

六七二 沃度兒 一、〇
酒精 一六、〇
右塗布 三四、〇

六七三 硫酸銅 〇、二〇、五
華攝林或刺納林 二〇、〇
右塗布

六七四 格魯兒石灰水(三十二%) 一〇、〇
右塗布

六七五 格魯兒亞鉛水(五十五%) 一〇〇、〇
右塗布

六七六 硝酸亞酸化水銀 一、〇
脂肪 五〇、〇一六〇、〇
右塗布不潔剖面

六七七 炭酸鉛軟膏、單鉛硬膏各五、〇
沃度兒 二、五
右塗布

六七八 石炭酸 一、〇
阿列布油 一〇、〇

白堂 適宜
右塗布

●濕布劑 五、〇
硫酸銅 一五、〇
右塗布

六八〇 硫酸亞鉛水(一%) 二〇〇、〇
右濕布繃帶用

六八一 過滿俺酸加留謨 二、一、〇
右濕布繃帶用

六八二 石洗滌及濕布用 二〇〇、〇
石炭酸水(二%)

六八三 右濕布繃帶用 二〇〇、〇
一次醋酸鉛水

六八四 右濕布繃帶用 三〇〇、〇
右濕法

六八五 醋酸禁土水 一五、〇
右塗布

六八六 格魯亞鉛水(十%) 八五、〇
右濕布繃帶用

六八七 沃度加留謨 一〇、〇
沃度 二、〇

六八八 沃度加留謨 二、〇
沃度 〇、二

水 一〇〇、〇

右繻帶用

六五五 苛性加里 〇、二

六五七 右濕布繻帶用 二〇、〇

六五七 アンチノシン 二、〇

六五七 餾水或稀酒精 一〇〇、〇

六五五 知母爾 〇、五

酒精 五、〇

六五五 偏里設林 一〇〇、〇

水 五〇〇、〇

右濕布包用

六五九 沃度仿謨 一〇〇、〇

六五九 柯柯阿酪 二〇〇、〇

●坐劑

六五九 沃度仿謨 一〇〇、〇

六五九 柯柯阿酪 二〇〇、〇

無痛便毒 *Bubones indolenta seu syphilitica.*

急性便毒 *Bubo acutus B. virulenta, A. lenitis inguinalis.*

橫痃、軟性橫痃、鼠蹊水脈腺化膿性炎

●塗布劑 二〇、〇

六六〇 沃度丁幾 二〇、〇

右塗布

右爲坐藥十個插入瘻管 三、〇

六六〇 沃度仿謨 〇、一

六六〇 篤刺侃篤護謨 右以偏里設林爲桿插入瘻管 一二、〇

六六二 沃度仿謨 一、〇

六六二 篤刺侃篤護謨 十六滴

六六二 偏里設林 十滴

右爲桿插入瘻管

●糕劑 各三、〇

六六三 白礬土、阿列布油 二、〇

六六三 次醋酸鉛液 一、〇

六六三 沃度仿謨 一、〇

六六三 右爲糕外用 六、〇

六六三 苛性加里 六、〇

六六三 苛性石灰 六、〇

右以酒精爲糕、腐蝕用

●注射劑

六六四 千五百倍硝酸銀水 右注射潰瘍周圍之皮下 一五、〇

六六五 アイロール 偏里設林 一〇〇、〇

六六五 右一日一回注入

●腐蝕劑

六六六 硝酸銀 若干

六六六 右爲挺子腐蝕潰瘍面

六六七 格魯兒化亞鉛水(二、五%) 一〇、〇

六六八 右以毛筆腐蝕潰瘍面 一〇、〇

六六八 硫酸銅水(十%) 一〇、〇

六六八 右腐蝕

六七一 沃度丁幾 一〇、〇

六七一 莫若丁幾 一〇、〇

右塗布

六六七 沃度仿謨

右魯胃謨

一、〇
一〇、〇

右塗布

六七三 沃度仿謨

依的兒

一、〇
一〇、〇

右塗布

六七四 格魯兒亞鉛水(一五%)

二〇、〇

右塗布

六七五 硫酸銅水(二%)

右塗布

五〇、〇

六七六 沃度加留謨

沃度

一、〇
〇、一

偈里設林

二〇、〇

右塗布

六七七 沃度鉛

鉛軟膏*

五〇、〇

エレミー軟膏*

右塗布

適宜

●墨法劑

ゴーラルド氏水

二〇〇、〇

右墨法

六七八 鉛醋

水

五、〇
二〇〇、〇

右墨法

六八〇 明礬

次醋酸鉛液

五、〇
二五、〇
五〇〇、〇

水

右墨法

●撒布劑

沃度仿謨

一〇、〇

右撒布

六八二 土瀝菁

硫酸石灰

一、五
五、〇

右撒布

●注射劑

六八三 硝酸銀水(一一二%)

右注射皮下

一〇、〇

六八四 安息香酸水銀

格魯兒那篤留謨〇、三一〇、五

一〇〇、〇

右每回半筒注射二三處腺內

六八五 過滿俺酸加留謨水

(一、〇)五〇〇、〇

右洗滌

六八六 沃度仿謨

柯柯阿脂

一〇、〇
二〇、〇

扁桃油

適宜

右爲小桿子十個插入瘻管

六八七 熔製硝酸銀

右腐蝕用

一〇、〇

梅毒 Syphilis, Lues.

梅毒、花柳病、愛嫉病、フランス病、微瘡、舊譯作楊梅毒、俗名髒病、宋元以後、始有此病、素問本草、金匱等、雖載陰瘡陰蝕瘡之名、攷其症候、皆非此病

硬性下疳

Ulcus durum, Sclerosis initialis. 疳瘡、下疳、陰疳、耻瘡、梅毒性疳瘡、眞疳瘡

●丸劑

六六六

昇汞

〇、一

右爲百九一日三回每回一二

六六九

昇汞

〇、五

右爲五十九一日一九至三九

六六九

昇汞

〇、三五

右以伽里設林爲百二十九一

白陶土

一一、〇

日三回每回一粒至三粒

六六九

昇汞

〇、七五

白蒸餅母

一、〇

白糖

六、〇

右爲二百四十九第一日四粒

後每二日增加二粒

六六九

昇汞

〇、六

右甘草末及甘草蒸適宜爲百

丸朝夕一粒至二粒

六六九

昇汞

〇、三

阿片越幾斯

昇汞

〇、二

右爲二十九一日二粒每四日

六六九

昇汞

〇、〇七

六六九

昇汞

〇、二

增加一粒

阿片越幾斯

〇、四

瘰癧木越幾斯

〇、八

右爲二十九一日一粒至三粒

六六九

石炭酸水銀

一、二

右爲六十九一日二粒至四粒

六六九

單寧酸水銀

四、〇

右甘草末甘草蒸適宜爲六十

六六九

撒里矢爾酸水銀

〇、五

右甘草末及甘草蒸適宜爲二

十五九一日二粒至四粒

六六九

撒里矢爾酸水銀

〇、三五

右括矢亞越幾斯及末適宜爲

二十五九一日二回每回二粒

六六九

醋酸チモール水銀

一、〇

阿片越幾斯

右甘草末及越幾斯適宜爲三

十九九一日三回每回一粒

六六九

沃度末

〇、四

鐵粉

白糖

甘草末

〇、七

右爲百九一日三粒乃至六粒

六六九

黃色沃度末

〇、八

刺苦去葛留謨

一、〇

右甘草末及越幾斯適宜爲三

六六九

刺苦去葛留謨

三、〇

黃色沃度末

三、〇

刺苦去葛留謨

三、〇

阿片越幾斯

一、〇

矢鳩答越幾斯

六、〇

右爲六十九最初每夕一粒後

每朝夕各二粒

六六九

黃色沃度末

〇、五

阿片末

〇、三

右甘草末及甘草蒸適宜爲三

十九九一日三回每回一粒

六六九

赤色沃度末

〇、五

阿片末

〇、五

右菖蒲根末及越幾斯適宜爲

二十五九一日二粒乃至四粒

六六九

黃色沃度末

五、〇

阿片越幾斯

二、〇

甘草末 五、〇

右以蜂蜜為百丸朝夕一粒

六七〇 赤色沃度末 〇、一

沃度加留謨 五、〇

亞拉昆亞護謨末 〇、五

右蜂蜜為二十九每朝二丸

六七七 加糖沃度鐵 五、〇一八、〇

右泥蒿根末及越幾斯適宜為

五十九一日三回每回一粒

六七八 甘草 一、〇

右甘草末及甘草蒸適宜為六

十九每食後一二粒

六七九 白蒸餅母 二、〇

右為七十九一日三回每回一

粒

七八〇 甘草 二、五

瘰癧木脂 五、〇

阿片末 〇、二五

亞拉昆亞護謨 適宜

右為五十九一日二粒至三粒

七八一 甘草 一、五

阿片末 〇、三

右甘草末及甘草蒸適宜為三

十九朝夕一粒 五、〇

七八二 沃度加留謨 五、〇

右泥蒿根末及越幾斯適宜為

五十九一日五粒至十粒

七八三 沃度加留謨 五、〇

真碧越幾斯 〇、二五

留里設林軟膏 四、〇

右以亞爾答亞根末為五十九

一日五回每回一粒

七八四 沃度里去謨 一、五

右泥蒿根末及越幾斯適宜為

五十九一日三回每回二粒

七八五 水銀 五、〇

刺乃林 五、〇

阿片末 〇、五

甘草末 七、〇

右為百九一日二粒乃至三粒

沃度仿謨 一、五

右龍膽越幾斯及末適宜為三

十九一日三回每回一粒

七八七 瘰癧木脂 五、〇

大黃末 五、〇

石鹼末 五、〇

右以酒精為百九一日三回每

回五粒至十粒

七八八 烏頭越幾斯 〇、五

右甘草根末及甘草蒸適宜為

五十九朝夕一粒

●注射劑

七八九 昇汞 〇、二

水 一、〇、〇

右一日半筒至一筒注射皮下

八九〇 昇汞 〇、一

溜水 一、〇、〇

格魯兒那篤留謨 二、五

鹽酸莫兒比涅 〇、〇、五

右注射皮下

八九一 昇汞 〇、一

格魯兒那篤留謨 〇、三十一、〇

溜水 一、〇、〇

右每回半筒至一筒注射皮下

八九二 昇汞 〇、一

鹽酸莫兒比涅 〇、〇、一

溜水 九、〇、〇

右每朝二筒注射皮下

六七三 昇汞

餽水

尿素

右一日一筒注射皮下

六七四

撒里矢爾酸水銀

亞拉昆亞護謨漿

餽水

右每一日乃至四日一筒注射

六七五

撒里矢爾酸汞、炭酸加留謨

無筋間

右每四日乃至六日一回注入

皮下

六七六

撒里矢爾酸水銀

流動巴刺資

六七七

安息香酸水銀

華攝林

流動巴刺資

六七八

安息香酸水銀

餽水

一、〇〇、〇〇、五

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

格魯兒那篤留謨

鹽酸古加乙滷

六七九

右每一日一筒注射皮下

ゾゾヨドル水銀

沃度加留謨

餽水

右一日一回注射皮下

七八〇

臟化水銀

餽水

七八一

右每一筒注射皮下

重臟化水銀

備里設林

七八二

右每一筒注射皮下

フオルムアミド末液(一%)

卵蛋白

右每三日一回一筒注射皮下

餽水

七八三

昇汞、格魯兒安母紐謨

格魯兒那篤留謨

右每回半筒至一筒注射皮下

〇、二五

〇、一五

〇、〇、八

〇、〇、六

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

昇汞液(5%)

格魯兒那篤留謨溶液(20%)

七八四

右一日一回注射皮下

百布頓、格魯兒安母紐謨

餽水

昇汞

備里設林

餽水

七八五

右每三四日一筒注射皮下

百布頓

餽水

昇汞水(5%)

格魯兒那篤留謨(20%)

右加水為一〇〇、〇 每回半筒乃至一筒注射皮下

昇汞水

乾燥百布頓末液

格魯兒那篤留謨液

右每回半筒至一筒注射皮下

〇、〇、〇

〇、〇、〇

六〇、〇

六〇、〇

六〇、〇

八〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

〇、〇、〇

右加留水爲一〇〇、〇 每回
半筒至一筒注射皮下

六七三 黃降汞 一、〇

阿列布油 三〇、〇

右一週一筒注射臀部肌肉

六七二 黃降汞 一、〇

亞拉昆亞護膜 〇、五

滅菌水 三〇、〇

右注射皮下 一、〇

六七〇 亞拉昆亞護膜 〇、五

赤色酸化汞 一、〇

縮水 一〇、〇

右一週間一筒三回乃至七回
注射皮下

六七四 赤降汞阿列布油(10%) 一〇、〇

右每回一筒注射皮下

六七三 黃色沃度汞 〇、五

阿列布油 一五、〇

右每八日注射皮下

六七二 赤色沃度汞 一、〇

沃度加留膜 一、〇

燐酸那篤留膜 二、〇

縮水 五〇、〇
右注射皮下

六七四 甘汞 二、〇

殺菌阿列布油 二〇、〇

右一筒注射皮下

六七三 甘汞 四、〇

格魯兒那篤留膜 四〇、〇

亞拉昆亞護膜 一、〇

右一筒注射皮下 一〇、〇

六七二 甘汞 五、〇

格魯兒那篤留膜 一、二五

縮水 五〇、〇

亞拉昆亞護膜 五、〇

六七四 甘汞 一〇、〇

亞拉昆亞護膜 五、〇

縮水 一〇〇、〇

右注射皮下

六七三 水銀 二〇、〇

刺納林 五、〇

流動華搨林 三五、〇

右每回〇、一注射皮下

六七五 ランク氏灰色油 (水銀三、〇刺納林三、〇
阿列布油四、〇) 一〇、〇

右注射 〇、五

六七四 沃度那篤留膜 〇、五

縮水 一〇、〇

右每回一二筒注射皮下

六七三 沃度仿膜 二、〇

亞拉昆亞護膜 五、〇

右注射 五、〇

六七二 沃度仿膜 一、〇

依的兒 五、〇

阿列布油 五、〇

右一筒注射皮下

六七四 沃度仿膜 一、〇

阿列布油 三、〇

右一筒注射皮下

六七三 沃度仿膜 一、〇

備里設林 二〇、〇

右二回注射 二〇、〇

六七二 沃度仿膜 六、〇

備里設林 二五、〇

六七五 鹽酸古加乙涅

藏化水銀

包

右二回注射皮下

〇、〇五
〇、〇一
一、〇

●散劑

六七五 單寧酸水銀

乳糖

右分十二包一日三回每回一

一、二
四、八

六七五 單寧酸水銀

白糖

右分二包一日三回每回一包

三、〇
三、〇

六七五 單寧酸水銀

單寧酸

〇、五
五、〇

乳糖

阿片末

六七〇 甘草

乳糖

右分十包一日三回每回一包

〇、五
一、〇

右分二包臨臥一包後半時一

六七二 甘露

莫替越幾斯或阿片

〇、二一五、〇
〇、一

白糖

右分十包一日二三回每回一

一、二
〇、〇

●水劑

六七三 昇末

水

右每朝夕各一食匙

〇、一
二〇〇、〇一三〇〇、〇

六七三 昇末

格魯兒那篤留謨

糖水

右一日三四回每回一食匙

一五〇、〇
二、〇

六七四 昇末

格魯兒安母紐謨

糖水

〇、一
三、〇

卵白

右一日三回每回一食匙

一、〇
〇、一

六七五 昇末

ルイム酒

右一日一乃至半食匙

一〇〇、〇
〇、一

六七六 昇末

酒精

右朝夕各半食匙

一〇〇、〇
一、〇

水

格魯兒那篤留謨

格魯兒安母紐謨

昇末

右一日三回每回一食匙

五〇〇、〇
一、〇
一、〇
〇、三

六七六 赤色沃度末

酒精

右一日十滴乃至二十滴

一、〇
五〇、〇

六七六 赤色沃度末

沃度加留謨水

右一日二回每回一食匙

(八、〇)一八〇、〇
〇、一

六七七 赤色沃度末

沃度加留謨

水

單含利別

右一日一茶匙

〇、二五
二、五
一〇、〇
五〇、〇

六七七 沃度加留謨

水

右朝夕各一食匙

二〇〇、〇
二〇〇、〇

六七三 沃度加留謨

苦味丁幾

水

二、〇一三、〇
三、〇一五、〇
二〇〇、〇

六七三

沃度加留謨 四、〇、一六、〇
右每二時一食匙

水 八、〇、〇

桑實舍利別 * * 二、〇、〇

右每夕三回每回一食匙

六七四

沃度加里 五、〇、一八、〇

或沃度ルビチウム 〇、〇、二

莨菪越幾斯 一六、〇、〇

榴水 〇、〇、〇

右加伽里設林爲二、〇、〇、〇

右一日三回每回一食匙

六七五

沃度 〇、〇、五

沃度加留謨 一、〇、〇

水 八、五

右一日三回每回五滴

六七六

沃度 〇、〇、五

沃度加留謨 〇、一、〇、〇、二

水 二、五、〇、〇

右最初時每一日服三分之二

蓋後則服一蓋

六七七

沃度 〇、〇、一

肝油 四、〇、〇

右朝夕每一茶匙乃至二茶匙

六七六

沃度那篤留謨 一、五、一三、〇

水 一五、〇、〇

右一日三回每回一食匙

六七七

沃度鐵舍利別 二、〇、〇

右一日三回每回二十滴

六七八

沃度鐵舍利別 三、〇、〇

單舍利別 三、〇、〇

榴水 一五、〇、〇

右一日三回每回一食匙

六七九

沃度丁幾 〇、五、一、〇

橙皮舍利別 五、〇、〇

右一日三回乃至四回每回一食(茶)匙

七八二

撒爾沙根煎 二、〇、〇、一、三、〇、〇、五、〇、〇、〇

右一日數回分服

七八三

撒爾沙根 三、〇、〇、〇

水 二、〇、〇、〇、〇

右煎出 三、〇、〇、〇

佛利設林 三、〇、〇、〇

單舍利別 一、〇、〇、〇

蜂蜜 一、〇、〇、〇

右每日二食匙乃至三食匙

七八四

撒爾沙根煎 二、五、〇、一五、〇、〇

沃度加留謨 七、五

赤色沃度末 〇、〇、一

單舍利別 二、〇、〇

右一日三回每回一食匙

七八五

撒爾沙根 一五、〇

機那皮 一五、〇

胡桃實皮 七、五

黑硫化安知母紐謨 七、五

溫水 一五、〇、〇

右煎出一二五、〇一日數回分服

七八六

撒爾沙根 三、〇、〇

癒瘡木 二、五、〇

胡桃實皮 八、〇

黑硫化安母紐謨 七、五

右煎出 七、〇、〇、〇

桂皮水 三、〇、〇

橙皮舍利別 三、〇、〇

右一日數回分服

七八七

癒瘡木 五、〇、〇

水 一、二、〇、〇、〇

甘草根

一〇、〇〇

茴香

五、〇〇

右一時間煎出一〇〇〇、〇〇

一日數回分服

六七六

瘡瘡木丁幾

一五、〇〇

白糖

一五、〇〇

亞拉昆亞護膜

七、五〇

水

六〇〇、〇〇

右一日三四回每回一食匙乃至四食匙

●塗布劑

六七九

水銀軟膏

二〇、〇〇

右塗布

六七〇

水銀軟膏

一〇、〇〇

單鉛硬膏

一〇、〇〇

阿列布油

五、〇〇

右塗布

六七二

水銀軟膏

三〇、〇〇

刺納林

三〇、〇〇

阿列布油

四〇、〇〇

右塗布

六七三

水銀軟膏

三六、〇〇

刺納林

七二、〇〇

六七五

昇汞俚里設林(〇、二%)

一〇、〇〇

右塗布

六七六

昇汞

〇、〇一

刺納林

一五、〇一

安息香脂

五、〇一

右塗布

六七七

昇汞

〇、〇五

酒精

二〇、〇〇

右塗布

六七八

昇汞

〇、〇五

古魯胃膜

四、〇〇

依的兒

一〇、〇〇

右塗布

六七九

昇汞

〇、〇五

古魯胃膜

四〇、〇〇

麗麻子油

一、五〇

右塗布

七八〇

昇汞

〇、〇五

古魯胃膜

二〇、〇〇

阿列布油

二〇、〇〇

右塗布

六七九 甘汞

五、〇〇

單軟膏或刺納林

二〇、〇〇

右塗布

七八〇

黃色酸化汞

一〇、〇一

蠟軟膏*

二〇、〇〇

刺納林

七〇、〇〇

右塗布

七八一

赤色酸化汞

一、〇〇

華攝林

二〇、〇〇

右塗布

七八二

赤色酸化汞

一、〇〇

蓄微軟膏

一五、〇〇

右塗布

七八三

赤色沃度汞

一〇、〇五

蠟軟膏*

一〇、〇〇

右塗布

七八四

白降汞

〇、〇一

カルミン

〇、〇五

緩和軟膏*

一〇、〇〇

右塗布

七八五

白降汞

三、〇〇

刺納林

二七、〇〇

右塗布

六〇六 白降末

一、〇一二、〇

單軟膏

二〇、〇

六〇七 右塗布

一五、〇

六〇八 沃度丁幾

一〇、〇

六〇九 右塗布

一〇〇、〇

六〇〇 格魯兒水*

一〇〇、〇

右塗布

五、〇

六〇一 硫酸亞鉛

一〇〇、〇

醋酸鉛

二、〇

六〇二 沒藥丁幾

八三、〇

華攝林

二、五

右塗布

二、五

六〇三 焦性沒食子酸

一、〇

撒里矢爾酸

二、五

イヒチオール

四四、〇

華攝林

二、〇

右塗布

四、〇

六〇四 嚼囉仿談

四、〇

亞比拉亞護膜漿

一、〇

右塗布齒齦

三〇、〇

六〇五 沒食子丁幾

三〇、〇

ラタニヤ丁幾**

三〇、〇

六〇三 右塗布齒齦

スピラント丁幾**

一〇、〇

阿片丁幾

一〇、〇

餛水

二〇、〇

右塗布齒齦

一〇、〇

六〇四 カチスーム油**

一〇、〇

酒精

一〇、〇

阿片丁幾

二、〇

右塗布齒齦

四〇、〇

六〇五 骨炭末

四〇、〇

●磨齒劑

五、〇

泥葛根末

五、〇

炭酸麻僱涅更膜

五、〇

薄荷油

五滴

六〇六 骨炭末

二〇、〇

泥葛根末

二〇、〇

酒石酸「ヒノリン」

五、〇

加里石鹼

〇、五

薄荷油

二、〇

六〇七 骨炭末

三滴

右磨齒粉

五〇、〇

炭酸麻僱涅更膜

一〇、〇

藥用石鹼末

一〇、〇

薄荷油

五滴

右磨齒粉

三〇、〇

炭酸石灰

一〇、〇

炭酸麻僱涅更膜

二〇、〇

泥葛根末

二〇、〇

右磨齒粉

四〇、〇

炭酸石灰

四〇、〇

炭酸麻僱涅更膜

五、〇

泥葛根末

五、〇

薄荷油

五滴

右磨齒粉

一〇〇、〇

沈降炭酸石灰

二、五

格魯兒酸加留膜

二、五

藥用石鹼末

二、五

薄荷油

一滴

右磨齒粉

各二〇、〇

機那皮末、撒爾維亞葉末

各二〇、〇

木炭末

各二〇、〇

右磨齒粉

各二〇、〇

●含嗽劑

各二〇、〇

六〇三 沒食子丁幾**

四、〇

六六三 右含嗽
ラタニヤ丁幾 ※

六、〇一、一二、〇
水 三〇〇、〇

六六四 右含嗽
格魯兒酸加留謨三、〇一六、〇

水 三〇〇、〇

六六五 右含嗽
撒里矢爾酸

一〇、〇
酒精 二〇〇、〇

六六六 右一茶匙和一碗之水含嗽
撒里矢爾酸

一、〇
重碳酸那篤留謨 二、〇

水 五〇〇、〇

六六七 右含嗽
結麗阿曹篤

一〇、〇
酒精 一〇〇、〇

六六八 右一茶匙加一碗之水含嗽
石炭酸

三、〇
酒精 七五、〇

右一茶匙和一碗之水含嗽

六六九 昇水 〇、一
酒精、餾水 各二五、〇

右一茶匙和一碗之水含嗽

六七〇 明礬 四、〇一八、〇

水 四〇〇、〇

六七二 右含嗽
單寧酸、明礬

各一、五
酒精、明礬 五〇、〇

六七三 右含嗽
單寧酸

二〇、〇
赤酒 二〇〇、〇

六七四 右含嗽
沃度丁幾

二〇、〇
水 二〇〇、〇

六七五 右含嗽
昇汞

〇、〇八
●濕布劑 三〇、〇

六七六 右繃帶用
格魯兒石灰

一〇、〇
水 一〇〇、〇

右繃帶用

六七七 硫酸銅 三、〇
餾水 三〇、〇

右繃帶用

六七八 沃度加留謨 一、〇
沃度 〇、一

餾水 五〇、〇

六七九 右繃帶用
撒布劑

一〇、〇一、二〇、〇

八〇 撒粉 五、〇一、一〇〇、〇

八〇一 右撒布
沃度仿謨

二〇、〇
依的兒 二〇、〇

八〇二 右撒布
腐蝕劑

〇、五
沃度 〇、五

八〇三 沃度加留謨 五、〇
儼里設林 一〇、〇

八〇四 右腐蝕用
昇汞

二、〇
明礬 二、〇

八〇五 炭酸鉛、樟腦 各二、〇
酒精、醋 各一五、〇

右腐蝕用

● 溶劑

六五

昇汞

一〇、〇一五、〇

水

四〇〇、〇

右一浴用

六五

昇汞

四、〇一二、〇

格魯兒安母紐膜

八、〇一二四、〇

水

一〇〇、〇一二〇〇、〇

右一浴用

六五

昇汞

一、〇一一五、〇

格魯兒安母紐膜

一〇、〇一一五、〇

水

右一浴用

六五

沃度仿膜

〇、五

白糖

一、〇

薄荷油

五滴

右為錠十個一日三回每回一

二個

六五

沃度加留膜

三、〇

貌羅膜加留膜 二、五一三、〇

別拉敦那越幾斯

〇、三

餽水

二〇〇、〇

右溶液二〇、〇和五〇、〇乃

至一〇〇、〇之溫水灌腸

六五 沃度加留膜、貌羅膜加留膜 各二、五

柯柯阿酪 一五、〇

右為坐藥十個一日插入一個

六五 赤色沃度末 五、〇

甘末 五、〇

右薰蒸用

六五 昇末 〇、〇四

舊微水 二〇〇、〇

阿片泊美爾丁幾 一、〇

右洗滌

第三節 婦人生殖器諸病

月經閉止 Menostasia. Amenorrhoea. 月經不通、經閉、不月、經絕、經停

月經變調 Menoxenia. 月經不順、月經不調

● 丸劑

六五

過滿倫酸加留膜

〇、二

右為五十粒每日三回每回一

粒至二粒

六五

蘆薈越幾斯

一、〇

密兒拉

適宜

右為五十九一日三回每回二

粒乃至三粒

六五

蘆薈

四、〇

沒藥末

二、〇

茴香末

一、〇

右以單舍利別為三十九丸每日

三粒乃至六粒

六五

蘆薈越幾斯

一、〇

沒藥越幾斯、泊美爾末各四、〇

格魯兒安母紐護

二、五

乳香

一〇、〇

右爲百五十九每朝夕各五粒

六五

蘆薈

六、五

硫酸鐵

八、〇

芳香散、玫瑰蜜

各六、五

右爲百九每一日一二粒

六五

蘆薈

二、〇

鐵粉

六、五

大黃末

四、〇

亞拉昆亞護末

四、〇

右爲百九一日二回每回三粒

六五

蘆薈、麥角

各二、〇

古魯聖篤越幾斯

〇、三

月經困難

Dysmenorrhoea.

月經痛、子宮痙痛、月信痛、經行腹痛

●散劑

六三

麥角末

三、〇

右分三包月經時前日三時間

內分服

六三

麥角越幾斯

〇、一〇、二

白糖

三、〇

右分五包一日五回每回一包

薩昆那油

十滴

右爲三十九一日三回每回二粒

六七

阿魏、乳香、沒藥

各三、〇

單舍利別

一、五

右爲百九一日數回每回二粒

六六

阿魏、蘆薈、藥用石鹼

各三、〇

乃至四粒

六六

玫瑰蜜

各三、〇

右爲百九一日數回每回二粒

六九

亞硫酸

〇、四

乃至四粒

六九

右黑胡椒末、僱利設林軟膏

六九

各適宜爲四十九一日三回每

六六

古揮乙涅

〇、一

六六

撒里矢爾酸規尼涅

一、〇

六六

ソラニン

〇、一五

六六

右分十包一日三回每回一包

六六

印度大麻越幾斯

〇、二

六六

白糖

五、〇

六六

右分十包每三時一包

六六

古揮乙涅

〇、一

六六

右分五包一日三回每回一包

六六

攪淘兒氏散

各三、〇

六六

右爲五十九每三時二粒

六六

加糖沃度鐵

一、〇

六六

麥角末、薩昆那葉末

各五、〇

食後一粒

●水劑

六六

蕃椒丁幾

三、〇

ラム酒

八〇、〇

護謨合劑

一二〇、〇

右每三時一茶匙

六六

蘆薈

二〇、〇

沒藥

六〇、〇

泊美蘭

三〇、〇

大黃末

一五、〇

鹽酸

一五、〇

葡萄酒

二〇〇、〇

右浸漬瀘過一日一回半茶匙

乃至一茶匙

右分十包一日三四回每回一

包

六六九 ルブリン、白糖 各六、〇

右分十二包每二時乃至三時

一包

六七〇 鹽酸莫爾比涅 〇、〇五

白糖

右分五包每二時乃至三時一

包

六七二 アピオール 二、五

右入膠囊十個每一日二個乃

至四個

●水劑

六七三 杏仁水 一〇、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、一

右每一時間十滴

六七四 杏仁水、麥角丁幾 各一〇、〇

林檎酸鐵丁幾

右一日三回每回半茶匙

六七五 杏仁水 五、〇

黃碧越幾斯 〇、一

縮水 一、二〇、〇

橙花舍利別 二五、〇

依的兒 二、〇

右每二時一食匙

六七六 加密列花浸 一五〇、〇

阿片丁幾 十五滴

薄荷舍利別 一五、〇

右每時一食匙

六七七 白鮮浸 六〇、〇

鹽酸莫爾比涅 〇、〇二

醋酸安母尼亞液 二〇、〇

右一日數回分服

六七八 麥角越幾斯 各一、〇

硫酸混和劑* 〇、一

別拉敦那越幾斯 〇、一

覆盆子舍利別 一五、〇

縮水 一五〇、〇

右每一時乃至二時一食匙

六七九 醋酸安母紐護液 二〇、〇

桂皮水 一、二〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右一日數回每回一食匙

八〇 流動ヒドラスチス越幾斯 各三〇、〇

マラガ酒

桂皮舍利別 一五、〇

右每二時乃至四時一茶匙

八〇 囉囉仿談 〇、五

樟腦 〇、二五

依的兒 〇、一五

沒藥丁幾 〇、一五

亞拉比亞護膜漿 〇、八

縮水 五〇、〇

右每十五分時一食匙

八二 阿片丁幾、黃碧丁幾

菲沃斯丁幾、緬草丁幾

瑪陀羅羅丁幾 各二〇、〇

右每日三四回每回二十滴

八三 加奈陀海狸丁幾 五〇、〇

蕃木鼈丁幾 五〇、〇

右一日四回每回二十滴

八四 抱水格魯刺爾 二、〇

水 二〇〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右一日三回二日分服

八五 貌魯護加留護、安知必林 各五、〇

水 六〇、〇

流動ウ井ブルヌーム越幾斯 一〇、〇

コンニヤツク酒

橙皮舍利別 各一五、〇

右每日二食匙乃至四食匙

六八五 嚼囉仿謨 〇、五

樟腦 〇、二五

依的兒、密拉了幾 各一、五

亞拉比亞護謨漿 一、〇

溜水 五〇、〇

右每十五分時一食匙

六八六 ●坐劑 〇、〇三

阿片越幾斯 〇、〇三

柯柯阿脂 二、〇

右爲膠球、坐藥

月經過多 Menorrhagie.

經血過溢、經行過多、月紅過溢

六八七 阿片越幾斯 〇、三

或莫塔越幾斯 〇、一

柯柯阿脂 二、〇

六八八 右爲膠球坐藥 〇、一

別刺敦那越幾斯 二、〇

柯柯阿脂 二、〇

六八九 右爲膠球坐藥 〇、五

菲沃斯越幾斯 一〇、〇

柯柯阿脂 一〇、〇

右爲膠球坐藥五個一日一個

六九〇 ●塗布劑 一、〇

鹽酸古加乙理 三、〇

溜水 二、〇

酒精 二、〇

右塗布於子宮口

六九一 嚼囉仿謨 三、五

菲沃斯油 三〇、〇

右塗布於下腹

六九二 ●洗腸劑 二十滴

阿片了幾 二〇〇、〇

水 二〇〇、〇

六九三 右洗腸 〇、一

別拉敦那越幾斯 一〇〇、〇

加蜜爾列浸 一〇〇、〇

右洗腸 一〇〇、〇

六九四 繡草根、加蜜列花 各一〇、〇

莢碧葉 〇、五

右浸出 一五〇、〇

阿片泊美蘭了幾 一〇、〇

右分二回灌腸

●散劑

六九五 實麥答利斯葉末 〇、三

麥角末 五、〇

白糖 五、〇

右分十包每二時一包 〇、五

六九六 吐根末 〇、五

桂皮末、明礬 各三、〇

右分十包每二時一包 〇、五

六九七 鉛糖 五、〇

白糖 五、〇

右分十包一日四回每回一包 〇、五

●水劑

六九八 實麥答利斯浸 (二、〇) 一八〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙 各一、〇

六九九 麥角越幾斯、單寧酸 一五〇、〇

常水 一五〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

六九〇 明礬 四、〇

桂皮丁幾 二〇、〇

薄荷水 一〇〇、〇

罌粟舍利別 * 三〇、〇

右每二時一食匙

六九二 流動ハマメリス越幾斯 四〇、〇

右每二時乃至三時一茶匙

六九二 鹽酸ピトラスチニン 一、〇

餹水 一〇、〇

右每二時乃至四時十五乃至二十五滴

六九三 鹽酸ピトラスチニン 一、〇

子宮出血 Metorrhagie

子宮出血

子宮血崩、子宮脫血、崩漏

●丸劑 麥角浸 (六、〇)一六〇、〇

桂皮丁幾 五、〇

覆盆子舍利別 * 二五、〇

右每十五分時一食匙

薄荷舍利別 五、〇

橙花水 * 五、〇

右每二時乃至四時十五滴乃至二十五滴

六九四 流動ピトラスチニス越幾斯 一五、〇

右出血時二十滴乃至三十滴

一日三四回

六九五 磷酸ベルベリン 一、〇

溫水 二〇、〇

設里酒 * 五、〇

桂皮舍利別 五、〇

右每二時乃至四時二十滴乃至三十滴

●丸劑 麥角越幾斯 一、〇

六九六 麥角越幾斯 一、〇

右爲二十九一日六粒至八粒

六九七 麥角越幾斯、單寧酸 各一、〇

阿片末 〇、二

右甘草蒸爲二十九每二時一粒

六九八 鹽酸ピトラスチニン 〇、五

右以甘草末及甘草蒸爲十九

一日一二粒

六九九 ヒトラスチニス越幾斯 各三、〇

綿馬越幾斯、麥角越幾斯

右爲百丸每三時三粒

六〇〇 硫酸亞篤羅比涅 〇、〇一

餹水 一〇、〇

右四分一筒至半筒注射皮下

六九三 麥角越幾斯 一、〇

水 一〇〇、〇

桂皮舍利別 一五、〇

右每時一食匙

六九四 麥角越幾斯 四、〇

常水 七五、〇
薄荷水 七五、〇
桂皮舍利別 二〇、〇
右每時一食匙乃至二食匙

六九五 過格魯兒鐵 一、五
榴水 一八〇、〇
桂皮舍利別 二五、〇
右每二時一食匙

六九六 依的兒性鐵丁幾 一五、〇
醋酸依的兒 八、〇
右每十五滴乃至二十滴

六九七 印度大麻丁幾 二、〇
生姜丁幾 一〇、〇
阿片越幾斯 〇、一
橙皮舍利別 三〇、〇
鹽水 一〇〇、〇
右每三時一食匙

六九八 磷酸 五、〇
桂皮丁幾 一〇、〇
沙列布漿 三〇、〇
右一日三回每回一茶匙

六九九 ヒドラステス越幾斯 二〇、〇

右一日數回每回二十滴乃至三十滴

六九〇 ハルレル氏硫酸越歷矢兒 二、〇
阿片丁幾 二、〇
桂皮丁幾 二二、〇
右每時二十滴

六九二 桂皮丁幾 五〇、〇
右每三十分一茶匙

六九三 麥角越幾斯 三、〇
右甘草末適宜爲三十九一日三四回每回一粒

六九四 チンツェル氏麥角越幾斯 各一、〇
麥角末 各一、〇
右爲二十九一日二回每回一粒

六九五 麥角越幾斯 四、〇
加糖炭酸鐵 四、〇
右蒲公英越幾斯及大黃末適宜爲六十九一日三回每回二粒乃至三粒

加糖炭酸鐵 六、〇
右龍膽末及龍膽越幾斯適宜爲三十九每三時至四時二粒

六九六 麥角越幾斯 二、〇
散劑 二、〇
右分六包一日二回乃至四回

六九七 麥角越幾斯 三、〇
每回一包

六九八 麥角末 二、〇
右分十包一日三包

六九九 沒食子酸 五、〇
芳香酸 五、〇
右分十包一日三包

七〇〇 鹽酸ヒドラステス 〇、二五
白糖 一〇、〇
右爲錠十個一日四回每回一個

七〇一 鹽酸ヒドラステス 一、〇
注射劑 一、〇

七〇二 鹽酸ヒドラステス 一〇、〇

右半筒乃至一筒注射皮下

六九三 麥角越幾斯、催利設林各一、〇

水 五、〇—一〇、〇

右一回一筒注射皮下

六九三 麥角越幾斯、催利設林各二、〇

餾水 一五、〇

右射注皮下

● 注入劑

六九四 過格魯兒鐵液 五、〇

水 五〇、〇—一五〇、〇

右注入腔內

六九五 過格魯兒鐵液 一、〇

常水 一〇、〇

右以數滴用ブラウン氏注射

器注入子宮內

六九五 醋酸鈣 五、〇

餾水 二〇〇、〇

沒藥丁幾 五〇、〇

阿片丁幾 三、〇

右一日五六回注入腔內

六九七 明礬

水 二〇〇、〇

右注入腔內

六九六 麥角越幾斯 五、〇

餾水 一二、〇

右洗腸

六九六 麥角越幾斯 五、〇

餾水 五〇、〇

右合於綿球插入腔內

子宮炎 Metritis.

急性子宮炎 Metritis acuta

急性子宮質炎 M. acuta barenchymatosa.

慢性子宮炎 Metritis chronica.

慢性子宮實質炎 M. chronica parenchymatosa.

子宮焮衝、子宮實質焮衝、子宮組織炎、子宮癰

處置 安臥靜息、骨盤部高置、下腹部水蛭貼用、腔內洗滌、下劑、濕溫器法等

● 水劑

六九四 蓖麻子油 一五、〇

右頓服

六九五 水製大黃丁幾 一四〇、〇

右每時一食匙

六九五 硫酸麻瘋涅叟護

二〇〇、〇—一三〇、〇

稀鹽酸 一八〇、〇

六九四三

右每時一食匙

大黃浸 (五、〇)一五〇、〇

單舍利別

右每二時一食匙

六九四四

旃那葉浸

(一五、〇—二〇、〇)一五〇、〇

單舍利別

右每半時至一時一食匙

六九四五

流動ヒドラスチ—ス越幾斯

右一日二回至四回每回二十

滴

六九四六

硫酸規尼涅

稀硫酸 一、〇

單舍利別 二、〇

餾水 五〇〇、〇

右每一二時一食匙

六九四七

燐酸那篤留謨

硫酸那篤留謨 二〇〇、〇

橙花水 一〇〇、〇

儂里設林 一二〇、〇

右早朝三食匙

六九四八

燐酸那篤留謨

四〇〇、〇

重炭酸那篤留謨

水 四、〇

右每回一酒杯

散劑 七五〇、〇

硫酸麻僱涅叟謨

右頓服 一五、〇

六九五〇 人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇

右頓服

六九五二 阿片 一〇、一

白糖 四、〇

右分六包每半時一包

丸劑

六九五三 大黃末、複方大黃越幾斯 各一、五

別刺敦那越幾斯 〇、一

右為三十九一日二粒至四粒

單寧酸 一〇、〇

右為錠十個一日三回每回一

個

●插入劑

六九五四 沃度仿謨 五、〇

單寧酸 五、〇

儂里設林 五〇、〇

六九五五

右含綿球插入 五、〇

儂里設林 一〇〇、〇

右蘸於綿花插入 一〇〇、〇

六九五六

沃度丁幾 二、〇

沃度加留謨 三、〇

貌羅謨加留謨 二、〇

水 一〇〇、〇

六九五七

右蘸綿花插入 一〇〇、〇

鹽酸莫兒比滷 〇、五

柯柯阿酪 一〇、〇

右為坐藥五個每夕插入一個

●塗布劑

六九五八

沃度加留謨 四、〇

儂里設林 三〇〇、〇

右塗布 三〇〇、〇

六九五九

沃度、沃度加留謨 各一、〇

酒精 二、〇

華攝林 三〇〇、〇

六九六〇

右塗布子宮脛部

イヒチヲール、刺乃林 各一〇〇、〇

右塗布下腹部

六九二 沃度丁幾 一五、〇

六九三 水銀軟膏 一五、〇

右塗布深膝部

六九四 莫碧越幾斯 二、〇

右塗布

六九五 嚼囉仿謨 一〇、〇

依的兒

六九六 樟腦精 一〇〇、〇

右塗布

六九七 阿片泊美蘭丁幾 一〇、〇

右以澱粉爲糊塗布膝部

六九八 ●洗滌劑 (〇、二) 一〇〇、〇

右洗滌

六九九 昇永水 (〇、二) 一〇〇、〇

右洗滌

七〇〇 撒爾矢里酸 五、〇

右洗滌

硼酸、硼酸那篤留謨各二五、〇

右一食匙加一里埤兒之溫水

一日三回洗滌

七〇一 別刺敦那葉浸 (二〇、〇) 二〇〇、〇

杏仁水 六〇、〇

右一回二食匙和八〇〇、〇

乃至一〇〇〇、〇之水用洗

水器洗滌膝內

七〇二 麥角エキス 五、〇

縮水 一四、〇

七〇三 僱里設林 二、〇

右隔日一篇注射腹部皮下

七〇四 緩下劑* 四〇、〇

右每回一〇、〇

七〇五 木醋 一五〇、〇

七〇六 右腐蝕用

七〇七 硝酸酸化汞 五、〇

縮水 二五、〇

酒精 二五、〇

七〇八 右腐蝕用

七〇九 沃度仿謨 五、〇

石炭酸 〇、二五

薄荷油 一滴

七一一 右吹入子宮口

七一二 硝酸銀錠* 四個

右爲桿

七一三 沃度加儲謨 四、〇

僱里設林 三〇、〇

右合於小海綿球子或綿球置

膝窩窩部

子宮內膜炎 Endometritis

急性子宮內膜炎 Endometritis acuta.

慢性子宮內膜炎 Endometritis chronica.

子宮頸部內膜炎 Endometritis cervicalis uteri

臍加答兒 Vaginitis.

白帶下 Fluor albus. Blennorrhoea vagina. Catarrhus vagina Leucorrhoea.

子宮粘膜炎、子宮白帶下、子宮粘膜炎加答兒

陰腫加多兒、陰腫粘膜炎、腫加多兒、腫淋、腫白帶下、慢性腫加答兒帶下、白帶、自沃

嚴禁交媾、安靜就褥、緩下劑、溫坐浴、腫洗滌、膝坐藥等

●水劑

六九五 機那煎 (八、〇)一〇〇、〇

號魯謨加留謨

六九七 機那丁幾

右一日三回分服

六九七 機那丁幾

麥角丁幾

沃度加留謨

桂皮丁幾

水

右一日三回分服

六九七 顯草根浸 (四、〇)一〇〇、〇

重碳酸那篤留謨

蕃木髓丁幾

單舍利別

右一日三回每回一食匙

六九七 顯草丁幾

重碳酸那篤留謨

單舍利別 八、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回每回一食匙

六九七 硝酸那篤留謨 八、〇

餾水 二〇〇、〇

右每二時一食匙

六九八 重酒石酸加留謨 一五、〇

六九八 蔚那葉浸(一〇、〇)一五〇、〇

滿那舍利別 三〇、〇

右每時一茶匙

●散劑

六九八 重酒石酸加留謨 三〇、〇

硝酸加留謨、枸橼油糖各五、〇

右一日數回每回一小刀尖

●丸劑

六九八 硼酸ヒドラスチニン 〇、五

右以甘草末及甘草蒸爲十九

一日一二粒

●洗滌劑

六九三 微溫湯 五〇〇、〇

右洗滌 五〇〇、〇

六九四 微溫湯 五〇〇、〇

食鹽 二〇〇、〇

右洗滌 二〇〇、〇

六九五 硼酸水 (二、〇)三〇〇、〇

右洗滌 (二、〇)三〇〇、〇

六九六 鹽剝水 (二、〇)二〇〇、〇

右洗滌 (二、〇)二〇〇、〇

六九七 過滿俺酸加里水 (二、〇)五〇〇、〇

右洗滌 (二、〇)五〇〇、〇

六九八 石炭酸水 (一、〇)一五〇、〇

右洗滌 (一、〇)一五〇、〇

六九九 單寧酸水 (一、〇)一五〇、〇

右洗滌 (一、〇)一五〇、〇

六九九 單寧酸水 (一、〇)一五〇、〇

右洗滌 (一、〇)一五〇、〇

六九六 右洗滌
撒里矢爾酸水 (三、〇)一八〇、〇

六九七 右洗滌
撒里矢爾酸水 (一、〇)三〇〇、〇

六九八 右洗滌
昇末水 (〇、一%)五〇〇、〇

六九九 右洗滌
過格魯兒鐵液 〇、六

七〇〇 右洗滌
硝酸銀水 (一、五)一〇〇、〇

七〇一 右洗滌
明礬水 (二、五)一〇〇、〇

七〇二 右洗滌
醋酸鉛水 (一%)二〇〇、〇

七〇三 右洗滌
醋酸鉛水 (一%)二〇〇、〇

七〇四 右洗滌
醋酸鉛水 (一%)二〇〇、〇

七〇五 右洗滌
阿片丁巒 二〇〇、〇

七〇六 右洗滌
阿片丁巒 二〇〇、〇

六九九 右洗滌
硫酸亞鉛水 (一、〇)二〇〇、〇

七〇〇 右洗滌
硫酸銅水 (〇、五)二〇〇、〇

七〇一 右洗滌
硫基石炭酸亞鉛水 (三、〇)一五〇、〇

七〇二 右洗滌
格魯兒石灰水 (二、〇)二〇〇、〇

七〇三 右洗滌
知母爾水 (一、〇)一〇〇、〇

七〇四 右洗滌
レゾルチン水 (三、〇)一〇〇、〇

七〇五 右洗滌
リゾール水 (五%)五〇〇、〇

七〇六 右洗滌
沃度仿謨 〇、一

七〇七 單寧酸 三、〇

七〇八 右注入 二〇〇、〇

七〇九 右注入 二〇〇、〇

七〇六 過格魯兒鐵液 一、〇
右以ブラウン氏注射器注入
子宮腔內後以五十倍石炭酸
水洗淨

七〇七 沃度丁巒 一、〇
右以ブフン氏注射器注入
子宮腔內後以五十倍石炭酸
水洗淨

七〇八 鞣酸 一〇〇、〇
右每日一茶匙溶於水六〇〇

七〇九 明礬 一〇〇、〇
右每日一食匙溶於水六〇〇

七〇〇 醋礬 一〇〇、〇
右每日一食匙溶於水六〇〇

七〇一 石炭酸 一〇〇、〇
鉛糖水 一〇〇、〇

七〇二 右一日一回二食匙和八〇〇
之水洗滌腔內

七〇三 塗布劑 一五、〇
過格魯兒鐵液 一五、〇

七〇四 右塗布

七〇五 過格魯兒亞鉛水

七〇六 過格魯兒亞鉛水

(五—五〇、〇%)三〇、〇

右塗布

七〇三 沃度丁幾

酒精

右塗布

七〇四 沃度丁幾、沒食子丁幾各五、〇

沃度

右塗布

七〇五 沃度仿謨

薄荷油

右塗布

七〇六 單寧酸

右塗布

七〇七 イヒチナール

右塗布

七〇八 イヒチナール

右塗布

僱里設林

右塗布

七〇九 イヒチナール

加里石鹼*

右塗布下腹部

七〇〇 硝酸銀

水

右塗布

七〇一 格魯謨酸

水

右塗布

●插入劑

單寧酸

柯柯阿酪

右爲球子插入子宮腔內

七〇三 鹽酸莫兒比涅

右爲膠球十個一日二個乃至
適宜

五〇、〇

一〇〇、〇

四〇〇、〇

一〇、〇

一、〇—二、〇

三〇〇、〇

五、〇

五、〇

五、〇

五、〇

五、〇

五、〇

一五、〇

二〇、〇

二〇、〇

一五、〇

二、五

四個

七〇四 依的兒性アリストール綿紗

右插入子宮腔內

七〇五 沃度仿謨綿紗

右插入子宮腔內

七〇六 鹽酸ヒドラスチニン

留水

右半筒至一筒注射皮下

七〇七 硝酸亞酸化汞液 八滴—十滴

水 右注入尿道

七〇八 沃度仿謨、亞拉比亞護謨

右吹入腔內

七〇九 水蛭

子宮腔部貼用

數條

各一〇、〇

各一〇、〇

各一〇、〇

各一〇、〇

各一〇、〇

各一〇、〇

各一〇、〇

骨盤蜂窠織炎 Pelviculitis.

假性子宮炎 Parametritis.

●坐劑

七〇二 水銀軟膏

五、〇

柯柯阿酪

右爲坐藥五個插入肛門

七〇三 沃度加留謨

沃度

三〇、〇

五、〇

緩和軟膏* 二〇、〇

右為坐藥十個插入肛門

七〇三 沃度加留謨 二五、〇

鹽酸莫爾比涅 〇、一

右柯柯阿脂適宜為坐藥五個

一日一個插入腔內

七〇三 沃度加留謨一五、〇一二五、〇

柯柯阿脂 一〇、〇一二五、〇

右為坐藥五個一日一個插入

腔內

七〇三 塗布劑 四、〇

沃度加留謨

子宮後側血腫

Haematocoele retrouterina.

沃度 三〇、〇

備里設林 三〇、〇

右塗布 二、〇

沃度加留謨 〇、四

沃度 五、〇

備里設林 二〇、〇

右塗布腹部 二〇、〇

沃度丁幾 二〇、〇

備里設林 二〇、〇

右塗布 三〇、〇

沃度仿謨 二〇、〇

備里設林 二〇、〇

薄荷油 六滴

右塗布

●水劑 三、〇

沃度加留謨 一五、〇

常水 二五、〇

覆盆子舍利別* 二五、〇

右一日三回每回一食匙

●散劑 〇、五

阿片 五、〇

白糖 五、〇

右分十包一日數回分服

●水劑

七〇四 過格魯兒鐵液 五、〇

右一日數回每回八滴

●注射劑

七〇一 麥角越幾斯 二、〇

備里設林、稀酒精 各六、〇

右四分一筒至一筒注射皮下

●洗滌劑 三〇〇、〇

七〇二 五十倍石炭酸水 三〇〇、〇

右洗滌

七〇三 三百倍撒里矢爾酸水 六〇〇、〇

右洗滌

七〇四 千倍知母爾水 六〇〇、〇

右洗滌

子宮外膜炎、骨盤腹膜炎

Perimetritis, Pelveoperitonitis.

●水劑

七〇五 沃度加留謨 二、〇

水 一八〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

七〇六 沃度加留謨 二、〇

子宮後側血腫 子宮外膜炎、骨盤腹膜炎

苦味了幾 三、〇
水 一〇〇、〇

右一日六回二分服

●塗布劑

七〇四七 イヒチナール 一〇〇、〇

華設林 一〇〇、〇

右塗布腹部

七〇四六 沃度仿謨 三〇、〇

華設林 三〇、〇

子宮癌 Calcinoma uteri.

處置 初期全截除術、其他清潔消毒、滋養強壯、避勞動、就平臥、注射、栓塞、燒灼法等之對症療法

●塗布劑

七〇四四 沃度 五、〇

石炭酸 一〇、〇

右塗布

七〇四五 貌魯謨 二、〇

酒精 一〇、〇

右塗布

七〇五 鹽剝水(一〇、〇)一〇〇〇、〇

●洗入洗滌劑

七〇五七 過格魯兒鐵液 五、〇

賴加豆末 適宜

右爲軟膏塗布上部

七〇四九 沃度仿謨 三、〇

百露拔爾撒謨 六、〇

僂里設林軟膏 二四、〇

●坐劑

七〇五〇 鹽酸莫爾比涅 〇、〇一

柯柯阿酪 二、〇

七〇五一 沃度仿謨 〇、二五

柯柯阿酪

適宜

右爲膠球一個插入

七〇五二 イヒチナール 二〇〇、〇

僂里設林 二〇〇、〇

右合於綿球插入

七〇五三 柳皮 一五〇、〇

右水適宜煎煮混和浴湯

水 五〇〇、〇

右注入

七〇五六 石炭酸水(五、〇)五〇〇、〇

右注入

七〇五九 過滿俺酸加價謨

(一〇、〇)一五〇、〇

右一茶匙和五〇〇、〇之水

注入

七〇六〇 トリクレンール 五〇、〇

加里石鹼 三五、〇

餽水 一五、〇

七〇六一 醋酸礬土液 二〇〇、〇

右二〇、〇加一里埤兒之水

七〇六二 醋酸礬土液 二〇〇、〇

右二食匙加半里埤兒之水

七〇六三 知母爾水(二、〇)一〇〇〇、〇

右洗滌

七〇六四 山毛櫸蓼兒 二五、〇

亞拉昆亞謨末 二五、〇

七〇六五 格魯兒水 五〇〇、〇

右一碗加一里埤兒之水洗滌

七〇六六 知母爾水(二、〇)一〇〇〇、〇

右洗滌

七〇六七 山毛櫸蓼兒 二五、〇

亞拉昆亞謨末 二五、〇

水 五〇〇、〇

右洗滌

七〇五 格魯兒石灰 二、〇一八、〇

縮水 四〇〇、〇

右洗滌

七〇六 ●綿球劑 一〇、〇

沃度仿謨

各四五、〇

僱里設林、酒精

七〇七 フエルピリン 一八、〇一二〇、〇

右薰綿球插入

卵巢炎 Oophoritis.

水 一〇〇、〇

右薰綿球壓抵

七〇八 ●坐劑 〇、三一〇、六

鹽酸莫兒比涅 〇、〇六

或水製阿片越幾斯 六、〇

柯柯阿脂 右爲坐藥三個一日一個至三

七〇九 ●散劑 〇、一

鹽酸莫兒比涅 三、〇

白糖

七〇四 沃度加留謨 二、〇

水 二〇〇、〇

苦味丁幾 四、〇

右每二時一食匙

七〇五 阿片丁幾 五、〇

苦味丁幾 一〇、〇

右一日三回每回十五滴至二

七〇六 ●丸劑 一、〇

古極乙涅

右龍膽越幾斯、甘草末適宜

爲三十九一日三回每回一粒

七〇七 印度大麻越幾斯 〇、二

水製阿片越幾斯 〇、五

樟腦 右爲十九發作時一粒

七〇八 ●外用劑 一〇、〇

イヒチオール 一〇〇、〇

僱里設林 一〇〇、〇

右合於タンボン送入

七〇九 沃度仿謨

三〇〇

右以タンボン送入

七〇一 發泡膏*

五〇〇

華攝林

三〇〇〇

七〇〇 沃度丁幾

一〇〇〇

右貼用

クマリン

〇〇〇一

右塗布

卵巢膿腫

Ovarialabscess.

卵巢囊腫

Ovarialcyste Cystis Ovarii.

腸覃、卵巢水腫等

處置

早期行卵巢截除、術其他對症療法、

膿加答兒(子宮炎參照) Catarrhus vagina.

白帶下 Fluor albus.

膿膿漏 Menorrhoea.

急性膿加答兒 Vaginitis catarrhalis acuta.

慢性膿加答兒 Vaginitis catarrhalis chronica.

●水劑

七〇二 林檎酸鐵丁幾

各一〇、〇

右一日三回每回一食匙

七〇六 加糖炭酸鐵

硫酸錫尼涅

一五、〇

龍膽丁幾

各一〇、〇

七〇四 乳酸鐵

五〇、〇

七〇七 加糖炭酸鐵

大黃末

一〇、〇

十滴

右一日三回每回十五滴至二十滴

白糖

右一日二回每回一小刀尖

七〇三 可溶性酸化鐵

五、〇

七〇五 加糖炭酸鐵

一、二、〇

一〇、〇

常水

一五〇、〇

蕃木藍越幾斯

〇、〇、四

覆盆子舍利別

二五、〇

右每日一小刀尖

●丸劑

右一日三回每回一小刀尖

七〇八 硫酸鐵、炭酸加留漢 各四、〇

麥角越幾斯 一、五

右甘草羔及甘草末適宜為五

十九一日三回每回二粒乃至

三粒

七〇九 硫酸鐵、炭酸加留漢 各五、〇

或酒石酸加留漢 五、〇

右龍膽越幾斯及龍膽末適宜

為六十九一日二回每回二粒

七〇九 明礬 五、〇

脂肪 三〇、〇

七〇九 單寧酸 〇、三

柯柯阿脂 三、〇

七〇九 單寧酸 一五、〇

右為膠坐藥一日送入一個

七〇九 柯柯阿脂 三〇、〇

右為膠坐藥六個一日送入一

二個

七〇九 硫酸亞鉛 一〇、〇

刺納林 五、〇

柯柯阿脂 二五、〇

右為坐藥十個插入腔深部

七〇四 撒布劑 二〇、〇

七〇四 明礬末 右撒布 各二、〇

七〇五 明礬末、澱粉 各二、〇

七〇六 綿球劑 右撒布 三〇、〇

七〇六 僱里設林 右含綿花栓塞 五、〇

七〇七 華攝林 右含綿球插入 三〇、〇

七〇八 明礬 右含綿球插入 五、〇

七〇八 華攝林 ラノリン 二〇、〇

七〇九 次硝酸鉛液 右含綿球插入 一五、〇

七〇九 酒精 石炭酸 三〇、〇

七〇九 水 右含綿球插入 八、〇

七〇〇 阿片越幾斯 僱里設林 三〇〇、〇

七〇〇 阿片越幾斯 僱里設林 四〇、〇

七〇二 沃度 右含綿球插入腔內 五、〇

七〇二 沃度丁幾 僱里設林 二〇、〇

七〇二 右蘸綿球插入 一七五、〇

七〇三 沃度仿漢 クマリ 一〇、〇

七〇三 右撒布綿球插入 〇、一

七〇三 イヒチオール 僱里設林 二、五

七〇三 右含綿球插入腔內 五〇、〇

七〇四 硫酸銅水(一〇、〇)一〇〇、〇

七〇五 硝酸銀水 右塗布膠粘膜 (一、〇—一、六)二〇、〇

七〇六 硝酸銀水 右塗布 六、〇

七〇七 明礬 單軟膏 三〇、〇

七〇八 硝酸銀水 (一〇%)一〇〇、〇

七〇九 單寧酸水 右塗布 (四〇、〇)八〇、〇

七〇九 單寧酸水 (四〇、〇)八〇、〇

七〇九 單寧酸水 (四〇、〇)八〇、〇

七〇九 單寧酸水 (四〇、〇)八〇、〇

七〇九 單寧酸水 (四〇、〇)八〇、〇

七〇九 單寧酸水 (四〇、〇)八〇、〇

七〇九 單寧酸水 (四〇、〇)八〇、〇

七〇九 單寧酸水 (四〇、〇)八〇、〇

七〇九 單寧酸水 (四〇、〇)八〇、〇

右塗布

七〇元 單寧酸 一、〇一四、〇

備里設林

三〇、〇

右塗布

七二〇 單寧酸 二、〇一三、〇

備里設林

二〇、〇

右每三日塗布一回

七二二 單寧酸 二、〇

酒精、錫水

各五、〇

備里設林

一〇、〇

右以綿花塗布

七二二 格魯謨酸、錫水 各五、〇

右塗布

七二三 沃度丁幾、沒食子丁幾 各一〇、〇

右塗布

七二四 沃度加留謨 一、〇

沃度

〇、五

備里設林

三〇、〇

右塗布

七二五 沃度仿謨 一、〇

備里設林

一〇、〇

薄荷油

二滴

右塗布膠粘膜潰瘍面

七二六 沃度仿謨 三、〇

百露拔兒撒謨

一、〇

備里設林軟膏

二四、〇

右塗布潰瘍面

●洗滌劑 七二七 明礬水 (四、〇)三〇〇、〇

右洗滌

七二八 明礬 二〇、〇

右分十包以一包加一里埤兒

之溫水洗滌 七二九 單寧酸水 (三、〇)三〇〇、〇

右洗滌

七三〇 石炭酸水 (五、〇)五〇〇、〇

右洗滌

七三一 撒里矢爾酸水 (一、〇)三〇〇、〇

右洗滌

七三二 撒里矢爾酸水 (五、〇)五〇〇、〇

右洗滌

七三三 撒里矢爾酸水 (五、〇)五〇〇、〇

右洗滌

七三三 硫酸 六、〇

右洗滌

水 四〇〇、〇

右洗滌

七三四 格魯兒酸加留謨 六、〇

水

四〇〇、〇

右洗滌

七三五 格魯兒石炭酸 (五、〇)五〇〇、〇

右洗滌

七三六 過滿飽酸加留謨 二、〇

水

四〇〇、〇

右洗滌

七三七 硫酸亞鉛水(四、〇)三〇〇、〇

右洗滌

七三六 硫酸亞鉛水 (〇、八)一、二)四〇〇、〇

右洗滌

七三九 硫酸亞鉛 一〇、〇

明礬

二〇、〇

右分十包以一包加半里埤兒

之溫水洗滌

七三〇 硫酸亞鉛 一〇、〇

明礬

四〇、〇

右一茶匙加半里埤兒之溫水

洗滌

七三 クレタリン水 (二、五)五〇〇、〇

七三三 重炭酸那篤留漢水 (三、三)五〇〇、〇

七三二 硼酸 右類同洗滌 一〇〇、〇

七三一 安息香丁幾 一八〇、〇

七三〇 醋酸礬土水 右一食匙加一碗之水洗滌 一〇〇、〇

七二九 醋酸礬土水 一〇〇、〇

子宮腠部之侵蝕及潰瘍

Errosionen untl. Geschwüre an der Portio vaginalis.

七二五 右加半里埤兒之水洗滌

七二四 醋酸礬土水 (二、〇—三、〇)一〇〇〇、〇

七二三 右洗滌 右加半里埤兒之水洗滌

七二二 右二茶匙乃至四茶匙和一里

七二一 揮兒之水洗滌 一〇〇、〇

七二〇 焦性木醋 右二食匙加一里埤兒之水洗

七一九 沃度加留漢水 五、〇

七一八 沃度丁幾水 一七〇、〇

七一七 右一食匙加一里埤兒之水洗滌

七一六 苦麗阿林 〇、五—一、〇

七一五 硼酸末 右吹入膠內 二五、〇

七四一 單寧酸 一〇〇、〇

七四〇 赤酒 右洗滌 一〇〇、〇

七三九 過滿飽酸加留漢水(〇、四%) 一〇〇、〇

七三八 明礬水(二%—四%) 一〇〇、〇

七三七 沃度酸水(一〇%) 一〇〇、〇

七二六 右洗滌

七二五 右洗滌

七二四 右二茶匙乃至四茶匙和一里

七二三 揮兒之水洗滌

七二二 焦性木醋

七二一 右二食匙加一里埤兒之水洗

七二〇 右洗滌 硫酸亞鉛水(一%) 一〇〇、〇

七一九 右洗滌 塗布劑

七一八 單寧酸 右塗布 二〇、〇

七一七 備里設林 右塗布 二〇、〇

七一六 沃度丁幾、沒食子丁幾 各一〇、〇

七二〇 沃度加留漢水 一〇〇、〇

七一九 沃度丁幾水 一七〇、〇

七一八 右一食匙加一里埤兒之水洗滌

七一七 苦麗阿林 〇、五—一、〇

七一六 硼酸末 右吹入膠內 二五、〇

七二〇 硝酸銀 一〇〇—一、五

七一九 刺納林 八〇、〇

七一八 阿列布油 二〇、〇

七一七 右塗布子宮內 一〇、〇

七一六 イヒチオール 六〇、〇

七一五 刺納林 三〇、〇

● 右塗布 一〇、〇

● 插入劑

七五二 ゴゾール水(〇、五—二%) 二〇〇、〇

右含綿球插入

七五三 苦麗阿林水(〇、五—二%) 二〇〇、〇

右含綿球插入

七五四 アリストール 五〇、〇

右含綿球插入

七五五 石炭酸、酒精 各一、〇

沃度丁幾 二、〇

僱里設林 一〇、〇

右含綿花插入子宮頸管 五、〇

七五五 ノヒチオール 僱里設林 一〇〇、〇

右含綿球插入

七五六 沃度丁幾 僱里設林 一〇〇、〇

右含綿球插入

七五七 沃度加留謨 僱里設林 一五、〇

右含綿球插入

七五八 沃度仿謨 僱里設林 一〇、〇

或沃度兒 一〇、〇

僱里設林 一〇〇、〇

單寧酸 一〇、〇

右含綿球插入

七五九 昇汞 〇、〇—

イヒチオール 〇、二

滑石末 〇、六五

亞拉昆亞護謨末 〇、〇四

僱里設林 〇、〇五

餾水 〇、〇五

右全量爲一瓦之桿注意插入

子宮頸 五〇、〇

七六〇 硫酸銅水(十%) 右腐蝕用 六、〇

單寧酸 一、〇

阿片丁幾 三五、〇

僱里設林 水朝夕灌腸

右一二食匙加一里埤兒之溫

七六一 鹽酸莫爾比涅 〇、五

柯柯阿脂 一〇、〇

右爲坐藥五個送入腔內

格魯布性及實扶的里性膠炎 Colpitis cronposa et diphtherica.

七六二 石炭酸水(二%—四%) 五〇〇、〇

右洗滌

七六三 昇汞水(〇、一%) 五〇〇、〇

右洗滌

七六四 知母兒水(一、〇%) 三〇〇、〇

右洗滌

七六五 過滿俺酸加里水(〇、五%) 五〇〇、〇

右洗滌

膾癩癢 Spasmus vagina

膾知覺過敏 Vaginismus.

●洗滌劑

七六六 ゴーラルド水 五〇、〇

右洗滌

七六六 硫酸銅水(一〇%) 一〇〇、〇

右洗滌

七六六 別刺敦那藥浸

(二〇、〇)二〇〇、〇

杏仁水

右一回(食匙)八〇〇、〇至

一〇〇〇、〇之水洗滌膾內

七六七 レゾルチン水(一%)

一〇〇、〇

右洗滌

●塗布

七七一 硝酸銀水(二、五%) 四〇、〇

右塗布

七七二 阿片越幾斯

豚脂

右一日一回塗布膾外口

七七三 別刺敦那越幾斯

豚脂

右一日一回塗布膾外口

七七四 鹽酸古加乙濕

石炭酸

〇、二

一〇、〇

七七五 鹽酸古加乙濕

右塗布

一〇、〇

三〇、〇

酒精

右塗布

七七六 沃度仿謨末

石炭酸

薄荷油

右塗布

七七七 沃度仿謨華設林(五%)

右塗布

七七八 鉛糖水(二%)

右塗布

右罨法

七七九 別刺敦那越幾斯

柯柯阿酪

右爲球、送入膾內

〇、〇五

二、〇

三〇、〇

三〇、〇

三〇、〇

三〇、〇

陰門搔痒 Pruritus pudendorum, Pruritus vulvae.

陰痒、前陰癬、陰戶癢癬

●洗滌劑

七八〇 明礬、皓礬

水

各三、〇

三〇〇、〇

右洗滌膾內

七八一 炭酸那篤留謨

留水

一、五—五、〇

一〇〇、〇

七八二 石炭酸偏里設林(二〇%)

右洗滌

一、二

三〇、〇

右一週間塗布一二回

七八三 石炭酸

六、〇

儼里設林

二〇、〇

水

七四、〇

右塗布

●塗布劑

七八四 鹽酸古加乙涅

〇、二

緩和軟膏

二〇、〇

右塗布

七八五 鹽酸古加乙涅

〇、二一、〇

石炭酸

一〇、〇

餾水

一〇、〇

右塗布

七八六 明礬、樟腦

各一、〇

刺納林

三〇、〇

右塗布

七八七 石炭酸

一、〇

陰門炎

Vulvitis

七八八 硫酸亞鉛

四、〇

水

二〇〇、〇

第七篇 運動器系諸病

水

三〇、〇

右塗布

七八八 石炭酸、亞爾個保兒各一〇、〇

右塗布

七八九 硝酸銀

二五、〇—三〇、〇

餾水

七八九 昇汞水(1%—2%)

一、〇—二、〇

石炭酸

安息香酸亞鉛華軟膏

五〇、〇

右塗布

七八九 嚼囉仿謨

三〇、〇

甘扁桃油

七八九 木菱兒

四、〇

右塗布

亞爾個保兒

三〇、〇

七八九 沃度仿謨

一、〇

七九〇 酸化亞鉛

軟膏

三、〇

右塗布

七九〇 硼酸那篤留謨

儼里設林(20%)

五〇、〇

右塗布

七九〇 鹽酸莫兒比涅

硼酸那篤留謨

三〇、〇

餾水

七九〇 硫酸亞鉛、醋酸鉛

右塗布

〇、〇—二、〇

右塗布

七九〇 酸化亞鉛

樟腦

各一〇、〇

澱粉

七九〇 重碳酸曹達、米粉

右塗布

三〇、〇

右塗布

各一〇、〇

僂麻質斯 Rheumatismus

筋肉僂麻質斯 R. musculi-rum

傷冷毒、傷風、涼麻質斯、僂麻斯性筋痛、舊譯作肌肉風濕痛、又名肉筋風濕、又名肌痺、古謂之肉痺、筋痺

●散劑

七二〇 撒里安甯酸那篤留謨 四、〇

右分四包一日四回每回一包

七二〇 鹽酸必魯加兒必連 〇、〇二

白糖 〇、五
右煎服

●水劑

七二〇 機那皮 一〇、〇

瀕草根 八、〇
右煎出

橙皮舍利別 四〇〇、〇
右每二時一食匙

七二〇 沃度加留謨 二、〇

鹽酸莫兒比連 〇、〇三
水 一八〇、〇

單舍利別 一五、〇
右每二時一食匙

七二〇 抱水格魯刺爾 一、五

亞拉昆亞護謨漿

單舍利別 各三〇、〇
右一日三回分服

●丸劑

七二〇 乳酸鐵 四、〇

右健質亞那末、健質亞那越
幾斯各適宜爲六十九、朝夕
三粒乃至四粒

●注射劑

七二〇 安知必林 一、〇
右注射皮下

七二〇 石炭酸水(一%—三%) 二、〇
右隔日乃至三日以一筒注射

患部之皮下 一〇、〇
右注射皮下

七二〇 鹽酸古加乙連(一%) 一〇、〇
右注射皮下

七二〇 鹽酸莫爾比連 〇、五

二〇、〇
右每回一筒注射皮下

七二〇 鹽酸莫爾比連 〇、五
俾里設林 五、〇

水 五、〇
右每回一筒至二筒注射皮下

七二〇 塗布劑 一、〇
右塗布患部

七二〇 洑拉馬里連 五〇、〇
豚脂 五〇、〇

七二〇 結晶アコニチン 〇、一
酒精 十滴
右塗布患部

七二〇 ラノリン 一〇、〇
右塗布

七二〇 亞爾個保兒 五〇、〇
芥子油 二十五滴

七二〇 右塗布疼痛部 五〇、〇
芥子精

| | | | | | |
|-------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|
| 依的兒性瑞香丁幾 | 一、〇 | 芳香精 | 二五、〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 樟腦 | 三、〇 | 刺賢坪兒精 | 二五、〇 | 菲沃斯油 * * | 二〇〇、〇 |
| 寬麻子油 | 五、〇 | 右塗布 | | 嚼囉仿謨 | 五、〇 |
| 右塗布 | | 七三九 芳香精、樟腦精、芥子精 | 各二五、〇 | 右塗布 | |
| 七二五 阿片丁幾 | 一五、〇 | 右塗布 | | 七三三 豚脂 | 四〇、〇 |
| 嚼囉仿謨、樟腦油 | | 七三〇 樟腦 | 一〇、〇 | 嚼囉仿謨 | 一五、〇 |
| 菲沃斯油 | 各一五、〇 | 刺賢坪爾油 | 六滴 | 拔爾撒謨油合劑 * | 五、〇 |
| 右塗布 | | 酒精 | 五〇、〇 | 右一日塗布三回 | |
| 七二六 イヒチオール | 五、〇 | 安母尼亞水 | 一五、〇 | 七三四 嚼囉仿謨 | 二五、〇 |
| 刺納林 | 一〇、〇 | 右塗布 | | 阿列布油 | 二五、〇 |
| 右塗布 | | 七三二 安母尼亞水 | 二四、〇 | 右塗布 | |
| 七二七 別拉敦那越幾斯 | 一、〇 | 刺賢坪兒精、迷迭香精 | 各三六、〇 | 七三五 アツエトン、阿列布油 | 各一〇、〇 |
| 單軟膏 | 二〇、〇 | エルギニス水 * * | 一、〇 | | |
| 右塗布 | | | | | |
| 七二八 蟻精 | 五〇、〇 | | | | |

關節癱瘓質斯 Rheumatismus articularum

急性關節癱瘓質斯 Rheumatismus articularum acuta

急性癱瘓質斯性多關節炎 Polyarthritus rheumatica acuta.

急性骨節癱瘓質私、急性癱瘓質斯性關節炎、白虎歲節風、白虎風痛

慢性關節癱瘓質斯 Rheumatismus articularum chronicus.

舊譯作新風濕

舊譯作久風濕、又名遠年風濕骨痛

慢性僂麻質斯性關節炎

Arthritis rheumatica chronica.

慢性骨節僂麻質斯、僂麻質私性痛風、痛風、風濕、中濕、濕痛

小兒僂麻質斯

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----------|-------|---------|-----------|------------|-------|----------------|------|---------|-------|
| ●水劑 | 七三六 | 撒里矢爾酸 | 一〇〇、〇 | 七三〇 | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 四〇、〇 | 七三五 | 沃度加留謨 | 五〇、〇 | | |
| 水 | 七三六 | 橙皮舍利別 | 一八〇、〇 | 水 | 七三〇 | 橙皮舍利別 | 二〇〇、〇 | 水 | 七三五 | 古魯矢屈謨丁幾 | 二〇〇、〇 |
| 右每二時一食匙 | 七三六 | 撒里矢爾酸利去謨 | 五〇、〇 | 右半時間內分服 | 七三〇 | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 五〇、〇 | 右一日三回每回一食匙 | 七三五 | イヒチオール | 一〇〇、〇 |
| 水 | 七三七 | 撒里矢爾酸利去謨 | 五〇、〇 | 水 | 七三五 | 生委舍利別 | 五〇、〇 | 右一日三回每回十五滴至二十滴 | 七三五 | 醋酸加留謨 | 五〇、〇 |
| 水 | 七三七 | 橙皮舍利別 | 二五〇、〇 | 右每二時一食匙 | 七三五 | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 五〇、〇 | 海葱醋 | 七三五 | 醋酸安母紐謨液 | 一〇〇、〇 |
| 水 | 七三七 | 撒里矢爾酸利去謨 | 五〇、〇 | 甘草糕 | 七三五 | 右每一時至二時一食匙 | 一五〇、〇 | 右每時一食匙 | 七三七 | 醋酸安母紐謨液 | 二〇〇、〇 |
| 水 | 七三六 | 橙皮丁幾 | 五〇、〇 | 水 | 七三五 | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 四〇、〇 | 桂皮水 | 七三七 | 桂皮水 | 一三〇、〇 |
| 嚼囉仿謨水 | 七三六 | 嚼囉仿謨水 | 一二〇、〇 | 嚼囉仿謨水 | 七三五 | 嚼囉仿謨水 | 一〇〇、〇 | 單舍利別 | 七三七 | 單舍利別 | 三〇〇、〇 |
| 右一日數回分服 | 七三六 | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 四〇、〇 | 單舍利別 | 七三五 | 單舍利別 | 三〇〇、〇 | 右一日四回每回一食匙 | 七三七 | 單舍利別 | 三〇〇、〇 |
| 水 | 七三六 | 薄荷水 | 一〇〇、〇 | 薄荷水 | 七三五 | 薄荷水 | 二〇〇、〇 | 古魯矢鳩謨丁幾 | 七三五 | 古魯矢鳩謨丁幾 | 一二〇、〇 |
| 右一日四回分服 | 七三六 | 薄荷水 | 三〇〇、〇 | 單舍利別 | 七三五 | 單舍利別 | 三〇〇、〇 | | 七三五 | | |

阿片丁幾 二、〇

右每三時十滴至二十滴

七三九 格魯兒鳩謨酒 二、〇、〇

阿片丁幾 二、〇

右一日二回至四回最初四十

滴次回以後漸次減量

七四〇 格魯兒鳩謨丁幾 五、〇

單舍利別 二五、〇

右一日三回每回一茶匙至二

茶匙

七四一 古魯兒屈謨丁幾

實麥利斯丁幾 各五、〇

甘藷石精 一、〇

右每三時二十滴

七四二 古魯兒屈謨丁幾 二〇、〇

阿片丁幾 二、〇

雙蘭菊丁幾 二、〇

右一日三回每回二十滴

七四三 實麥利斯葉浸

(二、〇)二〇、〇

硝酸加留謨 四、〇

古魯兒屈謨丁幾 五、〇

單舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙

七四四 實麥利斯浸 (〇、三)一〇〇、〇

硝酸加留謨 三、〇

格魯兒鳩謨丁幾 五、〇

右每一時一食匙

七四五 實麥利斯葉浸 (〇、三)一〇〇、〇

硝酸加留謨

硝酸那篤留謨 二、〇一三、〇

薄荷舍利別 二〇、〇

右每二時一小兒匙

七四六 實麥利斯丁幾 二、五

苦扁桃水 七、五

右一日三回每回十五滴至二

十滴

七四七 硝酸 一滴一二滴

單舍利別 六〇、〇

水 一〇〇、〇

右每二時一小兒匙

七四八 抱水格魯刺兒 五、〇

水 二〇、〇

椶皮舍利別 二〇、〇

右一回半量

七四九 抱水格魯刺兒 三、〇

貌魯謨加留謨 四、〇

椶皮舍利別 五〇、〇

水 一〇〇、〇

七五〇 醋酸コルヒチン五、〇一八、〇

醋酸莫爾比涅 〇、〇三

硝酸加留謨 二、〇

餾水 一六〇、〇

杏仁水 一〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右每時一食匙

七五一 炭酸加留謨 五、〇

醋酸(飽和)

餾水 五〇、〇

單舍利別 二五、〇

右每二時一食匙

七五二 クロラールアミール

水 三、〇

稀鹽酸 二〇、〇

單舍利別 四滴

右頓服 一五、〇

七五五 プロピールアミーン 二十滴

蒸餾水 一五〇、〇

橙皮舍利別 一五、〇

右一日六回毎回一食匙

七五四 クロラールフォルムアミード 二、〇一三、〇

赤酒 三〇、〇

右頓服

七五三 エキザルギン 二、五

薄荷舍利別 一五、〇

單舍利別 三〇、〇

水 一五〇、〇

右一日數回毎回一食匙

七五二 篤僧拔術撒謨了幾 一〇、〇

水 一〇〇、〇

ザロール 五、〇

亞拉昆亞護謨末 四、〇

篤拉侃篤護謨 〇、〇二

單舍利別 三〇、〇

右一日五回乃至十回毎回一

食匙

七五七 レゾルチン 三、〇

水 一二〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙

七五八 知母爾 二、〇

阿列布油 四、〇

亞拉昆亞護謨 二、〇

水 六〇、〇

右爲乳劑毎回一食匙乃至二

食匙

七五九 安知必林 一〇、〇

水 一五〇、〇

右一回二食匙

七六〇 安知必林 五、〇

橙皮舍利別 二五、〇

水 五〇、〇

右一日三回毎回一食匙

七六一 ザリピリン 六、〇

備里設林 一四、〇

覆盆子舍利別 三〇、〇

水 四〇、〇

右一日三回至五回毎三十分

間一食匙

七六二 安母尼亞水 一〇、〇

右一日數回毎回一滴

七六三 癩瘡木、茅根末 各四〇、〇

甘草根末 一〇、〇

水 一〇〇、〇

右煎出一日數回分服

七六四 デルオ撒里矢爾酸那篤留謨 二、〇

水 一五〇、〇

右朝夕一食匙

七六五 沃度加留謨 三、〇

水 一八〇、〇

單舍利別 一五、〇

右一日三回二日分服

七六六 沃度加留謨 一、〇

格魯矢鳩謨了幾 五、〇

單舍利別 七、〇

水 一〇〇、〇

右一日三回分服

七六七 沃度那篤留謨 八、〇

重碳酸那篤留謨 一六、〇

重碳酸加留謨 三〇、〇

亞砒酸加留謨液 六、〇

復方撒爾沙根煎 六〇〇、〇

右每食後一食匙

七六八 磷酸那篤留謨 五、〇

炭酸那篤留謨 〇、五

水 二、〇〇、〇

甘肅石精 二、〇〇

右一日四回每回一食匙

七六九 撒里失爾酸那篤留謨 〇、五

〇、五、一、〇、一、二、〇、一、三、〇

右分十包每時一包(二歲乃至十五歲)

七七〇 撒里失爾酸那篤留謨 三、〇

〇、一、五、〇

右分十包每時一包

七七一 撒里失爾酸那篤留謨 一、〇

〇、〇

七七二 安息香酸那篤留謨 一、〇

〇、〇

七七三 ザリチールアミード 〇、二

〇、一、〇、三

右爲散分三包一日三回每回一包

七三四 安知歌貌林 三、〇

〇、〇

七七五 安知必林 〇、二

〇、五

右分三包疼痛時一包

七七六 安知必林 一、五

〇、〇

右分三包一日三回每回一包

七七七 安知必林 一、〇

〇、〇

右分十包最初二包次回一包

七七八 ザリピリン 一、〇

〇、〇

隔一時間投與二三回

七七九 實麥答利斯末 〇、二

〇、一、〇、四

右一日三分服

七八〇 アンチテン非ン 〇、三

〇、一、〇、六

乃至十五歲)

七八一 アンチテン非ン 五、〇

〇、〇

七八二 マラキン 三、〇

〇、〇

右分六包一日二包乃至五包

七八三 マラキン 一、〇

〇、〇

右分十包一日三回乃至六回

七八四 ベンツアニリド 〇、一

〇、〇、四

右分三包一日三回每回一包

七八五 ザロール 〇、二

〇、五、一、一、〇

右分十包一日四回每回一包

七八六 ザロール 五、〇

〇、〇

(二歲乃至十五歲)

七八七 ザロール、薄荷油糖 各六、〇

〇、〇

右分十包每二時一包

七八八 ザロール、乳糖 各一、二、〇

〇、〇

五、〇

〇、〇

五、〇

〇、〇

五、〇

〇、〇

五、〇

〇、〇

五、〇

〇、〇

五、〇

〇、〇

五、〇

〇、〇

五、〇

〇、〇

五、〇

〇、〇

五、〇

〇、〇

右分十包一日五回乃至十回
每回一包

七三三 サリチン 一〇、〇

右分十包每二三時一包

七三四 サリチン 六、〇

右分六包每二時一包

七三五 マリゲニン 三、〇一六、〇

右分六包一日三回每回一包

七三六 サリゲニン 〇、五一一、〇

右分三包一日三回每回一包

七三七 鹽酸フェノコールム 〇、五一一、〇

右分三包一日三回每回一包

七三八 フェナツェチン 〇、二五一一〇、七五

右分五包一日五回每回一包

七三九 フェナセチン 二五、一五、〇

右分五包臨臥一包

七四〇 エキザルギン 一〇、一二、五

右分十包一日一回至三回每

回一包

七四一 オイフサリン 〇、五一一、〇

右爲散一日數回分服

七四二 アサプロール 〇、五一一、〇

右一日數回分服

七四三 重沃度撒里矢兒酸 五、〇

右爲十包一日二包乃至八包

七四四 撒里矢兒酸 三、〇

右分六包每二時一包

七四五 撒里矢兒酸 五、〇

右分五包每二時一包

七四六 撒里矢兒酸 五、〇一一〇、〇

右分十包每時一包

七四七 鹽酸規尼涅 一、〇

右分二包包於オブラート一

七四八 鹽酸規尼涅 〇、九一三、〇

日二回每回一包 一、五

右分三包每一時一包

七四九 重炭酸那篤留談 二〇、〇一四〇、〇

右一日數回分服(ゼナトール氏法合併症預防)

七五〇 質麥答利斯末 〇、二

硫酸規尼涅 〇、四

白糖 五、〇

七五二 甘末、金硫黃 各〇、五
白糖 五、〇

右分十包一日二回每回一包

七五三 甘末 〇、一〇、三

質麥答利斯末 〇、一

白糖 三、〇

右爲十包每二時一包

七五三 サリチン 〇、五一一、五

右分十五包一日五回每回一

七五四 硫黃華、燬性麻留涅良談 各二〇、〇

白糖、尚香油糖 各一〇、〇

右一日二回每回一食匙

●丸劑

七五五 安知撒魯林 二、〇

右爲二十九一日二回乃至四

七五六 安知撒魯林 二、〇

回每回五粒

七五七 亞拉比亞護末 一、〇

白糖 一、〇

右爲二十九一日二回乃至四

七五八 亞拉比亞護末 一、〇

白糖 一、〇

右爲二十九一日二回乃至四

七三七 鹽酸規尼滯 回每回五粒 〇、〇、六

實斐答利斯末 〇、〇、一

右爲丸一日三四分服

七三八 結晶アコニチン 〇、〇、〇、五

右甘草末甘草末適宜爲五十

丸一日二三粒

七三九 實斐答利斯末 一、五

鹽酸莫爾比滯 一、五

樟腦 二、〇

右爲四十九一日二回每回一

粒乃至二粒

七三〇 勃拉篤里滯 〇、〇、三

右甘草末甘草末適宜爲三十

丸一日三回乃至四回每回一

二粒

七三一 勃刺篤里滯 〇、〇、六

阿片 〇、〇、一

右亞拉比亞護謨末適宜爲三

十九一日三回每回一粒乃至

二粒

七三二 勃拉篤利滯 〇、一、五

右甘草末甘草末適宜爲三十九

七三三 瘰癧木脂、大黃末 每二三時一粒

藥用石鹼 各五、〇

右酒精適宜爲百丸一日三回

每回五粒

七三四 甘肅、金匱黃 各三、〇

瘰癧木脂 七、〇

右篤侃篤護謨漿適宜爲百丸

朝夕二粒乃至四粒

七三五 沃度那篤留謨 〇、一、五

右爲六丸一日三回每回二粒

●塗布劑

七三六 的列並油 二五、〇

樟腦石鹼擦劑 二五、〇

右塗布

七三七 的列並油 八〇、〇

樟腦 五、〇

加里石鹼 一〇、〇

右塗布

七三八 的列並油、亞麻仁油各三〇、〇

琥珀油、杜松子油 各一五、〇

石油 右擦布

七三九 勃拉篤利滯 〇、一、〇、五

嘔囉仿謨 一〇、〇

右塗布

七四〇 勃拉篤利謨 〇、〇、三

嘔囉仿謨 一五、〇

拔爾撒謨油合劑 三〇、〇

右塗布

七四一 勃刺篤里滯 一、〇

嘔囉仿謨 一五、〇

拔兒撒謨合劑 六〇、〇

右塗布

七四二 勃拉篤利滯 〇、一、〇、五

酒精 二滴—三滴

豚脂 一〇、〇

右朝夕塗布

七四三 撒里矢爾酸 二〇、〇

酒精 八〇、〇

嘔囉仿謨 一〇、〇—一五、〇

蓖麻子油 二〇〇、〇

右一日一回塗布

七四四 撒里矢爾酸、刺乃林 各一〇、〇

的列並底油 各一〇、〇

豚脂 一〇〇、〇

右一日一回塗布

七三三 樟腦丁幾 二〇、〇

右一日數回塗布

七三三 樟腦 一〇、〇

刺乃林 五〇、〇

右塗布

七三七 樟腦 一〇、〇

刺納林 五〇、〇

安息香丁幾 二〇、〇

右塗布

七三六 迷迭香油 一〇、〇

酒精 五〇、〇

右塗布墨法

七三六 沃度丁幾、沒食子丁幾 各三〇、〇

右塗布

七四〇 嘔囉仿謨、阿列布油各一〇、〇

右塗布

七四一 嘔囉仿謨 三〇、〇

單軟膏 一五、〇

右塗布

七四二 嘔囉仿謨、樟腦 各一五、〇

右塗布

七四三 嘔囉仿謨 三〇、〇

阿列布油 一五、〇

右塗布

七四四 嘔囉仿謨 一〇、〇

卵白 一個

彈力古魯胃謨 一五、〇

右塗布

七四五 芥子油 十滴

的列並油、石鹼精* 各二〇、〇

右塗布

七四六 芥子油 十滴

的列並底油 二五、〇

石鹼精 二〇、〇

右一日二回乃至三回塗布心

臟部

七四七 芥子油 一〇、〇

依的兒性瑞香越幾斯 一〇、〇

蓖麻子油 五〇、〇

酒精 二五、〇

右塗布

七四八 巴豆油 一〇、〇

古魯胃謨 一〇、〇

七四九 右塗布 三〇、〇

依的兒 二五、〇

甘扁桃油 〇、五

薄荷油 〇、五

右塗布

七五〇 沃度酸 二、五

豚脂 五、〇

右塗布

七五一 イヒチオール 一〇、〇

刺乃林 三〇、〇

右一日二回塗布

七五二 イヒチオール 各一〇、〇

刺乃林 三〇、〇

右塗布

七五三 イヒチオール、依的兒 各一〇、〇

右塗布

七五四 イヒチオール、格魯胃謨 各一〇、〇

右塗布

七五五 沃度丁幾* 沒食子丁幾 各一〇、〇

右塗布

七五五 沃度丁幾* 沒食子丁幾 各一〇、〇

右塗布

| | | |
|-----|-------------|-----------|
| 七五六 | 沃度仿謨 | 一〇〇 |
| | 豚脂 | 一〇〇 |
| 七五七 | 沃度仿謨、古魯謨質 | (一、〇)一五、〇 |
| | 右塗布 | |
| 七五八 | アツェトン | 一〇〇 |
| | 安母尼亞軟膏 | 一〇〇 |
| 七五九 | アツェトン、阿列布油 | 各一〇〇 |
| | 亞爾個保兒性苛性加里液 | 三〇〇 |
| 七六〇 | 結麗阿曹篤 | 一〇〇 |
| | 刺乃林 | 九〇 |
| 七六一 | 結麗阿曹篤 | 一〇〇 |
| | 酒精 | 九〇 |
| 七六二 | グアヤコール | 一〇〇 |
| | 阿列布油 | 五〇 |

| | | |
|-----|------------|------|
| 七六三 | 右塗布患部 | 一〇〇 |
| | 安母尼亞幾謨 | 一〇〇 |
| | 海葱醋 | 五〇 |
| 七六四 | 番椒末 | 二〇〇 |
| | 酒精 | 六〇〇 |
| | 右浸出 | |
| | 常用石鹼 | 三五〇 |
| | 水 | 一〇〇 |
| | 安母尼亞水 | 三〇〇 |
| | 樟腦 | 三〇 |
| | 迷迭香油、刺賢陸兒油 | 各一〇〇 |
| | 屬香草油、丁香油 | 各一〇〇 |
| | 桂皮油 | 一、五 |
| 七六五 | 默栗薩葉 | 九〇〇 |
| | 橙皮 | 一五〇 |
| | 機那皮 | 八〇 |
| | 丁香油 | 八〇 |
| | 肉豆蔻 | 八〇 |
| | 胡荽實 | 四〇 |
| | 白芷 | 四〇 |

| | | |
|-----|-----------|------|
| | 酒精 | 一五〇〇 |
| | 右浸出一日數回塗布 | |
| 七六六 | 石炭酸 | 一、五 |
| | 注射劑 | |
| 七六七 | 石炭酸水(二%) | 一〇〇 |
| | 右一筒注射皮下 | |
| 七六八 | 勃拉萬利涅 | 〇〇二 |
| | 酒精、水 | 各五〇 |
| 七六九 | 鹽酸必魯加兒必涅 | 〇〇二 |
| | 餾水 | 六〇 |
| 七七〇 | 檢水アミーレン | 四〇 |
| | 鹽酸莫爾比涅 | 〇〇一五 |
| | 水 | 五〇 |
| | 護謨漿 | 二〇 |
| | 右擦勝 | |
| 七七二 | 琥珀、安息香、乳香 | 各三〇 |
| | 靈貓香 | 二〇 |
| | 加斯加利刺皮 | 二〇 |
| | 右薰烟劑 | |

痛風 Gicht

一 作尿酸性關節炎、古謂之痺、痛風之名、始見於名醫別錄、又有風濕、中濕、濕痺、風濕痛、傷冷毒等名

尿酸性關節炎 Arthritis urica.

畸形性關節炎 Arthritis deformans. 舊譯作歪形關節炎

淋性關節膜炎 Arthromeningitis gonorrhoeica

●散劑

七七三 撒里失爾酸那篤留謨 四、〇

右分四包一日四回每回一包

七七四 撒里失爾酸那篤留謨 三、〇

右分三包每三時一包

七七五 撒里失爾酸那篤留謨 六、〇

右分六包一日三回每回一包

澤粉 五、〇

右分十包一日二三回每回一包

七七六 ザロフエン 一、五—三、〇

右分三包一日三回每回一包

七七七 ザロコロン 三、〇—六、〇

右分十包一日二回每回一包

七七六 サリチールアミード 一、〇—一、五

右分三包一日三回每回一包

七七九 サラツエトール 六、〇

右分五包一日三回每回一包

七八〇 安知必林 三、〇

右分三包一日三回每回一包

七八一 ビベラチン 三、〇

右分六包一日三回每回一包

七八二 炭酸利去謨 〇、五

白糖 二、〇

七八三 炭酸利去謨 〇、三—一、二

右分十包一日二回每回一包

白糖 三、〇

右分六包一日六回每回一包

七八四 炭酸利去謨 五、〇—一、〇、〇

重碳酸那篤留謨 一、五、〇—三、〇、〇

單寧酸 一、〇、〇—二、〇、〇

白糖 二、〇、〇—四、〇、〇

右一回一茶匙

七八五 貌魯謨金 〇、〇〇八—〇、〇一二

乳糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包

七八六 貌魯謨化樟腦 〇、五

白糖 一、〇

七三六 撒里突爾酸 右分三包一日三回每回一包 三、〇

七三六 サリチン或ザリゲニン 右分六包每二時一包 各五、〇

七三六 茴香油糖 右分十包一日三回乃至五回 每回一二包 各五、〇

七三九 炭酸加留謨 二、〇—一、〇、〇 右分十包一日二回乃至四回 每回一包 〇、〇五

七三九 加刺巴爾豆越幾斯 〇、〇五 貌魯謨加留謨 五、〇

七三九 乳糖 五、〇 茴香油 十滴

七三九 旃那藥 二、〇 安息香酸那篤留謨 三、〇

七三九 格魯兒安母紐謨 二、〇 右分二十包每食前一包漸次 增量至一日八包 一、〇、〇

七三九 リツエトリル 一、〇、〇 右分十包一日三回每回一包

●丸劑

七三九 沃度利去謨 〇、二五 右龍膽越幾斯龍膽末適宜爲 二十丸一日三回每回一粒

七三九 古爾突鳩謨越幾斯 各二、〇 蘆薈末 右爲二十九一日二粒至四粒

七三九 コルヒチン 〇、〇二 亞爾答亞根末 四、〇

七三九 白糖 一、〇 右爲四十九一日一粒至五粒

七三九 硫酸亞魯魯比涅 〇、〇五 右甘草羔甘草末各適宜爲六 十九朝夕一丸

七三九 硝酸銀 一、五 右以白陶土爲百丸一日二粒

七三九 酸化亞鉛 七、〇 緬草越幾斯 七、〇

七三九 右蒲公英越幾斯適宜爲百二 十九一日四粒 〇、〇三

七三九 硫酸銅 〇、〇三 緬草酸亞酸 〇、〇三

七三九 硝酸銀 〇、〇五 非沃斯越幾斯 〇、〇三

七四〇 抱水プロマール 三、〇 右爲三十九一日三回每食後 一粒

七四〇 右爲五十粒一日二回每回三 粒

七四〇 瘰癧木末、大黃末 各五、〇 藥用石鹼

七四〇 右以酒精爲百丸一日三回每 回五粒乃至十粒

七四〇 サリピリン 一、〇—二、〇 右入膠囊六個一日三回每回 二個

●水劑 二、〇 沃度加留謨 一、八〇、〇

七四〇 水 一、五、〇 單舍利別 一、五、〇

七四〇 右一日三回二日分服 一、五、〇

七四〇 古爾矢屈謨酒 一、五、〇 右一日三回每回十滴乃至二 十滴

七四〇 古爾矢屈謨丁幾 一、五、〇 右一日三回每回十滴乃至二 十滴

七四〇 右一日三回每回十滴乃至二 十滴

●丸劑

七四〇 古爾矢鳩謨酒 一、二、〇

阿片丁幾 二、〇一三、〇

右一日三回每回十五滴

七三七 格魯矢鳩謨丁幾 五、〇

單舍利別 四、五、〇

右一日三回每回一茶匙

七四八 古爾矢屈謨丁幾 一、五、〇

泊芙蘭阿片丁幾 二、〇

右一日四回十五滴至二十滴

七四九 烏頭丁幾 二、〇

橙皮舍利別 五、〇、〇

右一日三回每回一茶匙

七四〇 烏頭丁幾 〇、五

古爾矢屈謨酒 一、〇、〇

右一日三回每回五滴至十滴

七四二 烏頭越幾斯 一、〇

古爾矢屈謨酒 二、〇、〇

阿片丁幾 二、〇

右一日四回每回十滴

七四三 烏頭越幾斯 一、〇

古爾矢屈謨酒 二、〇、〇

右一日四回每回十滴

七四三 安息香酸利去謨 一、〇、〇

桂皮水 一、五、〇、〇

右一日三四回每回半食匙乃

至一食匙

七四四 撒里矢爾酸利去謨 六、〇一八、〇

薄荷水 二、〇〇、〇

右一日三回二日分服

七四五 ビペラチン 〇、五一一〇一二、〇

炭酸水 一、〇〇〇、〇

右一日數回分服

七四六 沃度加留謨 八、〇一一〇、〇

水 二、〇〇〇、〇

右一日三回每回一食匙

七四七 貌魯謨那篤留謨 六、〇

水 二、〇〇〇、〇

右每二時一食匙

七四八 貌魯謨加留謨 一、〇、〇

橙皮舍利別 一、〇〇、〇

水 一、〇〇〇、〇

右一日三回分服

七四九 貌魯謨加留謨 六、〇

番木鱉丁幾 一、〇

水 一、二、〇、〇

右一日六回每回半茶匙

七四〇 貌魯謨加留謨 五、〇

貌魯謨安母紐謨 五、〇

單舍利別 七、五、〇

水 一、二、〇、〇

右每時一食匙

七四三 緬草酸亞篤魯比涅 〇、一

水 六、〇、〇

右一日三回每回三滴

七四三 プロロムエチレン 〇、一〇、三

阿列布油 二、〇、〇

亞拉比亞護謨末 一、〇、〇

右為乳劑 一、五、〇、〇

高香油糖 一、〇、〇

右一日三回每回一食匙

七四三 パラアルデヒド 三、〇一五、〇

橙皮舍利別 一、〇、〇

水 一、〇〇、〇

右二回分服

七四四 硫酸亞篤魯比涅 〇、〇、二

〇、〇、二

橙皮舍利別

水

右一日二回每五滴至十五滴

七四四 尿酸亞篤魯比涅

亞爾個保兒

右朝夕五滴

七四五 碳酸麻偏涅更謨

格魯矢鳩謨醋

橙皮舍利別

薄荷水

右每三時一食匙

七四六 酸化麻偏涅更謨

水

橙花水

白糖

右振盪每一時一食匙

七四七 磷酸那篤留謨

碳酸那篤留謨

水

甘硝石精

右一日四回每回一食匙

七四八 琥珀酸安母尼亞液

依的兒精

七四九 癩疥木

右每二時十滴乃至二十滴

甘草根

茴香

水

右煎出爲一〇〇、〇、〇一日數

七五〇 癩疥木脂

白糖

亞拉昆亞謨謨

右爲乳劑一五〇、〇

四回分服 一日三

●塗布劑

莫若越幾斯

豚脂

右塗布

七五一 イヒチオール

格魯胃謨

右塗布

七五二 イヒチオール

刺乃林

右塗布

七五三 イヒチオール、刺乃林

七五四 イヒチオール

右塗布

水

右塗布

七五五 イヒチオール

右塗布

水

右塗布

七五六 イヒチオール

華攝林

右塗布

七五七 嚼囉仿謨

阿列布油

右塗布

七五八 沃度加留謨

沃度

華設林

右塗布

七五九 沃度加留謨

沃度

各一五、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

豚脂 二〇、〇

右擦布

七四四二 結麗阿曹篤

酒精 一〇〇、〇

右塗布 一〇〇、〇

七四四三 結麗阿曹篤

刺乃林 一〇、〇

右塗布 一〇、〇

七四四四 グアヤコール

阿列布油 一、〇

右塗布 五、〇

七四四五 菲沃斯油

嚼嚼仿謨 三〇、〇

右塗布 三、五

七四四六 沃度

〇、三一、〇

豚脂 一〇、〇

右塗布

七四四七 的列並油、水 各二五、〇

亞麻仁油 一〇、〇

卵黃 一個

右一日塗布數回

七四四八 安知必林、水 各五、〇

右一日一回一筒注射關節附近皮下

七四四九 ビベラチン 一、〇一二、〇

酒精 二〇、〇

水 二〇〇、〇

右器法 五、〇

七四五〇 バラアルデヒド 一〇、〇

亞拉比亞護謨漿

水 一〇〇、〇

右洗腸

七五一一 貌羅謨加留謨 一、〇

碳酸石灰 一、〇

碳酸那篤留謨 三〇、〇

磷酸那篤留謨 五、〇

硫酸那篤留謨 五、〇

硫酸礬土 一、〇

硫酸鐵 三、〇

迷迭香油 一、〇

刺賢陸爾油 一、〇

スタフイザグリー丁幾 五〇、〇

右一浴料

佝僂病、英吉利病

Rachitis.

舊譯作小兒骨軟症、又名遲行、又名骨軟化、又名嬰兒骨軟症、古時亦稱佝僂病、又有龜胸、龜背、雞胸、駝背等、亦屬之

骨軟化病

Osteomalacie.

●散劑

七五二 炭酸加爾叟謨、茴香油糖

右一日數回每回一刀尖

各一〇、〇

七五三 磷酸石灰、碳酸石灰 各四、〇

加糖炭酸鐵 一、〇一二、〇

右分四包每食後一包

七四四 磷酸加爾叟謨 二、〇

磷酸 三、五

水 一五〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右一日三回每回一食匙、小兒

七四五 加糖炭酸鐵 一、〇

炭酸麻備涅叟謨 〇、五

白糖 一〇〇、〇

右一日三回每回一小刀尖、小兒

七四六 焦性磷酸鐵 一、〇

白糖 三、〇

右分十包一日二回乃至三回

七四七 每回一包 〇、五

七四八 磷酸 二、〇

白糖 〇、五

右分十包一日三回每回一包

七四九 肝油 〇、〇〇五

白糖 一〇〇、〇

右一日數回分服

七五〇 磷酸 〇、〇一

白糖 七〇、〇

右一日數回每回一茶匙

七五一 依的兒 二十滴

白糖 三〇、〇

腰筋炎 Proitis

適宜

七四六 吸角

腰部貼用

若干

進行性筋消削症(處方未曾有) Atrophia muscularis progressiva
假性肌肉肥大(處方未曾有) Pseudohypertrophia musculorum.

硫化水素 〇、二五

水 一〇〇、〇

右一日二回每回一茶匙

七四二 肝油 五〇、〇

右一日二回每回一茶匙乃至一食匙、小兒

七四三 沃度鐵舍利別 各一五、〇

單舍利別 右一日三回每回十滴乃至十

五滴

七四四 丸劑 〇、〇三

右爲二百九一日三回每回一

粒

第八編 全身病

第一節 不傳染性全身病

萎黃病 Chlorose, Chlorosis.

室女病、處女病、黃萎病、黃胖、浮苦病、舊譯作室女經閉、又名女子初經血薄症、又名綠病、脾勞、瘰癧、黃腫、又名良勞疔黃、食勞黃疽。

貧血病 Anæmie.

水血病 Hydræmie.

白血病 Leukæmie.

舊作黃瘰、又名血生白球症、又名白血輪過多症、又名脾疔、緣此病脾亦變大

處置

選食物、改生活法、為轉地療養、專與鐵劑健胃劑強壯劑等、要適宜之運動

●水劑

七四六 林檎酸鐵丁幾 二〇、〇

右一日三回每回二十滴

七四七 林檎酸鐵丁幾 三〇、〇

橙皮丁幾 三〇、〇

右一日三回每回十五滴

七四八 林檎酸鐵丁幾

橙皮丁幾 各一五、〇

右一日三回每回二十滴

七四九 林檎酸鐵丁幾 五〇、〇

橙皮丁幾 二〇、〇

杏仁水 一〇、〇

七五〇 林檎酸鐵丁幾

右每食後一食匙

七五一 林檎酸鐵丁幾 各五、〇

右每回五滴乃至十滴

七五二 林檎酸鐵丁幾 二〇、〇

亞砒酸加留謨液 五、〇

七五三 林檎酸鐵丁幾 二、五

亞砒酸加留謨液 五、〇

鹽酸規尼涅 二、五

右每食後二十滴漸次增量

七五四 林檎酸鐵越幾斯 二〇、〇

設里酒 一〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右一日三回每回一食匙

七四四 蛋白化鐵液 一〇〇、〇

或百布頓鐵液 右每食後一茶匙乃至半食匙

七四五 焦性磷酸鐵水 * 七〇〇、〇

右一日數回分服

七四六 酒石酸加留鐵 五、〇

林糖酒 八〇、〇

右一日三茶匙

七四七 格魯兒鐵 一、〇

稀鹽酸 〇、五

單舍利別 五〇、〇

右一日三回每回一茶匙

七四八 依的兒性醋酸鐵丁幾 一〇、〇

苦味丁幾 一〇、〇

右一日三回每回十五滴

七四九 可溶性加糖酸化鐵 五、〇

水 一五〇、〇

右一日數回分服

七五〇 可溶性酸化鐵液 五、〇

薄荷水 五〇、〇

水 一五〇、〇

桂皮舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

七五一 可溶性酸化鐵 五、〇

水 一〇〇、〇

桂皮水 一〇〇、〇

桂皮舍利別 二〇、〇

右每時一食匙

七五二 枸橼酸鐵 五、〇

設利酒 一八〇、〇

橙皮丁幾 二〇、〇

右一日三回每回一茶匙乃至一食匙

七五三 枸橼酸鐵安母紐謨 五、〇

設里酒 一〇〇〇、〇

右一日三回每回半酒盃至一酒盃

七五四 枸橼酸鐵安母紐謨 各五、〇

桂皮水 各五、〇

單舍利別 一九〇、〇

右一日三回每回一匙

七五五 枸橼酸鐵安母紐謨 五、〇

橙皮丁幾、單舍利別各一二、〇

設利酒 七〇、〇

右一日三回每回一茶匙乃至一小兒匙

七五六 枸橼酸安母尼亞加焦性磷酸鐵 一〇、〇

水 二〇、〇

單舍利別 九七〇、〇

右每回一食匙

七五七 枸橼酸安母尼亞加焦性磷酸鐵 一〇、〇

機那越幾斯 五、〇

自葡萄酒 一〇〇〇、〇

右一日數回每回一食匙

七五八 フェロピリン 〇、六

橙皮舍利別 二〇、〇

水 二〇〇、〇

右一日三回每回一食匙

七五九 フェリピリン 〇、五

水 一五〇、〇

右一日四回每回一食匙

七六〇 フェルピリン 〇、六

稀鹽酸 五滴

百弗聖涅 五、〇

水 二〇〇、〇

右每食後一食匙

七六一 ヘモガルロール 〇、五

一、二、五

右分爲五包 一日三回 每回一包

七四三

機那皮 六、〇
古倫僕根 三、〇
丁香 一、五
鐵粉 三、〇

右薄荷水浸三日間 七五、〇
芳香丁幾 一八、〇
橙皮丁幾 三、〇

右一日三回 每回二食匙 乃至四食匙

七四三

稀鹽酸 一、〇
含糖百布聖 一、八
單舍利別 八、〇

右每食後三回 分服 一〇〇、〇

七四四

亞砒酸加留謨液 五、〇
右一日三回 每食後二滴 乃至六滴

七四五

亞砒酸加留謨液 五、〇
林檎酸鐵丁幾 二〇、〇
硫酸規尼涅 二、〇

右一日三回 每回二十五滴

七四六

沃度加留謨 或沃度ストロンチウム 九、〇

水 一九二、〇
右一日三回 每回一食匙

七四七

肝油 一〇〇、〇
右朝夕一茶匙

●丸劑 一、〇
還元鐵 五、〇

七四九

機那皮末 五、〇
右爲五十九 一日三回 每回一粒

七四九

還元鐵、硫酸規尼涅 各一、五
右僱里設林適宜爲三十九 一日三回 每回一粒

七五〇

硫酸鐵 五、〇
重碳酸那篤留謨 五、〇

七五一

蒲公英越幾斯 適宜
右爲六十九 朝夕三粒

七五二

硫酸鐵 九、〇
炭酸麻僱涅叟謨 一、〇
右僱里設林適宜爲六十九 一日三回 每回二粒

七五三

日三回 每回二粒
硫酸鐵、炭酸加留謨 各一八、〇
篤拉侃篤護謨末 二、四

七五三

水 適宜
右爲百二十九 一日三回 每回三粒 乃至五粒

七五三

硫酸鐵、炭酸加留謨 各一五、〇
純精石 各一五、〇
右達拉侃篤護謨 適宜爲百九 一日六粒 至十五粒

七五四

硫酸鐵 二、〇
龍膽越幾斯 四、〇
右爲五十粒 一日三回 每回一粒

七五五

硫酸鐵、硫酸規尼涅 各二、五
右龍膽越幾斯、龍膽末 各適宜爲五十九 一日三粒 至六粒

七五六

硫酸鐵 五、〇
炭酸加留謨 五、〇
沒藥 一〇、〇

七五七

單舍利別 適宜
右爲百五十九 一日三粒 乃至八粒

萎黃病

四百五十九

七五〇

硫酸規尼涅

二、〇

白糖、亞拉尼亞護謨

各一、〇

右爲二十九一日三四回每回一粒

七五〇

硫酸鐵、白糖

各一、〇

炭酸加留謨

五、〇

蝦性麻僱涅更謨

〇、五

右亞爾答根末、僱里設林各適宜爲百五十九一日三回每回一粒至三粒

七五〇

硫酸規尼涅

三、〇

還元鐵

一、〇

龍膽末

一、〇

龍膽越幾斯

五、〇

右爲百二十九一日六粒

七五〇

硫酸規尼涅

〇、三

ワシチー氏丸劑*

四、〇

龍膽末

適宜

右爲三十九一日三回每回四粒

七五二

硫酸滿俺

二、五

硫酸鐵

七、五

炭酸那篤留謨

一、二、〇

蜂蜜

六、〇

單舍

適宜

右爲百五十九一日二粒乃至十粒

七五三 可溶性酸化鐵

五、〇

大黃末

五、〇

右蒲公英越幾斯適宜爲六十丸一日三回每回二粒

七五三 加糖炭酸鐵

五、〇

重炭酸那篤留謨

五、〇

右爲十九

酒石酸

五、〇

枸橼油糖

二、五

右爲十九

右每回各一粒

七五四 枸橼酸鐵

五、〇

右龍膽末龍膽越幾斯適宜爲六十九一日三回每回二粒

七五五 枸橼酸鐵

五、〇

單舍利別

一、〇

右亞爾答亞根末適宜爲百丸一日一粒乃至十粒

七五六 枸橼酸鐵

五、〇

右甘草羔甘草末各適宜爲百丸一日三回每回二粒

七五七 枸橼酸鐵規尼涅

五、〇

右白糖、護謨漿、僱里設林各適宜爲五十九一日三回每回一九

七五八 酒石酸鐵

一、〇、〇

大黃越幾斯、龍膽越幾斯、

七五九 格魯兒鐵安母紐謨

各五、〇

右睡菜葉末蒲公英越幾斯各適宜爲六十九朝夕二丸

七五〇 焦性磷酸鐵那篤留謨

二、〇

右蘆薈越幾斯適宜爲五十丸朝夕二粒

七五二 蘆薈

二、〇

大黃末

八、〇

亞拉尼亞護謨

四、〇

適宜

適宜

適宜

適宜

適宜

適宜

適宜

適宜

右爲百五十九一日二回每回
三粒

七五三 鐵粉 一五、〇

古倫僕根末 五、〇

大黃末、桂皮末 各二、五

右括矢亞越幾斯適宜爲百五
十九一日三四粒

七五三 林檎酸鐵越幾斯 五、〇

酸化鐵 五、〇

七五四 亞砒酸 〇、三一〇、五

胡椒末、蜀葵根末 各五、〇

右亞拉比亞護謨漿適宜爲九
十九一日二回每回一粒

七五五 蘆薈、脫水硫酸鐵、芳香散 各一〇、〇

玫瑰油糖 各一〇、〇

右爲百五十九一日二回每回
一二粒

七五六 蘆薈越幾斯 一、〇

沒藥越幾斯 四、〇

泊美蘭末 四、〇

格魯兒鐵、母紐謨 二、五

乳香 一、〇

右爲二百九朝夕五粒

七五七 蘆薈、硫酸鐵 各三、〇

芳香散、泥蒿根油糖 各三、五

七五八 有加利油 百滴

ビペリン、白蠟 各四、〇

蜀葵根末 七、五

七五九 磷 〇、〇六

嗎囉仿謨 三、〇

僱里設林 三、〇

右亞爾答根末、亞拉比亞護
謨末適宜爲百九一日三回每
回一粒

七五〇 散劑 〇、五

● 散劑 〇、五

七五一 高香油糖 一、〇

七五二 乳糖 二、〇

右分十包一日三回每回一包

七五三 乳酸鐵 〇、五一、〇

桂皮油糖 四、〇

右分十包一日二回乃至三回

七五三 每回一包 〇、五

七五三 乳酸鐵 〇、三

大黃根末 〇、三

白糖 三、〇

右分十包一日三回食前一包
小兒 各五、〇

七五三 加糖沃度鐵、乳糖 各五、〇

右分十包朝夕一包 〇、七

七五四 加糖沃度鐵 〇、三

大黃末 〇、三

白糖 三、〇

右分十包一日三回每回一包

七五五 加糖炭酸鐵 一、〇

乳糖 二、〇

右分六包朝夕一包 一、〇

七五六 加糖炭酸鐵 一、〇

白糖 五、〇

右分六包朝夕一包 五、〇

七五七 加糖炭酸鐵、白糖 各五、〇

重炭酸那篤留謨 五、〇

沒藥末、大黃末 各三、〇

右一日三回每回一小刀尖 一、〇

七五八 枸櫞酸鐵規尼涅 一、〇

大黃末

白糖

右分十包一日三回每回一包

〇、三
三、〇

七五元

鐵粉

右分二十包一日三回每回一包

一、〇
一〇、〇

七五四

泥菖根末

橙皮油糖

右分六包朝夕一包

〇、二
〇、八
五、〇

七五二

硫酸鐵

〇、二
五、〇

腺病

Scrofulose, Scrofulosis.

瘰癧性腺炎、小兒之胎毒、千金方謂之氣腫、世後謂之癭癧、已潰者又謂之癭、又名馬刀瘡、一名馬刀狹瘻

處置

精選食物、遊於新鮮空氣、食鹽浴海水浴、用肝油鐵沃度砒石之諸劑、腺腫、塗布沃度丁幾、或腺腫內行注射等

七五三

硫酸鐵

單寧酸

重碳酸那篤留謨

白糖

右一日三回每回一茶匙

七五三

鹽酸規尼涅

右分六包一日一回乃至二回每回一包

白糖

白糖

右分三包一日三回每回一包

七五五

ヘモール

二五、〇

七五四

フエラチン

右分二十包每日三回每回一包

七五七

鹽酸オレキシン

右分十包一日一包乃至二包

七五九

昇華硫黃

右一日三回每回一刀尖

七五九

亞砒酸加留謨液

右一箇注射皮下

二〇、〇

一〇、〇

二〇、〇

一〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

三、〇

六、〇

七五〇

肝油

右一日三回每回一茶匙乃至一食匙、小兒及大人

五〇、〇

●水劑

七五二

肝油

右朝夕半食匙至一食匙

五〇〇、〇

亞爾個保兒

薄荷油

五〇、〇

十滴

七五三

沃度鐵舍利別

右每二時一食匙

二、〇

八、〇

八〇、〇

七五三 沃度鐵舍利別 一〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右一日三回每回一茶匙

七五四 沃度鐵舍利別 五、〇

橙皮舍利別 一五、〇

右朝夕一茶匙

七五五 沃度鐵舍利別 一〇、〇

依的兒 一、〇

單舍利別 二〇、〇

右一日三回每回半食匙乃至一食匙

七五六 沃度加留謨 〇、五一二、〇

水 八〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右一日二三回每回一小兒匙

七五七 沃度加留謨 〇、五

水 一〇〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右一日三回二分服、三四

七五八 沃度仿謨 一、〇

肝油 二〇〇、〇

茴香油 〇、五

七五九 亞砒酸加留謨液 五、〇

桂皮水 五、〇

右一日三回每食後三滴乃至六滴

七六〇 林檎酸鐵丁幾 二〇、〇

亞砒酸加留謨液 五、〇

鹽酸規尼涅 一、〇

右一日三回每回十五滴至三十滴

七六一 苦味丁幾 一五、〇

林檎酸鐵丁幾 五、〇

右每食前十五滴

七六二 硫酸鐵 二、〇

沃度加留謨 二、五

桂皮舍利別 二、〇

水 二〇〇、〇

右一日二三回每回二食匙

七六三 硫酸規尼涅 一、〇

加糖炭酸鐵 二、〇

白糖 一〇、〇

右朝夕一刀尖

七六四 機那煎 一〇〇、〇

沃度加留謨 〇、六

單舍利別 八、〇

右一日三四回每回一食匙

七六五 荳蔻根浸 二〇〇、〇

亞拉比亞謨謨 四、〇

白糖 八、〇

右每二時一小兒匙、小兒

七六六 胡桃葉 五〇、〇

白葡萄酒 五〇〇、〇

右冷浸四十八時間漚過一日

二回每回一茶匙

七六七 鐵粉 二、〇

白糖 二、〇

右甘草末、水適宜為百九一

日一二回每回一粒乃至二粒

七六八 還元鐵 〇、六

沃度 一、〇

白糖 一、〇

右亞爾答根末適宜為四十九

一日二三回每回一粒至二粒

七六九 沃度仿謨 〇、五

右龍膽越幾斯、龍膽根末各
適宜爲百粒一日三四回每回
三粒至五粒

●散劑

七五〇 乳酸鐵、大黃末 各一、〇
白糖 二、〇

右分十包朝夕一包

七五二 乳酸鐵、大黃末 各一、〇
白糖 二、〇

右分十包朝夕一包

七五三 加糖炭酸鐵、白糖 各五、〇
右朝夕一小刀尖

●塗布劑

七五三 沃度丁幾、沒食子丁幾 各一五、〇

右一日塗布二回

七五四 沃度 一、〇

癩病

Leprosy, Elephantiasis Graecorum 古名亦同、出肘後備急方、天刑病、列布羅、又名癩、

又曰大麻瘋、又名癩風、又名大風癩疾、又名惡癩、又有惡疾惡血之稱、
處置 與以大楓子油、撒里矢爾酸、撒里矢爾酸那篤留謨、依比知阿兒、結麗阿曹篤等、疼痛用鹽莫、麻痺用
斯篤利幾尼涅、潰痛用製腐劑等、

沃度加留謨 三、〇
單鉛硬膏 四〇、〇

右一日塗布三回

七五五 沃度仿謨 三、〇
彈力格魯胃謨 四〇、〇

右塗布

七五七 沃度仿謨 一、〇
蓖麻子油、薄荷油 各一、〇

右塗布

七五七 水銀軟膏 二〇、〇
右塗布

右塗布

七五八 赤色沃度水 四、〇
華設林 四〇、〇

右塗布

七五九 格魯兒安母紐謨 五、〇
龍腦 一、〇

家豬脂 三〇、〇
右塗布

右塗布

●注射劑

七五〇 石炭酸 一、〇
水 三〇、〇

右注射腺實質內

七五二 過オスミユム酸 〇、一
水 一〇、〇

右每回五分之一乃至一筒注
射腺腫內

●溶劑

七五二 沃度溶 * 右一日一回

七五三 食鹽水 * 右一日一回

七五〇 大楓子油 一、〇一五、〇
右爲九一日三回分服 一七五五 鴉答利陣 一、〇

右一回以一密里之十分之二

注射皮下

七五六

鴉答利陣

一、〇〇、〇

橙皮丁幾

一〇〇、〇

右溶解每回十分之一乃至一

筒注射皮下

七五八

オイロフェーン

二、五

阿列布油

五、〇

ラノリン

五〇、〇

右布塗

七五八 ナフタリン、刺納林

(一、〇—一、五)二〇、〇

右塗布

矢荷兒陪克

Scorbutus. シケウルボイク、壞血病、牙疳、牙縫血、牙宣、

血斑病 Purpura.

血友病 Haemophilia.

失血病、出血病、血證、諸血、即有微傷而出血不止、古名易駁症、

七五九

●丸劑

麥角越幾斯

一、〇〇

單寧酸

一、〇〇

右爲三十九丸每二時一粒

七五二

硫酸規尼涅

〇、〇二

阿片越幾斯

〇、〇六

白糖

一、〇〇

右分十包一日三回每回一包

七五〇

●散劑

醋酸鉛

〇、二〇

阿片末

〇、一〇

白糖

三、〇〇

右分十包一日三回每回一包

七五三

硫酸規尼涅

〇、〇二

實艾答利斯末

〇、〇三

阿片越幾斯

〇、〇六

白糖

四、〇〇

右分十包一日三回每回一包

七五九

●水劑

醋酸鉛、拖湧兒氏散

各〇、二〇

白糖

三、〇〇

右分十包一日三回每回一包

小兒

七五四

●水劑

麥角越幾斯

一、〇〇

阿片丁幾

三滴

單舍利別

二〇、〇

水

一〇〇、〇

右每二時一茶匙

七五五

明礬

二、〇〇

沙列布漿

一〇〇、〇

阿片丁幾

三滴—六滴

右每二時二茶匙

七五六

過格魯兒鐵液

一、〇〇

水

一〇〇、〇

橙皮舍利別

三〇、〇

右每二時一茶匙

七五七

過格魯兒鐵液

一、〇〇

水

六〇、〇

桂皮舍利別

二〇、〇

七五八 右每二時一茶匙、小兒
枸橼汁 三〇、〇

右一日數回分服

七五九 枸橼汁 三〇、〇
單舍利別 一〇、〇

右一日三回分服

七六〇 枸橼酸 一、〇
單舍利別 二〇、〇—三〇、〇

右每二時二茶匙

七六一 常醋 八、〇
單舍利別 二五、〇

右每二時一食匙

七六二 稀鹽酸 〇、三一〇、五
水 八〇、〇

覆盆子舍利別 *
右每三時一小兒匙

七六三 稀鹽酸 二、〇
橙皮舍利別 二〇、〇

右每二時二茶匙

七六四 稀鹽酸 二、〇

單舍利別 二五、〇
水 二〇、〇

右一日數回分服

七六五 磷酸單母奈瑤 二五〇、〇
右每二時二茶匙

七六六 稀硫酸 一、〇
單舍利別 二〇、〇

右每二時二茶匙

七六七 規那煎 (二五、〇) 二〇〇、〇
ハルレル氏酸性越歷矢兒

單舍利別 一五、〇

七六八 機那煎 (二〇、〇) 一〇〇、〇
稀鹽酸 二、〇

單舍利別 二〇、〇

七六九 酒石酸 五、〇
白糖 三〇、〇

水 二〇〇、〇

七七〇 硫酸那篤留謨 二、〇

水 二〇〇、〇
右每二時二茶匙

●塗布劑

七七一 撒里矢爾酸 一、〇
亞爾個保兒 三〇、〇

水 三〇、〇

●含嗽劑

七七二 過磷酸加留謨 〇、〇—五
水 三〇〇、〇

七七三 格魯兒酸加留謨 四、〇
水 二〇〇、〇

七七四 機那煎 (二五、〇) 二〇〇、〇
稀鹽酸 二、〇

沒藥丁幾 五〇、〇
蜂蜜 三〇、〇

右含嗽 五、〇

七七五 サロール 一〇〇、〇
亞爾個保兒 一〇〇、〇

コセニール丁幾 四〇、〇—五〇、〇
薄荷油 二滴

蕎麥油

三滴

右合嗽

ノタニヤ丁幾

一〇〇、〇
二〇〇、〇

三七〇 明礬、機那皮末、菩提樹木炭末
丁子油 各適宜
右爲齒磨劑

三七六 山蒼菜精

四〇、〇

右合嗽

糖尿病、蜜尿病 Diabetes mellitus.

甘蔗、甘血、糖血病、食饑、渴之病、蜜譯作尿變甜、又名消腎、又名消渴尿多、又名消渴小便甜、卽中
消症、消渴之名、始於金匱、或作多渴病、
處置 嚴守飲食攝生、專攝肉類、禁糖粉質、其他轉地靜養、運動適宜、藥劑主與物質性鹽類、

●散劑

三七八 撒里矢爾酸

五、〇

右分六包一日六回每回一包

●乳劑

三七四 安知必林

五、〇

右分十包一日三回每回一包

三七九 安息香酸

乳糖

二、〇

右分十包每二時一包

三七五 阿片末

一、〇

重碳酸那篤留謨

三七〇 安息香酸、護謨酸

各二、〇

右分十包每二時一包

三七六 硫酸規尼涅

一、〇、一、〇

右分二十包一日四包至五包

三七二 撒里矢爾酸那篤留謨

貌羅謨那篤留謨

各一、五

重碳酸那篤留謨

三七七 吉納末

七、五

右分三包一日三回每回一包

三七三 エキサルギン

〇、三一〇、六

右分十包一日三回每回一包

阿片末

〇、五

右分二十包一日三回每回一包

三七三 ザロール

一〇、〇

●丸劑

三七六 撒里矢爾酸

五、〇

安息香酸利去母

一〇、〇

甘草蒸、甘草末

各適宜

右爲百丸一日五粒乃至六粒

三七三 撒里矢爾酸利去謨

五、〇

安息香酸利去謨

一〇、〇

右甘草末、甘草蒸適宜爲百

丸一日五粒乃至六粒

三七〇 阿片越幾斯

〇、一五

右甘草蒸、甘草末各適宜爲

十九一日四五粒

三七二 單寧酸

一、五

右甘草末及甘草蒸適宜爲三

十九每二時二粒

糖尿病、蜜尿病

四百六十七

七六三 サツカリン 三、〇

重碳酸那篤留膜 二、〇

滿那 六、〇

右爲錠百個每回以咖啡或茶

服一個

七六三 阿片 〇、六

甘草末 二、〇

甘草羔 一、〇

右爲三十九一日五回每回一

粒

七六四 阿片末 一、五

藥用石鹼 六、〇

稀酒精 適宜

右爲百五十九一日五回每回

一二粒

七六五 阿片 一、〇

別刺敦那越幾斯 一、〇

右甘草羔、甘草末各適宜爲

三十九一日三粒

七六六 阿片越幾斯 各一、〇

別刺敦那越幾斯 各一、〇

右甘草末及甘草越幾斯適宜

爲三十九一日三粒

七六七 沃度仿謨 一、〇

蒿苳越幾斯 一、〇

クマリン 〇、一

右爲二十九一日一粒至二粒

沃度仿謨 一、五

右龍膽越幾斯、龍膽末各適

宜爲三十九一日四回每回一

粒

七六八 石炭酸 五、〇

右健質亞那越幾斯適宜爲五

十九一日三回每回二粒乃至

四粒

七六九 ザロール 五、〇

澱粉 一、〇

右爲錠十個每二時一個

乾燥重碳酸那篤留膜 二、〇

マンニント 五、〇

ザッハリン 三、〇

右爲百九一日三回每回三粒

七七〇 麥角越幾斯 一、五

右甘草羔適宜爲二十九一日

三回每回一粒

七七一 コデイン 〇、五

亞爾答亞根末 二、〇

右以單舍利別爲二十九每日

一二粒

七七二 磷酸コデイン 〇、五

右爲五十九一日三回每回一

粒

七七三 ミルチリ越幾斯 〇、一二

右爲十九一日三粒乃至六粒

水劑

七七四 亞砒酸加留膜液、杏仁水 各七、五

右一日三回每回二滴、漸次

增量

七七五 亞砒酸加留膜液 五、〇

水 二、〇

右一日三回每回十二滴、漸

次增量

七七六 亞砒酸加留膜液 各二、〇

單阿片丁幾 二五、〇

複方機那丁幾

右每食後十二滴

七七七 撒里矢爾酸那篤留膜 四、〇

水 二〇〇、〇

右一日數回分服

七六五 撒里矢爾酸那篤留謨 五、〇

水 一五、〇

桂皮舍利別 一〇〇、〇

右一日三回分服

七六一 撒里矢爾酸那篤留謨 五、〇

水 一五〇、〇

甘草羔 五、〇

右每二時一食匙

七六二 乳酸 五、〇

水 二五〇、〇

單舍利別 五〇、〇

右一日數回分服

七六三 乳酸 五、〇

水 一〇〇〇、〇

芳香水 * 二〇、〇

右每二時半盞

七六四 醋酸那篤留謨 二〇、〇

水 二〇〇、〇

サッカリ 〇、三

橙皮油 五滴

右一日數回分服

七六五 醋酸那篤留謨 三〇、〇

サッカリン

〇、三

水 五滴

枸橼油 三〇〇、〇

右一日數回分服

七六六 酒石酸那篤留謨 一五、〇

水 一六〇、〇

右一日數回分服

七六七 碳酸那篤留謨 一〇、〇

水 五〇、〇

或醋 七五、〇

水 五〇、〇

右一日數回分服

七六八 磷酸 一五、〇

水 一〇〇、〇

枸橼汁 一〇〇、〇

右一日三回每回一茶匙

七六九 枸橼酸 五、〇

水 一〇〇、〇

偏里設林 四、〇

右一日數回二日分服

七六〇 偏里設林 二〇、〇

水 一〇〇〇、〇

枸橼酸 一〇、〇

右一日數回分服

七六一 エキザルゲン 二、五

水 五、〇

橙皮丁幾 一二〇、〇

水 三〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右朝夕一食匙

七六二 烏華烏兒葉煎 一〇〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙

七六三 烏華烏兒葉煎 一〇〇、〇

水 二〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

七六四 ザッハリン 一、〇

咖啡涅 〇、三

安知必林 三、〇

水 一〇〇、〇

右一日二回分服

七六五 ザッハリン 一、〇

重碳酸那篤留謨 一、〇

水 一〇〇、〇

右每回一茶匙

七六六 安知必林 五、〇

咖啡浸 (一〇、〇) 一〇〇、〇

サツカリン 〇、一

右一日二三食匙

七六七 石炭酸 〇、五

生姜舍利別 一五、〇

水 一〇〇、〇

右每二時一食匙

七六八 石炭酸 一、〇

蒸餾水 二一〇〇、〇

淡尿崩 Diabetes insipidus.

單純性尿崩、舊譯作消渴尿清、又名尿多而清、單尿崩、尿崩、無味尿、消渴、渴利、渴病、

●水劑

七六七 耶僕蘭日葉浸 (二、〇) 五〇、〇

右一日一回頓服

七七四 續草根浸 (五、〇) 一〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右一日數回分服

七七五 僱里設林 二、〇 一五〇、〇

水 一〇〇〇、〇

右一日數回分服

枸橼酸 五、〇

七六九 橙皮舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

七六九 石炭酸 五、〇

水 一五、〇

薄荷水 五〇、〇

右一日二回乃至四回每回一茶匙

七七〇 流動ヤンブール越幾斯 一〇〇、〇

右一日三回每回二〇、〇

右一日三回每回一茶匙

右一日三回每回一茶匙

右一日六回每回一小兒匙、

小兒 散劑

七六一 阿片末 〇、一 五一〇、三

●注射劑 七七一 鹽酸必魯加爾必涅 二、〇

水 一〇、〇

右每回一筒注射皮下

七七二 炭酸那篤留謨 一、〇 一三、〇

格魯兒那篤留謨 四、〇 一六、〇

水 一〇〇〇、〇

右注射靜脈或皮下

右分十包一日三回每回一包

白糖 五、〇

七七九 緬草酸亞鉛 〇、三

白糖 一、五

右分三包一日三回每回一包

七七八 古埤乙涅 〇、四

枸橼油糖 八、〇

右分二十包一日三回每回一

包

七六一 安知必林 一、〇

右一日一回一包

七六三 スクンロンチ酸 〇、三

白糖 一、五

右分三包一日二回每回一包

●丸劑

七六三 麥角越幾斯 〇、八

右甘草末適宜爲六十九一日

四回每回二粒

七六四 麥角越幾斯、麥角末 各四、〇

右爲五十九每二三時一粒

七六五 乳酸 五、〇

白糖 五〇、〇

篤拉侃篤護謨

右爲錠五十個每食前一個乃

至二個

七六六 鹽酸必魯加兒必涅 〇、〇一

水 一、〇

右注射皮下

澱粉病 Amyloidkrankheit.

進行性澱粉變性症 Progressive Amyloidkrankheit

●水劑

七六七 海葱浸 (二〇〇)二〇〇、〇

孕糊酒石 二〇〇、〇

單舍利別 二〇〇、〇

右每二時一食匙

七六八 沃度加留謨 二、〇

水 二〇〇、〇

苦味丁幾 三、〇

右每二時一食匙

七六九 沃度鐵舍利別 一五、〇

單舍利別 五〇、〇

右一日三回每回半食匙乃至

一食匙

七六〇 格魯兒咸安母紐謨

龍膽越幾斯、大黃末 各二、〇

右爲五十九一日三回每回二

粒至三粒

脂肪增多症 Adiposis.

七六一 磷酸鐵

磷酸加爾叟謨

二、〇 蒲公英越幾斯 適宜

アヂソン氏病 Morbus Addisoni.

銅皮病、青銅色皮病

處置 與鐵劑、砒石劑、沃度劑、規尼涅劑、肝油劑等

澱粉病 脂肪增多症 アヂソン氏病

七六二 鹽酸規尼涅、還元鐵 各一、五

偏里設林

適宜

右爲三十九一日三回每回一

七六三

硫酸鐵

一五、〇

蝦製麻偏濕矢亞

二、五

ウエルホッフ氏(紫)斑點病 Morbus maculosus Werlhofii.

偏里設林

適宜

右爲九十九一日二粒乃至六粒

七六四

●水劑

機那皮 一〇、〇

稀硫酸 一、〇

稀鹽酸 〇、五

右煎出 一七〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

七六五

機那煎 (一〇、〇) 一五〇、〇

ハルレル氏酸性越歷矢兒

覆盆子舍利別 二、〇

右每二時一食匙 二〇、〇

機那煎 (一〇、〇) 一七〇、〇

硫酸混和劑* 二、〇

單舍利別 二八、〇

右每二時一食匙

七六六

機那煎 (三、〇) 一五〇、〇

流動麥角越幾斯十五二十滴

桂皮舍利別

右每二時一茶匙 一〇、〇

麥角越幾斯

水 一、〇

單阿片丁幾 七〇、〇

橙皮舍利別 一滴—三滴

右每二時一茶匙 一〇、〇

過格魯兒鐵液 十滴

水 一〇〇、〇

單舍利別 一五、〇

加糖酸化鐵舍利別 八、〇

沃鐵舍利別 四、〇

水 二二〇、〇

右一日三四回每回一食匙

七七一

枸櫞汁

橙皮舍利別 二〇、〇

右一日數回分服 四〇、〇

七六三 酒石酸

水 〇、五

單舍利別 七〇、〇

右每二時一茶匙 一〇、〇

●散劑

七六三 硝酸鉛

陀沲兒氏散 〇、二

白糖 〇、二

右分十包一日三四回每回二包 二、〇

七六四 麥角越幾斯

乳酸鐵 一、〇

桂皮油糖 〇、八

右分十包一日三四食匙 三、〇

●丸劑

七六五 亞拉比亞護膜

水 五、〇

單舍利別 一五、〇

脫水硫酸鐵 三〇、〇

炭酸加留謨 三〇、〇

右爲百九一日一二粒

●合嗽料

七七六 櫛皮煎 (二〇、〇)三〇〇、〇

明礬或單寧酸五、〇—一〇、〇

右合嗽

七七七 サルヒヤ葉浸

(一〇、〇)一〇〇、〇

赤葡萄酒

右合嗽

七八八 山蒼菜精

五〇、〇

水腫(腹水參照) Hydrops.

七三三 海葱浸

(一、五)一五〇、〇

孕礬酒石

一五、〇

椴皮舍利別

二五、〇

右每二時一食匙

七四四 實麥答利斯浸

(一、五)一八〇、〇

醋酸加留謨

六、〇

水 二〇〇、〇

ラタニヤ丁幾 一二、〇

右合嗽

七七九 沒藥末

四、〇

麒麟血

四、〇

重酒石酸加留謨

一五、〇

泥菖根末

八、〇

丁香油

四滴

右磨齒粉

七八〇 沒藥丁幾

五、〇

阿仙藥丁幾

五、〇

ラータニヤ丁幾 一、〇

明礬 二、〇

山蒼菜舍利別** 一五、〇

亞拉昆亞謨謨 一五、〇

右塗布齒齦

七七二 硫化加留謨

五〇、〇

右加於浴湯每三日一回入浴

七七三 格魯兒安母維謨一、〇—二、〇

水 二〇〇、〇

右洗拭壓定

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

七五五 實麥答利斯末、海葱根末

各二、〇

龍膽越幾斯

一、二

杜松實油

〇、四

亞拉昆亞謨謨

適宜

右爲三十九一日三回乃至四

回每回一粒

七七六 古魯聖篤越幾斯

〇、八

蘆薈

三、七

大黃

右爲四十九一日四粒至六粒

第二節 傳染性全身病

猩紅熱 Scarlatina.

水腫 猩紅熱

猩紅疹、丹疹、赤疹、癩疹、風疔、舊譯作疹子熱症、又名疹子、又名花紅熱症、又名疫毒痧、又名痧疹、古時又有風疹、風搔、風癩症之別名、千金方又謂之癩軫、案古書除痘疔之外、總稱謂之癩疹、故風疹亦有癩疹之名

●水劑

七七 蓖麻子油

一五〇

右頓服

七八 蓖麻子油

三〇、〇

亞拉比亞護謨末

七、五

餛水

七五、〇

單舍利別

一五、〇

右每一時一小兒匙

七九 剝度比爾林

〇、二

酒精

一、〇

覆盆子舍利別

四〇、〇

右振盪每回半小兒匙乃至一小兒匙

七〇 沸騰枸橼酸麻僱濕叟謨水

五〇〇、〇

右每回一酒盃

七二 維納緩下劑

三〇、〇

黑櫻實水

一五、〇

覆盆子舍利別

一五、〇

右二回分服

七三 鹽酸里母茶堙

二〇〇、〇

右每二時一食匙

七三 稀鹽酸

二〇、〇

櫻質舍利別

四〇、〇

右每時十滴乃至三十滴

七四 稀磷酸

一、〇

單舍利別

三〇、〇

水

一〇〇、〇

右一日數回分服

七五 實麥答利斯浸

〇、三六〇、〇

單舍利別

三〇、〇

右每二時一茶匙、小兒

七六 實麥答利斯葉浸

〇、一五七〇、〇

杏仁水

十五滴

單舍利別

一〇、〇

右每二時一食匙

七七 亞爾答煎

五、〇一〇〇、〇

別拉敦那越幾斯

〇、二〇、二

單舍利別

八、〇

七六 亞爾答根煎

一〇〇、〇

稀鹽酸

一、五

覆盆子舍利別

三〇、〇

右每二時一小兒匙

七九 機那煎

五、〇七〇、〇

格魯兒讓加留謨

〇、五一〇

右每二時一茶匙

七〇 機那煎

六、〇一〇〇、〇

醋酸加留謨

二、〇

橙皮舍利別

二〇、〇

右每二時一小兒匙

七三 複方姆那浸

各二五、〇

覆盆子舍利別

各二五、〇

右每二時一小兒匙

七三 撒里矢爾酸那篤留謨

三、〇一五、〇

蒸餾水

八〇、〇

橙皮舍利別

二〇、〇

右每二三時一小兒匙

三七 撒里矢爾酸那篤留謨

二、〇一五、〇

六、〇一五、〇

一、〇一二、〇

甘草羔

三七 撒里矢爾酸那篤留謨

一、〇一五、〇

一〇〇〇、〇

一〇〇〇、〇

三〇〇、〇

二十滴

三七 麥角越幾斯

七〇〇、〇

一〇〇、〇

單舍利別

三七 安忌香酸安母紐謨

〇、五

一、〇

二〇〇、〇

四〇〇、〇

三七 ストロファンツス丁幾

一〇〇、〇

右一日一回至四回每回五滴

三七 格魯兒安母紐謨

四、〇

二〇〇、〇

三〇〇、〇

四、〇一八、〇

三七 炭酸安母尼亞

二〇〇、〇

三〇〇、〇

六、〇

六、〇

六、〇

三七 依的兒

各五、〇

右每十五分時乃至半時五滴

乃至十滴

一五、〇

十五滴

四、五〇

九〇、〇

二、〇

一八、〇

桂皮水

一〇〇、〇

四〇〇、〇

右一日三回每回一食匙

〇、三一〇、八

二〇〇、〇

一〇〇、〇

二、五

二五、〇

五〇、〇

〇、五一、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

〇、一一、〇

二滴一四滴

〇、二一、〇

二、〇一三、〇

二、〇一三、〇

〇、〇五、〇

〇、〇五、〇

二滴一四滴

二〇〇、〇一三〇、〇

右一時間內二回分服(一歲)

七〇九 格魯兒鐵丁幾五、〇一〇、〇

民垠列里精 一〇〇、〇

右每二三時一二食匙和燕麥

粘汁服用 三〇、〇

七五〇 民垠列里精 八、〇

吐酒石酒 二〇〇、〇

接骨木花水 三〇、〇

亞爾答舍利別 〇、一五

右每二時一食匙

七五一 莫替越幾斯 三〇、〇

杏仁水 〇、一五

右朝夕二滴乃至三滴

●散劑 〇、五一一、〇

七五二 麝香 五、〇

白糖 五、〇

右分十包每二時一包

七五三 麝香、樟腦 各〇、五

白糖 五、〇

右分十包每二時一包

七五四 樟腦、安息香酸 各〇、四

白糖 三、〇

右分十包每二時一包

七五五 安息酸那篤留謨 〇、五一一、五

白糖 五、〇

右分十包每五時一包、一歲

小兒

七五六 撒里矢兒酸那篤留謨 二、〇

右分十包每二時一包

七五七 撒里矢兒酸那篤留謨 三、〇一六、〇

白糖 五、〇

右分十包一日二三回每回一

包

七五八 硫酸規尼涅 一、〇一三、〇

白糖 五、〇

右分十包一日二三回每回一

包

七五九 鹽酸規尼涅 一、〇

右分十包四時乃至六時間內

一包乃至十包、二歲乃至十

歲兒

七六〇 莫替越幾斯 〇、〇三

白糖 〇、五

右為散夜間與硫酸麻瘋涅更

謨一茶匙同服

七六一 單寧酸 一、〇

白糖 二、五

右分十包一日二回乃至四回

每回一包

七六二 廿末 一、〇

海葱 〇、五

實麥答利斯葉 〇、五

茴香油糖 一、〇〇、〇

右分十包一日三回每回一包

右每三時一包 四包

七六三 緩下沸騰散* 四包

七六四 プラツタオリエンタリース 二、〇一五、〇

右分十包每二時至四時一包

●錠劑

七六五 單寧酸規尼涅 二、〇

柯柯阿脂 一八、〇

右為錠二十個一時間內二個

乃至十八個、一歲至三歲兒

●含嗽

七六六 格魯兒酸加留謨水 〇、〇

右含嗽 (四、〇)一〇〇、〇

七七六 格魯兒酸加留誤水

(八、〇)二五〇、〇

玫瑰蜜

三〇、〇

右含嗽

七七六 民垓列里精

三〇、〇

玫瑰蜜

三〇、〇

接骨木花浸

二五〇、〇

右含嗽

七七六 格魯兒酸加留誤水

(六、〇)三〇〇、〇

右含嗽

七七〇 石炭酸

(〇、五—一、〇)一〇〇、〇

右含嗽

七七二 過滿俺酸加留誤水

〇、五
二〇〇、〇

右含嗽

● 塗布劑

七七三 格魯兒亞鉛 〇、二—一〇、三

水

一〇〇、〇

右塗布鼻腔

七七三 格魯兒水 五、〇—一〇、〇

水

二〇〇、〇

右塗布

七七四 沃度仿謨 一、〇

華設林

三〇、〇

右塗布腺腫

● 注射劑

七七五 依的兒 一〇、〇

右每回一筒注射皮下

七七六 石炭酸 一、〇

水 三〇、〇

右注射腺腫內

七七七 鹽酸必魯加兒比涅水

(一%)一〇、〇

右最小兒則用四分一筒至半

筒十歲兒則用一筒注射皮下

七七六 鹽酸必魯加兒比涅 〇、〇—二

蒸餾水 一〇、〇

右半筒乃至三筒皮下注射料

七七九 樟腦 一、〇

依的兒 二、〇

阿列布油 八、〇

右每二三時一回注射皮下

● 洗腸劑

七八〇 安知必林 〇、二—五—一〇、五

右溶於水洗腸

七八一 大黃浸 (二五、〇)一〇〇、〇

右洗腸

麻疹 Morbilli.

紅疹、一名痘狀血斑狀湊合麻疹、舊譯作麻子熱症、又名時痧、舊時亦名麻疹、傷寒論謂之癩疹、金匱謂之陽毒、準繩曰、北人謂之糠瘡、南人謂之麩瘡、吳人謂之痧、越人謂之瘡、醫通曰、麻卽疹也、疹軫也、出軫軫然生如疥子麻、又曰、麻疹手足太陰陽明二經、蘊熱所發、是亦時氣傳染之類也、又有麻子、赤疹、赤斑瘡、正疹子、膚疹、騷疹、痧子等別名

處置 安臥靜息、室溫調節、專通清氣、豫防加答兒、使病室陰暗、保身體均溫、其他與溫飲料緩和劑等

●水劑

七六二 蓖麻子油 五、〇

右頓服、一歲兒以上

七六三 稀鹽酸 二、〇

單舍利別 二〇〇、〇

右一日數回分服 二〇、〇

七六四 稀鹽酸 八、五—一、〇

水 一〇〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

七六五 燐酸 二、〇

水 二〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇

七六六 鹽酸莫兒比涅 〇、〇—一

右一日數回分服 一〇、〇

七六七 重碳酸那篤留謨 〇、五

吐酒石 〇、〇—一

甘草舍利別 一五、〇

七六六 炭酸加留謨 一、〇

右每二時一小兒匙 適宜

枸橼汁(飽和) 三〇、〇

メリツヰ井水 三〇、〇

旃那加滿那舍利別 三〇、〇

右每一二時一茶匙、四歲兒 一、二

七六九 炭酸加留謨 一、二

枸橼汁(飽和) 適宜

メリツヰ井水 一、五—三、〇

複方旃那浸 一五、〇—三〇、〇

旃那加滿那舍利別 三〇、〇

右每一二時一小兒匙、四歲兒 以上兒

七七〇 貌魯謨加留謨 三、〇

水 一〇〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每三時一小兒匙 〇、一五

七七一 菲沃斯越幾斯 七〇、〇

水 一〇、〇

單舍利別 右每二時一小兒匙

七六二 麝香丁幾 二、〇

茴香水 三〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右每二時一茶匙 〇、〇—三

七六三 硝酸銀 六〇、〇

水 一〇、〇

僱聖設林 一〇、〇

右每二時一茶匙、一二歲兒

●浸煎劑

七六四 獨葵根浸 (五、〇)—一〇〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每二時半食匙、一二歲小兒

七六五 亞麻仁煎 (一〇、〇)—一〇〇、〇

單舍利別 八、〇

右每二時一食匙

七六六 吐根浸 (〇、三)—一〇〇、〇

杏仁水 三、〇

單舍利別 八、〇

右每二時二茶匙、氣管枝炎

七六七 吐根浸 (〇、五)—一七五、〇

安母尼亞茴香精 五、〇

單舍利別

二〇、〇

右每二時一食匙

七六

吐根浸

(〇、三)一〇〇、〇

護謨漿

一〇、〇

阿片丁幾

二滴—四滴

單舍利別

一〇、〇

七五

吐根浸

(〇、三)一〇〇、〇

阿片越幾斯

〇〇、〇三

安山尼亞苗香精

二十滴

單舍利別

二〇、〇

右每時一食匙

七四

吐根浸

(〇、二)一〇〇、〇

杏仁水

二〇、〇

硝酸那篤留謨

二〇、〇

單舍利別

一〇、〇

右每二時一茶匙、氣管枝炎

七三

吐根浸

(〇、二—〇、五)一〇〇、〇

硝酸那篤留謨

二〇、〇

杏仁水

一〇、五

亞爾答亞舍利別

二〇、〇

右每二時一小兒匙

七二

吐根浸

(〇、五)一五〇、〇

阿片越幾斯

〇〇、〇三

安山尼亞苗香精

二〇、〇

單舍利別

一五、〇

右每二時一食匙

七一

攝涅瓦浸

(一、五—五、〇)一〇〇、〇

阿片丁幾

二滴—五滴

單舍利別

一五、〇

右一日六回二日分服、咳嗽

七〇

散劑

〇、〇一

甘汞

〇、〇一

乳糖

〇、〇一

右頓服、一二歲兒

六九

古煙乙涅

〇、一〇—〇、一五

白糖

二〇、〇

右分五包每三時一包

六八

次硝酸蒼鉛

〇、〇六

白糖

一〇、二

右分六包一日三回每回一包

六七

次硝酸蒼鉛

〇、〇六

重碳酸那篤留謨

一、八

右分六包一日三回每回一包

一二歲兒

次硝酸蒼鉛

二〇、一五、〇

護謨散

一〇、〇

右分二十包每二時一包

六一

〇、一〇—〇、二

白糖

三〇、〇

右分十包每二時一包、一二歲兒

六〇

挖淘兒氏散

〇、二

白糖

二〇、〇

右分五包一日三回每回一包

五九

撒里矢爾酸那篤留謨

一〇、一三、〇

右一日三回分服小兒

五八

樟腦

〇、二五—〇、二五

安息香酸

〇、二五

白糖

〇、二五

右分五包每二時一包

五七

安息香酸那篤留謨咖啡涅

〇、〇一

安息香酸

〇、〇三

醋酸鉛

〇、〇三

右分十包每一時至四時一包

一歲兒

ㄉ四 フエナツエチン

抱瀉兒氏散

右分五包每時一包

●注射劑

〇、〇、六
〇、一、五

ㄉ五 鹽酸必魯加兒必涅水

(〇、二%—一〇、三%) 一〇、〇

右注射皮下

ㄉ六 抱水格魯刺兒

水 一、五
一五〇、〇

ㄉ七 黃色酸化水

單軟膏

右眼藥

〇、〇、一
一〇、〇

右分三回浣腸、痙攣

風疹

Rubeola

假性麻疹、日耳曼麻疹、赤斑熱、輕症猩紅熱、三日麻疹、舊譯作輕麻、

ㄉ六

吐根浸

(〇、三) 一六〇、〇

阿片丁幾

三滴

右每三時一茶匙至一小兒匙

其他參考麻疹療法

痘瘡

Variola

天行痘、真痘、天然痘、痘瘡、痘熱症、天花熱症、古時亦名痘瘡、一名虜瘡、又有聖瘡、天瘡、百歲瘡、豌豆瘡等名、

假痘

Variolis

種痘者天然痘

●水劑

ㄉ九

枸橼汁、覆盆子舍利別

各一五、〇

ㄉ三 亞爾答煎*

稀硫酸 二〇〇、〇

水

右一日數回分服

二〇〇、〇

右每二時一食匙

ㄉ三 機那煎

稀硫酸

五、〇

ㄉ三

吐根浸

(四、〇) 六〇、〇

機那煎

(六、〇) 一〇〇、〇

ㄉ四 安知必林

水

〇、五—一三、〇

單舍利別 右每十五分時一茶匙至一食

右每二時一小兒匙

單舍利別 右每二時一二茶匙

ㄉ五 安知歌貌林 ○、二、一、〇

水 一〇〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每二時二茶匙

ㄉ三 撒里矢兒酸那篤留謨

水 一、〇、一、六、〇

單舍利別 一〇〇、〇

右每二時一二茶匙 一〇、〇

ㄉ七 硫酸規尼涅 ○、五、一、一、五

水 一〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

ㄉ六 鹽酸規尼涅 四、〇

水 二〇〇、〇

覆盆子舍利別 三〇、〇

右每三時一食匙

ㄉ元 キシロール 三〇、〇

右每二三時和五滴至二十滴

於赤葡萄酒服用

ㄉ三 キシロール 三、〇

薄荷水、水 各五〇、〇

護謨漿、桂皮舍利別各一〇、〇

ㄉ三 石炭酸 右每二時一食匙 ○、五、一、一、〇

護謨合劑 一五〇、〇

右每二時一食匙

ㄉ三 抱水格魯刺兒 四、〇

餾水、橙皮舍利別 各一五、〇

右臨臥一食匙

ㄉ三 アミールンヒドロライト 二、〇

水 一、二〇、〇

稀鹽酸 四滴

單舍利別 一五、〇

右每夕數回分服

ㄉ四 スルフオナル 二、〇

抱水格魯刺兒 五、〇

水 五〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右二回分服

ㄉ五 プランデー酒、水 各六〇、〇

卵黃 一個

單舍利別 二五、〇

右每二三時一食匙

ㄉ六 オイフオリン 二、五

白糖 一、五

右分五包一日三四乃至五回

每回一包

ㄉ七 ズルフオナル 二、〇

右分二包午後八時一回一包

ㄉ六 硼酸水(二%—三%) 二〇〇、〇—一五〇〇、〇

右含嗽

ㄉ元 過滿倫酸加留謨水 (〇、二)二〇〇、〇

右含嗽

ㄉ四 一半格魯刺兒鐵液 五、〇

水 二〇〇、〇

右含嗽

ㄉ四 單寧酸 一、〇

明礬 〇、五

貌魯謨加留謨 五、〇

亞拉比亞護謨漿 二五、〇

水 二〇〇、〇

右含嗽

●塗布劑

ㄉ四 巴豆油 二、〇

阿列布油 一〇、〇

| | | |
|----|---------|---------|
| 支四 | 右塗布 | 三、〇 |
| 支四 | 撒里矢爾酸 | 三〇、〇 |
| 支四 | 澱粉 | 七〇、〇 |
| 支四 | 僱里設林 | 二、〇 |
| 支四 | 右塗布 | 二〇、〇 |
| 支四 | 撒里矢爾酸 | 各二四、〇 |
| 支四 | 亞鉛華、澱粉 | 五〇、〇 |
| 支四 | 華攝林 | 一、〇 |
| 支四 | 單寧酸 | 二〇、〇 |
| 支四 | 安息香丁幾 | 一〇、〇 |
| 支四 | 右塗布發疹部 | 五、〇 |
| 支四 | 僱里設林 | 一〇、〇 |
| 支四 | 藥用石鹼 | 二〇、〇 |
| 支四 | 水銀軟膏 | 一〇、〇 |
| 支四 | 右塗布 | 一五、〇 |
| 支四 | 石炭酸 | 一、〇 |
| 支四 | 豚脂 | 一五、〇 |
| 支四 | 右塗布 | 五、〇 |
| 支四 | 石炭酸 | 各四〇、〇 |
| 支四 | 阿列布油、澱粉 | 四、〇一五、〇 |
| 支四 | 右塗布 | |

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 支五 | 亞麻仁油 | 三〇、〇一四〇、〇 |
| 支五 | 白蠟 | 適宜 |
| 支五 | 右塗布 | 四、〇一〇、〇 |
| 支五 | 石炭酸 | 四〇、〇 |
| 支五 | 阿列布油 | 六〇、〇 |
| 支五 | 精製石灰 | 一、〇 |
| 支五 | 右塗布 | 一五、〇 |
| 支五 | 昇汞 | 一五、〇 |
| 支五 | 僱里設林 | 一五、〇 |
| 支五 | 右塗布 | 一五、〇 |
| 支五 | 沃度丁幾 | 二〇、〇 |
| 支五 | 右塗布 | 二〇、〇 |
| 支五 | 硝酸銀水(一〇%) | 二〇、〇 |
| 支五 | 右塗布 | 二〇、〇 |
| 支五 | 水銀軟膏 | 一〇、〇 |
| 支五 | 加里石鹼 | 四、〇 |
| 支五 | 或藥用石鹼 | 二五、〇 |
| 支五 | 僱里設林 | 五、〇 |
| 支五 | 右塗布膿包 | 三、〇 |
| 支五 | 水銀軟膏 | |
| 支五 | 黃蠟 | |
| 支五 | 麥兒 | |
| 支五 | 右塗布 | |

| | | |
|----|------------|---------|
| 支五 | 水銀軟膏 | 二四、〇 |
| 支五 | 黃蠟 | 一〇、〇 |
| 支五 | 麥兒 | 六、〇 |
| 支五 | 右為軟膏塗布 | |
| 支五 | 石炭酸 | 五、〇一〇、〇 |
| 支五 | 阿列布油 | 四〇、〇 |
| 支五 | 沈澱炭酸加爾斐謨 | 六〇、〇 |
| 支五 | 右為軟膏塗布 | |
| 支五 | 刺納林 | 一〇、〇 |
| 支五 | 安息香亞鉛華軟膏 | 二〇、〇 |
| 支五 | 薔薇水 | 三〇、〇 |
| 支五 | 右塗布 | |
| 支五 | 僱里設林、甘扁桃油各 | 二〇、〇 |
| 支五 | 酸化亞鉛 | 一〇、〇 |
| 支五 | 右塗布 | |
| 支五 | ●洗滌劑 | 二〇〇、〇 |
| 支五 | 格魯兒水 | |
| 支五 | 右洗滌 | 四、〇 |
| 支五 | 石炭酸 | 各一〇〇、〇 |
| 支五 | 水、僱里設林 | |
| 支五 | 右洗滌 | |
| 支五 | ●沈腸劑 | |
| 支五 | 安知必林 | 一、〇一六、〇 |

水 五〇、〇

右一回灌腸

ㄉ六三 アミールンヒドラート 四、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇一五

餽水 五〇、〇

護膜漿 二〇、〇

右灌腸

● 罌法劑

ㄉ六四 昇末 〇、二

水 四〇〇、〇

右器法

● 浴劑

ㄉ六五 昇末 五、〇

水 二〇〇、〇

右浴湯

ㄉ六六 硫酸鐵 二〇〇、〇

硫酸亞鉛 二五〇、〇

木炭 一〇〇、〇

硫酸行灰 二六五〇、〇

右混和浴湯消毒用

ㄉ六七 硫酸規尼涅 三、〇

備里設林 三、〇

右半筒至一筒注射皮下

ㄉ六八 備里設林 一〇〇、〇

水 二〇〇、〇

右厚抵額帶用

麻拉里亞 Malaria.

間歇熱 *Febris intermittens (simplex)*

瘧、瘧病、瘧疾、泥沼熱、定時熱、舊譯作瘧熱、又作瘧氣、又名脾寒、俗名發瘧子、兩名打擺子、古名瘧、又名瘧、說文瘧二口一發瘧也、又名寒熱病、

弛張熱、胆液熱 *F. remittens.*

黃熱、舊作黃熱症、又名黃瘟瘧、又名黃汗時症、又名疫癘發黃、

充血熱 *F. intermittens remittens.* 惡性弛張熱、惡性間歇熱

麻拉里亞惡液質 *Malaria cachexie.*

● 鹽酸規尼涅劑

ㄉ六九 鹽酸規尼涅 〇、二五—〇、二五

備里設林

蒸餾水 五、〇

右注射皮下

ㄉ七〇 鹽酸規尼涅 二、〇

備里設林 八、〇

備里設林 八、〇

右注射皮下

戈七 鹽酸規尼涅 一、〇

格魯兒那篤留謨 〇、七、五

水 一〇、〇

右注入上腹靜脈內

戈七 鹽酸規尼涅 三、〇

安知必林 一、二

餽水 六、〇

右每回二筒注射皮下

戈七 鹽酸規尼涅 一、〇

鹽酸必魯加爾必涅 〇、〇、一

右發作前隔五時間頓服自其

翌日日日以鹽酸規尼涅 〇、〇、

五作一回頓服至五六日間

戈七 鹽酸規尼涅 一、〇、一、五

白糖 三、〇

右分四包發作前六時乃至十

二時一包乃至二包

戈七 鹽酸規尼涅 〇、六

右龍膽越幾斯適宜為丸頓服

戈七 鹽酸規尼涅 一、〇

佛里設林 一滴

右為丸發作前三時間內二回分服

戈七 鹽酸規尼涅 〇、一、〇、一、五

右發作四時乃至六時間前頓

服、二歲兒

戈七 鹽酸規尼涅 〇、一、〇、七

右發作四時乃至六時間前頓

服、二歲兒

戈七 鹽酸規尼涅 〇、四、〇、八

右發作四時乃至六時間前頓

戈六 鹽酸規尼涅 〇、五、一、〇

右發作四時乃至六時間前頓

服、六歲兒乃至十歲兒

戈六 鹽酸規尼涅 〇、六、一、二、五

右發作四時乃至六時間前頓

服、十歲乃至十四歲兒

白糖 各二、〇

戈六 鹽酸規尼涅、阿片 各二、〇

右分四包免熱時每二時一包

戈六 鹽酸規尼涅 五、〇

稀鹽酸 二滴

右為二十九一日二回每回二

粒乃至四粒

戈六 鹽酸規尼涅 〇、六、一、二

格魯兒安母紐謨 二、二

大黃末 二、二

右分十二包免熱時每時一包

戈六 鹽酸規尼涅 〇、〇、一、二、〇、〇

柯柯阿脂 二、〇、〇

右為坐藥十個插入直腸

戈六 硫酸規尼涅 一、〇

水 一、〇

戈六 硫酸規尼涅 二、〇、〇

橙皮舍利別 二、〇、〇

右發作前隔一時間二回分服

戈七 硫酸規尼涅 二、〇

水 三、〇、〇

單舍利別 三、〇、〇

右發作前一茶匙乃至三茶匙

戈六 硫酸規尼涅 〇、五

稀鹽酸 〇、五

水 四、〇

單舍利別 九、五、〇

右一日數回每回一二茶匙

戈六 硫酸規尼涅 一、〇

硫酸混和劑 十滴

橙皮舍利別 各三、〇、〇

右用於免熟時

支六 硫酸規尼涅 一、〇、一、五

右為一包免熟時中投一二回

支五 硫酸規尼涅 〇、〇、五

或鹽酸規尼涅 〇、〇、五

硫酸莫爾比涅 〇、〇、五

右分四包免熟時每二時一包

支五 硫酸規尼涅 二、〇、一、三、五

右為二十九間歇時二回每回五粒

支五 硫酸規尼涅 二、〇、〇

白糖 一、〇、〇

亞拉昆亞護謨 一、〇、〇

右為二十九一回十粒

支五 硫酸規尼涅 三、〇、〇

澤元鐵 一、〇、〇

龍膽末 一、〇、〇

龍膽越幾斯 五、〇、〇

右為百二十九一日三回每回二粒

支五 硫酸規尼涅 三、〇、〇

澤元鐵 六、〇、〇

亞砒酸 〇、一、二

硫酸斯篤利幾尼涅 〇、〇、六

右以備里設林軟膏為三十九

一日三回每食後一粒

支六 硫酸規尼涅 五、〇、〇

加糖炭酸鐵 五、〇、〇

亞砒酸 〇、〇、一

右以龍膽越幾斯為百九一日

三回每回二粒

支六 硫酸規尼涅、硫酸鐵 各二、五

右龍膽越幾斯適宜為五十九

一日三粒乃至六粒

支六 硫酸規尼涅 一、〇、〇

亞兒答煎 五、〇、〇

阿片丁幾 三滴

右流腸、入歲乃至五歲兒

支九 硫酸規尼涅 一、〇、〇

柯柯阿脂 六、〇、〇

右為坐藥十個插入直腸

●臭化規尼涅劑 二、〇、〇

●貌羅漢水素酸規尼涅 二、〇、〇

酒精 二、〇、〇

或備里設林 一、八、〇

餽水 一、八、〇

右每回半筒注射皮下

支九 貌魯漢水素酸規尼涅 一、〇、〇

硫酸依的兒 八、〇、〇

亞爾個保兒 二、〇、〇

右發作前頓服

支九 貌羅漢水素酸規尼涅 〇、〇、九

●顯草酸咖啡涅 〇、〇、五

右以甘草蒸為三十九一日一

二回每回十粒

支九 單寧酸規尼涅、白糖 各二、〇

●單寧酸規尼涅劑 各二、〇

右分六包一日三回每回二包

支九 單寧酸規尼涅 〇、一、五、〇、六

右以柯柯阿脂為錠二十四時

間分服

支九 枸橼酸規尼涅劑 四、〇、〇

●枸橼酸鐵規尼涅 四、〇、〇

右甘草末甘草蒸各適宜為六

十九朝夕四粒

●機那煎劑 一、〇、〇、〇

支九 機那煎 (一、〇、〇) 一、五、〇、〇

●稀鹽酸 一、〇、〇

生薑舍利別 三、〇、〇

七九七 右每二時一食匙
機那煎 (一五、〇) 一五〇、〇

生麥丁幾 一、〇
桂皮舍利別 二五、〇

七九八 右每時一食匙
機那煎 (四〇、〇) 二〇〇、〇

生麥丁幾 二、〇
桂皮舍利別 四〇、〇

七九九 右間歇時每時一食匙
機那煎 (二〇、〇) 二〇〇、〇

亞砒酸加留謨液 一、五
橙皮舍利別 二〇、〇

七八〇 右一日三回二分服
機那煎 (二〇、〇) 二〇〇、〇

亞砒酸加留謨液 一、五
桂皮舍利別 二〇、〇

七八一 右一日三回每回一食匙
機那煎 (一五、〇) 一八〇、〇

依的兒精 四、〇
右一日數回分服

七八二 緬那皮 一〇〇、〇
緬草根 五〇、〇

稀酒精 二〇〇、〇

白葡萄酒 一〇〇〇、〇
右八日間浸出濾過一日一酒

●亞砒酸劑 盃
七九三 亞砒酸加留謨液、水 各五、〇

右一日三回每回十滴乃至十

七九四 亞砒酸加留謨液 二滴 五、〇
桂皮水 一〇、〇

右一日三回每回四滴漸次增

七九五 亞砒酸加留謨液 五、〇
阿片丁幾 二、五

右免熱時一日四回每回三滴

七九六 亞砒酸加留謨液 五、〇
阿片丁幾 二、〇

右間歇時一日四回每回八滴

七九七 亞砒酸加留謨液 五、〇
乃至十二滴

格魯兒鐵丁幾 二〇、〇
右一日三回每食後二十五滴

七九八 亞砒酸 一、〇

炭酸加留謨 一、〇
水 九三、〇

貌羅謨加留謨 二、〇
右一日二回每回三四滴

七九九 亞砒酸 〇、五
稀鹽酸 十五滴

水 五〇、〇
右溶解一日三回每回二滴乃

七九〇 亞砒酸 至四滴 〇、〇一
右為十九每食後一粒

七九二 亞砒酸 〇、〇六
甘草越幾斯、白雲母

胡椒末 各三、〇
右為三十九一日五粒

七九三 亞砒酸 〇、〇五
黑胡椒末 〇、〇五

亞拉昆亞護謨 一、〇
右為十九朝夕一粒

七九三 亞砒酸 〇、一
乳糖 四、〇

亞拉比亞護謨 一、〇
右以蜂蜜為百九一日三回每

亞砒酸 一、〇

回一二粒

七九四 亞砒酸

〇、〇六

還元鐵

三、〇

黑胡椒末、甘草末

各一、五

右爲十五丸一日三回每回二粒

●ベルペリン劑

七九五 硫酸ベルペリン

〇、五一一、〇

右一日數回分服

七九六 硫酸ベルペリン

〇、五

右甘草越幾斯適宜爲十二丸

七九七 硫酸ベルペリン

一、五

每二時四粒

七九八 硫酸ベルペリン

一、五

右以芳香酸、龍膽越幾斯爲

七九九 硫酸ベルペリン

一、〇

三十九丸一日三回每回一粒乃

八〇〇 硫酸ベルペリン

一、〇

稀硫酸

十滴

水、橙皮舍利別

各三〇、〇

右間歇時數回分服

八〇一 硫酸ベルペリン

一、五

龍膽越幾斯

二、〇

右以芳香散爲三十九丸每二時

四丸

七九二 硫酸ベルペリン

一、〇

硫酸混和劑

十滴

橙皮舍利別、水

各三〇、〇

右用於免熱時

●鐵劑

七九三 還元鐵

一五、〇

格倫僕根末

五、〇

大黃末

二、五

桂皮末

二、五

括矢亞越幾斯

適宜

右一粒之丸量爲〇、二一日

七九四 還元鐵

一五、〇

番木髓越幾斯

一、〇

薯草越幾斯

七、五

右篤刺侃篤護漿適宜爲二百丸每三時三個乃至五個

七九五 有加里斯劑

四、五、〇

右一日三回每回一茶匙

七九六 有加里斯丁幾

三、〇、〇

右一日三回每回一茶匙

七九七 有加里斯丁幾

三、〇、〇

右一日三回每回一茶匙

七九八 有加里斯丁幾

三、〇、〇

九〇〇 有加里斯丁幾

一五、〇

右一日數回每回五滴

七九八 有加里斯油

一、〇一、二、〇

右入膠囊一日三回分服

七九九 有加里斯葉末六、〇一、二、〇

白糖 右分三包一日三回每回一包

七九〇 有加里斯葉末

(二、二、〇)一五、〇、〇

橙皮舍利別

三、〇、〇

右每時一食匙

●ベルペリン劑

七九一 ビペリン

一、〇

白糖 右一日三回分服

七九二 ビペリン

一、五

右一日三回分服

七九三 ビペリン

〇、五

右龍膽越幾斯適宜爲八丸每

七九四 硫酸ベルペリン

二、〇

二時四粒

七九五 龍膽越幾斯

二、五

芳香散

右爲五十九丸一日三回每回一

七九六 龍膽越幾斯

適宜

粒乃至二粒

●キノイヂー子劑

| | | |
|-----------------|--------|------|
| 七九四三 | 吉納乙實滯 | 一、〇 |
| 阿片 | 〇、〇五 | |
| 薄荷油糖 | 一五、〇 | |
| 右分十包每二時一包 | | |
| 七九四三 | 吉納乙實滯 | 四、〇 |
| 酒石酸 | 〇、三 | |
| 右護謨漿適宜爲三十九每一時一粒 | | |
| 七九四四 | 規納實滯 | 三、〇 |
| 酒石酸 | 〇、五 | |
| 芳香酸 | 二、五 | |
| 亞拉比亞護謨末 | 適宜 | |
| 右爲三十九每二時二粒 | | |
| 七九四四 | 吉納乙陳丁幾 | 三〇、〇 |
| 鹽酸規尼涅 | 一、五 | |
| 右一日三回每回二十滴 | | |
| ●ヒノリン劑 | | |
| 充奧 | 一、〇 | |
| 酒石酸ヒノリン | 五〇、〇 | |

脚氣 Kakke. Berberi

驚里驚里(ベリベリ)舊譯作風毒脚氣、印度名痺拉痺、內經名曰厥、漢時名緩風、宋齊後始名脚氣、

| | | |
|-----------------|------------|------|
| 單舍利別 | 五〇、〇 | |
| 右二三回分服、小兒 | | |
| 七九五 | 酒石酸ヒノリン | 一、〇 |
| 水、覆盆子舍利別 | 各五〇、〇 | |
| 右發作前三時二三回分服 | | |
| 七九五 | 酒石酸ヒノリン | 一、〇 |
| 水 | 五〇、〇 | |
| 杏仁水 | 一、〇 | |
| 覆盆子舍利別 | 五〇、〇 | |
| 右發作前三時間內二三回分服 | | |
| ●其他諸劑 | | |
| 七九四 | アピオール | 四、〇 |
| 右分四包發熱時一日三回每回一包 | | |
| 七九五 | アピオール | 二、五 |
| 右爲膠囊十個一日數回每回一個 | | |
| 七九五 | 貌羅謨水素酸(十%) | 一〇、〇 |
| 右一日三回每回十五滴乃至 | | |

| | | |
|-----------------------------|-----------|------|
| 二十滴 | | |
| 七九五 | 鹽酸フェノコリン | 〇、五 |
| 白糖 | 五、〇 | |
| 右出十包一日三回每回一包 | | |
| 七九五 | メチレンブラウ | 二、〇 |
| 右入膠囊三十個一日五回每回一個 | | |
| 七九五 | 撒里矢爾酸那篤留謨 | 三、〇 |
| 右頓服自其翌日日服一、五每一日二回頓服至五日乃至七日間 | | |
| 七九五 | ザリチン | 一、〇 |
| 白蘇越幾斯 | 適宜 | |
| 右爲六丸每半時二粒 | | |
| 七九五 | 赤色沃度化水銀 | 〇、五 |
| 脂肪 | 二〇、〇 | |
| 樟腦 | 二、〇 | |
| 右塗布臍部 | | |
| 七九五 | 樟腦依的兒(二%) | 一〇、〇 |
| 右惡寒時數滴 | | |

千金方曰、脚氣者、黃帝之緩風濕痺是也、又曰、頑弱名緩風、疼痛名濕痺、醫學綱目曰、脚氣頑麻、腫痛、爲痺厥、足痿軟不收爲痿厥、脚氣衝心、爲厥逆、
 處滑 常初期早轉居於高燥地、其他對症療法、就中下劑、實芝答利斯劑、樟腦赤酒、斯篤利幾尼涅等、恢復
 期專用強壯劑

●丸劑

七九六 鹽酸規尼涅、枸橼酸鐵各〇、〇、一
 亞砒酸 〇、〇、一
 右甘草羔適宜爲二十九每食
 後二粒

七九五 鹽酸規尼涅 〇、〇、三
 乳酸鐵 〇、〇、三
 甘草末 〇、〇、二
 右爲丸一日三回分服

七九四 鹽酸規尼涅 〇、〇、三
 番木鱉越幾斯 〇、〇、一
 右甘草羔適宜爲六丸一日三
 回每回二粒

七九三 雙蘭菊越幾斯 〇、〇、三
 右甘草羔適宜爲十九朝夕一
 粒

七九二 麥角越幾斯 一、五
 右甘草羔適宜爲二十九一日
 五回每回二粒

七九一 鹽酸規尼涅 〇、〇、三
 番木鱉越幾斯 〇、〇、一
 右甘草羔適宜爲六丸一日三
 回每回二粒

七九〇 鹽酸規尼涅 〇、〇、三
 番木鱉越幾斯 〇、〇、一
 右甘草羔適宜爲六丸一日三
 回每回二粒

七八九 鹽酸規尼涅 〇、〇、三
 番木鱉越幾斯 〇、〇、一
 右甘草羔適宜爲六丸一日三
 回每回二粒

七八八 鹽酸規尼涅 〇、〇、三
 番木鱉越幾斯 〇、〇、一
 右甘草羔適宜爲六丸一日三
 回每回二粒

七八七 鹽酸規尼涅 〇、〇、三
 番木鱉越幾斯 〇、〇、一
 右甘草羔適宜爲六丸一日三
 回每回二粒

七八六 鹽酸規尼涅 〇、〇、三
 番木鱉越幾斯 〇、〇、一
 右甘草羔適宜爲六丸一日三
 回每回二粒

七八五 鹽酸規尼涅 〇、〇、三
 番木鱉越幾斯 〇、〇、一
 右甘草羔適宜爲六丸一日三
 回每回二粒

七八四 鹽酸規尼涅 〇、〇、三
 番木鱉越幾斯 〇、〇、一
 右甘草羔適宜爲六丸一日三
 回每回二粒

七八三 麥角越幾斯 一、〇
 右甘草羔適宜爲十六丸一日
 四回每回二粒

七八二 實麥答利斯末 〇、〇、六
 鹽酸規尼涅 二、〇、〇
 番木鱉越幾斯 〇、〇、六
 右甘草羔甘草末各適宜爲丸
 一日三回分服

七八一 メントール 〇、〇、二
 重碳酸那篤留謨 二、〇、〇
 慢性麻痺涅更謨 四、〇、〇
 右龍膽越幾斯適宜爲丸一日
 六回分服

七八〇 散劑
 甘草、白糖 各〇、五
 右頓服

七九九 甘草、藥刺巴 各〇、五
 右頓服

七八八 人工加兒爾斯泉鹽 一五、〇
 右每朝頓服

七八七 人工加兒爾斯泉鹽 五〇、〇
 右每朝二茶匙

七八六 重酒石酸加留謨 二〇、〇
 硝酸加留謨 五、〇、〇
 枸橼油糖 五、〇、〇
 右一日數回每回一小刀尖

七八五 樟腦 一、〇、〇
 白糖 五、〇、〇
 右十包一日三包乃至五包

七八四 別刺敦那越幾斯 〇、二、〇
 白糖 三、〇、〇
 右分六包一日三回每回一包

七八三 水劑
 硫酸麻痺涅更謨 三〇、〇
 水 二〇〇、〇
 稀鹽酸 二、〇、〇
 右一日二回分服

七八二 硫酸麻痺涅更謨 一五、〇
 右一日二回分服

七八一 硫酸麻痺涅更謨 一五、〇
 右一日二回分服

七八〇 硫酸麻痺涅更謨 一五、〇
 右一日二回分服

硝酸加留謨 二、五
 橙皮舍利別 八、〇
 水 一〇〇、〇
 右一日三回分服

七九五 硫酸麻偏涅叟謨

苦味丁幾 一五、〇
 橙皮舍利別 一、五
 水 八、〇
 一〇〇、〇
 右一日三回分服

七九六 硫酸麻偏涅叟謨

蕃木斂丁幾 三〇、〇
 水 二〇〇、〇
 二〇、〇
 右一日三回分服

稀鹽酸

水 二〇〇、〇
 二〇、〇
 右一日三回分服

七九七 重酒石酸加留謨

蕃木斂丁幾 一〇、〇
 水 一、五
 一、二
 二〇〇、〇
 右一日三回二日分服

七九八 重酒石酸加留謨

苦味丁幾 一〇、〇
 水 四、〇
 二〇〇、〇
 右一日三回二日分服

七九九 重酒石酸加留謨

水 二〇〇、〇
 一〇〇、〇
 右一日三回二日分服

苦味丁幾 四、〇
 蕃木斂丁幾 一、〇
 一、二
 二〇〇、〇
 水 二〇〇、〇
 右一日二回分服

七九〇 重酒石酸加留謨

重碳酸那篤留謨 八、〇
 苦味丁幾 四、〇
 水 三、〇
 二〇〇、〇
 右一日三回二日分服

七九二 人工加爾爾斯泉鹽

水 二〇〇、〇
 右一日三回二日分服

七九三 實菱答里斯丁幾

水 二〇、〇
 人工加爾爾斯泉鹽 一五、〇
 一〇〇、〇
 右一日三回分服

七九三 ストロファンツス丁幾

水 一〇、〇
 右每回十滴乃至十五滴

七九四 重碳酸那篤留謨

大黃丁幾 二、〇
 單舍利別 六、〇
 八、〇
 一〇〇、〇

七九五 機那丁幾 一〇、〇
 蕃木斂丁幾 一〇、〇
 稀鹽酸 一〇、〇
 水 一〇〇、〇
 右一日三回分服

七九六 鹽酸必魯加兒必涅

硝酸斯篤里幾尼涅 〇、〇
 蒸餾水 〇、〇
 五〇、〇
 右每二時一茶匙

七九七 林檎酸鐵丁幾

亞砒酸加留謨液 二〇、〇
 五〇、〇
 右每食後二十滴

七九八 沃度加留謨

硫酸鐵 二、〇
 一、〇
 二五、〇
 桂皮水 二五、〇
 右混和濾過

硝酸斯篤里幾尼涅 〇、〇
 水餉 〇、〇
 一五〇、〇
 右一日三回每回一食匙

七九九 ポルト酒

單舍利別 六〇、〇
 一五〇、〇
 右一日數回分服

七九〇 鐵銹煎 *

一〇〇、〇一、一五〇、〇
右一日三回二日分服

● 浸劑煎

七九一

規那煎 (一〇、〇) 一五〇、〇
赤葡萄酒 五〇、〇
稀鹽酸 二〇、〇

單舍利別 一五、〇
右每二時一食匙

七九二

機那煎 (八、〇) 一〇〇、〇
硝酸加留謨 二〇、〇
蕃木鹽丁幾 一〇、〇

單舍利別 八、〇
右一日三回分服

七九三

機那煎 (八、〇) 一〇〇、〇
烏頭丁幾 一〇、〇
格魯矢鳩母丁幾 二〇、〇

醋酸加留謨 四〇、〇
單舍利別 一〇、〇
右一日三回分服

七九四

規那煎 (一〇、〇) 二〇〇、〇
蕃木鹽丁幾 一、五、一、二、〇

稀鹽酸 一、五

單舍利別

右每二時一食匙

七九五

機那煎 (二五、〇) 二〇〇、〇
硝酸斯篤利幾尼涅 〇、〇、一
苦味丁幾 一五、〇

單舍利別 一五、〇
右每二時一食匙

七九六

實麥答利斯浸 (〇、五) 一〇〇、〇
重酒石酸加留謨 一〇、〇

單舍利別 八、〇
右一日三回分服

七九七

實麥答利斯浸 (〇、三) 一〇〇、〇
硝酸加留謨 二〇、〇

重碳酸那篤留謨 二〇、〇
單舍利別 八、〇
右一日三回分服

七九八

實麥答利斯浸 (一、〇) 二〇〇、〇
硝酸加留謨 五〇、〇

硫酸麻僱涅叟謨 一五、〇
右一日三回二日分服

七九九 實麥答利斯浸

(一、〇) 一〇〇、〇

醋酸加留謨

單舍利別 六、〇

右一日三回分服

八〇〇

實麥答利斯浸 (一、〇) 一、五、二〇〇、〇

醋酸加留謨 六、〇、一八、〇
單舍利別 一五、〇
右每二時一食匙

八〇一

實麥答利斯葉浸 (一、〇) 一、五、二〇〇、〇

醋酸加留謨 一〇、〇、一、一五、〇
單舍利別 一五、〇
右每二時一食匙

八〇二

實麥答利斯浸 (〇、六) 一〇〇、〇

醋酸加留謨 四〇、〇
赤葡萄酒 一、五

單舍利別 八、〇
右一日三回分服

八〇三

實麥答利斯浸 (二、〇) 二〇〇、〇

赤葡萄酒 五〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右混和一日六回二日分服

八〇四 實麥答利斯浸

(一、五—二、〇)二〇〇、〇

忽布滿精 五、〇

單舍利別 一五、〇

右二時一食匙

八〇五 耶僕蘭日葉浸

(一〇、〇)二〇〇、〇

硝酸斯篤里幾尼涅 〇、〇—

右一日三回二日分服

八〇六 旃那浸 (一五、〇)二二〇、〇

虎列刺 Cholera

亞細亞虎列刺 Cholera asiatica

Cholera orientalis, Cholera indice, Morbus oryzeus, Garglioniitis peripheritis et mellularis, Trisplanchnia.

重酒石酸加留謨 一五、〇

單舍利別 二〇、〇

右每一時一食匙

八〇七 健質亞那浸(八、〇)一五〇、〇

重酒石酸加留謨 八、〇

橙皮舍利別 二、〇

右每一時一食匙

●注射劑

八〇八 硝酸斯篤里幾尼涅 〇、一

蒸餾水 二〇、〇

右一日一回一筒交換注射於

左右之脚皮下

八〇九 チキタリン 〇、〇五

蒸餾水 五、〇

右每一筒注射皮下

八一〇 樟腦 二、〇

阿列布油 一〇、〇

右每一筒注射皮下

八一一 鹽酸必管加兒必涅 〇、二

硝酸斯篤里幾尼涅 〇、二

〇、二—一〇、〇—

四、〇

●洗腸劑

右一日一回注射皮下

八一二 加密列浸(三〇、〇)四〇〇、〇

右洗腸

處置 最初與甘末、次以阿片、更及充奮劑、其他施皮下注射、又行單寧洗腸、廣行吐瀉物消毒法

舊譯作亞細亞霍亂、一名真霍亂、一名霍亂吐瀉、又名絞腸痧、瓜痧、瘟毒痢、番痧、沙病、暴瀉、卒霍亂流行虎性列刺、惡性虎列刺、冷徹疾、卒厥性霍亂、痙攣性霍亂、東國虎列刺、東方霍亂、東印度霍亂、三日坊等

●甘永劑

八〇三 甘末 〇、三
白糖 一、八
右分六包每二時一包

八〇四 甘永 〇、六
亞拉比亞護謨末 五、〇
●右分十包每一時一包

●阿片劑

八〇五 阿片 〇、五
白糖 五、〇
右分十包一日三回每回一包

八〇六 阿片 〇、三
樟腦 〇、三
乳糖 〇、三
右分三包每時一包

八〇七 古倫僕末 一、〇
阿片越幾斯 〇、二
白糖 五、〇
右分十包朝夕一包

八〇八 阿片 〇、三
單寧酸 二、〇
白糖 五、〇
右分十包一時乃至二時一包

八〇九 阿片 〇、二
明礬 二、〇
カスカリルラ皮末 四、〇
右分六包每一時一包

八〇〇 阿片 〇、〇
酸化亞鉛 〇、二
酒石酸 〇、五
重碳酸那篤留謨 〇、五
マチス油糖 〇、六
右分十包每時一包

八〇一 阿片越幾斯 一、〇
ナフトール 五、〇
右分十包每時一包

八〇二 阿片越幾斯 三、〇
甘末 〇、六
白糖 三、〇
右分六包每三時一包

八〇三 阿片丁幾 一、〇
右一日三回每回十五滴

八〇四 阿片丁幾 一、五
橙皮舍利別 三、〇
水 二、〇
右每半時一食匙

八〇五 阿片丁幾 五、〇
水製蘆苳越幾斯 四、〇
右十滴乃至十五滴和一盞之
葡萄酒與之

八〇六 阿片丁幾 三、〇
樟腦 一、〇
醋酸依的兒 一、〇
右每十分乃至三十分時十滴
乃至十五滴

八〇七 薄荷水 四、〇
阿片丁幾、芳香丁幾 各一、五
右每時十滴

八〇八 阿片丁幾 五、〇
繡草丁幾 五、〇
芳香丁幾 五、〇
薄荷油 一、〇
右每三十分下滴乃至二十滴

八〇九 阿片丁幾 一、〇
吐酒石酒 三、〇
繡草丁幾 二、〇
薄荷油 〇、一五
右一日數回每回二十滴乃至三十滴

八〇三 阿片丁幾 二、〇

八〇四 阿片丁幾 一〇、〇

八〇五 吐根丁幾 五、〇

八〇六 薄荷油 五滴

右每二時二十滴

八〇七 阿片丁幾 七、五

八〇八 烏頭丁幾 一五、〇

八〇九 アルニカ丁幾 五、〇

八〇一〇 繡草丁幾、蕃木甯丁幾

八〇一一 依的兒精 各一〇、〇

八〇一二 薄荷油 二、五

八〇一三 右每半時十滴乃至二十滴

八〇一四 芳香阿片酒 六、〇

八〇一五 吐根酒 三、〇

八〇一六 繡草丁幾 二〇、〇

八〇一七 薄荷油 〇、一五

右一日數回每回十五滴乃至二十五滴

八〇一八 阿片安息香丁幾 一〇、〇

八〇一九 シーデンハム氏阿片丁幾 五、〇

右每一時乃至三時十滴乃至十五滴

八〇二〇 シーデンハム氏阿片丁幾 六、〇

八〇二一 吐根酒 四、〇

八〇二二 繡草丁幾 一二、〇

八〇二三 薄荷油 一、〇

右每回十五滴乃至二十滴

八〇二四 嘔囉仿談 三、〇

八〇二五 依的兒精 三、五

八〇二六 鹽酸莫爾比涅 〇、五

八〇二七 苦扁桃水 一、五

八〇二八 薄荷油 一滴

八〇二九 甘草舍利別 二七、〇

右一日數回每回五滴至十滴

八〇三〇 ●注射劑

八〇三一 格魯兒那篤留謨四、〇一六、〇

八〇三二 重碳酸那篤留謨一、〇一三、〇

八〇三三 水 一〇〇〇、〇

右為四十度之溫注射皮下

八〇三四 カンタニー氏

八〇三五 食鹽 六、〇

八〇三六 碳酸加留謨 三、〇

八〇三七 水 一五〇、〇

右注入腹部皮下

八〇三八 阿片越幾斯 一〇、一

八〇三九 水 一五、〇

右注射皮下

八〇四〇 麥角越幾斯 一、〇

八〇四一 酒精、佛里設林 各六、〇

右每回半筒至一筒注入皮下

八〇四二 十倍抱水格魯刺爾液 一〇、〇

八〇四三 右一筒注射皮下、假死期 〇、四

八〇四四 鹽酸莫爾比涅 〇、四

八〇四五 石炭酸水(二%) 三、〇

八〇四六 水 七、〇

右每回四分之一乃至半筒注射皮下

八〇四七 濾膜製麥角越幾斯 二、〇

八〇四八 硫酸莫爾比涅 〇、一

八〇四九 硫酸亞篤羅必涅 〇、〇一

八〇五〇 餾水 一〇、〇

右每回半筒注射皮下

八〇五一 ●芥鉛劑

八〇五二 ザロール 三、〇

八〇五三 撒里矢爾設芥鉛 一、五

八〇五四 右分三包一日三回每回一包 五、〇

八〇五五 ザロール

撒里矢爾酸蒼鉛 二、〇

右分十包每二時一包

八〇四 次硝酸蒼鉛 一、〇、〇

或撒里矢爾酸蒼鉛

阿片越幾斯 二、五

右分十包初每半時後每十時一包 〇、一

八〇四 次硝酸蒼鉛、甘朮 各三、〇

右分六包一日三回每回一包

八〇七 次硝酸蒼鉛 一、〇、〇

阿片泊美蘭丁幾 二十滴

薄荷水 一、〇、〇

セルペンタリー根煎 七〇、〇

ラタニヤ舍利別 三〇、〇

八〇四 硝酸銀 〇、一

次硝酸蒼鉛 三、〇、〇

阿片 〇、三

右爲五十九每三時二粒

●鎮吐劑

稀酒精 一、〇、一

八〇九 コトイン

水 一、二〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙

八〇五 バラコトイン 〇、三

白糖 三、〇

右分六包每二時一包

八〇五 バラコトイン 一、〇

水、俚里設林 各五、〇

右一日二三回注射皮下、甚嘔吐

●充奮劑

杜松子油 二〇、〇

醋酸依的兒 一〇、〇

右每時五滴乃至十滴

八〇五 麝香 〇、三

薄荷油 十滴

依的兒 一〇、〇

右每時五滴乃至十滴

八〇四 樟腦 二、〇

依的兒 一〇、〇

右每回半筒至一筒注射皮下

八〇五 樟腦 〇、三

白糖 三、〇

右分十包每時一包

八〇五 桂皮水、桂皮精 各一五、〇

卵黃 二個

ブランデー酒 三〇、〇

右每時一茶匙

八〇七 炭酸安母紐膜 五、〇

樟腦 一、二

白糖 五、〇

右分十包每半時一包

八〇五 硫酸規尼涅、樟腦 各一、〇

亞拉比亞護膜末、白糖各二、〇

右分十包每半時一包

八〇五 安息香酸 〇、六

硫酸規尼涅 〇、八

白糖 二、〇

右分十包每時一包、小兒

八〇六 加密列浸 一二五、〇

苛性安母紐膜液 一、五

橙皮舍利別 二五、〇

甘硝石精 一、〇

右每十五分時一食匙

●大黃劑

酒製大黃丁幾、纈草丁幾

複方橙皮丁幾 各五、〇

右一日三回每回二十滴

八〇三 大黃浸 (五、〇)一五、〇、〇

重碳酸那篤留謨 五、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

●浣腸劑

八〇三 加密列浸 二〇〇〇、〇

單寧酸 三、〇

亞拉比亞護謨 五〇、〇

單阿片丁幾 三十滴—五十滴

右灌腸(カンタニー氏)

八〇四 單寧酸 一、〇

溫湯 一〇〇〇、〇

阿片丁幾 一、〇

右浣腸

八〇五 單寧酸 一〇、〇

亞拉比亞護謨 三〇、〇

水 二〇〇〇、〇

右灌腸

八〇六 單寧酸 〇、五

火酒 一五、〇

水 一〇〇、〇

右浣腸

八〇七 二百倍鹽酸水 二〇〇、〇

右灌腸

八〇六 稀鹽酸 二、〇—一〇、〇

乳酸 五、〇—一五、〇

單寧酸 三、〇—六、〇

水 二〇〇〇、〇

右灌腸(カンタニー氏)

八〇九 阿片丁幾 一、〇

水 一〇〇、〇

右浣腸

八〇〇 ザロール 一〇、〇

護謨漿 一〇〇、〇

右振盪洗滌胃腸

●消毒劑

八〇一 昇汞水(一%) 五〇〇、〇

右消毒用

八〇二 石炭酸(二%) 五〇〇、〇

右消毒用

八〇三 石炭酸水(五%) 四〇〇、〇

右衣服消毒用

八〇四 過滿侖酸加留謨 二、〇

水 二〇〇、〇

右消毒用

八〇五 硫酸鐵 一二、〇

硫酸 一〇、〇

水 二〇〇、〇

右消毒用

●浴湯劑

八〇六 芥子 五〇〇、〇

右浴用十五分時間、入湯

●塗布劑

八〇七 芥子精 一〇〇、〇

杜松子油 五、〇

右塗布腓腸部

●其他諸劑

八〇八 昇汞 〇、〇五

米粥汁 一〇〇〇、〇

右溶解二十四時內分服

八〇九 硝酸銀 〇、六

蒸餾水 二滴

阿片越幾斯 〇、三

亞兒答根末 一、五

健質亞那越幾斯 適宜

右爲三十九每一時乃至三時

二粒

八〇〇 稀鹽酸、餾水 各一〇、〇

右每回四滴乃至十滴

八〇一 硫酸ベルベリン 〇、五

稀鹽酸 〇、五

依的兒 〇、五

桂皮水 一〇、〇

右每時一食匙

八〇二 チモール 一〇、〇

右分十二包入膠囊、每二時

一包

八〇三 格魯兒水* 二〇、〇

亞爾答舍利別 四〇、〇

右每十分時一茶匙但同時須

衝冰塊

八〇四 蝦性麻偏濕更誤 二、〇

炭酸石灰 五、〇

護謨舍利別 一〇、〇

結麗阿曹篤 〇、〇五

餾水 一五〇、〇

右振蕩每十分時一食匙

八〇五 セルテル水 五〇〇、〇

右一日數回分服

八〇六 接骨木花 一五、〇

右為茶劑

八〇七 ナフタリン 各五、〇

ベルガモット油糖

右分十包一日五包乃至十包

八〇八 鹽酸規尼涅 三、〇

右分十包一日三四回每回一

包

八〇九 蘇木煎 (二〇、〇)二〇、〇

古倫僕越幾斯 五、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每一時一食匙

赤痢 Dysenterie, Dysenteria.

痢疾、痢病、實布の里性大腸炎、垢痢、素問名腸癖、傷寒論名使膿血、金匱名下痢、難經名火瘕泄、

古時又名滯下、又有紅痢白痢疫痢噤口痢休息痢寒痢等名、

處置 溫包靜臥、流動性液養物、緩性下痢、防腐性澀腸劑等

●水劑 薄荷水 一五〇、〇

八〇九 蓖麻子油 五〇、〇

右最初二食匙次回一食匙

八〇九 阿片丁幾 一、〇

單寧酸 二、五

單舍利別 二五、〇

餾水 一一〇、〇

偏里設林 三〇、〇

右一日三回每回一茶匙

八〇九 硝酸銀 〇、一

餾水 二〇〇、〇

杏仁水 六〇、〇

八〇五 醋酸礬土水

右一日四回每回一食匙

水

單舍利別

右每二時一食匙

八〇六 麥角越幾斯

沙列布漿*

石炭酸水

阿片丁幾

右每二時一茶匙

八〇七 麥角越幾斯

山慈姑煎

石炭酸水

阿片丁幾

右每回二時乃至三時一茶匙

八〇八 薔木醬越幾斯

桂皮水

亞拉比亞護膜漿

單舍利別

右每二時一食匙

八〇九 古倫僕越幾斯

沙列布煎

茴香油糖

八〇〇 古倫僕越幾斯

右每時一小兒匙、小兒

稀鹽酸

沙列布漿*

橙皮舍利別

右每二時一食匙

八〇一 次硝酸蒼鉛

亞拉比亞護膜漿

單舍利別

水

右一日三回分服

八〇二 ザロール

橙皮丁幾

依的兒

護膜舍利別

阿片越幾斯

水

右每二時一食匙

八〇三 甘扁桃油

亞拉比亞護膜

水

杏仁水

單舍利別

八〇四 巴豆油

右為乳劑每一二時一食匙

甘扁桃油

亞拉比亞護膜

薄荷水

杏仁水

扁桃舍利別

右為乳劑每一時一食匙

八〇五 蓖麻子油

亞拉比亞護膜末

右為乳劑

薄荷舍利別

右每二時一小兒匙

八〇六 吐根浸

阿片丁幾

右一日三回分服

八〇七 吐根浸

(〇、五—一、〇)一二〇、〇

阿片丁幾

單舍利別

右每二時一食匙

八〇八 シマルバ皮浸

(一〇、〇—一五、〇)

刺答尼亞越幾斯

單舍利別

四、〇
三、〇、〇

右每二時一食匙

八二〇 シマルバ皮煎

ブランデー酒

沙列布油

橙皮舍利別

右一日三回二分服

八二一 シマルバ皮

白葡萄酒

右微溫浸六時間

酒精

阿片丁幾

右每四時間二五〇、〇

八二二 柘榴根皮

シマルバ皮

白葡萄酒

右浸二十四時間濾過每二時

一食匙

八二三 柘榴根皮

白葡萄酒

三〇〇、〇

右冷浸濾過

橙皮舍利別

二〇、〇

右一日六回二分服

八二三 柘榴根皮

シマルバ皮

或括矢亞

ジンファンデル酒

或白葡萄酒

右浸二十四時間濾過三日間

八二四 大黃

吐根

右沸湯浸出

亞拉比亞護謨

亞爾答舍利別

右每一時一食匙

八二五 大黃

吐根

右浸出

護謨舍利別

右每時一食匙

八二六 格倫僕根煎

阿片泊美藍丁幾

橙皮舍利別

一、〇
一五、〇

右每二時一食匙

八二七 甘汞

白糖

白糖

右分四包先與一包直投蓖麻子油三〇、〇 其後甘汞每三時一包

時一包

八二八 甘汞

乳糖

右分十包每三時一包

八二九 甘汞

白糖

右分二包二時間內分服

八三〇 甘汞、阿片

白糖

右分十包一日三回每回一包

八三一 甘汞

阿片

吐根末

右分八包每時一包

八三三 甘汞、藥刺巴末

各一、五

八二三 阿片 右分三包每三時一包

阿仙藥 白糖 三、〇

右分十包每三時一包 一、二

八二四 掬洵兒氏散 一、二

單寧酸規尼涅 白糖 二、〇

右分五包一日三回每回一包 三、〇

八二五 掬洵兒氏散 三、〇

甘水 〇、三

白糖 三、〇

右分十包每三時一包 一、〇

八二六 吐根末 一、〇

右頓服 〇、一

八二七 吐根 〇、四

蓆酸セリウム 〇、五

乳糖 〇、五

右分四包每三時一包 〇、五

八二八 吐根 〇、五

阿片越幾斯 〇、二

白糖 三、〇

右分十包每二時一包 〇、二

八二九 撒里矢爾酸 三、〇

白糖 一、〇

右分六包每一時至二時一包 三、〇

八三〇 ザロール 三、〇

右分三包一日三回每回一包 一、〇

八三一 タンニール 一、〇

右一日三回每回一小刀尖、小兒 六、〇

八三二 次硝酸蒼鉛 〇、一八

阿片 三、〇

乳糖 〇、一八

右分六包一日六回每回一包 二、五

八三三 次硝酸蒼鉛 〇、四

阿片 一、五

白糖 〇、四

右分十包一日三回每回一包 五、〇

八三四 次硝酸蒼鉛 二、〇

掬洵兒氏散 二、〇

右分十包一日三回每回一包 一、〇

八三五 次硝酸蒼鉛 一、〇

亞拉比亞護謨末 五、〇

右分十包每二時一包、小兒 五、〇

八三六 撒里矢爾酸 五、〇

白糖 〇、五

右分十包每二時一包、小兒 〇、五

八三七 乳糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包 五、〇

乳糖 五、〇

右分十包一日三回每回一包 五、〇

●洗腸劑 各〇、五

八三八 阿片、鉛糖 各〇、五

水 一〇〇、〇

右洗腸 各〇、五

八三九 阿片丁幾、鉛糖 一〇〇、〇

水 各〇、五

右洗腸 一〇〇、〇

八四〇 亞拉比亞護謨漿 二〇〇、〇

阿片丁幾 一〇、〇

右洗腸 一〇、〇

八四一 阿片丁幾 十五滴

山慈姑煎 (五、〇) 一五〇、〇

右洗腸 一〇〇〇、〇

八四二 山慈姑煎 一〇〇〇、〇

次硝酸蒼鉛 一五、〇

阿片丁幾 二、〇

右洗腸 一〇〇〇、〇

八四三 亞麻仁煎 二〇〇、〇

過格魯兒鐵液 二、〇

右洗腸 二〇〇、〇

八四四 單寧酸水(1%) 三〇〇、〇

八二四 單寧酸水 右洗腸

(〇、五—二、〇) 一〇〇、〇
右分二回洗腸、小兒

八二五 醋酸礬土液 二〇、〇

右一〇、〇加於水一〇〇、〇
洗腸、小兒

八二六 醋酸鉛 三、〇—五、〇

右分五包以一包溶於水一〇〇、〇
〇〇、〇腸洗滌、小兒

八二七 明礬水(一%) 三〇、〇

右洗腸

八二八 三百倍撒里矢爾酸水 三〇〇、〇

右洗腸

八二九 撒里矢爾酸水 (一、〇—三、〇) 二〇〇〇、〇

右每回一碗洗腸、小兒

八三〇 撒里矢爾酸水(二%) 一〇〇〇、〇

右灌腸

八三一 タレチリン或リゾール 五〇、〇

右一茶匙和一〇〇〇、〇之水灌腸

八三二 格魯兒酸加留謨水 (二、〇) 三〇〇、〇

右洗腸

八三三 硼酸水(二%) 一〇〇〇、〇

右分二回灌腸

八三四 硝酸銀水(〇、一%) 一〇〇〇、〇

右洗腸

八三五 硝酸銀水(〇、二%) 三〇〇〇、〇

右洗腸

八三六 硝酸銀水 〇、〇—五、〇

右一日二回洗腸、小兒

八三七 硝酸銀水 一〇〇〇、〇

右一日二回洗腸

八三八 硝酸銀水 〇、二—〇、三

右洗腸

八三九 硝酸銀水 〇、三一〇、五

阿片丁幾 一五〇、〇

八四〇 鹽酸規尼涅 二、〇—四、〇
右分二回灌腸

水 四〇〇、〇

八四一 ナフトール 二、五

右十分包以一包和微溫湯一〇〇〇、〇洗腸

八四二 石炭酸水(〇、三%) 五〇〇、〇

右洗腸

八四三 抱水格魯刺兒 一、〇

蜂蜜 適宜

八四四 阿仙樂 水 一〇〇、〇

右振盪洗腸、小兒

八四五 巴豆油 〇、〇—五、〇

阿列布油 三〇、〇

八四六 亞拉比亞護謨水 一五、〇

右爲乳劑 一二〇、〇

八四七 菲沃斯越幾斯 〇、三一〇、六

右洗腸 沃度加留謨 一、五

沃度丁幾 一、二五—二、五
 水 一〇〇、〇
 右分五回澆腸
 八二六 沃度加里 一、五
 沃度丁幾 一五、〇
 水 二〇〇、〇
 右澆腸
 ●坐劑
 八二六 鹽酸古加乙涅 〇、五—一、〇
 阿片末 〇、五
 柯柯阿脂 二、〇
 右為坐藥十個朝夕一個
 八二六 鹽酸古加乙涅 一、〇
 別拉敦那越幾斯 〇、〇、五
 柯柯阿脂 二〇〇、〇
 右為坐藥十個一日二個
 八二七 別拉敦那越幾斯 〇、二五

實扶的里亞 *Diphtheria.*

一 作實布的里亞、舊譯作時疫白喉、又名喉嚨發炎生假皮、即鎖喉風、一名白皮痧、一名白喉、又有馬脾風脾喉風等名、古名爛喉丹痧、實布的里咽喉衝、咽壞疽、義膜性咽喉炎、咽喉實布的里亞
 爛喉丹痧 *Diphtheritis; Cyanucha contagiosa; Stomatylphus; Fagar.*

鼻實布的里亞 *Angina diphtherica.*

柯柯阿脂 一五、〇
 右為坐藥四個、裏急後重
 八二七 別拉敦那越幾斯 〇、六
 柯柯阿脂 二〇、〇
 為坐藥十個朝夕一個
 八二七 阿片 〇、六
 鉛糖 二、〇
 白蠟 〇、五
 柯柯阿脂 四、〇
 豚脂 二、〇
 為坐藥十個朝夕一個
 八二七 單寧酸 一、〇
 阿片末 二、〇
 柯柯阿脂 一、二、〇
 右為坐藥十個朝夕一個
 八二七 單寧酸、阿片越幾斯 各〇、五
 右柯柯阿脂適宜為坐藥十個

一日三回每回一個
 八二五 ナフタリン 一〇、〇
 右以柯柯阿脂為坐藥
 ●丸劑
 八二六 阿片、吐根 各〇、五
 加斯加里朋越幾斯 四、〇
 阿仙藥 適宜
 右為六十九一日三回每回二粒
 八二七 醋酸鉛、阿片 各〇、二五
 右入膠囊四個一日二回每回一個
 八二六 沃度仿謨 〇、五
 阿片 〇、三
 右入膠囊十個一日六回每回一個

●塗布劑

八七九 バ、ヨチン 〇、五
 水 一二、〇
 右每時塗布
 八八〇 苛性曹達 〇、五
 石灰水 六〇、〇
 右塗布
 八八一 苛性那篤倫液(1%) 一〇〇、〇
 右塗布
 八八二 沃度 〇、四
 酒精 二〇、〇
 呀囉仿謨 二、〇
 右塗布
 八八三 沃度酸 五〇、〇
 水 五〇、〇
 右塗布
 八八四 撒里矢爾酸 一、〇
 酒精 五〇、〇
 右塗布
 八八五 撒里矢爾酸 一、〇
 酒精、儂里設林 各二、五
 硼酸 五、〇

八八六 撒里矢爾酸 二、〇
 硼酸那篤倫謨 二、〇
 儂里設林 二〇、〇
 右塗布
 八八七 過滿俺酸加里水 (〇、三一〇、五) 一〇〇、〇
 右塗布
 八八八 格魯謨酸水 (二、五) 二五、〇
 右塗布
 八八九 格魯謨酸水 二、〇
 水 五、〇
 右塗布
 八九〇 貌羅謨、貌羅謨加留謨各 〇、五
 儂里設林 一〇、〇
 右塗布
 八九一 昇水 〇、〇五
 酒石酸 〇、二五
 水 一〇〇、〇
 右塗布
 八九二 石炭酸水 (〇、五) 一〇〇、〇
 右塗布
 八九三 石炭酸 五、〇

樟腦 一五、〇
 右塗布
 八九四 石炭酸 四、〇
 儂里設林 三〇、〇
 右塗布
 八九五 石炭酸 二、〇
 儂里設林 一二、〇
 右蘸於綿球塗布
 八九六 石炭酸 四、〇
 酒精、儂里設林 各一〇、〇
 右塗布
 八九七 過格魯兒鐵液 五、〇
 水 五、〇
 右塗布
 八九八 過酸化水素水(2%) 一〇、〇
 右塗布
 八九九 酒石酸 一〇、〇
 儂里設林 一五、〇
 薄荷水 二五、〇
 右塗布
 九〇〇 枸橼酸水 (一〇、〇) 五〇、〇
 右塗布
 九〇一 枸橼酸 〇、五
 一、〇

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---------|---------------|---------|-----------|----------------|----------|-------------|
| 酒精 | 一、〇 | 八〇八 | プロモール | 〇、四 | 篤露拔爾撒謨 | 五、〇 | | |
| 僱里設林 | 一〇、〇 | 僱里設林 | 右塗布 | 一〇、〇 | 右混和一日六回塗布 | 四、〇 | | |
| 右塗布 | 七、五 | 八〇九 | 格魯胃謨僱里設林(二十%) | 一〇、〇 | 八三五 | 沃度仿謨 | 一五、〇 | |
| 硼酸 | 各一五、〇 | 右塗布 | 八二〇 | クレオリン | 一、〇 | 硫酸依的兒 | 一五、〇 | |
| 僱里設林、水 | 一〇〇、〇 | 酒精、水 | 各一〇、〇 | 右一日二回塗布 | 八三六 | 甘扁桃油 | 一五、〇 | |
| 右每時塗布 | 三〇、〇 | 八二二 | 抱水格魯刺兒 | 四、〇 | 一六、〇 | 右振盪混和、晝六回夜二回塗布 | 五〇〇、〇 | |
| 八二四 | 樟腦精 | 僱里設林 | 右一日四回塗布 | 二〇、〇 | 八三七 | 苛性曹達 | 二〇、〇 | |
| 右每十五分時塗布一回 | 二〇、〇 | 右一日四回塗布 | 五、〇 | 八三二 | 酒石酸ヒノリン | 五〇、〇 | | |
| 八二五 | 樟腦 | 蒸餾水 | 五〇、〇 | 亞爾個保爾 | 五〇、〇 | 右吸入 | 二〇〇、〇 | |
| 蓖麻子油 | 一五、〇 | 右塗布 | 一〇、〇 | 的列並油 | 二〇、〇 | 八二八 | 炭酸利去謨 | 二、五 |
| 酒精 | 一〇、〇 | 石炭酸 | 一〇、〇 | 酒精 | 一〇、〇 | 八二九 | 乳酸 | 六十滴 |
| 石炭酸 | 五、〇 | 右塗布 | 一〇、〇 | 沃度仿謨 | 一、〇 | 水 | 一八〇、〇 | |
| 酒石酸 | 一、〇 | 依的兒 | 二五、〇 | 格魯胃謨 | 六、〇 | 八三〇 | 過滿俺酸加留謨水 | (〇、〇五)一〇〇、〇 |
| 右塗布 | 三〇、〇 | 八三四 | 依的兒 | 六、〇 | | | | |
| 八二六 | レゾルチン | 八三三 | 的列並油 | 一〇、〇 | | | | |
| 僱里設林 | 三〇、〇 | 石炭酸 | 二〇、〇 | | | | | |
| 右塗布 | 一〇、〇 | 酒精 | 一〇、〇 | | | | | |
| 八二七 | 知母爾 | 八三四 | 沃度仿謨 | 一、〇 | | | | |
| 酒精 | 五〇、〇 | 依的兒 | 二五、〇 | | | | | |
| 水 | 五〇、〇 | 格魯胃謨 | 六、〇 | | | | | |
| 右塗布 | 五〇、〇 | | | | | | | |

●吸入劑

八三三 右吸入 格魯兒酸加留謨水 (二、〇)四〇〇、〇

八三三 右吸入 格魯兒酸加留謨水 (五、〇)五〇〇、〇

八三三 右吸入 格魯兒酸加留謨水 (四、〇)二〇〇、〇

八三三 右吸入 格魯兒那篤留謨水 (二、〇)二〇〇、〇

八三五 右吸入 硼酸水 (四、〇)二〇〇、〇

八三五 右吸入 右舍嗽吸入 硼酸那篤留謨水 (二、〇)一〇〇〇、〇

八三七 右吸入 石炭酸水 (二、〇)五〇〇、〇

八三六 右吸入 昇水 一〇〇〇、〇

八三九 貌魯謨 〇〇、五

八三九 貌魯謨加留謨 〇〇、五

八三九 蒸餾水 一〇〇〇、〇

八三九 右吸入、漆布 貌羅謨、貌羅謨加留謨各〇、四

八三九 右吸入 知母爾 〇、五

八三九 硼酸那篤留謨 二〇〇、〇

八三九 佛里設林 三五、〇

八三九 樟腦水 七、〇

八三九 右吸入 爹兒水 二〇〇、〇

八三九 右吸入 有加里油 五、〇

八三九 酒精 二〇〇、〇

八三九 水 一七五、〇

八三九 撒里矢爾酸 一〇〇、〇

八三九 格魯保紐謨 一五、〇

八三九 亞爾個保爾 一二〇、〇

八三九 右舍於搽里矢爾酸綿紗吸入 水劑

八三九 機那煎 (五、〇)七〇、〇

八三九 或搽涅瓦枝 (五、〇)七〇、〇

八三九 格魯兒酸加留謨 一〇〇、〇

八三九 單舍利別 一〇〇、〇

八三九 右每二時一食匙 機那煎 (五、〇)一〇〇、〇

八三九 格魯兒水 一五、〇

八三九 單舍利別 二〇〇、〇

八三七 右每二時一小兒匙 鹽酸必魯加兒必涅 〇、〇二一〇、〇四

五百五

實扶的里亞

五百五

八三元 青酸水銀

蒸餾水

右每時一茶匙

一〇〇、〇

八四〇 青酸水銀

水

單舍利別

右一日二回每回一茶匙

一〇〇、〇
九〇、〇

八四二 格魯兒酸加留謨

水

單舍利別

右每時一食匙

一八〇、〇
一五〇、〇

八四三 格魯兒酸加留謨

水

格魯兒鐵丁幾

覆盆子舍利別 藥

右每時一食匙

一五〇、〇
七、五
三〇、〇

八四四 格魯兒酸加留謨

個里設林

右每時一茶匙

四〇、〇
三〇、〇
一〇〇、〇

八四五 知母爾

水

橙花水

〇、〇五、〇
一〇〇、〇
五〇、〇

八四六 知母爾

右一日數回每回一食匙

硫酸規尼涅

格魯兒酸加留謨

個里設林

ウヰスキ酒

八四七 貌魯謨

貌魯謨加留謨

蒸餾水

右每時一茶匙

八四八 過格魯兒鐵丁幾

右每二時十滴

八四九 依的兒性格魯兒鐵丁幾

單舍利別、薄荷水

右每二時一茶匙

八五〇 過格魯兒鐵丁幾

民埤列利精

右每二時一茶匙

八五一 過格魯兒鐵液

蒸餾水

右一日四回每回十滴至二十

八五二 安息香酸那篤留謨

薄荷水、水

橙皮舍利別

右每時一茶匙至一食匙

八五三 硫酸規尼涅

礮砂

水

橙皮舍利別

右每時一茶匙

八五四 鹽酸規尼涅

覆盆子舍利別

水

右每半時一小兒匙

八五五 プランデー酒

單舍利別

右混和一日數回分服、三四

歲兒

散劑

鹽酸規尼涅

白糖

右分十包每二時一包

滴

五、〇

各四〇、〇

一〇、〇

〇、二一〇、六

二、〇一六、〇

五〇、〇一〇〇、〇

二〇、〇一四〇、〇

〇、三一、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

八二五 鹽酸必魯加兒必涅 〇、〇一

白糖 二、五

八二六 右分五包一日數回每回一包

八二七 硫酸銅 五、〇

白糖、澱粉 各二、五

右分五包每十分時一包催吐

小兒

●丸劑

八二八 鹽酸規尼涅 五、〇

稀鹽酸 二滴

右為二十九每二時二粒

●合嗽劑

八二九 石灰水 五〇〇、〇

右合嗽

八三〇 格魯兒酸加留謨水 (八、〇)四〇〇、〇

右合嗽

八三一 格魯兒酸加留謨水 (八、〇)二五〇、〇

右合嗽

八三二 石炭酸水 (一、〇)二〇〇、〇

右合嗽

八三三 過滿俺酸加里水

八三四 昇汞 〇、〇五

右合嗽

八三五 薄荷水 五〇〇、〇

右合嗽

八三六 青酸水銀 〇、〇五

薄荷水

八三七 撒里矢爾酸 二、〇一四、〇

右合嗽

八三八 硼酸那篤留謨 二、〇一四、〇

水

八三九 蜂蜜 三〇〇、〇

水

八四〇 沃度酸 〇、一〇〇、二

右合嗽

八四一 純醋 二〇〇、〇

右合嗽

八四二 沃度丁幾 八〇、〇

右合嗽

八四三 知母爾水 (一、〇)一〇〇、〇

右每一二時一食匙合嗽

亞爾個保兒 一〇〇、〇

右合嗽

八四四 クレオリン水 (二、五)一〇〇〇、〇

右合嗽

八四五 クレオリン 一、〇

薄荷精

八四六 ヒノリン水(〇、五)二五〇、〇

右合嗽

八四七 硫酸斯篤里幾尼涅 〇、〇一

●注射劑

八四八 鹽酸必魯加兒必涅 〇、〇二

蒸餾水

八四九 右每回半筒注射皮下

●噴付劑

八五〇 撒里矢爾酸那篤留謨 一五、〇

水

八五一 石炭酸、稀酒精 各一、〇

右噴付

八五二 石炭酸、稀酒精 各一、〇

右噴付

八五三 石炭酸、稀酒精 各一、〇

右噴付

沃度丁幾 〇、五
 備里設林、水 各二、五
 右每回二十五滴至四十滴和
 一食匙之水噴付

六、〇一〇、〇
 水 二〇〇、〇
 右噴付
 石炭酸水(一%) 五〇〇、〇
 右噴付口內及鼻腔

八八三 マントール 二、〇
 阿列斯油 一〇、〇
 右蘸於綿球插入
 八八四 ババイン 一、〇
 水 二〇、〇
 右點入鼻中
 八八五 レゾルチン水 二〇、〇
 (〇、五一、一、〇)二〇、〇
 右灌腸

八二六 知母爾 〇、五
 礪砂 二〇、〇
 備里設林 四〇、〇
 樟腦水 八〇、〇
 麥兒水 二〇〇、〇

八二二 醋酸羆土液 一〇〇、〇
 水 二〇〇〇、〇
 右噴付
 八二三 沃度仿謨 一、〇
 白糖 三、〇
 右撒布患部

八二五 安息香酸那篤留謨

流行性感冒 Influenza.

インフルエンザ、流行性加答兒、天行中風、流行風、於七風、檀法風

●水劑

八二六 麗麻子油 一五、〇
 右頓服

八二〇 吐根浸 (〇、六)一八〇、〇
 右咳嗽頻發時十五滴

八二二 吐根浸 (〇、二一〇、四)六〇、〇
 右每二時一茶匙

八二七 鹽酸里母奈埤* 二〇〇、〇
 右每二時一食匙

八二一 單舍利別 一五、〇
 右每二時一食匙

安母尼亞茴香精 二、〇
 鹽酸亞剎莫兒比涅 〇、〇二一〇、〇四

八二八 嬌酸里母奈埤* 二〇〇、〇
 右一日數回分服

八二二 吐根浸 (〇、四)一〇〇、〇
 杏仁水 二、〇

鹽酸 〇、〇三
 攝涅瓦舍利別 二〇、〇
 右每二時一茶匙

八二九 鹽酸莫兒比涅 〇、一
 杏仁水、水 各一五、〇

八二二 醋酸安母紐謨液 三、〇
 單舍利別 一〇、〇

攝涅瓦舍利別 二〇、〇
 右每二時一茶匙

八二五 接竹木花浸

(一六、〇)一〇〇、〇

醋酸安母紐護水

四、〇

右一日三回分服

八二四 耶僕蘭日葉浸(五、〇)六〇、〇

單舍利別

一五、〇

右一回至二回分服

八二五 撒里矢爾酸那篤留護

三、〇一四、〇

水

覆盆子舍利別

一五〇、〇

右每二時一食匙

八二六 鹽酸規尼涅

稀鹽酸

一、〇

水

右二回分服

八二七 安知必林

橙皮舍利別

五、〇

水

右一日三回每回一食匙

八二八 硫酸斯篤里幾尼涅

水

〇、〇三

右一日二回至五回每回一茶

八二九

エキザルギン

匙

二、五

橙皮丁幾

五、〇

水

二、〇

橙皮舍利別

三、〇

右朝夕一食匙

八三〇

エキザルギン

二、五

薄荷舍利別

五、〇

チリ水*

一、二〇、〇

橙花舍利別

三、〇

右朝夕一食匙

八三一

ザリピリン

六、〇

水

一、四

僱里設林

三、〇

單舍利別

五、〇

右每二時一食匙

八三二

ザリピリン

六、〇

僱里設林

一、四

覆盆子舍利別

三、〇

水

四、〇

右振盪一日一二食匙

八三三

抱水格魯刺爾

一、〇

亞拉比亞護膜漿

單舍利別

各一五、〇

右頓服

●丸劑

八三四 安知歇貌林

白糖

二、〇

右護膜適宜爲二十九一日三

八三五 安知必林

白糖

二、〇

亞拉比亞護膜

右爲二十九一日二粒至五粒

八三六 硫酸規尼涅

白糖、亞拉比亞護膜

各一、〇

右爲九每日一回至三回分服

八三七 單寧酸規尼涅

柯柯阿脂

一、〇

右爲錠十個一日一回一個

●散劑

八三八 挖勿兒氏散

右臨臥頓服

〇、五

八三九 鹽酸莫兒比涅

乳糖

〇、〇一

右爲一包咳嗽頻發之時頓服

八三〇 撒里矢爾酸那篤留謨

二、〇一三、〇

右頓服

八三一 サリピリン 一〇、〇一ニ〇、〇

右分十包一日三回乃至六回

八三二 鹽酸規尼涅

右分十包每二時一包 一、〇

八三三 鹽酸規尼涅

格魯兒安母紐謨 〇、五一、〇

大黃末

右分十包每一時至二時一包 各二、〇

八三四 安知歇貌林

乳糖 一、〇

八三五 鹽酸必魯加兒必涅

白糖 〇、〇二

右頓服 〇、五

旬行熱 Febris herpetic.

八三六 安息香酸

〇、四

白糖

右分十包每三時一包 三、〇

八三七 フェナツエチン

右分五包一日四回乃至每夕 二、五

八三八 フェナツエチン

或ラクトフニン 〇、五一、〇

右分三包一日三回每回一包

八三九 フェナツエチン

撒里矢爾酸規尼涅、樟腦 各一、〇

金硫黃 〇、五

各分十包一日三回每回一包

八三〇 貌羅謨安紐謨

安息香酸那篤留謨 〇、六

咖啡涅 〇、三一、〇、六

八三一 貌羅謨加留謨、貌羅謨那篤留謨、貌羅謨安紐謨 各、六〇

右分九包一日一包至三包

●注射劑

八三二 撒里矢爾酸那篤留謨咖啡涅

水 二、〇一五、〇

右每回半筒至一筒一日二回

至四回注射皮下 一、〇、〇

八三三 硫酸規尼涅

右溶於水一五〇、〇 注入鼻 一、〇

中

八三四 重碳酸那篤留謨、食鹽各一、〇

鹽酸莫爾比涅 〇、〇二

水 二〇〇、〇

右注入

旬行疹熱、旬行疹、舊譯作水蟻癩、南名大水蟻癩、又名水丹毒、西名卑靴士

一日熱 F. ephemera. 每日熱、舊譯作常熱瘧症、又名應時輕重熱症、又名溫瘧不止

僕麻質斯熱 F. rheumatica.

加答兒熱 F. catarrhalis.

八三五 耶僕蘭日葉

沸湯

右浸出濾過爲五〇、〇頓服

二、〇 適宜

八三六 民坪列里精

接骨木花浸

接骨木花越幾斯

二五、〇
一五〇、〇
二〇、〇

醋酸依的兒

右每二時一食匙

五、〇

流行性加答兒熱

Grippe.

八三七

吐酒石

吐根末

白糖

催吐

八三六 硫酸規尼涅

白糖

水劑

鹽酸規尼涅

蒸餾水

橙皮舍利別

右每二時一小兒匙

散劑

吐酒石

吐根末

白糖

催吐

白糖

水劑

鹽酸規尼涅

蒸餾水

橙皮舍利別

右每二時一小兒匙

〇、二
三、〇
二、五

二、〇
四、〇

一、〇
三、〇
二、〇

二、〇
四、〇

一、〇
三、〇
二、〇

一、〇
三、〇
二、〇

一、〇
三、〇
二、〇

一、〇
三、〇
二、〇

一、〇
三、〇
二、〇

一、〇
三、〇
二、〇

一、〇
三、〇
二、〇

一、〇
三、〇
二、〇

一、〇
三、〇
二、〇

八三〇 鹽酸亞刺莫比涅

水

單舍利別

右每十分時一茶匙、小兒

醋酸莫爾比涅

杏仁水

右一日三回每回五滴至二十

滴

安息香酸

礮砂加荷香精

安質母尼酒

攝涅瓦舍利別

亞爾答舍利別、海葱蜜

〇、〇一
一五、〇
一〇、〇

〇、〇一
一五、〇
一〇、〇

〇、〇一
一五、〇
一〇、〇

〇、〇一
一五、〇
一〇、〇

〇、〇一
一五、〇
一〇、〇

〇、〇一
一五、〇
一〇、〇

〇、〇一
一五、〇
一〇、〇

〇、〇一
一五、〇
一〇、〇

〇、〇一
一五、〇
一〇、〇

〇、〇一
一五、〇
一〇、〇

〇、〇一
一五、〇
一〇、〇

〇、〇一
一五、〇
一〇、〇

〇、〇一
一五、〇
一〇、〇

八三三

吐根浸

格魯兒安母紐謨

安質母尼酒

甘草羔

八三四

攝涅瓦浸

礮砂加荷香精

亞爾答舍利別

右每二時一小兒匙

細草浸

忽布滿精

橙皮舍利別

右每二時一食匙

右每一時一小兒匙

右每一時一小兒匙

右每一時一小兒匙

右每一時一食匙

右每一時一食匙

右每一時一食匙

右每一時一食匙

右每一時一食匙

右每一時一食匙

右每一時一食匙

右每一時一食匙

右每一時一食匙

右每一時一食匙

〇、〇
一五、〇
四、〇

〇、〇
一五、〇
四、〇

〇、〇
一五、〇
四、〇

〇、〇
一五、〇
四、〇

〇、〇
一五、〇
四、〇

〇、〇
一五、〇
四、〇

〇、〇
一五、〇
四、〇

〇、〇
一五、〇
四、〇

〇、〇
一五、〇
四、〇

〇、〇
一五、〇
四、〇

〇、〇
一五、〇
四、〇

〇、〇
一五、〇
四、〇

〇、〇
一五、〇
四、〇

流行性腦脊髓膜炎

Meningitis cerebrospinalis epidemica.

舊譯作春腦衣炎熱症、又名瘰癧

●注射劑

八三六 鹽酸莫爾比涅

〇、五

備里設林

五、〇

水

右每回十分二乃至十分四筒

皮下注射

八三七 鹽酸古加乙涅

〇、一

石炭酸水(三%)

右每回半筒注射第六乃至第

八背椎各側

八三八 硫酸亞篤魯比涅

〇、〇一

水

右每回半筒至一筒注射皮下

八三九 安知必林

三、〇

餽水

右每回一筒至四筒注射皮下

八四〇 抱水格魯刺兒

五、〇

餽水

右每回一筒至四筒注射皮下

●散劑

八四二 甘露

〇、一〇、二

乳糖

右分五包一日三回每回一包

八四三 甘露

〇、五

藥刺巴末、白糖

各一、五

八四四 甘露

〇、五、一〇、八

藥刺巴末

一、〇、一、二、〇

乳糖

右分十包每時一包

八四五 甘露、大黃

各二、五

乳糖

右分五包每二時一包

八四六 安知必林

四、〇

右分四包每半時至一時一包

八四七 安知必林

一、〇、一、四、〇

右分五包每二時一包和赤酒

八四八 安知歌貌林

一、〇、一、二、五

白糖

八四九 鹽酸莫兒比涅

〇、〇五

白糖

右分五包每三時一包

八五〇 フェナツニラン

五、〇

右分十包一日四回每回一包

●水劑

八五一 機那煎

(五、〇、一、〇、〇)二〇〇、〇

赤葡萄酒 一〇、〇、一、三〇、〇

貌魯謨加留謨 一、〇、一、三、〇

單舍利別 六、〇、一、八、〇

右一日三回分服

八五二 機那煎

(一、〇、〇、〇)一〇〇、〇

沃度加留謨 〇、〇、八

赤葡萄酒 三、〇、〇

單舍利別 六、〇

右一日三回分服

八五三 沃度加留謨

一、〇、一、二、〇

薄荷水

二、〇、〇

水

右一日四回每回二茶匙

八三五 沃度加留謨 一、〇一二、〇

覆盆子舍利別 一五〇、〇

右每二時一食匙 二〇、〇

八三四 沃度加留謨 〇、五

或沃度那篤留謨 一〇、〇

水 七〇、〇

椴皮舍利別 一〇、〇

右每二時一食匙

八三五 旃那浸 (二〇、〇)二〇〇、〇

硫酸麻備涅留謨 二〇、〇

覆盆子舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙 六〇、〇

八三五 維納緩下水 六〇、〇

黑櫻實水 * * 各一五、〇

覆盆子舍利別 各一五、〇

右每時一食匙

八三七 抱水格魯刺兒 〇、二一三、〇

水、椴皮舍利別 各一五、〇

右二回分服

八三六 抱水格魯刺兒 一、〇

貌羅謨那篤留謨 二、〇

水 七〇、〇

椴皮舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

八三九 貌魯謨加留謨 一、〇

水 三〇、〇

右頓服

八三〇 貌羅謨加留謨 三、〇

水 一〇〇、〇

覆盆子舍利別 一〇、〇

右每二時一食匙

八三一 貌魯謨加留謨 五、〇

餽水 一五〇、〇

覆盆子舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

八三二 硫酸規尼涅 一、〇

咖啡涅 〇、二

右爲丸一日三回分服

八三三 硝酸銀 〇、〇五

右甘草蒸甘草末各適宜爲十

五九一日三回分服

●洗腸劑

八三四 旃那浸 (一〇、〇)一五〇、〇

硫酸那篤留謨 一〇、〇

右灌腸

八三五 抱水格魯刺兒 二、五

水 五〇、〇

亞拉昆亞護謨藥 五〇、〇

右洗腸

八三六 抱水格魯刺兒 一、〇一二、〇

沙列布煎 二〇〇、〇

右分四回灌腸

八三七 水銀軟膏 五、〇一〇、〇

●塗布劑

右塗布

八三八 沃度仿謨 五、〇

●蘸攝林 一〇〇、〇

右塗布

八三九 水銀軟膏、單軟膏 各一〇、〇

右塗布

其他從單純腦膜炎處置法

腸窒扶斯 Typhus abdominalis. Pleotyphus.

泰斐土熱(タイホイド熱)、下腹窒扶斯、腹臙熱腸腺熱、腸熱、瘟疫、勞役寒冒、證陰傷寒、時疫、舊譯作肚腸熱症、又名小腸壞熱症、古名傷寒

●散劑

八三七〇 甘汞 一分二

右分四包一日二回每回一包

八三七一 甘汞 一分五

右分三包每一時一包

八三七二 甘汞 三、〇一五、〇

乳糖 五分十包一日一回至數回每回一包

八三七三 甘汞 〇、一〇、六

乳糖 右分二包一日二回每回一包

八三七四 甘汞 三、〇

白糖 右分六包每四時一包

八三七五 甘汞 三、〇

白糖 右分六包每四時一包

八三七六 甘汞 四、〇

白糖 右分八包一日三回每回一包

八三七七 明礬 三、〇

右分八包一日三回每回一包

八三六〇 阿片 五、〇

右分十包每一時一包

八三六二 鉛糖 〇、三

八三六一 阿片 〇、一

阿片末 〇、三

阿片 〇、二

八三六二 阿片末 〇、三

阿片末 〇、三

阿片 〇、二

八三六三 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三六四 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三六五 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三六六 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三六七 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三六八 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三六九 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三七〇 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三七一 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三七二 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三七三 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三七四 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三七五 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三七六 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三七七 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三七八 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三三九 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三六〇 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三六一 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三六二 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三六三 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三六四 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三六五 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

八三六六 阿片 〇、一

阿片 〇、一

阿片 〇、二

薄荷油糖

右分六包每三時一包

五、〇

八三七 鹽酸莫兒比涅

白糖

右分十包一日三回每回一包

五、〇

八三六 次硝酸蒼鉛一五、〇—二〇、〇

右分六包一日六回每回一包

八三九 撒里矢爾酸蒼鉛

一〇、〇—一二、〇

右分十包一日數回分服

八三〇 撒里矢爾酸那篤留謨 三、〇

右爲一包一日一回一包

八三一 撒里矢爾酸那篤留謨 六、〇

右分三包每五十分時一包

八三二 安知獸貌林 〇、五—一、〇

白糖

右分十包每一時一包

八三三 安知獸貌林 一、〇—二、〇

白糖

右分四包一日二回至四回每

回一包

八三四 安知獸貌林、白糖 各三、五

右分十包一日四回每回一包

八三五 安知必林

右分六包每三四時一包

三、〇

八三六 カイリン 三、〇—六、〇

右分六包一日數回每回一包

八三七 鹽酸カイリン 一、五

白糖

右分三包每一時一包

八三八 鹽酸規尼涅 一、〇—二、〇

右分二包每一日一包

八三九 硫酸規尼涅 一、五—二、〇

白糖

右分五包每十分時一包

八四〇 硫酸規尼涅 二、〇

右夜間頓服

八四一 硫酸規尼涅、單寧酸 各〇、五

阿片

右分五包每二時一包

乳糖

單寧酸規尼涅 一、〇—三、〇

八四二 阿片末 〇、二

白糖

右分十包每二時一包

八四三 硫酸タルリン 五、〇

白糖 〇、〇七—〇、〇八

右作十包每二時一包

八四四 硫酸タルリン 〇、五—一、五

右分十包一日二回每回一包

八四五 硫酸タルリン 〇、一—〇、五

白糖

右作十包每二時一包、小兒

八四六 ザリチン 六、〇

茴香油糖

右分十二包一日五包至十二

八四七 ラクトフェニン 五、〇—一〇、〇

右分十包一日三回每回一包

八四八 オイフチリン 一、〇

右分十包一日一包至五包

八四九 フェナツエチン 三、〇

右分三包每夕一包

八五〇 撒里矢爾酸麻留謨 二、〇

白聖

右分十包一日數回分服

一、〇

一、〇

一、〇

八四二 ベトール、木炭末 各一、〇

右分十包一日三回毎回一包

八四三 ナフタリン、白糖 各五、〇

ベルガモット油 〇、〇三

右分二十包一日五包至二十包

八四三 ナフタリン 〇、〇五

茴香油糖 〇、〇五

右分三包毎三時一包

八四四 ベンツォナフトール

撒里矢爾酸蒼鉛 各〇、五

護謨散* 〇、〇三

右分五包一日三回毎回一包

八四五 レゾルチン 二、〇

右分二包臨臥十分間分服

八四六 實麥答利斯葉 一、〇

白糖 五、〇

右分十包毎三時一包

八四七 莨菪越幾斯 〇、〇三

白糖 〇、〇五

右爲一包臨臥頓服

八四八 安息香酸 〇、〇五

右分五包一時至二時一包

八四九 樟腦 〇、一〇、三

白糖 〇、〇三

右爲一包頓服

八五〇 樟腦 〇、五、一、〇

白糖 五、〇

右分十包毎一時至二時一包

八五二 麝香 〇、〇五

白糖 二、〇

右分五包毎三時一包

八五三 麝香 〇、〇五

樟腦 〇、〇三

白糖 三、〇

右分六包毎二時一包

八五三 阿片丁幾 五、〇

●水劑

右一日二回毎回五滴至八滴

八五四 阿片丁幾 一、〇

生姜丁幾 一、〇、〇

沙列布漿 一三〇、〇

桂皮舍利別 二〇、〇

右毎時一食匙

八五五 沙列布煎 (八、〇) 一五〇、〇

阿片越幾斯 〇、一

器粟舍利別* 二〇、〇

右毎二時一食匙

八五六 亞拉昆亞護謨漿 二〇〇、〇

阿片越幾斯 〇、一〇、二

右毎二時一食匙

八五七 明礬 四、〇

水 一八〇、〇

阿片丁幾 一、五

右毎二時一食匙

八五六 硝酸銀 〇、一

備里設林 二〇、〇

水 一〇〇、〇

右毎二時一食匙

八五八 鞣酸 一、五

水 一八〇、〇

阿片丁幾 一、五

單舍利別 一五、〇

右毎二時一食匙

八五九 安知必林 〇、二五、一〇、五

橙皮舍利別 二〇、〇

右毎回一茶匙、小兒

八六〇 安知必林 二、五

水 一五〇、〇

八四三 右每時二食匙
安知必林 三、〇
橙皮含利別 二〇、〇
留水 三〇、〇

八四三 右一日六回每回一茶匙
安知必林 五、〇
橙皮含利別 二五、〇
留水 五〇、〇

八四三 右每夕二食匙
安知歌貌林 〇、一〇、三
酒精 五、〇
單含利別 二五、〇

八四三 右每午後一茶匙
稀鹽酸 一、〇
留水 一〇〇、〇
單含利別 一〇、〇

八四三 右每二時一小兒匙、小兒
稀鹽酸 二、〇
沙列布煎* 一八〇、〇
單含利別 三〇、〇

八四三 右每二時一食匙
亞兒答煎 二〇〇、〇
鹽酸或燐酸 二、五

八四六 覆盆子含利別 三〇、〇
右每二時一食匙
枸橼酸 二、〇
留里設林 三〇、〇
水 三〇〇、〇

八四六 右每二時一食匙
鹽酸規尼涅 一、五、一、二、〇
覆盆子含利別 三〇、〇
水 三〇、〇

八四六 右每十分時一食匙
硫酸規尼涅 〇、五、一、〇
稀硫酸 二滴
單含利別 五〇、〇

八四二 右每回一茶匙、小兒
單寧酸規尼涅加麥芽越幾斯 五〇、〇

八四三 右一日三回每回一茶匙
過格魯兒化鐵丁幾 一、〇
桂皮水 一五〇、〇
單含利別 二〇、〇

八四三 右每時一食匙
過格魯兒鐵液、水 各五、〇
右一日三回每回二滴

八四四 過格魯兒鐵液 二、〇
默粟薩水** 一五〇、〇
橙皮含利別 二〇、〇

八四四 右每二時一食匙
樟腦依的兒 (一、〇、〇) 二〇、〇
右每二時二十滴

八四四 樟腦 〇、一、〇、五
阿列布油 一〇、〇
亞拉昆亞護謨末 五、〇
水 一五〇、〇

八四四 右為乳劑每二時一食匙
白糖 一〇、〇

八四七 樟腦 〇、五、一、〇
亞拉昆亞護謨 五、〇
留水 一五〇、〇

八四八 右為乳劑每二時一食匙
白糖 一〇、〇
樟腦 一、〇、二

八四八 亞拉昆亞護謨 一〇、〇
亞爾尼亞加花浸 (二四、〇) 二〇〇、〇

八四九 右為乳劑每二時一食匙
卵黃 二個

武蘭揮酒 五〇、〇

桂皮水 二〇〇、〇

單舍利別 三〇〇、〇

右一日三回分服

八四五〇 プランデー酒 一〇〇〇、〇

右每二時一茶匙

八四五二 麝香 一〇〇、〇

亞拉昆亞護謨 一〇〇、〇

薄荷水 一五〇〇、〇

白糖 五〇〇、〇

八四五三 右為乳劑每一二時一食匙

麝香、樟腦 各一〇、〇

亞拉昆亞護謨 一〇〇、〇

薄荷水 一五〇〇、〇

白糖 一〇〇、〇

右為乳劑每一時至二時一食匙

八四五三 抱水格魯刺爾 一、五

亞拉昆亞護謨漿 各一五、〇

單舍利別 各一五、〇

右頓服

八四五四 抱水格魯刺爾 四〇、〇

鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

亞爾答根煎 一五〇、〇

甘草越幾斯 一〇〇、〇

右每二時一食匙

八四五五 抱水格魯刺爾 〇、五

麝香丁幾 二十滴

チクネ水 * 八〇〇、〇

橙花舍利別 * 二〇〇、〇

右每二時一小兒匙、小兒

八四五五 麥角越幾斯 二、〇

覆盆子舍利別 一五〇〇、〇

水 三〇〇、〇

八四五七 麥角越幾斯 一、〇

右每一時至二時一食匙

餾水 八〇〇、〇

桂皮舍利別 二〇〇、〇

八四五七 麥角越幾斯 二、〇

右每二時一食匙

桂皮水 一八〇、〇

八四五九 撒里矢爾酸麻僱涅叟謨 一〇〇、〇

水 二〇〇、〇

右一日四回每回一食匙

八四六〇 ストロファンツス丁幾 五、〇

右一日數回每回五滴乃至十

五滴

八四六一 實麥答利斯浸(二、〇) 八〇、〇

單舍利別 二〇〇、〇

右每二時一食匙

八四六二 吐根浸 (〇、六) 二〇〇、〇

鹽酸 二、〇

亞拉比亞護謨漿 三〇〇、〇

右每二時一食匙

八四六二 攝涅瓦浸 (一、〇) 二〇〇、〇

安質母尼酒 一〇〇、〇

樟腦、亞拉比亞護謨 各〇、四

右每時一食匙

八四六四 攝涅瓦浸 (八、〇) 一八〇、〇

安母尼亞茴香精 四、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙

八四六五 的列並油、甘扁桃 各五、〇

護謨末、單舍利別 各二〇、〇

餾水 二〇〇、〇

右為乳劑每二時一食匙

八四六六 古加菓 八、〇

重碳酸那篤留謨 一、〇

水浸出 一八〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

右每二時一食匙

八四七 醋酸安母尼紐護謨 一〇、〇

依的兒精 二、〇

縮水、單舍利別 各七五、〇

八四六 安母尼亞尚香精 三、〇

默栗藤水 一五〇、〇

加密列花舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

八四九 酒精、單舍利別 各二五、〇

苦味丁幾、芳香丁幾 各二、〇

水 一五〇、〇

右每二時一食匙

八四七 沃度 〇、五

沃度加留謨 一、〇

水 五、〇

右每二時五滴

八四七 沃度加留謨 三、〇

水 二〇〇、〇

右每二時一食匙

八四七 格魯兒水 * 三〇、〇

水 一二〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右入黑瓶每二時一食匙

八四七 撒里矢爾酸 六、〇

水 四〇、〇

甘草煮 五、〇

八四四 撒里矢爾酸 五、〇

燐酸那篤留謨 一三、〇

安母尼亞水 二、〇

偏里設林、水 各一〇、〇

八四五 撒里矢爾酸 三、〇

甘扁桃油 一五、〇

亞拉比亞護謨 一二〇、〇

蒸餾水 三、〇

薄荷舍利別 三、〇

右為乳劑每二時一食匙

八四七 石炭酸 二、〇

水 六〇〇、〇

右每二時至三時二食匙

八四七 結列阿曹篤 〇、四

醋酸 〇、四

忽弗滿液、單舍利別各一五、〇

蒸餾水 二〇〇、〇

右每二三時二食匙

八四七 機那煎 (一〇、〇) 一七〇、〇

稀鹽酸 一、〇

生麥舍利別 三〇、〇

右一日三回每回一食匙

八四七 機那煎 (一五、〇) 一八〇、〇

稀硫酸 二、〇

依的兒精 四、〇

八四八 複方機那丁幾 三、〇

酒精 四〇、〇

水 一五〇、〇

右每二時一食匙

八四八 複方機那丁幾 一〇、〇

設利酒 一四〇、〇

右一日三回每回一食匙

八四八 機那越幾斯 五、〇

赤葡萄酒 一五〇、〇

桂皮丁幾 一〇、〇

橙皮舍利別 三〇、〇

八四八三 右每二時一食匙
枸橼酸安母紐誤燐酸鐵 一〇、〇

機那越幾斯 五、〇

白葡萄酒 一〇〇〇、〇
右濾過、一日三回每回一食匙

八四八四 燐酸那篤留誤 二、〇
薄荷舍利別 三〇、〇

水 一二〇、〇
右每二時一食匙

八四八五 ベトール 一、〇
一、〇
二、〇
二、〇
三、〇、〇

護謨漿 三〇、〇
橙花舍利別 三〇、〇

八四八六 オイフチリン 五、〇
酒精 四〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇
水 一〇〇、〇

右一日三回至五回每回半食匙

●丸劑

八四八七 阿片越幾斯 〇、五

右甘草羔甘草末各適宜爲十九一日一粒至二粒

八四八八 麥角越幾斯、鞣酸 各一、二
阿片越幾斯 〇、三

右甘草羔適宜爲二十九丸每二時至三時一粒

八四八九 酒石酸タルリン 二、〇
一六、〇
白糖 〇、五

亞拉比亞護謨 一、五
右爲三十九丸每時一粒至二粒

八四九〇 勿刺篤里涅 〇、〇
五
右甘草末甘草羔各適宜爲十九丸每一時一粒

八四九一 鹽酸規尼涅 五、〇
鹽酸 一滴

右爲二十九丸每一時六粒至八粒

八四九二 硫酸規尼涅 三、〇
還元鐵 一〇、〇

右以龍膽末及越幾斯爲百二十九一日三回每回四粒

八四九三 硫酸規尼涅 〇、三
ワレツチー氏炭酸鐵丸劑

右以龍膽末爲三十九一日三回每回四粒 四、〇

八四九四 鐵粉 一五、〇
古倫僕根末 五、〇

大黃根末、桂皮末 各二、五
右以括矢亞越幾斯爲百二十九一日三回每回三四粒

八四九五 安知歇貌林 二、〇
白糖、亞拉比亞護謨 各一、〇

右爲二十九丸每二時一粒

●浣腸劑
八四九六 安知必林 三、〇
一六、〇

水 五〇、〇
右浣腸

八四九七 トロピリン 三、〇
右分二回灌腸

八四九八 撒里矢爾酸那篤留誤 四、〇
一八、〇

水 一五〇、〇
右每夕灌腸

八四九九 樟腦、麝香 各〇、五
一、〇
卵黃 一個

亞拉昆亞護膜藥

二〇〇〇

樟腦

二、〇〇

八五五

石鹼軟膏

五〇〇

溫水

一五〇〇〇

阿列布油

一〇〇〇

八五五

沃度仿謨

五〇〇

阿片越幾斯

〇〇〇二

右注射皮下

一〇〇〇

八五〇

右塗布

二〇〇

右分二回灌腸

〇〇〇二

樟腦

一〇〇〇

八五〇

硼酸軟膏

二〇〇

●注射劑

〇〇〇二

依的兒

二〇〇〇

八五〇

或複方安傑利加精

二〇〇

鹽酸莫爾比涅

〇〇〇二

阿列布油

八〇〇〇

八五〇

右塗布

一〇〇

石炭酸水(三%)

二〇〇〇

右注射皮下

一〇〇〇

八五〇

格魯兒亞鉛

一〇〇

●注射劑

二〇〇〇

安息香酸

一〇〇〇

八五〇

右塗布表皮剝離部

一〇〇

右每回半筒注射皮下

二〇〇〇

樟腦

一〇〇〇

八五〇

格魯兒亞鉛

五〇〇

濾膜製麥角越幾斯

二〇〇〇

右注射皮下

一〇〇〇

八五〇

水

四〇〇

右一筒注射皮下

八〇〇〇

●磨瘡塗布劑

一〇〇〇

八五〇

右器法

四〇〇

發疹窄扶斯(參考腸室扶斯)

Erythra exanthematica 一作戰時窄扶斯、又作飢饉窄扶斯、又作飢饉熱、瘟疫論謂之瘟疫、凡中醫之所謂熱毒發疹、勞役感冒、內傷外感、陰證傷寒、陰虛、時疫、疔癩、伏熱病傷寒、皆瘟疫也、

反歸熱(無特效藥)

Febris recurrens *Erythra recurrens*

再歸熱、回歸熱、再歸窄扶斯、反復熱、即古醫書所謂差後勞復之類、

處置 遮斷厲行、安睡遊息、病室換氣、滋養攝養、微溫浴、解熱劑等、

八五〇元 鹽酸規尼涅

〇、六一一、八

安知必林

〇、六一一、八

八五二 甘末

〇、六

白糖

一、八

白糖

一、二

八五三

右分四包每三時一包

右分六包一日三回每回一包

右分六包一日三回每回一包

八五三 撒里失爾酸那篤儷謨

阿片丁幾 一〇一四〇
 蒸餾水 三滴
 六〇〇
 八五三 嚼囉仿謨 一〇〇〇
 橙皮舍利別 二〇〇〇
 右每二時一茶匙
 阿列布油 五〇〇
 右塗布、筋痛

黃熱 Febris flava.

處置 舊作黃熱症、又名黃瘟疫、又名黃汗時症、又名瘦癩發黃、雙黃熱、嘔血熱、吐黑病、黃痘風、瘟黃、
 下劑、解熱劑、衝動劑等、即亞麻子油、旂那、大黃、甘汞、規尼涅、揚曹、安知欵貌林、カイリン、樟腦、
 ブランデー酒、赤酒等、

枯草熱 Heufieber.

八五四 鹽酸規尼涅 一〇〇
 水 七〇〇〇
 八五五 格魯兒酸加留謨 一〇〇
 硫酸莫爾比涅 〇〇二
 水 三〇〇〇
 右吸入

電僂 Dengue Fieber

八五二 接骨木花浸 一〇〇〇
 民埤列里精 (一五〇) 一八〇〇
 三〇〇
 八五七 阿魏 二〇〇
 安質母尼酒 一〇〇〇
 右每二時一食匙
 卵黃 一個
 亞兒答煎 二二〇〇
 右浣腸、小兒瘰癧

發汗熱 Schweissfriesel.

八五八 亞爾答煎 二〇〇〇
 稀鹽酸 〇〇五
 覆盆子舍利別 三〇〇
 右每二時一食匙
 八五九 龍腦 二〇〇
 亞拉比亞護謨 五〇
 蒸餾水 適宜
 右爲乳劑 二〇〇〇
 橙花舍利別 二〇〇〇
 右每二時一食匙

恐水病、狂犬毒

Lyssa.

又名狂水病、舊作狂犬瘋、又名瘋狗噬毒、西名怕水瘋、又名癩犬毒

病、又名畏水病、

八五〇 苛性加留謨

水

二、〇〇

水

一〇、〇〇

各四、〇〇

八五二 石炭酸

酒精

五、〇〇

八五四 クラーレ

〇、〇一

八五七 抱水格魯刺兒

二、〇〇

右洗滌咬傷面

適宜

水

一〇、〇〇

單舍

一五、〇〇

右洗滌

一〇〇、〇〇

稀鹽酸

一滴

右二回分服

五、〇〇

八五三 微溫水

三〇〇、〇〇

八五五 嚼囉仿謨

一〇、〇〇

八五元 酸化亞鉛、澱粉

各二五、〇〇

右注入靜脈內

右吸入

八五三 硫酸亞篤羅必涅

〇、〇一

八五三 亞砒酸加留謨液、薄荷水

馬疫、馬鼻疽

Malignus, Malleus humidus.

M. farciniosus. 一名馬病、古名內勞、

炭疽熱癰、脾脫疽

pustula maligna. 惡性膿瘻、一名脾壞疽、

八五元 石炭酸水(二%)

一〇、〇〇

右每二時一食匙

八五三 沃度丁畿

一、〇〇

右一筒注射皮下

右卷法

八五〇 硫酸規尼涅

二、〇〇

八五三 石炭酸水(二、五%)

右每回十滴注射皮下

五〇、〇〇

稀硫酸

十滴

八五三 撒里矢爾酸

一、〇〇

單舍利別

二〇〇、〇〇

水

五〇、〇〇

八五三 撒里矢爾酸

一〇〇、〇〇

梅毒(參考生殖器病篇) Syphilis acquisita 後天梅毒

●水劑

八五五 昇水 〇、〇一—〇、〇二

格魯兒那篤留謨二、〇一四、〇

水 一五〇、〇

右每三時一食匙

八五五 沃度加留謨 三、〇一八、〇

水 二〇〇、〇

右一日三回每回一食匙

八五五 沃度加留謨 四、〇

水 二〇〇、〇

苦味了幾 四、〇

右一日三回二日分服

八五五 沃度 〇、一二

沃度加留謨 四、〇

水 二〇〇、〇

右一日三回每回一食匙

八五五 沃度 〇、〇六

肝油 三〇、〇

右朝夕一二茶匙

八五五 沃度丁幾 二〇、〇

右朝夕一食匙

八五四 沃度仿謨 一、〇

肝油 四〇〇、〇

荷香油 二、〇

右一日三回至六回每回一食匙

八五四 沃度那篤留謨 五、〇

水 一五〇、〇

榨皮舍利別 三〇、〇

右一日三回每回一食匙

八五四 沃度安母紐謨 三、〇

水 一〇〇、〇

礮砂加荷香精 二、五

單舍利別 五〇、〇

右每三時一食匙

八五五 沃度鐵舍利別 五、〇

單舍利別 一〇〇、〇

右朝夕一茶匙

八五五 弱寧萬滿煎 五〇〇、〇

右每夕冷服

八五五 強寧萬滿煎 五〇〇、〇

右早朝服用

●丸劑 〇、〇六

八五五 昇汞 六、〇

亞爾答根末 六、〇

白糖 六、〇

右為百丸每日二回每回一粒

八五五 昇汞 〇、〇六

依的兒 適宜

右甘草羔及甘草末適宜為十

六丸朝夕一粒

八五五 撒里矢酸水銀 〇、五

右為二十九粒夕一粒

八五五 單寧酸水銀 三、〇

右為六十丸一日三回每回一

粒至二粒

八五五 單寧酸水銀 四、〇

甘草羔、甘草末 各三、〇

右為六十丸一日三粒至五粒

八五五 甘汞 一、〇

失鳩答葉末 二、〇
藥用石鹼 二、〇

右爲二十九粒 每日一粒 五日後
逐日增加一粒

八五三 沃度加留謨 四、〇

右龍膽越幾斯、龍膽末各適
宜爲六十九一日三回每回五

八五三 沃度加留謨 五、〇

右甘草末、甘草蒸各適宜爲
五十九一日三回每回三粒至

八五四 沃度仿謨 一、五

括矢亞越幾斯 適宜

八五五 沃度仿謨 一、〇

右爲二十九一日二回至三回
每回一粒

八五五 黃色沃度末 一、〇

右甘草蒸甘草末適宜爲二十
五丸朝夕一粒

八五五 黃色沃度末 〇、二五

阿片 〇、二五

右蒲公英越幾斯甘草末各適
宜爲十六丸初每日二粒後四

八五七 黃色沃度末 〇、六

八五三 單寧酸水銀 〇、一

八五二 單寧酸水銀 〇、一

八五二 單寧酸水銀 〇、四

八五二 單寧酸水銀 〇、一

八五二 單寧酸水銀 〇、五

八五二 單寧酸水銀 〇、一

八五二 單寧酸水銀 〇、一

阿片 〇、二

右甘草蒸、甘草末各適宜爲
三十九一日三回每回一粒

八五五 散劑 〇、二

八五五 澱粉 二、〇

八五五 白糖 六、〇

右分十二包一日三回每回一

八五五 甘末 〇、二

八五五 加糖炭酸鐵 〇、五

八五五 白糖 一、〇

右分十包朝夕一包

八五〇 甘末 〇、二四

八五〇 阿片 〇、〇六

八五〇 白糖 一、五

右分十包一日三回每回一包

八五二 單寧酸水銀 〇、一

八五二 單寧酸水銀 〇、一

八五二 單寧酸水銀 〇、四

八五二 單寧酸水銀 〇、一

八五二 單寧酸水銀 〇、一

八五二 單寧酸水銀 〇、一

八五二 單寧酸水銀 〇、一

八五二 單寧酸水銀 〇、一

八五二 單寧酸水銀 〇、一

阿片 〇、五

右分十二包一日三回每回一

八五三 赤降末 〇、一〇、一五

八五三 阿片 〇、〇一、〇三

八五三 白糖 一、〇、〇

右分十包一日三回每回一包

八五四 赤降末 〇、一〇、一二

八五四 金硫黃 一、〇

八五四 白糖 二、五

右分十六包朝夕一包漸次增

量

●注射劑

八五五 昇末水 〇、〇二、〇〇、〇

右每日一筒注射背部

八五五 昇末水 〇、〇五

右一日一回半筒注射二局處

八五五 昇末水 一、〇

八五五 昇末水 六、〇、〇

八五五 昇末水 一、五、〇

八五五 昇末水 一、五、〇

八五五 昇末水 一、五、〇

八五五 昇末水 一、五、〇

八五八 昇汞

〇、二

格魯兒那篤留謨

二、〇

水

五〇、〇

八五九 昇汞

右每日二回至四回注射皮下

肉バブトン

一、〇

格魯兒那篤留謨

三、〇

水

一〇〇、〇

右每日一筒注射皮下

八五〇 昇汞尿素液

一〇、〇

此一立方仙迷中昇汞之含量

〇、〇一

右一日一筒注射皮下

八五一 靑酸水銀

〇、一

水

一五、〇

右注射皮下

八五二 蟻酸水銀

〇、一

水

一〇、〇

右每日半筒至二筒注射皮下

八五三 ソゾヨードル水銀

〇、八

沃度加留謨

一、六

水

一〇、〇

右每周一回一筒注射皮下

八五四 甘汞

〇、五

備里設林

一〇、〇

右隔五六日間一回注射皮下

八五五 赤色沃度末

一、〇

沃度加留謨

一、〇

水

二、〇

右注射皮下

八五六 格魯兒那篤留謨水

●含嗽料

五〇、〇

●含嗽料

(四、〇)二〇〇、〇

右含嗽

八五七 刺答尼亞丁幾、沒食子丁幾

水

各五、〇

右含嗽

八五八 水

●塗布劑

二〇〇、〇

石炭酸

八五九 阿列布油

●塗布劑

沈澱炭酸石灰

右塗布

八五九 昇汞

稀亞爾個保兒

二〇、〇

八六〇 右塗布

二、〇

水銀軟膏

右塗布

八六一 水銀軟膏

二、〇

單軟膏

右一日二回每回以十分之一

塗布

八六二 白降汞

〇、〇三一〇、一

華設林、刺乃林

各一〇、〇

右塗布

八六三 硝酸銀

〇、六一一、二

亞鉛華軟膏

一五、〇

百露拔爾撒謨

四、〇

右塗布

八六四 沃度仿謨

三、〇

酒精

備里設林

一〇、〇

右塗布

八六五 結列阿曹篤

一、〇

備里設林

二〇、〇

右塗布

八六六 ●撒布劑

沃度仿謨末

五、〇

| | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|-----|-----|-------|-----|---------|------|
| 八五七 | 右撒布瘡面 | 五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 四〇、〇 | 八六〇 | 右焦灼用 | 五〇、〇 |
| 八五八 | 右撒布 | 五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 一〇〇、〇 | 八六一 | 右焦灼用 | 二〇、〇 |
| 八五九 | ●外用劑 | 五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八六二 | 苛性加里 | 四〇、〇 |
| 八六〇 | 格魯兒水 | 五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 一〇、〇 | 八六三 | 燬製加爾叟謨 | 二〇、〇 |
| 八六一 | 石炭酸 | 一〇〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八六四 | 右作挺子焦灼用 | 一〇、〇 |
| 八六二 | 過滿俺酸加里水 | 一〇〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八六五 | レゾルチン | 二〇、〇 |
| 八六三 | 右外用 | 一〇〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八六六 | レゾルチン | 五〇、〇 |
| 八六四 | 右外用 | 一〇〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八六七 | バラピン軟膏 | 一〇、〇 |
| 八六五 | 右外用 | 一〇〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八六八 | 昇汞 | 二〇、〇 |
| 八六六 | 鉛糖 | 一〇〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八六九 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八六七 | 阿片丁幾 | 四〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八七〇 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八六八 | 水 | 一〇〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八七一 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八六九 | 樟腦 | 八〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八七二 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八七〇 | 亞爾個保兒 | 八〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八七三 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八七一 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八七四 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八七二 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八七五 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八七三 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八七六 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八七四 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八七七 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八七五 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八七八 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八七六 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八七九 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八七七 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八八〇 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八七八 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八八一 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八七九 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八八二 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八八三 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八八四 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八八五 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八八六 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八八七 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八八八 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八八九 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八九〇 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八九一 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八九二 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八九三 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八九四 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八九五 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八九六 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八九七 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八九八 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 八九九 | 昇汞 | 一〇、〇 |
| 八八〇 | 亞拉比亞護謨 | 一五〇、〇 | 八五九 | 右外用 | 二〇、〇 | 九〇〇 | 昇汞 | 一〇、〇 |

先天梅毒

Syphilis congenita.

●散劑
八六〇 銀灰散 * 〇、〇六一〇、一

乳糖 二、〇

右分六包一日三回每回一包

小兒

八六七 炭酸鐵 〇、四

甘朮 〇、二

白糖 二、〇

右分十包一日二回每回一包

八六八 加糖沃度鐵 〇、三

第九編 皮膚諸病

皮脂漏 Seborrhoea.

八六五 亞鉛華軟膏 一〇、〇

右塗布

八六六 酸化亞鉛 一〇、〇

華攝林 五〇、〇

右塗布

八六七 硼酸軟膏 一〇、〇

右塗布

八六八 硼酸 三、〇

備里設林 一、五

武蘭坪酒 一〇、〇

白糖 三、〇

右分十包一日三回每回二包

八六九 單寧酸水銀 〇、〇六

白糖 二、〇

右分六包一日三回每回一包

八七〇 甘朮、挖湧兒氏散 各〇、二

白糖 三、〇

右分十包朝夕一包

八七一 沃度加留謨 〇、五

●水劑

水 一〇〇、〇

右一日六回二日分服、小兒

八七二 水銀軟膏 一〇、〇

右塗布

八七三 甘朮 一〇、〇

右撒布

八七四 昇朮 三、〇

水 一〇〇、〇

右二分浴用

安息香丁幾 二、〇

右塗布

八七九 單寧酸 二、〇

單軟膏 二〇、〇

右塗布

八八〇 單軟膏 二五、〇

酸化亞鉛 〇、五

ラッル油 五滴

右塗布

八八二 酸化亞鉛 五、〇

炭酸鉛 五、〇

鯨蠟 五〇、〇

阿列布油 適宜

右塗布

八八三 鯨蠟 一〇〇、〇

阿列布油 一〇〇、〇

右塗布

八八三 刺納林 二〇、〇

華攝林 三〇、〇

右塗布

| | | |
|-----|----------------|-----------|
| 八六四 | 脩里設林、甘扁桃油各一〇、〇 | 五、〇 |
| | 酸化亞鉛 | 五、〇 |
| | 右塗布 | |
| 八六五 | 重炭酸那篤留謨 | 三、〇 |
| | 脩里設林、刺賢埤爾精 | 各一五、〇 |
| | 右塗布 | |
| 八六六 | 百露拔爾撒謨 | 一、〇 |
| | 阿列布油 | 五、〇 |
| | 右塗布 | |
| 八六七 | 安息香丁幾 | 五、〇 |
| | 依的兒精 | 五、〇 |
| | 右塗布 | |
| 八六八 | 石炭酸、百露拔兒撒謨各五、〇 | 二〇〇、〇 |
| | 酒精 | 二〇〇、〇 |
| | 右塗布 | |
| 八六九 | 石炭酸、脩里設林 | (五、〇)二〇、〇 |
| | 亞兒個保兒 | 二〇〇、〇 |
| | 右塗布 | |

●洗滌劑
面皰 Comedones.

| | | |
|-----|---------|-----------|
| 八七〇 | レゾルチン | 二、〇一五、〇 |
| | 脩里設林 | 一、〇 |
| | 橙皮水 | 二〇、〇 |
| | 酒精 | 八〇、〇 |
| | 右塗布 | |
| 八七一 | レゾルチン | 五、〇一〇、〇 |
| | 蓖麻子油 | 五、〇一四五、〇 |
| | 酒精 | 一五、〇 |
| | 百露拔兒撒謨 | 〇、五 |
| | 右塗布 | |
| 八七二 | 加里石鹼 | 八〇、〇 |
| | 酒精 | 四〇、〇 |
| | 刺賢埤爾精 | 一〇、〇 |
| | 右一日塗布二回 | |
| 八七三 | 加里石鹼 | 一〇〇、〇 |
| | 酒精 | 五〇、〇一〇〇、〇 |
| | 刺賢埤兒油 | 三、〇 |
| | ベルカモツト油 | 三、〇 |
| | 右塗布 | |
| 八七四 | 醋酸鉛 | 〇、五 |

| | | |
|-----|--------|------------|
| | 水 | 三〇、〇 |
| | 右洗滌 | |
| 八七五 | 撒里矢爾酸水 | (五、〇)二〇〇、〇 |
| | 右洗滌 | |
| 八七六 | 撒里矢兒酸 | 五、〇 |
| | 酒精 | 五〇、〇 |
| | 水 | 一五〇、〇 |
| | 右洗滌 | |
| 八七七 | 安息香丁幾 | 五、〇 |
| | 依的兒 | 二五、〇 |
| | 酒精 | 五〇、〇 |
| | 右洗滌 | |
| 八七八 | 安息香丁幾 | 五、〇 |
| | ブランデー酒 | 一〇〇、〇 |
| | 右洗滌 | |
| 八七九 | 石炭酸 | 三、〇 |
| | ブランデー酒 | 一〇〇、〇 |
| | 右洗滌 | |

八六〇 炭酸加留謨水(一%)

蝕蟲、穀嘴瘡、面粉刺、

五〇〇、〇

右洗滌

八六四 硼酸那篤留謨

五、〇

僱里設林、酒精

各一〇、〇

薔薇水

三五、〇

右洗滌

八六四 乳硫黃

一二、〇

樟腦

一、〇

亞拉尼亞護謨

二、〇

石灰水

一五〇、〇

薔薇水

一五〇、〇

右洗滌

● 塗布劑

八六四 乳硫黃、僱里設林、酒精

各二〇、〇

依的兒

各二〇、〇

右塗布

八六四 乳硫黃、酒精、僱里設林

各五、〇

炭酸加留謨

一、〇

右塗布

八六五 乳硫黃、僱里設林、稀酒精

炭酸加留謨、苦扁桃水、

各一〇、〇

右臨臥塗布翌朝洗去

八六五 加里石鹼

刺賢坪兒精

四〇、〇

酒精

一〇、〇

右塗布

八六五 醋

八〇、〇

僱里設林

白陶土

一〇、〇

右塗布

八六四 安母尼亞水

一五、〇

安息香丁幾

薔薇水

二、〇

右塗布

八六四 炭酸加留謨水(三%)

一〇、〇

右塗布

八六五 炭酸加留謨

硫黃華

五、〇

僱里設林

一〇、〇

安息香脂

三、〇

右一週塗布二三回

八六五 ナフトール

三〇、〇

乳硫黃

一〇、〇

刺納林

五〇、〇

加里石鹼

二五、〇

右塗布

八六五 ナフトール

二五、〇

乳硫黃

五、〇

華撒林

二五、〇

加里石鹼

一五、〇

右塗布

多汗症 Hyperhidrosis.

自汗、

手汗 Handschweiss. 手心汗、臍手、

足汗 Fusschweiss. 足心汗、臍足、

腋臭 Foeior axillae 胡氣

●内服劑
八六三 アガリチン 〇、〇二

白糖 二、〇
右分十包每三時一包

八六四 硫酸亞篤羅必涅 〇、〇一
各適宜

備里設林、水

右甘草末及甘草蒸適宜爲二
十九一日一粒至二粒

八六五 硫酸亞篤羅必涅 〇、〇一
篤拉侃篤護謨 一、五

右備里設林及甘草末適宜爲

二十九一日二粒

●塗布劑

八六六 格魯謨酸水(一%—五%) 一〇〇、〇

右塗布

八六七 重格魯謨酸加價謨水(五%) 一〇〇、〇

右塗布

八六八 單寧酸 五、〇

酒精 二〇〇、〇

右塗布、腋臭

八六九 ナフトール 五、〇
酒精 一〇〇、〇
備里設林 一〇、〇

右塗布

八七〇 酸化亞鉛 二五、〇
阿列布油 一〇〇、〇

刺賢埤耐油 一五、〇

右塗布

八七一 依比知阿兒的列並油 各五、〇

亞鉛華軟膏 一〇、〇
右塗布

●撒布劑

八七二 撒里矢爾酸 〇、五

山慈姑粉 一〇、〇
右撒布、腋臭

八七三 撒里矢爾酸 一、五

小麥粉 五、〇
滑石末 五〇、〇

右撒布

八七四 撒里矢爾酸 三、〇
澱粉、滑石末 各五、〇
右撒布

八七五 明礬末 二、〇
山慈姑粉 一〇、〇

右撒布、腋臭

八七六 撒里矢爾酸 二、〇

明礬 五、〇
澱粉 二〇、〇

ベルカモツト油 十滴

酒精 五、〇

滑石末 七、〇
右撒布

八七七 重碳酸那篤價謨 一〇、〇

右撒布、腋臭

八七八 重碳酸那篤價謨 一〇、〇

硼酸末 三、〇
右撒布、腋臭

八七九 鹽化亞鉛澱粉(二〇%) 五、〇

右撒布

八七〇 デルマトール 二〇、〇

滑石末 七〇、〇

澱粉 一〇、〇

右撒布

八七一 次硝酸蒼鉛 一五、〇

滑石末 一二、〇

過滿俺酸加儂謨 四、〇

撒里矢爾酸 一、〇

右撒布

八七三 ナフトール澱粉(一%)

五〇、〇

右撒粉

●洗滌劑

八七三 單寧酸酒精(〇、四%)

二五〇、〇

右洗滌

八七四 昇汞 〇、二五—〇、五

水 一〇〇、〇—二〇〇、〇

右洗浴用

八七五 單寧酸、亞鉛

藥用石鹼

右洗滌

八七六 烏頭越幾斯

武蘭坪酒

右洗滌

八七七 醋酸礬土水(一%)

右洗滌

一、五

五〇、〇

一、〇

二〇〇、〇

二〇〇、〇

第一節 皮膚諸炎

丹毒

Erysipelas

羅斯、舊譯作血蛇結症、又名大頭瘟、又名紫癩毒、又名火焰癩毒、古名亦作丹

毒、又有火丹赤丹等名、

遊走羅斯

E. migrans

遊走丹毒、赤遊風、赤遊丹

水泡羅斯

E. vesiculosum.

水泡性丹毒、火丹泡、水丹、風丹、

頭部羅斯

E. capitis

頭部丹毒、頭瘟、

顏面羅斯

E. faciei.

面部丹毒、蝦蟇瘟、

小兒羅斯

E. infantilis.

小兒丹毒、小兒赤遊丹、

●散劑

八七九 樟腦

白糖

〇、二

右分五包每三時一包

二、〇

八七九 硫酸規尼迥

白糖

二、〇

右分五包一日三回每回一包

●水劑

八六〇 稀鹽酸 五、〇

苦味丁幾 二、〇、〇

八六一 鹽酸規尼涅 一、〇

水、覆盆子舍利別 各一〇、〇

右頓服

八六二 鹽酸規尼涅 二、〇

水 五〇、〇

櫻實舍利別 三〇、〇

八六三 過格魯兒鐵液 二〇、〇

右每二時一食匙

八六四 依的兒性格魯兒鐵丁幾 五、〇一〇、〇

右每二三時十滴至十五滴

民埤列利精 一〇〇、〇

八六五 格魯兒安母紐謨 四、〇

右每二三時一茶匙

硝酸那篤留謨 四、〇

水 二〇〇、〇

八六六 キシロール 三〇、〇

右每一二時一食匙

右每二時二十滴點和葡萄酒服用

八六七 吐根浸 (五、〇)六〇、〇

右每十五分時一食匙得吐休

藥

●注射劑

八六八 石炭酸 〇、二

水 一〇、〇

右注射皮下

八六九 石炭酸 一、〇

水 三〇、〇

亞爾個保爾 一、〇

右一日數回每回一筒注射皮下

八七〇 可溶性麥角越幾斯 二、〇

偏里設林 八、〇

右每回一筒至三筒注射皮下

八七一 麥角越幾斯 二、〇

偏里設林 八、〇

右注射皮下

●塗布劑

八七二 硝酸銀水 (五、〇)五〇、〇

右塗布

八七三 白降汞 〇、一

明礬末 三、〇

偏里設林 一〇、〇

右塗布

八七四 石炭酸 一、〇

的列並油 一〇、〇

右含海綿每時塗布

八七五 石炭酸、酒精 各一、〇

的列並油 二、〇

偏里設林 五、〇

右塗布

八七六 依比知阿兒、華攝林 各一〇、〇

右一日二回至四回塗布

八七七 依比知阿兒、依的兒 各五、〇

古魯胃謨 一〇、〇

右塗布

八七八 依比知阿兒、澱粉 各八〇、〇

蛋白 二、〇

水 四〇、〇

八七九 レゾルチン 一〇、〇

右塗布

豚脂 三〇、〇

八七〇 右塗布
レゾルチン

水 五、〇
右塗布 三〇、〇

八七一 レゾルチン

酒精 五、〇
水、偲里設林 各二五、〇

八七二 依の兒

樟腦 六〇、〇
右塗布 三〇、〇

紅斑 Erythema.

溺尿の麻(エレテマ)、潮紅斑、血風瘡、其間有創傷性紅斑、日熱紅斑、溫熱紅斑、刺戟紅斑等區別、
滲出性潮紅斑 Erythema exudativum.

右每五六時塗布

八七三 格魯甘謨 三〇、〇

的列並油 一、五

蓖麻子油 〇、五

八七四 安息香 一〇、〇

百露拔爾撒謨 一〇、〇

甘扁桃油 一〇、〇

右溶解濾過 〇、一

枸橼油 〇、一

加耶布的油 〇、一

右塗布 一、五

八七五 知母兒 一〇、〇

阿列布油 一〇、〇

右綳帶用 一〇、〇

八七六 次醋酸鉛液 二〇、〇

水 二〇、〇

右器法 二〇、〇

●塗布劑

八七七 石炭酸 〇、五

酒精 一〇、〇

右塗布

八七八 石炭酸 一、〇一、二、〇

酒精 一〇〇、〇

右塗布

八七九 昇汞 〇、一

水 五〇、〇

右塗布

八七〇 撒里夫爾酸 二、〇

武蘭坪酒 一〇〇、〇

右塗布

八七二 水銀軟膏 一〇、〇

杜松實軟膏* 一〇、〇

右塗布

八七三 亞鉛華軟膏 二〇、〇

右塗布

八七三 アントラロビン

一〇、〇—二〇、〇

阿列布油 三〇、〇—四〇、〇

刺納林、或豚脂 四〇、〇—六〇、〇

右塗布

八七四 依比知阿兒水(二〇%)

右塗布 二〇、〇

八七五 白陶土、亞仁麻油 各一五、〇
酸化亞鉛、次醋酸鉛液 各一〇、〇

八七六 鯨腦膏 右塗布 三〇、〇

八七七 僱里設林軟膏 右塗布 二〇、〇

八七八 硼酸滑石(三%) 撒布劑 五〇、〇

八七九 石炭酸滑石(一%) 右撒布 五〇、〇

蕁麻疹 Urticaria.

八七〇 水劑 硫酸麻偏涅叟謨 二〇、〇

苦味丁幾 二〇、〇
水 二〇〇、〇

右一日六回二日分服
八七六 撒里矢爾酸那篤留謨 一〇、〇

水 二〇〇、〇
右每三時一食匙
八七元 亞砒酸加留謨液 五、〇

八七〇 右撒布 明礬末 三〇、〇
右撒布

八七二 酸化亞鉛 澱粉 四〇、〇—八〇、〇

八七三 酸化亞鉛 樟腦 三〇、〇
澱粉 〇、五

八七三 右撒布 アルムノール 一、〇

八七三 滑石末、澱粉

風團、蕁麻羅斯、蕁麻瘡、漢醫統謂之癩疹、

薄荷水 一五、〇
右一日三回每回八滴

八七三 亞砒酸加留謨液 一、〇
水 一〇〇、〇

右一日三回二日分服
八七三 純精酒石 二五、〇

●丸劑 枸橼油糖* 一〇、〇
右一日二回每回一茶匙

右撒布 各五、〇—一〇、〇
●墨法劑

八七四 右墨法 プロト氏液* 三〇〇、〇

八七五 鉛醋 水 五、〇

右墨法 醋酸鉛 二〇〇、〇

八七六 醋酸鉛 七、〇
硫酸亞爾密紐謨 二、〇

水 右墨法 二〇〇〇、〇

八七三 鹽酸規尼涅、麥角越幾斯 各一、〇

別拉敦那越幾斯 〇、〇二
僱里設林 適宜

右為丸每二時一粒至二粒
八七三 硫酸亞篤魯必涅 〇、〇一

餽水、僱里設林 各二、〇
右以篤拉侃篤護謨為二十九
一日二回每回一二粒

八七四 石炭酸 五、〇

右偏里設林軟膏、亞爾答亞
根末各適宜爲百九一日三回

每回三粒

● 墨法劑

八七五 昇汞 〇、五

鉛水 五〇〇、〇

右墨法

八七六 次醋酸鉛液 五、〇

水 二〇〇、〇

右墨法

八七七 ● 塗布劑 〇、五

石炭酸 三〇〇、〇

偏里設林軟膏

八七六 右塗布 三、〇

撒里矢爾酸

八七五 酒精 一五〇、〇

偏里設林 一〇〇、〇

八七四 刺納林 一〇〇、〇

安息香脂

八七三 薔薇水 三〇〇、〇

八七四 右塗布 五、〇

百露拔爾撒謨

偏里設林 三〇〇、〇

八七四 薄荷腦 三、〇

酒精 一〇〇、〇

右塗布 各五、〇

八七三 薄荷腦、偏里設林 二〇〇、〇

武蘭坪酒 三、〇

安息香丁幾

八七三 右塗布 各一〇〇、〇

武蘭坪酒、刺賢坪兒精

依的兒 二、五

アコニチン 一、〇

右塗布 二〇〇、〇

八七四 武蘭坪酒 五、〇

石油依的兒 二、五

偏里設林

八七三 抱水格魯刺兒 一、〇

乳硫黃 五、〇

偏里設林水 五〇、〇

扁桃乳劑 * 二三〇、〇

右一日塗布三回

八七四 樟腦、抱水格魯刺兒

亞拉昆亞護謨 各三、〇

蠟軟膏 * 三〇〇、〇

右塗布 〇、四

八七三 芳香丁幾 〇、五

甘硝石精 六滴

刺答尼亞丁幾

酒精 一〇〇、〇

水 一〇〇、〇

八七四 右塗布 五、〇

ナフトール 各五〇、〇

刺納林、華攝林

八七三 右一日塗布一回 五、〇

撒里矢兒酸 二〇〇、〇

米粉

八七五 右撒布 五、〇

醋酸 二〇〇、〇

酒精 五、〇

右洗滌

匍行疹 Herpes.

匍行疹熱、水泡疹、泡疹、泡癬、蛇行癬、頑癬、這疹、舊譯作水蠟癩、南名大水蠟癩、又名水丹毒、西名卑靴士、

禿髮匍行疹

Tinea tonsurans. 丹形癢瘡、禿瘡、頭禿、

帶狀匍行疹

Herpes zoster. 纏腰丹、生蛇、帶狀羅斯、火帶瘡、

口唇匍行疹

Herpes labialis. 唇邊泡疹、緊唇、口湧瘡、唇風、

包皮匍行疹

Herpes praeputialis. 包皮癩疹、包皮水癩疹、

陰部匍行疹

Herpes inguinalis. 鼠蹊匍行疹、陰癩癬、陰部ヘルペス、

●內服劑

八七五 硫酸規尼涅

一、〇

八七五 格魯兒酸加留謨水

(二、〇)二〇〇、〇

八七五 撒里矢爾酸滑石(5%)

二〇、〇

白糖

二、〇

覆盆子舍利別 一五、〇

●撒布劑

二〇、〇

右分五包每三時一包

八七五 亞砒酸加留謨液

六滴

右舍嗽 八七五 苛性加里水(1%) 二〇〇、〇

八七五 酸化亞鉛

五、〇

芳香水

二五、〇

右舍嗽

澱粉

三、〇

右一日三回分服

●含嗽劑

八七五 鹽素酸加留謨水(1%)

二〇〇、〇

八七五 醋酸礬土、硼酸

各四、〇

八七五 酸化亞鉛

二、〇

右舍嗽

一三〇、〇

樟腦

〇、五

二〇、〇

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------|-----|---------------|------|-----|-------------|-------|
| 八七〇 | 右撒布 | 二、〇一四、〇 | 八七七 | 右塗布 | 〇、二 | 八七四 | 右塗布 | 一五、〇 |
| | チオール | | | 鹽酸古加乙滷 | | | 右塗布 | |
| | 次硝酸蒼鉛 | 二、〇〇 | | 單軟膏 | 二、〇〇 | | 撒里矢爾酸 | 一、〇 |
| | 右撒布 | | | 右塗布 | | | 或硼酸 | 二、五 |
| | ●塗布劑 | | 八七六 | 石炭酸水(三%) | 二五、〇 | | 巴刺賓軟膏** | 二五、〇 |
| 八七二 | 偏里設林軟膏 | 二、〇〇 | | 偏里設林 | 二五、〇 | | 酸化亞鉛、小麥粉 | 各五〇、〇 |
| | 右塗布 | | | 右塗布 | | | 右塗布 | |
| 八七二 | 緩和軟膏** | 二、〇〇 | 八七九 | メリロト硬膏** | 二五、〇 | 八七五 | チオール軟膏** | 二五、〇 |
| | 右塗布 | | | 右塗布 | | | 右塗布 | |
| 八七三 | 鉛軟膏** | 二、〇〇 | 八七〇 | 矢鳩答硬膏 | 二五、〇 | 八七六 | 偏里設林 | 一〇、〇 |
| | 右塗布 | | | 右塗布 | | | 卵黃 | 八、〇 |
| 八七四 | 鉛硬膏 | 二、〇〇 | 八七一 | 依比知阿兒軟膏 | 二五、〇 | | 右塗布 | |
| | 阿片越幾斯或阿片 | 〇、五 | | (一〇一三〇%) | | 八七七 | 刺答尼亞丁幾 | 二〇、〇 |
| | 右塗布 | | | 右塗布 | | | 右塗布 | |
| 八七五 | 阿片越幾斯 | 一、〇〇 | 八七三 | 依比知阿兒刺納林(一〇%) | 三〇、〇 | 八七六 | ●注射劑 | |
| | 豚脂 | | | 右塗布 | | | 鹽酸莫兒比涅水(一%) | 一〇、〇 |
| | 右塗布 | | 八七三 | 依比知阿兒 | 五、〇 | | 右一筒至二筒注射皮下 | |
| 八七六 | 鹽酸古加乙滷刺納林(四%) | 二、〇〇 | | 刺納林 | 三〇、〇 | | | |

癬瘡

Furunkel

血瘍、癬、癰腫、疔、疔疔、疔疔、腎癰、

癰疽

Carbunculus, Anthrax.

炭瘍、癰、癰腫、九目疽、頸癰、漢名亦同、且兼括發背等類、

處置 切開、罌法、塗布劑等、

●散劑

八七九 鹽酸莫兒比涅 〇、〇五

白糖 二、〇

右分五包每夕一二包

●黠法劑

八七〇 石炭酸(三%) 一〇〇、〇

右黠法

●塗布劑

八七一 石炭酸水銀軟膏 * 五〇、〇

右塗布

八七二 撒里矢爾酸

石鹼硬膏

ヘブラ氏軟膏

右塗布

八七三 硝酸銀

百露拔爾撒謨

華設林

右塗布

八七四 硝酸銀

百露拔爾撒謨

八、〇

六〇、〇

三〇、〇

〇、三

三、〇

三、〇

一、〇

五、〇

單軟膏

右塗布

八七五 赤降汞

刺乃林

右塗布

八七六 鉛軟膏

刺乃林

華攝林

右塗布

一〇〇、〇

五、〇

五〇、〇

一〇、〇

八、〇

二、〇

濕疹 Eczema. 小水泡疹、エタセマ、膿疱、水蠶癩、濕癩瘡、

頭部水泡疹 E. capitis 頭瘡、

顏面水泡疹 E. facis. 黃水瘡、甜瘡、水瘡、

乳房水泡疹 E. mammae 妬乳病、

臍窩水泡疹 E. umbilicale 臍瘡、

陰部水泡疹 E. genitale 濕陰瘡、

肛門水泡疹 E. ani. 後陰水泡疹、肛門作痒、

支節水泡疹 E. extremitates 風疽之類、

●水劑

八七〇 沙爾沙根

一五、〇

旃那葉

五、〇

右煎出

二〇〇、〇

右一日數回分服

八七六 亞砒酸加留謨液

一、〇

水

二〇〇、〇

苦味丁幾

四、〇

右一日三回二日分服

八七九 沃度化砒素

〇、二

鱈水

一二〇、〇

赤色沃度末

〇、四

沃度加留謨

四、〇

右濾過一日三回每回十五滴

八七〇 亞砒酸

〇、一二

右甘草羔、甘草末各適宜爲

八七九 亞砒酸加留謨液

五、〇

薄荷水

一五、〇

右一日三回每回八滴至十六

滴

●塗布劑

八七二 昇汞

〇、〇三一〇、〇五

水

三〇、〇

右塗布

八七三 昇汞

〇、五

依的兒

一〇〇、〇

古魯胃謨

二〇、〇

右一週一回浴後塗布

八七四 白降汞

一、〇一三、〇

豚脂

三〇、〇

右塗布

八七五 自降汞

二、〇

酸化亞鉛

二、〇

華攝林

四〇、〇

右塗布

八七六 石炭酸阿列布油(一%)

二〇〇、〇

右塗布

八七七 石炭酸

二、〇

僱里設林、百露拔爾撒謨

酒精

各一〇、〇

右塗布

八七八 撒里矢爾酸

二〇〇、〇

酒精

二〇〇、〇

八七九 撒里矢爾酸

三、〇

酒精

六、〇

刺納林

三、〇

右塗布

八八〇 撒里矢爾酸

三、〇

酒精

一五〇、〇

僱里設林

一〇〇、〇

右塗布

八八一 撒里矢爾酸

一、〇

安息香丁幾

二、〇

豚脂

一七、〇

刺納林

三〇、〇

右塗布

八八二 撒里矢爾酸

一、〇

クレオリン

一、〇

酸化亞鉛

三、〇

華攝林

二〇、〇

刺納林

一〇、〇

右塗布

八八三 硼酸、明礬

各五、〇

僱里設林

八〇、〇

右塗布

八八四 硼酸

五、〇

僱里設林、豚脂、黃蠟

| | | |
|-----|----------|-------|
| 八八四 | 阿列布油 | 各二〇、〇 |
| 八八四 | 右塗布 | 一〇、〇 |
| 八八四 | 硼酸 | 五、〇 |
| 八八四 | 撒里矢爾酸 | 〇、五 |
| 八八四 | 酸化亞鉛 | 一〇、〇 |
| 八八四 | 華攝林 | 三五、〇 |
| 八八五 | 右塗布 | 一〇、〇 |
| 八八五 | 硼酸 | 一〇、〇 |
| 八八五 | 刺納林、安息香脂 | 各二〇、〇 |
| 八八六 | 右塗布 | 各五、〇 |
| 八八六 | 硼酸、備里設林 | 二〇、〇 |
| 八八六 | 刺納林 | 一、〇 |
| 八八七 | 百露拔爾撒謨 | 一、〇 |
| 八八七 | 右塗布 | 五、〇 |
| 八八七 | 硼酸 | 五、〇 |
| 八八七 | 白蠟 | 一〇、〇 |
| 八八七 | 甘扁桃油 | 一〇、〇 |
| 八八七 | 巴拉寶 | 一〇、〇 |
| 八八八 | 右塗布 | 各一五、〇 |
| 八八八 | 乳硫黃、木麥兒 | 一〇、〇 |
| 八八八 | 沈降炭酸石灰 | 一〇、〇 |
| 八八八 | 黑石鹼*、豚脂 | 各一〇、〇 |

| | | |
|-----|---------|-------|
| 八八九 | 右一日塗布二回 | 五、〇 |
| 八八九 | 沈降硫黃 | 一、〇 |
| 八八九 | ナフトール | 二〇、〇 |
| 八八九 | 石鹼精* | 一〇、〇 |
| 八八九 | 稀酒精 | 一〇、〇 |
| 八八九 | 或備里設林 | 五、〇 |
| 八九〇 | 右塗布 | 一、〇 |
| 八九〇 | 硫黃華 | 一、〇 |
| 八九〇 | 百露拔爾撒謨 | 一、〇 |
| 八九〇 | 刺納林 | 八、〇 |
| 八九一 | 右塗布 | 四、〇 |
| 八九一 | 硫黃華 | 二、五 |
| 八九一 | 格魯兒安母紐謨 | 二、五 |
| 八九一 | 明礬 | 二、五 |
| 八九一 | 豚脂 | 八、〇 |
| 八九二 | 右塗布 | 四二、〇 |
| 八九二 | 藥用石鹼 | 五、〇 |
| 八九二 | 乳硫黃 | 三、〇 |
| 八九二 | 安息香末 | 〇、五 |
| 八九三 | 右塗布 | 一、二、〇 |
| 八九三 | 赤色硫化汞 | 一、二、〇 |
| 八九三 | 昇華硫黃 | 三七、〇 |
| 八九三 | 華攝林 | 一、二、〇 |

| | | |
|-----|---------|-------|
| 八九四 | ベルガモット油 | 十五滴 |
| 八九四 | 右塗布 | 一〇、〇 |
| 八九四 | 酸化亞鉛 | 五〇、〇 |
| 八九四 | 備里設林軟膏* | 五〇、〇 |
| 八九五 | 右塗布 | 五、〇 |
| 八九五 | 酸化亞鉛 | 五〇、〇 |
| 八九五 | 單軟膏 | 五〇、〇 |
| 八九六 | 右塗布 | 三五、〇 |
| 八九六 | 酸化亞鉛 | 五〇、〇 |
| 八九六 | 豚脂或華攝林 | 二五、〇 |
| 八九六 | 澱粉 | 一、〇 |
| 八九七 | 撒里矢爾酸 | 一〇、〇 |
| 八九七 | 右塗布 | 一〇、〇 |
| 八九七 | 酸化亞鉛 | 一〇、〇 |
| 八九七 | 澱粉 | 一〇、〇 |
| 八九七 | 撒里矢爾酸 | 一〇、〇 |
| 八九七 | 華攝林 | 二〇、〇 |
| 八九八 | 右塗布 | 各一五、〇 |
| 八九八 | 酸化亞鉛、魚膠 | 二、五 |
| 八九八 | 備里設林 | 四、五 |
| 八九八 | 水 | 五、〇 |
| 八九八 | 硫黃華 | 五、〇 |
| 八九八 | 右患部塗布 | 五、〇 |

八一九 酸化亞鉛 二五、〇

撒里矢爾酸 一、〇

小麥粉 五、〇—八、〇

備里設林 七、五

餾水 四、〇

右塗布

八二〇 酸化亞鉛、ルスクス油 各五、〇

阿列布油 各五、〇

刺納林 五〇、〇

右塗布

八二一 酸化亞鉛 五、〇

備里設林、甘扁桃油各一〇、〇

右塗布

八二二 酸化亞鉛、獸膠、備里設林 各三〇、〇

餾水 二、〇

依比知阿兒那篤留謨

八二三 單軟膏 二〇〇、〇

安息香脂 五、〇

酸化亞鉛 四〇、〇

右塗布

八二四 安息香性酸化亞鉛軟膏* 八〇、〇

酒精 一〇、〇

右塗布

八二五 密陀僧、備里設林 各三〇、〇

醋 六、〇

小麥粉 一〇、〇

右一日塗布二回

八二六 密陀僧 一〇、〇

醋 三〇、〇

右蒸發爲 二〇、〇

阿列布油、豚脂 各一〇、〇

依比知阿兒 各一〇、〇

右塗布

八二七 醋酸鉛 一、〇

備里設林軟膏或安息香脂 三〇、〇

右塗布

八二八 次醋酸鉛液 三〇、〇

刺納林 一〇、〇

安息香脂 二〇、〇

右塗布

八二九 單鉛軟膏 一五、〇

阿列布油 六、〇

刺納林 六、〇

八三〇 單鉛硬膏 二〇、〇

無水刺納林 二〇、〇

阿列布油 二〇、〇

右塗布

八三一 依比知阿兒 一五、〇

餾水、備里設林 各二〇、〇

右塗布

八三二 依比知阿兒 五、〇—一〇、〇

へブラ氏軟膏 五〇、〇—一〇〇、〇

右塗布

八三三 依比知阿兒 一〇、〇

蓖麻子油 五、〇

依的兒精 五、〇

古魯胃謨 八〇、〇

撒里矢爾酸 二、〇

右塗布

八三四 苛性加里水(等分) 一〇、〇

右每三日塗布一回直以冷水洗去

八三五 苛性加里水(三十倍) 一〇、〇

右塗布

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|------|-----|----------|-------|-----|--------------|-------|
| 八六六 | 加實紐謨油 | 八、〇 | 八六四 | 續和軟膏、單軟膏 | 各二五、〇 | 八六五 | 右塗布 | 一、五 |
| 八六五 | 肝油 | 八〇、〇 | 八六三 | 右塗布 | 四〇、〇 | 八六四 | 單寧酸亞鉛 | 五〇、〇 |
| 八六四 | 右塗擦 | 二〇、〇 | 八六二 | 黑石鹼* | 八〇、〇 | 八六三 | 藥用石鹼 | 五〇、〇 |
| 八六三 | 加實紐謨油 | 二〇、〇 | 八六一 | 酒精 | 五、〇 | 八六二 | 右塗布 | 三〇、〇 |
| 八六二 | 黑石鹼* | 四〇、〇 | 八六〇 | 刺賢埤兒精 | 〇、二 | 八六一 | 的列並油 | 三〇、〇 |
| 八六一 | 酒精 | 八、〇 | 八五九 | 右朝夕塗布二回 | 八、〇 | 八六〇 | 亞麻仁油 | 三〇、〇 |
| 八六〇 | 加實紐謨油 | 八〇、〇 | 八五八 | 鹽酸古加乙涅 | 一、〇 | 八五九 | 琥珀油* | 各一五、〇 |
| 八五九 | 右一日塗布二回 | 五〇、〇 | 八五七 | 刺納林 | 二五、〇 | 八五八 | 杜松子油 | 一〇、〇 |
| 八五八 | 備里設林 | 五〇、〇 | 八五六 | 阿列布油 | 二五、〇 | 八五七 | 石油 | 一〇、〇 |
| 八五七 | 右塗布 | 五〇、〇 | 八五五 | 右塗布 | 一五、〇 | 八五六 | 右塗布 | 一〇、〇 |
| 八五六 | ルスチユーム丁幾* | 五〇、〇 | 八五四 | 麥兒水 | 一五、〇 | 八五五 | デルマトール | 一〇、〇 |
| 八五五 | 右塗布 | 五〇、〇 | 八五三 | 卵黃 | 一五、〇 | 八五四 | 刺納林 | 一〇、〇 |
| 八五四 | ルスチユーム油** | 五〇、〇 | 八五二 | 備里設林 | 各二〇、〇 | 八五三 | 右塗布 | 一〇、〇 |
| 八五三 | 肝油 | 五〇、〇 | 八五一 | 右塗布 | 一、〇 | 八五二 | レゾルチン | 一〇、〇 |
| 八五二 | 右塗布 | 五〇、〇 | 八五〇 | 木麥兒、黑石鹼* | 九四、〇 | 八五一 | 乳硫黃 | 二〇、〇 |
| 八五一 | 依的兒、酒精 | 二、〇 | 八四九 | 酒精 | 五、〇 | 八五〇 | 刺納林 | 三〇、〇 |
| 八五〇 | 刺賢埤爾油 | 一五、〇 | 八四八 | 右一日塗布二回 | 一、〇 | 八四九 | 右塗布 | 〇、二 |
| 八四九 | 右塗布 | 一五、〇 | 八四七 | ナフトール | 五、〇 | 八四八 | 鹽酸ヒドロキシールアミン | 〇、二 |
| 八四八 | 流動ツメノール** | 一五、〇 | 八四六 | 酒精 | 五、〇 | 八四七 | 右塗布 | 〇、二 |
| 八四七 | 右塗布 | 一五、〇 | 八四五 | 備里設林 | 五、〇 | 八四六 | 酒精 | 〇、二 |
| 八四六 | ツメノール* | 一五、〇 | 八四四 | 右塗布 | 五、〇 | 八四五 | 右塗布 | 〇、二 |
| 八四五 | 酸化亞鉛、次硝酸蒼鉛各二、五 | 三〇、〇 | 八四三 | 撒里矢爾酸蒼鉛 | 五、〇 | 八四四 | 撒布劑 | 四、〇 |
| | | | 八四二 | 華攝林 | 三〇、〇 | 八四三 | 酸化亞鉛 | 四、〇 |

寄生性匍行疹、禿髮匍行疹

澱粉 四〇、〇

右撒布

八六五 酸化亞鉛、次硝酸蒼鉛各五、〇

炭酸鉛 二、五

滑石、米粉 各五〇、〇

右撒布

八六五 酸化亞鉛 二、〇

樟腦 〇、五

澱粉 三〇、〇

右撒布

八六五 明礬末 一〇、〇

澱粉 一五〇、〇

石松子末 一〇、〇

右撒布

八六五 石松子 四五、〇

撒里失爾酸 〇、五

泥苜根末 四、五

右撒布

八六五 醋法劑 七、〇

醋酸鉛 二〇、〇

明礬 一〇〇〇、〇

水

寄生性匍行疹、禿髮匍行疹 *Herpes parasiticus*

頑癬、環狀疹 *Pezema marginatum.*

八六五 グリサルビン 二、〇一五、〇

豚脂 二、〇

刺納林 一六、〇

八六五 アントラロビン 一〇、〇一二、〇

右塗布 八〇、〇一九〇、〇

酒精 一〇、〇

右塗布 一〇、〇

八六五 アントラロビン 一〇、〇

癬疥、田蟲、錢瘡、錢蟲

右巻法 四〇〇、〇

八六五 硫酸亞鉛水(一%) 二、五

右巻法 二〇、〇

八六五 鹽酸古加乙涅 二〇、〇

柯柯阿脂 〇、五

八六五 右爲肛門坐藥二十個 〇、五

八六五 硫酸亞鉛 〇、五

杏仁水 一〇、〇

佛里設林 〇、五

右注入鼻中

阿列布油 三〇、〇

刺納林 六〇、〇

右塗布 二〇、〇

八六五 アントラロビン 三五、〇

硼酸那篤留謨 各九〇、〇

佛里設林、酒精 五、〇

右塗布 五、〇

八六五 焦性沒食子酸 五、〇

單軟膏 五、〇

●塗布劑

八六五 グリサルビン(吳亞末) 五、〇

右以醋爲稀泥塗布

八六五 グリサルビン 五、〇

加里石鹼 四五、〇

右塗布

八六五 グリサルビン華攝林(一〇%) 五〇、〇

右塗布

八七三 右塗布 焦性沒食子酸 二、五、一五、〇
豚脂 五、〇
刺納林 四〇、〇

八七三 右塗布 焦性沒食子酸 一、〇
無水刺納林 一、〇
右塗布 八、〇

八七四 右塗布 焦性沒食子酸 二、五、一五、〇
撒里矢爾酸 一、〇
豚脂 五、〇
刺納林 四〇、〇

八七五 右塗布 レゾルチン 五、〇
阿列布油 五、〇
刺納林 五〇、〇
右一日塗布一回 二、〇、一五、〇

八七六 右塗布 レゾルチン 一、〇
偪里設林 二〇、〇
橙花水 二〇、〇
酒精 八〇、〇

八七七 レゾルチン 五、〇、一〇、〇
蓖麻子油 四、五、〇
酒精 一五〇、〇
百露拔爾撒謨 〇、五

八七八 右塗布 石炭酸酒精(二%) 一〇、〇
右塗布 一〇、〇

八七九 右塗布 石炭酸刺納林(一〇%) 一〇、〇
右塗布 一〇、〇

八八〇 右塗布 ナフトール酒精(一一二%) 一〇〇、〇
右一日塗布二回 一〇〇、〇

八八一 ナフトール 一〇〇、〇
酒精 一〇〇、〇
偪里設林 五、〇
右塗布 五〇、〇

八八二 ナフトール華攝林(五%) 五〇、〇
右塗布 二、〇

八八三 ナフトール 二〇、〇
刺賢堉兒精 一〇〇、〇
加里石鹼 一〇〇、〇

八八四 右塗布 鹽酸ヒドロキシールアミン 〇、一
酒精、偪里設林 各五〇、〇
右一日塗布二三回 〇、一

八八五 偪里設林 五〇、〇
右一日塗布三回至五回 二〇、〇

八八六 酒精 〇、一
鹽酸ヒドロキシールアミン 〇、二、一〇、五
右塗布 適宜

八八七 酒精 二、〇
炭酸石灰 四、〇
右塗布 〇、六

八八八 白降汞 三、四、〇
沈降硫黃 〇、六
或知母爾 〇、六
蠟軟膏 三四、〇

八八九 右塗布 白降汞、次硝酸蒼鉛 各二、五
蠟軟膏 四〇、〇

八六九 撒里矢爾酸、安息香丁幾

各一〇、〇

酒精 七〇、〇

右一日塗布二回

八六九 知母爾 一、〇

酒精 一〇、〇

儂里設林 二〇、〇

右塗布 一五、〇

八六九 亞砒酸加留謨液 一五、〇

右一日塗布二三回

八六二 亞砒酸加留謨液 二、〇

水 一四〇、〇

酒精 四〇、〇

右塗布 各一〇〇、〇

八六三 硫黃、木爹兒 各一〇〇、〇

石鹼、單軟膏 各二〇〇、〇

碳酸石灰 一〇、〇

右塗布 二、〇

八六四 沈降硫黃 二、〇

或列曹兒聖(即レゾルチン) 二、五

或撒里矢爾酸 二、五

或亞砒、澱粉 五、〇

刺納林或流刺巴刺質 各五、〇

右塗布 一〇、〇

八六五 亞鉛華軟膏、白降末軟膏 各一五、〇

右塗布 一〇、〇

八六六 依比知阿兒 一〇、〇

蓖麻子油、依的兒精 各五、〇

古魯胃謨 八〇、〇

撒里矢爾酸 二、〇

右塗布 一、〇

八六七 苛性加里 〇、五

石炭酸 〇、五

刺納林、柯柯阿脂 各二五、〇

刺賢坪兒油 五滴

右塗布 一〇、〇

八六八 吐酒石 三〇、〇

安息香脂 一〇、〇

右塗布 一、二

八六九 丁香油 一五〇、〇

酒精 五、〇

硼酸 五、〇

右塗布

天疱瘡 Pemphigus 水泡疹、大水疱疹、天疱

慢性泡疹 Pemphigus chronica

嬰兒大水疱疹 Pemphigus neonatorum. 嬰兒大膿泡、生泡、

大膿泡疹 Ecthyma. 膿泡、膿疥、鱗漏、雁瘡、

八九〇 硝酸銀

一〇、〇

家猪脂

二〇、〇

右塗布

| | | | | | | | | |
|------|-------------|-------|------|-------------|------|------|-------------|-------|
| 八九〇二 | 石炭酸軟膏 | 二〇、〇 | 八九〇九 | 硫黃華 | 二五、〇 | 八九二五 | 刺納林 | 一三〇、〇 |
| | 右塗布 | | | 右塗布 | | | 右塗布 | |
| 八九〇三 | 石炭酸 | 五、〇 | 八九一〇 | 加里石鹼 | 七五、〇 | 八九二六 | 亞鉛華刺納林(一〇%) | 二〇、〇 |
| | 備里設林 | 一〇、〇 | | 右塗布 | | | 右塗布 | |
| | 百露拔爾撒謨 | 一〇、〇 | 八九一一 | ベルガモット油 | 一、〇 | 八九二七 | 亞鉛化亞鉛 | 五〇、〇 |
| | 酒精 | 二〇〇、〇 | | 右塗布 | | | 右塗布 | |
| 八九〇三 | 石炭酸油(一%—二%) | 二〇、〇 | 八九一二 | 木爹兒 | 一〇、〇 | 八九二八 | 亞鉛化亞鉛 | 二〇、〇 |
| | 或知母兒油 | | | 右塗布 | | | 樟腦 | 〇、五 |
| | 或撒里矢爾酸油 | | 八九一三 | 卵黃 | 一個 | 八九二九 | 酸亞鉛 | 三〇、〇 |
| | 右塗布 | | | 備里設林 | 二〇、〇 | | 右撒布 | 一、〇 |
| 八九〇四 | 石炭酸刺納林(五%) | 二〇、〇 | 八九一四 | 薄荷腦 | 二、〇 | 八九三〇 | 米粉 | 二〇、〇 |
| | 右塗布 | | | 右塗布 | | | | |
| 八九〇五 | 硼酸軟膏 | 二〇、〇 | 八九一五 | 安息香脂 | 六五、〇 | | | |
| | 右塗布 | | | 右塗布 | | | | |
| 八九〇六 | 硼酸 | 五、〇 | 八九一六 | 炭酸加留謨 | 一〇、〇 | | | |
| | 備里設林 | 五、〇 | | 餛水 | 〇、五 | | | |
| | 刺納林 | 二〇、〇 | 八九一七 | 安息香脂 | 六五、〇 | | | |
| | 百露拔爾撒謨 | 一、〇 | 八九一八 | 木爹兒 | 一〇、〇 | | | |
| | 右塗布 | | | 右塗布 | | | | |
| 八九〇七 | 硼酸 | 五、〇 | 八九一九 | 卵黃 | 一個 | | | |
| | 白蠟 | 五、〇 | 八九二〇 | 備里設林 | 二〇、〇 | | | |
| | | | 八九二一 | 薄荷腦 | 二、〇 | | | |
| | | | 八九二二 | 右塗布 | 六、〇 | | | |
| | | | 八九二三 | 亞鉛華刺納林(一〇%) | 二〇、〇 | | | |
| | | | 八九二四 | 亞鉛化軟膏 | 五〇、〇 | | | |
| | | | 八九二五 | 刺納林 | 五、〇 | | | |
| | | | 八九二六 | 安息香脂或亞鉛華軟膏 | 一〇、〇 | | | |
| | | | 八九二七 | 鉛糖水或薔薇水 | 一五、〇 | | | |
| | | | 八九二八 | 右塗布 | 〇、五 | | | |
| | | | 八九二九 | 刺納林 | 二〇、〇 | | | |
| | | | 八九三〇 | 亞鉛化亞鉛 | 一〇、〇 | | | |
| | | | | 米粉 | 二〇、〇 | | | |

小膿泡疹

五百四十八

滑石 四、〇
 泥蒿根末 一、〇
 右一日撒布數回
 八九二 昇末 三〇〇、〇—五〇〇、〇
 水 二〇〇、〇
 八九三 檫皮 右浴湯用 五〇、〇
 右煎出浴湯用

小膿泡疹 Impetigo. 小膿疱、膿疱瘡

頭膿泡疹 Impetigo capitis 頭上天疱瘡、蜂瘡、胎癩、

顏面膿泡疹 Impetigo facies 香辨瘡

●塗布劑

八九三 撒里矢爾酸 蠟軟膏 一、〇—三、〇
 華攝林 右塗布 二〇、〇

酸化亞鉛、澱粉 各一、二、〇 八九六 白降末軟膏 三〇、〇
 右塗布

八九四 苛性加里 〇、五 ●撒布劑 三、〇
 石炭酸 一、五 八九七 次硝酸蒼鉛 三、〇
 刺納林、柯柯阿脂 各一、五、〇 安息香脂 三〇、〇
 右一日塗布二回

八九五 黃降末 〇、五—一、〇 八九八 硫酸銅 一、〇—二、〇
 右撒布

汚苔疹 Rubis 一、〇—二、〇

瘰瘡 Acn3. 粉刺、酒蟻、亞苦涅(アクチ)、穀嘴瘡、刺癩、皮花粉刺

散生粉刺 Acne disseminata

散生粉刺 Acne disseminata

安息香脂 三〇、〇
 右撒布
 八九九 爹兒 五、〇
 硫化加爾曼謨 四、五、〇
 右撒布
 ●卷法劑
 八九〇 次醋酸鉛液 三〇、〇
 右三十個和一碗水卷法

酒皰鼻(銅色面皰)

Acne rosacea.

皰鼻、酒皰鼻、銅色鼻、皰赤皰、紅糟鼻、

●塗布劑

八九三 撒里爾酸、乳硫黃

加里石鹼

各五、〇

右塗布

八九三 撒里矢爾酸

糊酸那篤留謨

〇、五

ナフトール

亞鉛華軟膏

二、〇

右塗布

八九三 鉛軟膏*

單寧酸、麥角越幾斯

一〇〇、〇

右塗布

八九四 糊酸那篤留謨

糊里設林

二、〇

右每三時塗布

八九五 糊酸那篤留謨

糊里設林、酒精

各一〇、〇

薔薇水

二〇〇、〇

右塗布

八九六 硼酸

酒精、糊里設林

五、〇

橙花水

各五〇、〇

右一日塗布二回至三回

八九七 純醋酸、安息香丁幾

樟腦精

各六、〇

酒精

一〇〇、〇

右朝夕塗布

八九八 石鹼精*

右塗布

二〇〇、〇

八九九 黑石鹼*

右塗布

五〇、〇

八九〇 三倍依比知阿兒水

右塗布

三〇、〇

八九一 刺納林

安息香脂

一〇、〇

餽水

二〇、〇

依比知阿兒

二四、〇

右塗布

六、〇

八九二 デキストリン、糊里設林

水

各一五、〇

依比知阿兒

四、〇

右一日塗布數回

八九三 乳硫黃、稀酒精、水各一五、〇

右每夕塗布

八九四 乳硫黃

沒食子丁幾

一〇、〇

ラベンデル精

一〇、〇

糊里設林

一、五

右塗布

八九五 乳硫黃、炭酸加留謨

糊里設林

各一〇、〇

橙花水

石鹼精(或稀酒精)各一〇、〇

右塗布

八九六 乳硫黃

炭酸加留謨、糊里設林

一〇、〇

杏仁水

各一〇、〇

右塗布

八九七 乳硫黃

炭酸加留謨

七、五

黑石鹼* 安息香脂各一五、〇

右塗布

八九八 朱

〇、五

乳硫黃 一二、〇

ベルカモツト油 十五滴

華攝林 五〇、〇

右塗布

八九四九 乳硫黃、偏里設林

石鹼精 各三〇、〇

右每夕塗布

八九五〇 乳硫黃、偏里設林

石鹼精* 各五、〇

炭酸加留膜 一、〇

右塗布

八九五一 乳硫黃 四、〇

沈降炭酸石灰 二、〇

酸化亞鉛 二〇、〇

澱粉 一五、〇

偏里設林 二〇、〇

澆水 八〇、〇

右一日塗布三回

八九五二 昇汞 〇、〇五

偏里設林 一、〇

橙花水 二〇、〇

酒精 八〇、〇

右頻回塗布

八九五三 亞鉛華軟膏 四〇、〇

乳硫黃 五、〇

白陶土 五、〇

右塗布

八九五四 沃度化硫黃 〇、五

刺納林 五〇、〇

右塗布

八九五五 ナフトール 八、〇

華攝林、黑石鹼 各二〇、〇

硫黃華 五〇、〇

右塗布

八九五六 ナフトール、樟腦 各一〇、〇

華攝林 五、〇

白堊末 一五、〇

黑石鹼 五〇、〇

硫黃華 右塗布

右塗布

八九五七 ナフトール 五、〇

沈降硫黃 二五、〇

刺納林、黑石鹼* 各一〇、〇

右塗布二十分間後除去後撒

布澱粉

八九五八 レゾルチン 二、〇一五、〇

偏里設林 一、〇

橙花水** 二〇、〇

酒精 八〇、〇

右頻回塗布

八九五九 レゾルチン 〇、二

硫黃 一、〇

刺納林 一五、〇

右塗布

八九六〇 レゾルチン 一〇、〇

酸化亞鉛、澱粉 各二五、〇

流動巴刺賓 一〇〇、〇

右塗布

八九六一 レゾルチン、酸化亞鉛 各五、〇

澱粉 一五、〇

華攝林 右塗布

右塗布

八九六二 依比知阿兒 一〇、〇

水 三〇、〇

右塗布

八九六三 ベタ、ナフトール 一〇、〇

乳硫黃 五〇、〇

刺乃林、綠石鹼 各二五、〇

右塗布

●撒布劑

明礬 一五、〇〇

澱粉 五〇、〇〇

泥菖根末 二、〇〇

右撒布

●洗滌劑

八九五 昇汞水(一萬倍) 三〇、〇〇

右洗滌及綳帶用

八九六 昇汞 〇、一

安息香丁凝 一〇、〇〇

薔薇水 二〇〇、〇〇

右洗滌

八九七 炭酸加留謨 二、〇〇

備里設林 三、〇〇

留水 二〇〇、〇〇

右洗滌

八九六 硼酸那篤留謨 五、〇〇

備里設林、酒精 各一〇、〇〇

薔薇水 二〇〇、〇〇

右洗滌

八九六 沃度那篤倫石鹼** 一個

右洗滌用

八九七 乳硫黃 八、〇〇

樟腦 〇、五〇

亞拉比亞護謨 一、〇〇

石灰水、薔薇水 各六〇、〇〇

鬚苔疹 Acne mentagra

鬚瘡、醵花瘡 Mentagri. 鬚瘡、無花果狀癬、頤疹

●內服劑

八九二 ソントリナ蘆薈 二、〇〇

林檎酸鐵越幾斯 五、〇〇

大黃根末 五、〇〇

右爲六十九日二回每回三粒

●塗布劑

八九三 安息香酸 三、〇〇

百露拔爾撒謨 五、〇〇

蠟軟膏 三〇、〇〇

右塗布

八九三 撒里矢爾酸 一〇、〇〇

石鹼軟膏 一〇〇、〇〇

右塗布

八九四 撒里矢爾酸 二、〇〇

刺納林 五〇、〇〇

酸化亞鉛、澱粉 各二五、〇〇

右塗布

八九五 撒里矢爾酸 一、〇〇

乳硫黃 五、〇〇

華攝林 二五、〇〇

酸化亞鉛、澱粉 各五、〇〇

八九七 白降汞 五、〇〇

華攝林或單軟膏 五〇、〇〇

右一日塗布二回

八九七 赤降汞 〇、六〇

單軟膏 四〇、〇〇

右塗布

八九八 沃度化硫黃 四、〇〇

單軟膏 四〇、〇〇

右塗布

八九九 レゾルチン 五、〇〇

酸化亞鉛、澱粉 各一〇、〇
流動巴拉寶 三〇、〇
右晝間塗布

八九〇 ナフトール 二、五
華攝林、黑石鹼 * 各五、〇
沈降硫黃 二五、〇
右塗布

八九一 乳硫黃、炭酸加留謨
備里設林、杏仁水 各一〇、〇

鱗屑癬 Psoriasis
魚鱗癬 Ichthyosis.

●水劑
八九六 沃度砒液(ドノワン氏液) * 五、〇
生姜舍利別 二〇、〇
右一日三茶匙

八九七 沃度化砒素 〇、二
餽水 一二〇、〇
赤色沃度汞 〇、四
沃度加留謨 四、〇
右一日五十乃至百滴和水一
日三回分服

稀酒精 一〇、〇
右塗布

八九二 乳硫黃 四、〇
單寧酸 二、〇
酸化亞鉛、澱粉 各七、〇
華攝林 二〇、〇
右塗布

八九三 朱 一〇、五
乳硫黃 一〇、〇

乾癬、魚鱗癬、風癬、鱗屑疹

八九六 亞砒酸加留謨液 六滴
水 八〇、〇
右一日數回分服

八九九 亞砒酸加留謨液 〇、一
水 一〇〇、〇
右一日三回每回五滴

八九〇 亞砒酸加留謨液 二、〇
林檎鐵丁幾 一五、〇
薄荷水 一五〇、〇
右一日二回每回一食匙

華攝林 三〇、〇
右塗布

八九四 鉛軟膏 * 二〇、〇
右塗布

八九五 グリザロピン 一、〇
トラウマチチン 一〇、〇
右塗布

八九二 亞砒酸 〇、〇五
亞拉比亞護謨 適宜
甘草末 二、〇
右爲二十九一日二回每回一
粒

八九二 亞砒酸 〇、〇六
阿片 〇、二五
藥用石鹼 適宜
右爲二十九一日二回每回一
粒

八九三 亞砒酸 〇、一

●丸劑

阿片末

〇、三

右以藥用石鹼爲二十九一日

一二回每回一粒

八九五

亞砒酸

〇、五

黑胡椒末

六、〇

亞拉毘亞護謨末

一、五

亞爾答亞根末

二、〇

右爲百九一日三粒漸次增量

八九五

石炭酸

一、〇

僱里設林軟膏

四、〇

亞爾答亞根末

六、〇

右爲百九一日三回每食前二粒

●注射劑

八九六

亞砒酸那篤留謨液

一、〇

石炭酸

〇、二

餽水

一〇、〇

右注射皮下

八九七

亞砒酸加留謨液

四、〇

石炭酸

〇、四

水

二〇、〇

右注射皮下

●點法劑

八九六 鹽酸ヒドロキシールアミン

水 一、〇

石灰水 一〇〇、〇

右點法 適宜

●塗布劑

八九九

石炭酸

三、〇

單軟膏

三〇、〇

右塗布

九〇〇

石炭酸

五、〇

僱里設林

一〇、〇

酒精

五〇、〇

右一日塗布二回

九〇一

焦性沒食子酸

三、〇

單軟膏

三〇、〇

右塗布

九〇二

焦性沒食子酸、水

各三、〇

刺納林

二四、〇

右塗布

九〇三

白降汞

五、〇

華樹林

五〇、〇

右塗布

九〇四

白降汞

五、〇

加里石鹼

二〇、〇

刺納林

二〇、〇

右塗布

九〇五 白降汞、次硝酸蒼鉛

各五、〇

刺納林

八〇、〇

右塗布

九〇六

白降汞

四、〇

石炭酸軟膏

二、〇

僱里設林軟膏

四〇、〇

右塗布

九〇七

依比知阿兒

五、〇

僱里設林

五〇、〇

右塗布

九〇八

依比知阿兒

五、〇

撒里矢爾酸

三、〇

僱里設林

二〇、〇

酒精

一〇〇、〇

右塗布

九〇九

依比知阿兒

一〇、〇

蓖麻子油

五、〇

依的兒精

五、〇

右魯胃謨

八〇、〇

撒里矢爾酸

二、〇

九〇六 苦利沙羅並刺納林(二五%)

二五、〇

右塗布

九〇元 苦利沙羅並

嘔囉仿謨

黑石鹼*

右塗布

九〇三 苦利沙羅並

トラウマチチン

九〇三 アントラロピン

酒精

右塗布

九〇三 アントラロピン

酒精

右塗布

九〇三 アントラロピン

刺納林

九〇三 アントラロピン

阿列布油

刺納林

右塗布

九〇四 アントラロピン

硼酸那篤留謨

隔里設林

酒精

右塗布

九〇五 アリストール

華攝林

刺納林

右塗布

九〇五 アリストール

酸化亞鉛、澱粉

華攝林

右塗布

九〇七 ピロヂン

白降汞

昇汞

緩和軟膏

右塗布

九〇六 ナフトール

加里石鹼

豚脂

白蠟

右塗布

九〇元 杜松子油、黑石鹼*

酒精

右一日塗布二回

九〇四 ルスクス油(木爹兒油)

酒精

依的兒

刺賢埜兒油、芸香油

迷迭香油

右塗布

九〇四 肝油

亞拉昆亞護謨

白糖

魚膠、水

右塗布

赤色滲出性苔癬

Lichen exsudativus ruber

苔癬

Lichen.

汗癬、錢苔癬、苔瘡、

腺病性苔癬

Lichen scrofulosorum.

●注射劑
九〇三 亞砒酸加僞膜液 〇、〇、四
餽水 二〇〇、〇

石炭酸 〇、〇、四
右一筒注射皮下

九〇四 亞砒酸那篤留膜 〇、〇、一
石炭酸 〇、〇、二
餽水 一〇〇、〇

右五分之一至一筒注射皮下

●塗布劑
九〇四 昇汞 〇、一、〇、二
刺納林 三〇〇、〇

九〇五 水劑

痒疹、癢疹 Prurigo

九〇五 耶僕蘭日葉浸(三、〇)六〇、〇
右每日一回頓服

九〇五 耶僕蘭日煎(二五、〇)五〇、〇
耶僕蘭日舍利別 五〇、〇
右一日一茶匙至二茶匙

九〇五 耶僕蘭日舍利別 五〇、〇
右一日一茶匙至二茶匙

九〇五 燐 〇、〇、一

安息香脂 二〇〇、〇
右塗布

九〇五 昇汞 〇、〇、五、一、〇、一
石炭酸 一、〇、一、二、〇、〇

安息香亞鉛華軟膏* 五〇、〇、〇
右一日塗布二回

九〇六 白降汞 三、〇、〇
ヒドラツエチン 一、五、〇、〇

昇汞 〇、〇、六、〇、〇、〇
緩和軟膏 三、〇、〇、〇、〇

右塗布 二、五、〇、〇

九〇七 石炭酸 二、五、〇、〇

搔痒、痒疹、癢疹、泄風

甘橘桃油 一〇〇、〇
水 八〇〇、〇

亞拉昆亞護膜 一〇〇、〇
右爲乳劑一日一茶匙

九〇五 燐 〇、〇、一
肝油 三〇〇、〇
亞拉昆亞護膜、白糖各一五、〇

武蘭座酒 二〇〇、〇
備里設林 二、〇、〇
右塗布

九〇八 焦性沒食子酸、白降汞各三、〇
刺納林 三、〇、〇
右塗布

九〇九 單鉛硬膏 一〇〇、〇
亞砒酸那篤留膜液 一〇〇、〇
亞麻仁油 一〇〇、〇
右塗布

九〇九 單舍利別 四〇〇、〇
右爲乳劑一日一茶匙

九〇九 沃度 〇、〇、一
肝油 一〇〇、〇
右一日一茶匙至四茶匙

九〇九 石炭酸 〇、〇、二

| | | |
|------|-----------------|-------|
| 九〇六 | ●洗滌劑 | 五、〇 |
| 九〇六〇 | ●硫化加留謨 | 一〇、〇 |
| 九〇六 | ●藥用石鹼 | 一〇、〇 |
| 九〇五 | ●注射劑 | 一〇、〇 |
| 九〇五 | ●鹽酸必魯加兒比溫水(一%) | 一〇、〇 |
| 九〇五 | ●右每回半筒注射皮下 | 一〇、〇 |
| 九〇五 | ●石炭酸 | 五、〇 |
| 九〇五 | ●右僱里設林、亞兒答根末適 | 五、〇 |
| 九〇五 | ●宜爲百九一日三回每回一粒 | 五、〇 |
| 九〇五 | ●硫酸亞篤羅必涅 | 〇、〇一 |
| 九〇五 | ●右甘草羔及甘草末適宜爲二 | 〇、〇一 |
| 九〇五 | ●丸劑 | 〇、〇一 |
| 九〇五 | ●白糖 | 〇、〇二 |
| 九〇五 | ●散劑 | 〇、〇二 |
| 九〇五 | ●鹽酸必魯加兒比溫 | 〇、〇二 |
| 九〇五 | ●右爲一包頓服 | 〇、〇五 |
| 九〇六 | ●水 | 三〇〇、〇 |
| 九〇六 | ●右洗滌 | 三〇〇、〇 |
| 九〇六 | ●●硫化加留謨水(一一%) | 二〇〇、〇 |
| 九〇六 | ●右洗滌 | 二〇〇、〇 |
| 九〇六 | ●●碳酸那篤留謨水(二一五%) | 一〇〇、〇 |
| 九〇六 | ●右洗滌 | 一〇〇、〇 |
| 九〇六 | ●●硼砂 | 一〇、〇 |
| 九〇六 | ●●薔薇水 | 二〇〇、〇 |
| 九〇六 | ●●安息香丁幾 | 一〇、〇 |
| 九〇六 | ●●右洗滌 | 一〇、〇 |
| 九〇六 | ●●撒布劑 | 二、〇 |
| 九〇六 | ●●酸化亞鉛 | 〇、五 |
| 九〇六 | ●●樟腦 | 三〇、〇 |
| 九〇六 | ●●澱粉 | 三〇、〇 |
| 九〇六 | ●●右撒布 | 三〇、〇 |
| 九〇六 | ●●塗布劑 | 五、〇 |
| 九〇六 | ●●白降汞 | 三、〇 |
| 九〇六 | ●●樟腦 | 三、〇 |
| 九〇六 | ●●豚脂 | 三〇、〇 |
| 九〇六 | ●●右塗布 | 〇、〇五 |
| 九〇六 | ●●昇汞 | 〇、〇五 |

| | | |
|-----|-----------------|---------|
| 九〇七 | ●石炭酸 | 一、〇一二、〇 |
| 九〇七 | ●亞鉛華軟膏 | 五〇、〇 |
| 九〇七 | ●右塗布 | 五〇、〇 |
| 九〇七 | ●明礬、樟腦 | 各一、〇 |
| 九〇七 | ●刺納林 | 三〇、〇 |
| 九〇七 | ●右塗布 | 三〇、〇 |
| 九〇七 | ●石炭酸醋(一%) | 一〇〇、〇 |
| 九〇七 | ●右塗布 | 一〇〇、〇 |
| 九〇七 | ●ウヰルキンソン氏硫黃軟膏* | 三〇、〇 |
| 九〇七 | ●右塗布 | 三〇、〇 |
| 九〇七 | ●滑石末、澱粉 | 各一〇〇、〇 |
| 九〇七 | ●僱里設林 | 四〇〇、〇 |
| 九〇七 | ●鉛糖水 | 二〇〇、〇 |
| 九〇七 | ●右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九〇七 | ●石灰水、亞麻仁油 | 各五〇、〇 |
| 九〇七 | ●石炭酸 | 一、〇 |
| 九〇七 | ●右塗布 | 一、〇 |
| 九〇七 | ●●硫酸チオフェーン | 五、〇一 |
| 九〇七 | ●●刺納林、華攝林 | 各五〇、〇 |
| 九〇七 | ●●右塗布 | 各五〇、〇 |
| 九〇七 | ●●百露波爾撒謨刺納林(一%) | 一〇〇、〇 |

痒疹、癩疹

右塗布

二〇、〇

九〇四 苦利砂羅並刺納林(一〇%)

二〇、〇

右塗布

九〇五 撒普兒或撒里矢爾酸

三〇、〇

安息香脂

九〇六 麥兒刺納林(一〇%)

三〇、〇

九〇七 麥兒黑石鹼

各二〇、〇

酒精
右一日塗布二回

九〇八 嘔囉仿謨

一〇、〇

泊芙蘭丁幾

九〇九 嘔囉仿謨

一〇、〇

上皮癌

Carcinoma epitheliale.

九〇九 格魯兒化貌羅謨

一三、〇

格魯兒亞鉛
格魯兒安母紐謨

六、〇
五、〇

白蠟

五、〇

九〇八 嘔囉仿謨

一五、〇

九〇九 麥兒油

六〇、〇

九一〇 鹽酸古加乙涅刺納林(四%)

二〇、〇

九一一 鹽酸古加乙涅

〇、五

九一二 刺納林

二四、〇

九一三 鹽酸古加乙涅

〇、二

九一四 依比知阿兒

三〇、〇

九一五 刺納林

三〇、〇

九一五 依比知阿兒水(五〇%)

三〇、〇

九一六 那布篤兒(即ナフトール)

二、五

九一七 那布篤兒

一、五

九一八 硫黃華

三、〇

九一九 阿列布油

一〇、〇

九二〇 刺納林

五〇、〇

九二一 那布篤兒

一五、〇

九二二 加里石鹼

五〇、〇

九二三 豚脂

一〇〇、〇

九二四 白蠟

一〇、〇

九二五 緩和軟膏

二四、〇

九二六 亞砒酸

〇、二

甘汞 五、〇

亞拉昆亞護謨 一〇、〇

水 適宜

右為軟膏塗布

九〇九二 結麗阿曹篤 二〇、〇

亞砒酸 〇、三

阿片 〇、一五

右甘草末及甘草蒸適宜為糕

貼用

九〇九三 赤色沃度汞 〇、五

蠟軟膏 一四、〇

右塗布

九〇九四 格魯兒亞鉛 一〇、〇

亞爾答亞根末 一〇、〇—二〇、〇

餾水或酒精 適宜

右塗布

九〇九五 硫酸亞篤羅必涅 〇、〇五

餾水 適宜

華攝林 五、〇

右塗布

九〇九六 過滿俺酸加留謨 一〇、〇

餾水 二〇、〇

右綳帶用

凍傷 Congelationes Periones. 凍瘡、霜腫、寒瘡、雪瘡、

● 罌法劑

九〇九七 硝酸銀 一、〇

水 一五〇、〇

右罌法

九〇九八 ゴウラルド水 二〇〇、〇

右罌法

九〇九九 鉛糖水(一%) 五〇〇、〇

右罌法

九一〇〇 次醋酸鉛液 五、〇

水 二〇〇、〇

右罌法

九一〇一 醋酸礬土液 二〇〇、〇

水 一一三〇〇、〇

右罌法

九一〇二 明礬 五、〇

鉛糖 二五、〇

水 五〇〇、〇

右罌法

九一〇三 明礬 七、〇

鉛糖 二八、〇

水 八〇〇、〇

右罌法

九一〇四 過滿俺酸加留謨 各一〇、〇

白陶土、炭酸石灰 各一〇、〇

右撒布

九一〇五 格魯兒水 五〇、〇

水 一〇〇〇、〇

九一〇六 硝酸 一〇、〇

餾水 一〇〇、〇

右罌法

九一〇七 結列阿曹篤水(飽和) 一〇〇、〇

右綳帶用

九一〇八 桂皮水 五〇、〇

水 一五〇、〇

右罌法

九一〇九 粘着硬膏 二〇、〇

右壓迫綳帶用

九二〇 芥子浸 適宜

右洗滌

●塗布劑

九二二 硝酸銀 一、〇

阿列布油 〇、五—一、〇

刺納林 五、〇—一、〇、〇

右塗布

九二二 硝酸銀 〇、三

豚脂 二、〇、〇

右塗布

九二二 白降汞 二、〇

華攝林 三、〇、〇

右塗布

九二四 白降汞 四、〇

單軟膏 四、〇、〇

右塗布

九二五 白降汞軟膏、華攝林各三〇、〇

右塗布

九二六 石炭酸刺納林(五%) 二、〇、〇

右塗布

九二七 石炭酸 一、〇

沃度、單寧酸 各二、〇

蠟軟膏 三、〇、〇

九二八 石炭酸 右塗布

鉛軟膏

刺納林

扁桃油刺賢垓爾油

右塗布

九二九 次醋酸鉛液

樟腦精

右塗布

九三〇 樟腦 單軟膏

右塗布

九三二 樟腦 華攝林

右塗布

九三三 樟腦刺納林(一〇%)

右塗布

九三三 樟腦精

單寧酸

右塗布

九三四 樟腦 的列並底油

右塗布

九三五 樟腦精

阿片丁幾

石炭酸

酒精

一、〇、〇

二、〇、〇

二〇、〇

三十滴

二五、〇

二五、〇

二五、〇

三、〇

一〇〇、〇

五、〇

四五、〇

二〇、〇

一〇〇、〇

五、〇

一〇〇、〇

五、〇

四、〇

三、〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

右塗布

九二五 沃度仿謨

依的兒

右魯胃謨

二、〇〇
一五、〇〇
五〇、〇〇

右塗布

九二五 沃度仿謨華攝林(一〇%)

右塗布

二五、〇〇

九二五 枸橼汁

右一日數回塗布

適宜

火傷

Combustio.

火燒、湯傷、湯潑、

●塗布劑

九二四 硝酸銀水

右塗布

(一〇、〇)五〇、〇〇

刺納林

鯨蠟

一五、〇〇
四、〇〇

九二五 硝酸銀

右塗布

〇、五一、〇〇
二五、〇〇

九二六 撒里矢爾酸阿列布油(一%—二%)

右塗布

九二五 硼酸

華攝林

五〇、〇〇
九、〇〇
三、〇〇
三、〇〇
三〇、〇〇

九二五 硝酸銀

右塗布

一、〇〇
五〇、〇〇

九二六 撒里矢爾酸軟膏(十%)

右塗布

九二六 硼酸、白蠟

巴拉賓、甘扁桃油

各一〇、〇〇
各二〇、〇〇

九二五 鹽酸古加乙涅

水

〇、〇二
一〇、〇〇

九二六 撒里矢爾酸

亞鉛華軟膏

一、〇〇
四五、〇〇
五、〇〇

九二七 次硝酸砒鉛

硼酸

九、〇〇
四、〇〇

九二五 鹽酸古加乙涅

右塗布

一、〇〇
二〇、〇〇

九二六 石炭酸

刺納林

一〇〇、〇〇
五、〇〇

九二七 刺乃林

阿列布油

七〇、〇〇
二〇、〇〇

九二五 鹽酸古加乙涅

水

二、〇〇
一五、〇〇

九二六 石炭酸

右塗布古加乙涅水之後塗布

九二八 次硝酸砒鉛

二、〇〇

鉛糖 二〇、〇

右塗布

九八七 沃度仿謨 八、〇—一六、〇

白陶土、阿列布油 各三〇、〇

鉛醋水 二〇、〇

右塗布

九八六 依比知阿爾、餹水 各一〇、〇

右塗布

九八九 ザロール 五、〇

阿列布油 二五、〇

石灰水 二五、〇

九八九 偏里設林 二〇、〇

卵白 一六、〇

右塗布

九八九 古魯胃謨 一五、〇

蓖麻子油 一五、〇

右塗布

九八二 的列並底油、亞麻仁油

琥珀油、杜松實油 各三〇、〇

石油 各一五、〇

右塗布

九八三 ヘブラ氏軟膏 五〇、〇

右塗布

九八四 抱水格魯刺爾 一、〇—二、〇

水 五〇、〇

右器法及塗布

九八五 次醋酸鉛液 四、〇

水 二〇〇、〇

阿片丁幾 四、〇

右器法

●撒布劑

九八六 次硝酸蒼鉛、澱粉 各一〇、〇

右撒布

九八七 デルマトール 五、〇

滑石或澱粉 二〇、〇

九八九 チオホルム 三、〇

右撒布

九八九 デヨードチチフェーン 五、〇

デルマトール 一〇、〇

右撒布

九九〇 重碳酸那篤留謨 二〇、〇

右撒布

●充奮劑

九〇一 麝香 〇、五

白糖 五、〇

右分三包二十四時間分服

九〇二 桂皮丁幾 二〇、〇

右每回一茶匙

九〇三 安母尼亞茴香精 一、〇

右每回五滴乃至十滴

九〇四 安母尼亞水 一、〇

餹水 一〇、〇

右每回五滴乃至十滴

狼瘡 Lupus. 蠶食桑症、結節樣皮疹、侵蝕癬、漢醫誤以結毒鼻崩名之、

紅斑性狼瘡 Lupus erythematoses.

結節紅斑 Erythema nodosum.

●內服劑

九二五 麥角越幾斯 一、〇〇

水 一〇〇、〇〇

橙皮舍利別 二〇〇、〇〇

右每二時一小兒匙、小兒

九二六 沃度 〇〇、一〇

肝油 五〇〇、〇〇

右一日二回每回一二食匙

●腐蝕劑

九二七 熔製硝酸銀 一〇〇、〇〇

右腐蝕

九二八 硝酸銀、銹水 各一〇〇、〇〇

右腐蝕

九二九 昇汞筆(一〇%)

右腐蝕

九三〇 苛性加里 二〇〇、〇〇

右腐蝕

九三一 苛性加里 五〇、〇〇

銹水 一〇〇、〇〇

九三二 生石灰 二〇〇、〇〇

右腐蝕

九三三 煨製石灰 一二〇、〇〇

苛性加里 一〇〇、〇〇

右腐蝕

九三四 亞砒酸 一、〇〇

水 三、〇〇

華攝林 一五、〇〇

右腐蝕

九三五 亞砒酸 三、〇〇

甘汞 七、五〇

ケレナソート 〇、五〇

單軟膏 二五、〇〇

右腐蝕

九三六 格魯謨酸 五、〇〇

水 五、〇〇

九三七 格魯兒亞鉛 一〇〇、〇〇

水 二〇〇、〇〇

九三八 純鹽酸 五、〇〇

右腐蝕

●注射劑

九三九 桂皮酸、鹽酸古加乙混各一、〇〇

酒精 二〇〇、〇〇

右每回一二滴注射於結節

九三〇 チオシナミン酒精(一五—二一%) 一〇〇、〇〇

右一週二三回每回五分一筒

注射於背部

●搨法劑

九三一 鉛糖水 五、〇〇

石炭酸 三、〇〇

水 二〇〇、〇〇

右搨法

九三二 撒里矢爾酸 一〇〇、〇〇

結麗阿曹篤 二〇〇、〇〇

右繃帶

九三三 鹽酸ヒドロキシールアミン 一、〇〇

銹水 一〇〇〇、〇〇

石灰水 適宜

右搨法及繃帶用

●塗布劑

九三四 結晶硝酸銀、銹水 各五、〇〇

右塗布

九三五 苛性加里 五、〇〇

水 一〇〇、〇〇

右塗布

九三六 苛性加里、生石灰 各二〇、〇 適宜

酒精 右塗布

九三七 格魯兒亞鉛一〇、〇一二〇、〇

水 右塗布

九三六 格魯兒亞鉛 五、〇一五、〇

小麥粉 右塗布

九三元 格魯兒亞鉛 一〇、〇一〇、〇

小麥粉 右加水適宜爲泥狀塗布

九三〇 格魯兒亞鉛 三二、〇二四、〇

水 酸化亞鉛 右塗布

九三三 乳酸 右塗布

九三三 沃度加僧謨 沃度

九三三 沃度加僧謨 右塗布

九三三 沃度加僧謨 右塗布

九三三 沃度加僧謨 右塗布

九三三 沃度加僧謨 右塗布

九三三 沃度加僧謨 右塗布

九三三 沃度加僧謨 右塗布

九三三 沃度加僧謨 右塗布

九三三 沃度加僧謨 右塗布

九三三 沃度加僧謨 右塗布

九三三 沃度加僧謨 右塗布

九三三 沃度加僧謨 右塗布

九三三 沃度 沃度加僧謨

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 沃度加僧謨 右二日乃至三日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

九三三 亞鉛華軟膏 右一日塗布一回

樟腦石鹼 一〇〇、〇

右塗布

九四五 依的兒精 二一〇、〇

石炭酸 四、〇

昇汞 一、〇

右塗布創面

九四四 オノト格魯兒石炭酸 一〇、〇

備里設林 一〇〇、〇

疹癬

Scabies.

疹瘡、小疥、濕瘡、肥前瘡、

右塗布

九四〇 白膠、酸化亞鉛 各一五、〇

備里設林 二五、〇

鹽水 四五、〇

九四二 右調和爲亞鉛華膠

九四三 撒里矢爾酸 四〇、〇

グアヤコール 二〇、〇

右二迷篤兒攤爲硬膏以亞鉛華膠固定之

● 塗布劑

九五一 百露拔爾撒謨 三〇、〇

右塗布

九五二 百露拔爾撒謨 各二〇、〇

亞爾個保兒

九五三 百露拔爾撒謨、蘇合香 各一五、〇

右塗布

九五四 百露拔爾撒謨 一〇、〇

石鹼精 * 流動蘇合香 各二〇、〇

右塗布

九五五 蘇合香 三〇、〇

阿列布油 八、〇

九五六 右塗布 四五、〇

酒精 一〇、〇

九五七 亞麻仁油 四五、〇

右塗布 四〇、〇

九五八 蘇合香 三〇、〇

酒精 八、〇

阿列布油 四、〇

九四九 撒里矢爾酸 二〇、〇

結麗阿曹篤 四〇、〇

蠟軟膏 四〇、〇

右攤於二層之綑帶貼用

九五〇 備里設林 一八、〇

柯柯阿石鹼 一、五

撒里矢爾酸、結麗阿曹篤 各四〇、〇

右攤於二層之綑帶貼用

九五一 流動蘇合香 五〇、〇

酒精、亞麻仁油 各二五、〇

右塗布

九五二 流動蘇合香 五〇、〇

百露拔兒撒謨 五〇、〇

九五三 右塗布 各一〇、〇

九五四 硫黃華、牛脂 各一〇、〇

九五五 右塗布 五、〇

單軟膏 五〇、〇

九五六 右夜間塗布 各五〇、〇

九五七 昇華硫黃、黃蠟 各五〇、〇

| | | |
|-----|---------|--------|
| 九六三 | 豚脂 | 五〇、〇 |
| | 右塗布 | |
| 九六二 | 硫黃華 | 一〇〇、〇 |
| | 百露拔兒撒謨 | 一〇〇、〇 |
| | 單軟膏 | 一〇〇、〇 |
| | 右塗布 | |
| 九六四 | 硫黃華 | 二〇〇、〇 |
| | 炭酸加留謨 | 一〇〇、〇 |
| | 豚脂 | 八〇、〇 |
| | 右塗布 | |
| 九六五 | 硫黃華、石鹼 | 各一〇〇、〇 |
| | 右塗布 | |
| 九六六 | 硫黃華 | 二五〇、〇 |
| | 加里石鹼 | 七五〇、〇 |
| | ベルカモツト油 | 一〇〇、〇 |
| | 右塗布 | |
| 九六七 | 硫黃華 | 二〇〇、〇 |
| | 炭酸加留謨 | 一〇〇、〇 |
| | 留水 | 五〇〇、〇 |
| | 安息香脂或豚脂 | 六五〇、〇 |
| | 右塗布 | |
| 九六八 | 沈降硫黃 | 一〇〇〇、〇 |
| | 炭酸加留謨 | 四〇〇、〇 |

| | | |
|-----|-----------|--------|
| 九六九 | 刺賢理兒油、丁香油 | 各一〇〇、〇 |
| | 豚脂 | 五〇〇、〇 |
| | 右塗布 | |
| 九七〇 | 昇華硫黃 | 一五〇、〇 |
| | ルスクス油 | 一五〇、〇 |
| | 黃蠟 | 一〇〇、〇 |
| | 黑石鹼 * 豚脂 | 各三〇〇、〇 |
| | 右塗布 | |
| 九七一 | 流動蘇合香、乳硫黃 | 各二〇〇、〇 |
| | 白堊 | 四〇〇、〇 |
| | 黑石鹼 * | 四〇〇、〇 |
| | 華攝林 | 四〇〇、〇 |
| | 右一日塗布二回 | |
| 九七二 | 格魯兒安母紐謨 | 一〇〇、〇 |
| | 硫黃 | 六〇〇、〇 |
| | 加里石鹼 | 一六〇〇、〇 |
| | 右塗布 | |
| 九七三 | 昇華硫黃 | 五〇〇、〇 |
| | 加里石鹼 | 五〇〇、〇 |
| | 豚脂 | 一五〇〇、〇 |
| | 白藜蘆根末 | 一五〇〇、〇 |
| | 硝酸加留謨 | 一〇〇、〇 |
| | 右塗布 | |

| | | |
|-----|-------------|--------|
| 九七三 | 硫黃華 | 四〇〇、〇 |
| | 格魯兒安母紐謨 | 二、五 |
| | 明礬 | 二、五 |
| | 豚脂 | 八〇〇、〇 |
| | 右爲軟膏塗布 | |
| 九七四 | 藥用石鹼 | 四〇〇、〇 |
| | 右以水適宜溶解 | |
| | 硫黃 | 八五〇、〇 |
| | 豚脂 | 一六〇〇、〇 |
| | 右爲硫黃軟膏、塗布 | |
| 九七五 | 硫黃 | 二〇〇、〇 |
| | 生石灰 | 一〇〇、〇 |
| | 水 | 一〇〇、〇 |
| | 右煎煮濾過一日塗布二回 | |
| 九七六 | 消石灰 | 四〇〇、〇 |
| | 硫黃華 | 八〇〇、〇 |
| | 水 | 八〇〇、〇 |
| | 右煎煮塗布 | |
| 九七七 | 消石灰 | 二〇〇、〇 |
| | 硫黃華 | 四〇〇、〇 |
| | 水 | 二〇〇〇、〇 |
| | 右煎煮塗布 | |
| 九七八 | 加里石鹼、豚脂 | 各一五〇、〇 |

| | | | | | |
|-----|-----------|--------|-----|--------|-------|
| 九六九 | 刺賢培兒油、薄荷油 | 各一、五 | 九六九 | 苛性加里 | 二、〇 |
| 九六八 | 丁香油、桂皮油 | 各一、五 | 九六八 | 撒里矢爾酸 | 二、〇 |
| 九六七 | 篤拉侃篤護謨 | 五、〇 | 九六七 | 水 | 二〇〇、〇 |
| 九六六 | 炭酸加留謨 | 三五、〇 | 九六六 | 右塗布 | 三〇〇、〇 |
| 九六五 | 硫黃華 | 一〇〇、〇 | 九六五 | 豚脂 | 三〇〇、〇 |
| 九六四 | 儼里設林 | 二〇〇、〇 | 九六四 | 右塗布 | 一〇〇、〇 |
| 九六三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 九六三 | 白聖 | 一五〇、〇 |
| 九六二 | 昇汞 | 五、〇 | 九六二 | 綠石鹼 | 五〇〇、〇 |
| 九六一 | 昇汞 | 五、〇 | 九六一 | 綠石鹼、豚脂 | 一五〇、〇 |
| 九六〇 | 右塗布 | 四〇〇、〇 | 九六〇 | 右塗布 | 一〇〇、〇 |
| 九五九 | 石鹼油、阿列布油 | 各五、〇 | 九五九 | 亞麻仁油 | 一〇〇、〇 |
| 九五八 | 右塗布 | 二、〇 | 九五八 | 右塗布 | 一〇〇、〇 |
| 九五七 | 華攝林 | 二、〇 | 九五七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九五六 | 右塗布 | 二、〇 | 九五六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九五五 | 昇汞 | 〇、〇一 | 九五五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九五四 | 餾水 | 一、〇 | 九五四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九五三 | 刺納林 | 二〇〇、〇 | 九五三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九五二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 九五二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九五一 | 扁桃末、華攝林 | 各四〇、〇 | 九五一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九五〇 | 右塗布 | 各四〇、〇 | 九五〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九四九 | 硫黃華、杜松實末 | 各四〇、〇 | 九四九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九四八 | 右塗布 | 各四〇、〇 | 九四八 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九四七 | 華攝林 | 四〇〇、〇 | 九四七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九四六 | 石鹼精或酒精 | 四〇〇、〇 | 九四六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九四五 | 生石灰 | 一五、〇 | 九四五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九四四 | カヂヌーム油 | 二〇〇、〇 | 九四四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九四三 | 硫黃華 | 二〇〇、〇 | 九四三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九四二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 九四二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九四一 | 白蠟 | 五〇、〇 | 九四一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九四〇 | カヂヌーム油 | 七五、〇 | 九四〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九三九 | 硫黃華 | 七五、〇 | 九三九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九三八 | 右塗布 | 五〇、〇 | 九三八 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九三七 | 華攝林 | 各二〇〇、〇 | 九三七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九三六 | 華攝林 | 各二〇〇、〇 | 九三六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九三五 | 白堊 | 二〇〇、〇 | 九三五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九三四 | 綠石鹼、豚脂 | 各六〇、〇 | 九三四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九三三 | 右一日塗布四回 | 各六〇、〇 | 九三三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九三二 | 硫黃華、常用石鹼 | 各二〇〇、〇 | 九三二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九三一 | 華攝林 | 各二〇〇、〇 | 九三一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九三〇 | 白堊蘆根末 | 八、〇 | 九三〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九二九 | 硝酸加留謨 | 〇、八 | 九二九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九二八 | 右塗布 | 〇、八 | 九二八 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九二七 | 苛性加里滿汁 | 五、〇 | 九二七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九二六 | 餾水 | 四〇〇、〇 | 九二六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九二五 | 右塗布 | 四〇〇、〇 | 九二五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九二四 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 九二四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九二三 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 九二三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九二二 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 九二二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九二一 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 九二一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九二〇 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 九二〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九一九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 九一九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九一八 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 九一八 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九一七 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 九一七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九一六 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 九一六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九一五 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 九一五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九一四 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 九一四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九一三 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 九一三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九一二 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 九一二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九一一 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 九一一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九一〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 九一〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九〇九 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 九〇九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九〇八 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 九〇八 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九〇七 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 九〇七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九〇六 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 九〇六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九〇五 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 九〇五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九〇四 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 九〇四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九〇三 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 九〇三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九〇二 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 九〇二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九〇一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 九〇一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 九〇〇 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 九〇〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八九九 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八九九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八九八 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八九八 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八九七 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八九七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八九六 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八九六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八九五 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八九五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八九四 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八九四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八九三 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八九三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八九二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 八九二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八九一 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八九一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八九〇 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八九〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八八九 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八八九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八八八 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八八八 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八八七 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八八七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八八六 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八八六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八八五 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八八五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八八四 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八八四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八八三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 八八三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八八二 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八八二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八八一 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八八一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八八〇 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八八〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八七九 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八七九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八七八 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八七八 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八七七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 八七七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八七六 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八七六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八七五 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八七五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八七四 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八七四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八七三 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八七三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八七二 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八七二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八七一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 八七一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八七〇 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八七〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八六九 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八六九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八六八 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八六八 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八六七 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八六七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八六六 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八六六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八六五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 八六五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八六四 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八六四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八六三 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八六三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八六二 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八六二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八六一 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八六一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八六〇 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八六〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八五九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 八五九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八五八 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八五八 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八五七 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八五七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八五六 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八五六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八五五 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八五五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八五四 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八五四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八五三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 八五三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八五二 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八五二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八五一 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八五一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八五〇 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八五〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八四九 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八四九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八四八 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八四八 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八四七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 八四七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八四六 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八四六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八四五 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八四五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八四四 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八四四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八四三 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八四三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八四二 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八四二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八四一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 八四一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八四〇 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八四〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八三九 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八三九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八三八 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八三八 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八三七 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八三七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八三六 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八三六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八三五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 八三五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八三四 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八三四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八三三 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八三三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八三二 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八三二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八三一 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八三一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八三〇 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八三〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八二九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 八二九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八二八 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八二八 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八二七 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八二七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八二六 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八二六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八二五 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八二五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八二四 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八二四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八二三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 八二三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八二二 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八二二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八二一 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八二一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八二〇 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八二〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八一九 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八一九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八一八 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八一八 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八一七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 八一七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八一六 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八一六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八一五 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八一五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八一四 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八一四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八一三 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八一三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八一二 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八一二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八一一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 八一一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八一〇 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八一〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八〇九 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八〇九 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八〇八 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八〇八 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八〇七 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八〇七 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八〇六 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八〇六 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八〇五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 | 八〇五 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八〇四 | 豚脂 | 四〇〇、〇 | 八〇四 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八〇三 | 安息香脂 | 三〇〇、〇 | 八〇三 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八〇二 | 右塗布 | 三〇〇、〇 | 八〇二 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八〇一 | 撒里矢爾酸 | 五、〇 | 八〇一 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |
| 八〇〇 | 石鹼精 | 二〇〇、〇 | 八〇〇 | 右塗布 | 二〇〇、〇 |

疹癬

右塗布

九二六 ナフトール

黒石鹼*

九二七 華攝林

加里石鹼

ナフトール

白蠟

右塗布

九二八 炭酸加留謨

硝酸加留謨

酒精

一〇、〇

九〇、〇

一〇〇、〇

九〇、〇

一五、〇

適宜

一〇、〇

一〇、〇

一〇〇、〇

二〇〇、〇

水

右塗布

九二九 格魯兒石灰

水

右一日塗布二回

●溶劑

九三〇 サボナリヤ

膠

水

硫化加爾叟謨

格魯兒那篤留謨

右一回七五、〇溶用

二〇〇、〇

八〇、〇

八〇〇、〇

一八〇、〇

九〇、〇

三〇〇、〇

三六〇、〇

六〇〇、〇

九三一 貌羅謨加留謨

炭酸石灰

炭酸那篤留謨

磷酸那篤留謨

硫酸那篤留謨

硫酸礬土

硫酸鐵

迷迭香油、刺賢陸兒油

薄荷油

スタフイザグリー丁幾*

右溶用

一、〇

一、〇

三〇〇、〇

八、〇

五、〇

一、〇

三、〇

各一、〇

五〇、〇

白癬

Favus. 乾性頭癬、頭部鱗癬、鱗屑狀頭瘡、白禿風

●塗布劑

九三二 昇汞水(〇、五%)

右塗布

九三三 昇汞

古魯胃謨

右塗布

九三四 昇汞酒精(〇、一—〇、一%)

右塗布

九三五 昇汞

ブランドー酒

右塗布

九三六 白降汞

豚脂

右塗布

九三七 白降汞

次硝酸蒼鉛

刺納林

〇、二

一〇〇、〇

一、〇

一五、〇

五、〇

五、〇

八〇、〇

九三二 貌羅謨加留謨

炭酸石灰

炭酸那篤留謨

磷酸那篤留謨

硫酸那篤留謨

硫酸礬土

硫酸鐵

迷迭香油、刺賢陸兒油

薄荷油

スタフイザグリー丁幾*

右溶用

九三八 甘汞

沃度

蒸薇軟膏*

右朝夕塗布

九三九 加里石鹼

右塗布

九四〇 加里石鹼精

右塗布

一、五

〇、五

八〇、〇

五〇、〇

五〇、〇

五〇、〇

五〇、〇

九三一 加里石鹼 五〇、〇

ガジヌーム油 五〇、〇

酒精 一〇〇、〇

右塗布 一〇〇、〇

九三二 嚼囉仿謨、濃醋酸 各四、〇

餾水 八、〇

右塗布 各四、〇

九三三 列曹兒聖 五、〇

華設林 一〇〇、〇

右塗布 一〇〇、〇

九三四 石油 一〇〇、〇

百露拔爾撒謨 一〇〇、〇

右塗布 一〇〇、〇

九三五 知母兒 〇、五

嚼囉仿謨 五、〇

阿列布油 一、五

右塗布 一、五

九三六 杜松子油、加里石鹼各二〇、〇

酒精 四〇、〇

右一日塗布二回 四〇、〇

九三七 安息香丁幾 三、〇

硫黃 一、〇

豚脂 五、〇

刺納林 二五、〇

右塗布 二五、〇

九三八 刺納林 六〇、〇

餾水 三〇、〇

僱里設林 一〇、〇

蓋微油 一滴

右塗布 一滴

九三九 撒里矢爾酸 五、〇

僱里設林、酒精 各五〇、〇

右塗布 各五〇、〇

九四〇 苦利沙羅並 五、〇

撒里矢爾酸 二、五

古魯胃謨 三〇、〇

右塗布 三〇、〇

九四一 依比知阿爾 五、〇

撒里矢爾酸 三、〇

僱里設林、酒精 各五〇、〇

右塗布 各五〇、〇

九四二 焦性沒食子酸 五、〇

撒里矢爾酸 二、〇

依比知阿爾 五、〇

華攝林 八八、〇

右塗布 八八、〇

九四三 石炭酸 二、〇

僱里設林、酒精 各二〇、〇

水 一〇〇、〇

右塗布 一〇〇、〇

九四四 石炭酸 二、〇

僱里設林 二、〇

亞爾個保兒 各一〇、〇

水 八〇、〇

右塗布 八〇、〇

九四五 石炭酸 五、〇

僱里設林 五〇、〇

酒精 五〇、〇

右塗布 五〇、〇

九四六 石炭酸 五、〇

僱里設林、百露拔爾撒謨 五、〇

酒精 各一〇、〇

右塗布 二〇〇、〇

九四七 結麗阿曹篤 一、〇

豚脂 一五、〇

右塗布 一五、〇

九四八 流動蘇合香 一〇〇、〇

酒精 一〇〇、〇

右塗布 一〇〇、〇

右塗布
九三九 苦利沙羅並

刺納林
右塗布
二〇〇
〇、五
一〇〇、〇

九三〇 勃拉篤里涅
酒精
〇、八
八〇、〇

九三三 赤色沃度化汞
●洗滌劑
一〇、二

昇汞
酒精
一〇〇
四、〇
二五〇、〇

右洗滌

毛虱

Pediculus pubis.

陰毛虱、陰阜虱、匍匐虱、陰虱、三角蝨、八脚蟲、陰蝨、

頭虱

Pediculus capitis.

髮內生虱、

體虱

Pediculus vestimenti. 服虱、衣虱、被生虱、

●塗布劑

九三三 水銀軟膏
右塗布
一〇〇、〇

九三三 白降汞軟膏
右塗布
一五〇、〇

九三四 白降汞
右塗布
一〇一三〇、〇

九三五 華設林
右塗布
三〇〇、〇

九三六 石炭酸
阿列布油
一〇〇、〇
五〇〇、〇

九三七 百露拔爾撒謨
右塗布
一〇〇、〇

九三八 結麗阿曹篤
右塗布
五〇、〇

阿列布油五〇、〇—一〇〇、〇
右塗布

九三七 石油、白露拔爾撒謨各一五、〇
右外用

九三六 石油
阿列布油
二〇〇、〇

九三三 百露拔爾撒謨
右塗布
各一〇、〇

九三九 石油
阿列布油
二〇〇、〇
二〇、〇

九四〇 ナフトール軟膏(五%)
右外用
一〇〇、〇

九四二 ナフトール
右塗布
一〇〇、〇

九四三 酒精
阿列布油
一〇〇、〇

九四四 百露拔爾撒謨
右塗布
一〇〇、〇

九四五 酒精
右一日二回塗布
二〇〇、〇

九四六 百露拔爾撒謨
依的兒精
一五〇、〇—二〇〇、〇

九四七 百露拔爾撒謨
右塗布
二〇、〇

單軟膏或華攝林

二〇、〇

右塗布

酒精

一五〇、〇

九三五 刺賢堉兒油

三〇〇、〇

偏里設林

一〇、〇

ベルカモツト油

七、五

右一週間塗布二回

〇、五

九三五 琥珀丁幾

一、〇

烏頭丁幾

〇、五

酒精

一〇〇〇、〇

撒里矢爾酸

三、〇

右香水、塗布

〇、一

安息香丁幾

一〇、〇

九三六 勃拉馬里丁幾

〇、一

偏里設林

二〇、〇

或烏頭丁幾

〇、五

酒精

一五〇、〇

脫髮病

Alopecia.

禿頭、禿髮病、油風、茶瓶窓、藥罐頭、

鬼舐頭

Alopecia areata.

●塗布劑

九三五 撒里矢爾酸

二一〇

武蘭堉酒

二〇〇、〇

安息香丁幾

三、〇

右塗布

一、〇

牛脂

一〇〇、〇

羯答利斯丁幾

二五、〇

右塗布

二一〇

拔爾撒謨油合劑*

二五、〇

九三五 撒里矢爾酸

二一〇

右塗布

一〇、〇

安息香丁幾

三、〇

羯答利斯丁幾

〇、五

阿列布油

二〇〇、〇

芥子油

五五、〇

右塗布

二〇〇、〇

酒精

五五、〇

九三五 撒里矢爾酸

五、〇

刺賢堉兒油、扁桃油

各五、〇

安息香丁幾

二、〇

薔薇油、橙花油

各五、〇

九三六 刺納林

一五、〇

鯨蠟、苦扁桃油

各五、〇

ベルカモツト油

五滴

刺賢堉兒油

十五滴

右塗布

●洗滌劑

九三九 昇求水(〇、一%)

一〇〇、〇

右洗滌

右塗布

九三五 蕃椒丁幾、偏里設林各二五、〇

右塗布

九三五 烏頭丁幾

一、〇

武蘭堉酒

二〇〇、〇

百露拔爾撒謨

三、〇

右塗布

九三七 單寧酸規尼涅

二、〇

緩和軟膏

一〇〇、〇

薔薇油

五滴

右塗布

九三〇

規尼涅

一、〇

單寧酸

二、〇

緩和軟膏*

一〇〇、〇

レセグ油、橙花油

各三滴

右髮油、塗布

各三滴

九三五

石炭酸

二、〇

撒里矢爾酸

五、〇

華攝林

四〇、〇

右塗布

〇、五

九三六

昇汞

各七五、〇

備里設林、酒精

一五〇、〇

水

〇、一

九三一

昇汞

一、〇

赤色沃度汞

〇、一

酒精

六〇、〇

安息香丁幾

五、〇

水

五〇〇、〇

右每三日間塗布一回

九三二

白降汞

五、〇

緩和軟膏*

五〇、〇

安息香丁幾

一、〇

薔薇油

五滴

九三三

右髮油、塗布

一〇〇、〇

純酒精

〇、五

九三四

右塗布

一〇〇、〇

苦利沙羅並

三〇、〇

古魯保紐謨

五、〇

黃蠟

三五、〇

阿列布油

三〇、〇

右塗布

一、〇

百露拔爾撒謨

五、〇

華設林

五、〇

硫黃華

五、〇

右塗布

二〇〇、〇

百露拔兒撒謨

五、〇

酒精

二〇〇、〇

右一日塗布二回

百露拔兒撒謨

二、〇

機那越幾斯

五、〇

單軟膏

五〇、〇

右塗布

巴豆油

二、〇

白蠟、柯柯阿脂

各一、〇

九三九

桂皮油

十滴

依的兒

三〇、〇

右塗布

二、〇

肉荳蔻花油

一〇、〇

芫菁丁幾

二〇、〇

酒精

二〇、〇

右塗布

二、〇

肉荳蔻花油

二五、〇

阿列布油

二、〇

右塗布

八、〇

肉荳蔻花油

各三〇、〇

酒精、刺賢坪爾精

各三〇、〇

右塗布

一、〇

薩比那油

六〇、〇

酒精

二、〇

右塗布

二〇、〇

炭酸加留謨

二〇、〇

備里設林

八〇、〇

薔薇水

〇、五

右塗布

沃度

六、〇

酒精

一八、〇

彈力古魯胃謨

的列並底油

十五滴

右塗布

癩風

Pityriasis versicolor. 黃斑、紫癩風、黑癩風、

九三七 昇汞

●塗布劑

〇、一

水

一〇〇、〇

九三七 撒里矢爾酸

右塗布

三〇、〇

九三七 撒里矢爾酸

右塗布

一〇〇、〇

九三六 撒里矢爾酸

亞爾個保兒

右塗布

〇、五

九三九 撒里矢爾酸

安息香丁幾、酒精

各五〇、〇

九三八 焦性沒食子酸

右塗布

二、〇

第十篇 中毒症

吐劑 Emetica.

●注射劑

九三九 鹽酸亞刺莫爾比連

〇、〇一〇〇、〇二

華設林

右塗布

五〇、〇

九六一 ベタナフトール

酒精

五、〇

九六二 クリソフアン酸

右塗布

一〇〇、〇

單軟膏

右塗布

四、〇

九六三 苦利沙羅並

單軟膏

一、〇

九六四 苦利沙羅並

右塗布

二〇、〇

九六五 稀醋酸

稀醋酸

五、〇

水

右半筒至一筒注射皮下

二、〇

●內服劑

九三六 豚脂

右塗布

二〇、〇

九三五 加里石鹼

右塗布

六〇、〇

九三六 加里石鹼

豚脂

一〇〇、〇

九三七 洗滌劑

右塗布

一〇〇、〇

九三六 撒里矢爾酸

水

二〇、〇

九三六 石炭酸

右洗滌

二〇〇、〇

九三六 水

右洗滌

一五〇、〇

九三六 吐根末

吐酒石

一〇、一

九三六 右一回頓服

吐酒石

一〇、一

九三六 吐根末

吐酒石

一〇、一

九三六 右一回頓服

一〇、一

九三二 吐根末 二、〇

澱粉、亞拉比亞護謨 各〇、五

右分四包十分時一包

九三三 吐根末 一、〇

吐酒石 〇、〇三

白糖 一、五

右分四包每十分時一包

九三三 吐根末 〇、五

吐酒石 〇、〇一

海葱醋蜜 一、〇、〇

水 二、〇、〇

右每十分時一茶匙

九三三 吐根末 二、〇

吐酒石 〇、〇二

水 六、〇、〇

海葱醋蜜 二、〇、〇

右每十分時一食匙

九三五 吐根末 (一、〇)五〇、〇

海葱醋蜜 一、〇、〇

無機中毒

Vergiftungen der unorganischen Verbindungen.

九三六 吐根末 右每十分時一茶匙

吐酒石 (二、〇)二二〇、〇

海葱醋蜜 〇、一五

右每十分時一食匙

九三七 吐酒石 〇、一

吐根末 二、〇一四、〇

右分四包每十分時一包

九三六 吐酒石 一、〇

海葱醋蜜 一五、〇

右十分時一茶匙

九三九 吐酒石 〇、〇二一〇、三

單舍利別 三〇、〇

水 一二〇、〇

右每二時一茶匙

九四〇 硫酸銅 一、〇

水 六〇、〇

右每回一茶匙

九四一 硫酸銅 〇、五

水 八〇、〇

亞爾答舍利別 二〇、〇

右十分時半食匙

九四二 硫酸銅 三、〇

橙皮舍利別 七、〇

單舍利別 六〇、〇

右每十分時一食匙

九四三 硫酸銅 〇、四

白糖 二、〇

澱粉 二、〇

右分四包每十分時一包

九四四 硫酸亞鉛 一、〇

水 一〇〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右每十分時一食匙

九四五 流動了ボチヌム根越幾斯 一、〇一四、〇

右每十分時五十滴

九四六 石炭酸 〇、五

水 一〇〇、〇

右每十分時一食匙(貌魯謨及化合物)

九四七 硫酸那篤留謨 一五、〇

水 二〇〇、〇

右先與三分之一次則每十分

時一食匙(沃度及其化合物)

九四八 過酸化水素 * 二、〇〇、〇

水 一〇〇、〇

右每回一茶匙(硫化水素)

九四九 鹽酸必魯加兒比涅 〇、一五

水 一〇〇、〇

右一二筒注射皮下

同時行〇、六%食鹽水之注射(格魯兒酸加留謨)

九四〇 醋酸鉛 〇、二

重碳酸那篤留謨 一、二、〇

右分四包每十分時一包(格魯謨酸)

九四二 炭酸麻備涅叟謨 一〇、〇

水 三〇〇、〇

右十五分時內三回分服(格魯謨酸)

九四三 硫酸銅 一、〇

水 六〇、〇

右每十五分時一食匙(燐)

九四三 炭酸銅 * 〇、五

餽水 八〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每半時一食匙(燐)

九四四 的列並油 一〇、〇

亞拉昆亞謨漿 三〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每十五分時一食匙(燐)

九四五 的列並油 一〇、〇

右每時十五滴

九四六 煖性麻備涅叟謨 三〇、〇

格魯兒水 一、二〇、〇

右每十五分時一食匙(燐)

九四七 過滿俺酸加留謨水(〇、一%) 五〇〇、〇

右胃洗滌(燐)

九四八 砒石解毒劑 * 五〇〇、〇

右每十分時二食匙至四食匙(砒)

九四九 煖性麻備涅矢亞 一〇、〇

水 二〇〇、〇

右最初三分一、次每十分時

九四〇 酸化鐵舍利別 五〇、〇

右最初每十五分時半食匙

九四二 煖製麻備涅叟謨 五〇、〇

水 二五〇、〇

右時時一食匙(砒)

九四三 機那煎 (二〇、〇—三〇、〇) 一五〇、〇

右每回一茶匙(アンチモン)

九四三 單寧酸 三〇、〇

水 一四〇、〇

蜀葵根舍利別 六〇、〇

右每五分時一食匙(アンチモン)

九四四 酒石酸 五〇、〇

水 五〇〇、〇

右每五分時一食匙(亞爾加里)

九四五 醋 二五、〇

水 三〇〇、〇

單舍利別 三〇、〇

右每五分時一食匙(亞爾加里)

九四六 篤拉侃篤末 一〇、〇

水 五〇〇、〇

九四七 右飲料(亞爾加里) 二〇、〇
硫酸那篤留謨 一五〇、〇

水 右每五分時一食匙(重土化
合物)

九四六 沃度加留謨 二、〇
單舍利別 一五、〇

水 右每二時一食匙(水銀)

九四二 挖沕兒氏散 〇、五
右頓服(水銀)

九四〇 鐵粉 一五、〇
硫黃華 八、〇

水、單舍利別 各四〇、〇
右每時一茶匙(銅)

九四三 硫酸麻偏涅叟謨 三〇、〇
水 三〇〇、〇

右十分時內二回分服(鉛)

九四三 沃度加留謨 二〇、〇
水 一〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇
右一日數回分服(鉛)

九四三 阿片越幾斯 〇、三
白糖 三、〇

右分十二包一日三回每回一
包(鉛)

九四四 嚼囉仿謨 二、〇
亞拉昆亞護謨漿 五〇、〇

水 一〇〇、〇
單舍利別 二〇、〇

右每一二時一食匙(鉛)

九四五 硫酸亞篤羅必涅 〇、〇一
錫水 一〇、〇

右每回半筒注射皮下(鉛)

九四六 巴豆油 三滴
亞拉昆亞護謨漿 一〇、〇

水 四〇、〇
覆盆子舍利別 一五、〇

右每二時一食匙至有使通
(鉛)

九四七 麻子油 五〇、〇
巴豆油 二滴

右每一時一食匙至有快通
(鉛)

九四八 沃度加留謨 二、〇一三、〇
貌羅謨加留謨 八、〇

水 二〇〇、〇
苦味丁幾 四、〇

右每二時一食匙(鉛)

九四九 阿片 〇、三
白糖 五、〇

右分十包每一時一包、鎮痛
休藥(鉛)

九四〇 亞硝酸亞密爾 三滴
右浸綿絮吸入(鉛)

九四一 硝酸斯篤里幾尼涅 〇、〇五
錫水 一〇、〇

右一日一筒注射皮下(鉛)

酸類中毒 Vergiftungen der Säuren.

九四二 甘扁桃油

二〇、〇

亞拉昆亞護謨

一〇、〇

水

二五〇、〇

單舍利別

右每三十分時一食匙(硝酸)

九四四 炭酸石灰

右初三分一次每十分時一食匙(碳酸)

右初三分一次每十分時一食匙(碳酸)

九四三 醋

有機中毒

九四二 重碳酸加留謨

右每十分時一食匙(沃度仿謨)

九四一 醋

右灌腸(アルコール即酒精)

九四〇 温水

右灌腸(アルコール)

九三九 格魯兒那篤留謨

右灌腸(アルコール)

九三八 芥子泥

右塗布(アルコール)

九三七 安母尼亞水

右每半時間三滴至五滴(アルコール)

九三六 稀鹽酸

右初三分一次每十分時一食匙(碳酸)

九三五 橙皮舍利別

有機中毒

右每半時半食匙至一食匙(アルコール)

九三四 亞爾答舍利別

右每半時半食匙至一食匙(アルコール)

九三三 安母尼亞水

右一回頓服(アルコール)

九三二 阿片

右分十包每時一包(アルコール)

九三一 白糖

右半筒至一筒注射皮下(アルコール)

九三〇 白糖

右每二時一食匙(石炭酸)

九二九 硫酸那篤留謨

右每二時一食匙(石炭酸)

九二八 稀鹽酸

右每二時一食匙(石炭酸)

九二七 水

右每二時一食匙(石炭酸)

九二六 炭酸安母紐謨

右每二時一食匙(石炭酸)

九二五 水

右每二時一食匙(石炭酸)

右每二時一食匙(石炭酸)

Vergiftungen der organischen Verbindungen.

右一回頓服(アルコール)

右一回頓服(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每時一茶匙(アルコール)

右每食後八滴至十滴 (アル
コール)

九四〇 健質亞那根浸

(一〇、〇)二〇〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙 (アルコー
ル)

九四一 蕃木鼈丁幾

一〇〇、〇

苦味丁幾 二〇〇、〇

右每食後十五滴 (アルコー
ル)

九四二 規那煎 (八、〇)二〇〇、〇

單舍利別 一五、〇

右每二時一食匙 (アルコー
ル)

九四三 重碳酸那篤留謨

五、〇

苦味丁幾 三、〇

水 二〇〇、〇

亞爾加魯乙度中毒

九四四 安母尼亞水

一〇〇、〇

九四五 硫酸亞篤比涅

〇、〇二

右每二時一食匙 (アルコー
ル)

九四六 次硝酸蒼鉛

五、〇

重碳酸那篤留謨 二〇〇、〇

右一日三回每回一小刀尖
(アルコール)

九四七 安母尼亞水

二〇〇、〇

九四八 硝酸斯篤里幾尼涅

〇、〇二

餾水 一〇〇、〇

右每回一二筒注射皮下 (依
的兒)

九四九 蕃椒丁幾、安母尼亞茴香精

各四、〇

亞拉昆亞護謨漿 三〇、〇

溫水 一〇〇、〇

右灌腸 (抱水格魯刺兒) 〇、〇一

Vergiftung der Alkaloiden.

九五〇 餾水 一〇〇、〇

右注射皮下 (莫兒比涅)

九五一 過滿俺酸加留謨水 (一%)

九五二 餾水 一〇〇、〇

右每回四分一乃至一筒注射
皮下 (抱水格魯刺兒)

九五三 硝酸斯篤里幾尼涅

〇、一

白糖 四、〇

右分二十包一日三回每回一
包 (硫化炭素)

九五四 礬

〇、〇三

龍膽越幾斯 三、〇

右為三十九一日三回每回一
粒 (硫化炭素)

九五五 扁桃乳劑

一〇〇、〇

阿片越幾斯 二、〇

右每半時一食匙 (巴豆油)

九五六 阿片越幾斯 〇、二

亞拉昆亞護謨漿 二〇〇、〇

水 一五〇、〇

右分二回灌腸 (巴豆油)

九五七 右注射皮下及內服 (莫兒比
涅)

一〇〇、〇

九四七 クラーレ 〇、〇六

餾水 一〇、〇

右每回半筒至一筒注射皮下

(斯篤里幾尼涅)

九四七 單寧酸 五、〇

阿片越幾斯 〇、〇二

餾水 二〇〇、〇

右每五分時一食匙 (コルヒチン)

九四八 鹽酸必魯加兒必涅 〇、一

餾水 一〇、〇

右每十五分時一筒注射皮下

(亞篤羅必涅)

九四九 沃度 〇、〇二

沃度加留謨 二、〇

水 三〇〇、〇

右每五分時一酒盞 (亞篤羅必涅)

九四〇 抱水格魯刺爾 三、〇

水 七〇、〇

第十一篇 外科諸病

麻醉法 Anästhesirung.

單舍利別 一〇、〇

右一日數回分服 (亞篤羅必涅)

九四二 撒里矢爾酸比蘇斯知備密涅 〇、〇一

餾水 一〇、〇

右每半時一筒注射皮下 (亞篤羅必涅)

九四三 單寧酸 四、〇

水 二〇〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每十分時一食匙 (アコニチン)

九四三 沃度丁幾 一〇、〇

右每十分時一滴乃至十滴 (アコニチン)

九四四 依的兒 二、〇

餾水 一五〇、〇

阿片丁幾 十滴

加密列花舍利別 二〇、〇

右每半食匙 (腸詰、ガグツェリン)

九四五 麝香 〇、五

依的兒 一五、〇

右每時五滴至十滴 (ヂキタリン)

九四六 亞拉昆亞護謨漿 一五〇、〇

阿片丁幾 二、〇

右每時一食匙 (羯答利斯)

九四七 吐根末、阿片末 各〇、五

白糖 二、〇

右分五包每時一包 (麥角)

九四八 亞硝酸亞密爾 十五滴

依的兒 二〇、〇

右嗅用 (麥角)

九四九 ニトログリセリン精酒液 (一%) 十五滴

餾水 一八〇、〇

右一日三回分服 (麥角)

九四九 嘔囉仿謨 九九、〇

無水亞兒個保兒 一、〇

九四九 嘔囉仿謨 二〇〇、〇

酒精 六〇、〇

硫酸依的兒 六〇、〇

右嗅入 一〇〇、〇

九四九 嘔囉仿謨 三〇〇、〇

依的兒 二〇、〇

無水酒精 二〇、〇

右嗅入 〇、一

九四九 醋酸莫爾比涅 一〇、一

右麻藥嗅用前十分時一筒至

三筒注射皮下

九四九 抱水格魯刺兒 二、〇一四、〇

右頓服 三〇、〇

鹽酸古加乙涅 〇、一〇、二

右每回注射皮下器一二線注

九四九 鹽酸古加乙涅水(一%) 一〇、〇

右一筒至三筒注射皮下

綿篤爾 一、〇一、二、〇

阿列布油 一〇、〇

九四九 嘔囉仿謨 五〇、〇

依的兒 七五、〇

綿篤爾 五、〇

石油依的兒 二〇、〇

硫酸依的兒 八〇、〇

九四九 嘔囉仿謨 五〇、〇

右每回一筒注射皮下

依的兒 七五、〇

綿篤爾 五、〇

石油依的兒 二〇、〇

硫酸依的兒 八〇、〇

右噴布 二〇、〇

貌羅謀エチレン 一〇、〇

右距皮膚十至十五仙迷突噴

布 一、〇、〇

阿列布油 〇、〇、五

右注射局處

右一筒至三筒注射皮下

綿篤爾 一、〇一、二、〇

阿列布油 一〇、〇

右注射局處

皮下結締織炎、皮下蜂窩織炎、深達皮膚炎、牛程癩、

指頭嫩腫、

療疽 Panaritium.

疔、癰(見前)

器械

右卷法

三〇〇、〇

右卷法

四、〇

沃度丁幾

二〇、〇

右卷法

九四九 沃度丁幾 二〇、〇

九四九 格魯兒水 四〇、〇

九四九 次醋酸鉛液 四、〇

九四九 ゴーラルド水 三〇〇、〇

九四九 阿片丁幾 四、〇

九四九 沃度丁幾 二〇、〇

九四九 格魯兒水 四〇、〇

九四九 右每回數滴加於煮沸水頻頻 四〇、〇

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-------|---------|--------|---------|--------|-------------|------|----------|--------|
| 水 | 右器法 | 一六〇、〇 | 格魯兒安母紐謨 | 水 | 右器法 | 一〇〇〇、〇 | 右塗布 | 九五二 | 燬炭石灰 | 八、〇 |
| 九五〇 | 石炭酸水(三%) | 五〇〇、〇 | ●塗布劑 | 九五二 | 硼酸軟膏 | 五、〇 | 青性加留謨 | 九五六 | 藥用石鹼 | 一、〇 |
| 九五七 | 撒里矢爾酸 | 二、〇 | 右塗布 | 九五二 | 依比知阿爾、水 | 各二五、〇 | 酒精 | 右塗布 | 右塗布 | 一、〇 |
| | 知母爾 | 〇、一 | 九五三 | 樟腦那布答兒 | 右塗布 | 一〇、〇 | ●內服劑 | 九五七 | 有加里斯丁幾 | 五〇、〇 |
| | 酒精、備里設林 | 各五〇、〇 | 九五三 | 鹽酸古加乙涅 | 右塗布 | 〇、一 | 右一日三回每回一茶匙 | 九五八 | 石炭酸 | 〇、五 |
| | 薄荷油 | 〇、五 | 九五四 | 撒里矢爾酸 | 右塗布 | 二、〇 | 硫酸規尼涅、撒里矢爾酸 | | 右每時一食匙 | 各二、〇 |
| | 縮水 | 二〇〇、〇 | 九五五 | 複方鉛硬膏 | 右塗布 | 七、〇 | ルム酒 | | 右加卵黃灌腸二回 | 一、〇〇、〇 |
| 九五〇 | 知母爾、薄荷油 | 各〇、一 | 刺納林 | 硫化加爾叟謨 | 三〇、〇 | 三、〇 | 九五九 | 蓖麻子油 | 六〇、〇 | |
| | 樟腦精 | 一〇〇、〇 | | | | | | 的列並油 | 三〇、〇 | |
| 九五〇 | 抱水格魯刺兒 | 一〇、〇 | | | | | | | | |
| | 備里設林 | 八〇、〇 | | | | | | | | |
| 九五二 | 昇汞 | 〇、五 | | | | | | | | |

寒膿腫 Abscesse frigida. 流注、淋發膿腫、寒性腫瘍、寒腫、

骨結核 Ostitis tuberculose.

骨潰瘍 Caries. 骨疳、骨瘍、骨疽、附骨疽、

脊椎骨疽 Caries vertebralis.

九五〇 沃度仿謨 一〇、〇

偏里設林 九〇、〇

右滅菌注入膿腫內

九五二 沃度仿謨 一〇、〇

偏里設林 四五、〇

餾水 四五、〇

右注入 二、五、一三、〇

九五三 沃度仿謨 一〇〇、〇

阿列布油 一〇〇、〇

右注入 一〇、〇

九五三 沃度仿謨 各五〇、〇

酒精、偏里設林 各五〇、〇

右注入膿腫內 一〇、〇

九五四 沃度仿謨 一〇、〇

蓖麻子油 一五、〇

甘扁桃油 一五、〇

右注入膿腫內 一〇、〇

九五五 沃度仿謨 一〇、〇

潰瘍

Ulcus. Uleera. Geschwüre. 潰瘡

●洗滌劑

九五三 格魯兒石灰 五、〇

水 二〇〇、〇

偏里設林 八〇、〇

阿列布油 四〇、〇

右注入膿腫內

九五二 沃度仿謨 五、〇

偏里設林 四〇、〇

水 一〇、〇

鴛刺侃篤謨 〇、三

右注入膿腫內

九五七 沃度仿謨 五、〇

依的兒 五〇、〇

右注入 一〇、〇

九五八 沃度兒 一〇、〇

酒精 一六、〇

偏里設林 三四、〇

右注入膿腫內 一二、〇

九五九 沃度仿謨 一二、〇

偏里設林 一〇、〇

餾水 一〇、〇

鴛刺侃篤謨 一、〇

右作彈力性桿插入瘻管

九五〇 石炭酸水(三%) 一〇、〇

右注入

九五三 磷酸石灰 五、〇

稀磷酸 〇、六

水 一〇〇、〇

右一回注入十立方仙迷至二

十五立方仙迷

九五三 百露拔爾撒謨 一、〇

亞拉昆亞謨 一〇、一三、〇

甘扁桃油 一〇、一三、〇

格魯兒那篤留謨 〇、七

餾水 一〇〇、〇

右〇、五乃至一、〇注入組織間

九五五 撒里矢爾酸 五、〇

碳酸那篤留謨 一〇、〇

右洗滌

九五五 撒里矢爾酸 五、〇

碳酸那篤留謨 一〇、〇

九五五 撒里矢爾酸 五、〇

碳酸那篤留謨 一〇、〇

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------------|-------|-----|---------------|-------|
| 九五三 | 水 | 右洗滌 | 二〇〇、〇 | 九五二 | 右綳帶水 | 九五二 | 格魯兒亞鉛 | 二〇〇、〇 |
| 九五三 | 木醋 | 二、〇 | 九五二 | 格レオソート水(一%) | 二〇〇、〇 | 九五三 | 小麥粉 | 二〇〇、〇 |
| 九五四 | 右洗滌 | 二〇〇、〇 | 九五三 | ● 撒兒水(二%) | 五〇〇、〇 | 九五三 | 水 | 適宜 |
| 九五四 | ● 選法劑 | 五、〇 | 九五三 | ● 撒布劑 | 一〇、〇 | 九五三 | 右腐蝕 | 二〇、〇 |
| 九五五 | 醋酸礬土 | 五、〇 | 九五三 | ● 撒降末 | 一〇、〇 | 九五三 | 格魯兒亞鉛水(五—二〇%) | 二〇、〇 |
| 九五五 | 水 | 五〇〇、〇 | 九五三 | 右撒布 | 三〇、〇 | 九五三 | 右腐蝕 | 二〇、〇 |
| 九五五 | 右墨法 | 一、〇 | 九五三 | 次硝酸銻鉛 | 三〇、〇 | 九五三 | 吐酒石軟膏 | 二〇、〇 |
| 九五五 | 次醋酸鉛水 | 一、〇 | 九五三 | 右撒布 | 一〇、〇 | 九五三 | 右腐蝕 | 二〇、〇 |
| 九五五 | 水 | 二〇〇、〇 | 九五三 | 滑石 | 七〇、〇 | 九五三 | 沃度酸 | 二〇、〇 |
| 九五五 | 右墨法 | 二〇〇、〇 | 九五三 | ● 澱粉 | 一〇、〇 | 九五三 | 右腐蝕 | 適宜 |
| 九五五 | 明礬 | 一〇、〇 | 九五三 | ザロール | 〇、五 | 九五三 | 沃度酸水(十%) | 適宜 |
| 九五五 | 次醋酸鉛水 | 二〇、〇 | 九五三 | 右撒布 | 五〇、〇 | 九五三 | ● 塗布劑 | 一、〇 |
| 九五五 | 常水 | 二〇〇、〇 | 九五三 | 硫酸石灰 | 五〇、〇 | 九五三 | 硝酸銀 | 五、〇 |
| 九五五 | 右綳帶水 | 〇、五 | 九五三 | 木菱兒 | 一〇、〇 | 九五三 | 百露拔爾撒謨 | 一〇、〇 |
| 九五五 | 苛性加里 | 二〇〇、〇 | 九五三 | 右撒布 | 一〇、〇 | 九五三 | 豚脂 | 一〇、〇 |
| 九五五 | 右綳帶水 | 二〇〇、〇 | 九五三 | 木炭末 | 三〇、〇 | 九五三 | 右塗布 | 二、〇 |
| 九五五 | 碲酸銅 | 六、〇 | 九五三 | 機那皮末 | 三〇、〇 | 九五三 | 撒里矢爾酸 | 二、〇 |
| 九五五 | 碲酸亞鉛 | 六、〇 | | | | | | |
| 九五五 | 醋 | 八〇、〇 | | | | | | |
| 九五五 | 次醋酸鉛水 | 一二、〇 | | | | | | |

豚脂

刺納林

右塗布

九五六 撒里矢爾酸

酒精

刺納林

右塗布

九五九 撒里矢爾酸

刺納林

酸化亞鉛、小麥粉

九五六 撒里矢爾酸

硼酸

酸化亞鉛

華攝林

右塗布

九五一 硼酸

僂里設林

水

右塗布

九五二 硼酸

黃蠟

刺納林

四、〇
一六、〇

三、〇
六、〇

三〇、〇

二、〇
五〇、〇

各二四、〇

〇、五
五、〇

一〇、〇
五〇、〇

二、〇
三〇、〇

一、二〇、〇

二〇、〇
二〇、〇

三〇、〇

阿列布油

右塗布

九五三 硼酸軟膏、亞鉛華軟膏

右塗布

九五四 酸化亞鉛

阿列布油

九五五 硫酸亞鉛

右塗布

九五六 醋酸鉛

沒藥丁幾

九五七 華攝林

右塗布

九五八 赤降汞

刺納林

華攝林

右塗布

九五九 赤色沃度汞

蠟軟膏

右塗布

九五〇 沃度加留謨

沃度汞

僂里設林

五〇、〇

各二五、〇

一五、〇
二〇、〇

五、〇
一〇、〇

二、〇
八〇、〇

〇、二
一五、〇

五、〇

〇、五
二五、〇

五、〇
〇、五

五〇、〇

五〇、〇

右塗布

沃度仿謨

九五六 僂里設林軟膏

右塗布

九五七 刺納林

次醋酸鉛液

右塗布

九五八 オイロフエーン

阿列布油

刺乃林

九五九 デルマトール

右塗布

刺納林

華攝林

右塗布

九五〇 ロレチン 酸蒼鉛

安息香脂

右爲乾燥軟膏塗布

九五二 單鉛硬膏

刺納林

右塗布

九五三 單鉛硬膏、刺納林

阿列布油

三、〇

三〇、〇

四六、〇
四、〇

二、〇
一〇、〇

一〇、〇
八〇、〇

一〇、〇
八〇、〇

一〇、〇

二、〇
二、〇

五〇、〇
五〇、〇

五〇、〇

各二〇、〇

| | | | | |
|----------|------------|-----|------|------|
| 右塗布 | 百露坡兒撒謨 | 五、〇 | 水 | 五〇、〇 |
| 九五七 的列並油 | 赤檀油 | 二、五 | 僱里設林 | 三〇、〇 |
| 黃蠟 | 右塗布 | 一、〇 | 右塗布 | |
| 阿列布油 | 九五七 抱水格魯刺兒 | | | |

急性骨髓炎 Osteomyelitis acuta

急性骨膜炎 Periostitis acuta.

慢性骨膜炎 Osteomyelitis chronica.

慢性骨膜炎 Periostitis chronica.

漢醫所謂風濕、或中濕、或骨痛、或筋痠痛、或附髓病等症狀、似汎稱此等症、
慢性關節炎 Arthritis chronica.

漢醫所謂鶴膝手臂、鶴膝風、膝遊風、遠蹕風、穿蹕風、膝蓋風等屬之、

| | | | | |
|---------------------|---------|------|----------------|-------|
| ●內服劑 | 亞拉昆亞護謨 | 二、〇 | 九五二 沃度沃度加留謨軟膏* | 一〇〇、〇 |
| 九五七 撒里矢爾酸那篤留謨 二〇、〇 | 僱里設林 | 二、〇 | 右塗布 | 四〇、〇 |
| 右分二十包每二時一包 | 澱粉 | 二、〇 | 九五三 沃度 | 四〇、〇 |
| 九五七 撒里矢爾酸那篤留謨 一〇、〇 | 右為桿插入瘦管 | | 沃度加留謨 | 二、〇 |
| 留水 一〇〇、〇 | ●塗布劑 | | 僱里設林 | 一、〇 |
| 九五七 撒里矢爾酸那篤留謨 一〇〇、〇 | 九五二 沃度 | 二、〇 | 酒精 | 四〇、〇 |
| 留水 二五、〇 | 九五三 沃度 | 二、〇 | 右塗布 | 四〇、〇 |
| 九五七 撒里矢爾酸那篤留謨 二五、〇 | 九五二 沃度 | 四、〇 | 九五四 沃度 | 五、〇 |
| 九五七 撒里矢爾酸那篤留謨 二五、〇 | 九五三 沃度 | 三〇、〇 | | |
| 九五七 撒里矢爾酸那篤留謨 二五、〇 | 九五四 沃度 | 三〇、〇 | | |
| 九五七 撒里矢爾酸那篤留謨 二五、〇 | | | | |

骨髓炎、骨膜炎

五百八十七

別拉敦那越幾斯
鉛硬膏

一〇〇、〇
五、〇

右塗布關節部

九五五 沃度加留謨

餾水

四、〇
四、〇

偏里設林軟膏

右塗布

二二、〇

九五六 沃度加留謨

炭酸加留謨

餾水

四、〇
一、〇
五、〇

豚脂

三〇、〇

淋巴腫

Lymphoma.

漢家所謂紅絲瘡、恐包含此症、

九五二 亞砒酸加留謨液

林檢酸鐵丁幾

五、〇
五、〇

右每食時十滴至十五滴

九五三 亞砒酸

乳糖

〇、一
四、〇

亞拉昆亞護謨末

偏里設林、單舍利別

一、〇
各適宜

右爲百丸每食後一粒

●注射劑

九五七 右塗布

沃度

四、〇

沃度加留謨

水

一、〇
二、〇

安息香脂

右塗布

九三、〇

九五六 沃度丁幾、沒食子丁幾

右一日塗布二回至四回

各一〇、〇

九五九 沃度丁幾、阿片丁幾

沒食子丁幾

各五、〇

九五四 亞砒酸加留謨液

右一日注射一滴至三滴

五、〇

九五五 亞砒酸加留謨液

餾水

三、〇
一、〇

右注射三分之一至一筒

●塗布劑

九五六 沃度

沃度加留謨

四、〇
二、〇

偏里設林

一、〇

酒精

四〇、〇

石炭酸

右一日塗布二回

〇、五

九五〇 水銀刺乃林*

右塗布

一〇、〇

●溶劑

九五一 沃度

沃度加里

一〇、〇
二〇、〇

餾水

二〇〇、〇

右溶劑

九五七 沃度

沃度加留謨

四、〇
一、〇

餾水

二、〇

安息香脂

九三、〇

右塗布

九五六 沃度加留謨

炭酸加留謨

四、〇
一、〇

水

五、〇

豚脂

三〇、〇

右塗布
九五九 沃度加留謨

四、〇

粘著硬膏
單鉛硬膏
右塗布
九六一 沃度仿謨
古魯胃謨
右塗布

沃度仿謨
百露拔爾撒謨
古魯胃謨
右塗布

一、〇
三、〇
二、〇

水
備里設林軟膏
右塗布

四、〇
二五、〇

九六二 沃度仿謨
古魯胃謨
右塗布

九六三 沃度仿謨
百露拔爾撒謨
古魯胃謨
右塗布

一、〇
三、〇
二、〇

九六〇 沃度仿謨

五、〇—一〇、〇

水脉炎 Lymphangitis. 水脈管炎、淋巴管炎等、

甲狀腺腫 Struma. 甲狀腺囊腫、甲狀腺囊腫、頸腫、

鼠蹊腺炎 Lymphadenitis inguinalis. 疝建、勞發、漢名橫痃、

九六三 沃度
沃度加留謨

〇、五
一、〇
一〇、〇

九六九 沃度加留謨
備里設林
右塗布

一、〇
二〇、〇

水
右一日三回每回五滴

內服劑
沃度仿謨
依的兒
阿列布油
右注射

九六〇 沃度加留謨
炭酸加留謨

四、〇
一、〇

九六四 沃度加留謨

三、〇
二一〇、〇
二五、〇

九六七 過オスミエム酸
水
右每回五分之一至一筒注射

〇、二
二〇、〇

水
單舍利別
右朝夕一食匙

九六八 沃度仿謨
古魯胃謨
右塗布注射口

九六二 沃度
沃度加留謨

四、〇
一、〇

●注射劑
沃度丁幾

五、〇

九六一 沃度仿謨
古魯胃謨
右塗布注射口

一、〇
一五、〇

九六五 沃度丁幾
右每回半筒至一筒注射實質

九六六 沃度仿謨
依的兒
阿列布油
右注射

九六八 沃度仿謨
古魯胃謨
右塗布注射口

二、〇
一、〇

水脉炎

五百八十九

安息香脂

九三、〇

六三三 アリストール刺納林(五—十%)

六二五 格魯兒安母紐謨

五、〇

右塗布

二、〇

右一日三回塗布

二〇、〇

樟腦

一、〇

六三 沃度仿謨

四、〇

六二四 依比知阿爾

一〇、〇

豚脂或刺納林

三〇、〇

百露拔爾撒謨

一六、〇

刺納林

二〇、〇

右塗布

刺納林

一六、〇

刺納林

二〇、〇

右塗布

一六、〇

右塗布

二〇、〇

陰囊水腫

Hydrocele.

睪丸水腫、腎囊水疝、水瀝、

睪丸炎

Orchitis.

囊癰、陰筋、

六六 沃度丁幾

二〇、〇

右塗布

右塗布

三、〇

右塗布

〇、五

六二八 沃度軟膏(五%—十%)

六二〇 沃度仿謨

三、〇

六七 沃度

二、五

右塗布

華攝林

三〇、〇

沃度加留謨

二、〇

六二九 沃度仿謨

右塗布

豚脂

一五、〇

彈力古魯胃謨

一五、〇

脫疽

Gangraena.

壞死、壞疽、

轉移壞疽

三〇、〇

G. embolica.

病院脫疽、病院壞死、

病院壞疽

四〇〇、〇

病院壞疽

Gangraena nosocomialis.

病院脫疽、病院壞死、

痔瘡

四〇〇、〇

痔瘡

Decubitus.

眠瘡、褥瘡、壓迫壞疽、席瘡、

右飲料

〇、二

內服劑

五、〇

白糖

四〇〇、〇

六三三 樟腦

〇、二

枸橼酸

五、〇

白糖

四〇〇、〇

六三三 樟腦

〇、二

內服劑

五、〇

白糖

四〇〇、〇

六三三 樟腦

〇、二

內服劑

五、〇

白糖

四〇〇、〇

六三三 樟腦

〇、二

六六二 枸橼酸

五、〇

白糖

四〇〇、〇

六三三 樟腦

〇、二

亞拉昆亞護膜末 一、〇

右爲三九一日三四每回一粒

九六三 最良ルム酒 一〇〇、〇

右每時一食匙

●腐蝕劑

九六四 發烟硝酸 四〇、〇

右腐蝕

九六五 苛性加里水(二〇%) 二〇、〇

右腐蝕

九六六 ザロール 〇、五、五、〇

●撒布劑

澱粉 五〇、〇

右撒布

九六七 流動麥兒 五、〇

硫酸石灰 五〇、〇

右撒布

●洗滌劑

九六八 稀酒精 一〇〇、〇

右一食匙加醋洗滌發赤部

九六九 次醋酸鉛液 五〇、〇

右二三十滴和一碗之水洗滌

及綑帶用

九七〇 過滿俺酸加留誤 〇、四、一、〇

水 二〇〇、〇、一、四〇〇、〇

右洗滌

九七一 石炭酸 二、〇

水 二〇〇、〇

右洗滌

九七二 格魯兒石灰 一〇、〇、一、二〇、〇

水 五〇〇、〇

右濾過洗滌

●塗布劑

九七三 ザロール 五、〇

阿列布油 二五、〇

石灰水 二五、〇

右塗布

九七四 單寧酸 一、〇

次醋酸鉛 五、〇

單軟膏 二〇、〇

右塗布

九七五 酸化亞鉛 各三〇、〇

白陶土、亞麻仁油 二〇、〇

次醋酸鉛液 五、〇

右塗布 五、〇

九七六 石炭酸 五、〇

阿列布油 五、〇

右塗布 五、〇

九七七 石炭酸 五、〇

阿列布油 五、〇

白聖 適宜

右塗布

九七八 石鹼硬膏 五、〇

或石炭酸鉛硬膏

右塗布 三、〇

九七九 硫酸亞鉛 七、〇

醋酸鉛 一、〇

沒藥丁幾 五、〇

華攝林 右塗布

創傷 Vulnera Wunden.

截創 Vulnera secta. 金槍、截傷、刀傷、切創、

創傷

刺創 *Vulnera puncta.* 刺傷、竹木刺、突傷、

裂創 *Vulnera lacerata.* 裂傷、

挫創 *Vulnera contusa. Quetschung.*

銃創 *Vulnera sclopetaria.* 砲傷、鐵砲傷、

矢創 *Vulnera sagittalis.* 矢傷、箭傷、

打撲 *Distorsio.* 打傷、

關節閃挫 *Distorsio articuli.* 關節振轉、捫傷、關節捻挫、閃挫、

九六〇 ●撒布劑
沃度仿謨 一〇、〇
石炭酸 〇、五

薄荷油 一滴一二滴
右撒布

九六二 ●塗布劑
鹽酸古加乙溼 〇、二一一、〇
石炭酸 〇、二

餾水 一〇、〇
右塗布

九六三 硝酸銀 〇、一五一一〇、五
餾水 六〇、〇
右塗布

九六四 單軟膏 〇、二一〇、六
右塗布

九六三 硝酸銀 〇、二一〇、六
單軟膏 六、〇

九六四 硝酸銀 〇、二五一、〇
豚脂或刺納林 三〇、〇
右塗布

九六五 硝酸銀 〇、五
百露拔爾撒謨 二、〇
單軟膏 五、〇
右塗布

九六六 石炭酸 一、〇
刺納林 三〇、〇
右塗布

九六七 石炭酸 四〇、〇
阿列布油或偪里設林 四〇〇、〇
右塗布 五〇、〇

九六八 硼酸軟膏* 五〇、〇
右塗布

九六九 デルマトール 一〇〇、〇
刺納林、華攝林 各五〇、〇
右塗布

九七〇 石灰水 一〇〇、〇
偪里設林、薔薇水 二五、〇
トラガント末 五、〇
右外用

九七一 石灰水 一〇〇、〇
偪里設林、薔薇水 二五、〇
トラガント末 五、〇
右外用

九七二 石灰水 一〇〇、〇
偪里設林、薔薇水 二五、〇
トラガント末 五、〇
右外用

九六二 僱里設林

二〇、〇

卵白

一六、〇

右塗布

九六三 僱里設林

三〇、〇

水

硼酸那篤留謨

三〇、〇

右塗布

九六四 石炭酸水(一%—五%)

二〇、〇

●毒法劑

九六五 石炭酸

五〇〇、〇

右濕布繃帶

九六六 醋

一〇〇、〇

右繃帶用

咬傷

Vulnera morsa.

毒創

Vergiftete Wunden.

●腐蝕劑

九六三 苛性加留謨水*

一五、〇

右腐蝕

九六四 苛性加里

五〇、〇

水

右腐蝕創口

九六五 三格魯兒醋酸

五、〇

右濕布繃帶

九六五 醋酸鉛水(一%) 四〇〇、〇

右濕布繃帶兼毒法

九六六 次醋酸鉛液水(一一二、〇)

右冷毒法 一一〇、〇

九六七 ゴーラルド水 四〇〇、〇

右濕布繃帶兼毒法 四〇〇、〇

九六八 プロウ氏液 五〇〇、〇

右濕布繃帶 五〇〇、〇

九六九 格魯兒石灰 一〇〇、〇

餾水 一〇〇、〇

右繃帶用 四〇〇、〇

九六〇 格魯兒安母紐謨

一五、〇

餾水

三〇〇、〇

醋 一五〇、〇

右濕布繃帶

九六一 硝酸加留謨

一〇〇、〇

格魯兒安母紐謨 一〇〇、〇

醋 一〇〇、〇

水 四八〇、〇

右冷毒法 一五〇、〇

九六二 木醋 一五〇、〇

水 一五〇、〇

右繃帶用

九六三 右塗布 二〇、〇

九六四 撒里矢爾酸 一〇、〇

昇水水(〇、一%) 二〇、〇

右塗布 二〇、〇

九六七 嚼囉仿謨 一五、〇

右塗布

九六八 撒里矢爾酸那篤留謨水

右塗布

丸七一 格魯兒安質母紐謨液 一〇、〇

右塗布創面

●注射劑

丸七二 安母尼亞水 二、〇
 餾水 六、〇

右注射皮下

丸七三 石炭酸水(一〇%) 二〇〇、〇

右注射創口

丸七四 過滿俺酸加留謨水(一%) 一〇〇、〇

出血 Bluta.j.

丸八〇 的列並油 五〇、〇

右注射於深部出血

丸八一 過格魯兒鐵液 一、〇

格魯胃謨

丸八二 明礬 一五、〇

右外用

丸八三 單寧酸 一五、〇

阿仙藥

丸八三 單寧酸 五、〇

制腐藥 Antiseptica

右創之附近注射半筒

丸七五 鹽酸必魯加兒必涅水(一二二%) 一〇、〇

右半筒至一筒注射皮下

丸七六 硫酸亞篤魯必涅水(〇、一%) 一〇、〇

右四分之一至半筒注射皮下

丸七七 鹽酸莫爾比涅 〇、二

石炭酸水(二%) 二、〇

餾水 八、〇

偏里設林 二〇、〇

右外用

丸八四 沃度酸溶液(五%) 一〇、〇

右外用

丸八五 フェルリピリン液(一〇—二〇%) 一〇、〇

右外用

丸八六 アセブチン酸(一、〇%) 一〇〇、〇

丸八七 右半筒至一筒注射皮下

クラール 〇、〇一

餾水 一滴

鹽酸 一滴

丸八八 右濃過注射半筒 二〇、〇

安母尼亞水 五、〇

酒精 二、〇

精製琥珀油 右每回十滴至十五滴

丸八七 明礬 五、〇

右外用

丸八八 水 五〇、〇

右壓抵創面用

丸八九 沃度丁幾 五、〇

單寧酸

丸八九 水 一〇、〇

右洗滌及繃帶

丸九〇 水 一〇〇、〇

消毒藥 Desinficienta.

| | | | | | |
|---------------------|--------|----------------|--------|--------------|----------|
| 九六九 石炭酸水(五%) | 一〇〇〇、〇 | 九六五 昇汞 | 〇、五 | 九七三 昇汞 | 一〇〇〇、〇 |
| 右機械消毒用 | | 水 | 一〇〇〇、〇 | 右昇汞食鹽水 | 一〇〇〇、〇 |
| 九六〇 石炭酸水(三%—五%) | 一〇〇〇、〇 | 九六六 昇汞水(千倍) | 一〇〇〇、〇 | 九七二 昇汞 | 五、〇 |
| 右洗滌手指及剖面 | | 右手術、綳帶交換用 | | 格魯兒安母紙膜 | 一〇、〇 |
| 九六一 石炭酸偪里設林(五%) | 一〇〇〇、〇 | 九六七 昇汞水(五百倍) | 一〇〇〇、〇 | 右分十包每回半包至一包溶 | 解千瓦之水消毒用 |
| 右塗布於彈力結紮絲、安全針手指 | | 之貯藏 | | 九七三 昇汞 | 二、〇 |
| 九六二 石炭酸偪里設林(一五%) | 三〇〇〇、〇 | 九六八 昇汞酒精液(一%) | 一〇〇〇、〇 | 無水酒精 | 一〇〇〇、〇 |
| 右子宮消息子及カテーテル消毒用 | | 九六九 昇汞 | 一、〇 | 偪里設林 | 二〇〇〇、〇 |
| 九六三 石炭酸偪里設林(一〇—二〇%) | 五〇〇、〇 | 撒里矢爾酸 | 一、〇 | 右腸線貯藏用 | 〇、二 |
| 右消息子及腹腔手術用機械之消毒 | | 鹽酸、醋酸 各〇、五—一、〇 | | 九七四 昇汞 | 三〇〇〇、〇 |
| 九六四 石炭酸 | 五〇〇、〇 | 水 | 一〇〇〇、〇 | 單寧酸 | 六、〇 |
| 苛性那篤倫 | 一〇〇、〇 | 九七〇 昇汞 | 一、〇 | 乳糖 | 六〇〇、〇 |
| 餽水 | 一〇〇〇、〇 | 右酸性昇汞水、消毒用 | | 右ビツク氏制腐粉 | 〇、二 |
| 右消毒用 | | 九七一 昇汞 | 一、〇 | 九七五 過滿侖酸加留膜 | 〇、一—〇、五 |
| | | 水 | 五、〇 | 水 | 一〇〇〇、〇 |
| | | 九七二 昇汞 | 一、〇 | 右洗滌及綳帶用 | 一〇〇〇、〇 |
| | | 右ラブラーセ氏酸性昇汞水 | 一、〇 | 九七六 硼砂 | 五、〇 |
| | | 食鹽 | 一、〇 | 過酸化水素水 | 一〇〇〇、〇 |
| | | | | 右消毒用 | |

九〇七 格魯兒亞鉛 各一二、五

硫基石炭酸亞鉛 〇、三

撒里矢爾酸 〇、〇五

枸橼酸 一、〇

硼酸 〇、一

知母爾 〇、一

格魯兒那篤留謨 二、〇

水 一〇〇〇、〇

右ロツテル氏制腐洗滌液

九〇八 知母爾 一、〇

酒精 一〇〇、〇

儂里設林 二〇〇、〇

餾水 一〇〇〇、〇

右繩帶用

九〇九 沃度仿謨 三〇〇、〇

右撒布創傷

九一〇 沃度仿謨 一〇〇、〇

石炭酸 〇、五

薄荷油 一滴一二滴

右撒布

九一一 沃度仿謨 二、〇

硼酸末 一〇、〇

右撒布

九一三 沃度仿謨 一〇、〇

薩沙富拉斯油 二滴

右撒布

九一三 沃度仿謨末 一〇〇、〇

儂里設林 一〇〇、〇

右注入用

九一四 沃度仿謨末 一〇〇、〇

儂里設林 五〇〇、〇

餾水 五〇〇、〇

右注入用

九一五 沃度仿謨 一〇、〇

格魯胃謨 一〇、〇

右塗布用

九一六 沃度仿謨 一〇、〇

硫酸依的兒 一〇、〇

右綿紗用

九一七 沃度仿謨 二〇〇、〇

儂里設林、亞拉昆亞謨

澱粉 各八、〇

右爲坐藥五十個插入瘦管等

九一八 沃度仿謨、澱粉、儂里設林 各五、〇

亞拉昆亞謨

右爲坐藥三十個、插入瘦管

九一九 沃度仿謨 九、〇

等 柯柯阿脂 二〇、〇

苦扁桃油 適宜

右爲坐藥五十個、插入瘦管

等

九二〇 アリストール 三〇、〇

右撒布創傷

九二一 沃度蒼鉛 三〇、〇

右撒布創傷

九二三 ロレチン 二〇、〇

右撒布

或澱粉煨性麻儂遑叟謨或與

滑石配伍

九二五 ノゾフェン 一〇、〇

右撒布鼻軟下疳

九二六 チョイドフォル 一〇、〇

右撒布創傷

九二五 ズルフアミール 一〇、〇

右撒布創傷

九二六 チオ、フォルム 一〇、〇

右撒布火傷等

九二七 チオ、レゾルチン 一〇、〇

右撒布

九七六 右撒布創面
オイソフエン 一〇、〇

九七九 右撒布梅毒潰瘍
ザロール 〇、一―二、〇

九七三 澱粉 一〇、〇
右撒布創面

九七〇 クレオリン水(〇、五―二、〇%)
右洗滌 五〇〇、〇

九七一 ミクロチン水(三%―五%)
右洗滌 五〇〇、〇

九七二 右綑帶用
クレゾール石鹼液(一%―三%)
右器械消毒洗滌用 三〇〇、〇

消毒綿紗(花)

九七四 酒精 一〇〇〇、〇

コロホニエーム 二〇〇、〇

蓖麻子油 二〇、〇

石炭酸 五〇、〇

精製綿紗 五〇〇、〇

右石炭酸綿紗(十%)

九七三 ゴルオール 二〇、〇

水 一〇〇〇、〇
右洗滌用

九七四 アセプトール(三%)
右消毒及洗滌 一〇〇、〇

九七五 フォルムアルデヒート液
(三十五%) 一〇〇、〇
右海綿及器械消毒

九七六 チアフテリン(〇、五―一、〇%)
右外用 一〇〇、〇

九七七 格魯兒石灰水(二―四%)
右用於稀膿性梅毒性病院壞 五〇〇、〇

九七六 過酸化水素水(三%) 二〇、〇

九七九 ナフタリン 二〇、〇
右腐敗創面及室內撒散用

九七〇 ビオクタニン 二〇、〇
右撒布單味

九七四 デルマトール 二〇、〇
右撒布創面及潰瘍

九七三 オニロフエン 二〇、〇
右撒布

九七五 無水亞兒個保兒 一〇〇、〇
右器械及手術部皮膚消毒用

右壓搾乾燥(石炭酸綿紗)

九七四 昇水 一〇、〇

九七五 備里設林 五〇〇、〇

酒精 一〇〇、〇

水 一五〇〇、〇

精製綿紗 一〇〇〇、〇

右昇汞綿紗(一%)

昇汞 五、〇

酒石酸 二〇〇、〇

餾水 一〇〇〇、〇

綿紗(綿花) 適宜

右吸收乾燥 三、〇

昇汞 一〇〇、〇

食鹽 六〇〇、〇

餾水 一〇〇、〇

帶里設林 二〇〇、〇

酒精 適宜

繒帶品 適宜

右吸收乾燥 五〇、〇

撒里矢爾酸 二〇、〇

蓖麻子油 各一〇、〇

或蓖麻子油 各一〇、〇

コロホニユーム 二四三〇、〇

酒精 二四三〇、〇

精製綿紗 一〇〇〇、〇

右撒里矢爾酸綿紗(十%) 五〇、〇

沃度仿謨 二五〇、〇

依的兒 七五〇、〇

酒精 五〇〇、〇

精製綿紗 五〇〇、〇

右沃度仿謨綿紗(十%) 三五、〇

沃度仿謨 二二〇、〇

硫酸依的兒 一二〇、〇

酒精(九五%) 一〇〇、〇

精製綿紗 五〇、〇

右三十五%沃度仿謨綿紗 二〇、〇

沃度仿謨 五〇、〇

嚼囉仿謨 二〇、〇

帶里設林 五〇、〇

酒精 一〇〇〇、〇

精製綿紗 五〇〇、〇

右沃度仿謨綿紗(十%) 五〇〇、〇

九七五 帶里設林 一〇〇〇、〇

沃度仿謨 一五〇、〇

酒精 一〇〇〇、〇

精製綿紗 一〇〇〇、〇

右沃度仿謨綿紗(十五%) 二〇、〇

九七五 沃度仿謨 一〇〇、〇

帶里設林 四〇〇、〇

酒精 一〇〇、〇

精製綿紗 一〇〇、〇

右沃度仿謨綿紗(二十%) 二二〇、〇

九七五 沃度仿謨 一〇〇、〇

コロホニユーム 一〇〇、〇

亞兒個保兒(九五%) 一〇〇、〇

帶里設林 一〇〇、〇

綿紗 五〇、〇

右クライペンデル 六迷篤兒

綿紗 沃度仿謨

第十二篇 婦人科病

乳房痛 Mastodynia.

乳房炎 Mastitis.

乳房神經痛、コウベル氏胸痛、乳房腺神經痛、乳腺痛、乳痛、

乳腺炎、乳癰、妬乳、外吹、內吹、發乳、乳腫、

急性乳腺炎 Mastitis acuta.

乳頭炎 Inflammatio papillae mammae. 乳頭痛

乳輪炎 Inflammatio areolae mammae.

乳頭破裂 Fissura papillae mammae. 乳疖、乳癰、乳房表皮剝脫、乳房裂創等、

●內服劑

九七五 旃那浸 (一〇〇) 一五〇〇

單舍利別 三〇〇

右分二回頓服

●塗布劑

九七五 水銀軟膏 二〇〇

右塗布

九七六 依比知阿爾 一〇〇

右塗布

九七五 別拉敦那越幾斯 一〇〇

石鹼硬膏 一〇〇

右塗布

九七五 拉敦那丁幾 五〇

仁水 二〇〇

依的兒精 五〇

右塗布

九七一 單寧酸 六〇

偏里設林 五〇〇

薔薇水 五〇〇

右塗布

九七六 阿片丁幾 五〇

次醋酸鉛液 一五〇

薔薇水 一〇〇

右塗布

九七三 沃度仿謨 一〇

古魯胃謨 一五〇

右塗布

九七四 百露拔爾撒謨 二〇〇

阿片越幾斯 〇五

柯柯阿脂 三〇〇

右塗布

九七五 百露拔爾撒謨 一〇五

苦扁桃油 六〇

亞拉比亞護謨 三〇

薔薇水 五〇〇

九七六 百露拔爾撒謨 五〇

硼酸那篤儂謨 五〇

卵黃 一個

甘扁桃油 三〇〇

右塗布

九七七 複方安息香丁幾 十五滴

阿列布油 八〇

刺納林 二四〇

右塗布

九七六 蓖麻子油 一五〇

右塗布

九七九 偏里設林 二〇〇

卵黃 一六〇

右塗布

●洗滌劑

洗滌劑

九七〇 鞣酸

一〇〇・二〇〇

● 毒法劑

一〇〇・〇

右一食匙加水毒法

水

一〇〇・〇

九七二 安息香丁幾

一〇〇・〇

九七二 三角綳帶

一張

右洗滌

薔薇水

一〇〇・〇

右提舉乳房

乳房水泡疹(皮膚病參看)

Fezema mammae.

泌乳過多

Polygalactia. Galactorrhoea.

乳多、乳汁過溢、乳過多、乳流、腫流、

處置

飲食節制、下劑投與、乳部冷罨、乳房攜帶、脂肪塗布等、

九七三

旃那舍利

(一〇〇・〇) 一五〇・〇

右一日三回每回一食匙

依的兒精

八、〇

旃那舍利別

一五〇・〇

九七五 別拉敦那越幾斯

〇、一五

右朝夕塗布

九七四

沃度加留謨

二二〇

右朝夕塗布

二二〇・〇

九七七 囉囉仿謨

二二〇・〇

沃度加留謨

二二〇

右朝夕塗布

一〇〇・〇

菲沃斯油

四〇、〇

沃度加留謨

二二〇

右朝夕塗布

一〇〇・〇

右朝夕塗布

覆盆子舍利別

二二〇

苦扁桃油

二二〇・〇

蕁熱 Febris puerperalis. Puerperalfieber.

產蕁熱、產婦敗血熱、產婦熱、褥熱。

產褥腐敗熱 Puerperale Septicämie.

● 消毒洗滌劑

九七六

石炭酸

五〇、〇

九七〇 石炭酸水(三%) 三〇〇〇・〇

九七三 格魯兒水

一〇〇〇・〇

石炭酸

一〇〇〇・〇

右洗滌

一〇〇・〇

右消毒用

三一四〇〇〇・〇

九七九

石炭酸

一〇〇・〇

九七二 昇汞 一〇〇〇・〇

九七四 リゾール(即利曹兒)水(〇、三%) 一〇〇〇・〇

石炭酸

一〇〇・〇

九七二 昇汞水(〇、五%) 五〇〇・〇

右洗滌

一〇〇〇・〇

水

五〇〇・〇

九七二 昇汞水(〇、五%) 五〇〇・〇

右洗滌

五、〇

右洗滌用

右洗滌用

九七五 リゾール

五、〇

水 五〇〇、〇

右洗滌用

丸七六 クレオリン

水 一五〇、〇
右每回一食匙至四食匙加水

一里篤兒洗滌

丸七五 過清侖酸加留謨水(一%)

一〇〇〇、〇

右洗滌

丸七八 トリクレゾール

水 五〇、〇
加里石鹼 三五、〇

一〇〇〇、〇

右灌漑

丸七九 撒里矢爾酸

酒精 二、〇
水 五〇〇、〇

右消毒用

丸七〇 撒里矢爾酸

硼酸 四、〇
右分二包其一包加水一里篤

兒洗滌

丸七二 安息香酸

酒精 二、〇

水 五〇〇、〇

右消毒用

丸七三 水劑

水 四、〇
撒里矢爾酸那篤留謨

薄荷水 二〇〇、〇
右二回分服

丸七四 撒里矢爾酸那篤留謨

水 四、〇

覆盆子舍利別 二五、〇

右自午後八時至十時之間每

十五分至三十分時四回分服

丸七五 撒里矢爾酸那篤留謨

苦味丁幾 四、〇一六、〇

水 三、〇

右自午後八時迄十時數回分

服 一〇〇、〇

丸七六 硫酸規尼涅

撒里矢爾酸 二、〇

石炭酸 〇、五

ルーム酒 一二五、〇

右每時一食匙

丸七六 硫酸規尼涅 三、〇

稀鹽酸 八滴—十二滴

水 一五〇、〇

覆盆子舍利別 二五、〇

右一日三回分服

丸七七 安知必林 五、〇

橙皮舍利別 二五、〇

ブランデー酒 五〇、〇

右午後一回一食匙

丸七八 實菱答利斯浸 (二、〇)二〇〇、〇

硝酸加留謨 六、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

丸七九 機那煎 二〇〇、〇

纈草丁幾 二〇、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙至二食匙

丸八〇 燐酸 四、〇

水 二〇〇、〇

覆盆子舍利別 四〇、〇

右每時一食匙

丸八一 酒石酸 四、〇

水 單舍利別 二〇〇、〇
右每時一食匙 四〇、〇

丸〇三 枸橼酸 四、〇
水 二〇〇、〇

單舍利別 四〇、〇
右每時一食匙

丸〇三 的列並油、苦扁桃油 各五、〇
亞拉昆亞護謨漿

單舍利別 各二〇、〇
餹水 二〇〇、〇

右為乳劑每半時至二時一食匙

丸〇四 硫酸那篤留謨 二〇、〇
磷酸那篤留謨 二〇、〇

橙花水 * 一〇〇、〇
備里設林 五〇、〇

右每朝二三食匙

丸〇五 沃度加留謨 二、〇
水 一八〇、〇

苦味丁幾 三、〇
右每二時一食匙

● 散劑

丸〇六 撒里矢兒酸那篤留謨 五、〇
右分十包每二時一包

丸〇七 鹽酸規尼涅 〇、五—一、〇
右頓服

丸〇八 鹽酸規尼涅 二、〇
白糖 三、〇

右分四包每十分時一包

丸〇九 硫酸規尼涅 三、〇
右分五包每二時一包

丸一〇 硫酸規尼涅 二、〇
阿片 〇、二五—〇、二五

白糖 三、〇
右分十包每二時一包

丸一二 安知必林 二、〇—三、〇
右分十包每時一包

丸一三 樟腦 〇、五
白糖 二、〇

右分五包每二時一包

丸一三 單寧酸カンナビン 一、〇—二、〇
白糖 三、〇

亞拉昆亞護謨末 三、〇
右分十二包每二時至三時一

丸一四 甘表 〇、一
右頓服

丸一五 硫酸那篤留謨 一〇、〇
重碳酸那篤留謨 三、〇

右為一包

酒石酸 二、〇
右為一包(緩下沸騰散)

丸一六 樟腦 一、〇
● 注射劑

硫酸依的兒 一〇、〇
右每回一筒注射皮下

丸一七 撒里矢爾酸 一、〇
澱粉 一〇、〇

右撒布會陰破裂

丸一八 樟腦精 * 一〇〇、〇
右外用

● 浣腸劑

丸一九 蓖麻子油 三〇〇、〇
水 五〇〇、〇

右浣腸 三〇〇、〇
丸二〇 蓖麻子油 一〇〇、〇
的列並油

右加卵黃一個水適宜灌腸 一、二、三、安知必林 三、〇、一、五、〇、一 右溶於一碗之水分二回灌腸

稀膿性子宮內膜炎 Endometritis Purulenta.

丸三 石炭酸 四、〇 右洗滌 右洗滌 一六〇、〇
 水 三〇〇、〇 丸四 撒里矢爾酸 五、〇 右一茶匙和水五〇〇、〇洗
 右洗滌 四〇〇、〇 滌

丸三 格魯兒石灰 五、〇 右洗滌 四〇〇、〇

丸三 過滿倫酸加留謨 〇、八、一、一、二 右洗滌

子宮外膜炎 Perimetritis.

丸元 維納緩下水 八〇、〇 薄荷水 四〇、〇
 滿那舍利別 二〇、〇 單舍利別 二〇、〇
 右一時間內二回分服 右朝夕三十滴

丸二 甘汞 〇、五、一、〇 白糖 四、〇 丸三 答滿林皮煎 二〇、〇、〇、〇、〇
 右分六包每二時一包 右每二時一食匙

丸七 甘汞 一、五 藥刺巴根末 四、〇 丸三 沃度加留謨 〇、五、一、一、〇
 白糖 四、〇 滿那舍利別 二五、〇 華攝林或偏里設林 四〇、〇
 右分十包每二時一包 右每二時一食匙 右塗布 二〇、〇

丸六 巴豆油 二滴 丸三 水銀軟膏 二〇、〇
 白糖 四、〇 沃度加留謨 八、〇
 右分六包每二時一包 水 四〇、〇

子癩 Eclampsia Gravidarum. 妊婦搐搦、妊婦痙攣、妊婦急癩、妊婦癩痲狀搐搦、急癩、子冒、

稀膿性子宮內膜炎 子宮外膜炎

●水劑

丸三 醋酸加留謨

杜松子精

依的兒精

茴香水

右每回一食匙

丸三 醋酸加留謨

洋芹水

單舍利別

右每一時至二時一食匙至二食匙

丸三 實麥答利斯浸

重酒石酸加留謨

或醋酸加留謨

覆盆子舍利別

右每二時一食匙

丸七 オノニヂス根煎

實麥答利斯丁幾

橙皮舍利別

右每二時一食匙

丸元 枸橼酸麻佃涅叟謨

二〇、〇

二〇、〇

五、〇

二二〇、〇

二五、〇

一六〇、〇

二二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

四、〇

四、〇

三〇、〇

二〇、〇

一〇、〇

二五、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

丸元 セニエツト氏鹽

水

覆盆子舍利別

右分二回服用

丸四 抱水格魯拉兒

水

亞拉昆亞護謨漿

右一回至二回分服

丸四 依的兒性鹽化鐵丁幾

林檎鐵丁幾

桂皮水

右一日三回每回一茶匙

丸四 亞爾答亞根煎

吐酒石

單舍利別

右每半時一食匙

丸四 貌羅謨加留謨

二〇、〇—三〇、〇

四〇、〇

四〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二五、〇

一〇〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二、五

一五、〇

一五、〇

一〇、〇

一〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二五、〇

二五、〇

五、〇

貌羅謨那篤留謨

貌羅謨安母紐謨

水

右一日三回至五回每回一食匙

●滴劑

丸四 格魯兒鐵丁幾

纈草丁幾

右一日三回每回十五滴至二十滴

丸四 右爾矢伽謨丁幾

實麥答利斯丁幾

甘硝石精

右每三時二十滴至三十滴

●散劑

丸四 藥刺巴脂

甘汞

〇、五一、〇

白糖

右分十包每二時一包

丸四 實麥答利斯藥末

重酒石酸加留謨

枸橼油糖

右分十包每三時至四時一包

五、〇

二、〇

二〇〇、〇

一五、〇

五、〇

一五、〇

六、〇

一〇、〇

五、〇

一〇、〇

五、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

丸六阿片

〇、二一〇、三

白糖

二、〇

亞拉昆亞護謨末

二、〇

右分十包每半時一包

●丸劑

丸六四

藥刺巴脂
蘆薈越幾斯

二、〇

藥用石鹼

二、〇

右爲三十九朝夕二粒至四粒

●洗腸劑

丸五〇

抱水格魯刺爾
亞爾答亞根煎

四、〇一六、〇

(二五、〇)一〇〇、〇

右一回二三食匙洗腸

丸五一

抱水格魯刺爾
亞拉昆亞護謨末

三、〇一五、〇

右洗腸

丸五二

●注射劑

鹽酸必魯加兒必道

〇、〇二

水

一〇、〇

丸五

抱水格魯刺爾

右每回半筒至一筒注射皮下

水

五、〇

右每回一筒至四筒注射皮下

●嗅入劑

丸五

亞硝酸亞密兒

五、〇

亞硝酸亞密兒

右每回二筒至四筒嗅用一回

丸五

亞硝酸亞密兒

六、〇

右嗅用

五、〇

妊婦嘔吐

Hyperemesis gravidarum. Emesis gravidarum. Vomitus gravidarum.

惡阻、

丸五

●散劑

萘酸攝留謨

白糖

二、〇

右分十包一日三回每回一包

丸七

萘酸攝留謨

〇、三

乳糖

一、五

右分三包一日三回每回一包

丸六

鹽酸莫爾比道

〇、一

重碳酸那篤留謨

二、〇

右分十包一日三回每回一包

丸五九

鹽酸古加乙道

〇、〇六

鹽酸莫爾比道

〇、〇三

乳糖

一、五

右分三包一日三回每回一包

丸六〇

メントール

〇、八

白糖

二、〇

右分三包一日三回每回一包

丸六一

オレキシン

一、八

●水劑

右分六包一日三回每回一包

丸六三

鹽酸古加乙道

〇、〇六一〇、一

貌羅謨加留謨

五、〇

龍膽了幾

二、〇

水

一〇〇、〇

單舍利別

一〇〇、〇

右一日三回分服

丸六三

鹽酸古加乙道

〇、二

酒精

適宜

水

適宜

單舍利別

一〇〇、〇

二〇、〇

丸六 鹽酸莫爾比涅 右每二時一食匙 ○、〇五

白糖 二、〇

杏仁水 一五、〇

右一日四回至五回每回十五滴至二十滴

丸五 嚼囉仿謨 五滴

餽水 五〇、〇

右每嘔吐後十滴至二十滴

丸四 鹽酸莫爾比涅 一滴一、二滴

水醋酸 五、〇

嚼囉仿謨 一五、〇

純中兒個保爾 右一回五滴

丸三 硝酸銀 〇、三

莢碧越幾斯 〇、三

水 三〇、〇

右一日三回每回十五滴至二十滴

丸二 沃度加留謨 四、〇

龍膽丁幾 三五、〇

右每三時十五滴至二十滴

丸一 沃度丁幾 五、〇

右一日三回每回二滴

丸七 單舍利別 一八〇、〇

水 二〇、〇

右每二時一食匙

子宮強直

●嗅用劑

丸七 嚼囉仿謨 三〇、〇

丸六 沃度加留謨 四、〇

龍膽丁幾 三五、〇

右每三時十五滴至二十滴

丸五 沃度丁幾 五、〇

右一日三回每回二滴

丸七 レゾルチン 二、〇

水 一八〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一食匙

丸七 マントール 一、〇

酒精 二〇、〇

水 一五〇、〇

右每時一食匙

丸三 結麗阿曹薦 二十滴

醋酸 四十滴

硫酸莫兒比涅 〇、〇六

水 六〇、〇

右一日三回每回一茶匙

丸三 半夏浸 (一四、〇) 一八〇、〇

生薑丁幾 一〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右一日六回二日分服

丸七 硝酸銀 〇、五

右甘草羔及甘草末適宜爲三十九一日二回至三回每回二粒

丸五 ●注射劑 〇、一

硫酸亞錫羅必涅 〇、〇一

右每回半筒至一筒注射皮下

丸五 杏仁水 一〇、〇

鹽酸莫爾比涅 〇、〇五

右每回十滴乃至二十滴(嚼囉兼疼痛)

丸七 重碳酸那篤留謨 二〇、〇

右每回一小刀尖(嚼囉兼酸敗)

丸八 嚼囉仿謨 二四、〇

右嗅用

丸八 硫酸依的兒 三〇、〇

右嗅用

丸七 硫酸依的兒 三〇、〇

右嗅用

依的兒
純酒精 八、〇
右嗅用 八、〇

●散劑
鹽酸莫爾比涅 〇、一
白糖 二、〇

重碳酸那篤留謨 二、〇
右分十包一回二包至三包

尿閉 Jschurie. 產後尿閉、轉脬、

九六六 麥角越幾斯 一〇、〇

後陣痛 Wehen in der Nachgeburtsperiode. 兒枕痛、產褥陣痛、瘀血腹痛、

九六七 托勿兒氏散 一、〇
白糖 二、〇
右分五包每時一二包

惡露 Lochia. 產後排泄、血液狀排泄物、產後掃除、

九六八 阿片 〇、一
乳糖 五、〇
右分五包臨時一包

九六九 阿片安息香丁幾 一〇、〇
右臨時二十滴至四十滴

九六〇 石炭酸 三、〇
佩里設林 二〇、〇
水 二〇〇、〇
右洗滌 五、〇

●水劑
九六二 抱水格魯刺爾 二、〇
水 一、〇
糖皮舍利別 一、二〇、〇
右二回分服 三、〇、〇

九六三 抱水格魯刺爾 一、〇
亞拉昆亞護謨漿 一、〇
右澆腸 三、〇、〇

九六四 鹽酸莫爾比涅 〇、四
水 一、〇、〇
右每回半筒至一筒注射皮下 〇、三

九六五 鹽酸莫爾比涅 〇、三
佩里設林 二、〇
水 一、〇、〇
右每回半筒至一筒注射皮下

九六六 阿片 〇、一
乳糖 五、〇
右分五包臨時一包

九六七 阿片安息香丁幾 一〇、〇
右臨時二十滴至四十滴

九六八 阿片 〇、一
乳糖 五、〇
右分五包臨時一包

九六九 阿片安息香丁幾 一〇、〇
右臨時二十滴至四十滴

九七〇 石炭酸 三、〇
佩里設林 二〇、〇
水 二〇〇、〇
右洗滌 五、〇

九七一 麥角越幾斯 五、〇
硫酸規尼涅 一、二

九七二 麥角越幾斯 五、〇
硫酸規尼涅 一、二

九六四 鹽酸莫爾比涅 〇、四
水 一、〇、〇
右每回半筒至一筒注射皮下 〇、三

九六五 鹽酸莫爾比涅 〇、三
佩里設林 二、〇
水 一、〇、〇
右每回半筒至一筒注射皮下

九六六 阿片 〇、一
乳糖 五、〇
右分五包臨時一包

九六七 阿片安息香丁幾 一〇、〇
右臨時二十滴至四十滴

九六八 阿片 〇、一
乳糖 五、〇
右分五包臨時一包

九六九 阿片安息香丁幾 一〇、〇
右臨時二十滴至四十滴

九七〇 石炭酸 三、〇
佩里設林 二〇、〇
水 二〇〇、〇
右洗滌 五、〇

九七一 麥角越幾斯 五、〇
硫酸規尼涅 一、二

九七二 麥角越幾斯 五、〇
硫酸規尼涅 一、二

九七三 石炭酸 三、〇
佩里設林 二〇、〇
水 二〇〇、〇
右洗滌 五、〇

九七四 麥角越幾斯 五、〇
硫酸規尼涅 一、二

尿閉 後陣痛 惡露

六百七

產後出血 Blutung nach der Geburt

●水劑

丸九三 麥角浸 (八、〇)二〇〇、〇

硫酸合劑 * 一、五—二、〇

覆盆子舍利別 二〇、〇

右每五分鐘至十分時一食匙

丸九四 麥角浸 (五、〇)一五〇、〇

亞拉昆亞護謨 五、〇

印度大麻越幾斯 〇、一

單舍利別 二五、〇

右每半時一食匙

丸九五 麥角越幾斯 五、〇

亞拉昆亞護謨漿 一五、〇

覆盆子舍利別 一五、〇

水 一六〇、〇

右每一時至二時一食匙

丸九六 默粟薩水或薄荷水 一〇〇、〇

依的兒精 二〇、一四、〇

右每時一茶匙

麥角劑 Ergotinpräparat.

丸九七 碳酸安母紐謨

水 一四〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每半時至一時一食匙

丸九八 阿片泊美蘭丁幾

硫酸合劑 * 二、〇

桂皮丁幾 六、〇

右每時二十滴 一、二、〇

丸九九 阿片泊美蘭丁幾

麥角丁幾 五、〇

桂皮丁幾 一〇、〇

右每時十滴至二十滴 五、〇

丸一〇〇 桂皮丁幾 五〇、〇

右每半時一茶匙

丸一〇一 依的兒性鐵丁幾 一〇、〇

醋酸依的兒 五、〇

右每半時二十滴 一〇、〇

丸一〇二 硫酸依的兒 一〇、〇

●散劑 右每十五分五滴至十滴

丸一〇三 吐根末 〇、四—〇、六

桂皮末 五、〇

右分十二包每一時至二時一

包

丸一〇四 桂皮油糖或桂皮末 六、〇

右分十二包每五分至十五分

時一包

●注射劑

丸一〇五 格魯兒那篤儲謨 二、〇

水 三〇〇、〇

右注射皮下

丸一〇六 明礬 二、〇

單寧酸 〇、五

硫酸亞鉛 〇、五

水 五〇〇、〇—一〇〇〇、〇

右注入子宮內

丸一〇七 麥角浸 (五、〇)一五〇、〇

單舍利別 二五、〇

右每十五分至三十分時一食

匙

九一九 麥角越幾斯

一五〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右十五分至三十分二食匙

九九〇 麥角越幾斯

三〇、〇

覆盆子水 * * 五〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每十五分至三十分時一茶匙

九九一 麥角越幾斯

三〇、〇

桂皮水 七〇、〇

單舍利別 二五、〇

九九二 麥角越幾斯

四〇、〇

亞拉昆亞護膜凝 一五、〇

單舍利別 一五、〇

杏仁水 一〇、〇

健胃強壯劑

Stomachica n. Tonica

九九三 重碳酸那篤留膜

一〇、〇

加糖炭酸鐵 二〇、〇

橙皮油糖 四〇、〇

水

一四〇、〇

右每十五分至三十分時二食匙

九九三 麥角越幾斯

三〇、〇

桂皮丁幾 三〇、〇

右每十五分至三十分時二十滴至三十滴

九九三 麥角越幾斯

三〇、〇

桂皮油 二滴

單舍利別 一〇、〇

右每十分至三十分時三十滴至四十滴

九九四 麥角越幾斯

一〇、〇

右甘草越幾斯及甘草末適宜

九九五 麥角末

五〇、〇

桂皮油糖 五〇、〇

右分五包每十五分至三十分

九九二 含糖百布聖

右分十二包朝夕一包

稀鹽酸 一〇、〇

〇、八

時一包

九九六 麥角末 二、五、一五、〇

白糖 四〇、〇

桂皮油糖 〇、八

右分五包每十五分時一包

九九七 麥角越幾斯 一〇、〇

酒精 二〇、〇

偏里設林 六〇、〇

右每半時一筒注射皮下

九九八 麥角越幾斯 三〇、〇

偏里設林 七、五

偏里設林 七、五

右每半時一筒注射皮下

九九九 麥角越幾斯 一〇、〇

偏里設林 五〇、〇

偏里設林 二〇、〇

右半筒注射皮下

偏里設林 一八、〇

水 三〇、〇

右每食前一二茶匙

九三三 含糖百布聖

稀鹽酸

佩里設林

白葡萄酒

右每食後一小酒杯

九三三 含糖百布聖

枸橼酸

乳糖

右分六包每食前一包

九三四 可溶性酸化鐵

水

覆盆子舍利別

右朝夕一食匙

九三五 水製大黃丁幾

橙皮舍利別

右朝夕食前一茶匙

九三六 睡萊葉浸 (一、五) 一五〇、〇

重碳酸那篤留謨

橙皮舍利別

右每二時一食匙

九三七 杏仁水

鹽酸莫爾比涅

右一日三回每回八滴

緩下劑 Laxantia.

九九六 蘆苣越幾斯

藥用石鹼

右爲五十九每夕一二粒

九九二 複方旃那浸

六〇、〇—一〇〇、〇

右一回頓服

九九三 大黃浸 (一〇、〇) 一〇〇、〇

碳酸麻僱涅更謨

滿那舍利別

右一日數回分服

九九三 燉製麻僱涅更謨

水 一五、〇
二五〇、〇

滿那舍利別 三〇、〇

右每時一食匙

九九三 燉花水 * 一五〇、〇

覆盆子舍利別 * 二五、〇

右每半時至一時一食匙

衰弱諸症

九九三 機那煎 (一〇、〇) 一二〇、〇

赤酒

單舍利別

右每時一二食匙

九九四 メリツサ浸

(一〇、〇) 一五〇、〇

機那越幾斯

單舍利別

右每時一二食匙

九九五 依的兒精

拔爾撒謨合劑 * 二〇、〇

桂皮丁幾

右每一時乃至二時二十滴

九九三 硫酸合劑 二〇、〇

覆盆子舍利別 * 四〇、〇

右飲料

九九三

磷酸

五〇〇

覆盆子舍利別

五〇〇

右飲料

九九六

依的兒精

三〇〇

右一回五六滴虛脫

九九元

拔爾撒謨合劑

五〇〇

薄荷油

十滴

九九五

硫酸規尼涅

一〇〇

依的兒

二〇〇

阿片

〇〇六

右每半時十滴至二十滴

白糖

二〇〇

九九五 阿片

〇〇六

白糖

三〇〇

右分六包十五分至三十分時

一包

亞拉昆亞謨末

二〇〇

右分六包十五分至三十分時

第十三編 小兒科病

初生兒假死 Asphixia neonatorum.

肺膨脹不全 Atelectasis pulmonis.

九四三

安母尼亞水

一〇〇〇

右每二時三滴

橙皮舍利別

一〇〇〇

右噴入

九四四

吐根浸

(〇〇二五)七〇〇

右每半時一茶匙

九四三

安母尼亞尚香精

一〇〇〇

鹽酸亞刺莫兒比涅

〇〇〇一

臍膿漏 Plennorrhoea umbilica.

臍炎 Omphalitis.

臍靜脈炎 Phlebitis umbilicalis.

臍動脈炎 Arteritis umbilicalis.

●洗滌劑

九四五

石炭酸水(二%)

三〇〇〇

●撒布劑

九四五

硼酸

一〇〇五

右洗滌

九五四 右撒布 撒里爾矢酸 〇、五

澱粉 一〇、〇

右撒布 一五、〇

九四八 沃度仿謨 一五、〇

右撒布 各五、〇

九四九 沃度仿謨、澱粉 各五、〇

右撒布 一、〇一五、〇

九五五 酸化亞鉛 一〇、〇

石松子末 一〇、〇

初生兒黃疸 Icterus neonatorum.

加答兒性黃疸 Icterus catarrhalis.

九五二 右撒布 塗布劑 一、〇

沃度仿謨 依的兒 三〇、〇

右塗布 三〇、〇

九五二 沃度仿謨 一、〇

佩里設林 三〇、〇

右塗布 一、五

九五三 撒里爾矢酸 單軟膏 三〇、〇

單軟膏 一、五

九五四 右塗布 撒里爾矢酸 一、五

華攝林 一〇、〇

右塗布 一〇、〇

●卷法劑 五、〇

九五五 次醋酸鉛液 二〇〇、〇

餾水 二〇〇、〇

右墨法 二〇〇、〇

●散劑

九五五 重碳酸那篤留謨、白糖 各一〇、〇

右一日四回每回一刃尖 各一〇、〇

九五七 大黃、重碳酸那篤留謨 各三、〇

泥葛根油糖* 各三、〇

右一日三回每回一小刀尖 各三、〇

九五八 大黃 一、〇

碳酸麻僱涅更謨 二、〇

白糖 四、〇

●水劑

九五九 安母尼亞茴香精 五、〇

右每二時十滴 五、〇

九五〇 安母尼亞茴香精 各五、〇

硫酸依的兒 各五、〇

右每時十滴 各五、〇

九五二 大黃丁幾 二、〇

水 七〇、〇

單舍利別 一〇、〇

●大黃浸

九五二 大黃浸 (五、〇)八〇、〇

重碳酸那篤留謨 四、〇

橙皮舍利別 二〇、〇

右每三時一小兒匙 一、〇

九五三 稀硝酸 一、〇

水 八〇、〇

單舍利別 二〇、〇

右每二時一小兒匙 二〇、〇

九五四 答滿林度煎 (八、〇)八〇、〇

酒石酸
滿那舍利別
二〇、〇

九九五 硫酸規尼涅
〇、一〇、二

九九五 稀硫酸
一滴—二滴

初生兒腸胃出血

Melena neonatorum.

橙皮舍利別
右每二時一茶匙
一〇、〇

九六六 亞拉昆亞護膜漿
一〇〇、〇
杏仁水
一、〇—二、〇

九六七 撒里矢爾酸那篤留漢
右一日數回分服
五、〇

●水劑

九九五 麥角越幾斯
〇、五

水
單舍利別
七〇、〇

九七〇 麥角越幾斯
右每二時一茶匙
一〇、〇

水
單舍利別
八〇、〇

九七二 麥角越幾斯
右每二時一茶匙
二〇、〇

九七三 麥角越幾斯
右每二時一茶匙
七〇、〇

初生兒牙關緊急

Trismus neonatorum.

●水劑

Tetanus neonatorum.
九六六 抱水格魯刺爾
〇、五—一、五

水
單舍利別
六〇、〇

●外用劑
右每二時一茶匙
三〇、〇

九六六 沃度仿漢末
右外用
一五、〇

●注射劑

九六五 醋酸依的兒
右每二時一茶匙
一〇、〇

九六五 醋酸依的兒
右每回一滴至三滴
一〇、〇

九六六 麥角越幾斯
右半筒至一筒注射腹部皮下
五、〇

九六七 麥角越幾斯
右十分一筒注射皮下
五、〇

樟腦
右十分一筒注射皮下
五、〇

初生兒腸胃出血

初生兒牙關緊急

六百十三

七〇、〇

橙皮舍利別

一〇、〇

右每二時一茶匙

九九九

抱水格魯刺爾

一、〇一三、〇

水

九九九

貌魯謨加留謨

三、〇一五、〇

單舍利別

二〇、〇

右每二時一小兒匙

九九〇

抱水格魯刺爾

〇、二一〇、三

牛乳

適宜

右頓服

九九一

加刺拔兒豆越幾斯

〇、〇六

水

九九一

單舍利別

四〇、〇

右一日四回分服

九九二

加刺拔兒豆越幾斯

〇、一

備里設林

一五、〇一二〇、〇

右一日數回每回二滴至五滴

九九三

貌魯謨加留謨

一、〇一三、〇

水

九九三

單舍利別

四〇、〇

右一日四回分服

九九四

麝香丁幾

一滴一三滴

右一回量

●散劑

九九五

抱水格魯刺爾

〇、二五

白糖

一、〇

右分五包每二時一包

九九六

加刺拔兒豆越幾斯

〇、一

白糖

一、〇

右分五包每四時一包

九九七

印度大麻越幾斯

〇、三一〇、五

乳糖

三、〇

右分十包每三時一包

九九八

ズルフオナル

〇、五一〇、一

右分十包一日數回每回一包

九九九

トリオナル

〇、二一一、五

右一日量、二歲乃至十歲

●注射劑

九九〇

加刺拔兒豆越幾斯

〇、〇二

水

九九二

加刺拔兒豆越幾斯

〇、〇五一一〇、五

右每回一筒至二筒注射皮下

九九二

水

一〇、〇

右十分一筒注射皮下

九九二

撒里矢兒酸比蘇斯知屈密涅

水

〇、〇〇二一〇、〇〇五

右十分一筒注射皮下

九九三

硫酸亞篤魯必涅

〇、〇一

水

九九四

クラール

右每三時一滴注射皮下

九九四

〇、〇〇五一一〇、〇二

水

九九五

クラール

右每回十分一筒注射皮下

九九五

〇、〇〇一

水

九九六

稀鹽酸

右注射皮下

九九六

鹽酸必魯加兒必涅

〇、〇一

水

九九七

貌羅謨水素酸古埤乙涅

〇、〇一

水

九九六

●洗腸劑

沙列布煎* 六、〇一一〇〇、〇

抱水格魯刺爾 〇、五
右分二回灌腸

九死

抱水格魯刺兒

水

〇、二一〇、五

一〇〇〇

抱水格魯刺爾
亞拉昆亞護謨漿

右一回灌腸

水

一、〇
二〇、〇
八〇、〇

右分二回灌腸

口內炎

Stomatitis.

一名鵝口瘡、一名寄生性口內炎、舊作口瘡、又名口内生白點紅點、重者為口糜、古名鵝口、或名雪口、或名白珠子、

亞布答性口內炎

Stomatitis aphthosa.

加答兒性口內炎

Stomatitis catarrhalis.

潰瘍性口內炎

Stomatitis ulerosa.

口內糜爛

Stomacae.

●水劑

10031

機那煎 (二六〇) 一〇〇、〇
格魯兒酸加儂謨 二〇、〇

單舍利別

二〇、〇

右每三時一小兒匙

10034

格魯兒酸加儂謨

二〇、〇

10033

格魯兒酸加儂謨 〇、五—四、〇

水

一、二〇、〇

單舍利別

二〇、〇

10033

右一日數回分服

一、〇

格魯兒酸加儂謨

一、〇

水

六〇、〇

10035

格魯兒酸加儂謨

二〇、〇

覆盆子舍利別

二〇、〇

水

一〇〇、〇

橙皮舍利別

一〇、〇

右每二時一茶匙

水

一〇〇、〇

格魯兒酸加儂謨

二〇、〇

橙皮舍利別

二〇、〇

右每三時一小兒匙

水

一、〇

10037

單寧酸水

一、〇

10036

格魯兒酸加儂謨

一、〇—二、〇

水

一〇〇、〇

覆盆子舍利別

二〇、〇

右每三時一小兒匙

●含嗽劑

10037

單寧酸水

(〇、五—一、〇) 一〇〇、〇

右含嗽

10038

格魯兒酸加儂謨水

口內炎

六百十五

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------|------------|-------|
| 1000元 | 右舍嗽 | (一、〇—二、〇) | 1000、〇 | 1001五 | 右舍嗽 | 一〇〇、〇 | 1001三 | 硼酸 | 一、〇 |
| 1000元 | 格魯兒酸加價謨 | | 六、〇 | 水 | 右舍嗽 | 100、〇 | 水 | 右塗布 | 五〇、〇 |
| 1000元 | 水 | | 1100、〇 | ●塗布劑 | | | 1001三 | 硼酸水(二%) | 五〇、〇 |
| 1000元 | 右舍嗽 | | | 1001六 | 硝酸銀 | 〇、五 | 1001三 | 右頻回塗布 | 五〇、〇 |
| 1000元 | 硼酸水 | | | 1001七 | 水 | 五〇、〇 | 1001四 | 硼酸那篤留謨 | 一、〇 |
| 1000元 | (二、〇—四、〇) | 1000、〇 | | 右塗布 | | | 水 | 右塗布口內 | 三〇、〇 |
| 1001一 | 右舍嗽 | | | 1001七 | 格魯兒酸加價謨 | 一、〇 | 1001五 | 硼酸那篤留謨 | 五、〇 |
| 1001二 | 硼酸那篤留謨 | 五、〇—一〇、〇 | | 水 | | 三〇、〇 | 水 | | 二五、〇 |
| 1001三 | 水 | | 1000、〇 | 右塗布 | | | 1001六 | 右塗布 | 五〇、〇 |
| 1001三 | 過滿俺酸加價謨 | | 〇、二 | 1001八 | 硫酸亞鉛 | 一、〇 | 1001六 | 石炭酸水(一一二%) | 五〇、〇 |
| 1001三 | 水 | | 1000、〇 | 水 | | 二〇、〇 | 右塗布 | | |
| 1001三 | 右舍嗽 | | | 1001九 | 硫酸亞鉛水(五%) | 五〇、〇 | 1001七 | 撒里矢爾酸水(三%) | 五〇、〇 |
| 1001三 | 沃度加價謨 | | | 右頻回塗布 | | | 1001八 | 右塗布 | |
| 1001四 | 右舍嗽 | (〇、五) | 1000、〇 | 1001二 | 硫酸銅 | 〇、六 | 1001八 | ラタニヤ丁幾 | 各一〇、〇 |
| 1001四 | 撒魯兒 | | 〇、五 | 水 | | 三〇、〇 | 1001元 | 沒食子丁幾 | |
| 1001四 | 酒精 | | 100、〇 | 右塗布 | | | 1001元 | 貌羅謨水素酸 | 五、〇 |
| 1001四 | 水 | | 100、〇 | 1001二 | 過滿俺酸加價謨 | 一、〇 | 1001元 | 右燒灼 | |
| 1001四 | 右舍嗽 | | 100、〇 | 水 | | 150、〇 | | | |
| | | | | 右塗布 | | | | | |

急性鼻粘膜加答兒 Rhinitis acuta.

慢性鼻粘膜加答兒 Rhinitis chronica.

| | | | |
|-------|----------|-------------|--------|
| 10010 | ●水劑 | 滑石 | 二、〇 |
| | 接骨木花浸 | 右一日吹入二回 | |
| 10011 | 炭酸安紐謨 | 鹽酸古加乙混 | 〇、一〇、五 |
| | 單舍利別 | 滑石 | 一〇、〇 |
| | 右每時一小兒匙 | 右吹入 | |
| 10012 | 炭酸安母紐謨 | 安息香酸那篤留謨 | 五、〇 |
| | 稀醋酸 | 右吹入 | |
| | 吐根酒 | アリストール | 一〇、〇 |
| | 水 | 右吹入 | |
| | 單舍利別 | 撒魯兒 | 五、〇 |
| | 右每時一小兒匙 | 硼酸 | 二、〇 |
| 10013 | ●吹入劑 | 撒里矢爾酸 | 〇、五 |
| | 硝酸銀 | 知母兒 | 〇、五 |
| | 滑石 | 滑石 | 一〇、〇 |
| | 右吹入 | 右吹入 | |
| 10014 | 次硝酸蒼鉛 | ソゾヨドール酸亞鉛 | 一、〇 |
| | 硼酸 | 滑石 | 一〇、〇 |
| | 右一日吹入二三回 | 右吹入 | |
| 10015 | 撒里矢爾酸蒼鉛 | ソゾヨドール酸加留謨 | 一、〇 |
| | | 滑石 | 一〇、〇 |
| 10016 | | ●塗布劑 | |
| | | 百露拔爾撒謨 | 一〇、〇 |
| | | 俣里設林 | 一〇、〇 |
| | | 右塗布鼻粘膜 | |
| 10017 | | ●嗅入劑 | |
| | | 安母尼亞水 | 五、〇 |
| | | 石炭酸 | 五、〇 |
| | | 酒精 | 一五、〇 |
| | | 餽水 | 一〇、〇 |
| | | 右十滴蘸布片嗅入 | |
| 10018 | | 鹽酸古加乙混 | 〇、五 |
| | | 餽水 | 二五、〇 |
| | | 右注入鼻中 | |
| 10019 | | ●注入劑 | |
| | | 滑石 | 一〇、〇 |
| | | 右吹入 | |
| 10020 | | ソゾヨドール酸那篤留謨 | 一、〇 |
| | | 滑石 | 一〇、〇 |
| | | 右吹入 | |

急性喉頭加答兒

Laryngitis catarrhalis acuta. Pseudocroup.

●吐劑

10055 吐酒石 〇、一〇〇、二

亞拉尼亞護謨漿 三〇〇、〇

右頓服一食匙、催吐

10056 吐酒石 〇、一

亞拉尼亞護謨 五〇〇、〇

右每五分時一茶匙、催吐

10057 吐根浸

(一、〇一、二、〇)五〇〇、〇

單舍利別 一〇〇、〇

右每回一茶匙、催吐

10058 鹽酸亞剎莫爾比涅 〇、〇二

稀鹽酸 三滴

攝涅瓦舍利別 二〇〇、〇

或吐根舍利別 二〇〇、〇

水 三〇〇、〇

右每時一茶匙

10059 鹽酸亞剎莫爾比涅 〇、一

水 一〇〇、〇

右注射皮下

●水劑

10055 重碳酸那篤留謨 二〇〇

水 二〇〇、〇

加密爾列花舍利別 二五〇、〇

右每時一食匙

10055 格魯兒安母紐謨 〇、六一〇、八

水 二〇〇、〇

單舍利別 二五〇、〇

右每時一食匙

10055 沃度加留謨 一、〇一、二、〇

水 九〇〇、〇

攝涅瓦舍利別 一〇〇、〇

右每二時一食匙

10055 吐根浸

(〇、一、一〇、三)一〇〇〇、〇

安母尼亞茴香精 十滴

單舍利別 一〇〇、〇

右每二時一小兒匙

10055 吐根浸

(〇、一、五、一〇、二、五)七〇〇、〇

安母尼亞茴香精 〇、五、一、一、〇

單舍利別 一〇〇、〇

右每二時一茶匙

10055 吐根浸 (〇、一、五)七〇〇、〇

菲沃斯越幾斯 〇、一〇〇、二、五

單舍利別 一〇〇、〇

右每二時一茶匙

10055 印度大麻越幾斯

〇、一〇、一、五

水 七〇〇、〇

覆盆子舍利別 一〇〇、〇

右每二時一茶匙

●散劑

10057 挖勿兒氏散 〇、一〇、〇、五

白糖 三、〇

右分十包每二時一包

10055 挖勿兒氏散 〇、一〇、〇、五

金硫黃 〇、二

白糖 三、〇

右分十包每二時一包

10055 古堙乙涅 〇、〇三、一〇、一

白糖 三、〇

右分十包一日四包

●吸入劑

1005 昇汞 水 0,0,1
1006 右吸入 100,0

1007 格魯兒酸加留謨水 右吸入 (二,〇)二〇〇,〇

1008 明礬水 右吸入 (二,〇)二〇〇,〇

1009 明礬水 右吸入 (二,〇)一〇〇,〇

1010 單寧酸水 右吸入 (一,〇)一〇〇,〇

1011 食鹽水(〇,五%) 右吸入 一〇〇,〇

1012 硼酸 水 二,〇一四,〇
1013 右吸入 一〇〇,〇

格魯布性喉頭炎

●吐劑

1014 鹽酸亞刺真爾比涅 水 〇,〇一
1015 六,〇〇

1016 重碳酸那篤留謨 〇,五一,〇
1017 水 一〇〇,〇

1018 重碳酸那篤留謨水(1%) 右吸入 二〇〇,〇

1019 硼酸那篤留謨 水 一,〇
1020 右吸入 一〇〇,〇

1021 格魯兒安母紐謨 水 〇,五
1022 右吸入 一〇〇,〇

1023 碳酸安母紐謨 水 〇,五
1024 右吸入 一〇〇,〇

1025 石炭酸 水 一,〇
1026 右吸入 一〇〇,〇

Laryngitis crouposa. 喉頭義膜炎

1027 安息香酸那篤留謨水 右吸入 (六,〇)二〇〇,〇

1028 佛里設林 水 二〇,〇
1029 右吸入 二〇,〇

1030 貌羅謨那篤留謨水 右吸入 (五,〇)五〇〇,〇

1031 合嗽劑 右吸入 (一,〇)一〇〇,〇

1032 明礬水 右含嗽 五,〇
1033 ●吹入劑 五,〇

1034 明礬 白糖 右吹入 五,〇

右注射皮下、催吐

1035 吐酒石 〇,一—〇,五
1036 亞拉昆亞護謨漿 五〇,〇

1037 硫酸銅 水 〇,五
1038 右十五分時一茶匙、催吐 五〇,〇

單舍利別 二〇、〇

右十五分時一茶匙、催吐

●散劑

一〇八一 甘朮 〇、〇五—〇、一

白糖 二、〇

右分五包

一〇八二 沃度仿謨 〇、一

白糖 三、〇

右分十包每二時一包

一〇八三 硫酸規尼涅 一、〇—二、〇

白糖 三、〇

右分十包每三時一包

一〇八四 硫酸規尼涅 〇、五

加糖炭酸鐵 〇、五

白糖 五、〇

右分十包朝夕一包

一〇八五 枸橼酸鐵規尼涅 二、〇

白糖 三、〇

右分十包一日三回至四回每

回一包

一〇八六 麝香 〇、一五—〇、二五

白糖 三、〇

右分五包每二時一包

●水劑

一〇八七 昇朮 〇、〇一—〇、〇二

卵白 一個

水 一二〇、〇

右每時一茶匙

一〇八八 昇朮 〇、〇一—〇、〇二

水 一〇〇、〇

覆盆子舍利別 一〇〇、〇

右每時一茶匙

一〇八九 吐根浸 〇、一五—〇、二五

ベツシエフ井一氏丁幾 * 十五滴

單舍利別 一〇、〇

右每二時一茶匙

一〇九〇 攝涅瓦根浸 (二五、〇) 二二〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每二時一小兒匙

一〇九一 攝涅瓦根浸 (五、〇—八、〇) 七〇、〇

安母尼亞茴香精十五—二十滴

單舍利別 一〇、〇

右每二時一茶匙

一〇九二 攝涅瓦根浸 (五、〇—七、〇) 七〇、〇

鹽酸亞剎莫爾比涅 二〇、〇

單舍利別 一〇、〇

右每二時一茶匙

一〇九三 攝涅瓦根浸 (一一、〇) 一〇〇、〇

炭酸安母紐謨 一〇、〇

加密爾列花舍利別 * 一二、〇

右每時一小兒匙

一〇九四 鹽酸必加兒比涅 〇、一—〇、二

水 二〇〇、〇

右每時一茶匙

一〇九五 炭酸安母紐謨 〇、六

水 一〇〇、〇

加密爾列花舍利別 一二、〇

右每時一小兒匙

一〇九六 樟腦 〇、一

種子乳劑 * 八〇、〇

右每十五分時一茶匙

一〇九七 安母尼亞茴香精 一五、〇

右每十五分時五滴

●吸入劑

1007 昇汞水 (〇、〇五) 二〇〇、〇

右吸入

1008 乳酸 十滴

右吸入

1009 水 四〇、〇

1010 乳酸 三、〇一五、〇

右吸入

1011 明礬水 (四、〇) 四〇〇、〇

右吸入

1012 明礬水 六、〇

右吸入

1013 明礬水 二〇〇、〇

右吸入

1014 醋酸鉛 一、〇

右吸入

1015 水 五、〇

右吸入

1016 石灰水 一五〇、〇

右吸入

1017 水 一五〇、〇

右吸入

1018 石灰水 一五〇、〇

右吸入

1019 單寧酸水 五〇、〇

右吸入

1020 石炭酸水 (〇、二一〇、五) 五〇、〇

右吸入

1021 石炭酸水 (一、〇一〇、二〇) 一〇〇、〇

右吸入

1022 貌羅謨那篤留謨 五、〇

右吸入

1023 水 二五〇、〇

右吸入

1024 石灰水 五〇、〇

右吸入

1025 皮下注射劑 〇、一

●皮下注射劑

1026 昇汞 〇、一

格魯兒那篤留謨

1027 水 一〇〇、〇

右一日一回至四回每回半筒

1028 注射皮下 〇、三

●塗布劑

1029 水 一〇、〇

右四分之一乃至半筒注射皮下

1030 硼酸 一、五一二、五

單軟膏 五〇、〇

1031 右塗布 各五、〇

1032 水銀軟膏、單軟膏 各五、〇

1033 右塗布 各五、〇

1034 貌羅謨 〇、四

●吸入劑

1035 貌羅謨加留謨 〇、四

1036 水 二〇〇、〇

右吸入

1037 吹入劑 二、〇

●吹入劑

1038 沃度仿謨 二、〇

白糖 右一日吹入三回

1039 白糖 一、二、〇

●罌法劑

1040 石炭酸水 (二、〇) 一〇〇、〇

右前頸部罌法

聲門痙攣

Spasmus glottidis. 聲門痙、喉頭喘、

●水劑

- 1022 抱水格魯刺爾 二、五
- 水 七〇、〇
- 橙皮舍利別 一〇、〇
- 右每二時一茶匙
- 1027 抱水格魯刺爾 〇、三一、〇
- 單舍利別 五、〇
- 水 一〇、〇
- 右頓服
- 1028 貌羅謨安母紐謨 〇、〇五一〇、三
- 貌羅謨那篤留謨 二、〇
- 或貌羅謨加留謨 七〇、〇
- 水 一〇、〇
- 單舍利別 一〇、〇
- 右每二時一茶匙
- 1029 肝油乳劑(一〇、〇)一〇〇、〇
- 白糖 一〇、〇
- 右每二時一茶匙
- 1030 肝油乳劑(一〇、〇)一〇〇、〇
- 依的兒性鐵丁幾十五—二十滴
- 白糖 一〇、〇

右每二時一茶匙

- 1032 肝油 一〇〇、〇
- 磷 〇、〇一
- 右一日一二茶匙
- 1033 甘扁桃油 一〇、〇
- 磷 〇、〇一
- 白糖 一五、〇
- 亞拉昆亞護謨末 一五、〇
- 餛水 七〇、〇
- 右一日一二茶匙
- 1033 沃度鐵舍利別 一五、〇
- 單舍利別 一五、〇
- 右一日三回每回十滴
- 1034 林檎鐵丁幾 一五、〇
- 苦味丁幾 二五、〇
- 右一日二三回每回五滴至十滴
- 1035 林檎鐵丁幾 一五、〇
- 大黃丁幾 一五、〇
- 右一日二三回每回五滴至十滴
- 散劑

貌羅謨加留謨

- 1032 貌羅謨加留謨 二、五—五、〇
- 右分十包朝夕一包
- 1037 安知必林 一、〇—一、五
- 右分十包每時一包
- 1036 乳酸鐵 〇、五
- 白糖 二、五
- 右分十包朝夕一包
- 1036 加糖炭酸鐵 〇、五
- 泥葛根油糖 二、五
- 右分十包朝夕一包
- 1033 磷酸石灰、炭酸石灰 各三、〇
- 乳糖 四、〇
- 右一日三回每回一小刀尖
- 吸入劑
- 1033 鹽酸古加乙漚 (三一五%)二〇、〇
- 右以發霧器吸入
- 浣腸劑
- 1033 抱水格魯刺爾 〇、五
- 沙列布煎 一〇〇、〇
- 右分二回浣腸

肺結核、肺勞 Tuberculosis pulmonum.

●散劑

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------|-------|--------------|----------|---------|--------------|------------|--------|------|
| 10133 | アガリチン | 〇、〇一 | 10134 | 醋酸鉛 | 〇、二 | 10135 | 結麗阿曹篤 | 一、五 | | |
| | 白糖 | 五、〇 | | 右分十包每二時一包 | | | 甘扁桃油 | 三〇、〇 | | |
| | 右分十包一日三回每回一包 | | | 〇、二一〇、五 | | | 亞拉昆亞護謨 | 二〇、〇 | | |
| 10136 | 鹽酸莫爾比涅 | 〇、〇五 | | 白糖 | 二、〇 | | 餾水 | 八〇、〇 | | |
| | 白糖 | 二、〇 | | 右分十包一日三回每回一包 | | | 扁桃舍利別 | 二〇、〇 | | |
| | 右分十包發作時一包 | | | 〇、〇五 | | | 右爲乳劑一日二回至五回每 | | | |
| 10137 | 硫酸規尼涅 | 〇、五 | | 10136 | 加糖炭酸鐵 | 〇、五 | | 回一茶匙 | | |
| | 枸橼酸鐵 | 〇、五 | | 白糖 | 二、〇 | | 10137 | 結麗阿曹篤 | 一、〇 | |
| | 泥莖根油糖 | 二、〇 | | 右分十包一日二包 | | | | 肝油 | 一〇〇、〇 | |
| | 右分十包一日二回每回一包 | | | 〇、二〇、〇 | | | | 右一日二回每回一茶匙 | | |
| 10138 | 硫酸規尼涅 | 〇、二 | | 10137 | 硫酸規尼涅 | 〇、二一〇、三 | | 10138 | 沃度鐵舍利別 | 一〇、〇 |
| | 白糖 | 二、五 | | 右入膠囊一個一日一個至三 | | | | | 一〇、〇 | |
| | 右分十包一日二回每回一包 | | | 個 | | | | | 五、〇 | |
| 10139 | 醋酸鉛 | 〇、一五 | | ●水劑 | | | | | 五、〇 | |
| | 右分十包一日三回每回一包 | | | 杏仁水 | 一五、〇 | | | | 五、〇 | |
| 10140 | 陀沕兒氏散 | 〇、二一〇、五 | | 鹽酸莫爾比涅 | 〇、〇一五 | | | | 五、〇 | |
| | 白糖 | 二、〇 | | 右咳嗽劇甚時服四滴至六滴 | | | | | 五、〇 | |
| | 右分十包一日三回每回一包 | | | 10140 | グアヤコール | 一、〇 | | | 一〇〇、〇 | |
| 10141 | 醋酸鉛 | 〇、一五 | | | 機那丁幾 | 二、〇 | | | 一〇〇、〇 | |
| | 右分十包一日三回每回一包 | | | | 設里酒 | 一〇〇、〇 | | | 一〇〇、〇 | |
| 10142 | 陀沕兒氏散 | 〇、二 | | | 右每食後一小兒匙 | | | | 一〇〇、〇 | |
| | 白糖 | 四、〇 | | | | | | | 一〇〇、〇 | |

依的兒性鐵丁幾十滴—二十滴

右每二時一茶匙

1015

亞拉昆亞護謨漿

杏仁水

1015

單舍利別

右每二時一茶匙

1015

吐根浸

右每二時一茶匙

1015

菲沃斯越幾斯

右每二時一茶匙

1015

覆盆子舍利別

右每二時一茶匙

1015

過格魯兒鐵液

水

1015

桂皮舍利別

右每二時一茶匙

1015

胸膜炎、肋膜炎

Pleuritis

1015 麥角越幾斯

水

1015

桂皮舍利別

右每二時一茶匙

1015

麥角越幾斯

水

1015

單舍利別

右每一時至二時一茶匙

1015

麥角浸

右每半時乃至一茶時

1015

機那煎

右每回嗅入五滴

1015

エルゴチン(即麥角)

十五滴

1015

橙皮舍利別

右每二時一茶匙

1015

1015 依的兒性格魯兒鐵丁幾

十五滴—二十滴

1015

橙皮舍利別

右每二時一茶匙

1015

實麥答利斯浸

右每二時一茶匙

1015

杏仁水

十五滴

1015

印度大麻越幾斯

右一日三回每回十滴至三十滴(咳嗽鎮靜)

1015

過格魯兒鐵液

右每回一滴至二滴頻回服用

1015

●注射劑

エルゴチン

右每回一筒注射皮下

1015

オйкаールブートル

右每回嗅入五滴

1015 覆盆子舍利別

右每二時一茶匙

1015

實麥答利斯浸

右每二時一茶匙

1015

醋酸加留謨

右每二時一茶匙

1015

橙皮舍利別

右每二時一茶匙

1015

1016 エクイゼチー煎

(一、〇—二、〇)八〇、〇

海葱醋蜜

右毎二時一茶匙

一〇、〇

1017 オノニードス根煎

(二、〇—四、〇)八〇、〇

醋酸加留謨

杜松子舍利別

右毎二時一茶匙

1018 撒里矢爾酸那篤留謨

水 七〇、〇

單舍利別

右毎二時一小兒匙

●散劑

1019 鹽酸莫爾比涅

白糖

右分六包一日二三包

1020 チウレチン

右分六包一日三四包

1021 硫酸規尼涅

加糖沃度鐵

泥葛根油糖

一〇、〇

〇、〇三

二、〇

三、〇

〇、五

〇、五

二、〇

右分十包一日二回毎回一包

●塗布劑

1022 菲沃斯油

嚼囉仿謨

右塗布

1023 沃度加留謨

沃度

僂里設林

右塗布

三五、〇

三五、〇

二、五

〇、五

五〇、〇

五〇、〇

心臟內膜炎 Endocarditis.

外膜炎 Pericarditis.

●散劑

1014 實麥答利斯末

甘汞

乳糖

右分十包一日三回毎回一包

1015 實麥答利斯末

重酒石酸加留謨

白糖

右分十包毎三時一包

〇、一五

〇、一五

一、〇

〇、二

一、〇

四、〇

●滴劑

1016 ストロファンツス丁幾

右一日二回毎回五滴至十滴

1017 實麥答利斯丁幾

右一日二三回分服

1018 實麥答利斯丁幾

杏仁水

右一日三回毎回十滴

1019 實麥答利斯醋

右一日數回毎回五滴至十滴

1020 クエヅラホ丁幾

●水劑

1021 酒石酸

水

單舍利別

右毎二時一茶匙

1022 實麥答利斯浸

二〇、〇

二〇、〇

〇、五

〇、五

七〇、〇

一〇、〇

一〇、〇

(〇、二五—〇、二五)七〇、〇
杏仁水 十滴—二十滴

覆盆子舍利別 一〇、〇
右每二時一茶匙

一〇二八三 海葱醋 一〇、〇

炭酸加留謨(飽和) 一〇〇、〇

水 二〇〇、〇

單舍利別 二〇〇、〇

右每二時一小兒匙

一〇二八四 海葱醋蜜 一〇、〇

炭酸加留謨(飽和) 一〇〇、〇

水 二〇〇、〇

單舍利別 二〇〇、〇

右每二時一小兒匙

單純腦膜炎 Meningitis simplex.

惡性軟腦膜炎 Meningitis malignae.

●散劑

一〇二九二 甘汞、大黃末 各〇、〇六一〇、一

乳糖 〇、三
右頓服

一〇二九三 甘汞、大黃末 各〇、五

一〇二八五 撒里矢爾酸那篤留謨珈琲涅 〇、三

水 八〇、〇

枸橼舍利別 二〇、〇

右每二時一小兒匙

一〇二八六 ストロファンツス丁幾 〇、五

水 八〇、〇

覆盆子舍利別 一〇〇、〇

右一日六回每回一小兒匙

一〇二八七 醋酸加留謨 二、〇

水 七〇、〇

單舍利別 一〇〇、〇

右每二時一茶匙

一〇二八八 機那煎 (五、〇)七〇、〇

醋酸加留謨 二、〇

橙皮舍利別 一〇、〇

右每二時一茶匙

一〇二八九 綱草浸 (二、〇—五、〇)一〇〇、〇

右每二時一茶匙

●塗布劑 〇、五

沃度 二、五

沃度加留謨 五〇、〇

偪里設林 三〇、〇

右塗布

一〇二九一 杜松實軟膏 三〇、〇

右塗布

乳糖 四、〇

右分十包每二時一包

一〇二九四 ウレタン 〇、〇五一〇、二

乳糖 〇、三

右頓服、催眠

●水劑

一〇二九五 貌羅謨加留謨 〇、一—一、〇

單舍利別 一〇、〇

水 六〇、〇

右一日三回分服一歲乃至十歲

●浣腸劑

1012 抱水格魯刺兒 〇、五—一、五
四〇、〇
單舍利別

● 右洗腸
塗布劑

1017 水銀軟膏 〇、三一—一、〇
右每三時塗布頭部

結核性腦底腦膜炎

Meningitis basalis tuberculosa.

1019 ● 散劑
甘末 〇、三一—〇、五
乳糖 四、〇
右分十包每二時一包

1010 右每二時一茶匙
沃度加儂謨 〇、五
水 八〇、〇
洋芹舍利別 二〇、〇
右每二時一小兒匙

● 塗布劑
沃度仿謨 一〇、〇
單軟膏 一〇、〇
右塗布頭部

1020 ● 水劑
沃度那篤儂謨 一、〇—一、五
水 七〇、〇
橙皮舍利別 一〇、〇
右每二時一茶匙

1011 沃度加儂謨 一、〇—二、〇
水 七〇、〇
單舍利別 一〇、〇
右每二時一茶匙

1015 沃度仿謨 一、〇—二、〇
古魯胃謨 一〇、〇
右塗布前額

1010 沃度加儂謨 〇、二五—一、〇
水 七〇、〇
單舍利別 一〇、〇

1013 吐根浸 (〇、一五)—七〇、〇
沃度加儂謨 〇、五—一、〇
單舍利別 一〇、〇

1016 抱水格魯刺兒 〇、五—一、〇
沙列布煎 一〇〇、〇
右分二回注腸

小兒急癇、小兒搐搦

Eclampsie.

1017 ● 水劑
貌羅謨安母紐謨 〇、一五—一、〇、四
單舍利別 一〇、〇
水 六〇、〇

1018 右一日三回分服
古加丁幾 五、〇
右一日三回每回四滴至二十滴

單舍利別 一〇、〇
水 六、〇
右一日三回分服

1010 抱水格魯刺兒 〇、一—三、〇
水 一〇〇、〇

1010 抱水格魯刺兒 〇、一—三、〇
水 一〇〇、〇

1010 抱水格魯刺兒 一〇〇、〇
水 一二〇、〇

右朝夕二茶匙

10111 麝香丁幾

五〇〇

右一日三回每回一滴至三滴

●散劑

10112 甘末

〇〇〇一〇〇〇六

乳糖

〇〇〇三

出血病

Haemophilia.

失血、血友病、血斑病、

右頓服

10113 甘末

〇〇〇六

藥刺巴末

乳糖

右頓服

10114 顯草酸亞鉛

〇〇五〇二五

水

阿片丁幾

一滴—三滴

橙皮舍利別

一〇〇〇

右每二時一茶匙

10115 麥角越幾斯

一〇〇〇

水

桂皮舍利別

八〇〇〇

右每二時一茶匙

10116 麥角越幾斯

一滴—十五滴

阿片丁幾

一滴—五滴

水

單舍利別

七〇〇〇

右每二時一茶匙

10117 機那煎

(三〇〇—五〇〇)七〇〇

白帶

右分十包一日四回每回一包

●洗腸劑

10118 抱水格魯刺兒

〇〇五—一〇〇

水

右澆腸

10119 莫替越幾斯

十五滴—二十滴

桂皮舍利別

一〇〇〇

右每二時一茶匙

10120 枸櫞汁

二〇〇〇

橙皮舍利別

四〇〇〇

水

右顏料

●散劑

10121 醋酸鉛

〇〇〇二

抱物兒氏散

〇〇〇二

白糖

二〇〇〇

右分十包一日三回每回一包

10122 エルゴチン

一五〇〇

右每回半筒至一筒注射皮下

10123 麥角越幾斯

一〇〇〇

右每一時至二時一茶匙

單舍利別

一〇〇〇

水

10124 過格魯兒鐵液

十滴—十五滴

阿片丁幾

一滴—三滴

10125 過格魯兒鐵液

十滴

桂皮水

一〇〇〇〇

10126 單舍利別

一〇〇〇

水

10127 單舍利別

一〇〇〇

水

10128 酒石酸

〇〇〇五

水

10129 單舍利別

一〇〇〇

水

腺病、瘰癧 Serophulosis.

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-----------|---------------------|-------|----------------------|-----------|
| 10326 | ●水劑 肝油 | 五〇〇〇 | 右一日二回每回一茶匙 | 10336 | 沃度加留謨 | 〇、一、一〇、一五 | 右一日三回每回三分二乃至一盞 | 10346 | 大兒 磷酸加兒叟謨、乳糖各一〇〇〇 | 五、〇 |
| 10327 | 肝油 乳糖 | 一〇〇〇〇 | (五、〇、一、〇、〇) 一〇〇〇〇 | 10337 | 沃度仿謨 | 一、〇〇 | 甘葛桃油 | 二〇〇〇 | 右每朝一小刀尖 | 〇、五、一、一、〇 |
| 10328 | 白糖 | 一〇〇〇 | 右每二時一茶匙 | 10338 | 苦葛桃油 | 一滴 | 右一日三回每回一小兒匙乃至一食匙、大兒 | 10347 | 磷酸石灰 | 一、〇〇 |
| 10329 | 沃度加留謨 | 〇、一、一、〇 | 單舍利別 | 10339 | 沃度 | 〇、〇、五 | 沃度加留謨 | 一、〇〇 | 右分子包一日三回食後一包 | 四、〇 |
| 10330 | 水 | 六〇〇〇 | 右一日三回分服 | 10340 | 沃度 | 一、〇〇 | 炭酸石灰 | 二〇〇〇 | 右一日三回每回一小刀尖 | 六、〇〇 |
| 10331 | 沃度鐵舍利別 | 一〇〇〇 | 右一日數回一滴至二十滴 | 10341 | 水 | 一〇〇〇 | 右一日三回每回十滴 | 10348 | ●丸劑 加糖沃度鐵 | 〇、二 |
| 10332 | 單舍利別 | 一五、〇〇 | 右一日三回每回十滴 | 10342 | ●散劑 加糖沃度鐵 | 〇、三 | 右爲十二九一日三回每回一 | 10349 | 加糖沃度鐵 | 二、五 |
| 10333 | 沃度 | 〇、一 | 肝油 | 10343 | 乳糖 | 五、〇 | 右分子包一日三回每回一包 | 10350 | 加糖沃度鐵 | 二、五 |
| 10334 | 右朝夕一茶匙至二茶匙、大兒 | 四〇〇〇 | 硫酸規尼謨 | 10344 | 加糖沃度鐵 | 〇、五 | 右爲五十九一日三回每回二 | 10351 | 粒至四粒、大兒 | 二、〇 |
| 10335 | 沃度 | 〇、〇、五、一〇、〇、七五 | 白糖 | 10345 | 右分子包一日二回每回一包 | 二、〇 | 格魯兒鐵安母紐謨 | 10352 | 格魯兒鐵安母紐謨 | 二、〇 |

腺病、瘰癧

硫酸規尼涅

蘆薈越幾斯

右為六十九一日三回每回四粒至六粒

10133 沃度仿謨

白糖

薄荷油

右為錠十個一日三回每回一二個

10134 沃度仿謨

右為三十九一日三回每回一粒

10135 黃色沃度汞

阿片越幾斯

甘草末

佝僂病

Rachitis.

英吉利病、龜背、鳩胸等、

●水劑

10133 燐

阿列布油

枸橼油

右一日二回每回五滴至十滴

10134 燐

右以蜂蜜為百丸朝夕一粒、

大兒

●塗布劑

沃度丁幾、沒食子丁幾

右塗布患部 各一〇、〇

沃度

10136 沃度

沃度加留謨

脩里設林

右塗布

10137 沃度加留謨

餛水

豚脂

刺乃林

右塗布

10138 白降汞

刺乃林

單軟膏

右塗布

10139 黃色酸化汞

單軟膏

右鼻軟膏

10140 沃度仿謨

單軟膏

右塗布

10141 硝酸銀

緩和軟膏*

百露拔爾撒謨

右塗布

扁桃油

餛水

亞拉尼亞護謨

右為乳劑一日一茶匙

10135 燐

甘扁桃油

〇、二

二〇、〇

一、〇

〇、一

〇、一五

一〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

二〇、〇

〇、二

三〇、〇

三〇、〇

三〇、〇

〇、二

五、〇

五、〇

五、〇

八〇、〇

八〇、〇

〇、〇

〇、〇

〇、〇

一五、〇

白糖 一五〇、〇
水 四〇、〇

右一日一茶匙

一〇三七 嬌 〇〇、〇一

甘扁桃油 七〇、〇

白糖 三〇、〇

芳香依的兒 二十滴

一〇二六 嬌 〇〇、〇一

肝油 一〇〇、〇

右一日二回每回一茶匙

一〇二五 肝油 五〇、〇

右一日數回每回一茶匙乃至

三小兒匙

一〇二〇 肝油 二五〇、〇

白糖 二〇、〇

格魯兒那篤留謨 一〇、〇

乳清 六〇、〇

右一日二回每回一小兒匙

一〇六一 肝油 一〇〇、〇

珈琲末 五〇、〇

動物炭 二五、〇

右浸漬三日間濾過一日三回

佝僂病

一〇二二 磷酸 每回一小兒匙

水 五、〇

覆盆子舍利別 一二〇、〇

右每二時一食匙(大兒)

一〇二三 石灰水 一〇〇、〇

右一日數回每回一小兒匙

一〇二四 磷酸石灰 二、〇

水 六〇、〇

稀磷酸(中和) 一三〇、〇

白糖 右一日數回分服

一〇二五 還元鐵 〇、五

炭酸麻僱涅叟謨 二、〇

乳糖 一〇、〇

右一日二三回每回一小刀尖

一〇二六 鐵粉 〇、五

炭酸麻僱涅叟謨 二、五

桂皮末 〇、一

白糖 一〇、〇

右分二十包朝夕一包、大兒

一〇二七 含糖石灰 * 〇、一〇、三

白糖 三、〇

右分三包一日三回每回一包

一〇二八 沈降炭酸石灰 一〇、〇

加糖炭酸鐵 五、〇

乳糖 一〇、〇

茴香油糖 五、〇

右一日三回每回一小刀尖

一〇二九 次亞磷酸石灰 〇、二一、〇

白糖 三、〇

右分三包一日三回每回一包

一〇三〇 次亞磷酸石灰 二〇、〇

乳酸鐵 四〇、〇

炭酸石灰 四〇、〇

乳糖 六〇、〇

右每回一小刀尖(大人量)

一〇三一 加糖炭酸鐵、乳酸鐵 各五、〇

次亞磷酸石灰、乳糖 各五、〇

右一日二回每回一小刀尖

一〇三二 次亞磷酸石灰、乳糖 各一〇、〇

乳酸鐵 五、〇

右每朝一小刀尖

一〇三三 次亞磷酸石灰 各一〇、〇

六百三十一

● 九劑 五、〇

右朝夕一小刀尖、大兒

10174 燐 〇、一五

單舍利別 一、〇

亞拉昆亞護謨 〇、八

篤拉侃篤護謨 〇、四

甘草末 一、五

右爲三十九一日三回每回一

10175 燐 〇、〇六

嘔囉仿謨 三、二

偈里設林 二、五

亞爾答根末、亞拉昆亞護謨 適宜

右爲百九一日三回每回一粒

10176 次亞磷酸石灰 二、〇

沈降碳酸石灰 〇、一

糖尿病、密尿病 *Diabetes mellitus.*

尿崩症 *Diabetes insipidus.* 無味尿病、單尿崩

10176 加兒兒斯泉鹽 三〇、〇

右一日數回每回一茶匙

10179 撒里矢爾酸那篤留謨 〇、二一

右分三包一日三回每回一包

10180 緬草酸亞鉛 〇、二

右一日三回每回一茶匙

遺傳微毒 *Syphilis congenita.*

● 散劑

10184 甘汞 〇、〇五

加糖碳酸磷 〇、三

10180 乳糖 二、〇

右分十包一日三回每回一包

10181 磷酸古埤乙涅 〇、二

單舍利別 三〇、〇

右一日三回每回一茶匙

10182 サツカリン 〇、一

還元鐵 〇、〇三

右爲錠三十個一日三回每回

一個、大兒

10177 沃度 一、〇

沃度加留謨 四、〇

偈里設林 五、〇

右每回一筒注射囊內

10183 酒精 三〇、〇

右點加飲料

10183 鹽酸必魯加爾比涅 〇、〇三

糖水 一〇、〇

右一筒注射皮下、三歲兒

10185 乳酸鐵 〇、二

白糖 三、〇

右分十包一日一包乃至四包

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--------------------------|--|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|---|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 一〇二六 赤色沃度末 白糖 右分六包一日二回每回一 包 | 〇、〇八 二、〇 | 一〇二七 赤色沃度末 乳酸鐵 白糖 右分十包一日一回至三回每 回一包 | 〇、一 〇、二 三、〇 三、〇 | 一〇二八 單寧酸水銀 白糖 右分十包一日二回至四回每 回一包 | 〇、一〇、四 三、〇 | 一〇二九 單寧酸水銀 乳糖 右分十包一日二回每回一包 | 〇、二 五、〇 | 一〇三〇 加糖沃度鐵 白糖 右分十包一日三回每回一包 | 〇、二一〇、四 三、〇 | 一〇三一 加糖沃度鐵 乳糖 右分十包一日二回每回一包 | 〇、三 五、〇 | 一〇三二 加糖沃度鐵 | 一、〇 |
| 一〇三三 白糖 右分十包一日一包乃至三包 水劑 | 二、〇 〇、〇五 | 一〇三四 沃度 沃度加餛蛄 水 右一日三回每回十滴 | 一、〇 一、〇 一、〇 | 一〇三五 沃度加餛蛄 水 單舍利別 右一日三回分服、一歲至十 五歲小兒 | 〇、五 八、〇 | 一〇三六 洋芹舍利別、 水 右每二時一小兒匙、四歲兒 沃度鐵舍利別 | 二、〇、〇 二、〇、〇 | 一〇三七 沃度鐵舍利別 單舍利別 右每朝一茶匙 | 二、〇、〇 二、〇、〇 | 一〇三八 水 單舍利別 右一日二回每回半小兒匙至 一小兒匙 | 二、〇、〇 一、〇、〇 | 一〇三九 昇汞 右每食後二茶匙至四茶匙 | 〇、〇一 四、〇、〇 一、〇、〇 |
| 一〇四〇 昇汞 右每食後二茶匙至四茶匙 | 〇、〇五 〇、〇五 | 一〇四一 拾魯兒那為餛蛄 水 右一日三回至四回每回一小 兒匙 | 二、〇 一、〇、〇 | 一〇四二 赤色沃度末 沃度加餛蛄 水 單舍利別 右一日一二茶匙 | 〇、〇五 二、〇 一、〇、〇 一、〇、〇 | 一〇四三 漆布劑 水銀軟膏 豚脂 右一日塗布一回 | 〇、二一、〇 〇、五 | 一〇四四 水銀軟膏 刺乃林 右每回塗布五分一 | 五、〇 五、〇 | 一〇四五 昇汞 個里設林 | 〇、一〇、三 五、〇、〇 | | |

右塗布潰瘍面

10304 昇汞 〇、一

亞拉昆亞護膜藥

10305 右塗布 五〇、〇

單軟膏

10306 赤降汞 一〇、一

右爲鼻軟膏塗布

10307 單軟膏 一〇、〇

右塗布

10308 赤降汞 〇、〇五

單軟膏

10309 右塗布表皮剝脫部 一五〇、〇

10310 單軟膏 一、五

10311 右塗布潰瘍部 五〇、〇

右塗布潰瘍部

10312 單軟膏 五〇、〇

●注射劑

10313 百弗頓汞液 一〇、〇

右每回一筒注射皮下

10314 昇汞 〇、〇一

水 一〇、〇

格魯兒那篤儷膜 〇、四

右每回半筒乃至四筒注射皮下

10315 甘汞 〇、五一

亞拉昆亞護膜藥 五、〇

備里設林 五、〇

右每回半筒至一筒注射皮下

●浴劑

10316 昇汞 〇、五一

格魯兒安母紐膜 一〇、〇

水 一〇〇〇、〇

右分二回浴用

10317 昇汞 一、〇

格魯兒安母紐膜 一〇、〇

水 二〇〇、〇

右分二回浴用

●外用劑

10318 甘汞 一〇、〇

右撒布

10319 格魯兒水 * 一〇〇、〇

右洗滌

10320 黃金水 * 三〇〇、〇

昇汞 一、〇

石灰水 三〇〇、〇

右綳帶用

第十四編 耳科病

外聽道炎 Otitis externa. 耳道炎、耳瘡、耳疳、耳痛、

蔓延性外耳炎 Otitis externa diffusa.

寄生性外耳炎 Otitis externa Parasitica.

耳道加答兒 Otorrhoea. 聾耳、耳漏、

10327 水銀軟膏 一五、〇

右塗布

10328 昇水水

右洗滌

水或備里設林

五〇、〇

10328 醋酸礬土水(一〇%) 五〇、〇

右合於綿花栓塞

10329 (〇、一一一%) 一〇〇、〇

10326 醋酸鉛水(〇、二一一%) 五〇、〇

10329 酒石酸醋酸礬土水(一〇%) 五〇、〇

右合綿花栓塞

10330 撒里失爾酸水 (〇、一一〇、二%) 五〇、〇

10327 右洗滌 知母爾 五〇、〇

右合綿花栓塞

10330 硼酸水(二%) 一〇〇、〇

右洗滌

10331 石炭水(一一一%) 二〇〇、〇

10327 右洗滌 水 五〇〇、〇

10331 昇水水(〇、〇二) 一〇〇、〇

右洗滌

10332 硫酸亞鉛 〇、一五

10326 水銀石炭酸ムール* 右貼用

限性局外耳炎 Otitis externa circumscripta.

●塗布劑

10333 硼酸 一、〇

酒精

二〇、〇

10334 白降汞

緩和軟膏

〇、三

右塗布

10334 硼酸 一、〇

醋酸莫兒比涅

〇、一

10335 勃刺烏里涅

備里設林

〇、一五

華攝林

10335 華攝林 二〇、〇

右塗布

10336 石炭酸 〇、五

備里設林

一五、〇

10336 鹽酸莫爾比涅

右塗布

〇、一一〇、二

10337 華攝林 〇、一

10337 鹽酸古加乙涅 一〇、〇

10337 右塗布 一五、〇

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|------|-----------------------|------|
| 阿片丁幾 | 各二〇、〇 | 水 | 一〇、〇 | 飽水 | 一〇、〇 |
| 右塗布 | | 備里設林 | 二、〇 | 右點入 | |
| 一〇三四 甘扁桃油 | 四三、〇 | 右點入 | | ● 注入劑 | |
| 鯨腦 | 一二、〇 | 鹽酸莫爾比涅 | 〇、三 | 醋酸鉛 | 一、〇 |
| 白蠟 | 六、〇 | 杏仁水 | 一〇、〇 | 飽水 | 五〇、〇 |
| 薔薇油 | 二滴 | 右點入 | | 一〇三九 醋酸鉛 | |
| 安息香丁幾 | 三、〇 | 醋酸莫爾比涅 | 〇、二 | 右注入 | 五〇、〇 |
| 薔薇水 | 一二、〇 | 阿列布油 | 一〇、〇 | 一〇三五 硫酸亞鉛 | 〇、一五 |
| 右為軟膏塗布 | | 右點入 | | 黑櫻實水** | 五〇、〇 |
| ● 點入劑 | | 醋酸鉛 | 〇、一 | 右注入 | |
| 一〇三四 昇末 | 〇、〇二 | 醋酸莫爾比涅 | 〇、二 | 一〇三五 醋酸莫爾比涅 | 〇、〇五 |
| 酒精 | 三〇、〇 | 飽水 | 五〇、〇 | 飽水 | 五〇、〇 |
| 右點入 | | 右點入 | | 右注入 | |
| 一〇三四 硝酸銀 | 〇、五 | 阿片丁幾 | 二〇、〇 | 一〇三五 罌粟殼浸 (一〇、〇) 八〇、〇 | 二、〇 |
| 飽水 | 一〇、〇 | 飽水 | 二〇、〇 | 阿片泊美蘭丁幾 | |
| 右點入十滴 | | 右點入 | | 右注入 | |
| 一〇三四 炭酸那篤儷謨 | 〇、二 | 一〇三四 鹽酸古加乙涅 | 〇、五 | | |

外耳匐行疹 Herpes auricularae.

| | | | | | |
|-----------------|------|-----------|------|-------|------|
| 一〇三五 鉛軟膏、阿片越幾斯各 | 二五、〇 | 薔薇油 | 二滴 | 白蠟 | 六、〇 |
| 右塗布 | | 右塗布 | | 薔薇油 | 二滴 |
| 一〇三四 甘扁桃油 | 二〇、〇 | 一〇三五 甘扁桃油 | 四三、〇 | 安息香丁幾 | 三、〇 |
| 白蠟 | 一〇、〇 | 鯨腦 | 一二、〇 | 薔薇水 | 一二、〇 |

右塗布

外耳濕疹

Eczema auricularae.

●内服劑

一〇三六 亞砒酸加留謨液

林擒鐵丁幾

右一日數滴

一〇三七 磷酸鐵

次亞磷酸石灰

右一日三回每回一小刀尖

●點入劑

一〇三五 炭酸加留謨

僱里設林

右點入

一〇三九 硼酸亞鉛

僱里設林

右一日五滴乃至十滴點入三回

●塗布劑

耳垢堆積、町瞤滯積

Accumulatio cerminis.

町瞤凝固

Contrectio cerminis aurium.

耳町瞤

一〇三九 微溫湯

一〇〇〇

右洗滌

一〇三〇 阿列布油

三〇〇

一〇三〇 石炭酸

酒精

右塗布

一〇三一 酸化亞鉛

緩和軟膏

右塗布

一〇三二 硼酸

巴拉賓、白蠟

各一〇〇

右塗布

一〇三三 硼酸

僱里設林、巴拉賓

各二五〇

阿列布油

右塗布

一〇三四 白降汞

右塗布

〇、四

單軟膏

右塗布

一〇三五 へブラ氏軟膏

右塗布

一〇三六 安息香酸亞鉛軟膏

右塗布

一〇三七 僱里設林

澱粉

右塗布

一〇三八 ハスクス油

或加里紐謨油

僱里設林、緩和軟膏

右塗布

各二〇〇

外耳濕疹 町瞤凝固

六百三十七

| | | | | | |
|-------|-------------|-------|---------|---------|------|
| 10101 | 右點入 僱里設林 | 11000 | 阿列布油 | 1500 | 僱里設林 |
| | 右點入 | | 右點入 | | 右點入 |
| 10102 | 硼酸 | 10133 | 重碳酸那篤留謨 | 005 | |
| | | | 水 | 1512000 | |

外聽道癢痒

| | | | | | |
|-------|----------|-------|-----|-----|-------|
| 10104 | 硝酸銀水(4%) | 11500 | 右塗布 | 001 | 加耶布的油 |
| | 右塗布 | 10135 | 白降末 | 001 | 樟腦油 |
| 10105 | 緩和軟膏 | 10000 | 單軟膏 | 000 | 右點入 |
| 10105 | 碳酸鉛軟膏 | 10000 | 右塗布 | | |

耳血腫 Othaematoma.

| | | | | | |
|-------|------------|-------|---------|-------|------|
| 10106 | 沃度丁幾 | 10000 | 右塗布 | 各1000 | 沃度丁幾 |
| | 右塗布 | | | | 右塗布 |
| 10109 | 沃度丁幾、沒食子丁幾 | 10160 | 阿片泊美蘭丁幾 | | |

急性鼓膜炎 Myringitis acuta.

| | | | | | |
|-------|--------------|-------|-------|------|--------------|
| 10101 | 鹽酸莫爾比涅軟膏(1%) | 10000 | 僱里設林 | 2000 | 僱里設林 |
| | 右塗布且圍 | 10000 | 僱里設林 | 1000 | 右點入 |
| 10102 | 次醋酸鉛 | 001 | 沃度加留謨 | 001 | 醋酸鉛 |
| 10102 | 醋酸莫爾比涅 | 001 | 沃度 | 001 | 水 |
| | 水 | 5000 | 右塗布 | 100 | 阿片安息香丁幾 |
| | | 10160 | 石炭酸 | | 右一日三四回每回點入十滴 |

一〇三六 硫酸亞鉛、枯礬 各〇、四 水 四〇、〇 右點入

鼓膜破裂 Perforatio membranæ Tympani. 鼓膜穿透、鼓膜穿孔、

鼓膜乾燥穿孔 Perforatio siccæ membranæ tympani.

一〇三七 炭酸加留謨 〇、二 右塗布 單軟膏 一〇、〇
華攝林 一〇、〇 一〇三六 硝酸銀 一、〇 右塗布

慢性鼓膜炎 Myringitis chronica.

一〇三九 沃度加留謨水(二%) 五〇、〇 一〇三九 醋酸鉛水(一%) 一〇、〇 經十五分時洗滌

右洗滌

右一日二回每回點入十滴

一〇三九 昇末

〇、一 〇、五

一〇三〇 硫酸亞鉛水(一%) 一〇、〇 一〇三二 硝酸銀水(八%) 一〇、〇 酒精 二〇、〇

右點入十滴

右清洗後點入十滴至十五滴

右點入

鼓膜肥厚 Incrusatio membranæ tympani.

一〇三四 沃度加留謨 四、〇 右塗布 右塗布

沃度

〇、二 一〇三五 昇末

〇、五

備里設林

四〇、〇 水

三〇、〇

中耳加答兒 Otitis media 鼓室炎、耳痛、腦裏虛瘍、

急性中耳炎 Otitis media acuta.

慢性中耳炎 Otitis media chronica.

●內服劑

一〇三六 醋酸莫爾比涅 〇、〇三

白糖

鼓膜破裂、慢性鼓膜炎、鼓膜肥厚、中耳加答兒

六百三、

中耳加答兒

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|------------|---------|------|-------------|---------|------|------|---------------|---------|
| 一〇三九 | 抱水格魯刺兒 | 右分六包臨臥前二三包 | 二、五 | 一〇四二 | ●點入劑 | 阿片 | 一、〇 | 一〇四九 | 鹽酸古加乙澀 | 〇、二 |
| | 覆盆子舍利別 | * | 一五、〇 | | 水 | 右點入 | 二〇、〇 | | 水 | 一〇、〇 |
| | 右臨臥頓服半量 | | 一五、〇 | 一〇四三 | 鹽酸莫爾比涅 | 〇、二一〇、四 | | 一〇四〇 | 鹽酸古加乙澀水 | 〇、一〇、〇 |
| 一〇三六 | ●含嗽劑 | | | | 杏仁水 | 一〇、〇 | | | (〇、五一、一〇)一〇、〇 | |
| | 硼酸 | | 二、〇一四、〇 | | 右點入 | | | 一〇四二 | 石炭酸 | 一、〇 |
| | 水 | | 四〇、〇 | 一〇四四 | 醋酸莫爾比涅 | 〇、二 | | | 雷里設林 | 一〇、〇 |
| | 麥酒 | | 五〇〇、〇 | | 阿列布油 | 一〇、〇 | | | 右點入 | 一〇、〇 |
| | 右每二時含嗽 | | | 一〇四五 | 右點入 | | | 一〇四三 | 烏頭丁幾 | 五、〇 |
| 一〇三九 | 撒里美爾酸 | | 〇、二 | | 菲沃斯油 | 一〇、〇 | | | 右一日點入八滴至十滴 | |
| | 格魯兒那篤留謨 | | 〇〇、六 | | 阿片越幾斯 | 〇、五一〇、八 | | | | |
| | 水 | | 八〇、〇 | 一〇四六 | 右點入 | | | | | |
| | 右含嗽 | | | | 菲沃斯油 | 三〇、〇 | | | 依的兒 | 一、〇 |
| 一〇四〇 | 格魯兒安母紐謨 | | 五、〇 | | 嘔囉仿謨 | 三〇、〇 | | | ●塗布劑 | 一、二、〇 |
| | 水 | | 五〇〇、〇 | | 右點入 | | | | 右塗布耳周圍 | 一、二、〇 |
| | 別拉敦那丁幾 | | 〇〇、八 | 一〇四七 | 菲沃斯油、嘔囉仿謨 | 各二〇、〇 | | | ●塗布劑 | 一、〇、〇 |
| | 橙皮舍利別 | | 二〇、〇 | | 阿片丁幾 | | | 一〇四四 | 鹽酸莫爾比涅 | 〇、二一〇、四 |
| | 右每二時含嗽 | | | | 右點入 | | | | 綏和軟膏 | 一〇、〇 |
| 一〇四一 | 昇末 | | 〇、一 | | 菲沃斯油 | 二五、〇 | | | 右塗布 | 一〇、〇 |
| | 餛水 | | 四〇〇、〇 | 一〇四八 | 依的兒 | 三、〇 | | | 鹽酸莫爾比涅 | 〇、一十〇、二 |
| | 橙皮舍利別 | | 五〇、〇 | | 樟腦 | 一、五 | | 一〇四五 | 單軟膏 | 一〇、〇 |
| | 右含嗽 | | | | 右一日二回每回點入十滴 | | | | 右塗布 | 一〇、〇 |

● 注入劑

一〇四六 撒里矢爾酸

石炭酸

薄荷油

水

右注入

一〇四七 撒里矢爾酸

或硼酸

酒精

右一茶匙加一碗之水注入

一〇四八 ジャフテリン

〇、五—一、〇

水

右注入

一〇四九 罌粟殼煎(一〇、〇) 一〇〇、〇

阿片丁幾

右注入

● 吹入劑

一〇五〇 硫酸亞鉛

枯礬

右吹入

一〇五一 嚼嚼仿謨

依的兒

一〇〇、〇

十滴

五、〇

五、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

右為蒸氣送入

● 洗腸劑

知母爾

酒精

掘里設林

水

右灌腸

阿片丁幾

留水

右搥法

〇、五

五、〇

四、〇

七、〇

二、〇

二、〇

化膿性急性中耳炎
慢性化膿性中耳炎

Otitis media suppurativa acuta
Otitis media supp. chronica

● 洗滌劑

一〇四四 硫酸亞鉛

留水

右洗滌外耳

一〇四五 醋酸零士液

水

右洗滌

一〇四六 過滿他酸加留謨

留水

右洗滌

一〇四七 撒里矢爾酸

酒精

右一茶匙加一碗之水洗滌

一〇四八 クレチリン

右十滴加二五〇、〇之水洗

● 點入劑

一〇四九 撒魯兒水(1%)

右洗滌

● 點入劑

硫酸亞鉛

留水

右自歐氏管點入

硝酸銀液(10%)

右點入

硼酸

酒精

留水

一、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

一〇〇、〇

化膿性急性慢性中耳炎

急性迷路炎 Labyrinthitis acuta. 内耳炎

一〇四五〇 鹽酸必魯加兒必涅 〇、四 水 二〇、〇 右注射皮下

第十五編 眼科病

角膜翳 Macula corneae. 星翳、日星

角膜白斑 Leucoma.

角膜溷濁、角膜薄翳 Hornhauttrübung. Obscuraciones Corneae. Nubeculae conjunctivae.

●塗布劑

一〇四五二 黃降水 〇、〇五—〇、一 炭酸那篤留膜 〇、二

華攝林 一〇〇、〇 華攝林 三、〇

右塗布 〇、二五

一〇四五三 赤降水 一、〇—一、四五 沃度加留膜 〇、一五

醋酸鉛 一、〇 重碳酸那篤留膜 〇、二五

樟腦 〇、一 糖水 一、五、〇

華攝林 一八、〇 右點眼 〇、〇五

右塗布 一四六 鹽酸必魯加兒必涅 〇、〇五

一〇四五三 硫酸銅 〇、一—〇、二 糖水 五、〇、〇

牛酪 二、〇 右點眼 〇、〇一

樟腦 〇、一 硫酸カドミウム 〇、一

右塗布 一四七 糖水 五、〇

一〇四五四 沃度加留膜 〇、三 阿片丁幾 五、〇

急性迷路炎 角膜翳

右點眼 五、〇
●撒布劑
一〇五五 網末甘沫 一、〇
右撒布 〇、五
一〇五六 銅粉 四、〇
阿片 〇、五
白糖 〇、〇
右撒布 〇、〇五
沃度 〇、〇五
沃度加留膜 〇、〇一
糖水 〇、〇一
右器法 〇、〇一

一〇七九 水銀軟膏、單軟膏 各五、〇 別拉敦那越幾斯 一〇、〇 右塗布前額及顯額

角膜潰瘍

Ulcera corneae. 釘翳根深、星崩。

●洗滌器法劑

一〇八一 硼酸水(三%) 二〇〇、〇

右洗滌

一〇八六 硫酸亞錫魯比涅 〇、〇五

阿列布油

右一二滴點眼

一〇八三 撒里矢爾酸比蘇知密

錫水

右點眼

一〇八二 硼酸水(一%)

撒里矢爾酸

二〇〇、〇

一〇八七 硫酸亞錫魯比涅 〇、〇一

右洗滌

一〇八五 鹽酸規尼涅

錫水

右點眼

一〇八三 格魯兒水

水

五〇、〇

一〇八八 硫酸亞錫魯比涅 〇、〇五

鹽酸古加乙涅

一〇八四 銅禁

錫水

右一日二回點眼

一〇八三 別拉敦那越幾斯

水

三、〇

一〇八九 莫芽越幾斯

錫水

〇、〇五

●撒布劑

一〇八四 銅禁

阿片

白糖

右撒布

一、〇

〇、五

四、〇

一〇九〇 硫酸比蘇斯知密

錫水

右點眼

〇、〇五

五、〇

一〇九一 加刺拔兒豆越幾斯

錫水

右點眼

一〇八六 硫酸亞錫魯比涅

錫水

右塗布

〇、〇五

五、〇

一〇九五 沃度仿謨末

●點眼劑

一〇九七 硫酸亞錫魯比涅

錫水

右點眼

五、〇

角膜潰瘍

結膜加答兒

一〇四九 右塗布眼藥
ソゾヨトル那篤留膜

結膜加答兒

Conjunctivitis catarrhalis.

傷風性結膜炎、結膜傷風、天行赤眼、

硫酸亞篤魯比涅

〇、二五
〇、〇五

華搨杉

右塗布眼藥

一〇九六 ●點眼劑
硝酸銀 〇、二五—〇、五

一〇五八 醋酸亞鉛
右點眼 〇、〇三

一〇五二 硼酸那篤留膜
右點眼 〇、五

一〇五〇 硝酸銀水(〇、二%) 二〇、〇
右塗布 五〇、〇

一〇五七 硫酸亞鉛水(〇、一)五〇、〇
右一日二回點眼 一五、〇

一〇五三 硼酸那篤留膜
水 〇、五

一〇五二 硫酸亞篤魯比涅水(一%) 五、〇

一〇五八 硫酸亞鉛
右點眼 〇、一

一〇五三 鹽酸古加乙涅水(二%)
右一日二回點眼 一〇、〇

一〇五二 右點眼
泊芙蘭阿片丁幾 〇、五

一〇五九 硼酸那篤留膜水(〇、四%) 五〇、〇

一〇五四 鹽酸古加乙涅
右點眼 〇、二

一〇五三 昇汞
右點眼 一〇〇、〇

一〇五九 右點眼
泊芙蘭阿片丁幾 五滴

一〇五五 單寧酸水(一%)
右點眼 五〇、〇

一〇五三 次醋酸鉛液 二滴

一〇五〇 右點眼
硼酸那篤留膜 一、〇

一〇五六 銅礬
右點眼 〇、五

一〇五四 醋酸鉛水(〇、二五%) 一〇、〇

一〇五〇 杏仁水 五、〇

一〇五四 阿片泊芙蘭丁幾
右點眼 五滴

一〇五五 醋酸鉛水(〇、五%) 一〇、〇

一〇五一 硼酸那篤留膜
右點眼 一、〇

一〇五七 麥角越幾斯
右點眼 二、〇

水 四〇、〇

右點眼

一〇五八 亞爾答煎 二〇〇、〇

右點眼 二〇〇、〇

阿片泊芙蘭丁幾 十滴

右點眼

● 墨法劑

一〇五九 單寧酸 一、〇

杏仁水 二〇、〇

餾水 一〇〇、〇

右墨法

一〇五〇 硫酸亞鉛 六〇、〇

水 一〇〇、〇

阿片泊芙蘭丁幾 五滴

右墨法

一〇五二 硫酸亞鉛 〇、二五

阿片泊芙蘭丁幾 一、〇

醋酸鉛 〇、五

舊微水 一〇〇、〇

右墨法

一〇五三 次醋酸鉛液 六滴

水 一〇〇、〇

右一日三回十五分至三十分

時墨法

一〇五三 次醋酸鉛水(〇、二%) 二〇〇、〇

阿片丁幾 四、〇

右墨法

一〇五四 醋酸鉛 (四、〇) 三〇〇、〇

右墨法

一〇五五 醋酸鉛水 (一、〇) 一〇〇、〇

右墨法

一〇五六 石炭酸水 (〇、五) 一〇〇、〇

右墨法

一〇五七 昇汞水 (〇、〇一) 一〇〇、〇

右墨法

一〇五八 格魯兒安母紐護 〇、五

硫酸亞鉛 一、二五

餾水 二〇〇、〇

片腦油 〇、四一

阿片泊芙蘭丁幾 〇、一

右墨法

● 洗滌劑

一〇五九 硼酸水(二%) 三〇〇、〇

右洗滌

一〇六〇 醋酸鉛水(〇、五%) 三〇〇、〇

右洗滌

一〇六一 明礬

右洗滌

一〇六二 クレチリン

餾水

右洗滌

● 塗布劑

一〇六三 硝酸銀水(一一二%) 三〇、〇

右塗布

一〇六四 硫酸カドミウム

餾水

阿片丁幾 五、〇

右塗布

一〇六五 硫酸銅 五、〇

佛里設林軟膏

右塗布

一〇六六 撒里矢爾酸

水

右每夕塗布

一〇六七 華攝林、杏仁水

右塗布

一〇六八 昇汞

右塗布

實布的里性結膜炎 腺病性結膜炎

華攝林

一〇、〇

酸化亞鉛

〇、三一〇、五

一五〇四

依比知

一五三九 右爲眼軟膏塗布

九、〇

次醋酸鉛液

四滴—五滴

一〇、〇

澱粉、酸化亞鉛

二五、〇

一五三九 莫若越幾斯

一、〇

備里設林軟膏

一〇、〇

一〇、〇

華攝林

二五、〇

右塗布顯顯部

右塗布

〇、二

〇、二

●撒布劑

五、〇

一五四〇 白降汞 〇、〇三一〇、〇五

次醋酸鉛液

〇、六

一五〇四

沃度仿膜

五、〇

柯柯阿脂

二、〇

華攝林

一〇、〇

一五〇四

クマリン

〇、一

白蠟

一、〇

右塗布眼險綠

一〇、〇

一五〇四

右撒布

五、〇

甘扁桃油

三、〇

黃降汞

〇、一—〇、二

一五〇四

チナフォル

五、〇

右塗布眼險綠

華攝林

一〇、〇

一〇、〇

右撒布

五、〇

一五四一 白降汞 〇、二—〇、三

實布的里性結膜炎

Conjunctivitis diphtherica.

一五四二 硼酸水(一%)

三〇〇、〇

右點眼

五、〇

一五〇三

●鹽酸必魯加兒必涅水

〇、一—〇、二

右點眼

右點眼

〇、一—〇、二

右點眼

〇、一—〇、二

一五四三 硝酸銀水 (〇、五)二〇、〇—二五、〇

醋酸鉛水 (一、〇)一〇〇、〇

〇、一—〇、二

右點眼

〇、一—〇、二

右點眼

硫酸比蘇斯知備密涅水

〇、一—〇、二

右點眼

〇、一—〇、二

一五四四 鹽酸古加乙涅水(一—二%)

〇、一—〇、二

〇、一—〇、二

右點眼

〇、一—〇、二

腺病性結膜炎

Conjunctivitis serophulosa.

腺病性結膜炎、爛弦風、疳眼、

五滴

●內服劑

二、〇

水

五〇、〇

一五〇四

右朝夕一食匙

二、〇

一五五三 沃度加留謨

二、〇

覆盆子舍利別

一〇〇、〇

一五〇四

沃度鐵舍利別

二、〇

單舍利別 二〇、〇
 水 一八〇、〇
 右一日三四二分服
 一〇五五 六〇、〇
 一日二回分服
 炭酸鐵 二、〇
 規尼涅 一、〇
 一〇、〇
 右朝夕一刀尖
 ●毒法劑
 一〇五七 硼酸水(二%) 三〇〇、〇
 右毒法 一五、〇
 一〇五八 格魯兒水 一〇、〇
 水 一〇、〇
 右冷毒法
 ●撒布劑
 一〇五九 細末甘末 五、〇
 右撒布眼瞼內

一〇五〇 沃度仿謨 二、〇
 乳糖 二、〇
 右爲細末撒布
 ●點眼劑
 一〇六一 硝酸銀水(一%) 五〇、〇
 右點眼
 一〇六二 鹽酸古加乙涅 〇、一
 水 五、〇
 右點眼
 ●塗布劑
 一〇六三 甘末 〇、二
 刺乃林 三、〇
 華設林 二、〇
 右塗布結膜
 一〇六四 黃色酸化末 〇、〇五
 單軟膏 五、〇
 右塗布結膜囊
 一〇六五 黃色酸化末 〇、五

一〇六六 佛里設林軟膏 〇、〇
 右塗布結膜囊
 一〇六七 白降末 〇、〇
 別拉敦那越幾斯
 華設林 一〇、〇
 右塗布前頭及顯部
 一〇六八 赤色沃度末 〇、三
 阿片末 〇、二
 蓄微軟膏 六、〇
 右一日二回塗布眼瞼裏面
 一〇六九 硫酸亞錫魯比涅 〇、〇五
 華設林 一〇、〇
 右塗布結膜囊內
 一〇七〇 硫酸亞錫羅必涅 〇、〇五
 黃降末 〇、一
 鹽酸古加乙涅 〇、一
 華攝林或刺納林 〇、一
 右爲眼軟膏塗布 八、〇

顆粒性結膜炎 Conjunctivitis granulosa. Trachom.

トヲホーム、眼瞼顆粒腫、粗糙結膜炎、稗腫、險生風粟、
 處置 先豫防傳染、暗病室、施毒法、或行亂切以除劇痛、或貼地獄石以治膿漏其他要硝酸銀水、
 鉛糖水等隨便點眼、

顆粒性結膜炎

顆粒性結膜炎

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------|---------------------------|
| 一〇五七〇 | ●審法劑 硼酸水(二%) | 三〇〇、〇 | 阿片 白糖 | 〇、五 四、〇 | 一〇五八五 | 阿片消芙蘭丁 右點眼 | 〇、五 |
| 一〇五七一 | 右審法 硼酸 撒里矢爾酸 餾水 | 一五、〇 一、〇 五〇〇、〇 | ●點眼劑 右撒布眼險裏面 硝酸銀水(一一二%) 右點眼 | 五〇、〇 一〇、〇 | 一〇五八六 | 硫酸頭鉛水(〇、五%) 右點眼 | 五、〇 |
| 一〇五七二 | 右冷審法 醋酸鉛水(二一五%) | 五〇〇、〇 二〇〇、〇 | 右點眼 格魯兒水 醋酸鉛水(二%) | 一〇、〇 五〇、〇 | 一〇五八七 | ●塗布劑 白降汞 華林 右膏軟膏塗布 | 〇、〇 〇、五 一〇、〇 五、〇 |
| 一〇五七三 | 右冷審法 昇汞水(〇、一%) | 五〇〇、〇 | 右點眼 鹽酸古加乙濕水(一一三%) | 五、〇 | 一〇五八八 | 沃度仿 右點眼 | 〇、五 |
| 一〇五七四 | 一萬倍過滿倫酸加餾護水 | 五〇〇、〇 | 右點眼 鹽酸古加乙濕 五千倍昇汞水 | 一〇、〇 一〇、〇 | 一〇五八九 | 單藥酸 右一日一回塗布結膜囊內 | 〇、五 |
| 一〇五七五 | 右冷審法 硝酸 設林 | 一〇〇、〇 一〇〇、〇 | 右點眼 硫酸銅 餾水 | 〇、一 三〇、〇 | 一〇五九〇 | 備里設林軟膏 右塗布 | 一〇、〇 |
| 一〇五七六 | ●審法劑 鹽酸 エリチー煎 | (一五、〇)五〇〇、〇 | 右點眼 阿片丁幾 餾水 | 〇、五 三〇、〇 | 一〇五九一 | 醋酸鉛 備里設林 右塗布 | 一〇、〇 二、〇 一〇、〇 |
| 一〇五七七 | ●敷布劑 硫酸銅 | 一、〇 | 右點眼 硫酸銅 餾水、備里設林 | 〇、五 各一〇、〇 | 一〇五九二 | 硫酸銅軟膏(〇、五%) 右塗布結膜囊內 | 一〇、〇 |
| | 右一日三四洗滌 | | | | | | |

