

<三>

濟陰綱目卷之五

吳興 金德生閩風父輯著 錢塘 查學淳用拙父訂正

西陵 汪 淇澹河子箋釋 天都 查 望于周父參閱

○積聚癥瘕

○論婦人諸積形狀

外有腸胃有癥瘕三症亦當與此條參
按七門之中而癥有八其氣或聚或散
瘕則隱亦可與癥並
痛則八瘕之外又有
三積矣又男子為七
亦可同經男與女亦
有同病是癥不止於
八也瘕一不言及瘕
曰食而不化及瘕飲
何也蓋瘕氣之中未
嘗無飲而血凝食凝
之內未嘗無積則瘕
食血又未有不先因
積而成形病也故消
積之中當兼行氣消
痰消痰之藥為是

準繩云。大全良方。分瘕癥諸氣。癥瘕八癥。腹中痰血癥。痞食癥。血癥。凡七門。瘕者在腹內近臍左右各有一條筋。脈
急痛。大者如臂。次者如指。因氣而成。如弦之狀。故名曰瘕。瘕者僻在兩肋之間。有時而痛。故名曰瘕。瘕者痛也。瘕者
假也。其積聚浮假而痛。推移乃動也。八瘕者。黃瘕。青瘕。燥瘕。血瘕。脂瘕。狐瘕。蛇瘕。蠶瘕。積在腹內。或腸胃之間。與臟
氣結搏堅牢。雖推之不移。名曰癥。言其病形可徵驗也。氣壅塞為痞。言其氣痞塞不宣暢也。傷食成塊。堅而不移。名
曰食癥。痰血成塊。堅而不移。名曰血癥。若夫腹中痰血。則積而未堅。未至於成塊者也。大抵以推之不動為癥。推之
動為瘕也。至夫痰與瘕癥。則與痛俱痛。即現不痛。即隱在臍左右為瘕。在兩肋之間為瘕。在小腹而牽引腰脇為瘕。
恐學者一時難了。未免淆亂。故總叙而條析之。

○論婦人八瘕所因

病源曰。八瘕者。皆胞胎生產。月水往來。血脈精氣不調之所生也。腎為陰。主關閉。左為胞門。右為子戶。主定月水生
子之道。胞門子戶。主于精神氣所出入。合於中黃門。主門四邊。主持開元。禁閉子精。臍下三寸。名曰關元。主臟魂魄
婦人之胞。三焦之府。常所從止。然婦人血脈經絡合調。則月水以時來至。故能生子。而無病。婦人榮衛經絡斷絕不
通。邪氣便得往來。入合於臟。若生血未盡。而合陰陽。即使婦人血脈擊急。小腹重急。支滿胸脇。腰背相引。四肢痠痛。
飲食不調。腹中惡血不除。月水不時。或月前月後。因生積聚。如懷胎狀。邪氣相干者。令人恍惚多夢。寒熱。四肢不欲
動。陰中生氣。腫內生風。甚者小便不利。苦痛如淋。狀面目黃黑。歲月久。即不復生子也。

黃瘕者。婦人月水始下。若新傷墮。血氣未止。臥寢未定。五臟六腑。虛羸精神不足。因向大風便利。陰陽開闔。關節四
邊。中于風濕。氣從下入。入于腹中。稽留不去。名為陰虛。則生黃瘕。黃瘕之聚。令人苦四肢寒熱。身重淋露。臥不欲食。

左脇下有氣結牢不可破。若腰背相引痛。小水不利。令人不產。小腹急。下引陰中如刺。不得小便。或時寒熱。下赤黃汁。令人無子。當刺關元氣衝。行以毒藥。下即愈。

青瘕者。婦人新產未滿十日。起行以洗。洗太早。陰陽虛。玉門四邊皆解散。子戶未安。骨肉皆痛。手臂不舉。飲食未復。內臟吸吸。又當風卧。不自隱蔽。若居濕席。令人苦寒。洒洒入腹。煩悶沉淖。惡血不除。結熱不得散。則生青瘕。聚在左右脇下。藏于背脊上。與肩解。腰下擊急。腹下有氣起。喜唾不可多食。四肢不欲動搖。手足面目黃。大小便難。其後為之不通利。或不復禁。狀如崩中。此自過所致。令人少子。療之當刺胃管。行以毒藥。有法。瘕當下即愈。

燥瘕者。婦人月水下。惡血未盡。其人虛憊。而以夏月熱行疾步。若舉重。移輕汗出。交流氣血未平。而卒以恚怒。致腹中猥咽。不洩。經脈擊急。內結不舒。煩憊少力。氣上逆。胸膈背脊小腹壅急。月水與氣俱不通和。而反以飲清快心。月水橫流。溢入他臟。不去有熱。則生燥瘕之聚。大如半杯。上下腹中苦痛。連兩脇下。上引心而煩。害飲食。欲嘔吐。胸及腹中不得太息。腰背重喜卧。盜汗足疲。削久立而痛。小便失時。忽然自出。若失精。月水閉塞。大便澀難。病如此者。其人少子。療之以長鍼。按而刺之。法度行以毒藥。瘕當下即愈。

血瘕者。婦人月水新下未滿日數而中止。因飲食過度。五穀氣盛。溢入他臟。若大飢寒。呼吸不足。呼吸未調。而自勞動。血下未定。左右走腸胃之間。留絡不去。內有寒熱。與月水會合。為血瘕之聚。令腰痛不可俯仰。橫骨下有積氣。牢如石。小腹裏急苦痛。背脊疼。深達腰腹下擊。陰裏苦生風冷。子門僻。月水不時。乍來乍不來。此病令人無子。瘕之瘕當下即愈。

脂瘕者。婦人月水新來。若生未滿三十日。以合陰陽脈絡。分胞門傷。子戶失禁。關節散。五臟六腑津液流行。陰道暈動。百脈關樞四解。外不見其形。子精與血氣相通。犯禁。子精化不足。成子則為脂瘕之聚。令人支滿。更急。痺引小腹重。腰背如刺狀。四肢不舉。飲食不甘。卧不安席。左右走腹中切痛。時瘕時甚。或時少氣。頭眩身軀解散。苦寒惡風。膀胱脹。月水乍來乍去。不如常度。大小便血不止。如此者。令人無子。瘕之當刺以長鍼。行以毒藥。瘕當下即愈。

狐瘕者。婦人月水當日數來。而反悲哀憂恐。若似遠行。逢暴風疾雨。雷震驚恐。衣被沉濕。罷倦少氣。心中恍惚未定。四肢懈惰。振疾苦。寤寐氣絕。精神若亡。邪氣入于陰裏。不去則生狐瘕之聚。令人月水閉不通。少腹發滯。

胸膈腰背痛。陰中腫。小便難。胞門子戶不受男精。不藏氣。盛令人嗜食欲嘔。喜睡多所思。如有身狀四肢不舉。有此病者。終身無子。其瘕有手足成形者。殺人未成者。可療。以長鍼。急持刺之。行以毒藥。瘕當下。即愈。

蛇瘕者。婦人月水已下。新止。適閉未復。胞門子戶勞傷。陰陽未平。榮衛分行。若其中風暴病。羸劣。飲食未調。若起行當風。及涉泥塗。因衝寒太早。若坐濕地。名陰陽亂。腹中虛。若行道路。飲汗井之水。食不潔之食。吞蛇風之精。留絡不去。因生蛇瘕之聚。上食心肝。長大。其形如漆。在臍上下。還疔左右脇。不得吐氣。兩股脛間。苦疼。少腹多熱。小便赤黃。

膀胱引陰中。攣急。腰目俱痛。難以動作。喜發寒熱。月水或多或少。有此病者。不復生子。其瘕手足成形者。殺人未成者。可治。瘕之有法。行以毒藥。瘕當下。即愈。

蠶瘕者。婦人月水新至。其人劇作罷勞。汗出衣服潤濕。不以時去之。若當風睡。足踐濕地。恍惚覺悟。蹠立未安。顏色未平。復見所好。心為之開。魂魄感動。五內銳消。若入水浣洗沐浴。不以時出。而神不守。水精與邪氣俱入。至三焦之中。暮玉門先閉。津液妄行。留絡不去。因生蠶瘕之聚。大如小椽。令人小腹內切痛。惡氣左右走。上下腹中苦痛。若存若亡。持之躍手。下引陰裏。腰背亦痛。不可以息。月水不通。面目黃黑。脫聲少氣。有此病者。令人絕子。其瘕有手足成形者。殺人未成者。可治。瘕有法度。以長鍼按瘕之。行以毒藥。瘕當下。即愈。

○論婦人瘕痞
大全云。婦人瘕痞。由飲食失節。脾胃虧損。邪正相搏。積于腹中。牢固不動。有可徵驗。故名曰瘕。氣道壅塞。故名曰痞。得冷則發。冷入于臟則不孕。入胞絡則月水不通。

薛氏曰。前證若脾胃虛弱。用六君子。加芎歸。若肝脾虛弱。用補中益氣。及歸脾湯。若肝火鬱滯。佐以蘆薈丸。六味丸。外貼阿魏膏。患者須慎七情六淫。飲食起居。治者不時審察病機。而藥之庶幾有效。

○論食瘕
大全云。婦人食瘕。臟腑虛弱。月候來時。食生冷之物。脾胃既虛。不能消化。與臟氣相搏。結聚成塊。日漸生長。盤牢不移。故謂之食瘕也。

薛氏曰。前證若形氣弱。須先調補脾胃為主。而佐以消導。若形氣充實。當先疏導為主。而佐以補脾胃。若脾氣壅血。

移。故謂之食瘕也。

薛氏曰。前證若形氣弱。須先調補脾胃為主。而佐以消導。若形氣充實。當先疏導為主。而佐以補脾胃。若脾氣壅血。

薛氏之說可為病久虛羸者法

滯而不行者。宜用烏藥散散而行之。散用烏藥或醋浸炒心當歸批仁青皮木香各等分為末每二錢熱酒送下脾氣虛而血不行者。宜用四君芎歸補而行之。若脾氣鬱血而不行者。宜用歸脾湯解而行之。若肝脾血燥而不行者。宜用加味道遙散清而行之。大抵食積痞塊之證。為有形。蓋邪氣勝則實。真氣奪則虛。當養正關邪。而積自除矣。雖然。堅者削之。客者除之。胃氣未虛。或可宜用。若病久虛弱者。不可輕試也。

○論血癥

大全云。婦人寒熱失節。臟腑氣虛。風冷在內。飲食不消。與血氣相結。漸生顆塊。盤牢不移動者是也。皆因血氣勞傷。月水往來。經絡痞塞。惡血不除。結聚所生。久而不癒。則心腹兩脇苦痛。害于飲食。肌膚羸瘦。問癥一也。何以知是血癥。曰。血外之証。蒼悶煩燥。迷忘驚狂。痰嘔汗多。骨熱肢冷。其蓄在下焦者。必臍下結急。外熱內痛。尺脈洪而數也。桃仁靈脂生地黃牛膝大黃甘草逐之。

薛氏曰。前証多兼七情虧損。五臟氣血乖違。而致。蓋氣主噓之。血主濡之。脾統血。肝藏血。故鬱結傷脾。恚怒傷肝者。多患之。腹脇作痛。正屬肝脾二經証也。潔古曰。養正積自除。東垣云。人以胃氣為主。治法當主於固元氣。而佐以攻伐之劑。必需之歲月。若期速效。投以峻劑。反致有悞。

○論腹中痰血

大全云。婦人月經不調。或產後餘穢未盡。因而乘風取涼。為風冷所乘。而得冷。則成痰血也。血痰在內。則時時體熱。面黃。痰久不消。則為積聚癥瘕矣。

薛氏曰。前証若鬱結傷脾。用加味歸脾湯。若恚怒傷肝。用加味道遙散。若產後惡露用失笑散。若肝脾虛損。用六君子柴胡。以補元氣為主。胃氣虛弱。用補中益氣湯。加茯苓半夏為主。大凡腹中作痛。畏手按者。此內有痰血。若形體如常。屬病氣。元氣俱實。用桃仁承氣湯。直下之。若痛而肢體倦怠。飲食少思。此脾胃受傷。屬病氣有餘。元氣不足。用當歸散調和之。若痛而喜手按腹。形體倦怠。飲食少思。此形氣病氣俱不足。用六君子炮薑芎歸純補之。若痛而大便不實。飲食難化。此脾腎虛寒。用六君子炮薑肉桂溫散之。若痛而作嘔。少食。此脾胃虛弱。用六君子炮薑藿香。若痛而嘔注。不食泄瀉。用六君子薑桂。若兼手足逆冷。自汗。更加附子。此証多有因攻伐而致者。

立書專重脾胃。其言如此。然亦一偏之見。譬如攻劑之藥。不得其法。反致傷氣。以致為害矣。

○論痲瘕

大全云。痲者在腹內。近臍左右各有一條筋脈。急痛大者。如臂次者。如指。因氣而成。如弦之狀。名曰痲也。瘕者為僻。僻在兩肋之間。有時而痛。故曰瘕也。二者皆陰陽不和。經絡痞隔。飲食停滯。不得宣流。邪冷之氣。搏結不散。得冷則發作疼痛。○夫痲瘕癥。血氣塊硬。發作則痛甚。則欲死。究而言之。皆血之所為。僕嘗治一婦人。血氣刺痛。極不可忍。甚而死。一二日方省。醫巫併胎。數年不愈。僕以葱白散。烏雞丸。遂安。又嘗治一婦人。血氣作楚。如一小盤。樣走注刺痛。要一人扶定。方少止。亦用此二藥。而愈。尋常小小血氣。用此二藥。亦有奇效。故錄於後。

○論痲瘕

大全云。婦人痲瘕。由飲食不節。寒溫不調。氣血勞傷。臟腑虛弱。風冷入腹。與血相結。所生痲者痛也。瘕者假也。結聚浮假而痛。推移乃動也。婦人之病。有異於丈夫者。或因產後。血虛受寒。或因經水往來。取冷過度。非獨飲食失節。多挾痰血氣所成也。其脈弦急者。生虛弱。小者死。尺脈瀦而浮。牢為血實。氣虛其發腹痛。逆氣上行。此為胞中有惡血。久則結成血瘕也。

薛氏曰。子和云。遺溺閉癢。陰痿浮瘦。精滑白淫。皆男子之痲也。若血涸。月事不行。行後小腹有塊。或時動移。前陰突

女子亦有痲男子亦有痲

巢氏止言胞門傷而此直指胞中惡血亦本病源來

出後陰痔核。皆女子之痲也。但女子不謂之痲。而謂之瘕。一婦人小腹痞脹。小便時下白帶。小水淋漓。此肝經濕熱。下注用龍膽瀉肝湯而愈。一婦人小腹脹痛。小水不利。或胸乳作痛。或脇肋作脹。或氣逆心吻。余以為肝火而血傷脾。用四物柴胡青皮玄胡索木香而愈。

一婦人小腹痞悶。小便不利。內熱體倦。懶食。用八珍湯加柴胡山梔龍胆草治之而安。

○論腸覃

李氏曰。腸覃乃寒氣客於大腸。與胃相搏。大腸為肺傳送。肺主氣。氣得熱則行。得冷則凝。凝則清氣散而濁氣結。為瘕。覃日久不已。瘕肉乃生。始如雞卵。久如懷胎。按之堅。推之移。月事時下。或多或少。或氣病而血未病也。宜二陳湯加香附以開之。或香粉丸。

癥瘕積聚並起于氣
故有氣積氣聚之說
然謂氣積者氣
聚而後血凝也其夫
食失痰又各隨所積
而變見矣夫痰與血
食皆賴氣以爲之行
化故氣行物生氣病
物病此百病所以皆
生于氣而破血消食
消痰之劑必用氣藥
者以此

厥梳散同用益水
兼耳未必盡善
下不可輕漸守極妙

非癥積之症而謂癆
之症何歟
補中益氣何以能治
癆結意取積氣外散
也

蓋當言及治肝陰之結

論婦人癥瘕並屬血病

準繩云古方有五積六聚七癥八瘕之名五臟之氣積名曰積故積有五六府之氣聚名曰聚故聚有六雜病準繩
言之詳矣若夫七癥八瘕則婦人居多七者火數屬心蓋血生於心八者木數屬肝蓋血歸於肝雖曰強分理似不
混夫瘕者堅也堅則難破瘕者假也假物成形古人將婦人病為瘕疾以蛟龍等為生瘕然亦不必如此執泥婦人
瘕瘕並屬血病龍蛇魚鱉肉髮蟲瘕等事皆出偶然但飲食間誤中之留聚腹臟假血而成自有活性亦猶永徽中
僧病噎者腹中有一物其狀如魚即生瘕也與夫宿血停凝結為痞塊雖內所感之不同治法當以類相從所謂醫
者意也如以敗梳治蟲瘕銅屑治龍瘕麩葉治米瘕石灰治酒瘕如此等類學者可以理解也

論治積須養正氣

薛新甫云婦人瘕癖瘕瘕大抵因飲食起居七情失宜虧損臟腑氣血乖違陰絡受傷循行失度所致
羅謙甫云養正積自除必先調養使榮衛充實若不消散方可議下但除之不以漸則必有顛覆之害若不守禁忌
縱情嗜慾其有不喪者鮮矣

一婦人內熱作渴飲食少思腹內初如雞卵漸大四寸許經水三月一至肢體消瘦齒頰似蒼脈洪數而虛左關尤
甚此肝脾鬱結之証外貼阿魏膏午前用補中益氣湯午後用加味歸脾湯兩月許肝火稍退脾土少健午前補中
益氣下六味丸午後道遙散下歸脾丸又月餘日用蘆薈丸二服空心以道遙散下日晡以歸脾湯下喜其謹疾調
理年餘而愈

一婦人腹內一塊不時上攻或作痛有聲或吞酸痞悶月經不調小便不利二年餘矣面色青黃余以為肝脾氣滯
以六君加芎歸柴胡炒連木香吳茱各少許二劑却與歸脾湯送下蘆薈丸三月餘肝脾和而諸証退又與補中益
氣湯加茯苓牡丹皮中氣健而經自調

一婦人性多鬱善怒勤于女工小腹內結一塊或作痛或痞悶月經不調恪服伐肝之劑內熱寒熱胸膈不利飲食
不甘形體日瘦牙齦蝕爛此脾土不能生肺金肺金不能生腎水腎水不能生肝木當滋化源用補中益氣湯六味
丸至仲春而愈

原觀數葉皆以肝脾
腎為主而愈者在立
舊則可在也醫則不
可

至論

如服病相同故病可
陰子可得

魚腥黃涎能發濕熱

用法痛快

宜熱調

一婦人經候過期發熱倦怠或用四物黃連之類反兩月一度且少而成塊又用峻藥通之兩目如帛所蔽余曰脾
為諸陰之首。目為血脈之宗。此脾傷五臟皆為失所不能歸于目也。遂用補中益氣濟生歸脾二湯。專主脾胃年餘
而愈。

松江太守何恭。人性善。怒腹結一塊。年餘上齧。蝕透血氣虛極。時季冬肝脈洪數。按之弦緊。或用伐肝木清胃火之
藥。余曰。真氣虛而邪氣實也。恐伐肝木。至春不能發生耳。用八珍湯以生氣血。用地黃丸以滋腎水。肝木頓退。因大
怒耳內出血。肝脈仍大。煩熱作渴。此無根之火也。仍以前藥加肉桂二劑。脈飲熱退。因復大怒。果卒於季冬辛巳日。
乃金剋木故也。

李氏曰。善治癆瘵者。調其氣而破其血。消其食而豁其痰。衰其大半而止。不可猛攻峻施。以傷元氣。蓋扶脾胃正氣
待其自化。此開鬱正元散之由名也。愈後宜大小烏雞丸。八珍湯。交加散。交加地黃丸。調之。凡攻擊之藥。病重病受
病輕胃氣受之而傷矣。或云特塊消盡而後補養。則胃氣之存也幾希。

○論痰積用吐下

子和云。戴人過謙。過一卒。說出妻事。戴人問其故。答曰。吾婦為室女時。心下有冷積。如覆杯。按之如水聲。以熱手熨
之。如水。娶來已十五年矣。恐斷我嗣。是故棄之。戴人曰。公勿黜也。如用我藥。病可除。孕可得。卒從之。戴人診其脈沉
而遲。尺脈洪大。而有方。非無子之候也。可不踰年而孕。其良人笑曰。試之。先以三聖散。吐涎一斗。心下平軟。次服交
木調中湯。五苓散。後以四物湯和之。不再月氣血合度。數月而娠。二子。戴人嘗曰。用吾此法。無不子之婦。此言不誣。
三聖散用防風瓜蒂各三兩。藜蘆一兩。為粗末。以薑汁煎服。製煎法詳見儒門事親。○白朮調中湯。凡
白朮茯苓澤瀉橘紅各半兩。甘草一兩。乾姜官桂砂仁薑香各二錢。半為末。白糖化蜜調服。二錢。無時。
陽夏張主簿之妻。病肥氣。初如酒杯。大發寒熱。十五餘年後。因性急。悲感。病益甚。惟心下三指許。無病。滿腹如石片。
不能坐卧。針灸。徒勞人耳。乃邀戴人診之。曰。此肥氣也。得之季夏戊巳日。在左脇下。如覆杯。久不愈。令人發痰

瘡。瓜蒂散吐之。魚腥黃涎。約一二缶。至夜。繼用舟車丸。通經散。投之。五更。黃涎膿水相半。五六行。凡有積瘕。皆覺痛
後用白朮散。當歸散。和血流經之藥。如斯。湧泄。凡三次。愈。
瓜蒂散舟車丸。見雜病傷食。痰飲。二門。○通經散。用橘紅
酒。三味。各等分。為細末。每服三錢。臨卧。溫淡酒調下。○白朮散。白朮黃芩。各當歸。各等分。為末。每服二三錢。水煎。食
前服。○當歸散。當歸杜蘇。藜蘆。各等分。為末。米飲調服。食前此。吐泄兼施。且甘遂等逐水。太峻。用者。審之。不可妄用也。

按此諸藥方治氣血
痰食和平之劑海粉
不入者若作丸更佳

此惟病氣形氣俱平
者可用總書在隨氣
上下句若氣鬱生火
者忌

此方削堅積破滯氣
雖用白木為佐而氣
虛者不可輕服

胃寒氣實者可用
用藥巧處

工在氣行血流痰消
食消也妙在用醋之
多

此流行之法峻而不
猛行而得中妙在用
醋

○脈法

脈經曰婦人血脈積聚脈弦急者生虛弱者死 少陰脈浮而驚緊則必癆腹中痛半產而墮傷浮則亡血惡寒絕
產。

○通治諸積

開鬱正元散 治痰飲血氣鬱結食積氣不升降積聚腹痛宜此利氣行血和脾消導

白朮 陳皮 青皮 香附 山查 海粉 桔梗 茯苓 砂仁 玄胡索 神麩炒 甘草各右到每服一
兩生薑三片水煎服

大七氣湯 治癰疽積聚隨氣上下心腹疼痛上氣窒塞小腹脹滿大便秘不利

京三稜 蓬朮各煨 青皮去白 陳皮去白 香附炒 薑香葉 益智仁 桔梗 肉桂不見甘草錢半

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食前溫服

助氣丸 治三焦痞閉胸膈滿悶氣不流通蘊結成積瘕癖氣塊並皆起之

京三稜 蓬朮以上二味各用油紙包入 青皮去白 陳皮去白 白朮各十 枳壳炒 檳榔 木香各十

右為末糊丸桐子大每服五十丸滾水下

勝紅丸 治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水丈夫酒積女人脾血積小兒食積

京三稜 莪朮醋煮 青皮 陳皮 乾薑 良薑地各 香附子淨炒 右為末醋糊丸如桐子大每

服三十丸生薑湯下 虛者以補藥下之 一方加神麩麥芽

三稜煎 治婦人血脈血癥食積痰滯

三稜 莪朮各一青皮去白 半夏湯地 麥芽炒各 右用好醋六升煮乾為末醋糊丸如桐子大每服五十

丸淡醋湯下 痰積薑湯下

香稜丸 治一切積聚破痰癥消癥塊

丁香 丁香各半 枳壳炒 三稜酒浸 莪朮細到每一兩用巴豆三十粒去壳 青皮 梨川棟子肉 藜香炒

凡消塊俱用熱藥行氣劑整之劑而此方又以補中須真千金方也用云之

分等 右為末醋麪糊丸如桐子大朱砂為衣每服三十丸薑鹽湯或溫酒下無時

大硝石丸 治七癥八癥聚積痞塊及婦人帶下絕產腹中有癥瘕者當先下此藥但去癥瘕令人不困

硝石三兩 大黃兩 人參 甘草各一 右為末以三年苦酒三升置銅石器中先用大黃微火熬微沸當覺

不息至七分內餘藥復熬成膏至可丸即丸如桐子大每服二十九丸米飲下三日一服婦人服之或下如鴉肝

或如米汁赤黑等物二三升後息風冷

阿魏膏 治一切瘡塊

羌活 獨活 玄參 官桂 赤芍藥 川山甲 生地黃 兩頭共 大黃 白芷 天麻 紅花四錢

鬘子十粒 槐柳桃枝各三 亂髮雞子大 右用香油二觔四兩煎黑去渣入髮煎髮化仍去渣徐去黃丹

煎軟硬得中入芒硝阿魏蘇合油乳香沒藥各五錢麝香三錢調勻即成膏矣攤貼患處鋪平半指厚以紙蓋

用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥

○分治八癥

皂莢散 療黃癥導方

皂莢炙一兩 蜀椒去汁 細辛半兩 右搗散以三角囊大如指長三寸貯之內陰中欲便悶則出之已則復

內之惡血畢出乃洗以溫湯三日勿近男子忌生菜等

療青癥坐導方

戎鹽一升 皂莢半兩 皮子 去子 細辛半兩 右搗散以三角囊大如指長三寸貯之內陰中但卧癥當下清如葵汁養

之如產法

療燥癥方

大黃如雞子許 乾薑各二兩 黃連三兩 桂心一兩 厚朴四兩 炙郁李仁一兩 皮火炒 廩蟲三枚 雞臍脰中黃膜一枚 右搗散

早朝空腹以溫酒一盞和三錢頓服癥當下畢養之如產法三月勿合陰陽無子者當有

療血癥攻刺腹脇時痛導藥方

八癥之由皆自胞門子戶感受茲用此方以導之

大黃 當歸各半 山茱萸 皂莢去皮各 細辛 戎鹽各半 右搗以香脂丸如指大每用一丸綿裏內陰中
正坐良久瘕當自下養如乳婦法。

瘕婦人血瘕痛方。

乾薑 烏鰂魚骨一兩去 桃仁一兩去 右搗散酒服二方寸七日二一方無桃仁。

桃仁煎 治婦人血瘕血積經候不通。

桃仁 大黃各一兩 蟲炒半兩 朴硝各一兩 右為末以醅醋二升半銀石器中慢火煎取一升五合下大蟲蟲桃

仁不住手攪煎至可丸下朴硝攪勻出之丸如梧桐子大前一日不用吃晚飯五更初用溫酒吞下五九日午

取下如赤豆汁或如雞肝蝦蟆衣之狀未下再服如鮮血來即止續以調補氣血藥補之○本事方云頻年在

毗陵有一貴宦妻患小便不通臍腹脹不可忍東醫皆作淋治以八正散之劑愈甚予診之曰此血瘕也非瞑

眩藥不可去用此藥更初服至日午大痛不可忍遂卧少頃下血塊如拳者數枚小便如黑豆汁一二升痛止

即愈○此藥治病的切然猛烈氣虛弱者不可輕用。

瘕脂瘕方。

皂莢七錢半 礬石燒半 五味子 蜀椒去細辛 乾薑各半 右搗散以香脂和如大豆著男子陰頭以合陰

陽不三行其瘕即愈。

導散方。

皂莢灸去 吳茱萸 當歸各一兩 蜀椒去汁 乾薑 大黃 戎鹽各二 細辛炒 礬石燒 五味子絡二 右搗篩

為散以輕絹袋如指大長三寸盛藥令滿內陰中坐卧隨意勿行走小便時去之別換新者。

瘕狐瘕方。

取新死鼠一枚裏以新絮塗以黃泥穿地坎足沒鼠形置其中桑柴火灼其上。一日一夜出之研為末肉桂心

末二錢半酒服二方寸七病當下甚者不過再服愈。

瘕蛇瘕方。

以上八症方有本末
但須認在其耳
土懶不明

此方破結破血行氣
清飲溫行積塊要藥

此方破結氣滯結血
軟堅溫利亦可備用

猛峻之丸不可妄視

大黃 黃芩 芒硝各半 甘草大如指 烏鰂魚骨二枚 皂莢六枚 酥去皮
下礮 通冥溫服之十日一劑 空心服之 瘕當下

瘕瘕瘕方。
大黃五錢 芫薑 側子各半 附子 人參各三錢 麤蟲一付 桂心錢半 細辛 土蛆各半 白朮一兩 右搗散
以酒服方寸七日三

○治瘕瘕
穿山甲散 治婦人瘕瘕及惡血氣攻心腹疼痛面無顏色四肢瘦弱
穿山甲煨 鱉甲醋炙 赤芍藥 大黃炒 乾漆炒 合桂心各一兩 川芎 芫花醋炒 當歸各半 麝香二錢 半

右為末入麝和勻每服二錢熱酒調下無時
蓬莪朮丸 治婦人瘕瘕腹脇妨痛令人體瘦不思飲食
莪朮各錢 當歸焙 桂心 赤芍藥 檳榔 昆布 琥珀研 枳殼 木香各半 桃仁 鱉甲 大黃各一兩

右為末煉蜜丸如桐子大食前米飲下二十丸
丁香丸 治婦人瘕瘕結塊不散心腹疼痛
雄雞糞炒 黃鱉甲各一兩 礮砂 當歸焙 芫花醋炒 乾巴豆去皮 心油

右為末研勻醋煮麴糊丸如小豆大
當歸酒下三丸

桃仁散 治婦人瘕瘕心腹脹滿不能飲食體瘦無力
桃仁一兩 湯浸去皮尖雙仁訶子皮 白朮 赤芍藥 當歸各七京 三稜微炒 陳皮去白 鱉甲醋炙 去襖

右為散每服二錢水一盞入生薑一錢三分煎至六分去滓食前稍熱服○右方皆攻積之藥性多獷悍用者
慎之

○治食癥
化積丸 治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作雷鳴噎噎眩暈身熱時作時止

化積丸 治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作雷鳴噎噎眩暈身熱時作時止

此丹溪先生法也錄
古方率多香燥溫熱
反能助火損氣此方
以藥少而治右以山
梳治塊中之火其餘
破益消食散血誠種
當藥也

行氣消飲磨積

治血積甚平穩

此方恐致遲而腰腹
重痛須用行經藥方
效

平止效速

黃連一兩五錢用吳茱萸益 蘿蔔子 香附 山查各一川芎 山梔炒 三稜煨切 神麩炒 桃仁去皮共

右為末蒸餅丸服

小三稜煎丸

治食積酒癖血瘀氣塊時發刺痛全不思食及一切積滯不消心腹堅脹飲嘔噎酸脇肋刺痛

脾氣橫泄

三稜 莪朮各四 芫花二兩 右同入磁器中用米醋五升浸滿封器口以炭火煨令乾取出稜朮將芫花以

餘醋炒令微焦同稜朮焙乾為末醋糊丸如菜豆大一服十五丸生薑湯婦人血分男子脾氣橫泄腫滿如水

桑白皮煎湯下

礞砂丸 治婦人食積久不消令人瘦弱食少

礞砂 青礞石 穿山甲炙 三稜炒 乾漆炒令 硫黃各半 巴豆三十枚去皮 右為末用軟飯丸如小豆大每

服二丸生薑橘皮湯下

礞石丸 治婦人食積塊久不消攻刺心腹疼痛

青礞石 巴豆心法 朱砂 粉霜研 木香各二 礞砂研 右研勻以糯米軟飯和丸如菜豆大每二丸空心溫

酒下取下惡物為度○右二方犯礞砂巴豆非胃氣強壯而積氣堅頑勢不兩立者不可輕用也

○治血癥 增味四物散 治婦人血積

當歸 川芎 芍藥 熟地黄 三稜 黃芪 肉桂 乾漆炒烟毒 右為粗末每服五錢水煎服○余妻

曾患小腹積塊每遇寒觸劇痛不可忍諸醫治莫效余用此一服立止

六合湯 治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛

當歸 川芎 白芍藥 熟地黄 酒洗官桂 蓬朮煨切各 右咬咀每服四錢水煎空心服

血竭散 治婦人血瘀作痛臍下脹滿月經不行發熱體倦

當歸 芍藥 炒桂心 血竭 清黃炒各五分 胡索炒四分 右為細末每服二錢空心酒調下

牡丹散 治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼痛

牡丹皮 當歸 玄胡索 桂心各一兩 赤芍藥 半膝 莪朮各三兩 三稜一兩 右為粗末每服三錢水酒

各半盞煎服。

當歸丸 治婦人月經不調血積証。

當歸 赤芍藥 川芎 熟地黄 廣茂 京三稜各半兩 炒百草霜各二錢半 右為細末酒糊為丸如桐子

大沸水下六七十丸

大黃散 治婦人血凝血瘀食積痰滯。

川大黃碎錢半 鐵炒半盞 甲醋炙黃去 乾漆一兩 炒細盡 右為末用米醋一升煎為膏每服一錢食前溫酒調下

大紅花丸 治婦人血積癥瘕經絡滯血。

川大黃 紅花各二兩 蟲十個 去足 右取大黃二錢醋熬成膏和藥丸如桐子大每服五七丸食後溫酒下日

三服。

○治腹中瘀血

桃奴散 治血蟲及瘀血停積經水不通男子跌撲損傷皆效

桃奴炒 假鼠糞炒 玄胡索 肉桂 五靈脂 香附炒 砂仁 桃仁各等 右為末每服三錢酒調服

大黃湯 治婦人血瘀不消及撲損血瘀。

大黃生用 桃仁湯洗去皮 杏仁各一兩 肉桂去粗皮 郁李仁去皮 研生薑 地黃各一兩 右粗搗篩每服三錢水酒各半盞

同煎至七分去滓溫服

琥珀散 治婦人經絡痞閉腹內瘀血痛不可忍。

琥珀 乳香 沒藥各另研細末 右每服二錢水酒各半盞煎至七分入地黃自然汁二合再煎數沸去滓入

地榆散 治敗血

三物固妙而入地黃
清尤佳

何首烏白芷有奇處

何首烏 肉桂 地榆 香白芷 各等 右為粗末。每服二錢。米泔一盞。半沙糖一小塊煎至八分。去滓空心食前服。

此治氣血虛飲無狂不可

○治疔瘰

麝香丸 治婦人疔瘰冷氣兼症氣心腹痛不可忍。

麝香 另研 阿魏 煨令起熱 五靈脂 三棱 路七桃仁 錢芫花 醋炒 檳榔 各一 莪朮 桂心 沒藥 木香

當歸 各半 右為細末。入麝香。令勻。粳米飲飯為丸。如桐子。大每服十丸。淡醋湯下。無時。

治婦人疔瘰及血氣等神効方。

用豬猪肝一具。可及十兩者。以巴豆五十枚。去外皮。紫在肝內。用醞醋三碗。煮肝極爛。去巴豆。不用入京。三棱末和調得所。丸如桐子。大每服五丸。食前溫熱酒下。

葱白散 專治一切冷氣不和。及本臟膀胱氣攻衝疼痛。又治婦人胎前後腹痛。胎不安。或血刺痛者。兼能治血臟。

宿冷。百節倦痛。肌體怯弱。勞傷帶癖。久服盡除。但婦人一切疾病。最宜服此。與後烏雞煎丸兼服

川芎 當歸 枳殼 厚朴 桂心 乾薑 船上懷香 芍藥 青皮 木香 麥芽 苦棟子 熟地黃

三棱 莪朮 茯苓 神麴 人參 各等 右為細末。每服三錢。水一盞。連鬚葱白二寸。拍破。鹽羊錢煎至七分。內大黃。訶子。宜相度病狀。如大便不利。入大黃同煎。不入鹽。如大便自利。入訶子煎。

烏雞煎丸 治婦人胎前產後諸般疾患。並皆治之。

烏雄雞 一隻 烏藥 蛇牀 牡丹皮 人參 白朮 黃耆 各一 蒼朮 米泔浸切 海桐皮 肉桂 去粗 附子 去

臍川烏 炮 紅花 白芍藥 蓬莪朮 陳皮 各二 玄胡索 木香 肉豆蔻 熟地黃 光焙 琥珀 草萊 各

兩 右細剉。用烏雄雞一隻。湯燻去毛。及腸肚。將上件藥。安放雞肚中。用新磁瓶。以好酒一斗。同煮。令乾。去雞

骨。以油紙盛。焙乾。為細末。煉蜜和丸。如桐子。大每服三十丸。○胎前產後。傷寒。蜜糖酒下。○胎前氣悶。壯熱。炒

薑酒下。○赤白帶下。生薑。地黃酒下。○產後敗血。注心。童子。小便。炒薑酒下。○產後血塊。填氣。心腹疼痛。玄胡

索酒下。○胎前嘔逆。薑湯下。○催生。炒蜀葵子酒下。○安胎。鹽酒下。○室女。經脈。當通。不。前。四肢疼痛。煎紅花

之。最。蓋。女。人。以。陰。為。體。而。性。多。燥。故。用。

昔有一女人患腹中痞塊攻心作痛服此而愈

胎前宜若產後血刺痛或血氣冷者宜

人身以血氣流行者為無病此方以四物補血人參助氣枳殼厚朴行上焦之氣懷香若棟子下行肝氣乾薑溫行血中之氣其

血消之劑之皆所以溫而行之也氣一行則痛自止矣以溫引血分使氣下行而

內入以引氣外通而開表如是則內外和而痛愈矣

女人體陰而用陽其經行以厥陰為主難屬其木性通於肝肝屬木性通於肝肝

氣生則血得其養而逆生之功若烏雄雞者其體陰而陽之象有水三木水生火

之象蓋女人以陰為體而性多燥故用

此以鼓動肝氣而助
 其用耳本方用參芪
 白朮以益三焦之氣
 紅花熟地白芍以益
 心也肝腎之血氣滯
 而不行者有蒼陳高
 藥木香以調之而滯
 胡疏理以行之因寒
 而凝者有烏附肉桂
 以溫之其諸品類或
 以中酸或消殺
 以化積或於血中行
 氣或於氣中行血或
 行表或行裏皆所以
 相替成功總之以氣
 血為王溫行為用而
 又以脾胃氣為先
 服也其所以治胎前諸
 疾則有所未信血邪
 者邪祟之謂但因血
 積而成故云皆血所
 為是認塊要訣然有
 上下左右之分而疾
 飲食積亦須有辨不
 可執泥一草即此方
 所用內鏡草藥意可
 知矣
 凡脈繫小沉遲背血
 凝氣滯之胎
 此服法根丹溪先生
 須知女子之症與男
 子不同
 按此症二字雖相
 連然以方觀之只重
 在症字蓋女之症重
 在血字之義故耳大山
 之為而突起也亦然

酒下○血氣攻刺心腹疼痛煎當歸酒下○血暈校欄燒灰酒調吞下○血悶煎烏梅湯研硃砂下○子宮久
 冷溫酒或棗湯下空心日一服○血氣勞人參酒吞下○小腹疝痛炒茴香鹽酒吞下○血散四肢遍身虛浮
 黃腫赤小豆酒下○常服溫酒醋湯任下並空心食前服○血邪研硃砂麝香酒下

夫症癖癥瘕血氣塊硬發渴刺痛甚則欲死究而言之皆血之所為僕嘗治一婦人血氣刺痛極不可忍甚而死
 一二日方省醫巫並治數年不愈僕以葱白散烏雞丸遂安又嘗治一婦人血氣作楚如一小盤樣走注刺痛要
 一人扶定方少止亦用此藥而愈尋常小小血氣用此二藥亦有奇效陳宜人病血氣作楚痛不可忍服諸藥無
 效召僕診之兩關脈弱沉為肝脈沉差緊此血氣漸成症癖也只以此二藥治之而愈又四明馬朝奉後院亦病
 此用藥治之亦愈

四等丸 治婦人症癖氣心腹疼痛飲食不消

大黃剉碎訶黎勒去核檳榔 木香各等 右為細末酒煮麩糊和丸如桐子大每食前以生薑橘皮湯下十

五丸亦得

又方 蟹甲醋炙黃川大黃剉碎京三稜炮製各 右為末醋煮麩糊丸如桐子大每食前以生薑湯下十九

木香礞砂丸 治婦人症癖積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食不消久不瘥者

木香 礞砂研 丁香 官桂 附子炮 乾漆炒烟 細墨 乳香研 廣莪 青皮 沒藥研 大黃剉碎

三稜 猪牙皂角 乾薑地各巴豆霜減半 右除礞砂乳香沒藥外同為末以好醋一升化開礞砂去滓銀

器中慢火熬次下巴豆霜大黃熬成膏將前藥末與膏子為丸如麻子大每服三五丸食後溫酒送下加至

大便利為度○右三方皆攻積之劑全無補性虛人禁用實者亦須以四君子四物兼服乃可

○治症瘕

乾漆散 治婦人症瘕久不消令人黃瘦疔羸兩脇妨悶心腹疼痛

乾漆炒令木香 芫花醋炒赤芍藥 桂心 當歸 川芎 琥珀研各大黃炒牛膝七錢桃仁一兩麝香半錢 右為細末每服一錢溫酒調下無時

何彼皆連稱馬

此方治行經居多

專在瘀血乃流行之劑是知古人亦不專主於熱矣在人自擇

氣血凝食皆宜第藥太謹慎之

此方以氣為主而血藥止用一味然津有飛補之力又可以一當十也甚平穩宜備用

當歸散 治婦人疝瘕血氣攻刺心腹疼痛不可忍

醋炙當歸_{二兩} 桂心 檳榔 大黃_{各一兩} 川芎 吳茱萸_{湯泡七次} 木香 青皮_{去白} 蓬莪朮 赤芍藥

桃仁_{湯浸去皮共麩炒} 右為散每服三錢薑一錢三分水煎熱服不拘時

確砂丸 治婦人疝瘕及瘀血在臍時攻脇脇疼痛

川芒硝 確砂_{各一兩} 當歸 雄黃 桂心_{各半兩} 大黃_地 三稜_{各一兩} 右為細末米醋一碗熬大黃末為膏次入

餘藥末和丸如桐子大空心溫酒下十丸漸加至二十丸以利下惡物為度

巴豆丸 治婦人疝瘕及血氣疼痛

巴豆_{去皮心醋煮} 確砂_{半日} 大黃_炒 五靈脂 桃仁_{各七錢半} 木香_{各半兩} 以上 右煉蜜為丸如菜豆大淡醋湯空

心下五丸熱酒亦可

黑神丸

神麩 藎香_{各四兩} 木香 椒_炒 丁香_{各半兩} 檳榔_{四枚} 漆_{六兩} 羊生_{半兩} 用重 右除椒漆外五物皆羊生

羊炒為細末用前生熟漆和丸如彈子大又用藎香末十二兩鋪陰地陰乾候乾并藎香收器中至極乾去藎

香治腎氣膀胱疝瘕及疝墜五膈血崩產後諸血漏下赤白並一丸分四服死胎一丸皆綿灰酒下一雞麩炒

葵子四十九枚搗碎酒煎下諸疾不過三服疝氣十服膈氣癥瘕五服血瘕三丸當瘕一婦人病腹中有

大塊如杯每發痛不可忍諸藥莫愈投此丸盡三服杯氣盡消終身不作

肺露丸 治傷寒於內氣凝不流結於腸外久為癥瘕時作疼痛腰不得伸名曰腸覃

廣莖_{酒浸} 三稜_{酒浸} 乾漆_{去腥} 川烏_{各五錢} 確砂_{四錢} 青皮 雄黃_{另研} 茴香 鹽_炒 穿山甲_{地各輕粉一錢}

麝香_{半錢} 巴豆_{皮切} 右除研藥外將巴豆炒三稜廣莖二味黃色去巴豆不用共為末入研藥勻生薑

烏喙丸 治腸覃亦治乳餘并男子疝氣

烏喙_{地各一錢} 半夏_{湯洗} 石膏_煨 菘蘆_炒 牡蒙 茯苓_{酒浸} 桂心 乾薑_{地各一錢} 巴豆_{七個} 右為末煉蜜丸

寒者溫之者行之
以病在下焦並身血
分藥

此小兒疳積藥也
婦人亦有之大抵以
疳積為名故偶類集
之耳

以尺寸浮沉分氣血

又須分出氣虛血虛
不可並補

寒熱有上下治法分
早葦

生子要訣

如豆丸每服三五丸食後酒飲任下

見眼丹 治寒客於下焦血氣閉塞而成疔日以益大狀如懷子名曰石疔

附子地皮及鬼羽箭 紫石英各三錢澤瀉 肉桂 玄胡索 木香各二錢血竭一錢羊水蛭 檳榔二錢桃仁

另十個 三稜 五錢 大黃 五錢 右為細末用酒糊為丸如桐子大每服三十丸醋湯或溫酒下食前

蘆薈丸 治疔瘕肌肉消瘦發熱潮熱飲食少思口乾作渴或肝疔食積口臭生瘡牙齦蝕爛等証

蘆薈 胡黃連 黃連炒 木香 白萹荑炒 青皮各五錢當歸 茯苓 陳皮各一錢甘草七錢 右為末米

糊丸如桐子大每服七八十丸米飲下

濟陰綱目卷之六

○求子

○論求子須知先天之氣

胡氏曰男女交媾其所以疑結而成胎者雖不離乎精血猶為後天滓質之物而一點先天真一之靈氣萌於情慾之感者妙合於其間朱子所謂稟於有生之初悟真篇所謂生身受氣初者是也醫之上工因人無子語男則主於精語女則主於血著論立方男以補腎為要女以調經為先而又參之以補氣行氣之說察其脈絡究其虧盈審而治之夫然後一舉可孕天下之男無不父女無不母矣

○論求子脈須和乎

陳楚良曰人身氣血各有虛實寒熱之異惟察可知舍脈而獨言藥者妄也脈有十二經應十二時一日一周與天同運循環無端其至也既不宜太過而數數則熱矣又不宜不及而遲遲則寒矣不宜太有力而實非正氣能自實也正氣虛而火邪來乘以實之也治法先當散鬱以伐其邪邪去而後正可補也不宜太無力而虛虛乃正氣正血虛也治法惟當補其氣血耳亦有男婦上熱下寒表實裏虛而未得子者法當臨睡時服涼膈之藥以清其上每晨食未入口時服補藥以溫其下暫進升散之藥以達其表及服厚味之藥以實其裏又有女人氣多血少寒熱不調月水違期或後或先白帶頻下之無子者皆當診脈而以活法治之務欲使其夫婦之脈皆和平有力不熱不寒交

理婦人者先宜熟此
証治

合有期。不妄用精。必能生子。子不殤夭。故欲得子者。必須對脈立方。因病用藥。

○論求子先調經

婁氏曰。求子之法。莫先調經。每見婦人之無子者。其經必或前或後。或多或少。或將行作痛。或行後作痛。或紫或黑。或淡或凝。而不調。不調則血氣乖爭。不能成孕矣。詳夫不調之由。其或前或後。及行後作痛者。虛也。其少而淡者。血虛也。多者氣虛也。其將行作痛。及疑塊不散者。滯也。皆黑色者。滯而挾熱也。治法血虛者。四物加參芪。滯者。香附縮砂。木香檳榔。桃仁。玄胡。滯久血沉痼者。吐之下之。脈証熱者。四物加芩連。脈証寒者。四物加桂附。及紫石英之類是也。直至積去滯行。虛回。然後氣血和平。能孕也。予每治經不調者。只一味香附末。醋為丸。服之。亦百發百中。

○論求子貴養精血

袁了凡先生云。聚精之道。一曰寡慾。二曰節勞。三曰息怒。四曰戒酒。五曰慎味。今之談養生者。多言採陰補陽。此為大謬。腎為精之府。凡男女交接。必擾其腎。腎動則精血隨之而流。外雖不泄。精已離宮。未能堅忍者。亦必有真精數點。隨陽之痿而溢出。此其驗也。如火之有烟燭。豈有復反於薪者哉。是故貴寡慾。精成於血。不獨房勞之交損吾之精。凡日用損血之事。皆當深戒。如目勞於視。則血以視耗。耳勞於聽。則血以聽耗。心勞於思。則血於思耗。吾隨事而節之。則血得其養。而與日俱積矣。是故貴節勞。主閉藏者。腎也。司疏泄者。肝也。二臟皆有相火。而其系上屬於心。心君火也。怒則傷肝。而相火動。動則疎泄者。用事而閉藏不得其職。雖不交合。亦暗流而潛耗矣。是故當息怒。人身之血。各歸其舍。則常凝。酒能動血。人飲酒則面赤。手足俱紅。是擾其血而奔馳之也。血氣既衰之人。數月無房事。精始厚。而可用。然使一夜大醉。精隨薄矣。是故宜戒酒。內經云。精不足者。補之以味。然釀郁之味。不能生精。惟恬淡之味。乃能補精耳。蓋萬物皆有真味。調和勝而真味衰矣。不論脍炙。淡煮之得法。自有一段冲和恬淡之氣。益人腸胃。洪範論味。而曰稼穡作甘。世間之物。惟五穀得味之正。但能淡食。穀味最能養精。又凡煮粥飯。而中有厚汁。滾作一團者。此米之清液所聚也。食之。驟能生精。試之有效。○煉精有訣。全在腎家下手。內腎一竅。名玄關。外腎一竅。名牝戶。真精未洩。乾體未破。則外腎陽氣。至于時而興。人身之氣。與天地之氣。兩相融合。精洩體破。而吾身陽生之候。漸脫。

渴泄調經。惟子和可

有精滯。則汗濁不清。虛未回。則新生之氣。不鼓。一味香附。有去舊生新之妙。此五者。非特求子者。之良藥。亦可為養生者之真方。

玄牝內外之說。固是。結集猶未確。至論。

內腎二字蓋是一線法得口訣

須得逆取之道待之便是築基此先天氣生時也

有丑而生者。次則寅而生者。又次則卯而生者。有終不生者。始與天地不相應矣。煉之訣。須半夜子時。即披起坐。兩手搓極熱。以一手將外腎兜住。以一手掩臍。而凝神於內腎。久久習之。而精旺矣。

○論孕子必知綱緼之時

表了凡先生云。天地生物。必有綱緼之時。萬物化生。必有樂育之時。猶犬至微。將受娠也。其雌必狂呼而奔跳。以綱緼樂育之氣。觸之。而不能自止耳。此天然之節候。生化之真機也。世人種子有云。三十時辰。兩月半。二十八九君須算此特言其大槩耳。非的論也。丹經云。一月止有一日。一日止有一時。凡婦人一月經行。不可必有一日綱緼之候。於一時辰間。氣蒸而熱。昏而悶。有欲交接不可忍之狀。此的候也。於此時逆而取之。則成丹順而施之。則成胎矣。其曰。三日月出庚。又曰。溫溫鉛鼎。光透簾幃。皆言其景象也。當其欲情濃動之時。子宮內有如蓮花蕊者。不拘經淨幾日。自然挺出陰中。如蓮蕊初開。內人洗下體。以手探之。自知也。但含羞不肯言耳。男子預密告之。令其自言。一舉即中矣。

○論合男女必當其年

褚尚書求男論云。建平孝王。妃姬皆麗。無子。擇民家未笄女子入御。又無子。問曰。求男有道乎。澄對曰。合男女必當其年。男雖十六而精通。必三十而娶。女雖十四而天癸至。必二十而嫁。皆欲陰陽完實。然後交而孕。孕而育。育而子。堅壯強壽。今未笄之女。天癸始至。已近男色。陰氣早泄。未完而傷。未實而動。是以交親不孕。孕而不育。而子脆不壽。此王之所以無子也。然婦人有所產。皆女者。有所產。皆男者。大王誠能訪求多男婦人。至宮。詢有男之道也。王曰。善。未再期生六男。夫老陽遇少陰。老陰遇少陽。亦有子之道也。

○論男女精血盛衰

褚尚書曰。飲食五味。養髓。骨肉。血。肌膚。毛。髮。男子為陽。陽中必有陰。陰中之數八。故一八而陽精升。二八而陽精溢。女子為陰。陰中必有陽。陽之中數七。故一七而陰血升。二七而陰血溢。陽精陰血。皆飲食五味之秀實也。方其升也。智慮開明。牙齒更始。髮黃者黑。筋弱者強。暨其溢也。凡充身體。手足耳目之餘。雖針芥之滬。無有不下。凡子形肖父母者。以其精血嘗於父母之身。無所不滬也。是以父一肢廢。則子一肢不肖其父。母一目虧。則子一目不肖其母。

今年十二而子者亦事之常

方是求子一法

盛衰之道在七損八益之中

血竭者流白液竭
者必血來一以氣不
及化血一以血不
化精二者病則一般
其為害又不止于此

精未通而御女以通其精。則五體有不滿之處。異日有難狀之疾。陰已痿而思色以降其精。則精不出內。故小便道澀而為淋。精已耗而復竭。則大小便道牽疼。愈疼則愈欲。大小便愈便則愈疼。女人天癸既至。踰十年無男子合。則不調。未踰十年思男大合。亦不調。不調則舊血不出。新血誤行。或漬而入骨。或變而之腫。或雖合而難子。合男子多則瀝枯虛。產乳眾則血枯殺。觀其精血。思過半矣。

○論成胎分男女之異

褚尚書曰。男女之合。二精皆暢。陰血先至。陽精後衝。血開裏精。入為骨而男成形矣。陽精未入。陰血後參。精開裏血。入為骨而女形成矣。陽氣聚面。故男子面重。溺死者必伏。陰氣聚背。故女子背重。溺死者必仰。走獸溺死。仰伏皆然。陰陽均至。非男非女之身。精血散分。駢胎品胎之兆。父少母老。生女必羸。母壯父衰。生男必弱。古之良工。首察乎此。氣受偏瘁。與之補之。補羸女則養血壯脾。補弱男則壯脾節氣。羸女宜及時而嫁。弱男宜待壯而婚。此疾外所務之本。不可不察也。

丹溪曰。成胎以精血之後。先分男女者。褚澄之論也。愚竊惑焉。後閱東垣方有曰。經水斷後一二日。血海始淨。精勝其血。感者成男。四五日後。血脈已旺。精不勝血。感者成女。此論亦為未瑩。何以言之。易曰。乾道成男。坤道成女。夫乾坤陰陽之性情也。左右陰陽之道路也。男女陰陽之儀象也。父精母血。因感而會。精之泄。陽之施也。血能攝之。陰之化也。精成其骨。此萬物資始於乾元也。血成其胞。此萬物資生於坤元也。陰陽交媾。胎孕乃凝。胎之所居。名曰子宮。一系在下。上有兩歧。一達於左。一達於右。精勝其血。及剛日陽時感者。則陽為之主。受氣於左子宮。而男形成。精不勝血。及柔日陰時感者。則陰為之主。受氣於右子宮。而女形成。或曰。分男分女。吾知之矣。其有雙胎者。將何如。曰。精氣有餘。岐而分之。血因分而攝之。故也。若夫男女兩生者。剛日陰時感。柔日陽時感。則陰陽混雜。不屬左。不屬右。受氣於兩岐之間者也。亦有三胎四胎五胎六胎者。猶是而已。或曰。其有男不可為父。女不可為母。與男女之兼行者。又若何而分之。耶。子曰。男不可為父。得陽氣之虧者也。女不可為母。得陰氣之塞者也。兼形者。由陰為駁氣所乘。而為狀不一。以女兼男形者。有二。一則遇男為妻。遇女為夫。一則可妻而不可夫。又有下為女體。上具男之全形。此又駁之甚也。或曰。駁氣所乘。獨見於妻。而所乘之形。又若是之不同。耶。子曰。陰體虛。駁氣易於乘也。駁氣所乘。陰陽相

混無所為主不可屬左不可屬右受氣於兩歧之間隨所駁得氣之輕重而成形故所兼之形有不可得而同也
○論男女各由百脈齊到

承天之行乃是至理
然有不毛之地豈坤
道不順乎

程鳴謙云褚澄氏言男女交合陰血先至陽精後衝而男形成陽精先入陰血後參而女形成信斯言也人有精先
洩而成男精後洩而生女者獨何歟東垣曰纔斷一二日血海始淨感者成男四五日血脈已旺感者成女至於六
七日後則雖交感亦不成胎信斯言也人有經始斷交合生女經久斷交合生男者亦有四五日以前交合無孕八
九日以後交合有孕者獨何歟俞子木撰廣嗣要畧著方立圖謂實陽能入虛陰實陰不能受陽即東垣之故見也
又謂微陽不能射陰弱陰不能攝陽信斯言也世有疋羸之夫怯弱之婦屢次受胎雖欲止之而不能止者亦有血
氣方剛精力過人顧乃艱於育嗣而莫之救者獨何歟朱丹溪論治專以婦人經水為主然富貴之家侍妾已多其
中寧無經水過期者乎有已經前夫頻頻生育而娶此以圖其易者顧亦不能得胎更道與他人轉盼生男矣豈不
能受孕於此而能受孕於彼乎愚以為父母之生子如天地之生物易曰坤道其順乎承天而時行夫知地之生物
不過順承乎天則知母之生子亦不過順承乎父而已知母之順承乎父則種子者果以婦人為主乎以男子為主
乎然所謂主於男子者不拘老少強弱康寧病患精易泄難泄只以交感之時百脈齊到為善耳交感而百脈齊到
雖老弱病患易泄亦可以成胎交感而百脈參差雖少強雖康寧雖難洩亦難以成胎矣婦人所構之血固由於百
脈合聚較之男子之精不能無輕重之分也孔子贊乾元資始曰大贊坤元資生曰至得無意乎若男女之辨又不
以精血先後為拘不以經盡幾日為拘不以夜半前後交感為拘不以父強母弱母強父弱為拘只以精血各由百
脈齊到者別勝負耳是故精之百脈齊到有以勝乎血則成男矣血之百脈齊到有以勝乎精則成女矣至有既孕
而小產者有產而不育者有育而不壽者有壽而黃者無疆者則亦精血之堅脆分別修短耳世人不察其精血之堅
脆已定於稟受之初乃以小產專責之母以不育專付之男以夫壽專諉之數不亦謬乎

○趕經法

求嗣全書載趕經調和訣云有一女人月經來時專在下弦之期必用養血之法以逐之視其色紫則知血熱服涼
血藥以緩其氣則氣血和而來遲漸漸趕之定到初頭視其色淡短少者則服養血和血藥養其命門亦趕到初頭

經有不可起者謂女
人之經有一年一度
行者有四季行者

蔡女人肥瘦強弱而用藥一月便不能合疴之之久定到上弦此起經之法也以女人上弦交多生男耳又有一等女人身體肥胖子宮脂膜長滿經水難調亦令無子須服開子宮之藥以消其脂膜

○逐月養胎法

胎胎化於一氣胎者氣之足胎者形之著先天以制生故以水火土金木土石制而化馬後以逆而化以順而養成自然之妙也

袁先生云巢氏論婦人妊娠一月名胎胎足厥陰脈養之二月名始膏足少陽脈養之三月名始胎手少陰脈養之四月始受水精以行血脈手少陽脈養之五月始受火精以成其氣足太陰脈養之六月始受金精以成其筋足陽明脈養之七月始受木精以成其骨手太陰脈養之十月臟腑開節人神俱備足太陽脈養之此其大畧也若求其細則受胎在腹七日一變展轉相成各有相生大集經備矣○婦人墮胎在三月五月七月者多在二四六月者少臟陰而腑陽三月屬心五月屬脾七月屬肺皆在五臟之脈陰常易虧故多墮耳如昔曾三月墮胎則心脈受傷須先調心不然至三月復墮昔曾五月墮胎則脾脈受傷先宜治脾不然至五月復墮惟有一月之內墮胎則人皆知有胎但知不受妊不知其受而墮也一月屬肝怒則墮多洗下體則震開亦墮一次既墮則肝脈受傷他次亦墮今之無子者大半是一月墮胎非盡不受妊也故凡初交之後最宜將息勿復交接以擾其子宮勿令怒勿令勞勿令舉重勿令洗浴而又多服養肝平氣之藥胎可固矣

○論痰飲不孕

張子和云戴八過謙都營中飲會有一卒說出妻事戴人問其故答曰吾婦為室女時心下有冷積如覆釜按之如水聲以熱手熨之如水娶之已十五年矣恐斷吾嗣是以去之戴人曰公勿黜也如用吾藥病可除孕可得卒從之戴人脰其脈寸脈沉而遲尺脈洪大而有力非無子之候也可不逾年而孕其良人嘆曰試之先以三聖散吐涎一斗心下平軟次服白朮調中湯五苓散後以四物和之不再月氣血合度數月而娠一子戴人常用吾此法無不子之婦此言不誣○一婦年三十四歲夢與鬼神交驚怕異常及見神堂陰司舟楫橋梁如此一十五年竟無妊娠巫祈覲祝無所不至錯肌炙肉孔穴萬千黃瘦發熱引飲中滿足腫委命於天一日苦請戴人戴人曰陽火盛於上陰水盛於下見鬼神者陰之靈神堂者陰之所舟楫橋梁水之用兩手寸脈皆沉而伏知胸中有實痰也凡三湧三滑三汗不旬日而無夢一日而有娠

此二葉非子和生不能

○論求子禁用熱劑

妙在溫和二字蓋大寒大熱皆不能生物也

此桂最當

丹溪秦桂丸論曰無子之因多起於婦人醫者不求其因起於何處遍問古方惟秦桂丸其辭確其意專用溫熱藥
近乎人情欣然受之銳然服之甘受燂灼之禍猶懵然不悔何者陽精之施陰血能攝之精成其子血成其胞胎孕
乃成今婦人之無子者率由血少不足以攝精也血之少也固非一端然欲得子者必須調補陰血使無虧欠乃可
推其有餘以成胎孕何乃輕用熱劑煎熬臟腑血氣沸騰禍不旋踵矣或曰春氣溫和則萬物發生冬氣寒凜則萬
物消損非秦桂丸之溫熱何以得子臟溫煖而成胎耶子曰詩曰婦人和平則樂有子和則血氣均平則陰陽不爭
今得此藥經血必轉紫黑漸成衰少或先或後始則飲食驟進久則口苦而乾陰陽不平血氣不和疾病蜂起馬能
成胎縱然成胎生子亦多病而不壽以秦桂丸耗損天真之陰也戒之慎之按秦桂丸施於肥人而受其丸數雖服
調理補藥亦無妨但忌施於瘦人火多

○論孕子雜法

艾性雖熱實性下寒
寒者宜之

六味凡果驗

求育極當誠哉言也

豈此三方所能盡言
攝元之

丹溪曰婦人無子者多由血少不能攝精初醫悉謂子宮虛冷托以辛熱之藥煎熬臟腑血氣沸騰禍不旋踵或有
服艾者不知艾性至熱入火灸則下行入藥服則上行多服則致毒咎將誰挽○若是肥盛婦人稟受甚厚恣於淫
佚之人經水不調不能成胎謂之軀脂滿溢閉塞子宮宜行濕燥痰用星羊蒼朮台芎防風羌活滑石或導痰湯之
類○若是瘦怯性急之人經水不調不能成胎謂之子宮乾溢無血不能攝受精氣宜涼火降火或四物湯加香附
黃芩柴胡養血養陰等藥○東垣有六味地黃丸以補婦人之陰血不足無子服之者能使胎孕

薛氏曰婦人之不孕亦有因六淫七情之邪有傷衝任或宿疾淹留傳遺臟腑或子宮虛冷或氣旺血衰或血中伏
熱又有脾胃虛損不能營養衝任者此更當察其男子之形質虛實何如有腎虛精弱不能融育成胎者有稟賦先
弱氣血虛損者有嗜慾無度陰精衰憊者各當求其源而治之至於大要則當審男女之尺脈若左尺微細或虛大
無力者用八味丸左尺洪大按之無力者用六味丸兩尺俱微細或浮大者用十補丸若誤用辛熱燥血不惟無益
反受其害

○脈法

素問曰督脈生病女子不孕

脈經云婦人少腹冷惡寒久年少者得之此為無子年大者得之絕產○脈微弱而濇年少得此為絕產肥人脈細胞有寒故令少子其色黃者胸中有寒

○治血虛不孕

加味四物湯 治婦人不孕久服有子

當歸 川芎各二錢 白朮微炒 熟地黄酒洗各一錢半 白茯苓 芍藥微炒 續斷 阿膠各一香附 醋煮橘紅七分 甘草三分

分 右剉水二鍾煎八分食遠服

加味四物湯 治血氣兩虛不孕

當歸酒洗 白芍藥炒 肉苁蓉各二錢 熟地黄酒洗 白朮 白茯苓各一錢 人參五分 川芎三錢 右剉水煎服

每月經前三服經正行三服經行後三服

調經種玉湯 凡婦人無子多因七情所傷致使血傷氣盛經水不調或前或後或多或少或色淡如水或紫如血塊或崩漏帶下或肚腹疼痛或子宮虛冷不能受孕宜此藥百發百中效可通神

當歸酒洗 川芎 吳茱萸炒各四錢 熟地黄酒洗 香附炒各一錢 白芍藥 白茯苓去皮 陳皮 牡丹皮 玄胡索各三錢

右剉作四劑每一劑加生薑三片水一碗羊煎一碗空心溫服後再煎服待經至之日服起一日一劑藥盡經止則當交接而成孕矣縱不成孕經當對期候經來再服四劑必孕無疑○若過期而經水色淡者加官桂炒乾薑熟艾各二錢 若先期三四日色紫者加條芩三錢

經驗育胎丸 治婦人久無子嗣服此經調血盛子宮溫暖成孕孕後服之可保胎氣堅固

當歸酒洗 熟地黄酒洗 白朮 香附各四錢 砂仁三兩 芍藥酒洗 川芎 川續斷酒洗 陳皮 黃芩酒洗 各二兩

糯米糊丸如桐子大每服七八十丸空心淡醋湯下酒亦可以乾物壓之

婦人歸附丸 不但種子且無小產產後諸証

香附子大者炒城內醋煮極熟 當歸大者去蘆精用身酒洗 鹿角大者刮去粗皮銼末二三兩綿紙 右三味

二味簡切尤妙在鹿角

妙在調氣

種得當但氣旺血熱者須去芎朮而當歸味辛有熱症者亦須裁酌

不取血藥而能調血
凡胎前產後俱可服
謂之仙方亦宜

血熱者不宜又附加
艾此亦似畫蛇添足

此亦烏骨雞丸之變
考他方多用參朮白
朮以補氣而此兼蒼
朮砂仁益母以行氣
他方又佐以艾桂椒
薑等熱藥以溫經此
則以蛇麻山茺艾視
其下而又以條芩佐
之剛寒熱均停可無
偏弊之害矣服之當
自前驗

此方加服法尤為精
當可觀諸方而變通
之理又頭頂是道矣
玩之玩之

以薑汁浸地黃以醋
煮艾者有巽妙等分
亦是一法

服法須知
此早噴之劑而麥門
黑豆亦心腎藥也而
貝母與熟地用能無
功過相掩乎

和勻醋糊丸如桐子大每服三錢早起臨睡各一服白滾湯下一月經後入房即孕

神仙附益丸丹 不惟治婦人百病而生育之功効如神

香附米 一斤用童便浸透取出水洗淨露一蓋母草十二兩東流水右再用香附四兩北艾一兩煮汁用三分醋七分和前藥為丸如桐子大每服五七十丸空心臨臥淡醋湯下

加味地黃丸 治婦人久無孕育者効如影響

熟地黃四兩山茺二兩山藥二兩白茯苓二兩牡丹皮各一兩澤瀉各一兩香附子童便炒右為末煉蜜丸如桐子大每服七八丸滾湯下

金蓮種子仙方 一名夢熊丸有小苗女人服之有孕

熟地黃酒洗當歸酒洗白芍藥酒炒益母草川芎酒洗蒼朮米泔水浸一蛇床子酒洗條芩酒洗覆盆子炒玄胡索微炒陳皮水洗白丹參水洗砂仁去皮山茺酒浸香附四兩右為極細末先用白毛烏骨雞一隻預先喂養一月勿令與雌雞同處臨時將雞緝死不出血乾去毛剖開去腸內污物并膝內宿食肫內黃皮用酒洗盡一應事件仍裝入雞肚內不令見水置壘內入酒二斤封固重湯煮爛取出割下淨肉搗如泥又將雞骨用酥油和原汁或酒炙煉為末入前藥末內攪勻再用醋煮米糊同雞肉左杓內搗極細為丸如桐子大每服四五十丸漸至八九十丸空心清心飲下○如月信先期而至者加黃芪一兩人參白朮各一兩半溫酒或淡鹽湯下○如白帶者加蒼朮白朮升麻下○如月信先期而至者加黃芪一兩人參白朮各一兩半溫酒或淡鹽湯下○如白帶者加蒼朮白朮升麻

白芷各一兩半淡薑下

百子建中湯 女人服此藥調經養血安胎順氣不問胎前產後月事參差有餘不足諸症悉皆治之

當歸酒洗南川芎白芍藥酒炒熟地黃浸薑汁真阿膠蛤粉炒斷艾葉醋煮各右為細末煉蜜丸如桐子大每服八十丸空心百沸湯點醋少許下內寒者溫酒下

加味養榮丸 此方服之有孕且無小產之患

當歸酒浸熟地黃酒浸白朮各二兩芍藥川芎黃芩香附各一兩陳皮貝母去心茯苓麥門冬去心各

當歸酒浸熟地黃酒浸白朮各二兩芍藥川芎黃芩香附各一兩陳皮貝母去心茯苓麥門冬去心各

此妙在澤蘭蝶蚌而
聖者尤須看症的確
熟察本草使能得方
中三昧當素一言矣

此二方係男人藥也
借以治婦人之無嗣
者正所謂因病以望
方勿拘方以治病

阿膠 甘草各錢五
黑豆炒去皮四錢
右為細末煉蜜丸如桐子大每服七八十九食前空心白湯酒任下忌食諸血。

加味香附丸 男服聚精丸女服此

香附一斤四分
便浸一分酒浸二宿搗碎炒一分末醋浸同上
澤蘭淨葉六海蝶蚌六兩蒸歸酒洗四兩
川芎兩白芍藥酒炒熟地黄膏焙乾
右為末用浮小麥麩酒醋水打糊為丸如菜豆大每日早晚兩服白湯酒任下忌食葷蕪及牛肉生冷

大五補丸 瘦人無羸乃無血攝精宜潤

天門冬心去麥門冬心去菖蒲 茯苓 人參 益智 枸杞子 地骨皮 遠志肉 熟地黄各等
煉蜜為丸如桐子大每服三十九空心酒下服本方數服後以七宜丸泄之 右為細末

增損三本丸

天門冬酒浸去心熟地黃酒蒸人參 遠志心五味子 茯苓酒洗鹿角膠
右為細末煉蜜杵千下為桐子大每服五

十丸空心好酒下 年老欲補加混元衣即頭生兜胎衣全個酒浸晒乾為末入藥
一方加附子補相火不足
一方加麥門冬令人有力
一方加續斷以續筋骨
一方加沉香煖下焦虛冷神效墨附丸 治婦人久無子而經事不調及數墮胎者服之可立致效

香附一斤四分用米醋童便綿艾四兩用米醋二碗同香附煮
白茯苓 人參 當歸 川芎 熟地黄酒浸
宿上等徽墨火烟醋洋木香五錢 右丸味各另為末醋糊丸如桐子大每服五十九空心好酒下

青蒿烏雞丸 婦人服能令多子

青蒿即野蒿五月採一斤香附子童便鹽水酒醋各一斤斷艾煮秦當歸酒洗牡丹皮 地骨皮 白芍藥酒浸黃芪鹽炙

茯苓 人參 白朮 川芎各一兩薑甲醋煮一兩右為細末取白毛烏骨雞一隻初發聲者殺殺乾去毛

不用水湯亦不用水先惟用水去脚上粗皮用好酒入磁器內同熟地黄一兩煮雞熟去骨合前藥搗爛作

餅復晒乾為末仍用煮雞酒調糯米粉為糊丸如桐子大每服七八十九酒下日二三服不拘時一月見效

造藥忌鐵器

大烏雞丸 治婦人羸瘦血虛有熱經水不調崩漏帶下不能成胎及骨蒸等証

香附一斤熟地黃四兩生地黃 當歸 白芍藥 人參各三兩川芎 鱉甲各三兩白朮 黃芪 牛膝 柴胡

牡丹皮 知母 貝母各二兩黃連 地骨皮 玄胡索 乾薑各一兩茯苓二兩艾葉 青蒿各四兩

右香附等二十一味俱為細末用白毛烏骨雄雞一隻緝死去毛與腸將艾蒿各一半裝入腹內將雞並餘艾

蒿同入罐內以童便和水浸過雞二寸許隔湯煮爛取出去骨焙肉乾為末如有筋骨疼痛者去肉焙骨焦為

末與前末和勻雞汁打糊為丸如桐子大每服五六十丸漸加七八十丸溫酒或米飲下忌煎炒葷菜

小烏雞丸 治婦人百病

吳茱萸 良薑 白薑 當歸 白芍藥 玄胡索 破故紙 川椒 陳皮 劉寄奴 生地黃 菖朮

川芎各一兩荷葉反兩北艾二兩 右為末用白毛烏骨雞緝死煮爛去骨取肉搗如泥拌藥末晒乾磨細以雞子

汁作糊為丸如桐子大每服五十丸空心隨引下如從來未曾生育者乃油膜包裹子宮以致不能生氣成

孕宜加鳳凰衣燒存性七個硃砂為衣如腹痛血黑色者加炒黃連有濕痰者加南星蒼朮香附同丸○月

水不通紅花蘇木酒下○子宮久冷茯苓煎湯下○赤帶清茶下○白帶牡蠣粉調酒下○血成豆淋酒調綿

反下○胎不安蜜酒下○腸風陳米飲湯調百草霜下○心痛葛蒲酒下○腹痛芍藥酒下○胎漏下血烏梅

酒下 胎死不動斑貓三個調酒下○胎衣不下薑薑菜研水下○胎前產後白痢乾薑煎湯下○赤痢甘草

煎湯下○耳聾臘茶清下○頭風薄荷煎湯下○血風眼黑甘草湯下○身體疼痛黃芪末調酒下○腰脚痛

當歸酒下○生瘡地黃煎湯下○氣塊血塊作痛與葱白湯調服○四肢浮腫麝香湯下○咳嗽喘滿杏仁桑

白皮煎湯下○常服溫酒醋任下

十全濟陰丸 方論曰胎嗣主於濟陰者何也蓋人之所稟陽常有餘陰常不足氣常有餘血常不足在女人癸水

易虧而難盈以至不育舊方多以辛香熱燥之劑為溫煖子宮偏助陽氣反耗陰血豈能成胎况女性多氣多

鬱氣多則為火鬱多則血滯故經脈不行諸病交作生育之道遂阻矣又加脾胃虛弱者偏用四物涼血等藥

巧只在荷葉反一味

用鳳凰衣更巧中之巧方大熱非胎不安者所宜腸風瀉血又胎安用斑貓太毒不可妄試赤痢之用亦在荷葉頭風眼黑俱宗青皮之義生瘡豈可用熱藥

則脾胃益虛飲食頓減使氣血無資生之地何以得成胎育為子嗣之計者莫如養血順氣調經為本而兼以甘溫養脾辛溫開鬱斯為至當其調經之法又當因人而加減之初無一定之法也此方則以當歸身養血和氣為君入手少陰經以心主血也入足太陰經以脾裏血也入足厥陰經以肝藏血也熟地黃補腎中元氣生心血與芍藥同用又生肝血川芎乃血中之氣藥下行血海通經導氣為臣入參通經活血助熱地黃以補下元白朮利腰臍間血與人參同用補益脾氣用香附疏氣散鬱佐澤蘭能生新血而和平氣體牡丹皮養新血去壞血固真氣行結氣山藥能強陰兼補虛枸杞子補腎水而止下血腰疼為佐紫石英補心氣散心中結氣填補下焦艾葉助香附和百脈溫子宮兼行血藥而平其寒炙甘草通經脈血氣而和諸藥且緩用經之急為使十年不孕者此藥主之

當歸身酒熟地黃 香附子童便煮 乾山藥 白朮各二兩 枸杞子 人參各二兩 蘄艾葉去梗筋二兩同香附

煨爛川芎 白芍藥 牡丹皮 紫石英火煨 澤蘭各一兩 紫河車一具在淨水內洗去穢血 右各藥俱咀

片同河車入砂鍋內用陳老酒三碗陳木醋一碗清白童便一碗米泔水數碗和勻傾入鍋內浮於藥寸許如

尚少再加米泔以鍋蓋蓋密勿令透氣桑柴火慢煮以河車融化汁乾為度同藥俱取出在石臼內搗極爛於

作餅子日晒夜露三晝夜宜在月滿之時以受日精月華仍焙乾為末煉蜜搗千餘杵丸如桐子大每服五十

丸漸加至八九十九丸空心淡鹽湯下隨用早飯使藥下行忌食生蘿蔔凡月經過期而行或少或不行皆血

寒血少也尺脈必微弱加桂心五錢夏月黃芪二兩炙先期而來者血熱也脈來必數加條實黃芩二兩炒

酒製生地黃一兩五錢腹痛加白芍藥一兩凡經將行而腹中先作痛者血實而氣滯也去血成塊者氣凝

也脈來弦數滑大加玄胡索一兩酒炒陳皮八錢廣木香柴胡梢各五錢凡經水行後作痛者氣血俱虛也尺

脈必虛澀而兼緊加炒乾薑三錢白茯苓一兩桂心夏月二錢餘月五錢凡經行三五日後腹中綿綿作痛

或淋漓不止血因氣滯未盡也尺脈見沉澀或沉弦加廣木香五錢柴胡六錢凡經水紫色及黑色血熱之

甚也尺脈見洪數加條實黃芩一兩黃柏一兩炒生地黃一兩五錢酒浸凡過期行經而色淡者肥人則濕

瘦加白茯苓水浸陳皮水浸蒼朮水浸各一兩白朮五錢減去熟地黃一兩瘦人則血虛少而水混之加桂心五

竊謂此方妙在氣血兩虛之人而先期者將行腹痛者經水紫黑者肥人濕者皆多虧者如此之類皆非所宜雖有加減亦列於前

或米或斷或寒熱者
此肝經及心已絡氣
血不調
以多崩漏而或香附
艾葉加刺種黃芩則
冷崩漏者可思矣而
阿膠乾薑黃芪之治
崩又可想其意也
事屬拙序至此亦甚
苦心

衝為血海任土包絡
此方用四物香藥以
白朮石附養氣澤蘭
丹皮玄胡養陰中之
鐵乾薑肉桂護子宮
之寒去舊生新溫中
益胃亦溫和之正方
不用地黃是流瀉也
再查分兩果否

此方製附最妙分兩
輕當

此方妙在配合及酒
浸三日之功

錢經行或米或斷或發寒熱須加柴胡八錢白茯苓一兩 凡經脈不調多白帶者肥人主胃中濕痰流注加
製過蒼朮白茯苓各一兩五錢減熟地黃一兩 凡瘦人氣多血少脾虛加木香五錢牡蠣煨赤石脂煨白茯
苓各一兩 凡多崩漏者減香附艾葉各一兩加荆芥穗炒一兩黃芩一兩五錢血崩或多加阿膠珠一兩乾
薑五錢炒黃芪一兩炙 元氣虛弱經水閉者加牛膝二兩洗屬寒加桂心五錢屬熱加黃芩一兩炒 凡婢
妾素見忌於嫡室者必多抑鬱以致經水不調加味製香附二兩或血弱心虛交感時驚恐不寧則精氣不聚
加琥珀研酸棗仁臨炒紗 茯神各一兩 辰砂水 兼炒 紫石英各五錢

○治宮冷不孕

調生丸一名 治婦人衝任虛寒胎孕不成成多損墜

澤蘭葉 當歸洗 熟地黃洗 川芎 白芍藥 牡丹皮 玄胡索 石斛酒浸炒 白朮一兩 乾薑炮 肉桂去

錢五 右為末醋糊丸如桐子大每服五十丸空心酒下

調氣煖宮丸

當歸酒洗 肉桂各二 白芍藥煨 香附 艾葉醋炒 阿膠蛤粉炒 各四兩 右為末醋糊丸如桐子大每服五十丸

食前米湯下

艾附煖宮丸 治婦人子宮虛冷帶下白淫面色痿黃四肢疼痛倦怠無力飲食減少經脈不調血無顏色肚腹時

痛久無子息服藥更能忌惱怒生冷屢用經驗

香附六兩用醋五斤以砂石罐煮 艾葉大者去 川芎酒洗各 大川芎 吳茱萸去梗 黃芪 白芍藥淡酒炒

續斷去蘆一兩 生地黃酒洗 官桂 五錢 右共為細末用上好醋打糊丸如桐子大每服五七十九淡醋湯食遠

下擇壬子日或天德月德日修合

勝金丸一名 治婦人久虛或產後失調觸犯禁忌斷產少子及經事遲來赤白帶下脚腰重痛寒熱不一身體

瘦削眩暈嘔逆此藥善調經候每日一丸若胎前三日一丸產後二日一丸去一切雜症效難盡述珍之寶之

香附子十五兩醋 當歸 川芎 白芍藥 人參 白朮 茯苓 甘草炙 桂心 白薇 玄胡索 牡丹皮

治宮冷不孕方

以溫行則可以治羸則不可

以之補氣行血則是治上熱悉非

有燥濕溫經之治而無清潤和平之性非真陰寒者不可服內有沙參未如何解

溫平之方

以水旺之日而和溫熱之藥其意亦步

薑本 香白芷 沒藥另研各一兩 右除香附沒藥赤石脂其餘十三味用好酒浸三日去酒晒乾通

前香附一處為末方入沒藥石脂煉蜜為丸如彈子大每服一丸五更初嚼服溫酒送下白湯亦可此藥多在

四十九丸後以癸水調平受孕為度倘有孕依前三日一服無所忌戒 一方去沒藥加沉香 一方去桂心

加熟地黃丸如桐子大每服五十九空心溫酒或白湯下以乾物壓之

白薇丸 治婦人月水不利四肢羸瘦漸覺虛乏

當歸 白薇 柏子仁 白芍藥 川芎 白朮 桂心 附子 萹蘚 木香 檳榔 細辛 吳茱萸各

錢人參 白茯苓 石斛 川牛膝 澤蘭葉各七錢半 牡丹皮 紫石英各一兩 熟地黃二兩 右為末煉蜜丸如桐

子大每服五十九空心溫酒下

白薇丸 治婦人無子或斷經上熱下冷等病皆主之

白薇 熟地黃 川椒去核及開口 白龍骨各一兩 麥門冬去心 薑本 卷柏 白芷 覆盆子 桃仁湯浸

共雙仁 麩炒微黃 人參 白茯苓 桂心 菖蒲 遠志去心 車前子 當歸微炒 芎藭 蛇床子 細辛 乾薑地

半錢 右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心日午溫酒下 昔有數人無嗣俱用此方踰年而皆有

子故述之

秦桂丸 治婦人血海久冷不能孕育

附子一方用香附 白薇 半夏 茯苓 杜仲 厚朴 當歸 秦芫各三兩 防風 肉桂 乾薑 牛膝 沙參各二

錢兩 二細辛 人參錢 四右為末煉蜜丸如桐子大每服五十九空心酒下無效更加丸數經調受補者服七日

即交合孕後忌服

艾附丸 此藥能煖子宮胎前產後各隨飲用

當歸 芍藥 熟地黃 香附子 蘄艾略 陳皮 藿香 白芷 牡丹皮 薑本各五錢 丁皮 木香各三

右為細末酒糊丸每服三錢子宮冷熱酒下 白濁鹽湯下 產後積血艾醋煎湯下

壬子丸 此藥服之不過一月有孕試之有效

濟之法也而白芫白
依之用何居

此方藥品雖多自成
一局補氣而不用
我木行血而用丹
皮澤蘭黃香行氣
而有木香香附川椒
紫朮破血有桃仁
京朮溫經則肉桂
芎藭細辛引經和
胃而養陰補氣行
經而散溫補而不滯
溫而不燥若專以熱
易涼以燥易平即涼
行之法也
批與前方相表裡而
餘釋鳥獸又有燥溫
治帶之功天冬柏子
又有清涼潤燥之用
惟用古者能斟酌之

此方為某厚斷產者
設

吳茱萸 白芫 白茯苓 白飲各一 人參 桂心 沒藥各四 乳香三 川牛膝 厚朴各五 當歸 石菖蒲
白附子地各一錢 右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四九溫酒或鹽湯下日進三服用于子日雞犬不聞
之處修合有孕毋服無夫婦人不可服

南嶽魏夫人濟陰丹 治婦人血海虛冷久無孕育及數墮胎一切經候不調崩中漏下積聚諸證

秦苑 人參 薑本 石斛 甘草 蠶布燒 反桔梗各二 京墨煨 醋木香 桃仁去皮尖炒 糯米炒 一川芎

當歸 肉桂 乾薑地 細辛 牡丹皮各半 茯苓二 熟地黃 酒潤 香附子炒 澤蘭葉各四 川椒炒去 山藥各三

蒼朮米 油浸 大豆黃卷炒半 一方川椒山藥各七錢半 右為末煉蜜為劑每兩作六 每服一丸細嚼空

心溫酒醋湯任下或以醋調和丸如桐子大每服五十九丸亦可

紫石英丸 治婦人子宮久冷不成孕育及數經墮胎月候不勻崩中漏下七癍八瘕白淫白帶並宜服之

紫石英 天門冬 桂心 川芎 卷柏 烏頭地 熟地黃 辛夷仁 禹餘糧炒 當歸 石斛各三 紫威

牡蒙各二 粉草 烏劍骨燒 薯蕷各半 牛膝 柏子仁炒 吳茱萸 桑寄生 牡丹皮 人參 細辛 厚朴

續斷 乾姜地 一 右為末煉蜜丸如桐子大每服五十九丸空心米飲溫酒任下

盪胞湯 治婦人全不產育及斷續久不產二三十年者

朴硝 牡丹皮 當歸 大黃各二 桃仁各三 細辛 厚朴姜汁 苦梗 赤芍藥 人參 茯苓 桂心 甘

草牛膝 陳皮各二 附子地 一 蘇蟲炒 魚鱗各 水蛭炒 右為末每服六錢水酒各半煎至十分溫服日

二服夜一服溫覆得少汗必下積血與冷赤膿如小豆汁斟酌不盡若力弱大困不堪者只一二服止如惡物

不盡用坐蓐藥

坐蓐藥 治婦人全不產及斷續服前盪胞湯惡物不盡用此方

皂角去皮子 吳茱萸 當歸各二 大黃 細辛 五味子 乾薑地 各 白礬枯 戎鹽 蜀椒各半 一方無大

黃有黃葵花半兩 右為細末以絹袋盛如指狀入婦人陰戶中坐卧任意勿行走小便時去之一日一度易

新者必下青黃冷汁汁盡止若未見病出可十日去之本為子宮有冷惡物故令無子值天陰冷則發疼痛須

治宮冷不孕方

治脾寒不孕方

治脾寒不孕方

治脾寒不孕方

烏魚骨原根黃高筋
茹烏賊來

現在工須用子和法

不用地黃

不用四物

川枳實黃連

丹溪深開秦桂丸之
非而益斯丸又為取
用豈自相佐耶抑各
因其病而為去取耳

要知南星滑石防風
羌活之意

又如蒼朮

可與神仙附益凡並
妙在多醋意

始存之試之

俟病出方已不可中止每日早晚用苦菜煎湯熏洗之

內藥續生丸 母丁香 附子 肉豆蔻 枯礬 烏魚骨 右為末糊為軟丸綿裏內陰中此治疫塞不孕者

丹溪植芝湯 治婦人肥盛無子以中有脂膜閉塞子宮也宜先服此調理

當歸酒洗 川芎七錢 白芍藥 白朮 半夏湯洗 香附 陳皮各一錢 茯苓二錢 甘草兩 右剉作十貼加生薑三片水煎吞後九子

丹溪茂芝丸

白朮二兩 半夏麩 川芎 香附子各一錢 茯苓 神麩炒 各橘紅四錢 甘草 右為末粥丸如桐子大每服八十丸

煎湯下。○如熱多加黃連枳實各一兩。○服此藥後却服益斯丸

益斯丸即前秦桂丸無 右每服五丸空心酒下。加至十丸不妨。覺有娠三月後不可更服。○按此方即秦桂丸也

丹溪忌服之者。蓋忌於瘦人無血者。若肥人濕多者。又兼前調理藥。而所服丸數。十減其五。只服五分無妨也

累試有效

消脂膜導痰湯

半夏薑製 南星火橘紅 枳壳去穢 茯苓 滑石研細 各 川芎 防風 羌活各五車前子 右細切作一

服加生薑五片水煎空心服以乾物壓之

一方 治肥盛婦人稟受甚厚恣於酒食經水不調不能成胎謂之軀脂滿溢閉塞子宮

南星 半夏 羌活 蒼朮 台芎 防風 滑石 右剉水煎服或導痰湯亦可

○治婢妾不孕

煮附丸 治婢妾多鬱情不宣暢經多不調故難孕此方最妙不須更服他方

香附子不拘多少去毛與粗皮米泔水浸一宿曬乾用上好米醋砂鍋內煮之旋添醋旋煮以極爛為度取出

焙乾為末仍用醋糊為丸如桐子大每服五七十丸經即調不孕亦孕

一方 治婦人妬嫉悞夫無子常服不妬

天門冬去心赤黍米去壳炒薏苡仁去壳炒右為末煉蜜丸桐子大每服八九十九丸白湯下。

○附斷子法

用白麩麩一升。無反酒五升。打作糊。煮二升半。用絹帛濾去渣。作三服。候月經將來日。晚下吃一服。天明吃一服。月經即行。終身絕子。一方用故蠶紙方圓一尺。燒為末。酒飲調服。終身不復懷孕。一云產後酒服之又方用油

煎水銀。一日方息。空心服棗核大一丸。永絕孕。不損人。○一方四物湯五錢。加薑薑子二錢。於經行後。空心溫服。

良方論曰。易曰。天地之大德曰生。然婦人有臨產艱難。或生育不已。而欲斷之。故錄驗方以備用。若服水銀。蠶蠶水蛭之類。不惟孕不復懷。且禍在反掌。○薛氏曰。大抵斷產之法。多用峻厲。往往有不起者。是則產之害。未若斷產之害也。吾聞閩老張維峰太常。李恒齋之夫人。俱因服斷產之劑。自謂形體俱怯。過勞必病。有曰然矣。按夷堅志載東京女子曰。牡丹。以售墮胎藥。生得惡報。今雖列如上方。以備萬一之用。用者尚其慎之。

濟陰綱目卷之七

○浮腫

良方論曰。婦人經水不通。則化為血。血不通。復化為水。故先因經水斷絕。後至四肢浮腫。致小便不通。名曰血分。宜用椒仁丸。若先因小便不通。後身而浮腫。致經水不通。名曰水分。宜葶藶丸。經水不通。而化為水流。走四肢。悉皆腫滿。亦名血分。其證與水證相類。實非水也。用人參丸。

薛氏曰。按前證。或因飲食起居失養。或因六淫七情失宜。以致脾胃虧損。不能生發統攝。氣血乖違。行失常道。若先斷經。後浮腫。此血化為水。名曰血分。宜椒仁丸治之。若先浮腫。後經水不通。此水化為血。名曰水分。宜用葶藶丸治之。此屬形氣不足。邪淫隧道。必用此藥。以宜道其邪。而佐以補轉元氣之劑。庶使藥力有所仗而行。則邪自不能容。而真氣亦不至於復傷矣。大凡月水不通。疑結於內。久而變為血瘀。血水相并。亦為水腫。

李氏曰。經水斷而後腫。名曰血分。乃痰血化水。閉塞胞門。比水腫更難治。但能調其經。則水自消。小調經散。葶藶丸。先浮腫而後經水不通。名曰水分。乃脾不能制血。與水并浮。肌肉為之虛腫。經鬱丸。通用腎氣丸。水分君澤瀉。加防

夫氣者水之母。血者氣所化。非氣無以生。血非血無以養。氣若經水不通。則血病。血病氣亦病。豈有水不通而能化血乎。血不通而能化水者。乃是氣壅不能化血。而成水也。觀椒仁丸。可想矣。血凝成痰。因而致腫。當知此症。

腎虛則水不利。而飲溢妄行。故用腎氣丸加減。

已葶藶水通血分君牡丹皮加牛膝紅花有經閉脚腫者桑白皮散

○治方

椒仁丸 治先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通血化為水名曰血分

椒仁 續隨子去皮研 甘遂 附子炮 郁李仁 黑牽牛 五靈脂研 當歸 吳茱萸 延胡索各五錢 羌花醋浸

石膏各一 膽礬 信砒各一 虢青糯米炒黃 班貓糯米炒黃 右為末麵糊丸如碗豆大每服一丸橘皮湯下

此方藥雖峻利所用不多若畏而不服有養病害身之患當治虛弱之人亦未見其有誤也

葶藶丸 治先因小便不利後至身面浮腫經水不通水化為血名曰水分

甜葶藶炒 另續隨子去殼另研 乾葶藶各五錢 乾葶藶各一 右為末素肉丸如桐子大每服七丸煎扁竹湯下○如大便利者

減續隨子葶藶各一錢加白朮五錢

人參丸一名葶藶丸 治經脈不利血化為水流走四肢悉皆腫滿名曰血分其候與水相類若作水治之非也宜用此方

人參 當歸 大黃濕紙裏飯上蒸熟切炒 桂心 瞿麥穗 赤芍藥 白茯苓各半 葶藶炒另研 右為末煉蜜丸如

桐子大每服十五丸至二十九丸空心米飲下

小調經散 治敗血停積五臟日久腐爛成水變為浮腫忌用利水之藥產後浮腫亦宜

當歸 赤芍藥 桂心各一 沒藥 琥珀 甘草各一 細辛 麝香各五 右為末每服五分溫酒入薑汁調

服

桑白皮散 治脚氣感發兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣急坐卧不得

桑白皮炒 一 郁李仁炒 一 赤茯苓錢 木香 防己酒洗 大腹皮各五錢 蘇子 木通 檳榔 青皮各七 右剉一

服加生薑三片水煎服

正腕散 治中焦虛痞兩脇氣痛面目手足浮腫大便泌瀉兼治脚氣

白朮 川芎 木香 檳榔 甘草各七 大腹皮 紫蘇 木瓜 陳皮 沉香 獨活各一 右咬咀每服三

脾虛不能制水而氣不降者宜之

血既化而為水則以血開結破氣又不可少者然非峻厲氣悍之物不可故又佐之以大毒之藥此必已試有成驗者請之令人胆旺

無水病故先利水而又佐以白朮者助土以防水也

此重在敗血故此忌用利水所謂調經水自消

此係脾氣方借用也

此開兌門潔淨所法
皆在氣分而不在血
不調增寒自汗乃邪
在表也
血嬰之名甚新謂單
腹脹如抱嬰兒之狀
也然皆用行氣藥也
黃芪五味大黃又可
以補氣而行血

豈敢何狀
甘遂峻藥也恐太多

肝經之肚環陰器故
見註如是而治法亦
如是也

以不開屬虛故宜補
以脾痛屬實故宜瀉

錢水煎食後服

大調經散 治紫衝不調陰陽相乘增寒發熱自汗腫滿

大豆炒去皮 芡一兩 琥珀一錢 右為末每服一錢濃煎烏豆紫蘇湯下

大腹皮飲 治婦人血嬰單腹腫

大腹皮 防己 木通 厚朴 括蕪 黃耆 枳殼 桑白皮 大黃 陳皮 五味子各等 右剉每服

一兩水煎去滓入酒少許服

大黃甘遂湯 治婦人小腹滿如敵敵狀小便微微而不竭產後者惟水與血并結血室也

大黃兩 甘遂地 阿膠炒各 右剉每服二錢水一盞煎七分服其血當下

○前陰諸疾

○論陰戶腫痛

良方論曰婦人疝疾一名便癰一名便毒俗名痞子或肝經濕熱下注或鬱怒傷損脾肝其外證或兩拗小腹腫痛或五門焮腫作痛或寒熱往來增寒壯熱其內證或小便溢滯或腹內急痛或小腹痞悶或上攻兩脇或肺熱重墜若兩拗小腹腫痛肝經濕熱壅滯也用龍膽瀉肝湯玉門腫脹肝火血虛也用加味道遙散及龍膽瀉肝湯加木香若墜投散血攻毒之劑則誤甚矣○又曰婦人陰腫因胞絡素虛風邪客之乘於陰部血氣相搏故也○薛氏曰婦人陰腫若氣虛血弱用補中益氣湯舉而補之肝經濕熱用龍膽瀉肝湯滲而清之○李氏曰陰戶兩傍腫痛手足不能舒伸者用四物湯入乳香末同搗成餅安陰中立效 陰腫痛極便秘欲死者枳橘慰但腫痛者四物湯加柴胡山梔牡丹皮龍膽草如時常陰腫者四物湯加薑本防風○陰戶腫痛不閉者道遙散十全大補湯腫消不閉者補中益氣湯腫痛者如山梔牡丹皮○濕痒出水又痛者憂思過也歸脾湯加柴胡山梔牡丹皮芍藥生甘草○潰爛者道遙散○陰戶腫痛不閉寒熱溺溢體倦少食者補中益氣湯加升麻柴胡至一錢量入茯苓山梔○陰戶不閉小便淋瀝腹中一物攻動脹痛者道遙散加柴胡山梔車前子

○論陰痒生蟲

陰痒生蟲當與腸胃
求食之蟲不同仲景
滅三蟲此當從風木
所化故治法志以清
肝為主

此又脾胃濕熱下流
而生蟲者

若論諸痛痒瘡當於
乎少陰若以瘡在下
當從足少陰

俱屬肝經之火少分
虛寒求治
以腫痛屬血虛脾熱
濕痒為脾虛肝熱
淋瀝屬肝腎有熱
腐潰屬肝脾有熱
脫為不足有火其
立方如此

大全云婦人陰痒者是蟲蝕所為三蟲在於腸胃之間因臟虛三蟲動作蝕於陰內其蟲作熱微則為痒重者乃痛也○薛氏曰前證屬肝經所化當用龍膽瀉肝湯道遙散以主其內外以桃仁研粉和雄黃末或鷄肝納陰中以制其蟲○一婦人胸膈不利內熱作渴飲食不甘肢體倦怠陰中悶痒小便赤澀此鬱怒傷肝所致用歸脾湯加山柘而愈復因怒患處并小腹脹痛用小柴胡加山柘川芎當歸芍藥痛止用道遙散加山柘而愈又因勞役患處腫脹小便仍澀用補中益氣加山柘茯苓丹皮而痊○一婦人陰內痛痒不時出水食少體倦此肝脾氣虛濕熱下注用歸脾加丹皮山柘芍藥甘草主之而安○一婦人陰內痒痛內熱倦怠飲食少思此肝脾鬱怒元氣虧損濕熱所致用參耆歸朮陳皮柴胡炒柘車前升麻芍藥丹皮茯苓而痊若陰中有蟲痒痛亦屬肝木以桃仁雄黃研納陰中殺之仍用清肝解鬱之藥有以雞肝納之者乃取蟲之法也○一方搗新桃葉綿裏納陰中日三兩易

○諸陰戶生瘡

李氏曰陰中生蟲屬如小蛆者乃濕熱甚而心氣又鬱氣血凝滯而生宜藿香養胃湯補心湯硫鯉丸外用生艾汁調雄黃末燒酒薰之更用雄黃銳散納陰中○陰中生細蟲痒不可忍食入臟腑即死令人發寒熱與勞證相似先以蛇床子煎湯洗淨拭乾後用梓樹皮焙乾為末入枯礬四分之一麝香少許敷之立効○如下疽生蟲所下如柿汁臭穢及心中疔痛悶絕虛煩甚者不治。

大全云婦人少陰脈數而滑者陰中有瘡名曰蠱或痛或痒如蟲行狀膿水淋漓亦有陰蝕幾盡者皆由心神煩鬱脾胃虛弱致血氣流滯耳故經云諸痛痒瘡皆屬於心又云陽明主肌肉治之當補心養胃外以黃洗生道藥治之乃可○薛氏曰婦人陰中生瘡乃七情鬱火傷損脾濕熱下注其外證有陰中舒出如蛇俗呼陰挺有翻突如餅俗呼陰菌亦有如雞冠花亦有生諸蟲亦有腫痛濕痒潰爛出水脹悶脫墜者其內證口乾內熱體倦經候不調或飲食無味脯熱發熱胸膈不利脇肋不調小腹痞脹赤白帶下小水淋漓其治法腫痛者宜用四物湯加柴胡山柘牡丹皮龍膽草温痒者宜用歸脾湯加山柘牡丹皮柴胡淋瀝者宜用龍膽瀉肝湯加白朮牡丹皮潰腐者宜用加味道遙散腫悶脫墜者宜用補中益氣湯加山柘牡丹皮佐以外治之法

○陰挺下脫

此即陰病有謂禁本
一味能治婦人癩疔
以其升舉太陽之氣
也但與虛而下墜者
非宜

大全云。婦人陰挺下脫。或因胞絡傷損。或因子臟虛冷。或因分挽用力所致。○薛氏曰。陰挺下脫。當升補元氣為主。若肝脾鬱結。氣虛下陷。用補中益氣湯。若肝火濕熱。小便澇滯。用龍膽瀉肝湯。○一婦人陰中突出如菌。四圍腫痛。小便頻數。內熱。肺熱似痒似痛。小便重墜。此肝脾鬱結。蓋肝火濕熱而腫痛。脾虛下陷而重墜也。先以補中益氣。加山柘茯苓車前子青皮。以清肝火升脾氣。更以加味歸脾湯。調理脾鬱。外以生豬脂和藜蘆末塗之而收。○一婦人陰中挺出五寸許。悶痛重墜。水出淋漓。小便澇滯。久與龍膽瀉肝湯。分利濕熱。朝與補中益氣湯。升補脾氣。諸證漸愈。再與歸脾湯。加山柘川芎茯苓黃蘗。間服調理而愈。後因勞役。或怒氣下部濕痒。小水不利。仍用前藥。即愈。

○論陰冷

良方云。婦人陰冷。因勞傷子臟風冷客之也。○薛氏曰。陰冷屬肝經有濕熱。外乘風冷所致。若小便澇滯。或小腹痛。用龍膽瀉肝湯。若內熱寒熱。或經候不調。用加味逍遙散。若寒熱體倦。飲食少思。用加味四君子湯。若鬱怒發熱。少寐懶食。用加味歸脾湯。○一婦人陰中寒冷。小便黃溢。內熱寒熱。口苦脇脹。此因肝經濕熱。用龍膽瀉肝湯。利濕熱。用加味逍遙散。調補氣血而安。○一婦人所患同前。更寒熱嘔吐。兩股腫痛。先用小柴胡。加山柘一劑。寒熱嘔吐頓止。次用龍膽瀉肝湯。一劑頓消。○一婦人陰中寒冷。小便澄清。腹中亦冷。飲食少思。大便不實。下元虛冷。治以八味丸。月餘。飲食漸加大。便漸實。又月餘。諸證悉愈。

○論交接出血作痛

薛氏曰。女人交接。輒出血作痛。此肝火動脾。而不能攝血也。用補中益氣湯。濟生歸脾湯。若出血過多。而見他證。但用前藥。調補肝脾。

○論傷文夫頭痛

薛氏曰。女人交接。傷文夫頭痛。當用補中益氣湯。六味地黃丸。以滋化源為主。

補遺局方。來復丹。治婦人與男子交接相傷。因而四肢沉重。頭痛昏暈。米飲吞下五十丸。

脈法

脈經曰。少陰脈滑而數者。陰中生瘡。○少陰脈弦者。白腸必挺核。治陰戶腫痛。

有一婦患此每交感
后輒面黃如蠟亦終
身不育

瀉肝而東導赤瀉其
子也瀉肝而用利水

肝主疎瀉也龍膽山
地以肝陰生甘草
緩肝之急炒黃刺助
肝之氣

陰戶屬厥陰腫痛則
氣重血聚故用此四
味以行心肝之氣血
耳尤妙在蔥黃以麻
其妙又在麻黃以麻
黃氣性開竅而通
氣也艾葉暖其下以
其香爛故又佐以連
月烏梅云

陰腫者肝木之風也
以陽風瀉肝木之風
邪以艾葉溫厥陰之
始氣大成濕腫消毒
故加之消熱腫

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱下部兩物腫焮作痛小便澀滯陰挺如菌或出物如蟲等證

龍膽草酒炒澤瀉各一車前子炒木通 當歸酒炒生地黃酒炒山梔子炒黃芩炒生甘草各五 右剉水煎服

加味四物湯 治陰戶腫痛

當歸三川芍藥二生地黃各三柴胡二山梔子 牡丹皮 龍膽草各一 右剉水煎服

九味柴胡湯 治肝經濕熱下注便毒腫痛或小腹脇肋結核凡肝膽經部分一切瘡癢或風熱結核癩癧並皆治之

柴胡 黃芩各一錢人參 山梔炒半夏 龍膽草炒當歸 芍藥炒甘草各五 右剉水煎服

加味小柴胡湯 治肝經下部腫脹小便不利或寒熱往來或脯熱或胸脇作痛

柴胡二黃芩炒人參 半夏 山梔子 牡丹皮各七甘草各六 右剉加生薑水煎服

加味逍遙散 治婦人腫脾血虛濕熱流注下部陰內潰爛痒痛發熱脯熱寒熱等證

當歸 芍藥 白朮炒茯苓 甘草各一錢柴胡 牡丹皮 山梔炒 右剉水煎服外以蘆風草煎湯洗

萹蒲散 治婦人陰戶腫痛月水溢滯

萹蒲 當歸各一錢秦艽一兩吳茱萸製五 右為末每服五錢空心葱湯調下或水煎服

麻黃湯洗方 治婦人陰腫或瘡爛

麻黃 黃連 蛇床子各一牡艾葉一兩烏梅十 右剉細以水一斗煮取五升去滓熱洗避風冷

經心錄方 治婦人陰中腫痛不可忍

艾葉五兩防風三兩大戟二兩 右剉細以水一斗煮取五升熱洗日三次宜避風冷

白礬散 治婦人陰腫堅痛

白礬兩甘草半兩大黃一分 右為末水和丸如棗大綿裏內陰中日兩換以愈為度

黑白散 治婦人陰中腫痛小麥 朴硝 白礬 五倍子 葱白 右拌煎湯頻洗

女右不氣次血滯也
厥陰之經連心胃用
此使之行其氣耳

鐵精平肝熱甘菊清
肝熱而散
馬鞭草散肝血

陰行總是心肝二火
游行

生虫雖穢惡不潔外
治無非殺虫內治無
非清火養陰

此師云一內患此日
用熱水洗滌數次百
方不効者隨夫任至
山東食少米飯數月
而愈宜亦補土而制
逐飲此則治法又
須補脾燥濕矣姑試

枳橘散 治婦人陰腫如石痛不可忍二便不利

枳實 陳皮各四兩

右二味炒令香熟以絹袋盛之遍身從上至下及陰腫處頻頻熨之冷則又換直至喉中

雜方 治婦人陰中腫痛

用枳實半觔切碎炒熟布裏包熨之冷即易 一方用枳殼 一方用鐵精粉傅上 一方以甘菊苗研爛四

沸湯淋洗重浸 一方用馬鞭草搗爛塗之

○治陰癬生蟲

大黃散 治婦人陰癬

大黃炒黃芩 黃耆各一兩 赤芍藥 玄參 丹參 山茱萸 蛇床子各半 右為細末每服二錢食前溫酒

調服

硫鯉丸 治陰中生蟲亦治茄子疾

大鯉魚一個去頭皮入硫黃一兩黃泥固用火煨烟盡為末米糊丸如桐子大每服二十丸溫酒下

廣濟方 療婦人陰痒不止

蚺蛇膽 雄黃 硫黃 朱砂 硝石 蕪荑各半 藜蘆二錢 右為細末以臘月猪脂和如膏用細布作纏

子如指長一寸半以藥塗上內陰中日一易之易時宜用花椒根三五兩水煮熟洗乾拭內之

一方 治陰中生細蟲痒不可忍若食入臟腑即死

梓樹皮焙乾為末 枯礬五麝香許 右和一處研勻敷之立効○又方 桃仁雄黃研勻納陰中仍服清肝解鬱

之藥○又方 蛇床子白礬煎水淋洗即止○又方 狼牙細針 蛇床子三兩 以米三升煮汁沸熱洗○又方

取牛肝或猪肝截五寸繩繫內陰中半日蟲入肝取出立効○又方 取雞肝乘熱內陰中如有蟲當盡下○

○又方 新桃葉搗爛綿裏納陰中日三兩易○又方 生艾汁調雄黃末燒烟薰之更用雄黃末納陰中

聖惠方 療陰中有蟲痒且痛目腫身黃欲得男子漏血下白多氣思美食

湯名補心我不知其所以補能治陰瘡我不知其所以治當問之知者

此名養胃固宜第以陰中生瘡而歸之陽明經虛豈以上失生氣而自病歟以此而推則食小麥而陰胃乃愈者亦此意也

此方清熱導滯活血排膿生肌乃太陰陽明少陰厥陰正法也

用鯉魚長一尺去頭肉取骨搗末熬黃黑以猪脂和以絹袋盛如常法納陰中至痛處即止蟲當自出
崔氏療陰瘡不可忍方

杏仁燒作灰乘熱綿裏納陰中日二易之 又方蒜煮湯洗之 一方用枸杞根煎湯洗 又方小薊不拘多少水煎作湯熱洗日三次

○治陰戶生瘡

補心湯 治婦人陰戶生瘡名曰匿瘡或痛或痒如蟲行狀膿水淋漓陰蝕已盡治之當補心養胃

人參 茯苓 前胡 半夏湯泡 川芎各七錢 陳皮 枳殼去穢炒紫蘇 桔梗 乾薑 甘草各五錢 當歸 白芍

藥各一熟地黃半兩 右剉每服四錢加薑棗煎服 如濕熱有蟲者去薑蘇參梗四味加苦參壯艾桃仁吳茱萸水炒黃連

藿香養胃湯 治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不愈

藿香 蒼朮仁 神麩炒烏藥 砂仁 半夏麩 茯苓 白朮 人參各五錢 華澄茄 甘草各三錢 右剉薑棗煎服

一方 治陰內生瘡膿水淋漓或痒痛

升麻 白芷各二錢 黃連 木通各一錢 當歸 川芎 白朮各二錢 茯苓 右剉水煎服更用塌腫湯浴洗

塌腫湯 治婦人陰戶生瘡或痒痛或膿水淋漓

甘草 乾漆各三錢 生地黃 黃芩 當歸 川芎各二錢 鱉甲炙五錢 右剉作一劑用水數碗煎數沸去滓時常洗患處

洗患處

治陰瘡

蕪荑 川芎 黃芩 甘草 黃連 白芷 附子 礬石 雄黃各六錢 右咬咀取猪脂四兩合煎傳之

治婦人陰瘡與男子妬精瘡大同小異方

黃丹 枯白礬 篇蓄 薑本各一兩 荆芥 蛇床子研極細 白蛇皮燒灰 硫黃各半 右為細末另以荆芥蛇床

清酒為經事斷續不
了也
以補藥配膏牛以燥
濕合通利何也
燕窩酒奇

活血清熱燥濕殺蟲

活血開結殺蟲

燥濕生肌

燥濕殺蟲

燥濕去腐生肌

入肝開囊殺虫

胃氣殺虫除熱

子煎湯温洗軟帛參乾清油調塗如瘡濕乾未瘡之

治疔瘡因月後便行房致成泄瀉伏流陰道疔瘡遂生搔痒無時先用胡椒葱白作湯一日兩三度淋洗却服後藥

黃耆鹽水 兔絲子酒浸 沙苑蒺藜炒各 黑牽牛五錢 赤石脂 龍骨各三錢 右為末 蜜丸桐子大每服二十九

燕窩蒸酒澄上清者各下

黃芩湯洗方 療婦人陰中生瘡

當歸 大黃 黃芩 川芎 雄黃 礬石各二分 黃連一分 凡方中有云分者音念每一分二錢半也 右切以水五升取四升洗

瘡日三度

雄黃散

雄黃 川芎 當歸 北細辛 川椒 藜蘆 辰砂各錢 右為末綿蜜內陰中又傅外瘡止忌如常法

當歸 川芎 芍藥 甘草各二兩 地榆三兩 一方有蛇床子不用川芎○右細切以水五升煮取三升去滓熏洗

日三夜二

又方 五倍子 甘草 滑石 黃丹各等 右為末先以甘草湯洗然後敷之

肘後方 治婦人陰戶生瘡作痒或痛

杏仁炒 雄黃 白礬各五錢 麝香二分 右為細末敷入陰中 一方單用硫黃研細傅之亦效

銅綠散 治男婦陰部濕淹瘡

五倍子 鈺白礬各錢一分 輕粉錢一分 銅綠錢一分 右為末洗淨搽之

麝香杏仁散 治婦人陰瘡

麝香許少 杏仁不拘多少 右為細末如瘡口深用小絹袋子二個盛藥滿條口臨上床炙熱安在陰中立愈

栝蛤散 治下疳濕瘡 黃栝以磁鉢 蛤粉各等 右搽上即愈蓋黃栝去熱蛤粉燥温故也

又方 平胃散加胃氣末每服二錢煮熟猪肝拌藥內陰戶數日可安

○治陰痔

肉突為疔人嘗未語
烏頭醋洗亦所未知

治婦人陰中生痔。九竅有肉突出者皆名為痔。

用烏梅頭七箇。燒存性。用小瓦礮盛。醋淬之。乘熱熏。候通手洗之良。

洗方 治茄子疾 茄皮 白礬 痔椿頭根 朴硝 澤蘭各等 石灰炒少 右煮水熏洗

敷藥 治茄子疾 朴硝為末。黃荆柴燒。漚調敷。或濃鐵漿水調傅。

又方 治茄子疾 治茄子疾。心躁連綿。黃水易治。白水難愈。用生枳殼為散。煎湯熏洗。却用綿帛包枳殼滓。納入

陰中。即日漸消。

○治陰挺下脫

當歸散 治婦人陰中突出一物。長五六寸。名陰挺。又名癩疔。

當歸 黃芩各一兩 牡蠣半兩 蝟皮一兩 赤芍藥 右為末。每服二錢。食前溫酒調下。滾湯亦可。如不應。更以補

中益氣湯。倍加升麻柴胡兼服之。

又方 治陰挺 當歸 穿山甲 蒲黃炒各半兩 辰砂一錢 麝香許 右為末。每服二錢。酒調下。尤効。

三茱丸 治陰中生一物。所大牽引腰腹膨脹。痛至甚。不思飲食。皆因多服熱藥。及煎燂。或犯非理房事。兼意淫不

遂。名陰挺。

食茱萸 吳茱萸湯浸 山茱萸肉 舶上懷香 白蒺藜 桔梗慢火 青皮去白 五味子 海藻洗 大腹皮

酒洗川練子去玄胡索各一兩 右為末。酒糊丸。如桐子大。每服三十五丸。木通湯下。○下虛加川烏。炮去皮

肉桂去粗皮。各一兩。腰腹痛甚。加桃仁去皮尖。麩炒。別研青皮去白。枳實去穢。各一兩。真南木香七錢。羊服之。

一方每服二錢。生地黃湯調。仍用金毛狗脊五倍子白礬水楊根魚腥草山黃連。各一兩。為散。分作四服。以有

嘴瓦罐煎熟。預以銀錫作一長小筒。下透罐嘴。嘴上貫槌。上先熏。後洗。立効。再服白薇散。凌霄花少許煎。

一捻金丸 服前藥未効。却用此。

玄胡索 舶上藿香 吳茱萸 炒川棟子去青 各二 右為末。粳米飯糊丸。如桐子大。每服三十五丸。空

心木通湯下。又用梅花腦子半錢。鐵孕粉一錢。水調刷上。如陰畔生疔。以除血餘。每服三錢。加凌霄花少許煎。

此是肝家藥
腦子身涼透隨鐵粉
以金平肝兼而制之
誠治法之正也

治在肝

空心服立効

治婦人陰挺出下脫方

桂心一方作川椒 吳茱萸一兩 戎鹽二兩

右藥並炒令色變搗羅為末以綿裹如指大內陰中日再易之甚妙

又方 川椒 川烏頭並生用 白芨各半 右搗羅為末綿裹一錢內陰中深三寸腹中熱即止來日再用之 又方

蛇床子五兩 烏梅二兩 武叔卿先生著 以水五升煮取三升去滓稍熱洗之每日夜三五度用 又方 硫黃

烏鱗骨各半 搗羅為末傅之 又方 鐵精細研以羊脂調布裏炙熱熨之以瘥為度 又方 用羊脂煎令

適冷瘥取塗上以鐵精傅之多少令調以火炙布煖熨肛上漸塗內之然後末磁石酒服方寸匕日三次

重洗法 用荆芥穗臭椿樹皮藿香葉煎湯熏洗即入

托藥 用草麻子葉有九角者好飛過白礬為末以紙片攤藥托入

糝藥 先以淡竹根煎湯洗仍用白礬五倍子為末乾糝立効

敷藥 用溫鹽水洗軟却用五靈脂燒烟熏次用草麻子研爛塗上吸入如入則洗去

○治陰冷

五茄皮浸酒方 治婦人瘕瘦陰冷

五茄皮 乾薑 丹參 蛇床子 熟地黄 杜仲各三兩 地骨皮 天門冬各一兩 鍾乳粉四兩 右剉碎以生絹

袋盛用酒十五觔漬二宿每服一盞空心食前飲之 一方用枸杞子無地骨皮

八味丸 治血弱不能榮養臟腑津液枯溢風寒客於子臟以致陰冷

熟地黄一斤 山茱萸肉 乾山藥各四兩 牡丹皮 白茯苓 澤瀉各三兩 肉桂 附子各一兩 右為末和地黃膏

加煉蜜為丸如桐子大每服七八十丸空心食前白滾湯下

治婦人陰冷方

遠志 乾薑 蓮花各半 蛇床子 五味子 右搗羅為末每用兼以免薑塗陰門用綿裹一錢內陰中熱即

為効

總是寒者溫之而地骨天門又所以清上而實下也枸杞尤佳

齊

卷

卷

治陰冷

治交接出作痛

治陽丈夫頭痛

溫養其陰則陽脈而
受矣蓋寒則氣閉故
益傷焉

何物調塗之

按此方嫁痛之故乃
肝陽不足宜養肝之
陽以陰主閉陽主開
也
傷丈夫則淫慾過也
或肝陰不足致此方
既補肝陰復壯肝氣
服之自効

此溫中藥也於治嘔
閉固宜至頭痛而用
桑皮則真為之解

又方 蛇床子 吳茱萸 甜葶藶各半 沒石子一枚 右為末綿裏棗許大內陰中令腹內熱為度

又方 蛇床子兩 吳茱萸一兩半 一方用麝香 右為末煉蜜丸如酸棗大以綿裏納陰中下惡物為度

溫中生藥 用蛇床子為末白粉少許和勻如棗大綿裏納之自然溫熱有効

又方 吳茱萸入牛膽中令滿陰乾百日每取二十粒研碎帛裏納陰中良久如火熱

○治交接出血作痛

千金方 治女人交接出血 桂心 伏龍肝錢各五 右為末酒服方寸七瘥止

又方 黃連分六 牛膝 甘草分各四 每一錢半 右細切以水四升煮取二升洗日三四度瘥

又方 亂髮 青皮 二味燒灰敷之 又方 用熟艾葉裏一團然後以綿裏內陰中

集驗方 療女人交接陽道違理及他物所傷犯血流滯不止者取釜底墨斷葫蘆塗藥內之

又方 療女童交接陽道違理血出不止用燒髮并青布末為粉塗之 一方割雞冠血塗之 一方以赤石脂末

糝之 一方五倍子末糝亦良

治小戶嫁痛 甘草 生薑各五分 白芍藥四分 桂心一分 右剉以水二升煎四沸服

又方 海螵蛸燒為末酒調服方寸七日三服 又方 小麥甘草二味各等分煎湯洗甚効

○治傷丈夫頭痛

集驗方 療女人傷丈夫四肢沉重噓吸頭痛

生地黃兩 芍藥兩 甘草兩 香豉升一 蔥白斤 生薑兩 右以水七升煮取二升半分三服不得重作忌房事

桑白皮湯 治婦人傷丈夫苦頭痛欲嘔悶

桑白皮兩 乾薑 桂心五 大棗二十 右切以酒一斗煮三四升去滓分溫服衣適厚薄毋令汗出

○附治脚痲 金蓮穩步膏 治婦人脚指縫壞痛

黃連 黃柏 黃丹 荆芥微炒 右為細末糝脚指縫內布扎縛自然平穩不痛