

治下疳大便實以漏蘆湯踈之方見本卷前

○下疳發熱作渴以竹葉黃芪湯加柴胡主之方見七卷內

○下疳大便軟以托裏茯苓湯治之

方托裏茯苓湯

防風 桔梗 白芍藥 川芎 五味子

甘草炙 官桂 麥門冬 熟地黃各六分

當歸 黃芪 茯苓各九分

右次咀水煎八分食前熱服

治下疳注幹膿水交流寒熱頭疼以托裏當歸湯加柴胡主之

方托裏當歸湯

當歸 黃芪 人參 熟地黃 白芍

甘草炙 柴胡 白芍藥各一錢

右咬咀水煎八分食前熱服

〔治〕肝經濕熱不利陰囊腫痛或膿潰皮脫畢丸懸癰及下疳瘡並皆治之

〔方〕瀉肝湯

當歸尾

赤芍

生地黃

防風

黃連

炒

黃柏

知母

酒炒

澤瀉

龍胆草

酒浸炒

車前子

錢

炒各一

甘草

稍五分炙

右剉一劑水煎八分次早空心熱服

〔治〕下疳瘡甚久不痊應用此珍珠散敷之神效

〔方〕珍珠散

黃連

末

黃柏

末

乳香

沒藥

孩兒茶

輕粉

官粉

五倍子

珍珠

象牙

各于分

右爲極細末。以米泔水洗淨。摻患處。即痊。

治下疳。陰頭生瘡。腫痛。一名蠟燭發。以鳳凰散主之。

方鳳凰散

抱過鷄卵殼

黃連

輕粉 各等分

右各研爲極細末。用真香油調搽神效。

治下疳瘡發甚疼痛。不可忍。用此白金散治之。

方白金散

黃栢分作手指大條。慢火炙熟。淬猪胆汁中。用二枚。每炙每淬。汁盡爲度。研細入輕粉錢餘。用真香油調敷患處。效驗。

治疳瘡久不爲愈。用此洗疳湯洗之。

方洗疳湯

川練子

黃連

瓦松

花椒

菝葜根

艾葉

各等分

右件用水煎。傾入盆內。用青布一塊。展洗瘡上。立效。

○楊梅瘡

方至靈散

土茯苓

二兩

白花蛇

三分

防風

荆芥

薄荷

金銀花

皂角刺

牙皂

白蘚皮

當歸

五加皮

地骨皮

川芎

薏苡仁

人參

黃芩

牛膝

木通

甘草

右咬咀水煎熟。空心服。忌一切發物。

治楊梅瘡腫發。甚不可言。用此硃砂丸主之。

方硃砂丸

硃砂二錢

雄黃一錢伍分

苦參

荊芥穗

天麻

麻黃

牛蒡子

面粉

槐角子

各三錢

右為細末。用糖心鷄蛋為丸。如梧桐子大。每服三十九丸。用鷄湯或牛肉湯送下。一日一服。表出毒氣。再不服。忌房事勞

碌神効

治楊梅如天泡瘡。兼治發背毒瘡。

方神仙湯

防風

牛膝

五加皮

威靈仙

白芷

當歸

連翹

白蘚皮

各一兩

牙皂

木香

皂角刺

天麻

各三錢

白芷

各一劑

用土茯苓

二斤

右咬咀。二十劑。水煎。早晚各一服。服盡除根。忌茶醋菜薑豆

腐。鮮鷄。鮮鵝。牛羊等發物。

治楊梅瘡腫如番花石榴以神効散治之無出此方。

方神効散

肥皂子

四兩打碎
炒焦為末

何首烏

荆芥

苦參

天花粉

各一兩

右俱為末合一處每服一錢用土茯苓五兩猪脂油二兩水

六碗煎二碗分作三次服忌牛肉燒酒茶鐵器

方回生保命丹治楊梅天泡筋骨痛疔瘡輕粉毒風癬漏腫毒

一切頑瘡不拘新久並皆治之

當歸

炒二錢

川芎

三錢

白芷

稍三錢

舊槐花

一兩

乳香

五分

沒藥

輕粉

四錢

硃砂

四錢

雄黃

三錢

牛黃

四分

小丁香

一錢

血竭

一錢

兒茶

一錢

右為末用紅惠黏大米粉打糊為丸如黍米大每服十九用

土茯苓四兩牙皂半個同煎吞藥一日三服忌母猪牛肉

醬醋茶房事燒酒臘干葱蒜

治楊梅天泡等一切惡腫毒瘡

方三黃敗毒散

防風

荆芥

連翹

白芷稍

當歸尾

赤芍

黃芩

黃連

梔子仁

地骨皮

五加皮

白鮮皮

木瓜

苦參

蟬退

金銀花

薏苡仁

殭蚕

皂角刺

蒺藜子

黃柏

甘草

川芎

土部瘡多倍用

木通

下部瘡多倍用

以上各二兩

右咬咀用淨土茯苓白者三斤共剉作五十劑每日一服水

煎服忌茶鹽牛肉燒酒○瘡痛加羌活獨活○體虛去梔

子加人參茯苓

治楊梅惡瘡腫痛。及治瘰疾亦効。

方一粒金丹

砒以蕎麥包灰火煨令焦取出去麩稱一兩雄黃

硃砂各一錢五分 蕎麥麩炒一錢

右共為末。水煮蕎麥糊為丸。如豌豆大。每一粒空心涼水下。

一日一服。七日効。忌熱物。

治楊梅瘡初起。服此藥神効。

方驅毒散

土茯苓二兩 白花蛇三分 防風 荆芥 薄荷

牙皂 金銀花 皂角刺 白蘚皮 川芎

當歸 薏苡仁 人參 黃芩 牛膝

木通 甘草各一錢

右咬咀水煎熟溫服。

治一切楊梅天泡及遠年近日頑瘡。

方抵金丹

細辛

白芷

麻黃

金銀花

桂皮

當歸

防風

甘草

各一兩

牙皂

十筒

龍骨

火燉五錢

乳香

沒藥

孩兒茶

丁香

各二錢為末

右前藥十味共為末每服不拘多少以土茯苓煎水去渣

入麝藥在內攪勻再煎一二沸取出候溫加後四味末於

內再加蜜一筋頭以棗肉為丸溫服用土茯苓湯頻頻服

之亦可。

治楊梅瘡點藥如神。

方千金散

乳香

沒藥

血竭

雄黃

杏仁

去皮尖油
各一錢

輕粉

兒茶

枯礬

各五分

膽礬

三分

麝香 一分

右各件共為細末用雄豬胆汁貼洗然後摻藥患處。

治患楊梅悞服輕粉以致筋骨疼痛久而不愈服此。

方香鱧湯

茜草

麻黃

烏藥

各一撮

細茶

槐子

炒焦

花焦

各五錢

乳香

一錢

魚鱧

三錢

用頭麻炒成珠去麻

右以咀用生薑五片葱五根水煎一鍾通口服二三劑即愈

不發

病遠年梅瘡風漏或筋骨疼痛或近日起服此劑神効。

方登癩散

土茯苓 二斤 防風 荆芥 五加皮 白鮮皮

木瓜 各一兩半 當歸 酒洗 川芎 白芍 牛膝

生地黃 酒洗 白茯苓 去皮 杜仲 炒 白芷 地骨皮

青藤 槐花 黃連 各一兩 威靈仙 一兩半

右咬咀。十劑。每劑用水一鍾半。酒一鍾。煎至一鍾。初一帖。用

芒硝大黃各二錢。臨熟一下離火。瘡在上。食後服。在下。食

前服。渣再煎。餘不用硝黃。每日一帖。將逐日藥渣晒乾。積

三四次者。用鍋煎熬。候溫洗浴。初服五帖之內。瘡勢覺盛。

乃毒氣攻外。勿惧。輕者至十帖。重者倍之。立見奇功。服藥

時。要忌房事。生冷煎燂。母鷄。鵞。羊。猪頭蹄。鰕魚。此皆動氣

之物。葱蒜。燒酒。牛肉。并皆忌之。

治楊梅瘡已服輕粉愈後手發癬或手掌上皮膚退一層又退一

層生生不絕者。名曰鵝掌風。

方 蒼耳散

蒼耳子 金銀花 皂角刺 防風 荆芥

連翹 各一錢 天麻 前胡 蛇床子 各五分

牙皂 甘草 土茯苓 各三錢

右咬咀。用生薑三片。川椒一撮。水煎不拘時服。

治 楊梅瘡。愈後馱掌癬瘡。年久不瘥。一擦如掃。

方 玉脂膏

牛油 相油 香油 黃蠟 各一兩 溶化待溫入

銀硃 一錢半 官粉 二錢 麝香 五分

右為末。入內攪勻。抹癬上。火烘再擦。再烘如神。

以上治療楊梅瘡毒。服藥俱是王道之劑。療之無不効驗。

服之無有後患。但輕粉止可施點。搽擦實瘡門之捷藥也。稍一悞服。則將來傾肌露骨。釀禍豈淺鮮哉。用斯者慎之戒之。

○時毒

夫時毒者。為四時邪毒之氣。而感之於人。其候發於鼻面耳項咽喉。赤腫無頭。或結核有根。令人增寒發熱。頭痛肢體痛甚者。恍惚不寧。咽喉閉塞。人不識者。將為傷寒。便服解藥。一二日腫氣增益。方悟。始召瘡醫。原夫此疾。古無方論。世俗通為丹瘤。病家惡言時毒。切恐傳染。考之於經。曰。人身忽經變。赤狀如塗丹。謂之丹毒。此風熱惡毒。所為謂之丹瘤。與夫時毒。特不同耳。蓋時毒者。感四時不正之氣。初發狀如傷寒。五七日之間。乃能殺人。治之宜精。辨察先診其脉。滑數浮洪。沉緊弦濇。皆其候也。蓋

浮數者邪氣在表也。沉澁者邪氣深也。認是時毒氣實之人。急於大腑以攻之。熱實以不利。大黃湯下之。其有表症。以升麻荷葉湯以發之。頭面赤腫。以梔子仁散。或葛根牛蒡子散。經經三四日。雖未解。不可便下。只宜和解。以有犀角散。連翹散之類。至七八日。大小便通利。頭面腫起高赤。煩躁發渴。以竹葉黃芪湯去半夏。加升麻犀角解散。煩熱更宜針鑱砭刺出血。泄其毒氣。十日外。必自愈也。其熱若劇甚。而毒必深。患者每日須用通氣散三五次。喘鼻取嚏十餘聲。易能消散。嚏出膿血。治之必愈。但喘藥不作嚏者。不可治也。况此毒又能傳染。其左右侍病之人。日用此藥。喘之取嚏。庶幾可以避忌也。若五日以前。精神昏亂。咽喉閉塞。語聲不出。頭面不腫。食不知味者。是死之候。失治則無救。然而此疾有陰有陽。有可汗。有可下。嘗見龕工。但云熱毒。

只有寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審矣此與前類
大頭天行病同因未盡其詳又錄于此宜當參看

治時毒頭面紅腫大便閉實以大黃湯下之

方大黃湯

大黃

酒浸氣減半

黃芩

升麻 各二錢

芒硝

山梔仁

各一錢二分

右咀水煎熟空心熱服

治頭面紅腫疣瘡增寒身熱以升麻荷葉湯主之

方升麻荷葉湯

升麻

葛根

蒼朮

白芍藥

荷葉

各一錢

甘草

五分

右咬咀水煎食遠服

〔治〕時氣頭面赤腫或咽喉閉塞不通須取嚏噴七八遍泄出其毒則瘥以通氣散若傍人畏其傳染以此藥取嚏噴尤佳

〔方〕鼻嚏通氣散

玄胡索 一錢五分 猪牙皂角 灸去弦子 川芎 各一錢

藜蘆 五分 躑躅花 二分五釐

右為細末每用紙捲子蘸一米許紆於鼻中取嚏噴為度

〔治〕時氣熱毒咽喉腫痛或腮腫疼或口舌生瘡以犀角散主之

方見六卷內

〔治〕時毒三四日宜和解以連翹湯主之

〔方〕連翹湯

連翹 山梔仁 甘草 防風 各等分

右咬咀水煎熟食遠溫服

治時毒身熱煩躁腫赤尤甚以竹葉黃芪湯主之

方見七卷內

治時毒頭面腫赤非是俗云抱頭火丹乃大頭天行病也以葛

根牛蒡子散主之

方葛根牛蒡子散

葛根

牛蒡子

管仲

甘草

荳豉

各五錢

右件共為細末每服三錢用水調服

治頭面赤腫大便燥實以梔子仁散主之

方梔子仁散

梔子仁

鬱金

枳殼

升麻

牛蒡子

大黃

各五錢

右件共為細末每服三錢蜜水調下

治頰腮腫痛或一邊兩邊皆腫增寒身熱頭疼骨痛俗云瘡腮

亦時毒也。以荆防敗毒散主之。方見六卷內

○癩風

大風病是受天地間殺物之風。古人謂之厲風者。以其酷烈暴悍可畏耳。人得之者。可分在上在下。施治在上者以醉仙散。取涎血於齒縫中。出在下者以通天散。取惡物陳蠱於穀道中。出取蠱雖道路之殊。然皆不外乎陽明一經。須看其疣瘡與瘡。若上先見者。上體多病在下也。下先見者。下體多病在下也。上下同得者。在上復下也。陽明經胃與大腸也。無物不受此風之入人也。氣受之則在上多。血受之則在下多。氣血俱受者甚重。自非醫者識見。神手於病者罕能免此。又有男婦天癸未至。精血未完。氣脈未充。而成配偶。致真氣未足。而先敗。亦成此疾。古人有云。精未通而御女。四體有不滿之處。異日有難狀之疾。誠斯

言也經云脉風成厲此症非止肺臟有之以其病發於鼻從俗呼為肺風也鼻準腫赤脹大而為瘡乃血隨氣化也氣既不施則血為之聚血既以聚則使肉爛而生蟲也生蟲者厥陰主之以藥緩疎之孫真人云吾嘗醫此疾甚重卒無全者惟一婦人寡居淡薄而獲安愈得斯症者須當遠離房室靜居茹淡隨時調治猶云庶幾雖治全愈若不絕味色又不免乎再發則終不救矣

治風癩鼻準腫赤脹大瘡爛者以葛根升麻湯方見三卷內下

瀉青丸

方瀉青丸

當歸 龍胆草 川芎 山梔仁 羌活

防風 大黃濕紙包煨熟各等分

右件依法製度為末。煉蜜為丸。如芡實大。每服半丸。看小兒大小加添。煎竹葉湯調。砂糖化下。

〔治〕諸厲風。以凌稍花散主之。服後於浴室住湯中一時。或服天

麻湯。

〔方〕凌稍花散

凌稍花 五錢

蟬殼

地龍

白殭蚕

全蝎 各七枚

右件製度為末。每服二錢。溫酒調服。依前法行。服藥則効。

〔方〕天麻湯

胡麻 半升

天麻 二兩

乳香 七錢五分

右件為細末。每服五錢。臘茶調下。一日三服。

〔治〕大風疾。以淋洗如聖散浴之。

[General Information]

书名=杏苑生春 三十二

作者=

页数=20

SS号=12764179

出版日期=