

翁仲仁幼科

錦章圖書局印行

六



幼科痘疹

金鏡錄



增補痘疹金鏡序

人稟天地陰陽之氣以生而有餘不足或肇自先天或原於失養外因內傷病變無窮然小兒雖無七情而內傷惟乳居多至六淫外侵與大人無異但疾苦痛癢不能向父母而悉告之所以調治倍難也古人云甯醫十男子莫醫一婦人甯醫一婦人莫醫一小兒蓋謂此耳醫有望聞問切若孩抱之兒週歲未幾血氣未充惟風寒氣卯命辰三關略有可憑而望色聞聲表裡洞然矣故五臟皆列於頭面而啼哭叫呼聞其音之清濁長短而病之寒熱虛實莫不悉現于此若痘疹總憑色象以知吉凶辨症候蓋痘疹之出雖有五臟六腑之分要皆遺毒肇自先天發出之時無非因內而達於外者余先大人汝霖公博覽羣書嘗謂余曰幼科方書惟金鏡錄一冊可謂約而該簡而明矣余亦每閱是書其中歌括并賦詞類方極其指示詳明美善兼盡絕無偏寒偏熱偏攻偏補之弊誠後學之津梁痘科之明鑑也但其書購取者頗多傳世甚久近見坊間類多殘缺余甚惜焉適有客出書向余忝訂欲重刊行世余幸其福世不淺酬應之暇即揮汗攷正不自覺其倦之何以忘也志學君子尚亦與余有同情耳是為序

卷一 北法

使蒙北法歌

寒門總括歌

熱門總括歌

傷風門總括歌

傷寒總括歌

斑疹門總括歌

驚風門總括歌

慢驚慢脾歌

胎驚歌

大約歌

急慢驚風不治歌

傷寒斑疹不治

吐瀉門總括歌

痘門總括歌

痘疾經久不治歌

痢門總括歌

痢疾不治歌

疳積門總括歌

疳積不治歌

傷積總括歌

脾胃門總括歌

腫脹門總括歌

疝風撮口門總括

刺泡法

回氣法

卷二

論痘始終總要

因痘制施治法

論痘已輕重

辨痘賦一

辨痘賦二

辨痘賦三

辨痘賦四

辨痘賦五

辨痘賦六

論表裏寒熱虛實

紅氣血虛實

虛實獨發論

虛痘喘氣不

虛痘壞勢必至

虛痘變實辨

虛痘似實辨

極熱實痘似虛

極虛實虛辨

極熱實虛辨

實熱難過痘

三法治例

治虛弱痘

治血熱痘

痘有當微汗下

痘不可妄表妄下

五臟六腑所屬

時熱四臟形發

痘症歌

重痘歌

逆痘歌

頭面部位圖

頭面部位吉凶歌

生元總要歌

痘症變重

重痘變輕

卷三

驗形察色

痘疹變搖

雙翼腰疼

灰白煤塌

音心作嘔

寒或咬牙

乾枯陷伏倒靨

煩躁喘吐

口乾發渴

咳嗽痰涎

痘內異症

痘夾丹痧與痘疔

水泡失血

小便黃赤短澀

大便秘結泄瀉

增補癩疥五種金錢錄

申明可辨癩疥諸症

症不在乎得與朝散布雖多何害若連串珠有相相似而難辨其間者若唯眼指有象可名而問乎其內者有一於此望此既多亦何取意須知惡毒深聚血稠閉毒無頭或極不得透故多隙地內即受其毒其質珠積最毒衝雲氣血不能駕取一任毒之縱橫凝結及除者外見連串貫珠團結成塊者外見堆聚毒中形外信不誣也是毒積而不鬆伏而不透猶賊之巨魁也此不治諸癩皆為執拒治不以攻治之何益巨魁旋首前途不賊有例也之勢然世於貫珠者習矣不察而多怒於積毒者歸咎於命而憂之為與言及此亦來甚矣庶狀其圖像或得觸目驚心詳其治法或得挽回萬一未必無小補云

異形癩證圖像

游鱗

是癩貫珠成條其形如蚕故名游鱗有痛者有長短身上者輕頭面者重身上短而稀所見無多者較長而密更繁多者重重則必攻令鬆透如一赤豆其症方起

疊錢

是癩圓圓摺旋絕不成點錢許之大故名之也任見二三者輕多見者更重則必攻亦以的脂膏封貼更加猪尾膏大桑虫十劑內透之令毒如蒸餅其毒方透

鼠跡

是癩或內五粒或六七粒相簇如鼠跡故以是名無多者輕見於周身者重重則必攻令相併成塊其毒方鬆劑內調入化毒丹並猪尾膏

燕窩

是癩積毒最重似燕窩而名者也單見尚重見而不一者不治急攻之務令鬆透如餅其毒方化以油胭脂調入化毒丹用蠟紙攤貼再佐以猪尾膏大桑虫

雁行

雁行者狀似游鱗但曲而甚長其排行而若雁字也單見者亦重不一者更重攻透之甚若游毒而毒化矣

蕞沙

蕞沙者其癩扁潤歪斜無頂無盤有細點如沙積甚於蕞宛似蕞沙而名之也可以數紀者輕偏及者重重則必攻務令高抬如艾窠散其毒燒化而成發



口 鎖 腮 托 腰 雙 頭 發 兩 金 覆



是症發於兩頰如金之覆故曰覆金是毒在陽位之證也其餘疎明眼  
弱者以散肌透定散和猪尾膏化毒子治之外用桐脂膏貼更稠密大  
者必加大黃令眼水腐爛其毒化

是症上與下僻密如舖中皮絕無一點毒毒雜於上下氣血阻於中宮以  
致上下隔絕症之最危者也首尾一以攻毒為主尤以猪尾膏化龍命氣  
血以透要處毒散透點者可挽回

是症雙頭貫頂有似兜帽故曰雙頭毒來陽位之首毒也發更稠密大熱  
若不治則必攻與覆金同法必早圍可挽有獨聚於天庭者亦是家頭  
餘若疎明稠體不熾熱者不必用大黃

腰者腎之候也連毒環繞於此緣毒伏於腎而有此象首珠之類毒者也  
餘即疎明不得視為善治必以攻攻得此鬆指就成一團如紅豆旋方不  
為害否則瘰癧可觀九朝忽見則亂變其毒而變矣

頰下亦腎經所屬毒毒成一片是為托腮清毒為其所阻頭面必不能  
延身更可知痰湧氣喘可立而特從來不治若見點之初毒勢未成以治  
雙頰之法治之亦可救一二速宜封貼

雙頰口者二口兩左右一粒較旁痲瘋大板臂而與雙者是也此毒發於  
脾而有此象口乃脾之氣飲食接受之門可令毒藏此地乎治法較重與  
口鎖一類有連事候於上下唇畔亦是

頂水殺之路呼吸出入之門症毒連串環繞於此是毒鎖咽喉與托腮  
咽水喉中此毒俱屬不救但得散點之初即以清金攻毒散丹

普杜惠於神效有可起

乳家唇鎖膝地胸腹囊



於背便關生元氣流灌隨地皆山而可令此地肥及平槽而得養  
 於肌透毒氣之丹諸尾膏治之外咽脂膏貼而硬壯熱如  
 必攻頂得...可廢生

此近五內猶之同室與他處不同一有變證毒即入更速於反掌但此地  
 而本得為吉若亦不有此聚如囊而得無恙者也治法指背同

胸腹俱遠近...之囊腹調劑之法亦指背同

咽關宮喉指發而起者發者也若蟬窩則尤重要咽與項皆水穀之路呼  
 吸出入之門其宮與項無異項之害病在喉統咽關之害病在指發  
 治法與鎖項同更以咽脂膏貼

為膝指發如餅毒發於此藥不能遠足脛而致射於一着餘地無氣更無  
 內證止以敷肌透毒散加牛膝合化毒丹治之并用脂膏貼更多為良  
 二治者必攻

善者脾之華脾臟安和無不相及更得溫潤否則指發於此有黃熱如蠟  
 有喘突如富有更硬燥裂如血進皆毒攻於脾象見於唇如無地證瀉黃  
 散合指尾膏治之更壯熱如流者必攻

此以鬆肌透毒散如元參合化毒丹諸尾膏治之外用貼法更稠密  
 此也此者必攻

救 抱 鱗 生 靈 迷 靈



此病者如其病而光象也較之於背極位候候肺其及所象之處即其跡  
然少向屬可及而况指布成片乎此毒不致真氣獨閉上下阻塞治與  
背同法

變按太陽氣毒起伏於此取驗位證若重其即輪疎必此地微腫如豆解  
以及正而腫脹如豆毒根方透否則此地不脹即通身无此毒根猶伏感  
後終敗可令犯忌於此乎治法與家同

鱗坐者其背指集如鱗之穴屬環跳部位又至陰之地故發膿不逆環跳  
者不治平而乾滯者熱肌通聖散加牛膝板而紫帶且熾熱者涼膈攻毒  
散減豆根亦加牛膝俱合化毒丹並貼法

血得陰陽和暢雖密無好陽球乃下焦陰陽交會之所故陰上先收者言  
取其下焦和暢也於此若毒毒發交會可知上下相因下變則上開治以  
散結湯化毒丹熾熱者加大黃石膏

備用良方

清肌透毒湯 治癰瘡已發未發為風熱所感腫理阻塞者此湯主之

荆芥穗 二十乾蒲 八分 前胡 一錢 桔梗 四分 甘草 二分 山查 二錢 蟬蛻 三分 加薑 一片

散肌通聖散 治癰腫理阻塞血凝氣滯顆粒隱隱於肌肉之間色紫紅晦滯神情悶甚者此湯主之

羌活 荆芥 紫草 紅花 牛蒡子 木通 赤芍 地丁 青皮 山查 蜂房 當歸 防風 各等分 加

廣蜀胡安

攻毒散 治癰瘡大熱如火紫腫深紅煩渴狂者此湯主之

石膏 三錢 生一兩 黃連 一錢 生三錢 大黃 三錢 生六錢 木通 紅花 荆芥穗 各四分 牛蒡子 一錢 五分 犀角 磨汁

三分 丹皮 一錢 青皮 七分 生地 五錢 生一兩 地丁 一錢 加橙草 一分

清金攻毒散 治癰毒腫於脾胃骨不清喉間痛楚煩渴壯熱無不起者此湯主之

桔梗 甘草 牛蒡 大黃 玄參 前胡 枳殼 山查 蟬蛻 礞石 山豆根 荆芥穗 加燈草一分

涼結攻毒散 治癰熱毒發於上焦胸膈煩悶發為壯熱揭衣棄枕症色紫艷深紅者此湯主之

大黃 黃連 石膏 荆芥 地丁 元參 黑山梔 赤芍 生地 桔梗 木通 甘草 牛蒡 薄荷 枳

殼 加燈草一分 竹葉三十片

神應奪命丹 治癰毒毒氣透骨不起者

礞石 一兩 貴於白砂 內外配并麻麻黃 各五錢 紫草 連翹 各一兩 四味同入炒袋中於砂鍋內用新汲水將藥入

煮一晝夜取出辰砂研末仍將煮砂藥汁將藥瀉清晒乾為末聽用

散結湯 治癰血滯氣滯色紫紅而實不鬆者

赤皮 羌活 赤芍 紫草 地丁 山查 荆芥 升麻 川芎 甘草 牛蒡 丹皮 加蘆薈 射干 藜蘆 頭

猪尾膏 治癰瘡細如麻芥實而不鬆動而不活諸般惡毒是色紫黑日不起者 取小確猪尾取血少則給數多

則一匙以粥飯淨每匙和梅花水片二分即調於煎劑內服以癰轉為度如小確猪不得即大者亦可

蟻針法 治癰瘡有實硬有黑陷有歪斜並諸癰內色紫黑根腫硬獨大於癰瘡者用之 取水蛙大者放於患處將

蟻針入於蟻上用軟絹束之吐出毒血次以藥胭脂膏封 如無此物以銀針挑破令奶母含銀花汁以吮之

齊金化毒散 治癰內有伏毒暗號不已經日不起若發難治 打者以此散用蜜湯調服癰若潰傷或潰器堆膿或膿

島惡乾焦紫黑板硬等象急以此散調入胭脂內用綿紙做如膏藥樣以貼之

乳香 沒藥 各一錢 出汁研細配單藥川貝母 去心炒 雄黃 黃連 天花粉 各一錢 生用 大黃 半炒 半生 各二錢

甘草 七分 生赤芍 二錢 炒水 牛一 五分 牛黃 二分 珠 四分 研極細以無替為度

芎黃納合散 治癰邪熱犯胃唇口燥烈口中膩局甚至舌起芒刺嗜黑如煤聚後身猶壯熱種種燥熱而不思飲食

者此方主之 石膏 香薷 生地 丹皮 木通 甘草 用生甘草 牛蒡子 山查 荆芥穗 實者加大黃外加燈心

使靈使法歌

天好生兮地長養人與天地一靈當天之氣升人亦升天之氣降人亦降人宗天地陰陽氣父精母血成胎三月胎似珠露二月大似桃花根三月始分男共女四月形裝俱分明五月五臟俱生足六月方纔六腑成七日之胎動八月動手游其魂九月在胎通三轉十月受氣足方生在胎十月食母血母如妊子宜博節慈因母愛亦遺胎內熱六凡男女之胎生調道得宜免生患大腸如急小腸如緩胎未元休哺飯寒熱濕涼更適宜四肢膝理不密肌膚嫩月內不宜煩苦之始出胎水不作替母內胎於肺如水開目如靈身似大宜如三日目撮口若替替胎內傷寒中邪毒晝夜連聲到曉啼嗽或在心驚在腹身燥胎毒甚過身黃乃不胎黃牙疳出牙根上生於上脘七星應更推何故新長成其理由來在雙蒸三十二日連一雙六十四日連一英每連雙則精神易如遇蒸而長骨格道雙在須過七朝過蒸要過十三日初雙於水生腎志有蒸身散供合是二雙一英任膀胱上唇微腫臥蚕頰三雙丁火心喜生雙中學受生靈得四雙二蒸兩小腸壯熱身熱硬氣五愛屬乙生肝木此時夜必多喘哭六雙三蒸甲胆生學空閉目生驚搐七雙屬平生神昏喘喘學語齒牙生八雙四蒸庚大腸學河噴涕驚風九雙生志脾乙土吐涎流人知喜於十雙五蒸戊胃家微汗腹疼吐父母十度雙蒸俱足足三百念日不頑則心能三後無形象故不變兮又不蒸自後再加三大蒸新學移步能應名每蒸日至六十四都來五百十二雲雙中手足方受血手能持兮足能行人或原氣稟定足是兒必其無雙蒸定是不足看而部全依氣色決分明望開切能察究諸病方無補手尋面那諸服皆有屬局被上下皆屬木左目太陽右太陽其脾家土星應唇口二旁理所屬二氣頭間腎之端頭同額臉屬心火右兩唇中是肺是四時各有一色強派時無恙逆時強要分旺相休與皆盡在心中有酌量春天青旺為赤相黑休白囚黃否象夏天赤旺黃相吉青休黑囚白不良徵如肝病面青時白色當春不為醫此是肺金夾旺木色黃又被脾家欺心病夏天當西赤望色只惹形色黑此被腎水剋心火色白反受肺家欺肺病秋東面白宜若形赤色最難除此因心火剋肺金色否反令肝作成腎病而黑冬天相黃色白時多急候火乃脾土剋腎水色赤反致心虛

陰脾居四季面形黃如形青色最難當此為肝木尅脾土色黑反侮腎家強赤黃秋黑色冬青雖相亦無益從前  
來者定邪傳變瀉其子平方言五臟所居各一宮五色分來人不同色內能分明照攝據色方能辨吉凶心亦煩視難  
見色不宜赤血糊塗赤肝形翠羽暗光多色如嫩草為吉脾色青如蟹腹皆形如枳實必吳楚肺形得青猶骨狀枯  
骨瘦如壽不及腎色嫩尚如鳥羽形如煤炭非吉理色色能將二色分凶吉灼然不虛語更有神氣清明神守氣歸  
作凶惡瘦而氣壯色必寔肥而氣怯色必嫩氣壯則腎以安詳氣怯則虛以危論肥而見肉此為良瘦見骨了食不長  
再者得病面如荷枝然面上紅必多青色現時急驚作若形各異定時祖額同足令夾食驚顛然足熱風重額門青台  
不宜隨腫起成坑二無用印堂青色掌之病紅色心驚白主和或見微微青黃色以因各件脈相過山浪青亦驚為疾  
紫色傷於乳和食瀉腹宜黃白須死青生金黃驚之必年上黃為吐利甚若形純白是脾虛二頰赤為啼哭熱更兼黃  
色吐舌之左腮紅是疾氣高右腮紅是傷風熱如黑紫而危急醫而帶微紅急驚泄而帶白黃吐利因而面青台白急驚  
或面白唇青方瘡面多白色腹中疼而紅唇赤傷寒至面目皆黃理應生面黃瘦舌五心煩而腫虛浮多嘔利二眉  
紅主兒夜啼眉顴面赤疳疾為眼胞浮腫主久嗽不爾因疳瘡則虛寒時多者是胎前白睛多者是胎怯病之疳瘡目  
皆黃淡紅心熱無他說日多直視乃驚風赤脈皆疳疔病凶魚目定睛非吉兆瞳人中陷死之宗瞳目昏昏猶是瞽或  
不轉睛半開閉二目微開無睛无此病精未夜脾是目輪乾燥骨蒸家停赤身內常大壞貝輪冰冷藏麻瘋身後紅絲  
纏亦向鼻流清涕乃傷風鼻生疳脾肺熱夏內常集積熱從鼻孔黑狀肺家絕食中短胎因虫動唇中無根藥無用  
正口常紅無病端燥化脾熱瘡癰共滿口白垢多起口脾熱必振口中集魚口鵝鵝不祥舌唇黑色應難致張口出  
舌因風長舌舌木舌針方抽舌上生舌楊毒結舌上芒刺亦同類舌上白屑上難醫舌上黑胎全不利舌上黑色命將  
休舌捲短言終棄世咬牙寒戰虛倉傳牙松出似名牙空牙根白色瀉州急齒咬人不入延牙錫魚枯脾乾致牙折  
肝咬疳積至牙床痒斯攻牙疳牙關緊急驚風他口寒喘叫是虫痛沫吐白絲是腎寒滿口痰涎咽塞虛吐涎黑血肺  
應難癒而不吐冷坐疼吐而亦疼背中冷吐涎黃水不為良風涎吐盡兒方醒呵欠面黃腫土虛呵欠面青紫之為呵  
欠而赤風熱是呵欠久病陰陽離呵欠氣熱傷寒理呵欠喘急傷寒為呵欠多睡乃虛傳呵欠頻問瘡瘡使五指冷時  
必是驚者逆者黑傷寒厥二十中指筋弱冷必好麻痺重和投手足中青心病則手足甲黑是動蛇指甲上青紅絲

乎心亦俱難決乎捨春者急驚因乎開喉者健脾胃角弓反張驚風作手足痲或名健勞急虛驚手足冷血虛使  
然一足熱要減胃實手亦寒更來青乾手亦熱聞而知者聖之名身聽語言及聲音聲乾氣弱傷寒在重則傷風汗痛  
因熱寒稠瘰疾作聲母喘肺虛何用別急解春只為神驚高嘔狂言知是熱口噤言者榮不足聲嘶應知是寒或驚喘  
致如氣不順急喘喘涕傷寒證言語如從腹中出是寒併是傷風得盛指為實邪者虛証現傷寒和瘧疾有決為尺無  
聲喘斯分大哭與小啼哭而不啼是痛因啼而不啼驚之遺故煎不妥煩所為呻吟不定為瘧病口張舌出而不返吸  
逆不止是死論又問問病如何起要審根源何處至或遠或近或遠或近一日幾番便與利飲食或進或退莫非過飲  
母之乳或曾洗澡或過履厚薄衣寒皆問取履後方所形跡者要分宜卯辰三關男者左手女者右脈實氣邪命危安  
飯齊枝葉驚為病飯葉枝紅傷寒證紅如米粒肺結氣黑色透長傷暑黃紋瀉痢胃家寒白色微微即是舟枝赤濕  
潮胸痞膈黃飯墜上困脾端枝形宛如釣鈞傷風傷寒分所向向外傷風有汗汗向內傷寒無汗相枝青黃如魚刺  
形驚瘧瘧風三部分枝直懸針青黑色水驚肺熱慢脾併枝如水字三關有吸吸積滯風舟久枝如一字青紅飯總是  
驚風慢脾疾一曲如理傷食致二曲如鈞傷冷看三曲如虫傷硬物鈞鈞樣是傷寒枝形或是驚弓樣如環如虫不  
一飯亂紅十指如川字食積相乘五臟病五藏人將一指於十數始將二指於十五續將三指於六數與大人各勝能大  
人五至為和平小兒七至始無病四至五至冷危困十至十一熱為多三邊二散死跡決十二二十三魂欲滅臟腑三部  
脈來分但以浮沉遲數別風痰疾喜遲而浮急大洪數兒不穩驚天邪氣風癩作搐急寒邪盛冷水寒瘧脈旺而帶連  
熱瘧脈旺而帶數下痢之脈喜沉微浮大現時難用約吐瀉脈小而微乳後微吐脈氣宜中甚實乳喜厚尺蠶蛾沉  
細與沉逆急驚之脈強數喜慢驚之脈宜沉細病積時時洪大宜沉細必然無藥治水腫浮大得涎生沉細何嘗得安  
室吐切腹疼沉細吉浮數強長約未實數細快無飽疾沉緩不能消乳食氣喘身熱宜滑冲脈滑四肢寒者危四時  
各有一脈後春強夏洪秋脈浮冬實季緩正邪病微虛實亦宜求假如春間得冬脈從後來者虛邪也夏秋見是從  
前來我去生子實邪逆秋脈見分賦邪形鬼未起我我不勝脾家脈見微邪病夫尅妻于總病緩虛邪緩其母母  
能令子實而可實邪瀉子奪其母為子能令母虛故欲邪瀉誠補本緩微邪不治何須醫各使相平無勝負之秋脈  
弱斯詳別得肝脾一症多心腎二經病虛少已上一能來明暗病吉凶心了了方知外感與內傷個中何

內傷多成於乳食外感風寒特一方小兒症候雖多故大率先名評八端前論風疾和瘧痢後言吐瀉與寒  
症參乎內病症類明疾與氣煩如同病異方醫亦有異病同方治由來筋脈屬肝經肝病熱或則風生心熱  
古強肝散風甚反張頸肝經有熱目直視肝經有風目連劇吐瀉脾虛成慢風目閉口開二手撒傷風寒心  
傷魚脾自崩升風傷魚脾則氣喘風傷魚腎則長明傷風貪睡口中熱飲水不止脾經熱傷風服手足冷  
胃虛怯風則生痰上壅風挾驚總是風疾逆外感者來却中風手足不收遺溺出大凡咳嗽亦感寒疾火咳者又一組  
咳謂有聲肺氣渾嗽謂有痰脾濕侵春間咳是春升氣夏月火氣至上治秋天溼熱傷脾經冬作感寒外感是五火上  
半日多嗽食積胃火二分治午後嗽若屬陰虛貪食火氣浮于肺因嗽而痰在肺經因痰而咳在脾胃脾旺者不得  
眠實痰血夾痰魚氣鼻痰作咳肺癰醫只嫌午嗽最難除從咳嗽亦作瀉因傷脾氣脾溼連聲咳結痰致嗽久  
胸高龜胸治大凡久嗽尚成勞百日嬰孩難料理胸結總是鹹酸作火中痰中喘同倫水停心下尤能喘感風寒疾亦  
有成夏傷於暑秋發癰疔和二氣相擊博加之飲食不調勻生冷停痰寒熱作一日一發為易醫二日三日難為提一  
二日發時起易獨稱癰疔最難除先熱後寒間有之先寒後熱人多發亦有單熱而無寒飲食不思方易醫久瘧一日  
晏一日傳與陰分不依期又須治用升提藥仍歸陽分方全除午前發者是陽分午後發者在陰分無汗要汗發邪先  
有汗發之要扶正古方痢疾名滯下物積氣滯腹痛急後重大便泄數多圍而不能使傷食則赤傷食白黃色亦  
出傷食積氣血俱傷白間紅總是溼熱醫方的紅痢乃是小腸來白痢却從大腸出青垢因傷風與寒錄於色傷風  
瀉瀉作痢重脾傳腎痢作瀉輕腎傳脾瀉將瀉藥先治法用通因通治宜久痢不止怕身熱久痢癰閉脫肛尾久痢  
發呃病最險久痢傷心難與醫藥口不食令人怕濕湯流出休醫最難寒如瘧成鼓脹更難血俱難癒者腸肝旺者  
油脂黑痢腎水反侵脾屋漏水兼塵腐色魚骨魚腦並難醫嘔吐或因太過飽寒氣所冲亦吐了類嗽氣逆亦作吐者  
氣拘于亦宜疏胃中有大腸上疾久病胃虛納穀難胃中痰血尤宜吐火氣天上又一端中寒而吐四肢冷甚者吐  
今渴燥煩酒後氣升元作吐傷風嘔吐是涎痰月內嬰兒頻轉乳氣息未定飲乳定其氣逆上乳不下停滯胸滿故嘔  
身霍亂吐瀉及轉筋飲食不調脾虛因日間受熱夜感冷正邪二氣澤不分轉筋吐瀉三氣作肝不生風故轉筋脾土  
受濕故作瀉心火受濕吐上升陰傳太陽故作吐陽傳太陽而作瀉陰陽相搏吐瀉成霍亂米湯休飲下水瀉不止病

名聖克教不化脾虛泄瀉水腸鳴熱陣失火熱論之此宜滋或瀉不瀉或瀉多此是痰令氣偏的腸痛必須夫大便  
後痛者乃食積使青腸冷是驚風而起浮氣之逆大便酸臭飽傷飽受肚瀉今亦傷食論驚風論在胎驚百日內驚  
內反真驚三二發必死假驚何必問靈神驚之困乃驚搐故起風寒或跌蹠或因人叫喊驚高或因物什驚大驚更  
其急慢與陰陽慢宜溫補急宜涼急則輕今慢則重醫將二証必分方慢驚多成於瀉後昏睡嗜睡不招手冷氣出口  
日半開身熱不熱二俱有急驚本厚熱在心風生痰壅肝脾經精神恍惚神不守此時開腎養痰頻早上午間必頓覺  
晚間夜內不甚搔早覺上視晚視時必驚掣手足早覺項急渾身熱午後牙緊口涎垂晚覺必熱多氣喘夜覺大  
便黃水遺天吊疾延虛虛心不時攸作目翻顴角弓反張煩神果乳母忌食入乳成客忤小兒神氣弱其物生人驚搐  
著肚疼吐瀉五色形斜視咬牙眼赤數五臟停積生五疳之形不一般五疳之名又各別驚風氣積急多端心疳  
名驚其面赤壯熱憎寒形體瘦四肢不仁口鼻乾瀉痢無時更青色肝疳名風其面青白膜遮睛淚出頰面合地臥捺  
口鼻髮繞毛焦翻過身脾疳名積其面黃壯大青筋喉不常飲食不消吃泥土利下頻頻魚脫肛肺疳名氣其面白口  
鼻生瘡時氣逆渾身燥熱飲食少吐血吐痰喘急腎疳名急其面黑手足如冰兼吐逆背脊如鋸牙齒斷瀉痢蛔虫  
兼米出心虫為病好吃茶肝虫蚘皮醫其差肺虫尤為吃布物腎虫慣欲吃葎花脾虫吃土吃生米胆虫吃醋食酸味  
亦有長虫寸白虫蛔虫消食居脾胃醫其差泄瀉瀉之當心塊痛亦驚嗜乳癖多嗜尤壯熱在心上下痛兼時疳癖漸  
加身痛瘡右骨塊形如掌跡食癖其疼二脇下往來時復充心側胸癖不動不移凝左右脇間成塊疼癖癖方宜逐疳  
藥乳疳食膈消食分餐積小腸夜啼泣瀉黃其重多青色乳積斯分面必黃乳罷哭未吐前食醫積之因目白青渾身  
壯熱最分明疳積目黃必壯脹史衣數為瀉之頑食積是兒必多食贏瘦致於厚病久醫積醫宜要鎮心乳風疳食宜  
消食渾身壯熱面痿黃母惡傷寒熱如傷泄瀉愈時仍復作因食交乳却無妨孩兒過體生瘡毒母因風毒傷邪熱惡  
然兒體熱如湯母有孕妊三個月渾身壯熱不言論更兼面赤風傷口中氣熱風傷肺濕不甚熱傷脾經日日往來  
寒熱作外感內傷分的確提名似痛非痛名不唯清便方病却身熱惡熱是內熱身熱惡寒從外來身熱飲水內熱者  
身熱不飲表熱推身熱頭痛與惡寒無汗証是傷寒必身熱頭痛與惡風有汗却是傷風疾日重夜輕屬陽虛夜重日  
夜屬陰陽虛須將氣病治陰虛要將血病訣身熱陰虛而陽虛每飲湯湯不知熱身熱陽虛而陰虛水雪不知寒病

吸蓋因汗乃心之液在內為血在外汗陽虛自汗心腎虧陰虛睡中出盜汗小兒盜汗不須驚顛汗至胸亦陽虛更有  
胸下當膈汗此汗皆因屬胃虛傷寒瘧疾皆將營汗分四証分明起養蒸汗不藏汗戰汗振慄汗身顛汗如珠定  
不流過身冷汗滑如油是汗見之真不吉頃聞一命已休休或實時氣作頭疼或睡時感熱動喘痛刺痛乃肝火逆  
身痛是風寒重咽喉腫痛是涎痰乳鴉作痛有雙單急慢喉喉疾火或喉毒非腮風熱看腫痛甚說因寒得火熱作疾  
也相徵重按不疼作虛寒手不可近實熱的時候時止熱死血無散無休獨是寒熱腸沙痛唇中黑手足青冷死煩者  
胸前膈下心痛的膈下痛知胃脘積痛居小腹是寒因痛在當膈寒與食小腸心熱滿尿黃溺閉腹痛名雙腸小便溺  
血名風熱小便溺濁熱傷水瀉弱閉陰腸火熱小便癢閉溢陰愛腫名雙痔疔沙疔沙疔沙石水腫多因濕痢  
遺更患瘧疾致脾虛累年瘧尤能腫瘡亦瘧身亦腫之五臟之中脾土主非土不能制腎水脾土一虧水橫流水腫  
之因起於此肺朝百脈通水道下輸膀胱為導先勝肺州都津液腑氣化則能出小便上道下行故定出下塞則閉水  
由精所以三焦決清官引導陰陽通閉塞經云水飲入於胃游溢精氣輸於脾脾氣散精歸於肺養生豈可使脾虛脾  
虛傳入二經路小便不利從斯作一失降下一失化因而實喘何驚傷先喘後服本肺經先服後喘脾之因治肺清金  
次利水治脾利水次清金腰已上腹宜發汗腰以下腹宜水利然後醫方可嘗脾脾風方能自行水水行不治最難當  
治之必須分陰陽陰腫不煩尿色白陽腫燥渴尿溺黃壯大青筋真死候更真胸突真難救手足底平無脈那更肯  
平真不久腹高項小體假贏精采全無只欲喘喘喘不消因胃弱小兒有此號丁裏肌肉不容柴骨寒手足細小腹不  
大絕莫多食不生肌傷飽失飢名喘喘瘵子之因是發熱天時瘧毒也相干俗呼痧子即斯症療治宜將脾胃者患兒  
泄瀉相兼嘔煩悶昏死煩咳嗽足冷不溫其脈洪要知總是發斑候熱邪傳裏致表虛血熱不散乘於皮重則錫散熱  
疹子更現斑爛尤次之若現黑斑重之數十無一生不須治蓋因毒氣入胃深舌黑燥形乾死更乘未發斑之先日  
如見鬼或在言過熱極方才現暫復虛雖不設眠見斑不宜重發汗發汗重開泄其表形如果實黑陷生虛病不能  
施其巧風秀塊形亦類斯過身瘧疹斑如飲食如常身略熱不分大小游風醫赤痢赤痢赤痢赤痢赤痢赤痢赤痢  
身熱昏沉目半開頭眩出血無拘泥此毒亦由胎毒生消毒有方從火治自上而下尤可醫足上腫來病尤熾更分日  
野與青黃紫紅同病必分方山野常陷平胃氣香透宜服福脾強

百日胎寒或感寒中寒內病者得湯食積留中脫吐瀉嘔喘乳干小腹痛攻心與胃虛膨滿悶二眉指吐涎面  
白喘聲細寒戰唇青手足暴吐出不消純下白四肢厥逆夜瀉煎如斯以上皆寒証為勿因循變病端湯則理中加減  
用或投七劑七看丸若能依此而施治起死回生是人難

小七香丸 此乃提要之劑能治小兒諸寒之病其為皆溫煖之劑有益於脾胃者故皆可服之

香附去心宿砂 益智去心陳皮 蓮木 用丁香 甘草 為細末薑汁糊丸如黍米大

理中湯 治胃寒嘔吐心腹絞痛一切寒証。人參 去蘆 白朮 炮乾 長蘆 甘草 加姜棗水煎

凡胎寒臘寒手足暴曲面臉青白腸鳴口冷喘更身戰或口暴不乳加木香肉桂芍藥

凡中寒腹痛氣者痛從小腹引至心胃口吐青水面色青唇手足厥冷者加吳茱萸小回香川椒青皮枳殼

凡寒吐瀉者乳片不消多吐少出瀉利青白小腹作痛者加木香半夏 吐甚者加丁香

凡脾胃受寒飲食少用即作飽不易消化加丁香山香

凡寒脹腹大虛膨青筋內痛喜食熱物加大腹皮煖御木香

凡青胎疝氣乃腎之積寒自小腹下有物如蟬營升上即痛加澤瀉良姜青皮木香

凡吐乳者口角無涎乳食不消化加枳壳蜜香

凡寒疝夜啼急盡則復吐哭多睡少天明則已腰曲額汗眼中無淚面色青白漸入盤腸加茱萸茴香

凡盤腸內疝者身曲偃僵氣不舒暢加宿砂吳茱萸沒藥木香麝香白同煎

熱門諸法

小兒生下胎受熱日閉胞浮大便積熱黃赤通體黃小便淋瀝或見血滿口或唇赤赤游腫痛重木舌胎毒瘡

瘡痛甚言多啼不乳呻吟劇者証皆由積熱為大連細飲不虛設三黃化毒丹可煎類令慈母生養悅

三黃丸 上焦中焦滋熱之証並宜服之 大黃 黃芩 黃連 為末水丸燈心湯下

五福化毒丹 治小兒胎熱極胎毒口香 元參 桔梗 各五錢 人參 青黛 各一錢 赤茯苓 甘草 馬牙硝

二錢五分 射香三錢 七味各為末蜜丸如艾實大母服一丸薄荷湯下

大連細飲 治三焦積熱大小便不利目赤目腫丹毒口瘡重舌木舌咽痛瘡毒益熱等証並皆服之

逆組聖藥 滑石 牛膝 車前 木通 山花 雷歸 防風 黃芩 荆芥 柴胡 赤芍 甘草 蟬退

水煎服有加瀉法於左 胎熱者加生地 胎黃者加茵陳 目赤者加黃連羌活 小便澀者加豬苓 大便秘

者加大黃枳殼 大便血者加地榆槐角枳殼 小便血者加石蓮麥門冬生地 丹毒遍體加黃連犀角 胎毒

瘡癤加升麻當歸楮 發頭加羌活白芷 咽痛加桔梗薄荷 重舌木舌加黃連犀角朴硝 弄舌脾熱加石膏

傷風門總括歌

傷風會睡面青黃呵欠頻額熱似湯口吐氣來渾似火鼻流清涕嗽生痰法當解表清痰嗽加瀉參蘇飲正當更用抱

龍煎餃子寒時雲散日回光 咳嗽嗽 咳嗽皆因風入肺重則喘急熱不退肺傷於寒嗽多痰傷於熱者聲嘶痰寒

宜飲散熱則消實當瀉胃虛補肺嗽而不已便成癩疔風不已覺風至眼睡紫黑如傷損嗽而有血難調治疎風發痰

補瀉明數花膏子妙通神

長砂抱龍丸 此劑乃利發疎風豁痰清熱中和之約為活幼之首約也

專治急慢驚風慢脾風傷寒傷風咳嗽生痰喘急昏沉發熱鼻流清涕或吐瀉風者十種熱証堪中博擊痧疹癩毒胎

風胎驚胎熱百病皆治

天竺黃 四錢 獨活 羌活 牛胆星 一兩 珠砂 四錢 一兩 蘇木 天麻 五錢 射香 三錢 在行中 防風 三錢 甘草 三

錢 雄黃 錢 冬 三錢 蘇通 半斤 夏 二錢 痘疹時行加大花粉 四錢 為細末蜜丸如艾實大雷水糊丸尤加姜湯或薄荷湯

磨服

保生餃子 治急慢驚風痰涎攪攪

胆星 白附子 泡長砂 水飛各一兩 射香 二錢 天麻 五錢 防風 全蝎 去大 羌活 各五錢 蛇含石 七錢 水飛四兩

金箔 十二片 為末 為末大米糊作皮餃每團半錢薄荷湯下

定喘堂金丹 此方專治喘嗽氣急之症約有大毒量情用之可也

漢立鼓一內人牙一後將立鼓浸四五日已軟研爛和人牙為丸如葶豆大每歲一丸臨卧冷茶送下

涼風化痰丸 治小兒風痰咳嗽驚熱及喘

半夏二兩 乾南星二兩 姜製白附子一兩 明礬五錢 為末大麥糊為丸葶豆大滑石或長砂為衣

礞石滾痰丸 此方非獨治痰有功利精尤妙但脾虛者勿用

青礞石 研碎二兩 大黃酒蒸兩兩 黃芩兩兩 沉香五錢 為末湯丸葶豆大每服二三十丸白水下

加味參蘇飲 治尋常外感并痧疹前後悉用 人參 紫蘇 柴胡 陳皮 甘草 枳殼 前胡 白芷 半夏

桔梗 茯苓 乾葛 青皮 加姜蔥煎服

本方用參亦當量情病者體虛當寒則用餘症去之肺熱咽不利者加黃芩。起發症疹者加升麻。痰嗽者加南星竹瀝。壯熱者加黃芩。風感似欲發搐者加防風天麻。項背拘急加羌活。頭痛加川芎細辛。鼻塞加細辛白芷。初嗽加麻黃杏仁。痰燥熱感加桑皮葶藶。久嗽加杏仁五味貝母。肺虛昏白而嗽不能換氣者加人參阿膠糯米。初時感風欲令微汗發散者加麻黃蒼朮。春冬感風寒而甚者倍加羌活風寒已經發散泄熱不愈者另用小柴胡湯除去本方

浴痰湯 治感風寒風痰者用之

南星 半夏 橘紅 紫蘇 黃耆 枳殼 前胡 桔梗 杏仁 加姜汁竹瀝煎服

風痰吐涎加防風。食積痰面黃少食或多食即飢胃熱而化為痰吐出黃色而稠粘者加神麩米身山查。熱痰是一向熱而不已肺受其熱則吐出成塊者加山梔天花粉。結痰加瓜蒌仁。滯痰加白朮寒痰喘而嗽者加麻黃

干姜

款花膏 治痰嗽久不止者如神 款花 茯苓 杏仁 桑白皮 五味 貝母 紫苑 烏梅 各等分蒸過水

款仁和前約末同煎并共為末 蜜丸如芡實大甚渴應服

宣嗽潤肺丸 止咳定喘

桑皮 六錢 麻黃 五錢 杏仁 二兩 阿膠 五錢 款花 三兩 烏梅肉 二兩 粟殼 一兩 去殼 如前丸服

傷寒總括歌

傷寒六脈皆浮緊虎口三關數紫紅發熱惡寒腰疼項疼吐逆悶煩攻表醫臥睡時發聲矢食便臥吐氣充無汗必  
須微解散太陽莫使過微山

治法用抱龍丸 春用桑麻飲 二者俱見前  
十神湯 冬用

川芎 白芷 麻黃 陳皮 紫蘇 香附 升麻 干葛 芍藥 甘草 加姜棗煎服

惡痰湯 治虛胃或驚風痰厥者用之

南星 半夏 橘紅 紫蘇 黃芩 枳殼 前胡 桔梗 杏仁 加姜汁竹瀝煎服

風痰吐逆加防風。食積虛面黃少食或食即飽胃熱而化為痰吐出黃色稠粘者加神龜麥牙有汗去麻黃。  
熱或加黃芩。咳嗽如半夏杏仁。咽痛加桔梗。痰澀加紫胡黃芩。泄瀉加訶子木香。吐逆加姜汁半夏。頂  
痛如羌活獨活。裏熱甚則大便秘結加大黃大便秘結加枳實。便紅加桃仁

斑疹門總括歌

疹如麻子斑如錦水痘如珠赤痘紅四症並因風熱各分條理其相同

加減四味升麻湯此升使之劑也一二服則當止多則過矣

升麻 葛根 芍藥 甘草 防風 桔梗 紫蘇 蒼朮 陳皮 枳殼 柴胡 加姜棗煎

水痘亦痘即此一服水方不用加減。見疹熱不退加黃芩。嘔吐加藿香。瀉甚者杏仁枳殼加訶子肉果。咳  
嗽有痰加半夏杏仁五味。瀉痢後內虛加皮苓白朮。腹痛加蒼朮。裏熱加茅花生地。諸毒加黃芩

傷寒斑疹不治歌。病人目陷口開尿身臭昏昏命不長更看人中返向上爪甲青黑命將亡口中冷氣出無歸  
斑黑昏沉不透肌髮直毛焦兼喘急汗如珠子定難醫

發風門急驚歌。熱甚生風作急驚子然目剝有流鳴面青厥赤頭暈引舌流涎與利發全消張心是活散積  
涎走下痰涎纏搐而巳頭多汗生危運期自晚明

從驚悸脾散。逆服寒涼大病餘或因吐瀉久成之脾虧胃弱風邪入眼慢騰騰攝四肢面色白青身厥冷夜逆  
額汗露睛微或魚下痢中難治均用溫脾與補脾

胎驚散 壯熱腮紅心不寧四肢抽掣又疾生時時嘔吐身強直半歲中由胎受驚又有項間生大塊此名驚風  
積而成消痰清熱先須理定魄安神用鎮驚

天藥散 天藥原由精熱生濕潮心熱又多驚覺時翻上唇多燥項強疾鳴手爪青

凡治諸驚先要行痰一見牙關口禁先將稀涎散用白湯調一二匙灌服如口禁不能下咽者即從鼻管中灌入牙關  
少舒即以錫翎蘸姜汁頓探喉得吐風痰隨進痰厥丸使其痰下降然後用四磨湯以行其氣急得痰亦行稍得吐醒  
以金箔鎮心丸抱龍丸次第與服如痰或不得吐用姜汁竹瀝三四匙灌之又以噯鼻散紙條蘸藥水噴喉依法而行  
如不得噴或噴着不出口禁不省額汗如珠遺尿噴鼻者不可治也

抱龍丸 痰厥丸 俱已見前

金箔鎮心丸 此方藥性中和能散風定搐化痰鎮心安神急慢驚風使脾胎驚天藥皆治

犀黃 五錢 硃砂 三錢 天竺黃 五錢 胆星 一兩 茯苓 五錢 防風 三錢 全蠍 十四個 去尾 白附 三  
錢 牛黃 一錢 另研 真麝 一錢 另研 蟬退 十四個 片腦 二錢 山藥 三錢 金箔 五十片 為末 文米糊為丸 金箔為衣

稀涎散 痰擁咽喉才開聲閉用此開之

豬牙皂角 明礬 如要吐加瓜蒂等分 為末每用一匙白湯灌下

噯鼻散 半夏 細辛 各一錢 荆芥 七分 豬牙皂角 三錢 射香 一分 為細末用紙條蘸藥水噴喉為效

四磨湯 能行氣行痰 枳殼 木香 枳實 烏藥 用姜湯各磨服

人參羌活湯 氣風定搐驚安神 柴胡 獨活 天麻 前胡 人參 地骨皮 川芎 枳殼 羌活 羌活

桔梗 陳皮 防風 薑食 甘草 蟬退 加姜汁竹瀝煎服

凡痰風加南星。瀉者加訶子澤瀉。大便秘結加皂角。昏迷不省加黃連。服熱加黃芩。嗽加杏仁。天病加鈎

藤。心跳加當歸。目連眼動乃肝風厥也加青皮黃連。胸膈不寬者加枳實

溫脾飲 治慢驚慢脾風 人參 白朮 茯苓 厚朴 橘紅 甘草 半夏

肉 加姜蔥陳木百粒同煎

言語不出加石菖蒲。瀉者加訶子。渾身厥冷加附子。搐者加全蝎燻燒

急慢驚風不治證歌

驚風疳疔定要推水口甚聲息脈數憂眼合不開并窺視而維面墨手難收口張吐沫氣粗大腹立頭搖汗不流胸脇嘔

鳴原熱冷遺尿溺血並皆休

吐瀉門總括歌

小兒吐瀉何以分傷食冷熱風所因壯熱胸冷不飲食日晡潮熱往來生面黃腹痛餓吐瀉如不化原寒腹急須清

此有後劑七香九子能通靈冷吐乳疔不消化多吐少出瀉病清木香薤遠須服五苓湯散皆能殺夏月暑瀉昏微

紅吐少出多瀉如驚心煩口渴小便赤不須加減有神功

小七香丸 治吐瀉積溫胃如神 方見前

香枝丸 治積溫脾之劑

川棟 茴香 蓬朮各一兩炒木香 三枝 青皮以上各五錢丁香一錢枳殼每炒一兩 為末醋糊丸

木香薤薤丸 為治吐瀉

訶子 四兩 干姜 二兩 木香 五錢 為末粉糊丸 如夏月瀉干姜加肉桂黃連冬月依本方

加減五苓散 分理陰陽 豬苓 澤瀉 白朮 茯苓 肉桂 少許 姜棗同煎服

吐瀉並作加藿香木香蒼朮。寒吐寒瀉則乳疔不消下利清白腹痛加煨干姜。腹痛加煨芍藥。熱吐熱瀉則吐

利黃水瀉下如筒加炒黃連當歸。久瀉加訶子肉果。久吐如丁香。宿食不消吐瀉餓腹脹具如山壺神越參芽

枳殼。渴食甚者加煨榔單果。小使不利加滑石。吐瀉久而虛瀉加人參棗門久天花粉。脾胃受濕加倍白

木半夏。飲食不進加益智大腹皮。左脈加藟子大腹皮。胃口作痛加草薤薤木香山查。胸膈飽悶加枳殼。

飲食不易化加枳實。小便自利去豬苓。生痰去肉桂加橘紅。夏月暑瀉甚者加黃連白扁豆。小腹痛加荔枝