

蘭語做載

下

特別
二一
2727
2



明
三
號
2727
卷

蘭畝傲載卷三



東都槐園先生纂輯

腦與胃互相為因
玉函^子涅^子斯^子埵^子我^子甬^子德^子兒^子西^子名^子
蹟之斯有侶甚可異者屢
之人心有惡心若嘔吐証

早稻田大學
昭和25.7.5
蔵 朱

作源輝雄

門 豐田宗味校

陽 嶺 春泰

坵園

死生人之事態而蹤
其患旋暈眩冒等
若患壞液敗瘀在

明
三
號
2727
卷

蘭畝傲載卷三



東都槐園先生纂輯

美作 源 輝雄
長門 豐田宗味 授
常陽 嶺 春泰

腦與胃互相為因 槐園

玉函^{ヨシ}涅^ネ斯^ス埵^ト我^ワ爾^ニ德^{トク}兒^ル西^シ名^ナ名^ナ曰^ク就^ス生^シ人^ノ之^ノ事^ノ態^ノ而^シ蹤^シ
蹟^シ之^ヲ斯^レ有^ル侶^ト甚^ク可^ク異^ク者^{ナリ}屢^ニ歷^シ試^ス之^ヲ其^ノ患^ヲ旋^ニ暈^シ眩^シ冒^シ等^シ
之^ノ人^ノ心^ノ有^ル惡^ク心^ノ若^ク嘔^シ吐^ス証^{ナリ}有^ル惡^ク心^ノ若^ク患^ヲ壞^シ液^ヲ敗^シ瘀^シ在^リ

早稲田 大學
昭和 25.7.5
蔵 朱

胃中者亦必為旋暈眩冒証。其互相為出者見得是頭腦所為主動。與胃所為主動。甚相通而不二。學者須達斯義也。見內科撰要第百六章

又曰夫胃之與頭腦。雖上下遠相隔處。然其事甚相通而近一者也。何者。頭之有疾。率皆為善浸淫於胃。若上患頭痛之人。下必有不思食証配之。又其反對下患惡液未瀦胃中者。大抵上必偕發頭痛。見百二十六章據是兩節之言。考其胃之與頭腦。雖上下遠相隔處。然其事甚相通而近一之故。斯得其情。

蒲郎加爾都解剖術曰。第八神經。自腦直分以下於胃絡其胃口。周密遍滿若羅網然。是以胃口獨甚敏於感觸知覺。而其部有最可貴重之殊能存焉。如同胃膈中具一頭腦一般。又我爾德兒論心腹痛曰。內科撰要第百九十一章自胃府最上開哆之部。達食道所終竟。尽有神經布護於斯。故善為重痛。此以其為受納飲食之要關。人身死生存亡之所係。故令主知覺之神經。當其誰何盤問之任。是以神經之賦在此者。殊多於他部。其致源委未遠。上下相

通知覺感觸。甚相近一。職是之繇。因考漢人以腦
所主精神主宰為心之官能。其謬解之所自未亦
得其情矣。蓋胃管在膈中直心位。其作痛也。西人
尚且謂之心胃痛。以其神經聚焉者多。凡胃腹之
有感觸。必先知覺於斯。妄意思像。佯如凡百感觸
知覺。亦皆根乎斯。乃為精神之所在。亡論於其不
知其神在胃管。乃以為心之官能。抑有由也。夫精
神意識之在頭腦也。載在西書者昭昭焉。觀之自
不俟辨。然未讀西書之日。予而既甘心其主宰在

心藏。殊不知其所以想像如在膈然者。即是其所
以不在膈也。何者。人不見氣。魚不知水。自其他而
見之。乃可知己。其所以不日知其膈者。却是其
所以在膈也。亦唯其身。在廬山中。故爾。非邦。若夫
以腎為蓄精之藏。亦是以其自動脈大幹分下於
辜丸。以為製造精之精脈。與自腎達於膀胱之輸
尿道。兩管近相竝。致些紛錯。抑亦有由也。共詳論
于東西病考中。

乳糜

槐園

晉按乳糜謂之傑乙尔此飲食之精液。腸胃所化製血之樸也。漢醫所未說至輓近。歸化之士熊三拔。肇於水法論之。於是創著乳糜之名。曰。凡人飲食蓋有三化。一曰火化。烹煮熟爛。二曰口化。細嚼緩嚥。三曰胃化。蒸變傳送。二化得力。不勞于胃。故食生食冷。大嚼急嚥。則胃受傷也。胃化既畢。乃傳于脾。傳脾之物。悉成乳糜。次乃分散。達于周身。其上妙者。化氣歸筋。其次妙者。化血歸脉。用能滋益精髓。長養肌體。調和榮衛。所云妙者。飲食之精萃。

也。故能宣越流通。無處不到。所存糟粕。乃下於大腸。但言傳脾者。恐是熊三拔因漢醫每言飲食剋化。必並稱脾胃。取諸其易通曉。就其所膾炙於衆口。直云脾耳。其實不傳脾也。抑亦其人雖博豪多識。頗言醫事。然未精內景之詳說。而唯陳其所粗通之大概乎。今舉一二西說以明之。

西書云。

玉函經新垣我尔德兒

夫食之入口。咀嚼之

際。神水以漸潮溢。與其所咀嚼之物相和糅。以包撰之。送下食道。而入于胃。轉輸諸腸。腸云有六名。皆者皆

賴有此神水資焉。加以胃中之液。大機キ里リ尔ル汁及
膽汁等。以胃與諸腸之官能。消磨於斯。化熟於斯。以
製造一箇乳糜。飲食至此。經諸官主能。與糟粕相泌
別。得成白液。即乳糜和蘭乃導入一箇道路。其道路
謂之乳糜道。以混渚諸血中。遂與之偕化。成紅血。周
流身體。循環內外。又分利化成各部之諸液。以養吾
人生命。資給運營。無病平全之人皆然。
又云。夫人所飲食物。因胃與諸腸之官能而消磨之。
並有助之之諸液。以製造之。從諸腸所主運化喻收

于乳糜道之中。遂化成血液。以為養性命之基資也。
乳糜道一云液道。又方有乳糜會。新昏作奇縷科科。
又有乳糜管。新昏作奇縷管。本文不言及之者。幸一
以兼其
餘耳。

漢醫認乳糜為腸垢

槐園

晉按下利之証。古人見以為腸垢。或名積垢。呼積
謂膿。率皆乳糜之下利者耳。命名之失其實。不復
須辨而昭昭焉。其中少曉之者。張景岳一人而已。
豈不異乎。其言曰。凡腹中積聚之辨。乃以飲食之
滯留畜於中。或結聚成塊。或脹滿鞭痛。不化不行。

有所阻隔者。乃為之積。此皆粗粕成形之屬所當
逐也。今人不能辨察。但見痢如膿垢者。皆謂之積。
不知此非粗粕之屬。而實所腸著臟之脂膏。皆精
血之屬也。無論瘦人肥人。皆有脂。但肥者脂厚。瘦
者脂薄。未有無脂者也。若果無脂。則腸臟之間。豈
容單薄赤露。非惟藩籬不固。而且臟必易傷。無是
理也。今之凡患瀉痢者。正以五內受傷。脂膏不固。
故日利而下。若其臟氣稍強。則隨去隨生。猶無足
慮。若臟氣至敗。剝削至盡。或以久瀉久痢。但見血

水。及如屋漏水者。此在庸人。云其積聚已無。反稱
為善。而不知脂膏刮盡。則敗竭極危之候也。使今
後名家。但識此為脂膏。而本非積聚。則安之固之。
且不暇。而尚敢云攻之。逐之。或用苦寒以滑之。利
之者否。此固不及西說之精覈。則有之。然超然獨
能論及此。可謂卓見矣。予恨不令其聞乳糜之說
耳。香川太沖亦時發新見。間有可觀者。然其論腸
垢。駁景岳者。却大非矣。予性不好藏否人。於此等
說。實不得已而言之。蓋名實之不切。當其關係不

鮮淺故也。夫名不正則言不順實之所寓終將行之。故古者名之必可言。言之必可行。元氣常恐其虛而邪氣常恐其實。故正曰虛。邪曰實。則似矣。至若不識乳糜。而題以腸垢積膿。則可謂認親為賊也。夫言井有仁。君子可逝。聞隣有賊。寔整思逐。名之所使也。今舉至貴至重。可愛吝可保持之物。多以污穢可惡之稱。而注意於排擯驅除。其究不為梁北夫人者殆希。唯恐俾及於臭子。是故予之譯西書。常不嫌新目觀。不憚駁物聆。不取牽強以蹈

襲漢名之苟適衆好。而獨斷然曲翻西語。直釋原名者。蓋為此耳。今畧引西記示之。

我爾德兒曰。夫人所飲食物。因胃與諸腸之官能。而消磨之。茲有諸液。助其製造。從諸腸所生。運化。喻收于乳糜道之中。遂化成血液。以為養性命之基資也。其經絞榨之賸滓糟粕。從而後焉。即是大便也。若其大便。無論疎數。所下既非糟粕之屬。曾經製造而成。乳糜一變。將至血液。其色稍白者。謂之乳糜利。又曰。為是乳糜利。既然下利。其經製造之乳糜。則下

係消磨化熱其飲食之官夫其能也。亦不在助其製造之諸液瘞其務之罪也。元自明白矣。只是不喻收干乳糜道之中。是以泄利之耳。其不喻收干乳糜道者。尚有數因。其証其治。詳見予所譯內科撰要。

辨胎男女

月池

俺貌魯止烏巴亞歷曰。婦人妊娠之間。神思爽朗。顏色悅澤。眼中有神彩。身體壯健。此男胎也。且以男胎熱於女胎。故妊婦身體常有微熱。飲食日美。重身之後。至三四月。腹中覺微動。男也。女則更遲。 孕男胎

者。其腹突尖。右半身比左甚輕便。起座行步。皆先右足。欲起之際。每扶右手。右眼快明。乳頭右大於左。胎動多在右。其胎所在必上。高於女胎如兒頭大。或云。男子所施精之精。出右辜丸者成男胎。何者。右辜丸之精。純熱且壯也。曾見畜牛羊及野羊者。繫繫其左辜丸而合之。所生皆壯也。此可以為的証矣。按男子有因病損右辜丸者。後生子男也。然則造化之妙用。似非智術人為所得及也。但是交接之間。反于常理。或偏斜倚側。男女易地而行事。或女不快暢。則

縱得成胎。皆為女矣。婦人只受男子之精。以養成其胎而已。其所以成男成女之根原。全在男子用功之專精與否爾。

重胎說

婦人有雙胎品胎。又有一孕數胎。其受胎之原。亦不同。有每胎各胎者。有數胎同胞者。其每胎各胎者。已成胎之後。再受精成胎也。數胎同胞者。因一時受精過多而成也。瓦歷奴私曰。凡人已飲食訖。充滿胃中。之後。再復飲食。亦能共容納之。先自初次所納水穀。

漸漸消化。以為乳糜。分布散達于周身子宮之受精。亦猶此也。其所受只是一處。如虛器受物。期充盈而後已。非初次所受精容在一邊。而後所受則又容諸其一邊。然因交接之時。與受精之變。便成雙胎品胎。若數胎也。子宮內非有各空。可以受許多精之地。獸類常一產數子。然觀子宮內。只是一室。可以見已。或曰。子宮之受精也。必貯諸一邊。此說與古背馳。但子宮內含蓄氣。故精之純壯者。撞入宮內。則因其為氣所包之變。亦成雙胎品胎。若數胎也。觀每胎各胞。與

數胎同胞以為一時受胎與異時成胎之者法余顧
男女構精而成出有其理如亞利私突得歷斯瓦力
奴私等之說受其精純壯是以成胎者即胎立成矣
而子宮口尚未緊閉或成胎後偶甬有開口方是之
時適有交接則再受精而重成胎謂之重胎重胎之
厚無他一成胎後再受精也詳于非剝加刺得私雙
胎說考其子宮已結胎閉口者所以再開口之故其
說亦不一或謂結胎後為吐出瘀塞其中之物開口
者有之及其時而交者則成重胎又謂情意萌動乃

為交合之際男子用功極力尽抵觸摩盪之態女人
快羨之極有至如狂者正是子宮開口之期當是之
時男子亦瀉精則再受其精重結胎矣因按凡人飲
食飽滿之後雖胃中充塞不欲飲食然若值異常美
味管待亦懇至侑勸有適意則再有催食氣右所論
亦猶是然非皆甬婦人之有雙胎猶人之有長生此
所當有而不易有之事耳只多在其人壯實甚所心
愛而婦人亦性淫者或有初受胎之後重受胎其間
隔數日者布利尼烏私曰一婦妊娠九月而孿生共

一乃五月胎也又曰一婦孖生其顏容一似其夫一似面首男子布羅可念志惡曰一婢一日交其主與其管家及產孖生一侶其主一侶其管家羅烏設突曰一婦人產一子三七日之後又舉一子由是觀之重胎者其產亦有隔日此其受胎不同時每胎各胞故也數胎同胞者以一時受胎其生亦同時又曰重胎在受初胎之後四十日以内過此以往以初受胎氣漸々充實子宮內無地重受胎也羅馬人說亞力山的里垂之婦人一產四子後經四十日再舉一子蓋

婦人止兩乳而一產數子實造化之變所以不可測知也凡子宮之口在處女妊婦及石女則細小如男子陰頭然至如既產之後與不遠當成胎之期則異此必開哆矣其既受精者即緊閉不可辨自門口至產門底洞然如無物然及其再受精之時或泄精之期或當吐除月事淤塞其他水液之際則尚有再復開口焉

和蘭草木畧上編

木俊卿

信陽小諸之暨官木俊卿。從其君而東也。刀圭餘

暇。遍就都下諸名家而諮焉。聞予近唱泰西疾醫
之術。盍歸乎來。請曰。竊見世之從事蘭學者。大率
喜遐好異。詳乎奇器遠物。而畧乎日用必需之事。
僕則不願也。矧有賤職在焉。卑卑然唯刀圭之從。
從公于邁。一被一此。祇役之靡盬。不遑優柔。饜飲
於蘭畹之中。以俟其冰釋理順焉。願莫愛齒牙餘
論。使僕聞其說。予迺取宥坐所存西醫泥蘭度草
木畧。撰斯土所有日供藥用者。及良功善能。人莫
之知。懷才抱德。塊然湮滅山林。其情可憫者。旋讀

旋答亦唯絕域九萬里之異文。入乎眼而出乎口。
口眼之間。不能四寸。歐邏巴之言。轉為尋常之國
語。俊卿則隨聞隨筆。未嘗失之。每會期必與其所
友善水府醫官伊藤氏。未嘗不焚笠雪簑。以來訪
也。積而成編。以示予。予觀之。其性功主治。西人入
所歷試。亦足以知其梗槩。雖則篋爾小冊子哉。奚
徒尋常壞牛牯軸之書。率皆踏襲一魚卓識。超出
範圍之表。屢災梨棗。亦唯依樣一葫蘆者之比哉。
是書也。俊卿撰焉。伊藤氏校焉。今援數條。收載于

此以記其勤耳。寬政丁巳之春。字槐園題。

水仙

性功

溫而燥。在第二度。

木寒熱極為四級其

最高者為四度其說詳

干所著本草席例 主條刷陳滯且收斂

附方治

諸般劍傷及疥癬取根熟搗如膏貼患處又取花浸油中暴諸日數日後用蒸露罐依法取油聽用 湯

泡火燒及皮肉擦壞取根熟搗和蜜如膏貼患處 **增**

此以醫學寶函和以豆粉外貼拔竹木刺柔硬腫

山慈姑

性功

溫而燥。功與水仙畧似。

附方 滌除諸

般粘稠液及痰飲惡液下利大便根二支茴香子或

蔣蘿子少許酒若水煮服

西洋酒与和漢異皆以蒲

詳見遠西名物考

金盞花

性功

花。溫而燥。開發閉塞。消化堅硬發汗。

治傳滌惡氣 **附方** 傳滌諸病。心中悸動。用花製昆設

尔拂每朝空心服肉豆蔻大。天行疫疾取莖葉生

汁十六支頓服溫覆取汗又取底野迦和以花及醋

服。黃疸取生汁八支和製乾蚯蚓一支頓服。經

閉莖葉花酒煮服又取生汁八支空腹服。下胞衣

及死胎。取乾莖葉投諸熾炭烟薰下部。遊痛取

和
生汁含 創傷。莖葉搗加膏貼。寒熱經久取子七
枚用酒二十四支浸桑先熟發四時半服 眼目赤
腫 花露頻之滴目中。增花強壯心肝通經閉。
酸漿 [性功]寒而燥。功同酸模。附方口中生瘡污穢
生汁或水煮含漱。鬱胃肝熱及熱病。取生汁製含
利別取二十四支。蒸縮百二十八支頻服。增花及
葉治肺脹療白帶外用治眼疾。
蚕休 [性功]燥在第三度。毫無可知覺之熱味焉。收
斂發汗治中毒療傳染病。附方治諸傳染病婦人月

經過多吐血尿血。及胃腹內諸創傷。乾根為末。用莖
葉露若酒飲服一匙。口中諸惡瘡根煎湯含漱。
諸漏瘡根末搽患處。治小產。紫參根末一匙以蚕
休水十六支飲服。旁用新根莖葉多少適宜熟杵如
膏貼臍上。增根發汗療中毒強心。治天行疫疾。以
性收斂故諸般下利出血用之外用全草治蝮蛇及
諸蛇咬傷。

水楊梅 [性功]濕而燥在第二度。強壯衰弱少收斂。
收諸口藥品中。附方曾脇痛胃疔頭眩心肝衰弱。取

根十六支葉二溢以水酒煮取百二十八支日二三
服。新舊創傷根葉酒煎洗。〔增〕強壯男女陰精是
以令人有子取根酒若麥酒調服。

紫參

〔性功〕寒而燥在第三度強收斂發汗治傳染。

〔附方〕月經過多下利嘔吐及防小產取乾根一支為
末以赤酒菜菔水飲服又取根酒若水煮頻服。齒
斷出血齒牙不固根葉絞汁含嗽。天行疫疾傳染
諸病根為末一支取使用液飲服取汗。止諸出血
根末抹上。〔增〕根發汗解中毒療金瘡治赤利嘔吐

及諸毒甚良。

葶藶〔性功〕溫而燥。滌刷陳滯少收斂。〔附方〕面上點

黧新根杵爛搗上。又取根製露洗面上。愈傷損新

根搗爛如膏貼創上。淨刷粘稠液留飲惡水。取子

十二顆至十五顆服。上吐下利而愈。葉煎湯又為

末服一匙。同治前証。結石腎痛瘀血凝結經閉蒸

根取露服十六支。〔增〕根治白帶下外用治足膝痛

腫脚氣滅癩痕瘰諸瘡顏面黑痣小兒疥癬等露水

治暑沛美顏色。

狗脊 [性功] 根温而燥。開發閉塞。少收斂。[附方] 治肝
及子藏閉塞。根十六支。破裂細剉。酒煮。取百二十八
支。日再服。腹中有坑。根水煮。以蜜和服。湯泡火
燒。根多少。適宜。臼中杵熟。加薔薇露少許。再杵絞取
汁塗患上。[增] 根治脾胃子藏及他諸藏閉塞。殺諸虫。
骨碎補 [性功] 燥。開發閉塞。微利。下腐敗惡液及痰
飲。[附方] 治胸中痰塞。瘡久不愈。諸藏閉塞。根十六支。乾
葡萄二匁。用大麥水煮。取百二十八支。日再服。[增]
根主微利。開發諸藏閉塞。青腿牙疳及他病。生於血

中腐瘡者。為必用。催生下死胎。和以拔尔撒沒。熟研
如膏。能拔矢鏃入肉。

兜葵 性功大熱而燥。吸引拔出。滌刷陳滯。創開脉
口。以其峻烈。故唯供外用。[附方] 治疥癩瘡腫。取露頻洗。

瓜甲癰腫。及瓜甲蝦腫。生葉搗貼患處。 莖牙痛
及莖牙不固。全草酢煮。含嗽。

烏頭 [性功] 温而燥。在第四度。甚害人畜。可以致死。
[增] 全草可以毒物。然治諸癩良。中烏頭毒者。斡答底
野迦麝香。龍涎香。酒麥酒。並解之。

地榆 [性功] 温而燥 在第二度開 痰閉塞 滌刷陳
滯少收斂 [附方] 心痛悸動 腎痛石淋 惡心生葉 浸酒
中時服一酒盃 又取露和酒服亦良 療諸瘡傷止
出血 莖葉煎湯或入他治 創方 宁服旁 且搗莖葉貼
創上 天行疫疾及諸熱 絞取液服八匙 [增] 根葉
子發汗 利尿通月經 破石淋 治中毒 解水銀毒 又療
諸般金瘡 良外用 除顏面黧黯 療金瘡 經日治膿壞
諸腫小瘡 蝦腫 甚痛 益乳汁
藿菜 [性功] 温而燥 在第三度 頗走竄 開發閉塞

稀釋 黏 [附方] 催月經 令婦人有子 蒸取露 頓服二
十四 復且以莖葉作浴湯 令患婦浴 內部傷損生
汁 八分 酒和服

馬蘭 [性功] 在寒熱之間 少燥 消化堅硬 分疏鬱
積 [附方] 胃及眼目熱 腫莖葉搗熟 如膏貼 風火咬
傷 取花搗和 舊猪脂貼瘡上

絡石 [性功] 温中等 燥更多 主收斂 收在治創 菜
中 [附方] 諸般下利 出血 全草酒煮服 諸毒蟲獸咬
傷 搗全草貼患處 婦人白帶 絡石三 溢用酒百二

十八支者取三分一服一酒盃。耳痛生汁温滴耳中。[增]葉主收斂。諸般下利出血婦人帶下為必用。益乳汁。乳絕嗣。良調月經過多。

石葦 [性]功温在第一度燥在第二度或云寒而

燥。開發閉塞。稀釋凝粘。少收斂。[附]方。脾藏鬱脹。久瘧。

葉二溢用酒百二十八支者取三分之一服一酒盃。

日二三次。諸般下利吐血葉水者加砂糖少許服。

[增]葉為脾肝損傷之要藥。治下利下血。外用療瘡傷。膿腫。瘰癧痛。

白微 [性]功温而燥在第一度。開發閉塞。稀釋凝

粘。發汗。[附]方。治疝痛。通月經。根末一支。用酒飲服。

諸毒。獸風。犬咬傷。根末酒服數日。天行疫疾。

或傳染諸病。根細搗為末。一支。葛兒。儒。癩。涅。實。屈。蟄。

類。水及酸模水送下。温覆取汗。水腫。黃疽。根浸酒。

令漚。若酒煮服。一酒盃。日再。諸貴。根末。小兒。三分。

錢之一。大人。一支。用莖葉蒸。餾。飲服。散體中。凝血。

根末。一。支。用醋飲服。發癩。根。二。三。支。為藥子。三分。

支之一。為末。以使用。液飲服。污穢。膿瘡。根末。搽上。

增根驅砂石通小水催月經解諸中毒治天行疫疾
毒貴獸咬傷諸疰諸貴鬱冒心痛動悸

桃朱術

性功清涼而少燥苦味開發閉塞滌刷

陳滯淨除腐敗惡液 附方諸藏閉塞黃疽青腿牙

疳久瘡疥癬全草四溢用乳酪清二百五十六文煮

取三分之一數日服之眼目矇昧生汁滴目中

黃花桃朱術

性功味苦性功同桃朱術特其導

達水液利諸小水殊為有力耳 增全草及花驅腐

敗膠沐下水液清淨血液開發閉塞

錦荔枝

性功在寒熱之間然主燥是以有收斂

治創之功

附方新金瘡及惡膿瘡葉搗熟貼上又

以油漬柔其實後再者之蘸綿貼上 腹痛葉酒煮

服 乳房爛壞痔疾湯火傷用實製油塗患處 婦

人難產用右油塗腹部 肌肉皸折葉擣細大人一

反小兒五分酒服外用右油塗患處 增此草大有

按爾撒沒之功彼土呼此草為按爾撒沒過百尔以

莖葉根又堪內服外用療諸般瘡傷製油治諸般新

創不發熱腫不出數日而愈最能治口中折裂及乳

房破壞陰處亦同。

鳳仙花

性功與錦荔枝同功蘭名亦同錦荔枝

北為雌

羅勒 性功温在第二度消化堅硬多疏鬱積用

之 附方眼目旋運及矇昧取生汁滴目中 氣急

喘息子一匙以蜜水飲服 利小水通月經莖葉酒

煮服 增此草至清淨肺藏催月經然罕用

芸香 性功温而燥在第三度走竄潛搜决壅潰圍

稀釋凝粘而治傳染 附方通月經下胞衣作湯

服又取生汁酒和服 解中毒子一匙擣末取便用

液飲服 天行疫疾及傳染病胡桃二顆無花果二

顆芸香二十葉食塩少許右件合杵如昆設尔拂每

朝取豆大服此方於豫防術殊驗 惡証熱病芸香

多少從宜加食塩及酢少許共搗和以貼動取用布

縛定 水腫芸香二溢用百二十八匙酒煮減半四

次分服 眼目矇昧芸香汁一味或和蔣蘿汁滴目

中 耳聾 痛耳鳴以生汁若油滴耳中 脾藏鬱

脹取油塗左脇脾之部位 昏睡發癩以生汁一匙

與服且和酢灌鼻中 滑精芸香子一曳細末以少
液飲服 風犬咬傷生汁十六曳共酒飲服且取葉
搗和以食塩及蜜貼患處 [增] 葶葉子利水便通月
經催生頭腦諸疾為必用治神經眼目諸中毒青眼
牙疳卒中昏睡發癩眼目衰弱及多眵淚

大蒜 [性功] 熱而燥在第四度氣峻裂而味酷辣
開發閉塞決壅潰圍消化堅硬治傳染中毒與葱同
功而更强焉 [附方] 諸般寒毒大蒜調和食膳用或
浸酒用 小兒諸虫用甘乳酪煮與服膏搗大蒜以

新鮮牛酪和塗鳩尾 頭上惡瘡生汁以蜜和塗
咳嗽久不愈生汁和以猪脂塗足心及動脈上 天
行疫疾大蒜一顆芸香白屈菜各十葉共於臼中杵
加白酒及燒酒再杵取汁服 齒痛酢煮含之或灰
中煨乘熱貼痛處 [增] 治諸疔腸痛咳嗽呼吸不利
肺病黃胆腎痛石淋細剉以燒酒飲服最能治結石
証蒸饅解諸般中毒
葱 [性功] 温而燥在第四度然比大蒜不甚熱鬧
發閉塞稀釋凝粘決壅潰圍滌刷陳滯 [附方] 血痔

壅閉為患令其開泄生汁蘸繇納肚中 利小便通
月經分疏風氣常調食膳用 天行疫疾根白杏仁
充以底野迦和佛手柑汁蜜封其孔煨熟灰中取出
絞取頓服溫覆取汗 兒枕痛葱酒煮和以膽八香
油搗如膏貼脐中 風大咬傷葱芒香蜜及食塩多
少適宜共合熟研貼傷上 眼中斑點眼目矇昧生
汁和蜜點眼中 淨除腦中粘液生汁灌鼻中 血
血生汁酢和灌鼻中 停耳生汁濕滴耳中 耳聾
耳鳴葱根按心克以真防風子末 真防風葉鋪所種
出江州伊吹山

熟灰中煨絞取汁滴耳中 湯泡火燒皮膚剝脫生
汁和以雞油塗上 毛髮脫落生新髮取生汁塗

增利尿發汗緩釋肺中粘液蜜煮用除砂石驅諸虫
醋浸用通月經外用熟瘡腫開瘡口是以瘡腫及疫

瘡 譯名天行疫瘡
之譯名其說別見用以割口又狂大咬用之

凡 **性功**寒在第一度潤燥生津在第三度治胃

熱甚良然不利干患諸疝脾病若青腿牙疳之人瓜
子性功與胡瓜子同算得共列于四種大寒子之中
附方頭痛因熱者取穰切縛在額上 顏面斑點

子同蠶豆粉和以生汁作餅日乾酒和摩搯斑上
頭上疥癬取根乾末以蜜和塗 作吐藥取根乾末
以蜜水飲服一錢 腎痛石淋肝熱及府藏燔熱莖
其熟者取露頓服三十二支外用生汁和酢蘸巾貼
患處 [增]清熱投白炭然善發寒熱及下利宜以胡
椒及上好酒一盃共服乃得

藿香 [性]溫而燥在第二度強壯衰弱 [附方]
胃中水濕寒冷心中悸動腦中閉塞腹痛酒煮服又
取藿香昆設爾掃蠶豆大以其露飲服 氣急喘息

取生汁製舍利別類之紙服 諸般金瘡生汁灌患
處 經水不利子宮衝逆子宮疼痛酒煮服旁取藿
香苦薏花多少適宜以袋盛之水煮乘熱貼腹上

[增]治頭旋眩冒卒中痲証最能療心腹膨脹陰吹通
月經下胞衣外用煮湯坐浴治馬蠅蜂螫毒

紫蘘 [性]溫而燥在第三度微帶收斂 [附方]
諸証因寒傷頭腦神經者取花製昆設爾掃用紫蘘
露空心服蠶豆大又酒煮服 諸瘡不淨及創傷葉
搗如膏貼患處 莖斷不淨酒煮含嗽 中毒取葉

三個和塩少許服 腎痛石淋酒煮服一酒盃 耳

細後腫紫蘇葉埋的連草名等分持如膏貼上 豫防小

產使孕婦常食之 [增]花利小便便生產催月經下

胞衣胃家子宮病為心用治頭眩眩冒顛掉拘牽不

孕天行疫疾咳嗽肺病等葉功同花外用治出血齒

斷臭爛以指筴斷貼乳房減乳汁酒若麥酒浸用治

水腫及瘡三日一發者等

胡盧巴 性功温在第二度而燥在第一度和柔

酷厲消化堅硬釀腫疔痛 [附立]諸般腫瘍胡盧巴

末多少從宜以蜜水和為餅貼上 脾藏鬱脹末多

少適宜消石四支酢和為餅貼于左脇 脇痛如裂

用子製湯劑以水鏡射腸中 子宮堅癖子宮腫瘍

子水煮作浴湯令婦人浴後取子粘滑液和以鷲脂

灌藏中 今諸腫瘍成熟用葉浸酒與油之中十五

日煮至酒氣盡絞去滓入胡盧巴末及蠟多少適宜

煎為膏用 [增]子並為粉者消解堅硬疏散凝結

尉劑及水鏡劑用之以其有破氣驅風之功也其粘

滑液所謂傑烈乙能治夫行眼疾

紅花

〔性功〕溫少多疏消化

〔增〕子有下利之功

故下劑方中用之花染匝用之

鳧公英

〔性功〕清涼而燥在第二度味苦開發閉塞

滌刷陳滯

〔附方〕治寒熱病清淨血液莖葉三溢以

乳酪清百二十八支煮取三分之一頻服又絞取生

汁十六支和利母能舍利別利母能者仁預服眼

中生翳取白汁點眼中日二三次新金瘡莖葉煮

湯洗患處〔增〕全草及根為肝脾要藥治水腫黃疽

青腿牙疳尿管外用治眼中生翳莖中白汁散疣目

類

蜀葵

〔性功〕溫中等燥比尋常蜀葵更甚

此所主說者謂

蜀葵白花者就呼其他為尋常其花雜色者也柔和酷屬多疏鬱積除疼痛

和調酷屬液〔附方〕結石腎痛葉一溢或根十六支

以酒百二十八支煮減半分二服冒寒傷冷毒及

其毒陷曾部者取蜀葵糖用砂糖製者一個口中含

嚙咳嗽不止根十二支以甘乳酪煮取百二十八

支服一酒盃日二次諸般堅硬寒腫根多少適宜

以酒煮柔於旧中熟杵加猪脂少許如膏貼腫上

疏 [增]根及葉主下利及久鬱積減諸液中酷厲發汗消
痛用根與肉桂水煮下胞衣淨產後瘀血用根搗和
以砂糖塗疔目類及其折裂

蒲藿

[性功]甚同接骨木

[增]主峻利然其諸部各

有等差其根浸用者力殊強水煮則劣子用自一莖
至二莖初生苞葉其効柔丸要治其頭眩以酒乃解
菱 [性功]清涼微帶收斂 [附方]尿血腎胞結石
痛諸般下利乾菱一莖細末酒服其砂石即自小便
出若得新生者以取露用亦得 [增]實破砂石治赤

利尿血脇痛葉入眼料用治莖斷及口中焮腫

夏枯草

[性功]溫而燥在第二度開發閉塞決壅

潰圍稀釋凝粘滌刷陳滯 [附方]腦之寒傷肝脾子

藏閉塞黃疸腎胞結石用水若酒作湯劑和以砂糖

若其舍利別服一酒盃日二三次凡用以為藥酒又

取蒸餾又花作昆設爾拂共能治前証 頭上創傷

積葉貼上 驅除粘痰雷飲吐劑乾根二莖以蜜水

飲服 [增]花治頭腦諸患耳聽不聰耳鳴肺癰吐血

吐膿利小便驅除中毒

浮萍

〔性功〕潤燥生津清熱涼火在第二度 〔附

方〕頭痛熱証諸腫浮萍多少從宜外貼患處頻々更

換 眼目熱赤肝藏熱腫取露頻々洗眼又蘸巾貼

右脇肝部位 痛風浮萍多少從宜於磁罐若鐵罐

內大上煖之出攤綿布如膏貼患處予施諸脚氣敷

發者每得効 〔增〕治眼目赤痛或腫或破裂

萍蓬草 〔性功〕根子清涼而操在第三度 花葉

清涼潤燥生津 〔附方〕滑精月經過多下利不禁子

若根一匙以珍醪酒一頓飲服又花作昆設尔拂服

亦可 止諸出血青葉細搗如膏貼創上 熱病乾

咳諸藏熱腫白花萍蓬草蒸花取露百二十八匙又

作舍利別者十六匙和調頻服 脾脹根八匙以白

酒六十四匙煮分再服 頭痛肝脾及腎熱腫白花

萍運草花露多少從宜蘸巾縛額上又貼右脇肝位

若左脇脾位若臍上腎位 〔增〕子消除淫欲清涼血

熱治滑精白帶下花露主清涼是以諸般清涼劑用

之

茵陳 〔性功〕溫第二度燥第三度苦味開發閉塞

决壅潰圍滌刷陳滯微收斂 [附方] 因胃衰弱生雷
飲惡液及肝藏閉塞寒熱經久不癒茵陳昆設尔拂
一塊每朝服之又茵陳二溢以清水煮取百二十八
支和以其舍利別二十四支服一酒盃日二次又用
茵陳酒亦良服右葉之間取茵陳油塗腹上為妙
腹痛及蟲証茵陳花一溢國黑應子 代用小苗 二支
香可也
以酒煮取百二十八支服旁以其油塗脐中 黃疸
茵陳水煮服 杖癥搗葉和蜜貼 耳痛水煮以蒸
氣蒸耳中 子宮疼痛茵陳二溢以酒百二十支煮

取三夕之一頓服一酒盃 [增] 治腸痛壯胃氣療黃

疸水腫寒熱病

薺 [性功] 清涼而燥且收斂 [附方] 尿血赤利諸

般下血薺一溢芣苢半溢以雨水六十四支煮取半
漉過和赤石脂一支夕再服 血血葉破碎多少從
宜插入鼻中縛定腋下及項 金瘡出血葉搗如膏
貼上 黃疸葉搗熟貼足心縛定 [增] 主收斂是以
有止澁閉塞之功為金瘡要藥以赤酒煮治諸般出
血

石長生

〔性功〕燥而在寒熱之間稀薄曾隔粘痰

稠飲有成熟化融之功 〔附方〕咳嗽諸藏閉塞腎胞

結石葉四溢以酒百九十二支煮取三分之一渡過

以其舍利別和調服一酒盃日二次 頭上濕惡瘡

葉多少從宜以灰汁煮洗瘡 〔增〕性在寒熱之間多

入治胸膈諸病湯中用即治呼吸不利咳嗽肺病脾

脹水腫療尿血殊治尿道凝血若砂石係結石腎痛

証者須加燈籠兒及巴列尔沙度一名松的影

蟹殼草 〔性功〕其燥著明微帶清涼有生肌飲口

之功 〔附方〕內外損傷酒煮或與他治瘡藥配服一

酒盃日二三次 湯泡火燒取生葉搗如膏貼上

吐血經水過多諸般下血葉四溢細剉以剛鐵水煮

取百二十八支渡過迷尔點鼈失應舍利別十六支

槓楂舍利別八支右件和調日再服 〔增〕葉治湯火

傷金創膿壞膿管腫譯名腎癰肺癰入煎劑散

劑及罨尉劑內外用

佛甲草 〔性功〕清涼在第三度濃厚稀薄微帶收

斂 〔附方〕風眼熱赤及焮熱腫赤疱生汁頻頻點眼

又蘸巾貼腫處及瘡上 痛風因熱者大葉佛甲草
多少從宜細搗以大麥粉和罨貼患處 熱病大葉
佛甲草生汁八支子而子儒子覺子涅子實子屈子蟄子水十六支白
砂糖二支和調頻服一匙 熱病大頭痛大葉佛
甲草汁十六支薔薇油八支薔薇醋二支合和蘸巾
貼額上 肝藏嫩熟生汁酢和貼其部位 湯泡火
燒生汁以薔薇油及蠟作軟膏塗患處 衄血生汁
漬巾以縛額上及顛顛鼻上 吐除粘痰及腐敗惡
液生汁二支用便宜液飲服 [增]葉外用除疣目類

治咽喉膿腫眼目嫩腫肝藏嫩熟熱病譫妄療骨節
疼痛乳汁過多解醒

蕃椒 [性功]溫而燥在第四度強壯胃家驅逐體

中風氣 [附方]肝脹水腫蕃椒水煮作湯與服下利

水液而愈 痛風在脚蕃椒細搗多少從宜傳貼患

處發水疱多出惡液而愈 面部身上雀斑黧蕃

椒細搗以蜜和調塗患處 令齒牙牢固葉燒灰真

珠母燒灰各等分水飛令白以摩揩之 [增]主強胃

用造三纏糖又用醋及蔣蘿製一方多沒列見失醫名

用之治瘧疾

燈籠兒

〔性功〕實及中子涼而燥在第二度開發

閉塞通利小水

〔附方〕肝藏閉塞黃疸結石腎痛石

淋實十顆搗碎以水九十六文煮去滓加砂糖與服

〔增〕治腎膀胱損傷有大功通小水消結石療寒尿

詳見內科撰要 膿淋止腰痛

為藥

〔性功〕溫而燥在第二度微帶收斂

〔附方〕

卒中痲症癩癩冒寒傷冷其他頭腦諸患取根和其

花舍利別令其甘美作煎湯日二三次服又蒸根取

露傾服十六支又實十五六顆持末以酒若蜜水若

他便用液飲服 催月經淨產婦子宮治腹痛根乾

末以酒若蜜水服 子藏衝逆詳見內科撰要 子宮疼痛

實十五顆以酒若蜜水服 小兒驚搐取生根繫諸

兒頸又以線貫聯其末繫結其頸旁取其露二匙加

花舍利別令其甘美類之與服 肝藏閉塞水腫腎

痛膀胱痛共見內科撰要 用根作湯服 疼痛因青腿牙疳

若微毒發者用根作湯類服 〔增〕根葉及子並強頭

腦心藏及子宮治諸癩頭眩冒癩癩夢遺鬼交等

良根施諸小兒頭眩目癩瘡殊妙是以末兒叔尼
斯散中用之出和蘭局方主治癩瘡驚風搐搦掣抽
凡神經諸疾幸急拘牽等遠西名物考

甘草 性功在溫涼之間是以潤燥生津和緩

屬 附方咳嗽喘急取甘草膏葉舖所貨有舶來物若甘草舍

利別稍含嚥甚良 腎胞毒腫因發淋瀝小便頻

數甘草作湯服或以酒和調亦可 增治諸般胃膈

病咳嗽呃逆心中懊懣腰痛腎痛其汁熬乾作錠者
謂之獨鹿布即上甘草膏是也 主治同

薑 性功大溫開達閉塞疏通鬱積稀釋凝粘

附方胃寒胃腹諸藏寒冷諸液腐壞以薑稠和日常

食饌又加他方中服 增煖胃寒冷助飲食消化且

消化諸生粗末熟者治頭眩目眩重疼因胃家

諸患而發者殊良外用療眼疾

大黃 性功主疏滌腐敗膽汁說見內科撰要煩悶篇其餘

止惡液得效之後其下利自是以諸般泄瀉下利等必

用之每良服量自一匙至二匙為一服緊若要大便
順利不至泄瀉即取五分若三分餘以使用液飲服

〔增〕驅除腐敗膽汁自餘惡液其下利不駁劇又有收斂之功是以赤利用之

山竒糧

〔性功〕溫中適而燥在第二等利尿發汗

〔附方〕徵瘡熱病經久痲症水腫 風久頭痛黃疽

肝藏閉塞腎痛石淋煎湯服 〔增〕大發汗治水腫瘰

惡瘡疥癬徵瘡骨節疼痛良

白兔藿

〔性功〕溫一度而燥二度下痰飲及他水

液惡汁服量小兒三分錢之一大人一二分以為一

服之際

〔增〕主微利驅逐諸般惡液留飲水氣以其

無苦味淡口易服小兒下劑用之呼曰白大黃若夫

嬰兒須與六分錢之一二稍長者一分大人二分

鬼茉莉

〔性功〕主下利然專以除水液為能取一

分若三分錢之一用便宜液飲服 〔增〕主下利驅除

諸般粘液癆敗膽汁痰飲及他惡水服量細末自半

分至三分分之二脂四分分之一

款冬

〔性功〕生草溫涼中適殊有強壯肺氣之功

而乾者性溫 〔附方〕咳嗽喘急葉三溢以水百二十

八分煮和其葉舍利別調頻服 諸藏熱腫究猛熱

病其露十六文若二十四文頓服 頭痛及陰器熱
腫取露蘸巾貼患處 湯泡火燒搗葉取汁塗患處
還將生葉燻貼 [增]全草主胸膈病肺諸疾治肺癆
乾咳心中懊懣肺痛 見內科 標要 勞証葉外用療燻腫熱
証瘡腫赤利腹中煩熱乳頭折裂

玉蜀黍

[性功]實難消化然有濕燥之性 [附方]

熟成諸腫實搗碎以津液和貼上 風疹亦斑葉紋
汁蘸巾貼上

薏苡仁

[性功]世人所適知實治腎痛石淋甚良

延胡索

[性功]溫而燥在第二度消化堅硬滌刷

陳滯

[附方]疥癬延胡索月桂各等分搗為細末以

水液飲服一丸服後溫覆為妙 小兒貴証細末三

分錢之一以甘乳酪清服 咽喉腫水煮頻令噉

蓖麻子

[性功]溫而燥在第二度滌刷陳滯消化

堅硬峻利水飲惡液腐敗膽汁等殊有奇功然稀內

服之 [附方]驅除留飲惡液腐敗膽汁等取子六顆

至十五顆微煨搗碎加桂若生薑 乳酪飲服 婦

人乳房結核葉搗細以麥粉和調如糊貼患處 頭

瘡子榨取油摩塗瘡上
[增]子仁主峻利吐下腐敗
膽汁然稀用之油治水腫諸蟲外用療痔瘡皮膚癢
痕黑斑及浸淫頭瘡

敗醬

[性功] 溫而燥在第二度開發閉塞發汗利

尿 [附方] 胸脇痛月經不通小便不利根煮作湯服

氣急喘息根十六分寸草四分水煮取百二十八

分服一盃日二次 肝脾閉塞傳染諸病黃疸眼精

衰弱根煮作湯服或乾根搗末以便用液飲服一分

頭瘡經久不治莖葉搗絞取汁塗上 [增] 全草開

發閉塞發汗利尿通月經淨產後瘀血解諸毒治黃

疸尿閉三日瘡傳染疫熱胃脇痛眼精衰弱外用壯

陽物強眼神

淫羊藿

[性功] 根微燥而味瀟其葉甚苦殆與葛

默刺亞同味

根園按百工家言云根有收斂而燥之性葉味苦
搗細以油調貼婦人乳上令其不至長大若末
服五分或煮服令婦人不受胎此說與漢人諸說相
異但別錄久服令婦人無子一語正與此相合可疑
者須實驗參審以歸至當耳

曼陀羅花

[性功] 寒在第四度令人麻痺奪知覺

催昏睡 [附方] 止疼痛催睡眠取子八分粗剉以燒

酒六十四分浸液數日後絞去滓煮減半服一匙

[增] 全草雖同功然其子殊有力催睡令人麻不知痛
痒解其毒底野迦赤石脂甘巴旦香油主之

細辛 [性功] 根葉溫而燥在第三度開發閉塞通

利小便逐留飲除腐敗膽汁驅諸惡液或由吐去或由
前後通出 [附方] 經久熱病痛風水腫黃疸乾根

杵末以使用液飲服一匁又根三匁以酒蜜水多少
適宜煮去滓頓服又葉六箇至十箇於臼中熟搗加

酒再搗絞取汁頓服 乾婦人乳汁葉以酒熟研如

膏貼乳上 喘息氣急小便淋瀝乾根四匁以酒六

十四分煮減半分再服 眼目矇昧或用生汁一味

或以製胡粉和滴眼中 [增] 下死胎利小便治子宮

痛療黃疸水腫番替執 見內科 鼻膈及頭眩諸病通

經閉

薄荷 [性功] 溫而燥在第三度微帶收斂 [附方]

婦人白帶薄荷昆設尔拂豆大以其露飲服日二次

經久頭痛莖葉搗熟貼額上縛定及貼額顛 小

兒頭瘡新荃葉搗絞取汁塗瘡上 腹中諸蟲生汁
四夕和酢八夕頓服 惡心及肝脾腎閉塞薄荷露
四十夕薄荷舍利別十二夕調和頻令服二匙又取
莖葉酒煮服旁外用其油各塗患處 小兒腹痛取
薄荷露與服 斷乳荃葉搗熟如膏貼乳上 耳痛
生汁蜜水等分溫滴耳中 [增]治胃及子宮諸病療
吞酸噎氣腹脹腸痛見內科頭眩眩冒頭痛白帶殺
虵虫
桔梗 [性功]未詳 [增]全草涼而燥且收斂水煮

含嗽治口中巴且杏核旁挾懸壅如巴且杏核者咽謂之巴且杏核以形名也
喉懸壅等腫瘍及焮腫即漢人所謂喉風類有良効且療咽喉
壞膿及喉風根春初掘采可和菜蔬食
百合 [性功]花温而潤止疼痛消化堅硬和柔酷
屬根葉燥滌刷陳滯消化堅硬和柔酷屬烹釀熟成
[附方]臨產痛百合花露二十四夕雜腹蘭肉桂各
三分夕之一右三味合頓服旁取百合油塗小腹及
陰門 咳嗽氣急喘息花露多少從宜和乳糖頻服
二匙 湯泡火傷葉搗熟貼患處又取根埋灰煨入

薔薇油搗熟如膏貼患處 頭瘡久不癒及創傷取
百合汁以蜜及酢銅罐中煮熬令稠厚貼患處又取
葉酒煮外貼 柔熟堅硬腫毒根火灸或水煮熟研
和薔薇油或苦薏油如膏貼瘡上 骨節閃挫葉搗
熟貼患處且以其油摩塗 令顏面清美悅澤取百
合花露頻々塗之 檀根有烹釀熟成清淨汚滯分
疏鬱積之功且生肌起肉奕硬柔腫為必用是以柔
和堅硬之劑中用之花稀薄粘稠和熟生硬定疼痛
外用治羅斯及翁篤私參金 佷共見內 療金瘡膿壞

瘡久不愈並良花中黃催產通經水花露治顏面赤

泡炒

半夏 性功温而燥在第三度開達閉塞稀薄粘

稠解釋凝結驅逐小便分疏鬱積 附方脚氣關節

痛根多少從宜搗末和以牛屎如膏貼患處 解諸

中毒半夏末一匁底野迦五分共合以酒飲服又葉

搗絞取汁一匙和酢二匙頓服 喘急咳嗽因痰飲

起者半夏一匁乳糖二匁右二味合分再服 通經

水半夏末二匁酒服 水腫寒熱經久諸藏閉塞半

夏五分茵陳鹽酒石塩各六分及之一右三味合和
頓服 面上黥黥雀斑半夏乾末以薔薇露和調日
曝乾如此三次後為細末摩搽患上又以薔薇露和
直塗上 [增]治胃病通小水解中毒福兒福兒扭斯扭斯西西醫
用以治咳嗽有散劑

龍葵龍珠

槐園案西唇此草實有赤黑黃二品
共為一種故併二為一但黃者未見

[性功]清涼在第二度有收斂之功 [附方]頭痛因
熾盛熱病起者莖葉搗熟繞頭貼之及貼足心共縛
定之 羅斯羅斯莖葉生汁二分酢一分蘸布帛貼患

處

微兒微兒鳥吸胡兒鳥吸胡兒

瘡名猶日遊火
謂其毒遊走

浸淫腐蝕之証

生汁八分薔薇油四分定粉銀蜜陀各二分於鉛臼
中共研細至如軟膏聽用 [增]莖葉及實外用治身

熱頭痛赤利腐爛耳中膿爛子宮蝦腫

胭脂草

[性功]溫而燥微帶走竄算得列於治創

隊中

[附方]治金創生汁溫滴創中花油殊良其効

速 經久寒熱乾末一分先發酒服 腎痛石淋吐

血關節痛子一分以酒若便用液飲服 腹裏損傷

花一溢以上好麥酒六十四分煮取三分之一瀝過

加乳酪少許溫服 黃疸花葉以酒若水煮每朝服
一酒盃 [增]此為治創之良藥內服外用皆可又利
小水通石淋催月經治寒熱療男子陽事不舉或以
製治創拔尔撒謨

猪殃殃 [性功]濕而燥中適 [附方]釵血葉搗熟

塞鼻孔 痛風葉多少從宜浸薔薇油曝諸日令融

化以其油塗患處 疥癬荖葉水煮作湯灌洗患處

[增]外用治諸般出血今小兒身帶之若竊著諸衣
服裡令兒不啼泣煩擾

蛇含 [性功]燥在第三度不寒不熱有收斂之功

[附方]口中污穢生瘡荖葉煮湯含嗽 勞証吐血

尿血冒寒傷冷毒乾根一匁搗末以使用液飲服

諸般下利根以甘乳酪煮類之服 肌膚傷裂荖葉

搗貼患處諸出血荖葉按熟貼上殊妙 腹痛取荖

葉生汁二匙頓服 干結兒瘡名諸瘡及取葉於木

臼內以木杵搗細入猪脂及酒少許和調如膏貼瘡

上 眼目爛腫荖葉生汁滴眼中 [增]治下利及痔

出血尿血勞証咳嗽膽汁變壞為醋屬者腹痛外用

療齒牙動搖齒斷腐爛及痛眼目熱痛金劍

龍芽

〔性功〕温而燥在第二度開發閉塞滌刷陳

滯微帶收斂

〔附方〕肝藏閉塞衰弱黃疸經久寒熱

尿血葉三溢以清水煮取百二十八文去滓加砂糖

調分再服

腎痛石淋通下砂石龍芽露二十四文

頓服又作煎湯用亦可

寒尿

見內科撰要淋瀝篇中

荖葉酒

煮取四十八文服

熱病葉一溢薔薇酢六十四文

右合煮取三分之一頻服一匙

骨節閉挫取葉

及糠多少適宜酒煮如糊乘煖貼之

〔增〕壯胃及肝

脾衰弱治諸病發渴咳嗽脚痛勞証尿血膿淋由傳

染者療婦人帶下漏瘡等入治創飲劑用大紗

白屈菜

〔性功〕温而燥在第三度淨除滌刷之功

甚強

〔附方〕眼目矇昧及眼生翳膜生汁十六文蜂

蜜四文右合煮一二沸掠去上沫頻滴目中

腹痛

子宮疼痛全草多少從宜或搗細或吹咀於熱鍋上

以苦蕒花油和調如膏敷填脬中

黃疽及諸藏閉

塞葉細剉和雞子鍋上燒之令患人食又根作湯頻

與服

新金劍荖葉絞取汁滴劍上

治諸痔荖

葉搗熟貼肚上 除疔莖葉生汁頻摩楷其上落甚速
[增]根治黃疽良莖葉生汁頻摩疔目疔目自消
其露治眼疾大眇

蓼 [性功]温而燥在第三度消化堅硬分疏鬱積

[附方]皮上點鹽以生汁摩楷朝夕二次 指頭瘰

疽蓼並雞子殼內膜等分細研傳患處 痛風屬寒者及寒腫製蓼油塗患處製蓼油方蓼獨活薺共取生汁多少從宜黑蜻蛉五頭綠蝦蟆十五頭右件共用二百八十四文油於拔尔_レ涅_レ和_レ內煮熟至諸物軟

解為度以巾漉過收貯聽用 除物_レ粵_レ及_レ祿_レ乙_レ斯_レ西

注臭蟲也舊譯大風恐未穩 取蓼置卧床 [增]莖葉及花作菴劑

及膏治金創膿爛漏瘡歇_レ乙_レ傑_レ烏_レ梅_レ登_レ瘡_レ若_レ青_レ斑_レ腿痛汁去耳中聾

獨活 [性功]温而燥在第三度開發閉塞決壅潰

圍通利小便治諸中毒此物於治創隊中與居一焉

[附方]諸風脇胃痛經水不利胞衣不下子藏衝逆氣急喘息肝脾閉塞黃疽乾獨活根若子一匁細末以酒飲服又取根葉子以酒若水作湯與服 治新

金創莖葉搗熟如膏貼上 [增]根及子治心腹膨脹
破氣驅風葉作浴湯通經水

茴香 [性功]溫在第二度而燥在第一度稀釋凝

粘消化堅硬行氣驅風通利小便 [附方]腹痛並腎

痛石淋取子酒煮又製油又製露用 咳嗽胸中粘

痰子以火微炒細末和白砂糖若清淨蜂蜜類之服

難產腹痛茴香葶藶子各五分細末酒服 [增]子

壯頭眩胸腹諸部煖冷散寒破氣驅風治小兒腹痛

雞冠花 [性功]涼而燥有收斂之功 [附方]諸般

下利吐血婦人白帶雞冠花一盞以酒若水百二十

八分煮取三分之一服 [增]花作湯治泄瀉甚良根

含挾莖治莖痛子末酒服益乳汁

莖之菜 [性功]花莖葉並清涼潤燥生津和柔酷

厲強壯衰弱 [附方]胸脇痛熱病肺液腫咽喉不利

聲嘔不出肝腎嫩腫及心氣衰弱令其強壯花製舍

利別服二三匙又莖葉作湯和花舍利別頻之服又

大麥水百二十八分莖之菜花舍利別二十四分加

膽礬精數滴令酸味可口為度以作由列布與服昏西

由列布欵劑名也有強心
由列布等即調上菜味者

喉風葉三溢以水百二

十八及煮取三多之一去滓和其葉舍利別十六及

頻之含嚥 頭痛以其油摩額上及顛顛 腎痛石

淋子一及以水若酒飲服又子四及以一二便用液

浸候有如乳汁粘液出一頓服 [增]花主下利壯心

氣治胃膈諸病為必用療諸熱頭痛頭腦諸病諸部

閉塞子治熱病腎藏閉塞膀胱結石催生

薔薇 [性]功諸種薔薇共主清涼其中赤花普祿

飲書薔薇除腐敗膽汁惡液但赤薇一名撥莠薔

薇反之有收斂之功花中黃葉主澁閉 [附]方眼目

熱腫並疼痛薔薇露頻洗 諸藏內熱過度者及和

緩心藏薔薇露和以白砂糖藥局號曰薔薇飲用配

諸清涼劑及強壯心氣之方中 驅逐留飲粘痰腐

敗患液解諸藏熱治熱病主清涼答末林度十六及

以大麥水煮取百二十八及加普祿飲書薔薇舍利

別二十八及和調頻之服又普祿飲書薔薇昆設尔

拂用供燕羞寒具 心中悸動諸般下利婦人崩漏

赤薔薇昆設尔拂肉豆蔻核大日二三次服 口中

膿瘡壞爛遮斷腫熱及穿穴取薔薇蜜服主淋刷陳
滯清淨污穢而乾之 諸般熱腫湯泡火燒雞子白

一枚薔薇油多少適宜加薔薇露和調塗患處 婦

人白帶經候不調男子淋瀝及滑精營實未熟者與

中子乾一匁以釀赤酒及撒見邊酒未撒思思義義者服

又赤薔薇實未熟者一溢以酒百二十八匁煮服

熱症頭痛薔薇糕以薔薇醋烱開貼額上以帛卷住

又薔薇油十二匁薔薇露八匁薔薇醋四匁右和調

蘸布帛卷額上 [增]薔薇種類不一大抵有清涼之

功赤薔薇花乾者主收潘生者主微利白花者主收

潘而強壯自餘諸種主治諸般下利熱病發渴良花

中黃乾者主收潘能療遮斷病是以口葉散中用之

白芷 [性功]根濕在第三度燥在第二度開達閉

塞稀釋凝粘發汗解諸中毒治傳染諸毒 [附方]諸

般中毒天行疫疾傳染諸証肝脾閉塞胃氣衰弱婦

人月經不利白芷一匁以酒飲服又白芷五分底野

迦一匁用酒若一二露水便宜者少許調和頓服取

汗 天行疫疾惡氣為疾白芷醋煮嚙納其氣又取

一根條或含或齧 散體中凝血末一匁以麥酒飲
服 氣急喘息癩癩婦人子宮衝逆黃疸白芷子一
匁以便用液飲服 風大並蝮蛇咬傷其他毒蟲獸
咬傷葉一匁若加芸香搗以蜜和傳 耳中膿爛搗
莖葉絞取汁滴耳中 痛風在股莖葉生汁蘸巾貼
患處 [增]根通月經下胎及胞衣強壯胃氣疏通風
氣殺諸虫治青眼牙疳乾咳寒嗽呼吸不利牙齒疼
痛能發汗是以傳染諸病天行疫疾有良功
芹 [性]功根葉温而燥中適子則熱開發閉塞稀

釋凝粘滌刷陳滯通利小水 [附方]肝脾膽腎及子
藏閉塞以花雜調食膳頻用又作湯服最便又生汁
十六匁酒和服 腎痛石淋子一匁以酒若便用他
液飲服 治難產痛令其易產生汁十六匁用醋絞
取加食塩少許頓服 乳房結塊或斷乳汁生芹四
握剉細蒸餅中心多少從宜共合以水及酒若甘乳
酪煮作菴劑又取芹剉細以酪蒸之貼乳房 小兒
咳嗽甚者坐汁四匁人乳八匁告默應子代用苗三
分錢之一為細末合和頓服 [增]治肝脾胃疾經閉

石淋難產美進飲食又宜合歡

葛苴

〔性功〕涼而潤催睡眠

〔附方〕治胃熱及腐

敗膽汁刺戟或生用或者用從宜並可 催睡眠取

子加巴且杏乳用又取子擣細和人乳及雞子白以

縛額上又取生汁和薔薇油沾巾縛額上 漏精子

一味若加他藥服 〔增〕子催眠強胃止淫除夢療漏

精莖中作痛

蘭畝俶載卷三終

蘭畝俶載卷四

美作 源 輝雄

東都槐園先生纂輯 長門 豐田宗味 校

高崎 嶺 春泰

和蘭草木畧中編 木後卿

瞿麥 〔性功〕溫而燥中適有強壯心氣之功 〔附

〕方天行疫疾傳染諸病花製昆設尔拂大如蠶豆每

朝空心服之又取醋一匙以花浸之蘸玲瓏硝頻々

ウミワタ

嗜之取莖葉生汁三十二文一頓服此方甚能辟疫
疾 心中動悸頭眩胃發癩瘡擗瞿麥花昆設尔
拂若舍利別若花乾者一文以夏枯草水若菜王刺
那水飲服 難產花作湯服 瘡瘍頭瘡莖葉生汁
洗之以花細末抹之 頭痛浸花醋一分薔薇露二
分露巾縛額上 [增]強頭腦壯神經益心氣健胃藏
扶肝解階中毒治心中動悸子宮疼痛經閉甚良

樓斗菜 [性功]附方[肝藏閉塞黃疸子一文出末

雜腹蘭六分錢之一以酒飲服發汗 天行疫疾痘

瘡麻疹取子與服小兒三分錢之一大人一錢 賢

痛石淋每朝空心取根一箇直蓋之旋噉服 婦人

難產子一文酒服 喘急水腫根十六文以酒百二

十八文煮取三分之一服一酒盃 愈金創金草紋

取汁滴入創中 疥癬生汁若取根酒煎洗瘡上

口中腐蝕鼻竅膿爛取生汁洗口中若灌入鼻中

[增]子有發散之功故治痘瘡麻疹諸熱傳染諸病又

於黃疽殊妙以花製丁吉生兒亦有發散之功療遠

斷腐爛

燕子花

〔性功〕温而燥在第三度滌刷陳滯和柔

酷厲利導水飲

〔附方〕水腫黃腫根搗取汁十二分

以甘乳酪清飲服又和以雞子黃亦可 氣急喘息

及久咳嗽根搗細加上好蜜如昆設尔拂取肉豆蔻

核大日再服 腎痛石淋諸疾月經不利根作湯加

酒調服 子宮堅癖根水煮令婦人每日納諸藏中

經數持或用雜葉亦可 漏瘡以根細末摻入漏

中又以蜜和塗牡柿之 腹痛根一分以蜜水飲服

頭痛取根生汁灌鼻中根細末二錢薔薇醋十二分

薔薇油四錢右合和用傳額上 〔增〕新根搗汁逐水

甚強水腫用之服量自八分至二十四分純液二分

舍利別十六分細末三分錢之四以爲概

馬鞭草

〔性功〕温而燥味苦微收斂

〔附方〕黃疸

莖葉乾者一分微羅古五分爲末以古酒飲服 頭

痛莖葉多少從宜搗細加薔薇油薔薇醋少許用傳

額上 莖牙疼痛動搖口中腫爛取莖葉以水若酒

煮作湯以嗽洗口中 腎痛石淋癩癩肝脾閉塞及

癩疾莖葉榨取生汁八分頓服或酒煮作湯服亦可

勞証細末一匁以使用液飲服 肝痛葉一匁搗

細以酒飲服 新舊劍傷莖葉搗和以牛酪如膏貼

之 增治頭腦胸膈肝脾諸疾良又療眼疾諸熱天

行疫疾砂石証疥癬治淫念妄動咽喉腫頭痛

雜腹瀉 性功温在第二度燥石第一度開發閉

塞消化堅便柔和酷厲定疼痛壯心氣 附方精神

疲倦胸膈閉塞氣急喘息胸脇痛黃疸傳染諸病婦

人難產月經閉塞胞衣不下雜腹瀉三分錢之一以

酒若使用液飲服 痘瘡麻疹取雜腹瀉六十分錢

之二三服 眼目疼痛以雜腹瀉和薔薇露若乳汁

少許滴目中 增有緩急開塞和痛及拔尔撒謨樣

之殊功於肺藏殊有異能故名曰肺神益心氣強元

運通月經催生起眠 益母 性功温在第二度燥在第二度 性刷固滯

少收斂通利小水 附方諸藏閉塞婦人難產利小

水催月經乾葉為末酒服一錢 骨節閉挫者作浴

湯浸浴患處 暖痛子宮疼痛莖葉多少從宜用酪

者如膏貼暖上 暖中有莖葉一溢用茵蕒油煮數

脐中缚定 愈損傷止出血取葉搗熟貼創上 [增]
治諸閉塞癰瘡卒急

蘭草

[性功] 温而燥在第二度味苦開發閉塞決

壅潰圍少收斂清淨血液治創葉隊中與居一焉

[附方] 肝脾及膽閉塞葉三溢以水百二八八文煮取

三分之一漉過調以砂糖服一酒盃日二次 虵蛭

葉生汁四文蜜水經久者八文和調頓服 三日瘡

月經不通葉二溢酒百二十八文煮取四十八文先

其未發服其半治月經日夕服 金創及損傷水者

作湯日服二三次 [增] 花葉治金創皮膚不淨及怪

閉良

大麻 [性功] 清涼而燥子稍温而燥或謂寒而燥

[附方] 黃疸肝藏閉塞冒寒傷冷毒及諸藏痛麻子

四溢臼中搗細以薔薇昆設尔拂八文甘乳酪清百

二十八文煮加烈應設酒少許至凝結漉過服一酒

盃日二三次 漏精及胸脇痛麻子一文白中搗細

以大麥水六十四文及酪漿浸之和以砂糖分再服

堅硬腫毒麻子油塗之 耳痛取生汁滴耳中

增子減陽事是以有治滑精之功又治腸痛及脇中刺痛諸疾咳嗽黃疸

擔不歸

〔性功〕溫而燥條刷固滯決壅清圍奪感

觸之機瀉下惡物

〔附方〕陳腦中多惡液及治甚痛

作細末取少許入鼻中治甚痛用管吸烟吐陳紙新

名云飲擔不歸甚妙 瘡疾取露十六分先其將發

服之 貴証生汁和砂糖作舍利別服一匙更取生

葉貼脐中 湯泡火燒取生葉貼傷處 水腫荖葉

生汁一匙以使用液飲服上吐下利而愈 蘇舊金

瘡紋青葉汁滴瘡中葉貼上 氣急喘息及胸中痰

塞服舍利別一匙 脾藏鬱塞取葉貼左脇 腸中

及子宮痛葉搗匾貼脐中 〔增〕燥催眠消胃隔粘痰

匾証用之可

白頭翁 〔性功〕熱而燥在第三度決壅瀆圍稀釋

凝粘消堅化硬清淨污穢蝕物是以宜無內服 〔增〕

根治中毒發汗疫熱及他有毒諸病用有大功然花

葉則有腐蝕之功是以疣目汗斑拔除釘子等用之

葡萄 〔性功〕葉並鬚蔓清涼有強收斂之功葡萄

未熟者清涼而燥收斂熟則溫而潤燥生津在芽一
度然多食動風氣催泄瀉

〔附方〕頭痛因熱者葉並

鬚蔓各一溢擣細取大麥粉適宜煉如膏帛包縛佳
額上又方以水煮葉浸足此方能下頭熱且催眠

口中熱腫及喉風葉二溢細剉水煮取六十四文加
薔薇蜜八文含嗽 吐血諸般下利葉及鬚蔓生汁

八文和使用液飲服 眼目矇昧及眼赤斷莖取所

滴出液點目中一二滴 腎痛石淋斷莖取所滴出

液四文舊蜜水十六文共合和調頓服 熱病如燒

不思飲食及下利取未熟葡萄汁調和諸飲食用或

用葉局所鬻舍利別亦可 脚氣疼痛用葡萄子及

所造酒殘滓如膏溫貼患處 痔疾莖蔓燒灰醋調

如膏貼上 疥癬莖蔓燒灰多少從宜淋汁以洗瘡

〔增〕諸般乾葡萄性功畧同和柔諸液醅屬養人屬

焙諸証及肺諸患並堪用又能消堅更硬可作和胸

飲劑 春初所莖蔓取其所流滴液漿用以治砂石

眼目赤腫及多眵淚並良葡萄皮治痛風妙外用之

未熟葡萄榨取漿水漉過去滓密器貯之者名曰亞

厄列私太又曰濕發矢由誤強壯胃藏美進飲食
連錢草 [性功] 熱而燥味苦開發閉塞滌除陳滯

[附方] 黃疸及痛風乾葉一匁以使用液飲服數日

耳痛耳聾生汁濕蘸綿入耳中 頭腦寒傷取生汁

灌鼻中斯除泄腦中毒液乃愈 結石腎痛肝脾及

子宮閉塞水酒煮作湯劑服又方荃葉露水或花作

昆設尔拂並可又取花多少隨宜浸燒酒空腹服一

二匙 咽喉惡瘡以水若酒煎作湯劑含嚥 腹裏

損傷水煮作湯和薔薇蜜頓服三十二匁 脾痛及

脾脹取葉醋煮乘熱貼臍左脇 [增] 荃葉及花治胃

諸病良且為治創之藥通月經驅諸虫治黃疸止下

利赤利

麻黃 [性功] 寒而燥在第二度收斂 [附方] 腎膀

晄及腸脹腫麻黃三溢酒百二十八匁大麥水六十

四匁煮取三分之一服三匙日四次 吐血尿血下

利月經過多火咳咳急乾葉為末一匁以酒若其露

飲服又方生汁二十四匁赤葡萄酒十六匁共和調

頻々服二匙 衄血取草搗碎搗梟巾且縛在額上

陰莖赤疱露水三十二文薔薇酢八文薤中頻
貼瘡上 [增]治金瘡逐水氣良又治乾咳久嗽鼻齩
他諸出血金瘡瘡腫

羊蹄 [性]功葉及根寒而燥有攪擾腹中之功其

子強收斂 [附方]發起下利羊蹄葉或赤羊蹄葉雜

他菜蔬中煮服又方取根用如大黃 疥癬根醋煮

塗瘡上 黃疽根酒煎服 三日瘡根擦細白酒浸

一時半若二時濃過先幾半時服 月經過多諸般

下利子一女以剛鑿水飲服 [增]青腿牙疳黃疸三

日瘡並良外用治遠痛水煮洗小瘡疥癬

天南星 [性]功塞而燥第二度若三度收在治創

藥之算中 [附方]腸傷吐血嘔血乾葉搗末一女麻

黃水十六女共合頓服 熱病如燒肝藏熱腫諸般

內熱葉四溢以大麥水煮取百二十八女加紫花地

丁舍利別二十四女頻服 月經過多葉為末一女

以大葉標葉露飲服 新金瘡惡性膿腫葉多少從

宜浸膽八樹油少時加的烈並底納油少許用以愈

為度 眼目多淚葉一溢以酒六十四女煮洗眼

增葉治諸損傷吐血赤痢月經過多白帶下肝藏熱
腫熾盛熱病外用治金瘡膿瘡經久者頸腫湯泡火
傷眼目眇淚

樹衣

性功清涼而燥收斂

附方赤利吐血月

經不調大葉櫟樹衣一以女以未從宜以水西飲作湯劑

婦人

白帶下樹衣多少從宜水煮為浴湯日浴血血金

瘡出血大葉櫟樹衣若野梅樹衣

野梅澤語
誤名追考

入鼻中

又擣末抹瘡上

增燥濕且少收斂是以治肺病作

和自劑內服外用止諸出血擣末用

小麥

性功溫中等和柔酷屬烹釀其孰熟成其

生且有分疏功甚良於養身

附方痛風作細末盛

以囊襯患處

惡証疥癬醋煮其糖洗瘡

大麥

性功寒而燥在第一度滌刷陳滯開發閉

塞烹釀其孰熟成其生又云生津液至清涼是以諸

熱証用充清涼劑大有益人所知也

附方散踈諸

般瘡腫大麥粉多少從宜以蒸餅母和之且以蜜水

稠為膏用

骨節閉挫大麥粉共醋及乳酪和如膏

乘溫貼患處

頭痛因熱而發大麥粉多少從宜政

瑰花細剉半盞合盛袋中灌醋少許縛住頭上 聖
京健毒犯眼取大麥青葉為露類々滴自中

薑荷 [性功] 温而燥是以代格^{コッ}李^{ベシ}使用以禦缺之

格李便如胡椒者其說別見

金剛刺 [性功] 温中等而燥甚為通利小水發汗

[附] 徵瘡疥癬痛風冒寒傷冷毒用根製湯服如用

山竒糧取汗為妙 [增] 根發汗下利治瘡瘍久不愈

者又治徵瘡作湯日服

良薑 [性功] 温而燥在第三度開發閉塞決壅潰

圍 [附] 諸氣為患胃氣不和頭旋眩暈子宮閉塞腹

痛心中動悸為末酒服自五分至一文 [增] 主温煖

胃氣衰弱之証用之美進飲食強健消化

萊菔 [性功] 温第三度燥第二度開發閉塞稀釋

凝粘滌刷陳滯通利小水 [附] 結石腎痛萊菔煮汁

早朝空心服又方擦根皮酒浸少時朝夕服一酒盃

又方生汁十文和蜀葵生汁頓服 胸中粘痰咳嗽

久不愈水煮作湯調以砂糖服 水腫肝脾子宮閉

塞萊菔根隨便聽用或萊菔子一文以一二液飲服

作吐劑萊菔根皮以蜜醋飲服 天行疫疾萊菔

子酒煮每朝空心服 面上野鹽以生汁摩搥之

增利小水通砂石順月經治中毒後肺中粘痰治咳

嗽防醉外用治眼目赤腫齒牙動搖齒齦腐爛

蔓菁 性功溫第二度潤第一度然其子則溫而

燥蔓菁開發閉塞條刷陳滯消化堅硬 附方結石

腎痛通利小水初生蔓菁者熟食用 咳嗽及聲啞

不出

蘭畝倣載卷五

東都槐園先生纂輯

美作 源 輝雄
長門 豐田宗味 校
常陽 嶺 春泰

底野迦

槐園曰底野迦者泰西一奇藥也艾儒畧職方外
紀云如德亞之西有國名達馬斯谷土人製一藥
甚良名德里亞加能治百病尤解諸毒有試之者

先覓一毒蛇咬傷。毒發腫脹。乃以藥少許。嚙之。無
弗愈者。各國甚珍異之。此物蘭舶齎來於吾東
方者已久矣。人唯知其良治痘。而未能知其全能
也。李氏細目。雖載之。亦唯絕域萬里之遠物。無由
得其詳。徒據傳聞而筆之。乃曰。底野迦出西。或彼
人云。用豬膽作之。狀似人壞。凡葉赤黑色。胡人時
將至此。甚珍重之。試用有效。主治百病中惡客忤
邪氣。心腹積聚。此只就其經驗。僅記其所知已。
昇平之澤。亡所不暨。異國異書。梯航而來。時則有

若豪傑輩出。午其間。以異才讀異書。稽異說。烏乃
如底野迦。不啻得詳其物性。主療。又獲製而施用
焉。豈不愉快乎。其方出于西醫叔彌兒所撰居家
纂要。先輩譯之。舉之於左。

以底野迦名其方者。固不少矣。以治一切中毒及諸
惡症。皆有效驗。故吾輩於其諸方中。取單複二方。列
于左。此其罕而粹者。

蝮蛇

右先去頭尾及皮。而剝其腹。止畱心與肝。餘藏。盡除。

又割其諸血脉。去其蓄瘀。以水洗淨。乃入石臼內。搗爛。取出入鍋。上下加火焙乾。其法如造蒸餅。火則文武得宜。再入臼搗之。加上好蜜三倍。鍋內炒過。又入白搗勻為末。另蜜水各半。磁罐內煮。約半時。徐徐攪勻。要末焦黑。候其粘沫涌沸。乃下火。以布瀝過。再入罐內。微火煮。水氣盡為度。投末煮四時半。候和。下火。猶拌勻。冷定收貯。此為單方。底野迦。

主治天行疫諸熱凶惡症泄痢等。有奇効。每服取一胡桃殼大。以清酒一匙至三匙吞下。若泄痢。以燒耐

送下。更妙。彼土酒謂之物。應蓋此方有能發汗兼益

心氣之功。又方即複方。今和蘭舶來者是也。

設獨亞里意根草名。今換用高良薑。其說別見。
 捷地亞捺根草名。今換用高良薑。其說別見。
 各八錢龍膽充之。此草

七葉一枝今類龍膽故
 花和蘭謂之舍賢。顏鹿突屋爾的兒
 蠟益本草。此細目。七葉一枝。花正相當。故今用
 之然此土未詳。其有無。雖漢舶未嘗有。草載
 是物。只多。雜諸甘。松若。蒼朮。中。以。竊。介。量。因。

實者佳赤黑陳
久者不堪用

安傑里加代白芷屬今各四錢

蜜製腹蛇末製法前二十四錢

沒藥精好者佳和蘭稱印噫古地八錢

的蠟若無此物以麒麟竭代之又謂之十六錢

石硫黃赤石脂同功故今以赤石脂代之八錢

泊夫藍微者佳四錢或七錢

桂 七錢或八錢

丁子 三錢

阿片壓定為扁者

佛手柑自然汁 各三錢或七錢

右十三味除阿片柑汁二味先搗餘藥為極末而

合二味共入鉢內別杜松糕製法別具與蜂蜜各等分

加本劑之量徐々加之共研勻為泥今可九而釜

各三倍內煮候和下火冷定收貯未真有倚嗟加知心幾

者曰是方如法製煉收貯

主治 能發汗勸眠或曾膈鬱塞及怔忡或諸凶惡症

其他諸病用之多，參功是方最以發汗和痛為殊功。又配諸作劑以任用，皆有驗。蓋方中有阿芙蓉，此其所以有神効也。每用一錢或二錢，以醋或酸味汁送下。底野迦諸方用法皆與之同。凡諸邪毒壯熱諸症，其邪火日加者，宜和醋以與之，能抗其病熱，令其速解散。

四味底野迦方 此為貧人設者

沒葉

月桂 用實○倭名連母或云詞辭

龍膽 代用說見上

馬兜鈴 用圓根者○和漢不生此種今用其長根者 各十六錢

右先取沒葉碎細而下，餘葉共搗和為末，加淨好

蜂蜜研調，上火煮以條子攪，不住手，宜以如設

分盧不 製法為別見 為度而下，火冷定密封收貯

主治諸中毒，或傳染諸惡症，或貴獸傷，或可禮幾 此翻

腸痛因証多 或警捺烏僕尔私咄 病名未詳 或搗搦物辜

及驚癇顛眩失氣諸症，每服小兒自一釐，強至一分

弱大人強壯者，自一錢至二錢。凡外傳取効者，里

吉達連私足跗病名 涅原倭孤病名醫私吐可見

尔獨頻能病名未詳 或天行疫癘疾一切潮熱或心

胃小腹之病及便毒等以燒耐若油溶化外傳之皆

有效脊椎足蹠或動脈其他

一角辨

蘭化

尤品ト云者一書ノ説ニ依ルニ「カ」ト云ヘリ「カ」トハ卧見狼徳亞

ト云國ニテ獸莫等ノ交易シテ其利益ヲ得ルヲ云言ナリト云ヘリ

此國ハ北方僻遠ノ地和蘭ヨリ五百里三十六町ノ里法 許西北ニテリ其海

濱ニシテ人家アリ其北ハ夜國及ヒ氷海ナリ

其「カ」ト云者ハ即チ海鱈ヲ呼フ名カヘシ此魚即チ海鱈ノ一種ナリ

海鱈ヲ和蘭ヲ「カ」ト云フ「カ」ト云フ魚ト云フ義ナリ凡ソ和

蘭及其近國ノ海人「カ」ト云フ「カ」ト云フ南海中ニアル「カ」ト云フ

「カ」ト云國ニ往來シテ專ラ海鱈ヲ捕リテ産業トス

ル者多シ故ニ徑ニ彼國ノ言ヲ傳ヘテ其「カ」ト云ヨリ轉メ

「カ」ト云ヘル者カ「カ」ヲ知ルヘシ

然レ「カ」ト云フハ大利ヲ得ルノ海鱈ト云フ義ナリ是

其長牙アルニ係テ此稱ヲ為ス者ナリ

又一書ニ「カ」ヲ以テ「カ」ト云フ本名トシテ「カ」ト云フ

ニテ呼フ所ナリト云ヘリ按スルニウミニハ彼魚ノ上鬣ノ
前端へ着タル一株ノ長大ナル牙ナリ然ルヲ其分ヲ以テ
重貨ノ交易ヲナル故却テ牙ト云義ニ及ハスシテ單ニ其魚
ノ名ニミテ呼フ常ニ通シ称スルナルヘシ

又此書ヲ撰ム者ハ彼古言ニ云フ一角ノ義ハ虚名ナレバ
乃此物ノ産スル地ニテ常ニ呼フ所ヲ以テ貨實ナリトシ
コレヲ奉テ本名トナシタルナルヘシ

吾邦ニテ海鱈ノ鱈ヲ用テ器物ニ作り名ヲ單ニ鯨細
エ鯨尺等ト呼テ其鱈ヲ通称スルヲ以テ想ヒ見ルヘシ

大凡ウミニハノ真物古昔ハ西洋ニモ甚稀ニシテ民間
僅ニ其屑末ヲ以テ茶用トシ或ハ其小片ヲ得ル者ハコレ
ヲ佩テ護符トシ所謂諸毒ノ害ヲ被ラズト其尊重甚ニ
キヲ知ルベシ彼ノ全角ノ如キハ唯王侯ノ家ニコレヲ秘藏シ或
ハ好事ノ貴族特ニ其長大ナルモノヲ求ム其最ナルモノハ殆ト
丈許ニ至ルモアリ故ニ彼先輩陸獣此ノ如キ角アルヲ疑テ
議論紛々トシテ竟ニ一定ノ説ヲ得ルナシ彼「ホラゴドイ」ト云
國ニテ撰タル禽獸譜ナル者ヲ閱スルニ馬躰ニシテ額上一長
大ノ角ヲ戴キ前ニ向テ直生セル形ヲ出ス又星象ノ圖中ニ

テ「メセル」ト名名モノアリ其形即千コレニ同シ

按スルニ「メセル」トハ「ギリイキ」ト云フ古國ノ言ニシテ即

千獸ニ一角アリト云フノ義ナリ

喜竊ニ思フニ星象ハ上代ニ利未亞ト云フ一大洲中「エチヂ」

國ノ人コレヲ制作シタルモナリ是ヲ天文学ニ推輿トス乃其

最古キ「知」此「エチヂ」ノ國ハ彼ノ「ナル」出ル地ヨリ

遙南ニ隔ル「約」スルニ直径一千二三百里儼然トシテ別

世界ナリ其真ヲ詳ニセザル「亦」宜ナリトス但此物ノ「三」

アラズ或ハ馬飛馬雙女野人仁魚蛇髮等異類奇魅ノ

形像ヲ奉タリ想ニ是唯特ニ奇怪ニシテ却テ記憶シ易キニ

取テ固ク其物ノ有無其説ノ虛實ニ拘ハラズ然ルニ後

世ニ至テ故アリテ和蘭ノ人「エチヂ」及「エチヂ」海中ニテ

コレヲ得テ始テ眞牙ナルヲ知タリ但其ハ古来ヨリ方書等ニ

傳ヘ來リタルヲ以テ舊ニ仍テ称スルモノナリ

蝮蛇 羅甸語非百蝶 蘭語亞蝶兒 磐水

削墨兒曰蝮蛇ハ蛇ノ一種ニモ若シコレニ啗ル時ハ其毒
極ク甚キモノナリ其頭他ノ諸蛇ニ似レバ平ニシテ且廣ク嘴

外ニ向テ屈曲シテ恰モ豚ノ鼻ノ如シ大抵身ノ長サ一尺五寸ガリ
圍三寸許其上下ノ髑ニテスヘテ齒十六アリ甚小ニメ動カ
然レモ其中別ニ亦ニツノ大ナルモノアリ則チイキク齒ニシテ
甚大利ナリ上髑ノ兩角アリ齒ノ根ニ一箇ノ小囊アツテ
之ヲ廻リ中ニ黄丸液汁アリコレハ毒アルノ液ニアズルノ蝮
蛇ハ兩髑ノ中ニツノコイエタシデヒアリ他ノ蛇ハ三ツノ髑アリ
其尾ハ他蛇ヨリハ短シトス臟腑ハ鼻カラズテ他ノ蛇ノ臟腑ノ
臭氣ヲ起シテ耐スカラガガ如クナラズ這ヒ行クハ常ニ甚多逢フ
テ敢テ他蛇ノ飛跳スルニ似ス然レモ若シ物ヲ啗ニト欲

スニ當テハ其飛動甚速ナリ雄ナル者ニ陽物ニツアリ
雌ナル者ニ亦子宮ニツアリ凡其身體ノ色ニ様アリ
薄フノ又黯黒色ナルアリ黄ヲ帯テ金色或ヒハ赤キガ如
キモノアリ又長キ黯色ノ斑点アリテ皮上ニ散在ス鱗腹下ニ横
リ其状礪石ノ鋼ニ類ス其子ヲ生ユキハ之ヲ他蛇ノ窩中ニオキ他
蛇ヲ育セシメテ而生ルニ至ル是ヲ以テ人コレヲ名ケテアツカヒトシ
ト云フ其子ニナ皮膜ノ中ニ包ニルニ
日ヲ歴テ膜裂ケテ子出ツ凡ソ一孕二十子アリ日毎ニ一
子ヲ産スルナリ或人ノ説曰蝮蛇子ヲ生ユ則其母死ストイフ

世節歌
ハカラス

ト云フ其子ニナ皮膜ノ中ニ包ニルニ
日ヲ歴テ膜裂ケテ子出ツ凡ソ一孕二十子アリ日毎ニ一

蝮蛇ノ常ニ食ニ充ル所ノモノ皆毒アルノ生類ニシテコレヨリトス
千區^{諸毒類}ト名ツク則テ元音及ヒ蝎等ノ類ナリ是ノ故ニ蝮蛇
甚毒アツテ人ニ觸ルバ害ヲナス然レ亦コレニ反シテ理推スベカ
ラザルモノアリノ印度ノ人常ニ蝮蛇ヲ食フテ猶吾輩ノ鰻魚
ヲ食フガ如シ

凡諸家蝮蛇ヲ論ズルノ説ヲ考求スニ或人ノ曰ク蝮蛇ノ螫
シテ毒アルト云モノハ彼ノ毒ノ根ニアル所ノ二小囊中ノ黃液
出テ來リテコレ最モ毒アルカ故ナリト云然レトモ又或人
ノ説ニコレト相反セルモノアリ曰其黃ナル液ハ敢テ毒アルナシ

曾テ人其理ヲ試ムルガ為ニ其液ヲ取テ燻ニ飲シメザル
其鳩敢テ死セスト云又人宜シクサトルベシ凡ソ蝮蛇ノ怒ラ
逞フシ飛動シテ人ヲ咬ムトキハ其咬レタル所則チ冷血立
止ニ凝テヨク運行シ妨グト云フ又タ或人ノ説ニ人必ス慎
テ蝮蛇ノ諸液汁并ニ糞或ハ諸臟腑膽汁等ヲ食フ
ナカレ若シコレヲ食ハハ忽テ死スト云フ然レ亦蝮蛇ノ膽汁及肉
ハ茶ニ入ル諸般ノ病患ニ之ヲ用テ甚良薬ナリト云又或云ク蝮
蛇ノ心臓ハ其功肉ヨリモ甚タ勝レリト云又一説ニ人唾ヲ以テ
蝮蛇ニ吐キカクレハ必ス死スト云フモノハ誤ニシ

凡蝮蛇ニ咬ミシ者ノ甚危キト云モノ則其毒ノ速ニ血ニ
雜ルカ故ナリト頭然トノ知ヌヘシ其咬ミタル者ハ色青
白シ作シ又隨テ青色ニ變ス情思樂シニス心神安カラズ
遂ニ眠リ卧スニ至ル其脉或ハ緩ニ或ハ急其症寒シ
桑シテ患心或ハ戰慄ス此ノ如キニ至テハ縱ト茶ヲ服スト
雖凡速ニ故ニ復シテ起ツテ能ク如何トナハ其毒血已ニ凝テ
精氣ニ混スレバナリ

蝮蛇ニ咬ミシ者治スル茶夫レ人須ク蝮蛇ノ毒ヲ治セテシ
欲セバ先其毒血ノ脉中ニ雜リ良血ト相合テ運行スルヲ防クニ
アリ此故ニ外傳及内治ノ茶ヲ用ルヲ以テ要トス就中
外傳ノハ宜ク立口ニ用エルヲナスシ而后其他ナシ内茶ニ
種々多ク切テ奏スルモノアリ

外傳ノ茶若シ咬ミシ者其創シ容易ニ治セント欲セバ則
宜ク繃帶ヲ以テ創上ヲヨク固ク卷クニ創口ヨク閉合
スルナリ○人若瘡ヲ卷クニ能ズバ則蝮蛇ノ頭ヲ打碎キ
テコレヲ創上ニ傳クニ若シ蝮蛇ノ頭ナキトキハ他物ノ頭
ヲ用ユルモ又可ナリ或ハ一ノ小刀又ハ鉄ヲ作ル平カナル
物ヲ燒テ瘡ノ側ヨリコレヲ入ルニ但シ病人ノ堪ヘル程ニスベシ

○或ハ創上ニ火茶ヲ置キコレヲ燒テ以テ治ス○或ハ其
創ヲ切り開テ之ニ的里亞加^{アリ}傳ベシ又ハコグロ^{蒜ト}類
碯砂トテ合テ之ニツクヘシ

内治ノ茶人若蝮蛇ニカレタ^{アリ}ハ則諸獸ノコフリユク
ソウト^{アリ}名其義詳ニ六物新志^{アリ}ノ註ニ見ユ

○蝮蛇ノコフリタソウト^{アリ}ヲ用エハ其功他ノ生類ノコフリ
ヲソウトヨリハ甚勝^{アリ}其精粹ノ氣能内ニ通シテ立ニ効
驗アリ○若蝮蛇ノコフリタソウトキハ則須ク鹿角ヲ用
ユ^{アリ}亦其功他獸ニ勝^{アリ}或ハ小便又ハ靈天蓋^{アリ}ヲ用

亦佳ナリ 按スニ世ニ鹿角小便靈天蓋 ○又的里亞加^{アリ}服ス

甚々好シ 若的里亞加古キトキハ阿片ヲヨク煮テ粗糲丸
滓^{アリ}ヲ去リコレヲ清フメ用ユ^{アリ}

蝮蛇散^{アリ}ヲ製スル法先ツ新ニ捕ヘタル蝮蛇ヲ取テ
其頭ト尾トヲ切り去リ其皮ヲ剥テ臟腑ヲ取り出シ唯
心肝ノ二臟ヲ留メ鍋ノ内ニ入レテ蒸^シ餅ヲ製スガ如ク
シ而メコレヲ「テ子ホル」^{アリ}簾ノ上ニテ徐ニコレヲ乾カシ搗
碎テ細末トナシ其後卅粉三十二錢ヲ「カライセ」^{アリ}
ガラセハ硝子ナリ 中ニイ^{アリ}而シテ波茶ノ「キシクテ」^{アリ}
コトルハ器ノ名 名^{アリ}

ヲ加へ再ヒテシ軋カシテ精塩ヲイレ又麝香一厘六毛強
ヲ加へ又コレヲ程ヨキ火ニテ軋カシ而シ後チ字露拔兒
撒摩四錢ヲ加フルナリ
字露ハアメリカ州ニ屬ス國名ハルサカ葉名ヲ則チ「ベリ」
ト云フヨリ出ル所ノ樹脂ナリ。原書鼎蝮蛇ノ注ヲシテ

コシ子ルラ 按ニ握々絨ヲ
染モノコレナリ

伍シ志曰羅甸呼為コシ子ルラ又曰コシニルラ 和蘭呼
曰「コシセニリイ」其形小ニメ扁平一片三角或ハ四角ニ
分レタル顆粒ヲナス外面ハ銀色裡面ハ赤シ 伊斯把
你亞國人多ク西方亞墨利加州ヨリ得來ル其物多ク抄

樹ニシテ字露國ノ人心ヲ用テコレヲ採取スニタ諸厄利亞國人
テイニシガ曰クコシ子ルラハ則小虫ノ一種ニメ無花果樹ノ葉ニ
附テ生スト今生糸鋪ニテ之ヲ分テ四種トス其第一掃即
察國ノ人呼テ「ラセル」ニルレ。メステクエト云是則我輩常ニ多
見ル所ナリ第二コシ子ルラカムベシカト云フ第一種ニ比スレバ
粒々塊ヲナシ色其他ヨリモ猶 多且ツ不潔ナル者多
雜レリ第三コシ子ルラテトレカルラト名クコハ直ニ平地産
スル所ニ多ク「カムベシカ」未下ニ於テコレヲ得ルナリ第四種ハ
ワ井ルズコシ子ルラト云フコレハ大葉地榆根ニ於テコレヲ得ル

ナリ凡右ノ四種ノ内ニテ第一種ヲ以テ上好ノ品トス茶舖
コレヲ以テアークワーヒタ^{茶水ノ}名アリヲ製シ或ハ冒病ニ用ク茶水
ニ色ヲツケテ赤カラシメ又小水ヲ利スルノ良茶トス又漆匠^レ用テ專ラ物ヲ漆ル^ルコトナス

龍涎香

伍し志曰龍涎香ハ羅甸呼テ「アムル」又「アムラゲ」并セア
「巨ト云」和蘭呼曰「アムル」又「ガラアウ」又「アムルゲ」
井スト云フ多ク東方印第亞等詩国ニ出ツ其物色白ク淡

黒ニテ斑点アリ又黒色ノ條理アリ恰モ脂ノ如クシテ輕虚其
香殊ニ芳烈最モ愛賞スニ堪多則是海中ヨリ流出ス所
ニ大塊ナルモアリ形状一ナズ其價ハ黄金ヨリモ甚多貴也又
ソノ黒キヲ蕃渾青ニ齊シキモノ龍涎ヲ包裹スルモアリ之因
テ先哲著ス所ノ書コレテ論スルモ甚多也 按ルニ龍涎ハ
原ト燒酒ノ精ヲ以テ諸脂膏ヲ澆シ之ガ如キ膏茶ニ海底ノ
土中ヨリ出テ水面ニ浮ニ湧泊シテ凝テ塊ヲ成スモノナリ 世
人恒ニ言フ此物甚多白キト淡黒ナルトニ種アリ而シテ甚白キモノ
ハ新ニ未ク化セサル所ノモノ今世最モコレヲ得カ多トス其淡黒

ナル者ハ則今人常ニ用ニ充ル所ニシテ茶舖中亦有之九龍涎
ヲ貯ルニ深クコレヲ收藏シ風氣ヲ受ケシメザルニテ其上好淡
黒色ノ龍涎ハ塊小シ内盈實シ黄黒ノ點アリ其質硬ク
柔ナラス且輕クニ美香アリ此ヲ試ル法凡熱尖鉄ヲ以テ
コレヲ刺セバ膏油流出シ又或ハ水中ニ投スト雖凡容易ニ
解散ス亦ハ指ヲ以テ強ク壓ト雖凡敢テ破レ且陷ムナキ
コレ等ヲ以テ上好ノ精品トス其質製衣モノコレニ及シテ立ニ溶
化スルハ恰モ蠟ノ如シ主治身ニ温暖ノ氣ヲ生シテ強壯ナラシ
鬱シ閑テ神氣ヲ悦ビシメ体ヲ健シ齡ヲ延ブ又能頭部

ノ諸病ヲ療ス又ハ「エセ」ナリ 製法ニシテコレヲ用ユ詳ニ
其條下ニ記ス

阿片

西語一名「アピオン」按阿片
阿芙蓉共ニ音譯ナリ

伍シ志曰阿片ハ羅甸語「ツピウ」又「カピオン」ト云
和蘭語「エチオピア」ト云フ也 則凡人多國ナリ罌粟ヲ云フ
又「ウルサツ」ト云フ也 罌粟トイフ其質重固ニ濃キ液汁ナリ自然ニ
分レ出テ柔脂ノ如シ而シ其初ニ分レ出ルモノハ則堅脂ノ如シ
己罌粟ヨリ液ヲ取ルヲ云フモノカ 其色黒ク緒其香佳ナラスノ眠ヲ催スニ堪タリ

都兒格ノ地所出ノモノコレヲ固メ扁壓シテ大サ拳ノ如シ
罌粟ノ葉ヲ以テ包裹シ小匣ニ収テ我邦ニ輸シ来モアリ
就テ此物ヲ詳ニスルニ其上好精潔ノ阿片ナルモノハ則チ
生罌粟房ニ傷ケテ流出スル所ノ汲汁ニメ之ヲ我が歐羅巴
州中ニ輸シ来スト云ハ絶テ稀ナリコレ都兒格國及百兒
西亞國ノ人毎日常用ニ供スルガ為ニ収メ貯ル故ナリ因テ
今コレニ代ユルニ其殼及葉ノ汁ヲ烹テ之ヲ製ス名テ「メコ
ラム」ト云コレ我邦ノ茶局中ニテ真阿片ニ代テ賣ル所ニシ
醫家及生菜舖共ニ常ニ知ル所ノ者ナリ或言ニ又他草波

汁ノカラウシニ云ト名ルモノヲ取テコレニ雜テ云今茲ニ阿片ノ種類
ヲ分チ三品トス其一ハ羅甸語ヲシム。其二ハ和蘭語「ウツテ」
アサツテニ語共訣
目阿片 其三ハ羅甸語ヲシム。フアヒウ。和蘭語
「ゲレ」ニシツテニ語共訣
黄阿片 其三ハ羅甸語「オム」ニキリ云和蘭
語「スワレ」ニシツテニ語共訣
白阿片 人言フ其第一ハ者ハ則チ上好ノ
品ニシテコレヲ「ハイセ」ト名多東方印度及該祿既人多國
都ナリ
ノ地ヨリ持チ来ル第二品ハ甘巴カバヤオヲヨヒテカ堙甘並ニ東方
印度國名ヨリ出ツ
第三品瓊里亞歷山ニ國共ニアリ
五州ニ屬ス的里亞ケリイヌ
ノ屬國及「アラユン」
ヨリ出ツ其上品ノ阿片ハ清潔ニシテ甚 甚々乾固然尾

凝聚ノ一塊ヲナサズ小片ニシテ葉シ以テ包ミタルモノナリ
其理面滑澤アリテ香ヒ強シ主治催眠止諸下利諸出血
嘔吐又其修製ヲ作ス法ハ詳ニ「ラヒア」ノ條下ニ録ス或ハ
コレヲ單服スハ諸毒ノ解シ汚腐ヲ去ル又其阿片ノ不潔ヲ
モラシ製淨ノ用ルノ諸法アリコレヲ羅甸語「オビウム」コレヲ云
又「ラヒウム」テ「ユラ」トイ、和蘭語「フベ」修治「ラヒウム」又
「ケソイフル」オビウムト名クコレヲ便利ニセント欲セバ先ツ阿片ノ
中ニ「コルシ」酒或ハ加那里亞酒ヲツキコレヲ緩クテ暖クテ於テ
コレヲ烹テ后コレヲ地上ニ置クナリ又阿片ノ汁ニ酒ヲ加ヘ綿ヲ

以テコレヲ滌スベシ又其汁ヲ一ノ硝子器ニイレ錫蒸テ引取ルベ
シ則其酒ヲ眠ヲ起スベキ惡シキ香ヲ去テ阿片又故ノ如クニ
固ニリテ硬膏ノ如クナルナリ

安息香

伍し志曰安息香羅甸呼曰「アウサ」樹名「テニシス」又云「アサンド」
和蘭呼曰「ベンジン」其物質堅固ニシテ光澤アリ其塊ノ色黃
白相ニハリ諸腫混合シタルカ如キ凝脂ナリ味ニ油氣ヲ帶
ヒテ而其香ヒ甚ク愛賞スルニ堪タリ此物東方印度地ニ産ス

而暹羅國出所口殊多則子是一箇大樹ヨリ出セル所ノ
者ニテ其土人等此樹幹ニ劃スハ則其液汁シ流出スルナリ
按スルニコレ所著書云安息香ヲ出ス樹ハ暹羅蘇門答刺等ノ國多シ其樹多
大ニ枝多クナシ出テ甚美シ其葉香楸ニ似テ而香楸比スハ小ニ且少ナシ
此物生葉舖中コレヲ分テ數種トナス而「ダアレウ」人名一本ニテ
コレト作ル
者其三種ナルヲ明カセリ其第一種ハコレヲ「アメサロイテ」
ト名ク其物美ハキ白點アリテ恰モ巴且杏ノ如シ第二種ハ
「ニギリウス」ト名ク第三種ハ「ニギリ」ト云テ人言其第一種ハ
暹羅國ニ産ス其他ハ皆爪哇及蘇門答刺等ノ國ニ生スナリ
又「ギリ」ト云テ各ノ説ニシテ自然ニ樹幹ヨリ滴スル所ノ脂ヲ集メ

タルモノナリト凡其上好ナル者ハ其質大ニナル粒々ナシ色或ハ
黄ニ混合ノ甚堅固ナリ主治「シキキ」ノ殊ニツヨキヲ緩メ肺
及氣管ノ腐レタルヲ速ニ治スルノ功アリ又コレヲ内症ニ用ヒテハ
註曰專ラ其
精花ヲ用ユ 咳嗽勞瘵肺病ヲ治シ又「シキキ」及感犯等ノ
諸症ヲ治スルニ外用ス又或ハコレヲ「チクチ」製法「クツクヒルギニス
和蘭語「ユツルメル」ト云
ニ製スコレ意太里亞國ノ人多ク用ユ所ノ
顔料ニ所用ノモノナリ
モノナリ其コレヲ製スルノ法左ノ如シ
安息香 蘇合香 各 上好燒酒 四介或
六介 右三味コレヲ
暖處ニ久シク置キ其「チクチ」色赤ヲ血ノ如クニ至テコレ

ヲ澆過シ貯へ用ユナリ

又伍し志曰羅甸語「フロレス・ベンソニス」和蘭呼曰「ベニイニ」

ブルウム「ラテ」語「フロ」蘭語「ブルウム」共譯花曰花則安息香ノ上面ニ

浮ク所ノ「ラタ」ソレナリ其コレヲ做ノ法左ノ如シ先一箇エテ

作レル高クテ狭ク小キ縁アル壺ヲ取り安息香ノ多淨メテ

麩粉トナシ者三オニセ或ハ四「オニセ」「オニセ」量ノ名ニ「ラ」ハ此方ハ冬

ヲ其内ニイレ厚キ紙ヲ以テ其口ヲ固封シ熱灰ノ上ニ置テ其安

息香則暖氣ヲ生ス此ニ至ルバ則其精花上ノ紙ニ外リ着ル時

人速ニ其精花ヲ「硝子」器中ニ取納又其壺口ヲ固ク封ズヘシ

是ノ如クスル「數回」二時許日本ノナラハ新ナル厚紙ヲ以テ代

テ壺口ヲ封ズ紙ツク精花ノ此ニシク油氣ヲ帶ルニ至ルヲ以テ度

トシテ其壺ヲ火中ヨリ取下ロセハ精花スデニ盡ク采ラレテ其油ノニ

壺中ニ留ルナリ主治喘息咳嗽肺病等ニ用テ甚効アリ其

修合ノ分量ニ「ケ」ニヨリ四「ケ」ニ至ル「ケ」ハ此方ノ一厘六毛六拂強

含生草 我邦呼曰安産樹

伍し志曰魯斯「ロ」ス噎里「エ」リ羅甸曰魯撒非里「ロ」サ更知打亞「エ」リ
一曰魯撒非里吉「ロ」サ一曰魯撒桑吉打麻里「ロ」サ亞蓋魯撒「エ」リ

玫瑰ナリ噎里愕ハ如德亞國ニ属スル地名ナリ未ダ此地ニ是物ヲ
産スルヲ聞カス原トシ無学ノ僧侶所命ノ名ナリト云フ此物
勿酥多曷刺未亞國ノ地西紅海ニ沿ノ海濱ノ沙地ニ生ス其草
生ノ叢ヲナシ大ヤ徑リ一手許錯綜相交テ恰モ木枝ヲ以テ組成ス
カ如シ其葉狭小中央結圓實粒々邏馬國巫祝シ為者ノ
説ニ此物常ニ收藏シナスニ臨産時ニ當バ必ス展開メ其兆示ス
ト云フ今之ヲ取テ試ムルニ乾枯故ト如シ常時トイヘ凡湯ニ浸
セバ其緊縮シタルモノ展開スルナリ舊説ノ虚誕妖妄信
スルニ足ラズ亦此物酒ヲ注キ難産ノモノニ用ユハ極メテ功驗
アリト云リ顧フニ此説モ亦的實ナクハナシガタシ

鮮荅

伍シ志曰 斡族亞兒ハ獸類ニ出ス所ノ癖石ナリ東西諸州
ヨリ産ス其西方ヨリ出スモノ羅甸呼曰 斡族亞兒屋悉鄧
打亞利私世譯スルハ物私多印度亞安泄斡族亞兒ト
イウ義ナリ其状外粗朴ニシテ其色黧大小形状一ナズ解之
則層々為數薄片其片東方産スル所ノ者ニ比スバ頗ル
厚シ伊斯把尔亞及波尔杜瓦尔國人亞墨利加州ヨリコ

レソ索メ得來ル就中亭露國ノ地多クコレ産スト云蓋シ其
癖石ヲ出スノ獸類甚多シ最野羊諸品中ノ胃肉ニ上品多
ク老獸ノ胃中ニ此物ヲ生ス其品類ヲ辨別スル外面ノ形色ノ
其大小ト分ツナリ大抵其色ハ灰白ナルアリ或ハ黒ク帯テ而シ白
色ヲ錯ルアリ又青斑文ヲ帯ルアリ此類外面ヨリ鑿定區別甚多
シ其形ハ渾圓ナルアリ或ハ鈍圓或ハ方ナルアリ其大小モ亦數品
アリ多ク東方ノ産スルモノヨリハ甚大ナリ其大ナルモノ鳩卵ノ大
アリ又雞子大ノモノアリ其功用ノ如キハ東西ノ産俱相同シト云
然レモ西方ノ産ハ甚色澤頗ル青シ帯ル者ヲ異ニス此品東方

ノ者ニ比スレバ甚ダ上品ナリ貴重ノコレヲ收貯フベシ殊ニ其石
ノ裏面光輝アリテ條理アル者ヲ良品トス亭露國出ス所
ノ者最貴重ヲ新^ハ伊斯^ス把^バ你^ニ亞^ア國^クヨリ輸シ來ルモノナリ若此品
缺痛スルキハ鹿王ヲ以テ換ヘ用ユベシ是原ト其功用ヲ同フ
スバナリ傳染ノ諸病ニ用テ良劑ナリ而シテ熱毒傳染諸險症
ニ施スニ當テハ真品ニ非ラサバ功驗ヲ奏シカタク鹿王ノ比フ
ベカラザル所ナリ

主治強健心志或下石淋及胞衣或曰取此不掛指
頭保持則催睡眠云然一二之所試未盡其明證姑

記俟後者

警族^ベ亞^ソ兒^ル其東方ニ産スルモノ羅甸呼曰警族^ベ亞^ソ兒^ル阿^リ里^リ印^イ答^ダ里^リ私^ス此ニ譯スル^ハ阿^フ倭^イ斯^ス多^ト印^イ度^ダ亞^ア安^ア池^セ警族^ベ亞^ソ兒^ルト云フ其石柔軟ニ滑澤アリ大小形状數種アリ外面青色ヲ帶ブルモノナリ或ハ青黒ナルモノアリ之ヲ解スル^ハ則^チ為^シ數薄片其質ハ甚脆軟ナリ其状恰モ葱根ノ層々ト相重疊スルモノ如シ氣味馨香ナキガ如シ此物百兒西亞及東方諸國ヨリ舶来ス野羊牝牡俱ニ胃中ニ此物ヲ生ス殊ニ上好ナル者ハ斯の列拔奴摸ノ地方三日程僕分索法島ニ出スモノト

又齋^セ狼^イト穀^コ羅^ロ滿^ミ埵^テ兒^ルトニ屬スル島中ニ産スルモノナリ是則應^イ帝^ダ亞^ア沿^リ海^ノ獲^ル兒^ル峴^ト達^ト稱^スル地ナリ野豬胃中亦此物ヲ生ズ其春夏ノ交ニ生ズル所モノヲ以テ佳品トスコレ其菜草及灌木等ノ初生嫩苗ヲ斫テ胃中此物ヲ結成スルガ故ナリ又或家豬胃中ニモ此物ヲ生ス或ハ十二枚餘ヲ結スル者アリコレハ外ヨリ其腹状ヲ案察セモ知ルモノナリ此物大小輕重ニ依テ其價ニ差等アリテ世ニ貿易ス故ニ或ハ贗造モノ多シ其贗造ノ法數多アリ甚タ巧ニ偽製スルモノナリ然レ其正偽鑒定ノ諸法アリ其真ナル者ハ自ラ滑澤アリテ青色ヲ

帶ブ是天然固有ノ質ナリ刮磨メ末ト為セ六則為黑青色
或ハ紙上ニ磨メ官粉及白堊等ヲ用テコレヲ塗レバ

青黄色ヲ為ス又水中ニ投スハ沫ヲ噴ク如ク汁ヲ発スガ如
クナリ其質造ノモノ以熱手コレヲ持チ或ハ熱湯ニ投ス
レハ則柔軟ニナルナリ又以熱大鐵貫之則乍ク煙ヲ起ス
又水中ニ投スハ或ハ重キアリ或ハ輕キアリコレ等皆偽製
モノナリ

此石世ニ愛玩貴重シテ収メ貯フ其真ナル者ハ発汗ノ良劑ナリ
性芳烈恰如縮砂丁香等之香料及経復留骨索烏

多之製方故臨與之勿使過服單服有一厘六毛強
至二厘三毛強為率

按ニ此物應帝亞呼百鐸羅警族亞尔此方俗間ニ
所謂苛伊撒拉拔沙刺者ハ即是ナリ蓋シ苛伊撒拉
ハ百鐸羅拔沙拉ハ警族亞尔俱ニ西語ノ轉声ナリ梵石ヲ
呼テ百鐸羅ト云フ警族亞兎ハ獸ノ名蓋シ野羊ノ類
ナリ押輿外記曰渤泥國有獸石把雜尔似羊鹿腹
内生一石療百病極貴重至百換國王籍以為利
ト云フモノコレニ西人皆獸石ヲ以テ警族亞兎ト

通称スルモノハ原ト此獸ノ胃中ヨリ得ルヲ以テナラン皆
各勻シク是癘石ニ漢ニ所謂狗寶猿枣羊哀馬黑
鹿黄等ニ一ニ是同物ナリ又漢通ノコレヲ鮓荅ト云フ酢
荅未ダ何ノ意義タルヲ知ラズ顧フニ異邦ノ語字音ヲ填
ルモノナルヘシ和蘭船上從來齊來ルモノ我邦往々珍藏
スルモノ多シトイヘ凡東西ノ真偽主治功療等ヲ辨スル
ヲ知ラズ故ニ今世ニ譯メ其主療鑒定及其由テ出ル所ト
其轉訛等ノ語原ヲ詳ニ世ニ示サントスルニ

龍涎香

「アムブラキリッセア」一名「アムリムキリッセウム」和蘭呼テ
「シッピキテケン井セアムベ」ト名 是物貴重ノ薬ナリ白カナル
灰白ニ黒点ブツクトアリ其薬クサキ香アリ心ヲ強壯ニ
スルノ香ナリ其塊大小一ナラス水上ニ浮フ者ヲハ得ル莫ス
哥未亜ノ海岸或應帝亞ノ海中ニテコレヲ得諸先哲
ノ説ク「區々ニシテ一ナラズ其一説ニ「アールドレイ」ノ
一種ナリトシテ海底ヨリ出テ海濱ニ漂着スト云又二説ニ

蜜ノ一種トシテ石岸ニアル蜂海水ノ灌浸シタルモノ変テ
此物ヲ成ス是説ハウリス、ダウデレ井ガ、レ井君ノ着實ニセ
説ト同シ「タラウス」ガ説ニ此ハウリス、デレイガ、ヒロソヒセク
ハクチイニト書ノ三百八十七葉ノ七號ト二百六十
七號トニコシテ詳ニスコレニ因テコレヲ見レハ此物即チカケツ
テ「ナリ而即鯨」本國海濱ニテ
スレニコシテ見タリノ一種ニモソレヨリ生スル物々
リ玉ノ如ク三拵指横徑ヨリ十二拵指横徑ニ至ル重サ百三
十四匁ヨリ一千九百二十匁ニ至ル其滯軟ナルモノ楕形
ニシテ袋ノ如クニメ長サ三四尺ニメ二三尺ノ深濶ナルアリ

是袋ノ中ニ黯色ナル液アリ盈ツ其香甚タ強シ

鯨糞

「スベルニセナ」一名「アムブラブル」又「ハロスアントス」又「フロスニ
リス」和蘭呼テ「ワルスヨット」又「ワルヒスブレイン」ト名ク
白色脆軟脂油多ク小キ苔ノテキタ様ナリ脂膩ノ味
ニシテ油臭アリ其生ナルモノ多クハ卧兒葉得亞ヨリ持
來リ此土ニ於テ製ス昔ハ其物ヲ蜜ニセサルモノニメ其説

區々ナリ今ハ則其物ヲ詳ニスルヲ得タリ是レ鯨腦丸
ノミ別ニ名クテ「カケツ」ト云フ「スヘル」セツチト云フモニ製ス
ルトキハ物ヲ疎解ニスルノ功アリ主治脅ノ諸病小兒腹肚
拘攣絞痛打撲損傷血ノ凝結ヲ解釋シ能ク疼痛ヲ
和ス又「エム」フラスガム、デスヘル、テ、セツチト云膏菜ニ作テ
乳房固結ノ腫ヲ治ス

區々ナリ今ハ則其物ヲ詳ニ
ノミ別ニ名ケテ「カケツ」ト云フ
ルトキハ物ヲ疎解ニスルノ功アリ
拘攣絞痛打撲損傷血ノ滯
和ス又「エム」プラス「グム」デスヘルマ
乳房固結ノ腫ヲ治ス



得タリ是レ鯨腦丸
「セツチ」ト云フモノニ製ス
膏ノ諸病小兒腹肚
解釋シ能ク疼痛ヲ
「ト」云膏茶ニ作テ

