

069694

069694

徐氏醫學十六種



傷寒約編目錄

太陽病卷之一

太陽經脈證提綱一條

太陽經傷寒一條

麻黃湯證一條

麻黃湯方

加減建中湯證一條

加減建中湯方

變化黑膏湯證一條

變化黑膏湯方

養陰黑膏湯證一條

養陰黑膏湯方

瘀熱發黃

麻黃連翹赤小豆湯證二條

麻黃連翹赤小豆湯方

大青龍湯證一條

大青龍湯方

小青龍湯方

小青龍湯證一條

夾血傷寒證一條

夾血傷寒證一條

夾食傷寒證一條

夾食傷寒證一條

內傷夾傷證一條

內傷夾傷證一條

溫中紅膏湯方

陽氣夾傷寒證一條即紅膏湯證

葛根湯方

葛根湯證一條

葛根加半夏湯證一條

葛根加半夏湯方

傷寒約編

目錄

目錄

續

五苓散證一條

五苓散方

五苓散煩渴證一條

茯苓甘草湯證一條

茯苓甘草湯方

十棗湯證一條

十棗湯方

結胸與痞證一條

大陷胸湯證一條

大陷胸湯方

大陷胸丸證一條

大陷胸丸方

小陷胸湯證一條

小陷胸湯方

藏結證一條

藏結死證一條

結胸死證一條

生姜瀉心湯證一條

生姜瀉心湯方

甘草瀉心湯證一條

甘草瀉心湯方

半夏瀉心湯證一條

半夏瀉心湯方

乾姜黃連黃芩人參湯證一條

乾姜黃連黃芩人參湯方

大黃黃連瀉心湯證一條

大黃黃連瀉心湯方

附子瀉心湯證一條

附子瀉心湯方

赤石脂禹餘糧湯證一條

赤石脂禹餘糧湯方

旋覆代赭石湯證一條

旋覆代赭石湯方

抵當湯證一條

抵當湯方

畜血發黃證一條

抵當丸證一條

抵當丸方

桃仁承氣湯證一條

桃仁承氣湯方

畜血喜忘證一條

溫病

葛根湯與發散黑膏湯證合一條

葛根湯方

發散黑膏湯方

疎熱黑膏湯證一條

疎熱黑膏湯方

三甲散證一條

三甲散方

溫病夾陰

疎邪紅膏湯方

執傳厥陰

羚羊角散方

溫熱與疫有別

葛根加石膏湯方

達原散方

三消飲方

疫熱迫血

瀉熱理陰陽方

痧疫

傷寒約編

目錄

二續

寶花散方

清涼至寶飲方

暑疫

青蒿石斛飲方

中風

桂枝湯證二條

桂枝湯方

氣痞子湯方

桂枝證未解一條

形作傷寒脈不羸緊一條

藏無他病一條

病晝自汗出一條

桂枝四逆相關證一條

四逆湯方

柴胡桂枝湯證一條

柴胡桂枝湯方

桂枝湯禁

桂枝加附子湯證一條

桂枝加附子湯方

桂枝去芍藥生姜新加人參湯證一條

桂枝去芍藥生姜新加人參湯方

芍藥甘草附子湯證一條

芍藥甘草附子湯方

桂枝人參湯證一條

桂枝人參湯方

葛根黃連黃芩湯證一條

葛根黃連黃芩湯方

桂枝加厚朴杏仁湯證一條

桂枝加厚朴杏仁湯方

桂枝加芍藥湯證一條

桂枝加芍藥湯方

桂枝加大黃湯證合上條

桂枝加大黃湯方

桂枝甘草湯證一條

桂甘草湯方

茯苓桂枝甘草大棗湯證一條

茯苓桂枝甘草大棗湯方

桂枝去桂加茯苓白朮湯證一條

桂枝去桂加茯苓白朮湯方

桂枝加桂湯證一條

桂枝加桂湯方

桂枝去姜桂加龍骨牡蠣湯證一條

桂枝去姜桂加龍骨牡蠣湯方

蘇子清氣湯證一條

蘇子清氣湯方

濕痺

太陽經傷濕證一條

甘草附子湯方

桂枝附子湯證一條

去桂加白朮湯證一條

桂枝附子湯方

桂枝附子去桂加白朮湯方

甘草附子湯證一條

濕溫

蒼朮白虎湯證一條

蒼朮白虎湯方

發痲痧疹隱疹疹累水珠論一條

前胡疎肺欬方

大力子湯方

犀角地黃湯方

中暑

消暑十全散發一條

消暑十全散方

中暑脈證一條

補中益氣湯方

中暑渴證一條

清暑益氣湯方

瘧證

炎甘草湯方凡傷寒脈結代心動悸

桂枝加葛根湯方即桂枝湯加葛根桂枝湯見中風

陽明病卷之二

陽明病提綱一條

胃實外證一條

陽明病脈三條

不可下證一條

誤汗便難證一條

蜜導方

豬膽汁導方

陽明傷寒證一條

陽明病機一條

太陽轉屬證一條

本經成實證一條

太陰轉屬證一條

陰結陽結證一條

陽明桂枝證一條

陽明麻黃證一條

小青龍合吳茱萸湯證一條

陽明衄血證二條

瀕語證一條

瀕語脈一條

酸棗仁湯方

瀕語死證一條

瀕語鄭聲一條

熱入血室證三條

梔子豉湯方

黑道遙散方

舉輕占拜散方

陽明中風證二條

陽明中寒證一條

匡蓋證一條

穀痘證一條

枳實理中湯方

除中證一條

梔子豉湯證一條

白虎加人參湯證一條

白虎加人參湯方

豬苓湯證一條

豬苓湯方

梔子豉梔子甘草豉梔子生姜豉三湯證合一條

梔子甘草豉湯方

梔子生姜豉湯方

梔子乾姜湯證一條

梔子乾姜湯方

梔子厚朴湯證一條

梔子厚朴湯方

梔子柏皮湯證一條

梔子柏皮湯方

梔子湯禁

瓜蒂散證一條

瓜蒂散方

四逆湯證一條

吐後變證一條

白虎湯證一條

白虎加人參湯證三條

三陽合病一條

茵陳蒿湯證一條

寒濕發黃證一條

承氣湯證一條

調胃承氣湯方

煩熱如癘證一條

葶藶發熱證一條

胃不和譫語證一條

小便數大便硬證一條

小承氣湯方

大承氣湯證一條

傷寒約編

目錄

四  
頁

大承氣湯方

勿令大泄下證一條

欬水噦證一條

噦語發潮熱證一條

潮熱獨語證一條

大便硬則噦語證一條

下利噦語證一條

汗出噦語證一條

噦語潮熱反不能食證一條

繞臍痛煩躁證一條

不大便腹滿痛證一條

腹滿不減證一條

二陽併病一條

發汗不解腹滿證一條

發熱汗多急下證一條

目中不了了大便鞭證一條

口燥咽乾急下證一條

自利清水心下痛急下證一條

腹脹不大便急下證一條

少陽病卷之三

少陽病提綱一條

少陽傷寒證一條

少陽中風證一條

少陽欲罷脈一條

太陽少陽併病一條

少陽誤下證一條

小柴胡湯證一條

小柴胡湯方

嘔而發熱證一條

陽結陰結證合一條

小柴胡加減證一條

陽明少陽合病一條

陽明病脇下硬滿證一條

嘔多不可攻證一條

少陽轉屬陽明證一條

熱入血室如癰證一條

柴胡桂枝湯證一條

柴胡桂枝湯方

柴胡證反下一條

柴胡桂枝乾姜湯證一條

柴胡桂枝乾姜湯方

柴胡加龍骨牡蠣湯證一條

柴胡加龍骨牡蠣湯方

柴胡加芒硝湯證一條

柴胡加芒硝湯方

調胃承氣湯證一條

大柴胡湯證一條

大柴胡湯

傷寒熱結寒熱證一條

嘔而復利證一條

小建中湯證一條

小建中湯方

小建中湯不瘥證一條

建中湯禁

黃連湯證一條

黃連湯方

黃芩湯證黃芩加半夏生姜湯證合一條

黃芩湯并加半夏生姜湯方

少陽負脈一條

太陰病卷之四

太陰病提綱一條

理中湯證一條

自利證一條

四逆湯證一條

太陰黃發證一條

太陰死證一條

桂枝加芍藥加大黃二湯證合一條

桂枝加芍藥湯方

桂枝加大黃湯方

太陰經中風證一條

三物白散方 即三物小瀉胸湯

少陰病卷之五

少陰病脈證提綱一條

少陰病脈一條

少陰亡陽證一條

少陰病脈陰陽俱緊二條

少陰中風

少陰中風脈一條

少陰傷寒

少陰病可治不可治證三條

少陰病欲解一條

麻黃附子細辛湯方

麻黃附子甘草湯方

火劫證一條

附子湯證二條

真武湯證二條

太陰經桂枝證一條

寒實結胸證一條

寒實結胸治二條

少陰自利證一條

少陰不可汗不可下證一條

八味腎氣湯方

少陰病陽回證一條

少陰病死證三條

麻黃附子細辛湯證一條

麻黃附子甘草湯證一條

少陰傳經便血證一條

下厥上竭證一條

附子湯方

真武湯方

桃花湯證一條

桃花湯方

四逆湯證十條

四逆湯方

四逆加人參湯證一條

四逆加人參湯方

通脈四逆湯證二條

通脈四逆湯方

少陰病厥證二條

少陰亡血證一條

少陰病冷結膀胱一條

少陰傷寒脈足一條

少陰傷寒煩躁證一條

茯苓四逆湯證一條

茯苓四逆湯方

乾姜附子湯證二條

乾姜附子湯方

吳茱萸湯證三條

吳茱萸湯方

白通湯白通加豬膽汁湯證三條

白通湯方

白通加豬膽汁湯方

黃連阿膠湯證一條

黃連阿膠湯方

豬苓湯證二條

豬苓湯方

豬苓湯禁

豬膚湯證一條

豬膚湯方

甘草湯桔梗湯二證合一條并方

半夏散及湯證一條

半夏散及湯方

苦酒湯證一條

苦酒湯方

四逆散證一條

四逆散方

厥陰病卷之六

厥陰病提綱一條

肝乘脾證一條

左金丸方

枳朮丸方

肝乘肺證一條

厥陰消渴證一條

厥陰中風證一條

烏梅丸證一條

烏梅丸方

當歸四逆湯證一條

當歸四逆湯方

當歸四逆加吳茱萸生姜湯證一條

當歸四逆加吳茱萸生姜湯方

白頭翁湯證一條

白頭翁湯方

厥陰脈二條

厥陰病圍膿血證二條

厥陰病無陽證一條

熱厥利證

厥熱相應往來證四條

參附湯證一條

參附湯方

發癰證一條

厥利難治證一條

見厥復利證一條

厥陰傷寒喉痺證一條

厥利死證一條

炙甘草湯證一條

炙甘草湯方

傷寒效逆上氣脈散死證一條

燒棍散證一條

燒棍散方


諸寒熱證

六味丸證一條

八味丸證一條

六味丸方

八味丸即八味腎氣湯方見少陰



傷寒約編卷一

吳江徐大椿著

太陽證提綱

太陽之為病脉浮頭項強痛而惡寒

太陽主表其脉浮而有九與陽明兼長大小少陽兼拉細三陰之微浮者不同頭項主一身之表太陽經脉繫於頭會於項故太陽病則頭連項而強痛與陽明頭額痛少陽頭角痛者迥別惡寒為寒在表六經雖各惡寒而太陽應寒水之經故惡寒特甚與陽明二日自止少陽往來寒熱三陰內惡寒者懸殊矣脉浮頭項強痛惡寒八字為太陽一經受病之綱領無論風寒溫熱疫癘雜病皆當倣此以分經定證也

傷寒

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒

已發熱是寒傷於表即發熱以拒之未發熱是寒邪凝斂熱不遽發即發熱之遲早可知其人陽氣之感衰寒邪之重輕雖有已發熱未發熱之不同而惡寒體痛嘔逆之證陰陽俱緊之脉先見便可斷其為傷寒而非他病也傷寒必惡寒寒邪外束一身之陽氣不舒則體痛寒邪內侵胃中之陽氣不化則嘔逆寒令脉緊陰陽指浮沉不專指尺寸此太陽經傷寒之脈證

麻黃湯證

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

太陽主一身之表其經直抵腰中故傷寒則身疼腰痛主筋所生病筋皆會於手足肢節故受寒則骨



節疼痛其經會於頭為諸陽主氣寒邪外來陽氣不伸而皮毛閉遏故頭痛發熱惡風無汗而喘也太陽為開立麻黃湯以開之則汗出而邪自解發熱疼痛自除矣前條惡寒嘔逆此條惡風無汗前陰陽俱緊此並不言脈是互文見意處二條俱麻黃湯證要知麻黃湯治中風重劑寒傷於表者可通用之非專治傷寒之主劑也蓋風寒本同一氣風中無寒即是和風何足病人必風開腠理則寒得入於經絡乃病傷寒耳故不必於風寒而鑿分但審脈之虛實施治庶無差誤矣

麻黃湯

治發熱惡寒頭痛項強身疼腰痛骨節疼痛無汗而喘脈緊有力者

麻黃

一錢 杏仁二錢 甘草五分

水煎去渣溫服

嘔者加半夏生薑一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡氣煩躁不得眠也汗多者溫

粉撲之

寒邪傷表陽氣不伸故寒熱身疼無汗嘔逆而喘非此開表逐邪之峻劑不足以當之也麻黃入肺能去骨節之風寒從毛竅出為衛分發散寒風之品桂枝入心能化心液通經絡而出汗為營分解散寒邪之品杏仁為心果溫能散寒苦能降氣為肺家逐邪定喘之品甘草甘平外拒表邪內和血氣為中宮安內攘外之品此湯入胃行氣於元府輸精皮毛毛脈合精而溱溱汗出表邪盡去不留則痛止喘平寒熱頓解不必藉汗於穀也不用姜棗者以生薑之橫散麻黃之上升大棗之甘滯礙杏仁之速降若脈浮弱汗自出或尺中微遲者是建中所主非麻黃所宜麻黃湯為發汗重劑專治表實裡氣不虛者投之恰當一戰成功可一不可再嘔逆加半夏生薑即非麻黃湯法矣兼治冷風哮喘

加減建中湯證

脈浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗以營氣不足血少故也

腫脹身疼是據肝驗證法邪從汗解則陽氣得伸而身自不疼矣假令尺中脈遲以尺屬陰資血少則營氣不足雖發其汗不特無汗而身疼不除則營氣反虛而亡血亡津液之變頓起陽感者不妨發汗變證惟衄血乃邪解陰虛者不可發汗亡陽之變恐難挽回建中法加減始為合劑耳

加減建中湯 治發熱惡寒無汗身疼脈浮弱者

製首烏五錢 酒炒 川桂枝六分 白芍藥錢半 酒炒 淡豆豉錢半 當歸身三錢 炙甘草錢半 白雲神錢半 新會皮錢半

鮮生姜三片 肥大棗三枚

水煎去渣溫服 此養營解邪之劑血少則營氣不足絡脈空虛寒邪得以留戀經中故用首烏滋血歸芍養營淡豉解表姜桂祛寒茯神霍梗安神啟胃炙草大棗緩中益虛緩方和劑合之陳皮共勸養正祛邪之力

變化黑膏湯證

傷寒脈浮緊者麻黃湯主之不發汗因致衄

脈緊無汗用麻黃湯發汗則邪從汗解而陽氣得泄陰血不傷奪汗則無血也若不發汗而陽氣內擾陽絡受傷則血外溢而衄血奪血則無汗也再用辛溫汗劑何異抱薪救焚合變化黑膏湯主之

變化黑膏湯 治發熱無汗口燥鼻衄或汗後發熱不解脈浮數不振者

原生地五錢 荊芥穗錢半 建連翹三錢 白茯苓錢半 川貝母二錢 生薑肉三錢 淨蟬衣錢半 紫丹參錢半

水煎去渣溫服 此疎熱存陰之劑不發汗則陽邪受陷陽絡受傷而衄血故以荊芥連翹疎熱外泄

生地川貝解熱存陰茯神丹參以安神和血查蟬柳草以調中攘外也

衄家不可發汗汗出必額上脈緊急目直視不能瞬不得眠

太陽脉起目内眦上額已脫血而復汗之則津液枯竭故脉緊急而目直視也亦心腎俱絕矣目不轉故不能瞬目不合故不得眠勉用黑膏冀挽萬一

養陰黑膏湯 治心腎液竭邪迫垂危脉濡急症欲脫者

懷生地 六錢 淡豆豉 煨 生洋參 三錢 肥粳冬 三錢 真阿膠 三錢 生白芍 錢半 白玉竹 三錢 川貝母

二錢 淮山藥 炒 三錢 忍冬藤 三錢 乾荷葉 三錢

水煎去渣溫服 已脫血而復汗之則津血大傷經脈失養遂成危迫之候生地滋先天之水粳冬潤後天之津阿膠益血芍藥斂陰山藥洋參填中土以生金生水玉貝忍冬涵心氣以通脉通經淡豉荷葉提陷升陽如起涸轍之魚以冀寒谷逢春洵為生津潤燥起死回生之劑

瘧熱發黃證

病發於陽而反下之熱入因作結胸若不結胸但頭汗出餘處無汗至頸而還小便不利身必發黃也

寒氣侵人人即發熱以拒之是為發陽助陽散寒一汗而寒熱盡解矣若不發汗而反下之熱反內陷寒邪與水氣隨熱而入於胸必結熱氣陷炎上不能外越故頭有汗而身無汗也小便利即濕熱在內亦解不利則濕熱內蒸於臟腑而黃色外見於皮膚

麻黃連翹赤小豆證

傷寒瘧熱在裏身必發黃麻黃連翹赤小豆湯主之

熱反在裡不得外越謂之瘧熱非發汗以逐之則濕氣終不散然仍用溫散是抱薪救火也故於麻黃湯去桂枝之辛溫加連翹梓皮赤小豆之苦寒降泄可解表清火而利水一劑而三善備矣且以見太

陽疾熱之治與陽明迥別也

麻黃連翹赤小豆湯 治表邪內陷不解發熱發黃脈濡浮數者

麻黃八分連翹錢半小豆三錢梓皮錢半杏仁二錢甘草五分姜皮八分大棗三枚

潦水煎去渣溫服 皮膚之濕熱不散仍當發汗而在裡之痰熱不清非桂枝所宜故於麻黃湯去桂枝而加赤小豆之酸以收心氣甘以瀉心火專走血分而通經絡行津液而利膀胱梓白皮寒能清肺熱若以瀉肺氣專走氣方而清皮膚理胸中而解煩熱連翹杏仁瀉火降氣麻黃姜皮開表逐邪甘草大棗和胃緩中潦水煎之降火除濕也其表有不解黃有不退者乎

大青龍湯證

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之

寒風之厲熱帶於中故煩躁而腹垂惡寒蓋風有陰陽汗出脈緩是中於鼓動之陽風不汗出而脈緊乃中於凜冽之陰風也風令脈浮浮緊而沈不緊與傷寒脈陰陽俱緊有別發熱惡寒同桂枝證身疼痛不汗出同麻黃證惟煩躁是本證所獨風感於表非發汗不解熱帶於裡非大寒不降故於麻黃湯倍麻黃以大發其汗加石膏以并除其煩躁中風本惡風此惡寒甚故不見其更惡風耳

太青龍湯 治寒風在表火鬱於中發熱身疼無汗煩躁舌白中脘脈浮緊數有力若脈浮弱汗出惡風者不可服服之則筋惕肉瞤此為逆也

麻黃錢半桂枝錢半杏仁二錢甘草錢半石膏五錢生姜三片大棗五枚

水煎去渣溫服 煩躁是熱傷其氣無津不能作汗故發熱惡寒身疼不解特加石膏之泄熱生津以除煩躁然其性沈而大寒恐內熱頓除表寒不解變為寒中而嘔熱下和故也必倍麻黃以發表又倍

甘草以和中更用姜棗調和營衛一汗而表裏解風熱兩除何患諸證不平乎此大青龍清內擾外之功所以佐麻桂二方之不及也青龍以發汗命名各少陰亦有發熱惡寒無汗煩躁之證但脉不浮頭不痛為異

傷寒脉浮緩發熱惡寒無汗煩躁身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之

陽氣太重微寒外束亦令無汗煩躁發熱惡寒也傷寒脉浮緊身必疼浮緩身不疼前條中陰測之風此條受輕微之寒蓋陽運則身輕陽鬱則身重乍有輕時乃鬱陽得伸也無少陰證者則少陰虛陽不歸亦有發熱惡寒無汗煩躁之證法當溫補以回陽若反用麻黃之散石膏之寒則真陽立亡矣此條陽氣重傷寒微故以大青龍湯小其制而雙解之

大青龍湯見前

小青龍湯證

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之發熱是表不解乾嘔而欬是心下之水氣不散水性流動其變多端水氣下而不上則或渴或利上而不下則或噎或喘留而不利行則小便不利少腹因滿也小青龍兩解表裏之邪復立加減法以治或然之證此為太陽樞機之劑

小青龍湯 治發熱心下有水氣乾嘔而欬脉緊弦細者

桂枝 一錢芍藥 錢半甘草 五分半夏 錢半麻黃 一錢細辛 三分乾姜 五分五味 五分

水煎去渣溫服 渴者去半夏加栝實 微利去麻黃加羌活熱令赤色 噎者去麻黃加茯苓

喘者去麻黃加杏仁去皮尖

風寒夾水氣浸漬胸中內侵肺胃則發熱乾嘔而欬是小青龍主證故於桂枝湯去大棗之甘泥加麻黃以開元府半夏除嘔細辛逐水氣五味乾姜以除欬也既用麻辛發表不須生薑之橫散渴是心液不足故去半夏之燥易括萹之潤利與噎小便不利與喘則病機偏於向裏故去麻黃之發表加附子以除噎芫花茯苓以利水杏仁以定喘耳大小青龍俱是兩解表裡之劑當知大青龍治裡熱小青龍治裡寒且小青龍治水之動而不居亦與五苓散治水之留而不行者不同兼治膚脹最捷又主水寒射肺冷哮證

夾氣傷寒證

發熱惡寒胸滿脇痛手按不堅不硬左關脈實大傷寒藥中加芫全菴實加青皮菴滯加香附菴滯加青木香菴浮加烏藥右三部脈實大加檳榔右關獨實加枳實菴實加厚朴菴滯加枳殼菴滯加白豆蔻紫滯加草豆蔻滯加廣木香菴滯微滯加新會皮氣陷加升柴氣虛加參蒼氣熱加苓連氣寒加姜附

夾血傷寒證

脇間拒按脇下或臍下必有一處堅硬實滿痛有定跡非若氣病之流走也左關脈實大加歸尾桃仁菴實加全歸赤芍菴滯加全歸延胡菴滯加全歸芫蔚子菴浮加當歸紅花菴滯加當歸丹參若脈大血堅非蒲黃五靈脂不能奏効

夾痰傷寒證

胸滿惡心或心嘈眩暈嘔出痰涎或痰鳴氣喘欬吐肢麻右關脈滑數有力加括萹實菴細有力加法半夏右寸浮滑加蘇子滑數加川貝菴滑加白芥子滑大加杏仁泥右關滑實非萊菔子不能破結開

痰

夾食傷寒證

胸滿惡心。心下堅實。拒按。噎腐吞酸。惡食疼痛。右關滑實。加建耑山查。菴實。加生山查。炒麥芽。實大加。萊菔子。菴滯。加白朮。炭。枳實。枳殼。細加。糊汁。煮炒。白朮皮。

夾水傷寒證

胸中飽悶。漉漉有聲。惡心泛泛。嘔出清涎。綠水。右關脈弦。加半夏。白通草。右關脈細。加細辛。茯苓。右三。擊細沈實。非豬苓。澤瀉。黑丑。白丑。不能破結。逐水。

夾虫傷寒證

臍腹絞痛。吐瀉出虵。心嘈。思食。嘔出青涎。甚則面生白點。是為虫花。亦必腹中起扛。為確據。脈實。加檳榔。鶴靈。無美雷丸。脈虛。史君子。作湯煎本病藥。

內傷夾傷寒證

倦怠懶言。無氣以動。右脈偏細。偏軟。或濶大無力。加參耑。朮。草於表散藥中。間有氣傷不能化血。而血積於中者。切勿破之。但須調營托裏。血絡化而邪自解。

陽虛夾傷寒證

足冷。陽縮。舌白。戴陽。脈細。緊。瀰。宜紅膏湯。加調營解邪藥。凡係傷寒。無不發熱。惡寒。至於夾證。或托。或化。必期中病。為鉅。切勿過行。剋伐。有傷清陽之氣。反致外邪內陷。救藥莫及矣。

溫中紅膏湯 治陽虛傷寒。定冷陽縮。身熱面戴。陽脈細緊。瀰者。

製附子八分 鹽豉豆豉煨燂 炮姜炭八分 桂枝八分 當歸身三錢 白茯苓神二錢 炙甘草錢半

水煎去渣溫服。陽虛傷寒不能逐邪外出，非此扶陽解邪之劑，不能破其範圍也。姜附補火以禦寒，桂枝溫營以解表，茯苓安神，當歸養血，甘草緩中氣以和表裡也。表裡調和，營衛振發，則湯自回而寒自散，何患諸證之不瘳哉。

### 葛根湯證

太陽與陽明合病，必自下利。葛根湯主之。

一兩經合病下利而曰必自下利，必陽併於表，表實而裡虛也。用葛根湯解肌以和中，則裏和而表自解矣。

葛根湯 治表邪不解下利脈浮者。

桂枝錢半芍藥錢半葛根錢半甘草錢半麻黃八分大棗三枚生姜三片

水煎去渣溫服。此開表逐邪之輕劑，治風寒在表而自下利者，是為表實裡虛。用桂枝湯解肌和裡。

加麻葛以攻其表實也。葛根味甘氣涼，能起陰氣而生津液。麻黃生姜開元府腠理之閉塞，祛風邪而

出汗。更佐桂芍甘棗以和裡用之，治表實而外邪自解，不必治裡虛而下利自瘳矣。

葛根加半夏湯證

太陽與陽明合病，不下利，但嘔者，葛根加半夏湯主之。

太陽陽明合病，太陽少陽合病，陽明少陽合病，必自下利。則下利似乎合病，當然之證，今不下利而嘔。

又似乎與少陽合病矣。於葛根湯中加半夏，兼解少陽半裡之邪，便不得為三陽合病。

葛根加半夏湯 即葛根加半夏葛根湯見前。

### 五苓散證

中風發熱六七日不解而煩，有表裡證，渴欲飲水，水入則吐者，名曰水逆。五苓散主之。多服暖水汗出愈。

表熱不解內煩渴是因發汗過多反不受水者其人平素上虛不能制心下有水氣也

前文辨

元府上輸口舌下輸膀胱而水逆也藉四苓以培土滲水桂枝入心化液更伏煖水之功多服則水精四布而煩渴解汗自出一汗而表裡之煩熱頓除矣

五苓散 治胃虛水逆表裏不解脈浮者

茯苓 三兩 白朮 兩半 豬苓 兩半 桂枝 八錢 澤瀉 兩半

製為散白欬和服三錢亦可作湯。發汗不解內腹煩渴是胸中津液越出心下之水氣不散故需此培土滲水發汗除煩之劑澤瀉入下焦理水之本豬苓入膀胱利水之用白朮入脾製水之逆茯苓入肺清水之源表裏之邪不能因水利而盡解必少加桂枝多服煖水俾水精四布而上滋心肺外達皮毛則溱溱汗出而表裏之煩熱兩解渴無不除白欬和服亦啜稀熟粥之微義

發汗已脈數煩渴者五苓散主之

前條論證此條論脈互相發明五苓散解之義雖經發汗而表未盡除水氣內結故用五苓若無表熱與水結當與白虎加人參湯矣

五苓散 見前

茯苓甘草湯證

傷寒欬而心下悸者宜先治水當用茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也

心下悸是有水氣乘其未漬入胃時先治之不致厥利相連治法之次第也

茯苓甘草湯 治心下悸發熱而厥脈弦者

茯苓 三錢 桂枝 八分 甘草 六分 生姜 三片

水煎去渣溫服。心陽虛水積不散故發熱而致心下悸或厥宜此發散水邪之劑伏苓滑水甘草和中桂枝入心以發汗生姜溫胃以散水氣也。

### 十棗湯證

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱聚汗出發作有時頭痛心下痞硬滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也。十棗湯攻之。

下利嘔逆本於中風不可不細審其表也若表之風邪已解裏之水氣洋溢上攻頭腦而作痛外走皮膚而汗出洋溢心脇之間而痞硬滿痛下走腸胃而下利上走咽喉而嘔逆非浩浩莫禦不用十棗攻之中氣不止矣。

芫花 三錢 甘遂 三錢 大戟 三錢

製搗為末肥大棗十枚煮濃汁調服一錢未得快利再服。積水至甚洋溢中外非此下水之峻劑不能應敵也。甘遂芫花大戟皆辛苦氣寒而秉性最毒一下而水患可平矣。君以大棗預培脾土不使邪氣盛而無制元氣虛而不支也。

### 結胸證

病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之太早故也。

發陽發陰俱指發熱言陽指形軀陰指胸中心下結胸與痞俱是熱證作痞不言熱入者熱原發於裏也誤下而熱不得散水不得行因而痞硬。

### 大陷胸湯證

傷寒六七日結胸熱實脈沈緊心下痞按之石硬者大陷胸湯主之。

結胸有熱實亦有寒實太陽病誤下成熱實結胸外無大熱內有大熱也大陰病誤下成實實結胸  
胸下結硬外內無熱證也沈為在裏緊則為寒此正水結胸之脉心下滿痛按之石硬此正水結胸之  
證與寒實結胸證同脉異必細審是病發於陽誤下熱入乃可用大陷胸湯治病必求其本也

大陷胸湯 治熱實結胸心下至小腹石硬脈沈緊數者

大黃 三錢 芒硝 三錢 甘遂 三錢

先煮大黃取汁納硝烱盡入甘遂末溫服快利止後勿服 此水邪結於心胸而熱邪實於腸胃用甘

遂以瀦太陽之水硝黃以攻陽明之熱實也湯以瀦之是為兩陽在裡之下法大陷胸丸證

結胸者項亦強如柔痙狀下之則和宜大陷胸丸

頭不痛而項猶強不惡寒而頭汗出故如柔痙狀此表未盡陰而裡證又急丸以緩之是以攻劑為和

劑也

大陷胸丸 治熱結經久脉浮緊數者

大黃 三兩 芒硝 二兩 杏仁 二兩 葶藶 二兩

大黃葶藶搗末杏仁芒硝合研如脂和散別搗甘遂末一兩白蜜丸如彈子大溫水送下一丸一宿乃

下不下更服取下為度

此水結因於氣結氣結因於熱故用杏仁以開胸中之氣氣降則水自降矣氣結因於熱邪用葶藶

以清氣分之濕熱源清而流自潔矣水結之必成窠白佐甘遂之苦辛以直達之太陽之氣化不行則

陽明之胃府亦實必假硝黃小其制而為丸和白蜜以留戀胸中過一宿乃下即解胸中之結滯又保

陽明之無易九太陽裡病之下法

小陷胸湯證

小陷胸證正在心下。按之則痛。脈浮滑者。小陷胸湯主之。

結胸有輕重。立方有大小。從心下至小腹。按之石硬而痛不可近者。為大結胸。正在心下。未及脇腹。按之則痛。未及石硬者。為小結胸。大結胸是水結在胸腹。故脈沈緊。小結胸是痰結於心下。故脈浮滑。水結宜下。故宜甘遂芫花硝黃等藥。痰結宜消。故用黃連栝萸半夏以消之。

小陷胸湯 治痰熱結胸痞實正在心下。脈浮滑數者。

黃連一錢 栝萸五錢 半夏二錢

水煎去渣溫服。痰熱據清陽之位當瀉心而滌痰。用黃連除心下之痞實。半夏消心下之痰結。栝萸

助黃連之苦。滋半夏之燥。洵為除煩滌痰開結寬胸之要劑。

藏結證

按之痛寸脈浮關脈沈名曰結胸也。如結胸狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈小細沈緊名曰藏結。舌上白胎滑者難治。

如結胸狀而非結胸者。結胸則不能食不下利。舌上燥而渴。按之痛。脈沈緊實。大此結在藏而不在府。故見證種種不同。夫使而不通謂之結。此能食而和亦謂之結者。是結在無形之氣分。藏氣不通。故曰藏結。心為藏主。舌為心苗。舌上白胎滑者是水來尅火。故難治。病人脇下素有痞。連在臍旁。痛引小腹。入陰筋者。此名藏結死。

藏結如結胸者。有如痞狀者。臍為立命之原。臍旁者。天樞之位。氣交之際。肝脾腎三藏之陰凝結於此。所以痛引小腹入陰筋也。小腹者。厥陰之部。兩陰交盡之處。陰筋者。宗筋也。此陰常在。絕不見陽。陽氣

先絕陰氣繼結故死

結胸證具煩躁者亦死

結胸是邪氣實煩躁是正氣虛故死

生姜瀉心湯證

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞硬乾嘔食臭膈下有水氣腹中雷鳴下利者生姜瀉心湯主之

汗出解後是太陽寒水之邪侵於形軀之表者已罷胃中不和水邪入於形軀之裏者未散必其人平日心火不足故心下痞硬胃中虛冷故乾嘔食臭膈下即腹中土不制水寒水得以內侵而有水氣虛陽鬱而不舒寒熱交爭於心下故腹中雷鳴而下利也宜生姜瀉心湯分理之

生姜瀉心湯 治胃虛濕熱心下痞滿乾嘔下利脉浮數者

生姜 三錢 人參 六分 黃芩 錢半 黃連 六分 乾姜 六分 半夏 錢半 甘草 六分 大棗 三枚

水煎去渣溫服 胃氣既虛濕熱又盛非此寒熱攻補並舉不能分理錯雜之邪也芩連瀉心胸之熱乾姜散心下之寒生半夏夏去膈下之水參甘大棗培腹中之虛芩連必得乾姜而痞散半夏必得生薑而水消名曰瀉心實以安心也

甘草瀉心湯證

傷寒中風醫反下之其人下利日數行穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中空虛客氣上逆故使硬也甘草瀉心湯主之

誤下傷胃逆氣上攻則濕熱不化而下利清穀日數十行腹鳴痞硬心煩而滿是為虛邪故以甘草緩中除逆芩連半夏化痞而軟硬洵為分理中州洗滌濕熱良法

甘草瀉心湯 治胃虛氣逆濕熱不化痞滿嘔利脈緩數者

甘草錢半 乾姜錢半 黃連八分 黃芩錢半 半夏錢半 大棗三枚

水煎去渣溫服 君甘草者一以瀉心而除煩一以補胃中空虛緩客氣上逆也倍乾姜散中宮下藥之寒行苓連之氣以消痞硬半夏除嘔而中虛不用人參者以未經發汗熱不得越是上焦之餘邪未散也乾嘔不用生姜以上焦津液已虛不勝再散病在胃而仍名瀉心者以心煩痞硬病在上焦耳

半夏瀉心湯證

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之若心下滿而硬痛者此為結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯主之

嘔而發熱是小柴胡主證嘔多雖有陽明證宜大柴胡湯而以他藥下之誤也誤下之變因偏於半表者成結胸偏於半裡者成心下痞此本為半夏瀉心湯而發故只以痛不痛分結胸與痞未及他證

半夏瀉心湯 治寒熱相結成痞脈弦細數者

半夏錢半 乾姜錢半 黃連八分 黃芩錢半 人參八分 甘草五分 大棗三枚

水煎去渣溫服 寒熱相結心下成痞故用瀉心湯即小柴胡湯去柴胡加黃連乾姜也不往來寒熱故不用柴胡痞因寒熱之氣互結故用乾姜黃連大寒大熱者為之兩解痞以半夏去生薑而倍乾姜乾姜助半夏之辛黃芩協黃連之苦苦辛相合痞硬自消參甘大棗調既傷之脾胃且以壯少陽之樞也

乾姜黃連黃芩人參湯證

傷寒本是寒下醫復吐下之寒格若食入口即吐乾姜黃連黃芩人參湯主之

誤治變證故用瀉心之半夏胃口寒格宜用參姜胸中蓄熱宜用苓連嘔家不喜甘故去甘草不食則不

吐是心下無水氣故不用生姜半夏。夏要知寒熱相阻則為格證。寒熱相結則為痞證。乾姜黃連黃芩人參湯。治寒邪格熱食入則吐脈細數者。

乾姜錢半 黃連八分 人參八分 黃芩八分

水煎去渣溫服。誤下傷胃寒熱互結故食入口則吐非需此寒邪格熱之劑不能調平其胃氣也。乾姜散胃口之寒。芩連清胸中之寒。熱人參以通格逆之氣而調其寒熱以至和平也。

大黃黃連瀉心湯證

心下痞按之濡濡當作硬大便硬而不惡寒反惡熱其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之。

瀉心湯治痞是攻補兼施寒熱並馳之劑。此則盡去溫補獨任苦寒下泄。且以麻沸湯漬絞濃汁而用之。必燥湯痞硬大便不通不惡寒反惡熱比結胸更甚者可用此湯急瀉之。

大黃黃連瀉心湯 治熱結痞硬燥渴便閉脈沈急數者 大黃三錢 黃連錢半

麻沸湯漬須臾絞汁服。瀉心者瀉其熱也。黃連苦燥能解離宮之火。大黃瀉滌能除胃中之實。以麻沸湯漬絞汁乘其銳氣而急下之。除客邪須急也。

附子瀉心湯證

心下痞大便硬心煩不得眠而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之。

陽虛於下則衛外不密而惡寒汗出熱結於中則大便不通而心煩痞硬也。故用附子以回陽而惡寒汗出自解。大黃瀉結熱而心煩痞硬自除矣。

附子瀉心湯 治陽虛熱結心煩惡寒汗出使閉脈沈者 附子三錢 大黃三錢

採弗易分責各按汁合和服。陽虧熱結表虛裡實不解非此扶陽瀉結之劑不能勝其任也。故用附

子補火以溫積寒大黃通閉以除結熱寒熱各製而合服之是偶方中反佐之奇法也  
赤石脂禹餘糧湯證

傷寒服湯藥下利不止心下痞硬服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者當利其小便

服湯利不止是藥傷胃氣心下痞硬服瀉心湯不解則痞為虛痞硬為虛痞

則胃氣更

傷利仍不止理中不能收攝虛赤石脂禹餘糧體重性澁而利復不止當利小便以分消之蓋小便利則大便實也此太陰傷寒脾虛濕盛腸胃滑脫故仲景設法以禦其變耳

赤石脂禹餘糧湯

治腸滑下利脉濡者

赤石脂三錢禹餘糧三錢

醋煨

水煎去渣溫服 胃虛腸滑下利不禁故需此澁脫固下之劑以挽其下趨之勢石脂色赤入丙助命火以生土餘糧色黃入戊實胃土而澁腸用以治下焦之標實以培中宮之本也

旋覆代赭石湯證

傷寒發汗若吐若下解後心下痞硬噯氣不除者旋覆代赭石湯主之

寒傷心主汗吐下後心氣大虛邪乘虛結故心下痞硬心氣不降故噯逆不除也旋覆姜夏之辛鹹善能消痞散結人參代赭之溫重足以鎮逆補虛更需甘棗之甘和胃益氣噯有不退者乎

旋覆代赭石湯

治胃虛痰逆痞滿噯氣脉弦虛者

旋覆花錢半代赭石三錢

煨生人參八分

生甘草三分

法半夏錢半

鮮生姜三片

肥大棗三枚

水煎去渣溫服 氣虛邪逆心氣不降故心下痞硬噯氣不除非此瀉心之變劑不能分解虛中之留結也旋覆鹹能補心而軟痞硬半夏辛能散結而止噯逆甘草之甘以緩之生姜之辛以散之虛氣逆

上代赭石以鎮之人參大棗以補之也

抵當湯證

太陽病六七日表證仍在而反下之脉微而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當硬滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裡故也抵當湯主之

表證誤下熱邪隨經入府熱傷陰血血結膀胱故少腹硬滿而不結胸小便自利而不發黃也血病則知覺昏昧故發狂小腹為膀胱之室瘀血留結故硬滿小便由於氣化病在血分故小便自利病既傳裡脉應微沈用抵當湯直抵當攻之處

抵當湯 治熱瘀血蓄小腹硬滿小便自利脉沈者

桃仁 三錢 大黃 三錢 蟅蟲 十個 水蛭 五個諸合人水不燥色

水煎去渣溫服 誤下熱入於血必結故小腹硬滿病在血分故小便自利非比下血之峻劑不能破其堅壘也蛭昆蟲之巧於取血者蠱飛蟲之猛於吮血者佐桃仁以推陳致新大黃以蕩滌邪熱名之曰抵當謂直抵瘀結當攻之所

太陽病身黃脉沈結小腹硬小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血結也抵當湯主之

小便不利而發黃者病在氣分麻黃連翹赤小豆湯證小便自利而發狂者病在血分是抵當湯證凡誤下熱入如結胸發黃畜血等其脉必沈或緊或濡或結在受病之輕重元氣之感衰水結血結俱是膀胱病故皆小腹硬滿小便不利為水結小便自利是血結

抵當湯見前

太醫乙登

傷寒有熱小腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸

有熱即表證仍在小腹滿而未硬其人未發狂祇以小便自利預知其有畜血故小其制而丸以緩之  
抵當丸 治畜血少腹滿小便自利脉濡者

水蛭三十個 蟅虫五十個 桃仁三兩 大黃三兩

水蛭炙過入水不轉色共末白蜜搗丸每服三錢溫水下 血畜小腹滿而不硬其人不發狂故變湯

藥為丸是以峻劑作緩劑也取水陸之善取血者佐桃仁大黃而丸以緩之使膀胱之畜血無不潛消  
默奪矣

桃仁承氣湯證

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外未解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃仁承氣湯

標本病而陽氣重故其人如狂血得熱則行故尿血血下則不結故愈衝任之血會於少腹熱極則血不下而反結故急病自外來當先審其表熱之輕重以治其表繼用桃仁承氣以攻其裡之結血也少腹未硬滿故不用抵當服五合取微利亦見不欲大下意

桃仁承氣湯 治熱蓄膀胱血結小腹脉浮濡者

桃仁三錢 桂枝六分 大黃錢半 芒硝錢半 甘草五分

水煎入芒硝微沸去渣溫服五合取微利 此輕裏重表之劑彼陽明蓄血喜忘如狂反不用承氣此熱蓄膀胱血結小腹乃以桃仁桂枝加於調胃承氣之中微下熱結以行其血則血化熱解而狂自止以太陽隨經瘀熱在裡故也

陽明病其人喜忘者必有蓄血所以然者本有久瘀血故令喜忘尿雖硬大便反易其色必黑宜抵當湯下之

屎硬為陽明病硬則大便當難而反易者必有宿血以血主濡也血瘀久則黑不用桃仁承氣者大便反易不須芒硝無表證不得用桂枝瘀血久無庸甘草非水蛭蝱蟻不能勝其任

抵當湯見前

溫病

太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病

發熱而渴少陰津液先虧病在太陽反不惡寒明是溫病而非傷寒也脈必沈數舌胎白潤者葛根湯先解其肌 舌白口燥葛根湯中加生地兼滋其陰

葛根湯 治溫病口渴發熱不惡寒脈數者

粉葛根錢半 淡豆豉錢半 荊芥穗錢半 白雲神錢半 生薑肉三錢 廣蒼朮錢半 淨蟬衣錢半 生穀芽五錢

新會白錢半 西湖柳三錢

水煎去渣溫服 舌白尖紅口乾當燉去會白加生地五錢 即發散黑膏湯

溫由少陰伏熱發出太陽故以葛根升陽解肌淡豆豉疎邪發表荊芥出營中之汗蟬衣脫皮毛之邪生查導滯蒼朮調中會白和胃茯神安神生穀芽宣揚胃氣合西湖柳共勦解肌發汗化滯疎邪之功此

輕揚疎滯之劑斑疹咸宜主之去會白加生地亦滋陰以解表熱也

汗後不解

發汗已身灼熱者名曰風溫

汗為心液灼熱因於發汗是其人腎水先虧心陽素旺故邪熱反熾於汗出也脈數尺虛名曰風溫可見溫病之發必因外邪鬱伏與陰虛發熱不同宜黑膏湯分解邪熱為主

疎熱黑膏湯 治溫病汗後灼熱脈浮數者

懷生地 五錢 淡豆豉 錢半 建連翹 三錢 荊芥穗 錢半 川貝母 二錢 生查肉 三錢 白雲神 錢半 淨蟬衣 錢

半 廣霍梗 錢半 西湖柳 三錢

水煎去渣溫服 汗後灼熱陰虛火旺而邪熱不解也故以生地滋陰連翹清熱合廣霍神官壅化滯則邪熱自無內阻之患荊芥蟬蛻解表疎邪則邪熱更無外閉之憂川貝解鬱涼心肺胡柳疎邪解灼熱此輕揚微熱善發少陰之汗為溫熱門開手第一要方

日久蒸熱

病溫日久邪結三陰蒸熱不解瘦弱神昏大便或澀或結口燥齒乾或渴或盜汗或無汗脈濡粒數重按不振此邪熱深結三陰陰虛不能作汗以逐邪也是以或斑或疹經久纏綿宜三甲散分解之

溫邪之至是少陰陰虛火伏傳過三陽而病發邪少熱微為病溫邪重熱甚為病熱其熱未傳之初或兼感冒亦令人凜凜憎寒翕翕發熱一經熱傳於表則但熱而全不畏寒或反惡熱盜汗是營衛偏勝無汗是營陰枯竭口燥是津液不足齒乾是火熱內伏渴飲乃真水之虧便澀是中土之弱便結為少陰之燥至於陰虛不能作汗是少陰腎水虧乏元陰不能外鼓也最為沈重脈濡粒數重按不振此溫邪伏於少陰熱病發於少陽而得二經之脈非三甲散不能奏捷

三甲散 治溫病日久邪熱結於三陰脈濡粒數者

懷生地 五錢 生鱉甲 三錢 川甲片 三錢 敗龜板 錢半 川貝母 二錢 白雲神 二錢 金石斛 三錢 白嘉鱉

錢半 鹽 廣蒼梗 錢半 乾荷葉 三錢

水煎去渣溫服 陰虛燥結無火去生地加製首烏 舌紅口燥減嘉蠶加北沙參少入薄荷葉使  
瀉去石斛減龜板加炒米仁或生查汗煮炒以化胃氣 胎白吐涎去石斛川貝加法半夏廣橘紅  
邪熱結於三陰陰虛不能作汗故邪戀不解也三甲入三陰之經善化結邪之久戀生地川貝兩走心  
腎滋陰液以解心肺之涸熱石斛荷葉升陽退熱茯神蒼梗和胃安神少佐嘉蠶為祛邪散結之鎖匙  
則汗從陰發邪自不竊洩為大滋陰液解結散邪之劑是溫熱門因邪致損之要方其加減諸法乃正  
設法禦病之詳診家均宜着眼切勿草草看過

### 溫病夾陰

陽虛病溫者是溫病夾陰也乃下寒上熱或外熱裏寒大便澹泄口乾不渴脈象浮數尺部沈細宜紅膏  
湯疎邪為主

病溫之人少火不振而熱發三陽故下寒上熱外熱裏寒也裡寒則便澹足冷神志昏沈上熱則口乾  
煩躁或疹或斑浮數為假熱之脈沈細是真寒之象非紅膏湯不能返其虛陽歸宅而何以托解伏邪耶  
疎邪紅膏湯 治陽虛病溫上熱下寒脈浮數尺細者

製附子

六分 鹽 淡豆豉 錢半

法半夏 錢半

荊芥穗 錢半

白雲神 二錢

杜橘紅 錢半

廣蒼梗 錢半 淨蟬衣

錢半 炙甘草 六分

西河柳 三錢

錢半

水煎去渣溫服

陽虛之人少火不振則營衛空疎邪乘虛襲而虛陽得以內鬱病溫也口渴便澹下

寒上熱而或斑或疹故用附子振動生陽合荊芥蟬柳疎邪而上熱自解二陳蒼梗理脾濕通水火而

虛人傷寒亦不出是方歟

熱傳厥陰

病溫不解熱入厥陰而神昏脇痛譫妄煩躁溲溺赤澀大便溇薄脈象急疾重按弦澀舌白砂胎或斑或疹此熱傳手足厥陰而神明失措危劇之候也宜於羊角散急投之

病溫之人陰虛木旺肝與心包受邪而鬱成火熱傷神則神昏傷肝熱則多言而譫妄心熱則水竭而煩躁土受木火不能制濕則小便澀少大便溇泄也木鬱土中濕中火發故舌不能紅而砂白有胎火鬱發斑濕鬱發疹當此木燥火炎脈象急疾弦澀證脈俱危宜於羊角散急圖之

於羊角散 治陰虛病溫邪熱陷於手足厥陰脈急疾弦澀者

懷生地

五錢

北沙參 三錢

於羊角散

白池菊 錢半

川貝母 二錢

苡米仁 四錢

白雲神 三錢

泡純鈎藤

五錢

冬桑葉 錢半

水煎去渣溫服

病溫不解熱入厥陰而神昏譫妄溺澀便溇故以於羊池菊直清肝火而譫妄退生

地川貝兼滋心腎而煩躁寧沙參養元陰以疎溫熱則斑疹自化米仁茯神安心神而理脾濕二

便應調桑葉鈎藤為清金抑肝之佐自然身熱退而脈勢和緩神志有不清者乎此益陰清火之劑乃

溫熱傷陰之第一要方也

溫熱疫癘有別

溫熱與疫不同脈證一一有別蓋溫由少陰伏氣淹淹轟轟初覺微瀉畏寒直至熱傳於表則但熱無寒脈沈弦數是伏熱自裡達表宜葛根湯或發散黑膏湯陽熱亢甚發為熱病宜葛根加石羔湯疫癘乃醜醜濕熱發於陽明或雜病氣屍氣天時乖戾之氣若兼感冒始初雖亦瀉瀉惡寒二日自止其熱之勢

醜醜濕熱發於陽明或雜病氣屍氣天時乖戾之氣若兼感冒始初雖亦瀉瀉惡寒二日自止其熱之勢

壯熱神昏。語言譫妄。舌上白胎滿布。脈數弦亢。此熱傷腹原。宜達原飲主之。若脈沈數弦長。右手偏大。汗之不解。舌黃腹滿。法宜下之。宜三消飲分解之。

伏氣者。乃由少陰陰虛而亢陽之氣伏匿經中。鬱遏蒸騰。熱始傳表而發為溫病。宜葛根湯升陽散熱。發散黑膏湯疎熱存陰。若亢甚於中。則陽熱熾熾而發為熱病。脈弦大洪濇。宜葛根加石膏湯逐熱外泄。如水虧木旺。心火不能歸原於腎。證治已列厥陰。茲不復贅。疫由中道。乃陽明醞釀濕熱。雖病氣屍氣。及四時乘戾之氣而發。其發也暴。其勢也猛。舌胎滿布。脈數弦亢。此疫邪內結熱傷氣化之象。宜達原飲化而逐之。若脈弦長。或沈數大。一汗不解。仍須再汗。若腹滿舌黃。昏沈語妄。此疫邪傳胃熱結於中。宜三消飲下之。

葛根湯

見前

發散黑膏湯

見前

葛根加石膏湯 治熱病發於陽明。昏沈煩躁。舌白中乾。脈數弦大者。

生石膏 五錢 粉葛根 錢半 淡豆豉 錢半 青防風 錢半 梔子 八分 荊芥 總 錢半 江枳殼 煨 錢半 生甘草 八

西胡柳 三錢

水煎去渣溫服 陽亢於中。熱邪熾盛。發為熱病。葛根解陽明之肌肉。淡豆豉發少陰之熱。蒸防風開腠

理。荆芥疎營血。石膏清火。世熱生草瀉火。緩中枳殼瀉滯。西胡柳助諸藥以散邪熱也。此疏

熱散邪之劑。乃陽明熱鬱煩躁之需方。

達原飲 治疫邪內結不傳壯熱神昏口渴。脈數弦長。乳滯者。

生石膏 五錢 粉葛根 錢半 淡豆豉 錢半 青防風 錢半 梔子 八分 荊芥 總 錢半 江枳殼 煨 錢半 生甘草 八

水煎去渣溫服 疫發陽明盤踞腹原不能傳化故用積榔利三焦之氣厚朴除中州之滿草果搜除  
不使疫邪久竄速傳經府而化黃芩知母清熱潤燥不使蘊熱盤踞速傳肌表而泄白芍斂熱傷之營  
甘草緩中州之氣此疎熱化結之劑乃疫邪盤踞腹原之劑方陽明加葛根以升散之太陽加羌活以  
開發之少陽加柴胡以疎泄之原不出三湯表證之加法也

### 三消飲

治疫熱傳經入府煩躁腹滿表裡不解脈數大者

生大黃

三錢 粉葛根

錢半 枳實

錢半 紫厚朴

錢半 白芍

錢半 尖檳榔

錢半 肥知母

錢半 草果仁

炒粉甘草

五分 鮮生姜

一片

水煎去渣溫服 疫熱內結傳布經中而還入於府故壯熱神昏表裏不解檳黃朴果疎利三焦而化  
氣導滯蕩滌疫邪之盤踞葛根生薑直走陽明而解肌出汗驅散疫邪以傳表黃芩清熱之餘知母  
潤陽明之燥芍藥斂熱傷之營甘草緩中州之氣以和諸藥之悍名曰三消消內消外消不內外也洵  
為疎利蕩滌之劑是瘟疫門中表裏不解之劑方

### 瘟熱迫血

勞傷積積血蓄陽明瘟熱內迫積血上奔以致神昏壯熱齒衄如凝脂指拭不淨腹滿便溏澀瀉少此  
為疫熱迫血元氣大傷不能統運大危之候脈大急疾當遵邪盛則實治之勉用濕熱理陰湯冀挽萬一  
積勞之人元氣大傷不能統運營血而積結於腸胃絡間疫熱觸動致成危極之候理陰濕熱或可救  
於萬一也若耳目口鼻俱出血必垂斃不可救矣

### 濕熱理陰湯

治疫熱迫動積血上奔脈大急疾者

原生地

一兩 淡豆豉

錢半 烏犀角

三錢 西赤芍

錢半 小枳實

錢半 生大黃

三錢 川黃連

錢半 生甘草

錢

生玳瑁三錢 生黃芩錢半 西胡柳三錢砂

水煎去渣溫服 疫熱盤踞陽明人傷血分迫血上湧出於口齒鼻中如膠之粘謂之疫熱迫血故身熱腹滿神志昏沈生犀玳瑁大瀉血分之熱毒則血不迫而齒衄可止黃連黃芩大瀉氣分之熱毒則氣不逆而腹滿可除淡豉胡椒發越疫邪生地砂糖引入血分俾疫熱化而積血清則身熱退而神志自爽矣大黃赤芍芍瀉滌痰結為除根之計枳實甘草緩中消痞乃復元之圖於既化而元氣復則大便當調而小便亦利也此實起死回生之劑為溫疫門壞症之急救良方

### 痧疫

病人壯熱神昏脉道伏瀉或腹滿頭悶或眩暈心煩此為痧疫當疎利氣血以達其邪則營衛宣通而斑疹自透宜寶花散為主挾熱宜清涼至寶飲解熱達邪則痧邪自散而疫熱自清設誤行發散則結伏不開反致引動邪熱悶絕不救

疫乃穢氣觸人閉塞竅道故發熱而神志昏沈脉象伏瀉或腹滿不爽或煩悶不清或起則眩暈而臥則心煩名曰痧疫亦發斑疹忌刺宜刮以出肌膚之痧藥以滌藏府之痧惟身不發熱者更宜刺以出經絡之痧又如天時不正之氣令人條然眩暈迷狂熱斑疹是氣血內壅營衛外閉藏府不通不治則死此皆痧疫成當切忌針刺蓋刺必傷營營傷則身熱漫無止期又忌發表恐引動邪逆多致悶絕也均宜刮以通其氣泄其邪寒痧用寶花散溫痧用清涼至寶飲使痧邪外解則斑疹亦透矣

加減寶花散 治寒痧發熱脹悶脉沈瀉者

荆芥穗錢半

廣藜蘆錢半

台烏藥錢半

大檳榔錢半

紫厚朴錢半

萊菔子三錢

建澤瀉錢半

新會皮錢半

水煎去渣溫服後被濕去萊菔子加晚籬沙狹菴去木香新會皮加桃仁蘇木寒甚加北細辛廣霍香  
痧乃穢氣悶人或邪氣閉塞竅道令人一時脹悶昏迷此名悶痧且有全不知覺忽然昏暈病人名曰  
暗痧非尋常腹痛痧之形著也若發熱昏沈或斑或疹即為痧疫此方可統治無熱諸痧是治病求本  
之道乃逐其邪而病自解矣檳榔破滯氣菴子消痰食劑芥散血分之邪烏藥順三焦之氣木香調諸  
氣鬱金調諸血降香活血止痛會皮利氣和中澤瀉以降濁分清也加減諸味乃設法禦病之變洵為  
散痧消食通竅清神辟穢止痛之劑是暴病倉卒急救之良方細辛一味本寶花散所有以其味極辛  
性極烈故暫去以入加減法中

加減清涼至寶散 治溫痧日久壯熱昏沈脈滯數者

建連翹錢半 紫厚朴錢半 萊菔子三錢 大檳榔錢半 廣鬱香錢半 北細辛五分 薄荷葉錢半 小木通錢

新會皮錢半 淨銀花三錢

水煎去渣溫服 溫痧內蘊過熱傷營故蒸熱眩暈迷悶發斑也檳榔菴子破滯寬中連翹鬱金瀉熱  
調血細辛散久伏之邪新會調鬱結之氣銀花善解痧熱之毒薄荷清利頭目之邪木通以通利濁氣  
也此清熱散痧消滯解毒之劑為痧毒久蘊蒸熱之良方

暑疫

身熱煩渴齒躁唇乾舌白砂胎中有紅點脈象濡弦孔數此為暑疫當以辛涼解散則汗出而斑透身涼  
矣宜青蒿石斛欬以清徹其邪若誤行發表反致煩躁轉增厥脫不救

暑傷心包三焦受病則胃液虧少營衛枯滯故身熱無汗煩渴不解也脾液不升而唇乾胃液不潤而  
齒燥舌乃心之外候舌白有砂是火藏金內中離紅點乃暑熱傷陰之象耳此名暑疫亦令發斑脈象

濡枝丸數此正者傷陰絡之候宜以青蒿石斛飲清徹其邪則暑熱解而斑透身涼煩渴無不解矣

青蒿石斛飲

治暑疫蒸熱煩渴脉數濡枝丸濡者

青蒿葉錢半薄荷葉錢半金石斛三錢川貝母去心杜橋紅錢半白雲神二錢鮮薑錢半白池菊錢半

祛鮮查肉三錢鮮荷葉三錢

水煎去渣溫服 暑邪久伏逼熱傷陰令人蒸熱汗出煩渴發斑青蒿池菊清徹暑熱而金水益川貝薄荷解散暑熱而心肺涼橘紅伏神安神利氣鮮查薑梗宣滯和中石斛平虛熱荷葉升清陽自然汗更出而斑透身涼煩渴無不自除矣此辛涼徹熱之劑尤為伏暑傷陰發斑之品方

中風

太陽病發熱汗出惡風脉緩者名為中風

風為陽邪最易發熱內鼓於營則邪汗自出風性散漫故令脉緩傷風惡風別於傷寒溫病而為中風也此太陽中風之脉證非雜病經絡藏府傷殘之中風耳

桂枝湯證

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

風為陽邪頭為諸陽之會風邪上干故令頭痛發熱惡風同麻黃證汗出惡風是桂枝證獨也寒風脈必兼弦是桂枝所主溫風脈必兼數宜鼠粘子湯

桂枝湯 治頭痛項強發熱惡風汗出脉浮弱者

桂枝錢半芍藥錢半甘草五分大棗三枚生姜三片

傷寒論卷之九 辨發汗之法 故發熱汗出惡風脈弱非此和營散邪解肌發汗不能解也桂枝入心溫經散寒  
發心液而為汗桂枝湯中不可用麻黃麻黃湯中不可無桂枝也本方皆辛甘發散惟芍藥能益陰斂  
血內和營氣以止煩煩止汗亦止若倍加芍藥即建中之劑非復發汗之劑此方皆用桂枝發汗即用  
芍藥止汗生姜之辛佐桂解肌大棗之甘佐芍和裡且桂芍之相須姜棗之相得是陰陽表裡並行不  
悖而剛柔相濟以為和甘草之甘有安內攘外之功用以調和表裡者即以調和諸藥也其精義尤在  
吸稀熱粥以助藥力俾鼓氣內充則外邪勿復入餘邪勿復留故用之發汗自不至於亡陽用之止汗  
自不至於遺瀉要知桂枝湯治表虛受邪但能解肌以發營中之汗不能如麻黃開皮毛之數以出  
衛分之邪也兼治虛癰虛痢最捷

鼠粘子湯 治溫風不解脈浮粒數者

大力子三錢 荊芥穗錢半 淨蟬衣錢半 淡豆豉錢半 白雲苓錢半 粉甘草五分 白蔥頭三枚

水煎去渣溫服 溫風傷表過熱不解故發熱頭痛無汗微煩非此疎風散熱之劑不能解散也荊芥  
疎血中之邪淡豆豉發少陰之汗鼠粘子即大力子芫桂風熱淨蟬衣即蚶蚶殼善蛻皮膚茯苓溼濕甘  
草和中少佐葱白以通陽氣也洵為解表疎邪之劑為風熱不解之劑方

太陽病外證未解脈浮弱者當以汗解宜桂枝湯

前條論證此條論脈外證未解指頭痛熱惡風惡寒也浮為在表浮弱為營虛受邪故宜桂枝湯以和  
營散邪

桂枝湯見前

形作傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火者必譫語弱者發熱脈浮解之當汗出而愈

形作傷寒見惡寒體痛嘔逆脈當弦緊而反浮弱者陰不足也陽邪陷於陰分必渴若以寒寒而用火攻亡津液而必譫語脈雖弱而發熱身痛不休宜消息和解其外此營虛傷寒宜桂枝湯啜熱稀粥乃食入於陰長氣於陽也令汗出則愈

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯主之

藏無他病知病只在形軀發熱有時則汗出亦有時陰虛者陽必湊之乘未經發熱時則陽猶在衛用桂枝湯先發其汗使陰出之陽而衛陽不復陷是迎而奪之也脈虛者加當歸令正勝而邪却矣

桂枝湯見前

病嘗自汗出者此為營氣和營氣和者外不譫以衛氣不共營氣和諧故耳營行脈中衛行脈外衛行脈外復發其汗營衛和則愈宜桂枝湯

時發熱自汗出者為營虛陽邪陷於陰分無熱而汗嘗自出者是衛虛不能固外也以有熱無熱別之時出嘗出辨之並可用桂枝湯啜熱稀粥法汗之脈軟者加黃蒼是形不足者溫之以氣也

桂枝湯見前

桂枝湯四逆湯相關証

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裡後清便自調身疼痛者急當救表救裡宜四逆湯救表宜桂枝湯

誤下傷脾下利不止繼見完穀不化則胃陽已亡身疼不除是表裡俱困宜四逆湯急救其裏裡和而表自解矣身疼未除下利後不可更用麻黃亦宜桂枝湯救表是救表仍合和中也

桂枝湯見前

四通湯 治陰盛陽虛表裡不解脈細者

附子錢半 乾姜錢半 甘草錢半 人參錢半 生姜三片

水煎去渣溫服 陽虛傷寒表裏不解非此扶陽勝陰之劑不能回陽散寒也附子壯真陽以禦陰邪乾姜溫裡寒以逐表寒人參扶元炙草益氣四味成方大佐生姜有回陽散寒之功通理三焦之妙洵為陰盛陽虛表裏不解之需方

柴胡桂枝湯證

傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之

微惡寒見寒少六七日發熱見熱多肢節煩疼此身疼腰痛猶輕微嘔是喜嘔之兆支結是痞滿之始

此外證將解未去內熱初熾未深故合柴胡桂枝為一湯以兩解之雖不言脈而脈數弦弱可知也

柴胡桂枝湯 治兩陽併病寒熱不齊脈數弦弱者

人參八分 桂枝八分 白芍錢半 柴胡七分 黃芩錢半 半夏錢半 甘草五分 生姜三片 大棗三枚

水煎去渣溫服 兩陽併病太少不解取桂枝湯以解太陽未盡之邪柴胡湯以解少陽之微結合二

湯為一是雙解兩陽表裡之劑乃太陽少陽併病之需方也

桂枝方禁

桂枝本為解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者不可與也

解肌者解肌肉之邪脈浮緊是麻黃湯脈發熱汗不出是麻黃湯證桂枝湯無麻黃開腠理有芍芍飲

陰津麻黃湯脈證而妄用桂枝恐閉遏邪氣為害溼大故禁戒如此

酒客病不可與桂枝湯得湯而嘔以酒客不喜甘故也

嗜飲酒酪濕熱淫內故得甘則嘔助熱資濕也當亦禁戒之桂枝加附子湯證

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

發汗太過陽氣不密而漏汗惡風汗多津液營陰失滋則肢急而使難矣陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之故筋變而屈伸不利也用桂枝湯加附子以固陽和營陽密則漏汗自止而手足便和矣

桂枝加附子湯 治陽虛漏汗脈弱者

桂枝湯內加 炮附子錢半

水煎去渣溫服 陽虛則衛外不密而漏汗惡風若非需此補火固陽則亡陽之變兆於頃刻故用桂

枝湯益心之陽陽密則漏汗自止而惡風自罷加附子以固腎中之陽陽回則小便自利而四肢自柔

屈伸自利矣

桂枝去芍藥生姜新加人參湯證

發汗後身疼痛脈沈遲者桂枝去芍藥生姜新加人參湯主之

汗發身疼是表虛營弱不得過用辛辣而去生薑脈象沈遲是藏氣虛寒當遠斥陰寒而去白芍惟存

桂枝甘棗溫營人參以統血脈名曰新加者見表未解無補中法今因脈沈遲而始用之也

桂枝去芍藥生姜新加人參湯 治營衛虛寒身疼痛脈浮弱者

桂枝 八分 人參 八分 甘草 八分 大棗 三枚

水煎去渣溫服 汗後身疼是營氣不足血少故也專任甘棗以佐桂枝則桂枝當入心養血之任復

芍藥甘草附子湯證

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

發汗不解反加惡寒是陽虛營氣不足也故於桂枝湯去桂枝姜棗加附子以扶陽禦寒佐芍藥甘草

以調和營氣

芍藥錢半甘草八分附子錢半

水煎去渣溫服 陽虛則衝氣不振營弱則血脈少資故發汗不解反加惡寒也當於桂枝湯中去桂

枝姜棗取芍藥以收少陰之精甘草以緩虛邪之逆加附子固坎中之陽但使腎中元陽得位則表邪

不治而自解矣此養營固陽之劑為營虛真陽不足之需方

桂枝人參湯證

太陽病外證未解而數下之遂協熱而利利下不止心下痞硬表裡不解者桂枝人參湯主之

外證未解當發汗而反下之表熱乘虛入裡遂協熱而利病在太陽利下不止心下痞硬是胃氣虛寒

之極表熱不解裡證又急用桂枝人參湯化痞軟硬止利解表一舉而兼得之矣

桂枝人參湯 治表邪不解裏氣虛寒痞硬下利脈細者

桂枝八分人參八分乾姜八分白朮錢半甘草五分

水煎去渣溫服 胃氣虛寒表邪陷伏故心下痞硬而下利也故用桂枝甘草為君乾姜參朮為佐先

前四味後內桂枝使和中之力饒而解肌之氣脫是又於兩解中行權宜法也此乃辛熱化痞軟硬甘

溫止利解表之劑洵為表裏虛寒不解之需方

葛根黃連黃芩湯證

太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者葛根黃連黃芩湯主之

前條是陽虛此條是陽盛桂枝證脉弱誤下而脉反促者熱迫於裏也邪束於外故喘而汗出利遂不止是暴注下迫皆屬於熱也病在太陽表裏俱熱用葛根連芩清火而解表則利自止而身熱喘汗自除矣夫補中可以除痞解表寒中亦可止利解表神化極矣

葛根黃連黃芩湯 治表裡俱熱喘利汗出脉促者

葛根 三錢 黃連 錢半 甘草 錢半 黃芩 錢半

水煎去渣溫服 陽邪內陷表裏俱熱故汗出而喘利並作也君葛根解肌而止利佐連芩止利而除喘臣甘草以和中先煮葛根後內諸藥使解肌之力饒而清中之氣饒與補中逐邪之法迥殊此解表清裏之劑為表裡俱熱之端方

桂枝加厚朴杏仁湯證

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳

喘為麻黃證治喘功在杏仁此妄下後表雖不解腠理已疎故不用麻黃而用桂枝白芍酸寒但加杏仁治喘恐不勝任復加厚朴以泄之則喘隨汗解矣

桂枝加厚朴杏仁湯 治下後發熱氣喘表不解脉弦浮者

杏仁 二錢 桂枝 錢半 厚朴 一錢 甘草 五分 芍藥 錢半 生姜 三片 大枣 三枚 去皮

水煎去渣溫服 表邪誤下氣逆不降故表不解而氣微喘也須加桂枝湯解陷伏之邪加杏核以調中降逆芍藥酸寒但加杏仁不勝治喘之任必加厚朴之辛溫佐桂以解肌佐杏以降氣此解表治裏

桂枝加芍藥湯證

桂枝加大黃湯證

本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之  
腹滿時痛因於下後是陽邪轉屬太陰非太陰本病表證仍在故用桂枝湯解外滿腹既見故倍加白  
芍以和裡若下後而腹大實痛表仍不解加大黃以除是太陽併病陽明而胃實也故用桂枝湯以解  
外加大黃以除實痛桂枝倍芍藥即建中之方桂枝加大黃即調胃之劑

桂枝加芍藥湯 治表邪內陷腹滿時痛脉弦者

白芍 三錢 桂枝 錢半 甘草 錢半 生姜 三片 大棗 三枚

水煎去渣溫服 表邪誤下陷入太陰故腹滿時痛而表仍不解須倍白芍收太陰之陰桂枝解下陷  
之表甘棗緩中以此止痛生薑散邪以除腹滿也此和裡解表之劑為誤下陽邪陷入太陰之上方

桂枝加大黃湯 治誤下陽邪不解併病陽明而腹大實痛脉弦長者

大黃 三錢 桂枝 錢半 芍藥 錢半 甘草 八分 大棗 三枚 生姜 三片

水煎去渣溫服 陽邪誤下陷入陽明故腹大實痛而表仍不解是兩陽併病也當需大黃攻陽明之  
實熱以除腹痛桂枝舉下陷之陽邪以解肌表白芍斂陰和裏甘草緩中調胃姜之辛散棗之甘潤務  
使營衛振發則陽邪不復內陷而腹大實痛有不除者乎此攻裏解表之劑為表邪誤下併病陽明之  
上方

桂枝甘草湯證

發汗過多其人叉手自胃心下悸欲得安者桂枝甘草湯主之

汗多則心液虛心氣餒故心下悸又手自胃則外有所衛得按則內有所憑望之而知其虛矣用桂枝為君獨任甘草為佐去姜之辛散棗之泥滯并不用芍藥不藉其酸收且不欲其苦泄惟取甘溫相得則氣血和而悸自平矣與心中悸而煩心下有水氣而悸者迥別

桂枝甘草湯 治汗多亡陽心悸脈濡弱者 桂枝 八分 甘草 錢半

水煎去渣溫服 汗多則心陽外亡而心氣失養故心下悸而欲得按也桂枝本營分藥得甘草則內溫營氣而悸自平此辛甘溫養之劑為心虛心餒心悸之端方

茯苓桂枝甘草大棗湯證

發汗後其人臍下悸欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之

臍下悸者腎水尅火而上乘豚為水畜奔則昂首疾馳酷肖水勢上干之象欲作奔豚尚未發也當先其時而治之與茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓桂枝甘草大棗湯 治心虛水逆脈紫細弦浮者

茯苓 三錢 桂枝 六分 甘草 三分 大棗 三枚

甘瀾水煎去渣溫服 心陽不足腎水上逆故臍下悸動欲作奔豚也茯苓以伐腎邪桂枝以保心氣甘草大棗培土制水甘瀾水名勞水用以先煮茯苓取其下伐腎邪一惟下趨耳此培土制水之劑為

水邪尅火之端方

桂枝去桂加茯苓白朮湯證

服桂枝湯或下之仍頭項強痛會會發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之

汗出不徹而遽下之心下之水氣凝結故反無汗而外不解心下滿而微痛也小便利病為在表仍當發汗小便不利則病為在裏是太陽病及於本非桂枝證未罷也故加桂加茯苓白朮湯以崇土調營

主治之  
桂枝去桂加茯苓白朮湯 治水積膀胱小便不利脈緩者

茯苓三錢 白芍錢半 白朮錢半 甘草五分 生姜三片 大棗三枚

水煎去渣溫服 表邪誤下胃氣不化而水積膀胱故心下微痛小便不利也表雖不解病為在裏於桂枝湯去桂而君以苓朮姜芍即為利水散邪之用甘棗得効培土制水之功蓋水因中結可利而不可散但得膀胱水去而太陽表裏之邪悉除此崇土調營制水之劑為營虛邪戀小便不利之端方

桂枝加桂湯證

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚氣從小腹上冲心者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯寒氣傷營發為赤核水氣挾木邪上逆是發奔豚之兆從小腹冲心是發奔豚之象此陽不舒而陰反勝必灸核上以散寒邪服桂枝湯以壯心氣更加桂者不特益火之陽且以制木邪而逐水氣

桂枝加桂湯 治燒針迫汗氣從小腹上冲心脈弦緊細者

肉桂越詳 白芍酒炒 桂枝八分 甘草六分 生姜三片 大棗三枚

水煎去渣溫服 燒針迫汗被寒搏而起核從小腹上冲是肝腎氣逆奔豚之象也用桂枝湯解外以消其核更加桂者肉桂以益火之陽而平陰邪之上逆也此和營散邪益火消陰之劑為陽虛表不解而發奔豚之端方

桂枝去姜桂加龍骨牡蠣湯證

傷寒脈浮醫以迫劫汗亡陽必驚狂起卧不安火逆下之因燒針煩躁者桂枝去姜桂加龍骨牡蠣救逆湯主之

傷寒者寒傷君主之陽以火迫劫汗并亡離中之陰是為火逆妄汗亡陰而曰亡陽者以心為陽中之太陽故心之液為陽之汗也心液既亡則神明失養驚而且狂煩躁即驚狂之漸起卧不安之象也急用此湯以安神救逆

桂枝去姜桂加龍骨牡蠣救逆湯 治火逆驚狂起卧不安脈數者

龍骨三錢 牡蠣三錢 甘草五分 白芍錢半 大棗三枚

水煎去渣溫服 火迫劫汗心陽外亡故驚狂煩躁起卧不安也芍藥甘草緩中斂血合大棗補中氣以振營衛之陽龍骨牡蠣鹹以補心安神澀以益陰固脫俾陰陽和平則神明得旨而驚狂煩躁無不自安矣此安神救逆之劑為虛神不守舍之方

蘇子清氣湯證

痰鳴喘欬身熱不眠神昏脇痛赤疹累累脈濡粒數寸滑尺軟此乃風火鼓痰危劇莫甚宜蘇子清氣湯主之

風干肺氣熱入厥陰則木火內熾而金反受困故喘欬痰鳴身熱脇痛神昏不能眠卧也亦疹累累是風火鼓痰勢在危急宜蘇子清氣湯冀効於萬一

蘇子清氣湯 治痰鳴喘欬身熱脇痛不眠脈濡粒數寸滑尺軟者

懷生地五錢 紅蘇子三錢 羚羊角六分 川貝母二錢 苡米仁四錢 白茯苓二錢 白池菊錢半 麩橘紅錢

純狗眼五錢 桑葉錢半

水煎去渣溫服。風火鼓痰喘咳逆不眠故以羚羊池菊清肝火兼益金水生地川貝滋腎水心脾  
威涼鈎藤為柳肝舒絡之用蘇子乃開鬱豁痰之需茯神滲濕安神米仁益脾泮濕橘紅利氣力可除  
痰臭葉肅金並能退熱此降火瘦清火之劑為肝火上逆痰喘咳嗽不眠之端方。

濕痺

太陽病關節疼痛而煩脈沈而細者此名濕痺

濕痺者湯為濕過則煩濕流關節則痛濕為主邪性最凝閉脈亦應而沈細也此太陽傷濕脈證甘草  
附子湯分解之。

桂枝附子湯 治風濕相搏脈浮虛澀者。

甘草八分 附子錢半 桂枝八分 白朮錢半

水煎去渣溫服。火虛濕襲不能化氣制濕而流於關節痺閉不通故肢節疼痛謂之濕痺附子挾陽  
禦濕桂枝祛邪外出牽領白朮甘草分司表裏以培土勝濕也土旺濕除則關節自利而煩痛自除痺  
無不通矣此培土扶陽祛濕之劑為陽虛土弱濕傷在表之端方。

桂枝附子湯證

去桂加白朮湯證

傷寒八九日風濕相搏身體煩疼不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而澀者桂枝附子湯主之若其人大便  
硬小便自利者去桂加白朮湯主之

身體煩疼風濕相搏也不能自轉側樞機不利也不嘔是裏無寒不渴是濕氣勝浮為風澀為濕虛為  
風濕在裡表非虛弱之謂故主桂枝附子湯若其人大便秘小便自利是脾虛不能統運其濕則木勝

乘脾而風淫地下津液無以濡潤腸胃故大便反見燥化而小便自利也病本在脾故去桂加白朮以實脾制濕而風木自平矣

桂枝附子湯 治風濕相搏脉浮虛濡者

桂枝 錢半 附子 錢半 甘草 五分 生姜 三片 大棗 三枚

水煎去渣溫服 風濕襲經營行不利故身體煩疼而不能轉側焉桂枝祛在表之風配附子之苦熱以除濕率領甘草姜棗緩中和營氣則風濕兩邪並可解散矣此祛風勝濕之劑為陽虛襲受風濕之端方

桂枝附子去桂加白朮湯 治濕痺大便硬小便利脉沈濡弱者

白朮 三錢 附子 錢半 甘草 五分 生姜 三片 大棗 三枚

水煎去渣溫服 土虛不能運濕而津氣下流無以滋潤腸胃故大便反硬而小便自利也白朮專主健脾能使濕化而大便實濕流而大便潤附子扶陽行痺氣甘草益氣緩中虛姜棗和營衛散濕邪俾濕化而營氣調和則風邪自無容身之地而煩痛自除矣此扶陽行痺崇土祛濕之劑為陽虛脾氣不化之端方是即白朮附子湯也

甘草附子湯證

風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

風淫於外濕感於中則骨節疼痛不得屈伸惡風不欲去衣也汗出短氣小便不利是化源不清濕從

濕溫

濕溫之為病，蒸熱多汗，足冷神昏，或發斑或發疹，脈濡洪數，舌白砂胎，宜蒼朮白虎湯主之。

陽明濕熱，蒸動少陰之經，則昏熱多汗，足冷遺溺，證勢危劇，脈亦應而洪濡也。宜蒼朮白虎湯分解其邪，使陽化陰施，則足部自溫而斑疹自透矣。

蒼朮白虎湯 治濕溫內蘊發疹發斑脈濡洪數者

蒼朮錢半 石膏五錢 知母錢半 淡豆豉錢半 粉葛根錢半 廣霍梗錢半 白雲神錢二

生石膏五錢 粉甘草五分 肥知母錢半 淡豆豉錢半 粉葛根錢半 廣霍梗錢半 白雲神錢二

水煎去渣溫服 濕熱內滯傷經氣而發疹發斑昏熱多汗，勢非輕淺，故以政葛、胡椒發表，升陽、蒼朮

石、蒸、清、熱、燥、濕、甘、草、緩、中、藿、香、快、胃、茯、神、安、神、滲、濕、青、皮、破、滯、平、肝、佐、知、母、以、潤、燥、存、陰、汗、有、不、徹、邪

有不解者乎，可見從前之汗，由於邪盛而斯時之汗，乃由正氣所化也。此疎熱燥濕之劑，尚為濕溫表

裏不解之劑方

發斑痧疹隱疹疹累水珠論

傷風在表，肺熱而皮膚發疹，傷寒在裡，胃熱而肌肉發斑，斑屬三焦無根之火，疹屬心肺濕熱之火。古論

誠然，惜未細辨也。蓋肺主皮毛，脾主肌肉，風傷肺氣，邪鬱皮膚，發為痧子，顆粒細小，頭夫觸手，風

賊脾元邪，鬱肌腠則發疹子，高聳皮膚，頭圓光滑，風從熱見，疹色多赤，風受濕侵，疹色多白，痧子亦然。

氣血不充，不能鼓邪外出，斑於皮膚之內，肌肉之間，凝眸細審，影影可見，為斑疹。脾肺絡傷，氣不化，濕

發為水珠，觸之即消，略有水痕。脾虛邪鼓，發出紅癩，似疹而根脚散漫，不能成粒，光圓此為疹累，斑

傷風

痧

痧

傷風

痧

痧

屬陽明邪帶熱熾熱傷營血熱聚皮膚之內肌肉之間兩指糊閉愈細愈赤輕如星布重若綿絨是為陽斑 血氣不充虛邪外鼓則四肢脇肋略見數點古稱蚊迹是為虛斑與內傷發斑不殊少火氣衰生陽不振陰邪鬱邊傷營氣而亦令發斑是為隱斑斑色淡紅不若陽斑之明顯 如斑色不純或藍或紫或暗或青或見五色古稱勒蠶癰其實藏氣各異而湯明醞釀之濕熱尤倍於尋常之發斑焉 痲子宜透肌調營兼舒脾肺 隱疹宜舒脾達邪需調營衛切勿誤認未透反損元陰 水珠宜輕揚散邪化氣益脾 疹粟之治與疹無異但須顧慮其虛當見益脾調營務使元氣無傷始能解散 治斑之要首當疎熱存陰微邪扶元此為正治然必細審人之清高重濁藜藿膏粱證之陰陽表裏寒熱虛實當於溫熱門求治此活法也如有所誤則邪陷氣逆變幻莫測矣解表失時則邪入心包而脊冒無知風熱傷陰則邪得深入而厥陰受病筋失滋榮則經脈寧急而搐搦痙厥清尅傷中則邪陷入脾而健運失職泄瀉脹滿邪逼清陽則肺氣抑迫而分布無權寒喘身熱不眠耗散亡陰則腎水枯竭而真元虛憊呼吸之間條然脫絕不治

前胡疎肺飲 治身熱欬嗽發疹發痧 脉弦浮滑者

嫩前胡 錢半

紅蘇子 三錢

皓杏仁 二錢

小青皮 錢半

白茯苓 二錢

生香肉 三錢

荆芥穗 錢半

淨蟬衣 錢半

蒼橋紅 錢半

白葱頭 三枚

水煎去渣溫服

痧疹稠密身熱痰喘咳嗽脉弦浮滑舌潤白胎當此邪感宜主此方溫散之前胡疎

肺散邪兼以消痰下氣橋紅利氣除痰兼以表散風寒蘇子解鬱化痰杏仁疎痰降氣扶神滲濕安神

青皮平肝破滯生查化中州之滯則痧疹自透荆芥疎血分之風則外熱自除蟬衣蛻皮膚之邪而痧

風熱熾當用大力子湯而此方反為矛盾矣。

大力子湯 治溫風熱熾赤疹或斑脉浮數者

大力子三錢 荆芥穗錢半 淡豆豉錢半 淨蠶衣錢半 白茯苓二錢 生芍肉三錢 廣鬱金錢半 廣薤梗錢半

新會皮錢半 西湖柳三錢

水煎去渣溫服 風熱壅盛疹疹不透脉數狂浮舌胎微白當以荆芥疎血分之風淡豉發少陰之汗

大力子解散風熱淨蠶衣善蛻皮膚生查化滯茯神安神新會皮理氣通滯廣薤梗快胃和中廣鬱金

調血氣西湖柳發疹此解散熱之劑為風熱不解之方

前胡發表飲 治寒熱喘欬發熱發斑脉大粒浮滯數者

嫩前胡錢半 粉葛根錢半 淡豆豉錢半 甜桔梗八分 江枳殼錢半 廣鬱金錢半 粉甘草八分 荆芥穗錢半

西湖柳三錢

水煎去渣溫服 風寒外束肺胃熱壅致寒熱無汗喘欬發斑疹前荆降氣疎邪豉葛解肌發表甜桔

梗清咽隔江枳殼瀉滯氣廣鬱金調和血氣粉甘草和緩中州西湖柳以解散發斑疹也此疎邪發表

之劑為發斑疹風寒不解之方

新製犀角地黃湯 治濕熱傷血發斑脉沈濡數者

原生地五錢 烏犀角錢半 黑山桅錢半 牡丹皮錢半 小木通錢半 川貝母二錢 天花粉三錢 薄荷葉錢半

泡生甘草六分 白燈心數莖

水煎去渣溫服 濕熱內蘊傷營氣而身熱發斑脉沈濡數舌燥無津生地滋陰壯水犀角降火清熱

合丹皮並能涼血化斑燈心木通泄熱利水花粉川貝清胃涼心兼能解鬱潤燥山桅清三焦之火曲

屈下行甘草緩中州之氣協和內外薄荷散熱善清頭目也此清熱化班之劑尚為斑熱傷營之劑方  
濕溫一門證緒繁多僅僅四五方似難曲盡病變之妙用然不知此乃疫疔中一證實與濕熱門諸疫  
相通方已具載茲不復贅

葛根湯溫

中暑

太陽中暑者身熱疼重而惡寒脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也

身熱脈微得之傷暑暑傷乎氣也身疼惡寒得之傷寒寒傷乎形也暑為寒鬱陽氣不伸宜疎利調中  
而脈自復合用消暑十全散

消暑十全散 治中暑身熱疼重脈微弱者

香薷穗錢半 紫厚朴錢半 扁豆肉三錢 白朮錢半 粉甘草五分 白雲神二錢 紫蘇葉錢半 新會皮錢

宣木瓜三錢 廣藿香三錢

水煎去渣溫服 寒邪抑暑脾胃受困則身疼重惡寒不休焉薷朴豆苓甘草五物香薷飲也乃治暑

之和劑白朮健脾會皮理氣藿香快胃祛暑紫蘇解表散寒宣州木瓜以消暑和脾耳此健脾散暑之

劑為脾虧傷暑兼挾外邪之劑方

太陽中暑者發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細扎遲小便已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開

前板齒燥若發汗則惡寒甚加溫針則寒熱甚下之則淋

中暑被寒其脈弦細或扎遲其證發熱惡寒身重疼痛總是元氣有暑所傷形體為寒所鬱小便後不

得爽然口開齒燥是暑傷津液之象汗之則表陽愈虛故惡寒反甚火攻則陰津愈竭故發熱愈甚下

之則水行數道而成淋也此補中益氣法霍香靈顯始為合劑耳  
補中益氣湯 治中暑發熱惡寒身重倦怠脈弦細孔遲者

生人參 錢半

綿黃芪 三錢

冬白朮 半

炙甘草 六分

當歸身 三錢

新會皮 錢半

綠升麻 三分

軟柴胡 五

水煎去渣溫服 勞役之人中氣先傷一經中暑則營衛不振而發熱惡寒倦怠重高來茂朮草益  
氣補中當歸會皮理氣養血升麻柴胡升清氣以解表霍香靈顯快中氣以却暑也此補中却暑之劑  
為勞倦人中暑之良方

太陽中暑其人汗出惡寒身熱而渴也

暑氣內傷於藏府寒邪外透於肌膚則惡寒身熱汗出而渴也清暑益氣湯得之矣

清暑益氣湯 治中暑發熱倦怠汗多口渴脈軟微數者

人參 一錢

黃芪 三錢

茅朮 一錢

麥冬 三錢

白朮 半

黃柏 半

五味 六分

當歸 二錢

升麻 三分

葛根 錢半

青皮 炒 半

神麩 炒 半

澤瀉 錢半

會皮 錢半

生薑 三片

大棗 三枚

水煎去渣溫服 勞倦傷脾濕熱不化一經中暑則發熱倦怠汗多口渴渴為參芪益氣固表二朮燥濕

強脾黃柏清熱濟腎水青皮破滯平肝氣當歸養血神麩化積麥冬五味生津液以保肺升麻葛根升

清氣以解肌澤瀉瀉濕熱降濁陰會皮理氣化和中州甘草之甘緩合姜棗之辛甘以調營衛也更以

藿香露煎尤為益氣強脾除濕清暑之高方

痲病

太陽病發汗太多因致痲脈沈而細身熱惡寒頭項強急惡寒時頭熱面赤目脈赤獨頭面搐卒口噤背

反張者痲病也

汗多亡液不轉屬陽明而成瘧者以發汗太驟形身之津液暴脫而胃家津液未乾胃火猶未熾盛也故變見仍是太陽表證當滋陰以急和其裏脈之沈細是營衛陽氣勿得即以為可溫宜炙甘草湯主之

炙甘草湯 治血不榮筋被邪發瘧脈沉細數者

人參錢半 炙草錢半 麥冬三錢 生地五錢 桂枝三分 阿膠三錢 麻仁三錢 大棗三枚 生姜三片

入酒一杯煎去渣溫服 血氣兩虧不能滋榮經脈一經外邪過熱則陰液愈虛遂致角弓反張口噤頭搖謂之發瘧生地為君以滋陰血麥冬為臣以生津液炙草為佐以益氣也大劑滋陰反以甘草名方者取其留德膈中葢藥補虛以安神明神明莫位則血脈清和而瘧自平矣然涼寒之品無以奉發陳蕃秀之機必須人參桂枝佐麥冬以通脈葉能托解外邪姜棗佐甘草以和營亦是調和脾胃膠麻佐地黃補血脈甘草不使速下清酒引之上行且地黃麥冬得酒力而更優也


剛柔瘧證


大陰病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔瘧

此以表氣之虛實分剛柔推其本而名之即可知其人受病輕重靈氣強弱而為之施治庶無差謬也柔瘧炙甘草湯剛瘧桂枝加葛根湯

炙甘草湯見前

桂枝加葛根湯即桂枝湯加葛根桂枝湯見中風





陽明病提綱

陽明之為病胃家實也

陽明屬胃胃實為陽明病根有實於未病之先者有實於得病之後者有風寒外束熱不得越而實者有妄汗吐下重亡津液而實者有本經熱感而實者有他經轉屬而實者此只舉病根胃實外證

陽明病外證身熱汗自出不惡寒反惡熱也

胃家實外證身蒸蒸然裡熱熾而達於外汗濺濺然從內溢而無止息表寒已散故不惡寒裡熱閉結故反惡熱只因胃家實之病根即見身熱自汗之外證不惡寒反惡熱之病情非即可下之證必讎語潮熱煩躁痛脹繞可下耳

陽明病證脈

陽明病脈浮而緊者必潮熱發作有時脈浮者必盜汗出

潮熱有時脈浮而緊是浮為熱熾緊非為寒盜汗為營虛熱迫故脈必浮而不兼他象

傷寒三日陽明脈大

脈大者兩陽合明內外皆陽之象陽明初受表邪脈但浮而未大與太陽同三日來熱自裡發熱勢太盛故脈亦應而洪大也

脈浮而大心下反硬有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者不令溲數溲數則大便硬汗多則熱愈汗少則便難脈遲尚未可攻陽明主津液所生病津液乾則胃家實故禁汗並溲夫脈之浮緊浮緩浮數浮遲皆不可攻而可汗此浮而大反不可汗而可攻者以此為陽明三日之脈當知大為病進不可拘浮為

在表也。心下者胃心。心下硬已見胃實。一斑以表脈不當見裡證。故曰反硬有熱屬藏。是指心肺有熱。攻之謂攻其熱不令者。禁止之辭。屬府指膀胱。膀胱熱故洩數不令。處見當滋陰之義。汗出多亡津液而大便硬即汗出少亦未免大便硬而難出其利於急攻可知。若脈遲則使非藏熱而浮大皆為虛脈矣。正以發明心下硬一證有無熱屬藏為妄攻其熱者禁耳。

不可下證

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

嘔多者是水氣在上。傷而津液未乾也。胃家雖實。慎不可攻。攻之恐利遂不止。腹滿嘔吐。是太陰陽明相關證。胃實胃虛是陽明太陰分別處。要知胃家實雖變證百出。不失為生陽下利不止。參附不能挽回。便是死陰也。

誤汗便艱證

陽明病自汗出。若發汗。小便自利。此為津液內竭。大便雖硬不可攻之。當須自欲大便時。宜蜜煎導而通之。若土瓜根及大猪膽汁。皆可為導。

汗出溼利而更發其汗。乃胃中津液兩竭。必大便硬而難出。是內燥而非內熱也。只須外潤。不可內攻。於自欲大便時。因蜜煎導而通之。被熱者。土瓜根大猪胆汁。皆可為導。

蜜煎導 治陽明無熱胃虛便閉脈沈者

白蜜七合 銅器內煎熬如飴。攪之勿令焦着。可丸。捻作挺。頭銳如指。大長二寸許。乘熱納穀道。欲大便去之。

胃虛腸結燥閉不通。故宜甘以緩之。酒以通之。是陽明無熱而胃虛便閉者。法當需此通導。則腸結解。

而胃氣未傷也

大猪胆一枚 瀉汁少許入醋納穀道中。食頃當大便。

腸結有火胃家有實故宜猪胆之苦以泄之。寒以瀉之是胃本無火腸結挾熱者需此外導以通泄之。則腸熱化而胃不寒也。土瓜根導亦不出苦寒通導腸結之義。

陽明傷寒證

病有得之一日不發熱而惡寒者雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也。

陽明自受寒邪一日惡寒與太陽同至二日寒化熱熾即自汗出而惡熱也。若從他經轉屬必常在六七日而不在一二日間。

陽明病機

陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也。

陽明受寒始雖惡寒二日自止蓋胃為戊土位處中央表裏寒熱之邪無所不歸無所不化皆從燥化而為實實則無所復傳所以為陽明之病根也。

太陽轉屬證

太陽病若發汗若下若利小便亡津液胃中乾燥因轉屬陽明胃實大便難此為陽明也。此太陽轉屬陽明之病因有亡津液之病機故成此胃家實之病根也。

本經成實證

傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濺濺然者是轉屬陽明也。

胃實之病機在汗出多病情在不能食。初因寒邪外束故發熱無汗繼而胃陽中發故反汗多而嘔不

能食是病在陽明而成實也

太陰轉屬證

傷寒脈浮緩手足自溫者繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便硬者為陽明病也

太陰轉屬陽明者病機在小便小便不利是津液不行而濕土受病病仍在太陰身當發黃若小便自利則津液越出而轉屬陽明為燥土受病故大便當硬也

陽結陰結證

其脈浮而數能食不能便者此為實名曰陽結也期十七日當劇其脈沈而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結也期十四日當劇

脈浮數為陽盛陽盛於胃者名陽結脈沈遲為陰盛陰盛於胃者名陰結陽結能食不大便陰結不能食能大便陽結期十七日劇陽主進合乎陽數之奇陰結期十四日劇陰主退合乎陰數之便能食者過期不能食者不及期蓋陽結即是胃實陰結無表證當屬之少陰不可以身重不能食為陽明而不敢溫補也

陽明桂枝證

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

營虛受邪腠理不密故汗出多而微惡寒純是表氣虛寒汗出惡寒同太陽桂枝證以脈遲乃知病在陽明也惡寒微則發熱亦微宜桂枝湯啜熱稀粥法和營散邪則汗更出而營氣和邪自解矣

桂枝湯凡前

陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

表有風寒脈必浮盛有力無汗而喘者邪感外來氣鬱不伸也麻黃湯發汗則汗出而邪外解陽氣和喘自平而脈自斂矣脈證全同太陽而曰陽明者不頭痛項強故耳

麻黃湯見傷寒

小青龍湯合吳茱萸湯證

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛

小便利者裡無熱反無汗者表有汗頭痛厥逆必因嘔欬是表裡虛寒胃陽不伸而迫肺上干也小青龍合吳茱萸湯兩解表裡之邪則嘔欬而厥逆頭痛自平矣

小青龍湯見傷寒

吳茱萸湯見少陰

衄血證

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄

陽明氣血俱多主津液所生病津液內竭故口燥欲漱水但熱迫血分而不在胃中故不欲嚥水而衄血可必是病陽明之經絡也宜犀角地黃湯清降之

犀角地黃湯見溫病

脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄

鼻燥發熱為熱傷陽明之經能食口乾是熱迫陽明之胃表裡交蒸必浮盛有力而血熱於胃為

熱迫鼓衄血也。桃仁承氣湯散而逐之。

桃仁承氣湯

見太陽畜血

傷寒四五日脈沈而喘滿沈為在裏而反發其汗津液越出大便為難。表虛裡實久則譫語。

喘而胸滿必脈浮者病在表可發汗。今脈沈為在裡則喘滿皆屬於裡傷寒四五日正陽明將陷之候反發其汗而津液越出則轉屬陽明而成胃實使難譫語。所由來調胃承氣少和之條中久則譫語當作實則譫語此傳寫之誤。

調胃承氣湯

見陽明中風

發汗多若重發汗者亡其陽譫語脈短者死脈自和者不死。

陰汗太多津液越出則離中之陰大虛而陽亦外亡故神明失措而亦作譫語也。脈短為元陰將脫不勝收攝故死脈自和為脈有胃氣是知不死安神救逆即可生。酸棗仁湯滋養心液以安神明也。

酸棗仁湯

治亡陽譫語脈緩微數者

酸棗仁

三錢

懷生地

五錢

麥冬

三錢

肉桂

三錢

甘草

五錢

炒

牡蠣

三錢

炙甘草

五錢

炒

甘草

五錢

炒

甘草

五錢

水煎去渣溫服

汗發多則心液虛心陽外亡故譫語也。亡陰而曰亡陽者以心之液為陽之汗。棗仁

養心茯神安心所以奠神明之主。阿膠益血白芍斂陰所以振神明之用。生地麥冬滋既亡之陰。牡蠣五味收浮越之陽。炙甘草緩中益氣竹瀝養液化癢俾陰液內充則虛陽自斂而神明自安譫語自寤矣。

譫語直視喘滿者死下利者亦死。

譫語因於陽盛不是死證若譫語直視目不轉睛是藏府之精氣將絕即喘而不休肺氣已絕滿而不運。

夫實則讖語虛則鄭聲鄭聲重語也

邪氣感則實實則讖語言非誕妄與發狂不同自有一種莊嚴之狀正氣奪則虛虛則鄭聲語言婉轉與讖語不同自有一種必欲有求之狀故仲景以重語釋之乃見有鄭重其事而不忽其言也

熱入血室證

陽明病下血讖語者此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之澱然汗出則愈

熱鬱陽明陷入血室血下則陽熱上浮而神明被擾故神讖無主語言讖妄也但頭汗出刺期門期門乃肝之募瀉其熱而通其經則汗得通身而畜熱外泄下血自止而讖語無不自已黑膏施歧法亦可以已

梔子豉湯 治陽明挾熱脈弦長者

梔子三錢淡豉三錢

水煎去渣溫服 胃熱乘肝陷入血室故下血讖語為邪熱入於血室也梔子除內煩淡豉泄外熱君以黑膏則陽明之血熱自解而讖語自止矣

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇苦滿如結胸狀讖語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之

中風經至發熱惡寒當先解其外至七八日熱除身涼反胸脇滿而非結胸發讖語而非胃實脈遲為在藏是血結於肝而堵塞神明也此為熱入血室刺期門以瀉結除滿則結血化而讖語自已小柴胡加赤芍生地亦已

小柴胡湯見少陽

婦人傷寒發熱經水適來晝則明了夜則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上下焦必自愈。傷寒發熱見婦人中風傷寒皆有熱入血室證發熱不惡寒是病在陽明譫語不因胃實是肝虛魂不安而妄見故如見鬼狀病在血分故晝則明了夜則誕妄也不得妄下以傷中焦之胃氣亦不得妄汗以傷上焦之清陽刺之出血以傷下焦之真陰當養血清魂而譫語自已黑逍遙合舉經古拜散主之。黑逍遙散 治熱入血室脈數狂虛者

懷生地

錢五

軟柴胡

錢半

當歸身

錢三

白朮

錢半

白雲神

錢二

粉甘草

錢五

水煎去渣溫服

血熱加梔丹

傷寒經至血虛邪熱陷於血室故晝則明了夜則譫語凡鬼亦為熱

入血室歸芍斂陰養血尤草健中生血柴胡升陽散熱肝木得遂條達之性茯神滲熱安神心氣亦致

和平之德生地黃滋陰益血腎水有既濟之功炒荷葉升陽和血肝陰有轉舒之妙俾水潤木榮心脾得滋養之力更合黑荆則血室清而魂自藏外熱解而譫語自已又益梔丹以平血中之熱何患邪有

解熱猶陷入血室乎

舉經古拜散

治崩漏吐衄脈浮者

荆芥穗

炒黑

為末水調三錢亦可入煎劑

經受外邪遏熱迫血故血從諸竅溢出宜隨上下以酌湯治之荆芥理

血疎風炒黑炭入血分力能和血止血以疎血中之邪炭止吐衄崩漏挾邪之血因方製劑無不獲效

陽明中風證

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小使難也

從口裏寒脈浮而緊同太陽麻黃證口苦咽乾又似太陽少陽合病更兼腹滿又似太陽太陰合病何以名為陽明中風耶以無頭項強痛則不屬太陽不耳聾目赤則不屬少陽不腹痛自利則不屬太陰是知口為胃竅咽為胃門腹為胃室喘為胃病無疑今雖惡寒二日自止脈之浮緊亦陽明潮熱有時之候此陽明初病在裏之表若以腹滿為胃實而下之則腹更滿而小便難大便反易矣當以小柴胡合梔豉湯主之

小柴胡湯見少陽

梔豉湯見前熱入血室證

陽明中風脈弦浮大而短氣腹部滿脇下至心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身疼面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈弦浮者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治

中風二字便藏表熱在內刺之是刺足陽明隨其實而瀉之脈弦浮者向之浮大減小而弦尚存故可與小柴胡以解外脈但浮而不弦大則非陽明少陽脈無餘證則諸證悉罷惟太陽之表未散故可與麻黃湯以解外若不尿腹滿加噦此是內不解小便難者竟至不尿是化源已絕也腹部滿者竟不減脾氣敗而不運也時時噦者更加噦而胃氣敗絕均不可治也此陽明中風之劇者兼太陽少陽兩經證

小柴胡湯見少陽

麻黃湯見太陽

陽明中寒證

陽明病若能食名中風不能食名中寒

風為陽邪故能食寒為陰邪故不能食以能食不能食別風寒亦以見陽明之虛實也此陽明初受表邪先辨胃家虛實為診家着眼處

陽明病若中寒不能食小便不利手足濇然汗出此欲作固瘕必大便初硬後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也

胃陽盛則中熱而消穀胃陽虛則中寒而不能食固瘕即初硬後溏之謂也胃中雖固結而腸中不全乾也溏即水穀不別之故胃中寒不能化液故小便不利胃中虛不能攝液故手足濇然汗出耳理中湯加烏梅以溫理之

理中湯見太陰

陽明病脈遲腹滿食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也

食難用飽因於腹滿腹滿因於小便難頭眩又因於食飽耳此胃虛寒溼過濕於中故食入則胃氣不化而煩清湯下升而眩濁陰不降而腹滿小便難也身體盡黃名曰穀疸不用五苓合枳實理中而反以茵陳湯下之則脈遲為在藏脾氣愈傷故腹滿不減而如故

五苓散 見太陰

枳實理中湯 治穀疸腹滿脈遲者

於潯丸鹹半小枳實炒八分炮姜炭分白茯苓三錢甘草炙

水煎去渣溫服 胃虛寒伏過濕於中則中氣不化而腹滿小便難故身體淡黃名曰穀疸於木健脾枳實破滯炮姜合草灰溫中氣以化濕祛寒茯苓佐草灰滲脾濕以安中除滿也必偶之以五苓則清

傷寒論  
茵陳湯即茵陳蒿湯見於熱利黃

除中證

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲為寒今與黃芩湯復徹其熱腹中應冷當不能食今反能食此為除中必死

傷寒是熱發於表脈遲為寒伏於中與黃芩湯復徹在表之內熱則熱去而寒起胃陽不支饑穀氣以自救反能食者名除中必死不能食者為寒中宜桂枝人參湯溫之

桂枝人參湯見太陽

梔子豉湯證

陽明病脈浮而緊咽躁口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤而譫語若加燒針心忪惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之

此陽明半表裡證邪已入腹不在營衛之間故妄汗則腎液虛而發躁心液亡而憤憤且胃亡津液則無以榮潤腸府而大便秘硬譫語身重若溫針則心恐懼而忪惕煩躁不得眠也下之則胃中空虛客氣動膈故心中懊憹不安脈雖浮緊舌有胎是心中畜熱不散宜梔子豉湯兩解表裡之邪外而自汗惡熱身重可除內而喘滿咽乾口苦自解矣

梔子豉湯見熱入血室

白虎加人參湯

若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之

燥渴欲飲水是熱已入胃用白虎加人參湯瀉胃火而扶元氣

白虎加人參湯 治燥渴飲水舌燥口乾脈洪大者

石膏五錢人參八錢甘草五錢知母三錢粳米一握

水煎去渣溫服 胃熱熾盛津液頓亡故脈洪大大煩大渴欲飲水數升也生石膏大寒瀉胃火而津液生肥知母辛寒泄肺火以潤腎燥甘草緩寒藥之性用為舟楫而沈降之性始得留戀於胃粳米奠安中宮培形氣而生津液使陰寒之品庶無傷損脾胃之虞更加人參者以氣為水母於大寒劑中扶元氣生津血也此湯入胃輸脾歸肺則津液四布而胃熱頓除大煩大渴可解脈之洪大亦無不飲矣

豬苓湯證

若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主之

脈浮渴飲是熱已傷陰發熱小便不利乃濕熱瀆於水府也用豬苓湯益陰化氣則熱渴解而小便自利矣

豬苓湯 治發熱口渴小便不利脈浮者

豬苓三錢茯苓三錢澤瀉三錢白朮三錢滑石三錢阿膠五錢

水煎去渣納膠溶和服 發熱渴飲小便不利是濕熱內淫陰津虧少不能上奉以退熱也豬苓茯苓滲濕化氣理水之源澤瀉滑石滲瀉利水清水之用阿膠乃血氣之屬是精不足者補之以味以此滋陰利水則水升火降而小便無不利熱渴無不除矣

梔子豉湯證

梔子甘草湯證

梔子生薑豉湯證

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊懣梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯主之

虛煩是陽明之壞病懊懣一證以概憤懣怵惕是虛煩之象反覆顛倒切肖不得眠之狀心居胃上即陽明之表此心病皆為陽明表邪故製梔子豉湯因而越之若少氣加甘草以益氣若嘔加生姜以散邪是從虛煩中細細別出

梔子豉湯見熱入血室

梔子甘草豉湯 治虛煩少氣脈浮數者

梔子枳澁豉枳甘草糝

水煎去渣溫服 虛煩是熱乘心膈少氣是熱傷氣化此病在胸中乃陽明裏之表證梔子苦能泄熱寒能勝熱其形象心色赤通心故主治心中上下一切證豆形象腎色黑通腎製而為豉輕浮上行能使心腹之濁邪上出於口外散於肌肉也一吐而心腹得舒則表裏之煩熱悉除熱傷氣者少氣加甘草以益氣而氣自調耳

梔子生薑豉湯 治虛煩多嘔脈數弦浮者

梔子枳澁豉枳生薑分

水煎去渣溫服 虛熱相搏者胃氣不順而多嘔加生姜以散逆止嘔而虛熱自平胃氣自調嘔無不除矣

梔子乾姜湯

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之

攻裏不遠寒用寒藥大下之寒氣留中可知心微煩而身熱不去裏寒格熱之象也梔子乾薑湯主治之

梔子乾薑湯 治身熱微煩脉沈者

梔子獨半乾薑二錢

水煎去渣溫服 裏寒格熱故心中煩而身熱不去乃誤下之變也用梔子以解內煩倍乾薑以逐裡寒而表熱自散

梔子厚朴湯證

傷寒下後心煩膈滿起臥不安者梔子厚朴湯主之

心煩則難臥腹滿則難起起臥不安是心熱移胃與反腹顛倒之虛煩不同梔子厚朴湯主治之

梔子厚朴湯 治心煩腹滿起臥不安脉弦者

梔子三錢厚朴錢半枳實錢半

水煎去渣溫服 邪熱內乘中氣不化故心煩腹滿起臥不安是太陰陽明相關證也梔子以治煩枳實以泄滿此兩解心腹之劑不承氣之先着歟

梔子柏皮湯證

傷寒身熱發黃者梔子柏皮湯主之

寒傷於表陽氣拂鬱則汗不得出熱不得越而發黃者是胃火蒸騰於經絡黃色外見於皮膚也斯時

梔子<sup>三</sup>柏皮<sup>五</sup>甘草<sup>五分</sup>

水煎去渣溫服。內熱蒸騰表氣拂鬱則熱瘀經絡而汗不得出熱不得越故發黃也梔子以治內煩。

柏皮以泄外熱甘草和中則熱解氣調而黃自退矣。

凡用梔子湯病人舊微溼者不可與服之。

向來胃氣不實雖梔子亦當禁用。

瓜蒂散證

病如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞硬氣上冲咽喉不得息者此為胸有寒也當吐之宜瓜蒂散。

病如桂枝證但頭不痛項不強使非太陽中風證未經汗下而胸中痞硬更非結胸瀉心是邪中於面則入陽明故寸脈微浮鼻鳴發熱汗出惡風者似病在表之表乃病在胸中氣上冲不得息而又邪中於膈亦入陽明是病在裡之表則胸寒結而不散胃陽鬱而不伸故用瓜蒂散因而越之胃陽得升寒邪自散得裡之表和而表之表亦解矣。

瓜蒂散 治胸中痞硬寸脈微浮者。

赤小豆<sup>再</sup>甜瓜蒂<sup>兩</sup>

別搗篩合治之以三錢用豉一兩者稀糜去渣取汁和散溫服得吐乃止亡血虛家不可與邪結陽明心氣不降故胸中痞硬氣上冲咽喉不得息也瓜蒂色青象東方甲木之化得春升生發之機能提胃中陽氣除胸中實邪為吐劑中第一品其性走而不守必得穀氣以和之赤小豆象心甘酸可以保心。

氣黑豆象腎製而為鼓能令腎家之精氣上交於心胸中之濁氣外出於口快吐而不致傷脾奏功之捷勝於汗下也

#### 四逆湯證

少陰病飲食入口則吐心中溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之宜四逆湯

飲食入口即吐原非少陰虛寒心下溫欲吐溫上則復不能吐此寒結胸中熱蓄心下宜瓜蒂散因其高而越之則邪從吐解矣若膈上有寒飲與心下溫不同反乾嘔與飲食即吐不同宜四逆湯溫之可知手足寒脈弦遲有心溫膈寒二證治分天壤診家須着眼

#### 四逆湯見少陰

太陽病當發熱惡寒今自汗出不惡寒發熱關上脈細數者以醫吐之過也此為小逆一二日吐之春腹中飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也

太陽病當發汗而反吐之則膈氣內傷自汗反出關上脈細數也惡寒發熱雖除頭項強痛仍在猶未至不能飲食尚為小逆一二日熱正在表誤吐而邪未盡陷飢不能食三四日熱發於裡誤吐而胃陽已亡不喜穀食反喜瓜果是為陰中朝食暮吐此為大逆

#### 白虎湯證

傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之

脈浮發熱無汗是傷寒之表未解故不可清火若外熱已解是無表證渴欲飲水熱已內攻當用白虎加人參是瀉火而益元氣也俾火熱自化則煩渴自除矣

白虎加人參湯見前  
服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之

大汗出後表邪已解大煩渴脈洪大是裡熱已熾用白虎加人參乃瀉火益元而止煩渴也

白虎加人參湯見前

傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之

表無大熱見微熱猶在背微惡寒見惡寒將罷口燥心煩渴欲飲水此表邪將解已輕裡熱熾已甚急用白虎加人參則裏和而表自解矣

白虎加人參湯見前

傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裡表裡俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

傷寒七八日不解是當汗不汗而反行吐下津液頓亡表雖不解裡熱已甚也表裡俱熱是太陽陽明併病然時時惡風則有時不惡表亦將解與背微惡寒同煩躁舌乾大渴為陽明證欲飲水數升者是熱甚而津液大傷急當救裡以存津液當用白虎加人參則裡和而表自解故不須兩解之法

白虎加人參湯見前

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢遺尿發汗則譫語下之則額上出汗手足冷若自汗出者白虎湯主之

此陽明病而畧兼太少胃氣不運故腹滿無氣以動故身重難以轉側是少陽樞機不利津液不行於口故口不仁陽氣不行於面故面垢耳遺尿者膀胱不約也雖三陽合病而陽明居多汗則津竭而

譏語妄下則亡陽而頭汗厥冷自汗出為內熱所蒸必須渴脈洪可用白虎而諸證悉平玩無氣身重則白虎湯中不當去參無疑此亦傳寫之誤

白虎湯凡前不知人參即是

傷寒脈滑而厥者裡有熱也白虎湯主之

厥而脈滑病屬傷寒是邪熱閉結於裡陽氣不行於表也此陽極似陰之證全憑脈以辨之然必煩渴引飲能食大便難乃可用白虎湯以解之

白虎湯見前

茵陳蒿湯證

陽明病發熱汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還腹滿小便不利渴飲水漿此為瘀熱在裡身必發黃茵陳蒿湯主之

陽明多汗汗出則熱得外泄不能發黃也但頭汗劑頸身無汗則熱不得越腹滿小便不利渴飲水漿是瘀熱在裡不化故身必發黃也宜茵陳蒿湯通大便而瘀熱自化利小便而發黃自退矣

茵陳蒿湯 治瘀熱發黃脈沈數者

茵陳 三錢 大黃 三錢 梔子 三錢

水煎去渣溫服 大便秘腹自減尿如皂角汁狀色正赤黃從小便去

陽明瘀熱在裏熱不得越故腹滿便難身必發黃也茵陳蒿湯應過冬霜之氣能除瘀熱留結佐梔子以通水源而小便利大黃湯滌胃熱令瘀熱從大便泄則小便亦快而腹滿無不減發黃無不退矣此亦利而渴之法

傷寒發汗已自為黃所以然者以寒濕在裡不解故也不可下於寒濕中求之

傷寒固宜發汗發之而身自反黃者熱解而寒濕不解也身自黃而面不黃以此知繫在太陰當溫中散寒而除濕於真武五苓輩求之

真武湯見少陰

五苓散見太陽

承氣湯證

傷寒下大便六七日不惡寒反惡熱頭痛身熱者與承氣湯

得病便不大便見胃家先已挾實至六七日頭痛身熱不解不惡寒反惡熱乃陽邪更實於裡是太陽陽明合病已屆經盡之期可與調胃承氣湯攻其裡而表自解不必慮頭痛身熱為有表也

調胃承氣湯 治頭痛身熱惡熱使閉脈沈實數者

大黃三錢 炙甘草錢半 芒硝錢半

水煎去渣少少溫服得汗利為度 兩陽合病邪熱已實於裡故頭痛身熱惡熱使閉為表裡俱熱也大黃瀉熱以通地道芒硝瀉實以潤燥結炙甘草緩中以益胃氣推陳之中仍寓致新之意一攻一緩調胃之法備矣胃調則諸氣皆順而兩經之邪熱無不自解故亦以承氣名之也

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡發熱者屬陽明也脈實者宜下之與承氣湯

煩熱有汗似太陽欲解寒熱如瘧似少陽欲解繼而日晡潮熱此為轉屬陽明也脈已沈實可與調承

氣湯下之當與六七日不大便參看

調胃承氣湯見前

太陽病三日發汗不解頭不痛項不強不惡寒反惡熱蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之

病甫三日已經發汗邪氣得泄則發熱當解而不解是內熱反熾必其人胃陽素旺因發汗亡津液而轉屬陽明也故頭不痛項不強見太陽證已罷不惡寒反惡熱是陽明證已著可與調胃承氣湯調其胃而蒸熱自解要知日數不必拘當在脈證上講求

調胃承氣湯見前

若胃氣不和讞語者少與調胃承氣湯

讞語是胃熱所發調胃承氣乃下其熱而讞語自己少與者即調之之法

調胃承氣湯見前

小承氣湯證

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因硬者小承氣湯和之愈

太陽之壞病而轉屬陽明微煩小便數大便尚不當硬因妄治亡津液而然故用小承氣以潤其燥而

和其胃也

小承氣湯 治大便微煩脈弦實數者

大黃三兩 厚朴六兩

棗實

水煎去渣溫服得大便勿再服

太陽病不解因治壞而轉屬陽明故微煩小便數大便因硬而閉塞

不通也大黃通地道枳實消痞實厚朴除脹滿名之曰小味少力緩製小其服耳

大承氣湯證

六日與承氣湯一升。若不大便六七日，小便少者，雖不能食，但初頭硬後必溏，未定成硬，攻之必瀉。須小便利，屎定硬乃可攻之。宜大承氣湯。

得病二三日，尚在三陽之界，脈弱恐為無陽，無太陽少陽證，則病不在表而煩躁心下硬是陽邪已入陽明之裡。四五日尚能食，則胃中無寒而使硬可知。少與小承氣微和胃氣，令煩躁少安，不竟除之者，以脈弱恐大便易動故也。六日後與小承氣，而七日仍不大便，脈必不弱，是為胃家實之小驍。小便若少，雖不能食，為胃有燥屎，恐津液還入胃中，但初頭硬後必溏，得小便利，屎定硬乃可用大承氣下之。下之若早，語言必亂，以脈弱為太陽中風，能食為陽明中風也。

大承氣湯 治腹脹小便利，屎定硬，脈實數大者。

大黃<sup>三</sup>厚朴<sup>三</sup>芒硝<sup>三</sup>枳實<sup>三</sup>

水煎去滓，溫服，得下勿再服。病六七日不大便，堅實，腹脹及譫語潮熱煩渴，均宜以此攻之。大黃湯

滌熱實芒硝軟硬攻堅，枳實消痞厚朴除滿，承氣曰大味多力，猛製大其服也。

陽明病，脈遲微汗出不惡寒者，其身必重，短氣腹滿而喘，有潮熱者，此外欲解，可攻裏也。手足濇然而汗出者，此大便已硬也。大承氣湯主之。若汗多微發熱惡寒者，外未解也。其熱不潮，不可與承氣湯。若腹大滿不通者，可與小承氣湯，微和胃氣，勿令大泄下。

脈遲未可攻，恐為無陽，恐為在藏，故必表證悉罷裏證畢，其方可大承氣攻下。汗出多而微惡寒者是表證仍在，雖大滿不通，只可小承氣微和胃氣，勿令大泄下。胃實諸證以手足汗出為可據，而潮熱尤為親切。

大承氣湯見前

小承氣湯見前

陽明病潮熱大便硬者可與大承氣湯不硬者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯入腸中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初頭硬後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便硬而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可與也

此必因脈之遲弱即潮熱尚不足據又立試法如無燥屎而攻之則胃家虛脹而不能食故雖潮熱便硬而少也要知不轉失氣者即渴欲飲水而不可與況攻下乎以小承氣為攻仍以小承氣為和總是慎用大承氣耳

大承氣湯同小承氣湯俱見前

陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣者勿更與之明日不大便脈反微瀯者裡虛也為難治不可更與承氣湯也

脈滑而疾為有宿食譫語潮熱下證已具與小承氣湯試之不轉失氣者宜為易動明日仍不大便乃胃家似實而脈反微瀯是陽證反見陰脈元氣衰而邪不受製也故為難治

小承氣湯見前

傷寒若吐若下後不解不大便五六日至十餘日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人脣衣摸床惕而不安微喘直視脈弦者生瀯者死微者但發熱譫語大承氣主之若一服利止後

服

脈辨其虛實。弦脈象長是邪氣實不失為下證。故生滯脈象短是正氣虛不勝更下。故死。如見鬼狀。獨語與鄭聲。讖語不同。乃邪氣盛而神明不治耳。潮熱不大便。不惡寒。是邪實於胃。尚為可下。自旦視不識人。循衣摸床。此潮熱時事。故勿斷為死。而以大承氣湯下之。則病從下解矣。

大承氣湯見前

陽明病。其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必硬。硬則讖語。小承氣湯主之。若一服讖語止。更莫復服。陽明主津液所生病。故陽明病。必多汗。多汗是胃燥之因。使硬是讖語之由。一服讖語止。大便雖未利。而胃家濡潤。可知承氣雖小。不必更服。以傷胃氣也。

小承氣湯見前

下利讖語者。有燥屎也。宜小承氣湯。

下利是大腸虛。讖語是胃氣實。胃實腸虛。只須大黃以攻實。無庸芒硝以軟堅也。故宜小承氣湯。

小承氣湯見前

汗出讖語者。以有燥屎在胃中。此為風也。須下之。過經而可下之。若早。語言必亂。表虛裡實故也。下之則愈。宜大承氣湯。

汗多亡津。胃實則讖語。以有燥屎在胃中。而本於中風。過經乃可下之。下之若早。表以早下而虛熱不解。裡以早下而胃家不實。如十三日不解。過經下利而讖語。日晡潮熱。脈實沈數者。宜大承氣下之。而讖語自已。

大承氣湯見前

陽明病譏語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也宜大承氣湯下之若能食者但硬耳  
初能食反不能食胃實可知若能食大便硬是腸實而胃未實恐本中風未可下也譏語潮熱單見始  
宜大承氣下之耳

大承氣湯見前

病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎故也五六日不大便是陽邪已入於胃二腸附  
臍故繞臍痛以有燥屎故也煩躁有時謂日晡潮熱之時當下之宜大承氣湯

大承氣湯見前

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者以本有宿食故也宜大承氣湯  
得病時本有宿食故大下之後仍能大實痛隨刺減故宜大承氣湯

大承氣湯見前

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

下後無變證則非不當下腹滿不減下之未盡也當更下之宜大承氣湯

大承氣湯見前

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯

表雖不解邪甚於裡急當攻裡故宜大承氣湯裡和而表自解矣

大承氣湯見前

二陽併病見太陽證罷但發潮熱手足濇澀汗出大便硬而譏語吞下之則愈宜大承氣湯

二陽併病見太陽未罷時便有可下之證今太陽已罷則種種皆陽明下證也宜大承氣湯

陽明病發熱汗多者即下之宜大承氣湯

發熱汗多恐其亡陽當急下以存津液宜大承湯則裏和而熱解汗自止矣

大承氣湯見前

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯

傷寒七日不愈陽邪已實於裏自不了了由睛不和身微熱見大便已去無表證也不煩躁口渴是無裏證惟大便難為胃實胃家既實必濁邪上升清氣閉塞大承氣急下之則濁陰出下竅清陽走上竅矣

大承氣湯見前

少陰病得之二三日不大便口燥咽乾者急下之宜大承氣湯

熱淫於內腎水枯涸因轉屬陽明胃火上炎故口燥咽乾急下之則火歸於坎而津液自升大便自潤矣此若非本有宿食何得二三日便當急下如此

大承氣湯見前

少陰病自利清水色純青心下必痛口燥舌乾者急下之宜大承氣湯

自利而渴者屬少陰自利清水時必心下痛必口燥舌乾是土燥火炎水去而穀不去母病及子故色純青也大承氣急下之雖是通因通用其實仍是通因塞用

大承氣湯見前

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯

六七日當解不解因轉屬陽明是藏氣實而不能入則還之於府急攻之所謂已入於府者可下也  
大承氣湯見前

傷寒約編卷三

少陽病提綱

少陽之為病口苦咽乾目眩也

少陰居半表半裏口咽目不可謂表不可謂裡是表入裡裡出表也正是半表半裡開之可見合之不  
見恰合樞机之象為少陽一經之綱領苦乾眩三者皆相火上走空竅而為病蕪風寒雜病言但見一  
證即是不必悉具

少陽傷寒證

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語此屬胃不和則愈胃不和則煩而躁  
少陽初受寒邪病全在表故頭痛發熱與五六日而往來寒熱之半表不同弦為春脈細則少陽初出  
之象少陽少血不可發汗發汗則津液越出必胃燥而譫語若兼煩躁則為胃實矣

少陽中風證

少陽中風兩耳無所聞目赤胸滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚

少陽經絡繫於耳會於頭循於胸中為風木主相火風中其經則風動火炎故耳聾目赤胸滿而煩也

少陽主膽膽無出入津液重亡胆虛心亦虛故悸膽虛肝亦虛則驚雖不言脈可知其必弦而浮

少陽病欲罷脈

傷寒三日少陽脈小者欲已也

罷車

太陽少陽併病

太陽與少陽併病脈弦頭項強痛或眩暈時如結胸心下痞硬者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗則譫語若譫語不止當刺期門

脈弦屬少陽頭項強痛屬太陽弦胃結胸心下痞則兩陽之併病也病在經脈非刺法不足以言巧肺俞屬太陽肝俞屬少陽刺之則兩經之邪並解若妄汗則津液越出必胃燥而譫語宜肅胆腑以解兩經之邪柴胡桂湯加牡蠣主之

柴胡桂枝湯見太陽中風

太陽少陽併病而反下之或結胸心下硬下利不止水漿不下其人心煩

併病在兩陽而反下之如結胸者成真結胸結胸法當下今下利不止水漿不入是陽明閤病於下太陽開病於上少陽樞機無主其人心煩正是結胸證具煩躁者反也

小柴胡湯證

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿噤然不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞硬或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡湯主之

少陽自受寒邪陽氣衰少既不能退寒又不能發熱至五六日鬱熱內發始與寒氣相爭而往來寒熱一也若太陽傷寒過五六日陽氣始衰餘邪未盡轉屬少陽而往來寒熱二也風為陽邪少陽為風木一中於風使往來寒熱不必五六日而始見三也少陽脈循胸脇邪入其經故苦滿膈氣不舒故欬然

木邪犯土故不欲飲食相火內熾故心煩邪正相爭故寒熱往來而喜嘔也少陽為樞立方重在半裏而柴胡所主又在半表故小柴胡為和解表裡之主方

小柴胡湯

治寒熱往來脈弦數者

柴胡八分 參以半夏 蠶半 黃芩 糝甘草 生薑 片大棗 枳

水煎去渣溫服

胸中煩而不嘔去半夏人參加括婁實三錢

渴者去半夏加括婁三錢仍用人參

腹中痛者去黃芩加酒炒芍藥半

脇下痞硬去大棗加牡蠣三錢

心下悸小便不利去黃芩

加茯苓錢半 身有微熱不渴去人參加桂枝八分 欬者去人參大棗生薑加五味八分 乾姜八分

邪中於脇則入少陽中於頰亦入少陽其氣遊行三焦宜小柴胡所主其邪無定居故有或然之證更

立加減法以禦其變也柴胡解表邪黃芩清裏熱即以人參預扶其正氣甘棗緩中薑夏除嘔其薑夏

之辛一以佐柴芩而逐邪又以行甘棗之滯夫邪在半表勢已向裏未有定居所以方有加減藥無定

品之可拘也

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具

柴胡為樞機之劑凡邪氣不全在表未全入裏者皆可用故證不必悉具而方亦有加減也

嘔而發熱者小柴胡湯主之

傷寒則嘔逆中風則乾嘔凡傷寒中風無麻黃桂枝證但見喜嘔而發熱者便是柴胡證不必寒熱往

來而始用也

小柴胡湯見前

陽結陰結證

也脈沈亦在裏也汗出為陽微結假令純陰結不得復有外證當悉入在裏矣此為半在裏半在表也脈雖沈細不得為少陰病所以然者陰不得有汗今頭出汗故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解

此少陰少陽之疑似證大便秘謂之結脈浮數能食曰陽結沈遲不能食曰陰結陰不得有汗然少陰亡陽亦有脈紫汗出者蓋亡陽與陰結有別亡陽則咽痛吐利陰結則不能食而大便反硬也亡陽與陽結其別在汗亡陽則衛外不固汗必遍身陽結則邪熱閉結鬱汗只在頭也陽明陽盛故能食不大便此為純陽結少陽陽微故不能食而大便秘此為陽微結必究其病在半表微惡寒亦可屬少陰但頭汗出始可屬少陽反覆講明病在少陽而非少陰可與小柴胡而無疑也設不了了者宜大豬胆汁導之得屎而解矣

小柴胡湯見前

豬胆汁方見陽明

小柴胡加減證

傷寒四五日身熱惡風頭項強脅下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之

此太少兩陽併病身熱惡風頭項強是太陽證未罷脅下滿已見少陽一證便當小柴胡去來夏加桂枝枳實兩解之則邪從樞轉而太陽亦解矣

小柴胡湯見前

陽明少陽合病

陽明病發潮熱大便溼小便自可胸脅滿者小柴胡湯主之

此陽明少陽合病潮熱已屬陽明大便溼而小便自可未胃實胸脅苦滿用小柴胡和之則邪熱從少陽而解不復轉屬陽明也

小柴胡湯凡前

陽明病曾下硬滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濺然而汗出解也

不大便屬陽明膈下硬滿而嘔尚在少陽舌上白胎痰飲溢於上焦也與小柴胡湯則痰飲化而燥土潤上焦得通津液四布則濺然汗出而兩陽之病盡解矣

小柴胡湯凡前

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

陽明傷寒嘔因水氣不散此胃家未實故禁妄攻也

服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之

此少陽將轉屬陽明之證柴胡湯有參苓甘棗服之反渴必胃家已實津液不足以潤胃當行白虎承氣等法矣

柴胡湯即小柴胡見前

白虎承氣二湯俱見陽明

熱入血室

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小

中風至七八日寒熱已過復得寒熱發作有時此不在氣分而在血分必月事來時血室空虛邪熱乘虛內結故通斷耳小柴胡加歸赤則血分之結熱散而寒熱自解矣

小柴胡湯見前

柴胡桂枝湯證

傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之

傷寒至六七日正寒熱當退之時反見發熱微惡寒之表而兼心下支結之裡是表裡未解也然惡寒微則發熱亦微但肢節煩疼支結是微結而微嘔合柴胡桂枝二湯以兩解之則表裡之邪盡解矣

柴胡桂枝湯 治兩陽合病寒熱支結脈弦浮數者

柴胡八錢白芍八錢

瀝炒桂枝八分 黃芩錢半 甘草五分 半夏錢半 生薑三片 大棗三枚

水煎去渣溫服

兩陽併病寒熱雖微而肢節煩疼微嘔心下支結是太陽之陽邪併入少陽而邪微

結也故以桂枝解太陽未盡之邪柴胡解心下之微結微嘔合兩方為一則兩陽表裡之邪無不盡解矣此為兩陽並解之良法

凡柴胡湯病而反下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解

誤下柴胡證而仍與柴胡湯因其人不虛故不壞病但清陽既陷邪不派發故必蒸蒸發熱始汗出津津而邪得外解矣

柴胡湯見前

柴胡桂枝乾薑湯證

傷寒約編

卷三

十六續

傷寒六七日已發汗而復下之胸膈滿微結小使不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之初服微煩復服汗出使愈

汗下後而柴胡證仍在者仍用柴胡湯加減此因微結一證故變其方名耳此微結與陽明微結不同陽微結對純陰結而言是指大便硬病在胃此微結對大結胸而言是指心下痞其病在胸膈與心下硬心下支結同義

柴胡桂枝乾薑湯 治汗下後胸膈滿微結脈數緊細者

柴胡八錢黃芩三錢桂枝三錢枳實三錢乾姜三錢甘草三錢牡蠣五錢

水煎去渣溫服 汗下後胃氣既虛餘邪陷伏渴而不嘔似太陽病溫但頭汗出仍似少陽傷寒故此方全是柴胡加減法心煩不嘔而渴故去參夏加枳實胸膈滿而微結故去棗加牡蠣小使雖不利而心下不悸故不去黃芩不加茯苓雖渴而未解故不用參而加桂以乾薑易生薑散胸膈之滿結也初服煩即微是黃芩枳實之效繼服汗出週身而愈者薑桂之力也

柴胡加龍骨牡蠣湯證

傷寒八九日下之胸滿煩驚小使不利譫語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

妄下後熱邪內攻故煩驚譫語是心君不寧而神明內亂也小使不利火盛水虧也一身盡重陽內而陰反外也難以轉側是少陽之樞機不利此下多亡陰與火逆亡陽不同故以此湯主之

柴胡加龍骨牡蠣湯 治下後胸滿煩脈細數者

柴胡八錢黃芩三錢枳實三錢桂枝三錢茯苓三錢人參三錢大黃三錢牡蠣三錢半夏三錢龍骨三錢鉛丹三錢生薑三錢大棗三錢

水煎去渣溫服 煩驚譫語因於下後而兼胸滿身重是少陽之陽邪歸併陽明而病熱故難以轉側

之體受於水之氣力能澄熱安神龍為東方之神骨具西金之體鎮驚平木最效牡蠣靜可鎮驚怯性寒能除煩躁且鹹能潤下佐茯苓以利水又能軟堅佐大黃以清胃也半夏引陽入陰善治目不瞑乃化飲安神之品人參通血脈桂枝行營氣一身盡重不可轉側者在所必需此柴胡方加減而以龍蠆名之者乃血氣之屬同氣相求耳

柴胡加芒硝湯證

傷寒十三日下之胸膈滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡以解外後以柴胡加芒硝湯主之

此少陽陽明併病日晡潮熱已屬陽明而利既不因下藥潮熱嘔逆又不因利而除故知誤不在下而在丸藥丸藥發作既遲不能瀉滌腸胃而懸膈傍流也先服小柴胡以解少陽之邪後加芒硝以滌陽明之熱不加大黃者以地道原通不用大柴胡者以中氣已虛也

小承氣湯見前

柴胡加芒硝湯 治少陽陽明併病脈數弦長者

柴胡半斤 黃芩半斤 枳實半斤 芍藥半斤 甘草一分 生薑三片 大棗三枚 芒硝三錢

水煎去渣溫服 兩陽併病熱已內結故雖下利仍主此方芒硝滌結潤燥以下陽明內熱之熱柴胡和解表裡以祛少陽不解之邪此少陽陽明併病之劑為少陽不解熱蓄陽明之上方

調胃承氣湯證

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反澹腹微滿鬱鬱微煩先其時極吐下者與調胃承

氣滿若不滿者不可與但欲嘔胸中痛微漉者此非柴胡證以嘔故知極吐下也

太陽過經不解不轉屬陽明則轉係少陽心煩喜嘔為柴胡證胸中痛大便漉腹微滿皆不是柴胡證但以欲嘔一證似屬柴胡當深究其欲嘔之故必十日前吐下而誤之壞病也是太陽轉屬陽明而不屬少陽胃氣雖傷餘邪未盡故與調胃承氣和之則胃氣調和而煩痛自平矣

調胃承氣湯見前

大柴胡湯證

太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩而下利者為未解也與大柴胡湯下之則愈

屢經妄下十餘日而柴胡證仍在者因其人不虛故樞機有主而不為壞病也與小柴胡和之表證稍除內尚不解以前此妄下但去腸胃有形之物而未泄胸膈氣分之結熱耳故用葦夏以除嘔柴苓以去煩大棗和裡枳實舒急而曰下之則愈見大柴胡為氣分之下藥歟

小柴胡湯見前

大柴胡湯 治少陽熱結胸中脈弦數者

柴胡白芍 煨半 黃芩錢 枳實錢 半夏錢 生薑五片

水煎去渣溫服 熱結胸中少陽不解故心下急鬱鬱微煩而嘔不止者為大柴胡證因往來寒熱故

倍生薑佐柴胡以解表結熱在裡故去麥甘之補益加枳芍以舒急也後人因下之二字妄加大黃要

知條中並無大便硬更有下利證則不得妄用大黃以傷胃氣也

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯

溫補加枳芍之酸寒佐苓夏以破熱結也

大柴胡湯見前

傷寒發熱汗出不解心下痞硬嘔吐而下利者大柴胡湯主之

嘔而發熱汗出濇濇是表不解心下痞硬脇熱下利是裏不解故用大柴胡破裡之結熱以解表也

大柴胡湯見前

小建中湯證

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之

傷寒二三日無陽明少陽之表但心中悸而煩是少陽中樞受寒未邪挾相火為患非辛甘助陽酸苦維陰則中氣立亡矣故用桂枝通心散寒甘棗飴糖助脾安悸白芍瀉火除煩生薑佐金平木此雖桂枝湯加飴倍芍即名建中寓發汗於不發之中曰小者以半為解表不全圓中也

小建中湯 治中虛煩悸表不解脈緩弱者

白芍二錢桂枝六分炙甘草半錢生薑三片大棗三枚飴糖五錢

水煎去渣溫服 中氣虛餒表受寒邪則遏鬱不解木挾相火為患故煩而且悸為建中湯證即桂枝

湯加飴倍芍取酸苦以平厥陰之火辛甘以緩脾家之急有安內攘外瀉中寓補之功故名曰建中證

未除尚資薑桂以解表不全主中故名曰小耳

小建中小柴胡證

傷寒陽脈滿陰脈痿法當腹中急痛先用小建中湯不差者小柴胡湯主之

尺寸俱弦為少陽受病。今陽脈滿而陰脈弦是寒傷厥陰而不在于少陽。陽脈滿是陽氣不舒。表寒不解。陰脈弦弦為木邪。必挾相火。相火不能禦寒。必入厥陰而為患。厥陰抵少腹。挾胃屬肝絡脾。則腹中皆厥陰之部。故腹中急痛。非甘以緩之。酸以瀉之。辛以散之。不能解也。此小建中為厥陰驅寒發表。平肝止痛之劑。然邪入厥陰腹中必痛。原為險證。一劑建中未必成功。當更用柴胡。今不邪直走少陽。使有出路。陰出之陽則愈也。

小建中湯見前

小柴胡湯見前

嘔家不可用建中湯以甘故也。

此建中湯禁與酒客不可與桂枝湯同義。建中湯即小建中湯見前

黃連湯證

傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。黃連湯主之。

邪氣即寒氣。胸中蓄熱。上形寒。邪從胃侵。遂是寒格於中。熱不得降。故上炎作嘔吐也。胃陽不舒。故腹中痛。此病在焦府之半表裡。故以黃連瀉胸中蓄熱。薑桂散胃中寒。連甘草緩中止腹痛。半夏除嘔。人參益虛。雖無寒熱。往來於外。實有寒熱。相待於中。仍不離寒熱兩調之治法。

黃連湯 治寒熱相結。腹痛嘔吐。脈弦細數者。

黃連八錢 乾薑六錢 桂枝八錢 人參八錢 半夏半斤

水煎去渣溫服。寒邪格熱。腹痛嘔吐。因於傷寒。不得不審其表也。雖無寒熱。相待於外。實有寒熱。相

搏於中。故以黃連瀉胸中之熱。乾薑逐胃中之寒。桂枝散胃口之滯。甘草緩腹中之痛。半夏除嘔。人參

黃芩湯黃芩加半夏生薑湯證

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

太少兩陽合病必陽盛陰虛陰虛則陽氣下陷陰中故自下利也與黃芩湯徹熱益陰緩中止泄若嘔者是上焦不和加半夏生薑以除水氣則兩陽之患自平矣

黃芩湯 治兩陽合病下利脈浮數者

黃芩洗白芍洗炙甘草八大棗三

水煎去渣溫服 嘔者加半夏生薑 兩陽併病必自下利是陽盛陰虛陽氣下陷入陰中也故以黃

芩泄大腸之熱芍藥斂太陰之虛甘草調中州之氣雖非胃實亦非胃虛故不必人參以補中也嘔是

上焦水氣未散故仍加薑夏即柴胡桂枝湯去柴桂人參

陽明少陽合病必自下利其脈不負者順也負者失也互相尅越名為負 少陽負跌陽者為順也

兩陽合病必見兩陽之脈陽明脈大少陽脈弦此為順脈若大而不弦負在少陽弦而不大負在陽明

是互相尅賊皆不順之候也不能尅土少陽為賊邪若少陽負而陽明不負亦負中之順脈矣

傷寒約編卷四

太陰病候綱

太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸中結硬

太陰主三陰之裡為陰中至陰寒濕傷之則腹滿吐利其經從足入腹寒氣時上故腹時痛而食不下

也脈當沉細宜理中湯溫中散寒則寒濕化而腹痛吐利自解也若以腹滿為實而誤下之胃口受寒

傷寒約編

卷四

十九續

故胸下結硬

理中湯 治腹痛自利脈沈者

白朮炮 黃芩炮 薑炮 人參半錢 炙甘草分

水煎去渣溫服 傷寒脾土不能制濕而濕伏不化脾病則胃亦病故食不下而腹痛吐利也白朮倍脾土之虛人參益中宮之氣炮薑暖胃腕之寒甘草緩三焦之急且乾薑得白朮能除滿而止吐人參得甘草能療痛而止利或湯或丸隨病酌宜

自利證

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨少腹者此欲自利也

太陰從濕化故腹中痛轉氣下趨是下利之兆四五日乃太陰發病之期

四逆湯證

自利不渴者屬太陰以其藏有汗故也當溫之宜四逆輩

太陰為開主自利藏有寒故不渴脈當沈遲宜四逆湯溫之則春回寒谷而利自止矣

四逆湯見太陽

太陰發黃證

傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也

太陰受濕熱故脈浮緩不發熱而手足溫是太陰經傷寒也太陰為陰中至陰陰寒相合無熱可發手足為諸陽之本故自溫寒濕傷於肌肉不得越於皮膚故當發身黃宜理苓湯加茵陳若小便自利則

傷寒下利日十餘行脈反實者死

傷寒太陰下利而脈反實此脾氣虛而邪氣盛是正氣反虛而邪不受制故死

桂枝加芍藥加大黃二湯證

太陰病脈弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其胃氣弱易動故也

自利是太陰本證因脾陰弱而腹滿時痛當倍加芍藥大實而痛當稍加大黃脈弱宜制小恐易動也

桂枝加芍藥湯 治太陰腹滿時痛脈弱者

桂枝錢三芍藥錢三炙甘草錢三大棗三枚生薑片三

水煎去渣溫服 太陰陽邪不解因內陷而脾陰受傷不勝陽邪之內搏故腹滿時痛為桂枝解內陷之邪倍加芍藥以和陰而除滿痛此為用陰和陽法

桂枝加大黃湯 治太陰腹大實痛脈沈數者

桂枝錢三芍藥錢三甘草錢三大棗三枚生薑片三大黃錢三

水煎去渣溫服 脾陰虧弱則胃陽轉燥故胃家亦實而腹大實痛也用桂枝湯轉輸脾液以解未盡之邪稍加大黃濡潤胃熱以除實痛此是兩解表裏之法

太陰桂枝證

太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯

脈浮者病在表是表有風邪故可發汗太陰主開是裡之表證故用桂枝桂枝湯是表之裡藥也

桂枝湯見太陽

太陰中風證

太陰中風四肢煩疼陽微陰濡而長者為欲愈

風為陽邪四肢為諸陽之本太陰中風陰氣衰少而兩陽相搏故四肢煩疼也風脈本浮今而轉微則風邪當去病脈本濡今而轉長長則氣治故其病為欲愈

寒實結胸證

寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯為散亦可服

太陰腹滿時痛而反下之寒邪與寒熱相結成寒實結胸內外無熱證也宜三白小陷胸湯開之則寒實消散而胸下結硬自除矣

三物白散 治實寒結胸脈實者

桔梗兩貝母二兩白豆三錢  
去心 熬 研泥

二物為散內巴豆同杵白欬和服一錢匙弱人量減

腹滿時痛是陽邪搏陰誤下之則陰氣與寒藥相結故成寒實結胸貝母開心胸鬱結之氣桔梗提胸中下陷之氣然微寒之品不足勝結硬之陰邪非巴豆之辛熱斬關而入何以能使胸中之陰氣流行也

病在膈上者必吐在膈下者必利

病原吐利因胸下結硬反不能通因其勢而利導之塞因通解也

不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯

少陰病提綱

少陰之為病脈微細但欲寐也

三陰以少陰為樞微為水象微細而沈陰之少也衛氣行陰則寐少陰病則入陽分多故欲寐欲寐是病人意中非實能寐也

少陰自利證

少陰病欲吐不吐心煩欲求寐五六日自利而渴者屬少陰虛也故引水自救若小便色白者以下焦虛有寒不能制水故也

欲吐不得吐欲寐不得寐是少陰樞機之象五六日正少陰發病之期少陰脈絡心從火化下焦虛則坎中之陽不能引水上交故心煩而渴關閉不開不能制水故自利而小便色白也若但治上焦之實熱不顧下焦之虛寒則熱病未除而下利漫無止期矣

少陰病脈

少陰病脈沈細數病為在裏不可發汗

沈為在裏病亦在裏少陰脈沈者當溫然數則為熱又不可溫更不可汗言外使當濕陰和陽矣

少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺中弱濇者復不可下之

諸微為無陽諸濇為少血汗之則亡陽下之則亡陰陽虛者既不可汗即不可下其尺中弱濇者復不

可下亦不可汗也

病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利

脈陰陽俱緊則為寒當屬少陰陰虛生內熱故身無熱而反汗出也亡陽者虛陽不歸少陰不藏上焦從火化而咽痛嘔吐下焦從陰虛而下利不止也宜八味腎氣丸作湯則坎火歸原而下利汗出自止咽痛嘔吐自除矣

八味腎氣湯 治少陰亡陽咽痛吐利脈陰陽俱緊者

熟地六錢 萸肉三錢 附子三錢 鹽水炒 肉桂二錢 山藥三錢 澤瀉三錢 茯苓三錢 神二錢 丹皮三錢

水煎去渣溫服 陽亡則衛外不密而汗出吐利陰虛則坎中火發而咽痛脈緊此即少陰亡陽證也 熱地滋陰補腎 萸肉秘氣溢精 丹皮瀉君相伏火 澤瀉瀉膀胱水邪 山藥退虛熱 健脾益陰 茯苓滲濕 熱通腎交心 更加桂附以導引虛陽歸納真氣則陽回而咽痛自止汗出吐利無不除矣

脈陰陽俱緊者口中氣出唇口燥乾鼻中涕出跪臥足冷舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微發熱

手足溫者此為欲解或到八日以上反大發熱者此為難治設此惡寒者必欲嘔也腹內痛者必欲利也

少陰脈絡肺肺主鼻故鼻中涕出少陰絡舌本故舌上胎滑少陰大絡注諸絡以溫足脛故足冷諸證

全似亡陽而不名亡陽者外不汗出內不吐利也口中氣出唇口燥乾鼻中涕出此為內熱陰陽俱緊

舌上胎滑跪臥足冷久是內寒此少陰為樞故見寒熱相持之證勿妄治謂治之不當寧靜以待之到

七日一陽來復微發熱手足溫是陰得陽而解也若微熱不解八日以上反大發熱恐蓄熱有餘或發

癰膿或便膿血為難治若七日時不能發熱以陰陽俱緊之脈反如惡寒是寒甚於表上焦應之必欲

吐也如反加腹痛是寒甚於裡中焦應之必欲利也

脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解緊去人安此為欲解

少陰病脈至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去者為欲解也雖煩下利必自愈

此回陽脈證玩反溫前此已冷可知微本少陰脈煩利本少陰證至七八日陰盡陽復之時緊去微見所謂邪氣之來緊而疾較氣之來徐而和也煩則陽已反於中宮溫則陽已散於四末陰平陽秘故煩利自止也

少陰中風脈

少陰中風脈陽微陰浮者為欲愈

陽微復少陰本體陰浮知坎中陽回微則不緊浮則不沈即暴微而緊反去之謂邪從外來仍自內出故愈

少陰傷寒證

少陰病若利自止惡寒而踈臥手足溫者可治

少陰傷寒下利是坎宮不藏一陽無蔽陰盛陽虛故惡寒而踈臥也今利自止則陽已返於中宮手足溫則陽已散於四末故可治

少陰病惡寒身踈而利手足逆冷者不治

傷寒以陽為主陰盛則踈臥而惡寒下利不止手足逆冷是六府氣絕於外者手足寒五臟氣絕於內者利下不禁故不可治

少陰病惡寒而踈時自煩欲去衣被者可治

陽盛則煩時自煩是陽漸回故欲去衣被者可治

少陰病四逆惡寒而踈脈不至不煩而躁者死

陰極則躁四肢逆冷是陽已先脫脈不至是心腎氣竭不煩而躁惟形獨存故死

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至者灸少陰七壯

上吐下利是胃腕之陽將脫手足不逆冷乃諸陽之本猶在也反發熱為衛外之陽尚存灸之陰則

陽可復而吐利可止矣

少陰病吐利煩躁四逆者死

吐利而兼煩躁胃陽已脫四肢逆冷有陰無陽故死

少陰病脈微瀉嘔而汗出大便數而少者宜溫其上灸之

脈微瀉嘔而汗出是上焦之陽已外亡大便數少而不下利是下焦之陽尚存灸上會以溫其上則

陽猶可復而汗可欲嘔可平矣

少陰病脈沈微細但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩燥不得臥寐者死

脈沈微細是少陰本脈欲臥欲吐是少陰本證當心煩而反不煩反汗出亡陽已兆於始得之日五六

日自利反煩躁不得臥是微陽將絕必無生理矣

少陰病下利止而頭眩時時自胃者死

胃家汗出則愈今頭眩而時時自胃者是清陽之氣已脫非陽回而利自止也可知水穀已竭無物更

行故死

少陰病六日息高者死

氣息者腎間動氣三焦生氣之原也息高者但出心與肺不能入腎與肝是生陽之氣已絕故死六經

症之七日手足三部脈皆至大煩而口噤不能言其人躁擾者必欲解也若脈和其人煩目重胸內滯黃者此欲解也

三部手足皆至脈道原通有根有本大煩躁擾是陰出之陽非陰極當躁也口噤不能言因脈氣初復營血未調而心脾氣滯不運非死證也若其脈調和雖大煩不解亦不足慮更視目重胸內滯屬脾色黃而不雜他臟之色為至陰未虛雖口噤亦不足慮均為欲解耳

麻黃附子細辛湯證

少陰病始得之無汗惡寒反發熱脈沈者麻黃細辛湯主之

少陰主裏病當無熱始受寒邪即使發熱似病在太陽而屬之少陰者以少陰不藏坎陽無蔽則腎氣獨沈故反發熱脈沈也病在表脈浮者可發汗可知脈沈者病在表亦不得不汗矣沈為在裏而反發其汗津液越出亡陽則陰獨故用麻黃開腠理細辛散浮熱即以附子固元陽則陽不外亡而寒邪自解矣

麻黃附子細辛湯 治少陽傷寒反發熱脈沈者

麻黃分附子煖細辛五分

水煎去渣溫服 少陰傷寒一陽無蔽故假借太陽之面目而反發熱也麻黃開腠理細辛散浮熱即以附子固元陽則汗自出而陽不亡寒自散而精得藏元陰可不被其擾矣此少陰陽虛傷寒之托裡解外法

少陰病始得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也

無裏證只有表證以甘草易細辛故為微發汗必微惡寒微發熱故當微發汗也

麻黃附子甘草湯 治少陰傷寒微發熱惡寒脈沈者

麻黃分附子錢半甘草分

水煎去渣溫服 少陰傷寒坎陽無敵不能鼓邪外出故微發熱微惡寒而並無裡證也故以麻黃開

腠理附子固元陽以甘草之緩中易細辛之辛散所以為緩中和陽微發汗之劑

少陰傳經使血證

少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必使血

發於陰者六日愈至七日其人微熱手足溫是陰出之陽則愈至八日以上反大發熱此腎移熱於膀胱

膀胱熱則太陽經皆熱太陽主一身之表為諸陽生氣手足為諸陽之本故一身手足盡熱太陽經

多血血得熱則行陽病者上行極而下故尿血也

火劫證

少陰病欬而下利讖語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也

欬利因傷寒讖語因火劫以腎主五液少陰病液不上升故陰不得有汗也不得已用麻黃發汗即用

附子固裏豈可火劫之而強發汗哉頓使津液暴亡小便難而讖語矣

下厥上竭證

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治

陽不外達四肢逆冷為厥厥為無陽不能作汗若強發之不能汗必動血陰絡傷而血下行則積或可

救陽絡傷而血上溢則便難挽回矣

少陰病在臍手足寒背脊痠痛脈沈者附子湯主之

少陰陽虛陰寒切體故身體痛四肢不得喜陽氣故手足寒寒邪從陰注骨故骨節痛是少陰不藏腎氣獨沈也宜附子溫之則虛陽自回而寒邪自解骨節諸痛自舒矣

附子湯 治少陰傷寒身痛骨痛脈沈者

附子洗

羊

人參洗

茯苓洗

白芍洗

白朮洗

甘草炙

附子湯

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

半

水煎去渣溫服 少陰傷寒陽虛不能鼓邪外出故陰寒切體而身痛骨痛也附子壯火以禦寒人參補元氣以固本白朮培太陰之土白芍斂厥陰之木茯苓清治節以利少陰之水水利則土厚木榮火自生寒自解骨節諸痛無不自除矣此扶陽禦寒益陰固本之劑為少陰虛寒證之第一要方

少陰病得之二三日口中和其背惡寒者宜灸之附子湯主之

口中兼咽舌言和者不燥乾而渴五臟之俞皆系於背背惡寒者背俞陽虛陰寒得以乘之見於二三日其平素虛寒可知急救背俞溫以附子湯壯火之主而惡寒自罷矣

附子湯見前

真武湯證

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便利四肢沈重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便利或下利噦者真武湯主之

小便利是病根腹痛下利四肢沈重疼痛皆水氣為患坎中火用不宣腎家水體失職是下焦虛寒不能制水故也法當壯元陽以消陰翳逐留垢以清水源因立此湯後三項是真武加減法非生證也

真武湯 治少陰傷寒水氣不散脈沈弦者

附子煨白芍煨白朮煨茯苓生薑三錢

水煎去渣溫服 效者加五味細辛 小便利而不利者去芍藥茯苓加乾薑 嘔者去附子倍生薑  
少陰傷寒水氣不散故腹痛小便不利四肢沈重疼痛而下利也附子壯坎中之陽芍藥收炎上之氣  
茯苓清肺利水之用白朮培土制水之溢生薑散四肢之水五品成方洵為壯火崇土散水安腎之劑  
加五味細辛以治欬去芍藥茯苓加乾薑以治下利而小便自利去附子倍生薑以治嘔皆是隨證救  
治之法

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振欲辟地者真武湯主之

汗出不解是太陽陽微不能衛外而為固少陰陰虛不能藏精而為守仍發熱而心下悸可知坎陽外  
亡腎水上凌心主故頭眩身瞤振欲辟地也用真武湯則腎火歸原水氣自降而外熱因之亦解矣  
真武湯見前

桃花湯證

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

少陰病兼中氣虛二三日乃戊土見證之日四五日正少陰發病之期水火不歸土金失職故腹痛小  
便不利下利不止而使膿血也乾薑同石脂溫中而止痛止利乾薑同粳米崇土以利水清膿也

桃花湯 治少陰腹痛使膿血脈沈細者

乾薑半錢赤石子錢半粳米五錢

水煎亦可為散 少陰傷寒火土不振而邪陷不解故小便不利腹痛使膿血也乾薑炮黑溫中而止

四逆湯證

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之

脈法浮為在表遲為在藏遲從浮為是浮為表虛而遲為藏寒也下利至於清穀必其人胃氣本虛寒邪直入脾藏胃陽垂亡全賴此表熱尚可救其裏寒四逆湯溫之則裏和而表熱解矣

四逆湯 治少陰病表熱裏寒下利清穀脈浮遲者

附子煖半 乾薑煖半 甘草八分

水煎去渣溫服 少陰傷寒虛陽不歸而胃氣不化故下利清穀表熱裏寒也附子補火回陽乾薑溫中散寒炙草緩三焦之急必得人參大補元氣則陽可回而裡寒自解外熱亦退矣 凡治虛證以裏為重獲熱下利脈微弱者用人參此脈遲而利至清穀不煩不渴是中氣不虛元氣將脫但溫不補何以救逆乎必因本方之脫落而抄錄者仍之耳

下利清穀不可攻表汗出必脹滿

裡氣虛寒不能為陽之守賴表陽之尚存得以衛外而為固故攻之則更虛其表妄汗亡陽則藏更寒而生脹滿矣

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏

下利腹脹滿裡寒而胃氣不化也身體疼痛者表寒而衛陽外亡也先救其裏治其本矣

傷寒下之後續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏宜四逆湯

下後胃陽已亡故下利清穀不止身疼痛是表寒不解四逆湯急溫其裡則裏和而表亦解矣

四逆湯見前

病發熱頭痛脈反沈若不差身體疼痛者當救其裡宜四逆湯。

發熱頭痛是太陽麻黃證脈當浮而反沈者是陽症見陰脈也熱雖發於表為虛陽寒反據於裡為真寒也汗之不差自身疼不除乘裏證未發四逆湯急溫其裏則裏和而表自解庶無吐利厥逆之患。

四逆湯見前

大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之。

大汗則亡陽大下則亡陰陰陽俱虛竭故厥冷也四逆湯急溫之則陽回而生猶可望矣。

四逆湯見前

大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之。

汗之失宜雖大汗出而熱不去惡寒不止表未解也內急拘而下利是裏寒已甚四肢疼而厥冷乃表寒又見可知其表熱裏寒即表虛而亡陽者四逆湯急溫之冀回春於萬一。

四逆湯見前

嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之。

嘔而發熱者小柴胡證此脈弱而發熱非相火明矣內無熱故小便利裡寒甚故見厥膈上有寒飲故嘔也傷寒以陽為主陽消陰長故難治勉以四逆湯溫之冀挽回于萬一。

四逆湯見前

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之。

吐利交作中氣大虛也完穀不化脈微欲絕氣血喪亡矣小利復利而大汗出是玄府不開門戶不要。

也惟幸負熱不去手足不厥則諱陽之本與機外之陽尚存且脈亦未脫可望一線生機四逆湯急瀉則正勝而邪可却耳

四逆湯見前

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之

吐利則清穀汗出不大而手足厥冷惟賴發熱之表陽急以四逆湯溫之尚有可愈之機

四逆湯見前

四逆加人參湯證

惡寒脈微而復利利止亡血也四逆加人參湯主之

利雖止而惡寒未罷仍宜四逆湯溫之以其脈微為無血無血即亡陽也四逆湯當倍人參通血脈以

治之

四逆加人參湯 治少陰病惡寒下利脈微者

附子

錢半

人參

錢三

乾薑

半

炙草

半

水煎去渣溫服

陽亡則衛外不密猶賴胃陽猶存故利雖止而惡寒未罷也當於四逆湯中倍用人

參則陽回而惡寒自罷人參附子補火回陽乾薑炙草煖胃溫中洵為扶元補火之劑乃亡陽陰竭之

主方

通脈四逆湯證

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利

止脈不出者通脈四逆湯主之

下利清穀寒甚於裏也手足厥冷陰盛於外也身反不惡寒面赤為陽鬱利止咽痛為陽回腹痛乾嘔是寒甚於裏乃寒熱交爭於表裏脈微欲絕是少陰本脈利止脈不出是陽雖回而氣閉不行也通脈四逆湯裡通脈脈出則厥愈從陽而生脈不出厥不還則從陰而死矣

通脈四逆湯

治少陰病下利清穀厥逆戴陽脈微欲絕或脈不出者

附子

錢半

乾薑錢半甘草白葱九

水煎去渣溫服

腹中痛加白芍

嘔加生薑

咽痛去芍藥加桔梗

利止脈不出者去桔梗加人

參

陽虛於裏寒盛於中則虛陽鬱而不伸陰寒伏而不化故裏寒外熱下利清穀而厥逆戴陽也四逆之劇恐不足起下焦元陽而續欲絕之脈故加葱以通之葱秉東方之色能行少陽生發之機葱白入肺以行營衛之氣率領薑附甘參奏捷於經藏之間而氣自通脈自復虛陽得歸則裏寒自化而外熱亦解矣

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之  
下利脈沈而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

脈證皆輕故能鬱冒汗出而解面赤為陽戴於上因其人下虛故下利清穀而厥逆也熱微厥亦微故面亦少赤耳通脈四逆湯溫之則陽自回而厥還病愈矣

通脈四逆湯見前

凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆冷是也

手足六經之脈皆自陰傳陽自陽傳陰陰氣勝則陽氣不能達於四肢故為寒厥耳

熱厥方可下寒厥為虛慎不可妄下。

傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者不可下此為亡血下之死

腹濡脈虛內無熱結可知不結胸而復厥者為亡血乃陽不外敷也下之則微陽竭滅故死

病者手足厥冷言我不結胸小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也

關元在臍下三寸小腸之募三陰任脈之會冷結則陽不外達故厥冷宜灸之當知結胸有熱厥者

傷寒脈促手足厥者可灸之

促為陽脈有陽虛而促者亦有陰感而促者促與結要貨代脈之互文皆為不足之脈火氣雖微內攻有力故宜灸

傷寒六七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死

厥陰肝脈也應春生之氣少陽不息之機故灸其俞穴而陽可回厥可愈矣少陰病而灸厥陰以肝之相火即少陰之生陽耳

茯苓四逆湯證

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

未經汗下而煩躁為陽盛汗下後而煩躁為陽虛汗多既亡陽下多又亡陰故熱仍不解茯苓四逆湯  
薑附以回陽茯苓以清神則煩躁止而外熱自解矣

茯苓四逆湯 治少陰厥冷煩躁脈細欲絕者

茯苓三錢附子一枚甘草半錢乾姜半錢人參半錢

水煎去渣溫服 少陰傷寒虛陽挾水氣不化故內擾而煩欲脫而躁厥冷脈細危斯劇矣茯苓理先天無形之氣安虛陽內擾之煩人參配茯苓補下焦之元氣乾薑同附子回虛陽欲脫之躁緩以甘草而煩躁自寧允為清神回陽之良劑也

乾薑附子湯證

下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沈微身無大熱者乾薑附子湯主之

當發汗而反下之復發汗汗出而裏陽將脫故煩躁也晝日不得眠虛邪獨據陽分夜而安靜知陰不虛也身無大熱則微熱尚存不嘔渴是裏無熱不頭疼惡寒是無表證脈沈微是純陰無陽猶幸此微熱未除煩躁不寧之際獨任乾薑生附以急回其陽則煩躁止而微熱自解矣

乾薑附子湯 治夜靜晝日煩燥脈沈微者

乾姜三附子三

水煎去渣溫服 汗下倒施陽氣大虛虛陽擾於陽分故晝日煩躁夜而安靜也乾薑生附以急回其陽散其寒則煩躁寧而脈自復微熱無不自解矣此回陽散寒之劑為陽虛陰盛救急之需方

下之後復發汗必振寒脈微細所以然者內外俱虛故也

內陽虛故脈微細外陽虛則振慄惡寒此亦乾薑附子湯證

乾薑附子湯見前

吳茱萸湯證

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

少陰傷寒手足厥冷陽氣不伸則木火內鬱故煩躁欲死也少陰病吐利煩躁四逆者死此厥冷在手

寧厥冷自除矣

吳茱萸湯 治少陰傷寒煩躁厥冷脈遲者

吳茱萸湯 半人參 生薑 片大棗 枝

水煎去渣溫服 少陰傷寒木火內鬱則中氣大傷故手足厥冷煩躁欲死也吳茱萸入肝能溫中降逆而散寒佐以人參固助元氣而止嘔吐則煩躁可寧姜棗調和營衛則陽得敷於四末而手足自溫何危劇之有哉此撥亂反正之劑為少陽傷寒木火鬱伏之端方

乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之

乾嘔無物胃虛可知吐惟涎沫胃寒可知頭痛者清陽不足陰寒得以乘之吳茱萸湯溫中降氣舒陽散寒則胃氣溫而嘔吐止肝木舒而頭痛自除矣

吳茱萸湯見前

食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也

食穀吐嘔固是胃寒宜吳茱萸湯溫之得湯反劇者以痰飲在上焦再服吳茱萸湯探吐自愈

吳茱萸湯見前

白通湯白通加豬胆汁二湯證

少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加豬胆汁湯主之服湯後脈暴出者死微續者生

下利脈微是下焦虛寒不能制水與白通湯通陽却寒以制水而利仍不止更厥逆反無脈是陰盛格

陽也當取猪胆之苦寒加入白通湯中為反佐是熱因寒用從陰引陽之法俾陰盛格陽者得成水火既濟若脈暴出是孤陽獨行故死脈微續者是少陽初生故生

白通湯 治少陰厥冷下利脈微者

附子 乾姜 薤白 枳

水煎去渣溫服 少陰傷寒下利厥冷是火虛不能鼓舞以逐邪也乾姜附子振動元陽佐薤白以通陽氣俾水精四布而厥利自除矣此扶陽散寒之劑為陽虛不能施化之需方

白通加人尿猪胆汁湯 治厥逆下利乾嘔煩無脈者

附子 乾薑 葱白

水煎去渣沖入尿一杯猪胆汁少許 少陰傷寒格陽於上而不能外敷於四末故厥冷下利乾嘔心煩也白通通氣以回陽加人尿猪胆汁以平格陽之氣而煩嘔並除厥溫利自止矣此是熱因寒用之法

下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死

厥冷無脈不煩不嘔是陰盛於中非格陽於外也不須反佐內服白通外灸少陰則利止脈漸出手足溫者生若利不止脈不還反加微喘者是微陽已絕門戶不要故也

下利後脈絕手足厥逆時脈還手足溫者生脈不還者死

厥逆脈絕虛陽暴脫也脈漸出手足溫是內外回陽故生若脈不出厥不還乃微陽已絕於下利之日故死

黃連阿膠湯證

少陰病得之二三日心中煩不得臥黃連阿膠湯主之

此病發於陰熱為在裡二三日便見心中煩是熱傷心液不得臥是心火不降也黃連阿膠湯降心火以滋陰則心煩自除而臥寐自寧矣

黃連阿膠湯 治心煩不得臥脈數虛數有力者

黃連

分白芍

蟬

黃芩

阿膠

三錢

三物水煎去渣入膠烱盡內雞子黃一枚攪令相得溫服 此心湯素旺傷寒後熱傷心液心火不降故二三日使心中煩不得臥也需此少陰之瀉心湯芩連以直折心火佐芍藥以收斂神明非得氣血之屬交合心腎苦寒之味安能使水升火降陰火終不歸則少陰之熱不除雞子黃入通於心滋離宮之火黑驢皮入通於腎蓋坎宮之精與河井水相落成膠配合作煎是降火歸原之劑為心虛火不降之端方

豬苓湯證

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得臥者豬苓湯主之

欬嘔是水氣煩渴是陰虛下利至於六七日陰液頓亡濕熱內擾故不得眠也以豬苓湯滋陰利水俾濕熱降腎水升則欬嘔除而下利止煩渴解而臥寐自寧矣

豬苓湯 治欬嘔下利而渴心煩不得眠脈濡數者

豬苓

鞞

澤瀉

茯苓

半錢

滑石

三錢

阿膠

五錢

水煎四味去渣內膠烱盡溫服 濕熱傷陰水體失職不能上敷下達故欬嘔下利煩渴不得眠也豬

苓佐阿膠理少陰之體滑石佐茯苓清少陰之源澤瀉佐阿膠培少陰之本阿膠本血氣之屬合二苓

澤石淡滲膀胱利少陰之用重用阿膠是精不足者補之以味也以此滋陰利水使濕熱降腎水升則

效嘔下利自除煩渴不得眠無不並寧矣

陽明病若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

渴欲飲水陽明邪熱在胃也燥土不化津液不行故小便不利而發熱脈浮也猪苓湯潤燥行水則熱

渴解而小便無不利矣

猪苓湯見前

陽明病汗出而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故也

此猪苓湯禁汗多而渴是陽明熱邪在胃也津液外越大便秘燥猪苓湯雖用河膠而利水居其十七

故不可與

猪膚湯證

少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之

少陰下利下焦虛也少陰脈循喉嚨出絡心注胸中咽痛胸滿心煩是腎火不藏循經上走於竅也猪

為水畜津液在膚君其膚以除上焦之虛火佐白蜜白粉之甘瀉心潤肺而和脾脾為黃婆交構水火

俾水升火降則上熱自除下利自止矣

猪膚湯 治咽痛下利胸滿心煩脈虛者

猪膚一兩 白蜜一斤 白粉兩

水煮猪膚糜爛入白蜜白粉熬香和合温服一兩徐徐嚥 陰虛氣燥燥火燂金不能泌別水道故

下利咽痛胸滿心煩也猪為水畜津液在膚取以治上焦虛浮之火和白蜜花粉之甘瀉心潤肺而和

脾上滋化源兼培母氣使水升火降則上熱行虛陽得歸其部而煩滿咽痛自除不治利而利自止矣

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗湯

咽痛並無下利胸滿心煩證是少陰不虛邪熱上浮可與甘草湯甘緩之不差與桔梗湯辛散之二三日病熱原微故製劑亦微也

甘草湯 治少陰病咽痛脈緩者

生草一兩

水煎濃汁去渣溫服 少陰傷寒過熱不解少陰之脈循喉嚨挾咽故咽痛生草一味甘涼瀉火以緩其熱清其膈使熱緩膈清則中氣調而外邪自解咽痛無不退矣

桔梗湯 治咽痛服甘草湯不差脈微數者

桔梗穢甘草穢

水煎去渣微涼服 少陰咽痛有寒鬱者有過熱者有熱微者有熱甚者此以經氣之厚薄邪氣之淺深為病也故服甘草湯甘以緩之不差者配以桔梗之辛則甘緩其中辛散其寒而邪熱自解咽痛無不瘳矣

半夏散及湯證

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

此咽中痛是寒閉其竅病屬少陰脈必沈細遲微證必憎寒發嘔故可用半夏除嘔桂枝療寒湯散酌宜若挾相火則辛溫切禁矣

半夏散及湯 治少陰咽痛欲嘔脈沈細者

半夏穢桂枝炒甘草炒

水煎去渣溫服亦可為散。少陰傷寒閉塞竅道故清湯不舒咽痛欲咽也非辛甘溫泄之品不能破其範圍當急需桂枝療寒半夏除嘔緩以甘草和以白飲或為散或為湯隨病之宜可也。

苦酒湯證

少陰病嘔而咽中傷生瘡不能語聲不出者苦酒湯主之。

嘔傷咽嗝少陰浮火挾痰飲於上也傷必生瘡故聲不出不能語也苦酒湯飲瘡清音豁痰定嘔俾嘔平聲自出瘡飲語自能矣。

苦酒湯 治少陰病咽中傷聲不出脈弦滑者

苦酒一杯雞子一枚半夏半

苦酒即醪醕同半夏入雞子白殼內置刀環安火上令微沸去滓少少含嚥。

少陰傷寒挾痰飲而嘔傷咽嗝故咽中生瘡聲不出不能語焉當急以半夏豁痰飲苦酒飲瘡傷雞子白清潤發音聲三味相合半夏減辛烈之猛苦酒緩收飲之驟潤以滋其咽喉不令泥痰飲於胸膈則咽痛平而能語出聲矣。

四逆散證

少陰病四逆泄利下重其人或欬或悸或小便不利或腹中痛者四逆散主之。

泄利下重陽邪陷於少陰也四肢厥逆陽內而陰反外也欬悸腹中痛小便不利皆水氣為患故以四逆散舉下陷之陽邪而水氣自散諸證無不平矣。

四逆湯 治泄利下重四逆脈弦者

為散。薤白三枚煎湯調服三錢。效加五味乾薑。悸加桂枝。小便利加茯苓。腹中痛倍白芍。陽邪內陷氣滯於中而清濁不分營陰暗耗故泄利下重四肢厥逆也。柴胡升陽白芍飲陰枳實泄滯。氣甘草緩中州令伏邪升散四達則清陽不復下陷而厥利無不盡乎矣。

傷寒約編卷六

厥陰病提綱

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食食即吐虵下之利不止。

兩陰交盡名曰厥陰為陰中之陽寒傷其經則相火內鬱故氣上撞心中疼熱也火能消物故消渴易饑肝能尅胃故饑不欲食虵聞食臭則上入於膈而吐虵也病發於陰而反下之使氣無上息而利不止耳烏梅丸主之可以除虵亦可止利。

烏梅丸見虵

肝虛脾證

傷寒腹滿讖語寸口脈浮而緊此肝乘脾也名曰縱刺期門。

腹滿讖語似太陰陽明內證然未經妄汗妄下而非脈浮而緊似太陽陽明表脈然驗證並非可汗而又非也此固當以脈辨之脈法浮而緊名曰弦是弦為肝脈也諸腹脹大皆屬於熱肝氣熱則多言可知腹滿由於肝火讖語乃肝旺所發耳肝旺則乘其所勝直犯脾土故名縱刺期門以瀉之則腹滿可除而讖語自止矣左金枳朮加柴胡白芍生地梔丹並主之而腹滿讖語亦無不已。

左金丸 治肝火乘脾腹滿讖語脈弦數者。

黃連兩吳茱萸兩炒

七次

為末粥丸亦可量減作湯 肝旺乘脾不能數化精微四達故腹滿火炎心亂神明失其主宰故譫語也黃連大瀉心火燥脾濕吳茱萸引之直入厥陰以平肝除滿則譫語無不自已

枳朮丸 治脾虛腹滿脈弦者

白朮兩半枳實八錢

炒

為末粥丸亦可小其制而作湯 脾虛不化氣滯於中不能行其健運之職以灌四旁故腹滿也枳實瀉滯氣白朮健脾元俾健運有常則精微四達而腹滿無不退合左金丸為肝旺乘脾腹滿譫語之主方

肝乘肺證

傷寒發汗番番惡寒大渴欲飲水其腹必滿此肝乘肺也名曰橫刺期門自汗出小便利其病欲解發熱惡寒寒為在表渴欲飲水熱為在裏其腹因飲水多而滿此肝邪挾火尅金脾精不上歸於肺故大渴肺氣不能通調水道故腹滿是侮所不勝寡於畏也故名橫刺期門以瀉之發熱惡寒得自汗而解腹滿大渴得小便利而津氣自達也五苓散加青皮枳實亦無不可

首條肝乘心前條肝乘脾此條肝乘肺診家須着眼

五苓散

厥陰消渴欲飲水者少少與之愈

水能生木能制火厥陰消渴最宜之

厥陰中風證

脈微浮為風行地上陰出之陽故愈不浮為木鬱土中風淫地下故未愈厥陰為風木之藏復中於風  
變端必有更甚於他經者有欲愈脈失未愈證惜哉

### 烏梅丸證

傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此為藏厥非虵厥也虵厥者其人當吐虵令病者靜  
而復時煩此非藏寒虵上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者虵聞食食出其人故吐虵吐虵者烏梅  
丸主之又主久痢

傷寒厥冷脈微至七八日膚冷不煩而躁有陰無陽為藏厥不治虵厥亦膚冷脈微外寒內熱勿遽認  
為藏厥勿治其證顯在吐虵而細辨之在煩躁藏厥純寒躁而不煩虵厥挾熱煩而不躁靜而時煩與  
躁無暫安迥別此風木為病相火逆攻猶寒熱相半故烏梅丸可用連相是寒因熱用不特苦以安虵  
也

### 烏梅丸 治厥冷吐虵脈微者

烏梅三錢細辛三錢乾姜六錢黃連六錢附子六錢當歸錢人參六錢黃柏六錢蜀椒六錢桂枝六錢

十劑為末蜜丸亦可作湯 厥陰傷寒相火內鬱寒熱相搏於中故吐虵蓋虵生於濕得風木之化烏  
梅之酸入厥陰善收逆氣黃連之苦瀉心除煩兼以安虵黃柏之寒滋腎止渴更能燥濕附子以益  
火歸原也干薑蜀椒溫中除濕細辛桂枝散表祛寒人參當歸以調氣血此治虵之劑即厥陰治厥之  
主方

### 當歸四逆湯證

手足厥冷脈微欲絕者當歸四逆湯主之

此厥陰傷寒脈證雖無衛外之陽亦未見內寒吐利煩躁諸險證當歸四逆養營解邪則厥愈陽回而脈自復矣

當歸四逆湯 治厥陰傷寒手足厥冷脈細欲絕者

當歸三錢桂枝六分芍藥六分細辛四分甘草八分通草八分大棗三枚

水煎去渣溫服 厥陰傷寒內寄相火故雖手足厥冷而厥深熱深不可遽投薑附也但用桂枝解外而以當歸為君者厥陰主肝為藏血之室肝若急甘棗以緩之肝欲散細辛以散之通草通竅利一身之關節芍藥斂陰防相火之逆上此乃厥陰驅寒發表之劑為養營平肝之需方

當歸四逆加吳茱萸生薑湯證

若其人內有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯

久寒不用薑附者以厥陰受病必營血大傷第加吳茱萸生薑則營分受陰而寒邪外解脈道自復厥無不愈矣

當歸四逆加吳茱萸生薑湯 治厥陰藏寒厥冷脈細者

當歸三錢桂枝六分芍藥六分細辛四分甘草八分通草八分生薑三片大棗三枚吳茱萸六分酒炒

水煎去渣溫服 厥陰藏寒經久必傷營血外復傷寒則陽不外敷故手足厥冷脈細欲絕也當歸四

逆湯中桂枝得歸為生血於營細辛通草行氣於衛甘草得大棗則緩中以調肝營氣自得至於手太陰而脈自不絕本方能溫表以逐邪則衛氣能行於四末而手足自溫耳其久寒加吳茱萸厥陰之藏生薑溫空府之表此溫內解外之劑為厥陰經藏俱寒之需方

熱痢下重者白頭翁湯主之

熱痢下重是濕熱穢氣滯遏廣腸魄門重滯而難出也白頭翁湯清微其邪則濕熱化而滯氣自調下重無不自除矣

白頭翁湯 治熱痢下重脈沈數者

白頭翁 黃連 檳榔 秦皮 枳

水煎去滓熱服 厥陰下利後重者追是濕熱穢氣滯遏於陽明也白頭翁清理血分濕熱小秦皮佐

以平木升陽協之連柏清火除濕而止利此為清熱除濕之方乃熱利下重之宣劑也

下利欲飲水者以有熱故也白頭翁主之

渴欲飲水以有熱在裡為熱利也故主以白頭翁湯

白頭翁湯見前

下利脈沈按者下重也脈大者為未止脈微弱者為欲自止雖發熱不死

沈為在裡裡為少陽此胆氣不升火邪下陷故下重大為陽明大則病進故利未止微弱為虛利後數亦為虛虛則邪氣將盡故欲自止發熱是熱自裡發陰出之陽故不死

下利脈數有微熱汗出令自愈設脈復緊為未解

熱微脈數表有微邪裡有蓄熱也汗出則熱從外泄令利自愈設脈復緊是表不解而熱不得泄故利

未止

下利脈數而渴者令自愈設不差必圜膿血以有熱故也

下利脈數為虛利亡津液則渴水能制火則渴利自愈熱伏不差必傷血室故因膿血也  
下利寸脈反浮數尺中自滿者必因膿血

厥陰下利脈當驗於兩關今寸脈反浮數尺中自滿者是陽邪陷於陰中故必因膿血也  
傷寒六七日不利復發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也

六七日陰陽自和之際復發熱而利者正氣虛脫可知汗出不止陽亡而不能衛外也為有陰無陽故  
死

### 熱厥利證

傷寒一二日至四五日而厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反汗  
者必口傷爛赤

傷寒三日三陽為盡四五日而厥者三陰受邪也陰經受邪寒極生熱故先厥者後必發熱陰邪未散  
厥必復發厥之久者勢熱亦久厥之輕者勢熱亦輕熱與厥相應熱鬱三陰已入於府者可下而已陰  
不得有汗而強發之引火上升故口傷爛赤也此是胃熱而非胃實厥微者當四逆散芍藥枳實以攻  
裏柴胡甘草以和表也厥深者白虎湯參甘粳米以扶陽石膏知母以除熱也

### 四逆散

說少  
白虎湯

傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日故知自愈

熱與厥相應是陰陽和平故自愈厥終即不過五日即六日不復厥自愈

傷寒厥少熱微指頭寒默默不欲飲食煩躁數日小便利色白者此熱除也欲得食其病自愈若厥而嘔

身無大熱手足不冷但指頭寒是熱微厥亦微也默默不欲飲食是內寒亦微煩躁是內熱反其數日來小便利色白知內熱已除不煩不躁可知欲得食知內寒亦除不厥不嘔亦可知若雖熱少厥微反嘔不能食者此內寒稍深胸膈逆滿此內熱亦深熱深厥深熱傷陰絡故其後必圉膿血微者小柴胡和之深者大柴胡下之則熱解而厥亦解矣

小柴胡湯觀少

大柴胡湯觀少

傷寒發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多其病當愈四日至七日熱不除者其後必圉膿血

傷寒以陽為主厥少熱多是陽長陰消故其病當愈至七日熱若不除是熱勢太過必傷陰絡其後大便膿血矣甘草湯主之則熱與厥解而膿血自除矣

炙甘草湯心脈結代

傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽氣退故為進也

熱少厥多是陽消陰長宜病為進以熱微而厥反勝則寒自多而陽日少不急扶其陽而陰盛則亡也宜參附湯回其陽而厥自愈矣

參附湯 治陽虛陰盛熱少厥多脈微者

人參錢附子三錢

水煎去渣溫服 陽虛陰盛生氣日消故熱少厥多而病為進也附子補火扶陽以振生氣人參補氣扶元以通血脈則熱少厥多者無不陽回而厥自愈矣

發癰證

傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能食者恐為除中。食以蔗餅不發熱者知胃氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也。後三日脈之其熱續在脈和者期之是日夜半愈。所以然者本發熱六日厥反九日復發熱三日并前六日亦為九日與厥相應故期之是日夜半愈。後三日脈之而脈數其熱不罷者此為熱氣有餘必發癰膿也。

病雖發陽而陰反勝之故厥利此胃陽將乏竭也。當不能食今反能食恐為除中。除中者中空無陽求食以救反見善食之狀。食以蒸餅不發熱者是胃陽尚存尚能化食原是熱厥利厥深熱深故九日復能發熱厥利自止矣。若脈數熱甚此為熱氣有餘熱傷營血必發癰膿。便膿血是陽邪下陷於陰竅發癰膿是陽邪外結於形耳。

發熱而厥七下利為難治

發於陽者當七日愈今厥不止而反下利恐其陽已內亡故難治

傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利

先厥則後發熱是寒邪盛而陽氣微發熱則陽回而厥利自止見厥則陰邪盛而虛熱外退其寒內生故厥利復作也。厥與利相應則更是陽消陰長之機。

傷寒先厥後發熱而下利必自止而反汗出咽中痛者其喉為痺發熱無汗而利必自止若不止必使膿血便膿血者其嚙不瘳

此先陰後陽寒盛生熱之證。熱雖發而厥後而陽氣勝陰故厥利自止而不復發熱。熱氣有餘者又有犯上陷下之不同。下利不當有汗有汗是陽反上升故咽中痛而成喉痺無汗是陽從中發熱與厥應

也

傷寒發熱下利至甚厥不止者死厥逆躁者不得臥者亦死

炙甘草湯證

傷寒脈結代心動悸者炙甘草湯主之

厥陰傷寒是實傷心主神明不安故動悸心不主脈運行之機不利失其常度故結代也結與代皆陰脈傷寒得之是陽病見陰脈者死姑製炙甘草湯名復脈湯更欲挽回於萬一

炙甘草湯 治傷寒心動悸脈結代者

生地五錢人參錢炙甘草錢桂枝錢麻仁錢生薑錢大棗錢

水煎去渣入清酒一杯溫服 寒傷心主熱不可得泄而神明失養故動悸也以其人心血素虧不能

主脈故結代也需此滋陰和陽之劑生地為君冬為臣炙甘草為佐大劑峻補真陰反以甘草名方

者取其載藥入心以充血脈然寒涼之劑無以奉發陳蕃秀之機而寒終不散故必須參桂佐麥冬以

通脈散寒姜棗佐炙草以和營達邪膠麻佐地黃補血甘草不使速下清酒引之上行且地黃麥冬得

酒力而更優也 麻仁一味當是棗仁斯手厥陰心主傷寒也寒傷心主相火內鬱則血液枯涸而心

動悸脈結代製炙甘草湯以開後學滋陰之路蓋棗仁能養心寧神益血榮肝若麻仁第潤腸燥以通

虛開豈能入心主以操養血安神之任乎此非特傳寫之誤抑亦古今血氣不同耳

傷寒欬逆上氣其脈散者死謂其形損故也

外寒傷形內熱傷氣欬逆不止乃氣升不降也脈散不朝是心肺之氣已絕形不與氣相保故死

傷寒約編

卷六

三十五續

三十六續

陰陽易證

傷寒陰陽易之為病。其人身體重。少氣。少腹裏急。小便利。陰中拘攣。熱上冲胸。頭重不欲舉。眼中生花。膝脛拘急者。燒視散主之。

此證脈非傷寒。而曰傷寒者。原其起病之因也。今因淫情之不禁。而餘邪得以投其隙。移禍於不病之人。頓令一身之精氣。形神皆受熉火之為害。是不病於傷寒。而病於陰陽之為易。勿得以男女分名也。陰虛而淫邪湊之。故少氣而熱上冲胸。氣少不能運樞。故頭重不舉。身體皆邪中於陰。故陰中拘攣。衝任脈傷。故少腹裏急。精神散亂。故眼中生花。動搖拘急。故膝脛拘急也。病由於腎。毒侵水道。故小便不利。諒非土木金石所能治。仍須陰陽感召之理。以制之。斯視襦之以意相求也。

燒視散 治陰陽易脈數者

視襦近陰處剪方燒灰

入煎劑服。小便利。陰頭微腫即愈。無病人與傷寒溫疫初痊。不論男女合。頓令亦病。是餘邪乘熉火相感也。視襦者。男女陰陽之衝。衝乎外者。自能清乎內。感於無形者。治之以有形也。形氣相得。小便利。陰頭微腫。濁陰走下。竅清。陽出上竅。則熉火頓平。而諸證自息矣。男服女。女服男。更宜六味地黃合生地煎湯調下。則奏效始捷耳。

地黃湯見前寒熱證

諸寒熱證

病人身大熱。反欲近衣者。熱在外。膚寒在骨髓也。病人身大寒。反不欲近衣者。寒在外。膚熱在骨髓也。此屬內因。不是外感。身當大熱之時。反欲近衣者。乃皮膚之熱。雖以天時而積漸之寒。實在骨髓也。身

當大寒之時反不欲近衣者是皮膚之寒係天時而積漸之熱在骨髓也故遇天令之大寒大熱終不能除宜以六八味滋腎中真陰真陽而骨髓之積寒積熱無不漸平矣

六味地黃湯丸 治陰虛內熱脈數虛者

生地

八兩 芡肉 四兩 澤瀉 三兩 丹皮 三兩 茯苓 五兩 山藥 四兩

為末蜜丸亦可作湯 真陰內虛腎水不足不能制火而內熱於骨髓為生地滋陰壯水芡肉秘氣瀦精丹皮瀉血中伏火澤瀉瀉膀胱水邪山藥清虛熱於脾肺健脾益陰茯苓溼濕熱於肺脾通腎交心此為滋腎水退濕熱能除骨髓積熱之湯方也

八味丸湯 治水中火虛脈數細者

八味丸

即六味丸加熟附子 一兩 甜肉桂 一兩

真火內虛腎水亦不能足無以發育少火而積寒於骨髓為故以八味丸壯水補火能除骨髓積寒之湯方也亦可作湯分兩只宜十一耳

