

CATÁLOGO SISTEMÁTICO
DE TODA LA
FAUNA DE FILIPINAS
CONOCIDA HASTA EL PRESENTE,
Y Á LA VEZ
EL DE LA COLECCIÓN ZOOLÓGICA
DEL MUSEO DE PP. DOMINICOS DEL
COLEGIO-UNIVERSIDAD DE STO. TOMÁS DE MANILA,
ESCRITO CON MOTIVO
DE LA EXPOSICIÓN REGIONAL FILIPINA
POR EL
R. P. FR. CASTO DE ELEERA,
PROFESOR DE AMPLIACIÓN DE HISTORIA NATURAL
Y DIRECTOR DEL MENCIONADO MUSEO

VOLUMEN I.

VERTEBRADOS

MANILA

IMPRENTA DEL COLEGIO DE SANTO TOMAS

1893

Es propiedad.

59 - 4

E39

11
C.2Fishes

AL LECTOR.

PRESENTAR, en lo que cabe, de un solo golpe de vista, científicamente y por primera vez toda la Fauna de Filipinas conocida hasta el presente; ofrecer en compendio y metódicamente reunido, todo lo que sobre el Reino animal de este Archipiélago se halla esparcido en centenares de libros, folletos, memorias y revistas, publicado en diferentes idiomas por distinguidos Naturalistas; consignar algunas especies y variedades, ó desconocidas como existentes en esta Fauna, ó completamente nuevas, descubiertas por los colectores de este Museo de Santo Tomás, que años ha vienen recorriendo los diversos puntos del Archipiélago; formar como el croquis general de la obra que describa por extenso la Fauna Filipina, la cual, Dios mediante, saldrá á luz lo antes posible con las descripciones y láminas correspondientes; vulgarizar hasta cierto punto esta clase de conocimientos entre los habitantes de este país, consignando los nombres vulgares, con que son conocidos aquí los distintos animales, á fin de que por la clasificación científica puedan aquellos apreciar debidamente lo mismo que quizá conocen de una manera irreflexiva; estimular á todos al estudio de esta abundante é instructiva fase de la riqueza natural de Filipinas, y facilitársele mediante la reunión de la sinonimia de todas sus especies salvando así una de las mayores dificultades que ofrece el trabajo de clasificación; manifestar, en fin, al propio tiempo lo bien surtido de ejemplares zoológicos que se halla el Museo de este Centro científico, el más completo acaso, no sólo de estas regiones oceánicas, donde los asuntos mercantiles

*



más que los científicos suelen llamar la atención, sino aun quizá más rico y variado que muchos Museos de Europa: tal es el objeto del presente Catálogo, que el Director del Museo del Colegio-Universidad de Santo Tomás de Manila presenta á la Exposición Regional Filipina.

Ninguna ocasión, al parecer, más oportuna para dar á luz este modesto trabajo que la presente, en que todo el país se esfuerza generosamente en cooperar á la más brillante manifestación de la riqueza natural, agrícola, industrial, mercantil y hasta científica y literaria que encierra esta bella porción de los dominios españoles; y ya que por la premura del tiempo y dificultades insuperables de impresión, no haya sido posible presentar la Fauna completa y detallada, sirva el presente Catálogo como resumen suficiente para formarse idea de su grande riqueza y variedad.

Hállanse colocadas las Filipinas por lo que respecta á la geografía zoológica en la subregión Oriental, llamada Indo-Malaya, pero constituyendo al propio tiempo por sí solas un grupo particular, que sirve de lazo de unión a dicha Región con la Austro-Malaya, puesto que participa, aunque en diferente proporción, de las formas zoológicas de las dos Regiones, la Oriental y la Australiana.

Patentiza esta afirmación la mera lectura de este Catálogo. En él se comprueba fácilmente que Filipinas se halla respecto á la Fauna Malaya en la misma relación que lo están Madagascar con el continente Africano, las Antillas con la América del Sur, y Nueva Zelandia con Australia, esto es, que se distingue por la ausencia de casi todas las familias y géneros que caracterizan el resto de la Región Malaya á que pertenece, y al propio tiempo posee multitud de especies y hasta géneros propios y exclusivos de que carecen los demás países incluidos en la misma Región. De modo que, aún zoológicamente estudiadas estas Islas, son con todo rigor *insulares*, mientras que Borneo, Java y Sumatra que forman parte de la misma subregión que Filipinas, son verdaderamente *continentales* en casi todas las formas zoológicas de su respectiva Fauna, y esto mismo sucede con los países que se agrupan formando parte de la Región Australiana, pues todos ellos contienen las mismas especies que caracterizan á dicha Región Australiana.

Esta especialidad de la Fauna Filipina, unida á la menor profundidad de sus mares del Súr relativamente á la de sus mares Orientales, demostrada por multiples y minuciosos sondeos, ha movido á algunos sabios á pensar que estas Islas en unión con Borneo, Java y Sumatra no sólo formaron parte en tiempos anteriores relativamente recientes del continente Asiático, lo que ya habían sospechado nuestros primeros historiadores, sino que posteriormente y en época más reciente aun, Filipinas, después de haber permanecido unidas a alguna de esas Islas, se separaron definitivamente; con la cual hipótesis más ó menos probable, quieren explicar la causa de por qué Filipinas, careciendo de las formas zoológicas características de su Región, contienen sin embargo especies total y exclusivamente peculiares, que suponen haberse formado en el tiempo transcurrido desde su separación hasta el presente. Explicación gratuita es esta que no nos detendrémos en refutar, por no separarnos de nuestro objeto, derivada sin duda de la hipótesis no menos gratuita de la mutación de especies en sentido trasformista. Baste decir lo que todos sabemos, que cada animal, como cada planta, tiene su área, estación y habitación determinadas según su organización particular, formada por el conjunto de causas físicas y agentes que los rodean. Difícil sería á esos sabios demostrarlos que las formas zoológicas peculiares de Filipinas se formaron después de su separación del continente ó de esas Islas á las que se supone estuvieron unidas, y que no existían en ellas en los tiempos de su unión al continente. Especies peculiares contiene Mindoro, por ejemplo, que no se encuentran en Luzón, y sería ridículo afirmar que esas especies se hayan formado en Mindoro, después de haberse separado de Luzón. En una misma Isla se encuentran especies al Norte que no se hallan en la misma al Súr: si suponemos que esa Isla se divide en dos partes por un agente geológico cualquiera, cada parte seguirá conteniendo las propias especies que contenía antes, sin recibir más trasformación que las modificaciones debidas á la acción de los agentes físicos que les rodeen.

También por este Catálogo podrá apreciarse el inmenso valer de la Fauna Filipina, no menos rica y variada que su Flora, contra lo que hasta ahora se ha

venido creyendo por algunos, sino más abundante y variada que ella, con ser tan selecta y copiosa. Más de diez mil especies y variedades zoológicas de Filipinas contiene el presente trabajo, dos mil ~~cientos~~ doce de Vertebrados en este volumen, y las restantes en el segundo; mientras que las especies botánicas hasta el presente estudiadas no pasan de cinco mil cuatrocientas once. Se incluyen además unas setecientas especies exóticas que forman parte de la colección del Museo de Santo Tomás, y unas ciento veinte pertenecientes á Carolinas y Marianas, que se consignan aquí por formar parte de estas posesiones españolas, aunque zoológicamente consideradas corresponden á la Región Austro-Malaya.

Si se ha llamado á Filipinas *el paraíso de los muscos* por la abundancia y hermosa variedad de sus especies, no es menos rico y hermoso en las otras ramificaciones zoológicas. Aun en Mammalogía, en la cual algunos Naturalistas han escrito que este país se distinguía por la pobreza de especies, el presente Catálogo demuestra que es tan abundante y múltiple como la de cualquier otro país ó región del globo. Ciento setenta y seis especies ó variedades de mamíferos se consignan en este Catálogo, y aun cuando, como veremos al publicarse la Fauna detallada, y hacer la crítica de todas ellas, disminuirán probablemente las especies de Cérvidos y de alguna otra familia, siempre quedará esta clase abundantemente representada. No vacilamos en decirlo; ni por su Flora, ni por su Fauna tiene que envidiar Filipinas á ninguna otra región del mundo.

Estudio tan agradable e instructivo ha tenido en todo tiempo sus cultivadores. Ya desde los primeros años de la anexión á España, nuestros Misioneros, á la vez que difundían nuestra santa Religión entre los indígenas, y les enseñaban á vivir civil y cristianamente, no se descuidaron en estudiar este país y sus productos naturales, y en múltiples y apreciables escritos consignaron descripciones de algunos animales peculiares, las cuales, si bien es verdad que en la actualidad no están en armonía con el método científico, no dejan de ser interesantes, por ser los primeros datos sobre esta Fauna. Posteriormente distinguidos Naturalistas así españoles como extranjeros, que sería prolífico enumerar, hanse dedicado, muy en particular de algunos años á esta parte, al estudio de la Fauna Filipina. Comisiona-

dos por sus Gobiernos respectivos, ó por los Centros científicos de Europa y América, han recorrido casi todas las provincias del Archipiélago, recogiendo en sus excursiones científicas colecciones abundantes que han dado por resultado un conocimiento si no completo de esta tan rica Fauna, al menos más que suficiente para poder comprender su interés e importancia.

Entre los primeros, además de los Sres. Gilly, Baranda, Montero, Fungairiño, Domec, Busto, Mazarredo, y Pérez Maeso, quienes visitando localidades antes poco conocidas y estudiadas, reunieron importantes colecciones, que contribuyeron en gran manera á dar á conocer muchas de las especies características del Archipiélago, merecen citarse los Sres. D. Ramón Jordana y Morera, ingeniero de Montes que en su *Bosquejo geográfico-histórico natural del Archipiélago*, único trabajo de conjunto que se ha publicado en español, reunió casi todo lo relativo á la Fauna Filipina que entonces se conocía, posteriormente D. José Gogorza publicó en 1888 sus *Datos para la Fauna Filipina*, en donde consigna quinientas ochenta especies de Vertebrados filipinos, el distinguido conchólogo D. José Cuadras que en 1887 publicó sus importantes *Investigaciones conchológicas de Filipinas*, y el año pasado el *Catálogo de Moluscos* de esta Inspección de Montes, y el no menos célebre conchólogo Dr. D. J. F. Hidalgo que ha publicado un interesante Catálogo casi completo de los moluscos observados hasta hoy en las Islas, y por último los Sres. D. Hipólito Fernández, incansable colector, D. Domingo Sánchez, zoólogo auxiliar de esta Inspección de Montes, inteligente, activo y entusiasta de esta Fauna, que además de haber formado una importante colección, en 1890 publicó una bien escrita *Memoria sobre el Nylotrechus sp.* insecto destructor de los cafetos que tanto daño ha ocasionado en algunas de estas provincias, y el laborioso D. Regino García, auxiliar botánico de la misma Inspección, y no menos entusiasta colector zoológico, á quien se debe el conocimiento de muchos nombres vulgares de los peces de Filipinas.

Entre los extranjeros que más han enriquecido la Fauna Filipina, además de los sabios colaboradores de los Catálogos del Museo Británico, de donde se han tomado muchas de las sinonimias de este Catalogo,

merecen particular mención los distinguidos Naturalistas franceses Sonnerat, Mallat, P. de la Gironiere, Souleyet, Marche y el P. Heude S. J.; los ingleses Cuming, Sharpe, Günther, Boulenger; Swinhoe, Lord Walden, Everetti, y el Marqués de Tweeddale; los alemanes Meyer, Semper y Jagor; el italiano Salvadori; y los norte-americanos Dr. Steere, Franck S. Bourns, y Worcester, y otros muchísimos más, todos los cuales en sus diferentes y utilísimos escritos han tratado distintos puntos de esta Fauna, formando un nucleo importantísimo de estudio que demuestra bien claramente su riqueza y variedad.

Con el deseo de contribuir por nuestra parte á que la Fauna de Filipinas sea mejor conocida y apreciada que hasta el presente, unimos á todos los escritos de esos distinguidos Naturalistas este pequeño trabajo, que esperamos sea acogido con benevolencia por el público ilustrado.

Manila 23 de Enero de 1895.



ADVERTENCIA.

Para mejor inteligencia del presente Catálogo, debemos advertir que después de ordenarle metódicamente consignando el tipo, la clase, familia y género, antes del nombre específico se consigna sólo la inicial del género, á fin de evitar repeticiones innecesarias; á continuación de la especie y en la misma línea se ponen los signos ♂, macho, ♀ hembra, las iniciales *N. v.* que significan *Nombre vulgar*, y después se añaden las iniciales (*M. S. T.*) que se leen *Museo de Santo Tomás*, para indicar que dicha especie figura en la colección de este Museo. Después sigue la sinonimia ó sea los diferentes nombres que han dado á aquella especie los distintos Naturalistas en sus escritos respectivos que allí se citan. Continúa la palabra *Hab.*, que se lee *habitat*, y sirve para manifestar los diversos puntos donde dicha especie se encuentra. Para conocer si una especie es ó no peculiar y exclusiva de Filipinas, basta tener presente que siempre que sea esa especie común á otros países, después de consignar todos los puntos de las Islas, donde hasta el presente se ha encontrado, se expresa á continuación algún nombre de los otros países, y si sólo figuran nombres de puntos de Filipinas es señal de que dicha especie es peculiar y exclusivamente Filipina. Si por el contrario en el *habitat*, no aparece ningún nombre de las Islas, indica que la especie es exótica, y forma sin embargo parte de la colección Zoológica del Museo de Santo Tomás. Finalmente, las especies que á continuación de su nombre científico no lleven las iniciales de algún Naturalista, son nuevas y hasta el presente no clasificadas, y las que en el Índice lleven el asterisco * son especies por primera vez conocidas como existentes en Filipinas. De este modo sencillo y breve se comprenderá más fácilmente el presente Catálogo.

Tipo I.^o VERTEBRADOS.

Clase 1.^a MAMÍFEROS.

Subclase 1.^a MONODELFOS.

Orden 1.^o CUADRUMANOS (Simios.)

Fam. 1.^a SÍMIDOS.

Subfam. 1.^a SIMINOS.

1 Género SIMIA, LIN.

1. **S. satyrus**, Lin. var. *bicolor*. ♀ N. v. Orang-outan. (Museo Sto. Tomás.)

S. abelii, Fischer; Reich., 496, tête; *gigantica*, Pearson.
S. wurmbii, Owen; Reich., 450, 499; ² mias-pappan, Van Kessel.
S. bicolor, Is. Geoff.; Gerv., Mamm., 1, pl. 1; Reich., 497, tête.
S. morio, Owen; ² mias-rambi, Van Kessel; Reich., 453, 500.
S. wallichii, Blainv.; ² mias-rassar, Van Kessel; Reich., 498, tête.
Habita en Borneo, Sumatra.

Subfam. 2.^a HILOBATINOS.

2 Gén. HYLOBATES, LIG.

* 2. **H. funereus**, Is. Geoff. ♀ N. v. G. wou-wou. (M. S. F.)

H. funereus, Is. Geoff. Arch. du Mus., v. p. 532, t. 26; Reich. 445.
Hab. en la Isla de Joló y Mindanao.

Fam. 2.^a CERCOPITÉCIDOS.

Subfam. SEMNOPITECINOS.

3 Gén. SEMNOPITECUS, Cuv.

3. **S. entellus** F. Cuv. ♂ N. v. Mandi. (M. S. F.)

S. entellus, Dufrêne; F. Cuv.; Audeb. 4, 2, pl. 2; Bonnet, Gard. and Menag., I, fig.; Reich., 227-230.
Hab. en Bombay, Bengal, Nepal.

4. *S. dussumieri*, Desm. ♀ N. v. Houneman. (M. S. T.)

S. dussumieri, Is. Geaff., Arch. Mus., 2, 1841, pl. 1; Reich., 234, pl. 9. Johnii, Gray 235; Gerv., pl. 4; «Entelle vieux», F. Cur., M., (nec Fischer, nec Martn).

✓ 5. *S. hypoleucus*, Blyth; Reich., 231, 232.

S. thersites, Elliot, Proc. As. Sc. Beng., fig. Hab. en Ceilan.

5. *S. leucoprymnus*, Desm. ♀ N. v. id. (M. S. T.)

Cercopithecus? leucoprymnus, Ott. Nov. Acta Acad. Nat. Cur. xii, p. 505. Sepnopithecus? leucoprymnus, Desm. S. Nestor, Bennett, P. Z. S. 1833, p. 67, B. M.! *S. fulvogriseus*, Desm. *S. dentatus*, Shw. Cercopithecus latibarbarus, Geff. *S. porphyrops*, Link. Presbytis cephalopterus, Gray, List M. R. M. 4^o Cercopithecus cephalopterus, Zinn.
Hab. Ceilan.

✓ 6. *S. albipes*, I. Geff. N. v. id.

S. pallipes, Elliot; Blyth, An. et Mag. N. H. 1844 p. 312.
S. albipes, I. Geff. Cat. 14; Arch. du Mus. v. p. 576.
Hab. en la isla de Joló. Madrás.

4. Gén. NASALIS, GEOFF.

7. *N. nasica*, Schreb. ♀ N. v. Kahau. (M. S. T.)

N. nasica, Audeb., 4, 2, pl. 1; Schreber, pl. 10, 10; Buff., Suppl. 7, pl. 11, 12. Dahlbom, pl. 4; Müll. et Schl., Verh., pl. 12, juv.; Reich., 317-320.

N. larvatus, E. Geff. ex Wurmb.; rostrata, Blum. Abb., pl. 13.
N. recurvus, Vig. et Horsf., juv.; Gerv., p. 58, tête.
Hab. Borneo.

5. Gén. CYNAMOLGUS, REICH.

8. *C. cynamolgus*, Shr. C ♀ N. v. Machin. (M. S. T.)

Macaque à nigrette, Buff. H. N. XII^o, t. 20, 21.

Macacus aygula, Aud., 4, 2 pl. 3.

Simia cynomolgus, Lin. Syst. Nat.

Sennopithecus fascicularis, Raffles; Mart. (apud Schlegel) Reich 222.

Hab. en todas las Filipinas, India, Sumatra, Borneo, Java, Malaca, Siam.

✓ 9. *C. philippensis*, I. Geff. var. *albina*. N. v. Chongo.

Macacus philippensis, I. Geff. Arch. Mus. 2, pl. 5; Reich. 340; Jerv. p. 88.

Hab. Luzón, Cavite, Pangasinan.

✓ 10. **C. palpebrosus**, *L. Geoff.* ♂ N. v. id. (M. S. T.)

Macacus palpebrosus, *J. Geoff. Cat.* p. 92; *Arch. Mus.* v. p. 542.
Hab. Luzón, Laguna, Albay.

✓ 11. **C. fur**, *Stack. var.* N. v. id.

Macacus fur, *Stack. Proc. Natl. Sci. Phil.* 1857 pl. 1.
Hab. Luzón, Islas de Nicobar.

✓ 12. **C. var. cumingii**, *Gray.* ♂ ♀ N. v. id. (M. S. T.)

Macacus cynamolgus, *var. cumingii*, *Gray.*
Hab. Luzón.

6. Gen. MACACUS, LACEP.

✓ 13. **M. speciosus**, *F. Cuv.* ♂ N. v. Bruh. (M. S. T.)

M. speciosus, *F. Cuv.* *Mimim.* *Lith.*; *Reich.* 365, 366.
Innuus speciosus, *Tem. Faun. Jap.* pl. 1, 2.
In. fuscatus, *Sclat.* 1870; *speciosus*. *Sclat.* 1875, *P. Z. S.* pl. 47.
Hab. Joló y Japón.

14. **M. maurus**, *F. Cuv.* ♂ (M. S. T.)

Hab. la India.

15. **M. rhesus**, *Desm.* ♂ N. v. Bunder. (M. S. T.)

Macaque à queue courte, *Buffon. H. N.* *Supp.* vii. t. 13. Simia Rhesus, *Audeb.* t. 1. S. erytræa *Schreb.* Macacus erythraeus, *Is.* *Geoff. Voy. Bolang.* Simia patas, *Link.* M. rhesus, *Desm.* M. nipalensis, *Hodgson.*
Hab. Bombay.

16. **M. sinicus**, *Linn.* ♂ N. v. Munga. (M. S. T.)

Bonnet chinois, *Buff. H. N.* xiv. t. 30. Simia sinica, *Linn.* Cynocephalus sinensis, *Latr.* Cercopithecus sinicus, *Desm.* (not *Geoff.*) Macacus radiatus, *Geoff. (Mus. Paris).*
Hab. Bengal.

17. **M. nemestrinus**, *Liun* ♀ N. v. Barou. (M. S. T.)

Pig-tailed Monkey, *Edu. Glean.* t. 214. Maimon, *Buffon. H. N.* xiv. t. 19. Simia nemestrina, *Liun.* Macacus nemestrinus, *Desm.* S. carpolegos, *Baffles!* S. cristata, *Fischer.* S. platipygos *Scrib.* S. fuscus, *Shaw.*
Jeune? Babouin à longues jambes, *Buffon.* *Supp.* vii. t. 8. S. longierurus, *Link.*
Hab. Bombay.

*

✓ 18 **M. nemestrinus**, var. *philippina*. ♂ ♀ N. v. Cuongo. (M. S. T.)
Hab. Luzón, Indian (Cavite).

14 Gén. CYNOPITHECUS, LESS.

✓ 19. **C. aethiops**, *Zim.* ♂ ♀ N. v. Machin (M. S. T.)
Papio aethiops, *Zimm.*
Cynocephalus niger, *Desm.*; *Bennet*, *Gray*; *Spic. Zool.* pl. 1, fig. 2.; *Schleg. Handl.* pl. 1, 4.
Cy. aethiops, *Reich.* 404-407; *Jerr.* p. 99, 100.
Cynopithecus niger, *Lesson*, *I. Geoff.*
Papio nigrescens, *Tenn.*
Hab. isla de Negros, y Joló. Célebes, Gorontalo y Tomini.

Fam. 3.º CÉBIDOS.

S. Gén. CEBUS, ERNL.

20. **C. chrysopus**, *F. Cuv.* ♀ N. v. Sajou. (M. S. T.)
♀ *C. unicolor*, *Spix. Bras.* t. 42 Cebus chrysopus, *F. Cuv.* Mamm.
Lith. t. *C. chrysopus*, *Fischer.*
Hab. Colombia.

Orden 2.º PROSIMIOS.

Fam. LEMÚRIDOS.

Subfam. NICTICEBINOS.

1. Gén. NYCTICEBUS, GEOFF.

✓ 21. **N. tardigradus**, (*Lin.*) *Fisch.* ♂ ♀ N. v. Tonger. (M. S. T.)
Nyct. tardigradus, *Finch. ex L.*; *Kosmier* pl. 6.; *Audeb.* pl. 1. *Buff. Suppl.* 7, pl. 36; *Gerv.* p. 157.
Lemur tardigradus, *Lin. Syst. 1. nat.*
Loris bengalensis, *E. Geoff.*, *sondaicus*, *Fitz.*
Hab. Bohol, Bengala, Malaca, Birmania, Sumatra, Borneo.

Fam. TÁRSIDOS.

2. Gén. TARSIUS, STORR.

22. **T. spectrum**, (*Pall.*) ♂ ♀ N. v. Mago. M. S. T.

Lemur spectrum, *Pall.*; *Buff.* 13 pl. 87; *Schleg. Handl.* 1857, pl. 1, f. 9.; *Aud. f. 1.*

Didelphis macrotarsus, Schreb.; *tarsius*, Erxleb.

Tarsius daubentonii, I., Geoff.

T. fuscomanus, Fischer; Makis fig. 3; Fischeri, Desm.; *bancanus*, Sw.; *fuscus*, Horsf.

Hab. Samar, Leyte, Bohol, Mindanao; Java, Borneo, Célebes, Sumatra.

Orden 3.^o QUIRÓPTEROS.

Suborden 1.^o MEGAQUIRÓPTEROS.

Fam. 1.^a TEROPÓDIDOS.

1. Gén. PTEROPUS, BRISS.

1. *Pt. phaeocephalus*, Oldfield.

Hab. en las Islas Carolinas.

2. *Pt. breviceps*, Oldfield.

Hab. en las Islas Carolinas.

✓ 3 *Pt. leucopterus*, Temm. & O. N. v. Paniqui. M. S. T.

Pt. leucopterus, Temminck. Esquiss. Zool. sur la côte de Guiné, p. 60 (1853).

Spectrum leucopterus et Pt. chinensis, Gray, Catal. Monkeys and Fruit-eating Bats, pp. 102 & 111 (1870).

Hab. Luzón, Cagayan.

✓ 4 *Pt. edulis*, Geoff. & O. N. v. id. M. S. T.

Pt. edulis, Geoffroy, Ann. du Mus. xv. p. 90 (1810); Temm. Monogr. Mammal. i. p. 172, ii. p. 58; Peters, MB. Akad. Berl. 1867, p. 324; Dobson, Journ. Asiat. Soc. Beng. 1873 p. 197, pl. xiv. fig. 1 (ear); Monogr. Asiat. Chiropt. p. 20 (1876).

Pt. javanicus, Desm. Mamm. p. 109 (1820).

Pt. funereus, Temm. l. c. ii. p. 63 (1835-41).

Hab. Samar, Dinagat, Leyte, Cebú, Malasia, Java, Sumatra, Borneo.

✓ 5 *Pt. hypomelanus*, Temm. & O. N. v. id. (M. S. T.)

Pt. hypomelanus, Temm. Esquiss. Zool. sur la côte de Guiné, p. 61 (1853); Wagner, Suppl. Schreb. Säugeth. v. p. 599 (1857); Peters, MB. Akad. Berl. 1867 p. 350.

Pt. tricolor, Gray, Catal. Monkeys and Fruit-eating Bats, p. 108 (1870).

Hab. Dinagat, Mindanao, Luzón, Célebes, Ternate y Nueva Guinea.

6 Pt Keraudrenii, Q. et G. N. v. id.

(M. S. T.)

- ♂ Pt. mariannus, *Desm. Mamm.* p. 547 (1822).
Pt. keraudren, *Quoy et Gaimard, Voyage de l'Uranie*, i. p. 51,
pl. 3 (1824).
Pt. keraudrenius, *Temm. Monogr. Mammal.* i. p. 186 (1827);
Wagner, Suppl. Schreb. Säugeth. v. p. 600 (1857).
Pt. tonganus et vanicorensis, *Quoy et Gaimard, Voyage de l'Astro-*
trolabe, i. p. 74, pls. 8 & 9 (1833).
Pt. insularis *Hombr. et Jacquinot, Voyage au Pôle Sud*, pl. 5;
Peters, MB. Akad. Berl. 1869, p. 371.
Pt. dussumieri, *Geoffroy, Diction. Class.* xv. p. 701.
Pt. geddei, *Macgillivray, Peters, l. c.* 1867, p. 326.
Pt. keraudrenii, *Peters, l. c.* p. 331.
Pt. flavigollis et geddei et vitiensis, *Gray Catal. Monkeys and*
Fruit-eating Bats, pp. 107, 109 (1870).
Hab. las Islas Marianas, y en casi toda la Subregión Po-
linesiana.

7 Pt. insularis, H. et G. var. N. v. id

- Pt. insularis, *Hombr. et Jacq. Voy. au Pôle Sud.* pl. v.; *Ptro,*
MB. Akad. Berl. 1869, p. 391.
Hab. en las Islas Carolinas, Jap. y Palaps.

✓ 8. Pt. jubatus, *Esh. ♂ N. v. id.*

(M. S. T.)

- Pt. caniceps, *Gray, Catal. Monkeys and Fruit-eating Bats*, p. 107
(1870).
Pt. affinis, *Gray, l. c.* p. 108.
Hab. la Paragua, Mindanao, Joló, Dinagat, Luzón y Ba-
tangas.

✓ 9 Pt. philippinensis, ♂ N. v. id.

(M. S. T.)

- Hab.* Luzón, Cagayan, Pangasinan, Samar, Borongan, Para-
gua, P. Princesa.

2 Gén. CYNONYCTERIS, PIERS.

✓ 10 Cy amplexicaudatus, (*Geoff.*) ♂ N. x. Calapnit. (M. S. T.)

- Pt. amplexicaudatus, *Geoffroy, Ann. du Mus.* xv. p. 95 (1810);
Temminck, Monogr. Mammal. i. p. 200 (1827).
Pt. leschenaultii, *Desmar. Mammal.* p. 110 (1821); *Blyth, Catal.*
Mammal. Mus. Asiat. Soc. Beng. p. 21 (1863).
Pt. pyrivirus, *Hodgson, Journ. Asiat. Soc. Beng.* 1835, p. 700.
Pt. seminudus, *Kelaar, Journ. Asiat. Soc. Beng.* 1852, p. 345.
Cy. amplexicaudata, *Peters, MB. Akad. Berl.* 1867, p. 865; *Dobson,*
Proc. Asiat. Soc. Beng. 1872, p. 154; *Journ.*
Asiat. Soc. Beng. 1873, p. 202, pl. xiv. fig. 8 (ear); *Monogr.*
Asiat. Chiropt. p. 29 (1876).

Eleutherurus marginata, *infuscata*, *philippinensis*, *Gray*, *Catal.*
Monkeys and Fruit-eating Bats, pp. 118-119, (1870.)
Cy. infuscata, *Peters*, *I. c.* 1873, p. 487.
Hab. Luzón, Laguna, Batáan, Sumatra, Ceilan, Flores,
Timor.

3 Gén CYNOPTERUS, F. Cuv.

✓ 11. *Cy. marginatus*, *Geoff* ♂♂ N. v. Calapnit. (M. S. T.)

Pt. marginatus, *Geoff*, *Ann. du Mus.* xiv, p. 97; *Temm. Monogr. Mammal.* i, p. 202, pl. xiv.

Cynopterus marginatus, *F. Cuvier*, *Dents des Mammif.* p. 39 (1825); *col. tart*, *Prodr. Faunæ Zeylanicæ*, p. 18 (1852); *Blyth*, *ibid.* p. 37; *Peters*, *MB. Akad. Berl.* 1867, p. 866; *Jerdon*, *Mamm. of India*, p. 20 (1870); *Gray*, *Cat. Monkeys and Fruit-eating Bats*, p. 122 (1870); *Dobson*, *J. A. S. B.* 1873, p. 200, pl. xiv, fig. 4 (ear); *Monogr. Asiat. Chiropt.* p. 24.

Pt. tittheacheilus, *Temm*, *I. c.* i, p. 198.

Pachyoma diardii et duvaucellii, *Is. Geoffr. Dict. Class. Hist. Nat.* xiv, p. 705; *Temm*, *I. c.* ii, pp. 95, 96.

Pt. brevicaudatum, *Is. Geoff*, *I. c.*; *Temminck*, *I. c.* p. 92.

Pt. pyrivirus, *Hodson*, *P. Z. S.* 1836, p. 36.

Cynopterus horsfieldii, *Gray*, *Cat. Mamm. Brit. Mus.* p. 38 (1843); *Horsfield*, *Cat. Mamm. Mus. E. I. Comp.* p. 30 (1851).

Pa. luzoniense, *Peters*, *MB. Akad. Berl.* 1861, p. 708.

Eleutherurus marginata, *Gray*, *P. Z. S.* 1860, p. 64.

Hab. Luzón, Abra, Paragua, Java, Sumatra, Borneo, Siam, Ceilan.

✓ 12. *C. latidens*, *Dobs.* ♂♂ N. v. Colapnit. (M. S. T.)

Hab. en Luzón, Laguna, Batangas, y el Archipiélago Malayo.

Subgen. PTENOCHIRUS, PTRS.

✓ 13. *Pt. jagorii*, *Ptrs.* N. v. id.

Pachysoma (Ptenochirus) jagorii, *Ptrs.*, *M. B. Akad. Berl.* 1861 p. 707.

Cynopterus jagorii, *Dots. Monogr. Asiat. Chiropt.* p. 28 (1876).

Hab. Luzón, Ilocos, Pangasinan, Pampanga, Nueva-Ecija.

4 Gén. MACROGLOSSUS, F. Cuv.

✓ 14. *M. minimus*, *Geoff*. N. v. Cabag. (M. S. T.)

Pteropus minimus, *Geoffroy*, *Ann. du Mus.* xv, p. 97 (1810).

Pt. rostratus, *Horsfield*, *Zool. Research. in Java* (1825).

MacroGLOSSUS minimus, *Temminck*, *Monogr. Mammal.* i, p. 191,

ii, p. 96 (1835-41); *Horsfield*, *Cat. Mammal. Mus. E. I. Comp.* p. 29 (1851); *Gray*, *Proc. Zool. Soc. Lond.* 1866, p. 64;

Peters, *Monatsb. Akad. Wissenschaft. Berl.* 1877, p. 671; *Gray*,

Cat. Monkeys and. Fruit-eating Bats, 1870, p. 115; *Dobson, J. A. S. B.* 1873, p. 205; *Monogr. Asiatic Chiropt.* pp. 34, 35, fig.
Hab. Panay, Samar, Cuyo.

Suborden 2.º MICROQUIRÓPTEROS.

Fam. RINOLÓFIDOS.

Subfam. RINOLOFINOS.

1 Gén. RHINOLOPHUS, GEOFF.

✓ 1. **Ph. luctus**, Temm. ♂ N. v. Cabag. (M. S. T.)

Rh. luctus, Temm., *Monogr. Mammal.* ii, p. 24, pl. XXX; Peters, *MB. Akad. Berl.* 1871, p. 304; Dobson, *Monogr. Asiatic Chiroptera*, p. 39 (1876).

Rh. luctus, var. rufus, *Eydoux et Gervais, Voy. Favor. Zoologie*, 2º part. (1830).

R. morio, Gray, *Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1842, p. 257.

Rh. perniger, *Hodgs. Journ. As. Soc. Beng.* xii, p. 414, xiii, p. 484; *Horsf., Cat. Mamm. Mus. E. I. Comp.* (1851).

Aquias luctus, Gray, *P. Z. S.* 1847, p. 17; *id 1866*, p. 81.

Hab. en Luzón, Paragua, Leyte, Mindanao.

✓ 2 **Rh. philippinensis**, Waterh. ♂ N. v. Cabag. (M. S. T.)

Rhinolophus philippinensis, Waterh., *P. Z. S.* 1843, p. 68; Peters, *MB. Akad. Berl.* 1871, p. 305, Dobson, *Monogr. Asiatic Chiropt.* p. 43 (1876).

Phyllotis Philippensis, Gray, *P. Z. S.* 1866, p. 81.

Hab. en Luzón, Laguna, Cavite.

✓ 3 **Rh. rufus**, Thrs. ♂ N. v. Cabag. (M. S. T.)

Rh. rufus, Peters, *MB. Akad. Berl.* 1861, p. 710; Dobson, *Monogr. Asiatic Chiropt.* p. 44 (1876).

Rh. euryotis, Peters (*non Temm.*), *I. c.* 1861, p. 710.

Rh. arcuatus, Peters, *I. c.* 1871, p. 305.

Hab. Luzón, Manila, Bataan, Bulacan, N.ª Ecija, Batangas.

Subfam. FILORRININOS.

2. Gén. PHYLLORHINA, BR.

✓ 4. **Ph. diadema**, Geoff. ♂ N. v. Cabag. (M. S. T.)

Rhinolophus diadema, Geoff., *Ann. Mus. d' Hist. Nat.* xx, p. 263.

Rhinolophus nobilis, Horsfield, *Zool. Research. in Java*.

- Rh. griseus, *Meyen, Nova Acta Acad.* xvi. 2, p. 603.
Rh. diadema et nobilis, *Temm., Monogr. Mammal.* ii. p. 10.
Hipposideros nobilis, *Cantor, Journ. Asiatic. Soc. Beng.* xv.
p. 182.
Hip. lankadiva, *Kelaart, Prodr. Faun. Zeylan.* p. 19.
Phyllorhina diadema, *Peters, MB. Akad. Berl.* 1871, p. 315;
Dobson, Monogr. Asiat. Chiropt. p. 61 (1876).
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Cavite, Indian, Paragua, Min-
danao, Java, Borneo.

✓ 5 **Phy. pygmæa**, *Wat. C. N. v. Caguing.* (M. S. T.)

- Rhinolophus pygmaeus, *Waterh., P. Z. S.* 1843, p. 67.
Phyllorhina pygmæa, *Gray, P. Z. S.* 1866, p. 82; *Peters, Mo-*
natsb. Akad. Berl. 1871, p. 317; *Dobson, Monogr. Asiat.*
Chiropt. p. 63. (1876).
Hab. Luzón, Batangas, Laguna, Los Baños.

✓ 6 **Phy. larvata**, *Horsf. C. N. v. Talibatah.* (M. S. T.)

- Rhinolophus larvatus, vulgaris, insignis et deformis, *Horsf., Zoo-*
log. Research. in Java (1824).
Rh. insignis, *Temm., Monog. Mammal.* ii. p. 74.
Hip. insignis, *Gray Mag. Zool. & Bot.* ii. p. 492.
Hip. vulgaris, *Blyth, Journ. As. Soc. Beng.* xiii. p. 488.
Hip. larvatus, *Blyt, Cat. Mammal. Mus. As. Soc.* p. 26.
Speorifera vulgaris, *Gray, Proc. Zool. Soc. Lond.* 1866, p. 82.
Phyllorhina larvata, *Peters, MB. Akad. Berl.* 1871, p. 320;
Dobson, Monogr. Asiat. Chiropt. p. 68, figs. a, b (nose-leaf)
(1876).
Hab. Luzón, Manila, Antipolo, Java, Siam, Bengal.

✓ 7. **Phy. obscura**, *Ptrs. N. v. Cuyayapnit.* (M. S. T.)

- Phyllorina obscura, *Peters, MB. Akad. Berl.* 1861, p. 709, and
1871, p. 326; *Dobson, Monogr. Asiat. Chiropt.* p. 73 (1876).
Hab. Dinagat, Mindanao.

✓ 8. **Phy. coronata**, *Ptrs. N. v. id.* (M. S. T.)

- Phyllorhina coronata, *Peters, MB. Akad. Berl.* 1871, p. 327;
Dobson, Monogr. Asiat. Chiropt. p. 72 (1876).
Hab. Mindanao, Paragua, Samar.

9. **Phy. bicolor**, *Temm. C. N. v. Balachbalac.* (M. S. T.)

- Rhinolophus bicolor, *Temm., Monogr. Mammal.* ii. p. 18 (1835-41).
Phyllorhina antricola, *Peters, MB. Akad. Berl.* 1861, p. 709.
Phy. bicolor, *Peters, l. c. 1871*, p. 323; *Dobson, Monogr. Asiat.*
Chiropt. p. 70 (1876).
Hab. Cuyo, Calamianes, Paragua, Borneo, Java y Nicobar.

Fam. NICTÉRIDOS.

I. Gén. MEGADERMA, GEOFF.

1. **M. spasma**, (Lin) ♂. N. v. Talibatab.

(M. S. T.)

- Vespertilio spasma, *Linnæus*, *Syst. Nat.* 1758, p. 32; *Schreber*, *Säugethiere*, i, p. 158, p. I. xlvi. (1775).
Megaderma spasma, *Geoff*, *Ann. du Mus.* p. 195 (1810); *Cantor*, *Journ. Asiat. Soc. Beng.* 1846, p. 179; *Blyth*, *Append. Kelaart's Prodri. Fauna Zeylanicae* p. 38 (1852); *Peers*, *MB. Akad. Berl.* 1872, p. 193; *Dobson*, *Monogr. Asiat. Chiropt.* p. 79 (1876).
Meg. trifolium, *Geoff*, l. c. p. 193; *Wagner*, *Suppl. Schreb. Säugeth.* i, p. 415 (1844), v, p. 642 (1855).
Meg. philippinensis, *Walterh.*, *P. Z. S.* 1843, p. 69.
Meg. horsfieldii, *Blyth*, *Catal. Mammal. Mus. Asiat. Soc. Beng.* p. 23 (1863).
Hab. Luzón, Placer, Mindanao, Borneo, Célebes, Java, Singapur.

Fam. VESPERTILIÓNIDOS.

I. Gén. VESPERUGO, KEYS.

1. **Vesperugo pachypus**, Temm. ♂. N. v. Cabag. (M. S. T.)

- Vespertilio pachypus, *Temm.*, *Monogr. Mammal.* ii, p. 217, pl. 54, figs. 4-6.
Vesperus pachypus, *Wagner*, *Suppl. Schreb. Säugeth.* v, p. 741 (1855); *Dobson*, *Proc. Asiat. Soc. Beng.* 1871, p. 212.
Scotophilus fulvidus, *Blyth*, *Journ. Asiat. Soc. Beng.* xxviii, p. 293.
Tylonycteris pachypus, *Peters*, *MB. Akad. Berl.* 1872 p. 704.
Ty. meyeri, *Peters*, l. c. p. 705.
Vesperugo pachypus, *Dobson*, *Monogr. Asiat. Chiropt.* p. 715 (1876).
Hab. Luzón, Cebú, Negros, Mindanao, Java, Sumatra.

* 2. **Vesp. noctula**, Schr. ♂. N. v. Curatapit. (M. S. T.)

- Vespertilio noctula, *Schreber*, *Säugeth.* i, p. 166, pl. 52 (1875); *Gmel. Linn. Syst. Reg. Anim.* i, p. 146 (1788); *Desmarest*, *Mammalogie* (1820), p. 136; *Temm.*, *Monogr. Mamm.* ii, p. 169 (1835-41); *Jenyns*, *Brit. Vertebr.* p. 23; *Boënap. Fauna Ital.* fasc. xxi. (1837); *Bell's Brit. Quadrup.* p. 12, wdet (1837); *De Sélys-Longch. Faune Belge*, 1842.
Vesp. magnus, *Berkenhout*, *Synop. Nat. Hist. Gt. Brit. & Irel.* p. ii. (1789).
Vesp. altivolans, *White*, *Nat. Hist. Selborne* (1789).
Vesp. scrotinus, *Geoff*, *Ann. du Mus.* viii, p. 194 (1806).
Vesp. proterus, *Kuhl*, *Wetter*, *Ann.* iv, p. 41 (1817).
Vesp. libitata, *Hodgson*, *Journ. Asiat. Soc. Beng.* iv, p. 700 (1835).
Scotophilus noctula, *Gray*, *Mag. Zool. & Bot.* ii, p. 497 (1838).

- Vesperugo noctula, Keys, & Blas, *Wieg. Archiv.*, 1839, p. 317;
Wirborth, *Europ.*, p. 46; Wagner, *Suppl. Schreb. Säugeth.* v.
p. 728 (1855); Blasius, *Fauna Deutschl.* p. 53, wdet. p. 54
(1857); Lilleborg, *Sver. Norges Ryrgradsdjur*, p. 134 (1874);
Dobson, *Monogr. Asiat. Chiropt.* p. 88. (1876).
Vespertilio macuanus, Peters, *Reise nach Mossambique*, *Säugeth.*
p. 61 (1852).
Noctulinia noctula, Jerdon, *Mamm. of. India*, p. 36 (1867).
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Borneo, Java, China.

* 3 **Vesp. maurus**, *Piss. ♂♂ N. v. Cabag.* (M. S. T.)

- Vesperugo maurus, *Blasius Wieg. Archiv.* 1853, p. 35; *Fauna Deutschl.* p. 67, figs. 43 44 (1857); Dobson, *Monogr. Asiat. Chiropt.* p. 99, figs. a. b. (1876).
Scotophilus darwini, Tomes, *P. Z. S.* 1850, p. 70.
Vesp. mordax, Peters, *MB. Akad. Berl.* 1866, p. 408.
Vesp. pulveratus, Peters, *P. Z. S.* 1870, p. 617.
Pipistrellus austenianus, Dobson, *P. A. S. B.* 1871, p. 213.
Hab. Luzón, Manila, y toda las regiones Paleartica y Oriental.

* 4. **Vesp. abramus**, *Temm. ♂♂ N. v. id.* (M. S. T.)

- Vespertilio imbricatus, *Temm. (non Horsfield) Monogr. Mammal.*
ii. p. 216, pl. 54; Wagner, *Suppl. Schreb. Säugeth.* v. p. 738
(1855).
V. abramus, *Temm. l. c.* 232, pl. 58; Wagner, *l. c.* p. 739.
Scotophilus javanicus, Gray, *Mag. Zool. & Bot.* ii. p. 498 (1838).
Sc. coromandra, Gray *l. c.*
Vesperugo nathusii, Keys, & Blas, *Wieg. Archiv.* 1839, p. 329;
Blasius, Fauna Deutschlands, p. 58, figs. 37, 38 (1857).
Vespertilio coromandelicus, Blyth, *J. A. S. B.* p. 159 (1855).
Vesperugo blythii, Wagner, *op. cit.* p. 742 (1855).
Scotophilus coromandelicus, Horsfield, *A. & M. N. H.* 1855, p. 5.
Sc. pumiloides, Tomes, *P. Z. S.* 1857, p. 51.
Verpetilio coromandelicus, Tomes, *P. Z. S.* 1858, p. 539.
Pipistrellus coromandelicus, Dobson, *J. A. S. B.* 1871, p. 461.
Vesperugo imbricatus, *et micropus*, (Hutton), Peters, *P. Z. S.*
1872, pp. 707, 708.
Vesp. abramus, Dobson, *Monogr. Asiat. Chiroptera*, p. 97 (1876).
Hab. en Luzón Manila, Boso-boso, y con toda la región Oriental, China.

* 5 **Vesp var irretitus**, *Cantor ♂♂ N. v. id.* (M. S. T.)

- Vespertilio irretitus, Crator, *Ann. & Mag. Nat. Hist.* ix, p. 481
(1842).
V. meyeni, Warhouse, *P. Z. S.* 1845, p. 7; *Ann. & Mag. Nat.*
Hist. xvi, p. 53.
Vesperugo irretitus, Dobson, *Monogr. Asiat. Chiropt.* p. 98 (1876).
Hab. en Luzón, Laguna y China.

6 **Vesp** *tylopus*, Dob. ♂ N v Cuyayapnít. (M. S. T.)

Vesperugo (Glischropus) *tylopus*, Dobson, P. Z. S. 1875, p. 473; Monogr. Asiat. Chiropt. p. 114 (1876).
Hab. en Paragua, Borneo.

2. Gen. SCOTOPHILUS, Lach.

7. **Sc** *temminckii*, Horsf. ♂ N v. id. (M. S. T.)

?Scotophilus kuhlii, Leach, Trans. Linn. Soc. xiii, p. 71 (1822).
Vespertilio temminckii, Horsfieldi, Zool. Researches in Java (1824).
V. belangeri et noctilinus, Is. Geoff., Belang. Voy. aux Indes Orient. (1834) pp. 87 & 92, pl. 3.
V. castaneus, Gray, Illustr. Indian Zool.
Scotophilus temminckii, Gray, Mag. Zool. & Bot. ii, p. 497; Peters, M. B. Akad. Berl. 1866, p. 679; Dobson, P. Z. S. 1875, p. 379; Monogr. Asiat. Chiropt. p. 120, figs. a, b.
Nycticejus temminckii, Temm. Monogr. Mammal. ii, p. 149; Wagner, Suppl. Schreb. Säugeth. i, p. 541 (1841), v, p. 764 (1855); Cantor; J. A. S. B. 1846, xv, p. 185; Blyth, J. A. S. B. 1851, p. 157; Horsfield, Cat. Mamm. Mus. E. I. Comp. p. 37 (1851); Blyth, Cat. Mamm. Mus. As. Soc. Beng. p. 31 (1863).
Nycticejus luteus, Blyth, J. A. S. B. xx, p. 157, xxi, p. 34b; Wagner, Suppl. Schreb. Säugeth. v, p. 765 (1855).
N. flaveolus, Blyth, Horsfield in Cat. Mamm. Mus. E. I. Comp. p. 37 (1851).
Hab. en Dumaguete, Negros, Java, Sumatra, Borneo.

3. Gén. VESPERTILIO, Keyv.

* 8. **V.** *macrotarsus*, Wat N v Cabag.

Vespertilio macrotarsus, Waterh. Ann. & Mag. Nat. Hist. vol. xvi, p. 51 (1845); Wagner, Suppl. Schreb. Säugeth. v, p. 740 (1855); Dobson, Monogr. Asiat. Chiropt. p. 130 (1876).
Hab. en Mindoro.

* 9. **V.** *chinensis*, Dobr. ♂ N v. id. (M. S. T.)

Vespertilio chinensis, Tomes, P. Z. S. 1857, p. 52; Dobson, Monogr. Asiat. Chiropt. p. 130 (1876).
Hab. Luzón, Manila, China.

* 10. **V.** *formosus*, Horsd. N v. id.

Vespertilio formosus, Hodgson, J. A. S. B. iv, p. 700 (1835); P. Z. S. 1836, p. 46; Wagner, Suppl. Schreb. Säugeth. v, p. 736 (1855); Tomes, P. Z. S. 1858, p. 82, pl. ix.; Dobson, Monogr. Asiat. Chiropt. p. 140 (1876).
Kerivoula formosa, Gray, List of Mammals in Coll. Brit. Mus. p. 27 (1843).

Vespertilio rufo-pictus, Waterhouse, Ann. & et Mag. Nat. Nat. Hist. xvi, p. 54 (1845); Tomes, P. Z. S. 1858, p. 85.
Vesp. (Kerivoula) formosa, Horsfield, Cat. Mammal. Mus. E. I. Comp. p. 41 (1851).
Kerivoula pallida, Blyt, Catal. Mamm. Mus. Asiat. Soc. Beng. p. 34 (1863).
Murina formosa, Jerdon, Mammals of India, p. 42 (1867).
Vespertilio auratus, Dobson, J. A. S. B. xl, p. 186, pl. x. (1871).
Hab. Luzón, India, Formosa, China.

11. **V. capaccini**, Bp ♂ N v. Cabag.

(M. S. T.)

Vespertilio capaccinii, Bonap. Fauna Italica, 1832, fasc. xx.; Temm. Monogr. Mammal. ii, p. 139 (1839-41); Dobson. Monogr. Asiat. Chiropt. p. 129 (1876).
Verpertilio megapodius, Temm. l. c. p. 189.
Vesp. macrodactylus, Temm. l. c. p. 231 (vide Peters, in MB. Akad. Berl. 1866, p. 679).
Hab. en Luzón, Japón.

12. **V. muricata** Hodg. N. v. id

Vespertilio adversus, Temminck (non Horsfield), Monogr. Mammal. ii, p. 221; Peters, MB. Akad. Berl. 1866, p. 399; 1868, p. 626.
V. trilatitius, Temm. (non Horsf.) l. c. p. 228.
V. muricola, Hodgson, J. A. S. B. x. p. 98; Gray, Cat. Mamm. Brit. Mus. 1843, p. 26; id. List of Mammalia and Birds of Nepal presented by B. H. Hodgson, Esq., to the British Museum, 1846; Dobson, Monogr. Asiat. Chiropt. p. 134 (1876).
Kerivoula trilatitoides, Gray, Cat. Mamm. Erit. Mus. 1843, p. 27 (nomen nudum) (Vide Peters, MB. Akad. Berl. 1866, p. 399).
V. caliginosus, Tomes, P. Z. S. 1856, p. 73.
V. ater, Bernstein, Peters, l. c. 1860, p. 18.
V. (Pternopterus) lobipes, Peters, l. c. 1867, p. 706.
V. blanfordi, Dobson, P. A. S. B. 1871, p. 214.
V. moupinensis, Alph. Milne-Edwards, Mammif. du Tibet: p. 255 pl. xxxvii, fig. 2, pl. xxxvii, fig. 4 (1872).
Hab. Joló, Borneo, Célebes.

4. Gén. KERIVOULA, GRAY.

13. **Kerivoula pellucida**, Wat. ♂ N v. Cayayapnit (M. S. T.)

Vespertilio p. Illicidus, Waterhouse, P. Z. S. 1845, p. 6; Wagner, Suppl. Schreib. Säugeth. v. p. 742 (1855).
Kerivoula hardwickii, Tomes, P. Z. S. 1858, p. 329.
Kerivoula pellucida, Dobson, Monogr. Asiat. Chiropt. p. 149 (1870).
Hab. en Mindanao, Luzón, Samar.

14. **Kerivoula jagorii**, Pers. ♂ N v. Balacbalac. (M. S. T.)

Vespertilio (Kerivoula) jagorii, Peters, MB. Akad. Berl. 1856, p. 399; Dobson, Monogr. Asiat. Chiropt. p. 185 (1875).
Hab. en Samar.

5 Gén MINIOPTERUS, Br.

15. M. schreibersii, Natt N v. Cabag.

Vespertilio schreibersii, Natterer, in Kuhl, Deutsch. Flederm. Wetteran. Ann. iv. p. 40 (1819); Desmarest Mammalogie, p. 138 (1820); Temminck, Monogr. Mammal. ii. p. 174 (1835-41). V. natalensis, Smith, S. African. Quart. Journ. 1831. V. fuliginosa, Hodgson, Journ. Asiat. Soc. iv. p. 700 (1835). Miniopterus ursinii, Bonaparte, Fauna Italica (1837). V. ursinii, et blepotis, et dasythrax, Temminck, l. c. pp. 179, 212, 268 (1835-41). Trilatitus blepotis, Gray, Ann. & Mag. Nat. Hist. 1842, p. 258. V. eschscholtzii, Waterhouse, P. Z. S. 1845, p. 121. Miniopterus schreibersii, Keys, et Blas. Wirbelth. Europ. p. 44; Blasius. Fauna Deutschl. p. 46, figs. 28, 29 (head and ear) (1857); Dobson, Monogr. Asiat. Chiropt. p. 160 (1876). M. schreibersii, et blepotis, et tibialis, Tomes, P. Z. S. 1858, p. 126. Hab. en Luzón, Australia, Java, Ceilan, Italia y España en Sevilla.

✓ 16 M. var pusillus, Dobson, N v id.

M. pusillus, Dobson, Monogr. Asiat. Chiropt. p. 162 (1876). M. australis, Tomes, (in part.) P. Z. S. 1858, p. 125. Hab. en Luzón, Madras, Nicobar.

✓ 17. M. tristis. Wat C. O N. v. Calapnit. (M. S. T.)

Vespertilio tristis, Waterhouse, Ann. & Mag. Nat. Hist. xvi. p. 50 (1845); Wagner, Suppl. Schreb. Säugeth v. p. 743 (1855). M. tristis, Tomes, P. Z. S. 1858, p. 124. Hab. en Luzón, Cebú, Samar.

Fam. EMBALONURIDOS.

Subfam. EMBALONURINOS.

1. Gén. EMBALLONURA, TEM.

1 Em semicaudata, Peale, N. v. Cabag.

Vespertilio semicaudatus, Peale, United States. Expl. Expl., Mammalia, p. 23, pl. iii, fig. 2 (1848). E. semicaudata, Wagner, Suppl. Schreb. Säugeth. v. p. 698 (1855); Peters, MB Akad. Berl. 1867, p. 77. Emballonura fuliginosa, Tomes, P. Z. S. 1859, p. 77. Hab. en Carolinas, Marianas, Subregion Polinesiana.

✓ 2 E. monticola, Temm. ♂♂

(M. S. T.)

Emb. monticula, Temminck, Van der Hoeven, Tijdsch. voor

- Nat. Gesch.* v. p. 25, pl. II, figs. 1, 2 (1839); *Peters, MB Akad. Berl.* 1867, p. 486; *Dobson, Monogr. Asiatic. Chiropt.* p. 165 (1876).
Vespertilio (Nycticejus) alecto, *Eydoux et Gervais, Voy. Favortie*, 2. part. *Zoology*, p. 7 (1839).
Emballonura discolor, *Peters, MB. Akad. Berl.* 1861, p. 711.
Hab. Luzón Laguna, Java, Sumatra, Borneo.

2. Gén. TAPHOZOUS, GEOFF.

- * 3. *T. melanopogon*, *Tem. ♂♂ N. v. id.* (M. S. T.)
Taphozous melanopogon, *Temminck, Monogr. Mammal* II. p. 287 (1835-41); *Wagner, Suppl. Schreb. Säugeth.* v. p. 687; *Cantor, Journ. Asiatic. Soc. Beng.* xv. p. 180; *Dobson, Proc. Asiatic. Soc. Beng. Aug.* 1872, p. 153; *P. Z. S.* 1875, p. 549. fig. 2; *Monogr. Asiatic. Chiropt.* p. 167 (1876).
T. bicolor, *Tem. l. c.* p. 290.
T. philippensis, *Waterhouse, P. Z. S.* 1845, p. 9.
Hab. Luzón, Manila, Java, Borneo, India, Cochinchina.

3. Gén. NYCTINOMUS, GEOFF.

4. *N. plicatus*, *Buchan.-Hamilton, Trans. Linn. Soc.* v. p. 261, fig. (1800).
N. bengalensis, *Geoffroy, Descr. de l'Egypte*, II. p. 130 (1812).
N. tenuis et dilatatus, *Horsfield, Zoolog. Research. in Java* (1825); *Cantor, J. A. S. B.* xv. p. 179.
D. murinus, *Gray Illustr. Ind. Zools* (figured), 1830.
D. plicatus, *Temminck, Monogr. Mammal.* i. p. 223 (1835-41).
D. tenuis, *Temminck, l. c.* p. 228.
N. plicatus, *Jerdon Mammals of India* p. 33 (1867); *Dobson, J. A. S. B.* 1874, p. 143; *Monogr. Asiatic. Chiropt.* (1876); *P. Z. S.* 1876, p. 721.
Hab. en Luzón, Laguna, Java, Sumatra, Borneo, Singapur.

Orden 4.^o INSECTÍVOROS

Subord. MESODONTOS.

Tribu DERMÓPTEROS.

Fam. GALEOPITÉCIDOS.

Subfam. GALEOPITECINOS.

I. Gén. GALEOPITHECUS, PALL.

✓ 1. **G. volans**, (Shaw). ♂♂ N. v. Caguan. (M. S. T.)

Lemur volans, Shaw, Zool. 1, p. 38; Stovr. in Linn. Edit. 12. t. 1, p. 455.

G. volans, Pall. Act. Petrop. 4 pl. 7. 8; Schreb., Saig. 307; Aut., Makis pl. 1.

Schlegel, Handl. pl. 1, fig. 12; Gerv. Mamm. 1, p. 180.
Hab. en Bohol, Cebú y toda la Malasia.

✓ 2. **G. rufus**, Geoff. var. ♂♂ N. v. id. (M. S. T.)

G. rufus, I. Geoff. et Cuv.; G. ternatensis, Geoff.; Seba, Thes. pl. 58 f. 2, 3.; Encycl. pl. 22, fig. 1.
Hab. en Samar, Cebú, Siam, Malaca, Tenaserin.

✓ 3. **G. variegatus**, Geoff. var. ♂♂ N. v. id. (M. S. T.)

G. variegatus, E. Geoff. et Cuv., Aud. Makis pl. 2. Schreb. S. 307. D.: Temminckii, Waterh.
Hab. Cebú, Leyte, Samar, Java, Borneo, Sumatra.

✓ 4. **G. marmoratus**, Temm. var. ♂♀ N. v. id. (M. S. T.)

G. marmoratus, Temm. undatus, Wagner; Pall. loc. cit. pl. 7.
Hab. en Basilan, Samar, Banka.

✓ 5. **G. philippensis**, Waterh. var. ♂♀ N. v. id. (M. S. T.)

G. philippensis, Waterh., P. Z. S. 1838 p. 119.
Vespertilio admirabilis, Buntius, Hist. Nat. fig. p. 69; Griffith Animal Kingd. I. p. 158. f. 4.
Hab. en Samar, Mindanao, Java y Timor.

Subord. INSECTÍVOROS (Verdaderos.)

Fam. TUPÁYIDOS.

Subfam. TUPAINOS.

1. Gén. TUPAIA, RAFFL.

1. **T. ferruginea**, Rüd. ♂ ♀ N. v. Visin. (M. S. T.)

T. ferruginea, Rüd., Linn. Tr. ns. 13, p. 256; Horsff. Zool. Res. 3, fig.; id Zool. Java fig.; F. Cuv. Mamm. II, fig. Press.; S. Müll. Verh. hundl. 1, p. 163 pl. 26 f. 3 pl. 27, fig. 7-10; Reich. Raubt., f. 451.

Sorex glis, D'irid. Davancel. Asiat. Res. 14, pl. 9.

Hab. Culión, Paragua, Java, Sumatra, Borneo, Singapur, Malaca.

2. **T. javanica**, Horsf. ♂ ♀ N. v. id. (M. S. T.)

T. javanica, Horsf., Zool. Res. 1824, fig. 3; S. Müll. Verh. 1, p. 165 pl. 26 fig. 4. Reich. 451.

T. tana, Is. Geogr. Belang. Voy. p. 105.

Sorex glis press. F. Cuv. 1821, Mam. II, fig. Corps on Bauxong. Hab. Calamianes, Culion, Paragua, Borneo, Java, Sumatra.

Fam. ERINACEIDOS.

1. Gén. ERINACEUS, L.

1. **E. europaeus**, Lin. ♂ ♀ N. v. Erizo, España. (M. S. T.)

Fam. SORÍCIDOS.

1. Gén. CROCIDURA, WAGLER.

* 1. **C. cærulescens**, Shaw. ♂ ♀ N. v. Sangiò. (M. S. T.)

Cr. cærulescens, Shaw. Gen. Zool. 1800; Wagner, Schreb. Saug. Subpl. 5, 1855, p. 551; Jerd. Mamm. of India, 1897 p. 53. *filorides*, Shaw, Mus. Lever. 1, p. 31, pl. 8. *moschatus*, Rüd. Assam, p. 96. *giganteus*, L. Geaff. Dict. Plass. 1827, 11, p. 326. *citulus*, p. E. Geoff. Ann. Mus. p. 183.; id. M. n. Mus. 1815; Reich. fig. 500; Blyth. et Auders P. Z. S. 1873 p. 231.

Hab. Luzón, Manila, India, Bombay.

* 2. **C. murina**, Lin. ♂ ♀ N. v. Langam.

Sorex murinus, L'n. Schreb. Saug. 1802; Cuvier, Four. As Soc. Beug. 1846; Blyth. J. Asi. S. B. 1875.

Hab. Luzón, Paragua, Java, Melaca, C. Malinchur y China.

3. *C. luzoniensis*, *Pirs.* ♂♂ N. v. Buhlit.

Cr. luzoniensis, *Peters*, *M. B. Akad. Berlui* 1870, 35 p. 593.
Cr. murinus, *p. et myosurus*, *p. Auct.*

Hab. Luzón, Manila, Pampanga.

4. *C. albina*, *Blyth*, ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Cr. albina, *Blyth*, *J. As. L. Beng.* 1850, 29 p. 87.; *Syssinh. P. Z. S.* 1873 p. 615.
Hab. China, Emuy.

5. *C. Edwardsiana*, *Trt.* N. v. Langam.

Cr. edwardsiana, *Trt. Le Natural.* 1. 1880 p. 330.
Hab. Joló.

6. *C. aranea*, *Schreb.* ♂ N. v. Musarafia.

(M. S. T.)

C. araneus, *Schreb.* (nec *L.*) *Sang.*, 3, p. 379, pl. 160; «Musaraigne de Terre», *Daubenton*, *Mém. de l'Acad. des Sc.*, 1756, p. 211, pl. 5, f. 2; «La Musette», *Buff.*, *Quadr.*, 8, pl. 10, f. 1; *E. Geoff.*, *Ann. Mus.*, 1811, 17, p. 174, pl. 2, f. 2; *Duvernoy*, *Mag. Zool.*, 1842, p. 18, pl. 38; *Reich.*, 478-480; *Blasius*, *Fauna Deutschl.*, 1858, p. 144, f. 94; *E. Brandt*, *Bull. Nat. Moscou*, 1868, 2, pl. 4, dents.
C. russulus, *Hermann*, *Zimm.*, *Geog. Ges.* 2, p. 382.
C. musaranea, *Cuv.*, *Bp.*, *F. Ital.*, pl. 19, f. 5, 6.
C. inodorus, (*Savij*), *Selys*, *Micromamm.*, p. 34, 35.
C. fimbriatus, *Wagler*, *Isis*, 1832, p. 54 (juv.).
C. moschata, *major*, *rufa*, *poliogastra*, *Wagler*, *Isis*, 1832, p. 275, 1218 (Var.).
C. thoracica, (*Savij*), *Bp.*, *F. Ital.*, pl. 19, f. 7; *Reich.*, f. 720 (Var.); = 965 a. apud *Blasius*.
C. pachyurus, *Kuster*, *Isis*, 1855, p. 79 (Var.).
C. priscus, *Pomel* (*Musaraneus*), *Cat. Vert. foss. de l'Allier*, 1854, *araneus fossilis*, n° 14; *Gervais*.
C. mauritanicus, *Pomel*, *C. R. Ac. Sc. Paris*, 42, 1856, p. 653.
Hab. Europa, España.

Fam. TÁLPIDOS.

I. Gén. MYGALE, G. Cuv.

1. *M. pyrenaica*, *E. Geoff.* ♂ N. v. Desmaz.

(M. S. T.)

M. pyrenaica, *E. Geoff.*, *Ann. Mus.* 17, 1811, p. 193, pl. 4, f. 1-4; *id.*, *Mém. Mus.* 1, pl. 15, f. 10-12, dents; *Blaiv.*, *Ostéogr. Insect.* p. 53, pl. 5, 9; *Wagnér*, *S. S.* 2, p. 103; 5, p. 38; *Gervais*, *M. I. fig.* p. 248; *Tratat. Catal. Mamm. de Pyrénées* (in *Bull. Soc. H. N. Toulouse*), p. 95, fig. en *photograv.* 1.
ibid., Europa, Francia.

Fam. CENTÉTHIDOS.

1. Gén. CENTETES, Illus.

1. **C. ecaudatus**, Schreb. c^o N. v. Centetos. (M. S. T.)

C. ecaudatus, Schreb., Saug. 3, 1773, p. 584, pl. 64; «Tarecs», Buff., Quadr. 12, p. 438, pl. 56; Guérin, Linn. Syst. Nat., Ed. 12, 1783, 1, p. 117; Illig., Prodrom. 1811, p. 124; Wagn., S. S. 2, p. 552; 5, p. 583; Reich., f. 456; Fitz., S., f. 80; Gervais, M. I., p. 233 et 234, *sg. crâne*, deuts.; Pollen et Van Dam, Reckerches, 1868, 2^o part., p. 25; Jentink, Notes, 1. c., p. 144.

C. setosus, Desm. (nec Schreb., Gm., Blainv. et Auct.), Mamm., p. 161, n° 251; Encycl. pl. 37, f. 2.

C. variegatus, Gray (nec E. Geoff.), 1836.

C. aratus, Is. Geoff., Ann. Sc. Nat. 2^o Sér., 1837, 8, p. 60; id.; M. J. Zool. 1839, p. 17 et 31, pl. 2; Wagn., S. S. 2, p. 35; 5, p. 584.

Hab. Madagascar, Ilha Mauricio.

Orden 5.^o ROEDORES.

Fam. ESCIÚRIDOS.

Subfam. ESCIURINOS.

1. Gén. PTEROMYS, G. Cuv.

1. **Pt. petaurista**, Pall. & P. N. v. Taguan. (M. S. T.)

Pt. petaurista, Pallas, Miscell. p. 54; Scherb. (part), Saug. 4, p. 819 pl. 214; G. Cuv. et Aude Jerd. Mamm. of. India 1867 p. 175; Gerv., M. I., p. 296.

Taguan, p. Buff. Suppl. 3, p. 150, pl. 21.

Pt. oral, Gick Cat., G. N. II. 1842 p. 401, pl. 11; Anders. A. aud. Z. Rev. 1870 p. 279.

Hab. Paraguai, Ceilan, Himalaya, China.

2. **Pt. philippensis**, Elliot, var. ♂ N. v. id. (M. S. T.)

Pt. Philippensis, Elliot, Madras Journ. 1839, p. 217.
Hab. Paraguai.

3. **Pt. irornatus**, M. J. var. ♂ N. v. Tapilac. (M. S. T.)

Pt. inornatus, Müll et Sebold; Anders. Research. p. 279.
Hab. Paraguai y M. de las.

2. Gén. SCIUROPTERUS, F. Cuv.

* 4. Sc. melanotis, Gray, ♂ & N. v. Alalaesin. (M. S. T.)

Sc. melanotis, Gr. P. Z. S. 1836, p. 88; Anders, Res. p. 292.
Sc. melanopis, Mottley et D'Her., Cont. to Nat. H. of Labuan
and Borneo, 1855, p. 2.
Hab. Mindanao, Balabac.

* 5. Sc. pulverulentus, Gthr. ♀ N. v. id. (M. S. T.)

Sc. pulverulentus, Giinther, P. Z. S. 1873, p. 411 pl. 38; Au-
der Res. p. 297.
Hab. Mindanao, Malaca.

3. Gén. EOSCIURUS, LAT.

6. Ae. affinis, Roffl. ♂ & N. v. Alalaesin. (M. S. T.)

Sciurus bicolor, Sparv., Gotheb. Wet. Svensk. Handtl. 1778-1.
p. 70; Desm. Mam. 1820, p. 336 pl. 75 l. 3; Hores. Zool.
Res. 1824 Wagner, S. S. 1843, pl. 216; Auder, Auct. and
Zool. Researches, 1878, p. 215.
S. javensis, Zinn., Schreb. Sang. 1792 p. 781.
S. affinis, Raffles, Trans. Linn. Soc. 1822, 13 p. 259.
Hab. Calamianes, Culion, Singapur, Malaca, Célebes.

4. Gén. HETEROSCIURUS, TRT.

7. Het. prevostii, Desm. ♀ N. v. Ardilla. (M. S. T.)

Hab. Singapur, Borneo, Célebes.

8. Het. philippinus, Wat. ♂ ♀ N. v. Alalaesin. (M. S. T.)

H. philippinus, Waterh. P. Z. S. 1839 p. 117; Auders. Res.
p. 255.
Hab. Balabac, Mindanao.

9. Het. steerii, Gthr. ♂ ♀ N. v. Visin. (M. S. T.)

H. Steeri, Giinther, P. Z. S. 1870 p. 735 pl. 59.
Hab. Paragua, Balabac.

* 10. Het. lateralis, Var. ♂ ♀ N. v. id. (M. S. T.)

Hab. Samar, Paragua, Bohol, Culion, Calamianes.

5. Gén. NANNOSCIURUS, TRT.

* 11. Nan. exilis, Müll et Schl. ♂, N. v. Visin. (M. S. T.)

Sciurus exilis, Müll et Schleg., Tijd. Natuur. Ges. 1838-39, p. 148.
Wagner, S. S. 3 p. 268.
Hab. Basilan, Mindanao, Borneo, Sumatra, Malaca.

6 Gen. FUNAMBULUS, LEB.

✓ 12. **F. vittatus**, Raffles, ♀ N. v. id. (M. S. T.)

F. vittatus, Raffles, *Trans. L. S.* 1822, 13, p. 259; *F. Cuv.* *Mam.* 1851, 4, *Uv.* 33; Schlegel, *Ned. Tijd.* 1808, 1, p. 30, pl. 2, 1, 4; Anderson, *Res.* p. 266, a. *bivittatus*, Desm., *Mam.* 1920, *Suppl.* p. 543; «loufaye», Less., *Manuel*, 1827, p. 238. *Hab.* Samar, Birneo, Sumatra.

7 Gen. SCIURUS, LIN.

13 **S. vulgaris**, Lin. ♀ N. v. Ardilla comun (M. S. T.)

S. vulgaris, L., *Syst. Nat. éd.* 12, p. 86, 1; *F. Cuv.* *Mam.* 2, *liv.* 22; *Buffon*, II. *N.* 7, pl. 32-35; *Blasius*, *Gauna Deuts.* 1857, p. 272, f. 153, 154. *S. Var. alba*, *Erxleb.* *Gerv.*, M. 1, fig. p. 305. *S. Var. niger*, *Erxleb.* *Mam.* p. 415. *S. alpinus*, *F. Cuv.* *Mam.* 2, *liv.* 24. *S. italicus*, *Bp.*, *Faun. Ital.* fig. 20. *Hab.* Europa, España, etc.

Fam. MIÓXIDOS.

1 Gén. ELIOMYS, Wagner

1 **E. nitela**, Pall. ♂ N. v. Moscardina. (M. S. T.)

E. nitela, Pallas, *Nov. Sp. Quadr. Glir.* 1773, p. 88; *Buff.* H. *N.* 8, pl. 24, 25; *Schreb.*, *Näg.* 3, p. 233, pl. 220; *F. Cuv.* *Mam.* *Uv.* 40, fig.; *id.*, *Dents des Mam.* pl. 58; *Gerv.* *Mam.* 1, p. 373, fig. dents. *E. querquedula*, L., *Sys. Nat. Ed.* 12, p. 84; *Blasius*, *Pennula Dents.* p. 29. *Hab.* Europa, España, etc.

Fam. MÚRIDOS.

Subfam. FLEOMINOS.

1. Gen. PHLEOMYS, Wat.

✓ 1. **Ph. cumingii**, Wat. ♂ ♀ N. v. Parret. (M. S. T.)

Ph. cumingii, Waterh., *P. Z. S.* 1839, p. 108; Syd. et Sonley, *Voy. de la Bonite*, 1841, pl. 7, 8; Gerv. *Mam.* 1, p. 390. *Hab.* Luzon, N.º Ecija, Rosales, Laquint, Mahaihai.

✓ 2 **Ph. albayensis**, ♂ ♀ N. v. Parrot (M. S. T.)

Hab. Luzón, Allay, Mindoro.

2 Gén. BANDICOTA, GRAY.

✓ 3 Ba. gigantea, Hardw. ♂♂ N. v. Lampung (M. S. T)

Echimys giganteus, Hardw. *Trans. Linn. Soc.* 1804 p. 306 pl. 18;
Gray. *P. Z. S.* 1832; Anders. *I. c.* p. 232 pl. 14.
Ech. bauhicota, (Bechst.) Blyth. *Cat.* 1869 p. 112; Jord. *Mam. India* 1897.
Arv. setifer, Horsf. *Zool. Res.* n.º 8.
Perchal, Buff. *Suppl.* p. 276 pl. 69.; F. Cuv. *Mam.* 61.
Hab. Luzón, Cavite, Alfonso, Cagayan, Pamplona.

3 Gén. EPIMYS, TRT.

4 Ep. decumanus, Pall. ♂ N. v. Ulag. (M. S. T)

Mus decumanus, Pall. *Nov. Sp. Glir.* 1778 p. 91; Blas., *Fauna Deuts.* 1857. p. 313.
Hab. Europa, Asia, África, América, Oceanía, Filipinas?

4 Gén. LEGGADA, GRAY.

✓ 5 L. Everettii Gthr.

Mus everetti, Günther, *P. Z. S.* 1879. p. 75.
Hab. Mindanao.

5 Gén. MUS, LIN.

✓ 6 M. musculus, Lin. ♂ ♀ N. v. Babuit (M. S. T)

M. musculus, L., *Syst. Nat.* 12, 1766, p. 83; Pall., *Glir.*, p. 95;
Buff., *H. N.*, 7, p. 309, pl. 39; *Suppl.* 3, p. 181, pl. 30; 7,
pl. 40; Schreb., *Säug.* 4, pl. 181; Blasius, *Fauna Deuts.* 1857.
p. 320.
M. mucculus domesticus, Albert Magnus.
M. minor, Klein; *Sorex*, Brisson.
M. islandicus, Thienem., *Nat. Bem.* p. 153.
M. incertus, Sav.; *flavescens*, Fischer; *mollisimus*, Dehne.
M. poschiavinus, Fallo, *Faune de Suisse*, 1870. 1. pl. 7 (Var.
Melan.)
M. azoricus, Schinz. *Synops. Mam.* 2, 1845, p. 161 (Var
Melan.)
M. algirus, Pomet, *C. R. Acad. Sc. Paris.* 1856, 42, p. 654.
M. Hayi, Waterh., *Phil. Mag.* 1838, p. 597.
M. Alleni, Waterh., *Phil. Mag.*, *I. c.*, p. 597.
M. Allottii, Waterh. *Phil. Mag.*, *I. c.*, p. 597.
M. rama, Blyth.
M. adelaideensis, Gray, *Greys Journ.* 1, n.º 86.
M. taïtensis, Fitzang. et Zlebor, *Reis. Novara*, 1868.
M. vitiensis, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, 8, p. 49.
M. brevirostris, Waterh., *P. Z. S.* 1835, p. 119.
Hab. Europa, Asia, Filipinas,

✓ 7. M. rattus, Lin. ♂ ♀ N. v. Dagá. (M. S. T.)

M. rattus, L., Sys. Nat. 1766, 1, p. 79; Pall., Glir., p. 93;
Buff. H. N. 7, p. 278, pl. 284; Schreb. Saug., 4, pl. 179;
Giebel. Odont. p. 47; Blasius, Fauna Deuts. 1857, p. 317.

M. caruleus, Lesson, Tabl. Régne Anima. 1842.

M. latipes, Bennet, P. Z. S., 1833, p. 89.

M. insularis, Waterh., Voy. Beagle, p. 35.

M. alexandrinus, E. Geoff., Descr. Egypt. pl. 5, f. 1; Blasius,
Fauna Deuts. p. 316; A. de l' Isle, Ann. Sc. Nat. 1865, 4,
p. 173; Leche, Explor. Algér. Mam. p. 113, pl. 5, f. 1.

M. tectorum, Savii, Nuov. Giornal, 1825; Bonap., Faun. Ital.
fasc. 3 et 16, fig.

M. flaviventris, Brants, Muiz. 1827, p. 108.

M. flavigaster, Henglin, Nov. Act. Soc. Leop. 1861, 28, p. 4,
pl. 2, f. 2.

M. setosus, Lund, Blik. Bras. Dyr. 3, p. 277.

M. leucogaster, Pictet, Mém. Soc. H. N. Genève, 1841, p. 153.

M. Jacobae, Waterh., Voy. Beagle, p. 35.

M. cale lonicus, Wagner, S. S. 4.

M. nova-zelandica, Buller, Proc. N. Zool. Inst. 1871, 3, p. 1
fig.

M. exulans, Peale, U. S. Expl. Exp., 1848, 8, p. 47.
Hab. en todas las Islas.

8. M. peguensis, Blyth. ♂ N. v. Utot (M. S. T.)

M. peguensis, Blyth, J. A. S. B. 1859, p. 295.; Cat. of. Mam.
Burmo, 1875.

Hab. Luzón, Laguna, Pegou.

6. Gén. MICROMYS, Dhñe.

✓ 9. M. castaneus, Wu. ♂ ♂ N. v. Daguis. (M. S. T.)

Mus castaneus, Waterh. J. N. H. 1843, p. 134.
Hab. Luzón, Manila, Cebú.

10. M. minutus, Pall. ♂ ♂ (M. S. T.)

M. minutus, Pall. Glir., 1778; p. 96, 345, pl. 24 b; Schreb.
Saug. 4, p. 66, pl. 183; Gloger, Nov. Acta Leop. 14, p. 358,
pl. 23; Blasius, Fauna Deuts., p. 321; Schlegel, Zoogd. Nederl.
1857, pl. 6.

M. campestris, E. Geoff. et F. Cuv., Mam. liv. 64, fig.

M. messensis, Shaw, Gen. Zool. 2, p. 62.

M. pumilus et messorius, E. Geoff. et F. Cuv., I. c., liv. 64,
fig.

M. soricinus, parvulus et fundulus, Herm., Obser. Zool., 1,
p. 57-61.

M. pratensis, Ochotskij, Nov. Acta Leop., 1831, p. 243.

M. agilis, D' Lave, Hoffmannsitz, 1841, 16
Hab. Europa, Siberia, China.

Fam. HISTRÍCIDOS.

1. Gen. ACANTHION, F. CUV.

1. A. pumila. *Göth.* ♂ ♀ N. v. Durian (M. S. T.)
A. pumila, *Günther A. N. H.*, 1879, p. 106.
Hab. Paraguay, Balabac.

Fam. CÁVIDOS.

1. Gén. CAVIA, PALL.

1. Cavia cobaya. *Mariqu.* ♂ ♀ N. v. Cui. (M. S. T.)
Hab. América, Filipinas (introd.) Manila.

Fam. LEPÓRIDOS.

1. Gén. LEPUS, LIN.

1. L. variabilis. *Pall.* ♂ N. v. Liebre. (M. S. T.)
Hab. Europa, Asia, etc.

2. Gén. ORYCTOLAGUS, LILIJ.

2. Oryctolagus cuniculus (*Lur.*). ♂ ♀ N. v. Conejo (M. S. T.)
Hab. Europa, etc. Filipinas (introd. domest.)

Orden 6.^o CARNÍVOROS.

Subord. FÍSÍPEDOS.

Fam. ÚRSIDOS.

1. Gén. URSSUS, LIN.

1. Ursus arctos, *Lin.* var. *pyrenaicus*. ♂ N. v. Oso pardo (M. S. T.)

Ours brun des Alpes, *Buffon*, II. N. viii, pp. 24, 86, 61; *Cuvier*, *Oss. Foss.* iv. t. 22, f. 1, 2.
Ours brun des Pyrénées, *Cuv. Oss. Foss.* iv. p. 332.
Ours des Asturias, form. (*U. arctos.*) *De Blainv. Ostéogr.* Ursus t. 3 (skeleton), t. 7 (skull ♀, adult.).
Ursus arctos, *Schreb.* t. (from *Buffon*).
Ursus pyrenaicus, *F. Cuv. Mamm. Lithogr.* xlvi. t. (young).
Ursus arctos pyrenaicus, *Gray. P. Z. S.* 1864, p. 683.
Hab. Europa, Asia... España.

Fam. MUSTÉLIDOS.

1. Gén. MELES, STÖRR,

1. **M. taxus**, Boddaert, ♂ N. v. Tejon.

(M. S. T.)

Ursus taxus, Blumenb., Hanßl. p. 10.

U. meles, Linn., Syst. Nat. i. p. 70; Schreb., Säugeth. p. 516.

Meles taxus, Boddaert, Elench. i. p. 80; Schreb., Säugeth. t. 142; Blainv., Ostéogr. Subursus, t. 2 (skelton), 6 (skull), 9 (teeth); Gray, P. Z. S. 1865, p. 139; 1868; p. 207.

M. europaeus, Desm. N. Dict. Hist. Nat. iii. p. 465.

M. vulgaris, Desm. Mamm. p. 173.

Taxus vulgaris, Tiedm. Zool. i. p. 376.

Blaireau, Buffon, H. N. vii. p. 104, t. 7, 8.

Blaireau d'Europe, Cuvier, R. A. i. p. 145.

Common Badger, Penn. Brit. Zool. p. 30; Bell, Brit. Quad. p. 122.

Hab. Europa, Asia, España.

2. Gén. MYDAEUS, F. Cuv.

2. **M. meliceps**, F. Cuv. ♂ N. v. Pantoc.

(M. S. T.)

M. meliceps, F. Cuv. Mamm. Lith. 1825 pl. 159; Horsf., Zool. Res. Java, 1824 pl. 3.

Müll., Verhandl. Nat. Ned. 1835; Gray, P. Z. S. 1865 p. 142.

Mephitis javanensis et *javanicus*, Desm. Mamm. 1820 p. 147.

Hab. Paragua, Java, Sumatra, Malaca.

3. Gén. MUSTELA, NILS.

3. **M. erminea**, Lin. ♂ N. v. Armiño.

(M. S. T.)

Mustela erminea, Linn. S. N. i. p. 68; Nilsson, Skand. Faun. p. 157; Illum. Fig. t. 12, Gray, P. Z. S. 1855, p. 111.

Putorius erminca, Owen, Brit. Foss. Mamm. p. 116, f. 40, 41, 42, (skull).

M. ermineum, Pallas, Zoogr. i. p. 90; Buffon, H. N. vii. t. 29, f. 2, t. 31.

Stoat or Ermine, Penn. B. Zool. i. pp. 89, 67, f. 18.

Hab. Europa, Francia.

4. **M. vulgaris**, Bris. ♂ N. v. Comadreja.

(M. S. T.)

Mustela vulgaris, Bris. R. A. p. 241; Erxleb. M. p. 471; Gray, P. Z. S. 1805, p. 113; Blainv., Ostéogr. Mustela, t. 7 (skull), t. 15 (teeth).

M. gale, Pallas, Zoogr. p. 194 (*atibino* in winter).

M. nivalis, Linn. Act. Suec. vi. t. 8; S. N. p. 169.

Common Weasel, Penn. B. Z. i. p. 951, t. 7. f. 17.

Hab. Europa... Francia.

4. Gén. LUTRA, ERXL.

5. *Lutra vulgaris*, *Erxl.* ♂ N. v. Nutria (M. S. T.)

Lutra vulgaris, *Erxl.* *Mamm.* p. 488; *Nilsson, Illum. Fig.* t. 20;
Bell, Brit. Quad. p. 129, f. 4; *Blainv. Osteogr.* *Mustela*, t. 8.
(skull), t. 5 (skeloton), t. 13 (teeth); *Bonap. Icon.* t. 3; *Gray,*
P. Z. S. 1805, p. 126.
Mustela lutra, *Linn. S. N.* i. p. 66; *Rötz. F.* p. 18.
Viverra lutra, *Linn. F. S.* p. 12; *Pallas, Zoogr.* i. p. 76.
Lu loutre, *Buff. H. N.* vii. p. 134, t. 2, xii. p. 325, t. 45.
Otter, *Penn. B. Z.* i. p. 92, t. 8, f. 19.
Hab. Europa...

6. *I. sumatrana*, *Gray.* ♂ N. v. (M. S. T.)

I. sumatrana, *Gray. P. Z. S.* 1865; *Anders. I. c.* 1873 p. 203
pl. 10.
Hab. Paragua, Malaca, Sumatra.

Fam. CÁNIDOS.

1. Gén. CANIS, LIN.

1. *Canis japonicus*, *Tem.* ♂ N. v. Aso. (M. S. T.)

Hab. Japón.

2. *Canis molossus*, *Lin* ♂ N. v. Mastín. (M. S. T.)

Hab. Europa.

3. *Canis terræ novæ*, ♂ N. v. P. de T. n. (M. S. T.)

Hab. en Terra-nova.

4. *Canis pollokensis*. N. v. Iró.

Hab. Mindanao.

2 Gén. VULPES, BRISS.

4. *Vulpes vulgaris*, *Briss.* ♂ N. v. Zorro (M. S. T.)

V. vulgaris, *Briss., Regn. Anim.*, 1750, p. 239.
V. vulpes, *L.*, *S. Nat.*, 1760, i, p. 59; *Blainv., Ost., Canis*, pl. 4.
V. alopex, *L.*, *I. c.*, p. 59.
V. crucigera, *Briss., R. A.*, p. 240; *Gesner, Quadr.*, fig. p. 90;
Aldrov., Quadr. Digl., f. p. 222.
V. japonica, *Gray, P. Z. S.*, 1868, p. 517.
V. hoole, *Swinh.*, *P. Z. S.*, 1870, p. 631.
V. melanogaster, *Bp.*, *Faune Ital.*, 1835, fig.
V. lineiventer, *Swinh.*, *P. Z. S.*, 1870, p. 631.
Hab. Europa, Francia, China, Formosa.

Fam. VIVERRIDOS.

Subfam. ARCTICINOS.

1. Gén. ARCTICIS, Tem.

1. *Arctictis binturong*, Raffles, N. v. M. S. T.

Viverra binturong, *Raffles*, *Linn. Trans.*, 12 p. 236.

Arc. binturong, Tem., *Monogr.*, 2, p. 308; *Gray*, *P. Z. S.*, 1894 p. 525; *Sternad. Journ. Mem.*, 1894 p. 221.

Arc. penicillatus, Tem., *Monogr.*, 2, t. 92; *Müll. Zood. incl. Arch.* p. 32.

Paradoxurus albifrons, F. Cuv., *Mem. Mus.*, 9, p. 44, pl. 4. *Mamm. Sist.* pl. 201. *Deuts. des Mamm.* p. 104, pl. 34; *Väleuc.* *Ann. Sc. Nat.*, 1925, 4 p. 57, pl. 1.

Ictides ater, F. Cuv., *Mam. Lith.* pl. 202.

Ictides aureus, F. Cuv., *Mem. Mus.*, 9, p. 47; *Tem. Monogr. Mam.*, 2, p. 308.

Hab. en Filipinas Java, Sumatra, Malaca.

2. Gén. PARADOXURUS, F. Cuv.

2. *P. philippensis*, ♂♀ N. v. Alamed. Miló. (M. S. T.)

Martes philippensis, *Cam. Phil. Trans.*, 24 p. 2, 204.

Par. zeylanicus, (*part*) *Gray*, *Cat. Mamm. R. M.* p. 55.

Par. philippensis, *Temm. Monogr.*, 2, *Esquis Z.* p. 120; *Gray*, *P. Z. S.*, 1864 p. 537; *Ogilby*, *Zool. Journ.*, 4, p. 300.

Par. auratus, *Wid. Cat. Zool. Soc.*

Hab. Luzón, Laguna, Tayabas, Cagayan, Ilocos, Leyte.

3. *P. dubius*, *Gray*, ♂♂ var. N. v. Alamed y Masang. (M. S. T.)

Hab. en Luzón, Cagayan, Java.

4. *P. nigritrons*, *Gray*, ♂♂ var. N. v. Mungao. M. S. T.

P. hermaphroditus, *Pallas*, *Savag.*, 1777, p. 429; *Gray*, *P. Z. S.*, 1829, p. 69.

P. nigra, *Dowd. Mamm.*, 1820, p. 208; *Buff. Suppl.*, 3, pl. 47.

P. typus, F. Cuv., *Mam. Lith.*, 1821, 2, livr. 24; *Temm. Monogr. Mamm.*, 2, p. 315; *Blaw. Ost.*, pl. 2.

P. Pallasii, *Orn. Ind. Zool.*, 175, p. 107, pl. 72, 73.

♂P. prehensilis, *Bull. Soc. Phil.*, 1819; *Sclater*, *P. Z. S.*, 1877, pl. 71.

P. tenuis, *Wid. Cat. Zool. Savag.*, 2, p. 349.

P. nubiae, F. Cuv., *Mam.*, 3, liv. 75.

P. nigritrons, *Gray*, *Ill. Ind. Zool.*, pl.; *P. Z. S.*, 1894, p. 535.

P. macrodus, *Gray*, *P. Z. S.*, 1894 p. 538, fig. erlne.

P. quadriseriatus, *Hedge*, *Ann. Nat. Hist.*, 1855, 12, p. 106.

P. strictus, *Hedge*, loc. cit., p. 105.

P. fasciata, *Desm.*, *Mam.*, 1820, p. 260; *Gray*, *P. Z. S.*, 186

p. 536; *All. on*, *P. Z. S.*, 1879, p. 96.

*

- P. musanga, *Raffles, Lin. Trans.*, 13, 1812, p. 255; *Sterndale, Mam. Ind.*, 1884, p. 216.
P. typus, var. *sumatrana*, *Fischer, Synops.*, 1829, p. 159.
P. *Geoffroyi*, *Fischer, l. c.*, p. 171.
P. musanga, var. *javanica*, *Horsfield, Java*, pl.; *Temm., Monogr.*, 2, p. 317, pl. 53, 54.
P. «*Musang*», *Marsden, Sumatra*, p. 110, pl. 12.
P. *setosus*, *Hombr. et Jacq., Voy. Astrol., Zool.*, 3, p. 25, pl.
P. *Finlaysonii*, *Gray P. Z. S.*, 1832, p. 68.
P. *Pallasii*, *Gray (nec Otto), P. Z. S.*, 1832, p. 67; *Ill. Ind. Zool.*, pl.
P. *albifrons*, *Bennet (nec Cuv.)*
P. *quinquelineatus et nusangoïdes*, *Gray, Ann. Nat. Hist.*, 1837, p. 579.
P. *dubius*, *Gray, P. Z. S.*, 1832, p. 66.
P. *crassiceps*, *Pucheran, Rev. et Mag. Zool.*, 1855, p. 393.
Hab. Luzón, Gagayan, India.

5. P. *Crossii*, *Gray, C. & O. var. N. v. Galong, Lampog.* (M. S. T.)
P. *Grayi*, *Bennet, P. Z. S.*, 1835, p. 18; *Gray, P. Z. S.*, 1831, p. 95; 1864, p. 541; *Ann. Nat. Hist.*, 1874, 14, p. 241; *Sterndale, Ind. Mam.*, 1884, p. 217.
P. *nipalensis*, *Hodgs., As. Res. Beng.*, 1830, 19, p. 76.
P. *larvatus et bondar*, p., *Temm. Monogr.*, 2, pl. 55, fig. 1-4.
P. *leniger*, *Hodgs., Gray, P. Z. S.*, 1864, p. 542.
P. *leucopus*, *Ogilby, Zool. Journ.*, 4, p. 303, pl. 35.
P. *Crossii*, *Gray, P. Z. S.*, 1832, p. 67; *Ill. Ind. Zool.*, 2, pl. 7; *P. Z. S.*, 1864, p. 533, fig. crâne.
P. *musanga*, var., *Esg. Zool.* 1853, p. 120.
P. *leucomys ax*, *Gray, Mag. Nat. Hist.*, 1837, 1, p. 579; *P. Z. S.*, 1864, p. 540; *Temm. Monogr. Mam.*, 2, p. 325; pl. 64, f. 4-6, crâne.
P. *auratus*, *Blair, Os. Viverra*, pl. 12, deuts.
P. «*Amblyodon doré*», *Jourdan, Ann. Sc. Nat.*, 1837, 8, p. 372.
P. *Jourdanii*, *Gray, Mag. Nat. Hist.*, 1837, 1, p. 579.
P. *Ogilbii*, *Fraser, Zool. typ.*, pl.
P. *leucocephalus*, *Gray, Voy. of Samarang*, 1850.
P. *philippensis*, p., *Schinz, Synops.*, p. 387.
P. *Crossii*, *Gray, Proc. Zool. Soc.*, 2, p. 67. 1832; *Illustr. Ind. Zool.*
P. *Musanga*, var. *Tem. Esg. Zool.* p. 120.
Paguma *Crossii*, *Gray, Cat. Mam. B. M.* p. 54.
Hab. Luzón, Ilocos Norte, India, Borreo.

3. Gén. VIVERRA, LIN.

6. V. *tangalunga*, *Gray, C. & O. N. v. Musang.* (M. S. T.)
V. *tangalunga*, *Gray, P. Z. S.* 1832 p. 63; 1864 p. 512.
Cat. Mam. B. M. p. 48. *Cantor Mamm.: Horst. Cat. Mus. Ind. House.* p. 57.
V. *zibetha*, *Raffles, Lin. Trans.* 13 p. 231.; *F. Cuv. Mam. Ithog.*

Hab. Luzón, Cavite, Cagayán, Nueva-Exiña, Borneo, Sumatra, Célebes.

◆ 7 V zibetha *Linn.* ♂ & ♀ N. v. Mundo.

(M. S. T.)

Vivera zibetha, *Linn.* *S. N.* i. p. 65; *Gray, Illust. Ind. Zool.* ii. t. 5; *Proc. Zool. Soc.* 1832, p. 63; *Cat. Mamm. B. M.* p. 47; *P. Z. S.* 1864, p. 512; *Gerrard, Cat. Ost. B. M.* p. 71; *Schinz, Syn. Mamm.* i. 362; *Horsfield, Cat. Mus. India House.* p. 54.

Meles zibethica, *Linn.* *S. N.* 1756.

Viverra undulata, *Gray, Spec. Zool.* t. 8.

Viverra civettoides, *V. melanurus*, *V. orientalis*, *Hodgson, J. Asiatic Soc. Bengal.* x. 900.

Zibet, *Buffon*, ix. 290, t. 31; *ashtoni*, *Swinh.* *P. Z. S.* 1870.
Hab. Paragua, Negros, Panay, Formosa, China, India.

4. Gén. VIVERRICULA, HODG.

◆ 8 Viverricula malaccensis, *Cantor, Cat. Mamm. Malay.* p. 29; *Gray, P. Z. S.* 1864, p. 513.

V. malaccensis, *Gmelin, S. N.* p. 92 (from Sonn.) ; *Gray, Cat. Mamm. B. M.* p. 48; *Gerrard, Cat. Ost. B. M.* p. 70.

V. gunda, *Hamilton Buchanan, Icon.*

V. rasse, *Horsf. Zool. Java*, t. 5; *P. Z. S.* ii. (1832) p. 23; *Schinz, Syn. Mamm.* i. p. 362.

V. indica, *Geoff. M. S.*; *Fischer, Syn. Mamm.* p. 171; *Desm. Mamm.* p. 210; *Gervais, Mag. Zool.* 1835, p. 10, t. 1; *Horsf. P. Z. S.* ii. (1832) p. 23.

?*V. bengalensis*, *Gray, Illust. Ind. Zool.* i. t. 4.

Viverra leveriana, *Shaw, Mus. Lever.* t. 21.

Genetta manilensis, *Eydoux*.

G. indica, *Lesson, Man.* 174.

G. rasse, *F. Cuvier, Mamm. Lithogr.* t.

Civette de Malacca, *Sonnerat, Voy.* ii. 144, t. 91.

Viverricula indica, *Hodgson, Journ. Asia. Soc. Beng.* x. p. 909.
Hab. Luzon, Cagayan, Java, Madras, Sumatra.

5. Gén. HERPESTES, HILLIG.

9 H auropunctatus, *Hodgs., J. As. S. Beng.*, 1836, 5, p. 235; *Anderson, Anat. and Zool. R's. Yunnan.* 1878, p. 172, pl. 11, fig. 11, 12; *Sterndale, Ind. M. u.* 1894, p. 225.

H. nepalensis, *Gray, Mag. Nat. Hist.* 1836, p. 578.

H. javanicus, *Blyth, J. As. S.*, 1852, p. 349.

H. microcephalus, *Temm., Esq. Zool. côte de Guinée*, 1853, p. 113.

?*H. Edwardsii*, *Geoff.*

H. persicus, *Gray, P. Z. S.*, 1864, p. 554; *Anderson, l. c.*, p. 174, pl. 9.

H. pallipes, *Blyth, J. As. S.*, 1845, 14, p. 346.

H. griseus, *Hutton*.
Hab. Bengal, Malaca.

Fam. FÉLIDOS.

1. Gén. CYNAILURUS, WAGELL.

1. *C. tigris*, *Linn.* ♂ N. v. Tigre. (M. S. T.)

C. tigris, *Linn.*, *Syst. Nat.*, 1766, 1, p. 61; *Schreb. Sang.*, 3, p. 381, pl. 98, 98 a; *Elliot, Monogr. Felidae*, 1883, pl. 3; *Sterndale, Ind. Mamm.*, 1884, p. 101.

T. regalis, *Gray, P. Z. S.*, 1807, p. 263.

T. sondaica, *Fitzinger, Sitz. Ak. Wiss. Wien*, 1868, 58, p. 34.
T. longipilis, *Fitzinger, l. c.*, p. 35.

Hab. Asia, Java, China, Sumatra, Corea.

2. *C. macroscelis*, *Gray*, ♀ N. v. Rheinland. (M. S. T.)

C. Diardi, *Desmoul.*, *Diction. Class. 11. Nat.*, 1823, 3, p. 495; *Elliot, Monogr. Felidae*, 1883, pl. 8; *Stern, Ind. Mamm.*, 1884, fig. p. 186.

C. macroscelis, *Gray, P. Z. S.*, 1807, p. 266, fig. 3, crâne.

C. nebulosa, *H. Smith*.

C. macroceloides, *Hodgs.*

C. brachyurus, *Swinhoe, P. Z. S.*, 1802, p. 352, pl. 43.
Hab. Asia, China, Melaca, Sumatra, Java, Borneo.

2. Gén. FELIS, LINN.

3. *Felis viverrina*, *Bennet* N. v. Tarai, wagati (M. S. T.)

F. viverrina, *Bennet, P. Z. S.*, 1807, p. 68; *Elliot, Monogr. Felidae*, 1883, pl. 22; *Sterndale, Ind. Mamm.*, 1884, p. 187, fig. crâne.

F. viverricaps, *Irodgson*.

F. himalayana, *Jardine*.

F. celidofaster, *Gray* (nec *Temm.*)

F. Bennettii, *Gray, P. Z. S.*, 1807, p. 308, fig. 5.
Hab. China, Formosa, Tungquin, Melaca.

4. *F. javanensis* *Horsf.* N. v. Sanguon (M. S. T.)

F. javanensis, *Horsf. Zool. R. S.*, 1824; *Elliot, Monogr. Felidae*, 1883, pl. 28.

F. sumatrana, *Horsf. J.*

F. undata, (*Desm.*) *Less.* *Mus. d. Mus.*, 1827, p. 188.

F. Diardi, *Cuv.* (nec *Desmali*), *Oss. Foss.*, 4, p. 437.

F. minuta, *Temm.*, *Monogr. Mamm.*, 1, p. 173.

F. chinensis, *Gray, Mag. Z. Hist.*, 1837; *P. Z. S.*, 1867, p. 374, 400.

F. servalinus, *Gray*, (nec *Ogilby*), *P. Z. S.*, 1867, p. 401.

F. Reevesii, *Gray*.

F. Smithii et angulifera, *Fitzinger*.

F. Herscheli, *Gray. Cat. Curr. Mamm.*, 1869, p. 28.
F. bengalensis, *p.*, *Anderson. An. and Zool. Res. Yunnan*, 1878,
p. 162.
Hab. Panay, Illoilo, Negros, Capiz, China, Java, Borneo, Sumatra.

5. **F. domesticus.** *Briss. C. & O. N.*, v. Pusa, Curring. (M. S. T.)

F. domestica, *Briss.*, *Quadrap.*, p. 191; *Regn. Anim.*, 1750,
p. 164; *Blausius, Faun. Deuts.*, 1857, p. 167, f. 104-105; *Elliot,*
Monogr. Felidae, 1883, pl. 42.
F. manulata, *p.*, *Fitzinger*, 1869.
Hab. Filipinas, Europa, etc. cosmopolita.

6. **F. angorensis.** *Briss. C. & O. N.*, v. G. de Angola (M. S. T.)

F. sinensis, *Fischer.*
Hab. Asia menor, Chin.

Orden 7.^o PINNÍPEDOS.

Fam. TRIQUÉRIDOS.

1. Gén. TRICHECHUS, GRAY.

1. **Trichechus rosmarus.** *Schre. (edimillae)*, N. v. Morsa (M. S. T.)
Hab. Pacífico, Islas Batanes.

Orden 8.^o SIRENIOS.

Fam. HALICÓRIDOS.

1. Gén. HALICORE, LINN.

1. **Halicore dugong.** *Linn.* N. v. Dugon.
Hab. Oc. Indico, Mindanao.

Orden 9.^o CETÁCEOS.

Fam. BALÉNIDOS.

1. Gen. BALENA, LINN.

✓ 1. **Balaena australis.** *Desm. (barbata)*, N. v. Ballena (M. S. T.)
Hab. Mindanao, Dinagat, N.^a Zelandia.

Fam. BALENOPTÉRIDOS.

1. Gén. BALENOPTERA, GRAY.

✓ 1. **B. Swinhcei**, Gray. (*Cératodon*). N. v. (M. S. T.)

Hab. Batanes, Joló, Formosa.

✓ 2. **B. mindorensis**.

Hab. Mindoro.

Fam. CATODÓNTIDOS.

1. Gén. CATODON, GRAY.

✓ 1. **C. macrocephalus** Gray (*maxilar inf.*) (M. S. T.)

Hab. Batanes, Marianas, Mindanao, Mares tropicales.

Fam. DELFÍNIDOS.

1. Gén. STENO, GRAY.

1. **S. chinensis**, Osbeck.

Hab. Formosa, China.

2. Gén. DELPHINUS, GRAY.

2. **D. longirostris**, Gray ♂ juv. N. v.? (M. S. T.)

Hab. Japón, Marianas, Batanes.

Orden 10.^o ARTIDÁCTILOS.—(Rumiantes.)

Subord. CAVICORNIOS.

—
Fam. BÓVIDOS.

1. Gén. BOS, LIN.

✓ 1. **B. taurus**, Gray. ♂ N. v. Toro. (M. S. T.)

Hab. (introd.) en Filipinas.

2. Gen. BUBALUS, H. SMITH.

✓ 2. **B. carabao**, ♂ N. v. Carabao. (M. S. T.)

Hab. en todas las islas.

✓ 3. **B. mainitensis**, H. N. v. Cimarron.

Hab. Mainit, Mindanao.

- * 4 **B. mindorensis.** ♂♂ N. v. Tamarao, (M. S. T.)
Hab. Mindoro, Célebes.

Fam. ANTILÓPIDOS.

1. Gén. RUPICAPRA.

1. **R. tragus.** Gray. ♂ N. v. Gamuza. (M. S. T.)
Hab. Alpes Europeos.

Fam. CÁPRIDOS.

1. Gén. HIRCUS, GRAY.

- * 1. **H. ægagrus.** Gray. ♂♂ N. v. Cambing. (M. S. T.)
Hab. (domesticado introd.) en Filipinas.

Fam. ÓVIDOS.

1. Gén. OVIS, GRAY.

- * 1. **O. aries.** Gray. ♂♂ N. v. Tupa (M. S. T.)
Hab. Filipinas (introd.)

Suborden CAPREOLOS.

Fam. ÁLCIDOS.

1. Gén. ALCES

1. **A. malkis.** Gray. ♂♂ (cabeza) N. v. Elk. (M. S. T.)
Hab. Norte Europa y N. América, Canadá

Fam. CÉRVIDOS.

1. Gén. STRONGYLOCEROS, GRAY.

1. **S. canidensis.** Gray. ♂ (cabeza) N. v. Wapiti. (M. S. T.)
Hab. Norte América, Canadá.

2. Gén. PSEUDAXIS, GRAY.

2. **P. Tunquinensis.** ♂ (M. S. T.)
Hab. Tunquin.

✓ 3. *Ps. soloensis*, Heude.

El sábio naturalista P. Heude en sus *Etudes sur les cerfs des Philippines*, fundándose en los caracteres craneales y odontológicos enumera y clasifica los ciervos de Filipinas de la manera siguiente.

4. Gén. *SIKELAPIUS* H.

✓ 4. *S. soloensis*, H.

Hab. Joló.

3. Gén. *USSA*, H.

✓ 5. *U. Gorrichanus*, H. N. v. Usá. (M. S. T.)

Hab. en Batangan, Luzón.

✓ 6. *U. Barandanus*, H. N. v. id. (M. S. T.)

Hab. Mindoro.

✓ 7. *U. crassicornis*, H. N. v. id. (M. S. T.)

Hab. Cebú.

✓ 8. *U. Francianus*, H. N. v. id. (M. S. T.)

Hab. Mindanao, Mati.

✓ 9. *U. Nublanus*, H. N. v. id. (M. S. T.)

Hab. La Laguna, Luzón.

✓ 10. *U. Tuasoninus*, H. N. v. id. (M. S. T.)

Hab. Bulangas, Luzón.

✓ 11. *U. spatharius*, H. & N. v. Usá. (M. S. T.)

Hab. La Laguna, Luzón.

✓ 12. *U. Ramosianus*, H. N. v. id. (M. S. T.)

Hab. N. Ecija, Luzón.

✓ 13. *U. Ambrosianus*, H. N. v. id. (M. S. T.)

Hab. N.^a Ecija, Luzón.

✓ 14. *U. Marianus* H. & N. v. id. (M. S. T.)

Hab. N.^a Ecija, Luzón.

15. U. Elorzanus, *H.* ♂ N. v. id. (M. S. T.)
Hab. Bataan, Luzón.
16. U. Garcianus, *H.* ♂ N. v. Usa (M. S. T.)
Hab. N.^a Ecija, Luzón.
17. U. Guidoteanus, *H.* ♂ N. v. id. (M. S. T.)
Hab. Batangas, Luzón.
18. U. Rosarianus, *H.* N. v. id. (M. S. T.)
Hab. N.^a Ecija.
19. U. nigricans, *H.* ♂ N. v. Usa. (M. S. T.)
Hab. Jala-Jala, Laguna, Luzón.
20. U. Maraisianus, *H.* ♂ N. v. id. (M. S. T.)
Hab. Jala-jala, Laguna, Luzón.
21. U. Dailliardianus, *H.* ♂ N. v. Usa. (M. S. T.)
Hab. Jala-jala, Laguna.
22. U. Marzaninus, *H.* N. v. id. (M. S. T.)
Hab.
23. U. Roxasianus, *H.* ♂ N. v. id. (M. S. T.)
Hab. Batangas, Luzon.
24. U. longicuspis, *H.* N. v. id. (M. S. T.)
Hab.
25. U. microdontus, *H.* ♂ N. v. id. (M. S. T.)
Hab. Batangas.
26. U. Gonzalinus, *H.* N. v. id. (M. S. T.)
Hab.
27. U. Telesforianus, *H.* N. v. id. (M. S. T.)
Hab.
28. U. brachyceros, *H.* ♂ N. v. Usa (M. S. T.)
Hab. Batangas *

29 **U. Cortcanus.** *H.* ♂ N. v. Usá. (M. S. T.)

Hab. Bataan, Mariveles.

30 **U. Verzusanus.** *H.* N. v. id.

Hab.

31 **U. rubiginosus.** *H.* ♂ N. v. Usá.

(N. S. T.)

Hab. Bataan, N.^a Ecija.

32 **U. Hipolitianus.** *H.* ♂ N. v. id.

(M. S. T.)

Hab. Batangas, Laguna.

33 **U. chrysotricus.** *H.* ♂ N. v. id.

(M. S. T.)

Hab. Laguna, Batangas.

34 **U. Guevaranus.** *H.* ♂ N. v. id.

Hab. La Laguna.

35 **U. Marianus.** *H.* N. v. id.

Hab.

4 Gén. MELANAXIS. *H.*

36 **M. Alfredi.** *Sclat.* ♂ ♀ N. v. (M. S. T.)

Cervus Alfredi, Sclat P. Z. S. 1870. p. 381.

Hab. Guimarás, Negros, Cebú, Panay.

37 **M. Masbatensis.** *H.* N. v. Usá.

Hab. Masbate.

38 **M. breviceps.** *H.*

Hab. Masbate.

39 **M. elegans.** *H.*

Hab. ?

40. **M. Basilanensis.** *H.*

Hab. Basilan.

5. Gén. HYELAPHUS. SUNI.

41 **H. Calamianensis.** *H.* ♂ ♀ N. v. Calachao (M. S. T.)

Hab. Calamianes, Culion.

Fam. TRAGULIDOS.

1. Gén. TRAGULUS.

✓ 1. **T. javanicus**, *Pall.* ♂ N. v. Pilandoc. (M. S. T.)

Hab. Balabac, Java, Sumatra.

2. **T. fulviventer**, *Gray.* ♂ ♀ N. v. Pilandoc. (M. S. T.)

Moschus Kanchil, *Horsf.*
Tr. affinis, *Gray. Lut of Mam. B. M.* 1843, p. 173; *P. Z. S.* 1861, p. 138.

M. fulviventer, *Gray. P. Z. S.* 1836 p. 65.

Tr. *pygmæus*, var. 2. *Gray. Cat. Vng. B. M. i.* p. 250.

Tr. Kanchil, *M. Edwards. Iu. Sc. Nat.* 1864 p. 122.

Hab. Balabac, Java, Camboja.

3. **T. pygmæus**, *Gray.* ♂ N. v. Pilandoc (M. S. T.)

Hab. Balabac, Java, India.

Fam. SÚIDOS.

1. Gén. SUS, Ltn.

✓ 1. **S. scrofa**, *Lin.* ♂ N. v. Babuy. (M. S. T.)

Hab. Manila, Laguna, Luzón, etc.

2. **S. papuensis**, *Less.* ♂ ♀ N. v. Babuy. (M. S. T.)

El laborioso é inteligente P. Hende citado, en su «*Etude sur les sangliers des Philipines*» enumera los Súidos filipinos y los clasifica del modo siguiente:

3 **S. effrenus**, *H.* ♂ ♀ N. v. Babuy. (M. S. T.)

Hab. Laguna, Jala-jala.

4 **S. frenatus**, *H.* ♂ N. v. id. (M. S. T.)

Hab. Jala-jala.

5 **S. microtis**, *H.* ♂ N. v. id. (M. S. T.)

Hab. Bataan.

✓ 6 **S. cebrifons**, *H.* ♂ N. v. Babuy-phas (M. S. T.)

Hab. Cebú.

7. **S. minutus**, H. N. v. id.

Hab. ?

8. **S. arietinus**, H. N. v. id.

Hab. ?

9. **S. bucculutus**, H. N. v. id.

Hab. ?

10. **S. calamianensis**, H. N. v. Babuy-talong.

(M. S. T.)

S. longirontris, *Nch.*

Hab. Calamianes, Culion.

1. Gén. BABIRUSA, GRAY.

11. **B. alfarus**, *Less.* ♂ N. v. Babirusa (cabezas).

(M. S. T.)

Hab. Molucas.

Orden 11.º PERISODÁCTILOS.

Fam. ÉQUIDOS.

1. Gén. EQUUS, LIN.

1. **E. caballus**, *Lin.* ♂ N. v. Caballo.

(M. S. T.)

Hab. Filipinas, (import.)

2. Gen. ASINUS, LIN.

A. **vulgaris**, *Lin.* N. v. Asno.

I

Hab. Filipinas, (introduc.)

Fam. TAPIRIDOS.

1. Gen. TAPIRUS, LIN.

1. **T. indicus**, *Derm.* ♂ N. v. Danta.

(M. S. T.)

Hab. Malaca, Sumatra.

Orden 12.^o PROBOSCIDIOS.

Fam. ELEFÁNTIDOS.

1. Gen. ELEPHAS, LINN.

1. **E. maximus.** *L. (molar.)* N. v. Elefante de la India. M. S. T.)
Hab. India, Ceilan, China, Java.

Orden 13.^o DESDENTADOS.

Fam. MANÍDIDOS.

1. Gen. PHOLIDOTUS, BRÜS.

2. **P. javanicus,** *Desm.* ♀ N. v. Balintong. M. S. T.)

- P. Manis pentadactyla, *Raffles*, Linn. *Trans.* xiii. p. 249.
P. Manis javanica, (partly), *Fischer*, *Syn.* p. 400 (*not of Sundaoall.*)
P. Manis aspera, *Sunderall*, *I. c.* p. 253; *Rapp*, *Edent.* t. 2.^a (good), t. 6, f. 1, 2 (skull); *Desm. Mamm.* p. 377; *Gerrard, Cat. Bones B. M.* p. 285.
P. Pholidotus javanus, *Gray*, *P. Z. S.* 1865, p. 366.
Hab. Paragua, Culion, Chima, Java.

3. **P. dalmanii,** *Sauv.* M. S. T.)

4. **P. cunicularius,** ♂ N. v. Halintang. (M. S. T.)

- P. Manis, *D'Urville*, *A. S. Stockh.* t. 4, p. 265, t. 6.
P. Manis, *Ursula*, *U. L. Perel.* t. 59 (printed 1793), p. 10, t. 5, ♂? *S. c. 10.* L. c. *Up.* 262, 269.
P. Manis *D. U. 57.* *S. c. 10.* L. c. p. 256, t. 4 a. f. 10 (*incisives*), t. 2, L. c. 59, 262, p. 17.
P. Pholidotus *U. 57.* *S. c. 10.* *P. P. S.* 1865, p. 366.
P. Manis *U. 57.* *S. c. 10.*
P. Manis *U. 57.* *S. c. 10.* (partly), *Gerrard, Cat. Bones B. M.* p. 285.
P. Manis *javanica.* *S. c. 10.* *T. 2.* t. 1, 254, t. 4 a. f. 11; *Turner, P. Z. S.* 1854, p. 203.
P. Pangolin, *B. M.* t. 2, f. 37.
Hab. Calabar, Culion.

Fam. DASIPÓDIDOS.

1. Gén. TATUSIA, F. Cuv.

1. **T novocineta**, Lin. N v. Armadillo. (M. S. T.)

Hab. América del Sur.

Sub-clase 2.^o DIDELFOS.

Orden MARSUPIALES.

Fam PERAMÉLIDOS.

1. Gén PERAMELES, GROFF.

2. **P nasuta**, Geoff. N v. P de nariz aguda. (M. S. T.)

P. nasuta, Geoff. Ann. Mus. iv. p. 62, pl. xliv. (animal & skull) (1804); G. Fisch. Zoogn. iii. p. 13 (1814); G. Cuv. R. A. i. p. 177 (1817); Desm. N. Dict. d'H. N. (2) xxv. p. 183 (1817); id. Mamm. i. p. 265 (1820); Schinz. Cuv. Thierr. i. p. 256 (1821); F. Cuv. Dict. Sci., Nat. xxviii. p. 416 (1825); Gray, Griff. Cuv. An. K. iii. p. 39, fig. (animal), v. p. 195 (1827); Less. Man. Mamm. p. 216 (1827); id. Dict. Clas. d'H. N. xiii. p. 199 (1828); Lacép. (Europ. Buff. xxvi. p. 224 (1828); Fisch. Syn. Mamm. p. 273 (1829); Burm. Lehrb. Naturg. p. 548 (1830); Less. B. N. Mamm. (Compl. Buff.) iv. p. 483 (1830); Grant. Memm. Vern. N. H. Soc. vi. p. 184 (1832); (anat.) Waterh. Cat. Mamm. Mus. Z. S. p. 65. (1838); Gray, Grey's Austr., App. ii. p. 401 (1841); Waterh. Jard. Nat. Libr., Mamm. xi. p. 155 pl. xiii. (animal) (1841); Owen. Tr. Z. S. ii. p. 320 (1841); Less. N. Tabl. R. A. Mamm. p. 191 (1842); Gray, List Mamm. B. M. p. 96 (1843); Wagu. Schr. Säug. Supp. iii. p. 57, pl. clv. a (animal) (1843); v. p. 213 (1855); Schinz. Syn. Mamm. p. 515 (1844); Owen. Todd's Cyclop. Anat. iii. p. 260, fig. 84 (skull) (1845); Waterh. N. H. Mamm. i. p. 374 (1846); De m. Dict. Univ. d'H. N. ix. p. 578 (1849); Gould, Mamm. Austr. i. pl. xi. (animal) (1855); Schleg. Dierk. p. 138 (1857); Gieb. Säug. p. 721 (1859); Gerrard, Cat. Bones Mamm. B. M. p. 132 (1862); Kretsch. Cat. Mamm. Austr. Mus. p. 33 (1864); id. Austr. Vert. p. 13 (1871); Schleg. Dierent. p. 164 (1872); Bhrem. Thierl. ii. p. 565 (1880); Dobs. J. Anat. Phys. xvii. p. 152 (anat. foot) (1882); Pouton, P. Z. S. 1883, p. 599 (anat. tongue); id. Q. J. Micr. Soc. xxxiii. p. 69, pl. i. (1883); (anat. tongue); Flow. & Gars. Cat. Ost. Coll. Surg. ii. p. 738 (1884); Leyd. Cat. Foss. Mamm. B. M. v. p. 255 (1887); Jeunt. Cat. Ost. Leyd. Mus. p. 306 (1887); Coll. Zool. Jahrb. ii. p. 874 (1887); Olfield. T. Cat. of Mars. and Mon. Brit. p. 242 (1888).

Thylamis aurata, *Hil. Prodr. Syst. Mamm.*, p. 79 (1811).

Perameles luteus, *Q. & G. Ver. Natur.*, pp. 57 & 711 (1824);
id. Ann. Sci. Nat., v. p. 48 (1825); *Fisch. Syst. Mamm.*,
p. 274 (1829); *Less. N. Tabl. R. A.*, *Mamm.*, p. 191 (1842);
Schinz, Syst. Mamm., i. p. 520 (1844); *Desm. Dict. Univ.*
d'H. N., ix, p. 579 (1849).

«*Perameles aurata*, *Mus. Paris.*» *Waterh.*, *Gray, et al.*,
Hab. Australia.

Fam. DASIÚRIDOS.

1. Gén. DASYURUS, GEOPF.

1. *D. viverrinus* *Shaw*, N. v. *Tapiratua* (M. S. T.)
- Spotted Opossum*, *Phillip*, *Voy. Botan. Bzg.*, p. 147, pl. xv. (1789).
Farpa tuta, *schott's variety*, *Witt*, *Journ. Vdg.*, N. S., II, p.
285, pl. Ix. (1799).
Didelphis maculata, *Kerr*, *Linn. An. K.*, p. 199 (1792) (*nec*
Viverra maculata, *id. op. cit.* p. 170); *G. Cuv. Tabl. Elem.*
p. 125 (1798); *Wiedm. Cuv. Naturg. Thiere*, i, p. 179 (1800);
Turton, Linn. Syst. Nat., i, p. 68 (1806).
D. viverrinus, *Shaw*, *Gen. Zool.*, i, pt. ii, p. 491, pl. exi. (1806).
D. viverrinus *E. Geoff.* *Ann. Mus.*, iii, p. 360 (1804); *Sebast.*
Mém. Ac. Pérou, i, p. 443 (1807); *III. Pratc. Syst. Mamm.*
p. 77 (1811); *G. Fisch. Zootn.* ii, p. 585 (1813); *G. Cuv.*
R. A. i, p. 176 (1817); *Desm. N. Dict. d'H. N.* (2) ix, p. 139
(1817); *Geoff. Dict. Sci. Nat.*, xii, p. 511, (1818); *Desm. Mamm.*
i, p. 263 (1820); *Desmoul. Dict. Clss.* *d'H. N.*, v, p. 339 (1824);
Gray, Griff. Cuv. An. K., v, p. 193 (1827); *Less. Mamm. Mamm.*
p. 215 (1827); *Temm. Mon. Mamm.*, i, p. 72 (1827); *J. B. Fisch.*
Syn. Mamm., p. 272 (1829); *Less. H. N. Mamm. (Compl. Buff.)*
v, p. 373, pl. xxv. (1836); *Waterh. Cat. Mamm. Mus. Zool.*
Soc. p. 65 (1838); *Gunn. Ann. Mag. N. H.* (1) i, p. 104 (1838);
Gould, P. Z. S. 1840, p. 151; *Owen. Tr. Z. S.* ii, p. 408,
pl. lxx, fig. 2 (cráneo) (1841); *Gray. Grey's Austr.*, *Abb.* ii, p.
400 (1841); *Less. N. Tabl. R. A.*, *Mamm.*, p. 199 (1842);
Gray, List. Mamm. B. M., p. 97 (1843); *Wagn. Schr. Saig.*
Snpp. iii, p. 33, 1843, v, p. 194 (1855); *Waterh. N. H. Mamm.*
i, p. 442, pl. xii, fig. 1 (1846); *Gould, Mamm. Austr.* i, pl. 1,
(animal) (1851); *Gunn, P. Roy. Soc. Tasm.* ii, p. 81 (1852);
Gerv. S. N. Mamm. i, p. 282 (1855); *Schleg. Dierk.* p. 135
(1857); *Gieb. Saig.* p. 731 (1859); *Gerrard, Cat. Bones Mamm.*
B. M. p. 134 (1862); *Krefft, Cat. Mamm. Austr. Mus.* p. 26
(1864); *id. Notes Faun. Tasm.* p. 4 (1868); *id. Austr. Vert.*
p. 14 (1871); *Schleg. Dierent.* p. 159 (1872); *Brehm, Thierl.*
ii, p. 549 (1880); *Higg. & P. H. P. Roy. Soc. Tasm.* 1883, p.
197; *Flw. & Gurs. Cat. Ost. Coll. Saig.* ii, p. 742 (1884);
Jent. Cat. Ost. Liz. Mus. p. 324 (1887); *This. Phil. Trans.*
clxxvii, p. 461, pl. xxvii, fig. 5 (dientes) (1887); *Lyl. Cat. Foss.*
Mamm. B. M. v, p. 263 (1887); *O'field's Cat. of Murs. Brit.*
Mus. p. 265 (1888).
D. *maugei*, *Geoff. Ann. Mus.*, iii, p. 359 (1814); *Tetzen Zool.*

p. 429 (1808); *G. Fisch. Zool.* ii. p. 584 (1813); *Desm. N. Dict. d'H. N.* (2) ix. p. 138 (1817); *Geoff. Dict. Sci. Nat.* xii. p. 511 (1818); *Desm. Mamm.* i. p. 263 (1820); *Goldf. Handb. Zool.* ii. p. 449 (1820); *Desmont. Dict. Class. d'H. N.* v. p. 339 (1824); *F. Civ. H. N. Mamm.* (fol.) iii. lxxv. xliv. (animal) (1824); *Onoz & Ga'm. Voy. Traue,* p. 54, pl. iv. (1824); *Gray. Grff. Civ. An. K.* v. p. 193 (1827); *Timm. Mamm.* i. p. 71, pl. vii. figs. 5-8 (1827); *Less. Man. Mamm.* p. 214 (1827); *J. B. Fisch. Sgn. Mamm.* p. 271 (1829); *Less. H. N. Mamm.* (*Compl. Buff.*) v. p. 373, pl. xxvii. (animal) (1836); *Bonn. Cat. II. Austr. Mus.* p. 2 (1837); *Owen. P. Z. S.* 1838, p. 121 et seqq.; *Waterh. Cat. Mamm. Mus. Zool. Soc.* p. 65 (1838); *Gould. P. Z. S.* 1840, p. 115; *Owen. Tr. Z. S.* ii. pp. 397, 408, pl. Ixx, figs. 3 (teráneo) (1841); *Waterh. Jard. Nat. Libr. Mamm.* xi. p. 133, pl. vii. (animal) (1841); *Less. N. Tabl. R. A. Mamm.* p. 190 (1842); *Wagn. Schreb. Säng. Supp.* iii. p. 24, pl. clii. b. b. (animal) (1843); *Schinz. Sgn. Mamm.* i. p. 491 (1844); *Gieb. Odont.* p. 39, pl. xvii. fig. 8 (dientes) (1855).

D. guttatus, *Desm. N. Dict. d'H. N.* 24 p. 10 (1804).
Hab. N.^a Gales, Victoria y Tasmania.

Fam. DIDÉLFIDOS.

I. Gén. DIDELPHIS, LINN.

1. *D. marsupialis*, Linn. ♂ N. v. Zarigüeya.

(M. S. T.)

Philander maximus orie talis, *Seba. Thesaurus*, i. p. xxxix. (animal) (1734).

Didelphys marsupialis, *Linn. Syst. Nat.* (13) p. 54 (1760); *Müll. Linn. Natur.* i. p. 288 (1773); *Erxl. Syst. R. A.* p. 73 (1777); *Schreb. Säug.* iii. p. 536, pl. cxlv. (animal) (1778); *Blum. Handb. Naturg.* p. 87 (1779); *Zimm. Geogr. Gesch.* ii. p. 221 (1780); *Bedd. Elench. Anim.* i. p. 76 (1785); *Gmel. Linn. S. N.* i. p. 105 (1780); *Kerr. Linn. Au. K.* p. 191 (1792); *Donnd. Zool. Beytr.* i. p. 341 (1792); *G. Civ. Tabl. Elém.* p. 124 (1793); *Desm. N. Dict. d'H. N.* (2) xxiv. p. 19 (1804); *Turt. Linn. S. N.* i. p. 65 (1806); *Blumenb. Abbild. nat. Gegenst.* pl. liv. (animal) (1810); *Ill. Prodri. S. M.* p. 75 (1811); *G. Fisch. Zool.* ii. p. 576 (1813); *Ill. Abh. Ak. Berl.* 1811, p. 107 (1815); *G. Civ. R. A.* i. p. 173 (1817); *Schinz. Civ. Thierr.* i. p. 251 (1821); *Wied. Beytr. Nat. Bras.* ii. p. 387 (1826); *J. B. Fisch. Sgn. Mamm.* p. 204 (1829); *Kauf. Thierr.* p. 237 (1835); *Less. N. Tabl. R. A. Mamm.* p. 186 (1842).

D. karkinophaga, *Zinn. Geogr. Gesch.* ii. p. 226 (1780).

D. carcinophaga, *Rodd. Elench. Anim.* i. p. 77 (1785); *G. Civ. Tabl. Elém.* p. 124 (1798).

D. canivora, *Gmel. Linn. S. N.* i. p. 108. (1789); *Kerr. Linn. Au. K.* p. 195. (1792); *Donnd. Zool. Beytr.* i. p. 352 (1792); *Shaw. Gen. Zool.* i. pt. ii. p. 482 (1800); *Bechst. Uebers. Vierf. Thiere.* ii. p. 684 (1800); *E. Geoff. Cat. Mus.* p. 139 (1803); *Desm. N. Dict. d'H. N.* (1) vi. p. 458 (1803); *Turt.*

- n.*, *N.*, i, p. 66 (1806); *Ill. Abbh. Ak. Berl.*, i, p. 197 (1815); *Desm. N. Dict. d'H.*, N. (2) ix, p. 422 (1817); *id. Mamm.*, i, p. 255 (1820); *Desmoul. D. J. Class. d'H.*, N. v, p. 490 (1824); *F. Cuv. Dents. Mamm.*, p. 73, pl. xxiii, c. (teeth) (1825); *Gray. Griff. Cuv. An. K.*, v, p. 187 (1827); *Temm. Mon. Mamm.*, i, p. 32, pl. v. (skull & skeleton) (1827); *Less. Man. Mamm.*, p. 210 (1827); *Desm. Dict. Sci. Nat.*, xlvii, p. 386 (1827); *Waterh. Cat. Mamm. Mus.*, Z. S., p. 64 (1838); *id. Jard. Nat. Libr.*, Mamm. xi, p. 85 (1841); *Wagn. Schr. St. g. Supp.*, iii, p. 41 (1843), v, p. 225 (1855); *Schinz, Syn. Mamm.*, i, p. 499 (1844); *Waterh. N. H. Mamm.*, i, p. 473 (1846); *Caban's. Sch. mb.*, Br. *Guanaz.*, iii, p. 777 (1848); *G. Cuv. Anat. Comp.*, ii, pls. 174-176 (miolog.) (1849); *Burn. Thiere Bras.*, i, p. 129 (1854); *Gerv. H. N. Mamm.*, i, p. 286 (1855); *Burm. Erl. Faun. Bras.*, p. 66, pl. iv. (animal), pl. vi, fig. 2 & pl. vi, fig. 2 (1859); *Gieb. Säug.*, p. 707 (1859); *Tomes, P. Z. S.*, 1859, p. 208; *Gerrard. Cat. Bones Mamm.*, B. M., p. 138 (1862); *Hens. Abbh. Ak. Berl.*, 1872, p. 114, pl. i, fig. 2 (dientes); *Schleg.*, *Dierent.*, p. 160 (1872); *Gulliver, P. Z. S.*, 1875, p. 491; *U. x. Bull. Soc. Philom.*, (8) ii, p. 148 (anat.) (1879); *Brehm. Th. erl.*, ii, p. 561 (1880); *Natt. Petz. Bras. Säug.*, *Verh. z.-b. Wiss.*, xxxiii, Anh. p. 110 (1883); *Flower. & Gars. Cat. Ost. Coll. Surg.*, ii, p. 749 (1884); *Jent. Cat. Ost. Leyd. Mus.*, p. 300 (1887).
- D. virginiana*, *Kerr. Linn. An. K.*, p. 193 (1792); *G. Cuv. Tabl. Elém.*, p. 124 (1798); *Shaw. Gen. Zool.* i, pt. ii, p. 473, pl. evii, (animal) (1800); *Bechst. Uebers. Vierf. Th.*, ii, p. 684 (1800); *E. Geoff. Cat. Mus.*, p. 140 (1803); *Desm. N. Dict. d'H.*, N. (1) xx, p. 147 (1803); *G. Fisch. Zoogr.*, ii, p. 577 (1813); *Desm. N. Dict. d'H.*, N. (2) ix, p. 420 (1817); *G. Cuv. R. A.*, i, p. 172 (1817); *Desm. Mamm.*, i, p. 254 (1820); *Desmoul. Dict. Class. d'H.*, N. N. v, p. 489 (1824); *F. Cuv. Dents Mamm.*, p. 75 (1825); *Gray. Griff. Cuv. An. K.*, v, p. 186 (1827); *Temm. Mon. Mamm.*, i, p. 27 (1827); *Less. Man. Mamm.*, p. 209 (1827); *Desm. Dict. Sci. Nat.*, xlvii, p. 383 (1827); *J. B. Fisch. Syn. Mamm.*, p. 263 (1829); *Burm. Lehrb. Naturg.*, p. 548 (1830); *Waterh. Cat. Mamm. Mus.*, Z. S., p. 64 (1838); *id. Jard. Nat. Libr.*, Mamm. xi, p. 79 (1841); *Gulliver, P. Z. S.*, 1842, p. 49; *Less. N. Fauna. R. A.*, Mamm., p. 186 (1842); *De Kay. N. H. New-York. Zool.*, i, p. 3, pl. x, v. fig. 2 (animal) (1842); *Gray. List Mamm.*, B. M., p. 100 (1843); *Wagn. Schr. St. g. Supp.*, iii, p. 37, pl. cxlv^o (animal) (1843); v, p. 219 (1855); *Schinz, Syn. Mamm.*, i, p. 497 (1844); *Waterh. N. H. Mamm.*, i, p. 465 (1846); *Aud. & Bach. Quadr.*, N. A., ii, p. 107, pl. lxvi, (animal) (1854); *Gerv. Casteln. Am. Sud. Mamm.*, p. 109, pl. xx, fig. 7 (dientes) (1855); *id. N. H. Mamm.*, ii, p. 286 (1855); *Gieb. Odontogr.*, p. 41, pl. xvii, fig. 12 (dientes) (1855); *Burm. Erlöser. Ern. Bras.*, p. 60, pl. v, fig. 1 & pl. vi, fig. 3 (cráneo) (1856); *Baird. Mamm.*, N. A., p. 232 (1859); *id. Zool. Mex. Bound. Surv.*, p. 31 (1859); *Gieb. Säug.*, p. 708 (1859); *Gerrard. Cat. Bones Mamm.*, B. M., p. 137 (1862); *Flower. Philad.*, 1867, p. 635 pl. xxx, figs. 3-5; *Coues, P. Ac. Philad.*, 1871, p. 15; *id. Mem. Bost. Soc. N. H.*, ii, pp. 41-149, figs. 1-35 (1872) (osteolog. & miolog.); *Wyman. Mem. Bost.*,

- Soc. N. H. ii. p. 151 (1872); Schleg. Dierent. p. 160 (1872); Gullvér, P. Z. S. 1875, p. 491; Brehm, Thiere. ii. p. 858 (1880); Alst. Biol. Cent.-Am., Mamm. p. 196 (1881); Flow. & Gars. Cat. Ost. Coll. Surg. ii. p. 747 (1884); Selenka, Biol. Centralbl. v. p. 294 (1885); Jent. Cat. Ost. Leyd. Mus. p. 300 (1887). Philander virginianus, Tcdem Zool. p. 427 (1808).
- D. aurita, Wied. Beitr. Nat. Bras. ii. p. 305 (1826); Schinz, Syn. Mamm. i. p. 500 (1844); Burm. Thiere Bras. i. p. 130 (1854); id. Erläut. Faun. Bras. p. 64, pl. iii. (animal), pl. v. fig. 3 & pl. vi. fig. 1 (cráneo) (1856); Gieb. Säug. p. 709 (1859); Hens. Zool. Gart. viii. p. 290 (1867); Frantz. Arch. f. Nat. xxxv. p. 315 (1860); Alst. Biol. Cent.-Am., Mamm. p. 197 (1881); Natt. Petz. Bras. Säug. Verh.-b. Wien xxxiii Anh. p. 109 (1883); Jent. Cat. Ost. Leyd. Mus. p. 301 (1887).
- D. californica, Benn. P. Z. S. 1833, p. 40; Less. H. N. Mamm. (Compl. Buff.) v. p. 304 (1836); Waterh. Cat. Mamm. Mus. Z. S. p. 64 (1838); id. Jard. Nat. Libr. Mamm. xi. p. 87 (1841); Wagn. Schr. Säug. Supp. iii. p. 40 (1843), v. p. 223 (1855); Schinz, Syd. Mamm. i. p. 498 (1844); And. & Bach Quadr. N. Am. iii. p. 331 (1854); Burm. Erläut. Faun. Bras. p. 63 (1856); Baird, Mamm. N. A. p. 233 (1859); id. Zool. Mex. Bouud. Surt. p. 32, pl. iii. (animal) (1859); Gieb. Säug. p. 709 (1859); Tom s., P. Z. S. 1861, p. 287; Gerrad, Cat. Bones Mamm. B. M. p. 138 (1862).
- D. breviceps, Benn. P. Z. S. 1833, p. 40; Less. H. N. Mamm. (Compl. Buff.) v. p. 304 (1836); Waterh. Cat. Mamm. Mus. Z. S. p. 64 (1838); id. Jard. Nat. Libr. Mamm. xi. p. 88 (1841); Wagn. Schr. Säug. Supp. iii. p. 40 (1843), v. p. 224 (1855); Schinz, Syn. Mamm. i. p. 498 (1844); Waterh. N. H. Mamm. i. p. 478 (1846); And. & Bach, Quadr. N. A. iii. p. 339 (1854); Gieb. Säug. p. 709 (1859); Jent. Cat. Ost. Leyd. Mus. p. 301 (1887). Micoureus californicus y breviceps, Less. N. Tabl. R. A. Mamm. p. 186 (1842).
- D. prainos, Wagn. Schr. Säug. Supp. iii. p. 40 (1843); Schinz. Syn. Mamm. i. p. 499 (1844).
- D. pilosissima, e illinensis, Link, apud Gray, List Mamm. B. M. p. 100 (1843), y otros autores.
- Philander marsupialis, Gray, List. Mamm. B. M. p. 101 (1843); Gerrad, Cat. Bones Mamm. B. M. p. 139 (1862).
Hab. N. América.

Fam. MACROPÓDIDOS.

1. Gén. MACROPUS, SHAW.

1. M. antilopinus. Gould. ♂ ♀ N v Canguro antilopino. (M S T)

- Osphranter antilopinus, Gould, P. Z. S. 1841, p. 80; Gray, List Mamm. B. M. p. 91 (1843); Gould, Mon. Macr. pl. xxii. (animal) (1842); id. Mamm. Austr. ii. pls. viii. & (animal) (1858); Gerrard, Cu. Bones Mamm. B. M. p. 127 (1862). Halmaturus antilopinus, Schinz, Syn. Mamm. i. p. 524 (1844); Wagn. Schr. Säug. Supp. v. p. 309 (1855).

M. antilopinus, Waterh. N. H. Mamm. i. p. 95 (1805); pl. v. fig. 15 (incisivos); Giebel, Odontogr. pl. xix. fig. 12 c (1855) (incisivos); Schleg. Dierk. p. 142 (1857); Gieb. Säng. p. 677 (1859); Krefft, Mamm. Austr. text. pl. x. p. 2. (1871); Gieb. Breun's Kl. u. Ordin. vi. Abth. v. pl. xlvi. fig. 21 (incisivos) (1876); Flower & Gars. Cat. Ost. Coll. Surg. ii. p. 711 (1884); Olfield, Cat. of Mars. Brit. Mus. p. 21 (1888).
Hab. Australia.

2. **M. giganteus.** Shaw, ♂ & ♀ N. v. Canguro gigante. M. S. T.

Kangaroo, Cook, Hawkesw. Voy. (4to) iii. pp. 157 & 173, pl. xx. (animal) (1773); Phillip, Voy. Bot. Bay, pp. 106 & 168, pls. x. & xxx. (animal y craneo) (1789); With, Journ. Voy. N. S. W. p. 272 (1790).

Yerboa gigantea, Zimm. Spec. Geogr. p. 526 (1777).

Jaculus giganteus, Erxl. Syst. Regn. An. p. 409 (1777); Blumenb., Handb. Naturg. p. 88 (1779).

Didelphys gigantea Seireb. Säug. iii. p. 552, pl. cliv. (1778); Gmel. Linn. S. N. i. p. 109 (1788); Doudn. Zool. Beitr. i. p. 354 (1792); Kerr, Linn. An. K. p. 197 (1792); Meyer, Syst. Uebers. Zool. Ent. p. 13 (1793); G. Cuv. Tabl. Elém. p. 176 (1798); Geoff. Ann. Mus. i. p. 178 (1802); Desm. N. Dict. d'H. N. xii. p. 355 (1803); Blumenb. Man. d'Hist. Nat. i. p. 109 (1803); G. Fisch. Anat. Maki, p. 180, (craneo) (1804); Turt. Linn. S. N. pl. xix. i. p. 67 (1806).

D. kanguru, Zimm. Geogr. Gesch. ii. p. 231 (1780).

D. kanguro, Bodda. Elench. An. i. p. 78 (1785).

Macropus giganteus, Shaw, Nat. Hist. i. pl. xxxiii. (1790); Pander & D'Alton, Vergl. Ostcol. Beutelth. pls. i. & vii. (cráneo y esqueleto) (1828); Fisch. Syn. Mamm. p. 281 (1829); F. Cuv. H. N. Mamm. (fol.) iii. livr. iv. (1829); Less. II. N. Mamm. (Compl. Buff. v. p. 377 (1836); Waterh. Cat. Mamm. Mus. Zool. Soc. p. 66 (1838); id. Jard. Nat. Libr. Mamm. xi. p. 192 (1841); Less. N. Tabl. R. A. Mamm. p. 193 (1842); Waterh. N. H. Mamm. i. p. 62 pl. iii. figs. 3-5, y v. figs. 1 & 2 (dientes) (1846); Desm. Dict. Univ. d'H. N. vii. p. 170 (1849); Gunn, P. Roy. Soc. Tasm. ii. p. 88 (1852); Gerv. Hist. Nat. Mamm. ii. p. 70, pl. xlvi. (1855); Giebel, Odontogr. p. 43 pl. xix. fig. 14, a, b (incisivos), (1855); Schleg. Dürk. p. 142 (1857); Gieb. Säng. p. 672 (1859); id. Thiere. i. p. 235 figs. 397-400 (1859) Blth. Cat. Mamm. Mus. As. Soc. p. 183 (1863) Schäffer & Williams, P. Z. S. 1876, p. 165 (anat.); Giebel, Breun's Kliss. u. Ordin. vi. Abth. v. pl. xlvi. fig. 21, 1 & 2 (incisivos) (1876); Brehm, Thierl. ii. p. 591 (1880); Flower, Encycl. Brit. (9) xiii. p. 838 (1881), art. Kangaroo; Chapman, P. Ac. Philad. 1881, p. 468 pl. xx. (anat.); Flower & Gars. Cat. Ost. Coll. Surg. ii. p. 707 (1884); Lyd. Cat. Fiss. Mamm. R. M. v. p. 225 (1887); Jent. Cat. Ost. Leyd. Mus. p. 317 (1887); Coll. Zool. Jahrb. ii. p. 816 (1887).

Macropus major, Shaw, Gen. Zool. i. pt. ii. p. 505, pl. cxv. (1800); G. Cuv. R. A. i. p. 183 (1817); F. Cuv. Dict. Sci. Nat. xxiv. p. 347 (1822); id. Dents Mamm. pl. xlvi. (dientes) (1825); Owen; P. Z. S. 1831, p. 159 1833, p. 128, & 1837,

- pp. 82 & 120; *Gray*, *Charlesw. Mus.* N. H. i. p. 582 (1837); *Blyth*, *Cuv. An. Kingd.* p. 106 (1840); *Owen*, *Tr. Z. S.* ii. pp. 228 & 388 (1841); *Gray*, *Grey's Austr., App.* ii. p. 402 (1841); *Fenner*, *Nat. Hist. Quadr.* p. 275 (1841); *Gould*, *Mou. Mavr.* pl. i. (animal) (1841); *Gray*, *List Mamm. B. M.* p. 87 (1843); *Gould*, *Strzelecki's N. S. W.* p. 316 (1845); *Owen*, *Odontogr. Text, Tex.* p. 300, Alt. pl. e. fig. 8 (dientes) (1845); *id. Art. Marsupialia, Tod's Cycl. Anat. Phys.* iii. p. 266, fig. 92 (1847), y *Art. Teeth, op. cit.* iv. p. 993 fig. 594 dientes (1848); *G. Cuv. Anat. Comp.* ii. pls. clxxxiii.-cciiii. (mio-log.) (1849); *Owen*, *Cat. Ost. Mus. Coll. Surg.* i. p. 329 (1853); *Gould*, *Mamm. Austr.* ii. pls. i. & ii. (animal) (1857); *Gerrard*, *Cat. Bones Mamm. B. M.* p. 124 (1862); *Krefft*, *Cat. Mamm. Austr. Mus.* p. 47 (1864); *Huxl.* & *Hawke*, *Atl. Comb. Ost.* pl. x. figs. 4 & 6 (pelvis y pie) (1864); *Flower*, *Phil. Trans.* 1867, p. 633, pl. xxix, figs. 1, 2, & 3 *Owen*, *Comp. Anat. Phys.* iii. p. 379, fig. 296 (denticion) (1868); *Krefft*, *Notes Faun. Tasm.* p. 4 (1868); *id. Mamm. Austr.* pls. x. & x. bis. (animal) (1870); *Owen*, *Phil. Trans.* 1874, pp. 245 et seqq., p. xx, fig. 15 (maxilar inferior); *F. G. Waterh. Harc. S. Austr.* p. 284 (1876); *Owen*, *P. Z. S.* 1877, p. 358; *Fletcher*, *P. Linn. Soc. N. S. W.* vii. p. 651 (1882), and viii. p. 9 (anat.) (1883); *Higg.* & *Pett.* *S. Roy. Soc. Tasm.* 1883, p. 196. *Kanguro gigas*, *Lacép. Mém. Inst.* iii. p. 491 (1801). *Kangurus giganteus*, *E. Geoff. Cat. Mus.* p. 154 (1803); *Tiedem. Zool.* i. p. 436 (1808); *G. Fisch. Zoogn.* iii. p. 19 (1814). *Halmaturus giganteus*, *Ill. Prodr. Syst. Mamm.* p. 80 (1811); *Goldfuss*, *Zool.* ii. p. 446 (1820); *Schinz*, *Cuv. Therr.* i. p. 263 (1821); *Leuckh. Meck. Arch. Phys.* viii. p. 442 (anat.) (1823); *Burm. Lechr. Naturg.* p. 547 (1830); *Kaup*, *Terr.* i. p. 243 (1835); *Wieg. Schreb. Saüg. Saupp.* iii. p. 108 (1843); v. p. 302 (1855); *Schinz*, *Syn. Mamm.* i. p. 546 (1844). *Halmaturus rutilans*, *Ill. Abh. Ak. Berl.* 1811, p. 102 (1815); (nom. nudum). *Kangurus labiatus*, *Desm. N. Diet. d'H. N.* (2) xvii. p. 33 (1817); *id. Mamm.* i. p. 273, pl. xxi. fig. 4 (animal) (1820); *Schinz*, *Cuv. Therr.* i. p. 263 (1821); *F. Cuv. Dents. Mamm.* p. 137, pl. xliv. A. (dientes) (1835); *Geoff. Diet. Class. d'H. N.* ix. p. 110 (1826); *Gray*, *Griff. Cuv. An. Kingd.* v. p. 201 (1827). *Halmaturus griseofusus*, *labiatus*, y *griseorufus*, *Goldfuss*, *Is's, 1819*, pp. 266, 267. *Kangaroo géant*, *F. Cuv. H. N. Mamm.* (fol.) i. livr. xi. (1819). *M. labiatus*, *F. Cuv. Dents. Mamm.* p. 137, pl. xliv. A (dientes) (1825); *Less. Mamm.* p. 225. (1827). *M. ocydromus* *Gould*, *Aur. Mfg. N. H.* (1) x. pl. (1842); *Gray*, *List Mamm. B. M.* p. 87 (1843); *Gilbert*, *P. Z. S.* 1847, p. 33 (habits); *Gould*, *Mamm. Austr.* ii. pls. iii. & iv. (animal) 1860, and *Introd.* i. p. xxix. (1863); *Gerrard*, *Cat. Bones Mamm. B. M.* p. 124 (1862); *Krefft*, *Mamm. Austr.* text to pl. x. p. 1 (1871). *Yeruba kanguru*, *Forst. Descr. Anim.* p. 367 (1844). *M. giganteus*, var. *typicus*, *Offield. Cr. of Mars. of Brit. Mus.* p. 15 (1888). *Hab.* Australia.

Fam. FALANGÍSTIDOS.

I. Gen. TRICHOSURUS, LESS

1. **T. vulpinus** (*Mura.*) ♂ ♀ N. v. *E. zorro*. (M. S. T.)
Vulpine Oppossum, *Phillips*, *Voy. Brt. Bay*, p. 150, pl. xvi. (animal) (1789).
Didelphis vulpecula, *Kerr*, *Linn. An. K.* p. 198 (1792); *Turt. Linn. S. A.* i. p. 68 (1806).
Didelphis vulpina, *Meyer*, *Uebers. Zool. Entd. Neuhil.* p. 23 (1793); *Shaw*, *Gen. Zool.* i. pt. ii. 503 (1800); *Bechst.* *Uebers. vierf. Thiere*, ii. pp. 348 & 685 (1800).
Didelphis tapouaru, *Meyer*, *Uebers. Zool. Entd. Neuhil.* p. 24 (1793).
Didelphis lemurina, *Shaw*, *Gen. Zool.* i. pt. ii. p. 487 pl. cx. (animal) (1800).
Ursus novae-hollandiae, *Bechst.* *Uebers. vierf. Thiere*, ii. pp. 337 & 683 (1800).
Phalangista vulpina, *Cuv. R. A.* i. p. 179 (1817).
Phalangista vulpina, *Desm.* *N. Diet. d'H. N.* (2) xxv. p. 475 (1817); *id.* *Mamm.* i. p. 267 (1820); *Schinz*; *Civ. Thier.* i. p. 258 (1821); *F. Cuv. Diet. Sci. Nat.* xxxix. p. 414 (1826); *Gray*, *Griff. Cuv. An. K.* iii. p. 41, pl. (animal); v. p. 197 (1827); *Temm.* *Man. Mamm.* i. p. 5 (1827); *Less.* *Man. Mamm.* p. 218 (1827); *J. B. Fisch. Syn. Mamm.* p. 277 (1829); *Less.* *H. N. Mamm. (Compl. Buff.)* iv. p. 475 (1830); *Martin*, *P. Z. S.* 1832, p. 2. (animal); *Waterh.* *Cat. Mamm. Mus.* *Z. S.* p. 67 (1838); *id.* *Jard. Nat. Libr.*, *Mamm.* xi. p. 265, pl. xxii. (animal) (1841); *Gray*, *Grey's Austr. App.* ii. p. 401 (1841); *Less.* *N. Tabl. R. A.*, *Mamm.* p. 188 (1842); *Gray*, *List Mamm. B. B.* p. 186 (1843); *Wagn. Schr. Säng. Supp.* iii. p. 74 (1843); v. p. 269 (1855); *Schinz*, *Syn. Mamm.* i. p. 526 (1844); *Own*, *Ornat. z.* All. pl. c. fig. 1. (dientes) (1845); *Geb.* *Ondontogr.* p. 42, 11, xviii. figs. 8 & 13 (dientes) (1855); *Godd.* *Mamm. Austr.* i. pl. xvi. (animal) (1856); *Geb.* *Säng.* p. 697 (1859); *Gerrard*, *Cat. Mamm. B. M.* p. 122 (1862); *Kr. J. C. Linn. Austr. Mus.* p. 37 (1874); *Gieb.* *Z. ges. Nat.* xxvii. p. 392 (1866); *Flow.* *Phil. Trans.* 1837, p. 634, pl. xxix, figs. 5 & 6; *Krefft*, *Notes Paum. Tasm.* p. 4 (1868); *id.* *Mamm. Ind.* pl. viii. (animal) (1870); *Schleg.* *Dicent.* p. 165 (1872); *Ziemer*, *Naturh. Tafsskr.* (3) viii. p. 62, pl. xi. fig. 6 (1872); *Guttler*, *P. Z. S.* 1875, p. 491; *Brehm*, *Thierl.* ii. p. 577 (1886); *Dobs.* *J. Anat. Ph.* s. xvii. p. 151 (1882); *Flow.* & *Gars*, *Cat. Ost. Coll. Surg.* ii. p. 701 (1884); *De Vis*, *P. Linn. Soc. N. S. W.* (2) i. p. 1129 (1887).
Phalanger de Bougainville, *G. Cuv. R. A.* (ed 2) i. p. 183 (1829).
Ph. cooki, *F. Cuv.* (*in* *Desm.*) *H. N. Mamm.* 3. 45. (1824).
Phalangista bougainvillei, *J. B. Fisch. Syn. Mamm.* p. 583 (1829); *Less.* *N. Tabl. R. A.* *Mamm.* p. 188 (1842); *Wagn. Schr. Säng. Supp.* iii. p. 82 (1843).
Phalangista (*Trichosurus*) *vulpinus*, *Less.* *Diet. Class. d'H. N.* xiii.

- p. 335 (1823); Waterh. *N. H. Mamm.* i. p. 284, pl. ix, fig. 1 (animal) & xix, fig. 1 (1846).
Balaontis vulpina, Wagl. *Syst. Ambh. Säug.* p. 25 (1830).
Phalangista xanthopus, p. *Oz. b. P. Z. S.* 139; p. 135; Waterh. *Cat. Mamm. Mus. Z. S.* p. 67 (1883); *id. Jard. Nat. Libr., Mamm.* xi. p. 269 (1841); Gray, *Grey's Austr.* *App.* ii. p. 401 (1841); Wagn. *Schr. Säug. Suppl.* iii. p. 77 (1843); Schinz, *Syn. Mamm.* i. p. 529 (1844); Waterh. *N. H. Mamm.* i. p. 294 (1846).
Balaontis bougainvillei, Kaup, *Thi rr.* i. p. 240 (1835).
Phalangista cuvieri, Gray, *Grey's Austr.* *App.* ii. p. 401 (1841); Waterh. *Jard. Nat. Libr., Mamm.* xi. p. 286 (1841); Gray, *List. Mamm. B. M.* p. 86 (1843).
Trichosurus xanthopus, Less. *N. Tabl. R. A., Mamm.* p. 189 (1842).
Phalangista melanura, Wagn. *Schr. Säug. Suppl.* iii. p. 81 (1843).
T. vulpinus, Gerv. *H. N. Mamm.* ii. p. 275 (1855).
Phalangista hypoleucus, Wagn. *Schr. Säug. Suppl.* v. p. 273, pl. xxii. (animal) (1855).
Phalangista vulpecula, Thes. *Ann. Mtg. N. H.* (5) iv. p. 397 (1879); *id. Encycl. Brit.* (9) xviii. p. 723 (1885); Coll. *Zool. Jahrb.* ii. p. 910 (1887).
T. vulpecula, Jeit. *Notes Zool. Mus.* vii. p. 21 (1884); *id. Cat. Ost. Leyd. Mus.* p. 314 (1887).
T. vulpecula, var. *typicus*, O'field. *Cat. of Mrs. of Brit. Mus.* p. 187. (1888).
Hab. Australia.

Fam. FASCOLÁRCTIDOS.

1. Gén. PIASCOLARCTOS, Bl.

2. P. *cinereus*, Schr. *ÖP N* v. Coala ceniciente (M. S. T.)

- Koala, *G. Cuv. R. A.* i. p. 184, iv. pl. i. fig. 5 (animal) (1817); Desm. *N. Dict. d'H. N.* (2) xvii. p. 110 (1817).
Lipurus cinereus, Goldg. *Isis*, 1819, p. 274; Schinz, *Cuv. Thier.* i. p. 265 (1821). *Barm. Lehrb. Naturg.* p. 547 (1831); Owen, *P. Z. S.* 1838, p. 154.
Morolac ylus cinereus, Goldf. *Zool.* ii. p. 445 (1820).
P. fuscus, Desm. *Mamm.* i. p. 276 (1123); *id. Dct. Sci. Ntt.* xxxix. p. 448 (1826); *J. B. Fisch. Syn. Mamm.* p. 284 (1829); Martin *P. Z. S.* 1836, p. 109 (anat); Waterh. *Cat. Mamm. Mus. Z. S.* p. 68 (1838); *id. Jard. Nat. Libr., Mamm.* xi. p. 295, pl. xxxi. (animal) (1841); Less. *N. Tabl. R. A., Mamm.* p. 192 (1842); Wagn. *Schr. Säug. Suppl.* iii. p. 94 (1843), v. p. 281 (1855); Owen, *Otologr. Atl.* pl. c. fig. 6 (diates) (1845).
P. koala, Gray, *Griff. Cuv. An. K.* p. 205 (1827); *Cerv. H. N. Mamm.* ii. p. 273, pl. (animal) (1855).
P. flindersi, Less. *Man. Mamm.* p. 221 (1827).
P. cinereus, *J. B. Fisch. Syn. Mamm.* p. 285 (1829); Gray, *List. Mamm. B. M.* p. 87 (1843); Wagn. *Schr. Säug. Suppl.* iii. p. 95 (1843); Schinz, *Syn. Mamm.* i. p. 537 (1844); Waterh. *N. H. Mamm.* i. p. 259, pl. ix, fig. 2 (animal), y

pl. xv, fig. 5 (cráneo) (1846); *Habn.*, & *J. J. Voz.*, *Pôle Satl Zool.* p. 35. Ad. pls. xvii. & xviii. a. (animal, cráneo y esqueleto) (1845-53); *Gould, Mamm. Austr.* i. pls. xiii. & xiv. (animal) (1854); *Gerv., H. N. Mamm.* ii. p. 273 (1855); *Gieb. Säug.* p. 693 (1859); *Benn. P. Z. S.* 1862, p. 85; *Gerard, Cat. Bones Mamm. B. M.* p. 123 (1862); *Krefft, Cat. Mamm. Anstr. Mus.* p. 44 (1864); *id. Mamm. Austr.* pl. vi. (animal) (1871); *Schleg. Dierent.* p. 167 (1872); *Young, J. Anat. Phys.* xiii. p. 305 et seqq. pl. xviii. (anat.) (1879); *Selater, P. Z. S.* 1880, p. 355; *Brönn. Thierl.* ii. p. 579 (1880); *Forbes P. Z. S.* 1881, p. 181; et seqq. fig. 1-6 (anat.); *Dobs. J. Anat. Phys.* xvii. p. 151 (1882); *Flow. Encycl. Brit.* (9) xv. p. 382, figs. 25 (cráneo) & 32 (1883); *Flow. & Goss. Cat. Ost. Coll. Surg.* ii. p. 699 (1884); *Thos. P. Z. S.* 1887, p. 338, fig. 1 *Coll. Zool. Jahrb.* ii. p. 935 (1887); *Jent. Cat. Ost. Lyd. Mus.* p. 307 (1887). *O'field. Cat. of British Mus.* p. 210 (1888).

Hab. Australia.

Sub-clase 3.^o ORNITODELFOS.

Orden MONOTREMOS.

Fam. EQUÍDNIDOS.

1. Gén. ECHIDNA. G. Cuv.

1. M. aculeata, Shaw. ♂ ♀ N. v. Equidno equinosa. (M. S. T.)

Myrmecophaga aculeata, *Shaw, Nat. Msc.* iii. pl. civ. (animal) (1792); *id. Gen. Zool.* i. pt. i. p. 175, pl. liv. (animal) (1800); *Bechst. Uebers. vierf. Thiere*, ii. p. 571 (1800); *Turt. Linn. S. N.* i. p. 30 (1806).
Ornithorhynchus hystrix, *Home, Phil. Trans.* 1802, p. 348 et seqq., pls. x-xii. (animal y anat.)
E. hystrix, *E. Geoff. Cat. Mus.* p. 224 (1803); *id. Bull. Soc. Philom.* iii. «no. 77» 226 (26), pl. xiv. (animal) (1803); *Desm. N. Diet. d'H. N.* (1) xxiv., *Tabl. Meth.* p. 27 (1804); *id. op. cit.* (2) x. p. 53 (1817); *G. Cuv. R. A.* i. p. 226 (1817); *Schinz, Cuv. Thierr.* i. p. 339 (1821); *Desm. Mamm.* ii. p. 378 (1822); *F. Cuv. Dict. Sci. Nat.* xxxvi. p. 448 (1825); *Gray, Griff. Cuv. An. K.* v. p. 284 (1827); *J. B. Fisch. Syn. Mamm.* p. 401 (1829); *Less. H. N. Mamm. (Compl. Buff.)* v. p. 284 (1827); *J. B. Fisch. Syn. Mamm.* p. 401 (1829); *Less. H. N. Mamm. (Compl. Buff.)* v. p. 384 (1830); *Waterh. Cat. Mamm. Mus. Z. S.* p. 68 (1838); *id. Jard. Nat. Libr., Mamm.* xi. p. 303, pl. xxxiii. (animal) (1841); *Less. N. Tabl. R. A., Mamm.* p. 196 (1842); *Gray, List Mamm. B. M.* p. 192 (1843); *Owen, P. Z. S.* 1845, p. 80; *Gould, Mamm. Austr.* i. pl. ii. (animal) (1852); *Gieb. Säug.* p. 399 (1859); *Gerv., Cat. Bones Mamm. B. M.* p. 289 (1852); *Krefft, Cat. Mamm. Aus-*

- tr. Mus.* p. 55 (1864); *id. Vert. Lower Murray*, p. 23 (1865); *id. Mamm. Austr.* pl. xiv. (animal) (1871); *G. F. Benn.* *P. Z. S.* 1881, p. 737.
E. longiaculeata, *Tiedem. Zool.* i. p. 592 (1808).
Tachyglossus aculeatus, *Ill. Prodri. Syst. Mamm.* p. 14 (1881); *Goldf. Haubd. Zool.* p. 409 (1820); *Wagl. Syst. Amph. Säug.* p. 59 (1830); *Lütken, P. Z. S.* 1885, p. 150.
Echinopus hystrix, *G. Fisch. Zoogr.* iii. p. 692 (1814).
E. aculeata, *Garnot, N. H. Mamm.* i. p. 41 (1846); *Gray, P. Z. S.* 1865, p. 316; *id. Handl. Edentates*, q. 31 (1873); *Flowe. & Gars. Cat. Ost. Coll. Surg.* ii. p. 751 (1884); *Coll. Zool. Jahrb.* ii. p. 937 (1887).
E. Australiensis, *Less. Man. Mamm.* p. 318 (1887).
Tachyglossus hystrix, *Kaup, Thierr.* i. p. 255 (1835); *Glog. Haubd. Naturg.* i. p. 116 (1842); *Wagn. Schr. Säug. Suppl.* iv. p. 242 (1844); *Schuz, Sys. Mamm.* ii. p. 329 (1845); *Armit, J. Linn. Soc.* xiv. p. 411 (1878).
E. australis, *Less. H. N. Mamm. (Compl. Buff.)*, v. pl. li. (1836).
E. acanthion, *Coll. Forh. Vid. Selsk.* 1884, no. 13 (1088); *id. P. Z. S.* 1885, p. 150.
E. aculeata thypica, *Thos. P. Z. S.* 1885, p. 338, pl. xxi i. fig. B. (crôneo). *Olfeld. Cat. of Mars. of Brit. Mus.* p. 379 (1881). *Hab.* Australia.

Fam. ORNITORÍNQUIDOS.

1. Gén. ORNITHORHYNCHUS, BLUM.

1. O. anatinus, *Sav.* ♂ ♀ N. v. Or paradójico. [M S. T.]

- Platypus anatinus*, *Sav.*, *Nat. Misc.* x. pls. 385 & 386 (animal, pico &c.) (1790); *id. Gen. Zool.* i. pt. p. 229, pls. 66 & 67 (animal &c.) (1800); *Turt. Linn. S. N.* i. p. 30 (1806); *Gerrard. Cat. Bones Mamm.* B. M. p. 288 (1862); *Gray, P. Z. S.* 1865, p. 385; *id. Handl. Edentates*, p. 29 (1873).
O. paradoxus, *Blumenb. Voigt's Mag. Naturk.* ii. p. 205 (1800); *Home, Phil. Trans.* 1800, p. 432, pls. xviii. & xix. *id. op. cit.* 1802, p. 67, pls. ii.-iv. (anat.); *C. Blum. Nat. Verh. Bat. Mantsch-Wet.* ii. pt. i. p. 177 (1803); *Pass. N. Diet. d'H. N.* (1) xxiv., *Tabl. Méth.* p. 97 (1804); *Blumenb. Abbild. Nat. Gegenst.* no. 41 (animal) (1810); *G. Fisch. Zoogr.* iii. p. 689 (1814); *G. Cuv. R. A.* i. p. 227 (1817); *F. Cuv. Dents Mamm.* p. 202, 11. lxxxiiii. (1825); *E. Geoff. Ann. Sci. Nat.* ix. p. 451 (1826); *id. Meckel's Arch. f. Nat.* x. p. 14 (1827); *Gray. Griff. Cur. An. K.* iii. p. 265 (1827); *Less. Man. Mamm.* p. 319 (1827); *J. B. Fisch. Syst. Mamm.* p. 402 (1829); *Wagl. Syst. Amph. Söng.* p. 59 (1830); *Mante, P. Z. S.* 1832, p. 145; *Benn. P. Z. S.* 1834, p. 141; *id. Tr. Z. S.* i. p. 229, pl. xxxiv. (animal) (1834); *Kaup, Thierr.* i. p. 251 (1835); *Less. H. N. Mamm. (Compl. Buff.)* v. p. 316, pl. liii. (animal) (1836); *Warterh. Cat. Mamm. Mus. Z. S.* p. (1838); *id. Jard. Nat. Libr.*,

- Mamm.*, xi, p. 300, (i), xxiv, (animal) (1841); *Glog. Handb. Ntū. gr.*, i, p. 115 (1842); *Lees. N. Tafel. R. A.*, Mamm., p. 105 (1842); *Wagn. Schr. Säug. Spp.*, iv, p. 262 (1844); *Gieb. Odontogr.*, p. 62, pl. xxv, figs. 4 & 8 (1855); *id. Säug.*, p. 392 (1859); *G. F. Benn. P. Z. S.*, 1877, p. 161; *Arndt, J. Linn. Soc.*, xiv, p. 413 (1878).
Dermippus anatinus, *Wiedem. Arch. Zool.*, i, pt. i, p. 180, pl. iii, (animal) (1807).
O. rufus et fuscus, *Pér. & Les. Voy. Terres Austr.*, I, pl. xxix, (animal) (1807); *Wiedem. Zool.*, p. 589 (1808); III, *Prodr. Syst. Mamm.*, p. 115 (1811); *Leisch. Ntl. Mus.*, ii, p. 136, pl. cxi, (animal) (1815); *Desm. N. D'et. d' H. N.*, xxiv, p. 131 (1818); *Goldf. Handb. Zool.*, p. 4 & 8 (1820); *Schinz Cuv. Théor.*, i, pp. 340 & 341 (1821); *Desm. Mamm.*, ii, p. 380 (1822); *Fab. der Hoenen*, N. Act. Acad. Leipzig, xi, p. 301, pl. xlvi, (animal, pico, &c.) (1823); *F. Cuv. D'et. Sci. Nat.*, xxxvi, p. 443 (1825); *Gray. Griff. Cuv. Au. K.*, p. 284 & 285; *Schinz, Syn. Mamm.*, ii, p. 327 (1845).
O. brevirostris, *Ogib. P. Z. S.*, 1831, p. 150; *Schinz, Syn. Mamm.*, ii, 327 (1845).
O. crassus et lavis, *Margillray. Mem. Wern. Soc.*, vi, pp. 128 & 132 (1832).
O. anatinus, *Gray. List. Mamm.*, B. M., p. 191 (1843); *Waterh. N. H. Mamm.*, i, p. 25, pl. i, figs. 1-6 (pico, piés, &c.); *Gunn. P. Roy. Soc. Tasm.*, ii, p. 89 (1852); *Gould. Mamm. Austr.*, i, pl. i, (animal) (1855); *Bennett. P. Z. S.*, 1859, p. 213, pl. lxxi, (pico); *Krefft. Cat. Mamm. Austr. Mus.*, p. 56 (1864); *id. Vert. Zool. Murray*, p. 22 (1865); *id. Mamm. Austr.*, pl. xv, (animal) (1871); *Flow. & Gars. Cat. Ost. Coll. Surg.*, ii, p. 753 (1884); *Jent. Cat. Ost. Leid. Mus.*, p. 325 (1887); *Coll. Zool. Jahrb.*, ii, p. 940 (1837). *Offield. Cat. of Mars. of Brit. Mus.*, p. 388 (1888).
Hab. Australia.

Clase 2.^a AVES.

Orden 1.^o PRENSORAS.

Fam. CACATÚIDAS.

1. Gen. CACATUA, VÖGEL.

1. **C. haematuropygia** (*S. Müll.*) ♂ N. v. Catala, Abucay. (B. 191). (M. S. T.)

Cacatua minor, *Brisson*, *Orn.* iv. p. 212, no. 11, «*Philippines*». Le petit Kakatoës à bec couleur de chair, *Buffon*, *Hist. Nat.* vi. p. 96 (patr. non indic.).

Petit Kakatoës des Philippines, *D'Aubenton Pl. Ent.* 191. *Ps. haematuropygius*, *L. S. Müller*, *S. N. Suppl.* p. 77, no. 51 (1776) ex *Buffon*; *Walden & Layard*, *Ibis*, 1872, p. 96; *Bouchard Cat. Av.* n° 3142 p. 106, (1876).

Ps. philippinarum, *Gm. S. N. i.* p. 331, no. 95 (1788) ex *Brisson*; *O. Finsch*, *Monogr. Papag.* i. p. 310; v. *Martens*, *J. f. O.* 1866 p. 21, no. 112.

Lophochroa minor, (*Briss.*), *O. Finsch*, *Nederd. Tijdschr. Dierk.* *Berigten*, 1863, p. xxiii, «*Luzon*». *C. hamaturopygia*, *On birds. Wald. of Philip.* *Works of Tw.* p. 299. (1881).

Hab. Luzón, Bataan, Laguna, Calamba, Batangas, Guimarás, Negros, Valencia, Cebú, Leyte, Amparo, Nipah, Mindanao, Joló, Balibac, Samar, Paragua, P. Princesa, Butuan, Panaon.

2. **C. pusilla** *Var.* ♂ N. v. Abucay, Boqué. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Batuan, Balabac.

3. **C. rosea**, *E. & N.* v. (M. S. T.)

Eolophus roseicapillus V. *Bouch. Cat. An.* 107 1876. *Ps. roseus*, *Tem. pl.* 81.

Hab. Australia,

4. **C. sulphurea**, *Gm.* (B. 14. ♀ N. v. (M. S. T.)

Kakatoës à huppe jaune.

Psittacus sulphureus, *Lin.* (B. pl. 14).

C. sulphurea, *Vieill.* *Bouch. Cat. Av.* p. 106, n.º 3146 (1876). *Hab.* Molucas.

5. **C. nasica**, *Tem. 6.* (T. 331) N. v. Yacul. (T. 331) (M. S. T.)

Liemetis nasicus, (*Tem.*), *lam. 331*; *Cat. Av.* p. 107, n.º 3161 (1876) *Bouch.*

Hab. California.

6. *C. moluccensis*, Gm. (B. 498) N. v. *Cecilia*. (M. S. T.)

C. moluccensis, (Gm.) S. N. i. p. 331, n.^o 96 (1788); *Bouch. Cat. Av.* p. 106, n.^o 3143 (1876).

Hab. Molucas, Ceram, Amboina, Joló?

2. Gen. *MICROGLOSSUS*, GEOFF.

7. *M. aterrimus*, (Gm.) ♂ N. v. Rasmalo. (M. S. T.)

Ps. aterrimus, (Gm.) S. N. i. p. 330 n.^o 93 (1788); *gigas*, *Lath. grisens*, *Bech.*; *goliath*, *Kuhl*.

M. ater, *Less. Edw. B.* 316, *Lev. Perr.* 11-13, *Vil. La Creact.* p. 22, l. 21 (1873).

Hab. N.^a Guinea,

Fam. SITACIDAS.

1. Gen. *TANYGNATHUS*, WAGLER.

1. *T. luzonensis*, (Briss.) ♂ N. v. Picoy. (M. S. T.)

Psittacus lucionensis, *Brisson, Orn.* iv. p. 295, no. 41, «*Luçon*». *Linn.*, *S. N.* i. p. 146, n.^o 31 (1766), *ex Briss.*

La Perruche de l'isle de Luçon, *Sonnerrat, Voy. Nouv. Guin.* p. 80 pl. 44.

La Perruche aux ailes chamarées, *Buffon, Hist. Nat.* vi. p. 151, *Le Vaill, Pers.* pl. 60.

Perroquet de l'isle de Luçon, *D'Aubent. Pl. Enl.* 287.

Ps. marginatus, *L. S. Müller, S. N. Suppl.* p. 77, no. 54 (1776), *ex Buffon*.

Ps. gala, *Bodd. Tabl. Pl. Enl.* p. 17 (1783) *ex D'Aubent.*

Ps. pileatus, *Scopoli, Del. Fl. Faun. Insulbr.* ii. p. (85) 86, no. 21 (1786), *ex Sonn.*

Ps. olivaceus, *Gm. S. N.* i. p. 326, no. 76 (1788) *en Sonn.*

La Perruche aux ailes chamarées, *Le Vaillant, Perr.* pl. 60.

Ps. phrygius, *Shaw, Gen. Sool.* viii. pt. 21 p. 421 (1811). *ex Le Vaillant.*

Ectelus luconensis (*Linn.*), *O. Finsch, Monogr. Papag.* ii. p. 362. *Tanygnathus muelleri*, *ap. Walden & Layard, Ibis*, 1872 p. 95, «*Negros*».

T. luzoniensis, *Sharpe, Tr. L. Soc. 2. series 1876. Zool* i p. 312, *Wald. Tr. Z. S.* g. p. 133.

Hab. Luzón, Cagayán, Guimarás, Negros, Valencia, Cebú, Leyte, Mindoro, Marinduque, Masbate, S. Bernardino, Dumalon, Paragua, P. Princesa, Panay, Mindanao, Zamboanga, Butuan, Surigao, Basilan, Malanipa, Joló, Cagayán de Joló, Lapac.

2. *T. viridis*, ♂ Var. N. v. Quilaquit. (M. S. T.)

Hab. Paragua, Carangac, Luzón, Ilocos Norte, Samar, Calbayog, Culión, Calamianes.

- 3 T. Cyanescens, ♂♂ var. N. v. Calanḡag. (M. S. T.)
Hab. Luzón, Cagayán, Negros.
- 4 T. torquatus. ♂♂ var. N. v. Calangag. (M. S. T.)
Psittacus manillensis, Bech.
Palawanis torquatus, (Bodd.) Finsch.
Hab. Samar, Paric, Luzón, Cagayán, Ilocos.
- 5 T. everetti, Tw. ♂♂ N. v. Caranḡic (M. S. T.)
T. everetti, Tw. An. et Mag. N. H. ser. 4. vol. 20. p. 533. (1877).
T. sunatramus, (Raffles), G. R. Gray, Hand-list. n. ^b 8248 «Island of Simea.» Sharpe, on Birds, coll. by Steere; Trans. Lin. Soc. 1878. 2. ser. p. 312.
Hab. Negros, Minimico, Batuan, Samar.
- 6 T. burbridgei, Sharpe N. v.
T. burbridgei, Sharpe, P. Z. S. 1879, p. 313; Guillerm. Voy. of the Jacht «Marchesa», 1885, p. 252.
Hab. J. d. M.
- 7 T. macrorhynchus, Wagl. ♂ N. v. (M. S. T.)
Ps. macrorhynchus, L. (nitsutus, Lith. megalorhynchus, Bodd.
T. macr., Wagl. Imm. 713. Lev. Perr. t. 83.
Hab. Molucas, N.^o Guinea.
2. Gén. TRICLARIA, WAGL.
- 8 T. cyanogaster, Sharpe, (B. 61) ♂ N. v. (M. S. T.)
Ps. cyanogaster, Vieill.; malachitaceus, Spix. Av. Bras. 28 Bourj.
Perr. 57.
Hab. Brasil.
3. Gén. FLATYCERCUS, VIG.
9. Pl. eximus, Sharpe, ♂♂ N. v. Rosellia. (M. S. T.)
Perruche omnicolore, Buff.
Psittacus eximus, Sharpe.—Levaill. pl. 28-29.
Hab. Singapur, Molucas.
- 4 Gen CYCLOPSITTA, H. et J.
- 10 C. lunulata, Sharpe, ♂♂ N. v. Bombuctus. (M. S. T.)
Petite Perruche à collier de l'île de Luçon, troisième espèce, Sonn.
Voy. Nouv. Guin. p. 77, pl. 39.

- Psittacus lunulatus, *Scoot.*; *Del. Fl. Faun. Insulr.* ii, p. 86, no. 24 (1786), ex Sonn.
Ps. torquatus, *Gm. S. A.* i, p. 351, no. 134 (1783), ex Sonn.; *Lear. Illustr. Ps II*, pl. 40.
Ps. loxia, *Cuv. Mus. Paris, Lesson, Tr.* p. 24, «Mavlas», adult (1831); *Pucheran, Rev. Mus. Zool.* 1853, p. 163; *Bourjot, tom. cit.* pl. 94.
Psittacula squamo-torquata, *Bourjot, Perr.* pl. 97 (1837-8), en *Lear. Cyclopsita Loxia, Cuv.*, *Bp. Rec. et Mag. Zool.* 1854, p. 154.
Ps. lunulata et loxias, *O. Finsch, Monogr. Papag.* ii, pp. 116, 618; *v. Martens, J. f. O.* 1869, p. 21, nos. 118, 117; *G. R. Gray, Hand-list*, nos. 8377, 8376.
Psittacula lunulata, *Gray, Schlegel, Mus. Pays-Bas*, Psittaci p. 72.
Cy. lunulata, *Wald. On birds of Philippines*, p. 110, 301. (1875); *Sharpe T. I. n. Soc.* 2. ser. 1877, p. 312; *T. P. Z. S.* 1877 p. 689; *id. Works.* p. 514. (1881).
Hab. Luzón, Cagayán, Pamplona, Manila, San Mateo, Morong, Batangas, Laguna, Samar, Zamárraga, Mindanao, Butuan, Zamboanga.

11. **C. squammotorquata**, ♂ ♂ (var.). N. v. Guringig. (M. S. T.)
Hab. Luzón, Hocos, Cagayán.

12. **C. mindanaensis**, (Swin.). N. v. Quilaquil. (M. S. T.)
Hab. Mindanao, Zamboanga.

5. Gen. PRIONITURUS, WAG.

13. **P. discurus**, (*Vieill.*) ♂ ♂ N. v. Cagan. (M. S. T.)

Psittacus discurus, *Vieillot, Gal. des Oiseaux* i, p. 7, pl. 26, «Mindanao» (1825) 2.
Ps. spatuliger, *Bourjot* (?), *Perr.* pl. 53, «Mindanao» (1837-8).
Pionus discurus (*Vieill.*), *O. Finsch, Monogr. Papag.* ii, p. 401.
Urolophus discurus (*Vieill.*), *G. R. Gray, Mandelist*, no. 8047, «Ph Upp'ne Isl.»
U. spatuliger (*Bourjot*), *G. R. Gray, tom. cit.* no. 8048, «Mindanao».
Prioniturus discurus, *Wald. Birds. Ind. P. Upp.* p. 300. (1881)
Tie. P. Z. S. p. 535. (1871) (1878) *Sharpe, Tr. L. Soc.* p. 312; *id. P. Z. S.* 1879 p. 133 *G. II. Voy. of. March.* 1885, 1-133.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Morong, Laguna, Batangas, Samar, Paranao, Miniloc, San Bernardo, Guimaras, Negros, Mindanao, Zamboanga, Pasananca, Surigao, Plecer, Cebú, Panay, Basilan, Jolo, Balabac.

14. **P. cyaniceps**, ♂ ♂ var. N. v. id. (M. S. T.)
Hab. Luzón, Cagayán, Samar, Paranao.

15. **P. craneus**, ♂ ♂ N. v. Quilit. (M. S. T.)
Hab. Paragui; P. Primasa, Simut, Borongan.

16. **P. luzonensis.** (Steere.) ♂♂ N. v. id. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Mindanao, Marinduque.

17. **P. mindorensis.** Steere. ♂ ♀ N. v. id. (M. S. T.)

Hab. Mindoro.

6. Gén LORICULUS, BLYTH

18. **L. philippinensis.** (Briss.). ♂♂ N. v. Culasisi. (M. S. T.)

Psittacula philippensis, Briss. *Orn.* iv, p. 392, no. 87, «*Philippi-*
nes» (1760); Meyen, *Nov. Act. Ac. C. L. C. Mht. Cur. xvi. Suppl.*
prim. p. 94, «*Manila*».

Le coulaçassi, Buffon, *Hist. Nat. O's.* vi, p. 169, ex Brisson.

Perruche des Philippines, D'Aubent. *Pl. Enl.* 520 f. 1.

Psittacus philippensis, L. S. Müller S. N. *Suppl.* p. 80, no.
68 (1776); ex *Buffon*.

Ps. galgulus, var. b Gm. S. N. i, p. 349, no. 46, ex *Briss.*

Psittacula rubrifrons, Vigors, *Phil. Mag.* 1831, p. 147, no. 11;
Lear, *Illustr. Psitt.* pl. 41.

Ps. culacissi, Wagler, *Mongr.* p. 626 (1832); O. Finsch, *Mongr.*
Papag. ii, p. 705; G. R. Gray, *Hand-list.* no. 8181.

Petite Perruche de l'île de Luçon Sonn. *Voy. Nouv. Guin.* p.
77, pl. 40 fig. sup., M.

Psittacus melanopterus, Scopoli, *Del. Fl. Faun. Insubr.* ii, p. 80,
no. 23, M. (1786), ex *Sonn.*

Ps. minor (M.), Gm. tonn. cit p. 351, no. 135 (1788), ex *Sonn.*

Loriculus philippensis, Wald. *On birds of Philipp.* 1877.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Morong, Bulacan, Batangas,
Catbalonga, Negros, Marinduque, Jolö, Mindanao.

19. **L. siquijorensis.** Steere. N. v. Cusi. (M. S. T.)

Hab. Siquijor.

20. **L. mindorensis.** Steere. ♂ ♀ N. v. Cusi. (M. S. T.)

Hab. Mindoro.

21. **L. worcesteri.** Steere. ♂ ♀ N. v. Cusi. (M. S. T.)

Hab. Leyte, Samar, Calbayog.

22. **L. occipitalis.** (Finsch) N. v. Gulasisi.

Coryllis occipitalis, Finsch, *Pap.* 2, p. 710. *Ibis.* 1874 p. 208.
Tr. Works. p. 530. (1881) *P. Z. S.* 1877, p. 757.

Hab. Mindanao.

23. **L. chrysonotus.** S. I. N. v. Caguit.

L. chrysonotus, Selater, *Ibis*, 1872, p. 323, pl. 11, «*Zebu*.»
Hab. Cebú.

24. *L. hartlaubi*, *Finsch*, ♂ N. v. Caguit.

[M. S. T.]

Coryllis hartlaubi, *O. Finsch*, *Monogr. Papag.* ii. p. 701, «Mindanao» (1808).

L. melanopterus, (*Scop.*); *G. R. Gray*, *List. Psitt. Brit. Mus.* p. 55, fide *O. Finsch* l. c.

L. apicalalis, *Souancé*, *G. R. Gray*, tom. cit. p. 56, fide l. c., nec *S. urucu*.

Petite Perruche de l'île de Luçon, *Sonn. Voy. Nouv. Géin*; p. 77, pl. 40, fig. inf. ♂.

Psittacus melanopterus, *Scopoli*, *Del. Fl. Faun. Insubr.* il. p. 86, no. 23 (1780), ex *Sonn.*

L. melanopterus et apicalis, *G. R. Gray*, *Hand-list*, nos. 8175, 8176.

L. apicalis, *Souancé*, *v. Martens*, *J. f. O.* 1856, p. 21, no. 115, nec *Souancé*.

L. bonapartei, *Sonn. Rev. et Mag. de Zool.* 1856, p. 222.

L. hartlaubi, *Tw. P. Z. S.* 1877, p. 819.

Hab. Mindanao, Leyte, Bohol, Dumaguete, Bazol, Dimagat, Basilan, Mindanao, Surigao, Placer, Butuan, Joló.

25. *L. regulus*, *Sew.* ♂ ♀ N. v. Cusi.

[M. S. T.]

Loriculus regulus, *Souancé*, *Rev. et Mag. Zool.* 1856, p. 22, «patr. incert»; *v. Martens*, *J. f. O.* 1866, p. 21, no. 114; *G. R. Gray*, *List. Brit. Mus.*

L. panayensis, *Tw. Works*, p. 462.

Hab. Negros, Panay, Illoilo, Dumaguete, Guimarás, Masbate, Mindanao.

26. *L. galgulus* (*Lin.*) (B. 190) ♂ ♀ N. v. Talisoc.

[M. S. T.]

Ps. galgulus, *Lin.*: *flavigula*, *Bod.*; *pumilio*, *Scop.* pl. 190 Ed. 2, 293 2; *Sonn. Voy. Guinée*, 38; *Burm. Perr.* 38; *Horsf.* T.; *Lin. Soc.* xiii, p. 182 (1821); *Raff.* *ibid.* p. 281 (1822); *S. Müll.*, *Verhandl. Lieden Volk.* p. 107, 381 (1839-1844).

Psittacula galgulus, *Sav. Class. of B.* ii. p. 303 (1857); *Müll.* p. *Dilw.*, *Contr. N. H. of Lab.* p. 27 (1855).

Loriculus galgulus, *Bp. Conspl.* i. p. 6 (1850); *Rosemb.*, *Journ. f. Orn.* 1862 p. 60; *Scat. P. Z. S.* 1863 p. 208, esp. 15; *Vall. P. Z. S.* 1864 p. 287, esp. 51; *Schleg. Mus. P. B.* *Psittaci*, p. 131 (1864); *G. R. Gray*, *Hand List*, ii. p. 152 esp., 8169 (1870); *Sav. Cat. Ucc. di Borneo*, p. 26 (1874).

Coryllis galgulus, *Finsch*, *Die Papag.* ii. p. 699, esp. 289 (1868).

Hab. Borneo, Sumatra.

6. Gén. ECCLECTUS, WAGLER.

27. *E. grandis*, (*Gm.*) (B. 683) ♂ ♀ N. v. Ecléctido rojo.

[M. S.]

Ps. gr. ndis, (*Gm.*) *Syst. Nat.* 1. p. 335, n. 102. (1788.)

E. gran lis, *Wagler*.

E. cyloboensis, *Gr.* ex *Bodd.* pl. 683, *Brown*, *Ill. Zool.* t. 6 1.-vii. *Parr.* t. 126-128.

Hab. Ternate, Molucas.

28. *E. polychlorus*. (Scop.) ♂ N. v. Eclectida verde. (M. S. T.)

Ps. magnus et sinensis, Gm.; *viridis*, Lath.; *lateralis*, Shar.
Mascarinus prasinus, Less.—*Psittacoides magnus*, Wagl. Fe. po-
lychloros, Gr. ex Scop.) Pl. 514. Edw. B. t. 231. Lev.
Perr. 132.
E. polychlorus, Scop. Del. Flor. et Faun. Ins. p. 87. n. 27.
(1780.)
Hab. N.^a Guinea, I. Aru, N.^a Bretaña....

7. Gén. MELOPSITTACUS, Gould.

29. *M. undulatus*, Shar. ♂ ♀ N. v. Eufemia ondulada. (M. S. T.)

Ps. undulatus, Shar. Nat. Mis. t. 673; Gould Austr. t. 43 Nat.
Libr. Parr. t. 28; Bourj. Perr. t. 9; Vil. La Creación p. 36
f. 29 (1873.)
Psittacus, Nanodes, Euphema, Euphemia undulata (auctorum.)
Hab. Australia.

Fam. TRICOGLÓSIDAS.

1. Gén. LORIUS, Br.

1. *L. domicella*, Lin. (B. 84) N. v. Castorie. (M. S. T.)

Ps. domicella, L.; raja, Shaw.; rex, Bechst.; radica, Vieill. Pl.
84 y 110. Lev. t. 94, 95. Lear. Parr. t. 37.
Hab. Molucas.

2. *L. garrulus*, (Lin.) ♂ ♀ (B. 216.) N. v. (M. S. T.)

Ps. ruber, It. Wgoth. 137. *Lorius ceramensis*, Briss. av. 4. p.
215. n. 13. *Ps. garrulus*, Lin. Syst. Nat. t. 1.^o p. 333. n.^o 25.
(1780.)
Hab. Halmahera, Molucas, Gilolo, Batchian.

2. Gen. CHALCOPSITTACUS, Savv.

3. *Ch. ater*, (Scop.) ♂ N. v. (M. S. T.)

Ps. novae-guineae, Gm. ater, Scop. *Platicerens ater*, Gr. Sonn. Voy.
110. Lev. Perr. 100.
Hab. Molucas, N.^a Guinea.

3. Gén. CORPHIUS Wall.

2. *C. placens*, (Tem.) ♂ ♀ N. v. (M. S. T.)

Hab. N.^a Guinea.

4. Gen. CHARLES M. WADDELL

5. Ch. papuensis. (n.) Prev. 32, ♀ N.v. It was

Perrache lori papu, *Sorci Voy.*
Psittacus papuus, *Gra. Linné pl. 77; Janthinus*
psittacus et bimaculatus omnino rufus, Lath. Etat. Acad. Bel. St.
papuensis, Wagl. Ch. papua, Gr. ex S. p. 97. V. 17
Hab. N. Guin. a.

5. Gen. CALYPTORHYNCH S. SALV.

- C. macrofranctus, Gmel. ♀ (B. 743) N.

Ps. macrourynus, *L.*, *utsulut*, *Lith*; *megathys*, *Bo*. B.
1. *macrourynus*, *Wagl.*, *Pt.*, *713*, *Le.*, *Pere.*, *93*
Hab., *Nord*, *de*, *Australie*, *1013*.

6. Gen. THICOGLOSSUS, Wig.

7. T. haematoicus, Gn. ♂ N. v. 31-57

Perrache des Mâles, *Buff.* pl. 743.
Psittacus haematopus, *Gm.*—*Levaill.* pl. 24-26.
Hab. Malais.

Orden 2.^o RAPACES.

Sub-orden: HALCONES.

Fam. 1.^a VULTÚRIDAS.

Subfam. VULTURINAS.

I. G. hispaniolensis, Söm. t N v. Baire M S
 Vultur salvus, *Nunn. Fig. Deutschl.* i. p. 150. (1821).
 Werner, *Atlas*, R. pces, pl. 2 (1827); *Schl. d. Natur. Thk. Eur.* p. 12, pl. 2 (1839); *Dubois, Ois. d' Ecol.* pls. 2, 3 (1826).
 V. chassefiente, *Rüpp. N. W. Ugr.* p. 47 (1856).
 V. kolbii, *Crest. Num.* ii. Heft i. p. 76 (1852).
 V. fulvus occidentalis, *Hugl. Orn. N. O-Afr.* i. p. 1 (1860).
 Gyps hispaniolensis, Sharpe, *Cat. Brit. Mus.* p. 6. (1874).
 Hab. España, Europa, Africa.

Fam. 2.^a FALCÓNIDAS.

Subfam. ACCIPITRINAS.

1. Gén CIRCUS, LACEP.

1. *C. spilonotus*, Kaup. ♂ ♀ N. v. Balicbalic (M. S. T.)

Circus spilonotus, Kaup, *Contr. Orn.* 1851, p. 59; Strickl. *Orn. Syn.* p. 157 (1855); Swinhoe, *Ibis*, 1863, p. 213 v, 1865, p. 230, et 1870, p. 87; Gray, *Handl. B.* i. p. 36 (1860); Swinh. *P. Z. S.* 1871, p. 342; Taczan. *J. f. O.* 1872, p. 349, *Gurney*, *Ibis*, 1868; p. 356; Sharpe, *Cat. B. & Mus.* p. 58 (1874). *Wald. on birds of Philip.* 1875. *Tr. Works.* p. 311; *P. Z. S.* 1877, p. 686.

Hab. Luzón, Ilcos N., Cagayan, Pampanga; Dauria, China, Peninsula Malayana.

2. *C. melanoleucus*, Forst. ♂ ♂ N. v. Balicbalic (M. S. T.)

Falco melanoleucus, Forst *Indisch. Zool.* p. 11, pl. 12 (1781).

Faucon à collier des Indes, Sonn. *Voy. Ind.* ii. p. 182 (1782).

Black-and-White Falcon, Penn. *Ind. Zool.* p. 33, pl. 2 (1790); *Lath. Synop.* i. p. 81, n.^o 65, *Ceylon*, ex Pen.

Tchouq, *Levaill. Ois. d'Afr.* i. p. 133, pl. 32 (1799); *Sund. Crit. om. Levaill.* p. 27 (1857).

Circus melanoleucus, Vieill. *N. Dict. d'Hist. Nat.* iv. p. 495 (1816); Less. *Traité*, p. 87 (1831); Gray, *Gen. B.* i. p. 32 (1845); Strickl. *Orn. Syn.* p. 154 (1855); Jerd. *B. Ind.* i. p. 98 (1862); Schl. *Mus. P.-B.* *Circi*, p. 8 (1862); Gray, *Handl. B.* i. p. 37 (1869); Hume, *Rough Notes*, ii. p. 307 (1870); Swinh. *P. Z. S.* 1871, p. 34; Holdsw. *P. Z. S.* 1872, p. 414; *Wald. Tr. Z. S.* vol. 9, part. 2, p. 143; Sharpe, *Cat. Brit. Mus.* p. 61 (1874).

Strigiceps melanoleucus, Kaup, *Mus. Siuck*, iii. p. 258 (1845); *Bp. Conspl.* i. p. 35 (1850).

C. cyaneus hudsonius, Sch. *M. P.-B.*, *Circi*, p. 3. *Luzoni*, *Gurn. Ibis*, 1870, p. 444.

Hab. Negros, Luzón, Cagayan, Pamplona, Joló; Nepal, India, China.

3. *C. aeruginosus*, Lin ♂ ♂ N. v. Dumaraguit. (M. S. T.)

The Moor-Buzzard, *Albin. Bird.* i. pl. 3. (1731).

Le Busard de Marais, *Briss. Orn.* i. p. 401 (1760).

Le Busard reux, *Briss. Orn.* i. p. 404 (1760).

Falco aeruginosus, Linn. *S. N.* i. p. 130 (1766); *Buff. Pl. Ent.* i. p. 424 (1783).

La Harpaye, *Buff. Pl. Ent.* i. pl. 460 (1783).

Falco rufulus, Gm. *S. N.* i. p. 266 (1788, ex *Buff.*); Temm. *Mos.* i. p. 69 (1820); Naum. *Éég. Tenuischl.* i. p. 378, *Taf.* 37, 38, *fig.* 1 (1822); Wagler, *Atlas. Rapaces*, p. 27 (1827); Schl. u. Susek. *Vög. Eur. Tat.* 36 (1839); Yarr. *Erit. B.* i. p. 90 (1840).

F. arundinaceus, Beckst. *Crn. Teschenb.* 1. 23 (1802).

Circus aeruginosus, *Savign. Syst. Ois. Egypte*, p. 90 (1800); *Less. Traité*, p. 86 (1831); *Macgill. i rit.*, iii, p. 382 (1840); *Gray, Gen. B.*, i, p. 32 (1845); *Bp. Cosp.*, i, p. 34 (1850); *Schl. Vog. Noderl.*, pls. 20-22 (1854); *Strackl. Orn. Son.*, p. 146 (1855); *Hewits. Eggs. Brit. B.*, i, p. 44 (1856); *Fritsch. Vog. Eur.*, tab. 9, figs. 5, tab. 10, figs. 5-7 (1858); *Schl. Mus. P.-B. Circi*, p. 11 (1862); *Jerd. B. Ind.*, i, p. 99 (1862); *Newt. Ooth. Wallsey*, p. 143 (1864); *Betten. Ucc. Lomb.*, i, pls. 31, 31a (1865); *Sundev. Sv. Fugl.*, p. 222, pl. xxviii, figs. 4, 5 (1866); *Loche, Sci. Algir. Ois.*, p. 82 (1867); *Degl. & Gerbe, Orn. Europ.*, i, p. 105 (1867); *Gould, B. Gt. Br.*, pt. xiii, (1868); *Gray, Hand. B.*, i, p. 36 (1870); *Heugl. Orn. N. Oslfr.*, p. 103 (1870); *Blanf. Geol. & Zool. Abyss.*, p. 301 (1870); *Hume, Rough Notes*, ii, p. 314 (1870); *Lyres, Ibis*, 1871, p. 147; *Salvad. Faun. Ital. Ucc.*, p. 24 (1871); *Newt. ed Yarr. Brit. B.*, n. p. 127 (1871); *Skell. B. Egypt.*, p. 181 (1872); *Bocage, Jorus Lisb.*, 1872, p. 15; *Hume, Stray F.*, i, p. 160 (1873); *Schl. M.... P.-B. Revue Accipitr.*, p. 50 (1873); *Sharpe. Cat. Brit. Mus.*, p. 69 (1874).

C. rufus, *Savign. Syst. Ois. Egypte*, p. 91 (1800); *Less. Traité*, p. 86 (1831); *Gould, B. Eur.*, i, p. 37 (1837).

Accipiter circus, *Pall. Zool. Rossos-als.*, i, p. 362 (1811).

Pygargus rufus, *Koch, Sys. Baier. Zool.*, i, p. 119 (1816).

Buteo aeruginosus, *Elem. Brit. An.*, p. 55 (1828).

C. variegatus, *Sykes, P. Z. S.*, 1830, p. 81.

C. arundinaceus, *Brehm, Vög. Deutschl.*, p. 91 (1831).

C. aquaticus, *Brehm, Isis*, 1832, p. 836.

C. sykesii, *Less. Compl. Buff.*, vii, p. 161 (1836).

Buteo rufus, *Couch, Corn. Faun.*, p. 11 (1838).

Hab. Luzón, Cagayan, Ilécos, Laguna, Paragua; Europa, África, India, China, Formosa.

4. *C. cinereascens*, ♂ N. v. *Tagui*. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Cagayan, Samar.

5. *C. philippinensis*? *Steere. ♂ N. v.* (M. S. T.)

Hab. Paragua, P. Princesa, Mindanao, Guimarás, Cagayan, Laguna, Luzón.

6. *C. striatus*, ♂ N. v. *Dumar-guit*. (M. S. T.)

Hab. Berongan, Samar, Paragua.

2. Gén. ASTUR, LACEP.

7. *A. palumbarius*, *Lin. ♀ N. v. Azor.* (M. S. T.)

The Goshawk, *Albin. N. H. Birds.*, ii, p. 8, pl. 8 (1734); *Savign. & Brotr. Falconry*, p. 102, pls. xviii, xix, (1855).
L'Autour, Briss. Orn., i, p. 317 (1760); *Eiff. Pl. Ent.*, i, pl. 418 (1770); *Schl. & Verst. Traité Fauc.*, pls. x. & xi, (1844).
Le Gros Basid. Tr. . Orn., i, p. 398 (1770).

- L. Busard vari, *Briss. Orn.* i. p. 400 (1763).
 Falco palumbarius, *Linn. S. N.* i. p. 130 (1760); *Daud.* pl. 1, 2 (1810); *Tennm. Min. d'Orn.* i. p. 55 (1820); *Nom. U. r. Deutsch.* i. p. 249; *pls. 17, 18* (1822); *Wernw.* *Rapaces*, pl. 21 (1827); *Schl. u. Savva. Vog. Eur.* I. 6. (1839-45); *Yarr. Brit. B.* i. p. 57 (1833).
 L'Autour sors, i. *Buff. Pl. Ent.* i. pl. 461 (1770).
 Falco marginatus, *Lath. Ind. Orn.* i. p. 26 (1790).
 F. albescens, *Bodd. Tabl. Pl. Ent.* p. 25 (1783).
 F. dubius, *Sparv. Mus. Carls.* pl. 27 (1787); *Sundev. Cr.* p. 6. (1858).
 F. gallinarius, *Gm. S. N.* i. p. 276 (1788).
 F. nevius, *Gm. S. N.* i. p. 295 (1788).
 F. intericus, *Lath. Ind. Orn.* i. p. 32 (1790).
 Falco palumbarius, *Swigw. Hist. Nat. Ois. d'Egypte*, p. 297 (1838); *Lass. Traité*, p. 65 (1831).
 Accipiter astur, *Pall. Zool. Russie*, i. p. 367 (1811).
 Sparvus palumbarius, *Vieill. N. Dic. d'Hist. Nat.* x. p. 331 (1818); *Rogg. Orn. P. o.* i. p. 95, pl. 15 (1815).
 Astur palumbarius, *Cuv. Rég. Ani.* i. p. 322 (1817); *Grot.* *B. Eur.* i. pl. 17 (1837); *Grot. Gen. B.* i. p. 27, pl. 10, fig. 1. (1849); *Kirb. Cott.* *Orn.* 1852 p. 6; *Kirb. Orn. Ord. Afr.* iv. fig. 5 (1853); *Meyf. & Morel. B. Mus. E. L.* *C.* i. p. 41 (1854); *Schl. Vog. Natur.* *pls. 11, 12* (1854-58); *Bd. Rov. et Muz. d'Zool.* 1854, p. 538; *Schickl. Orn. Szn.* p. 116 (1855); *Hawke. Eggs B.* i. p. 34, pl. xi. (1856); *F. Isch. Vog. Etat.* i. (1858); *Schl. Dic. N. Afr.* *Vog.* pl. 1, figs. 9, 10, 11 (1858); *Id. Mus. P. B. Asteres*, p. 16 (1862); *Jerd. B. Ind.* i. p. 45 (1862); *Natr. Orth. Waller.* p. 73 (1864); *Lazell. Egypt. Aegypt.* p. 73 (1867); *Descl. & Garbe. Orn. Europe.* i. p. 93 (1867); *Hawke. J. f. O.* 1868, p. 253; *Hawke. Orn. N. Afr.* i. p. 5 (1868); *Sartor. Sy.* *Fogl.* pl. xxvii, figs. 2, 3 (1869); *Hawke. British Nats.* i. p. 112 (1869); *Gray. Handb.* B. i. p. 21 (1870); *Gould. B. G.* B. part. xv. (1870); *Schickl. Fauna Ital.* U. p. 14 (1871); *Newt. ed. Yarr. Br.* B. i. p. 83 (1871); *Jard. Thes.* 1871, p. 243; *Sewell. P. Z. S.* 1871, p. 341; 1871, *French. Natur.* *Hengel.* p. xxiv 1871, *Shelley. B. Egypt.* p. 185 (1872); *Saville. Cat. Brit. Mus.* p. 95 (1874).
 Falco palumbarius, *Flem. Brit. Att.* i. p. 54 (1828).
 Vultur gallinarum, *Brehm. Vog. Dicks.* p. 83 (1831).
 Accipiter palumbarius, *Meyg. B. Ind.* B. i. p. 34 (1840).
 V. indicus, *H. L. S. in Grotz. Zool. M. c.* p. 81 (1844).
 V. brachyrhynchus, *Brehm. Natur.* p. 203.
 V. paraloxus, *Brehm. Natur.* p. 205.
 Hab. Europa, Corse, China.

8. *A. trivirgatus*, Temm. S. N. v. Cinnamoni.

(M. A. T.)

- Falco trivirgatus, *Temm. Pl. Col.* i. pl. 33 «Savanna» (1824).
 Nisus trivirgatus, *Lass. Min. d'Orn.* i. p. 93 (1828).
 Astur trivirgatus, *Cuv. Rég. Ani.* i. p. 332 (1829); *Gray. Gen. B.* i. p. 27 (1840); *Bd. Corp. Camb.* i. p. 31 (1855); *Schickl. Orn. Szn.* p. 221 (1855); *Jerd. B. Ind.* i. p. 47 (1862); *Schl. Mus.*

P.-B. Astores, p. 22 (1862); *id.* *Vög. Naturf. Ind. Fölk.* pp. 12, 57; pl. 10 (1866); *ibid. Ibis*, 1898, p. 6; *Günz. Handl.* I, p. 30 (1869); *Holl. Nat. Z. S.* 1872, p. 410; *Schl. Revue Accipitr.* p. 65 (1873); *id.* *ibid. Cat. Brit. Mus.* p. 15 (1874); *T. Sely. Uccelli di Borneo*, p. 17 (1874).

Dendron trivirgatum, *Less. Tract.*, p. 66 (1831).

Spizaeus rufinotatus, *M'Clell. P. Z. S.* 1839, p. 153.

A. palumbarius, *Jord. Madr. Journ.* x, p. 85 (1839).

A. cristatus, *Gray. Ann. N. H.* xi, p. 371 (1843).

A. indicus, *Hodgs.* in *Gray's Zool. Misc.* p. 81 (1844); *Gray. Cat. Accipitr.* 1844, p. 33.

Lophospiza trivirgata, *Kaup. Contr. Orn.* 1850, p. 65; *Gray. Cat. Hodgs. Coll.* 1863, p. 19; *Hume. Rough Notes*, i, p. 116 (1866); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 341; *Witt. en Br/ls. o. Philpp.* 1877 *Works. of Tw.* p. 587 (1881).

Hab. Luzón, Cagayan, Paragua, P., Priñes, Cebú, Mindanao, Culion, Samar, Leyte, Guimaras, Mindanao, Surigao, Java, Sumatra, Formosa, China, Borneo.

9. *A. soloensis*, *Leth. C. N. v. Sircut.*

(M. S. 1.)

Halio soloensis, *Lath. Gen. Hist.* i, p. 209 (1821).

Falco soloensis, *Horsf. Tr. Linn. Soc.* xiii, p. 137 (1820).

Falco nisus (pequeño) *Ratfl. Tr. Linn. Soc. Var.*, xiii, p. 278 (1822).

Accipiter soloensis, *Vig. Zool. Journ.* i, p. 338 (1824); *Gr. d. G. n. B.* i, p. 29 (1849); *Strickl. Orn. Sch.* p. 107 (1855);

Swinh. P. Z. S. 1863, p. 313; *Sil. P. Z. S.* 1863, p. 207.

Astur soloensis, *Less. Man. d'Orn.* i, p. 94 (1824).

Nisus cuculoides, *Less. Man. d'Orn.* i, p. 97 (1824); *id. Traité*, p. 61 (1831).

N. minutus, *Less. Traité*, p. 60 (1831); *Pucher. Rev. Zool.* 1850, p. 210.

Tachyspiza soloensis, *Kaup. Classif. Säuget.* ii, *Vög.* p. 117 (1844);

id. Contr. Orn. 1850, p. 63; *Bb. Rev. et Hag. de Zool.* p. 538; *Kaup. P. Z. S.* 1867, p. 172; *Walden. Tr. Z. S.* viii, pp. 34, 110 (1872).

Microtis soloensis, *Gray. Cat. Accipitr.* B. M. p. 75 (1838);

Bp. Censp. i, p. 33 (1850); *Horsf. & Moore. Cat. B. Mus. E. I. Co.* i, p. 38 (1854); *Gray. P. Z. S.* 1860, p. 341;

Swinh. P. Z. S. 1863, p. 261; *Pelz. Reis. Nozara*, *Vög.* p. 12 (1863); *Wall. Ibis*, 1868, p. 12; *Gray. Hand-l. B.* i, p. 35 (1869); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 342; *Salv. Cat. d. Uccelli di Borneo* p. 17 (1874).

M. badius, *Swinh. Ibis*, 1860, p. 359.

Accipiter virgatus, *Swinh. Ibis*, 1861, p. 264.

Nisus soloensis, *Schl. Mus. P.-B. Astores*, p. 44 (1862); *Blyth. Ibis*, 1863, p. 16; *Schl. Vig. Aertel. Ind. Valku*, pp. 28,

66, pl. 19, figs. 4-6 (1866); *id. Revue Accipitr.* p. 97 (1873).

Astur soloensis, *Starp. Cat. Brit. Mus.* p. 114 lam. 4 fig. 1

(1874.)

Hab. Samar, Borongan, Java, China, Malaca, Sumatra.

10. *A. cuculoides*, *Tm. C. N. v. Tam.*

(M. S. 1.)

Falco cuculoides, *Tamw. Pl. Col.* i, pls. 110, 129 (1823).

Nisus cuculoides, *Less. Man. d'Orn.* i. p. 97 (1828); *id. Traité*, p. 61 (1831).

Astur cuculoides, *Sharpe. Cat. Brit. Mus.* p. 115 lam. 4 fig. 2 (1874).

Haë. Luzón, Cagayan, Ilocos N., China, Célebes.

11. A. poliopsides ♂ N. v. Tauí.

(M. S. T.)

Hab. Calamianes, Culion.

3 Gén. ACCIPITER, BRISS.

12 A nisus, (*Linn.*) ♂ N. v. Gavilán comán (M. S. T.)

The Sparrow-Hawk, *Albin. Nat. Hist. B.* i. pl. 5 (1731).
L'Epervier, *Briss. Orn.* i. p. 310 (1760); *Buff. Pl. Ent.* i. pls. 412, 467 (1783).

L'Epervier tacheté, *Briss. Orn.* i. p. 314 (1760).
Le petit Epervier, *Briss. Orn.* i. p. 315, pl. 30, fig. 1 (1760).
Falco nisus, *Linn. S. N.* i. p. 130 (1766); *Nuum. l'ög. Deut.* i. p. 258, Taf. 19, 20 (1822); *Yarr. Brit. B.* i. p. 62 (1843); *Schl. u. Susom. Vög. Eur.* Taf. 29 (1839).

F. minu us, *Linn. S. N.* i. p. 131 (1766, ex Briss.).
F. nisus major, *Bek., Deutsche Orn.* Heft iii. pls. 1, 2 (c. 1800).
F. nisus minor, *Bek., Deutsche Orn.* Heft iii. pls. 3, 4, 5 (c. 1800).

Dardalion fringillarius, *Swinh. Ois. d'Egypte*, p. 270 (1808).
Accipiter nisus, *Pall. Zoogr. Rosso-As.* i. p. 370 (1811); *Gray, Gen. B.* i. p. 29, pl. 10, fig. 4. (1819); *Bp. Cousin.* i. p. 32 (1850); *Stückl. Orn. Syn.* p. 104 (1855); *Hewit's. Eggs Brit.* B. i. p. 35 (1856); *Fritsch, Vög. Eur.* tab. 4, figs. 3, 4, 5 (1858); *Jerd. B. Ind.* i. p. 51 (1862); *Newt. Ooth. Wölley.* p. 79 (1864); *Gould, B. Gt. Br.* pt. v. (1865); *Brodr. Faie. Fav.* pl. ii. (1865); *Dugl. et Gerbe, Orn. Eur.* i. p. 99 (1867); *Loche, Expl. Sci. Algér.* i. p. 72 (1867); *Belloni, Ucc. Lomb.* ii. tav. 58 (1869); *Gray, Hind. B.* i. p. 31 (1869); *Hume, Rough Notes*, i. p. 124 (1869); *Newt. ed. Yarr. Brit. B.* i. p. 88 (1871); *Salvad. Faun. Ital. Ucc.* p. 15 (1871); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 341; *Sharpe & Dresser, B. Eur.* pt. ix. (1871); *Shelley, B. Egypt.* p. 185 (1872); *Hume, Siray F.* i. p. 124 (1873). *Sharpe. Cat. Brit. Mus.* p. 132 (1874).

Ierax fringillarius, *Leach Syst. Cat. Mamm. &c. Brit. Mus.* p. 10 (1816).

Sparvius nisus, *Vieill. N. D'ct.* x. p. 319 (1817).

Ac. fringillarius, *Vig. Zool. Journ.* i. p. 38 (1824); *Gould, B. Eur.* i. pl. 18 (1837).

Buteo nisus, *Flem. Brit. An.* i. p. 55 (1828).

Nisus communis, *Linn. Traité*, p. 58 (1831).

N. elegans, *Brehm, Vög. Deutschl.* p. 83 (1831).

N. fringillarum, *Brehm, tom. cit.* p. 87 (1831).

N. peregrinus, *Brehm, tom. cit.* p. 88 (1831).

Falco nisusimilis, *Tie., J. A. S. B.* ii. p. 571 (1833).

Astur nisus, *Keys. & Blas. Virg. Eur.* p. 140 (1840); *Bulby. Orn. Sav.* i. p. 75 (1853); *Dubois, O's. Belg.* pls. 15, 16 (1854);

- Schl. Vog. Nederl.*, pls. 13, 14 (1851); *Silvia. Sci. Vogl.*, p. 223; pl. xxvii, fig. 1 (1850).
Ae. nisosimilis, *Blyth. J. A. S. B.*, xii, p. 311 (1843); *Strickl. Orn. Syn.*, p. 105 (1855).
A. subtypicus, *Hodg. in Gray's Zool. Mus.*, p. 81 (1844).
Astur major, *D'Or. Orn. Etat.*, i, p. 81 (1840).
N. fringillarius, *Kraep. Contr. Orn. 1850*, p. 64; *Sch. Mus. P.-B.*, Astures, p. 28 (1852); *Hodg. Orn. N. O.-Afr.*, p. 65 (1859); *Sch. Revue Accipitr.*, p. 68 (1873).
N. major, *Joub. Mots. Eur. Orn.*, p. 21 (1851).
N. intercedens, *Brehm. Naum. 1855*, p. 261.
Hab. Europa, Asia, Africa, China.

13. *A. virgatus*. (*Reinw.*) ♂♂ N. v. Lauri Sa. (M. S. T.)

- F. Ieo virgatus*, *Tennm. Pl. Col.*, i, p. 109 (1823, ex *Reinw.* MS.).
Accipiter virgatus, *Vig. Zool. Journ.*, i, p. 338 (1824); *Gren. Gen. B.*, i, p. 29 (1849); *Blyth. Cat. B. Mus. A. S. B.*, p. 22 (1849); *id. J. A. S. B.*, xix, p. 331 (1850); *Bp. Conspl.*, i, p. 32 (1850); *Horsf. & Moore. Cat. B. Mus. E. I. Co.*, i, p. 37 (1854); *Moore. P. Z. S.*, 1854, p. 260; *Strickl. Orn. Syn.*, p. 106 (1855); *Jerd. B. Ind.*, i, *Gurney. t. c.*, p. 366 et 1865, p. 239; *Swinh. t. c.*, p. 105; *Beaw. P. S. S.*, 1858, p. 305; *Will. Ibis.*, 1858, p. 6; *Hume. Hough Notes*, i, p. 132 (1869); *Gray Handb. B.*, i, p. 33 (1869); *Jerd. Ibis.*, 1871, p. 243; 1872, p. 411; *Sharpe. Cat. B. M.*, i, p. 151.
N. virgatus, *Less. Man. d'Orn.*, i, p. 97 (1828); *Cuv. Rgn. An.*, p. 334 (1829); *Bp. Rev. et Migr. de Zool.*, 1852, p. 538; *Sch. Mus. P.-B.*, Astures, p. 32 (1862); *id. Vog. Nederl. Ind. Valk.*, pp. 20, 59, pl. 12, figs. *id. Revue Accipitr.*, p. 74 (1878).
A. dussumieri (*nec* *Tennm.*) *Sykes. P. Z. S.*, 1832, p. 79; *Hodg. J. A. S. B.*, xi, p. 308 (1843).
N. manillensis, *Myers. Beitr.*, p. 694, Taf. ix, (1834)*.
A. besra, *Jerd. Madr. Journ.*, x, p. 28 (1831); *Id. Ind. Orn.*, pl. 4 (1847).
A. fringillarius, *Jerd. Madr. Journ.*, x, p. 84 (1839).
A. minutus, *Blyth. J. A. S. B.*, xi, p. 832 (1842).
A. affinis, *Hodg. in Gray's Zool. Mus.*, p. 81 (1844).
A. nisooides, *Blyth. J. A. S. B.*, xvi, p. 727 (1847); *id. Cat. B. Mus. A. S. B.*, p. 22 (1849); *id. Ibis.*, 1855, p. 28, et 1865, p. 240, et 1870, p. 158.
Hieraspiza virgatus, *Kraep. Contr. Orn.*, 1850, p. 63.
Astur gularis, *Tennm. & Schl. Faun. Jap. Aves.*, p. 5, pl. 2 (1850).
A. gularis, *Bp. Rev. et Migr. de Zool.*, 1854, p. 538; *Gurney. Ibis.*, 1865, p. 547; *Swinh. P. Z. S.*, 1871, p. 342.
Micronotus badius, *Swinh. Ibis.*, 1850, p. 350, et 1851, p. 263.
M. sp., *Swinh. Ibis.*, 1864, p. 25.
M. gularis, *Swinh. Ibis.*, 1863, p. 212.
M. gularis, *Swinh. Ibis.*, 1863, p. 89.
M. virgatus, *Swinh. Ibis.*, 1865, p. 493.
Hieraspiza virgata, *Kraep. P. Z. S.*, 1867, p. 171; *Will. Tr. Z. P. S.*, 9, p. 141.

Ac. virgatus, *Sharpe*, *Cat. Brit. Mus.* p. 150 (1874); *Salv. Cat. di Ucc. di Borneo* p. 17 (1874).

Hab. Luzón, Pampanga, Negros, Guimarás, Paragua, Borneo, Java, China, Japon, Malaca.

12. *A. stevensonii*, *Gurney*.

Ac. stevensoni, *Gurney*. *Ibis*, 1863 p. 447 *Sharp*, *Cat. Ornith. Mus.* p. 109 *Tw. Works*, p. 620 *Pl. P. Z. S.* (1878.) p. 938.

Hab. Mindanao, Zamboanga.

13. *A. maculosus*, ♂ N. v.

(M. S. T.)

Hab. Ilocos N.

Subfam. BUTEONINAS.

1. Gén. BUTEO, Cuv.

1. *B. vulgaris*, *Leach*, ♀ N. v. *Buzo vulgaris*.

(M. S. T.)

The Puttock or Buzzard, *Albin*, *N. H. Birds*, i. p. 1, pl. 1 (1738).

La buse, *Briss. Orn.* i. p. 406 (1760); *Buff. Pl. Enl.* i. pl. 419 (1770).

Falco buteo, *Linn. S. N.* i. p. 227 (1766 ex *Albin*); *Naum. Vog. Dents.* i. Taf. 32, 33 (1822); *Yarr. Brit. B.* i. p. 76 (1843).

?*Aquila glaucopis*, *Merr.*, *Beitr.* ii. p. 22, Taf. 7 (1786).

F. glaucopis, *Gm. S. N.* i. p. 255 (1788).

?*F. versicolor*, *Gm. S. N.* i. p. 272 (1788).

F. albus, *Daud. Traité*, ii. p. 155 (1800).

Accipiter buteo, *Pall. Zoogr. Rosso-Asiat.* i. p. 362 (1811).

Buteo vulgaris, *Leach*, *Syst. Cat. Mamm. & B. Brit. Mus.* p. 10 (1816); *Steph. Gen. Zool.* xiii. p. 46 (1826); *Gould*, *B. Eur.* pl. 14 (1837); *Gray. Gen. B.* i. p. 11 (1849); *Kaup. Contr. Orn.* 1850, p. 77; *Schl. Vog. Nedert.* pls. 35, 36 (1854), *Strickl. Orn. Syn.* p. 27. (1855); *Peltz. Verh. z.-b. Wien.* 1862, p. 144; *Jerd. B. Ind.* i. p. 87 (1862); *Schl. Mus. P.-B.* *Buteones*, p. 3 (1862); *Gould*, *B. Gt. Br.* pt. iv. (1863); *Newt. Ooth. Wölley*, p. 138 (1864); *Sundev. Sv. Fögl.* pl. xxviii. fig. 4 (1869); *Heugl. Orn. N. O.-Afr.* p. 91 (1869); *Hume. Rough Notes*, ii. p. 261 (1870); *Salvad. Faun. Ital. Ucc.* p. 11 (1871); *Newt. et Yarr. Brit. R.* i. p. 109 (1871); *Shelley, B. of Egypt*, p. 200 (1872); *Schl. Revue Accipitr.* p. 105 (1873).

B. fasciatus, *Vieill. Faune Franc.* p. 17, pl. 8, fig. 1 (c. 1820).

B. mutans, *Vieill. Faun. Franc.* p. 18, pl. 8, fig. 2 (c. 1820).

F. mutans, *Savi. Nuov. Giorn. Pisa*, xxii. p. 64 (1822).

F. fasciatus, *Savi. Nuov. Giorn. Pisa*, xxii. p. 66 (1822); *Roux. Orn. Prov.* pls. 20-22. (1855); *Savi. Orn. Tosc.* iii. p. 195 (1851).

F. pojana, *Savi. Nuov. Giorn. Pisa*, xxii. p. 68 (1812); *id. Orn. Tosc.* iii. 197. (1831).

B. communis, *Less. Traité*, p. 78 (1831).*

- B. septentrionalis, *Brehm*, *Vög. Deutschl.* p. 42 (1831).
B. medius, *Brehm*, *V. D.* p. 43 (1831).
B. murum, *Brehm*, *V. D.* p. 44 (1831).
B. fuscus, *Macgill.* *Bist. Brit. B.* iii. p. 183 (1840).
F. albidus, *De Selys.* *Faun. Belg.* p. 55 (1842, nec *Gm.*)
F. variegatus, *De Selys.* *F. B.* p. 54 (1842, nec *Gm.*)
B. cinereus, *Bp. Conspl.* i. p. 18 (1850); *Loche, Expl. Algér.*
Ois. p. 41 (1867).
B. variabilis, *Bailly, Orn. Sav.* i. p. 127 (1853).
B. major, *Brehm, Naum.* 1855, p. 268.
B. minor *Brehm, Naum.* 1855, p. 268.
B. vulgaris, var. obscura, *Pelz.* *Verh. z.-b. Wien,* 1862, p. 144.
B. vulgaris, var. etrusca, *Pelz.* *tom. cit.* p. 114.
B. minor, *Pelz.* *tom. cit.* p. 114 (nec *Heugl.*)
Hab. Europa, Alemania, Africa.

2. **B. plumipes.** *Hodgs.* ♂ N. v. Anol.

(M. S. T.)

- Circus plumipes*, *Hodgs.* in *Gray's Zool. Misc.* p. 81 (1844);
Buteo plumipes, *Hodgs.* *P. Z. S.* 1845, p. 37; *Gray, Gen.* i.
p. 11 (1849); *Kaup, Contr. Orn.* 1850, p. 77, *Bp. Comp.*
Av. i. p. 19 (1850); *Strickl. Orn. Syn.* p. 38 (1855); *Jerd,*
B. Ind. i. p. 91 (1862); *Blyth, Ibis.* 1863, p. 21, et 1866,
p. 245; *Gray, Hand-l.* B. i. p. 7 (1869); *Hume, Rough Notes,*
ii. p. 285 (1870); *Jerd, Ibis.* 1871, p. 340; *Blanf. Ibis.* 1872,
p. 87. *Sharp, Brit. Mus.* p. 180 *lam.* 7. j. 1 (1874).
Archibuteo plumipes, *Blyth, J. A. S. B.* xix. p. 338 (1850).
Falco buteo japonicus, *Temm. & Scht. Faun. Jap.* p. 16 (1850).
B. vulgaris japonicus, *id. ut supra* pls. vi. & vi. b.
B. japonicus, *Bp. Conspl.* i. p. 18 (1850); *Schl. Mus. P.-B.* Bu-
teones, p. 7 (1862); *Blakist. Ibis.* 1862, p. 314; *Gray, Hand-l.*
B. i. p. 6 (1869); *Swinh. Ibis.* 1870, p. 87; *Jerd. Ibis.* 1871,
p. 337; *Schl. Revue Accipitr.* p. 106 (1873).
B. vulgaris, *Blyth, Ibis.* 1863, p. 20.
B. asiaticus, *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 339.
Hab. Cagayan, Pamplona, China, Fo-kien, Japon.

Subfam. AQUILINAS.

1. Gén. NEOIUS, HODGS.

1. **N. malayensis.** (*Temm.*) ♂ N. v. Manoyo.

(M. S. T.)

- Falco malayensis*, *Temm. Pl. Col.* i. pl. 117 (1824, ex *Reinw.*
MS.)
Aquila malayensis, *Vig. Zool. Journ.* i. p. 337 (1814); *Gray,*
Gen. B. i. p. 14 (1845); *Bp. Conspl.* i. p. 14 (1850); *Strickl.*
Orn. Syn. pp. 60, 220 (1855); *Schl. Mus. P.-B.* Aquilæ, p. 11
(1862); *id. Vog. Nederl. Ind. Valkv.* pp. 8, 49, pl. 3. figs.
1, 2 (1866); *Gray, Hand-l.* i. p. 11 (1869) *Schl. Revue Ac-*
cipitr. p. 117 (1873).
A. malayana, *Less. Traité*, p. 39 (1831).
A. (*Heteropus*) pernigra, *Hodgs. J. A. S. B.* v. p. 227 (1836).

- Heteropodus perniger*, Hodg. *J. A. S. B.* 30, p. 127 (1843).
Nisactes ovivorus, Jerd. *Madr. Journ.* xiii, p. 157 (1844).
Ictinaetus perniger, Blyth. *Ann. N. H.* xiii, p. 114 (1844).
Neopus perniger, Hodg. in *Gray's Zool. Mus.* p. 81 (1844).
1. malayensis, Blyth. *J. A. S. B.* xv, p. 7 (1846). Jerd. *Madr. Journ.* XIII, 2, p. 117 (1844).—Blyth. *Cat. B. Mus. As. Soc. B.* p. 28 (1849).—Layrd. *Ann. Nat. Hist. Ser.* 2, XII, p. 99 (1853).—Irby. *Ibis*, 1861, p. 221.
Onychactus malayensis, Kaup. *Class. der Säug. und. Vög.* p. 120 (1844).—Bp., *Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 531.—Peltz. *Vogel. der k.-k. zool. bot. Gesell. in Wien.* 1802, p. 102. Salv. *Cat. di Borneo* p. 4. (1874.)
Aquila malayensis, G. R. Gray. *Cat. B. Brit. Mus.* 1, p. 7 (1844).—Id., *Gen. C.* 1, p. 14 (1845).—Bp., *Consp.* 1, p. 14 (1850).—Id., *Rev. Zool.* 1850, p. 479.—Hartt. *Journ. für Orn.* 1855, p. 331.—Schleg. *Mits. des P. B. Aquilae*, p. 11 (1852).—Id., *O's. des Ind. Néerl. Accipitres* p. 43, pl. 3, f. 1, 2 (1850).—Id., *Mus. P. B. Accipitres*, p. 110 (1873).
Neopus malayensis, Gray. *Cat. Hodg.* *Coll. B. of Nep.* p. 42 (1846).—Horsf. and Moore. *Cat. B. Mus. E.* I. *Comp.* 1, p. 381 (1854).—Jerd. *B. of Ind.* 1, p. 63 (1862).—Blyth. *Ibis*, 1863, p. 19.—Wall. *Ibis*, 1868, p. 13.—Wald. *Trans. Zool. Soc.* VII, 2, p. 34 (1872). Sharp. *Cat. Brit. Mus.* p. 257 (1874).
Heteropus malayensis, G. R. Gray. *List of Gen. and Subgen. of B.* p. 3 (1855).—Gray. *Cat. Spec. present by Hodg. to the Brit. Mus.* p. 18 (1863).—Id., *Hand-List*; 1, p. 11, sp. 96 (1869). Beav. *P. Z. S.* 1858, Hume. *Rough Handw.* *P. Z. S.* 1872, p. 411.
Hab. Luzón, Mindoro; Java, Sumatra, Célebes.

2. Gén. PIZAETUS, VIEILL.

2. Sp. *kieneri* Gerv. ♂ ♀ N. v. Lauin-pira. (M. S. T.)
Astur kieneri, Gerv. *Mtg. Zool.* 1835, O's. pl. 35. *Geoffr. St.-Hil. Rev. Zool.* 1845, pl. 25 (1835).
Sp. cristatellus, Jard. et Selb., 3. *Or.* pl. 66.
Sp. albogularis, Tick. *J. A. S. B.* xi, 45 (1844); Limnaetus kieneri, Strickl. *Ann. N. H.* xiii, p. 33 (1844); Jerd. *B. Ind.* p. 1862.
Sp. kieneri, Gray. *Gen. B.* i, p. 14 (1845); Bp. *Consp.* i, p. 29 (1850); Strickl. *Orn. Sva.* p. 71 (1855); Schi. *Mus. P.-B. Astures*, p. 11 (1862); Wall. *Ibis*, 1868, p. 14; Hume. *Rough Notes*, i, p. 216 (1869); Gray. *Hand-l.* i, p. 213 (1869); Hume. *Str. F.* i, p. 311 (1873); Schi. *Revue Accipit.* p. 58 (1873). Salv. *Cat. Ucc. d' Borneo*, p. 16 (1874).
Lophotriorchis kieneri, Sharpe. *Cat. Brit. Mus.* p. 255 (1874).
Nisactes kieneri, Jerd. *Ill. Ind. Orn.* p. 5. (1847)
Hab. Marinduque, Mindanao, Panay, Borneo, Calaca, Java.

3. Sp. *lanceolatus*. ♂ N. v. Lauin-pira. (M. S. T.)

- Spizaetus lanceolatus*, Bp. *Consp.* i, p. 29 (1850); Wall. *Ibis*, 1868, p. 13; Gray. *Hand-l. B.* i, p. 13 (1861). Sharpe. *Cat. Brit. Mus.* p. 270 (1874).

- S. fasciolatus*, Temm. & Schleid. Faun. Jap., p. 8 (1850).
S. cirrhatus, Schlegel. Vog. Nederl. Ind. Valkv., pl. 7 figs. 2, 3 (1866); id. Rev. Accipitr., p. 52 (1873, pt.).
Limnaetus lanceolatus, Wald. Tr. Z. S. viii. p. 34 (1872).
Hab. Panay, Mindanao, Marinduque, Cagayan, Cebbes.

4. *S. alboniger*, (Blyth) ♂ N. v. Lauin-pira. (M. S. T.)

- Nisaetus alboniger*, Blyth. J. A. S. B. xiv. p. 173 (1845).
Spizaetus horneensis, Gray, Cat. Accipitr. 1848, p. 16.
S. alboniger, Blyth. J. A. S. B. xix. p. 335 (1850); Strickl. Orn. Syn. p. 71 (1855) Gould, B. Asia, pt. xv. (1863); Gurney in Gould's B. of Asia Wall. Ibis, 1868, p. 215; Home-Rongh. Notes, i. p. 200 (1866); Salter. Cat. Ucc. di Born., p. 13 (1874); Sharpe. Cat. Brit. Mus. p. 271 (1874); Gray, Handl. B. i. p. 13 (1869).
S. nanus, Wall. Ibis, 1868, p. 14, pl. 1.
Limnaetus albiniger, G. R. Gray, Handl. i. p. 13 esp. 113 (1869).
Sp. cirrhatus, Low. Sarawak, p. 409 (1848); Schlegel. Mus. P. B. Astures. p. 6. (1862) (*en parte*); id. Ois des Ind. Néerl. Accipitres. p. 54 (*en parte*) pl. 7. f. 1.; Id. Mus. P. B. Accipitres. p. 52, n.º 43 (1873).
Hab. Luzón, Ilocos Norte, Malaca, Borneo.

5. Sp. *limnaetus*, Horst. ♂ N. v. Lauin-pira. (M. S. T.)

- Falco limnaetus*, Horst. Tr. Linn. Soc. xiii. p. 138 (1822); id. Zool. Res. Java, pl. 36 (1824); Temm. Pl. Col. i. pl. 134 (1825) Bernst. Journ. T. Orn. 1850, p. 419.
Morphnus limnaetus, Vig. Zool. Journ. i. p. 325 (1824). Steph. Gen. Zool. xiii. pt. 2 p. 18 (1826); Less. Tr. d'Orn. p. 53 (1831).
A. limnaetus, Less. Mau. d'Orn. i. p. 94 (1828).
L. horsfieldii, T. & G. Mem. Raffl. p. 649 (1830).
L. unicolor, Blyth. Ann. N. H. xiii. p. 114 (1844).
Spizaetus cirrhatus, Schlegel. Rev. Crit. p. 20 (*parte*).—*id.*, Mus. P. B. Astures. p. 6 (*parte*) (1862).—*id.*, Ois des Ind. Néerl. Accipitres. p. 53, pl. 8, f. 1 (1866).—*Mus. P. B. Accipitres*. p. 52 (1873) (*parte*).—Horst. & Moore. Cat. B. Mus. E. Y. Comp. 1, p. 32 (1854).—Moore. P. Z. S. 1854, p. 250.
S. limnaetus, Gray. Gen. B. i. p. 14 (1845); Strickl. Orn. Syn. p. 71 (1855). Blyth. Cat. Mus. A. B. p. 24 (1849) (*en parte*); Sharpe. Cat. Brit. Mus. p. 272 (1874) (*en parte*).
Limnaetus cirrhatus, Kaup. Contr. Orn. 1850, p. 61.
Hab. Luzón, Laguna, Java, Sumatra, Malaca.

6. *S. philippensis*, Sharpe. ♀ N. v. Lauin-pira. (M. S. T.)

- Sp. philippensis*, Gurney in Gould's B. Asia, pt. xv. 1863; Gray, Handl. B. i. p. 13 (1869); Sharpe. Cat. of the Birds. Brit. Mus. p. 361. (1874).
Hab. Basilan, Negros, Masbate.

7. Sp. *caligatus*, (B. G.) ♂ ♀ N. v. Lauin-pira. (M. S. T.)

- Falco caligatus*, T. & G. Linn. Trans. xiii. p. 230 (1822).

- F. niveus, *Temm. Pl. Coll.* 127 (1823).
Morphnus niveus, *Steph., Gen. Zool.* xiii, pt. 2, p. 19 (1829).—
Vig., Zool. Journ. 1, p. 235 (1825).—*Cuv. Régne An. ed. 2.*
t, p. 331 (1829).—*Less., Tr. d'Orn.* p. 53 (1831).
Astur niveus, *Less. Man. d'Orn.* i, p. 94 (1828).
Limnaetus caligatus, *Vig. Rafl Life*, p. 649 (1831).—*G. R. Gray,*
Hand-List 1, p. 13, esp. 110 (1831).
Spizaetus niveus, *Blyth, Ann. and Mag. Nat. Hist.* xii, p. 91 (1843).
Limnaetus niveus, *Strickl. Ann. and Mag. Nat. Hist.* xiii, p. 33
(1844).—*Jerd., B. of Ind.* i, p. 70 (1862).
S. caligatus, *Gray, Cat. Accipitr.* 1844, p. 8; *id. Gen. B.* i,
p. 14 (1845); *Strickl. Orn. Syn.* p. 70 (1855); *Schl. Mus. P.-B.*
Astures, p. 6 (1862, pt.); *id. Vog. Nederl. Ind. Valkv.* pp. 14,
53, pls. 6, 7; figs. 1, 8 (1869); *Wall. Ibis*, 1868, p. 13; *Gray,*
Hand-L. B. i, p. 13 (1869); *Hume, Rough Notes*, i, p. 198
(1869). *Gurn. in Gould's B. Asia.* pt. xv (1863).
Spizaetus cirrhatus, *Schleg., Rev. Crit.* p. 20 (1844) (*parte.*)—
G. R. Gray, List. B. Brit. Mus. i, p. 16 (1848).—*Bp., Conspl.*
i, p. 29 (1850) (*parte.*).—*Blyth, J. A. S. B.* xix, p. 334 (1850);
Moore, P. Z. S. 1854, p. 259.—*Schleg., Mus. P. B. Astures*,
p. 6 (1862) (*parte.*).—*id. Ois. des Ind. Néerl. Accipitres*,
pp. 14, 63, pl. 6, i, i, 2, 3 y pl. 8, t, 2, 3 (no t, 1, ni
pl. 7) (1866).—*Wall., Ibis* 1868, p. 13 (*parte.*).—*Schleg., Mus. P. B. Accipitres*, p. 52 (1873) (*en parte.*) *Sharpe, Cat. Brit. Mus.* p. 272 (*en parte.*) (1874).
Spizaetus limnaetus, *Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 24 (1849)
(*parte.*).
Hab. Luzón, Cagayan, Borneo, Java, Sumatra.

3. Gén SPILOORNIS, GRAY.

8 S. cheela, *Lath. Syst. N. v. Mamuhac, Banog.*

(M. S. T.)

- Cheela Falcon, *Lath. Gen. Syn. Suppl.* p. 33 (1787).
Falco cheela, *Lath. Ind. Orn.* i, p. 14 (1790).
F. albidus, *Temm. Pl. Col.* i, pl. 19 (1824, ex *Cuv.*)
Cymindis albidus, *Vigors, Zool. Journ.* i, p. 324 (1824).
Buteo albidus, *Cuv. Régne An.* i, p. 337 (1829).
Haematornis undulatus, *Vigors, P. Z. S.* 1830-31, p. 171; *Gould, Cent. Himal. B.* pl. 1 (1832).
Circaetus nipalensis, *Hodgs. As. Research.* xviii, pt. 2, p. 17, pl.
2 (1833).
Haliaetus bacha, *Meyen, Beitr.* p. 68 (1834).
Spilornis undulata, *Gray, Cat. Accipitr.* 1844, p. 10.
C. undulatus, *Gray, Gen. B.* i, p. 16 (1845).
H. cheela, *Blyth, J. A. S. B.* xiv, p. 179 (1845); *Horsf. &*
Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. i, p. 59 (1854).
C. cheela, *Gray, Cat. Accipitr.* 1848, p. 11; *Schl. Mus. P.-B.*
Buteones, p. 25 (1862); *Gray, Hand-L. B.* i, p. 14 (1869).
S. cheela, *Bp., Conspl.* i, p. 17 (1850); *Strickl. Orn. Syn.* p. 17,
(1855 pt.); *Jerd., B. Ind.* i, p. 77 (1862), *Blyth, Ibis*, 1863,
p. 12, et 1866, p. 243; *Hume, R. N.* i, p. 222 (1869); *Swinh.*
P. Z. S. 1871, p. 340.
Sp. orientalis, *Gurney, Ibis*, 1866 243.

Sp. hoyas, Swinh. *Ibis*, 1866, pp. 304, 399; Gurns. t. c. p. 241.
Sharpe, *Cat. Brit. Mus.* p. 217 (1874).
Hab. Luzón, Cagayan, India, Formosa, China.

9. **Sp. bacha**, (*Daud.*) ♂♂ N. v. Lauin-buhac (M. S. T.)

Le bacha, *Lev. Ois. d'Alfr.* i. p. 60 pl. 15 (1799) *Sund. Krit. om Lev.* p. 25 (1838).

Faleo bacha, *Daud. Traité*, 11 p. 43 (1800, ex *Lev.*; *Lath. Ind. Orn. Suppl.* p. 4; *id. Syn. Suppl.* 11 p. 22; *id. Gen. Hist.* i. p. 172; *Shaw. Gen. Zool.* vii. p. 157, pl. 22 (1811); *Raffl. Linn. Tr.* xiii. p. 278 (1822).

F. bido, *Horsf. Tr. Lin. Soc.* xiii. p. 137 (1822); *Lath. Gen. Hist.* i. p. 149.

Cymindis bacha, *Vig. Zool. Journ.* i. p. 324 (1824); *Steph. Gen. Zool.* xiii. p. 2, p. 24 (1826).

Buteo bacha, *Vig. Mem. Raffl.* p. 650 (1830); *Cuv. Reg. An.* p. 324 (1817) p. 337 (1720); *Vieill. N. D.* iv. p. 467 (1816); *id. Enc. Meth.* 117, p. 1219 (1823); *Less. Tr. d'Orn.* p. 77 (1831).

Haematornis bacha, *Vig. P. Z. S.* 1830-31, p. 270; *Horsf. et Moore. Cat. B. Mus. C. L. Co.* i. p. 49 (1854).

Spihtrnis bacha, Gray, *List. Gen. B.* 1840, p. 3; *Bp. Conspl.* i. p. 16, (1850); Blyth, *Ibis* 1863, p. 12; Wall, *Ibis*, 1868, p. 15; Hume, *Rough Notes*, i. p. 230 (1869); Sharpe, *Cat. Brit. Mus.* p. 290 (1874).

Circaetus bacha, Gray, *Gen. B.* i. 16 (1845); Schlt. *Mus. P. B.* Buteones, p. 26 (1862); *id. Vog. Ned. Ind. Val.* pp. 36, 71, pl. 22 fig. 1-3 (1866); Gray, *Hand-l. B.* i. p. 14 (1869).

H. bido, Blyth, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 19 (1849).

C. bascha, Schlt. *Mus. P.-B. Rev. Accip.* p. 113 (1873).
Hab. Luzon, Laguna, Cavite, Indán, Laguna, Calamba, Paraguan; Borneo.

10. **S. pallidus**, Wald ♂♂ N. v. Cananamá. (M. S. T.)

Sp. cheela, Wall, *Ibis*, 1868, p. 15.

Sp. pallidus, Wald, *Ibis*, 1872 p. 363. Sharpe, *Cat. Brit. Mus.* p. 290, pl. ix. (1874).

Hab. Luzón, Bulacán, Cavite, Indán, Laguna, Calamba, Paraguan; Borneo.

11. **S. holospilus**, Vigors. ♂♂ N. v. Sagueg. (M. S. T.)

Buteo holospilus, Vigors, *P. Z. S.* 1830-31, p. 96.

Haematornis holospilus, Vigors, t. c. p. 170; Horsf. & Moore, *Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 50 (1854).

S. holospilus, Gray, *Cat. Accipitr.* p. 10 (1844); Bp. *Comp.* i. p. 17 (1850); Strickl. *Orn. Syn.* p. 45 (1855); Blyth, *Ibis*, 1860, p. 243, Wall, *Ibis*, 1868, p. 16. Sharpe, *Cat. Brit. Mus.* p. 293 (1874).

Circaetus holospilus, Gray, & Mitch. *Gen. of. B.* i. p. 16, pl. 7 (1845); Schlt. *Mus. P.-B.* Buteones, p. 28 (1862); Gray, *Hand-l.* i. p. 14 (1869); B. Schlt. *Revue Accipitr.* p. 114 (1873).

Hab. Luzón, Laguna, Calauan, Cagayán, Tuguegarao, Nueva

Vizcaya, Cavite, Indán, Marinduque, Mindoro, Samar, Parie, Leyte, Cebú, Paragua, Mindanao.

12. *S. panayenses*, *Storer*, *C. N. v. Sagueg*.

(M. S. T.)

Hab. Panay, Negros, Guimaras.

4. Gén BUTASTUR, Hodges.

13. *B. liventer*, (*Ten.*) *♂♂ N. v. Limbas*, *Sicut*.

(M. S. T.)

Falco liventer, *Tenm. Pl. Col.* i. pl. 438 (1827).

Buteo liventer, *Cuv. Règne An.* i. p. 337 (1829); *Tenm. & Schl. F. J. Aves*, p. 21 (1850); *Schl. Mus. P.-B.* *Buteones*, p. 21 (1862); *id. Vog. Nederl. Ind. Valks*, pp. 32, 69, pl. 21, fig. 1 (1866); *id. Revue Accipitr.* p. 111 (1873).

Buteo pallidus, *Less. Traité*, p. 82 (1831).

Astur liventer, *Gray, Cat. Accipitr.* p. 34 (1844).

Polioornis liventer, *Kaup, Classif. Säug. u. Vog.* p. 122 (1844); *Gray, Gen. B.* i. p. 30 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 18 (1850); *Strickl. Orn. Syn.* p. 125 (1855); *Wall. Ibis.* 1868, p. 1; *Gray, Hand-l. B.* i. p. 16 (1869); *Walden, Tr. Z. S.* viii. p. 37 (1872); *Hume, Stray F.* i. p. 319 (1873). *Salv. Cat. Ucc. di Borneo*, p. 9 (1874).

Butastur liventer, *Sharpe, Cat. Brit. Mus.* p. 296 (1874).

Hab. Luzón, Pampanga, Laguna, Calauan; Siam, Célebes, Java, Timor.

14. *B. indicus*, (*Gm.*) *♂♂ N. v. Sicup*, *Ticui*.

(M. S. T.)

Javan Hawk, *Lath. Gen. Syn. Suppl.* p. 32* (1787).

Falco indicus, *Gen. S. V.* i. p. 264 (1788, ex *Lath.*).

F. javanicus, *Lath. Gen. Hist.* i. p. 163 (1821).

F. poliogenys, *Tenm. Pl. Col.* i. pl. 325 (1825).

Astur poliogenys, *Gray, Cat. Accipitr.* 1844, p. 34.

Buteo fasciatus, *A. Hay, Madr. Journ.* xiii. p. 145 (1844).

A. barbatus, *Eyton, Ann. N. H.* xvi. p. 228 (1845).

B. pigmaeus, *Blyth, J. A. S. B.* xiv. p. 177 (1845); *id. Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 29 (1849).

Polioornis indicus, *Gray, Cat. Accipitr.* 1848, p. 68; *Strickl. Orn. Syn.* p. 125 (1855); *Walden, Tr. Z. S.* viii. p. 37 (1872). *Salv. Cat. Uccel. di Borneo*, p. 9 (1874).

P. pyrrhogensis, *Gray, Gen. B.* i. p. 30 (1849).

P. poliogenys, *Gray, Gen. B.* i. p. 30 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 18 (1850); *Wall. Ibis.* 1868, p. 19; *Gray, Hand-l. B.* i. p. 16 (1869); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 341.

B. pyrrhogensis, *Tenm. & Schl. F. J. Aves*, p. 21 pl. 7 b (1850).

B. poliogenys, *Schl. Mus. P.-B.* *Buteones*, p. 22 (1862); *id. Vog. Nederl. Ind.* pp. 33, 70, pl. 21 figs. 2, 3 (1866); *Blyth, Ibis.* 1866, p. 247; *Schl. Revue Accipitr.* p. 111 (1873).

P. barbatus, *Gray, Hand-l. B.* i. p. 15 (1869).

Butastur indicus, *Sharpe, Cat. Brit. Mus.* p. 297 (1874).

Hab. Samar, Calbayog, Leyte, Paraga, Bisilan, Miniloc,

Guimaraes, Negros, Panay, Cebu, Siquijor, Bohol, Luzon, Illoscos Norte, Cagayan; Japon, China, Malacca, Borneo, Célebes.

5. HALLETTUS, SAV.

15. *H. albicillus* (*Linn.*) N. ♂ ♀ N v Pygargus vulgaris, ♂ Borni. M. S. T.]

- The Golden Eagle, *Albin*, N. *H. Birds*, ii. pl. 1 (1738).
L'Aigle à queue blanche, *Briss. Orn.* i. p. 427 (1760).
Le Petit Aigle à queue blanche, *Briss. t. c.* p. 429 (1760).
L. Grand Aigle du mer, *Briss. t. c.* p. 437 (1760); *Buff. Pl. Ent.* i. pls. 112, 415.
Vultur albicilla, *Linn. S. N.* i. p. 123 (1766).
Falco ossitragus, *Linn. S. N.* i. p. 124 (1766).
F. albicilla, *Gm. S. N.* i. p. 253 (1788); *Naum. Vög. Deutsch'*. i. p. 224; pls. 12, 13, 14 (1822); *Werner, Atlas, Rapaces*, pl. 11 (1827); *Kittl. Kupf. Vog.* pl. 2 fig. 2 (1832); *Sch. u. Szen. Vög. Eur.* Taf. 25, 26 (c. 1839); *Nordm. in. Démid. Voy.* p. 98 (1840); *Yarr. Br. R.* i. p. 18 (1841).
F. melanactus, *Gm. S. N.* i. p. 254 (1788).
F. albicaudus, *Gm. S. N.* i. p. 258 (1788).
F. hinnularius, *Linn. Ind. Orn.* i. p. 15 (1790).
F. pygargus, *Dut. Traité*, ii. p. 62 (1800), ex *Briss.*
Haliaetus nisus, *Savigny. Descr. Égypte, Ois.* p. 253 (1809); *Less. Traité*, p. 40, pl. 8 fig. 2 (1831).
Aquila leucocephala, *Meyer in Wolf u. Mey. Taschenb. deutsch. Vogelk.* p. 16, pl. 4 (1810).
A. albicilla, *Pall. Zoogr. Rosso-As.* i. p. 345 (1811); *Midd. Sibir. Reis. Zool.* p. 125 (1851).
Haliaetus albicilla, *Leach. Syst. Cat. Mamm. &c. Brit. Mus.* p. 9 (1816); *Cuv. Régne An.* i. p. 315 (1817); *Gould, B. Eur.* pl. 10 (1837); *Macgill. Brit. B.* iii. p. 221 (1844); *Gray, Gen. B.* i. p. 17, pl. 7 fig. 8 (1850); *Bp. Consb.* i. p. 15 (1850); *Schl. Vog. Nederl.* pls. 28, 29 (1854); *Cass. B. Calif.* p. 111 (1855); *Strickl. Orn. Synt.* p. 48 (1855); *Fritsch. Vög. Eur.* tab. 7 figs. 4, 5, (1858); *Cass. in Burd's B. N. Am.* p. 43 (1860); *Schrenk, Reis. Amurl.* p. 223 (1860); *Sundev. Sv. Folg.* pl. xxx. figs. 2, 3 (c. 1865); *Schl. Mus. P.-B. Aquile*, p. 11 (1862); *Gould, B. Gt. Br.* pt. 3 (1863); *Peltz. Brüh. z. b. Wien.* 1863, p. 587; *Radde, Reis. Sibir. Vög.* p. 95 (1863); *Scl. P. Z. S.* 1863, p. 252; *Newt. Ooth. Wolley*, p. 345 (1864); *Scl. P. Z. S.* 1865, p. 731; *Degl. et Gerbe, Orn. Eur.* i. p. 39 (1867); *Heugl. Vög. N. O.-Afr.* p. 51 (1869); *Gray, Handb. B.* i. p. 16 (1869); *Salvad. Faun. Ital. Ucc.* p. 9 (1871); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 339; *Newt. ed. Yarr. Brit. B.* i. p. 25 (1781); *Shelley, B. Egypt.* p. 204 (1872); *Hume, Str. F.* i. p. 159 (1873); *Schl. Revue Accipitr.* p. 117 (1873). *albicillus*, *Sharpe Cat. Br't. Mus.* p. 302 (1874).
F. albicilla borealis, *Fisher, Isis*, 1827, p. 56.
H. greenlandicus, *Brehm. Naum.* 1855, p. 297, *borealis*, *Brehm. I. c. islandicus*, *Brehm. I. c. orientalis*, *Brehm. I. c. cinereus*, *Brehm. I. c. funereus*, *Brehm. I. c. pelagicus*, *Hume. Rough Notes*, ii. p. 252 (1870, *lapsus*, *brooksi*, *Harr. B's.* 1870, p. 438). *Hab.* Luzón, Laguna, Mindoro; Europa, África, China, Japón.

16. *H. pelagius*, (*Pall.*) ♂ ♀ N. v. Manoyo, Anol M. S. T.)

- Aquila pelagica*, *Pall. Zoogr. Rosso-As.* i. p. 343, pl. 18 (1811);
Kittl. Kupf. Vog. p. 3, pl. 2 fig. 1 (1832); *Midd. Sibir. Reise, Zool.* p. 125 (1851).
Falco leucopterus, *Temm. Pl. Col.* i. pl. 480 (1824).
F. imperatur, *Kittl. Kupf. Vog.* p. 3 (1832).
Thalassactes pelagicus, *Kasp. Mus. Senek.* iii. p. 261 (1845).
Buteo pelagicus, *Gray. Gen. B.* iii. *Apb.* p. 1 (1840); *Temm. & Scht. F. J. Aves.* p. 11 pl. 4 (1850); *Cass. B. Calif.* pp. 31, 110, pl. 6 (1855); *Strickl. Orn. Sya.* 51 (1855); *Schrenk. Reis. Amurl. Zool.* p. 222 (1859); *Cass. in Baird. B. N. A.* p. 42 (1860); *Schl. Mus. P.-B. Aquila*, p. 14 (1862); *Elliot. B. N. Am.* part 6 (1867); *Homey. J. f. O.* 1868, p. 248; *Gray. Handb. I.* p. 17 (1868); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 336; *Coues. Key N. A. Birds.* p. 220 (1872). *Sharpe. Cat. B. Mus.* p. 306 (1874).
hab. Luzón, Cagayan; Siberia, China, Japón, N. América.

6. Gén. CUNCUMA, *Hodg.*

17. *C. leueogaster*, (*Gm.*) ♂ ♀ N. v. Laan, Anol. (M. S. T.)

- White-bellied Eagle, *Lath. Gen. Syn.* i. p. 33 (1781).
Falco leucogaster, *Gm. S. N.* i. p. 257 (1788) ex *Lath.*; *Temm. Pl. Col.* i. pl. 49 (1823).
F. maritimus, *Gm. S. N.* i. p. 260 (1788).
Le Blagre, *Levaill. Ois. d'Afr.* i. pl. 5 (1797); *Sund. Krit. om Lervall.* p. 23 (1851).
F. blagrus, *Daud. Traite*, ii. p. 70 (1800), ex *Levaill.*.
Haliaetus blagrus, *Cuv. Régne An.* i. p. 316 (1817); *Smith. S.-Afr. Q. Journ.* i. p. 108 (1830); *Bp. Conspl.* i. p. 15 (1850).
F. dimidiatus *Raffl. Tr. Linn. Soc.* xiii. p. 277 (1822).
Pandion blagrus, *Bonn. et Vieill. Enc. Méth* iii. p. 1200 (1823).
F. oceanica, *Less. Voy de la Coq. Zool.* i. p. 343 (1829).
H. leucogaster, *Vig. Zool. Journ.* i. p. 336 (1824); *Gould. Syn. B. Austr.* pt. 3, pl. 37 fig. 1 (1838); *Strickl. Orn. Syn.* p. 53 (1855); *Schl. Mus. P.-B. Aquila*, p. 14 (1862); *Jerd. B. Ind.* i. p. 85 (1862); *Schl. Vog. Nedert. Ind. Valkv.* pp. 9, 50, pl. 4, figs. 1, 2 (1866); *Finsch. u. Hartl. Faun. Centralpolyn.* p. 1 (1867); *Gray. Handb. B.* i. p. 17 (1869); *Hume. Rough Notes.* i. p. 250 (1869); *Schl. Mus. P.-B. Revue Acceptr.* p. 117 (1873). *Sharpe. Cat. Brit. Mus.* p. 307 (1874).
H. dimidiatus, *Vig. Mem. Buff.* p. 648 (1830); *Gray. Gen. B.* i. p. 17 (1845); *Strickl. Orn. Syn.* p. 54 (1855).
H. sphenurus, *Gould. P. Z. S.* 1837, pp. 97, 138; *id. Syn. B. Austr.* pt. 3, pl. 37 fig. 2 (1838).
Ichthyæetus cultrunguis, *Blyth. J. A. S. B.* xi. p. 110 (1842).
I. leueogaster *Gray. Cat. Accipitr.* 1844, p. 13; *Gould. B. Ansar.* i. pl. 3 (1848); *Diggles. Orn. Austr.* pt. 5 (1866).
Pontoaetus leueogaster, *Gray. Gen. B.* i. p. 18 (1845); *Peltz. Verh. z.-b. Wiss.* 1873, p. 591.
P. blagrus, *Gray. Gen. B.* i. p. 18 (1845).

- Conimus leucogaster*, Gray, Cat. Auct. p. 24; *Ibis*, 1808, p. 15; *Wald. Tr. Z. S. viii.* p. 35 (1872); *Sav. Cook. Ucc. di Borneo*, p. 5 (1874).
- Blagrus leucogaster*, Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B. p. 30 (1849); *id. J. A. S. B.* xix. p. 341 (1850); *id. Ibis*, 1853, p. 225; *Sav. Cook. Ibis*, 1870, p. 16.
- I. blagrus*, Blyth, J. A. S. B. xi p. 116 (1849).
- P. leucogaster*, Gould, Hand. B. Austr. i. p. 13 (1863).
Hab. Luzón, Cagayan, Pampanga, Minili, Negros, Samar, Mindanao, Paragua; India, Ceilán, Australia, Polynesia, Malacca.

7. Gén. HALIAETUS, SELBY.

18. H. Indus, (Bodd.) ♂ ♀ N. v. Laniin.

(M. S. T.)

- L'Aigle de Pondichery, Briss. Orn. i. p. 450; pl. nxxv. (1760).
Agile des Grandes Inde, Buff. Pl. Ent. i. pl. 416 (1770).
Falco indus, Bodd. Tabl. Pl. Ent. 25 (1783).
F. pondicerianus, Gm. S. N. i. p. 265 (1833). Horsf. Tr. Linn. Soc. 13, p. 135 (1821); Raffl. Tr. L. A. Soc. 13, p. 278 (1823).
S. Mill. Verh. Land en Vol pp. 21, 381, 405, 409 (1839-1844).
Haliaetus pondicerianus, Cuv. Régne An. i. p. 316 (1813).
H. garudi, Less. Traité, p. 41 (1831).
Milvus pondicerianus, Jerd. Madr. Journ. x. p. 72 (1839).
H. pondicerianus, Selby, Cat. Gen. & Subg. Types, p. 3 (1840).
Dentiger ponicerianus, Holgs. in Gray's Zool. Misc. p. 81 (1844).
Milvus rotundicauda, Hodds. ut suprac. p. 81 (1844).
Haliaetus indus, Gray, Cat. B. i. p. 18 (1845); Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B. p. 31 (1849); Moore P. Z. S. p. 201 (1854); Schat. P. Z. S. p. 307 esp. 3 (1863); Petz. Novar. Reic. Vog. pp. 7, 161 (1865); Fall. Dis. p. 16 (1868); G. R. Gray, Hand. l. i. p. 18; esp. 155 (1890); Strickl. Orn. Syn. p. 73 (1855); Jerd. B. Ind. i. p. 101 (1862); Gray, Handl. B. i. p. 18 (1869); Hume, Rough Notes, ii. p. 316 (1870); Holdsw. P. Z. S. 1872, p. 414; Hume, Str. F. 160 (1873); Sharpe, Cat. Brit. Mus. p. 313 (1874).
Ictinaetus indus, Kaup, Arch. f. Naturg. xvi. p. 39 (1850).
H. ponticerianus, Bp. Conspl. i. p. 15 (1850).
Ictinoaeetus pondicerianus Kaup, Contr. Orn. 1850, p. 73.
Haliaetus indus, Sch. Mus. P.-B. Aquile p. 19 (1862); id. Recue Accipitr. p. 119 (1873).
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Cagayan; India, Ceilán.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Cagayan; India, Ceilán.

19. H. intermedius, Garn. ♂ ♀ N. v. Laniin-bulic.

(M. S. T.)

- Haliaetus pondicerianus, Horsf. Tr. Linn. Soc. xiii. p. 136 (1822); Meyen. Beitr. p. 69 (1834).
Falco pondicerianus, Raffl. Tr. L. S. xiii. p. 278 (1822).
Haliaetus intermedius, Garnier, Ib's, 1805, p. 2^o. Sharpe, Cat. Brit. Mus. Mus. p. 314 sub esp. a. (1874).
H. indus, Blyth, Ibis, 1808, p. 16.
H. indus, Sch. Vog. Nedert. Ind. Valkv. pl. 4 fig. 4 (1866), nec fig. 3.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Marinduque, Bohol, Panay,

Negros, Siujor, Samar, Leyte, Guimaras, Mindanao, Joló; Java, Sumatra, Célebes, Borneo.

20. **H. girrenera** (*Vieill.*) *C. P. N.* v. Lquin-Clie. (M. S. T.)

Falco ponticerianus, *Shaw & Nodd. Nat. Misc.* x. pl. 380 (1799).
White-headed Rufous Eagle, *Lath. Gen. Hist.* i. p. 218 (1821).
Haliactus girrenera, *Vieill. & Oud. Gal. Ois.* i. pl. x. (1825).
H. leucosternus, *Gould, P. Z. S.* 1837, p. 138; *id. Syn. B. Austr.* iii. pl. 3. fig. (1838).
Haliastur leucosternus, *Gray, Gen. B.* i. p. 18 (1845); *Gould, B. Austr.* i. pl. 4 (c. 1845); *Bp. Conspl.* i. p. 15, (1850). *Strickl. Orn. Syn.* p. 75 (1855). *Gould, Handb.* i. p. 17 (1865); *Waddl. Ibis*, 1868, p. 16; *Gray, Hand-b. B.* i. p. 18 (1869); *Wall. Ibis*, p. 16 (1868); *Gray Handl. B.* i. p. 18 (1869). *Diggles, Orn. Austr.* pt. 17 (1870); *Walden, Tr. Z. S.* viii. p. 35 (1872).
Ictinoctus leucosternus, *Kaup, Contr. Orn.* 1850, p. 73.
H. indus, *Schl. Vog. Nederl. Ind. Valkv.* p. 51, pl. 4 fig. 3 (1866).
Haliastur girrenera, *sub esp. b. Sharp, Cat. Brit. Mus.* p. 315. (1874).
Hab. Luzón, Laguna, Cagayan, Pampanga; Australia, Célebes Ternate, Amboina.

8. Gén. **MILVUS**, *Cuv.*

21. **M. ictinus** *Sav.* ♂ N. v. Milano real. (M. S. T.)

The Kite or Gleed, *Albin, N. H. Birds.* i. pl. 4 (1738).
Le Milan royal, *Bris. Orn.* i. p. 414, pl. 33 (1860).
Falco milvus, *Linn. S. N.* i. p. 126 (1766); *Naum. Vog. Deuts.* i. p. 333. Taf. 31 fig. 1 (1822); *Werner, Atlas, Rapaces*, pl. 23 (1827); *Schl. u. Susem. Vog. Enr.* Taf. 31 fig. 1 (1839); *Yarr. Brit. B.* i. p. 66 (1843).
Le Milan, *Buff. Pl. Ent.* i. pl. 422 (1770).
Milvus castaneus, *Daud. Traité*, ii. p. 148 (1800).
M. ictinus, *Sav. Syst. Oys. d' Egypte*, p. 259 (1809); *Newt. Ooth. Wolley*, p. 182 (1844); *id. ed. Yarr. Brit. B.* i. p. 92 (1871); *Sharpe, Cat. Brit. Mus.* p. 319 (1874).
Accipiter milvus, *Pall. Zoogr. Rosso-As.* i. p. 356 (1811).
M. regalis, *Roux. Orn. Prov.* i. p. 44 pls. 26, 27 (1825); *Macgill. Brit. B.* iii. p. 265 (1840); *Gray, Gen. B.* i. p. 24 (1845); *Bp. Conspl.* i. p. 21 (1850); *Schl. Vog. Nederl. Ind.* pl. 31 (1854); *Strickl. Orn. Syn.* p. 132 (1855); *Sundev. Sv. Fogl.* p. 235, pl. xxix, fig. 4 (1858); *Fritsch. Vog. Eur.* Taf. 6, fig. 7 (158); *Schl. Mus. P.-B. Milvi*, p. 1 (1862); *Degl. et Gerbe, Orn. Eur.* i. p. 64 (1867); *Loche, Expt. Sci. Alger. Ois.* i. p. 76 (1867); *Gould, B. Gt. Br.* pt. xiii. (1868); *Gray, Handl. B.* p. 26 (1869); *Heugl. Orn. N. N. O. Afr.* i. p. 97 (1869); *Salvad. Faun. Ital. Ucc.* p. 13 (1871); *Shelley, B. Egypt.* p. 195 (1872); *Schl. Revue Accipitr.* p. 126 (1873).
Milvus rufus, *Brehm, Vog. Deutschl.* p. 51 (1831).
M. vulgaris, *C. G. Br. B.* i. p. 74, pl. 5 (1833); *Gould, B. Eur.* i. pl. 21. (c. 375).
It. Europa, Francia, Alemania.

9. Gén. ELANUS, Sov.

22. E. hypoleucus. Gould. C. N. v. Lauan-puti. (M. S. T.)

Falco melanopterus. Horsf. Tr. Linn. Soc. xiii. p. 137 (1822).
Elanus hypoleucus Gould. P. Z. S. 1859, p. 127; id. B. Asiat. pt. xii. (1860); Schl. Mus. P. B. p. 7. (1862); Schlat. P. Z. esp. 8, p. 207 (1863). Wall. Ibis, 1868, p. 17; Gray, Hand-l. i. p. 28 (1860); Wald. Tr. Z. S. viii. p. 36 (1872); Schl. Mus. P.-B. Rœve Accipitr. p. 139 (1873); Sharpe, Cat. Brit. Mus. p. 338 (1874).

Elanus intermedius. Schl. Mus. P. B. Milvi, p. 7 (1862); id. Vog. Nederl. Ind. pp. 31, 68, pl. 24, figs. 2, 3 (1866); Gray, Illana-l. i. p. 28 (1866).

Hab. Luzón, Cagayan, Pampanga, Mindoro, Celú, Guimaras, Negros, Basilan, Mindanao; Borneo, Célebes, Java.

10. Gén PERNIS, Cuv.

23. P. ptilorhynchus (Temm) ♂ N. v. Anol. (M. S. T.)

Falco ptilorhynchus, Temm. Pl. Col. i. pl. 44 (1823); Müll et Schl. Verh. Nat. Gesch. Ned. ov. bez. Zool. Aves. p. 49, t. 7. (1839-44).

Pernis ptilorhynchus, Steph. Gen. Zool. xiii. pl. 35 (1826); Holdsw. P. Z. S. 1872, p. 404. Sharpe, Cat. Brit. Mus. p. 347 (1874).

P. crotata, Cuv. Règne. An. i. p. 335 (1829); Less. Tr. d' Orn. p. 76 (1831); Jord. Madr. Jour. L. S. x. p. 73; Gray, Gen. B. i. p. 24 (1845); Bp. Conspl. Av. i. p. 20 (1850); Strickl. Orn. Syn. p. 131 (1855); Jord. B. Ind. i. p. 108 (1862); Wall. Ibis, 1868, p. 17; Gray, Hand-l. B. i. p. 26 (1869); Hume, Rough Notes ii. p. 330 (1870); Schl. Mus. P.-B. Revue Accipitr. p. 132 (1873).

P. torquata, Less. Traité, p. 76 (1831); Gray, Gen. B. i. p. 24 (1845); Des. Murs. Iconogr. Orn. pl. 13 (1845); Pucher. Rev. et Mag. de Zool. 1850, 212.

P. ruficollis, Less. l. c. p. 77 (1831); Gray, l. c. p. 24 (1845); Des. Murs. l. c. pl. 14 (1845); Pucher. l. c. p. 212.

P. albicularis, Less. l. c. p. 77 (1831); Gray. l. c. p. 24 (1845); Pucher. l. c. p. 212.

P. maculosa, Less. in Bellang. Voy. Int. p. 223 (1834);

P. ellioti, James. Tr. Wern. Soc. vii. p. 493 (1836). Jord. Madr. Jour. L. S. x. p. 74.

P. bharattensis, Hodg. in Gray's Zool. Misc. p. 81 (1844).

P. apivorus, Temm. & Schl. Faun. Jap. Aves, p. 24 (1859); Swinh. P. Z. S. 1871, p. 341.

P. ptilorhyncha, Wald. Tr. Zool. Soc. 8. 2. p. 36 (1872); Salv. Cat. Ucc. di Born. p. 10 (1874).

Hab. Paragua, Mindoro; Borneo, Célebes, Java, India, Sumatra, Banka.

Subfam. FALCONINAS.

1. Gen BAZA, HOOVS.

1. B. magnirostris, Gray, N. v. Lauin.

Baza magnirostris, Gray, Cat. Accipitr. Brit. Mus., p. 19 (1844);
Strickl. Orn. Syu. p. 27 (1855); Gray, And. B. i. p. 53 (1869);
Sharpe, Cat. Brit. Mus. p. 350 (1874).
Aviceda magnirostris, Bp. Conspl. i. p. 20 (1850), et Rev. et Mag.
de Zool; 1854, p. 535.
Pernis madagascariensis, Kaup, Contr. Orn. 1850, p. 77.
Hab. Filipinas.

2. Gen. MICROHIERAX, SHARPE.

2. M. fringillarius, (Horsf.) ♂ ♀ N. v. Lauin-munti (M. S. T.)

Falco caerulescens, (nee Linn.), Horsf. Tr. Linn. xiii. p. 135 (1822); id. Zool. Res. Java, pl. 35 (1824); Tem. Pl. Col. i. pl. 97 (1824); Vieill. & Oud. Gal. Ois. i. p. 49, pl. (1825); Kittl. Kupf. Vog. p. 4, pl. iii, fig. 2 (1832); Sch. Mus. P.-B. Fal. p. 33 (1862); id. Vog. Nederl. Ind. Valks. pp. 7, 49, pl. 2 fig. 1 (1866).

F. fringillarius, Drap. Dict. Class. d'Hist. Nat. vi. p. 412, pl. v. (1824);

Hierax caerulescens Vig. Zool. Jouru. i. p. 339 (1824); id. Life Raffl. p. 649 (1830); Blyth, J. A. S. B. xii. p. 186 (1843); Gray, Gen. of. B. i. p. 21 (1844); Kaup, Contr. Orn. 1850, p. 52; Bp. Conspl. i. p. 28 (1850); Bp. Rev. et Mag. de Zool. 1854, p. 537; Moore, P. Z. S. 1854; p. 258; Strickl. Orn. Syu. p. 102 1855 Sch. P. Z. S. 1863, p. 206; Wald. Ibis. 1864, p. 6; Gray Hand-l. B. i. p. 24 (1869); Wald. Ibis. 1872, p. 362; Salv. Cat. Ucc. di Borneo p. 3 (1874).

H. malayensis, Strickl. Ann. N. H. xiii. p. 133 (1844); Gray, Gen. of. B. i. p. 21 (1844); Strickl. Orn. Syu. p. 104 (1855); Petz. Verh. z.-b. Wien. xiii. p. 629 (1863); id. Reis. Nov., Vog. p. 3 (1865).

H. fringillarius, Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc. Beng. p. 17 (1849); id. Ibis. 1803, p. 11; Wald. Ibis. 1871, p. 161.

H. melanoleucus, Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. i. p. 16 (1854 me Blyth.)

Hab. Mindanao, Samar; Borneo, Java, Sumatra.

3. M. erythrogenys, Vigors ♂ ♀ N.v. Lauin-munti. Guit-guit. (M. S. T.)

Hierax erythrogenys, Vig. P. Z. S. p. 96, 1831; Blyth, J. A. S. B. xi. p. 2 p. 789, 1842; Gray, Gen. B. i. p. 21, 1844; Fraser, Zool. Typ. pl. 31, 1849; Kaup, Contr. Orn. p. 52, 1850; Strickl. Orn. Syu. p. 102, 1855; Gray, Hand-l. B. i. p. 24, 1869.

Falco sericeus, Kittl. Kupf. Vog. p. 4, lam. 3, fig. 3. (1832);

id. *Mém. Acad. St. Petersb.* 2 p. 1 tab. 1, 1835; *Sch. Mus. P. B. Pale.* p. 24, 1802.
F. girinieri, *Edy. et Soul. Voy. Bouët. Zool.* i. p. 71 lam. 1, (1841.)

Hierax sericeens, *Gray. Gen. B.* i. p. 21, 1844; *Bp. Rev. et Mag. di Zool.* p. 536, 1854; *Strickl. Orn. Syn.* p. 104, 1855; *Pelz. Verh. z. b. Vienn.* 13, p. 630, 1863; *Wahl. Ibis*, p. 6, 1868; *Gray. Hand-l. B.* i. p. 24, 1869.

Microhierax erythrogenys, *Sharp. Cat. B. Mus.* i. p. 360, 874.
Hab. Luzin, Laguna, Pampanga, Cagayan, Samar, Paragua, Mindanao.

4. **M. latifrons** *Sharp.* N. v. Lauin.

(M. S. T.)

Hab. Cagayan de Misamis, Joló.

3. *Gen. FALCO*, Lin.

5. **F. communis**, *Gm.* ♂ N. v. Lambas, Lagpau,

(M. S. T.)

Le Faucon, *Briss. Orn.* i. p. 321 (1760); *Buff. Pl. Enl.* i. p. 197, pl. 421, *et Hist. Nat. Ois.* i. p. 249 (1770).

Le Faucon pèlerin, *Briss. Orn.* i. p. 341 (1760).

Le Faucon sars, *Buff. Pl. Enl.* i. pl. 470 (1770).

Oriental Hawk, *Lath. Gen. Syn. Suppl.* p. 34* (1877).

Bhree Falcon, *Lath. Gen. Syn. Suppl.* p. 35 (1877).

Falco orientalis, *Gm. Syst. Nat.* i. p. 264 (1781), *ex Lath.*; *Lath. Ind. Orn.* i. p. 22 (1790); *Daud. Traité*, ii. 1. 70 (1800); *Strikl. Orn. Syn.* p. 13 (1855); *Gray. Hand-l. B.* i. p. 19 (1869).

F. communis, *Gm. S. N.* i. p. 270 (1788), *ex Buff.*; *Less. Traité*, p. 18, pl. 16 fig. 1 (1831); *Schl. Rev. Crit.* p. ii. (1844); *Temm. & Schl. P. J. Aves.* p. 1 (1850); *Bp. Conspl.* i. p. 23 (1850); *id. Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 536; *Schl. Vog. Nederl.* p. 6, pls. 13 (1854); *id. Mus. P.-B. Falcones*, p. 1 (1862); *id. Vog. Nederl. Ind. Falcones*, pp. 2, 44, pl. 1 fig. 2 (1866); *Dsd. & Gerbe. Orn. Eur.* i. p. 81 (1867); *Sundev. Sv. Fogl.* p. 266, pl. xxvi, fig. 2 (1867); *Hengl. Orn. N. O.-Afr.* i. p. 20 (1869); *Bocage. Cat. Lisb. Mus.* p. 42 (1869); *Salvad. Faun. Ital. Ucc.* p. 17 (1871); *Sharp. Ann. N. H.* (4) xi. p. 222 (1873); *Schl. Revue Accipitr.* p. 32 (1873); *Sharp. Cat. Brit. Mus.* p. 376 (1874).

F. hornotinus, *Gm. S. N.* i. p. 270 (1788, *ex Buff.*)

F. peregrinus, *Gm. S. N.* i. p. 272 (1781, *ex Briss.*); *Wils. Am. Orn.* ix. p. 120, pl. lxxvi. (1814); *Temm. Man. d'Orn.* i. p. 22 (1820); *Naum. Vog. Deutschl.* i. Faf. 24, 25 (1822); *Werner. Atlas. Rapaces*, pl. 8 (1527); *Sw. & Rich. Faun. Bor.-Am.* p. 23 (1831); *Golds. B. Eur.* pl. 28 (1837); *Judibon. B. N. Am.* i. p. 84, pl. xx. (1839); *Magill. Hist. Brit.* B. iii. p. 294 (1840); *Yarr. Hist. Brit.* B. i. p. 32, 33, 43; *Gray. Gen. B.* i. p. 19 (1844); *Buff. Cat. B. Mus.* i. 2. *Se Rev.* p. 13 (1849); *Kaup. Contr. Orn.* 1850, p. 55; *Hart. & Moor. Cat. B. Mus.* E. I. Co. i. p. 16 (1854); *Nord. Orn. Syn.* i. 89 (1855); *Salvin & Brodr. Falconer*, p. 19,

- pls. 1-5 (1855); *Frisch.*, *Vog. Eur.*, tab. x. figs. 8, 9 (1858); *Reinh.*, *Ibis*, 1861, p. 5; *Gurney*, t. c. p. 331; *Jerd.*, *B. Ind.* i. p. 21 (1862); *Blakist.*, *Ibis*, 1862, p. 314; *Gould*, *B. Gt. Br.*, pt. 1 (1862); *Pelz.*, *P. Z. S.*, 1863, p. 206; *Gray*, *Cat. Brit. B.* p. 11 (1863); *Blyth*, *Ibis*, 1866, p. 234; *Whitley*, *Ibis*, 1867, p. 194; *Wall.*, *Ibis*, 1868, p. 5; *Hume*, *Rough Notes*, i. p. 19 (1869); *Gray*, *Hantl.*, *B. I.* p. 19, (1869); *Jerd.*, *Ibis*, 1871, p. 237; *Newton*, *et Yarr.*, *Brit. B.* p. 53 (1871); *Swinhoe*, *P. Z. S.*, 1871, p. 340; *Allen*, *Bull. Harv. Coll.* ii. p. 316 (1871); *Godman*, *Ibis*, 1872, p. 165; *Sci. & Silv. Nomencl.* p. 121 (1873).
F. calidus, *Lath. Ind. Orn.* i. p. 41 (1793); *Gray*, *Hantl.*, *B.* i. p. 19, (1869); *Blyth*, *Ibs.*, 1863, p. 7.
F. lunulatus, *Daud. Traitt.* ii. p. 127 (1800, ex *Lat.*).
F. abietinus, *Bechst. Naturg. Deutschl.* ii. p. 759 (1854).
F. gentilis, *Wils. Mem. Wern. Soc.* ii. p. 587 (1818); *Thienem. Abbild. Vogeleieren*, Taf. li. figs. 1 a. c. (1844).
F. corniculum, *Brehm. Vög. Deutschl.* p. 62 (1831).
F. griseiventris, *Brehm. Is's.*, 1833, p. 778.
F. anatum, *Bp. Comp. List. B. Eur. & N. Am.* p. 4 (1838) ex *Audubon*; *Gosse*, *B. Jmaica*, p. 16 (1847); *Bp. Cons.* p. 23 (1850); *Kaup. Contr. Orn.* 1850, p. 56; *Bp. Rv. et Mag. de Zool.* 1854, p. 536; *Strickl. Orn. Syn.* p. 83 (1855); *Cass. B. Calif.* p. 85 (1855); *Newton*, *Ibis*, 1859, p. 63; *Sci. & Silv. t. c.* p. 219; *Cass.* in *Baird's Ibis*, 1857, pp. 282, 283; *Copper*, *B. Calif. ed Baird*, p. 457 (1870).
F. micrurus, *Hodges*, in *Gray's Zool. Misc.* p. 81 (1844); *Jerd. Ibis*, 1871, p. 238; *id. tom. cit.* 1872, p. 2; *Sharpe*, *Ann. N. H.* (4) xi. p. 223, (1873).
Le Faucon hagard, *Schl. & Verst. Fane*, pl. 11 (1853).
Le Tiercelet sors de Faucon *tid. ut suprà*, pl. 12 (1853).
F. nigriceps, *Cass. B. Calif.* p. 87 (1855); *id. Pr. Phil. Acad.* 1855, p. 277; *id. U. S. Astr. Exp.* pl. xiv. (1855); *Strickl. Orn. Syn.* p. 85 (1855); *Cass.* in *Baird. B. N. Am.* p. 8 (1860); *Gurney*, *Ibis*, 1857, p. 465; *Brown*, *Ibis*, 1858, p. 418; *Copper*, *B. Calif. ed. Baird*, p. 456 (1870); *Allen*, *Bull. Harv. Coll.* ii. p. 317 (1871); *Sharpe*, *Ann. N. H.* (4) xi. p. 223 (1873).
F. leucogenys, *Brehm. Naumannia*, 1855 p. 268.
F. atriceps, *Hume*, *Ibis*, 1869, p. 359; *id. Rough. Notes*, i. p. 58 (1869); *id. Ibis*, 1871, p. 24; *Jerd. tom. cit.* p. 237; *Ridell. tom. cit.* p. 363; *Jerl. Ibis*, 1872, p. 2.
F. peregrinoides, *Vian. Rev. et Mag. de Zool.* 1867, p. 174.
F. brookii, *Sharp*, *Ann. N. H.* (4) xi. pp. 20 222 1873.
Hab. Luzón, Pampanga, Cagayan, Negros, Mindanao; Europa, América, Japón.

6. *F. peregrinator*, *Sund. ♂ N. v. Cageg.*

(M. S. T.)

Falco peregrinator, *Sundev. Physiogr. Tidsskr. Lunl.*, 1837, p. 177, pl. 4. *Gray*, *Gen. of. B.* i. p. 19 (1844); *Sundev. Ann. N. H.* xviii. p. 454 (1846); *Gray*, *Cat. Mamm. & B. Nepal. Hodgs.* p. 44 (1846); *Blyth*, *Cat. B. Mus. As. Soc. Beng.* p. 14 (1849); *Bp. Cons.* i. p. 23 (1850); *Knup. Contr.*

Orn., 1850, p. 55; *Gould, B. of. Astra*, part iii. (1850); *Blyth, J. A. S. B.*, xix, p. 321 (1851); *Bp. Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 536; *Strickl. Orn. Syn.*, p. 74 (1855); *Jerd. B.*, i. p. 55 (1862); *Blyth, Ibis*, 1863, p. 8; *Gray, Hand-l. B.*, i. p. 19 (1869); *Hume, Rough Notes*, i. p. 55 (1869); *Jerd. Ibis*, 1870, p. 237; *Sharpe, Ann. N. H.*, (4) xi. p. 223 (1873). *id. Cat. Brit. Mus.*, p. 382 (1874).

F. shaheen, *Jerd. Midr. Journ.*, x. p. 81 (1839); *id. Ill. Ind. Orn.*, pls. xii. & xxviii. (1847); *Pelz. Verh. z.-b. Wien*, xiii. p. 610 (1863).

F. sultaneus, *Hodgs in Gray's Zool. Misc.* p. 81 (1844).

F. ruber, *Schl. Mus. P. B. Falc.* p. 5. (1862).

Hab. Luzón, Cavite, Indian, Cagayan, Mindoro; India, Himalaya.

7. **F. melanogenys**, *Gould & N. v. Siecup.*

(M. S. 1.)

Falco peregrinus, *Vig. & Horsf. Tr. Linn. Soc.* xv. p. 153 (1826); *Digges' Orn. Austr.* part. 20 (1868).

F. melanogenys, *Gould, P. Z. S.* 1857, p. 139; *id. Syn. B. Austr.* pt. ii. (1838); *Gray, Gen. of B.* i. p. 19 (1844); *Gould, B. Austr.* fol. i. pl. 8 (1848); *Start, Exp. C. Austr.* ii. App. p. 14 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 23 (1850); *id. Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 536; *Strickl. Orn. Syn.* p. 56 (1855); *Gould, Handb. B. of Austr.* i. p. 26 (1865); *Blyth, Ibis*, 1866, p. 234; *Gray, Hand-l. of B.* i. p. 19 (1869); *Sharpe, Ann. N. H.*, (4) xi. p. 224 (1873). *id. Cat. Brit. Mus.* p. 385 (1874).

F. micropus, *Savins. Au. in Menag.* p. 341 (1837).

F. communis, *Schl. Valkv. Ned. Ind.* pp. 2, 44, pl. 8, fig. 2 (1866).

Hab. Luzón, Laguna; Australia, Java, Molucas.

4. Gén. HYPOTRIORCHIS, BOIE.

8. **H. severus** (*Horsf.*) ♂♂ N. v. Cageh, Samalinut.

(M. S. T.)

Falco severus, *Horsf. Tr. Linn. Soc.* xii. p. 135 (1822); *Strickl. Orn. Syn.* p. 87 (1855); *Schl. Mus. P.-B. Falc.* p. 23 (1862); *Blyth, Ibis*, 1863, p. 8; *Schl. Vog. Nederl. Ind. Valkv.* pp. 4, 45; *Taf. 2. figs. 2, 3* (1866); *Radel. Ibis*, 1871, p. 366; *Schl. Revue Accipitr.* p. 46 (1873); *Sharpe, Cat. Brit. Mus.* p. 397 (1874).

F. aldrovandii, *Temm. Pl. Col.* i. pl. 128 (1823); *Less. Traité d'Orn.* p. 91 (1831).

F. rufipedoides, *Hodgs. Calc. Journ. N. H.* iv. p. 283 (1844).

F. guttata, *Gray, Cat. Accipitr. Brit. Mus.* p. 26 (1844).

Hypotriochis severus, *Gray, Gen. of B.* i. p. 20 (1844); *Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc. Beng.* p. 15 (1849); *Kaup. Contr. Orn.* 1850, p. 54; *Bp. Conspl.* i. p. 25; (1850); *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 23 (1854); *Jerd. B. Ind.* i. p. 34 (1862); *Wall. Ibis*, 1868, p. 5; *Gray, Hand-l. B.* i. p. 20 (1869); *Hume, Rough Notes*, i. p. 87 (1869); *Wall. Tr. Z. S.* viii. p. 33 (1872); *Salv. Cat. Ucc. di Born.* p. 2 (1874).

Hab. Luzón, Cagayan, Negros, Samar, Paragua; Subregión Indo-Malaya, Célebes, Nueva Guinea.

5. Gen. CERCHNEIS, Boie.

9. C. tinnuncula, (Lin.) ♂♂ N. v. Lagpång.

(M. S. T.)

- L'Epervier des Alouettes, Briss. Orn. i. p. 279 (1760).
La Cresserelle, Briss. Orn. i. p. 393 (1760); Buff. Fl. Enl. i. pls. 402, 474 (1770).
Falco tinnunculus, Linn. S. N. i. p. 127 (1766); Temm. Man. d'Orn. i. p. 29 (1820); Naum. Vog. Deutschl. i. p. 323, Taf. 30 (1822); Werner, Atlas. Rapaces, pl. 12 (1827); Gould, B. Eur. i. pl. 26, (1837); Schl. u. Susem. Vog. Eur. Taf. 11 (1839-45); Macgill. Hist. Brit. B. iii. p. 325 (1840); Yarr. Brit. B. i. p. 52 (1843); Kjær. Orn. Dan. Mh. iii. fig. 4 (1851); Schl. Vog. Nederl. pls. 9, 10 (1854); Harl. Orn. II. Afr. p. 9 (1857); Fritsch, Vog. Eur. tab. 4 figs. 6, 7 (1858); Schl. Mus. P. B. Fal. p. 25 (1862); Dgl. & Gerbe, Orn. Eur. i. p. 93 (1867); Hengl. Orn. A. O.-Afr. i. p. 40 (1869); Sundev. Sc. Figl. p. 216, pl. xxvi. figs. 5, 6; Blauf. Geol. & Zool. Abyss. p. 290 (1870); Sharpe & Dresser, R. Eur. pt. 2 (1871); Newt. ed. Yarr. B. pt. B. p. 79 (1871); Salvad. Faun. Ital. Ucc. p. 22 (1871); Shelley, B. Egypt, p. 194 (1872); Schl. Revue Aciptr. p. 41 (1873).
F. alaudarius, Gm. S. N. i. p. 279 (1788, ex Briss.)
F. fasciatus, Retz. Faun. Suec. p. 70 (1800).
F. brunneus, Bechst. Orn. Taschenh. p. 38 (1802).
Cerchnæis tinnuncula, Boie, Isis, 1828, p. 344; Brehm, Vog. Deutschl. p. 73 (1831); Sharpe. Cat. Brit. Mus. p. 425 (1874).
C. murum, Brehm, Vog. Deutschl. p. 70 (1831), media, Brehm.
F. architinnunculus, Brehm, ut supra.
Tinnunculus alaudarius, Gray. Gen. of B. i. p. 21 (1844); Bp. Conspl. i. p. 27 (1850); Kaup. Contr. Orn. 1850, p. 53; Gould, B. G. Br. pt. ii. (1862); Jerd. B. Ind. i. p. 38 (1862); Petz. Verh. z.-B. Wien, xiii. p. 623 (1863); Blyth, Ibis, 1863, p. 9; Neat. Ooot. Waller. p. 80 (1864); More, Ibis, 1865, p. 9; Trist. t. c. p. 259; Hume, Rough Notes, i. p. 96 (1869); Gray, Hand-l. B. i. p. 22 (1869); Finsch, Tr. Z. S. vii. p. 205 (1870) Sharpe, Ibis, 1870, p. 486.
Cerchnæis tannura, intercedens accedens, fasciata, guttata, Brehm, Tasmania, 1855, p. 269.
Tinnunculus tinnunculus, Hengl. Peterm. Mittk. 1861, p. 26.
Hab. Luzon, Cagayan; Europa, Africa, China, Japon.

Suborden 2.º PANDIONES.

Fam. PANDIÓNIDAS.

1. Gén. PANDION, Saw.

1. P. halicetus, (Lin.) ♂♂ N. v. Anol.

(M. S. T.)

The Fishing Hawk, Catesby N. H. Carol. i. pl. 2 (1731).

Le Faucon pescheur, de la Caroline, Briss. Orn. i. p. 362 (1760).

- Aigle de Mer, *Briss. Orn.* i. p. 440 (1766).
Falco haliaetus, *Linn. S. N.* i. p. 129 (1766); *Nann. Vog. Deutschl.* i. p. 241, pl. 16 (1822); *Werner. Atlas. Rapaces*, pl. 19 (1827); *Schl. u. Susem. Vog. Eur.* Taf. 24 (1839).
Le Balbuzard, *Buff. Pl. Enl.* i. pl. 414.
Falco arundinaceus, *Gme. S. N.* i. p. 263 (1788).
F. carolinensis, *Gme. N. S.* i. p. 263 (1788).
F. cayenensis, *Gme. S. N.* i. p. 263 (1788).
Aquila americana, *Vieill. Ois. Am. Sept.* i. p. 31 (1807).
A. piscatrix, *Vieill. Ois. Am. Sept.* i. p. 29, pl. 4 (1807).
Pandion fluvialis, *Savign. Descr. Egypte. Ois.* p. 272 (1807).
Aquila haliaetus, *Meyer. u. Wolf. Taschenb.* i. p. 23 (1801).
Accipiter haliaetus, *Pall. Zoogr. Rosso-As.* i. p. 355 (1811).
Triorches fluvialis, *Leach. Syst. Cat. Mamm. &c. B. M.* p. 1 (1816).
Aquila balbusardus, *Dumont. Dict. Sci. Nat.* i. p. 351 (1816).
Pandion americanus, *Vieill. et Oud. Gal. Ois.* pl. 11 (1828).
Balbusardus haliaetus, *Fleming. Brit. An.* p. 51 (1828).
Pandion haliaetus, *Les. Man. d'Orn.* i. p. 86 (1828); *Sw. & Rich. Fam. Bor.-Am. Birds*, p. 20 (1831); *Gould. B. Eur.* pl. 12 (1837); *Gray Gen. B.* i. p. 17, pl. 7, fig. 5 (1845); *Bp. Comp.* i. p. 16 (1850); *Schl. Vog. Nederl.* pl. 30 (1854); *Strickl. Orn. Syn.* p. 63 (1855); *Hartl. Orn. W.-Afr.* p. 7 (1857); *Fritsch. Vog. Eu.* tab. 9 fig. 1 (1858); *Schrenck. Reis. Amurl.*, *Zool.* p. 227 (1859); *Jerd. B. Ind.* i. p. 80 (1862); *Schl. Mus. P.-B.* p. 22 (1862); *Radde. Reis. Sibir.*, *Ois.* p. 97 (1863); *Newt. Ooth. Waller.* p. 58 (1864); *Sunder Sv. Fugl.* pl. xxix, fig. 1 (1866); *Eegl. & Gerbe. Orn. Eur.* i. p. 47 (1867); *Layard. B. S. Afr.* p. 16 (1867); *Hume. Rough. Notes.* i. p. 234 (1869); *Gould. B. Gt. Br.* pt. xvii. (1870); *Finsch. u. Hartl. Vog. Ostafir.* p. 40 (1870); *Newt. ed. Yarr. Brit.* B. i. p. 30 (1871); *Pelz. Orn. Bras.* p. 4 (1871); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 340; *Cones. Key N. Am. B.* p. 219 (1872); *Holdsw. P. Z. S.* 1872, p. 412; *Salvad. Faun. Ital. Ucc.* p. 9, 1872; *Schell. B. Egypt.* p. 203 (1872); *Schl. Mus. P.-B. Revue Accipitr.* p. 123 (1873); *Sharpe. Cat. Brit. Mus.* p. 449 (1874).
P. alticeps, *Brehm. Vog. Deutschl.* p. 33 (1831), *planiceps*, id. id.
P. carolinensis, *Andub. B. N. Am.* pl. 81, et *Orn. Biogr.* i. p. 415 (1831); *Bp. Comp. List. B. Eur. & N.-Am.* p. 3 (1838); *id. Conspl.* i. p. 16 (1850); *Cassin. B. Calif. & Texas.* p. 112 (1855); *Strickl. Orn. Syn.* p. 64 (1855); *Cass. in Baird's B. N. Am.* p. 45 (1860); *Dall & Bann. Tr. Chic. Acad.* p. 272 (1860); *Gray. Handb. B.* i. p. 15 (1869); *Cooper. B. Calif. ed. Baird.* p. 454 (1870).
P. indicus, *Hodges. in Gray's Zool. Misc.* p. 81 (1844).
Hab. Luzón, Ilocos, Cagayan, Marinduque; Europa, Asia, China, América.

2. *P. leucocephalus*, *Gould. ♂ N. v. Anol.* (M. S. T.)

- Pandion leucocephalus*, *Gould. Syn. B. Austr.* pt. iii. pl. 6 (1838); *Gray. Gen. B.* i. p. 17 (1845); *Gould. B. Austr.* i. pl. 6 (1848); *Consp. Av.* i. p. 16 (1850); *Strickl. Orn. Syn.* p. 65 (1855); *Gould. Handb. B. Austr.* i. p. 15 (1869); *Schl. Vog.*

*

- Nederl. Ind.* pp. 12, 52, pl. 3, fig. 3 (1866); *Wall. Ibis*, 1868, p. 15; *Gray, Hand-l. B.* i. p. 15 (1869). *Sharpe, Cat. Brit. Mus.* p. 451 (*Sub esp. a)* (1874).
P. gouldii, Kaup, Isis, 1847, p. 270.
Hab. Luzon, N.^o Ecija, Paragua, Marindueque; Australia, Moulucas.

2. POLIOCTUS, KAUP.

3. *P. ichthyaetus*, (Horsf.) ♂ ♀ N. v. Anol. (M. S. T.)

- Falco ichthyaetus, Horsf. Tr. Lin. Soc.* xiii. p. 136 (1822); *id. Z. Res. Java*, pl. 34 (1824).
Pandion ichthyaetus, Vig. Zool. Journ. i. p. 321 (1824); *Gray, Cat. Accipitr.* 1848, p. 23; *Bp. Conspl.* i. p. 16 (1856); *Schl. Vog. Nederl. Ind.* *Valkv.* pp. 13, 62, pl. 5 figs. 1, 2 (1866); *Gray, Hand-l. B.* i. p. 15 (1869).
Haliaetus ichthyaetus, Cuv. Rég. An. i. p. 327 (1824); *Schl. Mus. P.-B. Aquilæ*, p. 18 (1862).
H. unicolor, Gray, & Hardw. Ill. Ind. Zool. i. pl. 19 (1830).
H. plumbeus, Hodgs. J. A. S. B. vi. p. 367 (1837).
Ichthyaetus bicolor, Gray, List Gen. B. i. p. 4 (1841); *Strickl. Orn. Syn.* p. 66 (1855).
Ich. hosniellii, Blyth, J. A. S. B. xi. p. 110 (1842).
I. plumbeus, Hodgs. in Gray's Zool. Misc. p. 81 (1844).
I. huemarius, Hodgs. in Gray's Zool. Misc. p. 81 (1844).
Pontoenetus ichthyaetus, Gray, Gen. B. i. p. 17 (1845); *Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 30 (1849); *id. Ibis*, 1863, p. 20 et 1865, p. 28.
Polioctus ichthyaetus, Kaup, Contr. Orn. 1850, p. 73; *Jerd. B. Ind.* i. p. 81 (1862); *Blyth, Ibis*, 1866, p. 243; *Beav. & Tytl. Ibis*, 1867, p. 316; *Wall. Ibis*, 1868, p. 14; *Hume, Rough N.* ii. p. 1 (1870); *Jerd. Ibis*, 1871, p. 330; *Blyth, Ibis*, 1872, p. 88. *Sharpe, Cat. Brit. Mus.* p. 452 (1874).
Hab. Luzon, Illicos, Cagayan, Mindanao; Borneo, Célebes, Java, Sumatra, Malaca, India.

Suborden 3.^o NOCTURNAS.

Fam. BUBONIDAS.

Subfam. BUBONINAS,

1. Gén. BUBO, Cuv.

1. *B. ignavus, Forster*, N. v. *Gran duque*. (M. S. T.)

The Great Horn-Owl or Eagle Owl, *Albin, Birds*, ii. pl. 9. Great Horned Owl, from Athens, *Edwards, Glean.* pl. 227. Le Grand Due, *Briss. Orn.* i. p. 477; *Buff. Pl. Enl.* i. pl. 435. Le Grand Due d'Italie, *Briss. Orn.* i. p. 482. *Strix bubo, Lin. S. N.* i. p. 131; *Shaw, Mus. Lever.* p. 119, pl. 29;

- Temm.*, *Man. d'Orn.*, i. p. 100; *Roux. Orn. Prov.*, p. 69, pl. 46;
Naum., *Vög. Deutschl.*, i. Tap. 44; *Werner. Atlas. Rapaces*,
pl. 41; *Schil. & Susem. Vög. Eur.*, Taf. 50; *Yarr. Brit. B.*,
i. p. 107; *Kjær. Orn. Dan.*, pl. vii, fig. 3; *Midd. Sibir. Reis.*,
p. 141; *Sundev. Sv. Fogl.*, p. 188, pl. xxiv, fig. 4.
Bubo microcephalus, *Leack. Syst. Cat. Mamm. &c. Brit. Mus.*,
p. 11 (1816); *Steph. Gen. Zool.*, xiii, pt. 2, p. 55.
B. ignavus, *Forster. Syn. Cat. Brit. B.*, p. 3; *Newt. ed Yarr. Brit. B.*, i. p. 168; *Shelley. B. Egypte*, p. 180; *Dresser. B. Eur.*, part xxii. *Sharpe. Cat. Brit. Mus.*, 2 p. 14 (1875).
B. maximus, *Fleming. Brit. An.*, p. 57; *Gould. B. Eur.*, i.
pl. 37; *Bp. Comp. List B. Eur. & N. Am.*, p. 6; *Macgill. Brit. B.*, iii. p. 228; *Gray. Gen. B.*, i. p. 37; *Kaup. Tr. Z. S.*, iv. p. 239, et *Contr. Orn.*, 1852, p. 116; *Horsf. & Moore. Cat. B. Mus. E. I. Co.*, i. p. 72; *Strickl. Orn. Syn.*, p. 212; *Hewits. Eggs. Br. B.*, i. p. 50, pl. xvii, fig. 4; *Fritsch. Vög. Eur.*, tab. 12, fig. 5; *Jaub. & Barth. Lapom. Rich. Orn.*, p. 80; *Schil. Mus. P.-B. Oti.*, p. 7; *Newt. Ooth. Wolley*, p. 100; *Degl. & Gerbe. Orn. Eur.*, i. p. 141; *Loche. Expl. Sci. d'Algér. Ois.*, p. 100; *Gray. Hand-l. B.*, i. p. 43; *Heugl. Orn. N. O.-Afr.*, i. p. 110; *Gould. B. Gt. Br.*, pl. xxx.; *Hume. Rough. Notes*, iii. p. 374; *Bettoni. Ucc. Lomb.*, i. tav. 107; *Salvad. Faun. Ital. Ucc.*, p. 32.
B. germanicus, *Brehm. Vög. Deutschl.*, p. 119, septentrionalis, *id.*
id., p. 120.
B. europaeus, *Less. Traité*, p. 115, pl. 17, fig. 1.
Asio bubo, *Swains. Classif. B.*, ii. p. 287.
Otus bubo, *Schl. Rev. Crit.*, p. xiii.
B. atheniensis, *Bp. Conspl.*, i. p. 48; *Taczan. J. f. O.*, 1860,
p. 39.
B. grandis, *Brehm. J. f. O.*, 1853, p. 346.
B. bubo, *Licht. Nomencl. Av.*, p. 7.
B. melanotus, *Brehm. Naum.*, 1855, p. 270.
Hab., Europa, Asia, China, Himalaya, Africa.

2. **B. philippensis.** *Schl. & N. v. Cuago Cul-lalao.* M. S. T.)

- Scops philippensis*; *Gray. Cat. Accipitr.* 1844, p. 45.
Syrnium philippens; *Gray. Cat. Accipitr.* 1848, p. 105; *Bp. Conspl.*, i. p. 52; *Strickl. Orn. Syn.*, p. 191.
Pseudoptynx philippensis, *Kaup. Cantr. Orn.* 1852, p. 117; *id. Tr. Z. S.* iv. p. 244; *Walden. Tr. Z. S.* ix. p. 144, pl. xxv, fig. 2.
Bubo philippensis, *Schl. Mus. P.-B. Oti.*, p. 14; *id. Dierent.*, p. 10, fig. 3; *Wall. Ibis*, 1808, p. 25; *Gray. Hand-l. B.*, i. p. 45; *Sharpe. Cat. Mus.*, 2 p. 43 (1875).
Hab., Luzon, Laguna, Pampanga, Cagayan, Bulacan, Ilocos-Norte.

3. **B. gurneyi**, *Tw. N. v. Cuago.* M. S. T.)

- Pseudoptynx gurneyi*, *Tw. Works.*, p. 632 (1881); *P. Z. S.* 1878,
p. 941.
Hab., Mindanao, Zamboanga, Paragua.

2. Gén. SCOPS, SAVIG.

4. **S. megalotis**, Gray. ♂ N. v. Cuago.

(M. S. T.)

- Scops megalotis, Gray, Cat. Accipitr. 1844, p. 45; Strickl. Orn. Syn. p. 202; Gray, Hand-l. B. i. p. 46. Sharp. Cat. Brit. Mus. p. 69, 2 (1873).
Ephialtes megalotis, Gray, Cat. Accipitr. 1848, p. 98; Bp. Conspl. i. p. 45.
Ptilopsis megalotis, Bp. Rev. et Mag. de Zool. 1854, p. 543.
Lempijus megalotis, Walden, Tr. Z. S. ix. p. 145, pl. xxv, fig. 3.
Hab. Luzon, Manila, Bulacan.

5. **S. lempiji**, (Horsf.) ♂ N. v. Cuago.

(M. S. T.)

- Strix lempiji, Horsf. Tr. Linn. Soc. xiii. p. 140.
St. noctula, Temm. Pl. Col. ii. pl. 99. ex Reimw.
Scops noctula, Steph. Gen. Zool. xlvi. pt. 2, p. 52; Schl. Mus. P.-B. Oti, p. 24.
Sc. javanicus, Less. Traité, p. 107; Pucher. Rav. et Mag. de Zool. 1849, p. 26.
Sc. lempiji, Blyth, J. A. S. B. xv. pt. 1, p. 182; id. Cat. B. Mus. A. S. B. p. 36; Bp. Conspl. i. p. 47; Strickl. Orn. Syn. p. 200; Gray, Hand-l. B. i. p. 46; Schl. Mus. P.-B. Revue Accipitr. p. 13; Salvad. Ucc. Bornz., p. 19 (1874); Sharpe, Cat. Brit. Mus. 2 p. 91 (1875).
Megascops lempiji, Kaup, Cont. Orn. 1852, p. 112; id. Tr. Z. S. iv. p. 229.
Lempijus indicus, Bp. Rev. et Mag. de Zool. 1854, p. 543.
L. noctula, Bp. Rev. et Mag. de Zool. 1854, p. 543.
L. lempiji, G. R. Gray, Hand-l. i. p. 46 esp. 471 (1869).
Ephialtes lempiji, Gray, Gen. B. i. p. 38; Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. i. p. 71. Wall. Ibis, 1868, p. 24. Hume, Str. F. ii. p. 469.
Hab. Samar, Borongan, Paragon; Borneo, Java, Sumatra.

6. **S. rufescens**, Horsf. ♂ N. v. Cuago.

(M. S. T.)

- Strix rufescens, Horsf. Tr. Linn. Soc. xiii. p. 140.
Scops rufescens, Sw. Classif. B. ii. p. 217; Blyth, J. A. S. B. xiv. p. 181; Strickl. Orn. Syn. p. 201; Gray, Hand-l. B. i. p. 49; Schl. Mus. P.-B. Revue Accipitr. p. 10; Salvad. Ucc. Born. p. 19 (1874); Sharpe, Cat. Brit. Mus. 2 p. 102 (1875).
Otus mantis, Temm. & Schl. Faun. Jap. Alves, p. 25.
Ephialtes mantis, Gray, Gen. B. i. p. 38; Wall. Ibis, 1868, p. 24.
Scops mantis, Strickl. Orn. Syn. p. 201; Schl. Mus. P.-B. Oti, p. 25; Gray, Hand-l. B. i. p. 46.
Ephialtes rufescens, Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. i. p. 71.
Lempijus mantis, Bp. Rev. et Mag. de Zool. 4854, p. 543.
Hab. Samar, Basilan, Mindanao, Joló; Borneo.

7. **S. everetti**, *Tro. C.* N. v. Cuajao.

(M. S. T.)

Works, p. 633 (1881).

Hab. Samar, Basílan, Mindanao, Zamboanga.

8. **S. asio**, (*Linn.*) *C.* N. v. Peq duque de la Carolina.

(M. S. T.)

- The Little Owl, *Catesby*, *N. H. Carol.* i. p. 7, pl. 7.
Le Petit Duc, d' la Caroline, *Briss. Orn.* i. p. 497.
Strix asio, *Linn. S. N.* i. p. 132; *Wils. Am. Orn.* vi. pl. 42,
fig. 13; *Temm. Pl. Col.* ii. pl. 80; *Audub. B. Am.* pl. xvii.;
id. Orn. Biogr. i. p. 486.
Red Owl, *Penn. Arctic Zool.* ii. p. 231, pl. xi, fig. 1.
Mottled Owl, *Penn. t. c.* p. 231, pl. xi, fig. 2.
Strix navia, *Gm. S. N.* i. p. 286 (ex *Penn.*); *Wils. Am. Orn.*
pl. xiv, fig. 1.
Bubo asio, *Vieill. Ois. d' Am. Sept.* p. 53, pl. 21.
B. striatus, *Vieill. t. c.* p. 54.
Otus asio, *Steph. Gen. Zool.* xiii. pt. 2, p. 57; *Schl. Faun. Jap.*
p. 25.
Asio asio, *Less. Man. d' Orn.* i. p. 187.
Otus navius, *Cuv. Règne Anim.* 1829, p. 241.
Surnia navia, *James. ed. Wils. Am. Orn.* i. p. 96.
Ephialtes asio, *Gray. Gen. B.* i. p. 38.
Scops asio, *Bp. Consip.* i. p. 45; *Knöp. Contr. Orn.* 1852,
p. 112; *Strickl. Orn. Syn.* p. 199; *Ciss. B. N. Am.* p. 51;
Schl. Mus. P.-B. Oti. p. 27; *Gray. Hand-l. B.* i. p. 46; *Schl. Revue Accipitr.* p. 9; *Ridge. B. N. Am.* iii. p. 49; *Cunes.*
B. N. H. p. 303. *Sharpe. Cat. Brit. Mus.* 2. p. 114 (1855).
Megascops asio, *Knöp. Tr. Z. S.* iv. p. 228.
Asio navaia, *Bp. Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 543.
Hab. Estados Unidos, Canadá.

3. Gén. CARINE, KAUP.

9. **C. noctua**, (*Sav.*) ♂♀ Pequeño mochuelo

(M. S. T.)

- Little Owl, *Edwards.*, *Gleanings*, pl. 228.
La Petite Chouette ou La Chevêche, *Briss. Orn.* i. p. 514.
Strix noctua, *Scop. Ann.* i. p. 22; *Naum. Vog. Deutschl.* i. p.
493, pl. 48, fig. 1; *Schl. u. Susem. Vog. Eur.* Taf. 47, fig. 1, 2;
Nordm. in Dicmid. Voy. Russ. Mérid. iii. p. 100; *Bailly. Orn.*
Sav. i. p. 194; *Keulem. Onze Vogels*, pl. 1.
La Chevêche, *Buff. Pl. Ent.* pl. 439.
S. passerina, *Gm. S. N.* i. p. 296; *Temm. Man. d' Orn.* i. p. 92;
Roux. Orn. Prov. i. p. 78, pl. 53; *Werner. Alitas. Rapaces*,
pl. 39; *Yarr. Brit. B.* i. p. 142.
S. psilolactyla, *Nilss. Skind. Faun. 1st. ed.* p. 88.
S. nudipes, *Nilss. Orn. Suec.* i. p. 68.
Athene passerina, *Boie. Isis.* 1822, p. 549; *Brehm. Vog. Deutschl.*
p. 110.
Carine noctua, *Knöp. Natürl. Syst.* p. 29; *Newt. et. Yarr. Br.*.

- B. i. p. 178; Irby, *B. Gibr.* p. 58; Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 258.
id. Cat. Brit. Mus. p. 133 (1875).
Noctua passerina, Cuv. *Régn. An.* i. p. 345; Less. *Traité d'Orn.* p. 103; Selby, *Ill. Brit. Orn.* i. p. 107, pl. 26; Stevenson, *B. Norf.* i. p. 59.
Surnia Noctua, Bp. *Oss. Regn. Anim. Cuv.* p. 48; Keys. n. *Blas. Würb. Eur.* p. xxxii; Borger, *Vogelf. Norddeutschl.* p. 64.
Scotophilus nudipes, Jard. *Brit. B.* i. p. 274.
Noctua nudipes, Gould, *B. Eur.* i. pl. 48; Hewits. *Eggs Br. B.* i. p. 67, pl. xix, fig. 3.
Athene noctua, Bp. *Comp. List. B. Eur. & N. Am.* p. 6; Gray, *Gen. B.* i. p. 34; Bp. *Consp.* i. p. 39; Kaup, *Contr. Orn.* 1852, p. 115, et *Tr. Z. S.* iv. p. 210; Schlt. *Vög. Nederl.* pl. 43; Strickl. *Orn. Syr.* p. 139; Fritsch, *Vög. Eur.* tab. 11, fig. 2; Jaub. et Barth. *Lapom. Rich. Orn.* p. 77; Newt. *Ooth. Wölley*, p. 151; Gould, *B. Gt. Br.* pl. xxxvii.; Gray, *Hand-l. B.* i. p. 39; Salvad. *Faun. Ital. Ucc.* p. 29; Sharpe & Dresser, *B. Eur.* part. iv.
Syrtia psilodactyla, Macgill. *Brit. B.* iii. p. 417.
Athene psilodactyla, indigen., Brehm, *Naum.* 1855, p. 270.
Noctua veterum, Schlt. *Mus. P.-B.* Striges p. 28; *id. Revue Accipitr.* p. 26,
Noctua minor, Degl. & Gerbe, *Orn. Eur.* i. p. 122
Hab. Europa, Francia, España, Alemania.

4. Gén. NINOX, HODGS.

10. **N. lugubris**, Tich. ♂ N. v. Caruung.

(M. S. T.)

- Strix lugubris*, Tickell, *J. A. S. B.* ii. p. 573.
Ninox nipalensis, Hodgs. *Madr. Journ.* v. p. 24, pl. 14.
Otus lugubris, Jerd. *Madr. Journ.* x. p. 7.
Ninox lugubris, Blyth, *Ann. N. H.* xii. pp. 93, 231; Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 258. *id. Cat. B.* 2. p. 154 (1874).
Ninox jeridius, Hods. in Gray's *Zool. Misc.* p. 82.
Ninox scutellatus, Blyth, *J. A. S. B.* xvi. p. 518; Jerd. *B. Ind.* i. p. 147; Hume, *Rough Notes*, ii. p. 420.
Athene hirsuta, Bonap. *Consp.* i. p. 41.
Ninox madagascariensis, Bonap. *Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 543; Hartl. *Faun. Madag.* p. 22; Gurney, *Ibis*, 1879, p. 453.
Noctua hirsuta, Schlt. *Mus. P.-B.* Striges, p. 25.
Athene lugubris, Gray, *Hand-l. B.* i. p. 41.
Athene Madagascariensis, Gray, *Hand-l. B.* i. p. 42.
Hab. Luzón, Guimarás, Sínar, Paragua, P. Princesa, Basílan, Mindanao; India Himalaya, Malabar.

11. **N. paraguanaensis**, ♂ N. v. Guague.

(M. S. T.)

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

12. **N. philippinensis**, ♂ N. v. Cuago.

(M. S. T.)

- Ninox philippensis*, Bp. *C. R.* xli. p. 654; Walden, *Tr. Z. S.* p. 144, pl. xxv, fig. 1. Sharpe, *Cat. Brit. B.* 2. p. 167 (1875).

Noctua hirsuta philippinensis, *Schl. Mus. P.-B.* Striges, p. 26.
Athene philippensis, *Wall. Ibis*, 1868, p. 22; *Gray, Handl. B.*
i. p. 42.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Bulacan, Marinduque, Siquijor,
Samar, Negros, Guimaras.

13. **N. scutulata.** (*Raff.*) ♂ N. v. Balimpasayo. (M. S. T.)

Strix scutulata, *Raffl. Tr. Linn. Soc.* xiii. p. (280).
Strix hirsuta, *Temm. Pl. Col.* i, pl. 289 (1824).
Noctua hirsuta, *Steph. Hen. Zool.* xiii. pt. 2, p. 66.
Surnia hirsuta, *Less. Man. d'Orn.* i. p. 110.
Athene malaccensis, *Eyton, Ann. N. H.* xvi. p. 228.
Athene scutulata, *Gray. Gen. B.* i. p. 35; *Kelaart, Prodr. Faun.*
Zeyl. p. 28; *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 68;
Strickl. Orn. Syn. p. 170; *Wall. Ibis*, 1868, p. 22.
Strix hirsuta japonica, *Schl. Faun. Jap. Aves.* p. 29, pl. 9 B.
Athene hirsuta, *Bp. Conspl.* i. p. 41; *Gray, Handl. B.* i. p. 41;
Pelz. Voy. Novara, Aves. p. 26.
Athene japonica, *Bp. Conspl.* i. p. 41; *Gray, Handl. B.* i. p. 42.
A. borneensis, *Bp. Conspl.* i. p. 41; *Gray, Handl. B.* i. p. 42; *Pelz.*
Voy. Novara, Vog. p. 26, *Wall. Ibs.* 1868, p. 22.
Ctenoglaux scutellatus, *Kaup, Contr. Orn.* 1852, p. 109; et *Tr.*
Z. S. iv. p. 219.
Ninox japonicus, *Bp. Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 543; *Walden,*
Tr. Z. S. viii. p. 40; *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 343;
Sharpe, Ibis, 1875, p. 259.
Ninox hirsutus, *Bp. Rev. et Mag. d' Zool.* 1864, p. 543; *Holdsw.*
P. Z. S. 1873, p. 418; *Hume, Str. F.* 1874, pp. 151, 469, et
1875, p. 441.
Ninox bornensis, *Bp. Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 543; *Walden,*
Ibis, 1872, p. 18; *Salvad. Ucc. Born.* p. 18.
Noctua hirsuta japonica, *Schl. Mus. P.-B.* Striges, p. 24.
N. hirsuta borneensis, *Schl. t. c.* p. 24.
Athene florensis, *Wall. P. Z. S.* 1873, p. 488; *id. Ibis*, 1868,
p. 23; *Gray, Handl. B.* i. p. 48.
Noctua hirsuta minor, *Schl. Mus. P.-B. Revue Accipitr.* p. 25
Ninox scutulata, *Sharpe, Cat. Brit. Mus.* 2. p. 156 (1875).
Hab. Luzón, Paragua, Mindanao, Basilan; India, China, Malaca.

14. **N. spilocephalus.** (*Steere*) N. v. Bucao. (M. S. T.)

Hab. Paragua, Basilan, Mindanao.

Subfam. SIRNINAS.

1. Gén. SYRNIUM, SAV.

1. **S. leptogrammicum.** (*Temm.*) ♀ N. v. Caigo. (M. S. T.)

Strix leptogrammica, *Temm. Pl. Col.* ii. pl. 525.
Syrnium leptogrammicum, *Gray, Gen. B.* iii. App. p. 3; *Strickl.*
Orn. Syn. p. 193; *Handl. B.* i. p. 49. *Sharpe, Cat. B. Mus.*
2 p. 264 (1875).

Ciccaba leptogrammica, *Bp. Conspl.* i. p. 44; *Kaup, Tr. Z. S.* iv. p. 255; *Wall. Ibis*, 1868, p. 26; *Salvad. Ucc. Born.* p. 21. Bulaca leptogrammica, *Kaup, Contr. Orn.* 1852, p. 130. Myrtha leptogrammica, *Bp. Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 541. Ulula leptogrammica, *Schl. Mus. P.-B. Striges*, p. 20, et *Revue Accipitr.* p. 21.
Hab. Paragua; Borneo.

2. *S. sinense*, (*Lath.*) N. v. Cuago

(M. S. T.)

China Owl, *Lath. Gen. Syn. Suppl.* ii. Add. p. 368. *Strix sinensis*, *Lath. Ind. Orn. Suppl.* p. xvi. *S. orientalis*, *Shaw, Gen. Zool.* vii. p. 257 (*ex Lath.*). *S. seloputo*, *Horsf. Tr. Linn. Soc.* xiii. p. 340; *Less. Man.* i. p. 109. *Strix pagodarum*, *Temm. Pl. Col.* i. pl. 230. *Noctua pagodarum*, *Steph. Gen. Zool.* xiii. pt. 2, p. 65. *Ulula pagodarum*, *Less. Man. d'Orn.* i. p. 113. *Syrnium pagodarum*, *Cuvier, Régne An.* i. p. 343. *Bulaca sinensis*, *Jerd. Madr. Journ.* x. p. 88; *Hume, Rough Notes*, ii. p. 357. *Syrnium seloputo*, *Gray, Gen. B.* i. p. 39; *Cass. Cat. Strigidae Philad. Mus.* p. 6; *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 84; *Strickl. Orn. Syn.* p. 191; *Gray, Hand-l. B.* i. p. 49. *Bulaca seloputo*, *Kaup, Contr. Orn.* 1852, p. 122. *Ciccaba pagodarum*, *Bp. Conspl.* i. p. 44. *Myrtha pagodarum*, *Bp. Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 541. *Ciccaba seloputo*, *Kaup, Tr. Z. S.* iv. p. 254; *Wall. Ibis*, 1868, p. 26; *Salvad. Ucc. Born.* p. 21. *Ulula seloputo*, *Schl. Mus. P.-B. Striges*, p. 22. *Syrnium sinense*, *Sharpe, Cat. B. Mus.* 2, 261 (1875).
Hab. Luzon; Java, Cochinchina.

Fam. EXTRÍGIDAS.

1. Gén. STRIX LIN.

1. *S. flammea*, Lin. N. v. Cuago, Puec.

(M. S. T.)

The Common Born-Owl or White Owl, *Albin. N. H. Birds*, ii. pl. xi. Le petit Chat-huant, *Briss. Orn.* i. p. 503. *Strix flammea*, *Linn. S. N.* i. p. 133; *Meyer u. Wolf, Vög. Deutschl.* pl. 10 p. 185; *Wils. Am. Orn.* vi. p. 51, pl. 58, fig. 2; *Vieill. Faun. Franc.* pl. 22, fig. 1; *Temm. Mau. d'Orn.* i. p. 91; *Max. Reis. Bras.* ii. 1821, p. 265; *Naum. Vög. Deutschl.* i. p. 483, pl. 47, fig. 2; *Roux, Orn. Prov.* pls. 54, 55; *Werner, Atlas, Rapaces*, pl. 36; *Brehm, Vög. Deutschl.* p. 186; *Less. Traité*, p. 112; *Audub. B. Amer.* pl. cxxi.; *id. Orn. Biogr.* ii. p. 483; *Gould, B. Eur.* i. pl. 36; *Schl. u. Susem. Vög. Eur.* Taf. 46; *Macgill. Brit. B.* iii. p. 473; *Nordin. in Démid. Voy Russie Mérid.* iii. p. 118; *Pears. J. A. S. B.* x. p. 638; *Darw. Voy. Beagle, Birds*, p. 34; *Yarr. Brit. B.* i. p. 127; *Gray, Gen. B.* i. p. 41, pl. 15, fig. 1; *Thomps. B. Irel.* i. p. 92; *Blyth, Cat B. Mus. A. S. B.* p. 41; *Bp. Conspl.* i. p. 55; *Kaup, Contr. Orn.* 1852, p. 118; *Horsf. &*

- Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. i. p. 44; Hartl, Orn. Westaf. p. 21; Schl. Vög. Nederl. pl. 41; Strickl. Orn. Syn. p. 178; Hewits. Eggs Brit. B. i. p. 61, pl. xxii. fig. 1; Swinh. No. Fogt. p. 131, pl. lxxi. fig. 1; Fritsch, Vög. Eur. tab. ii. fig. 4; Jaub. & Barth.-Lap. Rich. Orn. p. 80; Gould, B. G. Br. i. pl. xxviii; Schl. Mus. P.-B. Striges, p. 1; Newt. Ost. Wall. Ibis, 1864, p. 387; Pelz. Reis. Nov. Vög. p. 29; Degl. & Gerbe, Orn. Eur. i. p. 133; Loch. Esq. Sci. Alger. Ois. i. p. 91; Sch. & Poll. Faun. Madag. Ois. p. 48; Gray, Handb. B. i. p. 52; Hengl. Orn. N. O.-Afr. i. p. 124; Allen, Bull. Am. Coll. ii. p. 341; Gedman, Azores, p. 22; Finsch & Hartl. Vög. Ostafr. p. 111; Bard. ed. Cooper's B. Calif. p. 415; Salvad. Faun. Ital. Ucc. p. 27; Pelz. Orn. Bras. pp. 18, 488; Sel. & Salv. Nomen. Av. Nov. p. 116; Sharpe, ed Layard, B. S. Afr. p. 82; id. Cat. B. M. 2 p. 291 (1875).
- Strix aiba, Scop. Ann. i. p. 2.
- L'Effraye ou La Fresaye, Buff. i. pl. 448.
- Strix javanica, Gm. S. N. i. p. 295; Jerd. Madr. Journ. x. p. 85; Gray, Gen. B. i. p. 41, pl. 15; Blyth, J. A. S. B. xii. p. 513; Bp. Conspl. i. p. 55; Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. i. p. 82; Strickl. Orn. Syn. p. 188; Jerd. B. Ind. i. p. 117; Wall. Ibis, 1868, p. 26; Gray, Handb. B. i. p. 52; Salvad. Ucc. Born. p. 22; Hume, Nests & Eggs Ind. B. p. 56.
- Lechuza, Azara, Apunt. ii. p. 210; Hartl. Ind. Azara. p. 2.
- Strix perlata, Lichl. Verz. Doubl. p. 50; Max. Beitr. iii. p. 203; D'Orb. Voy. Amér. Mér. Ois. p. 135; Gray, Gen. B. i. p. 41; Schomb. Reis. Guian. iii. p. 732; Gray, Cat. Accipitr. 1848, p. 109; Cass. Cat. Strigidae Philad. Mus. p. 1; Bp. Conspl. i. p. 55; Kaup, Contr. Orn. 1852, p. 119; id. Tr. Z. S. iv. p. 247; Strickl. Orn. Syn. p. 180; Burm. Th. Bras. ii. p. 137; id. Reis. La Plata-St. ii. p. 448; Gray, Handb. B. i. p. 52; Muco flammeus, Fleming, Brit. An. i. p. 157; Newt. ed. Tars. Brit. B. i. p. 194; Shelley, B. Egypt. p. 176.
- Strix furcata, Temm. Pl. Col. i. pl. 432; D'Orb. in De la Segras H. N. Cuba, Ois. p. 34; Gudtl. J. f. O. 1871, p. 377.
- S. guttata, Brehm, Vög. Deutschl. p. 106.
- Ulula flammeca, James, ed Wils. Am. Oru. ii. p. 264.
- S. delicatula, Gould, P. S. 1836, p. 140; id. Synops. B. Austral. pt. 3, pl. 50, fig. 1; id. B. Austr. i. pl. 31; Sparr, Exp. C. Austr. App. p. 17; Bp. Conspl. i. p. 54; Kaup, Contr. Orn. 1852, p. 119; id. Tr. Z. S. iv. p. 247; Strickl. Orn. Syn. p. 180; Cass. U. S. Expl. Exp. 1858, p. 105; Gray, B. Trop. Isl. p. 3; Verr. Rev. et Mag. de Zool. 1860, p. 421; Gould, Handb. B. Austr. i. p. 66; Gray, Haad-L. B. i. p. 52; Finsch & Hartl. Vög. Cent.-Polyn. p. 11.
- S. pratinacola, Bp. Conspl. List. B. Eur. & N. Amer. p. 7; De Kay, Zool. N. Y. Birds, p. 31, pl. 13, fig. 28; Gray, Gen. B. i. p. 41; Bp. Conspl. i. p. 55; Strickl. Orn. Syn. p. 179; Cass. B. Calif. p. 176; id. B. N. Amer. p. 47; Gray, Handb. B. i. p. 52.
- S. punctatissima, Gray in Darw. Zool. Bangla. Birds, p. 34, pl. 4; id. Gen. B. i. p. 41; Bp. Conspl. i. p. 55; Kaup, Contr. Orn. 1852, p. 118; id. Tr. Z. S. iv. p. 247; Strickl. Orn.

- Syn.* p. 182; *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 52; *Scl. & Salv. Nomencl.* p. 116.
S. poensis, *Fraser*, *P. Z. S.* 1848, p. 189; *Gray*, *Gen. B.* i. p. 41; *Strickl. Orn. Syn.* p. 182; *Hartt. Orn. Westasir.* p. 22; *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 52; *Gurney*, *in Anderss. B. Dam.* *Id.* p. 36.
Stridula flammea, *Selys-Longch. Faun. Belge*, p. 60.
Strix bakkamma, *Forts. Descr. An.* p. 157.
Eustrinx flammea, *Webb. & Berth. Orn. Canar.* p. 8.
Strix lulu, *Peale*, *U. S. Expl. Exp. Birds*, 1843, p. 74, pl. 21; *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 52.
S. pusilla, *Blyth*, *J. A. S. B.* xviii. p. 101.
Athene forsteri, *Bp. Conspl.* i. p. 42; *Gray*, *B. Trop. Isl. Pacif.* p. 2.
Strix glaucoptera, *Kaup*, *Contr. Orn.* 1852, p. 148; *id. Tr. Z. S.* iv. p. 246; *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 52; *Pelz. J. f. O.* 1872, p. 23.
S. forsteri, *Hartl. Arch. Naturg.* 1852, p. 30.
S. americana, *Brewer*, *ed Wils. Am. Orn.* p. 687.
S. africana, *Bp. Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 540; *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 52.
S. adspersa, *margaritata*, *maculata*, *splendens*, *vulgaris*, *obscura*, *paradoxa*, *kirschoffii*, *Brehm*, *Naum.* 1855, p. 270, et 1858, p. 215.
S. indica, *Blyth Ibis*, 1860, p. 251; *Hume*, *Rough Notes*, ii. p. 342; *Gould*, *B. Asia*, pt. xxiv.; *Holdsw. P. Z. S.* 1872, p. 445; *Hume*, *Str. F.* 1873, p. 163; et 1875, p. 36.
S. flammea americana, *Schl. Mus. P.-B. Striges*, p. 4, et *Revue Accipitr.* p. 16.
S. rosenbergi, *Schl. N. T. D.* iii. p. 181; *Walden*, *Ibis*, 1868, p. 62; *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 52; *Walden*, *Tr. Z. S.* viii. p. 41; *Schl. Mus. P.-B. Revue Accipitr.* p. 16.
S. affinis, *Layard*, *B. S. Afr.* p. 43.
S. insularis, *Pelz. J. f. O.* 1872, p. 23.
S. flammea, var. *americana*, *Coues. Key N.-Am. S.* p. 202; *id. B. N. W.* p. 298.
S. flammea, var. *guatimalae*, var. *fureata*, var. *pratincola*, var. *javanica*, var. *delicatula*, *Ridgw. N.-Am. B.* ii. p. 11.
Aluco delicatula, *Sharpe*, *ed Toy. Ereb. & Terr. Birds*, p. 22.
Hab. Luzón, Manila, Bulacán, Pampanga, Cagayan; Europa, Asia.

2. **S. candida** *Tick. ♂ N. v. Manonoctoc.* (M. S. T.)
Strix candida, *Tickell. J. A. S. B.* ii. p. 572; *Jerd. Ill. Ind. Orn.* pl. 30; *Bp. Conspl.* i. p. 55; *Kaup*, *Contr. Orn.* 1852, p. 119; *Strickl. Orn. Syn.* p. 181; *Jerd. B. Ind.* i. p. 118; *Schl. Mus. P.-B. Striges*, p. 6; *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 53; *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 344; *Gould*, *B. Asia*, part xxiv. *Sharpe*, *Cat. B.* 2. p. 308 (1875).
S. longimembris, *Jerdon*, *Madr. Journ.* x. p. 86; *Gray*, *Gen. B.* i. p. 41.
Glaux candida, *Blyth*, *J. A. S. B.* xix. p. 513; *Ball. Str. F.* 1874, p. 381; *Hume*, *Nests and Eggs Ind. B.* p. 60.
Gl. javanica, *Blyth*, *Cat. Mus. A. S. B.* p. 42.
Scelostrix candida, *Kaup*, *Tr. Z. k.* iv. p. 248; *Blyth. Ibis*, 1860, p. 251; *Hume*, *Rough Notes*, ii. p. 345; *Walden*, *Tr. Z. S.* ix. p. 145.

- S. amauronota, *Cab. J. f. O.* 1866, p. 9, et 1872, p. 316; *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 52.
S. pithecopus, *Swinh. Ibis*, 1866, pp. 396, 397; *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 53.
S. walleri, *Diggles, Orn. Austr.* pl.—; *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 52.
Hab. Luzón, Bulacán, Cagayan, Ilocos, Samar; China, Formosa, Australia, India.

2 Gén. PHODILUS GEORGE.

3. Ph badius, (*Horsf.*) ♂ ? N. v. Cul-laao (M. S. T.)
Strix badia, *Horsf. Zool. Research, Java*, pl. 37; *Temm. Pl. Col.* i. pl. 318; *Less. Traite*, p. 112.
Phodilus badius, *Isid. Geoff. St-Hil. Ann. Sc. xxi*. p. 201; *Gray*, *Gen. B.* i. p. 42, pl. 15, fig. 1; *Blyth, Cat. B. Mus. 2. S. B.* p. 41; *Bp. Conspl.* i. p. 55 *Kaup, Contr. Orn.* 1852, p. 118; *id. Tr. Z. S.* iv. p. 245; *Mottl. & Dillw. N. H. Labuan*, p. 8; *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 80; *Strickl. Orn. Syn.* p. 183; *Jerd. B. Ind.* i. p. 110; *Scl. P. Z. S.* 1863, p. 207; *Blyth, Ibis*, 1866, p. 251; *Wall. Ibis*, 1868, p. 26; *Gray Hand-l. B.* i. p. 52; *Gould, B. Asia*, pl. xxii.; *Walden, Ibis*, 1872, p. 365; *Hume, Rough Notes*, ii. p. 346; *id. Str. F.* 1873, p. 429; *Salvad. Ucc. Born.* p. 21; *Sharpe, Cat. B. Mus. 2.* 309 (1875).
Ulula badia, *Schl. Mus. P.-B. Striges*, p. 23.
Phodilus nipalensis, *Hume, Str. F.* 1875, p. 47*.
Hab. Luzón, Cagayan, Ilocos; Java, Borneo.

Orden 3º PÁJAROS.

Grupo: COLIOMORFOS.

Fam. CÓRVIDOS.

1. Gén. COLÆUS KAUP.

1. C. monedula, (*Lin.*) ♂ N. v. Cuervo. (M. S. T.)
Le Choucas, *Briss. Orn.* ii. p. 24.
Le Choucas à collier, *Briss.* t. c. p. 27.
Le Choucas blanc, *Briss.* t. c. p. 27 (*v.v.*).
Le Choucas noir, *Briss.* t. c. p. 28; *Montb. Pl. Ent.* iii. pl. 522.
Corvus monedula, *Linn. S. N.* i. p. 156; *Turm. Mann. d'Orn.* i. p. 111; *Naum. Vog. Deutschl.* ii. Taf. 56, fig. 1; *Roux. Orn. Prov.* pl. 133; *Werner. Atlas. Omnivores*, pl. vi.; *Gould, B. Eur.* iii. pl. 223; *Macgill. Br. B.* i. p. 552; *Yarr. Br. B.* ii. p. 102; *Gray, Gen. B.* ii. p. 315; *Schl. u. Susem. Vog. Eur.* ii. Taf. iv, fig. 1; *Nordm. in Décim. Voy. Russie Mérid.* iii. p. 120; *Schl. Bier. Nederl. Vog.* pl. xiii, fig. 6; *id. Vog. Nederl.* pl. 140; *Kjæb. Orn. Dan.* Taf. xi. fig. 1; *Schl. Bijdr.*

Dierk. Amsterd. folio, p. 15; Jav. et Birch. Lipomen. Rich. Orn. p. 95; Schrenck, Reis. Amurl. Zool. p. 324; Syst. Sv. Fogl. pl. xx. fig. 4; Linderm. Vog. Griechent. p. 69; Gould, B. Gt. Br. iii. pl. 61) Filippi, Viagg. Pers. p. 263; Degl. et Gerbe, Orn. Eur. i. p. 203; Schl. Mus. P.-B. Coraces, p. 33; Gray, Hand-l. ii. p. 13; Doderl. Avif. Sicil. p. 63; Salval. Faun. Ital. Ucc. p. 173; Hengl. Orn. N. O., Afr. p. 498; Shelley, B. Egypt, p. 160; Hume, Nests & Ind. B. p. 414; Irby, B. Gbr. p. 128; Dresser, B. Eur. part. xlvi.; Scutell., Str. F. 1876. p. 158; Blauf. East. Persia, p. 263.
La Grolle on Choucas gris, Mys. Pl. Enl. iii. p. 523.
Corvus spernolegus, Vieill. N. D'ct. d'Hist. Nat. viii. p. 40;
Gray, Gen. B. ii. p. 315. Schl. u. Susem. Vog. Eur. ii. Tat. 1. fig. 2.
Lycus monedula, Boie, Isis. 1822, p. 551; Bp. Cmsph. i. p. 384.
Coleus monedula, Kaup, Naturl. Syst. p. 114; Hrfs. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. ii. p. 562; Jord. B. Ind. ii. p. 302; Hume, Lahore Yark. p. 239; Sharpe, B. Mus. p. 25 (1877).
Monedula turrirostris, Brehm, Vog. Deutsch. p. 172; Lohr. Expl. Sei. Alg. i. p. 114.
M. arborea, septentrionalis, Brehm, t. c. p. 173.
M. nigra, Bp. Conspl. i. p. 384.
M. spermolegus, Brehm, Naum. 1855. p. 273.
Hab. Europa, España, Francia, África.

2. Gén. CORONE, KAUP.

2. *philippina*. (Bp.) ♂ ♀ N. v. Uac-uac. (M. S. T.)

Corvus philippinus, Bp. C. R. xxxvi. p. 830; Gray, Hand-l. B. ii. p. 12; Walden, Tr. Z. S. ix. p. 201.
Corvus solitarius, Ktll. Reis. Russ. Amer. Mikronesien, &c., ii. p. 431. (1858, desc. nullæ).
Corvus brevipennis, Schl. Bijdr. Dierk. Amsterd. fol p. 9, pl. i. fig. 8; id. Mus. P.-B. Coraces, p. 22.
Corone philippina, Sharpe, Cat. Brit. Mus. 3.º p. 42 (1877).
Hab. Luzón, Negros, Cuyo, Canigain, Ilollo, Zinboang, Surigao, Mindanao, Dumaguete, Leyte, Samar, Bohol, Bisilan, Paragua, Panay, Cebú, Panion, Dnagat, Joló.

3. C. *pusilla*. (T. &.) ♂ ♀ N. v. Ugac, Cuare (M. S. T.)

Corvus pusillus, T. & Z. S. 1878. p. 622; id. Works. p. 617 (1881).
Hab. Paragua, P. Princeesa, Canigiran.

3. Gén. CISSA, BOIE

4. *Cissa chinensis*, (Bodl.) ♂ N. v. Rollier de China. (M. S. T.)

Le Rollier de la Chine, Briss. Orn. ii. p. 77, pl. 6, fig. 2; Pl. Enl. 620.
Chinese Roller, Lath. Gen. Syn. i. p. 414.

- Coracias chinensis*, *Bodd.* *Tabl. Pl. Ent.* p. 38.
Corvus speciosus, *Shaw*, *Gen. Zool.* vii. p. 364.
Pica speciosa, *Wagler*, *Syst. Av.* *Pica*, sp. 30.
Corapica bengalensis, *Less.* *Traité*, p. 353.
Kitta venatoria, *Gray*, *Ill. Ind. Zool.* i. pl. 2; *Mc Clell. P. Z. S.* 1839, p. 164; *Blyth*, *J. A. B.* xii. p. 938; *Bp. Conspl.* i. p. 166.
Chlorisoma sinensis, *Swains.* *Classif. B.* ii. p. 231.
Cissa siensis, *Blyth*, *J. A. B.* S. xiii. p. 934; *Gray*, *Gen. B.* ii. p. 308; *id. Cat. Mamm. &c. Nepal*, *Hodgs.* p. 101; *Horsf. & Moore*, *Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii. p. 575; *Jerd.* *B. Ind.* ii. p. 312; *Schl. Mus. P.-B.* *Coraces*, p. 68; *Blyth.* & *Wald.* *Burm.* p. 89.
Cissa venatoria, *Blyth*, *J. A. S. B.* xv. p. 29; *id. Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 92; *Gould*, *B. Asia*, part. ix.
Kitta speciosa, *Bp. Conspl.* i. p. 166.
Citta sinensis, *Licht.* *Nomencl. Av.* p. 9.
Cissa speciosa, *Gray*, *Hand-l. B.* ii. p. 6; *Hume*, *Nests & Eggs Ind. B.* p. 421; *id. Str. F.* 1875, p. 146.
Cissa chinensis, *Sharpe*, *Cat. B. M. 3^o* p. 85 (1877).
Hab. Himalaya, Nepal, China, Filipinas?

4 Gén. XANTHOURA, Bp

5. *X. cyanocapilla*, (*Cab.*) ♂ N. v. (M. S. T.)

- Pica chloronotus*, *Wagler*, *Is's*, 1829, p. 749.
Cyanocorax cyanocapillus, *Cab.* in *Tschudi*, *Faun. Peruana*, p. 233, note; *Scl. & Salv. Nomencl. Av. Neotr.* p. 39.
Xanthoura guatemalensis, *Bp. Conspl.* i. p. 380.
Xanthocitta cyanocapilla, *Cab. Mus. Hem.* i. p. 223
Cyanocorax guatemalensis, *Scl. & Salv. Ibis*, 1859, p. 22; 1860, p. 113; *Scl. Cat Amer. B.* p. 144.
Cyanurus cyanocapillus, *Gray*, *Hand-l. B.* ii. p. 5.
Xanthoura incas, var. *guatemalensis*, *Baird*, *Brewer*, & *Rdgw.* *N.-Amer. B.* 295.
Xanthura cyanocapilla, *Sharpe*, *Cat. B. 3^o* p. 131 (1877).
Hab. Guatemala.

Fam. FARADISÉIDOS.

Subfam. EPIMAQUINOS.

1. Gén. SELEUCIDES LESS.

1. *S. niger*, (*Shaw*) ♂ ♀ N. v. *Paradisea nigra*. (M. S. T.)

- Le Manucode à douze filets, *Audeb. et Vieill. Ois. Dor.* ii. p. 29, pl. 13.
Le Nébouleux, *Levaill. Ois. de Parad.* i. pls. 16, 17.
Le Promérops multifil, *Levaill H. N. Promér. & Guép.* ql. 17.
Paradisea nigra, *Shaw*, *Gen. Zool.* vii. pt. 2, p. 488, pl. 60 (1809).
P. alba, *Blumnb. Abbild. nat. Gegenb.* pl. 90; *Schl. J. f. O.* 1861, p. 385.

- P. nigricans, *Shaw*, *t. c.* p. 480.
P. violacea, *Bechst.* *Kurze Uebers.* p. 133.
P. vaillanti, *Shaw*. & *Nodd.* *Mat. Misc.* xxiv, pl. 1025.
White-winged, Paradise-bird, *Lath. Gen. Hist.* iii, p. 197.
Twelve-wired Paradise-bird, *Lath. t. c.* p. 199; pl. 48.
Le Promérops à douze filets, *Vieill. Gal. Ois.* pl. 185.
Epimachus albus, *Wagler*, *Syst. Av.* 1827, *Epinachus*, sp. 9;
Gray. Gen. B. i. p. 94; *id. P. Z. S.* 1861, p. 433; *Wall.*
P. Z. S. 1862, p. 160; *Schl. Mus. P.-B.* *Coraces* p. 95; *Gray.*
Hand-l. B. i. p. 105.
Falcinellus resplendens, *Less. Traité*, p. 324.
Scleucides acanthylis, *Less. H. N. Ois. Parad.* pls. 36-38; *id.*
Syn. p. 29.
Nematophora alba, *Gray. List. Gen. B.* p. 12.
Selencides alba, *Bp. Conspl.* i. p. 412; *Wallace. Malay Archip.*
ii. p. 253; *Elliot. Monogr. Parad.* pl. xxii, *Salvad. Ann. Mus.*
Civit. Genov. vii. p. 785; *Baccari. t. c.* p. 713; *Sc. P. Z.*
S. 1876, p. 252.
S. resplendens, *Ros. J. f. O.* 1854, p. 123.
S. ignota, *Salvad. Ann. Mus. Civit. Genov.* ix. p. 191.
S. niger, *Sharpe. Cat. B. Mus. 3.* p. 159 (1877)
Hab. Nueva Guinéa.

Subfam. PARADISEINOS.

I. Gén. PARADISEA, LIN.

2. P. apoda, LIN. ♂♂ N. v. Gran paradisea.

(M. S. T.)

- The Greater Bird of Paradise, *E. Birds, Birds.* iii, pl. 110.
L'Oiseau de Paradis, *Briss. Orn.* ii p. 130, pl. xiii.
Paradisea apoda, *Lin. S. N.* i. p. 165; *Wagler. Syst. Av.* Pa-
radisea sp. 1; *Gray. Gen. B.* ii. p. 323; *Bp. Conspl.* i. p.
412; *Gray. P. Z. S.* 1851, p. 436, 1862, p. 435; *Wall. Ibis,*
1859, p. 111, 1861, p. 289; *Schl. J. f. O.* 1861, p. 384; *id. Mus.*
P.-B. *Coraces* p. 78; *Wall. Malay Arch.* ii. p. 238;
Rosenb. J. f. O. 1864, p. 42; *Gray. Hand-l. B.* ii. p. 16.
Elliot. Monogr. Parad. pl. 1; *Salvad. Ann. Mus. Civit. Genov.*
ix. p. 191 *Sharpe. Cat. B. M. 3.* p. 166 (1877).
L'Oiseau de Paradis des Moluques, *Buff. Pl. Enl.* p. 190; pl. 254.
L'Emeraude, *Audub.* et *Vieill. Ois. Dor.* ii. p. 9.
Le Grand oiseau de Paradis émeraude, *Levaill. H. N. Ois. Pa-*
rad. i. pls. 1-3.
Paradisea major, *Shaw. Gen. Zool.* vii. p. 480, pl. 58; *Less. Ois.*
Parad. Syn. p. 6; *id. H. N.* p. 155, pl. 6.
Paradisea apoda, var. wallaciana, *Gray. F. Z. S.* 1858, p. 181,
Hab. Islas Aru.

3 P sanguinea, Shaw. ♂♂ N. v Ave roja del Paraíso. (M. S. T.)

- L. Paradis rouge, *Audub.* & *Vieill. Ois. Dor.* ii. p. 14, pl. 3.
L'Oiseau de Paradis rouge, *Levaill. Ois. Parad.* i. pl. 6.
Paradisea sanguinea, *Shaw. Gen. Zool.* vii. p. 487, pl. 59; *Gray.*

Hand-l. B. ii. p. 16; *Elliott, Monogr. Parad.* pl. iv.; *Savard, Ann. Mus. Civic. Genov.* vii. p. 782. *Sharpe, Cat. B. M.* 3 p. 170 (1877).
Paradisea rubra, *Vieill. Gal. Ois.* i. p. 152, pl. 97; *Less. Voy. Coquille, Zool.* p. 66; pl. 27; *Wagler, Syst. Av. Paradisea* sp. 3; *Less. Traité* p. 336, pl. 3; *id. Ois. Parat. Syn.* p. 8; *id. Hist. Nat.* p. 169, pls. 7, 8; *Gray, Gen. B.* ii. p. 323; pl. 79; *Bp. Conspl.* i. p. 413; *Wall. Ibis*, 1859, p. 111; 1861, p. 287; *id. P. Z. S.* 1862, p. 160; *Schl. J. f. O.* 1861, p. 385; *id. N. T. D.* ii. p. 249; *it. Mus. P.-B. Coraces* p. 84. *Uranornis rubra*, *Savard, Ann. Mus. Civic. Genov.* ix. p. 191.
Hab. Moluccas, Batanta.

2. Gén. SEMIPTERA, GRAY.

4. **S. wallacii**, *Gray* ♂♂ N. v. *Paradisea de Wallace*. (M. S. T.)

Paradisea wallacii, *Gray, P. Z. S.* 1859, p. 130; *Schl. Mus. P.-B. Coraces*, p. 385.
Semiptera wallacii, *Wall. Ibis*, 1859, p. 210, note, 1860, p. 61; *Scl. Ibis*, 1860, p. 26, pl. 2; *Gray, P. Z. S.* 1859, p. 355; *Gould, B. Austr. Suppl.* pl. 3; *Rosenb. J. f. O.* 1864, p. 125; *Wall. Malay Arch.* ii. p. 17; *Elliott, Monogr. Parad.* pl. 18; *Savard, Ann. Mus. Civic. Genov.* vii. p. 785, ix. p. 191. *Sharpe, Cat. B. M.* 3 p. 178 (1877).
Epimachus wallacii, *Gray, Hand-l. B.* i. p. 105.
Hab. Batchian, Gilolo.

3. Gén. LOPHORHINA, VIEILL.

5. **L. superba**, (*Penn*) ♂♂ N. v. P. soberbia, 6 el Soberbio. (M. S. T.)

L'Oiseau de Paradis de la Nouvelle Guinée, dit le Superbe, *Briss. Orn.* iii. p. 169; *Buff. Pl. Ent.* iii. p. 197.
Paradisea superba, *Penn. in Forster Int. Zool.* p. 40; *Sav. Dl. Faun. et Flor. Insul.* ii. p. 88; *Gen. S. N.* i. p. 402; *Sav. Gen. Zool.* vii. p. 494, pls. 63-65; *id. & Nodl. Nat. Misc.* xxvi. pl. 1021; *Wagler, Syst. Av. Paradisea* sp. 5; *Wall. Ibis*, 1859, p. 111; *Schl. J. f. O.* 1861, p. 385.
Oiseau de Paradis à gorge violette, *Sonn. Voy. Nouv. Guin.* p. 157, pl. 96.
Superb Bird of Paradise, *Lath. Gen.* p. 479.
Paradisea atra, *Bodd. Tabl. Pl. Ent.* p. 38.
Le Superbe, *Audeb.* et *Vieill. Ois. Djr.* ii. pl. vii.; *Levaill. H. N. Ois. Parad.* i. pls. 14, 15.
Paradisea furcata, *Bechst. Kurze Uebers.* p. 132.
Lophorhina superba, *Vieill. N. Dct. d'Hst. Nat.* xviii. p. 184; *id. Gal. Ois.* p. 149, pl. xcix.; *Less. Traité*, p. 337; *id. Ois. Parad. Syn.* p. 12; *id. H. N. Ois. Parat.* pls. 13, 14; *Bp. Conspl.* i. p. 414; *Wall. Ibis*, 1851, p. 287, 1852, p. 100; *Savard, Ann. Mus. Civic. Genov.* ix. p. 191. *Sharpe, Cat. B. M.* 3 *Sharpe, Cat. B. M.* 3 p. 179 (1877).
Epimachus ater, *Schl. Mus. P.-B. Coraces*, p. 96, note.
Lophorhina atra, *Wall. Malay Arch.* ii. p. 249; *Elliott, Monogr.*

Parad. pl. 11; *Salvad. Ann. Mus. Civic. Genov.* vii. p. 783;
Buccari, t. c. p. 712; *Schl. Ibis*, 1876, p. 251.
Hab. Nueva Guinea.

4. PHONYGAMA, LESS.

6. **Fh keraudreni**, Less. ♂♀ N. v.

(M. S. T.)

Phonygama keraudreni, *Less. Voy. Coquille, Ois.* i. p. 636; *id. Man. d'Orn.* i. p. 141; *Gray, Gen. B.* ii. p. 303; *Bp. Conspl.* i. p. 368; *Rosenb. J. f. O.* 1864, p. 123. *Sharpe, Cat. B. M.* 3 p. 180 (1877).

Barita keraudreni, *Less. Voy. Coquille, Ois. atlas*, pl. 13.

Chalybeus cornutus, *Cnæ. Règn. Anim.* i. p. 354 (1829); *Gould in Voy. Rattler Snake*, iii. p. 357.

Phonygama lessonia, *Swains. Classif. B.* ii. p. 264.

Manucodia keraudreni, *Gray, P. Z. S.* 1859, p. 158, 1861, p. 436; *id. Handl. B.* ii. p. 17; *Elliot, Monogr. Parad.* pl. viii. *Salvad. Ann. Mus. Civic. Genov.* vii. p. 781; *id. op. cit.* ix. p. 189; *Sci. Ibis*, 1876, p. 252.

Chalybeus keraudreni, *Schl. Mus. P.-B. Coraces*, p. 120.

Hab. Nueva Guinea.

Fam. ORIÓLIDOS.

1. Gén. ORIOLUS, LIN.

1. **O philippensis**, Gray. N. v. Culiauan.

(M. S. T.)

O. philippensis, *J. E. Gray. Zool. Misc.* p. 3; *Bp. Conspl.* i. p. 346; *Gray, Handl. B.* i. p. 4. 321.; *Walden Tr. Z. S.* i. p. 186. Hab. Filipinas.

2. **O. unicolor**, ♂♂ N. v. Dulao.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona.

3. **O. aehrorhynchus**, Vigors. Lin. ♂♂ N. v. Culiauan. (M. S. T.)

Le Loriot de la Cochinchine, *Briss. Orn.* ii. p. 326, pl. 33 fig. 1. *Oriolus chinensis*, *Linn. S. N.* i. p. 160 (*ex Briss.*); *Gray, Gen. B.* i. p. 232; *Blyth, J. A. S. B.* xv. p. 46; *id. Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 215; *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 270; *Gray, Handl. B.* i. p. 292. *Sharpe, Cat. B. M.* 3 p. 293 (1877).

Le Couliava de la Cochinchine, *Montb. Pl. Ent.* 570.

Oriolus acerorhynchus, *Vigors, P. Z. S.* 1831, p. 97; *Gray & Mitch. Gen. B.* i. p. 232; pl. 58; *Bp. Conspl.* i. p. 348; *Schl. Mus. P.-B. Coraces*, p. 104, (pt.); *Walden & Layard, Ibis*, 1872, p. 101; *Hume, S. F.* 1875, p. 132.

Oriolus cochinchinensis, *Bp. Conspl.* i. p. 348.

Broderipus acerorhynchus, *Walden, Tr. Z. S.* ix. p. 185.

Hab. Luzón Guimarás, Negros, Cebú, Bohol, Balabac, Minla-

nao, Panay, Panaon, Leyte, Dinagat, Basilan, Jolo, Lapac, Sibutu, Mindoro, San Bernardino, Dumalon.

4. **O. steerii**, *Sharp.* ♂ ♀ N. v. Tangsit.

(M. S. T.)

Sharpe, Cat. B. M. 3 p. 213, lam. x. (1877).

Hab. Negros, Samar, Basilan, Paragua, P. Princesa.

5. **O. assimilis**, *Tw.* N. v. Tangsit.

(M. S. T.)

O. assimilis, *Tw. Works.* p. 534 (1881).

Hab. Cebú, Masbate.

6. **O. xanthonotus**, *Horsf.* ♂ ♀ N. v. Tangsit.

(M. S. T.)

Oriolus xanthonotus, *Horsf. Tr. Linn. Soc.* xiii. p. 153; *Temm. Pl. Col.* 214; *Horsf. Zool. Research. in Java, Birds*, pl. 12; *Wagl. Syst. Av.* *Oriolus*, sp. 9; *Gray, Gen. B.* i. p. 232; *Blyth, J. A. S. B.* xv. p. 49; *id. Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 346; *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 268; *Pelz. Reis. Novara, Vog.* pp. 75, 151; *Schl. Mus. P.-B. Coraces*, p. 109; *Gray, Hand-l. B.* i. p. 292; *Salvad. Ucc. Born.* p. 277. *Sharpe, Cat. B. M.* 3 p. 213. (1877).

Oriolus leucogaster, *Temm. Pl. Col.* 214 (texte, *ex Reinw. MS.*)

Oriolus castanopterus, *Blyth, J. A. S. B.* xi. p. 796; *Gray, Gen. B.* i. p. 232.

Xanthonotus leucogaster, *Bp. C. R.* xxxviii. p. 538.

Hab. Paragua.

7. **O. suluensis**, *Sharp.* N. v.

O. suluensis, *Sharpe, Cat. B. M.* 3 p. 205 (1877).

Hab. Joló.

8. **O. palawanensis**, *Tw.* ♂ N. v. Tangsit.

(M. S. T.)

Broderipus palawanensis, *Tw. Works.* p. 611 (1881).

Hab. Paragua.

9. **O. Samarensis**, *Steere.* ♂ N. v. Tangsit.

(M. S. T.)

Hab. Samar.

Fam. DICRURIDOS.

1. Gén. DICRURUS MIEILL.

1. **D. balicassius**, *Lin.* ♂ N. v. Balicasao.

(M. S. T.)

Le Choucas des Philippines, *Briss. Orn.* ii. p. 31, pl. 2, fig. 1; *Montb. Pl. Ent.* 603.

Corvus balicassius, *Linn. S. N.* i. p. 157 (*ex Briss.*).

Le Balicasse des Philippines, *Month. Hist. Nat. Cis.* iii. p. 83.

- Edolius furcatus, Wagl. Syst. Av. p. 322. *ex Linn.*
Edolius viridescens, Gould, P. Z. S. 1836, p. 6.
Dicerurus viridescens, Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B. p. 202, Ap. xxii.
Badicassius philippensis, Bp. C. R. xxxviii. p. 539.
Badicassius furcatus, Bp. t. c. p. 539.
Dicerurus balicassius, Gray, Hand-l. B. i. p. 284; Wald. Tr. Z. S. ix. p. 180, pl. xxxi. fig. 1. Sharpe, Cat. B. M. 3. p. 230 (1877).
Hab. Luzón, Manila, Cagayan, Ilocos, Paragua, Samar, Mindoro.

2. **D. mirabilis**, Wald. ♂♂ N. v. Balicasiao. (M. S. T.)

- D. mirabilis, Wald. et Lay. Ibis, 1872, p. 103, pl. 5; Wald. Tr. Z. S. ix. p. 181; Sharpe, Cat. B. M. 3. p. 231 (1877).
Hab. Negros, Cebú, Panay, Guimarás, Masbate.

3. **D. striatus**, Tw. ♂♂ N. v. Balicasiao. (M. S. T.)

- D. striatus, Tw. Works. p. 469 (1881).
Hab. Panaon, Leyte, Samar, Basilan, Mindanao.

4. **D. palawanensis**, Tw. ♂♂ N. v. Pasian-sian. (M. S. T.)

- Dicerurus palawanensis, Tw. Works. p. 619 (1881).
Hab. Paragua, P. Princesa.

2. Gén. BUCHANGA, Hodgs.

5. **B. cineracea**, (Horsf.) ♂♂ N. v. Tambibiligao. (M. S. T.)

- Edolius cineraceus, Horsf. Tr. Linn. Soc. xiii. p. 145.
Dicerurus leucophaeus, Gray, Gen. B. i. p. 287 (*nec V.*); Bp. Conspl. i. p. 352; Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. i. p. 155.
D. intermedius, Blyth. J. A. S. B. xv. p. 209; *id.* Cat. B. Mus. A. S. B. p. 203.
D. cinerascens, Gray, Gen. B. i. p. 187.
D. cinaraceus, Bp. Conspl. i. p. 352; Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. i. p. 155.
Buchanga wallacii, Walden. Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) v. p. 220.
B. mouhoti, Walden. Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) v. p. 220; Swinh. P. Z. S. 1870, p. 245; *id.* P. Z. S. 1871, p. 378.
Buchanga cineracea, Sharpe, Cat. B. M. 3. p. 250 (1877).
Hab. Paragua, P. Princesa; Java, Lombok, Pegu.

3. Gén. CHIBIA, Hodgs.

6. **Ch. pectoralis**, (Wall.) ♂♂ N. v. Tambibiligao. (M. S. T.)

- Dicerurus pectoralis, Wallace, P. Z. S. 1862, p. 335 y 342; Finsch. Neu-Guinea, p. 170; Gray, Hand-l. B. i. p. 285.

Chuvia pectoralis, Sharpe, Cat. R. M. 3. p. 240 (1877); Guitt.
Voy. Marchesa, p. 259, 1885.
Bh. borneensis, Sharpe, P. Z. S. 1879, p. 246.
Hab. Maimbun y Parang, Joló.

Grupo: CICLOMORFOS.

Fam. CAMPEFÁGIDOS.

1. Gen. ARTAMIDES, HARTL.

1. *A. sumatrensis*, (S. Müll.) ♂ N. v. Babuy-babuyan. (M. S. T.)
Ceblepyris novæ-guineæ, S. Muller, Verh. Naturl. Geschied. Landen Volkenk., p. 190 (nec Gm.).
C. sumatrensis, S. Müll. t. c. p. 190.
Graucalus fasciatus, Bp. Conspl. i. p. 354 (nec V.); Jerd. B. Ind. i. p. 418; p. 218; p. 444; Sclat. P. Z. S. p. 218, 1863; Hartl. J. f. O. 1864, p. 444.
G. concretus, Hartl. J. f. O. 1864, p. 445; Walden, Ibis, 1872, p. 371.
Campephaga sumatrensis, Gray, Hand-l. B. i. p. 337, n. 5077.
C. concreta, Gray, t. c. p. 337, n.º 5089.
Graucalus sumatrensis, Salzad. Ucc. Bern. p. 150; Tweedd. Ibis. 1877, p. 312; Sharpe, Tr. Linn. Soc. new series, vol. i. p. 323; Tweedd. P. Z. S. 1878, p. 614.
Artamides sumatrensis, Sharpe, Cat. B. Mus. 4. p. 12. (1879).
Hab. Paragua, P. Princesa; Región Indo-Malaya, Malaca, Sumatra, Borneo.

2. *A. pollens*, Salv. N. v.

Graucalus pollens, Salv. An. Mus. Civ. Genov. 6. p. 75; id. P. Z. S. 1878 p. 87.
Artamides pollens, Sharpe, Cat. B. Mus. vol. 4. p. 13. (1879).
Hab. Joló, I. Lapac; Molucas.

3. *A. striatus*, (Bodd.) ♂ N. v. Balabang.

(M. S. T.)

Choucas de la Nouvelle Guinéé, Daubent., Pl. Enl. iii. pl. 626; Mouib. Hist. Nat. Ois. iii. p. 80.
New-Guinea Crow, Lath. Gen. Syn. i. pt. 1, p. 381.
Corvus striatus, Bodd. Tabl. Pl. Enl. p. 38. (ex Daubenton).
C. novæ guineæ, Gm. Syst. Nat. i. p. 371.
Coracina fasciata, Vieill. N. Dict. viii. p. 8.
Graucalus novæ guineæ, Cuvier. Regn. Anim. i. p. 341 (1817); Less. Man. d' Orn. i. p. 144.
Ceblepyris novæ guineæ, Temm. Man. d' Orn. i. p. lxxii; Rüpp. Mus. Senckenb. iii. p. 144.
C. plumbea, Wagler, Syst. Av. art. *Corvus*, App. sp. 44.
Graucalus lineatus, pt., Lesson, Traité, p. 349.
G. dussumieri, Lesson, tom. cit. p. 349; Jacq. et Pucher. Voy.

- Pôle sud*, *Zool.* iii. p. 65; *Pucher. Arch. du Mus.* vii. p. 303;
Blyth, J. A. S. B. xxx. p. 96.
Choucari de Dussumier, *Hombr. et Jacq. Voy. Pôle Sud, Atlas*,
pl. 8 fig. 1.
Camppephaga striata, *Gray, Gen. B.* i. p. 283; *id. Haud.-l. B.* i.
p. 337, n.^o 5076.
Grauculus lagunensis, *Bp. C. R.* xxviii. p. 540; *Blyth, J. A. S.*
B. xxx. p. 96; *Hartl. J. f. O.* 1874, p. 445.
Campephaga nova guineæ, *Gray, P. Z. S.* 1858, p. 193; *id. Cat.*
B. New Guinea, p. 58; *id. P. Z. S.* 1861, p. 435; *Finsch,*
Neu-Guinea, p. 171.
C. dussumieri, *Gray, Hand-l. B.* i. p. 336, no. 5070.
C. lagunensis, *Gray, tom cit.* p. 337, no. 5080.
Grauculus striatus, *Walden, Ibis*, 1873, p. 312; *id. Tr. Z. S.*
ix. p. 175, pl. xxx. fig. 1; *Sharpe, Tr. Linn. Soc.* new series,
i. p. 323; *Tweed. P. Z. S.* 1877, pp. 693, 759, 827, et 1878,
pp. 108, 283, 380.
Corvus papuensis, *Von. Kittl., Lütke, Vog. (Postels)*, iii. p. 32⁶
(nec *Gm.*, teste *Tweeddale*)
Artamides striatus, *Sharpe, Cat. B. M.* vol. 4. p. 18. (1879).
Hab. Luzón, Liguna, Calamán, Cagayan, Negros, Cebú, Pa-
naoa, San Bernardino, Leyte, Sinar, Mindanao, Zamboanga,
Paragua, Malamaui, Nipah, Pasanica, Basilan.

4. **A. mindorensis**, *Steere N. v.* Balicasiao. (M. S. T.)

Hab. Mindoro.

5. **A. mindanensis**, *Steere. ♂ ♀ N. v.* Balabang. (M. S. T.)

Hab. Samar, Mindanao.

6. **A. panayensis**, *Steere. N. v.*

Hab. Guimaras, Panáy, Masbate.

2 Gen. EDOLIISOMA, JACQ.

7. **E. cærulescens**, *Blyth. ♂ ♀ N. v.* Babuy-babuyan. (M. S. T.)

Ceblepyris ceruleascens, *Blyth, J. A. S. B.* 1842, p. 463, 1846,
p. 307; *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 191.

Campephaga cærulescens, *Gray, Gen. B.* i. p. 283; *Hartl. J. f.*
O. 1865, p. 157.

Ceblepyris aterrima, *Blith, Ibis*, 1860, p. 368.

Campephaga aterrima, *Gray, Hand-l. B.* i. p. 338, no. 5100
(*descr. nullæ*.)

Volvocivora cærulescens, *Walden, Tr. Z. S.* ix. p. 178, pl. xxx.
fig. 2; *Sharpe, Tr. Linn. Soc.* new series, vol. i. p. 351;
Tweed. P. Z. S. 1877, pp. 693, 759, et 1878, p. 283.

Edoliisoma cærulescens, *Sharpe, Cat. B. Mus.* vol. 4. p. 44. (1879).

Hab. Luzón, Manila, Cebú, Negros, Paragua, P. Princesa.

8. **E. mindanensis**, Temm. N. v.

Volvocivora mindanensis, *Tem. P. Z. S.* 1878, part. 4; *Sharpe, Cat. B. M.* 4, p. 470 (1879).
Hab. Mindanao, Basilan.

9. **E. panayensis**, Steere, N. v.

Hab. Guimaras, Panay.

3. Gen. **PERICROCOTUS**, Boie.

10. **P. igneus**, Blyth ♂ N. v. Simbag

(M. S. T.)

Pericrocotus igneus, *Blyth, J. A. S. B.* xv, p. 309; *id. Cat. B. Mus. A. B. B.* p. 193; *Bp. Conspl.* i, p. 356; *Verr. Rev. et Mag. de Zool.* 1867, p. 169; *Gray, Handl. B.* i, p. 335; *Swinh., P. Z. S.* 1871, p. 379; *Salvad. Ucc. Bern.* p. 144; *Sharpe, Str. F.* 1870, p. 209; *id. Tr. Linn. Soc. new ser.* i, p. 324; *id. Cat. B. Mus.* vol. 4, p. 78 (1879); *Hume, Str. F.* 1877, p. 190; *id. & Davison, Str. F.* 1878, p. 211.
P. min. tuis, *Strickl. Contr. Orn.* 1849, p. 94, pl. 31.
P. flagrans, *Bp. Conspl.* i, p. 357 (*tex* Boie, MS.); *Gray, Handl. B.* i, p. 335.
Hab. Paragua, P. Princesa, Inagauan; Borneo, Malaca, China.

11. **P. miniatus**, Temm. ♂ N. v Simbag

(M. S. T.)

Muscicapa miniata, *Temm. Pl. Col.* 156.

Pericrocotus miniatus, *F. Boie, Isis.* 1826, p. 972; *Gray, Gen. B.* i, p. 282; *Bp. Conspl.* i, p. 357; *Cab. Mus. Hein. Th.* i, p. 60; *Gray, Handl. B.* i, p. 336; *S. Sharpe, Str. F.* 1870, p. 210; *id. Cat. B. M.* 4, p. 80, 1879; *Hume, Str. F.* 1877, p. 192.

Acis miniata, *Lesson, Traité*, p. 388.

Phoenicoris miniata, *Jerd. Ill. Ind. Oru.* text to pl. xi.

Hab. Samar, Paragua, Java.

12. **P. cinereus**, Lafresn. N. v Simbag.

(M. S. T.)

Pericrocotus cinereus, *Lafresn. Rev. Zool.* viii, p. 94; *Bp. Conspl.* i, p. 357; *Schrenck, Reis. Amurl.* p. 381; *Radde, Reis. Sibir.* ii, p. 273; *Gould, B. Asia*, pt. ix.; *Gray, Handl. B.* i, p. 335, n. 5050; *Swinhoe, P. Z. S.* 1871, p. 378; *id. Ibis.* 1875, p. 116; *Dybowski, J. f. O.* 1875, p. 249; *Tacz. Bull. Zool. Soc. France*, i, p. 165; *Sharpe, Str. F.* 1876, p. 211; *Hume, Str. F.* 1877, pp. 174, 175; *Sharpe, Ibis.* 1877, p. 19; *id. Cat. B. M.* p. 83, 1879; *David & Oustalet, Ois. Cézine*, p. 137; *Hume & Davison, S. F.* 1878, p. 211.

P. modestus, *Strickl. P. Z. S.* 1846, p. 102; *Bp. Conspl.* i, p. 357 (*tex* Boie, MS. in *Mus. Lugd.*); *Gray, Handl. B.* i, p. 335, no. 5053.

Gliciphila luctuosus, *De Filippi, Mus. Mediol.* p. 31; *Salvad. Att. R. Accad. Torin.* 1868, p. 271.

Hab. Samar, Borneo, Sumatra, Malaca, China.

13. **P. marchesaæ**, Guitt. N. v.

(M. S. T.)

Pericrocotus marchesaæ, Guitt. *Voy. of. the Jacht «Marchesa»*.
Iam. 18 f. 1. 1885.

Hab. Joló, Maimbun.

14. **P. Leytensis**, Steere N. v.

Hab. Leyte.

4. Gen LALAGE, Boie.

15. **L. melanoleuca**, Blyth. ♂♂ N. v. Manlalangjis.

(M. S. T.)

Pseudolalage melanoleuca, Blyth. *J. A. S. B.* xxx. p. 97; *Walden, Tr. Z. S.* p. 178, pl. 29, fig. 2; Sharpe, *Tr. Linn. Soc.* new series, vol. i. p. 351.

P. melanictera, *Sclater, Ibis*, 1862, p. 78 (*lapsu cal.*)
Lalage melanoleuca, Hartl. *J. f. O.* 1865, p. 163; *Von Martin, J. f. O.* 1866, p. 12; Sharpe, *Cat. B. M.* 4. p. 91 (1879).
Campephaga melanictera, Gray, *Hand-l. B.* i. p. 339, no. 5129.
Hab. Luzón, Mindoro.

16. **L. terat**, Bodd. ♂♂ N. v. Dominicano.

(M. S. T.)

Le Merle des Indes, Briss. *Orn.* ii. p. 248, pl. 31, fig. 3.
Le Terat-Boulan, Montb. *Hist. Nat. des Ois.* iii. p. 397.
Le Merle des Indes orientales, D'Aubent. *Pl. Enl.* iv. pl. 40, fig. 2.
Ash-rumped Thrush, Lath. *Gen. Syn.* ii. p. 74.
Turdus terat, Bodd. *Pl. Enl.* pl. 17. (*ex Buff.* pl. enl. 273 f. 2).
T. orientalis, Gm. S. N. i. p. 821. Lath. *Ind. Orn.* p. 355. (1790).
Sylvia orientalis, Boun. & Vieill. *Enc. Meth.* ii. p. 487.
Sy. leucophaea, Vieill. *ibidem.* p. 452. 1823.
Cublepyris striga, Horst. *Tr. Linn. Soc.* xiii. p. 145.
Turdus striga, Raffl. t. c. p. 311. Lath. *Gen. Hist.* v. p. 87.
Lanius striga, Raffl. *Tr. Lin. Soc.* 13. p. 305 (1822).
Lalage orientalis, Boie, *Isis*, 1826, p. 973; Blyth. *Cat. B. Mus.* A. S. B. p. 192; *Bp. Conspl.* i. p. 355; *Cab. Mus. Hein. Th.* i. p. 60; *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 875; *Moore, P. Z. S.* 1854, p. 273; *Bernst. J. f. O.* 1859, p. 274;
Hartl. *J. f. O.* 1865, p. 866.
Erucivora orientalis, Swains. *Faun. Bor.-Amer., Birds*, p. 483;
Pelz Reis. Novara, Tög. p. 81.
Cublepyris orientalis, Tem.; S. Müller, *Nat. Versch. Land-en Volkenk.* p. 190; Less. *Echo du Monde Sav.* p. 232.
Pycnonotus humeraloides, Less. *Descr. Mamm. et Ois.* p. 305.
Campephaga terat, Gray, *Hand-l. B.* i. p. 339.
Colluricincla maculosa, Peale, *Un. St. Expl. Expl.* p. 81. pl. 23 f. 1. 1848; Hartl., *Wieg. Arch.* 1852, p. 97.
Lalage terat, Hume, *Str. F.* 1873, p. 454, 1874; p. 212; *Salvad. Ucc. Born.* p. 145; Sharpe, *P. Z. S.* 1875, p. 107; *id. Cat. B. M.* 4. p. 95 (1879).

Lalage dominica, *Walden*, *Tr. Z. S.* ix, p. 878; *Tweeddale*, *Ibis*, 1877, p. 383; *Sharpe*, *Tr. Linn. Soc.* new ser. i, p. 324; *Tweed P. Z. S.* 1877, pp. 545, 759, 827, 1878, pp. 808, 285, 342; *id. Ibis*, 1877, p. 383.

Hab. Luzón, Manila, Montalban, S. Mateo, Laguna, Calauan, Marinduque, Mindoro, Panáy, Cebú, Leyte, Bohol, Negros, Guimaras, Dinagat, Mindanao, Dumalon, Basilan, Malamaui, Joló, Paragua; Borneo, Sumatra, Java, Malaca, Nicobar.

17. *L. aurea*, (*Tem*) ♂ N. v. Malalangis

(M. S. T.)

Ciblepyris aureus, *Tem.* *Pl. Col.* 2, pl. 382, fig. 2; *S. Müll. Nat. Versch. Land-en Volkenk.* p. 190; *Rüpp. Mus. Sensch.* 3, p. 24; *Jacq. et Pucher. Voy. Pôle Sud.* 3, *O's.* p. 71; *Hartl. J. F. O.* 1854, p. 163.

Echinellieur orangá, *H. et Jacq. Voy. Pôle Sud.* *Atlas*, pl. 10, fig. 3.

Campephaga aurea, *Gray*, *Gen. B.* i, p. 283; *id. Hand-l. B.* i, p. 339.

Lalage aurea, *Bp. Conspl.* i, p. 335; *id. C. R.* xxxviii, p. 541; *Hartl. S. F. O.* 1805, p. 168; *Finsch New. Guinea*, p. 172; *S. F. O.* 1866, p. 12; *Walden*, *Tr. Z. S.* viii, p. 70; *Sharpe. Cat. B. M.* 4, p. 108 (1879).

Campephaga (Lalage) aurea, *Gray*, *P. Z. S.* 1860, p. 353.

Hab. Molucas, Gilolo, Ternate, Filipinas?

18. *L. insperata*, *Finsch*, N. v.

Volvocivora insperata, *Finsch. P. Z. S.* 1875, p. 643; *id. Journ. Mus. Godeffr. Heft.* xii, p. 27; *id. P. Z. S.* 1877, p. 779.

Lalage insperata, *Sharpe. Cat. B. M.* 4, p. 103 (1879).
Hab. Ponapé, Islas Carolinas.

19. *L. monacha*, (*H. et Finsch*) ♂ N. v. Malalangis. (M. S. T.)

Campephaga monacha, *Hartl. et Finsch. P. Z. S.* 1772, p. 99.
Volvocivora monacha, *Finsch Journ. Mus. God. Hef.* viii, taf. 3, f. 2 y 3.

Lalage monacha, *Sharpe. Cat. B. Mus.* 4, p. 105, 1879.
Hab. Ponapé, Carolinas; Palaos.

20. *L. leucopygialis*, (*Gray*) ♂ N. v. Malalangis.

(M. S. T.)

Campephaga leucopygialis, *Gray Hand-l. B.* i, p. 339, n.^o 5125. (descri. nulla).

Lalage leucopygialis, *Walden*, *Tr. Z. S.* viii, p. 69, n.^o 88 lam. 8, f. 2; *Salv. Ann. Mus. Civico Genov.* vii, p. 658; *Sharpe. Cat. B. Mus.* 4, p. 98, 1879.
Hab. Joló; Célebes.

21. *L. minor*, *Steere*.

Hab. Mindanao.

Fam. MUSCICÁPIDOS.

1. Gén. ALSEONAX, CAB.

1. A. latirostris, Raffl. & Co N. v. Pipit.

(M. S. T.)

- Muscicapa grisola, var. daurica, Pall. *Zoogr. Rossie-Asiat.* i. p. 461.
M. latirostris, Raffl. *Tr. Linn. Soc.* xiii. p. 312; *Savvin. Cat. Strickl. Coll.* p. 136.
M. poomensis, Sykes, *P. Z. S.* 1832, p. 85; Gray, *Cat. Mamm.* &c *Nepal. Coll. Hods.* p. 90.
Hemichelidon latirostris, Gray, *Gen. B.* i. p. 262; Blyth, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 175; Bp. *Consp.* i. p. 321; Horsf. & Moore, *Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 137; Moore, *P. Z. S.* 1854, p. 270; Swinhoe, *Ibis*, 1866, p. 57; Gray, *Hand-l. B.* i. p. 324, n.^o 4864.
Butalis terricolor, Blyth, *J. A. S. B.* xvi. p. 120; *id. Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 175; Bp. *Consp.* i. p. 318.
Paralix latirostris, Blyth, *J. A. S. B.* xvi. p. 121; Layard, *Ann. Nat. Hist.* 1854, xiii. p. 127; Swinh. *P. Z. S.* 1871, p. 379; Blyth & Wald. *B. Burm.* p. 104; Dybowski, *J. f. O.* 1872, p. 447; Taczan. *Bull. Soc. Zool. France*, i. p. 168; Davids & Oustal. *Ois. Chine*, p. 123; Tweedt, *P. Z. S.* 1878, p. 284.
Muscicapa cinereo-alba, Temm. & Schl. *Faun. Japon. Aves.* p. 42, pl. 15, 1850; Schrenk, *Reis. Amurl.* p. 379; Radde, *Reis. Sibir.* ii. p. 273.
Alseonax latirostris, Cab. *Mus. Hein. Th.* i. p. 53; Jerd. *B. Ind.* i. p. 459; Holst. *P. Z. S.* 1872, p. 441; Hume & Henders. *Lohore to Yark.* p. 185, pl. v; Sakad. *Ucc. Born.* p. 129; Hume, *Str. F.* 1875, p. 219 *id. Str. F.* 1874, p. 475; Brooks, *Str. F.* 1875, p. 270; et 1876, p. 173; Fairb. *op. cit.* p. 257; Hume, *op. cit.* p. 396; *id. & Davison. Str. F.* 1878, p. 227. Sharpe, *Cat. B. M.* 4. p. 127. (1879).
Alseonax terricolor, Cab. *Mus. Hein. Th.* i. p. 52, note.
Butalis cinereo-alba, Bp. *Consp.* i. p. 318.
B. pondiceriana, Bp. *Consp.* i. p. 318 (*ex Licht. in Mus. Berol.*)
Muscicapa poniceriana, Middend. *Sibir. Reis. Vög.* p. 188.
Hemichelidon terricolor, Gray, *Hand-l. B.* i. p. 324, n.^o 4865.
Alseonax cinerecoalba, Brooks, *Str. F.* 1875, p. 276.
Hab. Luzin, Negros, Borneo, Sumatra, Java, India, Ceylan, China.

2 Gén. MUSCICAPA, LIN

2 M. cœruleocephala, Sop. N. v.

- Le Colle-mouche à tête bleuâtre de l'île de Luçon, Sonn. *Voy. Nouv. Guin.* p. 57, pl. 26, n.^o 1.
Muscicapa cœruleocephala, Sop. *Det. Faun. et Flor. Insubr.* p. 95, no. 106 (*ex Sonn.*); Walden, *Tr. Z. S.* ix. p. 184.
Muscicapa cyanocephala, Gm. *S. N.* i. p. 943, n.^o 65 (*ex Sonn.*);
v. Martens, *J. f. O.* 1870, p. 11.
Hab. Luzon?

3. **M. luzoniensis**, *Gm.* N. v.

Le Gobe-mouche noir de l'île de Luçon, *Sonn. Voy. Nov. G.*
p. 59, pl. 27, fig. 2.
Muscicapa tessellata, *Scop. Del. Faun. et Flor. Insubr.* p. 88,
no. 108 (*ex Sonn.*)
Muscicapa Luzoniensis, *Gm. S. N.* i. p. 942, n° 62 (*ex Sonn.*)
Walden Tr. Z. S. ix. p. 184.
Hab. Luzón?

4. **M. macroura**, *Scop.* N. v.

Le Gobe-mouche à tête bleue de l'île de Luçon, *Sonn. Voy. Nov. Guin.*
p. 58, pl. 27, fig. 1.
Muscicapa macroura, *Scop. Del. Faun. et Flor. Insubr.* p. 98,
no. 107.; *Walden, Tr. Z. S.* ix. p. 184.
Hab. Luzón?

5. **M. philippinensis**, *Gm.* N. v.

Le Moucherolle des Philippines, *Buff., Hist. Nat. Ois.* iv. p. 565
Muscicapa philippinensis, *Gm. S. N.* i. p. 943, n° 63; *var. Mav-*
tens, *J. f. O.* 1800, p. 11, no. 34; *Walden, Tr. Z. S.* ix. p. 184.
Hab. Luzón?

6. **M. manillensis**, *Gm.* N. v.

Le Gobe-mouche à gorge jaune de l'île de Luçon, *Sonn. Voy.*
Nov. Guin. p. 57, pl. 26, fig. 2.
Muscicapa manillensis, *Gm. S. N.* i. p. 943, n° 66 (*ex Sonn.*)
Walden, Tr. Z. S. ix. p. 184.
Hab. Luzón?

7. **M. griseosticta**, (*Swinh.*) ♂ ♀ N. v. Calag. (N. S. T.)

Butilis manillensis, *Bp. C. R.* xxxviii. p. 652 (*non Muscicap*
manillensis, *Gm. ex Sonn.*; *nec Vieill. N. Dict.* xxi. p. 470, *ex*
Souzerat); *Walden, Tr. Z. W.* xiii. p. 66, ix. p. 183; *Sharpe,*
Tr. Linn. Soc. new series, i. p. 326; *p. Tweedd. P. Z. S.*
1877, p. 694.
Hemicelidon fuliginosa, *Swinh. Ibis*, 1860 p. 57 (*nec Hondgs.*)
H. griseosticta, *Swinh. Ibis*, 1871, p. 330.
Butilis hypogrammica, *Wallace, Ibis*, 1862, p. 350; *Walden, Tr.*
Z. S. vii. p. 66.
B. griseosticta, *Swinh. P. Z. S.* 1863, p. 288, 1866, p. 131,
147, p. 379; *David & Oustal. Ois. Chine*, p. 122.
Muscicapa hypogrammica, *Gray, Hand-l. B.* i. p. 321, n.º 4814.
M. griseosticta, *Sharpe, Cat. B. M.* 4.º p. 153, (1879).
Hab. Luzón, Montalban, Panay; China, Formosa, Molucas.

3. Gen. PRATINCOLA, KOCH.

8. *P. caprata*, LINN. ♂♀ N. v. Cipao.

(M. S. T.)

- La Traquet de l'isle de Luçon, *Briss. Orn.* iii. p. 444, pl. 24.
figs. 2, 3; *Daubent. Pl. Ent.* vi. pl. 235.
Motacilla caprata, *Linn. S. Nat.* i. p. 335; *Martens, J. f. O.*
1860, p. 10.
Glanthe caprata, *Vieill. N. Dict.* xxi. p. 433.
Saxicola fruticola, *Horsf. Tr. Linn. Soc.* xii. p. 157.
S. bicolor, *erythropygia*, *Sykes, P. Z. S.* 1832, p. 92.
Motacilla sylvatica, *Tickell, J. A. S. B.* ii. p. 575.
Saxicola caprata, *Jerd. Madr. J.* x. q. 265; *Gray. Gen. B.* i.
p. 179; *id. Cat. B.* *Nepal. coll.* *Hodgs.* p. 71; *Finsch, Neu-*
Guinea, p. 167.
S. meloleuca, *Hodgs. Icon. ined. Passeres*, pl. 98 (*Hodgs.* no.
420); *id. in Gray's Zool. Misc.* p. 83.
Pratinco a. caprata, *Blyth, J. A. S. B.* xvi. p. 129; *id. Cat. B.*
Mus. A. S. B. p. 169; *Bp. Conspl.* i. p. 305; *Cab. Mus. Hein.*
Th. i. p. 11; *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i.
p. 284; *Jerd. B. Ind.* ii. p. 123; *Gray, Hand-l. B.* i. p. 228,
no. 3282; *Holdsw. P. Z. S.* 1872 p. 454; *Hume, Str. F.* 1873,
p. 182; *Adam, t. c.* p. 379; *Ball, Str. F.* 1874 p. 413; *Hume,*
t. c. p. 477, et 1875, p. 134; *id. Nests and Eggs. Ind. B.* p. 313;
Brooks, S. F. 1875, p. 238; *Blyth & Walden, B. Burm.* p. 102;
Walden, Str. Tr. Z. S. viii. p. 63, ix. p. 102; *Salvad. Ucc.*
Born. p. 252; *Sharpe, Tr. Linn. Soc.* new series, i. p. 335;
Blandford, East Persia, p. 144; *Fairb. L. F.* 1876, p. 259;
Batler, S. F. 1877, p. 229; *Tweedd. P. Z. S.* 1877, pp. 606,
701, 1878, p. 710; *Salvad. P. Z. S.* 1877, p. 393; *Hume &*
Davison, S. F. 1878, p. 334; *Sharpe, Cat. B. M.* 4. p. 195.
1879.
P. atrata, *Blyth, J. A. S. B.* xx. p. 177; *Jerd. B. Ind.* ii. p. 124;
Gray, Hand-l. B. i. p. 228, no. 3281; *Holdsw. P. Z. S.* 1872,
p. 454; *Walden, Tr. Z. S.* viii. p. 63.
P. bicolor, *Hume, Nests and Eggs Ind. B.* p. 314;
Hab. Luzón, Laguna, Panay, Negros, Cebú, Bohol; Célebes,
Java, Bornco, India, Flores, Timor.

9. *P. pampilonensis*, ♂♂ N. v. Tamblabuy

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona.

4. Gen. GERYGONE, GOULD.

10. *G. simplex*, CAB. ♂♂ N. v. Tipit bulac.

(M. S. T.)

- Gerygone modesta*, *Cab. J. f. O.* 1860, p. 10 (*nec Pelz.*)
Acanthiza, sp., *Gray, Hand-l. B.* i. p. 220, no. 3147.
Gerygone simplex, *Cab. J. f. O.* 1872, p. 316; *Walden, Tr. Z.*
S. ix. p. 494; *Sharpe, Tr. Linn. Soc.* n. s. i. p. 352; *id.*
Notes Leyden Mus. i. n. 9, p. 28; *id. Cat. B. M.* 4. p. 214,
(1879).
Hab. Luzón, Laguna, Cal. lan.

11. *G. flaveola*, ♂ ♂ N. v. Pipit-bulac.

(M. S. T)

G. flaveola, *Cab. J. f. O.* 1873, p. 157; *Meyer*, t. 2, p. 404; *Savv. Ann. Mus. Civit. Genov.* vii, p. 665; *Sharpe, Notes Lev-* *den Mus.* t. n. 9, p. 28; *id. Cat. B. M.* 4, p. 214 lam. V. t. 2, (1879); *Guill. Voy. Marchesa*, p. 263, (1881).

Hab. Joló; Célebes, Borneo.

5. Gén. METABOLUS, Br.

12. *M. rugensis*, *H* et *J.* ♂ N. v. Pipit-bulac.

(M. S. T)

Drymophile de Ruk, *Hombr. et Jacq. Voy. Pole Sud, Atlas*, pl. 13. *Muscicapa rugensis*, *Hombr. et Jacq. Ann. Sci. (2) xvi*, p. 312. *Monarcha rugensis*, *Hartl. Arch. f. Naturg.* 1852, p. 133; *id. P. Z. S.* 1867, p. 829; *Gray, Hand-l. B.* i, p. 321, n.^o 4800. *Colluricincla rugensis*, *Jacq. et Pucher. Voy. Pole Sud, Zool.* iii, p. 62.

Metabolus rugensis, *Bp. C. R.* xxxviii, p. 650. *Sharpe, Cat. B. M.* 4, p. 238, (1879).

Monarcha (Metabolus) rugensis, *Gray, Cat. B. Trop. Isl. Pacific Ocean*, p. 19.

Hab. Islas Carolinas.

6. Gen XANTHOPYGIA, BLYTH.

13. *X. narcissina*, *Tem. ♂ ♂ N. v.* Pipit-bulao

(M. S. T)

Musicapa narcissina, *Temm. Pl. Coll.* iii, pl. 577, fig. 1; *Gray, Gen. B.* i, p. 263; *Temm. & Schl. Faun. Japon., Aves*, p. 40, pl. 17 C; *Gray, Hand-l. B.* i, p. 323, n.^o 4848; *Sharpe, Cat. B. M.* 4, p. 250, (1879).

Xanthopygia chrysophrys, *Blyth, J. A. S. B.* xvi, p. 124.

X. narcissina, *Blyth, Cat. B. Mus. A. B. B.* p. 155; *Bp. Conspr.* i, p. 327; *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i, p. 283; *Swinh. Ibis.* 1860, p. 58; *id. P. Z. S.* 1871, p. 380; *David & Oustal. Ois. Chine*, p. 119; *Sharpe, Tr. Linne. Soc.* new series, vol. i, 327; *Blakiston & Prysor, Ibis.* 1878, p. 234.

Hab. Mindanao, Paragua, China, Japón.

14. *X. cyanomelana*, (*Tem.*) ♂ ♂ N. v. Pipit-bulac.

(M. S. T)

Muscicapa cyanomelana, *Tem.* lam. 470; *Tem. et Schl. Faun. Jap.* p. 47.

M. bella, *A. Hay, Madr. Journ. XIII.* pt. 2, p. 158.

Cyanoptilia cyanocephala, *Blyth, J. A. S. B. XVI.* p. 125; *id. Cat. B. Mus. A. S. E.* p. 174; *id. Ibis.* 1870, p. 164.

Niltava cyanomelana, *Gray, Gray, Gen. B.* i, p. 264; *Swinh. Ibis.* 1860, p. 368 y 1861, p. 41; *Gray, Hand-l. B.* i, p. 326 n. 4802.

M. melanoleuca, *Tem. et Schl. Faun. Jap., Aves*, pl. 17 D.

M. gularis, *Tem. et Schl. t. c. pl. 16. ♀*

Butalis gularis, *Bp. C. nsp.* t. p. 318.

Hypothymis cyanomelana, *Bp.* id. p. 320; *Cass.* in *Perry's Expl. Jap.* p. 239; *Swinh.* *Ibis*, 1802 p. 306.
Cyanopula cyanomelana, *Horsf.* et *Moor.* *Cat. B. M. E. I. Co.* i. p. 291; *Swinh.* *P. Z. S.* 1871, p. 386; *David et Oust. Ois. China*, p. 116, pl. 81; *Blakst. et Prey.* *Ib's.* 1878, p. 234.
Xanthopygia cyanomelana, *Sharpe.* *Cat. B. Mus. 4.* p. 201. 1879.
Hab. Luzón, Cagayan; Borneo, China, Japón.

7 Gen. HYPOTHYMIS, BIE.

15. *Hy. azurea*, (*Bodd.*) ♂♂ N v. Pipit azul.

(M. S. T.)

Gobe-mouches bleu des Philippines, *Daubent.* *Pl. Enl.* 666, fig. 8.
Le petit Azur, *Montb. Hist. Nat. Ois.* iv. p. 534.
Muscicapa azurea, *Bodd. Tabl. Pl. Enl.* p. 41 (*ex Daubent.*)
Azure Flycatcher, *Lath. Gen. Syn.* ii. pt. 1, p. 339.
Muscicapa cerulea, *Gm. S. N.* i. p. 943; *Jerd. Madr. Journ.* xi. p. 14.
M. cœruleophala, *Sikes.* *P. Z. S.* 1832, p. 85.
Myiagra torquata, *Swains. Monogr. Flycatchers*, p. 208.
M. carulea, *Swains. Monogr. Flycatchers*, p. 208; *Gray, Cat. Mamm. &c Nepal. Coll. Hodgs.* p. 93; *Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 204.
M. azurea, *Gray. Gen. B.* i. p. 261; *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 138; *Jerd. B. Ind.* i. p. 450; *Pelz. Reis. Novara, Vög.* pp. 78, 101 (pt.); *Gray, Hand-l. B.* i. p. 328, no. 4930; *Godw.-Aust. J. A. S. B.* xxxix. p. 100; *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 381; *Ball, Str. F.* 1873, p. 68; *Hume, Str. F.* 1874, pp. 217, 474; *Ball, t. c.* p. 404; *Hume, Nests & Eggs Ind. B.* p. 198; *id. Str. F.* 1875, p. 103; *Fairb. Str. F.* 1876, p. 257; *Armstr. t. c.* p. 322; *Hume, t. c.* p. 395; *David & Oustal. Ois. Chine*, p. 114; *Sharpe; Tr. Linn. Soc. n. s. i.* p. 325.
Tchitreæ cœruleocephala, *Swinh. Ib's.* 1360, p. 57.
Hypothymis azurea, *Blyth & Wald. B. Burm.* p. 131; *Sharpe, Cat. B. M. 4.* p. 274. (1879).
Hab. Luzón, Laguna, Cagayan, Cebú, Mindanao, Mánipa, Bisilán, Paragua; Negros, Guimarás, Mindoro, Marinduque; Borneo, Java, Timor, India, China.

16. *H. oecipitelis* (*Vigors.*) ♂♂ N v. Pipit-azul

(M. S. T.)

L'Azur à calotte et à collier noir, *Levaill. Ois. d'Afr.* iv. p. 11, pl. 153.
Muscicapa carulea, (*nec Gm.*), *Raffl. Tr. Linn. Soc.* xiii. p. 31.; *Kittl. Kupf.* *Vög.* p. 7, *Taf. 9.* fig. 8.
Hypothymis carulea (*nec Gm.*), *Boie, Isis.* 1826, p. 273, et 1828, p. 318 (*ex Levaill.*); *Bp. Conspl.* i. p. 320; *Cab. Mus. He-n. Th.* i. p. 56.
Muscicapa oecipitalis, *Vigors.* *P. Z.* 1831, p. 97.
Myiagra aurea, (*nec Bodd.*), *Moore.* *P. Z. S.* 1854, p. 271; *Pelz. Reis. Nov., Vög.* p. 78 (pt.).
M. cœrulea, *Wallace.* *P. Z. S.* 1863, p. 485.

M. tytleri, Beavan, *Ibis*, 1867, p. 324; Gray, *Hand-l. B.* i, p. 328, no. 4928; Hume, *Str. F.* 1874, p. 217.

Hypothymis azurea, (nec *Birdi*), *Walden, Ibis*, 1872, p. 102; *Salvad. Ucc. Born.* p. 133; *Walden, Tr. Z. S.* ix, p. 182; *Oates, Str. F.* 1877, p. 149; Sharpe, *Ibis*, 1877, p. 18; *id. Tr. Linn. Soc. n. s. i.* p. 325; *Tweeddale, P. Z. S.* 1877, pp. 693, 760, 825, et 1878, p. 284.

Hypothymis occipitalis, Sharpe, *Cat. B. M.* 4, p. 275 (1879);
Hab. Luzón, Laguna, Calauan, Mindoro, Marinduque, Paragua, P. Princesa, Basilan, Joló; Borneo, Java, Sumatra, Formosa.

17. **H. superciliaris**, Sh. ♂ N v. Pipit.

(M. S. T.)

H. superciliaris, Sharpe, *Tr. Linn. Soc. n. s. i.* p. 326.

Hab. Basilan, Mindanao.

18. **H. sumarensis**, Steere, N. v.

Hab. Samar, Leyte.

8. Gén. CYANOMYAS, SHARP

19. **C. cælestis**, Tw., ♂♂ N v. Pine.

(M. S. T.)

Hypothymis cælestis, Tw., *An. et Mag. Nat. H.* 20, p. 539; *id. P. Z. S.* 1878, p. 109, pl. 7 t. 1.

Cyanomyas cælestis, Sharpe, *Cat. B. M.* 4, p. 278. 1879.

Hab. Dinagat, Samar, Basilan, Mindanao.

20. **C. helenæ**, Steere N. v.

Hab. Samar.

9. Gén. RHIPIDURA, VIGORS

21. **Rh. kubarii**, Finsch N. v.

Rhipidura kubaryi, Finsch, *P. Z. S.* 1875, p. 644; *id. Journ. Mus. Godeffr.* 1876 (Heft xii.) p. 29, pl. 2, fig. 2; *id. P. Z. S.* 1877, p. 779; Sharpe, *Cat. B. M.* 4, p. 314 (1879).
Hab. Ponapé, Isl. Carolinas.

22. **Rh. lepida**, H. et Finsch N. v.

Rhipidura lepida, Hartl. et Finsch, *P. Z. S.* 1878, pp. 6, 117; Gray, *Hand-l. B.* i, p. 331, n.º 4975; Finsch, *Journ. Mus. Godeffs.* viii, p. 21, pl. 4, fig. 23; Sharpe, *Cat. B. M.* 4, p. 322 (1879).

Hab. Ponapé, Carolinas, Palau.

23. **Rh. versicolor**, H. et Finsch N. v.

Hab. Uap, Carlinas.

24. **Rh. cyaniceps**, *Cass.* ♂♂ N. v. Pipit gubat. (M. S. T.)

Muscipeta cyaniceps, *Cas. Pr. Philad. Acad.* 1855, p. 438; *id. U. S. Expl. Expl.* p. 145, pl. 9, fig. 1.
Rhipidura caniceps (lapsu), *Gray*, *Hand-l. B. i.* p. 331, n.º 496.
Philentoma cyaniceps, *Walden*, *Tr. Z. S. ix.* p. 182; *Sharpe*, *Tr. Linn. Soc. new series*, i. p. 325; *Tweeddale*, *P. Z. S.* 1877, p. 693. *Sharpe*, *Cat. B. M.* 4. p. 323 (1879).
Hab. Luzon, Montalban, Laguna, Calauan, Mindanao.

25. **Rh. albiventris**, *Sharpe*. N. v.

Philentoma albiventris, *Sharpe*, *Tr. Linne.* new series, i. p. 325; *Tweeddale*, *P. Z. S.* 1878, p. 284.
Rhipidura albiventris, *Sharpe*, *Cat. B. M.* 4. p. 324. 1879.
Hab. Negros, Guimaras, Panay, Masbate.

26. **Rh. nigritorquis**, *Vigors*. ♂♂ N. v. Maria-capra (M. S. T.)

Rhipidura nigritorquis, *Vigors*, *P. Z. S.* 1831, p. 97; *Gray*, *Gm. B. i.* p. 259; *Blyth*, *J. A. S. B.* xii. p. 936; *Sharpe*, *Tr. Linn. Soc. new series*, i. p. 325. *Sharpe*, *Cat. B. M.* 4. p. 334 (1879).
Muscicapa bambusae, *Kittl*, *Kupf. Vog.* p. 7; pl. 9, fig. 2. *id. Mém. Acad. St. Petersb.* ii. p. 5, pl. 6.
Leucocerca javanica, *Blyth*, *Ibis* 1865, p. 30 (*nec Sparv.*)
L. nigritorquis, *Walden*, *Tr. Z. S. ix.* p. 182; *Tweeddale*, *P. Z. S.* 1877, pp. 693, 759, 826; *id. P. Z. S.* 1878, pp. 109, 284, 709.
Hab. Luzon, Laguna, Marinduque, Cebú, Mindanao, Paragua, P. Princesa, Basilan, Joló, Bohol, Negros, Guimaras, Dinagat, Panay.

10. Gén. ZEOCEPHUS, Br.

27. **Z. rufus**, *Bp.* ♂♂ N. v. Pipit canelo. (M. S. T.)

Tchitre rufa, *Gray*, *Ann. N. H.* xi, p. 371; *id. & Mitch. Gen. B.* i. p. 260, pl. 64; *Bp. Conspl.* i. p. 325; *id. Hand-l. B. i.* p. 334, n.º 5025.
Zeocephalus rufus, *Bp. Comptes. Rendus*, xxxviii, p. 552; *Cass. U. S. Expl. Expl.* p. 144; *Walden*, *Tr. Z. S. ix.* p. 183; *Sharpe*, *Tr. Linne. Soc. new series*, i. p. 328; *id. Cat. B. M.* 4. p. 343 (1879).
Hab. Luzon, Laguna, Mindoro, Marinduque, Negros, Panay.

28. **Z. cinnamomeus**, *Sharpe* N. v. ♀♂ Pipit-canelo. (M. S. T.)

Zeocephalus cinnamomeus, *Sharpe*, *Tr. Linne. Soc. new series*, i. p. 329, pl. 48, fig. 1; *id. Cat. B. Mus.* 4. p. 343 1879.
Hab. Basilan.

29. **Z. cyanescens**. *Sh.* ♂ ♀ N. v. Saritsit. (M. S. T.)

Zeocephus cyanescens, *Sharpe*, *Tr. Linn. Soc.* new series, i. p. 328, pl. 48, fig. 2; *id. Cat. B. M.* 4. p. 343 (1879).
Hab. Paragua.

11. Gén. PHILENTOMA, EYTON.

30. **Ph. velatum**. (*Tem.*) ♂ ♀ N. v. (M. S. T.)

Drymophila velata, *Temm.* *Pl. Col.* 334.
Monacha velata, *Savains. Classif. B.* ii. p. 257.
M. cæsia, *Less. Rev. Zool.* 1839, p. 167.
Muscicapa pectoralis, *Hay. Madr. Journ.* xii. pt. 2, p. 161.
Myiagra pectoralis, *Strickl. P. Z. S.* 1849, p. 101.
Monarcha velata, *Gray. Gen. B.* i. p. 260; *Bp. Conspl.* i. p. 326.
Philentoma velatum, *Blyth. Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 294; *Bp. Conspl.* i. p. 324; *Horsf. & Moore. Cat. B. Mus. E. Co.* i. p. 392; *Moore. P. Z. S.* 1854, p. 270; *Jerd. B. Ind.* i. p. 449.
Gray. Hano-l. B. i. p. 334, n.º 5027; *Walden. Ibis.* 1872, p. 373; *Salvad. Ucc. Bern.* p. 132; *Sharpe. Ibis.* 1877, p. 19; *Hume & Davison. Str. F.* 1878, p. 224; *Sharpe. Cat. B. M.* 4. p. 365 (1879).
P. unicolor, *Blyth. Ibis.* 1865, p. 46.
Techtrema velata, *Gray. Handl. B.* i. p. 334, n.º 5027.
T. unicolor, *Gray. Handl. B.* i. p. 334, n.º 5028.
Hab. Luzon, Laguna, Paragua; Borneo, Sumatra.

12. Gén. RIINOMYAS, SHARP.

31. **Rh. ruficauda**, *Sharp.* ♂ N. v. (M. S. T.)

Setaria ruficauda, *Sharpe. Tr. Linn. Soc.* new series, vol. i. p. 327; *id. Cat. B. M.* 4. p. 368 (1879).
Rh. ruficauda, *Sharpe. Cat. B. M.* 4. p. 367 (1881).
Hab. Basilan.

32. **Rh. samarensis**, *Steere.* N. v.

Hab. Samar, Mindanao.

13. Gén. CULICICAPA, SWINH.

33. **C. panayensis**, *Sharp.* N. ♂ ♀ v. (M. S. T.)

Xantholestes panayensis, *Sharpe. Tr. Linn. Soc.* new series, i. p. 327; *id. Cat. B. M.* 4. p. 371 (1879).
Hab. Panay, Negros, Paragua.

14. Gén. MYIAGRA, VIGORS

34. **M. pluto**, *Finsch.* N. v.

Myiagra pluto, *Finsch. P. Z. S.* 1875, p. 644; *id. Journ. Mus. Godeffr. Heft.* xii. p. 29; *id. Cat. B. M.* 4. p. 380 (1879).
Hab. Ponapé, Carolinas.

35 **M. oceanica**, Jacq. et Puch., N. v.

Platyrhynche océanien, Hombr. et Jacq., Voy. *Pôle Sud*, Atlas, pl. 12 bis, figs. 1, 2.

Myiagra oceanica, Jacq. et Pucher., Voy. *Pôle Sud*, texte, iii. p. 77; Gray, Cat. Birds Trop. Isl. Pacific. Oceani, p. 18; id. Hand-l. B. i. p. 328, n.^o 4929; Sharpe, Cat. B. M. 4. p. 383 (1879).

Hab. Carolinas, Marianas.

36 **M. erythrops**, Hartl et Finsch, N. v.

Myiagra erythrops, Hartl. & Finsch, P. Z. S. 1808, pp. 6, 117, et 1872, p. 97; Finsch, Journ. Mus. Goddeffr. Heft. viii. p. 25; Sharpe, Cat. B. M. 4. p. 383, (1879).

Hab. Marianas, Palaos.

15. Gén. MONARCHIA, Vig. et Horst.

37 **M. godeffroyi**, Hartl. & N. v.

(M. S. T.)

Monarcha godeffroyi, Hartl. P. Z. S. 1867, p. 820, pl. 38; Gray, Handl. B. i. p. 321, n.^o 4810; Sharpe, Cat. B. M. 4. p. 432, 1879.

Hab. Cap, Carolinas.

16. Gén. STOPAROLA, Blyth

38 **S. panayensis**, Sharpe, C. & N. v.

(M. S. T.)

Bunyias panayensis, Sharpe, Tr. Linn. Soc. new series, i. p. 326; Sharpe, Cat. B. M. 4. p. 440, (1879).

Hab. Panay, Negros.

17. Gén. SHPHIA, Hodggs

39 **S. elegans**, Temm. ♂ & N. v. Ibon-tulog

(M. S. T.)

Muscicapa elegans, Temm. Pl. Col. iii. pl. 506, fig. 2.

M. cantatrix ♂, Temm. Pl. Col. iii. pl. 226, fig. 2.

Niltava elegans, Gray, Gen. B. i. p. 264; id. Handl. B. i. p. 326, n.^o 4805.

Cyornis elegans, Bp. Conspl. i. p. 320; Walden, Ibis, 1872; p. 373; Salvad. Ucc. Born. p. 130; Walden, Ibis, 1877, p. 316; Brüggem. Abhandl. nat. Ver. Bremen, v. p. 458.

C. beccariana, Blyth, Ibis, 1870, p. 165 (nec Salvad.).

C. banyumas, Tweed. P. Z. S. 1878, p. 615 (♂).

Siphia elegans, Sharpe, Cat. B. M. 4. p. 447, (1879).

Hab. Paragua; Borneo, Java, Sumatra, Malacca.

40. **S. banyumas**, Horsf. ♂ & N. v. Ibon tulog.

(M. S. T.)

Muscicapa banyumas, Horsf. Tr. Linn. Soc. xiii. p. 146; id. Zool. Researches in Java' pl.

M. rufigastra, *Raffl.* *Tr. Linn. Soc.* xiii. p. 312.
M. cantatrix, *Tennm. Pl. Col.* iii. pl. 226 (♂ only).
Niltava banyumas, *Gray. Gen. B.* i. p. 264; *id. Hand-l. B.* i. p. 325, n.º 4870; *Brüggem. Abhandl. nat. Vereine Bremen*, v. p. 68.
Cyornis banyumas, *Bp. Conspl.* i. p. 320; *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. È. I. Co.* i. p. 290; *Bernst. J. f. Orn.* 1859, p. 205; *Pelz. Reis. Nevaria*, *Vög.* pp. 78, 161; *Walden, Tr. Z. S.* viii. p. 117; *Savard. Ucc. Born.* p. 130; *Sharpe, P. Z. S.* 1875, p. 107; *id. Ibis*, 1877, p. 18; *Brüggem. Abhandl. nat. Ver. Bremen*. v. p. 458; *Tweeddale, P. Z. S.* 1878, p. 615 (♂ only).

C. simplex, *Blyth, Ibis*, 1870, p. 165 (♂).

Siphia banyumas, *Sharpe, Cat. B. M.* 4. p. 449 (1879).

Hab. Luzon, Marinduque; Java, Borneo, Célebes.

41 **S. philippinensis**, *Sharp. ♂♂ N. v.* Ibon tulog. (M. S. T.)

Cyornis banyumas, *Von Martens, J. f. O.* 1806, p. 11; *Walden, Tr. Z. S.* ix. p. 182.

C. philippinensis, *Sharpe, Tr. Linn. Soc.* new series, i. p. 325; *Tweeddale, P. Z. S.* 1877, p. 693; et 1878, pp. 109, 284, 342. *Sharpe, Cat. B. M.* 4. p. 450 1879.
Hab. Panay, Dumaguete, Mindoro, Marinduque, Cebú, Siamar, Basilan, Panay, Luzon, Laguna, Leyte, Negros, Jolo.

42 **S. lemprieri** *Steere. N. v.*

Hab. Paragua.

Fam. TÚRDIDOS.

Subfam. SILVINOS.

1. PHYLLOSCOPUS, BOIE.

1. **Ph. borealis**, (*Blas.*) ♂♂ N. v. Pipit tulog. (M. S. T.)

Sylvia (*Phyllopneuste*) *eversmanni*, *Bp. apud Midd. Sibir. Reise*, p. 178, (1851), *apud Radde, Reis. Sibr.*, *Vög.* p. 263 (1863). *Phyllopneuste borealis*, *Blas. Naum.* 1858, p. 313; *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 356; *Tacz. Bull. Soc. Zool. France*, 1870, p. 141; *Prév. Rowley's Orn. Mise.* ii. p. 171 (1877); *David et Oust. Ois. Chine*, p. 271 (1877).

Phylloscopus sylvicultrix, *Swinh. Ibis*, 1860, p. 53; 1866, p. 295.

Sylvia flavescens, *Gray. P. Z. S.* 1860, p. 349; *id. Hand-l. B.* i. p. 215; n.º 3047 (1869).

Philloscopus hylebata, *Swinh. J. A. S. Beng.* xxix p. 265 (1860).

Sylvia (*Phyllopneuste*) *borealis* (*Blas.*), *Naum. Vög. Dentschl.* xiii. p. 69, pl. 375. fig. 1 (1860).

Phylloscopus borealis, (*Blas.*), *Blyth, Ibis*, 1867, p. 28; *Seeböhm*

*

- & Harvie Brown, *Ibis*, 1876, p. 216; Hume, *Str. F.* iv, p. 290 (1876); Sharpe, *Ibis*, 1877, p. 16; Seeb, *Ibis*, 1877, p. 60; Hume, *Str. F.* vi, p. 352 (1878); Seeb, *Ibis*, 1879, p. 9; *id. Cat. B. Mus.* 5, p. 40 (1881).
Phyllopeuste kennicotti, *Baird*, *Trans. Chicago Ac. Sc.* i, p. 313, pl. xxx, fig. 2 (1869).
Sylvia sylvicultrix (*Swinh.*), *Gray*, *Hand-l. B.* i, p. 216, n.^o 3054 (1869).
Sylvia borealis, (*Blas.*), *Gray*, *Hand-l. B.* i, p. 216, no. 3063 (1869).
Phyllopeuste eversmanni, *Bp. apud Salv. Alston & Harvie Brown*, *Ibis*, 1873, p. 61.
P. javanica, *Bp. apud Salv. Ucc. Born.* p. 244 (1874).
Phyllopeuste borealis, (*Blas.*), *Meves*, *Journ. Orn.* 1875, p. 429; *Hab.*, Luzón, Cebú, Leyte, Mindanao, Paragua, Guimarás, Panay, Masbate, Marinduque, Mindoro; Borneo, China Gilolo.

2. **Ph. lugubris**, *Blyth*, ♂♂ N. v. Pipit-tulog.

(M. S. T.)

- Phyllopeuste lugubris, *Blyth*, *Ann. Nat. Hist.* xii, p. 98 (1843); *Blyth*, & *Wald. B. Burm.* p. 105 (1875).
Phylloscopus lugubris, (*Blyth*), *Blyth*, *J. A. S. Beng.* xii, p. 968 (1843); *id. J. A. S. Beng.* xiv, p. 591 (1845); *id. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 185 (1849); *Jerd*, *B. Ind.* ii, p. 192 (1863); *Blanf. J. A. S. Beng.* xli, pt. 2, p. 53 (1872); *Seeb*, *Ibis*, 1877, p. 78; *Hume, Str. F.* vi, p. 355 (1878); *Seebok. Cat. B. Mus.* 5, p. 48 (1881).
Phyllopeuste trochilus, (*Linn.*), *apud Hodggs. MS. Drawings Brit. Mus.* of *B. of Nepal Passeres*, pl. 57, n.^o 861, *unde Hodggs. Gray's Zool. Misc.* p. 82, no. 861 (1844), *apud Gray. Cat. Mamm. & B. Nepal Coll. Hodggs.* p. 65 (1846).
Phylloscopus indicus, (*Jerd*), *apud Blyth. J. A. S. Beng.* xiv, p. 593 (1845, parte).
Phyllopeuste magnirostris (*Blyth*), *apud Gray. App. Cat. Mamm. &c. Nepal Coll. Hodggs.* p. 151 (1846).
Regulus lugubris, (*Blyth*), *Gray. Gen. B.* i, p. 175 (1848).
Abornis lugubris, (*Blyth.*) *Bp. Conspl.* i, p. 290 (1850).
Sylvia lugubris, (*Blyth*), *Gray. Hand-l. B.* i, p. 215, no. 3049 (1869).
Phyllopeuste lugubris, (*Blyth*), *Giebel. Thes. Orn.* iii, p. 119 (1877).
Phylloscopus lugubris, *Seeb. Cat. B. Mus.* 5, p. 48. (1881).
Hab. Mindanao, Basilan, Samar; Nepal, Calcutta, Bengal.

3. **Ph. superciliosus** *Gm.* ♂ N. v. Pipit

(M. S. T.)

- Yellow-browed Warbler, *Lath. Gen. Syn.* ii, p. 459 (1783).
Motacilla superciliosa, *Gmel. Syst. Nat.* i, p. 975 (1788).
Sylvia superciliosa (*Gmel.*) *Lath. Ind. Orn.* ii, p. 526 (1790); *Sund. Sv. Fogt.* pl. 68 fig. 1, (1858); *Gray. Hand-l. B.* i, p. 216 n.^o 3067 (1869).
Regulus modestus, *Gould. Hancock. Ann. Nat. Hist.* ii, p. 310 (1839); *Yarr. Brit. B.* i, p. 316; (1843); *Cab. Naum.* iii, pt. 1, p. 5 (1852); *Gactke. Journ. Orn.* 1853, p. 91; *Naum.*,

- Vög. Deut. ch. xiii. pl. 378. figs. 2 & 3 (1860); Tristram, Ibis, 1864, p. 230.
- R. inornatus, Blyth, J. A. S. Beng. xi. p. 291 (1842),
Phylloseopus modestus, (Gould), Blyth, J. A. S. Beng. xii. p. 963 (1843).
- Phyllopneuste modesta, (Gould), Blyth, Ann. Nat. Hist. xii. p. 98 (1843); Blyth, Ann. Nat. Hist. xiii. p. 116. (1844).
- Reguloides modestus, (Gould), Blyth, J. A. S. Beng. xvi. 442 (1847); Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc. p. 184 (1849, parte).
- Sylvia (Phyllopneuste) proregulus, (Pall.), Midd. Sib. Reise, p. 183 (1853, parte).
- Phyllobasileus superciliosus, (Gmel.), Cabauis, Journ. Orn. 1853, p. 81; Fritsch, Vög. Eur. pl. 19. figs. 3 & 4 (1871).
- Reguloides proregulus, (Pall.), Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. i. p. 342 (1854); Swinh., Ibis, 1863, p. 307, et ante; Jerdon, B. Ind. ii. p. 197 (1863); Bp. Cons. i. p. 291 (1850).
- Ficedula proregulus, (Pall.), Schleg. Vög. Nederl. pp. 130, 241 (1854).
- Phyllopneuste proregulus, (Pall.) Blass, Naum. viii. p. 311 (1858); Blasius bis, 1852, p. 66.
- Sylvia bifasciata, Gaetke, Naum. viii. p. 419 (1858).
- Phyllopneuste (Phyllobasileus) superciliosa, (Gmel.), Schrenck, Reis. Forsch. Amur-Lande, i. p. 363 (1860).
- Sylvia (Phyllopneuste) superciliosa, (Gmel.), Naum. Vög. Deutsch. xiii. pt. 2, p. 74 (1860); Radde, Reis. Sibir. Vög. p. 264 (1863, parte.)
- Reguloides superciliosus, (Gmel.), Blyth, Ibis, 1862, p. 380; Swinh., Ibis, 1863, p. 307, et subseq.; Tristram, Ibis, 1867, p. 83; Gould, Ibis, 1859, p. 128; Swinh., P. Z. S. 1871, p. 357; Harting, Handb. Br. B. p. 107 (1872); Gould, B. G. B. ii. pl. 68 (1873); Hume, Nests & Eggs Ind. B. p. 364 (1873; Blyth, & Wald, B. Burm. q. 106 (1875); Prjev. Rowley's Orn. Misc. ii. p. 172 (1877); David & Oust. Ois. Chine, p. 273 (1877); Hume & Davison, Str. F. vi. p. 358 (1878).
- Phylloscopus pallasi, Dubois, Ois. Eur. p. 83 (1862).
- Phyllopneuste superciliosa, (Gmel.), Bolle, Journ. Orn. 1863, p. 60; Tacz, Bul. Soc. Zool. France, 1870 p. 141.
- Regulus superciliosus, (Gmel.), Gray, Cat. Brit. B. p. 54 (1863).
- Phylloscopus superciliosus, (Gmel.), Crommelin, Ned. T. D. iii. p. 244 (1866); Neist. ed. Yarr. Br. B. i. p. 443 (1873); Dresser, B. Eur. pt. xxx. (1874); Seeböhm, Ibis, 1877, p. 102; id. Ibis, 1879, p. 12; id. Cat. B. M. 5. p. 68. (1881).
- Sylvia inornata, (Blyth), Gray, Hand-l. B. i. p. 216. no. 3066 (1869).
- Phyllopneuste proregulus, (Pall.) Giebel, Thes. Orn. iii. p. 120 (1877).
- Hab. Paragua; China, India.



2. Gén. ACROCEPHALUS, NAUM.

4. A. orientalis, Tem. ♂ N v Terat. (M. S. T.)

Sylvia turdoides, Meyer apud Kittl. Lütke, Voy. (Postels) iii. p. 327.
Salicaria turdina orientalis, Tem. et Schleg. Faun. Jap. Aves, p. 50 (1847).
S. turdoides orientalis, T. mm. et Schleg. Faun. Japon, Aves, pl. xx b. (1837).
Calamoherpe orientalis, (Temm. et Schleg.), Bp. Conspl. i. p. 285 (1850); Swinhoe, Ibis, 1863, p. 305; id. P. Z. S. 1863, p. 293 and 1870, p. 427; Tacz. Journ. Orn. 1874, p. 419, e^t 1875, p. 245; Tacz. Bull. Soc. Zool. France, 1876, p. 138; Blakiston & Poyer, Ibis, 1878, p. 237.
Acrocephalus orientalis, (Temm. et Schleg.), Gray, P. Z. S. 1860, p. 349; Wald. Tr. Z. S. viii p. 64 (1872), ix p. 195 (1875); Seehöhm, Cat. B. M. 5. p. 97 (1881).
A. magnirostris, Swinhoe, Ibis, 1850, p. 51, and 1861, pp. 32, 329.
Calamodyta orientalis, (Temm. et Schleg.), Gray, Handl. B. i. p. 207, n.^o 2919 (1869); Swinhoe, P. Z. S. 1871, p. 352; Prév. Rowley's Orn. Misc. ii. p. 169 (1877); David et Oust. Ois. Chine, p. 253 (1877).
Hab. Luzin, Manila, Cebú, Mindanao; Célebes, Bornéo, China, Sumatra.

5. A. syrinx, Kittl. N. v.

Sylvia syrinx, Kittl. Mém. l'Acad. St. Petersb. ii. p. 6, pl. 8 (1835).
S. oceanica, «Kittl. in Mus. Senckenb.» fide Finsch, Journ. Mus. Godeffr. xii. p. 30 (1876).
Tataré rousseroll., Hombr. et Jacq. Atl. Voy. Pôle Sud, pl. 20, fig. 5 (1853).
Tataré syrinx, (Kittl.), Jacq. et Puch. Voy. Pôle Sud, iii. p. 92 (1853).
Eparnetes syrinx, (Kittl.), Reichb. Nat. Syst. pl. lviii. (1859); B. Compt. Rend. 1855, p. 111.
Acrocephalus orientalis, (T. & S.), apud Pelz. Nov. Reise, pp. 63, 162 (1865).
Calamodyta syrinx, (Kittl.), Gray, Handl. B. i. p. 208, n.^o 2948 (1869).
Calamoherpe syrinx, Kittl., Finsch, Journ. Mus. Godeffr. xii. p. 30 (1876); id. P. Z. S. 1877, p. 778.
Acrocephalus syrinx, Seehöhm, Cat. B. Mus. 5. p. 100 (1881).
Hab. Ponapé, Carolines.

3. Gén. LOCUSTELLA, KAUP.

6. L. fasciolata, Gray. ♂ N v. Pipit. (M. S. T.)

Acrocephalus fasciolatus, Gray, P. Z. S. 1860, p. 349; Seehöhm, P. Z. S. 1878, p. 806; Tweeddale, P. Z. S. 1878, p. 439.

- Acrocephalus insularis*, *Hallace*, *Ibis*, 1862, p. 350.
Calamoperhe fumigata, *Swinhoe*, *P. Z. S.* 1863, pp. 91, 203.
Locustella fasciolata, (*Gray*), *Blyth*, *Ib.* 5, 1867, p. 21; *Seeböhm*,
Ibis, 1879, p. 15; *id. Cat. B. M.* 5, p. 109 (1881).
L. insularis, (*Wallace*), *Blyth*, *Ibis*, 1867 p. 21.
Calamodryta fumigata, (*Swinh.*), *Gray*, *Hand-l. B. i.* p. 207 n.^o
(2937) 1869.
C. fasciolata, (*Gray*), *Gray*, *Hand-l. B. i.* p. 207 n.^o 2924 (1869);
Swinh., *P. Z. S.* 1871, p. 352; *David et Oust.* *Ois. Chine*,
p. 253 (1877).
C. insularis, (*Wall.*), *Gray*, *Hand-l. B. i.* p. 207, no. 2924 (1869);
Swinh., *P. Z. C.* 1871 p. 352; *David et Oust.* *Ois. Chine*,
p. 253 (1877).
Calamoperhe subflavescens, *Elliot*, *P. Z. S.* 1870, p. 243.
C. fasciatus, (*Gray*), *Tacz. Journ. Orn.* 1872, p. 353; *id. Bull.*
Soc. Zool. France, p. 178 (1876).
Hab. Luzón, Marinduque; China, Gilolo, Batchian.

7. *L. ochotensis*, *Midd.* ♀ N. v. Pipit.

(M. S. T.)

- Sylvia (Locustella) certhiola*, (*Pall.*) *apud Midd. Sib. Reis.* ii. p.
184 (1853).
S. (Locustella) ochotensis, *Midd. Sib. Reis.* ii. p. 185 (1853);
Seeböhm, *Cat. B. M.* 5, p. 113. (1881).
Lusciniopsis japonica, *Cossin*, *Proc. Ac. Sc. Phil.* 1858, p. 193.
Calamodryta ochotensis, (*Midd.*), *Gray*, *Hand-l. B. i.* p. 210, no.
2973 (1879).
Locustella subcerthiola, *Swinh.*, *Ibis*, 1874, p. 154; *David et*
Oust. Ois. Chine, p. 249 (1877).
Arundinax blakistoni, *Swinh.*, *Ib.* 5, 1876, p. 332 (*bird of the*
year).
Locustella ochotensis, *Seeb. Cat. B. Mus.* 5, p. 113 (1881).
Hab. Marinduque; Borneo, Japon. Arch. Malayo.

4. *Géa. LUSCINIOLA* GRAY.

8. *L. fuscata*, *Blyth*. ♂ N. v. Pipit.

(M. S. T.)

- Phyllopeuste fuscata*, *Blyth*, *J. A. S. Beng.* xi, p. 113 (1842);
Bp. Conspl. i, p. 290 (1850); *Swinh.*, *P. P. S.* 1871, p. 350;
Homeyer, *Journ. Orn.* 1872, p. 202; *Blyth.* & *Wald.*, *B. Burma*, p. 105 (1875); *Tacz. Bull. Soc. Zool. France*, 1876,
p. 140; *Prjev.* *Rowley's Orn. Misc.* ii. p. 171 (1877); *David*
et Oust. Ois. Chine, p. 297 (1877).
Horornis fulviventer, *Hodgs. MS. Drawings Brit. Mus. of Birds*
of Nepal, Passeres, pl. 63, no. 878 (*circ. 1844*); *Hodgs. P.*
Z. S. 1845, p. 31; *Gray*, *Cat. Mamm. &c. Nepal Coll.* *Hodgs.*,
p. 64 (1846); *Bp. Conspl.* i, p. 290 (1850).
Phylloscopus brunnatus, *Blyth J. A. S. Beng.* xiv, p. 591 (1845);
Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 185 (1849); *Horsf. & Moore*,
Cat. B. Mus. E. I. Co. p. 338 (1854).
Sylvia fuscata, (*Blyth*), *Gray*, *Gray. Gen. B. i.* p. 174 (1848).
Regulus fulviventer, (*Hodgs.*), *Gray*, *Gen. B. i.* p. 175 (1848).
Phylloscopus fusatus, (*Blyth*), *Blyth*, *Cat. B. Mus. As. Soc.* p.

- 185 (1849); *Jerd. B. Ind.* ii. p. 181 (1853); *Blyth. Ibis.* 1867, p. 25; *Seeb. Ibis.* 1877, p. 85; *Humz. Stray Feath.* vi. p. 352 (1878); *Seeb. Ibis.* 1889, p. 11.
Sylvia (Phyllopleuste) sibirica, *Midd. Sib'r. Reise*, p. 180 (1853); *Radde, Reis. Sibir.*, *Vög.* p. 26; (1863).
S. brunnea, (*Blyth*), *Gray, Hand-l. B.* i. p. 216 n.^o 3057 (1869).
Phyllopleuste brunneus, (*Blyth*), *Blyth, Cat. Mamm. & B. of Burma*, p. 105 (1875).
Phyllopleuste fuscata, (*Blyth*), *Giebel, Thes. Orn.* iii. p. 118 (1877).
P. brunea, (*Blyth*), *Giebel, Thes. Orn.* iii. p. 118 (1877).
Lusciniola fuscata, (*Blyth*), *Seeböhm, Ibis*, 1880, 277; *id. Cat. R. Mus. S.* p. 127 (1881).
Hab. Luzón, Cagayan; Formosa, China, Japon.

Subfam. TÚRDINOS.

§ Gén. GEOCICHLA, KUHL.

g. *G. varia*, *Pall. Zoogr. N.* v.

(M. S. T.)

- Turdus varius*, *Pall. Zoogr. Rosso-As.* i. p. 449 (1811); *Macg. Brit. B.* ii. p. 146 (1839); *Sund. Vet. Ak. Hendl.* 1840, p. 37; *Temm. Man. d'Orn.* iv. p. 602 (1840); *Wernsr. Atlas in sectiv. App. pl. 7* (1842); *Sund. Isis*, 1845, p. 119; *Homeyer, Rhea*, 1849, p. 144; *Kjærb. Danm. Fugl.* p. 134 (1852); *Sund. Svensk. Fogl.* pl. lxvii, fig. 1 (1856); *Ridz, Reis. Sibir.*, *Vög.* p. 231 (1863); *Gray, Hand-l. B.* i. p. 254, n.^o 3387 (1869); *Newt. ed. Yarr. Brit. B.* i. p. 251 (1872); *Tweeddale, P. Z. S.* 1878, p. 429; *Dresser, B. Eur.* pt. lxxiii. (1878); *Szebhn Cat. B. M.* 5, p. 151 (1881).
T. aureus, *Holantre, Ann. de Verr.* 1825, p. 310; *Schinz, Eur. Faun.* i. p. 161 (1840); *Dabo's, Journ. Orn.* 1356, p. 237; *Degl. et Gerbe, Orn. Eur.* i. p. 420 (1867).
T. squamatus, *Boie, Isis*, 1835, p. 251.
1. *whitei*, *Eyton, Rarer Brit. B.* p. 92 (1836); *Gould, B. of Eur.* ii. pl. 81 (1837); *Keys. u. Blas. Wörb. Eur.* pp. lii et 179 (1840); *Yarr. Brit. B.* ed. i. p. 184 (1843); *Sch. Rev. Crit.* pp. xli et 70 (1844); *Gray, Gen. B.* i. p. 218 (1847); *Temm. et Schl. Faun. Japon.* p. 67 (1847); *Nau-n. Vög. Deutschl.* xiii. pl. 354 (1860).
Oreocinclla whitei, (*Eyton*), *Gould, P. Z. S.* 1837, p. 136; *Bp. Comp. List B. Eur. & N. Amer.* p. 17 (1838).
O. varia, (*Pall.*) *Gould, P. Z. S.* 1837, p. 136; *Cab. Mus. Hein.* i. p. 6 (1850); *Sund. Journ. Orn.* 1857, p. 160; *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 367; *Tacz. Bull. Soc. Zool. France*, 1876, p. 146; *David et Oust. Ois. Chine*, p. 158 (1877); *Prjev. Rowl. Orn. Misc.* ii. p. 200 (1877).
O. aurea, (*Hol.*), *Bp. Cat. Ucc. Eur.* p. 34, n.^o 156 (1842); *id. Conspl.* i. p. 362 (1850); *id. Rev. et Migr. Zool.* 1857, p. 205; *Tomes, Ibis*, 1859, p. 309; *Jaub. et Barth-Lipmann. Rich. Orn.* p. 202 (1859); *Gould, B. Gt. Br.* ii. pl. 39 (1873).
T. lunulatus, *Lath. apud Blas. List B. Eur.* p. 9 (1362).

T. dumet, *Litt. apud Petz. Verh. k. k. zool.-bot. Gesell. Wien*,
1871, p. 703.
Graech'a varia, *Szab. Cat. B. Mus.* 5, p. 151 (1881).
Hab. Luzjn.

10 **G interpres**, *Kuhl.*

Turdus interpres, *Kuhl*, *fil. Turd. P't. Cyl.* ii, n.^o 454 (1828);
Less. Tracté, p. 410 (1831); *Gray*, *Gm. B.* i, p. 223 (1847);
Gray, *Hindl. B.* i, p. 293, n.^o 3794 (1869).
Geocichla interpres, (*Temm.*); *Hartl. Syst. Verz.* p. 41 (1844);
Bp. Conspl. i, p. 161 (1830); *Horsf. & Moore*, *Cat. B. Mus. E.* 1, *C. O.* i, p. 191 (1854); *Szabóhán Cat. B. M.* 5, p. 165 (1881).
Hab. Basilan, Java, Sumatra, Lombok.

6. Gén. TURDUS, LIN

11. **T. musicus**, *Lin.* ♂ N. v. El músico.

(M. S. T.)

La petite Grive, *Orn.* ii, p. 205 (1760).
La Grive, *Montb. Hist. Nat. Ois.* iii, p. 280 (1775).
La Litorne, *Daubent. Pl. Ent.* n.^o 406 (1775).
La Calandrette, *Daubent. Pl. Ent.* n.^o 49 (1775).
T. musicus, *Linn. Syst. Nat.* i, p. 292 (1758); *Scop. Ann. i*, p. 133 (1769); *Lath. Gen. Syst. Suppl.* i, p. 285 (1787); *Gmel. Syst. Nat.* i, p. 839 (1788); *Lath. Ind. Orn.* i, p. 327 (1790); *Bechst. Naturg. Deutschl.* iv, p. 201 (1795); *id. Orn. Tacchenb.* i, p. 144 (1802); *Wolf. Taschenb.* i, p. 195 (1810); *Pallas Zoogr. Rosso-Asiat.* i, p. 454 (1811); *Temm. Man. d'Orn.* p. 88 (1815); *Koch. Syst. bauer. Zool.* i, p. 175 (1816); *Temm. Man. d'Orn.* i, p. 164 (1820); *Nicum. Vog. Deutschl.* ii, p. 202 (1822); *Gould. B. Eur.* ii, pl. 78 (1837); *Keys. u. Blts. Wir. Eur.* pp. 1, 177 (1840); *Nord. Dend. Voy. Russ. mird.* iii, p. 125 (1840); *Werner. Atlas. Insectiv.* pl. 13 (1842); *Degl. Orn. Eur.* i, p. 465 (1849); *Gray. Gm. B.* i, p. 218 (1847); *Bp. Conspl.* i, p. 270 (1850); *Cit. Mus. Hein.* i, p. 2 (1850); *Middendorf. Reis. Sibir.* *Zool.* ii, pt. 2, p. 169 (1858); *Lich. Nonncl. Ar.* p. 25 (1854); *Schl. Vog. Niderl.* p. 211 (1854); *Sundev. Sv. Fjgl.* p. 59 (1856); *Fabre. et Birth.-Lipponn. Rich. Orn.* p. 205 (1859); *Lindern. Vog. Griechenl.* p. 85 (1860); *Nwt. List B. Eur.* *Blasius.* p. 9 (1862); *Ridde. Reis. Sibir.* *Vog.* p. 234 (1863); *Gould. B. Gt. Brit.* ii, pl. xxxii. (1869); *Degl. et Gerbe. Orn. Eur.* i, p. 422 (1867); *Lich.* *Exp. Sci. Algér.* *Ois.* p. 186 (1871); *Gray. Hindl. B.* i, p. 253, n.^o 3977 (1871); *Dider. Afr. Sc'l.* p. 107 (1871); *Drost. Vogelw. Borkun.* p. 93 (1874); *Heugl. Orn. N. O.-Afr.* i, 318 (1869); *Fritsch. Vog. Eur.* p. 139 (1870); *Savard. Faun. Ital.* *Ucc.* p. 79 (1871); *Sharpe & Dresser. B. Eur.* pt. v. (1871); *Newt. ed. Yarr. Br. B.* i, p. 264 (1872); *Hartlaub. Hanib. B.* B. p. 11. (1872); *Shelley. B. Egypt.* p. 66 (1872); *Irby. B. Gibr.* p. 73 (1875); *B. (inf. Eist. Pers.)* ii, p. 150 p. (1876); *Tazz. Bull. Soc. Zool. France*, i, p. 148 (1876); *Böhl. B. Cauz.* p. 78 (1879); *Szabóhán. Cat. B. M.* 5, p. 191 (1881).

- Irhostrile, *Lath. Gen. Syn.* ii, pt. i, p. 18 (1783).
T. iliacus, *Linn.*, *apud Bodd. Table Pl. Ent.* p. 29 (1783).
T. pilaris, *Linn.*, *apud Bodd. Table Pl. Ent.* p. 29 (1783).
Sylvia musica, (*Linn.*), *Sav. Orn. Tosc.* i, p. 211 (1727).
T. minor, *philomelos*, *Brehm*, *Vög. Deutschl.* p. 312 (1831).
Merula musica, (*Linn.*), *Selby*, *Brit. Orn.* i, p. 162 (1833); *Rüpp.*
Syst. Uebers., p. 60 (1845).
Hab. Europa, Africa.

12. **T. viscivorus**, *Lin. C* N. v. El drene.

(M. S. T.)

- La grosse Grive, *Briss. Orn.* ii, p. 200 (1760).
T. viscivorus, *Linn. Syst. Nat.* i, p. 291 (1766); *Scop. Ann.* i, p. 132 (1769); *Lath. Gen. Syn. Supp.* i, p. 285 (1787); *Gmel. Syst. Mat.* i, p. 806 (1788); *Lath. Inst. Orn.* i, p. 326 (1790); *Bechst. Naturg. Deutschl.* iv, p. 181 (1795); *in. Orn. Taschenb.* i, p. 143 (1802); *Wol. Taschenb.* i, p. 191 (1810); *Pallas. Zoogr. Ross.-Asiat.* i, p. 454 (1811); *Tennm. Man. d'Orn.* p. 86 (1815); *Koch. Syst. baier. Zool.* i, p. 174 (1816); *Tennm. Man. d'Orn.* i, p. 161 (1820); *Naum. Vög. Deutschl.* ii, p. 248 (1822); *Ménétr. Cat. Rais. Cauc.* p. 29 (1832); *Gould. B. Eur.* ii, pl. 77 (1837); *Keys. u. Blas. Wirb. Eur.* pp. li, 177 (1840); *Nordm. Denim. Vög. Rus. mérid.* iii, p. 125 (1840); *Werner. Atlas. Insectiv.* pl. 11 (1842); *Gray. Gen. B.* i, p. 218 (1847); *Degl. Orn. Eur.* i, p. 467 (1849); *Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 160 (1849); *Bp. Conspl.* i, p. 269 (1850); *Cab. Mus. He'n.* i, p. 2 (1850); *Licht. Nomencl. Br.* p. 25 (1854); *Schl. Vög. Nederl.* p. 208 (1854); *Horsf. & Moore. Cat. B. Mus. E. I. Co.* i, p. 194 (1854); *Sundev. Sv. Fogl.* p. 49 (1856); *Jaub. et Barth. Lapom. Rich. Orn.* p. 204 (1859); *Linderm. Vög. Griechenl.* p. 86 (1860); *Nwt. List B. Eur. Blasius*; p. 9 (1862); *Degl. et Gerbe. Orn. Eur.* i, p. 418 (1867); *Locke. Exptl. Sci. Algér.* Ois. i, p. 183 (1867); *Gould. B. Gt. Br.* ii, pl. xxxiii. (1869); *Heugl. Orn. N.-Afr.* i, p. 379 (1869); *Gray. Hand-L. B.* i, p. 253, n.^o 3667 (1869); *Dodderl. Avf. Sicil.* p. 106 (1869); *Drost. Vogelw. Borkum.* p. 93 (1869); *Fritsch. Vög. Eur.* p. 135 (1870); *Salvad. Faun. Ital. Ucc.* p. 78 (1871); *Sharpe. & Dresser. B. Eur.* pt. vi, 41871); *Newton, ed. Yarr. Brit. B.* i, p. 258 (1872); *Harting. Handb. Br. B.* p. 11 (1872); *Shelley. B. Egypt.* p. 65 (1872); *Severtz. Turkest. Jevotn.* p. 65 (1873); *Dresser. Ibis.* 1875 p. 334; *Irby. B. Gibr.* p. 73 (1875); *Blanford. East. Pers.* ii, p. 157 (1876); *Tacz. Bull. Soc. Zool. France.* i, p. 146 (1876); *Bogd. B. Cauc.* p. 78 (1879); *Seehoem. Cat. B. M.* 5, p. 194 (1881).
La Draïne, *Montb. Hist. Nat. Ois.* iii, p. 295 (1775).
La Drenne, *Daubent. Pl. Ent.* n.^o 489 (1775).
Missel Thrush, *Lath. Gen. Syn.* ii, pt. i, p. 16 (1783).
Sylvia viscivora, (*Linn.*), *Sav. Orn. Tosc.* i, p. 208 (1827).
Xocossyphus viscivorus, (*Linn.*), *Kauf. Natürl. Syst.* p. 145 (1829).
T. major, *arboreus*, *Brehm*, *Vög. Deutschl.* p. 379 (1831).
Merela viscivora, (*Linn.*), *Selby*, *Brit. Orn.* i, p. 158 (1833); *Rüpp. Syst. Uebers.* p. 60 (1845).
T. Hodgsoni, *Honeyer*, *Rhea*, ii, p. 150 (1849); *Bp. Conspl.* i,

p. 269 (1850); *Gray*, *Handl. B.* i. p. 253, n. 3658 (1861).
Hume, *Nests and Eggs Ind. B.* p. 236 (1873).
F. bonapartei, *Cab. Journ. Orn.* 1870, p. 183.
Hab. Europa, Africa, Himalaya.

13. **T. mustelius**, *Gm. ♂ N. v.*

(M. S. T.)

Tawny Thrush, *Lath. Gen. Syn.* ii, pt. 1, p. 28 (1783), *ex Pennant*.
T. mustelinus, *Gmel. Syst. Nat.* i. p. 817 (1788), *ex Penn.*
Lath., *Lath. Ind. Orn.* i. p. 331 (1790); *Vieill. Ois. Amér.* sept. ii. p. 6, pl. lixii (1807); *Vieill. N. Dict. d'Hist. Nat.* xx. p. 241 (1818); *Audub. Orn. Biogr.* i. p. 372 (1831); *Bp. Comp. List. B. Eur. & N. Amer.* p. 17 (1838); *D'Orb.*, *La Sagra's Cuba*, *Ois.* p. 49 (1838); *Cossé*, *B. Jaraica*, p. 144 (1847); *Grab.*, *Gen. B.* i. p. 219 (1847); *Bp. Conspl.* i. p. 270 (1850); *Cab. Mus. Hein.* i. p. 5 (1850); *Baird*, *Gass. & Laur. B. N. Amer.* p. 212 (1858); *Sclat. P. Z. S.* 1859, p. 362; *id. Amer. B.* p. 2 (1862); *Baird*, *Review*, p. 13 (1864); *Gray*, *Handl. B.* i. p. 254, no. 3679 (1869); *Coues*, *Key N. Amer. B.* p. 72 (1872); *Baird*, *Brewer, & Ridgw. Hist. N. Amer. B.* i. p. 7 (1874); *Salv. & Godw.*, *Biol. Centr.-Amer. Zool., Aves*, i. p. 9 (1879); *Seeböhm*, *Cat B. Mus.* 5, p. 190 (1881).

T. melodes, *Bartr. Trav.* p. 290 bis (1791).

T. melodius, (*Bartr.*), *Wilson*, *Amer. Orn.* i. p. 29, pl. ii. fig. 1 (1808).

T. melodius, (*Bartr.*), *Bp. Journ. Phil. Acad.* iv. p. 33 (1824).

Merula mustelinus, (*Gmel.*), *Penny P. Z. S.* 1847, p. 38.

Turdus densus, *Bp. Compt. Rend.* xxxviii. p. 2 (1854).

T. (Hylocichla) mustelinus, (*Gmel.*), *Coues*, *Birds Colorado Vall.* p. 28 (1878).

Hab. América, Canadá.

14. **T. pallasi**, *Cab. ♂ N. v.* Culin.

(M. S. T.)

Turdus pallasi, *Cab.**

T. solitarius, *Wilson*, *Amer. Orn.* v. p. 95, *nec* pl. xlvi, fig. 2 (1812, *nec* Müll., *nec* Gmel.); *Bp. Comp. List. B. Eur. & N. Amer.* p. 17 (1838); *Audub. B. Amer.* iii. p. 29, pl. cxlvii. (1841); *Gray*, *Gen. B.* i. p. 219 (1847); *Bp. Conspl.* i. p. 270 (1850).

T. minor, *Gmel. apud Bp. Journ. Phil. Acad.* iv. p. 33 (1824), *apud* *Audub. Orn. Biogr.* i. p. 303, pl. lviii. (1831)

Merula solitaria, (*Wilson*), *Swe. Faun. Bor.-Amer. Birds*, ii. p. 184 pl. xxxxv. (1831).

T. nanus, *Audub. Orn. Biogr.* v. p. 201, pl. ccxxix, (1830); *id. B. Amer.* iii. p. 32, pl. cxlvii. (1841); *Gray*, *Gen. B.* i. p. 219 (1847).

T. guttatus, (*Pall.*), *apud Cab. Tschudi's Faun. Per.* p. 187 (1846).

T. pallasi, *Cab. Arch. für Naturg.* 1847, p. 205; *Homeyer*, *Rhea*, ii. p. 147 (1849); *Cab. Mus. Hein.* i. p. 5 (1850); *Gundlach*, *Journ. Orn.* 1855, p. 470; *Baird*, *Review*, i. p. 14 (1864); *Gray*, *Handl. B.* i. p. 254, no. 3684 (1869); *Coues*, *Key N. Amer. B.* p. 72 (1872); *id. B. N. West*, p. 2 (1874); *Baird*, *Brewer, & Ridgw. Hist. N. Amer. B.* i. p. 18 (1874); *Hu-*

*

shaw, *Bull. Nut. Orn. Cub.*, p. 136 (1879); *Salv. & Godm. Biol. Centr.-Amer. Zool., Aves*, i. p. 13 (1879); *Seeböhm, Cat. B. M.*, 5, p. 199. (1881).

T. (*Hylocichla*) *pallasi*, (*Cab.*), *Coues, B. Col. Vall.*, p. 20 (1878).
Hab. América, Canadá, Cuba, California.

15. **T. leucauchen**, *Sclat* & N. v.

(M. S. T.)

Turdus leucauchen, *Sclater, P. Z. S.* 1858, p. 447; *Scl. & Salv. Ibis*, 1859, p. 6; *Sclater, P. Z. S.* 1859, p. 328; *id. Cat. Amer. B.*, p. 3 (1862); *Baird, Rev. Am. B.* i. p. 24 (1864); *Salvin, P. Z. S.* 1867, p. 132; *Lawr.* Ann. L.* New York, ix. p. 91 (1868); *Gray, Handl. B.* i. p. 257. n.º 3749 (1869); *Scl. & Salv. P. Z. S.* 1870, p. 838; *Seeböhm, Cat. B. Mus. S.*, p. 212 (1881).
Hab. Guatemala.

16. **T. grayii**, *Bp.* & N. v.

(M. S. T.)

Turdus helvolus, *Licht. Preis-Verz. Mex. Vög.* no. 85 (1830, de er. nulla); *Licht. Nom. Av. Mus. Zool Berol.*, p. 26 (1854); *Cab. Journ. Orn.* 1868, p. 57.
T. *grayii*, *Bp. P. Z. S.* 1837, p. 118; *Gray, Gen. B.* i. p. 219 (1847); *Bp. Compt. Rend.* xxxviii. p. 4 (1854); *Cab. Mus. H. n.* i. p. 4 (1850); *Sclater, P. Z. S.* 1859, p. 330; *Scl. & Salv. Ibis*, 1859, p. 5; *Cab. Journ. Orn.* 1860, p. 323; *Owen, Ibis*, 1861 p. 60; *Baird, Rev. Am. B.* p. 26 (1864), *parte*; *Lawr. Ann. L. N. H.* New York, ix. pp. 91-109 (1868); *Sumichrast. Mem. Bost. Soc. N. H.* i. p. 544 (1869); *Gray, Handl. B.* i. p. 257 no. 3741 (1869) *Frantzius, Journ. Orn.* 1869, p. 290; *Scl. & Salv. P. Z. S.* 1870, 1870 p. 836 *Grayson, Pr. Bost.* xiv. p. 276 (1871); *Scl. & Salv. Nomencl. Av. Neotr.* p. 1 (1873); *Seeböhm, Cat. B. M.*, 5, p. 219 (1881).

Planesticus grayii, (*Bp.*), *Bp. Compt. Rend.* xxxviii. p. 4 (1854).
P. *Iuridus*, *Bp. Compt. Rend.* xxxviii. p. 4 (1854).

Turdus tristis, *Swains.*, *apud Sclater, P. Z. S.* 1856, p. 294.
T. *Iuridus*, (*Bp.*), *Scl. & Salv. Nomencl. Av. Neotr.* p. 2 (1873).
Hab. Guatemala.

7 Gén. MERULA, LEACH.

17. **M. merula**, *Lin.* & N. v. El mirlo.

(M. S. T.)

Le Merle, *Briss. Orn.* ii. p. 227 (1760); *Montb. Hist. Nat. Ois.* iii. p. 330 (1775).

Le Merle de France, *Daub. Pl. Ent.* nos. 2 (♂), 555 (♂) (1775).
Turdus merula, *Lin. Syst. Nat.* i. p. 295 (1760); *Scop. Ann.* i. p. 134 (1769); *Lath. Gen. Syn. Suppl.* i. p. 285 (1787); *Gmel. Syst. Nat.* i. p. 831 (1788); *Lath. Ind. Orn.* p. 340 (1790); *Bechst. Naturg. Deutschl.* iv. p. 219 (1795); *id. Orn. Tachenb.* i. p. 149 (1802); *Wolf, Tachenb.* i. p. 199 (1810); *Pallas, Zool. Rossia-Asiat.* i. p. 449 (1811); *Temm. Man. d'Orn.* p. 91 (1815); *Koch, Syst. bauer. Zool.* i. p. 172 (1816); *Vieill. Dict. d'Hist. Nat.* xx. p. 244 (1818); *Temm. Man. d'Orn.* i.

- i. p. 168 (1820); *Nat. m. Vog. Deutschl.* ii. p. 326 (1822); *Ménatr. Cat. Rais. Can. p. 29* (1832); *Kijs, u. Blas. Wirb. Eur.* pp. li, 178 (1840); *Nordm. Démid. Voy. Russ. mérid* iii. p. 128 (1840); *Werner Atlas. Insectiv.* pl. 16 (1842); *Gray. Gen. B.* i. p. 218 (1847); *Degl. Orn. Eur.* i. p. 456 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 274 (1850); *Cab. Mus. Hein.* i. p. 3 (1850); *Licht. Nomencl. Av.* p. 25 (1854); *Schl. Vog. Nederl.* p. 204 (1854); *Sundev. Sv. Fogl.* p. 25 (1858); *Linderm. Vog. Griechentl.* p. 86 (1860); *Newt. List. B. Eur. Blasius,* p. 9 (1862); *Neut. Baring-Gou's Iceland,* p. 408 (1863); *Filippi. Tagg. Pers.* p. 347 (1865); *Degl. et Gerbe. Orn. Eur.* i. p. 399 (1867); *Doderl. Avif. Sicil.* p. 105 (1869); *Droste. Vogelw. Borkum.* p. 92 (1869); *Gray. Handl. B.* i. p. 255 no. 3097, (1869); *Heugl. Orn. N. O.-Afr.* p. 386 (1869); *Gogman. Azores,* p. 23 (1870); *Fritsch. Vog. Eur.* p. 147 (1870); *Salvad. Faun. Ital. Ucc.* p. 76 (1871); *Newt. ed Yarr. Br. B.* i. p. 280 (1872); *Sharpe & Dresser. B. Eur.* pt. x (1872); *Harting. Handb. Br. B.* p. 12 (1872); *Shelley. B. Egyp.* p. 66 (1872); *S. vertz. Turkest. Jevotv.* p. 64 (1873); *Irby. B. Gibr.* p. 74 (1875); *Dresser. Ibis.* 1875, p. 332; *Blanc. East. Pers.* ii. p. 157 (1876).
Blackbird, *Lath. Gen. Syn.* ii. p. 43 (1783);
Merula nigra, *Leach. Syst. Cat. Mamm. &c. Brit. Mus.* p. 20 (1816); *Forster. Syn. Cat. Br. B.* p. 51 (1817).
M. merula, (*Linn.*), *Boie. Isis.* 1822, p. 452; *Kaup. Natürl. Syst.* p. 137 (1829).
Sylvia merula, (*Linn.*), *Savi. Orn. Tosc.* i. p. 205 (1827).
Merula pinetorum, *truncorum*, *alticeps*, *carniolica*, *Brehm. Deutschl.* p. 372 (1831).
Turdus merula, *var. syriaca*, *Hempr. et Ehrenb. Symb. Phys. Aves.* fol. bb (1833).
Merula vulgaris, *Selby. Brit. Orn.* i. p. 167 (1833); *Gould. B. Eur.* ii. pl. 72 (1837); *Rüpp. Syst. Uebers.* p. 10 (1845); *Jaub. et Barth.-Lapomm. Rich. Orn.* p. 214 (1859); *Gould. B. Gr. Br.* ii. pl. 37 (1862); *Loche. Expl. Sci. Algér., Ois.* i. p. 192 (1867); *Scully. Str. F.* 1876, p. 139; *Bogd. B. Cauç.* p. 80 (1879).
M. major, *Brehm. Naum.* p. 281 (1855).
Turdus menegazzianus, *Perini. Uccelli Veronesi*, p. 56 (1858).
T. dactylopterus, *Bp.*, *sive Gray. Handl. B.* i. p. 255 n.° 3714 (1869).
T. merula, *var. montana*, *Savi sive Salvad.*, *Dresser. B. Eur.* pt. x. (1872).
Merula merula, *Seeböhm. Cat. B. M.* 5. p. 235 (2881).
Hab. Europa, Francia.

18. *M. torquata*, Lin. ♂ N. v. Mirlo de collar.

(M. S. T.)

- Le Merle à collier, *Briss. Orn.* ii. p. 235 (1860); *Daubent. Pl. Enl.* no. 516 (1775).
Turdus torquatus, *Linn. Syst. Nat.* i. p. 296 (1766); *Scop. Ann.* i. p. 135 (1769); *Lath. Gen. Syn. Suppl.* i. p. 285 (1787); *Gmel. Syst. Nat.* i. p. 832 (1788); *Lath. Ind. Orn.* i. p. 343 (1790); *Bechst. Naturg. Deutschl.* iv. p. 214 (1795); *id. Orn. Taschenb.* i. p. 148 (1802); *Wolf. Taschenb.* i. p. 198 (1810);

- Pallas, *Zoogr. Rosso-Asiat.* i. p. 451 (1811); Temm. *Mal. d'Orn.* p. 90 (1815); Koch, *Syst. baier. Zool.* i. p. 173 (1816); Temm. *Man. d'Orn.* i. p. 166 (1820); Naum. *Vög. Deutsch.* ii. p. 318 (1822); Ménev. *Cat. Rais. Cauc.* p. 29 (1832); Keys. *n. Blas. Wirb. Eur.* pp. li, 177 (1840); Nordm. *Démid. Vög. Russ. mérid.* ii. p. 127 (1840); Werner. *Atlas. Insectiv.* pl. xv. (1842); Gray, *Gen. B.* i. p. 219 (1847); Degl. *Orn. Eur.* i. p. 458 (1849); Bp. *Consp.* i. p. 1274 (1850); Cab. *Mus. Hein.* i. p. 3 (1850); Schl. *Vög. Nederl.* p. 25 (1854); Licht. *Nomencl. Av.* p. 25 (1854); Sundev. *Sv. Fölg.* p. 52 (1856); Linderm. *Vög. Griechenl.* p. 85 (1860); Newton. *List B. Eur. Blasius.* p. 9 (1862); Degl. et Gerbe, *Orn. Eur.* i. p. 401 (1867); Doderl. *Avis. Sicil.* p. 106 (1869); Drost. *Vogelw. Borkum.* p. 92 (1869); Stengl. *Orn. N.O.-Afr.* i. p. 386 (1869); Gray, *Hond.-B.* i. p. 256, n.^o 3720 (1869); Fritsch, *Vög. Eur.* p. 146 (1870); Salvad. *Faun. Ital. Ucc.* p. 77 (1871); Newt. ed. Yarr. *Brit. B.* i. p. 287 (1872); Harting, *Haudb. Br. B.* p. 12 (1872); Shellcy. *B. Egypt.* p. 67 (1872); Sharpe & Dresser, *B. Eur.* pi. x. (1872); Irby, *B. Gibr.* p. 74 (1875); Blanf. *East. Pers.* ii. p. 158 (1876).
Le Merle à plastron blanc., *Moutb. Hist. Nat. Ois.* iii. p. 349 (1775).
Ring-Ouzel, *Lath. Gen. Syn.* ii. p. 146 (1783).
Merula torquata, (*Linn.*), *Boie, Isis*, 1822, p. 552; *Setby, Brit. Orn.* i. p. 169 (1833); *Gould, B. Eur.* ii. pl. 72 (1837); *Jaub. et Barth.-Lapowm. Rich, Orn.* p. 216 (1859); *Loche, Expl. Cé. Algér.*, *Ois.* p. 190 (1867); *Gould, B. Gr. Br.* ii. pl. xxxviii. (1873); *Bogd. B. Cauc.* p. 80 (1879); *Seeböhm, Cat. B. M.* 5. p. 246 (1881).
Sylvia torquata, (*Linn.*), *Savi, Orn. Tosc.* i. p. 206 (1827).
Copsichus torquatus, (*Linn.*), *Kaup, Natürl. Syst.* p. 157 (1829).
Merula mentana, collaris, alpestris, *Brehm, Vög. Deutschl.* p. 375 (1831).
Thoracocincla torquata, (*Linn.*), *Reich. Nat. Syst. pl. xlvi.* (1850).
Merula vociferans, maculata, *Brehm, Naum.* 1855, 281.
Hab. Europa, Alemania.

19. **M. obscura**, *Gmel.* ♂ ? N v Tamsi

(M. S. T.)

- Dark Thrush, *Lath. Gen. Syn.* ii. pt. i, p. 31 (1783).
Turdus obscurus, *Gmel. Syst. Nat.* i. p. 816 (1788, ex *Lath.*); *Lath. Ind. Orn.* i. p. 333 (1790); *Gray Gen. B.* i. p. 219 (1847); *Bp. Consp.* i. p. 273 (1850). *Mddend. Reis. Sbir.*, *Zool.* ii. pt. 2, p. 169 (1853); *Jaub et Barth.-Lapowm. Rich. Orn.* p. 214 (1859); *Swinhoe, Ibis*, 1863, p. 277; *Raddi, R. s. Sbir.*, *Vög.* p. 235 (1863); *Fritsch, Vög. Eur.* p. 143 (1870); *Swinhoe, P. Z. S.* 1871, p. 367; *Tacz. Journ. Orn.* 1872, p. 440; *Swinhoe, Ibis*, 1874, p. 443; *Blyth & Wald'n, B. Burm.* p. 99 (1875); *Tacz. Bull. Soc. Zool. France*, 1879, p. 148; *David et Oust. Ois. Chine*, p. 153 (1877); *Dresser, B. Eur.* pt. Ixix. (1878); *Hume & Davison, Stray Feath.* vi. p. 251 (1878); *Seeböhm, Ibis*, 1879, p. 4.
T. oocagaster, *Sparrm. Mus. Carls.* iv. pl. 85 (1789).
T. pallens, *Pallas, Zoogr. Pesso-Asiat.* i. p. 457 (1811); *Team.*

- et Schl., Faun. Japon., Aves, p. 63, pl. xxvii. (1847); Ctb. M.; Hein., i. p. 2 (1850); Swinh., Ibis, 1860, p. 56; Nrot. List. B. Eur., Blasius, p. 9 (1862); Salvad. Faun. Ital. Ucc. p. 82 (1871); Severtz. Turkst. Jeozu, p. 65 (1873); Dresser, Ib's, 1875, p. 334; Prjew. Rowley's Orn. Msc. ii. p. 198 (1877).
T. scyfertitzii, Brehm, Lehrb. eur. Vög. ii. p. 972 (1824).
T. rufulus, Drapiez, Dict. Class. d'Hist. Nat. x. p. 443 (1826); Gray, Hand-l. B. i. p. 256 n.^o 3728 (1869).
T. wernerii, Gémé, Mem. Ac. R. Tér. xxvii, p. 296, pl. 2 (1834).
T. pallidus, Gmel. apud Temm. Man. d'Orn. iii. p. 97 (1835, apud Degl. Orn. Eur. i. p. 461 (1849), apud Newt. List. B. Eur., Blasius, p. 9 (1862), apud Degl. et Gerbe, Orn. Eur. i. p. 402 (1867).
T. modestus, Blyton, P. Z. B. 1839, p. 103; Gray, Gen. B. i. p. 218 (1847).
T. javanicus?, Horsf. apud Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc. p. 161 (1849).
Planesticus obscurus, (Gmel.), Bp. Cat. Parzul. p. 5 (1836).
Turdus davidiensis, Milne-Edw. Nouv. Arch. du Mus. Hist. N. T. i. Bull. p. 26 (1825); Gray, Hand-l. B. i. p. 253. n.^o 3671 (1869).
T. chrysolaus, Temm., apud Godw.-Aust. J. A. S. Beng. xxxix. pt. 2, p. 101 (1870).
Geocichla obscura, (Fmel.), Jerdon, Ibis, 1872, p. 135.
Turdulus pallens, (Pall.), Godw.-Aust. J. A. S. Beng. xliii. pt. 2, p. 178 (1874).
Merula obscura, Seeböhm, 5. p. 273. (1881).
Hab. Luzón, Cagayan, Borneo, Japón, China, Malaca.

20 M chrysolaus, Tem. ♂ ♀ N. v. Tams.

(M. S. T.)

- Turdus crysolous, Temm. Pl. Col. ii. pl. 537 (1831); Temm. et Schleg. Faun. Japon., Aves, p. 64, pl. xxviii. (1847); Bp. Conspe. i. p. 273 (1850); Licht. Nomencl. Av. p. 25 (1854); Swinhoe, Ibis, 1860, p. 56; Schrenck, Reis. u. Forsch. Amur. i. p. 352 (1860); Selater, Ibis, 1863, p. 197; Swinhoe, Ib's, 1863, p. 276; id. P. Z. S. 1863, p. 280; Gray, Hand-l. i. p. 256 n.^o 3724 (1869); Sinh. Ibis, 1870, p. 248; id. P. Z. S. 1871, p. 367; David et Oust. Ois. Chine, p. 152 (1877); Blakiston & Pryer, Ibis, 1878, p. 241.
T. chrysolous, Temm. Pl. Col. ii. text to pl. 537 (1831).
T. chrysolutus, Temm., fide Gray, Gen. B. i. p. 219 (1847).
Merula chrysolaus, Seeböhm, 5. p. 275. (1881).
Hab. Luzón, Laguna.

S. Gén ERITHACUS, Cuv.

21 E. calliope, (Pall.) ♂ ♀ N. v. Iolin.

(M. S. T.)

- Motacilla calliope, Pall. Reis Russ. Reichs, iii. p. 697 (1776).
Kamtschatka Thrush, Lath. Gen. Syr. ii. p. 28 (1783).
Turdus camtschatkensis, Gmel. Syst. Nat. i. p. 817 (1788, ex Lath.).
T. calliope, (Pall.), Lath. Ind. Orn. i. p. 331 (1790).

- Accentor calliope, (Pall.), *Temn. Mtn. d'Orn.* iii. p. 172 (1835).
Calliope lathani, *Gould.*, *B. Eur.* ii. pl. 113 (1837); *Blyth.*, *J. A. S. Beng.* xi. p. 112 (1842).
Lusciola calliope, (Pall.), *Krys. u. Blas. Wirtz. Eur.* pp. lviii 190 (1840); *Temn. et Schleg. Faun. Japon. Azz.*, p. 57 (1847).
Calliope camtschatkensis, (Gmel.), *Strickl. Ann. Nat. Hist.* vi. p. 422 (1841); *Blyth. J. A. S. Beng.* xvi. p. 134 (1847); *id. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 149 (1849); *Blyth. Conspectus* i. p. 295 (1850); *Cab. Mus. Hein.* i. p. 1 (1850); *Horsf. & Moore. Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 313 (1854); *Jaub. et Barth. Lipogramm. Rich. Orn.* p. 236 (1859); *Dugl. et Gerbe. Oiseaux. Eur.* i. p. 464 (1867); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 359; *Dresser. B. Eur.* pt. xlvi. (1875); *Blyth. & Wald. B. Burm.* p. 101 (1875); *Seesbohm. Ibis.* 1879, p. 7; *Gould. B. Asia.* pt. xxxi. pl. 8 (1879).
Cyanecula calliope, (Pall.), *Gray. Gen. B.* i. p. 182 (1848).
Erythacus calliope, (Pall.), *Degl. Orn. Eur.* i. p. 514 (1840); *Seesbohm. Cat. B. M. S.* p. 305. (1881).
Sylvia (Calliope) kamtschatkensis, (Gmel.), *Middend. Reis Sicir. Zool.* ii. pt. 2, p. 174 (1853).
Calliope kaantschatecensis, (Gmel.), *Hartl. Journ. Orn.* 1859, p. 50; *Jerdon. B. Ind.* ii. p. 150 (1863).
Eritaazus ignigularis, *Dabois. Oiseaux. Eur.* pl. 61 (1762).
Meledes calliope, (Pall.), *Newt. List B. Eur. Blasius.* p. 10 (1862).
Lusciola (Calliope) kantschakeensis, (Gmel.), *Ritter. Riss. Sibir. Vög.* p. 248 (1863).
Cyanecula camtschatkensis, (Gmel.), *Gray. Handb. B.* i. p. 224. n.º 3202 (1859).
Lusciola (Meledes) calliope, (Pall.), *Fritsch. Vög. Eur.* p. 184 (1870).
Calliope kantschakeensis, (Gmel.), *Godwi.-Aust. J. A. S. Beng.* xxix. pt. 2, p. 270 (1850); *Tazz. Bull. Soc. Zool. France*, p. 143 (1876); *Prjev. Rjewly's Orn. Miss.* ii. p. 133 (1877); *Hinz* vi. p. 337 (1878).
Hab. Luzón, Liguria, Manila, Mindabaya; China, Calcuta, Nepal, India.

9. Gén. MONTICOLA, Briss.

22. M. affinis, Blyth, ♂ ? N. v. Solitario.

(M. S. T.)

- Petrocincla affinis, *Blyth. J. A. S. Beng.* xii. p. 177* (1843, *partim*).
Turdus (Monticola) erythropterus, *Gray. P. Z. S.* 1859, p. 35*.
Petrocossyphus cyaneus, (Linn.), *apud* *Jerd. B. Ind.* i. p. 512 (1862), *apud* *Blyth & Watf. B. Burm.* p. 99 (1875, *partim*).
Monticola affinis, (*Blyth*), *David et Oost. Oiseaux. Chine*, p. 162 (1877).
Monticola cyanus solitaria, *Seeb. Cat. B. M. S.* p. 315 (1881).
Hab. Luzón, Formosa, China, Japan.

23. M. solitaria, Briss. ♂ N. v. Solitario.

(M. S. T.)

- Le Solitaire de Manille, *Brisson. Orn.* ii. p. 270, pl. xxviii, fig. 2 (1760).

- Le Solitaire de Philippines, *Briss. Orn.* iii. p. 272, pl. xxviii. (1760).
- Le Merle solitaire de Manille, *Méth. Hist. Nat. Ois.* iii. p. 3⁶ (1775); *Daubent. Pl. Ent.* n. 564, fig. 2 (1775); *id. Pl. En.* n.^o 636 (1775, t.).
- Le Merle solitaire de Philippines, *Méth. Hist. Nat. Ois.* iii. p. 364 (1775); *Daubent. Pl. Ent.* n.^o 339 (1775).
- Turdus solitarius, *P. L. S. Müll. S. N.*, *Anhang*, p. 142 (1776); *Gray, Handl. B.* i. p. 260, n. 3807 (1869).
- T. philippensis, *P. L. S. Müll. S. N.*, *Anhang*, p. 145 (1776); *Bodd. Tabl. Pl. Ent.* p. 21 (1783); *Gray, Gen. B.* i. p. 220 (1847); *id. Handl. B.* i. p. 255, n. 3807 (1859).
- Pensive Thrush, *Lath. Gen. Syn.* ii. p. 53 (1783).
- Hermit Thrush, *Lath. Gen. Syn.* ii. p. 54 (1783).
- Turdus manilla, *Bodd. Tabl. Pl. Ent.* p. 39. (1783)
- T. manillensis, *Gmel. Syst. Nat.* i. p. 833 (1788); *Lath. Ind. Orn.* i. p. 345 (1790); *Vieill. N. Dict. d'Hist. Nat.* xx. p. 288 (1818); *Gray, Gen. B.* i. p. 220 (1847); *Temm. et Schleg. Faun. Japon. Aves.* p. 6 (1857).
- T. eremita, *Gmel. Syst. Nat.* i. p. 833 (1788); *Lath. Ind. Orn.* i. p. 346 (1790); *Vieill. N. Dict. d'Hist. Nat.* xx. p. 288 (1818).
- Petrocincla manillensis, (*Gmel.*), *Blyth. J. A. S. Beng.* xi. p. 460 (1842); *id. J. S. Beng.* xvi. p. 151 (1847); *id. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 164 (1849); *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 188 (1854); *Cassin, Perry's Exp. to Japan.* p. 240 (1856); *Swinhoe, Ibis,* 1862, p. 307.
- P. eremita, (*Gmel.*), *Bp. Conspl.* i. p. 297 (1850).
- Petrocossyphus manillensis, (*Gmel.*), *Bp. Conspl.* i. p. 297 (1850); *Swinhoe, Ibis,* 1860, p. 56.
- Petrocincla violacea, *Swinhoe, Zoolologist*, p. 6228.
- P. manilla, (*Bodd.*) *Swinhoe, P. Z. S.* 1871, p. 368.; *Tacz. Bull. Soc. Zool. France*, 1870, p. 149.
- Manticola solitaria, (*Müll.*), *Wald. Tr. Z. S.* viii. p. 63 (1872); *id. Tr. Z. S.* ix. p. 162 (1875); *Dwid. et Oust. Ois. Chine*, p. 161 (1878); *Seehöhm, Cat. B. M.* 5. p. 319 (1881).
- Cyanocincla solitaria, (*Müll.*), *Hum. & Divson, Str. F.* vi. p. 248 (1878).
- Hab.* Luzón, Laguna, Panay, Guimarás, Negros, Panón, Leyte, Samar, Paragua, Mindanao, Basilan, Balabac.

. Gén. SIALIA, Sw.

24 **S. sialis.** (*Lin.*) ♂♂ N. v. Pipit-tolog. (M. S. T.)

- La Rouge-gorge bleue de la Caroline, *Briss. Orn.* iii. p. 423 (1760).
- Motacilla sialis, *Linn. Syst. Nat.* i. p. 336 (1760).
- Le Rouge-gorge bleu de l'Amérique septentrionale, *Buff. Hist. Nat. Ois.* v. p. 212 (1778).
- La Gorge-rouge de la Caroline, *Daubent. Pl. Ent.* n.^o 396 (1778).
- Blue Warbler, *Lath. Gen. Syn.* ii. p. 446 (1783).
- Motacilla scalis, *Gmel. Syst. Nat.* i. p. 989 (1788), probable misprint.

- Sy'ia sialis, (Linn.), *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 522 (1790); *Jard. ed. Wilson's Amer. Orn.* p. 55 pl. iii. fig. 3 (1832).
Ceanthe sialis, (Linn.), *Vieill. N. Dict. d'Hist. Nat. Ois.* xxi. p. 417 (1818).
Saxicola sialis, (Linn.), *B. Ann. Lyc. N. York.* ii. p. 89 (1826).
Sialia wilsonii, *Swains. Zool. Journ.* iii. p. 173 (1827); *Bp. Comp. List B. Eur. & N. Amer.* p. 16 (1839); *Audub. B. Amer. Svo.* ii. p. 171, pl. cxxxiv. (1839); *Gray. Gen. B.* i. p. 184 (1840); *Bp. Coues.* i. p. 298 (1850); *Cab. Mus. Hein.* i. p. 7 (1850); *Sel. Cat. Amer. B.* p. 10 (1862, partim); *Gray. Hand-l. B.* i. p. 229, n.^o 3312 (1869).
Ampelis sialis, (Linn.), *Nuttall. Man. Orn.* i. p. 444 (1832).
Erythaca (Sialia) wilsonii, (Swains.), *Sw. & Rich. Faun. Bor.-Amer. Birds.* p. 210 (1831).
Sialia sialis, (Linn.), *Haldemann. Tregg's Geogr. Pennsylv.* p. 77 (1843); *Baird. Cass. & Lawr. B. N. Amer.* p. 222 (1858); *Baird. Review.* i. p. 62 (1874); *Coues. Key N.-Amer. B.* p. 76 (1872); *Coues. B. N. West.* p. 13 (1874, parte); *Baird. Brewer. & Ridgw. Hist. N.-Amer. B.* i. p. 62 (1874); *Coues. Birds Colorado Wall.* p. 77 (1878, parte); *Salv. & Godm. Biol. Centr.-Amer. Zool. Aves.* i. p. 45 (1879, parte); *Seeboh. Cat. B. M. 5.* p. 329 (1883).
Luscina scialis, (Linn.), *Giebel. Reich. Nat. Vög.* p. 44 (1860).
Scialia scialis, (Linn.), *Le Moine. Ois. Canad.* p. 202 (1861).
Hab. Luzón, Laguna; Cuba, Canadá.

9 Gén. RUTICILLA, BREHM.

25. R phoeniceus, Lin. ♂ N. v

(M. S. T.)

- Le Rossignol de muraille cendré, *Briss. Orn.* iii. p. 406 (1760).
Le Rouge-queue à collier, *Briss. Orn.* iii. p. 411 (1760).
Le Rossignol de muraille, *Briss. Orn.* iii. p. 403 (1766); *Buff. Hist. Nat. Ois.* v. p. 170 (1778); *Daubent. Pl. Ent.* n.^o 351 (1778).
Motacilla phoeniceus, *Linn. Syst. Nat.* i. p. 335 (1766); *Gmel. Syst. Nat.* p. 987 (1788); *Bechst. Naturg. Deutschl.* iv. p. 609 (1795).
Redstart, *Lath. Gen. Syn.* ii. p. 421 (1783).
Sylvia phoeniceus, (Linn.), *Lath. Gen. Syn. Suppl.* i. p. 287 (1787); *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 511 (1790); *Bechst. Orn. Taschenb.* i. p. 181 (1802); *Wolf. Taschenb.* i. p. 244 (1810); *Temm. Man. d'Orn.* p. 119 (1815); *Vieill. N. Dict. d'Hist. Nat.* xi. p. 267 (1817); *Temm. Man. d'Orn.* i. p. 220 (1820); *Ménétr. Cat. Rais. Canc.* p. 35 (1832, partim); *Nordm. Démid. Voy. Russ. mérid.* iii. p. 335 (1840); *Wernr. Atlas. Insectiv.* pl. 52 (1842).
Saxicula phoeniceus, (Linn.), *Koch. Syst. baier. Zool.* i. p. 188 (1816).
Piccelula phoeniceus, (Linn.), *Boie. Isis.* 1822, p. 553; *Hengl. Syst. Uebers.* p. 25 (1856).
Ruticilla sylvestris, *Brehm. Vög. Deutschl.* p. 363 (1831).*
R. arborea, *Brehm. Vög. Deutschl.* p. 363 (1831).*
R. tortensis, *Brehm. Vög. Deutschl.* p. 364 (1831).*

- Phoenicura muraria, Swains. & Rich. Faun. Bor.-Am. ii. p. 4²⁸ (1831).
Ficedula ruficilla, Eyton, Cat Brit. B. p. 10 (1836).
Phoenicura ruficilla, (Eyton), Gould, B. Eur. ii. pl. 95 (1837);
Swains, Classif. B. ii. p. 240 (1837).
Ruticilla phoenicura, (Linn.), Bp. Comp. List B. Eur. & N. Amer. p. 15 (1838); Bapp. Syst. Uebers. p. 57 (1845); Gray, Gen. B. i. p. 180 (1846); Bp. Conspl. i. p. 296 (1850); Cab. Mus. Hein. i. p. 2 (1850); Moore, P. Z. S. 1854, p. 25; Hartl. Orn. W.-Afr. p. 68 (1857); Jaub. et Barth. Lapom. Rich. Xrn. p. 230 (1859); Newt. List B. Eur. Blasius, p. 10 (1862); Jerd. B. Ind. ii. p. 136 (1863); Filippi, Viagg. Pers. p. 347 (1865); Degl. et Gerbe, Orn. Eur. i. p. 438 (1867); Loche, Expl. Sci. Algér., Ois. i. p. 215 (1867); Gould; B. Gt. Br. ii. pl. li. (1869); Gray, Handb. B. i. p. 221, n.^o 3153 (1869); Heugl. Orn. N. O.-Afr. i. p. 333 (1869); Doderl. Avis. Sier. p. 115 (1869); Drost, Vogelw. Borkum, p. 94 (1869); Harting. Handb. Br. B. p. 12 (172); Shelley, B. Egypt, p. 82 (1872); Newt. ed. Yarr. Br. B. i. p. 329 (1873); Severtz. Turkest. Jevotn. p. 65 (1873); Dresser, B. Eur. pt. xxvi. (1864); Irby, B. Gibr. p. 81 (1875); Dresser, Ibis, 1876, p. 77; Blanf. East. Pers. ii. p. 163 (1876); Tacz. Bull. Soc. Zool. France, i. p. 143 (1876); Bogd. B. Cau. p. 95 (1879); Scebohm, Ibis, 1880, p. 191; id. Cat. B. 5 p. 336 (1881).
Lusciola phoenicurus, (Linn.), Keys. u. Blas. Wirb. Eur. pp. lviii, 191 (1840); Schl. Rev. Crit. p. xxxi. (1844); Linderm. Vög. Griechent. p. 105 (1860).
Erithacus phoenicurus, (Linn.), Degl. Orn. Eur. i. p. 502 (1849).
Luscina phoenicurus, (Linn.), Sundev. Sv. Fogl. p. 59 (1856).
Sylvia (Ruticilla) phoenicura, (Linn.), Radde, Reis. Sibir. Vög. p. 254 (1863).
Lusciola (Ruticilla) phoenicura, (Linn.), Fritsch, Vög. Eur. p. 186 (1870).
Hab. Europa, Alemania, Africa.

Fam. TIMÉLIDOS.

Subfam. BRAQUIPODINOS.

i. Gén. AEGITHINA, VICIL

1. **Aeg. viridis**, (Bp.) ♂♂ N. v. Curibangao. (M. S. 1)
- Turdus scapularis, Raffles, Trans. Linn. Soc. xiii. p. 341 (nec Horsf.).
Iora viridis, Bp. Censpl. i. p. 397 (ex Temm. MSS. in Mus. Lugd.*).
I. scapularis, (nec Horsf.), Blyth, J. A. S. Beng. xiii. pt. 1, p. 381; id. Cat. B. Mus. As. Soc. p. 214; id. Ibis, 1870, p. 103; Salvad. Ucc. Born. p. 190; Sharpe, Ibis, 1877, p. 14; id. Trans. Linn. Soc. new. series, Zool. i. p. 333; id. P. Z. S. 1879, p. 339.

*

Aegithina viridis, *Tweedd. Ibis*, 1877, p. 304; *id. P. Z. S.* 1878,
p. 619. *Sharpe, Cat. B. M.* 6, p. 11. (1881).
Æ. scapularis, *Salvad. Ann. Mus. Civic. Genov.* xiv, p. 216.
Hab. Paragua, P. Princesa, Borneo, Sumatra.

2. Gén. CHLOROPSSIS, JARD.

2. *Ch. palawanensis*, *Sharpe, C. O. N.* v. Calandinao. (M. S. T.)

Phyllornis palawanensis, *Sharpe, Trans. Linn. Soc.* 2nd series,
Zool. vol. i, p. 333, pl. 50, figs. 1, 2; *Tweeddale, P. Z. S.*
1878, p. 619.

Chloropsis palawanensis, *Sharpe, Cat. B. M.* 6, p. 33. (1881).
Hab. Paragua, P. Princesa.

2. *Ch. flavipectus*, *Tweed. C. O. N.* v. Calindao.

Phyllornis flavipectus, *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 761, pl. lxxvii.
fig. 1.

Chloropsis flavipectus, *Sharpe, Cat. B. M.* 6, p. 34. (1881).
Hab. Cebú.

3. *Ch. nigricollis*, (*Vicill.*) *C. O. N.* v. (M. S. T.)

Le Verdin de la Cochinchina, *Daub. Pl. Ent.* 643, f. 3; *Buff. H. Nat. Ois.* III, p. 392.
Turdus cochinchinensis, *Gm. S. N.* i, p. 825 (*ex Daubj.*; *Audeb.*,
et Vicill. Ois. Dor. ii, pls. 77, 78).

Philemon nigricollis, *Teill. Nov. Diet.* XXVII, p. 432.
Pylornis cochinchinensis, *Tem. Pl. Col.* 484, f. 2; *Less. Rec. Zool.* 1840, p. 164; *Gray, Gen. B.* i, p. 124; *Bp. Conspl.* i, p. 396 (*pt.*); *Gray, Hand-l. B.* i, p. 277, n.^o 4080; *Wald. Ibis*,
1871, p. 169.

Chloropsis nigricollis, *Nichols. Ibis*, 1881, p. 148; *Sharpe, Cat. B. Mus.* 6, p. 27. (1881).
Hab. Java.

3. Gén. IXOCINCLA, BLYTH.

4. I. *crassirostris*, *E. Newt. N.* v.

Hypsipetes crassirostris, *E. Newt. P. Z. S.* 1867, p. 334; *id. Ibis*, 1867, p. 334. *Gray, Hand-l. B.* i, p. 273, n.^o 3996; *A. Newt. in Rowlay's Orn. Misc.* ii, p. 52, pl. xlvi, figs. 4a, 4b; *Oustal. Bull. Soc. Philom.* 5 (7) i, p. 101; *Hartl. Vog. Madag.* pp. 137, 409; *Oustal. Bull. Soc. Philom.* 1878, p. 172.
Ixocincla crassirostris, *Sharpe, Cat. B. M.* 6, p. 47. (1881).
Hab. Marianas.

4. Gén. IOLE, BLYTH.

5. I. *olivacea*, *Blyth. C. O. N.* v. (M. S. T.)

Iole olivacea, *Blyth. J. A. S. Beng.* xiii, p. 380, xiv, p. 573;

id. Cat. B. Mus. As. Soc. p. 207; *Bp. C.* (p. i. p. 261; *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 254; *Salvad. Ucc. Born.* p. 210; *Sharpe, Ibis, 1870,* p. 40; *id. Cat. B. M. o.* p. 55. (1881); *Tweedd. Ibis, 1877* p. 307.

Criniger, sp., *Gray, Gen. B.* i. p. 236, sp. 10.

C. charlotta, *Finsch, J. f. O.* 1867, p. 19; *Gray, Hand-l. B.* i. p. 274, no. 4033; *Giebel, Thes. Orn.* i. p. 811.

Trichophorus brunneus, *S. Müll. in Mis, Lugd.*: *Finsch, t. c.* p. 19; *Blyth, Ibis, 1870,* p. 170.

Criniger olivaceus, *Gray, Hand-l. B.* i. p. 275, no. 4048 (*nee Swains.*)

Hab. Luzon, Laguna, Bataan, Orion; Borneo, Malaca.

6. I. *everetti*. *Tweedd.* ♂ N. v.

(M. S. T.)

Criniger everetti, *Tweedd. Ann. & Mag. Nat. Hist.* (4) xx p. 535; *id. P. Z. S.* 1877, p. 827, pl. Ixxxiv., et 1878, p. 110. *Sharpe, Cat. B. M.* p. 57. (1881).

Hab. Panaon, Dinagat, Samar, Paranas, Leyte, Surigao, Mindanao.

7. I. *rufigularis*. *Sharpe, ♂ N. v.*

(M. S. T.)

Hypsipetes rufigularis, *Sharpe, Tr. Lin. Soc. Zool.* i. p. 335; *id. Cat. B. M. o.* p. 57. (1881); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 546, y 1878, p. 949.

Hab. Mindanao, Basilan, Malamaui, Pasananca, Zamboanga.

8. I. *philippensis*. *Montb. ♂ N. v.*

(M. S. T.)

La petite Grive des Philippines, *Montb. Hist. Nat. Ois.* iii. p. 316. Philippine Thrush, *Lath. Gen. Syn.* ii. part 1, p. 38.

Turdus philippensis, *Gm. Syst. Nat.* i. p. 814 (*ex Montb.*)

Galculus philippensis, *Kittl. Kupf. Vög.* p. 8, Taf. 12, fig. 2.

Hypsipetes philippensis, *Strikl. Ann. Nat. Hist.* xiii. p. 413; *Gray, Gen. B.* i. p. 238; *Bp. Conspl.* i. p. 261; *vou Martens, J. f. O.* 1866, p. 13; *Walten, Trans. Zool. Soc.* ix. p. 172; *Sharpe, Trans. Linnae. Soc. new series, Zool.* i. p. 335; *Tweedd. P. Z. k.* 1877, pp. 546, 696, 761, 827, et 1878, pp. 285, 242, 381.

Philedon gularis, *Cuv. Mus. Paris;* *Puchier, Arch. Mus.* vii. p. 344, pl. 18.

Microscelis philippensis, *Gray, Gen. B.* i. p. 235; *Bp. Conspl.* i. p. 263; *vou Martens, J. f. O.* 1866, p. 13; *Gray, Hand-l. B.* i. p. 268, no. 3917.

Hypsepetes gularis, *Gray, Hand-l. B.* i. p. 272, no. 3992.

1. *philippensis*, *Sharpe Cat. B. M. o.* p. 58 (1881).

Hab. Luzon, Laguna, Morong, Cagayan, Guimaras, Negros, Leyte, Samar, Borongan, Panaon, Cebu. Mindanao, Bohol, Marinduque.

8. I. *guimarasensis*, *Steere. N. v.*

Hab. Negros, Panay, Guimaras.

9 **I. mindorensis**, Steere, N. v.

Hab. Mindoro.

10 **I. siquijorensis**, Gm. N. v.

Hab. Siquijor.

5. Gén. POLILOPHUS, SHARPE

11 **P. urostictus**, Salv. ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Brachypus urostictus, Salvad. Atti R. Accad. Torino, v. p. 509.
Ixus² urostictus, Wald. Trans. Zool. Soc. ix p. 191, pl. xxii, fig. 2.
Poliolophus urostictus, Sharpe, Trans. Linn. Soc. new series, Zool. i. p. 334; id. Cat. B. M. 6. p. 63 (1881); Tweed. P. Z. S. 1877, p. 827, 1878, pp. 110, 380, 949.

Hab. Luzon, Laguna, Negros, Panaon, Dinagat, Mindanao; Surigao.

12 **P. basilanicus**, Steere, N. v.

Hab. Mindanao, Basilan, Java, Sumatra, Borneo.

6. Gén. MICROPUS, SWAIN.

13 **M. melanocephalus**, Gm. ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Black-headed Shrike, Lath. Gen. Syn. i. pt. i. p. 165, pl. vi.
Lanius melanocephalus, Gm. Syst. Nat. i. p. 369.
Turdus melanocephalus, Raffl. Trans. Linn. Soc. xiii. p. 310.
T. atriceps, Temm. Pl. Col. 147.
Ixos atriceps, Temm. Tabl. Méth. Pl. Col. p. 15.
Brachypodius melanocephalus, Blyth, J. A. S. Beng. xiv. p. 576;
id. Cat. B. Mus. As. Soc. p. 211; Horfs. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. i. p. 248; Moore, P. Z. S. 1854, p. 278; Salvad. Ucc. Born. p. 201; Blyth. & Wald. B. Burm. p. 136; Armstr. S. F. 1876, p. 324; Tweed. Ibis, 1877, p. 307; id. P. Z. S. 1878, p. 608; Hume, Str. F. 1878, p. 318, 1879, p. 98; Sharpe, P. Z. S. 1879, p. 339; Salvad. Ann. Mus. Civic. Genov. xiv. p. 221.
Ixos metallicus, Eytou. Ann. Nat. Hist. xvi. p. 228.
Pycnonotus melanocephalus, Strickl. P. Z. S. 1846, p. 101; Gray, Gen. B. i. p. 237; id. Hand-l. B. i. p. 270, no. 3972.
P. metallicus, Gray, Gen. B. i. p. 237; id. Hand-l. B. i. p. 271, no. 3973.
Brachypus melanocephalus, Bp. Conspl. i. p. 264.
Prosecusa melanocephala, Cab. Mus. Hein. Th. i. p. 110.
Ixus melanocephalus, Schl. Handl. Dierk. i. p. 272.
Brachypodius immaculatus, Sharpe, Ibis, 1876, p. 39, 1877, p. 14.
Micropus melanocephalus, Skarpe, Cat. B. Mus. 6. p. 65 (1881).
Hab. Paragua, P. Princesa; Sumatra, Java, Borneo, Melaka.

7 Gen. CRINIGER TEM

14. **C. frater**, Sharpe, ♂♂ N. v. Piroc piroc.

(M. S. F.)

Criniger frater, Sharpe, *Tr. Linn. Soc. 2nd. series, Zool.* vol. i, p. 334; *id. Cat. B. M. 6.* p. 79 lam. v. (1881). *Tweedt. P. Z. S.* 1878, p. 619.
Hab. Paragua, P. Princesa, Balabac.

15. **C. palawanensis**, Tweedt. ♂♂ N. v.

(M. S. F.)

C. palawanensis, *Tweedt. P. Z. S.* 1878, p. 618; *Sharpe, Cat. B. M. 6.* p. 83 lam. 6 fig. 2 (1881).
Hab. Paragua, P. Princesa.

8 Gén. PYCNONOTUS, Boie.

16. **Pyc. goiavier**, (Scop.) ♂ ♀ N. v. Guayabero.

(M. S. F.)

Petit Goiavier de Manille, Sonn. *Voy. Nouv. Guin.* p. 59, pl. 28.
Guava Flycatcher, Lath. *Gen. Syn.* ii. pt. 1, p. 335.
Muscicapa goiavier, Scop. *Del. Faun. et Flor. Insulr.* ii. p. 96 (*ex Sonn.*)
M. psdii, *Gm. Syst. Nat.* i. p. 941 (*ex Sonn.*)
Pycnonotus goiavier, Gray, *Gen. B.* i. p. 237; *id. Hand-l. B.* i. p. 269, no. 3942; *Sharpe, Cat. B. M. 6.* p. 141 (1881).
Ledorusia goiavier, Cab. *Mus. Heiu.* i. p. 109.
Ixus goiavier, Wadd. *Tr. Z. S.* ix. p. 190; *Tweedt. P. Z. S.* 1877, pp. 546, 695, 87, 1878, pp. 110, 285, 342, 710, 949.
Hab. Luzon, Manila, Navotas, San Mateo, Montalban, Laguna, Caluan, Calamba, Cagayan, Leyte, Bohol, Negros, Nipah, Amparo, Mindanao, Surigao, Zamboanga, Pasananca, Samar, Basilan, Guimaras, Marinduque.

17. **Pyc. sinensis**, (Gm.) ♂ ♀ N. v. Culiac.

(M. S. F.)

Le Gobe-mouches verdâtre de la Chine, Scop. *Voy. Ind. Orient.* ii. p. 197.
Wreathed Flycatcher, Lath. *Gen. Syn.* ii. part 1, p. 336.
Muscicapa sinensis, Gm. *Syst. Nat.* i. p. 942.
Turdus occipitalis, Less. *Territ.* p. 410 (*descri. nullâ*); Eyd. & Gervais, *Mag. de Zool.* 1836, pl. 66; *id. Voy. Favorite, Zool.* p. 39, pl. 14.
Pycnonotus sinensis, Blyth, *J. A. S. Beng.* xiv. p. 569; *id. Cat. B. Mus. As.* *Soc.* p. 210; Gray, *Hand-l. B.* i. p. 270 no. 3948. *Sharpe, Cat. B. M. 6.* p. 149 (1881).
P. occipitalis, Gray, *Gen. B.* i. p. 237; Horsf. & Moore, *Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 246.
Ixus sinensis, Bp. *Consp.* i. p. 266; Cass. in *Perry's Exped. Japan.* ii. p. 244; Swinh. *Id. s.* 1863, p. 289; *id. P. Z. S.* 1863, p. 278; *id. P. Z. S.* 1871, p. 399; Wadd. *Tr. Z. S.* 191; David. & Oustalet, *Ois. Chin.* p. 149.
Hab. Luzon, Laguna, Cagayan, China, Formosa.

18 *Pyc cinereifrons*, *Tweit.* ♂ N. v.

(M. S. T.)

Brachypus cinereifrons, *Tweit.* *P. Z. S.* 1879, p. 617.

Pycnonotus cinereifrons, *Sharpe*, *Cat. B. M. 6.* p. 153 (1881).
Hab. Paragua, P. Princesa.

Subfam. IRENINOS.

I. Gén. IRENA, HORSE.

19. I. *cyanogastra* *Vigors*. ♂ N. v. Bella irene. (M. S. T.)

Irena cyanogastra, *Vigors*, *P. Z. S.* 1831, p. 97; *Gray & Mitch.* *Gen. B.* i. p. 288, pl. 70; *Bb. Conspl.* i. p. 349; *Ciss. U. S. Expl. Expl.* Aves, p. 143; *Gray, Handb. B.* i. p. 288; *Walden*, *Tr. Z. S.* ix. p. 195; *Sharpe, Cat. B.* iii. p. 267; *id. Tr. Linn. Soc. new series, Zool.* i. p. 352; *id. Cat. B. M. 6.* p. 175 (1881); *Gould, B. Asia*, part xxxii.
Hab. Luzon, Laguna, Minil, Party.

20. I. *melanochlamys*, *Sharpe*. ♂ N. v. id. (M. S. T.)

Irena melanochlamys, *Sharpe*, *Cat. B.* iii. p. 265; *id. Trans. Linn. Soc. new series*, i. pp. 334, 352; *id. Cat. B. M. 6.* p. 176 (1881); *Tweed.* *P. Z. S.* 1879, p. 71.
Hab. Basilan.

21. I. *turcosa*, *Horsf.* ♂ N. v. Dalaga-irene. (M. S. T.)

Irena puella, *Horsf.* in *Linn. Trans.* xiii. p. 153; *id. Zool. Research.* in *Java, Birds*, pls. 13, 14; *Steph. Gen. Zool.* xiii. pt. 2, p. 142, pl. 48; *Gray, Gen. B.* i. p. 288; *Cab. Mus. Hein. Th.* i. p. 110.

Eolius puellus, *Temm. Pl. Col.* pls. 70, 47b, 225.

Irena turcosa, *Walden*, *Ann. N. H.* (4) v. p. 417; *Sharpe, Ibis*, 1876, p. 44; *id. Cat. B.* iii. p. 257; *id. Cat. B. M. 6.* p. 176 (1881); *Nichols, Ibis*, 1881, p. 147.
Hab. Luzon, Laguna, Calanan; Java.

22. I. *ellae* *Steere*. N. v.

Hab. Samar, Leyte.

23. I. *tweeddalii*, *Sharpe*. ♂ N. v. Dalipilpan. (M. S. T.)

Irena tweeddalii, *Sharpe*, *Cat. B.* iii. p. 238; *id. Trans. Linn. Soc. new series*, pp. 333, 352; *id. Cat. B. M. 6.* p. 178 (1881); *Wardlaw-Ramsay, Orn. Memoirs of Mt. quas of Tweeddale*, p. 657 (1881).
Hab. Balibac, Paragua, P. Princesa.

24. I. *paraguensis*, ♂ N. v. Delpipan. (M. S. T.)

Hab. Paragua, P. Princesa.

Subfam. TROGLODINOS.

1 Gén. CAMPYLORHYNCHUS, SLEW.

25. C. zonatus, Less. ♂ N. v.

M. S. T.

Pseudolaptes zonatus, Less. Cent. Zool. pl. 70; Laf. Rev. Zool. 1849, p. 94.

Campylorhynchus zonatus, Gray, Gen. B. i. p. 159; Bp. Conspl. i. p. 223; Cab. Mus. Hein. Th. i. p. 80; Sel. Pr. Philad. Acad. 1850, p. 264; id. P. Z. S. 1850, p. 290, 1859, p. 363; Sel. & Salv. Ibis, 1860, p. 29; Sel. Cat. Amer. B. i. p. 173; Baird, Review Amer. A. p. 104; Gray, Handl. B. i. p. 192, n.° 293b; Lawr. Ann. Lyc. N. Y. ix. p. 92; Sumichr. Mem. Bost. Soc. N. H. ii. p. 545; Sel. & Salv. Nomencl. Av. Neotr. p. 5; Lawr. Bull. U. S. Nat. Mus. n.º iv. p. 13; Boucard, P. Z. S. 1878, p. 51; Salv. & Godm. Biol. Centr.-Amer., Aves, i. p. 68; Sharpe, Cat. B. M. o. p. 195 (1881).

C. nigriceps, Sclater, P. Z. S. 1860, p. 461; id. Cat. Amer. B. p. 18; Baird, Review Amer. B. p. 109; Gray, Handl. B. i. p. 193, n.º 2654.

Hab. América, Guatemala.

2 Gén. THRYOTHORUS, VICKLL.

26. Th. maculipectus, ♂ N. v.

M. S. T.

Laryothorus maculipectus, Laf. Rev. Zool. 1845, p. 338; Sclater, P. Z. S. 1850, p. 290, 1859, pp. 363, 372; Sel. & Salv. Ibis, 1860, p. 30; Sel. Cat. Amer. B. p. 21; Sel. & Salv. P. Z. S. 1870, p. 836; id. Nomencl. Av. Neotr. p. 7; Lawr. Bull. U. S. Nat. Mus. no. 4, p. 13; Salv. & Godm. Biol. Centr.-Amer., Aves, i. p. 92; Sharpe, Cat. B. M. o. p. 237 (1881).

Pheugopedius maculipectus, Baird, Review Amer. B. p. 135; Sumichr. Mem. Bost. Soc. N. H. i. p. 545.

Troglodytes maculipectus, Gray, Handl. B. i. p. 189, n.º 2587.
Hab. América, Guatemala.

3 Gén. HENICORHINA, SEL.

27. H. leucosticta, Licht. ♂ N. v.

M. S. T.

Tricholodius leucostictus, Licht. in Mus. Berol., undé.

Cyphorhinus leucostictus, Cab. Arch. f. Naturg. xiii. pt. i. 1847, p. 266; Bp. Conspl. i. p. 224; Sclater, P. Z. S. 1858, p. 63; Gray, Handl. B. i. p. 193, no. 2671; Sharpe, Cat. B. M. o. p. 287 (1881).

Heterorhina leucosticta, (pt.) Baird, Review Amer. B. p. 117.
Hab. Colombia, Ecuador, Guatemala.

Subfam. TIMELINOS.

1. Gen. THAMNOBIA, Swa.

28. T. fulicata, (Lin.) ♂♂ N. v. Cipao.

(M. S. T.)

Le Traquet des Philippines, Bris. *Orn.* iii. p. 444, pl. xxxiii. fig. 2 (1760); Buff. *Pl. Ent.* vi. pl. 185, fig. 1.

Motacilla fulicata, Linn. *Sys. Nat.* i. p. 366 (1766; ex Briss.)

Le Traquet à queue striée, Levailly. *Ois. d'Afr.* iv. p. 111, pl. 188, fig. 1* (1805); Sundew. *Krit. Framst.*, Levailly. p. 45 (1857).

Enanthe fulicata, Vieill. *N. Dict. d' Hist. Nat.* xxi. p. 435 (1818).

E. pygmatura, Vieill. *t. c.* p. 436 (1818; ex Levailly.)

Thamnobia rufiventer, Swains. *Fann. Bor.-Amer., Bird.* p. 489 (1831; ex Levailly.)

Ixos fulicatus, Sykes, *P. Z. S.* 1832, p. 89.

Thamnobia fulicata, Jerd. *Madr. Journ.* x. p. 264 (1839); Gray, *Gen. B.* i. p. 185 (1845); Blyth, *J. A. S. Beng.* xi. p. 139 (1847); *id. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 165 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 298 (1850); Layard, *Ann. & Mag. Nat. Hist.* (2) xii. p. 266 (1853); Burgess, *P. Z. S.* 1854, p. 142; Horsf. & Moore, *Cat. B. E. I. Co. Mus.* i. p. 281 (1854); Jerd. *B. Ind.* ii. p. 121 (1863); Gray, *Hand-l. B.* i. p. 211, n.º 2988 (1869); Holdsa. *P. Z. S.* 1872, p. 454; Hume, *Str. F.* 1877, p. 307 (1873); Fairb. *Str. F.* 1876, p. 459; Hume, *Str. F.* 1877, p. 406; *id. Str. F.* 1878, vol. ii. p. 55; Ball, *t. c.* p. 216; Legge, *B. Ceylon*, p. 440 (1879); Hume, *Str. F.* 1879, p. 99; Sharpe, *Cat. B. M.* 7. p. 54 (1883).

Hab. Luzón, Laguna, India, Ceilán.

2. Gén. COPSYCHUS, Wagl.

29. C. mindanensis, (Gm.) ♂♂ N. v. Maria-capra.

(M. S. T.)

Le Merle de Mindanao, Daubent. *Pl. Ent.* 627, fig. 1; Month. *H. N. Ois.* iii. p. 387.

Turdus mindanensis, Gm. *S. N.* i. p. 283 (ex Moutb.)

Copsychus mindanensis, Sund. *Krit. Framst.*, Levailly. p. 36; v.

Martens, *J. f. O.* 1866, p. 10; Walden & Layard, *Ibis*, 1872,

p. 102; Walden, *Tr. Z. S.* ix. p. 194, pl. xxxiii. fig. 1 (1875);

Sharpe, *Trans. Linn. Soc. new ser., Zool.* i. p. 352 (1877);

Tweedd. *P. Z. S.* 1877, pp. 696, 761; 1878, pp. 285,

342, 994, 1879 p. 72; Wardlaw Ramsay, *Orn. Works Tweed.* p. 656, (1881); Sharpe, *Cat. B. Mus.* 7. p. 60, (1883).

Hab. Luzón, Manila, Montalbán, S. Mateo, Laguna, Calamba, Los Baños, Calauan, Guimaras, Negros, Cebú, Mindanao, Basilan.

30. C. seychellarum, A. Newton. N. v.

Copsychus seychellarum, A. Newton, *Ibis*, 1865, p. 332, pl. 8; E. Newton, *Ibis*, 1867, pp. 337, 352; Gray, *Hand-l. B.* i. p. 269, n.º 3998 (1869); Sharpe, *Cat. Afr. B.* p. 28 (1871); Hartl.

Vög Madag., p. 132 (1877); *Sarpare, Cat. B. Mus.*, 7, p. 61 (1883).
Hab. Marianas.

31. **C. cebuensis**, *Steere*, N. v.

Hab. Cebú.

3. Gén. CITTOCINCLA, SCLAT.

32. **C. nigra**, *Sharpe*, ♂ N. v. Mananataon.

(M. S. F.)

Cittocincla nigra, *Sharpe, Trans. Linn. Soc. Zool.* new series; i, p. 335, pl. lii. (1870); *Tweedd. P. Z. S.* 1878, p. 610; *Wardlaw Ramsay, Orn. Mem. Tweedd.* pp. 614, 657. (1881); *Sharpe, Cat. B. Mus.*, 7, p. 90. (1883).
Hab. Paragua, P. Princesa.

33. **C. luzoniensis**, *Kittl.* ♂ N. v. Mananataon.

(M. S. F.)

Turdus luzoniensis, *Kittl. Kupff.* *Vög.* p. 7, pl. 11, fig. 2 (1832); *id. Mém. Acad. S. Petersb.* ii, p. 5, pl. 7 (1833).

Copsychus luzoniensis, *Bp. Conspl.* i, p. 266 (1850); *Slater. P. Z. S.* 1861, p. 186; *Gray. Hand-l. B.* i, p. 265, no. 3887 (1860).
Cossypha pyrrhopygia, *Hartl. Orn. Westafgr.* p. 78 (1857); *id. J. f. Ö.* 1861, p. 163; *Sharpe, Ann. & Mag. Nat. Hist.* (4) xvi, p. 236 (1875).

Besornoris pyrrhopygia, *Gray, Hand-l. B.* i, p. 265, n.^o 3872 (1869).

Cittocincla luzoniensis, *Waldeu, Trans. Zool. Soc.* ix, pp. 193, 250 (1875); *Sharpe, Trans. Linn. Soc., Zool.* new series, i, p. 352 (1876); *Wardlaw Ramsay, Orn. Mem. Tweedd.* pp. 358, 411, 647; (1881); *Sharpe, Cat. B. M.*, 7, p. 91. (1883).
Hab. Luzón, Laguna, Calau n, Calamba.

4. Gén. PSAMATHIA, H. et F.

34. **Ps. annæ**, *H* et *F* N. v.

Psamathia annæ, *Hartl. & Finsch, P. Z. S.* 1868, pp. 5, 118, pl. ii., 1872, p. 94; *Finsch, Journ. Mus. Godeffr.* Heft v, p. 22 (1875); *Sharpe, Cat. B. M.*, 7, p. 101. (1883).
Calamodyta annæ, *Gray, Hand-l. B.* i, p. 208, n.^o 2949 (1860).
Hab. I. Palaos, Marianas.

5. Gén. BEBRORNIS, SHARP.

35. **B. seychellensis**, *Oustalet* N. v.

Ellisia seychellensis, *Oustalet, Bull. Soc. Philom. Paris.* (7) i, p. 102 (187).

Bebrornis seychellensis, *Sharpe, Cat. B. M.*, 7, p. 103 (1883).
Hab. Marianas.

6. Gen. MEGALURUS HORSE.

36. **M. palustris**, Horsf. ♂ N. v. Sunut-calabao. (M. S. T.)

Megalurus palustris, Horsf. *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 159 (1820); Gray, *Gen. B.* i. p. 169 (1845); Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 139 (1849); Bp. *Consp.* i. p. 279 (1850); *Cab. Mus. Hein. Th.* i. p. 45 (1850); Horsf. & Moore, *Cat. B. E. I. Co. Mus.* i. p. 330 (1854); Jerd. *B. Ind.* ii. p. 70 (1863); Blyth, *Ibis*, 1865, p. 30; Gray, *Hand-l. B.* i. p. 205, n.^o 2903 (1869); Blanf. *Ibis*, 1870, p. 467; Hume, *Nests & Eggs Ind. B.* p. 276 (1873); id. *Str. F.* 1874, p. 476; id. Oates, *Str. F.* 1875, p. 124; Walden, *Tr. Zool. Soc.* ix. pp. 189, 250 (1875); Blyth & Wald. *B. Burm.* p. 118 (1875); Ball, *Str. F.* 1876, p. 233; Godwin-Austen, *J. A. S. Beng.* xlvi. p. 78 (1876); Sharpe, *Trans. Linn. Soc.*, new series, *Zool. i.* p. 352 (1876); Oates, *Str. F.* 1877, p. 156; Tweedda. *P. Z. S.* 1877, p. 694; Anderson, *Zool. Exped. Yun-nan, Aves*, p. 639 (1878); Ball, *Str. F.* 1878, vol. ii. p. 214; Hume, *Str. F.* 1879, p. 97; Inglis, *Str. P.* 1880, p. 253; Wardlaw Ramsay. Tweedda. *Orn. Works*, p. 657 (1881); Oates, *B. Brit. Burm.* p. 106 (1883). Sharpe, *Cat. B. M.* 7. p. 123 (1883).

Malurus marginalis, Temm. *Pl. Col.* iii. pl. lxv. fig. 2 (1823, ex Reinw. MSS.); Kittl. *Voy. Lütke (Postels)*. Bd. iii. p. 326. *M. citrinus*, Gray & Mitch. *Gen. B.* i. p. 169, pl. 48 (1838); Bp. *Consp.* i. p. 270 (1850); Gray, *Hand-l. B.* i. p. 206, n.^o 2906 (1869).

Hab. Luzón, Manila, Nabatas, Laguna, Calauan, Samar, Marinduque, Mindoro, Baco.

37 **M ruficeps**, Tw. ♂ N. v. Tulturioe. (M. S. T.)

Megalurus ruficeps, Tweedda. *Ann. & Mag. Nat. Hist.* (4) xx. p. 95 (1877); id. *P. Z. S.* 1877, pp. 687, 695. pl. 72; id. *P. Z. S.* 1877, pp. 756, 761; id. *P. Z. S.* 1878, p. 285, 1879, p. 71; Wardlaw Ramsay in Tweedda. *Orn. Works*, p. 657 (1881); Sharpe, *Cat. B. M.* 7. p. 125 (1883).

Hab. Luzón, Cebú, Negros, Valencia, Basilan, Guimaras, Panay, Bohol, Marinduque, Mindoro, Baco.

7 Gen. SUTORIA, NICHOL.

38. **S sepium**, Raff. ♂ N. v. Pipit-cauayan. (M. S. T.)

Motacilla sepium, Raffl. *Tr. Linn. Soc.* xiii. p. 313 (1820, nec Horsf.).
Edela ruficeps, Less. *Cent. Zool.* p. 212, pl. 71 (nec Less. *Traité*, p. 309).
Orthotomus edela, Temm. *Pl. Col.* v. pl. 599. fig. 2 (1836); Gray, *Gen. B.* i. p. 162 (1848); Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 144 (1849); Bp. *Consp.* i. p. 282 (1850); Moore, *P. Z. S.* 1854, p. 79; Horsf. & Moore, *Cat. B. E. I. Co. Mus.* i. p. 314

(1854); *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 195, n. 2683 (1860); *Wardlaw* in *Blyth's B. Burm.* p. 120 (1875); *Sharpe*, *Ibis*, 1877, p. 112; *Sutoria edela*, *Sharpe*, *Cat. B. M.* 7, p. 218 (1883).
Hab. Luzón, Java.

8. Gén. ORTHOTOMUS, HORSEY.

39. **O. frontalis**, *Sharpe*, & N. v. Pipit.

(M. S. T.)

Orthotomus frontalis, *Sharpe*, *Ibis*, 1877, p. 112, pl. ii, fig. 1; *id.* *Trans. Linn. Soc.* new series, *Zool.* i. p. 336 (1877); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 828, 1878, pp. 111, 710, 950; *Sharpe*, *Cat. B. M.* 7, p. 220 (1883).

Hab. Bohol, Dinagat, Basilan, Mindanao, Zamboanga.

40. **O. cinereiceps**, *Sharpe* N. v. Pipit.

(M. S. T.)

Orthotomus cinereiceps, *Sharpe*, *Ibis*, 1877, p. 113, pl. ii, fig. 2; *id.* *Tr. Linn. Soc.* new series, *Zool.* i. pp. 337, 352 (1877); *Sharpe*, *Cat. B. M.* 7, p. 222 (1883).

Hab. Basilan, Mindanao.

41. **O. nigriceps**, *Th.* ♂ & N. v. Pipit.

(M. S. T.)

Orthotomus nigriceps, *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 828, pl. LXXXV.; *Wardlaw Ramsay*, *Orn. Works Tweedd.* pp. 554, 958 (1881); *Sharpe*, *Cat. B. M.* 7, p. 222 (1883).

Hab. Mindanao.

42. **O. castaneiceps**, *Wald. ♂ & N. v.* Pipit-cauayan.

(M. S. T.)

Orthothomus castaneiceps, *Walden*, *Ann. & Mag. N. H.* (4) x. p. 252 (1872); *id.* *Tr. Zool. Soc.* ix. p. 195 (1875); *Sharpe*, *Ibis*, 1877, p. 114; *id.* *Tr. Linn. Soc.* new series, *Zool.* i. pp. 337, 342 (1877); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 540, 1878, p. 286; *Sharpe*, *Cat. B. M.* 7, p. 223 (1883).
Hab. Panáy, Iloilo, Guimaras, Negros, Valencia.

43. **O. derbianus**, *Moore*, ♂ & N. v. Pipit cauayan.

(M. S. T.)

Orthotomus derbianus, *Montr. P. Z. S.* 1854, p. 309, pl. LXXVI.; *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 195, n. 2690 (1860); *Walden*; *Tr. Z. S.* ix. p. 195 (1875); *Sharpe*, *Ibis*, 1877, p. 114; *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 607; *Sharpe*, *Cat. B. M.* 7, p. 224 (1883).
Hab. Luzón, Manila.

44. **O. ruficeps**, *Less.* ♂ & N. v. Utut.

(M. S. T.)

Oedela ruficeps, *Lesson*, *Traité d'Orn.* p. 309 (1831), nec *Less.* *Cent. Zool.* pl. 71.

Orthotomus sericeus, *Temm.* *Pl. Col. texte to livr.* 101 (1836);

Gray, *Gen. B.* i. p. 162 (1848); *Bp. Conspl.* i. p. 282 (1850).

O. edela, *Blyth*, *Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 144 (1849).

O. ruficeps, *Moore, P. Z. S.* 1854, p. 79; *Horsf. & Moore, Cat. B. E. I. Co. Mus.* i. p. 316 (1854); *Gray, Handl. B.* i. p. 195, n.^o 2685 (1869); *Salvad. Ucc. Born.* p. 248 (1874); *Sharpe, Ibis.* 1877, p. 114; *id. Tr. Linn. Soc.* new series, *Zool.* i. pp. 337, 352 (1877); *Tweedd. P. Z. S.* 1878, p. 619; *Hume & Davison, Stu. F.* 1878, vol. vi. p. 346; *Hume, Str. F.* 1879, pp. 94, 108; *Sharpe P. Z. S.* 1879, p. 341, 1881, p. 798; *id. Cat. B. Mus.* 7. p. 224 (1883).

Hab. Paragua, P. Princesa, Borneo, Sumatra, Malaca.

45. O. cineraceus Blyth. ♂ N. v. Pipit.

(M. S. T.)

Oithotomus sepium, *Lysfr. Mag. de Zool.* 1836, pl. (no Horsf).
Or. cineraceus, *Blyth, J. A. S. Beng.* xiv. p. 489 (1845); *id. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 144 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 282 (1850); *Moore, P. Z. S.* 1854, p. 80; *Horsf. et Moore Cat. B. E. I. Co. Mus.* i. p. 315 (1854); *Scl. P. Z. S.* 1863, p. 215; *Gray, Handl. B.* i. p. 195, n.^o 2692 (1869); *Salv. Ucc. Born.* p. 248 (1874); *Sharpe, Ibis.* 1877, p. 114; *Tweedd. t. c. p.* 312; *Hume, Str. F.* 1879, p. 64; *Sharpe, P. Z. S.* 1879, p. 341; 1881, p. 798; *id. Cat. B. Mus.* 7. p. 225. 1883.
Or. borneonensis, *Salv. Ucc. Born.* p. 247 (1874); *Sharpe, Ibis.* 1876, p. 41, pl. ii. fig. 1; *Salv. Ann. Mus. Civile. Genov.* xiv. p. 235 (1879).
Hab. Cagayan de Joló; Borneo, Malaca, Sumatra.

46. O. panayensis Steere N. v.

Hab. Panáy.

47. O. Samarensis, Steere. N. v.

Hab. Samar.

9 Gén. CISTICOLA, KAUP.

48. C. cisticola, Vieill. Faune Franc. p. 27, pl. 102, fig. 1 (1820).

(M. S. T.)

La Fauvette cisticole, *Vieill. Faune Franc.* p. 27, pl. 102, fig. 1 (1820);
Sylvia cisticola, *Temm. Man. d'Orn.* i. p. 228 (1820); *id. Pl. Col.* vi. fig. fig. 3 (1820), *id. Man. d'Orn.* iii. p. 123; *Von der Mühlle, Monogr. Europ. Sylv.* p. 122 (1856).
Prinia cursitans, *Frankl. P. Z. S.* 1831, p. 118; *Jerd. Madr. Journ.* xi. p. 5 (1840); *id. Ill. Ind. Orn.* pl. vi. (1847).
Gysticola cisticola, *Löss. Traité* p. 415 (1851); *Licht. Nomencl.* p. 31 (1854); *Sharpe, Cat. B. M.* 7. p. 259 (1883).
Sylvia (Cisticola) tytus, *Rüpp. Neue Wörb. Vog.* p. 113 (1835-40).
Drymoica cisticola, *Swinns. Classif. B.* ii. p. 242 (1837); *Gray, Gen. B.* i. p. 164 (1848).
Salicaria cisticola, *Gouff. B. Env.* j1. 113 (1837); *Keys. u. Blas. Wrb.* Eur. p. iv. (1840); *Schl. Rev. Crit.* p. xxx (1844); *Linderm. Vog. Griechenl.* p. 95 (1869).
Cisticola schœnicola, *Bp. Comp. Lst. P. Figr. & N. Amer.* p. 12

- (1838); *Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 145 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 286 (1850); *Cab. Mus. Hein. Th.* i. p. 44 (1850); *Heugl. Syst. Uebers.* p. 21 (1856); *Tristr. Ibis.* 1859, p. 160; *Hummeyer. J. f. O.* 1862 p. 283; *Jerd. B. Ind.* ii. p. 174 (1853); *Swinh. Ibis.* 1863, p. 393; *Gigliotti. Ibis.* 1865, p. 52; *Leydig. Bull. Soc. Orn. Suisse.* i. p. 10 (1865); *Blyth. Ibis.* 1870, p. 23; *Loche, Expt. Sci. Algér.* *Ois.* i. p. 281 (1867); *Degl. & Goeze. Orn. Eur.* i. p. 537 (1867); *A. C. Smith. Ibis.* 1858, p. 44; *Brooks. t. c.* p. 130; *Hume. Ibis.* 1870, p. 136; *Swinh. t. c.* p. 345; *Sharpe. t. c.* p. 475; *Gurney. Ibis.* 1871, p. 83; *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 352; *Holdsw. P. Z. S.* 1872, p. 455; *Shetley. B. Egypt.* p. 97; *Hume. Nests & Eggs Ind. B.* p. 343 (1873); *id. Str. F.* 1873, p. 439; *Admn. t. c.* p. 382; *Jard. t. c.* p. 420; *Hayes Lloyd. Ibis.* 1873, p. 412; *Hume Str. F.* 1874, p. 233, 1875, p. 137; *Butler. t. c.* p. 481; *Hume. t. c.* p. 481, note; *Irby. B. Gibatrar.* p. 119 (1875); *Lloyd. Ibis.* 1875, p. 17; *Blyth & Wald. B. Burm.* p. 119 (1875); *Wharton. Ibis.* 1876, p. 19; *Ball. Str. F.* 1876, p. 234. *Drymoica uropygialis. Fraser. P. Z. S.* 1843, p. 17; *Alta & Thomps. Exped. Niger.* ii. *App.* p. 491 (1849); *Fraser. Zool. Typ.* pl. 42, fig. 2 (1849); *Gray. Gen. B.* i. p. 164 (1848); *id. Handl. B.* i. p. 198, n.º 2756 (1869). *Prinia subhimalayana. Blyth. J. A. S. Beng.* xiii. p. 377 (1844). *P. cisticola. Blyth. t. c.* p. 377 (1844). *Cisticola subhimalayana. Hodgs. Icon. ined. in Brit. Mus., Passeres.* pl. 51 (n.º 437); *id. in. Gray's Zool. Mssz.* p. 82 (1844). *Cisticola cursitans. Gray. Cat. Mamm. etc. Nepal pres. Hodgs.* p. 62 (1846); *Blyth. J. A. S. Beng.* xvi. p. 457 (1847); *Tibet. op. cit. xvii.* p. 300 (1849); *Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 145 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 286 (1850); *Horsf. & Moore. Cat. B. E. I. Co. Mus.* i. p. 324 (1854); *Cass. Proc. Philad. Acad.* 1856, p. 318; *Hartl. Orn. W.-Afr.* p. 264 (1857); *Swinh. Ibis.* 1861, p. 329; *Antin. Cat. d-ser. Ucc.* p. 37 (1864); *Hartl. P. Z. S.* 1867, p. 825; *Finsch & Hartl. Vog. Ostafir.* p. 229 (1870); *Salvad. Faun. Ital. Ucc.* p. 119 (1871); *Sharpe. Cat. Afr. B.* p. 29 (1871, pt.); *Gurney. in Anderss. B. Dim. Ld.* p. 88 (1872); *Walden. Trans. Z. S.* viii. p. 64 (1872); *Antin. & Salvad. Viagg. Bogos.* p. 101 (1873); *Sharpe & Bourier. Bull. Soc. Zool. France.* i. p. 305 (1876); *Dresser. B. Eur.* iii. p. 3, pl. 96 (1877); *Hume. Str. F.* 1877, p. 90; *Davidson & Wenden. Str. F.* 1878, vol. ii. p. 85; *Bull. t. c.* p. 217; *Cripps. t. c.* p. 235; *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 710; *Hume & Davison. Str. F.* 1878, p. 349; *Legge. B. Ceylon.* p. 531 (1879); *Meyer. Ibis.* 1879, p. 146; *Hume. Str. F.* 1879, p. 101; *Vidal. Str. F.* 1880, p. 67; *Bingham. t. c.* p. 186; *Butler. t. c.* p. 407; *Wardlaw Ramsay. Orn. Works Tweed.* p. 65 (1881); *Bocage. Orn. Angola.* p. 554 (1881); *Reid. Str. F.* 1881, p. 46; *Kelham. Ibis.* 1881, p. 58. *Cisticola omalura. Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 145 (1844); *descri. nullā;* *id. J. A. S. Beng.* xx. p. 176 (1851); *Bp. Conspl.* i. p. 286 (1850); *Kelaart. Prodr. Cat.* p. 120 (1852, pt.); *Blyth. Ibis.* 1867, p. 302; *Hume. Str. F.* 1877, p. 91. *Salicaria (Cisticola) brunneiceps. Temm. & Schleg. Faun. Jap.* i. p. 134, pl. 29 (1850).

- Cisticola brunneiceps, *Bp. Conspl.* i. p. 286 (1850).
Cisticola cisticola, *Brehm, Vogel.* p. 237 (1855).
Sylvia arquata, Von Müller, J. f. O. 1856, p. 224.
Drymoica uropygialis, Hartl. Orn. W.-Afr. p. 59 (1857).
Calamantella tintinnabulans, Swinh. J. As. Sc. N. China Br. 1859 p..
Cisticola tintinnabulans, *Swinh. Ibis,* 1860, pp. 51 & 131, 1861,
p. 32.
Schoenicola cisticola, *Blasius, List. B. Eur.* ed. Newton, p. 11
(1862); *Salvad. Ucc. Sardagn.* p. 56 (1864); *Bolle, J. f. O.*
1865, p. 142; *Brooke, Ibis,* 1873, p. 344.
Cisticola fuscicapilla, *Wall. P. S.* 1863, p. 489.
C. europaea, Hartl. Ibis, 1863, p. 325.
Drymoica cisticola, Heugl. Ibis, 1869, p. 132.
Drymoica omalura, Gray, Hand-l. B. i. p. 200, no. 2812 (1869).
D. cursitans, Gray, t. c. p. 200, no. 2806 (1869).
D. fuscicapilla, Gray, t. c. p. 200, no. 2810 (1869).
Cisticola munipurensis, *Godwin-Austen, P. Z. S.* 1874, p. 47;
id. J. A. S. Beng. xliii. pt. 2, p. 165 pl. ix. fig. 2, (1874);
Hume, Str. F. 1875, p. 398, 1877, p. 90, 1879, p. 101.
Liolestella brunneiceps, Seebohm, Ibis, 1879, p. 37.
Cisticola cisticola, *Oates, B. Brit. Burn.* p. 115 (1883); *Sharpe, Cat.*
B. Mus. 7. p. 259 (1883).
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calauan; Europa, China, Japon.

48. *C. exilis*, *Vig. et Horsf.* N. v. Mamansit.

(M. S. T.)

- Malurus exilis, Vig. et Horsf. Trans. Linn. Soc.* xv. p. 223
(1827, ex Lath. MSS.)
Cisticola lineicapilla, *Gould, P. Z. S.* 1847, p. 1; *id. B. Austr.*
fol. iii. pl. 43 (1848); *Bp. Conspl.* i. p. 287 (1850); *Gould,*
Handb. B. Austr. i. p. 351 (1865); *Ramsay, Ibis,* 1860,
p. 328.
C. ruficeps, Gould, P. Z. S. 1837, p. 150; *id. B. Austr.* fol.
iii. pl. 45 (1848); *Bp. Conspl.* i. p. 287 (1850); *Wallace, P. Z.*
S. 1863, p. 485; *Gould, Handb. B. Austr.* i. p. 353 (1865);
Ramsay, Ibis, 1868, p. 277; *id. P. Z. S.* 1860, p. 385, *id.*
P. Z. S. 1875, p. 589; *Sharpe, Journ. Linn. Soc.* xiii. pp.
315, 494; *Ramsay, Proc. Linn. Soc. N. S. W.* ii. p. 185 (1878);
iii. pp. 108, 275 (1879); iv. p. 97 (1880); *Salvad. Ann. Mus.*
Civico. Genov. viii. p. 376 (1879); xvi. p. 189 (1880); *Layard,*
Ibis, 1880, p. 297; *Finsch, Ibis,* 1881, p. 335; *Nichols, Ibis,*
1881, p. 150; *Salvad. Orn. Papuasia,* ii. p. 433 (1880).
C. isura, Gould, P. Z. S. 1847, p. 32; *id. B. Aust.* fol. iii. pl.
44 (1848); *Bp. Conspl.* i. p. 287 (1850); *Gould, Handb. B. Austr.*
i. p. 352 (1865); *Ramsay, Ibis,* 1860, p. 326.
C. exilis, Gould, B. Austr. iii. pl. 42 (1848); *Bp. Conspl.* i. p.
287 (1850); *Gould, Handb. B. Austr.* i. p. 350 (1865); *Ramsay,*
Ibis, 1866, p. 328; *Oates B. Brit. Burn.* p. 117 (1883); *Sharpe,*
Cat. B. M. 7. p. 269, (1883).
Drymoica ruficeps, Gray, Gen. B. i. p. 164 (1848); *id. Hand-l.*
B. i. p. 200, n.º 2817 (1869).
D. exilis, Gray, Gen. B. i. p. 164 (1848); *id. Hand-l.* B. i. p.
200, no. 2817 (1869).

- D. lineopilla, Gray, *Gen. B.* i. p. 164 (1848); *id. Handl. B.* i. p. 200, no. 2808 (1869).
D. isura, Gray, *Gen. B.* i. p. 164 (1848); *id. Handl. B.* i. p. 200, no. 2816 (1869).
Cisticola erythrocephala, Blyth, *J. A. S. Beng.* xx. p. 523 (1851); *Jerd. B. Ind.* ii. p. 175 (1863); Hume, *Str. F.* 1877, p. 91; *id. Str. F.* 1879, p. 101.
C. volitans, Swinh. *Journ. N. China Branch As. Soc.* 1859, p. 1; *id. Ibid.* 1863, p. 304; *id. P. Z. S.* 1871, p. 352; *Petöf. Ois. Chine*, p. 256 (1878).
C. tytleri, Jerd. *B. Ind.* ii. p. 176 (1863), ex Blyth MSS. n. 2; Blyth, *Ibis*, 1865, p. 24; Godwin-Austen, *J. A. S. Beng.* xli. p. 199 (1876); Hume, *Str. F.* 1877, pp. 90, 350.
C. rusticola, Wall, *P. Z. S.* 1863, pp. 19, 25; Finsch, *Nord-Ginea*, p. 166 (1865).
C. semirufa, Cab. *J. f. O.* 1869, p. 10, 1872, p. 316; Wall, *Tr. Z. S.* ix. p. 195 (1875); Sharpe, *Tr. Linn. Soc. (new ser.)* i. p. 352 (1877); Wardlaw Ramsay, *Orn. Works Tweed.* p. 657 (1881).
Drymoica tytleri, Gray, *Handl. B.* i. p. 200, no. (2813) 1869.
D. volitans, Gray, *l. c.* p. 200, no. 2815 (1869).
Cisticola delicatula, Blyth, *Ibis*, 1870, p. 170 (ex. MSS. in *Mus. Lugd.*)
C. melanocephala, J. Anderson, *P. Z. S.* 1871, p. 212; Swinh. *P. Z. S.* 1871, p. 352; Godwin-Austen, *J. A. S. Beng.* xiii. p. 165, pl. x, fig. 1 (1874); Hume, *Str. F.* 1877, p. 90; Anderson, *Zool. Exped. Yun-nan, Ives*, p. 641 (1878) David & Oustrellet *Ois. Chine*, p. 257.
C. ruficollis, Walden, *Ann. & Mag. Nat. Hist.* (4) vii. p. 242 (1871); Godwin-Austen, *J. A. S. Beng.* xlii. p. 165, pl. ix, fig. 2 (1874); Wardlaw Ramsay, *Orn. Works Tweed.* p. 664 (1881).
C. Grayi, Walden *Ann. & Mag. Nat. Hist.* (4) ix. p. 400 (1872); *id. Trans. Z. S.* viii. p. 117 (1874); Tweedt, *P. Z. S.* 1877, p. 282, 1878, p. 215; Wardlaw Ramsay, *Orn. Works Tweed.* p. 664 (1881).
C. ruficapilla, Salvad. *Ann. Mus. Civico Genov.* vii. p. 376 (1876).
C. sp., Salvad. *Ann. Mus. Civico Genov.* ix. p. 35 (1876); *id. Orn. Papuasia etc.* p. 424 (1881).
C. erythrocephalus, Hume, *Str. F.* 1879, p. 101.
C. melanocephalus, Hume, *Str. F.* 1879, p. 101.
Hab. Luzón, Negros; Australia, Moluccas, Formosa.

10 Gén CINCLOSOMA, VIGORS

49 *C. punctatum*, (*Lath.* ♂ N. v.

(M. S. T.)

- Punctated Thrush, *Lath. Gen. Syn.*, *Suppl.* ii. p. 187 (1801).
Turdus punctatus, *Lath. Ind. Orn. Suppl.* p. xliv. (1801).
Cinclosoma punctatum, Vig. & Horst. *Trans. Linn. Soc.* xv. p. 220 (1826); Gray, *Gen. B.* i. p. 224 (1846); Gould, *B. Aust.* fol. iv. pl. 4 (1848); Cab. *Mus. Hein. Th.* i. p. 85 (1850); Richonb. *Vög. Neugell.* p. 105 (1850); Gould, *Handb. B. Aust.* i. p. 433 (1855); Gray, *Handl. B.* i. p. 280, no. 4124 (1861).

Ramsay, *Proc. Linn. Soc. N. S. W.* ii. p. 187 (1878). Sharpe,
Cat. B. M. 7. p. 332. (1883).
/ punctatus, *Bp. Conspl.* i. p. 278 (1850).
Hab. Australia.

11. Gén. TATARE, LESS.

50. *T. syrinx*, Seib. N. v.

Aerocephalus syrinx (*Kittl.*), Seehoem, *Cat. B. Brit. Mus.* v.
p. 100; *Tristr. Ibis*, 1883, p. 44.
Calamoherpe syrinx, Finsch, *Ibis*, 1881, pp. 112, 115.
Tatare syrinx, Sharpe, *Cat. B. M.* 7. p. 527 (1883).
Hab. Ponapé, Carolinas.

51. *T. lusecinia*, Q. et G. N. v.

Tatare lusecinia, *Quoy et Gaim. Voy. Astrol., Zool.* i. p. 202, pl.
5, fig. 2 (1830); Gray, *Gen. B.* iii. *App.* p. 8 (1849); *id. Cat.*
B. Trop. Isl. Pacific Ocean., p. 14 (1850).
T. lusecinus, *Bp. Conspl.* i. p. 224 (1850); *Gray Hand-l. B.* i.
p. 194, n.º 2681 (1866).
Hybristes lusecinia, Reichenb., *Syst. Av.* pl. 57, fig. 7 (1850).
Aerocephalus marianne, *Tristr. Ibis*, 1883, p. 45.
Tatare mariannae, Sharpe, *Cat. B. M.* 7. p. 528 (1883).
Hab. Marianas.

12. Gén. TURDINUS, BLATH.

52. *T. rufifrons*, Tw. ♂ N. v Uit-uit.

(M. S. T.)

Trichostoma rufifrons, *Tweed P. Z. S.* 1878, p. 616, pl. xxxviii.
Turdinus rufifrons, Sharpe, *Cat. B. M.* 7. p. 546 (1883).
Hab. Paragua, P. Princesa.

13. Gén. DASYCROTOPHΑ, Tw.

53. *D. speciosa*, Tw. N. v. Tang-sit.

(M. S. T.)

Dasycrotopha speciosa, *Tweed P. Z. S.* 1878, p. 114, pl. ix, p. 286.
Wardlaw Ramsay, *Orn. Mem. Tweed.* p. 657 (1881); Sharpe,
Cat. B. M. 7. p. 574. (1883).
Hab. Negros, Bohol.

14. Gen. MIXORNIS, Horngs.

54. *M. woodi*, Sharpe, ♂ N. v. Ut-uit.

(M. S. T.)

Mixornis wodi, Sharpe, *Tr. Linn. Soc. new ser. Zool.* i. p. 331;
(1870); *id. Cat. B. M.* 7. p. 577. (1883); *Tweed P. Z. S.*
1878, p. 617; Wardlaw Ramsay, *Orn. Works Tweed.* p. 657
(1881).
Hab. Paragua, P. Princesa.

55. *M. cagayanensis*, Guill.

Mixornis cagayanensis, *Guillemard, Orn. birds of the Marchesa*, p. 419 (1885).
Hab. Cagayan de Joló.

6. *M. capitalis*, Tweed. ♂♂ N. v. Bancao-Lancao. M. S. T.)

Mixornis capitalis, *Tweed, Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) xx*, p. 535 (1877); *id. P. Z. S. 1878*, p. 110 pl. vii, fig. 2; *id. l. c.* pp. 342, 380; *id. P. Z. S. 1879*, p. 71; *Wardlaw Ramsay, Orn. Works Tweed*, p. 655 (1881); *Sharpe, Cat. B. M. 7*, p. 582 (1883).
Hab. Leyte, Samar, Panaon, Dinagat, Basilan.

57. *M. nigro-capitatus* Steere, ♂♂ N. v. Tangsit. (M. S. T.)

Hab. Samar, Leyte.

15. *Gén. MACRONUS*, JARD.

58. *M. striaticeps*, Sharpe, ♂♂ N. v. Tangsit.

Macronus striaticeps, *Sharpe, Trans. Linn. Soc. new series, Zool.* i, p. 331; *id. Cat. B. M. 7*, p. 584, 1883. *Tweed. P. Z. S. 1877*, p. 827, 1878, pp. 110, 949; *Wardlaw Ramsay, Orn. Works Tweed*, p. 657 (1881).

Hab. Basilan, Malamaui, Dinagat, Mindanao, Surigao.

59. *M. mindanensis* ♂♂ Steere, N. v. Tangsit. (M. S. T.)

Hab. Mindanao, Samar, Leyte.

60. *M. kettlewelli* Guill. ♂ N. v. M. S. T.)

Macronus kettlewelli, *Guillemard, Voy. of the Marchesa*, p. 262 (1885).
Hab. Joló, Lucatlapas.

16. *Gén. PTILOCICHLA*, SHARPE.

61. *Pt. falcata*, Sharpe ♂ ♀ N. v. Inahing. (M. S. T.)

Ptilocichla falcata, *Sharpe, Tr. Lin. Soc., Zool.* p. 332 (1876); *id. Cat. B. M. 7*, p. 586 (1883); *Wardlaw Ramsay, Orn. Works Tweed*, p. 657 (1881).
Hab. Paragua.

62. *Pt. basilanica* Steere, ♂ N. v. (M. S. T.)

Hab. Basilan.

63. *Pt. mindanensis* Steere, ♂ N. v. (M. S. T.)

Hab. Minlinao.

17. Gen ANUROPS S. SHARPE.

64 A. cinereiceps, (Tw.) ♂ ♀ N. v. Tangsit. (M. S. T.)

Drymocataphus cinereiceps, Tweed P. Z. S. 1878, p. 617.

Anuropsis cinereiceps, Sharpe, Cat. B. M. 7, p. 590 (1883).
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

18. Gén DENDROBIASTES, SHARPE.

65 D. basilanica, Sharpe, ♂ N. v. Utuit. (M. S. T.)

Dendrobiastes basilanica, Sharpe, Tr. Lin. Soc., i, p. 332, pl. 53, fig. 1 (1876); id. Cat. B. M. 7, p. 630 (1883).
Hab. Basilan.

Fam. PÁRIDOS.

Subfam. PARINOS.

i Gén PARUS, LINN.

i P. cœruleus, Lin. ♂ N. v. (M. S. T.)

Blue Titmouse, Genn. Arctic. Zool. p. 427 (785).

Parus cœruleus, Linn. S. N. i, p. 341 (1760); Lath. Gen. Syn. ii, p. 543; Beske, Vög. Kurlands, n.^o 193; Retzius, Faun. Suec. p. 269; Koch, System. bairer. Zool. p. 205; Temm. Man. d'Orn. p. 200; Roux, Orn. Hrov. p. 190; Less. Traité d'Orn. p. 456; Pall. Zoogr. Ross.-As. i, p. 554; Naum. Vög. Deutschl. iv, pl. 95; Nilsson, Skandin. Fauna, i, p. 341. (1835), i, p. 408 (1858); Schinz, Europ. Fauna, p. 217; Gould, B. Eur. n. pl. 154; Moquim-Tandon, Orn. Canar, p. 18; Yarrell, Brit. B. i, p. 330; Sclys-Longch. Orn. Belge, p. 104; Blyth, Cat. B. M. A. S. B. p. 104; B. C. A. p. 229; Nacevra, Cat. Av. Galizia, Mem. R. Acad. Maarrid. p. 109; (1850); Kjær-bölling, Danmarks Fugle, pl. xxviii.; Horsf. & Moore, Cat. B. M. E. I. Comp. p. 372; Schlegel, Vög. Nederl. pl. 120; Sunder, Svensk. Fogt. pl. xvi, fig. 1; Wright, Finl. Foggra, i, p. 181; Fritsch, Vogl. Eur. pl. 17, fig. 20; D'Orbigny, Ois. d'Eur. pl. xxviii.; Gould, B. Gr. Brit. vol. ii, pl. 24; Knolemans, Onze Vogels, pl. 14; Holland. Wribelth. Pommerns, p. 60; Salzad. Faun. Ital. ii, p. 66; Danford & Brown, Ibis, 1875, p. 303; Dresser, B. Eur. iii, p. 131, pl. 113; Moore, Br. Birds, ordo n.^o 55; Yarrell, Brit. B. ed Newton, p. 483; Gadow, Cat. B. M. 8, p. 12 (1883).

Cyanistes cœruleus, Kaup. Natürl. Syst. p. 99 (1839); Cab. Mus. Hein. i, p. 90.

Hab. Europa, Asia, Francia.

2. **P. amabilis.** Sharpe, C. O. N. v. Utuit.

(M. S. T.)

Parus amabilis, Sharpe, *Trans. Linn. Soc. Zool.* new ser. i, p. 338, pl. 53, fig. 2 (1876); *Gadow, Cat. B. M.* 8, p. 22 (1883); *Wardlaw Ramsay, Orn. Works. Tweedd.* p. 658 (1881).

Hab. Balabac, Paragua, P. Princesa.

3. **P. elegans,** Less. C. O. N. v. Pipit-maquin.

(M. S. T.)

Parus elegans, Lesson, *Traité d'Orn.* p. 456 (1831); *Pucheran, Rev. et Mag. Zool.* 1854, p. 68; *Bp. C. R.* xxxviii, p. 62; *Blyth, Ibis*, 1867, p. 34 (note); *Warden, Tr. Z. S.* 1875, p. 199; *id. P. Z.* 1877, pp. 688, 696, 756, & 762, 1878, p. 286; *Wardlaw Ramsay, Orn. Works. Tweedd.* p. 658 (1881); *Gadow, Cat. B. M.* 8, p. 22 (1883).

P. quadrioccidentalis, Lafresn, *Rev. Zool.* 1840, p. 129; *Bp. C. A.* i, p. 229.

Hab. Luzón, Manila, Guimarás, Cebú, Panay, Negros, Massbate, Paragua.

4. **P. semilarvatus.** Salv. C. O. N. v. Pipit motas.

(M. S. T.)

Melaniparus semilarvatus, Salvad. *Atti Soc. Ital. Sc. Nat.* viii, p. 375 (1865); *id. J. f. O.* 1868, p. 68; *id. Ibis*, 1870, p. 300, pl. ix.

Parus semilarvatus, Gadow, *Cat. B. M.* 8, p. 38 (1883).

Hab. Luzón; China.

Subfam. REGULINOS.

1. Gén. REGULUS, Koch.

5. **R. ignicapillus.** Brehm. C. N. v.

(M. S. T.)

Souci ou Poule, Buff. *Pl. Ent.* pl. 651, fig. 3.

Sylvia regulus, Bechstein, *Ornith. Taschenb.* p. 180 (1802).

S. ignicapilla, Brehm, in Temm. *Man. d'Orn.* p. 231 (1820); Naum. *Vög. Deutsch.* iii, pl. 93, figs. 4, 5, 6.

Regulus ignicapillus, Meyer, *Tasch. n. Deutschl. Vogelk.* iii, p. 109 (1822); Werner, *Atlas. Insectivores*, pl. 61; Roux, *Orn. Provinc.* pl. 235; Temm. *Man. d'Orn.* iii, p. 158; Gould, *B. Eur.* pl. 148, fig. 2; Schinz, *Europ. Faun.* i, p. 207; Keys. & Blas. *Wirb. Eur.* p. lv; Schlegel, *Reise*, p. xliv; Gray, *Gen. B.* i, p. 175; *Bp. C. A.* i, p. 291; *Cob. Mus. Hein. Th.* i, p. 34; *Kjærboell. Danmarks Fugle*, pl. 54, fig. 5; sch. *Vög. Eur.* pl. 19, figs. 1, 2; Degland & Gerbe, *Ois. Eur.* i, p. 555; Gould, *B. Gt. Br.* ii, pl. 70; Schlegel, *Vög. Nederl.* pl. 124; von Drost, *Vogelw. Borkums*, p. 90; Perini, *Ornic Veronese*, p. 212; Attum, *Forstzoologie*, p. 194; Newton, ed. Yarr. *Brit. B.* i, p. 456; Dresser, *B. Eur.* ii, p. 459, pl. 72, fig. 1. *Gadow, Cat. B. M.* 8, p. 85 (1883).

- R. *l. l.* p. 161 (1822). *Brehm, Beitr. Vogelk.* ii. p. 136, pl. i. fig. 1 (1822); *id. Lehrbuch*, p. 276; *id. Vog. Deutschl.* p. 483.
L. mystaceus, *Vieill. Faun. France*, p. 231 (1822).
R. nilsonii, *Brehm, Vog. Deutschl.* p. 482 (1831).
R. Frachyrhynchus, *Brehm, t. c.* p. 483 (1831).
Hab. Europa, España, Francia.

Fam. LÁNIDOS.

Subfam. GIMNORRINOS.

I. Gén. GYMNORHINA, GRAY

I. G. *tibicen*, *Lath.* ♂ N. v. M. S. T.)

- Pugnax*, *Roller, Lath. Gen. Syn. Suppl.* p. 122.
Coracis tibicen, *Lath. Ind. Orn. Suppl.* p. xxvii.
Barito tibicen, *Tourm. Man. d'Orn.* i. p. li; *Lesq. Traité*, p. 345; *Ap. C. A.* i. p. 367.
Croicticus tibicen, *Vig. & Horsf. Tr. Linn. Soc.* xv. p. 260; *Gould, Syn. B. Austr.* part i.; *Schl. Mus. P.-B. Coraces*, p. 125.
Gymnorhina tibicen, *Gray, List Gen. B.* 1843, p. 50; *id. & Mich. Gen. B.* ii. p. 302, pl. 73; *Gould, B. Austr.* ii. pl. 46; *Cab. Mus. Hein. Th.* i. p. 226; *Gould, Handb. B. Austr.* i. p. 175; *Gray, Handb. B.* ii. p. 2, n.º 6062; *Ramsay, Proc. Linn. Soc. N. S. W.* ii. p. 180.
Gymnorhina tibicen, *Reichenb. Handb. Naturg.* n.º 214 (1850).
Hab. Australia.

Subfam. PAQUICEFALINOS.

I. Gén. PACHYCEPHALA, VIG. ET HORSE.

I. P. *philippensis*, *Wald. ♂♂ N. v. Piroc-piroe* M. S. T.)

- Hylotrope philippensis*, *Walden, Ann. & Mag. N. H.* 1872, vol. x. p. 252; *id. T. Z. S.* 1877, viii. p. 179, pl. xxxi. fig. 2, ix. p. 250; *id. P. Z. S.* 1879, p. 100; *Wardlaw Ramsay, in Tweeddale's Ornith. Works, Appendix*, pp. 650, 666; *Gould, B. Asia*, part. 33.
Pachycephala philippensis, *Gadow, Cat. B. M.* 8, p. 221 (1883).
Hab. Luzón, Dímagat, Paragua, Imaguán.

Subfam. LANINOS.

I. Gen. LANIUS, LIN.

I. L. *schach*, *Linn. ♂ N. v. Tarat.* (M. S. T.)

- Lanius a-sack*, *Ost'ock, Ostind. Rest.* p. 227 (1757).
L. schach, *Linn. S. N.* i. p. 94 (1758); *Gra. S. N.* i. p. 503;

Vieill. Enc. Meth. ii. p. 737; *Less. Trait d'Orn.* p. 372; *Blyth. J. A. S. Beng.* xv. p. 301; *id. Cat. B. Mus. As.* Sw. p. 151; *Bp. C. A.* i. p. 364 (1850); *Horsf. & Moore. Cat. B. M. E. I. Co.* i. p. 163 (1854); *Cassin. Narrat. of. Explor. Amer. Squadr.* ii. p. 238 (1846); *Swinh. Ibis.* 1870, p. 48, and. 1871, p. 59; *id. P. Z. S.* 1873, p. 283, and 1874, p. 375; *Severtz. Turk. Jevotn.* (1873); *Walden. Tr. Z. Soc.* 1875, p. 170; *Dresser. Ibis.* 1875, p. 184; *Dav. & Oust. Ois. Chir.* p. 96, pl. 75 (1877); *Schulow. J. f. O.* 1878, p. 130; *Gmel. Cat. B. M.* 8. p. 261, (1883).

Chestnut-backed Shrike, *Lath. Gen. Son.* i. p. 159 (1781). *Lanius castaneus*, *Gmel. S. N.* xiii. p. 297, n.^o 5 (1788); *Lath. Ind. Orn.* i. p. 57.

L. macrourus, *Cuv. Mus. Par.* (teste Pucher. Arch. du Mus. d'Hist. nat. vii. p. 325, 1854).

L. chinensis, *Gray. Zool. Msc.* p. 1 (1831).

Collyrio schach, *Gray. Zool. Msc.* p. 1 (1831); *Gray. Hand-l. B.* i. p. 392, n.^o 5949 (1869); *id. Fas. B. Chin.* p. 4.

Lanius longicaudatus, *Gould. P. Z. S.* 1859, p. 151.

L. schach, var. *formosae*, *Swinh. Ibis.* 1873, p. 270; *id. P. Z. S.* 1873, p. 335.

Hab. Luzón, Cagayan; Formosa, China.

2 *L. nigriceps*, *Frankl. & Döderlein. Tarat San Diego* [M S T]

Pie-grièche d'Antigue, *Sommer. Voy. Nouv. Guin.* p. 114, pl. 70 (1770).

Lanius antiquanus, *Gmel. S. N.* i. p. 301, n.^o 29 (1788, ex *Sonnerat*).

L. nasutus, *Scop. Del. Fl. Faun. Insubr.* ii. p. 85, n. 13 (1786, ex *Sommer.*; *Walden. Tr. Z. S.* ix. p. 163).

Collurio nigriceps, *Frankl. P. Z. S.* 1831, p. 117; *Bp. Rev. et Mag. Zool.* 1853, p. 435; *Hume. Nests. & Eggs. Ind. B.* p. 172.

Lanius tricolor, *Hodges. Ind. Rev.* i. p. 446 (1837); *id. in Gray's Zool. Msc.* p. 81.

L. nigriceps, *Jord. Matr. Journ.* x. p. 236; *id. Ill. Ind. Orn.* pl. 17, fig. (1830-34); *Gray. Gen. B.* i. p. 290, pl. 71; *Blyth. Cat. B. Mus. As.* p. 151; *Bp. C. A.* i. p. 364 (1850); *Horsf. & Moore. Cat. B. M. E. I. Co.* i. p. 166 (1854); *Jerd. B. Ind.* i. p. 404 (1863); *Blyth. B's.* 1870, p. 164; *Jerd. Ibis.* 1872, p. 115; *Hume. Str. F.* 1874, p. 473; *Dwid & Oust. Ois.* p. 95 (1877); *Schulow. J. f. O.* 1878, p. 153; *Antwerp. B. Yun-nan.* p. 644 (1878); *Scully. Str. F.* 1879, p. 264; *Gadow. Cat. B. M.* 8. p. 268, (1883).

Collyrio pyrrhonotus, *Gray. Hand-l. B.* i. p. 392, n.^o 5152 (1869).

C. nigriceps, *Gray. Hand-l. B.* i. p. 392, n.^o 5955.

C. nasutus, *Gray. Hand-l. B.* i. p. 392, n.^o 5958.

Lanius pileatus, *Temm. (in. Mus. Lufç.)*, *sic* *Blyth. Ibis.* 1870, p. 164.

Hab. Luzón, Laguna, Negros, Guiñarás, Panay, Cebú, Leyte, Samar, Bohol, Siquijor; Himalaya, Cochinchina.

3 *L. cephalomelas*, *Bp. ♂♂ N. v. Tarat.*

(M. S. T.)

Lanius cephalomelas, *Bp. Rev. et Mag. Zool.* 1853, p. 436; *Gadow*, *Cat. B. M.* 8, p. 269, (1883).

L. nigriceps (pt.), *Walden*, *Ibis*, 1868, p. 70; *Schalow*, *J. f. O.* 1878, p. 153, *et auct. plurim.*

Collyrio cephalomelas, *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 392, n.^o 5959.
Hab. Leyte, Sanar, Paragua.

4 *L. superciliosas*, *Lath. ♂♂ N. v. Tarat.*

(M. S. T.)

Le Rousseau, *Levall. Ois. d'Afr.* pl. 66, fig. 2 (1796-1808).

Lanius superciliosus, *Lath. Ind. Orn., Subpl.* 20, n.^o 14 (1801);
Walden, *Ibis*, 1867, p. 218; *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 393, n.^o 5971; *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 375; *id. Ib's.*, 1875, p. 450; *Vian*, *Rev. Zool.* 1872, p. 327; *Dab. & Oustal. Ois. Chin.*, p. 100 (1877); *Legge*, *B. Ceylon*, p. 279, note (1879); *Gadow*, *Cat. B. M.* 8, p. 273, (1883).

Enneocotonus superciliosus, *Gray*, *Gen. i.* p. 291 (1846); *Bp. C. A.* i. p. 363 (1850).

Otomela superciliosa, *Bp. Rev. Zool.* 1853, p. 437; *Schalow*, *J. f. O.* 1875, p. 140.

Lanius phoenicurus (*non Pall.*), *Schrenck*, *Reis. Amur.* i. p. 384 (1860), *teste Schalow et Dav. & Oustal.*; *Sundw. Phys. Selsk. Tidsskr.* 1837-38 p. 64; *id. Ann. Nat. Hist.* 1846, p. 166; *Blasius*, *Nachr. Num. Fölg. Deutschl.* xiii. p. 39; *Walden*, *Ibis*, 1867, pl. 5, fig. 2.

Hab. Luzón, Cagayan; Malaca, Chi-a.

5 *L. lucionensis*, *Lin. ♂♂ N. v. Cabezote.*

(M. S. T.)

Lanius lucionensis, *Lin. S. N.* i. p. 135 (1766); *Swinh. Ibis*, 1890, p. 59, 1893, p. 272; *Blyth*, *Ibis*, 1897, p. 394, 1875, p. 116; *Walden*, *Ibis*, 1867, p. 215, 1873, p. 399; *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 393, n. 5970; *Jerdon*, *Ibis*, 1872, p. 115; *Swinh. P. Z. S.* 1893, pp. 286 & 335, 1871 p. 376; *Hume*, *Str. F.* 1873 p. 434, 1874, p. 193; *Walden*, *P. Z. S.* ix. 1875, p. 171, pl. 29, fig. 1; *id. P. Z. S.* 1877, pp. 602 & 758; *Sharpe*, *Ibis*, 1877, p. 19, 1870, p. 43; *Dav. & Oustal. Ois. Chine*, p. 99 (1877); *Legge*, *B. Ceylon*, p. 378 (1879); *Oates*, *B. Brit. Burm.* p. 251 (1883); *Gadow*, *Cat. B. M.* 8, p. 274 (1883).

L. phoenicurus (*non Pall.*), *Meyen*, *Act. Acad. Ces. Leopold.* xvi. p. 74 (1834) (*teste Schalow*); *id. Reise um. d. Erd.* p. 195 (*ex Philippin. ins.*, *teste Schalow*).

Otomela schwaneri, *Bp. Rev. Zool.* 1853, p. 437.

Enneocotonus schwaneri, *Bp. C. A.* i. p. 33.

Lanius jeracopsis, *De Fil. Mus. Mediol.* p. 31; *Bp. Rev. Zool.* 1853, p. 437, note; *Salvad. Atti. Acc. Sc. Torino*, 1868, p. 272.

L. schwaneri, *Walden*, *Ibis*, 1867, p. 223; *Gray*, *Hand-l. B.* i. p. 293, n.^o 5974; *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 376.

Otomela lucioensis, *Schalow*, *J. f. O.* 1875, p. 137.
Hab. Lazon, S. Mateo, Manila, Nabont, Cebu, Panay, Gili-

mara, Negros, Bisaya, Leyte, Bohol, Panay, Panaon, Mindanao, Borneo; China.

Fam. VIREONIDOS.

1. Gen. VIREO, Virelli.

1. *V. gilvus* (Vig.) N. v.

(M. S. T.)

- Muscicapa gilva*, *Vig. Ill. Obs. Am.* Sept. p. 65, pl. 34 (1807);
M. melodia, *W. s. Am. Obs.* vi. p. 85, pl. 42, fig. 2 (1812).
Vireo gilvus, *Bp. Obs. W. s.* n.º 123 (1825); *id. C. A.* i. p. 33; *Audub. Orn. Biog.* ii. pl. 118; *Id. Birds Am.* iv. pl. 24; *Baird. Birds N. Am.* p. 335; *Selat. P. Z. S.* 1858, p. 30; *Dresser. Ibis.* 1855, p. 48; *Sinclair. Birds New Engl.* 273; *Sav. & Galan. Biol. Curr. - Amer.*, *Aves.* i. p. 192; *C. d. d. C. Cat. B. M.* 8, p. 205 (1883).
V. bartramii, *Selat. P. Z. S.* 1851, p. 235 (1831).
Vireosylvia gilva, *Cass. Proc. A. N. Sc. Philad.* 1851, p. 153; *Selat. P. Z. S.* 1859, p. 293; 1859, p. 302; *Baird. Rev. Am. B.* p. 342; *Swinchurst. Mem. Bost. Soc. N. H.* i. p. 54; *Baird. Brew., & Ridgw.* i. p. 368.
Vireo swainsoni, *Baird. B. N. Am.* 1858, p. 336; *Elliott. Illust. Birds N. A.* i. pl. 7.
Vireosylvia swainsoni, *Baird. Rev. Am. B.* p. 343 (1858).
V. gilva, var. *swainsoni*, *Cope. Orn. Califor.* i. p. 116 (1870); *Baird. Brew., & Ridgw. N. Am. B.* i. p. 371; *Sel. & Sav. Nomen.* p. 12; *Lever. Brit. U. S. Nat. Mus.* i. p. 17.
Vireo gilvus swainsoni, *Coues. Birds Colorad. Vall.* p. 501.
Hab. W. América, Canadá.

2. *V. flavoviridis*, Cope. N. v.

(M. S. T.)

- Vireosylvia flavoviridis*, *Cope. Proc. A. N. Sc. Philad.* 1851, v. p. 152, vi. pl. 2; *Selat. P. Z. S.* 1859, p. 298, 1859, p. 375; *id. Cat. Am. B.* p. 44 (1861); *Sav. & Galan. Biol. Centr. Amer. L. C. N. Y.* vi. p. 323; *Sav. P. Z. S.* 1877, p. 137, 1879, p. 184; *c. Frantzius. J. f. O.* 1899, p. 509; *Baird. Brew., & Ridgw. N. A. B.* i. p. 369; *Swinchurst. Mem. Bost. Soc. N. H.* i. p. 547; *Taczanowski. P. Z. S.* 1874, p. 509; *Merrill. Proc. U. S. Nat. Mus.* i. p. 125; *Sel. & Sav. Nomen.* p. 11.
Vireo flavoviridis, *Baird. Birds N. Am.* p. 332 (1858); *Coue. B. Colorad. Vall.* i. p. 490; *Silva & Griswold. Biol. Centr. Amer. Aves.* p. 189; *Golds. Cat. B. M.* 8, p. 295 (1883).
Phyllomyias flavoviridis, *Cab. J. f. O.* 1861, p. 93.
Vireosylvia agilis flavoviridis, *Ridgw. Biol. U. S. Nat. Mus.* i. p. 14.
Hab. Bolivia, Guatemala.

2. Gen. HYLIOPHILUS, Tem.

3. *H. decurtata*, Vig. N. v.

(M. S. T.)

- Sylviola decurta*, *Bp. P. Z. S.* 1837, p. 118.

- (1) *s. l.* *albocinctus*, *Ba.*, *C.*, *i.*, p. 29; *philus*, *Baird*, *Rev. Am. B.*, *i.*, p. 350 (1851); *b.*, *P. Z. S.*, *vii.*, p. 133, 1852; *p.*, *id. Ibis*, p. 343, 1852; *p.*, *Salv.*, *P. Z. S.*, *viii.*, 1852, p. 26; *Tetra*, *Baird*, *C. N. Amer.*, *Max. N. A.*, p. 18; *Salv.*, *Ibis*, *v.*, p. 298; *Salv.*, *Gard. Lect. Cert. Amer.*, *Amer.*, p. 20; *Cat. B. M.*, *d.*, p. 30, (1853).
- (2) *cineraceus*, *Salv.*, *& Salv.*, *P. Z. S.*, *viii.*, p. 224, 1852, p. 384; *id. Ibis*, *x.*, p. 397.
- (3) *basillus*, *Linn.*, *Ann. Lyc. N. Y.*, *xii.*, p. 323, *xiii.*, p. 205, *v.*, p. 97; *Baird*, *Rev. Am. B.*, *i.*, p. 381.
- (4) *plumbiceps*, *Linn.*, *Ann. Lyc. N. Y.*, *xii.*, p. 323.
- (5) *antheros*—? *Salv.*, *P. Z. S.*, *1852*, p. 201.
Hab., América, Guatemala.

3. GEN. VII. EOLANIUS DE BE.

4. V. pulchellus, *Salv.* N. v. (M. S. T.)

- V. eolanius pulchellus*, *Salv.*, *Silv. Ibis*, *1850*, p. 12; *Salv.*, *Ibis*, *1851*, p. 143; *Jaeger*, *Ann. Lyc. N. Y.*, *xii.*, p. 407; *Salv.*, *Cas. Am.*, *v.*, p. 45; *Baird*, *Rev. Am. B.*, *i.*, p. 307; *Salv.*, *Exotic Orn.*, *i.*, pl. 8; *id. Natural.*, p. 13; *Salv.*, *Ibis*, *1852*, p. 443; *Golds.*, *Cat. B. M.*, *8.*, p. 315 (1853).
Linn., América, Guatemala.

Grapo: CERTIOMORFOS.

Fam. CERTIDOS.

Subfam. CERTINOS.

1. Gen. CERTHIA, LIN.

1. C. mexicana Gmel., N. v. (M. S. T.)

- C. mexicana*, *Gmel.*, *Histo.*, p. 381 note (1834, ex *Licht.*); *Wichelnb.*, *Habib.*, *spic.*, *Orn. Scav.*, p. 266 pl. 612; *Slater*, *P. Z. S.*, *1850*, p. 290, *d. ib.* *1850*, p. 363, 372; *Salvin*, *B.*, *1860*, p. 100; *Golds.*, *Cat. B. M.*, *1.*, p. 326 (1883).
C. americana, *Baird*, *C. N. Amer.*, p. 373, pl. 83, fig. 2.
C. mexicana, *Couper*, *Orn. Calif.*, p. 58 (1870).
C. bimiliaris, var. *mexicana*, *Baird*, *Brew.*, & *Ridgw.*, *B. N. Am.*, p. 128 (1874).
Hab., México, Guatemala.

2. Gén. CLIMACTERIS, TEMM.

2. C. mystacalis, (Temm.) N. v. Langgaas (M. S. T.)

- Uphaga mystacea* is, *Temm.*, *Pl. Col.*, pl. 335, fig. 2.
Characteris striolata, *Küllitz*, *Kupfer*, *Vög.*, pl. 6) fig. 2 (1832).

1. *Dendrophila frontalis*, *Swains. Class. B.* ii. p. 318 (1837); *J. d. Madr. Journ.* xi. p. 218; *Blyth, J. As. Soc. Beng.* xvi. p. 280; *id. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 190; *Mason, Burmah*, p. 280; *Bp. C. A.* i. p. 220; *Cab. Mus. Hein.* i. p. 93; *Reichenb. Handb., Scans.* p. 154, pl. 54, figs. 357-72; *Kelaart, Prodromus Cat.* p. 120; *Layard, Ann. & Mag. N. M.* xii. p. 370; *Horsf. & Moore, Cat. B. M. E. I. Co.* ii. p. 722; *Bernstein, J. f. O.* 1861, p. 122; *Jerdon, B. Ind.* i. p. 388; *v. Pelecanus Norvar, Reis.* 1765, pp. 59, 101; *Beavan, Ibis*, 1809, p. 425; *Jerdon, Ibis*, 1872, p. 21; *Holdsworth, P. Z. S.* 1872, p. 355; *Hume, Nests & Eggs.* i. p. 161; *Savad. Ucc. Born.* p. 161; *Legge, Ibis*, 1874, p. 16; *Hall, F.* 1874, p. 397; *Bourdillon, Str. F.* 1876, p. 393; *Fairbank, Str. F.* 1877, p. 399; *Hume & Davison, Str. F.* 1878, p. 211; *Legge, Birds of Ceylon*, p. 560; *Hume, Str. F.* 1879, p. 459.
2. *corallina*, *Reichenb. Handb., Scans.* p. 154 (1851); *Hume, Str. F.* 1874, p. 473, 1875, p. 89; *Sharpe, Str. F.* 1870, p. 436; *Anderson, Zool. Exped. Yunnan.* p. 633.
Hab. Paragua, P. Princesa, Balabac; Java, Borneo, Ceilan.

5. **S** *œnochlamys*, *Sharpe, ♂♂ N. v. Pipit-mingan.* (M. S. T.)

- Dendrophilus œnochlamys*, *Sharpe, Trans. Linn. Soc.* 2nd. ser. *Zool.* vol. i. p. 338, pl. liii, fig. 3 (1876).
Sitta œnochlamys, *Gadow, Cat. B. M.* 8. p. 350 (1883).
Hab. Guimaras, Panay, Basilan, Cebú.

Grupo 4º CINNIRIMORFOS.

Fam. NECTARÍNIDOS.

1. Gén. *CHALCOSTETHA*, *CAB.*

1. **C**h *insignis*, (*Jard.*) ♂♂ N. v. *Santist.* (M. S. T.)

- Nectarinia pectoralis*, *Tem.* pl. 135 fig. 3 (1823 no Horsf); *Schlegel et Müll. Natuirl. Gesch. Zool.*, *Aves* p. 57, pl. 9, f. (1846).
Cynniris pectoralis, *Less. Man. d'Orn.* 2. p. 33. (1846).
Nec. pectoralis, *Drapiez, Dict. Class.* 15 p. 513 (1829).
Nec. calvostetha, *Jard. Mon. Sun-birds*, p. 263 (1842).
Nec. insignis, *Jard. t. c. l.* p. 274 (1842 ex Temm.); *Gray, Gen. B.* i. p. 98, 1847; *Gould, P. Z. S.* 1865, p. 663; *id. B. Asia*, p. 19, pl. 5. (1867).
Cy. macklotii, *Bp. C. A.* i. p. 408, n. 44 (1880 ex Temm).
Chalcostetha pectoralis, *Cab. Ams. Hein.* v. p. 103 (1850).
Ch. macklotii, *Reichenb. Handb. S. ansoriæ*, p. 286, n. 662, pl. 572, figs. 3868-90 (1854).
Anthreptes chalcostetha, *Echt. Nom. Av. Mus. Berol.* p. 56 (1854).
Archnechthra chalcostetha, *Horsf. et Moor., Cat. B. E. I. Cr. Mus.* 2. p. 746 (1856-58).
Nec. macklotii, *Sclat. P. Z. S.* 1863, p. 220.
Promerops pectoralis, *Gray, Hand-l. B.* i. p. 110, n. 1254 (1869).
Archnothra insignis, *Gray, T. M. cit.* p. 112, n. 1384

Ch. insignis, *Wald. Ibis.*, 1870, p. 44; *Savv. In. Mus. C. G.* Genov., v. p. 177 (1874); *Hume. Srt. F.* p. 310 (1875); *Trottom. Iow. cit. id. P. Z. S.* 1878, p. 621; *Hume et Dav. Str. F.* p. 183 (1878); *Shelley. Mon. Act.* p. 87, pl. 39; *Hume. Srt. F.* 1879, p. 80; *Gadow. Cat. B. M.* q. p. 12, 1884.

Ch. inspirata, *Hume. Str. F.* 1875, p. 320, nota.

Nec. porphyrolaema, *Brüg. Abh. nat. Ver. Bremen.* v. p. 73 (1876).

Nec insignis, *Brüg. Abh. nat. ver. Brem. n.* v. p. 465 (1876).

Ch. pectoralis, *Oates. B. Br. Burm.* i. p. 317. (1883).

Hab. Paragua, P. Princesa, Samar; Célebes, Sumatra, Siam.

2. *Aethopyga. Cab.*

2. ♂t. *temmincki*, *S. Müll. & O. N.* v. Aramasit.

(M. S. T.)

Nectarinia temmincki, *S. Müll. Natuurl. Gesch. Land. en Vl-keuh.* p. 173 nota (1843; *id. et Schl. ob. cit. Zool. Aves.* p. 56, pl. 8, fig. 2, (1846); *Gray. Gen. B.* i. p. 98 (1847); *Bp. Conspl. Av.* 1. p. 405, n. 15 (1850).

♂t. *temmincki*, *Reichb. Handb. Scans.* p. 300, n. 702, pl. 594, f. 3997 (1854); *Wald. Ibis.* 1870, p. 419; *Sharpe. Ibis.* 1873, p. 419; *Savv. An. Mus. Civ. Gen.* XIV. p. 213 (1879); *Shelley. Mong. Meet.* p. 47, pl. 16, f. 1.; *Gad. Cat. B. Mus.* p. 16 (1884).

Promerops temmincki, *Gray. Hand-l. B.* i. p. 110, n. 1347 (1867).

Cynnitis temminckii, *Beccari. In. Mus. Civ. Genov.* XII. p. 453 (1878).

Hab. Paragua, Basilan; Borneo, Sumatra.

3. ♂t. *eximia*, (*Herrf.*) *& O. N.* v. Saritsit.

(M. S. T.)

Nectarinia eximinia, *Herrf. Tr. Lin. Soc.* XIII. p. 168 (1820); *Jard. Monog. Sun-birds.* p. 268 (1842); *Gray. Gen. B.* i. p. 98 (1847); *Bp. C. A.* i. p. 405 (1850).

Nec. *Kuhli*, *Tem.* pl. 376, figs. 1, 2. (1825); *S. Müll. et Schl. Natuurl. Gesch. Zool. Aves.* p. 56 (1846); *Hand-l. Dierk.* p. 256 (1857).

Cinnyris Kuhli, *Less. Man. d'Orn.* 2. p. 36 (1828).

C. *eximia*, *Vig. Mem. Raffl.* p. 673 (1830).

Aethopyga eximia, *Cab. Mus. Gen.* 1. p. 103 (1850); *Reich. Handb. Scans.* p. 303, pl. 587, fig. 3984-85 (1854); *Horsf. et Moor. Cat. B. E.* 1. *Civ. Mus.* p. 736 (1856); *Wald. Ibis.* 1878, p. 37; *Shelley. Monogr. Nect.* p. 27, pl. 9.; *Gid. Cat. B. M.* o. p. 17. 1884.

Anthreptes eximia, *Licht. Nom. Av.* p. 56 (1854).

Promerops eximia, *Gray. Hand-l. B.* i. p. 109, n. 1840 (1869).

Hab. Paragua; Java.

4. ♂t. *magnifica*, *Sharpe. & O. N.* v. Aramasit.

(M. S. T.)

Aethopyga magnifica, *Sharpe. Nat. Ird. Aug.* 1870, p. 297; *id. Tr. I. u. Soc.* 2. ser. *Zool.* 1. p. 332 (1876); *Tie. P. Z. S.*

— 18 —
♂, n. 75, p. 267; Shelley, Mong. Nect., p. 51 pl. 17
Cat. B. Mus., 9 p. 24 (1884).
Hab. Negros, Cebú.

5. *Et. shelleyi*, Sharpe, ♂♀ N. v. Saesac.

(M. S. T.)

hypoga shelleyi, Sharpe, Nat. Z. Aug. 1879, p. 297; id. Tr. Soc. Zool. 1, p. 243; Tr. P. Z. S. 1879, p. 21.
Shelleyi, Mong. Nect. p. 75, pl. 24 et 25, fig. 1; Gad. Cat. B. Mus. 9, p. 29 (1884).
Hab. Paragua, P. Princesa, Bilabac.

6. *Et. bella*, ♂♂ N. v. Suing.

(M. S. T.)

bella, Tweeddale, An. et Mus. Nat. Hist. xx, p. 337 (1877);
P. Z. S. 1877, pp. 819, 829; Shelley, Mong. Nect. p. 77-
23; Gad. Cat. B. M. 9, p. 29 (1884).
Hab. Surigao, Mindanao.

7. *Et. pulcherrima*, Sharpe, ♂♂ N. v. Tigboloan. (M. S. T.)

pulcherrima, Sharpe, Nutt. 3r. Aug. 1879, p. 297; Gad.
Cat. B. M. 9, (1884).
pulcherrima, Shelley, Mong. Nect. p. 83, pl. 28.
pulcherrima, Tr. P. Z. S. 1879, p. 112.
pulcherrima, Shelley, Mong. Nect. p. 85, pl. 20, fig. 2.
Hab. Dinagat, Samar, Leyte, Basilan.

7. Gén. CINNYRIS, Cov.

8. *C. sperata* (Lin), ♂♂ N. v. Suing.

(M. S. T.)

Grimpereau pourpré des Philippines, Briss. Orn. 3, p. 655,
n. 27, pl. 31, fig. 2, 3, (1860).
Chia sperata, Linn. S. N. 1, p. 186, n. 17, (1766 ex Briss.);
P. Z. S. Mäll. S. N. 2, 257, n. 13, (1773); Gen. S. N. 1,
p. 477, n. 13, et var. B. (1788); Lath. Ind. Orn. 1, p. 283,
n. 8 et var. g, (1790); Shre, Gen. Zool. viii, p. 205, (1811).
Grimpereau des Philippines, Durb. Pl. Ent. pl. 231, fig. 1, 2.
Erithia jugularis, P. L. S. Mäll. S. N. Anhang, p. 98, n. 29
(1776 ex Durb.); Cass. Pr. Acad. Philad. 1804, p. 244.
Troisième grimpereau, de l'ile de Luzin, Sonn. Voy. Nam. Guin.
p. 63, pl. 30, fig. 9, (1776).
Sui-yinga marron pourpré à poitrine rouge, Monté. Hist. Nat.
Ois. v, p. 497 (1778).
Le Grimpereau ou Soui-manga à gorge violette et poitrine rou-
ges, Month. t. cit. p. 490.
Red-Crested Creeper, var. B. Lath. Gen. Syn. B. p. 708 (1781);
ex Sonn. pl. 30 f. D.; id. Gen. Syn. B. 2, p. 706 n. 8 (1781);
id. Gen. Hist. B. v. p. 219 n. 8 (1822).
Erithia chalybea, Scop. Flor. et Faun. Insub. 2, p. 91, n. 8
(1786 ex Sonn.).
Sui-manga à gorge violette, Andeb. et Vieill. Ois. Dor. 2, pp.
55, 56, pls. 32, 33, (1802).

- C. affinis, Sharpe, Gen. Zool., viii, p. 208 (1880), (= *Aethopyga*, V., II.).
C. pusilla, Bechstein, Kürze Lebens-, p. 178 n. 8 (1822).
Cinnyris speratus, Cuvier, Ann. i, p. 412 (1816); *Polytmus*, Di. t. d'Hist. Nat. xxvi, p. 505 (1819); *Birds*, et al., Meth. ii, p. 593 (1823); *Less. Man. d'Orn.*, i, p. 59 (1825); *id. Maitré d'Orn.*, i, p. 297, n. 24 (1831); *Shelley, Monog.*, p. 131 pl. 43.
Nect. coenigaster, Temm., Pl. Cat., pl. 388, t. 3, (1826); *Dictionnaire*, Diction. Class., xv, p. 512; *Gray Gen. B.*, i, p. 28 (1827); *Mart. J. f. O.*, 1830, p. 12, n. 48 (1830); *id. Passer.*, Ost-Asien, p. 189.
Cin. coccineigaster, *Less. Man. d'Orn.*, ii, p. 30, (1828).
Nect. sperata, Drapiez, *Diction. Class.*, xc, p. 511 (1829).
Nect. philippensis, (part) Meyer, *Reise Zool.*, p. 20 (1831).
C. zeylanica, Meyer, tom. Cit., p. 200 (n. Linn.)
Nect. affinis, Jard., *Monog. Sun-birds*, p. 216, 212, 1 (1843).
Leprocoma sperata, Cab., Mus. Heu., i, p. 105, n. 500 (1850); *Bp. Compt. Rnd.* 1854, p. 265.
Anthrptes expectata, Lichten, *Nom. Av. Mus. Berol.* p. 56 (1854).
An. sperata, Lichten, tom. cit., p. 56 (1854).
Chalcochitra pusilla, Reichb., *Hindb. Scans.*, p. 280, n.º 649, 19 568 figs. 3871-72 (1854).
Nectarophila sperata, Reichb., tom. cit., p. 281, n. 651; *Idem*, ibid., 1870, p. p. 42; *id. Tr. Z. S.*, iv, p. 200 (1875).
Nectar. affinis, Reichb., *Hindb. Scans.*, p. 281, n. 651, pls. 35-568, figs. 3879-88, et 4066-67 (1854).
Nectar. coenigaster, Reichb., tom. cit., p. 283, n. 652, pl. 21 fig. 3882.
Arachnotra sperata, Gray, *Handb. B.*, i, 112, n. 1398 (1866).
Cinnyris sperata, Gadow, *Cat. B. Mus.*, 3 p. 63 (1884).
Hab. Luzon, Manila, Laguna, Calamba, Bataan, Orion, Mindoro, Marinduque, Guimaras, Negros, Samar, Dinagat, Misamis, Paragua, P. Princesa.
9. *C. juliae* (Tweed) ♂♂ N. v. Sung (M. S. I.)
Nectarophila juliae, Tweed, P. Z. S. 1877, pp. 535, 547; 1878, p. 951.
Cinnyris juliae, Shelley, *Monog. Nect.*, p. 135 pl. 44; *Gen. Cat. Mus.*, 9, p. 64 (1884).
Hab. Malanipa, Mindanao, Joló, Maimbung.
10. *C. aurora*, (Tweed) ♂♀ N. v. Sarisat (M. S. I.)
Cyrtostomus aurora, Tweeddale, P. Z. S. 1878, p. 62.
Cinnyris aurora, Shelley, *Monog. Nect.*, p. 149; *Gen. Cat. Mus.*, 9, p. 88 (1884).
Hab. Paragua, P. Princesa, Inagauran.
11. *C. flagrans*, (Oustalet) ♂♂ N. v. Sung, (M. S. I.)
Aethopyga flagrans, Oustalet, *Journ. de l'Instit.* 1879, p. 10.

Cinnyris fligrans, *Shell*, *Mong.* *Nat.* p. 147, pl. 47 f. 2.;
Gad. Cat. B. Mus. 9, p. 88 (1834).
Hab. Luzon, Bataan, Orion.

2. *C. guimaraensis*, *Stere.* ♂ N. v. Tieuy. (M. S. T.)

Hab. Guimarás.

13. *C. jugularis*, (*Lin*), ♂ N. v. Suing (M. S. T.)

Le Grimpereau des Philippines, *Briss. Orn.* iii. p. 613, n.^o 4, pl. 30, fig. 2 (1760).
Le Petit Grimpereau des Philippines, *Briss. tom. cit.* p. 616, n.^o 7, pl. 32, fig. 5; *Daub. Pl. Ent.* 576, fig. 3.
Le Grimpereau olive des Philippines, *Briss. tom. cit.* p. 623, n.^o 10, pl. 32, fig. 4; *Daub. Pl. Ent.* 570, fig. 4.
Certhia jugularis, *Linn. S. N.* i. p. 187, n.^o 21 (1766), ex *Briss.* n.^o 6; *P. L. S. Müll. S. N.* ii. p. 256, n.^o 7 (1773); *Gm. S. N.* i. p. 474, n.^o 7 (1788).
C. philippina, *Linn. S. N.* i. p. 187, n.^o 28 (1766), ex *Briss.* n.^o 4; *P. L. S. Müll. S. N.* ii. p. 260, n.^o 21 (1773); *Lath. Ind. Orn.* i. p. 293, n.^o 9 (1790).
C. tricoloris, *P. L. S. Müll. S. N.*, *Anhuz*, p. 99, n.^o 31 (1776) ex *Buff.* fig. 4.
Premier Grimpereau de l'Isle de Luçon, *Sonn. Voy. Nouv. Guin.* p. 63, pl. 30, fig. A (1776).
Second Grimpereau de l'Isle de Luçon, *Sonn. l. c.* fig. B.
Soui-manga à gorge pourprée, *Mont. Hist. Ois.* v. p. 505 (1778).
Philippine Creeper, *Lath. Gen. Syn.* ii. p. 711, n.^o 12 (781).
Grey Creeper, *Var. à Lath. tom. cit.* p. 714, n.^o 15^a; *id Gen. Hist. B.* iv. p. 231, n.^o 19.
C. quadricolor, *Scop. Del. Fauv. et Flor. Insub.* ii. p. 91, n.^o 69 (1786, ex *Sonn.*)
C. gularis, *Sparrm. Mus. Carls.* pl. 79, «Martinique» (!) 1786;
Lath. Ind. Orn. i. p. 303, n.^o 69 (1790).
C. curruaria, *Var. B.*, *Lath. Ind. Orn.* i. p. 280, n.^o 15 *P.* 1790.
Soui-manga à gorge bleue, *Aud. et Vieil'. Ois. Dor.* ii. pp. 51, 52, pls 20, 30 (1802).
C. curruaria et *jugularis*, *Bechst. Kurze Uebers.* p. 180, n.^o 15 (1812).
Cinnyris zeylonicus, *Cuz. Régne Anim.* i. p. 412 (1887, ex *Daubent.* fig. 4); *Vieil'. N. Dict. d'Hist. Nat.* xxvi p. 507 (1819); *id Encycl. Meth.* ii. p. 594 (1823).
C. philippensis, (*part.*), *Meyen, Reise Th.* iii. p. 206 (1834).
C. sperata ♂, *Meyen, tom. cit.* p. 207.
Nectarinia jugularis, *Jard. Mong. Sun-birds*, pp. 228, 267, pl. 25, fig. 2 (1842); *Gray, Gen. B.* i. p. 98 (1847).
Cereba gularis, *Gray, Gen. B.* i. p. 101, n.^o 4 (1847); *Bz. C. A.* i. p. 400, n.^o 4 (1850).
Nectarinia pectoralis, *Cab. Mus. Hein.* iii. *App.* p. 33 (1849, ex *Daubent.* fig. 4).
Cyrt. jugularis, *Cab. Mus. Hein.* i. p. 105, n.^o 570 (1850); *Reichb. Handb. Sezioriz.* p. 308, n.^o 723, pl. 570, fig. 3839 (1854).

4. Gen. ARACHNOPIERA, Tem.

- 15 *A. longirostris*, (Lath.) ♂♂ N. v. Santar. (M. S. F.)
Long-tailed Creeper, *Lith. Gen. Syst. Suppl.*, i, p. 133 (1787);
G. d. H. J., v, p. 251 (1792).

— (1) —

§. Gén. ANTHOTHREPTES (Linn.). Género.

18 A. chlorogaster, *Gmel.* ♂♂ N. v. (Uitam). M. S. (1)

Anthothreptes malaccensis, *Jard.* *Silv.* *Ind.* *Linn.* *Orn.* VII, p. 661 (1875); *id.* ix, p. 57 (1876); *id.* p. 24 (1877); *Copeia*, p. 320 (1877).

Anthothreptes chlorogaster, *Schleg.* *Tr. Linn.* *Acad.* p. 342 (1877).

Ant. chlorigaster, *Shelley*, *Nicobar Arch.* p. 320; *pl. 103*, fig. 1 (1877).

Ant. rhodolamia, *Schleg.* *Mona Is.* *Arch.* p. 30; *pl. 6*, fig. 1 (1877).

Anthothreptes chlorogaster, *Graves*, *Cat. Ind. Mus.* g. 1, p. 122 (1814).

Hab. Masbate, Negros, Cebú, Paragua, P. Philippines, Mindanao, Joló, Cañayán de Joló; Célebes.

19 An. griseigularis, ♂♀ N. v. (Uitam). M. S. (1)

Anthothreptes griseigularis, *Tweeddale*, *P. Z. S.* 1877, pp. 817, 130; *1878*, p. 113; *Georg. Cat. B. Mus.* g. 1, p. 126, (1884).

Hab. Mindanao, Samar, Borneo.

Fam. MELIFÁGIDOS.

Subfam. MIZOMELINOS.

1. Gén. MYZOMELA, Vig., pt. Hist. (1)

1 My. rubratra (*Lass.*) ♂ N. v. (Uitam). M. S. (1)

Cinnyris rubratus, *Less.* *Voy. Cog.*, *Zool.* p. 678 (1826); *id. Man. d'Orn.* ii, p. 55. (1828); *Kitt. Kupf. Vog.* pl. 8, f. 1; *id. Denkw. einer Reise*, i, pp. 364, 381 (1858).

My. rubratra, *Bp. C. R.* t. 38, p. 263 (1854); *Hartt. P. Z. S.* 1868, p. 5; *id. et Finsch. P. Z. S.* 1872, p. 94; *Finsch. Journ. Godeff. Mus.* xii, p. 26; *Forbes. P. Z. S.* 1879, p. 270; *Gadow. Cat. B. Mus.* g. p. 120 (1884).

Hab. Islas Carolinas, Palaos.

2 My. chermesina, ♂ N. v. (Uitam).

Myzomela chermesina, *Gmel.* *Cat. B.* i, pl. 38 (1810); *id. Cat. B. Trop. Asl.* p. 113; *Id. C. M.* i, p. 36; *Gray. P. Z. S.* 1858, p. 160; *id. C. M.* *New Cat.* p. 58; *Id. P. Z. S.* 1861, p. 343; *Rosenb. Nat. Trop. Kr.* *Ned. Trop.* xxv, p. 230; *Id. J. O.* 1894, I, 1-2; *Gray. Herold. B.* i, p. 154 n. 1989; *Rosenb. Natur. Arch.* p. 553; *Forbes. P. Z. S.* 1878, p. 52; 1879, p. 273; *Sab. Orn. Pap. av. t.* ii, p. 30; *Gadow. Cat. B. Mus.* g. p. 121 (1884).

Hab. Pen. (1) (Uitam).

Sulgam. ZOSTEROPINOS.

— ZOSTEROPS, VII. PT. II. 1881.

3. *Z. everetti*, Tem. & Co N. v. Tiere.

(M. S.)

Zosterops everetti, Tweddell, P. Z. S. 1857, p. 79; 1860, p. 203; ibid. (1878), pp. 111, 950; W. T. C. & G. Gould, Cat. Gen. B. i. p. 198 (1848); Bp. Conspl. i. p. 399 (1850); Griseb. Handl. B. i. p. 163, n. 2149 (1869).

4. *Z. palpebrosus*, Tem. & Co N. v. Tiere.

(M. S.)

Sylvia palpebrosa, Tem. & Co Coll. 203 f. 3. (1824).
Zosterops madraspatensi, Jerd. Mys. Journ. xi. p. 7. (1846).
Z. nicobarica, Blyth, J. A. S. Beng. xiv. p. 593 (1845); Griseb. Gen. B. i. p. 198 (1848); Bp. Conspl. i. p. 399 (1850); Griseb. Handl. B. i. p. 163, n. 2149 (1869).
Z. palpebrosus, J. A. S. Beng. xiv. p. 44 (1846); Griseb. Gen. B. i. p. 198 (1848); Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc. p. 200 (1849); Bp. Conspl. i. p. 398 (1850); Keuleps, Prakt. Cat. p. 121 (1852); Layard, Asiat. & Mus. Nat. Hist. 1853, p. 293; Horsf. & Moore, Cat. B. E. I. Cr. Mus. ii. p. 295 (1854); J. A. S. Beng. ii. p. 265 (1863); Garth, J. T. O. 1867, p. 14; Blyth, Ibis, 1867, p. 33; R. van, t. c. p. 328; Nouzkt, J. A. S. Beng. xxxvii. p. 51 (1868); Beaufort, 1872, 1898, p. 32; Tschudi, t. c. p. 177; Pelz, t. c. p. 313; Broek, 1880, p. 57; Gray, Handl. B. i. p. 162, n. 2122 (1869); Godwin-Austen, J. A. S. Beng. xxxviii. p. 169 (1870); Holdsworth, P. Z. S. 1872, p. 458; Hume, Nest. & Eggs. Ind. B. p. 350; p. 397 (1873); Cock & Marsh. Str. F. 1873, p. 359; Adam, t. c. p. 384; Hayes Lloyd, Ibis, 1873, p. 413; Legge, Ibis, 1874, p. 223; Warden, t. c. p. 143; Ball, Str. F. 1874, p. 417; Hume, Str. F. 1875, p. 143; Broek, t. c. p. 252; Hume, t. c. p. 493; Butler, t. c. p. 491; Blyth, & Wald. B. Barn. p. 110 (1875); Fairb. Str. F. 1876, p. 260; Hume, t. c. p. 403; Fairb. S. F. 1877, p. 407; Davids, & Warden, S. F. 1878, p. 84; Ball, t. c. p. 202; Auders. Zool. Exped. Zunam, p. 631 (1878); Butler, Cat. B. Sint & c. p. 42 (1879); Legge, B. Ceylon, p. 582 (1879); Hume, Str. F. (1879), p. 104; Scully, t. c. p. 322; Vidal, Str. F. 1880, p. 69; Butler, t. c. p. 413; Hume, t. c. p. 505; Butler, Cat. B. South. Bomb. Pres. p. 57 (1880); God. Cat. B. M. o. p. 175 (1884).
Zosterops japonicus, (nec T. v. S.) Swinh. His. 1861, p. 35.
Z. simplex, Steinh. His., 1861, p. 331, 1863, p. 294; Hartill, J. F. O. 1865, p. 15; Swinh. His. 1869, p. 120; Gray, Handl. B. i. p. 163, n. 2151 (1869); Swinh. His. 1870, p. 348; Gould, B. Asia, part. xxiii. (1871); Steinh. P. Z. S. 1878, p. 313; David & Audebert, Oiseaux Chine, p. 25 (1877); Hume, Str. F. 1878, vol. ii. p. 403; id. Str. F. 1879, p. 164.
Z. nicobariensis Hume, Str. F. 1873, p. 242; 1876, p. 104.
Z. palpebrosa, *nicobariensis*, Hume, Str. F. 1876, p. 291.
Hab. Luzón, Laguna, Samar, Forogon; China, Céilan.

5 *Z. meyeni*, *T. & S.* v. *Ticant.*

(M. S. T.)

Dicaeum flavum, (*now* *I. & S.*, *Kittl.*, *Kupf.*, *Vög.*, pl. 19, fig. 2, (1832); *id.* *Mem. Acad. S. Petersb.*, *1835*, pl. 3.

Sylvia flava, *Meyen*, *Acta Acad. Coss.-Leop. Vet. Cur.*, *xvi. Suppl.*, p. 203 (1834).

Zosterops, *sp.* *Gray*, *Gen. B.*, i., p. 198 (1848).

Z. meyeni, *Bp.* *Consp.*, i., p. 398 (1850); *Resch*, *Hanß.*, *Merop.*, p. 95, pl. 461, fig. 3294 (c. 1852); *Hartl*, *J. f. O.*, *1855*, p. 16; *Gray*, *Hanß.*, *B.*, i., p. 162, n.^o 2123 (1860); *Wahl*, *T.*, *Z. S.*, ix., p. 100 (1877); *Gadow*, *Cat. B. M.*, *g.*, p. 180 (1884).

Hab., Luzon, Manila, Cagayan, Alcalá.

6 *Z. semperi*, *H. et Finsch.*

Z. semperi, *Hartl. et Finsch*, *P. Z. S.*, *1868*, p. 117; *Gray*, *Handl. B.*, i., p. 163, n.^o 2144 (1869); *Hartl*, *P. Z. S.*, *1871*, p. 95; *Finsch*, *Journ. Mus. Godaff. Heft.*, viii., p. 16, *Taf.* 4, f. 1; *id.* *P. Z. S.*, *1880*, p. 575; *d.* *Ibis*, *1881*, p. 115; *Gadow*, *Cat. B. M.*, *g.*, p. 183 (1884).

Hab., Islas Carolinas, Palaos.

7 *Z. nigrorum*, *Twe*, *♂ N* v. *Suing*.

(M. S. T.)

Z. nigrorum, *Twe* *ddale*, *P. Z. S.*, *1878*, p. 286; *Wardlaw Ramsay*, *Orn. Works. Twedd.*, p. 658; *Gadow*, *g.*, p. 186 (1884).

Hab., Negros.

8 *Z. hypoleais*, *Hartl. et Finch.*

Z. hypoleais, *Hartl. et Finsch*, *P. Z. S.*, *1872*, p. 95; *Gadow*, *Cat. B. M.*, *g.*, p. 186 (1884).

Hab., Carolinas, Uap.

9. *Z. oleagina*, *H. et F.*

Z. oleagina, *Hartl. et Finsch*, *P. Z. S.*, *1872*, p. 95; *Gad. Cat. B. M.*, *g.*, p. 187 (1884).

Hab., Carolinas, Uap.

10 *Z. conspicillata*, *(Kittl.) ♂ N v.*

(M. S. T.)

Dicaeum conspicillatum, *Kittl.*, *Kupf.*, *Vög.*, pl. 19, f. 1 (1832); *id.* *Mem. Acad. S. Petersb.*, ii., pl. 4, (1835).

Z. conspicillata, *Gray*, *Gen. B.*, i., p. 398 (1848); *Bp.*, *C. Av.*, i., p. 398 (1850); *Reich*, *Handb. Merop.*, p. 92, pl. 461, f. 3295 (c. 1852); *Gray*, *Cat. B. Trop. Jet. Parif. Ocean.*, p. 16 (1859); *id.* *Handl. B.*, i., p. 163, n.^o 2141 (1869); *Gadow*, *Cat. B. Mus.*, *g.*, p. 187 (1884).

Hab., Guam, Marianas.

11. *Z. semiflava*, Newton.

Z. semiflava, *E. Newton*, *Ibis*, pp. 354, 359, 1867; *Gray*, *Handb. B.*, i, p. 163, n.^o 2160 (1869); *Hartl*, *Vög. Madag.*, p. 104 (1877); *Oust. Bull. Soc. Philom.*, 1878, p. 170; *Gad. B. M. Cat. o.*, p. 166 (1884).

Hab. Islas Marianas, Seychelles.

12. *Z. modesta*, Newton. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Z. modesta, *E. Newton*, 1867, p. 345, 359; *Gray*, *Handb. B.*, i, p. 163, n.^o 2159 (1869); *Hartl*, *Vög. Madag.*, p. 98, 1877; *Oust. Bull. Soc. Philom.*, 1878, p. 170; *Gad. Cat. B. M. o.*, p. 164 (1884).

Hab. Marianas.

13. *Z. finschii*, Hartl. N. v.

Lophura finschii, *Hartl*, *P. Z. S.*, 1868, pp. 6, 417) pl. 3; *Z. finschii*, *Gray*, *Handb. B.*, i, p. 164, n.^o 2173 (1869); *Hartl*, *et Finsch*, *P. Z. S.*, 1869, p. 96; *Gad. Cat. B. M. o.*, p. 197 (1884).

Hab. Carolinas, Palau.

14. *Z. ponapensis*, Finsch. N. v.

(M. S. T.)

Z. ponapensis, *Finsch*, *Journ. Mus. Godeff. Heft.*, xii, p. 27, Taf. 2, f. 1; *id. P. Z. S.*, 1877, p. 778; *id. Ibis*, 1881, p. 115; *Gad. Cat. B. M. o.*, p. 168 (1884).

Hab. Ponapé, Carolinas.

15. *Z. basilanica*, Steere. ♂ ♀ N. v. Mananataon.

(M. S. T.)

Hab. Samar, Paric; Basilan.

Subfam. MELIFAGINOS.

1. Gen. PHILEMON, Vieillot.

2. *Ph. philippinensis*, Steere. ♂ N. v. Ticuit.

Hab. Samar.

Grupo: FRINGILIFORMES

Fam. DICÉIDOS.

1. Gen. DICÆUM, Cuv.

1. *D. retrocinctum*, Gould. ♂ N. v. Pijit.

(M. S. T.)

Dicæum retrocinctum, *Gould*, *Ann. & Mag. Nat. Hist.*, x, p. 114 (1872); *Walden*, *Trans. Z. S.*, ix, p. 200 (1875); *Gould*,

B. schistaceus, part. xxvii, (1875); *Sci. & L. Ann.*, T. vii, p. 309 (1876); *Ward's Rev. Orn.*, B. M., p. 104, 628 (1881); *Sharpe, Cat. B. M.*, v. 1, p. 35 (1885).

Hab. Luzon, Manila, Mindoro, Bico, Cebu.

2. **D. haematostictum**, Sharpe, ♂ N. v. Pipit-pipalade.

Dicæum haematostictum, *Sharpe, Nature*, Aug. 1876, p. 220; *Transl. Linn. Soc. 2nd ser. Zool.*, vol. i, p. 330 (1877); *B. M.*, 10, p. 35 (1885); *Tweedt. P. Z. S.*, 1878, p. 293; *Ward's Rev. Orn. Works Tweedt.*, p. 658 (1881).

Hab. Guimaras, Negros, Panay.

3. **D. rubriventer**, Less. ♂ ♂ N. v. Pipit-pipalade.

Le Manikor de la Nouvelle Guinée, *Diction. P. E.*, v. pl. 2, fig. 2.

Le Manikor, *Buff. Hist. Nat. Ois.* iv, p. 431.

Papuan Manakin, *Zool. Gen. Syst.* iv, p. 532 (1783).

Pipra papuensis, *Gru. Syst. N. P.*, i, p. 104 (1788).

Muscicapa papuensis, *Tenu. Min. d'Orn.* 3, p. lxvii (1821).

Pl. Col. Tabl. Méth., p. 25 (1830).

Dicæum rubriventer, *Less. Trait.*, p. 303 (1831); *Sci. & L. Mus. Civic. Genov.*, viii, p. 511 (1876); *Tweedt. P. Z. S.*, pp. 608, 763, 829, (1878), pp. 411, 950; *Ward's Rev. Orn. Works Tweedt.*, p. 658 (1881); *Sharpe, Cat. B. M.*, p. 36 (1885).

D. schistaceum, *Tweedt. Ann. & Mag. Nat. Hist.*, (4) xx, p. 70 (1877); *id. P. Z. S.*, 1878, p. 111; *Ward's Rev. Orn. Works Tweedt.*, p. 658 (1881); *Sharpe, P. Z. S.*, 1883, p. 57.

D. papuense, *Hartl. Rev. Zool.*, 1845, p. 47; *Gray, Cat. B.*, p. 100 (1874); *Bp. Consb.*, i, p. 493 (1850); *Rothsbr. Monogr. Scansoria*, p. 249, fig. 3782 (1853); *Gray, P. Z. S.*, 1853, p. 190; *id. Cat. B. New. Guina*, p. 55 (1859); *id. P. Z. S.*, 1877, p. 434; *Finsch, Neu-Guinea*, p. 163 (1895); *Gray, Tandu*, i, p. 114, n.º 1421 (1869).

D. rubriventer, *Pushw. Rev. Zool.*, 1845, p. 135, note.

D. retrocinetum, *Gould. A. & Mag. Nat. Hist.*, v. 1, p. 182; *id. B. Asia*, part. xxvii, id. 75; *Ward. Trans Z. S.*, 1881, p. 182.

Hab. Luzon, Manila, Leyte, Cebu, Bohol, Samar, Leyte, Mindanao, Zamboanga, Basilan, Matalvi, Mindanao.

4. **D. hypoleucum**, Sharpe, ♀ N. v. Utan.

Dicæum hypoleucum, *Sharpe, Nature*, Aug. 1876, p. 220; *Transl. Linn. Soc. 2nd ser. Zool.*, vol. i, p. 330 (1877); *B. M.*, 10, p. 37 (1885); *Tweedt. P. Z. S.*, 1876, p. 111; *Ward's Rev. Orn. Works Tweedt.*, p. 658 (1881).

Hab. Basilan, Malamauai.

5. **D. mindanense**, Tweedt. ♀ N. v. Lipit.

Dicæum mindanense, *Tweedt. P. Z. S.*, 1877, p. 51; *Z. R. & Roy. 'Challenger.' Birds.*, p. 20, pl. 5, fig. 1 (1877); *Ward's Rev.*

Ramsay, *Orn. Works Tweedl.* pp. 471, 638 (1881). Sharpe, *Cat. B. M.* 10, p. 37 (1885).

Hab. Pasananca, Zamboanga, Mindanao.

6. **D. trigonostigma**, (Scop.) ♀ N. v. Utuit. (M. S. T)

Le Grimpereau siffleur de la Chine, Sonn. Voy. Ind. Orient. p. 210, pl. 61, fig. 2 (1776-82).

Certhia trigonostigma, Scop. Del. Flor. et Faun. Insulbr. ii. p. 91 (1786).

Orange-breasted Creeper, Lath. Gen. Syn. Suppl. p. 132 (1787).

Certhia cantillans, Lath. Ind. Orn. i. p. 299 (1790).

Dicæum cantillans, Cuv. Règne An. i. p. 410 (1817); Vieill. N. Dict. d'Hist. Nat. ix. p. 409 (1817); Temm. Pl. Col. iv. pl. 47b, fig. 3 (1829).

D. croceoventre, Vigors, Mem. Raffl. p. 673 (1830); Mottley & D'Uv. N. H. Labuan, p. 17 (1855).

D. trigonostigma, Gray, Gen. B. i. p. 100 (1847); Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc. p. 226 (1849); Bp. Consf. i. p. 403 (1850); Cab. Mus. Illn. Th. i. p. 98 (1850); Reichenb. Handb. Scanseriæ, p. 241, figs. 3788-89 (1853); Horsf. & Moore, Cat. L. & I. Co. Ms. ii. p. 748 (1854); Schlegel P. Z. S. 1803, p. 220; Wald. P. Z. S. 1800, p. 545; Beavan, Ibs., 1809, p. 422; Gray, Handb. B. i. p. 114, n.º 1416 (1809); Godwin, Aust. J. A. S. Beng. xxix, p. 303 (1870); Wald. Ibis, 1872, p. 380; Hume, Str. F. 1874, p. 473; Salvin, Ucc. Born. p. 160 (1874); Blyth & Wald. B. Burm. p. 142 (1875); Wardlaw Ramsay, Ibis, 1876, p. 349, pl. x, fig. 2; Sharpe, Ibis, 1876, p. 423; id. Trans. Linn. Soc. 2nd ser. Zool. i. p. 34 (1876); Tweedl. Ibs., 1877, p. 312; Hume, & Davison, Str. F. 1878, p. 194; Sharpe, Ibis, 1879, p. 261; id. P. Z. S. 1874, p. 343; Hume, Str. F. 1879, p. 90; Bingham, Str. F. 1883, p. 195; Wardlaw Ramsay, Orn. Works Tweedl. p. 658 (1881); Sharpe, P. Z. S. 1881, p. p. 79; id. Cat. B. Mus. 10, p. 38 (1883); Müller, Vog. Insel Sulawesi, p. 22 (1882); Oates, B. Brit. Burm. i. p. 356 (1883).

Hab. Negros; Borneo, Java, Sumatra.

7. **D. dorsale**, Sharpe, ♂, ♀ N. v. Utuit. (M. S. T.)

Dicæum dorsale, Sharpe, Nature, Aug. 1876, p. 298; id. Trans. Linn. Soc. 2nd ser. Zool. i. p. 340 (1876); id. Cat. B. M. 10, p. 40 (1885). Tweedl. P. Z. S. 1877, p. 763; Gould, B. Asiat. part xxx. (1877); Wardlaw Ramsay, Orn. Works Tweedl. p. 658 (1881).

Hab. Cebú, Panay.

8. **D. xanthopygium**, Tw. ♂, ♀ N. v. Print-didao. (M. S. T.)

Dicæum xanthopygiun, Tweedl. Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) xx. p. 95 (1877); id. P. Z. S. 1877, p. 618, pl. lxxiii, fig. 1; Wardlaw Ramsay, Orn. Works Tweedl. p. 658 (1881); Meyer, Vog. Ostind. Arch. p. 39 (1884); Sharpe, Cat. B. M. 10, p. 40 (1885).

Hab. Luzón, Mindoro, Calapan.

9. **D. cinerei_ulari.** ♂♂ N. v. Uit-uit. M. S. T.

Dicæum cinereum, *Tweed. P. Z. S.* 1877, p. 829 & 1878, p. 950; *Wardlaw Ramsay, Orn. Works Tweedd.* p. 658 (1881); *Sharpe, Cat. B. M.* 10, p. 47 (1885).
Hab. Minanau, Piaya, Zubuinga, Sanar, Paranas, Leyte.

10. **D. b. sti.** ♂♂ N.

Hab. Siuijor.

11. **D. pygmaeum** *Kuhl* ♂♂ N. v. Uit-uit (M. S. T.)

Nocturnia pygmaea, *Kuhl, Mem. pres. Acad. St. Petersb.* ii, pts. 1, 2, pl. 2 (1833).

Dicæum pygmaeum, *Gray, Gen. B.* i, p. 100 (1847); *Bp. Conspectus*, p. 493 (1850); *Reichenb., Handb. Scans.* p. 242 fig. 378 (1853); *Gray, Hand-l. B.* i, p. 115, no. 1436 (1859); *Sharpe, Cat. B. M.* 10, p. 43 (1885).

Myzanthe pygmaea, *Walden, Trans. Z. S.* ix, p. 200 (1875); *Sharpe, Trans. Linn. Soc. 2nd ser. Zool.* i, p. 352 (1876); *Tweed. P. Z. S.* 1877, p. 698; 1878, pp. 343, 620; *Wardlaw Ramsay, Orn. Works* *Tweed.* p. 658 (1881).

Hab. Luzón, Manila, Montalban, Leyte, Guimarás, Paragua, Negros, Marinduque, Mindoro.

12. **D. everetti.** *Twe.* ♂♂ N. v. Uit-uit. (M. S. T.)

Dicæum everetti, *Ann. & Mag. Nat. Hist.* (4) xx, p. 537 (1877); *id. P. Z. S.* 1878, p. 111; *Wardlaw Ramsay, Orn. Works* *Tweed.* p. 658; (1881); *Sharpe, Cat. B. M.* 10, p. 47 (1885).

D. modestum, *Tweed. P. Z. S.* 1878, p. 380; *Sharpe, Z. S.* 1878, p. 580.

Myzanthe modestum, *Wardlaw Ramsay, Orn. Works*, *Tweed.* p. 658 (1881).

Hab. Dingat, Panaon, Samar, Borongan, Loquilocnn.

2. Gén. PRIONOCHILUS, STRICKL.

13. **P. samarensis.** *Steere* ♂♂ N. v. Uit-uit. (M. S. T.)

Hab. Samar, Paric, Borongan.

14. **P. percussus**, *Tenn.* ♂♂ N. v. Uit-uit. (M. S. T.)

Paralotus percussus, *Tenn. Pl. Col.* iii, pl. 394, fig. 2 (1826). *Prionochilus percussus*, *Sharpe, P. Z. S.* 1883, p. 580; *id. Cat. B. M.* 10, p. 65 (1885).

Hab. Paragua, Puerto Princesa; Java.

15. **P. quadricolor.** *Twe. ♂ N. v. Ut-ut.* (M. S. T.)

Prionochilus quadricolor., *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 762, pl. lxxvii, fig. 2; *Wardlaw Ramsay. Orn. Works Tweed.* p. 65 (1881); *Sharpe. Cat. B. M.* 10, p. 70 (1885).
Hab. Panaon, Cebú.

16. **P. olivaceus.** *Twe. ♂ N. v. Ut-ut.* (M. S. T.)

Prionochilus olivaceus., *Tweedd. Ann. & Mag. Nat. Hist.* (4) xx, p. 536 (1877); *id. P. Z. S.* 1878, p. 111, pl. viii, fig. 3; *Wardlaw Ramsay. Orn. Works Tweed.* 658 (1881); *Sharpe. Cat. B. M.* 10, p. 75 (1875).

Hab. Dinagat, Samar, Parie.

17. **P. xanthopygius.** *Sav. ♂ N. v. Ut-ut.* (M. S. T.)

Prionochilus xanthopygius., *Savord. Atti R. Accad. Torin.* iii, p. 416, cum fig. (1868); *Hallden. Ibis.* 1872, p. 379; *Sclater. Ibis.* 1874, p. 2; *Savord. Ue. Burn.* p. 162 (1874); *Sharpe. Ibis* 1877, p. 27; *id. Ibis.* 1879, p. 251; *id. P. Z. S.* 1881, p. 795; *id. Cat. B. M.* 10 p. 6, (1885).
Hab. Paragua, P. Princesa; Barroco.

18. **P. Joannes.** *Sicere.*

Hab. Paragua.

Fam. HIRUNDÍNIDOS.

I. Gén. CHELIDON, Boie

1. **Ch. urbica.** (*Lin.*) ♂ N. v. Langay-lungayan. (M. S. T.)

La petite Hirondelle ou le Martinet à cul blanc, *Brisse. Orn.* ii, p. 490 (1760).
Hirundo urbica., *Linn. Syst. Nat.* i, p. 344 (1766); *Tennim. Man. d'Orn.* i, p. 428 (1885); *Rutte. Orn. Provinc.* pl. 144 (1825); *Werner. Atlas. Chelidon.* i, 18, 2, 3 (1827); *Nordm. Vog. Deutschl.* vi, p. 75; *Tab.* 148 (1823); *Meyn. Cat. rous. Cr.* p. 45 (1832); *Selby. Brit. B.* p. 213 pl. 42, fig. 2 (1833); *Gould. B. Eur.* ii, pl. 57 (1831); *S. L. & Sower. Vog. Eur.* *Taf.* vi, fig. 1 (1839); *Macgill. Brit. B.* iii, p. 573 (1840); *Nordm. in Demid. Vog. Russ.* *Méth.* iii, p. 200 (1840); *Heugel. E. Vog.* *Brit. B.* i, p. 216; pl. 57, fig. 3 (1846); *Thomps. Nat. Hist. Ireland.* i, p. 319 (1849); *Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 198 (1849, pt.); *Kjærh. Danm. Fysk.* pl. xiv, fig. 5 (1852); *Schl. Vog. Nederl.* pl. 58 (1854); *Sundev. Sv. Fogl.* pl. xvii, fig. 6 (1856-72); *Linderm. Vog. Græcent.* p. 117 (1860); *Schl. Dier. Nederl. Vogels.* pl. 6, figs. 5, 5^o (1861); *Keulem. A. T. D.* iii, p. 384 (1866); *Borggr. Vogel. Norddeutschl.* p. 100 (1869); *Gray. B. W. Scott.* p. 209 (1871); *Harting. Handb. Brit. B.* p. 35 (1872); *Godm. Ibis.* 1872, p. 171; *Keul. Onze. Vogels.* ii, pl. 9 (1873); *Saxby. B. Sheld.* p. 146 (1874); *Harting. Sum-*

n. r. *Migr.*, p. 84 (1875); *Orn. Bel.*, p. 124 (1875);
Siebold, *Ibis*, 1829, p. 20; 1831, *J. Brit. B.*, iii, p. 178;
pl. 17 (1833); *Dixoni*, *Proc. Linn. Soc.*, p. 53; *Hemeyer & Tauri*,
Migr. orn., *Proc. W.*, 1833, p. 13.

Petit Martin, *De la C. Fr.*, p. vii, pl. 542.

Hirondelle à couronne blanche, *L'Histoire naturelle de Fenêtre*, *Month.*
Phil. Nat. Oise., vi, p. 104, pl. xxv, figs. 2 (1779).

Hirundo, *Jahh. Gén. Nau.*, i, pt. 2, p. 269 (1883).

Hirundo domestica, *Leach*, Synt. Cat., *Audubon & Brit. Mus.*, p. v
(1861).

Chlidon urbica, *Bonap. Ibis*, 1822, p. 55; *Rüpp.* *Nat.*, *Wörb.*
p. 106 (1828); *Koch*, & *Thom.*, *Wörb. Fiss.*, p. ix (1840); *Rüpp.*
Syst. Ueter., p. 22 (1845); *Corynor. Orn. B.*, i, p. 90 (1845);
Gr. Cat. Peccor. Brit. Mus., p. 31 (1848); *Rh. Consip.*, i, p. 343
(1850); *Cab. Mus. Genov.*, Pl. 1, p. 51 (1850); *Holleu*, *J. J. O.*
1854, p. 460; *Hengel. Synt. Vogels.*, p. 17 (1856); *Jaub.* &
Parth.-Lapoam. 1854; *Orn. F.*, 140 (1859); *Satz.* *Ibis*, 1859,
p. 392; *Tristr.*, t. c, p. 435; *Heugl. J. f. O.*, 1861, p. 416;
Gould. B. Cl. Br., vol. ii, pl. 6 (1862-73); *Jerd. B. Ind.*, i,
p. 166 (1862); *Vestn. in Brit. in Gould's Catalog.* p. 498 (1863);
Brehm. Re's. Hirsch., p. 272 (1863); *Fleppi. Vogel.* *Pers.*
p. 346 (1865); *Brehm. Thier. und. Vogel.*, tav. 67 (1865-70);
More, Ibis, 1865, p. 139; *Baird*, *Ibis*, 1867, p. 281; *Deg.*
& *Girbe. Orn. F.*, i, p. 2 (1867); *Locke. Expl. S. d. Alger.*
Ois. ii, p. 71 (1867); *Tristr.* *Ibis*, 1867, p. 364; *Drake*, t. c, p. 425;
Saunders. Ibis, 1869, p. 143; *Heugl. Orn. V. O.-Afr.*, i, p. 108
(1869); *Doderl. Afr. S. Scl.*, p. 145 (1869); *Drost*, *Vogelw. Bork.*
p. 87 (1869); *Hartt. Ibis*, 1870, p. 12; *Elwes & Buckley*, t.
c, p. 203; *Blanf. Col. & Zool. Abyss.*, p. 349 (1870); *Sharpe.*
P. Z. S. 1870, p. 202; *Fritsch. Vog. Eur.*, tab. 23 fig. 5
(c. 1870); *Sabad. Ann. Ital. Ucc.* p. 51 (1871); *Shelley. P.*
Hight. p. 125 (1872); *Illst.* & *Harvie Brown*, *Ibis*, 1873,
p. 59; *Brooke*, t. c, p. 237; *Hume. Str. F.* 1873, p. 323;
Brooks. Str. F. 1875, p. 323; *Dresser. B. Eur.*, iii, p. 495,
pl. 162 (1875); *Irby. B. Gebr.* p. 192 (1875); *Wharton*, *Ibis*,
1870, p. 19; *Watkin*, t. c, p. 356; *Blanf. East. Persia*, ii,
p. 216 (1876); *Hume. Str. F.* 1879, p. 84; *Bogdanoff. B.*
Caucas. p. 116 (1879); *Nei L. et. Yarr. Brit. B.* ii, p. 349
(1880); *Butler. Cat. B. S. Bombay Pres.* p. 15 (1880); *Coll. et.*
Vorges. Fugle. p. 286 (1881); *Gigloli. Elench. Ucc. Ital.* p. 63
(1881); *Biddulph. Ibis*, 1881, p. 47; *Sully*, t. c, p. 428; *Sho-*
Dey. Ibis, 1882, p. 259; *Biddulph*, t. c, p. 269; *Severtz. Ibis*,
1883, p. 70; *B. O. U. List. Brit. B.* p. 44 (1883); *Tristr. Faun.*
& *Fler. Palest.* p. 62 (1884); *Radde. Orn. Caucas.* p. 36 (1814);
Sharpe. Cat. B. M. 10, p. 87 (1885).

Chelidon fenestrarum, *rupesris*, *variolata*, *var. pallida*, *Vauv.*
Vög. Deutschl. vi, p. 77 (1833). *C. L. Brehm*, *Vög. Deutschl.*
p. 140 (1831).

Chelidon tectorum, *C. L. Br. km.* *Vorn.* 1855, p. 271.

Hob. *Europa, Africa, India.*

2 *Ch. dasypus* *Bp. C. N.* v. *Engay. Abg. 1850.*

M. S. 1

Chelidon dasypus, *Bp. Censh.* i, p. 224 (1850), *et. Tschm. MS.*

- Horsf. & Moore, Cat. B. E. I. Co. Mus.*, i, p. 1854, G.
Hand-l. B., i, p. 74, n.º 883 (1860); *Brit. Mus. B. Eur.*, iii, p. 498 (1875); *Sharpe, Cat. B. M.*, io, p. 91 (1885).
C. blakistoni, *Swinh. P. Z. S.*, 1862, p. 320; *Id. Ibis*, 1863, p. 90; *Whitely, Ibis*, 1867, p. 196; *Gray, Hand-l. B.*, i, p. 74, n.º 882 (1869); *Swinh. Ibis*, 1874, p. 152, pl. vii, fig. 1; *id. Ibis*, 1875, p. 448; *Blakist. & Pryer, Ibis*, 1878, p. 231, id. B. *Japan*, p. 139 (1882).
Delichon (?) *dasyurus*, *Salvad. Uer. Born.*, p. 127 (1814).
Hirundo *dasyurus*, *Seehorn, Hist. Brit. B.*, iii, p. 179 (1883).
Hab. Luzón, Cagayan; Japón, Borneo.

2. Gén. COTYLE. Boie.

3. *C. sinensis*, *Gray, Spec. N. v. Tongay Langyan.* (M. S. T.)
- Hirundo chinensis*, *J. E. Gray in Hardw. Illustr. Ind. Zool.*, i, pl. 35, fig. 3 (1830-32).
H. brevicaudata, *McClell. P. Z. S.*, 1830, p. 156; *Gray, Gen. B.*, i, p. 58 (1845).
H. sinensis, *Jerd. Madr. Journ.*, xi, p. 238 (1840); *Blyth, J. A. S. Beng.*, xvi, p. 119 (1847); *id. Cat. B. Mus. Is. Soc.*, p. 191 (1849).
Cotyle brevicaudata, *Boie, Isis*, 1844, p. 170.
Hirundo minuta, *Hodges. Icon.*, ined. in *Brit. Mus., Passeres* pl. 9, fig. 2 (n.º 333); *id. in Gray, Zool. Misc.*, p. 82 (1844).
H. subsocciata, *Hodges. Icon.*, ined. in *Brit. Mus., Passeres*, pl. 9, fig. 1 n.º 332; *id. in Gray's Zool. Misc.*, p. 82 (1844).
Cotyle sinensis, *Gray, Cat. Fissir, Brit. Mus.*, p. 30 (1843); *Bp. Conspl.*, i, p. 342 (1850); *Cass. Cat. Hirund. Philad. Mus.*, p. 12 (1853); *Horsf. & Moore, Cat. B. E. I. Co. Mus.*, i, p. 96 (1854); *Jerd. B. Ind.*, i, p. 164 (1862); iii, p. 875 (1864); *Swinh. Ibis*, 1863, p. 259, 1866 p. 134; *Blyth, t. c.*, p. 338; *Beavan, Ibis*, 1869, p. 404; *C. leu-n-asten, J. A. S. Beng.*, xxxix, p. 266 (1870); *Swinh. P. Z. S.*, 1871, p. 347; *Adam, Sir. H.*, 1873, p. 370; *Hume, Str. F.*, 1874, p. 469, 1875, p. 452; *Blyth & Wald. B. Burm.*, p. 127 (1875); *Farb. Str.*, 1876, p. 254; *Batler, Str. F.*, 1877, p. 227; *Davids & Oust. Ois. Chine*, p. 128 (1877); *Anders. Rep. Zool. Exped. Yunnan*, Birds, p. 651 (1878); *Hume, & Davison, Str. F.*, 1878, p. 45; *Davids. & Wend. Str. F.*, 1878, vol. ii, p. 76; *Ball, t. c.*, p. 202; *Cripps, t. c.*, p. 257; *Hume, Str. F.*, 1879, p. 84; *Scully, t. c.p.*, 234; *Doig, t. c.*, p. 370; *Batler, Cat. B. Sind ete.*, p. 13 (1879); *id. Cat. B. S. Bomb. Pres.*, p. 14 (1880); *Murray, Vertebr. Fauna Sind.*, p. 103 (1884).
C. subsocciata, *Adams, P. Z. S.*, 1858, p. 495, 1859, p. 176; *Jerd. B. Ind.*, i, p. 163 (1862); *Blyth, Ibis*, 1860, p. 338; *Jerd. Ibis*, 1871, p. 353.
C. riparia, (*nec L.*) *Swinh. Ibis*, 1871, p. 328, 1883, p. 89.
C. sinensis, *Gray, Hand-l. B.*, i, p. 37, n.º 865 (1860); *Hume, Nests. and Eggs. Ind. B.*, p. 82; *t. c. Str. F.*, 1873, p. 14; *Brit. Burm. i.*, p. 309 (1883); *Sharpe, Cat. B. M.*, io, p. 104 (1885).

- C. subsoecata*, *Hume*, *Nests, and Eggs, Ind. B.*, p. 82 (1873).
C. obscurior, *Hume*, *Sir. F.*, 1875, p. 43.
C. obsoleta, *Legge*, *B. Ceylon*, p. 599 (1879).
Hub. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Calamba; Formosa; China, India, Bengal.

3. Gen. HIRUNDO, LIN.

4. *H. rustica*. *Linn.* ♂♂ N. v. Langay-langayan.

M. S. I.

1. Hirondelle de Cheminée, *Briss. Orn.* ii, p. 486 (1790); *Daubent. Pl. Nat.* vii, pl. 543 fig. 1; *Montb. Hist. Nat. Ois.* vi, p. 591, pl. 25, fig. 1 (1799).
Hirundo rustica, *Linn. Syst. Nat.* i, p. 343 (1766); *Temm. Mex. d'Orn.* i, p. 427 (1820); *Roux. Orn. Provenc.* pl. 141 (1825); *Werner. Atlas Chelidoni s.* pl. 1 (1827); *Ménér. Cat. rati. Canar.* p. 45 (1832); *Naum. Vog. Denksch.* vi, pl. 145 figs. 1 (1833); *Gould. B. Eur.* ii, pl. 54 (1857); *Schl. & Susem. Vog. Eur.* vi, Taf. 2, fig. 1 (1839); *Mag. H. Br.*, B. vi, p. 572 (1849); *Krys. u. Blas. Wrb. Eur.* p. 169 (1840); *Nördl. in Démid. Vog. Russ. Mérid.* iii, p. 201 (1840); *Yarrell. Brit. B.* ii, p. 213 (1843); *Hodges. Icon. Nud. in Br. Mus. Passeres*, pl. 8 (n.º 33); *id. in Gray's Zool. Misc.* p. 82 (1844); *Gray. Gen. B.* i, p. 57 (1845); *id. Cat. Fissi. Br. Mus.* p. 22 (1848); *Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 197 (1849, 10); *Thomps. N. H. Irel.* p. 374 (1849); *Bf. Conspl.* i, p. 338 (1850); *Cab. Mus. Hebr. Th.* i, p. 46 (1850); *Kjærh. Danar. Fauna*, pl. 14, fig. 4 (1852); *Schl. Vog. Nederl.* pl. 57 (1854); *Horst. & More. Cat. B. E. I. Co. Mus.* i, p. 91 (1854, pt. 3) *Heids. Eggs. Brit. B.* i, p. 257, pl. 65, figs. 3, 4 (1857); *Sundev. Sc. Fogl.* pl. 17 fig. 5 (c. 1856); *Grill. Zool. Auteckn.* p. 35 (1858); *Faub. et Barth. Lapon. Rich. Orn.* p. 207 (1850); *Salv. Ibis*, 1850, p. 334; *Linderm. Vog. Griechen.* p. 117 (1860); *Naum. Vog. Deutschl.* Anhang, xiii, Taf. 383, fig. 2 (1860); *Schl. Dier. Nederl. Vog.* pl. 6 fig. 4 (1861); *Hartt. J. J. O.* 1861, p. 103; *Jerd. B. Ind.* i, p. 157 (1862); *Gray. Cat. Brit. B.* p. 33 (1863); *Filippi. Tage. Pers.* p. 346 (1865); *Petten. Ucc. N.-dif. Lomb.* ii, tavo. 30 (1865-70); *Degl. et Gerbe. Orn. Eur.* i, p. 587 (1867); *Locke. Exptl. Sci. Algér.* O's, ii, p. 64 (1867); *Borggr. Vogel. Norddeutschl.* p. 100 (1869); *Doderl. Avif. Sist.* p. 143 (1869); *Gray. Handl. B.* i, p. 68, no. 786 (1869); *Kent. Onze Vogels*, pl. 10 (1869); *Heng. Orn. N. O.-Afr.* i, p. 150 (1869); *Godman Azores*, p. 341 (1870); *Godt.-Aust. J. A. S. Beng.* xxxix, p. 94 (1870); *Finsch. Vog. Eur.* Taf. 2, fig. 4 (1870); *Sharpe. P. Z. S.* 1870, p. 305; *id. & Dresser. I. c.* p. 244; *G.-Hett. Ibis*, 1870, p. 366; *Blasj. Cat. & Zool. Abyss.* i, p. 347 (1870); *Finsch & Hartt. Vog. Oceano.* p. 134 (1870); *R. Grc. B. W. Scott.* p. 205 (1871); *Jerd. His.* 1871 p. 351; *Salvad. Faun. Ital.* Ucc. p. 51 (1871); *Sharpe. Cat. Afr.* B. p. 45 (1871); *Harting. Handb. Br.* B. p. 35 (1872); *Holdsw. P. Z. Z. S.* 1872, p. 418; *Gurney. in Anderss. B. Dam.* Id. p. 50 (1872); *Shelley. B. Egypt.* 1872, p. 10; *Geim. Ibis*, 1873, p. 61; *Antn. & Sakad. Vogel. Rigos.* p. 72 (1873); *Heng.*

- Orn. N. O.-Afr.* iv. *App.* p. Iv. (1873); *Hume & Henderson.* *Lahore to York.* p. 176 (1873); *Severtz.* *Turkest. Jezotu.* p. 67 (1873); *Gould, B. Gt. Br.* ii. pl. 5 (1873); *Salvad. Ann. Mus. Civit. Genov.* (2) i. p. 120 (1884); *Murray, Tercebr.* *Faun. Sind.* p. 102 (1884); *Sharpe, Cat. B. M.* 10, p. 128 (1885).
himney swallow, *Lath. Gen. Syn.* ii. pt. 2, p. 561 (1783).
Hirundo domestica, *Pall. Zoogr. Rossio-Isiat.* i. p. 528 (pt. 1811);
Swinh. Ibis, 1864, pp. 414, 420; *Wyatt. Ibis*, 1870, p. 105;
Severtz. Turkest. Jezotu. p. 67 (1873).
helidor progne, *Forst. Syn. Cat. Br. t. B.* p. 55 (1817).
Ceropis rustica, *Boe. Isis.* 1826, p. 971 et 1844, p. 174; *Less. Compl. Buff.* viii. p. 498 (1827).
C. pagorum, *stibularum*, *C. L. Brehm. Vog. Deutschl.* p. 138 (1851); *id. Naam.* 1855, p. 271.
Hirundo cahirica, (*non Lich.*), *Hartl. Orn. W.-Afr.* p. 26 (1857); *Cass. Proc. Acad. N. Sci. Philad.* 1859, p. 32; *Salvad. Ibis*, 1870, p. 153; *Saunders. t. c.* p. 299; *Elwes & Buckley. t. c.* p. 200.
H. boissonneauti (*nec Temm.*), *Linderm. Vog. Griechenl.* p. 119 (1860); *Krüper. J. f. O.* 1860, p. 281.
H. savignii (*nec And.*), *Tristr. Ibis*, 1864, p. 230.
H. rustica orientalis (*nec Schlt.*), *Wright. Ibis*, 1864, p. 57.
H. riocouri (*nec And.*), *Gurney. jun.*, *Ibis*, 1869, p. 423.
Chelidon rustica, *Stejn. Pr. U. S. Nat. Mus.* vi. p. 31 (1852).
Hab. Dumalon, Mindanao; Europa, Africa, China.

5 *H. gutturalis*, *Scop.* ♂ ♀ N. v. Langay-langgayan. (M. S. T.)

- L'Hirondelle d'Antigue, *Sonn. Voy. Nouv. Guin.* p. 118, pl. lxxvi. (1776).
L'Hirondelle d'Antigue à gorge couleur de rouille, *Montb. Hist. Nat. Ois.* vi. p. 607 (1779).
Panayan swallow, *Lath. Gen. Syn.* ii. pt. 2, p. 565 (1783).
Hirundo gutturalis, *Scop. Del. Flor. et Faun. Insubr.* ii. p. 99 (1786); *Temm. Man. d'Orn.* i. p. 427 (1820); *Gray. Gen. B.* i. p. 57 (1845); *Blyth. J. A. S. Beng.* xvi. p. 117 (1847); *Gray. Cat. Fissir. Brit. Mus.* p. 22 (1848); *Cab. Mus. Hein. Th.* i. p. 46 (1850); *Cass. Cat. Hirund. Mus. Philad. Acad.* p. 1 (1853); *Gray. P. Z. S.* 1860, p. 365; *Swinh. Ibis*, 1860, pp. 148, 429, & 161, p. 303; *Jerd. B. Ind.* i. p. 157 (1862, pt.); *Swinh. Ibis*, 1863, p. 255, 1867, p. 411, & 1870, pp. 90, 240; *Jerd. Ibis*, 1871, p. 351; *Wald. Tr. Z. S.* viii. p. 65 (1872); *Dybowski. J. f. O.* 1872, p. 361; *Salvad. Ann. Mus. Civit. Genov.* ix. pp. 55, 64 (1876); *Tacz. Bull. Soc. Zool. France*, ii. pp. 133 (pt. 1876); *Blakist. Ibis*, 1871, p. 331; *Hume. Ibis*, 1876, p. 286, & 1877, p. 17; *Tweedt. P. Z. S.* 1877, pp. 545, 694; *Wald. Tr. Z. S.* ix. p. 184 (1877); *Prich. in Dawson Rouley's Orn. Misc.* ii. p. 160 (1877); *David. & Oust. Ois. Chine.* p. 124 (1877, pt.); *Hume & Davis. Str. F.* 1878, p. 41; *Cripps. Str. F.* 1878, vol. ii. p. 276; *Salvad. Ann. Mus. Civit. Genov.* xiv. p. 490 (1879); *Meyer. Ibis*, 1879, p. 128; *Hume. Str. F.* 1879, pp. 47, 84; *Sharpe. P. Z. S.* 1879, p. 344; *Hing. F.* 1880, p. 48;

- Hume, L.*, p. 245; *Tweedell, Report Gov. Chittagong*, p. 48 (1881); *Sclater, t. c.*, p. 116 (1881); *Kirkian, Ibis*, p. 372; *Salvad. Orn. Papuasia et al.*, ii, p. 1 (1884); *Birkhead & Prysor, B. Jafau*, p. 139 (1882); *Sharpe, Cat. B. M.*, i, p. 134 (1885).
- H. panayana, *Cat. Syst. Nat.*, i, p. 1018 (1788); *Moore, P. Z. S.* 1854, p. 264; *Horsf. & Moore, Cat. B. E. I. Co. Mus.*, i, p. 91 (1854).
- H. jewan, *Sykes, P. Z. S.* 1832, p. 83; *Jerd. Madr. Journ.*, xi, p. 237 (1840).
- H. rustica, (*non L.*), *Meyen, Nov. Acta Acad. Coss. Leop.-Civ. Nat. Cur. Suppl.* Taf. 10, fig. 1 (1834); *Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc.*, p. 197 (1849, pt.); *Temm. & Schi. Faun. Japn.* Aves, p. 31 (1850); *Swinh. Ibis*, 1821, pp. 254, 323, & 183, p. 89; *Scl. P. Z. S.* 1863, p. 217; *Gray, Handl. B.*, i, p. 68, n.^o 786 (1869, pt.); *Holdsw. P. Z. S.* 1872, p. 418; *Sharpe, Trans. Linne. Soc. 2nd s. r. Zool.*, i, p. 328 (1876); *Anderson, Zoo! Yun-nin Exped., Birds*, p. 649 (1878); *Blakist. & Prysor, Ibis*, 1873, p. 329; *Outes, B. Brt. Burm.*, i, p. 302 (1883).
- Ceropis payana*, *Less. Compl. Buff.*, viii, p. 498 (1837).
- C. jewan, *Less. t. c.*, p. 499 (1837); *Boie, Isis*, 1854, p. 174.
- C. rusticoides, *panayana*, *Boie, Isis*, 1844, p. 174 (ex *Kuhl*, MS.)
- Hirundo javanica*, (*non Sparrm.*), *Bp. Conspl.*, i, p. 338 (1850); *Bernst. J. f. O.* 1859, p. 267; *Blakist. Ibis*, 1862, p. 315, 316; *Whiteley, Ibis*, 1867, p. 196; *Hayes Lloyd, Ibis*, 1873, p. 405.
- H. frenata, *Gould, Handb. B. Austr.*, i, p. 110 (1865); *Gray, Handl. B.*, i, p. 70, n.^o 815 (1869); *Diggles, Orn. Austr.*, text to pl. 22 (c. 1870).
- H. frenata, *Blyth, Ibis*, 1866, p. 336; *Gray, Handl. B.*, i, p. 70, n.^o 816 (1869).
- H. andamensis, *Tytler & Beav. Ibis*, 1867, p. 316; *Gray, Handl. B.*, i, p. 68, n.^o 791 (1869); *Ball, Str. F.* 1873, p. 55; *Hume, Str. F.* 1874, p. 155, & 1876, p. 286.
- H. rusticus, var. *guturalis*, *Seehöhm, Hist. Brit. B.*, ii, p. 171 (1883).
Hab. Luzón, Manila, S. Mateo, Laguna, Samar, Parán, Paráragua, Mindanao, Guimarás, Panay, Carolinas; Java, Sumatra, Malaca, China.

6 *H. javanica*, *Sparr. &c.* N. v. *Langay-langayan*.

M. S. 1.

- Hirundo javanica*, *Sparrm. Mus. Carls.*, ii, pl. 100 (1789); *Vieill. N. Dict. d'Hist. Nat.* xiv, p. 523 (1817); *Temm. Pl. Cat.*, v, pl. 83, fig. 2 (1823); *Gray, Gen. B.*, i, p. 57 (1845); *Temm. & Schi. Faun. Jap.* Aves, p. 32 (1850); *Cab. Mus. Heine Th.*, i, p. 46 (1850); *Wall. Ibis*, 1860, p. 147; *id. P. Z. S.* 1863, p. 485; *Gray, Handl. B.*, i, p. 70, no. 813 (1869); *Linsch. & Hartl. Vog. Ostafř.*, p. 137, note (1870); *Walden. Tr. Z.* S. viii, p. 66 (1872); *Swinh. Ibis*, 1873, p. 231; *Morgan, Ibis*, 1875, p. 313; *Salvad. Ucc. Born.*, p. 120 (1874); *id. Ann. Mus. Civile. Genov.* viii, p. 767 (1875); ix, p. 23 (1876); x, p. 130 (1877); *Sharpe, Ibis*, 1876, p. 43; *Board. Str. F.*

- 1876, p. 374; *Farib.* *Str. F.* 1877, p. 392; *Sharpe, Journ. Linn. Soc., Zool.* xiii. p. 498 (1877); *Tweeddale, Ibis*, 1877, p. 316; *id. P. Z. S.* 1877, 760, & 1878, pp. 109, 342, 615, 709; *Salvad. Ann. Mus. Civic. Genova*, siv. pp. 492, 647 (1877); *id. P. Z. S.* 1878, p. 95; *Hume & Davison, Str. F.* 1878, p. 43; *Ramsay, Proc. Linn. Soc. N. S. W.* iii. p. 275 (1879), iv. p. 91 (1879); *Meyer, Ibis*, 1879, p. 128; *Hume, Str. F.* 1879, pp. 47, 84; *Sharpe, P. Z. S.* 1879, p. 344; *Legge, B. Ceylon*, p. 597; *Hume, Str. F.* 1880, p. 120; *Salvad. Reprot. Voy. Challenger*, ii. *Brids*, p. 78 (1881); *Davison, Str. F.* 1883, p. 345; *Sharpe, Cat. B. M.* 10. p. 142 (1885).
Javan swallow, *Lath. Gen. Syn. Suppl.* ii. p. 259 (1801).
H. frontalis, *Quoy et Gaim. Voy. de l'Istrol. Zool.* i. p. 204, pl. 12, fig. 1 (1830); *Gray, Gen. B.* i. p. 57 (1845); *Scl. Journ. Linn. Soc., Zool.* ii. p. 155 (1858); *Gray, P. Z. S.* 1858, p. 189, 1859, p. 154; *id. Cat. Mamm. et. N. Guin.* pp. 88, 54 (1859); *id. P. Z. S.* 1861, p. 433; *Finsch, Neu-Guinea*, p. 162 (1865, pt.); *Gray, Hand-l. B.* i. p. 70, n. 812 (1869, pt.); *Ramsay, Proc. Linn. Soc. N. S. W.* ii. p. 179 (1878).
Herse frontalis, javanica, *Less. Compl. Buff.* viii. p. 497 (1837).
Cecropis javanica, *frontalis*, *Boie, Isis*, 1844, p. 174.
Hirundo domicola, *Jerd. Madr. Journ.* xiii. p. 173 (1844); *Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 198 (1849); *Kelaart, Prodri. Cat.* p. 118 (1852); *Layard, Ann. & Mag. Nat. Hist.* xii. p. 170 (1853); *Moore, Cat. B. E. I. Co. Mus.* i. p. 384 (1854); *Jerd. B. Ind.* i. p. 58 (1862); *Scl. P. Z. S.* 1863, p. 217; *Blyth, Ibis*, 1866, p. 336; *Bulger, P. Z. S.* 1866, p. 568; *Gray, Hand-l. B.* i. p. 70, n. 814 (1869); *Holdsworth, P. Z. S.* 1872, p. 118; *Elwes, Ibis*, 1870, p. 527; *Jerd. Ibis*, 1871, p. 351.
H. pacifica, *Mott. & D'Urv. N. H. Libuan*, p. 10 (1855).
H. neoxena, (*non Gould*), *Gray, P. Z. S.* 1858, p. 189, 1861, p. 433; *Rosenb. N. T. D. Nidarl. Ind.* xxv. p. 235 (1863).
Hypurolepis domicola, *Gould, B. Asia*, i. pl. 32 (1868); *Hume & Ness, Birds and Eggs Ind.* B. p. (1873); *id. Str. F.* 1874, p. 155.
H. javanica, *Oates, B. Br. Burm.* i. p. 308 (1883).
Hirundo freteensis, *Ramsay, Proc. Linn. Soc. N. S. W.* ii. p. 179 (1878), *nec Gould*.
Hab. Mindoro, Baco, Sanar, Paric, Negros, Paragua, P. Princesa, Cebú, Leyte, Bohol, Dingat, Joló; Ceilan, Java, Bornéo, Célebes, Molucas.

7. *H. striolata*, (*Boie*). ♂♂ N. v. Lanḡiy Lanḡyan. (M. S. T.)

- Cecropis striolata*, *Boie, Isis*, 1844, p. 174 (*sex Temm. MS. j. Cass. Cat. Hirund. Mus. Philad. Acad.* p. 3 (1853); *Wald. in Blyth B. Burm.* p. 127 (1875)).
Hirundo striolata, *Gray, Gen. B.* i. p. 58 (1845); *Tem. & Schl. Fann. Jap.* p. 33 (1850); *Bp. Conspl.* i. p. 340 (1850); *Blyth, Ibis*, 1866, p. 337; *Gray, Hand-l. B.* i. p. 69, no. 801 (1869); *Hume & Davison, Str. F.* 1878, p. 44; *Seebuhn, Ibis*, p. 169; *Sharpe, Cat. B. M.* 10. p. 161 (1885).
Lillia striolata, *Hume, Str. F.* 1877, p. 261.
Hab. Luzon, Laguna, Paragua; Java.

Fam. MNIOFILTIDOS.

1. Gén. MNIOTILTA, VIEILL.

1. **Mt varia.** (*Lin.*) ♀ N. v.

(M. S. T.)

- The small black and white Creeper, *Sloane, N. H. Jamaica*, ii. p. 307, pl. 265, fig. 1 (1725).
Black and white Creeper, *Edwards, Gleanings*, vi. p. 191 pl. 300 (1760).
Le Figuier varié de S. Domingue, *Bris. Orn.* iii. p. 529, pl. 27, fig. 5 (1760).
Motacilla varia, *Linn. Syst. Nat.* i. p. 333; *Gm. Syst. Nat.* i. p. 979 (1788).
Le Figuier varié, *Buff. Hist. Nat. Ois.* v. p. 329, (1778).
Mniotilta varia, *Sharpe, Cat. B. M.* 10. p. 251 (1885).
Hab. Guatemala.

2. Gén. DENDRÆCA, SHARPE.

2. **D. pennsylvanica.** (*Lin.*) ♂ N. v. D. de pecho rojo. (M. S. T.)

- The Red-throated Flycatcher, *Edw. Glean.* ii. p. 193, pl. 30 (1760).
Figuier à teste jaune de Canada, *Bris. Orn.* iii. p. 517, pl. 27, fig. (1760).
F. à teste jaune de Pensilvania, *Brss. Orn.* vi. App. 105 (1760).
Motacilla pensylvanica, *Linn. S. N.* i. p. 333 (1766).
Dendræca pennsylvanica, *Sharpe, Cat. B. M.* 10. p. 286 (1885).
Hab. América, Canadá.

3. **D. cærulescens.** *Gm.* ♂ N. v. D. azul.

(M. S. T.)

- Blue Flycatcher, *Bdw. Glean.* p. 91, pl. 252, fig. 1 (1758).
Le Petit Figuier cendré de Canada, *Bris. Orn.* iii. p. 527, pl. 27, fig. 6 (1760).
Motacilla canadensis, *Linn. Syst. Nat.* i. p. 336 (1766, nec *Linn. op. cit.* p. 334).
Figuier cendré du Canadá, *Darb. Pl. Engl.* pl. 685, fig. 2.
Le Figuier bleu, *Buff. Hist. Nat. Ois.* v. p. 304 (1778).
La Fauvette bleuâtre de S. Domingue, *Buff. Hist. Nat. Oes.* v. p. 164 (1778).
Dendræca cærulescens, *Sharpe, Cat. B. M.* 10. p. 329 (1885).
Hab. América, Canadá

3. Gen. GEOTHLYPIS. CAR

4. **G. philadelphia.** *Wils.* ♀ N. v.

(M. S. T.)

- Sylvia philadelphia*, *Wils. Amer. Orn.* ii. p. 101, pl. 14, fig. 6 (1810); *Audub. B. Amer.*; *id. Orn. Biogr.* v. p. 79 (1839).
Geothlypis philadelphia, *Baird, B. N. Amer.* p. 243 (1858) *id.*

Setophaga ruticilla, *Linn.*, *Sc. Amer.*, *Amer. Mus.*, *Yale Univ.*, p. 361 (1861); *Sel. Sc. Amer.*, *B.*, p. 27 (1862); *Sharpe's Cat. B.*, *M.*, *10*, p. 362 (1885).
Hab. Canada.

4. Gen. SETOPHAGA Sy

s. S. ruticilla, *Linn.*, ♀ N. v. *Audub.* (M. S. T.)

The Redstart, *Catesby*, *Nat. Hist. Carol.*, i. tab. 67 (1731).
The Small American Redstart, *Edwards*, *Nat. Hist. B.*, p. 80, pl. 80 (1747).
Yellow-tailed Flycatcher, *Edwards*, *Gleanings*, p. 101, pl. 257, (1758).
Le Gobe-mouche d'Amérique, *Bris. Orn.*, ii. p. 383 (1760); *Daubent. Pl. Ent.*, vi. pl. 566 figs. 1, 2.
Muscicapa ruticilla, *Linn. Syst. Nat.*, i. p. 326 (1760); *Bodd. Tabl. Pl. Ent.*, p. 33 (1783); *Vieill. Ois. Amér. Sept.*, i. p. 66, pls. 35, 36 (1807); *Wils. Amer. Orn.*, i. p. 103, pl. 6, fig. 6 (1808), v. p. 119, pl. 45 fig. 2 (1812); *Audub. B. Amer.*, pl. 40; *id. Orn. Biogr.*, i. p. 302 (1831), v. p. 428 (1839); *B. Amer.*, i. p. 240, pl. 68 (1839).
Figuer noir et jaune de Cayenne, *Daubent. Pl. Ent.*, vi. pl. 391, fig. 2.
Setophaga ruticilla, *Swains. Phil. Mag.*, new series, i. p. 365 (1827); *Sharpe's Cat. B.*, *M.*, *10*, p. 411 (1885).
Hab. Canada.

Fam. MOTACÍLIDOS.

Gen. MOTACILLA L. &

t. M. alba, *Linn.*, ♂♀ N. v. *Carisayao*. (M. S. T.)

La Lavandière, *Bris. Orn.*, iii. p. 461 (1760); *Daubent. Pl. Ent.*, vi. pl. 652 fig. 1.
La Bergeronette grise, *Bris. Orn.*, iii. p. 465, pl. xxv, fig. 1 (1760); *Buff. Hist. Nat. Ois.*, vi. p. 261, pl. xlvi. (1778); *Daubent. Pl. Ent.*, vi. pl. 674 fig. 1.
Motacilla alba, *Linn. Syst. Nat.*, i. p. 331 (1706); *Gm. Syst. A.*, i. p. 960 (1788); *Tennm. Man. d'Orn.*, i. p. 254 (1825); ii. p. 255 (1826); *Vaum. Vog. Deutschl.*, iii. p. 803, Taf. 86, figs. 8-3 (1823); *Roux. Orn. Prov.*, pl. 193 (1825); *Werner. Atlas Insectorum*, pl. 73 (1827); *Méntr. Cat. Rais. Cané.*, p. 36 (1832); *Tennm. Man. d'Orn.*, iv. p. 178 (1835); *Rüpp. Neue Wirb.*, Taf. p. 84 (1835-40); *Gould. B. Eur.*, ii. pl. 143 (1837); *Macgill. Hist. Br. B.*, ii. p. 221 (1839); *Keys. & Blas. Wirbelth. Eur.*, p. 174 (1840); *Nordm. in Dém'd. Voy. Russ. Mérid.*, iii. p. 153 (1850); *Rüpp. Syst. Uebers.*, p. 59 (1845); *Gray. Gen. B.*, i. p. 203 (1847); *Thomps. B. Irrel.*, i. p. 218 (1892); *Bf. Consph.*, i. p. 250 (1850); *Cab. Mus. Hein. Th.*, i. p. 143 (1850); *Kjærh. Dana. Fagd.*, pl. xix, fig. 1 (1852); *Schl. Taf.*

- Nederl. p's. 100, 101 (1854); Sundt, Sc. Egg., pl. 9, figs. 1, 2 (c. 1856); Jaub. & Barth-Lapom. Rec. Orn. p. 276 (1858); Salvin, Ibis, 1859, p. 310; Vögel; Ibis, 1860, p. 169; Peters, t. c. p. 228; Simpson, t. c. p. 594; Lind rm. Vög. Gr. ehen, p. 79 (1860); Reinh. Ibis, 1860, p. 61; L. & P. Gedmen, t. c. p. 82; Schl. Dier. Nederl. Uitg. [1. q. nos. 7, 8, 8, — 1861]; Reinh. Ibis, 1861, p. 61; A. Act. in Herzog-Gould's Ictio. p. 406 (1863); Gould, B. G. Br. iii. [1. q. nos. 1863]; Cope, List. Br. B. p. 66 (1863); Rudek, R. sc. Nederl., p. 19 (1863); Baerl. Review, p. 152 (1863); Adams, Ibis, 1863, p. 27; Wright, t. c. p. 62; M. ree, Ibis, 1863, p. 122, no. 647; Ucc. Vidis. Lomb. tav. 37 (1865-70); Ibis, d. 1865, p. 186; p. 187; Trist. t. c. p. 290; Deeg., 8; Giebel, 1866, p. 383 (1867); Blaßb. Ibis, 1867, p. 26; C. J. Gray, t. c. p. 100; Drick, t. c. 427; Locke, Expl. Sci. Afric. Os. ii. p. 3 (1869); Smith, Ibis, 1868, p. 442; Kuhlem. O. v. Vogels, i. [1. 25 (1869); Gray, Handb. B. i. p. 245, n. 1592 (1870); Berger, Vogelj. Deutschl. p. 86 (1869); Doderl. 17, 27, p. 100 (1869); Hengl. Orn. N. O.-Afr. i. p. 316, iv. p. XXXVII. (1870-71); Blans. Geol. & Zool. Abes. p. 380 (1870); Finsch, Trans. Zool. Soc. viii. p. 324 (1870); Illatz, Ibis, 1870, p. 15; Elwes & Buckley, t. c. p. 195; Finsch, Vögel Eur. pl. 21, fig. 12 (c. 1870); Garver, juv., Ibis, 1871, p. 3; Samuels, t. c. 215; Sharpe, Cat. Afr. B. p. 73 (1871); Sclad. Paint. Ital. Ital. Ucc. p. 120 (1871); Gray, B. p. 73 (1871); Savid. Faun. Ital. Ucc. p. 120 (1871); Gray, B. West. Scottl. p. 111 (1871); Harting, Handb. Brit. B. p. 23 (1872); Shelley, B. Egypt. p. 126 (1872); Sveretz. Turkest. Jezolu. p. 66 (1873); Alston & Harvie Brown, Ibis, 1873, p. 61; Blant. t. c. p. 220; Brooke, t. c. p. 244; Hume, Sir. P. 1873, pp. 29, 30; Baird, Brewer, & Ridgw. Hist. N. Amer. B. i. p. 165 (1874); Durnf. Ibis, 1874, p. 396; Newton, cf. Yarr. Br. B. i. p. 541 (1874); Stolezka, Str. F. 1875, p. 217; Dresser, B. Eur. iii. p. 233, pls. 125, 126 (1875); Irby, B. Gibr. p. 108 (1875); Danf. & Harvie Brown, Ibis, 1875, p. 309; Dresser, Ibis, 1876, p. 176; Wharton, t. c. p. 223; Sebohm & Harvie Brown, t. c. p. 125; Blans. East. Persia, ii. p. 232 (1876); Scully, Str. F. 1876, p. 151; Wardla' Ramsay, Ibis, 1877, p. 495; Brooks, Str. F. 1877, p. 47; Danf. Ibis, 1878, p. 20; Sebechka, t. c. p. 343; Brooks, Str. F. 1878, vol. ii. p. 137; Bogdan. fl. B. Can. p. 106 (1878); Irby, Ibis, 1879, p. 344; Hume, Str. F. 1879, p. 103; Seidl., t. c. p. 313; Brooks, t. c. p. 414; Sebarat, Ibis, 1880, p. 193; Tidal, Str. F. 1880, p. 69; G. J. P. Icon. Anif. Ind. pl. 163 (1881); Ridgway, Bull. U. S. Nat. Mus. n. s. 21, p. 15 (1881); Beldph. Ibis, 1881, p. 61; Scully, t. c. p. 45; cf. Sculhoë. Ibis, 1882, p. 109; Seidl., t. c. pp. 216; Beldph. t. c. p. 210; Sebohm, t. c. pp. 375, 376; cf. Ibis, 1882, p. 163; Sveretz., t. c. p. 10; Irby, t. c. p. 184; Seidl., t. c. p. 359; B. O. U. List. Br. B. p. 20 (1882); O. U. B. Br. Burm. i. p. 156 (1883); Booth, Rough Notes, part. 4 (1883); Seeb. Im. Hist. Brit. B. vol. iii. p. 199 (1883); Lommeyer & Janer. Mittb. orn. Ver. Wien, 1883, p. 85; Trist. F. c. & Fl. Palest. p. 54 (1884); Ridle, Orn. Can. p.

- 223, Tuf. xii. (1884); *Salvad.* *Ann. Mus. Civ. Genov.* (2) i. p. 166 (1884); *Sharpe, Cat. B. M.* 10. p. 464 (1885).
White wagtail, *Lath. Gen. Syn.* ii. pt. 2, p. 395 (1783).
Cinereous wagtail, *Lath. tom. cit.* p. 397 (1783).
Motacilla cinerea, *Gm. Syst. Nat.* i. p. 961 (1788).
M. albeola, *Pall. Zoogr. Rosso-Asiat.* i. p. 516 (1811).
M. septentrionalis, *sylvestris*, *brachyrhynchos*, *Brehm, Vog. Deutsch.* chl. p. 347 (1831).
M. dukhunensis, *Sykes, P. Z. S.* 1832, p. 91; *Bp. Conspl.* i. p. 250 (1850); *Horsf & Moore, Cat. B. E. I. Co. Mus.* i. p. 346 (1854, pt.); *Gould, B. Asia*, pl. 62 (1861); *Blans. Ibis*, 1863, p. 289; *Blyth, Ibis*, 1865, p. 49; *Swinh. P. Z. S.* 1870, p. 130; *Finsch & Hartl. Vog. Ostafri.* p. 259 (1870); *Hume, Str. F.* 1873, pp. 29-30; *Ball. Str. F.* 1874, p. 416; *Brooks, t. c.* p. 457; *id. Str. F.* 1875, p. 249; *Butler, t. c.* p. 486; *Wald. in Blyth B. Burm.* p. 97 (1875); *Brooks, Str. F.* 1870, p. 506; *Prjev. in Rowley's Orn. Misc.* ii. p. 192 (1876); *Butler, Str. F.* 1877, pp. 221, 230; *Hume & Davison, Str. F.* 1878, p. 362; *Brooks, Str. F.* 1878, vol. ii. p. 137, *Hume, Str. F.* 179, p. 104; *Butler, Cat. B. Synd etc.* p. 40 (1879); *id. Cat. B. S. Bomb. Pres.* p. 54 (1889); *Vidal, Str. F.* 1880, p. 69; *Reid, Str. F.* 1881, p. 48; *Davidson, Str. F.* 1882, p. 310; *Davison, Str. F.* 1883, p. 395.
Motacilla gularis, *Swinh. B. W. Afr.* ii. p. 38 (1837); *Allen & Thompson's Exped. Niger*, ii. p. 310 (1838); *Hartl. Orn. W. Afr.* p. 72 (1857).
M. cervicalis, *Brehm, Vogel.* p. 143 (1855).
M. major, *fasciata*, *Brehm, Naum.* 1855, p. 280.
M. luzoniensis, *Beavan, Ibis*, 1868, p. 76.
M. alba β , *dukhunensis*, *Severtz. Turkest. Jevotn.* p. 66 (1870).
M. dakhaniensis, *Fairb. Str. F.* 1176, p. 260.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Orani, Bataan, Samar, Loquilocun, Paragua, P. Princesa; Europa, Asia, Africa, India.

2. **M. ocularis** *Swinh. ♂♂ N. v. Baticulo.*

(M. S. T.)

- Motacilla ocularis*, *Swinh. Ibis*, 1101, p. 55; *Gray, Hand-l. B.* i. p. 246, n.º 3576 (1869); *Swinh. P. Z. S.* 1870, p. 120, 1871, p. 364; *Prjev. in Rowley's Orn. Misc.* ii. p. 192 (1877); *David & Oustal. Ois. Chine*, p. 299 (1878); *Hume, Davison, Str. F.* 1171, p. 518; *Hume, Str. F.* 1179, p. 103; *Scully, t. c.* pp. 312, 315; *Hume, t. c.* p. 413; *Oates, B. Brit. Burm.* i. p. 158 (1883); *Dybowski, Bull. Soc. Zool. France.* viii. p. 360 (1883); *Nelson, Cruise R. S. «Corwsiu»* p. 62, pl. ii. (1883); *Ridgw. Pr. U. S. Nat. Mus.* iv. p. 414 (1882); *Coues, Key N. Amer. B.* 2nd ed p. 284 (1884); *Sharpe, Cat. B. M.* 10. p. 471 (1885).
Hab. Luzón, Manila, Montalban, Laguna, Los Baños, Samar, Paragua, P. Princesa; China.

3. **M. melanope**, (*Pall.*) ♂♂ N. v. Baticulo.

(M. S. T.)

- The yellow water wagtail, *Albin, Nat. Hist. B.* ii. p. 54, pl. viii. (1738-40)

- The grey water wagtail, *Edwards, Gleanings*, p. 105, pl. 259 (1753).
La Bergeronette jaune, *Briss. Orn.* iii. p. 471, pl. xxiii, fig. 3 (1700).
La Bergeronette de Java, *Briss. t. c.* p. 474, pl. xxv, fig. 2 (1760).
Motacilla flava, (*nec L.*) *Scop. Ann.* i. p. 154 (1769); *Bodd. Tabl. Pl. Enl.* p. 2 (1783).
Bergeronette jaune mâle, *Daubent. Pl. Enl.* vi. pl. 28, fig. 1; *Buff. Hist. Nat. Ois.* v. p. 268 (1778).
Motacilla melanope, *Pall. Reis. Russ. Reichs*, iii. App. p. 696 (1770); *Gm. Syst. Nat.* i. p. 997 (1888); *Pall. Zoogr. Rossco-Asiat.* i. p. 500 (1811); *Dresser, B. Eur.* iii. p. 251, pl. 128 (1875); *id. Ibis*, 1876, p. 177; *Dauſ. Ibs.*, 1877, p. 262; *Blakist. & Prye. Ibis*, 1878, p. 237; *Seeböhm, t. c.* p. 352; *Legge, B. Geylon*, p. 610 (1879); *Seeböhm, Ibis*, 1879, p. 34; *Wardlaw Ramsay, t. c.* p. 448; *id. Ibis*, 1881, p. 60; *Seeböhm, t. c.* p. 189; *Severtz. Ibis*, 1883, p. 64; *Sharpe, Cat. B. M.* 10 p. 497 (1885).
M. Loarula, *Linn. Mant.* p. 527 (1771); *Gm. Syst. Nat.* i. p. 997 (1788); *Temm. Man. d'Orn.* i. p. 257 (1820); *Roux. Orn. Provenç.* pl. 195 (1825); *Werner. Atlas. Insect.* v. pl. 74 (1827); *Rüpp. Neue Würb.* p. 84 (1835-40); *Eyton. Cat. Brit. B.* p. 15 (1836); *Gould. B. Eur.* ii. pl. 147 *Bp. Comp. List. B. Eur. & N. Amer.* p. 19 (1838); *Macq. Br. B.* ii. p. 235 (1839); *Keys. u. Blas. Würb. Fur.* p. xlix. (1840); *Nordm. in Demid. Vey. Russ. Mérid.* iii. p. 155 (1840); *Crespon. Orn. Gard.* p. 172 (1840); *Jerd. Madr. Journ.* xi. p. 10 (1840); *Rüpp. Syst. Uebers.* p. 59 (1845); *Hewitson. Eggs. Br. B.* p. 126, pl. 33, fig. 2, (1846); *Gray. Cat. Mamm. etc. Nepal pres.* *Hodges.* p. 75 (1846); *id. Cen. B.* i. p. 203 (1847); *Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 137 (1849); *Thomps. B. Irrel.* i. p. 218 (1861); *Temm. & Sehl. Faun. Jap.*, *Aves*, p. 59 (1850); *Kelaart. Prodri. Cat.* p. 121 (1852); *Kjær. Orn. Dau.* pl. 19 fig. 5 (1852); *Layard. Ann. & Mag. Nat. Hist.* xii. p. 268 (1853); *Vernon Harcourt, op. cit.* 1855, p. 437; *Bolle. J. f. O.* 1857, p. 268; *Jaubert & Barth. Lapomm. Rich. Orn.* p. 274 (1856); *Linderm. Vög. Griechenl.* p. 80 (1860); *Swinh. Ibis*, 1860, p. 55; *Powys, t. c.* p. 229; *Simpson, t. c.* p. 394; *Swinh. Ibis*, 1861, pp. 35, 383; *Irby, t. c.* p. 232; *Swinh. Ibis*, 1862, p. 260; *Blakist. t. c.* p. 318 *Swinh. Ibis*, 1863, p. 309; *Adams. Ibis*, 1864, p. 22; *Wright, t. c.* p. 62; *Salvad. Orn. Sard.* p. 57 (1864); *Filippini. Viagg. Pers.* p. 348 (1865); *Altom. J. f. O.* 1865, p. 246; *Swinh. Ibis*, 1866, p. 138; *Pelz. Ibis*, 1868, p. 312; *Swinh. t. c.* p. 412; *Grav. Handb. B.* i. p. 247, n.º 3592, (1869); *Vorggr. Vogelf. Deutschl.* p. 87 (1869); *Doderl. Avif. Sicil.* p. 101 (1869); *Salvad. Faun. Ibis. Ucc.* p. 121 (1871); *B. Gray, B. W. Scott.* p. 112 (1871); *Sanders. Ibis*, 1871, p. 215; *Hartung. Handb. Br. B.* p. 23 (1872); *Blith & Wald. B. Burm.* p. 97 (1875); *B. O. U. List Br. B.* p. 30 (1883); *Seeböhm. Ibis*, 1883, p. 30; *Jouy. Pr. I. S. Nat. Mus.* vi. p. 290 (1883); *Radde. Orn. Couc.* p. 222 (1884); *Blakist. Amended List B. Japan*, p. 55 8884).
Grey wagtail, *Iath. Gen. Syn.* ii. pt. 2, p. 308 (1783).

- M. cinerea*, Leach, Syst. Cat. Mann, etc. Br. t. Mus. p. 22 (1781);
M. listrigata, Raff. Trans. Linn. Soc. xiii. p. 312 (1820); Gray, Handl. B. i. p. 248, n.^o 3593 (1869).
Calolates sulphurea, Kaup, Naturl. Syst. p. 33 (1829); Moore, P. Z. S. 1854, p. 284; Horsf. & Moore, Cat. B. E. I. Co. Mus. i. p. 349 (1854); Jord. B. Ind. p. 220 (1863); Gould, B. Gt. Br. iii. pls. 6, 7; Heldw. P. Z. S. 1872, p. 415; Hume & Henders. Lahore to Yark. p. 224 (1873); Butler & Hume, Str. F. 1875, p. 419; Butler, Str. F. 1877, p. 233; Bogdan. R. Cane. p. 168 (1879); Homeyer & Tancre, MT. ern. Ver. Wien, 1883, p. 86.
Motilla montium, Brehm, Vog. Deutschl. p. 345 (1831).
M. xanthoschista, Hodgs. in Grey's Zool. Msc. p. 83 (1844).
M. lunulata, Des Murs in Lejeune, Voy. Abyss., Atlas, pl. 7 (1845).
M. ophthalmica, Des Murs, op. cit., texte Ois. p. 94 (1845).
Palleura sulphurea, Bp. Conspl. i. p. 250 (1850) Brohm, Naum. 1855, p. 280; Loche, Expéd. Sci. Algér., Ois. ii. p. 5 (1867); Tybowski, J. f. O. 1873, p. 82, 1874, p. 335; Tazan, Bull. Soc. Zool. Frnce, 1876, p. 150; Dybowski, op. cit. 1883, p. 360.
M. yvensis, Bp. Conspl. i. p. 250 (1850).
Motilla montium, rivalis, Brehm, Vogels. p. 143 (1855).
M. lindermayeri, Brehm in Linderm. Vog. Crichenl. p. 92 (1860).
Sedetes boarum, Trist. Ibis, 1859, p. 41; C. B. Wharton, Ibis, 1876, p. 22.
M. flava (sic I.), Bettini, Ucc. Nidif. Lomb. tav. 62 (1865-70).

- Calobates barbula, Swinh. *Ibis*, 1173, p. 319; *A. n.*, *Str.*, F. 1173, p. 201; *id.* *Nests. and Eggs Int. B.*, p. 381 (1874); *d. Str.*, F. 1174, p. 237.
- Motacilla (Calobates) sulphura, *Bifurc. Geol. & Zool. Abh.*, V. 381 (1870).
- M. (Calobates) barbula, *Haugt. Orn.*, V. *O.-Afr.*, ii. pt. 2, Ap. p. lxxxix (1871).
- Calobates melanops, Swinh. *P. Z. S.*, 1871, p. 394; *Brook.*, J. A. S. Beng. xli, p. 82 (1872); *id. Str.*, F. 1875, p. 253; *F. & Str.*, F. 1876, p. 261; *Boord.* t. c. p. 401; *Prjor. in Dresd.*; *Rowley's Orn. Misc.*, ii. p. 193 (1876); *Dav'd & Oates. O. C.* Chine, p. 302 (1877); *Walden. Tr. Z. S.*, ix, p. 193 (1877); *Tweedd. Ibis*, 1877, 310; *Hume & Dav'sm. Str.*, F. 1878, p. 362; *Davison & wend. Str.*, F. 1878, vol. ii, p. 84; *Id. & Str.*, F. 1879, pp. 65, 103, 161; *Scully. t. c.* p. 315; *Brook.*, t. c. p. 484; *Butler. Cat. B. Sind &c.* p. 49 (1879); *A. Crit. B. S. Bomb. Pres.* p. 54 (1880); *Vidal. Str.*, F. 1880, p. 10; *Rid. Str.*, F. 1881, p. 48; *Salzad. Orn. Papuasia etc.*, ii. p. 431 (1881); *Baddulph. Ibis*, 1881, p. 68; *Scully. t. c.* p. 452; *Dav'dson. Str.*, F. 1882, p. 310; *Nichols. Ibis*, 1882, p. 62; *C. Swinhoe. t. c.* p. 100; *Slater. t. c.* p. 433; *Nichols. Ibis*, 1883, p. 253; *Davison. Str.*, F. 1883, p. 395; *Oates. B. Br. Burm.* i. p. 159 (1883).
- C. bistrigata, *Salzad. Ucc. Born.* p. 259 (1874).
- Budytæ nova guineæ, Meyer, *Sitz. Isis Dresden*, 1875, p. 74; *id. Mitth. K. Zool. Mus. Dresden*, i. p. 10 (1875); *Salzad. Ann. Mus. Cliv. Genov.* xii, p. 345 (1878).
- Calobates melanops Ball, *Str.*, F. 1174, p. 446; *id. Str.*, F. 1174, vol. ii, p. 219.
- Hab.* Luzon, Manila, Montalban, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Pasanica, Zamboanga, Basilan, Guimaras, Panay, Negros, Samar, Parans, Cebu, Leyte; Europa, y Región 141; Malaya, China, Japón, Borneo, Java, Sumatra.
4. *M. flava Lin. ♂♂ N. v. Pagapug* (M. S. T.)
- La Bergeronnette de printemps, *Briss. Orn.* iii. p. 468 (1760, pt. 1). La Bergeronnette de Java, *Briss. t. c.* p. 475, pl. 25, fig. 2 (1760); *Mémb. Hist. Nat. O's.*, v. p. 260.
- Motacilla illiva, *Linn. Syst. Nat.*, i. p. 331 (1760); *Horsf. Tr. Linn. Soc.* xiii, p. 156 (1820); *Tennin. Mus. d'Orn.* i. p. 20 (1820); *Naum. Vog. Deutschl.* iii. p. 839, Taf. 87 (1823); *Rosa. Orn. Prav.* pl. 196 (1825); *Wernw. Atlas. Insectivores*, pl. 7 (1827); *Rüpp. Neue Wörb.* p. 84 (1835-40); *Tennin. Mus. d'Orn.* 1835, p. 181, (1840); p. 622; *Crespon. Orn. Gard.* p. 174 (1841); *Keys. & Blas. Wörb.* Eur. p. 175 (1840); *Nord. in Dänit. Loy. Russ. Mérid.* iii. p. 156 (1840); *Salas-Longch. Entz. Botan.* p. 88 (1842); *Schl. Rev. Crit.* p. xxxviii. (1844); *Histo. Eggs. Brit. B.* i. p. 172, pl. 34, figs. 1, 2 (1846); *Grav. Ged. B.* i. p. 203 (1847); *Middend. Reis. Sbr.*, *Zool.* p. 168 (1851); *Bjerb. Danm. Fugle.* Taf. xix, fig. 3, xix, *Suppl.* fig. 4 (1852); *Schl. Vog. Nederl.* pls. 98, 99 (1854); *Sundev. Svensk. Fögl.* pl. ix, fig. 4, 5 (c. 1856); *Salas-Longch. Naum.* 1859, p. 39 (can var.); *Swinh. Ibis*, 1859, p. 30; *U. Str.*, t. c. p. 32.

- Simpson, *Ibis*, 1860, p. 393; Lüderm., *Vög. Griechenl.* p. 80 (1860); Blasius, in *Nachtr. Naum. Vög. Deutschl.* p. 120 (1860); Schl., *Dier. Nederl.*, *Vög.* pl. ix, figs. 9, 10 (1861); F. & P. Godman, *Ibs.*, 1861, p. 82; Wright, *Ibis*, 1864, p. 62; Finsch, *Neu-Guinea*, p. 167 (1865); Smith, *Ibs.*, 1868, p. 442; Gray, *Hand-l. B.* i. p. 246, n.º 3578 (1869); Keul., *Orn. Vogels.* i. pl. 26 (1869); Baird, *Trans. Chicago Acad.* i. p. 312, pl. 30, fig. 1 (1869); Dall & Bann., *t. c.* p. 297 (1869); Heugl., *Orn. N. O.-Afr.* i. p. 320 (1869); Wyatt, *Ibis*, 1870, p. 15; Finsch & Hartl., *Vög. Ostafri.* p. 268 (1870); R. Gray, B. W. Scott., p. 113 (1871); Swinh. *P. Z. S.* 1871, p. 364; Harting, *Handb. Brit. B.* p. 23 (1872); Petz., *Verh. z.-b. Gesellsch. W'en.* viii. p. 428 (1872); Baird, Brever, & Ridgw. *Hist. N. Amer. B.* i. p. 167 (1874); Dauford & Hervie-Brown, *Ibis*, 1875, p. 310; Dresser, *B. Eur.* iii. p. 261, pl. 129, figs. 1, 2 (1875); id., *Ibis*, 1876, p. 178; Finsch, *t. c.* p. 62; Seeböhm, *Ibis*, 1878, p. 351; E. Adams, *t. c.* p. 423; Coues, *B. Color. Vall.* p. 192 (1878); Seeböhm, *Ibis*, 1882, p. 216; Dixon, *t. c.* p. 571; Seeböhm, *Ibs.*, 1883, p. 20; id., *Hist. Brit. B.* ii. p. 208 (1883); Shelley, *t. c.* p. 543; B. O. U. *List Brit. B.* p. 31 (1883); Tristr., *Faun. & Flor. Palest.* p. 55 (1884); Radde, *Orn. Cauc.* p. 220 (1884); Sharpe, *Cat. B. M.* 10. p. 516, lam. 6, figs. 3-5. (1885).
Parus luteus, caspicus, S. G. Gmelin, *Reis. Russl.* iii. p. 101, pl. 20, fig. 1 (1774).
La Bergeronette de l'île de Timor, *Month. Hist. Eat. Ois.* v. p. 275.
Motacilla boarula, β. javensis, *Gm. Syst. Nat.* i. p. 998 (1788).
M. flaveola, Pall., *Zoogr. Rosso-Asiat.* i. p. 501 (1811).
M. chrysogastra, Bechst., *Kurze Uebers.* p. 327 (1811).
M. flavescens, Steph., *Gen. Zool. pt. 2*, p. 559 (1817); Gray, *P. Z. S.* 1860, p. 350; Wall., *P. Z. S.* 1863, p. 485; Gray, *Hand-l. B.* i. p. 247, n.º 3586 (1869).
Budytes flava, Cuvier, *Règne Anim.* p. 371 (1817); Brehm, *Vög. Deutschl.* p. 344 (1831); Ménétr., *Cat. Rais. Cauc.* p. 36 (1832); Bp., *Faun. Ital.*, *Ucc.* pl. 31, fig. 1 (1832-44); Magg., *Brit. B.* ii. p. 208 (1839); Bp., *Consp.* i. p. 249 (1850); Jaub. et Barth., *Lipom. Rich. Orn.* p. 279 (1859); Tristr., *Ibs.*, 1859, pp. 31, 420; Savin., *t. c.* pp. 310, 358; Swinh., *Ibis*, 1860, p. 51, 1861, pp. 36, 333, 411; 1862, p. 260; 1863, p. 208; Brehm, *Reis. Habesch.* p. 214 (1863); Adams, *Ibs.*, 1864, p. p. 20; Salvad., *Ucc. Sard.* p. 58; (1864); Sol. *P. Z. S.* 1864, p. 108; Altum. *J. f. O.* 1865, p. 247; Blyth, *Ibis*, 1865, p. 50; Giglioli, *t. c.* p. 55; L'jord., *Ibs.*, 1866, pp. 187, 386, 391; Tristr., *t. c.* p. 290; Chambers, *Ibis*, 1867, p. 104; Drake, *t. c.* p. 427; Malmgr., *t. c.* p. 230; Degl. & Gerbe, *Orn. Eur.* i. p. 376 (1867); Loche, *Expl. Sci. Alger.*, *Ois.* p. 7 (1867); Heugl., *Orn. N. O.-Afr.* i. p. 322 (1868); Doderl., *Avif. Sicil.* p. 101 (1869); Dall. & Bann., *Tr. Chicago Acad.* i. p. 312, pl. 30, fig. 1 (1869); Wyatt, *Ibis*, 1870, p. 15; Elwes & Buckley, *t. c.* p. 195; Layard., *t. c.* p. 282; Gould, *B. Gr. Brit.* iii. pl. 4 (c. 1870); Fritsch, *Vög. Eur.* tab. 17, 18 (1870); Salvad., *Faun. Ital.*, *Ucc.* p. 122 (1871); Swinh., *P. Z. S.* 1871, p. 364; Ayres, *Ibs.*, 1871, p. 154; Saunders, *t. c.*

- (1875); *as Hyacinthine Bucley*, *I. c.* p. 245; *S. & S.* C. 146
 3, p. 13716; *Grauas in Antwerp*, *B. Dim. Ll.* p. 112
 (1872); *as Hyacinthine B. Egypt.* p. 128 (1872); *C. & S., Key N. Amer.*
B. p. 90 (1872); *Severtz. Turkist. Journ.* p. 97 (1873); *B. ruf.*
Brewer & R. I. & Co., H. st. N. Amer. *B.* p. 137 (1874); *B. ruf.*
Finst. Pers. ii. p. 233 (1874); *Tatze. Bull. Soc. Zool. Fr.*
 (1876) p. 150; *David & Ousta. O. s.* *C. & S.* p. 302 (1877);
Brooks. Ibis. 1877, p. 208; *Ayres. I. c.* p. 244; *H. m. 2.*
J. f. O. 1878, p. 130; *Bridg. B. Cana* p. 108 (1879); *Goldsch.*
Ibis. 1881, p. 209; *Kelham. I. c.* p. 517; *Sheld. P. Z. S.*
 1881, p. 573; *Ridgway. Bull. U. S. Natl. Mus.* no. 21, p. 13
 (1881); *Colwes. Check-Lst.* p. 32 (1882); *C. k. n.* *Ibis.* 1882,
 p. 110; *Irby. Ibis.* 1883, p. 135; *Swartz. I. c.* p. 61; *Nilsson.*
Cruise R. S. «Corwin», p. 62 (1883); *Dybowski. Bull. So.*
Zool. Fransc. viii. p. 360 (1883); *Hartert & Taverne. M. T.*
orn. Ver. Wien. 1113, p. 89; *Sharpe. et al. Livard's B. S.*
Afr. p. 550 (1884); *Sylvad. Ann. Mus. Civico Genov.* (2) i. p.
 166 (1884).
Motacilla neglecta, *Gould. P. Z. S.* 1832, p. 129; *id. B. Eur.*
 ii. pl. 146 (1837); *E. C. Taylor. Ibis.* 1859, p. 48.
M. flava vulgaris, *Sundev. Öfsv. K. Vet.-Akad. Förh.* Stockh.
 1840, p. 53.
Bulytes gouldi, *Maccull. Man. Brit. B.* i. p. 163 (1840).
Motacilla (Bulytes) flava, *Schrenck. Sibir. Reis.* p. 345 (1853);
Raddé. Reis. Ost-Sibir., *Vög.* p. 230 (1863).
 \ddagger *Budytes pygmaeus*, *A. E. Brehm. J. f. O.* 1854, p. 74, note.
B. tasciatus, *C. L. Brehm. Vogelf.* p. 141 (1855).
 \ddagger *B. pygmaeus*, *Oscar Brehm. in C. L. Brehm's Vogelf.* p. 142
 (1855).
Motacilla flava typica, *Raddé. Reis. Ost. Sib'r.*, *Vög.* p. 229 (1863).
Budytes viridis, (*non auct.*), *Sclater. P. Z. S.* 1853, p. 214;
Swinh. Ibis. 1864, p. 418; *Watson. Trans. Zool. Soc.* viii.
 p. 65 (1872); *Salvad. Uer. Brns.* p. 261 (1874); *Tweeddale. Ibis.*
 1877, p. 226; *id. P. Z. S.* 1878, p. 82; *Meyer. Ibis.* 1879,
 p. 127; *Sharpe. I. c.* p. 262; *Salvad. Orn. Papuasia etc.* ii.
 p. 430 (1881).
B. cinereocapillus, *Swinh. Ibis.* 1853, pp. 94, 309; *id. P. Z. S.*
 1871, p. 364.
Motacilla flava cinereocapilla fasciata, *Heugl. Orn. N. O.-Afr.* i.
 p. 321 (1860).
Bulides leucostriatus, *Homeyer. J. f. O.* 1873, p. 128.
B. ilavescens, *Homeyer. J. f. O.* 1873, p. 131.
Hab. Paragua, P. Princesa; Java, Célebes.

5. *M. borealis*, (*Sundev.* N. v. Baiculus).

(M. S. T.)

- Grön wargöhl*, *Brown Zool.* pl. 33, f. 2 (1775).
Motacilla flava borealis, *Sundev. Öfsv. K. Vet.-Akad. Förh.*
Söderb. 1840, p. 53.
M. viridis, *Gra. S. N.* i. p. 962 (1785); *Lith. Int. Orn.* ii. p.
 505 (1785).
M. borealis, *Sundev. Citt. B. M.* 16, p. 522, *lavn.* 8, *fig.* 1-3;
Hab. Luçon, Butuan, Orani, Bohol, Mindanao, Jolo; Borneo;
Cambodia.

3. Gen. ANTHUS. BECHTS.

6. A. richardi. Vieill. ♂♂ N. v. Pugapug (M S T)

Anthus richardi, *Vieill. N. Dict. d'Hist. Nat.* xxvi, p. 491 (1818); *Venm. Pl. Col.* iii, pl. 101 (1824); *Zool. Journ.* i, p. 411 (1825); *Roux, Orn. Prat.* pls. 180, 191 (1825); *Graaff, B. Eur.* ii, pl. 135 (1837); *Macgill. Br. & B.* ii, p. 199 (1839); *Verm. in Dénid. Vog. Russ. Mitt.* iii, p. 153 (1840); *Bonville, Orn. Dauphiné*, pl. 29, fig. 1 (1843); *Yarr. Brit. B.* p. 368 (1843); *Von der Mühle, Orn. Geschichte*, p. 58 (1844); *Gray, Gen. B.* i, p. 265 (1847); *Blyth, Cat. B. Mus. As. Svr.* p. 35 (1849); *Leydig, Ann. & Mag. N. H.* xii, p. 268 (1853); *Schl. Vog. Nedert.* pl. 93 (1854); *Horsf. & Moore, Cat. B. E. I. Co. Mus.* i, p. 355 (1854); *Blasius, in Nurn. Vog. Deutschl. Nachr.* viii, p. 94, pl. 371 (1860); *Swinh. Ibis*, 1860 p. 55, 1861, p. 30; *Blasius, Ibis*, 1862, pp. 62, 71; *Swinh. Ibis*, 1863, p. 314; *Gray, Lyst Brit. B.* p. 60 (1863); *Wright, Ibis*, 1864, p. 61; *Schomb., t. c.* p. 241; *Dybowski, J. f. O.* 1868, p. 234; *Hume, Ibis*, 1869, p. 129; *Sundevall, t. c.* p. 392; *Borger, Vogelj. Norddeutschl.* p. 86 (1869); *Dodert, Avi. Sic. I.* p. 97 (1869); *Drost, Vogelw. Bork* p. 104 (1869); *Gray, Handb. B.* i, p. 252, n.º 3649 (1869); *Swinh. Ibis*, 1870, p. 83; *Sundevall, Svensk. Vogl.* p. 42, pl. 66, fig. 5 (c. 1870); *Fritsch, Vog. Eur.* pl. 16, fig. 4 (1870); *Salvad. Fann. Ital., Ucc.* p. 128 (1871); *Hartling, Handb. Brit. B.* p. 24 (1872); *Gould, B. Gt. Br.* iii, pl. 8 (c. 1870); *Newt. ed. Yarell's Br. B.* i, p. 598 (1874); *Dresser, B. Eur.* iii, p. 325, pl. 138 (1875); *Irby, B. Gibr.* p. 111 (1875); *Cordeaux, Ibis*, 1865, pp. 173, 181; *Danf. & Harvie Brown, c. c.* p. 311; *Blanford, East. Persia*, ii, p. 236 (1876); *Seeböhm, Ibis*, 1877, p. 343; *B. O. U. List Br. B.* p. 34 (1883); *Sharpe, Cat. B. M.* io, p. 564 (1885).

Corydalla richardi, *Vigors, Zool. Journ.* ii, p. 397 (1862); *Bp. Conspl.* i, p. 247 (1850); *Kelaart, Prodri. Faun. Zeyl. Cat.* p. 121 (1852); *Jmb. et Barth-Lafomm. Rch. Orn.* p. 287 (1859); *Swinh. Ibis*, 1861, p. 265; *Jerd. B. Ind.* ii, p. 231 (1863); *Digl. et Gerbe, Orn. Eur.* i, p. 363 (1867); *Loche, Expl. Sci. Algér.* O. s. ii, p. 11 (1867); *Bear, Ibis*, 1868, p. 79; *Hume, Ibis*, 1869, p. 120; *Collett, J. f. O.* 1869, p. 393; *Bleasf. Ibis*, 1870, p. 490; *Swinh. t. c.* p. 317; *it. P. Z. S.* 1871, p. 300; *Hollwey, P. Z. S.* 1871, p. 458; *Brooks, Str. F.* 1870, p. 358; *Hume, Sr. F.* 1874, p. 239; *Ball, t. c.* pp. 416, 470, 495; *Blyth & Wald. B. Brum.* p. 95 (1875); *Aristot. Str. F.* 1871, p. 330; *Tazz. Bull. Soc. Zool. France*, i, 957 (1870); *Pritch. in Rowley's Orn. Misc.* ii, p. 195 (1876); *David & Oost. Ois. Chine*, p. 310 (1877); *Andrs. Zool. Erp. Yunnan*, p. 365 (1878); *Hume & Davison, Sri. F.* 1878, p. 365; *Ball, Str. F.* 1878, vol. ii, p. 220; *Cripps, t. c.* 288; *Legge, B. Ceylon*, p. 631 (1879); *Hume, Str. F.* 1879, p. 103; *Swinh. t. c.* p. 316; *Oates, B. Brit. Burm.* i, p. 166 (1833). *Anthus rupestris* (acc. *Niss.*), *Müetr. Cat. Rus. Cinc.* p. 37 (1832).

- A. macrourus*, *Gmel.* *Turc.* *Leg.* *Egypt.* p. 264 (1784).
A. longipes, *Holandre*, *Faune de la Malaisie*, p. 84 (1839).
Cichlops monticolus, *Hodges*, *Icon. ined.* in *Brit. Mus. Passeres*, pl. 121, 124, 124 fig., 1 (n. 431); *id.* in *Gray's Zool. Misc.* p. 103 (1844).
Corydalla sinensis, *Bp.* *Consp.* i. p. 247 (1850); *Daud. & O. S. Ois.* *Chine*, p. 311 (1877).
Anthus maximus, *Blyth* in *White's Nat. Hist. of Abyssinia*, p. 22 (1858).
Corydalla chinensis, *Swinh.* *P. Z. S.* 1850, p. 300.
Agrodromas richardi, *Sauvards*, *Ibis*, 1851, p. 213; *Gr. Zool.* p. 3, 1881, p. 260.
Hab. Luzon, China, Ceylon, Moluccas.

7. *A. rufulus*, *Virel. & Pugnac.*

M. S. 1.

- Anthus rufulus*, *Virel. N. Dict. d'Hist. Nat.* xxxvi, p. 494 (1818); *Gray*, *Gen. B.* i. p. 236 (1817); *Blyth*, *J. A. S. B. R.* xvii, p. 437 (1847); *id. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 135 (1849); *Id.* *Consp.* i. p. 248 (1847); *Lazard*, *Aust. & Meg. Nat. List.* xii, p. 268 (1853); *Horsf. & Moore*, *Cat. B. E. I. Co. Mus.* ii. p. 350 (1854); *Schomb.* *Ibis*, 1864, p. 2, 9; *Greef. Field-b.* i. p. 252, n. 3651 (1869); *C. Swinh.* *Ibis*, 1872, p. 110; *Sharpe*, *Cat. B. M.* 10, p. 574 (1885).
Alauda pratensis, *Rafpl.* *Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 315 (1820).
Anthus cinnamomeus, *Rüpp.* *Neue Wirb.* p. 103 (1835); *id. Syst. Uebers.* p. 59 (1845); *Gray*, *Gen. B.* i. p. 206 (1847); *Bp.* *Consp.* i. p. 248 (1850); *Heugl.* *Syst. Uebers.* p. 20 (1850); *id. Orn. N. O. Afr.* i. p. 329 (1869).
A. malayensis, *Eyton*, *P. Z. S.* 1839, p. 104; *Blyth*, *J. A. S. Beng.* xi, pp. 797, 885 (1842); xvi, 436 (1847); *Horsf. & Moore*, *Cat. B. E. I. Co. Mus.* i. p. 357 (1854); *Gray*, *Grand-t. B.* i. p. 252, n. 3653 (1860); *Hume*, *Str. F.* 1874, p. 497; *Tweeddale*, *Ibis*, 1877, p. 310; *Hume*, & *Davison*, *Str. F.* 1874, p. 309; *Hume*, *Str. F.* 1879, pp. 65, 103.
Agrodroma agilis, *Jerd.* *Madr. Journ.* xi, p. 33 (1840).
Cichlops ubiquitarius, *Hodges*, *Icon. ined.* in *Brit. Mus. Passeres*, pl. 122 figs. 1, 2 (n. 433); *id.* in *Gray's Zool. Misc.* p. 83 (1844).
C. tortipes, *Hodges*, *Icon. ined.* in *Brit. Mus. Passeres*, pl. 122 a, fig. 2 (n. 738); *id.* in *Gray's Zool. Misc.* p. 83 (1844).
Anthus ubiquitarius, *Gray*, *Inst. Minn.* & *B. N.* d. pres. II. 1, p. 77 (1846).
A. pallidus, *Sundev.* *Ostf. K. Veterinair. Fys. Skr.* 1880, p. 1 (1880); *Lazard*, *B. S. Afr.* p. 123 (1893); *Gr. Zool. ikimb.* *B.* i. p. 230, n. 3624 (1899); *Lazard*, *Ibis*, 1896, p. 98; *Fraser*, *J. C.* p. 83; *Sharpe*, *Cat. Afr. B.* p. 72 (1893); *Graves*, *Ibis*, 1871, p. 17; *Gurney* in *Anderss. B. Tans. Lab.* p. 113 (1872); *Blyth*, *Ibis*, 1874, p. 384; *Heugl.* *J. f. O.* 1874, p. 48; *Graves*, *Ibis*, 1875, p. 104; *Sharp* in *Oates's Malabolo Faun.* *M. S.* p. 87 (1882); *Shelley*, *Ibis*, 1882, p. 350; *Tucker*, *Teildon*, & *K. H.* *Z. 1882*, p. 335; *Schachw.* *J. f. O.* 1883, p. 367; *Gr. Zool.* p. 207; *Sharpe*, *et. Layard's B. S. Afr.* p. 434 (1884).
A. raddei, *Bp.* *Consp.* i. p. 248 (1850); *Gr. Zool.* *M. S.* p. 25.

- Lugd.*, *Lähti*, *Nemoral. Av. Ecor.*, I., p. 24; *Lar.*, P. Z. S. 1867, p. 825; *Leyard*, B. S. *Arch.*, p. 123 (1867); *Gray*, *Handb.* S. i. p. 249, n.^o 3616 (1869); *Cab.* in *Von der Decken's Reise*, iii. p. 22 (1869); *Finsch & Hartl*, *Vögel Ost-Asiens*, p. 274 (1870); *Shelley*, B. *Egypt.* p. 133 (1872); *Girouy* in *Anderss. B. Pam.* *Ld.* I. p. 113 (1872); *Gadew*, J. J. O. 1870, p. 431; *Fischer*, J. J. O. 1877, p. 267; *id.* J. J. O. 1878, pp. 208, 209; *Cab.* t. c. p. 220; *Nickels*, P. Z. S. 1878, I. 356; *Fischer*, J. J. O. 1879, pp. 294, 299, 303; *id.* & *Reichenb.* t. c. p. 355; *Shelley*, P. Z. S. 1881, p. 573;
A. euonyx, *Cab.* *Mus. Hen.* Th. i. p. 14 (1850); *Gray*, *Hend.* B. i. p. 252, n.^o 3659 (1860).
Corydalla ruficollis, *Kelaart*, *Indopr. Faun. Zool. Cat.* p. 121 (1852); *Jerd.* B. *Ind.* II. p. 232 (1863); *Blyth*, *Ibis*, 1867, p. 31; *Peltz*, *Ibis*, 1868, p. 312; *Blanf.* *Ibis*, 1870, p. 469; *Holdsw.* P. Z. S. 1872, p. 458; *Hume*, *Nests and Eggs Ind.* B. p. 384 (1873); *Brooks*, *Str. F.* 1873, p. 359; *Adam*, t. c. p. 384; *Ball*, *Str. F.* 1874, p. 416; *Hume*, t. c. p. 497; 1875, p. 142; *Brooks*, t. c. p. 252; *Butler* & *Hume*, t. c. p. 160; *Blyth*, & *Wald*, B. *Burm.* p. 69 (1875); *Fairb.* *Str. F.* 1876, p. 260; *Armstr.* t. c. p. 339; *Beard*, t. c. p. 401; *Hume*, t. c. p. 458; *Fairb.* *Str. F.* 1877, p. 107; *Hume*, & *Davis*, *Str. F.* 1878, p. 369; *Davids.* & *Wenden*, *Str. F.* 1878, vol. ii. p. 84; *Ball*, t. c. p. 220; *Cripps*, t. c. p. 288; *Butler*, *Cat. B. Sind &c.* p. 41 (1879); *Legge*, B. *Cyclon.* p. 625 (1879); *Hume*, *Str. F.* 1876, p. 103; *Scully*, t. c. p. 317; *Butler*, t. c. p. 386; *id.* *Cat. B. S. Bomb. Pres.* p. 56 (1880); *Tidal*, *Str. F.* 1880, p. 69; *Reid*, *Str. F.* 1880, p. 49; *Davids*, *Str. F.* 1882, p. 310; *Oates*, B. *Brit. Burm.* I. p. 168 (1813); *Davison*, *Str. F.* 1883, p. 397; *C. hasselti*, *rasselti*, *Brehm*, *Naum.* 1156, p. 463; *Savat.* *Ucc.* *Born.* p. 262 (1874).
Anthus hasselti, *Schl.* *Handb. Dierk.* p. 293 (1857, ex *Temm. Mys.*) *Gray*, *Handb. B.* i. p. 252, n.^o 3655 (1869).
A. meridius, *Wahl*, P. Z. S. 1863, p. 488; *Gray*, *Handb. B.* i. p. 252, n.^o 3654 (1869).
A. sp., *Autin* & *Salvad.* *Utagg. Bogos*, p. 101 (1873).
Corydalla malayensis, *Tweed.* *Ibis*, 1877, p. 310; *Hume* & *Davis*, *Str. F.* 1878, p. 369; *Hume*, *Str. F.* 1879, p. 65; *Kelham*, *Ibis*, 1881, p. 518.
C. lugubris, *Tweed.* P. Z. S. 1877, pp. 547, 606, 762, 828; *id.* Z. P. Z. 1878 pp. 286, 380, 710; *Wardlaw Ramsay*, *Orn. Works Tweed.* p. 658 (1881).
C. ubiquitaria, *Anders.* *Zool. Yun-nan Exped.*, *Aves*, p. 369 (1878).
Hab. Panay, Ililo, Mindoro, Leyte, Samar, Guimaras, Negros, Dumaguete, Siquijor, Bohol, Luzon, Cebu, Panaon, Minilao, Borneo, Timor, Celebes, Molucas.

8. *A. cervinus*, *Pall.* N. v.

- Motacilla cervina*, *Pall.* *Zoogr. Rosso-Asiat.* i. p. 511 (1811); *Eversm.* *Bull. Soc. Mosc.* xxiii, pt. 2, p. 570 (1850).
Anthus cervinus, *Naum.* *Vog. Deutsch.* iii. pl. 85 fig. 1 (1823); *Keys.* n. *Blas.* *Wirtb. Eur.* p. 172 (1840); *Gray*, *Gen. B.* i.

- p. 266 (1847); *Bp.* *Conspl.* i. 1. p. 24; (1850); *Mittheil.* *Sber.* *Reis.* p. 165 (1851); *Svensk. Fysl.* pl. 8, fig. 6 (c. 1858); *Jaub. et Barth.-Lapomma. Rik. Oim.* p. 184, pl. (1859); *Ble-sus.* *Isis.* 1861, p. 261, (1862); p. 71; *Sieuhoe.* *Ibis.* 1863, pp. 311, 443; *Wright.* *Ibis.* 1864, p. 61; *Sperling.* *L. C.* p. 279; *Tristr.* *Ihs.* 1866, p. 260; *Blyth.* *Ibis.* 1867, p. 31; *D. gl. & Grbe.* *Orn. Eur.* i. p. 369 (1867); *Lö-cho.* *Expl. Sci. Alér.* *Ois.* ii. p. 17 (1867); *Bewan.* *Ibis.* 1867, p. 328; *Dodart.* *Avis. Scell.* p. 99 (1869); *Grau.* *Hand-l.* *B.* i. p. 251, n. 3616, (1869); *Gould.* *B. Ista.* iv. pl. 66 (1869); *Fritsch.* *Vög. Eur.* pl. 16, fig. 5 (1870); *Seinh.* *Ibis.* 1870, p. 83; *Flous & Buckley.* *L. C.* p. 195; *Hume.* *Ibis.* 1871, p. 35; *Tristr.* *L. C.* p. 233; *Seinh.* *P. Z. S.* 1871, p. 355; *Salvad.* *Faun. Ital.* *Ucc.* p. 126 (1871); *Heugl.* *Ibis.* 1872, p. 61; *Vire.* *Rev. et Mag. Zool.* (2) xxiii. p. 44 (1872); *Hun-dag.* *Haudh. Brit.* B. p. 109 (1872); *Shelley.* *B. E. S. t.* p. 121 (1872); *Alst. & Harvie Brown.* *Ibis.* 1873, p. 61; *Brooke.* *L. C.* p. 245; *Ball.* *Sr. F.* 1873, p. 74; *Hume.* *L. C.* p. 319; *Hume.* *Str.* 1874, pp. 239, 479; *Liffrd.* *Ibis.* 1875, p. 215; *Cordeaux.* *L. C.* p. 181; *Dauz.* & *Harvie Brown.* *Ercan.* *L. C.* p. 310; *Stoliczka.* *Str. F.* 1875, p. 310; *Blyth & Walden.* *B. Burm.* p. 96 (1875); *Seehoeh & Harvie Brown.* *Ibis.* 1876, p. 122; *Dresser.* *L. C.* p. 180; *Brooks.* *L. C.* p. 560; *Tacz.* *Bull. Soc. Zool. France.* i. p. 159 (1876); *David & Ousti.* *Ois. Chine.* p. 306 (1877); *Finsch.* *Ibis.* 1877, p. 59; *Hume.* & *Pat's n.* *Str. F.* 1878, p. 367; *Dauz.* *Ibis.* 1878, p. 20; *Seehoeh.* *L. C.* p. 342, 1879, p. 34; *Göltke.* *L. C.* p. 103; *Finsch.* *Verh. z.-b. Gesellsch. Wien.* 1879, p. 66; *Hume.* *Str. F.* 1879, p. 103; *Seehoeh.* *Ibis.* 1880, p. 188; *Bidulph.* *L. C.* p. 70; *Giglioli.* *Ibis.* 1881, p. 300; *Ridgw.* *Bull. U. S. Nat. Mus.* vi. p. 156 (1881); *Belding.* *L. C.* p. 350; *Seehoeh.* *Ibis.* 1882, p. 216; *Bidulph.* *L. C.* p. 280; *Seehoeh.* *L. C.* p. 376; *B. O. U. List Brit. B.* p. 32 (1883); *Seehoeh.* *Hist. Brit. B.* ii. p. 229 (1883); *Dybowski.* *Bull. Soc. Zool. France.* viii. p. 361 (1883); *He-zer & Tancré.* *MT. orn. Ver. Wien.* 1883, p. 86; *Sharpe.* *P. Z. S.* 1884, p. 206; *Tristr.* *Faun. & Flor. Palest.* p. 55 (1884); *Radde.* *Orn. Cauc.* p. 219 (1884); *Sharp. Cat. B. M.* 10, p. 585 (1885).
- A. ceciliæ.* *Audouin.* *Deser. Egipte.* p. 360, pl. 5 fig. 6 (1828); *Blans.* *Geol. & Zool. Abs.* p. 382 (1870).
- A. pratensis nubicus.* *Hempr.* & *Ehr.* *Symb. Phys.* fol. dd (1828);
- A. rufogularis.* *Brehm.* *Fauna Deutschl.* p. 340 (1831); *Gould.* *B. Eur.* ii. pl. 140 (1837); *Bp. Comp. Lst. B. Eur. & N. Amer.* p. 18 (1838); *Milde.* *Sber. Reis.* p. 164 (1851); *Le'tt. Nomencl. Ar.* p. 38 (1854); *Adams.* *Ibis.* 1864, p. 207; *Tristr.* *Ibis.* 1871, p. 233; *Haus.* *Verh. z.-b. Gesellsch. Wien.* xxii. p. 400 (1873); *Tacz.* *Bull. Soc. Zool. France.* i. p. 159 (1876).
- A. pratensis.* (*nec L.*) *Finsch.* *All. Pall. Zoogr.* p. 15 (1875); *Nordm.* *n. Dem. d. Voy. Russ.* *Mérid.* iii. p. 159 (1840); *He-zer.* *Trans. Z. S.* vi. p. 229 (1870); *Nelson.* *Cruise R. S. G-* *rwin.* p. 62 (1883).
- A. pratensis, rufogularis.* *Schl. Rec. Crit.* p. xxxvi. (1840); *Gould.* *P. Z. S.* 1856, p. 151; *Blyth.* *Ibis.* 1867, p. 31.
- A. ruf superciliosus.* *Blyth.* *J. A. S. Beng.* 1860, p. 165.

A. thoracophorus, *Swin.*, *Ibis*, 1860, p. 5; 429, 1861, pp. 56, 411.
A. japonicus; *Swin.*, *Ibis*, 1861, p. 333; 1863, p. 443.
A. ruficollis, *Heng.*, *Orn. N. O.-Alfr.*, i, p. 323 (1869).
A. cervinus, var. *ruficollaris*, *Swin.*, *Turkestan. Jevonit.*, pp. 67, 140 (1873).

Hab. Mindanao; Basilan, China.

7. *A. gustavi*, *Swin.* N. v.

Anthus arboreus, var., *Gray*, *P. Z. S.* 1860, p. 350; *Finsch*, *Nat-Ges. d.* p. 167 (1865).

A. gustavi, *Swin.*, *P. Z. S.* 1863, p. 90; *Gray*, *Hand-l. B.* i, p. 251, n.^o 3933 (1869); *Swin.*, *Ibis*, 1874, p. 442; *Brüggm. Libbandl. nat. Ver.*, *Bremen*, v, p. 67 (1870); *Sharpe*, *Trans. Linn. Soc.* 2nd ser., *Zool.* i, p. 338 (1870); *Srebohm*, *Ibis*, 1877, pp. 120, 258, 1878, p. 341; *Tweedt*, *P. Z. S.* 1878, p. 430; *Finsch*, *Russ. West-Sibir.* p. 69 (1879); *Sharpe*, *Ibis*, 1879, p. 202; *Homeyer & Tancré*, *MT. orn. Ver. Wien*, 1883, p. 86; *Dybowski*, *Balt. Soc. Zool. France*, 1883, p. 361; *Sharpe*, *Cat. B. M.* 10, p. 613 (1885).

A. (Aegirocra) gustavi, *Swin.*, *P. Z. S.* 1863, p. 273.

A. leucostictus, *Gray*, *Hand-l. B.* i, p. 251, n.^o 3642 (1869).
Corydalla gustavi, *Swin.*, *P. Z. S.* 1871, p. 360; *Walden*, *Trans. Z. S.* viii, p. 117 (1872); *Meyer*, *J. f. O.* 1873, p. 405; *Davids. & Oost. O. Chine*, p. 309 (1877); *Salvad. Ann. Mus. Civico Genov.* xvi, p. 191 (1880); *id. Orn. Papuasia etc.* ii, p. 432 (1881).

Anthus seebohmi, *Dresser*, *B. Eur.* iii, p. 295, pl. 134 (1875); *Seehohm & Harvie Brown*, *Ibis*, 1876, pp. 120, 180; *Brooks*, *Ibis*, 1876, p. 501; *Finsch*, *Ibis*, 1877, *Seebohm*, t. c. p. 128.
Hab. Leyte, Guimaras, Basilan, Luzon; Borneo, Timor, Célebes, Moluccas.

9. *A. undatus*, ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzon, Laguna, Calauan.

10. *A. macularius*, *Hodg.* N. v.

Anthus macularius, *Hodg.*, *Icon. ined. in Brit. Mus. Passeres*, pl. 118A (n.^o 435); *id. in Gray's Zool. Msc.* p. 83 (1844); *Cab. Mus. Henr. Th.* i, p. 15 (1850); *Bp. Conspl.* i, p. 248 (1850); *Ball, Str. B.* 1874, p. 416; *Brooks, Str. F.* 1876, p. 278; *t. Ibis*, 1876, pp. 499, 504; *Ball, Str. F.* 1877, p. 417; *id. Str. F.* 1878, vol. iii, p. 219; *Cripps, t. c.* p. 287; *Butler, Cat. B. S'hd &c.* p. 41 (1879); *Seebohm*, *Ibis*, 1879, p. 34; *Forst. Str. F.* 1879, p. 103; *Brooks, t. c.* p. 484; *Seebohm*, *Ibis*, 1880, p. 189; *Red. Str. F.* 1881, p. 48; *Davison, Str. F.* 1883, p. 306; *Blakist. Chrys.* ii, p. 425 (1882); *id. lom. 60*, p. 30 (1883); *id. & Pryer, B. Japan*, p. 153 (1882); *Jony*, *J. U. S. Nat. Mus.* vi, p. 289 (1883); *Blakist Amended List*, *B. Japan*, p. 52 (1884); *Sharp, Cat. B. M.* 10, p. 547 (1885).
Pastes agilis, *Blanf. J. A. S. Beng.* 1872, p. 60; *Dybowski*, *Bull. Soc. Zool. France*, viii, p. 261 (1883), nec *Sykes*.
Hab. Luzon, Japon, China, India.

Fam. CEREBIDOS.

Subfam. CEREBINOS.

Gen. CHLOROPHANES, RICHARD.

1. Ch. spiza, LINN. ♂ N. v.

Certhia spiza, LINN. Syst. Nat. i. p. 186.

Grimpereau à tête noir de Brésil, DAUB. Pl. Ent. 1824, p. 33.

Grimpereau verd de Cayenne, DAUB. Pl. Ent. 1824, p. 32.

Certhia spiza, MAX. Beitr. iii. p. 771.

Daenis spiza, CAB. Mus. Hein. i. p. 95; BURM. Syst. Ent. i. p. 152.

Chlorophanes spiza, CASSIN. Pr. Ac. Sc. Phil. 1824, p. 231; idem Ann. Lyc. N. Y. viii. p. 174; SALV. Cat. Stéckl. Col. 177; id. Ibis. 1855, p. 209; SALV. et GODMAN. Biol. Centr. Aves. i. p. 247; BRLEPSCH. Ibis. 1851, p. 242; id. J. Z. O. 1854, p. 286; SELAT. Cat. B. M. ii. p. 29 (1885).

Hab. Guatemala.

Fam. TANÁGRIDOS.

1. Gén. CALLISTE, BOIS.

1. C. larvata, DA BUS. ♂

M. S. 1

Calliste larvata, DA BUS. Esq. Orn. pl. 9; BP. Conspl. i. p. 236; SELATER. Contr. Orn. 1851, p. 64; id. P. Z. S. 1850, pp. 19, 260; id. Mon. Callist. p. 81, pl. 36; id. Syn. Av. Tim. p. 80; id. Cat. A. B. p. 70; SELAT. et SALV. Ibis. 1850, p. 16, 1851, p. 33; id. P. Z. S. 1870, p. 836, et 1879, p. 499; ID. NOUVEL. p. 19; SALV. Ibis. 1859, p. 497, et 1872, p. 316; SELAT. et GODMAN. Biol. Contr. Am. Aves. i. p. 274; SELAT. Cat. B. M. ii. p. 124 (1885).

Hab. América, Guatemala.

2. Gen. PYRANGA, VIRELLA.

2. P. rubra (Linn). ♂ N. v.

(M. S. 1)

Tanagra nubra, LINN. S. N. i. p. 314; GM. S. N. i. p. 88; LATH. Ind. Orn. i. p. 420; WILS. Am. Orn. ii. p. 42, t. vi. fig. 3, 4; AUD. Orn. Biogr. i. p. 338, t. cccliv.; DESM. Tiere. t. 34.

Tangara du Canada, DAUB. Pl. Ent. 150, fig. 1.

Red Tanager, LATH. G. H. vi. p. 5.

Pyranga rubra, SW. North. Zool. ii. p. 273; JARL. WILS. Am. Orn. i. p. 192; BP. Conspl. i. p. 241; SELAT. Cat. B. M. ii. p. 188 (1885).

Hab. América, Guatemala.

3. Gén. PHENICOThRAUPIS, CAB.

3. Ph rubicoides, Laf. ♂ N. v.

(M S T)

Saltator rubicoides, Laf. Rev. Zool. 1844, p. 41; Criss. Proc. Acad. Sc. Philad. iv, p. 90.

Phoenicothraupis rubicoides, Cab. Mus. Hein. i, p. 24; Sclater, Cat. B. II, p. 197 (1885).

Hab. Méjico, Guatemala.

4. Gén. SALTATOR, VIEILL.

4. S. magnoides, Laf. ♂ N. v.

(M S T)

Saltator magnoides, Laf. Rev. Zool. 1844, p. 41; B. Conspl. i, p. 489; Sclater, Cat. B. M. II, p. 284 (1885).

Hab. Méjico, Guatemala.

5. Gén. PITTLUS, UV.

5. P. poliogaster, Du Bus. ♂ N. v.

(M S T)

Pitylus poliogaster, Du Bus., Bull. Ac. Brux. xiv, pt. ii, p. 105; id. Rev. Zool. 1848, p. 245; id. Esq. Orn. t. 22; Sclater, Cat. B. M. II, p. 307 (1885).

Hab. Méjico, Guatemala.

Fam. ICTÉRIDOS.

1. Gén. DOLICHONYX, SW.

1. D. oryzivorus, Lin. ♀ N. v.

(M)

Emberiza oryzivora, Lin. S. N. i, p. 311; Wils. Am. Orn. ii, p. 48, pl. 12, f. 1, 2.

Passerina oryzivora Vieill. N. D. xxv, p. 3.

Psarocolius caudacutus, Wagl. Syst. Avi. sp. 32.

Dolichonyx oryzivora, Sw. Faun. Bor.-Afr. ii, p. 278; Bp. Conspl. i, p. 437; Sclat. Cat. B. M. II, p. 331 (1885).

Hab. América, Canadá.

2. Gén. MOLOTHRUS, SW.

2. M. pecoris, Gm. ♂ N. v. Trapial de la Caroline. M S T

Troupiale de la Caroline, Daub. Pl. Eul. 606, fig. 1.

Fringilla pecoris, Gm. S. N. i, p. 910.

Emberiza pecoris, Wils. Am. Orn. ii, p. 145, pl. 18, f. 1, 2, 3.

Agelaius pecoris, Sw. Phil. Mag. 1827; i, 1, 43 (Mexico).

Melothrus pecoris, Sw. *Faun. Bor.-Am.* ii. p. 277; *Bp. Conspl.* i. p. 435; *Cab. Mus. Hein.* i. p. 192; *Baird. B. N. Am.* p. 524; *Sclater. Cat. B. M.* ii. p. 333 (1885).
Hab. América, Canadá.

3. **M. axenus**, Wagl. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Psarocolius axenus, Wald. *Isis*, 1820, p. 758; *Bp. Conspl.* i. p. 426.
Melothrus axenus, Cab. *Mus. Hein.* i. p. 192; *Sclater. Cat. B. M.* ii. p. 334 (1885).
Hab. América, Guatemala.

3. *Gén. AGELAEUS*, VIEILL.

4. **A. phoeniceus**, Lin. ♂ N. v. Trupial de alas rojas. (M. S. T.)

Oriolus phoeniceus, Lin. *S. N.* i. p. 161; *Gm. S. N.* i. p. 180;
Lath. Ind. Orn. i. p. 178.
Troupiale à ailes rouges de la Louisiane, *Daub. Pl. Ent.* 402.
Agelaius phoeniceus, Sw. *Faun. Bor-Am.* ii. p. 180; *Bp. Conspl.* i. p. 430; *Scl. Cat. B. M.* ii. p. 340 (1885).
Hab. América, Canadá.

Fam. FRINGILIDOS.

1. *Gén. VOLATINIA*, REICH.

1. **V. jacarini**, (Lin.) ♂ N. v. Volatin de Cayenna.

(M. S. T.)

The Jacarini, *Edwards. Gleanings*, ii. p. 202, pl. 306 (1760).
Le Tangara noir du Brésil, Briss. *Orn.* iii. p. 28 (1760).
Janagra jacarini, Linn. *Syst. Nat.* i. p. 314 (1760).
L. Jacarini, Buff. *Hist. Nat. Ois.* iv. p. 293 (1778); Vieill. *Ois. Chant.* pl. 33 (1805).
Moineau de Cayenne, Daubent. *Pl. Ent.* iv. pl. 224, fig. 3.
Volatinia jacarina, Sharpe, *Cat. B. M.* 12. p. 152 (1888).
Hab. América, Guatemala.

2. *Gén. CARDUELIS*, BRISS.

2. **C. carduelis**, (Lin.) ♂ N. v. El gilguero.

(M. S. T.)

Le Chardonneret, Briss. *Orn.* iii. p. 53 (1760). Daubent. *Pl. Ent.* iv. pl. 4, fig. 1; Montb. *Hist. Nat. Ois.* iv. p. 187 pl. 10 (1778).
The goldfinch, Penn. *Brit. Zool.* p. 108, pl. 108, figs. 1, 2 (1760).
Fringilla carduelis, Linn. *Syst. Nat.* i. p. 318 (1760); *Gm. Syst. Nat.* i. p. 993 (1788).
Carduelis carduelis, Boie, *Isis*, 1122, p. 554; Licht. *Nomen-vl. Av.* p. 46 (1854); Sharpe, *Cat. B. M.* 12. p. 185 (1888).
Hab. Europa, Canarias.

3. Gen. PASSER, Bris.

3. P. montanus, (Lin.) ♂♂ N. v. El c. : a. (M. S. T.)

- The Hamburgh Tree-Creeper, *Albin. Nat. Hist. B.* iii. p. 23, pl. 24 (1740).
The Red-headed Sparrow, *Albin. t. c.* p. 61, pl. 65 (1740).
Mountain Sparrow, *Albin. t. c.* p. 62, pl. 65 (fig. pass.).
M. S. Cock and Hen, *Edwards. Glaz. Mus.* ii. p. 124, pl. 260 (1760).
Le Moineau de Montagne, *Bris. Orn.* iii. p. 79 (1760).
L. M. de Cunig. ou Le Fripusc, *Bris. t. c.* p. 82 (1760).
Le Bouvreuil de Hambourg, *Bris. t. c.* p. 814 (1760).
Fringilla montana, *Linn. Syst. Nat.* i. p. 324 (1766); *Temm. Min. d'Orn.* i. p. 354 (1820); *Roxv. Orn. Prov.* pl. 83 (1825); *Nat. Vog. Deutsch.* iv. pl. 116, fig. 1, 2 (1826); *Werner. Atlas. Graniocores*, pl. 42 (1827); *Crispon. Orn. Gard.* p. 24 (1840); *Yarr. Brit. B.* i. p. 469 (1843); *Kjærb. Danm. Fugle.* pl. xxvi. fig. 5 (1852); *Sundt. Svensk. Vogl.* pl. vi. fig. 7 (1856); *Schl. Dier. Nederl. Vogl.* pl. 16, fig. 3 (1861); *Fallou. Ois. Belg.* p. 99 (1875).
Le Friquet, *Buff. Hist. Nat. Ois.* iii. p. 489 (1775); *Daubent. Pl. Enl.* iv. pl. 207, fig. 1.
L'Hambourroux, *Mintb. Hist. Nat. Ois.* iv. p. 398 (1778).
Tree Finch, *Lath. Gen. Syn.* ii. pt. 1, p. 252 (1783).
Loxia hamburgia, *Gm. Syst. Nat.* i. p. 854 (1788).
Fringilla campestris, *Schräck. Fauna Boica.* p. 181 (1798).
Passer montinina, *Pall. Zoogr. Rosso-Asiat.* ii. p. 30 (1811).
P. hamburensis, *Letch. Syst. Cat. Mamm. &c. Brit. Mus.* p. p. 14 (1816).
P. montinus, *Koch. Syst. baier. Zool.* p. 219 (1816); *Macgill. Brit. B.* i. p. 351 (1837); *Key. u. Blas. Wirb. Eur.* p. xxxix (1840); *Mühle. Orn. Griechenl.* p. 44 (1844); *Schl. Rev. Cril.* p. Ixiv (1844); *Rüpp. Syst. Uebers.* p. 78 (1845); *Gray. Gen. B.* ii. p. 372 (1849); *Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 120 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 508 (1850); *Cab. Mus. Hein. Th.* i. p. 156 (1850); *Middend. Reis. Sibir. Zool.* p. 148 (1851); *Schl. Vog. Nederl.* pl. 162, (1854); *Horsf. & Moore. Cat. B. E. Cr. Mus.* ii. p. 500 (1856); *Hewitt. Eggs. Brit. B.* i. p. 153, pl. 42, figs. 1, 2 (1856); *Jard. et Birth. - I. t. s. n. M. Rich. Orn.* p. 131 (1859); *Schreuzk. Reis. Amurt.* i. 284 (1859); *Tristr. Ibis.* 1859, p. 33; *Scoph. Ibis.* 1860, p. 61; *Pawys. t. c.* p. 137; *Linserm. Vog. Griechenl.* p. 56 (1860); *Swinh. Ibis.* 1861, pp. 45, 255; *Blyth. t. c.* p. 408; *Swinh. Ibis.* 1862, p. 258; *Blekest. t. c.* p. 327; *Gray. List Brit. B.* p. 100 (1863); *Jord. B. Inst.* ii. p. 366 (1863); *Radde. R. Sibir.* 1865, p. 181 (1863); *Swinh. Ibis.* 1866, p. 378; *Wright. Ibis.* 1864, p. 53; *Schomb. t. c.* p. 250; *Giglioti. Ibis.* 1865, p. 57; *More. t. c.* p. 126; *Swinh. Ibis.* 1867, p. 401; *Bewick. t. c.* p. 419, 1867, p. 131; *Dod. & Gerbe. Egy.* i. p. 245 (1867); *Whitley. Ibis.* 1897, p. 202; *Bewick. Ibis.* 1898, p. 174; *Buller. Ibs.* 1899, p. 165; *Swinh. t. c.* p. 348; *Burzgr. Vogelj.*

- Sparus*, *Sp.*, p. 72 (1873); *Sp. S. S.*, p. 75 (1875); *Swinh.*, *Ibis*, 1873, pp. 19, 33; *Elwes & Buckley*, *t. c.*, p. 112; *Hensl.*, *Cat.*, N.O.-Afr., 5, pt. 2, p. 632 (1870); *Gray*, *Handb.*, *B. B.*, p. 26, n. o. 7258 (1870); *Gould*, *B. Gr. Brit.*, id. pl. 38 (c. 1871); *Ertzsch. Trop. Ent.*, 1, 20 fig. 13 (c. 1870); *Saunders*, *Ibis*, 1871, p. 218; *Swinh.*, *P. Z. S.*, 1871, p. 389; *R. Gray*, *B. West. Scott.*, p. 140 (1871); *Hartig*, *Handb.*, *B. p.*, 28 (1872); *Schleg. B. F.*, p. 150 (1873); *Schultz*, *Tropisch. Javon.*, p. 64 (1873); *olst. & Harvie Brown*, *Ibis*, 1873, p. 14; *Brooks*, *t. c.*, p. 216; *Swinh.*, *t. c.*, p. 371; *Hume*, *Nest.*, *Exps. Ind. B.*, p. 460 (1873); *id.* & *Hawkins*, *Lahore to York*, p. 254 (1873); *Hume*, *Str. F.*, 1874, p. 481 (1873); p. 175; *Irby*, *B. Griff.*, p. 119 (1873); *Dresser*, *B. Eur.*, III, p. 597, pl. 178 (1875); *Blyth*, *B. Burm.*, p. 94 (1875); *Swinh.*, *1878*, 1875, p. 190; *Dresser*, *t. c.*, p. 239; *Danf. & Harvie Brown*, *t. c.*, p. 212; *Neast*, *ed. Yarr*, *Brit. B. i.*, p. 82 (1876); *Blaf.*, *East. Persia*, iii, p. 255 (1876); *Scully*, *Str. F.*, 1876, p. 103; *Hume*, *t. c.*, p. 490; *Tacz.*, *Bull. Soc. Zool. France*, i, p. 178 (1876); *Seeb. him. & Harvie Brown*, *Ibis*, 1876, p. 114; *Oates*, *Str. F.*, 1877, p. 163; *Priev.*, *in Rowley's Orn. Misc.*, ii, p. 204 (1874); *David & Oust. Ois. Chin.*, p. 349 (1877); *Swinh.*, *Ibis*, 1877, p. 145; *Seehöhm*, *Ibis*, 1878, p. 334; *Adv. vs. Zool. Exped.*, *Yunnan*, p. 601 (1878); *Hume & Davison*, *Str. F.*, 1878, pp. 407, 520; *Tirand*, *Bull. Com. Agric. Cochinchine*, i, p. 132 (1879); *Finsch*, *MT. zool-bot. Gesellsch. Wien*, 1879, p. 210; *Hume*, *Str. F.*, 1879, pp. 97, 107; *Scully*, *t. c.*, p. 334; *Wardlawe-Ramsay*, *Ibis*, 1883, p. 64; *Danf.*, *t. c.*, p. 94; *St. John*, *t. c.*, p. 145; *Seehöhm*, *t. c.*, p. 187; *Bingham*, *Str. F.*, 1880, p. 193; *Barnes*, *t. c.*, pp. 218, 450; *Kelham*, *Ibis*, 1881, p. 524; *Giglioli*, *Iconogr. Afrif. Ital.*, pt. 10 (1881); *C. Swinh.*, *Ibis*, 1882, p. 113; *Seehöhm*, *t. c.*, pp. 218, 378; *Blakist.* & *Pryer*, *B. Jatai*, p. 178 (1882); *Salvin*, *Cat. Strickl. Coll.*, p. 210 (1882); *Seehöhm*, *Ibis*, 1883, p. 9; *Dalgl.*, *t. c.*, p. 564; *Oates*, *B. Brit. Burm.*, i, p. 348 (1883); *B. O. U. List Brit. B.*, p. 51 (1883); *Homeyer* & *Tauró*, *MT. orn. Ver. Wien*, 1883, p. 89; *Clarke*, *Ibis*, 1884, p. 143; *Saunders*, *t. c.*, p. 375; *C. H. T. Marshall*, *t. c.*, p. 419; *Booth*, *Rough Notes*, pt. viii. (1884); *Seehöhm*, *Hist. Afr. B. ii.*, p. 60 (1884); *Radde*, *Orn. Caw.*, p. 477 (1884); *Cruze*, *K. v. A. Amer. B.*, 2nd. ed. p. 345 (1884); *Dixon*, *Ibis*, 1885, p. 92; *Giglioli*, *Afrif. Ital.*, p. 23 (1886); *Salvad. Elench. Ucc. Ital.*, p. 199 (1888); *Sharpe*, *Cat. B. M.*, 12, p. 302 (1889).
- Pyrgita montana*, *Cat. Recat. Ann.*, i, p. 285 (1817); *Gould*, *ii. Eur.*, iii, pl. 183 (1837); *B. Conf. Trop. B. Eur.*, ent. N. Amer., p. 31 (1838); *Schlegel*, *B. Faun. Belg.*, p. 50 (1842); *Hodges*, *Zool. Ind. Brit. Mus.*, *Passeres*, pl. 285, fig. 2, n.º 470; *id.* in *Gray's Zool. Mus.*, p. 84 (1844); *Gray*, *Cit. Mamm. etc. Nepal press*, *Hodges*, p. 107 (1846); *Licht. Nomenc. Av. Berol.*, p. 17 (1854); *Filippi*, *Vog. d. Persia*, p. 349 (1865); *Bettomi*, *Ucc. algéri. Lomb.*, i, pl. 9 (1865); *Loche*, *Expt. Sci. Algér.*, *O's.*, i, p. 13 (1867).
- Pyrgita campestris*, *septentrionalis*, *Brehm*, *t. c.*, p. 267 (1831); *Passer arboreus*, *Blyth* in *Ronne's Felt Naturalist*, i, p. 407 (1833).

Fringilla campestris, *Nordm.* in *Demid. Voy. Russ. Merid.* iii.
p. 180 (1840).

Salicipasser montanus, *Bogd. B. Cœc.* p. 60 (1879).

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Bataan; Europa, China.

4. **P. flaveolus**, *Blyth*, ♂ N. v.

(M. S. T.)

Passer flaveolus, *Blyth. J. A. S. Beng.* xiii. p. 946 (1844); *id. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 120 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 508 (1850); *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 86, n.º 7267 (1870); *Blauj. t. c.* p. 469; *Hume, Nest. & Eggs. Ind.* B. p. 40 (1873); *id. Str. F.* 1874, p. 481; *id. & Oates, Str. F.* 1875, p. 150; *Blyth & Walden, B. Burm.* p. 94; (1875); *Anderson, Zool. Exped. Yui-nan*, p. 682 (1878) *Hume & Davison, Str. F.* 1878, p. 406; *Tiraud, Bull. Com. Agric. Cochinchine*, i. p. 113 (1879); *Hume, Str. F.* 1879, p. 107; *Oates, Str. F.* 1882, p. 233; *id. B. Brit. Burm.* i. p. 349 (1883); *Sharpe, Cat. B. M.* 12, p. 330 (1885).

P. jugiferus, *Bp. Conspl.* i. p. 508 (1850, ex *Temm. MSS.*); *Blyth. Ibis*, 1870, p. 172; *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 80, n.º 7271 (1870).
Hab. Cochinchina, Pegu, Luzón?

4. Gén. POECETES, BAIRD.

5. **P. gramineus**, (*Gm.*) ♂ N. v.

(M. S. T.)

Grass Finch. *Lath. Gen. Syn.* ii. pt. i. p. 273 (1783); *Penn. Arctic. Zool.* ii. p. 375 (1785).
Fringilla graminea, *Gm. Syst. Nat.* i. p. 922 (1788); *Audub. B. Amer.* pl. 94; *id. Orn. Biogr.* i. p. 473 (1831), v. p. 502 (1830).
Poecetes gramineus, *Sharpe, Cat. B. M.* 12, p. 670 (1889).
Hab. América, Canadá.

5. Gén. SERINUS, KOCH

6. **S. canaria**, (*Lin.*) ♂ ♀ N. v. Canario

(M. S. T.)

Canary Birds. *Albin. Nat. Hist. B.* i. pl. 65 (1738).
Le Serin des Canaries, *Briss. Orn.* iii. p. 184 (1760); *Buff. Hist. Nat. Ois.* iv. p. 1 1778).
Fringilla canaria, *Linn. Syst. Nat.* i. p. 321 (1766); *Webb, et Berth. Orn. Canar.* p. 21, tab. 2 (1836-44); *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 83, n.º 7207 (1870).
Serinus canaria, *Cab. Mus. Hein. Th.* i. p. 163 (1850); *Bp. Conspl.* i. p. 523 (1850); *Sharpe, Cat. B. M.* 12, p. 370 (1885).
Hab. Canarias, Madera, Azores, Tenerife.

6. Gén. LOXIA, LIN.

7. **L. curvirostra**, ♂ *Lin.* N. v. Pico cruzado.

(M. S. T.)

L. curvirostra, *Lin. S. N.* 1, p. 290 (1885); *Sharpe, Cat. B. M.* 12, p. 435 (1885).
Le bec-croisé Allegmane, *Daub. Pl. Ent.* pl. 218.
Hab. Europa, Asia, China.

Grupo: ESTURNIFORMES.

Fam. ARTAMIDOS.

L. Gén. ARTAMUS, VIRGIL.

1 A leucogaster, Valenc. ♂♂ N. v. Pagat at. (M. S. 1)

- ♂ La Pie-Grièche de Manille, Briss. *Orn.* ii. p. 180; pl. xviii.
fig. 2 (1760).
♀ Lanius leucorhynchus, Linn. *Mantissa*, p. 524 (1771; ex Briss.);
Gm. S. N. i. p. 305 (1788).
♀ La Pie-Grièche dominiquaine des Philippines, Sonn. *Voy. Nouv.*
Guin. p. 54 (1776).
♀ Lanius philippinus, Scop. *Det. Flor. et Faun. Insubr.* ii. p. 85
(1785; ex Sonn.).
♂ L. dominicanus, Cim. *Syst. Nat.* i. p. 307 (1788; ex Sonn.).
Ocypterus leucogaster, Valenc. *Mém. Mus. d'Hist. Nat.* vi. p. 21,
pl. vii. fig. 2 (1820).
Leptopteryx leucorhynchus (nec L.), Horsf. *Trans. Linn. Soc.*
xiii. p. 244 (1821).
Lanius leucorhynchus (nec L.), Rafsl. *Trans. Linn. Soc.* xiii.
p. 386 (1821).
Leptopteryx leucogaster, Wagl. *Syst. Av.*; Leptopteryx, sp. 2
(1827).
Ocypterus alliventer (nec Gould), Less. *Traité*, p. 370 (1831).
O. leucorhynchus, Kittl. *Kupf. Vog.* p. 23, Taf. xxx. fig. 1
(1832); S. Müll. *Verh. Land en Volkenk.* p. 21 (1839-44).
Artamus leucopygialis, Gould, P. Z. S. 1842, p. 17; Gray, *Gen.*
B. i. p. 285 (1845); Gould, B. *Austr.* fol. ii. pl. 33 (1848);
Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 199 (1849); Bp. *Consp.* i. p.
344 (1840); Reichenb. *Vög. Neuholt.* p. 171 (1850); Gray, P.
Z. S. 1858, p. 493; id. *Cat. B. New Guinea*, p. 58 (1859);
Gould, P. Z. S. 1863, p. 233; id. *Audb. B. Austr.* i. p. 154
(1865); Finsch, *New-Guinea*, p. 171 (1865); Walden, P. Z. S.
1860, p. 555; Gray, *Hand-l. B.* i. p. 289, n.º 4279 (1869);
Ball, J. A. S. xli. p. 283 (1872); Cab. & Reichenb., J. f. O.
1876, p. 322; W. A. Forbes, P. Z. S. 1877, p. 122; Masters,
Proc. Linn. Soc. N. S. W. i. p. 48 (1877); Casteln. &
Rams. t. c. p. 380; Rams. t. c. p. 392; id. op. cit. i. p. 179
(1878), iii. p. 276 (1878), iv. p. 98 (1880); W. A. Forbes, *Rep.*
Voy. «Challenger.» *Zool.* ii. p. 85 (1881); Rams. *Proc. Linn.*
Soc. N. S. W. (2) ii. p. 167 (1887).
A. leucorhynchus, Gray, *Gen. B.* i. p. 285 (1845); Bp. *Consp.*
i. p. 343 (1850); Cab. *Mus. Hein. Th.* i. p. 208 (1850); Cass.
U. S. *Expl. Exped.*, *Birds*, p. 140 (1858); Gray, P. Z. S.
1860, p. 354; Wall. *Ibis*, 1860, p. 141; Gray, *Hand-l. B.*
i. p. 289, n.º 4269 (1869); Walden, *Ibis*, 1872, p. 371; id.
Trans. Z. S. viii. p. 67 (1872); id. *Ibis*, 1873, p. 309; Hume,
Str. F. 1874, p. 214; id. *Nests. & Eggs Ind. B.* p. 195
(1875); Salvad. *Ucc. Born.* p. 140 (1875); Sharp. *Ibis*, 1876,

- V.* 45, 1877, p. 21; p. 147 (1875). *Tuccid. t. c. P.* 1878, p. 383; *id. P. Z. S.* 1877, pp. 544, 692, 759, 826, (1878) pp. 283, 342, 709, 937; *Sharpe, Journ. Linn. Soc. Zool.* xiv. p. 688 (1879); *id. P. Z. S.* 1879, pp. 315, 345; *Meyer, t. c.* p. 146; *Nichols, Ibis.* 1879, p. 170; *Tweedd. Rep. «Challenger» Exped.*, *Zool.* ii. p. 16 (1881); *Sharpe, Rep. U. S. A. Amer.* p. 21 (1884); *Gulliem. P. Z. S.* 1885, pp. 251, 406, 505, 553. *V. leucogaster*, *Gray, Gen. B.* i. p. 285 (1845); *Bp. Conspl.* i. p. 343 (1850); *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. F. I. Co.* i. p. 161 (1854); *Bennst. J. f. O.* 1859, p. 208; *Will. P. Z. S.* 1863, pp. 28, 485; *Sel. t. c.* p. 217; *Finsch, Neu-Guinea*, p. 171 (1865); *Beavan, Ibis.* 1867, p. 324; *Hartl. & Finsh. P. Z. S.* 1867, p. 117; *Gray, Handb. B.* i. p. 289, n.^o 4273 (1869); *Meyer, Sitz. z.-b. Gesellsch. Wiss.* ixix. p. 204 (1874); *Salvad. Ann. Mus. Civic. Genov.* vii. pp. 656, 770 (1875); *id. op. cit. viii.* p. 377 (1876); ix. p. 28 (1876), x. p. 138 (1877); *Sharpe in Rowley's Orn. Misc.* iii. p. 184 (1875); *D'Albert. & Salvad. Ann. Mus. Civic. Genov.* xiv. p. (1879); *Salvad. t. c. xv.* p. 38 (1879); *id. Orn. Papuasia etc.* ii. p. 167 (1881); *Sel. P. Z. S.* 1883, pp. 51, 195; *H. O. Forbes, P. Z. S.* 1884, pp. 247, 432; *Gulliem. P. Z. S.* 1885, p. 635; *Vorderm. N. T. Nederl. Ind.* xlvi. p. 878 (1886). *Ramsay, Tab. List. Austr. B.* p. 3 (1888); *Sharpe, Cat. B. M.* 13, p. 3 (1890). *V. paupensis*, *Bp. Conspl.* i. p. 344 (1850), *ex Temm. MBS. in Mus. Lugd.*; *Sel. Journ. Linn. Soc.* ii. 1858, p. 150; *Gray, P. Z. S.* 1858, p. 179, 1861, p. 435; *Finsch, Neu-Guinea*, p. 171 (1865); *Walden, P. Z. S.* 1866, p. 555; *Gray, Handb. B.* i. p. 289, n.^o 4282 (1869); *Beccari, Ann. Mus. Civic. Ge-* vii. p. 709 (1875).
V. leucorhynus, *Walden, Trans. Z. S.* ix. p. 174 (1875); *Sharpe, Trans. Linn. Soc.* (2) i. p. 323 (1877); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 544, 1878, pp. 282, 342.
V. leucorhynchus, *var. celebensis*, *Brügg. Abhandl. nat. Var. Bremen.* v. p. 69 (1876).
A. celebensis, *Brüggem. t. c.* p. 70 (1876); *Tweedd. Ibis.* 1878, p. 386.
A. muschenbroekii, *Meyer, Vog. Nester und. Eer Ostind.-Arch.* p. 30 (1884); *Salvad. P. Z. S.* 1884, p. 578; *id. Ibis.* 1884, p. 355.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, S. Mateo, Laguna, Calamba, Negros, Cebú, Amparo, Butuan, Surigao, Bohol, Dumaguete, Basilan, Jolo, Mindanao, Guimrás, Panay, Siquijor, Marinduque, Miniloc; Java, Célebes, Borneo, Sumatra.

Fam. ESTURNIDOS.

1 Gén STURNIA, LESS.

t. St violacea, *(Bodil).* ♂ N. v Culaching p. m. (M. T. S.)

Le Grand Traquet des Philippines, *Briss. Orn.* iii. p. 446, pl. 22, fig. 3 (1760); *Daubent. Pl. Ent.* iii. pl. 185, fig. 2; *Monbt. Hist. Nat. Ois.* v. p. 230 (1778).

- Motacilla violacea, *Bodd. Tabl. Pl. Ent.* p. 11 (1783).
Pastor ruficollis, *Wagler, Syst. Av.*, Pastor, sp. 19 (1872);
Gray, *Gen. B.* ii, p. 334 (1847).
Lamprötornis pyrrhogensis, *Tenn. & Sch. Frat. Fab.* 1785, p. 86 (1850).
L. pyrrhogon, *id. t. c.* pl. 46 (1850).
Heterornis pyrrhogensis, *Bp. Conspl.* i, p. 418 (1850), ex *Müller*,
MSS. u. Swinh. P. Z. S. 1853, p. 202.
H. ruficollis, *Bp. Conspl.* i, p. 418 (1850).
Sturnia pyrrhopogon, Gray, *P. Z. S.* 1850, p. 355.
Calornis albifrons, *Byth. (teste Swinhoe) P. Z. S.* 1853, p. 302
note.
Temenuchus pyrrhogensis, Gray, *Hand-l. B.* ii, p. 21, n.º 63 (1870).
T. ruficollis, Gray, c. t. p. 21 n.º 6302 (1870).
Acridotheres pyrrhogensis, *Giebel, Thes. Orn.* i, p. 268 (1872).
St pyrrhogensis, *Wald. Trans. Z. S.* viii, p. 78 (1872); *Swinh. Ibis*, 1874, p. 159; *Blakist. & Prysor, Ibis*, 1878, p. 232;
Meyer, Ibis, 1879, p. 134; *Blakist. Amended List B. Jap.* p. 14 (1884).
St. dominicana, *Salvad. Ucc. Born.* p. 269 (1874); *Verderm. Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* xlvi, p. 235 (1847).
St. daurica, (*nec Pall.*), *Sharpe, Ibis*, 1879, p. 262.
St. violacea, *Walden, Trans. Z. S.* ix, p. 203 (1877); *Ramsay, Ibis*, 1886, p. 172; *Blasius, in Madaasz, Zeitschr.* 1886, p. 120; *Sharpe, Cat. B. M.* 13, p. 70 (1890).
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Cilauman, Sinar, Bi-
rongan, Paragua, P. Princesa, Negros, Damalon, Minlan, Célebes Java, Sumatra.

2. Gén. ACRIDOTHERES, VIEILL.

2. A. cristatellus. (Gm). ♂ N. v. Martin Engostero, (M. S.)
- The Chinese Starling or Blackbird, *Edwards, N. H. Birds*, i, pl. (1743).
Le Merle hépé de la Chine, *Briss. Orn.* ii, p. 253 (1800); *Dau bent, Pl. Ent.* ix, pl. 507; *Montb. Hist. Nat. Ois.* iii, p. 307 (1775).
Crested Grackle, *Lath. Gen. Syz.* ii, pt. i, p. 464 (1783).
Gracula cristatella, *Gm. Syst. Nat.* i, p. 397 (1788).
Acrilothères ater, *Bonn. et Vieill. Enc. Méth.* ii, p. 692 (1823);
Gray, *Hand-l. B.* ii, p. 20, n.º 6290 (1870).
A. cristatellus, *Bonn. et Vieill. Enc. Méth.* ii, p. 691 (1823);
Blyth, J. L. S. Beng. xv, p. 33 (1846); *id. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 108 (1849); *Cab. Mus. He'n.* Tn. i, p. 205 (1850);
Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. ii, p. 536 (1850);
Swinh. Ibis, 1890, pp. 60, 429, 1861, p. 44, 1862, p. 266;
id. P. Z. S. 1873, p. 302; *id. Ibis*, 1863, p. 382; *id. Ibis*, 1867, p. 387; *id. P. Z. S.* 1871, p. 384; Gray, *Hand-l. B.* ii, p. 19 n.º 6283 (1870); *Walten. Tr. Z. S.* ix, p. 202 (1875); *Tweedt. P. Z. S.* 1877, p. 698; *David & Oest. Ois. Chine*, & p. 365 pl. 86 (1877); *Statw. Ibis*, 1887, p. 434; *Sewall, Ibis*, 1883, p. 266; *Sharpe, Cat. B. M.* 83, p. 20 (1890).

A. fuliginosus, *Blyth*, *J. A. S. Beng.* xiii. p. 362 (1844, —juv.).
Merula philippensis, «*Brisson*,» *Bp. Conspl.* i. p. 420 (1850, nec *Brisson*).

Acridotheres philippensis, *Bp. Conspl.* i. p. 420 (1850); *Swinh.* *Ib's*, 1870, p. 352; *Gray*, *Hand-l. B.* ii. p. 20, n.^o 6287 (1870).
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Bataan, Batangas; China.

3 Gén. SARCOPS, WALD.

3. **L. calvus**, *Lin.* ♂ ♀ N. v. Culing, Gulin, Coleto (M. S. T.)

Le Merle chauve des Philippines, *Briss. Orn.* ii. p. 280, pl. xxxvi, fig. 2 (1760); *Daubent. Pl. Ent.* iv. pl. 200.

Gracula calva, *Linn. Syst. Nat.* i. p. 104 (1766); *Gm. Syst. Nat.* i. p. 396 (1788); *Daud. Traité*, ii. p. 690; (1800); *Kittl. Kupf. Tög.* p. 9, pl. xiii, fig. 2 (1832); *Gray*, *Gen. B.* ii. p. 330 (1845).

Le Goulin, *Montb. Hist. Nat. Ois.* iii. p. 420 (1775).

Bald Grakle, *Lath. Gen. Synt.* ii. pt. 2, p. 457 (1872).

Acridotheres calvus, *Bonn. et Vieill. Enc. Méth.* ii. p. 610 (1823).

Gymnops calvus, *Cuvier, Règne Anim.* i. p. 381; (1829); *Bp. Conspl.* i. p. 422 (1850); *Licht. Nomencl. Av.* p. 52 (1854); *Walden*, & *Layard*, *Ibis*, 1872, p. 103.

Gymnops griseus, *Meyen*, *N. Acta Acad. C. L.-C. G. Nat. Cur.* xvi. *Suppl. prim.* p. 78 (teste *Walden*).

Mino calvus, *Blyth*, *Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 111 (1849).

Eulabes tricolor, *Gray*, *Hand-l. B.* ii. p. 19, n.^o 6275 (1870).

Sarcops calvus, *Walden*, *Trans. Z. S.* ix. p. 205 (1875); *Sharpe*, *Trans. Linn. Soc.* new. ser. i. p. 344 (1876); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, pp. 699, 764, 839; *id. P. Z. S.* 1878, pp. 113, 287, 343; *Wardlaw Ramsay*, *Orn. Mem.* *Tweedd.* p. 754 (1881); *Guilleml.* *P. Z. S.* 1885, p. 267; *Sharpe*, *Cat. B. M.* 13. p. 97 (1890).

S. lowii, *Sharpe*, *Trans. Linn. Soc.*, 2nd. ser. *Zool. J.* p. 344 (1876); *id. P. Z. S.* 1870, p. 315.

Hab. Luzón, Mindoro, Paragua, Samar, Cebú, Guimarás, Negros, Leyte, Dinagat, Mindanao, Basilan, Joló, Butuan.

4 Gén. MAINATUS, LESS.

4. **M. religiosus**, (*Lin.*) ♂ ♀ N. v. Tiao. (M. S. T.)

The Minor, *Albin*, *Nat. Hist. B.* ii. pl. 38 (1738).

The Minor or Mino, *Edwards*, *Nat. Hist. B.* i. p. 17, pl. 17 (1743).

Le Grand Mainate, *Briss. Orn.* ii. p. 308 (1760).

Gracula religiosa *Linn. Syst. Nat.* i. p. 104 (1766); *Jerd. Madr. Journ.* xi. p. 24 (1840); *A. Hay, Madr. Journ.* xiii. pt. 2, p. 156 (1844); *Gray*, *Gen. B.* ii. p. 330 (1845, pt.); *Blyth*, *J. A. S. Beng.* xv. p. 31 (1846); *id. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 109 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 422 (1850); *Cab. Mus. Hein. Th.* i. p. 207 (1850); *Layard*, *Ann. N. H.* (2) xiii. p. 216 (1854); *Schl. V. T. D.* i. p. 3, pl. i. fig. 1 (1853).

1. Mainate des Indes Orientales, *Dictionnaire Encyclopédique*, pt. iv, pl. 26^a.
Major Grackle, *Lath. Gen. Syst.* i, pt. 2, p. 455 (1783).
Melanurus religiosus, *Less.* in *Perussiv.* *Bull.* x, p. 158 (1827);
Sharpe, *Cat. B. M.* 13, p. 99 (1890).
Gracula indica *Blyth*, *J. A. S. Beng.* xii, p. 1718* (143).
G. minor, *A. Hay*, *Madr. Journ.* xiii, pt. 2, p. 134 (1844).
Eulabes religiosus, *Horsf. & Moore*, *Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii, p. 522 (1856); *Jerd. B. Ind.* ii, p. 337 (1863); *Blyth*, *Ibis*, 1867, p. 40; *Molliss.* *Ibis*, 1870, p. 101; *Gray*, *Hand-l. B.* ii, p. 18, n.^o 6264 (1870); *Holdsæ P. Z. S.* 1872, p. 463; *Hume*, *Nest. & Egg. Ind. B.* p. 435 (1873); *Ball*, *Str. F.* 1874, p. 420; *Hume*, *Str. F.* 1870, p. 402; *Farib.* *Str. F.* 1877, p. 407; *Ball*, *Str. F.* vii, p. 221 (1878); *Legge*, *B. Ceylon*, p. 682 (1879); *Hume*, *Str. F.* 1879, p. 106; *Davison*, *Str. Fr.* 1883, p. 401; *Taylor*, *Str. F.* 1887, p. 461; *Terry*, *Str. F.* 1887, p. 478.
Hab. Paragua, Canigaran; Ceilan.

5. *M. javanicus*. *Osebeck*, *Sc. N. v. Trop.* (M. S. T.)

- Corvus javanensis*, *Osebeck Iter.* p. 102 (1757); *id. Voy.* (Engl. transl.), p. 157 (1771).
Gracula religiosa (*nece L.*), *Raffl. Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 393 (1820); *Gray*, *Gen. B.* ii, p. 330 (1854).
Eulabes javanensis, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 162 (1820).
Gracula religiosa, *Vieill. Gal. Ois.* i, p. 144, pl. 95 (1825).
Eulabes javanus, *Cuvier*, *Règne Anim.* i, p. 377 (1829).
Mainatus javanus, *Less.* *Traité*, p. 357 (1831).
M. sumatrana, *Less.* *Traité*, p. 357 (1831).
Gracula javanensis, *Blyth*, *J. A. S. Beng.* xv, p. 31 (1846); *id. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 107 (1849); *Bp. Consp.* i, p. 422 (1850); *Motley & Dillw. Nat. Hist. Labuan*, p. 25 (1855).
Schl. N. T. D. i, p. 5, pl. i, fig. 3 (1863); *Scl. P. Z. S.* 1863, p. 219; *Salvad. Ucc. Born.* p. 274 (1874); *Sharpe*, *P. Z. S.* 1875, p. 107; *Tweedd. Ibs.* 1877, p. 319; *Brüggem. Abhandl. nat. Ver. Bremen*, v, p. 401 (1877); *Sharpe*, *Ibis*, 1879, p. 262; *id. P. Z. S.* 1879, p. 349; *Salvad. Ann. Mus. Civit. Genov.* xiv, p. 138 (1879); *Nichols*, *Ibis*, 1881, p. 153; *Ketham*, t. c, p. 520; *Nichols*, *Ibis*, 1882, p. 63; 1883, p. 25; *Oates*, *B. Brit. Burm.* i, p. 393 (1883); *Snellem*, in *Veh. Midden-Sumatra Vog.* p. 43 (1844); *Büttik. Notes Leyden Mus.* ix, p. 71 (1887).
Gracula javana, *A. Hay*, *Madr. Journ.* xiii, pt. 2, p. 156 (1844); *Cab. Mus. Hein. Th.* i, p. 207 (1850); *Ball*, *Str. F.* 1874, p. 334.
Eulabes javanensis, *Horsf. & Moore*, *Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii, p. 524 (1856); *Moore*, *P. Z. S.* 1859, p. 444; *Stoliczka*, *J. A. S. Beng.* xxxix, p. 326 (1870); *Gray*, *Hand-l. B.* ii, p. 81, n.^o 6267 (1870); *Walden*, *Ibis*, 1871, p. 176; *Hume*, & *Davison*, *Str. F.* vi, p. 396 (1878, pt.); *Hume*, *Str. F.* 1879, pp. 66, 106; *Sharpe*, *Cat. B. M.* 13, p. 102 (1890).
Hab. Paragua, P. Princesa; Java, Borneo.

6. **M. palawanensis.** Sharpe. ♂♂ N. v. Tiao. (M. S. T.)

Gracula javanensis, (*ne* Osbeck), Sharpe, *Trans. Lin. Soc.* new. ser., i. p. 344 (1876); Tweedt. *P. Z. S.* 1878, p. 622; Sharpe, *Ibis*, 1884, p. 321; *Blassius, Ornith.* 1888, p. 415.
Eulabes javanensis, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 202.
M. palawanensis, Sharpe, *Cat. B. M.* 13, p. 104 (1890).
Hab. Paragua, P. Princesa, Inagáuan, Canigarán.

5. **Gén. MINO, Less.**

7. **M. dumonti** Less. ♂♂ N. v. Martin (M. S. T.)

Mino dumonti, Less. *Voy. Coquille, Zool.* i. p. 652, pl. 25 (1826); *Kittl. Kupf. Vög.* p. 9. Taf. xiii. fig. 1 (1833); *Salvad. Ann. Mus. Civit. Genov.* vii. p. 775 (1875), viii. p. 402 (1876), ix. p. 39 (1876), x. p. 150 (1877); *Salvad. P. Z. S.* 1878, p. 98; *D'Albert. & Salvad. Ann. Mus. Civit. Genov.* xiv. p. 93 (1879); *Salvad. op. cit.* vi. p. 195; *id. Orn. Papuasia, etc.* ii. p. 466 (1881); *id. Rep. Voy. H. M. S. «Challenger»*, ii. *Birds*, p. 81 (1881); Sharpe, *Cat. B. M.* 13, p. 111 (1890).
Mainatus dumonti, Lesson in *Férussac, Bull.* x. p. 159 (1828).
Gymnosp. dumonti, Cuvier, *Règne. Anim.* i. p. 381 (1829).
Gracula dumonti, Wagler, *Ibis*, 1829, p. 747; Müll. & Seel. *Verh. Land-en Volk.* p. 22 (1830-44); Gray, *Gen. B.* ii. p. 330 (1845); *Bp. Conspl.* i. p. 422 (1850), *ScL Proc. Linn. Soc.* ii. p. 164 (1858); Gray, *P. Z. S.* 1858, pp. 182, 194, 1859, p. 158; *id. Cat. B. New Guinea*, pp. 38, 59 (1859); *id. P. Z. S.* 1861, p. 436; *Schl. Nederl. Tijdschr.* i. p. 8, pl. i. fig. 8 (1863); Rosenb. *J. f. O.* 1864, p. 131; Finsch, *New-Guinea*, p. 174 (1865); Gray, *Hand-l. B.* ii. p. 48, n.º 6272 (1870); Ramsay, *Proc. Linn. Soc. N. S. W.* i. p. 592 (1876).
Eulabes dumonti, Sharpe, *Journ. Linn. Soc.* xiii. p. 82 (1876), p. 318 (1877), p. 508 (1877), xiv. p. 687 (1879); Ramsay *Proc. Linn. Soc. N. S. W.* iii. pp. 107, 279 (1878), iv. p. 99 (1879).
Hab. Molucas.

6. **Gen. APLONIS, GOULD.**

8. **A. pelzelni**, Finsch, N. v. (M. S. T.)

Aplonis pelzelni, Finsch, *P. Z. S.* 1875, p. 644; *id. Journ. Mus. Göd. gr. Heft.* xii. p. 32, pl. ii. fig. 3 (1876); *id. P. Z. S.* 1877, p. 779; *id. Ibis*, 1881, p. 110; Sharpe, *Cat. B. M.* 13, p. 136 (1890).
Hab. Ponapé, Carolinas.

9. **A. Khittlitzi**, Finsch. (M. S. T.)

? Pacific Shrike, *Lath. Gen. Syn.* i. pt. i. p. 164 (1871).
Lanius pacificus, Gm. *Syst. Nat.* i. p. 306 (1788, ex *Lath.*).
Turdus columbina (*ne* Gm.), Kittl. *Kupf. Vög.* p. 11, Taf. 15, fig. 2 (1833).

- Lamprotornis columbinus, (*nec Gm.*), *Bp. Conspl.* i. p. 417 (1850); *Hartl. J. f. O.* 1854, p. 168.
L. opaca, *Licht. in. Mus. Berol.*; *Cab. Mus. Hein. Th.* i. p. 201 (1850); *Licht. Nomencl. Av. Neot.* p. 53 (1854).
Calornis pacifica, *Gray. Cat. B. Tropical Isl. Pacific Ocean*, p. 25 (1859); *id. Hand-l. B.* ii. p. 27, n.º 6390 (1870).
C. opaca, *Gray. Cat. B. Tropical Isl.* p. 26 (1851); *Gray. Hand-l. B.* iii. p. 27, n.º 6391 (1870).
C. columbina, (*nec Gen. j.* *Pelz. Reis. Novara*, *Vög.* p. 88 (1881)).
C. kittlitzii, *Finsch. & Hartl. Faun. Centralepolyn.* p. 109 (1867); *Hartl. P. Z. S.* 1867, p. 380; *id. & Finsch. P. Z. S.* 1868, pp. 7, 117; *id. P. Z. S.* 1872, p. 100; *Finsch. Journ. Mus. Godeffr.* Heft. viii. p. 23 (1875); *Sharpe. Ibis.* 1876, p. 47; *Finsch. P. Z. S.* 1877, p. 779. *Sharpe Cat. B. M.* 13, p. 136 (1890).
C. pacificus, *Finsch. Journ. Mus. Godeffr.* Heft xii. p. 31 (1876); *id. P. Z. S.* 1880, p. 575; *id. Ibis.* 1881, p. 194; *id. Vög. der Südsee*, p. 49 (1884).
Hab. Ponapé, Carolinas.

7. Gén. CALORNIS, GRAY.

10. C. metallica, *Tro. N. v. Culagling.*

(M. S. T.)

- Lamprotornis metallica, *Temm. Pl. Col.* ii. pl. 266 (1824); *Less. Voy. Coquille*, i. p. 343 (1826); *Müll. Verh. Land-en Volkenk.* pp. 102, 110 (1839-44); *Bp. Conspl.* i. p. 417 (1850); *Jacq. et Pucher. Voy. Pôle Sud, Zool.* iii. p. 81 (1851); *Cass. Proc. Philad. Acad.* 1862, p. 313; *Finsch. Neu-Guinea* p. 184 (1863); *Cab. & Reichen. J. f. O.* 1876, p. 322.
Stourne bronzé, *Hombr. et Jacq. Voy. Pôle Sud, Atlas*, pl. 16, fig. 2 (1832-35).
Aplonis metallica, *Gould. B. Austr., Suppl.* pl. 33 (1851); *Macgillivray. Voy. «Rattlesnake»* ii. p. 351 (1852).
Calornis metallica, *Gray. Gen. B.* ii. p. 327 (1846); *Hartl. J. f. O.* 1854, p. 164; *Scl. Journ. Linn. Soc.* ii. p. 164 (1858); *Gray. P. Z. S.* 1858, p. 194; *id. Cat. Mamm. etc. New Guinea*, p. 59 (1859); *Wall. P. Z. S.* 1862, p. 335; *Gould. Handb. B. Austr.* i. 417 (1865); *Rosenb. Reis. naar Zuidoostereil.* p. 80 (1867); *Ramsay. P. Z. S.* 1868, 385; *Scl. P. Z. S.* 1879, i. 120; *Gray. Hand-l. B.* ii. p. 26, n.º 6376 (1870); *Walden. Trans. Z. S.* viii. p. 80 (1874); *Ramsay. P. Z. S.* 1875, p. 593; *Salvad. & D'Albert. Ann. Mus. Civit. Genov.* vii. p. 827 (1875); *Sharpe. Ibis.* 1876, p. 47; *Salvad. Ann. Mu. Civit. Genov.* viii. p. 402 (1876), ix. p. 38 (1876); *Briegg. Abhandl. nat. Ver. Bremen.* v. p. 78 (1876); *Masers. Proc. Linn. Soc. N. S. W.* i. p. 54 (1877); *Salvad. Ann. Mu. Civit. Genov.* x. p. 148 (1877); *id. P. Z. S.* 1878, pp. 88, 97; *Ramsey. Proc. Linn. Soc. N. S. II* iii. p. 107 (1878), p. 370 (1879) iv. pp. 77, 99 (1879); *Rasenb. Malay. Arch.* pp. 322, 370 (1879); *D'Albert. & Salvad. Ann. Mus. Civit. Genov.* xiv. p. 190 (1879); *Salvad. t. c. p. 656* (1879); *Tristr. Ibis.* 1879, p. 442; *L. C. Layard. Ibis.* 1880, p. 193; *Salvad. Ann. Mus. Civit. Genov.* xvi. p. 103 (1881); *id. Orn. Papuasia*, ii. p. 447 (1881);

- Blasius, J. f. O.* 1883, p. 160; *Meyer, Sitz. nat. Gesellsc^t.*
Isis, 1884, Abth. i. p. 48; *Finsch, Vög. der Sädsee*, p. 13
(1884); *id. t. c.* p. 36. *Sharpe, Cat. B. M.* 13, p. 138 (1890).
C. nitida, *Gray, P. Z. S.* 1858, p. 181; *id. Cat. Mamm., etc.*
New Guinea p. 38 (1859); *id. Cat. B. Trop. Isl. Pacific Ocean.*
p. 26 (1859); *id. Hand-l. B.* ii. p. 27, n.^o 6383 (1870); *Walden,*
Trans. Z. S. viii. p. 80 (1872); *Sharpe, Ibis.* 1876, p. 48;
Sci. P. Z. S. 1877, p. 104, 1878, p. 280; *Finsch, P. Z. S.*
1879, p. 11; *Layard, Ibis.* 1880, p. 295; *Finsch, Ibis.* 1881,
p. 537; *Tristram, Ibis.* 1882, p. 137.
C. viridescens, *Gray, P. Z. S.* 1851, p. 181 *id. P. Z. S.* 1861,
p. 436; *id. Hand-l. B.* ii. p. 26, n.^o 6378 (1870); *Walden,*
Trans. Z. S. viii. p. 80 (1874); *Sharpe, Ibis.* 1876, p. 47;
id. Journ. Linn. Soc. Zool. xiii. pp. 318, 501 (1877).
C. amboinensis, *Gray, P. Z. S.* 1858, p. 182; *id. Cat. Mamm.*
etc. New Guinea, p. 38 (1859); *id. P. Z. S.* 1860, p. 355;
Bernst. Nederl. Tijdschr. ii. p. 350 (1865); *Gray, Hand-l. B.*
ii. p. 27, n.^o 6382 (1870); *Walden, Trans. Z. S.* viii. p. 80
(1874); *Sharpe, Ibis.* 1876, p. 48; *Rosenb. Malay. Arch.*
p. 322 (1879).
C. virescens, *Gray, P. Z. S.* 1859, p. 158; *id. Cat. Mamm.*
etc. New Guinea, p. 59 (1859).
Lamprotornis virescens, *Rosenb. Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.*
xxv. p. 248 (1863); *id. J. f. O.* 1864, p. 131.
Calornis purpurascens, *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 26, n.^o 6377 (1870);
Walden, Trans. Z. S. viii. p. 80 (1874); *Sharpe, Ibis.* 1876,
p. 47.
Lamprotornis purpurascens, *Giebel, Thes. Orn.* ii. p. 430 (1875).
L. metallica, var. *nitida*, *North, Proc. Linn. Soc. N. S. W.*
(2) ii. p. 443 (1887).
Hab. Luzon, Cagayan, Pampanga; Molucas.

11 *C. chalybea*. (Horsf.) ♂ ♀ N v Culaglang. (M. S. T.)

- Turdus chalybeus*, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 148 (1820).
L. strigatus, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 148 (1820).
Lanius insularius, *Raffl. t. c.* p. 337 (1820).
Lamprotornis cantor, *Müll. Verh. Land-en Volkenk.* p. 174
(1830-44); *Bp. Conspl.* i. p. 416 (1850); *Licht. Nomencl.* p.
53 (1864).
L. chalybeus, *Eyton, P. Z. S.* 1839, p. 103.
Calornis cantor, *Blyth, J. A. S. Beng.* xiii. p. 366 (1844), xix.
p. 225 (1850); *id. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 111 (1849); *Sci.*
P. Z. S. 1863, p. 218; *Stoliczka, J. A. S. Beng.* xxxix. p.
326 (1870); *Walden, Ibis.* 1871, p. 176.
C. affinis, *A. Hay, J. A. S. Beng.* xv. p. 56 (1846); *Blyth, t. c.*
p. 369; *id. op. cit. xix.* p. 255 (1850); *id. Cat. B. Mus. As.*
Soc. p. 111 (1849); *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 27, n.^o 6381 (1870).
Blyth. & Walden, B. Biurm. p. 91 (1875); *Sharpe, Ibis.* 1876,
p. 46; *Hume, Str. F.* 1877, p. 38.
C. panayensis, *pt.*, *Gray, Gen. B.* ii. p. 327 (1846); *Motley &*
Dillw. Nat. Hist. Labuan, p. 56 (1856).
Lamprotornis affinis, *Bp. Conspl.* i. p. 416 (1850).
L. insidiator, *Cab. Mus. Hein. Th.* i. p. 201 (1850).

- Caloceras chalybea*, *Horsf.* & *Moore*, *Cat. B. Mus E. I. Co.* p. 543 (1856); *Moore*, *P. Z. S.* 1859, p. 445; *Gray*, *Handl. B.* ii, p. 26 n.^o 6374 (1870); *Walden*, *Trans. Z. S.* viii, p. 20 (1872); *Salvad. Ucc. Born.* p. 271 (1874); *Blyth* & *Walden* *Ibis*, Burm., p. 91 (1875); *Sharpe*, *Ibis*, 1879, p. 45, 1877, p. 21; *Tweedd. Ibis*, 1877, p. 318; *Hume* & *Davison*, *Str. F.* 1878, p. 394; *Hume*, *Str. F.* 1879, pp. 66, 106; *Nichols*, *Ibis*, 1879, p. 170; *Sharpe*, *P. Z. S.* 1879, p. 345; *id. Ibis*, 1879, p. 262; *Salvad. Ann. Mus. Civit. Genov.* xiv, p. 238 (1879); *Kelham*, *Ibis*, 1881, p. 519; *Nichols*, *Ibis*, 1882, p. 62; *Vorderm. N. T. Nederl. Ind.* xlili, p. 189 (1884); *Büttik. Notes Leyden Mus.* ix, p. 71 (1887); *Sharpe*, *Cat. B. M.* 13, p. 143 (1890).
C. insidiator, *Walden*, *Ibis*, 1872, p. 381.
Aplonis cantor, *Snellen. Expedit. Midden-Sumatra, Vogels*, p. 43 (1884).
C. inwini, *Hume*, *Str. F.* i, p. 481 (1873).
Hab. Luzón, Paragua, Sumatra, Java, Borneo.

12. **C. panayensis.** (*Scp.*) ♂♂ N. v. Culagling. (M. S. T.)

- Le Petit Merle ou Muscien de l'Isle Panay, *Sonn. Voy. N. Guin.* p. 115, pl. 73 (1770).
Muscicapa panayensis, *Scop. Del. Flor. et Faun. Insubr.* ii, p. 96 (1783).
Le Merle des Columbiers, *Montb. Hist. Nat. Ois.* iii, p. 381 (1775).
Sorgster thrush, *Iath. Gen. Syn.* ii, pt. i, p. 59 (1783).
Pigeon thrush, *Iath. t. c.* p. 64 (1813).
Turdus celurlinus, *Gm. S. N.* i, p. 836 (1888).
T. cantor, *Gm. S. N.* i, p. 837 (1888); *Kittl. Knüpf. Vög.* ii, p. 11; pl. 5, fig. 1 (1832).
Lanprotornis panayensis, *Cab. Mus. Hein. Th.* i, p. 200 (1850).
Calornis panayensis, *Gray*, *Handl. B.* ii, p. 26, n.^o 6373 (1870); *Walden* & *Layard*, *Ibis*, 1872, p. 97; *Walden*, *Trans. Z. S.* viii, p. 79 (1872); *Sharpe*, *Ibis*, 1876, p. 46; *id. Trans. Linn. Soc. 2nd ser. Zool.* i, p. 343 (1876); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, pp. 549, 763, 831; *id. P. Z. S.* 1878, pp. 113, 287, 343, 622, 710, 951; *id. P. Z. S.* 1879, p. 72; *Sharpe*, *Ibis*, 1884, p. 321; *Wardlaw Ramsay*, *Ibis*, 1886, p. 162; *Sharpe*, *Ibis*, 1888, p. 202; *Blassius. Ornis*, 1888, p. 315; *Sharpe*, *Cat. B. M.* 13, p. 148 (1890).
C. columbina, *Gray*, *Handl. B.* ii, p. 27, n.^o 6384 (1870).
Hab. Luzón, Cebú, Negros, Dumaguete, Panay, Amparo, Leyte, Camiguín, Bohol, Surigao, Zamboanga, Basilan, Paragua, Dinagat, Mindanao.

8. Gén. STREPTOCITTA, Br.

14. **St. torquata.** (*Temm.*) ♂♂ N. v. Martin. (M. S. T.)

- Garrula torquata*, *Temm. Pl. Col.* ii, pl. 444 (1828).
Pica torquata, *Gray*, *Handl. B.* ii, p. 11, n.^o 6180 (1870).
Streptocitta torquata, *Walden*, *Trans. Z. S.* viii, p. 76 (1874); *Brüggem. Abhandl. nat. Ver. Bremen*, v, p. 77 (1875); *Mey.*,

Ibis, 1879, pp. 133, 146; *id. Abbild. Vogel-Skel.* pl. xv. (1882); *Blasius Zeitschr. des Orn.* ii. p. 296, Taf. xiii. fig. 2 (1885); *Sharpe, Cat. B. M.* i. 1890, p. 152.
Hab. Paragua; Célebes.

9 Gén ENODFS, TEM.

15 E. erythrophrys, (*Ten.*) ♂♂ N. v. Piroc.

(M. S. T.)

Lamprotornis erythrophrys, *Temm. Pl. Col.* ii. pl. 267 (1824).
Enodes erythrophrys, *Temm. Pl. Col.* i. *Tabl. Méth.* p. 101 (1838); *Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 111 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 417 (1850); *Wallace, Ibis*, 1860, p. 141; *Walden, Trans. Z. S.* viii. p. 78 (1874); *Brüggem. Abhandl. nat. Ver. Bremen*, v. p. 77 (1876); *Meyer, Ibis*, 1879, p. 134; *Sharpe, Cat. B. M.* i. 1890, p. 192.
Calornis erythrophrys, *Gray, Gen. B.* ii. p. 327 (1846); *id. Handl. B.* ii. p. 27, n.º 6394 (1870).
Hab. Paragua; Célebes.

Fam. PLOCÉIDOS.

1. Gén. MUNIA, HODG.

1. M. oryzivora, (*Lin.*) ♂♂ N. v. Mayang costa.

(M. S. T.)

The Cock Padda or Rice bird, *Edwards, Nat. Hist. B.* i. p. 41, pl. 41 (1743).
Le Gros-bec cendré de la Chine, *Briss. Orn.* iii. p. 244, pl. xi. fig. 4 (1766).
Loxia oryzivora, *Linn. Syst. Nat.* i. p. 302 (1766); *Vieill. Ois. Chant.* p. 94, pi. lxi. (1805); *Raffl. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 314 (1820); *Hahn & Küster, Vog. ans Asien etc.* Lief. x. Taf. 3 (1821); *Schl. & Poll. Faun. Madag. Ois.* p. 154 (1868). Le pedda ou l'Oiseau de riz, *Buff. Hist. Nat. Ois.* iii. p. 463 (1775).
Le Calfat, *Buff. Hist. Nat. Ois.* iv. p. 371 (1778).
Grosbec de la Chine, *Daubent. Pt. Ent.* iv. pl. 152, fig. 1.
Java Grosbeak, *Lat. Gen. Syn.* ii. pt. i. p. 129 (1783).
Red-eyed Bunting, *Lath. t. c.* p. 210 (1783).
Emberiza caltat, *Gm. Syst. Nat.* i. p. 887 (1788).
Loxia javensis, *Gm. Syst. Nat.* i. p. 850 (1788); *Sparrm. Mus. Carls.* fasc. iv. pl. 89 (1789).
Coccothraustes oryzivora, *Vieill. N. Diet. d'Hist. Nat.* xiii. p. 545 (1817).
Fringilla oryzivora, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 861 (1820); *Swains. Zool. Illustr.* iii. pl. 156 (1882-23).
Anadina oryzivora, *Strickl. P. Z. S.* 1842, p. 167; *Blyth J. A. S. B.* xv. p. 285 (1846); *id. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 118 (1849); *Gray, Gen. B.* ii. p. 369 (1849); *id. Handl. B.* ii. p. 55, n.º 6770 (1870); *Hume, Str. F.* viii. pp. 67, 107 (1879).
Munia oryzivora, *Bp. Conspl. Av.* i. p. 451 (1850); *Stemh. Ibis*,

1861, p. 45; *E. Newton*, t. c. p. 115; *Scl. P. Z. S.* 1863, p. 219; *Hartl. P. Z. S.* 1867, p. 826; *id. Vög. Madth.* p. 404 (1877); *Shelley, Ibis*, 1886, p. 312; *Bartlett, Monogr. Weaver-B.* pt. i. (1888); *Sharpe, Cat. B. M.* 13. 1890, p. 32; *Oryzornis oryzivora*, *Cab. Mus. Hein.* i. p. 174. 1850, *id. i. Von der Decken's Re's.* iii. p. 30 (1869); *Finsch & Hartl. Vög. Ostafri.* p. 433 (1870); *Sharpe, Cat. Afr. B.* p. 68 (1871); *Padda oryzivora*, *Horsf. & Moor., Cat. B. E. I. Co. Mus.* ii. p. 504 (1856); *Moore, P. Z. S.* 1859, p. 443; *Reichenb. Sing.* p. 42, pl. xv. figs. 135-139 (1861); *Wall, P. Z. S.* 1863, p. 486; *Melliss, Ibis*, 1870, p. 100; *Swinh. P. Z. S.* 1879, p. 385; *Wald. Tr. Z. S.* viii p. (1872); *Hume, Nests & Eggs. Ind. B.* p. 454 (1873); *Stöcker, J. f. O.* 1874, p. 11; *Salvad. Ucc. Born* p. 293 (1874); *Walden, Tr. Z. S.* ix. p. 207 (1875); *Tweedd. Ibis*, 1877 p. 317; *David & Oustal. Ois. Chine*, p. 334 (1877); *Legge, Birds of Ceylon*, p. 646 (1879); *Messon, Ibis, yer. Ibis*, 1879, p. 132; *Sharpe, P. Z. S.* 1879, p. 344; *Nicholson, Ibis*, 1881, p. 153; *Forster, Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* xliv. p. 222 (1885); *slvi*. p. 87 (1887).
Padda verecunda, *Reichenb. Sing.* p. 41, *Taf. xv. fig. 153* (1861).
Oryzivora leucotis, *Jerd. B. Ind.* ii. p. 359 (1863).
Spermestes oryzivora, *Russ. Stubent.* p. 136. *Taf. viii. fig. 133* (1879).
Hab. Luzón, Manila, Mindanao.

2. **M. jagorii**, *Cab. ♂♂ N. v. Mayang paquing.* (M. S. I.)

Munia (Dermophrys) jagori, *Cab. in Mus. Berol.; Martens. J. f. O.* 1866, p. 14.
Dermophrys jagori, *Cab. J. f. O.* 1872, p. 316.
Amadina jagori, *Gray, Handl. B.* ii. p. 55, n.º 6766 (1870).
A. minuta, *Gray, t. c.* p. 55, n.º 6768 (1870).
Munia jagori, *Walden, Trans. Z. S.* ix. p. 207 (1875); *Salvad. Ann. Mus. Genov.* vii. p. 667 (1875); *Sharpe, Trans. Linn. Soc.* 2nd ser. i. p. 353 (1876); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, pp. 549. 690, 704; *id. P. Z. S.* 1878, pp. 288, 343, 710, 951; *id. Rep. Voy. «Challenger» Zool.* ii. p. 22 (1880); *Salvad. Ann. Mus. Genov.* xvi. p. 192 (1880); *id. Orn. Papurria etc.* ii. p. 347 (1881); *Wardlaw Ramsay, Tweeddale Mem.* p. 654 (1881); *Sharpe, Cat. B. M.* 13. p. 337 (1890).
Munia atricapilla, *(nec V.) Sharpe, Ibis*, 1888, p. 202.
Hab. Luzón, S. Mateo, Cebú, Leyte, Bohol, Valencia, Negros, Dumaguete, Butuan, Placer, Zamboanga, Mindanao, Paragui, Taguso.

3. **M. minuta**, *Meyer N v. Maya.* (M. S. T)

Fringilla minuta, *Meyer, N. Acta Acad. Cris. Leop.-Carol. Nat. Cur.* xvi. *Suppl.* p. 86, pl. xxii. fig. 2 (1834); *Martens, J. f. O.* 1866, p. 14.
Munia minuta, *Walden, Trans. Z. S.* ix. p. 208 (1877); *Sharpe, Cat. B. M.* 13. p. 337 (1890).
Ilib. Manila, Luzón.

4. **M. nisoria.**, (*Temm.*) N. v. Maya.

(M. S. T.)

Le Grosbec tacheté de Java, *Briss. Orn.* iii. p. 239, pl. xiii. fig. 2 (1760).

Loxia undulata, (*nec Müll.*), *Lath. Ind. Orn.* i. p. 387 (1790).

Fringilia punctularia, (*nec Gm.*), *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 161 (1820).

P. nisoria, *Temm. Pl. Col.* iii. pl. 500 fig. 2 (1830).

Amadina punctularia, (*nec Gm.*), *Hay. J. A. S. B.* xiv. p. 554, note (1845).

Oxycrex nisoria, *Gray. Gen. B.* iii. App. p. 10 (1849).

Munia punctularia, (*nec Gm.*) *Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 117 (1849); *Bp. Conspl. Av.* i. p. 452 (1850); *Horsf. & Moore. Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii. p. 665 (1856).

Amadina undulata, *Gray. Hand-l. B.* ii. p. 56, n.^o 6778 (1870).

A. nisoria, *Hume. Str. F.* viii. p. 66 (1876).

Lonchura undulata, *Vorderm. Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* xii. p. 224 (1885).

M. nisoria, *Sharpe. Cat. B. M.* 13. p. 352 (1890).
Hab. Luzón, Java.

5. **M. cabanisi.**, *Sharpe.* N. v. Mayang bulic.

(M. S. T.)

Uroloncha jagori, (*nec Munia jagori. Cab.*), *Cab. J. f. O.* 1877, p. 14.

Oxycrexa jagori, *Cab. J. f. O.* 1872, p. 317; *Walden. Trans. Z. S.* ix. p. 208 (1875); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 699.

M. cabanisi, *Sharpe. Cat. B. M.* 13. p. 353 (1890).
Hab. Luzón, S. Mateo, Montalban.

2. Gén. UROLONCHA, CAB.

6. **U. everetti**, (*Tw.*) N. v. Mayang bulic.

(M. S. T.)

Oxycrexa everetti, *Tweedd. Ann. & Mag. Nat. Hist.* (4) xx. p. 96 (1877); *id. P. Z. S.* 1877, pp. 699, 764, pl. lxxiii. fig. 2; *id. P. Z. S.* 1878, p. 622; *Sharpe. Ibis.* 1883, p. 202.

U. everetti, *Sharpe. Cat. B. M.* 83. p. 363 (1890).

Hab. Luzón S. Mateo, Montalban, Cebú, Paragua, P. Princesa.

7. **U. leueogastra**, *Blyth.* N. v. Maya.

(M. S. T.)

Amadina leucogastra, *Blyth. J. A. S. Beng.* xv. p. 286 (1846); *Gray. Gen. B.* ii. p. 379 (1849); *Hume. Str. F.* 1879, pp. 66, 107, 161; *Oates. Handb. Brit. Burm.* i. p. 367 (1883).

Munia melanictera, *Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 117 (1849); *Munia leucogastra*, *Horsf. & Moore. Cat. B. E. I. Co. Mus.* ii. p. 510 (1856); *Jerd. B. Ind.* ii. p. 359 (1863); *Savhad. Ucc. Born.* p. 267 (1874); *Hume. Str. F.* 1875, p. 323; *Davison. Str. F.* 1877, p. 460; *Hume. & Davison. Str. F.* iv. p. 492 (1878); *Vorderm. Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* xlvi. p. 234 (1887).

- M. chrysura, *Blyth. Ibis*, 1870, p. 172 (*ex MSS. Mus. Lugd.*);
Ocycreta leucogastra, *Tweed. Ann. & Nat. Hist.* (4) xx. p. 95
(1877); *id. P. Z. S.* 1878, p. 622.
U. leucogastra, *Sharpe. Cat. B. M.* 13. p. 362 (1890).
Hab. Paragua; Borneo.

3. Gén. ERYTHRURA, SPARR.

8. E. prasina (Sparr.) ♂ N. v. Maya.

(M. S. 1)

- Le Verdier de Java, *Briss. Orn.* iii. p. 108, pl. vii. fig. 4 (1760).
Le Quadricolor, *Buff. Hist. Nat. Ois.* iii. p. 467 (1775).
Le Toupet bleu, *Montb. Hist. Nat. Ois.* iv. p. 179 (1778).
Gros-bec de Java, *Daubent. Pl. Eul.* iv. pl. 101 fig. 2.
Red-rumped Bunting, *Lith. Gen. Syn.* ii. pt. i. p. 208 (1783).
Blue-faced Bunting, *Lith. Gen. Syn.* ii. pt. i. p. 209 (1783).
Loxia prasina, *Sparrm. Mus. Carls.* ii. pls. 72, 73 (1783); *Raffles. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 314 (1820); *Sundev. Crit. om. Sparrm.* p. 12 (1857).
Emberiza cyanopis, *Gm. Syst. Nat.* p. 886 (1788).
E. quadricolor, *Gm. Syst. Nat.* p. 886 (1788).
Coccothraustes prasina, *Vieill. N. Dict. d'Hist. Nat.* xiii. p. 537 (1817).
Fringilla prasina, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 161 (1820).
E. sphecura, *Tennm. Pl. Col.* iii. pl. 96. figs. 1-3 (1824).
Lochura quadricolor, *Sykes. P. Z. S.* 1832, p. 94.
Erythrura viridis, *Swains. Class. B.* ii. p. 280 (1837).
E. prasina, *Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 118 (1849).
Amadina prasina, *Gray. Gen. B.* ii. p. 370 (1849); *id. Handl. B.* ii. p. 58, n.º 6805 (1870).
Erythrura prasina, *Bp. Conspl. Av.* p. 457 (1850); *Horsf. & Moore. Cat. K. E. I. Co. Mus.* ii. p. 503 (1856); *Hartl. P. Z. S.* 1858, p. 461; *Reichenb. Singv.* p. 34, Taf. xi. figs. 99-101 (1861); *Salvad. Ucc. Born.* p. 201 (1874); *Hume. Str. F.* 1875, p. 323; *Sharpe. Ibis*, 1876, p. 50; *Hume. & Davison. Str. F.* vi. p. 405 (1878); *Nicholson. Ibis* 1879, p. 170; *Sharpe. t. c.* p. 262; *Hume. Str. F.* viii. pp. 67, 107, ix. p. 121 (1881); *Sci. Ibis*, 1881, p. 545; *Nicholson. Ibis*, 1882, p. 63; *Vorderm. Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* xlvi. p. 106 (1884), xlvi. p. 254 (1887); *Sharpe. Ibis*, 1889, p. 435. *id. Cat. B. M.* 13. p. 381. (1890).
Hab. Luzón, Pampanga; Borneo, Java, Sumatra.

9. E. trichroa, Kittl. N. v.

- Fringilla trichroa*, *Kittl. Mem. Acad. St. Petersb.* id. p. 8, pl. 10 (1835).
Estrelida trichura, *Gray. Gen. B.* ii. p. 309 (1849).
Erythrura trichura, *Bp. Conspl. Av.* i. p. 457 (1850); *Hartl. P. Z. S.* 1858, p. 461; *Reichenb. Singv.* p. 33, pl. xi. fig. 95 (1861); *Sci. P. Z. S.* 1870, p. 158; *Meyer. Sitz. k. Akad. Wien.* lxx. p. 127 (1874); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Genov.* xvi. p. 192 (1880); *Finsch. P. Z. S.* 1880, p. 576; *id. J. f. O.* 1880, p. 290; *id. Ibis*, 1881, pp. 108, 115; *Sci. Ibis*, 1881,

- p. 545; *Salvad. Orn. Pap.* ii. p. 442 (1881); *id. Ibis*, 1884, p. 354; *Gullem. P. Z. S.* 1885, p. 573; *Grant, P. Z. S.* 1888, p. 197; *Sharpe, Cat. B. M.* 13. p. 385 (1890).
E. kittlitzii, *Bp. Conspl. Av.* i. p. 457; *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 58, n.^o 6084 (1870).
Esurelda trichroa, *Gray, Cat. B. Trop. Isl.* p. 27 (1859).
Erythrura molesta, *Wall. P. Z. S.* 1862, p. 351.
Amadina modesta, *Finsch. Neu-Ginea*, p. 170 (1865).
Erythrura phoenicea, *Bernst. Nederl. Tydschr. Dierk.* ii. p. 331 (1865).
Amadina trichroa, *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 58 n.^o 6806 (1870); *Rosenb. Reistrocht. Geelbinteb.* p. 7 (1875); *id. Malay. Archip.* p. 405 (1879).
Erythrura glauca, *Finsch. Journ. Mus. Goddeffr.* xiii. p. 36 (1876).
E. sp. inc., *Finsch. P. Z. S.* 1877, p. 779.
Hab. Carolinas; Molucas.

4 Gén. PLOCEUS, Cuv.

10 **P. baya**, Blyth. N. v. Maya.

(M S T.)

- Le Grosbec des Philippines, *Briss. Orn.* iii. 1760, p. 232, pl. xii. fig. (♂), pl. xviii. figs. 1, 2 *Daubent. Pl. Ent.* iv. pl. 135. fig. 2.
Loxia philippina, *Linn. Syst. Nat.* i. p. 305 (1766).
Le Toucnaï-courvi, *Buff. Hist. Nat. Ois.* iii. p. 465 (1775).
Philippine Grosbeak, *Lath. Gen. Syn.* ii. pt. i. p. 120 (1783).
Ploceus philippinus, *Cuv. Régne An.* i. p. 363 (1817); *Sykes, P. Z. S.* 1832, p. 94; *Gray, Gen. B.* ii. p. 252 (1849); *Blyth, Cat. B.* p. 115 (1849); *Layard, Ann. & Mag. N. H.* (2) xiii. p. 256 (1854); *Reid, Str. F.* v. p. 54; *Davidson, t. c.* p. 312; *Davison, t. c.* p. 402; *Taylor, t. c.* p. 462; *Ball, Str. F.* viii. p. 22; *Legge, B. Ceylon*, p. 641 (1879); *Hume, Str. F.* 1879, p. 106; *Butler, Cat. B. Sind &c.* p. 45 (1879); *id. Cat. B. S. Bomb. Pres.* p. 60 (1880); *Vidal, Str. F.* ix. p. 71 (1880); *Davidson, & Wenden, t. c.* p. 415; *Swinh. & Barnes, Ibis*, 1885, p. 128; *Vidal, Str. F.* ix. p. 71 (1880); *Reid, Str. F.* x. p. 54 (1881); *Davidson & Wenden, t. c.* p. 312; (1882); *Davison, t. c.* p. 402; *Taylor, t. c.* p. 462.
Euplectes philippinus, *Jerd. Madr. Journ.* xi. p. 25 (1840); *Blyth, J. A. S. Beng.* xi. pp. 871, 889 (1842).
Ploceus baya, *Blyth, J. A. S. Beng.* xiii. p. 945 (1844); *Bp. Conspl.* i. p. 442 (1850); *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii. p. 515 (1850); *Jerd. B. Ind.* ii. p. 343 (1863). *Stoliczka, J. A. S. Beng.* xli. p. 246 (1875); *King, J. A. S. Beng.* xxxvii. p. 215 (1868); *Holdsw. P. Z. S.* 1872, p. 463; *Hume, Nests & Eggs Ind. B.* p. 346 (1873); *Adam, Str. F.* 1873, p. 387; *Hume, Str. F.* 1874, p. 481; *Ball, t. c.* p. 420; *Butler & Hume, Str. F.* 1875; *Butler, Str. F.* 1876, p. 39; *Fairb. t. c.* p. 260; *Hume, Str. F.* 1877, p. 323; *Walden, Tr. Z. S.* ix. p. 269 (1875); *Scully, Str. F.* 1879, p. 331; *Sharpe, Cat. B.* 13. p. 488, (1890).
P. bengalensis, (nec L.), *Sundev. Ann. & Mag. Nat. Hist.* xviii. p. 260 (1846).

- Euplectes baya*, *Jerd. Madr. Joarn.* xiii, p. 134 (1844).
Nelicurvius fuscicollis, *Reichenb. Singv.* p. 75, Taf. xxxiii. figs. 263-265 (1861).
Ploceus fuscicollis, *Reichenb. Zool. Jahrb.* i, p. 156 (1886).
Hab. Luzón, Abra, Cagayan, Pamplona; Ceilan.

11. **P. atrigula**, *Hodgs. N. v. Maya.*

(M. S. T.)

- Ploceus atrigula*, *Hodgs. Icon. ined. in Brit. Mus. Passeres*, pl. 278, figs. 1, 2 (n.^o 743); *id. in Gray's Zool. Misc.* p. 84 (1844); *Sharpe, Cat. B. M.* 13, p. 491 (1890).
P. passerinus, *Hodgs. Icon. ined. in Bibl. Zool. Soc. Passeres*, pl. 277, fig. 3 (n.^o 70); *Reichenb. Zool. Jahrb.* i, p. 156 (1886).
Nelicurvius baya, *Reichenb. Singv.* p. 76, Taf. xxxiv. figs. 266-268 (1861).
P. baya, (*nec* *Blyth*), *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii, p. 515 (1850, pt.); *Godwin-Austen, J. A. S. B.* xxxix, p. 810 (1870); *Blasf. op. cit.* xli, p. 167 (1872); *Hume, Str. F.* 1875, p. 153; *Blyth & Wald. B. Burm.* p. 92 (1875); *Audens, Rep. Zool. Exped. Yunnan, Aves*, p. 597 (1878); *Hume, Str. F.* 1878, p. 106; *id. Str. F.* ix, p. 257 (1880); *Oates, Handb. B. Br. B.* i, p. 358 (1883); *Vorderm. Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* xlii, p. 84 (1883).
Ploceus philippinus (*nec* *Linn.*), *Hume & Davison, Str. F.* vii, p. 399 (1874).
P. megarhynchus, *Hume, Str. F.* 1875, p. 406, 1878, p. 400, 1879, p. 106.
Hab. Luzón, Bataan, Hermosa, Pampanga, S. Fernando, Arayat; Java, Sumatra.

Gen. PLOCEELLA, OATES.

12. **P. javanensis**, (*Less.*) N. v. Maya

(M. S. T.)

- Fringilla philippina*, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 160 (1820).
Loxia philippina, *Raffl. Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 313 (1820).
L. javanensis, *Less. Traité*, p. 446 (1831).
Ploceus philippinus, (*nec* *Less.*), *Blyth, J. A. S. Beng.* xiii, p. 945 (1843); *id. Ibis*, 1867, p. 49.
P. hypoxanthus, *Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 114 (1849) *Bp. Conspl. Av.* i, p. 443 (1850); *Cab. Mus. Hein. Th.* i, p. 18 (1850); *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii, p. 513 (1856); *Gray, Hand-l. B.* ii, p. 44, n.^o 6613 (1870); *Hume, Nests & Eggs Ind. B.* p. 442 (1873); *id. Str. F.* iii, p. 154 (1875); *Vorderm. Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* xlii, p. 85 (1883); *Reichenb. Zool. Jahrb.* i, p. 161 (1886).
Ploceolus hypoxanthus, *Reichenb. Singv.* p. 77, Taf. xxxv. figs. 277, 278 (1861).
Ploceella javanensis, *Oates in Hume's Nests & Eggs Ind. B.* p. 443 (1873); *id. Str. F.* v, p. 160 (1877); *id. ibid.* x, p. 231 (1887); *Hume, F.* viii, p. 107 (1879); *Oates, Handb. B. Brit. Burm.* i, p. 362 (1883); *Sharpe, Cat. B. M.* 13, p. 474 (1890).
Ploceus javanicus, *Wald. Tr. Z. S.* ix, p. 210 note (1875); *Blyth & Wald. B. Burm.* p. 91 (1875).

*

P. chrysæus, *Hume*, *Str. F.* vi. p. 399, note (1878).
Hab. Luzón, Cavite, Indian; Java.

Fam. ALAUDIDOS.

1. Gén. MELANOCORYPHA, BOIE.

1. **M. calandra**, (*Lin.*) ♂ N. v. Calandria. (M. S. T.)

Alauda calandra, *Lin. S. N.* i. p. 288; *Sharpe*, *Cat. B. M.* i. p. 551 (1890).

La calandre, *Daub. Pl. Col.* pl. 363, f. 2.
Hab. Europa, España.

2. Gen ALAUDA, LIN.

2. **A. gulgula**, *Frankl.* ♂ N. v. Lalac bungā (M. S. T.)

Alauda gulgula, *Frankl. P. Z. S.* 1838, p. 119; *Jerd. Madr. Journ.* xi. p. 30 (1840); *Blyth, J. A. S. Beng.* xiii. p. 962 (1844); *id. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 132 (1849, pt.); *Bp. Consپ. i.* p. 245; *Jerd. B. Ind.* ii. p. 434 (1863); *Stoliczka, J. A. S. Beng.* xxxvii. p. 64 (1868); *King. t. c.* p. 216; *Beav. Ibis.* 1868, p. 181; *Brooks, Ibis*, 1869, p. 59; *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 117, n.º 7746 (1870); *Holdsw. P. Z. S.* 1872, p. 465; *Hume & Henders. Lahore to Yark.* p. 269, pl. 29 (1873); *Hume Nest & Eggs Ind. B.* p. 486 (1873); *id. Str. F.* i. pp. 39, 420 (1873); *Adam t. c.* p. 389; *Brooks, t. c.* p. 485; *Blyth & Wald. B. Burm.* p. 95 (1875); *Brooks, Ibis*, 1876, p. 499; *Butler, Str. F.* iv. pp. 2, 30 (1876); *Arms! t. c.* p. 337; *Godwin-Aust. J. A. S. Beng.* xlvi. p. 83 (1876); *Butler, Str. F.* v. p. 185 (1877); *Batt, t. c.* p. 223; *Hume & Davison, Str. F.* vi. p. 409; (1878); *Davids. & Wenden, Str. F.* vii. p. 86 (1878); *Legge, B. Ceylon*, p. 630 (1879); *Hume, Str. F.* viii. p. 108 (1879); *Scully, t. c.* p. 330; *Vidal, Str. F.* ix. p. 73 (1880); *Wardlaw Ramsay, Ibis*, 1880, p. 67; *C. Swinh. Ibis*, 1882, p. 116; *Reid, Str. F.* x. p. 58 (1883); *Davison, t. c.* p. 406; *Vidal, t. c.* p. 424; *Oates, Handb. B. Br. Burm.* i. p. 373 (1583); *Murray, Vertebr. Faun. Sind.* p. 197 (1884); *Swinh. & Barnes, Ibis*, 1885, p. 130; *Terry, Str. F.* x. p. 478 (1887); *Hume, Str. F.* xi. p. 289 (1888); *Sharpe, Cat. B. M.* i. 3, p. 575 (1890).

A. triborhyncha, *Hodgs. Icon. ined. in Brit. Mus., Passeres*, pl. 293, fig. 2 (n.º 739); *id. in Gray's Zool. Misc.* p. 84 (1844); *Gray, Cat. Mamm. &c. Nepal pres. Hodgs.* p. 109 (1846); *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii. p. 467 (1856, pt.); *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 117, n.º 7745 (1870).
A. gracilis, *Blyth, J. A. S. Beng.* xi. p. 201 (1842).
A. gangetica, *Blyth, J. A. S. Beng.* xiii. p. 181 (1843).
A. cristata, (pt.); *Gray, Gen. B.* ii. p. 380 (1844).
A. malabarica, (nec Sykes), *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii. p. 467 (1856).
A. cœlivox, *Swinh. Zool.* 1839, p. 6723; *id. Ibis*, 1860, pp. 52,

- 132, 1861, p. 46; 1863, p. 377; *id.* *P. Z. S.* 1863, pp. 89, 272; *id. Ibis*, 1870, p. 83; *Gray, Hand-l. B.* ii, p. 118, n.^o 7753 (1870); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 389; *David & Oust. Ois. Chine*, p. 314 (1871).
A. sala, *Swinh. Ibis*, 1870, p. 355; *id. P. Z. S.* 1871, p. 389; *David & Oust. Ois. Chine*, p. 314 (1871).
A. wattersi, *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 389; *David & Oust. Ois. Chine*, p. 314 (1871); *Tweed. P. Z. S.* 1873, p. 710; *Wardlaw Ramsay, Ibis*, 1886, p. 160.
A. australis, *Brooks, Str. F.* 1873, p. 484; *Hume, Str. F.* 1870, p. 108; *Brooks, t. c.* p. 489; *Terry, Str. F.* x, p. 479 (1887).
A. peguensis, *Oates, Str. F.* 1875, p. 343.
Hab. Luzón, Manila, Bohol; Formosa.

3. Gén. MIRAFRA, *Horsf.*

3. **M. javanica**, (*Horsf.*) ♂ N. v. Pugaput. (M. S. T.)

- M. javanica*, *Horsf. Tr. Lin. Soc.* xiii, p. 159 (1820); *Gray, Gen. B.* ii, p. 383 (1844); *Bp. Conspl.* i, p. 243 (1850); *Blyth, J. A. S. Beng.* xxiv, p. 255 (1855); *Horsf. et Moore, Cat. B. Mus. B. I. Co.* li, 1856, p. 474; *Gray, Hand-l. B.* ii, 1870, p. 121, n.^o 7796; *Satz. Ucc. Born.* 1874, p. 262; *Nich. Ibis*, 1881, p. 154; *Vord. Nat. Tijds. Ned. Ind.* xlili, 1884, p. 107, xlvi, 1887, p. 234; *Sharpe, Cat. B. M.* 13, p. 602 (1890).
Alauda mirastra, *Tem. Pl. Col.* iii, pl. 305, f. 2 (1824).
Geocoraphus javanicus, *Cab. Arch. f. Natur.* 1847, p. 328; *id. Mus. Hem.* i, p. 126 (1850).
M. borneensis, *Swinh. Au. et Mag. N. Hist.* viii, 1871, p. 257; *Satz. Ucc. Born.* 1874, p. 263; *Vord. Nat. Tijds. Ned. Ind.* xlvi, 1887, 234.
Hab. Samar, Borongan, Paric; Java, Borneo.

4. **M. philippinensis**, *Wardl. ♂ N. v. Pogapug.* (M. S. T.)

- Mirastra philippinensis*, *Wardlaw Ramsay, Ibis*, 1886, p. 160; *Sharpe, Cat. B. M.* 13, p. 605 (1890).
Hab. Luzón, Manila, Laguna.

Fam. TIRÁNIDOS.

1. Gén. TODIROSTRUM, LESS.

1. **T. schistaceips**, *Scl. ♂ N. v.* (M. S. T.)

- T. schitaceiceps*, *Sclater, Ibis*, 1859, p. 444; *id. Cat. B. M.* 14, p. 208; *id. Cat. B. M.* 14, p. 74 (1888).
Hab. América, Guatemala,

2. Gén. LEGATUS, SCH.

2. **L. albicollis**, (*Viell.*) ♂ N. v. (M. S. T.)

- Barbichon de Cayenne*, ♂, *Daub. Pl. Ent.* 83, fig. 2.

L. albicollis, *Sclater*, *P. Z. S.* 1859, p. 46; *id. Cat. B. M.* 14, p. 155 (1888).
Hab. América, Guatemala.

3. Gén. MYODINASTES, Bp.

3. **M. luteiventris**, *Bp.* ♂ N. v. (M. S. T.)

Tyrannus audax, *Sclater*, *P. Z. S.* 1856, p. 297.
M. luteiventer, *Bp. Compt. Reud.* xxviii. p. 650; *Sclater*, *Cat. B. M.* 14 p. 183 (1888).
Hab. América, Guatemala.

4. Gén. MEGARHYNCHIUS, THUME.

4. **M. pitangua**, *Lin.* N. v. (M. S. T.)

Lanius pitangua, *Lin. S. N.* i. p. 136.
M. pitangua, *Hein. J. f. O.* 1859 p. 343; *Sclater*, *Cat. B. M.* 14, p. 190. (1888).
Hab. América, Guatemala.

5. Gén. MYOBIUS, GRAY.

5. **M. sulphureipygius**, *Scl.* ♂ N. v. (M. S. T.)

Tyrannula sulphureipygia, *Scl. P. Z. S.* 1856, p. 296.
M. sulphureipygius, *Scl. Cat. B. M.* 14. p. 200. (1888).
Hab. América, Guatemala.

6. Gén. MYARCHUS, CAB.

6. **M. lawrencii**, *Gir.* ♂ N. v. (M. S. T.)

Muscicapa lawrencii, *Girad.*, *B. of. Texas.* 1841, pl. 2, f. 1.
M. lawrencii, *Scl. Cat. B. M.* 14. p. 256 (1888).
Hab. América, Guatemala.

7. Gén. TYRANNUS, CUV.

7. **T. pipiri**, *Vieill.* ♀ N. v. Tirano intrépido. (M. S. T.)

Lanius tyrannus, *Lin. S. N.* i. p. 136, (parte) *varr* carolinensis,
Gm. S. N. i. p. 302.
T. pipiri, *Vieill.* *Ois. Am.* Sept. i. p. 73 pl. 44; *Scl. Cat. B. M.* 14. p. 267 (1888).
Hab. América, Canadá.

Fam. TÍPRIDOS.

1. Gén. CHIROXIPHIA, BAB.

1. **Ch. caudata**, *Shaw*. ♂ N. v. (M. S. T.)

Pipra candata, *Ch. Shaw*, *Nat. Mis.* v. pl. 153 (1794).

Ch. candaei, *Crb. Wieg.* Arch. 1847, i. p. 235; *Bb. Corp.* i. p. 171; *Scl. Cat. B. M.* 14. p. 318 (1888).
Hab. América, Canadá.

2. Gén. CHIROMACHÆRIS, CAB.

2. Ch. candæi, *Parz.* ♂ ♀ N. v. (M. S. T.)

Pipra candæi, *Parzud. Rev. Zool.* 1841, p. 306.
Ch. candæi, *Cab. et Heine, Mus. Hein.* ii. p. 97; *Scl. Cat. B. M.* 14. p. 314 (1888).
Hab. América, Guatemala.

Fam. COTÍNGIDOS.

1. Gén. PACHYRHAMPHUS, GRAY.

1. P. major, *Sclat.* ♂ ♀ N. v. (M. S. T.)

P. major, *Scl. Cat. B. M.* 14. p. 346 (1888).
Hab. América, Guatemala.

2. Gén. LIPAUGUS, BOIE.

2. L. holerythrus, ♂ *Scl.* N. v. (M. S. T.)

L. holerythrus, *Scl. et Salv. P. Z. S.* 1860 p. 300; *Scl. Cat. B. M.* 14. p. 357 (1888).
Hab. América, Vera-Paz.

3. Gén. RUPICOLA, BRIS.

3. R. peruviana (*Lath.*) ♂ N. v. Gallo de peñasco. (M. S. T.)

Pipra rupicola, var. *Gm. S. N.* i. p. 998.
R. peruviana, *Scl. Cat. B. M.* 14. p. 370. (1888).
Hab. América, Perú.

4. Gen. XIPHOLÆNA, GLOG.

4. X. pompadoura, (*Lin.*) ♂ N. v. Cotinga purpurea. (M. S. T.)

Ampelis pompadoura, *Lin. S. N.* i. p. 218.
Cotinga pourpre de Cayenne, *Daub. Pl. Ent.* 279.
X. pompadoura, *Scl. Cat. B. M.* 14. p. 387 (1888).
Hab. América, Cayena.

Fam. PITIDOS.

1. Gén. PITTA, VIEILL.

1. **Pitta cyanoptera**, Temm. ♂♂ N. v. Uac-uac. (M. S. T.)

Merle des Moluques, Daub. Pl. Enl. 257.

Turdus moluccensis, P. L. S. Müll. Natursyst., Suppl. p. 144 (1776).

T. macrourus fasciatus, Bodd. Table d. Pl. Enl. p. 16 (1783).

Corvus brachyurus, var. d. madagascariensis, Gm. S. N. i. p. 376. (1785).

Myiothera brachyura, Raft. Trans. Minn. Soc. xiii. p. 300 (1822).

Pitta cyanoptera, Temm. Pl. Coll. 218 (1823); Vig. Mem. Russl. p. 659, (1830); Less. Tr. d'Orn. p. 394 (1831), Müll. et Schl. Verh. Zool. Pitta, pp. 7, 17; G. R. Gray, Gen. B. i. p. 213; Low, Sarawak, p. 410; Blyth. Cat. Mus. A. S. p. 157; Moore, P. Z. S. 1854, p. 274; Horsf. et Moore, Cat. B. Mus. E. I. C. i. p. 183; Mottl. et Dillw. Contr. Nat. Hist. Labuan, p. 22, Schlegel, Vog. Ned. ind. Pitta, pp. 9, 32, pl. 4 fig. 1 (1863); id. Mus. de Pays, Bas. Pitta, p. 9. (1863). et p. 15 (1874); Wallace, Ibis, 1864, pp. 105, 110; Walden, P. Z. S. 1866, p. 545; Beavan Ibis, 1870, p. 322; Salvador, Ibis, 1871, p. 248; id. Att. R. A. Sc. Tor. ix. p. 631; id. Ucc. d. Borneo, p. 235; Sharpe, Ibis, p. 262 Nicholson, Ibis, 1883, p. 88, Sel. Cat. B. M. 14. p. 420 (1888).

Coloburis cyanoptera, Cab. et Hein. Mus. Hein. v. i. p. 4.

Pitta malaccensis, Blyth, J. A. S. B. xii. p. 960 (1843).

Brachyurus malaccensis, Bp. Conspl. i. p. 254.

Coloburis malaccensis, Cab. et Hein. Mus. Hein. ii. p. 4.

Brachyurus cyanopterus, Blyth, J. A. S. B. xvi. p. 153. (1847); Bp. Conspl. i. p. 254; id. Conspl. Vol. Anisod. p. 7; Elliot, Mon. Pitt., pl. iv.

Pitta nympha, Swinh. Ibis, 1861, pp. 412, 414; id. P. Z. S. 1863, p. 277.

P. moluccensis, Swinh. P. Z. S. 1871, p. 374; Oates, Str. Feath. v. p. 149; id. B. Brit. Burm. i. p. 415, Hume et Dav. Str. Feath. vi. p. p. 240; Hume, Str. Feath. viii. p. 94; Kelham, Ibis, 1881, p. 509; David et Oast O's. d. Chine, p. 144.

Brachyurus moluccensis, Elliot. Ibis, 1880, p. 413; Hume, Str. Feath. iii. p. 106; Blyth. et Walden, B. Burma, p. 98; Sharpe, Ibis, 1877, p. 10.

Hab. Samar, Borongan; Borneo, China.

2. **Pitta erythrogaster**, Temm. ♂♂ Liocn. (M. S. T.)

Pitta erythrogaster, Temm. Pl. Col. 212 (1823); Less. Tr. d. Orn. p. 394; Mull. & Schl. Verh. Zool. Pitta. p. 18; Blyth. Cat. B. Mus. A. S. B. p. 157; Gray, Gen. B. i. p. 213; Schleg. Mus. P. B. Pitta, p. 8 (1863); et p. 12 (1874); Ibis, 1864, p. 106; Wardl. Ramsay, Ibis, 1884, p. 334; Sel. Cat. B. M. 14. p. 432 (1888).

Brachyurus erythrogaster, *Bp.* *Consp.* i. p. 255; *Elliott*, *Mon. Pitt.* pl. xvii; *id. Ibis*, 1870, p. 417.

Calburus erythrogaster, *Cib.* *et Hein.* *Mus. Hein.* ii. p. 5.

Erythropitta erythrogaster, *Bp.* *Consp. Vol. Anisnd.* p. 7; *Walden*, *Trans. Zool. Soc.* ix. p. ix, p. 187; *id. P. Z. S.* 1877, p. 50, 1878, p. 948, et 1879, p. 71; *Wardl. Rimsby*, *Tweedt. Mem. App.* p. 657.

Hab. Luzón, L. guna, Mindoro, Marinluque, Guimaras, Zamboanga, Mindanao, Basilan.

3. *P. propinquus*, *Sharpe*, ♂♂ N. v. Ucawas. (M. S. T.)

Brachyurus propinquus, *Sharpe*, *Trans. Linn. Soc. ser. 2. Zool.* i. p. 330.

P. propinquus, *Sclat. Cat. B. M.* 14. p. 433 (1888).
Hab. Sanar, Dumanon, Mindanao.

4. *P. Kochi*, *Brug.* ♂♂ N. v. Lioco. (M. S. T.)

Pittakochi, *Brüggem. Abhandl. nr. 1. Ver. Bremen*, v. p. 65, pl. iii. f. 6; *Ostl. Bull. Soc. Phil.* ser. 7. vi. p. 256; *Gould*, *P. Asia*, v. pl. 71; *Sel. Cat. B. M.* 14. p. 433 (1888).

Erythropitta kochi, *Tw. P. Z. S.* 1871, p. 435, pl. xxvi.
Hab. Luzón, Cagayan, Alcalá, Bataan, Orión.

5. *P. mackloti*, *Tem.* ♂ N. v. (M. S. T.)

Pitta Mackloti, *Temm. Pl. Col.* 547 (1834); *Müll. & Schleg.* *Verh. Zool. Pitta*, pp. 12, 18; *Gray*, *Gen. B.* i. p. 213; *id. P. Z. S.* 1858, p. 175, 1859, p. 155, 1891, p. 434; *id. Cat. B. New Guinea*, p. 26; *Selat. Proc. Linn. Soc.* ii. p. 158; *id. P. Z. S.* 1877, p. 99; *Schleg. Vog. Ned. Ind. Pitta*, p. 15, pl. 4 fig. 3; *id. Mus. P.-B. Pitti*, p. 7, (1863) et p. 10, 1874; *id. Ned. Tijdschr.* iii. pp. 188, 189; *Wallace*, *Ibis*, 1864, pp. 102, 105, 106; *Krefft*, *P. Z. S.* 1897, p. 31 (Cape York); *Gould*, *Suppl. B. Austria*, pl. 29; *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gorizia*, vii. p. 778, x. p. 128, xiv. p. 650, x i. p. 185; *id. Ibis*, 1879, p. 324; *id. Orn. Pap.* ii. p. 395; *Ramsay*, *Proc. Linn. Soc. N. S. W.* ii. p. 187, iii. p. 277, iv. p. 98; *Guillemaud*, *P. Z. S.* 1885, p. 643; *Nehrkorn*, *J. f. O.* 1885, p. 33; *Sclat. Cat. B. M.* 14. p. 436 (1888).

Brachyurus mackloti, *Bp.* *Consp. Vol. Anisnd.* p. 7; *Gray*, *Hand-l.* i. p. 296.

Brachyurus (Erythropitta) mackloti, *Elliott*, *Mon. Pitti.* pl. 21.

Pitta diggesi, *Krefft*, *Ibis*, 1869, p. 350.

P. strenua, *Gould*, *M. S.*; *Elliott*, *Ibis*, 1870, p. 410.

P. novae-hiberniae, *Ramsay*, *Proc. Linn. Soc. N. S. W.* iii. p. 73 (*cf. Salvad. Ibis*, 1879, p. 324.)

Hab. Australia, Nueva-Bretaña.

6. *P. atricapilla* *Bris.* N. v. ♂♂ *Uasua*.

(M. S. T.)

- Merula viridis atricapilla moluccensis*, *Briss. Orn.* ii, p. 319 (?).
Merle des Philippines, *Daub. Pl. Ent.* 89?
Breve des Philippines, *Buff. Hist. Nat. O's.* iii, p. 312 (?).
Turdus sordidus, *P. L. S. Müller*, *Naturhist. Suppl.* p. 143.
n.^o 51 (1776)?
Turdus brevicauda, *Bodd. Tabl. d. Pl. Ent.* p. 6 (1783)?
avus brachyurus, var. *B. philippensis*, *Gm. S. V.* i, p. 375 (?).
Citta melanoecephala, *Wolg. Syst. Av. Corvus*, n.^o 14 (1827).
Pitta atricapilla, *Less. Tr. d'Orn.* p. 394 (1834); *id. Compl. d. Buffon*, p. 501 (1848); *Temm. Pl. Col. Tab. Meth.* p. 16 (1832).
Gray. Gen. B. i, p. 214; *Gould. B. Asia*, v, pl. 76; *Sel. Cat. B. M.* 14, p. 438 (1888).
Brachyurus atricapillus, *Bp. Conspl.* i, p. 256; *Elliot. Mon. Pitt.* pl. xxv.
Melanopitta atricapilla, *Bp. Conspl. Vol. Anisod.* p. 7.
Coloburis brevicauda, *Cab. et Hein.* ii, p. 5.
Melanopitta sordida, *Tweed. P. Z. S.* 1878, p. 949; *id. Trans. Zool. Soc.* ix, pp. 187, 250; *Wardl. Ramsay. Tweed. Mem. Alpp.* p. 657.
Brachyurus sordidus, *Sharpe. Trans. Linn. Soc. ser. 2. Zool.* i, p. 331; *Elliot. Ibis.* 1870, p. 419 (part.).
Pitta sordida, *Sharpe. Ibis.* 1874, p. 321.
P. philippensis, *Müll. & Schl. Verh. Zool. Pitta*, p. 19; *Schl. Mus. P.-B. Pitta*, p. 2 (1863), et p. 5 (1874).
P. macrorhyncha, *Gray. Zool. Misc.* p. 3 (1831).
P. leucoptera, *Elliot. Proc. Ac. Sc. Phil.* 1861, p. 133 (?).
hab. Luzón Negros, Camiguin, Siújor, Marinduque, Bisílon, Mindanao, Paragua, P. Princesa, Mindoro.

7. *P. muelleri*, *Bp. ♂♂ N. v. Uasua*

(M. S. T.)

- Pitta atricapilla*, *Müll. & Schl. Zool. Pitta*, pp. 8, 19; *Müll. Verh. Ethn.* p. 405; *Horsf. et Moore. Cat. B. Mus. E. I. Co.* i, p. 399; *Schl. Hand-l. Dierk.* i, p. 254; *id. Vog. Ned. Ind. Pitta* p. 6, pl. ii, figs. 2, 3; *id. Mus. P.-B. Pitta*, p. 3 (1863), et p. 5 (1874); *Pelz. Novara Reise. Vog.* pp. 70, 161; *Gould. B. Asia*, v, pl. 76.
Brachyurus muelleri, *Bp. Conspl.* i, p. 259; *Mon. Pitt.* pl. xxvi; *Shirley. P. Z. S.* 1875, p. 104; *id. Ibis.* 1877, p. 10.
Pitta muelleri, *Sel. P. Z. S.* 1873, p. 215; *Wallace. Ibis.* 1864, p. 106; *Wald. n. Trans. Zool. Soc.* viii, p. 62; *Salvad. Ucc. Born.* p. 240; *Sharpe. Ibs.* 1870, p. 263; *id. P. Z. S.* 1870, p. 346, et 1881, p. 798; *Nichols. Ibis.* 1882, p. 63, et 1883, p. 88; *Guillemaud. P. Z. S.* 1885, p. 413; *Selat. Cat. B. M.* 14, p. 439 (1888).
Coloburis muelleri, *Cab. et Hein. Mus. Hein.* ii, p. 4.
Melanopitta muelleri, *Bp. Conspl. Vol. Anisod.* p. 7; *Walden. Ibis.* 1872, p. 374.
Brachyurus sordidus, *Elliot. Ibis.* 1870, p. 419 (part.).
Pitta malaccensis, *Müll. & Schl. Verh. Zool. Pitta*, p. 19.
hab. Paragua, P. Princesa; Borneo, Sumatra.

8. **P. steerii**, Sharpe, ♂♂ N. v. Uas-uac.

(M. S. T.)

Brachyurus steerii, Sharpe, *Nature*, xiv, p. 297 (1876); *id. Trans. Linn. Soc. ser. 2, Zool.* i, p. 329, t. xlxi.

Melanopitta steerii, Tweedie, *P. Z. S.* 1878, p. 949.

Pitta steerii, Gould, *B. Asia*, v, pl. 74; *Sci. Cat. B. M.* 14, p. 442 (1888).

Cyanopitta steerii, Gould, *Mon. Pitta*, pl. 8.

Hab. Dumalon, Zamboanga, Mindanao, Luzón, Paragua, P. Princesa, Samar.

9. **P. luzonica**, ♂♂ N. v. Iloco.

(M. S. T.)

Hab. Luzon, Laguna, Calauan.

10. **P. guttata**, ♂♂ N. v. Uas-uac.

(M. S. T.)

Hab. Paragua, P. Princesa.

11. **P. maxima**, ♂♂ N. v. Pitta gigantea.

(M. S. T.)

Pitta maxima, Mäh, c' Schleg. *Verh. Zool. Pitta*, p. 14; Gray, *Gen. B.* i, p. 273; *id. P. Z. S.* 1870, p. 351; Westermarck, *Bijdr. t. d. Dierk.* i, p. 45; *Pitta*, pl. 1; Schleg., *Hind-d. t. d. Dierk.* i, p. 253; *Aves*, pl. 2, fig. 21; *id. Vog. N.-l. Ind. Pitta*, p. 4 pl. i, fig. 4; *d. Mus. P.-B. Pitta*, p. 2 (1863), et p. 4 1874; *id. Ned. Tijdschr. Dierk.* iii, p. 189; *Walter*, *Ibis*, 1859, p. 112, 1860, p. 197, 1864, pp. 83, 105, 108; *Bernst. Nat. Tijdschr. Dierk.* ii, p. 373; *Salvad. Ann. Mus. Civ. Genov.* vii, p. 184; *id. Orn. pap.* ii, p. 378; *Gould*, *B. New Guin.* pt. ii, pl. 5; *Sci. Cat. B. M.* 14, p. 419 (1888). Brachyurus maximus, Bp. *Consp.* i, p. 253; Elliot, *Mon. Pitt.* pl. xii; *id. Ibis*, 1870, p. 413.

Gigantipitta maxima, Bp. *Consp. Vol. Anisod.* p. 7.

Leucopitta maxima, Gould, *Mon. Pitta*, pl. 7.

Hab. Gilolo.

12. **P. nymphæ**, Temm. et Schleg. ♂ N. v. Iloco.

(M. S. T.)

Pitta nymphæ, Temm. et Schleg., *Fam. Jap., Aves, Suppl.* t. A; *Willace Ibis*, 1864, p. 105; Swinhoe, *P. Z. S.* 1873, p. 730; *Sci. Cat. B. M.* 14, p. 425 (1888).

Brachyurus nymphæ, Bp. *Consp.* i, p. 254; *id. Consp. Vol. Anisod.* p. 7; Elliot, *Mon. Pitt.* pl. viii; *id. Ibis*, 1870, p. 415.

Pitta oreas, Swinh. *Ibis*, 1874, p. 428 (Formosa); *id. P. Z. S.* 1865, p. 678 (1871), p. 375; Elliot, *Ibis*, 1878, p. 408; Gould, *B. Asia* v, pl. 65; David et Oust. *Ois. d. Chine*, p. 153.

Brachyurus oreas, Elliot, *Ibs.* 1870, p. 415, pl. viii, fig. 1.
Hab. Luzon; Formosa, Borneo.

Fam. EURILEMIDOS.

1. Gén. SARCOPHANOPS, SHARPE.

1. *S. steerii*, Sharpe. ♂ ♀ N. v. Tucat. (M. S. T.)

Eurylaemus steerii, Sharpe, *Nature*, vol. xiv. p. 297 (Aug. 1876).
Sharcophanops steerii, Sharpe, *Trans. Linn. Soc.* ser. 2, vol. 11, *Zool.* p. 344, pl. 53; Gould, *B. Asia*, i, pl. 65; *Tweeddale, P. Z. S.* 1878, p. 110, et 1879, p. 70; *Wardlaw Ramsay, Tweeddale, Mem., App.* p. 658; *Sclat. Cat. B. M.* 14, p. 462 (1888).
Hab. Dinagat, Basilan, Mindanao; Java, Borneo, Sumatra.

2. *S. samarensis*, Steere. N. v.

Hab. Samar.

2. Gén. EURYLÆMUS, SCLAT.

3. *E. javanicus*, Horst. ♂ ♀ N. v. Tucat. (M. S. T.)

Eurylaemus javanicus, Horst, *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 170; *id. Zool. Res.* pl. 54; *Vigors, Mem. Raffles*, p. 653; *Less. Man. d. Orn.* i, p. 175, *id. Trait. d. Orn.* p. 261; *Blyth, Cat. B. J. S.* p. 195; *id. B. Burm.* p. 125; *Bp. Conspl.* i, p. 468; *Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* p. 116; *id. P. Z. S.* 1854, p. 267; *Cab. et Heine, Mus. Hein.* ii, p. 121; *Walden, Ibis*, 1872, p. 369; *Gould, B. Asia*, i, pl. 57; *Salvad, Ucc. Borneo*, p. 107; *Davison, Str. F.* v, p. 456; *Hume & Dav. Str. F.* vi, pp. 89, 489; *Hume, Str. F.* ii, p. 470, viii, pp. 50, 86; *Birmingham, Str. F.* ix, p. 157; *Sharpe, Ibis*, 1870, p. 48, 1877, p. 22, et 1879, p. 263; *Ramsay P. Z. S.* 1880, p. 14; *Nicholson, Ibis*, 1882, p. 63, et 1883, p. 88; *Oatas, B. Brit. Burm.* i, p. 427; *Guillemaud, P. Z. S.* 1885, p. 407; *Sel. Cat. B. M.* 14, p. 463 (1881).
Eurylaimus horsfieldii, Tem., *Pl. Col.* 130, 131 (1823); *Sie. Flycatch.* p. 240, pl. 30; *Wagl. Syst. Av. Euryl.* esp. 3.
Platyrhynchos horsfieldi, Vieill., *Gal. Ois.* i, p. 200, t. cxxv.
Javan tody, *Lath. G. H.* iv, p. 96.
Hab. Paraguaia; Java, Borneo, Sumatra.

Fam. DENDROCOLÁPTIDOS.

1. Gén. SYNALLAX S., VIEILL.

1. *S. erythrothorax*, Sel. ♂ N. v. (M. S. T.)

S. erythrothorax, Sclater, *Cat. B. M.* 15, p. 55 (1888).
Hab. América, Guatemala.

2. Gén. AUTOMOLUS, REINH.

2. *A. cervinigularis*, Sel. 3 N. v.

(M. S. T.)

A. cervinigularis, Sel. Cat. B. M. 15, p. 91 (1888).
Hab. América, Guatemala.

3. Gén. DENDROORNIS, EYTON.

3. *D. eburneirostris*, (Less.) 3 N. v.

(M. S. T.)

Dryocopus eburneirostris, Less. Scho. cl. M. S. 1843.
Dendroornis eburneirostris, Sel. Cat. B. M. 15, p. 130 (1888).
Hab. América, Guatemala.

4. *D. erythropygia*, Sel. 3 N. v.

(M. S. T.)

D. erythropygia, Sel. Cat. B. M. 15, p. 131 (1888).
Hab. América, Guatemala.

Fam. FORMICÁRIDOS.

1. Gén. THAMNOPHILUS, VIEILL.

1. *Th. doliatus*, (Lin.) ♂ N. v.

(M. S. T.)

Lanius doliatus, Lin. S. N. i. p. 136; Lin. S. N. i. p. 309.
Th. doliatus, Sel. Cat. B. M. 15, p. 207 (1888).
Hab. América, Venezuela.

2. Gén. RHAMPHOCÉNUS, VIEILL.

2. *Rh. rufiventris*, Bp. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Scolopacinus rufiventris, Bp. P. Z. S. 1837, p. 119.
Rh. rufiventris, Sel. Cat. B. M. 15, p. 261 (1888).
Hab. América, Guatemala.

3. Gén. CERCOMACRA, SEL.

3. *C. tyrannina*, Sel. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Cercomacra tyrannina, Slater, Cat. B. M. 15, p. 265 (1888).
Hab. Méjico, Vera Paz.

Orden 4º PICARIOS.

Suborden: UPUPOS.

Fam. UPUPIDOS.

1. Gén. UPUPA LIN.

1. U. epops, (Lin.) ♂ N. v. Abubilla,

(M. S. T.)

La Huppe ou Puput, *Briss. Orn.* ii, p. 455, lam. 43 (1760).
Upupa epops, *Lin. Syst. Nat.* i, p. 183 (1766); *Gn. S. N.* i, p. 469 (1788); *Bp. Conspr.* i p. 88 (1850); *Osbert. Cat. B. M.* 16, p. 5 (1892).

La huppe, *Daub. Pl. Eul.* vi, p. 52.
Hab. Europa, España, África, India, Japón.

Suborden: TROQUILOS.

Fam. TROQUÍLIDOS.

1. Gén. EULAMPIIS BOIE.

1. E. jugularis, (Lin.) ♂ N. v. El granate.

(M. S. T.)

Le grenat, *Buff. Hist. Nat. Ois.* vi, p. 48; *Aut. et Vieill. Ois. Dor.* i, p. 20, pl. 4.

Colibri violet de Cayenne, *Buff. Pl. Eul.* 600, f. 2.

Trochilus jugularis, *Lin. Syst. Nat.* i, p. 19; *Gn. S. N.* i, p. 479; *Eulampis jugularis*, *Reich. Aufz. de Col.* p. 11; *Bp. Conspr.* i, p. 72; *Osbert. Cat. B. M.* 16, p. 102 (1893).

Hab. Guadalupe, Dominica, Martinica.

2. Gén. FLORISUGA BR.

2. F. mellivora, (Lin.) ♂ N. v. Colibri de garganta azul. (M. S. T.)

Trochilus mellivorus, *Lin. S. N.* i, p. 193; *Gn. S. N.* i, p. 499; *Buff. Pl. Eul.* 640, f. 3; *Osbert Cat. B. M.* 19, p. 329, 1893.

Hab. América, Guatemala.

3. Gén. AMAZILIA REICH.

3. A. riefferi, (Bourc.) ♂ ♀ N. v. Colibri. (M. S. T.)

Trochilus riefferi, *Bourc. Ann. Soc. Phys et Nat. Lyon: Osbert Cat. B. M.* 16, 1893, p. 216.

Hab. América, Cuatemala.

Suborden: CORACIOS.

Fam. CIPSELIDOS.

Subfam. CHELURINOS.

Gen. CHELURA, Stejn.

1. *Ch. gigantea*, (Tem.) ♂♂ N. v. Balintagus. (M. S. T.)

Cypselus giganteus, Tem., Pl. Col. 364 (1825) Java.
Acanthylis caudacuta, part, Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc., p. 8, 1849.

A. giganteus, Blyth, Conspl., i, p. 64 (1850).
Chortura gigantea, Sel. P. Z. S. 1805, p. 608; id. J. f. O. 1857, p. 125; Hume, Str. F. iv, p. 223 (1876), viii, p. 47 (1879); Sharpe, P. Z. S. 1870, p. 335; id. Ibid., 1881, p. 198; Hartert, Cat. B. M. 10, p. 475 (1892).

Hirundinopus giganteus, Selv. U. P. n. p. 124 (1874); Orell. B. Barmah, ii, p. 5 (1883); Büttik. Notes Lyden Mus. ix, p. 40 (1887); Hart, J. f. O. 1889, p. 493; Sharpe, Ibid., 1890, p. 24; Steere, List. B. et Mamm. Philippin., p. 12 (1890).
Hab. Paragua, P. Princesa; Inagua; Borneo, Singapore Malaca.

3. COLLOCALIA, Gray.

- 2 *Collocalia lowi* (Sharpe), ♂♂ N. v. Salangana. (M. S. T.)

Cypselus lowi, Sharpe, P. Z. S. 1870, p. 333.
Cy. labuanensis, Ibid., 1879, p. 116.
Collucialia lowi, Hartert, Cat. B. M. 10, p. 498 (1892).
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo, Sumatra.

3. *C. fuciphaga* (Thunb.), ♂ ♀ N. v. Salangana. (M. S. T.)

Hirundo fuciphaga, Thunb., Act. Holm. xxiii, p. 151, pl. 4 (1772); Stejn. Gen. Zool. x, p. 111 (1847).
Esculent swallow, Lath. Gen. Syn. Suppl. ii, p. 257, pl. 135 (1802).
Hirundo esculenta, (Nec Lin.) Horsf. Tr. Lin. Soc. xiii, p. 142; Raffl. Ibid. p. 315 (1822).
Cypselus fuciphaga, S. Müll. Verh. Landen Volkenk., p. 45 (1839-44).
Hirundo unicolor, Jord. Madr. Journ. 1840, p. 238.
Cypselus concolor, Blyth, Journ. As. Soc. Beng. xi, p. 886 (1842).
Cy. unicolor, Jord. Journ. As. Soc. Beng. xiii, pt. i, p. 173, pt. ii, p. 144 (1844).
Collocalia unicolor, Blyth, Journ. As. Soc. Beng. xix, pp. 260, 212 (1845); Hume, Str. F. vth. iv, p. 374 (1870); Sculpy, ib. vth. p. 235 (1871); Blyth, Str. F. vth. ix, p. 381 (1871).

- Davison, *Stray Feath.*, x, p. 344 (1842); *Ostes*, id. *Hinc Nest.*, et *Egg Inl.*, B, iii, p. 28 (1844).
C. nidifica, Gray, *Gen. B.*, i, p. 55 (1843); Blyth, *Cat. B. M. As. Soc.*, p. 86 (1849); Bp. *Comsp.*, i, p. 343 (1850); Horsf. et Moore, *Cat. B. Mus. E. I. Comp.*, i, p. 98 (1854); id. *Cat. B. New Guinea* pp. 47, 54; Berust, *J. f. O.* 1859, p. 118; Jerd, *B. India*, p. 182 (1862); Rossm., *Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.*, xxv, p. 234 (1863); Sel. P. Z. S. 1863, p. 212; id. *J. O.* 1864, p. 120; Finsch, *Neu-Guinea*, p. 162 (1865); Pelz, *Reis. Novara*, *Vög.*, p. 39, (1865); Gray, *Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1866, xvii, p. 118; id. *Hand-l.*, i, p. 65, 746 (1869); Legge, *Ib's.* 1874, p. 13; Rey, *J. f. O.* 1875, p. 28; Brooks, *Stray Feath.* iii, p. 232 (1875); Green, *Journ. Physiol.* 1885, p. 40; Varigny, *Nature*, 1885, p. 186; Billkif, *P. Z. S.* 1885, p. 610; Pryer, *Zoologist.* 1885, p. 295; Murray, t. c. p. 147.
Hemiprocnæ salangana, Streubel, *Isis*, 1848, p. 368.
Collocalia fuciphaga, Bp. *Compt. Rend.* xli, p. 977 (1855); id. *Rev. et Mag. Zool.* 1855, p. 581; Wallace, *P. Z. S.* 1853, pp. 384, 484, *Sel. P. Z. S.* 1875, p. 616; id. *J. f. O.* 1867, p. 139; Holdsw., *P. Z. S.* 1872, p. 420; Wald. *Trans. Zool. Soc.* viii, p. 46 (1872); Salvad. *Ucc. Borneo*, p. 120 (1874); id. *Ann. Mus. Civ.* 1879, p. 647; id. *Orn. Papuas*, i, p. 544 (1880); id. *Agg. Orn. Pap.*, i, p. 63 (1880); *Tristr. Ib's.* 1880, p. 246; Sharpe, *Journ. Linn. Soc.*, *Zool.* xvi, p. 430 (1880); A. B. Meyer, *Abh. d. Vogelsk.* pl. 46, fig. 2 (1883); id. *Zeitschr. ges. Orn.* 1884, p. 278; W. Blas. *J. f. O.* 1884, p. 217; Kutter, *J. f. O.* 1885, p. 346; Finsch. & Meyer, *Zeitschr. ges. Orn.* 1885, p. 14; Hartert, *J. f. O.* 1889; *Tristr. Ib's.* 1889, p. 556; Sharpe, *Ib's.* 1890, p. 23; Hartert, *Cat. B. Mus.* 16, 1892, p. 498.
Hirundo vanikorensis, Qaz et Gaim. *Voy. Astrolabe*, *Zool.* i, p. 269, pl. xii, fig. 3 (1830).
Cotyle vanicorensis, Boie, *Ib's.* 1844, p. 170.
Collocalia vanicorensis, Hartl. & Finsch, *P. Z. S.* 1868, pp. 4, 116; Finsch & Hartl, *Journ. Centralpol.* p. 47, part. (1867); Finsek, *Journ. Mus. Godfr.* viii, p. 15 (1875); id. *ib. f. xi.* p. 23 (1876); Layard, *P. Z. S.* 1876, p. 52; id. *Ib's.* 1879, p. 391; Finsch, *P. Z. S.* 1877, p. 778; id. *J. f. O.* 1880, p. 285; id. *P. Z. S.* 1882, 575; id. *J. f. O.* 1880, ii, 298; id. *Ib's.* 1881, pp. 105, 108, 115, 536.
Cypselus inquietus, Kittl. *Denks. Reise*, ii, p. 26 (1858); Finsch, *Ib's.* 1881, p. 105.
Collocalia francica, Tweedd., *P. Z. S.* 1878, p. 283; Steere, *List. C. sp. inc.*, *Sel. P. Z. S.* 1879, p. 447.
C. linchi, Tristr., *Ib's.* 1880, pp. 223, 298.
C. cinerea, Layard, *Ib's.* 1881, pp. 223, 298; id. *Ib's.* 1882, p. 503. *Hab.* Paragua, Ihuaging; Borneo, Samatra.

4. *C. troglodytes*, Gray. ♂ ♀ N. v. Salangana.

(M. S. V.)

- C. troglodytes*, Gray, *Gen. B.* pl. 19 (1845); id. *Hand-l.*, i, p. 65 (1869); Wall., *P. Z. S.* 1873, p. 384; Miers, *J. F. O.* 1859, p. 18; Bps. *Compt. Rend.* xli, p. 977; Pelz, *Reis. Novara*,

Vög. p. 40 (1865); *Walden*, *Trans. Zool. Soc.* ix. p. 158 (1875); *Tweedd.* *P. Z. S.* 1877, p. 823; *Sharpe*, *Trans. Linn. Soc.* i. p. 320 (1877); *Hume*, *Stray Feath.* viii. p. 47 (1879); *Sharpe*, *Ibis*, 1883, p. 198; *Whitley*, *Ibis*, 1890, p. 46; *Hartert*, *List B. & Mamm. Philippines*, p. 12 (1890); *Hart.* *Cat. B. M.* 16, p. 507 (1892).

Hab. Paragua, P. Príncipe, Mindiniao, Placer.

5. **C marginata** *Salv. ♂♂ N. v. Balinsayaao.*

(M. S. T.)

Collocalia fuciphaga *Tweedd.* *P. Z. S.* 1878, p. 420.

C. marginata, *Savad. Atti R. Acc. Sc. Tor.* xvii. p. 448 (1882); *Reichen & Schalow J. f. O.* 1884, p. 382; *Hartert*, *Cat. B. M.* 16, 1892, p. 508.

Collocalia cebuensis, *Kutler*, *J. F. O.* 1882, p. 171; *Reichen & Schalow J. F. O.* 1884, p. 382.

Hab. Cebú, Samar, Paranas, Luzón; Manila?

6. **C linchi**, *H. et Moore*, ♂ N. v. Balinsayaao.

(M. S. T.)

Hirundo fuciphaga, *Horsf.* (*nec Thunb.*) *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 143 (1821).

Collocalia fuciphaga, *G. R. Gray*, *Gen. B.* i. p. 55 (1845); *Blyth*, *Journ. As. Soc. Beng.* xiv. p. 548 (1845), xv. p. 22 (1846); *id. Cat. B. Mus. As. Soc. Beng.* p. 80 (1849); *Walden*, *Ibis*, 1874, p. 133.

Collocalia linchi, *Horsf. & Moore*, *Cat. B. Mus. C. Y. Comp.* i. p. 100 (1845); *Bp. Compt. Rend.* xli. p. 548 (1855); *Borrust*, *J. F. O.* 1859, p. 119; *Wald. P. Z. S.* 1863, p. 548; *Sel. P. Z. S.* 1865, p. 610; *Peltz. Reis. Novara*, *Vög.* p. 39 pl. ii. fig. 2, & pl. vi. fig. 2 (1865); *Gray*, *Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1866, xvii. p. 111; *Gray*, *Hand-l.* i. p. 65 (1869); *Hartert*, *Cat. B. Mus.* 16, 1892 p. 508; *Ball*, *Stray Feath.* i. p. 55 (1873); *Hume*, *ibid.* ii. p. 157 (1874), vi. p. 48 (1878), viii. p. 47 (1879); *Savad. Ucc. Borueo*, p. 121 (1874); *Sharpe*, *Ibis*, 1879, p. 250; *Tristri. Ibis*, 1879, p. 438; *Nicholson*, *Ibis*, 1881, p. 143; *Kelham*, *Ibis*, 1881, p. 374; *Oates*, *B. Burmah*, ii. p. 10 (1883); *Vordem Nat. Tydsehr. Nederl. Ind.* p. 193 (1883); *Kutler*, *J. F. O.* 1883, p. 302; *id. J. F. O.* 1885, p. 344; *W. Blas*, *J. F. O.* 1884, p. 227; *Grabowsk.* *Ornis*, 1885, p. 157; *Sharpe*, *Ibis*, 1890, p. 23; *Oates*, *ed. Hum's Nests. & Eggs. Ind. B.* iii. p. 33 (1891); *Hartert*, *Cat. B. M.* 16, 1892, p. 508.

C. attinis, *Tytler & Beavan*, *Ibis*, 1867, p. 38; *Blyth*, *Ib.* 1868, p. 131; *Walden*, *Ibis*, 1873, p. 302; *Salvad.* *Ibis*, 1881, p. 130.

Hab. Samar, Borongan; Borneo, Java.

Subfam. MACROPTERIGINOS.

1. Gén. MACROPTERYX, Swains.

7. M. comata, (Temm.) ♂♂ N. v. Layan-Layan. (M. S. T.)

- Apsealus comatus*, Temm., Pl. Col., 268 (1824).
Dendrochelidon comatus, Boie, Isis, 1844, p. 166; *Bp. Conspl.* i, p. 69 (1850); Gould, B. Asia, i, pl. 25 (1859). *Cab. & Heine, Mus. Hein.* iii, p. 82 (1860); *Scl. P. Z. S.* 1863, p. 617; *id. J. f. O.* 1877, p. 141; Gray, Hand-l. i, 65 (1869); *Salvad. Ucc. Borneo*, p. 123 (1874); Hume, *Stray Feath.* iii, p. 318 (1875); *id. ibid.* viii, p. 47 (1879); Sharpe, *Ibis*, 1878, p. 414; *id. ibid.* 1879, p. 259; Hume & Divison, *Stray Feath.* vi, p. 51 (1878); Sharpe, P. Z. S. 1879, p. 334; Ketham, *Ibis*, 1881, p. 376.
Macropteryx comatus, Swains. *Class. B.* ii, p. 340 (1837); Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 87 (1849); Walden, *Trans. Zool. Soc.* ix, p. 158 (1875); Sharpe, *Ibis*, 1876, p. 53; *id. Trans. Linn. Soc. ser. 2, i.* p. 319 (1877); Tweeddale, P. Z. S. 1877, p. 823; *Salv. Cat. Strickl. Coll.* p. 373 (1882); Oates, B. Burriah, ii, p. 14 (1883); Hartert, J. f. O. 1889, p. 401; *id. J. f. O.* 1891, p. 295; *id. Cat. B. M.* 10, 1892, p. 517.
Hab. Luzon, Manila, Laguna, Los Baños, Calamba, Cebú, Negros, Mindanao, Pilar; Java?

Fam. CAPRIMULGIDOS.

Subfam. CAPRIMULGINOS.

1. Gén. CAPRIMULGUS, Lin.

1. Caprimulgus europaeus, Lin. ♂ N. v. Papavientos. (M. S. T.)

- Caprimulgus europaeus*, Linn. *Syst. Nat.* ed. x, p. 193 (1758); ed. 12, i, p. 346 (1865); *Gm. Syst. Nat.* ii, p. 1027 (1788); *Hart. Cat. B. M.* 10, p. 520 (1892).
La tête de Chèvre ou Crapaud volant, Briss. *Orn.* ii, p. 470, pl. 44 (1760).
L'Engoulement, Buff. *Hist. Nat. Ois.* vi, p. 512 (1779).
Crapaud volant, Daubent. *Pl. Ent.* 193 (1783).
Hirundo caprimulgus, Thunst. *Orn. Brit.* p. 2 (1771); *Pall. Zoogr. Rossio-Asiat.* i, p. 542 (1811).
Caprimulgus punctatus, Meyer & Wolf. *Taschenb.* p. 284 (1810); Brehm, *Vög. Deutschl.* p. 130 (1831); *id. Vogelf.* p. 44 (1855).
C. vulgaris, Vieill. *Faune Franc.* i, p. 140, pl. 61, fig. 2 (1828); Rüx. *Orn. Provence*, p. 240, pl. 147 (1825).
C. maculatus, Brehm, *Vög. Deutschl.* p. 131 (1831); *Vogelst.* p. 42 (1855).
Nyctinelidon europaeus maculatus, punctatus, punctorum, foliorum, v. peregrinus, A. E. Brehm, *Verz. Samml. C. L. Brehm*, p. 3 (1860), teste Dresser, l. c.

Caprimulgus smithii, *Bp.* *Consp.* i. p. 59 (1850); *Cass.* *Capr. Ac. Phil.* p. 2 (1851); *Hartl. Ibis*, 1862, p. 143; *Gould*, *Ibis*, 1868, p. 151; *Gray*, *Hand-l* i. p. 50 (1869); *Cab. J. J. f. O.* 1878, p. 236; *Reichen. J. j. O.* 1887, p. 61.
C. capensis, *Vers. M. S. teste Cat. Capr. Ac. Phil.* p. 2 (1851).
Hab. Europa, España, África, China, Luzón, Cagayan?

2 *C. macrurus*, *Horsf. Tr. Lin. Soc.* v. Paturtur.

(M. S. 1)

Javan goatsucker, *Lath. Gen. H. B.* vii. p. 346 (1823).
C. macrurus, *Horsf. Tr. Lin. Soc.* xiii. p. 142 (1821); *Jerd. Ill. Ind. Orn.* n.º 24 (1847); *Blyth. Cat. B. M. As. Soc.* p. 83 (1849); *id. Ibis*, 1860, p. 341; *Bp. Consp.* i. p. 60, (1850); *Horsf. et Moore. Cat. B. M. E. I. Co.* i. p. 112 (1854); *Gray. P. Z. S.* 1850, p. 154; *Cab. et Heine. M. Hein.* iii. p. 87 (1860); *Jerd. B. Ind.* p. 195 (1862); *Wall. P. Z. S.* 1865; *Gould. B. Austr.* ii. pl. ix.; *id. Handb. B. Austr.* i. p. 100, (1865); *Koenig-Warth. J. f. O.* 1868, p. 378; *Gray. Hand-l.* p. 57 (1869); *Beavan. Ibis*, 1869, p. 406; *Walden. Ibis*, 1874, p. 131; *Hume. Stray F.* ii. p. 469 (1874); *id. Stray F.* iii. p. 46 (1875); xiii. p. 48 (1879); xi. p. 39 (1888); *Sal. Ucc. Born.* p. 117, (1874); *id. Orn. Papuas.* i. p. 528 (1880); *A. B. Meyer. Sitzb. K. Ak. Wissenschaft. Wien.* 1874, pp. 20, 210; *Ramsay. P. Z. S.* 1875, pp. 113, 518; *Hume et Dav. Stray F.* vi. p. 58, (1878); *Cripps. Stray F.* vii. p. 258 (1878); *Sharpe. Journ. Lin. Soc.* xiii. p. 493 (1878); *id. Ibis*, 1879, p. 250; *id. P. Z. S.* 1879, p. 332; *id. Ibis*, 1888, p. 298; 1890, p. 22; *Bingh. Stray F.* ix. p. 150 (1880); *Layard. Ibis*, 1880, p. 298; *Kelam. Ibis*, 1881, p. 376; *Aug. Müll. J. f. O.* 1882, p. 403; *Vorderm. Nat. Tijdschr. Nedert. Indie.* 1883, p. 57; *Oates. B. Burm.* ii. p. 20, 1883; *id. ed. Hum's Nests. et Eggs. Ind. B.* iii. p. 45, (1890); *A. B. Meyer. Zeitschr. ges. Orn.* 1884, p. 197; *Hart. J. f. O.* 1889, p. 424; *Witch. Ibis*, 1890, p. 46; *Steere. List. B. et Mamm. Exp. Philipp.* p. 12; *Hart. Cat. B. M.* 16 p. 537; (1892).
C. schlegelii, *Gray. Hand-l.* i. p. 57, 1869; *Aru. New. Guin.*
C. Salvadorii, *Sharpe. P. Z. S.* 1875, p. 95, pl. xxii. f. 1; *Ibis*, 1877, p. 4.
Hab. Paragua, P. Princesa, Inagauan; Australia, Borneo, Java, Sumatra.

3 *C. afanis*, *Horsf. Tr. Lin. Soc.* v. Paturtur.

(M. S. 1)

C. affinis, *Horsf. Tr. Lin. Soc.* xiii., 1821 p. 142; *G. R. Gray. Gen. B.* i. 1847, p. 48; *Blyth. Cat. B. M. As. Soc.* 1849 p. 84; *Bp. Consp.* i. p. 60 (1850); *Cass. Cat. Capr. M. Philad. exp.* 17 (1851); *Horsf. et Moore. Cat. B. M. E. i Comp.* i. p. 144 (1854); *Sal. P. Z. S.* 1893, p. 312; *Gray. Hand-l.* i. p. 57 (1869); *Wald. Tr. Zool. Soc.* viii. 1872, p. 114; *Salv. Ucc. Borneo*, 1874 p. 115; *Vorderm. Nat. Tijds. Ned. Ind.* 1883, p. 54; *Hart. Ibis*, 1892, p. 280; *id. Cat. B. M.* 16, p. 549 (1892).
C. europaeus, *Riff. Tr. Lin. Soc.* xiii. p. 315, (1822).

- C. chujpa goatsucker, *Lath. Gen. II. B.* vli. p. 319 (1823).
Engoulement des rocaux, *H. et Jacq. Voy. Pole Ind.* pl. 21 fig. 2 ♂ (1846).
C. bisignatus, *Boie, M. L. teste Cass. Cat. Capr. M. Phil.* (1851);
Koenig-Warth. J. f. O. 1868 p. 373.
C. arundinaceus, *Bp. Conspl.* i. p. 60 (1850); *Jacq. et Puch. Voy au Pole Ind. Ois.* p. 93 (1853); *Hartl. J. f. O.* 1854, p. 164; *Wald. Tr. Zool. Soc.* viii. p. 115 1872; *Salv. Ucc. Borneo*, 1874, p. 116.
C. faberi, *Meyer. Sitzeng. Ges. Isis.* 1884, i. p. 20.
Hab. Paragua, P. Princesa, Joló, Samar, Borongan; Borneo, Célebes, Java, Sumatra.

4. **C. manillensis.** *Gray.* N. v. Candarapa. (M. S. T.)

- C. manillensis, *G. R. Gray, List. Fissirostres Brit. Mus.* p. 7, n.º 11, «Manilla», descr. nulla! (1848); *id. Hand-l.* p. 57, n.º 637 (1869).
C. macrurus, *Martens, J. f. O.* 1866, p. 19.
C. manillensis, *Walden, Trans. Zool. Soc.* ix. pp. 160, 410 (1873); *Tweedd. P. Z. S.* 1878, p. 635; *id. P. Z. S.* 1879, p. 60; *Whiteh. Ibis*; 1890, p. 46; *Steere, List B. & Mamm. Exped. Philipp.* p. 12 (1890); *Hart. Cat. B. M.* 16, p. 544 (1892).
Hab. Luzon, Manila, Navotas, Mindanao, Zamboanga, Basilan; Célebes.

5. **C. griseatus,** *Gray.* N. v. Indarapa. (M. S. T.)

- C. griseatus, *G. R. Gray, Hand-l.* i. p. 57, n.º 529; *Walden, Trans. Zool. Soc.* ix. p. 159 (1875); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 691; *Mutter, J. f. O.* 1882, p. 175; *Hart. Cat. B. M.* 16, p. 550, lam. xi. (1892).
Hab. Luzon, S. Mateo, Bulacan, Lolomboy, Mindoro, Baco.

6. **C. phalæna.** *Hart.* ♂ N. v. (M. S. T.)

- C. phalæna, *Hartl. & Finsch, P. Z. S.* 1872, p. 91; *Finsch, Journ. Mus. Godeffr.* 1875, p. 13, pl. ii. figs. 1, 2; *Hartert, Cat. B. M.* 16, p. 545 (1892).
Hab. Carolinas, Palaos.

2. Gén. **LYNCORNIS,** Gould.

7. **I. macrotis,** ♂ N. v. Daploc, Sacaculap. (M. S. T.)

- C. primulgus macrotis, *Vig. P. Z. S.* 1838, p. 97.
Lycornis macrotis, *Gould, Icon. Av.* pt. 2 (1883); *Bp. Conspl.* i. p. 62 (1850); *Gray, Hand-l.* i. p. 62 (1869); *Tweedd. Zool. Soc.* ix. p. 159 (1877); *Wardl. Ramsay, Ibis*, 1880, p. 157; *Hartert, Cat. B. M.* 16, 1892 p. 605.
Hab. Luzon, Manila, Cagayan, Ilocos, Mindoro, Baco.

8. **L mindanensis**, Tweed. ♂ ♀ N. v.

(M. S. T.)

Lyncornis mindanensis, Tw. P. Z. S. 1878, p. 644; Hart. Cat. B. M. 16, p. 605 (1892).
Hab. Mindanao, Zamboanga.

9. **L temminckii**, ♂ ♀ Gould. N. v. Paturtur.

(M. S. T.)

L. temminckii, Gould, Icon. Av. pt. 2 (1838); Bp. Conspl. i. p. 62 (1850); Gray, Hand-l. i. p. 62 (1869); Wald. Ibis, 1872, p. 360; Salzad. Ucc. Borneo, p. 114 (1874); Tweedd. Ibis, 1877, p. 298; Hume, Stray F. viii. p. 48; Nicholson, Ibis, 1882, p. 58; Grabowsky, Orn's, 1885, p. 187; Everett, Journ. Straits Branch Asiat. Soc. 1889; Hart. Cat. B. M. 16, p. 606 (1892).
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo, Java.

10. **L paraguanensis**, ♂ ♀ N. v.

(M. S. T.)

Hab. Paragua, Imagaua.

Fam. PODÁRGIDOS.

1. Gen. BATRACHOSTOMUS, Gould.

1. **Bat auritus**, Gr. ♂ N. v. Ijao.

(M. S. T.)

Podargus auritus, Gray in Griffith, id. Cuvier's An. Kingd. ii. p. 114, cum tab. (ex Vig. M. S.) (1829); Vig. App. Mem. Raffi p. 658.

Batrachostomus auritus, Gould, Icon. Av. ii. 14, pl. vii. (1838); Gray, List. Spec. B. Brit. Mus. ii. pt. i. p. 3 (1848); Bp. Conspl. i. p. 57 (1850); Cass. Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 8 (1851); Horsf. & Moore. Cat. B. Mus. E. I. Co. i. p. 387 (1854); Cab. et Heine Mus. Hein. ii. p. 123, (1860); Gray, Hand-l. i. p. 54 (1869); Sharpe, P. Z. S. 1875, p. 99, 1876, p. 332; Tweedd. Ibis, 1877, p. 388; id. P. Z. S. 1867, p. 439; Sharpe, Ibs., 1879, p. 249; Hume, Stray F. viii. p. 48; Hartl. Cat. M. 16, 1892, p. 637.

Bombycistomas fullertonii, Hay, Journ. A. S. Beng. 1841, p. 574, woodcut.

Podargus fullertoni, Blyth, Journ. A. S. Beng. 1842, p. 798.
Hab. P. Princesa, Paragua; Borneo, Sumatra.

2. **Bat septimus**, Tw. ♂ ♀ N. v. Paturtur

(M. S. T.)

Batr. septimus, Tw. P. Z. S. 1877, p. 542, 1878, p. 944; id. Voy. Challenger; p. 13, pl. ii. 1880; Harter. Cat. B. M. 16, 1891, p. 638.

Hab. Mindanao, Zamboanga, Paragua, P. Princesa.

3. **Bt. javanensis**, Horsf. & N. v. Iao.

(M. S. T.)

- Podargus javanensis, Horsf. *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 141 (1821); *Bart. Cat. B. M.* 16. 1892, p. 640.
Podargus cornutus, Temm. *Pl. Col.* p. 159; Schleg. *J. f. O.* 1856, p. 460; *id. Nederl. Tydschr. Dierk.* iii. p. 341, part. (1861); *P. javanensis*, Horsf. *Zool. Res. Jav.* pl. 37 (1824); *Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc. Beng.* p. 81 (1849); Schleg. *Handb. Dierk.* i. p. 224 (1857).
Batrachostomus javanensis, Gray, *Gm. B.* i. p. 45 (1846); *id. List. B. Brit. Mus.* ii. pt. i. p. 3 (1848); *id. Handb.* i. p. 54 (1869); *Bp. Conspl.* i. p. 57 (1850); *id. Cass. Cat. Caprim. Mus. Philad.* p. 7 (1851); *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 412 (1854); *Cab. & Hein., Mus. Hein.* ii. p. 123 (1860); *Bernst. J. f. O.* 1890, p. 428; *Sel. P. Z. S.* 1863, p. 211; *Salvad. Ucc. Borneo*, p. 102 (1874); Sharpe, *P. Z. S.* 1875, p. 99, 1879, p. 332; *Tweedt. Ibis.* 1877, p. 389; *id. P. Z. S.* 1877, p. 435; *Hume, Stray Feath.* vii. p. 143, note (1878); *Hart. Cat. B. M.* 16 p. 640 (1892).
Batrachostomus cornutus, Gray, *Gm. B.* i. p. 45 (1846); Pelz. *Reise Navara*, *Vog.* p. 34; *Tweedt. Ibis.* 1877, pp. 293, 388; *id. P. Z. S.* 1877, p. 432, pl. xlii; *W. Blas. J. f. O.* 1884, p. 217; *Kut'ev. J. f. O.* 1885, p. 341; pl. ix *Gribrovsky, Ossinis.* 1855, p. 157; Sharpe *Ibis.* 1883, p. 198; *Whitch. Ibis.* 1890, p. 46.
B. stellatus, (?) Büggem. *Abh. naturw. Ver. Bremn.* v. p. 356 (1876).
B. alspersus, Bruggem. *Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1877, xx. p. 178; *id. Abh. naturw. Ver. Bremen.* v. p. 528
Hab. Paragat, P. Princeps; Srinatra, Boenaz.

Fam. CORÁCIDOS.

1. Gén. EURYSTOMUS, VIEILL.

1. **E. orientalis**, (Lin.). ♂♂ N. v. Uac-uacan. Saggsae. (M. S. T.)

- Le Bollier des Inles, Briss. *Orn.* ii. p. 75, pl. 7. fig. 2 (1760); *Dubent. Pl. Ent.* iii. pl. 619; *Mmtb. Nit. Hist. Ois.* iii. p. 147 (1775).
Coracias orientalis, Linn. *S. N.* i. p. 159 (1766); *Gm. S. N.* i. p. 379 (1788); Raffl. *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 302 (1820).
Oriental roller, Lath. *Gen. Syn.* i. p. 411 (1781).
Le rolle à gorge bleue, Levaill. *Ois. de Parad.* Rolliers, p. 183, pl. 36 (1806).
Eurystomus orientalis, Steph. in Shaw's *Gen. Zool.* vii. p. 403 (1809); Swains. *An. in Menag.* 326 (1837); Gray, *Gm. B.* i. p. 62 (1845); *Bp. Conspl.* i. p. 168 (1850); Reichenb. *Handb. Merop.* p. 54, Taf. 437. figs. 3195, 3196, 3167 (1852); Moore, *P. Z. S.* 1854, p. 267; *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 121 (1854); *Cab. & Hein., Mus. Hein. Th.* iii. p. 120 (1861); Pelz. *R. s. Novara, Vog.* p. 42 (1865); Schl.

Mus. Pays-Bas, Coraces, p. 139 (1867, pt); *Gray, Handb.* B. i. p. 76, n.^o 906 (1869) *Blansford, Ibis*, 1870, p. 465; *Elliot, Ibis*, 1871, p. 204 (pt); *Walden & Layard, Ibis*, 1872, p. 100; *Walden, Ibis*, 1873, p. 108; *Ball, Str. F.* i. p. 57 (1873); *Hume, Str. F.* ii. p. 104 (1874); *Walden, Trans. Z. S.* ix. p. 152 (1875); *Salvad. Ucc. Born.* p. 105 (1874); *Blyth & Wald. B. Burm.* p. 72 (1875); *Sharpe, Ibis*, 1877, p. 7; *Wardlaw Ramsay, t. c.* p. 457; *Hume, & Davison, Str. F.* vi. p. 72 (1878); *Tirant. Ois, Basse-Cochinchine*, p. 99 (1879); *Salwarpe, Ibis*, 1879, p. 240; *id. P. Z. S.* 1879, p. 332; *Hume, Str. F.* p. 85 (1879); *Bingham, t. c.* p. 193. *id. op. c. l.* ix. p. 153 (1880); *Salvad. Orn. Papuasia* i. p. 508 (1880); *Kelham, Ibis*, 1881, p. 373; *Sharpe, P. Z. S.* 1881, p. 793; *Nichols, Ibis*, 1882, p. 67; *Oates Handb. B. Brit. Burm.* ii. p. 70 (1883) *Sneltem, in Veth's Midden-Sumatra, Vog.* p. 37 (1885); *Büttik. Notes Leyden Mus.* ix. p. 41 (1887) *Hurn. Str. F.* xi. p. 43 (1888); *Sharpe, Ibis*, 1888, p. 197; *Blasius, Ornith.* 1888, p. 579; *Sharpe, Ibis*, 1889, p. 21; *Whitehead, t. c.* p. 45; *Salvad. Agg. Orn. Papuasia*, p. 60 (1889) *Sharpe, Ibis*, 1890, p. 21; *id. P. Z. S.* 1890, p. 550; *Steere, Linst. B. & Mamm. Philipp.* p. 9 (1890); *Oates, ed. Hume's Nests & Eggs Ind. B.* iii. p. 57 (1890, pt.); *Sharpe, Cat. B. M.* 17, 1892, p. 33, lam. 2, fig. 1.

Colaris orientalis, *Cuv. Regne Anim.* i. p. 401 (1817); *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 162 (1820).

Eurystomus cyanocollis, *Vieill. t. c.* p. 425 (1819); *id. Gal. Ois.* i. p. 176, pl. iii. (1825); *Bp. Conspl.* i. p. 188 (1850).

E. fuscicapillus, *Vieill. N. Dict. d'Hist. Nat.* xxix. p. 426 (1819); *Colaris cyanocollis*, *Wagl. Syst. Av. Colaris*, sp. 4. (1827).

C. garula, (*nec L.*), *Guérin-Méneville. Iconogr. Régue, Anim.* pl. 22, fig. 2 (1829-38).

Eurystomus pacificus, (*nec Lath.*), *Mottl. & Dillw. N. H. Lan-*
buan, p. 11 (1855).

Hab. Luzón, Cavite, Indan, Laguna, Calamba, Bataan, Orion, Cagayan, Manila, San Mateo, Maríquina, Mindoro, Baco, Ma-
rinduque, Samar, Paranaí, Borongan, Negros, Valencia, Gui-
murás, Dinagat, Cuyo, Paragua, P. Princesa, Leyte, Amparo,
Cebú, Mindanao, Panaon, Dumalón, Zamboanga, Butuan, Basi-
lan, Joló; Borneo, Java, Sumatra, Célebes.

2 *E. calonyx*,² *Hodgs. &c. N. v. Ucc. uncon.*

(M. S. T.)

Eurystomus calonyx, *Hodgs. Icon. ined. in Brit. Mus., Passeres*, pls. 10, 11 (n.^o 247); *id. in Gray's Zool. Misc.* p. 82 (1844); *Sharpe, P. Z. S.* 1860, p. 551; *Slyan, Ibis*, 1891, p. 317; *Sharpe, Cat. B. M.* 17, 1892, p. 38, lam. 2, f. 2.

E. orientalis, (*nec L.*), *Hodgs. Icon.* pls. 10, 11 (n.^o 248); *id. in Gray's Zool. Misc.* p. 82 (1844); *Gray, Cat. Mamor. Ac. Nepal. press. Hodgs.* p. 55 (1846); *id. List. Fissir. Brit. Mus.* p. 31 (1848); *Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 51 (1849); *Swinh. Ibis*, 1860, p. 48, 1861, p. 31; *Radde, Reis. Sib.* p. 114, pl. ii. fig. 2 (1861); *Jerd. B. Ind.* i. p. 219 (1862); *Swinh. Ibis*, 1866, p. 129; *Bulger, Ibis*, 1869, p. 155; *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 347; *Jerd. Ibis*, 1872, p. 3; *Peltz, Ibis*.

1873, p. 108; Hume, *Nests & Eggs Ind. B.*, p. 105; (1873); Tacz., *Bull. Soc. Zool. France*, i, p. 135 (1876); Dybowski, *J. f. O.* 1876, p. 192; David & Oust. *O's. Chine*, p. 72 (1877); Hume, *Str. F.* viii, p. 49 (1879); Blakist. *Amend. List. B. Japan*, p. 24 (1884); Sivan, *Ibis*, 1887, p. 229; Outes, *ed Hume's Nests & Eggs*, iii, p. 57 (1890, pt.)

Hab. Samar, Paranas, Paragua, Negros, Mindanao, Luzon, Cagayan; China, Borneo.

Fam. MEROPÓDIDOS.

1. Gén. MEROPS, LINN.

1. M. bicolor, Bodda. ♂♂ N. v. Puraojurao

(M. S. T.)

Le Guépier de l'île de France, *Briss. Orn.* iv, 543, pl. 44 fig. 2 (1800); Daubent. *Pl. Enl.* vi, p. 252.
Le Petit Guépier des Philippines, *Briss. t. c.* p. 555, pl. 43, fig. 2 (1760).
Le Guépier marron et bleu, *Montb. Hist. Nat. Ois.* vi, p. 493 (1779).
Merops americanus, *P. Z. S. Müll. Syst. Nat. Suppl.* p. 95 (1776); *Cass. Proc. Philad. Acad.* 1394, p. 243.
Chestnut Bee-eater, *Lath. Gen. Syn.* i, pt. 2, p. 677 (1782).
Merops bicolor, Bodd. *Tabl. Pl. Enl.* p. 15 (1783); *Weld. Trans. Zool. Soc.* ix, p. 150, pl. xxvi, fig. 1 (1875); *Tweedd. P. Z.* 1877, pp. 549, 690, 757, 822; *id. P. Z. S.* 1878, pp. 282, 340; Dreser, *Monogr. Merop.* p. 27, pl. 7 (1884); Steere, *List. B. & Mamm. Philipp.* p. 9 (1890); Sharpe, *Cat. B. M.* 17, 1892, p. 60.
M. badius, *Gm. Syst. Nat.* i, p. 462 (1788); Gray *Gen. B.* i, p. 86 (1846); Reichenb. *Handb.*, *Merop.* p. 75, *Taf.* 449 fig. 3244 (1852).
Merops castaneus, *Lath. Ind. Orn.* i, p. 273 (1790); Vieill. *N. Dict. d'Hist. Nat.* xiv, p. 18 (1817).
Le Guépier marron et bleu, ou Le Gaépier Latreille mûle, *Lavaill. Hist. Nat. Guépiers*, iii, p. 45, pl. 12 (1807).
Merops hypoglaucus, Reichenb. *Handb.*, *Merop.* p. H. *Taf.* 449, Fig. 3245 (1852).
Melittophas badius, Reichenb. *t. c.* p. 82 (1852).
M. hypoglaucus, Reichenb. *t. c.* p. 82 (1852).
Merops ornatus, (*nec Lath.*) Von Martens, *J. F. O.* 1866, p. 17.
Hab. Luzon, Bulacan, Lolomboy, Manila, Montalban, San Mateo, Cavit, Indian, Cagayan, Minlоро, Bico, Marinduque, Cebu, Leyte, Sanar, Paranas, Guimaras, Panay, Negros, Valencia, Mindanao, Placer, Batuan, Zamboanga.

2. M. sumatranaus, Raffl. ♀ N. v. Pilophiloan

(M. S. T.)

Merops sumatranaus, *Raffl. Trans. Linn. Soc.* xii, p. 294 (1821); Gray, *Gen. B.* i, p. 86 (1846); Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 53 (1849); Gould, *P. Z. S.* 1850, p. 151; Welden, *Trans. Z. S.* ix, p. 151, pl. xxvi, Fig. 2 (1875); Weld. *Ib's.* 1877, pp. 7, 297; Sharpe, *Ib's.* 1879, p. 248; *Hazz.* F. viii,

- p. 48 (1879); *Tourt. Brit. Sci. Comm. Agric. Cebuchon.* 30 i. p. 98 (1879); *Shirley, P. Z. S.* 1879, p. 329; 1881, p. 793; *Nicholson, Ibis.* 1882, p. 50; 1883, p. 243; *Dresser, Monogr. Merop.* p. 23, pl. 6 (1884); *Sharp, Cat. B. M.* 17, p. 61 (1892); *M. cyanopygius, L. ss., Testr.* p. 238 (1841).
M. badius, Oliv. Grn. Bb. Consip. i. p. 162 (1850); *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 87 (1854); *Moore, P. Z. S.* 1854, p. 294; *Melby & Delv. Nat. Hist. Labuan.* p. 14 (1855); *Scl. P. Z. S.* 1853, p. 213; *Schl. Mus. Pays-Bas.* *Merops*, p. 3 (1863); *Keltham, Ibis.* 1881, p. 377.
M. bicolor, Oliv. Batt. Grn. Hantl. B. i. p. 99, fig. 1242 (1869); *Salvi, Ucc. Born.* p. 90 (1874); *Sharpe, P. Z. S.* 1875, p. 101; *id. Ibis.* 1879, p. 33; 1877, p. 5; *David & Oust. O's. Chine.* p. 73 (1877); *Vorderm. Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* xlii, p. 191 (1885), xlii, p. 67 (1887).
M. rochechouardi, Hend. Ann. Sci. Nat. 1873 (teste Dresser).
Hab. Sumatra, Mindoro, Paragua; Borneo, Sumatra, Java.

3 **M. apiaster**, *Linn. Sp. N.* v. Abejero comun.

(M. S. T.)

- Fie. Bee-eater, A'bun, Nat. Hist. B.* ii. p. 40, pl. 44 (1738); *Yarr. Br. t. B.* ii. p. 200 (1843).
Le Guespier, Bris. Orn. iv. p. 532 (1760); *Dubent, Pl. En' vi.* p. 938; *Mnhb. Hist. Nat. O's.* vi. p. 483, pl. 23 (1779).
Le Guespier à teste jaune, Briss. Orn. iv. p. 537 (1760).
Merops apiaster, Linn. Syst. Nat. i. p. 182 (1766); *Gm. Syst. Nat.* i. p. 400 (1788); *Sharpe, Cat. B. M.* 17, 1802, p. 63.
Hab. Europa, España, Francia, Asia, Africa.

4 **M. philippinus**, *Lin. Sp. N.* v. Pájaro-bundoc.

(M. S. T.)

- Le Grand Guespier des Philippines, Briss. Orn.* iv. p. 566; 43, Fig. 1. (1760); *Dubent, Pl. En' vi.* pl. 57.
Merops philippinus, Linn. Syst. Nat. 13 th. edit., i. p. 183 (1787, teste W'tson, Tr. Z. S. vii. p. 145); *Gm. Syst. Nat.* i. p. 468 (1788); *Vieill. N. Det. d'Hist. Nat.* xiv. p. 72 (1817); *Frankl. P. Z. S.* 1831, p. 115; *Strickl. P. Z. S.* 1842, p. 167; *Gray, Gen. B.* i. p. 86 (1846); *id. Cat. Mamm. & Nepal. press.* *Hodgs.* p. 57 (1846); *id. List. Fiss. Brit. Mus.* p. 69 (1848); *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 86 (1854); *Moore, P. Z. S.* 1854, p. 263; *Gould, B. Asia.* i. pl. 36 (1855); *Moore, P. Z. S.* 1857, p. 87; *Cab. & Heine, Mus. Hein.* Th. ii. p. 139 (1860); *Irry, Ibis.* 1861, p. 228; *Scl. P. Z. S.* 1863, p. 213; *Schl. Mus. Pays-Bas.* *Merops*, p. 2 (1863); *Blyth, Ibis.* 1865, p. 30; 1869, p. 344; *Beavan, Ibis.* 1867, p. 318; *Gray, Handl. B.* i. p. 99, n.º 1207 (1869); *Wald. Ta. Z. S.* vii. p. 145 (1872); *Hume Nests & Eggs Ind. B.* p. 101 (1873); *Bill, Str. F.* i. p. 57 (1873); ii. p. 386 (1874); *Holdew, Ibis.* 1874, p. 125; *B'ffl. Str. F.* iii. p. 289; *Salvi, Ucc. Born.* p. 89 (1874); *Blyth & Wald. B. Burm.* p. 72 (1875); *Hume, t. c.* p. 329; *B'ffl. Str. F.* p. 456; *Fairb. Str. IV.* p. 25 (1876); *Hume, t. c.* p. 329; *Butler, t. c.* p. 456; *Hume, Str. F.* p. 18 (1875); *Firib. t. c.* p. 344; *B'ffl. t. c.* p. 413.

- Davin & Oust. *Ois. Chine*, p. 72 (1877); Tweedd. *P. Z. S.* 1877, pp. 549, 690; 1878, pp. 107, 282, 340, 709; Hume & Davis, *Str. F.* vi. pp. 67, 498; Ball, *Str. F.* vii. p. 203 (1877); Cripps, *t. c.* p. 258; Legge, *B. Ceylon*, p. 306 (1879); Hume, *Str. F.* viii. pp. 48, 85 (1879); Bingham, *t. c.* p. 492; Doig, *t. c.* p. 370; Tirant, *Bull. Comm. Soc. Agric. Cochinchine*, p. 78 (1879); Meyer, *Ibis*, 1879, p. 57; Sharpe, *t. c.* p. 248; Vidal, *Str. F.* ix. p. 49 (1880); Bingham, *t. c.* p. 152; Doig, *t. c.* p. 278; Nichols, *Ibis*, 1881, p. 143; Kelham, *Ibis*, 1881, p. 378; Reid, *Str. F.* x. p. 21 (1881); Davidson, *t. c.* p. 295 (1882); Dawson, *t. c.* p. 350 (1883); Oates, *Handb. B. Br. Burm.* ii. p. 66 (1883); Dresser, *Monogr. Merop.* p. 55, pl. 15 (1874); Vorderm. *Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* xlii. p. 191 (1882); Salvad. *Ann. Mus. Civic. Genov.* (2) iv. p. 583 (1887); Hume, *Str. F.* xi. p. 42 (1888); Steere, *List. B. & Mamm. Philipp.* p. 9 (1890); Oates, *ed. Hume's Nests & Eggs Ind. B.* iii. p. 63 (1890); Sharpe, *Cat. B. M.* 17. p. 71 (1892). Le Guépier vert à queue d'azur, *Mont. Hist. Nat. Ois.* vi. p. 504 (1779).
- Philippine Bee-eater, *Lath. Gen. Syn.* i. pt. 2, p. 674 (1782).
- Le Guépier à queue d'azur, ou Le Guépier, Daudin, *Levall. Hist. Nat. Guépiers*, p. 49, pl. 14 (1807).
- Merops javanicus, Horsf. *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 171 (1820); Eyston, *P. Z. S.* 1839, p. 101; Gray, *Gen. B.* i. p. 86 (1840); Bp. Cons. i. p. 162 (1850); Reichenb. *Handb. Merop.* p. 66. Tal. 444 Figs. 3227-28 (1852); Molley, *P. Z. S.* 1853, p. 213.
- M. philippensis, Steph. in *Lam's Gen. Zool.* xiii. pt. 2, p. 75 (1826); Jerd. *B. Ind.* i. p. 207 (1862); Swinh. *Ibis*, 1865, p. 230; Beavan, *t. c.* p. 407; Hancock, *Cat. B. Northumb.* p. 28 (1874); Anderson, *Rep. Zool. Exped. Yunnan*, p. 511 (1878).
- M. daudini, Cuvier, *Régne Anim.* i. p. 422 (1829); Gray, *Handb. B.* i. p. 99, n.^o 1208 (1870); Swinh. *P. Z. S.* 1871, p. 349; Hume, *Str. F.* ii. pp. 162, 499 (1874); iii. p. 49 (1875).
- M. typicus, Hogs. *Icon. ined. in Brit. Mus. Passeres*, pl. 23 fig. 1, 2 (n.^o 746); id. in Gray's *Zool. Misc.* p. 82 (1844).
- Blpharomerops javanicus, Reichenb. *Handb. Merop.* p. 72 (1852).
- B. philippinus, Reichenb. *t. c.* p. 82 (1852).
- B. savignii, (nec Audouin), Reichenb. *t. c.* p. 82 (1852).
- Merops philippinus, var. celebensis, Blasius, *Zeitschr. ges. Orn.* ii. p. 239 (1885).
- Hab. Luzon, Manila, Mariguina, Montalban, S. Mateo, Laguna, Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Cebú, Negros, Valencia, Panay, Bohol, Mindoro, Siquijor, Guimaras, Samar, Mindanao, Zamboanga, Basol, Basilan; Java, Célebes, Sumatra, Singapore.

Suborden: HALCIONES.

Fam. ALCEDÍNIDOS.

Subfam. ALCEDININOS.

I. Gén. PELARGOPSIS, GLOGER.

1. ♀ melanorhyncha, (Tem.) ♂ N. v. Salacae. (M. S. A.)

Alcedo melanorhyncha, Temm. Pl. Col. iv. pl. 391 (1826); Schi. Mus. Pays. Bas., Alced. p. 15 (1863); id. Vog. Nederl. Ind. pp. 10, 16, pl. 2 fig. 1 (1864); id. Mus. Pays-Bas, Alced. Revue, p. (1874).

Halcyon melanorhyncha, Gray Gen. B. i. p. 79 (1846); Bp. Conspl. i. p. 155 (1850); Cass. Cat. Hale. Philad. Mus. p. 10 (1852); Wall. His. 1800, p. 142; id. P. Z. S. 1862, pp. 335, 338; Gray, Hand-l. B. i. p. 92, n.º 1202 (1869); Pelz. u. Lorenz, Ann. k. Nat. Coym. Wien, i. p. 258 (1886).

Hylecaon melanorhyncha, Reichenb. Hand-b., Alced. p. 18 Taf. 399, fig. 3074 (1851).

Rhamphaleyon melanorhyncha, Bp. Conspl. Voluer. Anis. p. 10 (1854).

Pelargopsis melanorhyncha, Sharpe, P. Z. S. 1870, p. 62; id. Monogr. Alced. p. 94, pl. 29 (1870); Walden, Tr. Z. S. viii. p. 95 (1872); Meyer This. 1870, p. 64; Guillemin, P. Z. S. 1883, p. 547; Blasius, Zeitschr. ges. Orn. iii. p. 92 (1886); Sharpe, Cat. B. M. 17. p. 97 (1892).
Hab. Célebes, Filipinas?

2. ♀ leucocephala, (Gm.) ♂ ♂ N. v. Salalu. (M. S. T.)

Martin-Pecheur de Java, Daubent. Pl. Ent. viii. pl. 757.
Le Martin-pecheur à tête et cou couleur de paille, Buff. Hist. Nat. O.s. vii. p. 190 (1780).

White-headed kingfisher, i. Pt. 2, p. 617 (1782).

Alcedo javana, Bodda. Tabl. Pl. Ent. p. 47 (1783).

Al. leucocephala, Gm. Syst. Nat. i. p. 456 (1788); Shaw. & Noddl. Nat. Misc. xix. pl. 793 (1807); Schi. Mus. Pays-Bas, Alced. p. 13 (1863, pt.); id. Vog. Nederl. Ind., Alced. pl. 2. (1864); Wall. u. P. Z. S. 1869, p. 553; Schi. Mus. Pays-Bas, Alced., Revue, p. 7 (1874).

Al. javanica, Shaw, Gen. Zool. viii. p. 67 (1812).

Halcyon leucocephala, Steph. 'n Shaw's Gen. Zool. xiii. pt. 2, p. 100 (1826); Gray, List. Fissir Brit. Mus. p. 55 (1848, pt.) Bp. Conspl. i. p. 154 (1850); Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. P. I. Co. i. p. 123 (1854, pt.); Sci. P. Z. S. 1893, p. 213.

Halcyon javana, Gray, Gen. B. i. p. 79 (1846); id. Hand-l. B. i. p. 92, no. 1104 (1869).
Rhamphaleyon gurial, (nec Pears.), Reichenb. Handb., Alced. Taf. 390 fig. 3075 (1851, nec deser.).

Pelargopsis leucocephala, Sharpe, *P. Z. S.*, 8th, p. 64, *id.*
Monogr. Alced. pr 99, pl. 31 (1870); *Walden, Ibis*, 1872, p.
368; *Salvad. Ucc. Born.* p. 95 (1874); *Sharpe, Trans. Linn.*
Soc. n. s. i. p. 317 (1876); *id. Ibis*, 1879, p. 33, 1879, p.
249; *id. P. Z. S.* 1870, p. 329; *id. P. Z. S.* 1881, p. 703;
Guilleml. P. Z. S. 1855, p. 407; *Blasius, Ornith.* i. p. 156
(1785); *Everett, Journ. Straits. Branch. R. As. Soc.* 1889,
p. 150; *Sharpe, Ibis*, 1890, pp. 19, 283; *id. Cat. B. M.* 17,
p. 98 (1892).

Hab. Paragua, Mindoro, Baco; Borneo.

3. *P. gouldi*, Sharpe, ♂♂ N. v. Picault.

(M. S. T.)

Pelargopsis gouldi, Sharpe, *Ibis*, 1870, p. 63; *id. Monogr. Al-*
ced. p. 101, pl. 32 (1870); *Blasius Ibis*, 1888, p. 373; *id. Orni-*
th. iv. p. 307 (1888); *Everett, P. Z. S.* 1889, p. 225; *id.*
Journ. Straits. Branch. R. As. Soc. 1889, p. 159; *Sharpe,*
Cat. B. M. 17, p. 100 (1892).

P. leucocephala (*nec Gm.*), Sharpe, *Ibis*, 1884, p. 318 (err.);
id. Ibis, 1888, p. 197.

Hab. Luzón, Laguna, Cagayan, Abra, Hocos Norte, Panay
Hoilo, Paragua, P. Princesa.

4. *P. gigantea*, Wald. ♂♂ N. v. Salulu

(M. S. T.)

Pelargopsis gigantea, *Walden, Ann. & Mag. Nat. Hist.* (4.)
xiii. p. 123 (1874); *Meyer, t. c.* pp. 401, 475; *Salvad. Ucc.*
Born. p. 95 (1874); *Sharpe, Trans. Linn. Soc. n. s. i.* p.
317 (1876); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, pp. 541, 822, 1871, pp.
108, 341, 943, 1870, p. 69; *id. Rep. Exped. Challenger.* iii.
Birds. p. 12, (1801); *Guilleml. P. Z. S.* 1885, p. 266; *Sharpe,*
Cat. B. M. 17, p. 100 (1892).

Hab. Samar, Borongan, Paric, Panay, Leyte, Amparo, Gui-
marás, Masbate, Dinagat, Mindinao, Malanipa, Butuan, Zam-
boanga, Paragua, Inagauan, Joló, Basilan, Lapac.

5. *P. mindorensis*, ♂♂ N. v. Salasac.

(M. S. T.)

Hab. Mindoro, Bacó.

2. Gén. ALCEDO, LIN.

v. *A. ispida*, Lin. ♂♂ N. v. Casay-casay.

(M. S. T.)

The Little Indian kingfisher, *Edwards, Nat. Hist.* B. i. p. 11,
pl. 11 (1743).

Le Martin pêcheur, *Bris. Orn.* iv. p. 471 (1760).

Le Martin pêcheur de Bengale, *Briss. Orn.* iv. p. 471 (1760).

Alcedo ispida, *Linn. Syst. Nat.* i. p. 179 (1760); *Gm. Syst. Nat.*
i. pp. 448 (1788); *Pall. Zagr. Rosso-Asiat.* i. p. 435 (1811);
Veill. N. Dict. d'Hist. Nat. xix. p. 396 (1818); *Temm. Man.*
d'Orn. i. p. 423 (1820); *Naum. Vög. Deutschl.* v. p. 480, T. II.
144 (1826); *Werner, Atlas. Alevons*, pls. 2, 3 (1827); *Brehm,*
Vög. Deutschl. p. 148 (1827); *Menetries, Cat. Rais. Cauc.* p. 4th

- (1824); *K. J. K. Vog.*, p. 2, pl. 29, fig. 1 (1824); *Selby*, *Br. & B.*, i, p. 136 (1833); *Gould*, *B. Eur.* ii, pl. 61 (1837); *Macgillivray*, *Br. B.*, iii, p. 671 (1840); *Crespin*, *Orn. Gard.*, p. 294 (1846); *Keys u. Blas. Würb. Eur.*, p. 149 (1846); *Nordm. in Dümel's Voy. Russ. Merd.* iii, p. 207 (1840); *Selys-Songch.*, *Janne Belg.*, p. 108 (1842); *Rüpp. Syst. Ubers.* p. 23 (1844); *Schl. Rev. Crit.*, p. iii, (1844); *Mühle, Beitr. Orn. Griechenl.*, p. 31 (1844); *Gray*, *Gen. Br.*, i, p. 81 (1847); *id. List Fissir. Brit. Mus.*, p. 62 (1848); *Thomps. B. Irel.*, i, p. 369 (1849); *Blkth. Cat. B. Mus. As. Soc.*, p. 49 (1849); *Bp. Consf.*, i, p. 158 (1850); *Cassin*, *Cat. Halcyon. Philad. Mus.*, p. 1 (1852); *Kjrrb. Orn.*, *Dan.*, pl. xiii, fig. 3 (1852); *Schl. Voy. Nederl.*, pl. 134 (1854); *Bp. Consf. Vaiuer. Avis*, p. 10 (1854); *Hewitts. Eggs. Br. B.*, i, p. 255, pl. 54, fig. 1 (1856); *Sunder. Sv. Faz.*, pl. lxxv, fig. 2 (1857-72); *journ. of Barth-Lapomme. Rch. Orn.*, p. 329 (1859); *E. C. Tielr. Ibis.*, 1859, p. 47; *Wright, Finl. Fog.*, p. 287 (1859); *Cal. & Heine, Mus. Hein. Th.*, ii, p. 143 (1860); *Parys, Ibis.*, 1860, p. 236; *Lunderm. Vog. Griechenl.*, p. 43 (1860); *Schl. Dier. Nederl. Vog.*, pl. 14, fig. 2 (1861); *Tristram, Ibis.*, 1862, p. 278; *Schl. Mus. Pays-Bas. Alcedines.*, p. 6 (1863); *Gray, List Br. B.*, p. 16 (1863); *Radde, Reis. Schr.*, *Vög.*, p. 143 (1863); *Adams, Ibis.*, 1864, p. 15; *Wight, t. c.*, p. 143 (1863); *Aitken, t. c.*, p. 237; *Sperling, t. c.*, p. 282; *More, Ibis.*, 1865, p. 138; *Tristram, Ibis.*, 1866, p. 84; *Silford, t. c.*, p. 178; *Desgl. & Gerbe, Orn. Eur.*, i, p. 173 (1867); *Taylor, Ibis.*, 1867, p. 56; *Drake, t. c.*, p. 125; *Löhrs, Expl. Sci. Alger. Ois.*, ii, p. 94 (1867); *Bettoni, Ucc. Ind. Lom.*, iii, *Alced. pls.*, i, l. a (1868); *Smith, Ibis.*, 1868, p. 849; *Cleott, Norzeg. Fugle.*, p. 147 (1869); *Gray, Hand-l. B.*, i, p. 95, n.^o 1151 (1869); *Keulen. Ouze.*, *Vög.*, i, pl. 45 (1869); *Borggr. Vogelf. Norddeuts. hl.*, p. 68 (1869); *Saunders, Ibis.*, 1869, p. 172; *Daderd. Avis. Sicil.*, p. 52 (1869); *Heugl. Orn. N. O.-Afr.*, i, p. 177 (1869); *Droste, Vog. Bork.*, p. 84 (1869); *Wyatt, Ibis.*, 1870, p. 12; *Ewles & Buckley t. c.*, p. 189; *Gould, B. Gt. Br.*, ii, pl. 10 (1870); *Sharpe, Monogr. Alced.*, p. 1, (1871) pl. i, (1870); *Fritsch, Vog. Eur.*, pl. xiv, fig. 1 (1871); *Salvad. Fauna Ital.*, *Ucc.*, p. 45 (1871); *Saunders, Ibis.*, 1871, p. 67; *R. Gray, B. W. Scott.*, p. 204 (1871); *Harting, Handb. Br. B.*, p. 34 (1772); *Godruan, Ibis.*, 1872, p. 169; *Shelley, B. Egypt.*, p. 168 (1872); *Brooke, Ibis.*, 1873, p. 236; *Savertz. Turkest. Jevotn.*, p. 68 (1873); *Hume, Str. F.*, i, p. 168 (1773); *Wright, Ibis.*, 1874, p. 257; *Silford, Ibis.*, 1875, p. 16; *Cordeaux, t. c.*, p. 184; *Dalst. & Havlie-Brown, t. c.*, p. 300; *Dresser, B. Eur.*, v, p. 113, pl. 260 (1775); *Iribi, B. Gibr.*, p. 68 (1875); *Stoliczka, Str. F.*, iii, p. 21 (1775); *Fallon, Ois. Belg.*, p. 122 (1775); *Whartou, Ibis.*, 1876, p. 19; *Dresser, t. c.*, p. 320; *Blauft. Last. Persia.*, ii, p. 121 (1776); *Butler, Str. F.*, v, p. 207 (1777); *Duf. Ibis.*, 1877, p. 262, (1878), p. 7; *Bogd. B. Cauc.*, p. 114 (1879); *Finsch. Verh. zool-bot. Ges. Wien.*, xxix, p. 173 (1779); *Butler, Cat. B. Sind. etc.*, p. 17 (1879); *Hume, Str. F.*, viii, p. 86 (1879); *Dauft. Ibis.*, 1880, p. 13; *Seeb. t. c.*, p. 293; *Nest. ed. Yarrowell's Br. B.*, ii, p. 443 (1881); *C. Swinh. Ibis.*, 1882, p. 102; *Seeb. t. c.*, p. 280; *B. O. U. List. Br. B.*, p. 80 (1833);

- Liebe, J. f. O. 1883, pp. 286–291; Seeb. Ibis, 1883, p. 21;
Irby, t. c. p. 179; Booth, Rough. Notes, ii. pl. 1831–87;
Gigl. Yconogr. Avif. Ital. sp. 59 (1882); Horreyer & Tancré,
MT. orn. Iser. Wien, 1883, p. 83; Capm. Ibs, 1884, p. 97;
Saunders, t. c. 379; Seeb. Hist. Br. B. ii. p. 341 (1884);
Tristr. Faun. & Flor. Palest. p. 86 (1884); Radde, Orn.
Cauc. p. 323 (1884); Murray, Vertebr. Faun. Sud, p. 111
(1884); Whitehead, Ibis, 1885, p. 27; Reid, t. c. p. 247; Gg'.
Ital. p. 283 (1886); Sharpe, Ibis, 1887, p. 166; Salzar, Elench.
Ucc. Ital. p. 76 (1887); Backh. Ibis, 1887, p. 12; Tait, t. c.
p. 305; Lorenz, Beitr. Orr. Kauk. p. 43 (1887); Leford, Cr.
Fg. Br't. B. part. viii. (1888); St. John, Ibis, 1889, p. 157;
Leford, t. c. p. 131; Gigl. Avif. Ital., 1st Resoc. p. 359
(1889); Seeb. B. Japan. Emp. p. 175 (1890); Sharpe, Cat. B. M.
17, p. 141 (1892).
- Martin-pecheur, Danbent, Pl. Ent. viii. pl. 77.
- Le Martin-pecheur, ou l'Aleyon, Buff. Hist. Nat. O's. vii. p. 164
(1780).
- Le Martin-pecheur, Buff. t. c. p. 201 (1790).
- Common Kingfisher, Lith. Gen. Svn. i. pt. 2, p. 626 (1782);
Yarrell, Hist. Brit. ii. p. 206 (1843).
- Indian Kingfisher, Lath. t. c. p. 631 (1782).
- Alcedo bengalensis, Gm. Syst. Nat. i. p. 450 (1788); Vieill. N.
Dct. d'Hist. Nat. xiv. p. 400 (1811); Sykes, P. Z. S. 1832,
p. 84; Kittl. Ktfl. Vdg. p. 22 pl. 29, fig. 2 (1842); Mc
Clell. P. Z. S. 1839 p. 156; Jerd. Matr. Journ. xi. p. 231
(1840); Hodgs. Icon. ined. in Brit. Mus., Passeres, pl. 17,
fig. 2 (606); id. in Gray's Zool. Misc. p. 82 (1844); Blyth, F.
A. S. R. xv. p. 11. (1846); Gray Cat. Mamm. etc. Nepal
pres. Hodgs. p. 57 (1846); id. Grn. B. i. p. 81 (1847); id.
Cat. Fiss. Brit. Mus. p. 68 (1848); Blyth, Cat. B. Mus.
As. Soc. p. 49 (1849); Bp. Conspl. i. p. 151 (1850); Cass.
Cat. Halc. Philad. Mus. p. 1 (1852); Layard, Ann. & Mag.
N. H. (2) xii. p. 172 (1853); Moore, P. Z. S. (1854),
p. 269; Bp. Conspl. Vol. An's. p. (1854); Horfs. & Moore,
Cat. B. Mus. E. Y. Co. i. p. 129 (1854); Adams, P. Z. S.
1858, p. 474; Gould, P. Z. S. 1859, pp. 150, 151; Adams,
t. c. p. 174; Swinh. Ibis, 1860, p. 49, 1861; pp. 31, 328;
Cub. & He ne, Mus. He'n. Th. ii. p. 144 (1860); Gould, B.
Asia, i. pl. 53 (1862); Jerd. B. Ind. i. p. 230 (1862); Blakist.
Ibs, 1862, p. 325; Schomb. Ibis, 1864, p. 247; Blyth, Ibis,
1866, p. 348; Whitley, Ibis, 1867, p. 196; Swinh. t. c. p.
408; Tytler, Ibis, 1868, p. 197; Bulger, Ibis, 1869 p. 156;
Beavan, t. c. p. 409; Gray, Handl. B. i. 95, n^o 1152
(1869); Godw-Aust. J. A. S. Beng. xxxix. p. 95 (1870).
Stol. t. c. p. 297; Swinh. Ibis, 1870, p. 92; Blanf. t. c. p.
465; Sharpe, Monogr. Alced. p. 11, pl. 2 (1870); Swinh.
P. Z. S. 1871, p. 347; Blanf J. A. S. Beng. xl. p. 271 (1871);
(1871); Shelley, B. Egypt. p. 166 (1872); Holdsw. P. Z. S.
1872, p. 424; Stoliezka, J. A. S. Beng. xli. p. 232 (1872);
Hume & Henders. Lahore to Yark. p. 178 (1873); Waldm.
Ibis, 1873, p. 202; Hayes, Lloyd, t. c. p. 407; Hume Nests.
& Eggs. Ind. B. p. 107 (1873); id. Str. F. i. pp. 168, 305,
450 (1873); Adam t. c. p. 372; Rainey, t. c. p. 496; Hume,

- Sr.*, *F.* ii, pp. 173, 470 (1874); *Ball*, *t. c.* p. 387; *Salvad.* *Loc.* *Born.* p. 92 (1874); *Hume*, *Str. F.* iii, p. 72 (1875); *Blyth.* & *Wald.* *B. Burm.* p. 71 (1875); *Butler*, *t. c.* 456; *Farb.* *Str. F.* iv, p. 254 (1876); *Armstrong*, *t. c.* p. 307; *Dresser*, *this*, 1876, p. 320; *Sharpe*, *Ibis*, 1877, p. 6; *Tweed.* *P. Z. S.* 1877, pp. 690, 757; *id. Ibs.* 1877, p. 297; *Ward*, *Ramsay*, *t. c.* p. 457; *David & Oust.* *Ois. Chine*, p. 74 (1877); *Tceurd.* *P. Z. S.* 1878, pp. 341, 709, 943; *Anders.* *Rap. Zool. Exped. Yunnan*, p. 580 (1878); *Blakist.* & *Pryer*, *Ibs.*, 1878, p. 229; *Hume & Davison*, *Str. F.* vi, p. 77 (1878); *Ball*, *Str. F.* vii, p. 204 (1878); *Cripps*, *t. c.* p. 260; *Segge*, *B. Ceylon*, i, p. 292 (1878); *Meyer*, *Ibis*, 1879, p. 64; *Hume*, *Str. F.* viii, pp. 49, 86 (1879); *Salvad.* *Ann. Mus. Civ. Genov.* xiv, p. 193 (1879); *Scully*, *t. c.* p. 238; *Doig*, *t. c.* p. 370; *Brooks*, *t. c.* p. 468; *Sharpe*, *P. Z. S.* 1879, p. 329; *Bull.* *Cat. B. Sind* & *p. 16* (1879); *id. Cat. B. S. Balab.* *Pres*, p. 20 (1880); *Salvad.* *Orn. Papuasia e delle Molucche*, i, p. 407 (1880); *Vidal*, *Str. F.* ix, p. 59 (1880); *Basham*, *t. c.* p. 155; *Butler*, *t. c.* p. 383; *Boulle*, *J. f. O.* 1880, p. 115; 1881, p. 53; *Ketham*, *Ibs.*, 1881, p. 382; *H. H. Slater*, *Ibis*, 1882, p. 432; *C. Swinh.* *Ibs.*, 1882, p. 102; *Jouy*, *Proc. U. S. Nat. Mus.* vi, p. 310 (1883); *Homeyer* & *Tancré M. T. orn. Ver. Wien*, 1883, p. 83; *Parker*, *Ibis*, 1883, p. 193; *Oates*, *Handb. B. Brit. Burm.* ii, p. 72 (1883); *Baklist*. *Amended. List. B. Japan*, p. 13 (1884); *Marras*, *Vertebr. Faun. Sind.*, p. 111 (1884); *Seeb.* *Ibis*, 1884, pp. 261, 428; *Sharpe*, *t. c.* p. 318; *C. H. T. Marshall*, *t. c.* p. 409; *Grimm*, *P. Z. S.* 1885, pp. 255, 407, 594, 547; *C. Siuah* & *Barnes*, *Ibis*, 1885, p. 61; *A. Mull.* *J. f. O.* 1885, p. 150; *Vorderm.* *N. T. Nederl. Ind.* xvi, p. 11 (1886); *Ggl.* & *Silvad.* *P. Z. S.* 1887, p. 581; *Sharpe*, *Ibis*, 1886, p. 485; *Reid*, *Str. F.* x, p. 22 (1887); *Oates*, *t. c.* p. 187; *Davison*, *t. c.* p. 295; *Davidson*, *t. c.* p. 351; *Taylor*, *t. c.* p. 457; *Tceury*, *t. c.* p. 471; *Stryan*, *Ibis*, 1887, p. 230; *Salvad.* *Ann. Mus. Civ. Genov.* (2) iv, p. 584 (1887); *Davries*, *J. f. O.* 1888, p. 65; *Vorderm.* *N. T. Nederl. Ind.* xl ix, p. 393 (1889); *Hartert*, *J. f. O.* 1889, p. 365; *St. John*, *Ibis*, 1889, p. 157; *Ewerett*, *P. Z. S.* 1889, p. 225; *id. Journ. Straits Branch R. As. Soc.* 1889, p. 158; *Sharpe*, *Ibs.*, 1890, pp. 18, 283; *Whitehead*, *t. c.* p. 45; *Oates* ed *Hume*, *Nests. & Eggs. Ind.* ii, p. 1 (1890).
Alcedo ispida bengalensis, *Temm.* & *Schl.* *Fann. Jap.*, *Aves*, p. 76, pl. 38 (1830); *Seehoem*, *Ibis*, 1882, pp. 248, 424; *id. Ibis*, 1887, p. 176.
A. ispida, var. *bengalensis*, *Raffl.* *Trans. Linn. Soc.* xii, p. 293 (1822); *Schrenck*, *Reis. Amurl.* p. 265 (1854); *Radde*, *Sibir. Ibis.*, *Vög.* p. 143 (1863); *Severtz.* *Turkestan. Journ.* p. 61 (1873).
A. hispida, *Less.* *Traité*, p. 243 (1831); *Filippi*, *Viagg. Persia*, p. 346 (1865).
A. subispida, *Brehm*, *Vög. Deutschl.* p. 149 (1831).
A. advena, *Brehm*, *t. c.* p. 150; *Fal.* xi, fig. 2 (1831).
A. pallasi, *Reichenb.* *Handb.*, *Alced.* p. 3, *Lat.* 392 *figs.* 3943-44, *Taf.* 393, *figs.* 3945-46 (1828).

- A. bengalensis, *var.* *sondaica*, *Reichenb.* *t. c.* p. 3 (1851).
A. japonica, *Bp. Conspl.* *Vol. Anis.* p. 10 (1854).
A. brachyrhynchus, *Brehm.* *Vogel.* p. 51 (1855).
A. pallida, *Brehm.* *t. c.* p. 51.
A. sondaica, *Cab.* & *Heine.* *Mus. Hein.* *Th. ii.* p. 144 (1860);
Gray. *Hand-l. B.* i. p. 95, n. 6 1157 (1869).
A. minor, *Schl.* *Mus. Pays-Bas.* *Alced.* p. 7 (1863); *id. Vog.*
Nedert. Ind. *Alced.* pp. 4, 43, pl. i. fig. 3 (1864).
A. ispida minor, *Heugl.* *Orn. N. O.-Afr.* i. p. 178 (1869).
Ispida bengalensis, *Tacz. J. f. O.* 1875, p. 254; *id. Bull. Soc.*
Zool. France, i. p. 135 (1876).
A. sindiana, *Hume.* *Str. f.* i. p. 168 (1873).
Alcedo minor, *Schlegel.* *in Veth's Midden-Sumatra.* *Vög.* p. 36 (1887).
Hab. Luzon, Manila, San Mateo, Montalban, Pampanga, Min-
doro, Baco, Negros, Cebú, Bohol, Leyte, Samar, Masbate, Si-
quijor, Guimaras, Basilan, Zamboanga, Mindanao, Paragua, Bi-
labac, Joló, Mainbun; China, Formosa, Europa, Asia.

7. A. meninting. *Horsf.* ♂ ♀ N. v. Bantîs.

(M. S. T.)

- Alcedo meninting, *Horsf.* *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 172 (1821).
Temm. *Pl. Col.* ii. p. 239 fig. 2 (1823); *Blyth.* *J. A. S. Beng.*
xv. p. 12 (1846); *Gray.* *Gen. B.* i. p. 81 (1847); *Kaup.* *Fam.*
Alced. p. 16 (1848); *Blyth.* *Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 49 (1849);
Bp. Conspl. i. p. 158 (1850); *Moore.* *P. Z. S.* 1854, p. 26; *Horsf.* & *Moore.* *Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 130 (1854);
Reichenb. *Handb.* *Alced.* p. 4, *Taf.* 394, fig. 3050-51 (1851);
Cass. Cat. Hale. *Philad. Mus.* p. 3 (1852); *Bp. Conspl.* *Voluer.*
Anis. p. 10 (1854); *Cab.* & *Heine.* *Mus. Hein.* *Th. ii.* p.
144 (1860); *Wall.* *P. Z. S.* 1863, p. 484; *Schl.* *Mus. Pays-*
Bas. *Alced.* p. 9 (1863); *id. Vog.* *Nedert. Ind.*, *Alced.* pp. 6,
44, pl. 3 (1864); *Gray.* *Hand-l. B.* i. p. 95, no. 1154 (1869);
Salvad. *Ucc. Born.* p. 93 (1874); *Sharpe.* *P. Z. S.* 1875,
p. 101; *Salvad.* *Ann. Mus. Civ. Genov.* vii. p. 652 (1875);
Tweed. *Ibis.* 1877, p. 397; *Hume & Davison.* *Str. F.* vi. p. 83
(1878); *Sharpe.* *P. Z. S.* 1879, p. 329; *id. Ibis.* 1879, p.
Hume. *Str. F.* viii. pp. 50, 16 (1879); *Salvad.* *Ann. Mus.*
Civ. Genov. xiv. p. 193 (1879); *Vorderm. Nat. Tijdschr. Nedert.*
Ind. xlvi. p. 185 (1881); *Kelham.* *Ibis.* 1881 p. 381; *A.*
Müll. J. f. O. 1882, p. 397; *Blasius.* *J. f. O.* 1883, pp. 213,
215; *Nichols.* *Ibis.* 1883, p. 83; *Blasius.* *Zeitschr. ges. Orn.*
iii. p. 94 (1886); *Vorderm. Nat. Tijdschr. Nedert. Ind.* xlvi.
p. 88 (1886); xlxi. p. 393 (1889); *Blasius.* *Ornis.* 1888, p. 307;
Sharpe. *Ibis.* 1890, pp. 18, 283; *Sharpe.* *Cat. B. M.* 17. 1892
p. 157.
Alcedo asiatica, *Swins.* *Zool. Illustr. 1st ser.* i. pl. 50 (1821);
Sharpe. *Ibis.* 1869, p. 218; *id. Monogr.* *Alced.* p. 25, pl. 5
(1870); *Walu.* *Ibis.* 1872, p. 368; *Hume Str. F.* i. p. 450
(1873); *Meyer.* *Ibis.* 1879, p. 64; *Guillem.* *P. Z. S.* 1885,
p. 255; *Sharpe.* *Ibis.* 1888, p. 197; *Everett.* *P. Z. S.* 1889,
p. 226; *id. Journ. Straits Branch R. As. Soc.* 1889, p. 159;
Whitehead. *Ibis.* 1880, p. 45.
Ceyx meninting. *Cuvier.* *Régn. Anim.* i. p. 444 (1829).
Alcedo bengalensis, *Cne. Gu. J. Less.* *Tract.* p. 243 (1821), pt.

A. verreauxi, *D. de Berg*, *Rev. Zool.* 1851, p. 305, pl. 9;
Reichenb. Handb. Alced. p. 5, Taf. 403 fig. 3173 (1851);
Blyth. Ibis, 1860, p. 348; *Gray. Handb. B.* i, p. 95, n° 1155
(1869).

Hab. Paragua, P. Princesa, Joló, Maimbun; Borneo, Sumatra,
Java, Célebes.

Subfam. DACELONINOS.

3. Gén. CEYN. LACÉP.

S. C. tridactyla, *Pall.* ♂ ♀ N. v. Susulbot.

{M. S. T.}

Meedo tridactyla, *Pallas. Spic. Zool.* vii, p. 10, tab. 2 fig. 1 (1769); *Linn. Mant. Plant.* p. 524 (1771); *Scop. Del. Faun. et Flor. Insul. II.* p. 90 (1795); *Cn. List. Nat.* i, p. 450 (1788).

Martin-pêcheur de l'île de Luçon, *Sonn. Vog. Nov. Guin.* p. 67, pl. 32 (1776).

Martin-pêcheur de Pondicherry, *Daubent. Pl. Ent.* vii, pl. 778, fig. 2.

Le Martin-pêcheur à trois doigts, *Buff. Hist. Nat. Ois.* vi, p. 203 (1780).

Meedo rubra, *Bott. Tabl. Pl. Ent.* p. 49 (1783).

A. purpurea, *Gm. Syst. Nat.* i, p. 449 (1788).

A. erythraea, *Gm. Syst. Nat.* i, p. 449 (1788).

Ceyx luzoniensis, *Steph. in Shaw's Gen. Zool.* xiii, p. 105 (1825).

C. tridactyla, *Sykes. P. Z. S.* 1832, p. 84; *Strickl. P. Z. S.* 1846, p. 66; *Gray. Gen. B.* i, p. 10 (1847); *id. Cat. Fissir. Brit. Mus.* p. 59 (1848); *Jerd. Ill. Ind. Oru.* pl. 25 (1847); *Bp. Consپ.* i, pp. 157, 158 (1858); *Cass. Cat. Haleyon. Pholid. Mus.* p. 13 (1852); *Bp. Consپ. Voluer. Anis.* p. 9 (1854); *Hartl. J. f. O.* 1854, p. 413; *Moore. P. Z. S.* 1854, p. 269; *Jerd. B. Ind.* i, p. 229 (1862); *Gray. Cat. Mamm. & Nepal.* *Hodges.* p. 24 (1863); *Sharpe. P. Z. S.* 1868, p. 271; *id. Monogr. Alced.* p. 119, pl. 40 (1868); *Gray. Handb. B.* i, p. 94, n.º 1142 (1869); *Salvad. Atti R. Accad. Sci. Torino.* iv, p. 455 (1886); *Stoliczka. J. A. S. Beng.* xxxix, p. 395 (1870); *Prov. Yellesley.*; *Holdsw. P. Z. S.* 1872, p. 424 *Hume. Str. F.* ii, p. 174 (1874); *Butler. t. c.* p. 453 *Walden. Ibis.* 1874, p. 137 *Hume. Str. F.* iii, p. 51 (1875); *Blyth. B. Burm.* p. 71 (1875); *Hume. Str. F.* iv, p. 287 (1876); *id. Str. F.* vi, p. 19 (1877); *id. & Davison. Str. F.* vi, pp. 80, 499 (1878); *Legge. B. Ceylon.* p. 303 (1879); *Hume. Str. F.* viii, p. 86 (1879); *Bingham. t. c.* p. 193 *id. Str. F.* ix, p. 155 (1880); *Butler. Cat. B. B. Somb. Pres.* p. 19 (1880); *Oates. Handb. B. Br. Burm.* ii, p. 80 (1883); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Genov.* (2) iv, p. 537 (1887); vii, p. 333 (1889); *Hume. Str. F.* xi, p. 45 (1888); *Oates. ed. Hume's Nests & Eggs Ind.* B. iii, p. 13 (1890); *Sharpe. Cat. B. M.* 17, 1892, p. 174.

C. purpurea, *Less. Tratè.* p. 38 (1831); *Reichenb. Handb. Alced.* 9, Taf. 398, fig. 3071 (1851); *Bp. Consپ. Vol. Anis.* p. 9 (1854); *Hartl. J. f. O.* 1855, p. 423.

- C. microsoma*, Burton, *P. Z. S.* 1837, p. 89.
C. erythaca, Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 50 (1849).
Dacelo rubra, Schl. *Mus. Pays-Bas, Alced.* p. 49 (1863); *id. Vog. Nederl. Ind. Alced.* pp. 40, 68, pl. 16, fig. 2 (1864).
Hab. Luzon, Laguna, Calauan, Los Baños.

9. *C. rufidorsa*, Sharpe, ♂♂ N. v. Bintis. (M. S. T.)

- Ceyx rufidorsa* (*nec Strickl.*), *Monogr. Alced.* p. 121, pl. 41 (1869); *id. Ibis*, 1877, p. 6 *Tweedd. Ibis*, 1877, p. 297 (SE.) *Kelham, Ibis*, 1881, p. 318 *Salvin, Cat. Strickl. Coll.* p. 418 (1882); *Nickols, Ibis*, 1883, p. 243; *Sharpe, Ibis*, 1884, p. 318; *Buttik Notes. Leyden. Mus.* ix p. 37 1887; *W. Whitehead, Ibis*, 1890, p. 45 *Everett, Journ. Straits Branch R. Asiat. Soc.* 1889, p. 159; *Steere, List Birds & Mamm. Steere Exped.* p. 10 (1890).
C. inornata (*nec Salvad.*), *Sharpe, P. Z. S.* 1875, p. 101.
C. dillwynni (*nec Sharpe 1868*), *Sharpe, Ibis*, 1879, p. 249 *id. P. Z. S.* 1881, p. 793.
Dacelo rufidorsa (*nec Strickl.*), *Schl. Mus. Pays Bas, Alced.* p. 49 (1863); *id. Vog. Nederl. Ind. Alced.* pp. 40, 67, pl. 16, fig. 1 (1864); *Sneltem. in Veth's Midden-Sumatra, Vog.* p. 36 (1884).
C. euerythra, *Sharpe, Cat. B. M.* 17, 1892, p. 179.
Hab. Mindoro, Calapan, Paragua, P. Princesa Iguahig; Borneo, Sumatra, Malaca.

10. *C. melanura*, Kaup, ♂♂ N. v. Casaycasay. (M. S. T.)

- Ceyx melanura*, *Kaup, Fam. Eisv.* p. 15 (1848); *Gray, Cat. Fissir. Brit. Mus.* p. 59 (1848); *id. Gen. B.* iii App. p. 5 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 158 (1850); *Reichenb. Handb. Alced.* p. 9 (1851); *Cass. Cat. Halcyon Philad. Mus.* p. 13 (1852; *Ambona*); *Cab. & Heine, Mus. Hein. Th.* ii. p. 151 (1860); *Sharpe, P. Z. S.* 1868, p. 271; *id. Monogr. Alced.* p. 117, pl. 39 (1868); *Gray, Haud.-I. B.* i. p. 94, n.º 1144 (1869); *Salvad. Atti R. Accad. Torino*, iv. p. 453 (1869); *Sharpe, P. Z. S.* 1890, p. 511; *Tweedd. Trans. Z. S.* ix. p. 152 (1875); *Wardlaw Ramsay, Ibis*, 1884, p. 332; (*Manila*), 1889, p. 156; *Steere, List Birds & Mamm. Exped. Philipp.* p. 9 (1890). *Sharpe, Cat. B. M.* 17, 1892, p. 180.
Dacelo melanura, *Schlegd, Mus. Pays-Bas, Alced.* p. 49 (1863).
Ceyx samarensis, *Steere, List Birds & Mamm. Steere Exped. Philipp.* p. 40 (1890).
C. platensis, *Blasius, J. f. O.* 1890, p. 148.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Laguna.

11. *C. basilanica*, Steere, ♂ N. v. Bintis. (M. S. T.)

- Ceyx basilanica*, *Steere, List. Birds et Mamm. Steere Exp. Philipp.* p. 10 (1890). *Sharpe, Cat. B. M.* 17, 1892, p. 181.
Hab. Basilan.

12. *C. mindanensis*, Steere, N. v.

Ceyx mindanensis, Steere, List. Birds. Exped. Philipp. p. 10 (1890); Sharpe, Cat. B. 17, (1892); p. 181.
Hab. Mindanao.

13. *C. lepida*, Temm. ♂ ♀ N. v.

(M S T)

Ceyx lepida, Temm. Pl. Col. iv. pl. 595 fig. 1 (1836); Less., Compl. Buff., O's. p. 649 (1838); Gray, Cat. Fissir. Brit. Mus. p. 59 (1849); Bp. Conspl. i. p. 158 (1850); Reichenb. Handb., Alced. p. 10 Taf. 398, fig. 3669 (1851); Cass. Cat. Haltym. Philad. Mus. p. 14 (1852); Bp. Conspl. Vol. Anis. p. 9 (1854); Hartl. J. f. O. 1854, p. 414; Gray, P. Z. S. 1858, p. 190; id. Cat. B. New Guinea, p. 55 (1859); id. P. Z. S. 1860, p. 348, 1861, p. 433; Wall, P. Z. S. 1862, pp. 335, 338 (pt.); id. P. Z. S. 1873, p. 25; Rosenb. Nat. Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. p. 251 (1863); id. J. f. O. 1864, p. 118; Finsch, Neu-Guinea, p. 161 (1865); Sharpe, P. Z. S. 1868, pp. 271, 596; id. Monogr. Alced. p. 131, pl. 46 (1868); Gray, Handl. B. i. p. 94, n.º 1145 (1869); Satzad. Atti R. Accad. Sci. Torino, iv. p. 471 (1869); Sharpe, P. Z. S. 1869, p. 509; Satzad. Ann. Mus. Civ. Genov. x. p. 30 (1877); id. P. Z. S. 1878, p. 81; id. Orn. Papuasia, i. p. 417 (1880); id. Rep. Zool. et. M. S. «Challenger», ii. p. 62 (1881); Blasius & Nehrk. Verh. z.-b. Ges. Wien. xxxii. p. 418 (1882); Blasius, P. Z. S. 1882, p. 704; Pleske, Bull. Acad. St. Petersb. xxix. p. 525 (1884); Guillemin, P. Z. S. 1885, p. 567; Salvad. Agg. Orn. Papuasia, i. p. 53 (1890); Sharpe, Cat. B. M. 17. 1892, p. 883.

Alcyone lepida, Gray, Gen. B. i. p. 82 (1847).

Ceyx uropygialis, Gray, P. Z. S. 1860, p. 348; Finsch, Neu-Guinea, p. 161 (1865); Sharpe, P. Z. S. 1868, pp. 271, 596; id. Monogr. Alced. p. 133, pl. 47 (1869); Satzad. Atti R. Accad. Sci. Torino, iv. p. 474 (1869); Gray, Handl. B. i. p. 94, n.º 1148 (1869); Satzad. Ann. Mus. Civ. Genov. v. p. 764 (1875).

Dacelo lepida, Schl. Mus. Pays-Bas, Alced. p. 48 (1863); id. Vög. Nederl. Ind. Alced. pp. 39, 66, pl. 16, figs. 4, 5 (1865); id. Mus. Pays-Bas, Alced. Rovue, p. 34 (1874).

Alcedo lepida, Rosenb. Reis. naar Geelvinkb. p. 6 (1875).

Hab. Filipinas? Molucas.

4. *C. malamaui*, Steere, N. v.

Ceyx malamaui, Steere List. Mam. et Birds. Exp. Philipp. p. 11 (1890); Sharpe, Cat. B. M. 17, p. 184, (1892).

C. suluensis, Blasius, J. f. O. 1890, p. 141.
Hab. Malamaui, Basilan, Joló.

15. *C. bournsi*, Steere, N. v.

Ceyx bournsi, Steere, List. Exped. Philipp. p. 10 (1890); 17 p. 185 (1892). Sharpe Cat. B. M. 17. 1892, p. 185.

C. margar, Blasius, J. f. O. 1890, p. 140.
Hab. Basilan, Joló.

16. **C. cyanopectus.** *Laf. & O N v. Susulbat.* (M. S. T.)

Ceyx cyanopectus, *Laf. Rev. Zool.* 1840, p. 33; *Gray, Gen. B.* ii. App. p. 5 (1841); *Wardlaw-Ramsay, Ibis*, 1884, p. 332, pl. ix; *id. Ibis*, 1886, p. 156; *Steere, List Birds & Mamm.* *Steere, Exped. Philipp.* p. 10 (pt. 1890); *Sharpe, Cat. B. M.* 17, p. 184 (1892).

Aleyone cyanopectus, *Jord. Coctr. Orn.* 1850, p. 82; *Bp Conspl.* i. p. 158 (1850); *Reichenb. Handb. Alced.* p. 74, Taf. 396, fig. 3660 (1851); *Bp Conspl. Voluer Anis.* p. 10 (1854); *Hartl. J. f. O.* 1854, p. lxiv; *Sharpe, P. Z. S.* 1869, p. 353; *id. Monogr. Alced.* p. 55, pl. 17 (1869); *Walden, Trans Z. S.* ix, pp. 153, 249 (1875); *Wardlaw-Ramsay, App. Tweed. Mem.* p. 655 (1881).

A. cineta, *Jard. Contr. Orn.* 1850, p. 82, pl. only.
Alcedo cyanopectus, *Schl. Mus. Pays-Bas Alced.* p. 18 (1863); *Gray, Handl. B.* i. p. 95, n° 1161 (1869).

Ceyx philippensis, *Gould, P. Z. S.* 1868, p. 404; *Sharpe, Monogr. Alced.* p. 113, pl. 37 (1869); *Walden, Trsns. Z. S.* ix, pp. 153, 249 (1875); *Wardlaw Ramsay, Tweed. Mem.* 1881, p. 654 (1881).

Hab. Luzón, Manila, Marinduque, Mindoro, Calapan.

17. **C. sterni**, *Sharpe. ♂ ♀ N. v. Casay-casay.* (M. S. T.)

Ceyx philippensis, *Steere, List. Bird. Exped. Philipp.* p. 10 (1890); *Sharpe, Cat. B. M.* 17, p. 187 (1892).

Hab. Mindoro, Baco, Naujan.

18. **C. argentata**, *Tw. ♂ ♀ N. v. Sibit.* (M. S. T.)

Ceyx argentata, *Tweeddale, An. et Mag. N. H.* xx, p. 533 (1877); *id. P. Z. S.* 1877, p. 822; *id. Ibid.* 1878, p. 108 pt. vi.; *Steere, List. Exped. Philipp.* p. 10. 1890; *Sharpe, Cat. B. M.* 17, p. 187 (1892).

Hab. Samar, Paranas, Paric, Borongan, Calbayog, Dingat, Mindanao, Placer, Zamboanga.

19. **C. fluminicola**, *Tw. ♂ ♀ N. v. Sibit.* (M. S. T.)

Ceyx argentata, *Tw. P. Z. S.* 1878, p. 341.

C. flumenicola, *Steere, List. Exped. Philipp.* p. 10. 1890; *Sharpe, Cat. B. M.* 17, p. 187 (1892).

Hab. Samar, Borongan, Leyte.

4. Gen. DACELO, LEACH.

20. **D. gigas**, *(Beddoe). ♂ N. v.* (M. S. T.)

Grand Martin-pecheur de la Nouvelle Guinée, *Sonn. Voy. Nov. Guin.* i. p. 171, Taf. 106 (1766).

Martin-Pêcheur de la Nouvelle Guinée, *Daubent. Pl. Ent.* viii, pl. 163.

Le plus grand Martin-pêcheur, *Buff. Hist. Nat. Ois.* vii. p. 181 (1780).

Dacelo gigas, Gray, *Gen. B.* i. p. 78 (1846); Sharpe, *Cat. B. M.* 17, 1892, p. 204.
Hab. Australia.

§. Gen. HALCYON, Swains.

21. H. coromandus, *Lath. S. N.* v. Salasae.

M. S. T.

Le Martin Pêcheur violet des Indes, *Sonn. Voy. Ind. Orient.* ii. p. 212 (1782).

Le Martin Pêcheur violet de la côte de Coromandel, *Sonn. t. c.* pl. 118 (1782).

Alcedo coromanda, *Lath. Ind. Orn.* i. p. 252 (1790); *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 174 (1820).

Halcyon coromanda, Steph. in Shaw's *Gen. Zool.* xiii. pt. 2, p. 100 (1826); *Cass. Cat. Hale. Philad. Mus.* p. 7 (1852); Sharpe, *Monogr. Alced.* p. 155, pl. 57 (1870); *Ball J. A. S. Beig.* xli. p. 277 (1872); *d. Str. F.* i. p. 58 (1873); *Hume, Str. F.* ii. pp. 469, 494, p. 470; *Blyth, & Wald. B. Burm.* p. 7 (1875); *Wardle Ramseyc.* *Ibis*, 1870, p. 456; *Hume & Davy. Str. F.* xi. p. 75 (1878); Sharpe, *Ibis*, 1879, p. 249; *d. P. Z. S.* 1879, p. 3, 1; *Hume, Str. F.* viii. pp. 49, 85 (1879); Sharpe *P. Z. S.* 1881, p. 793; *Sejn. Proc. U. S. Nat. Mus.* vi. p. 310 (1883); *Oates, Landab. B. Br. B. r. m.* ii. p. 81 (1883); *Güliem. P. Z. S.* 1885, pp. 497, 548; *Blakist. Amend. List. B. Japan.* p. 14 (1884); *Seeb. Ibis.* 1887, p. 176; *Stejn. Proc. U. S. Nat. Mus.* x. p. 403 (1887); *Hume, Str. F.* xi. p. 44 (1888); *Tacz. P. Z. S.* 1888, p. 154; Sharpe, *Ibis*, 1888, 1, 197; *Styan, Ibis*, 1889, p. 446; *Everett, P. L. S.* 1889, p. 220; *d. Journ. Straits Branch. R. Asiat. Soc.* 1889, p. 160; Sharpe, *Ibis*, 1890, pp. 20, 283; *Whithead, t. c.* p. 49; *Seebohn, P. Japan, Emp.* 173, (1890); *Steere, List. Birds. & Mamm. Steere. Exped. Philipp.* p. 11 (1890); Sharpe, *Cat. B. M.* 17, 1892, p. 266; *Halcyon coronatilobus*, Vigors, *App. Mem. Raffl.* p. 654 (1830); *Stolzschka, J. A. S. Beng.* xxix. p. 299 (1870); *Walden, Ibis*, 1, 71, p. 165.

Dacelo coromanda, Less. *Traité*, p. 247 (1831); *Sehl. Mus. Pays-Bas.* *Alced. Revue*, p. 16 (1874).

Halcyon bilineata, Swains. *Classi. B.* ii. p. 335 (1837); *Bp. Conspl.* i. p. 156 (1850); Motley & Dilw. *Nat. Hist. Labuan*, p. 13 (1855); *Sil. P. Z. S.* 1863, 4, 213.

Alcyon calypga, Hodgs. *Icon. Acad. a Brit. Mus., Passere*, 1, 16, n.º 769; *id. in Gray's Zool. Msc.* p. 82 (1844).

Halcyon coromandra, Gray, *Cat. Mamm. etc. Nepal pres. Hodsg.* p. 56 (1846).

H. coromandiana, Gray, *Gen. B.* i. p. 79 (1846); *id. List. Fix-sir. Brit. Mus.* p. 55 (1848); *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 126 (1854); *Jerd. B. Ind.* i. p. 227 (1862); *Swinh. Ibis*, 1863, p. 259; *id. P. Z. S.* 1863, p. 333; *id. P. Z. S.* 1871, p. 347; *Gray, Hand-l. B.* i. p. 91, n.º 1699 (1869); *Blakist. & Pryer, Ibis*, 1878, p. 230; *Seebohm, Ibis*, 1870, p. 24.

- H. coromanda major, *Temm.* & *Schl. Faun. Japon.* p. 75, pl. 39 (1842).
H. coromanda minor, *Temm.* & *Schl. Faun. Japon.* p. 76 (1842).
H. coromander, *Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc. Soc.* p. 47 (1849).
H. schlegeli, *Bp. C nsp.* i. p. 156 (1850).
Callialcyon coromanda, *Reichenb. Hantb. Alced.* p. 15, Taf. 495.
fig. 3092 (1851); *Bp. Conspl. Vol. An's.* p. 9 (1854); *Wald. Ibis*, 1873, p. 302; *Salvad. Ucc. Born.* p. 793 (1874); *Wald. Trans. Z. S.* ix. p. 155 (1875); *P. Z. S.* 1878, p. 944; *David & Oost. Ois Ch'ne*, p. 75 (1877); *Muller, J. f. O.* 1882, p. 398; *Ordermat. Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* xlvi. p. 11 (1886).
C. lilacina, *Bp. Conspl. Vol. An's.* p. 9 (1854).
C. schlegeli, *Bp. t. c.* p. 9 (1854).
Dacelo coromandiana, *Schl. Mus. Pays-Bas, Alced.* p. 25 (1863, pt.); *id. Vög. Nederl. Ind.* pp. 24, 56, pl. 8, fig. (1864).
D. cora vanelliana major, *Schl. Mus. Pays-Bas, Alced.* p. 25 (1863).
Halcyon rufa, *Wall. P. Z. S.* 1862, p. 338.
H. coromanda, var. rufa, *Brüggem. Abhandl. nat. Ver. Bremen*, v. p. 54 (1876).
Callialcyon rufa, *Wald. Trans. Z. S.* viii. p. 44 (1872); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Genov.* vii. p. 653 p. (1877); *Meyer, Ibis*, 1879, p. 62; *Blasius, Zeitschr. ges. Orn.* iii. p. 90 (1886); *id. Ornis*, iv. p. 572 (1888).
Halcyon coromanda rufa, *Stejn. Proc. U. S. Nat. Mus.* x. p. 403 (1887).
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Cavite, Cagayan, Guimaras, Mindanao, Zamboanga; Java, Sumatra, Formosa, Borneo, Célebes.

22. *H. smyrnensis*, (*Linn.*) ♂ ♂ N v Salacsac.

(M. S. T.)

- The smyrna Kingfisher, *Albin, Nat. Hist. B.* iii. p. 27, pl. 27 (1740).
T. Large Kingfisher from Bengale, *Albin, t. c.* p. 27, pl. 28 (1740).
T. Great Kingfisher from the River Gambia, *Edwards, N. Hist. B.* i. p. 8, pl. 8 (1743).
Le Martin-pêcheur de Smyrne, *Br.s. Orn.* iv. p. 499 (1760).
L. Grand Martin pêcheur de Bengale, *Br.s. t. c.* p. 501 (1760).
Alcedo smyrnensis, *Linn. Syst. Nat.* i. p. 181; *Gm. Syst. Nat.* i. p. 456 (1788); *Eyton, P. Z. S.* 1839, p. 101.
Martin-pêcheur de la côte de Malabar, *Daubent. Pl. Ent.* viii. pl. 894.
Smyrna Kingfisher, *Lath. Gen. Syn.* i. pt. 2, p. 615 (1782).
Great Gambian Kingfisher, var. A, *Lath. t. c.* p. 616 (1782).
G. Bengal Kingfisher, var. B, *Lath. t. c.* p. 616 (1782).
Alcedo fusca, *Bodd. Tabl. Pl. Ent.* p. 54 (1783).
Dacelo smyrnensis, *Less. Traité*, ii. p. 246 (1831).
Halcyon smyrnensis, *Steph. in Shaw's Gen. Zool.* xiii. p. 99 (1826); *Sykes, P. Z. S.* 1832, p. 84; *McClell. P. Z. S.* 1839, p. 156; *Jerd. Madr. Journ.* xi. p. 230 (1840); *Strickl. Ann. & Mag. Nat. Hist.* ix. p. 441 (1842); *Gray, Cat. Mamm. etc.* *Népal. pres. Hodgs.* p. 57 (1846); *id. Gen. B.* i. p. 79 (1846); *id. List. Fissir. Brit. Mus.* p. 55 (1848); *Blyth, Cat. B. Mus.*

- As. Boe.* p. 47 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 155 (1850); *Cis. Cat. Hale. Philad. Mus.* p. 6 (1852); *Moore P. Z. S.* 1854, p. 288; *Horsf. & Moore. Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 125 (1854); *Swinh. Ibis.* 1860, p. 48; 1861, p. 21; *Irby. Ibis.* 1861, p. 227; *Tristr. Ibis.* 1866, p. 86; *Blyth. t. c.* p. 348; *Gray. Handb. B.* i. p. 91, n.^o 1095 (1860); *Sharpe. Minogr. Alced* p. 161, pl. 59 (1870); *Swinh. Ibis.* 1870, p. 93; *Blanf. t. c.* p. 465 (Pegu); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 347; *Blanf. J. A. S. Beng.* xl. p. 371 (1871); *Holdsw. P. Z. S.* 1872, p. 424; *Szelczi. J. A. S. Beng.* xli. p. 232 (1872); *Hayes Lloyd. Ibis.* 1873, p. 407; *Hume. Nests & Eggs. Ind. B.* p. 105 (1873); *id. Sri. F. i.* pp. 103, 115, 168 (1873); *Adam. t. c.* p. 372; *Str. F. ii.* p. 387 (1874); *Hume. t. c.* p. 470; *Blyth. & Wald. B. Burm.* p. 70 (1875); *Hume. Str. F.* iii. p. 51 (1875); *Pegu.*; *Butler. t. c.* p. 456; *id. Str. F.* iv. p. 34 (1875); *Fairb. t. c.* p. 254; *Armstr. t. c.* p. 306; *Hume. t. c.* p. 383; *Blanf. Ex. Persia.* ii. p. 121 (1876); *Hume. Str. F.* v. p. 19 (1877); *Oates. t. c.* p. 143; *Fairb. t. c.* p. 394; *Hume. & Davison. Str. F.* vi. p. 74 (1873); *Hume. Str. F.* p. 54 (1878); *Davison & Wenden. t. c.* p. 77; *Murray. t. c.* p. 119; *Ball. t. c.* p. 244; *Cripps. t. c.* p. 260; *Anderson. Zool. Exped. Yun-nan.* p. 579 (1878); *Hume. Str. F.* viii. pp. 49, 85; *Scully. t. c.* p. 238; *Dougl. t. c.* p. 377; *Legge. B. Ceylon.* p. 298 (1879); *Butler. Cat. B. Sind etc.* p. 16 (1879); *id. Cat. B. S. Birb. Prev.* p. 19 (1880); *Vidal. Str. F.* ix. p. 49 (1880); *Bingham. t. c.* p. 154; *Danf. Ibis.* 1880, p. 83; *Bu-Str. F.* ix. p. 382 (1881); *Kelham. Ibis.* 1881, p. 380; *Reid. Str. F.* x. p. 21 (1881); *Davison. Str. F.* x. p. 296 (1882); *Davison t. c.* p. 351 (1883); *Oates. Handb. B. Br. Burm.* ii. p. 82 (1883); *Tristr. Faun. & Flora. Palest.* p. 87 (1884); *Murray. Vertebr. Faun. Sint.* p. 110 (1884); *C. H. T. Marshall. Ibis.* 1884, p. 409; *Swinh. & Barnes. Ibis.* 1885, p. 61; *Radde. Ibis.* 1885, p. 237; *Sharpe. Ibis.* 1886, p. 488 (Fao); *Taylor. Str. F.* x. p. 457 (1887); *Teery. t. c.* p. 471 (Palanis); *Styan. Ibis.* 1887, p. 230; *Gull. Ibis.* 1888, p. 102; *Hume. Str. F.* xi. p. 44 (1888); *St. John. Ibis.* 1889, p. 157; *Oates. ed. Hume's Nests. & Eggs.* iii. p. 15 (1890); *Sharpe. Cat. B. M.* 17 (1892) p. 222.
- Alcyon smyrnensis. Hodgs. Icon. ined. Brit. Mus., Passeres.* pl. 17 fig. 1 (no. 590); *id. in Gray's Zool. Misc.* p. 82 (1844).
- Alcyon fusca. Gray. Gen. B.* i. p. 79 (1846); *id. List. Fissir. Brit. Mus.* p. 6 (1852); *Horsf. & Moore. Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 125 (1854); *Jerd. B. Ind.* i. p. 224 (1862); *Beavan. Ibis.* 1865, p. 408; *Blyth. Ibis.* 1868, p. 348; *Walden. 16 s.* 1871, p. 165; *Cordeaux. Ibis.* 1888, p. 225, (Dras).
- Entomothera smyrnensis. Reichenb. Handb.; Alced.* p. 13 (1851)
- E. fuscata. Reichenb. t. c.* p. 12, Taf. 404, figs. 3088-89 (1851)
- Entomobius smyrnensis. Cab. & Heine. Mus. Hein. Th.* ii p. 155, note (1860); *David & Oust. O. s. Chine.* p. 76 (1877); *Salvad. Ann. Mus. Genov.* iv. p. 857 (1886, Blamo).
- E. fusca. Cab. & Heine. t. c.* p. 155 (1860).
- Dacelo fuscata. Schl. Mus. Pays-Bas. Alced.* p. 28 (1863); *id. Revue.* p. 18 (1874); *Heugl. Orn. N. O.-Afr.* p. 188 (1869).
- Hab.* Luzón, Cavite, Indian; China.

23 *H. gularis*, *Kuhl*. ♂♂ N. v. Salacae. (M. S. T.)

- L. Martin-pêcheur bleu de Madagascar, *Briss. Orn.* iv. p. 496, pl. xxxviii, fig. 2 (1760).
Gran Martin-Pêcheur de Madagascar, *Daubent. Pl. Ent.* viii. pl. 232.
Alcedo smyrnensis, var. 3, *Gm. Syst. Nat.* i. p. 456 (1788).
A. gularis, *Kuhl*, *Buffon*, & *Daubent. Fig. Av. Col. Nom. Syst.* p. 4 (1820).
A. rufigirostris, *Kittl*, *Kupf. Vog.* p. 10, Taf. 14, fig. 2 (1832); *Meyen, Beitr.* p. 94 (1834).
A. melanoptera (nec *Horsf.*), *Temm. Tabl. Méth.* p. 75 (1830).
Halcyon ruficollis, *Swains. Class. B.* ii. p. 335 (1837).
Alcyon smyrnensis, var. *albogularis*, *Blyth. J. A. S. Beng.* vii. p. 99 (1843), xiii. p. 394 (1844).
H. gularis, *Grav. Gen. B.* i. p. 79 (1846); *Kaup, Fam. Ess.* p. 8 (1848); *Bp. Conspl* i. p. 155 (1850); *Gould, B. Asia*, i. pl. (1861); *Grav. Handl. B.* i. p. 91, n.º 1095 (1869); *Shirps. Monogr. Alced.* p. 165, pl. 60 (1870); *Wald & Lizard, Ibis*, 1872, pp. 96, 97; *Sharpe, Trans. Linn. Soc.* (2) i. p. 317 (1876); *Steere, List Birds & Mamm. Steere Exped. Philipp.* p. 11 (1890); *Shirps., Cat. B. M.* 17, 1892, p. 227.
Entomothera gularis, *Reichenb. Handb.*, *Alced.* i. p. 13, Taf. 40, fig. 3082 (1861).
Entomobius gularis, *Cab. Mus. Hein. Th.* ii. p. 155 (1860); *Wald Tr. Z. S.* ix. p. 154 (1875); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 538 (Mindanao), p. 541 p. 690 p. 758 p. 823; *id. P. Z. S.* 1878, p. 282 p. 34 p. 379 p. 943.
Alcedo fusca, (nec *Bodd.*) *Martens J. f. O.* 1866, p. 16; *id. Preuss. Exped. Ost.-Ass'en.* p. 189 (1867).
Dacelo gularis, *Schl. Mus. Pays-Bas, Revue. Alced.* p. 19 (1867).
Hab. Luzón, Manila, S. Mateo, Montalban, Cavite, Indán, Bataan, Orini, Balacán, Loloñaboy, Luguña, Los Baños, Cagayán, Pamplona, Mindoro, Baco, Celú, Negros, Sibulan, S. Bernardino, Valencia, Panáy, Hiló, Guimarás, Senar, Masbate, Marinduque, Mindanao, Zamboanga, Panaon, Surigao.

24 *H. pileatus*, *Bodd.* ♂♂ N. v. Salacae. (M. S. T.)

- Martin-pêcheur de la Chine, *Dubent. Pl. Ent.* vii. pl. 673.
Le Martin-pêcheur à coiffe noir, *Ruff. Hist. Nat. O's.* vii. p. 119 (1780).
Black-capped Kingfisher, *Lith. Gen. Syst.* i. pt. 2, p. 624 (1782).
Alcedo pileata, *Bodd. Tabl. Pl. Ent.* p. 41 (1783).
A. atricapilla, *Gm. Syst. Nat.* i. p. 453 (1780); *Lath. Ind. Orn.* i. p. 251, (1790); *Raffl. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 293 (1820).
Halcyon atricapilla, *Vig. Mam. Raffl.* p. 655 (1830); *Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 47 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 155 (1850); *id. Conspl. Veluer. Anis.* p. 9 (1854); *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* i. p. 124 (1854); *Jerd. B. Ind.* i. p. 220 (1862); *Stellezki, J. A. S. Beng.* xxxix. p. 296 (1870); *Hum. Ibis*, 1870, p. 438; *Blanf. I. c.* p. 495; *Gould, B. Asia*, i. pl. 45 (1860); *Pelz, R's. Novara*, *Vog.* p. 94 (1855); *Bod. Syst. F.*

i. p. 58 (1873); *Hume Str. F.* ii. p. 167 (1874); *id. Str. F.* iv. p. (1876).

Alcedo brauna, *Less. Cant. Zool.* pl. 8 (1830).

Dacelo atricapilla, *Less. Traité*, p. 246 (1831).

Alcedo puebla, *Uen Kreling*, teste *Reichenb. J. f. O.* 1854, p. 149.

Halcyon pileata, *Gray, Gén. B.* i. p. 79 (1846); *id. List. Ess.* p. 54 (1848); *Cass. Cat. Hale. Phil. Mus.* p. 5. (1852); *Sharpe, Monogr. Alced.* p. 165; pl. 62 (1868); *Grey, Handb. B.* i. p. 91, n.^o 1097 (1869); *Wald. Ibis*, 1871, p. 165; *Seeb. Ibis*, 1870, p. 93; *id. P. Z. S.* 1871, p. 347; *Holdsw. P. Z. S.* 1872, p. 424; *Hume, Sir. F.* ii. p. 470 (1874), iii. p. 5 (1875); *Armstr. Str. F.* iv. p. 306; *Sharpe, P. Z. S.* p. 103 (1875); *Blyth. & Wald. B. Burn.* p. 70 (1875); *Sharpe, Ibis*, 1876, p. 33; *Tweedt. Ibis*, 1877, p. 290; *Wardlaw Ramsay, t. c.* p. 456; *Hume, & Davison Str. F.* vi. pp. 499 (1878); *Bell. Str. F.* vii. p. 235 (1878); *Sharpe, P. Z. S.* 1879, p. 331; *id. Ibis*, 1879, p. 249; *Legge, B. Ceylon*, i. p. 301 (1879); *Hume, Str. F.* viii. p. 40; p. 85; *Bingham, t. c.* p. 193; *Vidat. Str. F.* ix. 49 (1880); *B'ngham, t. c.* p. 154; *Butler, Cat. B. S. Bomb. Pres.* p. 19 (1880); *id. Str. F.* ix. p. 382 (1881); *Ketham. Ibis*, 1881, p. 380; *Ost's. Histb. B. Brit. Burn.* i. p. 83 (1883); *Nichols. Ibis*, 1883, p. 243; *Seeb. Ibis*, 1884, p. 261 (*Kiang R.*); *Guillem. P. Z. S.* 1885, p. 548; *Tacz. P. Z. S.* 1887, p. 600; *Syan. Ibis*, 1887, p. 237; *Tacz. P. Z. S.* 1888, p. 462; *Sharpe. Ibis*, 1888, p. 197; *Whitehead. Ibis*, 1890, p. 45; *Steere. List. Birds & Mamm. Steere Exped. Philipp.* p. 11 (1890); *Sharpe, Cat. B. M.* 17. 1892 p. 229.

Entomothera pileata, *Reichenb. Handb.*; *Alced.* p. 15, *Faf.* 401, *figs.* 3080-80 (1851).

Entomobius pileata, *Cab. & Heine. Mus. Hein. Th.* ii. p. 155 (1860); *Salvad. Ucc. Born.* p. 102 (1874); *Wald. Trans. Zool. Soc.* ix. p. 154 (1875); *David & Oust. Ois. Chine*, p. 75 (1877); *Meyer. Ibis*, 1879, p. 61; *Tacz. J. f. O.* 1881, p. 180; *Mitterer, J. f. O.* 1882, p. 398; *Vorst. m. Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* xlvi. p. 11 (1885); *Blasius. Ornus.* iv. p. 307 (1888).

Dacelo pileata, *Schl. Mus. Pays-Bas.* *Alced.* p. 27 (1863); *id. Vog. Nederl. Ind.*, *Alced.* pp. 22, 54, pl. ix. fig. 2 (1864); *id. Mus. Pays-Bas. Rev. Alced.* p. 18 (1874).

Hab. Balabac, Cuyo, Calauianes, Basilan; China, Sumatra, Java.

25. *H. albicillus*, (*Cuv.*) N. v.

(M. S. T.)

Alcedo albicilla, *Curver. M. S. S. : Dumont. Dict. Sc. Nat.* xxix. p. 273 (1823); *Pucher. Rev. Zool.* 1853, p. 388.

Sauvages albicilla, *Salv. Orn. Papuasia*, i. p. 470 (1880).

Hdeyon albicillus, *Sharpe, Cat. B. M.* 17. p. 249 (1892).

Hab. Islas Marianas.

26. *H. winchelli*, *Sharpe, C. O. N. v. Bintis.*

(M. S. T.)

Halcyon winchelli, *Sharpe, Tr. Lit. Soc.* i. p. 318, pl. 47 (1875); *id. Cat. B. M.* 17. p. 255, (1892); *Tweedt. P. Z. S.* 1879, p. 944; *Steere. List. Exped. Philipp.* 1890, p. 11.

H. alfredi, *Oustalet. Le Nat.* 1890, p. 62.

Hab. Sanar, B'rongan, Mindanao, Zamboanga, Basilan, Jel.

27. *H. cinnamominus*, Swains. N. v. (M. S. T.)

- Ialeyon cinnamominus, Swaison, Zool. Illustr. ser. i. vol. ii. pl. 67 (1821); Vig. & Horsf. Trans. Linn. Soc. xv. p. 266 (1827); Gould, Syn. B. Austr. part. iii. (1838); Gray, Gen. B. i. p. 97 (1846); id. B. Trop. Isl. Pacific Ocean, p. 5 (1859); id. Hand-l. B. i. p. 93, n^o 1123 (1870); Sharpe, Monog. Alced. p. 213, pl. 80 (1870); Finsch, Journ. Mus. Guldfr. Heft. xii. p. 20 (1876); Sharpe, Cat. B. M. 17, p. 259 (1892).
Eofirhamphus cinnamominus, Bp. Conspl. i. p. 157 (1850); Richéb., Itaudb., Alced. p. 32, Taf. 420, fig. 3140 (1851); Cass. Cat. Hale. Philad. Mus. p. 12 (1852); id. U. S. Expl. Explor. Birds, p. 220 (1858).
Sauroptis cinnamominus, Cab. & Heine, Mus. Hein. Th. ii. p. 159 (1860).
Dacelo cinnamominus, Schl. Mus. Pays-Bas, Alced. p. 39 (1860); id. Reise, Alced. p. 29 (1874).
Meodo ruficeps, Cuvier, MSS. in Mus. Paris; Dumont, Dict. Sci. Nat. xxix. p. 273 (1823); Pucher, Rev. et Mag. de Zool. 1853, p. 367; Harl. J. f. O. 1855, p. 423.
Dacelo ruficeps, Lesson, Traité d'Orn. p. 247 (1831).
Lidyon ruficeps, Gray, Hand-l. B. i. p. 93, n^o 1122 (1869).
Hab. Islas Marianas.

28. *H. medioris*, Sharpe, N. v.

- H. cinnamominus* (no. Vig.), Finsch, J. f. O. 1880, p. 285.
H. medioris, Sharpe, Cat. B. M. 17, p. 260 (1892).
Hab. Ponapé, Carolinas.

29. *H. chloris*, (Bodd.) ♂♂ N. v. Casaycasay. (M. S. T.)

- Martin-pecheur à collier blanc des Philippines, Sonn. Voy. Nov. Guin. p. 67, pl. 33 (1776).
Martin-pecheur à tête verte du Cap de Bonne Esperance, Daubent. Pl. Enl. viii. pl. 783, fig. 2.
Le Martin pecheur à tête verte, Buff. Hist. Nat. Ois. vii. p. 190 (1780).
Le Martin-pecheur à collier blanc, Buff. t. c. 192 (1780).
Green-headed Kingfisher, Lath. Gen. Syn. i. pt. 2, p. 620 (1782).
Alced. chloris, Bodd. Tabl. Pl. Enl. p. 49 (1783).
A. collaris, Scop. Del. Flor. et Faun. Insular. ii. p. 90 (1786); Lach. Ind. Orn. i. p. 250 (1790); Kittl. Kupf. Vog. i. pl. 14, fig. 1 (1833); S. Müll. Verh. Land-en Volkenk. p. 21 (1839-44); Rosenb. Malay. Arch. p. 364 (1878-79).
Meodo sacra, var. v. Gm. Syst. Nat. i. p. 453 (1788, ex Sonn.)
A. chlorcephala, Gm. S. N. i. p. 454 (1788, ex Daub.; Lath. Ind. Orn. i. p. 240 (1790); Shaw, Gen. Zool. viii. p. 77 (1811); Cuvier, Regné Anim. i. p. 417 (1817); Vieill. Nov. Dict. Hist. Nat. xix. i. 417 (1818); Horsf. Tr. Linn. Soc. xiii. p. 174 (1821); Ramfli. t. c. pt. 2, p. 293 (1821); Reichenb. J. f. O. 1834, p. 150.

- Halycon chloris*, *Sclater, Zool. Ill.* s. i. p. 27 (1851); *S. M. G.* Verh. Landesver. Naturf. Berl. pp. 174, 175 (1849-1850); *Grae. Ges.* Berl. i. p. 79 (1846); *d. L. d. F. S. P. B. Mus.* p. 50 (1846); *Horsf. & M. F. C. B. Mus.* p. V, C. 3, n. 127, p. 886; *Gray, P. Z. S.* 1853, pp. 171, 190; *id. Cat. B. New Gener.* pp. 19, 55 (1859); *J. P. Z. S.* 1860, p. 311; *ibid. P. Z. S.* 1863, p. 433; *Sci. P. Z. S.* 1863, p. 213; *Wulff, t. c.* pp. 23, 424; *U. sacra, var. T. B. m. of F. P. E. M. K. t. c.* p. 205 (1828); *II. chlorocephalus, Steph.* in *Shaw's Gen. Zool.* iii. p. 160 (1826); *Swans, Clasif. B.* ii. p. 335 (1837); *Hart, Ill. s. i.* p. 339.
- Dacelo chlorocephalus*, *Less.* *Tract.* p. 246 (1831).
- Halycon chloris*, *Gray, Gou. B.* i. p. 79 (1846); *Meyer & D. W.* *Nat. Hist. Labuan*, p. 12 (1855); *Pelz. Reis. Niederl.* p. 14 (1856); *Gray, Handlist B.* i. p. 92, n. 1116 (1860); *Shufeldt, Monogr. Steed.* p. 220, pl. 87 (1870); *Wieden & Lutzow,* *Ibis*, 1873, p. 96; *Hume, Str. F.* i. p. 450 (1873); *Brehm,* *Ibis*, 1874, p. 114; *Brugsom, Abhandl. nat. Ver. Bremen*, vi. p. 73 (1876); *Pelz, Verh. z.-b. Ges.* Wien, xiv. p. 718 (1876); *Sharpe, Trans. Linn. Soc.* (2) i. p. 319 (1876); *Sharpe, P. Z. S.* 1879, p. 323; *ibid. P. Z. S.* 1881, p. 793; *Nichols, Ibis*, 1881, p. 142; *Jago, 1883*, p. 86; *Sharpe, Ibis*, 1888, p. 197; *Evers, P. Z. S.* 1890, p. 2-5; *Whitehead, Ibis*, 1890, p. 453; *Sharpe, t. c.* pp. 60, 283; *Steere, List. Birds & Mamm. Exped.* *Philipp.* p. 11 (1890); *Sharpe, Cat. B. M.* 17, p. 273 (1892).
- Fodirhamphus collaris*, *Blyt, Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 48 (1849); *Bp. Conspl.* i. p. 156 (1850); *Reichenb. Handb., Akad.* p. 39; *Taf.* 417, *fig.* 3129, *Taf.* 403, *B.* *fig.* 3390 (1851); *Bp. Conspl. U. d. r. Anis.* p. 9 (1854); *P. Z. S.* 1862, p. 338; *id. P. Z. S.* 1863, p. 23; *Bourn.*
- Fodirhamphus chlorocephalus*, *Bp. Conspl.* i. p. 156 (1850); *R. T. c. sub. Handb., Akad.* p. 31; *Taf.* 417, *fig.* 3128 (1851); *B. Conspl. J. f. O.* 1885, p. 189.
- T. chloris*, *Cass. Cat. Hale, Philad. Mus.* p. 10 (1852); *id. U. S. Expl. Exped.* p. 203 (1858); *Pelz. Reis. Novara, Vogel.* p. 44 (1865); *Meyer, Ibis*, 1879, p. 61.
- Dacelo chloris*, *Schl. Handb. Dierk.* p. 32 (1857); *id. Mus. Pass. Bas.* *Audub.* p. 32 (1863); *id. U. S. Expl. Exped.* p. 26, p. 58; *pl. x. fig. 3, 4* (1843); *Finsch, N.-G. Asiat.* p. 193, p. 197; *Sold. Mus. P.-B.* *Audub.* *R. S.* p. 21 (1874); *Brehm, Natur-L. der Mus.* viii, p. 62 (1889).
- S. urens*, *Coll. C. B. & H. C. Mus. H. N. T. A.* n. 60 (1850); *Sabatell, C. C. B. Mus.* p. 105 (1854); *W. den. Trans. Zool. S. ix. p. 155 (1875); Sabatell, *Linn. Mus. G. 1855*, vii, p. 673 (1875); viii, p. 374, ix, p. 83 (1876); *id. P. Z. S.* 1877, p. 126, 3-5 (1877); *Tschudi, P. Z. S.* 1877, p. 196; *id. P. Z. S.* 1877, p. 299; *id. P. Z. S.* 1878, p. 108, p. 282, p. 340; *id. P. Z. S.* 1879, p. 69; *Sabatell, Ann. Linn. Coll. C. B. & H. C. Mus.* viii, p. 62 (1884); *J. Orz. P. S. sin. et. i.* p. 470 (1884); *Proc. U. R. S. Zool. Coll. H. M. S. Chaldean.* ii. p. 13 (1881); *Sabatell, t. c.* p. 76; *Meyer, Verh. z.-b. Ges.* Wien, xxvi, p. 7-13 (1881); p. 770; *Blyt, u. N. L. k. Verh. z.-b. Ges.* Wien, xxix, p. 221 (1886); *Kotzeb. J. f. O.* 1886, p. 301; *Sci. P. Z. S.**

1883, p. 200; Meyer, *Zeitschr. Ges. Orn.* i, p. 270 (1884); *id. Sitz. u. Abhandl. Ges. Isis Dresdei*, 1884, p. 19; *Fors-P. Z. S.* 1884, p. 432; *Plske, Bull. Acad. St. Petersb.* xxxix, p. 256 (1884). Guilleen, *P. Z. S.* 1885, p. 216, p. 502, p. 547, p. 568; *Toderm. Tijdschr. Ned. vrl. Ind.* xliv, p. 1 (1886); p. 111; Blasius, *Zeitschr. ges. Orn.* iii, p. 90 (1886); *id. Ornis*, iv, p. 307 p. 573 (1888); Sakad. Agg. *Orn. Papuasia*, i, p. 57 (1889); *Toderm. Nat. Tijdschr. Nedert. Indie*, i, *Afl.* 4, p. 439 (1890).

Hab. Luzon, Manila, Mariguana, Montalban, Navotas, Laguna, Los Baños, Cavite, Iloilo, Mindoro, Baco, Marinduque, Panay, Iloilo, Guimaras, Negros, Valencia, Cebú, Dumaguete, Leyte, Amparo, Samar, Paric, Bohol, Dinagat, Paragua, Mindanao, Surigao, Butuan, Caniguin, Basilan, Joló, Cagayan de Joló; Java, Sumatra, Gilolo, Borneo.

30. **H. humii.** Sharpe, ♂♂ N. v. Casaycasay.

(M. S. T.)

Halcyon chloris, Sharpe, *Monogr. Alced.* 1870, pt. p. 229; *Hume*, *Str. F.* viii, p. 49 (1879); *Kelham, Ibis*, 1881, p. 381.

Todirhamphus collaris, Moore, *P. Z. S.* 1854, p. 269.

II. *humii*, Sharpe, *Cat. B. M.* 17, p. 281, pl. viii. 1892.

Hab. Mindoro Baco; Sumatra.

31. **H. variegatus.** (J. et Pucher) ♂♂ N. v. Biutis.

(M. S. T.)

Vetenoides variée, Hombr. & Jacq. *Voy. Pde. Sud. Pl.* 23, fig. 2 (1846).

A. *variegata* (nec Bonn.), Jacq. & Pucher, *Vog. Pde. Sud. Zool.* iii, p. 181 (1853).

A. *hombronii*, Bp. *Consp.* i, p. 157 (1850); *Reichenb. Handb., Alced.* p. 36, Taf. 422, fig. 3147 (1851); *Bp. Consp. Voluer. Anis.* p. 9 (1854); *Waldn. Tr. Z. S.* ix, p. 155 (1875); *Gould, B. Asia*, i, pl. 40 (1877); *Tweedt. P. Z. S.* 1878, p. 994; *Steere, Lst. B. & Mamm. Steer. Exped. Philipp.* p. 11 (1890).

Halcyon hombronii, Gray, *Hand-l. B.* i, p. 93, n.^o 1136 (1869); Sharpe, *Monogr. Alced.* p. 221, pl. 84 (1871); *id. Trans. Linn. Soc.* 2nd. ser. *Zool.* i, p. 318 (1876); Sharpe, *Cat. B. M.* 17, p. 284 (1892).

Hab. Mindanao, Zamboanga, Samar, Paric.

2. **H. lindsayi.** (Vig.) ♂♂ N. v. Casaycasay.

(M. S. T.)

Dacelo lindsayi, Vig. *P. Z. S.* 1831, p. 97; *Eyd. & Souleyet, Voy. Bouile, Zool.* p. 100 (1841); *Schl. Mus. Pays-Bas, Alced.* p. 23 (1863).

D. *lessoni*, Vig. *P. Z. S.* 1831, p. 97.

Halcyon lindsayi, Gray, *Gen. B.* i, p. 79, pl. 27 (1846); *id. Sist. Fissir. Brit. Mus.* p. 52 (1848); *Bp. Consp.* i, p. 153 (1850); *Gray, Handb. B.* i, p. 93, n.^o 1135 (1869); Sharpe, *Monogr. Alced.* p. 217, pl. 82 (1871); *id. Cat. B. M.* 17, p. 286 (1892). *Paraleyon lindsayi*, Reichenb. *Handb., Alced.* p. 36, Taf. 421, figs. 3143-44 (1851); *Bp. Consp. Voluer. Anis.* p. 9. (1854).

Aetenoides lessoni, *Hartt*, *J. f. O.* 1854, p. 64.
Astacophilus lindsayi, *Cab.* & *U. n. Mus. Heinr. Th.* ii, p. 192
 (1800).

Alcedo lindsayi, *Martens*, *J. f. O.* 1804, p. 18; *id. Preuss. Exp. Ost. Alsen.* p. 189 (1805).

Aetenoides lindsayi, *Walden*, *Tr. Z. S.* i, p. 156 (1875); *Gould*,
B. Asia i, pl. 41 (1877); *Sere*, *Loc. B.* & *Mamm. Steere*
Exped. Philipp. d. II (1890).

Hab. Luzón, Manila, Malabon, S. Mateo, Montalban, Laguna,
 Los Baños, Calauan.

33. *H. moseleyi* *Sharpe*, ♂ N. v. Bintis.

(M. S. 1.)

Aetenoides moseleyi, *Steere*, *List. Exped. Philipp.* 1890, p. 11.

H. moseleyi, *Sharpe*, *Cat. B. M.* 17, p. 288 (1893).
Hab. Isla de Negros.

6 Gén. TANYSIPTERA, VIGORS.

34. *T. dea*, *Linn.* ♂♂ N. v.

(M. S. 1.)

? Martin-pêcheur à long brins, *Valentyn*, *Anthonit*, p. 301, Taf. iii.
 Le Martin-pêcheur d' Ternate, *Briss.* *Orn.* iv, p. 525, pl. 40,
 fig. 2 (1760).

Alcedo dea, *Linn. Syst. Nat.* i, p. 181 (1758); *Gm. Sist. Nat.*
 i, p. 458 (1788).

Martin pêcheur de Ternate, *Daubent. Pl. Eel.* pl. 116.

Tanysiptera dea, *Vigors*, *Tr. Linn. Soc.* xiv, p. 433 (1825, pt.);
Gray, *G. B.* i, p. 78 (1849); *Bd. Conspl.* i, p. 157 (1850,
 pt. 5); *Reichenb. Humb.*, *Alced.* p. 42 Taf. 405, fig. 3489 (1851).
Hab. Molucas.

Fam. MOMÓTIDOS.

1. Gén. HYLOMANES, LICHT.

1. *Hy. momotula*, *Licht.* ♂ N. v.

(M. S. 1.)

H. momotula, *Licht.*, *Sharpe*, *Cat. B. M.* 17 1892, p. 332.
Hab. Guatemala.

Suborden: BUCEROTES.

Fam. BUCERÓTIDOS.

1. Gen. HYDROCORAX, BALZ.

1. *H. hydrocorax*, *Linn.* ♂♂ N. v. Calao Calo.

(M. S. 1.)

Le Calao, *Briss. Orn.* iv, p. 566, pl. xlv. (1760).

Le Calao des Moluques, *Daubent. Pl. Eel.* n.º 283; *Buff. Hist.*
Nat. O's. vii, p. 147 (1790).

Philippine Hornbill, var. A, *Lath. Gen. Syn.* i. p. 345 [adult] (1781).

Indian Hornbill, *Lath. Gen. Syn.* i. p. 351 [immature] (1781). Le Calao roux, *Levaill. Hist. Nat. d'Ois. d'Amér.* i. p. 13, pl. vi. (1801).

Le Calao à casque plat, *Levaill. Hist. Nat. d'Ois. d'Afr.* i. p. 127, pl. 240 (1806).

Buceros hydrocorax, *Linn. Syst. Nat.* i. p. 153 (1766); *Forst. Ind. Zool.* p. 40 (1781); *Gm. S. N.* i. p. 359 (1783); *Lath. Ind. Orn.* i. p. 144 (1790); *Shaw. Gen. Zool.* viii. p. 31 (1811); *Vieill. N. Dict. d'Hist. Nat.* iv. p. 597 (1816); *Tenu. Pt. Col.* ii. p. 73, pl. 283 (1824); *Wagl. Syst. Av.* Buceros, n.^o 7 (1827); *Less. Traité Orn.* p. 254 (1831); *Gray. Gen. B.* ii. p. 399 (1847); *Blyth. Cat. Birds. Mus. As. Soc.* p. 43 (1849); *Bonap. Conspl. Gen. Av.* i. p. 89 (1850); *Sclat. Mus. Rais-Bas.* i. Buceros p. 2 (1862); *Fon Mart. J. f. O.* p. 13 (1869); *Waldn. Trans. Z. S.* ix. p. 164 (1873); *Tweed. P. Z. S.* 1877, pp. 543 & 692; *Steere. List Birds & Mamm. Philippines.* p. 13 (1890); *Hartel. Cat. Mus. Scand. b. Frankf.* p. 140 (1891); *Ogilvie. Cat. B. M.* 17. p. 358. (1892).

Platipterus hydrocorax, *Cab. & Heine. Mus. Heine.* iii. p. 174 (1860). Buceros hydrocorax, *Gray. Hand-l. B.* pt. ii. p. 128, sp. 784 (1870); *Dubois. Bull. Mus. Relg.* iii. p. 195 (1884).

Buceros bicornis, var., *Shaw. Gen. Zool.* viii. p. 17 (1811).

Buceros planicornis, *Merrem. Ersch. Encycl.* xiii. p. 287 (1824).

Hydrocorax planicornis, *Bonap. Conspl. Vol. An'spl.* p. 2 (1854); *Elliot. Monogr. Bucerot.* pl. vii. [text] (1877).

Buceros platyrhynchus, *Pears. J. As. Soc. Beng.* p. 652 (1841). *Hab.* Luzón, Montalban, Cavité, Ialán, Cagayán, Abra, Ilocos, Minlolo, Calapán, Marinduque, Samar, Paranas, Culbagan, Neg.

2. **H. mindanensis.** *Tweed. & N. v. Tulasi. Calao.* (M. S. T.)

Buceros minlanensis, *Tweeddale. P. Z. S.* 1878, pp. 543 & 823; *bid.* 1878, p. 278, figs. 1 & 2, & p. 946, & 1879, p. 703; *Sclater. Chall.* p. 15, pl. ii. (1880); *Steere. List Birds & Mamm. Philippines.* p. 13 (1890).

Hydrocorax mindanensis, *Elliot. Monogr. Bucerot.* pl. viii. [text] (1880); *Ogilvie. Cat. B. M.* 17. p. 351. (1892).

Buceros hydrocorax, var. mindanensis, *Dubois. Bull. Mus. Belg.* iii. p. 196 (1884).

Hab. Bas Ian, Mindanao, Surigao, Zamboanga, Butuan.

3. **H. semigaleatus.** *(Tweed.) S. & N. v. Calao.* (M. S. T.)

Buceros semigaleatus, *Tweeddale. P. Z. S.* 1878, p. 270, figs. 3 & 34, pp. 341, 379; *Steere. List. Birds & Mamm. Philippines.* p. 13 (1890).

Hydrocorax semigaleatus, *Elliot. Monogr. Bucerot.* pl. ix. [text] (1882); *Ogilvie. Cat. B. M.* 17. p. 360. (1892).

Buceros hydrocorax, var. semigaleatus, *Dubois. Bull. Mus. Belg.* iii. p. 195 (1884).

Hab. Sénar, Borongan, Loquilonen, Calbayo, I. (C), Vaparo, Panaon.

2. Gén ANTHRACOCEROS, REICH.

4. *A. montani*, ♂ N. v. Talusi.

(M. S. T.)

Buceros montani, Oust. Bull. Hebdom. Assoc. Sc. Fr. 1880, p. 204.

Liamnophalus montani, Elliot, Mon. Buc. 1882 pl. 25.

B. montani, Dubois, Bull. Mus. Belg. iii. 1884, p. 109.

Anthracoceros montani, Ogilvie, Cat. B. M. 17, 1892 p. 370.

Hab. Joló.

3. Gén GYMNOLEMUS, OGILV.

5 *Gy. marchii*, (Oust.), ♂ N. v. Tauchi, Talusi.

(M. S. T.)

Anthracoceros marchii, Oustalart, Le Nat. 1885, p. 108.

A. lemprieri, Sharpe, P. Z. S. 1885, p. 446, pl. xxvi; id. 1888, p. 198, 1890, p. 45.

Gymnolimus marchii, Ogilvie, Cat. B. M. 17, 1892, p. 370.

Hab. Paragua, P. Princesa, Inaguan, Calamianes, Cuyo.

4. Gén PENELOPIDES, REICH.

6. *P. panini*, Boddaert, Tab. Pl. Ent. p. 48 (1783); Gray, G. B. ii. p. 400 [part] (1847); Eyston, Osteol. Av. p. 63 (1867).

M. S. T.

Le Calao de l'Isle Panay *Dubent. Pl. Ent.* n. 78) [?], n. 781; *Buff. Hist. Nat. Ois.* vii. p. 145 (1780).

Le Calao mâle à bec ciselé de l'Isle Panay pl. 82, et Le Calao semelle & pl. 83; *Sav. Voy. Nov. Grin* p. 122 (1776).

Panayan Hornbill, Lath. Gen. Syn. i. p. 353 (1881).

Le Calao à bec ciselé, Levaill. Hist. Nat. d'Ois. l' Amer. i. p. 35, pls xvi & xvii. (1801)

Buceros panini, Boddaert, Tab. Pl. Ent. p. 48 (1783); Gray, G. B. ii. p. 400 [part] (1847); Eyston, Osteol. Av. p. 63 (1867).

Penelopides panini, Cab. & Hein's. Mus. Hein's. ii. p. 168 [part] (1860); Walden, Tr. Z. S. ix. p. 165, pl. xxviii, fig. 1-3, n° 2 ? (1875); Elliot, Monogr. Bucerot. pl. 21 [text] (1877); Steere, List Birds & Mamm. Philippines, p. 13 (1890); Ogilvie, Cat. B. M. 17, p. 372 (1892).

Buceros panini, Von Martens, J. f. O. p. 18 (1866); Gray Hand-B. ii. p. 129, p. 7892 (1870).

B. panayensis, Scop. Del. Faun. et Flor. Insulär. ii. p. 87 (1786); Gm. S. N. i. p. 360 (1788); Lath. Ind. Oen. i. p. 144 (1790); Shaw, Gen. Zool. viii. p. 33 (1811); Wall. N. D. Et. Phis. Nat. iv. p. 594 (1816); Temm. Pl. Col. sp. 12 (1824); M. rrem, Ersch u. Gruber, Encycl. p. 287 (1824).

Penelopides panayensis, Bonap. Conspl. Vol. Anisot. p. 3 (1854).

Buceros insculptus, Dumont, Dict. Sc. Nat. vi. p. 209 (1817).

Buceros sulcirostris, Wieg. Syst. Av. Bucerot. n. 13 [?]. (1827).

Teckus sulcirostris, Bonap. Conspl. G. N. Adv. i. p. 91 (1850).

Penelopides sulcirostris, Bonap. Conspl. Vol. Anisot. p. 3 (1854).

Buceros (*Penelopides*) *minillae*, var. *panini*, Dubois, Bull. Mus. Belg. iii. p. 211 (1884).

Hab. Mindoro, Baco, Guimaras, Valencia, Panay, Negros, Masbate, Luzon, Cagayan.

7. **P. manillæ**, *Bodd.* ♂ N. v. Tarigig.

(M. S. T.)

- Le Calao de Manille, *Dubent. Pl. Enc.* n.º 891; *Buff. Hist. Nat. Ois.* viii, p. 144 (1780);
Manida Hornbill, *Lath. Gen. Syn.* i, p. 354 (1781).
Le Calao à bec ciselé, *L'vall. Hist. Nat. d'Ois. l'Amer.* i, p. 35 pl. xviii. (1801).
Buceros manillæ, *Bodd. Tabl. Pl. Enc.* p. 54 (1782);
Penelopides manillæ, *Walden. Tr. Z. S.* ix, p. 168 (1875); *id. P. Z. S.* 1871, p. 692; *Ellot. Monogr. Bucerov.* pl. 20 [text] (1878); *Steere. List Birds & Mamm. Philippines*, p. 13 (1890); *Ogilvie. Cat. B. M.* 17, p. 373, (1892).
Buceros (Penelopides) manillæ, *Dubois. Bull. Mus. Belg.* iii, p. 210 (1884).
B. manillensis, *Gm. S. N.* i, p. 361 (1788); *Lath. Ind. Orn.* i, p. 145 (1790); *Vieill. N. Dict. d'Hist. Nat.* iv, p. 596 (1816); *Dumont. Dst. Sc. Nat.* vi, p. 208 (1817); *Meyen. Nov. Act. C. L. C. Nat. Cur. Suppl.* prim, p. 91, pl. xiii. [♂ ad.] (1834); *Schl. Mus. Pays-Bas. Buceros*, p. 11 (1852).
B. sulcirostris, *Wagl. Syst. Av. Buceros*, n.º 13 (1827).
B. panini, *Gray. Gen. B.* ii, p. 400 [part.] (1847); *v. Martens. J. f. O.* 1866, p. 18.
Penelopides panini, *Cab. & Heine. Mus. Hein* ii, p. 168 [part.] (1860).
Buceros paniensis, *Blyth. (nec Scop.)*, *J. As. Soc. Beng.* xv, p. 997 (1847).
Hab. Luzon, Manila, Montalban, Morong, Laguna, Los Baños, Calamba, Marinduque, Negros.

8. **P. mindorensis**, *Steere. ♂ N. v. Talietic*

(M. S. T.)

- P. mindorensis*, *Steere. List Exped. Philipp.* 1890, p. 13; *Hartt. Cat. Mus. Senkenb. Frankf.* p. 251; *Ogilvie. Cat. B. M.* 17, p. 374 (1892).
P. affinis schmackeri, *Hart. Cat. Mus. Szék. fü.* 1891, p. 139.
Hab. Minoro Baco.

9. **P. affinis**, *Twe. ♂ N. v. Talusi.*

(M. S. T.)

- P. affinis*, *Tweedd. An. Mag. N. H.* xx, 1877, p. 534; *id. P. Z. S.* 1877, p. 824, fig. 2; 1878, ii, 947; *Elliot. Mon. Bucer.* pl. 22 (1881); *Ogilvie. Cat. B. M.* 17, 1892, p. 375.
Buceros (Penelopides) manillæ, var. affinis, *Dubois. Bull. Mus. Belg.* iii, 1884, p. 211.
Hab. Minanao, Surigao, Butuan, Paragua.

10. **P. basilanica**, *Steere. N. v.*

- P. affinis*, *Twe. P. Z. S.* 1870, p. 70.
P. basilanica, *Steere. List. Exped. Philipp.* 1890, p. 13; *Ogilv. Cat. B. M.* 17, 1892, p. 375.
Hab. Basilan.

11. **P. samarensis.** Steere, ♂♂ N. v. Talusi.

(M. S. T.)

P. affinis, Tweeddale, P. Z. S. 1878, pp. 108, 341.

P. samarensis, Steere, List. Exped. Philipp. 1890, p. 13; Oñlv. Cat. B. M. 17. 1892 p. 376.

Hab. Samar, Loquilocu n, Zumárraga, Borongan, Calbayog, Leyte, Amparo, Dinagat.

5. Gén CRANORRHINUS, C. ET HEINE.

12. **C. cassidix,** ♀ N. v.

(M. S. T.)

Buceros cassidix, Temm. Pl. Col. ii pl. 210 (1823); Wagl. Syst. Av. Buceros, n° 3 (1827); Griff. Anm. King. ii p. 434, pl. (1829); Less. Traité Orn. p. 253 (1831); Müll. & Schl. Verh. Ges. Ned. Ind. p. 24 (1839-44); Gray, Gen. Birds, ii. p. 399 (1847); Schl. Mus. Pays-Bas, i. Buceros, p. 9 (1862).

Calao (Cassidix) cassidix, Bonap. Consپ. Gen. Av. i. p. 90 (1850). Rhyticeros (Cassidix) cassidix, Bonap. Consپ. Vol. Ansod. p. 3 (1854).

Cranorrhinus cassidix, Cab. & Heine, Bus. Hein. ii. p. 173 (1860); Müll. & Schl. Verh. Ges. Ned. Ind., Aves, p. 24, pl. 4 bis [v] (1839-44); Wallace, Malay. Arch. i. p. 364 (1869); Wal. Tr. Z. S. viii. p. 47, figs. 1-4 (1872); Lenz, J. f. O. 1877, p. 370; Elliot, Mon. Bucerot. pl. 16 [text] (1877); Meyer, Ibis, 1879, p. 65; Guillemaud, P. Z. S. 1885, p. 54; id. Marchesa, ii. p. 188 (1886); Ogilvie, Cat. B. M. 17. p. 377, (1892).

Buceros (Cranorrhinus) cassidix, Gray, Hand-l. B. ii. p. 129 (1870); Dubois, Bull. Mus. Belg. iii. p. 192 (1884).
Hab. Célebes, Gilolo.

13. **C. leucocephalus,** (Vigili) ♂♀ N. v. Aguiec.

(M. S. T.)

Buceros leucocephalus, Vieill. N. Dict. d'Hist. Nat. iv. p. 592 (1816).

Cranorrhinus leucocephalus, Wald. Tr. Z. S. p. 165, pl. xxvii. (1875); id. P. Z. S. 1877, p. 824; Elliot, Mon. Bucerot. p. 19 [text] (1880); Ogilvie, Cat. B. M. 17. p. 378, (1892).

C. leucocephalus, Steere, List Birds & Mamm. Philippines, p. 13 (1890).

Buceros (Cranorrhinus) leucocephalus, Dubois, Bull. Mus. Belg. iii. p. 193 (1884).

B. sulcatus, Temm. Pl. Col. ii. p. 89, pl. 69 (1823); Wagl. Syst. Av. Buceros, n° (1827); Less. Traité Orn. p. 254 (1831); Gray, Gen. Birds, ii. p. 400 (1847); Schl. Mus. Pays-Bas, i. Buceros, p. 10 (1862).

Tockus sulcatus, Bonap. Consپ. Gen. Av. i. p. 91 (1850).

Calao sulcatus, Bonap. Consپ. Vd. Ansod. p. 3 (1854).

Buceros (Penelopides) sulcatus, Von. Mart. J. f. O. 1866, p. 18.

B. (Cranorrhinus) sulcatus, Gray, Hand-l. B. ii. p. 129 (1870).
Hab. Mindanao, Surigao, Butuan, Camiguin, Marianas.

14. C. waldeni, Sharpe, ♂ N. v.

(M. S. T.)

Waldeni, Sharpe, *Tr. Lin. Soc.* i. pp. 322, 351, (1879); Elliot, *Mon. Bucer.* 1877, pl. 18; Steere, *List. Exped. Philipp.* 1890, p. 13; Ogilvie, *Cat. B. M.* 17, 1892, p. 380.
Hab. Panay, Guimaras, Concepcion.

6. Gén. ANORRHINUS, REICH.

15. A. galeritus, (Temm.) ♂ N. v.

(M. S. T.)

Buceros galeritus, Temm. *Pl. Col.* ii. p. 78, p. 520 (1824); Müll. & Schl. *Verh. Ges. Ned. Ind.* pp. 23 21 (1839-44); Gray, *Gen. B.* ii. p. 390 (1847); Low, *Sarawak*, p. 488 (1841); Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 44 (1849); Schl. *Mus. Pays-Bas*, i. *Buceros*, p. 1 (1862).

Aydrocissa galeritus, Bonap. *Consp. Gen. Av.* i. p. 90 (1850).
H. (Anthracobucco) galeritus, Bonap. *Consp. Vol. Anisod.* p. 2 (1854).

Anorrhinus galeritus, Reich. *Syst. Av.* pl. xlix (1850); Horsf. & Moore, *Cat. B. Mus. E. Ind. Co.* ii. p. 594 (1856-58); Moore, *P. Z. S.* 1859, p. 450; Cab. & Heine, *Mus. Hein.* ii. p. 169 (1860); Salvad. *Ucc. Rorneo*, p. 79 (1874); Hume, *Ibis*, 1875, p. 318; Tweeddale, *Ibis*, 1877, p. 292; Hume, & Dav. *Str. F.* vi. 109 (1871); Sharpe, *Ibis*, 1879, p. 246; Hume, *Str. F.* ix. p. 16 (1880); Elliot, *Mon. Bucerot.* pl. 42 [text.] (1880); Sharpe, *P. Z. S.* 1881, p. 793; id. *Ibis*, 1890, p. 16; Elliot, *Auk.* p. 9 (1891); Ogilvie, *Cat. B. M.* 17, 1892 p. 391.

Buceros (Anorrhinus) galeritus, Gray, *Hand-l. B.* ii. p. 128, sp. 7177 (1870).

B. carinatus, Blyth, *J. As. Soc. Beng.* xiv. p. 187 (1835), & xiv. p. 906 (1847).

Hab. Borneo, Sumatra, Filipinas?

Suborden: TROGONES.

Fam. TROGONIDOS.

1. Gén. HARPACTES, SWAINS.

t. H. ardens, (Temm.) ♂ N. v.

(M. S. T.)

Trogon ardens, Temm. *Pl. Col.* n.º 404 (1826); Gould, *Mon. Trog.* ed. i. pl. 35 [text.] (1835).

Harpactes ardens, Gray, *Gen. B.* i. p. 71 (1845); Gray, *List. Fissir. Brit. Mus.* p. 44 (1848); Bonap. *Consp. Gen. Av.* i. p. 151 (1850); Cassin, *U. S. Expl. Exp., Mamm. & Orn.* p. 229 (1858); Gould, *B. Asia*, pl. 76 [text.] (1862); Gould, *Mon. Trog.* ed. ii. pl. 39 [text.] (1869); Gray, *Hand-l. B.* i. p. 14 (1860); Wald. *Tr. P. Z. ix.* p. 149 (1875); Tweeddl. *P. Z. S.*

- 1877, p. 540, 1878, p. 107, 943; *Stejn.*, *List Birds & Mamm.* *Philippines*, p. 9 (1890); *Ostl. Cat. B. M.* 17, 1892, p. 487; *Pyrotrogon ardens*, *Bonap. Conspl. Vol. Zyg.* p. 14 (1854); *Cub & Heine, Mus. Hein. Th.* iv, p. 159 (1863).
Harpactes rhodiosternus, *Peale, U. S. Expl. Exp.* viii, p. 106, pl. 44 (1848); *Hartl. Wieg. Arch.* xviii, p. 112 (1852).
Hab., Luzon, Manila, Alora, Bucay, Dinagat, Samar, Paric Mindanao, Marinduque, Zamboanga, Basilan.

Suborden TREPADORES.

Fam. PICIDOS.

Subfam. PICINOS.

1. Gén. GECINUS Boie.

1. **G. viridis**, (*Linn.*) ♂ N.v. Pico-verde. (M. S. T.)

Le Pic verd, *Briss. Orn.* iv, p. 9 (1760); *Buff. Hist. Nat. Ois.* vii, p. 355 (1783); *Daub. Pl. Ent.* 879 (♂).

Le Pic verd, du Mexique, *Briss. Orn.* iv, p. 16. (1760).*

Le Pic jaune de Perse, *Briss. Orn.* iv, p. 20. (1760); *Salerne, Hist. Nat. Ois.* p. 108 (1767).

Picus viridis, *Linn. Syst. Nat.* i, p. 175 (1766); *Tunst. Orn. Brit.* p. 2 (1771); *Gm. Syst. Nat.* i, p. 433 (1788); *Hartl. Cat. B. M.* 17, p. 86 (1890).
Hab., Europa, Alemania.

2. **G. puniceus**, (*Horsf.*) ♂ N.v. Pico puniceo. (M. S. T.)

Picus punicus, *Horst. Trans. Linn. Soc.* xiii, pt. 1, p. 176 (1821); *Raff. tom. cit. pt. 2*, p. 289 (1822); *Lath. Hist. B.* iii, p. 352 (1822); *Temm. Pl. Col.* cccxxiii. (1827); *Wagl. (pt.) Syst. Av.* *Picus*, sp. 96 (1827); *id. Isis*, 1129, p. 518; *Vig. Mm. Raffl.* p. 668 (1830); *Less. Traité*, i, p. 222 (1831); *Sundev. Conspl. Av.* *Piein.* p. 58 (1866).

Picus gularis, *Wagl. Syst. Av. Add. Picus*, s. n.^o 6 (nec n.^o 80), ♂ (1827).

Brachylophus puniceus, *Strickl. P. Z. S.* 1841, p. 31; *Bp. Conspl. Volner. Zygod.* p. 10 (1854).

Gecinus puniceus, *Gray, Gen. B.* ii, p. 139 (1846); *Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 59, n.^o 270 (1849); *Wall. Ann. & Mag. Nat. Hist.* xv, p. 96 (1855); *Gray, Sist. Picid. Brit. Mus.* p. 77 (1868); *id. Hand-l. B.* ii, 192, n.^o 8687 (1870); *Harg. Ibis*, 1888, p. 176; *id. Cat. B. M.* 18, p. 64, (1890).

Venilia punicea, *Reichenb. Scans. Picinae*, p. 358, n.^o 176, pl. dxxviii.

V. punicea, *Reichenb. Scans. Picinae*, p. 358, n.^o 176, pl. dxxviii. figs. 476-77, ♂ ad. (1854); *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii, p. 664, n.^o 968 (1856-58); *Moore, P. Z. S.* 1859, p. 456.

*

- Chloropicus puniceus*, *Math. Picidæ*; ii. p. 110, pl. lxxiv. figs. 5, 6, ♂♂ (1862).
Chrysophlegma puniceus, *Jerd. B. Ind.* i. p. 291. (1862); *Blyth. & Wald. B. Burm.* p. 77 (1875); *Oates, B. Brit. Burm.* ii. p. 44 (1883).
Callophorus puniceus, *Salvad. Ucc. Born.* p. 49 (1874); *Sharpe, P. Z. S.* 1875, p. 103; *id. Ibis*, 1876, p. 36; *Hume & Davison, Str. F.* vi. p. 139 (1878); *Hume*, op. cit. 1879, p. 88; *Sharpe, Ibis*, 1879, p. 242; *id. P. Z. S.* 1881, p. 792; *Gulliemard*, op. cit. 1885, p. 405; *Büttikofer, Notes, Seyd. Mus.* ix. p. 23 (1887).
Chrysophlegma puniceum, *Salvad. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, ser. 2, iv. pp. 519, 529 (1887).
Hab. Sumatra.

2 Gén. CHLORONERPES Swa.

3. Ch. yucatanensis (Cabot) ♂♂ N. v. P de Yucatan. (M. S. T.)

- Picus yucatensis*, *Cabot, Bost. Journ. Nat. Hist.* 1845, p. 92.
P. yucataensis, *Gray, Gen. B.* iii. App. p. 21 (1849).
Chrysoptilus canipileus, (*non D'Orb.*), *Sclat. P. Z. S.* 1855, p. 161.
Chloronerpes yucatanensis, *Moore, P. Z. S.* 1859, p. 60; *Sclat. & Ibis*, 1859, p. 136; iid. op. cit. 1860, p. 44; *Sclat. Cat. Amer. B.* p. 339, n.º 2025 (1862); *Cab. J. f. O.* 1862, p. p. 321; *Cab. & Heine, Mus. Hein.* iv. p. 161 (1863), pt.; *Gray, Sist. Piid. Brit. Mus.* p. 104 (1868), pt.; *id. Hand-l. B.* ii. p. 198, n.º 8777 (1870); *Sclat. & Salv. Nomencl. Av. Neotr.* p. 100 (1873); *Salv. Cat. Strickl. Coll.* p. 396, n.º 1936 (1882); *Zeled. Cat. Av. Costa Rica*, 1882, p. 23, n.º 488; *Bauocard, P. Z. S.* 1883, p. 452; *Zeled. Proc. U. S. Nat. Mus.* 1885, p. 111; *Hargitt, Cat. B. M.* 18. 1890 p. 84.
Hab. América, Guatimala.

3. Gén. CHRYSOPLEGMA Gould.

4. Ch. mentale, (Temm.) ♂ N. v. (M. S. T.)

- Picus mentalis*, *Temm. Pl. Col.* 384, ♀ (1826).
P. gularis, *Temm. M. S.*; ♂ *Wagl. Syst. Av.* *Picus*, sp. 89 (1827), nec ♂.
*P. squamicollis**, *Less. Traité*, i. p. 229 (1831).
Gecinus mentalis (pt.), *Gray, Gen. B.* ii. p. 439 (1846), & iii. App. p. 21 (1849); *id. List. Picid. Brit. Mus.* p. 77 (1868); *id. Hand-l. B.* ii. p. 192, n.º 8686 (1870).
Venilia mentalis, *Bp. Conspl. Gen. Av.* i. p. 128 (1850).
Brachylophus mentalis, *Strickl. P. Z. S.* 1841, p. 31; *Bp. Conspl. Volner. Zygod.* p. 10 (1854).
Venilia gularis, *Reichenb. Scans. Picinæ*, p. 358, n.º 827, pl. dxxviii. figs. 4180, 4181 (1854).
Picus mentalis (pt.), *Sundev. Conspl. Ac. Picin.* p. 58 (1866).

- Chloropicus mentalis* (pt.), *Math. Picidæ*, ii. p. 112, pl. lxxv, figs. 4, 5 (1869).
Chrysophlegma mentale, *Hargitt, Ib's*, 1886, p. 267; *id. Cat. B. M.* 18 1890, p. 125.
Hab. Java, China.

4. Gen. MELANERPES, Swa.

5. **M. pucherani**, (*Math.*) ♂♂ N. v. (M. S. T.)

- Picus carolinus*, *rare*, *d*, *Lath. Ind. Orn.* i. p. 231, sp. 18 (1890).
P. aurifrons (*non Wagl.*), *Less. Rev. Zool.* 1839, p. 102; *Wagn. Arch. Jür. Naturg.* 1841, p. 100.
Zebrapicus pucherani, *Math. Rev. Zool.* 1840, p. 542; *Bp. Conspl. Volucr. Zygod.* p. 11, n.º 224 (1854); *Math. Picidæ*, ii. p. 227, pl. ciii, figs. 1, 2, ♂♂ (1862).
Centurus pucherani, *Bp. Conspl. Gen. Av.* i. p. 120, n.º 9 (1850); *Reichenb. Scans. Picinæ*, p. 411, n.º 966 (1854); *Selat. & Salv. Ibis*, 1859, p. 136; *Moore, P. Z. S.* 1859, p. 60; *Selat. & Salv. Ibis*, 1860, p. 43; *Selat. P. Z. S.* 1860, pp. 286, 296; *Lawr. Ann. Lic. N. I.* 1861, p. 220; *Cab. J. f. O.* 1862, p. 328; *Selat. Cat. Amer. B.* p. 342, n.º 2044 (1862); *id. & Salv. P. Z. S.* 1864, p. 387; *id. op. cit.* 1867, p. 230; *id. op. cit.* 1870, p. 387; *Salv. Ibis*, p. 320; *Selat. & Salv. Nomencl. Av. Neotr.* p. 101 (1873); *Boucard, P. Z. S.* 1878, p. 49; *Nutting, Proc. U. S. Nat. Mus.* vi. p. 406 (1883).
Zebrapicus gerini, *Math. Picidæ* ii. p. 231 (1862).
Picus gerini, *Sundev. Conspl. Av. Picin.* p. 55 (1866).
Melanerpes pucherani, *Hargitt, Cat. B. M.* 18, p. 164 (1890).
Hab. América, Guatemala.

5. Gén. DENDROCOPIUS, Koch.

6. **D. mixtus**, (*Bodd.*) ♂♂ N. v. (M. S. T.)

- L. Epeiche au Pic. varié de la Encenada, *Buff. Hist. Nat. Ois.* vii. p. 409 (1783).
Pic. mâle de la Encenada, *Daubent. Pl. Ent.* 748, fig. 1.
Picus mixtus, *Bodd. Tabl. Pl. Ent.* p. 47 (1783); *Gray. Gen. B.* iii. App. p. xxi. (1849); *Selat. Cat. Amer. B.* p. 334, n.º 1996 (1862); *Sundev. Conspl. Av. Picin.* p. 20 (1866); *Gray. Syst. Picid. Brit. Mus.* p. 48 (1868); *Selat. & Salv. P. Z. S.* 1868, pp. 138, 143; *Hudson, op. cit.* 1870, p. 158; *Gray. Hand-l. B. II.* p. 185, n.º 8608 (1870); *Felz. Orn. Bras.* p. 443 (1870); *Selat. & Salv. Nomencl. Av. Neotr.* p. 99 (1873); *Durmf. Ibis*, 1878, p. 62; *White, P. Z. S.* 1882, p. 617, 1883, p. 40; *Barrows, Auk*, 1884, p. 25; *Withington, Ibis*, 1888, p. 467; *Selat. & Huds. Arg. Orn.* ii. p. 19 1889.
Dendrocopus mixtus, *Hargitt, Cat. B. M.* 18, (1890) p. 259.
P. bicolor, *Gm. Syst. Nat.* i. p. 438 (1788); *Bp. Conspl. Gen. Av.*
Hab. América, Brasil.

6. Gén. SPHYROFICUS, BAIR.

7. Sh. varius, (Lin.) ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

The Yellow belly'd Woodpecker, *Catesby*, *Nat. Hist. Carol.* i. p. 21; pl. xxi., ♂ ad. (1731).
Pic varié de la Cardine, *Briss. Orn.* iv. p. 62 (1760); *Daubent. Pl. Ent.* 785, ♂ ad.
Picus varius, *Linn. Syst. Nat.* i. p. 176 (1766); *Penn. Arct. Zool.* ii. p. 275 (1785); *Gm. Syst. Nat.* i. p. 438 (1788).
Sphyropicus varius, *Hargitt. Cat. B. M.* 18. 1890 p. 188.
Hab. América, Canadá.

7. Gen. IYNGIPICUS, BP.

8. I. maculatus, (Sop.) ♂♂ N. v. Anlongue, Calpintero. (M. S. T.)

Petit Pic d'Antigue, *Sonn. Voy. Nov. Guin.* p. 118, pl. 77 (1776).
Le petit Epeiche (pt.), *Buff. Hist. Nat. Ois.* vii. p. 64 (1780, ex Sonn.).
Picus maculatus, *Scop. Del. Faun. et Flor. Insabr.* p. 89 (1786, ex Sonn.); *Jerd. B. Ind.* i. p. 279 (1863).
P. minor, var. b, *Lath. Ind. Orn.* i. p. 230 (1790).
P. moluccensis, *Less. Traité*, i. p. 221 (1831, non Gm.); *Müllerb. Picidæ*, i. p. 143, pl. xxxii. (1861).
P. nanus, *Blyth. J. A. S. Beng.* xiv. p. 197 (1846, non Vigors).
P. validirostris, *Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 64 (1849); *id. J. A. S. Beng.* xviii. p. 805 (1849); *Reichenb. Scans. Picina*, p. 373 (1854); *Sundev. Conspl. Av. Picin.* p. 29 (1855); *Gray. Syst. Picid.* *Brit. Mus.* p. 43 (1868); *id. Hand-l. B.* ii. p. 184, n.º 1582 (1870).
P. flavinotus, *Math. Picidæ*, i. p. 144 (1861, ex spec. in Mus. Brit.).
Baopipo validirostris, *Cab. & Heine. Mus. Hein. Th.* iv. p. 60 (1863).
Picus (Yungipicus) validirostris, *Martens. J. f. O.* 1866, p. 20.
Yungipicus maculatus, *Walden. Tr. Z. S.* ix. p. 148 (1875); *Sharpe. Tr. Linn. Soc.* 1877, *Zool.* i. p. 350; *Küster. J. f. O.* 1883, p. 295.
Yngipicus maculatus *Hargitt. Ibis.* 1882, p. 26; *id. Cat. B. M.* 18. 1890 p. 332; *Gould. B. Asia.* vi. pl. xxx., ♂♂ (1883).
Hab. Luzón, Manila, Montalban, Laguna, Panay, Guimarás, Marinduque.

9. I. fulvifasciatus. Harg. N. v.

Iyngipicus fulvifasciatus, *Hargitt. Ibis.* 1881, p. 598; *id. op. cit.* 1882, p. 28; *id. Cat. B. M.* 18. p. 333 (1790); *Gould. B. Asia.* vi. pl. xxxi., ♂♂ (1883).

Hab. Mindanao, Zamboanga, Basilan.

10. I. basilanicus, Steere. N. v.

Hab. Basilan.

11. *I. leytenensis*, Steere, N. v.

Hab. Leyte.

12. 1. *ramsayi*, Harg. N. v.

lyngipicus ramsayi, Hargitt, *Ibis*, 1881, p. 598; *id. op. cit.* 1882, p. 49; *id. Cat. B.* 18, p. 334 (1890); *Gould, B. As. d. vi. pl. xxiv.*, ♂♂ (1882); *Guillem. P. Z. S.* 1885, p. 254.
Hab. Jolo.

8. Gén TIGA, KAUP.

13. *T. everetti*, Tew ♂ ♀ N. v. Malalantoc. (M. S. 1)

Tiga javanensis (non *Ljung*), Sharpe, *Trans. Linn. Soc.* 2nd ser. i, p. 315 (1877); *Tweedl. Mem. ed. W.-Ramsay*, pp. 607, 655 670 (1881).

T. everetti, *Tweedl. P. Z. S.* 1878, p. 612, pl. xxxvii. ♀?; *Sharpe, Ibis*, 1884, p. 317, 1888, p. 197; *Hargitt, Cat. B. M.* 18, p. 418 (1890).

Hab. Paragua, P. Princesa.

14. *T. javanensis*, (*Ljung.*) ♂♂ N. v. Malalantoc. (M. S. 1)

Picus javanensis, *Ljung*, *Mém. Acad. Roy. Stockh.* 1797, p. 134 pl. vi. ♂; *Sundev. Conspl. Av. Picin.* p. 83 (1800).

P. tiga, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 177 (1822); *Raffl. t c.* p. 290 (1822); *Horsf. Zool. Research. Java (Gen. Cat.)* p. 4 (1824); *Wogl. Syst. Av. Picus sp.* 100 (1827); *Gray, Harw. Ill. Ind. Zool.* pl. 30, figs. 2 ♂, 2 a, head of ♀ (1830-32); *Vig. App. Mem. Raffl.* p. 669 (1831).

Chrysonotus tridactylus, *Swains. Classif. B.* ii, p. 309 (1837) *Jerd. Ibis*, 1872, p. 10.

Chrysonotus tiga, *Eyton, P. Z. S.* 1839, p. 106; *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii, p. 657 (1850-58).

Tiga tridactylus, *Blyth, J. A. S. B.* 1845, p. 193; *Strickl. P Z. S.* 1846, p. 104; *Gray, Gen. B.* ii, p. 441, pl. cix, fig. 7 (1846); *Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 56 (1849); *Bp. Conspl. Gen. Av.* i, p. 120 (1850); *Reichenb. Scans. Picinæ*, p. 390, pl. delii, figs. 4344-4485; ♂♂ (1854); *Gould, P. Z. S.* 1859 pp. 150, 151; *Sclat. op. cit.* 1863, p. 210; *Vord. Over. N. Tijds. Nederl. Ind.* xlvi, p. 17 (1882).

Picus intermedium, *Blyth, J. A. S. B.* 1845, p. 193.

P. rubropygialis, *Math. Rev. de Zool.* 1845, p. 400.

Chloropicoides tiga, *Math. N. Classif., Mém. Acad. Metz*, 1848, p. 347; *id. Picidæ*, ii, p. 97, pl. lxxi, figs. 5 ♀. 6 ♂. (1862).

Tiga intermedia, *Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 56 (1849); *Reichenb. Scans. Picinæ*, p. 396, n.º 918 b (1854); *Schomb. Ibis*, 1894, p. 257; *Blyth, op. cit.* 1865, p. 30; *Gray, List Picid. Brit. Mus.* p. 97 (1868); *id. Hand-l. B.* ii, p. 196, n. 8752 (1870); *Armstr. Str. F.* 1879, p. 311; *Salvad. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1887, p. 580 1888, p. 567.

- Tiga rubropygialis, *Bp. Conspl. Gen. Av.* i. p. 120 (1850); *id. Conspl. Volucr. Zygod.* p. 10, n.^o 183 (1854); *Reichenb. Scans. Picinæ*, p. 397, n.^o 921 (1854); *Gray, List Picid. Brit. Mus.* p. 97 (1868); *id. Hand-l. B.* ii. p. 196, n.^o 1753 (1870); *Hume, Str. F.* 1879, p. 88, n.^o 185.
Crysonotus intermedium, *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii. p. 657 (1856-58); *Moore, P. Z. S.* 1859, p. 456; *Jerd. B. Ind.* i. p. 299 (1862); *Cab. & Heine, Mus. Hein.* iv. p. 872 (1863); *Beavan, P. Z. S.* 1866, p. 4; *id. Ibis*, 1869, p. 415; *Hume & Oates, Str. F.* 1875, p. 14.
Chloropicoides intermedia, *Math. Picidæ*, ii. p. 99 (1862).
Chrysonotus rubropygialis, *Jerd. B. Ind.* i. p. 299 (1862); *Hume, Str. F.* 1876, p. 390.
Chloropicoides rubropygialis, *Math. Picidæ*, ii. p. 100, pl. lxx, fig. 5, juv. (1862).
Chrysonotus javanensis, *Cab. & Heine, Mus. Hein.* iv. p. 172 (1863); *Müll. Orn. Ins. Salanga*, p. 64 (1882).
C. erythropygius, *Cab. & Heine, Mus. Hein.* iv. p. 173 (1863).
Picus javanensis, var. *B.*, *Sundev. Conspl. Av. Picin.* p. 83 (1866).
P. javanensis, var. *C.*, *Sundev. Conspl. Av. Picin.* p. 83 (1866).
Tiga javanensis, *Gray, Lyst Picid. Brit. Mus.* p. 97 (1868); *id. Hand-l. B.* ii. p. 196, n.^o 8751 (1870); *Salvad. Ucc. Born.* p. 54 (1874); *Blyt. &c. II ald. B. Burm.* p. 75 (1875); *Hume & Davison, Str. F.* vi. pp. 146, 501 (1878); *Oates, op. cit.* 1879, p. 165; *Nicholson, Ibis*, 1879, p. 164; *Tirant, Ois. B.-Cochinchine*, p. 90 (1879); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1879, p. 183; *Sharpe, Ibis*, 1879, p. 243; *Hume, Str. F.* 1879, pp. 53, 88, n.^o 184; *Bingh. op. cit.* 1880, p. 164; *Tweed Mem. ed. W-Ramsay*, p. 479, (1881); *Keth Ibis*, 1883, p. 388; *Sharpe, P. Z. S.* 1881, p. 792; *Oates, Str. F.* x. 1882, p. 192; *Davison, t. c.* p. 357 (1883); *Oates, B. Brit. Bur. B.* ii. p. 55 (1883); *Vorg. Over. Nat. Tijds. Nederl. Ind.* Ixiv. p. 191 (1884); *Guilleml. P. Z. S.* 1885, p. 405; *Salvad. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1887, p. 518; *Hargitt, Cat. B. M.* 18. p. 412 1890.
Tiga rufa, *Stolicz. J. A. S. B.* 39. p. 289 (1870).
Hab. Culion, Calamianes.

9 Gen CHYSOCOLAPTES, BLYTH.

15 Ch erythrocephalus, *Sharpe ♂♂ N. v. Balitatu.* (M. S. T.)

Chrysocolaptes erythrocephalus, *Sharpe, Trans. Linn. Soc.* 1877, xxx, pp. 315, 350, pl. xlvi, fig. 1; *Tweed. P. Z. S.* 1878, p. 612; *Wardl-Rams. Tweed. Mem.* pp. 607, 655 (1881); *Sharpe, Ibis*, 1884, p. 317, 1888, p. 197; *Hargitt, Cat. B. M.* 18. p. 452 (1890).

Hab. Culión, Calamianes, Paragua, P. Princesa.

16. Ch hæmatribon, (*Wagl.*) ♂♂ N. v. Manunctoc. (M. S. T.)

Picus hæmatribon, *Wagl. Syst. Av.* *Picus*, sp. 95, ♀ (1827); *Sundev. Conspl. Av. Picin.* p. 80 (1866).

P. spiloglophus, Vig. P. Z. S. 1831, p. 98, ♂; Less. Compl. Buff., ix. p. 310, ♀ (1837).

P. philippinarum (*non Laht.*), Less. Traité, i. p. 222, ♀ (1831).

Brachipterus haematribon, Strickl. P. Z. S. 1841, p. 31.

Chrysocolaptes haematribon, Hlyth, J. A. S. B. 1843, p. 1004; Gray, Gen. B. ii. p. 436 (1845); Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc. p. 55 (1849); Bp. Conspl. Gen. Av. i. p. 121 (1850); id. Conspl. Voluer. Zygod. p. 10, n.^o 175 (1854); Reichenb. Scans. Picinae, p. 400, n.^o 930, pl. delv. figs. 4357-58, ♂♂ (1854); Jerd. B. Ind. i. p. 283 (1862); Cab. & Heine, Mus. Hein. iv. p. 169 (1863); Gray, List. Picid. Brit. Mus. p. 63 (1868); id. Hand-l. B. ii. p. 189, n.^o 8646 (1870); Wald. P. Z. S. 1873, p. 526; Tweed. op. cit. 1877, p. 689; Wardl.-Rams. Tweed. Mem. pp. 299, 314, 410, 515, 655 (1881); Hargitt, Cat. B. M. 18. p. 454 (1890).

Indopicus haematribon, Math. Picidae, ii. p. 84, pl. lxviii. figs. 1 ♂ 2 ♂ juv., 3 ♂ (1862).

Hab. Luzón, Cagayán, Ilocos, Manila, Montalban, Batanes, Calayan, Marinduque.

17. **Ch. lucidus**, (Scop.) ♂♂ N. v. Manunuctue.

(M. S. 1.)

Pic grivelé ou Grand Pic de l'île de Luçon, Sonn. Voy. Nouv. Guin. 1776, p. 73, pl. xxxvii.

Le Palalaca ou Pic vert tacheté des Philippines, Buff. Hist. Nat. Ois. vii. p. 21 (1780).

Pic verd des Philippines, Dauben. Pl. Ent. 691.

Bengal Woodpecker, var. B. Lath. Gen. Syst. ii. p. 581 (1782).

Picus aurantius (*non Linn.*), Bodd. Tabl. Pl. Ent. p. 43 (1783).

P. lucidus, Scop. Del. Fl. Faun. Insul. ii. p. 89 (1786).

P. bengalensis, var. & Gm. Syst. Nat. i. p. 433 (1788).

P. philippinarum, Lath. Ind. Orn. i. p. 236 (1790); Steph. Gen. Zool. ix. p. 190 (1815); Vieill. N. Dict. d'Hist. Nat. xxvi.

p. 15 (1818) id. & Bonn. Enc. Meth. iii. p. 1314 (1823); Valenc. Dict. Sc. Nat. xl. p. 175 (1826); Sundev. Conspl. Av. Picinae. p. 80 (1866).

P. palalaca, Wagl. Syst. Av. Picus, sp. 92 (1827).

P. squamosus, Less. Traité, i. p. 230 (1831).

Brachipterus philippinarum, Strickl. P. Z. S. 1851, p. 31.

Chrysocolaptes philippinarum Gray, Gen. B. ii. p. 436 (1845); Bp. Conspl. Voluer. Zygod. p. 10, n.^o 176 (1854); Gray, List. Picid. Brit. Mus. p. 63 (1868).

C. aurantius, Gray, Gen. B. iii. App. p. xxi. (1849); Cab. & Heine, Mus. Hein. iv. p. 168 (1863); Gray, Hand-l. B. ii. p. 189, no. 8648 (1870).

C. palalaca, Bp. Conspl. Gen. Av. i. p. 121 (1850); Reichenb. Scans. Picinae, p. 400, no. 932, pl. delv. fig. 4360 (1854).

Indopicus philippinarum, Math. Picidae, ii. p. 85, pl. lxvi. figs. 3 ♂, 4 ♀ (1862).

Chrisocolaptes lucidus, Tweed. P. Z. S. 1877, pp. 537, 539, 822, 1878, p. 942; Wardl.-Rams. Tweed. Mem. pp. 314, 410, 461, 462, 463, 548, 633, 655 (1881); Küller, J. f. O. 1883, p. 295; Hargitt, Cat. B. M. 18. p. 455, (1890).

C. maculiceps, Sharpe, *Trans. Linn. Soc.* 1877, xxx. pp. 314, 350, pl. xlvi. fig. 2, ♀.

Hab. Butuan, Mindanao, Zamboanga, Basilan, Negros, Sibulan, Luzon.

18. Ch. rufopunctatus, Harg. ♂♂ Palalaca. (M. S. T.)

C. lucidus, (*non* Scop.), Tweedt. *P. Z. S.* 1878, p. 379; Wardl.-Ramsay, ed. Tweedt. *Mem.* p. 603 (1881).

C. rufopunctatus, Harg. *Ibis*, 1889, p. 231; *id. Cat. B.* 18. p. 457 (1890).

Hab. Panaon, Samar, Paranas.

19. Ch. xanthocephalus, Wald. ♂♂ N. v. Palalaca. (M. S. T.)

Crysocolaptes xanthocephalus, Wald. & Layard, *Ibis*, 1872, p. 99, pl. iv.; Wald. *P. Z. S.* 1873, p. 526; Sharpe, *Trans. Linn. Soc.* 1877, xxx. p. 314; Gould, *B. As.* vi. pl. xxxvii. ♂♂ (1877); Wardl.-Rams., Tweedt. *Mem.* pp. 118, 299, 314, 410, 655, 664 (1881); Harg. *Cat. B. M.* 18. p. 457, (1890).

Hab. Negros, Guimaras, Panay, Masbate.

10 Gén. MICROSTICTUS, HARG.

20. M. fuliginosus, Tw. ♂♂ N. v. Palalaca. (M. S. T.)

Mulleripicus fuliginosus, Tweedt. *Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1877, xx. p. 534; *id. P. Z. S.* 1877, pp. 817, 821, pl. lxxxiii. ♂. Wardl.-Rams., Tweedt. *Mem.* pp. 543, 548, 562, App. 665, 667 (1881). Microstictus fuliginosus, Hargitt, *Cat. B. M.* 18. p. 492 (1890).

Hab. Butuan, Surigao, Mindanao, Samar, Paranas, Borongan.

21. M. funebris, (Valn.) ♂♂ Malagayang. (M. S. T.)

Picus funebris, Valene. *Dict. Sc. Nat.* xl. p. 179 ♀ (1826); Drap. *Dict. Class. d'Hist. Nat.* xiii. p. 497 (1828); Sundev. *Conspl. Av.* Picin. p. 10 (1866).

P. lichtensteini, Wagl. *Syst. Av.* *Picus*, sp. 31, ♀ (1827).

P. modestus, Vig. *P. Z. S.* 1831, p. 98; Less. *Compl. Buff.* ix. p. 310, ♂ (1837).

P. punctatus, Less. *Traité*, i. p. 230, ♀ (1831).

Hemilophus lichtensteini, Gray, *Men. B.* ii. p. 439 (1846); Bp. Conspl. Gen. Av. i. p. 131 (1850); Reichenb. *Scans. Picinæ*, p. 386, n.^o 892, pl. dclxxix. figs. 4485-4486, ♂♂ (1854).

H. funebris, Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 55, n.^o 247 (1849); Gray, *List. Picid. Brit. Mus.* p. 84 (1868).

Lichtensteinipicus modestus, Bp. Conspl. *Volucr. Zygod.* p. 7, n.^o 16 (1854).

L. lichtensteini, Gray, *List Gen.* 1855, p. 93, ex Bp. Dryopicus funebris, Math. *Picidae*, i. p. 54, pl. xv. figs. 1 T, 2 ♀ (1861).

Alophonerpes funebris, Cab. & Heine, *Mus. Hein.* iv. p. 107 (1863).

Campetherina funebris, Gray, *Hand-l. B.* ii. p. 193, n.^o 2158 (1870).
Mulleripicus funebris, Tweedie, *Trans. Zool. Soc.* 1875, pp. 145, 249; Sharpe, *Trans. Linn. Soc.* 1877, p. 350, tab. n.^o 29;
Tweedie. Mem. ed. Wardl.-Ramsay, pp. 313, 410, *Alph.* 655 (1881). *Microstictus funebris*, Harg. *Cat. B. M.* 18, p. 492, (8800).

Hab. Luzon, Cagayan, Manila, Calay n.

11 Gén. **HEMILOPHUS**, Sw.

22. **H. pulverulentus**, (*Temm.*) ♂♂ Balakatug.

(M S T)

- Picut javensis*, ♀, Horsf. *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 176, ♂ (1822); *Lath. Hist. B.* iii. p. 353, ♀ (1822); Steph. *Gen. Zool.* xiv. p. 159, ♂ (1826).
P. pulverulentus, Temm., *Pl. Col.* 389, ♂ (1826); *Vig. Mem. Raff.* p. 669 (1830); Less. *Traité*, i. p. 222, ♂ (1831); *Sundev. Conspl. Av. Picut.* p. 10 (1866).
P. gutturalis, Valenc. *Dict. Sc. Nat.* xl. p. 578 (1826).
P. mackloti, Wagl. *Syst. Av. Picus*, sp. 4 ♂ add., sp. 1 ♂ ad., ♀ imm., (1827); *id. Isis.* 1829, p. 508.
P. horsfieldii, ♀ Wagl. *Syst. Av. Picus*, sp. 5, ♂ (1827).
Hemilophus pulverulentus, Swains. *Classif. B.* ii. p. 309 (1837); Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 54, n.^o 244 (1849); *id. J. A. k. B.* 1854, p. 215; Blanf. *Ibis*, 1870, p. 494; Marg. *Cat. B. M.* 13, p. 494, (8804).
H. mackloti, Gray, *Gen. B.* ii. p. 430 (1846); *Bp. Conspl. Gen. av.* i. p. 131 (1850); Reichenb. *Scans. Picidæ*, p. 385, n.^o 880, pl. dextiv. figs. 4300-01, & ♀ (1854).
H. müllerii, Bp. *Conspl. Gen. av.* i. p. 131 (1850).
Mulleripicus pulverulentus, Bp. *Conspl. Vogelv.* Zygot. p. 7, n.^o 15 (1854); Gray, *Cat. Gen. B. Brit. Mus.* 1855, p. 93, n.^o 1576; Horsf. & Moore, *Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii. p. 951 (1856-58); Moore, *P. Z. S.* 1859, p. 455; Jord. *B. Ind.* i. p. 284 (1862); Blyth, *Ibis*, 1860, p. 355; Jord. *op. cit.* 1872, p. 9; Godw.-Aust. *J. A. S. B.* 1873, p. 155; Hume & Dzivison, *Str. F.* vi. p. 133 (1878); Hume, *op. cit.* 1879, pp. 52, 87, n.^o 168; Tiraut, *O.s. B.-Cochinchine*, p. 89 (1879); Biash, *Str. F.* 1880, pp. 141, 162, 472; Kelch, *Ibis*, 1887; p. 387; Oates, *Str. F.* x. p. 196 (1882); Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 197; Dryopicus gutturalis, Math. *Picidæ*, i. p. 51, pl. xv. figs. 4 ♂ ad.; 5 ♂ ad., 6 juv. (1861).
Alophoperes gutturalis, Cab. & Hine, *Mus. Hein.* iv. p. 109 (1863); Blyth. & Wardl. *B. Burm.* p. 75 (1875).
Herrilophus gutturalis, Gray, *List. Picid. Brit. Mus.* p. 83 (1868).
Campathera gutturalis, Gray, *Hand-l. B.* ii. p. 193; n.^o 8704 (1870).
Mulleripicus gutturalis, Hume, *Str. F.* 1874, p. 471; *id. & Oates*, *op. cit.* 1875, pp. 12, 66.
Alophoperes pulverulentus, Salvad. *Ucc. Born.* p. 51 (1874); Wardl.-Rams. *Ibis*, 1877, p. 457; Sharpe, *op. cit.* 1879, p. 242; *id. P. Z. S.* 1879, p. 326, 1881, p. 792; Oates, *B. Brit. Burm.* ii. p. 29 (1883); Vorderm. *Over. Nat. Tijds. Nederl. Ind.* xlii. p. 173 (1884).

*

Horrilophus fischeri, Brügg. *Abhaudl. nat. Ver. Brom.* 1877,
p. 454 (juv.).
Hab. Paragua, P. Princesa, Mindanao; Borneo, Java.

12. Gén. THRIPOanax, CAB. ET HEINÉ.

23. *Th. javensis*, (Horsf.) ♂♂ N. v. Manugtag. (M. S. T.)

Picus javanicus, Horsf. *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 175 (1822), ♂;
Steph. Gen. Zool. xiv. p. 159 (1826), ♂; *Vig. Mem. Raffl.* p.
668 (1830).

P. leucogaster, Valenc. *Dict. Sc. Nat.* xl. p. 178 (1826), ♀;
Wagl. Syst. Av. Picus, sp. 7, ♂ (1827); *id. Isis*, 1829, p.
109, ♂. *Tennm. Pl. Col.* iv. pl. 501, ♂ (1838); *Sundev. Conspl.*
Av. Picin. p. 9 (1866).

P. horsfieldii, Wagl. *Syst. Av. Picus*, sp. 5, ? (1827).

Dryocopus javanicus, Boie, *Isis*, 1828, p. 326.

D. leucogaster, Boie, *Isis*, 1828, p. 326.

Picus fulvigaster, Drap. *Dictionnaire Class. d'Hist. Nat.* xiii. p. 503,
(1828).*

P. maximus malayanensis, Bland, J. A. S. B. vi. p. 952 (1837).
Hemilophus leucogaster, Gray, *Gen. B.* ii. p. 439 (1846), ?.
H. javensis, Gray, *Gen. B.* ii. p. 439 (1846), ♂; Blyth, *Cat. B.*
Mus. As. Soc. p. 55 (1849); *Bp. Conspl. Gen. Av.* i. p. 131
(1850); *id. Conspl. Volucr. Zygod.* p. 7 (1854); Reichenb., *Scans.*
Picnar. p. 386, n.º 894, pl. dclxv, figs. 4306-4307, ♂♂ (1854);
Motley & Dillw., *Contr. Nat. Hist. Labuan*, p. 29 (1855); *S lat.*
P. Z. S. 1863, p. 211; Gray, *List. Picid. Brit. Mus.* p. 85
(1868); Stoliczka, J. A. S. B. 1870, p. 290; Brügg. *Abhandl.*
nat. Vor. Bremen, 1878, p. 531.

Dryopicus leucogaster, Math. *Mem. Acad. Metz*, 1848-49, p. 322.

Mullericus javensis, Horsf. & Moore, *Cat. B. Mus. E. Y. Co.*
ii. p. 652, n.º 946 (1856-58); Jerd. B. Ind. i. p. 285 (1862).

Dryopicus leucogaster, Math. *Picidae*, i. p. 47, pl. xiii, figs. 4,
5, 6 (1861).

Thriponax javensis, Cab. & Heiné, *Mus. Hein.* iv. p. 105 (1863),
Salvad. Ucc. Born. p. 52 (1874); Sharpe, *P. Z. S.* 1875, p.
103; Hume, *Str. F.* 1875, p. 310; Tweed. *Ibis*, 1877, p.
288; *id. P. Z. S.* 1877, pp. 689, 821; Hume & Davison, *Str.*
F. vi. p. 135 (1878); Hume, *op. cit.* 1879, pp. 52, 87; Sharpe,
Ibis, 1879, pp. 52, 87; Sharpe, *Ibis*, 1870, 2. 243; Tweed.
P. Z. S. 1879, p. 69; Sharpe, *tome cit.* p. 326; Dickolson,
Ibis, 1881, p. 141; Kelham, *tome cit.* p. 388; Sharpe, *P. Z.*
S. 1881, p. 792; Müll. *Orn. Ins. Salanga*, p. 72 (1882); N.
Dickolson, *Ibis*, 1882, p. 54; *id. op. cit.* 1883, p. 89; Oates,
B. Brit. Burm. ii. p. 27 (1883); Kütter, *J. f. O.* 1883, p.
295; Blas. *Verhandl. zool-bot. Gesellsch. Wien*, 1883, p. 30;
Vorderm. *List. B. Java*, n.º 61 (1884); Hargitt. *Ibis*, 1885,
p. 145; *id. Cat. B. M.* 18. 1890, p. 498.

Campethera javensis, Gray, *Hand-l. B.* ii. p. 193, n.º 8707 (1870).

Hab. Luzón, Negros, Mindoro, Paragua, P. Princesa, Célebes, Basilan, Java.

24 **Th pectoralis**, *Tweed. ♂♂ N. v.* Palawan.

(M. S. T.)

Thripomax pectoralis, *Tweed. P. Z. S.* 1878, pp. 349, 379,
Wardl.-Ramsay, *Tweed. Mém.* p. 596, & App. pp. 655, 670
(1881); *Harg. Ibis*, 1885, p. 143; *id. Cat. B. M.* 18. 1890.
p. 500, lam. xiii.

Hab. Leyte, Panaon, Samar, Borongan, Paranas.

25. **Th hargitti**, *Sharpe. ♂♂ N. v.* Balalaling.

(M. S. T.)

Thiponax javensis (pt.), *Sharpe*, *Trans. Linn. Soc.* 2nd. ser.
Zool. i. p. 314 (1876).

Th. hargitti, *Sharpe*, *Ibis*, 1884, p. 317, pl. viii.; *Harg. op. cit.*
1885, p. 115; *id. Cat. B. M.* 18. 1890 p. 505. *Sharpe*, *op.*
cit. 1888, p. 197.

Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa.

26 **Th philippinensis**, *Steere. N. v.*

Hab. Guimarás, Masbate.

27. **Th mindorensis**, *Steere. ♂♀ N. v.*

Hab. Mindoro.

Fam. CAPITÓNIDOS.

1. Gén. XANTHOLEMA, Br.

1. **X. haematocephala** (*S. Müll.*) ♂♂ Tubantug, Aso ni pusong (M. S. T.)

Le barbu des Philippines, *Bris. Orn.* iv. p. 99 (1760); *Daubent. Pl. Ent.* vii. p. pl. 331.

Bucco hornamecephalus, *P. L. S. Müll. S. N. Anhang.* p. 88 (1776 ex *Daubent.*); *Cass. Proc. Acad. Phil.* 1864, p. 242.
Barbu à gorge jaune, *Buff. Hist. Nat. Ois.* viii. p. 102 pl. 5 (1780).

?Le Petit Barbu, *Buff. Hist. Nat. Ois.* vii. p. 105 (1780), *Senegal!*
?Barbu au Senegal, *Daubent. Pl. Ent.* vii. p. 746 fig. 2.

Yellow-throated Barbet, *Lath. Gen. Syn.* i. pt. 2. p. 500 (1782).
Little Barbet, *Lath. Gen. Syn.* i. pt. 2. p. 503 (1782).

Buff-faced Barbet, *Lath. Gen. Syn.* i. pt. 2. p. 504 pl. xxii. (1782).
Bucco flavigula, *Bodd. Tabl. Pl. Ent.* p. 20 (1783); *ex Daubent.*)

?*B. nanus*, *Bodd. Tabl. Pl. Ent.* p. 47 (1783 *ex Daubent.*).

Indian Barbet, *Lath. Gen. Syn. Suppl.* i. p. 97 (1787).

Bucco philippinensis, *Gm. Syst. Nat.* ii. p. 407 (1788 *ex Briss.*);
Raffs. Trans. Linn. Soc. xiii. p. 283 (1820); *Less. Traite*,
p. 163 (1831).

?*B. parvus*, *Gm. Syst. Nat.* i. p. 407 (1788, *ex Buff.*)

B. lathami, *Gm. Syst. Nat.* ii. p. 408 (1788).

B. indicus, *Lath. Ind. Orn.* i. p. 205 (1790).

- Le Barbu à collier rouge, *Levaill. Hist. Nat. Barbus*, ii. p. 7³
pl. 33 (1806).
- Capito lathami, *Lieill. N. Dict.* iv. p. 499 (1816).
- C. flavicollis, *Bonn. et Vieill. Enc. Meth.* p. 1424 (1823).
- Bucco rubricollis, *Cuv. Régne Anim.* i. p. 457 (1802 ex *Levaill.*)
- B. luteus, *Less.* p. 163 (1831) var; *Des Murs. Icon. Orn.* pl. 21.
- B. rafflesius (*nec Less.*), *Boie Brief. Ost. Ind.* n.^o 15 (1832).
- Megalaima philippensis, *Gray. Gen. B.* ii. p. 429 (1846); *Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 68 (1849); *Bp. Conspl. Av.* i. p. 844 (1850);
- ?M. parva, *Gray. Gen. B.* ii. p. 430 (1846).
- M. lathami, *Gray. Gen. B.* ii. p. 429 (1846).
- M. rafflesius, *Bp. Conspl. Av.* i. p. 144 (1850); *Gray. Hand-l. B.* ii. p. 175 n.^o 8452 (1870).
- Xantholæma philippensis, *Bp. Conspl. Volucr. Zygod.* p. 12 (1854).
- X. flavigula, *Bp. Conspl. Volucr. Zygod.* p. 12 (1854).
- X. indica, *Horsf. & Moore. Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii. p. 644 (1856); *Gould. P. Z. S.* 1859, p. 151; *Jerd. B. Ind.* i. p. 315 (1862); *Bevan. Ibis.* 1865, p. 412; *Blyth. Ibis.* 1856, p. 359; *Beavan. Ibis.* 1869, p. 410; *Godw. Aust. J. S. Beng.* xxxix. p. 267 (1870); *Stol. t. c.* p. 289 (1870); *Wald. Ibis.* 1871, p. 862; *Holdsw. P. Z. S.* 1872, p. 430; *Jerd. Ibis.* 1872, p. 12; *Hume. Nests & Eggs Ind.* *Bp.* 131 (1873).
- Megalaima inica, *Moore. P. Z. S.* 1859, p. 454.
- Megalaima philippensis, *Irby. Ibis.* 1861, p. 220; *Schomb. Ibis.* 1864, p. 258; *Ton. Martens. J. f. O.* 1866, p. 20.
- Megalaima flavigula, *Goffin. Mus. Pays-Bas. Buccans.* p. 24 (1863); *Snelleman in Veth's Midden-Sumatra. Vog.* p. 35 (1885).
- M. rubrifrons, *Gray. List. Capit. Brit. Mus.* p. 11 (1868); *id. Hand-l. B.* ii. p. 175; n.^o 8453 (1870).
- M. haematocephala, *Gray. Hand-l. B.* ii. p. 175 n.^o 8448 (1870).
- Xantholæma haematocephala, *Macshull. Monogr. Capit.* p. 101 pl. 42 (1871) 1891, p. 89.
- X. haematocephala, *Hayes. Lloyd. Ibis.* 1873, p. 497; *Blyth. & Wald. B. Burm.* p. 74 (1875); *Wald. Tr. Z. S.* ix. p. 156 (1877); *Ticeed. Ibis.* 1877, p. 299; *id. P. Z. S.* 1877, pp. 690, 823; *id. P. Z. S.* 1878, p. 944; *Ball. Str. F.* vii. p. 200 (1878); *Cripps. t. c.* p. 264; *Legge. B. Ceylon.* i. p. 218 (1879); *Hume. Str. F.* 1879, pp. 53, 38; *Sclater. t. c.* p. 253; *Salvad. Ann. Mus. Civ. Genov.* xiv. p. 180 (1879); *Vidal. Str. F.* ix. p. 54 (1880); *Binghan. t. c.* p. 166; *Butler. t. c.* p. 387; *Wardlaw Ramsay. Tweedd. Mem.* p. 656 (1881); *Kelham. Ibis.* 1881, p. 399; *Nicholson. Ibis.* 1883, p. 243; *Oates. Handb. B. Brit. Burm.* ii. p. 136 (1883); *Murray. Vertebr. Faun. Siad.* p. 116 (1884); *Swinh. & Barnes. Ibis.* 1885; p. 63; *Buttice Notes Leyden. Mus.* ix. p. 16 (1886); *Reid. Cat. Lucknow. Mus.* p. 31 (1886); *id. Str. F.* x. p. 26 (1887); *Davison. t. c.* pp. 299, 358; *Salvad. Ann. Mus. Civ. Genov.* (2) iv. p. 577 (1887), v. p. 564 (1888); *Shelley. Cat. B. M.* 19. 1891, p. 89.
- X. rafflesii, *Traud. Bull. Soc. Agric. Coch. Ch.* 1879, p. 91.
Hab. Luzón, Manila, Montalban, Abra, Hocos, Cagayan, Leyte, Mindoro, Mindanao, Placer, Surigao, Zamboanga.

2 **X. rosea**, (Dum.) ♂♂ N. v. Tubantug.

(M. S. T.)

Le Barbu rose-gorge, *Levaill. Hist. Nat. Ois. Parad's*, ii. p. 76, 33 (1806).

Bucco roseus, *Dumont. D'et. Sci. Nat. (1st. ed)* iv. p. 52 (1806 ex *Levaill.*) *Cuv. Régne An.* i. p. 428 (1817).

Capito rosaceicollis, *Levill. N. D'et. d'Hist. Nat.* iv. p. 500 (1818).

Bucco philippensis (*nec Gm.*), *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 181 (1820).

B. roseicollis, *Vigors. Mem. Raffl.* p. 667 (1830).

Megalaima rosea, *Gray. Gen. B.* ii. p. 429 (1846); *Bp. Conspl. Av.* i. p. 14 (1850); *Gosse. Mus. P. B. Buccones*, p. 27 (1863); *Gray. Hand-l. B.* ii. p. 174 n.^o 8445 (1870).

Xantholæma rosea, *Horsf. & Moore. Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii. p. (1856); *Marshall. Monogr. Capit.* p. 107, pl. 43 (1871); *Walden. Tr. Z. S.* ix. p. 157 (1875); *id. Ibis*, 1877, p. 299; *Nicholson. Ibis*, 1881, p. 142; *Lorderm. Nat. Tijdschr. Nederland. Ind.* xli. p. 187 (1882) *id. op. cit. xlvi.* p. 71 (1887); *Shelley. Cat. B. M.* 19. p. 99 (1891).

Hab. Negros, Luzón, Abra, Bucay; Sumatra, Java.

3 **X. intermedia**, (Shelley) ♂♂ N. v. Tubantug.

(M. S. T.)

Xantholæma rosea, (*nec Dum.*) *Walden. Ibis*, 1872, p. 100; *id. Tr. Z. S.* ix. pp. 131, 157, 250, (1875); *Tweeddale. P. Z. S.* 1877, p. 758, 1878, p. 283; *Shelley. Cat. B. M.* 16. 1891 p. 97.

Hab. Cebú, Negros, Valencia, Guimarás.

2 Gen. CHOTORHEA, BP.

4 **C. versicolor**, *Raffl.* ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Bucco versicolor, *Raffl. Trans. linn. Soc.* xiii. p. 284 (1820); *Temm. pl. Col.* iii. pl. 309 (1825); *Blyth. J. A. S. Beng.* xv. p. 13 (1846).

B. rafflesii, *Less. Rev. Zool.* 1839, p. 137.

Megalaima versicolor, *Gray. Gen. B.* ii. p. 429 (1846); *Bp. Conspl. i.* p. 143 (1850).

Chotorhea versicolor, *Shelley. Cat. B. M.* 19. 1891, p. 59.
Hab. Sumatra.

Fam. RAMFÁSTIDOS.

1. Gen. RHAMPHASTOS, LIN.

1. **Rh dicolorus**, *Linn. ♂ N. v.* Tucan de vientre rojo. (M. S. T.)

Ramphastos dicolorus, *Linn. S. N.* i. p. 152; *Gm. S. N.* i. p. 35^o; *Shelley. Cat. B. M.* 19. 1891, p. 133.

Lepetit Toucan à ventre rouge, *Levaill. Ois. de Par.* ii. p. 22 pl. 8.
Hab. Brasil.

Fam. GALBÚLIDOS.

I. Gén. GALBULA, BRISS.

I. *G. melanogenia*, *Scl. ♂ N. v.*

(M. S. T.)

Galbula melanogenia, *Scl. Contr. Orn.* 1852, p. 61, pl. 90; *Shelley, Cat. B. M.* 19, 1891, p. 166.
Hab. América, Guatemala.

Suborden: COCCÍGEO³.

Fam. CÚCULIDOS.

Subfam. CUCULINOS.

I. COCCYSTES, GLOG.

I. *C coromandus*, (*Lin*) ♂ ♀ N. v Sabucut.

(M. S. T.)

Le Coucou huppé de Coromandel, *Briss. Orn.* iv, p. 147, pl. xi.
A. fig. 1 (1760).
Cuculus coromandus, *Linn. Syst. Nat.* i, p. 171 (1766).
Coucou huppé de Coromandel, *Pl. Ent.* vi, pl. 274 ex *Briss.*
Le coucou huppé à collier, *Montb. Hist. Nat. Ois.* v, p. 389
(1779).
Collared cuckow, *Lath. Gen. Syn.* i, pt. 2, p. 529 (1782).
Le coucou à collier blanc, *Levaill. Ois. d'Afr.* v, pl. 213 (1806);
Sundev. Krit. orn. *Levaill.* p. 47 (1858).
Cuculus collaris, *Vieill N. Diet. Hist. Nat.* viii, p. 299 (1817);
Borm. et Vieill. Enc. Meth. p. 1333 (1823).
C. coromandelicus, *S. Müll. Naturl. Geset. Land-en Volkenk.*
p. 234, note (1839-44).
Oxylophus coromandus, *Jerd. Madr. Journ.* xi, p. 272 (1840);
Blyth, J. A. S. Beng. xi, p. 920 (1842); *Gen. B.* ii, p. 464
(1847); *Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 74 (1849); *Bp. Conspl.*
i, p. 102 (1850); *Licht. Nomencl. Av. Berol.* p. 79 (1854);
Motley & Dillw. Labuan. N. H. p. 55 (1855); *Irby, Ibis,*
1861, p. 230 *Sclat. P. Z. S.* 1863, p. 209.
Oxylophus coromandus vel rubrarmus, *Hodgs. Icon. ined en*
Brit. Mus. Passeres, pl. 345 figs. 1, 2 (no. 611); *id. in. Gray's*
Zool. Misc. p. 85 (1844).
Coccystes coromandus, *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.*
ii, p. 693 (1854); *Moore, P. Z. S.* 1859, p. 459; *Jerd. B. Ind.* i, p. 341 (1862); *Cab. & Heine, Mus. Heine*, iv, p. 45
(1862); *Schl. Mus. Pays-Bas, Cuculi*, p. 43 (1863); *Blyth, Ibis,*
1866, p. 364; *Swinh Ibis*, 1867, p. 227; *Bulger, Ibis*, 1869,
p. 169; *Gray, Hand-l. B.* ii, p. 229, no. 906 (1870); *Swinh,*
P. Z. S. 1871, p. 394; *Holdsw. P. Z. S.* 1872, p. 432; *Hume, Nests, & Eggs. Ind. B.* p. 138 (1873); *Salvad. Ucc. Born.*
p. 67 (1874); *Blyth & Walden, B. Burm.* p. 81 (1875); *Hume,*

Str. F. 1871; p. 82; *Brüggem. Abhandl. nat. Ver. Bremen*, v. p. 465 (1876); *David & Oust. Ois. Chine* p. 71 (1877); *Hume & Davis*, *Str. F.* 1878, p. 162; *Sharpe, Ibis*, 1878, p. 414; *Tweedd. P. Z. S.* 1878, p. 946; *Legge B. Ceylon*, p. 249 (1879); *Hume, Str. F.* 1879, p. 89; *Seally t. c. p.* 257; *Wardlaw-Ramsay, App. Tweedd. Mem.* p. 656 (1881); *Simson, Ibis*, 1882, p. 87; *Silvin, Cat. Strickl. Coll.* p. 437 (1882); *Müller, J. F. O.* 1882, p. 406; *Blasius, J. F. O.* 1883, p. 155; *Oates B. Brit. Burm.* ii. p. 117 (1883); *Guillet. P. Z. S.* 1885, p. 406; *Büttik. Notes, Leyd. Mus.* ix. p. 29 (1886); *Vorderm. Nat. Tijdschr. Nedert. Ind.* xlvi. p. 10 (1886); *Norman, Ibis*, 1888, p. 409; *Sharpe, Ibis*, 1890, p. 12; *Shelley, Cat. B. M.* 19, p. 214 (1891).
Hab. Mindanao, Zamboanga; Borneo, Sumatra, Java, Célebes.

2. Gén. SURNICULUS, LES.

2. S. lugubris (Horsf.) ♂ N. v. Meisaquit.

(M. S. T.)

Cuculus lugubris, Horsf. *Tr. Linn. Soc.* xiii. p. 179 (1820); *id. Zool. Res. Java*, pl. 58 (1824); *S. Müll. Verh. Land-en Volks*, p. 178 (1839-44); *Less. Traité Orn.* p. 151 (1831); *id. in Belang. Voy. Ind. Orient.* p. 238 (1834); *Blyth, J. A. S. Beng.* 1842, p. 916; *Bp. Conspl.* i. p. 105 (1850); *Schl. Mus. Pays-Bas, Cuculi*, p. 28 (1864); *Pelz. Novara Reis., Vög.* p. 104 (1865); *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 219, n.º 9052 (1870).
Cuculus albopunctatus, Drap. *Dict. Class. Hist. Nat.* iv. p. 570 (1823).
C. albopunctatus, Horsf. *Zool. Res. Java*, pl. (1824).
Pseudornis dicruroides, Hodgs. *Icon ined. in Brit. Mus., Passeres*, pl. 353 no. 502; *id. J. A. S. Beng.* 1839, p. 136; *id. in Gray's Zool. Misc.* p. 85 (1844); *Gray, Cat. Mamm. & Nepal. pres. Hodgs.* p. 119 (1846).
P. lugubris, Hodgs. *J. A. S. Beng.* 1839, p. 137.
Cuculus dicruroides, Jerd. *Madras, Journ.* x. p. 221 (1840); *Blyth, J. A. S. Beng.* 1842, p. 915 (1843); p. 244; *kelaart. Cat. Prodr. App.* p. 60 (1853); *Leyard, Ann. & Mag. N. H.* xiii. p. 453 (1854); *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 219, no. 9051 (1870).
Polyphasia lugubris, Blyth, *J. A. S. Beng.* xii. 1843, p. 244.
Surniculus dicruroides, Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.* 1849, p. 72; *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii. p. 696 (1856); *Jerd. B. India*, i. p. 336 (1862); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 394; *Holdsworth, P. Z. S.* 1872, p. 431; *Hume, Str. F.* 1874, p. 472; *David & Oust. Ois. Chine*, p. 61 (1877).
S. lugubris, Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 72 (1849); *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii. p. 695 (1856); *Sclat. P. Z. S.* 1869, p. 209; *Walden, Ibis*, 1873, p. 368; *Salvad. Ucc. di Borneo*, p. 63 (1874); *Sharpe, Ibis*, 1877, p. 8; *Tweeddale, t. c. p.* 287; *id. P. Z. S.* 1878, p. 613; *Hume, & Danson, Str. F.* vi. pp. 159, 502 (1878); *Ball, Str. F.* vii. p. 207 (1878); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* 1879, p. 184; *Sharpe, Ibis*, 1879, p. 244; *id. P. Z. S.* 1879, p. 328; *Hume, Str. F.* viii. pp. 54, 19 (1879); *Legge, Legge, B. Ceylon*, p. 243

(1880); Hume, *Str. F.* ix, p. 241 (1880); Wardlaw Ramsay, *Tweeddale's Orn. Works*, App. p. 656 (1881); Sharpe *P. Z. S.* 1881, p. 792; Oates, *Handb. B. Br. Burm.* ii, p. 112 (1883); Blasius, *Verh. zool-bot. Ges. Wieu*, xxxiii, p. 30 (1883); Böttk., *Notes Leyden Mus.* 1886, p. 27; Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 394, 1890, p. 10; Whittlehead, *t. c.* p. 46; Shelley, *Cat. B. M.* 10, 1891, p. 227.

Caeculus lugubris, *Cab. & Heine, Mus. Hein.* iv, p. 17 (1862); A. Müll. *J. f. O.* 1882, p. 404.

C. diceroides, *Cab. & Heine, Mus. Hein.* iv, p. 18, note (1862). *Surniculus velutinus*, (*nec Sharpe,*) *Tweeddale, P. Z. S.* 1879, p. 69.

Hab. Paragua, P. Princesa; Java, Sumatra.

3. *S. velutinus*, Sharpe. ♂♂ N. v. Misaquit. (M. S. T.)

Surniculus velutinus, Sharpe, *Tr. Linn. Soc. ser. 2, Zool.* i, p. 320 (1877); *Tweeddale P. Z. S.* 1877, p. 823, 1878, p. 945; Wardlaw Ramsay, *Tweeddale's Orn. Works*, App. p. 659 (1881); Shelley, *Cat. B. M.* 10, 1891, p. 230.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Indan, Butuan, Zamboanga, Basilan, Mindanao, Malamauí.

3. Gén HIEROCOCCYX, S. MULL.

4. *H. sparverioides*, (*Vig.*) ♂♂ N. v. Sico-socop. (M. S. T.)

? Coucou à ventre rayé de l'Isle de Panay, Sonn, *Voy. Nov. Guin.* i, p. 20 pl. 179 (1776).

? Coucou brun et jaune à ventre rayé, *Buff. Hist. Nat. Ois.* vi, p. 379 (1779).

Cuculus flavigularis, *Scop. Del Flor et Faun. Insubr.* ii, p. 89 (ex Sonn. 1786); *Strickl. J. A. S. Beng.* 1844, p. 390, note.

C. radiatus, *Gm. S. N.* i, p. 420 (ex Sonn. 1788).

C. sparverioides, *Vig. P. Z. S.* 1831, p. 173; Gould, *Cent. Himal. B.* pl. 53 (1832); Blyth, *J. A. S. Beng.* xi, p. 898 (1842), xii, p. 240 (1843); Hodgs. in *Gray's Zool. Miss.* p. 85; Gray, *Cat. Mamm. & B. Nepal pres Hodgs.* p. 120 (1846); Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 70 (1849); Schlt. *Mus. Pays-Bas*, *Cneuli*, p. 15 (pt., 1864); David. & Oust. *Ois. Chine*, p. 63 (1877); Blakiston, *Ibis*, 1878, p. 228.

Hierococcyx sparverioides, *Bp. Conspl.* i, p. 104 (1850); Horsf. & Moore, *Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii, p. 699 (1856); Jerd. *B. Ind.* i, p. 331 (1862); Blyth, *Ibis*, 1866, p. 362; Jerd. *Ibis*, 1872, p. 14; Hume, *Neste & Eggs*. *Ind. B.* p. 135 (1873); *id. Str. F.* vii, p. 80 (1873); Armstrong, *Str. F.* iv, p. 311 (1876); Tacz J. F. O. 1876, p. 201; Hume & Davison, *Str. F.* vi, p. 157 (1878); Ball, *Str. F.* vii, p. 207 (1878); Hume, *Str. F.* viii, pp. 54, 89, (1879); Scully, *t. c.* p. 250; Bingham, *Str. F.* ix, p. 167 (1880); Hume, *t. c.* p. 248; Davison, *Str. F.* x, p. 359; Oates, *Handb. B. Br. Burm.* ii, p. 108 (1880); Marshall, *Ibis*, 1884, p. 411; A. Müll. *J. f. O.* 1885, p. 157; Salvador. *Ann. Mus. Civ.* Gen. 1887, p. 581; Sharpe,

Ibis, 1890, p. 11; *Oates*, et *Hume's Nests & Eggs*, Ind. B. ii, p. 384 (1890); *Shelley*, *Cat. B. M.* 19, 1891, p. 232.
Cuculus strenuus, *Gould*, *P. Z. S.* 1856, p. 96; *id. B. Asia*, vi, p. 42 (1856); *Blyth*, *Ibis*, 1890, p. 362.
Hierococcyx sparverinus, *Cab.* & *Heine*, *Mus. Hein.* iv, p. 28 note (1862).
H. strenuus, *Cab.* & *Heine*, *Mus. Hein.* iv, 28 note (1862); *Hume*, *Pr. Z. S. Beng.* 1872, p. 71; *Walden*, *Tr. Z. S.* ix, p. 161 (1875); *Sharpe*, *P. Z. S.* 1879, p. 327; *Blasius*, *Orn.* ii, p. 306 (1888); *Everett*, *P. Z. S.* 1889, p. 225; *Whitchead*, *Ibis*, 1890, p. 46
Hab. Paragua, Tagburus, Luzón, Manila, Cagayan, Pamplona; China, Borneo.

5. *H. fugax*, (*Horsf.*) *♂♂* N. v. *Sabucot*.

(M. S. T.)

Cuculus fugax, *Horsf.* *Tr. Linn. Soc.* xiii, p. 178 (1821); *Vig. Mem. Rajst.* p. 671 (1830); *Sykes*, *P. Z. S.* 1832, p. 98; *Jerd.* *Mad. F.* xi, p. 219 (1840); *S. Müll.* *Verh. Land-en Volk.* p. 233 (1839-44); *Blyth*, *J. A. S. Beng.* xi, p. 900 (1842), xii, p. 240, (1843), xiv, pp. 204, 943 (1845); *id. Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1846, p. 385; *Gray*, *Cat. Mamm. & B. Nepal pres. Hodgs.* p. 120 (1846).
C. lathamii, *J. E. Gray*, *Ill. Zool.* p. 34 fig. 2 (1834).
C. vagans, *S. Müll.* *Verh. Land-en Volk.* p. 233 note (1839-44).
C. nasicolor, *Hodgs.* *Icon. ined. in Brit. Mus., Passeres*, pl. 357, fig. 1 (n. ^o 872); *Blyth*, *J. A. S. Beng.* 1843, p. 18.
C. flaviventris, (*nec Scop.*) *Strickl.* *J. A. S. Beng.* 1843, p. 390, note.
Hierococcyx iliviventris, *Blyth*, *J. A. S. Beng.* p. 390, note 1844; *id. Ibis*, 1866, p. 362.
H. fugax, *Bp. Conspl.* i, p. 104 (1850); *Cab.* & *Heine*, *Mus. Hein.* iv, p. 28, note (1862); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* v, p. 65 (1874); *Tweedd. Ibis*, 1877, p. 7; *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* xiv, p. 185 (1879); *Sharpe*, *Ibis*, 1879, p. 245; *Hume*, *Str. F.* viii, p. 52 (1879); *Kelham*, *Ibis*, 1881, p. 391; *Wardlaw*, *Ramsay*, *Ibis*, 1884, p. 333; *A. Müll. J. f. O.* 1885, p. 157; *Butiib.* *Notes Leyd. Mus.* 1880, p. 28; *Sharpe*, *P. Z. S.* 1887, p. 442; *id. Ibis*, 1890, p. 10; *Shelley*, *Cat. B. M.* 19, 1891, p. 230.
H. vagans, *Bp. Conspl.* i, p. 104 (1850); *Cab.* & *Heine*, *Mus. Hein.* iv, p. 30, note (1862).
Cuculus hyperthrus, *Gould*, *P. Z. S.* 1856, p. 96; *id. B. Asia* vi, pl. 431 (1856) *Swinh.* *P. Z. S.* 1874, p. 395; *David & Oust. Ois. Chine* p. 64 (1874); *Layard*, *Ibis*, 1878, p. 327; *Seebh.*, *Ibis*, 1884, p. 36.
H. pectoralis, *Cab.* & *Heine*, *Mus. Hein.* iv, p. 27 (1862); *Walden*, *Tr. Z. S.* ix, p. 161 (1875); *Tweedd.* *P. Z. S.* 1878, p. 946.
H. hyperthrus, *Cab.* & *Heine*, *Mus. Hein.* iv, p. 30, note (1867); *Walden*, *Tr. Z. S.* ix, p. 161 (1875); *Wardlaw* *Ramsay*, *Ibis*, 1886, p. 157; *Tweedd.* *P. Z. S.* 1878, p. 946.
H. sparveroides (*nec Vig.*), *Schrenck*, *Reis. im Amurlande*, *Vog.* p. 257, pl. 10 (1859-67).
H. nasicolor, *Jerd.* *B. Ind.* i, p. 330 (1862); *Blyth*, *P. A. S.* *

Beng. xxx. p. 93 (1861); *id.* *Ibis*, 1866, p. 361; *Jerd. Ibis*, 1872, p. 14; *Hume, Str. F.* vi. p. 157, (1870); *Jerd. Str. F.* vii. p. 371 (1878); *Hume, Str. F.* viii. pp. 53, 80 (1879); *Oates, Handb. B. Bs. Burm.* ii. p. 109 1883; *id. ed Humes Nests. & Eggs. Ind. B.* ii. p. 383 (1890).

Hab. Luzón, Manila, S. Mateo, Zamboanga, Mindanao; Borneo, Java, Sumatra.

4 Gen. CUCULUS, LINN.

o C. canorus, LINN. m N. v. El Cuclillo.

(M. S. T.)

Cuculus canorus, Linn., *Syst. Nat.* ip. 168 (1766); *Horsf. Trans. Linn. S.* xiii. p. 179 (1821); *Naum, Vög. Deutschl.* pls. 127; 128, 129, (1822-53); *Temm. Mam. d'Orn.* i. p. 381 (1820); *Werner, Atlas Zygod.* pls. 1, 2 (1828); *Sykes, P. Z. S.* 1832, p. 98; *Gould, B. Eur.* iii. p. 240 (1837); *Blyth, J. A. S. Beng.* xi. p. 901 (1842); *Rupp, Syst. Uebers.* p. 96 (1845); *Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 71 (1849); *Karb. Orn. Dan.* pl. 10, & *Suppl.* pl. 4 (1851); *Schl. Vög. Neuerl.* pls. 55, 56 (1854-58); *Hartl. Orn. W. Afr.* p. 266 1857; *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii. p. 702 (1858); *Irby, Ibis*, 1801, p. 229; *Sundew, Svensk. Fogl.* pl. 21, figs. 4, 5 (1862); *Blakiston, Ibis*, 1862 p. 325; *Cab & Heine, Mus. Hein.* iv. p. 32 (1862); *Jerd. B. Ind.* i. p. 322 (1862); *Swinh. Ibis*, 1863, p. 396; *Schl. Mus. Pays-Bas, Cuculi*, p. 4 (1864); *Bettene, Ucc. Lomb.* ii. pl. 92 (1865-70); *Blyth, Ibis* 1860, p. 359; *Tytler, Ibis* 1868 p. 202; *Blan. Geol. & Zool. Abyss.* p. 312 (1870); *Fritsch, Vög. Eur.* pl. iv. figs. 8, 9 (1870); *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 215, n.^o 8985; *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 395; *Heng. Orn. N. O. Afr.* p. 779 (1871); *Shelly, B. Egypt.* p. 162 (1872); *Gurney in. Anderss B. Damara Id.* p. 227 (1872); *Jerd. Ibis*, 1872 p. 12; *Cab. J. f. O.* 1872, p. 235; *Gould, B. Gt. Britt.* iii. pls. 67, 68 (1873); *Hume, Nests. & Eggs. Ind. B.* p. 133 (1873); *Alston. & Harvie-Brown, Ibis*, 1873, p. 59; *Brooke, t. c.* p. 236; *Cock. & Marshall, Str. F.* i. p. 351 (1873); *Adams, t. c.* p. 373; *Stejneger, J. f. O.* 1873, p. 305; *Ussher, Ibis* 1874, p. 52; *Durnford, t. c.* p. 395; *Ball, Str. F.* ii. p. 393 (1874); *Swinh. Ibis*, 1875, p. 125; *Dunford, t. c.* p. 299; *Krüper, J. f. O.* 1875, p. 270; *Sachse, t. c.* p. 424; *Hume, Str. F.* iii. p. 78 (1875); *Brooks, t. c.* p. 232; *Bagrave Wharton, Ibis*, 1876, p. 20; *Seehom. & Harvie-Brown, Ibis* 1876, p. 112; *Barratt, t. c.* p. 199; *Dresser t. c.* p. 320; *Scully, Str. F.* iv. p. 134 (1876); *Hume, t. c.* p. 288; *Bechallow, J. f. O.* 1876, p. 180; *Boeage, Orn. Angola.* p. 138 (1877); *David & Oust. Ois. Chine.* p. 64 (1877); *Alyres, Ibis.* 1877, p. 342; *Wardlaw Ramsay, t. c.* p. 458; *Hume, Str. F.* v. p. 27 (1887); *Schalow J. f. O.* 1877, p. 196; *Dresser, B. Eur.* v. p. 199, pl. 299, (1878); *Dunford, Ibis*, 1878, p. 7; *Blakiston & Prysor t. c.* p. 227; *Seehom, t. c.* p. 326; *Hume, Str. F.* vi. p. 156 (1878); *Ball, t. c.* p. 206; *Finsch, P. Z. S.* 1879 p. 12; *Hume, Str. F.* viii. p. 88 (1879); *Scully t. c.* p. 253; *A. Müll J. f. O.* 1879, p. 387; *Legge, B. Ceyl n.* i. p. 221 (1880); *Wardlaw Ramsay, Ibis*, 1880; p. 50 *Biddulph,*

- Sir E. ix. p. 314 (1889); Butler, t. c. p. 387; Barnes, t. c. p. 453; Biddulph, *Ibis*, 1881 p. 49; Sculley, t. c. p. 430; Red. Str. I. x. p. 26 (1881); Sculley t. c. p. 102 Davison, t. c. p. 299; Swinh. *Ibis* 1882, p. 103; Seehöhm, t. c. pp. 309, 373; Shelly t. c. p. 309; Oates, *Gandh. B. Brit. Burmah*, ii. 1. 103, (1883); Seehöhm, *Ibis*, 1883, p. 22; Severts, t. c. p. 71; Isby, t. c. p. 179; Sharpe, ed. Layard's *B. S. Afr.* pp. 147; 889 (1875-84); Tristr. *Faun. & Hor. Palestine*, p. 89 (1884); Seehöhm, *Hist. Brit. B.* ii. p. 378, pl. 19 (1884); Agres, 16's, 1884, p. 223; Saunders, t. c. p. 380 Marshall, t. c. p. 410; Fisch. *Zeitschr. ges. Orn.* 1884 p. 305; Swinh. & Barnes, *Ibis*, 1885 p. 63; Dixon, t. c. p. 257; Guillemin, P. Z. S. 1885 p. 551 Fisch. J. f. O. 1885, p. 124; Ded'ius, t. c. p. 203; Dubois, *Bull. Mus. Belg.* 1885, p. 181; Schalow, *Zeitschr. ges. Orn.* 1885 p. 86; Booth, *Rough. Notes*, part. xiii pl. Sharpe *Ibis*, 1866, pp. 489, 498; Hartert, J. f. O. 1886 p. 597; Styan, *Ibis*, 1887, p. 230; Tait, t. c. p. 306; Bocage, *Forn. Lisb.* 1887, p. 5; Leverk. J. f. O. 1887, pp. 79, 191; W. Müll. t. c. p. 169; Schalow, t. c. p. 188; Hartert, t. c. p. 253; Eckstein, t. c. p. 286; St. Pohn, *Ibis*, 1889 p. 159; A. Müll. t. c. p. 219; Lilford, t. c. p. 330; Oates, t. c. p. 355; Clarke, t. c. p. 549; Oates, ed. Hume's *Nests. & Eggs.* ii. p. 37 (1890); Shelley, *Cat. B. M.* 19 1891, p. 245.
Le coucou, Montb. *Hist. Nat. Ois.* vi. p. 305 (1779); Daubent. *Pl. Enl.* vi. pl. 811.
Coucou du Cap de Bonne Esperance, Month. pl. Enl. vi. pl. 300.
Cuculus capensis, P. Z. S. Müll. *Syst. Nat. Suppl.* p. 90 (1776); *Gm. Syst. Nat.* i. p. 410 (1788); *Steph. Gen. Z.* ix p. 85 (1825); *Cab. & Heine, Mus. Hen.* iv. p. 42 (pt., 1862); *Cass. Proc. Philad.* & 1864, p. 243.
C. hepaticus, *Sparrm. Mus. Carls.* iii. p. 55 (1789); *Lath. Ind. Orn.* i. p. 215 (1790); *Sundev. Krit. Orn. Sparrm.* p. 10 (1857).
C. rufus, Bechst. *Nat. Hist. Deutschl.* ii. p. 1142 (1792); id. *Orn. Taschenb.* i. p. 84 (1802).
C. tristis, Hermann, *Observ. Zool.* p. 131 (1804).
Coucou vulgaire d' Europe, Levaill. *Ois. a' Afr.* v. p. 26, pl. 202, 203 (1806).
Cuculus borealis, Pall. *Zoogr. Rosso-As.* i. p. 442 (1811).
C. tenuirostris, S. Müll. *Verh. Nat. Gesch. Landen Volk.* p. 235, note (1830-44); Bp. *Consp. Av.* i. p. 103 (1850); *Cab. & Heine Mus. Hen.* iv. p. 39 (1862).
C. longipennis, Brehm, *Naumann.* 1855, p. 271.
C. striatus (*nec Drap.*) Swinh. *Ibis*, 1861, p. 259.
C. telephonus, Heine, *J. f. O.* 1863, p. 352.
C. libanatus, Tristr. P. Z. S. 1864, p. 432.
C. canorus telephonus, Stejn. *Bull. U. S. Nat. Mus.* n.^o 29, p. 224 (185); Traزانowski, P. Z. S. 1887, p. 607, 1888, p. 466.
C. canorus borealis, Stejn. *Bull. U. S. Nat. Mus.* n.^o 29, p. 225 1885.
C. peninsulae, Stejn. t. c. p. 227.
Hab. Luzon; Europa, y casi cosmopolita.

7. *C. intermedius*, Vahl. ♂♂ N. v. Sabucot. Mesaquit. (M. S. T.)

- C. intermedius*, Vahl. Skriv. af. Natuur. Setzk. iv. p. 58 (1797); Oates, ed. Hume's Nests. & Eggs. Ind. B. ii. p. 381 (1860); Seeb. Birds: Japan Emp. p. 169 (1890); Shelley, Cat. B. M. 19. 1891, p. 252.
- C. striatus*, Drap. Dict. Class. Hist. Nat. p. 570 (1823); id. Dict. Class. Sc. iii. p. 144 (1838); Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. ii. p. 703, pt. (1856-58); Swinh. Ibis, 1861, pp. 259, 340; Cab. & Heine, Mus. Hein. iv. p. 37 (1862); Schl. Mus. Pays-Bas, Cuenli, p. 7 (1864); Blyth, Ibis, 1866, p. 359; Swinh. P. Z. S. 1875, p. 395; Humz, Str. F. i. p. 422 (1873); id. Nests & Eggs. Ind. B. p. 134 (1873); id. Str. F. ii. pp. 190; Rosenb. Reits naar Geelbinkb. p. 6 (1875); Hume, Str. F. vi. p. 156 (1878), viii. pp. 53, 88 (1879); Scully, t. c. p. 254; Davison t. c. p. 359; A. Müll. J. f. O. 1882, p. 306; Oates, Handb. B. Brit. Burm. ii. p. 105 (1883); id. Ibis, 1889, p. 357.
- C. himalayanus*, Vig. P. Z. S. 1831, p. 172; Blyth. Cat. B. Mus. As. Soc. p. 71 (1849); Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. ii. p. 704 (1858); Jerd. B. Ind. i. p. 323 (1862); Tytler, Ibis, 1868, p. 202; Jerd. Ibis, 1872, p. 82; Seeböhm. Ibis, 1878, p. 326; Sharpe, P. Z. S. 1879, p. 327; Biddulph, Str. F. ix. p. 314 (1880); id. Ibis, 1881, p. 50; Scully, t. c. p. 431; id. Str. F. x. p. 103 (1881); Seeböhm. Hist. Brit. B. ii. p. 379 (1884), p. 36; Marshall, t. c. i. 410.
- C. canorooides*, S. Müll. Verh. Nat. Gesch. Land-en Volk. p. 235, note (1839-44); Bp. Conspl. Av. i. p. 103 (1850); Gray, P. Z. S. 1860, p. 359; Wallace, P. Z. S. 1863, p. 484; Finsch, Neu-Guinea, p. 159 (1865); Gould, B. Australia, p. 614 (1865); Blyth, Ibis, 1865, p. 31; Gray, Hand-l. B. ii. p. 216, n.º 9006 (170); Blyth, Ibis, Cat. B. Burmah, p. 79 (1875); Wardlaw Ramsay, P. Z. S. 1875, p. 600; Salvad. Ann. Mus. Civ. Genov. x. p. 124 (1877), xiii. p. 457 (1878); Dr. Albert's & Salvad. Ann. Mus. Civ. Genov. xiv. p. 42 (1879); Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. Wales, iv. p. 96 (1879); Salvad. Orn. Papuasia, i. p. 328 (1880); App. op. cit. p. 48 (1888); Blasius, u. Nehek. Verh. Gesellsch. Wien 1882 p. 417; Finsch, Vog. der Sudsee, p. 16 (1884); Pleske, Bull. Act. Petersb. xxix. p. 524 (1884); Guillemaud, P. Z. S. 1885, pp. 565, 624; Blasius. Ornis. v. p. 306; Whitehead, Ibis, 1890, p. 46.
- C. saturatus*, Horsf. J. A. S. Beng. xii. p. 942 (1843); Blyth, J. A. S. Beng. xv. p. 18 (1846); Cab. & Heine, Mus. Hein. iv. p. 37, note (1862).
- C. optatus*, Gould, P. Z. S. 1845, p. 18; Gray, Gen. B. ii. p. 463 (1847); Gould, B. Australia, iv. pl. 48; id. Introd. B. Australia p. 67 (1848); Rehb. Vog. Neuholl. ii. pp. 113, 309 (1851); Bp. Conspl. Av. i. p. 103 (1850); Cab. & Heine, Mus. Hein. iv. p. 34, note 1862.
- C. canorus indicus*, Blyth, J. A. S. Beng. xv. (1846 p. 19; Stejn. Bull. U. S. Nat. Mus. n.º 29, p. 228 (1885).
- Nicoclarus optatus*, Bp. Conspl. Vol. Zygod. p. 6, sp. 169 (1854); Gray, Hand-l. ii. p. 216 n.º 9007 (1870).

- Nicocarius canoroides, *Bp. Conspl.*, Vol. Zygod. p. 6 sp. 169 (1854);
Gray, *Hand-l. B.* ii. p. 216 (1870).
Cuculus horsfieldii, Moore, *Cal. B. Mus. E. I. Co.* ii. p. 703
(1858).
C. fuscus, Peale, *U. S. Expl. Exped.* p. 136, pl. 37, fig. 2 (1848);
Cab. & Heine, Mus. He'n. iv. p. 40, note, (1862); Gray, *Hand-l. B.* ii. p. 216 n.^o 8997 (1870).
C. tenuirostris, (nec Less.), Cass., *U. S. Expl. Exped.* 1858, p.
244 pl. 21 fig. 1.
C. indicus, Cab. & Heine, *Mus. He'n.* iv. p. 34 (1862); Tacz J.
J. f. O. 1876, p. 200; id. *Bull. Soc. Z. France*, 1882, p. 395;
Dyb. op. cit. 1883, p. 368; Lorenz, *Beitr. Orn. Kuk.* p.
43 (1887).
C. cantor, *Ill. fide Cab. & Heine, Mus. Hein.* iv. p. 34 (1862).
C. canorus, Cab. & Heine, *Mus. He'n.* iv. p. 35 (1862); Guib.
Thes. Orn. i. P. 834 (1872); Taczan, *J. f. O.* 1873, pp. 90,
118; Salvad. *Ucc. Borneo*, p. 67 (1874); Swinh. *Ib's.* 1875,
p. 254; Stejn. *Pr. U. S. Nat. Mus.* vi. p. 182 (1883).
C. swinhoii, Cab. & Heine, *Mus. Hein.* iv. p. 37, note (1862).
C. kelungensis, Swinh. *Ib's.* 1863, p. 394; Gray, *Hand-l. B.*
ii. p. 216, n.^o 9000 (1870).
C. mon syllabicus, Swinh. *Ib's.* 1865, p. 545; Gray, *Hand-l. B.*
ii. p. 216, n.^o 8998 (1870).
Hab. Luzon, Laguna, Calauan, Paragua, P. Princesa; China,
Célebes, Australia.

8. *C. poliocephalus*, Lath. ♂♂ N. v. Sabucot, Meisaquit (M. S. T.)

- Cuculus poliocephalus*, Lath. *Ind. Orn.* i. p. 214 (1790); Gould.
Cent. B. Himalaya, pl. 54 (1832); Blyth, *J. A. S. Beng.* xi.
p. 974 (1842); Gray, *Cal. Mamm. & Nepal, pres Hodgs.* p.
119 (1846); Blyth, *Cal. B. Mus. As. Soc.* p. 7 (1849); Horsf.
& Moore, *Cal. B. Mus. E. I. Co.* ii. p. 704 (1856-58); Cab.
& Heine, *Mus. Hein.* iv. p. 31, note (1862); Jerd. *B. Ind. i.*
p. 324 (1892); Schlegel, *Mus. Pays-Bas.* *Cucuti*, p. 12 (1864); Jerd.
Ib's. 1872, p. 13; Gray, *Hand-l. B.* ii. p. 215, n.^o 8990; Hume,
Nests. & Eggs. Ind. B. p. 135 (1873); Milne-Edw. & Grand.
Hist. Madag. Ois. *Atlas*, i. pl. 66 (1876); Fairbank, *Str. F.*
iv. p. 255 (1879); David & Oust. *Ois. Chin.* p. 66 (1877);
Davidson & Wenden, *Str. F.* vii. p. 71 (1878); Hume, *Str. F.*
viii. p. 88 (1879); Sharpe, *Ibis*, 1879, p. 394; Legge, *B. Ceylon*, p. 231 (1880); Vidal, *Str. F.* ix. p. 54 (1880); Butler,
t. c. p. 385; Davison, *Str. F.* x. p. 299 (1881); Sharpe,
Ibis, 1883, p. 344; Oates, *Ibis*, 1889, p. 357; Sharpe, *Ibis*,
1890, p. 11; Shelley, *Cat. B. M.* 19. 1891, p. 355.
C. himalayanus vel. *bharovus*, Hodgs. *Zool. Misc.* p. 85 (1831).
C. canorus (nec Linnae), Desjard. *P. Z. S.* 1832, p. 111; Harff,
Ann. & Mag.-Nat. Hist. ii. p. 391 (1848); id. *J. f. O.* 1890,
p. 110; Vinson, *Voy. Madag.* p. 88 (1865); Verr. *Ann. B.*
Voy. Madag. *Vinson*, p. 3 (1865).
Le Pigeon ramier gris et verdâtre, *Sganzin*, *Mem. Soc. Mus.*
Hist. Nat. Strasbourg, 1840, p. 40.
Hirhococcyx poliocephalus, *Bp. Conspl. Av.* i. p. 104 (1850).

- Cuculus bartlettii, Layard, Ann. & Mag. Nat. Hist. 2nd. ser. xiii. p. 452 (1854).
Nicoclarius temicrostris (nec Less.), Bp. Cousp. Vol. Zygod. p. 6 (1854).
Cuculus rochii, Hartl. P. Z. S. 1862, p. 224; Roch. & Newton, Ib's, 1863, p. 166; E. Newton, t. c. p. 453; Poll. Ned. Tijdschr. v. d. Dierh. p. 300 (1863); Schl. P. Z. S. 1866, p. 424; Schl. & Poll. Faun. Madag. ii. Ois. p. 53 (1868); Gray, Hand-l. B. ii. p. 215, n.^o 1992; Sharpe, P. Z. S. 1870, p. 399; 1873, p. 582; Hartl. Vog. Madag. p. 253 (1877); Bartlett, P. Z. S. 1879, p. 771.
C. clamosus (nec Lath.), Coquerel, Bull. Soc. Accl. Réunion ii. 10 (1864).
C. tamsicus, Swinh. Ib's, 1865, p. 108.
C. himalayanus (nec Vig.), Grand. Rev. et Mag. Zool. 1867, p. 418; Poll. Faun. Madag., Relat. Voy. i. p. 198 (1877).
C. sp. inc., Blakiston & Prysor, Ib's, 1878, p. 227.
C. poliocephalus, var. rochii, Milne-Edw. & Grand. Hist. Madag. Ois. i. p. 176 (1879).
C. leptodetus (nec Cab.), Dubois, Bull. Mus. Hist. Nat. Belg. iv. p. 147 (1880).
C. stormsi, Dubois, Bull. Mus. Hist. Nat. Belg. v. p. 3, pl. 2 (1817).
Hab. Luzón, Laguna, Calauán; Java, Borneo.

5 Gén. CACOMANTIS, S. MÜLL.

9. **C. merulinus**, (Scop.) ♂ N. v. Mesaquit, Pasay. (M. S. T.)

- Le Petit coucou de l' Isle Panay, Sonn. Voy. Now. Guin. i. p. 122 p. 81 (1776).
Cuculus merulinus, Scop. Del. Flor. et Faun. Insulbr. ii. p. 89 (1786); Strickl. J. A. S. Beng. 1844, p. 391; Blyth, Cat. B. M. As. Soc. p. 71 (1864); Schl. Mus. Pays-Bas, Cuculi, p. 21 (1864); Gray, Hand-l. B. ii. p. 217 n.^o 9016 (1870).
C. flavus, Gm. S. N. i. p. 421 (1878); Steph. Gen. Zool. ix. p. 107 (1815); Horsf. Trans. Linn. Soc. xiii. p. 179 (1822); Raffl. t. c. p. 285; Vig. Mem. Raffl. p. 671 (1830); Less. in Belang. Voy. Ind. Orient. p. 231 (1834); S. Müll. Verh. Nat. Gesch. Land-en Volk. p. 177 (1839-44); Blyth, J. A. S. Beng. 1842, p. 912, 1843, p. 241; Low, Sarawak, p. 411 (1848); Waldau, Ib's, 1869, p. 337.
Surniculus flavus, Less. Traité, p. 151 (1831).
Coucou à tête grise de Java, Less. in Belang. Voy. Zool. p. 237 (1834).
Cuculus sepulcralis, S. Müll. Verh. Nat. Gesch. Land-en Volk. p. 177, note, (1839-44); Gray, Hand-l. B. ii. p. 217, n.^o 9022 (1870).
C. lanceolatus, S. Müll. Verh. Nat. Gesch. Land-en Volk. p. 178 (1839-44).
C. abruptus, Burm. Verz. Mus. Halle, p. 54 (1850).
Cacomantis flavus, Bp. Conspl. i. p. 103 (1850).
Cacomantis sepulcralis, Bp. Conspl. i. p. 104 (1850); Cab. & Herre, Mus. Hein. iv. p. 20 (1852); Sclat. P. Z. S. 1863, p.

- 209; *Walden*, *Trans. Z. S.* viii, p. 54 (1872); *Salvad. Ucc. Borneo*, p. 65 (1874); *Tweedd. P. Z. S.* 1878, p. 945; *Wardlaw Ramsay*, *App. Tweedd. Orn. Works*, p. 656 (1881); *Gull-Hemard*, *P. Z. S.* 1885, p. 550; *Beddard*, *P. Z. S.* 1887, p. 175.
Cuculus Ineatus, *Pucher*, *Rev. et Mag. Zool.* 1853, p. 70.
Cacomantis boreaensis, *Bp. Conspl. Vol. Zygod.* p. 6 (1854);
Wald. Tr. Z. S. viii, p. 54 (1872).
Polyphasia merulina, *Horsf. & Moore*, *Cat. B. Mus. E. I. Co.* ii, p. 697 (1856-58).
Cocomantis threnodes, *Cab. & Heine*, *Mus. Hein.* iv, p. 19 (1862);
Wald. Tr. Z. S. viii, p. 54 (1872); *Hume, & Davis Str. F.* vi, p. 158; *Ball*, *op. cit.* p. 207 (1878); *Cripps*, *t. c.* p. 265; *Hume*, *op. cit.* viii, pp. 54, 89 (1879); *Bingham*, *op. cit.* ix, p. 167 (1880); *Kelham*, *Ibis*, 1881, p. 391; *A. Müll. J. f. O.* 1882, p. 405; *Oates*, *Handb. B. Brit. Burmah*, ii, p. 111 (1883); *A. Müll. J. f. O.* 1885, p. 157; *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* 1888, p. 568.
Cuculus rufoviridis, *Cab. & Heine*, *Mus. Hein.* iv, p. 20 (1862).
Cacomantis merulinus, *Cab. & Heine*, *Mus. Hein.* iv, p. 21; *Wald. Tr. Z. S.* viii, p. 156 (1872); *Salvad. Ucc. Borneo*, p. 64 (1874); *Wald. Tr. Z. S.* ix, p. 160 (1875); *Sharpe*, *Ibis*, 1879, p. 34, 1877, p. 7; *id. Trans. Linn. Soc. ser. 2, i. Zool.* p. 320 (1877); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 691, 1878, pp. 613, 709; *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen. xiv.* p. 185 (1879); *Sharpe*, *Ibis*, 1879, p. 244; *Hume*, *Str. F.* viii, p. 54 (1879); *Tweedd. P. Z. S.* 1879, p. 60; *Sharpe*, *t. c.* 1879, p. 328, 1881, p. 792; *Wardlaw Ramsay*, *App. Tweedd. Orn. Works*, p. 656 (1881); *Büttik Notes Leyden Mus.* ix, p. 28 (1886); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* 1887, p. 532; *Sharpe*, *Ibs.* 1888, p. 198, 1890, p. 10; *Whitehead*, *t. c.* p. 46; *Everett*, *P. Z. S.* 1889, p. 225; *Shelley*, *Cat. B. M.* 19, 1891, p. 268.
Polyphasia tenuirostris, (*nec S. Müll.*), *Jerd. B. Ind.* i, p. 335 (pt.) (1862).
Cacomantis dysnomus, *Heine, J. f. O.* 1863, p. 352.
C. querulus, pt., *Heine, J. f. O.* 1863, p. 352.
Polyphasia rufiventris, *Jerd. Ibis*, 1877, p. 15.
Cacomantis passerinus, (*nec Vahl*), *Blyth. & Walden*, *B. Burmah*, p. 80 (1875).
Oolygon tenuirostris, *Hume*, *Str. F.* iii, p. 80 (1875).
Cacomantis rufiventris, *Armstrong*, *Str. F.* ix, p. 312 (1876); *Wardlaw Ramsay*, *Ibis*, 1877, p. 458; *Anders*, *Zool. Exped. Yunnan*, p. 587 (1878).
C. tenuirostris, (*nec Bp.*), *David & Oust. Ois Chine* p. 62 (1877).
Cuculus threnodes, *Gray*, *Hand-l. B.* ii, n.º 217, n.º 9017.
Hab. Luzón, Minila, Montalban, S. Mateo, Laguna, Calauan, Panay, Negros, Misbate, Cebú, Sinar, Leyte, Bohol, Zamboanga, Mindanao, Basilin, Paragua, P. Princesa, Malamau, Java, Sumatra, Borneo, Ternate.

6. Gén. CHALCOCOCCYX, CAB.

10. Ch xanthorhynchus, (Horsf.) ♂ ♀ N. v. Sabucot. (M. S. T.)

Cuculus xanthorhynchus, Horsf. Tr. Linn. Soc. xiii. p. 879 (1822); id. Zool. Res. Java, pl. 59 (1824); Vig. Mem. Raffl. p. 672 (1830); S. Müll. Verh. Nat. Nat. Gesch. Land-n Volk. p. 234 (1839-44); Blyth, J. A. S. Beng. xi. p. 919 (1842); Schl. Mus. Pays-Bas, Cuculi p. 32 (1864); Gray, Hand-l. B. ii. p. 219, n.^o 9040 (1870); Sharpe, Ibis, 1879, p. 244.
Lampromorpha amethystina, Vig. P. Z. S. 1831, p. 98.
Chrysococcyx xanthorhynchus, Blyth, J. A. S. Beng. xi. p. 919 (1842), xii. p. 245 (1843); id. Cat. B. Mus. As. Soc. p. 73 (1849); Bp. Cons. i. p. 106 (1850); Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. ii. p. 706 (1856-58); Sel. P. Z. S. 1863, p. 200; Salvador. Ucc. Borneo, p. 62 (1874); Wald. Ibis, 1874, p. 37; Hume, Str. F. iii. p. 472 (1874); Blyth, & Wald. B. Burm., p. 80 (1875); Tweed. Ibis, 1877, p. 287; Wardlaw Ramsay, Ibis, 1877, p. 458; Hume, Str. F. vi. p. 506 (1878), viii. pp. 54; 89 (1879); Sharpe, P. Z. S. 1879, p. 327; Hume, Str. F. ix. p. 248 (1880); Sharpe, P. Z. S. 1881, p. 792; Oates, Handb. B. Br. Burm. ii. p. 114 (1883); Büttik notes Leyden Mus. 1886, p. 21; Sharpe, Ibis, 1888, p. 198, 1890, p. 95; Whitehead I. c. p. 46.
Lamprromorpha xanthorhynchus, Bp. Cons. Vol. Zygod. p. 7 (1854).
Chalcococcyx xanthorhynchus, Cab. & Heine, Mus. Hein. iv. p. 15 (1862); Hume, Str. F. ii. p. 191 (1874); iii. p. 81 (1875); Hume & Davis Str. F. vi. pp. 161, 506 (1878); Shelley, Cat. B. M. 19, 1891, p. 289.
C. amethystinus, Wald. Tr. Z. S. ix. pp. 160, 250 (1875).
Chalcites xanthorhynchus, Gould, B. Asia vi. pl. 47 (1877).
Chrysococcyx limborgi, Tweed. P. Z. S. 1877, p. 366; id. Str. F. vii. p. 319 (1878); Hume, Str. F. viii. p. 89 (1879); Birmingham, Stos. F. ix. p. 168 (1880); Oates, Handb. B. Br. Burm. ii. p. 116 (1783).
Hab. Mindoro, Calapan, Naujan, Luzon, Bataan, Orion; Java, Sumatra, Borneo.

11. Ch basalis, (Horsf.) ♂ ♀ N. v. Sabucot. (M. S. T.)

Cuculus basalis, Horsf. Tr. Linn. Soc. xiii. p. 879 (1821); Vig. Mem. Raffl. p. 672 (1830); Gray, Gen. B. ii. p. 463 1547, id. Hand-l. B. p. 218 no. 9038 (1870).
Chrysococcyx chalcites (nec Ill.), Blyth, J. A. S. Beng. xi. p. 919 (1842).
C. lucidus (nec Gm.), Gould, B. Austr. iv. pl. 86, pt. fig. ♀ et juv. (1848).
C. basalis, Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc. p. 73 (1849); Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. ii. p. 107 (1856-58).
Chalcites basalis, Bp. Cons. Vol. Zygod. p. 7 (1854); Hume Str. F. iii. p. 319 (1875); Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. Wales, (2) ii. p. 170 (1887).

- Lamprocoecyx basalis, Cab. & Heine, Mus. Hein. iv. p. 12 (1829);
Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen. xiii. p. 459 (1878); id. Orn. Papuasia, i. p. 349 (1880); App. p. 40 (1889); Shelley, Cat. B. M. 19, p. 294 (1891).
Cuculus lucidus, Schl. Mus. Pays-Bas, Cuculi, p. 33 (pt., 1864).
? Cuculus neglectus, Schl. Mus. Pays-Bas, Cuculi, p. 35 (1864);
Gray, Hand-l. B. ii. p. 219 n.^o 9945 (1870).
Hab. Negros, Mindanao; Java, Australia.

12 Ch. lucidus (Gm.) ♂ ♀ N. v. Sabucot.

(M. S. T.)

- Shining cuckoo, Lath. Gen. Syn. ii. p. 528, pl. 23 (1782).
Cuculus lucidus, Gm. Syst. Nat. i. p. 421 (1788); Vig. & Horsf. Trans. Linn. Soc. xv. p. 30 (1826); Temm. Pl. Col. iii. pl. 102 fig. 1 (1824); id. Tabl. Meth. p. 52 (1838); Gray, Hand-l. B. ii. p. 218, no. 9042 (1870); Shelley, Cat. B. M. 19, 1191 p. 295.
Variable Warbler, Lath. Gen. Syn. Suppl. ii. p. 250 (1801).
Sylvia versicolor, Lath. Ind. Orn. ii. Suppl. p. 56 (1801).
Cuculus metallicus, Vig. & Horsf. Tr. Linn. Soc. xv. p. 302 (1827).
Chalcites lucidus, Less. Traité, p. 153 (1831); Bp. Conspl. Vol. Zygod. p. 7 (1854).
Cuculus nitens, Forst. Descr. Anim. p. 151 (1844).
Cuculus versicolor, Gray, Gen. B. iii. p. 463 (1847).
C. chalceites, Ill. en Mus. Berol. Temm. Tabl. Meth. p. 52 (1838).
Chrysococcyx lucidus, Bp. Conspl. Av. i. p. 105 (1850); Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. ii. p. 706 (1856-58); Finsch, Neu Guin. p. 159 (1865); Buller, B. New Zeland, p. 77 (1873); 2nd id. i. p. 132, pl. 15 (1888).
C. chalceites, Licht. Nomencl. Av. p. 78 (1854).
Lamprocoecyx lucidus, Cab. & Heine, Mus. Hein. iv. p. 14 (1862).
Hab. Australia.

13 Ch. malayanus, (Raffles.) ♂ ♀ N. v. Bahao.

(M. S. T.)

- Cuculus malayanus, Raffles. Trans. Linn. Soc. xiii. p. 286 (1822).
C. chalceites (nec Ill.), Blyth, J. A. S. Beng. xi. p. 919 (1842), xii. p. 944 (1843); S. Müll. Verh. Nat. Gesch. Landen Vth. p. 234, note (1839-44).
C. lucidus (nec Gm.), Blyth, J. A. S. Beng. xii. p. 944.
Chrysococcyx basalis, ? Blyth, J. A. S. Beng. xv. p. 54 (1846); ? Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. ii. p. 707 (1856-58); Salvad. Ucc. de Borneo p. 62 (1874); Sharpe, Trans. Linn. Soc. 2nd ser. i. Zool. p. 320 (1877); id. Ibis, 1878, p. 416; Wardlaw Ramsay, App. to Tweed. Orn. Works. p. 656 (1881).
C. chalceites (nec Ill.), Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc. p. 73 (1849); Bp. Conspl. i. p. 106 (1850); Sclat. P. Z. S. 1163, p. 209; Wall. t. c. p. 484.
C. minutillus, Gould, P. Z. S. 1159, p. 128; id. B. Austr. Suppl. pl. 56 (1859).
C. malayanus, Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. ii. p. *

- 706 (1856 58); *Walden*, *P. Z. S.* 1878, p. 945; *Shelley*, *Cat. B. M.* 19 1891, p. 298.
Lamprococcyx minutillus; *Cab. & Heine*, *Mus. Hein.* iv, p. 15, note (1862); *Gould*, *Handb. B. Austr.* i, p. 625 (1865).
Cuculus minutillus, *Gray*, *Hand-l. B.* ii, p. 218, no. 9043 (1870).
Lamprococcyx malayanus, *Hume*, & *Davson Str. F.* vi, p. 503 (1878).
L. basalis, *Grant*, *P. Z. S.* 1887, p. 191.
Hab. Mindanao, Zamboanga; Java, Borneo Malaca.

7. Gen. EUDYNAMIS, Vig

14. *E mindanensis* (*Linn.*) ♂♂ N. v. Bahao, Tarucay, Carajao. (M. S. T.)

- Coucou tacheté de Mindanao, *Briss. Orn.* iv, p. 130 (1760).
Cuculus mindanensis, *Linn. Syst. Nat.* i, p. 169, (1766); *ex Briss. Vieill. Enc. Meth.* p. 1337 (1823); *Wald. Ibis*, 1869, p. 327.
Coucou tacheté de l'Isle de Panay, *Sonn. Voy. Nouv. Guin.* p. 120 pl. 78 (1776).
Cuculus variegatus, *Scop. Del Fl. et Faun. Insub.* ii, p. 89 (1703).
C. panayanus, *Gm. Syst. Nat.* i, p. 143 (1788); *Enc. Meth.* p. 1336 (1823); *Wald. Ibis*, 1869, p. 336.
Eudynamis mindanensis, *Cab. & Heine*, *Mus. Hein.* iv, p. 52; *Wald. Ibis*, 1869, p. 340 (pt.); *Gray*, *Hand-l. B.* ii, p. 221 n.º 9070; *Wald. Trans. Z. S.* ix, p. 162 (1875); *Sharpe*, *Trans. Linn. Soc. Zool.* 1877, pp. 320, 351; *Tweedd. P. Z. S.* 1877, pp. 536, 543, 661, 823, 1878, p. 946, 1879, p. 70; *Wardlaw Ramsay*, *Appl. Tweedd. Orn. Works.* p. 656 (1881); *Meyer Sitz. Ab. Handl. Ges. Isis*, p. 17 (1884); *Blasius*, *Ornis*, 1888, p. 306; *Everett*, *P. Z. S.* 1889, p. 225; *Whitehead*, 1890, p. 46; *Shelley*, *Cat. B. M.* 19 1891, p. 321.
E. niger, (*acc Linn.*), *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* ix, p. 53 (1876); *Tweedd. P. Z. S.* 1878, p. 613.
Hab. Luzon, Cavite, Inlan, Montalban, Laguna, Guimaras, Mactan, Negros, Panay, Zamboanga Butuan, Marinduque, Milanipa, Taguso, Paragua, Samar, Mindoro, Basilan; Sanghir.

15. *E. honorata*. (*Linn.*) ♂♂ N. v. Bahao, Tuao. (M. S. T.)

- Black Indian cuckoo, *Edwards*, *Nat. Hist. B.* ii, pl. 58 (1747).
Brown and spotted Indian cuckoo, *Edwards*, *t. c.* pl. 59 (1747).
Coucou tacheté de Bengale, *Briss. Orn.* iv, p. 132 (1760), *ex Edw.* pl. 50.
C. tacheté de Malabar, *Briss. t. c.* p. 136, pl. 11 fig. 2; *Dau-bent.* pl. 294.
. noir de Bengale, *Briss. t. c.* p. 141 (*ex Edw.* pl. 58); *Dau-bent.* pl. *Enl.* pl. 516.
C. tacheté de la Chine, *Buff. Pl. Enl.* p. 764.
Le Coucou à gros. bec, *Levaill. Ois. Afr.* v, p. 50, pl. 214 (1806).
Le Coucou tacheron, *Levaill. t. c.* p. 62, pl. 216.
Cuculus honoratus, *Linn. Syst. Nat.* i, p. 169 (1766) *ex Briss.*

- C. (1) fig. 2); Vieill. Enc. Meth. p. 1332 (1821); Blyth. J. A. S. Beng. xi. p. 913 (1842); Walden. Ibis, 1869, p. 32; C. scolopaceus, Linn. Syst. Nt. i. p. 170 (1766, ex Edw. pl. 50); Wald. Ibis, 1869, p. 327.*
C. niger, Linn. Syst. Nt. i. p. 170 (1766, ex Edw. pl. 58; Wald. Ibs., 1869 pp. 327, 335.
C. maculatus, Gm. Syst. Nt. i. p. 415 (1718, ex Dabent. pl. 764); Wald. Ibis, 1869, p. 336.
C. indicus, Lath. Ind. Orn. i. p. 211 (1790).
C. orientalis, var. y, Lath. t. c. p. 211.
C. crassirostris, Steph. Gen. Zool. iv. p. 86 (1815 ex Levall pl. 215); Virill. Enc. Meth. p. 1333 (1823).
C. orientalis, (nec Linn.), Horsf. Trans. Linnae. Soc. xiii. p. 178 (1822); Blyth. J. A. S. Beng. xi. p. 913 (1842); Strickl. Ann. & Mag. Nat. Hist. 1840, p. 400.
Eudynamis orientalis, Vig. Mem. Raffl. p. 671 (1830); Sykes, P. Z. S. 1832, p. 97; Jerd. Madras Journ. xi. p. 220 (1840); Pearson, J. A. S. Beng. x p. 657 (1841); Blyth. J. A. S. Beng. 1843, p. 245, 1847, p. 468; Lavard, Ann. & Mag. Nat. Hist. xii. p. 451 (1854); Moll. & Dillw. Contr. Nat. Hist. Labuan, i. p. 55 (1855); Horsf. & Moore Cat. B. Mus. E. I. Co. ii. p. 708 (1856-58); Swinh. Ibis, 1861, p. 46; Irby t. c. p. 230; Jerd. B. Ind. i. p. 342 (1862); Blyth, Ibis, 1863, p. 363; Gray Handl. B. ii. p. 221, n.^o 9072 (1870); Jerd. Ibis, 1872, p. 15; Anderson. Ibs., 1873, p. 74; Legge, Ibis, 1874, p. 16; Bull. Notes Leyd. Mus. 1883, p. 29.
E. honorata, Blyth. J. A. S. B. 1842, p. 912; Gray Gen. B. ii. p. 464 (1847); Wald. Ibis, 1869, p. 338; Gray, Handl. B. ii. 220, n.^o 908 (1870); Holdsworth, P. Z. S. 1872, p. 434; Hume, Nests. & Egg. Ind. B. p. 139 (1873); Adams, t. c. p. 373; Ball, Str. F. ii. p. 394 (1874); Anders. Ibis, 1875, p. 142; Fairbank, Str. F. iv. p. 225 (1876); Hume, t. c. p. 493; Fairbank, Str. v. p. 257; Davison & Wendon Str. F. vii. p. 79 (1878); Butler, t. c. p. 182; Ball, t. c. p. 207; Crisp t. c. p. 266; Hume, Str. F. viii. p. 89 (1879); Scully, t. c. p. 257; Legge. B. Ceylon, i. p. 251 (1880); Vidal, Str. F. ix. p. 55 (1880); Butler, t. c. p. 385; Reid, Str. F. x. p. 27 (1881); Davison, t. c. pp. 299, 360; Swinh & Barnes, Ibs., 1885, p. 63; Shelley, Cat. B. M. 19. 1891, p. 316.
E. maculata, Gray. Gen. B. ii. p. 464 (1847); David & Oust. Ois. Chine p. 60 (1877).
E. indicus, Gray. Gen. B. ii. p. 464 (1847).
A. australis, (nec Swain's), Bp. Conspl. Av. i. p. 181 (1850).
E. nigra, Cab. & Heine, Mus. Hein. iv. p. 49 (1862).
E. erythroneurus, Cab. & Heine, Mus. Hein. iv. p. 51, note (1862).
E. chinensis, Cab. & Heine, Mus. Hein. iv. p. 52 note (1862); Blyth. Cat. Mamm. & B. Burmah, p. 81 (1875).
Eudynamis malayana, Cab. & Hein. Mus. Hein. iv. p. 52 (1862); Wald. Ibis, 1869, p. 339; Handl. B. ii. p. 220, n.^o 9069, (1870); Wald. Ibis, 1873, p. 303; Salvad. Ucc. Borneo p. 68 (1874); Hume, Str. F. iii. pp. 192, 472 (1874), iii. p. 82 (1875); Sharpe, Ibis, 1876, p. 34; David. & Oust. Ois. Chine, p. 11 (1877); Hume, Str. F. iv. p. 162 (1878), viii. pp. 54, 89 (1879); Sharpe, Ibis, 1879, p. 245; id. P. Z. S. 1879, p. 328;

Bingham, *Str. F.* ix, p. 168 (1880); *Habac.*, t. c, p. 248; K. L. Bingham, *Ibis*, 1881, p. 392; A. Müll. *J. f. O.* 1882, p. 400; Ooates, *Handb. B. Brit. Burmah*, ii, p. 119 (1883; Guillermard, *P. Z. S.* 1885, p. 406; Müll. *J. f. O.* 1885, p. 157; Salvad. *Ann. Mus. Civ. Gen.* 1885, 581, 1887, p. 569; Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 198; Everett, *P. Z. S.* 1889, p. 226; Sharpe, *Ibis*, 1890, p. 12.
Hab. Luzón, Cavite, Alfonso, Mindoro, Baco, Samar, Paric; China.

16. **E rufiventer**, (*Less.*) ♂ N v. Sabucot.

(M. S. T.)

Coucou tacheté des Indes Orientales, *Dub. Pl. Ent.* vi, pl. 771 (1783).

Cuculus rufiventer, *Less. Voy. Cog.*, *Zool.* i, p. 623 (1838); *id. Traité*, p. 150 (1831).

Eudynamis rufiventer, *Less. Compl. Bif.*, *O's.* p. 625 (1838); *Gray, Gen. B.* ii, p. 464 (1847); *Wald. Ibis*, 1851, p. 344; *Gray, Hand-l. B.* ii, p. 221, n.º 9074; *Wald. Trimb. Z. S.* ix, p. 162 (1875); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* xiii, p. 461 (1878); *id. Atti R. Accad. Torino*, xiii, p. 318 (1878); *id. Orn. Papuasia*, p. 368 (1880); *Sharpe, Journ. Linn. Soc. xvi*, p. 428, 1882; *Gull. P. Z. S.* 1885, p. 625; *Salvad. Orn. Papuasia App.* p. 51 (1889); *Shelley, Cat. B. M.* 19, 1891, p. 325.

E. picatus, *S. Müll. Verh. Land-en Volk.* p. 876, note (1839-44); *Bp. Cons. Av.* i, p. 101 (1850); *Cab. & Hein.*, *Mus. Hebr.* iv, p. 55, note (1862); *Cab. & Reichen. J. f. O.* 1876, p. 324.

E. punctatus (*nec Linn.*), *pt.*, *Bp. Cons. Av.* i, p. 101 (1850); *Gray, Cat. B. New Guin.* p. 40 (1859); *id. P. Z. S.* 1859, p. 159, 1861, p. 437.

E. rufiventer, *Sclat. Journ. Linn. Soc. Zool.* ii, p. 166 (1858).

E. orientalis, *pt.*, *Finsch. Neu-Guin.* p. 159 (1865).

E. cyanocéphala (*nec Lath.*), *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* iv, p. 17, 1876.

Hab. Nueva Guinea.

8. Gen. COCCYZUS, VIEILL.

17. **C erythrophthalmus**, *Wils.* ♂ N v.

(M. S. T.)

Cuculus erythrophthalmus, *Wils. Ann. Orn.* iv, p. 16, pl. 23, fig. 2, (1811); *Steph. Gen. Zool.* xiv, p. 208 (1826); *Harting. Handb. Brit. B.* p. 124 (1872).

Coccyzus dominicus (*nec L.*), *Nutt. Man. Orn.* i, p. 556 (1832).

C. erythrophthalmus, *Bp. Journ. Acad. Philad.* iii, p. 307, pl. 2 (1824); *Audubon, Orn. Bogr.* i, p. 170 (1831, v, p. 523 (1839); *Shelley, Cat. B. M.* 19, 1891, p. 311.

Hab. América, Canadá.

9. Gen. SCYTHROPS, LATH.

18. S. novæ-hollandiæ, Lath. ♂ N. v. C. anomalo. (M. S. 1)

Psttaceous Hornbill, *Phil. Voy. Botan. Bay*, p. 155, pl. (1789).
Anomalous Hornbill, *J. White, Journ. Voy. N. S. Wales*, p. 142, pl. (1790).
Scythrops novæ-hollandiæ, *Lath. Ind. Orn.* i. p. 141 (1790).
S. novæ-hollandiæ, var. prasagus, *Brügg. Abhandl. nat. Ver. Brem.* v. p. 56 (1876); *Shelley, Cat. B. M.* 19. 1891, p. 33.
Hab. Australia.

Subfam. CENTROPODINOS.

10. Gén. CENTROPUS, LILL.

19. C. mindorensis (Steere) ♂, ♂ N. v. Sabucot-talahiban (M. S. 1)

Centrococcyx mindorensis, *Steere, List. Birds. & Mam. Expt. Philipp.* p. 12 (1890).
Centropus mindorensis, *Hartert, Kat. Vog. Mus. Senckenb.*, App. p. 253 (1891); *Shelley, Cat. B. M.* 19. 1891, p. 339.
Hab. Mindoro, Calapan, Baco, Naujan.

20. C. sinensis, (Steph.) ♂, ♂ N. v. Bab-but. (M. S. 1)

Polophilus sinensis, *Steph. Gen. Zool.* ix. p. 51 (1815).
Centropus bubutus, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 189 (1821);
id. Zool. Research Java, pl. 6, 1 (1824); *Bp. Conspl. Vol. Zyg.* p. 5 (1854).
Chestnut Coucal, *Lath. Gen. Hist. B.* iii. p. 243, pl. 54 (1822).
Centropus philippensis, var. javanica, *Horsf. Zool. Research, Jav.* text to pl. 60 (1824).
C. castanopterus, *Steph. Gen. Zool.* xiv. p. 215 (1829); *Helfer. J. A. S. Beng.* 1838, p. 802; *Swinh. op. cit.* 1841, p. 658.
C. philippensis (*Inec Cuv.*), *Sykes. P. Z. S.* 1832, p. 98; *Mc Clelland. P. Z. S.* 1839, p. 166; *Blyth. J. A. S. Beng.* 1842, 1849, 1843, p. 246, 1844, p. 945, 1845, p. 202; *S. Müll. Verh. Land-ein. Volh.* p. 405 (1839-44); *Blyth. Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1847, p. 385; *id. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. 78 (1849); *Lizard. Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1854, xiii. p. 450; *Mithey. & Dillwyn. Contr. Nat. Hist. Labuan*, p. 54 (1855); *Irby. Ibis.* 1851, p. 230; *Sel. P. Z. S.* 1863, p. 209.
Cuculus philippensis, *Sundev. Physiogr. Söllsk. Tijdskr.* 1837, p. 167; *Strickl. Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1840, p. 401.
Centropus pyrrhopterus, *Jerd. Madras. Journ.* xi. p. 224 (1840).
Cuculus fasciatus, *Swinh. J. A. S. Beng.* 1841, p. 659.
Centropus sinensis, *Blyth. F. A. S. Beng.* xii. p. 247 (1843), xiv. p. 202 (1845); *id. App. Cat. B. Mus. As. Soc.* p. xix. (1852); *Swinh. Ibis.* 1861, p. 49; *Gray Hand-l. B.* ii. p. 214 n.º 1955 (1870); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 393; *David & Oust. Ois. Chine* p. 58 (1877); *Styan. Ibis.* 1887, p. 230; *Shelley, Cat. B. M.* 19. 1891, p. 343.

- Centropus eurycercus*, Hay, J. A. S. Beng. xiv. p. 551 (1845); Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc. p. 78 (1849); Bo., Conspl. Vol. Zygod. p. 4 (1854); Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. ii. p. 683 (1856-58); Schl. Mus. Pays-Bas, Cuculi p. 66 (1864); Gray, Hand-l. B. ii. p. 212, n.^o 1963 (1870); Blyth, & Walden Cat. Mamm. & B. Burma, p. 82. (1875); Tweeddl. *Ibis*, 1877, p. 288; Hume, Str. F. v. p. 27 (1877); Nicholson, *Ibis*, 1882, p. 54; Snelleman, in Veth's *Midden Sumatra*, Vog. p. 34 (1884); Böttk. Notes Leyden, Mus. 1880, p. 32.
- Centropus rufipennis* (nec Ill.) Blyth, Ann. & Mag. Nat. Hist. 1843, p. 95; id. Cat. B. Mus. As. Soc. pp. 321, xix, (1849); Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. ii. p. 681 (1856-58); Jerd. B. Ind. i. p. 248 (1862); Schl. Mus. Pays-Bas, Cuculi. p. 68 (1864); Gray, Hand-l. B. iii. p. 213 n.^o 8951 (1870); Jerd. *Ibis*, 1872, p. 15; Hume, Nests. & Eggs. Ind. B. p. 142 (1873); id. Str. F. i. p. 173 (1873); Adams, t. c. p. 374; Morgan *Ibis*, 1875, p. 345; Blyth & Walden, B. Burma, p. 81 (1875); Fairbank, Str. F. vi. p. 255 (1876); Legge, B. Ceylon, p. 260 (1880); Marshall, *Ibis*, 1884, p. 411.
- C. viridis* (nec Scop.), Swinh. P. Z. S. 1863, p. 266; id. *Ibis*, 1870, p. 235.
- C. borneensis*, Bp. Conspl. Vol. Zygod. p. 5 (1854); Gray, Hand-l. B. ii. p. 213, n.^o 8962 (1870).
- Centrococcyx rufipennis*, Cab. & Heine, Mus. Hein. iv. p. 115 (1862); Balt. Str. F. iii. p. 394 (1874); Fairbank, op. cit. vi. p. 297 (1877); Davison & Wenden, op. cit. vii. p. 79 (1878); Ball, t. c. p. 207; Hume, op. cit. viii. p. 89 (1879); Vidal, op. cit. ix. p. 56 (1880); Butler, t. c. p. 389; Davison, op. cit. x. pp. 299, 301 (1881); A. Müll. J. f. O. 1882, p. 411; Swinh & Barns, *Ibis*, 1885, p. 64; A. Müll. J. f. O. 1885, p. 157.
- C. sinensis*, Cab. & Heine, Mus. Hein. iv. p. 119 (1862).
- C. eurycercus*, Cab. & Heine, Mus. Hein. iv. p. 116, note (1862); Wld. *Ibis*, 1872, p. 396; Hume, Str. F. i. p. 453 (1873); Salvad. Ucc. Borneo, p. 78 (1874); Hume, Str. F. ii. pp. 193, 473 (1874); iii. p. 83 (1875); Armstrong, op. cit. iv. p. 312 (1876); Sharpe, *Ibis*, 1877, p. 8; Tweeddl. P. Z. S. 1878, p. 614; Sharpe, P. Z. S. 1879, p. 328; Salvad Ann. Mus. Civ. Gen. xiv. p. 188 (1879); Hume, Str. F. viii. p. 55 (1879); Keilham, *Ibis*, 1888, p. 394; Sharp, P. Z. S. 1888, p. 793; Wardlaw, Ramsay, App. Tweeddl. Orn. Works, p. 650 (1881); Blasius, J. f. O. 1882, p. 247; A. Mull. Orn. Ins. Salanga, p. 60 (1812); Nicholson, *Ibis*, 1883, p. 241; Blasius, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien xxxiii. p. 39 (1883); Gaillandard P. Z. S. 1885, p. 406; Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen. iv. p. 533 (1887); Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 198; Everett, P. Z. S. 1889 226; Hartert. J. f. O. 1889, p. 372; Sharpe, *Ibis*, 1890, p. 13; Hitchcock, t. c. p. 46; Everett, Journ. Straits. Branch. As. Soc. 1889, p. 175.
- C. validus*, Heine, J. f. O. 1863, p. 357.
- C. intermedius*, Hume, Str. F. i. p. 454 (1873); id. & Davison, op. cit. vi. p. 168 (1878); Cripps., op. cit. vii. p. 266 (1878); Hume, op. cit. viii. pp. 89, 155 (1879); Bingham, op. cit. ix. p. 169, (1880); Reid, op. cit. x. p. 23 (1881); Dates, t. c.

p. 199; *id. Handb. B. Brit. Burmah*, ii. p. 126 (1883); *Sat-*
vat. Ann. Mus. Civ. Gen. (2) iv. p. 583 (1887); *id. op. cit. v.*
p. 569 (1888).

C. maximus, *Hume, Str. F.* i. p. 454 (1873).

Centropus intermedius, *Oates, Str. F.* v. p. 145 (1877).

Centrococcyx achenensis, *Hume, Str. F.* vi. p. 171 (1878).

Hab. Paragua, P. Princesa, Ningpo, Joló; Borneo, China,
Java.

21. **C. viridis**, (*Scop.*) ♂♂ N. v. Saguesue, Tarueug. (M. S. T.)

Coucou vert d'Antigee, *Soun. Voy. Nouv. Guin.* p. 121, pl. 80
(1876).

Cuculus viridis, *Scop. Del. Fl. Fann. Insul.* ii. p. 89 (1786).

C. argyptius, *Gm. Syst. Nat.* i. p. 420, vars β f. (1788).

Coucou des Philippines, *Buff. Hist. Nat. Ois.* vi. p. 369 (1779);
Daubent. Pl. Ent. 824 (1783).

Polophilus viridis, *Steph. Gen. Zool.* ix. p. 55 (1815).

Centropus rufipennis, *III. Abhandl. Berl. Acad.* 1818, p. 224.

Cuculus philippensis, *Civ. Regne, An.* i. p. 436 (1817).

Corydonix viridis, *Vieill. Nouv. Dict.* xxxiv. p. 299 (1818); *id.*
Enc. Meth. iii. p. 1355 (1823).

C. pyrropterus, *Vieill. Enc. Meth.* iii. p. 1353 (1823).

Centropus viridis, *Blyth, J. A. S. Beng.* vi. p. 1102 (1842);
Gray, Gen. B. ii. p. 455 (1846); *id. Handb. B.* ii. p. 213,
n.^o 8956 (1870); *Shelley, Cat. B. M.* 19. 1898, p. 349.

Centrococcyx viridis, *Cab. & Heine, Mus. Hein.* iv. p. 110, note
(1862); *Walden Trans. Z. S.* viii. p. 58 (1872); ix. p. 163
(1875); *id. P. Z. S.* 1877, pp. 543, 691, 758, 823; *Sharpe*
Trans. Linn. Soc. 1877, p. 322; *Tweeddale, P. Z. S.* (1878) pp.
213, 341, 799, 1879, p. 946; *id. Rep. Voy. Challenger*, ii. p.
15 (1880); *Wardlaw Ramsay App. Tweeddale's Orn. Works.* p.
658 (1880); *Kuter J. f. O.* 1881, p. 185; *Guillemaud, P. Z.*
S. 1885, p. 257; *Steere, List. Birds. & Mamm. Exped. Philipp.*
p. 12 (1890).

Hab. Luzon, Manila, Montalban, S. Mateo, Laguna, Calamba,
Los Baños, Cagayan, Pamplona, Ilocos, Cebú, Samar, Calbayog,
Paranas, Borongan, Panay, Ililo, Negros, Valencia, Gui-
marás, Surigao, Zamboanga, Mindanao, Mactan, Leyte, Mas-
bate, Marinduque, Basilan, Bohol, Joló.

22. **C. javanicus**, (*Dumont*) ♂♂ N. v. Tarueug. (M. S. T.)

Cuculus javanicus, *Dumont, Dict. Sc. Nat.* xi. p. 144 (1818).

Centropus tolu, (*nec Gm.*) *Raffles, Trans. Linn. Soc.* xiii. 285
(1822).

C. lepidus, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 180 (1822); *Steph.*
Gen. Zool. xiv. p. 214 (1826); *Bernst. J. f. O.* 1859, p. 817;
Gray, Handb. B. ii. p. 213 n.^o 8950 (1870).

C. affinis, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 810 (1822); *Vig.*
Mem. Raffl. p. 670 (1830); *Blyth, J. A. S. Beng.* xi. p. 1105
(1842); *Bp. Conspl.* i. p. 108 (1850); *Bernst. J. f. O.* 1859,
p. 185 1860, p. 269; *Scl. P. Z. S.* 1863, p. 200 *Finsch,*
Neu-Guin. p. 160 (1865); *Gray Handb. B.* ii. p. 213, n.^o

- 8960 (1870); *Blasius*, *J. f. O.* 1883, p. 132 1883, p. 374; *Sharpe*, *Ibis*, 1888, p. 198.
C. pumilus, *Less. Traité*, p. 136 (1831); *Pucher, Rev. et Mag. Zool.* 1883, p. 66.
C. molkenboeri, *Bp. Conspl.* i. p. 108 (1850); *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 214 n.º 8964 (1870).
C. medius, *Bp. Conspl.* i. p. 108 (1850); *ex Müller, MSS. in Mus. Lugd.*; *Pucher, Rev. et Mag. Zool.* 1852, p. 475, note, *Bp. Conspl. Vol. Zygod.* p. 86 (1854); *Gray, P. Z. S.* 1860 p. 359; *Wallace*, *op. cit.* 1863, p. 23; *Finsch, Neu-Guén.* p. 59 (1865).
Centrococcyx lepidus, *Cab. & Heine, Mus. Heine* iv. p. 109 (1862); *Hartert, J. f. O.* 1889, p. 372.
C. affinis, *Cab. & Heine*, t. c. p. 110; *Wald. Trans. Z. S.* viii. pp. 56, 58, 112 (1872); *Meyer, Ibis*, 1879, p. 70; *id. Sitr. nat. Ges. Isis*, p. 18 (1884); *Guillemaud P. Z. S.* 1885, pp. 504, 551; *Whitehead, Ibis*, 1890, p. 47.
Centropus moluccensis, *Cab. & Heine*, t. c. *ex Bernst. MSS. in Mus. Berol.*; *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 214 n.º 8967 (1870).
Centrococcyx moluccensis, *Cab. & Heine, Mus. Heine* iv. p. 113 (1862); *Heine J. f. O.* 1863, p. 357; *Walden, Trans. Z. S.* viii. pp. 50, 60 (1872).
Centropus rectunguis, *pt.*, *Schl. Mus. Pays-Bas, Cuculi* p. 69 (1864).
Centrococcyx javanicus, *Walden, Trans. Z. S.* viii. pp. 5860 (1872); *id. Ibis*, 1887, p. 367; *Salvad. Ucc. Born.* p. 76 (1874); *Ad. Ann. Mus. Civ. Gen.* vii. p. 651 (1875); *Sharpe, Ibis*, 1876 p. 34; *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* xiv. p. 188 (1879); *Nicholson, Ibis*, 1881, p. 141, 1883, p. 241; *Blasius Zeitschr. ges. Orn.* ii. p. 263 (1885); *Everett, P. Z. S.* 1889, p. 226; *Sharpe, Ibis*, 1890, p. 14; *Everett, Journ. Straits Branch. As. Soc.* 1889, p. 175.
C. medius, *Walden, Trans. Z. S.* viii. pp. 57, 59 (1872); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* vii. p. 762 (1875); xiii. p. 463, (1878); *id. Orn. Papuasia*, i. p. 375 (1880).
C. bengalensis, var. *javanica*, *Brügg. Abhandl. nat. Ver. Brem.* v. p. 61 (1876).
C. javanicus, *Sharpe, Ibis*, 1870, p. 946; *id. P. Z. S.* 1879, p. 328; *Shelley, Cat. B. M.* 12, 1891, p. 354.
Hab. Mindoro, Calapan, Panay, Concepción, S. Antonio, Negros, Leyte, Bohol, Paragua, P. Princesa; Sumatra, Java, Borneo, Célebes, Molucas.

23. C. melanops, (*Lees.*) ♂ Obon-obon.

(M S T)

- Centropus melanops*, *Lees. Traité*, p. 137 (1831); *Gray, Gen. B.* ii. p. 455, (1846); *id. Hand-l. B.* ii. p. 214, n.º 8980 (1870); *Shelley, Cat. B. M.* 12, 1891, p. 365.
C. nigrifrons, *Peale, U. S. Expl. Expl. int. ed.* p. 137, pl. 38 fig. 1 (1848); *Hartl. Arch. f. Nat.* xviii. p. 137, pl. 30 (1852); *Cass. U. S. Expl. Expl.* 1855, p. 249, *Atlas*, pl. 22 (1855); *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 214, n.º 8979 (1870).
Nesocentor nigrifrons, *Cab. & Heine, Mus. Heine* iv. p. 110, note (1862).

N. melanops, *Cab.* & *Heine*, *Mus. Hein.* iv, p. 119 note (1862).
Pyrrhocentor melanops, *Walden*, *Tr. Z. S.* ix, pp. 164, 330;
Tweeddale P. Z. S. 1877, p. 823; *Sharpe*, *Trans. Linn. Soc.* ser. 2, *Zool.* i, p. 322 (1877); *Tweed. Orn. Works*, p. 656 (1881); *Kitter*, *J. f. O.* 1883, p. 303.
Hab. Butuan, Surigao, Basilan, Nipah, Zamboanga, Mindanao,
Samar, Paranao, Loquilocuin, Calbayog, Paric, Borongan, Leyte,
Malamau.

24. **C. unirufus**, *Cab. A. Heine*, ♂♂ N. v. Sigguea. (M. S. T.)

Pyrrhoceritor unirufus, *Cab.* & *Heine*, *Mus. Hein.* iv, p. 811,
note, (1862); *Walden*, *Trans. Z. S.* viii, p. 46 (1872); p. 104
(1875).

Centropus unirufus, *Gray*, *Hand-l. B.* ii, p. 214, n.º 8973; *Shelley*,
Cat. B. M. 19, 1891, p. 367.

Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona, Manila, Ilocos Norte.

25. **C. var. albina**, ♂♂ N. v. Sigguea. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona.

Subfam. FENICOFAINOS.

1. Gén. PIAYA, LESS.

1. **P. cayana** (*Lin.*) ♂ N. v. El Tingaru. (M. S. T.)

Cuculus cayanus, *Linn. Syst. Nat.* i, p. 170 (1766); *Wald. Ibis*,
1869, p. 335.
C. ridibundus, *Gm. Syst. Nat.* i, p. 414 (1788); *Wald. Ibis*,
1869, p. 336.

Tingaru, *Azara*, *Apunt. Hist. Nat. Pax.* (1) ii, p. 265 (1805);
Hartl. Syst. Ind. Azara, p. 17 (1847).
Playa cayana, *Less. Traité*, p. 140 (1831); *Shelley*, *Cat. B. M.*
19, 1891, p. 373.
Hab. América, Guatemala.

2. **P. melanogastra**, (*U.*) ♂ N. v. (M. S. T.)

Cuculus cayanus, *var. y*, *Gm. Syst. Nat.* i, p. 147 (1788); *Wald.*
Ibis, 1869, p. 337.

C. melanogaster, *Veill. Nouv. Dict.* viii, p. 236; *id. Enc. Meth.*
p. 1337 (1823).

Playa melanogaster, *Sehl. Mus. Pays-Bas*, *Cuculi* p. 59 (1864);
Shelley, *Cat. B. M.* 19, 1891, p. 337.
Hab. América, Guatemala.

2. Gén. RHOPODYTES, CAB. ET HEINE

3. **Rh. tristis**, (*Less.*) ♂ N. v. (M. S. T.)

Melias tristis, *Less. Traité Orn.* 1834, p. 132; *id. in Belang*
Voy. Ind. Orient. Zool. 1834, p. 231, pl. i. *

Rhopodytes tristis, Cab. & Hein., Mus. Hein. iv, p. 64 (1862);
Shelley, Cat. B. M. 19. 1891, p. 386.
Hab., China.

3. Gén. RHINORTHA, VIG.

4. Rh. chlorophœa, (Raffl.) ♂ N. v. (M. S. T.)

Rhinortha chlorophœa, Vig. Afp. Mem. Raffl. p. 671 (1830);
Shelley, B. M. 19. 1891, p. 393.
Hab. China.

4. Gén. DRYOCOCCYX, SHARPE.

5. D. harringtoni, Sharpe, ♂♂ N. v. Bub-bui. (M. S. T.)

Dryococcyx harringtoni, Sharpe, Trans. Linn. Soc. (2) Zool. i, pp. 321, 351 (1877) id. Ibis, 1888, p. 198; Whitehead Ibis, 1890, p. 46; Shelley, Cat. B. M. 19. 1891, p. 400.
Phœnicophaeus harringtoni, Wald. P. Z. S. 1878, p. 198; War-
dlaw Ramsay, Afp. Tweedd. Orn. Works, p. 656 (1881).
Hab. Paragua, P. Princesa, Balabac.

5. Gén. DASYLOPHUS, SWA.

6. D superciliosus, (Cuv.) ♂♂ N. v. Sabucot-palongan. (M. S. T.)

Phœnicophaeus superciliosus, Cuv. Dect. Hist. Nat. x, p. 55 (1826);
Less. Man. Orn. ii, p. 127 (1828); Blyth, J. A. S. Beng. xi, p. 925 (1842); Schl. Mus. Pays-Bas Cuculi, p. 51 (1864).
Melia superciliosus, Less. Traité, p. 133 (1831).
Maleoqua superciliosus, Guér. Icon. Regne An. i, pl. 33, fig. 1 (1864-38).
Dasylophus superciliosus, Swains. Class. ii, p. 324 pl. 286, fig. a (1837); Gray, Gen. B. ii, p. 456, pl. 116 (1845); Blyth, J. A. S. Beng. xiv, p. 199 (1845); id. Cat. B. Mus. As. Soc. p. 75 (1849); Bp. Conspl. Vol. Zygod. p. 5 (1834); Cab. & Hein., Mus. Hein. iv, p. 69 (1862); Gray, Hand-l. B. ii, p. 206, n.º 887 (1870); Sharpe, P. Z. S. 1873, p. 603 fig. 7, head; Wald. Trans. Z. S. ix, p. 162 (1875); Gould, B. Ásia, vi, pl. 44 (1876); Tweedd. P. Z. S. 1877 p. 691; Sharpe, Trans. Linn. Soc. (2) Zool. i, p. 321 (1877); Kutter, J. f. O. 1882, p. 175; Shelley, Cat. B. M. 19. 1891, p. 404.
Phœnicophaeus ornatus, Blyth, J. A. S. Beng. xi, p. 925 (1842).
Hab. Luzón, Manila, Montalban, Bataan, Laguna, Calauan, Marinduque.

6. Gén. LEPIDOGRAMMUS, REICH.

7. L. cumingi, Fraser ♂♂ N. v. (M. S. T.)

Phœnicophaeus cumingi, Fraser, P. Z. S. 1839, p. 112; Blyth, J. A. S. Beng. xi, 925 (1845); Fraser, Zool. Týp., pl. 53 (1848-49); Schl. Mus. Pays-Bas, Cuculi, p. 51 (1864).

P. barrotii, *Eydoux & Souleyet*, *Voy. Brit. Zool.* p. 89 *Atlas*, pl. 6 (1841).

Dasylophus cumingii, *Gray*, *Gen. B.* ii. p. 459 (1845); *Blyth*, *J. A. S. Beng.* xiv. p. 199 (1845); *Gray*, *Hand-l. B.* ii. p. 205, n.^o 8871 (1870).

Lepidogrammus cumingi, *Bp. Conspl. Vol. Zygof* p. 5 (1854); *Cab. & Heine*, *Mus. Hein.* iv. p. 70 (1862); *Sharpe*, *P. Z. S.* 1873, p. 602 fig. 6 *cabeza*; *Wald*, *Trans. Z. S.* ix. p. 163 (1875); *Gould*, *B. Asia* vii. pl. 45 (1876); *Tweedie*, *P. Z. S.* 1877, p. 691; *Shelley*, *Cat. B. M.* 19. 1891, p. 404.

Cuculus decorus, «*Gravenhorst*» *Bp. Conspl. Vol. Zygof* p. 5 1854. *Hab.* Luzón, Manila, Montalban, Bataan, Laguna, Calamba.

Subfam. CROTOFAGINOS.

I. Gén. CROTOPHAGA, LIN.

I. C. sulcirostris, SW. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Crotophaga sulcirostris, *Swains*, *Philos. Mag.* (n. s.) i. p. 440 (1827); *Shelley*, *Cat. B. M.* 19. 1891, p. 432. *Hab.* América, Guatemala.

Orden: PALOMAS.

Fam. TRERÓNIDAS.

I. Gén. TRERON, VIEILL.

I. T. nipalensis, (Hodg.) ♂ N. v. Curiasiao. (M. S. T.)

Columba curvirostra, *Raffl.* *Tr. Lin. Soc.* xiii. 2. 311 (1822). *Toria nipalensis*, *Hodgs. As. Res.* xix. p. 164, ix. fig. (1836); *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 222, n.^o 9086 (1870); *Blyth*, *B. Burm.* p. 143 (1875).

Columba aromaticata, *S. Müll.* (*nec Gm.*) *Verh. Land-en Volkenk.* p. 396 (1839-44).

Treron aromaticata, *part.*, *G. R. Gr. Gen. B.* ii. p. 467, n.^o 1 (1844); *id.* (*nec Gm.*) *Cat. Hodgs. Coll. B. M.* p. 121 (1840); *Gieb. Thes. Orn.* iii. p. 469 (1877).

T. nipalensis, *Blyth*, *J. A. S. B.* xiv. 2, p. 847 (1845); *id.* *Ann. & Mag. N. H.* xix. p. 44 (1847); *G. R. Gr. Gen. B. App.* p. 23 (1849); *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 228 (1849); *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 11 (1854); *id. Comp. Rend.* xxxix, p. 873 (1854); xl. p. 286, n.^o 14 (1855); *id. Coup. d'ail.* fig. pp. 5, 54, n.^o 14 (1855); *G. P. Gr. List B. Brit. Mus. Columba*, p. 10 (1856); *Moore*, *P. Z. S.* 1859, p. 404; *Rehn's Tauben*, i. p. 109 (1862); *Gray*, *Cat. Hodgs. Coll. B. Mus. 2nd ed.* p. 66 (1863); *Jerd. B. of Ind.* iii. 445 (1864); *Godw.-Aust. J. A. S. B.* xliv. p. 171 (1874); *Hume*, *Str.*

- Feath.* iii. p. 160 (1875); *Wald.* *B. Burm.* p. 143 (1855); *Hume & Davis. Str. Feath.* vi. p. 410 (1878); *Hume, Str. Feath.* vii. p. 109, n.^o 771 (1870); *Binch Str. Feath.* ix. p. 193 (1880); *?Kelkham, Ibis,* 1881, p. 225; *Salv. Cat. B. Strickl. Coll.* p. 557 (1882); *Oates, Str. Feath.* x. p. 235 (1882); *id. B. Brit. Burm.* ii. p. 306 (1883); *Anders. Journ. Linn. Soc., Zool.* xxi. p. 125 (1887); *Grau, Ann. & Mag. N. H.* (6) ii. p. 352 (1888); *Hume, Str. Feath.* xi. p. 289 (1888); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* (2) v. p. 619 (1888), vii. p. 423 (1889); *Hartert, J. f. O.* 1889, p. 405; *id. Kat. Vogelsam.* p. 191 (1891); *Salv. Cat. B. Mus.* 21, p. 34 (1893).
- T. aromaticum,* *Low* (*nec Gm.*), *Sarawak*, p. 411 (1878).
- T. nepalensis,* *Wall. Ibis,* 1865, p. 376; *id. J. f. O.* 1866, p. 277; *Blyth, Ibis,* 1857, p. 147; *G. R. Gr. Hand-list.* ii. 322, n.^o 9081 (1870); *Tweed. Ibis,* 1877, p. 321; *Salvat. Ann. Mus. Civ. Gen.* xiv. p. 240 (1879); *Tiraut, Bull. Com. Agr. et Ind. Cochinch.* (3) i. p. 141, n.^o 250 (1879); *Tweed. Orn. Work.* p. 502 (1881).
- T. nasica,* *Sharpe* (*nec Schleg.*), *Tr. Linn. Soc., Zool.* i. p. 346 (1876); *Tweed. P. Z. S.* 1878, p. 623; *id. Orn. Works.* p. 659 (1881); *Sharpe, Ibis,* 1883, p. 202; *Grant, Ann. & Mag. N. H.* (6) ii. p. 352 (1888); *Blas. Orn's.* iv. p. 316 (1888); *Everett, P. Z. S.* 1889, p. 226; *id. Journ. Str. Br. R. As. Soc.* 1889, p. 166; *Vöderm. N. T. N. I.* xlix. p. 412 (1889), i. p. 499 (1890); *Whiteh. Ibis,* 1890, p. 5'; *?Steere, List.* p. 24 (1890); *Hartert, J. f. O.* 1891, p. 301.
- T. nasica,* *Oust. (Schleg.) Nouv. Arch. Mus.* (2) ii. p. 29 (1879).
- Rhamphoteron nipalensis,* *Heine & Rehm. Nomencl. Mus. Hein. Orn.* p. 279 (1890).
- Hab.* Paragaa, Inagauan, Banguey; Borneo, Sumatra, Malaca.

2. Gén. OSNOTRERON, Br.

2. *Os. axillaris*, Gray N. v. Punay, Pune. (M. S. T.)

- Treron axillaris*, *G. R. Gray, MS.*; *Bp. Compt. Rend.* xxxix. p. 875 (1854); xl. p. 286, n.^o 89 (1855); *id. Comp. d'ac'l Ord'r. Pig.* pl. 6, 54, n.^o 16 (1855); *id. Compt. Rend.* xlii. p. 833 (1856); *Wald.* *Ibs.* 1863, p. 319; *id. Ibis,* 1865, pp. 374, 396; *id. J. f. O.* 1866, p. 277; *Salv. Cat. B. Strickl. Coll.* p. 557 (1882); *Tristr. Cat. B.* p. 45 (1889).
- ? Os. axillaris*, *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 13 (1854).
- Treron aromaticata*, *G. R. Gr. (nec Cm.) List. B. Brit. Mus. Columba,* p. 10 (1856); *Bp. Compt. Rend.* xliii. p. 833 (1856); *Id. Icon. Pig.* pl. 7 (1857); *Schleg. N. T. D.* i. p. 64 (1853); iii. p. 346 (1866); *v. Mart. J. f. O.* 1869, p. 23; *Schleg. Mus. P. B. Columbae*, p. 52 (1873); *Gieb. Thes. Orn.* iii. p. 649 (1877).
- T. amboinensis*, part, *G. R. Gr. Hand-list.* ii. p. 222, n.^o 9079 (1870).
- Osinotreron axillaris*, *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix. p. 211, 212 (1875); *Sharpe, Tr. Linn. Soc. Zool.* ii. pp. 349, 353 (1876); *Tweed. P. Z. S.* 1877, pp. 549, 619, 764, 832 (1878), pp. 113, 287; *Sharpe, P. Z. S.* 1879, p. 316; *Tweed. Orn. Works.* pp. 374,

375, 412, 462, 492, 473, 525, 538, 558, 572, 593, (1881); Wardl. Rams. Tweedl. Orn. W'k'ss, p. 65) (1881); Kuhl'sr. J. f. O. 1883, p. 314; Guillem. P. Z. S. 1885, p. 208; Steere. List. R. & M. Phil'p. Expl. p. 24 (1890); Salv. Cat. B. M. 21 p. 48, Ian. 4. (1893).

Hab. Luzón, Manila, Montalban, Liguna, Ililo, Panay N., gros, Valencia, Duñagut, Simal, Paric, Borongan, Cebú, Guimaras, Mindanao, Butuan, Zamboanga, Joló.

3 *Os. vernans*, (Lin.) ♂ ♀ N. v. Panay.

(M. S. T.)

Columba viridis philippensis, Briss. Orn. ip. 143, t. 11, f. 1. (1760).

C. vernans, Linu. Mant. p. 526 (1771); (ex Brissone); Gm. S. N. i. 2, p. 789, n.º 69 (1788); Lith. Ind. Orn. ii. p. 55), n.º 22 (1790); Bonn. Enc. Méth. i. p. 239 (1791); Tenu. Hist. Nat. Pig. i. pp. 70, 443 (1813); Vieill. N. D. xxvi. p. 392 (1818); Horsf. Tr. Linn. Soc. xiii. i. p. 182 (1821); Raiff. Tr. Linn. Soc. xiii. 2, p. 318 (1822); D'sm. Dct. Hist. Nat. xi. p. 369 (1826); Wagl. Syst. Av. Columba, sp. 9 (1897); Rosenb. Versl. El. Nias. p. 29 (18?).

Pigeon vert des Philippines, D'Aubent. Pl. Eul. 138; Raiff. Hist. Nat. Ois. ii. p. 527 (1781).

Columba viridis, L. S. Müll. (nec Linu.) S. N. Suppl. p. 132 (1776); (ex Daubenton). Scop. Del. Flor et Faun. Insulbr. ii. p. 94 n.º 95 (1786); (ex Sonnerat.) Ca's. Pr. Ac. Philat. 1804, p. 248.

Pigeon vert de l'Is'e de Luçon, et d'Antigue Sonu; Voy. Novv. Gu'n. p. 110, pls. 64, 65 (1776).

Purple Pigeon, Bromov. Illustr. p. 42, pl. 18 (1776); Lith. Syn. ii. 2, p. 628, n.º 78 (1783); id. Gen. Hist. viii. p. 76 (1823).

Parrot Pigeon, Lath. Syn. ii. 2, p. 629, n.º 20 (1783); id. Gen. Hist. viii. p. 75 (1823).

Columba purpurea, Gm. S. N. i. 2, p. 784, n.º 61 (1788); Lith. Ind. Orn. ii. p. 599, n.º 20 (1790); Bonn. Enc. Méth. i. p. 241, pl. 78 f. i. (1791); Vieill. N. D. xxvi. p. 359 (1813); Desn. Dict. Sc. Nat. xi. p. 374 (1826); Resenb. Versl. El. Nias, p. 20 1827.

Vinago vernans, Cuw. Rign. An. i. p. 457 (1817); Steph. Gm. Zool. vi. p. 113 (1819); Cuw. Rign. An. 2nd ed. i. p. 492 (1829); Eyt. P. Z. S. 1839, p. 107.

Treron vernans, Steph. Gm. Zool. xiv. i. p. 274 (1825); G. R. Gr. Gen. B. ii. p. 467, n.º 7 (1844); Strickl. Ant. & My. N. II. xiii. p. 38 (1844); Blyth. J. A. S. B. xiv. 2, p. 851 (1845); Ruhn. Syn. Av. ff. 134-41 (1847); Müll. & Dide. Contr. Nat. Hist. Lab. p. 39 (1855); Ciss. Narr. Explor. Amer. Squadr. &c. p. 243 (1859); id. J. f. O. 1859, p. 45; G. R. Gr. P. Z. S. 1870, p. 360; Wall. Ibis. 1863, p. 32; Selat. P. Z. S. 1873, p. 220; Schleg. N. T. D. i. p. 70 (1863); id. de D'eren. p. 211 (1864); Pelz. Vouira Reise, Vog. p. 105 (1865); Schleg. Mus. P-B. Columbe, p. 49 (1873); Salvad. Ucc. Brnu. p. 286 (1874); Sharpe. P. Z. S. 1875, p. 110; Brüggem. Abh. nat. F'g. Brnu. v. p. 74 (1876).

- pp. 461; 529 (1877); *Gieb. Thes. Orn.* iii. p. 652 (1877); *Rosenb. Malay. Archip.* p. 68 (1876); *Sharpe, P. Z. S.* 1879, p. 348; *Blas. Jarh. Ver. Nat. Braunschwe.* 1881, p. 59; *Sharpe, P. Z. S.* 1881, p. 799; *Vordern. N. T. N. I.* xliii. p. 89 (1882); *Salv. Cat. B. Strickl. Coll.* p. 556 (1882); *Snellem. Sum-Exp. Vogels.* p. 47 (1884); *Guillem. P. Z. S.* 1885, p. 509; *Vorderm. N. T. N. I.* xlvi. p. 397 (1886); *Buttik. Nat. Leyd. Mus.* 10 p. 75 (1880); *Vorderm. N. T. N. I.* xlvi. p. 235; *Blas. Ornis.* iv. p. 316 (1888); *Everet, P. Z. S.* 1889, p. 225; *id. Journ. Str. Br. R. A. Soc.* 1889, p. 196; *Eristr. Cat. Coll. B.* p. 46 (1889); *Vorderm. N. T. N. I.* i. p. 501 (1890); *Sharpe, Ibis*, 1890, pp. 134, 283.
Columba vernans, var., *Less. Tr. d'Orn.* p. 426 (1831).
Treron viridis, *Blyth. Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 229, n.^o 1887 (1849); *G. R. Gr. List. B. Brit. B. Mus. Columbae*, p. 12 (1856); *Gould, P. Z. S.* 1859 p. 151; *Wall. Ibis*, 1854, p. 374; *id. J. F. O.* 1866, p. 277; *Mart. J. F. O.* 1886, p. 23; *Rosenb. Malay. Archip.* p. 220 (1878); *Sclat. List. Vert. An. 8th. ed.* p. 445 (1883).
Osmotreron vernans, *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 12 (1854); *id. Compt. Rend.* xxxix. p. 874 (1854), xl. p. 216; n.^o 23 (1855); *id. Coup. d'cit. Ordr. Pig.* pp. 6, 54, n.^o 23 (1855); *ld. Icon. des Pig.* pl. xiii. (1857); *Rehnw. Tauben.* i. p. 105, t. 241. ff. 1340-41 (1862); ii. p. 180 (1862); *Wald. Tr. Zool. Soc.* viii. 2, pp. 81, 113 (1872); *Sousa. Mus. Nac. Lisb. Columbae*, p. 7 (1873); *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix. pp. 210, 251 (1875); *Sharpe, Tr. Linn. Soc. Zool.* p. 346 (1876); *Tweedd. Ibis*, 1877, p. 321; *id. P. Z. S.* 1877, p. 704, 1878, p. 623, 1878, p. 951; *Hume. & Davis. Str. Feath.* vi. p. 411 (1878); *Hume, t. c.* p. 414 (1878); *id. Str. Feath.* viii. pp. 67, 109 (1879); *Tweedd. P. Z. S.* 1879, p. 73; *Sharpe P. Z. S.* 1879, p. 315; *Tiran. Bull. Com. Ahr. et Ind. Cochinch.* (3) i. p. 140, n.^o 247 (1879); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* xiv. p. 242 (1879); *Tweedd. Orn. Works.* pp. 182, 211, 374, 412, 503, 537, 618, 623, 642, 650 (1881); *Wardl. Rams. Tweedd. Orn. Works. App.* p. 659 (1881); *Kelh. Ibis*, 1881, p. 526; *Salvad. Orn. Pap. c. Mol.* iii. p. 3 (1882); *Nichols. Ibis*, 1882, p. 65, *Blas. J. F. O.* 1883, p. 138; *Oates, B. Brit. Brum.* ii. p. 309 (1883); *Guillem. P. Z. S.* 1885, pp. 268, 416, 509; *Blas. Zeitschr. f. ges. Orn.* 1886, p. 127; *Anders. Journ. Linn. Soc. Zool.* xxi. p. 125 (1887); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* (2) iv. pp. 523, 557; *Sharpe, Ibis*, 1888, p. 202; *Vordern. N. T. N. I.* xliv. p. 412 (1889); *Hartert, J. F. O.* 1889, p. 376; *Whithead, Ibis*, 1890, p. 56; *Steere, List. B. & M. Steere Exp.* p. 24 1890; *Hartert, Kat. Vogdsamml.* p. 191 (1891); *Salv. Cat. B. M.* 21, p. 60 (1893).
Osmotreron viridis, *Moore. P. Z. S.* 1859, p. 465, *G. R. Gr. Hand-list.* ii. p. 223, n.^o 999 (1870); *Hume, Str. Feath.*, p. p. 461 (1873), iii. p. 162 (1875); *Blyth. B. Burm.* p. 114. (1875); *A. Müller, J. F. O.* 1882, p. 431, 1885, p. 159; *Hein. & Rehnw. Nomen. I. Mus. Hem. Orn.* p. 279 (1890).
Treron griseicapilla, *Schleg. N. T. D.* i. p. 70 (1863); *Salvad. Ucc. Born.* p. 288 (1874).
T. vernalis, *Peltz. Novara Reise, Vog.* p. 176 (1865).

T. vernans, *Stol'czka, J. A. S. B.* xxxix. 2, p. 330 (1870); *Oust. Bull. Soc. Philom.* (8) iv. p. 117 (1892).

T. chlorops, *Salvad. Uc. Born.* p. 288 (1874).

Hab. Luzon, Manili, Laguna, Calamba, Bataan, Orani, Panay, Guimaras, Bohol, Cebú, Samar, Paric, Paragua, Cuyo, Calamianes, Mindoro, Calapan, Mactan, Zamboanga, Mindanao, Basílan, Joló; Célebes, Java, Borneo.

3. Gén. PHABOTRERON, Br.

4. **Ph amethystina.** Br. ♂♂ N. v. Bato batong-tulug. (M. S. I.)

Phapitreron amethystina, *Br.* *Conspl. Av.* ii. p. 28 (1854). *id. Comp. Rend* xl. pp. 214, 217, n.^o 64 (1855); *id. Coup. d'ail. Ordre. Pig.* pp. 52, 55; n.^o 64 (1855); *Rchnb Tauben*, i. p. 91 (1862); *G. R. Gr. Hand-List*, ii. p. 246; n.^o 9422 (1870); *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix. p. 251 (1875); *Elliot, P. Z. S.* 1878, p. 505; *Tweedd. Orn. Works*, pp. 378, 412, pl. xxxiv fig. 2 (1881).

Phaps amethystina, *G. R. Gr. List. B. Brit. Mus. Columba*, p. 62 (1856); *Gieb. Thes. Orn.* iii. p. 89 (1877).

Ptilonopus amethystina, *Wall. Ibis*, 1805, pp. 382, 397; *id. J. F. O.* 1866, p. 279.

Phaps (Phapitreron) amethystina, *Mari. J. f. O.* 1866, p. 24. Chlorænas amethystina, *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix. p. 214, pl. xxxiv. f. 2 (1875); *Sharpe, Tr. Linn. Soc. Zool.* i. p. 353 (1876); *Tweedd. P. Z. S.* 1871, p. 832, 1878, p. 113, p. 381; *id. Orn. Works*, pp. 378, 409, 558, 572, 604 (1881); *Fardl. Rams. ibid.* p. 659 (1881); *Steere, List. Philipp. Birds*, p. 24 (1890); *Salvad. Cat. Brit. Mus.* 21. 1893, p. 66.

Hab. Luzon, Batuan, Orion, Samar, Borongan, Calbayog, Leyte, Dinagat, Panaon, Butuan, Mindoro, Mindanao, Baco.

5. **Ph cinereiceps,** Frank et Worcester.

Prelim. Notes Menage, *Exp. Philipp.* 1894, p. 8.

Hab. Tawi-tawi.

6. **Ph brunneiceps,** Fr. et Worcester.

Prel. Not. Men., *Exp. Philipp.* 1894, p. 9.

Hab. Basilan.

7. **Ph. maculipectus,** Fr. et Worcester.

Prel. Not. Men., *Exp. Philipp.* 1894, p. 10.

8. **Ph. frontalis,** Fr. et Worcester.

Prel. Not. Men., *Exp. Philipp.* 1894, p. 10.

Hab. Cebú.

9. **Ph leucotis, (Tun)** ♂♂ N. v. Bato-batong-tulug.

(M. S. I.)

Columba leucotis, Temm. Pl. Coll. 1809, *Desm. Dict. Sc. Nat.* xl. p. 338 (1826); *Wagl. Syst. Av. Columb.* sp. 60 (1827);

- Less.* *Tr. d'Orn.* p. 471 (1831); *G. R. Gr. Gen. B.* ii. p. 470, n.^o 28 (1844); *Rchnb. Syn. Av. Columbariaæ*, f. 1259 (1884); *Hartl. J. F. O.* 1854, B. lxv.
- Goura? leucotis*, *Steph. Gen. Zool.* xiv. p. 295 (1826).
- Phaps leucotis*, *G. R. Gr. Gén. B.* ii. p. 477, n.^o 5 (1845); *id. List B. Br. Mus. Columbae*, p. 61 (1856); *Gieb. Thes. Orn.* iii. p. 90 (1877).
- Peristera (Oreopeleja) leucotis*, *Rchnb. Av. Syst. Nat.* p. xxv. (1852).
- Phapitreron leucotis*, *Bp. Conspl. Av.* ii. sp. 28 (1854); *id. Compt. Rend.* xxxix. p. 879 (1854); xl. p. 217 no. 65 (1855); *id. Coup. d'œil Ordre Pig.* pp. 11, 55, no. 65 (1855); *Rchnb. Tauben*, i. p. 91, t. 224 f. 1259 (1862); *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 246, no. 9432 (1870); *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix. p. 251 (1875); *Tweed. Orn. Works*, p. 412 (1881); *Hein. u. Rchnw. Nomeuel. Mus. Hein. Orn.* p. 286 (1890); *Hartert. Kat. Vogelsamml.* p. 190 (1891); *id. J. F. O.* 1891, p. 301.
- Ptilonoropus leucotis*, *Wall. Ibis*, 1865, pp. 382, 397; *id. J. F. O.* 1866, p. 279.
- Phaps leucotis*, *Mart. J. F. O.* 1860, p. 24.
- Phapiscus leucotis*, *Sund. Meth. Nat. Av. d'sp. Tent.* p. 99 (1872).
- Chlorenas leucotis*, *Schleg. Mus. P. B. Columbae*, p. 79 (1873).
- Ihabotreron leucotis*, *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix. p. 214 (1875); *Sharpe. Tr. Linn. Soc., Zool.* i. p. 353 (1876); *Tweed. P. Z. S.* 1877, p. 699; *id. Orn. Works*, pp. 378, 525, 538, 559, 643 (1881); *Wardl. Rams. ibid.* p. 659 (1881); *Salv. Cat. B. Strickl. Coll.* p. 552 (1882); *Guille. P. Z. S.* 1885, p. 270; *Tristr. Cat. Coll. B.* p. 41 (1889); *Steere, List Philipp. Birds*, p. 24 (1890); *Salv. Cat. B. M.* 21, p. 67 (1893).
- Hab.* Luzon, Manila, Montalban, San Mateo, Laguna, Calauan, Bataan, Orion, Cagayan, Alcalá, Hocos, Pampanga, Mindoro, Baco.
10. **Ph. occipitalis**, *Tiw.* ♂ ♀ N v. Panay (M. S. T.)
- b. brevirostris*, *Tweed. P. Z. S.* 1879, p. 73; *id. Orn. Works* p. 650; *Steere, List. Philipp.* p. 24; *Salv. Cat. B. M.* 21, p. 68 (1893).
- Hab.* Basilan.
11. **Ph. nigrorum**, *Sharpe*, ♂ ♀ N v. Limuquin, (M. S. T.)
- Phapitreron leucotis*, *Wald et Layard. (no Temm.) Ibis*, 1872. p. 104; *Twed. Orn. Works*, p. 121 (1881).
- P. nigrorum*, *Sharpe, Tr. Lin. Soc. Zool.* i. pp. 346, 353; *Tw. P. Z. S.* 1877, p. 764; *id. Orn. Works*, p. 538 (1881); *Wardl. Rams. Twedd. Orn. Works*, p. 659 (1881); *Tristr. Cat. Coll.* p. 41, (1889); *Steere, List. Philipp. Birds*, p. 24 (1890); *Salv. Cat. B. M.* 21, 1893, p. 68.
- Hab.* Negros, Guimaras, Cebú, Panay, San Bernardino.
12. **Ph. brevirostris**, *Tiw.* ♂ ♀ N v. Dimucuyo, Limucun. (M. S. T.)
- Phaps leucotis*, *part. G. R. Gr. List. B. Brit. Mus. Columbae*, p. 61, specim. c. (1856).

Phabotreron brevirostris, Tweed. *P. Z. S.* 1877, pp. 349, 832, 1878, pp. 113, 344, 952; *id. Orn. Works*, pp. 461, 473, 558, 572, 599, 643, 650 (1881); Wardl. Rams. *ibid.* pp. 650, 669 (1881); Tweed. *Voy. Challenger*, Birds, p. 22, pl. vi. (1881); Kutter, *J. F. O.* 1883, p. 314; Guillem. *P. Z. S.* 1885, p. 269; Tristr. *Cat. Coll. B.* p. 41 (1890); Steere, *List Philipp. Birds*, p. 24 (1890); Salv. *Cat. B. M.* 21, p. 69 (1893).
Hab. Dingat, Leyte, Samar, Borongan, Bohol, Mindanao, Surigao, Butuan, Pasananca, Zamboanga, Sibulan, Placer, Jol.

Fam. PTHLÓPIDAS.

1. Gén. LEUCOTRERON, Br.

1. *L. occipitalis*, Gr. N. v. Punay.

M. S. 1

Ptilonopus occipitalis, G. R. Gray, *List. B. Br. Mus. Gallinæ*, p. 1 (1844); Gr. & Mitch. *Gen. B.* ii, p. 467, no. 25, pl. 118 (1844); G. R. Gr. *List. B. Brit. Mus. Columbæ*, p. 7, specim. a, b. (1856); Wallace, *Ibis*, 1865, p. 378; *id. J. F. O.* 1869, p. 278; Garrod, *P. Z. S.* 1174, p. 250; Salv. *Cat. B. M.* 21, p. 72 (1893).
Rampiculus occipitalis, Bp. *Consp. Av.* ii, p. 17 (1854); *id. Compt. Rend.* xxxix, p. 878 (1854); xl, p. 216, no. 34; *id. Comp. d'Ordr. Pig.* pp. 10, 54, no. 34 (1855); *id. Icon. Pig.* pl. 14 (1857); G. R. Gr. *Hand-list.* ii, p. 227, no. 9149 (1870); Sousa, *Mus. Nac. Liss. Columba*, p. 7 (1873); Wardl. *Tr. Zool. Soc.* ix, pp. 214, 251 (1875); Sharpe, *Tr. Linn. Soc.* (2) i, p. 353, no. 202 (1876); Tweedt. *P. Z. S.* 1877, p. 764, p. 832, 1378, p. 952, 1879, p. 73; *id. Orn. Works*, pp. 378, 412, 538, 558, 643, 653 (1881); Wardl. Rams. *Tweed. Orn. Works*, p. 659 (1881).

Oeotreron batilda, Bp. *Consp. Av.* i, p. 27 (1854); *id. Compt. Rend.* xxxix, p. 878 (1854), xl, p. 217, n.º 61; *id. Comp. d'Ordr. Pig.* pp. 10, 55, n.º 61 (1855).

Columba occipitalis, Schleg. *Handleid.* i, p. 411 (1857).

Lamotreron porphyrea, Bp. (*nec* Temm.) *Icon.* fig. pl. xv.

Xenotreron occipitalis, Rehnb. *Tauben*, p. 101, t. 259 f. 1331 (1862).

Ptilomopus batilda, Wall. *Ibis*, 1865, p. 382; *id. J. f. O.* 1869, p. 279.

Ptilopus (Phamphiculus) occipitalis, Mart. *J. f. O.* 1866, p. 23; n.º 124.

P. (Oeotreron), batilda, v. Mart. *J. f. O.* 1886, p. 23, n.º 125. *P. occipitalis*, Schleg. *Mus. P.-B. Columbar.* p. 35 (1873); *Geb. Thes. Orn.* iii, p. 366 (1877); Elliot, *P. Z. S.* 1878, p. 560; *Tristr. Cat. Coll. B.* p. 44 (1889); Steere, *List. Philipp. Birds*, p. 24 (1890).

P. incognita, Tweed. *Ann. & Mag. N. H.* (4) x, p. 538 (1877); *id. Orn. Works*, p. 565 (1881); Wardl. Rams. *Tweed. Orn. Works*, pp. 654, 659 (1881).

Leucotreron incognita, Tweed. *P. Z. S.* 1877, p. 816.

Xenotreron incognita, Tweed. *P. Z. S.* 1877, p. 832.

Hab. Luzón, Manila, Calaocan, Bataan, Orani, Laguna, Cagayan, Cebú, Leyte, Mindanao, Butuan, Zamboanga, Basilan.

2. *L. mirelei* Oust. ♂♂ N. v. Punay.

(M. S. T.)

Ptilopus (Rhamphiculus) marchei, *Oust. Le Nat.* 1880, p. 324; *Rembau et Schel. J. f. O.* 1881, p. 26; *Oust. Nov Arch. du Mus. d'H. N.* viii, p. 304, pl. xiii. (1884); *Salvad. Cat. B. M.* 21, p. 75 (1893).

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

3. *L. leclanderi*, Bp. ♂♂ N. v. Innalatataad

(M. S. T.)

Treron leclanderi, *Bp. Compt. Rend.* xli, p. 247 (1855); xlivi, p. 833 (1856); *id. Icon.* fig. pl. 16 (1857); *G. R. Gr. Ibis*, 1862, p. 342; *id. Hand-list.* ii, p. 230, n.^o 9201.

Ptilopus occipitalis, *part.*, *G. R. Gr. List. B. Brit. Mus. Columbae*, p. 7, specim. c. (1856).

(arophaea leclancheri, *G. R. Gr. List. B. Brit. Mus. Columbae*, p. 21 (1856); *id. P. Z. S.* 1858, p. 196, 1861, p. 437; *Resenb. N. T. N. I.* xxv, p. 249, n.^o 225 (1863); *id. J. f. O.* 1864, p. 132, n.^o 225).

Leucoteron gironieri, *Verr. & Des. Murs. Ibis*, 1862, p. 342, pl. xii. *G. R. Gr. Ibis*, 1862, p. 344; *Schleg. Ibis*, 1863, p. 120; *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix, pp. 213, 251, sp. 137, pl. xxxiv, f. 1 (1875); *Sharpe. T. Linn. Soc.* (2) i, p. 353, n.^o 201 (1876); *Tweedd. P. Z. S.* 1878, p. 287; *id. Orn. Works*, pp. 277, 412, 593 (1881).

Ptilopus geversi (*errore*), *Schleg. N. T. D.* i, p. 60 (1863). *P. hugonianus*, *Schleg. op. cit. pl. 3 f. 2* (1863); *Wall. Ibis*, 1865, p. 378, n.^o 20; *Schleg. Mus. P.-B. Columbae*, p. 36 (1873); *Gieb. Thes. Orn.* iii, p. 364 (1877).

Treron leclancheri, *G. R. Gr. Hand-list.* ii, p. 230, n.^o 9292 (1890).

Ptilopus leclancheri, *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* ix, p. 199 n.^o 32 (1876); *Gieb. Thes. Orn.* iii, p. 395 (1877); *Elliott P. Z. N.* 1879, p. 568; *Wardl. Rans.*, *Tweedd. Orn. Works*, pp. 654, 659 (1881); *Eberett. P. Z. S.* 1889, p. 225; *Steere. List. of. Philipp. Birds*, p. 24 (1890).

P. gironieri (*errore*), *Gieb. Thes. Orn.* iii, p. 364 (1877). Leucoteron leclancheri, *Salvad. Atti R. Acc. Sc. Tor.* xiii, p. 427 (1878); *Blas. Ornis*, 1888, p. 316; *Meyer. J. f. O.* 1891, p. 73; *Salv. Cat. B. M.* 21, p. 79 (1893).

Ptilopus leclancheri, (*sic*), *Tr. str. Cat. Coll. B.* p. 44 (1889). *Hab.* Luzón, Laguna, Bataan, Guimarás, Valencia, Negros, Cebú, Panay, Paragua, P. Princesa.

4. *L. roseicollis*, Gr. ♂♂ N. v. Punay.

(M. S. T.)

Columba porphyrea, *Reinw. in Temm. Pl. Col.* 106 (1824) *neec* *C. porphyracea*, *Forst.*; *Desm. Dict. Sc. Nat.* xl, p. 356 (1826); *Lass. Tr. d' Orn.* p. 472 (1831); *Knip. & Prev. Pig.* ii, pl. 4 (183-1843).

Ptilinopus porphyreus, *Sw. Zool. Journ.* i, p. 473 (1825); *Steph. Gen. Zool.* xiv, p. 277, pl. 33 (1826); *Lass. Compl. de Buff.* vii, p. 37 (1837), 2nd ed. p. 279 (1838).

Columba rosicollis, Wagl. Syst. Av. *Columba*, n° 27 (1827); id. Isss., 1829, p. 741.

Ptilopus erythrocephalus, Sw. Class. B. ii. p. 347 (1836).

P. porphyreus, Hartl. Syst. Verz. Brem. p. 97 (1844).

P. rosicollis, G. R. Gr. Gen. B. ii. p. 467, n° 21 (1844); id. Sst. Gallinæ B. M. p. 1 (1844); id. List. Spec. B. Brit. Mus. *Columba*, p. 8 (1856); Petz. & Lor. Ann. Naturh. Hofmus. p. 47; Salv. Cat. B. M. 21, 1889, p. 75.

Kurukuru roseicollis, Des Murs & Prev. Voy. *Venus*, p. 269 (1855)?

Lamprotteron porphyrea, Bp. Conspl. Av. ii. p. 18 (1854); id. Compt. Rend. xxxix, p. 879 (1854); xl. p. 216, n° 37; id. Coup. d'œil Ordr. Pig. pp. 8, 54, n° 37 (1855); Rehn. Tauben, p. 97, t. 237, ff. 1322-23 (1862); Sousa, Mus. Nac. Lisb. *Columba*, p. 7 (1873).

Ptilopus porphyreus, Schleg. De Dierent. p. 210 (1864); id. Mus. P.-B. *Columba*, p. 33. (1873); Gieb. Thes. Orn. iii. p. 367 (1877); Elliot P. Z. S. 1878, p. 553; Salvad. P. Z. S. 1879, p. 64; Nichols. Ibis, 1881, p. 154; Vorderm. N. T. N. Y. xlv. p. 395 (1885).

Pito opus porphyreus, Wall. Ibis, 1865, p. 380; id. J. f. O. 1866, p. 279.

Lamprotteron roseicollis, G. R. Gr. Hand-list, ii. p. 227, n° 9160 1870.

Ptilopus roseicollis, Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen. xiii. p. 454 (note) (1878) id. P. Z. S. 1879, p. 64; id. Ann. Mus. Civ. Gen. xiv. p. 245 (1879); Vorderm. N. T. N. I. xlvi. p. 412 (1889), li. p. 400 (1892).

Lamprotteron porphyreus, Hein. & Rehnw. Nomencl. Mus. Hein. Orn. p. 281 (1860).

Hab. Paragua, P. Princesa, Samar, Paric; Java, Sumatra.

5. *L. gularis*. Q. et G. ♂ N. v. Punay.

(M. S. T.)

Columba gularis, Quoy et Gaim. Voy. Astrol. Zool. i. p. 247, pl. 29, 1830; Kup. et Prov. Pig. pl. xi. 1838-41.

Ptilinopus gularis, Less. Compl. de Buff. viii. O's. p. 39 (1837); Brüg. Abh. naturw. Ver. Brem. v. p. 82 (1876).

Carpophaga gularis, Gr. R. Gray. Gen. B. ii. p. 460 n° 25 (1844).

Leucotteron gularis, Bp. Conspl. Av. ii. p. 15 (1854); id. Compt. Rend. 39 (1854) p. 876; id. Coup. d'œil Ordr. Pig. pp. 8, 54 n° 31 (1855); Wald. Tr. Zool. Soc. viii. p. 83 (1872); Sousa, Mus. Nac. Lisb. *Columba* p. 7 (1873); Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen. ix. p. 670 (1875); Meyer. Ibis, 1879, p. 135; Blas. J. f. O. 1882, p. 138; id. Zeitschr. f. ges. Orn. iii. p. 131 (1886). *Treron gularis*, Bp. Compt. Rend. xli. p. 24 (1855); G. R. Gr. Hand-list, ii. p. 230, n° 9203 (1870) Schneid. Cat. p. 22 (1878).

Laryngogramma gularis Rehn. Tauben, p. 102, t. 233 f. 1297, ii. p. 203, t. i., f. 44 (1862); Hein. & Rehnw. Nomencl. Mus. Hein. Orn. p. 282 (1890).

Ptilopus gularis, Schleg. De Dierent. p. 210 (1864); id. Mus. P.-B. *Columba*, p. 37 (1873); Gieb. Thes. Orn. iii. p. 364 (1877); Elliot. P. Z. S. 1878, p. 570; Salv. Cat. B. M. 21, p. 78 (1893).

Ptilonopus gularis, Wall. *Ibis*, 1865, p. 377; *id. Journ. f. Orn.* 1866, p. 278.
Hab. Samar, Borongan, Calamianes, Culion; Célebes.

6. *L. sp* ♂ N. v. Lare. (M. S. T.)
Hab. Culion, Calamianes.

7. *L. jambu* (*Gm.*) ♂ N. v. Bato bató. Laré. (M. S. T.)

Pooni jamboo, Marsd, *Sumatra*, p. 84.
Jamboo-pigeon, Lath. *Syn.* ii. 2, p. 627, n.^o 16 (1783).
Columba jambu, Gm. *S. N.* ii. 2, p. 784, n.^o 63 (1788); Temm. & Knf, fig. pls. 27, 28 (1808-11); Raffl *Tr. Linn. Soc.* xiii. p. 316 (1822); Hagn. *Syst. Av. Columba*, n.^o 28 (1827); Eyton, *P. Z. S.* 1839, p. 107; Schleg. *Handl. Dierk.* i. p. 411 (1857).
C. jambos, Lath. *Ind. Orn.* ii. p. 598, n.^o 18 (1790); Bonn. *Enc. Méth.* p. 252 (1790); Temm. *Pig. A. Gall.* i. pp. 257, 460 (1813); Vieill. *N. D.* xxvi. p. 349 (1818); Desm. *Dict. Sc. Nat.* xl. p. 333 (1826); Less. *Tr. d'Orn.* p. 472 (1813).
C. jamboo, Steph. *Gen. Zool.* xi. 1, p. 49 (1819); xiv. 1, p. 284 (1826).
Ptiliropus jambu, Less. *Compl. de Buff. Ois.* viii. p. 27 (1837), 2nd ed. p. 276 (1838); Hartl. *Syst. Verz. Brem.* p. 97 (1841); Blyth, *Cal. B. Mus. A. S. B.* p. 230, n.^o 1395 (1849); Brügg. *Abh. naturw. Ver. Brem.* v. p. 536 (1878).
Pt. jambu, G. R. Gr. *Gen. B.* ii. p. 467, n.^o 16 (1844); *id. List. of Gallinæ B. M.* p. 2 (1844); *id. List. B. Brit. Mus. Columba*, p. 7 (1856); Schlat. *P. Z. S.* 1863, p. 221; Wall. *Ibis*, 1865, p. 378; *id. J. f. O.* 1866, p. 278; Salvad. *Ucc. Born.* p. 289 (1874); Sharpe, *Ibis*, 1877, p. 23; Hume, *Str. Feath.* viii. p. 67 (1878); Vorderm. *N. T. N. I.* 1, p. 503 (1890).
Rumphiculus jambu, Bp. *Consp.* ii. p. 17 (1854); *id. Compt. Rend.* xxxix. p. 878 (1854), xl. p. 215, n.^o 35; *id. Coup. d'av Ord. Pig.* pp. 10, 54, n.^o 35 (1855); Moore, *P. Z. S.* 1859, p. 465; G. R. Gr. *Hand-list.* ii. p. 227, n.^o 9150 (1870); Sousa, *Mus. Nac. Lish. Columba*, p. 7 (1873).
R. jambu, Rehb. *Tauben*, p. 99, t. 230, ff. 1334-35, t. 244, ff. 3488-89 (1862); A. Müll. *J. f. O.* 1882, 431.
Ptilophus jambu, Schleg. *De Dierent.* p. 210 (1864); *id. Mus. P.-B. Columba*, p. 36 (1873); Gieb. *Thes. Orn.* iii. p. 365 (1877); Elliot, *P. Z. S.* 1878, p. 554; Beccari. *Ann. Mus. Civ. Gen.* xiv. p. 244 (1879); Sharpe, *P. Z. S.* 1879, p. 348, 1881, p. 299; Salv. *Cat. B. Strickl. Coll.* p. 555 (1882); Schlat. *List. Vert. An.* 8th ed. p. 444 (1883); Sharpe, *P. Z. S.* 1887, p. 432; Snell. *Sum.-Exped. i. Vog.* p. 48 (1887); Ggl. & Salvad. *Mem. R. Ac. Sc. Tor.* (2) xxxix. p. 110 (1888); Everett, *Journ. Str. Br. R. As. Soc.* 1889, p. 137; Vorderm. *N. T. N. I.* xl. pp. 64, 412 (1889); Tristr. *Cat. Coll. B.* p. 44 (1889); Sharpe, *Ibs.* 1890, p. 413; Salv. *Cat. B. M.* 21, p. 80 (1893).
Ptilinopus jambu, Stoliczka, *J. A. S. B.* xxxix. 2, p. 330 (1870).
Phassa jambu, Heine & Rehmw. *Nomencl. Mus. Hein. Orn.* p. 281 (1890).
Hab. Luzón, Paragua, Calamianes, Culion; Borneo, Sumatra.

2. Gea. PTILOPUS, STRICKL.

8. Pt. ponapensis. *Finsch*, ♂ N. v. Inimataid. M. S. M.

Ptilonopus fasciatus? *Finsch*, *Journ. Mus. Godeffr. Heft.* xii. p. 37 (1870).

Pt. ponapensis, *Finsch*, *P. Z. S.* 1877, p. 779; *Schmetz*, *Ethnogr. Abth. Mus. Godeffr.* p. 353 (1881).

Ptilopus fasciatus, *Elliot*, *P. Z. S.* 1878, pp. 535, 536; *Trist. Cat. Coll. B.* p. 44. (1880).

Pt. ponapensis, *Schmetz*, *Verh. Ver. Hamb.* 1877, (1879), pp. 178, 179; *Finsch*, *J. f. O.* 1880, p. 291; *id. P. Z. S.* 1880, p.

576; *id. Ibis*, 1881, pp. 113, 115; *Wiglesw.* *Ibis*, 1891, p. 583; *id. Aves Polynes.* p. 50, n.^o 201 (1191); *Salv. Cat. B. M.* 21, p. 93 (1893).

Hab. Ponapé, Carolinas.

9. Pt. herosheimeri. *Finsch* N. v.

Pt. herosheimeri, *Finsch*, *J. f. O.* 1880, p. 303; *id. P. Z. S.* 1880, p. 577; *id. Ibis*, 1881, pp. 106-108; *Rchnb. et Schef. J. f. O.* 1888, p. 75; *Wiglesw.* *Ibis*, 1891, p. 583; *id. Aves Polynes.* p. 51 n.^o 262 (1891); *Salv. Cat. B. M.* 21, p. 94; (1893).

Hab. Ualan, Carolinas.

10. Pt. roseicapillus (*Less.*) N. v. Curacaua.

Kurukuru, *Quoy et Gacin.* *Vög. Uvanie, Zool.* p. 34, 1824.

Columba roseicapilla, *Less. Tr. d'Orn.* p. 472 (1831).

C. purpurata, *Kitl. Kupfertaf. Heft.* iii. p. 25, t. xxxiii, f. 2 (1833).

Kurukuru des Mariannes, *Less. Compl. de Buff.* viii. p. 33 (1837); *id. op. cit. 2nd ed.* p. 278 (1838).

Ptilonopus swainsoni, *G. R. Gr. Gen. B.* ii. p. 469, n.^o 6 (1844).

P. purpureocinctus, *G. R. Gr.* *P. Z. S.* 1853, p. 48, pl. IV.; *id. Ann. & Marg. N. II.* (2) xv. p. 159 (1855); *id. List. B. Brit. Mus. Columbar.* p. 4 (1856).

Kurukuru roseicapilla, *Des Murs & Prev. Voy. Venus, Ois.* pp. 259, 269 (1855).

Ptilopus roseicapillus, *Bp. Comsp. Av.* ii. p. 21 (1854); *id. Compt. Rend.* xxxix, p. 877 (1854), xl. p. 246, n.^o 46 (1855), xlii. p. 833 (1856); *id. Rev. et Mag. de Zool.* 1856, p. 536; *id. Icon. Pig.* pl. xxiii. (1857); *Schleg. Mus. P.-B. Columbar.* p. 8 (1873); *Sousa, Mus. Nac. Lisb. Columbar.* p. 8 (1873); *Gieb. Thes. Ois.* iii. p. 368 (1877); *Elliot*, *P. Z. S.* 1878, pp. 516, 537; *Aust. Le Natural* 1889, p. 261; *Wiglesw.* *Ibis*, 1891, p. 584; *id. Aves Polynes.* p. 48, n.^o 259 (1891); *Salvad. Cat. B. M.* vi. p. 108 (1893).

Ptilonopus roseicapillas, *G. R. Gr. List B. Trop. Isl.* p. 37 1859; *Rchnb. Tauben*, p. 96 (1862); *Finsch*, *P. Z. S.* 1874, p. 94.

P. roseicapillus, *Rchnb. Tauben*, ii. p. 177 (1862); *Finsch* &

- Hartl. Orn. Centralpol.* p. 127 (1867); *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 225, n.^o 9119 (1870).
P. purpuratus, *Hartert, Kat. Vogelsamml.* p. 190, n.^o 2866 (1891).
Hab. Islas Marianas, Guahan.

3. Gén. LAMPROTRERON, BR.

11. **L. temmincki**, *Des Murs. C. & O. N. v.* Bato-bato. (M. S. T.)

- Columba superba*, *Knip. et Prev. Pig.* ii. pl. 42 (1838-43).
Ptilonopus superbus, part., *G. R. Gr. Gen. B.* ii. p. 407, n.^o 17 (1844).
Kurukuru temminckii, *Des Murs & Prev. Voy. Vénus, Zool.* pp. 236, 268 (*sex Prevost, l. c.*) (1855?).
Ptilonopus formosus, *G. R. Gr. P. Z. S.* 1860, p. 360; *Wall. Ibis*, 1865, p. 379, n.^o 28; *id. J. f. O.* 1866, p. 278.
Ptilopus superbus, *Schleg. N. T. D.* iii. p. 209 (1866); *id. Mus. P.-B. Columbae*, p. 30 (1863); *Gieb. Thes. Orn.* iii. p. 368 (1877).
Lamprotreron formosus, *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 277, n.^o 9159 1870.
Ptilonopus (?) celebensis, *Wall. fide G. R. Gr. Hand-list, l. c.* (1870).
Lamprotreron formosa, *Wall. Tr. Zool. Soc.* viii. p. 82 (1872); *Lenz, J. f. O.* 1877, p. 377; *Meyer, Ibis*, 1879, p. 135; *Blas. J. f. O.* 1883, p. 138.
Ptilonopus formosus, *Brügg. Abh. naturw. Ver. Brem.* v. p. 79 (1876).
Ptilopus temmincki, *Elliot, P. Z. S.* 1879, p. 62; *Blas. Zeitschr. f. ges. Orn.* 1885, p. 302, t. xiv. ff. 1, 2; *Salv. Cat. B. M.* 21, p. 115 (1893).
P. formosus, *Guillem. P. Z. S.* 1885, pp. 269, 556.
? *Lamprotreron temmincki*, *Heine & Rehnw. Nomencl. Mus. Hein. Orn.* p. *Orn.* p. 281 (1890).
Hab. Joló; Célebes.

4. Gén. SPILOTRERON, SALV.

12. **Sp bangueyensis**, *Meyer, C. & O. N. v.* Punay. (M. S. T.)

- Ptilopus melanocephalus*, *Tweed. P. Z. S.* 1878, p. 951, 1879, p. 73; *Sharpe, P. Z. S.* 1879, p. 316; *Wardl. Rams. Tweedd. Orn Works*, p. 659 (1881); *Sharpe, Ibis*, 1864, p. 322; *Guillem. P. Z. S.* 1875, p. 269; *Everett, Ibis*, 1886, p. 524; *Sharpe, Ibis*, 1888, p. 202; *Everett, ibid.* p. 282; *Blasius, Ornis*, 1888, p. 315; *Everett, P. Z. S.* 1889, p. 225; *id. Journ. of the Str. Branch R. As. Soc.* 1889, p. 197; *Whiteh. Ibis*, 1890, p. 56; *Steere, List B. & M. Philipp. Steere Exp.* p. 24 (1890); *Salv. Cat. B. M.* 21, 1893, p. 143.
P. bangueyensis, *Meyer, J. f. O.* 1891, p. 70.
P. purpureinucha, *Meyer, J. f. O.* 1891, p. 71.
Hab. Mindanao, Zamboanga, Banguey, Basilan, Paragua, P. Princesa, Joló.

§. Gén. ALCTR ENAS. GRAY

13. A. pulcherrima. (*Scop.*), N. v.

- Pigeon violet à tête rouge d'Antigue, *Sou. Voy. Nou. Guin.* n. 112, pl. 67 (1766).
Columba pulcherrima, *Scop. Del. Flor. et Faun. Insular.* ii. p. 94, n.º 98 (1776).
Red-crowned Pigeon, *Lath. Syn.* ii. 2, p. 628, n.º 17 (1783).
Columba rubricapilla, *Gm. S. N.* i. 2, p. 784, n.º 62 (1788); *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 599, n.º 19 (1790); *Temm. & Knip. Pig.* i. pl. 20 (1808-1811); *Temm. Pig. et Gallin.* i. pp. 233, 464 (1813); *Teill. N. D.* xxvi. p. 393 (1818); *Step. Grph. Zool.* xi. 1, p. 11 (1819); *Desm. Dict. Sc. Nat.* xl. p. 329 (1826); *Wagl. Syst. Av. Columba*, sp. 24 (1827); *Less. Tr. d'Orn.* p. 470 (1831); *id. Compl. de Buff. Ois.* viii. p. 14 (1837); *id. op. cit. 2nd ed.* p. 295 (1838).
C. rubrocappillata, *Bonn. Enc. Méth.* i. p. 334, pl. 77, 1, 4 (1790).
Ptilinopus pulcherrimus, *G. R. Gr. List. B. Brit. Mus. Gallin.* p. 1 (1844); *id. Gen. B.* ii. p. 467, n.º 23 (1844); *id. List. B. Brit. Mus. Columba*, p. 9 (1856).
Carpophaga rubricapilla, *Rchnb. Tauben. Novitiae* a. vi. p. 1, 1, 230 b. f. 3361.
Janthonas pulcherrima, *Rchnb. Syst. As.* p. xxv. (1852).
Ptilopus rubricapillus, *Licht. Nomencl.* p. 82 (1852).
Erythrœna pulcherrima, *Bp. Consپ. Av.* ii. p. 30 (1854); *Rchnb. Tauben*, i. p. 131 (1862).
E. pulcherrima, *Bp. Compt. Rend.* xxxix. p. 860 (1854), xl. p. 217, n.º 70 (1855); *id. Coup d'œil. Ordre. Pig.* pp. 12, 55, n.º 70 (1855); *Hartt. J. f. O.* 1860, p. 112; *id. Orn. Bestr. Faun. Madag.* p. 65 (1861); *Pollen. N. T. D.* i. p. 318 (1863); *E. Newt. Ibis*, 1867, pp. 337, 345, 356, 359, 360; *Oust. Bull. Soc. Philom.* (7) p. 101 (1877).
? *Alectroenas nitidissima*, *E. Newt. Ibis*, 1862, p. 196; *Rchnb. Tauben*, ii. p. 186 (1862).
Ptilopus pulcherrimus, *Schleg. De Dierent.* p. 211 (1864); *id. Mus. P.-B. Columba*, p. 44 (1873); *Geb. Thes. Orn.* iii. p. 367 (1877).
Erythrœnas pulcherrima, *Sclat. P. Z. S.* 1865, p. 318; *E. Newt. P. Z. S.* 1867, p. 344; *Garrod. P. Z. S.* 1875, p. 368; *Sclat. List. Vert. An 8th ed.* p. 444 (1883).
E. pulcherrima, *G. R. Gr. Hand-list.* ii. p. 227, n.º 9163 (1870).
Alectroenas pulcherrima, *Hartt. Vog. Madag.* p. 264 (1877); *Shell. Ibis*, 1883, p. 260; *Salv. Cat. B. M.* 21, 1863, p. 161.
Funingus pulcherrimus, *Oust. Bull. Soc. Philom.* (7) ii. p. 176 (1878).
Alectroenas pulcherrima, *A. Newt. P. Z. S.* 1879, p. 4.
A. pulcherrimus, *Tristr. Cat. Coll. B.* p. 43 (1889).
Hab. Marianas, Panay.

Fam. CARPOFÁGIDOS.

1. Gén. GLOBIBERA, Br.

1. G. oceanica, (Less.) N. v.

- Columba oceanica*, Less., Voy. Coq. Zool. i, p. 432; Atlas, pl. 41 (1826); Desm. Dict. Sc. Nat. xl, p. 316 (1826); Less. op. cit. i, 2, p. 708 (1828); id. Min. d'Orn. ii, p. 166 (1828); Wagl. Isis, 1829, p. 730; Less. Tr. d'Orn. p. 468 (1831); Kittl. Kupfert. p. 25, t. 33, f. 1 (1833); Prév. & Knip., Pig. ii, pl. 24 (1838-43); Kittl. Reise. i, p. 377; ii, pp. 39, 62 (1858).
Carrophaga oceanica, G. R. Gr. Gén. ii, p. 468, n.^o 2 (1844); Peale, Un. St. Expl. Exped., Birds, n.^o 119 (1848); Hartl. Wieg. Arch. f. Naturg. 1852, pp. 115, 135; id. J. f. O. 1854, p. 168; Cass. Pr. Ac. Nat. Sc. Philad. 1854, p. 229; Hartl. P. Z. S. 1867, p. 830; Hartl. & Finsch, P. Z. S. 1872, p. 101; Schleg. Mus. P.-B., Columbae, p. 87 (1873); Finsch, Vog. der Palau Gruppe, p. 26; id. P. Z. S. 1877, pp. 726, 775, 780; Salvad. Monogr. sottogen. Globicera, p. 8 (1878); id. Ibis, 1879, p. 304; Nehrk. J. f. O. 1879, p. 407; Finsch, J. f. O. 1880, pp. 292, 304; id. P. Z. S. 1880, p. 570; id. Ibis, 1880, pp. 220, 331, 332, 1881, pp. 108, 113; Schmeltz, Ethn. Abth. Mus. Godeffr. 1881, pp. 298, 330, 353; Finsch, Mittb. orn. Ver. Wien, 1884, p. 125; Tristr. Cat. Coll. B. p. 42 (1889); Hartert, Kat. Vogelsamml. p. 130 (1891); Wiglesw. Aves polynes. p. 52, n.^o 266 (1891).
Globicera oceanica, Bp. Conspl. Av. iii, p. 31 (1854); id. Compt. Rend. xxix, p. 1072 (1854); xi, p. 217, n.^o 73 (1855); id. Coup. d'ail. Ordr. Pig. pp. 15, 55, n.^o 73, (1856); Rehn. Lauben, i, p. 120, t. 130 ff. 128-84 (1662); C. R. Gr. Hand-list, ii, p. 229, n.^o 9170 (1870); Salv. Cat. B. M. 21, 1893, p. 176.
Carrophaga (Globicera) oceanica, G. R. Gr. Cat. B. Trop. Isl. p. 41 (1859).
C. pacifica, part., Hartl. & Finsch, Orn. Centralpolyn. p. 142 (1867); id. P. Z. S. 1868, pp. 7, 118.
Hab. Ponapé, Carolinas, Palaos.

2. Gen. CARPOPHAGA, SELBY.

2. C. nuchalis, Cab. ♂ N. v. Punay.

(M. S. U.)

- C. paulina, part. Schleg. N. T. D. iii, pp. 200, 201, (1860); Wald. Tr. Zool. Soc. viii, p. 13 (1872); Schleg. Mus. P.-B., Columbae, p. 85 (1873); Wald. Tr. Zool. Soc. ix, p. 215 (1875); Tweed. Orn. Works. p. 379; Kutter, J. f. O. 1882, p. 176; Hartert, Kat. Vogelsamml. p. 181 (1891).
Ducula paulina, Sonsa. Mus. Nac. Lisb. Columbae, p. 10 (1873).
Cerrophaga nuchalis, Cab. J. F. O. 1882, p. 126; Kutter, J. F. O. 1882, p. 877; Reckwo & Schat. J. F. O. 1883, p. 403; Hartert, Kat. Vogelsamml. p. 189 (1891); Salv. Cat. B. M. 21, 1893, p. 190.
Hab. Luzon, Batuan, Mindoro, Mindanao.

C. ænæa. *Jin.* 3 ♀. N. v. Balut, Capoo.

M. S. I

- Palumbus moluccensis*, *Bris. Orn.* i. p. 48; *pl. xii. f. 2* (1760); *Less. Compl. de Buff.*, *Ois.* viii. p. 81 (1837); *id. op. cit. 2nd ed.* p. 291 (1838).
- Columba ænæa*, *Linn. S. N.* i. p. 283, n.^o 22 (1760); *Gm. S. V.* i. 2, p. 780, n.^o 22 (1788); *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 62, n.^o 33 (1790); *Benn. Enc. Méth.* i. p. 233 (1790); *Tourr. & Knig. Pig.* i. fam. sec. *pl. 3* (1808-11); *Tennm. Pig. et Gallin.* i. p. 89, 446 (1813); *Veill. N. D.* xxvi. p. 363 (1818); *Steph. Gen. Zool.* xi. p. 21 (1819); *Horsf. Tr. Linn. Soc.* xiii. p. 184 (1821); *Raffl. Tr. Linn. Soc.* xiii. pt. 2, p. 316 (1822); *Dasm. Dict. Sc. Nat.* xl. p. 315 (1826); *Wieg. Nest Av. Columba*, sp. 15 (1827); *Less. Tr. d'Orn.* p. 468 (1831).
- Pigeon Ramier des Moluques, *D'Aubent. Pl. Enl.* 164 (17-?); *Buff. Hist. Nat., Ois.* ii. p. 538 (1771).
- Columba moluccensis*, *Müll. S. N. Suppl.* p. 133, n.^o 35 (1776); *Cass. Pr. Ac. Nat. Sc. Philad.* 1854, p. 248.
- Nutmeg Pigeon, *Lath. Syn.* ii. 2, p. 636, n.^o 30 (1783).
- Columba sylvatica*, *Tieckell. J. A. S. B.* ii. p. 581 (1833).
- Carpophaga ænæa*, *Selby. Nat. Libr., Pigeons.* p. 113 (1834); *Sw. Class. B.* ii. p. 348 (1837); *Jerd. Madr. Journ.* xii. p. 11 (1840); *G. R. Gr. Gen. B.* ii. p. 468, n.^o 1 (1844); *Hartl. Syst. Verz.* p. 98 (1844); *Peale. U. S. Expl. Exped., Zool.* p. 198 (1848); *Rchnb. Syn. Av. Novt. Columbaria*, t. 230 b, f. 3359 (1851); *Hartl. Arch. f. Naturg.* 1852, p. 115; *Cass. Pr. Ac. Nat. Sc. Philad.* 1854, p. 227; *Bp. Conspl. av. ii.* p. 32 (1854); *id. Compt. Rend.* xxxix. p. 8074 (1854); *sl. p. 287, n.^o 80* (1855); *id. Coup. d'x l'Ordre Pig.* pp. 84, 45, n.^o 80 (1855); *Gould. P. Z. S.* 1859, p. 150; *G. R. Gr. P. Z. S.* p. 361; *Rchnb. Tauben*, i. p. 119, t. 2206 f. 3359 (1862); *Selbt. P. Z. S.* 1863, p. 221; *Wall. P. Z. S.* 1863, p. 486; *Pelz. Novard. Reis.*, *Vög.* p. 105 (1863); *Wall. Ibis.* 1865, pp. 383, 397; *id. J. F. O.* 1866, p. 280; *Schleg. N. F. D.* iii. p. 197 (1866); *G. R. Gr. Hand-list.* ii. p. 228, n.^o 9170 (1870); *Geb. Thes. Orn.* i. p. 583 (1872); *Wald. Ibis.* 1873, p. 314; *Schleg. Mus. P.-B. Columba*, p. 85 (1873); *Sousat. Mus. Nac. Lisb.* *Columba*, p. 9 (1873); *Garrod. P. Z. S.* 1873, pp. 468, 639, 1874, p. 256; *Hume. Str. Feath.* ii. p. 260, 424 (1874); *Silvad. Ucc. di Born.* p. 290 (1874); *Blth. & Wald. B. of Burn.* p. 144 (1875); *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix. pp. 215, 251 (1875); *Hume. Nests & Eggs.* iii. p. 496 (1875); *... Str. Feath.* iii. p. 163 (1875); *Legge. Ibis.* 1875, p. 399; *Sharpe. Ibis.* 1875, p. 51; *Brüggem. Abh. Ver. Brem.* v. p. 1876; *Ball. Str. Feath.* iv. p. 235 (1876); *Armstr. b. b.* p. 337 (1876); *Sharpe. Tr. Linn. Soc. Zool.* i. pp. 346, 353 (1876); *Inglis. Str. Feath.* v. p. 39 (1877); *Ball. ibid.* p. 418 (1877); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, pp. 64, 832, 1878, pp. 113, 288, 344, 623, 752; *Rosenb. Malay. Archip.* p. 108 (1878); *Hume. & Davis. Str. Feath.* vi. p. 410 (1878); *Ball. Str. Feath.* vii. p. 224 (1878); *Hume. Str. Feath.* viii. pp. 67, 100, n.^o 780 (1879); *Tweedd. P. Z. S.* 1879, p. 733; *Sharpe. P. Z. S.* 1879, 348; *Tirant. Bull. Com. Agr. et Ind. Cochinch.* (3) i.

p. 141 n.^o 252 (1879); *Bingh. Str. Feat.* ix. p. 194 (1880); *Parker*, *ibid.* p. 481 (1880); *Wardl. Rams. P. Z. S.* 1880, p. 15; *Sharpe*, *P. Z. S.* 1881, p. 799; *Tweedd. Orn. Works*, pp. 245, 378, 379, 380, 412, 538, 559, 573, 594, 599, 618, 643, 650, (1881); *Wardl. Rm. Tweedd. Orn. Works*, App. p. 652 (1881); *Kelham. Ibis*, 1881, p. 527; *Blas. Nchrk. Jahresh. für Naturw. zerr. Braunschwe.* 1881, p. 59; *Nichols. Ibis*, 1882, p. 65; *Oates*, *Str. Feath.* x. p. 235 (1882); *Cab. J. f. O.* 1882, 1 p. 125, 126; *Kutter. J. f. O.* 1882, p. 177; *Salv. Cat. B. Strickl. Coll.* p. 553 (1882); *Nichols. Ibis*, 1883, p. 524; *Kutter. J. f. O.* 1883, p. 318; *Sclat. List. Vert. An.* ed. p. 433 (1883); *Blas. Verh. z.-b. Ges. Wien*, xxxiii. p. 62 (1883); *Oates. B. Brit. Burm.* ii. p. 301 (1883); *Meyer. Abhäl. Vogel-Skel. I.* lxiii. (1884); *Sharpe. Ibis*, 1884, p. 322; *Sne-Hem. Sumatra-Exp.*, *Vogels*, p. 48 (1884); *Vorderm. N. T. N. I.* lxiv. p. 226 (1884); *Guillem. P. Z. S.* 1885, p. 270; *Bedd. P. Z. S.* 1885, p. 844; *Vorderm. N. T. N. I.* xlvi. pp. 25, 236 (1886); *Buttik. Not. Leyd. Mus.* ix. p. 76 (1886); *Anders. Journ. Linn. Soc., Zool.* xxi. p. 152 (1887); *Sharpe. Ibis*, 1888, p. 302; *Hume. Str. Feath.* xi. p. 294 (1888); *Erett. Journ. Str. Br. R. As. Soc.* 1889, p. 194; *id. P. Z. S.* 1889, p. 225; *Tristr. Cat. Coll. B.* p. 42 (1889); *Vorderm. N. T. N. I.* xlix. p. 412 (1889), xl. p. 505 (1890); *Whitech. Ibis*, 1890, p. 56; *Sharpe. Ibis*, 1890, p. 134, 283; *Steere. List. of Philipp. Birds*, p. 23 (1890); *Hein. & Rehnu. Nomencl. Mus. Hein. Orn.* p. 281 (1890); *Hartert. Kat. Vogel-samml.* p. 189 (1891); *id. J. f. O.* 1891, p. 300; *Salv. Cat. B. M.* 21. p. 191 (1893).

Hab. Samar, Boro igan, Tablas, Siquijor, Panay, Sibuyan, Calamianes, Culián, Leyte, Negros, Luzon, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Mindoro, Baco, Joló, Tawi-tawi.

4. *C. chalybura*, *Bp. ♂♂ N v Balot.*

(M. S. T.)

C. chalybura, *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 32 (1854); *id. Compt. Rend.* xxxix. p. 1074, xl. p. 217, n.^o 81 (1855); *id. Comp. d'aval Ordav.* Pig. pp. 14, 55, n.^o 81 (1855); *G. R. Gr. List B. Brit. Mus. Columbar.* p. 17 (1856); *Bp. Icon.* pl. xlvi. (1857); *Wall. Ibis*, 1861, p. 286; *Rehn. Tauben*, i. p. 119 (1862); *Wall. Ibis*, 1865, pp. 383, 396; *id. J. f. O.* 1866, p. 280; *Mart. J. f. O.* 1866, p. 24; *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 288, n.^o 9169 (1870); *Sousa. Mus. Hein. Orn.* p. 281 (1890).

Muscadivora aenea, *Schleg. Dierent.* p. 210 (1864); *Salv. Cat. B. M.* 21. 1893 p. 192.

Hab. Luzon, Manila, Montalban, Negros, Dumaguete, Cebú, Amparo, Leyte, Dinagat, Surigao, Samar, Butuan, Zamboanga, Basilan, Mindanao, Calamianes, Cuyo.

5. *C. palawanensis*. *Blas. ♂♂ N v Balut.*

(M. S. T.)

C. aenea palawanensis, *Blas. Orn.* ix. p. 316 (1888); *id. Ibis*, 1888, p. 374; *Salv. Cat. B. M.* 21 p. 192 (1893).

Hab. Banguey, Paragua, P. Princesa.

6. *C. perspicillata*, Temm. ♂ N. v. Punay.

(M. S. T.)

- Columba perspicillata*, Temm. Pl. Col. 246 (livr. 42, 1825); Steph. Cien. Zool. xiv. 1, p. 286 (1826); Desm. Dict. Sc. Nat. xl. p. 311 (1826); Wagl. Syst. Av. Columba, sp. 13 (1827); Less. Th. d' Orn. p. 469 (1831); id. Compl. de Buff. Ois. viii. p. 86 (1837); id. op. c.t. 2nd ed. p. 293 (1838).
Carpophaga perspicillata, G. R. Gr. Gen. B. ii. p. 468, n.^o 14 (1844); Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B. p. 232 n.^o 1403 (1849); Bp. Consپ. ii. p. 33 (1854); id. Compt. Rend. xxxix. p. 1074 (1854), xl. p. 217, n.^o 84 (1855); id. Coup. d' ail Ordre. P. g. pp. 14, 55, n.^o 84 (1855); Cass. Pr. Ac. Nat. Sc. Philad. 1854, p. 239; Bp. Compt. Rend. xlvi. p. 835 (1856); id. Icon. P. g. pl. 45 (1857); G. R. Gr. P. Z. S. 1860, p. 360 (part.) 1861, p. 437; Wall. Ibis, 1861, p. 290; Rehn. Tauben, i. p. 189, t. 231 ff. 1291-92 (1862); Finsch, Neu-Guin. p. 177 (1865); Schleg. N. T. D. iii. pp. 194, 344 (1865); G. R. Gr. Hand-list, ii. p. 228, n.^o 9197 (170); Giëb. Thes. Orn. i. p. 587 (1872); Schleg. Mus. P.-B. Columba, p. 89 (1873); Sausa, Mus. Nac. Lisb. Columba p. 10 (1873); Wald. Tr. Zool. So. ix. p. 216 (1875); Salzad. Ann. Mus. Civ. Gen. vii. p. 789 (1875), viii. p. 382 (1876) ix. p. 201, n.^o 45 (1876); Peltz. Verh. z.-B. Ges. Wien, 1876, p. 719; Roseub. Malay. Archip. p. 407 (1878-79); Salzad. Orn. Pap. e Mol. iii. p. 91 (1882); Pleske, Bull. Acad. Petersb. xxix. p. 535 (1884) (Ternate); Tristr. Cat. Coll. B. p. 42 (1889); Heine & Rehnw. Nomencl. Mus. Hein. Orn. p. 281 (1890) (New Guinea!); Salzad. Mem. R. Ac. Tor. (2) xlvi. p. 56 (Agg. Orn. Pap. e Mol. p. 182) (1891); Salv. Cat. B. M. p. 199 (1893).
C. perspicillata, var., Wall. P. Z. S. 1863, p. 33.
C. temminckii, Wall. Ibis, 1865, p. 384, n.^o 54; id. J. f. O. 1866, p. 280, n.^o 54; G. R. Gr. Hand-list, ii. p. 228, n.^o 9173 (1870).

Hab. Mindoro, Baco, Paragua, P. Princesa; Batchian.

7. *C. pickeringi*, Cass. ♂ N v Balut.

(M. S. T.)

- C. ænea*, Peale. U. S. Expl. Exped., Zool. p. 198 (1848); Hartt. Archiv. f. Naturg. 1852, p. 115.
C. pickeringii, Cass. Pr. Ac. Nat. Sc. Philad. vii. p. 228 (1854); Bp. Compt. Rend. xlvi. p. 035 (1856); Cass. Un. St. Expl. Exp. 2nd ed. p. 267, pl. xxvii. (1858); Rehn. Tauben, ii. p. 184; Novit. Suppl. t. vi. f. 72 (1862); Wald. Tr. Zool. Soc. ix. p. 215 (1875); Sharpe, Tr. Linn. Soc., Zool. i. p. p. 353 (1876); id. P. Z. S. 1885, pp. 248, 270, 418, 420; Everett, Ibis, 1888, p. 282; id. Jour. Str. Br. R. As. Soc. 1889, p. 195; Blas. J. f. O. 1890, p. 138; Salv. Cat. B. M. 21, p. 201 (1893).
C. chalybura, part., G. R. Hand-list, ii. p. 228, n.^o 9196 (1870).
C. ænea, part., Giëb. Thes. Orn. i. p. 583 (1872).
C. everetti, Grant. Ann. & Mag. N. H. (6) ii. p. 351 (1888); id. Ibis, 1889, p. 582.
Hab. Cagayan de Joló, Mantanani, Joló.

3. Gén. PTILOCALPA, P.

8. Pt. griseipectus, Bp. N. v. Balut-isla.

M. S. T.

- Carpophaga pectoralis, *G. R. Gr. List. B. Brit. Mus.* iii. *Gallinar.*, p. 7 (1844); *Hartl. J. F. O.* 1854, B. xlv. 1855, p. 98.
C. griseipectus, *G. R. Gr. Mus. Brit.* 1855; *id. List. B. Brit. Mus. Columbae*, p. 22 (1856); *Wall. Ibis*, 1855, pp. 382, 398; *id. J. F. O.* 1866, p. 281; *Geb. Thes. Orn.* i. p. 585 (1872); *Schleg. Mus. P.-B. Columbae*, p. 88 (1873); *Tristr. Cat. Coll. B.* p. 42 (1889); *Salv. Cat. B. M.* 21 p. 265 (1893).
Ptilocolpa griseipectus, *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 34, n.^o (1854); *id. Compt. Rend.* xxxix. p. 1075 (1854), xl. p. 217, n.^o 88 (1855); *id. Coup. d'ail. Ordre Pig.* pp. 15, 55, n.^o 88 (1855); *id. Icon. Pig.* pl. 51 (1857); *G. R. Gr. Hand-lst.* ii. p. 231, n.^o 922 (1870); *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix. pp. 216, 251 (1875); *Sharpe, Tr. Linn. Soc., 2nd ser. Zool.* i. p. 353 (1876); *Tweedd. P. Z. S.* 1878, pp. 937, 952; *id. Orn. Works*, pp. 389, 412, 628, 643 (1881); *Wardl. Rams. Tweedd. id. Orn. Works*, p. 659 (1881); *Küller, J. f. O.* 1883, p. 315; *Wardl. Rams. Ibis*, 1886, p. 160; *Steere, List. Philipp. B.* p. 24 (1890); *Hein. & Rehm. Nomencl. Mus. Hein. Orn.* p. 283 (1890); *Hartert, J. f. O.* 1891, p. 301.
Pt. griseipectus, *Rehn. Tauben*, i. p. 91 (1862), ii. p. 176, *Novit. Suppl.* t. iii. ff. 30, 31 (1862).
Carpophaga griseipectus, *Mart. J. f. O.* 1866, p. 24.
C. sp. *Tweedd. P. Z. S.* 1878, p. 937.
Hab. Luzon, Manila, Mindoro, Mindanao, Zamboanga.

9. Pt. carola, (Bp.) ♂♂ N. v. Camaso.

(M. S. T.)

- Carpophaga carola, *Bp. in litt.* *id. Conspl. Av.* ii. p. 34 (1854); *G. R. Gr. List. B. Brit. Mus. Columbae*, p. 22 (1856); *Wall. Ibis*, 1868, pp. 385, 398; *id. J. f. O.* 1866, p. 281; *Salv. Cat. B. M.* 21, p. 206 (1893).
Ptilocolpa carola, *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 34, n. (1854); *id. Compt. Rend.* xxxix. p. 1075 (1854), xl. p. 217, n. 87 (1855); *id. Coup. d'ail. Ordre Pig.* pp. 15, 55, n.^o 87 (1855); *id. Compt. Rend.* xli. p. 658 (1855), xliii. p. 835 (1856); *G. R. Gr. Hand-lst.* ii. p. 231, n.^o 9227 (1870); *Sousa, Mus. Nac. Lish. Columbae*, p. 10 (1873).
Pt. carola, *Rehn. Tauben*, p. 91 (1862).
Carpophaga carola, *Mart. J. f. O.* 1866, p. 24.
Ptilocalpa griseipectus, *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix. pp. 216, 251 (1875); *Tweedd. Orn. Works*, pp. 380, 412 (1881); *Wardl. Rams. Tweedd. Orn. Works*, p. 659 (1881).
Hab. Luzón, Manila.

4. Gen. ZONOPHAPS, SALV.

10. Z. poliocephalus, (Gray) ♂♂ N. v. Balutro.

(M. S. T.)

- Carpophaga poliocephala, *Gr. List. B. Brit. Mus.* iii. *Rallinae*, p. 6 (1844); *G. R. Gr. & Mitch. Gen. B.* ii. p. 460, n.^o 30, pl.

(1844); *Rchrb.*, *Syn. Av. Columbar.*, f. 1298 (1847); *Hartl.*, *J. f. O.* 1854, *B.*, *Ixx.*, 1855, p. 97; *G. R. Gr.*, *Lis B. Brit.*, *Mrs. Columbar.*, p. 22 (1855); *Walt.*, *Ibis*, 1865, pp. 387, 395; *id.*, *J. f. O.* 1866, p. 281; *Geb.*, *Thes. Orn.*, i., p. 587 (1872); *Schleg.*, *Mus. P. B. Columba*, p. 92 (1873); *Tristr. Cat. Coll.*, *B.*, p. 42 (1889); *Hein.*, & *Rchrb.*, *Nomencl. Mus.*, *Hein. Orn.*, p. 283 (1890); *Savv. Cat. B.*, *M.*, 91, p. 209 (1890).
Zonornas poliocephala, *Rchrb.*, *Av. Syst. Nat.*, p. xxvi. (1852); *id.*, *Tautens.*, i., p. 112, t. 233, f. 1298 (1862).
Hemiphaga poliocephala, *Bp. Comsp. Av.*, ii., 30 (1854); *id. Compt. Rend.*, xxxix, p. 1077 (1854); xl., p. 217, n.^o 105 (1855); *id. Coup. d'ail Ordr. Pig.*, pp. 17, 55, n.^o 105 1855; *id. Compt. Rend.*, xli., p. 658 (1855), xliv., p. 836 (1856); *G. R. Gr.*, *Hand-List.*, ii., p. 231, n.^o 9223 (1870); *Sousa*, *Mus. Acad. Lisb.*, *Columba*, p. 11 (1873); *Wall.*, *Tr. Zool. Soc.*, ix., pp. 217, 253 (1875); *Sharpe*, *Tr. Linn. Soc.*, (2), *Zool.*, i., pp. 347, 353 (1876); *Tweedd.*, *P. Z. S.*, 1878, pp. 413, 952; *id. Orn. Works*, pp. 381, 412, 573, 643 (1881); *Wardl. Rims.*, *Tweedl. Orn. Works*, p. 659 (1881); *Steere*, *List. Philipp. B.*, p. 24, (1890).
Carpophaga torsterii, *port.*, *Cass. Pr. Ac. Nat. Sc. Philad.*, 1854, p. 231;
C. (*Hemiphaga*) *poliocephala*, *Mart. J. f. O.*, 1867, p. 24;
Hab. Luzón, Laguna, Negros, Dinaagat, Panay, Cebú, Samar, Borongan, Masbate, Mindanao, Zamboanga, Basilan.

5. Gén. MYRISTICIVORA, Reichenb.

11 M. bicolor, (*Scop.*) ♂♂ N. v. Camiso.

(M. S. T.)

Pigeon ou Ramier blanc mangeur de muscade de la Nouv. Guinée,
Sonn., *Voy. Nouv. Guin.*, p. 169, pl. 103 (1776).
White Nutmeg Pigeon, *Lath. Syn.*, ii., 2, p. 538, n.^o 31 (1783).
Columba bicolor, *Scop. Del. Flor. et Faun. Insubr.*, ii., p. 94, n.^o 97 (1789).
C. alba, *Gm. S. N.*, ii., p. 780, n.^o 53 (1788) *Lath. Ind. Orn.*, ii., p. 602, n.^o 34 (1790); *Bonn. Enc. Méth.*, i., p. 246 (1790); *Vieill. N. D.*, xxvi p. 362 (1818); *Wagl. Syst. Av. Columba*, sp. 20 (1827); *id. Isis*, 1829, p. 741; *Less. Compl. de Buff. Ois.*, viii., p. 90 (1837); *id. op. cit. 2nd ed.*, p. 293 (1838); *Hartl. Syst. Verz.*, p. 98 (1844).
C. littoralis, *Temm. & Kup. Pig.*, i., pl. 7 (1808-11); *Temm. Pig. A. Gallin.*, pp. 99, 448 (1813); *Steph. Gen. Zool.*, xi., 1, p. 23 (1819); *Horsf. Tr. Linn. Soc.*, xiii., p. 182 (1821); *Steph. Gen. Zool.*, xiv., 1, p. 291 (1826); *Desm. Dict. Sc. Nat.*, xl., p. 319 (1826).
Carpophaga myristicivora, *G. R. Gr.*, *List Gallinæ B.*, M., p. 4 (1844); *id. Gen. B.*, ii., p. 468, n.^o 3 (1844); *Blyth. J. A. S. B.*, xx., p. 371 (1846); *Beav. Ibis*, 1867, pp. 332, 334.
C. casta, *Peale*, *Un. St. Expl. Exp.*, *Zool.*, p. 204 (1848); *Hartl. Arch. J. Naturg.*, xviii., 1, p. 116 (1852); *Bp. Compt. Rend.*, xliv., p. 836 (1856).
C. bicolor, *G. R. Gr.*, *Gm. B. Abb.*, p. 23 (1849); *Blyth. Cat. B. Mus. A. S. B.*, p. 232, n.^o 1436 (1849); *Cass. Pr. Ac. Np. Sc. Philad.*, 1854, p. 232; *G. R. Gr.*, *Lis B. Brit.*,

- Mus. Columbae*, p. 19 (1856); *Cass. Un. St. Expl. Expl. 2nd ed. Orn.* p. 265, pl. 28 (1858); *Sclat. Journ. Pr. Linn. Soc.* ii. p. 167, n.^o 139 (1858); *G. R. Gr. P. Z. S.* 1858, p. 196; *id. Cat. B. Neu-Guin.* pp. 47, 61 (1859); *id. P. Z. S.* 1861, p. 447; *Blyth. Mouat's App.* p. 362 (1863); *Finsch. Neu-Guin.* p. 177 (1865); *Pelz. Novara Reis., Vög.* p. 107 (1865); *Wall. Ibis*, 1865, p. 386, n.^o 68; *id. J. f. O.* 1866, p. 281; *Schleg. N. T. D.* iii. pp. 203, 205, 343 (1866); *Blyth & Beav. Ibis*, 1867, p. 332; *Ball. J. A. S. B.* xxxix. 2, p. 32 (1870); *Gieb. Thes. Orn.* i. p. 584 (1872); *Ball. Str. Feath.* i. p. 79 (1873); *Schleg. Mus. P.-B. Columbae*, p. 38 (1873); *Hume. Nests. & Eggs.* iii. p. 896 (1873); *id. Str. Feath.* ii. p. 264 (1874); *Salvad. Cat. Ucc. Born.* p. 292 (1874); *Hume. Str. Feath.* ii. pp. 80, 84, 96, 103, 114, 119, 264 (1874); *Sharpe. P. Z. S.* 1875, p. 108; *Blyth. B. Burm.* p. 145 (1875); *Koch. Verz. Samml. Vogelbälge.* p. 2; *Brügg. Abh. Naturw. Ver. Brem.* v. p. 85 (1876); *Hume. Str. Feath.* vi. p. 418 (1878); *Kelh. Ibis*, p. 527; *Vorderm. N. T. N. I.* xl. p. 227 (1882); *Oates. B. Brit. Burm.* ii. p. 303 (1883); *Sclat. List. Vert. An.* 8th ed. p. 443 (1883); *Vorderm. N. T. N. I.* xli. p. 239 (1886); *Büttik. Not. Leyd. Mus.* viii. p. 66 (1886); *Sharpe. Ibis*, 1888, p. 202; *Tristr. Cat. Coll. B.* pp. 42, 269 (1889); *Vorderm. N. T. N. I.* xl. p. 412 (1889); *Everett. Journ. Str. Br. R. As. Soc.* 1889, p. 195; *id. P. Z. S.* 1889, p. 225; *Whiteh. Ibis*, 1890, p. 50; *Sharpe. Ibis*, 1890, pp. 135, 284; *Vorderm. N. T. N. I.* i. p. 507 (1890).
- Myristicivora littoralis*, *Rchnb. Av. Syst. Nat.* p. xxvi. (1852); *Meyer. J. f. O.* 1873, p. 405.
- M. bicolor*, *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 36 (1854); *id. Compt. Rend.* xxxix. p. 1078 (1854), xl. p. 217, n.^o 98 (1855); *id. Coup. d'œil Ordre Pig.* pp. 18, 55, n.^o 98 (1855); *Moore. P. Z. S.* 1859, p. 466; *Rchnb. Tauben*, i. p. 110, t. 229, ff. 1278-79 (1862), ii. p. 182, t. vi. ff. 64-65 (1862); *Rosenb. N. T. N. I.* xxv. p. 249, n.^o 228 (1863); *id. J. f. O.* 1864, p. 132, n.^o 228; *G. R. Gr. Hand-list.* ii. p. 229, n.^o 9187 (1875); *Gieb. Thes. Orn.* i. p. 584 (1872); *Wald. Tr. Zool. Soc.* viii. p. 84 (1872); *Sousa. Mus. Nac. Lisb. Columbae*, p. 10 (1873); *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix. p. 217 (1875); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* ix. p. 62, p. 202, n.^o 54, p. 270, f. 3, p. 276 (1876); *Sharpe. Tr. Linn. Soc.* (2) *Zool. i.* pp. 347, 353 (1876); *Lenz. J. f. O.* 1877, p. 319; *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 350, 1878, pp. 113, 952; *Salvad. P. Z. S.* 1878, p. 39; *id. Ann. Mus. Civ. Gen.* xiv. p. 661 (1879); *Meyer. Ibis*, 1879, p. 136; *Sharpe. P. Z. S.* 1881, p. 799; *Tweedd. Voy. Challeng.* *Birds*, p. 23; 1881; *Salvad. ibid.* p. 71 (1881); *Wardl. Rams. Tweedd. Orn. Works*, pp. 184, 380, 412, 460, 462, 474, 573, 643 (1881); *Wardl. Rams. Tweedd. Orn. Works. App.* p. 659 (1881); *Salvad. Orn. Pap. Mol.* iii. p. 107 (1882); *Sclat. P. Z. S.* 1883, pp. 51, 195, 200; *Kutler. J. f. O.* 1883, p. 315; *Forbes. P. Z. S.* 1884, p. 433; *Meyer. Sitzb. u. Abh. Ges. Isis*, 1884. Abh. i. p. 6; *Guille. P. Z. S.* 1885, p. 271, p. 416, pp. 558, 575; *Blas. Zeitschr. f. d. ges. Orn.* 1886, p. 197; *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* (2) iv. p. 559, (1887); *Blas. Ornis.* iv. p. 617 (1888); *Pelz. & Lorenz. Ann.*

- Ann. Naturh. Hofmus.* m. p. 47 (1888); *Hein & Rehm's. Nomencl. Mus.* Hein. Orn. p. 291 (1890); *Steere, List Philipp. B.* p. 24 (1890); *Hartert, Kat. Vogelsamml.* p. 190 (1891); *Salvad. Mem. R. As. Sc. Tor.* (2) viii. p. 58; *id. Cat. B. M.* 21. p. 228 (1893).
- Myristicivora luctuosa*, *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 37 (1854); *id. Compt. Rend.* xxxix. p. 1078 (1854); xl. p. 217, no. 99 (1855); *id. Coup. d'ail Ordre Pig.* pp. 18, 55, no. 99 (1855).
- Carpophaga luctuosa*, *Moll. & Dilw. Contr. Nat. Hist. of Lab.* p. 51 (1855); *G. R. Gr. List B. Brit. Mus. Columbr.* p. 20 (1856); *Rosenb. N. T. N. I.* xxv. p. 241, no. 224 (1863); *id. J. F. O.* 1864, p. 132, no. 24; *Gieb. Thes. Orn.* i. p. 58 (1872); *Ros-nb. Malay. Archip.* p. 220 (1878).
- Carpophaga littoralis*, *Hartl. J. F. O.* 1855, p. 319; *Finsch. Neu-Guin.* p. 178 (1865); *Rosenb. Verstl. Eit. Mus.* p. 20. *d. Malay. Archip.* p. 108 (1878).
- Carpophaga littoralis*, *G. R. Gr. P. Z. S.* 1800, p. 361.
- Carpophaga alba*, *G. R. Gr. P. Z. S.* 1800, p. 361.
- Muscadivora bicolor*, *Schleg. Dierent.* p. 210 (1864).
- Myristicivora siliorrhœa*, *Whitley in Gurn. Ibis.* 1801, p. 275.
- Myristicivora melanura*, part., *Blas. P. Z. S.* 1882, p. 709; *Bernst. Dagboek*, pp. 127, 160 (1883); *Nehrk. J. F. O.* 1885, p. 34; *Salvad. Ibis.* 1886, p. 153.
- Hab.* Luzon, Cagayan, Abra, Ilocos, Mindoro, Calapan, Masbate, Negros, Paragua, P. Princesa, Calamianes, Cuvo, Malanipa, Nipah, Zamboanga, Mindanao, Tawi-awi; Java.

Fam. COLUMBIDAS.

1 Gen. COLUMBA, LIN.

1. *C. livia*, *Breh. C. O.* N. v. *Paloma domesticus*. (M. S. T.)
- Columba domestica*, *Gm. S. A.* i. p. n.^o 2.
- Biset*, *D' Aubent. Pl. Ent.* 510.
- Hab.* Cosmopolita.
2. *C. griseigularis*, *Wald. C. O.* N. v. *Balut-munti*. (M. S. T.)
- Carpophaga metallica*, pat. *Schleg. N. T. D.* iii. pp. 202, 203 (1866).
- Lanthanas griseogularis*, *Wald. & Layard, Ibis.* 1872, p. 104, pl. vi; *Sclat. Ibis.* 1874, p. 455; *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix, pp. 218, 251 (1875); *Sharpe, Tr. Linn. Soc., Zool.* i. p. 353 (1876); *Tweedd. P. Z. S.* 1878, p. 288, 1879, p. 73; *2 Sharpe, P. Z. S.* 1879, p. 316; *Tweedd. Orn. Works*, pp. 117, 121, 381, 412, 594, 651 (1881); *Wardl. Rvns. Tweedl. Orn. Works.* pp. 659, 669 (1881); *Guillet. P. Z. S.* 1885, p. 271; *Everett. Ibis.* 1887, 363; *id. Journ. Str. B. R. As. Soc.* 1889, p. 105; *Steere, List. Philipp. Birds.* p. 24 (1890); *Slas. J. F. O.* 1890, p. 145.
- Janthanas luzoniensis*, *Schleg. Mus. P.-B. Columbr.* 75 (1873); *Sclat. Ibis.* 1874, p. 455.
- Carpophaga griseigularis*, *Tris r. Cat. Coll. B.* p. 42 (1889).

Columba grisigularis, *Salv. Cat. B. M.* 21, p. 313 (1893).
Hab. Luzón, Guimaras, Negros, Valencia, Basilan, Mindanao, Joló; Borneo.

3. *C. cinerea*, *Sav.*

Fourterelle cendréé de l'île de Luzon, *Sonn. Voy. Nov. Guin.* p. 52 pl. 22 (1776); *Wald. Tr. Zool. Soc.* 9 p. 220 (1875).
Luzonian turtle, *Lath. Syn.* ii. 2, p. 646, var. c. (1783).
Columba cinerea, *Scopoli. Del. Fl. et Faun. Insulbr.* ii. 1700 p. 94 n.^o 93.
C. turtur, *d. T. Iuzoniensis*, *Gm. S. N.* i. 2 1788 p. 780.
Fourterelle de l'île de Luçon, *Bonn. Tabl. Enc. Orn.* p. 248, pl. 84 t. 4 1790.
C. turtur, *d. Lath. Ind. Orn.* ii. p. 606 (1790); *Steph. Gen. Zool.* 17, p. 73, 1819.
C. turtur, *var. d. Tem. Pig. et Gall.* i. p. 479 (1813).
Fourterelle grise de l'île de Luçon, *Vieill. N. D.* 20, p. 381, (1818).
C. turtur, *var. d. Wagl. Syst. Av. Columba sp. dubia* o. (1827).
C. phainocorhyncha, *Wagl. Ibis*, 1829, p. 745 (1829).
C. cinerea, *part. Bp. Conspl. Av.* ii. p. 61 (1854); *Wahl. Ibis*, 1865, p. 392; *id. J. F. O.* 1866, p. 213.
C. cinereus, *Rechnb. Tauben*, 1, p. 70 *part.* 1862, ii. p. 174; *Nevit. Suppl.* t. iii. 4. 25 (1862); *v. Mart. J. F. O.* 1869, p. 24; *G. R. Gr. Hand-l.* ii. p. 238, n.^o 9312 *part.* (1870); *Gibb. Thes. Orn.* iii. p. 726 (1877); *Salv. Cat. B. M.* 21, p. 631 (1893).
Hab. Luzon.

Fam. MACROPÍGIDAS.

1. Gen. TURACÉNA, Br.

1. *T. modesta?* ♂♂ N. v. Imamata. (M. S. 1.)

Columba modesta, *Tem. Pl. Coll.* 552. (1835).
Turacéna modesta, *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 59, (1854); *Salv. Cat. B. M.* 21, p. 334. (1893).
Hab. Paragua.

2. Gén. MACROPYGIA, Sw.

2. *M. tenuirostris*, *Gr. ♂♂ N. v. Batig-lauin* (M. S. T.)

Columba phasianella, *Tem. Pl. Coll.* 100; *Steph. Gen. Zool.* xiv. (1826); *Desm. Dict. Sc. Nat.* xl. p. 357 (1826); *Wagl. Syst. Av. Columba sp.* 36 (1827); *Less. Tr. d'Orn.* p. 473 (1831); *Knip & Prev. fig.* ii. pl. 52 (1843).
Macropygia phasianella, *Sw. Class. B.* ii. p. 349 (1837).
Turtur amboinensis, *part.*, *Less. Compl. de Buff. Ois.* viii. p. 6, (1837); *id. op. cit. 2nd. ed.* p. 287 (1838).
Macropygia amboinensis, *part.*, *G. R. Gr. List. Gen. B.* p. 38

(1840); *id. Gen. B.* p. 471, n.^o 1 (1840); *Rehn's Synt.* I., f. 1304 (1847).

M. tenuirostris, *G. R. Gr.* MSS.; *Bp. Conspl. Av.* II., p. 57 (1854); *id. Compt. Rend.* xxix, p. 1111 (1854); *M.* p. 219, n.^o 109 (1855); *id. Coup. d'avl. Ordre fig.* pp. 27, 57, n.^o 101 (1855); *G. R. Gr.* *Lst. B. Brit. Mus. Columba*, p. 39 (1860); *Rehn's Tabben*, i., p. 87, t. 251, f. 1304 (1862); *Wall. Ibis*, 1866, p. 366; *id. J. f. O.* 1866, p. 282; *Mart. J. J. O.* 1866, p. 27; *G. R. Gr.* *Haug-Lst.* ii., p. 237, n.^o 9294 (1870); *Wald. Ibis*, 1873, p. 315; *Schl. g. Mus. P.-B. Columba*, p. 106 (1873); *Sousa. Mus. Nae. Lish. Columba*, p. 15 (1873); *Geb. Th. Orn.* II., p. 518 (1875); *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix., p. pp. 212, 412 (1875); *Sharpe, Ibis. Linn. Soc.*, 2nd. ser., *Zool.* i., p. 347, 253 (1876); *Tweedd. P. Z. S.* 1878, p. 288; *Sh. 17*; *P. Z. S.* 1879, p. 317; *Tweedd. Orn. Works*, pp. 247, 382, 412, 594 (1881); *Wardl. Rams. Tweedd. Orn. Works*, *App.* p. 659 (1881); *Salv. Cat. B. Strickl. Coll.* p. 546 (1882); *Geb. Item. P. Z. S.* 1883, p. 271; *Sharpe, Ibis.* 1883, p. 203; *Bios. Ornith.* 1883, p. 317; *Trist. Cat. Coll. B.* p. 39 (1889); *Everett, Journ. Str. Br. R. As. Soc.* 1889, p. 193; *Whitch. Ibis.* 1890, p. 57; *Wardl. Rams. Ibis.* 1890, p. 221; *Steere, List.* p. 24; *Hartert, Kat. Vogels.* p. 485 (1891); *Salv. Cat. B.* M. 21, p. 346 (1893).

M. eurycrea, *Tweedd. P. Z. S.* 1878, p. 288, p. 952, 1879, p. 73; *id. Orn. Works*, pp. 586, 594, 643, 651 (1881); *Wardl. Rams. Tweedd. Orn. Works*, *App.* pp. 659, 667 (1881); *Steere, List.* p. 24 (1890).

Hab. Luzón, Manila, Cagayan, Mindoro, Bacó, Negros, Valencia, Paniquí, P. Princesa, Calamities, Culion, Samar, Mindoro, Bacó, Mindanao, Zamboanga, Basílan, Joló, Tawi-tawi.

Fam. PERISTERIDAS.

Subfam. TURTURINAS.

I. Gén. HOMOPELIA, SALV.

1. H. rostrata, (*Bp.*) N. v.

(M. S. T.)

Columba picturata, var. *Prev.* fig. ii., p. 66 pl. 35 (1838-43).
Turtur rostratus, *Bp. Conspl. Av.* II., p. 62 (1854); *id. Rehn's Lst.* pp. 16, 219, n.^o 179 (1855); *id. Coup. d'avl. Ordre fig.* pp. 39, 57, n.^o 179 (1855); *Hartert. Orn. Beitr. Faun. Madag.* p. 67 (1861); *Reinh. Tabben*, i., p. 71 (1862); *E. Newt. P. Z. S.* 1867, p. 344; *id. Ibis.* 1867, pp. 336, 337, 354 f. wing and Load, pp. 355, 359; *J. N. & Ibs.* 1868, p. 477; *G. R. Gr.* *Haug-Lst.* II., p. 238, n.^o 6320 (1870); *Schleg. Mu. P.-B. Columba*, p. 130 (1873); *Orst. Tull. Soc. Philom.* 1871, p. 180; *Shell. Ibs.* 1873, p. 320; *Trist. Cat. Coll. B.* p. 58 (1889); *Salv. Cat. B.* II., 21, 1893, p. 413.

I. picturatus, *part.*, *Schleg. P. Z. S.* 1866, p. 424; *Schleg. Thes. Orn.* III., p. 727 (1877), & *Poll. Rech. Faun. Madag.* Ois. p. 113 (1868); *p. Geb. Thes. Orn.* III., p. 727, (par c) (1877).
Hab. Marianas, Seychelles.

*

2. *H. picturata*, Temm.

- Columba picturata*, Temm. *Pig. et Gallin.* I. pp. 315, 480 (1813); *Vieill. N. D.* xxvi. p. 357 (1818); *Steph. Gen. Zool.* xi. p. 85 (1819); *Vieill. Enc. Meth.* i. p. 383 (1823); *Temm. Pl. Col.* 242 (livr. 41, 1823); *Steph. Gen. Zool.* xiv. p. 280 (1826); *Desm. Dict. Sc. Nat.* xl. p. 352 (1826); *Vagl. Syst. Av. Columba, sp. 61* (1827); *Less. Compl. de Buff., Ois.* viii. p. 50 (1837); *id. op. cit. 2nd ed.* p. 282 (1838); *Knöp. & Prev. Pig.* ii. pl. 35 (1838-43); *G. R. Gr. Gen. B.* ii. p. 470, n.^o 29 (1844); *Rchb. Syn. Av.* f. 1260 (1847).
- Columba dufresni*, Leach, *fide Steph. Gen. Zool.* xi. p. 77, pl. 3 (1819).
- Peristera picturata*, Boie, *Isis*, 1828, p. 327.
- Columba picta*, part., *Less. Tr. d' Orn.* p. 473 (1831).
- Turtur versicolor*, Kitt. (*nec Columba versicolor*, Kittl.) *fide Rchb. Syn. Av.* f. 2 (1847), et *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 61 (1854).
- I. *picturatus*, Blyth, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 236, n.^o 1433 (1849); *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 61 (1854); *id. Compt. Rend.* xl. pp. 16, 219, n.^o 178 (1855); *id. Coup. d'ail Ordre Pig.* pp. 30, 57, n.^o 178 (1855); *G. R. Gr. List B. Brit. Mus. Columba*, p. 42 (1856); *Hartt. J. f. O.* 1860, p. 101; *id. Orn. Beitr. Faun. Madag.* p. 66 (1861); *Rchb. Tauben*, i. p. 70, f. 224, f. 1260 (1862); *Maill. Nat. sur l'ile Réun.* p. 163 (1862); *Sclat. P. Z. S.* 1863, p. 164; *Roch & E. Newt. Ibis*, 1863, p. 167; *E. Newt. Ibis*, 1863, p. 454; *Pollen. N. T. D.* i. p. 319 (1863); *Cögnerel. Bull. Soc. Acclim. Réun.* p. 19 (1864); *Schleg. P. Z. S.* 1866, p. 424; *E. Newt. Ibis*, 1867, pp. 346, 354, 355, 359; *Grand. Rev. et. Mag. de Zool.* 1867, p. 418; *Schleg. & Poll. Rech. Faun. Madag. Ois.* p. 113 (part.) (1868); *A. Newt. Ibis*, 1868, p. 477; *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 238, n.^o 9314 (1870); *Sclat. P. Z. S.* 1871, p. 693; *Schleg. Mus. P.-B. Columba*, p. 129 (1873); *J. Milne-Edw. Ann. Sc. Nat.* (5) xix. p. 14, pl. xii. f. 2. (1874); *Bartl. P. Z. S.* 1875, p. 67; *Hartt. Vog. Madag.* p. 268 (1875); *Gieb. Thes. Orn.* iii. p. 727 (part.) (1877); *Oust. Bull. Soc. Philom.* 1878, p. 178; *Shell. Ibis*, 1883, p. 317; *Sclat. List. Vert. An.* 8th ed. p. 452 (1883); *Milne-Edw. & Grand. Hist. Nat. Madag.* xii. *Ois.* p. 400, pls. 185, 186, 187 (1885); *Tristr. Cat. Coll. B.* p. 38 (1889); *Heine & Rchb. Nomencl. Mus. Hein. Orn.* p. 77 (1890); *Sibree. Ibis*, 1891, p. 564; *Salv. Cat. B. M.* 21, 1893, p. 409.
- Turtur prevostianus*, *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 62 (1854) (—*C. picta*, *Mus. Paris*, *Quoy & Gaimard*); *id. Compt. Rend.* xl. pp. 16, 219, n.^o 180 (1855); *id. Coup. d'ail Ordre Pig.* pp. 30, 57 n.^o 180 (1855); *G. R. Gr. List B. Trop. Isl.* p. 43 (1859); *Hart. Orn. Beitr. Faun. Madag.* p. 67 (1861); *Rchb. Tauben*, i. p. 71 (1862); *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 238, n.^o 9301 (1870); *Gieb. Thes. Orn.* iii. p. 227 (1877); *Oust. Bull. Soc. Philom.* 1878, p. 170; *Wiglesw. Aves Polynes.* p. 54 (1891).
- I. *pictus*, *Mus. Paris*, *fide Oust. Bull. Soc. Philom.* 1878 p. 179.
- I. *picturatus*, var., *Tristr. Cat. Coll. B.* p. 38 (1889).
Hab. Marianas; Mauricio, Madagascar.

2 Gén. STREPTOPELIA, Bl

3. *St. dussumieri*. (*Ten*) C. O. N. v. Bato-batong de collar. (M. S. T.)

Columba dussumieri, Tem. Pl. Col. 188 (1823; Steph. Gen. Zool. xiv. p. 285 (1826); Desm. Dict. Sc. Nat. xl. p. 348 (1826); Wagl. Syst. Av. Columba, sp. 99 (1827); Less. Tr. d'Orn. p. 473 (1831); id. Compl. de Buff. O's. viii. p. 54 (1837); id. op. cit. 2nd. ed. p. 283 (1838); Prév. & K'np., Pig. ii. pl. 20 (1838-43).

Colombe dussumieri, Quoy & Gaim. Vog. Uran., Zool. i. p. 35 (1824).

Peristera dussumieri, Boëe, Is's. 1828, p. 327.

Furtur dussumieri, G. R. Gr. Gen. B. ii. p. 472, n.^o 12 (1844); Rehn. Syn. Av. f. 1360 (1847); G. R. Gr. List. B. Br. Mus. Columba, p. 45 (1856); Rehn. Tauben, i. p. 71, t. 246, f. 1360 (1862); Wall. Ibis, 1865, p. 392; id. J. F. O. 1866, p. 283; G. R. Gr. Hand-list, ii. p. 239, n.^o 9331 (1870); Schleg. Mus. P.-B. Columba, p. 120 (1873); Wardl. Trans. Zool. Soc. ix. pp. 218, 251 (1875). Sharpe, Trans. Linn. Soc. (2) i. pp. 347, 353 (1876); G'eb. Thes. Orn. iii. p. 726 (1877); Tweed. P. Z. S. 1877, pp. 700, 705, 833, 1878, p. 288, p. 354, p. 711, p. 952; Tweed. Orn. Works, pp. 382, 383, 412, 525, 538, 559, 594, 600, 623, 628, 643 (1881); Wardl. Rans. Pw odd. Orn. Works, p. 659 (1881). Sharpe P. Z. S. 1881, p. 790; Guillem. P. Z. S. 1885, p. 272; Blas. Ibis, 1885, p. 374; id. Orns. 1889, p. 317; Everett, Journ. Str. Br. R. As. Soc. 1889, p. 193; Trior. Cat. Coll. B. p. 38 (1889); Whiteh. Ibis, 1890, p. 16; Steere, List. p. 24 (1890); Hartert. Kat. Vogelsamml. p. 118 (1891); id. J. f. O. 1891, p. 309 Wiglesw. Aves Polyn. p. 54 (1891); Salv. Cat. B. M. 21, p. 423 (1893).

Streptopelia dussumieri, Bp. Conspl. As. ii. p. 65 (1854); id. Compt. Rend. xl. i. p. 18, 210, n.^o 191 (1855); id. Coup. d'ail Ordre Pig. pp. 31, 57, n.^o 191 (1855); G. R. Gr. Hand-list, ii. p. 269, n.^o 9331 (1870); Sousa, Mus. Nac. Lisb. Columba, p. 17 (1873).

S. guimardi, Bp. Conspl. Av. ii. p. 66 (1854); id. Conspl. Rend. xl. pp. 18, 219, n.^o 192 (1855); id. Coup. d'ail Ordre Pig. pp. 31, 57, n.^o 192 (1855); Rehn. Tauben, i. p. 76 (1862); G. R. Gr. Hand-list, ii. p. 239, n.^o 9333 (1870).

Furtur gai ardi, G. R. Gr. List. B. Trop. Isl. p. 43 (1859). T. dussumieri, v. Mart. J. F. O. 1871, p. 24.

T. guimardi, Wardl. Trans. Zool. Soc. ix. p. 219 (1875); Tweed. Orn. Works, p. 219 (1881).

Hab. Luzon, Manila, Montalban, S. Mateo, Laguna, Tayabas, Batangas, Bulacan, Cigayan, Ilocos, Mindoro, Marinduque, Bohol, Romblon, Tablas, Sibuyan, Calamianes, Negros, Siquijor, Masbate, Cebú, Panay, Guimaras, Samar, Leyte, Amparo, Dumanegue, Valencia, Mindanao, Surigao, Basilan, Tawi-tawi, Buan, Joló, Marianas.

4. *St. humilis*, *Columba* & N. v. *Baudouin*. — 13.
- Columba humilis*, (*Tem. Pl. Col.* 259 (3) n. 11. *Tim.* 258 (324); *Steph.* *Gen. Zool.* xiv. p. 280 (1826); *Desm. Dct. Sc. Nat.* xl. p. 350 (1826); *Wahl. Syst. Av.* *Columba*, sp. 95 (1827); *Knip. & Prev. Pig.* ii. pl. 1838-43; *Hume, J. F. O.* 1870, p. 170.
- Peristera humilis*, *Boie*, *Ib's.* 1828, p. 327.
- Turtur humilis*, *G. R. Gr.* *Gen. B.* ii. p. 472, n.º 7 (1844); *Re nb.* *Syn. As.* i. 1370 (1847); *Swinh.* *Ib's.* 1805, p. 63, 1807, p. 49, 1862 p. 261, 1863, p. 397; *id.* *P. Z. S.* 1804, p. 366; *Blyth. Monat's App.* p. 362 (1803); *Jord. B. of. Ind.* iii. p. 482 (1804); *Swinh.* *Ibis*, 1805, pp. 355, 541, 542; *Wall.* *Ibis*, 1805, pp. 392, 399; *id.* *J. J. O.* 1860, p. 283; *Blyth.* *Ib's.* 1807, p. 151; *Boie.* *Ib's.* 1867, p. 332; *Slat.* *P. Z. S.* 1809, p. 627; *Swinh.* *Ibis*, 1870, pp. 80, 356; *id.* *Ib's.* 1871, p. 397; *Schleg.* *Mus. P.-B. Columba*, p. 125 (1873); *Hume, Str. Feath.* ii. p. 299 (1874); *Swinh.* *Ibis*, 1875, p. 125; *Hume, Nests and Eggs*, p. 507 (1875); *Wald. Trans. Zool. Soc.* ix, p. 219 (1875); *id.* *in. Phys'k's B. Burm.* p. 145 (1875); *Hume, Str. Feath.* iii. p. 165 (1875); iv. p. 292 (1876); *Armitiz. & Hume, Str. Feath.* iv. p. 338 (1876); *Ta z Bull. Soc. Zool. Fr.* i. p. 24 (1876); *Sharpe, Tr. Linn. Soc.* (2) *Zool.* i. pp. 347, 353 (1876); *Gieb. Thes. Orn.* iii. p. 272 (1877); *D'Orb. & Oust. O. C. Chne.* p. 388 (1877); *Hume & David's. Str. Feath.* ix. p. 423 (1878); *Hume, Str. Feath.* viii. p. 210 (1879); *Brinch Sf.* *Feath.* ix. p. 194 (1880); *Tweedt. Orn. Works*, p. 383 (1881); *Warbl. Rams.* *Ibid.* p. 659 (1881); *Tacz. J. F. O.* 1881, p. 187; *Oates, Str. Feath.* x. p. 235 (1882); *id. Brds. of. Br't. Burm.* ii. p. 294 (1883); *Blakist. Amend. List. B. Jap.* p. 43 (1884); *Seebh.* *Ib's.* 1884, p. 179; *Marsh.* *Ib's.* 1884, p. 421; *S'v'n. Pr. U. S. Nat. Mus.* 1887, p. 428; *Hume, Soc. Feath.* xi. p. 229 (1888); *Tr'str. Cat. Coll. B.* p. 38 (1889); *Salvat. Ann. Mus. Civ. Gen.* (2) vii. p. 494 (1889); *Stejn.* *List.* p. 24 (1890); *Hartl. Abh. Nart. Ver. Brem.* x. p. 400; *Seebh. B. Jap. Erp.* p. 162 (1890); *Styan.* *Ib's.* 1891, pp. 328, 489; *Hartert, Kat. Vogel'samml.* p. 188 (1891); *id. J. f. O.* 1891, p. 300; *Salv. Cat. B. M.* 21, p. 434 (1893).
- Columba* ? *terrestris*, *Timm.* *jde Rehnb. Syn. As.* *Columbraria*, p. 3 (1847).
- Streptopelia humilis*, *Bp. Conspt. Av.* ii. p. 66 (1854); *id. Compt. Rend.* xl. pp. 18, 219, n.º 193 (1855); *id. Compt. d'ail Ord'e P'g.* pp. 32, 57, n.º 193 (1855); *id. Compt. Rend.* xli. p. 659 (1855); *Rehnb. Trubetzk.* i. p. 76, t. 247, f. 1370 (1852); *G. R. Gr. Hand-lst.* ii. p. 239, n.º 9331 (1870).
- Turtur terrestris*, *Mercatorum*, *jde Bp. Conspt. Rend.* xl. p. 18 (1855); *id. Compt. d'ail Ord'e P'g.* p. 32 (1855).
- Columba humilis*, *Schrenck.* *Vog. d. Amur-L.* p. 284 (1860).
- Turtur humilis*, *v. Mart.* *J. F. O.* 1860, p. 24.
- T. humilior*, *Hume, Proc. As. Soc. Beng.* 1874, p. 241; *id. Str. Feath.* iii. pp. 299, 280 (1875).
- T. tranquebaricus*, *Blyth. B. Burm.* p. 145 (1875).
- T. sp.*, *Blakist. & Pryer, Tr. As. Soc. Jap.* x. p. 120 (1882).
- Hab.* Luzon, Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan, Cagayan, Mindoro, Marinduque, Samar; Cochinchina, Formosa.

3. Gen. SPILOELIA. Sundev.

5. Sp chinensis. Scop. ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Tourtelle grise de la Chine, Sonn. Voy. Ind. ii. p. 172, pl. 10 (1782).

Chinese grey Turtle, Lath. Synt. ii. 2, p. 649, n.^o 42 (1783).

Columba chinensis, Scop. Dic. Flor. et Faun. Insular. p. 94, n.^o 90 (1786).

C. risoria, var. B. Gm. S. N. i. p. 787 (1788); Lath. Ind. Orn. ii. p. 608 (1790).

C. tigrina, part., Temm. Pig. et Gallin. i. pp. 317, 481 (1818); Steph. Gen. Zool. xi. p. 78 (1819); Desm. Dic. Sc. Nat. xl. p. 347 (1826); Wagl. Syst. Av. Columba, sp. 96 (1827); Less. Compt. de Buff., O.s. viii. p. 51 (1837); id. op. cit. 2nd ed. p. 213 (1838).

Turtur chinensis, G. R. Gr. Gm. B. ii. p. 472, n.^o 9 (1844); Blyth. J. A. S. B. xiv. p. 875 (1845); id. Ann. & Mag. N. II. xix. p. 185 (1847); id. Cat. B. Mus. J. A. S. B. p. 239, n.^o 1844 (1849); Bp. Conspl. i. p. 63 (1854); id. Compt. R. n. xl. p. 17, p. 10, n.^o 183 (1855); id. Coubr. Part Oiseaux P. Z. pp. 39, 57, n.^o 183 (1855); Blyth. J. A. S. B. xxiv. p. 203, p. 480 (1855); Cass. Natur. Parry's Explor. ii. p. 244 (1856); Swinh. Ibis, 1860, p. 62, 1861, p. 49, 1862, p. 268; Reichenb. Tauben, i. p. 72 (1862); ii. p. 874; Av. & Subsp. t. iii. f. 26 (1862); Swinh. P. Z. S. 1863, p. 306; id. Ibis, 1863, p. 397, 1865, p. 549; Wall. Ibis, 1865, p. 391; id. J. f. O. 1869, p. 283; Swinh. Ibis, 1866, p. 292, 1867, p. 395, 1870, p. 356; Gr. R. Gr. Hand-list ii. p. 238, n.^o 9380 (1870); Swinh. P. Z. S. 1871, p. 397; Schleg. Mus. P.-B. Columbae, p. 127 (1873); Gavr. P. Z. S. 1874, p. 256; David & Onst. Oise. Chine, p. 386; (1877); Gavb. Thes. Orn. iii. p. 276 (1877); Finch. Ibis, 1880, p. 78; Kelby. Ibis, 1881, p. 52; Selater. Ibis, 1882, p. 435; Mill. J. f. O. 1882, p. 432; Selat. List Vertebr. 4th ed. p. 453 (1883); Seebk. Ibis, 1884, p. 266; Tristr. Citt. Coll. B. p. 38 (1886); Hartl. Abh. nat. Ver. Brem. vi. p. 406 (1889); Sylam. Ibis, 1891, pp. 328, 498; Selat. Cat. B. M. 21, p. 439 (1893).

Turtur tigrinus, Hartl. Syst. Verz. p. 99 (1844).

T. pinensis, Blyth. J. A. S. B. xxiv. p. 480 (1855).

Spilopelia chinensis, Sundev. Meth. nat. Av. disp. p. 100 (1872).
Hab. Luzón, Hocos, Cagayan; Formosa.

6. Sp. tigrina. Tem. ♂♂ Lancker.

(M. S. T.)

Columba tigrina, Tem. et Knip. Pig. i. pl. 43 (1808-81); Temm. Pig. et Gallin. i. pp. 387, 481 (1813); Wagl. N. D. xxvi. p. 380 (1818); Steph. Gen. Zool. xi. p. 78 (1819); Horsf. Trans. Linn. Soc. xiii. p. 183 (1821); Desm. Dic. Sc. Nat. xi. p. 347 (1826); Wagl. Syst. Av. Columba, sp. 96 (1827); Less. Td. d'Orn. p. 473 (1831); id. Compt. de Buff., O.s. viii. p. 51 (1837); id. op. cit. 2nd ed. p. 283 (1838); S. Müll. Ueb. Linke. Volkensb. p. 109 (1839-44); Blyth. Hand-l. Dairk. i. p. 494

- (1857); Rosenb. *Reist. nach Geslinskij*, p. 8 (1875); Gallin. P. Z. S. 1875, p. 489.
- ? *G. turtur*, var., Raffl. *Tr. Linn. Soc.* xiii. p. 388 (1822).
- Peristera suratensis*, Boie, *Isis.* 1828, p. 327.
- Columbina inornata*, G. R. Gr. *List. Gallinar. B.* M. p. 13 (1844).
- Turtur chinensis*, G. R. Gr. B. ii. p. 472, n.^o 9 (1844); Reichenb. *Syn. Av.* fl. 1361-62 (1847); Bp. *Compt. Av.* ii. p. 63 (1854); id. *Compt. Rend. sl.* pp. 17, 214, n.^o 183 (1855); id. *Coup. d'ail Ordre Pig.* pp. 30, 57, n.^o 183 (1855); G. R. Gr. *List. B. Brit. Mus. Columba*, p. 42 (1856); Wall. *Ibis*, 1890, p. 147; Petz. *Novar. Reis.* *Vog.* p. 108 (1865); G. R. Gr. *Hand-list.* ii. p. 238, n.^o 9316 (1870); Sousa, *Mus. Nac. Lisb. Columba*, p. 16 (1873).
- Columba chinensis*, Thienem. *Forstpl.* p. 59, t. xi. f. 6 (1840).
- Turtur suratensis*, Blyth, J. A. S. B. xv. p. 372 (1846); id. *Ann. & Mag. N. H.* xix. p. 184 (1847); Gould, P. Z. S. 1889, pp. 150, 151; G. R. Gr. P. Z. S. 1860, p. 361; Schomb. *Ibs.* 1864, p. 252.
- T. tigrinus*, Blyth, J. A. S. B. xxiv. pp. 263, 410 (1855); Moore, P. Z. S. 1859, p. 467; Reichenb. *Tauben*, i. p. 72, t. 24b, ff. 1861-62 (1862), ii. p. 174 (1862); Schütz. P. Z. S. 1863, p. 221; Blyth, *Monat's Spiss.* p. 362 (1863); Wall. J. J. O. 1865, p. 283; Swinh. *Ibis*, 1866, p. 292; Blyth; *Ibis*, 1867, p. 150; Beauf. *Ibis*, 1868, p. 376; Blanf. *Ibis*, 1870, p. 469; Blyth, J. A. S. B. xxxix. pt. 2, p. 332 (1870); Ball. *Str. Feath.* i. p. 80 (1872); Schleg. *Mys. P.-B. Columba*, p. 127 (1873); Blyth. & Wald. B. of. Burm. p. 145 (1875); Brüggem. *Abh. naturw. Ver. Brem.* v. p. 87 (1876); Petz. *Verh. z.-b. Ges. Wiss.* 1879, p. 720; Gieb. *Tues. Orn.* iii. p. 728 (1877); Oates, *Str. Feath.* v. p. 164 (1877); Anders. *Journ. Exped.* p. 665 (1878); Hume, & Davis *Str. Feath.* vi. p. 422 (1878); Hume, *Str. Feath.* viii. p. 110 (1879); Rosenb. *Malay. Archip.* p. 407 (1879); Bingsh. *Str. Feath.* ix. p. 194 (1880); Kelt. *Ibis*, 1881, p. 528; Bock, *Ibis*, 1882, p. 475; Müll. J. f. O. 1882, pp. 431, 432; Salv. *Cat. B. Strickl. Coll.* p. 545 (1882); Oates, *Str. Feath.* x. p. 235 (1882); id. *B. Burm.* ii. p. 260 (1883); Snell. *Sum.—Exp.* *Vogels.* p. 48 (1884); Forderm. N. T. N. J. xliv. p. 228 (1844), xlv. p. 404 (1885); Müll. J. f. O. 1885, p. 160; Hume, *Str. Feath.* xi. p. 299 (1888); Tr. *str. Cat. Coll. B.* p. 39 (1889); Hartst. J. f. O. 1889, p. 376; Salv. *Cat. B. M.* 11. p. 442 (1893).
- Metriopelia inornata*, Bp. *Compt. Rend.* ii. p. 76 (1854); id. *Compt. Rend.* xl. pp. 24, 220, n.^o 225 (1855); id. *Coup. d'ail Ordre Pig.* pp. 40, 58, n.^o 225 (1855); Burm. *Syst. Vog. Tr. Bras. Vog.* ii. p. 301 (1856).
- Melopelia inornata*, Bp. *Compt. Rend.* xlvi. pp. 945, 949 (1856).
- Peristera inornata*, G. R. Gr. *List. B. Brit. Mus. Columba*, p. 53 (1856); Petz. *Orn. Bras.* pp. 278, 451 (1856).
- Metropelia inornata*, Reichenb. *Tauben*, i. p. 18 (1852); G. R. Gr. *Hand-list.* ii. p. 242, n.^o 9371 (1870).
- Turtur tigrina*, Wall. P. Z. S. 1893, p. 481; id. *Ibis*, 1895, p. 391; Finsch *Neu-Guin.* p. 178 (1895); Wald. *Tr. Zool. Soc.* vii. p. 85 (1872); id. *Ibis*, 1872, p. 331; Hume, *Str. Feath.* i. p. 401 (1873); id. *Nests & Eggs.* p. 506 (1873); id.

- Str. Feath.*, ii. pp. 269, 481 (1874); iii. pp. 14, 164 (1875); *Armstr. Str. Feath.*, iv. p. 337 (1876); *Hume, Str. Feath.*, vi. p. 424 (1876); *Anders. Journ. Expéd.* p. 665 (1878); *Meyer, Ibis*, 1879, p. 137; *Léiraud. Bull. Com. Agr. et Ind. Cochinch.* (3) i. p. 142, n.^o 255 (1879); *Sharpe, Ibis*, 1888, p. 203; *Whitech. Ibis*, 1890, p. 57.
- T. suratensis, *Ibis*, 1864, p. 252; *Swinh. Ibis*, 1866, p. 299; *Spilogelia tigrina*, *Sundev. Meth. nat. Av. disp. Tent.* p. 100 (1872); *Salvad. Cat. Ucc. Born.* p. 290 (1874); *id. Ann. Mus. Civ. Gen.* vii. p. 673 (1875), ix. p. 205, n.^o 70 (1876); *Ficettil. Ibis*, 1877, p. 322; *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* xiv. p. 247 (1879); *Sharpe, P. Z. S.* 1881, p. 799; *Meyer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, 1881, pp. 766, 769, 772; *Salvad. Orn. Pap. c Mol.* iii. p. 151 (1882); *Blas. J. f. O.* 1883, p. 139; *Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn.* i. pp. 115, 215 (1884); *Günther. P. Z. S.* 1885, p. 510, p. 558; *Büttik. Not. Leyd. Mus.* ix. p. 76 (1885); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* (2) ix. p. 490 (1890); *Vorderm. N. T. N. I.* xlix. p. 413 (1889), I. p. 508 (1890); *Salvad. Mem. R. Ac. Sc. Tor.* (2) xlii. p. 63 (1891); *Vorderm. N. T. N. I.* ii. pp. 401, 402 (1892).
- Chimæpelia inornata*, *Gieb. Thes. Orn.* i. p. 634 (1872).
- Turtur striatus*, *Schleg. Mus. P.-B. Columba*, p. 127 (1873).
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Calamianes, Cuyo; Célebes, Molucas.

Subfam. GEOPELLINAS.

4 Gén. GEOPELLIA, Sw.

7 *G. striata* (*Lin.*) ♂♀ N v. Bato-batong camumu (M. S. T.)

- Transverse striped or barred dove, *Edie. Bird.*, i. pl. 16 (1750). Dove from China, *Alb. Orn.* iii. p. 43, t. 46.
- Turtur sinensis striatus*, *Bris. Orn.* i. p. 107 (1760).
- T. indicus striatus*, *Bris. Orn.* i. p. 109 (1760).
- Columba striata*, *Linn. S. N.* i. p. 282, n.^o 18 (1766); *Jacq. Beitr.* p. 34 n.^o 28, t. 15 (1784); *Gm. S. N.* i. 2, p. 775, n.^o 18 (1788); *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 608, n.^o 53 (1790); *Bonn. Enc. Meth.* p. 243, pl. 74 f. 2 (1790); *Viell. N. D.* xxvi. p. 384 (1818); *Wagl. Syst. Av. Columba*, sp. 106 (1837); *Thielem. Fortpfl.* p. 60, t. xi. f. 10 (1846); *Schleg. Handb. Dierk.* i. p. 404 (1857).
- Columba sinica*, *Linn. S. N.* i. p. 284, n.^o 28 (1760); *Gm. S. N.* i. p. 783, n.^o 28 (1788); *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 608, n.^o 52 (1790); *Tem. Pig. et Gallin.* i. pp. 373, 472 (1813); *Viell. N. D.* xxvi. p. 384 (1818); *Steph. Gm. Zool.* xi. xi. p. 68 (1819); *Desm. Dict. Sc. Nat.* xl. p. 377 (1820).
- Fourrâtre rayée des Indes, *Buff. Hist. Nat. Ois.* ii. p. 557 (1771).
- T. rayée de la Chine, *Buff. op. cit.*
- Petite tourterelle de Quêda, *Szani. Voy. aux Ind. et à la Chine*, ii. p. 177 (1770).

- Striated twete, *Lath.*, *Syn.* ii. 2, p. 650, n. 43 (1783).
Bowed turtle, *Lath.*, *op. cit.* n.^o 44.
Malaca turtle, *Lath.*, *op. cit.* p. 661, n.^o 60.
Columba malaccensis, *Gm. S. N.* ii. p. 788, n.^o 68 (1788); *Lith. Ind. Orn.* ii. p. 612, n.^o 69 (1790); *Bonn. Enc. Méth.* p. 523 (1790); *Temm. & Knip. Pig.* i. pl. 47 (1808-11); *Temm. Tem. Pig. et Gallin.* i. pp. 339, 484 (1873); *Vieill. N. D.* xxvi. p. 313 (1818); *Steph. Gen. Zool.* xi. 1, p. 88 (1819); *Dict. Sc. Nat.* xl. p. 353 (1826); *S. Müll. Verh. Landen Volkenk.* p. 109 (1839-44); *Schleg. Handl. Dierk.* i. p. 404 (1857).
Columba bantamensis, *Sparrm. Mus. Carls. fasc.* iii. t. 57 (1788); *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 615, n.^o 77 (1790); *Bonn. Enc. Méth.* p. 256 (1790); *Vieill. N. D.* xxvi. p. 375 (1818); *Horsf. Trans. Zool. Soc.* xiii. p. 183 (1821); *Raffl. Trans. Zool. Soc.* xiii. 2, p. 319 (1822); *Less. Compl. de Buff.*, *Ois.* viii. p. 57 (1837); *id. op. cit.* 2nd ed. p. 284 (1838).
Columba lunulata, *Bonn. Enc. Méth.* p. 251 (1790).
Columba fowat, *Bonn. op. cit.* p. 251 (1790).
Peristera malaccensis, *Boie. Isis.* 1828, p. 327.
Columba moluccensis, *Less. Tr. d'Orn.* p. 474 (1831).
Geopelia lineata, *Sw. Class. B.* ii. p. 348 (1837).
Geopelia striata, *G. R. Gr. List. Gen. B.* p. 58 (1840); *id. Gen. B.* ii. p. 471, n.^o 2 (1844); *App. p. 23* (1849); *Blyth. Cat. B. Mus. A. N. B.* p. 235, n.^o 1428 (1849); *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 94 (1845); *id. Compt. Rend.* xl. pp. 210, 211, 221, n.^o 284; *id. Comp. d'ail Ordre Pig.* pp. 48, 49, 59, n.^o 284 (1855); *G. R. Gr. List. B. Brit. Mus. Columba*, p. 36 (1856); *Moore. P. Z. S.* 1859, p. 466; *Hartl. J. F. O.* 1860, p. 162; *id. Orn. Beitr. Faun. Madag. Not. Ile Réun.* p. 163 (1862); *Blyth. Ibis.* 1862, p. 92; *Id. all. P. Z. S.* 1863, p. 486; *Pollen. N. T. D.* i. p. 319 (1863); *Jerd. B. of. Ind.* iii. p. 480 (1864); *Sclat. P. Z. S.* 1864, p. 839; *Finsch. Neu-Guin.* p. 179 (1865); *Wall. Ibis.* 1865, p. 394, n.^o 115; *id. J. F. O.* 1866, p. 284; *Mart. J. F. O.* 1866, pp. 24, 284; *Schleg. P. Z. S.* 1866, p. 224; *E. Newt. Ibis.* 1867, pp. 342, 359; *Sclat. P. Z. S.* 1869, p. 227; *G. R. Gr. Hand-list.* ii. p. 236, n.^o 9286 (1870); *Wald. Ibis.* 1871, p. 177; *id. Tr. Zool. Soc.* viii. p. 86 (1872); *Sunder. Méth. Nat. Av. disp.* *Tent.* p. 100 (1872); *Schleg. Mus. P.-B. Columba*, p. 131 (1873); *Sousa. Mus. Nac. Lisb. Columba*, p. 23 (1873); *Pelz. Ibis.* 1873, p. 34; *Garr. P. Z. S.* 1873, pp. 468, 630, 1874, p. 256; *Salvad. Cat. Ucc. Born.* p. 298, n.^o 314 (1874); *Gieb. Thes. Orn.* ii. p. 250 (1875); *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix. p. 223 (1875); *Hume. Str. Feath.* iii. p. 323 (1875); *Sharpe. Tr. Linn. Soc.* (2) *Zool.* i. p. 353 (1876); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* ix. p. 205, n.^o 73 (1876); *Hartl. Vog. Madag.* p. 404 (1877); *Tweedd. Ibs.* 1877, p. 322; *Hume & Davis Str. Feath.* vi. p. 423, 123 (1878); *Becc. Ann. Mus. Civ. Gen.* viii. p. 454 (1874); *Salvad. ibid.* xiv. p. 247 (1879); *Hume. Str. Feath.* viii. p. 110 (1879); *Meyer. Ibis.* 1879, p. 138; *Tweedd. Orn. Works.* pp. 112, 186, 386, 412, 503, 513, 525 (1881); *Wardl. Rams. ibid.* p. 659 (1881); *Meyer. Verh. z.-b. Ges. Wien.* 1881, p. 772; *Kelh. Ibis.* 1881, p. 5-8; *Salvad. Orn. Pap. c. Mol.* iii. p. 155 (1882); *Oates. B. of. Brit. Burm.* ii. p. 208 (1883); *Sclat. List. Vert. Au.* 8th

- ed. p. 450 (1883); *Schl. Ibis*, 1883, p. 330; *Snellem. Syst. Exp.*, *Vogels*, p. 49 (1884); *Vorderm. N. T. N. I.* pl. vi. 229 (1884); xlvi. p. 494 (1885); xlvi. pp. 89, 236 (1886); *Büttk. Not. Leyd. Mus.* ix. p. 77 (1886); *Vorderm. N. T. N. I.* xlvi. p. 413 (1886); *Tristr. Cat. Coll. B.* p. 41 (1889); *Schleg. Lat. Minn. & B.* p. 24 (1890); *Salvad. Mem. R. Ac. Sc. Tor.* (2) xlvi. p. 63 (1891); *Hartert. Kat. Vogelsamml.* p. 185 (1891); *Vorderm. N. T. N. I.* li. p. 422 (1892); *Salv. Cat. B. M.* 1893 p. 458.
Geopelia striata, *Rchenb. Av. Syst. Nat.* xxv. (1862); *id. Faunen*. i. p. 26, t. 250 fl. 1385-86 (1862), ii. p. 164 (1862).
G. malaccensis, *Hom. J. F. O.* 1859, p. 364.
Turtur striatus, *Schleg. De Dierent.* p. 207 (1864); *Schleg. & Poll. Rech. Faun. Madag.* p. 162 (1868).
T. malaccensis, *Schleg. & Poll. Rech. Faun. Madag.* p. 155 (1868).
Hab. Luzon, Manila, Navotas, Montalban, San Mateo, Laguna, Bataan, Cagayan, Illocos, Abra; Célebes.

Subfam. FABINAS.

5 Gén. CHALCOPHAPS, Gould.

- S Ch. indica**, (*Linn.*) *Scop. N. v.* Bato-batong chile Sipagan. (M. S. 1.)
- Green-winged dove, *Edw. Birds*, i. pl. 14 1741; *Lath. Syn.* ii. 2. p. 625, n.^o 14 1783.
Palumbus amboinensis, *Briss. Orn.* i. p. 150, t. 15 f. 1 (1760).
Columba indica, *Linn. S. N.* i. p. 284, n.^o 29 (1761); *Penn. Faun. Ind. in Forst. Zool. Ind.* p. 41 (1781); *Jaeg. Beyfer.* p. 35, n.^o 29 (1784); *Gm. S. N.* i. p. 785, n.^o 29 (1788); *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 598, n.^o 16 (1790); *Hayes. Portr. of rare & cur. B.* ii. pl. 79 (1799); *Vieill. N. D.* xxvi. p. 362 (1818).
Tourterelle de Java, *D'Aubent. Pl. Ent.* 177.
Turvert. n.^o 3, *Buff. Hist. Nat. Ois.* ii. p. 556 (1771).
Pigeon vert à tête grise d'Antigue, *Souner. Voy. Nouv. Guin.* p. 112, pl. 66 (1766).
Columba javanensis, *Müll. S. N. Suppl.* p. 133, n.^o 35 (1776); *Cass. Pr. Ac. Philad.* 1804, p. 248.
Blue-crowned turtle, *Lath. Syn. Av.* ii. 2. p. 655, n.^o 52 (1783).
Columba turtur viridis, *Bodd. Tabl. Pl. Ent.* p. 11 (1783).
C. pileata, *Scop. Del. Flor. et Faun. Insubr.* ii. p. 94, n.^o 96 (1786).
C. albicapilla, *Gm. S. N.* i. p. 1775, n.^o 8 (1788); *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 597, n.^o 11 (1790); *Vieill. N. D.* xxvi. p. 368 (1818).
C. javonica, *Gm. S. N.* i. p. 781, n.^o 55 (1788); *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 610, n.^o 60 (1790); *Bonn. Tabl. Enc. Meth.* p. 237 (1790); *Temm. Pis. et Gallin.* pp. 254, 468 (1813); *Vieill. N. D.* xxvi. p. 381 (1818); *Steph. Gen. Zool.* xi. p. 47 (1819); *Horsf. Tr. Linn. Soc.* xiii. 1. p. 183 (1821); *Raffl. Tr. Linn. Soc.* xiii. 2. p. 317 (1822); *Desm. Dict. Sc. Nat.* xl. p. 332 *

- (1826); *Less. Tr. d'Orn.* p. 471 (1831); *id. Compt. de Buff.* *Ois.* viii. p. 43 (1837); *id. op. cit.* 2nd ed. p. 280 (1838); *Ez.* *P. Z. S.* 1839, p. 107; *S. Müll. Verh. Landen Volkenk.* p. 109 (1839-44); *Temm. Tabl. pl. Engl.* p. 18 (1840).
C. cyanocephala, *Gm. S. N.*, i. p. 781, n.^o 56 (1788).
C. cœrul-ocephala, *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 618, n.^o 61 (1799); *Heill. N. D.* xxvi. p. 389 (1818).
C. cyaneopileata, *Bonn. Tabl. Enc. Méth.* p. 238 (1790).
C. griseocapilla, *Bonn. Tabl. Enc. Méth.* p. 238, pl. 77, f. 2 (1790).
C. aurata, *Bonn. Tabl. Enc. Méth.* p. 252 (1790).
C. superciliaris, *Wagl. Syst. Av. Columba, sp.* 80 (1827).
Monormis pelpulchra, *Hodgs. Gray's Zool. Misc.* p. 85 (1844).
Ptilinopus superciliaris, *Hartl. Syst. Verz.* p. 97 (1844).
Chalcocephala indica, *G. R. Gr. List. Gallinæ Brit.* *Mus.* p. 18 (1844); *id. Gen. B.* ii. p. 477, n.^o 1 (1844); *Blyth. J. A. S.* B. xiv. 2, p. 859 (1845); *id. Ann. & Mag. N. H.* xix. p. 69 (1847); *Strickl. ibid.* p. 101 (1847); *Rchnb. Av. Syst. Nat.* p. xxv (1852); *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 91 (1854); *id. Compt. Rend.* xl. pp. 208, 209, 222, n.^o 273 (1855); *Bp. Conspl. d'ordre Pig.* pp. 46, 47, 59, n.^o 273 (1855); *G. R. Gr. List. B. Brit. Mus. Columba*, p. 59 (1856); *Moore. P. Z. S.* 1859, p. 467; *Rchnb. Tauben*, i. p. 46, t. 260 ff. 1441-42 (1862), ii. p. 166 (1862); *Scat. P. Z. S.* 1861, p. 365, 1862, p. 321, 1864, p. 139; *Pelz. Norvar. Reis.*, *Vög.* pp. 109, 102 (1865); *Schleg. N. T. D.* iii. p. 265, 266, 245 (1866); *Blyth.* 16., 1867, p. 151; *G. R. Gr. Hand-List.* ii. p. 244, n.^o 9415 (1870); *Swinh. Ibis.* 1870, p. 356; *Elwes. Ibis.* 1870, p. 528; *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 397; *Wald. Tr. Zool. Soc.* viii. pp. 86, 114 (1872); *Holdsw. P. Z. S.* 1872, p. 467; *Elwes. P. Z. S.* 1873, p. 655; *Hume Nests & Eggs.* p. 509 (1873); *Schlik. Mus. P.-B. Columba.* p. 145 (1873); *Sonsa. Mus. Nac. Lisb. Columba*, p. 23 (1873); *Salvad. Ucc. Born.* p. 299 (1874); *Hume. Str. Feath.* ii. p. 481 (1874); *Wald. Trans. Zool. Soc.* ix. p. 221 (1875); *Hume. Str. Feath.* iii. p. 105 (1875); iv. p. 404 (1876); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* viii. p. 303 (1876); *Brüg. Abh. Nat. Ver. Brem.* v. p. 87 (1876); *Sharpe. Tr. Linn. Soc. Zool.* i. pp. 348, 353 (1876); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* ix. p. 266, n.^o 77 (1876); *Rowl. Orn. Mus.* i. p. 19, pl. 57 (1877); *Oust. & David. Ois. Chine.* p. 384 (1877); *Rosinb. Malav. Archip.* pp. 275, 407 (1878); *Anders. Yunn. Exped.* p. 667 (1878); & *Davids. Str. Feath.* vi. p. 424 (1878); *Hume. Str. Feath.* viii. p. 110 (1879); *Tirant. Büll. Com. Agr. A. Ind. Cochinch.* (3) i. p. 142, 254 (1879); *Meyer. Ibis.* 1879, p. 138; *Legge. B. of Ceyl.* p. 714 (1880); *Kelh. Ibis.* 1881, p. 528; *Oates. Str. Feath.* x. p. 235 (1882); *Vorderm. N. T. N. I.* xlii. p. 228 (1882); *Salvad. Orn. Pap.* 552 (1882); *Oates. B. Brit. Burm.* p. 297 (1883); *Scat. List. Vert. An.* 8th. ed. p. 459 (1883); *Pleske Büll. Acad. Petersb.* xxix. p. 535 (1884); *Vorderm. N. T. N. I.* xlii. p. 230 (1886); *Snedd. Sum. Exp.* i. *Vög.* p. 48 (1887); *Sarvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* (2) iv. p. 61 (1887); vii. 1. 424 (1889); *Vorderm. N. T. N. I.* xlii. p. 413 (1889); *Anders. Journ. Linn. Soc. Zool.* xxi. p. 152 (1889); *Bray. Bull. Soc. Acclim.* 1889,

- p. 57; *Tristis Cat. Coll. B.* pp. 41, 269 (1889); *Steers. I.* p. 24 (1860); *Vorderm. N. T. N. I.* p. 508 (1890); *Hein. & Rehnw. Nomencl. Mus. Hein. Frk.* p. 286 (1890); *Hartert. Kat. Vogelsamml.* p. 188 (1891); *Sulzad. Mem. R. Ac.* p. 7; *Tor. (2) xlii.* p. 64 (1891); *Vorderm. N. T. N. I. Sharp. Ibis.* 1892, p. 442; *Sav. Cat. B. M.* 21, 1893 p. 514.
C. indicus, *Zick.* in *Blyth. J. A. S. B.* sylv. 2, p. 848 (1851); *id. Ann. & Mag. N. H.* xix p. 160 (1847); *Blyth. J. A. S. B.* xv, p. 471 (1849); *id. Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 237, n.^o 1440 (1849); *Gould. P. Z. S.* 1850, p. 149; *Blyth. Monit. App.* p. 362 (1853); *Jerd. B. of Ind.* iii. p. 484 (1864); *Beav. Ibis.* 1897, p. 332; *Blyth. Ibis.* 1868, p. 133; *Ball. J. A. S. B.* xli. pt. 2, p. 2, p. 287 (1872); *id. Str. Feath.* i. p. 80 (1873); *Wald. Ibis.* 1873, p. 315; *Hume. Str. Feath.* ii. pp. 70, 75, 80, 269 (1874); *Ball. Str. Feath.* ii. 1, 425 (1874); *Blyth. & Wald. B. Burm.* p. 147 (1875).
C. javanica, *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 91 (1854); *id. Compt. Rend.* xl, pp. 208, 209, 222, n.^o 274 (1855); *id. Coup. d'œil Ordre Pig.* pp. 46, 47, 59, n.^o 274 (1855); *Rehnb. Tauben.* i. p. 49 (1862); ii. p. 166 (1862); *Wall. P. Z. S.* 1863, p. 486; *id. Ibis.* 1865, p. 393; *id. J. f. O.* 1869 p. 484; *Suska. Mus. Nac. Lish. Columba.* p. 23 (1873).
R. augusta, *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 92 (1854); *id. Compt. Rend.* xl, pp. 209, 221, n.^o 275 (1855); *id. Coup. d'œil Ord. P.* pp. 47, 59, n.^o 275 (1855); *Schleg. N. T. S.* iii. pp. 265, 267 (1860); *Blyth. Ibis.* 1868, p. 133; *G. R. Gr. Hand-list.* i. p. 244, n.^o 9419 (1870); *Ball. Str. Feath.* i. p. 81 (1873).
Peristera bornensis, *S. Müll. Mus. Lugd. Ep. Conspl. Av.* ii. p. (1854); *id. Compt. Rend.* xl, p. 208 (1855); *id. Coup. d'œil Ordre Pig.* p. 47 (1855).
Chalcophaps bornensis, *Bp. Compt. Rend.* xlii, pp. 947, 948, (1856); *Wall. Ibis.* 1865, p. 393; *id. J. f. O.* 1866, p. 284.
C. javanica, a bornensis, *Bp. Comp. Rend.* xlii, p. 949 (1856).
C. moluccensis, *G. R. Gr. P. Z. S.* 1860, p. 361; *Wall. P. Z. S.* 1862, pp. 335, 345, 1863, p. 34; *id. Ibis.* 1865, p. 393; *id. J. f. O.* 1866, 284; *Schleg. N. T. D.* iii. p. 265, 266 (1866); *G. R. Gr. Hand-list.* ii. p. 265, n.^o 9420 (1870); *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix. p. 222 (1875); *Hein. & Rehnw. Nomencl. Mus. Hein. Orn.* p. 286 (1890).
C. albicapilla, *Rehnb. Tauben.* i. p. 48 (1862), ii. p. 166, x. i. f. 10 (1862).
Goura javanica, *Schleg. Dierent.* p. 208 (1864).
Peristera moluccensis, *Finsch. Neu-Guin.* p. 179 (1865).
Chalcophaps formosana, *Swinh. Ibis.* 1865, pp. 357, 549; *G. R. Gr. Hand-list.* i. p. 245, n.^o 9424 (1870); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 397; *Eckes. P. Z. S.* 1873, p. 667.
Chalcopaps, sp., *Mart. J. f. O.* 1860, p. 24, sp. 137.
C. pileata, *G. R. Gr. Hand-list.* ii. p. 245 n.^o 9422 (1870).
C. javanensis, *G. R. Gr. Hand-list.* ii. p. 245, n.^o 9416 (1870); *Hein. & Rehnw. Nomencl. Mus. Hein. Orn.* p. 286 (1890).
Phaps albicapilla, *Gieb. Thes. Orn.* i. p. 630 (1872), iii. p. 88 (1877).
P. augusta, javanica, formosæ, indica, moluccensis, *Gieb. op. cit.* i. p. 139.

Chalophaps mariae, «*Bp.*» *Blyth, Birds of Burm.* p. 147 (1875).
C. javanus, *Rosenb. Reis naar Zuidoostereil.* p. 8 (1875).
C. sp., *Becc. Ann. Mus. Civ. Gen.* vii. p. 716 (1875).
Hab. Luzón, Manila, S. Mateo, Montalban, Bataan, Orani, Hermosa, Laguna, Calamba, Negros Valencia, Cebú, Surigao, Zamboanga, Basilan; Célebes, Formosa.

6. Gén. OCYPHAPS, GOULD.

9. *O. lophotes*, (*Tem.*) ♂ N. v.

(M. S. T.)

Columba lophotes, *Tem. Pl. Col.* 152 (1823).
Ocyphaps lophotes, *Gould, P. Z. S.* 1842, p. 20; *Salv. Cat. B.* M. 21 p. 535 (1893).
Hab. Australia.

Subfam. GEOTRIGONINAS.

7. Gén. PHILODENAS, RICHNB.

10. *Ph. luzonica*, (*Scop.*) ♂ N. v. Bato puñalada

(M. S. T.)

Touterelle greie ensanglantée de l'îsb. Luçon, Sonn. Voy. Nou. Guin. p. 52 pl. 21 (1776).
Red.—treasted Turtle, *Lath. Syn.* ii. 2, p. 657, n.^o 56. (1786).
Columba luzonica, *Scop. Del. flor. A. Faun. Insubr.* p. 94, n.^o 92 (1786).
Columba cruenta, *Gm. S. N.* i. 2, p. 785, n. 66 (1788); *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 611, n.^o 65 (1790); *Bonn. Tabl. Enc. Méth.* p. 250 (1790); *Temm. & Knip. Rig.* i. fam. trois. p. 16, pl. 8 (1808-11); *Tem. Pig. et Gallin.* p. 494 (1813); *Vieill. N. D.* xxvi. p. 403 (1818); *Wagl. Syst. Av. Columba*, sp. 73 (1827); *Less. Tr. d'Orn.* p. 474 (1831).
C. cruenta, «*Lath.*» *Temm. Pig.* i. fam. trois p. 16 (1808-11); *id. Pig. et Gallin.* i. p. 407 (1813); *Desm. Dict. Sc. Nat.* xl. p. 306 (1826); *Less. Compl. de Buff.*, *Ois.* viii. p. 15 (1837); *id. op. cit. 2nd ed.* p. 128 (1810).
Goura cruenta, *Steph. Gen. Zool.* xi. p. 128 (1819).
Red. brasted Pigeon, *Lath. Gen. Hist.* viii. p. 90 (1823).
Columba luzonica, *Scop. Del. Flor. A. Faun. Insubr.* p. 94, n.^o 92 (1786).
C. cruenta, *Gm. S. N.* i. 2, p. 785, n.^o 66 (1788); *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 611, n.^o 65 (1790); *Bonn. Tabl. Enc. Méth.* p. 250 (1790); *Temm. & Knip. fig.* i. fam. trois. p. 16, pl. 8 (1808-11); *Tem. Pig. et Gallin.* p. 494 (1813); *Vieill. N. D.* xxvi. p. 403 (1818); *Wagl. Syst. Av. Columba*, sp. 72 (1827); *Less. Tr. d'Orn.* p. 474 (1831).
C. cruenta, «*Lath.*» *fig.* i. fam. trois. p. 16 (1808-11); *id. Pig. et Gallin.* i. p. 407 (1813); *Desm. Dict. Sc. Nat.* xl. p. 306 (1826); *Less. Compl. de Buff.*, *Ois.* viii. p. 15 (1837); *id. op. cit. 2nd ed.* p. 128 (1810).
Goura cruenta, *Steph. Gen. Zool.* xi. p. 128 (1819).
Red breasted Pigeon, *Lath. Gen. Hist.* viii. p. 90 (1823).

- Calænas cruenta, *Strickl.* *P. Z. S.* 1842, p. 168; *Cab. side Bp. Conspl.* *Av.* ii. p. 88.
C. luzonica, *G. R. Gr. List. Gallinæ Brit. Mus.* p. 18 (1844);
id. Gen. B. iii. p. 478, n.^o 3 (1845).
Phlegenas luzonica, *Rchub. Syn. Av. Columbaria, Navit.* t. 227;
f. 247 (1851); *Wahl. Ibis.* 1855, pp. 392, 399; *id. J. f. O.* (1866); p. 283, n.^o 104; *G. R. Gr. Hand-list.* ii. p. 246, n.
9442 (1870); *Schleg. Mus. P.-B. Columba*, p. 157 (1873); *Tristr. Cat. Coll. B.* p. 41 (1889).
Ph. cruenta, *Rchub. Av. Syst. Nat.* xxv. (1852); *Bp. Conspl. Renl.* xl. pp. 206, 221, n.^o 262 (1855); *id. Coup. d'œil Ordre Pig.* pp. 45, 59, n.^o 262 (1855); *Rchub. Tauben*, i. p. 40 (1862).
Ph. cruenta, *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 88 (1854); *Sousa. Mus. Nac. Lish. Columba*, p. 22 (1873).
Calænas luzonica, *G. R. Gr. List. B. Brit. Mus. Columba*, p.
63 (1856).
Phlegenas cruenta, *Sclat. P. Z. S.* 1861, p. 366, 1863, p. 377;
Gould. B. Asia, vi, pl. 51 (1863); *Savill's Tentamen*, p. 10
(1872); *Hartert. Kal. Vogelsamml.* p. 189 (1891).
Calænas cruenta, *Mürt. J. f. O.* 1869, p. 25.
Phlegenas luzonica, *Wald. Tr. Zool. Soc.* viii. p. 29 (1872), ix.
pp. 221, 251 (1875); *Shaw's Tr. Linn. Soc., Zool.* i. p. 34
(1876); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 700; *id. Orn. Works*, p.
659 (1881); *Savill. Cat. B. Srockl. Coll.* p. 552 (1882); *Steer.*
Lst. p. 24, n.^o 300 (1890); *Silv. Cat. B. M.* 21. p. 585 (1893).
Ph. cruenta, *Garrad. P. Z. S.* 1873, pp. 468, 639, 1874, p.
250; *Vagenführ. J. f. O.* 1876, p. 334; *Sclat. List. Vert.*
Än. 8th ed. p. 461 (1883); *Hein. & Rchub. Nomencl. Mus.*
Hein. Orn. p. 286 (1890).
Ph. eructatus, *Cab. J. f. O.* 1875, p. 126.
Phaps cruenta, *Geb. Thes. Orn.* iii. p. 89 (1877).
Tourterelle blanche eusanglentée, de l'île de Luçon, *Sommer.*
Joy. Nouv. Guin. p. 51, pl. 20 (1776).
Columba nivea, *Scop. Del. Flor. et Faun. Insubr.* p. 94, n.
91 (1786).
Sanguine Turtle, *Lath. Syn.* ii. 2, p. 657, n.^o 57 (1873).
Columba sanguinea, *Gm. S. A.* i. 2, p. 785, n.^o 65 (1788); *Lith.*
Ind. Orn. ii. p. 611, n.^o 66 (1790); *Bonn. Tabl. Enc. Méth.*
p. 250 (1790); *Vieill. N. D.* xxvi. p. 400 (1881).
C. cruenta, var., *Temm. & Knüp. Pig. i. sam. trois.* p. 17, pl.
9 (1808-11); *Temm. Pig. A. Gallin.* i. p. 494 (1813); *Wagl.*
Syst. Av. Columba, sp. 73 (1827); *Rchub. Syn. Av.* i. 125 (1847).
C. cruenta, var., *Temm. Pig. et Gallin.* i. p. 410 (1813).
Goura cruenta, var., *B. Steph. Gen. Zool.* xi. p. 128 (1819).
Hab. Luzón, Manila, en todas las provincias, Calamianes.
11. Ph. luzonica, var. albina. N. v. Bató bató (pájaro).
Hab. Id. id.
12. Ph. samarensis, ♂♂ N. v. Amamoquit. (M. S. T.)
Hab. Samar, Borongan, Calbayog, Parais, Paranas.
13. Ph. mindorensis, ♂♂ N. v. Alcalauin. (M. S. T.)
Hab. Mindoro, Bacó, Calapan, Naujan.

14. **Ph. crinigera**, (*Het Jacq.*) ♂♂ N. v. Bato-puñalada. (M. S. T.)

- Peristera crinigera, *Homb. et Jacq.* *Voy. Pole Sud. Atlas*, pl. 27, f. 2 (1845).
Cidanas, *G. R. Gr. Gen. B.*, *App.* p. 24 (1849).
Peristera crinigera, part., *Rchnb. Syn. Av. Columbaria*, *Novit.* t. 259, f. 2597 (1851).
Pampusana criniger, *Pucher. & Jacq.* *Voy. Pole Sud*, iii. *Ois.* p. 118 (1853); *Hartl. J. f. O.* 1854, p. 166.
Phlegenas criniger, *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 88 (1854).
Ph. criniger, *Bp. Compt. Rend.* xl pp. 206, 221, n.º 294 (1855); *id. Conspl. d'ail Ordre Pig.* pp. 45, 59, n.º 254 (1855); *Rchnb. Tauben*, p. 40, t. 249, f. 2597 (1862); *Wall. ibis*, 1865, pp. 392, 403; *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 246, n.º 9443 (1870).
Phlegenas bartletti, *Sclat. P. Z. S.* 1863, p. 377, pl. xxxiv., 1865 p. 238.
Phlegenas crinigera, *Sclat. P. Z. S.* 1855, p. 239; *Gould. B. of. As.* vi. pl. 52 (1855); *Sclat. P. Z. S.* 1869, p. 628; *Garrod. P. Z. S.* 1874, p. 250; *Tweedd. P. Z. S.* 1877, pp. 817, 833, 1878; p. 952; *id. Orn. Works* pp. 544, 559, 643 (1881); *Wardl. Rams. Tweedd. Orn. Works*, p. 659, n.º 289 (1881); *Sclat. List Vert. An.* 8th ed. p. 461 (1883); *Steere. List*, p. 24 (1890); *Salv. Cat. B. M.* 21. p. 587 (1893).
Phlegenas crinigera, *Wall. J. F. O.* 1856, p. 284, n.º 105; *Tristr. Cat Coll. B.* p. 41 (1879).
Phaps crinigera, *Gieb. Thes. Orn.* iii. p. 89 (1877).
Hab. Samar, Borongan, Minlanao, Placer, Zamboanga, Basilan, Jolo.

15. **Ph. plateneæ**, *Blas.* ♂♂ N. v. (M. S. T.)

- Phlegenas criniger, *Hartl. J. f. O.* 1891, pp. 300, 302.
Ph. plateneæ, *Blas in Ibis. Hartl. J. f. O.* 1891, p. 302.
Phlegenas plateneæ, *Salv. Cat. B. M.* 81. p. 588 (1893).
Hab. Mindoro, Baco.

16. **Ph. yapensis**, *H. et Finsch.*

- Phlegenas yapensis, *Hartl. et Finsch. P. Z. S.* 1872, p. 102; *Sch. miltz.*, *Ethn. Abth. Mus. Godeffr.* 1881, p. 398; *Wieg. Iesw. Aves Pocyn.* p. 57, n.º 293 (1891).
Ph. napensis, *Sharpe. Zool. Rec.* ix. 1872) p. 53 (1874).
Phaps yapensis, *Gieb. Thes. Orn.* iii. p. 91 (1877).
Phlogenas yapensis, *Salv. Cat. B. M.* 21. p. 593 (1893).
Hab. Carolinas, Upap.

7. **Ph. Kubaryi**, *Finsch*

- Phlegenas erythroptera, pat. *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 89 (1854).
Phlegenas erythroptera, part., *Rchnb. Tauben*, i. p. 41 (1862).
P. sp., *Finsch. Journ. Mus. Godeffr.* viii. p. 131 (1875), xii. pp. 16, 17 (1876).
P. erythroptera, *Finsch. P. Z. S.* 1877, p. 780, 1880, p. 576;

id. Ibis, 1881, pp. 112, 115; *Tristr. Cat. Coll. B.* p. 41 (1889).
P. Kubaryi, *Finsch. J. F. O.* 1880, p. 292; *Rchnw. & Schal. J. F. O.* 1881, p. 75; *Wiglesw. Avs. Polyn.* p. 55, n.^o 284;
Salv. Cat. B. M. 21, p. 599. (1893).
Hab. Carolinas.

17. **Ph. menagei**, Fr. et Worcester

Ph. menagei, *Frank et Worcester. Prelim. Not. Menage Expt.*
Philipp. 1894, p. 10.
Hab. Tawi-tawi.

18. **Ph. pampusan**, Q. et G.

Columbe rousseau, *Tem. Pl. Col.* 190 (*soy.*) 1443.
Columba xanthonura, *Cuv. Tem. Pl. Coll.* 190; *Steph. Gen. Zool.*
xvi. p. 211 (1826); *Less. Compl. de Buff.*, *Ois.* viii. p. 44
(1837); *id. op. cit.* 2nd. ed. p. 281 (1838); *G. R. Gr. Gen.*
B. ii. p. 470, n.^o 30 (1845); *Rchnb. Syn. Av. ff.* 1269-70 (1847).
Columbe erythroptère à gorge blanche, *Quoy & Gaim. Voy. Uran.*
Zool. p. 35 (1824).
C. de couleur rousse, *Quoy & Gaim. Voy. Uran.* *Zool.* p. 35
(1824).
Columba pampusan, *Quoy & Gaim. Voy.*, *Zool.* p. 121, pl. 30
(1824); *Desm. Dict. Sc. Nat.* xl. p. 345 (1826); *Wagl. Syst.*
Av. Columba, sp. 82 (1827); *Less. Tr. d'Orn.* p. 471 (1838);
id. Compl. de Buff., *Ois.* viii. p. 42 (1837); *id. op. cit.* 2nd.
ed. p. 280 (1838); *Hartl. J. F. O.* 1845, p. 167.
C. xanthura, *Cuv. Régén. Ad.* 2nd. ed. i. p. 491 (1829); *Temm.*
Tabl. Méth. Pl. Col. p. 81 (1839); *Prev. & Knip. Pig.* ii.
p. 45, pl. 23 (1838-43); *Schleg. N. T. D.* iv. p. 29 (1871).
Pampusana xanthura, *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 89 (1854); *id. Comp.*
Rend. xl. pp. 207, 221, n.^o 267 (1855); *id. Coup. d'œil. Ordre.*
Pig. pp. 45, 59, n.^o 267 (1855); *Rchnb. Tauben*, i. p. 39, t.
226, fig. 1270 (1862).
Pampusana rousseau, *Bp. Conspl. Av.* ii. p. 89. (1854); *id. Comp.*
Rend. xl. pp. 207, 222, n.^o 268 (1855), *id. Coup. d'œil. Ordre.*
Pig. pp. 46, 59 n.^o 268 (1855); *Rchnb. Tauben*, i. p. 39, t.
226 t. 1269 (1862).
P. erythroptera, part., *Bp. Compt. Rend.* xlii. p. 947 (1857).
Columba erythroptera, *Hartl. J. F. O.* 1854, p. 167.
Peristera erythroptera, part., *Cass. Un. St. Expl. Exped.*, *Birds.*
p. 277 (1858).
Calænas erythroptera, var., *G. R. Gr. Cat. B. Trop. Isl.* p.
44 (1859); *id. Hand-list*, ii. pp. 246, n.^o 9449, (1870).
C. xanthura, *G. R. Gr. Cat. B. Trop. Isl.* p. 45. (1859).
C. rousseau, *G. R. Gr. Cat. B. Trop. Isl.* p. 45 (1859).
Phlegænas erythroptera, part., *Rchnb. Tauben*, i. p. 41 (1862);
Oust. Le Natural 1869, p. 261.
Pampusana xanthura, *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 247, n.^o 9450
(1870).
Columba rousseau, *Schleg. N. T. D.* iv. p. 29 (1871).
Leptoptila pampusan, *Schleg. N. T. D.* iv. p. 30 (1871); *id. M. S.*
P.-B. Columba, p. 162 (1873).

- Phaps erythroptera*, Hart., Gieb. Thes. Orn. iii. p. 89 (1877).
Phaps xanthura, Gieb. Thes. Orn. iii. p. 91 (1877).
Paloënas pampusan, Wiglesw. Av. Polynes. p. 55, n.^o 283 (1891).
Salv. Cat. B. M. 21. p. 602 (1892).
Hab. Marianas, Guam, Marquesas.

Subfam. CALENADINAS.

S. Gén. CALOENAS, Gray.

19. *C. nicobarica*. (Lin.) ♂ N. v. Dundunay. (M. S. T.)

- The Nincombar Pigeon, Abb. Nat. Hist. Birds. iii. p. 44, pls. 47, 48 (1740); Elze. Glean. iii. p. 271, pl. 339 (1761); Lath. Syn. ii. 2, p. 642, n.^o 38 (1783).
Columba nicobaricensis, Bris. Orn. i. p. 154 (1760).
Columba nicobarica, Lin. S. N. i. p. 283, n.^o 27 (1766); Gm. S. N. i. 2 p. 783, n.^o 27 (1788); Lath. Ind. Orn. ii. p. 605, n.^o 44 (1790); Linn. Tabl. Enc. Méth. p. 246, pl. 80, t. 8 (1790); Hayes, Portr. of rare and curious Birds, ii. pl. 91 (1799); Temm. & Krip. Pig. i. fam. trois. p. 5, pl. 2 (1808-11); Temm. Pig. et Galin. i. pp. 385, 445 (1813); Cuv. Rég. i. p. 456 (1817); Vieill. N. D. xxvi. p. 395, pl. G. 38 (1818); Desm. Dict. Sc. Nat. xl. p. 303 (1820); Less. Vor. Coq., Zool. i. 1, p. 342 (1826); id. Tr. d'Orn. p. 475 (1831); J. Compl. de Buff., Ois. viii. p. 12 (1837); id. op. cit. 2nd. ed. p. 272 (1838); Temm. Pl. Col. i. Tabl. Méth. p. 79 (1839); Bennett. Wandering, ii. p. 65 (1834); Thienem. Forstfl. p. 56; (1846); Gallié. P. Z. S. 1879, p. 419.
Columba de Nincombar, l'Aubéat. Pl. Eul. 491; Buff. Hist. Nat. Mus. ii. p. 541 (1671).
Columba Nicobar, Penn. Faunula Ind. in Forst. Zool. Ind. p. 16 (1781).
Columba gallina à canail, Lévaill. Ois. d'Afr. vi. p. 102, pl. 279 (1808); Sundev. K. Sc. Vet.-Ah. Handl. 1851, p. 55, n.^o 279.
C. para nicobarica, Steph. Gen. Zool. xi. pt. 2, p. 122 (1819); Ranz. Elec. Zool. iii. pt. 1, p. 217 (1821), p. 55, n.^o 279.
Columba gallus, H. v. Syst. Av. Columba, sp. 113 (1827).
C. gouldiae, Gray & Hardw. Ill. Ind. Zool. ii. pl. 57 (1834); off. Compt. Rend. xxxix. p. 871 (1854); id. Conf. d'ail Ordre Pig. p. 3 (1855); Bartl. II. P. Z. S. 1890, p. 79.
C. philus nicobaricus, Scby. Nat. Libr., Pisces, p. 221, pl. 29 (1835); Blyth. Calc. Journ. N. II. I. p. 605 (1841); Petre, J. R. St. Expl. Exped. Birds, p. 125 (1848); Hartl. Arch. f. Naturg. 1852, i. p. 117; Rams. Pr. Linn. Soc. N. S. W. i. p. 370 (1876).
C. olivacea nicobarica, G. R. G. List Gen. B. p. 59 (1840); Blyth. J. L. S. B. xv. p. 371 (1846); McCull. Narr. Vor. «Rattler. Afr.» i. p. 244 (1852); Hartl. J. f. O. 1854, p. 368, n.^o 257; Blyth. Conspl. Av. ii. p. 95 (1854); id. Compt. Rend. xl. p. 221, p. 266 (1855); Hartl. J. f. O. 1855, p. 319; G. R. Gr. List. B. Brit. Mus. Columba, p. 63 (1855); Schleg. Handl.

- Nicobar Pigeon, *Bartl. P. Z. S.* 1860, p. 90; *Wall. Malay.*
Archip. ii. p. 65 (1860).
Calænas nicobaricus, *Jerd. B. of Ind.* iii. p. 480 (1864); *Beav.*
Ibis, 1867, p. 332; *Hume, Str. Feath.* ii. p. 70 (1884); *Blyth,*
B. of Burm. p. 147, n.^o 524 (1875).
C. gouldii, *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 256, n.^o 9440 (1870).
Calliænas nicobarica, *Sund. Méth. nat. Av. disp. Tent.* p. 99 (1860).
C. nicobarica, *Rams. Pr. Linn. Soc. N. S. W.* vi. p. 38 (1882).
Hab. Luzón, Laguna, Paquil, Mindoro, Calapan, Negros, Si-
quijor, Joló, Tawi-tawi.

Fam. GÜRIDAS.

1. Gén. GOURA, STEPH.

1. **G. coronata**, (*Lin.*) ♂ N. v. La coronada (M. S. T.)
Columba coronata, *Lin. S. N.* i. p. 282, n.^o 17 (1766); *Gm. S.*
V. i. p. 774, n.^o 17 (1788).
Paisan couronné des Indes, *D'Aubent. Pl. Ent.* 118.
Goura coronata, *Salv. Cat. B. M.* 21. p. 620. (1893).
Hab. N.^o Guinea.
2. **G. victoria**, *Fraser.* ♀ N. v. (M. S. T.)
G. victoria, *Ca' B. M.* 21. p. 524 (1893).
Hab. N.^o Guinea.

Orden: GALLINAS.

Fam. FASIÁNIDAS.

1. Gén. CACCABIS, KAUP.

1. **C. rufa**, (*Lin.*) ♂ N. v. Perdiz roja. (M. S. T.)
Tetrao rufus, *Lin. S. N.* i. p. 276 (1766); *Gm. S. N.* i. pt. ii,
p. 756 (1788).
La perdrix rouge d'Europe, *D'Aubent. Pl. Ent.* ii. pl. 44.
C. rufa, *Ogilvie, Cat. B. M.* 22, p. 118 (1893).
Hab. Europa, España, Francia, África.

2. Gén PERDIX, BRISS.

2. **P. perdix**, (*Lin.*) ♂ N. v. Perdiz gris. (M. S. T.)
Tetrao perdix, *Lin. S. N.* i. p. 276 (1766); *Gm. S. N.* i. pt.
p. 757 (1788).
La perdix grise, *Buff. Hist. Nat. Ois.* ii. p. 461 (1770); *D'*
Aubent. Pl. Ent. ii. pl. 41 n.^o 27.
P. cinerea, *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 645 (1790).

P. perdix, *Hart. Kat. Mus. Sinkeuh* p. 194 (1891); *Ogil. Cat. B. M.* 22, p. 185 (1893).
Hab. Europa, Francia, Asia.

3. Gén. ARBORICOLA HODG.

3. *A. gingica*, (*Gmel.*) ♂♂ N. v. Pugong-buquit. (M. S. T.)

Lia perdrix de Gingi, *Sonn. Voy. Ind. Or. euts* ii. p. 167 (1782).
Gingi partridge, *Lath. Gen. Syn.* ii. p. 773 (1783); *id. Gen. Hist. viii.* p. 278 (1823).

Tetrao gingicus, *Gmel. S. N.* i. p. 760 (1788).
Perdix gingica, *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 618 (1790); *Bonn. Tabl. Encycl. Méth.* i. p. 212 (1791); *Tem. Pig. et Gall.* iii. pp. 410 y 733 (1815); *Vieill. N. Dict. d' Hist. Nat.* xxv. p. 197 (1817); *Steph.* in *Shaw. Gen. Zool.* xi. p. 351 (1819).

Goget partridge, *Lath. Gen. Hist.* viii. p. 302 (1823).

Perdix scutata, *Gray, in Griff. ed. Cuv.* iii. p. 54 (1829).
Arboricola gingica, *Blyth. Ibis*, 1870, p. 174; *Grant, Ibis*, 1862, p. 395, pl. ix; *Ogil. Cat. B. M.* 22, p. 213 (1893).
Hab. Luzon, Calaocan.

4. Gén. ROLLULUS BONN.

4. *R. roulroul*, (*Scop.*) ♂♂ N. v. Pugo. (M. S. T.)

Roulroul de Malacca, *Sonn. Voy. Ind. Or.* ii. p. 174, pl. 100, (1782).

Green partridge, *Lath. Gen. Syn.* iv. p. 777, pl. 67 (1783).
Phasianus roulroul, *Scop. Del. Flor. et Faun. Insubr.* ii. p. 93 (1786).

P. cristatus, *Sparrm. Mus. Carls. fasc.* iii. pl. 64 (1788).
Columba cristata, *Gmel. S. N.* i. pt. ii. p. 774 (1788); *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 596 (1790).

Tetrao viridis, *Gmel. S. N.* i. pt. ii. p. 761 (1788); *Ramfsl. Vi. Linn. Soc.* xiii. p. 322 (1822).

Perdix viridis, *Bonn. Tabl. Encycl. Méth.* i. p. 219, pl. 95, fig. 4 (1791).

Coturnix viridis, *Bonn. Tabl. Encycl. Méth.* i. p. 219, pl. 95, fig. 4 (1791).

Tetrao porphyrio, *Shaw & Nodd. Nat. Misc.* iii. pl. 84.
Perdix coronata, *Lath. Suppl. Ind. Orn.* p. 62 (1801).

Crowned partridge, *Lath. Gen. Syn. Suppl.* ii. p. 278 (1802); *id. Gen. Hist.* viii. p. 331, pls. cxxx, cxxxi. (1823).

Cryptonyx coronatus, *Temm. Pig. et Gall.* iii. pp. 526, 745 (1815); *Temm. Pl. Col.* v. pls. 43 & 44 (1855); *Less. Traité d'Orn.* p. 499, pl. 86, fig. 1 (1831); *Müll. Verhandl. Land-en Volkenk.* p. 395 (1839-44); *Schinz, Nat. Vogel*, p. 154, pl. 75 (1853); *Schl. Handl. Dierk.* i. p. 395 (1857).

Cryptonyx cristatus, *Vig. Zool. Journ.* iv. p. 348 (1829); *Cuv. Rig. Anim., Ois.* pl. 62, fig. 2 (1836-46).

C. coronatus, *Schinz, Nat. Abbild.*, *Vög.* p. 267 (1833); *Jard. Nat. Lib., Orn.* iv. p. 187, pl. xxvi. (1834).

- Rollulus roulroul*, Vieill. *Gill. O's.* p. 35; pl. 210 (1843); *F. & Ger. Att. Vog.* fig. 239 (1864).
Rollulus cristatus, Gray, *List & n. B.* 80 (1841); Blith., C. B. *Mus. As. Soc.* p. 253 (1849); Benth. C. R. xlii. p. 850 (1856); Mamm. & B. *Burm.* p. 151 (1875).
Rollulus roulroul, Gray, *List Gill. B.* iii. p. 42 (1844); id. *G. B.* p. 507 (1845); id. *Hand-l. B.* ii. p. 209, n.^o 9726 (1870); *Weld. Ibis*, 18, 2, p. 382; *Salvad. Ucc. Borneo*, p. 308 (1874); *Hume, Str. F.* iii. p. 324 (1875); Sharpe, *Ibis*, 1876, p. 53; *Ticeedd. 15*, 1877, p. 322; *Hume & Deutzson, Str. F.* vi. 1, 448 (1878); *Berg. Ann. Mus. Gron.* xiii. p. 455 (1878); *Salval. t. c. xiv.* p. 252 (1879); Sharpe, *Ibis*, 1879, p. 270; *Hume, Str. F.* viii. p. pp. 69, 111 (1879); *Hume & Marsch. Game B.* ii. p. 103, pl. 1870; Sharpe, *P. Z. S.* 1881, p. 800; *Kelham, Ibis*, 1882, p. 4; *Vidholson, Ibis*, 1883, p. 65; & 1884, p. 90; *Blas. Verh. Ges. Wien*, xxmii. p. 61 (1883); Oates, *B. Burmish.* ii. p. 230 (1883); Meyer, *Vög-Skild.* pl. lxxxv. (1883); *Büttikofer, N. Vogl. Mus.* ix. p. 78 (1887); *Ewerdt, List B. Borneo*, p. 200 (1886); Sharpe, *Ibis*, 1890, pp. 140, 234; *Ibis*, 1893, p. 423; *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 225. (1893).
Hemipodius nigrifrons, Drapiez, *Diction. Sci. Nat.* x. p. 562, pl. 45, fig. 2 (1845).
Rollulus coronatus, Jerd. *B. Ind.* ii. p. 580 (1864); v. *Peltz Ibis*, R. roulroul, Brüggem. *Akh. nat. Ver. Brem.* v. p. 463 (1877).
Cryptonix roulroul, Snellman, in *Vetts. Midden-Suvarna*, iv. 1, 46 (1887).
Rollulus roulroul, Elliot, *Anuk.* viii. p. 15 (1891).
Hab. Paragua, ?Borneo, Java, Sumatra.

5. Gen. COURNIX, MOEHRING.

5. **Courornix**, (Lin.) ♂♂ N. v. Codorniz. (M. S. T.)

- La caille*, Briss. *Orn.* i. p. 247 (1806); Buff. *Hist. Nat. O's.* ii. p. 449, pl. xvi. (1771); D'Aubent. *Pl. Ecol.* ii. pl. 49, n.^o 170. *Petrao couronix*, Lin. *S. N.* i. p. 278 (1766); Gm. *S. N.* i. p. ii. p. 765 (1788).
Couronix, Ogilv. *Cat. B. M.* 22, p. 231 (1893).
Hab. Europa, España, Asia, China.

6. Gen. EXCALFACTORIA, Br.

6. **chinensis**, (Lin.) ♂♂ N. v. Pagonistica. (M. S. T.)

- The Chinese quail, Edw. *Glean. Nat. Hist.* v. p. 77, pl. 217 (1758); Lath. *Gen. Syn.* ii. pt. ii. p. 783 (1783); id. *Gen. Hist.* viii. p. 318 (1823).
Petrao chinensis, Linn. *S. V.* i. p. 277 (1766); Gm. *S. N.* i. p. ii. p. 765 (1788).
Perdix chinensis, Lath. *Ind. Orn.* ii. p. 652 (1790); Vieill. *N. Dict. d'Hist. Nat.* xxv. p. 260 (1817).
Coturnix chinensis, Bonn. *Tabl. Encycl. Méth.* i. p. 223, pl. 96, fig. 3 (1791).

- C. pallidiora*, *T. em. P. et G.*, no. p. 126 (1815);
ibid., in *Shaw's Zool. Syst.*, xi, p. 371 (1819).
C. philippensis, *Blyth, J. L. S. & C. Beng.*, xi, p. 803 (1842); *Gray*,
Gen. B., iii, p. 507 (1845).
C. chinensis, *Gray, List of B.*, pt. iii, p. 39 (1844); *id. Cn.*
H. Ind. et. i., p. 128 (1845); *id. G. & B.*, iii, p. 597 (1846);
Layard, Ann. Mus. N. L., (2) xiv, p. 107 (1854); *Swinhoe*,
Ibis, 1861, p. 59; *Legge, B. Cycl.*, iii, p. 755 (1880); *Park*,
Ibis, 1889, p. 187.
C. philippensis, *Hodg.*, in *Gray's Zool. Misc.*, p. 85 (1844); *Id.*
Ieon., *ed.*, in *Brit. Mus. nos.*, 119, 120.
Excalactoria chinensis, *Bonap. C. R.*, xlii, p. 188 (1856); *MacLeod*,
Notes Résumé, p. 163 (1862); *Jord. B. Ind.*, iii, p. 591 (1863);
Swinhoe, *Ibis*, 1863, p. 398; *id. P. Z. S.*, 1863, p. 392;
Gould, B. Asia, vii, pl. 6 (1867); *Bewan*, *Ibis*, 1868, p. 389;
Swinhoe, *Ibis*, 1870, p. 360; *id. P. Z. S.*, 1871, p. 401; *H. Ibis*,
P. Z. S., 1872, p. 470; *Hume, Nests & E.*, *Ind. B.*, p. 553
(1873); *Ball, Str. F.*, ii, p. 428 (1874); *Legge, Ibis*, 1874,
p. 26; *Hume, Str. F.*, iii, p. 323 (1875); *Oates, Str. F.*, iii,
p. 345 (1875); *Blyth & Webb, Cat. Mamm. & B.*, *Burm.*,
p. 151 (1875); *Davison & Oustalet, O. C. Ind.*, p. 397 (1877);
Ball, Str. F., viii, p. 226 (1878); *Hume, Str. F.*, viii, p. 61
(1879); *Oates, Str. F.*, viii, p. 167 (1879); *Blyth, Str. F.*, vi,
p. 209 (1880); *Hume & Ingolds, Str. F.*, ix, p. 258 (1880); *B. Ind.*,
Str. F., ix, p. 423 (1880); *Redd. Str. F.*, p. 63 (1881);
Wenden, Str. F., x, p. 105 (1881); *Oustalet, Str. F.*, x, p. 236
(1882); *Davison, Str. F.*, x, p. 312 (1883); *Klunz.*, *Ibis*, 1882,
p. 35; *Oates, B. Burmah*, ii, p. 334 (1883); *Müll. J. f. O.*, 1885,
p. 160; *Hume, Str. F.*, xi, p. 310 (1885); *Hartlaub, J. F. O.*,
1889, p. 434; *Oates, et. Hume's Nests & E.*, *Ind. B.*, ii, p.
148 (1890); *Oude, Cat. B. M.*, 22, p. 250 (1893).
C. pallidiora minima, *Gould, T. Z. S.*, 1850, p. 255; *id. B. Asia*,
i, pl. 7 (1867); *Walter, Tr. Z. S.*, viii, p. 27 (1872); ix, p.
224 (1875); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Genov.*, vii, p. 675 (1875);
xvii, p. 9 (1882); *id. Orn. Pap.*, iii, p. 255 (1882); *Plessey,*
Bull. Acad. Peiresc., xxix, p. 536 (1884); *Salvat. Agg.*, *Orn.*
Pap., pt. iii, p. 195 (1891).
Syntomis sinensis, *N. Atten., Ibis*, 1891, pp. 116, 275.
Courax caineana, *Swinh. Ibis*, 1855, pp. 351, 512; *id. Ibis*,
1856, p. 360.
C. (Excalactoria) chinensis, *Gray, List Gallinace.*, Brit. Mus., p.
63 (1837); *id. Handb. B.*, ii, p. 290 (1870).
C. (Excalactoria) minima, *Gray, List Gallinace.*, Brit. Mus., p.
63 (1837); *id. Handb. B.*, ii, p. 290 (1870).
Excalactoria sinensis, *Hume & Davison, Nests & E.*, vi, p. 447
(1874); *Blasius, Vog. F.*, v, p. 100 (1875).
C. (Excalactoria) sinensis, *S. Hartlaub, Orn. Pap.*, vii, p. 25, (1872);
ix, p. 5; *Luzon, Laguna, Jolo; Borneo, Celebes, China*, *C. I. Ind.*,

7. *Ex. lineata* *S. & P. N. S. v. T. 1874 (1875)* (Mus. T.)

Courax philippensis, *Blyth, Orn.*, i, p. 254; pl. xxv, fig. 1
(1790).

Lacaille des Philippines, *D' Aubrev. Pl. Enc.*, i, p. 50; fig. 2.

- La petite caille de l'île de Luçon, Sonnerat. *Loy. N. Guin.* p. 54, pl. 24 (1776).
Manilla Quail, *Lath. Gen. Syn.* ii. pt. ii. p. 790 (1783); *id. Gen. Hist.* viii. p. 321 (1823).
Oriolus lineatus, *Scop. Del. Flor. et Faun. Insubr.* ii. p. 87 (1786).
Tetrao manillensis, *Gmel. S. N.* i. pt. ii. p. 764 (1488).
Perdix manillensis, *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 655 (1790).
Coturnix manillensis, *Bonn. Tab. Encycl. Méth.* i. p. 221, pl. 97 fig. 4 (1791).
Tetrao chinensis, *Hayes, Osterl. Menag.* pl. 50 (1794).
1. *sinensis*, *Raffl. Tr. Linn. Soc.* xiii. p. 324 (1822).
hestnut-bellied-partridge, *Undulated Partridge*, *Lath. Gen. Hist.* viii. p. 305 (1823).
Coturnix nana, *Schinz, Nat. Abbild. Vog.* p. 275 (1833).
Synoicus? chinensis, *Gould, B. Austr.* v. pl. 92 (1848); *Diggles, B. Austr.* ii. pt. xx. pl. 96 (1860).
Coturnix chinensis, *Sclat. P. Z. S.* 1863, p. 221.
Excalfactoria chinensis? *Walden & Layard, Ibis*, 1872, p. 609
Salvad. Ucc. Borneo, p. 311 (1874); *Walden, Tr. Z. S.* ix.
224 (1875); *Sharpe, Ibis*, 1878, p. 419 *id. P. Z. S.* 1870,
p. 350 *Nichols. Ibis*, 1881, p. 155, 1883, p. 255. *Kutter, J. F. O.* 1883, pp. 293, 316; *Wardlaw-Ramsay, Ibis*, 1880,
p. 160; *Everett, P. Z. S.* 1889, p. 225. *Whitehead, Ibis*,
1890, p. 57; *Sharpe, Ibis*, 1890, pp. 140, 284; *Ogilv. Cat. B. M.* 22 p. 253 (1893).
Excalfactoria australis, *Gould. Handb. B. Austr.* ii. p. 197 (1865);
Ramsay, Ibis, 1868, p. 279 *id. P. Z. S.* 1870, p. 119 *id.*
Tab. List. Aust. B. p. 19 (1888); *North, N. & E. B. Austr.* p. 291 (1889).
Coturnix (Excalfactoria) australis, *Gray, List Gallinæ. Brit. Mus.* p. 63 (1867); *id. Hand-l. B.* ii. p. 269 (1870).
C. sinensis, *Jwinh. Ibis*, 1869, p. 348.
Synoicus (Excalfactoria) sinensis, *Ramsay, P. Linn. Soc. N. S. W.* i. p. 186 (1876).
Hab. Luzon, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy, Laguna,
Calauan, Ilocos Norte, Abra, Panay, Cebú, Masbate, Calamianes,
Culión, Paragua, P. Princesa, Taguso. Joló; Borneo, Java, Sumatra, Australia.

7 Gén. LOPHURA, FILMING.

8. **L. rufa** *Raffl. C. N. v. Fassan de Sumatra* (M. S. T.)
Phasianus ignitus, *Raffl. Tr. Linn. Soc.*; *id. rufus*, *ibid.* p. 231
1022.
L. rufa, *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 286 (1863).
Hab. Sumatra, Malaca, Borneo

8 Gén. TRAGOPAN, Cuv.

9. **T. satyra**, (*Linn.*) *C. O. N. v. Faisan cornudo*. (M. S. T.)
Meleagris satyra, *Linn. S. N.* i. p. 229 (1796).
Tragopan satyrus, *Cuv. Regr. An.* i. p. 479 (1829); *Terr. P. Col.* v. pls. 13, 14 (n. 543, 544)

T. satyra, *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 271 (1893).
Hab. India, Nepal.

10. **T. temmincki**, *Gray*, ♂ N. v. Faisan de Temminck. (M. S. T.)

Satyrus temmincki, *J. E. Gray*, *Ill. Ind. Zool.* i, pl. 50 (1830-32).
T. timmincki, *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 275 (1893).
Hab. China.

9. Gen. GENN.EUS, WAGL

11. **G. nyctemerus**, (*Lin.*) ♂ N. v. Faisan plateado. (M. S. T.)

Phasianus nycthemerus, *Lin. S. N.* i, p. 272 (1766); *Gm. S. N.* i, pt. ii, p. 743 (1788).

Fasian noire et blane de la Chine, *D'Aubent. Pl. Ent.* pls. 123, 124.

G. nycthemerus, *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 307 (1893).
Hab. China, Fokien.

10. Gén. PHASIANUS, LIN.

12. **Ph. colchicus**, *Lin.* ♂♂ N. v. Faisan comun. (M. S. T.)

Le Fasian, *Briss. Orn.* i, p. 262 (1760); *D'Aubent. Pl. Ent.* pls. 121, 122.

Phasianus colchicus, *Lin. S. N.* i, p. 271 (1766); *Gm. S. N.* i, pt. ii, p. 741 (1788); *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 320 (1893).
Hab. Inglaterra, Alemania.

13. **Ph. torquatus**, *Gm.* ♂♂ N. v. Faisan de collar. (M. S. T.)

Ph. torquatus, *Gm. S. N.* i, pt. ii, p. 742 (1788); *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 331 (1893).
Hab. China, Canton, Sanghai.

14. Gen. CHRYSOLOPHUS, GRAY.

14. **Ch. pictus**, (*Lin.*) ♂♂ N. v. Faisan dorado. (M. S. T.)

Phasianus pictus, *Lin. S. N.* i, p. 272 (1866); *Gm. S. N.* i, pt. ii, p. 745 (1788).

Le faisant doré, *D'Aubent. Pl. Ent.* pl. 217.

Chrysolophus pictus, *J. E. Gray*, *Ill. Ind. Zool.* ii, pl. 41, fig. 2. (1834); *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 339 (1893).
Hab. China.

15. Gén. GALLUS, LIN.

15. **G. stramineicollis**, Sharpe. N. v. Labuyo.

G. stramineicollis, *Sharpe. P. Z. S.* 4879, p. 317; *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 343 (1893).
Hab. Joló.

16. **G. gallus**, Lin. *S. N.* i. p. 270 (1766); *Raffl. Tr. Lin. Soc.* xiii. p. 349 (1822).

(M. S. T.)

- Phasianus gallus, *Lin. S. N.* i. p. 270 (1766); *Raffl. Tr. Lin. Soc.* xiii. p. 349 (1822).
Grande Caille de la Chine, *Sonn. Voy. Ind. Orient.* ii. p. 171 (1782).
Hacked Partridge, *Lath. Gen. Syn.* ii. p. 766, pl. 66 (1783); *id. Gen. Hist.* viii. p. 307, pl. 129 (1823).
Tetrao ferrugineus, *Gm. S. N.* i. pt. 768 (1788).
Perdix ferruginea, *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 651 (1790).
Coturnix spadnea, *Bonnat. Tabl. Eneycl. Méth.* i. p. 228 (1791).
Gallus bankiva, *Temm. Pig. et Gall.* ii. p. 87 (1812); iii. p. 654 (1815); *Steph. in Shaw's Gen. Zool.* xi. p. 198 (1819); *Horsf. Tr. Linn. Soc.* xiii. p. 185 (1822); *Vieill. Tao Encycl. Méth.* i. p. 364 (1823); *Griff. ed. Cuv.* iii. p. 20 (1829); *Guerin. Icon. Reg. Anim., Ois.* p. 26, pl. 42, figs. 2, 2a (1829-38); *J. E. Gray, Ill. Ind. Zool.* i. pl. 43 fig. 3 (1830-32) *Less. Traite d'Orn.* p. 491 (1831); *Schinz, Nat. Abbild. Vög.* p. 342, pl. 94 (1833); *Jard. Nat. Lib. Orn.* iv. p. 175, pl. (1834); *Hodgs. in Gray's Zool. Misc.* p. 85 (1844); *Gray, List. of B.* pt. iii. *Gall.* p. 27 (1844); *id. Gen. B.* iii. p. 499 1845; *id. Cat. Hoags. ed.* i. p. 125 (1846); *Schinz, Nat. Vög.* p. 145, pl. 69 (1853); *Adams, P. Z. S.* 1858, p. 498; *Wallace, P. Z. S.* 1863, p. 486; *Sclat. List. of Phas.* p. 10 (1863); *Blyth, Ibis*, 1867, p. 156; *Melliss. Ibis*, 1870, p. 103; *Wald. Tr. Zool. Soc.* viii. pt. 2, p. 86 (1872); *Hartl. & Finsch, P. Z. S.* 1872, pp. 89, 103; *Tweedd. P. Z. S.* 1878, p. 953; 1879, p. 73; *Meyer, Ibis*, 1879, p. 138; *Guille. P. Z. S.* 1885, p. 272; *Blas. Ibis*, 1888, p. 374; *Shufeldt. J. Comp. Med. & Surg. Oct.* 1888, 34 pp. 30 figs.; *Blas. Ornis.* 1888, p. 317; *Everett, List. B. Born.* p. 199 (1889); *Sharpe, Ibis*, 1890, p. 57.
G. ferrugineus, *Blyth, Ann. Mag. N. H.* xx. p. 387 (1847); i. p. 455 (1848); *id. Cat. Mus. As. Soc.* p. 242 (1849); *Adamus. P. Z. S.* 1859, p. 185; *Irby, Ibis*, 1861, p. 234; *Jerd. B. Ind.* iii. p. 536 (1863); *Gray, List Gallinæ Brit. Mus.* p. 37 (1867); *Blyth, Ibis*, 1867, p. 154; *Beavan, Ibis*, 1868, p. 381; *Brooks. Ibis*, 1869, p. 60; *Bulger, Ibis*, 1870, p. 170; *Swinhoe, Ibis*, 1870, p. 357; *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 261 (1870); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 399; *Elliot, Mon. Phas.* ii. pl. 32 (1872); *Hume. N. & E. Ind. B.* p. 528 (1873); *Ball. Str. f. i. iii.* p. 426 (1874); *Hume, Str. f. ii.* p. 482 (1874); *Blyth. & Walden, Cat. Mamm. & B. Burma*, p. 149 (1875); *Hume, Str. f. iii.* p. 371 (1875); *Armstr. Str. f. iv.* p. 331 (1876); *Finsch, P. Z. S.* 1877, p. 780; *Hume & Inglis, Str. f. v.* 44 (1877); *Oates, Str. f. v.* p. 164 (1877); *Wardl. Rams. Ibis*, 1877, p. 468; *David. & Oustal. Ois. Chine*, p. 420 (1877); *Marsh. B. Nest. Ind.* p. 59 (1877); *Hume, & Marsch. Game B. Ind.* i. p. 217, pl. (1878); *Audens. B. W. Yunnan*, p. 669 (1878); *Hume & Davison, Str. f. vi.* pp. 442 & 521 (1878); *Ball. Str. f. vii.* p. 225 (1878); *Hume, Str. f. viii.* p. 68 1879; *Scully, Str. f. viii.* p. 348 (1779); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* xiv. p. 254 (1879); *Binghani, Str. F.* ix. p. 895 (1880); *Fasson, Str. F.* ix. p. 205 (1880); *Müll. J. F. O.* 1882, p. 432; *Kelham, Ibis*,

1882, p. 8; *Nichols, Ibis*, 1882, p. 65; *Oates, Str. F.* x. p. 236; 1882, *id. B. Burmah*, ii. p. 322 (1883); *Nichols, Ibis*, 1883; p. 255; *Marsh, Ibis*, 1884, p. 423; *Büttikofer, N. devd. Mus.* ix. p. 78 (1887); *Taylor, Str. F.* x. p. 538 (1887); *Hume, Str. F.* xi. p. 304 (1888); *Hartert, J. F. Ö.* 1889, pp. 279, 434; *Tegetm. Ibis*, 1890, p. 304; *Oates, ed. Hume's Nests. & Eggs*, iii. p. 417 (1890).

G. gallus, *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 344. 1893.

Hab. Luzon, Manila, Cavite, Laguna, Pampanga, Bataan, Cagayan, Illocos, Abra, Guimaras, Cebú, Mindoro, Baco, Paragua, P. Princesa, Calamianes, Cuyo, Balabu, Samar, Börongon, Masbate, Romblon, Sibuyan, Tablas, Tawi-tawi, Negros, Panay, Paranas, Basilan, Mindanao, Surigao, Butuan, Zamboanga, Joló; Java, Célebes, Sumatra.

17. *G. varius?* *Shaw*. ♂♂ N. v. Cadlaganon.

(M. S. T.)

Phasianus varius, *Shaw*, et *Nodd. Nat. Misc.* x. pl. 353. *G. varius*, *Griff. ed. Cuv.* iii. p. 21 (1820); *Less. Traité d'Orn.* p. 492 (1831); *Gray, List. of B.* pt. iii. *Gall.* p. 27 (1844); *id. Gen. B.* iii. p. 499 (1845); *Sclat. List. of Phas.* p. 10 (1863); *Blyth, Ibis*, 1867, pp. 307, 308; *Gray, List Gallinæ Brit. Mus.* p. 40 (1867); *id. Hand-l. B.* ii. p. 261 (1870); *Elliot, Mon. Phas.* ii. pl. 35 (1872); *Kelham, Ibis*, 1881, p. 3; *Hume, Str. F.* x. p. 68 (1887); *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 352 (1897). *Gallus furcatus*, *Temm. Pig. et Gall.* ii. p. 261 (1813), iii. p. 662 (1815); *Steph. in Shaw's Gen. Zool.* xi. p. 215 (1819); *Vieill. Tabl. Encycl. Méth.* i. p. 364 (1823); *Temm. Pl. Col.* v. pl. 4 (1829); *Gray, Ill. Ind. Zool.* i. pl. 43, fig. 2 (1830-32); *Schinz, Nat. Abbild. Vög.* p. 242 (1833); *Jard. Nat. Lib. Orn.* iv. p. 184, pl. x. (1834); *Schinz, Nat. Vög.* p. 145 (1853); *Wallace, P. Z. S.* 1863, p. 486. *Gallus javanicus*, *Horsf. Tr. Linn. Soc.* xiii. p. 185 (1822). *Hab.* Paragua, Inaguan, Mindoro, Baco; Java.

18. *G. domesticus*, (*Lin.*) ♂♂ N. v. Gallo comun.

(M. S. T.)

Hab. Todas las islas.

19. *G. d. patavinus*, (*Lin.*) ♂♂ N. v. G. de moño.

(M. S. T.)

Hab. China, Japón.

20. *G. d. cochinchinensis*, ♂♂ N. v. G. Cochinchina (M. S. T.)

Hab. Cochinchina.

21. *G. sonnerati*, (*Tem.*) ♂♂ N. v. Manoc de Joló.

(M. S. T.)

Coq. et Poule sauvage des Indes, *Sonn. Voy. Ind. Orient.* ii. p. 148, pls. 94, 95 (1782). *Wil Cock, Lath. Gen. Syn.* ii. p. 698 (1783). *Phasianus gallus*, *Scop. (nec Linn.) Del. Flor. et Faun. Insubr.* pt. ii. p. 93 (1786); *Gm. S. N.* i. pt. ii. p. 737 (1788); *Lath.* *

- Ind. Orn.* ii. p. 625 (1790); *Bonnat. Tabl. Encycl. Meth.* i. p. 180, pl. 86, figs. 4, 5 (1791).
Sonnsrat's Wild Cock, *Lath. Gen. Hist.* viii. p. 181 (1823).
Gallus sonneratii, *Temm. Pig et Gall.* ii. p. 246 (1813) p. p. 659 (1815); *Steph. in Shaw's Gen. Zool.* xv. p. 200, iii. 12 (1819); *Temm. Pl. Col.* v. pls. 1 & 2 [nos. 232, 233] (1823); *Vieill. Gal. Ois.* ii. p. 26, (1825); *Grieff. ed. Civ.* iii. p. 19 (1829); *Less. Traité d'Orn.* p. 492 (1831); *Sykes, P. Z. S.* 1832, p. 151 [III. Ghauts]; *Schinz, Nat. Abbild.* Vog. p. 243, pl. 94 (1833); *Jard. Nat. Lib., Orn.* p. 186, pls. xv. & xii. (1834); *Gray, List of B. pt. iii. Gall.* p. 27 (1844); *id. Gen. B.* iii. p. 499 (1845); *Blyth, Ann. Mag. N. H.* xx. p. 388 (1847), i. p. 455 (1848); *id. Cat. Mus. As. Soc.* p. 243 (1849); *Schinz, Nat. Vog.* p. 145, pl. 69 (1853); *Burgess, P. Z. S.* 1855, p. 29; *Sace, Rev. Zool.* (2) xiv. p. 11, pl. 3 (1862); *Jerv. B. Ind.* iii. p. 539 (1863); *Sclat. List of Phas.* p. 10 (1863); *Bulger, P. Z. S.* 1866, p. 571 [Nilghiris]; *Gray, List. Gallinæ Brit. Mus.* p. 39 (1867); *Blyth, Ibis*, 1867, pp. 164, 307; *Gray, Hand-l. B.* ii. p. 261 (1870); *Elwes, Ibis*, 1870, p. 528; *Elliot, Mon. Phas.* ii. pl. 34 (1872); *Lloyd, Ibis*, 1873, p. 406; *Hume, N. & E. Ind. B.* p. 531 (1873); *Butt. Str. F.* iv. p. 5 (1876); *Fairb. Str. F.* iv. p. 262 (1876); *Hume, Str. F.* iv. p. 404 (1876); *Butt. Str. F.* v. p. 222 (1877); *Fairb. Str. F.* v. p. 409 (1877); *Marsh. B. Nest. Ind.* p. 59 (1877); *Gould, B. Asia*, vii. pl. 56 (1877); *Hume, & Marsh Gome. B. Ind.* i. p. 231, pl. (1878); *Davidson & Wend. S. R. F.* vii. p. 86 (1878); *Butt. Cat. B. Sind.* p. 53 (1879); *Mc. Troy. Str. F.* viii. p. 493 (1879); *Vidal, Str. F.* ix. p. 76 (1880); [S. Konkan]; *Biller, Str. F.* ix. p. 205 (1880); [Belgaum], p. 421 (1880); *Davidson. Str. F.* x. p. 316 (1882); *Davison, Str. F.* x. p. 409 (1883); *Swinh. & Barnes, Ibis*, 1885, p. *Taylor, Str. F.* x. p. 404 (1887); *Terry, Str. F.* x. p. 479 (1887); *Oates, ed. Hume's Nests & Eggs*, iii. p. 420 (1890).
Phasianus indicus, *Leach, Zool. Misc.* ii. p. 6, pl. 61 (1815); *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 350 (1893).
Hab. Joló.

13. Gén. POLYPLECTRON. Tim.

22. **P. emphantes**, *Sclat. Ib's.* 1878, p. 386; *Tuv. P. Z. S.* 1878, p. 623.

- P. napoleonis*, *Tuv. P. Z. S.* 1878, p. 702; *Sharpe, Ibis*; 1888, p. 203; *Blasius, Ov.* 1888, p. 317; *Everett. List. B. Born.* p. 198 (1889); *Whitehead, Ibis*, 1890, p. 57.
P. nehrkornae, *Blas. Mittb. orn. Ver. Wien.* 1891, p. 1; *id. J. f. O.* 1891, p. 10; *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 360 (1891).
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Balabac.

23. **P. napoleonis**. *Less. & P. N. v. Tandican.* (M. S. T.)

- P. napoleonis*, *Less. Traité d'Orn.* pp. 487, 650, (1831); *id.*

- Cat. de Buff.* viii, p. 323 (1836); *Gray, Gen. B.* iii, p. 493 (1845); *id. List. Coll. Br. Mus.* p. 25 (1867); *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 361 (1893).
P. emphanum, *Tem. Pl. Col.* v, pl. 18 n.^o 549 (1831); *Jard. Nat. Lib. Orn.* iv, p. 159, pl. 5 (1834); *Gray, Hand-l. B.* p. 257 (1870); *Elliot, Mon. Phas.* i, pl. 9, (1872); *Salv. Ucc. Born.* p. 304 (1874); *Oscut. Bull. Soc. Phil.* vi, p. 259 (1882).
Emphania napoleonis, *Bp. C. R.* xlvi, p. 878 (1856).
P. emphanes, *Scl. List. of Phas.* p. 12 (1863).
Hab. Balabac, Paragua, Luzón.

14 Gén. ARGUSIANUS, RAF.

24. **A**r **a**rgus, *Lin. ♂♂ N. v.* Faisan argos. (M. S. T.)

Phasianus argus, *Lin. S. N.* i, p. 272 (1766); *Gm. S. N.* i, pt. ii, p. 742 (1788).
Argusianus argus, *Tour. Ibis.* 1877, p. 322; *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 363 (1893).
Hab. Sumatra, Malaca.

15 Gén. PAVO, LIN.

25. **P** cristatus, *Lin. ♂♂ N. v.* Pavo real. (M. S. T.)

P. cristatus, *Lin. S. N.* i, p. 267 (1766); *Gm. S. N.* i, pt. ii, p. 729 (1788); *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 368 (1893).
Le Paon, *D'Aub. Pl. Enl.* pls. 433, 434.
Hab. India, Ceilan.

26. **P.** muticus, *Lin. ♂ N. v.* P. específero. (M. S. T.)

Hab. Java.

16 Gén. MELEAGRIS, LIN.

27. **M** gallo-pavo, *Lin. ♂♂ N. v.* Pavo comun. (M. S. T.)

Hab. Filipinas, (introd.)

17. Gén. NUMIDA, LIN.

28. **N** meleagris, *Lin. ♂♂ N. v.* La pintada. (M. S. T.)

N. meleagris, *Lin. S. N.* i, p. 273 (1766); *Gm. S. N.* i, pt. ii, p. 744 (1788); *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 375 (1893).
Le Peintade, *D'Aub. Pl. Lnl.* ii, pl. 80, n.^o 108.
Hab. Filipinas (introd.)

29. **N** id var. alba, ♂ N. v. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila.

18. Gén. LOPHORTYX, Br.

30. **L. californicus**, Shaw. ♂ N. v

(M. S. T.)

Tetrao californicus, Shaw et Nodd. Nat. Mus. ix. pl. 345 (1797).

L. californicus, Ogilv. Cat. B. M. 22 p. 400 (1893).

Hab. California.

Fam. MEGAPÓDIDAS.

1. Gén. MEGAPODIUS, Q. ET GAIM.

1. **M. cumingi**, Dillw. ♂ N. v. Tavon, Talinae-uac. (M. S. M.)

Megapodus rubripes, Wagler, Isis, 1829, p. 737.

M. ruipes, Gray, List of B. Gall. p. 21 (1844).

M. cumingii, Dillwyn, P. Z. S. 1851, p. 118, pl. 39; Motley & Dillwyn, Contr. N. H. Labuan, p. 32, pl. 7 (1855); Gray, P. Z. S. 1861, p. 29, 1864, p. 43; v. Martens, J. f. O. 1866, p. 26; Schl. Ned. Tiddschr. Dierk. iii. p. 263 (1866); Gray, List Gallinæ Brit. Mus. p. 21 (1867); id. Hand-l. B. ii. p. 255 (1870); Walden, Trans. Zool. Soc. ix. pp. 225, 251 (1875); Tweed. P. Z. S. 1878, p. 624; Sharpe, Ibis, 1879, p. 267; id. P. Z. S. 1879, p. 349, p. 322; Oustal. Ann. Sci. Nat. xi. p. 111 (1881); Whitehead, Ibis, 1888, p. 411; Sharpe, Ibis, 1888, p. 203; Blasius, Ornis, 1888, p. 217; Everett, P. Z. S. 1889, p. 225; id. J. As. Soc. Str. Br. p. 197 (1889); Sharpe, Ibis, 1890, p. 141; Ogilv. Cat. B. M. 22, p. 449 (1893); Sharpe, P. Z. S. 1890, p. 141.

M. gilbertii, Gray, P. Z. S. 1861, p. 289, 1864, p. 43; id. Hand-l. B. ii. p. 255 (1870); Walden, Trans. Zool. Soc. viii. p. 87 (1872); Meyer, Ibis, 1879, p. 138; Oustal. Ann. Sci. xi. p. 107 (1881); Guilleml. P. Z. S. 1885, p. 559.

M. lowi, Sharpe, P. Z. S. 1885, p. 111.

M. pusillus, Tweed. P. Z. S. 1877, p. 765, pl. lxxviii.

M. dillwini, Tweed. P. Z. S. 1877, p. 766, 1878, p. 953, 1879, p. 73; Oustal. Ann. Sci. Nat. xi. p. 118 118 (1881).

M. dillwini, Steere, List Berds. & Mamm. Philippines, p. 25 (1890).

Hab. Luzon, Laguna, Cagayan, Ilocos, Tablas, Romblon, Sibuyan, Labuan, Mindoro, Cuyo, Balabac, Dumalon, Cebú, Basífan, Joló, Tawi-tawi, Mindanao, Zamboanga, Paragua, P. Princesa, Samar, Paranas, Masbate, Marinduque; Borneo, Célebes.

2 **M. laperousii**, (Tem.) ♂ N. v. Tavon.

(M. S. T.)

Megapodus la Perouse, Quoy. et Gaim. Voy Uranie. p. 127, pl. 33. (1824).

M. laperousii, Tem. Pl. Col. v. livr. 69, p. 3 (1826); Wagler, Isis, 1829, p. 736; Less. Traité d'Orn. p. 478 (1831); id. Compl. de Buff., Ois. p. 255t pl. 9, fig. 2 (1840); Gray, Cat. B. Trop. Is. p. 46 (1859); id. P. Z. S. 1861, p. 289, 1864,

- p. 42; *Reichenb. Tauben*, pp. 5, 190, pl. 276, fig. 1532 (1862); *Schl. Mus. Pays-Bas*, viii. p. 65 (1880); *Oustal. Ann. Sci. Nat.* xi. p. 138 (1881); *id. Le Nat.* 1889, p. 261; *id. Ann. Sci. Nat. Nat.* xi. p. 196 (1891); *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 460 (1893).
M. la peyrouse, *Less. Man. d'Orn.* ii. p. 221 (1828).
M. senex, *Hartl. P. Z. S.* 1867, p. 830; *Hartl. & Finsch, P. Z. S.* 1868, pp. 7, 118, 1872, pp. 89, 103; *id. Cat. Mus. Godeff.* v. p. 11 (1874); *Finsch, J. Mus. Godeff.* iv pt. viii. p. 29, pl. v, figs. 2. & 3 (1875); *Schl. Mus. Pays-Bas*, viii. p. 65 (1880); *Oustal. Ann. Sci. Nat.* xi. p. 140 (1881); *Schmetz. Ethn. Abth. M. G.* p. 407 (1881); *Oustal. de Nai.* 1889, p. 261; *Wiglesw. Abh. Mus. Dresd.* 1892-93, n.º 6, p. 58 (1892); *Megapodius perousii*, *Wiglesw. Abh. Mus. Dresd.* 1892-93, n.º 6, p. 58 (1892).
Hab. Marianas, Palaos.

Orden: HEMIPODIOS.

Fam. TURNÍCIDOS.

1 Gen. TURNIX, BONNAT.

- 1 T. **pugnax**, (*Tem.*) N. v. Pugong-gubat. (M. S. T.)
Hemipodius pugnax, *Tem. Pig. et Gall.* iii. pp. 612, 794 (1791); *Schinw. Nat. Abbld. Vög.* p. 268 (1833); *id. Nat. Vögel.* p. 165, pl. 89 (1853).
Ortygis luzoniensis, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 185 (1822).
Tetrao Iuzoniensis, *Raffl. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 334 (1822).
Jighting Quail, *Lath. Gen. Hist.* viii. p. 341 (1823).
Turnix pugnax, *Blyth. Ibis.* 1867, p. 309; *Nibholson. Ibis.* 1881, p. 155; *Grant. Ibis.* 1889, pp. 449, 450, 458 (1893); *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 534.
T. taigoor, *Holdsw. P. Z. S.* 1872, p. 470; *Legge. Ibis.* 1874, p. 26, 1875, p. 400; *id. B. Ceylon*, iii. p. 761 (1880).
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calauan, Cagayan, Hocos, Mindoro.

2 T. **fasciata**, (*Tem.*) ♂♀ N. v. Pugong gubat. M. S. T.

- Hemipodius fasciatus, *Tem. Pig. et Gall.* iii. pp. 614, 757 (1815).
T. fasciata, *Gray. Hand-l. B.* ii. p. 270, n.º 9740 (1870); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 701; *Ramsay. Orn. Works. Tweedd.*, App. p. 659 (1881); *Grant. Ib's.* 1889, pp. 449, 450, 459. *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 535 (1893).
T. nigrescens, *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 765; *Ramsay. Orn. Works. Tweedd.*, App. p. 659 (1881); *Sharpe. Ibis.* 1888, p. 203; *Whitehead. Ibis.* 1890, p. 58.
T. haynaldi, *Blasius. Ornis.* iv. p. 317 (1888).
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calambo, Cebú, Ne-

gros, S. Antonio, Masbate, Panay, Sibuyan, Calamianes, Culion, Dumaguete, Paragua, P. Princesa.

3 **T. ocellata**, (Scop.) ♂ N. v. Pugong-daan. (M. S. T.)

Gaille de l'Isle de Luçón, *Sonn. N. Guinea*, p. 54, pl. 23 (1776). *Oriolus ocellatus*, *Scopoli, Del. Flor. Faun. Insulbr.* pt. ii, p. 88 (1786).

Tetrao luzoniensis, *Gm. S. N.* i, pt. ii, p. 767 (1788).

Perdix luzoniensis, *Lath. Ind. Orn.* ii, p. 656 (1790).

Hemipodius thoracicus, *Temm. Pig. et Gall.* iii, pp. 622, 755 (1815).

Turnix rufus, *Vieillot. 2nd. ed. Nouv. Dict. d'Hist. Nat.* xxxv, p. 48 (1823).

Ortygis ocellata, *Meyer, Nov. Act. Acad. C. L.-C. Nat. Curios.* xvi, *Suppl. Primum*, p. 101, pl. 17 (1834).

Turnix ocellatus, *Gray, Gen. B.* iii, p. 511 (1847).

Hemipodius ocellatus, *v. Martens, J. f. O.* 1866, p. 26.

Turnix ocellata, *Gray, Hand-l. B.* ii, p. 271, n.º 9750 (1870); *Walden, Ibis*, 1872, p. 107; *id Tr. Z. S.* ix, pp. 224, 251 (1875); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, p. 700; *Ramsay, Orn. Works.*

Tweedd., App. p. 659 (1881); *Grant, Ibis*, 1889, pp. 452, 469; *Ogilv. Cat. B. M.* 22, p. 536 (1893).

Hab. Luzón, Manila, Montalban, Laguna, Calauan, Cavite, Sta. Cruz, Naic, Batangas.

Orden: CORREDORAS.

Fam. CASUÁRIDAS.

1 Gén. CASUARIUS, LIN.

1 **C. emeu**, *Lath. P. E.* 313 N. v. Casuario de casco (M. S. T.)

Hab. Ceram.

2 **C. bicarunculatus**, *Sclat.* ♂ N. v. C. de carúnculas. (M. S. T.)

C. Sclat. Tr. Z. S. iv, pl. 37.
Hab. N.º Guinea.

Orden: ZANCUDAS.

Fam. OTÍDIDAS.

1 Gén. OTIS, LIN.

1 **Otis tarda**, *L. ♂ N. v. Ayutarda.* (M. S. T.)

Hab. Europa, Africa.

Fam. EDICNEMIDAS.

1. Gén. ORTHORAMPHUS, SALV.

1. **O. magnirostris**, (Geoff.) ♂♂ N. v. Tilin-tihm, Tabalabang, (M. S. T.)

Oclicenemus magnirostris, Geoff. in Vieill., N. D. xxiii, p. 23 (1818); Tem. Pl. Col. 387 (1826); S. Müll., Verhandl. Nat. Gesch. Nederl. Overz. Ber. Land-en Volkenk. p. 23 (1839-41); Schleg. Mus. P. B. Cursores, p. 22 (1855).

Charadrius magnirostris, Wagl. Syst. Av. Gen. Charadrius, esp. 3 (1827).

Ch. giganteus, Licht. in Wagl. Isis, 1829, p. 647.

Esacus magnirostris, G. R. Gray. List Gén. of. B. 2 ed. p. 83 (1841); id. Cat. B. New. Guin. p. 50 (1859); id. Hand-l. iii, p. 10 esp. 9948 (1871); Gould. B. Aust. vi, pl. 6, id. Handb.-Austr. iv, p. 213 (1865); Bp. Compt. Rend. xliii, p. 416 esp. 29 (1856); Sclat. Pr. Lin. Soc. ii, p. 169 (1858); Hald. Tr. Zool. Soc. viii, 2 p. 91 (1872).

Orthoramus magnirostris, Salv. Cat. Ucc. di Borneo, p. 312 (1874).

Hab. Paragua, P. Princesa, Samar, Borongan, Paric, Joló; Célebes, Java.

Fam. CHARÁDRIDAS.

1. Gén. SQUATEROLA, Cuv.

1. **Sq. helvetica**, (Briss.) N. v. Tuhec (M. S. T.)

Vanellus helveticus, Briss. Av. 5, p. 106 n.^o 4, t. 10, f. 1.

Tringa helvetica, Lin. S. N. p. 250 (1766); Gm. S. N. ii, p. 676.

Vanellus melanogaster, Bechst. Horsf. Tr. Lin. Soc. xiii, p. 180 (1821).

Vanneau de Suisse, Buff. Hist. Nat. Ois. 8, p. 60; Pl. Ent. n.^o 853.

Tringa subtridactyla, Hassel. Iter. Palestinum, p. 397, n.^o 28.

Sq. helvetica, Sav., Mottl. et Dilliv. Contr. Nat. Hist. of Labuan, p. 56 (1855); Sw's. sandpiper, Arc. Zool. 2 p. 478, n.^o 396; Lath. Syn. iii, p. 167, n.^o 10; G. R. Gray, Hand-l. iii, p. 13, esp. 9980 (1871); Wald. et Layard, Ibis, 1872, p. 105; Salv. Cat. Ucc. Borneo, p. 313 (1874); Brehm. Vida de los animales, 4, p. 347 (1881).

Hab. Luzon, Manila, Navotas, Samar, Paric, Negros, Siquijor, Paragua, P. Princesa, Calamianes, Cuwo, Mindanao; Borneo; Java, China.

2. **Sq. grisea**, (Briss.) ♂♂ N. v. Tarinting (M. S. T.)

Vanellus griseus, Briss. Av. 5, p. 100, n.^o 2, t. f. 1.

Pluvialis cinerea, Bell. Av. 62, Aldr. Orn. 3, p. 333.

Vanneau pluvier, Buff. H. Nat. des Oiss.

V. gris, *Buff. Pl. Ent.* n.^o 854.
Tringa squaterola, *Gm. S. N.* 2. p. 628, esp. 23 (1889)
Hab. Luzon, Manila, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Europa.

3. **Sq. varia**, *(Briss.) ♂♂ N. v.* Matang-vaca. (M. S. T.)

Vanellus varius, *Briss. Av.* 5. p. 103, n.^o 3. t. 9 f. 2.
Vanneau varié, *Buff. Pl. Ent.* n.^o 923.
Tringa varia, *Gm. var. b. S. N.* 2. p. 628 (1789); *Brehm. V. Au.* 4. p. 347.
Hab. Luzon, Manila, Navotas, Laguna, Paragua, P. Princesa, Samar, Paraná; Europa.

2. Gén. BELENOPTERUS, REICH.

4. **B. cayennensis**, *Gm.* (B. 836) ♂ N. v. Avefria de Cayena (M. S. T.).
Hab. Cayena, Brasil.

3. Gén. CHARADRIUS, LINN.

5. **Ch. fulvus**, *Gm.* ♂♂ N. v. Matang-vaca. (M. S. T.)

Fulvus pluvier, *Lath., Gén. Syn.* iii. p. 211 (1785) n.^o 17.
charadrius fulvus, *Gm. S. N.* i. p. 687 (1788); *Lath., Ind. Orn.* ii. p. 147 (1790); *Schel. Mus. Pays-Bas. Cursores*, p. 30; *Hartl. & Finsch. Beitr. Faun. Centralpolyn.* p. 188 (1867); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 403; *G. R. Gray. Hand-list.* iii. p. 14; sp. 9985 (1875); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 313; *Wald. Trans. Zool. Soc.* IX. 1875, p. 226.
C. pluvialis, *Horsf. (nec Linn.). Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 187 (1821).
C. xanthochelius, *Wagl.*, *Syst. Av. Gen. Charadrius*, sp. 37 (1827); *Gauld. B. Austr.* vi. pl. 13; *G. R. Gray. Hand-list.* iii. p. 14, sp. 9986 (1871).
C. taitensis, *Less.*, *Man. d'Orn.* ii. p. 321 (1829).
C. virginianus, *Jard. & Selb.*, iii. *Orn.* ii. pl. 81 (1830).
C. glaucopus, *Forst. Diser. An.* p. 170 (1844).
C. virginicus, *Blyth (neet Barkhausen). Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 262 (1849); *Motil. & Dillw. Contr. Nat. Hist. Lab.* p. 57 (1855); *Swinh. Ibis*, 1860, p. 358 et. loc. al.
C. longipes, *Temm. apud Bp.*, *Rev. Crit.* p. 180 (1850); *Sclat. P. Z. S.* 1863, p. 222; *Swinh. P. Z. S.* 1863, p. 309; *Jerd. B. F. Ind.* iii. p. 636 (1864); *G. R. Gray. Hand-list.* iii. p. 14, sp. 9984 (1871).
C. auratus orientalis, *Temm. & Schleg. Faun. Japon. Aves.* p. 104 t. 62 (1850).
Pluvialis longipes, *Bp.*, *Compt. Rend.* x. L. iii. p. 417, sp. 37 (1856).
Pluvialis taitensis, *Bp. ibid.* sp. 38.
P. Fulvis, *Bp.*, *ibid.* sp. 39. *Schleg. Mus. P. B. Cursores*, p. 70 (1865).
Charadrius auratus, *Wohrenck. Reis. Amurl. Vogel*, p. 410 (1890).

C. orientalis, *Gould, Hand. C. B.*, I. p. 225 (1865).
Hab. Luzon, Manila, Navotas, Malabon, Bulacan, Angat, Pugnaga, P. Princesa, Calamianes, Cebu, Basilan, Samar, Panay, Negros, Cebu, Leyte, Bohol, Silawan, Misbate, Mindanao, Siquijor, Balabac, Carolinas; Borneo, Sumatra, Célebes, China.

6. **Ch. pluvialis** *Linn.* ♂ N. v. Matang-vata. (M. S. T.)

Pluvialis viridis, *Mars., Danub.*, p. 25.
P. aurea, *Briss.*, *Ac.*, 5, p. 43, n.^o 1, t. h. f. 1.
Golden pluver, *Brit. Zool.*, n.^o 208, t. 72, *Act. Zool.*, 2, p. 483, n.^o 399; *Lath. Synt.*, 111, t. p. 193, n.^o 1.
Pluvier d'ore, *Buff. H. Nat. Ois.*, 3, p. 81, pl. *Eul.*, 904.
Ch. pluvialis, *Tur. Gen. L. N.*, 2, p. 688, n.^o 7, *Ch. nu.*, 5, 190 (1875); *Wood. Nat. Hist.*, p. 666, f. *Brehv.*, cit. p. 348, t. 110.
Hab. Luzon, Manila, Navotas, Laguna, Calamba; Europa, Alemania.

4. Gén. AEGIALITES, Bonap.

7. **Ae. peronii**, *Tem. et Scop. N. v. Tari-tung*, *Caudirung*. (M. S. T.)

Charadrius peronii, *Tem. in Mus. Lugd.*; *Bp. Compt. Rend.*, xliii, p. 417 (ex p. 68 (1856)) *Schleg. Mus. P. B. Cursores*, p. 53 (1865); *Blith. Ibis*, 1870, p. 175.
Ch. alexandrinus, *Mottl. et Dillw. Contr. Nat. Hist. Lab.*, p. 47 (1855).
Ch. philippinus, *Pelz. Navas. Reis. Virg.*, pp. 146, 162 (1865).
Aegialites peronii, *Swinh. P. Z. S.*, 1870, p. 139; *G. R. Geogr. Hand-l.*, 111, p. 16, sp. 10005 (1871); *Wil. Tr. Zool. Soc.*, viii, 2, p. 96, pl. 10, t. 2 (1872); *Salv. Ucc. Borneo*, p. 515 (1874).
Hab. Luzon, Manila, Navotas, Leyte, Bohol, Samar, Borongan, Negros, Siquijor, Mindanao; Borneo, Java, Célebes.

8. **E. dubius**, *Scop.* ♂ ♀ N. v. Tamitung. (M. S. T.)

Charadrius dubius, *Scop. D' Flor. et Faun. Insubr.*, ii, p. 93 (1786); (ex *Sonn.*, *Uer. Nov. Guia*, p. 84, pl. 30).
C. coronicus, *Beske. Schr. der berl. Nat. v. F. Ges.*, vii, p. 493 (1787); *Gm. S. V.*, iii, p. 692 (1888); *Tarce. Jour. F. Oce.*, 1860, p. 26.
C. alexandrinus, *d'Gru. S. A.*, i, p. 684 (1788) (ex *Sonne*).
C. philippinus, *Lath. Ind. Oen.*, ii, p. 745 (1790); (ex *Sonn.*, ... *Sch. f. Mu. P. B. Cursores*, p. 28, (1865)).
Ægidites philippinus, *S. L's. P. Z. S.*, 1894, p. 222; *G. R. Geogr. Hand-l.*, iii, t. 15, sp. 10001, (parte) (1871).
E. dubius, *Wald. Trans. Zool. Soc.*, viii, 2, p. 86 (1872); *Salv. Ucc. d' Borneo*, 1874, p. 316; *Wald. Iris. Zool. Soc.*, IX, 1895, p. 227.
Hab. Luzon, Manila, Navotas, Bulacan, Laguna, Calamba, Bataan, Oriñ, Guinárás, Negros, Leyte, Bohol, Mindanao, Paraguit; Borneo, Java, Célebes.

9. *Æ. mongolicus*, *Pall.* ♂ ♀ N. v. Ulenan

M. S. I.

- Charadrius mongolicus*, *Pall. Reis.* 111, p. 700 (1861).
C. mongolicus, *Pall., Zoogr. Ross. As.* ii, p. 136 (1811-1831).
Midd., Sib. Reis. ii, 1, p. 211. *ta. F.* xix fig. 2, 3 (1853);
Schrenck Reis. Amurl. *Vög.* p. 411. (1860); *Radde, Reis. S.*
O. Sib. ii, p. 324 (1863); *Schleg., Mus. P. B. Cursores.* p.
81. (1865). *Gertl. & Degl., Orn. Eur.* ii, p. 141 (1867).
Blyth., Ibis. 1867, p. 164.
C. cantianus, *Hors. F. (nec Lath.) Trans. Linn. Soc.* xiii, p.
107. (1821).
C. cirrhepidesmos, *Wagl., Syst. Av. Gen. Charadrius. sp.* 18
(1887).
C. gularis, *Wagl., op. cit. sp.* 40.
C. sanguineus, *Less., Man. d'Orn.* ii, p. 330. (1828); *id. Tr.*
d'Orn. p. 544. (1831).
C. pyrrhothorax, *Temm. apud. Gould, B. of Eur.* pl. 299. (1837);
Bp. Compt. List. Birds Eur. and N. Am. p. 45 (1838); *Temm.*
Man. 2nd ed. iv, p. 355 (1840); *Schleg. Rev. Crit.* pt. ii, p. 95,
(1844); *Bree, B. Eur.* iv, p. 18. (1862); *Tristr., P. Z. S.*
1864, p. 450. *id.* *Ibis.* 1868, p. 323.
Egaiitis pyrrhotorax, *Keys. & Blas., Wirbeltk. Eur.* p. 70 (1840);
Jerd., B. of. India, iii, p. 639 (1864); *Beavan, Ibis.* 1867, p.
332. *Pelz., Ibis.* 1868 p. 321.
Charadrius rufinellus, *Blyth. Ann. and Mag. Nat. Hist.* xii, p.
169 (1844).
Hiativala leschenaultii, *Blyth. (nec Less.) J. A. S. B.* xii, p. 188,
(1843); *id. Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 263. (1849).
Charadrius ruficollis, *Cuv. & Temm., apud. Pucher., Rev. Zool.*
1851, p. 282; *Hengst., Syst. Veteris. Vög. N. O. Afr.* p. 56
(1856).
C. subrufinus, *Hodgs. Zool. Misc.* p. 86 (1844).
Haticula inconspicua, *Licht. Nomencl. Av.* p. 94 (1854); (*de r. r.*
nulli).
H. inornata, *Gould, B. Austr.* vi, pl. 19.
Pluviorhynchus mongolus, *Bp. Compt. Rend. x. I.* iii, sp. 41
(1856); *Id., Cat. Ois. d' Eur.* p. 14 (1856).
Cirrhepidesmus pyrrhotorax, *Bp. Compt. Rend. t. c. sp.* 50. *Gr.*
R. Gray, Hand. List. iii, p. 18 sp. 9995. (1871).
Charadrius inornatus, *G. R. Gray, Cat. B. N. Guin.* p. 51.
(1859).
C. leschenaultii, *Adams. (nec Less.) P. Z. S.* 1859, p. 188;
id. Wand. Nast. India, p. 283 (1867).
Ochthodromus inornatus, *Gould. Handb. B. Austr.* ii, p. 237 (1865).
Aegialitis mongolus, *Harting, Ibis.* 1870, p. 384.
Cyrroptedesmus mongolus, *G. R. Gr. Hand.-List.* iii, p. 15. sp.
9994 (1871).
Aegialitis nongolus, *Swinh., P. Z. S.* 1871, p. 404.
Æ. mongolicus, *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 316; *Wald.*
Trans. Zool. Soc. IX. 1875, p. 227.
Hab. Leyte, Bohol, Mindoro, Baco, Negros, Panay, Paragua,
P. Princesa; Europa, Borneo, Java, Borneo, China, Australia.

10 Ae. geoffroyi, Wag. ♂♂ N. v. Candurog. (M. S. 1.)

Charadrius asiaticus, Horsf. Tr. Lin. Soc. xiii, p. 187 (1821); *Ore Pall.*; *Tristr.*, P. Z. S. 1864, p. 450; *Id. Ibis*, 1867, p. 93.
Ch. geoffroyi, Wagl., Syst. Av. Gen. *Charadrius*, sp. 19 (1827);
Kittl., Kupf. Vog. p. 26, pl. 34, f. 2. (1833); *Blyth*, J. A. S. B. xii, p. 180 (1843); *Hengl.*, *Ibis*, 1859, p. 345; *Newt. Ibis*, 1863, p. 455; *id. Ibis*, 1866, p. 343; *Blyth*, *Ibis*, 1865, p. 34; *Schlegel*, Mus. P. B. *Cursos*, p. 59 (1865).
Ch. leschenaulti, Less. Man. dan. ii, p. 322 (1828); *Swinh.*, J. A. S. B. xxix, p. 259 (1861); *Wallace*, P. Z. S. 1863, p. 488; *Layard*, B. S. Afr. p. 299 (1867).
Ch. griseus, Less. Tr. d'Orn. p. 544 (1831).
Ch. fuscus, Cuv., in *Puch.*, Rev. et Mag. Zool. 1851, p. 282.
Ch. rufinus, *Blyth*, Ann. and Mag. N. H. xii, p. 169 (1843);
Hodgs. Zool. Misc. p. 86 (1844).
Hiaticula geoffroyi, Rupp., Syst. Vog. p. 118 (1845); *Blyth*, Cat. B. Mus. A. S. B. P. 262 (1849).
H. columbina, Licht., Nomencl. p. 94 (1854).
Cirrhepides nus geoffroyi, Bp. Compt. Rend. xliv, p. 417, sp. 49 (1856); G. R. Gray, Hand-List, iii, p. 14, sp. 9993 (1871).
Aegialites geoffroyi, *Hengl.*, Syst. Vog. N. O. Afr. p. 76 (1850); *Sclat.*, P. Z. S. 1863, p. 222; *Swinh.*, *Ibis*, 1863, p. 403; *Jerd. R. of. Ind.*, iii, p. 638 (1864); *Harting*, *Ibis*, 1871, p. 378, pl. xi; *Swinh.*, P. Z. S. 1871, p. 404; *Salv. Uit. de Borneo*, 1874, p. 318; *Wald. Trans. Zool. Soc.* 9, p. 227 (1875).
Charadrius columbinus, Pelz., Novar. Reis. Vog. pp. 116, 112 (1865).
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Pampanga, Leyte, Bohol, Negros, Paragua, Puerto Princesa; Borneo, Java, Sumatra, China, Formosa.

11 Ae. cantianus, (Lath.) ♂♂ N. v. Taitting M. S. 1

Charadrius cantianus, Lath. Suppl. Ind. Orn. p. lxvi. (1801).
Ch. littoralis, albifrons, y trochilus, Brehm. l. cit. p. 351.
Ae. cantiana, albifrons, ruficeps, dealbata, y albigularis, Breh. l. c.
Hiaticula cantiana, y elegans, Brehm. l. c.
Vegicophilus cantianus, Brehm. l. cit.

Hab. Bohol, Panay, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

Fam. GLAREÓLIDAS.

1. Gén. GLAREOLA, LESS.

1. Cl. orientalis, Leach. ♂♂ N. v. Cananay-buquit. (M. S. M)

Oriental pratincola, Lath. Gen. Hist. ix, p. 365.
Pratincola orientalis.
Glareola orientalis, Leach. (nec Jerdon). Trans. Linn. Soc. xiii, 2, 132, pl. 15, f. 1, 2 (1821), (1); Horsf. ibid. p. 187 (1821);

- Gould, *B. Austr.* vi, pl. 23; Blyth, *Cat. B. Mus. A.* v. B. P. 259 (1849); *Bp. Compt. Rend.* xliii, p. 419 sp. 117 (1856); Schleg., *Handl. Dierk* i, pp. 445, 481, t. 7, f. 79 (1857-58); Jerd., *B. of. India*, iii, p. 631 (1864); Schleg., *Mus. P. B. Cursores*, p. 16 (1865); Gould, *Handb. B. Austr.* ii, p. 245 (1865); G. R. Gray, *Hand-list*, iii, p. 18, sp. 10031 (1871); Swinh., *P. Z. S.* 1871, p. 403; Salv. *Ucc. de Borneo*, 1874, p. 318.
Hirundo, y trachelia pratincola, *Brehm. V. Au.* 4, 1881, p. 3561-121.
Glareola torquata, *Jerd. Cat.* n.^o 370.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Pampanga, San Fernando, Tarlac, Pangasinan, Negros; Borneo, Java, China, Australia.

2. *G. isabel'a*, *Vieill. C. O. N. v. Canamay.* M. S. T.)

Glareola isabella, *Vieill. Nouv. Dict.* xiii, 1817, p. 221; *id. Enc. Méth.* 1823, p. 1048; *id. Gal. des Ois.* ii, 1834, p. 159; pl. 263; *Sclat., Pr. Lin. Soc.* ii, p. 160 (1858); G. R. Gray, *Cat. B. New. Guin.* 1859, p. 50; *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 320.
G. grallaria, Temm., *Man. d'Orn.* ii, 1820, p. 503; S. Müll., *Verh. Nat. Ges. Nederl. Overz. Bez. Land-en Volkenk.* 1829, 44, p. 23; Gould, *B. Austr.* vi, pl. 22; Schleg., *Handl. Dierk.* i, 1857, p. 445; *id. Mus. P. B. Cursores*, 1859, p. 18; Gould, *Handb. B. Austr.* ii, 1865, p. 243; *Wald. Trans. Zool. Soc.* viii, 2, 1872, p. 117.
G. australis, Leach, *Trans. Lin. Soc.* xiii, p. 132 Lin. 14 f. 1, 2 (1821).
Stiltia grallaria, *Bp. Compt. Rend.* xliii, p. 419, esp. 113 (1856); G. R. Gray, *Hand-l.* iii, esp. 10032, 1871, p. 117.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan, Orion; Borneo, Java, Célebes.

Fam. HEMATOPÓDIDAS.

4. Gén. STREPSILAS, Illig.

1. *St. interpres* (*Lin.*) C. O. N. v. T. (ingting). M. S. T.)

Tringa interpres, *Lin.*, *S. N. I.* p. 248 (1766).
Strepsilas interpres, Leach, *Cat. B. Mus.* p. 29 (1819); Gmel., *B. Austr.* vi, pl. 39; *Sclat., R. Linn. Soc.* ii, p. 160 (1858); G. R. Gray, *Cat. B. New. Guinea*, p. 51 (1859); Jerd., *B. of. India*, iii, p. 56 (1864); Schleg., *Mus. P. B. Cursores*, p. 12 (1865); Harl. & Finsch, *Beitr. Faun. Centralpalyn.* p. vi, iii, 2, p. 91 (1872); Salv. *Ucc. di Borneo*, 1874, p. 320; *Wald. P. Z. S.* 1878, p. 711.
St. borealis, *littoralis*, *y minor*, *Brehm. V. Au.* 4, p. 158 (1881), f. 122.
St. collaris, Mull., *Verhandl. Land-en Volkenk.* pp. 90, 110 (1839-1844).
Tringa interpres, *morinella*, *y oahuensis*, *Brehm. I. cit.* p. 358.

Cinclus interpres, *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii, p. 22 op. 10068
(1871).

Hab. Paragua, P. Princesa, Taguburus, Bohol, Siquijor, Masbate; Java, Célebes, Borneo, Europa, China.

2. Gen. HEMATOPUS, LINN.

2. **H. osculans**, Swinh. ♂♂ N. v. Candurung-dagat. (M. S. T.)

H. mantopus ostralegus, Swinh. (nec Linnaeus) *Ibis*, 1860, p. 63, 1861, pp. 261, 342; Schlegel, *Mus. P. B. Cursores*, p. 70 (parte) (1865).

Hematopus longirostris, Swinh. (nec Vieillot), *Ibis*, 1863, p. 406, id. *P. Z. S.* 1863, p. 310.

H. ostralegus, hypoleucus, balthicus, orientalis y longirostris, Brehm, *V. An.* 4, p. 359, f. 123.

H. sp., Gray, *Hand-list*, iii, p. 21, sp. 100660 (1871).

H. osculans, Swinh., *P. Z. S.* 1871, p. 405; *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba; China, Borneo.

Fam. ESCOLOPÁCIDAS

1. Gen. HIMANTOPUS, BRISSE

4. **H. leucocephalus**, Gould, ♂ ♀ N. v. Ticas-tica. (M. S. T.)

Himantopus leucocephalus, Gould, *P. Z. S.* 1837, p. 26; *S. Müll. Verhandl. Land-en. Völkenk.* p. 153 (1839-1839); Gould, *B. Austr.* vi, pl. 24 (1848); *Scat. Pr. Linn. Soc.* ii, p. 106 (1858); *G. R. Gray*, *Cat. B. New Guinea*, p. 52 (1859); Schlegel *Mus. P. B. Scopulares*, p. 106 (1864); Blyth, *Ibis*, 1865, p. 35; *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii, p. 48 op. 10295 (1871); *Wald. Trans. Zool. Soc.* viii, 2, p. 91 (1872); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1871, p. 321.

H. melanopterus, S. Müll. (nec Temm.), *Verh. Nat. Gesch. Niederr. overz. Bez. Land-en. Völkenk.* p. 32 (1839-1844).

♀ *H. intermedius*, Blyth, *J. A. S. B.* xviii; *id. Cat. B. Mus. J. A. S. B.* p. 265 (1840); *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii, p. 47 sp. 10293 (1871).

Hab. Mindanao, Luzón, Manila.

2. **H. autumnalis**, Harv. ♂♂ N. v. Candurung-dagat. (M. S. T.)

Charadrius autumnalis, Hasselby, *Iter Palatinum*, p. 253, n. 29 (1757); *Reise nach Palästina, Gadeb, Germ Tr.* p. 308, n. 29, (1762).

Himantopus rufipes, Bechts. v. Martem. *J. f. O.* 1806, 28, n. 100. *Hab.* Luzón, Laguna.

3. **H. minor**, Nat. ♂♂ N. v. Ticas-tica. (M. S. T.)

Hab. Mindoro, Baco.

2. Gen. RECURVIROSTRA, LIN.

4. **R. avocetta**, Lin. ♂ ♀ N. v. Candurung. (M. S. T.)

Scopung avosetta, *Brit. Zool.* 2. n.^o 228 t. 8; *Auct. Zool.* 2. p. 503.; *B. Lath. Syn. III.* i. p. 293, n.^o 1.
Avocetta, *Buff. H. N. Ois.* 8. p. 465. t. 38; *Pl. Ent.* n.^o 353.
Recurvirostra avocetta, *Lin. S. N.* 2. p. 693, n.^o 1; *Brehm. T.*
An. 1881, 4. p. 392, f. 126.
Hab. Paragua, P. Princesa.

3. Gen. CALIDRIS, ILLIGER.

5. **C. arenaria** Lin. ♂ ♀ N. v. Canduru. (M. S. T.)

Tringa arenaria, *Lin. S. N.* i. p. 251 (1766); *Jerd. B. of. India.* III, p. 964 (1864); *Schleg. Mus. P.-B. Scolopaces.* p. 55 (1864);
Swinh. P. Z. S. 1871, p. 408; *G. R. Gray Hand-List III,*
p. 51, sp. 10324 (1871); *Brehm.* 4. p. 371.
Calidris arenaria, *Salv. Ucc. de Borneo*, 1874, p. 322.
Hab. Luzón, Laguna; China, Formosa, Java, Borneo?

4. Gen. LIMICOLA, KOCH.

6. **L. platyrhyncha**, (Temm.) ♂ ♀ N. v. Candurung-dagat. (M. S. T.)

Numenius pigmaeus, *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 713 (1890).
Limicola pigmaea, *Baier. Zool.*, p. 315 (1816); (*nec N. pygmaeus*,
Lath.?); *Brehm. T. Anim.* 4. 1881, p. 370.
Tringa platyrhyncha, Temm.; *Blyth. Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 269 (1849); *Schleg. Mus. P.-B. Scolopaces.* p. 46 (1864); *Jerd. B. of. India III*, p. 692 (1864); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 408;
G. R. Gray, Hand-List. III, p. 49, sp. 10305 (1871).
Limicola platyrhyncha, *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 322.
Hab. Luzon, Manila, Navotas, Paragua, P. Princesa, Cala-
mianes, Culion, Bohol, Negros; Europa, China, Java, Borneo.

5. Gen. PEIUDNA, CUV.

7. **P. subarquata**, (Gulden) ♂ ♀ N. v. (M. S. T.)

Scolopax subarquata, *Guldenst. Nov. Comm. Petrop.* xix, p. 471
(1775).
Tringa subarquata, *Temm. Man. II.* p. 609 (1820); *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. p. 193 (1821); *S. Müll. Verhandl. Land-en Volkenk.* p. 110 (1839-1844); *Blyth. Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 269 (1849); *Jerd. B. of. Ind. III.* p. 689 (1864); *Schleg. Mus. P.-B. Scolopaces.* p. 81 (1864).
Schornielus subarquatus (!) *G. R. Gray List Spec. B. Brit. Mus. III.* *Grallæ.* p. 105 (1844); *Gould. B. Austr.* vi. pl. 32 (1848).
Acylocheilus subarquatus, (?) *Bp. Compt. Rend.* XLII, p. 591.

sp. 213 (1856); *Gould*, *Andb. B. Austr.* II, p. 256 (1856);
Brehm, *V. An.* 4. 1881, p. 372.

A. subarquata, *G. R. Gr. Hand-list.* III, p. 50, sp. 10319 (1871);
Tringa subarquata (?) *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 409.

Pelidna subarquata, *Solv.* *Ucc. di Borneo*, 1874, p. 322.

Hab. Luzón, Manilá, Malabón, Bataan, Orion, Negros, Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion, Símar, Borongan, Loquilocum; Borneo, Java, China, Europa, Asia.

8. *P. alpina* (*Linn.*) ♂♂ N. v. Tarniting.

M. S. T.

Tringa alpina, *Linn.* *S. N.* 1. p. 294, sp. 11 (1766); *Brehm*,
V. An. 4. p. 372.

T. cinclus, *Linn.* *ibid.* p. 251, sp. 18 (1766); *Blyth*, *Cat. B. Mus.*
A. S. B. p. 269 (1849); *Jerd. B. of. Ind.* iii. p. 690 (1864);
Schleg. Mus. P. B. Scopaces, 2 (1864).

T. chinensis, *Gray. Zool. Misc.* p. 2.

T. cinclus, var. *chinensis*, *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 408.

Schoeniculus cinclus, *G. R. Gray. Hand-list.* iii. p. 49, sp. 10310
(1871).

Pelidna alpina, *Solv.* *Ucc. di Borneo*, 1874, p. 323.

Hab. Luzón, Manila, Bulacán, Paragua, P. Princesa; Borneo, Java, Europa.

9. *P. acuminata* (*Horsf.*) ♂♀ N. v. Taringting.

M. S. T.

Totanus acuminatus, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 192 (1831).

Tringa australis, *Jard. & Selby*, iii. *Orn.* ii. pl. 91.

Schoeniculus australis, *G. R. Gr. y List. B. Brit. Mus.* iii. p. 105
(1844); *Gould B. Austr.* vi. pl. 80 (1844).

: *Tringa rufescens*, *Mdd. (nec Vieill.) Sib. Reis.* ii. p. 22 (1853).

T. acuminata, *Swinh.*, *Ibis*, 1863, p. 412; *Schleg. Mus. P.-L.*
Scopaces, 38 (1864); *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 409.

Limnocinclus acuminatus, *Gould. Handb. B. Austr.* ii. p. 254 (1855);
G. R. Gr. Hand-list. iii. p. 49, sp. 10304 (1871).

Pelidna acuminata, *Solv.* *Ucc. di Borneo*, 1874, p. 323.

Hab. Luzón, Manila, Malabón, Laguna, Calamba, Paragua, Inaguan; Java, Borneo, Australia.

o Gén. ACTODROMAS, KAUP.

10. *A. albescens*, (*Tem.*) ♂♂ N. v. Taguinting, Candura.

M. S. T.

Tringa albescens, *Tem. Pl. Col.* 41. f. 2. (1824); *G. R. Gray. Cat. B. N. Guin.* p. 52 (1850); *Rosenb. Sourn. f. ornith.*
1864, p. 135; *Sharpe, & Dress. B. of. Eur. ncl. testo. dell' T. minuta*, pp. 45-1871 (1873).

Calidris australis, *Cav. Mus. Paris.*

Tringa australis, *Less. Tr. d' Orn.* p. 558 (1831).

T. pusilla, *Mull. Verh. Nat. Gesch. Nederl. Overz. Bes. Land-en.*
Volkenk. p. 23 (1839-1834).

Schoeniculus albescens, *Gould. B.* vi. pl. 31 (1848); *Sclat. P.*
Linn. Soc. ii. p. 170 (1858).

Actodromus albescens, *Bp. Compt. Rend.* xlvi. p. 596 sp. 223
(1856); *Solv.* *Ucc. di Borneo*, 1874, p. 323.

- Tringa minuta*, Schleg. *Mus. P.-B. Scolopaces*, p. 43 (*parte*) (1864); *Wald Trans. Zool. Soc.* viii, 2 p. 97 (1872).
Actodromas australis, Gould. *Handb. B. Austr.* ii, p. 257 (1865).
A. albescens, G. R. Gray, *Hand-list*, iii, p. 50, sp. 10312 (1871).
Tringa salina, Swinh. *P. Z. S.* 1871, p. 409. (*parte*).
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Paragua, Tagburus, Calamianes, Culion; Borneo, Java, Célebes.

11. *Fe temminckii*, (Leistl) ♂♂ N. v. Taguinting. (M. S. T.)

- Tringa pusilla*, Lath. *Ind. Orn.* p. 737 (1890, *nec* Linn.).
T. temminckii, Leistl. *Nachtrag* zu Bechst. *Naturg. Deutschl.* i, p. 75 (1811); Blyth. *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 270 (1849); Jerd. *B. of. Ind.* iii, p. 621 (1864); Schleg. *Mus. P. B. Scolopaces*, p. 47 (1864); Swinh. *P. Z. S.* 1871, p. 409; Brehm. f. p. 374.
Pelidna temminckii, Boie, *Isis*, 1826, p. 979.
Limoneites temminckii, Kaup, *Naturl. Syst.* p. 38 (1829); G. R. Gray, *Hand-list*, iii, p. 50, sp. 10315 (1871).
Actodromus temminckii, Kaup, *Bp. Compt. Rend.* xlvi. p. 396. sp. 219 (1856); Salv. *Ucc. di Borneo*, 1874, p. 324.
Hab. Luzon, Manila, Navotas; Borneo, China, Europa.

12. *Ac salina*, (Pall) ♂♂ N. v. Canduru. (M. S. T.)

- Tringa salina*, Pall, *Itin.* iii, App. p. 700 (1776); *Ind. Zoogr. Rosso-As.* ii, p. 191 (1810-31); Dybowsky, *Journ.* 1868, p. 337; Hartl. & Finsch, *Vög. O. Afr.* p. 766 (*nota*) (1870); Sharpe & Dress *B. of. Eur.* testo de ella *T. minuta*, pp. 4, 5 (1871-72).
T. ruficollis, Gm. *S. N. I.* p. 688 (1788); Lath. *Ind. Orn.* p. 736 (1790); Vieill. *Enc. Meth.* p. 1088 (1823).
Potanus damacus, Horsf., *Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 192 (1821).
Tringa brevirostris, Kuhl, *litt. et Temm.* (*ex parte*).
T. subminuta, Midd. *Sib. Reis.* p. 222 t. xix, f. 6 (1858); Swinh. *Ibis*, 1862, p. 255; 1861, p. 37.
Actodromus minutus, a. *brevirostris*, Bp. *Compt. Rend.* xlvi. p. 596 (1856).
Tringa damaccensis, Swinh. *Ibis*, 1863, p. 418; id. *P. Z. S.* *P. Z. S.* 1863, p. 316; Schleg. *Mus. P. B. Scolopaces*, p. 48 (1864); Swinh. *P. Z. S.* 1871, p. 409; *Wald. Trans. Zool. Soc.* viii, 2, p. 97 (1872).
Actodromias salina; G. R. Gray, *Hand-list*, iii, p. 50, sp. 10313 (1871); Salv. *Ucc. Borneo*, 1874, p. 324.
Hab. Luzon, Manila, Malabon, Cebú, Negros, Paragua, P. Princesa; Borneo, Formosa, Célebes.

7. Gén TRINGA, LIN.

: *T. crassirostris*, Tem. et Schl ♂♂ N. v. Candurung-bato (M. S. T.)

- Tringa crassirostris*, Tem. et Schleg. *Faun. Japon. Aves*, pl. 64 (1846), p. 107 (1850); Midd. *Sib. Reis.* ii, 2, p. 219 (1855); Schrenck, *Reis. Amurl. Vogel*, p. 420 (1860); Schleg. *Mus.*

P.-B. Scolopaces, p. 28 (1864); *Blyth, Ibis*, 1865, p. 34; *Salv. Ucc. de Borneo*, 1874, p. 325.
Schoeniculus magnus, *Gould, P. Z. S.* 1848, p. 39 *Id. B. Austr.* vi, pl. 33 (1848).
Tringa magna, *Bp. Compt. Rend.* xliii, p. 596, sp. 211 (1856).
T. tenuirostris, *Swinh. P. Z. S.* 1863, p. 315; *Gould, Handb. B. Austr.* ii, p. 260 (1865); *P. R. Gray, Hand-list.* iii, p. 49, sp. 10301 (1871); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 408.
Hab. Luzon, Manila, Malabon, Negros; Borneo, Java, China, Japon.

14. **T. canutus?** (*Lath.*) ♂♂ N. v. Candurung. (M. S. T.)
Hab. Luzon, Manila, Malabon; Europa.

8. Gén. TRINGOIDES, Bp.

15. **Tr. hypoleucus.** (*Lhi.*) ♂♂ N. v. Tica ticang manti. (M. S. T.)
Tringa hypoleucus, *Lin. S. N.* i, p. 250 (1766).
Actitis hypoleucus, iii, *Prodri. Syst. Mamm. et. Av.* p. 262 (1811);
F. Boie, Is's, 1822, p. 649; *Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 267 (1849); *Bp. Compt. Rend.* xiii, p. 597, sp. 250 (1856);
Schleg. Mus. P. B. Scolopaces, p. 80 (1864); *Jord. B. of. Ind.* iii, p. 699 (1864); *Rosenb. Journ. F. Orn.* 1864, p. 135; *Gould, Handb. B. Austr.* ii, p. 263 (1865); *Wald. Trans. Zool. Soc.* viii, 2, p. 96 (1872); *Brehm, V. An.* 4, 1881, p. 381; *Tweed. P. Z. S.* 1877, p. 793.
Tringa leucoptera, *Pall. Zoogr. Rosso-As.* p. 196 (1816-31).
Totanus hypoleucus, *Temm. Man.* p. 424 (1815); *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 192 (1821); *S. Moll., Verhandl. Landen Volkenk.* p. 22 (1839-44); *Wall. P. Z. S.* 1863, p. 487.
Totanus guinetta, *Leach, Syst. Cat. M. and. B. Brit. Mus.* p. 30 (1816).
Actitis stagnalis, *Brehm. Handb. Nat. Vög. Deutschl.* p. 649 (1831).
Guinetta hypoleuca, *G. R. Gray List. Gen. B.* p. 68 (184).
Tringoides hypoleuca, *G. R. Gray, List. Gen. B.* p. 88 (1848);
Möll. & Dltw., Contr. Nat. Hist. of. Lab. p. 60 (1855);
Selat. P. Z. S. 1863, p. 222; *G. R. Gray, Hand-list.* iii, p. 46, sp. 10279 (1871); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 406; *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 326.
Actitis s. empusa, *Gould, P. Z. S.* 1845, p. 222; *id. B. Austr.* vi, pl. 35 (1848); *Bp. Compt. Rend.* xlvi, p. 597, sp. 259 (1856).
Actitis schlegelii, *Bp. I. C.* sp. 252.
Tringoides empusa, *Selat. Pr. Lin. Soc.* ii, p. 170 (1858).
Totanus empusa, *G. R. Gray, Cat. B. New. Guin.* p. 52 (1859).
Hab. Bohol, Paragua, P. Princess, Masbate, Caramianes, Cebu, Samar, Borongan, Tawi-tawi; Formosa, Java, Sumatra.

9. Gén. TOTANUS, BECHST.

16. **T. glareola**, (*Linn.*) ♂♂ N. v. Tica-tica. (M. S. T.)

Tringa glareola, *Lin. S. N.* i, p. 250 (1766).
Totanus glareolas, *Temm.* p. 421 (1815); *Schleg. Mus. P.-B.**

Scolopaces, p. 71 (1864); *Pelz. Novar. Reis.* pp. 131, 162 (1865); *Swinh., P. Z. S.* 1871, p. 406; *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 327; *Brehm, V. An.* 4, p. 387; *Blas. Ornis.* 1888, p. 320.

Totanus affinis, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 191 (1821); *Gray & Hardw.* iii. *Ind. Zool.* t. 51, f. 2; *Strickl., Auct. and. Mag. Nat. Hist.* xiv, p. 120 (1844); *Sclat. P. Z. S.* 1863, p. 222; *P. Z. S.* 1863, p. 311.

T. grallatorius, *Steph.* in *Shaw, Gen. Zool.* xii, p. 148 (1824).

T. glareoloides, *Hodg.*

Phycophilus glareola, *Kaup, Nat. Syst.* p. 140 (1829); *G. R. Gray, Hand-list*, iii, p. 44, sp. 10260 (1871).

Tringa littorea, *Pall. Zoogr. Rossio-As.* p. 195 (1810-31).

Totanus sylvestris, *Brehm, Handb. Nat. Vög. Deutschl.* p. 638 (1831).

T. palus ris, *Brehm, op. cit.* p. 639.

Actitis glareola, *Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 267 (1849); *Jerd. B. of India* iii, p. 697 (1864); *Wald, Trans. Zoot. Soc.* viii, 2, p. 96 (1872).

Hab. Luzon, Manila, Negros, Panay, Guimarás, Paragua Basílan, Cebú, Siquijor, Calamianes, Culion; Borneo, Java, Célebes, Europa.

16. *T. ochropus*, *Linn.* ♀ N. v. Tarinting.

(M. S. T.)

Hab. Paragua, P. Princesa.

17. *T. calidris*, (*Gm.*) ♂♂ N. v. Tica-tica.

(M. S. T.)

Totanus striatus, *Briss. Orn.* v, p. 196, n.^o 5, t. 12, f. 1 (1760).

T. naevius, *Briss. op. cit.* p. 230, n.^o 6.

Scolopax calidris, *Gm., S. N. I.* p. 664 (1788).

Tringa gaibetta, *Gm., op. cit.* p. 671, n.^o 3. *

T. striata, *Gm., op. cit.* 672, n.^o 5.

Totanus calidris, *B'chst., Orn. Taschenb. Deutschl.* ii, p. 284 (1803); *Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 266, (1849); *Schleg., Mus. P. B. Scolopaces*, p. 65 (1864); *Jerd., of. India*, ii, p. 702 (1864). — *Swinh., P. Z. S.* 1871, p. 406. *G. R. Gray, Hand-List*, iii, p. 45, sp. 102 72 (1871) — *Wald, Trans. Zoot. Soc.* viii, 2, p. 97 (1872); *id. ibidem*, IX, 1875, p. 234; *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 328; *Brehm, V. Anim.* 4, 1881, p. 386.

Gambetta calidris, *Bb.*, *Compt. Rend.* xlivi, p. 597 (1856).

Hab. Negros, Siquijor, Cebú, Paragua, P. Princesa, Basílan; Europa.

18. *T. stagnalis* *Becht.* ♂♂ N. v. Tica ticang munti.

(M. S. T.)

Totanus stagnalis, *Bchs. Orn. Taschenb. Deutschl.* ii, p. 292 (1803); *Gould, B. Austr.* vi, pl. 37 (1848); *Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 266 (1849); *Jerd. B. of Ind.* iii, p. 701 (1864); *Schleg., Mus. P. B. Scolopaces*, p. 68 (1864); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 405; *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 328; *Brehm, V. An.* 4, 1880, p. 384.

- Tringa guinetta*, *Pallas*, *Zoogr. Rosso-As.* ii. p. 195 (1810-1831).
Totanus tenuirostris, *Horsf.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 192 (1821).
T. horsfieldii, *Sykes*, *Cat.* p. 196.
T. lathami, *Gray*, & *Hardw.*, iii. ind *Zool. pl.* 51 f. 3.
T. stagnalis, *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii. p. 44, sp. 10266 (1871).
Hab. Luzon, Manila, Malabon, Navotas, Laguna, Calamba; Borneo, Java, China, Europa.

19. **T. glottis**, (*Lin.*) ♂♂ N. v. Tica-tica (M. S. T.)

- Scolopax glottis*, *Linn. S. N.* i. p. 245, sp. 10 (1766).
S. totanus, *Linn.*, *ibid.* sp. 13.
S. canescens, *Gm.*, *S. N.* i. p. 668 (1788).
Totanus glottis, *Buchst.*, *Orn. Träschensb. Deutschl.* ii. p. 287 (1803); *Horsf.*, *Trans. Lin. Soc.* xiii. p. 192 (1821); *Blyth. Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 265 (1864); *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 495; *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.* viii., 2, p. 96 (1872); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 328; *Bremh. V. Ani.* 4, p. 384.
Glottis nivigula, *Hodges*, *Zool. Misc.* ii. p. 36 (1831).
Totanus glottoides, *Vig.*, *P. Z. S.* 1831, p. 173; *Gould.*, *Cent. Hist. B.* pl. 76.
Limosa glottoides, *Sykes*, *P. Z. S.* 1832, p. 163.
Glottis vigorsii, *G. R. Gray*, *List. Spec. B. Brit. Mus.* iii. *Grallae*, p. 39 (1844).
Glottis horsfieldii, *G. R. Gray*, *ibid.*
Totanus horsfieldii, *G. R. Gray*, *Gén. B.* iii. p. 573 (1846); *Sclat.*, *P. Z. S.* 1863, p. 222.
Glottis glottoides, *Gould*, *B. Austr.* vi. pl. 36 (1848); *id.*, *Handb. B. Austr.* ii. p. 265 (1865).
Totanus canescens, *Adams*, *P. Z. S.* 1859, p. 169; *Sharpe & Dress. B. Eur.* pl. 42 (1871-1872).
Glottis glottis, *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii. p. 45, sp. 10276 (1871).
Hab. Luzon, Manila, Malabon, Negros; Borneo, Java, Célebes, China, Europa.

19. **T. incanus**, (*Gm.*) ♂♂ N. v. Tugil, Tarintung. (M. S. I.)

- Scolopax incanus*, *Gm. S. N.* i. p. 658 (1788); *ex-Lath.*, *Gm. Syn.* iii. p. 154; *Lath.*, *Ind. Orn.* p. 724 (1790).
Totanus incanus, *Vieill.*, *N. D.* iv. p. 410 (1816); *id. Enc. Meth.* p. 1098 (1823); *G. R. Gray*, *B. Isl.* p. 50 (1859); *Sclat.*, *P. Z. S.* 1864, p. 9. *Schleg. Misc. P. B. Scolopaces*, p. 74 (1864); *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 406; *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 329.
T. brevipes, *Vieill.*, *N. D.* iv. p. 410 (1816); *id. Enc. Meth.* p. 1106 (1823); *Puch.*, *Rev. et Mag. de Zool.* 1851, pp. 370, 370; *Cass.*, *Pr. Ac. Philad.* viii. p. 40 (1856); *id. Pr. Ac.*, *Philad.* 1861, p. 321; *id. Un. Sl. Expl. Expl. Orn.* p. 319 (1858); *G. R. Gray*, *B. Trop. Isl.* p. 51 (1859); *Swinh.*, *P. Z. S.* 1863, p. 312; *Pelz.*, *Novar. Reis. Vög.* p. 129 (1865).
Tringa glareola, *Pall.* (*nec. auct.*), *Zoogr. Rosso-As.* ii. 194, t. 60 (1810-31).
Totanus pedestris, *Less.*, *Tr. d'Orn.* p. 553 (1881).

- T. fuliginosus*, *Gould*, *Voy. Beagle, Birds*, p. 130 (1843).
Scopopax undulata, *Forst.*, *Descr. An.* p. 173 (1844).
S. pacifica, *Forst.*, *op. cit.* p. 174.
S. aedicnemus, *Licht.*, *Mus. Berol.*
Totanus pulverulentus, *S. Müll.*, *Verh. Nat. Gesch. Nederl. overz. Bez. Lutten. Volkenk.* p. 153 (1839-1844); *Temm. & Schleg.*, *Faun. Japon. Aves*, p. 109, t. 65 (1850); *Midd.*, *Sibir Reis. Zool. Vög.* p. 24 (1853); *Radde*, *Reis. O. Sib.* ii. p. 326 (1863).
Totanus oceanicus, *Less.*, *Descr. Mamm. et Ois.* p. 224 (1847); *Bp.*, *Compt. Rend.* xli. p. 1112 (1855); *Cass.*, *Un. St. Expl. Expl. Orn.* p. 318 (1858).
T. griseopygius, *Gould*, *P. Z. S.* 1848, p. 39; *id.*, *B. Austr.* vi. pi. 38 (1848); *G. R. Gray*, *P. Z. S.* 1860, p. 364.
T. solitarius, *Btoxh.*, *Byr. Voy.* p. 244.
T. polynesiæ, *Peale*, *Un. St. Expl. Expl. Birds*, p. 237, pl. 65, f. 1 (1841); *Hartl. Wiegmu. Arch.* 1852, p. 120; *id.*, *op. cit.* p. 134.
Actitis brevipes, *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 267 (1849).
Totanus scolopaceus, *Licht.* ap. *Midd. Sibir. Reis. Zool. Vög.* p. 214 (1853).
Actitis brevipes, *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 267, (1849).
Gambetta fuliginosa, *Bp.* *Compt. Rend.* xlvi, p. 597, sp. 234 (1856).
G. oceanica, *pulverulenta*, *griseopygia*, *brevipes*, *Bp.* *op. cit.* sp. 235, 236, 237, 238.
Heteroscelus crevipes, *Baird*, *B. N. Am.* p. 734 (1858); *id. Attas*, pl. 88. *G. R. Gray*, *Hand-List.* iii. p. 45, sp. 18271 (1871).
Totanus undulatus, *forst.* ap. *verr. Revet. Mag. Zool.* 1860, p. 437.
Gambetta pulverulentus, *Gould*, *Handb. B. Austr.* ii, p. 268 (1865).
Actitis incanus, *Hartl.* & *Finsch.*, *Faun. Centralpolin.* p. 182 (1867).
Heteroscelus incanues, *G. R. Gray*, *Hand-List.* iii. p. 45, sp. 18270 (1871).
Hab. Bohol, Samar, Calbayoc, Negros, Siquijor, Mindanao, Paragua, P. Princesa; Borneo, China.

10. Gén. TEREKIA, Bp.

21. *T. cinerea*, (*Guld.n.*) ♂♂ N. v. Tarinting. (M. S. 1.)

- Scopopax cinerea*, *Guldenst.* *N. Comm. Petrop.* xix, p. 473. t. xix (1774). *Gm.* *S. N.* i. p. 657. (1788).
Terek snipe, *Lath.*, *Gen. Syu.* v., p. 155 (1785).
Scolop x terek, *Lath.*, *ind. Orn.* ii, p. 724 (1790).
Totanus javanicus, *Horsf.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 193. (1828).
Scopopax sumatrana, *Raffi*, *Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 327 (1822).
Numenius cinereus, *Vieill. Enc. Meth.* p. 1157 (1823).

- Fedoa terekensis*, Steph., Gen. Zool. xii, i, p. 83 (1824).
Nenus cinereus, Kaup, Naturl. Syst. p. 115 (1829); G. R. Gray, List spec. B. Bril. Mus. iii. Grallae, p. 96, (1844); Blas, List. B. Eur. p. 18 (1862; Finsch, Trans. Zool. Soc. vii. p. 328 (1870); Brehm, v. An. 4. 1881, p. 383.
Limicula (err.) indiana, Less., Tr. d'Orn. p. 554 (1831).
Limosa recurvirostra, Pall. Zoogr. Rosso As. ii. p. 181 (1810); Schleg. Rev. Crit. p. lxxxviii. (1844).
Terekia javanica, Bp. Comp. List. B. Eur. and. N. Am. p. 52 (1838); Swinh., P. Z. S. 1862, p. 319.
Limosa terek, Temm. Man. d' Orn. iv, p. 426 (1840); Gould, B. Eur. iv, pl. 307.
L. (Simorhynchus) cinerea, Keys. & Blas, Wirbelth. Eur. pp. lxxi, 212 (1840).
Tenekia cinerea, G. R. Gray, List. Gen. B. p. 88 (1840); Gould, Austr. vi. pl. 34 (1848); Blyt, Cat. B. Mus. A. S. B. p. 267 (1849); Bp. Compt. Rend. xliv, p. 597, sp. 267. (1856); Swinh. Ibis, 1863, p. 97; id. P. Z. S. 1453, p. 312; Jerd, Bof. Ind. ii. p. 682 (1849); Gould, Handb. B. Aves r. ii, p. 261 (1865); Salvad, Ibis, 1870, p. 154; G. R. Gray, Hand. List, iii, p. 44, sp. 10265 (1871); Salvad., Faun d'Ital. Uccelli, p. 221 (1870-71); Swinh., P. Z. S. (1871), p. 405; Sharpe & Dress, B. of. Eur. pl. lxxx (1871-72); Salv. Ucc. di Borneo, 1874, p. 330; Tweed: P. Z. S. 1873, p. 711.
Terekia guttata, Nordm. apud. Bp. Compt. Rend. xliv, p. 597; sp. 268 (1856).
Limosa cinerea, Blas & Naum, Vog. Deutschl. xiii, pt. 2 p. 48, t. 386; 1.3 (1860).
Totanus cinereus, Schleg., Mus. P. B. Scolopaces, p. 77 (1864).
Hab. Paragua, Tagburus, Bohol, Negros, Masbate; Borneo, Sumatra, China.

II. Gén. LIMOSA BRISS.

22. L. melanuroides. Gould ♂♂ N. v. Tica-tica. (M. S. T.)

- Limosa melanuroides*, Gould. P. Z. S. 1845, p. 84; id. B. Austr. vi, pl. 28 (1848); Id. Handb. B. Austr. ii, p. 251 (1865); G. R. Gray, Hand. List, iii, p. 43, sp. 10260 (1871); Sharpe & Dress, B. of. Eur. nel testo della *L. aegocephala*, p. 3 (1872); Salv. Ucc. di Borneo, 1874, p. 331.
L. melanura, Temm. & Schleg., Faun. Sap. Aves. p. 113 (1850); Swinh., P. Z. S. 1863, p. 313; id. Ibis, 1868, p. 58.
L. brevipes, Scheleg, (nec Gray), Mus. P.-B. Scolopaces, p. 21 (1864); Swinh., P. Z. S. 1871, p. 405.
Hab. Luzon, Manila, Navotas, Bulacan; Borneo, China.

23. L. baueri, Naum. ♂♂ N. v. Tica-tica. (M. S. T.)

- Limosa baueri*, Naum, Vog. Deutschl. viii, p. 429 (1836); Buller. B. New. Zealand, p. 198 (1872); Salv. Ucc. di Borneo, 1874, p. 331.
L. lapponica, var. *novae zealandiae*, Gray, Voy. Erebus and Terror, Birds, p. 13, 1844.

- L. australasiana, Gray, List B. Brit. M. III, Grelle, 1844, p. 96.
L. novae zealandiae, Gray, Gen. B. iii, p. 570 (1847); id. Hand-List. iii, p. 43, sp. 10262 (1871); Sharpe & Dress., B. of Eur. nel testo della L. aegocephala, p. 3 (1872).
L. uropygialis, Gould, P. Z. S. 1848, p. 33; id. B. Austr. vi, pl. 29 (1848); Schleg., Mus. P.-B. Scolopaces, p. 25 (1864); Handl. B. Austr. ii, p. 252 (1863); Hartl. & Finsch., Faun. Centralpolyn. p. 177 (1867); G. R. Gray, Hand-List., iii, p. 43, sp. 10261, (1871); Swinh., P. Z. S. 1871, p. 406; Walld., Trans. Zool. Soc. viii, 2, p. 97 (1872); Sharpe & Dress., B. of Eur. nel testo della L. aegocephala, p. 3 (1872).
L. fodi, Peale, U. S. Expl. Exh. Birds, p. 231, pl. 65 (1848).
L. rufa, Temm. & Schleg. Faun. Jap. Aves, p. 114 (1850).
Gallinago punctata, Ellman, Zool. 1851, p. 7470.
Hab. Bohol, Negros, Luzon, Manila, Calaoan; Célebes, China, Java.

24. L. aegocephala, ♂♂ N. v. Tica-tica.

(M. S. T.)

- Scolopax aegocephala, Lin. S. N. 2, p. 67 n.º 16.
Limosa barge rouse, Buff. H. N. Ois. 7, p. 505 Pl. Ent. 870, 916.
L. aegocephala, islandica, y jodreca, Brehm. V. An. 4, 1801, p. 389; Wood. Nat. Hist. 1854, p. 694.
Scopax limosa, belgica y aegocephala, Brehm. l. c.
Hab. Luzón, Manila, Malabón, Bulacan, Negros; Europa, Asia

25. L. brevipes, Gray. N. v. Tica-tica.

(M. S. T.)

- G. R. Gray, List. B. M. Grelle, p. 93 (1844).
Hab. Luzón, Manila, Malabón, Mindoro Bacó; Borneo, Java, China.

12. Gén. PSEUDOSCOLOPAX, BLYTH

26. Ps. semipalmatus, (Jerd) ♂♂ N. v. Tica-tica.

(M. S. T.)

- Macrorhamphus semipalmatus, Jerd, in. Blyth, J. A. S. B. xvii, p. 252 (1848); Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B. p. 27 (1849); Jerd. B. of. India, iii, p. 679 (1874).
M. guiseus semipalmatus, Bp., Compt. Rend. xliv, p. 579, sp. 201, var. a. (1856).
Pseudoscolopax semipalmatus, Blyth, (1859) Swinh., P. Z. S. 1863, pp. 181, 313; G. R. Gray, Hand-List. iii, p. 52, sp. 10327 (1871); Swinh., P. Z. S. 1871, p. 407; Salv. Vec. B. Borneo, 1875, p. 332.
Micropalama tacksawinskia, J. Ver. Rev. et Mag. de Zool. 1860, p. 206, pl. xiv.
Limosa semipalmata, Schleg., Mus. P. B. Scolopaces, p. 26 (1864).
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Borneo, China.

12. (Gen. NUMENIUS Bon.)

27. **N. arquata.** (Linn.) ♂♂ N. v. Balangaitan, Canumit. (M. S. T.)

Scolopax arquata, Linn. S. N. i. p. 242 (1766).
Numenius arquatus, Lath. Ind. Orn. ii. p. 710 (1790); *Ind. Cat.* n.^o 355; *Blyth. Cat. Br. Mus. I. S. B.* p. 298 (1849); *Jerd. B. of. Ind.* iii. p. 683 (1864); *Schleg. Mus. P. B. Scolopaces*, p. 85 (1864); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 33; *Brehm. V. An. 4.* p. 394, t. 127.

Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo, Java, Sumatra.

28. **N. lineatus** Steere N. v.

Hab. Negros.

29. **N. major.** Temm. & Schleg. ♂♂ N. v. Balangaitan, Canumit. (M. S. T.)

Numenius major, Temm. & Schleg., *Fam. Jap. Aves*, p. 110, pl. lxvi, 1850; *Schleg. Mus. P. B. Scolopaces*, p. 89 (1855); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 333.
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo, Java, Sumatra.

30. **N. australis**, Gould ♂♂ N. v. Balangaitan. (M. S. T.)

♂ *Scolopax tahitiensis*, Gmel. N. i. p. 550 (1888); (*ex Lath. Syn.* iii. i. p. 122, n.^o 4).
Numenius tahitiensis, Lath. Ind. Orn. ii. p. 711 (1800); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 410.
N. cyanopus, Vieill. N. D. viii. p. 306 (1817); *Gould. Handb. B. Austr.* ii. p. 277 (1865).
N. australis, Gould, *P. Z. S.* 1837, p. 155; *id.*, *B. Austr.* vi. pl. 42 (1888); *Schrenck. Reis. Amurl. Vog.* p. 426 (1860); *Schleg. Mus. P. B. Scolopaces*, p. 91 (1864); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 332.
N. major, Temm. & Schleg., *Fam. Jap. Aves*, p. 110, t. lxvi, (1850), (parte).
N. rufescens, Gould, *P. Z. S.* 1862, p. 286 *id.*, *B. of Asia*, pt. xvi. pl. 13 (1864).
Hab. Luzón, Manila, Malabon, Bulacan; Formosa, Japon, Australia.

31. **N. phaeopus.** Linn. ♂♂ N. v. Balangaitan. (M. S. T.)

Scolopax phaeopus, Linn., S. N. i. p. 245 (1871); *Gmel. S. N.* ii. p. 957.
Corleus, Buff. H. N. Ois. 8. p. 27; *Pl. Eul.* n.^o 842.
Numenius phaeopus, Lath. Ind. Orn. ii. p. 711 (1790); *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 191 (1821); *S. Mull. Verh. Nat. Gesch. Nederl. Overz. Bez. Land-en Volkenk.* p. 22 (1830-44); *Schleg. Mus. P. B. Scolopaces*, p. 97 (1864); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 410; *Wald. Trans. Zool. Soc.* viii. 2, p. 96 (1872); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 332; *Brehm. V. An. 4.* p. 394

- : N. uropygialis, *Gould*, *P. Z. S.* 1840, p. 175; *id.*, *B. Austr.* vi. pl. 43 (1848).
Hab. Panay, Negros, Cebú, Siquijor, Calamianes, Cuyo; Borneo, Java, Sumatra, Célebes.

32. **N. minutus**, *Gould*. ♂♂ N. v. Candurung-dagat. (M. S. T.)

- Numenius minutus*, *Gould*, *P. Z. S.* 1840, p. 176; *Scheleg.* *Mus. P. B. Scolopaces*, p. 101 (1864); *id.* *Ned. Tijdschr. Dierk.* 1866, p. 348; *Swink*, *P. Z. S.* 1871, p. 409; *Wald.* *Trans. Zool. Soc.* viii. 2, p. 96 (1872); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1871, p. 356.
N. minor, *S. Mull.* (*nec Briss.*), *Verh. Nat. Gesch. Nederl. Overz. Bez. Land-en Volkenk.* p. 110 (1839-44); *Temm.* & *Schleg.*, *Faun. Jap. Aves*, p. 111, pl. 67 (1850); *Gould*, *Handb. B. Austr.* ii. p. 280 (1865); *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii. p. 53, sp. 10254 (1871).
N. uropygialis, *G. R. Gray*, *Cat. B. New. Guin.* p. 51 (1859) (parte).
Hab. Luzón, Manila, Calaocan, Laguna; China, Japon, Australia.

33. **N. luzoniensis**, (*Gm.*) ♂♂ N. v. Candurung, Canunuat (M. S. T.)

- Scolopax luzoniensis*, *Gm. S. N.* ii. 656.
Courlis tachaté de l' île de Luçon, *Sonn.*; *Buff. H. N. Ois.* 8, p. 32.
Hab. Luzón, Manila, Malabon.

14. Gén. GALLINAGO, STEPH.

34. **G. megala**, *Swinh.* ♂♂ N. v. Candurung buquit. (M. S. T.)

- Gallinago solitaria*, *Swinh.* (*nec Hodgs.*), *Ibis*, 1860, p. 66.
G. megala, *Swinh.*, *Ibis*, 1861, p. 343; *Schleg.* *Mus. P. B. Scolopaces*, p. 12 (1864); *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 407; *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 334; *Wald.* *Trans. Zool. Soc.* ix. 1875, p. 235.
G. stenura, *Radde* (*nec Kabl.*), *Reise S.-O. Sibis.* p. 334, Taf. xiii. f. 1-3 (1863).
Spilura megala, *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii. p. 53, sp. 10345 (1871); *Wald.* *Trans. Zool. Soc.* viii. 2, p. 98 (1872).
Hab. Panay, Negros, Siquijor, Leyte, Samar, Paric, Masbate, Sibuyan, Calamianes, Basilan, Tawi-tawi, Zamboanga, Mindanao; China, Célebes.

35. **G. scolopacina**, *Bp.* ♂♂ N. v. Candurung. (M. S. T.)

- Scolopax gallinago*, *Linn. S. N.* i. p. 244 n.º 7 (1760).
Recassine, *Buff. H. N. Ois. Pl. Eul.* n.º 883.
Gallinago scolopacina, *Bp.* *Compt. Rend.* p. 579, *Wald.* 1875, p. 397. *Orn. Rend. Philip.*
Hab. Luzón, Manila, Bohol, Leyte; Europa.

15 Gén. PAVONCELLA, LEACH.

36 P pugnax, *Lin*) ♂♂ N. v. Pavon de mar.

(M. S. T.)

Hab. Australia.

16 Gén. SPIURA, Br.

37 S. stenura, (*Kuhl*) ♂♂ N. v. Taringting.

(M. S. T.)

Scolopax gallinago, *Horsf.* (nec *Linn*), *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 191 (1821); *Raffl.*, *ibid.* p. 327 (1822); *Jerd.*, *Cat.* p. 337 (*artimp*).

S. stenura, *Kuhl*, in *Bp.*, *Ann. di Stor. Nat.* iii. fasc. x. 1830; *Isis*, 1833, p. 1077.

S. stenoptera, *Temm.* (*ubii?*).

S. horsfieldii, *G. R. Gray*, *iii. ind. Zool.* pl. 54, f. 2 (1834); *Wall.*, *P. Z. S.* 1863, p. 487.

S. strenua, *G. R. Gray*, (1834).

S. biclavata, *Hodgs.* *P. Z. S.* 1837, p. 491.

S. heterura, *Hodgs.* *Eyt.*, *P. Z. S.* 1839, p. 107.

S. pectinicauda, *Peale*, *U. S. Expl. Exp. Birds*, p. 227 (1848). *Gallinago stenura*, *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 272 (1849); *Cass. U. S. Expl. Orn.* p. 313. (1858); *Jerd.*, *B. of. India*, iii. p. 674 (1864); *Schleg.*, *Mus. P.-B. Scolopaces*, p. 12 (1864); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 334.

Scolopax indica, *Light.* (nec *Hodgs.*), *Nomencl.* p. 93 (1854).

Spilura horsfieldii, *Bp. Compt. Rend.* xliii. p. p. 579, sp. 168 (1856); *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii. p. 53 sp. 10344 (1871).

Scolopax (*Gallinago*) heterura, *Cab.*, n.^o sp., *Mart. Journ. J. Orn.* 1866, p. 28.

Gallinago horsfieldii, *Swinh.* *P. Z. S.* 1861, p. 407.

G. heterocerca, *Cab.*, *fide Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 407.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Minoro, Baco; Borneo, Sumatra, China.

17 Gén. RHYNCHEA, CUV.

38 Rh bengalensis (*Lin*) ♂♂ N. v. Pacobo.

(M. S. T.)

Rallus bengalensis, *Lin*, *S. N.* i. p. 263 (1800).

Scolopax capensis, *Linn*; *Raffl.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 327 (1822).

Rhynchaea orientalis, *Horsf.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 193 (1821).

Rh. variegata, *Vieill.*, *Gal. Ois.* ii. p. 109, pl. 240 (1824); *Schleg.*, *Mus. P.-B. Scolopaces*, p. 16 (1864); *Brehm*, *V. An.* 4, p. 447, p. 147.

Rh. australis, *Gould*, *P. Z. S.* 1837, p. 135; *id. B. Austr.* vi. pl. 41 (1848).

Rh. bengalensis, *G. R. Gr.* *Jerd.*, *B. of. India*, xiii. p. 677 (1864); *Swinh.* *P. Z. S.* 1871, p. 408; *G. R. Gr.* *Hand-l.* iii. p. 55. sp. 10357; *Salv. Ucc. Borneo*, 1874, p. 335; *Wald.* *Trans. Zool. Soc.* ix. 1875, p. 235.

Hab. Zambanga, Mindanao, Luzon, Manila, Malabon, Laguna, Calamba, Siquijor, Panay; Java, Sumatra, China.

IS Gén. SCOLOPAX, LIN.

39 Sc rusticola, Lin. ♂ N. v. Becada commun.

(M. S. T.)

Hab. Europa.

Fam. RALLIDAS.

1. Gén. HYPOTENIDIA, Rehb.

1. H striata, (Lin). ♂ N. v. Tieling-gubat

(M. S. T.)

Rallus philippensis striatus, Briss. Orn. v. p. 167, n.^o 5 t. 14, f. 2.

R. striatus, Lin. S. N. i. p. 262 (1766); ex Bris. Gm. S. N. i. p. 714 (1788); Less. Tr. d' Orn. p. 536 (1831); Blyth. Cat. B. Mus. A. S. B. p. 285 (1849); Jerd. B. of India, iii. p. 726 (1864).

Rallus gularis, Horsf. Trans. Linn. Soc. xiii. p. 196 (1821); Raffles, ibid. p. 328 (1822); Bernst. Journ. f. Orn. 1821, p. 190; Sclat. P. Z. S. 1863, p. 223.

R. philippinus, Blyth. (nec R. philippensis, Linnaeus).

R. indicus, Verreaux. ap. Rehb., Syn. Av. iii. Rassores, t. 201, f. 2575-76.

Hypotaenidia striata, Bp. Compt. Rend. xliv. p. 599, sp. 334 (1850); Schleg. Mus. P. B. Ralli, p. 24 (1865); G. R. Gray, Hand-list. iii. p. 57, sp. 10378 (1871); Swinh. P. Z. S. 1871, p. 415; Wald. Trans. Zool. Soc. viii. 2, p. 95 (1872); Ib's, 1872, p. 382; Pelz. Ib's, 1873, p. 40; Sav. Ucc. d' Borneo, 1874, p. 336; Sharpe, Cat. B. M. 23, 1894, p. 33.

Fulabeornis celebensis, Pelz. (nec Auct.), Novar. Re's, Tög. pp. 134, 162 (1865).

Hab. Luzon, Manila, Caloocan, Laguna, Cagayan, Ilocos, Mindoro, Samar, Negros, Panay, Guimaras, Mindanao, Siquijor, Calamianes; Java, Borneo, Célebes.

2. H. torquata, Briss. ♂ N. v. Tieling-tae, Balintauac. (M. S. T.)

Rallus philippensis torquatus, Briss. Orn. v. p. 170, n.^o 6 (1766); Gm. S. N. ii. 714, n.^o 6.

R. torquatus, Lin. S. N. ed. 12, i. p. 262 (1766); ex Brisson. R. lineatus, Cuv. Mus. Paris, fide Puch. Rev. et Mag. Zool. 1851, p. 276; Lesson. Tr. p. 536, n.^o 11 (1831).

R. torquatus, Briss. Meyer, Nov. Act. Ac. C. L. C. Nat. Cuv. Suppl. prim. p. 108, pl. 10; Lesson. I. c. n.^o 12.

Hypotenidia torquata, Watt. On the Birds. Philipp. 1875, p. 394; Sharpe Cat. B. M. 23, 1894, p. 43.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Ca'amba, Bataan, Orion, Marinduque, Mindoro, Romblon, Siquijor, Masbate, Panay, Samar, Mindanao.

1. *H. philippinensis*, *Ru* ♂ ♀ N. v. Tichou. (M. S. 1.)

Rallus philippinensis, *Briss.*, *Orn.*, v., p. 163, n. 4; *Linn.*, *S. N.*, i., p. 263, n. 7, 1766; *ex Brissom*; *Schlegel*, *Mus. Pays-Bas*, *Rall.*, p. 23; *Wald.*, *Tr. Z. S.*, viii., p. 95; *Butler*, *Birds N. Zooland*, part. iii., pl. 6.

Rale rayé des Philippines, *D'Aubent.*, *Pl. Ent.*, 774.

Hypotaenidia philippinensis, *Wald.*, *On Bird. Philipp.*, p. 394, 1875.
Hab., Luzón, Manila, Mindoro, Calapán.

2. *AMAUERNIS*, REICH.

4. *A. olivacea*, *Meyer*, ♂ ♀ N. v. Quijao. (M. S. 1.)

Gallinula olivacea, *Meyer*, *Nov. Act. Ac. C. L. C. Cuv.*, xv., *Suppl. prim.*, p. 109, pl. 20 (1834).

Amauernis olivacea, *Reich.*, *Natürl. Syst. Wld.*, *On Birds Phil.*, 1875, p. 392 far 33 f. 2; *Sharp.*, *Cat. B. M.*, 23, 1894, p. 156.

Hab., Luzón, Manila, Si-ujor, Leyte, Samar, Borongan, Panay, Cebú.

3. Gén. *RALLINA*, RCHB.

5. *R. fasciata*, (*Raffl.*) ♂ ♀ N. v. Tieling-paule. (M. S. 1.)

Rallus fasciatus, *Raffl.*, *Trans. Linn. Soc.*, xiii., p. 328 (1822).

Gallinula euryzona, *Temm.*, *Pl. Coll.*, 417 (1829).

Crex fasciata, *Blyth*, 7. *A. S. B.*, xi., p. 797 (1842).

Coretrura fasciata, *G. R. Gray*, *Gen. B.*, p. 595 (1849).

Porzana fasciata, *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S. B.*, p. 285 (1849); *Jerd. B. of. Ind.*, iii., p. 275 (1854).

Rallina euryzona, *Rchb.*, *Syn. iii. Rasores*, t. cxx (209), f. 1186.

Hypotaenidia euryzona, *Rchb.*, *Ac. Syst. Nat.*, p. xxiii. (1852).

Rallina fasciata, *G. R. Gray*, *Gen. and Subgen. of B.*, p. 121 (1855); *Schleg.*, *Mus. P. B. Ralli*, p. 19 (1865); *id. Ned. Tijdschr. Dierk.*, iii., p. 349 (1866); *Hartl. & Finsch.*, *P. Z. S.*, 1858, p. 7; *G. R. Gray*, *Hant-list*, p. 68, sp. 1039 (1871); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 337.

Euryzona fasciata, *Bp.*, *Compt. Rend.*, xlvi., p. 599, sp. 342 (1856).
Hab., Luzón, Manila, San Mateo, Montalban, Bulacán, Lobomboy; Java, Borneo, Sumatra.

6. *R. fusca*, (*Tinn.*) ♂ ♀ N. v. Tieling-gui-st. (M. S. 1.)

Rallus philippinensis fusca, *Briss.*, *Orn. U.*, p. 173, t. 15, f. 2.

R. fusca *Linn.*, *S. N.*, i., p. 262 (1766); *ex Brissom*, *Gm. S. N.*, ii., p. 713, n.º 4.

Rale brune des Philippines, *D'Aubent.*, *Pl. Ent.*, 773.

Gallinula rubiginosa, *Temm.*, *Pl. Coll.*, 357 (1825).

Porzana fusca, *Blyth*, *Cat. A. S. B.*, p. 285 (1849); *Jerd. B. of India*, iii., p. 724 (1864).

Euryzona rubiginosa *Bp.*, *Compt. Rend.*, xlvi., p. 599, sp. 344 (1856).

Rallina fusca, Schleg., *Mus. P.-B. Ralli*, p. 20 (1863); G. R. Gray, *Hand-lis*, iii. p. 58, sp. 10391 (*parte*) (1871); Salv. Ucc. di Borneo, 1874, p. 338.

Limnobaenus rubiginosus, Sund., *Meth. Nat. Av. dispon. Tentamen*, p. 131 (1873).

Hab. Luzón, Maní'a, Navotas, Cagayan, Alcalá, Abulung, Ilocos, Mindanao.

7. **R. rufigenis**, ♂♀ N. v. (*Wall.*) Tiebling-tubigan. (M. S. T.)

Porzana rufigenys, *Wall.*, *P. Z. S.* 1865, p. 480; *Newt. Zool. Rec.* 1865, p. 128.

Rallina rufigenis, G. R. Gray, *Hand-list*, iii. 58, sp. 10396 (1871).

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan; Java, Borneo, Sumatra.

8. **R. euryzonoides**, (*Lafres.*) ♂♂ N. v. Tiebling. (M. S. T.)

Gallinula euryzonoides, *Lafres. Rev. Zool.* 1845, p. 368.

Rallina euryzonoides, *Tw. P. Z. S.* 1877, p. 767; 1878, pp. 288, 345; Sharpe, *Cat. B. M.* 23, 1894, p. 78, lam. viii.

Hab. Luzón, Mindoro, Baco, Panay, Negros, Leyte, Cebú, Joló.

4. Gén. ORTYGOMETRA, LIN.

9. **O. cinerea**, (*Vieill.*) ♂♀ N. v. Tica, Matang-bayani (M. S. T.)

Porphyrio cinereus, Vieill., (*nec Rallus cinereus, Vieill.*), *N. D.* xxviii. p. 29 (1819); *id. Enc. Méth.* iii. p. 1049 (1823); Puch., *Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 563.

Rallus quadristriatus Horsf., *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 196 (1821).

Gallinula superciliosa, Temm. (*nec Sws.*)

G. leucosoma, Sws., *Two Cent. ant. a Duart.* p. 348.

Rallus tannensis, Forst., *Descr. An.* p. 275 (1844).

R. quadristratus, Temm. (*fide Licht.*)

Crex quadristrata, Licht., in. Forst., *Descr. An.* p. 275 (nota) (1844).

Rallus nigrolineatus, Hodgs. (*M. S.*), G. R. Gray, *List. Spec. B. Brit. Mus.* iii. *Grallae*, p. 117 (1844).

R. superciliosus, Eyt. Ann. and. Mag. N. H. 1845, p. 230.

Gallinula mystacina, *Mus. Paris.* (*fide Bonaparte*).

Zapornia nigrolineata, Hodgs., *J. A. S. B.* 1845, p. 281, n.^o 765; Gray, *Cat. Hodgs. Coll. B. Mus.* p. 143 (1840).

Porzana leucophrys, Gould, *P. Z. S.* 1847, p. 33; *id. B. Austr.* vi. pl. 81 (1848).

P. quadristrigata, Blyth, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 284 (1849); Wall. *P. Z. S.* 1863, p. 487.

Erythra leucophrys, Bp., *Compt. Rend.* xliii. p. 600, sp. 405 (1856).

E. cinerea, Bp., *op. cit.* sp. 406.

E. cinerea, var. media, Bp. *ibid.* (*ex Borneo*).

E. cinerea var. minima, Bp. *ibid.* (*ex Nova Guinea*).

Ortygometra tannensis, G. R. Gray, *Cat. B. Trop. Isl.* p. 52 (1859).

Porzana (Zapornia) leucophrys, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.* 1860, p. 437.

Ortygometra superciliaris, *G. R. Gr.*, *Cat. Hodgs. Coll. B. Mus.*,
2.^o ed; p. 75 (1833).

Porzana cinerea, *Schleg. Mus. P. B. Ralli*, p. 32 (1865).

Erythra quadristrigata, *Gould, Handb. B. Austr.* ii p. 343 (1865);
Ortygometra quadristrigata, *Hartl. & Finsch, Faun. Centralpo-*
lyn. p. 164 (1867); *id.*, *P. Z. S.* 1868, p. 8.

Zapornia quadristrigata, *G. R. Gray, Hand-list.* iii. p. 68 sp.
1044 (1871).

Ortygometra cinerea, *Wald., Trans. Zool. Soc.* viii. p. 2, p. 94
(1872); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 339.

Hab. Luzon, Manila, Laguna, Calauan, Los Baños, Guimarás,
Cebú, Naga, Siquijor, Leyte, Marinduque, Mindoro, Naujan, Panay,
Negros, Paragua, P. Princesa, Basilan; Borneo, Célebes,
Java.

5 Gén PORZANA. V.

10. *P. erythrothorax*, *Steere*, N. v.

Hab. Siquijor.

11. *P. palykuli*, *Steere*, N. v.

Hab. Basilan.

12. *P. bailloni*, *Vieill.* ♂ N. v. *Tieling*. (M. S. T.)

Crax pygmaea, *Natom*, *Schleg. Mus. Pays-Bas. Ralli*, p. 30 (1829).

Porzana pygmaea, *Wald. Birds. Philipp.* 1875, p. 392.

Hab. Luzon, Manila, Navotas.

6 Gén GALLICREX, BLYTH

12. *G. cristata*, *Lath.* ♂ N. v. *Manunggabut*. (M. S. T.)

Crested gallinule, *Lath. Syn.* iii. i. p. 267 n.^o 22.

{ *Fulica cinerea*, *Gm.*, *S. N.* i. 702 (1788); (*ex Lath.*)

Gallinula cristata, *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 773 (1800); *Schleg. Mus.*,
P. B. Ralli p. 39 (1865).

G. cinerea, *Vieill. N. D.* xiii. p. 404 (1817); *Mart., Journ. f.*
Orn. 1866, p. 29; *Sharpe, Cat. B. M.* 23, 1894, p. 183.

G. plumbea, *Horsf.*, *ibid.*

G. gularis, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 195 (1821) (?).

G. lugubris, *Horsf.*, *ibid.* (?).

G. naevia, *Less. Tr. d'Orn.* p. 534 (1831).

G. porphyrioides, *Less.*, *ibid.*

G. rufescens, *Jerd., Madr. Journ.* xii. p. 205 (1840).

Gallicrex cristatus, *Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 283 (1849);

Bp. Compt. Rend. xlvi. p. 600, sp. 400 (1865); *Jerd. B. of.*

India, iii. p. 716 (1864); *Holstw. P. Z. S.* 1872, p. 475.

Crex lugubris, *Rehb.*, *Syn. Av.* iii. *Rasores*, t. 201 f. 257-273.

Hypnodeus lugubris, *Rehb.*, *Av. Syst. Nat.* p. xxiii. (1852).

Gallinulophaga cristata, *Bp.* (1854).

Gallicrex cristata, *Sclat.*, *P. Z. S.* 1863, p. 223; *G. R. Gray.*

Hand-list, iii. p. 67, sp. 10511 (1871); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 404; *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 340.

Hab. Luzon, Laguna, Cagayan, Ilocos, Mindoro, Calapan, Marinduque, Panay, Masbate, Cebú, Mindanao, Joló; Borneo, Java, China, Formosa.

7. Gén. ERYTHRA, RICH.

14. *E. phoenicura*, (Penn.) ♂ N. v. Taliuacuac. (M. S. T.)

Rallus phoenicurus, *Penn. Ind. Zool.* p. 19, pl. 9 (1781); *Gm. S. N. I.* p. 715 (1788).

Fulica chinensis, *Bodd. Tabl. Pl. Enl.* p. 54 (1783) (*ex Buff. Pl. Enl. 896.*)

Gallinula phoenicura, *Lath. Ind. Orn.* ii. p. 770 (1790); *Less. Tr. d. Orn.* p. 534; (1831); *Mottl. & Dillw., Contr. Nat. Hist. Lab.* p. 60 (1855); *Jerd B. of. India*, iii. p. 720 (1864); *Schleg., Mus. P. B. Ralli*, p. 41 (1865); *Pelz., Novar. Reis. Vög.* pp. 133, 162 (1865); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 414.

Gallinula erythrina, *Bechst.*, *fide Schlegel*, t. c.

Porphyrio phoenicurus, *Vieill.*, *N. D.* xxviii p. 29 (1819).

Gallinula javanica, *Horsf. Linn. Trans.* xiii. p. 136 (1821); *id. Zool. Res. in Java*, *Gen. Ind.* (1824).

?*Rallus sumatrana*, *Raffl.*, *Linn. Trans.* xiii. p. 324 (1822).

?*Porzana phoenicura*, *Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 284 (1849); *Sclat.*, *P. Z. S.* 1863; p. 223.

Erythra phoenicura *Rchb.*, *Av. Syst. Nat.* p. xxi (1852); *Bp. Compt. Rend.* xlivi. p. 600, sp. 403 (1856); *G. R. Gray, Hand-list*, iii. p. 67, sp. 10508 (1871); *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.*, viii. 2, p. 94 (1872); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 340.

?*Porzana?*, *Sclat.*, *P. Z. S.* 1863, p. 223.

Hab. Luzon, Laguna, Marinduque, Mindoro, Baco, Calamianes, Siquijor, Mindanao, Paragua, P. Princesa, Joló, Basilan, Tawi-tawi; Borneo, Java, Célebes, Sumatra.

8. Gén. GALLINULA, BRIS

15. *G. orientalis*, *Horsf.* ♂ N. v. Uluc, Mangugobog. (M. S. T.)

Gallinula orientalis, *Horsf., Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 195 (1821); *Raffl.*, *ibid.* p. 329 (1822); *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.* viii. 2, p. 94 (1872); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 342.

G. ardosiacia, *Vieill.*, *Gal.* p. 173, pl. 268 (1825).

G. chloropus, *Schleg.*, *Mus. P. B. Ralli*, p. 45 (parte), (1865); *G. R. Gray, Hand-list*, iii. p. 66, sp. 10495 (parte), (1871); *Wood. Nat. H.* 2, p. 717 fig.; *Sharpe, Cat. B. M.* 23, 1894, p. 169.

Stagnicola chloropus, *minor*, *partifrons*, *brochiptera*, *Brehm. V. An.* 4, p. 457.

Hab. Luzon, Manila, Navotas, Laguna, Biñan, Santa Rosa, Cagayan, Pamplona, Mindoro, Naujan, Panay, Guimarás; Borneo, Célebes, Sumatra.

16. G. ♂ N. v. Agbagat

(M. S. T.)

Hab. Luzon, Laguna, Calauan.

9. Gen. PORPHYRIO, Bress

17. P. pulverulentus, Tem. ♂♂ N. v. Agbagat

(M. S. T.)

Porphyrion pulverulentus, Tem. Pl. Col. 405 (1826); v. Martens, J. F. O. 1869, p. 29, n.^o 176; Wald. Or. Birds. Philipp., p. 391, 1875; Sharpe, Cat. B. 23, 1894, p. 507.

P. poliocephalus, Lath. apud Schlegel, Mus. Pays-Bas, Ralli, p. n.^o Lith. Comp. Walden, Tr. Z. S. viii, p. 92.

Hab. Luzon, Laguna, Calamba, Mindoro, Calapan.

10. Gen. PORPHYRIO, Bress

18. P. indicus, Forst. ♂♂ N. v. Agbagat

(M. S. T.)

Porphyrion indicus, Horsf. Tr. Lin. Soc. xiii, p. 194 (1821); Cass. Cn. St. Expl. Exp. Orn. p. 308 (1858); G. R. Gray, B. Trop. Isl. p. 53 (1859); Schlegel, Mus. P. B. Ralli, p. 55 (1865); Finsch & Hartlaub, Faun. Centralpolyn., p. 170, pl. xii, 1, 2 (1867); G. R. Gray, Hand-list, iii, p. 64, sp. 1048 (1871); Wald., Trans. Zool. Soc. viii, 2, p. 92 (1872); Salv. Vec. di Borneo, 1874, p. 342.

Porphyrio smaragdinus, Temm., Pl. Col. 421 (1827 (ex Java.)) Less. Man. d'Orn. ii, p. 297 (1828).

P. melanopterus, Temm., Mus. Lugd. (ex Geram); G. R. Gr., op. cit. p. 65, sp. 10483 (1871).

Parphirion samoensis, Peale, U. S. Expl. Birds, p. 220, pl. 62, t. 1 (1848); Hartl., Wieg. Arch. f. Naturg. 1852, p. 118; G. R. Gray, op. cit. p. 65, sp. 10482, (1871).

Hab. Luzon, Manila, Bulicán, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Célebes, Java, Sumatra.

11. Gen. FULICA, Lin.

19. F. atra, Lin. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Hab. Europa.

Fam. PÄRRIDAS.

1. Gen. HYDROPIASIANUS, Wag.

1. H. chirurgus, Scop. ♂♂ N. v. G. og

(M. S. T.)

Le Chirurgien d'isle de Luçon, Sina. Voy. Nouv. Guin. p. 82 pl. 45.

Tringa chirurgus, Scop., Del For. et. Faun. Insubr. p. 92 (1781) (ex Sina).

- Parra* *luzoniensis*, *Gm.*, *S. N.* i, p. 790, n.^o 13 (1788, ex *Soum*).
P. sinensis, *Gm.*, *ibid.* n.^o 15, ex *Lath.*, *Schleg.*, *Mus. P. B. Rallii*, p. 71 (1865); *Mart.*, *Journ. f. Orn.* 1892, p. 29.
Hidrophasianus sinensis, *Hagl.*, *Isis*, 1832, p. 270; *Gould*, *B. Is.* pt. vii, pl. 3 (1855); *Wood*, *Not. Hist.* 1852, 2, p. 710.
Parra *phoenicura*, *Hodgs.* in *Gray's Zool. Misc.* p. 86.
Hidrophasianus chirurgus, *chirurgus*, *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S.* p. 273 (1849); *Jerd.*, *B. of Ind.* iii, p. 70, sp. 10540, (1875); *Swinth*, *P. Z. S.* 1871, p. 414; *Holdsw.*, *P. Z. S.* 1872, p. 475; *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 343.
Hab. Luzon, Manila, S. Mateo, Montalban, Laguna, Calamba, Los Baños, N.^o Ecija, Rosales, Cagayan, Alcalá, Rocos, Mindoro; Java, China, Formosa, Ceylon.

Fam. GRÚIDAS.

I. Gén. ANTIGONE. Reichenb.

- i. **M. torquata**, *Wittl.* ♂♂ N. v. Tipol.

(M. S. T.)

- Ardea antigone*, *Lin.*, *S. N.* ii, p. 622.
grus orientalis indica, *Briss.*, *Av.* 5, p. 378, n.^o 7.
greater indian crane, *Edw.*, *Glean. Av.* t. 45.
Indian crane, *Lath.*, *Syn. III*, i, p. 38 esp. 4.
Grus torquata, *Gm.* var. *C. S. N.* ii, p. 622; *Brehm*, *V. An.* 4, 1881, p. 435.
Grue a collier, *Buff.*, *Ois.* vii, p. 307, pl. ent. 865.
Ardea torbueta, *Viell.*, *Gal. Ois.* t. 256; *Reich.*, *Syst. Av.* t. 214, 1, 425 et t. 18 t. 1239 ad. ex *Viell.* 1240.
Autigone torquata, *Bp.*, *Comp. Av.* 2, p. 100. (1854).
Hab. Luzon, N.^o Ecija, Pangasinan, Villani, S. Nicols; Australia, Asia.

Fam. ARDEIDAS.

i. Gen. ARDEA, LIN.

- i. **A. sumatrana**, *Raff.* ♂♂ N. v. Arandungao.

(M. S. T.)

- Ardea sumatrana*, *Raff.*, *Linn. Soc.* xiii, p. 325 (1829); *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 278 (1849); *Jerd.*, *B. of Ind.* iii, p. 740 (1864); *Gould*, *Handb. B. Austr.* ii, p. 296 (1865); *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.* viii, 2, p. 98 (1872); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 344.
A. typhon, *Tenui.*, *Pl. Col.* 475 (1829); *G. R. Gray*, *P. Z. S.* 1860, p. 363; *Schleg.*, *Mus. P. B. Ardeidae*, p. 3 (1863); *Wall.*, *P. Z. S.* 1863, p. 287; *Schleg.*, *Ned. Tijdsch. Dierk.* iii, p. 348 (1860).
A. rectirostris, *Gould*, *P. Z. S.* 1842, p. 22; *id. B. Austr.* vi, pl. 54 (1848).
A. fusca, *Blyth*, *Ann. and. Mag. N. H.* xiii, p. 176 (1844) (juv.).
A. insignis, *Hodgs.*, *Grig's Zool. Mus.* p. 26.

A. robusta, *S. Müller*, in litt.

Typhon temminckii, *Rehb.* *Syst. Av. Nat.* p. xvi. (1852).

Ardeomega nobilis, *Blyth*, *apud Bp. Conspl.* ii. p. 109 (*Enc. Bl. 1855*); *Blyth*, *Ib's*, 1865, p. 36.

Ardea goliath, *Tomm.* ex *Célebes*, *apud Bp.* *op. cit.* p. 10 (1855); *Typhon robusta*, *Bp.* *op. cit.* p. 100 (1855).

Ty. sumatrana, *Bp.* *op. cit.* p. 113 (1855); *Gray*, *Hand-list*, n. p. 27, sp. 10105 (1871).

Ty. rectirostris, *Bp.* *op. cit.* p. 110 (1855).

Hab. Paragua, P. Princesa; Célebes, Sumatra, Australia, Gilolo.

2. **A cinerea**, *Lin.* ♂♂ N v. Candangeo na pati. (M. S. T.)

Ardea cinerea, *Lin.* *S. N.* i. p. 236 (1766); *Horsf.* *Tr. Lin. Soc.* viii. p. 188 (1821); *Schleg.* *Mus. P. B. Ardeæ*, p. 5 (1863); *Jerd.* *B. of India*, iii. p. 742 (1864); *Gould*, *Handb. B. Austr.* ii. p. 295 (1865); *Swinh.* *P. Z. S.* 1871, p. 411; *G. R. Gray*, *Hand-l.* iii. p. 26 esp. 10099 (1871); *Salv.* *Ucc. di Borneo*, 1874, p. 344; *Brehm*, 4. p. 422.

A. brag. *Z. Geogr. Belang.* *Voy.* pl. 8.

A. leucophrys, *Gould*, *P. Z. S.* 1848, p. 58; *id.* *B. Austr.* vi. pl. 55 (1848).

Hab. Guimaras, Luzon, Manila, Malabon; Java, Chin, Europa.

3. **A purpurea**, *Lin.* ♂♂ N v. Candangahue, Cindagapi (M. S. T.)

Ardea purpurea, *Lin.* *S. N.* i. p. 236 (1766); *Horsf.* *Tr. Lin. Soc.* xiii. p. 188 (1821); *Mottl.* et *Dillw.* *Contr. N. Hist. cf Salv.* p. 34 (1855); *Schleg.* *M. P. B. Ardeæ*, p. 8 (1863); *Sclat.* *P. Z. S.* 1863, p. 222; *Pelz.* *Nov. Reis.* *Vög.* pp. 118, 162 (1865); *G. R. Gray*, *Hand-l.* iii. p. 27 (esp. 10102 (1871); *Salv.* *Ucc. di Borneo*, 1874, p. 945; *Brehm*, 4. 1881, p. 422; *Wald. Trans. Zool. Soc.* ix. 1875, p. 338.

Hab. Luzon, Manila, Malabon, Bulacan, Laguna, Sta. Rosa, Panay, Leyte, Negros, Marinduque, Mindoro, Tablas, Calanis, Tawi-tawi, Paragua, P. Princes; Borneo, Java, China, Europa.

2. Gen. DEMIEGRETTA, BLYTH

4. **D. sacra**, (*Gm.*) ♂♂ N v. Candangahue. (M. S. T.)

Ardea sacra, *Gm.* *S. N.* i. p. 646 (1766) ex *Lath.* *J. v. L.* *Ind. Orn.* ii. p. 646 (1790); *Veill.* *N. D.* xv, p. 423 (1817); *id.* *Ene. Meth.* 1221 (1823); *Hartt.* & *Fuschi*, *Faun. Centralp-lyn*, p. 201 (1867); *Butler*, *B. New. Zeal.* 228, pl. (1872).

A. matook, *Viell.* *N. D.* xiv. p. 416 (1817); *id.* *Ene. Meth.* p. 1118 (1827); *G. R. Gray*, *Ib's*, 1892 p. 235.

A. jugularis, *Forst.* *Icon. Ined.*; *Wagl.* *Syst. Av. Gen. Ardea*, sp. 18 (1827); *Less.*, *Tr. d'Orn.* p. 574 (1831) (excl. syn.); *Forst.*, *Deser. An.* p. 172 (1844); *Less.*, *Deser. Mamm. et. Ois.* p. 341 (1847); *Mottl.* & *Dillw.*, *Contr. Nat. Hist. Lat.**

- p. 58 (1855); *Cass.*, V. S., *Expl. Distr.*, p. 21 (1854); *Schleg.*, *Mus. P. B.-Ardeae*, p. 25 (1863); *Peltz.*, *Novar. Rec. Vog.*, p. 118 (1865); *Schleg.*, *Ned. Tijdschr. Dierk.*, iii, p. 348 (1866).
- A. gularis*, *Less.* (*nec Bosc.*), *Tr. d'Orn.*, p. 574 (1831).
- ? *A. asha*, *Sykes*, *P. Z. S.* 1832, p. 157.
- Herodias matook*, *G. R. Gray*, *Abb. Dietl. N. Z.*, ii, p. 166 (1843); *id.*, *Voy. Ereb et Terr. Birds*, p. 13 (1845).
- Herodias greyi*, *G. R. Gray*, *List Spec. B. Br. Mus.*, iii, *Grallae*, p. 80 (1844); *Gould*, *B. Austr.*, vi, pl. 61 (1848); *Bp.*, *Consp.*, ii, p. 122 (1855); *Sclat.*, *P. Z. S.* 1862, p. 223.
- H. jugularis*, *G. R. Gray*, *op. cit.* *ibid.*
- Demigretta concolor*, *Blyth*, *J. A. S. B.* xv, p. 375 (1849).
- Herodias pannosus*, *Gould*, *P. Z. S.* 1847, p. 221; *id.*, *B. Austr.*, vi, pl. 59 (1848); *Bp.*, *Consp.*, ii, p. 121 (1855).
- H. asha*, *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 280 (1849); *Bp.*, *Consp.*, ii, p. 120 (1855); *Gould*, *Handb. B. Austr.*, ii, p. 305 (1865).
- H. jugularis*, *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 341 (1849); *Gould*, *B. Austr.*, vi, pl. 60 (1848); *Wald.*, *P. Z. S.* 1893, p. 487; *Sclat.*, *P. Z. S.* 1894, p. 9.
- Ardea atra*, *Cuv.-Pucher.*, *Rev. et Mag. de Zool.* 1851, p. 375.
- Herodias atra*, *Bp.*, *Consp.*, ii, p. 121 (1845).
- H. sacra*, *Bp.*, *Consp.*, ii, p. 121 (1855); *id.*, *Compt. Rend.*, xl, p. 1212, sp. 53 (1855).
- H. concolor*, *Bp.*, *Consp.*, ii, p. 121 (1855).
- ? *Ardea aruensis*, *G. R. Gray*, *P. Z. S.* 1851, p. 458; *id.*, *P. Z. S.* 1861, p. 438; *Schleg.*, *Ned. Tijdschr. Dierk.*, iii, p. 318 (1866); *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii, p. 28, sp. 10119 (1871).
- A. albolineata*, *G. R. Gray*, *P. Z. S.* 1859, p. 166; *Id. B. Trop. Isl.*, p. 48 (1859); *Verr. et Dom.*, *Rex et Mag. de Zool.* 1860, p. 438; *Schleg.*, *Mus. P. B. Ardeae*, p. 27 (1863).
- A. cinerea*, *Ellm.*, *Zool.* 1861, p. 7460.
- Demigretta asha*, *ord. B. of India*, iii, p. 746 (1864).
- D. jugularis*, *Gould*, *Handb. B. Austr.*, ii, p. 307 (1865).
- Demigretta greyi*, *Gould*, *op. cit.* p. 309 (1865).
- D. sacra*, *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii, p. 28, sp. 10120 (1871); *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.* viii, 2, p. 100 (1872); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 246; *P. Z. S.* 1877, p. 551; *Sharpe*, *Id. 1894*, p. 244; *Twet.*
- Hab.* Mindoro, Niujan, Panay, Masbate, Siquijor, Saenar, Bongongan, Luzon, Batan, Orion, Cagayan, Pamplona, Panaon, Jolo, Marianas, Cebu, Borneo, Java, Sumatra, Celebes, China.

5 Gen. HERODIAS, Boie.

3. *H. torra*, (*Buch-Hamilt.*) ♂♂ N. v. Tagac.

M S T

} } }

Ardea torra, *Buch. Hamilt.* ap. *Franklin*, *P. Z. S.* 1830-31, p. 123.

A. modesta, *Gray*, *Zool. Misc.* p. 19; *Gray and Hardw.*, iii, *Ind. Zool.* ii, pl. 49, f. 1 (1834).

A. nigrirostris, *Gray & Hardw.*, *ibid.* t. 27.

- Heron flavirostris, *G. R. Gray*, *U. S. Fish. & T.*, p. 12 (1843); *Id.*, *Ibis*, 1842, p. 235.
H. modesta, *G. R. Gray*, *List Spec. B. Brit. Mus.* iii. *Grallae*, p. 77 (1844).
H. torra, *Salv. Ucc. di Berneo*, 1874, p. 347.
H. syrmatophora, *Gould*, *B. Austr.* vi. pl. 56 (1843).
H. alba, *Blyth* (*nec Lin.*), *Cat. B. Mus.* i. *S. B.*, p. 279 (1849); *Jerd.*, *B. of India*, iii. p. 744 (1864); *Gould*, *Handb. B. Austr.* ii. p. 301 (1865); *Hildesc.*, *P. Z. S.* 1872, p. 477.
Ardea alba, *Temm.* & *Schleg.*, *Faun. Japon. Aves*, p. 114 (1850); *Gray*, *P. Z. S.* 1860, p. 303; *Hartl.* & *Finsch*, *Orn. O. Afr.* p. 683 (1870); (partes).
Egretta modesta, *Bp.*, *Consp.* ii. p. 117 (1855); *Swinh.*, *P. Z. S.* 1874, p. 412.
E. nigrirostris, *Bp.*, *op. cit.* p. 117 (1855).
E. syrmatophora, *Bp.*, *op. cit.* p. 115 (1855).
Herodias egretta, *Blyth*, *Ib's.* 1850, p. 64; 1861, p. 51; *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.* viii. 2, p. 99 (1872).
H. syrmatophorus, *Blyth*, *Ib's.* 1855, p. 36 (=alba).
Ardea egretta, *Schleg.*, *Mus. P. B. Ardeal*, p. 17 (1863); (partim), *Id.*, *Ned. Tijdsch. Dierk.* iii. p. 342 (1866).
Egretta modesta, *Swinh.*, *P. Z. S.* 1874, p. 412.
Hab., Paragua, P. Princesa, Calanianes, Culion; Berneo, Java, Célebes.

6. **H. intermedia**, (Hassel) ♂♂ N. v. Tagao, Col-o M. S. 1)

- Ardea intermedia, *Hassel*, in *U. H. Hagl.*, *Ib's.* 1829, p. 65; *Schleg.*, *Mus. P. B. Ardeac.* p. 19 (1863); *id.*, *Ned. Tijdsch. Dierk.* iii. p. 348 (1866); *Hartl.* & *Fins h. Vog. O. Afr.* 1. 686 (1870).
A. melanopus, *Hagl.*, *Ib's.* 1829, p. 659.
A. putea, *Buch. Hamilt.*, *ap. Frankl.*, *P. Z. S.* 1830-31, p. 123.
A. nigrirostris, *Gray & Hardw.*, iii. *Ind. Zool.* pl. 492 (1834).
A. egrettoides, *Temm. (nec Gm.)*, *Man. d'Orn.* iv. p. 314 (1840); *Temm.* & *Schleg.*, *Faun. Jap. Aves*, p. 155. t. 69 (1850).
Herodias plumifera, *Gould*, *P. Z. S.* 1847, p. 221; *id.*, *B. Austr.* vi. pl. 57 (1848).
H. intermedia, *Blyth*, *Cat. B. Mus.* i. *S. B.*, p. 279 (1879); *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.* ix. 1875, p. 273.
Ardea niva, *Cuv. (nec Gm.)*, *Puch.*, *Rev. et Mag. de Zool.* 1851, p. 576.
Egretta plumifera, *Bp.*, *Consp.* ii. p. 115, n.^o (1855).
E. egrettoides, *Bp.*, *ibid.* n.^o 5.
E. melanopus, *Bp.*, *ibid.* p. 116, n.^o 7.
E. intermedia, *Bp.*, *ibid.* p. 116, n.^o 8.
Herodias egrettoides, *Swinh.*, *Ibis*, 1861, p. 261; *Jerd.*, *B. of Ind.* iii. p. 745, (1864); *Gould*, *Handb. B. Austr.* ii. p. 303 (1865).
Herodias intermedia, *Swinh.*, *Ibis*, 1861, p. 344; *Id.*, *P. Z. S.* 1863, p. 313; *id.*, *P. Z. S.* 1870, p. 427; *G. R. Gray*, *Handlist*, iii. p. 28, sp. 10110 (1871); *Swinh.*, *P. Z. S.* 1874, p. 412; *Wald.*, *Tr. Zool. Soc.* ix. 1875, p. 237.
Hab., Mindoro, Baço, Mindanao, Zamboanga, Bohol, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Java, Berneo, China.

7. *H. garzetta* *Lin.* ♂♂ N. v. Tagac. (M. S. T.)

Aigrette, *Buff. H. N. O's.* 7, p. 372, t. 20 *Pl. Enl.* 901.
Ardea garzetta, *Lin.* *I. N.* 2, p. 628; *Wald. Trans. Zool. Soc.*
ix, p. 237 (1875).
Hab. Panay, Siquijor; Borneo, Java, Célebes.

4. Gén. GARZETTA Br.

8. *G. nigripes*. (*Tem.*) ♂♂ N. v. Bacao-itim, Cabo. (M. S. T.)

Ardea nigripes, *Tem. Man. d'Orn.* 2.^a ed. iii, p. 377 (1840).
Herodias immaculata, *Gould, B. Austr.* vi, pl. 58 (1848).
Garzetta nigripes, *Bp.*, *Consp.* ii, p. 119, n.^a 3 (1855).
Girzetta immaculata, *Bp.*, *ibid.* n.^a 4 (1855).
Ardea garzetta, *Müll. & Dille*, *Contr. Nat. Hist. cf. Lab.* p.
35 (1855); *Seleg. Mus. P. B. Ardeac.* p. 12 (parte), (1863).
Herodias melinopus, *Gould*, (*ng. Wagl.*) *Handb. B. Austr.* ii,
p. 304 (1865); *Krechm.* *V. Ann.* 4 p. 424, f. 139.
Herodias nigripes, *Wald. Trans. Zool. Soc.* viii, 2, p. 99 (1872);
Savv. Ucc. di Borneo, 1874, p. 349.
Hab. Luzon, Bataan, Orion, Laguna, Paric, Samar, Borneo,
Leyte, Bohol; Java, Célebes.

5. Gén. BUBULCUS, Br.

9. *B. coromandus*, (*Bodd.*) ♂ ♀ Tagac-calabao. (M. S. T.)

Cancroma coromanda, *Bodd. Tabl. Pl. Enl.* p. 54 (1783) ex *Ruff.*
Pl. Enl. 910; *Schleg. Mus. P. B. Ardeac.* p. 30 (1863).
Ardea coromandensis, *Steph.*, *Gen. Zool.* xi, p. 577 (1819) e,
xiv, p. 324 (1826).
A. affinis, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 189. (1829).
A. caboga, *Frankl.*, *P. Z. S.* 1830-31, p. 124.
A. roussata, *Temm.*, *Man. d'Orn.* 11, p. 566 (partim) (1820).
A. russata, *Wagl.*, *Syst. Av. Gen. Ardea*, sp. 12. (1827) (partim).
Gray, *P. Z. S.* 1860, p. 363.
Herodias bubulcus, *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 280 (1841)
(partim).
Bubulcus coromandensis, *Bp. Conspl.* ii, p. 125 (1855).
Herodias coromanda, *Wall.*, *P. Z. S.* 1863, p. 487.
Buphus coromandus, *Jerd.*, *B. of India*, III, p. 749 (1864).
Bubulcus coromandus, *G. R. Gray*, *Hand-lst.* iii, p. 30 sp.
10133 (1871); *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 412; *Savv. Ucc. di*
Borneo, 1874, p. 350; *Wald. Trans. Zool. Soc.* ix, 1875, p.
337.
Hab. Luzon, Manila, Bulacan, Laguna, Bataan, Negros, Ta-
blas, Masbate, Cebú, Panay, Guimarás, Mindanao, Paragua,
Balabac, Bohol; Borneo, Java, China.

6. Gen. ARDEOLA, Boie.

10. A. speciosa, Horsf. ♂♂ N. v. Bacao.

(M. S. F.)

Ardea speciosa, Horsf. Tr. Lin. Soc. xiii. p. 189 (1821); Id., Zool. Res. in Java, pl. 62 (1824).

Ardeola speciosa, G. R. Gray, Lst. Gen. B. p. 86 (1841); Id., Hand-Lüt, id. p. 30, sp. 10138 (1871); Walld., Trans. Zool. Soc. viii, 2, p. 97 (1872); Sito. Ucc. di Borneo, 1874, p. 351; Buphus speciosus, Bp. Conspl. ii, p. 127 (1855).

Ardea leucoptera speciosa, Schleg., Mas. P. B. Ardeae, p. 34 (1863).

Hab. Paragua, P. Princesa, Borneo, Java, Célebes.

7. Gén. BUTORIDES, Blyth.

1. B javanica (Horsf.) ♂♂ N. v. Bacao-aluhin

(M. S. F.)

Ardea javanica, Horsf. Lin. Tr. Soc. xiii. p. 190. (1821); Rafsl. bid. p. 320 (1822); Less. Mem. Orn. ii, p. 249 (1821); Schleg. Mus. P. B. Ardeae, p. 43 (1863); Id., Nederl. Tijdschr. Dierk. iii, p. 343 (1866); Hartl. & Finsch, Faun. Centralpal., i, p. 207 (1867); Ardea choriceps, Hodges.

Ardea stagnatilis, Gould, P. Z. S. 1847, p. 221, In., B. Austr., vi, pl. 67. (1848).

?Butorides javanica, Blyth, Cat. B. Mas. A. S. B. p. 281 (1849); Bp., Conspl. ii, p. 129 (1855); Cat., P. Z. S. 1893, p. 228; Wall., ibid. p. 487; Jerd., B. of. Int. iii, p. 752 (1864); Gould, Handb. B. Austr., ii, p. 317 (1865); Swinh., P. Z. S. 1871, p. 413; G. R. Gray, Hand-Lst.; iii, p. 31, sp. 10157 (1871); Haldw. P. Z. S. 1872, p. 478; Walld., Trans. Zool. Soc. viii, 2, p. 100 (1872); Sito. Ucc. di Borneo, 1874, p. 351; Walld., Trans. Zool. Soc. ix, 1875, p. 237.

?Ardet a. thalassina, «Sws.» Klaart, Prodr. Faun. Ceyl. p. 133 (1852).

Ardea stagnalis, Cass., U. S. Expl. Exp. Orn. p. 297 (1858); G. R. Gray, Cat. B. Trop. Isl. p. 49 (1859); Pelz; Novar. Reis. Vög. p. 124 (1865).

Ardea (Butorides) viridiceps, Gray, P. Z. S. 1890, p. 304.

A. (Butorides) virescens var. scapularis et var. amurensis, Schrenk. Vög. Amurl. p. 437. (1860).

Hab. Luzon, Laguna, Calauan, Mindoro, Naujan, Tablas, Sibuyan, Negros, Leyte, Amparo, Dimagat, Paragua, P. Princesa, Minanau, Guiaras, Panay, Cebú, Samar, Marindique, Masbate, Siquijor, Calamianes, Tavi tavi, Joló; Borneo, Java, China, Célebes.

12. B macrohyneha (Gould) ♂♂ N. v. Bacao-bençé.

(M. S. F.)

Arletta macrohyneha, Gould, P. Z. S. 1848, p. 39; Id., B. Austr., vi, pl. 66 (1848).

Ardea scapularis, Temm. & Schleg. (nec III), Faun. Jap. Aves, p. 149. 1850.

- Butorides macrorhyncha*, *Bp.* *Consp.* ii. p. 131 (1855); *Gould*, *Handb. B. Aus'r.* ii. p. 316 (1855); *Swinh.* *P. Z. S.* 1811, p. 413; *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 353.
Ardea javanica, *Mettl.* & *Dtlw.* (*nec Horsf.*), *Contr. Nat. Hist. of Labuan*, p. 59 (1855).
A. macrorhyncha, *Schleg.*, *Mus. P. B. Ardeac*, p. 44 (1863).
Butorides javanicus, *Swinh.* (*nec Bp.*), *Ibis*, 1853, p. 413.
Hab. Mindoro, Baco; Borneo, China, Java.

8 Gén. ARDEIRALLA, VERR

- 13 *A. flavicollis*, (*Loth.*) ♂♂ N. v. Cobo, Bacao-lat. (M. S. T.)

- Ardea flavicollis*, *Lath.* (*nec Gould.*), *Ind. Orn.* ii. p. 701 (1790); *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 189 (1821); *Wagl.* *Syst. Av. Gen. Ardea*, sp. 16 (1827); *Hardw. & Gray*, iii, *Int. Zool.* i. pl. 66, f. 2. (1830-34); *Jerd.*, III, *Ind. Orn.* pl. 16 (1843); *Schleg.*, *Mus. P. B. Ardeas*, p. 45 (1863); *Id.*, *Ned. Tijdschr. Dierk.* iii, p. 348 (1866).
A. nigra, *Vieill.*, *N. D.* xiv, p. 417 (1817).
A. picta, *Raffl.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 323 (1822).
A. bilineata, *Cuv.*, *Mus. Par. Less.*, *Tr. d'Orn.* p. 574 (1831); *Pucher.*, *Rev. et Mag. de Zool.* 1851, p. 375.
Ardetta flavicollis, *Blyth Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 272, (1849); *Bp.* *Consp.* ii. p. 131 (1855); *Wall.*, *P. Z. S.* 1863, p. 35; *Jerd.*, *B. of Ind.* iii. p. 853 (1864); *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 413; *G. R. Gray*, *Hand-List.* iii. p. 30, sp. 10147 (1871); *Holdsw.*, *P. Z. S.* 1872, p. 478; *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.* ix. p. 236. (1875).
Botaurus flavicollis, *Rehb.*, *Syst. Av. Nat.* p. xvi, (1852).
Ardetta bilineata, *Bp.*, *Consp.* ii. p. 132 (1855).
Ardea (*Ardetta*) *flavicollis*, *Gray*, *P. Z. S.* 1860, p. 364.
Ardiralla flaviacollis, *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 353.
Hab. Luzon, Bulacan, Malolos, Samar, Paric, Mindoro, Naujan, Cebú, Mindanao; Borneo, Java, Sumatra.

9. Gén. ARDETTA, G. R. GRAY.

14. *A. sinensis*, (*Gm.*) ♂♂ N. v. Bacao bengē. (M. S. T.)

- Ardea sinensis*, *Gm. S. N.* i. p. 642 (1788); *Gray*, & *Hardw.*, iii, *Ind. Zool.* i. pl. 66, f. 2 (1830-34); *Schleg.*, *Mus. P. B. Ardeae*, p. 40 (1853).
A. lepida, *Horsf.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 190 (1821); *Wagl.* *Syst. Av. Gen. Ardea*, sp. 38 (1827).
A. melanophis, *Cav.*, *apud Less.*, *Tr. d'Orn.* p. 573 (errore) (1831).
A. melanotis, *Cuv.*, *apud G. R. Gray*, *Gen. B.* iii. App. p. 25 (errore) (1849).
Ardetta sinensis, *Blyth. Cat. B. Mus. A. S.* p. 282 (1849); *Jerd. B. of Ind.* iii. p. 755 (1864); *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 414; *G. R. Gray*, *Hand-list.* iii. p. 31, sp. 10147 (1871); *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.* viii. 2, p. 99 (1872); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 354; *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.* ix. 1875, p. 237.

Ardea melanoptera, *Cuv.*, in *Mus. Paris.-Pucher.*, *Rev. et Mag. de Zool.* 1851, p. 375.

Ardeola sinensis, *Bp.*, *Conspl.* ii, p. 133 (1855); *Wall.*, *P. Z. S.* 1863, p. 487.

Hab., Luzón, Laguna, Calamba, Cagayan, Alcalá, Ilcos, Batac, Panay, Mindoro, Baco, Calapan, Joló, Tablas; Borneo, Java, Célebes, China.

15 **A piraguanensis**, ♂ N. v. Cobo. (M. S. T.)

Hab., Paragua, P. Princesa.

16 **A cinnamomea**, (*Gm.*) ♂♂ N. v. Bacao canela. (M. S. T.)

Ardea cinnamomea, *Gm.*, *S. N.* i, p. 643 (1788); *Raffl.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 326 (1822); *Wagl.*, *Syst. Av. Gen. Ardea*, sp. 39 (1827); *Gray*, & *Hardw.*, *Ill. Ind. Zool* pl. 62, f. 1 (1830-34); *Schleg.*, *Mus. P. B. Ardeae*, p. 40 (1863); *Mart. Journ. f. Orn.* 1866, p. 28.

A. nebulosa, *Horsf.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 190 (1821).

Ardeola cinnamomea, *Blyth. Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 282 (1849); *Jerd.*, *B. of Int.* iii, p. 755 (1864); *Scat. P. Z. S.* 1871, p. 413; *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii, p. 31, sp. 10146 (1871); *Holdsw.*, *P. Z. S.* 1872, p. 478; *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 354; *Wald. Trans. Soc.* ix, p. 237 (1875).

Ardeola cinnamomea, *Bp.*, *Conspl.* ii, p. 132 (1855).

Hab., Luzón, Manila, Malabon, Laguna, Calamba, Bataan, Orion, Cagayan, Pamplona, Ilcos, Batac, Mindoro, Baco, Mairindueque, Panay, Amparo, Leyte, Cebú, Tablas, Guimaras, Mindanao, Zamboanga, Tawi-tawi; Java, Borneo, China.

17. **A. sp.** ♂♂ N. v. Bacao-tulic (M. S. T.)

Hab., Cagayan, Pamplona, Ilcos, Batac.

10. BOTARUS, STEPH

18. **B. limnophylax**, (*Gen.*) ♂♂ N. v. Bacao. (M. S. T.)

Nycticorax limnophilax, *Tem. Pl. Col.* 581 (juv.) (1835).

Botaurus limnicola, *Rchb.*, *Syn. Av.* ii, *Grallatores*, t. 148, f. 510; *Ligrisoma limnicola*, *Rchb.*, *Syst. Av. Nat.* p. xvi. (1852).

Botaurus limnophilax, *Bp.*, *Conspl.* ii, p. 136 (1855); *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii, p. 32, sp. 10164 (1871); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 355.

Ardea limnophylax, *Schleg.*, *Mus. P. B. Ardeae*, p. 55 (1863).

Hab., Luzón, Bataan, Orion, Mindoro, Baco; Java, Bangka.

19 **B stellaris**, *Lin.* ♂ (B 289) N. v. Alcaravan. (M. S. T.)

Hab., Europa, Alemania.

II. Gén. BUPHUS, Boie.

20. **B. malaccensis**, (Gm.) N. v. Bacao.

(M. S. T.)

Ardea malaccensis, Gm. S. N. 2. p. 643 esp. 73.
Crabier blanc et brun, Buff. Hist. Nat. des Ois. 7. p. 394.
C. de Malac., Buff. Pl. Ent. n.º 911; Hardw. Ill. Ind. Zool. 1.
t. 48.
Malacca Heron, Lath. Syn. III. 1. p. 78 n.º 44.
Buphus malaccensis, Cab.; Reich Syst. Av. t. 150, f. 500, 7 Buff.
t. 50 f. 2397; Bp. Comp. Ar. 2. p. 126 (1857).
Hab. Luzón, Manila, Malabon, Bulacan, Ilocos, Batac.

12. Gén. ZEBRILUS, Bp.

21. **Z. radiolatus**, Bp. ♂ N. v. Bacao butic.

(M. S. T.)

Ardea philippensis et *undulata*, Gm. S. N. 1. p. 670.
Acrophagus philippensis, Br. Or. v. p. 274 t. 33 f. 2.
Botaurus undulatus, Cab.
Tigrisoma undulatum, Gr. Reich S. Av. t. 150 f. 506.
Zebrius radiolatus, Bp. Conspl. Av. 2. p. 138 (1857).
Crabier des Philippines, Buff. Pl. Ent. 898 ad et 769 jov.
Hab. Luzón, Laguna, Mindoro, Baco; Cayena.

13. Gén. GORSACHIUS, Pueg.

22. **G. melanophous**, (Rafpl.) ♀ N. v. Bacao-pulu.

(M. S. T.)

Ardea melanophopa, Rafpl. Tr. Lin. Soc. xiii. p. 326 (1822); Blyth,
Ibis, 1865, p. 38.
Nycticorax goisagi, Temm., Pl. Col. 582 (1836); Hartl. & Finsch,
P. Z. S. 1868, p. 8.
Ardea goisagi, Temm. & Schleg., Faun. Jap. Aves, p. 116, pl.
70 (1850); Swinh., *Ibis*, 1861, p. 344; Schleg., Mus. P. B.
Ardeae, p. 54 (1863); Swinh., *Ibis*, 1865, p. 358.
Tigrisoma goisagi, Rehb., *Syn. Av.* ii. Gaillatores, t. 146, f. 501.
Botaurus goisagi, Rehb., *op. cit.* t. 149, f. 2566-2567; *id.*, *Syst.*
Av. Nat. v. xvi. (1852).
Gorsachius typus, Pucher.
G. goisaki, Bp., Conspl. ii. p. 138 (1855).
Nycticorax melanophous, Swinh., P. Z. S. 1863, p. 320.
Gorsachius melanophous, Blyth., *Ibis*, 1865, p. 38; *id.*, *Ibis*,
1867, p. 173 (nota); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 355;
Wald. Trans. Zool. Soc. ix. 1875, p. 238.
Ardea melanocephala, Swinh. (*erroneo*), *Ibis*, 1865, p. 359.
Gorsochius goisagi, Swinh., *Ibis*, 1866, pp. 122, 123 403.
Goisakius melanophous, G. R. Gray, *Hand-list*, iii. p. 23, sp.
10177 (1871).
Goisachius melanophous, Swinh., P. Z. S. 1871, p. 413; Holdsw.,
P. Z. S. 1871, p. 478.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Cebú, Masbate, Siquijor, Gui-
marás, Mindanao; Sumatra, Japon, Malaca.

14. Gen. NYCTICORAX, Spix.

23. N. griseus. (*Linn.*) ♂♂ N. v. Bacao taling.

M. S. T.

Ardea nycticorax, *Linn. S. N.* i. p. 275 (1166); *Horsf.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 189 (1821); *Wagl.*, *Syst. Av. Gen. Arde.* sp. 31 (1827); *Temm.* & *Schleg.*, *Faun. Jap. Aves.* p. 116 (1850); *Schleg.*, *Mus. P. B. Ardeac.* p. 56 (1863).

N. grisea, *Linn.*, loc. cit.

Nycticorax europaeus, *Steph.*, *Gen. Zool.* xi, p. 609 (1819).

N. griseus, *Strickl.*—*Blyth*, *Cat. B. Mus. I. S. B.* p. 281 (1849); *Bp. Cousp.* ii, p. 140 (1855); *Sclat.*, *P. Z. S.* 1863, p. 223; *Jerd. B. of Ind.* iii, p. 758 (1864); *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.* viii, 2, p. 100 (1872); *Holdsw.*, *P. Z. S.* 1872, p. 478; *Sav. Ucc. di Borneo*, 1674, p. 356.

N. europaea, *Sav.*, *Class. B.* ii, p. 355 (1836).

N. nycticorax, *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii, p. 33, sp. 10171 (1871); *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 413.

Hab. Luzón, Manila, Malabon, Bataan, Orion, Laguna, Calamba, Mindanao; Java, Borneo, Célebes, China.

24. N. manillensis, *Vig.* ♂♂ N. v. Bacao-dagat

M. S. T.

N. manillensis, *Vigor*, *P. Z. S.* 1831, p. 08; *Trans. Zool. Ty-pice*, pl. 66; *Bp. Cousp.* ii, p. 140; *F. Marten. J. f. O.* 1860, p. 28; *Schlegel. Mus. Pays.-Bas.*, *Ardear* p. 60; *G. R. Gray*, *Handl* n.º 10173; *Wald.*, *Ov. Rimb. Philipp.* p. 400, 1875.

Hab. Luzón, Manila, Mindanao, Siquijor, Marinduque, Samar, Paric, Basilan, Amparo, Leyte, Cebú, Negros, Tablas, Sibuyan, Panay, Masbate, Siquijor, Tawi-tawi.

Fam. CICÓNIDAS.

1. Gén. LEPTOPTILOS, Less.

1. L. dubius, (*Gm.*) ♂♂ N. v. Cigüeña marabú.

(M. S. T.)

Ardea dubia, *Gm. S. N.* i. p. 624 (1788) ex *Lath.*

A. argada, *Lath. Ind. Orn.* ii, p. 676 (1790).

Ciconia marabeu, *Temm.*, *Pl. Col.* 300 (1824).—*Wagl.*, *Syst. Av. Gen. Ciconia*, sp. i. (1827).

Hab. Sumatra, Java, Borneo.

2. Gén. MELANOPELARGUS, Rchb.

2. M. episcopus, (*Bodd.*) ♂♂ N. v. Camabuy, Ligay

(M. S. T.)

Ardea episcopus, *Bodd. Tabl. Pl. Engl.* p. 54 (1783) ex *Ruff.*, *Pl. Engl.* 906).

A. leucocephala, *Gm. S. N. I.* p. 642 (1788).

Ciconia leucocephala, *Horsf.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 188

- (1821); *Lykes, P. Z. S.* 1832, p. 150; *Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 277 (1849); *Jerd., B. of Ind.* iii. p. 737 (1864); *Schleg., Mus. P. B. Ciconiae*, p. 9 (1864).
C. arrebellatta, *Wagl.*, *Syst. Av. Gen. Ciconia*, sp. 11 (1827).
C. biclavata, *Hodgs.*, *Gray's Zool. Misc.* (1831).
C. bicaudata, *Tickell, J. A. S. B.* xvii, p. 304 (1848).
C. episcopus, *G. R. Gray, Gen. B.* 561 (1848); *Hartl. & Finsch. Vog. O. Afr.* p. 122 (1870).
C. microscelis, *G. R. Gray, op. cit. pl.* 151 (1848); *Rehb.*, *Syn. Av.* ii. *Grallatores*, t. 144, f. 2388.
Sphenorhinus leucocephalus, *Rehb.*, *op. cit.*, t. 105, f. 455; *Id.*, *Syst. Av. Nat.* p. xvi. (1852).
Melanopelargus leucocephalus, *Bp.*, *Consp. Av.* ii. p. 105 (1855).
Ciconia pruysenaerii, *Heugl.*, *Journ. f. Orn.* 1863, p. 28; *Id.*, *Ibis*, 1864, p. 430; *Id.*, *Journ. f. Orn.* 1864, p. 275.
Melanopelargus episcopus, *Blyth, Ibis*, 1867, p. 172; *G. R. Gray, Hand-List*, iii. p. 35, sp. 10187 (1871); *Wald. Trans. Zool. Soc.* viii. 2, p. 101 (1872); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874 1. 356; *Tw. P. Z. S.* 1878 p. 953.
Dissoura leucocephala, *Lab.*, v. d. *Decken's Reisen*, iii. p. 48 (1869).
Diplura leucocephala, *Blyth, (Jerd., B. of Ind.* iii. p. 737).
Diplocercus leucocephalus, *Blyth (Jerd., loc. cit.)*
Hab. Luzón, Cagayan, Ábra, Ilocos, Laguna, Calamba, Min-doro, Calapan, Marín Luque, Bohol, Samar, Borongan, Calbayoc, Paranas, Masbate, Panay, Mindanao, Zamboanga; Borneo Java, Sumatra, Célebes.

Fam. TANTÁLIDAS.

i Gén. FALCINELLUS, BECHST.

i. F. igneus, (*Gm.*) ♂ N. v.

(M. S. T.)

- Tantalus falcinellus*, *Linn., S. N. I.* p. 241 (1760).
Numenius igneus, *S. G. Gm., Nov. Comm. Petrop.* xv. p. 460, t. 18 (1771).
N. viridis, *S. G. Gr.*, *op. cit.* p. 462, t. 19.
Tantalus castaneus, *P. L. S. Müll. Sist. Av. et Mamm.* p. 261 (1811); *Vieill., N. D.* xvi, p. 23 (1817); *Wagl.*, *Syst. Av. Gen. Ibis*, sp. 1 (1827); *Schleg., Mus. P. B. Ibis*, p. 2 (1863); *Swinh., P. Z. S.* 1871, p. 411.
Plegadis falcinellus, *Kaup. Nat. Sist.* p. 82 (1829).
Tantalis falcinellus, *Wagler. Isis*, 1832, p. 1231.
Falcinellus igneus, *G. R. Gray, List Gen. B.* p. 87 (1841); *Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 274 (1849); *Bp.*, *Consp.* ii. p. 158 (1855); *Jerd., B. of Ind.* iii. p. 770 (1864); *Resenb., Journ. f. Orn.* 1864, p. 173; *Gould, Handb. B. Austr.* ii. p. 286 (1867); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874 p. 360.
Falcinellus bengalensis (*Licht.*) *Bp.*, *Consp.* ii. p. 158 (1855).
F. peregrinus, *Bp.*, *Consp.* ii. 159 (1855).
F. falcinellus, *G. R. Gray, Hand-list*, iii. p. 39, sp. 10214 (1871).
Hab. Luzón, Laguna; Borneo, Java, Sumatra, Célebes.

Fam. PLATALEIDAS.

1. Gén. PLATALEA, LINN.

1. **P. leucorodia**, LINN. ♂ N. v. Espátula blanca. (M. S. T.)

Hab. Europa.

2. Gen. LEUCORODIUS, REICH.

2. **L. luzonicensis**, (Scop.) ♂ N. v. Tagae-euchara, Canutsut. (M. S. T.)

La spatule blanche de l'île de Luçon, Sonn. Voy. Nouv. Guin., p. 89 pl. 51.

La spatule huppée de l'île de Luçon, Sonn. t. c. p. 95, pl. 52; Platalea cristata, Scop. t. cit. p. 92, n.^o 76 ex Sonn.

Pl. leucorodia, var. g. Gm. t. e. ex Sonn.

Pl. tenuirostris, Tem. Man. d'Orn. 1820, ex Sonn. pl. 51, 52; Hand boek der Eur. Vog. p. 134 (1824), ex Sonn; Finsch. et II. parte.

Pl. luzoniensis, Bp. Conspl. ii. p. 148 n.^o 6 (1857), ex Sonn. pls. 51, 52; v. Martens J. f. O. 1866, p. 27, n.^o 159.

Hab. Luzón, Manila, Malabon, Laguna, Calamba.

Orden: NADADORAS.

...

Fam. ANATIDAS.

1. Gén. QUERQUEDULA, STEPH.

1. **Q. multicolor**, (Scop.) ♂ ♂ N. v. Pato sa bundoc. (M. S. T.)

La petite Sarcelle de l'île de Luçón, Sonn. Voy. Nouv. Guin., p. 91, pl. 55.

Sterna multicolor, Scopoli, D.L. Fl. Faun. Insubr. ii. p. 92, n.^o 74 (1766), ex Sonn.

Anas manillensis, Gm. S. N. i. p. 523, n.^o 91 (1788), ex Sonn; Eytton, Monogr. Anatidae p. 125.

Querquedula multicolor, Wald. On Birds Philipp. Arch. in Two Works, p. 404 (1876).

Hab. Luzón, Manila, Malabon, Bulacan, Laguna.

2. **Q. circia**, (Lin.) ♂ ♂ N. v. Pato sa bundoc. (M. S. T.)

Anas querquedula, Lin. S. N. i. p. 203 (1766); Schleg. Mus. P.-B. Anseres, p. 49 (1863). *

A. circia, Lin. t. c. p. 204.

Querquedula circia, Steph. in Shaw, Gen. Zool. xiiit. 2. p. 113 (1824); Blyth. Cat. B. Mus. A. S. B. p. 305 (1849); Jerd. B. of Ind. iii. p. 807 (1864); Swinh. P. Z. S. 1871, p. 418;

G. R. Gray, *Hand-L.* iii. p. 83 esp. 10656 (1871); *Wald. Tr. Zool. Soc.* viii. 2. p. 102 (1872); *Sav. Ucc. Born.* p. 361 (1874).
Cyanopterus cincia, *Eyton, Mon. Anat.* p. 130 (1838).
Anas (Querquedula) humeralis, *Müller, Verhandl. Land. en Volkenk.* p. 159 (1839-44); *Brehm, Th. An.* 4. 1881, p. 490.
Pterocyanæa querquedula, *Bp. Compt. Rend.* xlvi. p. 650. esp.
Querquedula humeralis, *Bp. ibid.* esp. 98.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; Célebes, Java, China.

2. Gén. ANAS, LIN.

3. A. *Iuzonica*, *Fraser*, ♂ ♀ N. v. Itic, Ngaga, Patiqui. (M. S. T.)

Anas iuzonica, *Fraser*, *P. Z. S.* 1839, p. 113; *Zool. Typica*, pl. 67; *v. Martens, J. f. O.* 1866, p. 30. n.^o 189; *Walden, On Birds Philippin.* in *Tweed. Works*, p. 404 (1875).

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Cagayan, Alcalá, Ilocos, Batac, Guimarás, Marinduque, Siquijor, Panay, Masbate, Paragua, P. Princesa.

4. A. *superciliosa*, *Gm.* ♂ N. v. Itic (M. S. T.)

A. superciliosa, *Gm. S. V.* 2. p. 537. n.^o 111.
Hab. Luzón, Manila, Malabon.

5. A. *boschas*, *Lin.* N. v. Pato sa bundoc. (M. S. T.)

Hab. Luzon, Manila.

6. A. *paraguanensis*, ♂ N. v. Araquit-raquit. (M. S. T.)

Hab. Paragua, Tagburus.

7. A. *pasilla*, N. v. Patiqui. (M. S. T.)

Hab. Luzon, Laguna, Calamba.

8. A. *cinerescens*. ♂ ♀ N. v. Araquit. (M. S. T.)

Hab. Paragua, P. Princesa.

3. Gén. DENDROCYGNA, SWAINS.

9. D. *vagans*, *Eyton*, ♂ ♂ N. v. Ngaga balliri, Pato bundoc, Papan. (M. S. T.)

Dendrocygna vagans, *Eyton, M. S.*; *Fraser Zool. Typica*, pl. 68, 1849; *Walden, Zool. Soc.* viii. p. 102; *id. On Birds Philipp.* in *Works*, of *Tw.* p. 404 (1875); *v. Martens, J. f. O.* 1866, p. 30. n.^o 190; *v. Pelz. Reise Nov. Vog.* p. 137.

Hab. Luzón, Manila, Malabon, Bulacan, Laguna, Calamba, Samar, Mindanao, Borongan, Loquilocum, Mindoro, Naujan, Panay, Masbate, Siquijor, Guimarás, Basilan, Cebú, Dinagat, Leyte, Amparo, Mindanao, Zamboanga, Bohol; Australia, Java, Célebes.

10. **D. arquata**, (*Forst.*) ♂♂ N. v. Papan. (M. S. T.)

- Anas arcuata, *Cuv. Mus. Paris*; *Horsf. Zool. Res. Java*, pl. 65 (1824).
A. javanica, var. b. *Horsf. Tr. Lin. Soc.* xiii. p. 200 (1821).
A. sp. *Ritssl. Tr. Lin. Soc.* xiii. p. 331 (1822).
Anas awsuree, Sykes, *P. Z. S.* 1832, p. 168.
Dendronetta arcuata, *Wolg. Isis.* 1832, p. 282.
Dendrocygna arcuata, Sw. *Class. B.* ii. p. 365 (1876); Eyston, *Mons. Anat.* p. 108 (parte) (1838); Blyth, *Cat. B. Mus. A. S.* B. p. 301 (1848); *Sclat. P. Z. S.* 1863, 224; *id. P. Z. S.* 1864, p. 300; Blyth, *Ibis*, 1865, 39; Schleg. *Mus. P.-B. Anseres*, p. 89 (1866); Blyth, *Ibis*, 1867, p. 175; G. R. Gray, *Hand-l.* iii. 1871, esp. 10608; Salv. *Ucc. Borneo*, 1874, p. 362.
D. arcuata, var. minor, Bp. *Compt. Rend.* xlvi. p. 649 (1856).
D. awsuree, Jerd. *B. of Ind.* iii. 1864, p. 789.
D. javanica, Hotstu. *P. Z. S.* 1872, p. 479.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Laguna, Calamba, Siquijor, Guimaras, Basilan, Bohol, Leyte, Amparo, Samar, Cebú; Borneo, Sumatra, Java, Ceilan, Africa.

11. **D. guttata**, (*Forst.*) ♂♂ N. v. Japan, Ngaga. (M. S. T.)

- Dendrocygna guttata, *Forst. in Mus. Lugd.*; Schleg. *Mus. P.-B. Anseres*, 1866, p. 85; G. R. Gray, *Hand-l.* p. 79 esp. 10613 (1871).
D. guttulata, Tem., *Wall. P. Z. S.* 1853, p. 32; Mäll, *M. S.*, *Sclat. P. Z. S.* 1864, p. 300.
D. guttata, Salv. *Prodri. Orn. Pap. e. Moln.* p. 401; G. R. Gray, *Hand-l.* p. 72, esp. 10612 (1871).
Hab. Luzón, Manila, Tinajeros; Célebes, Ternate, Gilolo.

4. Gén. NETTAPUS, BRAND.

12. **N. coromandelianus**, (*Gm.*) ♂♂ N. v. Papan. (M. S. T.)

- La sarcelle de Coromandel, Buff. *H. Nat. Ois.* ix. p. 274, *Côte de Coromandel*, D'Aubent. *Pl. Ent.* 549, 850.
Anas coromandeliana, Gm. *S. N.* i. p. 522 n.º 90 (1788); ex Buff., v. Petz. *Reis. Novara, Vögel*, p. 136.
Nettapus coromandelianus, Wald. *On. Birds. Philipp. Arch.* w. Tweed. *Worph.* p. 404 (1875).
Hab. Luzon, Laguna, Calamba, Bataan, Orion; Java, India.

5. Gen. SPATULA, Bonn.

13. **S. clypeata**, Lin. ♂♂ N. v. Papan bundoc. (M. S. T.)

- Anas clypeata, Lin. *S. N.* 2. p. 518 n.º 19; Briss. *Av. o.* p. 329, n.º 6 t. 32 f. 1; Naum. *Vög. t.* 306; Gould. *B. E.* p. 360.
A. virescens, Mars. *Dan.* 5 p. 129, t. 58.
S. uchet., Buff. *H. N. Ois. o.* p. 191; *Pl. Ent.* n.º 971, 972.

Clypeata pomorina, *microrhynchos*, *platyrhynchos*, y *brachyrhynchos*, *Brehm.* *V. An.* 4, 1881 p. 495 f. 158.

Hab. Luzon, Manila, Malabon, Laguna, Calamba; Europa, China, Australia.

6. Gén. ANSER, LINN.

14. A. *segetum*. *Gm.* ♂♂ N. v. (M. S. T.)

Bean goose, *Brit. Zool.* 2, n.^o 267; *Arct. Zool.* 2 p. 546; n.^o 472; *Lath. Syn.* III. 2 p. 464, n.^o 23.

Anas segetum, *Gm. S. N.* 2, p. 512, n.^o 68; *Naum.* *Vög.* t. 287; *Gould. B. E.* pl. 348; *Brehm.* *V. An.* 4, 1881, p. 474.
Hab. Luzon, Manila, Malabon; Europa.

15. A. *cinereus*, *Meyer.* ♂ ♀ N. v. *Oca cenicienta*. (M. S. T.)

Hab. Europa.

7. Gén. OLOR, WAGLER.

16. O. *musicus*, (*Lin.*) ♂ N. v. *Cisne cantor*. (M. S. T.)

8. Gén. AIX, BOIE.

17. A. *galericulata*, *Lin.* ♀ ♂ N. v. *Pato de abanico*. (M. S. T.)

Hab. China.

S. Gén. DAFILA, LEACH.

18. D. *acuta*, *Lin.* ♀ ♀ N. v. *Itig* (M. S. T.)

Canard à longue queue, *Buff. H. N. Ois.* 2, p. 199, t. 13, *PL. Enl.* n.^o 954.

Sea pheasant, or *Cracker*, *Raj. Av.* p. 147. *A. 5:* *Will. Orn.* p. 376; *Alb. Av.* 2, t. 94, 95.

Pin-tail, *Brit. Zool.* 2, n.^o 282. *Arct. Zool.* 2 p. 566, n.^o 500; *Lath. Syn.* III. 2, p. 526.

Anas acuta, *Gm. S. N.* 2, p. 529, n.^o 28.

Dafila acuta, *Gould. B. E.* pl. 365; *Brehm.* *V. An.* 4, p. 494.
Hab. Luzon, Manila, Malabon, Laguna, Calamba; Formosa, Europa.

9. Gén. FULIX, SUNDEV

19. F. *cristata*, *Lin.* ♂ ♀ N. v. *Pamituin*. (M. S. T.)

Fuligula cristata, *Brehm.* *V. Am.* 4, 1881, p. 502.

Anas fuligula, *Gesn.* *Av.* 107. *Aldr. Orn.* 3, p. 221; *Gm. S. N.* 2, p. 543, n.^o 45.

A. cristata, *Pas. Av.* 142.

Morillon, *Buff. H. Nat. Ois.* 9, p. 227, 231, t. 15 *PL. Enl.* n.^o 1001.

Hab. Luzon, Manila, Malabon, Pampanga, Basilan.

Fam. PELECANIDAS.

1. Gén. PELECANUS, Linn.

1. **P. roseus**, *Gm.*, ♂♂ N. v. Pagala. (M. S. T.)

Pelecanus roseus, *Gm.*, *S. N. I.*, p. 570, sp. 9 (1788); *ex Sonn.* *Salv. Ucc. de Borneo*, 1874, p. 363.

P. manilensis, *Gm.*, *op. cit.* p. 571, sp. 11, (*yuv.*) *ex Sonn.* *Rafpl.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 330, (1822).

P. philippensis, *Gm.*, *op. cit.* p. 571, sp. 12, (1788); *ex Briss.* *Horsf.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 330, (1822); *Schleg.*, *Mu.* *P. P. Pelecani*, p. 33, (1823), (*parte*); *Jerd.*, *B. of Ind.* iii, p. 858 (1864); *Selat.*, *P. Z. S.* 1868, p. 268; *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 420; *Id.*, *P. Z. S.* 1871, p. 633.

P. rufescens, *Licht.*, *Abhandl. Akad. Wiss. Berl.* 1838, p. 43, (*parte*); *Elliot*, *P. Z. S.* 1869, p. 583 (*parte*); *G. R. Gray*, *Hand-List.* iii, p. 128, sp. 10115 (1871), (*parte*).

Hab. Luzón, Cavite, Náv., Laguna, Calamian; China, Jay-

2. **P. javanicus**, *Horsf.* ♂♂ N. v. Pagala. (M. S. T.)

Pelecanus javanicus, *Horsf.*, *Trans. Lin. Soc.* xiii, p. 197 (1821); *Jerd.*, *B. of Ind.* iii, p. 857 (1864); *Blyth*, *Ibis*, 1897, p. 179; *Selat.*, *P. Z. S.* 1898; *Elliot*, *P. Z. S.* 1869, p. 583; *G. R. Gray*, *Hand-List.* iii, p. 130, sp. 11154 (1871); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 363.

P. minor, *Rüpp.*, *Mus. Senckenb.* ii, p. 185 (1837); *Id.*, *Vö.* *N. O. Afr.* p. 140, t. 49 (1845); *Elliot*, *P. Z. S.* 1869, p. 584; *P. mitratus*, *Licht.*, *Abhandl. Akad. Wiss. Berl.* 1838, p. 436, t. iii, f. 2; *Blyth*, *Ibis*, 1897, p. 178; *Selat.*, *P. Z. S.* 1869, p. 266; *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 420; *Selat.*, *P. Z. S.* 1871, p. 633.

P. brevirostris, *Hodggs.* (*parte*).

Hab. Luzón, Cagayan, Panplona; China, Java, Sumatra.

2. Gén. FREGATA, Linn.

3. **F. aquila**, (*Linn.*) ♂♂ N. v. (M. S. T.)

Pelecanus aquilus, *Linn.*, *S. N. I.*, p. 216 (1766).

Fregate, *Buff. H. N. Ois.* 8, p. 381, *Pl. Ent.* n.º 901.

P. leucocephalus, *Gm.*, *S. N. I.*, p. 572 (1788); (*yov.*) *Rafpl.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 330 (1822).

Fregata aquila, *Ill. Prodri.* p. 279 (1811); *Schleg.*, *Mit. P. B. Pelecani*, p. 2, (1863); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 394.

Trachypetes aquilus, *Vieill.*, *Gould.*, *Hinsh. B. Austr.* ii, p. 658 (1865); *Hartl. & Finsch. Faun. Centrafr. Polyn.* p. 205 (1867); *Brehm. V. An.* 4, p. 555.

Attagen aquilus, *Gray*, *Jerd. B. of Ind.* iii, p. 853 (1864); *G. R. Gray*, *Hand-List.* iii, p. 131, sp. 11161 (1871).

Hab. Luzón, Manila, Cebú, Círolinis; N. Guinea, Samar

4. **F. minor**, (*Gm.*) ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

- Fregata minor*, *Briss. Orn.* vi, p. 509 (1760); *Schleg.*, *Mus. P. B. Pelecani*, p. 3 (1863); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874 p. 364; *Witteh. Ibis*, 1890, p. 61.
Pelecanus minor, *Gm. S. N. I.* p. 572 (1788) (*ex Briss.*).
Atagen ariel, *Gould, Ms. G. R. Gray, Gen. B.* p. 669, pl. 184 (1815); *Gould, B. Austr.* vii, pl. 72 (1848).
Trachyptetes minor, *Bp. Conspl.* ii, p. 107. (1855); *Gould, Handb. B. Austr.* ii, p. 499 (1865); *Swinh.*, *Ibis*, 1868, p. 56.
Atagen minor, *G. R. Gray, Hand-List.* iii, p. 113, sp. 11162 (1871); *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 423.
Hab. Luzon, Manila, Negros, Mindanao; Tabuan, Molucas, China.

3. *Gén. GRÁCULUS, LINN.*

5. **G. carbo**, (*Linn.*) ♀ N. v. Cormoran.

(M. S. T.)

- Cormoran*, *Buff. H. N. Ois.* 8 p. 310. t. 26. *Pl. Enl.* 972.
Elecanus carbo, *Linn. S. N. I.* p. 216 (1766) (*spec. major*).
Phalacrocorax medius, *Nilss. Skand. Faun. Fogl.* ii, p. 478 (*spec. minor.*) (1835).
Pelecanus sinensis, *Shaw, Nat. Misc.* pl. 529.
Carbo filamentosus, *Temm. & Schleg., Faun. Jap. Aves*, p. 129 (1850).
C. capillatus, *Temm. & Schleg., op. cit.* t. 83, 84.
Graculus carbo, *Gray, Schleg. Mus. P. B. Pelecani*, p. 6 (1863); *Jerd. B. of Ind.* iii, p. 861 (1864); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874 p. 364.
Phalacrocorax carbo, *Dum. Bp., Conspl.* ii, p. 168 (1855); *Swinh. P. Z. S.* 1871, p. 420.
P. novae Hollandiae, *Steph., Gen. Zool.* xiii. 1. p. 93 (1825); *Gould, Handb. B. Austr.* ii, p. 488 (1865); *Buller, Birds. New. Zeal.* p. 325 (1873).
P. carbooides, *Gould, P. Z. S.* 1837, p. 156. *Id.*, *B. Austr.* vii, pl. 68 (1848).
Graculus carbo, *Baird, B. N. Am.* p. 876. (1858).
P. macrorhynchus, *Cuv., Puch., Rev. Zool.* 1850. p. 557.
Hab. Samar, Borongan; Australia, Sumatra, China.

‘IROCARBO, Bp.

6. **M. sulcirostris**, (*Brandt.*) ♀ N. v.

(M. S. T.)

- Garbo graculus*, *Temm. (nec Linn.), Man. d'Orn.* ii, p. 897 (1835), é iv, p. 565 (1840).
Phalacrocorax sulcirostris, *Brandt, Bull. Sc. Acad. Imp. Petersb.* iii, p. 56 (1838); *G. R. Gray, List. B. Brit. Mus.* iii, *Anseres*, p. 135 (1843); *Gould, B. Austr.* vii, pl. 67 (1848).
Graculus sulcirostris, *G. R. Gray, Gen. B.* p. 667 (1845); *Schleg., Mus. P. M. Pelecani*, p. 13 (1863).
Haliaeetus sulcirostris, *Bp., Conspl.* ii, p. 178 (1855).

H. stictocephalus, *Bp.*, seu:

Microcarbo stictocephalus, *Bp.*, *Consp.* ii. p. 178 (1855); *G. R. Gray*, *Hand-List*, iii. p. 129, sp. 11150 (1871).

Carbo sulcirostris, *Temm.*, *Mus. Lugd. ex Borneo* (*Bp. l. c.*) *Phalacrocorax stictocephalus*, *Gould*, *Handb. B. Austr.* ii. p. 495 (1865).

Microcarbo sulcirostris, *G. R. Gr.*, *Hand-List*, iii. p. 129, sp. 11149 (1871); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 365.
Hab. Luzón, Cagayan; Australia, Borneo, Java.

7. *M. pygmaeus*, (*Pall.*) ♂ N. v.

(M. S. T.)

Pelecanus pygmaeus, *Pall.*, *Itin. Atl.* t. 9; *Id.*, *Zoogr. Rosso-As.* t. 74, f. 1 (1810-1831).

Hydrocorax niger, *Wieill.*, *N. D.* viii. p. 88 (2817).

Carbo javanicus, *Horsf. Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 197 (1821).

C. africanus, *Horsf.* (*nec Gm.*), *Cat. Jav. B. in Zool. Res. in Java*, p. ult. (1824).

C. melanognathos, *Brandt*, *Bull. Acad. Sc. Petersb.* 1837, p. 6.

C. raptensis, *Hodges*.

Graculus pygmaeus, *G. R. Gray*, *Gen. B.* p. 667 (1845); *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 298 (1849); *Schleg.*, *Mus. P. B. Pelecani*, p. 13 (1863); *Brehn*, 4. p. 559.

Graculus pygmaeus indicus, *Rehb.*, *Syn. Av. I. Natafores*, t. 58, f. 2304.

G. pygmaeus algeriensis, *Rehb.*, *op. cit.* t. 6, f. 2305-2306.

Phalacrocorax pumilio, *Licht.*, *Nomencl.* p. 103 (1854).

Carbo oriepii, *Malh. Faun. Orn. de l'Alg.* p. 38 (1855).

Haliaeetus pygmaeus, *Bp.*, *Consp.* ii. p. 179 (1855).

H. pygmaeus, *a. algeriensis*, *melanognathus*, *javanicus*, *niger*, *Bp. op. cit.* p. 180.

Microcarbo pygmaeus, *Bp. Cat.*, *Parzud.* p. 10, (1856); *G. R. Gray*, *Hand-List*, iii. p. 129, sp. 11143 (1871); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1174 p. 366.

Graculus javanicus, *Jerd.*, *B. of Ind.* iii. p. 863 (1863); *Holdsw. P. Z. S.* 1872, p. 483.

Microcarbo melanognathos, *G. R. Gray*, *Hand-List.* iii. p. 129, sp. 11144 (1871).

M. niger, *G. R. Gray*, *op. cit.* sp. 11148 (1871).
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo, Java.

5. *Gén. SULA*, BRISS.

8 *S. cyanops*, *Sund. N. v.*

(M. S. T.)

?*Sula dactylatra*, *Less. Voy. Coq. Zool.* ii. p. 494 (1823); *Id.*, *Tr. d'Orn.* p. 601 (1831); *Less. Compl. Buff.* ii. p. 707 (1838), *G. R. Gray*, *Gen. B.* iii. p. 666 (1845); *Pucher.*, *Rew. et Mag. de Zool.* 1850, p. 626; *Bp.*, *Consp.* ii. p. 165 (1855); *Hartl.*, *Journ. f. Orn.* 1855, p. 420; *Bryant*, *Journ. f. Orn.* 1855, p. 420; *Bryant*, *Journ. f. Orn.* 1861, pp. 57, 58; *G. R. Gray*, *Hand-List*, iii. p. 126, sp. 11106 (1871).

?*S. nigroductyla*, *Less.* (*G. R. Gray*, *Hand-List*, iii. p. 126, *in synon. S. dactylatrae*). *

- S. cyanops, Sundev. Physiogr. Söllsk. Tidskrift, 1837, p. 205; t. 5; Id., Isis, 1842, p. 858; G. R. Gray, Gen. B. iii. p. 666 (parte) (1845); Bp. Conspl. ii. p. 166 (1855); Id., Conspl. Gav. Syst. sp. 17 (1856); Schleg., Mus. P. B. Pelecani, p. 30 (1863); Gould, Handb. B. Austr. ii. p. 506 (1865); G. R. Gray, Hand-List, iii. 126, sp. 11107 (1871); Shelley, B. of Egypt, p. 294 (1872); Hengel., Vög. N. O. Afr. p. 1480 (1873); Salv. Ucc. di Borneo 1874, p. 367.
- S. personata, Gould, P. Z. S. 1846, p. 21; id. B. Austr. vii. pl. 77 (1848); Rehb., Neuentd. Vög. Neu-Hell. n.^o 304; Id., Syn. Av. i, Natatores, t. 54, f. 2291 (nec f. 2280-90); Cass. U. S. Expl. Expl. Orn. p. 368 (1858); G. R. Gray, B. Trop. Isl. p. 61 (1859); Id., Cat. B. New. Guin. p. 63 (1859).
- S. piscator, Peale (nec Linna.), U. S. Expl. Expl. Birds. p. 273 (1848).
- S. melanops, Hartl., Ibis, 1859, p. 351; pl. x. f. 2 et 3; Hengel., Faun. Roth. Meer. n.^o 332 et p. 32; Brehm, Habesch, p. 230; Hengel., Peterm. Geogr. Mittb. 1869, p. 418.
- Sula bossana, Thoms., (nec Linna.), Allen Expl. Niger, ii. p. 175.
- Dysporus cyanops, Licht., Nomencl. p. 103 (1854); Hartl. & Finsch, Faun. Centrapolyn. p. 252 (1867); Hartl. & Finsch, Vög. O. Afr. p. 843 (1870).
Hab. Filipinas; Australia.

a. **S. piscatrix**, (Linna.) ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

- Sula candida, Briss. Orn. vi. p. 501 (1760); Steph., Gen. Zool. p. 103 (1826).
- Fou blanc, Buff. H. N. Ois. 8, p. 371.
- Pelecanus piscator, Linna., S. N. I. p. 217 (1766); Forst., Deser. In. p. 244 (1844).
- Dysporus piscator, Licht., Doubl. Verz. p. 83 (1823); Sundev. Physiogr. Söllsk. Tidskrift, 1837, p. 220; Hartl. & Finsch, Centrapolyn. p. 255 (1867).
- Sula erythrorhyncha, Less., Tr. d'Orn. p. 601 (1831).
- S. rubripes, Gould, P. Z. S. 1837, p. 156; Gray, List Spec. B. Brit. Mus. iii. Anseres p. 183 (1844).
- S. piscator, G. R. Gray, Gen. B. p. 666 (1845); Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B. p. 297 (1849); Gould, B. Austr. Gould, B. Austr. vii. pl. 79 (1848); Rehb., Neuentd. Vög. Neu-Hell. n.^o 306; id., Syn. Av. i, Natatores, t. 53 (xxix), t. 855; Cass., U. S. Expl. Expl. Orn. p. 365 (1858); Hartl., Orn. Beitr. W. Afr. p. 268 (1857); G. R. Gray, Cat. B. Trop. Isl. p. 61 (1859); Hartl., Orn. Beitr. Faun. Madag. p. 87 (1861); G. R. Gray, Ibis, 1862, p. 250; Salvin, Ibis, 1864, p. 379; Jerd., B. of Ind. iii. p. 852 (1864); Gould., Handb. B. Austr. ii. p. 509 (1865).
- S. rubripeda, Peale, U. S. Expl. Expl. Birds, p. 274, pl. 83 (1848); Hartl., Wiegmann. Arch. 1852, p. 125.
- S. piscatrix, Rehb., Syn. Av. i, Natatores, t. 55 (cclxxvii.), f. 2294-95; Schleg., Mus. P. B. Pelecani, p. 40 (1863); Salv. Ucc. di Borneo, 1874, p. 368.

- Dromix canidens*, *Rzhák*, *Tr. Syst. Nat.*, vi. (1852); *Bp.*, *Consp.* ii. p. 166 (1855); *id.*, *Consp. Gm. S.*, p. 20; sp. 18 (1856).
P. piscator, *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii. p. 126; sp. 1108 (1871).
Hab. Luzon, Manila, Mindanao, Zamboanga; Java, China, Australia.
10. *S. fiber*, (*Linn.*) ♂ N. v. (M. S. T.)
- Sula fusca*, *Briss.*, *Orn.* vi. p. 499, t. 43, f. 1 (1760).
Petit ou brun, *Buff. H. N. Obs.* 8, p. 374. *Pl. Enc.* 674.
Pelecanus sula, *Linn.*, *S. N. I.* p. 218, sp. 7 (1800); *Raff.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 330 (1822).
P. fiber, *Linn.*, *op. cit.* sp. 8.
Pelecanus parvus, *Gm.*, *S. N. I.* p. 579 (1788).
Pelecanus leucogaster, *Bodd.*, *Tabl. Pl. Enc.* p. 57 (1788); *Buff.*, *Pl. Enc.* 973.
Disporus sula, *Licht.*, *Doubt. Verz.* p. 87 (1823); *Bp.*, *Consp.* ii. p. 164 (1855); *Hartl.* & *Pinsch.*, *Faun. Centrapoly.* p. 266 (1767); *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.* viii. 2, p. 106 (1872).
Sula brasiliensis, *Spix*, *Av. Bras.* ii. p. 83 t. 107 (av. jun.) (1825).
S. australis, *Steph.*, *Gen. Zool.* xiii. p. 104 (1826).
S. fiber, *Steph.*, *op. cit.* p. 105; *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 296 (1849); *Schleg.*, *Mus. P. B. Pelecani*, p. 41 (1863); *Jerd.*, *B. of Ind.* iii. p. 851, 1864; *Gould*, *Handb. B. Austr.* ii. p. 1-507 (1865); *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii. p. 126, sp. 11100 (1871).
Swinh., *P. Z. S.* 1871, p. 420; *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 369.
S. fulica, *Less.*, *Tr. d'Orn.* p. 601 (1831).
Pelecanus plotus, *Forst.*, *Deser. An.* p. 278 (1844).
Phalacrocorax flavirostris, *Gould*, *apud Licht.*, *in Forst., Deser. An.* p. 278 (1844).
Sula sinicadvena, *Swinh.*, *Ibis*, 1865, p. 109; *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii. p. 126, sp. 11111 (1871).
S. leucogastra, *G. R. Gray*, *op. cit.* sp. 11110 (1871).
Hab. Luzon, Manila, Laguna, Mindanao, Carolinas; Australia.

Fam. PLÓTIDAS.

1. Gén. PLOTUS, LINN.

1. *P. melanogaster*, (*Penn.*) ♂ N. v. Pato castil, Casili. (M. S. T.)

- Anhinga melanogaster*, *Penn.*, *Ind. Zool.* p. 22, pl. 12 (1781).
Anhinga de Cayenne, *Buff.*, *Pl. Enc.* n.º 959, et 107.
Plotus melanogaster, *Gm.*, *S. N. I.* p. 580 (1788); *Lath.*, *Ind. Orn.* ii. p. 865 (1790); *Horsf.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 108 (1821); *Bp.*, *Consp.* ii. p. 181 (1855); *Schleg.*, *Mus. P. B. Pelecani*, p. 26 (1863); *Jerd.*, *B. of Ind.* iii. p. 861 (1864); *Mant.*, *Journ. f. Orn.* 1866, p. 30; *G. R. Gray*, *Hand-List*, iii. p. 125, sp. 11100 (1871); *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.* viii. 2, p. 106 (1872); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874 p. 367. *Brehm*, 4, p. 555 f. 173.

P. novæ-holändicæ, *Gould*, *P. Z. S.* 1847, p. 34; *Gray*, *G. R.* *B.* pl. 184 (1848); *Id.*, *B. Austr.* vii pl. 75 (1848); *Bp.*, *Consp.* ii. p. 181 (1855); *Gould*, *Handb. B. Austr.* ii. p. 496 (1865); *G. R. Gray*, *Hand-List*, iii, p. 125, sp. 1102 (1871).

Hab. Luzón, Manila, Bulacán, Laguna, Calamba, Cavite, Naic, Cagayan, Alcalá, Parípona, Abulug, Mindoro, Calapan, Naujan; Borneo, Java, Célebes.

Fam. FETÓNIDAS.

1. Gén. PHAETON, LINN.

1. *Ph. rubricauda*, *Bodd.* ♂ N. v.

(M S T.)

Phaeton rubricauda, *Bodd.*, *Tabl. Pl. Ent. d'Aub.* p. 57 (1783); *Schleg.*, *Mus. P. B. Pelecani*, p. 44 (1863); *Jerd.*, *B. of Ind.* iii. p. 849 (1864); *Hartl. & Finsch.*, *Faun. Central'olyn*, p. 248 (1867); *Heldsw.*, *P. Z. S.* 1872, p. 482; *Salv. Ucc. di Bor-* *nei*, 1874, p. 370.

Paille en queue de l'ile de France, *Buffl.*, *Pl. Ent.* 979; *id. H. N. Ois.* 8, p. 357.

Phaeton phoenicus, *Gm.*, *S. N.* ii. p. 583 (1788); *Gould*, *B. Austr.* vii. pl. 73 (1848); *id.*, *Handb. B. Austr.* ii. p. 501 (1865).

P. aethereus, *Blokh.* (*nec Linn.*), *Voy. Blond.* App. p. 251 (1826); *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 296 (1849).

P. erubescens, *Brandt*.

Phœnicurus rubricauda, *Bp.*, *Consp.* ii. p. 183 (1855); *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii. p. 125, sp. 11098 (1871).

Phaeton rubricandata, *Hartl. & Finsch*, *Vög. O. Afr.* p. 839 (1870).

Hab. Mindoro, Baco, Luzón, Laguna, Bataan, Orion; Ceilan, Australia.

2. *Ph. candidus*, (*Briss.*)

Orn. vi. pl. xlii f. 2, (1760).

Hab. Islas Carolinas.

Fam. LÁRIDAS.

1. Gén. LARUS, LINN.

1. *L. fritzei*, (*Bruch.*) ♂ ♂ N. v. Cananay.

(M S T.)

Larus fuscus, *Fritze*, in *Mus. Westad*; *Brehm. V. Am.* 4. p. 526. *Dominicanus fritzei*, *Bruch.*, *Journ. f. Orn.* 1855, p. 280, taf. iv. f. 4; *Bp.*, *Consp.* ii. p. 214 (1856); *G. R. Gray*, *Hand-* *List*, iii. p. 112, sp. 10957 (1871).

Larus dominicanus, *Schleg.*, *Mus. P. B. Lari*, p. 12 (parte) (1863).

Larus fritzii, Bl. Journ. f. Orn. 1865, p. 378; Satz. Ucc. di Borneo, 15, p. 370.
Hab. Samar, Borongan; Borneo; Java.

2. *L. ridibundus*, Lin. ♂ N. v. Cananay. (M. S. T.)

L. cinereus, Scop. Ann. 1, n.º 105, Raf. Av. p. 128.
Monette rieuse à pattes rouges, Buff. H. Nat. Ois. 8, p. 433,
Pl. Enl. 970.
Larus ridibundus, Lin. S. N. 2, p. 601; Brehm. V. An. 4, p.
527 f. 162.
Hab. Luzón, Manila; Asia.

3. *L. hardyi*, Bp. ♂ N. v. Cananay. (M. S. T.)

L. hardyi, Bp. Conspl. 2, p. 210 (1854); Compt. Rend. Ac. Sc.
1856.
L. parasiticus, Boie.
Hab. Luzón, Manila; Sandwich.

Fam. ES TERNIDAS.

1. Gén. GELOCHELIDON, BREHM.

1. *G. anglica*, (Mont.) ♀ N. v. Cananay. (M. S. T.)

Sterna anglica, Mont., Orn. Dict. Suppl. (1823); S. Müll., Verhandl. Landen Volkenk. p. 125 (1839-1844); Schleg., Mus. P. B. Sternae, p. 34 (1863).
S. aranea, Wils., Am. Orn. viii, p. 143, pl. lxxii. (1814).
S. affinis, Horsf. (nec Büpp.), Trans. Linn. Soc. xiii, p. 190
(1821).
Viralva? *affinis*, Steph., Gen. Zool. xiii, 1, p. 175 (1826).
? *Sterna macrotarsa*, Gould, P. Z. S. 1837, p. 26.
Gelochelidon anglicus, Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B. p. 290 (1849);
Jerd., p. of Ind. iii, p. 839 (1864).
G. anglica, Bp., Compt. R. nd. xlii, p. 772, sp. 100 (1856); Sclat.,
P. Z. S. 1863, p. 224; Blas., Journ. f. Orn. 1866, p. 82;
Sclat. & Salv., P. Z. S. 1871, p. 572; Salv. Ucc. di Borneo,
1874, p. 371; Brehm. V. Anim. 4, 1881, p. 518.
G. nilotica, G. R. Gray, Hand-List, iii, p. 119, sp. 11040 (1871).
Hab. Balabac; Borneo, Java.

2 Gén HYDROCHELIDON, BOIE.

2. *H. nigra*, (Linn.) ♀ N. v. Cananay. (M. S. T.)

Sterna nigra, Linn., S. N. I, p. 227 (1766); Schleg., Mus. P. B. Sternae p. 31 (1863); Gm. S. N. 2, p. 608, n.º 3.
S. leucoptera, Meissn. & Schinz, Vög. der Schweiz, p. 264 (1815).
Hydrochelidon nigra, G. R. Gray, Jerd., B. of Ind. iii, p. 875
(1864); G. R. Gray, Hand-List, iii, p. 121, sp. 11070 (1871);
Swinh., P. Z. S. 1871, p. 421; Wald., Trans. Zool. Soc.

vii, 2, p. 103 (1872); *Holdsve.*, P. Z. S. 1874, p. 48; *Sav. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 372; *Brehm, Th. Anim.*, 4, 1881, p. 519.
H. javanica, *Swinh.* (*nec Horsf.*), *Ibis*, 1870, p. 68, 1851 p. 345;
Hab. Samar, Calbayoc, Mindanao; Célebes, China.

3. *H. hybrida*, (*Pall.*) ♂ N. v. Canauay.

(M. S. T.)

Sterna hybrida, *Pall.*, *Zoogr. Ross.-As.* ii, p. 338 (1810-1831);
Schleg. Mus. P. B. Sternae, p. 32 (1863).
S. leucopareja, *Natn. in Temm.*, *Man. d'Orn.* 2nd ed. ii, p. 74^a (1820); *S. Mill.*, *Verhandl. Landen Volkenk.* p. 125 (1830-1844).
S. grisea, *Horsf.*, *Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 190 (1821).
S. cantiaca, *Rüff.* (*nec Gm.*), *Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 322 (1822).
S. d'lamotei, *Vieill.*, *Ene. Meth.* p. 350 (1823).
Virálva inlica, *Scp.*, *Gm. Zool.* i, pl. 70 t. 2 (1832).
Sterna semilis, *J. E. Gray* iii, *Ind. Zool.* i, pl. 70 t. 2 (1832).
Hydrochelid in fluviatilis, *Gould*, (*nec Naum.*) *P. Z. S.* 1842, p. 140; *id.*, *B. Afr.* vii, pl. 31 (1848).
H. inlica, *Blyth*, *Cat. B. M.s. A. S. B.* p. 260 (1849); *Jerd. B. of Ind.* iii, p. 837 (1864).
H. hybrida, *Bp.*, *Compt. Rend.* xlii, p. 773, sp. 150 (1850); *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 421; *Sav. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 372; *Brehm, Th. Anim.*, 4, 1881, p. 519.
H. leucopareja, *Gould*, *Habib. B. Austr.* ii, p. 400 (1865); *Wall.*, *Trans. Zool. Soc.* viii, 2, p. p. 103 (1872).
Pelodes hybrida, *G. R. Gray*, *Hand-List.* iii, p. 121 sp. 11071 (1871).
P. indica, *G. R. Gray*, *op. cit.* sp. 11072.
P. fluviatilis, *G. R. Gray*, *op. cit.* p. 122 sp. 11075.
P. delalandei, *G. R. Gray*, *op. cit.* sp. 11076.
Hab. Luzon, Manila, Samar, Borongan, Sibuyan, Panay, Romblon, Guimaras, Negros, Masbate, Cebu, Siquijor, Tablas, Camarines, Tawi-tawi, Minlao, Jolo; Borneo, Formosa, Célebes, Java.

3. Gen. ONYCHOPRION, WAGL.

4. *O. fuliginosus*, (*Gm.*) ♂ N. v. Canauay.

(M. S. T.)

Hirondelle demer à grande envergure, *Büff. H. N. Ois.* 3, p. 345.
Sterna fuliginosa, *Gm.*, *S. N. I.* p. 605 (1788); *Temm.* & *Schleg.*, *Faun. Jap.*, *Aves*, p. 135, t. 89 (1850); *Schleg.*, *Mus. P. B. Sternae*, p. 25 (1863); *Hartl.* & *Finsch*, *Faun. Ce. Insolit.* p. 225 (1867); *Brehm, Th. Anim.*, 4, p. 517 (1887).
Onychoprion serratus, *Wagl.*, *Isis*, 1832, p. 277.
Planetes guttatus, *Wagl.*, *op. cit.* p. 1222.
Haliphanes fuliginosa, *Wagl.*, *op. cit.* p. 1223; *Bp.*, *Compt. Rend.* xlii, p. 772, sp. 10 (1850); *Coues*, *Pr. Ac. Phil.* 1862, p. 557; *Blas.*, *Journ. f. Orn.* 1869, p. 81; *G. R. Gray*, *Hand-List.* iii, p. 122, sp. 11279 (1871).
Sterna serrata, *Först.*, *Descr. An.* p. 276 (1844); *Peltz*, *Novav. Reis.* 1851, p. 154 (1855).

- S. guttata*, Forst. *ib.* vii, p. 211.
Onychoprion fuliginosus, Gould, *B. Austr.* vii, pl. 72 (1848);
Sclat. P. Z. S. 1871, p. 572; *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874,
p. 373.
Anous therminieri, Less., *Descr. de Mamm. et d'Ois.* p. 255 (1827).
Sterna gouldii, Rehb., *Syn. Av. i. Natares*, t. 37, f. 2267-68.
Onychoprion fuliginosus, Newton, *Ibis*, 1855, p. 371.
Sterna fuscicollis, Linn., *Ucc. di Borneo*, 1869, pt. i, p. 126.
Hab. Luzon, Bataan, Hermosa; Japon, Borneo, Sumatra.

8. *O. anaethetus* (Scop.) ♂ N v. Cananay. (M. S. I.)

- Sterna anaethetus*, Scop., *Del. Flor. et Faun. Insubr.* ii, p. 92,
n. 72 (1790); *ex Sonn.*, *Voy. Nov. Guin.* pl. 84.
S. panayensis, Gim., *S. N. I.* p. 1607 (1788); *ex Sonn.*, *I.* 1.
Schleg., *Mus. P.-B. Sternar.* p. 26 (1803).
S. panaya, Lath., *Ind. Orn.* ii, p. 808 (1790); Hartl. & Finsen,
Fam. Centropolyini, p. 228 (1867).
S. oahuensis, Bloch., *Voy. Blonde*, p. 251 (1826).
S. melanoptera Broxhi., *Voy. Blonde*, p. 251 (1826).
S. melanoptera, Sles., *S. W. Afr.* ii, p. 24 (1843); Hartl., *Syst.*
Orn. W. Afr. p. 255 (1857).
S. fuligula, Lich., *in Forst.*, *Descr. An.* p. 276 (nota) (1844).
S. antartica, Cuv., *in Forst.*, *in Mus. Paris*.
Onychoprion panaya, Gould, *B. Austr.* vii, p. 33 (1848).
O. anaethetus, Blyth, *Cat. Mus. A. S. B.* p. 293 (1849); Jerd.,
B. of. Ind. iii, p. 844 (1864); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874,
p. 374.
Haliplana panayensis, Bp., *Compt. Rend.* xlii, p. 772, sp. 98
(1856); Blas., *Journ. für Orn.* 1866, p. 86.
H. panaya, Coues, *Ibis*, 1864, p. 391.
H. discolor, Coues, *Ibis*, 1864, p. 392; Lawr., *Ann. Soc. N. I.*
viii, p. 104 (1864); Elliot, *B. N. Am.* ii, pl. 57 (1869).
Onychoprion panayensis, Gould, *Handb. B. Austr.* ii, p. 411 (1865);
Sclat. & Salv. P. Z. S. 1871, p. 373.
Sterna nubilosa, Sund., *Off. of K. V. A. Fork.* 1869, p. 589.
Haliplana anaethetus, G. R. Gray, *Hand-list*, iii, p. 122, sp.
11080 (1871).
H. maetheta, Swinh., *P. Z. S.* 1871, p. 422.
Onychoprion anaethetus, Hohlsav., *P. Z. S.* 1872, p. 482; Wald.,
Trans. Zool. Soc. viii, 2, p. 103 (1872).
Hab. Luzon, Manila, Navotas, Laguna, los Baños, Biñan,
Samar, Paranas, Borongan, Paragua, P. Princesa, Calamianes,
Calião, Mindoro, Baco; Borneo, Célebes, Java.

9. *O. sumatrana* (Raffl.) ♂ N v. Cananay. (M. S. I.)

- Sterna sumatrana*, Raffl., *Trans. Linn. Soc.* xiii, p. 329 (1822).
S. melanuchen, Temm., *Pl. Col.* 427 (1827); Less., *Man. d'Orn.*
ii, p. 382 (1829); II., *Tr. d'Orn.* p. 622 (1831); Müll., *Ver-*
handl. Land- und Volkenk. p. 125 (1839-44); Gould, *B. Austr.*
vii, pl. 28 (1848); Rehb., *Nientl. Vög. Nieu-Holl.* n. 2).
II., *Syn. Av. i. Nitatores*, t. 32 (xx), f. 282, et t. 35 (cdlxvi),
f. 2255-56; Schleg., *D. Dierent.* fig. p. 29; II., *Hindl. Dierk.*
59

- l. 8, 102 (1857); *Selat. Journ. Pr. Linn. Soc.* 1858, p. 170; *G. R. Gray*, *P. Z. S.* 1859, p. 116; *Id.*, *B. Trop. Isl.* p. 59 (1859); *Id.*, *Cat. B. New Guin.* ii. 53 (1859); *Verr. Rev. et Mag. de Zool.* 1860, p. 442; *Schleg.*, *Mus. P.-B. Sternæ*, p. 28 (1863); *Rosenb.*, *Journ. f. Orn.* 1894, p. 138; *Gould. Handb. B. Austr.* ii. p. 400 (1865); *Pelz.*, *Novar. Reis Vög.* p. 154 (1865); *Finsch & Hartl.*, *Faun. Centralpolyn.* p. 224 (1867); *Swinh.*, *Ibis*, 1867, p. 230; *Chao.* 3, p. 669.
S. marginata, *Blyth*, *J. A. S. B.* xv. p. 373 (nota) (1846).
Omychoptrion melanuchen, *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S. B.* 293 (1849); *Jerd.*, *B. of Ind.* iii. p. 844 (1864); *Blyth*, *Ibis*, 1865, p. 39; *Wald.*, *P. Z. S.* 1866, p. 556; *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 422; *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.* viii. 2, p. 104 (1872).
Sternula melanuchen, *Bp.*, *Compt. Rend.* xlvi. p. 773, sp. 142 (1856); *Blas.*, *Journ. f. Orn.* 1866, p. 74; *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii. p. 121, sp. 11053 (1861).
Sterna minutæ *Swinh.* (*nec Linn.*), *Ibis*, 1860, p. 429.
Gygis sp., *Hartl.*, *Ibis*, 1864, p. 232.
G. decorata, *Hartl.*, *Hartl. Godeffr. Cat.* i. p. 5 (1864).
Omychoptrion sumatrana, *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 374.
Hab. Mindoro Calapan; Borneo, Célebes.

5. Gen. GYGIS, WAGL.

10. **G. alba**, (*Sparrm.*) ♂ N. v. Cananay.

(M. S. T.)

- Sterna alba*, *Sparrm.*, *Mus. Carls.* n.º xi. (1786); *Schleg.*, *Mus. P.-B. Sternæ*, p. 35 (1863).
S. candida, *Gm. S. N.* p. 607 n.º 19 (1788); *Lath.*, *Ind. Orn.* ii. 807 (1790); *Forst.*, *Dregr. An.* p. 179 (1844).
Gygis candida, *Wagl.*, *Isis*, 1832, p. 1224; *Gould*, *B. Austr.* vii. pl. 30 (1848); *Bp.*, *Compt. Rend.* xlvi. p. 772, sp. 116 (1856); *G. R. Gray*, *B. Trop. Isl.* p. 59 (1859); *Pelz.*, *Novar. Reis. Vög.* p. 155 (1865).
G. alba, *Bp.*, *Compt. Rend.* xlvi. p. 772, sp. 115 (1756); *Cass.*, *U. S. Expl. Exp. Orn.* p. 389 (1858); *Gould*, *Handb. B. Austr.* ii. p. 495 (1865); *Blas.*, *Journ. f. Orn.* 1866, p. 73; *Hartl.* & *Finsch*, *Faun. Centralpolyn.* p. 232 (1867); *Swinh.*, *P. Z. S.* 1871, p. 422; *G. R. Gray*, *Hand-list*, iii. p. 122, sp. 11083 (1871); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 375; *Brehm. F. Anim.* 4, 1881, p. 520.
Gygis napoleonis, *Bp.*, *Compt. Rend.* xlvi. p. 772, sp. 117 (1856).
Hab. Mindoro, Baco, Paranas, Samar, Carolinas, Palaos, China.

6. Gen. STERNA, LINN.

Subgen. PELECANOPUS, WAGL.

11. **St. cristata**, Steph. ♂ N. v. Taratara.

(M. S. T)

- Sterna cristata*, *Steph.* (*nec Sws.*), *Gen. Zool.* xiii. p. 146 (1826); *Mill.* & *D'Her.*, *Contr. Nat. Hist. of Lab.* p. 61 (1855);

- Swinh.*, *Ibis*, 1863, p. 430; *G. R. Gray*, *Hand-List*, iii., p. 120, sp. 11058 (1871).
St. pelecanoides, *King*, *Surv. Intertrop. Austr.* II, *Alph. Acc.*, p. 422 (1827); *Schleg.*, *Mus. P. B. Sternæ*, p. 9 (1860); *Id.*, *Ned. Tijdschr. Dierk.* iii., p. 350 (1866).
Pelecanopus pelecanoides, *Wagl.*, *Isis*, 1832, pp. 277, 1225; *G. R. Gr.*, *List B. Brit. Mus.* iii., *Ausseres*, p. 180 (1844); *Bp.*, *Compt. Rend. Sci. Paris*, xlii., p. 772, sp. 90 (1856); *Swinh.*, *P. Z. S.*, 1871, p. 422.
Sterna velox, *S. Müller* (*nec Rüpp.*), *Verhandl. Landen-en Volkenk.*, p. 125 (1839-1844); *Selat. Journ. Pr. Tiers. Soc.*, 1858, p. 170; *Swinh.*, *Ibis*, 1860, p. 429; 1861, p. 345; 1869, p. 134.
St. ressa, *S. Müller*.
Thalasseus pelecanoides, *Gould*, *B. Austr.* vii., pl. 23 (1848); *Rosenh.*, *Journ. f. Orn.*, 1864, p. 138; *Swinh.*, *P. Z. S.*, 1871, p. 422.
T. cristatus, *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S. B.*, p. 291 (1849).
Swinh., *P. Z. S.*, 1863, p. 329; *Jerd.*, *B. of Ind.* iii., p. 842 (1864); *Gould*, *Handb. B. Austr.* ii., p. 394 (1865); *Holdsw.*, *P. Z. S.*, 1871, p. 481.
Sterna Bergii, *Finsch & Hartl.*, *Paun. Centraafolyn.* p. 216 (partim) (1867); *Brehm*, *V. Ann.* 4, 1887, p. 544.
Pelecanopus cristatus, *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.* viii. 2, p. 105 (1872); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874 p. 376.
Hab. Luzon, Manila, Siquijor, Cebú, Masbate, Negros, Guimaras, Panay, Sibuyan, Romblon, Tablas, Calauitan, Samar, Tawi-tawi, Joló, Paragua, P. Princesa, Canigaran, Mindanao, Bohol, Leyte; Formosa, Célebes.

12. *St. media*, Horsf. ♂ N. v. Cananay. (M. S. T.)

- Sterna media*, *Horsf.* (*nec Forst.*), *Trans. Linn. Soc.* xiii., p. 195 (1821); *Hartl. & Finsch*, *Vög. O. Afr.* p. 830 (1870).
S. affinis, *Rüpp* (*nec Horsf.*), *Atlas*, p. 23, tab. 14 (1826); *Temm.*, *Mon.* iv., p. 454 (1849); *S. Müll.*, *Verhandl. Landen-en Volkenk.* p. 152 (1839-1844); *Schleg.*, *Mus. P. B. Sternæ*, p. 6 (1863).
S. bengalensis, *Cuv.*, *Mus. Paris.-Less.*, *Tr. d'Orn.* p. 621 (1831); *Pucher.*, *Rev. et Mag. de Zool.* 1850, p. 512.
S. torresii, *Gould*, *P. Z. S.*, 1842, p. 140.
Thalasseus torresii, *Gould*, *B. Austr.* vii., pl. 25 (1848); *Blyth*, *Ibis*, 1865, p. 39.
Sylochelidon affinis, *Gray*, *List. B. Brit. Mus.* iii., *Ausseres*, p. 177 (1844).
Phalesseus maxuriensis, *Licht.*, *Nomencl.* p. 98 (1854).
T. bengalensis, *Jerd.* iii., p. 813 (1864); *Gould*, *Handb. B. Austr.* ii., p. 396 (1865); *Blyth*, *Ibis*, 1867, p. 177.
T. affinis, *Blas.*, *Journ. f. Orn.* 1866, p. 82.
Artochelidon media, *G. R. Gray*, *Hand-List*, iii., p. 119, sp. 11047 (1871).
Thalasseus medius, *Holdsw.*, *P. Z. S.*, 1872, p. 482.
Pelecanophus medius, *Wald.*, *Trans. Zool. Soc.* viii. 2, p. 104 (1872); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 377.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; Java, Célebes, Sumatra.

7. Subgen. STERNA, LINN.

13. St. melanogastra, Temm. ♂♂ N. v. Cananay. (M. S. T.)

- ?Sterna javanica, Horsf., *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 198 (juv.) (1821); Blyth, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 293 (1840); Jerd., *B. of Ind.* iii. p. 840 (1864).
S. melanogaster, Temm., *Pl. Col.* 434, (1827); Horsf., *General Catalogue of Jav. Birds, nelle Zool. Res. in Java*, p. ult. (1824); Burg., *P. Z. S.* 1855, p. 184; Gould., *B. As.* pt. xix. pl. 16 (1867); Holsw., *P. Z. S.* 1872, p. 481.
S. acuticanda, Hardw. & Gray, *Ill. Ind. Zool.* pl. 70, f. 3 (1830-34).
Hydrochelidon melanogaster, G. R. Gray, *Gen. B.* p. 660 (1846); Bp., *Compt. Rend.* xlii. p. 777, sp. 154 (1856).
Sterna melanogastra, Schleg., *Mus. P. B. Sterna*, p. 21 (1863); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874, p. 377.
Sternula melanogastra, Blas., *Journ. f. Orn.* 1866, p. 74.
Pelodes javanica, G. R. Gray, *Hand-list.* iii. p. 122, sp. 11073 (1871).
Hab. Luzon, Manila, Paragua, P. Princesa, Masbate; Ceilán, Java.

14 St. sinensis, Gm. ♂ N. v. Cananay. (M. S. T.)

- St. sinensis, Gm. S. N. 2, p. 608; Whiteh., *Ibis*, 1800, p. 60.
Hab. Mindoro, Calapan.

8 Gén. STERNULA, BOIE

15 St. minuta, (*Linn.*) ♂♂ N. v. Canauay. (M. S. T.)

- Sterna miuuta, Linn., S. N. I. p. 228 (1766); Gm. S. N. 2, p. 608; Horsf., *Trans. Linn. Soc.* xiii. p. 198 (1821). ?S. Müll., *Verhandl. Land-en Volkenk.* p. 125 (1839-1844); Schleg., *Mus. P. B. Sternae*, p. 21 (1863); Blas., *Journ. f. O-n.* 1866, p. 74. Petite hirondelle de mer, Buff. H. N. Ois. 8, p. 377; Pl. Enf. 996.
Sterna netopoleucus, Gm., S. N. ii. p. 608 (1788).
Sternula minuta, Boie, *Isis*, 1822, p. 564; Blyth, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 292 (1840); Sclat., *P. Z. S.* 1853, p. 224; Jerd., *B. of Ind.* iii. 841 (1864); G. R. Gray, *Hand-list.* iii. p. 121, sp. 11062 (1871); Swinh., *P. Z. S.* 1871, p. 422; Wld., *Trans. Zool. Soc.* viii, 2, p. 118 (1872); Salv. *Ucc. di Borneo*, 1874, p. 378; Brehm, *V. Anim.* 4, 1881, p. 517.
?Sternula nericis, Gould, *P. Z. S.* 1842, p. 142; id., *B. Austr.* vii, pl. 29 (1848); id., *Handb. B. Austr.* ii. p. 402 (1865).
?Sterna nereis, Rosenb., *Journ. f. Orn.* 1864, p. 138.
Hab. Mindanao, Zamboanga; Borneo, China.

9. Gén. ANOUS, LEACH.

16 A. stolidus, (*Linn.*) ♂♂ N. v. Cananay. (M. S. T.)

- Sterna stolidus, Linn., *Amoen. Ac.* iv. p. 240; Id., S. N. I. p.

- 227 (1766); *Gm. S. N.* p. 605 (1788); *Schleg.*, *Mus. P. R. Sternæ*, p. 36 (1803).
Monette brune, *Buff. Pl. Ent.* n.^o 907. *H. N. Ois.* 8. p. 461.
Gavia fusca, *Briss.*, *Orn.* vi. p. 199, t. 18, f. 2 (1760).
Sterna pileata, *Scop.*, *Del. Flor. et Faun. Insubr.* p. 92, n. 73 (1786); *ex Sonner.*, *Voy à la Nouv. Guin.* p. 125, t. 85.
St. philippina, *Lath.*, *Ind. Orn.* ii. p. 805 (1790).
Anous niger, *Steph.*, *Gen. Zool.* xiii. p. 149 (1826).
Megalopterus stolidus, *Boie*, *Gould*, *Voy. Beagle*, p. 145 (1841).
Sterna leucocephs, *Sw.*
S. unicolor, *Erman*, *Verz. von Thier. u. Pflanz.* 1835, p. 17.
Anous stolidus, *G. R. Gray*, *List. Gen. B.* p. 100 (1841); *Gould*, *B. Austr.* vii. pl. 34 (1848); *Blyth*, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 293 (1849); *Cass.*, *U. S. Expl. Exp. Orn.* p. 391 (1858); *Jerd.*, *B. of Ind.* iii. p. 845 (1864); *Couess.*, *Ibis*, 1864, p. 392; *Gould*, *Handb. B. Austr.* ii. p. 413 (1865); *Pelz.*, *Növar. Reis. Vög.* p. 155 (1864); *Blas.*, *Journ. f. Orn.* 1866, p. 83; *Hartl.* & *Finsch*, *Faun. Centralpolyn.* p. 238 (1867); *Sclat.* & *Salv.*, *P. Z. S.* 1871, p. 566; *G. R. Gray*, *Hand-List.* iii. p. 123, sp. 11084 (1871); *Salv. Ucc. di Borneo*, 1874 p. 379; *Brehm*, *V. Ani.* 4. 1881 p. 521 *Wood. Nat. Hist.* 2 v. 755 fig.
A. pileatus, *G. R. Gray*, *Gen. B.* p. 661 (1846); *Pelz.*, *Növar. Reis. Vög.* p. 155 (1855).
A. unicolor, *G. R. Gray*, *op. cit. ibid.*
A. rousseauii, *Hartl.*, *Orn. Beitr. Madag.* p. 86 (1861).
A. frater, *Coues*, *Pr. Ac. Philad.* 1862, p. 558; *Id.*, *Ibis*, 1864, p. 393.
Hab. Luzón, Manila, Laguna; Borneo, Sumatra, Java, Formosa.

17. *A. melanogenys*, *Gr. N.* v.

Hab. Carolinas.

Fam. PODICÍPIDAS.

1. Gén. SYLVEOCYCLUS, Br.

1. *S. philippensis*, (*Bon*) ♂ N. v. Suliasip. (M. S. T.)

- Le castagneux des Philippines, *Buff. Hist. Nat. Ois.* viii. p. 246;
D'Aubent. Pl. Ent. 946; *Tem. Man. d'Orn.* ii. p. 729.
Colymbus minor, var. *B.* *Gm. S. N.* i. p. 591, n.^o 20 *ex Buffon*.
C. philippensis, *Bonnaterre*, *Eency.* i. p. 58, pl. 46 f. 3. (1823);
ex Buffon; *v. Martens*, *J. f. O.* 1866, p. 31 n.^o 192.
Podiceps philippensis, *Wald*, *On Birds Philip.* 1875 p. 406;
Brehm, *Vida de los animales* 4. p. 572.
Hab. Luzón, Laguna, Calauan, Guimarás.

2. *S. var.* ♂ N. v. Suliasip. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Pampanga, Bataan, Orion.

2. Géne PODICEPS, LATH.

3. **S. australis**, Gould ♂ N. v. Calapini. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Australia.

3. Gén PEDEAITHVIA, KAUP.

4. **S. rubricollis**, Lath. ♂ (B. 931) N. v. (M. S. T.)

Hab. Europa, Alemania.

Fam. COLÍMBIDAS.

1. Gén. COLUMBUS, LIN.

1. **C. arcticus**, Lin. ♂ (Buff. 952) N. v. (M. S. T.)

Hab. Norte de Europa, Alemania.

Fam. PROCELÁRIDAS

1. Gén. DIOMEDEA, LIN.

1. **D. exulans** Lin. ♂ N. v. Pájaro carnero, Al atos aullador M. S. T.)

Hab. Pacífico, Australia, África.

2. Gén. PUFFINUS, BRISS.

2. **P. leucomelas**, (Tem.) ♂ N. v. (M. S. T.)

Procellaria leucomelas, Tem. Pl. Coll. 587, «Japan» (1836); Tem. et Schl. Faun. Jap. Aves, p. 131, pl. 15; G. R. Gray, List. Br. Mus. Anseres, p. 160, «Cataguas» (1844).

Hab. Luzón, Manila; Japon.

Fam. ÁLCIDAS.

1. Gén. CHENISCUS, MOEHR.

1. **Ch. cirratus**, (Gm.) ♂ (Buff. 761) N. v. (M. S. T.)

Hab. América.



Clase 3.^a REPTILES.

Orden: QUELONIOS

Suborden: ATECOS.

—
Fam. ESFÁRGIDOS.

1. Gen. DERMOCIELYS, BLAINV.

† **D. coriacea?** (Linn.) ♂ N. v. Paguican.

Lestudo coriacea, Linn. S. N. i. p. 350 (1766); *Schoepff*, *Vest.* p. 123, pl. xxix. (1792); *Daud. Rept.* ii. p. 62, pl. xviii. fig. 1 (1802).

T. arcuata, *Catesby*, *Nat. Hist. Carol.* ii. p. 40 (1771).

Chelon coriacea, *Schweigg. Prodr.* p. (1814).

Sphargis mercurialis, *Merr. Tent.* p. 19 (1820); *Schleg. Faun. Japon.*, *Rept.* p. 6, pls. i-iii. (1838).

Corindo coriacea, *Harlan. Journ. Ac. Philad.* vi. p. 37 (1827).

Sphargis tuberculata, *Gravenh. Delic. Mus. Uratist.* p. 9 (1829).

Dermatochelys porcata, *Wagl. Syst. Amph.* pl. i, figs. 1-3 (1830).

Sphargis coriacea, *Gray. Syn. Rept.* i. p. 51 (1831); *Dum. & Bibr.* ii. p. 500, pl. xxiv, fig. 2 (1835); *Bell. Brit.* p. 11, fig. (1831); *Bonap. Icon. Faun. Ital.* pl.—(1841); *Holbr. N. Am. Herp.* ii. p. 45, pl. vi. (1842); *Gray. Cat. Tort.* p. 51 (1844); *et Sh. Rept.* i. p. 71 (1855); *Agaßiz. Contr. N. H. U. S.* i. p. 373 (1857); *Gray. Suppl.* p. 119 (1870); *Gervais. N. Arch. Mus.* viii. p. 199, pls. v-ix. (1872); *Schreib. Herp. Eur.* p. 509 (1875); *German. Bull. U. S. Nat. Mus.* n.º 25, p. 303 (1884); *McGow. Prodr. Zool. Viet.* pls. xlvi. & xlvi. (1885); *Wood. Nat. Hist.* 3. p. 20, f.

Dermatochelys coriacea, *Strauch. Chelon. Stud.* p. 180 (1862), and *Verh. Sekildkr.* p. 133 (1865); *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 55 (1864); *Boulanger. Cat. B. M.* p. 10 (1880); *Brehm. V. Au.* p. 52 f. 19; *Vilim. Cread. S.* p. 22 f. 16.

Hab. Luzón, B. de Manila, Malabon; Océano pacífico.

Suborden: TECÓFOROS.

— — — — —

Fam. PLATISTERNIDOS.

1. Gen. PLATYSTERNUM, GRAY.

† **Pt. megacephalum**, *Gray* in *N. v.* (M. S. M.)

Platysternon megacephalum, *Gray. L. c.* p. 107, et *III. Ind. Zool.* i. pl. lxiii. (1834); *Dum. & Bibr.* p. 344, pl. 2; *Gr. I.*,

- Tort.* p. 35, *et Sh. Rept.* i. p. 49; *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 43 (1854); *Theob. Journ. Linn. Soc.* x. p. 17 (1868); *Bouleng. Ann. & Mag. N. H.* (5) xix. p. 461, pls. xvi. & xvii. (1887); *id. Cat. B. M.* 1889, p. 46.
Emys megacephala, *Schleg. Faun. Japon.*, *Rept.* p. 49 (1838).
Platysternon peguense, *Gray, Suppl. Cat. Sh. Rept.* i. p. 70 (1870).
Hab. Mindoro; China.

Fam. TESTUDÍNIDOS.

1 Gén. CALLAGUR, GRAY.

1. *C. picta*, Gray, ♂ N. v. (M. S. T.)

Emys trivittata, (*non D. & B.*), *Cantor, Cat. Mal. Rept.* p. 4 (1847).

Tetraonyx affinis, *part.*, *Cantor, l. c.* p. 6.
Bitagur picta; *Gray, Proc. Zool. Soc.* 1862, p. 204.
B. affinis, *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 40, pl. iii. fig. C. (1864);
Theob. Cat. Rept. Brit. Ind. p. 19 (1876).
Clemmys grayi, *Strauch, Verth. Schildkr.* p. 88 (1865).
Kachuga affinis, *Gray, Proc. Zool. Soc.* 1869, p. 203.
Gallagur picta, *Gray, Suppl. Cat. Sh. Rept.* i. p. 53 (1870);
Boul. Cat. B. M. 1889, p. 60.
Cantorella affinis, *Gray, l. c.* p. 58.
Kachuga major, *Gray, Ann. & Mag. N. H.* (4) xi. p. 300 (1873).
Tetraonyx pictus, *Theob. l. c.*
Hab. Paragua, Balabac; Borneo.

2 Gén. OCADIA, GRAY.

2. *O. sinensis*, (*Gray*) ♂ N. v. (M. S. T.)

Emys sinensis, *Gray, Proc. Zool. Soc.* 1834, p. 53, *et Cat. Tort.* p. 17 (1844), *et Sh. Rept.* i. p. 20, pl. vii. (1855);
Günth. Rept. Brit. Ind. p. 27 (1864).

E. bermettii, *Gray, Cat. Tort.* p. 21, *and Sh. Rept.* i. p. 22, pl. x.

Clemmys sinensis, *Strauch, Chelon. Stud.* p. 32 (1862).
C. bennettii, *Strauch, l. c.*, *et Verth. Schildkr.* p. 72 (1865).
Ocadia sinensis, *Gray, Suppl. Cat. Sh. Rept.* i. p. 35 (1870);
Boul. Cat. B. M. 1889, p. 85.

Hab. Vigan, Ilocos; Formosa, China.

3. Gén. DAMONIA, GRAY.

3. *D. reevesii*, Gray. N. v. (M. S. T.)

Emys reevesii, *Gray, Syn. Rept.* p. 73 (1831); *Dum. & Bibr.* ii. p. 313 (1835); *Gray, Cat. Tort.* p. 18 (1844); *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 29 (1864); *Rütimeyer, Verh. Naturf. Ges. Basell.* vi. p. 48 (1875).
E. vulgaris picta, *Schleg. Abbild.* p. 127, pl. xlvi. (1844).

E. japonica, *J. Dan.*, *Cat. Meth. Rept.*, p. 8 (1851), et *Arch. Mus.*, vi, p. 220 (1852).

Geoclemmys reevesii, *Gray*, *Cat. Sh. Rept.*, i, p. 18, pl. v. (1855). *Clemmys reevesii*, *Strauch*, *Ch. Im. Stud.*, p. 104 (1862).

Danura reevesii, *Gray*, *Proc. Zool. Soc.* 1869, p. 194, et *Suppl. Cat. Sh. Rept.*, i, p. 44 (1870), et *Ann. & Mag. N. H.* (4) xi, p. 148 (1873); *Boul. Cat. B. M.* 1889, p. 95.
Hab. Luzon, Cavite; China.

4. Gen. **BELLIA**, GRAY.

4. ***B. crassicollis*, (Gray) ♂**

(M. S. T.)

Emys crassicollis, *Gray*, *Syn. Rept.*, p. 21 (1831), et *Ill. Ind. Zool.*, i, pl. xxvi, fig. 2 (1832); *Dum. & Bibr.*, ii, p. 325 (1835). *Gray*, *Cat. Tort.*, p. 16 (1844); *Cantor*, *Cat. Mil. Rept.*, p. 1 (1847); *Gray*, *Cat. Sh. Rept.*, i, p. 20 (1855); *Günth.*, *Rept. Brit. Ind.*, p. 28, pl. iv, fig. E (1864).

E. spengleri, *part.*, *Schleg.*, *Faun. Japon.*, *Rept.*, p. 49 (1833).

E. nigra, *Blyth*, *Journ. As. Soc. Beng.* xxiv, 1855, p. 713 (1856); et xxxii, 1863, p. 81.

Clemmys crassicollis, *Strauch*, *Chelon. Stud.*, p. 32 (1862); *et Verth.*, *Schildkr.*, p. 69 (1865).

Bellia crassicollis, *Gray*, *Proc. Zool. Soc.* 1869, p. 197, et *Suppl. Cat. Sh. Rept.*, i, p. 40 (1870); *Boul. Cat. B. M.* 1889, p. 98.

B. crassilobris, *Theob. Cat. Rept. Brit. Ind.*, p. 10 (1876).
Hab. Cuyo, Calamianes; Borneo, Sumatra.

5. Gén. **NICORIA**, GRAY.

5. ***N. spengleri*, Gray, ♂ N. v.**

(M. S. T.)

Wallbaum, *Schr. ges. Naturf. Freunde*, vi, p. 122, pl. iii. (1785).

Testudo spengleri, *Gmel. S. N.*, i, p. 1043 (1789); *Daud. Rept.*, ii, p. 103 (1802).

T. serrata, *Shaw*, *Zool.* iii, p. 51, pl. ix, fig. 2 (1802).

T. tricarinata, *Bory de St. Vinc.*, *Voy. dans les quatre princ. Iles des Mers d'Afrique*, ii, p. 308, pl. xxxvii, fig. 1 (1804).

Emys spengleri, *Schweigg.*, *Prodri.*, p. 41 (1814); *Dum. & Bibr.*, ii, p. 307 (1835).

Geomyda spengleri, *Gray*, *Proc. Zool. Soc.* 1834, p. 100, et *Cat. Tort.*, p. 14 (1844).

Nicoria spengleri, *Gray*, *Cit. Sh. Rept.*, i, p. 17 (1855); *Boul. Cat. B. M.* 1889, p. 120.

Clemmys spengleri, *Strauch*, *Chelon. Stud.*, p. 32 (1862); *et Verth.*, *Schildkr.*, p. 63 (1865).
Hab. Balabac, Paragua; China, Borneo.

6. Gen. **CYCLEMYS**, BELL.

6. ***C. trifasciata*, (Gray) ♂ N. v. Paguican.**

(M. S. T.)

Sternotherus trifasciatus, *Bell*, *Zool. Journ.*, ii, p. 305, pl. xiii. (1825).

- Cistudo trifasciata, Gray, *Syn. Rept.*, p. 19 (1831); and *Ill. Ind. Zool.*, ii, pl. lxi. (1834); Dum. & Bibr. ii, p. 219 (1835); Gray, *Cat. Tort.*, p. 31 (1844).
Cuora trifasciata, Gray, *Cat. Sh. Rept.*, i, p. 42 (1855); Günth. *Rept. Brit. Ind.*, p. 14 (1864).
Terrapene trifasciata, Strauch, *Chelon. Stud.*, p. 27 (1862).
C. trifasciata, Boul. *Cat. B. M.* 1889, p. 133.
Hab. Batanes; China.

7. **C. amboinensis.** Daud. ♂♂ N. v. Paganian. (M. S. T.)

- Testudo amboinensis, Daud. *Rept.*, ii, p. 309 (1802).
♀ Testudo melanocephala, Daud. *I. c.*, p. 128.
Emys amboinensis, Schweigg. *Prodri.*, p. 45 (1814).
E. couro, Schweigg. *I. c.*, p. 46; Schleg. *Faun. Japon.*, *Rept.*, p. 63 (1843).
Terrapene amboinensis, Merr. *Tent.*, p. 28 (1820); Strauch, *Chelon. Stud.*, p. 99 (1862); et Verth. *Schildkr.*, p. 47 (1865); Sowerby & Lear, *Tort.*, pl. xxiii. (1872).
Kinosternon amboinense, Bell, *Zool. Journ.*, ii, p. 305 (1825).
Terrapene bicolor, Bell, *I. c.*, p. 484, pl. xi.
T. couro, Pilzing. *N. Class. Rept.*, p. 45 (1826).
Cistudo amboinensis, Gray, *Syn. Rept.*, p. 19 (1831); and *Ill. Ind. Zool.*, i, pl. lxxvii, fig. 2 (1832); Dum. & Bibr. ii, p. 215, pl. xv, fig. 2 (1835); Gray, *Cat. Tort.*, p. 30 (1844); Giebel, *Zeitschr. f. ges. Naturw.*, xxvii, p. 11 (1866).
Cuora amboinensis, Gray, *Cat. Sh. Rept.*, i, p. 41 (1855); Günth. *Rept. Brit. Ind.*, p. 12, pl. iv, figs. A, B. (1864); Gray, *Suppl. Cat. Sh. Rept.*, i, p. 21 (1870); et *Append.*, p. 10 (1872); *Incoh. Cat. Rept. Brit. Ind.*, p. 7 (1876).
Cyclemys amboinensis, Boul. *Cat. B. M.* 1889, p. 133.
Hab. Luzon, Manila, Cavite, Laguna de Bay, Negros, Dingat; Siam.

8. **C. flavomarginata.** (Gray.) N. v. Bayuyuco. (M. S. T.)

- Cuora trifasciata, part., Gray, *Cat. Sh. Rept.*, i, p. 42 (1855).
Cistoclemmys flavomarginata, Gray, *Proc. Zool.* 1863, p. 175, et *Ann. & Mag. N. H.* (3) xiii, p. 107 (1864), et *Suppl. Cat. Sh. Rept.*, i, p. 20 (1870).
Cuora flavomarginata, Günth. *Rept. Brit. Ind.*, p. 13, pl. v, fig. A. 1864.
Terrapene flavomarginata, Strauch, Verth. *Schildkr.*, p. 48 (1865).
Cyclemys flavomarginata, Boul. *Cat. B. M.* 1889, p. 135.
Hab. Luzón, Pangasinan, Lingayen; Formosa.

9. **C. platynota.** (Gray.) ♂♂ N. v. Bayuyuco. (M. S. T.)

- Emys platynota, Gray, *Proc. Zool. Soc.* 1834, p. 54 et *Ill. Ind. Zool.*, ii, pl. 111, t. 1 (1834); et *Cat. Tort.*, p. 16, 1844; Strauch, Verth. *Schildkr.* 1865, p. 57.
Cyclemys platynota, Gray, *Cat. Sh. Rept.*, i, 1855 p. 43. *Bouleng. Cat. Ch. B. M.* 1889, p. 130.
Notochelys platynota, Gray, *Proc. Zool. Soc.* 1863, p. 377; Gthr.

- Rept. R. India*, 1864, p. 17; *Gray, Suppl. Cat. Sh. Rept.* I.
1870, p. 21.
C. dentata (*non Gray*) *Giebel, Zeitschr. J. ges. Natu.* xxvii, p.
15, pl. iii. (1866).
Geocemyda granalis, *part. Gray, Suppl. Cat. Sh. Rept.* i, p. 26.
C. Giebelii, Hubrecht, Notes Leyd. Mus. iii. (1881); p. 45.
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo, Sumatra.

Fam. QUÉLÓNIDOS.

1. Gén. CHELONE, STRAUCH.

1. Ch. mydas, (*Jm.* & ? N. v. Paguican,

M. S. T.)

- Testudo mydas*, *Linn. S. N.* i, p. 350 (1768); *Schoepff, Testud.*
p. 73, pl. xvii, fig. 2 (1792); *Daud. Rept.* ii, p. 10, pl. xvi.
fig. 1 (1802).
T. macropus, Walbaum, Chelonogr. p. 112 (1782).
T. viridis, Schneid. Schildkr. p. 299, pl.— (1783); *Brehm, T.*
An. 5. p. 47, fig.
T. japonica, Thunberg, Vetensk. Acad. Handl. viii, p. 178, pl.
vii, fig. 1 (1787).
T. cepediana, Daud. l. c. p. 50.
Chelonia japonica, Schweigg. Prodri. p. 21 (1814).
C. virgata, Schweigg. l. c.; Dum. & Bibr. ii, p. 541 (1835);
Cocteau, in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Rept. p. 26, pl. iii.
(1843); *Gray, Cat. Tort.* p. 54 (1844); *Cantor, Cat. Mal.*
Rept. p. 11 (1847); *Gray, Sh. Rept.* i, p. 74 (1855); *Agassiz,*
Contr. N. H. U. S. i, p. 379 (1857); *Günth. Rept. Brit. Ind.*
p. 53 (1864).
C. mydas, Schweigg. l. c. p. 22; *Gray, Syn. Rept.* p. 52 (1831);
Dum. & Bibr. ii, p. 538; Holbr. N. Am. Herp. ii, p. 25, pl.
iii. (1842); *Agassiz, Contr.* i, p. 378; *Sowerby & Lear, Tort.*
pls. lix. & lx. (1872); *Peters, Reiss n. Mossamb.* iii, p. 18
(1882); *Vilan, Creat.* 5, p. 19, fig. 14.
Carretta cepedii, esculenta, nasicornis, thurbergii, Merr. *Tent.*
p. 18 (1820).
Chelonia maculosa, lachrymata, Cuv. R. A. 2, ed. ii, p. 13 (1829);
Dum. & Bibr. ii, p. 544.
C. viridis, Temm. & Schleg. Faun. Japon., Rept. p. 18, pls. iv.
& vi. (1843); *Cocteau, l. c.* p. 19; *Gray, Cat. Tort.* p. 54,
et Sh. Rept. i, p. 75; *Girard, U. S. Explor. Exped. Herp.*
p. 452 (1858); *Gray, Proc. Zool. Soc.* 1873, p. 402; *Wood.*
Nat. Ibis, t. 3. p. 21.
C. bicarinata, Lesson, in Balang. Voy. Ind. Or., Zo l. p. 301 (1834).
C. marmorata, Dum. & Bibr. ii, p. 546, pl. xxiii, fig. 1; *Girard,*
l. c. p. 455, pl. xxxi, figs. 5-7.
Euchelys macropus, Girard, l. c. p. 448, pl. xxxi, figs. 9-11.
Chelonia formosa, Girard, l. c. p. 456, pl. xxxi, figs. 1-4.
C. tenuis, Girard, l. c. p. 459, pl. xxxi, fig. 8.
Chelone macropus, virgata, viridis, Strauch, Chelon. Stud. p. 61
(1862); p. 185, *Verh. Schildkr.* p. 141 (1865); *Schreib. Herp.*
Eur. p. 518 (1875).

- Chelone maculosa, marmorata, Storer, Chelon. Stud. I., 186.*
Mydas viridis, Gray, Suppl. Cat. Sh. Rept. i. p. 119 (1870).
Chelonia agassizii, Bocourt, MSS. Sc. Mex., Rept. p. 29, pl. iv. (1870); Garman, Bull. Mus. Compt. Zool. vi. p. 126 (1880).
C. depressa, Garman, l. c. p. 124.
C. lata, Philippi, Syst. Gart. xxviii. p. 84 (1887).
Chelone mydas, Boul. Cat. B. M. 1889, p. 180.
Hab. Mindanao, Mangsi; Formosa, Australi.

2 *Ch. imbricata* Strauch ♂ M. v. Puguican

(M. S. T.)

- Testudo imbricata, Linn. S. N. i. p. 35 (2766); Schneid. Schildkr. p. 309 (1783); Schoepff, Testud. p. 72, pl. xviii. (1792).*
T. caretta, Daud. Rept. ii. p. 39, pl. xvii. fig. 2 (1802).
Chelonia imbricata, Schweigg. Prodri. p. 21 (1814); Gray, Syn. Rept. p. 51 (1831); Temm. & Schleg. Faun. Japon., Rept. p. 13, pl. v. (1833); Dum. & Bibr. ii. p. 548, pls. ii. & xxv. fig. 2 (1835); Bell, Brit. Rept. p. 1 (1839); Holbr. N. Am. Herp. ii. p. 39, pl. v. (1842); Sowerby & Lear, Tigr. pls. lviii. (1872); Vilan, Creac. 5. p. 19, f. 15.
Caretta imbricata, Merr. Tent. p. 19 (1820); Gray, Cat. Tort. p. 53 (1844), et Sh. Rept. i. p. 74 (1855); Girard, U. S. Explor. Exped., Herp. p. 440 (1857); Gray, Proc. Zool. Soc. 1873, p. 397; Wood, Nat. His. 3. p. 20 fig.
Chelonia pseudo-mydas, Lesson, in Belang. Voy. Ind. Or., Zool. p. 299 (1834).
C. pseudo-caretta, Lesson, l. c. p. 302.
Caretta bissa, Rüpp. N. Wirbelth. Abyss., Amph. p. 4, pl. ii. (1835).
Eretmochelys imbricata, Agass. Contr. N. H. U. S. i. p. 381 (1857).
E. squamata, Agass. l. c. p. 302.
Caretta squamosa, Girard., l. c. p. 442, pl. xxx. figs. 1-7.
C. rostrata, Girard., l. c. 446, pl. xxx. figs. 8-13.
Chelone imbricata, Strauch, Chelon. Stud. p. 181 (1862); and Verth. Schildkr. p. 136 (1865); Schreib. Herp. Eur. p. 522 (1875); Boul. Cat. B. M. 1889, p. 183; Brehm, V. An. c. p. 51 fig. 18.
Caretta squamata, Gänth. Rept. Brit. Ind. p. 54 (1864).
Omychochelys kraussi, Gray, Proc. Zool. Soc. 1873, p. 398, figs. Hab. Batanes, Joló, Paragua, P. Princesa; Formosa, Célebes.

2 Gén. THALASSOCHELYS, FITZING.

3. *Th. caretta*, (Lin) ♂ M. v. Cala,

(M. S. T.)

- Testudo caretta, Linn. S. N. i. p. 351 (1768); Walbaum, Chelonogr. p. 95 (1782); Schopff, Testud. p. 67, pls. xvi. & xvii. fig. 3 (1792).*
Testudo cephalo, Schneid. Schildkr. p. 303 (1783).
T. caouana, Daud. Rept. ii. p. 55, pl. xvi. fig. 2 (1802).
Chelonia caouana, Schweigg. Prodri. p. 2 (1814); Wagl. Syst. Amph. pl. i. figs. ixvii. (1830); Dum. & Bibr. ii. p. 552 (1835).
Caretta atra, Merr. Tent. p. 17 (1820).
C. cephalo, Merr. l. c.

- Chelonia multiscutata*, *Kuhl*, *Beitr. Zool.* p. 78 (1820).
C. olivacea, *Eschscholtz*, *Zool. All.* p. 3, pl. iii. (1829); *Carter*, *Cat. Mal. Rept.* p. 13 (1847).
C. cephalo, *Tennm.* & *Schleg.*, *Faun. Jav.*, *Rept.* p. 23, pls. vi. & vi. (1833); *Cocteau*, *in R. de la Sagrada Hist. Cuba*, *Rept.* p. 35 (1843).
Chelonia pelasgorum, *Val.* *in Herp. Explor. Moree Zool.* pl. vi. (1833).
C. dussumieri, *Dum.* & *Bibr.* p. 557, pl. xxiv, fig. 1.
Caretta olivacea, *Rüpp.* *N. Würthlth. Abyss.*, *Amph.* p. 7, pl. iii. (1835).
Cheloni caretta, *Bonap.* *Faun. Ital.* (1835); *Holbr.* *N. z.m.* *Herp.* ii, p. 33, pl. iv. (1842).
Caouana caretta, *Gray*, *Cat. Tort.* p. 52 (1844), et *Sh. Rept.* i, p. 72 (1855), et *Proc. Zool. Soc.* 1873, p. 404.
C. elongata, *Gray*, *Cat. Tort.* p. 53, et *Sh. Rept.* i, p. 73.
C. olivacea, *Gray*, *Cat. Tort.* p. 53, et *Sh. Rept.* i, p. 73; *Günth.* *Rept. Brit Ind.* p. 52 (1864).
Thalassochelys caouana, *Agassiz*, *Contr. N. H. U. S.* i, p. 384, pl. vi, figs. 13-32 (1857).
T. corticata, *Girard*, *U. S. Explor. Explor.*, *Herp.* p. 431, pl. xxix. (1858); *Strauch*, *Chelon. Stud.* p. 187 (1862), et *Vert.* *Schildkr.* p. 146 (1865); *Schreib.* *Herp. Eur.* p. 513 (1875).
Lepidochelys olivacea, *Girard*, *I. c.* p. 435; *Gray*, *Proc. Zool. Soc.* 1873, p. 407.
L. dussumieri, *Girard*, *I. c.* p. 437.
Thalass chelys olivacea, *Strauch*, *Chelon. Stud.* p. 63.
Cephalochelys oceanica, *Gray*, *Proc. Zool. Soc.* 1873, p. 408.
Eremonia elongata, *Gray*, *I. c.* fig.
Thalassochelys tarapacana, *Philippi*, *Zool. Gart.* xxviii. p. 14 (1887).
Th. caretta, *Boul. Cat. B. M.* 1880, p. 184.
Hab. Luzón, B. de Manila; Borneo, Célebes

Fam. TRIONÍCIDOS.

1. Gén. TRIONYX GRAY.

1. T. subplanus, *Geoffr.* ♂ N. v. (M. S. T.)
- Trionyx subplanus*, *Geoffr.* *Ann. Mus.* xiv. p. 11, pl. v, fig. 2 (1809); *Gray*, *Ill. Ind. Zool.* i, pl. lxxix (1832); *Günth.* *Rept. Brit. Ind.* p. 49 (1864); *Strauch*, *Vert.* *Schildkr.* p. 139 (1865); *Boul. Cat. B. M.* 1880, p. 246.
Gymnopus subplanus, *Dum.* & *Bibr.* ii, p. 496 (1835).
Dogania subplana, *Gray*, *Cat. Tort.* p. 49 (1844), et *Sh. Rept.* i, p. 69, pl. xxxiii (1855), et *Proc. Zool. Soc.* 1862, p. 265, et *Suppl. Cat. Sh. Rept.* i, p. 106 (1870), et *Proc. Zool. Soc.* 1873, p. 57, fig.
Trionyx frenatus, *Gray*, *Cat. Sh. Rept.* i, p. 67.
Dogania guntheri, *Gray*, *Proc. Zool. Soc.* 1862, p. 265, et *Suppl. Cat. Sh. Rept.* i, p. 107, et *Proc. Zool. Soc.* 1873, p. 58.

- Trionyx güntheri*, *Günth.* *Rept. Br. Ind.* p. 49, pl. vi, fig. A.
Potamochelys frenatus, *Gray*, *Proc. Zool. Soc.* 1864, p. 87.
Sarbieria frenata, *Gray*, *Proc. Zool. Soc.* 1869, p. 220, et
Suppl. Cat. Sh. Rept. i. p. 100.
Flatypeltis ferox, part., *Gray*, *Proc. Zool. Soc.* 1873, p. 58.
Trionyx dilwinii, *Gray*, *Ann. & Mag. N. H.* (4) xi. p. 306 (1873).
Hab. Mindanao, Paragua; Sumatra, Borneo.

2 **T. sinensis** *Wiegm.* ♂ N. v.

(M. S. T.)

- Trionyx (Aspidonectes) sinensis*, *Wiegm.* *Nov. Act. Ac. Leop.-Carol.* xvii. p. 189 (1834).
T. stellatus, var. *japonica*, *Schleg.* *Faun. Japon.*, *Rept.* p. 33, pl. vii. (1838).
T. japonicus, *Schleg.* *Abbild.* p. 108, pl. xxxi. (1840).
T. tuberculatus, *Cantor*, *Ann. & Mag. N. H.* ix. p. 482 (1842);
Gray, *Proc. Zool. Soc.* 1861, p. 42.
Tyrse perocellata, *Gray*, *Cat. Tort.* p. 48 (1844).
Trionyx perocellatus, *Gray*, *Cat. Sh. Rept.* i. p. 65, pl. xxxi. (1865).
T. mackii, *Braudt*, *Bull. Ac. St. Petersb.* xvi. p. 110 (1857).
T. schlegelii, *Braudt*, l. c.
T. sinensis, *Strauch*, *Chelon. Stud.* p. 177 (1862); *Günth.* *Rept. Brit. Ind.* p. 46 (1864); *Strauch*, *Verh. Schildkr.* p. 128 (1865), et *Ioy*, *Przewalski*, *Rept.* p. 5, pl. i. (1876); *Boul. Cat. B. M.* 1889, p. 256.
Potamochelys perocellatus, *Gray*, *Proc. Zool. Soc.* 1864, p. 86.
P. tuberculatus, *Gray*, l. c. p. 87, et Suppl. Cat. Sh. Rept. i. p. 105 (1870).
L. undemiana irrorata, *Gray*, *Proc. Zool. Soc.* 1869, p. 216, fig., and Suppl. Cat. Sh. Rept. i. p. 96, and *Ann. & Mag. N. H.* (4) xii. p. 160 (1873).
L. perocellata, *Gray*, *Proc. Zool. Soc.* 1869, p. 216, et Suppl. Cat. Sh. Rept. i. p. 96, et *Proc. Zool. Soc.* 1873, p. 53, figs., et *Ann. & Mag. N. H.* (4) xii. p. 159 (1873).
Psilognathus laevis, *Heude*, *Mem. Hist. Nat. Emp. Chin.* i. p. 24, pl. ii. (1880).
Temnognanthus mordax, *Heude*, l. c. p. 26, pl. iii.
Gomphopelta officinæ, *Heude*, l. c. p. 27, pl. iv.
Bælognathus novem-costatus, *Heude*, l. c. p. 99, pl. v.
Tortisternum novem-costatum, *Heude*, l. c. p. 31, pl. vi.
Ceramopelta lairostris, *Heude*, l. c. p. 33, pl. vii.
Coptopelta septem-costata, *Heude*, l. c. p. 35, pl. viii.
Cinctisternum bicinctum, *Heude*, l. c. p. 37, pl. ix.
Hab. Batanes; Formosa, China.

2 **Gén. PELOCHELYS**, *GRAY*.

3 **P. cantoris**, *Gray*, ♂ N. v.

(M. S. T.)

- Chitra indica*, part., *Gray*, *Cat. Tort.* p. 49 (1844); et *Sh. Rept.* i. p. 70 (1855); *Günth.* *Rept. Brit. Ind.* p. 50, pl. vi, fig. C (1864).
Gymnopus indicus *Cantor*, *Cat. Mal. Rept.* p. 10 (1847).

- Pelochelys cantori, Gray, Proc. Zool. Soc. 1864, p. 90, figs., et Suppl. Cat. Sh. Rept. i. p. 90 (1870); Theob. Cat. Rept. Brit. Ind. p. 28 (1876); Boul. Cat. B. M. 1889, p. 263.
P. cumingii, Gray, II. cc. pp. 90, 91.
P. bibronii, Gray, II. cc.
Hab. Balabac; Borneo.

3. Gén. CHITRA. GRAY.

4. Ch. indica, (Gray) T. N. v.

(M. S. T.)

- Trionyx indicus, Gray, Syn. Rept. p. 47 (1831).
T. agytaeus, var. indicus, Gray, Ill. Ind. Zool. i. pl. lxxx. (1832).
Gymnopus lineatus, Dum. & Bibr. ii. p. 491 (1835).
Chitra indica, part., Gray, Cat. Tort. p. 49 (1844); anal. Sh. Rept. i. p. 70, pl. xlvi. (1855); Günh. Rpt. Brit. Ind. p. 50 (1864); Boul. Cat. B. M. 1889, p. 294.
C. indica, Gray, Proc. Zool. Soc. 1864, p. 91, figs., anal. Suppl. Cat. Sh. Rpt. i. p. 89 (1870); Theob. Cat. Rept. Brit. Ind. p. 27 (1876).
Hab. Paragua; India.

Orden: EMIDOSAURIOS.

— — —

Fam. CROCODILIDOS.

1. Gén. CROCODILUS, Cuv.

1. C. porosus, Schneid. ♂ & ♀ N. v. Buaya, (M. S. T.)
Crocodilus porosus, Schneid. Hist. Amph. ii. p. 159. (1801); Gray Cat. Tort. & p. 58 (1844); Günth. Rept. Brit. Ind. p. 62. (1864); Theob. Cat. Rept. Brit. Ind. p. 36 (1876); Boul. Cat. B. M. 1889, p. 284.
C. oopholis, Schneid. l. c. p. 165.
Crocodilus biporcatus, Cuv. Ann. Mus. x. p. 48, pls. i. & ii. (1807); Tiedem., Opp., & Lib. Nat. Amph. p. 72, pl. ix. (1817); Lesson, u. Belang. Voy. Ind. Or., Zool. p. 303 (1834); Dum. & Bibr. iii. p. 115 (1836); Schleg. Abbild. p. 3, pl. i. (1837); Huxley, Journ. Linn. Soc. iv. p. 11 (1860); Strauch. Syn. Crocod. pp. 52 & 99 (1866); Brehm. V. An. 5. p. 63, f. 24; Vilan. Creac. 5. p. 31.
C. biporcatus raninus, Schleg. & Müll. in Temminck, Verh. Nat. Gesch. Nedert. Ind., Rept. p. 28, pl. iii, figs. 7 & 8 (1844).
Oopholis porosus, Gray, Ann. & Mag. N. H. (3) x. p. 297 (1862), et Trans. Zool. Soc. vi. p. 138 (1867), et Cat. Sh. Rept. ii. p. 8 (1872).
O. pondicherianus, Gray, II. cc. pp. 268, 139, 9.
Crocodilus pondicerianus, Gunth. Rept. Brit. Ind. p. 62, pl. vii.; Stoliczka, Journ. As. Soc. Beng. xlii. p. 113 (1873); Theob. l. c.
Hab. Luzón, L. de Bay, Pampanga, Cagayan, Mindanao, Mindanao.

2. *C. palustris*, *Lers.* N. v. Buaya

- Crocodus palustris*, *Lesson in Belang. Voy. Ind. Or.; Zool.* p. 305 (1834); *Kelaart, Prodr. Faun. Zeyl.* p. 183 (1852); *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 61, pl. vii, fig. A. (1864); *Strauch, Syn. Croco. I.* pp. 48 & 97 (1866); *Theob. Cat. Rept. Brit. Ind.* p. 36 (1876); *Boul. Cat. B. M.* 1889 p. 285.
C. vulgaris, var. *B. Dum.* & *Bibr.* iii. p. 108 (1836); *Cantor, Cat. Mal. Rept.* p. 15 (1847).
C. palustris, part., *Gray, Cat. Tort.* & p. 62 (1844).
C. trigonops, *Gray, l. c.*
C. bombifrons, *Gray, Cat. Tort.* p. 59 (1844); *Huxley, Journ. Linn. Soc.* iv. p. 13 (1860).
Bombifrons trigonops, *Gray, Ann. & Mag. N. H.* (3) x. p. 269 (1862).
B. indicus, *Gray, Trans. Zool. Soc.* vi. p. 140, figs., pl. xxxi, figs. 1-3 (1867), et *Cat. Sh. Rept.* ii. p. 9 (1872).
Hab. Mindanao, Placer.

Orden 3.^o: SAURIOS.

Subord. 1.^o LAGARTOS.

Fam. GECÓNIDOS.

1. Gén. GYMNOADACTYLUS, SPIX.

1. *G. marmoratus*, *Dum.* & *Bibr.* ♂♂ N. v. Batiqui. (M. S. T.)

- Cyrtodactylus marmoratus*, part., *Gray, Cat.* p. 173.
Phyllurus marmoratus, (*Kuhl*), *Fitzing. N. Class. Rept.* p. 47.
Gonyodactylus marmoratus, (*Kuhl*), *Gray, Griff. A. K.* ix. *Syn.* p. 51; *Girard. U. S. Explor. Exped.*, *Herp.* p. 304; *Boul. Cat. B. M.* i. p. 44 (1885).
Gymnodactylus marmoratus, *Dum.* & *Bibr.* iii. p. 426, pl. xxiv, fig. 1; *Schleg. Abbild.* p. 8, pl. ii.; *Steindachn. Novara. Rept.* p. 17.
Hab. Luzón, Cavite, Indan; Célebes, Sumatra, Java.

2. *G. philippinicus*, *Steindachn.* ♂♂ N. v. Batiqui. (M. S. T.)

- Cyrtodactylus marmoratus*, part., *Gray, Cat.* p. 173.
Gymnodactylus philippinicus, *Steindachn. Novara. Rept.* p. 17, pl. ii, fig. 1; *Boul. Cat. Liz. B. M.* 1885, p. 46.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Los Baños, Dingat, Albay.

3. *G. consobrinus*, *Peters.* ♂♂ N. v. Batiqui. (M. S. T.)

- Gymnodactylus consobrinus*, *Peters. Mon. Berl. Ac.* 1871, p. 569, and *Ann. Mus. Genov.* iii. 1872, pl. ii, fig. 1; *Boul.* i. p. 47.
Hab. Paragua, P. Princesa, Samar, Borongan; Borneo.

4. **G. platurus**, *White*, ♂♂ N. v. Butiqui.

(M. S. T.)

- Phyllurus platurus*, *Gray*, *Cat.* p. 176.
P. inermis, *Gray*, *l. c.*
Lacerta platura, *White Journ. N. S. Wales*, p. 246, pl.—, fig.
— *Shaw*, *Gen. Zool.* iii. p. 247.
Stellio phyllurus, *Schneid. Amph. Phys.* ii. p. 31.
S. platurus, *Daud. Rept.* iv. p. 24.
Agama platyura, *Mévr. Syst. Amph.* p. 51.
A. discorsus, *Merr.* *l. c.*
Phyllurus platurus, *Fitzng. N. Class. Rept.* p. 47; *Guérin, Ich.*
— *R. A.*, *Rept.* pl. xiv, fig. 1; *Gray, Zool. Ereb. & Terror*, pl.
xvii, fig. 3; *Girard, U. S. Explor. Expd.*, *Herp.* p. 303.
P. cuvieri, *Bory de St. Vinc. Dict. Hist. Nat.* vii. p. 183, pl.
—fig. 2.
Gymnodactylus platyurus, *Wagl. Syst. Amph.* p. 144; *Boul. Cat.*
— p. 49.
Gyrtodactylus platura, *Gray, Griff. A. K.* ix. *Syn.* p. 52.
Gymnodactylus phyllurus, *Dum. & Bibr.* iii. p. 428.
Gonyodactylus (Phyllurus) platurus, *Fitz Syst. Rept.* p. 92.
Phyllurus inermis, *Gray, Zool. Ereb. & Terror*, pl. xvii, fig. 1.
Hab. Paragua, Ynag iuan; Australia.

2. Gén HEMIDACTYLUS, Cuv.

5. **H. frenatus**, *Gray*, ♂♂ N. v. Butiqui.

(M. S. T.)

- Hemidactylus frenatus*, *Gray*, *Cat.* p. 155.
H. vittatus, *Gray*, *l. c.*
H. frenatus (*Schleg.*), *Dum. & Bibr.* iii. p. 366; *Ketaart, Prodri.*
Faun. Zeyl. p. 181; *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 108; *Stoliczka,*
Journ. As. Soc. Beng. xxxix. 1870, p. 164, & xii. 1872, p.
96; *Anders. Zool. W.* Yunnan, p. 801.
H. (Pnoepus) javanicus, *Fitzng. Syst. Rept.* p. 106; *Boul. l. cit.*
p. 120.
? *H. punctatus*, *Hallow. Jerdon, Journ. As. Soc. Beng.* xxii. 1854,
p. 467.
H. inornatus, *Hallow. Proc. Ac. Philad.* 1860, p. 492.
? *H. pumilus*, *Hallow. l. c.* p. 502.
Gecko chaus, *Tyler, Journ. As. Soc. Beng.* xxxiii. 1864, p. 547.
G. caracal, *Tyler, l. c.*
Hemidactylus vittatus, *Gray, Zool. Ereb. & Terror*, pl. xv.
fig. 5.
H. longiceps, *Cope, Proc. Ac. Philad.* 1868, p. 320.
Hab. Luzón, Manila, Cebú, Ticao, Paragua, Puerto Princesa; Borneo, Java.

6. **H. maculatus**, *Gray*, ♀ N. v.

(M. S. T.)

- Hemidactylus maculatus*, *part.*, *Gray, Cat.* p. 153.
H. maculatus, *part.*, *Dum. & Bibr.* iii. p. 358; *Boul. Cat.* 1.
p. 132.

H. sykesii, (Gray), *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 108, pl. xii. fig. C.
Hab. Mindoro, Samar, Paric, Borongan; India.

7. *H. garnotii*, Dum. *Bib. N.* v. ♂ Batiqui. (M. S. T.)

Doryura garnotii, Gray, *Cat.* p. 157.
Hemidactylus garnotii, Dum. & Bibr. iii. p. 368; *Bouleng. Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 118, pl. xxii. fig. 3; *id. Cat. Liz. B. Mus.* p. 141.
Hoplopodion (Onychopus) garnotii, Fitz. *Syst. Rept.* p. 104.
Doryura vulpecula, Girard, *Proc. Ac. Philad.* 1857, p. 197; and *U. S. Explor. Exped., Herp.* p. 286, pl. xxiv. figs. 17-24.
Hemidactylus indekingii, Bleek. *Nat. Tijds. Ned. Ind.* xxvi. 1850, p. 27.
Doryura gaudama, Theob. *Journ. Linn. Soc.* x. 1868, p. 30.
Hemidactylus (Doryura) mandellianus, Stoliczka, *Journ. As. Soc. Beng.* xli. 1872, p. 101, pi. iii. figs. 1, 2.
Hab. Mindoro, Naujan; N.^o Caledonia, Birma.

8. *H. platyurus*, Lach. ♂♂ N. v. Butiqui (M. S. T.)

Platyurus schneiderianus, Gray, *Cat.* p. 157.
Stellio platyurus, Schneid. *Amph. Phys.* ii. p. 30, et *Denkschr. Ak. Münch.* 1811, p. 62, pl. i. fig. 3.
Lacerta schneideriana, Shaw, *Zool.* iii. p. 278.
Gecko platyurus, Merr. *Syst. Amph.* p. 41.
G. marginatus, Cuv. R. A. ii. p. 54.
Hemidactylus platurus, Wieg. *Nova. Acta. Ad. Leop. Carol.* xvii. i. 1835, p. 288; *Cantor Catal. Mal. Rept.* p. 24; *Boul. Cat. B. M.* p. 143.
H. marginatus, Gray, *Griff. A. K.* ix. *Syn.* p. 51; *Dum. & Bibr.* iii. p. 370, pl. xxx. fig. 2.
Hoplopodion (Cosymbotus) platyurum, Fitz. *Sysl. Rept.* p. 104.
Crossurus platyurus, Hirard, *U. S. Explor. Exped., Herp.* p. 281.
Nycteridium schneideri, Günth. *Rept. Brit. Ind.* p. 111.
N. himalayanum, Anderg. *Journ. As. Soc. Beng.* xl. 1871, p. 15.
N. platyurus, Stoliczka, *Journ. As. Soc. Beng.* xli. 1872, p. 103.
Hab. Luzón, Manila, Dinagat; China, Java, Borneo.

3. Gén GERYRA, GRAY.

9. *G. mutilata*, Wiegw. ♂♂ N. v. (M. S. T.)

Peripia peronii, Gray, *Cat.* p. 159.
Peropus mutilatus, Gray, l. c.
Hemidactylus (Peropus) mutilatus, Wiegm. *Nova. Acta. Ac. Leop. Carol.* xvii. p. 238.
P. mutilatus, Dum. & Birdsi ii. p. 354.
P. peronii, Dum. & Bibr. iii. p. 352, pl. xxx fig.; *Jacquin. Voy. Pole Sud. Saur.* pl. i. fig. 2; *Cantor. Cat. Mal. Rept.* p. 221 *Kelaart, Prodri. Faun. Zeyl.* p. 187.

- Perophus (Dactyloperus) peronii, *Fitz. Syst. Rept.* p. 103.
P. mutilatus, *Fitz. l. c.; Girard, U. S. Explor. Exped., Herp.*
p. 277.
Peripia peronii, *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 110; *Stoliczka, Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. 1870, p. 163, & xli. 1872, p. 103.
Gecko pardus tytleri, *Journ. As. Soc. Beng.* xxxiii. 1864, p. 547.
Gecko harrietti, *Tytler, I. c.* p. 548.
Hemidactylus (Peripia) mutilatus, *Peters, Mon. Berl. Ac.* 1867,
p. 14; *Anders. Zool. W. Yunnan*, i. p. 799.
Peropus packardii, *Cope, Proc. Ac. Philad.* 1898, p. 319.
Peripia mutilata, *Günth. Proc. Zool. Soc.* 1873, p. 168; *Peters & Doria, Ann. Mus. Genov.* xiii. 1878, p. 370.
Gehyra mutilata, *Boul. Cat. Lis. B. M.* p. 148.
Hab. Negros, Luzón, Manila, Tayabas, Dolores, Mindanao;
Ceilán, Penang, Méjico.

4. Gén. PEROCHIRUS, Blgr.

10. **P. ateles**, Dum. ♀ N. v.

(M. S. T.)

Hemidactylus ateles, *A. Dum. Arch. Mus.* viii. p. 426, pl. viii.
fig. 9. *Boul. Cat. Lis. B. M.* p. 154.
Hab. Zamboanga, Mindanao.

11. **P. depresso**, Fisch.

Hemidactylus ateles, var. depresso, *Fischer. Arch. f. Nat.* 1882,
p. 300, pl. xvii. figs. 31-36; *Boul. Cat. l.* p. 155.
Hab. Carolinas.

12. **P. scutellatus**, Fisch.

Hemidactylus ateles, var. scutellatus, *Fischer. Arch. f. Nat.* 1882,
p. 299 pl. xvii. figs. 26-30; *Boul. Cat. l.* p. 156.
Hab. Carolinas.

13. **P. var articulatus**, Fisch.

Boul. Cat. l. p. 156.
Hab. Carolinas.

5. Gén. SPATHOSCALOBAES, Gthr.

14. **Sp. mutilatus**, Gthr.

Spathodactylus mutilatus, *Günth. Proc. Zool. Soc.* 1872, p. 591.
Boul. Cat. p. 156, lam. 13, fig. 1.
Hab. Ticao; Archipiélago Indico.

6. Gén. LEPIDODACTYTUS, FITZING

15. **L. lugubris**, D. B. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Amydosaurus lugubris, *Gray, Cat.* p. 162.

*

Platydactylus lugubris, Dum. & Bibr. iii, p. 304; *Jacquin. Voy. Pole Sud, Saur.* pl. i, fig. 1; *Cantor. Cat. Mal. Rept.* p. 16.
Lepidodactylus lugubris, *Fitzing. Syst. Rept.* p. 98; *Bouleng. Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 120, pl. xxii, fig. 3; *Boul. Cat.* 1, p. 165.
Hemidactylus meyeri, Bleek. *Nat. Tijds. Nederl Ind.* xvi, 1859, p. 47.
Peripia cantoris, *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 110; *Stolzezka, Journ. As. Soc. Beng.* xli, 1872, p. 103.
Gecko *mästus*, Peters. *Mou. Berl. Ac.* 1867, p. 13.
Gymnodactylus candeloti, *Baoay. Rept. N. Calédon.* p. 13.
Peripia meyeri, *Günth. Proc. Zool. Soc.* 1872, p. 594.
P. mysorensis, Meyer, *Mou. Berl. Ac.* 1874, p. 129.
P. lugubris, Peters, & Doria, *An. Mus. Genov.* xiii, 1878, p. 371.
Platydactylus (Lepidodactylus) crepuscularis, (*non Bao.*), *Sauvage, Bull. Soc. Philom.* (7) iii, 1878, p. 69.
Hab. Carolinas; Amboina,

16. **L. labialis**, *Pirs.* ♂ N. v. (M. S. T.)

Gecko *labialis*, Peters, *Mou. Berl. Ac.* 1867, p. 14; *Boul. Cat.* p. 166.
Hab. Mindanao,

7. Gén. LUPEROSAURUS, GRAY.

17. **L. cumingii** Gray ♂ N. v. Calasayan, (M. S. T.)

Luperosaurus cumingii, Gray, *Cat. Boul. Cat.* p. 181 l. 15 f. 2.
Hab. Luzon, Laguna, Calamba, Cabuyao, Manila, S. Mateo.

Gén. GECKO, LAUR.

18. **G. verticillatus**, Laur. N. v. Chacon. (M. S. T.)

Gecko *verus*, Gray, *Cat.* p. 160.
Gecko *revesii*, Gray, *I. c.* p. 161.
Lacerta gecko, Linn. *S. N.* i, p. 105.
Gecko verticillatus, Laur, *Syst. Rept.* p. 44; *Boul. Cat.* p. 183.
G. teres, Laur, *I. c.*
Stellio gecko guttatus, Daud, *iv.* p. 122, pl. xlix.; *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 102.
S. verus, Merrem, *Tent.* p. 42.
S. annulatus, Kuhl, *Beitr. Zool. Vergl. Anat.* p. 132.
S. reevesii, Gray, *Griff. A. K.* ix, *Syn.* p. 48; *Richards. Zool. Herald*, p. 151, pl. xxvii.
Platydactylus guttatus, Guérin, *Icon. R. A.*, *Rept.* pl. xiii.; Dum. & Bibr. iii, p. 321, pl. xxviii, fig. 4; Vilau, *Crac.* 5, p. 62, l. 41.
P. reevesii, *Fitzing. Syst. Rept.* p. 101.
Gecko indicus, Girard, *U. S. Exped., Herp.* p. 290, pl. xvi, fig. 9-16.
Hab. Panay, Ililo, Negros, Joló, Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Batangas, Albay, Guibat, Tayabas, Dolores, Camarines, Mindoro, Mindanao; Siam, Java, China.

19. **G. vittatus** Gray N. v.

Gecko vittatus, *Gray*, *Cat.* p. 162.
G. vittatus, *Houttuyn*, *Verh. Geotrich.* *Vlissing.* ix. 1782, p. 325, pl.—, fig. 2; *Breugn. Bull. Soc. Philom.* ii. 1800, pl. vi, fig. 3; *Daud.* *Rept.* iv. p. 130, pl. 1.; *Peters & Doria*, *Ann. Mus. Génov.* xiii. 1878, p. 368; *Boul. Cat.* i. p. 185.
Lacerta unistrigata, *Shaw*, *Natur. Miscell.* iii. pl. lxxxix.
Platydactylus vittatus, *Dum.* & *Bibr.* iii. p. 331; *Dumeril*, *R. A. Rept.* pl. xx, fig. 1.
P. (Scelotretus) vittatus, *Fitzing*, *Syst. Rept.* p. 101.
Hab. Marianas, Molucas.

20. **G. var. bivittatus**, ♂ N. v. Tocé

(M. S. T.)

Gecko bivittatus, *Gray*, *Cat.* p. 162.
Platydactylus bivittatus, *Dum.* & *Bibr.* iii. p. 334.
P. (Scelotretus) bivittatus, *Fitzing*, *Syst. Rept.* p. 101.
Gecko trachylemus, *Peters*, *Mon. Berl. Ac.* 1872, p. 774.
Hab. Luzón, Manila, Mindanao, Davao; Palaos, N. Guinea.

21. **G. monachus**, Gray ♂ N. v. Chacon

(M. S. T.)

Gecko monachus, *Gray*, *Cat.* p. 161; *Boul. Cat.* p. 187.
Platydactylus monachus, (*Schleg.*), *Dum.* & *Bibr.* iii. p. 335;
Cantor, *Cat. Mal. Rept.* p. 19.
P. (Scelotretus) monachus, *Fitzing*, *Syst. Rept.* p. 101.
Gecko monachus, *Girard*, *U. S. Explor. Exped., Herp.* p. 292;
Günth. *Rept. Brit. Ind.* p. 103.
Hab. Mindanao, Placeer, Dingat; Borneo, Célebes.

Fam. AGAMIDOS.

1. Gén. DRACO, Linn.

1. **D. volans**, Gray. ♂ N. v. Huniangao.

(M. S. T.)

Draco volans, *Gray*, *Cat.* p. 233.
D. volans, *Linn. S. N.* i. p. 358; *Latr. Rept.* ii. p. 3; *Cantor*, *Cat. Mal. Rept.* p. 37; *Günth. Rept. Brit. Ind.* i. 124; *Ste-
liczka*, *Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. 1870, p. 182; *Boul. Cat.* i. p. 253; *Vitan*, *Creac.* 5. p. 50 i. 35; *Wood*, *Nat. Hist.* 3. p. 85 fig.
D. prepos, *Linn.* l. c.
D. major, *Laur.* *Syn. Rept.* p. 50.
D. minor, *Laur.* l. c. p. 51.
D. viridis, *Daud.* *Rept.* iii. p. 301, pl. xii.; *Kuhl*, *Beitr. Zool.* u. *Vergl. Anat.* p. 102; *Schleg. Abbild.* p. 89, pl. xxiv, fig. 1.
D. fuscus, *Daud.* l. c. p. 307; *Kuhl*, l. c.
D. daudinii, *Dum.* & *Bibr.* iv. p. 451.
Hab. Samar, Borongan; Borneo, Java.

2. **D. reticulatus.** *Gthr.* N. v. id. (M. S. T.)

Rept. B. India, p. 125; *Ptrs et Doria, An. Mus. Genov.* xiii, 1878, p. 374; *Boul. Cat.* i, p. 127, lam. xxi.
Hab. Luzón, Albay, Tayabas, Atimonan; Sanghir.

3 **D. id v. cyanopterus,** *Prs.*

Hab. Mindanao.

4. **D. guentheri,** *Blgr.* ♂♂ N. v. (M. S. T.)

Boulenger, Cat. p. 257, lam. 20, f. 2.
Hab. Mindanao, Samar, Borongan.

5. **D. everetti.** *Blgr.* N. v. (M. S. T.)

Bouleng. r., Cat. B. M. 1885, p. 258, l. 20, f. 3.
Hab. Mindanao, Placer, Dinagat.

6. **D. ornatus,** *Günth.* ♂♂ N. v. (M. S. T.)

Dracunculus ornatus, *Gray, Cat.* p. 235.
Draco ornatus, *Günth. Proc. Zool. Soc.* 1873, p. 167; *Boul. Cat.* p. 259.
Hab. Luzón, Laguna, Albay, Daraga, Dinagat.

7. **D. spilopterus.** *Dum. & Bibr.* ♂♂ N. v. (M. S. T.)

Dracunculus spilopterus, *Gray, l. c.* p. 236.
D. spilopterus, *Wiegm. Nova Acta Ac. Cas.-Leop.* xvii. i. 1835, p. 216, pl. xv.
Draco spilopterus, *Dum. & Bibr.* iv, p. 461; *Gerv. in Eyd. Vey. Favorite Zool.* pl. xxvii.; *Schleg. Abbild.* p. 92; *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 124; *Boul. Cat.* p. 260.
Dracontoides personatus, *Fitz Syst. Rept.* p. 51.
Hab. Luzón, Cavite, Silan, Albay, Tayabas, Atimonan, Negros, Dumaguete; Java.

8. **D. bimaculatus,** *Gthr.* ♂♂ N. v. (M. S. T.)

Draco bimaculatus, *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 127; *Boul. Cat.* p. 263, l. 20, f. 6.
Hab. Dinagat, Samar, Borongan.

9. **D. spilonotus.** *Gthr.* ♀ N. v. (M. S. T.)

Draco spilonotus, *Günth. Proc. Zool. Soc.* 1872, p. 592, pl. xxxv, fig. B. & 1873 p. 167; *Boul. Cat.* i, p. 265.
Hab. Paragua, Tagburus; Célebes.

10 D *dussumieri*, *Dum.* & *Bibr.* ♂ ♀ N. v.

M. S. T.

Dracocella dussumieri, *Gray*, *Cat.* p. 234.

Draco dussumieri, *Dum.* & *Bibr.* iv. p. 456; *Jerdon*, *Journ. As. Soc. Beng.* xxii. 1853, p. 474; *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 125, pl. xiii. fig. D; *Anders. Proc. Zool. Soc.* 1871, p. 164; *Boul. Cat.* i. p. 268.

Draco (Pterosaurus) dussumieri, *Fitz. Syst. Rept.* p. 51.

Hab. Luzón, Manila; India, Madras.

11. D *quinquefasciatus*, *Gray*, ♂ ♂ N. v.

(M. S. T.)

Dracunculus quinquefasciatus, *Gray*, *Cat.* p. 235.

Draco quinquefasciatus, *Gray*, *Zool. Journ.* iii. 1827, p. 219, et *Zool. Dum.* & *Bibr.* ii. p. 455; *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 129; *Stoliczka, Journ. As. Soc. Beng.* xlvi. 1873, p. 118; *Boul. Cat.* i. p. 269 lam. 20 f. 8, *cabeza*.

Hab. Samar, Paranas, Calbayog; Penang.

2 Gen. GONYOCEPHALUS, KAUP.

12. G. *sophiae*, (*Gray*) ♂ ♂ N. v. Humáño.

(M. S. T.)

Tiaris bellii, (*non D. & B.*) *Gray*, *Cat.* p. 239.

T. sophiae *Gray*, *I. c.* p. 240.

T. petersii, *Günth. Zool. Rec.* iv. p. 136.

T. sophiae, *Günth. Proc. Zool. Soc.* 1872, p. 593, pl. xxxvii. t. C; *Boul. Cat.* p. 288.

Hab. Mindanao, Luzón, Albay, Bulusan, Tayabas, Dolores.

13. G. *semperi*, *Piss.* ♂ N. v.

(M. S. T.)

Lophyrus (Tiaris) semperi, *Peters*, *Mon. Berl. Ac.* 1867, p. 16;

Boul. Cat. p. 289.

Hab. Luzón, Cagayan, Alcalá.

14. G. *interruptus*, *Blgr.* N. v.

(M. S. T.)

Boul. Cat. p. 290, l. 21; *J. G. Fisch. Jahrb. d. wiss. Aust.*

Hamb. 2, 1835, p. 80. (*Tiaris suberistata*).

Hab. Mindanao.

3. Gén. CALOTES, CUV.

15. C. *cristatellus*, (*Kuhl*) ♂ ♂ N. v. Layagan.

(M. S. T.)

Bronchocela cristatella, *Gray*, *Cat.* p. 243.

Agama cristatella, *Kuhl*, *Beitr. Zool. Vergl. Anat.* p. 108.

A. gutturosa, *Merr. Tent.* p. 51.

Calotes cristatellus, *Fitz. N. Class. Rept.* p. 49; *Boul. Cat.* p. 316.

Agama moluccana, *Lesson*, *Coquille. Rept.* pl. i. fig. 2.

Calotes gutturosa, *Guerin*, *Icon. R. A.*, *Rept.* pl. vii. fig. 3.

Agama vultuosa, *Gray*, *Griff. A. K.* ix. *Syn.* p. 56.

- Bronchocela cristatella, Kaup, *Isis*, 1827, p. 619; Dum. & Bibr. IV, p. 395; Cantor, *Cat. Mal. Rept.* p. 39; Girard, U. S. Ex-
ped., Herp., p. 411; Günth. *Rept. Brit. Ind.* p. 138; Peters,
Mon. Berl. Ac. 1867, p. 17; Steinb. *Novara*, *Rept.* p. 27;
Stoliezka, *Journ. As. Soc. Beng.* xxxix, 1870, p. 178.
B. (Lopodeira) cristatella, Fitz. *Syst. Rept.* p. 46.
B. moluccana, Peters, *Mon. Berl. Ac.* 1867, p. 17; Stoliezka,
I. c. p. 179.
B. intermedia, Peters, & Doria, *Ann. Mus. Genov.* xiii, 1878,
p. 375.
B. burmana, Blanf. *Journ. As. Soc. Beng.* slviii, 1878, p. 127.
Hab. Paragua, Inagauan, P. Princesa, Dinaagat, Sánar, Min-
danao, Luzón, Albay, Singalon, Daraga, Tayabas, Davao; Cé-
lebes, Borneo.

16. **C. marmoratus**, Gray, ♂♂ N. v. Layagan (M. S. T.)

- Bronchocela marmorata, Gray, *Cat.* p. 242.
Hombr. & Jacq. *Voy. Pôle Sud, Rept.* pl. iii.
Lophyrus spinosus, A. Dum. *Cat. Mélh. Rept.* p. 91.
Calotes (Bronchocela) philippinus, Peters, *Mon. Berl. Ac.* 1867,
p. 16.
Bronchocela marmorata, Günth. *Proc. Zool. Soc.* 1873, p. 168;
Boul. *Cat.* p. 318.
Hab. Luzón, Manila, Albay, Daraga, Mindanao, Davao.

17. **C. ophiomachus**, Gray, ♂ N. v. Layagan. (M. S. T.)

- Calotes ophiomachus, Gray, *Cat.* p. 243; Vilan, *Creac.* 5, p. 48.
Lacerta calotes, Linn. S. V. i, p. 367.
Iguana calotes, Lur. *Sym. Rept.* p. 49.
Agama calotes, Daud. *Rept.* iii, p. 361, pl. xlvi.
C. ophiomachus, Merr. *Tent.* p. 51.
T. lineata, Kuhl, *Beitr. Zool. Vergl. Anat.* p. 108.
Calotes ophiomachus, Kaup, *Isis*, 1827, p. 621; Dum. & Bibr.
iv, p. 493; Kelaart, *Prod. Faun. Zeyl.* p. 169; Günth. *Rept.*
Brit. Ind. p. 142; Boul. *Cat.* 1, p. 327.
Hab. Luzón, Cavite, Indan; Ceilan.

4. Gén. LOPHURA, GRAY.

18. **L. amboinensis**, Gray ♂♂ N. v. Layagan. (M. S. T.)

- Lophura amboinensis, Gray, *Cat.* p. 247; Boul. *Cat.* p. 402.
L. shawii, Gray, *I. c.*
Lacerta amboinensis, Schlosser, *Epist. Hornst. Abh. Acad.*
Stockh. iv, 1785, p. 130, pl. vi, fig. 1.
Iguana amboinensis, Latr. *Rept.* i, p. 271.
Basiliscus amboinensis, Daud. *Rept.* iii, p. 322.
Lophura amboinensis, Gray, *Phil. Mag.* ii, p. 56; Wagl. *Icon.*
Amph. pl. xxviii.; Günth. *Proc. Zool. Soc.* 1873, p. 168; Pe-
ters & Doria, *Ann. Mus. Gen.* xiii, 1878, p. 383.
Hydrosaurus amboinensis, Kaup, *Isis* 1828, p. 1147.
Istiurus amboinensis, Cuz. R. A. 227. ed. ii, p. 41; Dum. &

- B. br.* iv. p. 380; *Duvern.* R. A., Rept. pl. xv. fig. 1; *Brehm.* V. An. 3. p. 122, f. 48; *Vilan.* Creac. 5. p. 48.
Histiurus pustulosus, Eschsch. Zool. Atlas, pl. vii.; Lichtenst. Nomencl. Rept. Mus. Berol. p. 10.
Lophura pustulosa, Fitz. Syst. Rept. p. 49.
Istiurus microlophus, Bleek. Natuurk Tijdschr. Ned. Ind. xxii. 1860, p. 80.
Lophura celebensis, Peters. Mon. Berl. Ac. 1872, p. 581.
Hab. Luzón, Manila, Ticao, Negros, Cebú, Dinagat, Mindanao, Placer, Surigao; Célebes, Java, Molucas.

Fam. VARÁNIDOS.

t. Gén. VARANUS, MERR.

1. **V. grayi.** Gthr. ♂ N. v. Bayauac. (M. S. 1.)
Varanus ornatus, (non Daud) Gray, Cat. p. 10; Boul. 2. Cat. p. 312.
Hab. Luzón, Laguna.
2. **V. rudicollis** Gray. ♂ N. v. Bayauac. (M. S. 1.)
Varanus rudicollis, Gray, Cat. p. 10; Coul. Cat. 2. p. 313.
Hab. Samar, Borongan; Borneo.
3. **V. salvator.** Laur. ♂♂ N. v. Banias, Bayauat. (M. S. 1.)

- Hydrosaurus salvator, Gray. Cat. p. 13.
Stellio salvator, Laur. Syn. Rept. p. 50.
Tupinambis bivittatus, Kuhl, Beitr. z. Zool. p. 125.
Monitor elegans, Gray, Zool. Journ. iii. 1828, p. 225.
Varanus vitattus, Lesson in Belang. Voy. Ind. Or., Rept. 1. 305.
Hydrosaurus bivittatus, Wagl. Syst. Amph. p. 164; Vil. Creac. 5. p. 37.
H. marmoratus, Wieg. Nova. Acta Ac. Leop.-Card. xvii. 1835.
i. p. 196, pl. xiv.
Varanus bivittatus, Dum. & Bibr. iii. p. 487.
V. salvator, Cantor, Cat. Mal. Rept. p. 29; Boul. Cat. 2. p. 314; Brehm. V. An. 5. p. 99. f.
Monitor bivittatus, Schleg. Abbild. p. 76, pls. xxi. & xxii. figs. 1, 2; Müll. & Schleg. Verh. Naturl. Gesch. Nederl. ov. Bezill. Rept. p. 38.
Hydrosaurus salvator, Günth. Rept. Brit. Ind. 67, pl. ix, fig. E.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calaguan; Borneo, Java, Célebes.

4. **V. nuchalis** Gthr. ♂♂ N. v. Bayauat. (M. S. 1.)
Hydrosaurus nuchalis, Günth. Proc. Zool. Soc. 1872, p. 145.
pl. viii., et 1873 p. 165; Boul. Cat. 315. 2. p. 215.
H. marmoratus, (non Wieg.). Günth. l. c. 1873, p. 165.
Hab. Luzón, Albay, Manila, Batangas, Bulacán, Laguna, Cebolla, Negros.

5. **V. cumingii.** *Mart.* ♂ N. v. (M. S. T.)

Varanus cumingii, *Martin*, *Proc. Zool. Soc.* 1838, p. 69; *Boul. Cat.* 2, p. 316.

Hydrosaurus cumingii, *Günth.*, *Proc. Zool. Soc.* 1872, p. 145 pl. vii.

Hab. Mindanao, Zamboanga, Placer, Butuan.

Fam. LACER FIDOS.

1. Gén. LACERTA, LIN.

1. **L. viridis.** (*Laur.*) N. v. Lagarto verde. (M. S. T.)

Hab. Europa, Francia.

Fam. ESCÍNCIDOS

1. Gén. EGERNIA GRAY.

1. **E. cunninghami.** *Gray*, ♂ N. v. Bubuli. (M. S. T.)

Egernia cunninghami, *Gray*, *Cat.* p. 105; *Boul. Cat.* 3, p. 139. *Tiliqua cunninghami*, *Gray*, *Proc. Zool. Soc.* 1832, p. 40.

Egernia cunninghami, *Gray*, *Ann. N. H.* ii. 1838, p. 288, et in *Stokes, Diocov. in Austral.* i. p. 489 pl. ii.

Tropidolepisma cunninghami, *A. Dum. Cat. Méth. Rept.* p. 177. *Egernia krefftii*, *Peters*, *Mon. Berl. Ac.* 1871, p. 30.

Hab. Paragua, P. Princesa; Australia.

2. Gén. MABUIA, FITZ.

2. **M. multicularinata.** (*Gray*). ♂♂ N. v. (M. S. T.)

Tiliqua multicularinata, *Gray*, *Cat.* p. 109; *Boul. Cat.* 3, p. 185 lam. 12 f. 2.

Hab. Dinagat, Luzón, Bulacan, Angat.

3. **M. multifasciata.** *Kuhl*, N. v. (M. S. T.)

Tiliqua rufescens, part. *Gr.* *Cat.* p. 109.

Scincus carinatus, part. *Schneid. Hist. Amph.* ii. p. 183.

Lacerta rufescens, part. *Shaw. Zool.* iii. p. 285.

Scincus multifasciatus, *Kuhl. Beitr. Zool. u. Vergl. Anat.* p. 126. *Mabuya multifasciata*, *Fitz.* *N. Class. Rept.* p. 52; *Boul. Cat.* 3, p. 186.

Tiliqua rubriventris, *Gray*, *Ind. Zool.*

Euprepes sebæ, part. *D. et B.* p. 692.

Euprepis rufescens, *Cantor. Cat. Mal. Rept.* p. 46.

Eup. carinatus, *Gracinh. I. c.* p. 338; *Bocourt. Mus. Sc. Mex.* *Rept.* pl. xxii. c. 1. 5.

- Plestiodon sikkimensis, Gray, *An. et Mus. V. H.* 12, p. 58; p. 388.
Tiliqua rufescens, Girard, U. S. *Exped. Herp.* p. 227.
Eupreps rufescens, part. *Gthr. Rept. B. Ind.* p. 70.
Tiliguia carinata, part. *Stollia. Journ. As. Soc. Ben.* xxxix, 1870, p. 160.
Eupreps carinatus, part. *Theob. Cat. Rept. B. Ind.* p. 40.
Eup. ocellatus, *Bocourt. An. Sc. Nat.* vii, 1878, art. 16 pl. xxii, 18.
Hab. Negros, Mindanao, Zamboanga, Talibon.

3. Gén LYGOSOMA, GRAY.

4. *L. fasciatum*, Gray, ♂♂ N. v. Bubuli. (M S T)

Hinulia fasciata, Gray, *Cat.* p. 75; *Boul. Cat.* 3, p. 237.
Lygesoma (Hinulia) fasciatum, Peters, *Mon. Berl. Ac.* 1871, p. 683.

Hab. Luzón, Manila, Albay, Daraga, Tayabas, Dolores, Camarines Sur, Negros, Mindanao, Surigao, Mindoro, Boac.

5. *L. jagorii* Ptrs. ♂♂ N. v. Bubuli. (M S T)

Lygosoma (Hinulia) jagorii, Peters, *Mon. Berl. Ac.* 1864, p. 54; *Boul. Cat.* 3, p. 240.

Hinulia variegata, (non Peters), Gänth. *Proc. Zool. Soc.* 1871, p. 165, pl. xvii, fig. B.

Hab. Leyte, Samar, Tacloban, Borongan, Dinagat, Negros, Mindanao.

6. *L. variegatum* Ptrs. ♂ N. v. Bubuli. (M S T)

Lygosoma melanopogon, part., Dum. & Bibr. v. p. 723.
L. (Hinulia) variegatum, Peters, *Mon. Berl. Ac.* 1867, p. 20.

L. (H.) nævium, Peters & Doria, *Ann. Mus. Genova*, xiii, 1873, p. 340; *Boul. Cat.* 3, p. 246.

Hab. Dinagat, Mindanao; Borneo, Molucas.

7. *L. acutum*, Ptrs. ♂♂ N. v. Bubuli. (M S T)

L. (Hinulia) acutum, Peters, *Mon. Berl. Ac.* 1864, p. 54; *Boul. Cat.* 3, p. 248.

Hab. Samar, Loquilocum, Dinagat.

8. *L. cumingii*, Gray, N. v.

Otosaurus cumingii, Gray, *Cat.* p. 93; *Boul. Cat.* 3, p. 249.
Eupreps otus, Peters, *Mon. Berl. Ac.* 1867, p. 20.

Hab. Dinagat, Mindanao; Davao.

9. *L. chalcides*, (Lin) ♂♂ N. v. Bubuli. (M S T)

Lacerta chalcides, Lin. *S. N.* i, p. 369.

Anguis quadrupes, Lin. *I. c.* p. 390.

- L.*, *serpens*, *Bloch*, *Besch. Ges. Natur. Freunde*, ii. 1776, p. 28, pl. ii.
Scincus brachypus, *Schneid. Hist. Amph.* ii. p. 192.
Seps pentadactylus, *Daud. Rept.* ix. p. 325.
Maluya serpens, *Fitz. N. Class. Rept.* p. 53.
Lygosoma serpens, *Gray*, *Zool. Journ.* iii. 1828, p. 228.
L. aurata, *Gr. Griff. A. K.* ix. *Syn.* p. 72.
L. abdominalis, *Gray*, *An. N. H.* ii. 1849 p. 332.
L. brachypoda, *D. et B.* x. p. 721.
L. chalcides, *Cant. Cat. Mal. Rept.* p. 49; *Boul. Cat. 3.* p. 340.
Eumeces chalcides, *Gühr. Rept. B. Ind.* p. 90.
Podophis chalcides, *Gray. Cat.* p. 88.
Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona; Java, China.

10. **L. quadrivittatum**, *Prs.* N. v.

- Lygosoma (Cophoscincus) quadrivittatum*, *Peters, Mon. Berl. Ac.* 1867, p. 19 *et* 1872, p. 583; *Boul. Cat. Liz. B. M. 3.* p. 329.
Hab. Mindanao, Davao, Gorontalo.

11. **L. smaragdinum**. *Less. C. O.* N. v. Buliuli. (M. S. T.)

- Kenenxia smaragdina*, *Gray, Cat.* p. 79.
Scincus smaragdinus, *Lesson, Voy Coquille, Zool.* ii. p. 43, pl. iii. fig. 1; *Schleg. Abbild.* p. 33, pl. xi.
S. viridipunctus, *Lesson, l. c.* p. 44 pl. iv. fig. 1.
S. caelestinus, *Guér. Uon. R. A. Rept.* pl. xv. fig. 2.
Lygosoma smaragdina, *Dum. et Bibr.* x. p. 738; *Boul. Cat. 3.* p. 25.
L. (Hinulia) smaragdinum, *var. viridifuscum*, *Peters, Mon. Berl. Ac.* 1872, p. 776.
L. (Kenenxia) smaragdinum, *Peters & Doria, Ann. Mus. Genova*, xiii. 1878, p. 345.
Hab. Luzón, Negros, Cebú, Dinagat, Carolinas, Mindanao.

12. **L. olivaceum**, *Gr. N. v.*

- Dasia olivacea*, *Gray, Cat.* p. 108.
Tiliqua grisea, *Gray, l. c.* p. 110.
Dasia olivacea, *Gray, Ann. N. H.* ii. 1838, p. 331; *Boul. Cat. 3.* p. 251.
Euprepes ernestii, *Dum. & Bibr.* v. p. 696; *Cantor, Cat. Mal. Rept.* p. 47.
E. olivaceus, *Günth Rept. Brit. Ind.* p. 80, pl. x. fig. D; *Theob. Cat. Rept. Brit. Ind.* p. 51.
E. (Tiliqua) semicinctus, *Peters, Mon. Berl. Ac.* 1867, p. 21.
Tiliqua olivacea, *Stoliczka, Journ. As. Soc. Ben.* xxxix. 1870, p. 172.
Hab. Mindanao; Borneo, Java, Sumatra.

13. **L. semperi**, *Prs.* N. v.

- L. (Lipinia) semperi*, *Peters, Mon. Berl. Ac.* 1867, p. 18; *Boul. Cat.* p. 254.
Hab. Camiguin, Mindanao.

14. **L. pulchellum**, Gr. ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Lipinia pulchella, Gray, Cat. p. 84; *Boul. Cat.* 3. p. 254.
Euprepes pulchellus, Steindachn., Novara, Rept. p. 48.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

15. **L. vulcanium**, Gir. ♀ N. v.

(M. S. T.)

Lipinia vulcania, Girard, Proc. Ac. Philad. 1857, p. 196, et
U. S. Explor. Exped., Herp. p. 254; *Boul. Cat.* 3. p. 255,
Hab. Caldera, Mindanao, Samar, Borongan.

16. **L. atrocostatum**, (Less.) ♀ N. v.

(M. S. T.)

Mocoa cumingii, Gray, Cat. p. 81.
Mabouya atrocostatus, Gray, l. c. p. 95.
Scincus atrocostatus, Lesson, Voy. Coquille, Zool. ii. p. 50, pl.
iv. fig. 3.
Eumeces freycinetii, Dum & Bibr. v. p. 648.
Euprepes bitaeniatus, Peters, Mon. Berl. Ac. 1864, p. 53.
E. (*Mabuya*) *cumingii*, Peters, Mon. Berl. Ac. 1867, p. 20.
E. (*Mabuya*) *crostictus*, Peters, Mon. Berl. Ac. 1874, p. 373.
? *Mabouia marmorata*, Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. W. ii.
1877, p. 65.
? *M. irrorata*, Macleay, l. c. p. 66.
Euprepes (*Mabuya*) *atrocostatus*, Peters & Doria, Ann. Mus.
Genova, xiii. 1878, p. 358; *Boul. Cat.* 3. p. 295.
Eumeces serratus, Finsch, Abh. Naturw. Ver. Hamburg, xi.
1886, p.—, pl. ii. fig. 3.
Hab. Dinagat, Luzón, Paracale, Samar, Paranas, Cathalogan,
Carolinas; N.³ Guinea.

17. **L. nigrum**, H. et Jacq.

Eumeces niger, Hombr. & Jacq. Voy. au Pôle Sud (Astrolabe
et Zélée), Rept. p. 11, pi. iv. fig. 2; *Boul. Cat.* 3. p. 597.
Emva nigrita, Girard, U. S. Explor. Exped., Herp. p. 208.
Euprepes (*Mabuya*) *niger*, Peters, Mon. Berl. Ac. 1868, p. 449.
? *E. longicaudis*, Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. W. ii. 1877, p. 68.
Hab. Carolinas.

4. Gen. TROPIDOPHORUS, D. B.

18. **T. leucospilus**, (Pis.) ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Lygosoma (*Hinulia*) *leucospilos*, Peters, Mon. Berl. Ac. 1872,
p. 684; *Boul. Cat.* 3. p. 360.
Hab. Luzón, Cavite, Indian.

19. **T. grayi**, Gthr. ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Tropidophorus cocincinensis, (non D. & B.), Gray, Cat. p. 101.
(p. 364).

1. grayi, *Günth. Proc. Zool. Soc.* 1861, p. 189; *Boul. Cat.* 3.
Cat. B. M. 3, p. 364, 1887. lam. 36 t. 2.
Enoplosaurus insignis, *Sauvage. Bull. Soc. Philom.* (7) iii. 1879
p. 211.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

5 Gén. BRACHYMELES, D. B.

20. B. schandenbergii, (*Fischer.*) N. v.

Brachymeles, *Dum. & Bibr.* v. p. 776; *Gray, Cat.* p. 98.
Senira, *Gray, l. c.*; *Boul. Cat.* 3. p. 386.
Hab. Mindanao.

21. B. gracilis, *Fuch* N. v.

Senira bicolor, *part.*, *Gray, Cat.* p. 98.
Eumeces (Riopa) gracilis, *Fischer, Fahrb. Wiss. Ans.* Hamb.
ii. 1885, p. 85 pl. iii. fig. 1.; *Boul. Cat.* 3. 387.
Hab. Negros, Mindanao.

- 22 B. bicolor, *Gray*, N. v. (M. S. T.)

Senira bicolor, *part.*, *Gray, Cat.* p. 98; *Boul. Cat.* 3. p. 388.
l. 31.
Hab. Luzón, Manila, Dilao.

23. B. bonitæ, *D. B. ♂♀* N. v. (M. S. T.)

Brachymeles bonitæ, *Gray, Cat.* p. 98.
3. bonitæ, *Dum. & Bibr.* v. p. 777; *Boul. Cat.* 3. p. 388.
Hab. Luzón, Manila.

Suborden: RIPTOGLOSOS.

Fam. CAMELEÓNTIDOS.

1. Gén. CHAMÆLEON, LAUR.

1. Ch. vulgaris, *Daud* ♂ N. v. Camaleon.

(M. S. T.)

Hab. Europa, España.

Orden 4.^o: OFIDIOS.

Fam. TIFLÓPIDOS.

1. Gen. TYPHILOPS, D. B.

1. **T. braminus**, (Daud.) ♂♂ N. v. (M. S. T.)

Eryx braminus, Daud. *Hist. Rept.* t. 7, p. 279.
Typhlops rondo talooloo, Cuv. *Reg. Ani.* t. 2, p. 63.
T. russelii, Merr. *Tent. Syst. Teph.* p. 84; Schleg. *Abbild. Amph.*
p. 39.
T. braminus, Cuv. *Mus. Par.*; Fitz. *Neue Clas. Rept.* p. 53.
Griff. *An. Kingd. Cuv.* vol. 9, p. 241; Gray. *Synops. Rept.*
in Griff. D. e' B. 6, p. 309.
Hab. Luzón, Manila, Tayabas, Dolores, Daraga, Paracale,
Mindanao, Marianas, Guam; China, Molucas.

2. **T. philippinus**, (Mull.) N. v.

Trev. *Zeits. J. Physiol.* 4, p. 349; D. et B. 7, p. 154 (1854).
Hab. Filipinas?

3. **T. jagorii**, Pirs.

Peters, *Mon. Ber. Berlin. Akad.* 1861, p. 684.
Hab. Luzón, Monte Isarog, Camarines.

4. **T. petersi**, Steind. N. v.

Steindecker, *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien* 1897, p. 515, lam.
13, fig. 7-9.
Hab. Davao, Mindanao.

5. **T. ruficaudus**, (Gray.) ♂♂ N. v. (M. S. T.)

Gray, *Cat. Lizards Brit. Mus.* 1845, p. 136 (*Anilios*); *Plrs.*
Mon. Per. Berlin Akad. 1871, p. 684.
Hab. Luzón, Paracale, Daraga.

6. **T. sp.**

Hab. Davao.

2. Gen. ONYCHOCEPHALUS, D. H.

7. **O. cumingii**, (Gray.) ♂♂ N. v. (M. S. T.)

Gray, *I. c.* p. 133 (*Onychophis*).
Hab. Luzón, Manila, Malabon.

8. **O olivaceus**, Gray. ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Gray I. c. p. 133. (*Onychophis*); *Ptrs. Mon. Ber. Berlin Akad.* 1881, p. 684.

Hab. Samar, Paranas, Loquilocum y Borongan.

Fam. UROPELTIDOS.

1. Gén. UROPELTIS, D. B.

1. **U. philippinus**, (Cuv.) N. v.

Cuvier, *Regn. ani. D. et B.* 7. p. 161, (1854).

Hab. Filipinas.

2. Gén. RHINOPHIS.

1. **Rh philippinus**, Cuv. N. v.

Jan, *Icon. Oph.* lam. 50.

Hab. Filipinas; Ceilan.

Fam. CALAMÁRIDOS.

1. Gén CALAMARIA, Boie.

1. **C. bitorques**, Pts. N. v.

Peters, *Mon Ber. Berlin. Akad.* 1872, p. 585.

Hab. Filipinas.

2. **C gervasii**, D. B. ♂♂ N. v

(M. S. T.)

Calamaria virgulata, Gervais, *Mag. Zool. Guerin, Rept.* pl. 16, t. 7-10, et *Voy. du monde de la Favorite, Zool.* ii. p. 75.

C. gervasii, Dum. et Bibr. *Erp. gen.* t. 7. p. 76; *Gthr., Cat. Col. snake, Brit. Mus.* 1858, p. 4 et *Proc. Zool. Soc.* 1879, p. 77; Peters, *Mon. Berl. Akad.* 1861, p. 684; Jan, *Icon. d. Ophid. Lief.* 10, 1865, lam. 2, f. nn; F.

Müller, *III. Nachtr. Cat. Herp. Sam. Basal Ann.* 1883, p. 12; Fischer, *Jahrb. Hamburg.* 2, 1885, p. 80.

Hab. Luzón, Camariues Sur, Bula, Paracale, Daraga, I. yabas, Dolores, Angat, Bulacan, Bataan, Orion, Negros, Samar, Mindanao; Java, Sumatra.

3. **C. grayi**, Gthr. N. v

Günther, *Colubr. Sn. Brit. Mus.* 1858, p. 6.

Hab. Filipinas.

4. **C. lumbricoidea.** Boie. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Boie, *Isis*, 1827, p. 540; Günther, *I. c.* p. 5; Wagl. *Syst. p. 12*; Schleg. *Ess.* pl. 1, f. 14-16; Cantor, *Cat.* p. 61; Dum. et Bibr., p. 89 t. 7.

C. virgulata, (joven) Boie, I. c. (no. Gervais).
Hab. Samar, Paranas, Borongan; Java, Asia.

5. **C. philippinica.** Steind. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Steindachner, *Ver. Zool. Bot. Gesell. Wien Bd. 17*, 1867, p. 514, lam. 13, t. 4-6.

Hab. Samar, Borongan.

6. **C. vermiformis.** D. B. ♂ N. v.

(M. S. T.)

C. vermiformis, D. B. Erp. gen. t. 7, p. 83.
Hab. Samar, Paric.

7. **C. temminckii.** ♂ D. et B. N. v.

(M. S. T.)

C. temminckii, Dum et Bibr. vii, p. 87; *Gthr. Cat. Br. Mus.* 1858, p. 5.
Hab. Paragua, P. Princesa.

2. Gén. OXYCALAMUS, GTHR.

8. **O. oxycephalus.** Gthr. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Rhabdosoma oxycephalus, *Cat. Colubr. Sn. Brit. Mus.* 1848, p. 242 y *Proc. Zool. Soc. London* 1863, p. 168, f. 9.
Hab. Luzón, Bataan, N. Ecija.

3. Gén. TYPHLOGEOPHUS, GTHR.

9. **T. brevis.** Gthr. N. v.

Günther, *Proc. Zool. Soc. London* 1879, p. 77.
Hab. Dinagat, Mindanao.

4. Gén. GEOPHIS, WAGL.

10. **G. schadenbergi.** Fischer. N. v.

Gr. sch. J. G. Fischer, *Jahrb. d. wis. Aust. Hamburg. Bd. 2*, 1885, p. 80 y 93, lam. 3, fig. 4.
Hab. Mindanao.

11. **G. brevirostris.** Peters. N. v.

Stenognathus brevirostris, Peters, *Mon. Ber. Berlin. Akad.* 1872, p. 586.
Hab. Filipinas.

12. **G modestus.** (*D. B.*) ♂♂ N. v. (M. S. T.)

Stenognathus modestus, *D. et B.* *Erp. gen.* t. 7, 1854; p. 504.
Rhabdosoma leporinum, *Gthr. Cat. Colubr. Sn. Brit. Mus.* 1858,
p. 12; *Proc. Zool. Soc. London* 1873, p. 169, y 1879 p. 77.
St. modestus, *Peters. Mon. Ber. Berlin. Akad.* 1861, p. 684.
Rhabdosoma leporinum, *F. Müll. III. Nachtr. Cat. Herp. Samml.*
Mus. 1883, p. 12.

Hab. Luzón, Samar, Tubig, Dinagat, Mindanao; Java.

5. Gen. RABDION, B. B

13. **R torquatum.** *B. B.* ♂♂ N. v. (M. S. T.)

Rabdion torquatum, *Dumeril et Bibron*, *Erp. gen.* t. 7, 1854,
p. 139; *Plrs. Mon. Ber. Berlin. A. Kad.* 1861, p. 684.
Calamaria conica, *Mus. de Leyde*. 1845.

Pseudorhabdion torquatum, *Jan.*

Hab. Luzón, Daraga, Davao, Mindanao; Malaca.

6. Gen. ASPIDURA, WALGER

14. **A. brachyorrhos.** *Gth.* ♂ ♀ N. v. (M. S. T.)

Seytale brachyorrhos, *Boie, Isis*, 1827, p. 517 pl. 25.
As. seytale, *Wagler*, *Nat. Syst. Amph.* p. 191. *D. et B.* t. 7,
p. 128; (1854).

Calamaria seytale, *Schleg. Ess. z.* p. 42, n.^o 12.
As. brachyorrhos, *Gthr. Cat. Colub. Sn. Brit. Mus.* 1852, p. 14.

Hab. Luzón, Bulacan, Angat; Ceilan India.

Fam. OLIGODÓNTIDOS.

1. Gen. OLIGODON, BOIE.

1. **O. modestus.** *Gthr.*

O. modestus, *Rept. Brit. India*, 1804, p. 210; *Proc. Zool. Soc. London*, 1879, p. 77.
Hab. Negros.

2. **O. notospilus.** *Gthr.*

O. notospilus, *Gthr. Proc. Zool. Soc. London* 1873 p. 169, fig. A.
Hab. Mindanao.

3. **O. sublineatus.** *Gthr.* ♂♂ N. v. (M. S. T.)

O. sublineatum, *D. A. B. loc. cit.* p. 57.
O. sublineatus, *Gthr. Cat. Col. Sn. Brit. Mus.* 1852, p. 21.
Hab. Samar, Parans; Ceilan.

2. Gen. ADLABES, D.

4. *A. collaris*, (Gray.) ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Psammophis collaris, Gray, *An. et Mag. Nat. Hist.* 1853, p. 300.

Adlabes collaris, Gthr. Cat. B. M. p. 28. (1858).

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

3. Gen. SIMOTES, D. B.

5. *S. ancoralis*, Jan ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Jan, *Elenco sist. d. Ophidi*, Milano, 1863, p. 45, *Prodri. Icon. Gen. d. Ophidi*, II.

Coronellidr., Modena 1863 p. 23, et *Icon. d. Ophid. Lief.* 11, p. 1865, lam. 6, fig. 2; *Steind. Reise, d. Novara, Rept.* Wien, 1869 p. 60; F. Müll., III.

Nachtr., Cat. Herp. Samml. Basel. Mus. 1883, p. 14.

Hab. Luzón, Laguna, Calauan, Camarines Sur, N. Vizcaya, Bayombong.

6. *S. aphanospilus*, Cope

Cope, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1860 p. 245.

Hab. Filipinas.

7. *S. phænochalinus*, Cope, ♂ N. v.

(M. S. T.)

Cope, I. c. p. 244; F. G. Fischer, *Jahrh. d. wiss. Aust. Hamh.* Bd. 2, 1885, p. 80.

Hab. Manila, Mindanao.

8. *S. purpurascens*, (Schleg.) ♀ N. v.

(M. S. T.)

Xenodon purpurascens, Schleg. *Ess. pl.* 3, f. 13, 14, et *Abbildung.* pl. 14; *D. et B.* p. 753; *Cantor. Cat.* p. 67.

Coronella albocincta, Cantor. *Proc. Zool. Soc.* 1839, p. 50.

Simotes albocincta, D. et B. p. 633 lam. 32 f. 1.

S. purpurascens, Gthr. Cat. Colubr. Sn. Brit. Mus. 1858 p. 25, var. C; Peters. Mon. Ber. Berlin. A. Kad., 1861 p. 684; Os

Kar. Cat. Philip. Rept. 1886, p. 10

Hab. Luzón, Daraga.

9. *S. russelli*, Jan ♀ N. v.

(M. S. T.)

Elenco sist. de Ophidi; Milano 1863, p. 45, et *Icon. d. Ophi*, 11, 1865, lam. 6, f. 1. B.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

Fam. 4.^a COLUBRIDOS.

Subfam. COLUBRINOS.

1. Gén. ELAPHIS, Ader.

1. E. subradiatus, (Schleg.)

Coluber subradiatus, Schleg., *Ess.* ii. p. 136, et *Abbildung.* t. f. 7, 8, t. 29.
Compsosoma subradiatum, D. et B. vii. p. 297.
Elaphis subradiatus, Gthr. *Cat. Col. Sni. B. M.* 1858 p. 95; *Oe. Kar. Cat. Rept. Rulip.* p. 107.
Hab. Filipinas; Timor.

2. Gén. CORYPHODON, D. B.

2. C. Korros, (Reinw.) ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Coluber korros, Reinw.; Schleg., *Ess.* ii. p. 139, et *Abbildung.* t. 27, t. 28, f. 1-6.
C. cancellatus, Oppel, *Mus. Paris;* Boie, *Isis*, 1827 p. 537.
Coryphodon korros, D. et B. vii. p. 186; Gthr. *Cat. Colu. Sni. B. M.* 1858 p. 110.
Hab. Luzón, Manila; Hong-kong, China.

3. C. hexanotus, (Cantor) ♂ N. v.

(M. S. T.)

Coluber hexanotus, Cantor, *Cat. of Malay. Rept.* p. 74.
Coryphodon hexanotus, Gthr. *Cat. B. M. Snakes*, 1858 p. 110.
Hab. Calamianes, Culion; Borneo, Singapor.

4. C. mucosus, (Lin) ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Coluber mucosus, Lin. *Mus. Ad. Fried.* t. 13 f. 2, t. 23 f. 2;
Boie, Isis, 1827, p. 536; Russell, i. t. 34, ii. t. 18 f. 2; *Lacep. Quadr. Ovip.* ii. pl. 34; *Latr. Rept.* iv. p. 156; Daud. *Rept.* vi. p. 355.
C. blumenbachii, Merr. *Tent.* p. 119; Schleg. *Ess.* pl. 5, f. 78.
C. dhumua, Cantor, *Proc. Zool. Soc.* 1839, y *Cat. of. Malay. Rept.* p. 74.
Coryphodon blumenbachii, Dum. et Bibr. vii. p. 184; Gthr. *Cat. B. M.* 1858, p. 111.
Hab. Luzón, Bataan, Orion; China, Ceilan.

5. C. fuscus,? Gthr. ♂ N. v.

(M. S. T.)

C. fuscus, Gthr. *Cat. B. M. Snakes* 1858 p. 112.
Hab. Samar, Borongan; Borneo.

3. GENUS COMPSOSOMA, D. B.

6. C melanurum, Schleg. N. v.

M S T

Schleg., *Ess.*, p. 141, ii. lam. 5, fig. 11, 12, *c* Abbild. lams. 5, (*Coluber*); Peter, *Mon. Ber. Berlin. Akad.* 1861 p. 685, 681, var. *Plegiodon erythrurus*, Jan. *Elenco sist. d. Ophidi Mito* 1893 p. 61 *é* Icon. de Osti L'if. 21 1867, lam. 4, fig. 1, (var.—var. *Mallensis*); Gthr., *Proc. Zool. Soc. London* 1873, p. 169, (var.) et 1879 p. 78 (*Spilotes*); F. Müll., *III. Nachtr. Cat. Herp. Samml. Basel. Mus.* 1883 p. 14 (var.); F. G. Fischer, *Jadhrb. d. wiss. Aust. Hamburg.* Bd. 2. 1885, p. 80, et 101 (var.); Oskar. *Cat. Rept. Philipp.* p. 108 (1886).

Compsosoma melanurum, D. et B. vii. p. 299.

Hab. Luzón, Manila, Batangas, Lian, Nasugbú, Mindoro, Da-
raga, Negros, Leyte, Samar, Loquilocum, Paragua, P. Princesa,
Mindanao; Borneo, China.

7. C var erythrura, D. B. N. v.

M S T

Hab. Samar, Paric, Loquilocum, Mindanao.

4. Gén. SPILOTES WAGL.

8. sp. samarensis, Ptrs. ♀ N. v.

(M. S. T.)

Peters, *Mon. Ber. Berlin. Akad.* 1891; p. 685; Oskar. I. c.t.
p. 108.

Hab. Samar, Cubo-cubo.

Fam. DRIADÍNIDOS.

1. Gén. ZAOCYS COPE.

1. Z. luzonensis, Gthr. ♂ N. v. Duhul.

(M. S. T)

Gthr., *Proc. Zool. Soc. London*, 1893, p. 169; Oskar., loco cit.
p. 108.

Hab. Luzon, Cavite, Indan.

Fam. NATRÍCIDOS.

1. Gén. TROPIDONOTUS KUHL.

1. T. auriculatus, Gthr. ♀ N. v.

(M. S. T.)

Gthr., *Cat. Colubr. Sn. Brit. Mus.* 1858, p. 80; Peters, *Mon. Ber. Berlin. Akad.* 1861, p. 697; F. Müll., *III. Nachtr. Cat. Herp. Samml. Basel. Mus.* 1883, p. 15; J. G. Fischer, *Jahrs. d. wiss. Aust. Hamburg.* Bd. 2. 1885, p. 80; Oskar. *Ca. Rept. Philipp.* 1886, p. 108.

Hab. Samar, Loquilocum, Mindanao.

2 **T. chrysargus.** *Boie* N. v.

(M. S. T.)

Boie, Isis, 1827 p. 534; *Schleg. Ess.* t. 12, f. 6, 7; *Gthr. Cat. Col. B. Mus.* 1858, p. 70; *Oskar. l. cit.* p. 108.

Steriophis chrysargus, Fitz, Syst. Rept. 27.

Amphiesma chrysargum, D. et B. vii. p. 739.

Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo, Java, Sumatra.

3 **T deudrophiops.** *Gthr* N. v.

Gthr. An. Mag. Nat. Hist. (5) Bd. 11, 1883, p. 136; *Oskar. Cat. Rept. Philipp.* p. 109 (1886).

Hab. Mindanao, Zamboanga.

4 **T lineatus.** *Ptrs* ♂ N. v.

(M. S. T.)

Ptrs. Mon. Ber. Berlin. Akad. 1861, p. 686; *Oskar. l. cit.* p. 109.

Hab. Samar, Loquilocum.

5 **T spilogaster.** *Boie* ♂ N. v.

(M. S. T.)

Tr. spilogaster, Boie, Isis, 1828, p. 559; *D. et B.* vii. p. 598; *Gthr. Cat. Colubr. Sni. Br. Mus.* 1858 p. 66; *Peter. Mon. Ber. Berlin. Akad.* 1861, p. 687; *Jan. Elenco sist. d. Ophi.* Milano 1863, p. 72 et *Icon. d. Ophid. Lieb.* 27, 1868, lam. 2 fig. 1; *J. G. Fischer, Arch. t. Naturg.* Bd. 481, 1882, p. 282 y *Jahrb. d. wiss. Aust. Hamburg.* Bd. 2 1885 p. 82; *F. Müll. iii. Nachtr. Cat. Herp. Samml. Basel Mus.* 1883, p. 15; *Oskar Cat. Rept. Philipp.* p. 109 1886.

Tr. quincunciatius, var. Schleg. Ess. ii. p. 309; *Eydoux et Gerv. Voy. de la Favorite* v. pl. 28.

Hab. Luzon, Manila, Laguna, Los Baños, Morong, Bosoboso, Bulacan, Tayabas, Dolores, Bayombong, Nueva-Vizcaya, Batangas, Nasugbú, Daraga, Tabaco, Albay, Camarines Sur, Bataan, Orani, Mindanao.

6. **Tr sp** ♂ N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzon, Batangas, Manila.

7 **Tr sp.** N. v.

Hab. Mindanao.

8 **Tr. stolatus,** (*Linn.*) ♂ N. v.

(M. S. T.)

Coluber stolatus, Lin. Mus. Ad. Fried. t. 22 f. 1 et. *S. N.* i. p. 379; *Laur. Syn. Rept.* p. 95; *Shaw, Gen. Zool.* iii. p. 542;

Pts. Mon. Ber. B. Akad. 1861, p. 686.

Coronella cervina, Laur. l. c. p. 88.

Coluber cervinus, Gm. Syst. Nat. i. p. 1114; *Lacep. Hist. Nat. des Serp.* ii. p. 107; *Latr. Rept.* iv. p. 80; *Daud. Rept.* vii.

p. 161; *Russell*, *Ind. Serp.* i. t. 10, ii. 19 et iii. t. 15 *B. joy.*

Natrix stolata, *Merr.* *Tent.* p. 123.

Tropidonotus stolatus, *Boie*, *Isis*, 1827, p. 535; *Schleg. Ess.* ii. p. 317; *Gthr. Cat. Sm. B. M.* 1858, p. 68.

Vipera stolatum, *D. et B.* vii. p. 727.

Hab. Luzon, Bulacan, Calumpit; Ceilán, Hong-kong, China.

9. **Tr. aff. dorsalis**, *Gthr* ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

F. Müll. i. *Nachtr. Cat. Herp. Samml. Basel. Mus.* 1830, p. 31.
Hab. Luzon, Manila.

10 **Tr. aff. hypomelas**, *Gthr*

F. Müll. iii. *Nachtr. Cat. Herp. Samml. Basel. Mus.* 1830, p. 15.
Hab. Mindanao.

11. **Tr. schistosus**, *(Daud.)* ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Coluber schistosus, *Daud.* *Rept.* 7, p. 132.

Tropidonotus schistosus, *Schleg. Phys. Sarp.* i. n.° 13 p. 198; t. 2 p. 318; *Det. B. Exp. Gen.* 7, p. 59.
Hab. Mindanao, Mindoro, Luzon, Tayabas, Laguna, Calamba, China, Hong kong.

Fam. HOMALPÓSIDOS.

1 Gén. CERBERUS Cuv.

1. **C. rhynchos**, *(Schneid.)* ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Hydrus rhynchos, *Schn. H. Amph. Bd.* 1, p. 246.

Cerberus boæformis, *Peters. Mon. Ber. Berlin Akad.* 1891, p. 687.
Homalopsis boæformis, *Jau, Eleneo List. d. Ojed. Malano*, 1893, p. 77; *Gthr. Rept. B. India* 1864, p. 279 et *Proc. Zool. Soc. London*, 1879, p. 78.

C. cinereus, *Gray. Wood.* p. 118.

C. obtusatus, *Cuv.*

Elaps boæformis, *Schneid.*

Homalopsis rhynchos, *Cant.*

H. schneideri, *Schleg.*

Hurria schneideriana, *Daud.*

Hab. Luzon, Manila, Batangas, Lobo, Camarines Sur, Albay, Boac, Mindoro, Daraga, Buti, Negros, Mindanao, Placer, Davao, Paragua, P. Princesa.

2. Gén. CAMPYLODON, D. B.

2. C. prevostianum, D. B. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Dumeril et Bibron, *Erp. gen.* t. 7, p. 964, 1854; *Jan. Icon. d. Ophid.* 30, 1868, taf. 6, f. 3.

Coluber prevostianus, *Eyd. et Gerv.*

Homalopsis plumbea, *Eyd. et Gerv.*

Hab. Luzon, Manila, Laguna, Calamba, Bataan, Orion.

Fam. PSAMMÓFIDOS.

1. Gén. PSAMMODYNASTES, GLHU.

1. Ps. pulverulentus, (Boie) ♂ N. v.

(M. S. T.)

Psammophis pulverulentus, Boie, *Isis*, p. 546, (1827); *D. et B.* p. 895; Schlegel, *Ess.* 18, p. (171); *Gthr. Rept. B. India*, 1864, p. 292; *A. Proc. Zool. Soc. London* 1870 p. 78; *F. Müll.* III. *Nachtr. Cat. Herp. Samml. B. Mus.* 1883 p. 17; *J. G. Fischer, Jahrb. d. wiss. Amt. Hamburg*, 2, 1885, p. 81; *Oskarbi. Cat. Rept. Philipp.* 1886, p. 110.

Dipsas ferruginea, Cant.

Hab. Luzón, Isarog, Leyte, Samar, Loquilocum, Dinagat, Mindanao, Placer; Borneo, Java, Célebes, Sumatra.

Fam. DENDRÓFIDOS.

1. Gén. GONYOSOMA, WAGL.

1. G. oxycephalum, (Boie) ♂ N. v.

(M. S. T.)

Coluber oxycephalus, Boie, *Isis*, 1827, p. 537; *Ptrs. Mon. Ber. Berlin. Akad.* 1871 p. 688; *Gthr. Rept. B. India* 1864, p. 294; *id. Cat. Sn. B. M.* 1858, p. 122.

Leptidea robusta, Hallow.

Coluber cæruleocephalus, Lin. *Mus. Ad. Frind.* t. 20, f. 2; *Daud. Rept.* VI. p. 320; *Shaw. Gen. Zool.* iii. p. 514; *Merr. Tent.* p. 112.

Mopecophis chalybaeus, Gray.

Gonyosoma oxycephalum, D. et B., *Erp. Gen.* VII. p. 213.

G. viride, Wagl. *Icon.* t. 9, *et Nat. Syst.* p. 185.

Herpetodryas oxycephalus, Schlegel, *Ess.* t. 7, f. 8-10, *et Abbildz.* t. 44, f. 1-9; *Cantor, Cat. of Malay. Rept.* p. 80.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Angat, Camarines Sur, Mindanao, Surigao, Legaspi; Borneo, Java, Sumatra, Célebes.

2. G. frenatum, (Gray) ♂ N. v.

(M. S. T.)

Herpetodryas frenatus, J. E. Gray. *An. et Mag. Nat. Hist.* 1853, p. 295.

G. frenatum, *Gthr. Cat. B. M.* 1858 p. 123.
Hab. Luzón, Malabon.

2 Gén. DENDROPHIS. BOIE

3 D. pietus, (*Guér.*) ♂♂ N. v. Remorana.

(M. S. T.)

Coluber pictus, *Gm. S. N.* t. p. 1116; *D. et B. Lurp.* gen. 7, 1854, p. 197; *Ptrs. mon. Ber. Berlin. Akad. 1861*, p. 687; *Gthr. Rep. B. India* 1864, p. 297; *J. G. Fischer, Jahrb. d. wiss. Aust. Hamburg.* 2, p. 80, 1885.

Ahatulla belli, *Gray, Ill. Ind. Zool.; Cant. Cat.* p. 79.

C. cæruleus, *Bonn. Ophiol.* p. 30.

C. decorus, *Shaw, Gen. Zool.* p. 538; *Merr. Teut.* p. 128.

Dendrophis chairecacos, *Boie, Isis, 1827*, p. 541; *Erpet. Java.* t. 34; *Wagl. N. Syst.* p. 183.

Leptophis mimar, *Bell. Zool. Journ.* ii, p. 329.

Den. picta, *Schleg. Ess.* t. 9, f. 5-7; *D. et B. VII.* p. 197; *Gthr. Cat. S. B. Mus.* 1858, p. 148; *Brehm. F. An.* 5, p. 233, f. var. B.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Bulacan, Angat, Morong, Antipolo, Albay, Daraga, Camarines, Samar, Loquilocum, Mindanao, Davao.

4. D punctulatus, (*Gray*).

Leptophis punctulatus, *J. E. Gray in King's Australia*, ii, p. 432, y in *Grey. West. Australia*, ii, p. 431.

Dendrophis (Ahatulla) olivacea, *Gray, Zool. Misc.* p. 54.

D. lineatus, *D. et B. VII.* p. 200; *Troy au Pôle Sud. sur les Corvettes l'Astrol. et la Zélée, Ophid.* pl. 2.

D. punctulata, *Gthr. Cat. Col. S. B. Mus.* 1858, p. 149; *Parenti et Picaglia, Atti Soc. Nat. Modena Mem. Orig.* 5, 1880, p. 50.

Dendrophis arnensis, *Doria. D. calligaster, Gthr. D. lineolata, D. B. D. olivacea, Gray. D. striolatus, Pts.*
Hab. Ticao.

5. D terrificus, *Pts.* ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Peters. Mon. Ber. Berlin Akad. 1861, p. 688; (*caudolineatus*, non *Gray*, y 1872, p. 583; *Gthr. Proc. Zool. Soc. London* 1879, p. 78 (*Philippinensis*); *Parenti et Picaglia, I. c.* p. 50; (*octolineata*))

Hab. Luzón, Bulacan, Tayabas, Dolores, Tiaon, Batangas, Lian, Albay Ticao, Samar, Brongan, Loquilocum, Paragu, P. Princesa, Mindanao; Célebes.

3 Gen. CHRYSOPELEA. BOIE.

6 Ch ornata (*Shaw*), ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Coluber ornatus, *Shaw. Zool.* 3, p. 477; *Cope, Proc. Ac. Nat. Sci. Phil.* 1850, p. 55; *var. A. t. Gthr.: Pts. Mon. Ber. 1*

- Akad.* 1861, p. 687; *Gthr.*; *Rept. B. India*, 1864, p. 298; *Steind.*, *Reise d. Novara, Rept. Wien* 1869, p. 71; *J. G. Fischer, Jahrb. d. wis. Hamb.* 2, p. 80, 1885.
Natrix ornata, *Merr. Test.* p. 100.
Chrysopelea paradisei, *Boie, Isis*, 1827, pp. 546, 547; *Wagl. Amph.* p. 188.
Tyria ornata, *Kit.* 2, *None Class. Rept.* p. 60.
Dendrophis ornata, *Schleg. Ess. pl. 9 t. 8-10; Fitzp. Cat. Serp. Mus. Par.*
■ *ruber ibitoca*, *Latr. Rept.* iv, p. 131.
■ *paradisei*, *Moll. et Dillw.*
■ *hrysopelea ornata*, *D. et B. VII.* p. 1042.
Leptophis ornatus, *Cant.*
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Leyte, Samar, La-
uang, Mindanao, Balabac; Borneo, Java, Célebes, Sumatra.

7. *Chr rubescens*, (Gray) ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

- Dipsas rubescens*, *Gray, Ind. Zool.* pl. fig. 2, *Gthr. I. c.* p. 299;
Steind. I. c. p. 71.
Dendrophis sumatrana, *Bleek.*
eptophis rubescens, *Blyth.*
Chrysopelea rubescens, *Gthr. Cat. B. Mus.* 1858, p. 145; *Oskar. Cat.* p. 112 (1886).
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Alfonso.

4. Gen. LOPTOPRUS, BELL

8. *L. vertebralis*, *D. B.* ♂ N. v.

(M. S. T.)

- D. et B. Erp. Gen.* 7, p. 543 1854.
Tamnosophis vertebralis, *Jan.*
Hab. Luzón, Manila.

Fam. DRIOFIDOS.

1. Gen. TRAGOPS, WAGL.

1. *T. prasinus*, (Reinw.) ♂♂ N. v. Dahumpalay (M. S. T.)

- Dryophis prasina*, *Reinwartt. Tijdschrift voor Natuur*, *Boie, Isis*, 20, p. 545, 1827; *Schleg. Ess. pl. 10, 1. 9-13; et Abbildg. 1. 8, 1. 1-6; Gthr. Cat. C. Su. B. Mus.* 1858, p. 159; *col. Rept. B. India* 1864, p. 303; *y Proc. Zool. Soc. London* 1870, p. 78; *Cope, Proc. Ac. Nat. Sc. Phil.* 1800, p. 554; *var. lata*, *Pfirs. Mon. Berlin, Akad* 1807, 4, p. 688; *F. I. Fischer Jahrb. d. wiss. Aust. Hamb.* 2, 1885 p. 80.
Drymus nasutus, *Bell. Zool. Jour.* 11, p. 327.
Tragops nasutus, *Wagl. Syst. Amph.* p. 184.
T. prasinus, *D. B.* vii, p. 824; *Cantor.*
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Los Baños, Daraga, Albay, Samar, Catbalogan, Mindanao, Davao; Célebes, Sumatra.

2. T. var. *læta*, *Cap.* ♂ ♀ N. v.

Hab. Haguasa, Mindanao.

3. L. *xanthozonius*, *var. Boie* ♂ ♀ N. v. Dahunpalay. (M. S. T.)

Russell, *Ind. Serp.* ii. pl. 24.

Dryophis xanthozonias (*Kuhl.*) *Boie, Isis*, 1827, p. 545; *Gthr. Cat. Sn. B. M.* 160, (1858).

Tragops xanthozonius, *Wagl. Syst. Amph.* p. 184; *D. et B.* vii. p. 826.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

2. Gén. PASSERITA, GRAY.

4. P. *mycterizans*, (*Lin.*) ♂ ♀ N. v. Dahunpalay. (M. S. T.)

Coluber mycterizans, *Lin. Mus. Ad. Fried.* p. 28; *Lacep. Quadr. Ovip.* ii. pl. 4, f. 2; *Bom. Ophi. Enc. Meth.* pl. 30, f. 62;

Russell, Ind. Serp. t. 12, 13; *Daud H. Rep.* vii. pl. 87.

Drymus nasutus, *Merr. Tent.* p. 196.

Passerita mycterizans, *Gray, An. Phil.* x. p. 208; *Gthr. Cat. Sn. B. Mus.* 1858, p. 160.

Drymus oxyrhynchus, *Bell. Zool. Journ.* 1821, p. 325.

Dryophis nasutus et *D. pavoninus*, *Boie, Isis*, 1827, pp. 520, 543; *Cuv. Anim.; Guer. Icon. Rept.* t. 22, f. 2.

Tragops nasutus et *T. pavoninus*, *Wagl. Sys. der Amph.* p. 184; *Schleg. Ess.* t. 10, f. 1-5.

Herpetotragus nasutus, *Fitz. Syst. Rept.* p. 27; *D. et B.* vii. p. 809.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

Fam. DIPSÁDIDOS.

1. Gén. DYPASAS, BOIE.

1. D. (*Dipsadomorphus*) *angulata*, *Pis.*

Peters, *Mon. Ber. Berl. Akad.* 1861, p. 668.

Hab. Leyte.

2. D. *sp.* ♂ ♀ N. v. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

3. 1D. (*Eudipsas*) *cynodon*, *Cuv.* ♂ N. v. (M. S. T.)

Cuv. Reg. Anim.; Boie, Isis, 1827, p. 559; *Guerin, Iconoogr.* pl. 21, f. 2; *Shleg. Phys. di Serp.* 2, p. 268 lam. 11, t. 10, 11; *Cant. Cat.* p. 77; *Gthr. Rept. India*, 1864, p. 308, y *Proc. Zool. London* 1870, 1879, p. 71.

*

Eudipsas cynodon, *Fitzinger, Syst. der Rept.* p. 27; *Wood, Nat. Hist.* 139, fig.

Ospetiodon cynodon, *D. et B.* vii. p. 207.

Pareas waandersi, *Bleek.*

Hab. Mindanao, Paragua, Puerto Princesa; Borneo, Java, Sumatra.

4. **D. sp. ♂♂ N. v.**

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Cavite, Alfonso.

5. **D. (Dipsas) dendrophila**, *Wagl. ♂♂ N. v.* (M. S. T.)

Wagler, Syst. Amph. p. 181, *ē Icon.* lam. 8; *Peters Mon. Ber. Berlin. Akad.* 1861, p. 688 (*genomicincta*); *Gthr. Rept. B. India* 1864, p. 310; *et Proc. Zool. Soc. London*, 1870; p. 78; *J. G. Fischer, Jahrb. d. wiss. Aust. Hamburg.* 2, p. 81, 1885.

Dy. *dendrophila*, *Reinv.* *Boie, Isis*, 1827, p. 549; *Schleg. Ess. t. 11. f. 1-3; Caut. Cat.* p. 76; *Brehm. Th. Ani.* 5, p. 206, t. 93.

Triglyphonon dendrophilum et gemmicinctum, *D. B.* vii. p. 1001, p. 1086.

Hab. Samar, Paragua, Puerto Princesa, Butuan, Mindanao, Davao.

6. **D. drapiezii**, *(Boie.) N. v.*

D. drapiezii, *Boie, Isis*, 1827, p. 559; *Schleg. Ess. pl. 11. f. 8, 9, et Abbilg. t. 15.*

Triglyphonon drapiezii, *D. et B.* viii. p. 1007.

Hab. Mindanao.

7. **D. (Eudipsas) guiraonis**, *Steind. N. v.*

Steindachner, Reise der Novara, Rept. Wien. 1869, p. 75; *F. Müller. III. Nachtr. Cat. Herp. Samml. Basel Mus.* 1883,

p. 18, *J. G. Fischer, l. c.* p. 81.

Hab. Mindanao.

8. **D. fusca**, *(Gray) ♂♂ N. v.*

(M. S. T.)

Dendrophis fusca, *(Gray.) Zool. Misc.* 1842, p. 54; *Gthr. Cat. B. M.* 1858, p. 171.

Triglyphonon flavescens, *D. et B.* vii. p. 1080.

Hab. Luzón, Laguna, Mindoro, Calapan.

9. **D. philippina**, *Pts. ♂♂ N. v.*

(M. S. T.)

Peters Mon. Ber. Berlin. Akad. 1867, p. 27.

Hab. Luzón, Manila, N.^a Vizcaya, Quiangan.



Fam. LICODÓNTIDOS.

1. LYCODON, Boie.

1. *L. aulicus*, *Lin.* ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Coluber aulicus, *S.* *N.* i, p. 381; *Cope*, *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadel.* 1857, p. 292 (*var.* *D. B.*); *Peters*, *Mon. Ber. Berlin Akad.* 1861, p. 688; *Gthr. Rep. B. Ind.* 1864, p. 916; *et Proc. Zool. Soc. London* 1879, p. 78; *J. G. Fischer*, *Jahrb. d. wiss. Aust. Hamb.* 2, 1885, p. 81 *var. g*; *D. et B.* vii, p. 960; *Vil. Creaç.* 5, p. 107.

Lycodon hebe, *Schleg.*

Hab. Luzon, Manila, Tayabas, Dolores, Batangas, Nasigbu, Camarines Sur, Paracale, Mindoro, Boac, Butuan, Mindanao.

2. *L. capucinus*, Boie, var., *D. Russel*, N. v.

(M. S. T.)

Ly. capucinus, *Boie*, *Isis*, 1826, p. 981; *Gthr. Cat. R. M.* 1858, p. 203.

Ty. atro-purpureus, *Cont. Cat.* p. 68.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

3. *L. bairdi*, *S'nd.*

Steind., *Reise d'Nov. Rept. Wien.* 1809, p. 90.

Hab. Filipinas.

4. *L. modestum*, N. v.

Nom. Rept. M. Zool. B. Berl. 1809, p. 27.

Hab. Manila.

5. *L. tessellatus*, *Jan.* ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Jan. *Elenco sist. d. Ophid. Milano* 1863, p. 96; *et Icon. di Ophid.* 1, 36, 1870 lam. 4 f. 2; *Müll.* *III. Nachtr. Cat. Herp. Samml. Basel. Mus.* 1833, p. 17.

Hab. Luzón, Manila.

6. *L. eucullatum*, N. v.

Nom. Rept. et Amph. Mus. Zool. B. Berl. 1856, p. 27.

Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. ODONTOMUS, D. B.

7. *O. mülleri* (*D. B.*) ♂ N. v.

(M. S. T.)

Lycodon mülleri, *Dumeril et Bibron*, *Erp. gen.* 7, 1854, 1, 382; *Gthr. Cat. Col. Sn. B. Mus.* 1858, p. 203; *et Proc. Zool.*

Soc. London 1879, p. 78; *Peters Mon. Ber. Berlin. Akad.* 1861, p. 688.

Hab. Luzón, Daraga, Iriga, Balabac, Mindanao, Surigao.

3. Gén. CYCLOCORUS, D. B.

8. C. *lineatus*, (Reinck.) ♂ ♂ N. v.

(M. S. T.)

Lycodon lineatus, Reinck, *I. cit.* t. I, f. 7-9.

Cyclocorus lineatus, D. et B. p. 386; *Gthr. Cat. Col. Su. R. Mus.* 1858, p. 208; *Peters Mon. Ber. Berlin. Akad.* 1861, p. 688; *Jam. Icon. d. Ophid.* 30, 1870, lam. 6, t. 2; *F. Müll. III. Nachtr. Cat. Herp. Samml. Basel. Mus.* 1883, p. 17.

Hab. Luzón, Manila, Tayabas, Dolores, Albay, Mayen, Daraga, Mindanao, Surigao, Sanar, Paric.

Fam. ESCITÁLIDOS.

1. Gén. HOLOGERRIUM, GTHR.

1. H. *philippinum*, Gthr. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Günther, *Cat. Colubr. Su. B. Mus.* 1858 p. 186; *id. Proc. Zool. Soc. London.* 1873 p. 171, lam. 18 fig. B. et 1870 p. 78.

Cyclochorus maculatus, *Jan. Icon. d. Ophid.* 36 1870 lam. 6 fig. 3.

C. lineatus, var. *maculata*, *J. G. Fischer, Jahrb. d. wiss. Aust. Hamb.* 2, 1885 p. 81.

Hab. Mindoro, Baco, Mindanao, Placer.

Fam. AMBLICEFÁLIDOS.

1. Gén. AMBLYCEPHALUS, KUHL.

1. A. *boa*, Bie. N. v.

(M. S. T.)

Boie, Isis 1828 p. 1035; *Gthr. Rept. B. India* 1864 p. 325; *J. G. Fischer l. c.* p. 81.

Dipsas boa, Schleg., *Ess. t. II, f. 29, 30; Cant. Cat.* p. 78, pl. 40, f. 3.

Alopeltura boa, D. et Bibr. vii. p. 444.

Hab. Mindanao; Barneo, Java.

Fam. BÓIDOS.

1. Gén. PIESIGASTER, SEOANE.

1. P. *bocagii*, Seoane, N. v.

Seoane, Abhandl. Senckenbg. Nat. Gen. 12, 1880 p. 219, t. 1.
Hab. Panay, Mindanao, Pollock.

Fam. PITÓNIDOS.

1. Gen. PYTHON, Daudin

1. *Py. reticulatus*, Schneider, *SPN* N. v. Sana. M. S. F. |
Schneider, *Hist. Amph.* p. 264 (*Boa*); *Peters Mon. Ber. Berl. Akad.* 1861 p. 689; *Gthr. Rept. B. India* 1864 p. 339; V. Mertens, *Preuss. Exp. O. Asien Zool.* 1. 1875 p. 197; *Brehm. V. Au.* 5. p. 194.
Python schneideri, *Mesr. Tent. Syst. Amph.* p. 89.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calatán, Balacán, L. Dibuy.

Fam. ACROCÓRDIDOS.

1. Gen. CHERSIDRUS, Cuv.

1. *Ch. granulatus*, (Lichten.) *SPN* N. v. M. S. F. |
Hydrus granulatus, Schneider, *I. c.* p. 243; Peters, *Mon. Ber. Berlin. Akad.* 1861 p. 684, et *Preuss. Exp. P. Asien. Zool.* 1. p. 382, 1870; *Gthr. I. c. t.* p. 336; Steind. *Reise d. Nov. Rept. Wien.* 1869 p. 58.
Acrochordus fasciatus, Shaw; Aer. granulatus, Cantor; Ch. annulatus, Gray; Ch. fasciatus, Cuv.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Mindoro, Boac, Mindanao; Célebes, Timor, Sumatra.

Fam. ELÁPIDOS.

1. Gen. NAJA, Laur.

1. *N. tripudians*, Merv. N. v.
Merrem, *Tent.* p. 147; Peters, *Mon. Ber. Berlin. Akad.* 1861 p. 690 (*var. j.*); *Gthr. Rept. B. India* 1874 p. 334 et *Proc. Zool. Soc. London* 1879, p. 78; *id. Cat. Su. B. Mus.* p. 223, 1855; Wood, *Nat. Hist. J.* p. 141, fig.; J. G. Fischer, *Jahrb. wiss. Aust. Hamburg.* 2. p. 81, 1835; D. B. p. 1293.
Coluber naja, Lin. *Mus. Al. Fried.* i. t. 25, f. 1, et *J. Nat.* i. p. 382, *Lacep.* ii. pp. 102, 104; Laur. *Syn.* p. 91; Shaw, *Zool.* iii. p. 409; Russell, *Lat. Scrp.* i. t. 5, 6 ii. t. 1.
Naja atra, Cantor; kaonthia, Less; larvata, Cant; Brehm, *Gl. Aqu.* 5, p. 251, f. lutescens, Laur.
Hab. Leyte, Mindanao, Davao.

2. *N. sp.* N. v.

Hab. Mindanao

3. **N. var. samarensis**, *Pts.* ♂ N. v. (M. S. T.)

Peters, *I. cit.* p. 690.
Hab., Samar, Loquilocum, Leyte.

4. **N. sputatrix**, (*Réinw.*) Schleg. N. v.

Schleg., *Ess. Phys. Serp.* 2, 1837, p. 469 (*Tripudians, var. j.*);
Gthr. Rep. B. India 1864, p. 339; *F. Müll. III. Nachtr. Cat. Herp. Samml. Basel. Mus.* 1883, p. 18.
N. tripudians, var. nigra.
Hab., Mindanao.

2. Gén. OPHIOPHAGUS, GTHR.

5. **O. elaps**, (Schleg.), N. v.

Naja elaps, Schleg., *I. c.* p. 4, 76; *Gthr. I. c.* p. 341; *et Cat. Sn. B. M.* 1858, p. 319; *J. G. Fischer, Jahrb. d. wiss. Aust. Hamb.* 2, 1885; p. 81, (*Hamadryas*); *Brehm, V. Ani*, 5, p. 263, f. 99.
Hamadryas bungarus, Schleg., *Ess. ii.* p. 476.
O. ophiophagus, *Cant. Cat.* p. 116.
Naja bungarus, Schleg.
N. vittata, *Ell. Madr. Journ. Lit. et Sc.* xi. pl. 1.
Trimeresurus ophiophagus, *D. B.* p. 1245.
Hab., Mindanao; Borneo, Java, Sumatra.

6. **O. fasciatus**, (*Pts.*) ♂ N. v. (M. S. T.)

Hamadryas fasciatus, *Peters, Mon. Ber. Berl. Akad.* 1861, p. 689.
Oph. fasciatus, *Oscar Cat. Rept. Philipp.* 1886, p. 117.
Hab., Samar, Loquilocum.

3. Gén. HEMIBUNGARUS, PTRS.

7. **H. calligaster**, (*Wiegman*) ♂ N. v. Camamaló. (M. S. T.)

Elaps calligaster, *Wiegman, N. Ant.* 1835, t. 25, f. 2; *D. et B.* p. 1226; *Ptrs. Mon. Ber. Berlin Akad.* 1861, p. 689; *Jan. Icon. d. Ophid.* 43, 1873, l. 2, fig. 2; *F. Müll. III. Nachtr. Gthr. Cat. B. M.* 1858, p. 231; *Cat. Herp. Samml. Basel. Mus.* 1883, p. 11; *J. G. Fischer, Jahrb. de wiss. Aust. Hamb.* 2, 1885, p. 81.
E. collaris, (*Boie*) Schleg., *Ess. ii.* p. 448, *et Abbildg.* t. 40, fig. 10, 11.
Hab., Luzón, Bataan, Manila, Camarines Sur, Daraga, Mindanao, Paragua, Balabac.

8. **H. collaris**, (Schleg.) ♂ N. v.

(M. S. T.)

Elaps collaris, Schleg., *Ess. Phys. Serp.* 2, 1837, p. 448; *Jan.*

*Elego sist. de Ophi. Milano 1803, p. 114 et Icon. d. Ophid. 1803, 1873; l. 14, t.
Elaps gastrolelus, B. B.
Hemibungarus collaris, Oskard. Cat. Rept. Philip. 1880, p. 117.
Hab. Luzón, Manila.*

9. *H gemmianulus*, *Fn* , N. v.

*Peters, Mon. Ber. Berlin. Akad. 1872, p. 587; F. Müll. III.
Nachtr. Cat. Herp. Samml. Basel Mus. 1883, p. 18; Oskard.
Cat. Rept. Philip. p. 117, 1886.
Hab. Mindanao.*

4. Gén. CALLOPHIS, GRAY.

10. *C bilineatus*, *Prs.* ♂ N. v.

(M. S. T.)

*Peters, Sitz. Ber. Ges. Nat. Freunde Berlin, 1831, p. 109;
Oskar, Cat. B. M. 1880, p. 117.
Hab. Paragua, P. Princesa, Balabac.*

5. Gén. ADENOPHIS, *Prs.*

11. *A. philippinus*, (*Gthr*) N. v.

*Callophis intestinalis, var. *Gthr*. Proc. Zool. Soc. London 1859,
p. 82, lam. 16 fig. A. et Rept. B. Indic. 1864, p. 348; A.
B. Meyer, Sitz. Ber. Berlin. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, 39,
1886, p. 612.
Hab. Mindanao.*

6. Gén. ELAPS, SCHNEID.

12. *E intestinalis*, (*Seba*) ♂ N. v.

(M. S. T.)

*E. intestinalis, Seba, ii. pl. 19; *Gthr*. Cat. Sn. B. M. 1858
p. 230, var.
Aspis intestinalis, Lanz. Syn. Amph. p. 106.
Coluber intestinalis, Gm. S. N. p. 1085.
Elaps furcatus, Schneid. Hist. Amph. p. 303; Schleg. Ess. pl.
16 l. 12, 13 et Abbildg. t. 46, f. 1-8; Cant. Proc. Zool. Soc.
1839, p. 34 et Cat. p. 107; D. et B. p. 1228.
Vipra furcata, Daud. Rept. vi. p. 22.
Hab. Sumar, Paranas.*

13. *E gracilis* Gray, N. v.

(M. S. T.)

*Callophis gracilis, Gray, Ind. Zool. pl. 1, 1-2; Schleg. Ess. iii.
p. 451.
Elaps nigromaculatus, Cantor, Cat. pl. 40 t. 7.
Elaps gracilis, Gthr. Cat. B. M. 1868, p. 230.
Hab. Mindoro, Baco.*

Fam. HIDRÓFIOS.

1. Gen. PLATURUS, LAM.

1. Pl. laticaudatus, (Lin.) ♂ N. v.

(M. S. T.)

Pl. fasciatus, D. et B. p. 1321; Fischer, *Seeschlangen*, p. 28.
Hydeus laticaudatus, Schneid. *Hist. Amph.* p. 238; *Gthr. Cat.* 356 (*scutatus*); *Pts. Mon. Ber. Berlin. Akad.* 1861 p. 691 (*fasciatus*) 1872 p. 860 et 1877 p. 41; *Brehm. V. An.* 5. p. 207, f. 104.

Coluber laticaudatus, Lin.

Hydrophis colubrinus, Schleg.

Laticauda scutata, Lam.

Hab. Samar, Nipa-nipa, Luzón, Legaspi, Joló

2. Pl. var. colubrina, Schneid. N. v.

Hab. Samar, Jolo.

2. Gén. HYDROPHIS, DAED.

3. H. abbreviatus, Jan ♂ N. v.

(M. S. T.)

Jan. *Elenco sist. d. Ophiidi*, Milano 1803, p. 109, et *Icon. d. Ophid. 40*, 1870 l. 4, f. 2.

Hab. Luzón, Manila.

4. H. brevis, Jan. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Jan. *I. cit.* p. 109 et 40, lam. 5, t. 2.

Hab. Luzón, Manila.

5. H. nigrocinetus, D. B.

D. et Bibr. *Erp. gen.* t. 7, 1854 p. 1351.

Hab. Manila.

6. H. fasciatus Schneid. ♂ N. v. Calabucab.

(M. S. T.)

Hydrus fasciatus, Schneid. *Hist. Amph.* 1, 1799 p. 240; *Pts. Mon. Ber. Berlin Akad.* 1872, p. 849, lam. 1 f. 1.

Hydrophis gracilis, Schleg.

Hy. chloris, Fayr.

Hab. Luzón, B. de Manila.

7. H. loreata, (Gray) ♂ N. v. Dalig-asan.

(M. S. T.)

Lapemis loreata, Gray, *An. Mag. N. Hist.* 1843, ii. p. 46; *Gthr. Rep. B. India*, 1864, p. 386; Steind. *Rese d. Nov. Rept. Wien.* 1869, p. 85 (annulata); *J. G. Fischer, Jahrb. d. wiss. Aust. Hamburg.* 2, p. 81, 1882.

Hydrophis pelamoides, var. *annulata*, *Fud.*

Lapemis hardwicki var. *Grav.*

Hab. Luzon, Manila, Mindanao, Joló; Borneo, Célebes.

8. **H. semperi**, *Görm.* & N. v.

(M. S. T.)

Garman, *Bull. Mus. Comp. Zool.* 8, p. 85, 1885.

Hab. Luzon, Taal, Batangas.

9. **H. spiralis**, (*Shaw.*) ♀ N. v.

(M. S. T.)

Hydrus spiralis, *Shaw*, *Zool.* 3, p. 564, lam. 125; *Gthr. L. c.* p. 366 lam. 25 f. D. *Jan. Icon. d. Ophid.* 41, 1872, l. 2 f. 2 (nigromictus).

Hydrophis melanurus, *Wagl.*

H. spiralis, *Oskar. Cat. Rept. Philipp.* p. 119 (1886).

Hab. Luzon, Manila.

10. **H. westermanni**, *Jan.* ♂ N. v.

(M. S. T.)

Jan. Icon. d. Ophid. 39 1872, l. 5 f. 1. *Oskar. Cat. Rept. Philipp.* 1886, p. 119.

Hab. Luzon, Bahía de Manila.

3. Gen. PELAMIS, DAUD.

11. **P. bicolor**, (*Schneid.*) ♂ ♀ N. v.

(M. S. T.)

Hydrus bicolor, *Schneid. Hist. Amph.* p. 242; *Gthr. Rept. B. India*, 1864, p. 382; *Phr. Preuss. Exped. O. Asien Zool.* 1, 1870 p. 382.

Hy. pelamis, *Schleg.*

H. variegata, *Schleg.*

P. bicolor, *Dumet Bibr.* ix, p. 1335; *Brehm. V. An.* 5, p. 268, f. 103.

Pelamis ornata, *Gray.*

Hab. Luzon, B. de Manila; Borneo, Célebes.

Fam. CROTAILDOS.

1. Gen. TRIMERESURUS, GÜRK.

1. **Tr. erythrurus**, (*Cantor*) T. N. v. Opong

(M. S. T.)

Trigonocephalus erythrurus, *Cant. Proc. Zool. Soc. London*, 1830, p. 31.

Tr. viridis, *Schleg. Ptrs. Mon. Ber. Berlin Akad.* 1861, p. 160; *Gthr. Rept. B. India* 1864, p. 386; *J. G. Fischer, Jahrb. d. wiss. Aust. Hamb.* 2, 1885 p. 87.

Trimeresurus albolabris, *Gray.*

Tr. erythrurus, *Oskar. Cat. Rept. Philipp.* 1886, p. 19.

Bóthrops erythrurus, *Brehm. V. An.* 5, p. 315, l. 116.

Hab. Luzon, Manila, Paracel, Mindanao; China, Java.

*

2 **T. flavomaculatus.** (Gray.)

Megæra flavomaculata, Gray, Zool. Aus. 1842, p. 49.
Parias flavomaculata, Gray, Cat. Vip. Sn. Br. Aus. 1849, p. 103;
Gthr. Proc. Zool. Soc. London, 1879, p. 79.
Tr. gramineus, F. Müll. III. Nachtr. Cat. Herp. Samml. Basel.
Mus. 1883, p. 19.
Megæra ornata et variegata, Gray.
Parias ornata et variegata, Gray.
Hab. Mindanao, Placer, Luzon, Albay.

3. **T. hombronii.** (Günsh) N. v. Alimurain

M. S. T.

Tropidolæmus hombronii, Guichenot, Voy. Pôle Sud et Oceania, Part. Zool. 1848, p. 231, 2 f. 2. D. et B. Exp. gen. 7, 1854 p. 1527; Ptrs. Mon. Ber. Berlin, Akad. 1867, p. 29
Hab. Mindanao, Zamboanga, Joló.

4 **T. philippensis.** (Gray.) ♀ N. v.

M. S. T.

Gray, Zool. Msc. 1842, p. 48 et. Cat. Vip. Sn. B. Mus. p. 10.
Tropidolæmus philippensis, Ptrs. Mon. Ber. B. Akad. 1861, p. 691.
Hab. Samar, Calbigan.

5 **T. sp.** ♂ N. v.

M. S. T.

Hab. Luzon, Cavite, Alfonso.

6 **Tr. schadembergi.** Fisch.

J. G. Fischer, Jahrb. d. wiss. Aust. Hamb. 2. 1884 p. 81 et 116.

Hab. Mindanao,

7 **Tr. wagleri.** Schleg. ♂ N. v. Dupong, Dipong.

(M. S. M.)

Trigocephalus wagleri, Schleg. Ess. Phys. Serp. 2. p. 542, l. 19 f. 16-18.

Trimeresurus maculatus, Gray, Zool. Mis. p. 48 et Viper. Sh. p. 8.

Tropidolæmus scheli, Bleeker.

Tropidolæmus subannulatus et maculatus, Ptrs. Mon. Berlin Akad. 1861, p. 691; Gthr. Rept. B. India 1864, p. 388 et Proc. Zool. Soc. London 1879, p. 78; F. Müll. III. Nachtr. Cat. Herp. Samml. Basel. Mus. 1883, p. 19; J. F. Fischer, t. c. p. 81; var. Gray, Vip. Sn. p. 9; Moell. et Dillw. N. II. Labuan, p. 44; var.

Trigocephalus sumatranaus, Cant. Mal. R. pt. p. 121.

Trimeresurus formosus, Gray, sumatranaus, Gray, Vip. Sn. p. 10.
Hab. Luzon, Albay, Daraga, Mindanao, Butuan; Borneo, Java.

S. Tr. hypnale (♂ et ♀ N. v. Ahmeen) al. sp. M. S. T.

Trigonocephalus hypnale, Dum. et Bibr. ix. p. 1498; Gthr. Cat., B. M. 1858, p. 267.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Angat.

♀ T. viridis, ♂ et ♀ N. v. (M. S. T.)

Bethrops viridis, Dum. et Bibr. ix. p. 1513.
Trimeresurus viridis, Gthr. Cat. B. M. 1858, p. 266.
Hab. Luzón, Ilocos; China, Hong-kong.

Clase 4.^a: ANFIBIOS (BATRACIOS).

Orden 1.^a: ANUROS.

Subord. FAVEROGLOSOS.

Fam. RÁNIDOS.

1. Gen. OXYGLOSSUS, Tschudi.

1. O. lævis, Gthr. ♂ N. v. Palacá. M. S. T.

Oxyglossus lævis, Gunth. Cat. p. 7 pl. i. f. A.
Phrynoblennius lævis, Peters, Mon. Berl. Ac. 1857, p. 29.
Oxyglossus lævis, Stol'čka, Proc. A. S. 1870, p. 273, et
1872 p. 101; Boul. Cat. Batr. Sal. B. Mus. p. 6 1882.
Microdiscopus sumatranaus, Peters, Mon. Perl. Ac. 1877, pp.
422, 682.
Hab. Luzón, Laguna de Bay, Bulacan, Sibul, Tayabas, Do-
lores, Samar; Sumatra.

2. O. lima, Gthr. ♂ N. v. Palacá. (M. S. T.)

Oxyglossus lima, Gunth. Cat. p. 6.
O. lima, Tschudi, Batr. p. 85; Dum. & Bibr. p. 334, pl. 86 f.
4, Gunth. Rept. Brit. Ind. p. 401; Stol'čka, As. Soc. 1070,
p. 272, and 1872, p. 101; Boul. Cat. Batr. Sal. B. Mus. 1882,
p. 5.
Hab. Luzón, Abra, Cagayan; Java.

2. Gen. RANA, Lin

3. R. mindanensis, (Gir.) N. v.

Hylarana mindanensis, Girard. V. S. Expl. Expl. Herp. p. 42;
Boul. Cat. B. Sal. of Br. Mus. p. 6, 1882.
Hab. Mindanao, Caldera.

4 R. corrugata *Phs. ♂♂ N. v.*

(M. S. T.)

- Rana kuhlii, var. *B.* *Günth.* *Cat.* p. 8.
R. corrugata, *Peters.* *Mou. Berl. Ac.* 1862, p. 412; *Boul. Cat. R. Sal. Mus.* p. 19 (1882).
R. kuhlii, *Günth.* *Rept. Brit. Ind.* p. 404 pl. 26, f. B.
Hab. Mindoro, Naujan, Ilocos; Ceilan, China.

5 R. kuhlii, *Günth. ♂♂ N. v.*

(M. S. T.)

- Rana kuhlii, var. *A. et C.* *Günth.* *Cat.* p. 8.
R. kuhlii, (*Schleg.*) *Dum. & Bibr.* p. 384; *Anders. Anat. Zool. Res.* *Yunnan*, p. 838; *Boul. Cat. B.* of *B. Mus.* p. 20, 1882.
R. kuhlii, *fasc.*, *Günth.* *Rept. Brit. Ind.* p. 404 pl. 26, f. A.
R. conspicillata, *Günth.* *Proc. Zool. Soc.* 1872, p. 595 pl. 40, t. A; *id. Zool. Record.* ix, p. 97.
Hab. Paragua, Sunar, Bronggan; Borneo, Célebes.

6 R. macrodon, *Gthr. ♂♂ N. v.* *Palacá*

(M. S. T.)

- Rana macrodon, *Günth.* *Cat.* p. 8; *Boul. Cat. B. Mus.* p. 24, lam. i, f. 4.
R. macrodon, (*Kuhl.*) *Tschudi Batr.* p. 86; *Dum. & Bibr.* p. 382; *Peters.* *Mou. Berl. Ac.* 1871, p. 652; *Blans. Proc. Zool. Soc.* 1871, p. 225 pl. xxi, f. 4.
R. fusca, *Blyth. Journ. As. Soc.* xxxiv, p. 719; *Anders. Proc. Pool. Soc.* 1871, p. 197; *Stoliczka Journ. As. Soc.* 1873, p. 115; *Anders. Anat. Zool. Res.* *Yunnan*, p. 837.
Ixalus aurifasciatus, *Peters.* *Mou. Berl. Ac.* 1863, p. 455.
Hab. Luzón, Manila, Laguna de Bay, Dimagat, Negros, Mindanao, Zamboanga; Java, Singapore.

7. R. tigrina, *Gthr. ♂♂ N. v.*

(M. S. T.)

- Rana tigrina, *Günth.* *Cat.* p. 9.
R. tigrina, *Daud. Rani.* p. 64 pl. 10, et *Rept.* vii, p. 125; *Merr. Tent.* p. 174; *Cuv. R. A.* *Dum. & Bibr.* p. 375; *Keelaart.* *Prodri. Faun. Zeyl.* p. 192; *Peters.* *Mou. Berl. Ac.* 1863, p. 77; *Günth.* *Rept. Brit. Ind.* p. 407; *Steindachn. Novara.* *Anat. Zool. Res.* *Yunnan*, p. 837; *Boul. Cat. Batr. Sel. of B. Mus.* p. 26 (1882).
R. cancrivora, (*Boie*) *Gravenh. Delic.* p. 41; *Tschudi. Batr.* p. 79.
R. brauni, *Lesson in Belang. Voy. Ind. Or.*, *Rept.* p. 329 pl. 6.
R. vittigera, *Wiegm. Nova. Acta Ac. Leop.* 1835, p. 329, t. 21, f. 1.
R. regulosa, *Wiegm. I. c.* p. 258, pl. 21, f. 2.
R. crassa, *Jerdon. Journ. As. Soc.* 1853, p. 581; *Theobald. Cat. Rept. As. Soc. Mus.* p. 79; *Anders. Proc. Zool. Soc.* 1871, p. 199.
Hydrostentor pantherinus, *Fitzing. Sitz. Ac. Wien.* xlvi, p. 414.
Pyxicephalus fodiens, *Peters.* *Mou. Berl. Ac.* 1860, pl. 186.
Hoplobatrachus ceylanicus, *Peters.* *Mou. Berl. Ac.* 1863, p. 449; *Günth.* *Rept. Brit. Ind.* p. 410.

Rana latrans; *David*, *Nouv. Arch. Mus.*, v. 1872, *Batr.*, p. 56.
Hab., Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Tayabas, Dolores,
Samar, Basilan, Mindanao, Surigao, China, Borneo.

8. **R. gracilis**, *Wieg.* ♂ N. v.

(M. S. T.)

Rana vittigera, *Günth. Cat.*, p. 9.

R. gracilis, *Wieg.*, *Nouv. Acta Ac. Lopb.*, 1855, p. 257; *Peters*, *Mon. Berl. Ac.*, 1853, p. 78; *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 409; *Steindachn. Novara*, *Angsh.*, p. 18; *Stoliczka. Journ. As. Soc.*, 1870, p. 142; *Auders. Proc. Zool. Soc.*, 1871, p. 200; *Günth. Proc. Zool. Soc.*, 1875, p. 567; *Auders. Anat. Zool. Res. Yunnan.* p. 840; *Boul. Cat. Batr. Syst. of B. Mus.* p. 28 (1882).
R. nilagirica, agricola, *Jerdon. Journ. As. Soc.*, 1854, p. 531.
R. brevipalmata, *Peters. Mon. Berl. Ac.*, 1871, p. 640.
R. lymphocaris, (*Boie*) *Stoliczka. Proc. As. Soc.* 1872, p. 10 et *Journ. As. Soc.*, 1873, p. 116.
Hab., Samar, Villareal; China, Formosa.

9. **R. guentheri**, *Boul.* N. v.

(M. S. T.)

Boul. Cat. Batr. Syst. of B. Mus., 1882 p. 48, pl. ix, t. 2.
Hab., Paragua, P. Princesa, Miniloc, Naian; China.

10. **R. macrodactyla**, *Gthr.* ♂ N. v.

(M. S. T.)

Hylarana macrodactyla, *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 424; *Stoliczka. Proc. As. Soc.*, 1872, p. 104; *Boul. Cat. B. Mus.*, 1882 p. 54.
Hab., Luzón, Laguna, Cagayan, Dinagat, Negros, Zamboanga, Mindanao.

11. **R. erythræa**, *Gthr.* ♂ N. v.

(M. S. T.)

Hylarana erythræa, *Günth. Cat.* p. 73.

Hyla erythræa, *Schleg. Abbild.* pl. 9 f. 3.

Hylarana erythræa, *Tschudi. Batr.* p. 78; *Günth. Rept. Brit. Ind.* p. 425; *Stoliczka. Proc. As. Soc.*, 1872, p. 104; *Auders. Anat. Zool. Res. Yunnan.* p. 840; *Boul. Cat. B. Mus.*, 1882 p. 65.

Limnoctyes erytraeus, *Dum. & Bibr.* p. 511, pl. 88, f. 1; *Cantor. Mal. Rept.* p. 141.

Hylorana subcœrulea, *Cope. Proc. Ac. Philad.* 1868, p. 139.
Hab., Mindanao, Samar; Borneo, Sumatra.

12. **R. chalconata**, *Gthr.* ♂ N. v.

(M. S. T.)

Hylarana chalconata, *Günth. Cat.* p. 73.

Hyla chalconata, *Schleg. Abbild.* pl. 9, f. 1.; *Boul. Cat. B. Mus.* p. 66. (1882).

Polypedades chalconotus, *Tschudi. Batr.* p. 76.

Limnodutes chalconotus, *Dum. & Bibr.* p. 513.

Hab., Paragua, Inaguan, Bulacan; Borneo, Java.

13. **R. jerboa**, *Gthr.* ♂ N. v. (M. S. T.)
Hylorana jerboa, *Gthr. Proc. Zool. Soc.* 1872, p. 599 pl. 4;
Boul. Cat. B. Ann. 1882 p. 67.
Hab. Samar, Loquilocum; Borneo.
14. **R. luctuosa**, (*Prs.*) N. v.
Limnoctyes luctuosus, *Peters. Mon. Berl. Ac.* 1871, p. 579,
et Ann. Mus. C.v. Génov. 1872, p. 43 pl. 9, f. 1.
Hab. Mindanao, Butuan.
15. **R. natatrix**, *Gthr.* ♂♂ N. v. (M. S. T.)
Ixalus natator, *Günth. Cat.* p. 75 pl. iv, f. C.
I. guttatus, *Günth.* I. c. p. 76 pl. iv, f. D.
Staurois natator, *Cope. Nat. Hist. Rev.* 1865 p. 117.
I. guttatus, *Cope. I. c.*
Rana natatrix, *Boul. Cat. B. M.* 1882 p. 71.
Polypedates, guttatus, *Günth. Proc. Zool. Soc.* 1873, p. 610.
Hab. Dimagat; Borneo.
16. **R. similis**, *Gthr.* ♂♂ N. v. (M. S. T.)
Polypedates similis, *Gthr. Proc. Zool. Soc.* 1873 p. 171.
Rana similis, *Boul. Cat. B. M.* 1882 p. 72.
Hab. Luzón, Manila, Laguna de Bay, Los Baños; Borneo.
17. **R. sp** N. v.
Hab. Luzón, Bulacán, S. Miguel de Mayumo.
18. **R. everetti**, *Boul.* ♂♂ N. v. Palacang-saguing (M. S. T.)
Rana everetti, *Boul. Cat. B. M.* 1882 p. 72, lam. 6.
Hab. Mindanao, Zamboanga, Cagayan de Misamis.
19. **R. glandulosa** *Boul.* ♀ N. v. (M. S. T.)
Rana glandulosa, *Boul. Cat. B. Mus.* 1882 p. 73 lam. 7.
Hab. Parag a, P. Princesa; Borneo.
- 3 Gén RHACOPHORUS KUHL
20. **R. hecticus** *Prs.* ♂♂ N. v. (M. S. T.)
Polypedates hecticus, *Peters. Mon. Berl. Ac.* 1863, p. 457; *Boul. Cat. B. M.* 1882 p. 78.
Hab. Samar, Loquilocum.

21. *R. surdus*, ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Polypedates surdus, Peters, Mon. Berl. Ac. 1863, p. 459; Boul. Cat. B. Mus. 1882, p. 79.
Hab. Luzon, Manila, Mindanao.

22. *R. maculatus*, Gthr. ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Polypedates maculatus, Günth. Cat. p. 78.

Hyla maculata, Gray, Ind. Zool.

H. leucomystax, Gravenh. Delic. p. 26.

Polypedates leuconystix, Tschudi, Batr. p. 75; Dum. & Bibr. p. 519; Kelaart, Prodr. Faun. Zeyl. p. 193.

Birgeria maculata, Teckaudi, l. c.

Polyedates rugosus, Dum. & Bibr. p. 520.

P. cruciger, Blyth, in Kelaart, Prodr. Afp. p. 48.

P. megacephalus, Hollow, Proc. Ac. Philad. 1860, p. 48.

P. maculatus, Günth. Rept. Brit. Ind. p. 428; Blanford, Journ. As. Soc. 1870 p. 376; Anders. Proc. Zool. Soc. 1871, p. 307; Stoliczka, Proc. As. Soc. 1872, p. 106; Boul. Cat. B. M. 1882, p. 83.

P. biscutiger, Peters, Mon. Berl. Ac. 1871, p. 649.
Hab. Luzon, Manila, Batangas, Ticao; Borneo, China.

23. *R. var quadrilineata*, Wieg. N. v.

Polypedates quadrilineatus, Günth. Cat. p. 79.

Hyla quadrilineata, Wieg. Acta Ac. Caes. Leop-Carol. 1835, p. 260. t. 22 f. 1; Boul. Cat. B. M. 1882, p. 84.

Limnodytes celebensis, Fitzing. Sitzb. Ac. Wien. xlii. p. 413.

Polypedates quadrilineatus, Günth. Rept. Brit. Ind. p. 429; Steindachn. Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1864, p. 253 pl. 10 f. 2; Anders. Proc. Zool. Soc. 1871, p. 207.

Hab. Luzon, Manila; Formosa, Java.

24. *R. appendiculatus*, Gthr. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Polypedates appendiculatus, Gthr. Cat. p. 79; Boul. Cat. B. M. 1882, p. 86, lam. 8 fig. 4.

Hab. Dinagat, Mindanao, Samar, Villareal.

25. *R. pardalis*, Gthr. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Rhacophorus pardalis, Günth. Cat. p. 83.

R. reinwardtii, Eyd. & Soul. Voy. Bonite, pl. 10, f. 1; Boul. Cat. B. M. 1882, p. 91.

Hab. Dinagat, Mindanao; Borneo.

4. Gén. IXALUS, D. ET B.

26. *I. acutirostris*, Peters, ♂♂ N. v. Palaca.

(M. S. T.)

Ixalus acutirostris, Peters, Mon. Berl. Ac. 1867, p. 32; Boul. Cat. B. M. 1882, p. 99.

Hab. Paragua, P. Princesa, Mindanao.

27. **I pictus**, Peters. T N. v.

Ixalus pictus, Peters. *Mon. Berl. Ac.* 1871, p. 580; *et Ann. Mus. Civ. Gen.* iii. 1872, p. 44, pl. 6 f. 3; *Boul. Cat. B. M.* 1882, p. 99.

Hab. Paragua; Borneo.

28. **I ? bimaculatus**, Ptrs. ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Leptomantis bimaculatus, Peters. *Mon. Berl. Ac.* 1867, p. 32.
I. bimaculatus, *Boul. Cat. B. M.* 1882, p. 106.

Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Cuyo, Mindanao.

5 Gén CORNUFER, TSCHUDI.

29. **C. guentheri**, (Boul.) N. v. Palaca.

(M. S. T.)

Boul. Cat. B. M. 1882, p. 108 lam. 11 f. 3.

Hab. Dinagat, Mindanao.

30. **C. meyeri**, Gthr. ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Platymantis meyeri, Günth. *Proc. Zool. Soc.* 1873, p. 171; *Boul. Cat. B. M.* 1882, p. 108 lam. 11 fig. 4.

Hab. Luzon, Manila, Laguna de Bay.

31. **C. jagorii**, Ptrs. ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Halophila jagorii, Peters. *Mon. Berl. Ac.* 1863, p. 456; *Boul. Cat. B. M.* 1882, p. 109.

Hab. Luzon, Manila, Samar, Paranas, Mindanao.

32. **C corrugatus**, Dum. ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Platymantis plicifera, Günth. *Cat.* p. 95 pl. viii. f. 13.

Hylodes corrugatus, A. Dum. *Ann. Sc. Nat.* (3) xix. p. 176.

Platymantis corrugata, Peters. *Mon. Berl. Ac.* 1873, p. 611;
Peters. & Doria, *Ann. Mus. Civ. Gen.* xiii. p. 420; *Boul. Cat. B. M.* 1882, p. 110.

Pl. placifera, Günth. *Proc. Zool. Soc.* 1817, p. 132.

Hab. Luzon, Laguna, Negros; N.^o Guinea.

Fam. ENGISTOMATIDOS.

1 Gen. MYCROHYLA, TSCHUDI.

1. **M. achatina**, Gthr.

Microhyla achatina, Günth. *Cat.* p. 121; *Boul. Cat. B. M.* 1882,
p. 166.

Hylaplesia achatina, Boie, *Isis*, 1827, p. 294.

Microhyla achatina, *Tschudi*, *Batr.* p. 71; *Dum.* & *Bibr.* p. 614;
Peters. & *Doria Ann. Mus. Genov.* xiii. p. 428.
Diplopelma disciferum, *Peters. Mon. Berl. Ac.* 1867, p. 36.
Hab. Mindanao; Java, Molucas.

2. Gén CALLULA, GR.

2. **C. picta**, *Gthr. σφ N. v.* (M. S. T.)

Kaloula picta, part., *Günth. Cat.* p. 123.
Plectropus pictus, (*Bibr.*) *Eyd & Soul. Voy. Bonite Rept.* pl. 9
f. 2; *Dum.* & *Bibr.* p. 737; *Peters. Mon. Berl. Ac.* 1863,
p. 455.
Callula picta, *Günth. Rep. Brit. Ind.* p. 436; *Boul. Cat.* 1882,
p. 168.
Hab. Luzon, Manila, Laguna de Bay, Negros, Cebú.

3. **C. conjuncta**, *Ptrs. σφ N. v.* (M. S. T.)

Hylædactylus (Holonectes) conjunctus, *Peters. Mon. Berl. Ac.* 1863,
p. 455; *Steindachn. Verh. zool-bot. Ges. Wien*, 1864, p. 256,
pl. 11 f. 5.
Callula conjuncta, *Cope, Journ. Ac. Philad.* (2) vi. 1867, p. 192;
Boul. Cat. B. M. 1882, p. 168.
Hab. Luzon, Manila, Mindanao.

4. **C. baleata**, *Müll. σφ N. v.* (M. S. T.)

Kaloula baleata, *Günth. Cat.* p. 122; *Boul. Cat.* 1882, p. 169.
Bombinator baleatus, *Müll. Verhandel. Batav. Genootsch.* 1836,
p. 96.
Hylædactylus baleatus, *Tschudi. Batr.* p. 85; *Dum.* & *Bibr.*
p. 734.
Kaloula baleata, *Steindachn. Novara. Amph.* p. 68.
Hab. Luzon, Laguna de Bay; Célebes, Java.

Fam. BUFÓNIDOS.

1. Gén NECTOPHYNE, BUCH.

1. **N. guentheri** (*Boul.*)

Bufo leptopus, *Günth. Proc. Zool. Soc.* 1872, p. 598; *Boul. Cat.*
B. M. 1882, p. 280.
Hab. Mindanao; Borneo.

2. **N. ? sundana**, *Ptrs. N. v.*

Calohyla sundana, *Peters. Mon. Berl. Ac.* 1867, p. 35; *Boul. Cat.*
B. M. 1882, p. 281.
Hab. Mindanao; Borneo.

*

2. Gén BUFO, LAUR.

3. **B. brevipes**, *Peters*, ♂♂ N. v. Cacapuy

Hylaplesia brevipes, *Peters*, *Mon. Berl. Ac.* 1867, p. 34 *Brevipes*.
Cat. B. M. 1882, p. 287.
Hab. Mindanao, Zamboanga.

4. **B. melanostictus**, *Gthr.* ♂♂ N. v. Palacang bató (M. S. T.)

Bufo melanostictus, *Günth. Cat.* p. 61; *Boul. Cat. B. M.* 1882,
p. 306.

B. isos, *Günth. l. c.* p. 62.
B. melanostictus, *Schneid. Hist. Amph.* p. 216; *Gravenh. Detec.*
p. 57; *Cantor. Cat. Mal. Rept.* p. 142; *Girard. V. S. Expl. Exped.*, *Herp.* p. 92, pl. 5 f. 10-14; *Günth. Rept. Brit. Ind.*
p. 422; *Steindachn. Novara. Amph.* p. 42; *Stoliczka. Proc. As. Soc. 1870*, p. 155.
B. scaber, *Daud. Rain.* p. 94 pl. 34 f. 1 et *Rept.* viii. p.
194; *Tschudi. Batr.* p. 98; *Dum. & Bibr.* p. 690; *Schlech.*
Abbild. p. 64, pl. 20, f. 2.
B. bengalensis, *Daud. Rain.* p. 96, pl. 35 f. 1. et *Rept.* viii.
p. 197; *Lesson*, in *Belang. Voy. Ind. Or. Rept.* p. 334.
B. isos, *Lesson. l. c.* p. 333, pl. 7; *Dum. & Bibr.* p. 702.
B. dubia, (*Shaw.*) *Gray. Ind. Zool.*
B. carinatus, *Gray. l. c.*
B. gymnauchen, *Bleeker. Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* 1858, xvi,
p. 46.
Phrynoïdís melanostictus, *Cope. Proc. Ac. Philad.* 1863, p. 357.
Bufo spinipes, (*Fitzing*), *Steindachn. l. c.* p. 43, pl. 5, f. 6.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Borneo, Java, China.

5. **B. biporcatus**, ♂♂ *Gthr.* Palacang bató. (M. S. T.)

Bufo biporcatus, *Günth. Cat.* p. 62.
B. biporcatus, (*Schlech.*) *Tschudi. Batr.* p. 88; *Gravenh. Detec.*
p. 53; *Dum. & Bibr.* p. 714; *Boul. Cat. B. M.* 1889, p. 311.
Chilophryne biporcata, *Cope. Proc. Ac. Philad.* 1862, p. 357.
Hab. Luzón, Manila, Batangas, S. Pablo.

6. **B. panayensis**, *Seean.*

Hab. Luzón, Manila, Batangas, S. Pablo.

Fam. HÍLIIDOS.

1. Gén HYLA, LAUR.

1. **H. chinensis**, *Gthr.* ♂♂ Palacang-saguin. (M. S. T.)

Hyla arborea, var. *chinensis*, *Günth. Cat.* p. 108, pl. ix, f. C.

H. chinensis, *Günth.* *Rept. Brit. Ind.* p. 430; *Camerano*, *Atti. Acc. Torin.* xiv, 1879 p. 894; *Boul. Cat. B. M.* 1882, p. 381.
H. arborea, var. *chinensis*, *Steindachn.* *Novara*, *Amph.* p. 59.
Hab. Luzón, Basilan; China, Formosa.

Fam. HILEDACTÍLIDOS.

I. Gén. HYLEDACTYLUS, TSCHUDI.

1. *H. pictus*, Bibr. ♂ N. v. Palacá.

(M. S. T.)

Kalooula, *Gray*.

H. pictus, Bibr.; *Voy. Bonite*, *Rept. lam.* 9.
Hab. Luzón, Bulacan.

Fam. PELOBÁTIDOS.

I. Gén. MEGALOPHRYS, KUHL.

1. *M. montana*, Gthr. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Megalophrys montana, *Günth.* *Cat.* p. 36.

M. montana, (Kuhl), *Wagl. Syst. Amph.* p. 204; *Tschudi*, *Batr.* p. 82; *Dum. & Bibr.* p. 458; *Cantor*, *Cat. Mal. Rept.* p. 14; *Günth.* *Rept. Brit. Ind.* p. 413, *et Ann. & Mtg. N. H.* (4) xi, p. 419; *Boul. Cat. B. M.* 1882, p. 442.

Ceratophrys montana, Schleg., *Abbild.* t. x. l. 3.
Hab. Dinagat, Negros, Mindanao.

Ord. URODELOS.

Fam. SALAMÁNDRIDOS.

I. Gén. MOLGE, MERV.

1. *M. sinensis*, Eoul. ♂ N. v.

(M. S. T.)

Cinops chinensis, *Gray*, *Proc. Zool. Soc.* 1859, p. 229 pl. 19.
f. 1; *Gthr.* *Rept. Brit. Ind.* p. 439.

Triton chinensis, *Strauch*, *Salam.* p. 51; *Boul. Cat. B. M.* 1882,
p. 20.
Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona; China.



Orden ÁPODOS.

Fam. CECÍLIDOS.

1. Gén. ICHTHYOPHIS, FITZ.

1. **Ieh. monochrous**, *Ptrs.* ♂ N. v. (M. S. T.)

- I. *glutinosus*, var. *Cant. Cat. Mal. Rept.* p. 137.
Epicrium monochroum, *Blkr. Nat. Tydschr. Ned. Ind.* xvi. 1858,
p. 188; *Gthr. Rept. Brit. Ind.* p. 443.
I. *monochrous*, *Peters, Mon. Berl. Ac.* 1879, p. 932; *Boul. Cat. B. M.* 1882, p. 91.
Hab. Paragua, P. Princesa, Samar, Calbayoc; Borneo, Java.

Clase 5.^a PESES.

Subclase 1.^a TELEOSTEOS.

Orden: ACANTOPTERIGIOS.

Fam. BERÍCIDOS.

1. Gén. MONOCENTRIS, SCHNEID.

1. **M. japonicus**, *Houtt.* N. v. (M. S. T.)

- Gasterosteus japonicus*, *Houttuyn, Act. Soc. Harl.* xx. pt. 2 p. 329.
Sciaena cataphracta, *Thunberg, Nov. Act Scient. Suec.* xi. p. 102 lam. 3.
Monocentris carinata, *Bl. Schn.* p. 100, lam. 24.
Lepisacanthus japonicus, *Lacép* iii. p. 321.
Monocentris japonicus, *Cuv. & Val. id.* p. 461 lam. 97; *Faun. Japon*, p. 50 lam. 22 f. 1; *Gthr. Cat. B. M.* i. 1859, p. 9.
Hab. Luzón, Manila, Bataan; China, Japon.

2. Gén. MYRIPRISTRIS, CUV

2. **M. pralinus**, *Cuv.* N. v. (M. S. T.)

- Myripristis pralinus*, *Cuv. & Val.* iii. p. 170 et vii. p. 486;
Gthr. Cat. B. M. i. 1859, p. 20.
M. seychellensis, *Cuv. & Val.* iii. p. 172.
Hab. Luzón, Samar, Paragua; Célebes, Océano Índico y Pacífico.

3. **M. murdjan**, *Forsk.* N. v.

(M. S. T.)

Sciæna murdjan, *Forskål*, p. 48.

Perea murdjan, *Schneider*, p. 86; *Lacép* iv. pp. 396, 418 *Russell*, t. 105.

Myripristis murdjan, *Cuv. & Val.* iii. p. 177, vii. p. 495; *Rüppell*, *All.* p. 36, t. 23 f. 2, et *Fische des Rothen Meers*, p. 15; *Bleeker Amboina*, iii. p. 19; *Gthr. Cat. B. M.* t. 1859, p. 21.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Batangas, Nasugbú; Amboina.

4. **M. japonicus**, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

Myripristis japonicus, *Cuv. & Val.* iii. p. 173 lam. 58; *Faun. Japon*, p. 23 lam. 9; *Richardson Schth. China*, p. 222; *Gthr. Cat. B. M.* t. 1859, p. 25.

? *M. pralinus*, *Richardson*, l. c. p. 223.

Hab. Luzón, Currimao, Ilocos; China, Japon.

3. Gén. HOLOCENTRUM, AKTEDI.

5. **H. rubrum**, (*Forsk.*) N. v.

(M. S. T.)

Seba, iii. 27. 1

Sciæna rubra, *Forsk.* p. 48 (no. Bl. Schæ.)

Renard, *Poiss.* t. 29. f. 159; *Valentyn*, *Ind.* iii. p. 390. f. 137.

Perca rubra, *Bl. Schn.* p. 90.

P. praslin, *Lacép.* iv. p. 418.

Holocentrum alborubrum, *Lacép.* iv. p. 372; *Richardson*, *Ichth. China*, p. 223.

H. orientale, *Cuv. & Val.* iii. p. 497; *Bleeker*, *Perc.* p. 53.

Holocentrus ruber, *Rüpp. All.* p. 83. t. 22 f. 1, et *N. W. Fische*, p. 96.

H. rubrum, *Gthr. Cat. B. Mus.* t. 1859, p. 35.

Holocentrum marginatum, *Cuv. & Val.* iii. p. 216.

? *H. spinosissimum*, *Richardson*, l. c. p. 223 (no *Fauna Japon.*)

Hab. Luzón, Manila, Pangasinan, Samar, Paragua, Cebú; Amboina, China.

6. **H. punctatissimum**, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

Holocentrum punctatissimum, *Cuv. & Val.* iii. p. 213; *Less. & Garn. Voy. Cog. Zool.* ii. p. 219; *Bleeker*, *Sumatra*, ii. p. 6; *Gthr. Cat. B. M.* t. 1859, p. 38.

? *H. lacteoguttatum*, *Cuv. & Val.* iii. p. 214.

Hab. Cebú, Carolinas, Marianas; Sumatra

7. **H. stereus-muscarum**, *C. V.* N. v.

Cuv. & Val. vii. p. 503; *Gthr. Cat. B. M.* t. 1859, p. 39.

Hab. Carolinas, Guam, Marianas

8. **H. spiniferum**, *C. U.* N. v.

(M. S. T.)

- Sciæna spinifera*, *Forsk.* p. 49.
Perca spinifera, *Bl. Schn.* p. 86; *Lacep.* iv. p. 418.
Holocentrum leo, *Cuv. & Val.* iii. p. 204; *Less. Voy. Coq.* ii. p. 222; *Cuv. Regne Anim.* III. lam. 14. f. 1; *Bleeker*, *Kokos Islands*, p. 355; *Voy. Astrol. Poiss.* p. 678. lam. 14. f. 3; *Gthr. Cat. B. M. 1. 1859*, p. 39.
Holocentrus spinifer, *Rüpp. N. W. Fische*, pp. 96, 97. t. 25. f. 1. (no Atlas); *Vilan. Creac.* 5. p. 220.
Hab. Luzón, Cavite, Naic, Batangas, Nasugbú, Mindoro.

9. **H. binotatum**, *Q. et G.* N. v.

- Quoy & Gaim.*, *Voy. Astrol. Poiss.* p. 679. lam. 14. f. 4 (no Bleek); *Gthr. Cat. B. M. 1. 1859*, p. 40.
Hab. Guam, Marianas; N.^o Guinea.

10. **H. spinosissimum**, *Temm. et Sch.* N. v.

(M. S. T.)

- Temm. & Schleg. Fann. Japon.* p. 22 lam. viii. et *Richardson Ichthyol. China*, p. 223; *Gthr. Cat. B. M. 1. 1859*, p. 41.
Hab. Luzón, Currimao, Ilocos; China, Japon.

11. **H. diadema**, *Lacep.* N. v.

(M. S. T.)

- Holocentrus diadema*, *Lacep.* iv. pp. 372, 374 iii. lam. 32. f. 3; *Rüpp. Atl. Fische*, p. 84 t. 22 f. 2; *Vil. Creac.*; 5. p. 230.
Perca pulchella, *Benn. Zool. Journ.* iii. p. 377. lam. f. 3.
Holocentrum diadema, *Cuv. & Val.* iii. p. 213; *Less. Voy. Duperr. Zool.* iii. p. 220 p. 25. f. 2; *Bleeker*, *Amboina & Ceram*, p. 259; *Gthr. Cat. B. M. 1. 1859*, p. 42.
Hab. Mindoro, Cebú, Samar, Paragua; Borneo, China.

12. **H. melanopterum**, *Blkr.* N. v.

(M. S. T.)

- Bleeker*, *Célebes* viii. p. 302; *Gthr. Cat. B. M. 1. 1859*, p. 43.
Hab. Mindoro, Culion, Calamianes, Paragua, P. Princesa, Célebes.

13. **H. cornutum**, *Blkr.* N. v.

(M. S. T.)

- Bleeker*, *Ceram* 3 p. 240; *Gthr. Cat. B. M. 1. 1859* p. 45.
Hab. C. de Samar, Borongan; Amboina.

14. **H. violaceum**, *Blkr.* N. v.

M. S. T.

- Bleeker*, *Amboina id.* p. 335; *Gthr. Cat. B. M. 1. 1859*, p. 44.
Hab. Ililo, Panay, Cebú; Amboina.

15. **H. sammara**, *(Forsk.)* N. v.

(M. S. T.)

- Sciæna sammara*, *Forskal.*, p. 48; *Lacep.* iv. p. 314.

Percia summara, Bl. Schn., p. 89.

Habrus angulosus, Lacep. iii, p. 439; lam. 1, t. 1.

Holocentrum summara, Rüpp. Att. Fische, t. 22, t. 3; Cuv. & Val. iii, p. 216; Bleeker, Perc., p. 54, et Amboina ii,

555; Gthr. Cat. B. M. i. 1859, p. 46.

H. caristianum, (Ehr. uberg); Cuv. & Val. iii, p. 219; Gthr. Cat. B. M. i. 1859, p. 46.

Att. p. 85.

Hab. Samar, Cebú; Amboina, Mar Rojo.

4. Gén. RHYNCHICHTHYS, C. V.

10. Rh. pelamides¹ C. V. N. v.

(M. S. 1.)

Cuv. & Val. vii, p. 504, lam. 208; Gthr. Cat. B. M. i. 1859,

p. 50.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Amboina.

Fam. PÉRCIDOS.

1. Gén. PERCICHTHYS, GIRARD.

1. P. ciliata Gthr. N. v.

(M. S. 1.)

Percia ciliata, (Kuhl & v. Hasselt), Cuv. & Val. ii, p. 52.

Percichthys ciliata, Gthr. Cat. B. M. 1859, p. 62.

Hab. Panay, Illoilo, Paragua, Culion; Java.

2. Gén. LATES, C. V.

2. L. calcarifer (Block) N. v.

(M. S. 1.)

Holocentrus calcarifer, Block, t. 244.

Russell, ii, t. 131.

Holocentrus heptadactylus, Lacep. iv, pp. 344, 391.

Oicus vaeti, Ham. Buch. Ganges, Fishes, t. 16, t. 28.

Lates nobilis, Cuv. & Val. ii, p. 96, t. 13; Richardson, Ichth. China, p. 222; Bleeker, Perc., p. 27; Cantor, Catal. p. 1; Hagenian in Naturk. Tijdschr. Nederl. Ind. 1851, p. 348.

L. calcarifer, Gthr. Cat. B. M. i. 1859, p. 68.

Hab. Mindoro, Calapan; China, India.

3. Gén. CNIDON, M. ET TROSCHE.

3. C. chinensis, Mull. N. v.

(M. S. 1.)

Müll. & Trosch Hov. Ichth. p. 21; Gthr. Cat. B. M. i. 1859,

p. 18.

Hab. Luzón, Manila, Lingayen, Pangasinan, Cebú; China.

4. Gén. PSAMMOPERCA, RICH.

4. P. waigiensis, C. et V. N. v.

(M. S. 1.)

Labrus waigiensis, Cuv. & Val. ii, p. 83; Bleeker, Natuurk. Tijdschr., Nederl. Ind. n. p. 479; Süssig, Usp. Cij. Zool. 237.

Psammopercatatumoides, Richardson, *Voy. Erebus & Terror-Fisch.*, p. 116, lam. 57 f., t., 2.
Ps. waigiensis, Bleeker, *I. c. v.*, p. 177; *Gthr. I. c. v.*, p. 69.
Hab. Luzon, Cagayan, Marinduque, Samar; China, Australia.

5. Gen. PERCAI ABRAX, Tem.

5. *P. japonicus*, C. et V. (M. S. T.)

Labrax japonicus, *Cuv. & Val.* ii, p. 85.
Pericalabrax japonicus, *Faun. Japon.*, p. 241—2, f. 1, t.; *Gthr. I. cit. v.*, p. 71.
Lateolabrax japonicus, Bleek, *I. c.*, p. 177.
Hab. Luzon, Batuan, Orion; China, India.

6. Gen. ETELIS, C. V.

6. *E. carbunculus* C. V.

Cuv. et Val. ii, p. 127; *Gthr. Cat. Brit. Mus.*, v, p. 79, 1858.
Hab. Carolinas; Seychelles.

Fam. SERRÁNIDOS.

1. Gen. APRION, C. V.

1. *A. virescens*, C. V. N. v. (M. S. T.)

Cuv. et Valenc. G. p. 544, lam. 168; *Gthr. Cat. Brit. Mus.*, p. 84, t. 1859.
Hab. Paragua, P. Princesa, Samar; Parie; Seycheles.

2. Gen. ANTHIAS, Blek

2. *A. eichlopi*, Blek. N. v. (M. S. T.)

Serranus eichlopi, Bleeker, *Sumatra*, i, p. 3, *Gthr. I. cit. v.*, p. 95.
Hab. Samar, Borongan.

3. *A. rafos*, Richardson N. v. (M. S. T.)

Serranus rafos, Richardson, *P. Z. S.* 1839, p. 95, p. *Trans. Z. Soc.* 1849, p. 73, lam. 4, f. 1, t.; *Gthr. I. c. v.*, p. 93.
Hab. Samar, Vidareal; Australia.

4. *A. sehelegelii*, Gthr. N. v. (M. S. T.)

Caprodon, Tem. et Schleg. *Faun. Jap. Pois.*, p. 64, lam. 30;
Richardson, *Ichth. China*, p. 235; *Gthr. I. cit. v.*, p. 93.
Hab. Mindoro, Illos; Vigan; China; Japon.

3. Gen. ANYPERODON, Gmel.

5. A. leucogrammiceps Gthr.

M. S. T.

Renard, Poiss., I, x, f. 6; Valent. iii, p. 176, t. 100.

Serranus leucogrammicus, (Renard), Cuv. & Val. ii, p. 347; Bleek.
Perc., p. 33.

Anyperodon leucogrammicus, Gthr., L. cit. i, p. 66.
Hab. Maranasi; Molucas.

4. Gen. SFERRANUS Cuv.

6. S. brunneus Gthr. N. v. Lapo-lapo.

M. S. T.

Epinephelus brunneus, Bloch, t. 328, t. 2; Bl. Schn. p. 300.

Serranus kawamebari, Richardson, Ichth. China, p. 234 (no Panze Japon.)

S. brunneus, Gthr., Cat. B. M. i, p. 107 (1850).
Hab. Luzon; Tagaytay; China.

7. S. albofasciatus Gthr. N. v. Lapo-lapo.

M. S. T.

Holocentrus maculatus, Bl. id. p. 96, t. 212, t. 3; Bl. Schn.
p. 315.

H. albofasciatus, Lacep. iv, pp. 311, 384, 385; Gthr., L. cit. p. 188.
Serranus maculatus, Bleeker, Boeroe, p. 398.

Hab. Paragua; Borneo.

8. S. oceanicus C. V. N. v. Lapo-lapo.

M. S. T.

Percis fasciata, Forskal, p. 40.

Holocentrus oceanicus, Lacep. iv, p. 377; id. 367, t. 7, t. 3.

H. forskali, Lacep. iv, p. 377.

Serranus oceanicus, Cuv. & Val. ii, p. 302; Gthr., L. cit. p. 100.

S. marginalis var., Bleeker, Perc., p. 31.
Hab. Cebú; Samar; Isla de Francia; Mar Rojo.

9. S. louti Forsk. N. v. Lapo-lapo.

M. S. T.

Seba, iii, 27, 75; Renard, t. 41, t. 207, t. 21, t. 100; Valentyn
p. 412, f. 205.

Percis louti, Forskal, p. 40.

Labrus punctatus, Lacep. iii, p. 377 (non: t. 7, t. 2).

Bodianus louti, Bl. Schn. p. 332; Lacep. iv, p. 280.

Serranus punctatus, Cuv. & Val. ii, p. 376; ix, p. 135; Bleek.
Linn. i, p. 570; Quoy. & Gaim. Voy. Astrol. Patav. p. 651;
lamb. 3, t. 2; louti, Rüppell, Atl. p. 106; lamb. 26, t. 2 (no Val.)
Gthr., loco cit. i, p. 101.

Hab. Paragua; Mindanao; Sumatra; Molucas.

10. S. trimaculatus, C. V. N. v. Lapo-lapo.

M. S. T.

Epinephelus japonicus, Krusenst. Relat., lam. 61, t. 2.

Serranus trimaculatus, *Cuv. & Val.* ii. p. 531; *Fish. Japon.* Poiss., p. 8; *Richardson*, *Icht. China*, p. 232; *Gthr. I. c. i.* p. 109.
Hab. Samar; China, Japon.

11 *S. flavimarginatus* *Rupp.* N. v. (M. S. T.)

Rüpp. *Atlas, Fische*, p. 109; *Gthr. Cat. Brit. Mus.* i. p. 103.
Hab. Luzon, Manila, Mindanao; Mar Rojo.

12. *S. diacanthus* *Cuv.* N. v. (M. S. T.)

Serranus diacanthus, *Cuv. & Val.* ii. p. 319; *Gthr. I. c. i.* p. 110.
S. nebulosus, *Richards*, (*no Cuv. & Val.*, *ni Bleek.*), *Ichth. China*, p. 232.
S. schihpan, *Richards*, *I. c.* p. 231.
Hab. Luzon, Currimao, Ilocos; China, Hong-kong.

13. *S. stigmopomus*, *Rupp.* N. v. (M. S. T.)

Richardson, *Ichth. China*, p. 232; *Gthr. I. c. i.* p. 111.
Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; China, Australia.

14. *S. tigrinus*, *C. V.* N. v. Lapo-lapo. (M. S. T.)

Seba iii. 27. 5.
Crochilus, sp. 4, *Klein, Miss.* p.
Holocentrus tigrinus, *Bloch*, t. 237; *Bl. Schn.* p. 314.
Serranus tigrinus, *Cuv. & Val.* ii. p. 314; *Gthr. I. c. i.* p. 114.
Hab. Samar, Zumárraga, Borongan; Indias Orientales.

15. *S. zanarella* *Rupp.* N. v. Lapo-lapo (M. S. T.)

Serranus zanarella, *Bleeker, Perc.* p. 32.
♂ *Labrus guasa*, *Lacep.* iii. p. 501, lam. 27 f. 1.
♀ *Serranus zanarella*, *Cuv. & Val.* ii. p. 304; *Gthr. I. c.* p. 116.
Hab. Mindoro, Cebú, Luzon, Cavite; Java.

16. *S. micropion*, *Bleeker* N. v. (M. S. T.)

Bleeker, *Amboina*, ii. p. 552; *Gthr. I. c. i.* p. 116.
Hab. Samar, Villareal, Panay; China.

17. *S. cyagnostigma* *C. V.* N. v. (M. S. T.)

Renard, *Poiss. Mol.* t. 28 f. 153; *Valent.* iii. p. 392.
Serranus cyanostigma, (*Kuhl. & v. Hass.*), *Cuv.* iii. p. 359 et
Regne, *Anim.* III. pl. 8 f. 2; *Bleeker, Perc.* p. 32; *Gthr. I. c.* p. 117.
Hab. Paragua; Java.

18. **S. aurantius.** C. U. N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & Val. ii. p. 305; *Bleek.*, *Sum.* i. p. 571; *Gthr. Ichth.* i. p. 148;
Hab., Celú; Sumatra.

19. **S. guttatus** R. N. v. Lapo-lapo.

(M. S. T.)

Percat. miniatæ, var., B., *Forsk.* p. 41.

Renard, i. pl. 22 f. 3, lam. 30 t. 162; *Valent.* iii. p. 358 f. 37.
Bodianus guttatus, *Bl.* t. 224; *Bl. Schn.* p. 320.

Serranus myriaster, *Cuv. & Val.* ii. p. 305; *Rüppell. Atlas*, p. 107
t. 27 f. 1; *Richards. Ichthiol. China*, p. 233; *Quoy & Gaim.*
Voy. Astrol., lam. 34. 1; *Less. Voy. Coquille*, pl. 37; *Bleek. Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indie*, vi. p. 192; *Quoy & Gaim. Voy. Astrol.*, *Poiss.* p. 653, lam. 34. 1.

S. guttatus, *Gthr. Cat. B.* M. i. p. 119.

Hab., Luzon, Manila, Cavite, Santa Cruz, Batangas; China,
Polynesia, Australia.

20. **S. urodelus.** C. U.

Percat. urodelæ, *Forst. Descr. Anim.*, *Cuv. Lichtenst.* p. 221.

Serranus urodelus, *Cuv. & Val.* ii. p. 306, vi. p. 513; *Bleek.*
Kokoseland'n, p. 39; *Gthr. I. c.* i. p. 122.

Hab., Islas Carolinas; Amboina.

21. **S. lumbitus.** C. U. N. v.

Cuv. & Val. ii. p. 307; *Gthr. I. c.* i. p. 125.

Hab., Guam, Marianas.

22. **S. suillus.** C. U. N. v. Lapo-lapo.

(M. S. T.)

Russell, pl. 127.

Bola cooides, *Buchanan Hamilton*, pp. 82, 369.

Serranus suillus, *Cuv. & Val.* ii. p. 335; *Bleeker. Verhand. Bat.*
Greenootsch xxii. p. 9; *Gthr. I. c.* i. p. 127.

S. cooides, *Cant. Catal.* p. ii.

Hab., Cebú; Java.

23. **S. altiveliooides.** Blh. N. v.

(M. S. T.)

Bleeker. Perc. p. 38; *Gthr. M. B.* i. p. 127.

Hab., Samar; Batavia.

24. **S. marginalis.** C. U. N. v.

(M. S. T.)

Epinophelus marginalis, *Bloch*, t. 328 f. 1.

Holocentrus rosmarus, *Lacep.* id. pp. 389, 392 t. 7, f. 2.

Serranus marginalis, *Cuv. & Val.* ii. p. 301; *Richards. Ichth.*
China, p. 233; *Bleeker. Perc.* p. 34; *Gthr. I. c.* i. p. 135.
Hab., Mindoro, Calapan, Panay, Ililo; China.

25. *S. seba*, Blk. N. v.

(M. S. T.)

Bleeker, *Amboina* v. p. 488; *Gthr. I. c. 1.* p. 137.
Hab. Luzón, Manila; China, Amboina.

26. *S. celebicus*, Blk. N. v.

(M. S. T.)

Bleeker, *Célebes* i. p. 217; *Gthr. I. c. 1.* p. 139.
Hab. Samar, Cebú, Nasugbú; Célebes.

27. *S. sp.* N. v. Lapolapó

(M. S. T.)

Hab. Luzón, B. de Manila, C. de Ilocos.

28. *S. hexagonatus* *Gthr. N. v.*

(M. S. T.)

Gthr. I. c. p. 140.
Hab. Luzón, B. Manila; China, Amboina.

29. *S. var. hexagonata*, *Fris. N. v.*

(M. S. T.)

Perca hexagonata, *Forster, Desr. Anim et Licht.* p. 189.
Holocentrus hexagonatus, *Bl. Sch.* p. 323.
Serranus hexagonatus, *Cuv. & Val. II. p. 330 VI. p. 516; Guérin, con Poiss.* lam. 4. I. 1; *Richardson, Voy. Sulph.* p. 82 lam. 38 f. 15; *Cantor, Catal.* p. 7; *Bleek. Natuurk. Tijdschr. Nederl., Indie,* vi. p. 191; *Gay Chile, Zool.* ii. p. 150; *Gthr. var. I. I. c. p. 141.*
S. toveatus, *Cuv. & Val. II. p. 329.*
S. stellans, *Richardson, Ann. Nat. Hist. 1842 vol. ix.* p. 23.
Hab. Luzón, Batangas, Nasugbú; China.

30. *S. var. merra* *C. V. N. v.*

(M. S. T.)

Seba, iii. 277; *Klein, Hist. Pisc.* v. p. 43. t. 8. f. 3.

Perca tauvina, *Forsk.* p. 39.

Epinephelus merra, *Bl. t. 329; Bl. Sch.* p. 300.

Holocentrus tauvinus, *Bl. Sch.* p. 321; *Lacép. id.* p. 338.

H. merra, *Lacép. id.* p. 329.

Serranus merra, *Cuv. & Val. II. p. 325; Gthr. I. c. 1.* p. 141.

Hab. Cavite, Naic, Nasugbú; China, Singapur.

31. *S. punctatissimus* *Ghr. N. v.*

(M. S. T.)

S. punctatissimus, *Gthr. Cat. B. M. 1.* p. 144 (1859) lam. x. f. 1.
Hab. Luzón, Manila; China.

32. *S. giberti*, *Richard.* N. v.

(M. S. T.)

Percis n.º 15, *Klein, Hist. Pisc.* v. p. 43. t. 8 f. 3.

Serranus giberti, *Richardson, Ann. Nat. Hist. 1842*, p. 19; *et Ichth. China*, p. 230; *Gthr. I. c. 1.* p. 148.

S. megachir, *Richardson, Ichth. China*, p. 230.

S. pardalis, Bleeker, *Perc.* p. 37.
Hab. Paraguay; P. Princesa; China

33. *S. awoara*, Schleg. N. v. (M. S. T.)

Tem. et Schleg., *Faun. Japon.* p. 94. 34. 2. Richards Ichth. China, p. 231; Gthr. l. cit. l. p. 154.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China, Japon.

34. *S. chlorostigma*, Gthr. N. v. (M. S. T.)

Cuv. & Val. ii. p. 352; Gthr. Cat. B. M. i. p. 151 (1859).
Hab. Luzón, Manila; Seychelles.

35. *S. altivelis* C. V. N. v. (M. S. T.)

Cuv. & Val. ii. p. 324, lam. 25; Richards, Ichth. Chin., p. 230.
Bleeker, *Perc.* p. 33.
Cantor, *Catal.* p. 10; Gthr. Cat. B. M. i. p. 152 (1859).
Hab. Luzón, B. de Manila; Cavite, Sta. Cruz, Nasugbu, Batangas; China, Cebú, Japon.

36. *S. formosus*, Shaw, N. v. (M. S. T.)

Russel, t. 129.
Sciama formosa, Shaw, Zool. Misc. p. 23 t. 1007.
Serranus formosus, Cuv. & Val. ii. p. 311; Richards, Ichth. China, p. 233; Bleeker, *Perc.* p. 31; Gthr. l. c. l. p. 154.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China, Batavia.

37. *S. lineatus*, C. V. N. v. (M. S. T.)

Cuv. & Val. ii. p. 312; Gthr. Cat. B. M. i. p. 156 (1859).
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China.

5. Gén. PLECTROPOMA, Cuv.

38. *P. oligacanthus*, Blkr. N. v. (M. S. T.)

Bleeker, Java ii. 1854, p. 422; Gthr. Cat. B. M. i. p. 157 (1859).
Hab. Lúzon, Cavite, Santa Cruz; Batavia.

39. *P. susuki*, C. V. N. v. (M. S. T.)

Cuv. & Val. ii. p. 404; Faun. Japon., p. 11, pl. 4; Richards, Ichthiol. China, p. 230; Gthr. Cat. B. M. i. p. 160 (1859).
Hab. Luzón, Currimao; China, Japon.



6 Gén. GRAMMISTES Cuv.

40. **G. orientalis**, Bl. N. v.

M. S. T.

- Gramistes sebr, *Seba*, iii. 27. 5.
G. orientalis, Bl. *Schn. Syst. Posth.* p. 180; *Cuv. & Val.* ii. p. 203, lam. 27; *Bleeker Amboina*, iii. p. 15; *Gthr. I. c. t. 1.* p. 171.
Percia bilineata, *Thunb. Nov. Act. Holm.* xiii. p. 142 t. 5.
Sciaena vittata, *Lacép.* iv. p. 323.
Percia triacanthus, *Lacép.* pp. 398, 424.
P. pentacanthus, *Lacép.* pp. 398, 424.
Hab. Luzón, Manila, Pangasinan, Sual; Océano Indico, Australia.

7 Gén. DIPLOPRION, C. v.

41. **D. bifasciatum**, C. V. N. v.

(M. S. T.)

- Diploprion bifasciatum*, (*Kuhl & van. Hasselt*) *Cuv. & Val.* ii. p. 137 lam. 21; *Faun. Japon.* p. 2, lam. 2 A. *Richards Ichthyol. China*, p. 222; *Bleek. in Verh. Ind. Batav. Genootsch.* xxvi. p. 59, et *Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind.* vi. 1854, p. 207; *Gthr. I. c. t. 1.* p. 174.
Hab. Luzón, Zambales, Pangasinan; Hong-kong, China, Japon.

8 Gén. MYRIODON, Briss.

41. **M. waigiensis**, G. A. Y. N. v.

(M. S. T.)

- Scorpena waigiensis*, *Quoy et Grix. Voy. Freyc. Zool.* p. 324, lam. 38, fig. 1.
Centropristes scorpioides, *Cuv. et Val.* iii. p. 48; *Rich. Ann. et Mag. Nat. Hist.* 1842, vol. ix. p. 120.
Myriodon scorpioides, *Briss. de Barnev. Rev. Zool.* 1847, p. 130; *Bleeker, Rionw.* p. 480.
M. waigiensis, *Gthr. I. c. t. 1.* p. 175.
Hab. Cebú; Australia.

9 Gén. GENYOROGE, CANTOR.

42. **G. bengalensis**, Bloch.

(M. S. T.)

- Renard, Poiss.* i. t. 20 f. 110; *Valentyn Ind.* iii. f. 25.
Sciaena kasmira, *Forskal*, p. 46.
Holocentrus bengalensis, *Bloch*, t. 246, f. 2; *Bl. Schn.* p. 316.
H. quinquefasciatus, *Bloch*, t. 239; *Gthr. I. c. t. 1.* p. 178.
Gramistes kasmira, *Bl. Schn.* p. 189.
Labrus octolineatus, *Lacép.* iv. p. 478 lam. 22 f. 1.
L. kasmira, *Lacép.* iii. p. 483.
Percia polyzonias, *Forst. Anim. cur.* *Lecht.* p. 225.
Diacope octolineata, *Cuv. & Val.* iv. p. 418, vi. p. 526; *Faun. Japon* p. 12, tab. 6, f. 2^o. *R. Sharpe Ichtyol. Catalog.* p. 229.

j. lecimlineata, *Cuv.* & *Val.* vi. p. 528.
Mesoprion etaape, *Less.* *Voy. Coq. Zool.* p. 229
M. octolineatus, *Bleeker*, *Perc.* p. 40.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz, Hocos, Vigan, Cebu.

43. **G. macolor.** (*C. V.*) N. v.

(M. S. T.)

Macolor, *Renard*, i. lam. 9 f. 60, ii. lam. 7. f. 30; *Valent.* iii. p. 348, lam. 1. f. 1.
Diacope macolor, *Cuv.* & *Val.* ii. p. 315; *Less. Mem. Soc. II.* *Val.* iv. p. 409, x *Voy. Coq. Zool.* ii. p. 230, lam. 22, 1-2.
Mesoprion macolor, *Bleek.* *Celeb.* iii. p. 752.
Gonyroge macolor, *Gthr. Cat. B. M.* i. p. 176, 1858.
Hab. Cebú, Samar, Borongan; Célebes, Moluccas.

44. **G. sebae.** (*C. V.*) N. v.

Sebae, iii. 27. 2; *Russell*, lam. 99; *Gthr. l. c.* 1. p. 176.
Diacope sebae; *Cuv.* & *Val.* ii. p. 411.
D. siamensis, *Cuv.* & *Val.* iv. p. 524.
Mesoprion sebae, *Bleeker*, *Perc.* p. 45.
Hab. Cebú; Java.

45. **G. rosea.** (*C. V.*) N. v.

Diacope rosea, *Cuv.* & *Val.* vi. p. 437; *Gthr. Cat. B. M.* i. p. 186 (1859).
Hab. Carolinas.

46. **G. bottonensis.** (*C. V.*) N. v.

(M. S. T.)

Holocentrus boutton, *Lacep.* iv. pp. 331, 367.
Diacope bottonensis, *Cuv.* & *Val.* iv. p. 434, vi. p. 533.
Mesoprion bottonensis, *Bleeker*, *Natuurk Tijdschr. Nedert. Indie*, ii. p. 170.
G. bottonensis, *Gthr. l. c.* p. 181.
Hab. Luzón, Camarines Sur, Pasacao.

47. **G. rivulata,** *C. V.* N. v.

(M. S. T.)

Diacope rivulata, *Cuv.* & *Val.* ii. p. 414, lam. 38; *Rüpp. N. II.* *Fische* p. 94.
D. alboguttata, *Cuv.* & *Val.* vii. p. 445.
Gonyroge rivulata, *Gthr. l. c.* p. 182.
Hab. Luzón, Manila, R. Pasig; China, Amboina.

9. Gén. MESOPRION, *Cuv.*

48. **M. gembra** *C. V.* N. v. Currimao

(M. S. T.)

Russell lam. 95.
Mphistes sambra, *Bl. Sehn. Syst. Posth.* p. 236 t. 51.
Mesoprion yapilli, *Cuv.* & *Val.* ii. p. 483.
M. gembra, *Cuv.* & *Val.* ii. p. 485; *Gaster. Coll.* p. 15

- M. immaculatus*, *Cuv.* & *Val.* ii. p. 474; *Bleek.* *Perc.* p. 45.
M. gembra, *Bleek.* *Sumatra*, ii. p. 246; *Gthr.* *I. cit.* p. 193.
Hab. Luzón, C. Illocos, Camarines, Cagayan, Samar, Bo-
rongan.

49. **M. bohar**, *Forsk.* N. v.

(M. S. T.)

- Sciaena bohar*, *Forsk.* p. 46.
Sparus lepisurus, *Lacep.* iii. lam. 15. t. 2.
Lutjanus bohar, *Bl. Schneid.* p. 325.
Diacope bohar, *Cuv.* & *Val.* ii. p. 433; *Rüpp.* *All. Fische* p.
73, et *N. W. Fische*, p. 103.
Mesopriion bohar, *Gthr.* *I. cit.* p. 190.
Diacope quadriguttata, *Cuv.* & *Val.* ii. p. 427, vi. p. 533.
Hab. Luzón, B. Manila, Cavite, Santa Cruz, C. Mindanao,
Zamboanga.

50. **M. johnii**, *Bloch.* N. v.

(M. S. T.)

- Renard*, *Poiss.* i. t. 31. f. 172; *Russel*, t. 96.
Anhias johnii *Bloch*, t. 318.
Sparus tranquebaricus, *Shaw*, *Zool.* iv. p. 471.
Coius catus, *Buch.* *Han.* *Gang Fish.* p. 90 lam. 38 f. 30.
Mesopriion unimaculatus, *Quoy & Gaim Zool.* *Frege* p. 304; *Cuv.*
& *Val.* ii. p. 441; *Bleeker*, *Perc.* p. 42; *Richards Ichth.* *Chi-*
na, p. 229; *Quoy & Gaim*, *Voy de l'Astrol.* *Poiss.* p. 665 lam.
5. t. 3.
M. johnii, *Cuv.* & *Val.* ii. p. 443; *Cantor Catal.* p. 13; *Gthr.*
I. cit. t. p. 200.
Hab. Luzón, Camarines Sur, Pasacao; China, Australia.

51. **M. fuscescens**, *C. V.*

(M. S. T.)

- Mesopriion fuscescens*, *Cuv.* & *Val.* vi. p. 538; *Bleeker*, *Batjan* ii.
p. 197; *Gthr.* t. cit. p. 201.
M. hotsen, *Richards Ichthyol.* *China*, p. 229.
Hab. Cebú; China, Célebes.

52. **M. quinquelineatus**, *C. V.* N. v.

(M. S. T.)

- Russell*, ii. lam. 110.
Mesopriion quinquelineatus, *Cuv.* & *Val.* ii. p. 445; *Gthr.* t. c.
p. 209.
Diacope ceruleolineata, *Rüpp.* *N. W. Fische*, p. 93. t. 24 f. 3.
Hab. Cebú; Java.

53. **M. fulviflamma**, *(Forsk.)* N. v.

(M. S. T.)

- Sciaena fulviflamma*, *Forsk.* p. 45.
Percis fulviflamma, *Bl. Schneid.* p. 28.
Centropomus hoferi, *Lacep.* iv. p. 255.
Diacope fulviflamma, *Cuv. Régne Anim.*; *Rüpp.* *All. Fische*,
p. 72 t. 19. f. 2, et *N. W. Fische*, p. 94; *Cuv.* & *Val.* ii.
p. 423.

Mesoprion monostigma, *Cuv. & Val.* ii, p. 446 (*no Bleek.*)
M. fulviflamma, *Bleek.* *Amb.* ii, p. 553. *Gthr. I. c.* p. 201.
Hab. Luzón, B. Manila, C. Cebú; China, Java.

54. **M. annularis.** *C. F.* N. v.

(M. S. T.)

Mesoprion annularis, *Cuv. & Val.* ii, p. 484; iii, p. 497, *Richardson Ichth. China*, p. 229; *Bleeker, Perc.* p. 47; *Cautor, Catal.* p. 14 *Gth. I. c.* p. 200.

Diacope annularis, *Rüpp. Atl. Fische*, p. 74, *et N. W. Fisch.* p. 91, t. 24 f. 2; *Quoy, & Gaim. Voy. Astrol. Poiss.* p. 666 pl. 5, f. 4.

D. metallicus, *Bleek. Topogr. Batav.*

Mesoprion sanguinlus, *Bleek. Pere.* p. 48.
Hab. C. Cebú; China, Australia.

55. **M. malabaricus.** *Bl.* N. v.

(M. S. T.)

?Sparus malabaricus, *Bl. Schn.* p. 278.

?Mesoprion malabaricus, *Cuv. & Val.* ii, p. 480, *Gthr. I. c.* p. 204.

M. malabaricus, *Bleek. Sumatra*, iii, p. 3.
Hab. Luzón, Manila; Sumatra.

56. **M. decussatus.** *C. F.*

(M. S. T.)

Cuv. & Val. ii, p. 487; *Bleeker, Perc.* p. 43; *Gthr. Cat. B. M. I.* p. 210, 1859.

Hab. Luzón, Camarines Sur, Pasacao, C. Mindanao, Zamboanga; Amboina.

57. **M. vitta.** *Q. et G.* N. v.

(M. S. T.)

Serranus vitta, *Quoy, & Gaim. Voy. de Freyc. Zool. Poiss.* lam. 58, f. 3, p. 315; *Richardson, Ichth. China*, p. 234.

?Serranus vitta, *Cuv. & Val.* ii, p. 239, vi, p. 505.

Diacope vitta, *Schleg. & Temm. Faun. Japon.* p. 13, pl. 6, f. 1.
?Mesoprion vitta, *Bleek. Pere.* p. 43; *Gthr. I. c. I.* p. 214.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China, Australia, Java.

Fam. PRIACÁNTIDOS.

1. Gén. PRIACANTHUS, C. V.

1. **P. japonicus.** *C. V.* N. v.

(M. S. T.)

Priacanthus japonicus, (*Langsdor.*) *Cuv. & Val.* iii, p. 106, lam. 50, *Faun. Japon.* p. 26. (*no Bleek.*) *Gthr. I. c. I.* p. 217.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China, Japón.

2. **P. carolinus.** *C. V.*

Cuv. & Val. iii, p. 105; *Less. Voy. Coq. Zool. Poiss.* p. 224;
*

Bleeker, *Banda* i, p. 235; *Gthr. Cat. B. M.* i, p. 216 (1859).
Hab. Carolinas, Ualan.

3. **P. holocentrum**, *Plkr* N. v. (M. S. T.)

Bleeker, *Perc.* p. 48; *Gthr. Cat. B. M.* i, p. 220 (1859).
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Paragua, P. Princesa.

4. **P. tayenus**, *Richard* N. v. (M. S. T.)

Priacanthus tayenus, *Richard*, *Ichth. of the Seas of China* sp. 237; *Gthr. Cat. B. M.* i, p. 221 (1859).
Hab. Luzón, Ilocos, Vigan, Marinduque, Mindoro, Calapan; Chiba.

Fam. APOGÓNIDOS.

1. Gén. AMBASSIS, C. U.

1. **A. robustus**, *Gthr* N. v. (M. S. T.)

A. robustus, *Gthr. Cat. B. M.* i, p. 222 (1859).
Hab. Samar, Cebú, Bermeo.

2. **A. interruptus**, *Blk.* N. v. (M. S. T.)

Bleeker, *Ceram.* 2, p. 696; *Gthr. Cat. Brit. Mus.* i, p. 226.
Hab. Luzón, Manila, R. Pasig; Java, Australia.

3. **A. safgha**, *Forsk.* N. v. (M. S. T.)

Seneca safgha, *Forsk. Descr. Anim.* p. 53.
Centropomus ambasis, *Lacep.* ix, p. 273.
Lutjanus gymnocephalus, *Lacep.* ix, p. 216, iii, lam. 23, f. 2.
Ambassis commersonii, *Cuv. & Val.* ii, p. 176, lam. 25; *Rüpp.* N. II'. *Fische*, p. 80; *Gthr. I. c.* p. 223.
A. nalua, Bleek, *Perc.* p. 30; *Batav.* p. 453.
Hab. Luzón, Manila; Java, Australia.

4. **A. urotaenia**, *Blk.* N. v. Langaray. (M. S. T.)

Bleeker, *Amb. & Cer.* p. 257; *Gthr. Cat. B. M.* i, p. 224 (1859).
Hab. Luzón, Manila, R. Pasig; Amboina.

5. **A. apogonoides**, *Blk.* N. v. (M. S. T.)

Bleeker, *Borneo*, ix, p. 200; *Gthr. I. Cat. B. M.* i, p. 224 (1859).
Hab. Rio de Cathbalonga, Samar; Borneo.

6. **A. dussumieri**, *C. U.* N. v. (M. S. T.)

Ambassis dussumieri, *Cuv. & Val.* ii, p. 181, vi, p. 503, ix, p.

431; Bleeker, *Perc.* p. 30; Quoy & Gaim. *Voy. Astrol.* Pois.
650 lam. t. f. 3; Gthr. *t. cit.* p. 225.
Chanda dussumieri, Cantor, *Catal.* p. 6.
Hab. Cebú; China, Célebes.

7. *A. buruensis*, Blk. N. v. (M. S. T.)

Bleeker, *Boeroe*, p. 396; Gthr. *Cat. B. M.* t. p. 220 (1859).
Hab. Luzón, Pasig, Manila; Borneo.

8. *A. wolffii*, Blk. N. v. (M. S. T.)

Bleeker, *Borneo*, i. p. 9; *Cat. B. M.* t. p. 226 (1859).
Hab. Samar, Borongan; Borneo.

9. *A. batjanensis*, Blk. N. v. (M. S. T.)

Bleeker, *Batjan*, ii. p. 196; Gthr. *Cat. B. M.* t. p. 225.
Hab. R. Pasig, Manila; Amboina.

2 Gén APOGON, LACEP.

10. *A. taeniatus*, C. V. N. v. (M. S. T.)

Apogon taeniatus (Ehrenberg) *Cuv. & Val.* ii. p. 159; Ruppelt.
Atlas. Fische, p. 48, *and.* N. W. *Fische*, p. 87; Gthr. *Cat.*
B. M. t. p. 234 (1859).
Hab. Luzón, Manila; Mar Rojo.

11. *A. hyalosoma*, Blkr.

Apogon thermalis, Bleeker, *Perc.* p. 27. (*no Cuv.*); Gthr. *t. c.*
p. 231.

A. hylosoma, Bleeker, *Singapore*, p. 63 *et Ambogna*, iv. p. 329.
Hab. Cebú; Sumatra, Batavia.

12. *A. nigripinnis*, C. V. N. v. (M. S. T.)

Cuv. & Val. ii. p. 152 *Faun. Japon.* Poiss. p. 3.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

13. *A. pæciliopterus*, C. V. N. v. (M. S. T.)

Apogon pæciliopterus, Kuhl. & van Hasselt. *Cuv. et Val.* ii. p.
154; Cantor, *Catal.* p. 2; Gthr. *t. cit.* p. 232.
Hab. Cebú; Java.

14. *A. multiteniata*, C. V. N. v. (M. S. T.)

Cuv. et Val. t. cit.; Rüppel. *Attl.* p. 47; Gthr. *t. cit.* p. 229.
Hab. Cebú; Mar Rojo.

15. *A. monochrous*, Bleeker, N. v. (M. S. T.)
Bleeker, *Act. Soc. Nederl.* i. *Manado en Macassar* p. 34; *Gthr.* loc. cit. p. 236.
Hab. B. de Manila, C. de Cebú; Amboina.
16. *A. bifasciatus*, Rüppell, N. v. (M. S. T.)
Apogon bifasciatus, Rüppell, N. W. *Fische*, p. 86, t. 22, 1. 2;
Gthr. loc. cit. p. 238.
A. trimaculatus, (no Cuv.) Richards *Ichthyol. China* p. 221.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz; China, Mar Rojo.
17. *A. annularis*, Rüpp. N. v. (M. S. T.)
Rüppell, *Atlas*, p. 48; and. N. W. *Fische*, p. 85; — *Gthr.* l. cit. p. 239.
Hab. C. de Cebú; China, Amboina.
18. *A. quadrifasciatus*, Val. N. v. (M. S. T.)
Valenciennes, ii. p. 153; Bleeker, *Perc.* p. 28; Cantor, *Catal.* p. 3; Peters, *Wiegm.; Arch.* 1855, p. 234; *Gthr.* l. cit. p. 239.
Hab. Luzón, B. de Manila; China, Australia.
19. *A. frenatus*, Val. N. v.
Apogon frenatus, Valenc. *Nouv. Ann. Mus. Hist. Nat.* 1832, p. 57, lam. 4 f. 4; Bleeker, *Act. Soc. Nederl.*, *Amboina*, p. 25 *Gthr.* loc. cit. p. 241.
A. vittiger, Bennett, in *Proc. Zool. Soc.* 1833, p. 32.
A. melanorhynchos, Bleeker, *Amb. & Cer.* p. 255, et l. c. p. 26.
Hab. Marianas, Guam; Mauricio.
20. *A. fasciatus*, White, N. v. (M. S. T.)
Mullus fasciatus, White, *New. South. Wales*, p. 268 f. 1.
Apogon novem-fasciatus, Cuv. & Val. ii. p. 154; Bleeker, *Timor*, i. p. 163; Peters, *Wiegm. Arch.* 1855, p. 234.
A. fasciatus, Quoy, & Gaim. *Voy. Freyc. Zool.* p. 334; *Gthr.* l. c. p. 241.
A. balinensis, Bleeker, *Perc.* p. 28 et *Verhand. Batav. G.-nootsch.* xxii., *Bali* p. 5.
A. endeka-tania, Bleeker, *Banks*, p. 449.
Hab. C. de Cebú; India, Moluccas.
21. *A. guamensis*, Val. N. v.
Nouv. Ann. Mus. H. Nat. 1832, p. 54; *Gthr.* l. c. p. 229.
Hab. Marianas, Guam.

22 A. cyanotenia, Bleeker N. v. (M. S. T.)

Bleeker *Solor*, p. 71; *Gthr. Cat. B. M.* t. p. 242 (1859).
Hab. C. de Cebú.

23 A. fuscus, Q. et G. N. v.

Ouoy et Gajin *Voy. Frise Zool.* p. 345; *Gthr. Cat. f.* 229.
Hab. Guam, Marianas.

3. Gen. APOGONICHTHYS, BLKR.

24. A. glaga, Blkr. N. v. (M. S. T.)

Apogon glaga, Bleeker, *Perc.* p. 29.
Apogonichthys glaga, Bleek. *Verh. Batav. Genootsch.* xxvi. p. 57.
Gthr. Cat. p. 247.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Java, Singapor, Japon.

25 A. carinatus, C. V.

Apogon carinatus, *Cuv. & Val.* ii. p. 157; *Faun. Japon Poiss.* p. 3.
Apogonichthys carinatus, Bleeker, *Floris.* p. 321, et *Verh. Batav. Genootsch.* xxvi. p. 56, lam. 1. f. 3; *Gthr. I. c.* p. 247.
Hab. Luzón; China.

26. A. polystigma, Blkr. N. v. (M. S. T.)

Apogon punctulatus, Bleeker, *Nat. Tydschr. Nederl. Indie.* iii. p. 616 (no Rüpp.).
Apogonichthys polystigma, Bleeker, *I. c.* vi. p. 484; *Gthr. I. c.* p. 246.
Hab. Cebú; Sumatra.

4. Gen. CHILODIPTERUS, LACÉP.

27 Ch. quinquefasciatus, C. V.

Cheilodipterus quinquefasciatus, *Cuv. & Val.* ii. p. 167; *Rüpp. N. W. Fische.* p. 89; *Lesson, Zool. Voy. Duperr.* ii. p. 167,
Bleeker, *Amb. & Cer.* p. 252; *Gthr. I. cit.* p. 248.
Hab. Cebú; Amboina.

Fam. GRÍSTIDOS.

1. Gen. DULES, C. V.

1. D. tæniurus, C. V. N. v. (M. S. T.)

Cuv. & Val. iii. p. 114; Bleeker, *Perc.* p. 49; *Gthr. Cat. B. M.* t. p. 267 (1859). p. 267.
Hab. Luzón, B. de Manila; China, Java.

2. *D. guamensis* C. V.

Cuv. & Val. vii. p. 474; *Dumont d'Urville Voy. Pole Sud. Poiss.* p. 42 lam. 3. f. 1; *Gthr. Cat. B. M.* 1. p. 260 (1850).
Hab. Guam, Marianas.

Fam. PRISTIPOMÁTIDOS.

1. Gén. THERAPON, Cuv.

1. *T. theraps*, Cuv. N. v.

(M, S T)

Therapon theraps, *Cuv. & Val.* iii. p. 129, lam. 53; *Bleeker. Perc.* p. 50; *Richards Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1842, vol. ix. 126; *Rüpp. Neue. Wirb. Fische*, p. 95; *Gthr. B. M.* 1. p. 174 (1850).
Hab. Luzón, Manila, C. de Cebú; China.

2. *T. servus*, Block. N. v. Bagaong.

(M, S T)

Sciæna jarbua, *Forskal. Descr. Anim.* p. 50; *Shaw, Zool.* vi. p. 541.

Holocentrus servus, *Block*, t. 238. f. 1.

1. *jarbua*, *Lacép.* iv. pp. 348, 355.

Grammistes servus, *Bl. Schu.* p. 185.

Therapon timoriensis, *Quoy & Gaim. Voy. Freyc. Poiss.* p. 341.
Th. servus, *Cuv. & Val.* iii. p. 125, vii. p. 479; *Bleeker. Perc.* p. 50; *Richardson. Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1842, vol. ix. p. 126; *Rüpp. N. Wirb. Fische*, p. 95; *Gthr. I. b.* p. 278.

Pterapon trivittatus, *Gray. Ind. Zool.* pl. f. 1.

Hab. Luzón, B. de Manila, C. de Samar, C. de Mindanao; China.

3. *T. ellipticus*, Rich. N. v.

(M, S T)

Datnia alleptica, *Rich. Voy Ereb. et Terr. Fisches* p. 118 1.
52 f. 4 8; *Gln. Cat. Brit. Mus.* 1. p. 276.

Hab. Laguna de Bay; Australia.

4. *T. trivittatus*, (Buch) N. v.

(M, T, S)

Russel, ii. pl. 126.

Ovius trivittatus, *Buch. Ham.* pp. 92, 370.

Therapon puta, *Cuv. & Val.* iii. 131; *Bleek. Perc.* p. 50; *Cuv. Régue Anim. Ill. Poiss.* lam. 12. f. 2.

T. trivittatus, *Cant. Catal.* p. 19; *Gthr. I. c.* p. 280.

Hab. Luzón, B. de Manila; Ceilan, Singapore.

5. *T. oxirhynchus*, N. v.

(M, S T)

Temm. & Schleg. Faun. Japon p. 16 lam. 6. f. 3; *Richards*

I. lithynx. Chinæ, p. 239; Bleek, Verhandl. Batav. Genootsch., xxvi, p. 64; Gthr. loc. cit. p. 281.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

6. **T. quadrilineatus.** (Bleek) N. sp.

(M. S. T.)

Haplochirus quadrilineatus, Bloch, t. 238, f. 2.
Iherapon quadrilineatus, Cuv. & Val. iii, p. 134; Bleeker, Per., p. 51; Richards, Ichth. Chinæ, p. 239; Gthr. L. c. p. 282.
I. xanthurus, Cuv. & Val. iii, p. 135.
Hab. Luzón, B. de Manila, C. de Cebú; China, Java.

7. **T. argenteus.** C. V. N. sp.

(M. S. T.)

Datnia argentea, Cuv. & Val. iii, 139, lam. 54; Bleeker, Per., p. 52.
Mesopristis macrocanthus, Bleeker, Topogr. Batav.
Iherapon argenteus, Günther, Cat. B. M. I., p. 283.
Datnia cancellatoides, Bleek, Sumatra, i, p. 5.
Hab. Luzón, Camarines Sur, Pasacao, Manila, Laguna de Bay.

2. Gen. PRISTIPOMA, Cuv

8. **P. nigrum.** C. V. N. sp.

(M. S. T.)

Pristipoma nigrum, (Mertens), Cuv. & Val. v, p. 258; Cant. Catal. p. 74; Gthr. Cat. B. M. I., p. 289 (1859).
Hab. Luzón, Manila; China.

9. **P. hasta.** (Bloch) N. sp.

Aethanops hasta, Bloch, lam. 246, f. 1; Bl. Schu. p. 324; Lacep. v, p. 229.
Leibus commersoni, Lacep. iii, pp. 431, 477 lam. 23 f. 1; Shaw, Zool. iv, p. 493.
Lutjanus microstoma, Lacep. iii, lam. 34, f. 2, iv, pp. 181, 210.
Pristipoma Kahaan, Cuv. & Val. v, p. 244; Räpp N. W. Fische, p. 123, f. 20, f. 1; Richardson, Ichth. China, p. 227; Bleek, Verh. Bat. Genootsch., xxii, p. 3.
P. commersonii, Cuv. & v, p. 252; Cant. Catal. p. 72.
P. hasta, Cuv. & Val. v, p. 247, cop. in Belanger, Voy. Ind. Orient. p. 362; Bleek, L. c. xxiii, Scien. p. 20; Gthr. L. cit. p. 289.
P. erythrolion, (Kuhl, & v. Hasselt.), Cuv. & Val. v, p. 248.
Hab. Luzón, B. de Manila, Bütangas, Nasugbu, Cebú; China, Mar Rojo.

10. **P. leucurum.** C. & V. N. sp.

(M. S. T.)

P. leucurum, Cuv. et Val. iv, p. 488; Gthr. Cat. B. M. I., p. 286, 1859.
Hab. Marians, Guam.

11. **P. argyreum**, Bleek, N. v.

(M. S. T.)

Pristipoma argyreum, Bleek, Verh. Bat. Gen. xxiii. Scien. p. 22.
Pristipoma argyreum, Cuv. & Val. iv. p. 485; Gthr. l. c. p. 292.
Hab. Luzón, B. de Manila; Sumatra, Batavia.

12. **P. maculatum**, (Bl.) N. v.

(M. S. T.)

Anthias maculatus, Bl. Tab. 326 f. 2; Bl. Schn. p. 306; Gthr.
l. c. p. 293.
Lutjanus maculatus, Lacép. iv. p. 239.
Caripe, Russel, pl. 124.
Pristipoma caripa, Cuv. & Val. v. p. 261; Caud. Catal. p. 75;
Rüpp. N. W. Fische. p. 124; Bleek, l. c. p. 21.
Hab. Luzon, B. de Manila; Amboina.

13. **P. japonicum**, C. V. N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & Val. v. p. 288; Fann. japon., Poiss. p. 60 lam. 26 f. 2,
Richards. Ichth. China, p. 228; Gthr. Cat. B. M. I. p. 303
(1859).
Hab. Luzon, Cavite, Santa Cruz; China, Japon.

3. Gén. HAPALOGENYS, RICHARDS.

14. **H. nigripinnis**, (Tem. Sch.) N. v.

(M. S. T.)

Pagonias nigripinnis, Temm. & Schlech. Faun. Japon. Poiss. p. 59
pl. 25.
Hapalogenys nitens, Richards. Ann. & Mag. Nat. Hist. 1844,
xiii. p. 463, et Ichthyol. Sulph. p. 84 lam. 43 f. 1, 2.
Hapalogenys maculatus, Richards. Ichth. China, p. 235.
Hab. Luzon, Cavite, Santa Cruz; C. int.

15. **H. mucronatus**, (Eyd. et Seul.) N. v.

(M. S. T.)

Pristipoma mucronatus, Eydoux & Souleyet, Voy. de la Bonite,
Zool. p. 161 lam. 2 f. 1 (1841).
Hapalogenys analis, Richards. l. c. & Ichth. Sulph. p. 85 lam. 43
f. 2.
Hab. Luzon, Manila; China.

4. Gén. DIAGRAMMA, CUV.

16. **D. gibbosum**, H. et Jaq. N. v.

Diagramma gibbosum, Hambr. & Jacq. Guichen Voy. Pole Sud,
Poiss. p. 46 lam. 5 f. 2; Gthr. Cat. B. M. I. p. 319 (1859).
Hab. Marianas, Guam.

17. **D. affine**, Gthr. N. v.

(M. S. T.)

Diagramma crassispinum, Bleek. Verh. Batav. Genootsch. xiii.

Sciæn., p. 26 (*no Rüpp.*); *Gthr. Cat. B. M.*, i., p. 319 lam.
xix, f. A. (1859).

Hab., Luzón, B. de Manila; Australia, China.

18. **D. lineatum**. *Linn.* N. v.

(M. S. T.)

Seba, iii, 27, 18; *Benn.*, *Cyl. Fish.*, p. 13 f. 13,
Perca diagramma, *Linn. Gm.*, p. 1319.

P. lineata, *Linn. Gm.*, p. 1319.

Sciæna lineata, *Linn. Mus. Ad. Frid.*, i., 31 f. 4.

S. abumgaterin, *Forsk.*, p. 51.

Grammistes lineatus, *Bl. Schn.*, p. 180.

Diagramma lineatum, *Cuv. & Val.*, v., p. 309; *Bleek.*, *Amboina* in
p. 22; *Wood*, *Nat. Hist.*, 3, p. 237, fig.

Hab., B. de Manila, Cebú; Amboina.

19. **D. pardalis**. *V.* C. N. v.

(M. S. T.)

Diagramma pardalis, (*Kuhl.* & *v. Hasselt.*) *Cuv. & Val.*, v., p. 309;

Gthr. Cat. B. M., i., p. 323 (1859).

Hab., Luzón, Manila; Java.

20. **D. punctatum**. *C.* V. N. v.

(M. S. T.)

Diagramma punctatum, (*Ehrenb.*) *Cuv. & Val.*, v., p. 302; *Faun. Japon.*, *Poiss.*, p. 60; *Rüpp.*, *All. Fische*, p. 126 lam. 32 f. 2,
et N. II., *Fische*, p. 125; *Quoy.* & *Gaim.*, *Voy. Astrol.*, *Poiss.*
lam. 12 f. 2, p. 699; *Cuv.*, *Régn. Anim.*, III, *Poiss.* lam. 30 f. 3;
Bleeker, *Verh. Batav. Genootsch.*, xxiii, *Sciæn.*, p. 25; *Gthr.*
loc. cit., p. 323.

Holocentrus radjabon, *Lacép.*, iv., p. 307; *Rüpp.*, *All.*, p. 127.
Hab., Luzón, Cavite, Santa Cruz; China.

21. **D. emetum**. *T.* et *Schl.* N. v.

(M. S. T.)

Tem. & *Schleg.*, *Fam. Japon.*, *Poiss.*, p. 61, lam. 26, f. 1; *Richardson*,
Ichth. China, p. 226; *Gthr. Cat. B. M.*, i., p. 325 (1859).

Hab., Luzón, Manila; China.

22. **D. choetodonoides**. *Lacép.* N. v.

(M. S. T.)

Plectorhynchus choetodonoides, *Lacép.*, iii., p. 135, ii., lam. 13, f. 2;
Lutjanus choetodonoides, *Lacép.* id., pp. 195, 243.

Choetodon pectorrhynchus, *Shaw. Zool. id.*, p. 356, lam. 49.

Diagramma pectorrhynchus, *Cuv. & Val.*, v., p. 294; *Bleek.*, *Verh.*
Batav. Genootsch., xxiii, *Sciæn.*, p. 24.

D. choetonooides, *Gthr. I. cit.*, p. 326.

Hab., Cebú; Batavia.

23. **D. pictum**, *Thunb.* N. v.

(M. S. T.)

Seba, iii, 26, 32.

Perca picta, *Thunb.*, *Nua. Handl.*, xiii, p. 141 lam. 5.

Grammistes pictus, *Bl. Schn.*, 190.

*

Lutjanus pictus, *Lacep.* v. pp. 587, 688.
Diagramma pictum *Cuv.* & *Val.* v. p. 215; *Faun. Japon. Poiss.*
p. 62; *Richardson, Ichth. China*, p. 227; *Gthr. I. c.* p. 327.
Plectorhynchus baldeatus, *Cat. Catal.* p. 78.
Hab. C. de Samar, Cebú; China, Amboina.

24. **D. balteatum** var. **B. C.** *I.* N. v.

Diagramma balteatum, (*Kuhl. & v. Hass.*) *Cuv.* & *Val.* v. p.
316; *Gthr. Cat. B. M.* i. 328 (1859).
Hab. Paragua; Borneo.

25. **D. albovittatum**, *Rüpp.* N. v.

Rüppell, N. W. Fisch. p. 125. lam. 31. f. 2; *Bleek. Act. Soc. Sc.*
Indy-Nederl. i. *Mam.* en *Makass.* p. 46; *Gthr. I. c.* p. 330.
Hab. Cebú; Manado.

26. **D. reticulatum**, *Gthr.* N. v.

(M. S. T.)

D. reticulatum, *Gthr. Cat. B. M.* i. p. 334 (1859).
Hab. Luzón, Manila; China.

5. Gén. LOBOOTES, *Cuv.*

27. **L. auctorum**, *Gthr.* N. v.

(M. S. T.)

Holocentrus surinamensis, *Bl.* lam. 243; *Bl. Shn.* p. 316.
Bodianus triunus, *Mitch.* *Trans. Lit. & Phil. Soc. New. York*,
i. p. 418 lam. 3. f. 10.
Sobotes surinamensis, *Cuv.* & *Val.* v. p. 319; *Dekay, New. York.*
Fauna, Fishes, p. 88. lam. 18. f. 49; *Holbr. Ichth. S. Carol.*
p. 159. lam. 23. f. 2.
S. erate, *Cuv.* & *Val.* v. p. 322; *Bleek. Verh. Bat. Genootsch.*
xxii. p. 4 et xxiii. *Sciara*, p. 26; *Cant. Catal.* p. 80; *Cuv.*
Régne, Anim. Ill. Poiss. lam. 31. f. 1.
S. tarkharia, *Cuv.* & *Val.* v. p. 324.
S. somnolentus, *Cuv.* & *Val.* v. p. 324.
S. incurvus, *Richards. Ichth. Chin.* p. 237.
L. auctoruui, *Gthr. I. c.* p. 338.
Hab. Luzón, Manila; China, Molucas.

6. Gén. GERRIES, *Cuv.*

28. **G. punctatus**, *C. U.* N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & *Val.* vi. p. 480; *Gthr. Cat. B. M.* i. p. 346 (1859).
Hab. Luzón, Manila, Cebú; China.

29. **G. japonicus**, *Birk.* N. v.

(M. S. T.)

Bleeker Japon. p. 404, et *Verh. Bat. Gen.* xxvi. *Japon.* lam. 5
f. 2; *Sthr. Cat. B. M.* sp. 351. (1859).
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China, Japón.

30. **G. kapas**, *Bleek.* N. sp.

(M. S. T.)

Bleeker, Riw., p. 482; *Gthr. Cat. R. M. I.*, p. 352, (1859).
Hab., Luzón, Manila.

7. Gén. SCOLEPSIS, *Gün.*

31. **S. ciliatus**, *(Lacep.)* N. sp.

(M. S. T.)

Holocentrus ciliatus, *Lacep.* iv, pp. 333, 371.

Lycogenis argyrosoma, *Kühl.* & *van Hasselt.*

Scolopsides lycogenis, *Cuv. & Val.* v, p. 346 lam. 127.

Sc. ciliatus, *Gthr. I. c. I.*, p. 355.

Hab., Luzón, Manila; C. de Cebú; Amboina, Java.

32. **S. japonicus**, *(Blch.)* N. sp.

(M. S. T.)

Anthias japonicus, *Blch.* lam. 325, f. 2; *Bl. Schn.* p. 307.

Lutjanus japonicus, *Laép.* iv, p. 31.

Knrete, *Russell*, lam. 106.

Scolopsis kate, *Cuv. & Val.* v, p. 329.

Sc. kurite, *Rüpp. Att. Fische*, p. 9 lam. 2, f. 3; *Cuv. & Val.* v, p. 331.

Scolopsides ruppelii, *Cuv. & Val.* v, p. 332; *Richardson, Ichth. China*, p. 236.

Sc. japonicus, *Gthr. I. c.*, p. 354.
Hab., Luzón, Cavite; China.

33. **S. bimaculatus**, *Rüpp.* N. sp.

(M. S. T.)

Scolopsis bimaculatus, *Rüpp. Att. Fische*, p. 8 lam. 2, f. 2, et 3 (*N. W. Fische*, p. 126); *Cuv. & Val.* v, p. 340; *Gthr. I. c.*, 357.

Scolopsides tenuitatus, *(Ehrenb.)* *Cuv. & Val.* *I. c.*

S. inermis, *Rich. Ichth. China*, p. 236 (*no Schleg.*)
Hab., Luzón, Manila; China.

34. **S. cancellatus**, *C. V.*

?*Scolopsis lineatus*, *Quoy. & Gaim.* *Voy. de l' Astral*, lam. 60, 1.
3 (*very bad*).

Scolopsides cancellatus, *Cuv. & Val.* v, p. 351; *Bleek. Verk. Batav. Genootsch.* xxiii. *Sciawi.* p. 28; *Gthr. I. c.*, p. 361.
Hab., Marianas; Sumatra.

35. **S. bleekeri**, *Bleek.*

Scolopsides lineatus, *Bleeker, Solor*, p. 37. (*no Rüpp.*); *Gthr. Cat. R. M. I.*, p. 361 (1859).
Hab., C. de Cebú.

8. Gén. HETEROGNATHODON, Blkr.

36. **H. nemurus**, Blkr.

Bleeker, *Celebes*, iii, p. 754; *Gthr. l. c. t.*, p. 365.
Hab. Cebú; Batavia.

9. Gén. SYNAGRIS, Gthr.

37. **S. japonicus**, (Bloch) N. v.

M. S. T.

Sparus japonicus, Bloch, t. 277, f. 1.
Dentex blochii, Bleeker, *Natuurk. Tijdschr. India* 1851, p. 176,
S. japonicus, *Gthr. l. c. t.*, p. 378.
Hab. Luzón, Manila; Batavia.

38. **S. sinensis**, (Lacép.) N. v.

(M. S. T.)

Sparus sinensis, Lacép., iv, p. 46.
Deutex setigerus, Cuv. & Val., v, p. 253; *Faun. Japon Poiss.*,
p. 73 lam. 37, f. 1.
Sy. sinensis, *Gthr. l. c. t.*, p. 379.
Hab. Luzón, Manila; China.

10. Gén. DENTEX, Cuv.

39. **D. nematophorus**, Blkr., N. v.

(M. S. T.)

Dentex nematophorus, Bleeker, *Sumatra*, iii, p. 500.
Synagris nematophorus, *Gthr. l. c. t.*, p. 379.
Hab. Luzón, B. de Manila; Sumatra.

11. Gén. PENTAPUS, Cuv.

40. **P. paradiseus**, *Gthr.* N. v.

Güüther, *Cat. B. M. S. t.* 1859, p. 883 lam. xxiv, f. A.
Hab. Marianas; Sumatra.

12. Gén. COESIO, Cuv.

41. **Cœ. maculatus**, C. I^r, N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & Val. vi, p. 439; *Gthr. Cat. B. M. t.*, p. 391 (1859).
Hab. Cebú; Hong-kong; China.

42. **Cœ. tile**, C. I^r N. v.

Cuv. & Val. vi, p. 428; *Less. Voy. Cog. Zool. Poiss.*, p. 181.
Cuv. Regne Anim. Ill. Poiss. lam. 36, f. 2; *Gthr. Cat. B. M. t.*, p. 393 (1859).
Hab. Carolinas.

Fam. MULIDOS.

1. Gen. UPENEOIDES, Blkr

1. **U. vittatus.** (Forck, N. v.

(M. S. T.)

Mullus vittatus, *Forskal Faun. Arab.* p. 31; *L. Gm. Syst. Nat.* i. p. 1341; *Bl. Schn.* p. 79; *Lacep. iii.* pp. 382, 401; *Iam.* 14, t. 1, *Shaw, Zoot.* iv. p. 616; *Iam.* 89.

Russell, *Iam.* 158.

Mullus baudii, *Shaw, Zoot.* iv. p. 515.

Upeneoides vittatus, *Gthr. I. cit.* t. p. 397.

Hab. Luzón, B. de Manila; Batangas; Nasugbu; Amboina; Ceilan.

2. **U. tragula.** (Richard) N. v.

(M. S. T.)

Upeneus tragula, *Richardson Ichth. China*, p. 220.

Upeneoides variegatus, Bleeker, *Pere.* p. 64 et *Act. Soc. Nedert.* ii. *Amboina*, p. 48.

U. tragula, *Gthr. I. cit.* t. p. 398.

Hab. Luzón, B. de Manila; China, Amboina.

3. **U. subvittatus.** (Tem. et Sch.) N. v.

(M. S. T.)

Mullus subvittatus, *Tem. et Schleg. Faun. Japon. Poiss.* p. 30.

Upeneus subvittatus, *Richardson Ichth. China*, p. 219; *Gthr. Cit.* B. M. t. p. 397 (1859).

Hab. Luzón, B. de Manila; China, Japon.

4. **U. sulphureus,** C. V. N. v. Saramulete.

(M. S. T.)

Valent. iii. p. 504 fig. 505; Renard, i. 43, 216.

Upeneus sulphureus, *Civ. & Val.* iii. p. 450.

? Hypeneus vittatus, var., *Cant. Catal.* p. 35.

Upeneoides sulphureus, Bleeker, *Act. Soc. Nedert.* ii. *Amboina* p. 45; *Gthr. I. cit.* t. p. 398.

Hab. Luzón, B. de Manila; China, Mar Rojo.

5. **U. moluccensis.** Blkr. N. v.

(M. S. T.)

Bleeker, *Amboina*, vi. p. 409; *Gthr. loc. cit.* t. p. 399.

Hab. Luzón, Manila; Amboina.

6. **Upeneoides, esp.** N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, B. de Manila.

2. Gen. MULLES, Lin.

7. **Mullus, esp.** N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila.

3. Gén. MULLOIDES, Blekr.

8. M. flavolineatus, Lacép. N. v.

(M. S. T.)

Mullus flavolineatus, Lacép. iii. p. 406.

M. aureovittatus, Shaw, Zool. iv. p. 418.

Hypeneus flavolineatus, Cuv. & Val. iii. p. 456; Rüpp. N. II.
Fische, p. 101 t. 26, f. 1; Jenyns, Zool. Bengal. Fischer p. 24.

Hypeneus flavolineatus, var., Cant. Catal. p. 36.

Mulloides flavolineatus, Bleek. Ceram. ii. p. 607; Gthr. l. cit.
p. 403.

Hab. Luzón, Manila; China; Madagascar.

4. Gén. UPENEUS, Blekr.

9. U. indicus, (Shaw) N. v.

(M. S. T)

Russell ii. p. 42 lam. 157.

Mullus indicus, Shaw, Zool. iv. pt. 2. p. 614.

Hypeneus russelli, Cuv. & Val. iii. p. 465; Richards Ichth. China
p. 220; Bleeker, Perc. p. 62.

U. indicus, Gthr. l. cit. p. 406.

U. waigensis, Cuv. & Val. iii. p. 466.

Hab. Luzón, Camarines Sur, Pasacao; China.

10. U. pleurospilos, Bleeker.

Bleeker, Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. iv. p. 110, et Verhand Batav. Genootsch xxvi. Japon, p. 69; Gthr. l. cit. p. 407.
Hab. Cebú; Amboina.

11. U. malabaricus, C. B. N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & Val. iii. p. 467; Gthr. C. B. M. l. p. 407 (1859).

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Cebú; Malabar.

12. U. barberinus, Lacép. N. v.

(M. S. T.)

Mullus barberinus, Lacép. iii. p. 406, lam. 13, f. 3.

Hypeneus barberinus, Cuv. & Val. iii. p. 462; Rüpp. N. II.
Fische, p. 101; Gthr. l. cit. p. 405.

Hab. Luzón, B. de Manila, Cebú; Moluccas.

13. U. trifasciatus (Lacép.) N. v

(M. S. T.)

Mullus bifasciatus, Lacép. iii. p. 494, lam. 14, f. 2.

M. tritasciatus, Lacép. iii. p. 404, lam. 15, f. 1.

M. multitasciatus, Quoy & Gaim. Voy. Freyc. pl. 59, f. 1.

Hypeneus bifasciatus, Cuv. & Val. iii. p. 468.

U. trifasciatus, Cuv. & Val. iii. p. 468; Jenyns, Zool. Beagle.
Fishes p. 25; Bleek. Banda, i. p. 237; Gthr. l. cit. p. 407.

Vian. Crac. s. p. 263, f. 150; Wood. Nat. Hist. 3. p. 238, fig.

Hab. Irian, Banda, Nesiung, etc. Cebú, Mindanao; China.

14. **U. atherinoides.** *C. V.*

atherinoides, *Cuv. et Val.* vii, p. 526; *Gthr. Cat. B. M.* i, p. 404 (1859).
Hab. Marianas, Guam.

15 **U. chrysopleuron,** *T. et Sch. N. v.*

(M. S. T.)

tullus chrysopleuron, *Temm. & Schleg. Faun. Japon. Poiss.* p. 29, lam. 12, t. 1.

peneus bicarinatus, *Gray, Rich Ichth. China*, p. 219.
p. neoides chrysopleuron, *Bleek. Verhand. Batav. Genootsch.* xxv, *Japan*, p. 10.

peneus chrysopleuron, *Bleek. I. c. xxvi. Japan*, p. 70; *Gth. l. cit.* p. 410.
Hab. Samar, Villareal; China.

Fam. ESPÁRIDOS.

1. Gén. CANTHARUS Cuv.

1. **C. grandoculis.** *C. V.*

Cuv. & Val. vi, p. 343; *Cuv. Regne Anim. Ill. Poiss.* lam. 35 t. 3; *Gthr. Cat. B. M.* i, p. 417 (1859).
Hab. Marianas.

2. **C. cœruleus.** *C. V.*

Cuv. & Val. vi, p. 343; *Gthr. Cat. B. M.* i, p. 417 (1859).
Hab. Marianas, Guam.

3 **maculatus.** *C. V. N. v.*

(M. S. T.)

Cuv. & Val. vi, p. 343; *Gthr. Cat. B. M.* i, p. 417 (1859).
Hab. Luzón, Manila; Oce. Indico.

4 **C. lineolatus.** *C. V. N. v.*

(M. S. T.)

Cuv. & Val. vi, p. 344; *Gthr. Cat. B. M.* i, p. 418 (1859).
Hab. Luzón, Cavite, Naic; Oceano Indico.

2. Gén. GIRELLA, GRAY.

5 **G. punctata.** *Gray. N. v.*

(M. S. T.)

Girella punctata, *Gray, Ill. Ind. Zool.* lam. 98 t. 3, 4; *Gthr. Cat. V.* p. 427.

Melanichthys, *Temm. & Schleg. Faun. Japn. Poiss.* p. 75 (tab. 3).
Orendiens punctatus, *Richardson Ichth. Chin.* p. 242.

C. melanichthys, *Richardson Ichth. Chin.* p. 242.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China, Japon.

Fam. PAGRÍNIDOS.

1. Gen. LETRINUS, Cuv.

1. *L. richardsonii*, Gthr. N. v.

(M. S. T.)

Lethrinus hematopterus, Richardson, Zool. Sulph. Fishes, p. 144; lam. 64 t. 1. 3; Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. Japon, p. 91; *L. richardsonii*, Gthr. Cat. B. M. 1, p. 456 (1859).
Hab. Luzón, Manila; Hong-kong, China.

2. *L. nemacanthus*, Blkr. N. v.

Bleeker Japon, p. 403, Verhand. Batav. Genootsch. xxvi. Japon, p. 91; lam. 6; Gthr. Cat. B. M. 1, p. 456 (1859).
Hab. Cebú; Japon.

3. *L. harak*, Forsk. N. v.

(M. S. T.)

Sciana harak, Forsk. p. 52.
Lethrinus harak, Rüpp. N. W. Fische, p. 116 lam. 29 f. 3; Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xxiii. Spar. p. 15; Gthr. 1. c. 1, p. 458.
Lethrinus erythrurus, Cuv. & Val. vi. p. 293.
Lethrinus rhodopterus, Bleek. Singapore, i. p. 65.
Hab. Luzón, Manila, Batangas, Nasugbú; Mar Rojo.

4. *L. ramak*, Forsk. N. v.

(M. S. T.)

Sciana ramak, Forsk. p. 52.
Lethrinus ehrenbergii, Cuv. & Val. vi. p. 312.
L. ramak, Rüpp. N. W. Fische, p. 117; lam. 28 fig. 3; Gthr. 1. c. 1, p. 459.
Hab. Luzón, Manila, Nasugbú, Cebú; Mar Rojo, Ceilán.

5. *L. leutjanus*, Lacep. N. v.

(M. S. T.)

Bodianus leutjanus, Lacep. iv. p. 281.
Lethrinus leutjanus, Cuv. & Val. vi. p. 309; Gthr. 1. c. 1, p. 461.
Lethrinus leutjanus, Bleek. Verhand. Bat. Genootsch. xxiii. Spar. p. 14.
Hab. Luzon, B. de Manila; Sumatra.

6. *L. mahsenoides*, C. V. N. v.

(M. S. T.)

Lethrinus mahsenoides, Cuv. & Val. vi. p. 286; Gthr. 1. c. 1, p. 464.
Lethrinus mahsenoides, Bleek. Ver. Bat. Genootsch. xxiii. Spar. p. 15.
Hab. Luzon, B. de Manila; Amboina.

≡ Gen. SPHERODON, Bleeker.

7. **Eph heterodon**, Bleeker.

Pagrus heterodon, Bleeker, Gilolo, p. 54.
Sphaerodon heterodon, Gütz, L. cit. i, p. 495.
Hab. Cebú; Ceilán.

3. Gén PAGRUS, Cuv.

8. **P. unicolor**, Quoy & Gaimard.

(M. S. T.)

Chrysophrys unicolor, Quoy & Gaimard, Voy. Uranie, p. 200.
Pagrus unicolor, Cuvier & Valenciennes, vi, p. 162; Richardson, Ichth. China, p. 242; Gthr. L. cit. i, p. 468.
P. guttulatus, Cuvier & Valenciennes, vi, p. 160; Less, Voy. Coq. Zool. ii, p. 188.
Hab. Luzon, Manila, Navotas; Australia, Hong-kong, China.

9. **P. cardinalis**, Lacepède.

(M. S. T.)

Sparus cardinalis, Lacepède, iv, p. 141.
Chrysophrys cardinalis, Cuvier & Valenciennes, vi, p. 130; Faun. Japon. Poiss., p. 69; pl. 33; Richardson, Ichth. China, p. 240.
Pagrus cardinalis, Gthr. L. cit. i, p. 470.
Hab. Luzon, Manila, Navotas; China.

10. **P. major**, Temm. et Schlegel.

(M. S. T.)

Chrysophrys major, Temm. & Schlegel, Faun. Japon. Poiss., p. 71
lam. 35.
Pagrus major, Gthr. L. cit. i, p. 470.
Hab. Luzón, Manila, Malabón, China, Australia.

11. **P. spinifer**, Forskål.

Sparus spinifer, Forskål, p. 32; L. Gmelin, i, p. 1273; Bl. Schenck, p. 281; Russell, ii, p. 1, lam. 101.
Pagrus spinifer, Cuvier & Valenciennes, vi, p. 156; Rüppell, N. W. Fische, p. 145; Gthr. L. cit. i, p. 472.
P. longifilis, Cuvier & Valenciennes, vi, 159; Bleeker, Celebes, iii, p. 756.
Hab. Cebú; China.

4. Gén CHRYSPHYS, Cuv.

12. **Charies**, Temm. et Schlegel.

(M. S. T.)

Temm. & Schlegel, Faun. Japon. Poiss., p. 68, lam. 31; Bleeker, Verhandl. Batav. Genootsch xxvi, p. 87; Gthr. L. cit. p. 480.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China, Java.

12 Ch. hasta, Bl. N. v.

(M. S.)

- Sparus hasta*, Bl. Schn. p. 275.
Cirrus datnia, Bach. Ham. Fisch. Gauj. p. 48 lam. 9. I. 26.
Chrysophris longispinis, Cuv. & Val. vi. p. 110; Bleeker, Verhandl. Batav. Genootsch xxv. Nalez Faun. Beng. & Hind. p. 93.
Ch. berda, Cuv. & Val. vi. p. 113; Richardson, Ichth. China, p. 240.
Ch. longispinis, Faun. Japon. Poiss. p. 68 pl. 32 Richardson, Ichth. China p. 240.
Ch. schlegelii, Bleeker, Japon. p. 400, et Verhandl. Batav. Genootsch. xxvi. p. 86.
Ch. calamara, Cant. Catal. p. 48 (no C. & V.).
Ch. xanthopoda, Richardson, Ichth. China, p. 241.
Ch. auripes, Richardson, l. c. 1.
Ch. hasta, Gthr. l. cit. 1. p. 490.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Ceilan, China.

14 Ch. calamara, Russell N. v. Dorada.

(M. S. T.)

- Calamara*, Russell, i. lam. 92.
Chrysophris calamara, Cuv. & Val. vi. p. 117; Bleeker, Verhandl. Batav. Genootsch. xxiii. Spar. p. 10; Gthr. l. cit. 1. p. 403.
Ch. berda, Bleek. Topogr. Batav. et Ichth. Madura.
Hab. Luzón, Manila, Batangas, Nasugbú; Archip. Indico.

5. Gén. PIMELEPTERUS, Cuv.

15. P. tahlmel, Forsk. N. v.

(M. S. T.)

- Sciæna tahlmel*, Forsk. p. 53.
Pimelepterus attipinus, Cuv. & Val. vii. p. 270; Bleek. Banki. ii. p. 727.
P. tahlmel, Rupp. N. W. Fische, p. 35 lam. 10. f. 4; Gthr. l. cit. 1. p. 499.
Hab. Luzón, B. de Manila; Mar Rojo, N.^a Guinea.

Fam. QUETODÓNTIDOS.

1. Gén. CHETODON, ARTEGU

1 Ch. setifer, Bl. N. v.

(M. S. T.)

- Rivard*, i. p. 29. f. 198, ii. lam. 31. f. 145; Valent. iii. p. 385. f. 110; Seba, iii. t. 25 f. 11.
Chetodon setifer, Bl. t. 426. f. 1. Bl. Schn. p. 225; Cuv. & Val. vii. p. 76; Guérin, Insomagr. Poiss. lam. 22. f. 1; Less. Vor. Coq. Zool. ii. p. 175; Poiss. lam. 29. f. 2; Richardson, Ichth. China. p. 216; Cuv. Régne Anim. Ill. Poiss. lam. 38. t. 1; Jenyns. Zool. Beagle, Fishes, p. 61; Gthr. Cat. B. M. 2. p. 6 (1860).
Pranacanthus filamentosus, Lacép. iv. pp. 506, 511.

- Chaetodon sebanus, *Cuv. & Val.*, vii, p. p. 74.
Ch. auriga, var., *Rüpp. N. W. Fische*, p. 28.
Ch. lunaris, *Gronov. Syst. ed. Gray*, p. 70.
Ch. auriga, *Bleek. Célebes*, iv, p. 164.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Amboina, China.

2. Ch. ephippium, *Cuv. N. v.*

(M. S. T.)

- Chaetodon ephippium, *Cuv. & Val.*, vii, p. 80, lam. 174; *Less. U. Coq. Zool.*, ii, p. 174; *Poiss. lam.*, 29, f. 15; *Bleek. Amboina*, p. 330; *et Floris*, p. 325; *Gthr. L. c.*, 2, p. 7.
Ch. garnotii, *Less. L. c.*
Hab. Luzón, Currimao, Ilocos; Molucas, Philippines.

3. Ch. nesogallicius, *Cuv. N. v.*

(M. S. T.)

- Renard, *Poiss. Mol.*, i, lam. 5, f. 37.
Chaetodon nesogallicius, *Cuv. & Val.*, vii, p. 63; *Bleek. Banda*, i, p. 240.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Amboina.

4. Ch. ocellatus, *Bloch. N. v.*

(M. S. T.)

- Bloch*, iii, p. 105, lam. 211, f. 2; *Bl. Schn.*, p. 223; *Cuv. & Val.*, vii, p. 75, (no *Bleek. Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indië*, vi, p. 212); *Gthr. Cat. B. M.*, 2, p. 10 (1800).
Hab. Luzón, Manila, Malabón; Indias Orientales.

5. Ch. modestus, *Timm. N. v.*

(M. S. T.)

- Chaetodon modestus, *Timm. & Schleg. Faun. Japon.* *Poiss.*, p. 8, lam. 41, f. 2; *Gthr. Cat. B. M.*, 2, p. 10.
Ch. ocellatus, *Gronov. Syst. ed. Gray*, p. 68.
Hab. Luzón, Manila; China.

6. Ch. unimaculatus, *Bloch. N. v.*

(M. S. T.)

- Bloch*, t. 201, f. 1; *Bl. Schn.*, p. 221; *Cuv. & Val.*, vii, p. 72; *Cuv. Régne. Anim. Ill. Poiss.* lam. 39, f. 3; *Bleek. Banda*, i, p. 241; *Gthr. Cat. B. M.*, 2, p. 11 (1800).
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

7. Ch. meyeri, *Bl. N. v.*

(M. S. T.)

- Valent.* iii, p. 455, f. 347; *Renard*, i, 25, 135.
Chaetodon meyeri, *Bl. Schn.*, p. 223; *Cuv. & Val.*, vii, p. 19; *Cuv. Régne. Anim. Ill. Poiss.* lam. 37, f. 2; *Bleek. Act. Soc. Nederl.*, i, *Amboina*, p. 37; *Gthr. L. c.*, 2, p. 13.
Holacanthus flavo-niger, *Lacép.* iv, pp. 529, 538, lam. 13, f. 2.
Hab. Luzón, Cavite, Naic; Amboina, Célebes.

8. Ch. ornatissimus, *Cuv. N. v.*

- Chaetodon ornatissimus, (*Solander*), *Cuv. & Val.*, vii, 22; *Less.*

Voy. Cog. Zool. ii, p. 170, lam. 30, f. 1 *Bleek. Act. Soc. Nederl.* ii, *Amboina*, p. 55; *Gthr. l. c. 2.* p. 15.
Ch. ornatus, *Gray. Zool. Miscell.* p. 33, et in *Griff. Anim. Kingd.* x, p. 323, lam. 20.
Hab. Carolinas.

9. **Ch. reticulatus**, *C. U. N.* v.

Cuv. & Val. vii, p. 32, lam. 171; *Less. Voy. Cog. Zool. Poiss.* p. 178, lam. 30, f. 2; *Gthr. Cat. B. M.* 2, p. 22 (1860).
Hab. Marianas.

10. **Ch. kleinii**, *Bloch.* N. v.

(M. S. T.)

Klein, *Miss.* iv, lam. 10, f. 2, 255.
Chatonon kleinii, *Bloch*, lam. 218, f. 2; *Bl. Schn.* p. 225.
Ch. virescens, *Cuv. & Val.* vii, p. 30; *Bleek. Verh. Batav. Genootsch.* xiii, *Chaetodon*, p. 18; *Gthr. l. c. 2.* p. 22.
Ch. flavescens, *Benn. Proc. Com. Zool. Soc.* i, p. 61.
Hab. Luzón, Manila; Java, Amboina.

11. **Ch. fasciatus**, *Forsk.* N. v.

(M. S. T.)

Chaetodon fasciatus, *Forsk.* p. 59; *Gm.* p. 1266; *Cuv. et. Val.* vii, p. 61; *Gthr. l. cit. 2.* p. 24.
Ch. flavus, *Bl. Schn.* p. 225; *Rüpp. Atlas. Fische*, p. 40, lam. 9, f. 1.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; China.

12. **Ch. lunula**, *Cuv.*

Pomacentrus lunula, *Lacép.* iv, pp. 507, 510, 513.
Chaetodon lunula, *Cuv. & Val.* vii, p. 59, lam. 173; *Bleek. Gilolo*, p. 57; *Gthr. l. cit. 2.* p. 25.
Hab. Marianas.

13. **Ch. vagabundus**, *Linn.* N. v.

(M. S. T.)

Renard, i, 23, 126.
Chaetodon vagabundus, *Linn. Mus. Ad. Fried.* ii, p. 71, et *Syst.* i, p. 495; *L. Gm.* p. 1251; *Bl. lam.* 204, f. 2; *Bl. Schn.* p. 222; *Cuv. & Val.* iii, p. 50; *Bleek. Verhand. Batav. Genootsch.* xxiii, *Chaetod.* p. 18, (*no Benn.*); *Gthr. l. cit. 2.* p. 25.
Hab. Luzón, Batangas, Nasugbú, Cavite, Naic, Cebú.

14. **Ch. ocellicauda**, *C. U. N.* v.

(M. S. T.)

Cuv. & Val. vii, p. 69; *Gthr. l. cit. 2.* p. 29.
Hab. Luzón, Cavi e; Oceano Indico.

15. **Ch. lineolatus**, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

Chaetodon lineolatus, *Cuv. & Val.* vii, p. 40; *Bleek. Florio*, p. 323.

C. labiatus, (*Ehrhardi*) *Cuv.* & *Val.* vii, p. 57; *Rüpp.* N. II
Fische, p. 30, t. 9, f. 3; *Gthr.* I. cit. 2, p. 30.
Chetodon semilarvatus, (*Ehrhardi*) *Cuv.* & *Val.* vii, p. 39 *Young*
Hab. C. de Mindoro; Mar Rojo.

16. *Ch. milkaris*, *Q. et G.* N. v.

M. S. 1.

Quoy. & *Gaim.* *Voy. Previ.* *Zool.* p. 380, lam. 62, t. 6, (?) *Cuv.*
& *Val.* vii, p. 26; *Voy. Bonite.* *Poiss.* p. 163, lam. 2, t. 2; *Gthr.*
I. cit. 2, p. 30.
Hab. C. de Mindoro; Islas Sandwich.

17. *Ch. tau nigrum*, *C. V.*

Cuv. & *Val.* vii, p. 38; *Gthr.* I. cit. 2, p. 32.
Hab. Marianas, Guam.

18. *Ch. citrinellus*, (*Brouss.*) *N. v.*

M. S. 1.

Renard, i, lam. 8, f. 59.
Chetodon citrinellus, (*Brouss.*) *Cuv.* & *Val.* vii, p. 27; *Regne*
Anim. III. Poiss. pl. 39, f. 1; *Bleek.* *Sumatra*, iii, p. 501; *Gthr.*
I. cit. 2, p. 33.
Hab. Luzón, Batangas, Nasugbú, Cavite, Naia.

19. *Ch. sp*

Hab. C. de Cebú.

20. *Ch. chrysozonus*, (*Kuh.* & *v. Hass.*)

Chetodon chrysozonus, (*Kuhl.* & *v. Hass.*) *Cuv.* & *Val.* vii, p. 82;
Cuv. Régne Anim. III. Poiss. lam. 38, t. 2, *Bleek.* *Verhandl.*
Batav. Genootsch. xxiii, *Chetodont.* p. 17; *Gthr.* I. cit. 2, p. 34
C. labiatus, (*Kuhl.* & *v. Hass.*) *Cuv.* & *Val.* vii, p. 83.
C. melanopus, *Cuv.* & *Val.* vii, p. 84.
C. guttatus, *Gronov. Syst. ed Gray.* p. 71.
Hab. Luzón, Manila; China, Molucas.

21. *Ch. sp*

Hab. C. de Cebú.

22. *Ch. oligacanthus*, *Blk.* N. v.

M. S. 1.

Bleeker. *Verhandl. Batav. Genootsch.* xxiii, *Chetodont.* p. 6; *Gthr.*
I. cit. 2, p. 34.
Hab. C. de Samar v. de Cebu

23. *Ch. sp.*

Hab. Cebú.

24. Ch. strigatus *Langsd.* N. v.

M. S. T.)

Chetodon strigatus, (*Langsd.*) *Cuv.* & *Val.* vii, p. 25, lam. 120;
Faun. Japon. *Poiss.* p. 80, lam. 41, f. 1; *Bleek. Verhand. Batav.*
Genootsch. xxvi. *Japon.* p. 94; *Gthr. I. cit.* 2, p. 34;
Hab. Luzón, Cavite; China.

25. Ch sp.

Hab. C. de Cebú.

26. Ch. polylepis, *Bleeker*. N. v.

M. S. 1

Bleeker, *Act. Soc. Indo. Nederl.* ii. *Amboina*, p. 54; *Gthr. I.*
cit. 2, p. 35.
Hab. Luzón, Manila; Amboina.

2. Gén. CHELMO, *Cuv.*

27. Ch. rostratus, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

Seba, iii, lam. 25 f. 17.
Chetodon rostratus, *L. Mus. Ad. Fried.* i, p. 61, lam. 33, f. 1.;
L. Gm. p. 1244; *Bl. lam.* 202, f. 1; *Bl. Schn.* p. 221; *Shaw.*
Zool. iv, p. 337, lam. 47; *Gronov. Syst. ed.* *Gray*, p. 73.
Jaculator schlosseri, *Phil. Trans.* 1764, p. 39, lam. 9.
Chetodon enceladus, *Shaw.* *Nat. Misc.* p. 2, lam. 67.
Chelmon rostratus, *Cuv.* *Régne. Anim.*; *Benn.* *Life of Raffles*,
p. 689; *Cuv.* & *Val.* vii, p. 87; *Cant. Catal.* p. 158; *Cuv.*
Régne Anim. III. *Poiss.* lam. 40, f. 1; *Bleek. Verhand. Batav.*
Genootsch. xxiii. *Chetod.* p. 20; *Gthr. I. cit.* 2, p. 36; *Wood.*
Nat. Hist. 3, p. 243, fig.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Célebes, Australia.

3 Gén. HENIOCHUS, *C. V.*

28. H. macrolepidotus, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

Renard, i, 3, 13, 31, 168, ii, 14, 66; *Ruysech.* i, n.° 3; *Valent.*
iii, figs. 18, 201, 524, 372, 409; *Seba*, iii, 25, 8.
Chetodon macrolepidotus, *Arvedi*, *Species*, p. 94; *L. Syst.* i, p.
464; *L. Gm.* p. 1248; *Bl. lam.* 200, f. 1; *Lacép.* ix, p. 455,
lam. 11, f. 3 et lam. 12, f. 1; *Bl. Schn.* p. 321; *Gthr. I. cit.*
2, p. 39.
Ch. acuminatus, *L. Mus. Ad. Fried.* lam. 33, f. 3.
Ch. bifasciatus, *Shaw.* *Zool.* iv, p. 342; *Gronov. Syst. ed.* *Gray*,
p. 75.
Heniochus acuminatus, *Cuv.* & *Val.* vii, p. 98.
H. permutteri, (*Bennett*) *Cuv.* & *Val.* vii, p. 99.
H. macrolepidotus, *Cuv.* & *Val.* vii, p. 93; *Faun. Japon.* *Poiss.*
p. 82, lam. 44 f. 1; *Ricards. Ichth. Chin.* p. 246; *Bleeker.*
Verh. Bat. Gen. xxiii. *Chetod.* p. 21.

Diphreutes macrolepidotus, *Cant. Catal.* p. 150.
Hab. C. de Cebú; Amboina, Ceilan.

22. **H chrysostoma**, *C. V.* N. v.

(M. S. T.)

? *Heniochus chrysostomus*, (*Perkins.*) *Cuv. & Val.* vii. p. 99;
Cuv. Régne Anim. Ill. Poiss. lam. 40. f. 2.
H. chrysostoma, (*Solander.*) *Voy. Beech. Zool.* p. 62, lam. 18. 4.
1; *Gthr. l. cit. 2.* p. 41.
H. melanistion, *Bleeker.*, *Banda*, iii. p. 98.
Hab. Luzon, Manila; Amboina.

4. Gén. HOLACANTHUS, LACÉP.

30. **H. bicolor**, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

Renard, i. lam. 19, f. 106.
Chetodon bicolor, *Bl.* t. 206. f. 1; *Bl. Schn.* p. 218.
Holacanthus bicolor, *Cuv. & Val.* vii. p. 168; *Bleek.*, *Solor.* p.
77; *Gthr. l. cit. 2.* p. 50.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

31. **H. xanthometopon**, *Bleeker.* N. v.

(M. S. T.)

Bleeker., *Sumatra*, ii. p. 258; *Gthr. l. cit. 2.* p. 51.
Hab. Luzón, Cavite; Sumatra.

32. **H semicirculatus**, *Bl.* N. v.

(M. S. T.)

Holacanthus semicirculatus, *Cuv. & Val.* vii. p. 191, lam. 183;
Bleek., *Amboina*, vi. p. 414 (no Banka, p. 452); *Voy. Coqu.*
Zool. Poiss. p. 173, lam. 30. f. 3; *Gthr. l. cit. 2.* p. 53.
Chetodon microlepis, *Bleeker.*, *Sumatra*, ii. p. 257.
Hab. C. de Mindoro; Polinesia.

5. Gén. SCATOPHAGUS, C. V.

33. **Sc argus**, *Cuv.* N. v. *Quitang.*

(M. S. T.)

Piscis stercorarius, *Willughby.* *App.* p. 2, lam. 2. f. 2.
Renard, ii. 50, 211; *Valent.* iii. p. 403. f. 180; *Ruysch.*, *Pis-*
Amb. p. 33, lam. 17. f. 6; *Klein.*, *Mss.* iii. p. 36. n.^o 4; *Rus-*
sell, i. lam. 78.
Strontzisch., *Vienhof. Braz. Land-und Zee-Reise*, p. 269, lam. 208.
Chetodon argus, *L. Gm.* p. 1248; *Bl.* lam. 204. f. 1; *Bl. Schn.*
p. 232; *Shaw. Zool.* iv. p. 331.
C. paratalis, *Buch. Ham.* pp. 122, 372, lam. 16. f. 41.
Ephippus argus, *Cuv. Régne. Anim.*
Chetodon atramaculatus, *Benn. Ceyl. Fisc.* p. 18.
Scatophagus argus, *Cuv. & Val.* vii. p. 130; *Richards. Ichth.*
Chin. p. 245; *Bleek. Verh. Batav. Genootsch.* xxiii. *Chatod.* p.
34; *Gthr. loc. cit. 2.* p. 58.
Cacoduxus argus, *Cant. Catal.* p. 163.
Scatophagus macronotus, *Bleek. Topogr. Batav.*

Sargus inaequalis, *Gronov. Syst. ed Gray*, p. 65.
Hab. Luzón, B. de Manila, Nasugbu, Cebú, Visayas; China.

34. **Sc. ornatus**, *C. F. N. v. Quittang* (M. S. T.)

Cuv. & Val. vii. p. 142; *? Richards. Ichth. Chin.* p. 245; *Gthr. loc. cit.* 2, p. 59.
Hab. Luzón, B. de Manila, C. de Cebú; Amboina.

6. Gén. DREPANE, C. V.

35. **D punctata**, *Cuv. N v. Quittang* (M. S. T.)

Chetodon punctatus, *L. Gm.* p. 1243; *Shaw. Zool.* iv. p. 365.
C. longimanus, *Bl. Schn.* p. 231.
C. falcatus, *Lacep.* iv. pp. 452, 470.
Russell, *Kinimas* 79, 80, 81.
Ephippus punctatus, *Cuv. Regne Anim.*
F. longimanus, *Cuv. Regne Anim.*
D. punctata, *Cuv. & Val.* vii. p. 132, lam. 179; *Richards. Ichth. Chin.* p. 245, pt. *Am. & Mag. Nat. Hist.* x. 1842, p. 28; *Gthr. l. cit.* 2, p. 62.
D. longimanus, *Cuv. & Val.* vii. p. 133; *Richards. Ichth. Chin.* p. 246; *Bleek. Verh. Batav. Genootsch.* xxiii. *Chetod.* p. 28.
Harpochirus punctatus, *Cant. Catal.* p. 162.
H. longimanus, *Cant. Catal.* p. 163.
Hab. Luzón, B. de Manila, Mindoro; China.

Fam. TONÓTIDOS.

1. Gén. TONOTES, *Cuv.*

1. **T jaculator**, *Cuv. N v.* (M. S. T.)

Sciæna jaculatoria, *Pall. Spicil.* viii p. 41, et *Phil. Trans. Vol. li.* 1766, p. 186, lam. viii. f. 6.
Scarus schlosseri, *L. Gm.* p. 1282; *Lacep.* iv. pp. 5, 17; *Shaw. Zool.* iv. p. 398.
Labrus jaculatoria, *Lacep.* iii. pp. 425, 464; *Shaw. Zool.* iv. p. 485, lam. 68.
Cojus chatareus, *Buch. Ham.* pp. 201, 370, lam. 14, f. 34.
Toxotes jaculator, *Cuv. & Val.* vii. p. 314, lam. 192 *Cant. Catal.* p. 176; *Agass. Poiss. Foss.* iv. p. 262, lam. H. *Cuv. Régne Anim. III. Poiss.* lam. 44, t. 3; *Bleeker. Verh. Batav. Genootsch.* xxiii. *Chetod.* p. 31; *Gthr. l. cit.* 2, p. 67.
Hab. Luzón, Batangas, Nasugbu, Cavite, Sta. Cruz, C. de Cebú; Polinesia, Molucas.

Fam. CIRRITIDOS.

1. Gen. CIRRITICHTHYS, Bleeker.

1. **C. maculatus**, Lacep. N. v.

(M. S. T.)

Cirrhites maculatus, Lacep. v. p. 3; Cuv. & Val. iii p. 69.
Labrus marmoratus, Lacep. iii. p. 492, lam. 5, f. 3.
Cirrhites maculosus, Bennett, Zool. Journ. 1829, p. 38; Gthr.
l. cit. 2, p. 74.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Polynesia.

2. **C. aureus**, Temm. et Schleg. N. v.

(M. S. T.)

Cirrhites aureus, Temm. & Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 15,
lam. 7, f. 2, Gthr. loc. cit. 2, p. 75.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; China, Japan.

2. Gen. CHILODACTYLUS, Cuv.

3. **Ch. zonatus**, Cuv. N. v.

(M. S. T.)

Labe du Japon, Krusenst. Rose. All. lam. 63, f. 1.
Chioldactylus zonatus, Cuv. & Val. v. p. 365 lam. 129; Faun. Japon. Poiss. p. 64 lam. 29; Richards, Ichth. Chin., p. 339, Proc. Zool. Soc. 1850, p. 69, et Ann. & Mag. Nat. Hist. 1851, vii. p. 282; Bleek, Verhand. Batav. Genootsch. xxvi. Japan, p. 83; Gthr. l. cit. 2, p. 82.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

Fam. TRIGLIDOS.

1. Gen. SEBASTES, C. V.

1. **S. pachycephalus**, Temm. et Schleg. N. v.

(M. S. T.)

Temm. & Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 47 lam. 20, f. 3; Richards Ichthyol. Chin. p. 214; Gthr. l. cit. 2, p. 97.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

2. **S. marmoratus**, Cuv. N. v.

(M. S. T.)

Sebastes marmoratus, Cuv. & Val. iv. p. 345; Faun. Japon. Poiss. p. 46, lam. 21, f. 1, 2; Gthr. l. cit. 2, p. 104.
Holocentrus albo-fasciatus, Lacep. iv. p. 372.
Sebastes albo-fasciatus, Cuv. & Val. iv. p. 344.
S. sinensis, McClell. Calc. Journ. Nat. Hist. iv. p. 397, lam. 21
f. 3. *Cfr.* Richards, Ichth. Chin. p. 215.
Hab. Luzón, Manila; China.

3. **S. strongensis**, Cuv. N. v.

Scorpaena strongia, Cuv. & Val. iv. p. 323; Quoy. & Gaim. Voy. Astrol. Poiss. p. 688, lam. 11, f. 2; Less. Voy. Duperr. Zool. Poiss. p. 213.

Sc. cyanostigma, Bleeker, Burn. p. 100.
Sebastes strongensis, Gthr. l. cit. 2, p. 106.
Hab. Zamboanga, Mindanao, Marianas.

4. **S. minutus**, Cuv.

Cuv. & Val. iv. p. 348; Gthr. l. cit. 2, p. 106.
Hab. Marianas.

5. **S. polylepis**, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Scorpaena polylepis, Bleek. Natuurk. Tydschr. Nedert. Indie, 1851, ii. p. 173.
Sebastes polylepis, Gthr. l. cit. 2, p. 107.
Hab. Cebú; Sumatra.

2. Gén. SCORPÆNA, ARTEMI.

6. **Sc. guamensis**, Q. et G.

Quoy, et Gaim. Voy. Freyc. p. 326; Gthr. l. cit. 2, p. 107.
Hab. Marianas, Guam.

7. **Sc. picta**, Cuv. N. v.

(M. S. T.)

Scorpaena picta, (Kuhl & van Hass.) Cuv. & Val. iv. p. 323;
Cantor, Catal. p. 40; Gthr. l. cit. 2, p. 114.
Hab. C. de Cebú; Célebes.

8. **Sc. polyprión**, Blkr. N. v.

(M. S. T.)

Bleeker *Sclerop.* p. 21; et *Verhand. Batav. Genootsch.* xxii. *Bali*, p. 5, and *ibid. Sclerop.* p. 7; Gthr. l. cit. 2, p. 115.
Hab. Luzon, Batangas, Nasugbú, C. de Mindoro; Borneo.

9. **Sc. haplodactylus**, Bleek. N. v.

Scorpaena bandanensis, Bleeker, *Banda*, i. p. 237.
Sc. aploactylus, Ceram. ii. p. 698; Gthr. l. cit. 2, p. 117.
Hab. Cebú; Ceram.

10. **Sc. diabolus**, Cuv. N. v.

(M. S. T.)

Ikan satan, Renard, ii. pl. 8 f. 35; Valent. iii. p. 309, f. 170;
Duhamel, Pêches, ii. sect. 5 p. 92 lam. 3, f. 1.
Scorpaena diabolus, Cuv. & Vol. iv. p. 312; Richards, Ichth. Voy.

Sulph., p. 76 lam. 40; *Bleeker*, *Amboina & Ceram*, p. 266; *Gthr.*,
t. cit., 2, p. 117.
Hab. Cebú; China, Amboina.

11. **Sc. gibbosa**, *Bl.* N. v.

(M. S. T.)

Bl. *Schn.*, p. 192, lam. 44; *Trosch. Arch. Naturgesch.* vi. *Band.*,
1, p. 274; *Bleek. Act. Soc. Nederl.* i. *Amboina*, p. 31; *Gthr.*,
t. cit., 2, p. 118.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Amboina, China.

12. **Sc. cirrhosa**, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

Perca cirrhosa, *Chunb.* *Nya Handl.* *Stockh.* xiv. 1703, p. 199,
lam. 7, f. 2.
Scorpaena cirrhosa, *Cuv. & Val.* iv. p. 318; *Faun. Japon.*, *Poiss.*,
p. 42, lam. 17, f. 2, 3; *Bleeker*, *Verhand. Batav. Geuwtsch.*
xxvi. p. 79; *Gthr. t. cit.*, 2, p. 120.
S. barbata, *Rüpp.* *N. W. Fische*, p. 105, lam. 27, f. 1.
?Scorpaena leonina, *Richards. Ichth. Chin.* p. 216.
Scorpaena oxycephalus, *Bleek.* *Sclerop.* p. 20, & *Verh. Batav.*
Genootsch. xxii. *Sclerop.* p. 7.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

13. **Sc. laniaria**, *C. V.* N. v. ,

Cuv. & Val. iv. p. 324; *Gthr. t. cit.*, 2, p. 121.
Hab. Marianas, Guam.

3. Gén. PTEROIS, *Cuv.*

14. **Pt. volitans**, *Cuv.* N. v. Bantol.

Seba, iii. 28, 1, (*bad*). *Renard*, *Poiss.* i. 6, 41, i. 43, 215, ii.
15, 72; *Valentyu*, *Ind.* iii. p. 413 f. 210, et p. 415, f. 213;
Lacep. ii. t. 17, f. 3; *Russell*, lam. 133.
Amboynese visch, *Nieuw. Bras. Lant-en Zee-Reize*, p. 268.
Gasterosteus volitans, *L.* i. p. 491.
Perca, *sp.*, *Gronov. Zoophye*, n.^o 294.
Scorpaena volitans, *L. Gm.* i. p. 1217; *Bloch*, t. 184; *Bl. Schn.*,
p. 193; *Gronov. Syst. ed.* *Gray*, p. 119; *Bennett. Fisches, of*
Ceylon, lam. 1.
Scorpana ahe, *Lacep.* iii. p. 278.
Pterois volitans, *Cuv. & Val.* iv. p. 352, lam. 88; *Bleeker. Berhand.*
Batav. Genootsch. xxii, *Sclerop.* p. 8; *Rüpp.* *N. W. Fische*,
p. 107; *Gthr. loc. cit.*, 2, p. 122.
Hab. Cagayan de Misamis, Mindanao, Paragua; China.

15. **Pt. antennata**, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

Pseudopterus sp., *Klein. Miss.* v. p. 76, n.^o 1, lam. 4, f. 6.
Scorpaena antennata, *Bl.* t. 185; *Bl. Schn.* p. 193.
Pterois antennata, *Cuv. & Val.* iv. p. 361; *Less. Voy. Coq. Zool.*
Poiss. p. 212; *Bleek. Solor*, p. 72; *Gthr. t. cit.*, 2, p. 124.

P. geniserra, *Cuv.* & *Val.* iv. p. 366; *Belanger*, *Voy. Ind. Orient.* p. 353, lam. 1, f. 2,
Pterois russellii, *Benn.*, *Proc. Comm. Zool. Soc.* i. p. 128.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China, Amboina.

16. **Pt. miles**, *Cant.* N. v.

(M. S. T.)

Scorpaena miles, *Bennett*, *Fishes of Ceylon*, lam. 9.
Pterois muricata, *Cuv.* & *Val.* iv. p. 363; *Rüpp. N. W. Fishes*, p. 107.
P. miles, *Cant. Catal.* p. 42; *Gthr. loc. cit.* 2. p. 125.
Hab. Luzón, Cavite; Oceano Indico.

17. **Pt. zebra**, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

Renard, i. lam. 6, f. 41.
Pterois zebra, *Cuv.* & *Val.* iv. p. 367; *Régne. Anim. Ill. Poiss.* lam. 24, f. 1. *Bleek. Amb.* & *Cer.* p. 265; *Quoy & Gaim. Voy. Uran. Zool.* p. 329, et *Voy. Astrol. Poiss.* p. 692, lam. 11, f. 6. *Gthr. loc. cit.* 2, p. 126.
Hab. Cebú, Samar, Villareal; China.

4. Gén CENTROPOGON, *Gthr*

18. **C. robustus**, *Gthr.* N. v.

(M. S. T.)

Gthr. loc. cit. 2. p. 128.
Hab. Cebú; Australia.

19. **C. fuscovirens**, *Q. et G.* N. v.

? *Apistus fuscovirens*, *Quoy & Gaim. Voy. Astrol. Poiss.* p. 695, lam. 11, f. 5; *Cuv.* & *Val.* iv. p. 409; *Gthr. loc. cit.* 2. p. 130.
A. fuscovirens, *Bleeker Amboina & Ceram.* p. 269.
Hab. Marianas; Amboina.

5. Gén TETRAROGE, *Gthr.*

20. **T. longispinis**, (*C. et V.*) N. v.

(M. S. T.)

Apistus longispinis, *Cuv.* & *Val.* iv. p. 408; *Quoy & Gaim. Voy. Astrol. Poiss.* p. 694, lam. 11, f. 4.
Tetrauge longispinis, *Gthr. loc. cit.* 2. p. 134.
Apistes multicolor, *Richards. Voy. Samar. Fishes*, p. 3, lam. 4, f. 3, 4.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Samar; China, Borneo.

21. **T. amblycephalus**, *Bleek* N. v.

(M. S. T.)

Apistus amblycephalus, *Bleeker. Sclerop.* p. 27; *Gthr. loc. cit.* 2. p. 133.
Hab. Luzón, Manila; Padang.

22 **T. crista-galli**, *Gthr.* N. v.

(M. S. T.)

Apistus tenuianotus, *Richards*, *Voy. Samarang. Fishes* p. 5 lam.
4, f. 1, 2; (*no Cuv. & Val.*)

Tetrarogis crista-galli, *Gthr.* loc. cit. 2, p. 134.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

23 **T. barbata**, *C. I.* N. v.

(M. S. T.)

Apistus barbatus, *Cuv. & Val.* iv. p. 413; *Bleeker*, *Act. Soc. Nedert.* i. *Amboina*, p. 36.

A. melas, *Bleeker*, *Natuurk. Tijdschr. Nedert. Ind.* i. p. 26.
Hab. C. de Cebú; Molucas.

24 **T. tenuianotus** *C. I.* N. v.

Tenuianotus latovittatus, *Lacep.* iv. lam. 3, f. 2.

Apistus tenuianotus, *Cuv. & Val.* iv. p. 404; [*no Richards*, *Voy. Samarang. Fishes* lam. 4, f. 1, 2;] *Bleeker*, *Amboina*, ii. p. 557.

Tetraroge tenuianotus, *Gthr.* loc. cit. 2, p. 136.
Hab. Cebú; Japon.

6. Gén PROSOPODASYS, CANTOR.

25 **Pr. leucogaster**, *[Richard]*, N. v.

(M. S. T.)

Apistus leucogaster, *Richards*, *Voy. Samar. Zool. Fishes*, lam.
5 f. 1, 2; *Bleeker*, *Amboina*, iii. p. 21.

Pr. leucogaster, *Gthr.* loc. cit. 2, p. 141.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Amboina, China.

26. **Pr. cottoides**, *C. I.* N. v.

(M. S. T.)

Perca cottoides, *L. Mus. Ad. Fries* ii. p. 84.

Apistus cottoides, *Cuv. & Val.* iv. p. 410; *Richards*, *Voy. Samar. Fishes*, p. 4 lam. 3, f. 6, 7; *Bleek. Batavia* p. 459.

Prosopodasys cottoides, *Gthr.* loc. cit. 2, p. 142.

Hab. Luzón, Manila; Borneo, China.

7. Gén APLOACTIS, TEM. ET SCHLEG.

27. **A. aspera**, *Richards*, N. v.

(M. S. T.)

Aploactis, *Temm. & Schleg. Faun. Japon. Poiss.* p. 51. lam. 22.
f. 3.

A. aspera, *Richards*, *Voy. Sulph. Fishes*, p. 72; *Gthr.* loc. cit.
2, p. 142.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

S. Gén. TRICHOPLEURA, KAUP.

28. Tr. **mollis**, (*Richard.*) N. v.

(M. S. T.)

Sthenopus mollis, *Richards*, *Voy. Samar. Fishes*, p. 10, lam. 2, f. 6, 7.
Tr. *mollis*, *Gthr. loc. cit.* 2, p. 143.
Hab. Luzón, Manila; China.

8. Gén. SYNANCIDIUM, MÜLL.

29. sy. **horridum**, (*Lin.*) N. v.

(M. S. T.)

Renard, i. 39, f. 199.
Scorpaena horrida, *L. Syst.* i. p. 453; *Bloch*, t. 183; *Lacép.* iii. p. 261, ii. t. 17, f. 2.
Perca sp., *Gronov. Zoophyl.* n.^o 292, lam. 11, 1, lam. 12, f. 1, lam. 13, f. 1.
Synanceia horrida, *Bl. Schn.* p. 194; *Cuv. & Val.* iv. p. 440; *Bleek. Verhand. Batav. Genootsch.* xxii. *Sclerop.* p. 9.
Scorpaena monstrosa, *Gronov. Syst. ed. Gray*, p. 117.
Synanceia trachynis, *Richards. Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1842, ix. p. 385.
Synancidium horridum, *Gthr. l. cit.* 2, p. 144.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China, Australia.

9. Gén. SYNANCEIA, C. V.

30. sy. **verrucosa**, *Bloch*, N. v.

(M. S. T.)

Synanceia verrucosa, *Bloch. Schn. Syst.* p. 195, t. 45; *Rüppell. N. II^e. Fische.* v. 109; *Gthr. l. c.* 2, p. 146.
Scorpaena brachio, *Lacép.* iii. pp. 259, 272, lam. 12, f. 1.
S. brachio, *Shaw. Zool.* iv. pt. 2, p. 274.
Synanceia sanguinolenta, *Ehrenb. Pisc.* t. 2.
Sy. brachio, *Cuv. Régne Anim.: Cuv. & Val.* iv. 447; *Bleeker. Verhand. Batav. Genootsch.* xxiii. *Sclerop.* p. 9; *Cuv. Régne. Anim.* III. *Poiss.* lam. 25, f. 3; *Agass. Oss. Foss.* iv. p. 200, lam. L.
Hab. Luzón, Manila; Polinesia.

10. Gén. PELOR, C. V.

31. P. **cuvieri**, Gr. N. v.

Pelor cuvieri, *Gray. Ill. Ind. Zool.* ii. lam. 20, f. 2; *Richards. Ichthyol. Sulph.* p. 72, lam. 39, f. 4, et *Ichthyol. China*, p. 212; *Bleeker. Sumatra*, ii. p. 252; *Gthr. l. cit.* 2, p. 150.
? *P. sinense*, *Cuv. & Val.* iv. p. 468.
Hab. Mindanao, Zamboanga; China, Sumatra.

32. *P. japonicum*, *C. V.* N. v.

(M. S. T.)

Pelor japonicum, *Cuv. & Val.* iv, p. 437; *Faun. Japon. Poiss.* p. 44, lam. 18, f. 2; *Gthr. l. cit.* 2, p. 151.

P. tigrinum, *Richards. Ichthyol. Chin.* p. 212.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China, Japón.

11. Gén. PODABRUS, RICHARDS.

33. *P. cottoides*, *Rich.* N. v.

(M. S. T.)

Richards. l. c. p. 13, lam. 1, f. 1, 6; *Gthr. l. cit.* 2, 152.
Hab. Luzón, Cavite; China.

12. Gén. CENTRIDERMICHTHYS, RICHARDS.

34. *C. fasciatus*, *Heckel.* N. v.

(M. S. T.)

Trachidermus fasciatus, *Heckel. Ann. Wien. Mus.* ii, 1840, p. 160, lam. 9, f. 1, 2.

Centridermicthys ansatus, *Richards. Voy. Sulph. Fishes*, p. 74, lam. 54, f. 6-10.

Cottus uncinatus, *Temm. & Schleg. Faun. Japon. Poiss.* p. 38, (*no Reinh.*)

C. fasciatus, *Gthr. l. cit.* 2, p. 169.
Hab. Luzón, Manila; China.

13. Gén. PLATYCEPHALUS, BL.

35. *Pl. insidiator*, *Bl.* N. v. Sumoc.

(M. S. T.)

Cottus insidiator, *Forsk.* p. 25; *L. Gm.* i, p. 1213; *Shaw. Zool.* iv, p. 260.

Callionymus indicus, *L. Gm.* i, p. 1153.

Cottus spatula, *Bl.* lam. 424.

Platycephalus insidiator, *Bl. Sehn.* p. 59; *Cuv. & Val.* iv, p. 227; *Rüpp. N. W. Fische*, p. 102; *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxii. *Sclerop.* p. 6; *Faun. Japon. Poiss.* p. 39, lam. 15, f. 1; *Cant. Catal.* p. 37; *Gthr. loc. cit.* 2, 177.

Pl. spatula, *Bl. Sehn.* p. 59.

Batrachus indicus, *Bl. Sehn.* p. 43.

Calliomorus indicus, *Lacep.* ii, p. 343.

Cottus madagascariensis, *Lacep.* iii, p. 248, lam. 11, f. 1, 2; *Schaw.* l. c. p. 261, lam. 26.

Russell, lam. 46.

Colliomorus chacca, *Buch. Ilam.* pp. 133, 373.

Platycephalus endrachtensis, *Quoy. & Gaim. Voy. Freyc.* *Zool.* p. 353; *Cuv. & Val.* iv, p. 240.

Pl. chacca, *Gray. Ind. Zool.* ii, lam. f. 2.

Hab. Luzón, B. de Manila; Cina, Amboina.

36. **Pl. japonicus**, *Tiles*, N. v.

(M. S. T.)

Tiles in Krusenst. Reise, lam. 59, f. 1; *Cuv. & Val.*, iv, p. 256;
Faun. Japon. Poiss., p. 40 lam. 16, f. 3; *Bleeker, Verhand.*
Batav. Genootsch xxv, p. 28.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China.

37. **Pl. isaacanthus**, *C. V.* N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & Val., iv, p. 246; *Cuv. Régne Anim. Ill. Poiss.* lam. 22,
t. 3; *Less. Voy. Coq. Zool. Poiss.*, p. 214; *Gthr. I. cit.* 2, p. 183.
Hab. Luzón, B. de Manila; Boro.

38. **Pl. tentaculatus**, *Rüpp.* N. v.

(M. S. T.)

?? *Platycephalus longiceps*, *Cuv. & Val.*, iv, p. 255.
Pl. tentaculatus, *Rüpp. N. W. Fische*, p. 104, lam. 26, f. 2; *Gthr.*
loc. cit. 2, p. 184.
Hab. Cebú; Mar Rojo.

39. **Pl. neglectus**, *Troschel*, N. v.

(M. S. T.)

Troschel in Wiegmann Arch. 1840, p. 272; *Gthr. I. cit.* 2, p. 187.
Hab. Luzón, Manila; China.

40. **Pl. fasciatus**, *Gthr.* ?
Hab. Luzón, B. de Manila.

41. **Pl. pristiger**, *C. V.* N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & Val., iv, p. 260; *Quoy. & Gaim. Voy. Astrol. Poiss.* iii,
p. 685, lam. 10, t. 5; *Bleek. Ternate*, viii, p. 205; *Gthr. I. cit.*
2, p. 189.
Hab. Luzón, B. de Manila; Célebes, Java.

42. **Pl. asper**, *C. V.* N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & Val., iv, p. 257, lam. 82; *Faun. Japon. Poiss.*, p. 40, lam.
16, t. 4, 5; *Gthr. loc. cit.* 2, p. 190.
Hab. Luzón, Manila; China.

44. **Gén. HOPLICHTHYS**, *C. V.*

43. **H. longsdorffii**, *C. V.*

Cuv. & Val., iv, p. 264, lam. 81; *Temm. & Schleg. Faun. Japon.*
Poiss., p. 150, lam. 79, f. 2; *Gthr. I. cit.* 2, p. 191.
Hab. Luzón, Manila; China, Japon.

15 Gén. TRIGLA, Cuv

44. Tr. kumu, Less. et Garn. N. v.

(M, S, T.)

Trigla kumu, Less. & Garn. Coqu. Poiss. lam. 19; Cuv. & Val. iv. p. 50; Jenyns, Zool. Beagle, Fishes, p. 27; Faun. Japon. Poiss. p. 37, lam. 14 A. f. 3; Ow'm, Osteol. Catal. i. p. 55; Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xxvi. Japan, p. 74; Gthr. l. cit. 2. p. 204.

Trigla spinosa, McClellant, Calc. Journ. Nat. Hist. iv. p. 39^o, lam. 22 f. 2.

Hab. Luzón, Mindoro; China, Australia.

16 Gén. DACTYLOPTERUS, Lacep.

45. D. orientalis, Cuv N. v.

(M, S, T.)

Renard, i. lam. 10. f. 66; Valenç. iii. f. 35; Russell. lam. 161. Dactylopterus orientalis, Cuv. & Val. iv. p. 134, lam. 76; Richardson, Ichth. Chin. p. 218; Bleek. Amb. & Cer. p. 264. Temm. & Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 37, lam. 15 A; Gthr. l. cit. 2. p. 222.

D. orientalis et japonicus, Bleeker, Japan, p. 39^o, et Verh. Batav. Genootsch. xxvi. Japan, p. 72.
Hab. Luzón, Mindoro; China, Amboina.

Fam. TRAQUÍNIOS.

1. Gén. URANOSCOPUS, Cuv

1. U. bimaculatus, Tem. et Schl. N. v.

(M, S, T.)

Temm. & Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 26, lam. 10. B.; Bleek. Act. Soc. Neerl. ii. Amboin, p. 41; Gthr. l. cit. 2. p. 228.
Hab. Luzón, Cavite; China, Amboina.

2. U. asper, Tem. et Schl. N. v.

(M, S, T.)

Temm. & Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 26, lam. 9. f. 1. Richards. Ichth. Chin. p. 211; Gthr. loc. cit. 2. p. 228.
Hab. Luzón, Manila; China.

2. Gén. PERCIS, Bl.

2. P. cylindrica, Bloch, N. v.

(M, S, T.)

Seba, iii. 27, 16.

Sciana cylindrica, Bloch, lam. 299. f. 1; Lacep. iv. p. 314.

Bodianus sebae, Bl. Schn. p. 335.

Percis cylindrica, Cuv. & Val. iii. p. 267; Bleek. Banda, i. p. 235 (no Rüpp., Gthr. l. cit. 2. p. 239).

Hab. Cebú, Luzón, Cavite; China, Amboina.

*

3. Gén. SILLAGO, C. V.

4. S. sihamma, *Forsk.* N. v.

(M. S. T.)

- Atherina sihamma, *Forsk.* p. 70.
Sciæna malabarica, *Bl. Schn.* p. 81, t. 19.
Platycephalus sihamus, *Bl. Schn.* p. 60.
Russell, t. 113.
Sillago sihamma, *Rüpp. Atl. Fische*, p. 9 lam. 3, f. 1; *Gthr. I. cit.* 2, p. 243.
S. amita, *Cuv. & Val.* iii. p. 400; *Bleeker* *Perc.* lam. 61.
S. erythcea, *Cuv. & Val.* iii. p. 409.
S. malabarica, *Cant. Catal.* p. 21; *Bleek.* *Bali*, iii. p. 157.
Hab. Luzón, Manila; China, Amboina.

5. S. maculata, *Quoy et Gaim.*

- Sillago maculata, *Quoy. & Gaim. Voy. Freyc. Zool.* p. 261 lam. 53 f. 2; *Cuv. & Val.* iii. p. 411; *Bleeker* *Perc.* p. 62 *et Bali.* iii. p. 161; *Gthr. I. cit.* 2, p. 245.
S. bassensis, *Cuv. & Val.* iii. p. 412^o; *Quoy & Gaim. Voy. As-trol.* *Poiss.* p. 672 lam. 1 f. 2.
Hab. Marianas; Australia.

4. Gén. LATHLUS, C. V.

6. L. argentatus, C. V. N. v.

(M. S. T.)

- Coryphæna sina, *Bl. Schn.* p. 296.
? *Coryphæna sinensis*, *Lacép.* iii. pp. 176 200.
Latilus argentatus, *Cuv. & Val.* v. p. 369, ix. p. 495; *Faun. Japon.* *Poiss.* p. 63 lam. 28 f. 2; *Bleek.* *Verh. Batav. Genootsch.* xxvi. p. 85; *Gthr. I. cit.* 2, p. 252.
Hab. Luzon, Cavite, Santa Cruz; China.

5. Gén. PSEUDOCHROMIS, RÜPP.

7. P. adustus, *Müll. et Tros.* N. v.

(M. S. T.)

- Müll. & Trosch. Hor. Ichthyol.* iii. p. 23 lam. 4 fig. 3; *Gthr. I. cit.* 2, p. 258.
Hab. Luzon, Samar.

Fam. ESCIÉNIDOS.

1. Gén. UMBRINA, CUV.

1. U. russellii, CUV. N. v.

(M. S. T.)

- Russell.* lam. 118.
Umbrina russelli, *Cuv. & Val.* v. p. 178; ? *Richards. Ichth. Chin.* p. 226; *Cant. Catal.* p. 71; *Gthr. I. cit.* 2, p. 278.

Umbrina kuhlii, *Cuv. & Val.* v. p. 179; *Bleek. Verhand. Batav.*
Genoootsch. xxiii. *Sciæn.* p. 19.
Hab. Luzon, Manila; China.

2. *Sc. erœca*, *Richards*, N. v.

(M. S. T.)

Richardson, *Ichth. Chin.* p. 224; *Gthr. l. cit.* 2, p. 284.
Hab. Luzón, Cavite; China.

3 *Sc. diacanthus* *Lacep* N. v.

M. S. T.

Lutjanus diacanthus, *Lacep*. iv. pp. 195, 244.
Russell, ii. lam. 115, 116.
Bela chaptis, *Buch. Hamm.* p. 77 lam. 10 f. 25.
Johnius catalaeus, *Cuv. Règne Anim.*; *Cuv. & Val.* v. p. 128.
J. chaptis, *Cuv. & Val.* v. p. 130.
Corvina catalaeus, *Belanger*, *Voy. Ind. Orient. Zool.* p. 360; *Richards*, *Ichth. Chin.* p. 226; *Bleek. Verhand. Batav.* *Gen.* xxiii. *Sciæn.* p. 18.
Johnius platycephalus, (*Kuhl. & Van Hasselt*), *Cuv. & Val.* v. p. 132.
Sciæna maculata, *Gray. Ind. Zool.* ii. lam. 83 f. 1.
Johnius diacanthus, *Cant. Catal.* p. 67; *Bleek. Java*, iv. p. 320.
J. valenciennii, *Eydoux & Souleyet*, *Voy. Bouite*, *Zool.* i. p. 150, pl. 1 f. 2.
Sciæna diacanthus, *Gthr. l. cit.* 2, p. 290
Hab. Luzón, Manila; China, Malaya.

4. *Sc. sina*, *C. L.* N. v.

(M. S. T.)

Johnius sina, *Cuv. & Val.* v. p. 122.
Corvina sina, *Belang. Voy. Indes Orient. Zool.* p. 359; *Faun. Japon.* *Poiss.* p. 58 lam. 24 f. 2; *Bleek. Verhand. Batav.* *Genootsch.* xxvi. p. 82.
Sciæna sina, *Gthr. l. cit.* 2, p. 292.
Hab. Luzón, Manila; China, Malaya.

5 *Sc. dussumieri*, *C. L.* N. v.

(M. S. T.)

* *Corvina dussumieri*, *Cuv. & Val.* v. p. 119; *Règne Anim.* III, *Poiss.* pl. 28 f. 2.
Johnius dussumieri, *Cant. Catal.* p. 64.
Sciæna dussumieri, *Gthr. l. cit.* 2, p. 292.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China, Malabar.

6 *Sc. borneensis*, (*Bleeker*) N. v.

(M. S. T.)

Otolithus borneensis, *Bleeker*, *Borneo*, ii. p. 268; *Gthr. l. cit.* 2, p. 294.
Hab. Samar; Borneo.

3. Gén. CORVINA, Cuv.

7. *C. miles*, Cuv.

(M. S. T.)

Holocentrus soldado, *Lacep.* iv. pp. 344, 373.

Russell. lam. 117.

Corvina miles, *Cuv. & Val.* v. p. 94, ix. p. 479; *Bleek.* *Verhand.* *Batav.* *Genwtsch.* xxiii. *Scian.* p. 17; *Gthr. l. cit.* 2, p. 300.

C. soldado, *Cant. Catal.* p. 70.

Hab. Luzón, B. de Manila; Ceilan.

8. *C. coitor*, Cuv. N. v.

(M. S. T.)

Bola coitor, *Buch. Ham.* pp. 75 & 368. lam. 27. f. 24.

Corvina coitor, *Cuv. & Val.* v. p. 116; *Gthr. l. cit.* 2, p. 301.

C. nalla-katchelec, *Richards.*, *Ichth. Chin.* p. 226.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

9. *C. belangerii*, C. V. N. v.

(M. S. T.)

Corvina belangeri, *Cuv. & Val.* v. p. 120, *cop.* in *Belanger*, p. 358; *Gthr. l. cit.* 2, p. 303.

C. kuhlii, *Cuv. & Val.* v. p. 121; *Bleeker*, *Verhand.* *Batav.* *Genwtsch.* XXIII. *Scian.*

Iohnius belangeri, *Cant. Catal.* p. 65.

Corvina sampitensis, *Bleeker*, *Borneo*, vi. 421.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Borneo.

10. *C. sémiluctuosa*, C. V. N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & Val. v. p. 97. lam. 106; *Gthr. l. cit.* 2, p. 304.

Hab. Luzon, Manila; China, Pondichery.

11. *C. olvida*, C. V. N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & Val. v. p. 93. *cop.* in *Belanger*. *Voy. Ind. Orient. Zool.* p. 355. *Gthr. l. cit.* 2, p. 304.

Hab. Luzón, Manila; China.

4. Gén. OTOLIT. US, Cuv.

12. *O. tridentifer*, Richards N. v.

(M. S. T.)

Richards. *Ichth. China*, p. 225; *Gthr. l. cit.* 2, p. 305.

Hab. Luzón, Manila; China.

13. *O. ruber*, Cuv N. v.

(M. S. T.)

Johnius ruber, *Bl. Schn.* p. 75. lam. 17.

Otolithus ruber, *Cuv. & Val.* v. p. 60. lam. 102; *Cant. Catal.*

p. 59; *Gthr. loc. cit.* 2, p. 309.

Hab. Luzón, Manila; Malabar.

14. **O. leuciseus**, *Gthr.* N. v. Curvina. (M. S. T.)

Hab. Luzón, B. de Manila.

15. **O. argenteus**, (*Kuhl. & v. Hass.*) N. v. (M. S. T.)

Otolithus argenteus, (*Kuhl. & v. Hass.* *Cuv. & Vall.* v. p. 62; *Richards. Ichth. China*, p. 225; *Bleek. Verhand. Batav. Geenootsch.* xxiii. p. 15; *Gthr. l. cit.* 2. p. 310).

? *Sciaena japonica*, *Faun. Japon.* p. 58 lam. 24 t. 1.
Hab. Luzon, Cavite; China; Java.

5. Gén. COLLICITHYS, *Gthr.*

16. **C. lucida**, *Richards.* N. v. (M. S. T.)

Sciaena lucida, *Richards. Ichth. Voy. Sulph.* p. 87. lam. 44. t. 3, 4.

Colliechthys lucida, *Gthr. l. cit.* 2. p. 312.
Hab. Luzon, Manila; China.

17. **C. bi urita** *Cantor* N. v. (M. S. T.)

Otolithus biauritus, *Cantor. Catal. Malay. Fishes*, p. 57; *Bleek. Act. Soc. Sc. Indo-Nederl.* iii. *Borneo*, p. 3.

C. biaurita, *Gthr. l. cit.* 2. p. 315.
Hab. Luzon, Manila; Borneo.

Fam. POLINÉMIDOS.

I Gén. POLYNEMUS, LIN.

1. **P. paradiseus**, *C. V.* N. v. (M. S. T.)

Edwards, *Av.* p. 208. t. 208; *Russell*, ii. f. 185.

Polynemus paradiseus, *L. Syst. Nat.* i. p. 1401. [*no Bloch*];
Gthr. l. cit. 2. p. 320.

Polynemus, n.º 398, *Gronov. Zoophyl.*

P. risus aureus?, *toposu?*, *Buch. Ham. Gang. Fishes*, p. 228
P. longifilis, *Cuv. & Val.* iii. 365, vi. p. 512; *Bleeker. Borneo.*

ii. p. 268, *et Borneo*, vi. p. 418.

Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; Siam.

2. **P. multifilis**, *Schleg.* N. v. (M. S. T.)

Polynemus multifilis, *Schleg. Faun. Japon. Poiss.* p. 29, *et Bydrage tot de dierkunde*, 1851, p. 12, *cum tab.*; *Gthr. l. cit.* 2. p. 320.

P. quatuordecimfilis, *Pel. Bydrage tot de diercunde*, 1851, p. 9.

P. polydactylus, *Bleeker. Borneo*, vi. p. 417.

Hab. Samar, Borongan; Borneo.

3. P. **multiradiatus**, *Gthr.* N. v.

(M. S. T.)

Gthr. loc. cit. 2, p. 324.

Hab. Luzon, Manila; China.

4. P. **lineatus**, *Gthr.* N. v.

(M. S. T.)

Gthr. loc. cit. 2, p. 327.

Hab. Luzón, Manila; Amboina.

5 P. **pleb:jas**, *Gm.* N. v.

(M. S. T.)

Polynemus plebejus, *Gm.* L. *Syst.* p. 1401; *Bloch*, t. 400; *BL Schn.* p. 17; *Shaw*, *Zool.* v. lam. 125; *Cuv. & Val.* iii. p. 380; (*no Fauna Japon.* lam. 11, f. 1); *Bleeker*, *Perc.* p. 58; *Richards*, *Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1842, ix. p. 210; *Cantor*, *Catal.* p. 27; *Gthr.* l. cit. 2, p. 329.

P. *lineatus*, *Lacep.* v. la.n. 13, f. 2.

Bruce, *Voyage*, t. 41.

Polynemus niloticus, *Shaw*, *Zool.* v. p. 151.

Trigla asiatica, *Forst. Descript. Anim. cur.* *Lichtenst.* p. 236.
Hab. Luzón, Currimao, Ilocos; Amboina.

6. P. **tetradactylus**, *Shaw* N. v.

(M. S. T.)

Russell, lam. 183, *Renard*, *Poiss.* f. 147.

Polynemus tetradactylus, *Shaw.*, *Zool.* v. p. 155; *Cuv. & Val.* iii. p. 375, vii. p. 514; *McClell. Journ. As. Soc.* viii. 1839, p. 206; *Richards*, *Ichth. China*, p. 218; *Bleeker*, *Perc.* p. 57; *Cuv. Régne Anim. Ill.* *Poiss.* lam. 19, f. 1; *Cantor*, *Catal.* p. 25; *Gthr.* l. cit. 2, p. 329.

P. *teria*, *Buek*, *Ham.* pp. 224, 381; *Gray*, *Ind. Zool.* i. lam. 92 f. 2.

P. *salliah* et *quadrifilis*, *Cant r Journ. As. Soc.* v. p. 166.
Hab. Luzón, Manila; China, Borneo.

Fam. ESFIRÉNIDOS.

1. Gén. SPHYRENA, ARTEDEI.

1. S. **jello**, *Cuv*

Jellow, *Russell*, lam. 174.

Sphyraena Jello, *Cuv. & Val.* vi. p. 349; *Bélanger*, *Voy. Zool.* p. 346, lam. 1, f. 1; *Rüppell*, *N. Wirb. Fische*, p. 98; *Bleeker*, *Perc.* p. 56; *Cantor*, *Catal.* p. 24; *Bleeker*, *Batjan.* p. 369, et *Sphyraen.* p. 12; *Gthr.* l. cit. 2, p. 337.
Hab. Cebú; China, Amboina.

2. Sp. **commersonii**, *C. V.* N. v. Batalai.

(M. S. T.)

Renart, *Poiss.* i. t. 40 f. 202; *Valen'yan*; *Ind.* iii. p. 369, f. 70.

Sphyraena commersonii, *Cuv.* & *Val.* iii. p. 352; *Bleeker*, *Perc.* p. 55; *Java*, p. 425, et *Sphyraen*, p. 15; *Gthr.* l. cit. 2, p. 338.
Hab. Luzón, B. de Manila, Cebú; Java.

3 Sp. obtusata, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

Renard, *Poiss.* i. 40, 202; *Valentyn*, *Ind.* iii. p. 369, n.º 70.
S. chinensis, *Lacep* v. p. 321, t. 10, f. 2.
S. obtusata, *Cuv.* & *Val.* vi. p. 350; *Bleeker*, *Perc.* p. 56, *Sphyraen*. p. 17, et *Batjan*, p. 364; *Cant. Catal.* p. 24 *Faun. Japon.* p. 33, lam. 13, f. 2, *Gthr.* l. cit. 2, p. 339.
Hab. Luzón, Manila; Ambeina.

4 Sp. esp. N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

Fam. TRIQUIÚRIDOS.

1. Gén. TRICHIURUS, LIN.

1. T. savala, *Cuv.* N. v. Pez espada.

(M. S. T.)

Trichiurus savala, *Cuv.* *Régne Anim.*; *Cuv.* & *Val.* viii. p. 251, lam. 224; *Cant. Ann.* & *Mag. Nat. Hist.* ix. p. 15, et *Catal.* p. 115; *Cuv.* *Régne Anim.* ill. *Poiss.* lam. 68; *Bleeker*, *Makr. Verh. Bat. Gen.* xxiv. p. 41; *Gthr.* loc. cit. 2, p. 347.
T. armatus, *Gray*, *Zool. Misc.* p. 9, et *Ill. Ind. Zool.* lam. t. 1; *Richards*, *Ichth. China*, p. 268.
Hab. Luzón, B. de Manila, Cavite; China.

2 T. muticus? GR. N. v.

(M. S. T.)

Trichiurus muticus, *Gray*, *Zool. Misc.* p. 10; *Griff. Anim. Kingd. Fische*, p. 349, lam. 6, f. 2; *Gthr.* l. cit. 2, 348.
T. intermedius, *Gray*, *Zool. Misc.* p. 10; *Richards*, *Ichth. China*, p. 268.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

3 Tr. haumela, *Forsk.* N. v. Balila.

(M. S. T.)

Willughby, *App.* lam. 3, f. 3.
Clupea haumela, *Försk.* p. 72; *L. Gm.* p. 1408.
Trichiurus lepturus, *Lacep*. ii. lam. 7, f. 1, (*no Cuv.*)
Russel, lam. 41.
Trichiurus ahumela, *Bl. Schn.* p. 518; *Cuv.* & *Val.* viii. p. 249; *Rüpp. N. W. Fische*, p. 41; *Cant. Catal.* p. 113; *Bleek. Makr. Verh. Bat. Gen.* xxiv. p. 41; *Gthr.* l. cit. 2, p. 348.
Hab. Luzón, B. de Manila, Cavite, Sta. Cruz; Océano Índico.

4 Tr. sp. N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

2. Gén. THYRSITES, C. V.

5. Th. sp. N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

Fam. ESCÓMBRIDOS.

1. Gén. SCOMBER, Cuv.

Sc. microlepidotus, Rüppell, N. v.

(M. S. T.)

Rüppell, N. II. Fishes, p. 38, lam. 11, f. 2; Cantor, Catal. p. 105; Gthr. l. cit. 2, p. 361.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Batangas, Nasugbú; China.

2. Gén. PELAMYS, C. V.

2. P. orientalis, Temm. et Schleg. N. v.

(M. S. T.)

Temm. & Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 99, lam. 52; Gthr. l. cit. 2, p. 368.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Japon.

3. Gén. CYBLUM, Cuv.

3. Cy. guttatum, Cuv. N. v.

(M. S. T.)

Valent. iii. f. 105.

Scomber guttatus, Bl. Schn. p. 23 lam. 5.

Russell, ii. p. 26, lam. 137.

Scomber leopardus, Shaw. Zool. iv. p. 591.

Cyblum guttatum, Cuv. & Val. viii. p. 173; Richards. Ichth. Chin. p. 268; Cant. Catal. p. 111; Bleeker, Verh. Bat. Geenootsch. xxiv. Makr. p. 38; Gthr. Cat. B. M. 2. p. 371.

Cy. kuhlii, Cuv. & Val. viii. p. 178.

Hab. Luzón, Manila; China.

4. Gén. ECHENEIS, ARTEDEI.

4. E. albescens, T. N. v.

(M. S. T.)

Temm. & Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 272, lam. 120, f. 3; Gthr. l. cit. 2, p. 377.

Hab. Luzón, Cavite; China.

5. E. brachyptera, Lowe.

Remora, Catesby, Hist. Natur. South. Carol. ii. p. 26, lam. 26. Echeneis Catesby?, Lowe, Trans. Zool. Soc. ii. p. 191. E. brachyptera, Lowe, Proc. Zool. Soc. 1839, p. 89. et Transc.

- Zool. Soc.* p. 17; *Günth. Ann. & Mag. Nat. Hist. May.* 1860, p. 399; *id. Cat. B. M.* 2, p. 378.
E. sexdecim-lamellata, *Eydoux et Gervais, Voy. de la Favorite*, v. *Zool.* p. 77, lam. 31.
? E. quatuordecim-lamellatus, *Storer, Report Fishes. Massach.* p. 155.
E. pallida, *Tenn. & Schleg. Faun. Japon. Poiss.* p. 271, lam. 120, f. 2, 3.
E. nieuhofii, *Bleek. Sumatra*, ii. p. 279.
Hab. Paragua, P. Princesa; China.

.6 E. naucrates, L. N. v.

M. S. T.

- Echeneis s. Remora, *Aldrovandi*, iii. cap. 22, p. 335; *Jouston, Thaumaturg.* i. tit. 1, cap. 2, art. 4, lam. 4, f. 3, lam. 25, 1, 8; *Maregr. Iter. Brvs.* p. 180; ? *Gottorff. Kunstkammer*, lam. 25, f. 2; *Willughby*, p. 119, lam. G. 8, f. 2; *Ray, Syn.* p. 71; *Ruyssch, Théatr. Univ.* p. 7, lam. 4, f. 3, lam. 39 f. 8; *Seba*, iii. p. 103, lam. 33 f. 2; *Diderot, Hist. Gén. des Antilles*, ii. p. 299, fig. opp. p. 222; *Brown, Hist. Jamaica*, p. 443.
E. naucrates, L. *Syst.* i. p. 446; *Hasselg. Iter Palest.* p. 324; *Schoepff. Schrifft. Gesellsch. Naturf. Freunde. Berlin*, viii. 3, p. 145; *Bl. ii.* 131, lam. 171; *Bl. Schn.* p. 239; *Lacep.* iii. lam. 146, 162, lam. 9, f. 2; *Shaw, Zool.* iv. p. 209, lam. 31; *Cuv. Régne Anim.*; *Storer, Rep. Fishes. Massach.* p. 153; *Mitch. Trans. Lit. & Phil. Soc. New-York*; i. p. 377; *Richards, Faun. Bor. Amer.* iii. p. 266, et *Ann. & Mag. Na'. Hist.* xi 1843, p. 498; *Cantor, Catal.* p. 190; *Faun. Japon. Poiss.* p. 270, lam. 120, f. 1; *Richards, Ichthyol. China*, p. 203; *Guichen Explor. Algér. Poiss.* p. 111; *Webb. & Berthel. Iles. Canar. Poiss.* p. 87; *Günth. Ann. & Mag. Nat. Hist. May.* 1860, p. 395; *Gthr. l. cit.* 2, p. 384.
E. sp. *Gronov. Zoophil.* p. 75. n.º 252. et *Mus. Ichtyhol.* i. p. 13. n.º 34; *Klein, Miss. Pisc.* iv. p. 51. n.º 2.
Pegador, *Parra* p. 94, lam. 66, f.
Ala Mottah, *Russell*, i. p. 39, pl. 49.
Echeneis albicauda, *Mitch. Ann. Mouth.* *Mag. ii.* p. 244.
E. lunata, *Bancroft, Proc. Comm. Zool. Soc.* i. p. 134, et *Zool. Journ.* v. p. 411, lam. 18.
E. australis, *Griff. Anim. King. Pisc.* lam. opp. p. 504; *Bennett. Whaling Voyage*, ii. p. 273.
E. vittata, *Lowe, Proc. Zool. Soc.* 1839, p. 89, 1850, p. 252, et *Trans. Zool.* iii. p. 17.
Echeneis vittata, *Rüpp. N. W. Fische*, p. 82.
E. albicanda, pt., *Dekay, New. York. Faun. Fishes*, p. 307, lam. 54, f. 177.
E. fusca, *Gronov. Syst. ed. Gray*, p. 92.
Skeleton, *Agass. Recherches. Poiss. Foss.* iv. tab. G.
Hab. Luzón, B. de Manila; China.

5. Gén STROMATEUS, ARTEDEI.

7. str argenteus, Bl. N. v.

(M. S. T.)

Stromateus argenteus, Bl. xii, p. 92, lam. 421; *Sav. Zool.* iv, p. 110; *Cuv. & Val.* ix, p. 393; *Cant. Catal.* p. 142; *Richards. Ichth. Chin.* p. 272; *Gthr. l. cit.* 2, p. 400. *Russell*, pp. 31, 35, lam. 42.
Stromateus candidus, *Cuv. & Val.* ix, p. 391; *Bélanger. Voy.* p. 369, lam. 2, f. 2.
Str. *securifer*, *Cuv. & Val.* ix, p. 394, lam. 273. *Cant. Ann. & Mag. Nat. Hist.* ix, p. 15; *Richards. Ichth. Chin.* p. 273.
? *St. punctatissimus*, *Schleg. Faun. Japon. Poiss.* p. 121, lam. 65.
Hab. Luzón, Cavite; China.

8 str niger, Bloch, N. v.

(M. S. T.)

Renard, i, lam. 5, f. 38; *Russell*, i, p. 32, lam. 44.
Stromateus niger, *Bloch*, xii, p. 93, lam. 422; *Bl. Schn.* p. 49, tab. 93; *Shaw. Zool.* iv, p. 111; *Cuv. & Val.* ix, p. 385; *Cant. Ann. & Mag. Nat. Hist.* ix, p. 15, et *Catal.* p. 139; *Richards. Ichth. Chin.* p. 272; *Bleeker. Makr.* p. 370, et *Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Makr.* p. 77; *Gthr. l. cit.* 2, p. 401.
Str. *paru*, *Bl.* v, p. 75; *Bl. Schn.* p. 491; *Lacep.* ii, p. 319; *Shaw. Zool.* iv, p. 108.
Str. *siatola*, *Bl.* lam. 160.
Apolectus stromateus, *Cuv. & Val.* viii, p. 439, lam. 238; *Cant. Catal.* p. 123.
? *Séserinus vachellii*, *Richards. Ichth. Chin.* p. 273.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

6. Gén BRAMA, RISSO.

9. B. dussumieri, C. V N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & Val. vii, p. 294; *Gthr. l. cit.* 2, p. 400.
Hab. Luzón, Cavite, Samar; China.

7. Gén MENE, LACEP.

10 M. maculata, Cuv N. v.

(M. S. T.)

Zeus maculatus, *Bl. Schn.* p. 95, lam. 22.
Mene anna carolina, *Lacep.* v, pp. 47p, 48o, lam. 14, t. 2.
Russell, i, p. 47, lam. 60.
Mene maculata, *Cuv. & Val.* x, p. 104, lam. 285; *Faun. Japon. Poiss.* p. 127, lam. 67, f. 3; *Richards. Ichth. Chin.* p. 276; *Cant. Catal.* p. 154; *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Makr.* p. 86; *Cuv. Régne. Anim. III. Poiss.* lam. 62, f. 2.
Hab. Luzón, B. de Manila, Cebú; Península Malayana.

Fam. CARANGIDOS.

1. Gén. CARANX, C. V.

1. **C. cestus** *Richard*, N. v. (M. S. T.)

Ichth. China, p. 274; *Gthr. I. cit. 2.*, p. 422.
Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; China.

2. **C. margarita**, *Richards* N. v. (M. S. T.)

Richards, Ichth. Chin. p. 276.
Hab. Luzón, Cavite; China.

3. **C. sp** N. v. (M. S. T.)

Hab. Luzon, B. de Manila.

4. **C. rottleri** *Rüpp.* N. v. Atun, Sábalos (M. S. T.)

? *Scomber cordylus*, *L. Syst. Nat.* i. p. 483; *L. Gm.* p. 1362;
Bl. Schn. p. 23.
S. rottleri, *Bl. x.* p. 40. lam. 346; *Bl. Schn.* p. 25; *Shaw. Zool.*
iv. p. 598.

Russell, ii. p. 33. lam. 143.

? *Scomber guara*, *Lacep.* ii. p. 604.

Caranx rottleri, *Rüpp. Atl. Fische*, p. 102, et *A. W. Fische*,
p. 48; *Cuv. & Val.* ix. 29; *Rüpp. N. W. Fische*, pp. 48, 52;
Richards, Ichth. China p. 273; *Cant. Catal.* p. 124; *Gthr.*
I. cit. 2. p. 424.

Megalaspis rottleri, *Bleeker, Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Makr.* p. 49.
Hab. Luzon, Manila; China.

5. **C. maruadsi**, *Temm* N. v. (M. S. T.)

? *Caranx sanctæ Helenæ*, *Cuv. & Val.* ix. p. 37.
C. maruadsi, *Temm. & Schleg. Faun. Japon. Poiss.* p. 109. lam.
58. f. 2; *Gthr. I. cit. 2.* p. 428.

Decapterus maruadsi, *Bleeker, Verh. Bat. Gen.* xxvi. *Japan*,
p. 100.
Hab. Luzón, Manila; China.

6. **C. lioglossus**, *Gthr.* N. v. (M. S. T.)

Leioglossus curvangooides, *Bleeker, Makr.* p. 367, et *Verhand.*
Balav. Genootsch. xxiv. *Makr.* p. 70.
Caranx lioglossus, *Gthr. loc. cit. 2.* p. 432.
Hab. Luzón, B. de Manila; China.

7. **C. calla**, *V. C. N. v.* (M. S. T.)

Cuv. & Val. ix. p. 49; *Gthr. I. cit. 2.* p. 433.
Hab. Luzón, B. de Manila; China.

8. **C. malabaricus**, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

- Scomber malabaricus, *Bl. Schn.* p. 31.
Russell, p. 37. lam. 150.
Caranx cæruleo-pinnatus, *Rüpp. Atl. Fische*, p. 100, et *N. W. Fische*, p. 47. lam. 13. f. 2. (*no Cuv.*)
C. malabaricus, *Cuv. & Val.* ix. p. 121; *Richards. Ichth. Chin.* p. 275; *Cant. Catal.* p. 128; *Gthr. l. cit.* 2. p. 436.
Carangoides talamparah, *Bleeker. Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Mark.* p. 64.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

9. **C. leptolepis**, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

- Caranx leptolepis et mertensii, *Cuv. & Val.* ix. pp. 63, 64.
C. leptolepis, *Gant. Catal.* p. 127; *Gthr. l. cit.* 2. p. 440.
Leptaspis leptolepis, *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Makr.* p. 71.
Selaroides leptolepis, *Bleek. l. c.* p. 87.

Hab. Luzón, Manila; Archipiélago Indico.

10. **C. speciosus**, *Lacép.* N. v.

(M. S. T.)

- Scomber speciosus, *Forsk.* p. 54; *L. Gm.* p. 1332; *Shaw. Zool.* iv. p. 603.
Caranx speciosus, *Lacép.* iii. p. 72. lam. 1. f. 1; *Gthr. l. cit.* 2. p. 444.
Russell, ii. p. 36. lam. 149.
C. speciosus, *Cuv. & Val.* ix. p. 130; *Cant. Catal.* p. 133; *Peters. Wieg. Arch.* 1855, p. 245 (*no Rüpp.*)
C. petaurista, *Geoffr. Descr. Eg.* pl. 23. f. 1. (*no Rüpp.*)
Guathanodon speciosus, *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Makr.* p. 72.
Caranx poloosoo, *Richards. Voy. Ereb. & Terr. Ichth.* lam. 58. f. 4, 5.
Hab. Luzón, B. de Manila; Madras, Borneo.

11. **C. melampygus**, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

- ?*Russell*, ii. lam. 145.
Caranx melampygus, *Cuv. & Val.* ix. p. 116; *Bleek. Gilolo*, p. 58.
Hab. Luzon, Manila, Nasugbú, Batangas; Polinesia.

12. **C. jarra**, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

- Iarradanre parah, *Rusell*, ii. p. 35. lam. 147.
Caranx jarra, *Cuv. & Val.* ix. p. 109; *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Makr.* p. 58; *Gthr. l. cit.* 2. p. 446.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Nasugbú, Batangas; Amboina.

13. **C. hippos**, *Lin.* N. v.

(M. S. T.)

- Guara tereba, *Marcgr.* p. 172; *Seba*, iii. 27. 3.

- Scomber hippo, *L. Syst. Nat.* i. p. 494 (*no Mitch.*); *Bl. Schn.* p. 28; *Först. Dscr. Anim. cur. Licht.* p. 199.
C. Kleinii, *Bl. lam.* 347. f. 2; *Bl. Schn.* p. 30.
Russell, ii. lam. 148.
Caranx fallax, *Cuv. & Val.* ix. p. 95; *Casteln. Anim. nouv. ou rares. Poiss.* p. 22; *Guichen. Poiss.* in *Ramon de la Sagra, Tist. Cuba*, p. 111.
C. sem, *Cuv. & Val.* ix. p. 105.
C. forsteri, *Cuv. & Val.* ix. p. 107; *Cant. Catal.* p. 127; *Bleek. Verhand. Batav. Genootsch.* xxiv. *Makr.* p. 57; *et Natuurk. Tydschr. Nederl. Ind.* 1852, iii. p. 164.
C. sexfasciatus, *Quoy & Gaim. Voy. Freyc.* p. 358. lam. 65. f. 4; *Cuv. & Val.* ix. p. 110.
?Caranx peronii, *Cuv. & Val.* ix. p. 112.
C. lessonii, *Cuv. & Val.* ix. p. 113 (*no Bleek.*); *Less. Voy. Cog. Zool. Poiss.* p. 115. lam. 31. f. 1.
C. belangerii, *Cuv. & Val.* ix. p. 116.
C. hippo, *Gthr. loc. cit.* 2. p. 449.
Caranx defensor, *Dekay, New-York. Fauna, Fishes*, p. 120, lam. 24. f. 72; *Holbr. Ichth. S. Caral.* p. 85; lam. 12. f. 1.
C. flavo-ceruleus, *Selleg. Faun. Japon.* p. 110 lam. 59 f. 2.
C. parapistes, *Richards. Ichth. Voy. Ereb. & Terr.* p. 136 lam. 58 f. 6, 7.
Hab. Luzon, Bat ngas, Laguna de Taal, Cebú.

14. *C. atropus*, *Cantor. N. v.*

(M. S. T.)

- Brama atropus, *Bl. Schn.* p. 98, t. 23.
Russell, ii. p. 38 lam. 152.
Caranx nigripes, *Cuv. & Val.* ix. p. 122; *Richards. Ichth. Chin.* p. 275; *Cantor, Catal.* p. 129.
Olistus atropus, *Cuv. & Val.* iv. p. 141.
Carangooides atropus, *Bleek. Makr.* p. 366; *et Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Makr.* p. 66.
Caranx atropus, *Cantor, Catal.* p. 130; *Gthr. loc. cit.* 2, p. 450.
Hab. Manila, Luzon; China.

15. *C. armatus*, *Cuv. N. v.*

(M. S. T.)

- Sciæna armata, *Forsk.* p. 53; *Gm. L.* p. 1306.
Russell, lam. 151 p. 38.
Citula plumbea, *Quoy & Gaim. Voy. Freyc. Zool. Poiss.* p. 361.
C. ciliaria, *Rüpp. Atl. Fische*, p. 102 lam. 25 f. 8.
C. armata, *Rüpp. Atl. Fische*, p. 103, *et N. W. Fische*, p. 50.
Caranx citula, *Cuv. & Val.* ix. p. 126.
C. armatus, *Cuv. & Val.* ix. p. 127; *Cantor, Catal.* p. 131; *Gthr. loc. cit.* 2, p. 453.
C. ciliaris, *Cuv. & Val.* ix. p. 129 *Faun. Japon. Poiss.* p. 112; *Richards. Ichth. Chin.* p. 276.
C. cirrhosus, (*Ehrenb.*) *Cuv. & Val.* lam. 250.
Olistus malabaricus, *Cuv. & Val.* ix. p. 137, lam. 251; *Cuv. Regne Anim. III. Poiss.* lam. 58. f. 1.
C. rüpellii, *Cuv. & Val.* ix. p. 144.

* urangoïdes citula, Bleeker, Verh. Bat. Gen. xxiv. Makr. p. 65.
Hab. Luzón, B. de Manila; China.

16. C. sansun, Forsk. N. v.

(M. S. T.)

Scomber sansun, Forsk. p. 56.

Russell, ii. p. 33 pl. 144.

Caranx sansun, Rüpp. Atl. Fische, p. 101; lam. N. W. Fische, p. 48 lam. 13 f. 3; Gthr. l. cit. 2, p. 447.
Hab. Cebú; Mauricio.

17. C. sp. N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz, Nasugbú, Batangas.

18. C. gallus Lin N. v.

(M. S. T.)

Meer-haen, Nienhof, Zee-en. Lint-Reize, i. p. 270, fig.

Valent. iii. p. 465 f. 376; Renard, ii. 26 128; Rüpp., Theatr. Anim. i. 9, 7; Seba, iii. 26 34; Willughby, Append lam. 7 f. 1.

Zeus, sp. n.^o 2, Aristedi, Genera, p. 50 (no synon).

Z. gallus, Syst. i. p. 454; Bloch, lam. 192 f. 1; Bl. Schu, p. 94; Gthr. l. cit. 2, p. 455.

Z. sp., Gronov. Mus. i. n.^o 108.

Russell, i. p. 45, lam. 57, p. 46, lam. 58.

Gallus virescens, Lacép. iv. pp. 583, 584.

Gallichthys major, Cuv. & Val. ix. p. 168 lam. 254; Richards. Ichth. Chin. p. 271; Cantor, Catal. p. 136.

G. chevola, Cuv. & Val. ix. p. 175.

Seyris indica, Rüpp. Atl. Fische, p. 128, lam. 33, f. 1; Cuv. & Val. ix. p. 145 lam. 252; Rüpp. N. W. Fische, p. 51; Richards. Ichth. Chin. p. 276; Cantor, Catal. p. 134; Régne. Anim. III. Poiss. lam. 58 f. 2.

Carangoïdes gallichthys, Verh. Bat. Gen. xxiv. Makr. p. 68.
Hab. Luzon, Cavite, Santa Cruz; China.

2. Gén. SERIOLA, C. V

19. S. dumerilii Risso, N. v

(M. S. T.)

Caranx dumerilii, Risso, Ichth. Nice, p. 175.

Seriola dumerilii, Risso, Eur. Mér. iii. p. 424; Cuv. & Val. ix. p. 201 lam. 258; Cuv. Régne Anim. III. Poiss. lam. 56 f. 1; Guichen. Explor. Algér. Poiss. p. 62; Webb. & Berthel. Iles. Canar. Poiss. p. 57; Gthr. loc. cit. 2, p. 462.

S. purpurascens, S. auro-vittata, et S. quinque-radiata, Richards. Ichth. Chin. p. 271 (no Schleg.)

S. purpurascens, Schleg. Faun. Japon. Pois. p. 113 lam. 61; Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xxvi. Japan, p. 103.
Hab. Luzon, Manila, Cavite, Santa Cruz; China.

3. Gen. CHORINEMUS, Cuv. v.

20. Ch. lysan, Cuv., N. v.

(M. S. T.)

- ?Dampier, Voy. *New-Holland*, i. lam. 3, f. 5 p. 162.
Scomber lysan, *Forsk.* n.^o 67, lam. 54.
S. forsteri, Bl. *Schiz.* p. 26.
Scomberoides commersonianus, *Lacep.* ii. lam. 20, f. 3.
Russell, ii. p. 31, lam. 141.
Scomber madagascariensis, *Sauv. Zool.* iv. p. 590, lam. 85; *Bennett*,
Life of Raffles, p. 689.
Lichia lysan, *Rüpp. Atl. Fische*, p. 91.
Chorinemus commersonianus, *Cuv. & Val.* viii. p. 370; *Bleek.*
Verh. Bat. Gen. xxiv. *Makr.* p. 44.
Ch. lysan, *Cuv. & Val.* viii. p. 387; *Rüppell, N. W. Fische*,
p. 44; *Cantor, Catal.* p. 118; *Gthr. loc. cit.* 2. 471.
?Chorinemus farkhariae, *Cuv. & Val.* viii. p. 388.
Chorinemus aculeatus, *Cuv. & Val.* viii. p. 384 (*no Bloch.*)
Ch. forsteri, *Richards, Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1843, xi p. 24.
Hab. Luzon, B. de Manila, Cavite, Sta. Cruz; China.

21. Ch. toloo, Cuv. N. v.

(M. S. T.)

- ?Toloo parah, *Russell*, ii. p. 29, lam. 137.
Lichia toloo-parah, *Rüpp. Atl. Fische*, p. 91.
Chorinemus toloo, *Cuv. & Val.* viii. p. 377; ?*Bleek. Verh. Batav.*
Gen. xxiv. Makr. p. 45.
Hab. Luzon, Manila; Indias Orientales.

22. Ch. sancti-Petri, Cuv. N. v.

(M. S. T.)

- ?Coningo-visch, *Nieuhof, Bras. Zee-en Land-Reize*, p. 269.
Renard, *Poiss. Mol.* i. 15. 86; *Valent.* iii. p. 351, f. 11.
Scomber, sp., *Gronov. Zoophyl.* n.^o 305.
Chorinemus sancti Petri, *Cuv. & Val.* viii. p. 379, lam. 236;
Bleek. Verh. Bat. Gen. xxiv. p. 45; *Peters, Wieg. Arch.*
1855, p. 245; *Gthr. loc. cit.* 2. p. 473.
Ch. modetta, *Cuv. & Val.* viii. p. 382; *Rüpp. N. W. Fische*,
p. 45.
Ch. mauritianus, *Cuv. & Val.* viii. p. 382.
Ch. tol, *Cantor, Catal.* p. 119 (*no Cuv.*)
Thynnus moluccensis, *Gronov. Syst. ed Gray*, p. 121.
Hab. Luzón, Manila, Cebú; China, Amboina.

23. Ch. orientalis, Temm. et Schlt. N. v.

(M. S. T.)

- Chorinemus orientalis, *Temm. & Schleg. Faun. Japon.* Poiss.
p. 106, lam. 57, f. 1.
?Scomber aculeatus, *Bloch*, lam. 336.
Hab. Luzón, Manila, Cavite; Japon.

4. Gén. LICHIA, Cuv.

24. *L. glauca*, Bl. N. v.

Prima glauci species, Rondel, p. 252; Willughby, p. 297.
Lampuge, Bellon, p. 155.
Scomber n.^o 5^r, Arfedi, Genera, p. 52.
S. glauces, L. Syst. Nat. i. p. 494; Bl. Schn. p. 33; Shaw, Zool. iv. p. 593.
Gasterosteus glaucus, (Forst.) Bl. Schn. p. 539; Forst. Descript. Anim. cur. Lichtenst. p. 5.
Caranx glaucus, Lacép. iii. pp. 58, 66.
Centronotus glayeos, Risso, Ichth. Nicae, p. 194.
Lichia glaucus, Risso, Eur. Mérid. iii. p. 420; Cuv. & Val. viii. p. 358. lam. 234; Webb. & Berthel. Iles. Canar. p. 56. lam. 13. f. 1; Jarrell, Brit. Fishes, edit. 3. ii. p. 232; Gthr. l. cit. 2. p. 477.
Hab. Luzon, B. de Manila; Senegal.

5. Gén. TRACHYNOTUS, C. V.

25. *Tr. ovatus*, Lin. N. v.

Gasterosteus ovatus, L. Syst. Nat. i. p. 490.
Centronotus ovalis, Lacép. iii. pp. 300, 316.
Valent. iii. p. 386, f. 118, Renard, i. 27, 151.
Scomber falcatus, Forstk. p. 57.
Cteniomorus Blochii, Lacép. iii. p. 95. lam. 3, f. 2.
Trachinotus falcatus, Lacép. iii. p. 79; Rüpp. Atl. Fisch. p. 89; Cuv. & Val. viii. p. 430.
Mookalee-parah, Russel, ii. p. 39, lam. 154.
Trachinotus mookalee, Cuv. & Val. viii. p. 523; Cantor, Catal. p. 120; Bleeker, Verhand. Batav. Genootsch. xxiv. Makr. p. 48.
T. blochii, Cuv. & Val. viii. p. 425.
T. affinis, Cuv. & Val. viii. p. 428.
T. talciger, Cuv. & Val. viii. p. 428.
T. drepanis, Cuv. & Val. viii. p. 429.
T. ovatus, Gthr. l. cit. 2. p. 481.
T. auratus, Richards, Ichth. Chin. p. 270.
Hab. Cebú; China.

6. Gen. PSETTIUS, C. V.

26. *Ps. argenteus*, Lin. N. v.

(M. S. T.)

Chetodon argenteus, L. Iman. Acad. iv. p. 249; Bl. Schn. p. 230.
Scomber rhombeus, Forstk. p. 58.
Centrogaster rhombeus, L. Gm. p. 1338.
Acanthopus argenteus, Lacép. iv. pp. 558, 559.
Centropodus rhomboidalis, Lacép. iii. pp. 303-305.
Russell, lam. 59.

Psettos rhombicus, *Cuv.* & *Val.*, vii, p. 245; *Cuv. Régne Anim.* III. Poiss. lam. 42, f. 2; Bleek. Verh. Batav. Genootsch. xxiii. Chetod. p. 29; Peters, Wieg. Arch. 1855, p. 247.

Monodactilus rhombicus, *Cant. Catal.*, p. 172.

Psettos argenteus, Richards. Toy. Arch. & Terr. Fiches, p. 57. lam. 35, f. 1-3; Gthr. I. cit. 2, p. 487.

Hab. Luzón, Nasugbú, Bitangas, Pasacao, Camarines, Currimao, Ilocos; Australia.

27. **Psetus** *sp.* N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, B. de Manila.

7. Gen. PLATAN. C. V.

28. **Pl. vespertilio**, *Cuv.* N. v.

Valent. n.^o 62; Renard, lam. 24, f. 120; Seba, iii, 25, 15.

Chætodon vespertilio, Bl. lam. 199 f. 2; L. Gm. p. 1857; Bl. Schin. p. 228; Shaw. Zool. iv, p. 344; Bennet, Ceylon Fishes, pl. 5.

? Chætodon pinnatus, L. Mus. Ad. Frid. lam. 33, f. 6; L. Gm. p. 1241.

Platix vespertilio, *Cuv. Régne Anim.*; Rüpp. Att. p. 143, et N. W. Fische, p. 33; Cantor. Catal. p. 166; Peters in Wieg. Arch. 1885, p. 247; Gthr. I. cit. 2, p. 489.

P. gaimardi, *Cuv.* & *Val.* vii, p. 216.

P. guttulatus, *Cuv.* & *Val.* vii, p. 227; lam. 186.

P. albipunctatus, Rüpp. Att. Fische, p. 69, f. 18, f. 4.

P. blanchii, *Cuv.* & *Val.* vii, p. 222; Bleeker, Verh. Bat. Gen. xxiii. Chetod. p. 27.

P. ehrenbergii, *Cuv.* & *Val.* vii, p. 221; Rüpp. N. W. Fische, p. 33; Richards. I. c. p. 245; *Cuv. Régne Anim.* III. Poiss. lam. 42, f. 1.

Hab. Cebú; China.

29. **Pl. teira** *Cuv.* N. v. Miyang.

(M. S. T.)

Chætodon teira, Forsk. p. 60, lam. 22, Bl. lam. 199, f. 1; L. Gm. p. 1265; Bl. Schin. p. 221; Shaw. Zool. iv, p. 345, lam. 48. Russell, lam. 87.

Platix teira, *Cuv. Régne Anim.*; Rüpp. Att. Fische, p. 68, et N. W. Fische, pp. 33, 37; *Cuv.* & *Val.* vii, p. 226; Cantor. Catal. p. 168; Bleek. Verh. Bat. Gen. xxiii. Chetod. p. 28; Peters. Wieg. Arch. 1855, p. 247; Gthr. I. cit. 2, p. 492.

P. leschenedi, *Cuv.* & *Val.* vii, p. 223.

P. vespertilio, Temm. & Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 83, lam. 42. Hab. Luzón, Manila, C. de Cebú; China.

30. **Pl. sp.** N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzon, B. de Manila.

8. Gén. PEMPHERIS, C. V.

31. P. otaitensis, C. V. N. v.

P. oualensis, C. et V. vii. p. 299; Less. Voy. Coq. Zool. Poiss. p. 168; Bleeker, Banda. i. p. 422.
P. otaitensis, C. et V. vii. p. 304, lam. 191; Less. l. cit. p. 167; Gthr. l. cit. 2. p. 508.
Hab. Cebú; Amboina.

9. Gén. EQUULA, Cuv.

32. E. fasciata, Lacép. N. v.

(M. S. T.)

Karah, Russell, i. p. 51, lam. 66.
Equula filigera, longispinis, carah, et fasciata, Cuv. & Val. x. pp. 92-97, lam. 284.
E. filigera, Cuv. Mem. Mus. i. p. 402, lam. 23. f. 1; Cantor, Catal. p. 150 Bleeker Timor, i. p. 165, et Verh. Bat. Gen. xxiv. Makr. p. 79.
E. setigera, Agass. Recherch. Poiss. Foss. v. p. 24, lam. B.
E. fasciata, Gthr. loc. cit. 2. p. 498.
Hab. Luzón, B. de Manila; Mar Rojo

33. E. edentula, (Bloch). N. v.

(M. S. T.)

Scomber flavescens, &c., Seba, iii. p. 75. lam. 27. f. 4.
Sc. edentulus, Bloch, lam. 428 Bl. Schn. p. 36.
Leiognathus argenteus, Lacép. iv. pp. 448, 449.
Komay-karah, Russell, i. p. 50, lam. 63.
Equula ensifera, Cuv. & Val. x. p. 66; Bleek. Verh. Bat. Gen. xxiv. Makr. p. 80.
E. coma, Cuv. & Val. x. p. 76.
E. serrulifera, Richards. Voy. Ereb. & Terr. Ichthyol. p. 137, lam. 59. f. 12-14.
E. edentula, Gthr. l. cit. 2. p. 498.
Hab. Luzón, B. de Manila; China, Amboina.

34. E. caballa, (Forsk.) N. v.

(M. S. T.)

Scomber equula, Forsk. p. 58; Bl. Schn. p. 36; Shaw. Zool. iv. p. 506.
Centrogaster equula, L. Gm. p. 1337.
Cæsio equulus, Lacép. iii. pp. 85, 90.
Russell, pl. 62.
Equula caballa, Cuv. & Val. x. p. 73; Rüppell, N. W. Fische, p. 51; Cantor Catal. p. 146; Gthr. l. cit. 2. p. 499.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Nasugbú, Batangas; Mar Rojo.

35. E. dussunieri, C. V. N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & Val. x. p. 77, lam. 283; Cuv. Régne Anim. Ill. Poiss. lam. 62. f. 1. Gthr. l. cit. 2. p. 500.
Hab. Luzón, B. de Manila, C. de Cebú; Borneo.

36. **E nuchalis** Schleg. N. v.

(M. S. T.)

Schleg. *Faun. Japon.* Poiss. p. 126, lam. 67 f. v; *Gthr. I. cit.* 2, p. 500.
Hab. Luzón, Manila; China.

37. **E splendens** Cuv. N. v.

(M. S. T.)

Goomorah karah, Russell, i. p. 48, lam. 61.
Equula splendens, Cuv. *Régne Anim.*; Cantor, *Catal.* p. 149; *Gthr. I. cit.* 2, p. 501.
E. gomorah, Cuv. & Val. x. p. 80; Rüppell, *N. W. Pische*, p. 51; Bleek, *Verh. Bat. Gen.* xxiv, *Makr.* p. 82.
E. caballa, Bleek, *Oos-Java (no Cuv. & Val.)*
Hab. Luzón, B. de Manila; Mar Rojo.

38. **E oblonga**, Cuv. N. v.

(M. S. T.)

Scomber equula, var. *Forsk.* p. 58.
Equula oblonga, Cuv. & Val. x. p. 85; Bleek, *Verh. Bat. Gen.* xxiv, *Makr.* p. 84; *Gthr. I. cit.* 2.
E. berbis, Cuv. & Val. x. p. 85.
Hab. C. de Samar; Java, Mar Rojo.

39. **H leuciscus**, Gthr.

Gthr. I. cit. 2, p. 303.
Hab. Ce'ú; Amboina.

40. **H insidiatrix**, Bl. N. v. Sapi-sapi.

(M. S. T.)

Zeus insidiator, Bl. lam. 192, f. 2, 3; L. Gm. p. 1221; Bl. Schn. p. 95; Shaw, *Zool.* iv. p. 284, lam. 41; Lacép. iv. pp. 572, 574; Equula insidiatrix, Cuv. & Val. x. p. 98; Cant. *Catal.* p. 151; Bleek, *Verh. Bat. Gen.* xxiv, *Makr.* p. 84; *Gthr. I. cit.* 2, p. 504.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz; China, Sumatra.

41. **E interrupta**, C. V. N. v.

(M. S. T.)

Chanda ruconius, Buch. *Ham. Gang. Fisches.* pp. 106, 371, lam. 12, f. 35.
Equula interrupta, Cuv. & Val. x. p. 102; Bleek, *Verh. Bat. Gen.* xxiv, *Makr.* p. 85; *Gthr. I. cit.* 2, p. 504.
E. ruconius, Cuv. & Val. x. p. 73.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China, Amboina.

9 Gén. GAZZA, RÜPP.

42. **G. minuta**, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Scomber minutus, Bl. lam. 429, f. 2; Bl. Schn. p. 36.
Equula minuta, Cuv. & Val. x. p. 88; *Gthr. I. cit.* 2, p. 566.

G. dentex, *Cuv. & Val.* x. p. 91; *Peters.* *Wiegmat. Arch.* 1855,
p. 247.
Gazza minuta, *Bleek.* *Sumatra*, ii. p. 25, et *Verh. Bat. Gen.*
xxiv. *Makr.* p. 85
Hab. Luzon, B. de Manila, Cavite; Amboina.

43 *G. argentaria*, *Forst* N. v.

Zeus argentarius, (*Forst.*) *Bl. Schn.* p. 96; *Descript. Anim. cur.*
Lichtenst. p. 288.
G. argentaria, *Gthr.* l. cit. 2. p. 506.
Gazza tapeinosoma, *Bleeker.* *Sumatra*, ii. p.
Hab. Cebú; Sumatra.

44 *G. equulaeformis*, *Rüpp.* N. v.

(M. S. T.)

Rüppell. N. W. *Fische*, p. 4. lam. 1. f. 3; *Bleeker.* *Sumatra*,
ii. p. 261; *Cantor.* *Catal.* p. 153; *Gthr.* l. cit. 2. p. 506.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Nasugbú, Batangas; Mar Rojo.

10 *Gén. PEMPHERIS*, C. V.

45 *P. mangula*, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

Mangula kuttí, *Russell*, ii. lam. 114.
Pempheris mangula; *Cuv. & Val.* vii. p. 304; *Bleek.* *Verhand.*
Batav. *Genootsch.* xxiii. *Chvtd.* p. 30; *Gthr.* l. cit. 2. p. 509.
P. vanicolensis, *Cuv. & Val.* vii. p. 305.
P. nesogallica, *Cuv. & Val.* vii. p. 306.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Amboina.

46. *P. esp.* N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzon, Cavite.

Fam. XIFIDOS.

1 *Gén. HISTIOPHORUS*, C. *V.

1 *H. gladius*, N. v.

(M. S. T.)

Nieuhoff. *Embassy to China* p. 237; *Mahagr.* p. 171; *Willughby.*
App. lam. 5. f. 9; *Valent.* iii. 509. f. 125; *Renard*, i. t. 34.
f. 182, ii. t. 54. f. 233.
Scomber gladius, *Brouss. Mém. Acad. Sc.* 1786, p. 454. lam. 10;
Bl. lam. 345.
Xiphias velifer, *Bl. Schn.* p. 93.
Istiophorus gladius, *Lacep.* iii. pp. 374, 375; *Gthr.* l. cit. 2. p. 513.
Xiphias ensis, *Lacep.* ii. p. 296.
Notistium, *Hermann.* *Observ. Zool.* p. 305.
Xiphias platypterus, *Shaw. Zool.* iv. p. 101.
Histiophorus indicus, *Cuv. & Val.* viii. p. 293. lam. 229; *Cuv.*
Regn. Anim. Ill. *Poiss.* lam. 53. f. 1.

H. americanus, *Cuv.* & *Val.* viii, p. 303; *Guchen, Poiss.* in *Ramon de la Sagra, Hist. Cuba*, p. 105.
Hab. Luzon, Batanes; Oceano Indio.

Fam. GÓBIDOS.

1. Gén. GOBIUS. ARTEMI.

1. **G. guamensis**, *Cuv.* & *Val.*

C. et *V.* xii, p. 103; *Gthr. Cat. B. M.* 3, p. 5.
Hab. Marianas, Guam.

2. **G. baliurus**, *Cuv.*

Gobius baliurus, *Cuv.* & *Val.* xii, p. 61; *Bleek. Verhand. Batav. Genootsch.* xxii, *Blenn. en Gob.* p. 31; *Gthr. I. cit.* 3, p. 18.
Hab. Cebú; Amboina, Célebes.

3. **G. puntangooides**, *Bleek.*

Gobius puntang, *Bleek. Natuurk. Tijdschr. Nedertl. Ind.* iii, p. 692 (n.^o ii, p. 480.)
G. puntangooides, *Bleek. Ceram.* iii, p. 242; *Gthr. I. cit.* 3,
p. 19.
Hab. Cebú; Amboina.

4. **G. lentiginosus**, *Richards.*

Richards. Ichth. Voy. Ereb. & Terr. p. 3, lam. 1 figs. 5, 6;
Gthr. I. cit. 3, p. 20.
Hab. Cebú; N.^o Zelandia.

5. **G. ornatus**, *Rüpp.*

Gobius ornatus, *Rüpp. Atl. Fische*, p. 135, et *N. W. Fische*,
p. 137; *Gthr. I. cit.* 3, p. 21.
G. ventalis, (*Ehrenb.*) *Cuv.* & *Val.* xii, p. 113.
G. interstitiosus, *Richards. Voy. Ereb. & Terr. Fishes*, p. 3
lam. 5 figs. 3-6; *Bleek. Amb. & Ceram.* p. 275.
G. periophthalmoides, *Bleek. Natuurk. Tijdschr. Nedertl. Ind.*
1851, i, p. 249.
Hab. C. de Samar; Amboina, Molucas.

6. **G. giuris**, *Buch. N. v.*

(M. S. T.)

Korah-motta, *Russell*, lam. 50.
Koku, *Russell*, lam. 51.
Bullee korah, *Russell*, lam. 53.
Gobius giuris, *Buch. Ham. Fish. Gang.* p. 51 lam. 33 fig. 15;
Cuv. & *Val.* xii, p. 72; *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xii, *Blenn.-Gob.* p. 24; *Gthr. I. cit.* 3, p. 22.
G. kokus, *Cuv.* & *Val.* xii, p. 68; *Jardon in Madr. Journ.* xx.

- p. 148; Bleek, l. c., *Cant. Cat.* p. 180; Jaeg. *Voy. Int. Poiss.* lam. 14, fig. 3.
G. russelli, *Cuv. & Val.* xii, p. 75.
G. catebus, *Cuv. & Val.* xii, p. 76.
G. kora, *Cuv. & Val.* xii, p. 77.
G. celebicus, *Cuv. & Val.* xii, p. 74; Bleek. *Banten.* p. 318.
G. kurpah, Sykes in *Trans. Zool. Soc.* ii, p. 352, lam. 61 fig. 1.
G. platycephalus, Peters. *Monatsber. Berl. Acad.* 1852, p. 681,
G. phaiosoma, Bleek. *Verhand. Batav. Genootsch.* xxii, *Blenn.* en *Gob.* p. 30; et *Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind.* 1851, i. fig. 5.
Gobius fusiformis, Bleeker, *Verhand. Batav. Genootsch.* l. c.
G. fasciato-punctatus, Richards. *Voy. Sulph. Ichth.* p. 145, lam. 62
figs. 13, 14.
Hab. Luzón, B. de Manila, Laguna de Bay, C. de Cebú y
Samar; China.

7. **G. borneensis**, Bleeker. N. v.

(M S T)

- Bleeker, *Borneo*, i, p. 10; *Gthr. l. cit.* 3, p. 33.
Hab. Luzon, Cavite; Santa Cruz; Borneo.

8. **G. echinocephalus**, Rüpp. N. v.

(M S T)

- Gobius echinocephalus, Rüpp. *Atl. Fische*, p. 136, et *N. IV.*
Fische, pp. 137 & 138; *Cuv. & Val.* xii, p. 134; *Gthr. l. cit.* 3, p. 34.
Hab. Luzon, Manila, Cavite; China.

9. **G. ophthalmotœnia**,¹ Bleeker.

- Bleeker *kokos-Eiland*, p. 46; *Gthr. l. cit.* 3, p. 37.
Hab. Cebú; China.

10. **G. chlorostigmatoides**, Bleeker. N. v.

(M S T)

- Bleeker, *Verhand. Batav. Genootsch.* xxii, *Blenn. en Gob.* p. 26;
Gthr. l. cit. 3, p. 39.
Hab. Luzón, Manila; Java, Borneo.

11. **G. cyanoclavis** Cantor.

- Cant. Catal. Mal. Fishes*, p. 185; *Gthr. l. cit.* 3, p. 40.
Hab. Luzón, Manila; Pinang.

12. **G. caninus** C. V. N. v.

(M S T)

- Gobius caninus, *Cuv. & Val.* xii, p. 86; Bleek. *Verhand. Batav. Genootsch.* xxii, *Blenn. en Gob.* p. 27; *Gthr. l. cit.* 3, p. 38.
G. grandinosus, Valenc. in *Voy. Bonite, Poiss.* p. 177, lam. 5
fig. 4.
Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; China.

13. **G. brevirostris**, *Göhr.* N. v.

(M. S. T.)

Gthr. *l. cit.* *3.* p. 41.
Hab. Luzon; Manila; China.

14. **G. xanthosoma**, Bleeker, N. v.

(M. S. T.)

Gobius xanthosoma, Bleeker, *Ceram.* ii. p. 703; *Gthr.* *l. cit.* *3.* p. 42.

Gobiodon xanthosoma, Bleeker, *Enum. Spec.* p. 120.
Hab. Luzon; Laguna de Bay; Célebes.

15. **G. spectabilis**, Göhr. N. v.

Gthr. *l. cit.* *3.* p. 45.
Hab. Cebu; India.

16. **G. schlegelii**, Göhr. N. v.

(M. S. T.)

Gthr. *l. cit.* *3.* p. 46.
Hab. Luzon; B. de Manila; Angat, Bulacan.

17. **G. microlepis**, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Gobius acutipinnis, var., *Cantor*, *Catal.* p. 184.

G. microlepis, Bleek, *Verhand. Batav. Genootsch.* xxiii., *Bleenn.* en *Gob.* p. 35, et *Java*, ii. p. 436; *Gthr.* *l. cit.* *3.* p. 49.

Oxyurichthys microlepis, Bleek, *Enum. Spec.* p. 120.
Hab. Luzon; Cavite; Sta. Cruz; China.

18. **G. grammepomus**, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Gobius grammepomus, Bleek, *Verhand. Batav. Genootsch.* xxiii., *Bleenn.* en *Gob.* p. 34, et *Batjan*, ii. p. 200; *Gthr.* *l. cit.* *3.* p. 63.

G. melanocephalus, Bleek, *Verhand. Batav. Genootsch.* *l. c.* p. 33.

G. personatus, Bleek, *l. c.* p. 34, et *Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind.* 1851, i. fig. 4.

Hab. Samar; Borneo; Java.

19. **G. bynoensis**, Richards, N. v.

(M. S. T.)

Gobius bynoensis, Richards, *Ichtyol. Ereb. & Terr.* p. 1, lam. 1 figs. 1, 2; *Gthr.* *l. cit.* *3.* p. 70.

G. stethophthalmus, Bleek, *Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind.* i. p. 249 fig. 7, et xx. p. 236.

Hab. Luzon; R. Pasig, Manila; Australia.

20. **G. sp.** N. v.

(M. S. T.)

Hab. Samar

21. **G. knuttei**, *Cuv. & Val.* N. sp. (M. S. T.)
Gobius filieri, *Cuv. & Val.* xii. p. 106.
Gobius knuttei, Bleek. *Act. Soc. Sci. Indo-Nedert.* iii., *Japon*, p. 16 lam. 4, fig. 2; *Gthr. l. cit.* 3. p. 73.
Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; China.
22. **G. lacrymosus**, *Phs.* N. sp. (M. S. T.)
Hab. Luzon, B. de Manila.
23. **G. sp** N. sp. (M. S. T.)
Hab. Luzon, Manila, Rio Munang, Antipolo.
- 2 Gen APOCRYPTES, C. V.
24. **A. serperator**, Richards, N. sp. (M. S. T.)
Richards. *Ichthyol. Chinta* p. 206; *Gthr. l. cit.* 3. p. 82.
Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; China.
25. **A. nekipinnis**, Cantor, N. sp. (M. S. T.)
Cantor, *Catal.* p. 188; *Gthr. l. cit.* 3. p. 83.
Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; Penang.
3. Gén. GOBIODON, BLEEK.
26. **G. ceramensis**, Bleeker, N. sp. (M. S. T.)
Gobius ceramensis, Bleeker, *Ceram*, ii. p. 703; *Gthr. l. cit.* 3. p. 88.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China, Borneo.
27. **G. histrio**, C. L. N. sp.
Gobius histrio, (Kuhl & v. Hass.) *Cuv. & Val.* xii. p. 132. lam. 347; Bleek. *Naturk. Tijdschr. Nederl. Ind.* 1851, i. fig. 6; *Gthr. l. cit.* 3. p. 88.
Hab. Mindanao, Zamboanga; I. Amigos.
- 4 Gen TRLENOPHORICHTVS, GILL.
28. **Tr. trigonocephalus**, Gill N. sp. (M. S. T.)
Gill. *I. c.* p. 18; *Gthr. l. cit.* 7. p. 89.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.
5. Gén. SICYDIUM, CUV.
29. **S. cyanocephalum**, Cuv. N. sp.
Sicydium synocephalum, Cuv. & Val. xii. p. 177. lam. 352; Bleek.

- Batjan*, ii, p. 201; *Naturk. Tysk.*, V Del. Int. i, 2, p. 150; *Gthr. I. cit.* 3, p. 94.
S. lagoccephalum, Bleek, *Verhand. Batav. Genootsch.* xxii., *Blenn. en Gib.*, p. 39 (*no Val.*)
Gobius hasseltii, Bleek, *Naturk. Tyschfr. Nederl. Ind.* i, 10, 250, fig. 8.
Hab. Luzon, Manila, Rio Lamateng, Morong; Indias Orientales.

6. Gen. PERIOPHTHALMUS, Bl.

30 P. koelreuteri *Pall.* N. v.

(M. 8)

- Patent*, iii, p. 391, fig. 140; *Rouind.* i, 16, 65; *Seba*, iii, 26, 47; *Koelreuter in Nov. Comm. Petrop.* viii, p. 421.
♂ *Gobius barbatus*, L. *Gm.* i, p. 1201; *Bl. Schn.* p. 70.
G. koelreuteri, *P. II. Specil.* viii, p. 8, tab. 2, fig. 1.
Periophthalmus koelreuteri, *Bl. Schn.* p. 65; *Gthr. I. cit.* 3, p. 9.
Hab. Cebu, Luzon, Manila, Malabon, Bulacan; Ceilan.

31 P. schlosseri *Pall.* N. v.

- Gobius schlösseri*, *Pall. Specil.* viii, lam. 1, fig. 1-4; *L. Gm.* i, 1201; *Liv. & Pl.* ii, p. 573; *Syst. Zool.* iv, p. 246.
Periophthalmus schlösseri, *Bl. Schn.* p. 64; *Cuv. Régne Anim. Cuv. & Val.* xii, p. 192; Bleeker, *Verhand. Batav. Genootsch.* xxii., *Blenn. en Gob.* p. 39; *Cant. Catal.* p. 191; *Cuv. Régne Anim. III. Poiss.* lam. 81, fig. 1; *Gthr. I. cit.* 3, p. 100.
Gobius tredecim-radiatus, Buch, *Hain. Fishes of the Ganges*, p. 48.
G. septem-radiatus, *Buch. Ham.* i, c. p. 46.
G. novem-radiatus, *Buch. Ham.* i, c. p. 47, lam. 2, fig. 14.
Periophthalmus tredecim-radiatus, *Cuv. & Val.* xii, p. 189.
P. septem-radiatus, *Cuv. & Val.* xii, p. 190.
P. novem-radiatus, *Cuv. & Val.* xii, p. 191.
P. freycineti, *Cuv. & Val.* xii, p. 197; *Oriol & Grati. Voy. Freyc.* *Poiss.* p. 157.
P. borneensis, Bleek, *Born.* i, p. 11.
Hab. C. de Samar; Indias Orientales.

32 P. var. freycineti, C. et V. N. v.

- Cuv. et Val.* xii, p. 197; *Gthr. I. cit.* 3, p. 100.
Hab. Filipinas.

7. Gen. ELEOTRIS, Cuv.

33. E. ophiocephalus (C. et V. Hae.)

- Eleotris ophiocephalus*, (Kuhl & v. Hass.) *Cuv. & Val.* xii, 339; Bleek, *Verhand. Batav. Genootsch.* xxii., *Blenn. en Gob.* lam. 22; Cantor, *Catal.* p. 199; *Gthr. I. cit.* 3, p. 107.
E. porocephalus, *Cuv. & Val.* xii, p. 237 (*no Cant. or Bleek.*)
E. margaritacea, *Cuv. & Val.* xii, p. 240.
Hab. Luzon, Manila, Rio Munting, Antipolo; Borneo.

*

34. E. *hædtii*, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Bleek. *Amboina*, v. p. 496; *Gthr.* *l. cit.* 3. p. 110.
Hab. Luzón, Laguna de Bay; Amboina.

35. E. *obscura*, Schleg. N. v.

Schleg. *Faun. Japon. Poiss.* p. 149, lam. 77, figs. 1-3; *Gthr.* *l. cit.* S. p. 115.
Hab. Luzón, Manila; China.

36. E. *oxycephala*, Schleg. N. v.

(M. S. T.)

Eleotris *oxycephala*, Schleg. *Faun. Japon. Poiss.* p. 150, lam. 77
figs. 4, 5; *Gthr.* *l. cit.* 3. p. 115.
E. *cantherius*, Richards. *Ichth. China*, p. 269.
Hab. Luzón, Cavite; China.

37. E. *butis*, (Buch) N. v.

Cheilodipterus *butis*, Buch. *Ham.* pp. 57, 367; Gray. & Hardy.
Ill. Ind. Zool. ii, lam. 93, f. 3.
Eleotris *humeralis*, Cuv. & Val. xii, p. 246; Bleek. *Verhand. Batav. Genootsch.* xxii., *Blenn. en Gob.* pp. 5, 22.
E. *butis*, Cant. *Catal.* p. 196; *Gthr.* *l. cit.* 3. p. 116.
? E. *melanopterus*, Bleek. *Ceram.* ii. p. 766.
Hab. Filipinas; Borneo, China.

38. E. *melanostigma* Bleeker.

(M. S. T.)

Bleeker, *Verhand. Genootsch.* xxii., *Blenn. en Gob.* p. 23; *Gthr.*
l. cit. 3. p. 117.
Hab. Luzón, Rio Pasig, Laguna de Bay; Java, Borneo.

39. E. *caperata*, Cantor. N. v.

(M. S. T.)

Eleotris *caperatus*, Cant. *Catal.* p. 197; *Gthr.* *l. cit.* 3. p. 117.
E. *koiromatolom*, Bleek. *Verhand. Batav. Genootsch.* xxii., *Blenn. en Gob.* p. 21.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China, Java.

40. E. *cyrinoides?* C. I. N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & Val. xii, p. 248; Bleek. *Sumatra*, ii. p. 277.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Manila; Sumatra.

41. E. *marmorata*, Bleeker. N. v.

(M. S. T.)

Bleeker, *Borneo*, vi. p. 424; *Gthr.* *l. cit.* 3. p. 123.
Hab. Luzón, Rio Pasig, Manila; Sumatra.

42. E. *sinensis*, Lacep. N. v.

(M. S. T.)

Bostrychus *sinensis*, Lacep. iii. p. 141, lam. 14, fig. 2.

- Gedins, *Cuv.* & *Val.* xii, p. 94.
Philypnus ocellicauda, Richards, *Voy. Sulph. Fishes*, pp. 58, 149,
lam. 56, figs. 15, 16.
Ph. sinensis, Richards, *Ichth. Ch'iu*, p. 210.
Ph. ophicephalus, Bleek, in *Verhand. Batav. Genootsch.* xxii.,
Blenn. en *Gob.* p. 20.
Bostrichthys sinensis, Gill, *Proc. Acad. Nat. Sc. Philad.* 1860,
p. 125.
Electris sinensis, Gthr. I. cit. 3. p. 127.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China, Java.

43. **E. muralis**, (*Quoy & Gaim.*) N. v. M. S. 4

- Electris muralis, (*Quoy & Gaim.*) *Cuv.* & *Val.* xii, p. 253, lam.
353; Bleek, *Amboina & Ceram*, p. 276; Gthr. I. cit. 3. p. 130.
Valenciennea muralis, Bleek, *Batræ*, p. 412.
Electriodes muralis, Bleek, *Coram*, p. 212.

Hab. Luzón, Cavite, Samar, Borongan; Archipiélago Indio.

8. Gén. AMBILOPUS, C. V.

45. **A. brachygaster**, Gthr. N. v. M. S. 4

- Gthr. I. cit. 3. p. 134.
Hab. Luzón, B. de Manila; Indias Orientales.

46. **A. brachysoma**, Bleeker. N. v. M. S. T.

- Bleeker, *Sumatra*, iii, p. 510; Gthr. I. cit. 3. p. 130.
Hab. Luzón, B. de Manila, Bulacan, Angat; Priaman.

9. Gén. PLATYPTERA, C. V.

47. **P. aspro**, (v. Hass.) N. v. M. S. 4

- Platyptera aspro (v. Hass.) *Cuv.* & *Val.* xii, p. 321, lam. 360;
Bleek, *Celeb.* viii, p. 310; Gthr. I. cit. 3. p. 138.
Pl. flavescentia, Valencié, in *Cuv. Rgne Anim. III. Poiss.* lam. 83.,
fig. 1.
Hab. Luón, B. de Manila.

10. Gén. CALLIONYMUS, LIN.

48. **C. longicaudatus**, Tm. et Seid. N. v. M. S. 4

- Callionymus japonicus, Houtt, *Verh. Holl. Maatsch. Wet. Haar.*
xx, p. 311 (no Val.)
C. longicaudatus Temm. & Schlegel, *Fishes*, p. 60, lam. 78, figs.
1, 2, lam. 79, A, fig. 1; Bleek, *Act. Soc. Sci. Indo-Nedert.* v.,
Japon, p. 17; Gthr. loc. cit. 3. p. 148.
C. reevesii, Richards, *Voy. Sulph. Fishes*, p. 60, lam. 30, figs. 1-3
(no fig. 4); et *Ichth. Chin.* p. 201; Bleek, *Coram* i., p. 211;
Bleek, *Nalez. Ichth. Jap.* p. 44.
C. variegatus, Schlegel, *Faun. Japon. Poiss.* p. 153.

b Icheri, Richards, *Voy. Sulph. Fishes*, p. 62, lam. figs. 1 & 2.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China, Amboina.

49. **C. schaapii**, Blkr.

Bleeker, *Banka*, p. 453; *Gthr. l. cit. 3.* p. 148.
Hab. C. de Samar; Banka.

59. **C. simplicicornis**, C. V.

Cuv. & Val. xii. p. 303; *Gthr. l. cit. 3.* p. 143.
Hab. Marianas, Guam.

50. **C. opercularis**, C. V. N. v.

Cuv. et Val. xii. p. 305; *Gthr. l. cit. 3.* p. 151.
Hab. C. de Mindoro.

II. Gén. VULSUS, GTHR.

31. **V. daetylophus**, C. V. N. v.

Callionyus dactylopus, (Benn.) Cuv. & Val. xii. p. 310; Bleek.
Amboina, ii. p. 559.
Dactylopus Lennetti, Gill, l. c.
Vulsus dactylopus, *Gthr. l. cit. 3.* p. 152.
Hab. Cebú; Célebes.

Fam. BATRÁQUIDOS.

I. Gén. BATRACHUS, C. V.

1. **B. Sp.** N. v.

(M. S. 1.)

Hab. Samar, Borongan.

Fam. ANTENÁRIDOS.

I. Gén. LOPHIUS, ARFEDI.

1. **L. setigerus**, Wah! N. v.

(M. S. 1.)

Lophius setigerus, Wah!, *Skript. of Naturh.* iv. p. 214, lam.
3 figs. 5, 6; Cuv. & Val. xii. p. 383; Schleg. *Faun. Japon.*
Poiss. p. 158, lam. 80; Richards, *Ichth. Chin.* p. 203; Bleek.
Verhand. Batav. Genootsch. xxv., *Japon.*, p. 46; *Gthr. loc. cit.*
3 p. 180.

L. viviparus, Bl. Sch. p. 142 tab. 32.
Hab. Luzón, Manila; China.

2. Gen. ANTENNARIUS, COMMIERS

2. A. marmoratus, *Gthr.* N. v. (M. S. T.)

Seba, i. 74, 4.
Cochinchina *Iophius*, *Shaw*, *Nat. Misc.* vol. xxiii, lam. 1012.
Skeleton: *Cuv. Mem. Mus.* iii, pl. 18, fig. 4. (*Chironectes hystrix*).

Au. marmoratus, *Gthr.* l. cit. 3, p. 185.
Hab. Luzón, Manila; China, Australia.

3 A. tridens, (Schleg.), N. v. (M. S. T.)

Chironectes tridens, *Schleg.* *Faun. Japon.* *Poiss.* p. 159, lam. 81
figs. 2, 3 et 5; *Bleek.* *Verhand. Batav. Genootsch.* xxv. *Japon.*
p. 47.

Ant. tridens, *Gthr.* l. cit. 3, p. 191.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

4 A. urophthalmus, Bleek N. v. (M. S. T.)

Chironectes caudimaculatus, *Richards*. *Voy. Ereb. & Trir. Fishes*
p. 125, 60, figs. 8, 9 (*no Rüpp.*)

Antennarius urophthalmus, *Bleek.* *Natuurk. Tijdschr. Nederl.*
Ind. ii, p. 488, et xv, p. 237; *Gthr.* l. cit. 3, p. 192.
Hab. Luzón, Manila.

5. A. sp.

Hab. Mindanao, Zamboanga.

6 A. notophthalmus, Bleek

Bleek. *Natuurk. Tijdschr. Nederl.* *Ind.* v. 1853, p. 544; *Gthr.*
l. cit. 3, p. 196.

Hab. Visayas; Archipiélago Indico.

• 3. Gén. HALIEUTEA C. V.

7. H. stellata, *Cuv.* N. v. (M. S. T.)

Lophius stellatus, *Wahl.* *Skr. Naturh. Kjøbenhavn*, iv, p. 214, lam.
figs. 3, 4; *Bl. Sch.* p. 142.


L. taenius, *Lacép.* i, p. 118.

L. muricatus, *Shaw*, *Zool.* v, p. 382, lam. 162.

Tiles, *Kruseanst. Reise*, lam. 61, figs. 3, 4.

Halieutea stellata, *Cuv. & Val.* xii, p. 456, lam. 360; *Faun. Jap.*
Poiss. p. 160 lam. 72; *Bleek.* *Amb. & Cer.* p. 279; *Gthr.*
l. cit. 3, p. 203.

Hab. Luzón, Manila; China.



Fam. BLÉNIDOS.

1. Gén. BLENNIUS, ARREDI

1. Bl. sinensis, *Gthr.* N. v.

(M. S. T.)

Gthr., l. cit. 3. p. 212.
Hab. Luzón, Manila; China.

2. Gén. PETROSCIRTES, RÜPP.

2. P. tæniatus, (*Q.* et *G.*)*Aspidontus tæniatus*, *Quoy & Gaim.* *Voy. Astrol.* *Poiss.* p. 719.
lam. 19, fig. 4.
Petrosциetes paradiseus, *Bleeker*, *Amboina*, v. p. 495.
Hab. Marianas, Guam; Amboina.3. P. anema, *Bleeker*, N. v.*Bleek.* *Amboina & Ceram*, p. 273; *Gthr.* l. cit. 3. p. 236.
Hab. Cebú; China.

4. P. sp. N. v.

(M. S. T.)

Hab. C. de Samar.5. P. grammistes, *G. V.* N. v.

(M. S. T.)

Blennechis grammistes, *Cuv. & Val.* vi. p. 285; *Gthr.* l. cit. 3.
p. 236.
Hab. C. de Samar, Cebú.

3. Gén. CLINUS, C. V.

6. Clinus, esp., N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila.

4. Gén. SALARIAS, C. V.

7. S. fasciatus, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

Blennius gattorugine, *Forsk. Descr. Anim.* p. 23.
B. fasciatus, *Bl.* ii. p. 111, lam. 102, fig. 1; *Bl. Schn.* p. 168.
Salarias quadripinnis, *Rüpp. All. Fische*, p. 112, lam. 28 fig. 2;
Cuv. & Val. xi. p. 318; *Bleek. Verhand. Batav. Genootsch.*
xxii., *Blenn. en Gob.* p. 19.
S. fasciatus, *Cuv. & Val.* xi. p. 324.
S. priamensis, *Bleek. Sumatra*, ii. p. 268.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Batangas, Nasugbu, Cebú;
Borneo.

8. *S. sp.* N. v.

(M. S. T.)

Hab. Cebú.

9. *S. ceramensis*, Bleeker.

Bleeker, Ceram, ii, p. 701; Gthr. I. cit. 3, p. 246.
Hab. C. de Samar y Cebú; Célebes.

10. *S. sebæ* Cuv. N. v.

(M. S. T.)

12. *Seba*, iii, 39, 5.
? *Salaris sebæ*, Cuv. & Val., xi, p. 323.
Salaris sebæ, Bleek. Ternate, vii, p. 373; Gthr. I. cit. 3, p. 246.
Hab. Luzon, Cavite, Santa Cruz; Amboina.

11. *S. variolosus*, C. V.

Cuv. & Val. xi, p. 317; Gthr. I. cit. 3, p. 247.
Hab. Marianas, Guam.

12. *S. sumatranaus* Bleeker, N. v.

(M. S. T.)

Bleeker Bleen. en Gob. p. 256; Gthr. I. cit. 3, p. 252.
Hab. Luzon, Batangas, Nasugbú, Cavite, Santa Cruz; Archipiélago Indílico.

13. *S. quadricornis* G. V.

Cuv. & Val. xi, p. 329, lam. 329; Jenyns, Zool. Beagle Fishes, p. 87; Gthr. I. c. 3, p. 255.
Hab. Luzon, B. de Manila, C. de Cebú.

14. *S. bellus*, Gthr. N. v.

(M. S. T.)

Gthr. Cat. B. M. 3, p. 256.
Hab. Luzon, Cavite; China.

Fam. TEÚTIDIDOS.

1. Gén. TEUTHIS, LIN.

1. *T. javus*, L. N. v.

(M. S. T.)

Teuthis javus, L. Syst. i, p. 507; L. Gm. i, p. 1362; Cant. Catal. p. 207; Gthr. I. cit. 3, p. 315.
Hepatus, Gronov. Zooph. p. 113 n.º 352 lam. 8 fig. 4; Russell, ii, lam. 102.
Amphacanthus javus, Cuv. & Val. x, p. 118; Bleek. Verhand. Botav. Gennotsch. xxiii. Teuth. p. 9; Schleg. & Müll. Verhand. Nat. Gesch. Overz. Bezitt. p. 10.

A. russelli, Bleek. *Topogr. Batav.*
Hab. Luzón, Manila, Cebú; Ceilán.

2. **T. vermiculata**, C. V. N. v.

(M. S. T.)

Amphacanthus vermiculatus, (Kuhl & v. Hass.) Cuv. & Val. x. p. 126; Müll. & Schleg. Verh. Overz. Bez. Viessch. p. 11 lam. 3 fig. 2; Bleek Verhand. Batav. Genootsch. xxiii., Teuth. p. 11. T. vermiculata, Gthr. l. cit. 3, p. 317.
Hab. Luzón, Batangas, Nasugbú, Cavite, Santa Cruz; Amboina.

3. **T. margaritifera**, C. V.

Amphacanthus margaritiferus, Cuv. & Val. x. p. 145; Bleek. Java, iv. p. 334.
Teuthis margaritifera, Gthr. l. cit. 3, p. 317.
Hab. C. de Cebú; Archipiélago Indico.

4. **T. albopunctata**, (Schleg.) N. v.

(M. S. T.)

Amphacanthus albopunctatus, Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 128.
A. margaritiferus, Richard, Ichth. Chin. p. 243 (no Cuv. & Val.)
A. fuscescens, Richards, Ichth. Chin. p. 243 (no Auct.)
A. dorsalis, Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xiii., Teuth. p. 9, et Java, iv. p. 332; (no Cuv. & Val.)
Teuthis brevirostris, Gronov. Syst. ed. Gray, p. 142.
T. albopunctatus, Gthr. l. cit. 3, p. 318.
Hab. Luzón, Manila, Batangas, Nasugbú; Ch'na.

5. **T. hexagonata**, Bleek.

Amphacanthus hexagonatus, Bleek. Kokos, p. 41.
T. exagonata, Gthr. l. cit. 3, p. 320.
Hab. C. de Cebú; Java.

6. **T. lurida**, Rupp.

Amphacanthus duridus, (Ehrenb.) Rüpp. Atb. Fische. p. 45; Cuv. & Val. x. p. 150.
T. lurida, Gthr. l. cit. 3, p. 321.
Hab. Cebú; Mar Rojo.

7. **T. nebulosa** Q. et G. N. v.

(M. S. T.)

?Amphacanthus punctatus, Bl. Schn. p. 210; Cuv. & Val. x. p. 146; Forst. Deser. Anim. ed. Licht. p. 286.
A. nebulosus, Quoy, & Gaim. Voy. Uran. Zool. p. 369; Cuv. & Val. x. p. 164; Schleg. & Müll. l. c. p. 12.
A. maculosus, Quoy, & Gaim. l. c. p. 370.
A. gymnopareius, Richards, Ann. & Mag. Nat. Hist. 1843, xi. p. 174.
A. nebulosus, Gthr. l. cit. 3, p. 321.
Hab. Luzón, Manila, C. de Cebú; Australia.

8 **T. argentea**, Q. et G. N. v.

(M. S. 1)

Amphacanthus argenteus, Quor & Gaim. Voy. Uran. Zool. p. 368.
pl. 62, fig. 3; Cuv. & Val. x. p. 461.

A. argentea, Gthr. I. cit. 3. p. 322.
Hab. Luzón, Batangas, Nasugbú, Marianas.

9 **T. virgata**, C. L. N. v.

(M. S. T.)

Amphacanthus virgatus, Cuv. & Val. x. p. 133; Müll. & Schleg. Verh. Overz. Beob. Utsch. p. 14, lam. 3, fig. 1; Bleek. Merh. Batav. Genootsch. xxiii. Teuth. p. 11.

T. virgata, Gthr. I. cit. 3. p. 323.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz; China.

10 **T. vulpina**, Schleg. N. v.

(M. S. 1)

Valent. iii. p. 354, fig. 23, et p. 387, fig. 124*; Renard, i.
4. 29.

Amphacanthus vulpinus, Schleg. Müll. Beschr. Zeevissen, in Verh. Nat. Gesch. Nederl. overz. Beijt. Vissen, p. 12, et Bydrag. tot. de Dierkund', v. 1852, p. 38, fig. 1; Bleek. Ternate, p. 135.

Teuthis tubulosat, Granov. Syst. ed. Gray, p. 142.

T. vulpina Gthr. I. cit. 3. p. 324.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Amboina.

11. **T. sp.** N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Batangas, Nasugbú.

Fam. ACRONURIDOS.

I. Gén. ACANTHURUS, Bl. SCHN.

1. **A. triostegus** Bl. N. v.

(M. S. 1)

Seba, iii. 25. 4; Russell, i. lam. 86.

Chaetodon triostegus, L. Syst. i. p. 463.

Acanthurus triostegus, Bl. Schn. p. 215; Cuv. & Val. x. p. 197;
Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xxiii., Teuth. p. 13; Jenyns,
Voy. Beagles. Fische, p. 75; Gthr.

Harpurus fasciatus, Forst. Descr. Anim. ed. Licht. p. 216.

Acanthurus zebra, Lacép. iv. p. 546, lam. 6, fig. 3.

Chætodon zebra, Lacép. iii. lam. 25, fig. 3.

C. couagga, Lacép. iv. p. 727.

Acanthurus hirudo, Benn. Ceyl. Fishes, p. 11, lam. 11.

Teuthis australis, Gray, in King's Survey of the Coasts of Austr.
ii. p. 435.

Acanthurus subarmatus, Benn. Whaling. Voy. ii. p. 278

Hab. Luzón, Manila, Ilocos, Currimao, C. de Samar.

2. *A. matooides*, *Cuv.*

- Acanthurus nigricans*, pt., *Bl. Schn.* p. 211.
? *A. fuliginosus*, *Less. Voy. Cop. Zool.* p. 149; lam. 27, fig. 2.
? *A. rasi*, *Cuv. & Val.* x. p. 203.
A. matooides, *Cuv. & Val.* x. p. 294; *Bleek. Verhand. Batav. Genootsch.* xxiii., *Tenth.* p. 12; *Gthr. l. cit. 3.* p. 331.
A. annularis, *Cuv. & Val.* x. p. 209.
A. blochii, *Cuv. & Val.* x. p. 209.
? *A. xanthopterus*, *Cuv. & Val.* x. p. 215; *Cuv. Regne. Anim. Ill. Poiss.* lam. 71, fig. 2.
A. xanthopterus, *Cant. Catal.* p. 209, lam. 4.
Skeleton: Agass. Poiss. Foss. iv. p. 206, lam. F. (*A. xanthopterus*).
Hab. Cebú, Marianas.

3. *A. bipunctatus*, *Gthr. N. v.*

(M. S. T.)

- Gthr. l. cit. 3.* p. 331.
Hab. Luzón, Cavite; China.

4. *A. nigros*, *C. V.*

- Acanthurus nigroris*, *Cuv. & Val.* x. p. 208; *Gthr. l. cit. 3.* p. 332.
Hab. C. de Samar; N. Hibridas.

5. *A. lineatus*, *Bl. N. v.*

(M. S. T.)

- Valent.* iii. p. 360 fig. 47, p. 424 fig. 257; *Renard*, i. 7. 54, i. 13. 80; *Seba*, iii. 25. 1 (26. 37).
Chatodon, n.º 1 *Artedi*, *Spec.* p. 89.
C. lineatus, *L. Syst. Nat.* 13th. edit. i. p. 1246.
Acanthurus lineatus, *Bl. Sch.* p. 214, lam. 49; *Lacep.* iv. pp. 547, 549; *Cuv. & Val.* x. p. 223; *Bleek. Sumatra*, ii. p. 263; *Gthr. l. cit. 3.* p. 333.
A. vittatus, *Benn. Fish. Ceyl.* p. 2, lam. 2.
Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; Amboina.

6. *A. striatus*, *Q. et G.*

- Quoy & Gaim. Voy. Uran. Zool.* p. 373, *Poiss.* lam. 63, fig. 3
Cuv. & Val. x. p. 229; *Gthr. l. cit. 3.* p. 334.
Hab. Marianas; Borneo.

7. *A. achilles?* *Shaw* N. v.

(M. S. T.)

- Shaw. Zool.* iv. p. 383; ? *Cuv. & Val.* x. p. 218; *Gthr. l. cit. 3.* p. 340.
Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; China.

8. *A. etenodon*, *C. V. N. v.*

- Acanthurus etenodon*, *Cuv. & Val.* x. p. 241, lam. 289, *Gthr. l. cit. 3.* p. 342.

A. strigosus, Bleek. *Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind.* iv. p. 164,
& vi. p. 102.
Hab. Carolinas; Amboina.

9. *A. sp.* N. v. (M. S. T.)

Hab. Luzon; Batangas; Nasugbú, Samar.

2. Gén. ACKONURUS, C. V.

10. *A. argenteus*. ♂ et ♀.

O. et Gam. Voy. *Uran. Zoot.* p. 372; lam. 63; t. 2; *Cuv.* et
Val. x. p. 239; *Gthr.* l. cit. 3. p. 340.
Hab. Marianas.

3. Gén. NASEUS, COMMERS.

11. *N. olivaceus*. *Cuv.* N. v. (M. S. T.)

Chetodon olivaceus, Salander, M. S. Brit. Mus.
Naseus olivaceus, *Cuv.* & *Val.* x. p. 288; *Gthr.* l. cit. 3. p. 352.
Hab. Luzon; Manila; Orahiti.

4. Gén. KERIS, C. V.

12. *K. amboinensis*, Bleeker. N. v.

Bleeker, *Amboina & Ceram.* p. 272 *Gthr.* l. cit. 3. p. 356.
Hab. C. de Mindoro, y Cebú; Amboina.

Fam. HOPLEGNÁTIDOS.

1. Gén. HOPLEGNATHUS, GTHR.

1. *H. punctatus* Richards. N. v. (M. S. T.)

Chetodon olivaceus, Salander, M. S. Brit. Mus.
Naseus olivaceus, *Cuv.* & *Val.* x. p. 288.
H. punctatus, *Gthr.* l. cit. 3. p. 358.
Hab. Luzon, Cavite; China.

Fam. NÁNDIDOS.

1. Gén. PLESIOPS, CUV.

1. *Pli cæruleo-lineatus*, Rupp. N. v. (M. S. T.)

Plesiops cæruleo-lineatus, Rupp. N. W. Fische, p. 5. lam. 2,
fig. 5; Bleek. *Amboina*, iii. p. 116; *Gthr.* l. cit. 3. p. 363.
Pli melas, Bleek. *Verhand. Batav. Genootsch.* xxii., *Bali*, p. 9.
Hab. Luzon, Manila; Australia.

2. Pl. **corallicola**, Bleek, N. v. (M. S. T.)

Plesiops corallicola, (K. & v. H.) Bleek, Sumatra, ii. p. 280; Gthr. l. cit. 3. p. 364.
Hab. Luzon, Cavite; Amboina.

Fam. LABIRINTIDOS.

1. Gén. ANABAS, Cuv.

1. A. **scandens**, Cuv., N. v. Martinico. (M. S. T.)

Willughby, App. p. 4. lam. 4. fig. 4.
Percis scandens, Daldorff, Trans. Linn. Soc. iii. p. 62.
Anthias testudineus, Bl. t. 322.
Amphiprion testudineus, et scandens, Bl. Schn. pp. 204, 570.
Lutjanus testudo et scandens, Lacep. iv. pp. 235, 239.
Sparus testudineus, Shaw, iv. p. 471.
Cejus cebuensis, Buch. Ham. pp. 98, 370. lam. 13. fig. 33; Taylor in Breuster's Edinb. Journ. Sc. 1831, v. pp. 34, 36.
Anabas testudineus, Cuv. Régne Anim.
A. scandens, Cuv. & Val. vii. p. 333. lam. 193 & 205; Cant. Ann. Nat. Hist. ix. 1842, p. 28; et Catal. p. 82; Cuv. Régne. Anim. Ill. Poiss. p. 74. fig. 1; Richards. Ichth. Ch'nt. p. 250; Jerdon in Madr. Journ. xv. p. 144; Bleek. Verh. Bat. Genootsch. xxiii. p. 8 lam. et Java, iv. p. 329; Gthr. l. cit. 3. p. 375.
A. spinosus, Gray, Ind. Zool. ii. lam. 89. fig. 1.
A. tripoliatus, Kaup. in Wiegmann. Arch. 1850, p. 124. lam. 6. fig. 4.
Hab. Luzón, Manila, Rio Pasig, Laguna de Bay.

2. A. **macrocephalus**, Bleek, N. v. Liualo. (M. S. T.)

Anabas scandens, Bleek. Verh. Bat. Gen. xxiii., Dooth. K. p. 8.
A. macrocephalus, Bleek. Java, ii. p. 430; Gthr. l. cit. 3. p. 376.
Hab. Luzón, Manila; Borneo, Java.

3. A. **oligolepis**, Bleeker, N. v. (M. S. T.)

? Anabas oligolepis, Bleeker, Borneo viii. p. 161; Gthr. l. cit. 3. p. 376.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China.

2. Gén. POLYACAN THUS, C. V.

4. P. **opercularis** Richards. N. v. (M. S. T.)

Labrus opercularis, L. Amoen. Acad. iv. p. 428; Bl. Schn. p. 245.
Chetodon chinensis, Bl. lam. 218. fig. 1; Lacep. iv. pp. 461, 496;
Bl. Schn. p. 234.

Polyacanthus chinensis, *Cuv. & Val.* vii. p. 357; *Richards. Ichth. Chin.* p. 250.

Macropodus ocellatus, *Cant. Ann. & Mag. Nat. Hist.* ix. 1842, p. 474.

Polyacanthus (?) opercularis, *Richards. I. e.; Gthr. I. cit. 3.* p. 370.
Polyacanthus (?) paludosus, *Richards. I. e.*

Hab. Luzón, Manila, Cavite; China.

3. Gén. MACROPODUS, GTHR.

5. M. viridi-auratus? *Lacép.* N. v.

(M. S. T.)

Macropodus viridi-auratus, *Lacép.* iii. p. 417, lam. 16, fig. 1; *Cuv. & Val.* vii. p. 373; *Cuv. Regne Anim. Ill. Poiss.* lam. 74 fig. 2; *Gthr. I. cit. 3.* p. 382.

M. venustus, *Cuv. & Val.* vii. p. 375, lam. 197.
Hab. Luzón, Cavite; China.

4. Gén. OSPHRONEMUS, LACEP.

6. O. olfax, (*Commercy.*) N. v.

(M. S. T.)

Osphronemus gourami, *Lacép.* iii. p. 117, lam. 3, fig. 2.

Trichopodus mentum, *Lacép.* iii. p. 125, lam. 3, fig. 3.

Trichopus gouramy, *Shaw. Zool.* iv. p. 388, lam. 55.

T. satyrus, *Shaw. Zool.* iv. p. 391, lam. 35.

Osphronemus olfax, (*Commercy.*) *Hardw. Zool. Journ.* iv. p. 300, lam. 36, suppl.; *Cuv. & Val.* vii. p. 377; *Richards. Ichth. Chin.* p. 251; *Bleek. Verh. Bat. Genootsch.* xxiii. p. 10; *Cant. Catal.* p. 88.

O. gourami, *Cuv. & Val.* vii. p. 377, lam. 198; *Cuv. Regne Anim. Ill. Poiss.* lam. 73, fig. 1.

O. satyrus, *Bleek. Topogr. Batav.*

Superbranchial organ, *Cuv. & Val.* lam. 206 *Peters. in Müll. Arch.* 1853, lam. 13, fig. A.

Osp. olfax, *Gthr. I. cit. 3.* p. 383.
Hab. Samar; Borneo, Java.

7. O. trichopterus, *Pall.* N. v.

(M. S. T.)

Sparus, *Karlreuter. Nov. Comm. Petrop.* ix. p. 452, lam. 9, fig. 1.

Labrus trichopterus, *Pall. Spicil.* viii. p. 45; *L. Gm.* p. 1286; *Bloch*, lam. 295, fig. 2.

Trichogaster trichopterus, *Bl. Schn.* p. 165.

Trichopus trichopterus, *Lacép.* iii. p. 129; *Cuv. & Val.* vii. p. 388, lam. 199; *Bleek. Verhand. Batav. Genootsch.* xxiii. p. 10; *Cantor. Catal.* p. 89, lam. 2, fig. 5.

T. pallasi, *Shaw. Zool.* p. 392.

F. leeri, *Bleek. Sumatra.* i. p. 577.

Os. trichopterus, *Gthr. I. cit. 3.* p. 384.
Hab. Samar; Borneo.

S. O. striatus, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

? Osphronemus yittatus, (Kuhl & v. Hass.) Cuv. & Val. vii. p. 387.
Trichopus striatus, Bleek Verhand. Batav. Genootsch. xxiii.; Labr. p. 11. et Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. 1850, i. p. 106;
Gthr. 1. cit. 3. p. 386.
Hab. Luzón, Cavite; Java, Borneo.

Fam. LUCIOCEFÁLIDOS.

I Gén. LUCIOCEPHALUS, BLEEK.

1. L. pulcher,? Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Diplopterus pulcher, Gray, Ill. Ind. Zool. i. lam. fig. 1.
Luciocephalus pulcher, Bleek. Boruso, ii. p. 274. et Blitong, p. 99; Gthr. 1. cit. 3. p. 390.
Hab. Luzón, Manila; China.

Fam. ATERÍNIDOS.

I Gén. ATHERINA, ARTEDEI.

1. A. bleekeri, Gthr. N. v.

(M. S. T.)

Atherina japonica, Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xxv. Japan, p. 40. fig. 2 (no Hoult); Gthr. 1. cit. 3. p. 398.
Hab. Luzon, Manila; China.

2. A. lineata, Gehr.

Hab. Cebú.

3. A. sp. N. v

(M. S. T.)

Hab. Cebú.

Fam. MUGÍLIDOS.

I Gén. MUGIL, ARTEDEI.

1. M. cephalotus, Cuv N. v

(M. S. T.)

? Renard, i. lam. 2. fig. 10; Valent. p. 458. n.^o 356.
Mugil oür, Forsk. p. xiv. n.^o 109. var. 7; Rüpp. N. W. Es-
che, p. 131.
M. cephalotus, Cuv. & Val. xi. p. 110 (no synon.); Cant. Ann.
& Mag. Nat. Hist. ix. 1842, p. 484 (no Catal. Mal. Fishes);
? Eyd. & Soul. Voy. Bonite, Zool. i. p. 175. lam. 4. fig. 4;
Gthr. 1. cit. 3. p. 419.

- M. japonicus, Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 134, lam. 72, fig. 1;
Richards. Ichth. Chin. p. 247; Bleek. Verhandl. Batav. Genootsch.
xxv., Japon, p. 41.
M. macrolepidotus, Richards. Ichth. Chin. p. 249 (no auct.)
Hab. Luzón, Cavite; China.

2 M. haematochilus. Schleg. N. v.

M. S. I.

- Mugil hematocheilus, Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 135, lam. 72
fig. 2; Bleek. Verhandl. Batav. Genootsch. xxvi., Japon, p. 107.
Gthr. I. cit. 3, p. 422.
M. xanthurus, Richards. Ichthyol. Chin. p. 248.
Hab. Luzón, Manila; China.

3 M. subviridis. C. V. N. v.

- Cuv. & Val. xi. p. 115; Gthr. I. cit. 3, p. 423.
Hab. Manila; Madras.

4 M. sundanensis. Bleek. N. v. Talilon.

M. S. I.

- Mugil sundanensis, Bleek. Sumatra, ii. p. 265; Atl. Mugil, lam.
1, fig. 1; Act. Soc. Sc. Indo-Nederland. vi., Borneo, xiii. p. 45.
M. brachysoma, Bleek. Java, iii. p. 399.
Hab. Luzón; Rio Pasig, Laguna de Bay, Archipiélago Indico.

5 M. meyeri. Gthr. N. v.

M. S. I.

- Hab. Luzón, Laguna de Bay

6 M. sp. N. v. Talilon.

M. S. I.

- Hab. Luzón, Rio Pasig, Manila.

7. M. planiceps. Cuv. N. v.

M. S. I.

- Mugil planiceps, Cuv. & Val. xi. p. 122; Bleek. Verhandl. Batav.
Genootsch. xxv., Bengal, en Hindost. p. 101, lam. 1, fig. 5.
Gthr. I. cit. 3, p. 428.
? M. dussumieri, Cuv. & Val. xi. p. 147.
M. cephalotus, Cant. Catal. p. 95.
M. dussumieri, Bleek. Java, iv. p. 339, no Journ. Ind. Archip. i.
ii., Ichth. Sumbawa, p. 637.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

8 M. kelaartii. Gthr. N. v.

M. S. I.

- Günther. Cat. B. M. 3, p. 420.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Ceilan.

9 M. affinis. Gthr. N. v.

M. S. I.

- Gthr. I. cit. 3, p. 433.
Hab. Luzón, Manila; China.

10 **M. cæruleo maculatus.** Lacep. N. v.

Mugil cæruleo-maculatus, Lacep. v. pp. 385, 389; Cuv. & Val. xi. p. 128.

M. cæruleo-maculatus, Bleek. Rionne, p. 484, et Act. Soc. Sc. Indo-Nederl. viii., Siamatra, ix. p. 5; Gthr. I. cit. 3. p. 445. Hab. Luzón, Manila; Mauricio

11 **M. trosehélii** Bleeker, N. v.

(M. S. T.)

Bleeker, Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. xvi. p. 277, et Act. Soc. Sc. Indo-Nederl. vi., Sumatra, viii. p. 80; Gthr. I. cit. 3. p. 448. Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java, Sumatra.

12 **M. borneensis** Bleeker N. v.

(M. S. T.)

Mugil borneensis, Bleeker, Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. ii. 1851, p. 201, et Soc. Sc. Indo-Nederl. vi., Borneo, xiii. p. 55; Gthr. I. cit. 5. p. 448.

M. adustus, Bleek. Naturk. Tijdschr. Nederl. Ind. v. 1853 p. 593. Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Archipiélago Indico.

13 **M. melinopterus,** C. I. N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & Val. xi. p. 146, pl. 314; Gthr. I. cit. 3. p. 452.
Hab. Luzón, Cavite; Vanicolo.

Fam. OFIOCEFÁLIDOS.

1 Gen. OPHIOCEPHALUS, BLOCH

1. **O. rhodotœnia** Bleeker, N. v. Dalag

(M. S. T.)

Bleeker, Borneo, v. p. 425; Gthr. I. cit. 3. p. 472.
Hab. Samar; Borneo.

2. **Oph melanopterus.** Bleeker N. v. Dalag.

(M. S. T.)

Bleeker, Borneo ix. p. 420; Gthr. I. cit. 3. p. 473.
Hab. Luzón, Bulacan; Borneo.

3 **Oph striatus.** Bl. N. v. Dalag.

Ophiocephalus striatus, Bl. lam. 359; Bl. Schu. p. 238; Shaw, Zool. iv. p. 530; Cuv. & Val. vii. p. 417, lams. 202 & 206; Jerdon, Madr. Journ. xv. p. 146; Cant. Catal. p. 92; Cuv. Regne Anim. III. Poiss. lam. 75, fig. 2; Bleek. Verh. Bat. Gen. xxii. Labyr. p. 13; Gthr. loc. cit. 3. p. 474.
Ophicephalus wrahl, Lacep. iii. p. 552; Buch. Ham. pp. 60, 367 lam. 31; Russell, lam. 162.
Ophicephalus chena, Buch. Ham. pp. 62, 367.

? *Ophicephalus planiceps*, *Cuv.* & *Vat.* vii, p. 424.
Hab. Davao, Mindanao; Java, China.

4. **Oph. nigricans** *C.* *F.* *N.* *v.*

(M. S. T.)

Cuv. & *Vat.* vii, p. 434; *Gthr. L. cit.* 3, p. 477.
Hab. Luzón, Manila; Archipiélago Indico.

5. **Oph. argus**,? *Cantor.* *N.* *v.*

(M. S. T.)

Cant. *Ann.* & *Mag. Nat. Hist.* 1842, ix, p. 484; *Gthr. L. cit.* 3, p. 480.
Hab. Luzon, Laguna; China.

6. **Oph. maculatus** *Cuv.* *N.* *v.*

(M. S. T.)

Bostrychus maculatus, *Lacep.* iii, pp. 140, 143.
Ophicephalus maculatus, *Cuv.* & *Vat.* vii, p. 437; *Richards. Ichth.* Chin., p. 251; *Gthr. L. cit.* 3, p. 480.
Hab. Luzon, Bataan, Orion; China.

7. **Oph. vagus**, *Ptrs.* *N.* *v.* *Dalag.*

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna de Bay; Borneo, Sumatra.

Fam. TRICONÓTIDOS.

1. Gen. TRICHONOTUS, *C.* *V.*

1. **Tr. setigerus**, *Bl.* *N.* *v.*

(M. S. T.)

Trichonotus setigerus, *Bl.* *Schn.* p. 179 lam. 39; *Cuv.* & *Vat.* xii, p. 316; *Bleek. Celeb.* v, p. 251; *Gthr. L. cit.* 3, p. 484.
F. *polyophthalmus*, *Bleek. Cram.* iii, p. 243.
Hab. Samar, Borongan; Célebes.

Fam. CEPÓLIDOS.

1. Gen. CEPOLA, *LIN.*

1. **C. abbreviata**,? *C.* *F.* *N.* *v.*

(M. S. T.)

Cuv. & *Vat.* x, p. 493; *Cant. Catal.* p. 178; *Bleek. Act. Sc. N. S. Indo-Nederl.* iii, *Sumatra*, p. 38; *Gthr. L. cit.* 3, p. 488.
Hab. Luzon, Cavite, Santa Cruz; China.

Fam. CENTRÍSCIDOS.

1. Gén. CENTRISCUS, LIN.

1. *C. gracilis*, Loize, N. v.

(M. S. T.)

Poiss. Proc. Zool. Soc. 1839, p. 86, et *Trans. Zool. Soc.* iii, p. 12; *Gthr. I. cit.* 3, p. 521.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

2. Gén. AMPHISELE, KLEIN.

2. *A. scutata*, Cuv. N. v.

(M. S. T.)

Valent. Amb. iii, p. 420, figs. 243 & 254; *Seba*, iii, p. 107, lam. 34, fig. 5; *Ruysech. Coll. Amb.* lam. 3, n.º 7.
Centriscus scutatus, L. *Syst. Nat.* i, p. 415; *Bl.* i, p. 57, lam. 123, fig. 2; *Bl. Schn.* p. 113; *Lacép.* ii, p. 88, i. lam. 19, fig. 2; *Shaw, Zool.* v, p. 458, lam. 181.
Centriscus, sp., *Grenev. Poophyl.* n.º 390, lam. 7, fig. 3.
Amphisile scutata, *Cuv. Régne, Anim.*; *Guér. Iconogr. Poiss.* lam. 45, fig. 3; *Gthr. I. cit.* 3, p. 525.
Centriscus scutatus, *Grenov. Syst. ed.* *Gray*, p. 138.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

3. *A. strigata*, *Gthr.*

Amphisile scutata, *Bleek. Banda*, i, p. 245; *Gthr. I. cit.* 5, p. 528.
Hab. Luzón, B. de Manila Cebú; Java.

Fam. FISTULÁRIDOS.

1. Gén. FISTULARIA, LIN.

1. *F. serrata*, Cuv. N. v

(M. S. T.)

Pike Fish Conger, *Dampier, Voy. New Holl. in Coll. Voy.* iii, lam. p. 184.
Fistularia tabaccaria, *White, Voy. Bot. Cay.* p. 296, fig. 2.
F. tabaccaria, var., *Bl.* viii, p. 130, lam. 387, figs. 2, 3; *Bl. Schn.* p. 114; *Russell*, ii, p. 58, lam. 173.
Fistularia immaculata, *Cuv. Régne, Anim.*; *Richards, Ichth. Chin.* p. 247; *Faun. Japon. Poiss.* p. 320; *Bleek. Amb. & Cer.* p. 281, et *Verhandl. Acad. Wetensch. Amsterd.* i, *Japn.* p. 11.
F. serrata, *Cuv. Régne, Anim.*; *Gthr. I. cit.* 3, p. 533.
F. comersenii, *Rüpp. N. W. Fische*, p. 142; *Peters, in Wiegmanns Arch.* 1855, p. 258.
Cannorhynchus immaculatus, *Cant. Catal.* p. 211.
Skeleton; *Rosenthal, Ichthyol. Taf.* ix, figs. 8-12 (*Fistularia tabaccaria*).
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Ambeira, China.

Fam. MASTACEMBELIDOS.

1. Gén. RHYNCHOBDELLA, C. V.

1. **Rhy. aculeata**, Bl. N. v.

M. S. T. 1

- Pentophthalmus,* Willughb. App. lam. 10. 428.
Mastacembelus, sp. Gronov. Zoophil. p. 133.
Enchelyopus, sp.; Klein, Pisc. Miss. iv. p. 58. n. 18.
Ophidium aculeatum, Bl. lam. 159. f. 2.
Rhynchobdella orientalis, Bl. Schn. p. 478.
R. aral, Bl. Schn. p. 479. lam. 89.
Macrognathus aculeatus, Lacép. ii. p. 284; Buch. Ham. Fish. Gaug. p. 29.
Ophidium rostratum, Shaw, Zool. iv. p. 73.
Macrognathus ocellatus, Buch. Ham. I. c. p. 29.
Rhynchobdella aral, Cuv. & Val. viii. p. 239.
R. ocellata, Cuv. & Val. viii. p. 445; Bleek. Verh. Batav. Genootsch. xxiii., Notac. p. 5.
Mastacembelus pentophthalmus, Gronov. Syst. ed. Gray, p. 17.
Ph. aculeata, Gthr. I. cit. 3. p. 550.
Hab. Luzón, Cavite; Borneo, Molucas.

2. Gén. MASTACEMBELUS, C. V.

2. **M. unicolor**, C. V. N. v.

M. S. T. 1

- Mastacembelus unicolor, (Kuhl. & v. Hass.). Cuv. & viii. p. 45; Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xxiii., Notac. p. 5; Gthr. I. cit. 3. p. 542.
Hab. Luzón, Cavite; Java.

Orden 2.^o: FARINGOGNATOS.

— — —

Fam. POMACÉNTRIDOS.

1. Gén. AMPHIPIRION, Bl. Schn.

1. **A. bifasciatus**, Bl. N. v.

- Percis, sp., Kölrent. N. Comm. Petrop. x. p. 340. lam. 8. fig. 4.
? Sciaena sp., Gronov. Mus. Ich. p. 38.
? Coracinus sp., Gronov. Zoophil. n.º 227.
Athias bitaeniatus, Bl. lam. 310. fig. 2.
Amphiprion bifasciatus, Bl. Schn. p. 204; Cuv. & Val. v. p. 392; Schleg. Overz. Amphipr. &c. in. Verh. Ned. Overz. Bez. p. 18; Bleek. Amb. & Cer. p. 282; Gthr. Cat. B. M. 1864. p. 3.
Holocentrus bifasciatus, Bl. Schn. p. 567.

Lutjanus jourdin, *Lacep.*, iv, pp. 191, 235.
Amphiprion latiflavus, *Cuv. & Val.*, v, p. 296, lam. 132; fig. 1.
Coracinus vittatus, *Gronov. Syst. ed. Gray*, p. 57.
Hab. Cebú; Amboina.

2. A. *intermedius*, Schleg. N. v.

(M. S. T.)

Sciaena, var., *Gronov. Mus. Ichthyol.* p. 39.
Amphiprion intermedius, Schleg. *I. c.* p. 48; *Gthr. I. cit.* 4.
p. 4.
A. trifasciatus, Bleek, *Celeb.* iii, p. 767 (*no Cuv. & Val.*)
Hab. Luzón, Manila, Cebú; Molucas.

3. A. sp. N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila.

4. A. *sebae*, Bleek N. v.

(M. S. T.)

Seba, iii, p. 70, lam. 26, fig. 24.
Amphiprion sebae, Bleek, *Batav.* p. 478; *Gthr. I. cu.* 4. p. 4.
Hab. Santa Cruz, Luzón, Cavite; Sumatra.

5. A. *clarkii*, Cuv. N. v.

(M. S. T.)

Athias clarkii, Benn, *Fish. Ceyl.* lam. 29.
Aphiprion clarkii, Cuv. & Val. ix, p. 504; Peters in *Wieg. Arch.* 1855, p. 265; *Gthr. I. cit.* 4. p. 5.
A. japonicus, Schleg. *Faun. Japon.* Poiss. p. 66.
A. chrysargyrus, Richards, *Ichth. Chin.* p. 254.
A. xanthurus, Bleek, *Amboin.* ii, p. 561 (*no Cuv. & Val.*).
Amphiprion polymnus, Steindachner, *Verhandl. Zool. Bot. Gesellsch. Wien*, 1861, p. 79.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Amboina, China.

6. A. *pereula*, Cuv. N. v.

(M. S. T.)

Tetragonopterus, n.º 5. Klein, *Pisc. Miss.* iv, p. 38, lam. 11,
fig. 8.
Seba, iii, p. 69, lam. fig. 20.
Perca, sp., Tyson, in *Philos. Trans.* i, xi, p. 247, lam. 7, fig. 8.
Anthias polynna var., Bl. lam. 316; fig. 3.
Lutjanus polymnus, var., *Lacep.* iv, p. 224.
L. pereula, *Lacep.* iv, pp. 239, 248.
Amphiprion pereula, Cuv. & Val. v, p. 397; Bleek, *Amb.* &
Cer. p. 287; Schleg. *Overz. Amphipr. &c in Verhand. Nat.*
Gesch. Nederl. Overz. Bezzt. p. 19; Steindachner, *Verhandl. Zool. Bot. Gesellsch. Wien*, 1861, p. 78; *Gthr. I. cit.* 4. p. 6.
A. tunicatus, Cuv. & Val. v, p. 399, lam. 132, fig. 2; Less. *Voy. Coqu. Zool. Poiss.* p. 192, lam. 25, fig. 3.
A. ocellaris, Cuv. & Val. v, p. 399.
A. melanurus, Cuv. & Val. v, p. 400.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China, Amboina.

7 **A. boholensis** [P. Cart. N. v.

M. S. T.

A. boholensis, *O. Cuv. Besch. Paryn Wurzburg*, 1873.
Hab. Bohol, Cebú.

2 Gén. PREMNAS, Cuv.

8 **P. biaculeatus** Bleek, N. v.

M. S. T.

Premnas biaculeatus, Bleek, Banda, iii, p. 105; Gthr. Cat. B.
M. 4, p. 10.

Renard, Poiss. Met. i, lam. 22, fig. 122.

Percis, sp., Kolreut. in Nov. Comm. Petrop., x, p. 346, lam.
8, fig. 5.

Chaetodon biaculeatus, Bl. lam. 219, fig. 2.

Lutjanus trifasciatus, Bl. Schu. p. 568.

Holocentrus biaculeatus, Lacép. iv, pp. 528, 537.

Holocentrus sonneratii, Lacép. iv, pp. 344, 391.

Scorpena aculeata, Lacép. iii, pp. 258, 268.

Preinias trifasciatus, Cuv. & Val. v, p. 405; Cuv. Régne Anim.
III. Poiss., lam. 32, fig. 2; Schleg. Overz. Amphipr. Je. n.
Verhand. Nat. Gesch. Nederl. Overz. Bezitt. p. 20, lam. 6
fig. 6; Bleek, Verhand. Batav. Genootsch. xxi. Labr. Cten. p. 6.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Amboina.

3 Gén. DASCYLLUS, Cuv.

9 **D. aruanus**, Cuv.

Va'ent. Amb., iii, p. 501, fig. 489; Renard, i, fig. 165; Seba,
iii, 26, 23.

Chaetodon arcuatus, L. Mus. Ad. Fried. lam. 33, fig. 8; Shaw.
Zool. iv, p. 341.

Ch. aruanus, L. Syst. Nat. i, p. 464; Bl. iii, p. 62, lam. 198,
fig. 2; Bl. Schu. p. 220; Shaw. Zool. iv, p. 348.

Tetragonopterus, n.º 6, Klein, Pisc. Miss. iv, p. 38, lam. 11
fig. 9.

Chaetodon abu dafur, Forsk. p. 15.

Lutjanus aruanus, Lacép. iv, p. 720.

Pomacentrus aruanus, Rüpp. All. Fische, p. 39.

Dascyllus aruanus, Cuv. & Val. v, p. 434; Bleek, Banda, i, p. 240.
Banda, i i, p. 108.

Chaetodon araneus, Benn. Cyl. Fish. lam. 17.

Tetradrachnium arcatum, Cant. Mal. Fish. p. 241.
Hab. Cebú, Amboina.

10 **D. xanthosoma**, Bleek N. v.

M. S. T.

Dascyllus xanthosoma, Bleek, Banda, i, p. 247; Gthr. l. cit. 4
p. 12.

D. marginatus, var., Steindachner, Verhandl. Zool. Bot. Gesellsch
Wien, 1891, p. 77.

Hab. Luzón, Manila; China.

11. *D. reticulatus*, Rich

Heliases reticulatus, Richards, Ichth. Cinn., p. 254; Oberth, Beschrei. p. 97; Gthr. l. cit. 4, p. 14.
Hab. Bohol, Cebú; China.

4. Gén. POMACENTRUS, C. V.

12. *P. fasciatus*, C. V.

Cuv. & Val. v. p. 426, lam. 134; Schleg. Overz. Amphipr. & in Verhand. Nat. Gesch. Nederl. Overz. Bezitt., p. 20, lam. 4, fig. 1; Bleek. Batav. p. 482; Guér. Iconogr. Régne Anim. lam. 19, fig. 7; Gthr. l. cit. 4, p. 19.
Hab. C. de Cebú; Archipiélago Indico.

13. *P. ovoides*, O. Cart. N. v. (M. S. T.)

P. ovoides, O. Cart. Beschrei. n. Phorgogognethen. p. 98. 1873.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Bohol.

14. *P. trimaculatus*, C. V. N. v. (M. S. T.)

Cuv. & Val. v. p. 320; Schleg. Overz. Amphipr. & in Verhand. Nad. Gesch. Nederl. Overz. Bezitt., p. 20, lam. 4, fig. 2; Bleek. Batav. p. 481 (no Rüpp.) Gthr. l. cit.
Hab. Luzón, Sta. Cruz, Cavite; China.

15. *P. punctato-lineatus*, O. Cart. N. v.

Beschrei. nener Phorgogog uethen. p. 98.
Hab. Bchol.

16. *P. tæniurus* Bleek

Bleek, Act. Soc. Sc. Indo-Nederl. i. Amboina, p. 51; Gthr. l. cit. 4, p. 22.
Hab. Bohol.

17. *P. tæniurus*, var. Cart

Cart. Beschrei. Faryng, p. 100. 1873.
Hab. Cebú, Ubay, Bohol.

18. *P. sinsiang*, Bleek. N. v. (M. S. T.)

Bleek, in Natuurk. Tydschr. Nederl. Ind. 1859, xi, p. 90; Gthr. l. cit. 4, p. 22.
Hab. Samar, Borongan; Batavia.

19. *P. sp* Cartier. N. v. (M. S. T.)

Hab. Cebú.

20. *P. pavo*, *Lacép.*

Chetodon pavo, *Bl.* t. 108, f. 1; *Bl. Schn.* p. 228.
Pomacentrus pavus, *Lacép.* iv, p. 508; *Rüpp.* *A.H. Fisch.* p. 11.
Cuv. & Val. v, p. 413; *Cuv. Régne. Anim. Ill. Poiss.* lam. 7, fig. 3; *Bleek. Banda* i, p. 247; *Peters in Wiegman. Archiv.* 1855, p. 265; *Gthr. I. cit.* 4, p. 23.
Holocentrus diacanthus, *Lacép.* iv, pp. 338, 373.
Hab. Cebú; Amboina.

21. *P. pavo*, *var.* *O. Cart.* N. v.

Beschrei. Pharyng. p. 99-1873.
Hab. Cebú.

22. *P. chrysopæcitus*, *Kuh!* N. v.

Pomacentrus chrysopæcitus, (*Kuhl.* & *var.* *Hass.*) *Schleg.* *Overz. Amphipr. &c.* in *Verhand. Nederl. Overz. Bezitt.* p. 21, lam. 5, fig. 3; *Bleek. Amboina & Ceram.* p. 284; *Gthr. I. cit.* 4, p. 24.
P. notostigmus, *Richards.* *Voy. Sulph. Ichth.* p. 89, lam. 44, figs. 1 & 2.
Hab. Cebú; Archipiélago Indico.

23. *P. chrysurus*, *Cuv.* N. v.

M. S. T

Chetodon chrysurus, *Broussonet.*

Pomacentrus chrysurus, *Cuv. & Val.* v, p. 423; *Gthr. I. cit.* 4, p. 29.
Hab. C. de Cebú; Amboina.

24. *P. cyanospilus*, *Bleek* N. v.

(M. S. 1)

Pomacentrus cyanospilus, *Bleek. Ceram.* ii, p. 709; *Gthr. I. cit.* 4, p. 30.

P. prosopotaeniooides, *Bleek. Amb. & Ceram.* p. 286.
Hab. Luzón, B. de Manila, C. de Mindoro, Cebú; Amboina.

25. *P. scolopseus*, *Q. et G.* N. v.

Pomacentrus scolopseus, *Quoy et Gaim.* *Voy. Uram. Zool.* p. 398.
P. tenuiops; *Cuv. et Val.* v, p. 423; *Less. Voy. Coq. Zool.* ii, p. 190, lam. 28 f. 2; *Bleek. Sumatra*, iii, p. 512.

P. emano, *Less. I. cit.* p. 190.

P. scolopsis, *Gthr. I. c.* 4, p. 28.
Hab. Cebú; Polinesia.

5. Gén. GLYPHIDODON. Girir.

26. *G. cælestinus*.

Renard, i, lam. 33, n.^o 176; *Valent.* n.^o 75.
Sparus, *sp.*, *Gronov. Zoophy.* n.^o 222.

- † *haetodon saxatilis*, *Forsk.* p. 62; *Bl.* lam. 206, fig. 2.
Labrus sextaciatus, *Lacep.* iii. p. 477, lam. 19, fig. 2.
Rahti potah, *Russell*, i. p. 67, lam. 86.
Chætodon tyrowhitti, *Benn. Fsh. of. Ceylon*, lam. 25.
Glyphisodon saxatilis, *Rüpp. Atl. Fische*, p. 35 et *N. W. I. Fische*, p. 126.
G. *rahti*, *Cuv. & Val.* v. p. 456, ix. p. 507; *Cant. Mal. Fish.* p. 242; *Schleg. Overz. Amphipr. &c. in Verh. Ned. Overz. Bißt.* p. 22; *Bleek. Amb. & Cer.* p. 287; *Richards. Ichth. Chin.* p. 253.
G. *caelestinus*, (*Soland.*) *Cuv. & Val.* v. p. 464, ix. p. 508; *Richards. I. c.*; *Bleek. in Verhand. Batav. Genootsch.* xxi. *Labr. Cten.* p. 15.; *Guor. Ménev. Iconogr.* iii. lam. 19, fig. 8; *Gthr. I. cit. 4.* p. 38.
G. *tyrowhitti*, *Richards. I. c.*
G. *quadrifasciatus*, *Bleek. Labr. Cten.* p. 47.
G. *waigiensis*, *Bleek. Labr. Cten.* p. 43, et *Batav.* p. 484.
Sparus fasciatus, *Gronov. Syst. ed Gray.* p. 60.
Hab. *Luzón*, *Batangas*, *Nasugbú*, *C. de Cebú*; *China*.
27. G. *mutabilis* O. *Cartier N.* v.
- O. *Cart. Beschrei. Pharyng.* p. 100. 1873.
Hab. *Cebú*.
- 28 G. *septempunctatus* C. V. N. v.
- C. & V. *Val.* v. p. 493; *Bleek. Sumatra*, i. p. 582; *Gthr. I. cit. 4.* p. 40.
Hab. *Luzón*, *Batangas*, *Nasugbú*; *China*.
- 29 G. *tænioruptus* O. *Cart. N.* v.
- O. *Cart. loc. cit.* p. 101.
Hab. *Bohol*.
30. G. *affinis*, *Gthr. N.* v. (M. S. T.)
- Günthr. Cat. B. M.* 4. 1862, p. 41.
Hab. *Luzón*, *Cavite*, *Sta. Cruz*; *China*.
31. G. *cinctus*, *Kur. var. Cint. N.* v.
- O. *Cartier loc. cit.* p. 101.
Hab. *Ubay*, *Bohol*.
32. G. *sordidus* (*Forsk.*) N. v. (M. S. T.)
- Chætodon sordidus*, *Forsk.* p. 62, n. 87; *Bl. Schne.* p. 230.
Pomacanthus sordidus, *Lacep.* iv. p. 519; *Russell*, lam. 85.
Glyphisodon sordidus, *Rüpp. Atl. Fische*, p. 34, lam. 8, fig. 1;
Cuv. & Val. v. p. 466; *Bleek. Verhand. Batav. Genootsch.* xxi. *Labr. Cten.* p. 46; *Gthr. I. cit. 4.* p. 41.

G. gigas, *Lienard*, *Dix.*, *Rapp. Soc. Nat. Mauor*, p. 35.
Hab., Luzon, Navotas; China.

33. **G. albofasciatus**, *H* et *J.* N. v.

(M. S. 1)

Hambr & *Jacq.*, *Voy. Pole Ind.*, *Poiss.*, p. 49, lam. 5, fig. 4; *Gthr.*
l. cit., 4, p. 43.
Hab., Samar, Borongan; Borneo.

34. **G. bonang**, Bleeker, N. v.

(M. S. 1)

Bleeker, *Sumatra*, i, p. 582; *Gthr.*, *l. cit.*, 4, p. 45.
Hab., Luzón, B. de Manila; Java.

35. **G. lachrymatus**, Q et G

Quoy & *Gaim.*, *Voy. Uran.*, *Zool.*, p. 388, lam. 62, fig. 1; *Cuv.* &
Val., v, p. 478; *Bleek.*, *Ternate*, v, p. 303; *Gthr.*, *l. cit.*, p. 49.
Hab., Guam, Marianas.

36. **G. florulentus**, *Gthr.*, N. v.

(M. S. 1)

Günther, *l. cit.*, 4, p. 49.
Hab., Luzón, B. Manila; Océano Indo

37. **G. antjerius**, Bleeker

Glyphisodon antjerius, *Bleek.*, *Kokos*, iv, p. 454; *Gthr.*, *l. cit.*,
4, p. 50.

G. antjerius, (*Kuhl.* & *v. Hass.*), *Cuv.* & *Val.*, v, p. 481.

G. biocellatus, *Cuv.* & *Val.*, v, p. 482; *Quoy* & *Gaim.*, *Voy. Uran.*, *Zool.*, p. 389; *Schleg.*, *Overz. Amphipr.* &c, in *Verhand. Nat. Gesch. Nederl.*, *Overz. Bezitt.*, p. 24, lam. 6, fig. 4; *Bleek.*, *Sum.*, ii, p. 286; *Less.*, *Voy. Coqu.*, *Zool. Poiss.*, p. 188.

G. zonatus, *Cuv.* & *Val.*, v, p. 483; *Schleg.*, *l. c.*; *Peters.*, in *Wiegmanns Arch.*, 1855, p. 266.

G. punctulatus, *Cuv.* & *Val.*, v, p. 484.

G. andjerinus, *Schleg.*, *l. c.*, p. 24, lam. 6, fig. 3.

G. rossii, *Bleek.*, *Kokos*, p. 48.
Hab., C. de Cebú; Borneo.

38. **G. plagiometopon**, Bleeker, N. v.

Bleeker, *Singapore*, p. 67; *Gthr.*, *l. cit.*, 4, p. 51.
Hab., Luzón, Manila; Java.

39. **G. unimaculatus**, C. U. N. v.

(M. S. 1)

Glyphisodon unimaculatus, *Cuv.* & *Val.*, v, p. 478; *Schleg.*, *Overz. Amphipr.* &c, in *Verhand. Nat. Gesch. Nederl.*, *Overz. Bezitt.*, p. 23, lam. 6, fig. 1; *Bleek.*, *Sumatra*, ii, p. 284; *Gthr.*, *l. cit.*, 4, p. 51.

G., balinensis, Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xxii. Bali, p. 9.
Hab. Borongan, Samar; Borneo.

40 **G assimilis**, Gthr. N. v.

(M. S. T.)

Glyphisodon unicellatus, Bleek. Amboin, iii. p. 119 (no Quoy & Gaim.).

Glyphidodon assimilis, Gthr. l. cit. 4. p. 52.
Hab. Luzón, Manila.

41. **G dispar** Gthr. N. v.

Glyphidodon dispar, Günther. I. cit. 4. p.
Hab. Luzón, Batangas, Nasugbu; Amboina.

42. **G. bankieri**, Richards N. v.

(M. S. T.)

Glyphisodon bankieri, Richards. Ichth. Chin. p. 253; Gthr. loc. cit. 4. p. 54.

G. nemurus, Bleeker, Booroo, ii. p. 73.
Hab. Luzón, Santa Cruz, Cavite; Amboina.

43 **G modestus**, Schleg. N. v.

(M. S. T.)

Schleg. Overz. Amphipr. &c. in Verhan. Nat. Gesch. Overz. Bezitt. p. 23. tav. 6 fig. 2; Bleek. Sumatra, ii. p. 285.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Amboina, China.

6. Gén. HELIATES, GTHR.

44 **H cinerascens**, C. V. N. v.

Cuv. & Val. v. p. 495; Schleg. Overz. Amphipr. in Verhand. Nat. Gesch. Niderl. Overz. Bezitt. p. 24. lam. 6, fig. 5; Bleek. Labr. Cteia, p. 31; Gthr. l. cit. 4. p. 61.
Hab. C. de Cebú; Moiucas.

45 **H frenatus**, C. V.

Cuv. & Val. v. p. 498; Gthr. l. cit. 4. 62.
Hab. Marianas; Guam.

Fam. LABRIDOS.

1. Gen. CHÆROPS, Rüpp.

1. **Chæ. macrodon**, Lacép.

Labrus macrodontus, Lacép. iii. pp. 451, 522; Cuv. & Val. xiii. p. 98.
Chærops meleagris, Rüpp. l. c.
Cossyphus macrodon, Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xxii. Labr. p. 10.

?*Labrus chlorodus*, Gronov. *Syst. ed. Gray.* I. p. 86.

Ch. macrodon, Gthr. I. cit. 4. p. 94.

Hab. C. de Cebú, Luzón, Batangas, Nasugbú; Australia.

2. **Ch meander**, *Cuvier*.

O. Cart. Beschreib. Pharyng. loc. cit. p. 102.

Hab. Cebú.

3. **Chæ. ommopterus**, *Richards*. N. v.

(M. S. T.)

?*Cossyphus schonleinii*, (Agass.) *Cuv. & Val.* xiii. p. 143.

C. ommopterus, *Richards*. *Ichth. Chin.* p. 257.

C. schonleinii, Bleek. *Celebes*, v. p. 252.

Ch. ommopterus, Gthr. I. cit. 4. p. 94.

Hab. Luzón, Sta. Cruz, Cavite; China.

4. **Ch unimaculatus**, *Cart.* N. v.

(M. S. T.)

Cart. loc. cit. p. 102.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

5. **Chæ. leucozona**, Bleek.

Crenilabrus leucona, Bleek. *Biliton*, iv. p. 238.

Chærops leucona, Gthr. I. cit. 4. p. 95.

Hab. Cebú; Biliton.

6. **Chæ. anchorago**, Bl. Schn.

Sparus anchorago, Bl. v. p. 108. lam. 276; Bl. Schn. p. 276.

Cossyphus anchorago, Trosch. in Wiegmann. Arch. 1840, p. 276.

Ch. anchorago, Gthr. I. cit. 4. p. 95.

Hab. Cebú; Amboina.

7. **Chæ. japonicus** (C. V) N. v.

(M. S. T.)

Labrus japonicus, Cuv. & Val. xiii. p. 99; Schleg. *Faun. Japon.*

Poiss. p. 163. lam. 85.

Cossyphus japonicus, Bleek. *Verhand. Batav. Genootsch.* xxv.

Nalez. Jap. p. 16. et xxvi. *Nalez. Jap.* p. 114.

Ch. japonicus, Gthr. I. cit. 4. p. 96.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

8. **Ch. oligacanthus**, Bleek. N. v.

Crenilabrus oligacanthus, Bleek. *Rouw*, p. 489, et *Singap. re*, p. 68.

Ch. oligacanthus, Gthr. I. cit. 4. p. 96.

Hab. Cebú; Archipiélago Indico.

2. Gén. LABRICIITHYS, BLEEK.

9. **L. rubiginosa**, (Schleg.) N. v. (M. S. T.)

Labrus rubiginosus, Schleg. *Faun. Japon. Poiss.* p. 168, lam. 86.
fig. 1.

Labrichthys rubiginosa, Gthr. *l. cit.* 4. p. 114.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

10. **L. (?) unilineata**, Guichen.

Cossyphus unilineatus, Guichen. in Guer.-Menev. *Rev. Zool.*
1847, p. 284.

Labrichthys unilineatus, Gthr. *l. cit.* 4. p. 118.
Hab. Marianas, Guam.

3. Gén. LABROIDES, BLEEK.

11. **L. paradiseus**, Bleek.

Valent. iii. p. 348 fig. 8, et p. 407 fig. 193; *Renard, Poiss.*
Mol. i. lam. 24 fig. 131.

Labroides paradiseus, Bleek. *Banda*, i. p. 249, et *Att. Ichth.*
p. lam. 44 fig. 2; *Gthr. l. cit.* 4. p. 119.
Hab. C. de Cebú; Archipiélago Indico.

4. Gén. DUYMOERIA, BLEEK.

12. **D. aurigaria**, Bleek N. v. (M. S. T.)

Crenilabrus aurigarius, Richards. *Voy. Sulph. Fishes*, p. 95 lam.
45, figs. 1 & 2.

C. rubellio, Richards. *l. c.* p. 93 lam. 45 fig. 3.
Duymertia aurigaria, Bleek. *Act. Sac. Sc. Indo-Nedert.* i. *Am-*
boina, p. 53; *Gthr. l. cit.* 4, p. 121.

D. rubellio, Bleek. *l. c.*
Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; China.

5. Gén. CHEILINUS, Cuv.

13. **Ch. festivus**, C. V.

Cuv. & *Val.* xiv. p. 124; *Gthr. l. cit.* 4, p. 125.
Hab. Marianas.

14. **Ch. rostratus**, Cartier.

Cartier, loc. cit. p. 103.
Hab. Cebú.

15. **Ch. fasciatus**, Rupp.

Renard, Poiss. *Mol.* lam. 26 n.^o 132; *Valent.* iii. nos. 74 & 113.

Sparus fasciatus, *Bl.* v. p. 18, lam. 257; *Bl. Schn.* p. 299; *La-*
cép. v. pp. 39, 127.
Labrus enneacanthus, *Lacep.* iii. pp. 433, 480.
Cheilinus fasciatus, *pt.*, *Rüpp.* *Att. Fische*, p. 23.
C. fasciatus, *Cuv. & Val.* xiv. p. 92; *Rüpp.* *N. W. Fische*, p. 18;
Bleek. *Verhand. Batav. Genootsch.* xxii. *Labr.* p. 31; *et Att.*
Ichth. p. 67, lam. 26 fig. 25; *Gthr.* *I. cit.* 4, p. 129.
Hab. C. de Cebú; Amboina.

16. **Ch. martensi**, *C. V.*

Cuv. & Val. xiv. p. 102; *Gthr.* *I. cit.* 4, p. 125.
Hab. Guan, Marianas.

19. **Ch. godeffroyi**, *Gthr.*

Gthr. *I. cit.* 4, p. 126.
Hab. Cebú.

6. Gén. ANAMPSES, *Cuv*

18. **A. meleagris**, *C. V.*

Ruysch. *Thes.* i. p. 42, lam. 7, fig. 1, a.
Anampses meleagrides, *Cuv. & Val.* xiv. p. 12; *Bleek.* *Act. Soc.*
Sc. Indo-Nedert. i. *Amboina*, p. 57, *et Att. Ichth.* p. 102,
lam. 24, fig. 1.
A. meleagris, *Gthr.* *I. cit.* 4, p. 135.
Hab. C. de Cebú; Amboina.

7. Gén. STETHOJULIS, *GTHR.*

19. **St. strigiventer**, *Günth.* N. v.

Julis strigiventer, *Benn.* *Proc. Zool. Soc.* 1832, p. 184; *Cuv. &*
Val. xiii. p. 468; *Bleek.* *Banda*, i. p. 251.
Stethojulis strigiventer, *Günth.* *Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1861,
viii. p. 386; *Bleek.* *Att. Ichth.* p. 135, lam. 43, fig. 1; *Gthr.*
I. cit. 4, p. 140.
Hab. C. de Cebú; Ambina.

20. **St. esp.** N. v.

(M. S. 1)

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Batangas, Nasugbu.

21. **Pt. trilineata**, *Günth.* N. v.

Seba, iii. 31, 5; *Valent.* fig. 54.
Labrus trilineatus, *pt.*, *Bl. Schn.* p. 253.
Julis sebanus, *Cuv. & Val.* xiii. p. 474.
J. casturi, *Bleek.* *Celebes*, iii. p. 768.
Stethojulis trifasciata, *Günth.* *Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1861,

viii. p. 386; Bleek. Att. Ichth. p. 131, lam. 43, fig. 3; Gthr.
l. cit. 4. p. 140.
Hab. Luzón, Manila; Amboina.

22. **St albovittata**, Günth. N. v.

Gallenay castouri, Renard, fig. 133.
Labrus albovittatus, (Bonnat.) Lacép. iii, pp. 443, 509.
Julis balteatus, Quoy & Gaim. Voy. Uran. p. 267, lam. 56, fig.
1; Cuv. & Val. xiii. p. 475; Bleek. Banda, i p. 253.
Stethojulis albovittata, Günth. Ann. & Mag. Nat. Hist. 1861,
viii. p. 386; Bleek. Att. Ichth. p. 132, lam. 44, fig. 5; Gthr.
l. cit. 4. p. 141.
Hab. C. de Cebú; Amboina.

23. **St. kalosoma?** Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Bleek. Amboina & Ceram, p. 280, et Att. Ichth. p. 134, lam.
43, fig. 4; Gthr. loc. cit. 4. p. 142.
Hab. Luzon, B. de Manila; Amboina.

8. Gén. PLATYGLOSSUS, KLEIN.

24. **Pl dussumieri**, C. V. N. v.

(M. S. T.)

? Seba, iii. lam. 31, fig. 2.
Sahnee moia, Russell, ii. fig. 120.
? *Labrus nigrescens*, Bl. Schn. p. 263.
Julis dussumieri, Cuv. & Val. xiii. p. 478, lam. 387. *Cant. Catal.*
p. 236.
J. exomatus, Richards. Ichth. C. sin. p. 258.
J. notophthalmus, Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xxii. *Labr.*
Cycl. p. 20.
Halichoeres nigrescens, Bleek. Syn. Labr. p. 14, et Att. Ichth.
p. 118, lam. 37, fig. 4.
Platyglossus dussumieri, Gthr. l. cit. 4. p. 144.
Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; China.

25. **P. esp.** N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzon, Manila, Samar.

26. **Fl pseudogramma**, Cartier. N. v.

Cartier; loc. cit. p. 104.
Hab. Ubay, Bohol.

27. **P. esp.** N. v.

(M. S. T.)

Hab. Samar, Cebú.

28. **Pl schwarzii**, Bleek. N. v.

Julis schwarzii, Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xxii. *Labr.*
p. 7.

- J. dieschismenacanthus, Bleek. *Banda, Neira*, p. 645.
J. dieschis nenaecithnides, Bleek. *Amboina*, iii, p. 121.
Halichares schwarzi, Bleek. *Att. Ichth.* p. 117. lam. 39. fig. 3.
Pl. tyglossus schwarzi, Gthr. *I. cit.* 4. p. 149.
Hab. Cebú; Amboina.

29 Pl. reticulatus Cartier N. v.

- J. Cartier: loc. cit. p. 104.
Hab. Cebú.

30. Pl. miniatus C. V. N. v.

(M. S. 1)

- Julis miniatus, (Kuhl. & v. Hass.) *Cuv. & Val.* xiii, p. 460.
Bleek. *Verhandl. Batav. Genootsch.* xxii. *Bali*, p. 8, et *Act. Soc. Se. Indo-Nederl.* i. *Amboina*, pt. 60.
J. miniatus, pt., Bleek. *Timor*, p. 177.
Halichares miniatus, Bleek. *Att. Ichth.* p. 114. lam. 41. fig. 5.
Platyglossus miniatus, Ghr. *I. cit.* 4. p. 150.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

31 Pl. alternans, Cartier. N. v.

- Cartier: loc. cit. p. 104.
Hab. Cebú; Panglao.

32 Pl. guttatus, Bl. N. v.

(M. S. 1)

- Prochilus, sp., Klein. *Miss. Pise.* v. lam. 12. fig. 5.
Labrus guttatus, Bl. lam. 287. fig. 2; Bl. Schu. p. 247.
Labrus argus, Bl. Schu. p. 263.
Julis argus, Zool. Journ. iii. p. 577. lam. 13. fig. 7.
J. polyophthalmus, Bleek. *Banka*, p. 731.
Halichares guttatus, Bleek. *Synon. Labr.* p. 13, et *Att. Ichth.* p. 124. lam. 35. fig. 1.
Platyglossus guttatus, Ghr. *I. cit.* 4. p. 155.
Hab. Luzón, Manila, C. de Samar, Cebú; Sumatra.

33. Pl. ubayensis. Cartier. N. v.

- Cartier: loc. cit. p. 104.
Hab. Ubay, Bohol.

34. Pl. binotopsis, Bleek N. v.

- Halichares binotopsis, Bleek. in *Verh. Ind. Batav. Genootsch.* xxii. *Bali*, p. 7; *Timor*, p. 179, et *Att. Ichth.* p. 122. lam. 40. fig. 4.
Platyglossus binotopsis, Ghr. *I. cit.* 4. p. 153.
Hab. Cebú; Archipiélago Indico.

35 Pl. tenuispinis, Ghr N. v.

(M. S. 1)

- Günther, *I. cit.* 4. p. 161.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

36. *Fl. scapularis*, Bonn.

- Julis scapularis*, Bonn. Proc. Comm. Zool. 1831, p. 167.
J. cœruleovittatus, Rüpp. N. W. Fische, p. 14 lam. 4, fig. 1 (var.).
J. elegans, (Kuhl & v. Hass.) Cuv. & Val. xiii. p. 467; Bleek. Natur. Eydscr. Nederl. Ind. iii. p. 289, ii. lam. 3.
J. leschenaultii, Cuv. & Val. xiii. p. 453.
J. phaiotenia, Bleek. Batav. p. 322.
Hüntheria cœruleo-vittata, Bleek. Proc. Zool. Soc. 1861, p. 413;
Versl. Akad. Wet Amsterd. xiii. p. 291, et Atl. Ichth. p.
157, lam. 32, fig. 2.
Hab. Cebu; Amboina.

37. *Pt. pæcilopæterus* Schleg. N. v. (M. S. T.)

- Julis pæcilopæterus*, Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 169, lam. 86
bis, fig. 1; Richards. Ichth. Chin. p. 260.
J. thersites, Richards. l. c.
Platyglossus pæcilopæterus, Gthr. l. cit. 4. p. 166.
Hab. Luzon, Manil; Navotas; China.

g. Gen. PSEUDOJULIS, BLEEK.

38. *Ps. girardi* Bleek. N. v.

- Julis girardi*, Bleek. Bali, iii. p. 168.
Pseudojulis girardi, Bleek. Proc. Zool. Soc. 1861, p. 412, et
Atl. Ichth. p. 127, lam. 33, fig. 3. Gthr. l. cit. 4. p. 168.
Hab. Manila, Luzon; C. de Boeleng.

10. Gén. NOVACULA, C. V.

39. *N. tæniurus*, Lacep. N. v.

- Labrus fuscus*, Lacep. iii. p. 437.
Sparus hemisphaerium, Lacep. iv. pp. 53, 60.
S. brachio, Lacep. iv. pp. 54, 160.
Labrus tæniurus, Lacep. iii. pp. 448, 518, lam. 29, fig. 1.
Xyrichtys tæniurus, Cuv. & Val. xiv. p. 54, lam. 363. (no Bleek.)
Novacula tæniurus, Gthr. l. cit. 4. p. 172.
Hab. C. de Cebu; Mauricio.

40. *N. pentadactyla* Cuv. N. v.

- Palent.* figs. 67, 123, 262, Renard, i. fig. 84, ii. figs. 6, 112;
Ruyssch, lam. 20, fig. 8.
Blennius, s. p., Ankarkrona, Act. Holm. i. 1740 p. 451, lam. 3,
fig. 2.
Cypræna pentadactyla, L. Syst. i. p. 447; Bl. lam. 173; Bl.
Schn. p. 294.
Himipteronotus quinque-maculatus, Lacep. iii. p. 215.
Novacula pentadactyla, Cuv. & Val. xiv. p. 69, lam. 395; Bleek.
Ceb. i. p. 222; Gthr. l. cit. 4. p. 177.

N. sexmaculata, *Cuv. & Val.* xiv, p. 72.
Hemipteronotus pentadactylus, *Bleek. All. Ichth.* p. lam. 30, fig. 4.
Hab. Luzón, Lobo, Batangas; China.

41. **N. punctulata**, *C. I. N.* v.

M. S. T.

Cuv. & Val. xiv, p. 73; *Gthr. I. cit.* 4, p. 177
Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; China.

44. Gen. JULIS, Gthr.

42. **J. lunaris** *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

Seba, iii, lam. 31, fig. 7; *Valent.* fig. 178; *Renard*, n. sp., fig. 39.
Labrus lunaris, *L.* *Syst. Nat.* i, p. 474; *Lacép.* iii, pp. 427, 497.
Gronou, *Syst. ed. Gray*, p. 82.
Labrus, n.º 180, *Grimov*, *Mus. Ichthol.* ii, lam. 6, fig. 2, *Zoophyl.* p. 71, n.º 242.
Scarus gallus, *Forsk.* *Descr. Anim.* p. 26.
Labrus ceylonicus, *(Forst.) Penn. Inst. Zool.* p. 56, lam. 16; *Bl. Schn.* p. 246; *Lacép.* iii, pp. 427, 472.
L. viridis, *Bl.* v, p. 129, lam. 282; *Bl. Schn.* p. 243; *Ia. ip.* iii, pp. 454, 222.
L. gallus, *L.* *Gm.* i, p. 1284; *Bl. Schn.* p. 245.
Oosphrone nus gallus, *Lacép.* iii, p. 122.
Julis hardwickii, *Gray. Ind. Zool. Pisc.* lam. 9, fig. 1.
J. porphyrocephala, *Bonn. Proc. Comm. Zool. Soc.* ii, p. 183.
J. duperrei, *Quoy. & Gaim.* *Voy. Wan. Zool.* 1, p. 268, lam. 56, fig. 23; *Cuv. & Val.* xiii, p. 421.
J. lunaris, *Cuv. & Val.* xiii, p. 409; *Bleek. Verhandl. Batav. Genootsch.* xxii, *Labr.* p. 28; *Synon. Labr.* p. 6, et *All. Ichth.* p. 90, lam. 33, fig. 5; *Gthr. I. cit.* 4, p. 186.
J. virilis, *Cuv. & Val.* xiii, p. 420.
J. meniscus; *Cuv. & Val.* xiii, p. 415.
J. triaculatus, *Rüpp. N. W. Fische*, p. 13, (*no Q. & G.*)
J. mertensi, *Cuv. & Val.* xiii, p. 421.
J. celebicus, *Bleek. Celebes*, p. 313.
J. lutescens, (*Solander*), *Zool. Beech. Voy. Fisches*, p. 65, lam. 19, fig. 2.
Hab. Luzón, Manila, Cebú; China.

43. **J. umbrostigma** *Rüpp.* N. v.

(M. S. T.)

Julis umbrostigma, *Rüpp. N. W. Fisch.* p. 11, lam. 3, fig. 2;
Bleek. All. Ichth. p. 92; lam. 34, fig. 2; *Gthr. I. cit.* 4, p. 185.
J. souleyetii, *Cuv. & Val.* xiii, p. 457; *Eyd. & Soul. Voy. Bengal.* *Zool.* i, p. 190, *Poiss.* Lam. 6, fig. 2; *Bleek. Kokos.* iii, p. 176.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

44. **J. trilobata**, *Lacép.* N. v.

M. S. T.

Labrus trilobatus, *Lacép.* iii, pp. 454, 520, (*no Sato*).
L. fuscus, *Lacép.* iii, p. 437.
Julis bicatenatus, *Bonn. Proc. Comm. Zool. Soc.* i, (1831), p. 107.

- J. quadricolor*, *Less.* *Voy. Cogu.* *Zool.* ii, p. 139, lam. 35, fig. 1; *Cuv.* & *Val.* xiii, p. 443; *Bleek. Nat. Tyschr. Nederl. Ind.* xix, p. 339, et *Att. Ichth.* p. 93, lam. 34, fig. 3.
J. semicirculus, *Röpp.* *N. W. Fische*, p. 10, lam. 3, fig. 1; *Cuv.* & *Val.* xiii, p. 442.
Scarus georgii, *Benn. Fish. Ceyl.* lam. 24.
Julis trilobatus, *Cuv.* & *Val.* xiii, p. 437; *Gthr. l. cit.* 4, p. 187.
J. formosus, *Cuv.* & *Val.* xiii, p. 439.
J. aeruginosus, *Cuv.* & *Val.* xiv, p. 441.
J. cyanogaster, *Cuv.* & *Val.* xiii, p. 444.
J. erythrogaster, *Cuv.* & *Val.* xiii, p. 447.
Scarus (?) quinquevittatus, *Richards. Voy. Blossom.* *Zool.* p. 66, lam. 19, fig. 3.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

45 *J. dorsalis*, *Quoy. & Gaim.* N. v.

(M. S. T)

- Renard*, *Poiss. Mol.* i, lam. 28, fig. 155, ii, fig. 68; *Valent.* fig. 53.
Sparus hardwickii, *Benn. Fish. of Ceyl.* pl. 12 (*no Julis hardwicki*, *Gray*).
Julis dorsalis, *Quoy. & Gaim. Voy. Astrol. Zool.* iii, *Poiss.* p. 713, lam. 15, fig. 5; *Cuv.* & *Val.* viii, p. 440; *Bleek. Amboina*, ii, p. 564, et *Att. Ichth.* p. 94, lam. 34, fig. 4, *Gthr. l. cit.* 4, p. 193.
J. semifasciatus, *Cuv.* & *Val.* xiii, p. 448.
J. urostigma, *Bleek. Sumatra*, ii, p. 287.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz, Samar, Villareal; China.

46 *J. truncatus*, *Cartier.*

- Cartier*, *loc. cit.* p. 105.
Hab. Cebú.

47. *J. schwanefeldii*, *Bleeker.*

- Bleeker*, *Sumatra*, ii, p. 288, et *Att. Ichth.* p. 95, lam. 33, fig. 7; *Gthr. l. cit.* 4, 191.
Hab. Luzón, Batangas Nasugbu, Cebú; Sumatra.

12 Gen. *GOMPHIOSUS*, *Lacép.*

48. *G. tricolor*, *Quoy & Gaim.* N. v.

(M. S. F.)

- ? *Renard*, ii, lam. 22, fig. 109.
Gomphiosus tricolor, *Quoy. & Gaim. Voy. Uran.* *Zool.* p. 286, lam. 55, fig. 2; *Bleek. Act. Soc. Sci. Indo-Nederl.* i, *Manado & Makars.* p. 54, et *Att. Ichth.* p. 85, lam. 21, fig. 6; *Gthr. l. cit.* 4, p. 193.
G. cepedianus, *Cuv.* & *Val.* xiv, p. 18, lam. 390.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China.

49 **G. varius.**, Lacép.

Gomphosus varius, Lacép., iii, p. 104, lam. 5, fig. 2; *Gthr. I. off.* 4, p. 193.

G. pectoralis, Quoy. & Gaim., *Voy. Uran. Zool.*, p. 282.

G. fuscus, Cuv., *et Val.* xiv, p. 25.
Hab. Marianas; Mauricio.

13. Gen. CHEILLIO, Lacép.

50 **Ch. inermis.**, Bleek N. v.

(M. S. T.)

Valent. figs. 203. & 516; *Renard*, i, lam. 34, fig. 181.

Labrus inermis, Forsk., p. 34; *Bl. Schn.*, p. 262.

L. bassek, Lacép., iii, p. 513.

Cheilio auratus, (Commers.), Lacép., iv, p. 433; *Quoy. & Gaim.*, *Voy. Uran. Zool.*, p. 274, lam. 54 fig. 2; *Cuv. & Val.* xiii, p. 341; *Bleek.*, *Celebes*, i, p. 221.

Ch. fuscus, (Commers.), Lacép., iv, p. 433, *Cuv. & Val.* xiii, p. 349.

Labrus fusiformis, Rüpp., *N. W. Fische*, p. 7, lam. 1 fig. 4.

Cheilio cyanochloris, *Cuv. & Val.* xiii, p. 346, lam. 382.

Ch. forskalii, *Cuv. & Val.* xiii, p. 349.

Ch. hemichrisos, *Cuv. & Val.* xiii, p. 351; *Bleek.*, *Banda*, i, p. 252.

Ch. viridis, *Cuv. & Val.* xiii, p. 352.

? *Cheilio microstoma*, *Cuv. & Val.* xiii, p. 353.

Cheilio ramosus, Jenyns, *Zool. Beagle. Fische*, p. 102.

Ch. b color, *Blanc.*, *Spec. Zool. Mosamb.*, p. 254, lam. 5.

Ch. inermis, *Bleek.*, *Att. Ichth.*, p. 82, lam. 31 fig. 4; *Gthr. I.* 4, p. 194.

Hab. Luzón, B. de Manila, C. de Cebú; Amboina.

14. Gén. CHEILLINUS, Gill.

51. **Ch. rostratus**, Cartier.

Hab. Cebú.

14. Gén. PSEUDODAX, BLEEK

52. **Ps. moluccensis** (*C. V.*)

Renard, i, lam. 2 n.º 12; *Valent.*, p. 359 fig.

Olax moluccanus, *Cuv. & Val.* xiv, p. 305 lam. 408 *Cuv. Regn. Anim. Ill. Piss.*, lam. 91 fig. 3; *Bleek.*, *Act. Soc. Sc. Ind.-Nederl.*, i, *Manado, en Makassar*, p. 64; *Kner*, *Pitzsber. Wien. Acad.*, 1860, xl, p. 59, lam. 2 fig. 18.

Pseudodax moluccanus, *Bleek.*, *Att. Ichth.*, p. 80, lam. 22 fig. 2, lam. 18 fig. 5.

Hab. Bohol, C. bú; Célebes.

15 Gén SCARICHTHYS, BLEEK.

16. Sc auritus Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Scarus auritus, (Kuhl. & van Hass.) Cuv. & Val. xiv. p. 218.
S. vaigiensis, pt., Quoy & Gaim. Voy. Freyc. Zool. p. 288;
Cuv. & Val. xiv. p. 214.
S. norvius, Cuv. & Val. xiv. p. 253; Bleek. Celebes, iii. p. 769.
Callyodon chlorolepis, Richards. Voy. Sulph. Ichthyol. p. 137,
lam. 64 figs. 4-7.
Scarichthys auritus, Bleek. All. Ichth. p. 15 lam. 1 fig. 3.
Hab. Luzón, Manila; China.

16. Gén CALLYODON, C. V.

54. C. carolinus, Cuv

Callyodon carolinus, Cuv. & Val. xiv. p. 291.
Callyodon carolinus, Bleek. Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. 1859,
xx. p. 444, et All. Ichth. p. 14 lam. 2 fig. 4; Gthr. 1. cit. 4,
p. 214.
Hab. Carolinas.

55. C. brachysoma, Bleeker.

Bleeker, All. Ichth. p. 14 lam. 2 fig. 3; Gthr. 1. cit. 4, p. 215.
Hab. Zumárraga, Samar; Ternate.

56 C spinidens Q. et G.

Scarus spinidens, Quoy & Gaim. Voy. Uran. Zool. p. 289.
S. vaigiensis, pt., Quoy & Gaim. l. c. p. 288; Cuv. & Val. xiv.
p. 214.
Callyodon waigiensis, Cuv. & Val. xiv. p. 296.
C. hypselosoma, Bleek. Amboina, vi. p. 425.
C. spinidens, Bleek. All. Ichth. p. 13 lam. 2, fig. 2; Gthr. 1.
cit. 4, p. 215.
Hab. C. de Samar; Amboina.

57 C sp N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila.

17. Gén PSEUDOSCARUS, GTHR.

58 Ps spilurus, C. V.

Scarus spilurus, Cuv. & Val. xiv. p. 279.
Hab. Carolinas.

59. Ps pulchellus Bleek N. v.

(M. S. T.)

Scarus pulchellus, Röppell, N. W. Fische, p. 25, lam. 8, fig.

3, et varz, *Fische Senckenl. Mus.*, p. 21; *Cuv. & Val.* xiv.
p. 266; Bleek, *Java*, ii, p. 440.
Pseudoscarus pulchellus, Bleek, *Att. Ichth.* p. 34, lam. 10, fig.
3; Gthr., l. cit. 4, p. 219.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

60. **Ps. margaritus**, *Carter*

Cartier, loc. cit. p. 105.
Hab. Cebú.

61. **Ps. esp** N. v. (M. S. 1)

Hab. Luzón, Pasacao, C marines Sur, Cavite, Sta. Cruz.

62. **Ps. chrysopoma**, *Bleek*.

Scarus quoyi, (part.) *Cuv. & Val.* xiv, p. 273.
S. chisopomus, Bleek, *Verhand. Batav. Gen.* xxii, *Labr. Cyel.*
p. 53; Gthr., l. cit. 4, p. 221.
Pseudoscarus viridis, Bleek, (no Bloch.) *Att. Ichth.* p. 45, lam.
17, fig. 2.
Hab. Cebú; Indias Orientales.

63. **Ps. sp** *Carter*

Cartier, loc. cit. p. 105.
Hab. Cebú.

64. **Ps. pyrrhostethus**, *Bleek* N. v. (M. S. 1)

Scarus psittacus, *Forsk.* p. 29; *Shaw*, *Zool.* iv, p. 397; *Röff.*
Ill. Fische, p. 77, lam. 26, fig. 1; *Cuv. & Val.* xiv, p. 256.
Cant. Catal. p. 239; (no *Cirrhiphanus psittacus*, L.)
Scarus pyrrhostethus, *Richards*, *Ichth. Chin.* p. 262.
S. harid, *Cuv. & Val.* xiv, p. 247; (part.) lam. 404; *Cuv. Regne
Anim.* III, *Poiss.* lam. 91, fig. 1; *Bleek*, *Verhand. Batav. Ge-
nootsch.* xxii, *Labr. Cyel.* p. 48; (no *Forsk.*)
S. harideoides, *Bleek*, *Enumer.* p. 104.
Pseudoscarus pyrrhostethus, *Bleek*, *Att. Ichth.* p. 42, lam. 6,
fig. 1; Gthr., l. cit. 4, p. 223.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

65. **Ps. aeruginosus**, *C. V.* N. v. (M. S. 1)

?*Scarus aeruginosus*, *Cuv. & Val.* xiv, p. 257.
S. lacerta, *Cuv. & Val.* xiv, p. 217.
S. aeruginosus, *Bleek*, *Verhand. Batav. Genootsch.* xxii, *Labr.*
Cyel. p. 58; Gthr., l. cit. 4, p. 222.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Batangas, Nasugbu; Archipiél.
lago Indico.

66. **Ps. (?) ocellatus**, *C. V.*

Scarus ocellatus, *Cuv. & Val.* xiv, 1, p. 278.

Ps. ocellatus, *Gth.*, *l. cit.* 4, p. 233.
Hab. Carolinas.

67. **Ps. celebicus** Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Scarus celebicus, Bleek. *Celebes.*, v. p. 253.
Pseudoscarus celebicus, Bleek. *Att. Ichth.* p. 26, lam. 15, fig.
2; *Gthr.*, *l. cit.* 4, p. 237.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

68. **Ps. muricatus** Bleek.

Scarus muricatus, Cuv. & Val. xiv. p. 208, lam. 402; Bleek. *Verhand.* Batav. *Genootsch.* xxii. *Labr.* p. 46.
Pseuso carus muricatus, Bleek. *Att. Ichth.* p. 26, lam. 7, fig. 3;
Gthr., *l. cit.* 4, p. 238.
Hab. C. de Mindoro; Java.

69. **Ps. balinensis** Bleek.

Scarus balinensis, Bleek. *Verhand.* Batav. *Genootsch.* xxii. *Batr.*
p. 8.
Pseudoscarus balinensis, Bleek. *Att. Ichth.* p. 39, lam. 16, fig.
3; *Gthr.*, *l. cit.* 4, p. 228.
Hab. Luzón, Pasacao, Camarines, Cebú; Banda.

Fam. GÉRRIDOS.

1. **G. GERRIES**, Cuv.

1. **G. philippinus**, Gthr.

Günther, *l. cit.* 4, p. 258.
Hab. Filipinas.

2. **G. kapas**, Bleeker. N. v.

(M. S. T.)

Bleeker, *Rionv.*, p. 482; *Gthr.*, *l. cit.* 4, p. 259.
Hab. Luzón, Manila, C. de Samar; Archipiélago Indico.

3. **G. punctatus**, C. V. N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & Val. vi. p. 480; *Gthr.*, *l. cit.* 4, p. 260.
Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; China.

4. **G. japonicus** Bleeker. N. v.

(M. S. T.)

Bleeker, *Japan*, p. 403, et *Verh.* Bat. Gen. xxvi. *Jabon*, p. 93,
lam. 5, fig. 2. *Gthr.*, *l. cit.* 4, p. 260.
Hab. Luzón, Sta. Cruz, Cavite; China, Emuy.

5. **P. oyena**, Cuv. N. v.

Labrus oyena, Forsh., p. 35; Bl. S. 57, p. 245; *Lit. 5* iii. p. 403.

- Sparus erythrinurus*, Bl. lam. 261.
Cichla erythrina, Bl. Schn. p. 336.
Sparus britanicus, Lacép. iv. pp. 132, 134.
Labrus longirostris, Lacép. iii. p. 467. lam. 19. fig. 1.
Smaris oyena, Rüpp. Atl. p. 11. lam. 3. fig. 2.
Gerres oye a, Cuv. & Val. vi. p. 472; Jenyns, Zool. Brit. Fisch. s. p. 59; Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xxiii. Meeuw. p. 12; Gthr. l. cit. 4. p. 261.
G. oblongus, Bleek. Topogr. Batav. (no Cuv.)
? Gerres equul, Temm. & Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 76. lam. 41. fig. 1. Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xxxvi. p. 92.
Hab. Cebú; Mar. Rjo.

Orden 3º ANACANTINOS.

Fam. GÁDIDOS.

1. Gén. BREGMACEROS, THOMPS.

1. *B. mecclellandii*, Thoms. N. v. (M. S. 1.)
Bregmaceros mecclellandii, Thoms. l. c. fig.; Gthr. l. cit. 4. p. 398.
Calloptillum mirum, Richards. l. c. 95. lam. 46. figs. 4. 7.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Sanur, Villareal; China.

Fam. OFÍDIDOS.

1. Gén. ENCHILOPHIS, MÜLL.

1. *E. vermicularis*, Müll. N. v.
Müll. l. c. p. 154. lam. 5. figs. 4. & 5; Gthr. l. cit. 4. p. 384.
Hab. Filipinas.

2. Gén. CONGROGADUS, GTHR.

2. *C. subducens*, Richards. N. v.
Malabarium subducens, Richards. Ann. & Mag. Nat. Hist. 1843. xii. p. 175. lam. 6. et Voy. Ereb. & Terr. Fish. p. 72. lam. 44. figs. 1-6.
M. reticulatum, Bleek. Banka. ii. p. 734.
Congrogalus subducens, Gthr. l. cit. 4. p. 388.
Hab. Cebú; Australia.

Fam. PLEURONÉCTIDOS.

1 Gén. PSETTODES, BENN

1. *Ps. erumei*, Schm. N. v. Daba

(M. S. T.)

Pleuronectes erumei, Bl. Schm. p. 150.
Adalah, Russell, i. p. 5., lam. 69.
Morce malakah, Russell, i. p. 60, lam. 77.
Aippoglossus erumei, Cuv. Régne Anim. Rüpp. Atl. Fische, p. 121, et N. II. Fische, p. 84; Cant. Catal., p. 210; Bleek. Verh. Batav. Genootsch. xxiv. Pleuron. p. 13.
H. malaka, Cuv. Régne Anim.
H. dentex, Richards. Voy. Sulph. Fish. p. 102, lam. 47.
H. orthorhynchus, Richards. Ichth. Chin. p. 278.
Psettodes belcheri, Beauf. Proc. Comm. Zool. Soc. 1831, p. 147.
Ps. erumei, Gthr. I. cit. 4. p. 402.
Hab. C. de Mindoro, Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz; China.

2 Gén. TEPHRITIS, GHHR

2. *T. sinensis*, Lacép. N. v.

(M. S. T.)

Pleuronectes sinensis, Lacép. iv. pp. 505, 658, lam. 14, fig. 1.
Platessa chinensis, Gray, Ind. Zool. lam. fig. 1; Richards. Ichth. Chin. p. 277.
Tephritis sinensis, Gthr. I. cit. 4. p. 506.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

3 Gén. SAMARIS, GRAY.

3. *S. eristatus* Gray N. v.

(M. S. T.)

Gray, I. c. p. 5; Gthr. I. cit. 5. p. 420.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China.

4 Gen. PSEUDORHOMBUS, BLEEK.

4. *Ps. russellii* (Gray.) N. v.

(M. S. T.)

Platessa russellii, Gray, Ill. Ind. Zool. lam. fig. 2; Cant. Catal. Mal. Fish. p. 214.
Rhombus lentiginosus, Richards. Ann. & Mag. Nat. Hist. xi. 1843, p. 405; Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xxiv. Pleuron. p. 15.
Platessa chrysoptera, Richards. Ichth. Chin. p. 278.
Pl. balteata, Richards. I. c.
Rhombus polystipus, Bleek. Batav. p. 504.
Rh. oligodon, Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xxvi. Nieuwe Nederl. &c. p. 121; Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. vi. p. 419; Act. Soc. Sc. Indo-Nederl. v. Japan, v. tab. 3, fig. 2.
Pseudorhombus russelli, Gthr. I. cit. 4. p. 424.
Hab. Luzón, Manila; China.

5. **Ps. pentophthalmus**, *Gthr.* N. v.

(M. S.)

Gthr. *I. cit.* *4.* p. 428.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

6. **Ps. olivaceus**, *Schleg.* N. v.

(M. S. T.)

Hipoglossus olivaceus, *Schleg.* *Faun. Japon.* *Pelago*, p. 184; lam. 03.
Rhombus wolfi, *Bleek.* *Japan.* p. 121; *Act. Soc. Sci. Nederl.* v. Japan, v. lam. 2, fig. 3.

Ps. olivaceus, *Gthr.* *I. cit.* *4.* p. 429.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China.

5. Gen. RHOMBOIDICHTHYS, Bleek.

7. **Rh. pavo**, *Bleek.* N. v.

(M. S. T.)

? Rhombus macropterus, *Gaim.* *Voy. Uran.* *Zool.* p. 236; *Poss.* lam. 50.

Rh. pavo, *Bleek.* *Kokos.* iii. p. 177.

Rhomboideichthys pavo, *Gthr.* *I. cit.* *4.* p. 435.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

8. **Rh. assimilis**, *Gthr.* N. v.

(M. S. T.)

Gthr. *I. cit.* *4.* p. 437.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

9. **Rh. grandisquama**, *Schleg.* N. v.

(M. S. T.)

Rhombus grandisquama, *Schleg.* *Faun. Japon.* *Poss.* p. 183; lam. 12, f. 3 & 4.

Rhomboideichthys gr. grandisquama, *Gthr.* *I. cit.* *4.* p. 537.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China.

6. Gen. SOLEA, Cuv.

10. **S. ovata**, *Richards.* N. v., Sumac, & Rodaballo

(M. S. T.)

? Solea ovata, *Richards.* *Ichth. Ochin.* p. 279 (no Cant); *Gthr.*

I. cit. *4.* p. 472.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

7. Gen. PARDACHIRUS, *Gthr.*

11. **P. pavoninus**, *Lacep.* N. v.

Achirus pavoninus, *Lacep.* iv. pp. 658, 661; *Cant. Cotel* p. 225; *Bleek.* *Verhand. Batav. Genootsch.* xxiv. *Pleuron.* p. 18.

Pleuronectes pavoninus, *Shaw.* *Zool.* iv. p. 310.

Pardachirus pavoninus, *Gthr.* *I. c.* *4.* p. 479.

Hab. Cebú; Singapore.

8. Gén. SYNAPTURA, CASTOR.

12. Sy. foliacea, Richards. N. v.

(M. S. T.)

Solea foliacea, Richards. Ichth. Chin. p. 279.

S. ovalis, Richards. l. c.

Sinaputra foliacea, Gthr. l. cit. 4. p. 481.

Hab. Luzon, Manila, Navotas; China.

13. Sy. zebra, Cant. N. v.

M. S. T.

Pleuronectes zebra, Bl. Aust. Fische, iii. p. 27, lam. 117. Bl.

Schn. p. 151; Lacép. iv. p. 597; Shaw. Zool. iv. p. 315. lam. 44.

Solea zebra, Cuv. Regne Anim., Bleek. Verhand. Batav. Genootsch. xxiv. Pleuron. p. 16.

S. zebra, Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 86, lam. 95, fig. 1.

S. commatura, Richards Ichth. Chin. p. 279.

Synaptura zebra, Cart. Catal. Mal. Fish. p. 224; Gthr. l. cit. 4. p. 484.

Pleuronectes fasciatus, Gronov. Syst. ed. Gray, p. 91.

Hab. Luzon, Cavite, Santa Cruz, Samar; China.

14. Sy. quagga (Kaup) N. v.

M. S. T.

Æsopia quagga, Kaup in Wiegm. Arch. 1858, p. 68.

Hab. Mindoro, Calapan; China.



9. Gén. CYNOGLOSSUS, HAM. BUCH.

15. Cy. auro-limbata? Richards. N. v.

(M. S. T.)

Plagusia auro-limbata, Richards Ichth. Chin. p. 289. China.

Cynoglossus auro-limbatus, Gthr. l. cit. 4. p. 492.

Hab. Luzon, Cavite, Santa Cruz; China.

16. Cy. abbreviatus, Gray. N. v.

(M. S. T.)

Plagusia abbreviata, Gray, Ill. Ind. Zool.

Arelia abbreviata, Kaup, l. c.

Cynoglossus abbreviatus, Gthr. l. cit. 4. p. 494.

Hab. Luzon, Manila, Navotas; China.

17. Cy. trigrammus, Gthr. N. v.

(M. S. T.)

Gthr. l. cit. 4. p. 494.

Hab. Luzon, Cavite, Santa Cruz; China.

18. Cy. melampetalus, Richards. N. v.

(M. S. T.)

Plagiusa melampetala, Richards. Ichth. Chin. p. 281.

Cynoglossus melampetalus, Gthr. l. cit. 4. p. 496.

Hab. Luzon, Samar, Borongan; China.

19. Cy quadrilineatus. Bleeker, N. v. (M. S. T.)

Achirus bilineatus, Lacep., iv, pp. 650, 663.

Plagusia bilineata, Rüpp. Atl. Fische, p. 123.

Pl. quadrilineata, Bleek. Verhand. Batav. Genootsch., xxiv. Pl. von, p. 24, or Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. i. p. 412.

Arelia quadrilineata, Kaup, in Vienn. Arch. 1858, p. 107.

Cynoglossus quadrilineatus, Gthr. l. cit. 4. p. 497.

Hab. Luzón, Manila; Amboina.

20 Cy. oxyrhynchos. Bleek. N. v. (M. S. T.)

Plagusia oxyrhinchos, Bleek. Verhand. Batav. Genootsch., xxiv. Pl. von, p. 26, or Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. i. p. 416.

Arelia oxyrhynchos, Bleek. Enom. p. 185.

Cynoglossus oxylinchus Gthr. l. cit. 4. p. 499.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Amboina.

21 Cy puncticeps. Richards. N. v. (M. S. T.)

Plagusia puncticeps, Richards. Ichth. Chin. p. 283.

Plagusia javanica, Bleek. Verhand. Batav. Genootsch., xxiv. Pl. von, p. 26, or Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. i. p. 414.

Hab. Luzón, Manila; China.

22. Cy. brachyrynchus. (B.)

Plagusia Brachyrynchus, Bleek. Verhand. Batav. Gen. xxiv. Pl. von, p. 24, or Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. i. p. 414.

Arelia brachyrynchus, Bleek. Enom. p. 184.

Cynoglossus brachyrynchus, Gthr. l. cit. 4. p. 499.

Hab. Luzón, Manila.

Orden. FISÓSTOMOS.

Fam. SILÚRIDOS.

I. Gén. CLARIAS, Grönov.

1. cl macrocephalus, Gthr. N. v. Hito. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Laguna de Bay; Siam.

2. cl. fuscus. Lacep. N. v. Hito. (M. S. T.)

Micropterus fuscus, Lacep., v, p. 88, lam. 2, f. 2.

Clarias pulicaris, Richards. Voy. Sulph. Fish. p. 135, lam. 62, figs. 5 & 6.

C. fuscus, Gthr. Cat. B. M. 5. p. 18, 1864.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

3. Cl. melanoderma, Bleek.

(M. S. T.)

Clarias melanoderma, Bleek. Verh. Bat. Gen. xxi. Silur. Batav. p. 54; Prodr. Silur. p. 343; et Atl. Ichth. Silur. p. 102, lam. 97, fig. 2; Gthr. l. cit. 5. p. 12.
C. melasoma (melanosoma), Bleek. Nat. Tydschr. Ned. Ind. iii. p. 427.

Hab. Luzon, Camarines Sur, Laguna de Batos, Laguna de Bay; Java, Borneo.

4. Cl. liacanthus, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Bleeker, Nat. Tydschr. Nederl. Ind. ii. p. 430; Prodr. Silur. p. 347; et Atl. Ichth. Silur. p. 104, lam. 98, fig. 1; Gthr. Cat. Fische, p. 20; Gthr. l. cit. 5. p. 20.

Hab. Paragua; Java, Borneo.

5. Cl. nieuhofii, Cuv. et Val. N. v.

Bontaei, Nicu. Lant-en Zee-reibe, p. 271.
Laapreta india, Will. Ichth. Abb. p. 4, lam. 6, f. 2.
Clarias nieuhofii, Cuv. & Val. xv. p. 386; Hyrtl. Denkschr. Acad. Wiss. Wien, 1859, xvi. p. 17; Bleek. Prodr. Silur. p. 351, et Atl. Ichth. Silur. p. 105, tab. 99, f. 1; Gthr. l. cit. 5. p. 20.
Cl. pentapterus, Bleek. Nat. Tydschr. Nederl. Ind. ii. p. 206.
Hab. Filipinas; Archipiélago Índico.

2 Gén. HETEROBANCHUS, GEOFF.

6. H. tapeinopterus, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Bleek. Nat. Tydsh. Nederl. Ind. iii. p. 732; Prodr. Silur. p. 337; et Atl. Ichth. Silur. p. 101, lam. 97, fig. 1.
Hab. Samar; Borneo.

3 Gén. PLOTOSUS, LACEP.

7. Pl. anguillaris, Lacép. N. v.

(M. S. T.)

Falut. Amb. iii. p. 502, fig. 496; Renard. Poiss. Mol. i. lam. 3 fig. 11; Russell. ii. p. 51, lam. 166.
Silurus arab, Forsk. Descript. Anim. p. xvi. n. 36.
Platystacus anguillaris, Bloch. viii. p. 61, lam. 363, fig. 1; Bl. Schn. p. 373, lam. 74; Shaw. Zool. v. p. 30, lam. 99.
Plotosus anguillaris, Lacép. v. p. 130, lam. 3, f. 2; Rüpp. N. W. Fische, p. 76; Cant. Mat. Fish. p. 264; Peters, in Wieg. Arch. xxi. p. 267; Bleek. Silur. p. 314; Gthr. l. cit. 5. p. 24.
Plotosius ikapir, Liss. Voy. Coqu. Zool. ii. p. 132, lam. 31, f. 3.
Plotosus marginatus, Bennett. in Life of Raffles, 691.
Pl. lineatus, Cuv. & Val. xv. p. 412; Richards. Fish. Chin. p. 286; Schleg. Faun. Jap. Poiss. p. 228, lam. 104, fig. 3;
Bleek. in Vic. h. Bat. Gen. xxi. Silur. Batav. pp. 4, 17, 57.

- 10 —
- Pl. castaneus, *Cuv. & Val.* xv. p. 421
 Pl. castaneoides, Bleek, *Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* ii. p. 49.
 Pl. arab, Bleek, *Atlas Ichth. Silur.* p. 98, lam. 95, f. 2.
Hab. Luzón, B. de Manila, Nasugbu, Batangas, C. de Cebú,
 C. de Samar; Borneo, China.

8 Pl. canius, Ham. N. v.

- Plotosus canius, Ham.*, *Bach. Fish. Gtng.* p. 142, lam. 15, t. 44
Cuv. & Val. xv. p. 425; Bleek, *Verh. Bat. Gen.* xxv., Nélez.
Beng. p. 125; *Prodri. Silur.* p. 318, et *Atlas Ichth. Silur.*
 p. 99, lam. 96, fig. 2, *Kner, Sitzgsber. Wien. Acad.* xvii. p.
 157; *Gthr. I. cit.* 5. p. 25.
 Pl. unicolor, (*Kuhl. & v. Hass.*) *Cuv. & Val.* xv. p. 426; Bleek,
Verh. Bat. Gen. xx., *Silur. Batav.* p. 58.
 Pl. horridus, viviparus, multiradiatus, Bleek, *I. c.* p. 59, 60.
 ? Pl. caecius, *Hyrtl, Acad. Wiss. Wien.* 1859, xvi. p. 17.
Hab. Cebú; Archipiélago Indico.

4. Gen. SHURUS, ARTHUR

9 S. asotus, L. N. v.

(M. S. T.)

- Silurus asotus, L.*, *Syst. Nat.* i. p. 501; *C. Schr.* p. 378; *Bris.*
in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. 1855, x. p. 240, lam. 3.
 4, 4, *in C. & V. J. Gthr.* I. cit. 5. p. 33.
 S. punctatus, *Cant. Ann. & Mig. Nat.* *Ilst.* 1842, ix. p. 485.
 S. xanthostomus, *Richards, Voy. Sulph. Fish.* p. 133, lam. 56, figs.
 12, 14; *Ichth. Chin.* p. 281.
 S. sinensis, *Richards, Ichth. Chin.* p. 281, (*no McClell.*)
 S. japonicus, *Schlegel, Faun. Japon.* *Poss.* p. 226, lam. 104, f. 1;
Richard, Ichth. Chin. p. 281.
Hab. Samar, Calbayog; China.

5 Gen. SILURI ITHYS BLEEK

o. S. phaeosoma Bleek. N. v.

(M. S. T.)

- Bleekr., *Prodri. Silur.* p. 269, et *Atlas Ichth. Silur.* p. 81, lam.
 87, fig. 2, *Gthr. I. cit.* 5. p. 35.
Hab. Samar, Borongan; Borneo.

6 Gen. WAI LAGO BLEEK

II. W. leerii, N. v.

(M. S. T.)

- Bleek. Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind.* ii. p. 427, et *Atlas Ichth. Silur.* p. 80, lam. 85, *Gthr. I. cit.* 5. p. 37.
Hab. Samar, Borongan; Sumatra, Borneo.



7. Gen BELODONTICHTHYS, BLEEK.

12. **B macrochir** Bleek N. v.

(M. S. T.)

Wallago dinema, Bleek, Nat. Tydschr. Nederl. Ind. ii. p. 252.
Belodontichthys macrochir, Bleek, Prodr. Silur. p. 266, et Atl. Ichth. Silur. p. 89. lam. 86, fig. 2; Gthr. l. cit. 5. p. 37.
Hab. Samar, Borongan; Borneo.

8. Gén. CRYPTOPTERUS, BLEEK.

13. **Cr limpok**, N. v.

(M. S. T.)

Silurus limpok, Bleek, Nat. Tydschr. Nederl. Ind. iii. p. 583.
Kryptopterus limpok, Bleek, Prodr. Silur. p. 286, et Atl. Ichth. Silur. p. 87. lam. 91, fig. 2; Gthr. l. cit. 5. p. 39.
Hab. Samar, Borongan; Sumatra, Borneo.

14. **Cr schilbeides**, ? Becker, N. v.

(M. S. T.)

Henusilurus schilbeide, Bleek, Prodr. Silur. p. 297, et Atl. Ichth. Silur. p. 94. lam. 90, fig. 4; Gthr. l. cit. 5. p. 41.
Hab. Samar, Borongan; Sumatra, Borneo.

15. **Cr bicirrhis**, C. V. N. v.

(M. S. T.)

Silurus bicirrhis, Cuv. & Val. xiv. p. 367. lam. 411; Bleek, Verh. Bat. Gen. xxi., Silur. Batw. p. 20, et Nat. Sydschr. Nederl. Ind. i. p. 271.
Kryptopterichthys bicirrhis, Bleek, Prodr. Silur. p. 292, et Atl. Ichth. Silur. p. 88 lam. 90, fig. 1; Gthr. l. cit. 5. p. 41.
Hab. Samar, Borongan; Java, Borneo.

16. **Cr lais**, Bleek, N. v.

(M. S. T.)

Silurus lais, Bleek, Nat. Tydschr. Nederl. Ind. ii. p. 428.
Kryptopterichthys lais, Bleek, Prodr. Silur. p. 291, et Atl. Ichth. Silur. p. 88 lam. 90, fig. 2; Gthr. l. cit. 5. p. 42.
Hab. Samar, Borongan; Borneo.

17. **Cr micropus**, Bleek, N. v.

(M. S. T.)

Silurus cryptopterus, Bleek, Nat. Tydschr. Nederl. Ind. i. p. 270.
Kryptopterus micropus, Bleek, Prodr. Silur. p. 84, et Atl. Ichth. Silur. p. 86. lam. 89, fig. 3. Gthr. l. cit. 5. p. 42.
Hab. Samar, Borongan; Sumatra.

18. **Cr micronema** ? Bleek, N. v.

(M. S. T.)

Silurus micronemus, Bleek, Verh. Bat. Gen. xxi., Silur. Batw. p. 18.
S. phalaenostus, Bleek, Nat. Tydschr. Nederl. Ind. ii. p. 429.

Microstoma typos, Bleek. *Prodr. Silur.* p. 300, et *Att. Ichth. Silur.* p. 91, lam. 92, fig. 2, lam. 93, fig. 1.
Phalaconotus micropterus, Bleek. *Prodr. Silur.* p. 207.
Micronema phalaconotus, Bleek. *Enom.* p. 139.
Cryptopterus micronema, Gthr. *I. cit.* 5, p. 43.
Hab. Samar, Borongan; Java, Borneo.

19. **Cr hexapterus**, t Bleek. N. v. (M. S. T.)

Silurus hexapterus, Bleek. *Nat. Tyschr. Nederl. Ind.* ii. p. 213.
Micronema hexapterus, Bleek. *Prodr. Silur.* p. 301, et *Att. Ichth. Silur.* p. 91, lam. 92 f. 1.
Cr. hexapterus, Gthr. *I. cit.* 5, p. 45.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java.

9. Gén. CALLICHROUS, Gthr.

20. **C. bimaculatus**, Bleek.

Wittsch, *Nieuw. Zee-en. Land-reize*, p. 276.
? *Silurus bimaculatus*, Bl. viii. p. 24 lam. 364; Bl. Schn. p. 377; McClell. *Calc. Journ. Nat. Hist.* iv. p. 401.
Ompok siluroides, Lacép. v. p. 50, vi. lam. 1 f. 2.
Silurus bimaculatus, Cuv. & Val. xiv. p. 360.
Pseudosilurus bimaculatus, Bleek. *Prodr. Silur.* p. 277.
Phalaconotus siluroides, Bleek. *Prodr. Silur.* p. 304.
Callichrous bimaculatus, Bleek. *Att. Ichth. Silur.* p. 84 lam. 87
fig. 3; Gthr. *I. cit.* 5, p. 45.
Hab. Samar, Borongan; Java, Borneo.

10. Gén. LAIS, BLEEK.

21. **L. hexanema**, Bleek. N. v. (M. S. T.)

Pangasius hexanema, Bleek. *Nat. Tyschr. Nederl. Ind.* iii. p. 589.
Lais hexanema, Bleek. *Prodr. Silur.* p. 171, et *Att. Ichth. Silur.* p. 72 lam. 75 fig. 2; Gthr. *I. cit.* 5, p. 57.
Hab. Luzon, Manila, Navotas; Java.

11. Gén. PANGASIUS, C. V.

22. **P. macronema**, Bleek. N. v. (M. S. T.)

Bleeker, *Nat. Tyschr. Nederl. Ind.* i. p. 11; *Prodr. Silur.* p. 183; et *Att. Ichth. Silur.* p. 74, lam. 75 fig. 3; Gthr. *I. cit.* 5, p. 62.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Borneo.

23. **P. nasutus**, ? Bleek. N. v. (M. S. T.)

Ischilopengasius nasutus, Bleek. *Versh. Kon. Akad. Wet.* xv. p. 72, et *Att. Ichth. Silur.* p. 76 lam. 29, fig. 1.
Pangasius nasutus, Gthr. *I. cit.* 5, p. 53.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Borneo.

12. Gén. PSEUDOBAGRUS, BLEEK.

24. *Ps. vachellii*, Richards, N. v.

(M. S. T.)

? Bagrus (?) boudierius, Richards. *Ichth. Chin.* p. 283.

Bagrus (?) vachellii, Richards. *I. c.* p. 284.

Pseudobagrus vachellii, Gthr. *I. cit. 5*, p. 85.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

25. *Ps fulvi-draco*, ? Richards, N. v.

(M. S. T.)

Pimelodus (?) fulvi-draco, Richards. *Ichth. Chin.* p. 286.

? Silurus calvarius, Basil. in *Nouv. Mém. Natur. Mosc.* 1855, x. p. 241 lam. 9 fig. 1.

Pseudobagrus fulvi-draco, Gthr. *I. cit. 5*, p. 14.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

13. Gén. RITA, BLEEK

26. *R. manillensis*, C. V. N. v.

(M. S. T.)

Arius manillensis, Cuv. & Val. xv. 93; Gthr. *I. cit. 5*, p. 94.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

14. Gén. ARIUS, GTHR.

27. *A. tonggol*, Bleek.

Arius tonggol, Bleek. *Verh. Bat. Gen.* xxi. *Silur. Bat.* p. 48.

Arius crossochelos, Bleek. *I. c.* p. 46.

Ariodes tonggol, Bleek. *Prodr. Silur.* p. 83, et *Att. Ichth. Silur.* p. 39. lam. 57.

Arius tonggol, Gthr. *I. cit. 5*, p. 164.

Hab. Luzón, Laguna de Bay; Java.

28. *A. sagor*, Ham. Buch. N. v.

Pimelodus sagor, Ham. Buch. p. 169.

Bagrus sondaicus, Cuv. & Val. xiv. p. 444; *Cant. Mal. Fish.* p. 255.

B. javensis, Cuv. & Val. xiv. p. 445.

B. sagor, Cuv. & Val. xiv. p. 446.

Hexanemathichthys sundaeicus, Bleek. *Prodr. Silur.* p. 127, et *Att. Ichth. Silur.* p. 26, lam. 62.

Arius sagor, Gthr. *I. cit. 5*, p. 141.

Hab. Balabac, Samar; Borneo.

29. *A. pidada*, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Arius pidada, Bleek. *Verh. Bat. Gen.* xxi. *Silur. Bat.* p. 43, et *Prodr. Silur.* p. 74; Gthr. *I. cit. 5*, p. 167.

A. viviparus, Bleek. *I.* c. p. 45.
Pseudarius pidada, Bleek. *Atl. Ichth. Silur.* p. 37 lam. 50.
Hab. Luzón, Manila; Navotas; Java.

30. *A. cælatus*, Cuv. N. v.

Arius cælatus, Cuv. & Val. xiv. p. 66; Bleek. *Atl. Ichth. Silur.* p. 35 lam. 53; Gthr. *I. cit.* 5. p. 158.
A. aequibarbis, Cuv. & Val. xiv. p. 68.
A. granosus, Cuv. & Val. xiv. p. 69.
A. carlatoides, Bleek. *Verh. Bat. Gen.* xxi. *Silur. Batav.* p. 32.
A. microgastropterygius, Bleek. *I. c.* p. 33.
A. clypeaster, Bleek. *I. c.* p. 34.
A. clypeastodes, Bleek. *I. c.* p. 34.
A. chondropterygius, Bleek. *I. c.* p. 35.
A. melanopterygius, Bleek. *I. c.* xxii. *Madur.* p. 10.
Cephalocassis cælatus, Bleek. *Prod. Silur.* p. 110.
Hab. Samar, Joló, Borneo; Java, Sumatra.

31. *A. falcarius*, Richards. N. v.

? *Tachisurus chinensis*, Lacép. v. p. 151. lam. 5. fig. 2
? *Pimelodus tachisurus*, Cuv. & Val. xv. p. 163.
Arius falcarius, Richards. Voy. Sulph. Fish. p. 134. lam. 62.
figs. 7-9; Gthr. *I. cit.* 5. p. 168.
Bagrus crinalis, Richards. *Ichth. Chin.* p. 282.
Pimelodus mong, Richards. *Ichth. Chin.* p. 286.
Arius schlegelii, Bleek. *Nederl. Tijdschr. Dierk.* 1863. p. 146.
Hab. Luzon, Laguna de Bay; China.

32. *A. microcephalus*, Blkr. N. v.

(M. S. T.)

Arius microcephalus, Bleek. *Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* ix. p. 423, et *Prod. Silur.* p. 77; Gthr. *I. cit.* 5. p. 170.
Pseudarius microcephalus, Bleek. *Atl. Ichth. Silur.* p. 37. lam.
51. f. 1.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Borneo.

15. Gén. HEMIPIMELODUS, BLEEK.

33. *H. borneensis*, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Pimelodus borneensis, Bleek. *Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* ii. p. 430.
Hemipimeledus borneensis, Bleek. *Prod. Silur.* p. 238, et *Atl. Ichth. Silur.* p. 43. lam. 82. fig. 3; Gthr. *I. cit.* 5. p. 176.
Hab. Samar, Borongan; Sumatra.

34. *H. macrocephalus*, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Bleeker, *Prod. Silur.* p. 239, et *Atl. Ichth. Silur.* p. 43. lam. 82. fig. 2; Gthr. *I. cit.* 5. p. 176.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

35. *H. manillensis*, *C.* & *V.* N. v. Candole. (M. S. T.)

Cuv. & *Val.* xv. p. 192; *Gthr.* l. cit. 5. p. 176.
Hab. Manila, Luzón.

16. Gén. KETENGUS, BLEEK.

36. *K. typus*, Bleek N. v. (M. S. T.)

Ketengus typus, Bleek. *Verh. Bat. Genootsch.* xxi. *Silur.* p. 9;
Natuurk. Tydschr. Nederl. Ind. i. p. 271; et *Att. Ichth. Silur.* p. 44, lam. 82, fig. 1. *Gthr.* l. cit. 5. p. 177.

Pimelodus pectinidens, *Cant. Mal. Fish.* p. 261.
Hab. Samar, Borongan; Borneo.

Fam. ESCOPÉLIDOS.

1. Gén. SAURIDA, C. V.

1. *S. tumbil* *Cuv.* N. v. (M. S. T.)

Roover, *Valent.* fig. 131; Renard, i. fig. 149.
Lacertus perigrinus, Rondel. *De Pisc.* xv. cap. 9. p. 428.
Padi mottah, Russell, lam. 172.
Salmo tomabil, Bloch, ix. p. 112, lam. 430; Bl. Schn. p. 495.
Saurus badimottah, Cuv. *Régne Anim.*; Rüppell. *Neue. Wirbeltth.*
Fische, p. 77; *Cant. Mal. Fish.* p. 270.
Saurida tomabil, Cuv. & Val. xxii. p. 500; Bleek. *Verh. Batav.*
Genootsch. xxiv. *Chiv.* p. 20; *Gthr.* l. cit. 5. p. 399.
Hab. Luzón, B. de Manila, Navotas; Oceano Índico.

2. *S. argyrophanes* Richards. N. v. (M. S. T.)

Saurus argyrophanes, Richards. *Ichth. Chin.* p. 302.
Aulopus elongatus, Schleg. *Faun. Japon. Fisc.* p. 233, lam. 105,
fig. 2.
Saurida argyrophanes, *Gthr.* l. cit. 5. p. 400.
Hab. Luzón, B. de Manila, Navotas; China.

3. *S. sp.* N. v. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Rio Pasig, Manila, Navotas.

2. Gen HARPODON, LESVÉUR.

4. *H. nehereus*, Ham-Buch. N. v. (M. S. T.)

Bummalo, or Bombay Duck,
Russell, ii. p. 55, lam. 171.
Osmerus nehereus, Ham. Buch. *Fish. Gang.* p. 209.
Salmo (*Harpodon*) microps, Lesvénur, *Journ. Acad. Nat. Sc. Philad.* 1825, v. p. 48, lam. 3.

- Saurus ophiodon, *Cuv. Régne Anim.; Cuv. & Val.* xxii, p. 4;
S. nehareus, *Richards. Ichth. Chin.* p. 391; *Cant. Mat. v. Rep.*
p. 273;
Harpodon nehareus, *Gthr. l. cit.* 5, p. 402.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

Fam. SALMONIDOS.

Gén. SALANX, *Cuv.*

1. *S. chinensis* (*Oseck.*) N. v. (M. S. 1)
Albula chinensis, *Oseck. Reise in China, Rostock* 1765, p. 300;
Gthr. Cat. B. Mus. 6, 1860, p. 205.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

Fam. ESCOMBRESÓCIDOS.

1. Gén. BELONE, *Cuv.*

1. *B. melanotus*, *Bleek.*

- Belone melanotis, *Bleeker. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* i, 94, or *Verh. Genootsch.* xxiv. *Snoek. Visch.* p. 14; *Gthr. l. cit.* 6, p. 238.
Mastacembelus crocodilus, *Bleek. Ned. Tijdschr. Dierk.* iii, (no syn.)
Hab. Cebú; Archipiélago Indico.

2. *B. schismatorhynchus*, *Bleeker.* N. v.

(M. S. 1)

- Belone gracilis, *Schleg. Faun. Japon. Poiss.* p. 246, lam. 10, t. 13;
Bleek. Verh. Bat. Gen. xxvi. *Nieuwe Nalez. Japan.* p. 116
(no Lowe).
Belone schismatorhynchus, *Bleeker. Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* i, p. 95, or *Verh. Genootsch.* xxiv. *Snoek. Visch.* p. 15; *Gthr. l. cit.* 6, p. 239.
Mastacembelus gracilis, *Bleek. Ned. Tijdschr. Dierk.* iii.
Hab. Luzón, Manila, Batangas, Nasugbú; Mar Rojo.

3. *B. annulata*, *C. V.*

- Russell*, lam. 175.
Belona indica, *Lesueur. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad.* ii, 1821,
p. 331.
Belone annulata, *Cuv. & Val.* xviii, p. 447, lam. 550; *Bleek. Cuv. Mal. Fish.* p. 244; *Day. Fish. Malabar.* p. 165; *Gthr. l. cit.* 6, p. 240.
Belone gigantea, *Schleg. Faun. Japon. Poiss.* p. 245; *Bleek. Act. Soc. Sc. Indo-Nederl.* iii, *Japan*, p. 21.
? *B. melanurus*, *Bleek. Verhand. Batav. Genootsch.* xxv. *M. S. 1*, p. 11.

- ? *B. cylindrica*, Bleek., *Verhand. Batav. Genootsch.* xxiv. Snoek. p. 13.
B. brachyrinchus, Bleek. *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* vi. p. 61.
Mastacembelus choram, Bleek. *Nederl. Tijdschr. Dierk.* iii.
M. brachyrhynchus, Bleek. l. c.
Hab. Luzón, Batangas, Nasugbú; China.

4. *B. caudimaculata*, Cuv. N. v. (M. S. T.)

- Belone caudimaculata*, Cuv. *Régne Anim.*; Cuv. & Val. xviii. p. 452; Gthr. l. cit. 6. p. 245.
Hab. Luzón, Manila, R. Pasig; Amboina.

5. *B. strongylurus*, (Bleek.) N. v. (M. S. T.)

- Russell*, ii. lam. 176.
Belone caudimaculata, Cant. Catal. p. 246; Bleek. *Verhand. Batav. Genootsch.* xxiv. Snoek. p. 12 (*no Cuv.*)
Mastacembelus strongylurus, (v. Hass.), Bleek. Ned. *Tijdschr. Dierk.* iii. (*no synon.*)
Belone strongylurus, Gthr. l. cit. 6. p. 246.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China.

6. *B. anastomella*, C. V. N. v. (M. S. T.)

- Belone anastomella*, Cuv. & Val. xviii. p. 446; Gthr. l. cit. 6. p. 249.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

7. *B. cancilioides*? Bleek. N. v. (M. S. T.)

- Belone cancilioides*, Bleek. *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* v. p. 454
Gthr. l. cit. 6. p. 253.
Mastacembelus cancilioides, Bleek. Ned. *Tijdschr. Dierk.* iii.
Hab. Samar, Borongan; Borneo.

2. Gén. HEMIRHAMPHUS, Cuv.

8. *H. viparus*, Peters.

- Peters, *Monatsber. Akad. Wiss. Berl.* 1865, p. 132; Gthr. l. cit. 6. p. 259.
Hab. Samar.

9. *H. esp.* N. v. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila.

10. *H. intermedius*, Cantor. N. v. (M. S. T.)

- Hemirhamphus intermedius*, Cant. Ann. & Mag. Nat. Hist. 1842, ix. p. 485; Richards. *Ichth. Chin.* p. 264; Gthr. l. cit. 6. p. 260.

Hemirhamphus melanochir, *Cuv.* & *Val.* xix. p. 41.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz; China.

11. **H. georgii**, *C. V.*

Hemirhamphus georgii, *Cuv.* & *Val.* xix. p. 37, lam. 555; *Cant.*
Cat. p. 248; *Gthr.* I. cit. 6. p. 264.
Hab. C. de Cebú; Océano Índico.

12. **H. cantoris**, *Bleeker*, N. v.

(M. S. T.)

Hemirhamphus longirostris, *Bydr. Topogr. Bat* (no *Cuv.*)
H. georgii, *Bleek.* *Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Snoek.* 19 (no *Cuv.*
& *Val.*)

H. cantori, *Bleeker*, *Ned. Tydschr. Dierk.* iii. p. 145; *Gthr.* I.
cit. 6. p. 264.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

13. **H. melanurus**, *C. V.* N. v.

(M. S. T.)

Hemirhamphus melanurus, *Cuv.* & *Val.* xix. p. 42; *Gthr.* I. cit.
6. p. 264.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China.

14. **H. sinensis**, ? *Gthr.* N. v.

(M. S. T.)

Hemirhamphus sinensis, *Gthr.* I. cit. 6. p. 265.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

15. **H. quoyi**, *C. V.*

Cuv. & *Val.* xix. p. 26; *Blek. Nat. Tydschr. Nederl.* et ii. p.
491, cop. in *Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Snoek.* p. 26, et *Ned.*
Tydschr. Dierk. iii. p. 153; *Gthr.* I. cit. 6. p. 267.
Hab. Luzón, Batangas, Nasugbu; N.^a Guinea.

16. **H. gernaerti**, *C. V.* N. v.

(M. S. T.)

Cuv. & *Val.* xix. p. 43; *Gthr.* I. cit. 6. p. 268.
Hab. Luzon, Manila, Navotas; China.

17. **H. commersonii**, *Cuv.*

Valent fig. 318; *Renard*, ii. lam. 5. fig. 2.
Acus, sp., *Willughby*, *Hist. Pisc.* lam. p. 8. f. 3.
Far, *Forsk. Descr. Anim.* p. 67.
Esox espadon, var., *Lacép.* v. lam. 7. f. 3.
Hemirhamphus commersonii, *Cuv. Régne Anim.*; *Cuv.* & *Val.* xix.
p. 28; *Blek. Verh. Bat. Genootsch.* xxiv. *Snoek.* p. 17; *Gthr.*
I. cit. 6. p. 271.
H. far, *Rüpp. N. W. Fische*, p. 74.
Hab. Luzón, Batangas, Nasugbú; Amboina.

18. *H. dispar*, *C. V. N.* v.

(M. S. T.)

Hemirhamphus dispar, *Cuv. & Val.* xix. p. 58, lam. 458; *Bleek. Nat. Tydschr. Ned. Ind.* vi. p. 498; *Gthr. l. cit. 6.* p. 274.
Zenarchopterus dispar, *Bleek. Nederl. Tydschr. Dierk.* iii. p. 164.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Indias Orientales.

19. *H. fluviatilis*, *Bleeker*, N. v

Hemirhamphus fluviatilis, *Bleeker*, *Nat. Tydschr. Ned. Ind.* i. p. 95; *cop. in Verh. Bat. Genootsch.* xxiv. *Snoek.* p. 16; *Peters. Monatsh.* *Gthr. l. cit. 6.* p. 275.
Dermogenys pusillus, (*v. Hass.*) *Bleek. Ned. Tydschr. Dierk.* iii. p. 165.
Hab. Samar, Borongan; Java.

20. *H. sumatrana*s, *Bleeker*.

*Hemirhamphus sumatrana*s, *Bleeker*, *Nat. Tydschr. Ned. Ind.* v. p. 526; *Gthr. l. cit. 6.* p. 275.
*Dermogenys sumatrana*s, *Bleek. Nederl. Tydschr.* iii. p. 167.
Hab. Luzón, R. Lonaten, Morong; Sumatra.

3 Gén. EXOCETUS, ARTEDEI.

21. *Ex. apus*, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

Exocetus apus, *Cuv. & Val.* xix. p. 107.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

22. *Ex. monocirrhus*, *Richards*, N. v.

(M. S. T.)

Exocetus monocirrhus, *Richards. Ichth. Chin.* p. 265.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

23. *Ex. brachipterus*, *Solander*, N. v.

(M. S. T.)

Exocetus brachipterus, *Solander*, M. S.; *Richards. Ichth. Chin.* p. 265; *Gthr. l. cit. 6.* p. 280.
Hab. Samar, Borongan; China.

24. *Ex. mento*, *C. I.* N. v. Botador.

(M. S. T.)

Exocetus mento, *Cuv. & Val.* xix. p. 124; *Bleek. Verh. Bat. Genootsch.* xxiv. *Snoek.* p. 21; *Gthr. l. cit. 6.* p. 281.
Parexocetus mento, *Bleek. Nederl. Tydschr. Dierk.* iii. pl. 126.
Hab. Luzón, Manila, C. de Samar; Ilías.

25. *Ex. volitans*, *Lin.* N. v. Botador.

(M. S. T.)

Hirundo, *Salv.* fol. 185, lam. 67.

Exocetus, n° 1, *Arteedi. Genera*, p. 8, *et Spec.* p. 37.

Exocetus volitans, *L.* *Amano*, *Acad.* i. p. 320; *Syst. Nat.* i. p. 520; *Cuv. & Val.* xix. p. 83, lam. 559; *Gthr.* I. cit. 6. p. 293.
Exocetus, *Gronov.* *Zoophyl.* p. 116.
Duhamel, *Pêches*, ii. p. 480, lam. 22, fig. 2.
Exocetus exilens, *Bloch*, lam. 397.
Exocetus quadriremis, *Gronov.* *Syst. ed. Gray*, p. 145.
Hab. Luzón, Manila, C. de Cebú y Samar.

26. **Ex. oligolepis**, Bleeker

Exocetus unicolor, Bleek. *Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Snock. Fisch.* p. 21. *Cno Cuv. & Val.*,
Ex. *oligolepis*, Bleek. *Ned. Tijdschr. Dierk.* iii. p. 109. *Gthr.* I. cit. 8. p. 296.
Hab. Luzón, Manila; Archipiélago Indico.

27. **Ex. evolans**, Lin. N. v Lauin

(M. S. T.)

Dutertre, *Hist. Ant.* ii. p. 212; Rochefort, *Hist. Ant.* i. p. 372;
Catesby. Carol. lam. 8.
Exocetus evolans, *L.* *Syst. Nat.* i. p. 521; *Bl.* lam. 393; *Bl.* *Schn.* p. 430, lam. 84; *Cuv. & Val.* xix. p. 138; *Gronov.* *Syst. ed. Gray*, p. 145; Bleek. *Cape of Good Hope*, p. 28; Yarrell. *Brit. Fish.* 3r. edit. i. p. 474; *Gthr.* I. cit. 6. p. 282.
Exocetus, *sp.*, *Gronov.* *Zoophyl.* n.º 358.
Exocetus volitans, *Lacep.* v. p. 401, lam. 12, f. 2; *Penn. Brit. Zool.* p. 441, lam. 78; *Donov. Brit. Fish.* ii. p. 31; *Brown. Philos. Trans.* lxxviii. p. 790, pl. 12; *Yarrell. Brit. Fish.* 2nd. edit. i. p. 453; *Bonn. Natur. Voy.* ii. p. 284.
Flying Fish White, *Voy. New. South. Wales*, lam. 52 fig. 2.
Exocetus splendens, Clark. *Abel. Journ. Chin.* 1818, p. 4.
E. volans, (*Solander*) Richards. *Ichth. Chin.* p. 264.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

28. **Ex. arcticeps**, *Gthr.* N. v

(M. S. F.)

Gthr. I. cit. 6. p. 289.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

29. **Ex. paeциlopterus?** *C. V.* N. v

(M. S. T.)

Valent. fig. 165; *Ruysch.* lam. 7. n.º 18.
Exocetus paecilopterus, *Cuv. & Val.* xix. p. 112, lam. 561; *Gthr.* I. cit. 6. p. 291.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

30. **Ex. esp.** N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Cebú, Samar.

31. **Ex. spilopterus**, *C. V.*

Exocetus spilopterus, *Cuv. & Val.* xix. p. 113; *Gthr.* I. cit. 9. p. 292.
E. spilopterus, Bleek. *Ned. Tijdschr. Dierk.* iii. p. 116.
Hab. Carolinas.

32. **Ex. oxycephalus**, Bleeker. N. v.

(M. S. T.)

Bleeker, *Nat. Tydschr. Ned. Ind.*, 1859, iii. p. 771, *et Nederl. Tydschr.* iii. p. 124; *Gthr. I. cit. 6.* p. 294.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Formosa.

33. **Ex. brachycephalus**, *Gthr.* N. v.

(M. S. T.)

Gthr. I. cit. 6. p. 297.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

Fam. CIPRÍNIDOS.

1. Gén CYPRINUS Nils.

1. **C. fossicola**, ♀ Richards. N. v.

(M. S. T.)

Cyprinus (?) fossicola, Gray. Richards. *Ichthyol. Chin.* p. 291.
Gthr. Cat. B. M. 7, 1868, p. 28.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

2. Gén. CIRRIINA, Cuv.

2. **C. chinensis**, *Gthr.* N. v.

(M. S. T.)

Gthr. I. cit. 7, p. 36.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

3. Gén DANGILA, C. V.

3. **D. ocellata**, Heckel. N. v.

(M. S. T.)

Cyrene ocellata, Heckel, in *Russegger's Reisen*, i. p. 1025.
Dangila microlepis, Bleek. *Nat. Tydschr. Ned. Ind.* iii. p. 595.
D. ocellata, Bleek. *I. c. xiv.* p. 475; *Prodr. Cypr.* p. 194; or
Atl. Ichthyol. Cypr. p. 43, lam. 16 fig. 3; *Gthr. I. cit. 7,*
p. 37.
Hab. Samar, Borongan; Borneo.

4. **D. cuvieri**, Cuv. N. v.

(M. S. T.)

Dangila cuvieri, Cuv. & Val. xvi. p. 230, lam. 470; *Gthr. I. cit. 7,* p. 38.
D. leptochela, Cuv. & Val. xvi. p. 234; Bleek. *Prodr. Cypr.* p. 198; or *Atl. Ichthyol. Cypr.* p. 45, lam. 17 fig. 1.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Java.

5. **D. sumatrana** Bleeker.

? Cyrene philippinia, Heckel, in *Russegger's Reisen*, i. p. 1025.
Dangila sumatrana, Bleek. *Nat. Tydschr. Ned. Ind.* iii. p. 595;

or Prodr. Cypr. p. 200; or Atl. Ichthol. Cypr. p. 46, lam. 15
fig. 2; Gthr. l. cit. 7, p. 39.

Hab. Filipinas; Sumatra.

6. *D. festiva*. Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Cyrene festiva, Heckel, in Russgger's Reisen, i. p. 1025.
Dangila festiva, Bleek. in Act. Soc. Sc. Indo-Néerl. ii. Borneo,
x. p. 16; or Prodr. Cypr. p. 202; or Atl. Ichthyol. Cypr.
p. 47, lam. 15 fig. 4; Gthr. l. cit. 7, p. 39.

Hab. Samar, Villareal; Borneo.

4. Gén. OSTEOCILUS, Gthr.

7. *O. melanopleurus*, Bleeker. N. v. Apahap.

(M. S. T.)

Rohita melanopleura, Bleek. Nat. Tydschr. Ned. Ind. iii. p. 430;
or Prodr. Cypr. p. 163; or. Atl. Ichthyol. Cypr. p. 62, lam. 13.
Osteochilus melanopleurus, Gthr. l. cit. 7, p. 40.

Hab. Samar, Borongan; Borneo.

8. *O. hasseltii*, Cuv. N. v.

(M. S. T.)

Rohita hasseltii, Cuv. & Val. xvi. p. 274; Bleek. Nat. Tydschr.
Ned. Ind. v. p. 450; or Prodr. Cypr. p. 171; or Atl. Ichthol.
Cypr. p. 65, lam. 14, fig. 1.

R. leiorhynchos, Bleek. Verh. Bat. Gen. xxiii. Midd. Oost-Java,
p. 19.

Osteochilus hasseltii, Gthr. l. cit. 7, p. 41.

Rohita artedii, Bleek. Nat. Tydschr. Ned. Ind. i. p. 434.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Sumatra.

9. *O. vittatus*, C. V. N. v. Apahap.

(M. S. T.)

Rohita vittata, Cuv. & Val. xvi. p. 267; Bleek. Nat. Tydschr.
Ned. Ind. v. p. 451; or Prodr. Cypr. p. 178; or Atl. Ichthyol.
Cypr. p. 68, lam. 12, fig. 2.

R. erythrura, Cuv. & Val. xvi. p. 268; Bleek. Nat. Tydschr.
Ned. Ind. v. p. 452.

R. enneaporus, Bleek. l. c. iii. p. 596; or Prodr. Cypr. p. 184;
or Atl. Ichthyol Cypr. p. 70, lam. 11, fig. 2.

Osteochilus vittatus, Gthr. l. cit. 7. p. 44.

Hab. Luzón, Manila, Malabon; Borneo.

Fam. CLUPÉIDOS.

1. Gén. ENGRAULIS, Cuv.

1. *E. tri*, Bleek. N. v.

Engraulis tri, Bleek. Verh. Bat. Gen. xxiv. Haring, p. 40; ⁶
Nat. Tydschr. Ned. Ind. iii. p. 436; Gthr. loc. cit. 7 p. 389.
Hab. Luzón, Manila; Borneo.

2. *E. japonica*, *Houtt.* N. v.

(M. S. T.)

Atherina japonica, *Houttuyn*. *Verh. Holl. Maatsch. Wet. Haarl.* xx, 2, 1781, p. 340.

Engraulis commersonianus, *Richards*. *Ichth. Chin.* p. 308. (no *Lacép.*)

Engraulis japonica, *Gthr. l. cit.* 7, p. 390.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

3. *E. heterolebus*, *Rüppell*. N. v.

Rüppell, *N. W. Fische*, p. 79, lam. 21, fig. 4; *Bleek.* *Ned. Tydschr. Dierk.* iii, p. 305; *Gthr. l. cit.* 7, p. 392.

Hab. C. de Samar; Mar Rojo.

4. *E. rhinorhynchus*, *Bleek*. N. v.

Engraulis kammalensis, *Bleek*. *Verh. Bat. Gen.* xxii. *Madura*, p. 13.

E. rhinorhynchus, *Bleek*. *l. c.* xxiv. *Haring*, p. 41; *et Nat. Tydschr. Ned. Ind.* iv, p. 432; *Gthr. l. cit.* 7, p. 394.
Hab. Cebú; Borneo.

5. *E. compressus*, *Girard* N. v.

(M. S. T.)

Girard, *U. S. Pac. R. R. Exped. Fish.* p. 336; *Gthr. l. cit.* 7, p. 395.

Hab. Luzón, Manila; California.

6. *E. hamiltonii*, *Gray*. N. v.

(M. S. T.)

Thryssa hamiltonii, *Gray*. *Ind. Zool.* c. fig.

Thryssa mystax, *Richards*. *Ichthyol. Chin.* p. 309.

Engraulis mystax, *Cantor*. *Mal. Fish.* p. 307.

E. grayi, *Bleek*. *Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Haring*, p. 41; *et Nat. Tydschr. Ned. Ind.* ii, p. 492; *Kner*, *Novara Fish.* p. 333;

Gthr. l. cit. 7, p. 395.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

7. *E. mystacoides*, *Bleek*. N. v.

(M. S. T.)

Engraulis hamiltonii, *Cuv. & Val.* xxi, p. 66 (no *Gray*); *Kner*, *Novara Fish.* p. 334.

? *Engraulis mystax*, *Cuv. & Val.* xxi, p. 67 (no *Bl. Schn.*).

Thysso porava, *Bleek*. *Verh. Bat. Gen.* xxii. *Madura*, p. 14 (no *Ham. Buch.*)

Engraulis mystacoides, *Bleek*. *l. c.* xxiv. *Haring*, p. 42. *Gthr. l. cit.* 7, p. 396.

E. mystax, *Bleek*. *l. c.* p. 43. (no *Bl. Schn.*)

Stolephorus (Thryssa) valenciennensis, *Bleek*. *Ned. Tydschr. Dierk.* iii, 1866, p. 306.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

8. **E. esp.** N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, B. de Manila.

9. **E. setirostris.** *Brouss.* N. v.

(M. S. T.)

Clupea setirostris, *Brouss.* *Ichth.* i. lam. 11; *L. Gm.* p. 1407; *Bl. Schn.* p. 428; *Russel*, ii. p. 80, lam. 201.

C. mystacina, *Forster*, *Descript. Anim. ed. Lichtenstein*, p. 295. *Engraulis setirostris*, *Cuv. & Val.* xxi. p. 69; *Bleek.* *Verh. Bat.* Gen. xxiv. *Haring*, p. 44; *Gthr. I. cit.* 7. p. 397.

Tryssa macronthus, *Bleek.* I. c. xxii. *Madura*, p. 14.

Hab. Luzón, Manila; Oceano Indico.

10. **E. breviceps?** *Cantor* N. v.

(M. S. T.)

Engraulis breviceps, *Cant. Mal. Fish.* p. 36; *Gthr. I. cit.* 7. p. 401.

E. pfeifferi, *Bleek.* *Nat. Tydschr. Ned. Ind.* iii. p. 433.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Borneo.

2. Gen. COILIA, GRAY.

11. **C. clupecoides.** *Lacép.* N. v.

(M. S. T.)

Clupea mystus, *L. Amoen. Acad.* iv. p. 252, fig. 12; *Osbeck. Iter.* p. 256.

Mystus clupecoides, *Lacép.* v. p. 467.

Chatomus playfairii, *M'Clell. Calc. Journ. Nat. Hist.* iv. 1843, p. 405, lam. 24, fig. 3.

Coilia playfairii, *Richards. Voy. Sulph. Fish.* p. 100, lam. 54, figs. 3-4; *Cuv. & Val.* xxi. p. 86.

C. clupecoides, *Gthr. I. cit.* 7. p. 404.

Engraulis mystus, *Cuv. & Val.* xxi. p. 73.

Osteoglossum priostoma; *Basil. Nov. Mém. Soc. Nat. Mosc.* x. 1855, p. 244.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

12. **C. grayi** *Richards.* N. v.

(M. S. T.)

Richards. Voy. Sulph. Fish. p. 99, lam. 54, figs. 1 & 2; *Kner. Novara. Fische*, p. 335; *Gthr. I. cit.* 7. p. 405.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

3. Gen. CHATOESSUS, C. V.

13. **Ch. nasus**, *Cuv.*

Clupea nasus, *Bl.* lam. 429; *Russell*, ii. lam. 197.

Chatoessus altus, *Gray. Ind. Zool.* c. fig.; *Day. Fish. Mact.* p. 243.

C. nasus *Cuv.* & *Val.* xxi. p. 104; *Bleek.* *Nat. Tydschr. Ned. Ind.* ii. p. 223; *Gthr. l. cit.* 7. p. 407.
Hab. Luzón, Manila; Java.

14. **Ch. punctatus**, *Schleg.* N. v.

(M. S. T.)

Chatoëssus punctatus, *Schleg.* *Faun. Japon.* *Poiss.* p. 241, lam. 109, fig. 1; *Cuv.* & *Val.* xxi. p. 107; *Bleek.* *Verh. Bat. Gen.* xxv. *Japan*, p. 50; *Kner.* *Novara*, *Fisch.* p. 336. *Gthr. l. cit.* 7. p. 408.

Chatoëssus aquosus, *Richards.* *Ichthyol. Chin.* p. 307, *Cuv.* & *Val.* xxi. p. 109.

?*Ch. punctatus*, *Kner.* *Novara*, *Fisch.* p. 336.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China,

15. **Ch. chacunda**, *Cuv.* N. v. Cabasi.

(M. S. T.)

Chapanodon chacunda, *Ham.* *Buch. Fish. Gang.* p. 246.

Chatoëssus chacunda, *Cuv.* & *Val.* xxi. p. 111; *Cant. Mal. Fsh.* p. 311; *Bleek.* *Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Haring*, p. 47; *Gthr. l. cit.* 7. p. 411.

Anodontostoma hasseltii, *Bleek.* *Verh. Bat. Gen.* xxii. Madura, p. 15.

Chatoëssus selangkat, *Bleek.* *l. c.* xxiv. p. 47; or *Nat. Tydschr. Ned. Ind.* iii. p. 458.
Hab. Luzón, Manila; China.

4 Gén CLUPEA, *Cuv.*

16. **Clupea mauritiana**, *Benn.* N. v.

(M. S. T.)

Benn. *Proc. Zool. Soc.* i. p. 32; *Mauritius*; *Gthr. l. cit.* 7. p. 413.

Hab. Luzón, Sta. Cruz, Cavite; Mauricio.

17. **C. isenglema**, *Rich.*

Hab. Luzón, B. de Manila.

18. **C. argyrotænia**, *Bleeker.* N. v.

(M. S. T.)

Alausa champil, *Cant. Mal. Fisch.* p. 302 (*no Gray*).

Rogenia argyrotænia, *Bleek.* *Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Haring*, p. 26; or *Nat. Tydschr. Ned. Ind.* iii. p. 457.

Clupea argyrotænia, *Gthr. l. cit.* 7. p. 423.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Java.

19. **C. fimbriata**, N. v. Tamban, Tungsuy & sardina.

(M. S. T.)

Spratella fimbriata, *Cuv.* & *Val.* xx. p. 359, lam. 600; *Day, Fish. Malab.* p. 233.

Kowala lauta, *Cant. Mal. Fish.* p. 270.

Clupea fimbriata, *Gthr. l. cit.* 7. p. 427.
Hab. Luzón, Manila; Océano Índico.

20. **C. nymphæa.** Richards, N. v.

(M. S. T.)

Clupea nymphæa, Richards, *Ichthyol. Chin.*, p. 304; *Gthr. l. cit.*, 7, p. 428.
Hab., Luzón, Manila; China.

21. **C. sp.** N. v.

(M. S. T.)

Hab., Luzón, B. de Manila.

22. **C. reevesii.** Richards N. v. Sardina.

(M. S. T.)

Alosa reevesii, Richards, *Ichth. Chin.*, p. 305.
A. palasah, Richards, *l. c.*, p. 306.
? Alausa reevesii, *Cuv. & Val.* xx, p. 437 (L. lat. 30).
Clupea reevesii, *Gthr. l. cit.*, 7, p. 446.
Hab., Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

23. **C. kowal.** Rüppell N. v.

(M. S. T.)

Kowal, *Russel*, lam. 186.
Clupea kowal, Rüppell, *Neue Wirbelth. Fische*, p. 79; *Gthr. l. cit.*, 7, p. 450.
? Kowala thoracata, *Cuv. & Val.* xx, p. 363.
K. thoracata, *Cant. Mal. Fish.* p. 269.
Clupalosa bulan, Bleek, *Verh. Bat. Gen.* xxii. *Madura*, p. 12,
et xxiv. *Haring*, p. 30.
Hab., Luzón, Cavite, Santa Cruz; China.

24. **C. zunasi.** (Bleek) N. v.

(M. S. T.)

Clupea kowal, Schleg., *Faun. Japan. Poiss.* p. 235, lam. 7, fig. 1 (*no Rüpp.*).
Harengula zunasi, Bleek, *Verh. Bat. Gen.* xxvi. *Japan*, p. 117.
Clupea zunasi, *Gthr. l. cit.*, 7, p. 451.
Hab., Luzón, Manila; Japon.

5 Gén. PELLONA, C. V.

25. **P. elongata.** ♀ Bennett, N. v.

(M. S. T.)

Alosa elongata, Bennett, *Mém. Raffles*, p. 691.
Clupea affinis, Gray, *Ind. Zool. c.* fig.
Ilisha abnormis, (Gray,) Richards, *Ichth. Chin.*, p. 306.
Clupea melastoma, Schleg., *Faun. Japon. Poiss.* p. 237, lam. 108
fig. 1 (*no Bl.*)
Pellona viabellla, *Cuv. & Val.* xx, p. 317.
P. grayana, *Cuv. & Val.* xx, p. 315; Bleek, *Verh. Bat. Gen.* xxiv.
Haring, p. 25.
P. affinis, *Cant. Mal. Fish.* p. 291.
P. schlegelii, Bleek, *Verh. Bat. Gen.* xxvi. *Japan*, p. 118.
P. elongata, *Gthr. l. cit.*, 7, p. 456. **Hab.*, Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

6. Gén. DUSSUMIERIA, C. V.

26. D. elopsoides, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Dussumieria elopsoides, Bleek. Verh. Bat. Gen. xxii. Madura, p. 12; xxiv. Chiroc. p. 12; or Nat. Tydschr. Ned. Ind. i. p. 421. D. hasseltii, Bleek. Verh. Bat. Gen. xxiv. Chiroc. p. 13; or Nat. Tydschr. Ned. Ind. i. p. 422.
Hab. Luzón, Manila; China.

7. Gén. ELOPS, LIN.

27. E. saurus, Lin. N. v.

(M. S. T.)

Sloane, Jamaica, ii. p. 284, lam. 250, fig. 1.
? Harengus minor, Catesby, ii. p. 24.
Elops saurus, L. Syst. Nat. i. p. 518; Bloch., lam. 393 fig. 1; Bl. Schn. p. 430 lam. 82; Dekay, New-York, Fauna, Fish. p. 267, lam. 41 f. 131; Cuv. & Val. xix. p. 365; Cant. Mal. Fish. p. 287; Bleek. Verh. Bat. Gen. xxiv. Haring, p. 14; Gronov. Syst. ed. Gray, p. 168; Kner, Novara, Fisch. p. 338; Gthr. t. cit. 7 p. 470.
Argentina carolina, L. Syst. Nat. i. p. 519.
Argentina machnata, Forsk. Descr. An. p. 68.
Mugilomorus annae carolinae, Lacép. v. p. 398.
Russell, lam. 179.
Elops inermis, Mitchell. Lit. & Phil. Trans. New-York, i. p. 445.
Elops machnata, Rüpp. N. W. Fische, p. 80; Richards. Éreb. & Terr. Fish. p. 59, lam. 36 figs. 3-5; et Ichth. Chin. p. 311; Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 241, lam. 109 fig. 2; Güth. Fish. Zanz. p. 121.
Elaps purpurascens, Richards. Ichth. Chin. p. 311.
E. capensis, Smith. Ill. Zool. S. Afr. Pisc. lam. 7.
Hab. Luzón, B. de Manila; China.

8. Gén. MEGALOPS, LACEP.

28. M. cyprinoides, Bleek. N. v. Buambuan.

(M. S. T.)

Clupea cyprinoides, Brouss. Dec. Ichthyol. i. lam. 9 (no synon. n. Bonnaï. Encycl. Méth. Ichth. p. 187, lam. 75, fig. 314; (cop. Brouss.); Lacép. v. lam. 13, fig. 3, Forster, Descr. Anim. ed. Licht. p. 296.
Megalops filamentosus, Lacép. v. pp. 289, 290, lam. 13, fig. 3; Bleek. Ned. Tydschr. Dierk. iii. 1866, p. 286.
Kundlinga, Russell, ii. p. 81, lam. 203.
Cyprinodon cundinga, Ham. Buch. Fish. Gang. pp. 254, 383.
Megalops setipinnis, Richards. Ann. Nat. Hist. xi. p. 493; et Ichth. Chin. p. 310.
M. curtifilis, Richards. Ichth. Chin. p. 310.
M. indicus, Cuv. & Val. xix. p. 388, lam. 542; Bleek. Verh. Bat. Gen. xxiv. Chiroc. p. 15; Kner, Novara, Fisch. p. 339.
Elops eunliga, Cant. Mal. Fish. p. 289.

- Megalops macrourus*, Bleek, *I. c.*
M. macropterus, Bleek, *Ned. Tijdschr. Dierk.* iii. 1895, p. 284.
M. kundunga, Bleek, *I. c.* p. 288.
M. cyprinoides, Bleek, *I. c.* p. 290; *Gthr. I. cit.* 7, p. 471.
M. oligolepis, Bleek, *I. c.* p. 292.
Elops apelike, Day, *Fish. Malab.* p. 228.
Hab. Luzón, B. de Manila; Amboina.

9 Gen. CHANOS LACEP.

- * 29 *Ch. salmoneus*, Bl. Schn. N. v. Bangos M. S. 1)

- Renard, *Poiss. d'Imb.* fol. 34, n. 184.
Mugil chanos, Forsk. *Descr. An.* p. 74; Bl. Schn. p. 16.
M. salmoneus, (Forst.) Bl. Schn. p. 121; *Forst. Descr. Anim. ad. Lichtenstein*, p. 299.
Chanos arabicus, Lacep. v. p. 395; Cuv. & Val. xix. p. 187.
Palah bontah, Russell, ii. lam. 207.
Toolelvo, Russell, ii. lam. 208.
Cyprinus (leuciscus) palah, Cuv. *Régne Anim.*
C. tolo, Cuv. *Régne Anim.*
Leuciscus zeylonicus, Benn. *Proc. Comm. Zool. Soc. 1832*, p. 184.
Lutodeira chanos, (Kuhl.) Rapp., *N. W. Fische*, p. 18, lam. 5.
fig. 1; Günthr. in *Fish. Zanz.* p. 120.
Leuciscus (Ptycholepis) salmoneus, Gray, in *Dicffenbach, Travels. in New Zealand*, ii. p. 208.
Butirinus maderaspensis, Jerdon, *Madr. Journ. Lit. & Sc.* xv.
p. 344.
Lutodeira salmonea, Richards, *Voy. Ereb. & Terr. Ichthol.* p.
58, lam. 36; fig. 1.
C. mento, Cuv. & Val. xix. p. 194.
C. chloropterus, Cuv. & Val. xix. p. 195; Kner, *Natura, Fisch.*
p. 341.
C. nuchalis, Cuv. & Val. xix. p. 196.
C. orientalis, Cuv. & Val. xix. p. 197; Kner, *I. c.*
C. cyprinella, Cuv. & Val. xix. p. 198.
C. salmoneus, Cuv. & Val. xix. p. 201; *Gthr. Cat. B. Mus.* 7.
p. 473.
C. pala, *Cant. Mal. Fish.* p. 278; Day, *Fish. Malab.* p. 224.
C. tolo, *Cant. I. c.* p. 282.
C. indicus, Bleek *Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Chiroc.* p. 11.
Hab. Luzón, Estanques de Malabon, Manila.

Fam. QUIROCÉNTRIDOS.

1 Gen. CHIROCENTRUS, Cuv.

- * 1 *Ch. dorab*, Forsk. N. v. (M. S. T.)

- Clupea dorab*, Forsk. *Descr. An.* p. 72; Lacep. v. p. 425; Russel, ii. lam. 199.
C. dentex, Bl. Schn. p. 428.
Esox chirocentrus, Lacep. v. p. 429.

Chirocentrus dorab, *Cuv. Régne Anim.*; *Rüpp. N. W. Fische*, p. 81; *Richards. Ichthyol. Chin.* p. 311; *Cuv. & Val. xix*, p. 159, lam. 565; *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxii. *Madura*, p. 6; *Cant. Mal. Fish.* p. 277; *Day. Fish. Malab.* p. 223; *Gthr. l. cit.* 7, p. 475.
Ch. hypselosoma, *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Chiroc.* p. 25; *o Nat. Tydschr. Ned. Ind.* iii. p. 71.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China.

Fam. SIMBRÁNQUIDOS.

1. Gén. SYMBRANCHUS, BLOCH.

1. *S. bengalensis*, *M' Clell. N. v.*

(M. S. T.)

Ophisternon bengalensis, *M' Clell. Calc. Journ. Nat. Hist.* v. pp. 197, 200, lam. 11, figs. 1 & 2; *Kaup. Apod.* p. 121, lam. 15, fig. 76.
Ophisternon hepaticus, *M' Clell. l. c.* p. 198, figs. 3 & 4.
Symbbranchus immaculatus, *Müller. Abhandl. Ak. Wiss. Berlin*, 1830, p. 245; *Cantor. Mol. Fish.* p. 537; *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxv. *Mur.* p. 57; *o Nat. Tydschr. Ned. Ind.* iii. *Borneo*, vi. p. 438.
S. gutturalis, *Richards. Voy. Ereb. & Terr. Fish.* p. 49, lam. 30 figs. 14-17.
Tetrabranchus microphthalmus, *Bleek. Nat. Tydschr. Ned. Ind.* ii. p. 69.
Symbbranchus bengalensis, *Bleek. Atl. Ichth. Mur.* p. 119, lam. 48, fig. 1; *Gthr. Cat. B. M.* 8. 1870, p. 16.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Archipiélago Indico.

Fam. MURENIOS.

1. Gén. ANGUILLA, CUV.

1. *A. mauritiana*, *Benn. tt.*

Anguilla mauritiana, *Bennett. Proc. Comm. Zool. Soc.* 1831, p. 128; *Gthr. l. cit.* 8, p. 25.
A. labrosa, *Richards. Voy. Ereb. & Terr. Ichth.* p. 113.
Murena maculata, *Bleek. Nat. Tydschr. Dierk.* i. p. 237, *o Atl. Ichthol. Muræn.* p. 9, lam. 1, fig. 2 (*o H. B.*)
M. manillensis, *Bleek. Atl. Ichthyol. Muræn.* p. 10, lam. 44, 1, 2; *Ned. Tydschr. Dierk.* 1864, p. 31.
Anguilla johanna, *Günth. in Fish. Zanz.* p. 124.
Murena marmorata, *Kner. Novara. Fisch.* p. 369.
Hab. Luzón, Laguna de Bay; Amboina.

2. *A. fidjiensis*, *Gthr.*

A. fidjiensis, *Gthr. l. cit.* 8, p. 26
Hab. Luzón, Manila.

3. *A. amboinensis*, *Pb.* N. v.

(M. S. T.)

Peters, *Monatsber. Ak. Wiss. Berl.* 1806, p. 523; *Gthr. l. cit.*
δ. p. 34.
Hab. Luzon, Manila; Amboina.

4. *A. esp.* N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna; Sta. Rosa.

2. *Gén. UROCONGER*, KAUP.

5. *U. lepturus* *Kaup*, N. v.

(M. S. T.)

Congrus lepturus, *Richards*, *Voy. Sulph. Fish.* p. 106, lam. 56,
figs. 1-6, et *Voy. Ereb. & Terr. Fish.* p. 109; *Bleek.* *Atlas Soc. Sc. Indo-Néerl.* iii. *Sumatra*, vi. p. 45.
Uroconger lepterus, *Kaup*, *Apod.* p. 110; *Bleek.* *Atlas Ichth. Mur.*
p. 29, lam. 5, fig. 1; *Kner*, *Novara, Fisch.* p. 373; *Gthr. l. cit.* δ. p. 44.
Hab. Luzón, B. de Manila; China.

3. *Gén. MURÆNESOX*, M'CLELL.

6. *M. talabon*, *Bleek*, N. v.

(M. S. T.)

Tala Bon, *Russell*, i. p. 27, lam. 38.
Conger (*Muraena*) *talabon* *Cuv.* *Régne An.*; *Cant. Mal. Fish.*
p. 312; *Bleek.* *Nat. Tijds. Ned. Ind.* iii. p. 78 (parte), et v.
p. 456; et *Verh. Bat. Gen.* xxv. *Mur.* p. 18.
Muraenesox lanceolata, *M'Clell.* *Calc. Journ. Nat. Hist.* iv. p. 409.
M. exodon, *M'Clell.* l. c.
M. serralentata, *M'Clell.* l. c., et v. p. 210.
M. exodontata, *M'Clell.* v. p. 180, lam. 8, fig. 4, et p. 210.
M. pristis, *Kaup*, *Apod.* p. 116.
M. talabon, *Bleek.* *Atlas Ichth. Mur.* p. 22, lam. 8, fig. 2; *Kner*,
Novara, Fisch. p. 372; *Gthr. l. cit.* δ. p. 45.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Indias-Orientales.

7. *M. cinereus*, (*Forsk*) N. v.

(M. S. T.)

Muraena cinerea, *Forsk.* *Descr. An.* pp. x. et 22.
M. arabica, *Bl. Schn.* p. 488.
M. bagio, *Ham.* *Buch* pp. 24, 364.
Ophisurus rostratus, *Quoy & Gaim.* *Voy. Uran. Zool.* p. 242.
lam. 51, fig. 1.
Conger longirostris, *Benn.* in *Life of Raffles*, p. 692.
C. oxyrinchus, *Eydoux & Soul.* *Voy. Bon.* i. p. 203, lam. 6.
fig. 2.
Muraenesox tricuspidata, *M'Clell.* *Calc. Journ. Nat. Hist.* iv
p. 409, lam. 24, fig. 1.
M. hamiltonii, *M'Clell.* l. c.
Congrus tricuspidatus, *Richards*. *Voy. Sulph. Fish.* p. 105, lam.
*

51. fig. 2 *Ichth. Chin.* p. 312; or *Voy. Ereb. & Terr. Fish.* p. 110.
Conger hamo, Schleg. *Faun. Japon. Poiss.* p. 262, lam. 114,
fig. 2; Richards. *Voy. Ereb. & Terr. Fish.* p. 111.
C. bagio, Cant. Mal. *Fish.* p. 316; Bleek. *Nat. Tyds. Ned.* iii. p. 777; or *Verh. Bat. Gen. xxv. Mur.* p. 22.
Congrus pretervus, Richards. *Voy. Ereb. & Terr. Fish.* p. 110.
C. angustidens, Richards. *I. c.*
C. brevisuspis, Richards. *I. c.* p. 111.
Conger singapurensis, Bleek. *Verh. Bat. Gen. Mur.* xxv. p. 21.
Murenæsox bagio, Peters. *Wiegm. Arch. 1855*, p. 270; Kaup.
Apod. p. 116, lam. 14, fig. 73; Bleek. *All. Ichth. Mur.* p. 24, lam. 26, fig. 2; Kner. *Novara, Fisch.* p. 373.
M. cinereus, Gthr. *I. cit. 8.* p. 46.
M. singapurensis, Bleek. *I. c.* p. 25, lam. 7, fig. 2; Kner, *I. c.* p. 373.
Hab. Luzón, B. de Manila, R. Munang, Mindoro; China.

4. Gén. MURÆNICHTHYS, BLEEK.

8. **M. macropterus**, Bleek. N. v.

Bleek. *Act. Soc. Sc. Indo-Nederl.* ii. *Amboina*, viii. p. 91; or
All. Ichth. Mur. p. 31, lam. 7, fig. 3; Gthr. *I. cit. 8.* p. 52.
Hab. P. Princesa, Paragua; Amboina.

9. **M. schultzii**, Bleek. N. v.

Bleek. *Nat. Tyds. Ned. Ind.* xiii. p. 366; or *All. Ichth. Mur.* p. 33, lam. 4, fig. 3. Gthr. *I. cit. 8.* p. 52.
Hab. Luzón, B. de Manila; Java.

10. **M. sp.** N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, B. de Manila.

5. Gén. OPHICHTHYS, GTHR.

11. **O. adspersus**, Gthr. N. v.

(M. S. T.)

Gthr. I. cit. 8. p. 57.
Hab. Luzón, Manila; China.

12. **O. dicellurus**, Richards. N. v.

(M. S. T.)

Ophisurus dicellurus, Richardson. *Voy. Sulph. Ichthyol.* p. 106,
lam. 48, figs. 2-4; *Voy. Ereb. & Terr. Fish.* p. 105.
Ophichthys dicellurus, Gthr. *I. cit. 8.* p. 59.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

13. **O. pallens**, Richards. N. v.

(M. S. T.)

Ophisurus harancha, Richards. *Ichth. Chin.* p. 313 (no H. B.).
O. pallens, Richards. *Voy. Ereb. & Terr. Fish.* p. 101.

Pisodonophis pallens, *Kaup. Apod.* p. 17.
Ophichthys pallens, *Gthr. I. cit. 8.* p. 61.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

14. *O. brockmeyeri*, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Ophisurus brockmeyeri, Bleek. *Act. Soc. Sc. Indo-Nederl.* i. *Mazando* p. 71.
O. celebicus, Bleek. *I. c.* p. 70.
Ophichthys amboinensis, Bleek. *Ned. Tydschr. Dierk.* ii. p. 45;
o. Att. Ichthyol. Muran. p. 54, lam. 45, fig. 1.
O. brockmeyeri, Bleek. *Att. Ichthyol. Muran.* p. 53, lam. 15,
fig. 1.
O. celebicus, Bleek. *I. c.* p. 54, lam. 15, fig. 3; *Gthr. I. cit. 8.*
p. 61.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Amboina.

15 *O. cirrochilus*, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Ophisurus cirrhocheilus, Bleek. *Act. Soc. Sc. Indo-Nederl.* ii.
Amboina, viii. p. 89.
Brachysomophis cirrochilus, Bleek. *Att. Ichthyol. Muran.* p. 38,
lam. 9.
Ophichthys cirrochilus, *Gthr. I. cit. 8.* p. 65.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Formosa.

16. *O. cephalozona*, Bleek. var. *Ghr. N. v.*

(M. S. T.)

Centrurophis spadiceus, *Kaup. Apod.* fig. 1 (*no descript., n.*
Richards).
Muranopsis marginatus, Bleek. *Ned. Tydschr. Dierk.* i. p. 170
(*no Ptrs.*)
Ophichthys cephalozona, Bleek. *Att. Ichthyol. Muran.* p. 49, lam.
12, fig. 2; *Kner. Novara. Fisch.* p. 377; *Gthr. I. cit. 8.* p. 69.
Hab. Luzón, Manila, Cebú; Japon.

17. *O. apicalis*, Bennett N. v.

(M. S. T.)

Ophisurus apicalis, *Bennett*, in *Life of Raffles*, p. 692.
O. s adiceus, *Richards. Ichthyol. Chin.* p. 313; *Voy. Ereb. &*
Terr. Ichthyol. p. 103.
O. compar, *Richards. Voy. Ereb. & Terr. Ichthyol.* p. 105.
O. bangko, Bleek. *Verh. Bat. Gen.* xxv. *Muran.* p. 67.
Centrurophis spadiceus, *Kaup. Apod.* p. 2 (*no fig.*)
C. bangko, *Kaup. Apod.* p. 3.
Oxilophis compar, *Kaup. Apod.* p. 6.
Ophisurus diepenhorsti, Bleek. *Act. Soc. Sc. Indo-Nederl.* viii.
Sumatra, viii. p. 85.
Ophichthys bangko, Bleek. *Att. Ichthyol. Muran.* p. 51, lam. 14,
fig. 1.
O. diepenhorsti, Bleek. *Att. Ichth. Muran.* p. 52, lam. 15, fig. 4.
O. apicalis, *Ghr. I. cit. 8.* p. 70.
Hab. Luzón, B. de Manila; China.

18. *O. chinensis*, Kaup. N. v.

(M. S. T.)

- Cirrhimuræna chinensis, Kaup, *Apod.* p. 27.
Ophisurus polyodon, Bleek. *Act. Soc. Indo-Nedert.* viii. *Sumatra*,
viii. p. 86.
Cirrhimuræna polyodon, Bleek. *Atl. Ichthiol. Muræn.* p. 41, lam.
8, fig. 1.
Ophichthys chinensis, Gthr. l. cit. 8. p. 75.
Hab. Luzón, B. de Manila; China.

19. *O. boro*, (Ham-Buch).

- Ophisurus boro*, Mam. *Buch. Fish. Gang.* pp. 20, 363; Gray,
Ill. Ind. Zool.; McClell. *Calc. Journ. Nat. Hist.* v. p. 211;
Richards. *Ichth. Chin.* p. 313, et *Voy. Ereb. & Terr. Fish.*
p. 99; Bleek. *Verh. Bat. Gen.* xxv. *Beng.* p. 156; *Cant. Mal.*
Fish. p. 322, lam. 5, fig. 2.
O. harancha, Ham. *Buch. l. c.* pp. 21 363; Gray, l. c.; McClell.
l. c. lam. 12, fig. 4.
O. caudatus, McClell. l. c. p. 185, lam. 12, fig. 3.
Conger microstoma, Eyd. & Soul. *Voy. Bonite*, i. p. 205, Poiss.
lam. 9, fig. 3.
Ophisurus potamophilus, Bleek. *Nat. Tydschr. Ned. Ind.* v. p.
458, o *Verh. Bat. Gen.* xxv. *Muræn.* p. 68.
Pisodonophis boro, Kaup, *Apod.* p. 17; Bleek. *Atl. Ichth. Mu-*
ræn. p. 62, lam. 20, fig. 3; Day, *Fish. Malab.* p. 148.
P. potamophilus, Kaup, *Apod.* p. 20; Bleek. l. c. p. 63, lam. 28,
fig. 2.
Ophichthys boro, Gthr. l. c. 8. p. 77.
Hab. Cebú; Indias Orientales.

20. *O. cancrivorus*, Richards. N. v.

(M. S. T.)

- ? *Conger flavipinnatus*, Bennett, *Proc. Comm. Zool. Soc.* 1831,
p. 168.
Ophisurus cancrivorus, Richards. *Voy. Ereb. & Terr. Fish.* p.
97, lam. 50, figs. 6-9.
O. sinensis, Richards. l. c. p. 98.
O. baccidens, *Cant. Mal. Fish.* p. 320, lam. 5, fig. 1.
O. schaapi, Bleek. *Nat. Tydschr. Ned. Ind.* iii. p. 735; o *Verh.*
Bat. Gen. xxv. *Muræn.* p. 53.
O. brachysoma, Bleek. l. c. 1^o, p. 776; o l. c. 2^o, p. 55.
Pisodonophis cancrivorus, Kaup, *Apod.* p. 15, fig. 9 (cop. de
Ri hards.); Kuer, *Novara, Fish.* p. 379.
P. brachysoma, Kaup, *Apod.* p. 19; Bleek. *Atl. Ichth. Muræn.*
p. 60, lam. 18, fig. 2.
P. schaapi, Kaup, l. c.; Bleek. l. c. lam. 17, fig. 1.
P. moluccensis, Bleek. *Atl. Ichthiol. Muræn.* p. 72, lam. 49 (no.
15) fig. 2.
Ophichthys cancrivorus, Gthr. l. c. 8. p. 78.
Hab. Luzón, B. de Manila; Amboina.

21. *O. culubrinus*. Boddaert.

- Muraena culubrina*, Boddaert, in Pallas's *Neue Nord. Beytr.* ii 1781, p. 56, lam. 2, fig. 3.
M. annulata, Ahl, *De Muraena et Ophichtho*, 1789, p. 8 lam. i, fig. 1.
M. fasciata, Ahl, l. c. p. 9.
Gymnothorax annulatus, Bl. Schn. p. 257.
G. fasciatus, Bl. Schn. p. 529.
G. culubrinus, Bl. Schn. p. 529.
Ophisurus fasciatus, Lacép. iv, p. 686; Richards, Ereb. & Terr. Fish. p. 100; Bleek. Atl. Ichthyol. *Muraen.* p. 64, lam. 21 fig. 1; Kner, *Natura, Finsch.* p. 379.
O. alternans, Quoy & Gaim. Voy. Urv. i. p. 243; lam. 45, fig. 2.
O. culubrinus, Richards, l. c. p. 100; Bleek. Nat. Tydschr. Ned. Ind. xi. p. 106.
Ophithorax colubrina, McClell. Calc. Journ. Nat. Hist. v. p. 212 (no synon.)
Pisodonophis fasciatus, Kaup, Apod. p. 23.
Ophichthys colubrinus, Gthr. l. cit. 8. p. 81.
Hab. Cebú; Borneo.

22. *O. quadratus*; Richards N. v.

M. S. 3)

- Sphagebranchus quadratus*, Richards. Voy. Sulph. Fish. p. 115, lam. 52 8-15.
Ophichthys quadratus, Gthr. l. cit. 8, p. 89.
Hab. Luzón, Manila; China.

6. Gen. MORINGUA, GRAY

23. *M. lumbrioidea*. Richards

- ? *Moringua linearis*, Gray, Zool. Misc. p. 9; et Ill. Ind. Zool. c. fig. *Moringua lumbrioidea*, Richards. Voy. Sulph. Ichth. p. 113, lam. 56 figs. 7-11; Kaup, Apod. p. 107; Gthr. l. cit. 8, p. 91.
M. microchir, Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind. iv. p. 124; o. Verh. Bat. Gen. xxv. Mur. p. 66; or Atl. Ichth. Mur. p. 16, lam. 4 fig. 2.
Hab. Luzón, Manila; Amboina, China.

24. *M. abbreviata* Bleek

- Aphthalmichthys abbreviatus*, Bleek. N. L. Tyds. Dierk. l. p. 103; Atl. Ichth. Mur. p. 17, lam. 1 fig. 1.
Moringua abbreviata, Gthr. l. cit. 8, p. 92.
Hab. Cebú; Archipiélago Indico.

7. Gen. MURCENA, GTHR.

25. *M. punctato-fasciata*. Bleeker

- Muraena catenata*, Bleek. Act. Soc. Indo-Néerl. i. Ambon., p. 103 (no synon.)

M. punctato-fasciata, *Gthr.* *I. cit.* *8*, p. 106.
Gymnothorax punctato-fasciatus, *Bleek.* *Atl. Ichth. Mur.* p. 99,
lam. 31 fig. 4.
Hab. Luzón, B. de Manila, Cebú; Amboina.

26. ***M. tessellata*, Richards.** N. v.

(M. S. T.)

? *Gymnothorax favagineus*, *Bl. Schn.* p. 525. lam. 105.
? *Muroëna favaginea*, *Cuv. Régne. Anim.*
Tao-ro-lontis reticulata, *M'Clell. Calc. Journ. Nat. Hist.* v.
1845, pp. 188, 216, lam. 7, fig. 1 (*no Bl. Schn.*).
Muroëna tessellata, *Richards.* *Ichth. Sulph.* p. 109, lam. 55 figs.
5^a, et *Ereb. & Terr. Fish.* p. 88; *Bleek. Nat. Tydschr. Ned.*
Ind. v. p. 530, o *Verh. Bat. Gen.* xxv. *Muræn.* p. 74; *Gthr.*
I. cit. *8*, p. 106.
M. isingleena, *Richards. Ichth. Sulph.* p. 108, lam. 48 fig. 1;
et *Ereb. & Terr. Fish.* p. 86.
M. python, *Kaup. Apod.* p. 68, fig. 52.
M. favaginea, *Kaup. Apod.* p. 68, fig. 53.
Thyrsoidea tessellata, *Kaup. Apod.* p. 76.
T. isingleena, *Kaup. Apod.* p. 75, fig. 57.
Gymnothorax isingleena, *Bleek. Atl. Ichth. Mur.* p. 92, lam. 37
fig. 1.
G. tessellatus, *Bleek. I. c.* p. 93, lam. 27, fig. 3, et lam. 28
fig. 1.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China.

27. ***M. fimbriata*, Bennett.** N. v.

(M. S. T.)

Muroëna fimbriata, *Bennett. Proc. Comm. Zool. Soc.* i. 1831,
p. 168.
M. bullata, *Richards. Ereb. & Terr. Ichth.* p. 86 (*cop. de Kaup.*
Apod. p. 81, fig. 60); *Gthr.* *I. cit.* *8*, p. 108.
M. isingleena, *Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind.* ix. p. 277 (*no Ri-*
chards.)
M. isingleenoides, *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxv. *Mur.* p. 48.
Gymnothorax isingleenoides, *Bleek. Atl. Ichth. Mur.* p. 91, lam.
35, fig. 1, lam. 36, fig. 1.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Amboina.

28 ***M. melanospila*, Bleek.**

Muroëna melanospilus, *Bleek. Nat. Tydschr. Ned. Ind.* ix. p. 279
Gymnothorax melanospilus, *Bleek. Atl. Ichth. Mur.* p. 91, lam.
42 fig. 1.
M. melanospila, *Gthr.* *I. cit.* *8*, p. 109.
Hab. Luzón; Sumatra.

29 ***M. makassariensis*, ? Bleek** N. v.

(M. S. T.)

Muroëna thyrsoides, *Richards. Voy. Sulph. Fish.* lam. 49 fig. 1
(*no descript.*)
Gymnothorax makassariensis, *Bleek. Ned. Tydschr. Dierk.* i. p.
168; or *Atl. Ichth. Mur.* p. 104, lam. 37 fig. 3.

- † *Muraena elegantissima*, *Kaup*, *Apod.* p. 67
Thyrsoidea macrops, *Kaup*, *Apod.* p. 74.
M. macassariensis, *Gthr. I. cit.* 8, p. 111.
Hab. Luzón, Manila, Makabon, Bulacan; China

29. *M. thyrsoidea*, *Richard.* N. sp.

(M. S. T.)

- Muraena thyrsoidea*, *Voy. Sulph. Ichth.* p. 111 (no fig.), et 1.
Ereb. & Terr. p. 90; *Cant. Mal. Fish.* p. 330, lam. 54, 5.
Gthr. I. cit. 8, p. 113.
M. griseobadia, *Richards*.
M. prosopion, *Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind.* iv, p. 300; ó *Verh. Bat. Gen.* xxv. *Mur.* p. 73.
Thyrsoidea griseobadia, *Kaup*, *Apod.* p. 74, (cop. Richards.).
L. arenata, *Kaup*, *Apod.* p. 55 (cop. Richards.).
Gymnothorax prosopion, *Bleek. Atl. Ichth. Mur.* p. 88, pl. 39, fig. 3.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

30. *M. pieta*, *Ahl.* N. sp.

(M. S. T.)

- Conger indicus maculosus*, *Willyughby*, *Apennud.* p. 24, lam. 6, fig. 1.
Muraena picta, *Ahl. De Mur. et Ophichth. in Thunb. Dissert.* iii, p. 6, lam. 2, fig. 2; *Günth.* in *Fish. Zanz.* p. 120; *id. Cat. B. M.* 8, p. 116.
Gymnothorax pictus, *Bl. Schu.* p. 529; *Bleek. Atl. Ichth. Mur.* p. 87, lam. 26, figs. 3, 4, lam. 28, fig. 3, lam. 29, fig. 1, lam. 45, fig. 3; *Kner. Novara. Fish.* p. 384.
Muraenopsis pantherina, *Lacép.* v, pp. 628, 641, 643.
Muraena variegata, *Ouoy & Garm.* *Voy. Uran. Zool.* p. 246, lam. 52, fig. 1.
M. lita, *Richards*. *Voy. Ereb. & Terr. Fish.* p. 84; *Bleek. Nat. Tydschr. Ned. Ind.* iii, p. 294, et 8, p. 383, ó *Verh. Bat. Gen.* xxv. *Muran.* p. 47.
M. siderea, *Richards*. *I. c.* p. 85; lam. 48 figs. 1-5.
M. pleiferi, *Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind.* v, p. 173; ó *Verh. Bat. Gen.* xxv. *Muran.* p. 72.
Sidera pleiferi, *Kaup*, *Apod.* p. 76.
S. pantherina, *Kaup*, *Apod.* p. 71.
G. minthorax panterinus, *Bleek. Ned. Tydschr. Dierk.* i, p. 152.
Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; Amboina.

31. *M. nubila*, *Richards*. N. sp.

(M. S. T.)

- Muraena nubila*, *Richards*. *Voy. Ereb. & Terr.* p. 81, lam. 46, figs. 6-14 (cop. de *Kaup*, *Apod.* p. 57, fig. 48); *Gthr. I. cit.* p. 117.
M. sunilis, *Richards*. *I. c.* p. 83 (cop. de *Kaup*, *Apod.* p. 63).
M. kidako, *Schleg. Faun. Japon. Poiss.* p. 266, lam. 117.
Gymnothorax sagenoleta, *Bleek. Atl. Ichth. Mur.* p. 103, lam. 40, fig. 4 (no synon.).
G. chilispilus, *Bleek. Ned. Tydschr. Dierk.* ii, p. 52; ó *Atl. Ichth. Mur.* p. 103, lam. 44, fig. 1.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Amboina, Formosa.

32 *M. tenebrosa*, Richards, N. v.

Richards, *Voy. Ereb. & Terr. Fish.* p. 84; *Gthr. I. cit. 8.* p. 119.
Hab. Marianas.

33 *M. macrurus*, Bleek N. v.

(M. S. T.)

Muraena macrurus, Bleek, *Nat. Tyds. Ned. Ind.* ii. p. 324; *Gthr. I. cit. 8.* p. 127.

Thyrsodea longissima, Kaup, *Apod.* p. 82.

M. macrurus, Bleek, *Atl. Ichth. Mur.* p. 111, lam. 22, fig. 2;
Kner, *Novara, Fisch.* p. 386.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Ceilan.

34. *M. zebra*, Bleek, N. v.

(M. S. T.)

Seba, ii. p. 72 lam. 70, fig. 3.

Gymnomuraena zebra, Shaw, *Zool. Misc.* p. 101; Richards, *Voy. Ereb. & Terr. Fish.* p. 95 (*cop. de Kaup, Apod.* p. 104, fig. 70).

Gymnothorax zebra, Bl. Sch. p. 528.

Gymnomuraena doliata, Lacep. v. pp. 648, 649, lam. 19, fig. 4.

Muraena molendinaria, Bennett, *Proc. Zool. Soc.* i. 1833, p. 32.

M. zebra, Bleek, *Nat. Tyds. Ned. Ind.* xiii. p. 80; *et Act. Soc. Sc. Indo-Neerl.* ii. *Amboina*, viii. p. 93; *Gthr. I. cit. 8.* p. 128.

Gymnomuraena fasciata, Kaup, *Apod.* p. 103, fig. 69.

Echidna zebra, Bleek, *Atl. Ichthyol. Mur.* p. 81, lam. 27, fig. 1.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Batangas, Nasugbu; Sumatra.

35 *M. polyzona*, Richards, N. v.

(M. S. T.)

Muraena polyzona, Richards, *Voy. Sulph. Zool.* p. 112, lam. 55, figs. 11-14, *et Voy. Ereb. & Terr. Fish.* p. 95; Bleek, *Act. Soc. Sc. Indo-Neerl. Manado*, p. 73; *Gthr. I. cit. 8.* p. 129.

M. dizona, Bleek, *Nat. Tyds. Ned. Ind.* xxii. p. 260.

Pocelophis polyzonus, Kaup, *Apod.* p. 101 (*cop. de Richardson*); Kner, *Novara, Fische*, p. 382.

Echidna polyzona, Bleek, *Atl. Ichth. Mur.* p. 81, lam. 24, fig. 3.
Hab. Luzón, Manila; Archipiélago Indico.

36. *M. nebulosa*, Ahl, N. v.

Seba, ii. lam. 69, figs. 1, 17.

Muraena nebulosa, Ahl, *D. Mur. et Ophichth.* p. 5, lam. 1, fig. 2; *Gthr. I. cit. 8.* p. 130.

Gymnothorax nebulosus, Bl. Sch. p. 528.

G. echidna, Bl. Sch. p. 526.

Echidna variegata, Forst. *Descr. An. ed. Licht.* p. 181; Bleek, *Atl. Ichth. Mur.* p. 80, lam. 24, fig. 2.

Muraena ophis, Rüpp. *Atlas, Fische.* p. 116, lam. 29, fig. 2; Richards, *Voy. Ereb. & Terr. Fish.* p. 93.

Thaerodontus ophis, McClell. *Calc. Journ. Nat. Hist.* v. p. 217.

Muraena variegata, *Richards*, *Voy. Ereb. & Terr. Fish.* p. 94, lam. 47, figs. 11-16; *Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind.* iii. p. 295, ó *Verh. Bat. Gen.* xxv. *Mur.* p. 47; *Peters*, *Wieg. Arch.* 1855, p. 270.

Parciliophis variegata, *Kaup*, *Apod.* p. 98, lam. 13, fig. 67; *Kner*, *Nova Fisch.* p. 381.
Hab. C. de Cebu; China.

8 Gén. *GYMNONURAENA*, *BLEEK.*

6 *G. marmorata*, *Bleek.*

Gymnomuraena marmorata, *Lacep.* v. pp. 648, 650; *Bleek. Al. Ichth. Mur.* p. 113, lam. 31, fig. 3; *Gthr. l. cit. 8.* p. 133.

Ichthyophis pantherinus, *Less.*, *Voy. Coq. Poiss.* ii. p. 131, 177 lam. 13; *Bleek. Verst. Ak Wet. Natuurk.* xv. p. 467.

Muraena micropterus, *Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind.* iii. p. 298; *Verh. Bat. Gen.* xxv. *Mur.* p. 50 (*joven*).

Uropterigius xanthopterus, *Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind.* xix. p. 350; (*joven*).

Gymnomuraena macrocephalus, *Bleek. Ned. Tyds. Dierk.* ii. p. 54; or. *Al. Ichth. Mur.* p. 114, lam. 21, fig. 2 (*joven*).
Hab. Mindanao, Zamboanga.

37 *G. esp.* N. v.

(M. S. T.)

Hab. Zamboanga, Mindanao.

Fam. PEGÀSIDOS.

1 Gén. *PEGASUS*, *LIN.*

1. *P. volans*, *Linn.* N. v.

(M. S. T.)

Pegasus volans, *L. Syst. Nat.* i. p. 418; *Gthr. l. cit. 8.* p. 148. *P. laternarius*, *Cuv. Régne An.*; *Kaup*, *Lophobr.* p. 3, lam. 1, fig. 4.

Hab. Luzón, Manila; China.

2 *P. natans*, *Linn.* N. v.

(M. S. T.)

Pegasus natans, *L. Syst. Nat.* i. p. 418; *Bl. Aust. Fish.* i. p. 53, lam. 121, figs. 2, & 3; *Richards*, *Voy. Sulph. Fish.* p. 118, lam. 50, figs. 5-7; *Gthr. l. cit. 8.* p. 148. *Wood Nat. Hist.* 3. p. 340, fig.

Cataphractus, *sp.*, *Gronov. Zoophyl.* n.º 357, lam. 11, figs. 2 & 3.

Pegasus spatula, *Lacep.* ii. p. 85.

P. volans, *Richards*, *Voy. Sulph. Fish.* lam. 50, figs. 8-10.

P. pristis, *Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind.* iii. p. 606; ó *Verh. Bat. Gen.* xxv. *Trosk.* p. 28.

Cataphractus anceps, *Gronov. Syst. ed. Gray*, p. 144.

Hab. Luzón, Santa Cruz, Cavite, Samar.

*

3. **P. lancifer**, *Kaup*. N. v.

(M. S. T.)

Pegasus natans, *Kaup*. *Lophobr.* p. 4, lam. 1, fig. 2.
P. lancifer, *Kaup*. *Wiegmann Arch.* 1868, p. 117; *Gthr. l. cit.* 8, p. 149.

Hab. Luzón, Santa Cruz; Tasmania.

Orden 5.^o LOFOBRANQUIOS.

Fam. SOLENOSTOMIDOS.

1. Gen. SOLENOSTOMA, LACEP.

1. **S. cyanopterum**, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Solenostomus paradoxus, *Richards*. *Icht. Chin.* p. 203; *Bleek.* *Nat. Tyds. Ned. Ind.* iii, p. 308; *Kaup*. *Lophobr.* p. 2.
Solenostoma cyanopterum, *Bleek*. *I. c. vi.* p. 506; *Gunth.* *in Fish Zanz.* p. 137, lam. 20, figs. 2 & 3; *id. l. cit.* 8, p. 151.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

2. **S. brachyurum**, Bleek N. v.

(M. S. T.)

Bleek. *Nat. Tyds. Ned. Ind.* viii, p. 433; *Gthr. l. cit.* 8, p. 132.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Amboina.

Fam. SINGNÁTIDOS.

1. Gén. SYNGNATHUS, ARTEMI.

1. **S. schlegelii**, *Kaup*. N. v.

(M. S. T.)

Syngnathus tenuirostris, *Schleg.* *Faun. Japon. Poiss.* p. 273, lam. 120, fig. 5.
S. schlegelii, *Kaup*. *Lophobr.* p. 46; *Gthr. l. cit.* 8, p. 160.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

2. **S. zanzibarensis**, *Gthr.* N. v.

(M. S. T.)

Gunther, *in Fish. Zanz.* p. 140, lam. 20, fig. 5; *ed. Cat. B. M.* 8, p. 168.
Hab. Luzón, Manila; China.

3. **S. spicifer**, *Rüppell*. N. v.

(M. S. T.)

Syngnathus spicifer, *Rüppell*, *N. W. Fische* p. 143, lam. 33, fig. 4;
Kaup, *Lophobr.* p. 34; *Day*, *Fish. Malab.* p. 264; *Gthr. l. cit.* 8, p. 172.

- S. djarong, Bleek, Verh. Bat. Gen. xxv. Trosk. p. 22; et A. Tyds. Ned. Ind. vii. p. 325.
S. gastrotenia, Bleek. l. c. 1^o, et l. c. 2^o, iii. p. 713.
S. helfrichi, Bleek. l. c. 2^o, ix. p. 428.
S. argyrostictus, Kaup, Lophobr. p. 33.
S. biserialis, Kaup, Lophobr. p. 33.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; China, Borneo.

4. **S. conspicillatus**, Jenyns. N. v.

(M. S. T.)

- Valentyn, fig. 81; Ruyssch, Amboina, lam. 6, fig. 18; Renard, i. lam. 4 fig. 30.
Syngnathus fasciatus, Gray, Ind. Zool. c. fig. (no Risso).
?S. perlatus, Bonn. in Beechey's Voy. Fish. p. 68, lam. 21, fig. 1.
S. conspicillatus, Jenyns, Voy. Beagle, Fish. p. 147, lam. 27, fig. 4; Gthr. loc. cit. 8. p. 174.
S. haematopterus, Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind. ii. p. 258; ó Verh. Bat. Gen. xxv. Trosk. p. 20.
Corythoichthys fasciatus, Kaup, Lophobr. p. 25; Kner, Novara, Fish. p. 391.
Hab. Luzón, Manila, Cebú, P. Princesa, Paragua; Amboin.

2. Gén. ICHTHYOCAMPIUS, KAUP.

5. **I. belcheri**, Kaup. N. v.

(M. S. T.)

- Ichthyocampus belcheri, Kaup, Lophobr. p. 30; Gthr. l. cit. 8. p. 177.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

3. Gén. DORYIHTHYS, KAUP.

6. **D. boaja**, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

- Syngnathus boaja, Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind. i. p. 16; ó Verh. Bat. Gen. xxv. Trosk. p. 14.
Doryichthys spinosus, Kaup, Lophobr. p. 57.
D. boaja, Gthr. l. cit. 8. p. 180.
Hab. Luzón, Cavité, Sta. Cruz; China.

7. **D. caudatus**, (Pirs).

- Microphis caudatus, Peters. Monatsber. Ak. Wiss. Berlin, 1890, p. 278.
Doryichtys caudatus, Gthr. l. cit. 8. p. 182.
Hab. Samar; Java.

8. **D. pleurostictus**, (Pirs).

- Microphis pleurostictus, Peters, Monatsber. Ak. Wiss. Berlin, 1890, p. 278.
Doryichtys pleurostictus, Gthr. l. cit. 8. p. 185.
Hab. Luzón.

4. Gén. GASTEROTOKEUS, KAUP.

9. G. biaculeatus, Kaup.

Valent. Amb. iii. p. 500, n.^o 481; *Renard*, fig. 73.
Syngnathus biaculeatus, *Bl. Aust. Fisch.* iv. p. 19, lam. 121, figs. 1 & 2; *Bl. Schn.* p. 515, lam. 107; *Cant. Mal. Fish.* p. 387.
S. *tetragonus*, *L. Gm.* i. p. 1433; *Lacép.* ii. p. 42.
Syngnathoides blochii, *Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind.* ii. p. 259.
Solegnathus blochii, *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxv. *Trosk.* p. 24.
Gasterotokeus biaculeatus, *Kaup. Lophobr.* p. 19; *Gthr. l. cit.* 8. p. 194.
Hab. C. de Samar; China.

5. Gén. SOLENOGNATHUS, KAUP.

10. S. hardwickii, Kaup. N. v.

(M. S. T.)

Syngnathus hardwickii, *Gray. Ind. Zool.* c. fig.
Solegnathus polypyrron, *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxv. *Trosk.* p. 25.
Solenognathus hardwickii, *Kaup. Lophobr.* p. 20; *Gthr. l. cit.* 8. p. 195.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

6. Gén. HIPPOCAMPUS, KAUP.

11. H. longirostris, Schleg. N. v.

(M. S. T.)

? Willughby, lam. J. 25, fig. 4.
? *Hippocampus longirostris*, *Cuv. Régne An.*
Hippocampus longirostris, *Schleg. Faun. Japon. Poiss.* p. 273;
Gthr. l. cit. 8. p. 201.
Hab. Samar, Borongan; China.

12. H. guttulatus, Cuv. N. v.

(M. S. T.)

Hippocampus kuda, *Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind.* iii. p. 82; ó
Verh. Bat. Gen. xxv. *Trosk.* p. 26.
H. moluccensis, *Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind.* iii. p. 305.
H. tenuirostris, *Bleek. l. c.* p. 306.
H. polytaenia, *Bleek. l. c.* vi. p. 338.
H. melanospilus, *Bleek. l. c.* p. 505.
H. comes, *Kaup. Lophobr.* p. 10; *Day. Fish. Malabar.* p. 262,
(no *Cant.*)
H. punctulatus, *Kaup. Lophobr.* p. 14.
H. punctulatus, guttulatus et monckeji, *Günth. Fish. Zanz.* p. 139;
Id. Cat. B. M. 8. p. 202.
Hab. Luzón, B. de Manila, Cebú; Amboina.

13. H. trimaculatus, Leach N. v.

(M. S. T.)

Hippocampus trimaculatus, *Leach. Zool. Misc.* p. 104; *Gthr. l. cit.* 8. p. 204.

- H. mannulus, *Cant. Mal. Rept.* p. 388, pl. 11, fig. 1; *Kaup*, *Lophohr.* p. 14.
? H. chinensis, *Basilewsky*, *Nouv. Mem. Nat. Musc.* x, 1855, p. 249.
? H. kampylotrachelos *Bleek*, *Nat. Tyds. Ned. Ind.* vii, p. 107.
? H. manadensis, *Bleek*, *Act. Soc. Sc. Indo-Neerl.* i. *Manado*, p. 79.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

14 H. comes, *Cantor*, N. v.

(M. S. T.)

- Cantor*, *Mal. Fesh.* p. 389, lam. 11, p. 2; *Gthr. l. cit.* 8, p. 204.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

Orden 6.º PLECTOGNATOS.

Fam. TRIACANTHIDOS.

1 Gén. TRIACANTHUS Cuv.

1. T. brevirostris, *Schleg.* N. v.

(M. S. T.)

- Hoornvisch Nieuhof, *Laut-en Zee-R.* p. 272.
Piscis cornutus Willughby, *Append.* p. 5, lam. 10 fig. 2.
Balistes, sp., *Gronov.* *Mus.* i, p. 52 n.º 115; *Zoophyl.* p. 53, n.º 194; *Russell*, i, p. 14, lam. 21.
Balistes biaculeatus, *Benn.* *Fish. Ceyl.* lam. 15 (*no Bl.*).
Triacanthus brevirostris, *Schleg.* *Faun. Japon.* *Poiss.* p. 294, lam. 129, fig. 2; *Hollard*, *Ann. Sc. Nat.* 1854, i, p. 45, lam. 2, fig. 1; *Bleek*, *Att. Ichth. Balist.* lam. 17, fig. 3; *Gthr. l. c. t.* 8, p. 209.
T. biaculeatus, *Bleek*, *Verh. Bat. Gen.* xxiii. *Madur.* p. 6 (*no Cuv.*)
T. rhoipterus, *Bleek*, *l. c.* xxiv. *Balist.* p. 25, lam. 4, fig. 8
T. russelli, *Bleek*, *l. c.*
T. nieuhofii, *Bleek*, *l. c.* p. 26, lam. 4, fig. 9, or *Nat. Tyds. Ind.* iii, p. 459, or *Att. Ichth.* v, p. 92, lam. 3, fig. 3.
T. brachysoma, *Bleek*, *Nat. Tyds. Ned. Ind.* iv, p. 128.
Balistes bipes, *Gronov.* *Syst. ed. Gray*, p. 37.
Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; China, Formosa.

2. T. biaculeatus, *Cuv.* N. v.

(M. S. T.)

- Balistes biaculeatus, *Bl.* lam. 148, fig. 2.
Triacanthus biaculeatus, *Cuv.* *Regie*, *An.*; *Cant. Mal. Fish.* p. 360; ? *Day*, *Fish. Malabar.* p. 260; *Gthr. l. cit.* 8, p. 210.
T. oxycephalus, *Bleek*, *Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Balist.* p. 27, lam. 5, fig. 10, o *Nat. Tyds. Ned. Ind.* ii, p. 496, o *Att. Ichth.* v, p. 99, *Balist.* lam. 6, fig. 3.
T. blanchii, *Bleek*, *Nat. Tyds. Ned. Ind.* iii, p. 81, o *Att. Ichth.* v, p. 89, *Balist.* lam. 3, fig. 1; *Kner*, *Novara. Fische*, p. 304.
T. angustifrons, *Hollard*, *Ann. Sc. Nat.* 1854, i, p. 45, lam. 2, fig. 2.

T. macrurus, Bleek. Atl. Ichth. v. p. 91; *Balist.* lam. 8, fig. 3.
Hab. Luzon, B de Manila, C. de Cebú; Australia.

3. **T. strigilifer**, Cant. N. v.

M. S. T.)

Triacanthus strigilifer, Cant. Mtl. Fish. p. 363, lam. 93; Bleek. Act. Soc. Se. Indo-Nerl. ii. Amboina, viii. p. 97; o. Atl. Ichth. v. p. 89; *Balist.* lam. 15, fig. 3; Gthr. I. cit. 8, p. 211.
T. longirostris, Hollard, Ann. Sc. Nat. 1854, i. p. 46, lam. 2, fig. 3.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

Fam. BALÍSTIDOS.

1. Gén. BALISTES, Cuv.

1. **B. stellatus**, Lacép. N. v.

M. S. T.)

Willughby, Append. p. 1, lam. 1, fig. 1; Valent. fig. 202; Renard, ii. lam. 33, fig. 153; Ruyssch, Anb. lam. 2, fig. 8.
Balistes stellatus, Lacép. i. p. 330, lam. 15, fig. 1; Röpp. Atl. Fish. p. 31; Bleek. Verh. Bat. Gen. xxi. *Balist.* p. 13; Bleek. Verh. Bat. Gen. xxiv. *Balist.* p. 13; Gthr. I. cit. 8, p. 212.
Balistes stellaris, Bl. Schu. p. 476; Hollard, Ann. Sc. Nat. 1854, i. p. 320.
B. vachellii, Richards, Voy. Sulph. Fisch. p. 129.
B. phaleratus, Richards. in Stokes, Discov. in Austral. i. p. 484, lam. 1, figs. 4-5.
Leiurus stellatus, Bleek. Atl. Ichth. *Balist.* p. 105, lam. 1; Kner, Novara, Fisch. p. 398.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China, Amboina.

2. **B. maculatus**, Gm. N. v.

(M. S. T.)

Guaperva longa, Willughby, Append. p. 21, lam. 1-20.
Sabaco, Parva, p. 17, lam. 10.
Balistes maculatus, Gm. L. i. p. 1468; Bl. ii. p. 25, lam. 151; Bl. Schu. p. 404; Lacép. i. p. 361; Hollard, Ann. Sc. Nat. i. 1854, p. 158; Gthr. I. cit. 8, p. 213.
B. sufflamen, Mitch. Lit. & Phil. Trans. N. York, i. p. 467, lam. 6, fig. 2.
B. oculatus, Gray, Ill. Ind. Zool.
B. willughbei, Benst. Proc. Comm. Zool. Soc. i. p. 168; et in Beechey's Voy. Zool. p. 68, lam. 21, fig. 2.
B. angulosus, Quoy & Gaim. Voy. Uran. Zool. p. 210; Hollard, I. c. p. 57.
B. azureus, Less. Voy. Cog. Zool. ii. p. 121, lam. 10, fig. 2.
B. rotundatus, Proc. Bull. Soc. Philom. 1822, p. 130.
B. conspicillum, Cant. Mtl. Fish. p. 344 (*no syn.*).
B. longus, Grönv. Syst. ed. Gray, p. 37.
B. senticosus, Richards. Voy. Samar. Fish. p. 23, lam. 9, figs. 5-8; Bleek. Nat. T. N. Ind. v. p. 93.
B. longissimus, Hollard, Ann. Sc. Nat. i. p. 60, lam. 3, fig. 3.

- B. brevissimus, Hollard, Ann. Sc. Nat. 1854, i, p. 56, lam. 3, fig. 1.
B. (Canthidermis) oculatus, Bleek, Atl. Ichth. Batist. p. 121, lam. 4, fig. 2.
B. (Canthidermis) maculatus, Bleek, l. c. p. 122, fig. 4; Kuier, Nozara, Fisch. p. 401.
B. sibaco, Poey, Mem. Cub. ii, p. 324.
B. macrops, Poey, l. c. p. 326.
Hab. Samar, Borongan; China.

3 B. vidua Richards, N. v.

(M. S. T.)

- Renard, i, lam. 17, fig. 9b.
Balistes vidua, Richards, Voy. Sulph. Fish. p. 128, lam. 59, figs. 9, 10; Bleek, Nat. Tyds. Ned. Ind. iii, p. 565; Hollard, Ann. Sc. Nat. 1854, i, p. 319; Gthr. l. cit. 8, p. 216.
Melichthys vidua, Bleek, Atl. Ichth. v, p. 109, lam. 217, fig. 2.
Hab. Luzón, Cayite, Santa Cruz; China.

4 B. mitis, Bonn, N. v.

(M. S. T.)

- Baliste bridé, Lacep. i, pp. 335, 381, lam. 15, fig. 3.
Balistes amboinensis, Gray, Ill. Ind. Zool. c, fig.
B. mitis, Bonn, Proc. Comm. Zool. Soc. i, p. 169; Gthr. l. cit. 8, p. 218.
B. frenatus, Richards, Voy. Sulph. Fish. p. 129, lam. 60, fig. 1; Hollard, Ann. Sc. Nat. 4th serie, i, p. 322, lam. 5, fig. 3; Bleek, Act. Soc. Sc. Indo-Nerl. i, Manado, p. 74.
B. hihpe, Richards, l. c. p. 127, lam. 60, fig. 2.
B. semimittii, Bleek, Verh. Batt. Gen. xxiv. Bilist. p. 37.
B. (Balistapus) frenatus, Bleek, Atl. Ichth. Batist. p. 114, lam. 223, fig. 2; Kuier, Nozara, Fisch. p. 400
Hab. Luzón, Manila; China.

5 B. bursa, Bl. N. v.

- Valent. figs. 377 & 403; Renard, i, lam. i, fig. 7, ii, lam. 26, fig. 127; Ruyssch, lam. 19, figs. 5 & 6.
Baliste bourse, Lacep. i, pp. 335.
B. bursa, Bl. Schn. p. 476; Bleek, Nat. Tyds. Ned. Ind. v, p. 350; Hollard, Ann. Sc. Nat. 1854, i, p. 328; Gthr. l. cit. 8, p. 219.
Balistes (Balistapus) bursa, Bleek, Atl. Ichth. Batist. p. 116, lam. 9, fig. 3.
Hab. Cebút: Oceano Pacifico.

6 B. aculeatus, L. N. v.

(M. S. T.)

- Seba, iii, lam. 24, fig. 15; Valent. figs. 22 & 422; Renard, i, t. 28, f. 154, ii, t. 28, f. 136; Ruyssch, t. 2, f. 2, t. 19, f. 8.
Balistes, sp., Gronev. Zoophyl. n.º 188, o. Mus. Ichth. i, p. 53; n.º 117.
Capriceps, sp., Klein, Pisc. Miss. iii, p. 25, n.º 7, lam. 3, fig. 1.
Balistes aculeatus, L. Syst. Nt. i, p. 405; Bl. ii, p. 19, lam. 14; Bl. Schn. p. 495; Lacep. i, p. 367, lam. 17, fig. 1;

- Bennett*, in *Beechey's Voy. Zool.* p. 69, lam. 22, fig. 2; *Jenyns*, *Zool. Beagle. Fish.* p. 155; *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxiv, *Ballist.* p. 15; *Hollard. Ann. Sc. Nat.* i. 1854, p. 333; *Gthr. I. cit.* 8, p. 223.
B. ornatissimus, *Less. Voy. Coq. Zool. Poiss.* i. p. 119, lam. 10, fig. 1.
B. armatus, *Cuv. R. An. Ill. Poiss.* lam. 112, fig. 2.
B. striatus, *Gronov. Syst. ed. Gray.* p. 32.
B. (*Ballistapus*) aculeatus, *Bleek. Att. Ichth. Ballist.* p. 120, lam. 2, fig. 3.
Hab. Luzón, B. de Manila; China.

7. **B. verrucosus**, *L. Syst. N. v.*

(M S T)

- Valent.* fig. 173; *Renard*, ii. lam. 34, fig. 157; *Ruyssch, Amb.* lam. 14, fig. 14; *Schae*, iii. t. 24, f. 17.
? *Ballistes verrucosus*, *L. Syst. Nat.* i. p. 405.
Balliste pralin, *Lacép.* i. p. 363.
Ballistes viridis, *Bl. Schn.* p. 476.
B. *verrucosus*, *Bl. Schn.* p. 476; *Gthr. I. cit.* 8, p. 225.
B. *unimaculatus*, *Shaw. Zool. v. pt. 2*, p. 410.
B. *praslinensis*, *Quoy & Gaim. Voy. Uran. Zool.* p. 205, lam. 46, fig. 1.
B. *praslinoides*, *Less. Voy. Coq. Zool.* ii. p. 117, lam. 9, fig. 3.
B. *melanopleura*, *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxiv, *Ballist.* p. 14.
B. *praslenensis*, *Hollard. Ann. Sc. Nat.* 1854, i. p. 332.
B. (*Ballistapus*) *verrucosus*, *Bleek. Att. Ichth. Ballist.* p. 120, lam. 2, fig. 2; *Kner. Novara. Fisch.* p. 399.
Hab. Luzón, Batangas, Nasugbú, Mindoro, Cebú; China.

8. **B. rectangulus**, *Bl.*

- Balliste echarpe*, *Lacép.* i. pp. 333, 352, lam. 16 fig. 1.
Ballistes rectangulus, *Bl. Schn.* p. 465; *Günth. in Fish. Zanz.* p. 134; *id. Cat. B. M.* 8, p. 225.
B. *medinilla*, *Quoy & Gaim. Voy. Uran. Poiss.* lam. 46, fig. 2.
B. *erythropteron*, *Less. Voy. Coq. Zool.* ii. p. 123, lam. 10 fig. 3.
B. *cinctus*, *Ann. Sc. Nat.* 1854, i. p. 335.
B. (*Ballistapus*) *cinctus*, *Bleek. Ned. Tijds. Dierk.* iii. p. 24, et *Att. Ichth. v.* p. 119, lam. 228 fig. 1.
Hab. Luzón, Batangas, Nasugbú; Polinesia. —

9. **B. undulatus**, *Mungo Park. N. v. Pcol.*

(M S T)

- Valent.* figs. 78 & 333; *Renard*, i. lam. 43, f. 217, ii. lam. 2, f. 7, lam. 25, fig. 123; *Ruyssch*, lam. 7, f. 4.
Ballistes undulatus, *Mungo Park. Trans. Linn. Soc.* iii. p. 37; *Lacép.* iv. p. 682; *Gthr. I. cit.* 8, p. 226.
B. *lineatus*, *Bl. Schn.* p. 466, lam. 87; *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxiv, *Ballist.* p. 14; *Hollard. Ann. Sc. Nat.* i. 1854, p. 337.
B. *aculeatus*, β *viridis*, *Benn. Fish. Ceylon*, lam. 10.
B. *capistratus*, *Tiles. Mem. Ac. Sc. St. Petersb.* vii. p. 301, lam. 9.

11. *La nouvouxii*, *Quoy & Gaim.*, *Voy. Uran. Zool.* p. 268, lam. 4^o
fig. 1.
B. sexquilineatus, *Benn.* in *Beechey*, *Voy.* p. 69, lam. 24 fig. 3.
B. porcatus, *Gronov.* *Syst. et Grav.* p. 32.
B. (*Ballistapus*) *lineatus*, *Bleek.* *Ned. Tyds. Dierk.* ii. 1805, p. 24,
Att. Ichth. v. p. 118, lam. 229 fig. 2; *Kner*, *Acara*, *Fisch.*
p. 400.
Hab. Luzon, Cavite, Santa Cruz, Cebú; China.

2. Gen. MONACANTHUS, Cuv.

10. **M. chinensis** Cuv., N. sp.

(M. S. 1)

- Valent.* fig. 406.
Ballistes chinensis, *Bl.* ii. p. 29, lam. 52, fig. 1; *Bl. Schn.* p. 40^o
B. sinensis, *Gm. L.* i. p. 4470.
B. punctatus, *Marion de Pocic*, *Bull. Philom.* 1822, p. 130.
Monacanthus chinensis, *Cuv. Régne An.*; *Bleek.* *Ned. Tyds. Dierk.*
iii. p. 26, ♂ *Att. Ichth.* v. p. 125, lam. 222 f. 2; *Gthr. L.*
cit. 8. p. 236.
M. geographicus, *Cuv. Régne An.*; *Cant. Mal. Fish.* p. 348; *Bleek.*
Verh. Bat. Gen. xxiv. *Ballist.* p. 17.
? *Monacanthus canteris*, *Bleek.* *L. c.* ♂ *Nat. Tyds. Ned. Ind.*
iii. p. 80.
Ballistes gr. nulosus, *Gronov.* *Syst. et Gray.* p. 34.
Hab. Samar, Luzon, Cavite, Santa Cruz; China.

11. **M. sp.** N. sp.

(M. S. 1)

Hab. Luzón, Nasugbú, Batangas.

12. **M. tomentosus**, Cuv.

- Ballistes*, *sp.*, *Gronov. Mus. Ichth.* i. p. 53, n.^o 114, ♂ *Zoophyt.*
n.^o 191, lam. 6, fig. 5; *Seba*, iii. lam. 24 fig. 18.
Ballistes tomentosus, *L.* *Syst. Nat.* i. p. 405; *Gronov.* *Syst. et*
Gray. p. 54; *Wood. Nat. Hist.* 3, p. 354, fig.
Balliste velu, *Lacép.* i. pp. 333, 359.
Monacanthus tomentosus, *Cuv. Régne An.*; *Bleek.* *Verh. Bat.*
Gen. xxiv. *Ballist.* p. 19, *et Att. Ichth.* v. p. 127, lam. 220,
fig. 1 lam. 229 1; *Gthr. loc. cit. 8.* p. 238.
M. hajam, *Bleek.* *L. c.* 1^o, p. 18, lam. 1 fig. 1, *et L. c.* 2^o
p. 126, lam. 230 figs. 1 & 3.
M. trichurus, *Bleek.* *Nat. Tyds. Ned. Ind.* iv. p. 125.
M. helleri, *Steindachner*, *Stegesber. Ak. Wiss. Wien.* 1897, 1^o
p. 712, lam. 3, fig. 3.
Hab. C. de Mindoro, Luzón, y Samar, Cebú; China.

13. **M. sulcatus**, Hollard, N. sp.

(M. S. 1)

- Monacanthus sulcatus*, *Hollard*, *Ann. Sc. Nat.* 1854, ii. p. 363,
lam. 14, fig. 3; *Gthr. L. cit. 8.* p. 239.

*

M. isogramma, Bleek. *Nat. Tyds. Ned. Ind.* xiii. 1857, p. 367; *All. Ichth. Balist.* p. 128, lam. 222, fig. 1.
Hab. Luzon, Cavite, Santa Cruz; China.

14. **M. setifer** Bennett N. v.

(M. S. T.)

M. macanthus setifer, Bennett, *Proc. Comm. Zool. Soc.* 1850, p. 112; *Hollard*, *Ann. Soc. Nat. Ind. Ind.* 1854, ii. p. 342, lam. 12, fig. 4; *Cithr. I. cit.* 8, p. 239.
M. cirriter, Schleg. *Faun. Japon. Poiss.* p. 299, lam. 130, fig. 1; Bleek. *Act. Soc. Sc. Indo Neerl.* iii. Japan, iv. p. 31.
M. varius Ranzani, *Nov. Comm. Ac. Sc. Inst. Bonon.* 1842, v. p. 6, lam. 2.
M. broccus, Storer, *Proc. Boston. Soc. Nat. Hist.* 1842, p. 84 (no Mitch.).
M. filamentosus, Valenc. in Webb. & Berthel. *Iles Canar. Poiss.* p. 95, lam. 17, fig. 1.
M. galinula, Valenc. *I. c.*
M. signifer, Storer, *Mem. Am. Ac.* ii. 1846, p. 497, et viii. p. 426 (lam. 35 fig. 1).
M. auriga, Lowe, *Proc. Zool. Soc.* 1850, p. 253.
M. setifer, Dekay, *New. York. Faun. Fish.* p. 337, lam. 59, fig. 194.
M. massachusetts, Storer, *Fish. Mass.* p. 174, et *Mem. Am. Ac.* viii. p. 425, (lam. 34, fig. 4); Dekay, *I. c.* p. 336, lam. 57, fig. 187.
M. komukii, Bleek. *I. c.* lam. 3, fig. 3, et *Verh. Ak. Wet.* i. Japan, p. 13, c. fig.
M. auratus, Castelnau, *Poiss. d'Afr. Austr.* p. 77.
M. oppositus, Pörr., *Mem. Cuv.* ii. p. 331.
Hab. Luzon, B. de Manila; China.

15. **M. monoceros** Osbeck. N. v.

(M. S. T.)

Acaria inuca, Willughby, lam. E. 2, fig. 2; Valent. fig. 310; *Renaud*, i. lam. 4, fig. 24, ii. lam. 4, fig. 16.
Balist s. sp. *Genov. Zophyl.* n.^r 8, lam. 3, fig. 11.
B. monoceros, Osbeck, II. p. 110; *L. Syst. Nat.* i. p. 404; *B.* lam. 147; *Bl. Schn.* p. 462.
Capriceus, sp., Klein, *P. Sc. Miss.* iii. p. 25, n.^r 8, lam. 3, fig. 11.
Lixa barbuda, Parva, p. 48, lam. 22, fig. 2.
Halistes kleinii, Gm. L. p. 1472.
B. monoceros, var. *unicolor*, Bl. Schn. p. 463.
B. serraticornis, Fremund. *Naw. Bull. Sc. Soc. Philom.* n.^r 67, p. 249, lam. 4, fig. 1.
Meutereres berardi, Less. *Voy. Coq. Zool.* p. 107, lam. 7; Richard. *Voy. Sulph.* chth. p. 132, lam. 61 fig. 1.
Alutera cinerea, Schleg. *Faun. Japon. Poiss.* p. 202, lam. 131, fig. 1.
Balistes unicornu, Basilewsky, *Nouv. Mem. Soc. Nat. Musc.* v. 1855, p. 263.
Alutarius macracanthus, Bleek. *Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Balist.* p. 22, lam. 3, fig. 6.
A. amphacanthorhynchus, Bleek. *I. c.* p. 23, lam. 2, fig. 5.

- A. obliteratus*, *Cat. Mal. Fish.* p. 188.
Balistes lingualis, *Groenw. Syst. ed. Grav.* p. 35.
Aluterus anginosus, *Hollard, Ann. Sc. Nat.* 1855, iv, p. 11.
Aluterus githiana, *Pöhl, Proc. Akad. Nat. Sc. Philad.* 1853.
Aluterus amoenus, *Berk. Nrd. Tidz. Dörfk.* iii, 1865, p. 23;
Alt. Ichth. vi, p. 140, lam. 22, fig. 2.
Monacanthus monacanthus, *Gthr. L. et. Sc.* 251.
Hab. Samar, Lizar, Cavite, Santa Cruz; China.

Fam. OSTRACIÓNTIDOS.

1. Gen. OSTRACION, Arribal.

1. *O. gibbosus* *Lau* N. v. Taglio.

M. S. 1.

- Ostracion alter, *Altrov.* iv, p. 561 (*err.*); *Jouston*, lam. 25, fig. 6, y de Willughby; *Umn. J.* 9, fig. 10.
Ostracion, sp., *Arribal*, *Synon.* p. 85, n.º 2, et *Genera*, p. 55, n.º 2.
Ostracion gibbosus, *L. Syst. Nat.* i, p. 400; *Gthr. L. et. Sc.* p. 27; *Valent.* pp. 391, 425, figs. 171, 292; *Röhrs.* p. 93; *Umn. 5*, fig. 5, 93; *Revert.* ii, *Umn. 6*, fig. 24, *Umn. 9*, fig. 46.
Crayacion, sp., *Kt. u. Psc. Mus.* vii, p. 26, n.º 17.
Ostracion turritus, *Forsk. Descr. Aq.* p. 75, n.º 113; *Bl. Aq. Fisch.* i, p. 113, *Umn. 136*; *Bl. Sch.* p. 500; *Lacép.* i, p. 45; *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxiv, *Bil'st.* p. 31, et *Act. Soc. Neerl.* vii, *Indo-Neerl.* vii, *Japan.* vi, p. 153; *Act. Acad. Art. Sc. Nat.* 1857, vii, p. 150.
Lactophrys camelinus, *Dekay, New York Trans. Fish.* p. 341, 14, 58, fig. 160.
Ostracion (*Tetrosimus*) turritus, *Bleek. Alt. Ichth. Ostrac.* p. 31, *Umn. 3*, fig. 3.
Hab. Luzon, Cavite, Santa Cruz; Archipiélago Indico.

2. *O. concatenatus* *Bl.* N. v.

M. S. 1.

- Ostracion concatenatus, *Bl.* *Umn. 131* (*err.*); *Bl. Sch.* p. 41; *Lacép.* i, p. 454; *Hollard, Ann. Sc. Nat.* 1857, vii, p. 15; *Gthr. L. et. Sc.* p. 259.
O. stellifer, *Bl. Sch.* p. 491, *Umn. 98* (*err.*).
O. lieu sis, *Blumenbach, Abbild.* *Umn. 58*; *Smith, Ill. Zool. S. Afr. Pis.* *Umn. 18*.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China.

3. *O. canticus*, *Lin.* N. v.

- Ostracion prior, *Altrov.* ii, c. 19, p. 56; *Jouston*, p. 125, 130, 25, fig. 7.
Willughby, *Append.* p. 20, *Umn. J.* 10 et *J.* 12; *Valent.* p. 38, fig. 12; *Seba*, iii, *Umn. 24*, fig. 11.
Ostracion, sp., *Arribal*, *Synon.* p. 85, n.º 8; et *1.* 84, p. 16; *Genera*, pp. 55, 56, nos. 1 & 4; *Gronov. Mus.* i, p. 21, 119; *Zoëphyl.* p. 51, n.º 173.

- O. tetragnathus, *L. Mus. Ad. Fred.* p. 59; Bleek. *Atl. Ichth. Ostrac.* p. 39, lam. 1, fig. 2, et lam. 3, fig. 2; Günth. in *Fish. Chin.* p. 129; Day, *Fish. Malab.* p. 254.
O. tuberculatus, *L. Syst. Nat.* i. p. 400.
O. cubicus, *L. l. c.* p. 410; Bleek. *Austl. Fish.* i. p. 115, lam. 137; Lacép. i. p. 401, lam. 22, fig. 13; Rüpp. *Atlas, Finsch.* p. 3; Bleek. *Verh. Bat. Ges.* xxiv. *Balist.* p. 35, lam. 7, fig. 14; Lejebr. *Voy Poiss.* p. 238, lam. 8; Hollard, *Ann. Sc. Nat. N. S.* 1857, vii. p. 162; Gthr. *l. cit.* 8, p. 260.
Abu senduk, *Forsk. Dzser. As.* p. 17, n.º 48.
Ostracion deux-tubercules, Lacép. i. p. 459.
O. bituberculatus, Bl. Schn. 501.
O. cyanurus, Rüpp. *Atl. Fische*, p. 4, lam. 1, fig. 2; Hollard, *Ann. Sc. Nat.* 1857, vii. p. 167.
O. argus, Rüpp. *l. c.* fig. 1.
O. maculatus, Quoy et Gaim. *Voy. Urv. Zool.* p. 218.
O. immaculatus, Schleg. *Faun. Japon. Poiss.* p. 296; Bleek. *Nat. Ichth. Japan*, p. 55; Brevoort, *Not. Jap. Fish.* p. 284.
O. tesserula, Bleek. *Nat. Tysd. Ned. Ind.* iii. p. 305.
Hab. Cebú, Paraguá; Amboina.

4. O. diaphanus, Bl.

- Ostracion, sp., Gronov. *Zoophyl.* p. 45 n.º 176.
O. diaphanus, Bl. Schn. p. 301; Bleek. *Act. Soc. Sc. Indo-Néerl.* iii. *Japan*, tr. p. 38; Hollard, *Ann. Sc. Nat.* 1857, vii. p. 157; Gthr. *l. c.* 8, p. 264.
O. brevicornis, Schleg. *Faun. Japon. Poiss.* p. 297, lam. 130, fig. 3.
O. undecim-aculeatus, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.* lam. 17; Castle, *Mem. Poiss. Afr. Austr.* p. 78.
O. pentacornis, Bennett, *Whaling Voyage*, p. 266.
Leptophrys diaphanus, Kaup, *Arch. Ntsgeschr.* 1855, p. 217.
Ostracion (acanthostracion) cornutus, Bleek. *Atl. Ichth. Ostrac.* p. 33, lam. 2, fig. 2, et lam. 4, fig. 3. (*no L.*, vide Peters, *Mitth. Ak. Wiss. Berl.* 1868, p. 461).
Hab. Zamboanga, Mindanao; Japon.

5. O. cornutus Lin N. v. Pez toro.

(M. S. T.)

- Willughby, *Append.* p. 20, n.º 12, lam. J. 13, fig. 1; Valent. pp. 358, 451, 455, 461, figs. 36, 333, 344, 397; Ruyssch, pp. 9, 10, 17, lam. 5, figs. 8, & 20; lam. 9, fig. 8; Reuvred, i. lam. 39, fig. 197, ii. lam. 8, fig. 38, lam. 13, fig. 60, lam. 27, fig. 135; Seba, iii. lam. 24, figs. 8, 9, & 13.
Crayacion n.º 26, Klein, *Pisc. MSS.* iii. p. 22.
Ostracion, sp., Gronov. *Mus.* i. p. 54, n.º 118; *Zoophyl.* p. 45, n.º 175.
O. cornutus, *L. Syst. Nat.* i. p. 400; Bleek. i. p. 105, lam. 133; Bl. Schn. p. 500; Lacép. i. p. 470; Shaw, *Zool.* v. p. 223, lam. 170; Schleg. *Faun. Japon. Poiss.* p. 299, lam. 131, fig. 4; Bleek. *Verh. Bat. Gen.* xxv. *Balist.* p. 32; Hollard, *Ann. Sc. N. S.* 1857, vii. p. 153; Peters, *Mitth. Ak. Wiss. Berl.* 1868,

- p. 460; *Gthr.*, *l. cit.*, 8, p. 265; *Wood. Nat. Hist.*, 3, p. 342
figs.
O. arcus, *Bl. Schn.*, p. 502.
O. cornutum, *Cant. Mal. Fish.*, p. 365.
O. valentini, *Bleek. Journ. Ind. Archipel.*, 1849.
O. (acanthostracion) arcus, *Bleek. Atl. Ichth. Ostr.*, p. 35, lam.
2, fig. 3; lam. 4, fig. 4.
Hab., C. de Cebú, Davao, Mindanao, Joló; China.

Fam. TETRODÓNTIDOS.

1. Gén. XENOPTERUS, BIBRON.

1. **X. naritus**, (*Richards*) N. v. (M. S. T.)
Tetraodon naritus, *Richards. Voy. Samar. Fish.*, p. 18, lam. 8;
Cant. Mal. Fish., p. 383, lam. 10; *Bleek. Verh. Bat. Gen.*, xxiv,
Blootk., p. 21, *o Nat. Tydschr. Ned. Ind.*, iii, p. 439.
Tetrodon grandispina, *Van. der Hoeven. Handb. Dierk.*, 2nd edit.,
ii, p. 275.
Chonerhinus naritus, *Bleek. Atl. Ichth. Gymnod.*, p. 77, lam. 7,
fig. 2.
Xenopterus naritus, *Gthr. l. cit.*, 8, p. 271.
Hab., Samar, Borongan; Borneo.

2. **X. modestus**, (*Bleek*) N. v. (M. S. T.)

- Tetraodon modestus*, *Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind.*, i, p. 16, et
iii, p. 440, *o Verh. Bat. Gen.*, xxiv, *Blootk.*, pp. 19, 21.
Chonerhinus modestus, *Bleek. Atl. Ichth. Gymnod.*, p. 78, lam.
9, fig. 8.
Xenopterus modestus, *Gthr. l. cit.*, 8, p. 271.
Hab., Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Borneo.

2. Gén. TETRODON, LIN.

3. **T. lunaris**, *Bl. Schn.*, N. v. (M. S. T.)

- Tetrodon lunaris*, *Bl. Schn.*, p. 505; *Schleg. Faun. Japon.*, Poiss.
p. 277, lam. 122, fig. 1; *Rüpp. N. W. Fisch.*, p. 59; *Cant. Mal. Fish.*, p. 378; *Bleek. Verh. Bat. Gen.*, xxiv, *Blootk.*, p. 12,
et *Atl. Ichth. Gymnod.*, *Russell*, i, p. 20, n.^o 29; *Gthr. l. cit.*,
8, p. 274.
T. tupa, *Ham. Buch.*, pp. 10, 362.
T. hispida, *Gray. Ind. Zool.*
Physogaster lunaris, *Müll. Abhandl. Ak. Wiss. Berl.*, 1830,
p. 252.
Gastrophysus lunaris, *Müll. Wieg. Arch.*, ix, p. 330.
Promecocephalus lunaris, *Bibr. Rev. Zool.*, 1855, p. 279.
Tetrodon spadiceus, *Richards. Voy. Saph.*, *Ichth.*, p. 123, lam.

58, figs. 4 & 5; Bleek. Atl. Ichth. Gymnod. p. 64, lam. 3, fig. 1.

Hab. Luzón, B. de Manila, C. de Mindoro; China.

4 T var spidiceus (Rich.) N. v.

(M S T)

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

5. T sceleratus (Forst.) N. v.

(M S T)

Tetraodon sceleratus, (Forst.) Gme. L i. p. 1444; Bl. Schn. p. 506; Lacep. i. pp. 476, 508; Gthr. l. cit. 8, p. 275.

T. argenteus, Lacep. Ann. Mus. d'Hist. Nat. iv. 1804, p. 211, p. 58, fig. 2; Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 275, lam. 121, fig. 2; Bleek. Nat. Tyds Ned. Ind. iii. p. 737, c. Atl. Ichth. Gymnod. p. 64, lam. 5, fig. 1.

T. argyropleura, Bennett, Proc. Comm. Zool. Soc. ii. 1832, p. 184.

T. argentatus, Blyth, in Kelaart's Prodr. Faun. Zejl. i. Appel. p. 49.

Proneococephalus argentatus, Bibron, Rev. Zool. 1855, p. 279. Tetraodon bicolor, Brevoort, Not Japan. Fish. p. 283.

Hab. Luzon, Manila; Formosa.

6 T hypselogenion, Bleek. N. v.

Tetraodon honckenii, Rüpp. Atl. Fisch. p. 65, lam. 17, fig. 2 (no Bl.)

T. hypselogenion, Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind. iii. p. 300; Verh. Bat. Gen. xxiv. Bloothk. p. 24, or Atl. Ichth. Gymnod. p. 61, lam. 9, fig. 5.

Hab. Luzón, Manila; Australia.

7 T oblongus, Bl. N. v.

(M S T)

Tetraodon oblongus, Bl. Ausl. Fisch. ii. p. 6, lam. 146, fig. 1; Lacep. i. pp. 476, 502; Bl. Schn. p. 504; Cant. Mal. Fish. p. 380; Bleek. Verh. Bat. Gen. xxiv. Bloothk. p. 22, et Atl. Ichth. Gymnod. p. 62, lam. 4, fig. 4; Gthr. l. cit. 8, p. 278. Physogaster oblongus, Müller, Abhandl. c. Wiss. Berl. 1839, p. 252.

Tetraodon alboplumbeus, Richards. Voy. Sulph. Ichthyol. p. 121, lam. 58, figs. 6 & 7; et Ichth. Chn. p. 199; Bleek. l. c. p. 62, lam. 1, fig. 1.

T. precilonatus, Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 279, lam. 124, fig. 2.

T. patoca, Bleek. Verh. Bat. Gen. xxiv. Bloothk. p. 11. (n) H. B.) Gastrophusus alboplumbeus, Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind. vii. p. 104.

Tetraodon niveatus, Brevoort, Notes on Japan. Fish. p. 284.

T. hartlaubii, Bianconi, Mem. Accad. Bolign. vi. p. 146, lam. 2, fig. 1.

Gastrophysus microphthalmus, *Blyth, Journ. As. Soc. Beng.* xxix

1851, p. 174.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

8. **T. oblongus**, var. **albo-plumbeus**, *Rich. N. v.* (M. S. T.)

Hab. Luzón, B. de Manila; China.

9. **T. ocellatus**, *Osbeck, N. v.*

(M. S. T.)

Tetronodon (*Dioton*) *ocellatus*, *Osbeck, It.* p. 226, ó *Engl. edit.* i, p. 364, ii, p. 331; *L. Syst. Nat.* i, p. 411, *Bl. lam.* 145; *Lacepèd.* i, pp. 475, 497; *Bl. Schn.* p. 504; *Richards. Voy. Sulph. Fish.* p. 120, *lam.* 58, *figs.* 1 & 2; *Gthr. loc. cit.* 8, p. 279.

Tetronodon *fasciatus*, *McClell. Calc. Journ. Nat. Hist.* iv, p. 412, *lam.* 21, *fig.* 2.

T. sp., *Benn. in Beechey's Voy. Zool.* p. 50.

T. bimaculatus, *Richards. I. c.* p. 119, *lam.* 57, *figs.* 7-9.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, China.

10. **T. rubripes**, *Schleg. N. v.*

(M. S. T.)

Tetraodon *rubripes*, *Schleg. Faun. Japon. Poiss.* p. 283, *fig.* 1.
Gthr. loc. cit. 8, p. 279.

T. xanthopterus, *Schleg. I. c.* p. 284, *lam.* 125, *fig.* 1.

Gastrophysus *rubripes*, *Bleek. Act. Soc. Sc. Indo-Néerl.* viii. *Japau*, vi, p. 68.

G. xanthopterus, *Bleek. I. c.* p. 69.
Hab. Luzon, Manila; China.

11. **T. patoca**, *Ham. N. v.*

(M. S. T.)

Kappa, *Russell*, i, p. 18, *fig.* 25.

Tetronodon *patoca*, *Ham. Buch.* pp. 7, 363, *lam.* 18, *fig.* 2; *Bribon, Rev. Zool.* 1855, p. 280; *Gthr. I. cit.* 8, p. 288.

Tetronodon *dissutidens*, *Cant. Mal. Fish.* p. 382.

T. kappa, *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxiv, *Bloothk.* p. 16, *xxv. Beng.* p. 160, *o Nat. Tyds. Ned. Ind.* iii, p. 301.

Leiodon *patoca*, *Bleek. Atl. Ichth. Gymnod.* p. 76, *lam.* 6, *fig.* 2.
Hab. Luzón, Manila, C. de Samar; China.

12. **T. inmaculatus**, *Bl. var. **virgata***, *Rich. N. v.*

(M. S. T.)

Tetronodon *manilensis*, *Procé, Bull. Philom.* 1822, p. 130.

T. virgatus, *Richards. Voy. Erebus. & Terr. Fish.* p. 62, *lam.* 39 *figs.* 8 & 9, *et Voy. Herald. Zool.* p. 163, *lam.* 28 *figs.* 6-8; *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxiv, *Bloothk.* p. 24, *o Nat. Tyds. Ned. Ind.* iii, p. 229.

Holocanthus *pilosus*, *Gronov. Syst. et Gray*, p. 28.

Dibolomycter *longicaudus*, *Bibron, Grévy. Rev. Zool.* 1855, p. 279.
Crayracion *manillensis*, *Bleek. Atl. Ichth. Gymnod.* p. 69, *lam.* 4, *fig.* 2.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Manila; Amboina.

13. *T. nigropunctatus*, Bl.

Tetrodon nigropunctatus, Bl. Schn. p. 507; Gthr. I. cit. 8, p. 293.
Tetraodon trichoderma, Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind. v. p. 532.
T. trichodermatoides, Bleek. I. c. vi. p. 336.
Arotbron melanorhynchus, Bleek. I. c. ix. p. 111.
Crayracion nigropunctatus; Bleek. Atl. Ichth. Gymnod. p. 74, lam. 2 fig. 4.
Hab. Cebú; Sumatra.

14. *T. mappa*, Less.

Tetraodon mappa; Less. Voy. Coq. Poiss. p. 102, lam. 5; Gthr. I. cit. 8, p. 293.
T. reticulatus, Bleek. Verh. Bat. Gen. xxii. Madura, p. 16, et xxiv. Blootk. p. 18.
Tetraodon calamarioides, Bleek. I. c. xxiv. p. 16, o Nat. Tyds. Ned. Ind. i. p. 96 (adult.)
T. meleagris, Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind. v. p. 91. (no synon).
Crayracion mappa, Bleek. Atl. Ichth. Gymnod. p. 72, lam. 6, fig. 3 (adult.)
C. meleagris, Bleek. I. c. fig. 1.
Crayracion mappa, Bleek. Atl. Ichth. Gymnod. p. 72, lam. 6, fig. 3 (adult.)
C. meleagris, Bleek. I. c. fig. 1.
Hab. Cebú; Archipiélago Indico.

15. *T. reticularis*, Bl.

Tetrodon testudineus, (no L.) Bl. Aust. Fisch. i. p. 123, lam. 130; Lacep. i. p. 477; Bl. Schn. p. 502; Shaw, Zool. v. p. 444, lam. 178; Cant. Mal. Fish. p. 376; Bleek. Verh. Bat. Gen. xxiv. Blootk. p. 14 o Nat. Tyds. Ned. Ind. iii. p. 78.
T. reticularis, Bl. Schn. p. 506; Gthr. I. cit. 8, p. 296.
Arothron testudineus, Bleek. Atl. Ichth. Gymnod. p. 71, lam. 8, fig. 3; Day, Fish. Malabar, p. 257.
Hab. Cebú; Célebes.

16. *T. hispidus*, Lin var. *semistriatus*, Rüpp. N. v. (M. S. T.)

?*Tetrodon hispidus*, L. Syst. Nat. i. p. 411 (no synon.)
?T. hispidus, Bl. Aust. Fisch. i. p. 130, lam. 142; Bl. Schn. p. 504.
T. hispidus, Lacep. i. p. 487, lam. 24, fig. 1; Richards. Voy. Samar. Fish. p. 17, lam. 9, figs. 3 & 4; Gthr. I. cit. 8, p. 297.
Tetraodon perspicillaris, Rüpp. Atl. Fische, p. 63.
T. semistriatus, Rüpp. N. W. Fische. p. 58, lam. 16, fig. 3.
T. implusus, Genys, Voy. Beagle, Fish. p. 152.
T. stellatus, Eyd. & Soul. Voy. Bonite, Poiss. p. 212, lam. 10, fig. 2. (no Lacep.).
T. laterna, Richards. Voy. Sulphur, Zool. p. 124, lam. 61, fig. 2, et Ichth. Chin. p. 199; Bleek Verh. Bat. Gen. xxiv. Blootk.

p. 23, ♂ *Nat. Tyds. Ned. Ind.* iii. p. 209; *Günth. Fisch. Zanz.* p. 131.

Crayracion implusus, Bleek. *Atl. Ichth. Gymnod.* p. 71.
T. laterna, Bleek. *I. c. lam.* i. fig. 3.
Hab. Luzón, Sta. Cruz, Cavite, Samar; Amboina.

17. **T. meleagris**, *La sp.*

Tetrodon meleagris, Lacep. i. pp. 476, 505; *Bl. Scha.* p. 507.
Richards Voy. Sulphur. Fish. p. 122, lam. 57, figs. 1-3; *Gthr. loc. cit.* 8. p. 299.

? *Tetrodon lacrymatus*, (*Cuv.*) Quoy & Gaim. *Voy. Uran. Poiss.* p. 204.
Hab. Marianas.

18. **T. fluviatilis**, *Ham.* N. v.

(M. S. T.)

Tetrodon fluviatilis, Ham. *Buch. Fish. Gang.* p. 6, lam. 30, fig. 1; *Gthr. I. cit.* 8. p. 299.

T. nigroviridis, *Proce Bull. Philom.* 1822, p. 130.

T. simulans, *Cantor. Mal. Fish.* p. 374.

T. potamophilus, Bleek. *Verh. Bat. Gen.* xxii. *Madura*, p. 16, or xxiv. *Blootk.* p. 17.

Arothron dorsovittatus, Blyth, *Journ. As. Soc. Beng.* xxix. 1861, p. 173.

Crayracion fluviatilis, Bleek. *Atl. Ichth. Gymnod.* p. 68, lam. 6, fig. 4; Day, *Fish. Malab.* p. 256.

Hab. Luzón, Manila, Laguna de Bay; Ceilan.

19. **T. papua**, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Valent. Amb. p. 353, fig. 21, et p. 412, fig. 498; *Ruysch. Amb.* p. 9, lam. 5, fig. 10; *Renard*, i. lam. 39, fig. 200, ii. lam. 25, fig. 124.

Tetraodon margaritatus, (*no Rüpp.*) Bleek. *Ver. Bat. Gen.* xxiv. *Blootk.* p. 25, *o Nat. Tyds. Ned. Ind.* iii. p. 302.

T. papua, Bleek. *Journ. Ind. Arch.* ii. p. 638, et *Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Blootk.* p. 13; *Gthr. I. cit.* 8. p. 301.

Tropidichthys margaritatus, Bleek. *Nat. Tyds. Ned. Ind.* vi. p. 500.
Canthogaster margaritatus, Bleek. *Atl. Ichth. Gymnod.* p. 81.

Psilonotus margaritatus, Bleek. *I. c. lam.* 9. fig. 4.

Hab. Luzón, B. de Manila, Cebú; Amboina.

20. **T. striolatus**, Quoy & Gaim. N. v.

(M. S. T.)

Vatentyn, p. 422, fig. 249; *Renard*, i. lam. 25, fig. 138.

Tetraodon striolatus, Quoy & Gaim. *Voy. Uran. Zool.* p. 203; *Gthr. I. cit.* 3. p. 304.

T. compressus, *Proce. Bull. Soc. Philom.* 1822, p. 130.

Tropidichthys striolatus, Bleek. *Nat. Tyds. Ned. Ind.* vi. p. 503.

Psilonotus striolatus, Bleek. *Atl. Ichth. Gymnod.* lam. 9. fig. 6.

Canthogaster striolatus, Bleek. *I. c. p.* 82.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Amboina.

*

3. Gén. DIODON, Gthr.

21. D. *hystrix* Lin. N. v. Ganotan.

(M. S. T.)

- Histrix piscis*, *Clusius*, *Exot*, vi. c. 23; *Jonston*, *Hist. Nat. Pisc.* lam. 45, fig. 4; *Willughby*, *Hist. Pisc.* lam. p. 5.
Reversus indicus, *Aldrov*, *Pisc.* iii. p. 113, lam. 15, fig. 12; *Jonston*, *I. c.* lam. 3, fig. 1.
Valeut, *Amb.* p. 458, fig. 357; *Renard*, i. p. 9, lam. 5, fig. 32.
Ostracion, sp., *Artefi*, *Gen.* p. 60, n.^o 19; *Synon.* p. 86, n.^o 21; *Gronov*, *Mus.* ii. p. 40 n.^o 181, et *Zoophil*, p. 47, n.^o 181.
Seba, iii. p. 58, lam. 23, figs. 1 & 2, et p. 62, lam. 24, fig. 10.
Crayracion, sp., *Klein*, *Pisc. Miss.* iii. p. 20, nos. 13 & 14.
Erizo, *Parra*; p. 60, lam. 29, fig. 1.
Diodon *hystrix*, *L. Syst. Nat.* i. p. 413; *Bris*, *Barnev.* *Rev. Zool.* 1846, p. 141; *Gthr.* I. cit. 8. p. 306; *Wood*, *Nat. Hist.* 3. p. 337, fig.
D. *atinga*, *Bl.* lam. 125; *Schn.* p. 511; *Lacep.* ii. pp. 1 & 3; 1. lam. 25, fig. 3; *Kaup*, *Wiegm. Arch.* 1855, p. 227 (*no L.*)
D. *plumieri*, *Lacep.* ii. pp. 2 & 10, i. lam. 3, fig. 3.
D. *brachiatus*, *Bl.* *Schn.* p. 513.
D. *punctatus*, *Cuv.* I. c. p. 132; *Bleek.* *Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Blootk.* p. 19.
Holocanthus hystrix, *Gronov.* *Syst. ed. Gray*, p. 27.
Paradiodon *hystrix*, *Bleek.* *Att. Ichth. Gymnod.* p. 56, lam. 3 fig. 1.
Hab. Luzón, B. de Manila; Océano Indico.

22. D. *maculatus*, (*Gthr.*) N. v.

(M. S. T.)

- Diodon *tacheté*, *Lacep.* ii. p. 13.
D. *novemmaculatus*, *Cuv.* I. c. p. 136, c. fig.; *Bleek.* *Nat. Tyds. Ned. Ind.* iii. p. 567.
D. *sexmaculatus*, *Cuv.* I. c. p. 136, c. fig.; *Kaup*, I. c. p. 229.
D. *multimaculatus*, *Cuv.* I. c. p. 136, c. fig; *Kaup*, I. c. p. 227.
D. *quadrimaculatus*, *Cuv.* I. c. p. 137, c. fig.; *Bleek.* *Act. Soc. Sc. Indo-Neerl.* ii. *Amboina*, viii. p. 94.
D. *spinosissimus*, *Kaup*, I. c. p. 228 (*no Cuv.*).
Paradiodon *novemmaculatus*, *Bleek.* *Att. Ichth. Gymnod.* p. 57, lam. 2, fig. 3.
P. *quadrimaculatus*, *Bleek.* I. c. p. 58, lam. 8, fig. 2.
Diodon *maculatus*, *Gthr.* I. cit. 8. p. 307.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

4. Gén. CHILOMYCTERUS, Gthr.

23. Ch. *orbicularis*, Bl. N. v.

- Diodon *orbicularis*, *Bl.* lam. 127; *Lacep.* ii. p. 16; *Bennett*, *Whaling. Voy.* ii. p. 264; *Barnevile*, *Rev. Zool.* 1846, p. 141; *Bleek.* *Nat. Tyds. Ned. Ind.* v. p. 92, o *Act. Soc. Sc. Indo-Neerl.* ii. *Amboina*, viii. p. o *Att. Ichthyol. Gymnod.* p. 55, lam. 1, fig. 4
D. *cæruleus*, *Quoy & Gaim.* *Zoot. Uran Poiss.* p. 201, lam. 65, fig. 5.

D. triedricus, *Cant. Mal. Fish.*, p. 371 (*no Cuv.*)
Chilomycterus orbicularis, *Gthr. loc. cit.* 8, p. 312.
Hab. Luzón, Paragua; Océano Indico.

Orden: CONDROSTEOS.

Fam. ACIPENSÉRIDOS.

1. Gén. ACIPENSER, ARTEDE

1. *A. sinensis*, Gray N. v. (M. S. T.)
Acipenser sinensis, *Gray, Ill. Ind. Zool. c.* fig., & *Proc. Zool. Soc.* 1834, p. 122. *Gthr. l. cit.* 8, p. 338.
??Acipenser mantschuricus, *Basil. Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc.* x. 1855, p. 259.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

Orden: PLAGIÓSTOMOS.

Fam. 1. CARCÁRIDOS.

1. Gén. CARCHARIAS, CUV.

1. *C. laticaudus*, Müll N. v. Pating. (M. S. T.)
Carcharias (Scoliodon) laticaudus, Müll. & Henle, p. 28, lam. 8;
Dumeril, Elasmobr. p. 343; *Gthr. l. cit.* 8, p. 358.
C. macrorhynchus, Bleek. *Verh. Bat. Gen* xxiv. *Plag.ost.* p. 31,
lam. 1, fig. 1; *Dumeril, l. c.*
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; China.

2. *C. acutus* Rüpp. N. v. Pating. (M. S. T.)

Carcharias acetus, Rüpp. N. W. *Fische*, p. 65, lam. 18, fig. 4;
Gthr. l. cit. 8, p. 358.
Squalus russellii, Gray, *Ill. Ind. Zool.*
C. charias (Scoliodon) acutus, Müll. & Henle, p. 29; *Cant. Mal. F.sh.* p. 399; Bleek. *Verh. Bat. Gen* xxiv. *Plag.* p. 30; *Dumeril, Elasmobr.* p. 345
Hab. Luzón, Manila; China.

3. *C. hemiodon* Müll. N. v. Pating 6 Tiburon Ijo. (M. S. T.)

Carcharias (Hypoprion) hemiodon, Müll. & Henle, p. 35, lam. 19,
fig. 2 *Dumeril, Elasmobr.* p. 351; *Gth. l. cit.* 8, p. 362.
Hypoprionodon hemiodon, Gill, *Ann. Syc. Nat. Hist. New. York*,
vii, p. 409.
Hab. Luzón, B. de Manila; Célebes.

4. *C. borneensis*, Bleek. N. v.

(M. S. T.)

Carcharias, (*Prienodon*) *borneensis*, Bleek. *Act. Soc. Sc. Indo Neerl.* v. *Borneo*, xii. p. 8; *Gthr. I. cit.* 8. p. 371.
Hab. Samar, Borongan; Borneo.

2. Gén. *GALEUS*, Cuv.

5. *G. canis*, Rondel. N. v.

(M. S. T.)

Galeus canis, Rondel. *De Pisc.* p. 377.
Canis galeus; *Salvian*, p. 130, fig. 41; *Willughby*, *Hist. Pisc.* p. 51 lam. B 6, fig. 1.
Squalus sp., *Arteði*, *Gen.* p. 68, n.^o 9; *Synon.* p. 97.
S. galeus, *L. Syst. Nat.* i. p. 319; *Brünn. Pisc. Massil.* p. 9;
Bl. p. 118; *Bl. Schn.* p. 128; *Risso. Ichth. Nice*, p. 32; *Turt. Brit. Faun.* p. 112; *Genyns. Man.* p. 501; *Nilss. Skand. Faun. Fisk.* p. 714; *Couch. Fish. Brit. Isl.* i. p. 45, lam. 9.
Milandre, Duham. Pesch. ii. pl. 22, figs. 1 & 2; *Lacép.* i. p. 237.
Tope, Penn. Brit. Pool. iii. p. 98, ó edit. 1812, iii. p. 146
(no lam. 18).
Carcharias galeus, *Risso. Eur. Mérid.* iii. p. 121.
Galeus vulgaris, *Flem. Brit. An.* p. 165; *Farrell, Brit. Fish.* 2nd. edit. ii. p. 509 o 3rd. edit. ii. p. 491; *Parnell, Wren. Mem.* vii. p. 414; *Kröyer. Danm. Fisk.* iii. p. 834.
G. canis, *Bonap. Faun. Ital. Pesc.* Müll. & Henle. p. 57; *Gaimard, Voy. Isl. et Groent. Poiss.* lam. 21, *Wright & Ekstr. Skand. Fisk.* p. 185, lam. 45; *Dumeril, Elasmobr.* p. 390; *Bogage & Capello. Peix. Plagiost.* p. 18; *Gtr. I. cit.* 8, p. 379.
G. communis, *Owen. Osteol. Catl.* i. p. 92.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Océano Indico.

3. Gén. *ZYGENA*, Cuv.

6. *Z. malleus*, Shaw. N. v.

(M. S. T.)

Libella, *Bellon. de Aquat.* p. 61; *Salvian*, p. 128, lam. 40; *Aldrov.* p. 408; *Jonston*, lam. 7, fig. 8; *Willughby*, lam. B 1.
Zygæna, *Rondel.* p. 389; *Gesner. De Aquat.* p. 1050.
Squalus, sp., *Arteði*, *Gen.* p. 44, n.^o 7; *Synon.* p. 96, n.^o 7;
Gronov. Mus. Ichth. i. pp. 63, 139; *Zooohyl.* p. 146.
Zygæne, *Dutertre. Hist. Nat.* ii. p. 207; *Duhamel. Pesches.* ii. sect. ix. pl. 21, figs. 3-8.
Squalus zygæna, *L. Syst. Nat.* p. 399; *Bl. lam.* 117; *Bl. Schn.* p. 131; *Lacép.* i. p. 257; *Brünn. Pisc. Mass.* p. 4; *Forsk. Descript. Anim.* p. xvii; *Milch. Trans. List. & Phil. Soc. New. York*, i. p. 284; *Gronov. Syst. ed. Gray*, p. 6.
Cestracion, sp. n.^o 1, *Klein. Pisc. MSS.* iii. p. 13
Cornuda, *Parva*, lam. 32.
Koma sorra, *Russell*, lam. 12.
Squalus malleus, *Risso. Ichth. Nice*, p. 34.
Zygæna malleus, *Shaw. Nat. Misc.* lam. 267; *Val. Mem. Mus.* ix. 1832, p. 223, lam. 11, fig. 1; *Risso. Eur. Mérid.* iii. p. 125;

- Cant. Quart. Med. Jour. Calcutta, 1837, fig. 1; Schleg. Faun. Japon. Poiss. p. 306, lam. 138; Jenyns, Man. p. 507; Yarrell, Brit. Fisch. 2nd edit. ii. p. 504. o 3rd edit. ii. p. 486; DeKay, New. York Faun. Fish. p. 362; lam. 68. fig. 804; Storer, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. i. p. 36; Bleek Verh. Bat. Gen. xxiv. Plag. p. 48, lam. 3. fig. 8; Couch, Fish. Brit. Isl. i. p. 70, lam. 16.
Z. lewini, Griff. An. Kingdom, x. p. 640, lam. 50.
Sphyraena zygæna, Müll. & Henle, p. 51; Bonap. Faun. Ital. Pisces; Cant. Fish. Brit. Isl. i. p. 70 lam. 16.
Cestracion zygæna, Gill. Ann. Lyc. Nat. Hist. New. York, vii. p. 493; Duméril, Elasmobr. p. 382; Day, Fish. Malab. p. 270.
C. leeuwenii, Duméril, l. c. p. 383.
Hab. Luzón, B. de Manila, Laguna de Bay; China.

7. **Z. tiburo**, Valenc. N. v.

(M. S. T.)

- Tiburonis species minor, Pison. Hist. Nat. Bras. 181; Willughby, p. 55, lam. B 9. n.^o 3.
Cestracion, n.^o 2, Kleiu, Miss. iii. p. 13, lam. 2. figs. 3 & 4.
Squalus tiburo, L. Syst. p. 399; Bl. Sch. p. 131; Gronov. Syst. ed. Gray, p. 6.
Hear-headed Shark, Shaw, Gen. Zool. v. 2. p. 355, lam. 154, et Nat. Misc. lam. 229.
Sphyraena tiburo, Müll & Henle, p. 53; Gthr. l. cit. 8. p. 382.
Zygæna tiburo, Valenc. Mem. Mus. ix. p. 226, lam. 12. fig. 2.
?Z. subarcuata, Storer, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 1848, p. 70.
Cestracion tiburo, Duméril, Elasmobr.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

4. Gén. TRILENODON, GTHR.

8. **T. obesus**, Rüpp. N. v.

(M. S. T.)

- Carcharias obesus, Rüpp. N. W. Fish. p. 64, lam. 18. fig. 2.
Trienodon obesus, Müll. & Henle; p. 55, lam. 20; Dumeril, Elasmobr. p. 386; Gthr. l. cit. 8. p. 383.
Hab. Luzón, B. de Manila; Océano Índico.

Fam. RINODÓNTIDOS.

1. Gén. RINODON, SMITH.

1. **Rh. typicus**, Smith. N. v.

(M. S. T.)

- Smith, Ill. Zoot. S. Afr. Fish. lam. 26; Müll. & Henle, p. 77, lam. 35. fig. 2 Duméril, Elasmobr. p. 428; Gthr. l. cit. 8. p. 306.
Hab. Luzon, Manila; Seychelles.

Fam. ESCILIDOS.

I Gén. SCYLLIUM, M. ET H

1. **Sey. marmoratum.**, Benn. N. v. (M. S. T.)

Scylium marmoratum, Benn. *Life of Raffles*, p. 693; *Gthr. I. cit. 8.* p. 400.

Sey. maculatum, Gray, *Ind. Zool.*; *Richards Ichth. Chin.* p. 193; Müller & Henle, p. 5, lam. 7; *Cant. Mal. Fish.* p. 391; Bleek. *Verh. Bat. Gen. xxiv. Plag. ost.* p. 16; Duméril, *Elasmobr.* p. 319 (*suo Bl. Schn.*)

Hab. Luzón, Manila; Sumatra.

2. **Sey. maculatum.**, (Bl. Schn.) N. v. (M. S. T.)

Squalus maculatus, Bl. Schn. p. 130 (*no auct.*)
S. cuvier, *Peron & Les. Journ. Ac. Nat. Sc. Phil.* ii. p. 351.

Scyllium maculatum, *Gthr. I. cit. 8.* p. 401.

Hab. Luzón, Cavite; Australia.

3. **Sey. bürgeri.**, Müller, N. v. (M. S. T.)

Scylium bürgeri, Müller. & Henl., p. 8, lam. 2; Schleg. *Faun. Japon. Poiss.* p. 301; Bleek. *Act. Soc. Sc. Ind.-Neerl.* i. *Amboyna*, p. 69.

Halaelurus burgeri, Gill, *Ann. Syc. Nat. Fist. New York.* vii. p. 414.

Scylium bürgeri, *Gthr. I. cit. 8.* p. 404.

Hab. Luzón, Currimao, Ilocos; Amboina.

2. Gén. STEGOSTOMA, M. ET H

4. **E. tigrinum.**, (Gm.)

Seba, iii. p. 105, lam. 34, fig. 1.

Squalus, sp., Gronov. *Mus. Ichth.* i. p. 62, et *Zoophyl.* p. 31. n.º 147.

Squalus tigrinus, Gm. L. i. p. 249; *Forst. Zool. Int.* p. 24, lam. 13, fig. 2.

S. longicaudus, Gm. L. i. p. 1496.

S. fasciatus, Bl. lam. 113; Bl. Schn. p. 130.

Zebra shark, Shaw, *Nat. Misc.* lam. 434.

Polloc makun, Russell, *Fish. Coron.* i. lam. 18.

Scylium heptagonum, Rüpp. N. W. *Fisch.* p. 61, lam. 17, fig. 1.

Stegostoma fasciatum, Müller & Henle, p. 25, lam. 17; *Cant. Mal. Fish.* p. 396; Bleek. *Verh. Bat. Gen. xxiv. Plag.* p. 23; Duméril, *Elasmobr.* p. 336; Günth. in *Fish. Zanz.* p. 140.

St. tigrinum, *Gthr. loc. cit. 8.* p. 409.

St. carinatum, Blyth. *Journ. As. Soc. Beng.* xvi. 1847, p. 725, lam. 25 b. fig. 1.

Squalus cirrosus, *Gronov. Syst. ed. Gray.* p. 6.
Hab. Paragua, P. Príncipe; Ceilan.

3 Gén. CHILOSCYLLIUM, M. ET H.

5 Ch indicum (*Gm.*) N. v.

(M. S. T.)

Squalus, sp., *Gronov. Mus. Ichth.* i. p. n.^o 133; *Zoophyl.* n.^o 150.
Squalus indicus, *Gm. L.* i. p. 1503; *Bl. Schn.* p. 137.
Squalus dentelé, *Lacép.* i. p. 281, lam. 11, fig. 1.
Squidus gronovianus, *Lacép.* i. p. 280.
Sq. tuberculatus, *Bl. Schn.* p. 137.
Russell, p. 10, lam. 16 (*Bokee Sorrah et Ra Sorrah*).
Scyllium plagiosum, *Bennett, Life of Raffles* p. 694.
Sc. ornatum, *Gray, Ill. Ind. Zool.* c. fig.
Chiloscyllium plagiosum, *Müller. & Henle*, p. 17; *Cant. Mal. Fisch.* p. 352; *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Plagiost.* p. 17;
Dumeril Elasmobr. p. 328; *Duy. Fish. Malabar.* p. 267.
Ch. indicum, *Gthr. l. cit.* 8. p. 411.
Ch. griseum, *Müll. & Henle*, p. 19, lam. 4 (*no buena*).
Ch tuberculatum, *Müll. & Henle*, p. 19; *Bleek. l. c.* p. 20; *Dumeril, l. c.* p. 331; *Kner, Novara, Fisch.* pp. 412, 413.
Squalus caudatus, *Gronov. Syst. ed. Gray.* p. 8.
Scyllum hasseltii, *Bleek. l. c.* p. 19.
Sc. phymatodes, *Bleek. l. c.* p. 21; *Dumeril. l. c.* p. 331.
Hemicellum malayanum, *Bleek. Nat. Tyds. Ned. Ind.* vii. p. 376
(*no Less.*)
Chiloscyllium margaritiferum, *Bleek. Ned. Tyds. Dierk.* i. p. 243;
Dumeril. l. c. p. 329 (*joven*).
Synchismus tuberculatus, *Gill, Ann. Soc. Nat. Hist. New. York,*
1861, l. 408.
Hab. Luzón, Sta. Cruz, Cavite; China.

Fam. RHINOS.

1 Gén. RHINA, KLEIN

1. Rh squatina Dumeril, N. v.

(M. S. T.)

Pivn, *Aristot. Hist. An.* ii. c. 15; v. c. 5, 10, 11; ix. c. 37.
Squatina, *Bellon De Aquat.* p. 78; *Rouatl.* p. 367; *Gesner, De Aquat.* p. 899; *Aldrov.* p. 472; *Salvian.* p. 152, fig. 53; *Willughby.* p. 79, lam. D. 3; *Jonston.* p. 23, lam. 11, fig. 7.
Squalus, sp., *Artedi, Synt.* p. 95 n.^o 6; *Gm.* p. 67. n.^o 6;
Gronov. Zoophyl. p. 151.
Rhina, Klein, *Pisc. Miss.* iii. p. 14. sp. 1, lam. 2: figs. 5 & 6.
Angel-fish, *Borlase Cornwall.* p. 265, lam. 26, fig. 5; *Pennant, Brit. Zool.* iii. p. 74, lam. 12, o edit. 1812, iii. p. 130, lam. 15.
Squalus squatina, L. *Syst. Nat.* i. p. 394; *Bräun. Ichth. Miss.* p. 5; *Bl. Aust. Fisch.* i. p. 25, lam. 116; *Bl. Schn.* p. 137;
Donov. Brit. Fish. i. pl. 17; *Turton, Fauna.* p. 114.
Angelo, *Cornide. Pec. Galie.* p. 129.
Squatina, *Duhamel, Pesch.* ix. lam. 14, figs. 1-4.

- Squalo ange, *Lacep.* i. p. 293, lam. 12, fig. 2.
Angel-shark, *Shaw*, *Nat. Hist. Msc.* xxi, lam. 90b.
Squatina levis, *Cuv. Regne Anim.*
Sq. aculeata, *Cuv. Regne Anim.*
Sq. vulgaris, *Risso, Ichth. Nce.* p. 45; *Fleming, Brit. An.* p. 169; *Müll. & Henle Plagiost.* p. 99, lam. 35, fig. 4; *Kröv. Danm. Fisk.* iii. p. 935; *Schlgl. Journ. Japon. Pisc.* p. 305, lam. 136.
Sq. angelus, *Dumeril, Zool. Anil.* p. 102; *Blainv. Journ. Jr.* p. 53, lam. 13, figs. 1 & 2; *Risso, Eur. Merid.* iii. p. 139; *Jenyns, Manual*, p. 507; *Bonap. Faun. Ital. Pesc.*; *Yarrell, Brit. Fsh.* 2nd. edit. ii. p. 539, o 3rd. edit. ii. p. 536; *Parnell, Werner. Mem.* vii. p. 421; *Gronov. Syst. ed Gray*, p. 14.
Squatina lewis, *Couch, Linn. Trans.* xiv. p. 98; *Jenyns, Manual*, p. 508.
S. dumerili, *Lesueur, Journ. Ac. Nat. Sc. Philad.* i. p. 225, lam. 10; *Dekay, New-York, Faun. Fish.* p. 363, lam. 62 fig. 203; *Leidy, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad.* 1847, p. 247.
S. timbriata, *Müll. & Henle*, pp. 101, 192, lam. 35.
S. oculata, *Bonap. Faun. Ital. Pesc.*
S. japonica, *Bleek Act. Soc. Sc. Indo-Neerl.* iii. *Japan*, iv. p. 40.
Monk-fish, *Couch, Fish. Brit. Isl.* i. p. 37, lam. 17.
Rhina squatina, *Duméril, Elasmobr.* p. 464; *Gthr. l. cit.* 8, p. 430.
R. aculeata, *Dumeril, l. c.* p. 465.
R. dumerili, *Duméril, l. c.* p. 467.
R. californica, *Ayres, Proc. Calif. Ac. Nat. Sc. Philad.* 1859, p. 29, 1860, fig. 7.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Japon.

Suborden. BATOIDEOS.

Fam. PRISTIDOS.

1. Gen. PRISTIS, LATH.

1 *P. pectinatus*, *Latham N. v.* (M. S. T.)

- Pristes pectinatus*, *Latham, Trans. Linn. Soc.* 1794, ii. p. 278, lam. 26, fig. 2; *Bl. Sehn.* p. 351, lam. 70, fig. 1; *Risso, Ichth. Nce.* p. 22; *et Eur. Merid.* iii. p. 141; *Blainv. Faun. Fr.* p. 51; *Müll. & Henle*, p. 109; *Blyth, Journ. As. Soc. Beng.* 1800, xxix. p. 36; *Owen, Odontogr.* lam. 8, fig. 1; *Dumeril, Elasmobr.* p. 475; *Gthr. l. cit.* 8, p. 437.
Squalus scie, *Lacep.* i. p. 286, lam. 8.
Pristes megalodon, *Duméril, Elasmobr.* p. 476, lam. 9, fig. 4.
P. acutirostris, *Duméril, l. c.* p. 479.
P. ocea, *Duméril, l. c.* p. 479.
P. leptodon, *Dumeril, l. c.* p. 480.
P. brevirostris, *Duméril, l. c.* p. 480.
Hab. Luzón, B. de Manila, Laguna de Bay.

Fam. RINOBATIDOS.

1. Gen. RHYNCHOBATUS, Gthr.

1. Rh. aencylostomus, Bl. Schn. N. v. (M. S. T.)

L'Endormie (Seychelles).

- Rhina aencylostomus, Bl. Schn. p. 352, lam. 72; Gray, Ill. Ind. Zool.; Agass. Poiss. Foss. iii. p. 82, lam. H. figs. 3 y 4; Richards, Ichth. China, p. 195; Müll. & Henle, p. 110; Owen, Odontogr. lam. 23; Cantor, Mal. Fish. p. 409; Bleek. Verh. Bat. Gen. xxiv. Plag. p. 56.
Rhaaphobatis aencylostomus, Gill, Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York, 1861, vii. p. 408.
Rhynchobatus aencylostomus, Gthr. l. cit. 8, p. 440.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China.

2. Rh. djeddensis, Cant. N. v.

(M. S. T.)

- Rhinobatus, Duhamel, Pesches, ii. lam. 45, figs. 1 & 2.
Raja djeddensis, Forsk. Descr. Anim. p. 18.
Raie bokhat, Lacép. i. p. 139.
Raie rhinobate, Lacép. i. p. 145, lam. 6 fig. 3.
Rhinobatus levis, Bl. Schn. p. 354, lam. 71; Schleg. Faun. Jap. Poiss. p. 306, lam. 139.
R. djidensis; Fl. Schn. p. 356.
Walawah tenkee, Russell, i. p. 6, lam. 10.
Rhinobatus djeddensis, Rüpp. Att. Fisch. p. 54, lam. 14 fig. 1;
Benn. in Life of Raftles, p. 693; Gthr. l. cit. 8, p. 441.
R. duhameli, Blainv. Faun. Fr. p. 48.
Rhynchobatus levis, Müll. & Henle, p. 111; Bleek. Verh. Bat. Gen. xxiv. Plag. p. 58; Duméril, Elasmobr. p. 483.
R. djeddensis, Cant. Mal. Fish. p. 412; Day, Fish. Malab. p. 273.
Hab. Samar, Luzón, Sta. Cruz, Cavite; Sumatra.

2. Gén. RHINOBATUS, Gthr.

3. Rh. halavi, Rüpp. N. v.

(M. S. T.)

- Raja halavi, Forsk. Descr. An. p. 19.
Rhinobatus halavi, Rüpp. Att. Fisch. p. 55, lam. 14, fig. 2; Müll. & Henle, p. 120; Guichen. Explor. Alger. Poiss. p. 129; Duméril, Elasmobr. p. 406; Gthr. l. cit. 8, p. 442.
Hab. Luzón, La Unión; China.

4. Rh. schlegelii (M et H) N. v.

(M. S. T.)

- Rhinobatus schlegelii, Müll. & Henle, p. 123, lam. 42; Richards. Ichth. China, p. 195; Schleg. Faun. Japón. Poiss. p. 207; Bleek. Act. Soc. Sc. Indo-Neerl. iii. Japan, iv. p. 41; Gthr. loc. c. 8, p. 445.

Rh. hynnicephalus, *Richards. Ichth. Chin.* p. 195.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

Fam. TORPEDÍNIDOS.

1. Gén. TEMERA, GRAY.

1. **T. hardwickii**, Gray.

Gray, *t. c., et III. Ind. Zool. c. fig.*; Müll. & Henle, p. 131,
lam. 59, fig. 2; *Cant. Mat. Fish.* p. 420, lam. 12; Bleek. Nat.
Tyds. Ned. Ind. xx, p. 451; *Gthr. loc. cit. 8.* p. 455.
Hab. Filipinas; Indias Orientales.

Fam. RÁYIDOS.

1. Gén. RAJA, uv.

1. **R. kenojei**, M. et H. N. v. Pagui.

(M. S. T.)

Müll. & Henle, p. 149, lam. 47 (no buena); *Richards. Ichth. Chin.*
p. 197; Schleg. *Faun. Japon. Poiss.* p. 308; Bleek. *Act. Soc.
Se. Indo-Neerl. ii. Japan.* iv, p. 42 (part.), et viii. *Japan.* vi.
p. 65; Dumeril, *Elasmobr.* p. 550; *Gthr. l. cit. 8.* p. 461.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa,

2. Gén. PLATYRHINA, M. ET H.

2. **Pl. sinensis**, Müll. N. v.

(M. S. T.)

Raja chinensis, Lacép. i, pp. 34, 157, lam. 2, fig. 2.
Rhina sinensis, Bl. Schr. p. 352.
Platyrhina sinensis, Müll. & Henle, p. 125, lam. 43; Dumeril,
Elasmobr. p. 576; *Gthr. l. cit. 8.* p. 471.
Hab. Luzon, Cavite, Sta. Cruz; China.

Fam. TRIGÓNIDOS.

1. TRYGON, ADAUSSON.

1. **T. gerrardi**, Gray. N. v.

(M. S. T.)

Trygon gerrardi, Gray, *Chondropt.* p. 116; *Gthr. l. cit. 8.* p. 474.
T. macrurus, Bleek. *Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Plag.* p. 74; *o. Nat.
Tyds. Ned. Ind.* iii, p. 607.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Japon.

2. **T. bennetii**, M. et H. N. v.

(M. S. T.)

Trygon bennetii, Müll. & Henle, p. 160, lam. 52; Dumeril, *Elas-
mobr.* p. 595; *Gthr. l. cit. 8.* p. 480.

T. Barna, *Richards, Ichth. Chin.* p. 167.
Hab. Luzón, Manila; China.

2. Gén. PTEROPLATEA, M. ET IL

3. Pt. hirundo, Lowe, N. v. (M. S. T.)

Pteroplatea hirundo, *Lowe, Proc. Zool. Soc.* 1842, p. 94; *Gthr.*
I. cit. 8. p. 487.
P. japonica, *Schleg. Faun. Japon. Poiss.* p. 309, lam. 141; *Bleek.*
Act. Soc. Sc. Indo-Néerl. ii. *Japan*, iv. p. 45.
Pt. marmorata, *Cooper, Proc. Calif. Acad. Nat. Sc.* iii. p. 112,
fig. 25.
Hab. Luzón, Manila; China.

Fam. MILIOBÁTIDOS.

1. Gén. MYLIOBATIS, Cuv.

1. M. nieuhofii Cuv. N. v. (M. S. T.)

Zee-vleermuis, *Nienhys, Lant en Zee-Reize*, ii. p. 278, fig.;
Willughby, App. p. 6, lam. 10, fig. 3; *Russell, Fish. Corom.*
lam. 10.
Raja nieuhofii, *Bl. Schn.* p. 364.
R. fasciata, *Shaw, Gen. Zool.* v. 2. p. 286, lam. 143.
Myliobatis nieuhofii, *Cuv. Regne. An.*; *Müll. & Henle* p. 177;
Cantor, Mal. Fish. p. 432; *Bleek. Verh. Bat. Gen.* xxiv. *Plag.*
p. 85; *Dumeril, Elasmobr.* p. 638; *Gthr. I. cit. 8* p.
Hab. Luzón, Cavite; Océano Indico.

2. M. milvus, Müll. N. v. (M. S. T.)

Myliobatis milvus, *Müll. & Henle*, p. 178; *Bleek. Verh. Bat. Gen.*
xxiv. *Plag.* p. 87; *Dumeril, Elasm br.* p. 638.
M. vultur, *Müll. & Henle*, p. 179; *Dumeril, I. c.* p. 640.
M. oculatus, *Richards, Ichth. Chin.* p. 198.
Hab. Luzón, Manila; China.



APÉNDICE.

- Pag. 2. 9. *M. philippinensis*, *Günther*, *P. Z. S.* 1879, p. 74.
Pag. 4. *N. tardigradus*, *Everet. Mamm. of the Bornean Islands*,
1893 p. 494.
Hab. Bongao, Tawi-tawi.
- Pag. 4. *T. spectrum*, *Everett. P. Z. S.* 1893, p. 494.
Pag. 16. *G. philippinensis*, *Gthr. P. Z. S.* 1879, p. 74.
Hab.... Basilan.
- Pag. 17. *T. javanica*, *Everett P. Z. S.* 1893, p. 495.
Pag. 21. 14. *Sciurus nigripes*, *Thos; Everett. P. Z.* 1893,
p. 495.
Hab. Paragua.
- Pag. 15. *Sciurus mindanensis*, *Steere List B. et M. Steere Exped.* 1890, p. 29; *Sc. caggisi Meyer*.
Hab. Mindanao, Basilan.
- Pag. 16. *Sc. coccinus*, *Thomas. Ann. et Mag. Nat. H.* (6) vol. 11, p. 407 (1888); *Sc. philippinensis*, *Steere List B. et M. Steere Exped.* p. 59.
Hab.... Mindanao, Basilan.
- Pag. 17. *Sc. samarensis*, *Steere, List B. et M. Steere Exped.* p. 30.
- Pag. 24. *A. pumilla*, *Everett. P. Z. S.* 1893, p. 495.
Hab.... Calamianes, Culion.
- Pag. 25. *M. marchei*, *Hent. esp. 2.: Everet. P. Z. S.* 1893,
p. 495.
Hab.... Calamianes.
- Pag. 27. *A. binturong*, *Raffl: Everret. P. Z. S.* 1879, p. 75.
Hab.... Mindoro, Panay, Negros, Mindanao, Basilan, Paragua.
- Pag. 28. *V. tangalunga*, *Gray: Everet. P. Z. S.* 1863, p. 495.
Hab.... Siquijor, Panay, Mindoro, Calamianes, Paragua; Min-
danao.
- Pag. 31 linea 3; *Blanford. P. Z. S.* 1887, p. 631.
Hab.... Cebú, Toledo.
- Pag. 33. linea 1.^a *B. mindorensis*, *Heude: Nehring Sitzungsbericht. der. Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin.* n.^o 6, 1890, p. 101; *Probubalus mindorensis*, *Steere, List B. et M. Steere Exped.*
- Pag. 37. *S. celebensis*, var. *philippinensis*, *Nehring*.
Hab. Luzón, Mindoro, Baco, Sibulan, Masbate, Panay, Ne-
gros, Samar, Borongan, Mindanao, Basilan, Joló, Tawi-tawi.
- Pag. 8. *S. ahaenobarbus*, *Hent: Everett. P. Z. S.* 1893, p. 596.
Hab. Paragua. Calamianes.

Pag. 52. Fam. NESTÓRIDAS.

Gén. NESTOR.

N productus, Gould ♂ N v

(M. S. T.)

Wilson's parakeet, *Lath. Gen. Hist.* ii. p. 170 (1822).
Plyctolophus productus, *Gould, P. Z. S.* 1836, p. 19.
Nestor productus, *Gould, Syn. Austr. B. et adj. Isl.* pt. i. lam.—f. 1 (133—?); *Burjot, Perr. Lam.* 59 (1837-38); *Gould, B. Austr.* v. lam. 6 (part. v., 1841); *G. R. Gr. Gen. B.* ii. p. 426, n.^o 2 (1845); *Rchnb. Vtg. Nauh.:l.* n.^o 187 (1850); *Bp. Crisp.* i. p. 8 (1850); *Rchnb. Journ. f. Orn.* 1853, p. 10; *Bp. Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 155, n.^o 252; *Schwané, Rev. et M. t. Zool.* 1855, p. 224; *Selat. Pr. Linn. Soc.* 1858, p. 132; *G. R. Gr. Lst. Psitt. Brit. Mus.* p. 100 (1859); *Selat. Journ. Orn.* 1860, p. 34; *Pelz. Verh. k. Ak. Wissensch. Wien.* xli. pp. 322-325, la. 2.—f. 2, 3 +, 5 (1863); *Schleg. Journ. f. Orn.* 1861 p. 377; *G. R. Gr. Ibis.* 1852, p. 230 *Schleg. Dierent.* p. 84 (1864); *id. Mus. P.-B. Psitt.* p. 157 (1864); *Gould, Handb. B. Austr.* ii. p. 550 (1865); *Finsch. Journ. f. Orn.* 1867, p. 322; *Finsch. Papag.* ii. p. 888 (1868); *Natr. Ibis.* 1869, p. 323; *Selys-Longch. Ibis.* 1870, p. 450 (*Mus. de Florenciæ*); *G. R. Gr. Handb. t.* p. 150, n.^o 8258 (1870), *Ridley, P. Z. S.* 1874, p. 497; *Geb. Tes. Orn.* ii. p. 701 (1875); *Ibis.* 1877, p. 129 (spéc. in *Tarotti's Mus.*); *Rchnb. Vtgzbild.* t. xviii. f. 6 (1878-83); *id. Journ. f. Orn.* 1881, p. 21 (*Consp. Psitt.* p. 21); *Salvad. Ibis.* 1881, p. 609; *Salvad. Cat. Strickl. Coll.* p. 463 (1882); *id. Cat. B. M.* 20. 1894, p. 9; *Layard, Ibis.* 1884, p. 123; *Wagl. Bull. B. New. Zeal.* 2nd ed. i. p. 164 (1888); *Ibis.* 1888, p. 650; *Ramsay, Tab. List.* p. 38 (1888).
Centurus productus, *Bp. Naumannia.* 1856, *Consp. Psitt.* n.^o 265.
Hab. Filipinas?

Pag. 52. Cacatua hæmaturopygia

Cacatua minor, *Briss. Orn.* iv. p. 212, n.^o 11, lam. xxii. f. (1760).
Gerini, Orn. i. p. 96, t. 119; *Schleg. Dierent.* p. 81 (1864);
Psittacus humaturopygius, *Cass. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad.* 1864, p. 239, n.^o 51.
Red-vented cocktoo, *Brown, Ill.* p. 10, t. (1776); *Lath. Syn.* i. p. 258 (1781); *id. Gen. Hist.* ii. p. 204 (1822).
Psittacus philippinarum, *Lath. Ind. Orn.* i. p. 108, n.^o 79 (1790);
Bechst. Kurz. Uebers. p. 88 (1811); *Shaw, Gen. Zool.* viii. p. 481 (1811); *Kuhl, Consp. Psitt.* p. 85 (1820); *Dasm. Dic. Sc. Nat.* xxxix. p. 114 (1825); *Vogt, Cuv. Uebers.* p. 337 (1831); *Temm. Tabl. Méth.* p. 56 (1839).
Cacatua philippinarum, *Vieill. N. D.* xvii. p. 10 (1817); *id. Enc. Méth.* iii. p. 1413, lam. 227, f. 1 (1823); *Wagl. Mon. Britt.* p. 692 (1832); *Hartl. Syst. Verz. Gzs. Mus.* p. 88 (1844); *G. R. Gr. Gen. B.* ii. p. 425, n.^o 2 (1845); *Bp. Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 155, n.^o 255; *id. Naumannia.* 1855,

Consp. Psitt., n. 27; *Cass. U. St. Expl. Expl.*, p. 233 (1858); *G. R. Gr. List. Psitt.*, *Brit. Mus.*, p. 92 (1859); *Sclat. P. Z.*, *S.*, 1860, p. 225; *Schleg. Journ. Art. Magistra*, 1861, p. 183; *id. Journ. f. Orn.*, 1861, p. 378; *Sclat. P. Z. S.*, 1861, p. 234; 1864, p. 188; *Wald. P. Z. S.*, 1874, pp. 279, 293; *Schleg. Mus. P.-B. Psittaci*, p. 144 (1844); *id. Neth. Tijdschr. Dierk.*, iii, p. 319 (1855); *Mvt. Journ. f. Orn.*, 1855, p. 20; *Sclat. P. Z. S.*, 1857, p. 284; *Wald. & Layard, Ibis*, 1872, p. 96; *Schleg. Mus. P.-B. Psittaci Revue*, p. 67 (1874); *Grauw. P. Z. S.*, 1876, p. 692; 1877, p. 793; *Tweedt. Orn. Works*, p. 116 (1881); *Sclat. List. Vert. An.*, 8th. ed., p. 311 (1883); *id. P. Z. S.*, 1885, p. 251; *Tristr. Cat. Coll. B.*, p. 72 (1886); *Plyctolophus philippinum*, *Steph. Gen. Zool.*, xiv, p. 108 (1826); *Selby. Nat. Libr., Parrots*, p. 131 (1836); *Kakaoe philippinarum*, *Bourjot. Perr. lam.*, 81 (1827-38); *Eolophus philippinarum*, *Sauvage. Rev. et Mag. de Zool.*, 1856, p. 224; *Bd. Compt. R. n. t. xliv.*, p. 537 (1857); *Plicholophus philippinarum*, *Finsch. Papig.*, i, p. 310 (1861); *Gulliver. P. Z. S.*, 1875, p. 49; *Giebel. Thes. Orn.*, iii, p. 230 (1877); *Cacatua haematuropygia*, *G. R. Gr. Hand-list.*, ii, p. 160, n. 8384 (1870); *Wald. & Layard, Ibis*, 1872, p. 96; *Wald. Tr. Zool. Soc.*, ix, pp. 132, 250 (1875); *Sharpe. Tr. Linn. Soc.* (2) *Zool.*, i, p. 312 (1876); *Tweedt. P. Z. S.*, 1877, pp. 755, 756, 871, 1878, pp. 107, 281, 341, 379, 937; *Sharpe. P. Z. S.*, 1879, p. 313; *Tweedt. Orn. Works*, pp. 116, 299, 410, 521, 430, 542, 566, 587, 575, 602, 628 (1881); *Wardl. Rams. Tweedt. Orn. Works*, p. 655, n. 1 (1881); *Silvin. Cat. Strickl. Coll.*, p. 453, n. 2216 (1882); *Kutler. Journ. f. Orn.*, 1882, p. 176, 1883, p. 293; *Sharpe. Ibis*, 1884, p. 316; *Guille. P. Z. S.*, 1885, pp. 250, 251; *Sharpe. Ibis*, 1888, p. 192; *Blas. Ornary.*, p. 315 (1888); *Everett. Journ. St. Br. R. As. Soc.*, 1889, p. 176; *Whist. Ibis*, 1890, p. 41; *Steere. List.*, p. 5 (1890); *Sclat. Cat. B. M.*, 20, p. 130.

Camptolophus philippinarum, *Sundev. Meth. nat. Av. disp. Tenuit.*, p. 69 (1872).

Plissolophus philippinaram, *Rehwe. Journ. f. Orn.*, 1881, p. 25. (*Consp. Psitt.*, p. 25; *id. Vögelbild.*, lam. xxxii, f. 2 (1878-83). *Hab.*.... *C. damiana*, *Culion*, *Pantay*, *Tablas*, *Siquijor*, *Tawi-tawi*.

Pág. 53. *Tanygnathus luzonensis*.

Psittacus luzonensis, *Lath. Int. Orn.*, i, p. 120, n.º 161 (1790); *Psittacus minor*, *sive Psittacula luzonensis*, *Genin. Orn.*, ii, p. 21, t. 138 (1769).
Psittacus marginatus, *Gm. S. N.*, i, p. 324, n.º 71 (1788); *Lath. Int. Orn.*, i, p. 96, n.º 42 (1790); *Shaw. Gen. Zool.*, viii, (2) p. 422 (1811); *Brock. Lith. U. S.*, p. 73 (1812); *Vieill. N. D.*, xxv, p. 555 (1817); *Kuhl. Conspl. Psitt.*, p. 37 (1820); *Vieill. Encyclop. Méth.*, iii, p. 1389; *Lin. 213, t. 2* (1823); *Voigt. Curr. Ubers.*, p. 734 (1831); *Cass. Pr. Acad. Nat. Sc. Philad.*, 1864, p. 240. *Varied-wing'd parrot*, *Lath. Syn.*, i, p. 233 (1791); *id. Gen. Hist.* ii, p. 155 (1822).

- Lace-winged parrot, *Lath. Syn.* i. p. 244 (1781); *id. Gen. Hist.* ii. p. 157 (1822).
Manilla green parrot, *Lath. Syn.* i. p. 296 (1781); *id. Gen. Hist.* ii. p. 230 (1822).
Psittacus olivaceus, *Gm. S. N.* i. p. 326, n.^o 76 (1788) (ex Buffon); *Lath. Ind. Orn.* i. p. 97, n.^o 43. (1750); *Beschst. Kurze Ueb.* p. 73 (1812); *Vieill. Enc. Meth.* iii. p. 1383 (1823).
Arara marginata, *Less. Tr. d'Orn.* p. 187 (1831).
Tanygnathus marginatus, *Wagl. Mon. Psitt.* p. 678 (1832); *Bp. Conspl. Av.* i. p. 15 (1850); *id. Rev. et Mag. d' Zool.* 1854, p. 153, n.^o 156; *Souancé, Rev. et Mag. de Zool.* 1856, p. 209; *Bp. Naumannia*, 1856, *Cousp. Psitt.* n.^o 154; *Sclat. P. Z. S.* 1857, p. 225; *G. R. Gr. P. Z. S.* 1858, p. 195; *id. Cat. B. New. Guin.* p. 60 (1859); *Rosenb. Journ. f. Orn.* 1864, p. 115; *Sousa. Mus. Nac. Lisb. Psittaci*, p. 16 (1869); *Salvad. Orn. Pap. é Mol.* i. p. 135 (1880).
T. gala, *G. R. Gr. Gen. B.* ii. p. 420, n.^o 2 (1846).
T. maerorhynchos, part., *Blyth. Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 3 (1849).
T. pileatus, *Cass. Un. St. Expl. Exp., Birds*, p. 230 (1858).
T. luzoniensis, *G. R. Gr. List. Psitt. Brit. Mus.* p. 67 (1859); *Sclat. P. Z. S.* 1860, p. 225; *G. R. Gr. P. Z. S.* 1861, *Finsch.*, *Ned. Tijdschr. Dierk. i. Berigt.* p. xviii. (1863); *Wall. P. Z. S.* 1864, pp. 285, 294; *G. B. Gr. Hand-list*, ii. p. 158 n.^o 8247 (1870); *Sund. Meth. nat. Av. disp. Tent.* p. 69 (1872); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, pp. 436, 588; *Sharpe. P. Z. S.* 1879, p. 133; *Tweedd. Voy. Chall. Birds*, p. 9 (1881); *Kutter. Journ. f. Orn.* 1882, p. 176; 1883, p. 294; *Blass. Ornis*, iv. pp. 305, 559 (1888); *Tristr. Cat. Coll. B.* p. 76 (1889); *Salvad. Cat. B. M.* 20, 1894, p. 424.
Eclectus luciensis, *Scleg. Mus. P.-B. Psittaci*, p. 48 (1864); *id. op. cit. Revue.* p. 26 (1874).
E. mülleri, part., *Scleg. Mus. P.-B. Psittaci*, p. 48, n.^o 7 (1864).
Loriculus (Tanygnathus) luzoniensis, v. *Mart. Journ. f. Oor.* 1866, p. 21.
Eclectus luconensis, *Finsch. Papag.* ii. p. 362 (1868); *Gieb. Thes. Orn.* ii. p. 75 (1875).
T. luconensis, *Sclat. P. Z. S.* 1871, p. 479; *id. Ibis*, 1872, p. 324; *Wald. Trans. Zool. Soc.* ix. pp. 133, 249 (1875); *Wardl. Rams. Tweedd. Orn. Works*, p. 655 (1881); *Rehnw. Journ. f. Orn.* 1881, p. 244 (*Conspl. Psitt.* p. 132); *Meyer. Sitzb. v. Abh. Ges. Isis*, 1884, *Abh.* i. p. 6; *Sharpe. Ibis*, 1884, p. 310; *Steere. List.* p. 6 (1895).
T. luzoniensis, *Brüggz. Abh. Brem.* v. p. 38 (1876); *Koch. Verz. Vogelb. aus Celebes und Sanghir*, *Febr.* 1876, p. 1; *Salvad. Orn. Mus. Civ. Gen.* ix. p. 33 (1876); *Tweedd. P. Z. S.* 1877, pp. 755, 756; 817; 1878, p. 281 p. 340 p. 642 p. 937; 1879, p. 68; *Tweedd. Orn. Works*, pp. 301, 410, 460, 462, 529, 530, 544, 587, 595, 607, 628, 646 (1881); *Rehnw. Vogelbild. Nachtr.* 62 (1883); *Sclat. List Vert. An. 8th ed.* p. 325 (1883); *Sharpe. Ibis*, 1888, p. 194; *Hilteh. Ibis*, 1890, p. 41.
T. luzoniensis, *Sharpe. Tr. Linn. Soc. (2) Zool.* i. p. 312 (1876); *Meyer. Ibis*, 1879, p. 48; *Guillemin. P. Z. S.* (1885); p. 252;

- p. 418 Everett, *Ib's.*, 1888, p. 282; *id. Journ. Str. Br. R. A. Soc.*, 1889, p. 176.
T. sumatranus, *Tristr.* (*no Raffl.*) *Cat. Coll. B.*, p. 76 (1889);
Hab.... Mantanani, Tablas, Romblon, Sibuyan, Siuijor,
Tawi-tawi.

Pag. 54 **T. everetti.**

- Tanygnathus sumatranus*, *G. R. Gr.* (*no Raffl.*) *List Psitt. Brit. Mus.*, p. 68; 1859; *id. Hand-list*, ii, p. 158, n.^o 8248 (1870).
Loriculus (Tanygnathus) sumatranus, v. *Mart. Journ. f. Orn.* 1889, p. 22 (*part.*).
Tanygnathus müllerii, *part.*, *Wald. Tr. Zool. Soc.*, viii, p. 31 (1872).
T. everetti, *Tweedt. Ann. & Mag. N. H.* (4) xx, p. 533 (1877);
id. P. Z. S. 1877, p. 818; *Sharpe, P. Z. S.* 1879, p. 314;
Tweedt. Orn. Works, pp. 544, 561 (1881); *Wardl. Rams. Tweedt. Orn. Works*, pp. 655, 670 (1881); *Rehw. Journ. f. Orn.* 1881, p. 246 (*Consp. Psitt.* p. 134; *id. Vogelbild text of pl. xxvii. t. o* (1878-83); *Steere, List*, p. 6 (1890); *Salv. Cat. B. M.* 20, p. 432; 1894.
Hab.... Panay, Concepción.

Pag. 54 **T. burbridgei.**

- Tanygnathus burbridgei*, *Rehw. u. Schal. Journ. f. Orn.* 1879,
p. 427; *Wardl. Rams. Tweedt. Orn. Works*, p. 655 (1881);
id. Ib's., 1884, p. 470; *Salv. Cat. B. M.* 20, 1894, p. 432.
T. albirostris, *part.*, *Rehw. f. Orn.* 1881, p. 246; *id. Consp. Psitt.* p. 134 (1881).
Hab.... Tawi-tawi.

Pag. 54 **C. lunulata**, (*Savigny*)

- Peruche à collier, *Buff. Hist. Nat. Ois.* vi, p. 173 (1779).
Collared parrakeet, *Lath. Syn.* i, p. 317 (1821) (*ex Sonnerat*); *id. Gen. Hist.* ii, p. 270 (1822).
Ps. torquatus, *Lath. Ind. Orn.* i, p. 133, p. 154 (1790); *Bechst. Kurze Uebers.* p. 54 (1811); *Shaw, Gen. Zool.* viii, 2, p. 551 (1811); *Vieill. N. D.* xxv, p. 374 (1817); *Kuhl, Conspl. Psitt.* p. 66 (1820); *Vieill. Enc. Meth.* iii, p. 1495 (1823); *Voigt, Cuv. Uebers.* p. 747 (1831); *Pucher. Rev. et Mag. de Zool.* 1853, p. 163.
P. streptophorus, *Desm. Dict. Sc. Nat.* xxxix, p. 88 (1826); *Bp. Compt. Rend.* xliv, p. 538 (1857).
Psittacula torquata, *Steph. Gen. Zool.* xiv, 2, p. 144 (1826); *Wagl. Mon. Psitt.* p. 630 (1832); *Lear, Parr.* pl. 40 (1832).
Psittacula loxia, *Less. Tr. d'Orn.* p. 204 (1731); *Bourj. Perr. lam.* 94 (1837-38); *Less. Compl. de Buff.* ix, p. 209 (1837); *id. op. cit. 2nd ed.* p. 607 (1838); *G. R. Gr. Gen. B.* ii, p. 423, n.^o 22 (1846); *id. List. Psitt. Brit. Mus.* p. 90 (1859).
P. squammatto-torquata, *Bourj. Perr. lam.* 97 (1837-38) (*ex Lear.*).
P. lunulata, *G. R. Gr. Gen. B.* ii, p. 423, n.^o 22 (1846); *id. List. Psitt. Brit. Mus.* p. 91 (1869); *Schleg. Mus. P.-B. Psittact.* *

p. 72 (1864); *Finsch, Papag.* ii. p. 616 (1868); *Schleg. op. cit. Rev.* p. 31 (1873); *Gieb. Thes. Orn.* iii. p. 328 (1877).
Cyclopsitta loxia, *Bp. Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 154, n.^o Hartl. *Journ. s. Orn.* 1854, B. p. ixiii; *Souance, Rev. et Mag. de Zool.* 1855, p. 217; *id. Naumannia*, 1856, *Consp. Psitt.* n.^o 229; *G. R. Gr. Hand-list*; ii. p. 164, n.^o 8376 (1870).
Psittinus torquatus, *Bp. Naumannia*, 1856, *Consp. Psitt.* p. 159.
Loriculus (Cyclopsitta) loxia, *v. Mart. Journ. f. Orn.* 1866, p. 21, n.^o 117.
Loriculus (Cyclopsitta) lunulatus, *v. Mart. ibid.* n.^o 18.
Psittacula loxias, *Gieb. Thes. Orn.* iii. p. 328 (1877).
Cyclopsitta lunulata, *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 163, n.^o 8377 (1870); *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix. pp. 133, 249 (1875); *Sharpe. Trans. Linn. Soc. (2) Zool.* i. p. 312 (1876); *Tweedd. P. Z. S.* 1887, pp. 689, 818, 1878, p. 937; *id. Orn. Works*, pp. 301 410, 514 (1881); *Wardl. Ramsay, Tweedd. Orn. Works, App.* p. 655 (part.) (1881); *Meyer, Vogel-Skeletan*, i. pl. xxi. (1879-88); *Tristr. Cat. Coll. B.* p. 78 (1889); *Steere, List.* p. 6 (1860).
Cyclopsittacus lunulatus, *Rehnw. Journ. f. Orn.* 1881, p. 136 (*Consp. Psitt.* p. 136.)
Cyclopsittacus loxias, *Rehnw. Journ. f. Orn.* 1881, p. 137 (*Consp. Psitt.* p. 73); *id. Vogelbild, Nachr.* 18 (1883).
Bolbopsittacus lunulatus, *Salv. Cat. B. M.* 20, 1894, p. 504.
Hab.... Manila, Monta ban, S. Mateo, Bataan, Orion.

Pag. 55. *Cyclopsitta intermedia*, (Salv.)

Bolbopsittacus intermedius, *Salv. Cat. B. M.* 20, 1894, p. 505
lam. XIII.
Hab. Luzón, Mindaraao, Sarar, Borongan.

Pag. 55. *Cy mindanensis*.

Cyclopsitta lunulata, (part.), *Tweedd. Tr. Zool. Soc.* ix. pp. 134, 249 (1875); *id. Orn. Works*, pp. 301, 410 (1881).
Cyclopsitta lunulata, *Tweedt. (nec Scop.) P. Z. S.* 1878, p. 818 1878, p. 937 *id. Orn. Works*, pp. 545 628 (1881); *Wardl. Rams. Tweedd. Orn. Works, App.* p. 655 (1881).
Cyclopsitta mindanensis, *Steere, List B. & M. Steere. Exped. to the Philipp.* p. 6 (1890).
Bolbopsittacus mindanensis, *Salv. Cat. B. M.* 20, 1894, p. 505, lam. XIII.
Hab.... Surigao, Panaon, Butuan.

Pag. 55. *Frioniturus discurus*.

Psittacus discurus, *Vieill. Gal. des Ois.* i. p. 7, lam. 26; *id. Euc. Meth.* iii. p. 1369 (1823).
Psittacus discosurus, *Wagl. Mon. Psitt.* p. 524 (1832).
Psittacus spatuliger, *fam.*, *Bourj. Perr.* lam. 53 bis (1837-38).
Prioniturus discosurus, *Bp. Consp. Av.* i. p. 6 (1850).
Urodiscus spatuliger, *Bp. Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 155, n.^o 226; *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 141, n.^o 8048 (1870).
Urodiscus spatulifer, *Bp. Naumannia*, 1856, *Consp. Psitt.* n.^o 233.

Prioniturus discurus, *G. R. Gr. List Psitt. Brit. Mus.*, p. 18 (1859); *Philippine Isl. Selat. P. Z. S.* 1890, p. 224; *Gould, B. of Asia*, vi, lam. 15 (pt. xiv., 1862); *v. Mart. Journ. f. Orn.* 1860, p. 22; *Wald. Tr. Zool. Soc.* ix, 1p. 132, 249, (part.) 1875; *Sharpe, Tr. Linn. Soc.* (2) *Zool.* i, p. 312 (1876); *Tweed. P. Z. S.* 1877, pp. 538, 756, 817, 1878, pp. 379, 937, 1879, p. 68; *Tweed. Voy. Chall. Birds.*, p. 9 (1881); *id. Orn. Works*, pp. 30 (part.), 410, 461; 462, 539, 544, 602, 628 (46) (1881); *Wardl-Rams.*; *Twe. id. Orn. Works*, p. 655 (1881); *Schlegel Vogelbd. t. xxvii. f. 3* (1873-83); *id. Journ. f. Orn.* 1881, p. 154 (*Consp. Psitt.* p. 142); *Tristr. Cat. Coll. B.* p. 75 (1889); *Steere, List.*, p. 6 (1890); *Salv. Cat. B. M.* 20, 1894, p. 517.

Prioniturus spatuliger, *G. R. Gr. List Psitt. Brit. Mus.*, p. 18 (1859); *Gould, B. of Asia*, vi, lam. 14 (pt. xiv., 1862); *Wald. P. Z. S.* 1864, p. 294; *Mart. Journ. f. Orn.* 1866, p. 22.

Prioniturus, sp., *Wall. P. Z. S.* 1864, p. 284.

Pionias discurus, *Finsch, Papag.* ii, p. 401 (1868); *Gieb. Thes. Orn.* iii, p. 190 (1875).

Urodiscus discurus, *G. R. Gr. Hand-list.*, ii, p. 141, n.^o 8047 (1870).

Hab.... Tablas, Sibuyan.

Pag. 55. *P. cyaniceps*

Prioniturus platerus², *Blass. Braunschweigische Anzeiger*, n.^o 37, Febr. 12 (1888), p. 335; *id. Ornis*, iv, p. 305 (1888); *Id. Ibis*, 1888, pp. 372, 374.

Prioniturus cyaniceps, *Sharpe, Ibis, April.* 1889, p. 194 (Palawan); *Whiteh. Ibis*, 1890, p. 42; *Everett, Journ. Str. Br. R. As. Soc.* 1880; p. 176; *Steere, List.*, p. 6 (1890); *Salv. Cat. B. M.* 20, 1894, p. 419.

Hab... Calamianes, Culion, Paragua, P. Princesa.

Pag. 55 *P. suluensis*.

Prioniturus discurus, *Sharpe (nec Vieill.), P. Z. S.* 1879, p. 313 *Gullien. P. Z. S.* 1885, p. 251.

Prioniturus discurus, var. *suluensis*, *Blas. Journ. f. Orn.* 1890, p. 140.

P. suluensis, *Salv. Cat. B. M.* 20, 1894, p. 419.
Hab. Joló.

Pag. 56 *P. verticalis*, *Sharpe*.

Ibis, 1894, p. 248, lam. vi, f. 1, 2.
Hab. Tawi-tawi.

Pag. 56 *P. luzonensis*.

Prioniturus discurus, (part.), *Tweed. Tr. Zool. Soc.* ix, p. 312 (1875) *id. (nec Vieill.) P. Z. S.* 1877, p. 688; *id. Orn. Works*, p. 300 (part.) et p. 514 (*nec Vieill.*) (1887).

Prioniturus luconensis, *Steere, List. B. & M.* *Steere Expedit. to the Philipp.* p. 6 (1890).
Hab.... Manila, Mentalban.

Pag. 56. *P. mindorensis*, St.

Prioniturus mindorensis, Steere, List. B. & M. Steere, List to the Philipp. p. 6 (1890).
Hab.... Calapan.

Pag. 56. *Loriculus philippinensis*.

- Psittacula philippensis*, Bris. Orn. iv. p. 392, lam. xxx, f. 1 (1760); Steph. Gm. Zool. xiv. 2, p. 144 (1820); Meyer, Nov. Act. C. L.-C. Nat. Cuv. vii Suppl. prim. p. 94 (1834); Bourj. Perr. lam. 89 (1837-38); Licht. Nomencl. Av. p. 71 (1854).
Psittacus philippensis, Voigt, Cuv. Uebers, p. 747 (1831); Kuhl, Conspl. Psitt. p. 64 (1820).
Petite perrue de l'île de Luzon quatrième espèce, Sonnerat, Lov. à la Nau. Guin. p. 77, lam. 40 (1776).
La Perrache à ailes noires, Buff. Hist. Nat. Ois. vi. p. 174 (1770) (ex Sonnerat).
Philippine parakeet, Lath. Syn. i. p. 311 (1781); id. Gen. Hist. ii. p. 255 (♂) (1822).
Luzonian parakeet, Lath. Syn. i. p. 318 (1781) (ex Sonnerat); id. Gen. Hist. ii. p. 271 (1822).
P. galgulus, var. β Gm. S. N. i. p. 349, n. 46 (1788) (ex Brisson); Lath. Ind. Orn. i. p. 131, n. 148 (1788); Shaw, Gen. Zool. viii. 2, p. 550 (1811).
P. minor, Gm. S. N. i. p. 351, n. 135 (1788) (ex Sonnerat); Lath. Ind. Orn. i. p. 133, n. 155 (1790); Vieill. Enc. Meth. iii. p. 1404 (1823).
P. coulacci, Vieill. Enc. Meth. iii. p. 1405 (1823).
Psittacula coulaci, part., Liss. Tr. d' Orn. p. 202 (1831).
P. rubrifrons, Lvar. Parots, lam. 41 (1832); Bourj. Perr. lam. 87 (1837-38) ex Lazar.
P. rubrifrons, Vig. P. Z. S. 1831, p. 97.
Psittacula rubrifrons, Sw. Class. B. ii. p. 303 (1836).
Psittacula melanoptera, G. R. Gr. Gen. B. ii. p. 423, n.º 19 (1849).
Loriculus rubrifrons, Bp. Rev. et Mag. de Zool. 1854, p. 155, n.º 242; Hartl. Journ. f. Orn. 1854, p. Ixiii.
L. philippensis, Swinhé. Rev. et Mag. de Zool. 1856, p. 221; Schleg. Mus. P.-B. Psitaci, p. 130 (1864), v. Mart. Journ. f. Orn. 1866, p. 21; op. cit. Revue, p. 59 (1874); Wardl. Tr. Zool. Soc. ix. pp. 135, 249 (1875); Tweedd. P. Z. S. 1877, p. 820; id. Orn. Works, pp. 299, 303, 304, 410, 547 (1881); Wardl. Rams. Tweedd. Orn. Works, p. 655 (1881); Zristr. Cat. Coll. B. p. 70 (1889); Steere, List. p. 6 (1890); Salv. Cat. B. M. 20. 1894, p. 524.
Licmetulus philippensis, Bp. Naumania, 1856, Conspl. Psitt. n.º 254.
Loriculus coulaci, G. R. Gr. List. Psitt. Brit. Mus. p. 56 (1859); Wall. P. Z. S. 1874, p. 288; Gib. Thss. Orn. ii. p. 498 (1875); Meyer, Rowl. Orn. Msc. ii. p. 232, n.º 6 (1877); id. Vogel-Skelett. t. ii. (1879).
L. melanopterus, Wall. P. Z. S. 1864, pp. 288, 294.

- Coryllis culacissi*, Finsch, *Popag.* ii, p. 705 (1868).
Licmetulus culacissi, G. R. Gr. *Hand-list*, ii, p. 852, n.^o 8181
(1870).
Coryllis philippensis, Rehw. *Journ. f. Orn.* 1881, p. 228 (Consp.
Psitt., p. 116); *id. Vogelbl. Nachtr.* 47 (1883).

Pág. 56. **L. mindorensis**

- L. mindorensis*, Steere, *List. B. & M. Steere Exped. to the
Philippines*, 1890, p. 6; *Salv. Cat. B. M.* 20 1894, p. 526.
Hab. Mindoro, Calapan, Baco, Naujan.

Pág. 56. **L. siquijorensis**

- L. siquijorensis*, Steere, *List. B. & M. Steere Exped. Philipp.
1890*, p. 6; *Salv. Cat. B. M.* 20 1894, p. 527.

Pág. 56. **L. indicus**

- L. indicus*, (Bris.).
The smallest green et red Indian paroquet, Edw. i, lam. 6
(1745); Seligm. *Samml. Ausländs. Vög.* i, pl. xi, f. 1 (1749).
Psittacula indica, Briss. *Orn.* iv, p. 390 (1760); *Red et Green
Indian Parrot*, Lath. *Syn.* i, 311 (1781); *id. Gen. Hist.* ii,
p. 294 (1822).
Psittacus indicus, Gm. S. N. i, p. 349 n.^o 128 (no n.^o 58)
(1788) (ex Brisson); Bechs. *Kurze Übers.* p. 104 (1811); Kuhl,
Consp. Psitt. p. 65 (§ no 9) (1820); Voigt, *Civ. Übers.* p.
747 (1831).
P. asiaticus, Lath. *Ind. Orn.* i, p. 130, n.^o 146 (1790); Shaw,
Gen. Zool. viii, 2, p. 553 (1811); Vieill., *Eoc. Meth.* iii, p.
1407 (1823).
P. indica, part., Steph. *Gen. Zool.* xiv, 2, p. 114 (1826); G. R.
Gr. Gen. B. ii, p. 423, n.^o 17 (1846).
P. coulaci, part., Less. *Tr. d'Orn.* p. 202 (♂) (1831).
P. minor, part., Mon. *Psitt.* p. 628 (♂) (1832).
P. indicus vel *minor*, Bourr. *Perr.* xxii, p. 89 (1837-38).
Loriculus philippensis, Blyth. (*no* Briss.), *Cat. B. Mus. A. S.*
B. p. 10, n.^o 46 (1849).
L. asiaticus, Blyth, *op. cit.* p. 312 (1849); *id. Journ. A. S. B.*
xviii, p. 801 (1849), xix, p. 236 (1850); Kelaar, *Predr. Faun.*
Ceyl. p. 127 (1852); Layard, *Ann. & Mag. N. H.* (2) xii,
p. 261 (1854); Hartl. *Journ. f. Orn.* 1854, p. 158; Horsf. &
Moore, *Cat. B. Mus. E. I. Comp.* ii, p. 628 (1856); Wald. P.
Z. S. 1860, p. 539; Garrod, *P. Z. S.* 1873, p. 634, 1874, p.
587; Tweed. *Orn. Warkf.* p. 17 (1881); Sclat. *List. Vert.*
An. 8th. ed. p. 326 (1883).
L. indicus, Bp. *Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 155, n.^o 240;
Souané, *Rev. et Mag. de Zool.* 1856, p. 219, n.^o 173, p.
220 (§ no 9), p. 221 Bp. Naumann, 1856, *Consp. Psitt.*
n.^o 247; Cass. *Narr. Exp. undr Comm. Perry* p. 242 (1856);
Journ. f. Orn. 1858, p. 449; G. R. Gr. *List. Psitt.* *Brit. Mus.* p. 55 (1859); Schleg. *Mus. P.-B. Psittaci*, p. 132 (1864);

- Pelz. Novara Reise, 176g. p. 99 (1865); G. R. Gr. Hand-list, ii. p. 152, n.^o 8173 (1870); Holdsv. P. Z. S. 1872, pp. 485, 426; Legge, Ibis, 1874, 15; Hume, Str. Feath. ii. p. 186 (1874); Schleg. Mus. P. B. Psittaci, Revue, p. 61 (1874); Legge, Str. Feath. iii. p. 365 (1875); Gob. Thes. Orn. ii. p. 498 (1873); Meyer, Rowl. Orn. Misc. ii. p. 232, n.^o 2 (1877); Tweed. P. Z. S. 1877, p. 823; Hume, Str. Feath. vii. p. 368 (1878), viii. p. 87, n.^o 153 bis (1879); Legge, B. of Ceyl. pp. 130, 1212, lam. iv. inferior (ad.), lam. vii. superior fig. (juv.) (1880); Tweed. Orn. Works, pp. 546, 457 (1881); Tristr. Cat. Col. B. p. 76 (1880); Salz. Cat. B. M. 20. 1894 p. 526.
- ? L. punicus (sinensis), Bp. Rev. et Mag. de Zool. 1854, p. 155, n.^o 241; Souancé, Rev. et Mag. de Zool. 1856, pp. 219, 221; Bp. Naumannia, 1856. Conspl. Psitt. n.^o 250; G. R. Gr. List. Psitt. Brit. Mus. p. 55 (1859)*; Sclat. Ib's, 1860, p. 361 (nota); Swinh. Ib's, 1861, p. 411 1862, p. 305; G. R. Gr. Hand-list, ii. p. 152, n.^o 8174 (1870); Swing. P. Z. S. 1871, p. 391.
- L. coulaci, Blyth, Ib's, 1853, p. 7, 1867, p. 226.
- L. edwardsi, Blyth, Ib's, 1857, pp. 294, 311; Wald. Ib's, 1867, p. 46; Nevill. Journ. A. S. B. (Ceyl. Br.) 1870-71, p. 32; Tweed. Orn. Works, p. 41 (1881).
- Corylis indica, Finsch, Papag. ii. p. 714 (1853) Röhre. Journ. f. Orn. 1881, p. 227 (Conspl. Psitt. p. 115); id. Vogelbild. Nachtr. 46 (1883).
- Hab. Mindanao; Ceilán.
- Pag. 56 L. chrysotus
- Loriculus regulus, G. R. Gr. (nec Souancé) List Psitt. Brit. Mus. p. 56 (1859); Wall. P. Z. S. 1864, p. 288; Finsch, Ib's, 1874, p. 208; Wald. Trans. Zool. Soc. ix. p. 137 (1875); Tweed. Orn. Works, p. 304 (1881).
- Coryllis regulus, (purt.), Finsch, Papag. ii. p. 711 (1868); id. Ib's, 1872, p. 208.
- Loriculus eulachissi, Sclat. (nec Vieill.) P. Z. S. 1871, p. 479; id. Rev. Lyst. of Vert. p. 202 (1872).
- L. chrysotus, Sclat. Ib's, 1872, p. 324, lam. xi. * id. P. Z. S. 1872, p. 790; Wald. P. Z. S. 1873, p. 52*; Grirrod, P. Z. S. 1873, p. 634, 1874, p. 537; Gieß. Tiers Orn. ii. p. 497 (1875); Wald. Trans. Zool. Soc. ix. pp. 137, 249 (1875); Sharpe, Tr. Linn. Soc. (2) Zool. i. p. 313 (1875); Meyer, Rowl. Orn. Misc. ii. p. 232, n.^o 8 (1877); Tweed. P. Z. S. 1877, pp. 539 757 820; id. Orn. Works, pp. 293, 304, 410, 493, 530 547 (1881); Wardl. Rams. Tweed. Orn. Works, p. 655 (1881); Tweed. Voy. Chal., Birds, p. 10 (1881); Sclat. List Vert. Au. 8th. ed. p. 325 (1883); Steere, List etc. p. 6 (1890).
- Coryllis occipitalis (purt.), Finsch, Ib's, 1874, S. 203*; Röhre. Journ. f. Orn. 1881, p. 228 (Conspl. Psitt. p. 116); id. Vogelbild. Nachtr. 47 (1883).
- C. chrysotus, Finsch, Ib's, 1874, p. 208.
- Loriculus occipitalis, Wall. Tr. Zool. Soc. ix. pp. 135 (1877), 249 (1875); Meyer, Rowl. Orn. Misc. ii. p. 232, n.^o 9 (1877); Tweed. Orn. Works, pp. 303, 510 (1881); Wardl. Rams. Tweed. Orn. Works, p. (1881).

Coryllis chrysonota, Rehne, Journ. f. Orn. 1881, p. 22) (*Consp.*, Psitt., p. 117); *id.* Vogelbild. Nachtr. 48 (1883).
Hab.... Mindanao.

Pag. 56. *Loriculus vernalis* (Sparr.)

- Psittacus vernalis*, Sparrm. Mus. Carls. t. 29 (1787); Lath. Ind. Orn. i. p. 130, n.^o 147 (1790); Bechst. Kurze Ueb. p. 105 (1811); Vieill. N. D. xxv, p. 375 (1877); *id.* Enc. Meth. iii. p. 1407 (1823); Voigt, Cuv. Ubers. p. 747 (1831).
Vernal parakeet, Lath. Syn. Suppl. ii. p. 95; n.^o 26 (1802); *id.* Gen. Hist. ii. p. 265 (1822).
Psittacus indicus, Swam., Kuhl, Conspl. Psitt. p. 65 (1820).
Psittacula galgulus, Swam., Wagl. Mon. Psitt. p. 626 (1832).
Ps. miau, Swam., Wagl. op. cit. p. 521 (1832).
Psittaculus galgulus, Solbi, Nat. Libr., Parrots, p. 167 (1836).
Ps. pendulus, Pears. Journ. A. S. B. x. p. 654 (1840).
Ps. vernalis, Blyth, Journ. A. S. B. x. p. 921 (1841); Jerd. Madras Journ. xi. p. 201 (1840).
Psittacula pyrrhopyga v. *vernalis*, Hodg. Gray's Zool. Msc. p. 85 (1844).
Ps. vernalis, Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B. p. 10, n.^o 40 (part.) (1849); *id.* Journ. A. S. B. xviii. p. 801 (1849), xix. p. 237 (1850); Bb. Rev. et Mag. de Zool. 1854, p. 155, n.^o 239; Souance, Rev. et Mag. de Zool. 1856, p. 219; Bp. Naumannii, 1859, Conspl. Psitt. n.^o 246; Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Comp. ii. p. 627 (1858); G. R. Gr. List Psitt. Brit. Mus. p. 54 (1859); Jerd. B. of Ind. i. p. 215 (1862); Gray, Cat. Hodgs. Coll. B. Mus. 2nd ed. p. 62, n.^o 45 (1863); Blyth, Ibis, 1873, p. 6 (part.); *id.* App. Zool. of the Antim. Isl. in Merv's Arch. Antim. Isl. p. 355 (1863); Wald. P. Z. S. 1896, p. 538; Blyth, Ibis, 1877, p. 295; Beau. Ibis, 1877, p. 322; 1879, p. 412; Elwes, Ibis, 1879, p. 527; G. R. Gr. Hint-list, ii. p. 152, n.^o 8172 (1879); Ball, Journ. A. S. B. xli. p. 279 (1872); Wald, Ibis, 1873, p. 298; Btl., Str. Feath. i. p. 62 (1873); Hume, Nests & Eggs, p. 119 (1873); Wald, Ibis, 1878, p. 293; Hume, Str. Feath. iii. pp. 57, 185, 471 (1874), iii. p. 57 (1875); Blyth. & Wald. B. of Burm. p. 68 (1875); G. Ch. Tiers. Orn. ii. p. 499 (1870); Hume, ibid. p. 383 (1874), v. p. 25 (1877); Finsb. ibid. p. 395 (1877); Meyer, Rowl. Orn. Msc. ii. pp. 231, 234, n.^o 1 (1877); Hume & Davis, Str. Feath. vi. pp. 120, 500 (1878); Hume, Str. Feath. viii. p. 87, n.^o 153 p. 153 (1879); Udt. Str. Feath. x. p. 52 (1880); Bung. ibid. p. 101 (1880); Buth. ibid. p. 384 (1880); Oates, Str. Feath. x. p. 197 (1882); Salz. Cat. B. Strickl. Coll. p. 459 (1882); Oates, B. of Brit. Burm. ii. p. 146 (1883); Salzert. Avi. Mus. Cz. G. n. (2) v. p. 560 (1888), viii. p. 376 (1889); Tristr. Cat. Coll. B. p. 25 (1889); Murr. Avif. of Brit. Ind. ii. p. 463 (1890); Oates, Nests & Eggs. Int. B. iii. p. 92 (1890).
Loriculus indicus, (part.), Souance, Rev. et Mag. de Zool. 1859, (A. Swam.).
L. apicalis, (part.), Souance, ibid. (B. Swam.).
Coryllis vernalis, Finsch, Papag. ii. p. 721 (1883); Rehne. Vor-

gelbild, t. xv, f. 4 (1878-83); *id. Journ. f. Orn.* 1881, p. 226.
(Consp. Psitt. p. 114); *Müll. Journ. f. Orn.* 1882, p. 428.
Hab. Península Malaya, Filipinas.

Pag. 57. **L. hartlaubi**

- ♂ *Psittacus melanopterus*, *Scop. Del. Flor. et Faun. Insubr.* ii. p. 86, n.º 23 (♂) (1786) (ex Sonnerat).
♂ *Loriculus indicus*, *A. Souané, Rev. et Mag. de Zool.* 1856, p. 220 (parte).
L. apicalis, *Souané, Rev. et Mag. de Zool.* 1856, pp. 220, 221; *Bp. Naumannia*, 1856, *Consp. Psitt. Brit. Mus.* p. 55 v. *Mart. Journ. f. Orn.* 1860, p. 21; *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 151, n.º 8176 (1870); *Liggs, B. of Ceyl.* p. 181 (1880).
♂ *L. sp.*, *Souané, L. c.* p. 221.
♂ *L. cyanæmus*, *Bp. Naumannia*, 1856, *Consp. Psitt. Brit. Mus.* p. 55 v. *Mart. Journ. f. Orn.* 1860, p. 21; *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 152, n.º 8175 (1870).
L. melanopterus, *G. R. Gr. List. Psitt. B. M.* p. 55; v. *Mart. Journ. f. Orn.* 1860, p. 21; *P. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 152, 1870, n.º 8175.
Corillus hartlaubi, (part.), *Finsch. Papag.* ii. p. 711 (♂) (1868).
Loriculus hartlaubi, *Wald. P. Z. S.* 1873, p. 256; *id. Tr. Zool. Soc.* xx, pp. 131, 249 (1875); *Meyer. Rowl. Orn. Misc.* ii. p. 238, n.º 10 (1877); *Tweed. P. Z. S.* 1877, p. 819, lam. lxxxii, 1. 1. ♂, 2. ♀ 1878, pp. 107, 340 (♂) 709, 937 (1879), p. 68; *id. Orn. Works*, pp. 290, 303, 304, 410, 545, 546, 547, 566, 655, 621, 628, 640 (1881); *Wardl. Rats. Tweed. Orn. Works*, p. 655 (1881); *Küller. Journ. f. Orn.* 1883, p. 294; *Steere, List.* p. 6 (1890).
Coryllis apicalis, *Rehwe. Journ. f. Orn.* 1881, p. 229 *Consp. Psitt.* p. 117; *id. Vogelbild. Nachtr.* 49 (1883).
Loriculus bonapartei (part.), *Gullem. P. Z. S.* 1885, p. 252.
Loriculus wrocæsteri, *Steere, List B. & M. Steere Expd. to the Philipp.* p. 6 (1890).
Hab... Samar, Borongan, Paric, Leyte, Amparo, Zamboanga, Tawi-tawi.

Pag. 57. **L. regulus**

- Loriculus regulus*, *Schlat. Ibis*, 1872, p. 324; *id. P. Z. S.* 1872, p. 706; *Wald. P. Z. S.* 1873, p. 526; *Gieb. Thes. Orn.* ii. p. 499 (parte) (1875); *Wald. Tr. Zool. Soc.* viii. p. 135 (1875); *Sharpe. Trans. Linn. Soc. Zool.* i. p. 313 (1876); *Meyer. Rowl. Orn. Misc.* ii. p. 232, n.º 7 (1877); *Rowl. & Meyer, ibid.* p. 238; lam. 58 (1877); *Tweed. P. Z. S.* 1877, pp. 539, 820, 1878, p. 281; *id. Orn. Works*, pp. 393, 410, 587 (1881); *Wardl. Rats. Tweed. Orn. Works*, p. 655 (1881); *Steere, List.* p. 7 (1890); *Salv. Cat. B. M.* 20, 1894, p. 523.
♂ *Liometulus regulus*, *Bp. Naumannia*, 1859, *Consp. Psitt.* n.º 255.
♂ *Loriculus (Liometulus) regulus*, v. *Mart. Journ. f. Orn.* 1860, p. 21.
♂ *Coryllis regulus*, *Finsch. Ibis*, 1874, p. 208; *Rehwe. Journ. f.*

- Orn.* 1835, p. 223 (*Crisp.*, *Psitt.*, p. 86); *J. T. & B. L. Vick* 47 (1883).
Loriculus occipitalis (part.), *Willd.*, *Tr. Zool. Soc.*, ix, pp. 135 (nota), 249 (1875; *Meyer*, *R. d'Orn.*, *Oiseaux*, *M. 1875*, ii, p. 232; n.^o 1 (1877); *Tiedt*, *Orn. Works*, p. 655 (1881).
Loriculus punayensis, *Tiedt*, *P. Z. S.* 1877, pp. 539, 538; *Id.* *Orn. Works*, p. 462, (1881); *Willd.*, *Rims.* 1871, p. 955, 957 (1881); *Poey*, *Voy. Chiloé, Brdy*, p. 9, lam. i, f. 1, 2 (1881); *Coryallis parvicensis*, *Röhrw.*, *Journ. f. Oiseaux*, 1881, p. 227 (*Crisp.*, *Psitt.*, p. 115); *id.* *Vogelld. Nachtr.*, 45 (1883).
Hab.. Negros, Valencia, Tablas, Romblon, Sibuyan.

Pag. 57. *Eclerurus roratus*, (*S. Müll.*)

- Perper roode lori, *Fosmaer*, *Mou.*, p. 10, t. 7 (1761).
Lory de la Nouvelle Guinée, *D'Aubent.*, *Pl. Ent.* 683.
Psittacus roratus, *P. L.*, *S. Müll.*, *S. N.*, *Suppl.* p. 77 (1776); *Cass. Pr. Ac. Sc. Philad.* 1804, p. 240, n.^o 52.
Le grand lori, *Buff. Hist. Nat. Ois.*, vi, p. 135 (1879).
Grand lory, *Lath. Syn.*, i, p. 275 (1781); *id.* *Gen. Hist.*, ii, p. 230 (1822).
Psittacus celebensis, (*sic?*), *Bodd.*, *Tabl. Pl. Ent.* p. 42 (1783).
P. grandis, *Gm.*, *S. N.*, i, p. 335, n.^o 102 (1783); *Lith. Int. Orn.*, i, p. 110 (1784); *Ste.*, *Gm. Zool.*, viii, p. 133, lam. 80 (1811); *Bechst. Kurz. Uebers.*, p. 14 (1811); *Kuhf. Conspl.*, *Psitt.*, p. 38 (1820); *Vieill. Ent. Méth.*, p. 1378 (1823); *Vög.*, *Cat. Uebers.*, p. 734 (1831); *Hahn.*, *Orn. Atl.*, *Papag.*, p. 83, t. 68 (1837); *Tenm. Tabl. Méth.*, p. 59 (1839); *S. Müll.*, *Kröh. Lüder.*, *Volkenk.*, pp. 107, 103 (parte) (1839-41); *Thienem.*, *Fouquépitz.*, *d. ges.*, *Vög.*, p. 76 (1852); *Dohne.*, *Naumannia*, 1854, p. 39; *Finsch.*, *N. u. G. S.*, p. 157 (parte) (1865).
Le Perroquet grand lory, *Levaill.*, *Perr.*, *lam.* 126, 127 (var.), 128 (var.) (1865).
Lorius grandis, *Steph. Gen. Zool.*, xiv, p. 131 (1826); *Hartl. Syst. Verz. Ges. Mus.* p. 87 (1844).
Mascarinus puniceus, *Less. (no Gm.) Tr. d'Orn.*, p. 188 (1831).
Eclerurus grandis, *Walg.*, *Mou.*, *Psitt.*, p. 143; *id.* *Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 155, n.^o 23; *id.* *Naturhistor.*, 1855, *Conspl. Psitt.*, n.^o 244; *Savigny.*, *Rev. et Mag. de Zool.* 1855, p. 218; *Horsf. & Mivore.*, *Cat. B. Mus. E. I. Comp.*, ii, p. 624 (1858); *G. R. Gr.*, *P. Z. S.* 1860, p. 357; *Brust.*, *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* xxvii, p. 295 (1864); *Willd.*, *P. Z. S.* 1864, p. 286; *Schl. g. Mus.*, *P.-B. Psittaci*, p. 38 (1864); *Finsch.*, *Papag.*, ii, p. 340 (1868); *Meyer.*, *Zool. Gart.* 1874, p. 161; *Schleg. Mus. P. B. Psittaci*, *Résumé*, p. 13 (1874); *Gieb. Thes. Orn.*, ii, p. 74 (1875); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.*, vii, p. 757, n.^o 6 (1875); *Rosenb.*, *Reist. natur. Geelzinkh.*, p. 6 (1873); *Forbes.*, *Ibis*, 1877, p. 282; *Salvad. Ibis*, 1877, p. 475; *Rosenb.*, *Zool. Gart.* 1878, p. 345; *Morr.*, *Zeitschr. f. wissenschaftl. Zool.* xxxvii, p. 156 y siguientes (1882).
E. ceylonensis, *G. R. Gr.*, *Gen. B.*, ii, p. 418, n.^o 2 (1845).
Polychlorus magnus, *Sclat.*, *P. Z. S.* 1860, pp. 226, 227 (parte).
Eclerurus polychlorus var., *G. R. Gr.*, *P. Z. S.* 1860, p. 358.
Psittacus magnis, *Rosenb.*, *Journ. f. Orn.* 1862, p. 62; *id.* *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* xxx, pp. 141, 142 (1863). *

- E. polychlorus, *Bernst.* (no Scop.) *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* xxvii, p. 294 (1864); *Wall. P. Z. S.* 1864, p. 286 (parte); *Schleg. Mus. P.-B. Psittaci*, p. 40 (parte) (1864); *Finsch. Pap. fog.* ii, p. 333 (parte) (1868); *Meyer. Zool. Gart.* 1874, p. 161 (parte); *Schleg. Mus. P.-B. Psittaci, Revue*, p. 14 (parte) (1874); *Rosenb. Reitt. naar Geelvinkb.* p. 6 (1875); *id. Zool. Gart.* 1878, p. 345 (parte); *Musschenbr. in Bernst. Dagboek*, p. 256 (parte) (1883).
Psittacus polychlorus part., *Finsch. Neu-Guin.* p. 357 (1867).
Eclectus roratus, *G. R. Gr. Hand-list*, ii, p. 157, n.^o 8240 (1870); *Salvad. P. Z. S.* 1878, p. 78; *id. Orn. Pap. e Mol.* i, p. 209 (1880); *id. Cat. B. M.* 20, 1894, p. 393; *Rchnw. Vogelbild.* v. xxvii, f. 6 (♂) (1878-83); *id. Journ. f. Orn.* 1881, pp. 252, 397 (*Consp. Psitt.* pp. 140, 229); *Salvad. Voy. Challe. Birds*, p. 59 (1881); *Sclat. P. Z. S.* 1883, p. 196; *Meyer. Zeitschr. f. ges. Orn.* i, p. 274, lam. xvi. (1884); *Guillem. P. Z. S.* 1885, p. 563; *Salvad. Mem. R. Ac. Sc. Tor.* ser. 2, xl. p. 165 (1889); *Meyer. Ibis.* 1890, p. 26, pl. i.
Muscarinus (*sic!*) *polychlorus*, part., *G. R. Gr. Hand-list*, ii, p. 158, n.^o 8243 (1870).
Eclectus cardinalis, *Salvad. (nec Bodd.) Ann. Mus. Civ. Gen.* vii, p. 757, n.^o 2 (nec n.^o 5) (1875).

Varietas.

- Perroquet violet, *Fermin. Descr. gen. de Surinam*, iii, p. 175, (1769).
Violet lory, *Lath. Syn.* i, p. 220 (1781); *id. Gen. Hist.* ii, p. 135 (1822).
Psittacus janthinus, *Gm. S. N.* i, p. 319, n.^o 61 (1788).
Psittacus quebiensis, var. β *Lath. Ind. Orn.* i, p. 90.
Hab. Filipinas. \sim

Pag. 57. E pectoralis, (*L. S. Müll.*)

- Green and red parrot from China, *Edw. Glean.* v. lam. 231 (1758); *Seligm. Ausl. Vog.* vii, pl. 14 (1770).
Psittacus sinensis, *Brass. Orn.* iv, p. 291 (1700) *Gm. S. N.* i, p. 337, n.^o 109 (1788); *Lath. Ind. Orn.* i, p. 117 (1790); *Becht. Kurze Uebers.* p. 94 (1811); *Kuhl. Conspl. Psitt.* p. 84 (1820); *Vieill. Enc. Méth.* p. 1369 (1823); *Liss. Voy. Coq.*, *Zool.* i, p. 342 (1826), ii, p. 627 (1828); *Vög', Cuv. Uebers.* p. 743 (1831); *Temm. Tabl. Méth.* p. 59 (1839).
Perroquet de la Chine, *D' Aubent. PL. Enc.* 514.
Grand Perroquet vert de la Nouvelle Guinée, *Sommer. Voy à la Nov. Guin.* p. 174, lam. 108 (1776).
Psittacus pectoralis, *P. L. S. Müll. S. N. Suppl.* p. 78, n.^o 58 (1776); *Cass. Pr. Ac. Nat. Ss. Philad.* 1864, p. 240.
P. aurantius, *P. L. S. Müll. op. cit.* p. 80, n.^o 64; *Cass. t. c.*
Perroquet vert, *Buff. Hist. Nat. Ois.* vi, p. 116 (1779).
New-Guinea green parrot, *Iat'i. Syn.* i, p. 296 (1781); *id. Gen. Hist.* ii, p. 233 (1822).
Psittacus polychlorus, *Scop. Del. Flor. et Faun. Insubr.* p. 87,

- n.^o 27 (1789) (*ex Sonnerat*); *Finsch*, *Neu-Guin.* p. 153 (parte) (1875); *Rosenb.*, *Reist. naar Geelvinkb.* p. 83 (1875).
P. magnus, *Gm.*, *S. N.*, i, p. 344, n.^o 122 (1788) (*ex Sonnerat*); *Buchst.*, *Kurze Übers.* p. 100 (1811); *Vieill. Enc. Méth.* p. 1366 (1823); *S. Müll.*, *Verh. Land-en Volkenk.* pp. 22, 167 (1839-1844).
P. viridis, *Lath. Ind. Orn.* i, p. 125, n.^o 123 (1790) (*ex Gmelin*); *Le perrquet à flancs rouges*, *L'Aviell. Perr.* tab. 132 (1805).
Psittacus lateralis, *Shaw*, *Gen. Zool.* viii, p. 493 (1811).
Green y red chineze parrot, *Lath. Gen. Hist.* ii, p. 233 (1822).
Psittacus grandis, *Less.* (*no Gm.*) *Voy. Coq.*, *Zool.* i, p. 342 (1826); *S. Müll.*, *Verh. Land-en Volkenk.* p. 22 (1830-1844).
P. puniceus (parte), *Less.*, *Voy. Coq.*, *Zool.* i, 2, p. 627 (1828).
Mascarinus prasinus, *Less.*, *Tr. d'Orn.* p. 188 (1831).
Electrus lanius, *Wagl. Mon. Psitt.* p. 571, t. xxi. (1832); *G. R. Gr. Gen. B.* ii, p. 418, n.^o 1 (1845); *Bp. Nau-namia*, 1859; *Consp. Psitt.* n.^o 243; *Souancé, Rev. et Mag. de Zool.* 1855, p. 219; *Wall. Ann. & Mag. N. H.* (2) xx, p. 473 (1857); *G. R. Gr. P. Z. S.* 1858, p. 182, 194, 1859, p. 153; *id. C. U. B.*, *New Guin.* pp. 40, 59 (1859); *id. L'st Psitt. Brit. Mus.* p. 65 (1859); *Wall. Ibis*, 1861, p. 286; *Cass. Pr. Ac. Sc.*, *Philad.* 1872, p. 319; *Selat. Ibis*, 1873, p. 223; *Finsch*, *N. J. Tijdschr. Dierk.* i, Berigten, p. xvii. (1863); *Wall. P. Z. S.* 1864, p. 280; *Bernst. Nat. Tijdschr.* Int. xxvii, p. 297 (1864); *Schleg. Mus. P.-B. Psittaci*, p. 58 (1861); *Rönn. Reis u. Zuid-oosterl.* pp. 48, 80 (1867); *Finsch*, *Papag.* ii, p. 349 (1868); *G. R. Gr. Handlist*, ii, p. 157, n.^o 823 (1870); *id. Ann. & Mag. N. H.* (4) v. 1, 329 (1870); *Meyer Zool. g. Gart.* 1874, p. 161; *Schleg. Mus. P.-B. Psittaci, Revue*, p. 11 (1874); *Rosenb.*, *Reist. naar Geelvinkb.* pp. 30, 55, 113 (1875); *id. Zool. log. Gart.* 1878, p. 345.
Psittacodus magnus, *Wagl. Mon. Psitt.* p. 575 (1832); *Bp. Conspl.* i, p. 4 (1850); *id. P. Z. S.* 1850, p. 26; *id. Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 155, n.^o 232; *id. Nau-namia*, 1859; *Coelop. Psitt.* n.^o 239; *Souancé, Rev. et Mag. de Zool.* 1859, p. 218; *Wall. Ann. & Mag. N. H.* (2) xx, p. 473 (1852); *Rosenb.*, *Journ. f. Orn.* 1872, pp. 62, 94, 65, 68; *id. Nat. Tijdschr. Ned. Int.* xxv, pp. 143, 144, 145, 148, 223, n.^o 22 (1873).
Psittacus lanius, *Hahn. Orn. Attis. Papag.* t. 77 (1830); *Finsch*, *Neu-Guin.* p. 157 (1865).
Psittacus grandis, var., *S. Müll.*, *Verh. Land-en Volkenk.* pp. 107, 108 (1839-1844).
Eclectus polychlorus, *G. R. Gr. Gen. B.* ii, p. 428, n.^o 4 (1843); *id. Cat. B.*, *New Guin.* pp. 4, 5 (1859); *id. C. U. B.*, *Trop. Isl.* p. 34 (1859); *id. L'st Psitt. Brs. Mus.* p. 65 (1859); *Cass. Pr. Ac. Sc.*, *Philad.* 1872, p. 319; *Selat. Ibis*, 1873, p. 229; *Rosenb.*, *Nat. Tijdschr. Ned. Int.* xxv, p. 226, n.^o 21 (1863); *id. Journ. f. Orn.* 1874, p. 114, n.^o 21; *Wall. P. Z. S.* 1864, p. 286 (parte); *Schleg. Mus. P.-B. Psittaci*, p. 41 (parte) (1864); *id. Ned. Tijdschr. Dierk.* iii, p. 332 (1865); *Rosenb.*, *Reis. naar Zuid-oosterl.* pp. 48, 80 (1867); *Finsch*, *Papag.* ii, p. 48, *Gesellsch. W.* 4, 1874, p. 179; *id. Zool. Gart.* 1874, p. 161; *Schleg. Mus. P.-B. Psittaci, Revue*, pp. 14, 15 (1874); *Geb. Thes. Orn.* ii, p. 76 (1875); *Meyer, Mth. zool.*

- Mus. Dresd.* i. p. 11 (1875); *Sitzb. Is's Dresd.* 1875, p. 77; *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* vii. p. 756 (1875); *Salvad. e D'Alb. Ann. Mus. Civ. Gen.* viii. p. 811 (1875); *Rosenb. Reist. nach Gelvinck*, pp. 36, 55, 118 (1875); *Selvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* ix. p. 11 (1875); *Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W.* i. p. 344 (1875); *Cit. u. Rhin. Journ. f. Orn.* 1876, p. 324; *Selvad. Ann. Civ. Gen.* x. p. 31, n.^o 49, p. 121 (1877); *Selvad. P. Z. S.* 1877, p. 105; *Meyer, P. Z. S.* 1877, p. 800, lam. 79; *Forbes, Ibis*, 1877, p. 282 (parte); *Salvad. Ib's*, 1877, p. 475; *id. P. Z. S.* 1878, p. 92; *Selvad. P. Z. S.* 1878, pp. 289, 295; *Sharpe, Journ. Linn. Soc., Zool.* xiii. p. 491, n.^o 15 (1878); *Meyer, O-n. Centralblatt.* 1878, pp. 119, 137; *Gull. B. New Gu'n.* pt. viii, lam. 4 (1878); *Rosenb. Zool. Gart.* 1878, p. 345 (parte); *Meyer, Zool. Gart.* 1878, p. 377; *Rosenb. Malay. Archip.* p. 371 (1878-79); *Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W.* iii. p. 253 (1878-79), iv. p. 69 (1879); *Finsch, P. Z. S.* 1879, p. 12; *D'Alb. e Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* xiv. p. 36 (1879); *Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen.* xiv. p. 639 (1879); *Rehnw. Vogelbil.* t. xi. ff. 3, 4 (1878-83); *Salvad. Toy. Chall., Birds.* p. 75 (1881) *Meyer, Zeitschr. f. wissenschaftl. Zool.* xxxvii. p. 146 (1882); *Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W.* viii. p. 33 (1882); *Tristr. Ibis*, 1882, p. 143; *Musschenbr. Daghoch*, p. 256 (parte) (1883); *Finsch, Vog. d. Süddsee*, p. 17 (1884); *Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn.* i. p. 373 (1884); *Grant, P. Z. S.* 1887, p. 329, 1888, p. 189; *Meyer, Vogel-Skelett.* t. x., xlii. (1878-89).
Eclectus puniceus, *Bp. P. Z. S.* 1849, p. 142 *id. Rev. et Mig. de Zool.* 1854, p. 155, n.^o 235; *Rosenb. Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* xxv. pp. 143, 145, 226, n.^o 20 (1863); *id. Journ. f. Orn.* 1864, p. 114, n.^o 20.
Eos puniceus, *Licht. Nomencl. Av.* p. 71 (1854).
Polychlorus magnus, *Selvad. P. Z. S.* 1857, p. 26, 1890, p. 227 *Marie, Act. Soc. Linn. Bord.* xxvii. p. 327 (1870) *Oust. Bull. Soc. Philom. Paris*, 1870, p. 218.
Polychlorus grandis, *Selvad. (no Gm.) Journ. Pr. Lnu. Soc.* ii. p. 165, n.^o 113 (1858).
Eclectus polychlorus, var. *aruensis*, *G. R. Gr. P. Z. S.* 1858, p. 183; *id. Cat. B. New Gu'n.* pp. 49, 59 (1859); *Bernst. Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* xxvii. p. 297 (1864).
Psittacodis polychloros, *G. R. Gr. P. Z. S.* 1858, p. 104.
Mascarinus polychloros, *Hersf. & Moore, Cat. B. Mats. E. I. Comp.* ii. p. 625 (1858); *Finsch, Ned. Tijdschr. Dierk.* i. Berigten, p. xvi. (1863).
Eclectus ceylonensis, *G. R. Gr. (no Bodda.) Cat. B. Trop. Isl.* p. 34 (1859).
Eclectus cardinalis, *Wall. (no Bodda.) Ib's*, 1859, p. 210; *Selvad. P. Z. S.* 1860, p. 227; *Rosenb. Journ. f. Orn.* 1862, pp. 63, 64, 65; *id. Malay. Archip.* p. 37 (1878-79); *Dz. Vis. Ann. Rep. Brit. New Gu'n.* p. 58 (1890); *id. Colonial Papers*, n.^o 103, p. 108 (1890); *id. Ib's*, 1891, p. 29.
Psittacodis magna, *Rosenb. Journ. f. Orn.* 1864, p. 114, n.^o 22.
Muscaris (sic) polychlorus, *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 158, n.^o 8243 (1870).

M. (*sic*) intermedium, part., *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 158, n.^o 8245 (1870).

Eclectus (*sic*) intermedium, *G. R. Gr.* (*no Bp.*) *Ann.* & *Mag. N. H.* (4) v. p. 32) (1870).

Lorius simensis, *Gmel.* *P. Z. S.* 1875, p. 489.

Eclectus pectoralis, *Silvad. Orn. Pap. e Mol.* i. p. 197 (1880); *Rehne, Journ. f. Orn.* 1881, p. 252 (*Consp. Psitt.* p. 140); *id. Vogelbild. Bericht.* (1883); *Selat. P. Z. S.* 1883, p. 196; *Meyer, Sitz. u. Abh. Gesellsch. Isis*, 1884, Abh. i. p. 16; *Nehrk. Journ. f. Orn.* 1885, p. 31; *Guille. P. Z. S.* 1885, p. 62; *Silvad. Mem. R. Ac. Sc. Tor.* s.v. 2, xl p. 165 (1889); *id. Cat. B. M.* 20, 1894, *Tristr. Cat. Coll. B.* p. 76 (1889).

?*Eclectus grandis*, *Bernst.* (*no Gm.*) *Dagboek*, p. 144 (1883).

Ec. intermedium, (part.), *Musschenbr. in Bernst.* *Dagboek*, p. 250 (1883).

Hab. Filipinas.

Pag. 5. *Lorius lory*, (*Lin.*).

?*Psittacus orientalis exquisitus* Lœri dictus, *Sebt. Thes.* i. p. 37, f. 4 (1734).

First black-capped lory, *Eur. Birds*, iv, lam. 170 (1751).

?*Ara moluccensis varia*, *Briss. Orn.* iv. p. 197 (1760) (ex Seba).

Lorius philippensis, *Briss. Orn.* iv. p. 225 lam. xxiii. t. 2 (1760); *Hartl. Syst. Verz. G's. Mus.* 89 (1844); *Horsf. & Moore, Cat. B. Mus. E. I. Cons.* ii. p. 629 (1856).

Psittacus lory, *Linn. S. N.* i. p. 145 (1766); *Gm. S. N.* i. p. 335, n.^o 27 (1788); *Lith. Ind. Orn.* ii. p. 155, n.^o 93 (1790); *Shaw, Nat. Misc.* lam. 633 (1803); *id. Gen. Zool.* viii. p. 534 (1812); *Bernst. Kurze Uebers.* p. 92 (1811); *Kuhl, Cons. Psitt.* p. 41 (1820); *Veill. Enc. Meth.* p. 1380 (1823); *Less. Voy. Coq.* i. p. 628 (1828); *Vogt, Cuv. Uebers.* p. 745 (1851); *Tenim. Tabl. Meth.* p. 60 (1839); *S. Müll. Verh. Lind-en Volkenk.* p. 107 (1839-1844).

Lory des Philippines, *D'Aub. Pl. Ent.* 168.

L. tricolor, *Buff. Hist. Nat. Ois.* vi. p. 132 (1779).

?Grand perruche à barbe noir, *Buff. Hist. Nat. Ois.* vi. p. 158 (1779).

Black-crowned parrot, *Zath. Syn.* i. p. 213 (1781); *id. Gen. List.* ii. p. 125 (1822).

Black-cappel lory, *Lith. Syn.* i. p. 273, n.^o 78 (1781).

Psittacus atricapillus, *Gm. S. N.* i. p. 317 (1788); *Lith. Ind. Orn.* i. p. 88, n.^o 18 (1790); *Buchst. Kurze Uebers.* p. 63 (1881); *Veill. Enc. Meth.* p. 1387 (1823).

Lory à scapulaire bleu, *Levaill. Perr.* lam. 123, 124 (1805).

Psittacus solanus, *Shaw, Gen. Zool.* viii. p. 459 (1812).

Lorius tricolor, *Steph. Gen. Zool.* xiv. p. 132 (1826); *Less. Voy. Coq. Zool.* i. p. 628 (1828); *id. Tr. d'Orn.* p. 192 (1831); *G. R. Gr. Gm. B.* ii. p. 416, n.^o 2 (1845), *Bp. Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 156 sp. 282; *id. Naumannia*, 1856, *Consp. Britt. Psitt.* sp. 203; *Savince, Rev. et Mag. de Zool.* 1859, p. 225; *Selat. Journ. Pr. Mar. Soc.* ii. p. 165, sp. 108 (1858); *G. R. Gr. P. Z. S.* 1853, p. 791 (part.); *id. Cat. B. New. Guin.*

- pp. 39 59 (parte) (1859); *id.* *P. Z. S.* 1859, p. 158; *Selat.* *P. Z. S.* 1860, p. 227; *Wall. Ibis*, 1861, p. 311; *G. R. Gr.* *P. Z. S.* 1861, p. 435; *Rosenb. Journ. f. Orn.* 1862, pp. 63, 64; *id. Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* xxv. p. 142, 143, 147, 225, sp. 17 (1863); *Bernst. Nat. Tijdschr. Ned.* xxvi. p. 297 (1864); *Rosenb. Journ. f. Orn.* 1864, p. 114, sp. 17; *Schleg. Mus. P.-B. Psittaci*, p. 118 (1864); *Finsch. Nuz. Guin.* p. 157 (1865); *Schleg. Mus. P.-B. Psittaci. Revue*, p. 54 (1864); *Garrod. P. Z. S.* 1874, p. 587; *Selat. P. Z. S.* 1874, p. 684, pl. xvi. f. 11; *Selat. Vert. An. 8th. ed.* p. 318 (1883).
Domicella lory, *Wagl. Mon. Psitt.* p. 568 (1832); *Wall. Ann. & Mag. N. H.* (3) iii. p. 147 (1859).
Psittacus lorius, *Wagl. Mon. Psitt.* p. 568 (1832); *Wall. Ann. & Mag. N. H.* (3) iii. p. 147 (1859).
Lorius lory, *Wall. Ann. & Mag. N. H.* (3) iii. p. 148 (1859); *id. P. Z. S.* 1864, p. 288; *Salvat. Ann. Mus. Civ. Gen.* vii. p. 759 (1875), x. p. 32, n.^o 50, p. 122, (1877); *id. Orn. Pap. d. Mol.* i. p. 223 (1883); *id. Cat. B. M.* 29. 1894 p. 33; *Nérk. Journ. f. Orn.* 1885, p. 31; *Guilleml. P. Z. S.* 1885, p. 612; *Salvat. Ibis*, 1886, p. 154; *id. Mon. R. Ac. Sc. Tor.* ser. 2, xl. p. 167 (1889); *Müller. Vogel-Schl.lett.* t. lxix. (1878-89).
L. cyanuchen, *Rosenb. (n. Mill.) Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* xxv. pp. 143, 225, sp. 18 (1863); *id. Journ. f. Orn.* 1874, p. 114, sp. 18; *Bernst. Digtboek.* pp. 82 126, 151 (1883).
Domicella lory, *Finsch. Papig.* ii. p. 76 (1868); *Müller. Sitzs. k. Ak. Wissensch. Wien.* lxx. pp. 233, 238 (parte), (1874); *id. Sitzs. Isis. Drest.* 1875, p. 78 (parte); *id. Ibis.* 1875, p. 147; *Rchno Vogelbild.* t. xi. f. 2 (1878-83).
Lorius lori, *G. R. Gr. Hand-lst.* ii. p. 153, sp. 8387 (1870); *Garrod. P. Z. S.* 1874, p. 587; *Salv. Cat. B. Strickl. Coll.* p. 455 (1882); *Tristr. Cat. Coll. B.* p. 73 (1889).
Domicella tricolor, *Rchno. Vogelbild.* t. xi. f. 2 (1878-83); *id. Journ. f. Orn.* 1881, p. 272 (*Consp. Psitt.* p. 108).
Eos (?) tricolor, *Selat. Lst. Vert. An.* 8th. ed. p. 318 (1883).
Hab. Filipinas;

Gén. PALEORNIS.

Pag. 58 *P. torquata*, (Briss.) ♂ N. v.

(M. S. T.)

- ?The long-tailed green parrot, *Eduv. Glean.* iv. pl. 175 (1751); (*West Indies*); *Lath. Gen. Syn.* i. p. 23, (w/out var. A) 1781; *id. Gen. Hist.* ii. p. 153 (1822).
Psittaca, *Briss. Orn.* iv. p. 319, (1760).
Ps. torquata, *Briss. Orn.* iv. p. 323, n. 55 (1760).
Psittacus alexandri (part.), *Linn. S. N.* i. p. 141 (1766).
? *Psittacus rufirostris*, *Linn. S. N.* i. p. 143, n. 18 (?) (1766). *Gm. S. N.* i. p. 323, n.^o 18 (1788); *La h. Ind. Orn.* i. p. 95, n. 39 (1790); *Bechs. Lath. Ubers.* p. 73. (1811); *Kuhl. Conspl. Psitt.* p. 26 (1820); *Veill. Enc. Méth.* iii. p. 1401 (1823); *Veig. Cuv. Ueb.* p. 729 (1831).
? *Ps. krameri*, *Scop. Annus. I. Hist. Nat.* p. 31 (1769).
La Perruche, *D'Aubent. Pl. Ent.* 550 (♂).
La Perruche à collier, *D'Aubent. Pl. Ent.* 551 (♂).

- La perruche à collier couleur de rose, *Buff. Hist. Nat. Ois.* vi.
p. 152 (1779).
- Le Sincialo, *Buff. Hist. Nat. Ois.* vi. p. 265.
- Alexandrine parraquet, var. A, *Roseringed Parrakeet*, *Lath. Syn.* i. p. 235 (1781).
- Psittacus torquatus*, *Bodd. Tabl. Pl. Eul.* p. 32 (1783); *Kuhl.*
Consp. Psitt. p. 30 (1820); *Voigt. Cuv. Ueb.* p. 727 (1831);
Sunscr. Physiogr. Sällsk. Tidskr. 1837, p. 173; *Thienm. Fortschr.*
d. ges. Vög. p. 73 (1846).
- P. alexandri, var. B, *Gm. S. N.* i. p. 321 (1788); *Lath. Ind.*
Orn. i. p. 98 (1790).
- P. manillensis, *Bechst. Stubenvög.* p. 612 (1794); *id. Lath. Ueb.*
p. 75, n.º 50 (1811); *Hahn. Orn. Att.*, *Papag.* p. 17, t. 6
(♂) (1834).
- Alexandrine parraquet, *Lath. Syn. Suppl.* ii. p. 86 (1802).
- La perruche à collier rose, *Levaill. Perr.* p. 42 (♂), lam. 23
(joven) (1801).
- La perruche sincialo, *Levaill. Perr.* p. 42 (♀) (1801).
- La perruche souffre, *Levaill. Perr.* lam. 43 (var.) (1801).
- Sulphur parraquet, *Shaw. Gen. Zool.* viii. 2, p. 428 (1811); *Lear.*
Parr. lam. 33 (1832).
- Psittacus s. ncialo*, *Shaw. Gen. Zool.* viii. 2, p. 441 (1811).
- Rose-ringend parraquet, *Lath. Gen. Hist.* ii. p. 160 (1822).
- Palaeornis torquatus*, *Vig. Zool. Journ.* ii. p. 50 (part.). (1825);
Steph. Gen. Zool. xiv. 2, p. 126 (1826); *Frankl. P. Z. S.*
1831, p. 120; *Sykes. P. Z. S.* 1831, p. 120; *Sykes. P. Z. S.*
1832; p. 96 (*Dukhunum*); *M. Clell. P. Z. S.* 1839, p. 165; *Du-*
win. J. A. S. B. viii. p. 1097 (1839) (*Oxus*); *Jerd. Midr.*
Journ. xi. p. 207 (1840); *Blyth. Ann. & Mag. N. H.* xii. p.
90 (1840); *Ewer. P. Z. S.* 1842, p. 92; *Strickl. P. Z. S.*
1842, p. 167; *Hodgs. Gray's Misc.* p. 85 (1844); *Gray. Cat.*
Hodgs. Coll. B. Mus. p. 113 (1846); *G. R. Gr. Gen. B.* ii. p.
409, n.º 3 (parte) (1846); *Blyth. Cat. B. Mus.* A. S. B. p.
4 (1849); *id. J. A. S. B.* xix. p. 231 (1850); *Kelaart. Prodri.*
Faun. Ceyl. p. 127 (1852); *Layard. Ann. & Mag. N. H.* (2)
xiii. p. 262 (1854); *Burg. P. Z. S.* 1854, p. 255; *Theobald.*
J. A. S. B. xxiii. p. 59 (1854); *Hartl. Journ. f. Orn.* 1854,
p. 158; *Bp. Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 152, n.º 138;
Chesney. Jour. of the Euphr. Exped. i. pp. 443-537;
Souancé. Rev. et Mag. de Zool. 1859, p. 957; *Bp. Naumannia*,
1859, *Consp. Psitt.* n.º 143; *Horsf. & Moore. Cat. B. Mus.*
E. I. Comp. ii. p. 611 (1859-58); *Philipp. P. Z. S.* 1857,
p. 99; *Adams. P. Z. S.* 1858, p. 490, 1859, p. 173
Moore. P. Z. S. 1859, p. 453; *G. R. Gr. List Psitt.* *Brit.*
Mus. p. 19 (1859); *Irby. Ibis.* 1861, p. 218; *Jerd. B. of Ind.*
i. p. 257 (1862); *Blyth. Ibis.* 1863, p. 2; *Finsch. Ned. Tijdschr.*
Dierk. i. *Berigt.* p. ix. (1863); *Schleg. Mus. P.-B.* *Psittaci*,
p. 80 (parte) (1864); *Park. P. Z. S.* 1865, p. 238; *Beav. ibid.*
p. 691; *id. Ibis.* 1865, p. 409, 1867, p. 320; *Layard. B. of S.*
Afr. p. 320 (*nutrix*) (1867); *Finsch. Papag.* ii. p. 17 (parte)
(1868); *Hume. Ibis.* 1869, p. 4; *Sousa. Mus. Nat. Lish.* *Psittaci*,
p. 14 (1869); *Blyth. Ibis.* 1870, p. 162; *G. R. Gr. Hand-list*,
ii. p. 142, n.º 8151 (1870); *Autrs. P. Z. S.* 1871, p. 97-9,
1872, p. 85; *Hodgson. P. Z. S.* 1872, p. 425; *Ewes. P. Z. S.*

- 1873, p. 661; Hume, *Str. Feath.* i. p. 170 (1873); *id.*
Nests & Eggs, p. 116 (1873); Lloyd, *Ibis*, 1873, p. 407; Hume,
Str. Feath. ii. p. 13 (1874); Hall, *ibid.* p. 389 (*Chota Nagpur*);
Legge, *Ibis*, 1874, p. 14; Wald, *Ibis*, 1874, p. 282; Schleg.
Mus. P.-B. Psittaci, Revue, p. 35 (part.) (1874); Gulliv. *P. Z. S.*
1875, p. 489; Blyth, *B. of Burm.* p. 55 (1875) Legge, *This*,
1875, p. 282; Hume, *Str. Feath.* iii. p. 56 (1875); Bull.
Str. Feath. iii. p. 457 (*Mount. Aboo et N. Guzerat*) (1875);
Gieb. *Thes. Orn.* iii. p. 11 (part.) (1877); Hume, & Davis.
Str. Feath. vi. p. 118 (1878); Hume, *Str. Feath.* viii. pp. 51,
86, n.^o 148 (1879); Scully, *Str. Feath.* viii. p. 240 (1879);
Schmidt, *P. Z. S.* 1880 p. 309; Legge, *B. of Ceyl.* p.
171 (1880); Rehnw. *Vogelbild.* t. v. f. 7 (1878-83); *id. Journ.*
f. Orn. 1888, p. 235 (*Consp. Psitt.* p. 124); Salv. *Cat. B.*
Strickl. Coll. p. 457 (part.) (1882); Oates, *Str. Feath.* x. p.
189 (1882); *id. B. Brit. Burm.* ii. p. 141 (1883); *Scat.*
List Vert. An. 8th ed. p. 321 (1883); Swinh. & Barn. *Ibis*,
1885, p. 65; Park. *Ibis*, 1886, p. 183; Sundev. *Ibis*, 1886, p.
454; Hume, *Str. Feath.* xi. p. 54 (1888); Tristr. *Cat. Coll.*
B. p. 75 (1889); Murr. *Avis. of Brit. Ind.* ii. p. 467 (1890);
Oates *Nests & Eggs. Ind. B.* iii. p. 85 (1890); Salv. *Cat. B.*
M. 20. 1894, p. 443.
Conurus rufirostris, Less. *Tr. d'Orn.* p. 213 (1831); *Le Maout,*
Hist. Nat. Ois. p. 97 (1853).
C. torquatus, Less. *Tr. d'Orn.* p. 215 (1831).
Palæarnis cubicularis, Wagl. *Mon. Psitt.* p. p. 507 (1832).
Psittacus torquatus luteo varians, Bourj. *Perr. lam.* 2 (1837-38).
Palæornus bitorquatus, Blyth (no Kuhl), *Cat. B. Mus. A. S.*
B. p. 4 (1849).
P. layardi, Blyth, *Cat. B. Mus. A. S. B.* p. 341 (1849);
Bp. Rev. et. Mag. de Zool. 1854, p. 152, n.^o 142; *G. R. Gr. List Psitt.* *Brit. Mus.* p. 20 (1859); *Sousa, Mus. Nac.*
Lisb. *Psittaci*, p. 15 (1869); *G. R. Gr. Hand-list*, ii. p. 143,
n.^o 8060 (1870).
P. frenatus, (part.), *Licht. Nomencl. Av.* p. 71 (1854).
P. torquata, Beav. *Ibis*, 1869, p. 410; Llyard, *Ibis*, 1869, p.
456 (var) Garrod, *P. Z. S.* 1873, p. 634, 1874, p. 587; Par-
ker, *Ibis*, 1883, p. 193.
Hab. Ceilan, Luzon.

Pag 58. Gén. EOS, WAGLER.

E. rubiginosa, Bp.

- (*halcopsitta rubiginosa*, Bp. *Conspl. An.* i. p. 3 (1850); *id. Compt.*
Rend. xxx, p. 134 (1850); *id. P. Z. S.* 1850, p. 26 (no), lam.
xvi.); *id. Riv. Mag. Zool.* 1854, p. 156, n.^o 292; *id. Nau-*
marinia, 1856, *Conspl. Psitt.* n.^o 306; *Scat. P. Z. S.* 1860, p.
227; *Walt. Ibis*, 1861, p. 290; *G. R. Gr. P. Z. S.* 1861, p. 436;
Rosenb. *Journ. f. Orn.* 1862, p. 63; *id. Nat. Tijdschr. Ned.*
Ind. xxv. p. 143 (1863); Wall. *P. Z. S.* 1864, pp. 289, 294;
Pelz. *Novara Reise, Vög.* p. 99 (1865); *G. R. Gr. Hand-list*,
p. 153, n.^o 8193 (1870); Tristr. *Cat. Coll. B.* p. 73 (1889).

Eos rubiginosa, *G. R. Gr.*, *List Psitt. Brit. Mys.*, p. 53 (1859);
id. Cat. B. New Guin., pp. 49, 50 (1859); *Rosenb. Journ. J.*
Orn. (1864), p. 114; *Salvad. Orn. Pap. e Mol.* i, p. 267
(1880); *id. Cat. B. M.*, 20, 1894, p. 29.

Lorius rubiginosus, *Schleg. Mus. P.-B. Psittaci*, p. 129 (1864);
Finsch. New-Gu'n., p. 157 (1895); *Schleg. Mus. P.-B. Psittaci,*
Revue, p. 58 (1874); *Giel. Thes. Orn.* ii, p. 592 (1875).

Domicella rubiginosa, *Finsch. Papag.* ii, p. 781 (1868); *id. P. Z.*
S. 1890, pp. 127, 128, 1872, p. 88.

Trichoglossus rubiginosus, *Finsch. Journ. Mus. Godeffr. Heft.*
xii, p. 17, 18 (1876); *id. P. Z. S.* 1877, p. 778; *id. Journ.*
f. Orn. 1880, p. 284; *id. Ibis*, 1881, pp. 110, 111, 114; *Rehne.*
Journ. f. Orn. 1881, p. 162 (*Consp. Psitt.* p. 98); *id. Vogel-*
bild. i, xxx, f. 6 (1878-83).

Hab. Carolinas, Ponapé.

Pág. 66. *Accipiter manillensis*, *Mey.n.*

Wardlaw Ramsay. Ibis. 1884, p. 339.

Hab..... Guimaras.

Pág. 71. *Spilornis holospilus*, *Vig.*

Hab..... Masbate; Romblon, Tablas, Sibuyan, Joló, Tawi-tawi.

Pág. 72. *S. panayensis*.

Steere. List. B. etc. M. Steere, Exped. 1890, p. 7 (es sinonimia
de la especie 11) *S. holospodus*, *Vig.*

Hab..... Masbate, Tablas, Romblon, Sibuyan, Joló, Tawi-tawi.

Pág. 72. *Butastur indicus*, *(Gm.)*

Hab..... Calamianes, Misbate, Joló, Tawi-tawi.

Pág. 74. *Cuncuma leucogaster*, *(Gm.)*

**Hab.*.... Mindoro, Naujan, Calamianes, Culión, Misbate, Tablas,
Romblon, Sibuyan, Siquijor, Basilan, Tawi-tawi.

Pág. 75 *Haliastur intermedius*, *Gurn.*

Hab..... Tablas, Romblon, Misbate, Sibuyan, Calamianes, Cu-
lión, Basilan, Tawi-tawi.

Pág. 77. *Elanus hypoleucus*, *Gould.*

Hab..... Calamianes, Culión, Tawi-tawi.

Pág. 77 *Pernis ptilonorhynchus*, *(Tem.)*

Hab..... Cebú, Sibuyan.

Pág. 81. **Hypotriorchis severus**, (Horsf.)

Hab... Cebú, Romblon, Siquijor, Calamianes, Sibuyan, Tawi-tawi.

Pág. 88. **Ninox lugubris**, Tick.

Hab... Masbate, Joló.

Pág. 88. **N. philippinensis**.

Hab... Masbate.

Pág. 89. **N. spilogaster** Fr. et Worc.

Prelim. Not. Menag. Exped. Philipp. 1894, p. 8.

Hab. Cebú, Sibuyan, Tablas, Mindoro, Baco.

Pág. 89. **N. japonica**, T. et S.

Sharpe, P. Z. S. 1879, p. 325.

Hab. Cebú.

Pág. 94. **Corone philippina**.

Hab... Romblon, Tablas, Sibuyan, Tawi-tawi.

Pág. 98. **Criolus achorhynchus**, Vig.

Hab... Romblon, Masbate, Sibuyan, Tablas, Calamianes, Tawi-tawi.

Pág. 99 **O. samarensis**,

Steere, List. B. et M. Steere Exped. 1890, p. 17; *id. Ibis*,
1891, p. 311.

O. cinereogenys, Fr. et Worc.

Prelim. Not. Menag. Exped. Philipp. 1894, p. 16.

Hab. Tawi-tawi.

O. nigrostriatus, Fr. et Worc.

Prelim. Not. Menag. Exped. Philipp. 1894, p. 16.

Hab. Negros, Masbate.

Pág. 100 **Buchanga palawanensis**, Whitch.

Whitehead, Ibis, 1890, p. 47.

Hab. Calamianes, Paragua.

Pág. 101. **Chibia menagei**, Fr. et Wore.

Prelim. Not. Menage Exped. Philipp. 1894 p. 15.
Hab. Sibuyan.

Ch. palawanensis, (Tw.)

Sharpe, Ibis, 1884, p. 318.
Hab. Paragua, Calamianes.

Ch. borneensis, Sharpe.

Sharpe, P. Z. S. 1879, p. 246.
Hab. Tawi-tawi.

Pág. id. **Artamides sumatrensis**, (S. Mill.)

Hab... Calamianes, Culion.

Pág. 102. **A. mindorensis**.

Steere List, B. et M. Steere Exped. Philipp. 1890, p. 14.
Hab... Tablas.

Pág. 102. **A. guilleardi**, (Salv.).

Salvad. Ibis, 1886, p. 154.
Hab. Tawi-tawi.

Pág. 103. **Edoliisoma everetti**, Sharpe.

Sharpe, Ibis, 1894, p. 254.
Hab. Joló, Tawi-tawi.

Pág. 104. **Pericrocotus leytenensis**, Steere.

List B. et M. Steere Exped. p. 15 (1890).
Hab... Samar, Borongan, Paric.

Pág. 105. **Lalage terat**, (Bodd).

Hab... Calamianes, Tablas, Romblon, Sibuyan, Siquijor.

Pág. 105. **L. minor**, (Steere).

Pseudolalage minor, Steere, List Bel. u. Steere, Exped. Philipp. 1890, p. 15.
Hab... Samar.



Pág. 106. Gén. CRYPTOLOPHA, SWAINSON.

1. *C. olivacea*, Mossely.

Mossely, *Ibis*, 1891, p. 46.

Hab. Mindanao, Joló, Tawi-tawi.

2. *C. flavigularis*, Fr. et Worc.

Prelim. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 23.

Hab. Cebú.

Gén MUSCICAPULA, SALV.

M. mindanensis, Blas.

Blas. J. f. O. 1890, p. 147.

Hab. Basilan.

M. samarensis, Gr. et Worc.

Prelim. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 26.

Hab. Samar.

Pág. 107. **Muscicapa griseisticta**, (Swinh.)

Hab... Mindoro, Baco, Siquijor, Masbate, Calamianes, Tawi-tawi.

Pág. 108 **P. caprata**.

Hab... Masbate, Siquijor.

Pág. 110. **Hypothymis azurea**, (Bodd.).

Hab... Tablas, Romblon, Sibuyan, Masbate, Siquijor, Calamianes, Tawi-tawi.

Pág. 111. **Cyanomyias cælestis**, Tav.

Hab... Sibuyan, (Men. Exped.)

Pág. 111. **C. helenæ**, Steere.

List B. et M. Steere Exped. Philipp. 1890, p. 16; *Ibis*, 1891, p. 311.

Pág. 111. **Rhipidura sauli**, Fr. et Worc.

Prelim. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 26.

Hab. Tablas.

Pag. 112 *Rh. nigritorquis*, *Vigors.*

Hab.... Samar, Borongan, Mindoro, Calamianes, Tablas, Romblon, Sibuyan, Masbate, Siquijor, Tawi-tawi.

Pag. 112 *Zeocephus rufus*, *Blyth.*

Hab.... Tablas, Romblon, Sibuyan, Cabú.

Z *cinnamomeus*, *Sharpe.*

Hab.... Tawi-tawi.

Pag. 113 *Z. cyanescens*, *Sh.*

Hab.... P. Princesa, Calamianes, Calion.

Rhinomyias albicularis, *Fr. et Wore.*

Prelim. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 27.
Hab. Negros, Guimaras.

Rh. ocularis, *Gr. et Wore.*

Prelim. Not. Menage Exped. 1894, p. 28.
Hab. Joló, Tawi-tawi.

Cuicicapa penayensis, *Sharpe.*

Hab.... Romblon, Tablas, Sibuyan, Guimaras, Masbate, Siquijor, Tawi-tawi.

Pag. 115 *Siphia philippensis*, *Sharpe*

Hab.... Tablas, Siquijor, Romblon, Sibuyan, Guimaras, Masbate, Tawi-tawi.

S lemprieri

Sharpe, Ib's, 1894, p. 319.
Hab.... Calamianes.

Pag. 116 *Phylloscopus borealis*.

Hab.... Samar, Borongan; Calamianes, Tablas, Sibuyan, Jolo, Tawi-tawi.

Pag. 118 *Aerocephalus orientalis* *Zem*

Hab.... Mindoro, Baco.

Pág. 121. **Geocichla cinerea**, Fr. et Wore.

Prel. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 23.
Hab. Mind ro, Naujan.

Pág. 128. **Frithacus calliope**

Hab... Masbate.

Pág. 129. **Monticola solitaria**. (Bris.)

Hab... Tablas, Masbate, Romblon, Sibuyan, Siquijor, Joló, Tawi-tawi.

Pág. 133. **Iole haynaldi**, (Blas.)

Sharpe, Ibis, 1894, p. 253.
Hab. Tawi-tawi.

Iole cinereiceps, Fr. et Wore.

Prel. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 25.
Hab. Tablas, Romblon.

Iole monticola, Fr. et Wore.

Prel. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 25.
Hab. Cebú.

Pág. 135. **Pycnonotus goiavier**.

Hab... Masbate, Tablas, Panay.

Pág. 136. **P. cinereifrons**.

Hab... Calamianes.

Pág. 136. **Irena tweeddalei**.

Hab... Calamianes, Culion.

Pág. 138. **Copsychus mindanensis**

Hab... Min loro, Naujan, Tablas, Sibuyan, Masbate, Siquijor, Tawi-tawi.

Pág. 139. **Cittocincla cebuensis**, Steere.

Steere, List. B. et M. Exped. Philipp. 1894, p. 20; Id. Ibis, 1891, p. 314.
Hab. Cebú.

C. superciliaris. *Fr. et Wore.*

Prel. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 23.
Hab. Masbate.

Pág. 140. **Megalurus palustris.**

Hab.... Masbate.

M ruficeps.

Hab.... Calamianes, Culion.

Pág. 141. **Orthotomus castaneiceps.**

Hab.... Masbate.

Pág. 142. **O. ruficeps.**

Hab.... Calamianes, Culion.

Pág. 143. **Cisticola exilis.** *Fig.*

Hab.... Samar, Borongan, Tablas, Sibuyan, Panay, Cebú, Si-
quijor, Masbate, Mindoro, Baco, Calamianes, Culion.

Pág. 147. **Mixornis plateni,** *Blas.*

Blas. J. F. O. 1890, pp. 145, 147.
Hab. Samar, Paric.

Ptilocichla minuta. *Fr. et Wore.*

Prelim. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 21.
Hab. Samar, Brongan, Calbayog.

Pág. 149. **Parus elegans.**

Hab.... Mindoro, Baco, Tawi-tawi.

Pág. 150. **Pachycephala winchelli,** *(Fr. et Wore).*

Hyloterpe winchelli, *Franck et Worcester. Prelim. Not. Menage Exped. Philipp. 1894*, p. 21.
Hab. Panay, Negros, Misbate.

P. major, *(Fr. et Wore).*

Hyloterpe major, *Franck et Wore. loc. cit.* p. 22.
Hab. Cebú, Tablas, Siquijor.

P. mindorensis., Fr. et Wore, ♂♂ N. v. (M. S. T.)

Hyloterpe mindorensis, Gr. c/ Wore, loc. cit. p. 22.
Hab. Mindoro, Calapan, Naujan.

P. homeyeri., Blas.

Blas, J. f. O. 1860, p. 143.
Hab. Mindanao, Tawi-tawi.

Pág. 151. **Lanius nigriceps**

Hab... Masbate, Calamianes, Culion.

L. lucionensis.

Hab... Calamianes, Cuion, Tablas, Roñblon, Sibuyan, Si-
quijor, Jolo, Tawi-tawi.

Pág. 154. **Climacteris mystacalis**

Hab... Negros, Masbate.

Pág. 156. **Sitta oenochlamys.**

Hab... Samar, Borongan, Parauas.

Pág. 158. **Aethopyga arolasi**, Fr. et Wore.

Prelim. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 17.
Hab. Jolo, Tawi-tawi.

Ae. bonita, Fr. et Wore.

Prelim. Not. Menage Exped. Philipp. p. 17 (1894).
Hab. Negros, Cebú, Masbate.

Ae. minuta, Fr. et Wore, ♂♂ N. v.

(M. S. T.)

Prelim. Not. Menage, Exped. Philipp. 1894, p. 18.
Hab. Mindoro, Naujan.

Pág. 157. **Ae. magnifica**.

Hab... Panay, Tablas, Sibuyan.

Pág. 158. **Ae. shelleyi**.

Hab... Calamianes, Culion.

Cinnyris sperata.

Hab..... Calamianes, Culion, Tullas, Ronblon, Sibuyan, Panay,
Siquijor, Cebú.

Pag. 159 *C. juliae.*

Hab..... Tawi-tawi.

Pag. 160 *C. guimaraensis.*

Steere, *List B. et M. Exped. 1890*, p. 22; *id. Ibis. 1894*, p. 305.
Hab.... Panay.

C. jugularis.

Hab.... Tawi-tawi, Tablas, Ronblon, Sibuyan, Masbate.

Pag. 163 *Anthothreptes chlorogaster.*

Hab.... Tablas, Sibuyan, Ronblon, Panay, Tawi-tawi.

Pag. 166, 14 bis. *Zosterops cinerea*. *King*

Hab. Marianas.

15 bis. *Z. siquijorensis*. *Fr. & Wrc.*

Prel. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 21.
Hab. Siquijor.

Pag. 166 *Z. basilanica*

Steere, *List B. et M. Exped. 1890*, p. 91; *id. Ibis. 1894*, p. 314.
— *Z. everetti.*
Hab.... Tawi-tawi.

Pag. 167. *Dicæum rubriventer.*

Hab.... Samar, Borongan, Masbate.

Pag. 167. *D. palidior*. *Fr. & Wrc.*

Prel. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 19.
Hab. Cebú.

D. sibuyanica. *Fr. & Wrc.*

Prel. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 19.
Hab. Sibuyan.

D. intermedia, *Fr. et Wore.*

Prel. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 19.
Hab. Romblon, Tablas.

D assimilis, *Fr. et Wore.*

Prel. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 19.
Hab. Joló, Tawi-tawi.

D. mindanense.

Hab... Basilan, Joló, Tawi-tawi.

Pag. 169. D. pygmaeum.

Hab... Samar, Borongan, Siquijor, Masbate, Sibuyan.

Pag. 170. Prionochilus aeruginosus, *Fr. et Wore.*

Prel. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 20.
Hab. Cebú, Mindanao.

P. bicolor, *Fr. et Wore.*

Prel. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 20.
Hab. Mindanao, Zamboanga.

P. modestus, *Hume.*

Hume, Str. F. p. 289, (1875).
Hab. Paragua.

Pag. 174. Hirundo gutturalis

Hab... Mindoro, Baco, Basilan, Siquijor, Joló.

Pag. 175. H. javanica.

Hab... Panay, Guimarás, Luzón, Laguna, Los Baños, Masbate, Siquijor, Calamianes, Tawi-tawi.

H. striolata.

Hab... Masbate.

Pag. 180. Motacilla melanope.

Hab... Romblon, Sibuyan, Masbate, Tablas, Joló, Tawi-tawi.

Pag. 187. *Anthus rufipennis*.

Hab.... Calamianes, Culion, Tablas, Romblon, Sibuyan, Masbate.

Pag. 190. *A. gustavi*.

Hab. Masbate, Romblon, Sibuyan, Tawi-tawi.

Pag. 197. *Artamus leucogaster*

Hab.... Tablas, Romblon, Sibuyan, Masbate, Calamianes, Tawi-tawi.

Pag. 200. *Sarcops calvus*.

Hab.... Tablas, Romblon, Sibuyan, Tawi-tawi, Luzón, Laguna, Calamba.

Pag. 202. *Mainatus palawanensis*.

Hab.... Calamianes, Culion.

Pag. 205. *Calornis panayensis*.

Hab.... Luzon, Laguna, Calamba, Samar, Borongan, Paranas, Calamianes, Culion, Tablas, Romblon, Sibuyan, Tawi-tawi.

Pag. 206. *Munia oryzivora*.

Hab.... Manila, Pasig, Laguna, Calamba, Panay, Samar, Paric.

Pag. 207. *M. jagorii*.

Hab.... Tablas, Romblon, Sibuyan, Siquijor, Calamianes, Basilan, Tawi-tawi.

Pag. 208. *Uroloncha everetti*.

Hab.... Calamianes, Tablas, Romblon, Sibuyan, Tawi-tawi.

Pag. 216. *Pitta erytrogenastra*.

Hab.... Tablas, Sibuyan, Romblon, Panay, Masbate, Cebú, Siquijor, Tawi-tawi.

Pag. 218. *P. atricapilla*.

Hab.... Tablas, Cebú, Calamianes, Tawi-tawi.

Pag. 223. *Colocalia fuciphaga*

Hab. Luzón, Pangasinan, Sual.

Pag. 224. *C. troglodytes*.

Hab.... Samar, Borongan, Cebú, Mindoro, Siquijor, Masbate, Sibuyan, Romblon.

Pag. 225 *C. marginata*.

Hab.... Masbate.

Pag. 225. *C. francica*. (*Gm*)

La petite Hiro-delle noire à croupion gris, *Buff. Hist. Nat. Ois.* vi. p. 696 (1779); *ibid.* fol. vii. p. 343 (1783).

Grey-rumped swallow, *Lath. Gen. Syst.* ii. p. 582 (1783).

Hirundo francica, *Gm. Syst. Nat.* iii. p. 1017 (1783); *Lath. Ind. Grn.* p. 580 (1790); *Steph. Gen. Zool.* x. p. 115. (1817); *Grat. An. Kingd.* vii. p. 67 (1829).

Hirundo francisca, *Vieill. Nov. Duct.* xiv. p. 525 (1817).

Hirundo francia, *Less. Tr. Orn.* p. 270 (1831).

Collocalia francica, *Gray. List. Spec. B. Brit. Mus.* p. 21 (1848); *E. Newton, Ibis*, 1860, p. 201; *Cab. & Heine. Mus. Hein.* iii. p. 82 (1860); *Hartl. Orn. Beitr. Fauna. Madag.* p. 25 (1861); *Coquerel, Alb. Réunion*, p. 21, fig. 1 (1825); *Schleg. P. Z. S.* 1866, p. 421; *Gray. Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1866, xvii. p. 122; *E. Newton, Ibis*, 1861, 271; *ibid.* 1877, p. 359; *Schleg. & Pölln. Fauna. Madag.* ii. p. 67, (1868); *Gray. Handl. i.* p. 95 (1869); *Walden. Ibis*, 1874, p. 132 (part.); *il. ibd.* 1876, p. 356 (part.); *Hartl. Voy. Madag.* p. 59 (1877); *Milne-Edw. & Grandid. Madagascar*, p. 198, pls. I—LXXV. (1879); *Salv. Cat. Strickl. Coll.* p. 372 (1882); *Hartl. Cat. B. M.* 16, 1892, p. 503. *Macropteryx spodiopygia*, *Peale. U. S. Expl. Exp.* 1848, p. 179, 44, 1848, *Hartl. Wiegm. Arch.* 1852, p. 112.

Collocalia spodiopygia, *Cass. U. S. Expl. Exp.* 1853, p. 184, lam. xii. fig. 3 (1858); *Gray. Ann. & Mag. Nat. Hist.* 1859, xvii. p. 122; *id. Handl. i.* p. 95 (1860); *Hartl. & Finch. Orn. Contr. Polynes.* p. 48 (1875); *Finsch. & Hartl. P. Z. S.* 1871, p. 23; *Whitmer. Ibis*, 1875, p. 437; *Layard. Ibis*, 1870, p. 391; *Kleinschm. Journ. Mus. Godeffr.* vii. p. 805 (1870); *Cas. & Reichen. J. F. O.* 1870, p. 524; *Finsch. P. Z. S.* 1870, p. 19; *id. P. Z. S.* 1877, p. 723; *Ramsay. Proc. Linn. Soc. N. S. W.* iii. p. 265 (1878); *Salvad. Ibis*, 1879, p. 323; *id. Atti. R. Acc. Sc. Tor.* xv. p. 347 (1880); *id. Orn. Papuasia*, i. p. 546 (1880); *Sci. Voy. Challenger*, p. 34, 44 (1880).

Cypselus francicus, *Schlzg. & Pölln. Ois. Mad.* ii. p. 67 (1868).

Cypselus terræ reginae, *Ramsay. P. Z. S.* 1874, p. 601.

Collocalia terra reginae, *Gould. B. N. Guinea*, iv. pl. 38 (1875); *Ramsay. Proc. Linn. Soc. N. S. W.* ii. p. 178 (1877); *Sauvage. Journ. Linn. Soc. N. S. W.* iii. p. 265 (1878); *Salvad. Ibis*, 1879, p. 323.

*Collocalia infuscata**, *Salvad. Atti. R. Acc. Sc. Tor.* xv. p. 348 (1880); *id. Orn. Papuasia*, i. p. 447 (1880); *id. Atti. R. Acc. Sc. Tor.* xvii. p. 450 (1882); *id. Aggr. Orn. Pap.* i. p. 64 (1889). *Hab.* Pan y, Calanianes; Australia.

Pag. 226. *Macropteryx comata*

Hab.... Samar, Tablas, Masbate, Jolo, Tawi-tawi.

Pag. 227. 1 bis *Caprimulgus jotaka*. *Ten et Sch.*

Caprimulgus jotaka, Temm. & Schleg. *Fam. Jap.*, 1858, p. 37; *Num. 12* (1847); *Bp. Conspect.* i, p. 69 (1850); Schrenck, *Vog. Amurland*, ii, p. 253 (1850); *Soviet. Ibis*, 1871, p. 327; *id. P. Z. S.* 1873, p. 263; *d. Ibis*, 1870, p. 89; *id. P. Z. S.* 1871, p. 344; *id. Ibis*, 1874, p. 434; *id. Ibis*, 1875, p. 331; Ridde, *Ris. Sib.*, 152, p. 133 (1853); Whistler, *Ibis*, 1877, p. 195; Gray, *Hand-l.* i, p. 57 (1860); Swinh. *P. Z. S.* 1871, p. 344; Tacz. *J. J. O.* 1872, p. 351; *id. Bull. Soc. Zool. Fr.* 1876, p. 132; Przevalski, *Riot. Orn. Mscr.* ii, p. 157 (1877); Dav. & Oost. *O's. Chine*, p. 67 (1877); Blak. & Poyer, *Ibis*, 1878, p. 251; Hume & Davison, *Stray. F.* vi, p. 56 (1878); Scully, *Stray F.* viii, p. 235 (1879); Jerv., *Proc. U. S. Nat. Mus.* vi, p. 310 (1883); Oates, *B. Burm.* ii, p. 21 (1883); *id. et. Hume's Nest. & Eggs. Ind. B.* iii, p. 45 (1860); Irissi *Ibis*, 1885, p. 194; Sian, *Ibis*, 1887, p. 228; Hume, *Stray F.* xi, p. 38 (1888); Szeb. *P. Jap. Eup.* p. 178 (1890); Hartert, *Ibis*, 1892, p. 283.

Caprimulgus indicus, Pelz. *Reis. Nov. Iör.* p. 34 (1853); Pithy, *B. Burma*, p. 83 (1875); Hume, *Stray F.* vi, p. 17 (1877); p. 318 *Hume & Davison. Stray. F.* vi, p. 56 (1878).

C. dytiscivorus, Swinh. *Ibis*, 1870, p. 130.

C. melanopogon, Salvert. *Ann. Mus. Civ. Gen.* vii, p. 918 (1875); *n.* p. 311 (1877); *id. Orn. Papuas.* i, p. 530 (1880).

Caprimulgus innominatus, Hume, *Stray F.* 1875, p. 318, *nota*
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo, China.

C. micrurus.

Hab.... Sibuyan.

Pag. 228. *Lynconis mindanensis*.

Hab.... Basilan.

Pag. 230 *Batrachostomus menagei*. *Fr. pt. II.*

Prelim. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 11.
Hab. Filipinas.

Pag. 231. *Eurystomus orientalis*.

Hab.... Tablas, Sibuyan, Romblon, Calamianes, Leyte-tawi.

Pag. 232. *Merops bicolor*

Hab.... Tablas, Masbate, Calamianes.

Pag. 236. *Pelargopsis gouldi*.

Hab... Calamianes, Culion.

P. gigantea.

Hab... Cebú, Negros, Tablas, Sibuyan, Tawi-tawi.

Alcedo ispida.

Hab... Tablas, Romblon, Sibuyan, Panay, Tawi-tawi.

Pag. 242. *Ceyx rufidorsa*.

Hab... Calamianes, Tawi-tawi.

Pag. 243. *Ceyx nigrirostris*, *Fr. et Worcester*.

Prel. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 13.

Hab. Panay, Negros, Cebú.

Pag. 245. *Halecyon coromandus*.

Hab... Masbate, Sibuyan, Tawi-tawi.

249. *H. winchelli*.

Hab... Tawi-tawi, Siquijor, Cebú, Tablas, Romblon, Sibuyan.

Pag. 250. *H. chloris*.

Hab... Calamianes, Culion, Tawi-tawi, Tablas, Sibuyan, Masbate, Siquijor.

Pag. 258. *Harpactes ardens*. N. v. Sinaguilala, Adac.

Hab... Laguna, Calamba.

Pag. 262. *Iyngipicus menagei*, *Fr. et Worcester*.

Prelim. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 262.

Hab. Sibuyan.

Pag. 269. *Thripornax philippinensis*.

Steere, List. B. et M. Steere Exped. 1890, p. 8; *id. Ibis*, 1891

p. 315.

Hab... Panay.

Pag. 271. *Xantholæma intermedia.*

Hab... Tablas, Masbate.

Pag. 27. *Coccystes coromandus.*

Hab... Paragua P. Princesa, Siquijor.

Pag. 274. *Surniculus velutinus.*

Hab... Samar, Borongan, Joló, Tawi-tawi.

Pag. 276. *Cuculus canorus.*

Hab... Siquijor.

Pag. 280. *Cacomantis merulinus.*

Hab... Tablas, Calamianes, Tawi-tawi.

Pag. 284. *Eudynamis mindanensis.*

Hab... Cebú, Siquijor, Masbate, Panay, Sibuyan, Romblon, Tablas, Tawi-tawi.

Pag. 289. *Centropus viridis.*

Hab... Siquijor, Tablas, Romblon, Sibuyan.

C. javanicus

Hab... Mindanao, Tawi-tawi, Siquijor, Cebú.

Pag. 291. *C. steerii. Fr et Wore* & N. v. *Talahiban.* (M. S. T.)

Prel. Not. Menage Exped. Philipp. 1894, p. 14.

Hab. Mindoro, Baco, Calapan.

Pag. 292. *Dryococcyx harringtonii.*

Hab... Calamianes.

Pag. 294. *Osmotreron axillaris.*

Hab... Siquijor, Tawi-tawi.

Pag. 295. *O. vernans.*

Hab... Negros, Masbate.

Pag. 298. *Phabotreron occipitalis.*

Hab... Samar, Mindoro, Calapan.

Ph. nigrorum.


Hab... Tablas, Masbate, Sibuyan.

Pag. 299. **Leucoteron occipitalis.**

Hab... Samar, Paranas, Mindoro, Naujan.

Pag. 300. **L. leclanderi.**

Hab... Tablas, Calamianes, Culion.



INDICE.

Tipo 1.^o VERTEBRADOS.

Clase 1.^a MAMIFEROS.

Subclase 1.^a

MONODELFOS.

Orden 1.^o CUADRUMANOS.

Fam. 1.^a SIMIDOS.

Subfam. 1.^a SIMINOS.

Pág.

1. Gén. Simia, <i>Lin.</i>	1
satyrus, <i>Lin.</i> var. <i>bicolor.</i>	»

Subfam. 2.^a HILOBATINOS.

Gén. Hylobates, <i>Hilg.</i>	»
funereus, <i>Is.</i> <i>Geoff.</i>	»

Fam. 2.^a CERCOPITÉCIDOS.

Subfam. SEMNOPITÉCINOS.

Gén. Semnopithecus, <i>Cuv.</i>	»
entellus, <i>F.</i> <i>Cuv.</i>	»
dussumieri, <i>Desm.</i>	2
leucoprymnus, <i>Desm.</i>	»
albipes, <i>I.</i> <i>Geoff.</i>	»

Gén. Nasalis, <i>Geoff.</i>	»
nasica, <i>Schreb.</i>	»

Gén. Cynomolgus, <i>Reich.</i>	3
cynomolgus, <i>Schr.</i>	2

philippensis, <i>I.</i> <i>Geoff.</i> var. <i>albina.</i>	2 et 623
---	----------

palpebrosus, <i>I.</i> <i>Geoff.</i>	3
--	---

fur, <i>Slack.</i> var. . . .	»
var. <i>cumingii</i> , <i>Gray.</i>	»

Gén. Macacus, <i>Lacep.</i>	»
-------------------------------------	---

speciosus, <i>F.</i> <i>Cuv.</i>	»
--	---

maurus, <i>F.</i> <i>Cuv.</i>	»
---------------------------------------	---

rhesus, <i>Desm.</i>	»
------------------------------	---

sinicus, <i>Lin.</i>	3
nemestrinus, <i>Dum.</i>	»
nemestrinus, var. <i>phi-</i>	

<i>lippina.</i>	4
Gén. Cyaopithecus, <i>Less.</i>	»
ethiops, <i>Zim.</i>	»

Fam. CÉBIDOS.

Gén. Cebus, <i>Erxl.</i>	»
chrysopos, <i>F.</i> <i>Cuv.</i>	»

Orden 2.^o PROSIMIOS.

Fam. LEMURIDOS.

Subfam. NICTICÉBINOS.

Gén. Nycticebus, <i>Geoff.</i>	»
tardigradus, (<i>Lin.</i>) 4 et 623	

Fam. TÁRSHIDOS.

Gén. Tarsius, <i>Storr.</i>	»
spectrum, <i>Pall.</i> 4 et 623	

Orden 3.^o QUIRÓPTEROS.

Suborden

MEGAQUIRÓPTEROS.

Fam. TEROPÓDIDOS.

Gén. Pteropus, <i>Bris.</i>	5
phoenicephalus, <i>Oldfield.</i>	»
breviceps, <i>Oldfield.</i>	»
leucopterus, <i>Tem.</i>	»
edulis, <i>Geoff.</i>	»
hypomelanus, <i>Tem.</i>	»
keraudrenii, <i>O.</i> et <i>G.</i>	6
insularis, <i>H.</i> et <i>G.</i> var. . . .	»
jubatus, <i>Esch.</i>	»
philippensis. . . .	»

*

	Pág.		Pág.
Gén. Cynonycteris, <i>Ptrs.</i> . . .	6	* muricula, <i>Hodg.</i> . . .	13
amplexicaudatus, <i>Geoff.</i> »		Gén. Kerivoula, <i>Gray.</i> . . .	»
Gén. Cynopterus, <i>F. Cuv.</i> . . .	7	pellucida, <i>Wat.</i> . . .	»
marginatus, <i>Geoff.</i> . . .	»	jagorii, <i>Ptrs.</i> . . .	»
* latidens, <i>Dobs.</i> . . .	»	Gén. Miniopterus, <i>Bp.</i> . . .	14
Subgen. Ptenochirus, <i>Ptrs.</i> . . .	»	schreibersii, <i>Nat.</i> . . .	»
jagorii, <i>Ptrs.</i> . . .	»	vitt. pusillus, <i>Dobs.</i> . . .	»
Gén. Macroglossus, <i>F. Cuv.</i> . . .	»	tristis, <i>Wat.</i> . . .	»
minimus, <i>Geoff.</i> . . .	»		
Suborden:		Fam. EMBALONURIDOS.	
MICROQUIRÓPTEROS.		Subfam. EMBALONURINOS.	
		Gén. Emballonura, <i>Tem.</i> . . .	»
		semicaudata, <i>Peale.</i> . . .	»
		monticola, <i>Temm.</i> . . .	»
Gén. Rhinolophus, <i>Geoff.</i> . . .	8	Gén. Taphozous, <i>Geoff..</i> . . .	15
luctus, <i>Tem.</i> . . .	»	melonopogon, <i>Tem.</i> . . .	»
philippensis, <i>Wat.</i> . . .	»	Gén. Nyctinomus <i>Geoff.</i> . . .	»
rufus, <i>Ptrs.</i> . . .	»	plicatus, <i>Buch.</i> . . .	»
		Orden 4.º INSECTIVOROS.	
		Subord. MESODONTOS.	
		Tribu: DERMÓPTEROS.	
		Fam. GALEOPITÉCIDOS.	
		Subfam. GALEOPITECINOS.	
Gén. Phyllorhina, <i>Bp.</i> . . .	»	Gén. Galeopithecus, <i>Pall.</i> . . .	16
diadema, <i>Geoff.</i> . . .	»	volans, (<i>Shaw.</i>) . . .	»
pygmaea, <i>Wat.</i> . . .	9	rufus, <i>Geoff.</i> var. . .	»
larvata, <i>Horsf.</i> . . .	»	variegatus, <i>Geoff.</i> var. . .	»
obscura, <i>Ptrs.</i> . . .	»	marmoratus, <i>Tem.</i> var. . .	»
coronata, <i>Ptrs.</i> . . .	»	philippensis, <i>Wat.</i> . . .	»
bicolor, <i>Temm.</i> . . .	»	var. . .	16 et 623
		Subord. INSECTIVOROS	
		(VERDADEROS.)	
		Fam. TUPÁYIDOS.	
		Subfam. TUPAINOS.	
Gen. Tupaiia, <i>Raffl.</i> . . .	17	Gen. Tupaiia, <i>Raffl.</i> . . .	17
ferruginea, <i>Raffl.</i> . . .	»	javanica, <i>Horsf.</i> . . .	»
		Fam. ERINACÉIDOS.	
Gén. Erinaceus, <i>L.</i> . . .	17		

	Pág.		Pág.
europaeus, <i>Lin.</i>	17	Fam. MURIDOS.	
		Subfam. FLEOMINOS.	
Fam. SORICIDOS.		Gén. Thlaomys, <i>Wat.</i>	21
Gén. Crocidura, <i>Hagler.</i>	»	cumingii, <i>Wat.</i>	»
carruleocens, <i>Shaw.</i>	»	* albayensis. . . .	»
murina, (<i>Lin.</i>). . . .	»	Gén. Bandicota, <i>Gray.</i>	22
luzoniensis, <i>Ptrs.</i>	18	* gigantea, <i>Hardw.</i>	»
albina, <i>Blyth.</i>	18	Gén. Epimys, <i>Trt.</i>	»
edwardiana, <i>Trt.</i>	»	decumanuu, <i>Pall.</i>	»
aranea, <i>Schreb.</i>	»	Gén. Leggada, <i>Gray.</i>	»
Gén. Mygale, <i>G. Cuv.</i>	»	everetti, <i>Gthr.</i>	»
pyrenaica, <i>E. Geoff.</i>	»	Gén. Mus, <i>Lin.</i>	»
		musculus, <i>Lin.</i>	»
Fam. CENTÉTIDOS.		rattus, <i>Lin.</i>	23
Gén. Centetes, <i>Illi.</i>	19	peguensis, <i>Blyth.</i>	»
ecaudatus, <i>Schreb.</i>	»	Gén. Micromys, <i>Dhne.</i>	»
Orden ROEDORES.		eastaneus, <i>Wat.</i>	»
		minutus, <i>Pall.</i>	»
Fam. ESCIÚRIDOS.			
Subfam. ESCIÚRINOS.		Fam. HISTRÍCIDOS.	
Gén. Pteromys, <i>G. Cuv.</i>	»	Gén. Acanthion, <i>F. Cuv.</i>	24
petaurista, <i>Pell.</i>	»	pumila, <i>Gthr.</i> 24 et 623	
philippensis, <i>Elliot.</i>	»		
inornatus, <i>Müll.</i> var. . . .	»	Fam. CÁVIDOS.	
Gén. Sciuropterus, <i>F. Cuv.</i>	20	Gén. Cavia, <i>Pall.</i>	24
melanotis, <i>Gray.</i>	»	cobaya, <i>Marçgv.</i>	»
pulverulentus, <i>Gthr.</i>	»		
Gén. Æosciurus, <i>Lat.</i>		Fam. LEPÓRIDOS.	
affinis, <i>Raffl.</i>	»	Gén. Lepus, <i>Lin.</i>	»
Gén. Heterosciurus, <i>Tr.</i>	»	variabilis, <i>Pall.</i>	»
prevostii, <i>Desm.</i>	»	Gén. Oryctolagus, <i>Lillj.</i>	»
philippensis, <i>Wat.</i>	»	cuniculus, <i>Lin.</i>	»
steerii, <i>Gthr.</i>	»		
lateralis, <i>Var.</i>	»		
Gén. Nannosciurus, <i>Trt.</i>	»		
exilis, <i>Müll.</i> et <i>Schl.</i>	»		
Gén. Funambulus, <i>Less.</i>	21		
vittatus, <i>Raffl.</i>	»		
Gén. Sciurus, <i>Lin.</i>	»		
vulgaris, <i>Lin.</i>	»		
samarensis, <i>Steere.</i> 21 et 623			
mindanensis, <i>Steere.</i> 21			
et 623			
coccinus, <i>Thomas.</i> 21 et 623			
nigripes <i>Thos.</i>	623		
Fam. MIÓCIDOS.			
Gén. Eliomys, <i>Hagler.</i>	21	Fam. ÚRSIDOS.	
nitela, <i>Pall.</i>	»	Gén. Ursus, <i>Lin.</i>	»
		arctus, <i>Lin.</i> var. <i>pyrenaicus.</i>	»
Fam. MUSTÉLIDOS.			
		Gén. Meles, <i>Storr.</i>	25
		taxus, <i>Bodd.</i>	»
		Gén. Maydaus, <i>F. Cuv.</i>	»

	Pág.		Pág.
Gén. <i>Mustela</i> , <i>Nils.</i> . . .	25	Gén. <i>Mustela</i> , <i>Nils.</i> . . .	25
<i>erminea</i> , <i>Lin.</i> . . .	»	<i>erminea</i> , <i>Lin.</i> . . .	»
<i>vulgaris</i> , <i>Briss.</i> . . .	»	<i>vulgaris</i> , <i>Briss.</i> . . .	»
Gén. <i>Lutra</i> , <i>Erxl.</i> . . .	26	Gén. <i>Lutra</i> , <i>Erxl.</i> . . .	26
<i>vulgaris</i> , <i>Erxl.</i> . . .	»	<i>vulgaris</i> , <i>Erxl.</i> . . .	»
* <i>sumatrana</i> , <i>Gray.</i> . . .	»	* <i>sumatrana</i> , <i>Gray.</i> . . .	»
Fam. CÁNIDOS.		Fam. CÁNIDOS.	
Gén. <i>Canis</i> , <i>Lin.</i>	»	Gén. <i>Canis</i> , <i>Lin.</i>	»
<i>japonicus</i> , <i>Tem.</i>	»	<i>japonicus</i> , <i>Tem.</i>	»
<i>molossus</i> , <i>Lin.</i>	»	<i>molossus</i> , <i>Lin.</i>	»
<i>terrae novae</i>	»	<i>terrae novae</i>	»
* <i>pollokensis</i>	»	* <i>pollokensis</i>	»
Gén. <i>Vulpes</i> , <i>Briss.</i>	»	Gén. <i>Vulpes</i> , <i>Briss.</i>	»
<i>vulgaris</i> , <i>Briss.</i>	»	<i>vulgaris</i> , <i>Briss.</i>	»
Fam. VIVÉRRIDOS.		Fam. VIVÉRRIDOS.	
Subfam. ARCTICHTINOS.		Subfam. ARCTICHTINOS.	
Gén. <i>Artictis</i> , <i>Tem.</i>	27	Gén. <i>Artictis</i> , <i>Tem.</i>	27
<i>binturung</i> , <i>Raffl.</i> 27 et 623		<i>binturung</i> , <i>Raffl.</i> 27 et 623	
Gén. <i>Paradoxurus</i> , <i>F. Cuv.</i> 27		Gén. <i>Paradoxurus</i> , <i>F. Cuv.</i> 27	
<i>philippensis</i> , <i>Cam.</i>	»	<i>philippensis</i> , <i>Cam.</i>	»
* <i>dubius</i> , <i>Gray.</i>	»	* <i>dubius</i> , <i>Gray.</i>	»
* <i>nigrifrons</i> , <i>Gray.</i>	»	* <i>nigrifrons</i> , <i>Gray.</i>	»
* <i>crossii</i> , <i>Gray.</i>	28	* <i>crossii</i> , <i>Gray.</i>	28
Gén. <i>Viverra</i> , <i>Lin.</i>	»	Gén. <i>Viverra</i> , <i>Lin.</i>	»
<i>tangalunga</i> , <i>Gray.</i> 28 et 623		<i>tangalunga</i> , <i>Gray.</i> 28 et 623	
<i>zibetha</i> , <i>Lin.</i>	29	<i>zibetha</i> , <i>Lin.</i>	29
Gén. <i>Viverricula</i> , <i>Hodg.</i>	»	Gén. <i>Viverricula</i> , <i>Hodg.</i>	»
* <i>malacensis</i> , <i>Cantor.</i>	»	* <i>malacensis</i> , <i>Cantor.</i>	»
Gén. <i>Herpestes</i> , <i>Illig.</i>	»	Gén. <i>Herpestes</i> , <i>Illig.</i>	»
<i>europunctatus</i> , <i>Hogds.</i>	»	<i>europunctatus</i> , <i>Hogds.</i>	»
Fam. FÉLIDOS.		Fam. FÉLIDOS.	
Gén. <i>Cynailurus</i> , <i>Wagler.</i>	30	Gén. <i>Cynailurus</i> , <i>Wagler.</i>	30
<i>tigris</i> , <i>Lin.</i>	»	<i>tigris</i> , <i>Lin.</i>	»
<i>macroscelis</i> , <i>Gray.</i>	»	<i>macroscelis</i> , <i>Gray.</i>	»
Gén. <i>Felis</i> , <i>Lin.</i>	»	Gén. <i>Felis</i> , <i>Lin.</i>	»
<i>viverrina</i> , <i>Bennet.</i>	»	<i>viverrina</i> , <i>Bennet.</i>	»
<i>javanensis</i> , <i>Horsf.</i> 30 et 623		<i>javanensis</i> , <i>Horsf.</i> 30 et 623	
<i>domestica</i> , <i>Briss.</i>	31	<i>domestica</i> , <i>Briss.</i>	31
<i>angorensis</i> , <i>Briss.</i>	»	<i>angorensis</i> , <i>Briss.</i>	»
Orden 7. ^o PINNÍPIDOS.		Orden 7. ^o PINNÍPIDOS.	
Fam. TRIQUÉQUIDOS.		Fam. TRIQUÉQUIDOS.	
Gén. <i>Trichechus</i> , <i>Gray.</i>	»	Gén. <i>Trichechus</i> , <i>Gray.</i>	»
<i>rosmarus</i> , <i>Schre.</i> (col- millos).	31	<i>rosmarus</i> , <i>Schre.</i> (col- millos).	31
Orden 8. ^o SIRENIOS.		Orden 8. ^o SIRENIOS.	
Fam. HALICÓRIDOS.		Fam. HALICÓRIDOS.	
Gén. <i>Halicore</i> , <i>Illig.</i>	»	Gén. <i>Halicore</i> , <i>Illig.</i>	»
<i>dugong</i> , <i>Lin.</i>	»	<i>dugong</i> , <i>Lin.</i>	»
Orden 9. ^o CETÁCEOS.		Orden 9. ^o CETÁCEOS.	
Fam. BALÉNIDOS.		Fam. BALÉNIDOS.	
Gén. <i>Balaena</i> , <i>Lin.</i>	»	Gén. <i>Balaena</i> , <i>Lin.</i>	»
* <i>australis</i> , <i>Desm.</i> (bar- bis).	»	* <i>australis</i> , <i>Desm.</i> (bar- bis).	»
Fam. BALENOPTÉRIDOS.		Fam. BALENOPTÉRIDOS.	
Gén. <i>Balaenoptera</i> , <i>Gray.</i>	32	Gén. <i>Balaenoptera</i> , <i>Gray.</i>	32
* <i>swinhoci</i> , <i>Gray</i> (verte- bra).	»	* <i>swinhoci</i> , <i>Gray</i> (verte- bra).	»
* <i>mindorensis</i>	»	* <i>mindorensis</i>	»
Fam. CATODÓNTIDOS.		Fam. CATODÓNTIDOS.	
Gén. <i>Catodon</i> , <i>Gray.</i>	»	Gén. <i>Catodon</i> , <i>Gray.</i>	»
* <i>macrocephalus</i> , <i>Gray.</i>	»	* <i>macrocephalus</i> , <i>Gray.</i>	»
Fam. DELFÍNIDOS.		Fam. DELFÍNIDOS.	
Gén. <i>Steno</i> , <i>Gray.</i>	»	Gén. <i>Steno</i> , <i>Gray.</i>	»
* <i>ehrenbergi</i> , <i>Ösbeck.</i>	»	* <i>ehrenbergi</i> , <i>Ösbeck.</i>	»
Gén. <i>Delphinus</i> , <i>Gray.</i>	»	Gén. <i>Delphinus</i> , <i>Gray.</i>	»
* <i>longirostris</i> , <i>Gray.</i>	»	* <i>longirostris</i> , <i>Gray.</i>	»
Orden 10. ARTÍDÁCTILOS.		Orden 10. ARTÍDÁCTILOS.	
Subord. CAVICORNIOS.		Subord. CAVICORNIOS.	
Fam. BÓVIDOS.		Fam. BÓVIDOS.	
Gén. <i>Bos</i> , <i>Lin.</i>	»	Gén. <i>Bos</i> , <i>Lin.</i>	»
<i>taurus</i> , <i>Gray.</i>	»	<i>taurus</i> , <i>Gray.</i>	»
Gén. <i>Bubalus</i> , <i>H. Smith.</i>	»	Gén. <i>Bubalus</i> , <i>H. Smith.</i>	»
<i>carabao</i> ,	»	<i>carabao</i> ,	»
<i>mainitensis</i> , <i>P. Heude.</i>	»	<i>mainitensis</i> , <i>P. Heude.</i>	»
<i>minlorensis</i> , <i>P. Heude.</i>	»	<i>minlorensis</i> , <i>P. Heude.</i>	»
			33 et 623

Fam. ANTILÓPIDOS.	<i>Pág.</i>	<i>Pág.</i>
Gén. Rupicapra, <i>Gray</i>	33	35
tragus, <i>Gray</i>	»	»
Fam. CÁPRIDOS.		
Gén. Hircus, <i>Gray</i>	»	»
argagrus, <i>Gray</i>	»	»
Fam. ÓVIDOS.		
Gén. Ovis, <i>Gray</i>	»	»
aries, <i>Gray</i>	»	»
Fam. ÁLCIDOS.		
Subord. CARREOLOS.		
Gén. Alces, <i>Gray</i>	»	»
malkis, <i>Gray</i>	»	»
Fam. CÉRVIDOS.		
Gén. Strongyloceros, <i>Gray</i>	»	»
canadensis, <i>Gray</i>	»	»
Gén. Pseudaxis, <i>Gray</i>	»	»
tunquinensis	»	»
soloensis, <i>Heude</i>	34	35
Gén. Sikelaphus, <i>H.</i>	»	»
soloensis, <i>H.</i>	»	»
Gén. Ussa, <i>H.</i>	»	»
gorrichanus, <i>H.</i>	»	»
barandanus, <i>H.</i>	»	»
crassicornis, <i>H.</i>	»	»
francianus, <i>H.</i>	»	»
nublanus, <i>H.</i>	»	»
tuasoninus, <i>H.</i>	»	»
spatherius, <i>H.</i>	»	»
ramosianus, <i>H.</i>	»	»
ambrosianus, <i>H.</i>	»	»
macarianus, <i>H.</i>	»	»
elorzanus, <i>H.</i>	35	35
garciánus, <i>H.</i>	»	»
guidoceanus, <i>H.</i>	»	»
rosarianus, <i>H.</i>	»	»
nigricans, <i>H.</i>	»	»
maraisianus, <i>H.</i>	»	»
dailliardianus, <i>H.</i>	»	»
marzanius, <i>H.</i>	»	»
roxasiánus, <i>H.</i>	»	»
longicuspis, <i>H.</i>	»	»
microdóntes, <i>H.</i>	»	»
gonzalinus, <i>H.</i>	»	»
telesforianus, <i>H.</i>	»	»
brachyceros, <i>H.</i>	»	»
corteanus, <i>H.</i>	36	36
verzusanus, <i>H.</i>	»	»
rubiginosus, <i>H.</i>	»	»
hipolitanus, <i>H.</i>	»	»
chrysotricus, <i>H.</i>	»	»
guevaranus, <i>H.</i>	»	»
marianus, <i>H.</i>	»	»
Gén. Melanaxis, <i>H.</i>	»	»
alfredi, <i>H.</i>	»	»
masbatensis, <i>H.</i>	»	»
breviceps, <i>H.</i>	»	»
elegans, <i>H.</i>	»	»
basilanensis, <i>H.</i>	»	»
Gén. Hyelaphus, <i>Sund.</i>	37	37
calamianensis, <i>H.</i>	»	»
Fam. TRAGÚLIDOS.		
Gén. Tragulus	»	»
javanicus, <i>Pall.</i>	»	»
* fulviventer, <i>Gray</i>	»	»
* pygmaeus, <i>Gray</i>	»	»
Fam. SÚIDOS.		
Gén. Sus, <i>Lin.</i>	»	»
scrofa, <i>Lin.</i>	»	»
papuensis, <i>Less.</i>	»	»
effrenus, <i>H.</i>	»	»
frenatus, <i>H.</i>	»	»
microtis, <i>H.</i>	»	»
cebrifrons, <i>H.</i>	»	»
celebensis, var. <i>philippi</i> nensis.	623	623
ahaenobarbus, <i>Hent.</i>	623	623
minutus, <i>H.</i>	38	38
arietinus, <i>H.</i>	»	»
bucculutus, <i>H.</i>	»	»
calamianensis, <i>H.</i>	»	»
Gén. Babirusa, <i>Gray</i>	»	»
alfurus, <i>Less.</i>	»	»
Ord. II. ^o PERISODÁCTILOS.		
Fam. ÉQUIDOS.		
Gén. Equus, <i>Lin.</i>	»	»
caballus, <i>Lin.</i>	»	»
Gén. Asinus, <i>Lin.</i>	»	»
vulgaris, <i>Lin.</i>	»	»

Fam. TAPÍRIDOS.		Fam. FALANGÍSTIDOS.
Gén. <i>Tapirus</i> , <i>Lin.</i> . . .	Pág. 38	Gén. <i>Trichosurus</i> , <i>Less.</i> . . .
<i>indicus</i> , <i>Desm.</i> . . .	»	Pág. 47 <i>vulpinus</i> , (<i>Meyer</i>). . .
Orden 12. ^o PROBOSCÍDOS.		Fam. FASCOLÁRCTIDOS.
Fam. ELEFÁNTIDOS.		Gén. <i>Phascolarctos</i> , <i>Bl.</i> . . .
Gén. <i>Elephas</i> , <i>Lin.</i> . . .	39	<i>cinereus</i> , <i>Schr.</i> . . .
<i>maximus</i> , <i>L.</i> (<i>molaris</i>)	»	»
Orden 13. ^o DESDENTADOS.		Sub-clase 3. ^a
Fam. MANÍDIDOS.		ORNITODELFOS.
Gén. <i>Pholidotus</i> , <i>Brüs.</i> . . .	»	Orden 15. ^o MONOTREMOS.
<i>javanicus</i> , <i>Desm.</i> . . .	»	Fam. EQUÍNDIDOS.
<i>dalmatinus</i> , <i>Sauv.</i> . . .	»	Gén. <i>Echidna</i> , <i>G.</i> <i>Cuv.</i> . . .
<i>cilionensis</i>	»	<i>aculeata</i> , <i>Shaw.</i> . . .
Fam. DASIPÓDIDOS.		»
Gén. <i>Tatusia</i> , <i>F.</i> <i>Cuv.</i> . . .	40	Fam. ORNITORÍNQUIDOS.
<i>novocineta</i> , <i>Lin.</i> . . .	»	Gén. <i>Ornithorhynchus</i> , <i>Blum.</i> . . .
Sub-clase 2. ^a DIDELFOS.		<i>anatinus</i> , <i>Shaw.</i> . . .
Orden 14. ^o MARSUPIALES.		»
Fam. PERAMÉLIDOS.		Clase 2. ^a AVES.
Gén. <i>Perameles</i> , <i>Geoff.</i> . . .	»	Orden 1. ^o PRENSORAS.
<i>nasuta</i> , <i>Geoff.</i> . . .	»	Fam. CACATÚIDAS.
Fam. DASIÚRIDOS.		Gén. <i>Cacatua</i> , <i>Vieill.</i> . . .
Gén. <i>Dasyurus</i> , <i>Geoff.</i> . . .	41	<i>haematuropygia</i> , (<i>S.</i> <i>Müll.</i> . . . et 624
<i>viverrinus</i> , <i>Shaw.</i> . . .	»	<i>pusilla</i> , <i>var.</i>
Fam. DIDÉLFIIDOS.		<i>rosea</i> , <i>V.</i>
Gén. <i>Didelphis</i> , <i>Lin.</i> . . .	42	<i>sulphurea</i> , <i>Gm.</i> . . .
<i>marsupialis</i> , <i>Lin.</i> . . .	»	<i>nasica</i> , <i>Tem.</i>
Fam. MACROPÓDIDOS.		<i>moluccensis</i> , <i>Gm.</i> . . .
Gén. <i>Macropus</i> , <i>Shaw.</i> . . .	44	Gén. <i>Microglossus</i> , <i>Geoff.</i> . . .
<i>antilopinus</i> , <i>Gould.</i> . . .	»	<i>aterrinus</i> , <i>Gm.</i>
<i>giganteus</i> , <i>Shaw.</i> . . .	45	Fam. NESTÓRIDAS.
		Gén. <i>Nestor</i>
		<i>productus</i> , <i>Gould.</i> . . .
		624
		· Fam. SITÁCIDAS.
		Gén. <i>Tanygnathus</i> , <i>Wagler.</i> . . .
		53

	<i>Pig.</i>		<i>Pig.</i>
luzonensis, <i>Briss.</i> 53 et	625	domicella, <i>Lin.</i> . . .	58
viridis, <i>var.</i> . . .	53	garulus, (<i>Lin.</i>) . . .	»
cyanescens, <i>var.</i> . . .	54	lory, (<i>L'v.</i>) . . .	639
torquatus, <i>var.</i> . . .	»	Gén. <i>Chalcopsittacus</i> , <i>Salv.</i> .	58
everetti, <i>Tw.</i> . . .	54 et 627	ater, (<i>Scop.</i>) . . .	»
burbidgei, <i>Sharpe.</i> 54 et 627		Gén. <i>Coriphilus</i> , <i>Wagl.</i> . .	»
macrorhynchus, <i>Wagl.</i> .	54	placens, (<i>Teem.</i>) . . .	»
Gén. <i>Triclaria</i> , <i>Wagl.</i> . .	»	Gén. <i>Charmosyna</i> , <i>Wagl.</i> .	59
cyanogaster, <i>Shaw.</i> . .	»	papuensis, (<i>Gem.</i>) . . .	»
Gén. <i>Platycercus</i> , <i>Vig.</i> . .	»	Gén. <i>Calyptorhynchus</i> , <i>Salv.</i> .	»
eximus, <i>Shaw.</i> . .	»	microrhynchus, <i>Gould</i> .	»
Gén. <i>Cyclopsitta</i> , <i>H. et J.</i> .	»	Gén. <i>Tricoglossus</i> , <i>Wig.</i> .	»
lunulata, <i>Scop.</i> . . 54 et 627		haematocephalus, <i>Gm.</i> . . .	»
squamotorquata, <i>var.</i> . .	55	Gén. <i>Paleornis</i> , <i>Vig.</i> . . .	64
intermedia, (<i>Salv.</i>) . .	628	torquata, <i>Briss.</i> . . .	640
mindanensis, (<i>Steere.</i>) .		Gén. <i>Eos</i> , <i>Wagl.</i> . . .	641
55 et 628		rubiginosa, (<i>Bp.</i>) . . .	641
Gén. <i>Prioniturus</i> , <i>Wagl.</i> . .	55		
discurus, (<i>Vieill.</i>) 55 et 628			
cyaniceps, <i>Sharpe.</i> ,			
var. 55 et 629			
cyaneus,	55		
suluensis, <i>Blas.</i> . .	629		
luzonensis, <i>Steere.</i> 56 et 629			
mindorensis, <i>Steere.</i> .			
56 et 630			
verticalis, <i>Sharpe.</i> . .	629		
Gén. <i>Loriculus</i> , <i>Blyth.</i> . .	56		
philippensis; (<i>Briss.</i>) .			
56 et 630			
siquijorenensis, <i>Steere.</i> .			
56 et 631			
mindorensis, <i>Steere.</i> 56			
et 631			
worcesteri, <i>Steere.</i> . .	56		
occipitalis, (<i>Finsch.</i>) .			
* chrysoloratus, <i>Scl.</i> 56 et 632			
indicus, (<i>Gm.</i>) . . .	631		
hartlaubi, (<i>Finsch.</i>) 57			
et 634			
regulus, <i>Sow.</i> . . 57 et 634			
galgulus, (<i>Lin.</i>) . . .	*		
vernalis, (<i>Sparr.</i>) . .	633		
Gén. <i>Ecclectus</i> , <i>Wagler.</i> . .	57		
granitis, (<i>Gm.</i>) . . .	»		
polychlorus, (<i>Scop.</i>) .	58		
roratus, <i>S. Müll.</i> . .	635		
pectoralis, <i>S. Müll.</i> . .	633		
Gén. <i>Melopsittacus</i> , <i>Gould</i> .	58		
undulatus, <i>Shaw</i> . . .	»		
Fam. TRICOGLOSIDAS.			
Gén. <i>Lorius</i> , <i>Br.</i> . . .	*		

Orden 2.º RAPACES.

Sub orden: HALCONES.

Fam. 1.º VULTURIDAS.

Subfam. VULTURINAS.

Gén. <i>Gyps</i> , <i>Lav.</i> . . .	59
hispiniolensis, <i>Sharp.</i> .	»

Fam. FALCÓNIDAS.

Subfam. ACCIPITRINAS.

Gén. <i>Circus</i> , <i>Lacép.</i> . . .	60
spilonotus, <i>Kaup</i> . . .	»
melanoleucus, <i>Forst</i> .	»
* eruginosus, <i>Lin.</i> . . .	»
cinerescens,	61
philippensis? <i>Steere.</i> .	»
striatus,	»
Gén. <i>Astur</i> , <i>Lacép.</i> . . .	»
palumbarius, <i>Lin.</i> . . .	»
trivirgatus, <i>Tem.</i> . . .	62
soloenensis, <i>Lath.</i> . . .	63
* eucuboides, <i>Tem.</i> . . .	»
poliopsides,	64
Gén. <i>Accipiter</i> , <i>Briss.</i> . . .	»
ninus, (<i>Lin.</i>)	»
virgatus, (<i>Rünn.</i>) . . .	65
stevensonii, <i>Gurney.</i> .	69
maculosus,	»
minillensis, <i>Meyen.</i> .	643

Subfam. BUTEONINAS.

Gén. <i>Buteo</i> , <i>Cav.</i> . . .	66
	84

	Pág.		Pág.
vulgaris, <i>Leach</i>	66	Gén. Falco, <i>Lin</i>	»
* plumipes, <i>Hodgs</i>	67	communis, <i>Gm</i>	»
Subfam. AQUILINAS.		* peregrinator, <i>Sund</i>	»
Gén. Neopus, <i>Hodgs</i>	»	* melanogenys, <i>Gould</i>	80
malayensis, (<i>Tem</i>). . . .	»	Gén. Hypotriorchis, <i>Boie</i> . . .	81
Gén. Spizactus, <i>Vieill</i>	68	s verus, (<i>Horsf</i>). 81 et 644	
* Kieneri, <i>Gerv</i>	»	Gén. Certhneis, <i>Boie</i>	82
* lanceolatus, <i>Bp</i>	»	* tinnuncula, <i>Lin</i>	»
* alboniger, (<i>Blyth</i>). . . .	69	Subord. 2.º PANDIONES.	
limnaetus, <i>Horsf</i>	»	Fam. PANDIÓNIDAS.	
* philippensis, <i>Sharpe</i> . . .	»	Gén. Pandion, <i>Sav</i>	»
* caligatus, (<i>Raffl</i>). . . .	»	* haliaetus, <i>Lin</i>	»
Gén. Spilornis, <i>Gray</i>	70	* leucocephalus, <i>Gould</i>	83
* cheela, <i>Lath</i>	»	Gén. Polioætus, <i>Kaup</i>	»
* b. cha, (<i>Daud</i>). . . .	71	* ichthyætus, (<i>Horsf</i>). . . .	84
pallidus, <i>Wald</i>	»	Subord. 3.º NOCTURNAS.	
holospilus, <i>Vigors</i>	71	Fam. BUBÓNIDAS.	
panayensis, <i>Steere</i>	72	Subfam. BUBONINAS.	
	et 643	Gén. Bubo, <i>Cuv</i>	»
Gen. Butastur, <i>Hodgs</i>	72	ignavus, <i>Förster</i>	»
* liventer, (<i>Tem</i>). . . .	»	philippensis, <i>Schl</i>	85
indicus, (<i>Gm</i>). . . .	72 et 643	gurneyi, <i>Tw</i>	»
Gén. Haliastur, <i>Sav</i>	73	Gén. Scops, <i>Savig</i>	86
albicillus, (<i>Lin</i>). . . .	»	megalotis, <i>Gray</i>	»
* pelagicus, (<i>Pall</i>). . . .	74	lempiji, (<i>Horsf</i>).	»
Gén. Cuncuma, (<i>Hodgs</i>). . .	»	rufescens, <i>Horsf</i>	»
leucogaster, (<i>Gm</i>). . . .	74	everetti, <i>Tw</i>	87
	et 643	asio, <i>Lin</i>	»
Gén. Haliastur, <i>Selby</i>	75	Gén. Carine, <i>Kaup</i>	»
indus, (<i>Bodd</i>). . . .	»	noctua, (<i>Scop</i>).	»
intermedius, <i>Gurn</i>	75	Gén. Ninox, <i>Hodgs</i>	88
	et 643	lugubris, <i>Tich</i>	88 et 644
* girrenera, (<i>Vieill</i>). . . .	76	paraguanensis.	88
Gén. Milvus, <i>Cuv</i>	»	philippensis, <i>Bp</i>	et 644
ictinus, <i>Sav</i>	»	* scutulata, <i>Raff</i>	89
Gén. Elanus, <i>Sav</i>	77	spilocephalus, (<i>Steere</i>). . . .	»
hypoleucus, <i>Gould</i>	77	spilonotus, <i>Fr</i>	et
	et 643		Worc. 644
Gén. Pernis, <i>Cuv</i>	77	japonica, <i>T. et S</i>	»
ptilonorhynchus, (<i>Tem</i>). .	77	Subfam. SIRNINAS.	
	et 643	Gen. Syrnium, <i>Sav</i>	»
Subfam. FALCONINAS.			
Gén. Baza, <i>Hodgs</i>	78		
magnirostris, <i>Gray</i>	»		
leucopais, <i>Sharpe</i>	636		
Gén. Microhierax, <i>Sharpe</i> . .	78		
* fringillarius, (<i>Horsf</i>). . .	»		
erythrogenys, <i>Vigors</i> . . .	»		
* latifrons, <i>Sharpe</i>	79		

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
* leptogrammicum (<i>Tem.</i>)	80	achrorhynchus, <i>Vigors.</i>	99
* sinense, (<i>Lath.</i>)	90	steerii, <i>Sharpe.</i>	99
Fam. ESTRÍGIDAS.		assianilis, <i>Tie.</i>	»
Gén. Strix, <i>Lin.</i>	»	xanthorhous, <i>Horsf.</i>	»
flammea, <i>Lin.</i>	»	saluensis, <i>Sharp.</i>	»
candida, <i>Tieck.</i>	92	palawanensis, <i>Tie.</i>	»
Gén. Phodilus, <i>Geoff.</i>	93	samarensis, <i>Steere.</i>	99
*badius, (<i>Horsf.</i>)	»		et 644
Orden: 3.º PÁJAROS.		cinereogenys, <i>Fr.</i>	Worc. 644
Grupo: COLOMORFOS.		nigrostriatus, <i>Fr.</i>	Worc. »
Fam. CÓRVIDOS.		Fam. DICRÚRIDOS.	
Gén. Corvus, <i>Kaup.</i>	»	Gén. Dicrurus, <i>Micill.</i>	99
monedula, (<i>Lin.</i>)	»	balicassius, <i>Lin.</i>	»
Gén. Corone, <i>Kaup.</i>	94	mirabilis, <i>Wal'.</i>	100
philippina, (<i>Bp.</i>)	94	striatus, <i>Tie.</i>	»
pusilla, (<i>Tie.</i>)	94	palawanensis, <i>Tie.</i>	»
Gén. Cissa, <i>Boie.</i>	»	Gén. Buchanga, <i>Hodgs.</i>	»
chinensis, (<i>Bodd.</i>)	»	cineracea, (<i>Horsf.</i>)	»
Gén. Xanthoura, <i>Bp.</i>	95	palawanensis, <i>Whiteh.</i>	644
cyanocapilla, (<i>Cab.</i>)	»	Gén. Chibia, <i>Hodgs.</i>	100
Fam. FARADISÉIDOS.		pectoralis, (<i>Wal'</i>)	»
Subfam. EPIMAQUINOS.		menagei, <i>Fr.</i> et <i>Worc.</i>	645
Gén. Seleucides, <i>Less.</i>	»	palauensis, (<i>Tie.</i>)	»
niger, (<i>Shaw.</i>)	»	borneensis, <i>Sharpe.</i>	»
Subfam. PARADISEINOS.		Grupo: CICLOMORFOS.	
Gén. Paradisea, <i>Lin.</i>	96	Fam. CAMPEFÁGIDOS.	
apoda, <i>Lin.</i>	»	Gén. Artamides, <i>Hartl.</i>	101
sanguinea, <i>Shaw.</i>	»	sumatrensis, (<i>S. Müll.</i>)	»
Gén. Semioptera, <i>Gray.</i>	97		et 645
wallacii, <i>Gray.</i>	»	pollens, <i>Salv.</i>	101
Gén. Lophorhinus, <i>Tieill.</i>		striatus, (<i>Bodd.</i>)	»
superba, (<i>Penn.</i>)	»	mindorensis, <i>Steere.</i>	102 et 645
Gén. Phonygama, <i>Less.</i>	98	mindanensis, <i>Steere.</i>	102
keraudreni, <i>Less.</i>	»	panayensis, <i>Steere.</i>	»
Fam. ORIÓLIDOS.		guilleardi, (<i>Salv.</i>)	645
Gén. Oriolus, <i>Lin.</i>	»	Gén. Edolisoma, <i>Jacq.</i>	102
philippinus, <i>Gray.</i>	»	corynipes, <i>Blyth.</i>	»
unicolor.	*	everetti, <i>Sharpe.</i>	102 et 645
		mindanensis, <i>Tie.</i>	103
		panayensis, <i>Steere.</i>	»
		Gén. Pericrocotus, <i>Boie.</i>	»
		igneus, <i>Blyth.</i>	*

	Pág.	Pág.	
* miniatus, <i>Tem.</i> . . .	103	Gén. <i>Rhipidura</i> , <i>Vigors.</i> . . .	111
* cinereus, <i>Lafresn.</i> . . .	104	<i>kubarii</i> , <i>Finsch.</i> . . .	»
marchesæ, <i>Guill.</i> . . .	»	<i>levida</i> , <i>H. et Finsch.</i> . . .	»
leytensis, <i>Steere.</i> 104 et 645		<i>vers.color</i> , <i>H. et Fins-</i>	
Gén. <i>Lalage</i> , <i>Boie.</i> . . .	104	<i>ch.</i> . . .	»
melanoleuca, <i>Blyth.</i> . . .	»	<i>sauli</i> , <i>Fr. et Wore.</i> . . .	646
terat, <i>Bood.</i> . . .	104 et 645	<i>cyaniceps</i> , <i>Cass.</i> . . .	112
* aurea, (<i>Tem.</i>) . . .	105	<i>albiventris</i> , <i>Sharp.</i> . . .	»
insperata, <i>Finsch.</i> . . .	»	<i>nigritorquis</i> , <i>Vigors.</i>	
monacha, (<i>H. et Fins-</i>			
<i>ch.</i>) . . .	»		
* leucopygialis, (<i>Gray.</i>) 105			
minor, <i>Steere.</i> 105 et 645			
Fam. MUSCICÁPIDOS.			
Gén. <i>Alseonax</i> , <i>Cab.</i> . . .	106	Gén. <i>Zeocephus</i> , <i>Bp.</i> . . .	112
latirostris, <i>Raff.</i> . . .	106	<i>rufus</i> , <i>Bp.</i> . . .	112 et 647
Gén. <i>Muscicapa</i> , <i>Lau.</i> . . .	106	<i>cinnamomeus</i> , <i>Sharp.</i>	
<i>caruleocephala</i> ; <i>Scop.</i> . . .	106		
<i>luzoniensis</i> , <i>Gm.</i> . . .	107	<i>cyanescens</i> , <i>Sh.</i> . . .	113 et 647
<i>macrura</i> , <i>Scop.</i> . . .	107	Gén. <i>Philentoma</i> , <i>Eyton.</i> . . .	»
<i>philippinensis</i> , <i>Gm.</i> . . .	107	* <i>velatum</i> , <i>Tem.</i> . . .	»
<i>manillensis</i> , <i>Gm.</i> . . .	107	Gén. <i>Rhinomyias</i> , <i>Sharp.</i> . . .	»
<i>griseisticta</i> , (<i>Swinh.</i>)		<i>ruficauda</i> , <i>Sharp.</i> . . .	»
	107 et 646	<i>albigularis</i> , <i>Fr. et</i>	
Gén. <i>Muscicapula</i> , <i>Blyth.</i> . . .	646	<i>Worc.</i> . . .	647
<i>mindanensis</i> , <i>Blas.</i> . . .	»	<i>samarensis</i> , <i>Steere.</i> . . .	»
<i>samarensis</i> , <i>Fr. et</i>		<i>ocularis</i> , <i>Fr. et Wore.</i>	
<i>Worc.</i> . . .	»		113 et 647
Gén. <i>Cryptolopha</i> , <i>Swanson.</i>		Gén. <i>Culicicapa</i> , <i>Swinh.</i> . . .	»
<i>olivacea</i> , <i>Mosseley.</i> . . .	»	<i>panayensis</i> , <i>Sharp.</i> . . .	113
<i>flavigularis</i> , <i>Fr. et</i>			et 647
<i>Worc.</i> . . .	»	Gén. <i>Myiagra</i> , <i>Vigors.</i> . . .	»
Gén. <i>Pratincola</i> , <i>Koch.</i> . . .	108	<i>pluto</i> , <i>Finsch.</i> . . .	»
<i>caprata</i> , <i>Lin.</i> . . .	108 et 646	<i>oceania</i> , <i>Jacq. et Puch.</i> . . .	114
<i>pampilonensis</i> , . . .	»	<i>erythrops</i> , <i>Hart et</i>	
Gén. <i>Grygone</i> , <i>Gould.</i> . . .	»	<i>Finsch.</i> . . .	»
<i>simplex</i> , <i>Cab.</i> . . .	408	Gén. <i>Monarcha</i> , <i>Vig. et</i>	
* <i>flaveola</i> , <i>Cab.</i> . . .	109	<i>Horsf.</i> . . .	»
Gén. <i>Metabolus</i> , <i>Bp.</i> . . .	»	<i>godeffroyi</i> , <i>Hart.</i> . . .	»
<i>rugensis</i> , <i>H. et J.</i> . . .	»	Gén. <i>Stoparola</i> , <i>Blyth.</i> . . .	»
Gén. <i>Xanthopygia</i> , <i>Blyth.</i> . . .	»	<i>panayensis</i> , <i>Sharp.</i> . . .	»
<i>narcissina</i> , <i>Tem.</i> . . .	»	Gén. <i>Siphia</i> , <i>Hodgs.</i> . . .	»
* <i>cyanomelana</i> , <i>Tem.</i> . . .	»	<i>elegans</i> , <i>Tem.</i> . . .	»
Gén. <i>Hypothymis</i> , <i>Boie.</i> . . .	110	<i>banyumas</i> , <i>Horsf.</i> . . .	»
<i>azurea</i> , (<i>Bodd.</i>) . . .	110 et 646	<i>philippinensis</i> , <i>Sharp.</i>	
<i>occipitalis</i> , (<i>Vigors.</i>) . . .	110		115 et 647
<i>supercilialis</i> , <i>Sh.</i> . . .	111	<i>lemprieri</i> , <i>Steere.</i> . . .	115
<i>samarensis</i> , <i>Steere.</i> . . .	»		et »
Gén. <i>Cyanomyias</i> , <i>Sharp.</i> . . .			
<i>cælestis</i> , <i>Tw.</i> . . .	111 et 646		
<i>helenæ</i> , <i>Steere.</i> . . .	»		
		Fam. TÚRDIDOS.	
		Subfam. SILVINAS.	
Gén. <i>Phylloscopus</i> , <i>Boie.</i> . . .	115		
<i>borealis</i> , (<i>Blas.</i>) . . .	115 et 647		
<i>lugubris</i> , <i>Blyth.</i> . . .	116		
* <i>superciliosus</i> , <i>Gm.</i> . . .	»		

	Pág.		Pág.
Gén. <i>Acrocephalus</i> , <i>Naum.</i>	118		
orientalis, <i>Tem.</i>	647	haynaldi, (<i>Blas.</i>)	648
Gén. <i>Locustella</i> , <i>Kaup.</i>	»	cinericeps, <i>Fr.</i> et <i>Worc.</i>	»
* fasciolata, <i>Gray.</i>	»	monticola, <i>Fr.</i> et <i>Worc.</i>	»
ochotensis, <i>Midd.</i>	119	mindorensis, <i>Steere.</i>	134
Gén. <i>Lusciniola</i> , <i>Gray.</i>	»	siquijorensis, <i>Gm.</i>	»
fusca, <i>Blyth.</i>	»	Gén. <i>Poliocephalus</i> , <i>Sharpe.</i>	»
		urostictus, <i>Shalv.</i>	»
		basilanicus, <i>Steere.</i>	»
Subfam TÚRDINOS.		Gén. <i>Micropus</i> , <i>Swain.</i>	»
Gén. <i>Geocichla</i> , <i>Kuhl.</i>	120	melanocephalus, <i>Gm.</i>	»
varia, <i>Pall.</i>	»	Gén. <i>Criniger</i> , <i>Tem.</i>	135
* interpres, <i>Kuhl.</i>	121	frater, <i>Sharpe.</i>	»
cinerea, <i>Fr.</i> et <i>Worc.</i>	648	palawanensis, <i>Tw.</i>	»
Gén. <i>Turdus</i> , <i>Lin.</i>	121	Gén. <i>Pycnonotus</i> , <i>Boie.</i>	»
músicus, <i>Lin.</i>	»	goávier, (<i>Scop.</i>) 135 et 648	
viscivorus, <i>Lin.</i>	122	* sinensis, <i>Gm.</i>	»
mustelinus, <i>Gm.</i>	123	cinerifrons, <i>Tw.</i> 136 et 648	
pallasi, <i>Cab.</i>	123		
leucauchen, <i>Sclat.</i>	124		
grayii, <i>Bp.</i>	»	Subfam. IRÉNINOS.	
Gén. <i>Mérule</i> , <i>Leach.</i>	»	Gén. <i>Irena</i> , <i>Horsf.</i>	136
merula, <i>Lin.</i>	»	cyanogastra, <i>Vigors.</i>	»
torquata, <i>Lin.</i>	125	melanochlamys, <i>Sharpe.</i>	
obscura, <i>Gm.</i>	126	136 et 648	
chrysolaus, <i>Tem.</i>	127	* turcosa, <i>Horsf.</i>	»
Gén. <i>Erythacus</i> , <i>Cuv.</i>	»	ella, <i>Steere.</i>	»
calliope, <i>Pall.</i>	128 et 648	tweeddallii, <i>Sharpe.</i>	
Gén. <i>Monticela</i> , <i>Boie.</i>	128	136 et 648	
affinis, <i>Blyth.</i>	»	paraguanensis,	»
solitaria, <i>Briss.</i>	128 et 648		
Gén. <i>Sialia</i> , <i>Sw.</i>	129	Subfam. TROGLODINOS.	
sialis, (<i>Lin.</i>)	»	Gén. <i>Campylorhynchus</i> , <i>Spix.</i> 173	
Gén. <i>Ruticilla</i> , <i>Brehm.</i>	130	zonatus, <i>Less.</i>	»
phoenicurus, <i>Lin.</i>	»	Gén. <i>Thryothorus</i> , <i>Vieill.</i>	»
Fam. TIMÉLIDOS.		maculipectus, <i>Lasfr.</i>	»
Subfam BRAQUIPODINOS.		Gén. <i>Henicorhin</i> , <i>Scl.</i>	»
Gén. <i>Aegithina</i> , <i>Vieill.</i>		leucosticta, <i>Licht.</i>	»
viridis, (<i>Bp.</i>)	131		
Gén. <i>Chloropsis</i> , <i>Jard.</i>	132	Subfam. TIMELINOS.	
palawanensis, <i>Sharpe.</i>	»	Gén. <i>Thamnobia</i> , <i>Swa.</i>	138
flavipennis, <i>Tw.</i>	»	* fulicata, (<i>Lin.</i>)	»
nigricollis, (<i>Vieill.</i>)	»	Gén. <i>Copsychus</i> , <i>Wagl.</i>	»
Gén. <i>Ixocincla</i> , <i>Blyth.</i>	»	mindanensis, (<i>Gm.</i>) 138	
crassirostris, <i>E. Newt.</i>	»	et 648	
Gén. <i>Iole</i> , <i>Blyth.</i>		seychellarum, <i>A. Newt.</i>	»
olivacea, <i>Blyth.</i>	»	cebuensis, <i>Steere.</i>	139
everetti, <i>Tw.</i>	133	Gén. <i>Cittocincla</i> , <i>Slat.</i>	»
rfigularis, <i>Sharpe.</i>	»	nigra, <i>Sharpe.</i>	»
philippinensis, <i>Montb.</i>	»	cebuensis, <i>Steere.</i>	648
guimarasensis, <i>Steere.</i>	»	luzoniensis, <i>Kittl.</i>	»

<p>superciliaris, <i>Fr.</i> et <i>Worc.</i> 649</p> <p><i>annaæ, H. et F.</i> . . . 139</p> <p>Gén. <i>Bebrornis, Sharpe.</i> . . »</p> <p><i>seychellensis, Oust.</i> . . »</p> <p>Gén. <i>Megalurus, Horsf.</i> . . 140</p> <p><i>palustris, Horsf.</i> 140 et 649</p> <p><i>ruficeps, Tw.</i> . . et »</p> <p>Gén. <i>Eutoria, Nichol.</i> . . »</p> <p><i>sepium, Raff.</i> . . »</p> <p>Gén. <i>Orthotomus, Horsf.</i> . . 141</p> <p><i>frontalis, Sharpe.</i> . . »</p> <p><i>cineraceps, Sharp.</i> . . »</p> <p><i>nigriceps, Tw.</i> . . »</p> <p><i>castaneiceps, Wald.</i> 141</p> <p style="text-align: right;">et 649</p> <p><i>derbianus, Moore.</i> . . »</p> <p><i>ruficeps, Less.</i> 141 et 649</p> <p><i>cineraccus, Blyth.</i> . . »</p> <p><i>panayensis, Steere.</i> . . 142</p> <p>Gén. <i>saiarensis, Steere.</i> . . »</p> <p>Gén. <i>Cisticola, Kaup.</i> . . »</p> <p>* <i>cisticola, Vieill.</i> . . 142</p> <p>* <i>exilis, Vig. et Horsf.</i></p> <p style="text-align: right;">144 et 649</p> <p>Gén. <i>Cinclosoma, Vigors.</i> . . 145</p> <p><i>punctatum, (Lath.)</i> . . »</p> <p>Gén. <i>Tatara, Less.</i> . . . 146</p> <p><i>syrix, Seeb.</i> . . . »</p> <p><i>luscinia, Q. et G.</i> . . »</p> <p>Gén. <i>Turdinus, Blyth.</i> . . »</p> <p><i>rufifrons, Tw.</i> . . »</p> <p>Gén. <i>Dasyurotopha, Tw.</i> . . »</p> <p><i>speciosa, Tw.</i> . . »</p> <p>Gén. <i>Mixornis, Hodgs.</i> . . »</p> <p><i>woodi, Sharpe.</i> . . »</p> <p><i>cagayanensis, Guill.</i> . . »</p> <p><i>capitalis, Tw.</i> . . . 147</p> <p><i>nigro-capitatus, Steere.</i> . . »</p> <p><i>plateni, Blas.</i> . . . 649</p> <p>Gén. <i>Macronus, Jard.</i> . . . 147</p> <p><i>striaticeps, Sharpe.</i> . . »</p> <p><i>mindanensis, Steere.</i> . . »</p> <p><i>kettlewelli, Guill.</i> . . »</p> <p>Gén. <i>Ptilocichla, Sharpe.</i> . . »</p> <p><i>falcata, Sharpe.</i> . . »</p> <p><i>basilanica, Steere.</i> . . »</p> <p><i>mindanensis, Steere.</i> . . »</p> <p><i>minuta, Fr. et Worcester.</i> 649</p> <p>Gén. <i>Anurops, Sharpe.</i> . . . 148</p> <p><i>cineraceps, (Tw.)</i> . . »</p> <p>Gén. <i>Dendrobiastes, Sharpe.</i> . . »</p> <p><i>basilanica, Sharpe.</i> . . »</p>	<p><i>Pág.</i></p> <p>Fam. PÁRIDOS.</p> <p>Subfam PARINOS. <i>Pág.</i></p> <p>Gén. <i>Parus, Lin.</i></p> <p><i>cæruleus, Lin.</i> »</p> <p><i>amabilis, Sharpe.</i> 149</p> <p><i>elegans, Less.</i> 149 et 649</p> <p>Subfam REGULINOS.</p> <p>Gén. <i>Regulus, Koch.</i> 149</p> <p><i>ignicapillus, Brehm.</i> »</p> <p>Fam. LÁNIDOS.</p> <p>Subfam GIMNORRINOS.</p> <p>Gén. <i>Gymnorhina, Gray.</i> 150</p> <p><i>tibicen, (Lath.)</i> »</p> <p>Subfam PQUICEFALINOS.</p> <p>Gén. <i>Pachycephala, Vig. et Horsf.</i> . . »</p> <p><i>philippinensis, Wald.</i> 150</p> <p><i>homeyeri, Blas.</i> 150 et 650</p> <p><i>winchelli, Fr. et Worcester.</i> 649</p> <p><i>major, Fr. et Worcester.</i> »</p> <p><i>mindorensis, Fr. et Worcester.</i> 650</p> <p>Subfam LANINOS.</p> <p>Gén. <i>Lanius, Lin.</i> 151</p> <p><i>schach, Lin.</i> »</p> <p><i>nigriceps, Frankl.</i> 151 et 650</p> <p><i>cephalomelas, Blas.</i> 152</p> <p><i>superciliosus, Lath.</i> »</p> <p><i>lucionensis, Lin.</i> 152 et 650</p> <p>Fam. VIREÓNIDOS.</p> <p>Gén. <i>Vireo, Vieill.</i> 153</p> <p><i>gilvus, Vieill.</i> »</p> <p><i>flavoviridis, Cass.</i> »</p> <p>Gén. <i>Hylophilus, Tem.</i> »</p> <p><i>decurtatus, (Blas.)</i> »</p> <p>Gén. <i>Vireolanius, Du Bus.</i> 154</p> <p><i>pulchellus, Scl.</i> »</p>
---	--

Grupo CERTIOMORFOS.

Fam. CÉRTIDOS.

Subfam. CERTINOS.

	Pág.
Gén. Certhia, <i>Lin.</i>	155
menetina, <i>Glog.</i>	»
Gén. Climacteris, <i>Tenm.</i>	»
mystacalis, (<i>Tenm.</i>) 154	154
	et 650

Subfam. SITINOS.

Géz. Sitta, <i>Lin.</i>	155
carolinensis, <i>Hilts.</i>	»
frontalis, <i>Sw.</i>	»
oenochlamys, <i>Sharpe.</i>	156
	et 650

Grupo 4. CINNIRIMORFOS.

Fam. NECTARÍNIDOS.

Gén. Chalcostetha, <i>Cab.</i>	»
insignis, (<i>Jerd.</i>)	156
Gén. Æthopyga, <i>Cab.</i>	157
* temmincki, (<i>S. Müll.</i>)	»
* eximia, (<i>Horsf.</i>)	»
magnifica, <i>Sharpe.</i> 157	157
	et 650
arolasi, <i>Fr.</i> et <i>Wore.</i>	»
bonita, <i>Fr.</i> et <i>Wore.</i>	»
minuta, <i>Fr.</i> et <i>Wore.</i>	»
shelleyi, <i>Sharpe.</i> 158 et	158
bella, <i>Tw.</i>	158
palcherrima, <i>Sharpe.</i>	»
Gén. Cinnyris, <i>Cuv.</i>	»
sperrata, (<i>Lin.</i>) 158 et 651	158
juliae, (<i>Tweed.</i>) 159 et	159
aurora, (<i>Tw.</i>)	»
flagrans, (<i>Oust.</i>)	»
guimaraensis, <i>Steere.</i>	161
	et »
jugularis, (<i>Lin.</i>) » et	»
* pectoralis, (<i>Horsf.</i>)	161
Gén. Arachnothera, <i>Zem.</i>	»
* longirostris, (<i>Lath.</i>)	»
* flammifera, <i>Tw.</i>	162
dilutior, <i>Sharpe.</i>	»
Gén. Aethothreptes, <i>Gadow.</i>	163

	<i>Pág.</i>
chlorogaster, <i>Gadow.</i>	163
griseigularis, <i>Tweed.</i>	163

Fam. MELIFÁGIDOS.

Subfam. MIZOMELINOS.

Gén. Mizomela, <i>Vig.</i> et	163
<i>Horsf.</i>	163
rubratra, (<i>Less.</i>)	»
chermesina, <i>Gray.</i>	»

Subfam. ZOSTEROPINOS.

Zosterops, <i>Vig.</i> et	163
<i>Horsf.</i>	163
everetti, <i>Tw.</i>	163
* palp-brosus, (<i>Tem.</i>)	»
meyeni, <i>Bp.</i>	163
semperi, <i>H.</i> et <i>Finsch.</i>	»
nigrorum, <i>Tw.</i>	»
hypoleucis, <i>Hartl.</i> et	163
<i>Finsch.</i>	163
oleagina, <i>H.</i> et <i>F.</i>	»
conspicillata, (<i>Kittl.</i>)	»
semillava, <i>Newton.</i>	163
modesta, <i>Newton.</i>	»
finschii, (<i>Hartl.</i>)	»
ponapensis, <i>Finsch.</i>	»
basilanica, <i>Steere.</i> 166 et 651	166
cinerea, (<i>Kittl.</i>)	651
siquijorensis, <i>Fr.</i> et	»
<i>Wore.</i>	»

Subfam. MELIFAGINOS.

Gén. Philemon, <i>Vig.</i> et	163
<i>philippensis.</i> <i>Steere.</i>	»

Grupo FRINGILIFORMES.

Fam. DICÉIDOS.

Gén. Dicæum, <i>Cuv.</i>	166
retrocinctum, <i>Gould.</i>	»
haematosictum, <i>Shar-</i>	
<i>pe.</i>	167
rubriventer, <i>Less.</i> 167	167
	et 651
hypoleucum, <i>Sharpe.</i>	»
mindanensis, <i>Tw.</i> 167 et 652	167

Pág.		Pág.	
* trigonosticta, (<i>Scop.</i>)	168	* alba, <i>Lin.</i>	178
dorsale, <i>Sharpe.</i>	»	* ocularis, <i>Swinh.</i>	180
xanthopygium, <i>Tw.</i>	»	melanope, (<i>Pall.</i>)	180
cinereigulare, <i>Tw.</i>	169	et 652	
besti, <i>Steere.</i>	»	* flava, <i>Lin.</i>	183
pygmaeum, (<i>Kittl.</i>)	169 et 652	* borealis, (<i>Suntev.</i>)	185
everetti, <i>Tw.</i>	»	Gén. Anthus, <i>Bechts.</i>	186
palidior, <i>Fr. et Worcester.</i>	651	* richardi, <i>Vieill.</i>	»
sibuyanica, <i>Fr. et Worcester.</i>	»	rufulus, <i>Vieill.</i>	653
intermedius, <i>Fr. et Worcester.</i>	652	* cervinus, <i>Pall.</i>	188
assimilis, <i>Fr. et Worcester.</i>	»	gustavi, <i>Swinh.</i>	190
Gén. Prionochilus, <i>Strickl.</i>	»	undatus.	190
samarensis, <i>Steere.</i>	»	* maculatus, <i>Hodgs.</i>	»
* percussus, <i>Tem.</i>	»		
quadricolor, <i>Tw.</i>	170	Fam. CERÉBIDOS.	
olivaceus, <i>Tw.</i>	»	Subfam. CEREBINOS.	
* xanthopygius, <i>Salv.</i>	»	Gén. Chlorophanes, <i>Reich.</i>	191
joannes, <i>Steere.</i>	»	spiza, <i>Lin.</i>	»
aeruginosus, <i>Fr. et Worcester.</i>	652		
bicolor, <i>Fr. et Worcester.</i>	»	Fam. TANÁGRIDOS.	
modestus, <i>Hume.</i>	»	Gén. Calliste, <i>Boie.</i>	191
		larvata, <i>Du Bus.</i>	»
Fam. HIRUNDÍNIDOS.		Gén. Pyrrhula, <i>Vieill.</i>	»
Gén. Chelidon, <i>Boie.</i>	170	rubra, (<i>Linn.</i>)	»
* urbica, (<i>Lin.</i>)	»	Gén. Phoenicothraupis, <i>Cab.</i>	192
* dasypus, <i>Bp.</i>	171	rubicoides, <i>Lafr.</i>	»
Gén. Cotile, <i>Boie.</i>	172	Gén. Saltator, <i>Vieill.</i>	»
* sinensis, <i>Gray.</i>	172	magnoides, <i>Lafr.</i>	»
Gén. Hirundo, <i>Lin.</i>	173	Gén. Pitius, <i>Cuv.</i>	»
rustica, <i>Lin.</i>	»	poliogaster, <i>Du Bus.</i>	192
gutturalis, <i>Scop.</i>	174 et 652		
javanica, <i>Sparr.</i>	175 et 652	Fam. ICTÉRIDOS.	
striolata, (<i>Boie.</i>)	»	Gén. Dolichonyx, <i>Sw.</i>	192
		oryzivorus, <i>Lin.</i>	»
Fam. MNIOTÍLTIDOS.		Gén. Molothrus, <i>Sw.</i>	»
Gén. Mniotilla, <i>Vieill.</i>	177	pecoris, <i>Gm.</i>	»
varia, (<i>Lin.</i>)	»	aeonus, <i>Wagl.</i>	193
Gén. Dendreca, <i>Sharpe.</i>	»	Gén. Agelaius, <i>Vieill.</i>	»
pennsylvanica, (<i>Lin.</i>)	»	phoeniceus, <i>Lin.</i>	»
cáerulescens, <i>Gm.</i>	»		
Gén. Geothlypis, <i>Cab.</i>	»	Fam. FRINGÍLIDOS.	
philadelphica, <i>Wils.</i>	»	Gén. Volatinia, <i>Reich.</i>	193
Gén. Setopaga, <i>Sw.</i>	178	jacarini, (<i>Lm.</i>)	»
ruticilla, (<i>Lin.</i>)	»	Gén. Carduelis, <i>Briss.</i>	»
		carduelis, (<i>Lin.</i>)	»
Fam. MOTACÍLIDOS.		Gén. Passer, <i>Briss.</i>	194
Gén. Motacilla, <i>Lin.</i>	178	* montanus, (<i>Lin.</i>)	»
		* flaveolus, <i>Blyth.</i>	196

	Pág.		Pág.
Gén. Poæctes, <i>Baird.</i>	195	everetti, (<i>Tw.</i>)	653
gramineus, (<i>Gm.</i>).	»	* leucogastra, <i>Blyth.</i>	»
Gén. Serinus, <i>Koch.</i>	»	Gén. Erythrura, <i>Sparr.</i>	211
canaria, (<i>Lin.</i>).	»	* prasina, (<i>Sparr.</i>).	»
Gén. Loxia, <i>Lin.</i>	»	trichroa, <i>Kittl.</i>	»
curvirostra, <i>Lin.</i>	»	Gén. Ploceus, <i>Cuv.</i>	211
		baya, <i>Blyth.</i>	»
		* atrigula, <i>Hodgs.</i>	211
Grufo: ESTURNIFORMES.		Gén. Ploceella, <i>Oates</i>	»
		javanensis, (<i>Less.</i>).	»
Fam. ARTÁMIDOS.			
Gén. Artamus, <i>Vieill.</i>	197	Fam. ALÁUDIDOS.	
leucogaster, <i>Valenc.</i>	197 et 653	Gén. Melanocorypha, <i>Boie.</i>	212
		* calandra, <i>Lin.</i>	»
Gén. Acriotheres, <i>Vieill.</i>	199	Gén. Alauda, <i>Lin.</i>	»
cristatellus, (<i>Gm.</i>).	»	* gulgula, <i>Frankl.</i>	»
Gén. Sarcops, <i>Wahl.</i>	200	Gén. Mirafra, <i>Horsf.</i>	213
calvus, <i>Lin.</i>	200 et 653	* javanica, <i>Horsf.</i>	»
Gén. Mainatus, <i>Less.</i>	»	philippinensis, <i>Wardl.</i>	»
religiosus, (<i>Lin.</i>).	»		
javanicus, <i>Osbeck.</i>	201	Fam. TIRÁNIDOS.	
palawanensis, <i>Sharp.</i>	202 et 653	Gén. Todirostrum, <i>Less.</i>	213
Gén. Mino, <i>Less.</i>	»	schistaceips, <i>Scl.</i>	»
dumontii, <i>Less.</i>	»	Gén. Legatus, <i>Sch.</i>	»
Gén. Apfonis, <i>Gould.</i>	»	albicollis, (<i>Vieill.</i>).	»
pelzelni, <i>Finsch.</i>	»	Gén. Myodinastes, <i>Bp.</i>	214
khittitzi, <i>Finsch.</i>	»	luteiventris, <i>Bp.</i>	»
Gén. Calornis, <i>Gray.</i>	203	Gén. Megarhynchus, <i>Tumb.</i>	»
* metallica, <i>Tw.</i>	»	pitangua, <i>Lin.</i>	»
* chalybea, (<i>Horsf.</i>)	204	Gén. Myobius, <i>Gray.</i>	»
panayensis, (<i>Scop.</i>)	205	sulphureipygius, <i>Scl.</i>	»
Gen. Streptocitta, <i>Bp.</i>	»	Gén. Myarchus, <i>Cab.</i>	»
torquata, (<i>Temm.</i>).	»	lawrencii, <i>Gr.</i>	»
Gen. Endes, <i>Tem.</i>	206	Gén. Tyrannus, <i>Cuv.</i>	214
* erythrophrys, (<i>Tem.</i>).	»	pipiri, <i>Vieill.</i>	»
Fam. PLOCÉIDOS			
Gén. Munia, <i>Hodg.</i>	206	Fam. PÍPRIDOS.	
oryzivora, (<i>Lin.</i>).	206	Gén. Chiroxiphia, <i>Bab.</i>	214
	et 653	caudata, <i>Shaw.</i>	»
jagorii, <i>Cab.</i>	207 et »	Gén. Chiromachæris, <i>Cab.</i>	215
minuta, <i>Meyer.</i>	207	candæi, <i>Parz.</i>	»
* nisoria, (<i>Tem.</i>).	208		
cabanisi, <i>Sharp.</i>	»		
Gén. Urolonchus, <i>Cab.</i>	»		
		Fam. COTÍNGIDOS.	
		Gén. Pachyrhamphus, <i>Gray.</i>	215
		majör, <i>Sclat.</i>	»
		Gén. Lipaugus, <i>Boie.</i>	»
		holerythrus, <i>Scl.</i>	»
		Gén. Rupicola, <i>Briss.</i>	»
		peruviana, (<i>Lath.</i>).	»
			85

	Pág.		Pág.
Gén. Nipholena, <i>Glog.</i> . . .	215	epops, (<i>Lin.</i>) . . .	222
pompadora, (<i>Lin.</i>). . .	»		
Fam. PÍTIDOS.			
Gén. Pitta, <i>Vieill.</i> . . .	216		
* cyanoptera, <i>Tem.</i> . . .	»		
crythrogaster, <i>Tem.</i> . . .	216 et 653		
propinqua, <i>Sharpe</i> 217	et 653		
kochi, <i>Brug.</i> . . .	»		
makloti, <i>Tem.</i> . . .	»		
atricapilla, <i>Bris.</i> . . .	118		
* muelleri, <i>Bp.</i> . . .	»		
steerii, <i>Sharpe</i> . . .	219		
luzonica.	»		
guttata.	»		
maxima, <i>Müll. et Schleg.</i> . .	»		
* nympha, <i>Tem. et Schl.</i> . .	»		
Fam. EURILÉMIDOS.			
Gén. Sarcophanops, <i>Sharpe</i> . . .	220		
steerii, <i>Sharpe</i> . . .	»		
samarensis, <i>Steere</i> . . .	»		
Gén. Eurylæmus, <i>Sclat.</i> . . .	»		
* javanicus, <i>Horsf</i> . . .	»		
Fam. DENDROCOLÁPTIDOS.			
Gén. Synallaxis, <i>Vieill.</i> . . .	220		
erythrothorax, <i>Scl.</i> . . .	»		
Gén. Automolus, <i>Reich.</i> . . .	221		
cervinigularis, <i>Scl.</i> . . .	»		
Gén. Dendroornis, <i>Eyton</i> . . .	»		
eburneirostris, (<i>Less.</i>) . .	»		
erythropygia, <i>Scl.</i> . . .	221		
Fam. FORMICÁRIDOS.			
Gén. Thamnophilus, <i>Vieill.</i> 221			
doliatus, (<i>Lin.</i>). . .	»		
Gén. Rhamphocænus, <i>Vieill.</i> . .	»		
rufiventris, <i>Bp.</i> . . .	»		
Gén. Cercocæra, <i>Scl.</i> . . .	»		
tyrannina, <i>Scl.</i> . . .	»		
Orden 4.º PICARIOS.			
Suborden UPUPOS.			
—			
Fam. UPÚPIDOS.			
Gén. Upupa, <i>Lin.</i> . . .	222		
Suborden: TROQUILOS.			
Fam. TROQUÍLIDOS.			
Gén. Eulampis, <i>Bore</i> . . .	222		
jugularis, (<i>Lin.</i>) . . .	»		
Gén. Florisuga, <i>Bp</i> . . .	»		
mellivora, (<i>Lin.</i>) . . .	»		
Gén. Amazilia, <i>Reich.</i> . . .	»		
riefferi, (<i>Bourc.</i>) . . .	»		
Suborden: CORACIOS.			
Fam. CIPSÉLIDOS.			
Subfam. CHETURINOS.			
Gén. Chœtura, <i>Steph.</i> . . .	223		
* gigantea, (<i>Tem.</i>) . . .	»		
Collocalia, <i>Gray</i> . . .	»		
lowi, (<i>Sharpe</i>). . . .	»		
fuciphaga, (<i>Thunb.</i>) . . .	»		
troglodytes, <i>Gray</i> 224	et 654		
marginata, <i>Salv.</i> 225 et 654	»		
* linchi, <i>H. et Moore</i> . .	»		
francica, (<i>Gm.</i>) . . .	654		
Subfam. MACROPTERIGINOS.			
Gén. Macropteryx, <i>Swains.</i> 226			
comatus, (<i>Tem.</i>) 226 et 655			
Fam. CAPRIMÚLGIDOS.			
Subfam. CAPRIMULGINOS.			
Gén. Caprimulgus, <i>Lin</i> . . .	226		
europaeus, <i>Lin</i> . . .	»		
macrurus, <i>Horsf.</i> 227 et 655			
atthis, <i>Horsf.</i> . . .	»		
manillensis, <i>Gray</i> . . .	228		
griseatus, <i>Gray</i> . . .	»		
phalœna, <i>Hart</i> . . .	»		
jotaka, <i>Tem. et Schleg.</i> 655			
Gén. Lyncornis, <i>Gould</i> . . .	228		
macrotis, <i>Vig.</i> . . .	»		
mindanensis, <i>Tweedd.</i>	228 et 655		

	Pig.	Pág.
* tamminkii, Gould	229	cyanipectus, <i>Liffr.</i>
paraguensis, " "		steeri, <i>Sharpe</i>
Fam. PODÁRGHIDOS.		argenteata, <i>Tie</i>
Gén. Batrachostomus, Gould, 229		fluminicola, <i>Tie</i>
* auritus, Gr.		Gén. Dacelo, Leach
septimus Tie.		gigas, (Bodd.)
javanensis, Horst.	230	Gén. Halcyon Swinh.
menagei, Fr. et Wore. 655		coronatus, (Lath.) 245 et 656
Fam. CORÁCIDOS.		smyrnensis, (Lin.)
Gén. Eurystomus, Vieill.	230	gularis, (Kuhl.)
orientalis, (Lin.) 230 et 655		pileatus, (Bodd.)
* calonyx? Hodge.	231	albicollis, (Cuv.)
Fam. MEROPÓDIDOS.		winchelli, <i>Sharpe</i> . 249 et 656
Gén. Merops, Lin.	232	cinnamominus, <i>Swinns.</i> 250
bicolor, Bodd. 232 et 656		mediocris, <i>Sharpe</i>
* sumatranus, Raffl.		chloris, (Bodd.) 250 et 656
apiaster, Lin.	233	humii, <i>Sharpe</i>
philippinus, Lin.		variegatus, (J. et Puch.)
Suborden: ALCIONES.		lindsayi, (Vig.).
Fam. ALCEDÍNIDOS.		moseleyi, <i>Sharpe</i>
Subfam. ALCEDININOS.		Gén. Tanyptera, Vigors
Gén. Pelargopsis, Gloger.	235	dea, (Lin.)
melanorhyncha, (Ten.) " "		
leucocephala, (Gm.)		Fam. MOMÓTIDOS.
gouldii, Sharpe 236 et 656		
gigantea, Wald. 236 et		Gén. Hylomanes, Licht.
mindorenensis,	236	momotula, Licht.
Gén. Alcedo, Lin.		
ispida, Lin.	236 et 656	Suborden: BUCEROTES.
meninting, Horst.		
Subfam. DACELONINOS.		Fam. BUCERÓTIDOS.
Gén. Ceyx, Lacep.	241	
* tridactyla, (Pall)		Gén. Hydrocorax, Briss.
rufidorsa, Sharpe 242 et 656		hydrocorax, (Lin.)
melanura, Kaup.		mindrensis, Tieedd.
b. silanica, Steere		semigaleatus, (Tweed.)
mindanensis, Steere.	243	Gén. Anthracoceros, Reich.
lepidia, Tem.		montani, Oust
malamaui, Steere		Gén. Gymnolemus, Ogilv.
hounsi, Steere		marchii, (Oust.)
nigrostris, Fr. et Wore. 656		Gén. Penelopides, Reich.
		panini, (Bodd.)
		manillae, (Bodd.)
		mindorenensis, Steere.
		afunis, Tie.
		basilanica, Steere
		samarensis, Steere.
		Gén. Cranorrhinus, C. et Heine. 257
		cassidix, Tem.
		*

	Pág.		Pág.
leucocephalus, (<i>Vieill.</i>)	357	Gén. Hemilophus, <i>Sw.</i>	267
waldeni, <i>Sharpe.</i>	258	* pulverulentus, (<i>Tem.</i>)	»
Gén. Anorrhinus, <i>Reich.</i>	»	Gén. Thripornax, <i>Cab.</i> et	
galeritus, (<i>Tem.</i>)	»	Heine.	268
Suborden: TROGONES.		javensis, (<i>Horsf.</i>)	»
Fam. TROGÓNIDOS.		pectoralis, <i>Tw.</i>	269
Gén. Harpactes, <i>Swain.</i>	258	hargitti, <i>Sharpe.</i>	»
ardens, (<i>Tem.</i>)	258 et 656	philippinensis, <i>Steere.</i>	
Suborden: TREPADORES.		269 et 656	
Fam. PÍCIDOS.		mindorensis, <i>Steere.</i>	269
Subfam. PÍCINOS.		Fam. CAPITÓNIDOS.	
Gén. Gecinus, (<i>Boie.</i>)	257	Gén. Xantholæma, <i>Bp.</i>	269
viridis, (<i>Lin.</i>)	259	hematocephala, (<i>S.</i>	
puniceus, (<i>Horsf.</i>)	»	<i>Müll.</i>)	269 et 657
Gén. Chloronarpes, <i>Sw.</i>	260	* rosea, (<i>Dum.</i>)	271
yucatanensis, (<i>Cabot.</i>)	»	intermedia, (<i>Shell.</i>)	271
Gén. Chrysophlegma, <i>Gould.</i>	»	et 657	
mentale, (<i>Tem.</i>)	»	Gén. Chotorhea, <i>Bp.</i>	271
Gén. Melanerpes, <i>Sw.</i>	261	versicolor, <i>Raffl.</i>	»
pucherani, (<i>Malh.</i>)	»	Fam. RAMFÁSTIDOS.	
Gén. Dendrocopos, <i>Koch.</i>	»	Gén. Rhamphastos, <i>Lin.</i>	271
mixtus, (<i>Bodd.</i>)	»	dicolorus, <i>Lin.</i>	»
Gén. Sphyrapicus, <i>Bair.</i>	262	Fam. GALBÚLIDOS.	
varius, (<i>Lin.</i>)	»	Gén. Galbula, <i>Briss.</i>	272
Gén. Yngipicus, <i>Bp.</i>	»	melanogenia, <i>Scb.</i>	»
maculatus, (<i>Scop.</i>)	»	Suborden: COCCIGEOS.	
fulvifasciatus, <i>Harg.</i>	»	Fam. CUCÚLIDOS.	
basilanicus, <i>Steere.</i>	262	Subfam. CUCULINOS.	
ménagei, <i>Fr.</i> et		Coccystes, <i>Glog.</i>	272
<i>Worc.</i> 656		coromandus, (<i>Lin.</i>)	272
leytensis, <i>Steere.</i>	263	et 657	
ramsayi, <i>Harg.</i>	»	Gén. Surniculus, <i>Less.</i>	273
Gén. Tiga, <i>Kaup.</i>	»	lugubris, (<i>Horsf.</i>)	»
everetti, <i>Tw.</i>	»	velutinus, <i>Sharpe.</i>	274
javanensis, (<i>Ljung.</i>)	»	et 657	
Gén. Chrysocolaptes, <i>Blyth.</i>	264	Gén. Hierococcyx, <i>S. Müll.</i>	274
erytrocephalus, <i>Sharp.</i>	»	sparverioides, (<i>Vig.</i>)	»
hœmatribon, (<i>Wagl.</i>)	»	fugax, (<i>Horsf.</i>)	275
lucidus, <i>Scop.</i>	265	Gén. Cuculus, <i>Lian.</i>	
rufopunctatus, <i>Harg.</i>	266	canorus, <i>Lin.</i>	276 et 657
xanthocephalus, <i>Wald.</i>	»	intermedius, <i>Vahl.</i>	278
Gén. Microstictus <i>Harg.</i>	»	* poliocephalus, <i>Lath.</i>	279
fuliginosus, <i>Tw.</i>	»	Gén. Cacomantis, <i>S. Müll.</i>	280
tenebris, (<i>Valen.</i>)	»	merulinus, (<i>Scop.</i>)	280
		et 657	

	Pág.
Gén. Chalcoecyx, <i>Cab.</i> . . .	281
* <i>xanthorhynchus</i> , <i>(Horsf.)</i> 282	
* <i>basalis</i> , <i>(Horsf.)</i> . . .	»
* <i>lucidus</i> , <i>(Gm.)</i> . . .	283
<i>malayanus</i> , <i>(Raffl.)</i> . . .	»
Gén. Eudynamis, <i>Tig.</i> . . .	284
<i>mindanensis</i> , <i>(Linn.)</i> . . .	284 et 657
* <i>honorata</i> , <i>(Lin.)</i> . . .	286
<i>rufiventer</i> , <i>(Less.)</i> . . .	»
Gén. Coccyzus, <i>Vieill.</i> . . .	
<i>erithrophthalmus</i> , <i>Wils.</i> 286	
Gén. Scythrops, <i>Lath.</i> . . .	
<i>nova-hollandiae</i> , <i>Lath.</i> 287	

Subfam. CENTROPODINOS.

Gén. Centropus, <i>Ill.</i> . . .	287
<i>mindorensis</i> , <i>(Steere.)</i> »	
<i>sinensis</i> , <i>(Step.)</i> . . .	»
<i>viridis</i> , <i>(Scop.)</i> 289 et 657	
<i>javanicus</i> , <i>(Dum.)</i> 289 et	
<i>melanops</i> , <i>(Less.)</i> . . .	290
<i>unirufus</i> , <i>Cab.</i> . . .	
<i>Heine.</i> 291	
<i>vir. albina</i>	»
<i>steerii</i> , <i>Fr.</i> et <i>Worc.</i> .	657

Subfam. FENICOFAINOS.

Gén. Piaya, <i>Less.</i>	291
<i>cayana</i> , <i>(Lin.)</i>	»
<i>melanogastra</i> , <i>(Vieill.)</i> »	
Gén. Rhopodytes, <i>Cab.</i> et <i>Hein.</i> 291	
<i>tristis</i> , <i>(Less.)</i> . . .	291
Gén. Rhinortha, <i>Tig.</i> . . .	292
<i>chlorophœa</i> , <i>(Raffl.)</i> . . .	»
Gén. Dryococcyx, <i>Sharpe.</i> . .	»
<i>harringtoni</i> , <i>Sharpe.</i> . .	
et 657	
Gén. Dasylophus, <i>Sw.</i> . . .	292
<i>superciliosus</i> , <i>(Cuv.)</i> . . .	»
Gén. Lepidogrammus, <i>Reich.</i> . .	»
<i>cumingi</i> , <i>Frassér.</i> . . .	

Subfam. CROTOFAGINOS.

Gén. Crotaphaga, <i>Lin.</i> . . .	292
<i>sulcirostris</i> , <i>Sw.</i> . . .	293

Orden: PALOMAS.

Fam. TRERÓNIDAS.	Pág.
Gén. Treron, <i>Vieill.</i> . . .	293
<i>nipalensis</i> , <i>(Hodgs.)</i> . . .	»
Gén. Os notron, <i>Bp.</i> . . .	»
<i>axillaris</i> , <i>Gray.</i> 294 et 657	
<i>vernans</i> , <i>(Lin.)</i> 295 et	»
Gén. Phabotreron, <i>Bp.</i> . . .	297
<i>amethystina</i> , <i>Bp.</i> . . .	»
<i>cinereiceps</i> , <i>Fran.</i> et <i>Worc.</i> 297	
<i>brunneiceps</i> , <i>Fr.</i> et <i>Worc.</i> 297	
<i>maculipectus</i> , <i>Fr.</i> et <i>Worc.</i> 297	
<i>frontalis</i> , <i>Fr.</i> et <i>Worc.</i> .	»
<i>leucotis</i> , <i>(Tem.)</i> . . .	»
<i>occipitalis</i> , <i>Tw.</i> 298 et 657	
<i>nigrorum</i> , <i>Sharpe.</i> 298	
et 658	
<i>brevirostris</i> , <i>Tw.</i> . . .	298

Fam. PTILÓPIDAS.

Gén. Leucotreron, <i>Bp.</i> . . .	297
<i>occipitalis</i> , <i>Gr.</i> 299 et 658	
<i>marchei</i> , <i>Oust.</i> . . .	300
<i>leclanderi</i> , <i>Bp.</i> 300 et 658	
<i>roseicollis</i> , <i>Gr.</i> . . .	300
<i>gularis</i> , <i>Q.</i> et <i>G.</i> . . .	301
sp.	302
<i>jambu</i> , <i>(Gm.)</i> . . .	»
Gén. Ptilopus, <i>Strickl.</i> . . .	303
<i>ponapensis</i> , <i>Finsch.</i> . . .	»
<i>hernsheimi</i> , <i>Finsch.</i> . . .	303
<i>roseicapillus</i> , <i>(Less.)</i> . . .	»
Gén. Lamprotreron, <i>Bp.</i> . . .	304
* <i>temminckii</i> , <i>Des Murs.</i> . . .	»
Gén. Spilotreron, <i>Salv.</i> . . .	»
<i>bangueyensis</i> , <i>Meyer.</i> . . .	»
Gén. Alectraenus, <i>Gray.</i> . . .	305
<i>pulcherrima</i> , <i>(Scop.)</i> . . .	»

Fam. CARPOFÁGIDAS.

Gén. Globiceri, <i>Bp.</i> . . .	306
<i>oceánica</i> , <i>(Less.)</i> . . .	»
Gén. Carpophaga, <i>Selby.</i> . . .	»
<i>nuchalis</i> , <i>Cab.</i> . . .	»
<i>ænea</i> , <i>(Lin.)</i> . . .	307

	Pág.		Pág.
chalybura, <i>Bp.</i> . . .	308	luzonica, (<i>Scop.</i>) . . .	326
palawanensis, <i>Blas</i> . . .	»	luzonica, var. albina. . .	327
perspicillata, (<i>Tem.</i>) . . .	309	samarensis,	»
pickeringi, <i>Cass.</i> . . .	»	mindorensis,	»
Gén. Ptilocalpa, <i>Bp.</i> . . .	310	crinigera, (<i>H. et Jacq.</i>) .	328
griseipectus, <i>Bp.</i> . . .	»	plateneæ, <i>Blas.</i>	»
carola, (<i>Bp.</i>) . . .	»	yapensis, <i>H. et Funz.</i> . .	»
Gén. Zonophaps, <i>Salv.</i> . . .	»	Kubaryi, <i>Finsch.</i> . . .	»
poliocephalus, <i>Gray.</i> . . .	»	menagei, <i>Fr. et Worc.</i> . .	329
Gén. Myristicivora, <i>Rchb.</i> . .	311	pampusan, <i>Q. et G.</i> . .	»
bicolor, (<i>Scop.</i>) . . .	»		
		Subfam. CALENADINAS.	
Fam. COLÚMBIDAS.			
Gén. Columba, <i>Linn.</i> . . .	313	Gén. Calanias, <i>Gray.</i> . . .	330
livia, <i>Briss.</i>	»	nicobarica, (<i>Linn.</i>) . . .	»
griseigularis, <i>Wald.</i> . . .	»		
cinerea, <i>Scop.</i>	»		
		Fam. GÚRIDAS	
Fam. MACROPÍGIDAS.			
Gén. Turacæna, <i>Bp.</i> . . .	314	Gén. Goura, <i>Steph.</i> . . .	332
* modesta?	»	coronata, (<i>Linn.</i>) . . .	»
Gén. Macropygia, <i>Sw.</i> . . .	»	victoria, <i>Fraser.</i> . . .	»
tenuirostris, <i>Gr.</i> . . .	»		
Fam. PERISTÉRIDAS.			
Subfam. TURTURIIDAS.			
Gén. Homopelia, <i>Salv.</i> . . .	315	Gén. Caccabis, <i>Kaup.</i> . . .	332
rostrata, (<i>Bp.</i>)	»	rufa, (<i>Linn.</i>)	»
picturata, (<i>Tem.</i>)	316	Gén. Perdix, <i>Briss.</i>	»
		perdix, (<i>Linn.</i>)	»
Gén. Streptopelia, <i>Bp.</i> . . .	317	Gén. Arboricola, <i>Hodgs.</i> .	333
dussumieri, (<i>Tem.</i>)	»	* gingica, (<i>Gm.</i>)	»
humilis, (<i>Tem.</i>)	318	Gén. Rollulus, <i>Bonn.</i> . . .	»
Gén. Spilopelia, <i>Sundev.</i> . .	319	roulroul, (<i>Scop.</i>)	»
* chinensis, (<i>Scop.</i>) . . .	»	Gén. Coturnix, <i>Moehring.</i> .	334
* tigrina, (<i>Tem.</i>)	»	coturnix, (<i>Linn.</i>)	»
		Gén. Excalfactoria, <i>Bp.</i> .	334
		chinensis, (<i>Linn.</i>)	»
Subfam. GEOPELINAS.		lineata, <i>Scop.</i>	335
		Gén. Lophura, <i>Fleming.</i> .	336
Gén. Geopelia, <i>Sw.</i>	321	rufa, <i>Raffl.</i>	»
striata, (<i>Linn.</i>)	»	Gén. Tragopan, <i>Cuv.</i> . .	»
		satyra, (<i>Linn.</i>)	»
		temmincki, <i>Gray.</i>	337
Subfam. FABINAS.		nyctemerus, (<i>Linn.</i>) . . .	»
		Gén. Gennæus, <i>Wagl.</i> . .	»
Gén. Chalcophaps, <i>Gould.</i> . .	323	Phasianus, <i>Linn.</i>	»
indica, (<i>Linn.</i>)	»	colchicus, <i>Linn.</i>	»
Gén. Ocyphaps, <i>Gould.</i> . .	326	torquatus, <i>Gm.</i>	»
lophotes, (<i>Tem.</i>)	»	Chrysolophus, <i>Gray.</i> . .	»
		pictus, (<i>Linn.</i>)	»
Subfam. GEOTRIGONINAS.			
Gén. Phlogænas, <i>Rchb.</i> . .	326		

	Pág.		Pág.
Gén. Gallus, <i>Lin.</i>	337	tarda, <i>Lin.</i>	344
stramineicollis, <i>Sharpe.</i> »		Fam. EDICNÉMIDAS.	
gallus, <i>Lin.</i>	338	Gén. <i>Orthonomus</i> , <i>Sav.</i> 345	
varius, <i>Shaw.</i>	»	* magnirostris, <i>Geoff.</i>	»
domesticus, (<i>Lin.</i>)	339	Fam. CHARÁDRIDAS.	
d. patavinus, (<i>Lin.</i>)	»	Gén. <i>Spatula</i> , <i>Cuv.</i>	345
d. cochininchensis.	»	helvetica, (<i>Briss.</i>)	»
sonneratii, (<i>Tem.</i>)	»	* grisea, (<i>Briss.</i>)	»
Gén. <i>Polypectron</i> , <i>Tem.</i>	»	* varia, (<i>Briss.</i>)	346
emphanes, <i>Sci.</i>	»	Gén. <i>Balaenopterus</i> , <i>Reich.</i> »	
napoleonis, <i>Less.</i>	340	cayennensis, <i>Gm.</i>	»
Gén. <i>Argusianus</i> , <i>Raf.</i>	341	Gén. <i>Charadrius</i> , <i>Lin.</i>	»
argus, <i>Lin.</i>	»	fulvus, <i>Gm.</i>	»
cristatus, <i>Lin.</i>	»	* pluvialis, <i>Lin.</i>	347
muticus, <i>Lin.</i>	»	Gén. <i>Aegialites</i> , <i>Boie.</i>	»
Gén. <i>Meleagris</i> , <i>Lin.</i>	»	* peronii, (<i>Tem.</i>)	»
gallo-pavo, <i>Lin.</i>	»	dubius, (<i>Scop.</i>)	»
Gén. <i>Numida</i> , <i>Lin.</i>	»	mongolicus, (<i>Pall.</i>)	348
meleagris, <i>Lin.</i>	»	geoffroii, (<i>Wagl.</i>)	349
id. vir. alba,	»	* cantianus, (<i>Lath.</i>)	»
Gén. <i>Lophortyx</i> , <i>Bp.</i>	342	Fam. GLAREÓLIDAS.	
californicus, <i>Shaw.</i>	»	Gén. <i>Glareola</i> , <i>Less.</i>	349
Fam. MEGAPÓDIDAS.		orientalis, <i>Leach.</i>	»
Gén. <i>Megapodius</i> , <i>Q. et Gaim.</i> 342		* isabella, <i>Veill.</i>	350
cumingi, <i>Dillw.</i>	»	Fam. HEMATOPÓDIDAS.	
laferousii, (<i>Tem.</i>)	»	Gén. <i>Strepsilas</i> , <i>Illig.</i>	351
Orden: HEMIPODIOS.		* interpres, (<i>Lin.</i>)	350
Fam. TURNÍCIDOS.		Gén. <i>Hematopus</i> , <i>Lin.</i>	351
Gén. <i>Turnix</i> , <i>Bonnat.</i>	343	* osculans, <i>Swinh.</i>	»
pugnax, (<i>Tem.</i>)	343	Fam. ESCOLOPÁCIDAS.	
fasciata, (<i>Tem.</i>)	»	Gén. <i>Himantopus</i> , <i>Briss.</i>	351
ocellata, (<i>Scop.</i>)	344	* leucocephalus, <i>Gould.</i>	»
Orden: CORREDORAS.		* autumnalis, <i>Has.</i>	»
Fam. CASUÁRIDAS.		* minor, <i>Nat.</i>	»
Gén. <i>Casuarius</i> , <i>Lin.</i>	344	Gén. <i>Recurvirostra</i> , <i>Lin.</i>	352
emeu, <i>Lath.</i>	»	* avocetta, <i>Lin.</i>	»
bicearunculatus, <i>Selat.</i>	»	Gén. <i>Calidris</i> , <i>Illigr.</i>	»
Orden: ZANCUDAS.		* arenaria, <i>Lin.</i>	»
Fam. OTÍDIDAS.		Gén. <i>Limicola</i> , <i>Koch.</i>	»
Gén. <i>Otis</i> , <i>Lin.</i>	344	* platyrhyncha, (<i>Tem.</i>)	»
		Gén. <i>Pelidna</i> , <i>Cuv.</i>	»
		* subarquata, (<i>Gulden.</i>)	»
		* alpina, (<i>Lin.</i>)	353

	Pág.
* <i>acuminata</i> , (<i>Horsf.</i>)	353
Gén. <i>Actidiromas</i> , <i>Kruup.</i>	»
* <i>albescens</i> , (<i>Tem.</i>)	»
* <i>teminckii</i> , (<i>Leis.</i>)	354
* <i>s.dina</i> , (<i>Pall.</i>)	»
Gén. <i>Tringa</i> , <i>Lin.</i>	»
* <i>cassirostris</i> , <i>Tem.</i> et <i>Schl.</i>	354
* <i>canutus?</i> , (<i>Lath.</i>)	355
Gén. <i>Tringoides</i> , <i>Bp.</i>	»
<i>hypoleucus</i> , (<i>Lin.</i>)	»
Gén. <i>Totanus</i> , <i>Bechst.</i>	355
<i>glareola</i> , (<i>Lin.</i>)	355
<i>ochropus</i> , <i>Lin.</i>	356
<i>calidris</i> , (<i>Gn.</i>)	»
* <i>stagnalis</i> , <i>Bechst.</i>	»
<i>glottis</i> , (<i>L'n.</i>)	357
<i>incana</i> , (<i>Gm.</i>)	»
Gén. <i>Terekia</i> , <i>Bp.</i>	358
<i>cinerea</i> , (<i>Gulden.</i>)	»
Gén. <i>Limosa</i> , <i>Briss.</i>	359
* <i>m tanuroides</i> , <i>Gould.</i>	»
* <i>baueri</i> , <i>Nauv.</i>	»
* <i>ægoccephala</i> , <i>Lin.</i>	360
<i>brevipes</i> , <i>Gray.</i>	»
Gén. <i>Pseudoscopax</i> , <i>Blyth.</i>	»
* <i>semipalmatus</i> , (<i>Jerd.</i>)	»
Gén. <i>Nunenius</i> , <i>Briss.</i>	361
<i>arquatus</i> , (<i>Lin.</i>)	»
* <i>lineatus</i> , <i>Steere.</i>	»
* <i>major</i> , <i>Tem.</i> <i>Schleg.</i>	»
* <i>australis</i> , <i>Gould.</i>	»
* <i>phoenopus</i> , (<i>Lin.</i>)	»
* <i>minutus</i> , <i>Gould.</i>	362
<i>luzoniensis</i> , (<i>Gm.</i>)	362
Gén. <i>Gallinago</i> , <i>Steph.</i>	»
* <i>megalia</i> , <i>Swinh.</i>	»
* <i>scopulapina</i> , <i>Bp.</i>	»
Gén. <i>Pavoncella</i> , <i>Lesch.</i>	363
<i>pugnax</i> , (<i>Lin.</i>)	»
Gén. <i>Spirura</i> , <i>Bp.</i>	»
<i>stenura</i> , (<i>Kuhl.</i>)	»
Gén. <i>Rhynchos</i> , <i>Cuv.</i>	»
<i>bengalensis</i> , (<i>Lin.</i>)	»
Gén. <i>Scopulapax</i> , <i>Lin.</i>	364
<i>ruficola</i> , (<i>Lin.</i>)	»
Fam. RÁLIDAS.	
Gén. <i>Hypotænidia</i> , <i>Reich.</i>	364
<i>striata</i> , (<i>Lin.</i>)	»
<i>torquata</i> , (<i>Briss.</i>)	»
<i>philippinensis</i> , (<i>Briss.</i>)	365
Gén. <i>Amaurornis</i> , <i>Reich.</i>	365
<i>olivacea</i> , (<i>Meyer.</i>)	»
Gén. <i>Rallina</i> , <i>Rehb.</i>	»
<i>fasciata</i> , (<i>Riffl.</i>)	»
<i>fusca</i> , (<i>L'nn.</i>)	»
* <i>rufigula</i> , <i>Wall.</i>	366
Gén. <i>Ortygonetra</i> , <i>Lin.</i>	»
<i>cineracea</i> , (<i>Vieill.</i>)	366
Gén. <i>Porzana</i> , <i>L'</i>	367
<i>erythrothorax</i> , <i>Steere.</i>	»
<i>palykulii</i> , <i>Steere.</i>	»
* <i>baillonii</i> , <i>Vieill.</i>	»
Gén. <i>Gallirex</i> , <i>Blyth.</i>	»
<i>cristata</i> , (<i>Lath.</i>)	»
Gén. <i>Erythra</i> , <i>Rehb.</i>	368
<i>phenicura</i> , (<i>Penn.</i>)	»
Gén. <i>Gallinula</i> , <i>Briss.</i>	»
<i>orientalis</i> , <i>Horsf.</i>	»
<i>sp.</i>	»
Gén. <i>Porphyrio</i> , <i>Briss.</i>	369
* <i>palverulentus</i> , <i>Tem.</i>	»
<i>indicus</i> , <i>Forsf.</i>	»
Gén. <i>Fulica</i> , <i>Lin.</i>	»
<i>atra</i> , <i>Lin.</i>	»
Fam. PÁRRIDAS.	
Gén. <i>Hydrophasianus</i> , <i>Wtg.</i>	369
<i>chirurgus</i> , (<i>Scop.</i>)	»
Fam. GRÚIDAS.	
Gén. <i>Antigone</i> , <i>Reich.</i>	370
* <i>torquata</i> , (<i>Wieg.</i>)	»
Fam. ARDÉIDAS.	
Gén. <i>Ardea</i> , <i>Lin.</i>	371
* <i>su natans</i> , <i>Riffl.</i>	»
<i>cineracea</i> , <i>Lin.</i>	371
<i>parpurea</i> , <i>Lin.</i>	»
Gén. <i>Diagrettia</i> , <i>Blyth.</i>	»
<i>siera</i> , (<i>Gm.</i>)	»
Gén. <i>Herodias</i> , <i>Boie.</i>	372
* <i>torra</i> , (<i>Buch-Hamilt.</i>)	»
<i>intermedia</i> , (<i>Hassel.</i>)	373
<i>garzetta</i> , (<i>Lin.</i>)	374
Gén. <i>Girazetta</i> , <i>Bp.</i>	»
* <i>nigripes</i> , (<i>Tem.</i>)	»
Gén. <i>Babaleus</i> , <i>Bp.</i>	»
<i>coromandus</i> , (<i>Bo.td.</i>)	»
Gén. <i>Ardeola</i> , <i>Boie.</i>	375

	Pág.	Pág.	
* speciosa, (<i>Horsf.</i>) . . .	375	* superciliosa, <i>Gm.</i> . . .	382
Gén. Butorides, <i>Blyth.</i> . . .		boschas, <i>Linn.</i> . . .	»
javanica, (<i>Horsf.</i>) . . .	375	paraguanensis, . . .	»
* macrohyncha, (<i>Gould.</i>) . . .	»	pusilla, . . .	»
Gén. Ardeirala, <i>Verr.</i> . . .	376	cinerescens, . . .	»
flavicollis, (<i>Lath.</i>) . . .	»	Gén. Dendrocygna, <i>Swains.</i>	»
Gén. Ardetta, <i>G. R. Gray.</i> . . .	»	vagans, <i>Eyton.</i> . . .	»
sinensis, (<i>Gm.</i>) . . .	»	* arquata, (<i>Cuv.</i>) . . .	383
paraguanensis, . . .	377	* guttata, (<i>Forts.</i>) . . .	»
cinnamomea, (<i>Gm.</i>) . . .	»	Gén. N. ttipus, <i>Braufl.</i> . . .	»
sp.	»	* coromandelianus, (<i>Gm.</i>) . . .	»
Botaurus, <i>Steph.</i>	»	Gén. Spatula, <i>Boie.</i>	»
limnophylax, (<i>Gen.</i>) . . .	»	* clypeata, <i>Linn.</i>	»
stellaris, <i>Lin.</i>	»	Gén. Anser, <i>Linn.</i>	384
Gén. Buphus, <i>Boie.</i>	378	* segetum, <i>Gm.</i>	»
* malaccensis, (<i>Gm.</i>) . . .	»	cinereus, <i>Meyer.</i>	»
Gén. Zebrilus, <i>Bp.</i>	»	Gén. Olor, <i>Wagler.</i>	»
* radiolatus, <i>Bp.</i>	»	musicus, (<i>Lin.</i>)	»
Gén. Gorsachius, <i>Pueg.</i> . . .	»	Gén. Aix, <i>Boie.</i>	»
* melanolophus, (<i>Rafpl.</i>) . . .	»	galericulata, <i>Lin.</i>	»
Gén. Nycticorax, <i>Steph.</i> . . .	379	Gén. Dafila, <i>Leach.</i>	»
griseus, <i>Lin.</i>	»	* acuta, <i>Lin.</i>	»
manillensis, <i>Vig.</i> . . .	»	Gén. Fulix, <i>Sundev.</i>	»
		* cristata, <i>Lin.</i>	»

Fam. CICÓNIIDAS.

Gén. Leptoptilos, <i>Less.</i> . . .	379
dubius, (<i>Gm.</i>) . . .	»
Gén. Melanopelargus, <i>Rchb.</i> . . .	»
episcopus, (<i>Bodd.</i>) . . .	»

Fam. TANTÁLIDAS.

Gén. Falcinellus, <i>Bechst.</i> . . .	380
* igneus, (<i>Gm.</i>) . . .	»

Fam. PLATALÉIDAS.

Gén. Platalea, <i>Lin.</i>	381
leucorodia, <i>Lin.</i> . . .	»
Gén. Leucorodius, <i>Reich.</i> . . .	»
luzoniensis, (<i>Scop.</i>) . . .	»

Orden: NADADORAS

Fam. ANÁTIDAS.

Gén. Querquedula, <i>Steph.</i> . . .	»
multicolor, (<i>Scop.</i>) . . .	»
* circia, (<i>Lin.</i>)	»
Gén. Anas, <i>Lin.</i>	382
luzonica, <i>Fras.</i>	»

Gén. Pelecanus, <i>Linn.</i> . . .	385
roseus, <i>Gm.</i>	»
javanicus, (<i>Horsf.</i>) . . .	»
Gén. Fregata, <i>Ill.</i>	»
* aquila, (<i>Linn.</i>)	»
* minor, (<i>Gm.</i>)	386
Gén. Gráculus, <i>Linn.</i>	»
* carbo, <i>Linn.</i>	»
Gén. Microurcarbo, <i>Bp.</i>	»
* sulcirostris, (<i>Brandt.</i>) . . .	»
* pygmaeus, (<i>Pall.</i>)	387
Gén. Sula, <i>Briss.</i>	388
* cyanops, <i>Sundev.</i>	»
piscatrix, (<i>Linn.</i>)	»
fiber, <i>Linn.</i>	389

Fam. PLÓTIDAS.

Gén. Plotus, <i>Linn.</i>	»
melanogaster, (<i>Penn.</i>) . . .	»

Fam. FETÓNIDAS.

Gén. Phaeton, <i>Linn.</i>	390
rubricauda, <i>Bodd.</i> . . .	»
* candilus, (<i>Briss.</i>) . . .	»

		Pág.	Pág.
Fam. LARIDAS.			
Gén. <i>Larus</i> , <i>Linn.</i>	...	390	leucomelas, (<i>Tem.</i>) . . .
* <i>fritzii</i> , (<i>Bruch.</i>) . . .	"		398
<i>ridibundus</i> , <i>Linn.</i> . . .	391		
<i>hardyi</i> , <i>Bp.</i> . . .	"		
Fam. ESTÉRNIDAS.			
Gén. <i>Gelochelidon</i> , <i>Brehm.</i>	"		
* <i>anglica</i> , (<i>Mont.</i>) . . .	"		
Gén. <i>Hydrochelidon</i> , <i>Boie.</i>	"		
<i>nigra</i> , (<i>Linn.</i>) . . .	"		
<i>hybrida</i> , <i>Pall.</i> . . .	392		
Gén. <i>Onychoprion</i> , <i>Wagl.</i>	"		
<i>fuliginosus</i> , (<i>Gm.</i>) . . .	"		
<i>anachetus</i> , (<i>Scop.</i>) . . .	393		
<i>sumatranus</i> , (<i>Raffl.</i>) . . .	"		
Gén. <i>Gygis</i> , <i>Wagl.</i> . . .	394		
<i>alba</i> , (<i>Sparrm.</i>) . . .	"		
Gén. <i>Sterna</i> , <i>Linn.</i> . . .	"		
Subgén. <i>Pelecanopus</i> , <i>Wagl.</i>	"		
* <i>cristatus</i> , <i>Steph.</i> . . .	"		
* <i>medius</i> , <i>Horsf.</i> . . .	395		
Subgen. <i>Sterna</i> , <i>Lin.</i> . . .	50%		
<i>melanogastra</i> , <i>Tem.</i> . . .	"		
* <i>sinensis</i> , <i>Gm.</i> . . .	"		
Gén. <i>Sternula</i> , <i>Boie.</i> . . .	"		
<i>minuta</i> , (<i>Linn.</i>) . . .	"		
Gén. <i>Anous</i> , <i>Leach.</i> . . .	"		
* <i>stolidus</i> , (<i>Linn.</i>) . . .	"		
<i>melanogenys</i> , <i>Gr.</i> . . .	397		
Fam. PODICÍPIDAS.			
Gén. <i>Sylveoccyclus</i> , <i>Bp.</i> . . .	"		
<i>philippinensis</i> , (<i>Bon.</i>) . . .	"		
* <i>var.</i>	"		
Gen. <i>Podiceps</i> , <i>Lath.</i> . . .	398		
* <i>australis</i> , <i>Gould.</i> . . .	"		
Gén. <i>Pedethyia</i> , <i>Kaup.</i> . . .	"		
<i>rubricollis</i> , <i>Lath.</i> . . .	"		
Fam. COLÍMBIDAS.			
Gen. <i>Colymbus</i> , <i>Lin.</i> . . .	"		
<i>arcticus</i> , <i>Lin.</i> . . .	"		
Fam. PROCELÁRIDAS.			
Gén. <i>Diomedea</i> , <i>Lin.</i> . . .	"		
<i>exulans</i> , <i>Lin.</i> . . .	"		
Gen. <i>Puffinus</i> , <i>Briss.</i> . . .	"		
Fam. ÁLCIDAS.			
Gén. <i>Cheniscus</i> , <i>Moehr.</i> . . .	"		
<i>cirrhatus</i> , (<i>Gm.</i>) . . .	"		
Clase 3. ^a REPTILES.			
Ordeu 1. ^o QUELONIOS.			
Suborden: ATECOS.			
Fam. ESFÁRGIDOS.			
Gén. <i>Dermochelys</i> , <i>Blainv.</i>	397		
* <i>coriacea?</i> , (<i>Lin.</i>) . . .	399		
Suborden: TECÓFOROS.			
Fam. PLATISTÉRNIDOS.			
Gén. <i>Platysternum</i> , <i>Gray.</i> . . .	"		
* <i>megacephalum</i> , <i>Gray.</i> . . .	"		
Fam. TESTUDINIDOS.			
Gén. <i>Callagur</i> , <i>Gray.</i> . . .	400		
* <i>picta</i> , <i>Gray.</i> . . .	"		
Gén. <i>Ocadia</i> , <i>Gray.</i> . . .	"		
* <i>sinensis</i> , (<i>Gray.</i>) . . .	"		
Gén. <i>Damonia</i> , <i>Gray.</i> . . .	"		
* <i>reevesii</i> , <i>Gray.</i> . . .	"		
Gén. <i>Bellia</i> , <i>Gray.</i> . . .	401		
* <i>crassicollis</i> , (<i>Gray.</i>) . . .	"		
Gén. <i>Nicoria</i> , <i>Gray.</i> . . .	"		
* <i>spengleri</i> , <i>Gray.</i> . . .	"		
Gén. <i>Cyclemys</i> , <i>Bell.</i> . . .	"		
* <i>trifasciata</i> , (<i>Gray.</i>) . . .	"		
<i>ambboinensis</i> , <i>Daud.</i> . . .	402		
* <i>flavomarginata</i> , (<i>Gray.</i>) . . .	"		
* <i>platynota</i> , (<i>Gray.</i>) . . .	"		
Fam. QUELÓNIDOS.			
Gén. <i>Chelone</i> , <i>Strauch.</i> . . .	"		
<i>mydas</i> , (<i>Lin.</i>) . . .	"		
<i>imbricata</i> , <i>Strauch.</i> . . .	404		
Gén. <i>Thalassochelys</i> , <i>Fitzing.</i> . . .	"		
<i>caretta</i> , (<i>Lin.</i>) . . .	"		

Fam. TRIONÍCIDOS.

	<i>Pág.</i>
Gén. <i>Trionyx</i> , <i>Gray.</i>	405
* <i>subplanus</i> , <i>Geffr.</i>	»
* <i>sinensis</i> , <i>Wiegm.</i>	406
Gén. <i>Pelochelys</i> , <i>Gray.</i>	411
<i>cantorii</i> , <i>Gray.</i>	409
Gén. <i>Chitra</i> , (<i>Gray.</i>)	407
* <i>indica</i> , <i>Gray.</i>	»

Orden 2.º EMIDOSAURIOS.

Fam. CROCODILIDOS.

Gén. <i>Crocodilus</i> , <i>Cuv.</i>	»
<i>porosus</i> , <i>Schneid.</i>	»
* <i>palustris</i> , <i>Less.</i>	408

Orden 3.º SAURIOS.

Subord. 1.º LAGARTOS.

Fam. GECÓNIDOS.

Gén. <i>Gymnodactylus</i> , <i>Spix.</i>	»
* <i>marmoratus</i> , <i>D. & B.</i>	»
* <i>philippinus</i> , <i>Steind.</i>	»
* <i>consobrinus</i> , <i>Peters.</i>	»
* <i>platyrus</i> , <i>White.</i>	409

Gén. <i>Hemidactylus</i> , <i>Cuv.</i>	»
<i>frenatus</i> , <i>Gray.</i>	»
* <i>maculatus</i> , <i>Gray.</i>	»
<i>garnotii</i> , <i>Dum. Bibr.</i>	410
<i>platyurus</i> , <i>Lach.</i>	»

Gén. <i>Gehyra</i> , <i>Gray.</i>	»
<i>mutilata</i> , <i>Wiegw.</i>	»
Gén. <i>Perochirus</i> , <i>Blgr.</i>	411
<i>ateles</i> , <i>Dum.</i>	»
<i>depresus</i> , <i>Fisch.</i>	»

Gen. <i>Spathoscalopab-</i>	
<i>tes</i> , <i>Gthr.</i>	»
<i>mutilatus</i> , <i>Gthr.</i>	»
Gén. <i>Lepidodactylus</i> , <i>Fitzing.</i>	»
<i>lugubris</i> , <i>D. B.</i>	»
<i>labialis</i> , <i>Ptrs.</i>	412

Gén. <i>Luperosaurus</i> , <i>Gray.</i>	»
<i>cumingii</i> , <i>Gray.</i>	»
Gén. <i>Gecko</i> , <i>Laur.</i>	411
<i>lateralis</i> , <i>Gray.</i>	»

verticillatus, <i>Laur.</i>	411
* <i>vittatus</i> , <i>Gray.</i>	413
* <i>vir. bivittatus</i> .	»
monarchus, <i>Gray.</i>	»

Fam. AGÁMIDOS.

Gén. <i>Draco</i> , <i>Lon.</i>	»
<i>volans</i> , <i>Gray.</i>	»
<i>reticulatus</i> , <i>Gthr.</i>	414
<i>i. v. cyanopter-</i>	
<i>rus</i> , <i>Ptrs.</i>	»
<i>guentheri</i> , <i>Blgr.</i>	»
<i>everetti</i> , <i>Blgr.</i>	»
<i>ornatus</i> , <i>Günhr.</i>	»
<i>spilopterus</i> , <i>D. & B.</i>	»
<i>spilonotus</i> , <i>Gthr.</i>	»
<i>bimaculatus</i> , <i>Gthr.</i>	»
<i>dussumieri</i> , <i>D. & B.</i>	415
<i>quinquefasciatus</i> , <i>Gray.</i>	»
Gén. <i>Gonocephalus</i> , <i>Kaup.</i>	»
<i>sophie</i> , (<i>Gray.</i>)	»
<i>sempre</i> , <i>Ptrs.</i>	»
<i>interruptus</i> , <i>Blgr.</i>	»
Gén. <i>Calotes</i> , <i>Cuv.</i>	»
<i>cristatellus</i> , (<i>Kuhl.</i>)	»
<i>marmoratus</i> , <i>Gray.</i>	416
* <i>ophiomachus</i> , <i>Gray.</i>	»
Gén. <i>Lophura</i> , <i>Gray.</i>	»
<i>amboinensis</i> , <i>Gray.</i>	»

Fam. VARÁNIDOS.

Gén. <i>Varanus</i> , <i>Merr.</i>	417
<i>grayi</i> , (<i>Gthr.</i>)	»
<i>radicollis</i> , <i>Gray.</i>	»
<i>salvator</i> , <i>Laur.</i>	»
<i>nuchalis</i> , <i>Gthr.</i>	»
<i>cumingii</i> , <i>Mart.</i>	418

Fam. LACÉRTIDOS.

Gén. <i>Lacerta</i> , <i>Lin.</i>	»
<i>viridis</i> , (<i>Laur.</i>)	»

Fam. ESCÍNCIDOS.

Gén. <i>Egernia</i> , <i>Gray.</i>	»
<i>cunninghami</i> , <i>Gray.</i>	»
Gén. <i>Mabuya</i> , <i>Fitz.</i>	»
<i>multicarinata</i> , <i>Gray.</i>	»
<i>multifasciata</i> , <i>Kichl.</i>	»
Gén. <i>Lygosoma</i> , <i>Gray.</i>	419
<i>fasciatum</i> , <i>Gray.</i>	»

	Pág.		Pág.
jagorii, <i>Ptrs.</i> . . .	421	Fam. CALAMÁRIDOS.	
variegatum, <i>Ptrs.</i> . . .	»	Gén. Calamaria, <i>Boie.</i> . . .	424
acutum, <i>Ptrs.</i> . . .	»	* bitorques, <i>Pts.</i> . . .	»
cumingii, <i>Gray.</i> . . .	»	gervasi, <i>D. B.</i> . . .	»
chalcides, (<i>Lin.</i>). . .	»	grayi, <i>Gthr.</i> . . .	»
quadrivittatum, <i>Ptrs.</i> . .	420	lumbricoidea, <i>Boie.</i> . . .	425
smaragdignum, <i>Less.</i> . .	»	philippinica, <i>Steind.</i> . . .	»
olivaceum, <i>Gr.</i> . . .	»	vermiformis, <i>D. B.</i> . . .	»
semperi, <i>Ptrs.</i> . . .	»	* temminckii, <i>D. et B.</i> . . .	»
pulchellum, <i>Gr.</i> . . .	421	Gén. Oxycaelanus, <i>Gthr.</i> . . .	»
vulcanium, <i>Civ.</i> . . .	»	oxycephalus, <i>Gthr.</i> . . .	»
atrocostatum, <i>Less.</i> . .	»	Gén. Typhlogeophis, <i>Gthr.</i> . . .	»
nigrum, <i>H. et Jacq.</i> . .	»	brevis, <i>Gthr.</i> . . .	»
Gén. Tropidophorus, <i>D. B.</i> . .	»	Gén. Geophis, <i>Wagl.</i> . . .	»
leucospilus, (<i>Pts.</i>). . .	»	schadenbergi, <i>Fisch.</i> . . .	»
grayi, <i>Gthr.</i> . . .	»	brevirostris, <i>Ptrs.</i> . . .	»
Gén. Brachymeles, <i>D. B.</i> . .	»	modestus, (<i>D. B.</i>) . . .	426
schandenbergii, (<i>Fuer-</i> <i>cher.</i>). . .	422	Gén. Rhabdion, <i>B. B.</i> . . .	»
gracilis, <i>Fisch.</i> . . .	»	torquatum, <i>B. B.</i> . . .	»
bicolor, <i>Gray.</i> . . .	»	Gén. Aspidura, <i>Walger.</i> . . .	»
bonita, <i>D. B.</i> . . .	»	* brachytorhos, <i>Gth.</i> . . .	»
Suborden: RIPTOGLOSOS.		Fam. OLIGODÓNTIDOS.	
Fam. CAMALEÓNTIDOS.		Gén. Oligodon, <i>Boie.</i> . . .	»
Gén. Chamæleon, <i>Laur.</i> . .	»	modestus, <i>Gthr.</i> . . .	»
vulgaris, <i>Daud.</i> . . .	»	notospilus, <i>Gthr.</i> . . .	»
Ordeño 4.º OFIDIOS.		* sublineatus, <i>Gthr.</i> . . .	»
Fam. TIFLÓPIDOS.		Gén. Adlabes, <i>D. B.</i> . . .	427
Gén. Typhlops, <i>D. B.</i> . .	423	* collaris, (<i>Gray.</i>) . . .	»
braminus, (<i>Daud.</i>). . .	»	Gén. Simotes, <i>D. B.</i> . . .	»
philippinus, (<i>Müll.</i>) . .	»	ancoralis, <i>Jan.</i> . . .	»
jagorii, <i>Ptrs.</i> . . .	»	aphanospilus, <i>Cope.</i> . . .	»
petersi, <i>Steind.</i> . . .	»	phenochoalinus, <i>Cope.</i> . . .	»
ruficaudus, (<i>Gray.</i>) . .	»	purpurascens, (<i>Sclig.</i>). . .	»
sp.	»	* russelli, <i>Jan.</i> . . .	»
Gén. Onychocephalus, <i>D. B.</i> . .	»	Fam. 4.º COLÚBRIDOS.	
cumingii, (<i>Gray.</i>). . .	»	Subfam. COLUBRINOS.	
olivaceus, <i>Gray.</i> . . .	424	Gén. Elaphis, <i>Aldr.</i> . . .	428
Fam. UROPELTIDOS.		subradiatus, (<i>Sclig.</i>) . . .	»
Gén. Uropeltis, <i>D. B.</i> . . .	»	Gén. Coryphonodon, <i>D. B.</i> . . .	»
philippinus, (<i>Cuv.</i>). . .	»	* korros, (<i>Reinw.</i>) . . .	»
Gén. Rhinophis, <i>Cuv.</i> . . .	»	* hexanotus, (<i>Cantor.</i>) . . .	»
philippinus, <i>Boie.</i> . . .	»	* mucosus, (<i>Lin.</i>). . .	»
		* fuscus? <i>Gther.</i> . . .	»
		Gén. Compsosoma, <i>D. B.</i> . .	»
		melanurum, (<i>Schleg.</i>) . . .	»
		var. erythrura, <i>D. B.</i> . . .	429
		Cén. Spilotes, <i>Wagl.</i> . . .	»

	Pág.		Pág.
samarensis, <i>Ptrs.</i>	429	xanthozonius, var. <i>Boie</i>	435
Fam. DRIADÍNIDOS.		Gén. Passerita, <i>Gray</i>	»
Gén. Zaocys, <i>Cope</i>	»	* mycterizans, (<i>Lin</i>). . . .	»
luzonensis, <i>Gthr</i>	»		
Fam. NATRÍCIDOS.		Fam. DIPSÁDIDOS.	
Gén. Tropidonotus, <i>Kuhl</i>	»	Gén. Dypas, <i>Boie</i>	»
auriculatus, <i>Gthr</i>	»	angulata, <i>Pts</i>	»
chrisargus, <i>Boie</i>	»	cynodon, <i>Cuv</i>	»
dendrophiops, <i>Gthr</i>	»	sp.	436
lineatus, <i>Ptrs</i>	»	dendrophila, <i>Wagl</i>	»
spilogaster, <i>Boie</i>	»	drapiezii, (<i>Boie</i>).	»
sp.	»	guiraonis, <i>Steind</i>	»
sp.	»	* fusca, (<i>Gray</i>).	»
stolatus, (<i>Lin</i>).	»	philippina, <i>Pts</i>	»
aff. dorsalis, <i>Gthr</i>	431		
aff. hypomelas, <i>Gthr</i>	»		
schistosus, (<i>Daud</i>).	»		
Fam. HOMALÓPSIDOS.		Fam. LICODÓNTIDOS.	
Gén. Cerberus, <i>Cuv</i>	»	Lycodon, <i>Boie</i>	»
rhynchos, (<i>Schneid</i>).	»	aulicus, (<i>Lin</i>).	437
Gén. Campylodon, <i>D. B.</i>	432	* capucinus, <i>Boie</i> var. <i>P. Russel</i>	»
prevostianum, <i>D. B.</i>	»	bairdi, <i>Steind</i>	»
Fam. PSAMMÓFIDOS.		modestum,	»
Gén. Psammodynastes, <i>Glu</i>	»	tesselatus, <i>Jan</i>	»
pulverulentus, (<i>Boie</i>). . . .	»	cucullatum,	»
Fam. DENDRÓFIDOS.		Gén. Odontomus, <i>D. B.</i>	»
Gén. Gonyosoma, <i>Wagl</i>	»	mülleri, (<i>D. B.</i>).	»
oxycephalum, <i>Boie</i>	»	Gén. Cyclocorus, <i>D. B.</i>	438
* frenatum, (<i>Gray</i>).	»	lineatus, (<i>Reinh</i>).	»
Gén. Dendrophis, <i>Boie</i>	433		
pietus, <i>Gml</i>	»	Fam. ESCITÁLIDOS.	
punctalatus, (<i>Gray</i>).	»	Gén. Hologerrhum, <i>Gthr</i>	»
terrificus, <i>Pts</i>	»	philippinum, <i>Gthr</i>	»
Gén. Chrysopela, <i>Boie</i>	»		
ornata, (<i>Shaw</i>).	»	Fam. AMBLICEFÁLIDOS.	
rubes ens, (<i>Gray</i>).	434	Gén. Amblycephalus, <i>Kuhl</i> . . .	»
Gén. Leptopholis, <i>Bell</i>	»	boa, <i>Boie</i>	»
vertebralis, <i>D. B.</i>	»		
		Fam. BÓIDOS.	
Fam. DRIÓFIDOS.		Gén. Piesigaster, <i>Seoane</i>	»
Gén. Tragops, <i>Wagl</i>	»	boettgeri, <i>Seoane</i>	»
prasinus, (<i>Reinw</i>).	»		
var. lata, <i>Cap</i>	»	Fam. PITÓNIDOS.	
Gén. Python, <i>Daud</i>	439	Gén. Python, <i>Daud</i>	439
reticulatus, (<i>Schneid</i>). . . .	»		
		Fam. ACROCÓRDIDOS.	
Gén. Chersidrus, <i>Cuv</i>	»		

	Pág.		Pág.
granulatus, (<i>Schneid.</i>) .	439	* hypnale, <i>D. et B.</i> .	445
Fam. ELÁPIDOS.		* viridis, <i>D. et B.</i> .	»
Gén. Naja, <i>Laur.</i> »		Clase 4. ^a	
tripudians, <i>Merr.</i> . . »		ANFIBIOS, (<i>Batrachos.</i>)	
sp. . . . »		Orden 1. ^o ANUROS.	
var. samarensis, <i>Pts.</i> . . 440		Subord. FANEROGLOSOS.	
sputatrix, (<i>Reinw.</i>)			
<i>Schleg.</i> . »		Fam. RÁNIDOS.	
Gén. Ophiophagus, <i>Gthr.</i> . »		Gén. Oxyglossus, <i>Tschud.</i> . »	
elaps, (<i>Schleg.</i>) . . »		loewis, <i>Gthr.</i> »	
fasciatus, (<i>Pts.</i>) . . »		* lima, <i>Gthr.</i> »	
Gén. Hemibungarus, <i>Ptrs.</i> . »		Gén. Rana, <i>Lin.</i> »	
calligaster, (<i>Wiegm.</i>) . »		mindanensis, (<i>Gav.</i>) . . »	
collaris, (<i>Schleg.</i>) . . »		* corrugata, <i>Ptrs.</i> 446	
gemmianulius, <i>Ptrs.</i> . . 441		* kuhlii, <i>Günth.</i> »	
Gén. Callophis, <i>Gray.</i> . . »		macrodon, <i>Gthr.</i> »	
bilineatus, <i>Ptrs.</i> . . »		tigrina, <i>Gthr.</i> »	
Gén. Adenophis, <i>Ptrs.</i> . . »		* gracilis, <i>Wieg.</i> 447	
philippinus, (<i>Gthr.</i>) . . »		* guentheri, <i>Boul.</i> »	
Gén. Elaps, <i>Schueid.</i> . . »		* macrodactyla, <i>Gthr.</i> »	
* intestinalis, (<i>Seba.</i>) . . »		erythraea, <i>Gthr.</i> »	
* gracilis, (<i>Gray.</i>) . . »		chalconata, <i>Gthr.</i> »	
Fam. HIDRÓFIDOS.		* jerboa, <i>Gthr.</i> 448	
Gén. Platurus, <i>Latr.</i> 442		* luctuosa, (<i>Ptrs.</i>) »	
laticeaudatus, (<i>Lin.</i>) . . »		natatrix, <i>Gthr.</i> »	
var. colubrina, <i>Schneid.</i> . »		similis, <i>Gthr.</i> »	
Gén. Hydrophis, <i>Daced.</i> . . »		sp. »	
abbreviatus, <i>Jan.</i> »		everetti, <i>Boul.</i> »	
brevis, <i>Jan.</i> »		* glandulosa, <i>Boul.</i> »	
* nigrocinctus, <i>D. B.</i> . . »		Gén. Rhacophorus, <i>Kuhl.</i> »	
fasciatus, <i>Schneid.</i> . . »		hecus, <i>Ptrs.</i> »	
loreata (<i>Gray.</i>) »		surdus, <i>Ptrs.</i> 449	
semperi, <i>Garm.</i> 443		maculatus, <i>Gthr.</i> »	
spiralis, (<i>Shaw.</i>) »		var. quadrilineata, <i>Wieg.</i> . . »	
Westermannii, <i>Jan.</i> »		appendiculatus, <i>Gthr.</i> »	
Gén. Pelanis, <i>Daud.</i> »		pardalis, <i>Gthr.</i> »	
bicolor, (<i>Schneid.</i>) . . »		Gén. Ixalus, <i>D. et B.</i> »	
Fam. CROTÁLIDOS.		acutirostris, <i>Peters.</i> »	
Gén. Trimcresurus, <i>Gthr.</i> . . »		* pictus, <i>Peters.</i> 45	
erythrurus, (<i>Cantor.</i>) . . »		bimaculatus, <i>Ptrs.</i> »	
flavomaculatus, (<i>Gray.</i>) . . 444		Gén. Cornufer, <i>Tschudi.</i> »	
hombronii, (<i>Ginsb.</i>) »		güntneri, (<i>Boul.</i>) »	
philippinensis, (<i>Gray.</i>) . . »		meyeri, <i>Gthr.</i> »	
sp. »		jagorii, <i>Ptrs.</i> »	
schadembergi, <i>Fisch.</i> »		corrugatus, <i>Dam.</i> »	
wagleri, <i>Schleg.</i> »			

Fam. ENGISTOMÁTIDOS.

	Pág.
Gén. Mycrohyla, <i>Tschudi</i>	450
achatinæ, <i>Gthr.</i> »	
Gén. Callula, <i>Gr.</i>	451
picta, <i>Gthr.</i> »	
conjuncta, <i>Ptrs.</i> »	
baleata, <i>Müll.</i> »	

Fam. BUFÓNIDOS.

	Pág.
Gén. Nectophryne, <i>Buch.</i>	
guentheri, (<i>Boul.</i>) »	
sundana, <i>Ptrs.</i> »	
Gén. Bufo, <i>Laur.</i>	
brevipes, <i>Ptrs.</i> »	
melanostictus, <i>Gthr.</i> »	
biporcatus, <i>Gthr.</i> »	
panayensis, <i>Seoan</i> »	

Fam. HÍLIDOS.

	Pág.
Gén. Hyla, <i>Laur.</i>	
* chinensis, <i>Gthr.</i> 452	

Fam. HILEDACTÍLIDOS.

	Pág.
Gén. Hyledactylus, <i>Tschudi</i> . »	
* pictus, <i>Bibr.</i> 453	

Fam. PELOBÁTIDOS.

	Pág.
Gén. Megalophrys, <i>Kuhl</i>	
montana, <i>Gthr.</i> »	

Orden: URODELOS.

Fam. SALAMÁNDRIDOS.

	Pág.
Gén. Molge, <i>Merv.</i> »	
* sinensis, <i>Eo d.</i> »	

Orden: ÁPODOS.

Fam. CECÍLIDOS.

	Pág.
Gén. Ichthodis, <i>Fitz.</i> 454	
* monochrous, <i>Ptrs.</i> »	

Clase 5.^a PECES.

Sub-clase:

1.^a TELEOSTEOS.

Orden: AGANTOPTERIGIOS.

Fam. BERÍCIDOS.

	Pág.
Gén. Monocentris, <i>Schnid.</i>	454
* japonicus, <i>Houll.</i> »	
Gén. Myripristis, <i>Cuv.</i>	
* pralinus, <i>Cuv.</i> »	
* murjan, <i>Forsk.</i> 455	
* japonicus, <i>Cuv.</i> »	
Gén. Holocentrum, <i>Artef.</i>	
rubrum, (<i>Forsk.</i>) »	
punctatissimum, <i>Cuv.</i> »	
stercus-muscarum, <i>C. V.</i> »	
spiniferum, <i>C. V.</i> 456	
binotatum, <i>O. et G.</i> »	
* spinosissimum, <i>Tem et Sch.</i> »	
* diadema, <i>Lacep.</i> »	
* melanopterum, <i>Blkr.</i> »	
cornutum, <i>Blkr.</i> »	
* violaceum, <i>Blkr.</i> »	
simmara, (<i>Forsk.</i>) »	
Gén. Rhynchichthys, <i>C. V.</i> 457	
* pelanides? <i>C. V.</i> »	

Fam. PÉRCIDOS.

	Pág.
Gén. Percichthys, <i>Girard.</i>	
* ciliata, <i>Gthr.</i> »	
Gén. Lutes, <i>Cuv.</i>	
* calcarifer, (<i>Forsk.</i>) »	
Gén. Cnidon, <i>M. et Trosch.</i>	
* chinensis, <i>Müll.</i> »	
Gén. Psammopera, <i>Rich.</i>	
* walgiensis, <i>C. et V.</i> »	
Gén. Percalabrax, <i>Tem.</i> 458	
* japonicus, <i>C. et V.</i> »	
Gén. Etelis, <i>C. V.</i>	
carunculus, <i>C. V.</i> »	

Fam. SERRÁNDIDOS.

	Pág.
Gén. Aprion, <i>C. V.</i>	458
virescens, <i>C. V.</i> »	
Gén. Arribas, <i>Blkr.</i> »	

	<i>Pág.</i>	<i>Pág.</i>	
* cichlops, <i>Blk.</i>	458	rivulata, (<i>C. V.</i>)	465
* raso, (<i>Richard.</i>)	»	Gén. <i>Mesoprion</i> , <i>Cuv.</i>	»
* schelegelii, <i>Gthr.</i>	»	gembra, <i>C. V.</i>	»
Gén. <i>Anpyerodon</i> , <i>Gthr.</i>	459	bohar, <i>Forsk.</i>	»
* leucogrammicus, <i>Gthr.</i>	»	johnii, <i>Bloch.</i>	466
Gén. <i>Serranus</i> , <i>Cuv.</i>	»	* fuscescens, <i>C. V.</i>	»
* brunneus, <i>Gthr.</i>	»	* quinquaflaeatus, <i>C. V.</i>	»
* albosfuscus, <i>Gthr.</i>	»	fulviflamma, (<i>Forsk.</i>)	»
* oceanicus, <i>C. V.</i>	»	antularius, <i>C. V.</i>	467
* louti, <i>Forsk.</i>	»	* malabaricus, <i>Bl.</i>	»
* trimaculatus, <i>C. V.</i>	»	decussatus, <i>C. V.</i>	»
* flavimarginatus, <i>Rüpp.</i>	460	* vitta, <i>Q. et G.</i>	»
* diacanthus, <i>Cuv.</i>	»		
* stigmatorius, <i>Rich.</i>	»		
tigrinus, <i>C. V.</i>	»		
zananella, <i>Blk.</i>	»		
* micropion, <i>Blk.</i>	»		
* cyagnostigma, <i>C. V.</i>	»		
* aurantius, <i>C. V.</i>	461		
* guttatus, <i>Bl.</i>	»		
* urodelus, <i>C. V.</i>	»		
* lumbatus, <i>C. V.</i>	»		
* suillus, <i>C. V.</i>	»		
* altiveloides, <i>Blk.</i>	»		
* marginalis, <i>C. V.</i>	»		
* seba, <i>Blk.</i>	462		
* celebicus, <i>Blk.</i>	»		
sp.	»		
hexagonatus, <i>Gthr.</i>	»		
var. hexagonata, <i>Forst.</i>	»		
var. merra, <i>C. V.</i>	»		
* punctatissimus, <i>Gthr.</i>	»		
* giberti, <i>Richard.</i>	»		
* awoara, <i>Schleg.</i>	463		
* chlorostigma, <i>Gthr.</i>	»		
* altivelis, <i>C. V.</i>	»		
* formosus, (<i>Shaw.</i>)	»		
* lineatus, <i>C. V.</i>	»		
Gén. <i>Plectropoma</i> , <i>Cuv.</i>	»		
* oligoanthus, <i>Blkr.</i>	»		
* susuki, <i>C. V.</i>	»		
Gén. <i>Grammistes</i> , <i>Cuv.</i>	464		
orientalis, <i>Bl.</i>	»		
Gén. <i>Diplopriion</i> , <i>C. V.</i>	»		
* bifasciatum, <i>C. V.</i>	»		
Gén. <i>Myriodon</i> , <i>Briss.</i>	»		
* watiensis, <i>G. A. I.</i>	»		
Gén. <i>Genyoroge</i> , <i>Cantor.</i>	»		
* bengalensis, <i>Bloch.</i>	»		
* macolor, (<i>C. V.</i>)	465		
* sibar, (<i>C. V.</i>)	»		
rosea, (<i>C. V.</i>)	»		
bottonensis, (<i>C. V.</i>)	»		
Gén. <i>Apogonichthys</i> , <i>Blkr.</i>	»		
* glaga, <i>Blkr.</i>	»		
* carinatus, <i>C. V.</i>	»		
* polystigma, <i>Blk.</i>	»		
Gén. <i>Chilodipterus</i> , <i>Lacep.</i>	»		

	Pág.		Pág.
quin juclineatus, <i>C. V.</i>	471	* nemurus, <i>Blk.</i>	471
Fam. GRÍSILIDOS.		Gén. <i>Synagris</i> , <i>Gthr.</i>	»
Gén. <i>Dules</i> , <i>C. V.</i>	»	* <i>japonicus</i> , (<i>Bloch.</i>)	»
tenuurus, <i>C. V.</i>	»	* <i>sinensis</i> , (<i>Lacép.</i>)	»
guamensis, <i>C. V.</i>	472	Gén. <i>Dentex</i> , <i>Cuv.</i>	»
Fam. PRISTIPOMÁTIDOS.		* <i>nemrophorus</i> , <i>Blkr.</i>	»
Gén. <i>Therapon</i> , <i>Cuv.</i>	»	Gén. <i>Pentapus</i> , <i>Cuv.</i>	»
theraps, <i>Cuv.</i>	»	* <i>paradiseus</i> , <i>Gthr.</i>	»
servus, <i>Bloch.</i>	»	Gén. <i>Cors o</i> , <i>Cuv.</i>	»
elipticus, <i>Rich.</i>	»	* <i>maculatus</i> , <i>C. V.</i>	»
trivittatus, (<i>Buch.</i>)	»	tilo, <i>C. V.</i>	»
oxyrhynchus,	»	Fam. MÚLIDOS.	
qua trilineatus, (<i>Bloch.</i>)	473	Gén. <i>Upeneoides</i> , <i>Blkr.</i>	471
argenteus, <i>C. V.</i>	»	vittatus, (<i>Forck.</i>)	»
Gén. <i>Pristipoma</i> , <i>Cuv.</i>	»	tragula, (<i>Richard.</i>)	»
nigrum, <i>C. V.</i>	»	* subvittatus, (<i>Tem.</i> et	
hasta, (<i>Bloch.</i>)	»	<i>Sch.</i>)	»
leucurum, <i>C. et V.</i>	»	sulphureus, <i>C. V.</i>	»
argyreum, <i>Bleek.</i>	»	molluccensis, <i>Blkr.</i>	»
maculatum, (<i>Bl.</i>)	474	esp.	»
japonicum, <i>C. V.</i>	»	Gén. <i>Mullus</i> , <i>Lin.</i>	»
Gén. <i>Hapalogensis</i> , <i>Ri-</i>		esp.	»
<i>chard.</i>	»	Gén. <i>Mulloides</i> , <i>Blkr.</i>	450
<i>nigripinnis</i> , (<i>Tem.</i>)		* <i>flavolineatus</i> , <i>Lacép.</i>	»
<i>Schl.</i>)	»	Gén. <i>Upeneus</i> , <i>Blkr.</i>	»
<i>macronotus</i> , (<i>Eyd.</i> et		indicus, (<i>Shaw.</i>)	»
<i>Soul.</i>)	»	* <i>pleurospilos</i> , <i>Bleek.</i>	»
Gén. <i>Diagramma</i> , <i>Cuv.</i>	»	malabaricus, <i>C. B.</i>	»
gibbosum, <i>H. et Jacq.</i>	»	bicolorinus, <i>Lacép.</i>	»
affine, <i>Gthr.</i>	»	trifasciatus, (<i>Lacép.</i>)	»
linatum, <i>Lin.</i>	475	* <i>athritroides</i> , <i>C. V.</i>	451
pardalis, <i>V. C.</i>	»	* <i>chrysopleuron</i> , <i>T. et</i>	
parcatum, <i>C. V.</i>	»	<i>Sch.</i>)	»
cinctum, <i>T. et Schl.</i>	475	Fam. ESPÁRIDOS.	
chelotonoides, <i>Lacép.</i>	»	Gén. <i>Cantharus</i> , <i>Cuv.</i>	»
pictum, <i>Thumb.</i>	»	granulosus, <i>C. V.</i>	»
loltatum, var. b. <i>C.</i>		corallus, <i>C. V.</i>	»
<i>V.</i>	476	maculatus, <i>C. V.</i>	»
albovittatum, <i>Rüpp.</i>	»	lineatus, <i>C. V.</i>	»
* reticulatum, <i>Gthr.</i>	»	Gén. <i>Girilla</i> , <i>Gray.</i>	»
Gén. <i>Lobotes</i> , <i>Cuv.</i>	»	* punctata, <i>Gray.</i>	»
* auctorum, <i>Gthr.</i>	»	Fam. PAAGRÍNIDOS.	
Gén. <i>Scolopsis</i> , <i>Gthr.</i>	477	Gén. <i>Letrinus</i> , <i>Cuv.</i>	452
ciliatus, (<i>Lacép.</i>)	»	* richardsonii, <i>Gthr.</i>	»
* japonicus, (<i>Bloch.</i>)	»	* nemacanthus, <i>Blkr.</i>	»
* bimaculatus, <i>Rüpp.</i>	»	harak, <i>Forsk.</i>	»
* canellatus, <i>C. V.</i>	»	ranta, <i>Forsk.</i>	»
bleekeri, <i>Blk.</i>	»		
Gén. <i>Heterognathidium</i> , <i>Blk.</i>	478		

	Pág.		Pág.
leutjanus, <i>Lacép.</i>	482	* xanthometopon, <i>Bleek.</i>	489
mahsenoides, <i>C. V.</i>	»	semicirculatus, <i>Bl.</i>	»
Gén. <i>Sphaerodon</i> , <i>Rüpp.</i>	483	Gén. <i>Seatophagus</i> , <i>C. V.</i>	»
* heterodon, <i>Blk.</i>	»	argus, <i>Cuv.</i>	»
Gén. <i>Pagrus</i> , <i>Cuv.</i>	»	ornatus, <i>C. V.</i>	490
* unicolor, <i>O. et G.</i>	»	Gén. <i>Drepane</i> , <i>C. V.</i>	»
* cardinalis, <i>Lacép.</i>	»	punctata, <i>Cuv.</i>	»
* major, <i>T. et Sch.</i>	»		
* spinifer, <i>Forsk.</i>	»		
Gén. <i>Chrysophrys</i> , <i>Cuv.</i>	»		
* aries, <i>T. et Sch.</i>	»		
* hasta, <i>Bl.</i>	484		
calamara, <i>Russell.</i>	»		
Gén. <i>Pimelepterus</i> , <i>Cuv.</i>	»		
tahmel, <i>Forsk.</i>	»		
Fam. QUETODÓNTIDOS.		Fam. TOXÓTIDOS.	
Gén. <i>Choetodon</i> , <i>Arvedi</i>	»	Gén. <i>Toxotes</i> , <i>Cuv.</i>	»
* setifer, <i>Bl.</i>	»	jaculator, <i>Cuv.</i>	»
* ephippium, <i>Cuv.</i>	485		
* nesogallicus, <i>Cuv.</i>	»		
* cellatus, <i>Bloch.</i>	»		
* modestus, <i>Temm.</i>	»		
* unimaculatus, <i>Bloch.</i>	»		
* meyeri, <i>Bl.</i>	»		
* ornatissimus, <i>Cuv.</i>	»		
* reticulatus, <i>C. V.</i>	486		
* kleini, <i>Bloch.</i>	»		
* fasciatus, <i>Forsk.</i>	»		
* lunula, <i>Cuv.</i>	»		
* vagabundus, <i>Linna.</i>	»		
* ocellicauda, <i>C. Bl.</i>	»		
* lineolatus, <i>Cuv.</i>	»		
* miliaris, <i>O. et G.</i>	»		
* tau-nigrum, <i>C. V.</i>	487		
* citrinellus, (<i>Brouss.</i>)	»		
sp.	»		
* chrysozonus, (<i>Kuhl & Hass.</i>)	»		
sp.	»		
oligacanthus, <i>Blk.</i>	»		
sp.	»		
* strigatus, <i>Langsd.</i>	488		
sp.	»		
* polylepis, <i>Bleeker</i>	»		
Gén. <i>Chelmo</i> , <i>Cuv.</i>	»		
rostratus, <i>Cuv.</i>	»		
Gén. <i>Heniichus</i> , <i>C. V.</i>	»		
macrolepidotus, <i>Cuv.</i>	»		
* chrysostoma, <i>C. V.</i>	489		
Gén. <i>Holocanthus</i> , <i>Lacép.</i>	»		
* bicolor, <i>Cuv.</i>	»		
Fam. CIRRÍFIDOS.		Fam. CIRRÍFIDOS.	
Gén. <i>Cirrhitichthys</i> , <i>Bleek.</i>	491	Gén. <i>Chilodactylus</i> , <i>Cuv.</i>	»
* maculatus, <i>Lacép.</i>	»	* zonatus, <i>Cuv.</i>	»
* aureus, <i>Temm. et Schl.</i>	»		
Fam. TRÍGLIDOS.		Fam. TRÍGLIDOS.	
Gén. <i>Sebastes</i> , <i>C. V.</i>	»	Gén. <i>Pterois</i> , <i>Cuv.</i>	»
* pachycephalus, <i>Tem. et Schleg.</i>	»	volitans, <i>Cuv.</i>	»
* marmoratus, <i>Cuv.</i>	»	* antennata, <i>Cuv.</i>	»
* strongensis, <i>C. V.</i>	492	* miles, <i>Cant.</i>	494
minutus, <i>C. V.</i>	»	zebra, <i>Cuv.</i>	»
* polylepis, <i>Bleek.</i>	»	Gén. <i>Centropogon</i> , <i>Gthr.</i>	»
Gén. <i>Scorpena</i> , <i>Arvedi</i>	»	* robustus, <i>Gthr.</i>	»
guamensis, <i>O. et G.</i>	»	* fuscovirens, <i>O. et G.</i>	»
pieta, <i>C. V.</i>	»		
polyprion, <i>Blkr.</i>	»		
* haplodactylus, <i>Bleek.</i>	»		
* diabolus, <i>Cuv.</i>	»		
* gibbosa, <i>Bl.</i>	493		
* cirrhosa, <i>Cuv.</i>	»		
* laniaria, <i>C. V.</i>	»		
Gén. <i>Pterois</i> , <i>Cuv.</i>	»		
volitans, <i>Cuv.</i>	»		
* antennata, <i>Cuv.</i>	»		
* miles, <i>Cant.</i>	494		
zebra, <i>Cuv.</i>	»		
Gén. <i>Centropogon</i> , <i>Gthr.</i>	»		
* robustus, <i>Gthr.</i>	»		
* fuscovirens, <i>O. et G.</i>	»		
Gén. <i>Tetracloge</i> , <i>Gthr.</i>	»		
* longispinis, (<i>C. et V.</i>)	»		
amblycephalus, <i>Bleek.</i>	»		
crista-galli, <i>Gthr.</i>	495		
barbata, <i>C. V.</i>	»		

	Pág.		Pág.
Gén. Prosopodasys, <i>Cantor.</i>	495	Fam. ESCIÉNIDOS.	
* leucogaster, (<i>Richard.</i>)	»	Gén. Umbrina, <i>Cuv.</i>	500
* cottooides, <i>C. V.</i>	»	russellii, <i>Cuv.</i>	»
Gén. Aploactis, <i>Tem. et Schl.</i>	leg.	Gén. Sciaena, <i>Cuv.</i>	501
* aspera, <i>Richards.</i>	»	* crocea, <i>Richards.</i>	»
Gén. Trichopleura, <i>Kaup.</i>	496	* diacanthus, <i>Lacep.</i>	»
* mollis, (<i>Richard.</i>)	»	sina, <i>C. V.</i>	»
Gén. Synanceia, <i>Müll.</i>	»	* dussunieri, <i>C. V.</i>	»
* horridum, (<i>Lin.</i>)	»	* borneensis, (<i>Bleeker.</i>)	»
Gén. Synanceia, <i>Bloch.</i>	»	Gén. Corvina, <i>Cuv.</i>	502
verrucosa, <i>Bloch.</i>	»	miles, <i>Cuv.</i>	»
Gén. Pedor, <i>C. V.</i>	»	* coitor, <i>Cuv.</i>	»
cuvieri, <i>Gr.</i>	»	* belangerii, <i>C. V.</i>	»
* japonicum, <i>C. V.</i>	497	* semiluctuosa, <i>C. V.</i>	»
Gén. Podabrus, <i>Richards.</i>	»	* olvida, <i>C. V.</i>	»
* cottooides, <i>Rich.</i>	»	Gén. Otolitus, <i>Cub.</i>	»
Gén. Centridermichthys, <i>Richards.</i>	»	* tridentifer, <i>Richards.</i>	»
* fasciatus, <i>Heckel.</i>	»	ruber, <i>Cuv.</i>	»
Gén. Platyccephalus, <i>Bl.</i>	»	leuciscus, <i>Gthr.</i>	503
insidiator, <i>Bl.</i>	»	* argenteus, (<i>Kuhl.</i> & <i>v.</i> <i>Hass.</i>)	»
* japonicus, <i>Tiles.</i>	498	Gén. Colliethys, <i>Gthr.</i>	»
* isacanthus, <i>C. V.</i>	»	* lucida, <i>Richards.</i>	»
* tentacularis, <i>Rüpp.</i>	»	* biaurita, <i>Cantor.</i>	»
* neglectus, <i>Troschel.</i>	»	Fam. POLINÉMIDOS.	
* fasciatus, <i>Gthr.</i>	»	Gén. Polynemus, <i>Lin.</i>	»
pristiger, <i>C. V.</i>	»	paradiseus, <i>C. V.</i>	»
* asper, <i>C. V.</i>	»	* multifilis, <i>Schleg.</i>	»
Gén. Hoplichthys, <i>C. V.</i>	»	* multiradiatus, <i>Gthr.</i>	504
* longsdorffii, <i>C. V.</i>	»	lineatus, <i>Gthr.</i>	»
Gén. Trigla, <i>Cuv.</i>	»	plebejus, <i>Gm.</i>	»
* kumu, <i>Less. et Garn.</i>	499	tetradactylus, <i>Shaw.</i>	»
Gén. Dactylopterus, <i>Lacep.</i>	»	Fam. ESFIRÉNIDOS.	
* orientalis, <i>Cuv.</i>	»	Gén. Sphyraena, <i>Arteci.</i>	»
Fam. TRAQUÍNIDOS.		jello, <i>Cuv.</i>	»
Gén. Uranoscopus, <i>Cuv.</i>	»	commersonii, <i>C. V.</i>	»
bicinctus, <i>Tem. et Schl.</i>	»	obtusata, <i>Cuv.</i>	505
asper, <i>Tem. et Schl.</i>	»	esp.	»
Gén. Percis, <i>Bl.</i>	»	Fam. TRIQUIÚRIDOS.	
cylindrica, <i>Block.</i>	»	Gén. Trichiurus, <i>Lin.</i>	»
Gén. Sillago, <i>C. V.</i>	500	savala, <i>Cuv.</i>	»
sihamo, <i>Forsk.</i>	»	muticus? <i>Gr.</i>	»
maculata, <i>Quoy et Gaim.</i>	»	haumela, <i>Forsk.</i>	»
Gén. Latilus, <i>C. V.</i>	»	esp.	»
* argentatus, <i>C. V.</i>	»	Gén. Thryssites, <i>C. V.</i>	506
Gén. Pseudochromis, <i>Rüpp.</i>	»	esp.	* *
* adustus, <i>Mull. et Tros.</i>	»		

Fam. ESCÓMBRIDOS.	Pág.		Pág.
Gén. Scomber, <i>Cuv.</i> . . .	506	Psettus, <i>C. V.</i> . . .	514
microlepidotus, <i>Rüpp.</i> »		argenteus, <i>Lin.</i> . . .	»
Gén. Pelamys, <i>C. V.</i> . . .	»	sp.	515
orientalis, <i>Tem. et Schi-</i> <i>leg.</i> »		Platax, <i>C. V.</i> . . .	»
Gén. Cybium, <i>Cuv.</i> . . .	»	* vespertilio, <i>Cuv.</i> . . .	»
guttatum, <i>Cuv.</i> . . .	»	teira, <i>Cuv.</i> . . .	»
Gén. Echeneis, <i>Artedi.</i> . . .	»	sp.	»
* albescens, <i>T.</i> . . .	»	Pempheris, <i>C. V.</i> . . .	516
brachyptera, <i>Löwe.</i> . . .	»	* otaitensis, <i>C. V.</i> . . .	»
naucrates, <i>L.</i> . . .	507	* mangula, <i>Cuv.</i> . . .	518
Gén. Stromateus, <i>Artedi.</i> . . .	508	esp.	»
* argenteus, <i>Bl.</i> . . .	»	Equula, <i>Cuv.</i> . . .	»
* niger, <i>Bloch.</i> . . .	»	fasciata, <i>Lacép.</i> . . .	»
Gén. Brana, <i>Risso.</i> . . .	»	edentula, (<i>Bloch.</i>) . . .	»
* dussumieri, <i>C. V.</i> . . .	»	caballa, (<i>Forsk.</i>) . . .	»
Gén. Mene, <i>Lacép.</i> . . .	»	dussumieri, <i>C. V.</i> . . .	»
maculata, <i>Cuv.</i> . . .	»	nuchalis, <i>Schleg.</i> . . .	517
Fam. CARÂNGIDOS.		splendens, <i>Cuv.</i> . . .	»
Gén. Caranx, <i>C. V.</i> . . .	509	oblonga, <i>Cuv.</i> . . .	»
cestus, <i>Richards.</i> . . .	»	* leuciscus, <i>Gthr.</i> . . .	»
margarita, <i>Richards.</i> . . .	»	insidiatrix, <i>Bl.</i> . . .	»
sp.	»	* interrupta, <i>C. V.</i> . . .	»
rottleri, <i>Rüpp.</i> . . .	»	Gazza, <i>Rüpp.</i> . . .	»
maruad i, <i>Temm.</i> . . .	»	minuta, <i>Bleek.</i> . . .	»
lioglossus, <i>Gthr.</i> . . .	»	argentaria, <i>Forst.</i> . . .	»
calla, <i>C. V.</i> . . .	»	equulaeformis, <i>Rüpp.</i> . . .	»
malabaricus, <i>Cuv.</i> . . .	510		
leptolepis, <i>Cuv.</i> . . .	»	Fam. XÍFIDOS.	
speciosus, <i>Lacép.</i> . . .	»		
melampigus, <i>Cuv.</i> . . .	»	Gén. Histiophorus, <i>C. V.</i> . . .	»
jarra, <i>Cuv.</i> . . .	»	* gladius	»
hippos, <i>Lin.</i> . . .	»		
atropus, <i>Cantor.</i> . . .	511	Fam. GÓBIDOS.	
armatus, <i>Cuv.</i> . . .	»		
sansun, <i>Forsk.</i> . . .	512	Gén. Gobius, <i>Artedi.</i> . . .	519
sp.	»	guamensis, <i>Cuv. & Val.</i> . . .	»
gallus, <i>Lin.</i> . . .	»	* baliurus, <i>Cuv.</i> . . .	»
Gén. Seriola, <i>C. V.</i> . . .	»	* punctagooides, <i>Bleek.</i> . . .	»
dumerilii, <i>Risso.</i> . . .	»	* lentiginosus, <i>Richards.</i> . . .	»
Gén. Chorinemus, <i>C. V.</i> . . .	513	ornatus, <i>Rüpp.</i> . . .	»
lysan, <i>Cuv.</i> . . .	»	giuris, <i>Buch.</i> . . .	»
* tollo, <i>Cuv.</i> . . .	»	borneensis, <i>Bleeker.</i> . . .	520
sancti-Petri, <i>Cuv.</i> . . .	»	echinocephalus, <i>Rüpp.</i> . . .	»
orientalis, <i>Tem. et Schi.</i> . . .	»	ophthalmotenia, <i>Bleek.</i> . . .	»
Gén. Lichia, <i>Cuv.</i> . . .	514	chlorostigmatooides, . . .	»
glauca, <i>Bl.</i> . . .	»	Bleek. . .	»
Gén. Trachynotus, <i>C. V.</i> . . .	»	cyanoclavis, <i>Cantor.</i> . . .	»
oyatu, <i>Lin.</i> . . .	»	caninus, <i>C. V.</i> . . .	»

	<i>Pág.</i>
grammepomus, Bleek.	520
bynoensis, Richards.	»
sp.	»
knutelli, Bleek.	522
lachrymosus, Ptrs.	»
sp.	»
Gén. Apocriptes, C. V.	»
serperaster, Richards.	»
* nexipinnis, Cantor.	»
* madurensis, Blhr.	»
Gen. Gobiodon, Bleek.	»
* ceramensis, Bleeker.	»
histrio, C. V.	»
Gén. Trianophorichthys, Gill.	»
* trig nocephalus, Gill.	»
Gén. Sicydium, Cuv.	»
cyanocephalum, Cuv.	»
Gén. Periophthalmus, Bl.	523
koelreuteri, Bl.	»
schlosseri, Pol.	»
v-r, freycineti, C. et V.	»
Gén. Electris, Cuv.	»
ophiocephalus, (Kuhl.)	
& v. Hass.	»
hädtii, Bleek.	524
obscura, Schleg.	»
* oxycephala, Schleg.	»
bitis, (Buch.).	»
melanostigma, Bleek.	»
* caperata, Cantor.	»
cyprioides? C. V.	»
marmorata, Bleek.	»
* sinensis, Lacép.	»
inuralis, (Quoy & Gaim.).	525
Gén. Amblyopus, C. V.	»
brachygaster, Gthr.	»
brachysoma, Bleek.	»
Gén. Platyptera, C. V.	»
aspro, (v. Hass.).	»
Gén. Callionymus, Lin.	»
* longicaudatus, Tem. et	
Schl.	»
schaapii, Blkr.	526
simplicicornis, C. V.	»
opercularis, C. V.	»
Gén. Vulsus, Gthr.	»
* daetylophus, C. V.	»
*	

Fam. BATRÁQUIDOS.

Gén. Batrachus, C. V.	»
sp.	»

Fam. ANTENÁRIDOS.

	<i>Pág.</i>
Gén. Lophius, Artedi.	526
* setigerus.	»
Gén. Antennarius Commers.	527
marmoratus, Gthr.	»
* tridens, (Schleg.).	»
* urophthalmus, Bleek.	»
sp.	»
notophthalmus, Bleek.	»
Gén. Halicutea, C. V.	»
* stellata, Cuv.	»

Fam. BLÉNIDOS.

Gén. Blennius, Artedi.	528
* sinensis, Gthr.	»
Gén. Petroscirtes, Rüpp.	»
tæniatus, (Q. et G.).	»
* anema, Bleek.	»
sp.	»
* grammistes, G. V.	»
Gén. Clinus, C. V.	»
esp.	»
Gén. Salaris, Cuv.	»
fasciatus, Cuv.	»
sp.	529
* ceramensis, Bleek.	»
* sebae, Cuv.	»
* variolosus, C. V.	»
sumatranaus, Bleek.	»
* quadricornis, G. V.	»
* bellus, Gthr.	»

Fam. TEUTÍDIDOS.

Gén. Teuthis, Lin.	529
javus, L. N.	»
ver iculata, C. V.	530
margarifera, C. I.	»
albo-punctata, (Schleg.).	»
hexagonata, Bleek.	»
* lurida, Rüpp.	»
nebulosa, Q. et G.	»
* argentea, Q. et G.	531
virgata, C. V.	»
vulpina, Schleg.	»
sp.	»

Fam. ACRONÚRIDOS.

Gén. Acanthurus, Bl. Schn.	»
triostegus, Bl.	»

	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
matoides, <i>Cuv.</i> . . .	532	Fam. MUGÍLIDOS.	
bipunctatus, <i>Gthr.</i> . . .	»		
nigros, <i>C. V.</i> . . .	»	Gén. Mugil, <i>Artedi</i> . . .	»
lineatus, <i>Bl.</i> . . .	»	* cephalotus, <i>Cuv.</i> . . .	»
striatus, <i>Q. et G.</i> . . .	»	* haematochilus, <i>Schleg.</i> . . .	537
achilles? <i>Shaw.</i> . . .	»	subviridis, <i>C. V.</i> . . .	»
etenodon, <i>C. V.</i> . . .	»	sundanensis, <i>Bleek.</i> . . .	»
sp.	»	meyeri, <i>Gthr.</i> . . .	»
Gén. Acronurus, <i>C. V.</i> . . .	533	sp.	»
argenteus, <i>Q. et G.</i> . . .	»	planeiceps, <i>Cuv.</i> . . .	»
Gén. Naseus, <i>Commers.</i> . . .	»	kelaartii, <i>Gthr.</i> . . .	»
olivaceus, <i>Cuv.</i> . . .	»	* affinis, <i>Gthr.</i> . . .	»
Gén. Keris, <i>C. V.</i> . . .	»	cæruleo-maculatus, <i>La-</i> <i>cép</i> . . .	538
amboinensis, <i>Bleek.</i> . . .	»	troeschelii, <i>Bleek.</i> . . .	»
Fam. HOPLEGNÁTIDOS.		* borneensis, <i>Bleek.</i> . . .	»
Gén. Hoplegnathus, <i>Gthr.</i> . . .	»	melinopterus, <i>C. V.</i> . . .	»
punctatus, <i>Richards.</i> . . .	»		
Fam. NÁNDIDOS.		Fam. OFIOCEFÁLIDOS.	
Gén. Plesiops, <i>Cuv.</i> . . .	»	Gén. Ophiocephalus, <i>Bloch.</i> . . .	»
cœruleo-lineatus,		* rhodotenia, <i>Bleek.</i> . . .	»
Rüpp. . .		* melanopterus, <i>Bleek.</i> . . .	»
* corallicola, <i>Bleek.</i> . . .	534	striatus, <i>Bl.</i> . . .	»
Fam. LABIRÍNTIDOS.		nigricans, <i>C. V.</i> . . .	539
Gén. Anabas, <i>Cuv.</i> . . .	»	* argus? <i>Cantor.</i> . . .	»
scandens, <i>Cuv.</i> . . .	»	* maculatus, <i>Cuv.</i> . . .	»
macrocephalus, <i>Bleek.</i> . . .	»	vagus, <i>Ptrs.</i> . . .	»
* oligolepis, <i>Bleek.</i> . . .	»		
Gén. Polycanthus, <i>C. V.</i> . . .	»	Fam. TRICONÓTIDOS.	
* opercularis, <i>Richards.</i> . . .	534	Gén. Trichonotus, <i>C. V.</i> . . .	»
Gén. Macropus, <i>Gthr.</i> . . .	535	* setigerus, <i>Bl.</i> . . .	»
* viridi-auratus? <i>Lacep.</i> . . .	»		
Gén. Osphronemus, <i>Lacep.</i> . . .	»	Fam. CEPÓLIDOS.	
olfax, (<i>Commers.</i>) . . .	»	Gén. Cepola, <i>Lin.</i> . . .	»
trichopterus, <i>Pall.</i> . . .	»	* abbreviata? <i>C. V.</i> . . .	»
striatus, <i>Bleek.</i> . . .	536		
Fam. LUCIOCEFÁLIDOS.		Fam. CENTRÍSCIDOS.	
Gén. Luciocephalus, <i>Bleek.</i> . . .	»	Gén. Centriscus, <i>Lin.</i> . . .	540
* pulcher? <i>Bleek.</i> . . .	»	* gracilis, <i>Lowe.</i> . . .	»
Fam. ATERÍNIDOS.		Gén. Amphisele, <i>Klein.</i> . . .	»
Gén. Atherina, <i>Artedi</i> . . .	»	scutata, <i>Cuv.</i> . . .	»
* bleekeri, <i>Gthr.</i> . . .	»	strigata, <i>Gthr.</i> . . .	»
* lineata, <i>Gthr.</i> . . .	»		
sp.	»	Fam. FISTULÁRIDOS.	
		Gén. Fistularia, <i>Lin.</i> . . .	»
		* serrata, <i>Cuv.</i> . . .	»

Fam. MASTACEMBÉLIDOS.

	Pág.
Gén. Rhynchosbella, <i>C. V.</i>	541
* aculeata, <i>Bl.</i>	»
Gén. Mastacembelus, <i>C. V.</i>	»
* unicolor, <i>C. V.</i>	»

Ord. 2º FARINGOGNATOS.

Fam. POMACÉNTRIDOS.

Gén. Amphiprion, <i>Bl. Sch.</i>	»
bifasciatus, <i>Bl.</i>	»
intermedius, <i>Schleg.</i>	542
sp.	»
* sibti, <i>Bleek.</i>	»
* clarkii, <i>Cuv.</i>	»
* percula, <i>Cuv.</i>	»
boholensis, <i>O. Cart.</i>	543
Gén. Premnas, <i>Cuv.</i>	»
biaculeatus, <i>Bleek.</i>	»
Gén. Dascyllus, <i>Cuv.</i>	»
aruanus, <i>Cuv.</i>	»
* xanthosoma, <i>Bleek.</i>	»
reticulatus, <i>Bleek.</i>	544
Gén. Pomacentrus, <i>C. V.</i>	»
fasciatus, <i>C. V.</i>	»
ovoides, <i>O. Cart.</i>	»
* trimaculatus, <i>C. V.</i>	»
punctato-lineatus, <i>O.</i>	
Cart..	»
tenuirostris, <i>Bleek.</i>	»
tenuirostris, var., <i>Cart.</i>	544
* siensiensis, <i>Bleek.</i>	»
sp. <i>Cartier</i>	»
pavo, <i>Lacep.</i>	545
pavo, var. <i>O. Cart.</i>	»
* chrysopacilus, <i>Kuhl.</i>	»
chrysurus, <i>Cuv.</i>	»
cyanospilus, <i>Bleek.</i>	»
* seolopsis, <i>Q. et G.</i>	»

Gén. Glyptodon, <i>Gthr.</i>	»
coleostinus.	»
mutabilis <i>O. Cartier.</i>	546
septemfasciatus, <i>C. V.</i>	»
tenioruptus, <i>O. Cart.</i>	»
* affinis, <i>Gthr.</i>	»
cingulatus, <i>Kur.</i> var.	
<i>Cant.</i>	»
* sordidus, (<i>Forsk.</i>)	»
* albofasciatus, <i>H. et J.</i>	547
bonang, <i>Bleek.</i>	»

	Pág.
lachrymatus, <i>Q. et G.</i>	547
florulentus, <i>Gthr.</i>	»
* antjerius, <i>Bleek.</i>	»
plagiometopon, <i>Bleek.</i>	»
* uninaculatus, <i>C. V.</i>	»
assimilis, <i>Gthr.</i>	548
dispa, <i>Gthr.</i>	»
* bankieri, <i>Richards.</i>	»
* modestus, <i>Schleg.</i>	»
Gén. Heliates, <i>Gthr.</i>	»
cinerascens, <i>C. V.</i>	»
* frenatus, <i>C. V.</i>	»

Fam. LÁBRIDOS.

Gén. Chérops, <i>Rüpp.</i>	»
macrodon, <i>Licép.</i>	»
meanler, <i>Carreir.</i>	549
* omnopterus, <i>Richards.</i>	»
unimaculatus, <i>Cart.</i>	»
* leucozona, <i>Bleek.</i>	»
* anchorago, <i>Bl. Schn.</i>	»
japonicus, (<i>C. V.</i>)	»
* oligacanthus, <i>Bleek.</i>	»
Gén. Librichthys, <i>Bleek.</i>	550
* rubiginosa, (<i>Schleg.</i>)	»
unilineata, <i>Guichen.</i>	»
Gén. Libriiles, <i>Bleek.</i>	»
paradiseus, <i>Bleek.</i>	»
Gén. Daymaria, <i>Bleek.</i>	»
* aurigaria, <i>Bleek.</i>	»
Gén. Cheilinus, <i>Cuv.</i>	»
* festivus, <i>C. V.</i>	»
rostratus, <i>Cartier.</i>	»
* fasciatus, <i>Rüpp.</i>	»
* martensi, <i>C. V.</i>	551
* godeffroyi, <i>Gthr.</i>	»
Gén. Anampses, <i>Cuv.</i>	»
méléagris, <i>C. V.</i>	»
Gén. Stethojulis, <i>Gthr.</i>	»
strigiventer, <i>Günth.</i>	»
esp.	»
trilobata, <i>Günth.</i>	»
albovittata, <i>Günth.</i>	»
kalosoma, <i>Bleek.</i>	»
Gén. Platyglossus, <i>Klein.</i>	552
* dussumieri, <i>C. V.</i>	»
esp.	»
pseudogramma, <i>Cartier.</i>	»
esp.	»
* schwarzii, <i>Bleek.</i>	»
reticulatus, <i>Cartier.</i>	553

	Pág.		Pág.
* miniatus, <i>C. V.</i> . . .	553	philippinus, <i>Gthr.</i> » et	477
alternans, <i>Cartier.</i> . . .	»	kapas, <i>Bleek.</i> » et	»
* guttatus, <i>Bl.</i> . . .	»	punctitus, <i>C. V.</i> » et	»
ubayensis, <i>Cartier.</i> . . .	»	* japonicus, <i>Bleek.</i> » et	»
* binotopsis, <i>Bleek.</i> . . .	»	* oyena, <i>Cuv.</i> . . . » et	»
* tenuispinis, <i>Gthr.</i> . . .	»		
* scapularis, <i>Benn.</i> . . .	554		
* precipitus, <i>Schleg.</i> . . .	»		
Gén. Pseudojulis, <i>Bleek.</i> . . .	»		
girardi, <i>Bleek.</i> . . .	»		
Gén. Novacula, <i>C. V.</i> . . .	»		
tenuirostris, <i>Lacép.</i> . . .	»		
pentadactyla, <i>Cuv.</i> . . .	»		
* punctulata, <i>C. V.</i> . . .	555		
Gén. Julis, <i>Gthr.</i> . . .	»		
lunaris, <i>Cuv.</i> . . .	»		
* umbrostigma, <i>Röpp.</i> . . .	»		
* trilobata, <i>Lacép.</i> . . .	»		
dorsalis, <i>Quoy. et Gaim.</i>	556		
truncatus, <i>Cartier.</i> . . .	»		
* schwanefeldii, <i>Bleek.</i> . . .	»		
Gén. Gomphosus, <i>Lacép.</i> . . .	»		
* tricolor, <i>Quoy et Gaim.</i> . . .	»		
* varius, <i>Lacép.</i> . . .	557		
Gén. Cheilio, <i>Lacép.</i> . . .	»		
iheringi, <i>Bleek.</i> . . .	»		
Gén. Cheillinus, <i>Gill.</i> . . .	»		
rostratus, <i>Cartier.</i> . . .	»		
Gén. Pseudodax, <i>Bleek.</i> . . .	»		
moluccensis, <i>C. V.</i> . . .	»		
Gén. Scarichthys, <i>Bleek.</i> . . .	558		
auritus, <i>Bleek.</i> . . .	»		
Gén. Callionym, <i>C. V.</i> . . .	»		
carolinus, <i>Cuv.</i> . . .	558		
brachysoma, <i>Bleek.</i> . . .	»		
spinidens, <i>Q. et G.</i> . . .	»		
sp.	»		
Gén. Pseudoscarus, <i>Gthr.</i> . . .	»		
* pulchellus, <i>Bleek.</i> . . .	»		
margaritus, <i>Cartier.</i> . . .	559		
esp.	»		
* chrysopoma, <i>Bleek.</i> . . .	»		
sp. <i>Cartier.</i> . . .	»		
* phyrhostethus, <i>Bleek.</i> . . .	»		
aeruginosus, <i>C. V.</i> . . .	»		
ocellatus, <i>C. V.</i> . . .	»		
* celebicus, <i>Bleek.</i> . . .	560		
muricatus, <i>Bleek.</i> . . .	»		
* balinensis, <i>Bleek.</i> . . .	»		
Fam. GÉRRIDOS.			
Gén. Gerres, <i>Cuv.</i> . . .	560 et 477		
Orden 3. ^o ANACANTINOS.			
Fam. GÁDIDOS.			
Gén. Bregmaceros, <i>Thomps.</i>	561		
maclellandii, <i>Thomps.</i>	»		
Fam. OFÍDIDOS.			
Gén. Encheliophis, <i>Müll.</i> . . .	»		
vermicularis, <i>Müll.</i> . . .	»		
Gén. Congrogadus, <i>Gthr.</i> . . .	»		
* subducens, <i>Richards.</i>	»		
Fam. PLEURONÉCTIDOS.			
Gén. Pssettodes, <i>Benn.</i> . . .	562		
erumei, <i>Schn.</i> . . .	»		
Gén. Tephritis, <i>Gthr.</i> . . .	»		
* sinensis, <i>Lacép.</i> . . .	»		
Gén. Samaris, <i>Gray.</i> . . .	»		
* cristatus, <i>Gray.</i> . . .	»		
Gén. Pseudorhombus, <i>Bleek.</i> . . .	»		
russelli, <i>(Gray.)</i> . . .	»		
* pentophthalnus? <i>Gthr.</i> . . .	563		
* olivaceus, <i>Schleg.</i> . . .	»		
Gén. Rhomboidichthys,			
<i>Bleek.</i> . . .	563		
* pavo, <i>Bleek.</i> . . .	»		
* assimilis, <i>Gthr.</i> . . .	»		
* granulosum, <i>Schleg.</i> . . .	»		
Gén. Solea, <i>Cuv.</i> . . .	»		
ovata, <i>Richards.</i> . . .	»		
Gén. Pardachirus, <i>Gthr.</i> . . .	»		
* pavoninus, <i>Lacép.</i> . . .	»		
Gén. Synaptura, <i>Cantor.</i> . . .	564		
* foliacea, <i>Richards.</i> . . .	»		
* zebra, <i>Cant.</i> . . .	»		
quagga, <i>(Kanp.)</i> . . .	»		
Gén. Cynoglossus, <i>Ham.</i>			
<i>Buch.</i> . . .	»		
* auro-limbatus <i>Richards.</i>	»		
* abbreviatus, <i>Gray.</i> . . .	»		
* trigrammus, <i>Gthr.</i> . . .	»		
* melampetalus, <i>Richards.</i>	»		

Pág.		Pág.	
quadrilineatus, Bleek.	505	corlatus, C. U.	570
* oxyrhynchos, Bleek.	"	falcarius, Richards.	"
* puncticeps, Richards.	"	* microcephalus, Bleek.	"
brachyrynchus, (Bl.)	"	Gén. Hemipimelodus, Bleek.	571
		* borneensis, Bleek.	"
		* macrocephalus, Bleek.	"
		manillensis, C. & U.	572
		Gén. Ketengus, Bleek.	"
		* typus, Bleek.	"
<hr/>			
Orden: FISÓSTOMOS.			
<hr/>			
Fam. SILURIDOS.			
Gén. Clarias, Gronov.	"		
macrocephalus, Gthr.	"		
* fuscus, Lacép.	"		
* melanoderma, Bleek.	566		
* liacanthus, Blkr.	"		
nieuhoffii, Cuv. et V.	"		
Gén. Heterobranchus, Geofe.	"		
* typeinopterus, Bleek.	"		
Gén. Plotosus, Lacép.	"		
anguillaris, Lacép.	"		
canius, Ham.	"		
Gen. Silurus, Artedi.	"		
* asotus, L.	"		
Gén. Silurichthys, Bleek.	"		
* phaiosoma, Bleek.	"		
Gén. Wallago, Bleek.	"		
* lecrii, Bleek.	"		
Gén. Belodontichthys, Bleek.	568		
* macrochir, Bleek.	"		
Gén. Cryptopterus, Bleek.	"		
* limpop, Bleek.	"		
* schilbeides? Bleek.	"		
* bieirrhis, C. V.	"		
* lais, Bleek.	"		
* micropus, Bleek.	"		
* micronema? Bleek.	"		
* hexapterus? Bleek.	569		
Gén. Callichrous, Gthr.	"		
* bimaculatus, Bleek.	"		
Gén. Laïs, Bleek.	"		
* hexanema, Bleek.	"		
Gén. Pangasius, C. V.	"		
* macronema, Bleek.	"		
* nasutus? Bleek.	"		
Gén. Pseudobagrus, Bleek.	570		
* vachellii, Richards.	"		
* fulvi-draco? Richards..	"		
Gén. Rita, Bleek.	"		
manillensis, C. V.	"		
Gén. Arius, Gthr.	"		
* tonggol, Bleek.	"		
* sagor, Ham. Buch	"		
pidala, Bleek.	"		

	Pág.	Pág.	
monocirrhus, <i>Richards.</i>	576	argyrotornia, <i>Bleek.</i>	582
brachipterus, <i>Solander.</i>	"	fimbriata, <i>C. V.</i>	"
mento, <i>C. V.</i>	"	nymphora, <i>Richards.</i>	583
volitans, <i>Lin.</i>	"	sp.	"
oligolepis, <i>Bleek.</i>	577	* reevesii, <i>Richards.</i>	"
evolans, <i>Lin.</i>	"	* kowal, <i>Räppell.</i>	"
arcticeps, <i>Gthr.</i>	"	zunasi, (<i>Bleek.</i>)	"
* paciolarpterus,? <i>C. V.</i>	"	Gén. <i>Pellona</i> , <i>C. V.</i>	"
esp.	"	* elongata,? <i>Bennet.</i>	584
spilopterus, <i>C. V.</i>	"	Gén. <i>Dussumeria</i> , <i>Bleek.</i>	"
* oxycephalus, <i>Bleek.</i>	578	elopsoides, <i>Bleek.</i>	"
brachycephalus, <i>Gthr.</i>	"	Gén. <i>Elops</i> , <i>Lin.</i>	"
Fam. CIPRÍNIDOS.		saurus, <i>Lin.</i>	"
Gén. Cyprinus, <i>Nils.</i>	"	Gén. <i>Megalops</i> , <i>Lacep.</i>	"
* fossicola,? <i>Richards.</i>	"	cyprinoides, <i>Bleek.</i>	"
Gén. Cirrhina, <i>Cuv.</i>	"	Gén. <i>Chanos</i> , <i>Lacep.</i>	585
* chinensis, <i>Gthr.</i>	"	salmoneus, <i>Bl.</i> <i>Schn.</i>	"
Gén. Dangila, <i>C. V.</i>	"		
* ocellata, <i>Heckel.</i>	"		
* enivieri, <i>Cuv.</i>	"		
sumatrana, <i>Bleek.</i>	"		
* festiva, <i>Bleek.</i>	579	Fam. QUIROQUÉNTRIDOS.	
Gén. Osteochilus, <i>Gthr.</i>	"		
* melanopleurus, <i>Bleek.</i>	"	Gén. Chirocentrus, <i>Cuv.</i>	585
* hasseltii, <i>Cuv.</i>	"	* dorab, <i>Forsk.</i>	"
* vittatus, <i>C. V.</i>	"		
Fam. CLUPÉIDOS.			
Gén. Engraulis, <i>Cuv.</i>	"	Fam. SIMBRÁNQUIDOS.	
tri, <i>Bleek.</i>	"		
* japonica, <i>Houtt.</i>	580	Gén. Symbranchus, <i>Bloch.</i>	586
heterolobus, <i>Rüpp.</i>	"	bengalensis, <i>McClell.</i>	"
* rhinorhynchus, <i>Bleek.</i>	"		
compressus, <i>Girard.</i>	"		
* hamiltonii, <i>Gray.</i>	"	Fam. MURÉNIDOS.	
mystacoides, <i>Bleek.</i>	"		
esp.	581	Gén. Anguilla, <i>Cuv.</i>	586
setirostris, <i>Brouss.</i>	"	mauritiana, <i>Bennett.</i>	"
* breviceps,? <i>Cantor.</i>	"	sidjensis, <i>Gthr.</i>	"
Gén. Coilia, <i>Gray.</i>	"	* amboinensis, <i>Ptrs.</i>	"
* clupeoides, (<i>Lacep.</i>)	"	esp.	587
* grayi, <i>Richards.</i>	"	Gén. Uroconger, <i>Kaup.</i>	"
Gén. Chattoessus, <i>C. V.</i>	"	* lepturus, <i>Kaup.</i>	"
nasus, <i>Cuv.</i>	"	Gén. Muranexos, <i>McClell.</i>	
* punctatus, <i>Schleg.</i>	582	* talabon, <i>Bleek.</i>	"
chacunda, <i>Cuv.</i>	"	cinerous, (<i>Forsk.</i>)	"
Gén. Clupea, <i>Cuv.</i>	"	Gén. Muranichthys, <i>Bleek.</i>	588
* mauritiana, <i>Benn.</i>	"	maeropterus, <i>Bleek.</i>	"
* isenglema, <i>Rich.</i>	"	schultzii, <i>Bleek.</i>	"
		sp.	"
		Gén. Ophichthys, <i>Gthr.</i>	"
		* adspersus, <i>Gthr.</i>	"
		* dicellurus, <i>Richards.</i>	"
		* pallens, <i>Richards.</i>	"
		* broekmeyeri, <i>Bleek.</i>	589
		cirrochilus, <i>Bleek.</i> var.	"
		cephalozena, <i>Bleek.</i> var.	
		Gthr.	
		* apicalis, <i>Bennett.</i>	"

	Pág.		Pág.
chinensis, Kaup.	590	caudatus, <i>CPtrs.</i>	597
boro, (<i>Ham-Buch.</i>)	»	pleurostictus, <i>Ptrs.</i>	»
cancrivorus, Richards.	»	Gén. Gasterosteus, Kaup.	»
* culubrinus, Budd.	591	biaculeatus, Kaup.	597
* quadratus, Richards.	»	Gén. Solenognathus, Kaup.	»
Gén. Moringua, Gray.	»	* hardwickii, Kaup.	»
* lumbricoidea, Richards.	»	Gén. Hippocampus, Kaup.	»
* abbreviata, Bleek.	»	* longirostris, Schleg.	»
Gén. Murena, Gthr.	»	guttulatus, Cuv.	»
punctato - fasciata, Bleek.	»	* trimaculatus, Leach.	»
* tessellata, Richards.	592	comes, Cantor.	599
* fimbriata, Bennett.	»		
melanospila, Bleek.	»		
* macassariensis, ? Bleek.	»		
* thyrsoidae, Richards.	593		
* picta, Ahl.	»		
* nubila, Richards.	»		
* tenebrosa, Richards.	594		
* macrurus, Bleek.	»		
zebra, Bleek.	»		
polyzona, Richards.	»		
nebulosa, Ahl.	»		

Gén. Gymnomuraena, Bleek. 595
marmorata, Bleek.. . . . »
esp. »

Fam. PEGÁSIDOS.

Gén. Pegasus, Lin. . . . »
* volans, Lin. . . . »
* natans, Lin. . . . »
* lancifer, Kaup. . . . 596

Orden 5.^o LOFOBRANQUIOS.

Fam. SOLENOSTOMIDOS.

Gén. Solenostoma, Lacép. . . »
* cyanopterum, Bleek. . . »
* brachyurum, Bleek. . . »

Fam. SYNGNÁTIDOS.

Gen. Syngnathus, Arvedi. . . »
* schlegelii, Kaup. . . »
* zanzibarensis, Gthr. . . »
spiefer, Rüppell. . . »
conspicillatus, Jenyns. 597
Gén. Ichthyocampus, Kaup. »
* belcheri, Kaup. . . »
Gen. Doryichthys, Kaup. . . »
* boaja, Bleek. . . »

Orden 6.^o PLECTOGNATOS.

Fam. TRIACANTIDOS.

Gén. Triacanthus, Cuv. . . . »
* breviristris, Schleg. . . »
biaculeatus, Cuv. . . . »
strigilifer, Cant. . . . »

Fam. BALISTIDOS.

Gén. Balistes, Cuv. . . . 600
* stellatus, Lacép. . . . »
* maculatus, Gim. . . . »
* vidua, Richards. . . . 601
* mitis, Benn. . . . »
* bursa, Bl. »
aculeatus, L. »
verrucosus, L. Syst. . . 602
rectangulus, Bl. . . . »
undulatus, *Mungo Park.* »
Gén. Monacanthus, Cuv. . . 603
* chinensis, Cuv. . . . »
sp. »
tomentosus, Cuv. . . . »
* suteatus, Hollard. . . . »
setifer, Bennet. . . . 604
* monoceros, Osbeck. . . »

Fam. OSTRACIÓNIDOS.

Gén. Ostracion, Arvedi. . . 605
gibbosus, Lin. »
* concatenateus, Bl. . . . »
cubicus, Lin. »
diaphanus, Bl. 606
cornutus, Lin. »

Fam. TETRODÓNTIDOS.

Gén. Xenopterus, Bibron. . . 617
*

	Pág.		Pág.
* <i>naritus</i> , (<i>Richards.</i>)	607	* <i>tiburo</i> , <i>Valenc.</i>	615
* <i>modestus</i> , (<i>Bleek.</i>)	»	Gén. <i>Triaenodon</i> , <i>Gthr.</i>	»
Gén. <i>Tetradon</i> , <i>Lin.</i>	»	obesus, <i>Rüpp.</i>	»
<i>lunaris</i> , <i>Bl.</i> <i>Schn.</i>	»	Fam. RINODÓNTIDOS.	
<i>var. spadicetus</i> , (<i>Rich.</i>) 608		Gén. <i>Rinodon</i> , <i>Smith.</i>	»
<i>sceleratus</i> , (<i>Forst.</i>)	»	* <i>typicus</i> , <i>Smith</i>	»
<i>hypselogenion</i> , <i>Bleek.</i>	»	Fam. ESCÍLIDOS.	
* <i>oblongus</i> , <i>Bl.</i>	»	Gén. <i>Scyllum</i> , <i>M. et H.</i>	616
<i>oblongus</i> , <i>var. albo-</i> <i>plumbeus</i> <i>Rich.</i> 609		* <i>marmoratum</i> , <i>Benn.</i>	»
* <i>ocellatus</i> , <i>Osbeck.</i>	»	* <i>maculatum</i> , (<i>Bl.</i> <i>Sch.</i>)	»
* <i>ruberipes</i> , <i>Schleg.</i>	»	* <i>burgeri</i> , <i>Müller.</i>	»
<i>patoca</i> , <i>Ham.</i>	»	Gén. <i>Stegostoma</i> , <i>M. et H.</i>	»
<i>immaculatus</i> , <i>Bl.</i> <i>var.</i> <i>vrgata</i> , <i>Rich.</i>	»	<i>tigrinum</i> , (<i>Gm.</i>)	»
* <i>nigropunctatus</i> , <i>Bl.</i>	610	Gén. <i>Chiloscyllium</i> , <i>M. et H.</i> 617	
* <i>mapa</i> , <i>Less.</i>	»	<i>indicum</i> , (<i>Gm.</i>)	»
<i>reticularis</i> , <i>Bl.</i>	»	Fam. RÍNIDOS.	
* <i>hispidus</i> , <i>Lin.</i> <i>var. se-</i> <i>mistratius</i> , <i>Rüpp.</i>	»	Gén. <i>Rhina</i> , <i>Klein.</i>	»
* <i>meleagris</i> , <i>Lacép.</i>	611	* <i>squatina</i> , <i>Dumeril.</i>	»
<i>iluvatilis</i> , <i>Ham.</i>	»	Subord. RATOIDEOS.	
<i>papua</i> , <i>Bleek.</i>	»	—	
<i>striolatus</i> , <i>Quoy. &</i> <i>Gaim.</i>	»	Fam. PRÍSTIDOS.	
Gén. <i>Diodon</i> , <i>Gthr.</i>	»	Gén. <i>Pristis</i> , <i>Lath.</i>	618
<i>hystricis</i> , <i>Lin.</i>	»	* <i>pectinatus</i> , <i>Latham.</i>	»
<i>maculatus</i> , (<i>Gthr.</i>)	»	Fam. RINOBATIDOS.	
Gén. <i>Chilomycterus</i> , <i>Gthr.</i>	»	Gén. <i>Rhynchosbatus</i> , <i>Gthr.</i> 619	
<i>orbicularis</i> , <i>Bl.</i>	»	* <i>ancylostomus</i> <i>Bl.</i> <i>Schn.</i>	»
Orden: CONDROSTEOS.		* <i>djeddaensis</i> , <i>Cant.</i>	»
Fam. ACIPENSÉRIDOS.		Gén. <i>Rhinobatos</i> , <i>Gthr.</i>	
Gén. <i>Acipenser</i> , <i>Artedi.</i>	613	* <i>halavi</i> , <i>Rüpp.</i>	»
<i>sinensis</i> , <i>Gray.</i>	»	* <i>schlegelii</i> , (<i>M. et H.</i>)	»
Orden: PLAGIOSTOMOS.		Fam. TORPEDÍNIDOS.	
Fam. 1. CARCÁRIDOS.		Gén. <i>Temera</i> , <i>Gray.</i>	620
Gén. <i>Carcharias</i> , <i>Cuv.</i>	»	<i>hardwickii</i> , <i>Gray.</i>	»
<i>laticaudus</i> , <i>Müll.</i>	»	Fam. RÁYIDOS.	
<i>acutus</i> , <i>Rüpp.</i>	»	Gén. <i>Raja</i> , <i>Cuv.</i>	»
<i>hemiodon</i> , <i>Müll.</i>	»	<i>kenojei</i> , (<i>M. et H.</i>)	»
<i>borneensis</i> , <i>Bleek.</i>	614		
Gén. <i>Galeus</i> , <i>Cuv.</i>	»		
<i>canis</i> , <i>Rouvel.</i>	»		
Gén. <i>Zygæna</i> , <i>Cuv.</i>	»		
<i>malleus</i> , <i>Shaw.</i>	»		

Gén. Platyrrhina, <i>M.</i> et <i>H.</i> ^{Pig.} 620	Gén. Pteroplatea, <i>M.</i> et <i>H.</i> ^{Pig.} 621
* sinensis, <i>Müll.</i> . . »	* hirundo, <i>Low.</i> . . »
Fam. TRIGÓNIDOS.	Fam. MILIOBÁTIDOS.
Gén. Trygon, <i>Adanson.</i> . . »	Gén. Myliobatis, <i>Cuv.</i> . . . »
* gerrardi, <i>Gray.</i> . . »	* neuhofii, <i>Cuv.</i> . . . »
* bennetti, <i>M.</i> et <i>H.</i> . . »	* milvus, <i>Müll.</i> . . . »



591.8

CATÁLOGO SISTEMÁTICO
DE TODA LA
FAUNA DE FILIPINAS
CONOCIDA HASTA EL PRESENTE,

Y A LA VEZ
EL DE LA COLECCIÓN ZOOLOGICA

DEL MUSEO DE PP. DOMINICOS DEL
COLEGIO-UNIVERSIDAD DE SANTO TOMÁS DE MANILA,
escrito con motivo de la

EXPOSICIÓN REGIONAL FILIPINA

POR EL

R. P. FR. CASTO DE ELERA,

PROFESOR DE AMPLIACION DE HISTORIA NATURAL
Y DIRECTOR DEL MENCIONADO MUSEO

VOLUMEN I

VERTEBRADOS

MANILA

IMPRENTA DEL COLEGIO DE SANTO TOMÁS

1895

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00712 0256