

至七分去粗食後溫服

青蒿散 楊氏方 治虛勞骨蒸咳嗽聲啞皮毛乾枯四肢倦

怠夜多盜汗時作潮熱飲食減少白漸瘦弱 方見發熱

經効阿膠丸 濟生方 治勞嗽并嗽血唾血

卷柏葉 山藥 阿膠 蛤粉炒 生地黄 酒洗

防風 去芦 雞蘇 各一 栢子仁 炒另 大薊根

五味子 百部 洗去 遠志 去心 人參

茯苓 去皮 麥門冬 去心各

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼濃煎小麥湯

送下

寧肺湯 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰壅

方見咳嗽

蠟煎散 楊氏方 治虛勞久嗽痰多氣喘或咯膿血

杏仁 去皮尖 雙仁 者炒黃別研 人參 去芦 麥門冬 去心

乾山藥 貝母 去心 白茯苓 去皮 百合 去苗

黃明鹿角膠 炙如無以 甘草 炙各

右爲末將杏仁別研拌勻每服二錢水一盞入黃蠟皂

角子大一塊同煎七分食後熱服

參耆散 直指方 治勞瘵嗽喘咯血舌焦潮熱盜汗

柴胡 阿膠 炒 黃耆 蜜炙 白茯苓

紫苑茸

當歸

川芎

半夏製

貝母

去心

枳殼製

桔梗

秦艽洗

甘草

各五錢

人參

五味子

羌活

防風

杏仁去皮

款冬花

鱉甲

醋炙

桑白皮

炒各五錢半

右吹咀每服八錢水一盞半生姜三片棗子一枚煎至

八分食後服

○已上諸方止咳寧肺之劑

加味十全大補湯

治發熱漸成勞瘵者

十全大補湯加柴胡黃連煎服如執在骨髓更加青蒿

鱉甲煎服

方見補損

一方 治男子婦人骨蒸瘵瘵增寒壯熱

青蒿

春夏用葉秋冬用子不用藥用根不用莖四者混用而反以為瘵疾必用童便浸過便旬

功驗無毒

大鱉甲

炙

白朮

煨

地骨皮

白茯苓

桑白皮

炙

粉草

炙

揀人參

去芦頭

北柴胡

去芦

瓜蒌實

各半兩

右為末每服二錢姜三片煎湯調服不拘時

鱉甲地黃湯

治虛勞手足煩熱心下怔忡及婦人血室

枯乾身體羸瘦飲食不為肌肉

方見發熱

青骨散

經驗方

治男子婦人五心發熱欲成勞瘵

生地黃 二兩 人參

防風 去芦

熟地黃 各一兩

北柴胡 二兩 薄荷葉 七錢 秦艽

赤茯苓

胡黃連 各半兩

右咬咀每服五錢水一盞煎七分溫服患骨熱先服荆

蓬煎丸一服使臟腑微利然後服此 荆蓬煎丸見積聚類

○廣按丹溪云骨蒸發熱積病最多此云先服荆蓬煎

丸後服青骨散暗合其妙

白木黃耆散 宣明方 治五心煩熱自汗四肢痿弱飲食減

少肌瘦昏昧並皆治之

白朮

黃耆

當歸

黃芩 去皮

芍藥 各半兩

人參

川芎 各七錢半

石膏

甘草 各一兩

寒水石

茯苓 各一兩

官桂 一兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分去粗溫服食前

日三服

地骨皮枳殼散 治骨蒸壯熱肌肉瘦痿劣多困夜夢盜

汗 方見發熱

柴胡梅連散 瑞竹堂方 治骨蒸勞熱久而不痊三服除根

其効如神及五勞七傷虛弱皆治

胡黃連

柴胡

前胡

烏梅 各二錢

右咬咀作一服取童子小便二盞豬膽一箇豬骨髓一

條菲白半錢煎至一盞去粗服無時

○廣按此劫劑也胃虛者斟酌用之

太上混元丹 醫方集成治勞損五臟補真氣

紫河車

一具用少婦首生男子者良帶子全者於東流水洗斷血脈入射香一錢在內以線縫定用生絹包裹懸胎於沙盆內入無灰酒五升慢火熬成膏

沉香

別研 硃砂各一兩

人參

肉蓯蓉

酒浸

乳香

別研

安自香

酒煮

白茯苓

去皮

右為末入河車膏子和藥末杵千百下丸如梧桐子大每服七十九空心溫酒下沉香湯下尤佳服之可以輕身延年

○已上諸方補虛除熱之劑

當歸地黃湯 宜明方治咳血衄血大小便血或婦人經候不調月水過多喘嗽者

當歸

芍藥

川芎

白朮

染槐子

黃藥子

生地黄

甘草

茯苓

黃芩

白龍骨

右為末每服五錢水一盞煎至七分去粗食前溫服

一方 治陰虛內多食積痰

川芎

黃連

瓜蒌仁

白朮

神麩

夾麥芽

青黛

人中白

右爲末姜汁蒸餅丸服

外丹溪退勞熱食積痰有方具在發熱類

遇仙灸

和劑方

治瘵捷法取癸亥日二更後六神皆聚時

解去下衣直身平立以墨點記腰上兩傍陷處謂之腰
眼穴然後上床合面卧每穴灸七壯勞虫或吐或瀉而
出取後用火焚之棄於江河中恐害人故也或依崔氏
穴法灸之宜服後將軍丸

將軍丸

秘方治傳屍勞瘵前灸法并此藥乃異人傳授累

經効驗

錦文大黃

九蒸曝焙

麝香

一錢研

管仲

牙皂

去皮醋炙

桃仁

去皮炒

檳榔

雷丸

各一兩

蕪荑

半兩

鱉甲

醋炙黃

一兩

右爲末先將蒿葉二兩東邊桃柳李桑葉各七片水一
碗煎至七分去粗入蜜一大觔再熬至成膏入前藥末
及麝香安息香搗丸如梧桐子大每服三十九食前棗
湯下

○廣按此方追虫取積之藥也

神授散

三因方

治諸傳屍勞氣殺虫去毒

川椒

二斤揀去子并合口者炒去汗

右爲末每服一錢空心米湯調下必麻痺暈悶少頃如
不能禁即以酒糊丸如梧桐子大空心服五十九

○已上諸方治血痰虫積之劑

○廣按人之五藏各一惟腎有二左腎以藏真水右腎以藏相火少年之人嗜欲無節以致真陰衰虛相火獨旺火寡于畏自下衝上自裏達表故名爲骨蒸勞瘵病也夫証有二其火衝手上焦者發熱之中則兼咳嗽喘急吐痰吐血肺痿肺癰等証其火結於下焦者發熱之中則兼淋瀝濁結燥遺精盜汗腹痛驚悸等証葛可久先生保和湯保真湯中已具其端倪矣東垣先生曰火與元氣不相兩立一勝則一負經曰少火生氣壯火食氣可見火爲元氣之賊火既熾而氣

傷天氣傷則不能運化水穀水穀停留而爲濕熱生虫生積之所由也治之之法滋陰降火是澄其源也消痰和血取積追虫是潔其流也醫者可不以補虛爲主而蕪去邪矣乎

勞瘵治例

出明醫雜著

王節齋曰男子二十前後色欲過度損傷精血必生陰虛火動之病睡中盜汗午後發熱哈哈咳嗽倦怠無力飲食少進甚則痰涎帶血咯唾出血或咳血吐血衄血身熱脉沉數肌肉消瘦此名勞瘵最重難治輕者用藥數十服重者期以歲年然必須病人得命堅心定志絕房

室息忘想。戒惱怒。節飲食。以自培其根。否則雖服良藥無用也。此病治之於蚤則易。若到肌肉消燼。沉困着床。尺脉沉取細數。則難爲矣。又此病大忌服人參。若曾服過多者亦難治。今製一方于後。治色慾証先見潮熱盜汗咳嗽倦怠。趁早服之。

主方

川芎

熟地黄 各一錢

白芍藥 炒三分 一錢

當歸 一錢 三分

黃蘗 七分 蜜水拌炒 知母 一錢 蜜水拌炒

生地黄 五分 酒浸 甘草 五分 炙

白朮 一錢 三分 陳皮 七分

天門冬 一錢 去心皮

乾姜 三分 炒紫色

右剉用生姜三片水煎空心溫服

若咳嗽盛加桑白皮馬兜鈴瓜蒌仁 各七分 五味子粒

若痰盛加姜製半夏貝母瓜蒌仁 各一錢

若盜汗多加牡蠣酸棗仁 各七分 浮小麥 一撮

若潮熱盛加桑白皮沙參地骨皮 各七分

若夢遺精滑加牡蠣龍骨山茱萸 各七分

若赤白濁加白茯苓 一錢 黃連 三分 炒

若兼衄血咳血出於肺也加桑白皮 一錢 黃芩 山梔仁

各五分 炒

若無嗽血痰血出於脾也加桑白皮貝母黃連瓜蒌仁

各七

若兼嘔血吐血出於胃也加山梔黃連乾姜蒲黃炒各一錢
薑汁半銀盞姜汁少許

若兼咯唾血出於腎也加桔梗玄參側柏葉炒各一錢

若先見血証或吐衄盛大者宜先治血治法輕少者涼
一血止血盛大者先消瘀血次止血涼血蓋血過多必
有瘀於胸膈者不先消化之則止之涼之不應也葛
可久十藥神書方可次第檢用方內惟獨參湯止可
用於大吐血後昏倦脈微細氣虛者氣雖虛而復有
火可加天門冬玉錢若如前所云陰虛火動潮熱盜

汗咳嗽脈數不可用也說見本草集要人參條下明
白

此病屬火大便多燥然須節調飲食勿令泄瀉若胃氣
復壞泄瀉稀瀉則前項寒涼之藥難用矣急宜服藥
理脾胃用白朮茯苓陳皮半夏神麩麥芽甘草等藥
候胃氣復然後用前本病藥

收功保後可合補陰丸常服之及用葛可久方

又治勞証方法 出十藥神書

心法附錄曰夫人之生也稟天地氤氳之氣在乎保養真
元固守根本則萬病不生四體康健若曰不養真元不

因根本。疾病由是生焉。且真元根本。則氣血精液也。余嘗聞葛先師有言曰。萬病莫若勞。証最爲難治。蓋勞之起。因人之壯年。氣血完聚。精液充滿之際。不能保養性命。酒色是貪。日夜耽嗜。無有休息。以致耗散真元。虛敗精液。則嘔血吐痰。以致骨蒸體熱。腎虛精竭。面白額紅。口乾咽燥。白濁遺精盜汗。飲食艱難。氣力全無。謂之火盛。全衰重則半年而斃。輕則一載而亡。况醫者不究其源。不窮其本。或投之以大寒之劑。或療之以大熱之藥。妄爲施治。絕不取效。殊不知大寒則愈虛。其中大熱則愈竭。其內所以世之醫勞者。萬無一人焉。先師用藥治

勞如羿之射無不中的。今開用藥次第于後。用藥之法如嘔吐咯嗽血者。先以十灰散遏住。如甚者。項以花蕊石散止之。大抵血見熱則行。見寒則凝。見灰則止。理之必然。止血之後。其人必倦。其體次用獨參湯一補。令其熟睡。一覺不要驚動。睡起病去五分。後服諸藥。

保和湯止嗽寧肺

保真湯補虛除熱

太平丸潤肺除痰

消化丸下痰消氣

保和湯內分血盛痰盛喘盛熱盛風盛寒盛六事加味和之。保真湯內分驚悸淋濁便澁遺精燥熱盜汗六事加味用之餘無加用。服藥之法每日仍濃煎薄荷

湯灌喉中用太平丸先嚼一丸徐徐嚥下次嚼一丸
緩緩溶化至上床時亦如此用之夜則肺竅開藥流入
竅中此訣要緊如痰壅却先用飴糖拌消化丸一百丸
吞下次又依前嚼嚼太平丸令其仰面臥而睡 服前
七藥後若肺有嗽可煮潤肺丸食之如常七藥之前有
餘暇煮此服之 亦可續煮白鳳膏食之固其根源完
其根本 病可之後方可合十珍丸服之此為收功起
身之妙用也
甲字號十灰散 治勞証嘔血吐血咯血嗽血先用此藥
止之

大薊

小薊

栝葉

荷葉

茅根

茜根

大黃

山梔

牡丹皮

棕櫚皮各等分

右各燒灰存性研極細用紙包碗蓋於地上一夕出火
毒用時先將白藕搗絞汁或蘿蔔汁磨京墨半碗調服
五錢食後下如病勢輕用此立止如血出成升斗者用
後藥止之

乙字號花蓋石散

五內崩損湧噴出血斗升用此止之

花蓋石

火煨存性
研如粉

右童子小便一鍾煎溫調末三錢甚者五錢食後服下

如男用酒一半女用醋一半與小便一處和藥服使瘀血化為黃水服此訖以後藥補之

丙字號獨參湯 止血後服此藥補之

大人參去苦

右吹咀水二鍾棗五箇煎不拘時細細服之服後宜熱

睡一覺後服諸藥除根

丁字號保和湯 治勞瘵成痿者服之決效

知母 貝母 天門冬 款冬花各三錢

麥門冬去心 天花粉 薏苡仁 杏仁

五味各一錢 粉草一錢 馬兜鈴 紫苑

百合 桔梗 阿膠炒 當歸

生芋 紫蘇 薄荷各半錢 葶藶炒

一方無生芋有百部

右以水煎生姜三片入飴糖一匙入藥內服之每日三服食後進加減于後

○血盛加蒲黃茜根藕節大蓟小蓟茅花

○痰盛加南星半夏橘紅茯苓枳殼枳實括蕒實炒

○喘盛加桑皮陳皮大腹皮蘿蔔子葶藶蘇子

○熱盛加山梔子炒 黃連黃芩黃栢連翹

○風盛加防風荆芥金沸草甘菊細辛香附

○寒盛加人參芍藥桂皮五味子蠟片

戊字號保真湯 治勞証體虛骨蒸服之決補

當歸 生藥 白朮 黃芪

人參各三錢 蓮心 赤茯苓 白茯苓各半錢

天門冬 麥門冬 陳皮 白芍藥

知母 黃柏炒 五味子 柴胡

地骨皮 熟芩各一錢 赤芍藥 甘草各半錢

右以水煎生姜三片棗一枚食後服

○驚悸加茯苓遠志柏子仁酸棗仁

○淋濁加草薢天台烏藥猪苓澤瀉

○便溺加木通石黃蒲蓄

○遺精加龍骨牡蠣蓮蓬子

○燥熱加滑石石膏青蒿鱉甲

○盜汗加浮麥子炒牡蠣黃芪麻黃根

巳字號太平丸 治勞証久嗽肺痿肺癰並皆驗服

天門冬 麥門冬 知母 貝母

款冬花 杏仁各二兩 當歸 生地黃

熟地黃 黃連 阿膠珠各一兩半 蒲黃

京墨 桔梗 薄荷各一兩 白蜜 四兩

麝香少許

右爲細末和勻用銀石器先下白蜜煉熟後下諸藥末攪勻再上火入麝香略熬三二沸丸如彈子大每日三服食後細嚼一九煎薄荷湯緩緩化下次噙一九臨卧時如痰盛先用錫糖拌消化丸吞下却噙嚼此丸仰卧使藥流入肺竅則肺清潤其嗽退除七日病痊凡一切咳嗽只服此藥立愈

庚字號沉香消化丸 治熱痰壅盛

青礞石煨黃明礬飛研 猪牙皂角 南星火炮

半夏姜製 白茯苓 陳皮各二 枳殼

枳實各一兩半 薄荷一兩 沉香 黃芩各五錢

右爲細末和勻姜汁浸神麴攪糊爲丸如梧桐子大每服一百丸每夜臨卧錫糖拌吞次噙嚼太平丸二藥相攻痰嗽除根

辛字號潤肺膏 治久嗽肺燥肺痿

羊肺一具 杏仁一兩 柿霜 真酥

直粉各一兩 白蜜二兩

右先將羊肺洗淨次將五味入水攪粘灌入肺中白水煮熟如常服食前與七藥相間服之亦佳

壬字號白鳳膏 治一切久勞怯弱虛憊咳嗽吐痰嗽血發熱

黑嘴白鴨 一隻

大京棗 二升

參苓平胃散 一升

陳煮酒 一瓶

右將鴨縛定脚量患人飲酒多少隨量酒在器中盪盪將鴨項割開滴血入酒攪勻一氣飲之直入肺經潤補其肺却將鴨乾搥去毛於脇邊開一孔取其腸雜拭乾次將棗去核每箇中納參苓平胃散末填滿鴨肚用麻扎定以沙窰一箇置鴨在內四圍用火慢煨將陳煮酒分作三次添入煮乾為度取出先食鴨肉其棗陰乾隨意食用人參湯送下後服補髓丹則補髓生精和血順氣

製鴨以如上法煮乾為度取出用火焙乾連骨為末取鴨腹內藥棗搗膏為丸如丸不就加煉蜜為丸如梧桐子大每服七八十九人參湯下或作大丸如雞子黃大用人參湯化下一丸空心日午臨卧各一服如此製曾驗有效

癸字號補髓丹

一名十珍丸

治久勞虛敗髓乾精竭血枯

氣少服前藥愈後服此藥

豬脊膂 一條

羊脊膂 一條

團魚 一枚

烏雞 一隻

四味製淨去骨存肉用酒一大碗於沙窰內煮熟搗細再入後藥

大山藥 五條 蓮肉 半斤 京棗 一百枚 霜柿 十枚

四味修製淨用井花水一大瓶於沙釜內煮熟搗細與前熟肉一處再用慢火熬之却下

明膠 四兩 真黃蠟 三兩

右二味逐漸下與前八味和一處熬成膏子和平胃散末四君子湯末知母黃栢末各一兩共一十兩攪和成劑如十分硬再入白蜜同熬取起放青石上用木搥打如泥丸如梧桐子大每服一百丸不拘時候棗湯下

補損 九十一 附諸虛

丹溪心法

大補丸 去腎經火燥下焦濕治筋骨軟氣虛以補氣藥下血虛以宜血藥下並不單用

川黃栢 炒褐色

右以水丸服

龍虎丸 補下焦

白芍藥 陳皮 各二兩 瑣陽 酥炙 當歸 各一兩半

虎骨 酒浸酥炙 知母 酒炒 熟棗 各三兩 黃栢 半斤 鹽炒

龜板 四兩 酒浸酥炙

右為末酒煮羊肉搗汁丸服冬月加乾姜半兩

補損

法付餘卷之十九

四百

辛

中

補腎丸 治痿厥重者湯使與大補丸同此冬令之正藥

春夏去乾姜

乾姜 二錢

黃柏 炒

龜板 酒炙各一兩半 牛膝 一兩

陳皮 半兩

右為末姜汁糊丸或酒糊丸每服七十九白湯下

補天丸 治氣血俱虛甚者以此補之多與補腎丸並行

若治虛勞發熱者又當以骨蒸藥佐之

紫河車淨洗用布繳乾同前補腎丸搗細焙碾末酒

米糊丸夏加五味子半兩

虎潛丸 治痿與補腎丸同

黃柏 酒炒

龜板 酒炙

知母 酒炒

熟地

陳皮 各二兩

瑣陽 一兩

虎骨 炙一兩

乾姜 半兩

白芍藥 二兩

右為末酒糊丸或粥丸 一方加金箔一片 一方用

生地黄懶言語加山藥炒黃柏知母炙龜板各等分乾

姜三分之一酒糊丸名補血丸 一方無乾姜冬月方

加有當歸一兩半熟地比前多一兩餘同

補虛丸

人參

白朮

山藥

枸杞

瑣陽各等分

右為末麵糊丸如梧子大每服五十九空心鹽湯下

湯藥 補心肝脾腎

蓮肉 去心

枸杞

山藥 炒

瑣陽 各等分

右為細末沸湯調服若加酥油些少尤妙

補陰丸

側柏

黃栢

烏藥 各二兩

龜板 酒炙五兩

苦參 三兩

黃連 半兩

冬加乾姜夏加縮砂

右為末地黃膏丸梧桐子大每服五十九滾水下

又方

黃栢 半兩酒炒

知母 酒浸

熟艾 各三兩

龜板 四兩酒浸炒

白芍藥 炒

陳皮

牛膝 各二兩

瑣陽

當歸 各一兩半

虎骨 一兩酒浸斷炙

右為末酒煮羊肉為丸每服五十九鹽湯下冬加乾姜

半兩

又方

下甲 二兩

黃栢 炒

牛膝

人參 各半兩

香附

白芍藥 各一兩

甘草 二錢

砂仁 三錢春不用

右為末酒糊丸如梧子大每服五十九空心鹽湯下

又方

下甲 二兩

黃栢 一兩

右細切地黄酒蒸熟搗細丸

又方

龜板酒炙

黃柏半兩

知母三錢

五味子二錢

右為末酒糊丸如梧子大每服五十九空心鹽湯下

又方

白朮

白芍藥

人參

蓮肉

知母

黃柏各等分

右為末酒糊丸朱砂為衣空心鹽湯下一百丸

又方

治抑結不散

下甲五兩

側柏一兩半

香附三兩

右為末姜汁浸地黄膏為丸如梧桐子大空心鹽湯下

七八十九

加減補陰丸

熟苳八兩

兔絲子四兩

鹽酒

當歸酒浸

白芍藥炒

瑣陽各

各

杜仲三兩

炒

牛膝四兩

酒浸

破故紙

枸杞各一兩半

虎骨二兩

炙

龜板三兩

炙

黃柏

山藥

人參

黃芪各二兩

冬加乾姜一兩

右為末猪骨髓入蜜丸梧子大空心鹽湯下一百丸

三補丸

治上焦積熱泄五臟火

神機 小治陰虛者之一方 四十一 三百五十五

黃芩 黃栢 黃連各等分

右爲末蒸餅丸如梧桐子大每服五十九丸食遠白湯下
一方 治酒色過傷少陰

黃栢兩少半 黃連兩少 條芩兩少半 龜板酒炒黑
冬加乾姜炒黑 夏加砂仁三錢 五味子錢

右爲末蒸餅丸如桐子大每服三十九丸食前白湯下
一方 治陰虛

人參一錢 白朮二錢 麥門冬半兩 陳皮一錢
右剉作一服水煎吞補陰丸

一方 治體弱肌肥血虛脉大

龜板二兩 側柏七錢半 生芩一兩 白芍藥炒
烏藥葉酒浸七錢半

右除生芩細切熬膏餘皆作末同搗爲丸以白朮四錢
香附一錢半煎湯下

一方 益少陰經血解五臟結氣

山梔子炒令十分有 右爲末以姜汁入湯煎飲之此方甚驗於他也

五補丸 枸杞子 瑣陽各半 續斷 蛇床子炒各
兩頭尖二錢半

補員 去付餘卷之七 四十一 三百五十五

右爲末酒糊丸桐子大每服三十九淡鹽湯下
瑣陽丸

龜板炙

知母酒炒

黃柏酒炙各

虎骨炙

牛膝酒炙

杜仲姜炒

瑣陽酒浸各

破故紙

續斷酒浸各當歸

地黃各

右爲末酒糊丸梧子大每服五十九

○諸補命門藥須入血藥則能補精陽生陰長故也陽藥若多則散火

補心丸

硃砂二錢五分

瓜蔓五錢

黃連三錢

歸身尾三錢五分

右爲末猪心血爲丸如菜豆大食後白湯下三十九
又方 寧心益智

人參

茯苓

茯神

牡蠣

酸棗仁

遠志

益智各半兩

辰砂二錢半

右爲末棗肉丸如菜豆大每服三十九食後白湯下
大補陰丸 降陰火補腎水

黃柏炒褐

知母酒浸各熟艾酒蒸

龜板酥炙各

右爲末猪脊髓和蜜丸桐子大每服七十九空心淡鹽

湯下

濟陰丸

補

補

補

補

黃栢二兩七錢
鹽酒拌炒

龜板錢多一兩三
錢五分

陳皮七錢 當歸一兩
酒浸

知母一兩
酒炒 虎骨七錢
酥炙

瑣陽一兩 牛膝一兩三
錢半

山藥 白芍藥

砂仁 杜仲炒斷
絲

黃芪各七錢
鹽水拌炒

枸杞五錢 熟芋七錢

破故紙三錢
半炒

兔絲子酒浸一兩
二錢半

右為末以地黃膏為丸如梧子大每服七十九粒湯下
克按丹溪書並無補損專條諸補陰藥兼見于各症
之下楊氏類集于此又取燥熱與陽諸方混於其間
殊不知丹溪之補乃滋陰益血之藥與燥烈壯陽之

劑其意天壤懸隔今故去之不復錄也

附諸賢論

王節齋先生曰男子陰痿不起古方多云命門火衰精氣
虛冷固有之矣然亦有鬱火甚而致痿者經云壯火食
氣譬如人在夏暑而倦怠痿弱遇冬寒而堅強也予嘗
親見一二人腎經鬱火而有此証令服黃栢知母清火
堅腎之藥而効故須審察不可偏認作火衰也

附諸方

補陰丸 明醫雜著 論曰人之一身陰常不足陽常有餘况

節慾者少過慾者多精血既虧相火必旺火旺則陰愈

消而勞瘵咳嗽咯血等症作矣故宜常補其陰使
 與陽齊則水能制火而火亦不降斯無病矣故丹溪先
 生發明補陰之說謂補陰者乃腎水也古方滋補藥皆
 兼補右尺相火不知左尺原虛右尺原旺若左右平補
 依舊火勝於水只補其左制其右庶得水火俱平也右
 尺相火固不可衰若果相火衰者方宜補火但世之人
 火旺而致病者十居八九火衰成疾者百無二三且人
 在少年腎水正旺似不必補然慾心正熾妄用太過至
 於中年慾心雖減然少年虧損既多焉得復實及至老
 年天真漸絕只有補陽故補陰之藥自少以至老不可
 缺也丹溪先生發明先聖之旨以正千載之訛其功甚
 哉今立補陰丸方備加減法于後

黃栢去皮酒拌炒

知母去皮土酒拌炒

敗龜板酥炙透

熟地黄酒拌蒸

瑣陽酥炙乾 五味子一兩

枸杞子茸州 天門冬去心

白芍藥酒炒各

乾姜炒紫色三錢寒

右爲極細末煉淨蜜和入猪骨髓二條和藥末杵極勻
 丸如梧子大每服八九十九空心淡鹽湯送下寒月可
 用溫酒下

愚按乾姜宜換作肉桂蓋肉桂引諸藥入腎又和知母黃栢爲從治法也

若有夢遺精滑病者加牡蠣童便煅七次 白朮各一兩

山茱萸去核 椿根白皮炒過各七錢

若有赤白濁病者加白朮白茯苓各二兩半

山梔仁黃連各炒各五錢

若有軟弱無力者加牛膝酒洗 虎脛骨酥炙透

防己酒浸 木瓜各五錢

若有疝氣病加蒼朮蓋炒一兩半 黃連生姜汁炒

山梔子仁炒各六錢 川芎一兩 吳茱萸炒

青皮去穢各五錢

若脾胃虛弱畏寒易泄者加白朮三兩 陳皮一兩

乾姜炒加至七錢

其眼目昏暗者加當歸酒洗 川芎菊花各一兩

柴胡黃連酒炒 烏犀各五錢

蔓荊子防風各三錢

其兼氣虛之人加入參黃芪蜜炙各二兩

其右左尺既虛右尺亦微命門火衰陽事不舉加黑附子

小便浸 肉桂去皮各七錢 沉香五錢

金匱腎氣丸 即六味地黃丸

治形體瘦弱無力多困腎氣久虛久新憔悴寢汗發熱
一五臟齊損遺精便血消渴淋濁等証及婦人血虛無子

者服之有效

乾山藥

山茱萸肉各四兩

澤瀉去茛

牡丹皮

去心白茯苓去皮各二兩

熟芋八兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五六十九空心白湯下寒月溫酒下如腎虛有飲作淡唾生薑湯下

○廣按腎惡燥而脾惡濕前補陰藥中多是濕藥若只腎虛而脾胃壯實者宜服苟脾胃兩虛則不可服也惟此六味地黄丸及八味丸八物腎氣丸雖專補腎虛又兼理脾胃不濕不燥而於脾胃兩虛者甚得其宜也矣

八味丸 治腎氣虛之下元冷備臍腹疼痛夜多漩溺脚膝緩弱肢體倦怠面皮痿黃或鴛翼及虛勞不足渴欲飲水腰重疼痛小腹急痛小便不利

熟芋八兩

澤瀉

牡丹皮

白茯苓各三兩

山茱萸肉

山藥各四兩

附子炮

桂心各一兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五十九溫酒送下或淡鹽湯送下婦人淡醋湯送下空心服

○廣按六味地黄丸專補左尺腎水之藥八味丸既補左尺腎水兼補右腎相火之藥少年水虧火旺宜服六味地黄丸老年水火俱虧宜服八味丸况老年腎

臟真水既虛邪水乘之而為濕熱以作腰痛足痿痰唾消渴小便不禁淋閉等証非桂附之溫散而能治之之手

八物腎氣丸 平補腎氣堅齒駐顏

熟羊半斤 山茱萸肉各四兩 山藥各四兩 澤瀉

牡丹皮 白茯苓各三兩 五味子各一兩 桂各一兩

右為末蜜丸服六七十丸空心白湯下

三一腎氣丸古菴方補心腎諸臟精血瀉心腎諸臟火濕

○廣按人之一身陽常有餘陰常不足氣常有餘血常不足故滋陰補血之藥自幼至老不可缺也古方如

腎氣丸固本丸補陰丸俱是滋陰補血之劑然固本丸胸滿有痰者忌之補陰丸脾虛有濕者忌之惟腎氣丸專於補血滋陰而兼理痰濕最為切當但品味數少不足以盡其變今廣將三方合而為一略用加減名曰三一腎氣丸其間補瀉兼施庶乎可也

熟地黃 生地黃 山藥俱懷慶者

山茱萸肉各四兩 牡丹皮 赤白茯苓

澤瀉 瑣陽 龜板各三兩 牛膝川者

枸杞子甘州者 人參遼 麥門冬 天門冬各二兩

知母 黃柏 五味子遼 肉桂各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十九漸加至
六七十丸空心淡鹽湯下或溫酒下 虛甚加鹿茸一
兩虎脛骨一兩

此藥其間有補有瀉其故何哉夫五臟藏精血者也精
血一虛邪水乘之而爲濕熱補者所以補其精血也瀉
者所以瀉其濕熱也世人徒知五臟精血虛而生火殊不知五臟精血虛而邪火得以乘之此方既用知母黃
柏以瀉火又用茯苓澤瀉以滲濕充爲備也

補腎丸 有効無燥

熟苧 八兩

兔絲子

酒浸 八兩 歸身 三兩

肉苁蓉

酒浸 五兩

破故紙

酒炒 半兩

山茱萸肉

三兩

黃柏

酒炒 褐色

知母

酒浸 炒各一兩

右爲末酒糊丸梧子大每服五十九空心服

滋血百補丸

熟苧

酒蒸

兔絲子

酒蒸 各半斤

當歸

酒浸

杜仲

酒炒 各四兩

知母

酒浸

黃柏

酒炒 各二兩

沉香

一兩

右爲末酒糊丸如梧桐子大每服五十九空心鹽湯下

沉香百補丸

熟苧

六兩

兔絲子

四兩

杜仲

炒 三兩

知母

炒

黃柏

酒炒

人參

各二兩

山藥

當歸

茯苓各三兩 沉香一兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十九空心鹽湯下
滋腎百補丸

當歸酒浸四兩 知母酒浸二兩 沉香五錢 黃柏酒炒

山藥 菊花 楮實各二兩 青鹽炒一兩

兔絲子酒炒四兩 杜仲炒二兩 熟苧八兩

右為末酒糊丸或煉蜜丸桐子大空心白湯下五十九
○廣按已上三方兼補右尺之藥也

人參固本丸 簡易方 夫人心藏血腎藏精精血充實則鬚
髮不白顏貌不衰延年益壽其天闕者多由服性熱之

藥不能滋生精血也而藥之滋補精血者無出於生熟
二地黃世人徒知服二地黃而不知服二門冬為引也
蓋生地黃能生心血用麥門冬引人所生之地熟地黃
能補腎精用天門冬引入所補之地四味互相為用本
草又以人參為通心氣之主故宜加焉

生地黃 熟地黃各酒洗浸 天門冬去心酒浸 麥門冬去心酒浸

各二兩 人參一兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五十九空心溫酒淡
鹽湯任下 如有痰者生熟地黃各用姜汁炒過恐泥
隔故也

鹿栢固本丸

鹿角霜

半斤以角之新者裁寸入布囊置長流水中七日鹿角水煮每角一斤入黃蠟半斤銜口用露酒一壺掩之別沸流水旋添勿令下竭桑柴火足十二待其角軟矣用竹刀切去黑皮取白者春

黃栢 一斤酒一製乳

天門冬

四兩去心酒浸

麥門冬

四兩同上製

生地黄

四兩酒洗浸

熟地黄

四兩酒洗浸

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五七十九溫酒送下不飲酒白湯下

玄兔固本丸

生地黄

酒浸

熟地黄

酒浸蒸俱不犯鐵器

天門冬

去心

麥門冬

去心

五味子

去枝核神

各四兩

蓮肉

人參

去芦

枸杞子

各二兩并州者佳

乾山藥

白者微炒

三兩

兔絲子

一斤酒煮數沸搗爛壓作餅晒乾淨秤八兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五十九漸加至八九十九空心滾白湯下或淡鹽湯下溫酒下俱可

冷補丸 濟生方 治腎水燥少不受峻補口乾多渴目暗耳

聾腰痛腿軟小便赤澁大便或秘

天門冬

去心

麥門冬

去心

生地黄

酒洗

川牛膝

白芍藥

地骨皮

石斛

去根

玄參

沉香

另研

不熟乾地黄

酒蒸磁石

火焙七次研水飛過各等分

右爲末煉蜜丸如梧子大每服七十九空心鹽湯酒下
○廣按此方云冷補丸者蓋因當時不明心屬火而惡
熱腎屬水而惡燥反用熱燥之藥見傷之意也

明目益腎丸

枸杞甘州者

當歸

兔絲子

生芋

各一兩俱酒浸

五味子半兩

知母

黃栢酒炒各七錢

茯神

一兩

山藥

巴戟去心

人參

甘菊

天門冬

去心各五錢

右爲末煉蜜丸如梧子大空心鹽湯下五十九

三才封髓丹 降心火益腎水

天門冬去心

熟地黃酒洗人參各五錢

黃栢炒褐色三兩

砂仁一兩半

甘草七錢半一方無

右爲末水糊丸如梧子大每服五十九用茯苓半兩切
作片子酒一盞浸一宿次日煎三四沸去粗空心下

古庵心腎丸

論曰予嘗見年高之人有患其無子者有惡其白髮者
予謂之曰無子責乎腎髮白責乎心何則腎主精精盛
則孕成心主血血勝則髮黑今也嗜慾無窮而虧其本
然之真憂慮太過而損其天然之性心君火也腎相火
也君火動而相火翕然從之相火動則天君亦瞽亂而

不寧矣是二者有相須之道焉夫髮白者古方皆責之於心蓋以心之所藏者神神之所附者血血之所動者火也心火動則血沸騰血沸騰則神不安神不安則夢寐紛紜而髮漸白矣雖然天地間不過陰陽五行而已五行有相生者有相制者今心火上炎由乎腎水虧之不能制耳是髮白不獨由於心也夫無子者古方皆責之於腎蓋以腎之所藏者精精盈則有子精虧則乏嗣耳今腎精之妄泄由乎心之所逼而使之然是無子不獨由於腎也予雖不敏粗具一方補血生精寧神降火庶幾無治

熟棗

生棗

山藥

茯苓三兩木各

山茱萸酒浸

龜板酥炙

枸杞子甘州者

牛膝去芦各

牡丹皮去心

鹿茸火去毛

當歸去芦

澤瀉去毛

黃柏炒褐色

辰砂為衣

生甘草非兩

黃連去毛

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九漸加至一百九空心溫酒或淡鹽湯任下辰砂為衣不遍再加一兩

法曰心惡熱腎惡燥此方補精益血清熱潤燥治心腎

之聖藥也不獨施於髮白無子二者其驚悸怔忡遺精盜汗目暗耳鳴腰痛足痿諸症無不治也

五精丸 澹寮方 治腎虛痿弱大補元氣

秋石 剛硬者 鹿角霜 茯苓 去皮 陽起石

山藥 各等分

右為末酒糊丸如梧子大每服五十丸須要常近火邊使乾燥庶幾服之無戀隔之患

鹿峻丸 鹿稟純陽一名班龍峻者天地初分之氣牝牡

相感之精也醫書稱鹿茸角血髓大補元氣于人此峻則入神矣 其法用初生牡鹿三五隻苑圍馴養每日以

人參煎湯同一切料草任其飲食久之以硫黃細末和

入從少至多燥則漸減周而復始大約三年之內一旦毛脫筋露氣勝陽極別以牡鹿隔苑誘之欲交不得或

洩精于外或令其一交即設法取其精置磁器內香粘如飴是峻也 隨人所宜補藥古方如六味地黃丸八

味丸補陰丸固本丸之類以此峻加陳蜜三分之一同和丸劑或和鹿角霜一味為丸空心鹽酒送下用起虛

療危疾尤捷予之軀羸賴此再造願與人人共之

異類有情丸 此方并前方四

鹿角霜 製法見前鹿相固本丸下 龜板 八字文異者醇酒浸

此方并前方四 韓飛霞作也 龜板八字文異者醇酒浸 酥炙透黃為末

鹿茸

新如紫茄者薰乾酒洗數過酥炙炭火令透為細末

虎脛骨

新而真者長水浸七日蜜酥和炙令透為細末

右霜板末各三兩六錢茸脛末各二兩四錢重羅極細火煉白蜜入獾猪脊髓九條同春劑為丸每空心鹽湯下五七八十九周而復始丈夫中年覺衰者便可服餌此方鹿純陽也龜虎陰也血氣有情各從其類非金石草木例也如厚味善飲之人可以猪膽汁一二合于和劑中以寓降火之義

○廣按丹溪補損條中多主滋心血而補腎精為事夫心惡熱而腎惡燥故凡執燥之藥皆損心腎而虧精血也今附已上訪方皆是補精益血清熱潤燥之劑或專補腎或兼補心或補腎左尺或兼補腎右尺在人分而用之

○諸虛 新增

附脉理

脉理提綱曰氣虛脉細或緩而無力右手弱血虛脉大或數而無力左手弱陽虛脉遲陰虛脉弦真氣虛脉緊指男子久病氣口脉弱則死強則生女人久病人迎脉強則生弱則死

附諸方

四君子湯和劑方 補氣和胃進食

白朮

人參

茯苓

甘草 各等分

右咬咀水煎服

○廣按四君子湯用白朮人參茯苓甘草者白朮則健脾燥濕人參則補肺扶脾茯苓則降氣滲濕甘草則補胃和中譬如寬厚和平之君子而不為奸險卒暴之行也和劑云等分愚以為藥之君臣劑之大小又人之所處何如也

四物湯和劑方 補血和血調經

當歸

白芍藥

地黃婦人用生 男子用熟

芍藥 各等分

右咬咀水煎服

○廣按四物湯用當歸芍藥地黃芍藥者當歸則和血歸經芍藥則涼血補腎生辛則生血寧心孰辛則補血滋腎芍藥則行血通肝其性不同所治亦異和劑云等分愚以為隨其所在而輕重之度得通變之道也

○王節齋曰氣虛補氣用四君子湯血虛補血用四物湯虛甚者俱加孰附子蓋四君四物皆和平寬緩之劑須得附子健悍之性行之方能成功附子熟藥本

不可輕用但常病則雖在暑熱時月亦可用也予嘗
治一僕人五月間病熱口渴唇乾讖語診其脉虛細
而遲用四君子湯加黃芪當歸芍藥熟附子進一服
愈甚狂言狂走或曰附子差矣脉之如舊仍增附子
進一大服遂汗出而熱退脉還四至矣又嘗治一婦
人亦夏間病熱初用和調氣血兼清熱和鮮之劑服
三二服不應執俞盛舌上焦黑膈間如火漱水不嚥
診其兩手脉皆虛而遲右手微甚六七日內謔語撮
空循衣摸床諸惡証俱見後用四物湯加黃芩人參
白朮陳皮麥門冬知母熟附子服之一二時汗出而

熱退次日復熱再進一服又退又次日復發知其虛
極也遂連進十服皆加附子脉復始而病安

八物湯 平補氣血調和陰陽

白朮

人參

茯苓

甘草

當歸

白芍藥

地黃

川芎

右收咀水煎服

十全大補湯 和劑方 治男子婦人諸虛不足五勞七傷此

藥性溫平補常服生血氣壯脾胃

白朮

去芦

人參

去芦

茯苓

去皮

甘草

當歸

酒洗

白芍藥

酒浸

地黃

酒洗

蒸焙

川芎

黃芪去芦 肉桂去皮各

右為粗末每服五錢水一盞半生姜三片棗二枚煎至八分温服

雙和湯和劑方 治男子婦人五勞七傷血氣不足面色痿

黃四肢倦乏將為虛勞之証常服養氣益血

白芍藥上兩 當歸酒浸 熟地黄酒洗 黃耆去芦

川芎去芦各 甘草炙 肉桂去皮不見火各

右吹咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心温服

雙和散板粹方 補益血氣治虛勞少力

黃芪去芦 熟地黄 當歸去芦 川芎各一兩

官桂去皮七 甘草七分半 人參二錢 白芍藥去七

右吹咀每服五錢水二盞生姜三片棗一枚煎至八分

去粗温服大病之後虛勞氣乏者宜此

太真丸御藥院方 治一切亡血過多形容枯槁四肢羸弱

飲食不進腸胃滯泄津液枯竭久服生血補氣暖胃駐

顏

羊肉七斤精者為妙先去筋 肉蓯蓉一兩

濕山藥去皮 當歸十二兩去 天門冬去心焙

右四味為末置之羊肉內裹定以麻縷纏縛用無灰好

酒四瓶煮令酒盡再入水二升又煮直候肉爛如泥再入黃耆末五兩人參末三兩白朮二兩熟糯米飯焙乾為末將前後藥末同劑為丸如梧子大一日二次服二百粒温酒送下須以漸而進如覺難丸入蒸餅五七枚焙乾為末同入臼杵千百下丸之

養血當歸地黃湯 按粹方治病久血氣漸虛邪氣入胃和氣養血

芍藥 當歸 川芎 地黃

藁本 防風 白芷 各一錢 細辛 七分

右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去粗食後温服

黃耆建中湯和劑方治男子婦人諸虛不足羸乏少力此藥大生血氣補益榮衛

黃芪 去芦 肉桂 去皮各三兩 白芍藥 六兩 甘草 參 二兩

右吹咀每服五錢水一盞半姜三片棗一枚同煎八分

服一法用炒浮小麥煎去粗入錫少許再煎令溶稍熟服虛甚加熟附子

十四味建中湯和劑方治榮衛失調血氣不足積勞虛損形體羸弱短氣嗜卧欲成勞瘵

當歸 酒焙 白芍藥 白朮 麥門冬

黃芪 炙 甘草 肉蓯蓉 酒浸 人參 去芦

川芎

肉桂 去皮

附子 炮去皮臍

半夏 湯洗

熟地黄

酒浸焙

茯苓 去皮各等分

右咬咀每服五錢水一盞半姜三片棗一枚煎至八分

去粗空心温服

未病蓮心散

簡易方

治虛勞或大病後心虛脾弱盜汗遺

精

人參

白茯苓

蓮肉 各一兩

白朮

甘草 炙

白扁豆 炒

薏苡仁 炒

北桔梗 炒

黃耆 炒

當歸 各半兩

桑白皮

百合

半夏 麩

乾姜 炮

山藥 炒

五味子

乾葛 炒

木香

丁香

杏仁 炮去皮大

白芷

神麩 炒各一兩

右咬咀每服五錢水一盞姜棗同煎空心温服

黃耆益損湯 直指方治諸虛勞倦

官桂

熟地黄

半夏 製

甘草 炙各三錢

石斛 酒浸

當歸

川芎

黃耆 炙

白朮 各一兩

白芍藥 一兩半

北五味子 半兩

木香 三錢

右咬咀每服一兩水二盞姜五片棗二枚有熱加此木胡

煎至一盞通口服

○已上諸方治氣血新虛之劑

鹿茸大補湯和齋方 治男子諸虛不足婦人亡血一切虛損

鹿茸酒洗數遍去鹽炭火炙令透為細末 黃耆洗 當歸洗

白茯苓各一兩 白芍藥 白朮

附子炮 人參 肉桂 半夏

石斛各一兩半 甘草半兩 肉蓯蓉酒浸

杜仲炒斷絲

右咬咀每服四錢姜三片棗一枚水一盞煎七分去粗

空心熱服

究原雙補丸簡易方治一切虛損五勞七傷面色黧黑唇

口乾燥目暗耳鳴夜夢驚恐四肢酸疼煩熱盜汗

鹿角霜三兩 熟地黃酒洗 沉香 羌活酒浸

覆盆子去枝蒂 白茯苓去皮 人參去芦 宣木瓜蒸焙

黃耆炙 杜從蓉酒浸 五味子去枝

石斛去根 當歸去芦 澤瀉切塊再蒸

麝香一錢 硃砂半兩 別研石研為衣

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九空心鹽湯鹽酒

任下

寃原心腎丸簡易方理水火不既濟心忪盜汗夜夢遺精

目暗耳鳴腰膝緩弱常服調陰陽補心腎

牛膝 酒浸 熟地黄 酒洗 茯苓 酒洗各二兩 人參 去芦

鹿茸 火去毛 附子 炮去皮臍 遠志 去苗甘草水炙去骨

白茯苓 去木 黃芪 蜜炙 山藥 炒 當歸 酒去芦

龍骨 各一兩 兔絲子 酒浸蒸燥

右為末用浸藥酒煮麵糊丸如梧桐子大每服七十九空心麥湯下

○廣按此方補虛溫寒燥濕蓋為虛中有寒者設也然虛中有熱者又當以古庵心腎丸治之

瑞蓮丸 經驗方 定心煖腎生血化痰

蒼朮 主脾一兩 米泔 浸四兩 主用四兩

枸杞子 主肝二兩 北五味子 主肺二兩

蓮肉 主心一兩 去心皮酒浸軟猪肚內煮極爛取出焙乾為膏每一斤納猪肚二箇

熟地黄 主血二兩 破故紙 主脾二兩

右為末煮猪肚膏同酒糊丸如梧桐子大空心溫酒下四五十九

說說書從蓉丸 簡易方 治丈夫稟受氣血有偏勝者氣勝

血則陽盛宜服此藥和陽助陰

熟地黄 酒浸洗蒸一兩 紫巴戟 嫩鹿茸 酥炙

龍齒 各一兩 川當歸 洗焙一兩 人參 去芦

石蓮肉 肉苁蓉 洗焙 北五味子 嫩黃芪 蜜炙

白茯苓

各一兩

兔絲子

蒸二次研一兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九溫酒鹽湯任下

鹿茸四斤九和劑方治肝腎虛損之極以致筋骨痿弱不

能自持起居無力足膝酸疼肌體瘦悴氣血不生

肉苁蓉

酒浸

天麻

兔絲子

酒浸

牛膝

酒浸

熟地黄

杜仲

酒浸

鹿茸

去毛

乾木瓜

各等分

右為末蜜丸如梧桐子大每服五十九米湯或酒空心下

五味子丸

本事方

理肝腎俱虛收斂精氣補真陽止虛汗

益智仁

炒

肉苁蓉

酒浸

川巴戟

去心

人參

去芦

五味子

去枝

骨碎

補去

土茴香

白朮

覆盆子

白龍骨

熟地黄

兔絲子

牡蠣

童便煨

滓七

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心米湯下

援粹方名巴戟丸

○廣按此方專為遺精盜汗已久虛脫者設也

金櫻丹

御藥院方

治男子去血失精婦人半產漏下五勞

七傷衰憊之極身體瘦削四肢困乏虛勞骨蒸等疾

金櫻

仙朮

生地黄

仙靈皮

格取

木香

肉苁蓉

酒浸

兔絲子

酒浸

牛膝

酒浸

生雞頭肉

乾丁香

生蓮子肉

乾山藥

麝香別研

栢子仁別研

人參

茯苓去皮

陳皮去白

菖蒲各一兩

右將兔絲子已下同為細末入栢子仁并白沙蜜入銀石器中於爐內置熟火五斤煉蜜微解入童男母乳汁二升以筴攪次入上項膏汁同攪勻勿令住手傾入藥末一處熬攪至火消續續緩添熟火勿令火緊熬至膏成取出就於銀石器中候稍溫入射末一處搜和成劑更於石臼中杵千餘下每兩作十丸每服一丸空心細嚼酒下

無比山藥丸和劑方治諸虛百損五勞七傷肌體消瘦耳

聾目暗常服壯筋骨益腎水

赤石脂

茯神去皮

巴戟去心

澤瀉

乾熟地黄酒蒸

山茱萸肉各一兩

山藥三兩

牛膝一兩

杜仲去皮炒

兔絲子酒浸各三兩

菴蓉酒浸四兩

五味子煉六兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十九丸空心溫酒下

還少丸楊氏方大補真氣虛損肌體瘦悴目暗耳鳴氣血

凝滯脾胃怯弱飲食無味

乾山藥

牛膝酒浸一宿焙乾各一兩半

白茯苓去皮

山茱萸肉

楮實子

杜仲去皮姜汁和酒炙香

五味子

肉蓯蓉酒浸

巴戟去心

遠志去心

茴香各一兩

石菖蒲

枸杞子

熟芩燒焙各半兩

右爲末煉蜜爲丸入蒸熟棗肉和勻丸如梧子大每服五十九空心溫酒鹽湯下

是齋雙補丸

簡易方

平補氣血不燥不熱

熟地黄半斤補血

兎絲子半斤補氣

右爲末酒糊丸如梧子大每服七十九人參湯下

氣不順沉香湯下

心氣虛茯苓湯下

心氣煩熱不

得睡酸棗仁湯下

腎氣動茴香湯下

小便少車前

子湯下 小便多益智湯下

小兎絲丸

治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺精

又云心腹脹滿脚膝酸疼小便滑數股內濕痒水道澀

痛小便出血時有遺瀝並宜服之

石蓮肉二兩

兎絲子酒浸五兩

白茯苓一兩

山藥二兩七錢打糊

右爲末山藥打糊丸如梧子大每服五十九空心鹽湯

下脚無力木瓜湯下

葉氏十補湯

簡易方

治諸虛不足安益心腎

沉香

木香

半夏湯泡七次

白芍藥各一兩

當歸酒浸一宿

黃耆蜜炙

生乾地黄洗

茯神去木各半兩

肉桂去皮四錢

北五味子

酸棗仁炒

陳皮去白各三錢

天台烏藥 麥門冬去心 人參 白木各二錢半

右吹咀每服五錢水一盞姜三片棗二枚煎七分去粗

服

返本丸 補諸虛百損

黃健牛肉

不拘多少去筋膜切片以河水洗數遍令血水盡仍浸一宿次日再洗一二遍水清為度用無灰好酒入磁器內重泥封固桑柴文武火一晝夜取出如黃沙為佳焦黑無用焙乾為末每用末半斤為則用

山藥

葱鹽炒去葱鹽 蓮肉去心葱鹽炒去葱鹽

白茯苓去皮

小茴香

微炒各四兩

右為細末和勻用好紅棗不拘多少蒸之候爛剥去皮

核研為膏加好酒入前藥和劑為丸如梧子大晒乾空心溫酒下五十九日進三服又服止一服切忌用麵糊米飲之類為丸不効

海藏大五補丸 補諸虛不足

天門冬

麥門冬各去

茯苓去木

菖蒲

人參

益智

枸杞子

地骨皮

遠志

熟下各等分

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心酒下三十丸

茸珠丸 澹寮方

昔西蜀藥市中嘗有黑髮未頰道人每大醉高歌厲聲曰龍鬪不禁滄浪竭九轉靈丹都莫說惟

有斑龍頂上珠能補玉堂閣下血即貨此藥也朝野遍傳一名斑龍丸

鹿角膠炒珠 鹿茸去皮毛切片酥炙 鹿角霜

陽起石煨研 大附子別研 當歸 地黃蒸火焙

辰砂別研 肉苁蓉 酸棗仁去殼 黃芪蜜炙

栝子仁去殼各三錢 同棗仁搗膏

右為細末酒煮麵為丸如梧子大每服五十丸空心溫酒鹽湯任下

養氣丹 治諸虛百損真陽不固氣不升或發喘促

方見風熱

○廣按古人補虛方中多是燥熱之藥蓋為虛中生寒者設也然虛中生熱者十常八九而虛中生寒者百無一二世俗好溫而惡寒好甘而惡苦用藥處方故至於斯不可盡棄謹錄可用者於右中間有用附子者此又甚焉然肥白人陽虛氣虛脾虛有濕衰老人命門火衰陽事不舉脉沉細而遲者又不可舍附子也

降心丹 和劑方治心腎不交盜汗遺精及服熱藥過多上感下虛小便赤白濁常服鎮心益血

熟乾地黃酒浸焙 天門冬去心 麥門冬去心

乾三兩 三兩 三兩

人參

茯神 去木

山藥

茯苓 去皮

遠志

甘草煮去
骨各一兩

當歸 去芦

肉桂 去皮各
半兩

朱砂

半兩別
研為衣

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十九人參湯下

平補鎮心丹 和劑方 治心血不足時或怔忡夜多異夢如

墮層崖常服安心腎益榮衛

白茯苓

去皮

五味子

去梗

車前子

茯神 去皮

肉桂

各一兩

麥門冬

去心各一兩
二錢半

天門冬

山藥

洗姜
製

熟苧

酒蒸

遠志

去心甘草煮
各一兩半

人參

去芦
五錢

龍齒

半兩

朱砂

半兩另
研為末

酸棗仁

去皮炒
三錢半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心米飲温

酒任下

十四友丸 和劑方

治心腎虛損神志不寧

白茯苓

白茯神 去木

酸棗仁 炒

人參 各一兩

龍齒

別研
二兩

阿膠

蛤粉
炒

黃芪

遠志 酒湯浸
去心焙

當歸

酒洗

熟地黄

柏子仁 別研

肉桂

紫石英

別研各
一兩

辰砂

別研
一錢

右為末同別研四味細末煉蜜為丸如梧桐子大每服

三十九食後棗湯下

天王補心丹 寧心保神益血固精壯氣力強志令人不
忘清三焦化痰涎去煩熱除驚悸瘵咽乾育養心神

熟地黄 白茯苓 人參 遠志去心

石菖蒲 玄參 栢子仁 桔梗

天門冬去心 丹參 酸棗仁炒 麥門冬去心

牛草炙 百部 五味子 茯苓

當歸 杜仲姜汁浸炒斷絲

右各等分為細末煑蜜為丸每兩作十九金箔為衣每
服一九用燈心棗湯化下食遠臨卧服或作小丸亦可
○廣按已上四方兼治心腎二經之藥已下諸方獨治

心經之藥也

妙香散 治男子婦人心氣不足精神恍惚虛煩少睡夜
多盜汗常服補益氣血安鎮心神 方見發熱類

寧志膏和劑方 治心氣虛耗神不守舍恐怖驚惕恍惚健
忘睡卧不寧夢涉危險一切心疾並皆治之

乳香盆五錢坐水 辰砂研細水

酸棗仁炒去皮取 人參取末

右和勻煉蜜丸如彈子大每服一九温酒棗湯下

茯苓補心湯 治心虛耗不藏精血以致面色黃悴五心
煩熱咳嗽唾血及婦人懷妊惡阻嘔吐亦服之方見咳血

麥門冬去心各一兩

細辛半兩

天麻

半夏麴

南星炒黃

白附子生各一兩

右為末用生姜五兩取汁入水煮糊丸如菉豆大別以

朱砂為衣每服二十九夜卧生薑湯下

鎮心丹濟生方治男婦人心氣不足神志不寧一切心

疾並皆治之

遠志甘草煮去心

熟地黄酒洗

新羅人參

木鱉子炒去殼

白朮各五兩

麥門冬去心

當歸去芦酒焙

石菖蒲

石蓮肉炒去心

黃芪去芦

茯神去木

栢子仁揀淨

茯苓去皮

益智仁各三兩

朱砂五十兩

右將人參等十四味各如法修製剉碎拌勻次將朱砂

袞和以夾生絹袋盛貯用麻線緊繫袋口却用瓦鍋一

口盛水七分重安銀罐一箇於鍋內入白沙蜜十斤將

藥袋懸之中心不令着底使蜜浸過藥袋以桑柴火燒

令滾沸勿使火歇煮三日蜜焦黑再換蜜煮候七日足

住火取出淘去衆藥洗淨朱砂令乾入牛心內入白沙

蜜於重湯內蒸如湯乾復以熱水從鍋弦添下候牛心

蒸爛取砂再換牛心如前法蒸凡七次其砂已熟即用

湯水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研至十分細米糝為丸如

豌豆大陰乾每服二十九食後人參湯棗湯麥門冬湯

任下

○廣按本草云此物鎮養心神但宜生使煉服則有毒
少有不作疾者以此觀之反不如生使之為愈也

一方 治心氣虛損 百一選方

猪腰子一枚用水二椀煮至一椀半將腰子細切入人
參半兩當歸身半兩同煎至八分將腰子吃以汁送下

又服為妙也

補心神効丸 百一選方

黃芪焙炙

茯神去木

人參去芦

生乾地黄

遠志去心

柏子仁

酸棗仁炮七次

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九丸米飲溫酒下

盜汗不止浮麥湯下 亂夢失精人參龍骨湯下 卒

暴心痛乳香湯下 虛煩發熱麥門冬湯下 吐血人

參湯下 大便下血當歸地榆湯下 小便出血茯苓

車前子湯下 中風不語薄荷生姜湯下 風癩涎潮

防風湯下

八物定志丸 按粹方 補益心神安定魂魄去邪熱治風痰

人參一兩

石菖蒲

遠志去心

茯苓去皮

茯神去心

朱砂一錢

麥門冬去心

白朮各半

牛黃三錢

別研

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大米飲下五十九無時
大歸神丹 安鎮心神固濟元氣

顆塊朱砂入猪心內酒蒸

酸棗仁

當歸

人參

白茯苓去木各二兩

龍齒

遠志姜汁炒

琥珀各二兩

金箔

銀箔各二片

右爲末酒煮稀糊丸如梧桐子大每服二十九至三十
丸麥門冬湯下 如寢不寐亂夢炒酸棗仁湯下

又方

石菖蒲三分 茯苓

人參各五分

遠志七分

右爲細末白湯調服方寸匕

○已上諸方治臟腑久損之劑

○庶按古方滋補虛損之劑多不清切夫心腎主陰血
心惡熱而腎惡燥則清熱潤燥之藥是補心腎而瀉
肺脾也肺脾主陽氣肺惡寒而脾惡濕則溫寒燥濕
之藥是補肺脾而瀉心腎也今一方而能通補之乎
五臟豈有齊損之乎如袖珍方中三建湯鬼絲子丸
安腎丸麝香鹿茸丸椒附丸菴蓉大補丸橘皮煎丸
起痿丸正元散固真丸丹溪心法附方中價寶丹延
齡丹添精補髓丹巨勝子丸如意丸延生護寶丹延
壽丹等劑皆是類聚辛香燥熱之藥補陽而消陰助

氣而耗血殊不知人身中陽常有餘陰常不足氣常有餘血常不足用此藥損不足而益有餘實實虛虛之禍誰任其咎今將此等偏方不錄外上錄簡當中和之劑以便後人也抑嘗論之局方用辛香燥熱之劑而不覺其非者蓋以其能健脾燥濕多進飲食也雖然則陰血潛消而心腎暗損容顏日改而壽筭自偷矣可不畏哉可不謹哉

或問曰長營集一少年素好風月今孟夏清河之時赴宴笑談間而卒其故何也予曰此陰竭而陽暴絕也何以明之蓋人之陰血爲陽氣之依附此少年平日色慾過度陰血已竭一旦赴宴馬上勞役心中隱忿不無動火火性炎上陽無依附遂隨火而發越也譬如樹木賴土培養平日土藪根露一旦天地作變則樹木亦隨風而傾倒矣夫陽爲陰之先導陰爲陽之依附天先乎地夫先乎婦氣先乎血先導之義也天倚乎地夫倚乎婦氣倚乎血依附之義也不曰陽陰而曰陰陽蓋以陰有形爲陽無形之依附也知此理者可不以陰血爲至寶乎哉

丹溪心法附錄卷之二十

休寧東山古庵方廣約之類集

婦人門上

經病九十二

丹溪心法

○婦人經水過期血少也。四物加參朮。帶痰加南星半夏。陳皮之類。經水不及期而來者血熱也。四物加黃連。過期紫黑有塊亦血熱也。必作痛。四物加香附黃連。過

經病 丹溪心法附錄卷之二十 全百五



期淡色來者。痰多也。二陳加川芎當歸。過期而來是血虛。宜補血。用四物加黃芪陳皮升麻。未及期先來。乃是氣血俱熱。宜涼氣血。柴胡黃芩當歸白芍生芩香附之屬。經不調而血水淡白。宜補氣血。參芪芩歸香附白芍。腹痛加膠珠艾葉玄胡索。經候過而作痛者。乃虛中有熱。所以作疼。經水將來作疼者。血實也。一云。四物加桃仁黃連香附。臨行時腰疼腹痛。乃是鬱滯有瘀血。宜四物加紅花桃仁莪朮玄胡索香附木香。發熱加黃芩柴胡。紫色成塊者熱也。四物加黃連柴胡之類。痰多占住血海地位。因而下多者。自必漸昏。肥人如此。用南星蒼朮川

芎香附作九子服之。肥人不及日數而多者。痰多血虛有熱。亦用前九藥。甲更加黃連白朮丸服。血枯經閉者。四物加桃仁紅花。軀脂滿經閉者。以導痰湯加黃連川芎。不可服地黃泥。明啞故也。如用以姜汁炒。肥胖飲食過度之人而經水不調者。乃是濕痰。宜蒼朮半夏滑石茯苓白朮香附川芎當歸。臨經來時肚痛者。四物湯加陳皮玄胡索牡丹皮甘草。痛甚者。豆淋酒痛緩者。童便煮附入炒條芩末為丸。經水去多不能住者。以三補丸加香附龜板金毛狗脊。陰虛經脈久不通。小便澀。身體疼痛。四物加蒼朮牛膝陳皮生甘草。又用蒼朮丸加蒼耳酒芍藥為

九就煎前藥吞下

入方 治經水過多

黃芩炒 白芍藥炒 龜板炙各一兩 黃柏炒三錢

椿根白皮半七錢 香附子半二錢

右為末酒糊丸空心溫酒或白湯下五十九

又方 治積痰傷經不行夜則妄語

瓜蒌子一兩 黃連半兩 吳茱萸十粒 桃仁五十

紅麴二錢 砂仁二兩 麻粗木

右為末生姜汁浸炊餅為丸如梧子大每服一百丸空

心滾白水下

又方 治一切瘀血為痛

香附醋煮四兩 瓦龍子煨二兩醋煮一晝夜 桃仁二兩

牡丹皮 大黃蒸熟 當歸各一兩 川芎

紅花各半兩

右為末蒸餅丸如梧子大空心溫酒下三五十丸

導痰湯 見痰類

三補丸 見補損

蒼蒞丸 見咳嗽

附諸方

○月經不調

加減四物湯 治衝任虛損月水不調臍腹疔痛

當歸

川芎

芍藥

白芍

右以水煎服加減于後

若經候微少漸漸不通手足煩疼漸瘦生潮熱脉微數
本方去地黃川芎加澤蘭葉三倍甘草半分 經候過
多本方去熟芩加生芩或只加黃芩白朮 經行身熱
脉數頭昏本方加柴胡黃芩 經行數少或脹或痛四
肢疼痛加延胡索沒藥白芷與本方等為末淡醋湯調
下

經候不調心腹疔痛只用芍歸二味名君臣散 氣冲

經脉故月事頻併臍下多痛加芍藥 經欲行臍腹絞

痛如玄胡楨即苦練炒木香減半 經水澁少加葵花

紅花 經水適來適斷或有往來寒熱先宜服小柴胡

湯後以四物和之 經候過而作痛血氣俱虛也宜本

方對四君子湯服之

大溫經湯和劑方 治衝任虛損月候不調或來多不已或

過期不行或崩中去血過多或經損娠瘀血停留小腹

急痛五心煩熱

阿膠 碎炒

芍藥

當歸 去芦

人參 去芦

肉桂 去皮

甘草 炙

芍藥

牡丹皮 各二兩

半夏二兩半湯包七次

吳茱萸二兩湯洗七次

麥門冬去心五兩半

右以咀每服五錢水一盞姜五片煎七分空心熱服

南嶽魏夫人濟陰丹和劑方治婦人血海虛冷久無孕育

及數隨胎一切經候不調崩中漏下積聚諸証

秦艽二兩

京墨微醋碎

糯米炒一斗

川芎一兩半

熟地黄酒蒸四兩

茯苓去皮三兩

人參去芦二兩

石斛去根酒二兩

蒼朮米泔浸去粗皮二兩

香附四兩去二兩

毛木香炮一兩

藁本去芦二兩

當歸去芦酒浸一兩五錢

肉桂去粗皮一兩半

乾姜炮一兩半

山藥半錢

澤蘭葉四兩

川椒去目炒七錢半

細辛去苗葉一兩半

桔梗二兩

桃仁去皮尖一兩炒

大豆黃卷炒半斤

甘草炙二兩

蚕布燒灰二兩

牡丹皮一兩

右為末煉蜜為劑每兩作六丸每服一丸細嚼空心溫

酒醋湯任下以醋糊為丸如梧桐子亦可

交加地黄丸 治經水不調血塊氣痞肚腹疼痛

生苜一斤

老生薑一斤

玄胡索

川芎

白芍藥各二兩

沒藥

木香各一兩

桃仁去皮尖

人參各一兩半

香附子半斤

右將地黄生薑各搗汁以生薑汁浸地黄相地黄汁浸生薑相皆以汁盡為度次將餘藥為末共作一處日乾

同為末醋糊丸如梧子大空心服五十九姜湯下

肉灸散和劑方治婦人血氣虛損崩中漏下淋瀝不已或

凝積血塊腰腹刺痛凡月水不調血暈頭眩皆治

藿香葉 丁香皮 熟乾地黄洗肉桂去皮各一兩半

甘草多 當歸洗白朮 山藥

白芷各八兩 茴香一兩 藁本去芦 乾姜炮

川芎 黃芪去苗各一兩 木香口一兩

陳皮去白四兩 白芍藥一兩

右為末每服三錢水一盞姜五片以又十葉同煎空心熱

服溫酒調下亦可如產後下血過多加蒲黃煎惡露不

快加當歸紅花煎嘔吐加藿香生姜煎

活血散御藥院方治衝任經虛經事不調不以多少前後

並皆治之

當歸 川芎 白芍藥 玄胡索各四兩

肉桂去皮一兩

右攷咀每服四錢水一盞煎至七分食後熱服

溫經湯大全良方治婦人血海虛寒月水不利

當歸 川芎 芍藥 桂心

牡丹皮 莪木各半兩 人參 甘草

牛膝各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服不拘時

醋煮香附丸 澹寮方 治婦人經候不調血氣刺痛腹脇彭

脹頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕並宜服之

大香附 砂盆擦去皮以米醋浸半日用瓦塊慢火煮令醋盡漉出切薄片焙研為末

右用米醋煮糊丸如梧桐子大日乾每服五十九粒醋

湯下一方香附子一斤艾葉四兩當歸二兩製如前法

治証一同名艾附丸

如聖丹 聖惠方 治婦人經脈不調赤白帶下

枯礬 四兩 蛇床子 二兩

右為末醋糊丸如彈子大用乾胭脂為衣綿裹放陰中

如熱極再換

增損四物湯 宣明方 治月經不調心腹疼痛補血藏溫經

注顏

川芎 芍藥 當歸 熟地黃

白木 牡丹皮 各五錢 地骨皮 一兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓通口服食前

丹參散 大全良方 治婦人經脈不調或前或後或多或少

產前胎不安產後惡血不下並治之無治冷熱勞腰脊

痛骨節煩疼

丹參 去其不以多

右為末每服二錢酒調下經脈不調食前冷熱勞無時
來狀如瀉水四肢虛弱不能飲食腹中堅痛不可行動
月水或前或後或月水不來舉體沉重惟欲眠多思酸
物

- 桃仁 甘草 半夏各一
- 生地黄各二 澤蘭 牛膝
- 桂心 牡丹皮 人參 蒲黃

川芎各一
右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至八分空心服

四製醋附丸 瑞竹堂方 治婦人女子 經候不調

- 香附子去毛一斤 作四分
- 一分好酒浸七日 一分小便浸七日
- 一分鹽水浸七日 一分米醋浸七日各焙乾

右為末醋糊丸如梧桐子大每服七十九空心食前鹽
酒送下肥人依方服瘦人加澤蘭葉赤茯苓各二

○廣按香附子血中之氣藥也婦人血用事今用香附
子開鬱行氣蓋氣行而血亦行矣何病之不瘳哉

當歸地黃丸 治婦人血氣不和月事不勻腰腿疼痛
當歸 川芎 白芍藥 熟艾各半

牡丹皮

玄胡各二錢半

人參

黃芪各一錢二分半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九食前米湯送下

○廣按月信趨前為熱宜用涼藥以清熱退後為虛宜用溫藥以補虛已上諸方不及分而為二用者審之

○月經不通

王節齋曰婦人女子經脈不行多有脾胃損傷而致者不可便認作經閉血死輕用通經破血之藥遇有此證便須審其脾胃如何若因飲食勞倦損傷脾胃少食惡食泄瀉痠痛或因誤服汗下攻剋藥傷其中氣以致血少

而不行者宜補養脾胃用白朮為君茯苓為藥為臣佐以黃芪甘草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等藥脾旺則能生血而經自行矣又有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積補脾若脾胃無病果有血塊凝結方宜行血通經紅花當歸散和劑方治婦人血臟虛竭經候不調或斷續不來或積瘀塊腰腹刺痛肢躄瘦弱

劉寄奴草五兩當歸去蘆

牛膝酒浸各一兩肉桂去蘆

紅花

白芷各一兩半

甘草炙二兩

赤芍藥一兩

紫葳即凌霄花

蘇木各二兩

右為末每服二錢空心熱酒調下如經閉濃煎紅花酒

調下

通經丸 濟生方 治婦人室女經候不通 臍腹疼痛或成血

川椒炒去

蓬朮炒去

乾漆炒去

當歸去蘆

青皮去白

乾姜炒

大黃炒

桃仁炒

紅花

桂心各等分

右為末將一半用米醋熬成膏和餘藥一半成劑白中杵之丸如梧桐子大陰乾每服五十九醋湯溫酒空心下

千金桃仁煎 簡易方 治婦人血積癥瘕月水不行等疾

桃仁

去皮尖

朴硝

大黃各二兩

蜜虫半兩炒令黑色

右和勻以醎醋二升半於銀石器中慢火煎取一半却以桃仁大黃蜜虫末入內不住手攪度可圓時却下朴硝更不住攪良久出之丸如梧桐子大五更初溫酒下五九至日午取下如赤豆汁雞肝蝦蟆各樣以盡為度六合湯 濟生方 治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛

當歸

白芍藥

官桂去皮

熟地黄酒洗

川芎

蓬朮炮各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心服

凌花散 澹寮方 治婦人月水不行發熱腹脹

經方

金匱要略卷之二十一

十一

十一

金匱要略

當歸 酒浸

凌霄花

劉寄奴

官桂 去皮

紅花 酒浸候煎藥

牡丹皮 酒洗

川白芷

赤芍藥

延胡索 各等分

右吹咀每服四錢水一盞酒半盞煎八分再入紅花煎

熱服

玉燭散 張子和方

四物湯承氣湯朴硝各等分水煎食前服 四物湯見補損承氣

湯見傷寒

三和湯 張子和方

四物湯涼膈散當歸各中停水煎服 涼膈散見溫熱

一方 治室女月經不通

系歲 一兩

乾漆 二錢半

芍藥

蓬萊木

當歸 稍

右為末每服二錢空心酒調下

一方 療月經不通腹中痛

牛膝 六錢

大黃

細辛

桃仁 去皮尖雙

川芎

當歸 四錢

水蛭 三錢 煨

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九空心酒下

通經散 聖惠方 治室女月水不通

椎鼠屎一兩燒存性為末空心溫酒調下一錢神効

導經丸 聖惠方

治婦人經病不通臍腹連腰腿疼痛

當歸

川芎

白芍藥

甘草炒

官桂

桃仁炒一兩

大黃二兩

血竭二錢

紅花少許

地膽去翅足

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九空心溫酒下量

虛實加減服之

溫經湯 大全良方

若經道不行造臍寒疝痛徹其脉沉緊

此由寒氣客於血室血凝不行又為氣所衝新氣與故血相搏所以作痛宜溫經湯及桂枝桃仁湯

當歸

川芎

芍藥

官桂

牡丹皮

蓬莪朮各半兩

人參

甘草

牛膝各三錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食前溫服

桂枝桃仁湯 大全良方

官桂

芍藥

生地黄各二兩

甘草一兩

桃仁去皮尖五十箇

右咬咀每服一兩姜三片棗子一枚水二盞煎至一盞

去滓溫服

當歸散 大全良方 治血脉不通

當歸

川山甲灰焙

蒲黃炒各五錢

展砂一錢

麝香少許

右為末研停每服三錢熱酒調下薄荷湯亦可

琥珀散經驗方治心膈迷悶腹臑痛氣急痞塞月信不

通等疾

烏藥二兩

當歸

蓬莪木各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下服後以食壓之大忌生

冷油膩等物產後諸疾用炒姜湯調下

萬病丸按粹方治女人月經淋閉月候不來逸臍寒疝痛

徹及產後血氣不調腹中生瘕結而不散等疾

乾漆

杆碎炒令烟盡

牛膝

去苗酒浸一宿焙乾各一兩

右為細末生地黄汁一升入二味銀石器慢火熬候可

丸如梧桐子大每服二九空心米飲或溫酒下

通經散揚氏方治衝任不調經脈閉塞久而不通漸成堅

瘦服尋常通經藥不効者正宜服之

班猫去翅足炒

虫

水蛭

麩炒黑各一枚 牛膝半兩

當歸

紅花各三錢

滑石半錢

右為細末每服一錢用桃仁七箇研細末溫酒調下食

前服

○廣按此方善能通經然月候不通有血滯者有血枯

者此方用之於血滯者可矣若用之於血枯者是猶

求千金於乞丐也

瑞金散 大全良方 治婦人血氣撮痛月經不行預先嘔吐

咳痛

片姜黃四兩 牡丹皮 蓬莪朮 紅花

當歸 赤芍藥 川芎 延胡索

官桂 各一兩半

右咬咀每服八錢水一盞酒三分煎至八分食前溫服

一方 治經候閉塞亦治乾血氣

班猫 二十箇 桃仁 五十箇 炒 大黃 錦文者半兩

右為細末酒糊丸如梧桐子大空心溫酒服五九甚宜

十九 如或血枯經閉者用四物湯送下

血竭膏 治乾血氣

用錦紋大黃酒浸乾四兩為末以好醋一升熬成膏丸

如鷄彈大每服一九熱酒化開待溫臨卧服大便利一

二行紅脉自下此藥調經水之仙藥也 又方加香附

千金散 治經候不通

籬蓄 瞿麥 各四錢 換柳 麥蘗

小茴香 各三錢 大黃 錦文者六錢

右為細末每服三錢臨卧溫酒調下

○經病疼痛

聖藥

金匱要略卷之二十一

一百

三

三

大烏金丸 治婦人三十六病思慮過度變生多疾孕育不成崩中帶下五心煩熱口苦咽乾飲食無味身痿羸瘦面目痿黃手足酸軟經水不勻臍腹脹痛髮髮黃落喜卧倦起產後惡血上行心腹刺痛敗血不止及子宮一切惡疾

大艾葉 當歸醋炒 破故紙炒 茴香炒

熟地黃醋炒 南木香不見火 吳茱萸 三稜

莪朮醋炒 川芎醋炒 芍藥醋炒 香附子 六兩

延胡索 一兩 紫荊皮醋炒

右先將以上二兩香附子六兩米醋一升浸一日一夜冬

月三晝夜煮乾炒令赤黑色入後十二味同為末米醋煮糯米糊為丸如梧桐子大每服七八十九空心鹽酒湯任下日二服如崩中下血不止加棕灰一兩綿灰五錢蒲黃炒一兩百草霜七錢

玄胡索湯濟生方治婦人室女七情所感血氣相併心腹疼痛或連腰脇甚作搐搦但是一切血氣經候不調皆治有效

當歸去蘆 蒲黃 玄胡索 赤芍藥

片子姜黃 官桂不見火 乳香 木香不見火

甘草半錢 沒藥三錢

右咳嗽每服四錢水一盞姜七片煎至七分食前溫服
吐逆加半夏橘紅各半兩

琥珀散濟生方治婦人室女月水凝滯腹脇脹痛及血逆

攻心眩暈木省並皆治之

劉寄奴去梗牡丹皮去木熟地黄酒浸玄胡索炒去

烏藥赤芍藥蓬萊木京三稜

當歸去芦酒浸官桂不見火一方有菊花蒲黃炒各

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同煮
豆爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢空心溫酒

送下

三神丸濟生方治室女血氣相搏待腹中刺痛經候不調

橘紅二兩玄胡索去皮醋煮當歸去芦酒浸炒各一兩

右為末酒煮米糊丸如梧桐子大每服一百丸空心艾
醋湯下

當歸前丸大全良方治婦人久積血氣發作刺痛肌瘦乏
力月候不調

當歸三兩別研末樞榔 赤芍藥 牡丹皮

玄胡索各一兩

右同當歸末米醋熬膏入藥丸如梧桐子每服二十九
溫酒下

姜黃散 大全良方 治益臟久冷月水不調臍腹刺痛

片姜黃 四兩 蓬莪朮 紅花 官桂

川芎 各二兩 玄胡索 牡丹皮 當歸 各二兩

白芍藥 三兩

右咬咀每服一兩水二盞酒少許煎至一盞去滓通口

服食前

蠲痛散 大全良方 治婦人血氣刺痛

荔枝核 燒存性 五錢 香附子 炒一兩

右為末米飲調二錢食前服鹽湯亦可

牡丹散 拔萃方 治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食

牡丹皮 川大黃 炒各一兩 赤茯苓 生地黃

桃仁 當歸 官桂 赤芍藥

白朮 石膏 去皮 木香 各半兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至一盞去滓通

口食前服

牛膝散 拔萃方 治婦人月水不利臍腹疼痛

牛膝 一兩 官桂 赤芍藥 桃仁

玄胡索 當歸 牡丹皮 川芎

木香 各七錢半

右為細末每服三錢溫酒調下食前

替灸丸 秘方 治婦人久冷赤白帶下肚腹疼痛經脈不通

面色痿黃脚手疼痛四肢無力久無子息此藥常服溫中散臍調經有子服藥未盡即時有效

茯苓 艾葉各八兩 香附子 當歸各四兩

吳茱萸三兩 川芎 白芍藥各二兩

右用醎醋五升沙鍋煮藥乾為末醋糊丸如梧桐子大每服五十九空心午前日二服用淡醋湯送下

大延胡索散 宣明方 治婦人經病疼痛并產後腹痛或腹滿喘悶或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛平心胃急痛尤宜服之

玄胡索 當歸 赤芍藥 京三稜

川練子去核 蓬朮煨 官桂去皮 厚朴製

木香 川芎各二錢半 桔梗 黃芩

大黃各五錢 甘草一兩 檳榔二錢

右為末每服三錢水一盞煎六分去滓熱服食前日三服如惡物多去大黃官桂加苦藥子桑槐子龍骨各錢

延胡索散 大全良方 治婦人血氣攻心腹疼痛

延胡索 當歸 川芎 官桂各七錢半

木香 枳殼 赤芍藥 桃仁各五錢

熟地黃 一兩

右吹咀每服八錢水 薑生薑三片煎至八分去滓通
口食前服

當歸散 大全良方 治婦人久積血氣疔痛小便刺痛四肢
無力不能食

當歸酒炒 赤芍藥 劉寄奴 沒藥

枳殼 玄胡索

右等分為末熱酒調下二錢不拘時候

失笑散 和劑方 治小腸氣痛婦人血氣痛欲死者

五靈脂 蒲黃 各等

右為末每服二錢用醋一合熬藥成膏入水一盞煎七

分熱服

異方濟陰丹 秘方 治婦人內有血積經水不調腰腹疼痛

香附子 三稜 蓬朮 陳皮 去白

青皮 敗姜 各一兩

右用黑豆半升米醋五升同煮豆爛取出焙乾留餘醋
打糊

官桂 當歸 赤芍藥 白芍藥

生地黃 熟地黃 澤瀉 片姜黃

牡丹皮 乾姜 川芎 劉寄奴

澤蘭 人參 蒲黃 紀炒 木香

白朮

玄胡索

右各一兩焙乾與前藥為末醋糊丸如梧桐子大每服五十九炒姜酒下艾醋湯亦得空心食前經事不行酒下心脾疼姜湯下或酒下

○經病發熱

逍遙散和劑方治血虛煩熱胃小水不調臍腹脹痛痰嗽潮

熱

甘草炙半兩

當歸去芦炒

茯苓去皮

芍藥

白朮

柴胡去芦一兩

右咬咀每服五錢水一盞煎

姜一塊薄荷少許煎至七

分溫服

人參荆芥散和劑方治婦人血風發熱身體疼痛頭昏目

澁煩渴盜汗或月水不調臍腹疼痛痲痺塊硬等症

赤芍藥五兩

柴胡去芦兩半

牡丹皮五兩

荆芥穗

蟹甲醋浸去

羚羊角

酸棗仁

枳殼去穢炒

生乾地黄

人參去芦

白朮

肉桂去皮各七錢半

防風去芦

當歸

芎藭

甘草略五兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎六分溫服不拘時

油煎散

和劑方

治婦人血風發熱喘滿多汗口乾舌澁

五加皮

牡丹皮

赤芍藥

當歸去芦各一兩

右為末每服一錢水一盞將青銅錢一文蘸油入煎項藥同煎七分煎不得攪喫不得吹常服此藥能肥婦人滋血湯和劑方治婦人血熱氣虛經候不調血聚四肢或為乳腫肌腠發熱疑為勞瘵宜以此藥滋養通利

馬鞭草 荆芥穗各四 牡丹皮一兩 赤芍藥

枳殼去白 炒 肉桂去皮 當歸去尾 炒 川芎各三

右咬咀每服四錢水一盞烏梅一箇煎服以經調為度牡丹散和劑方治血氣虛損內則月水不行外發潮熱肌

體羸困漸成骨蒸並宜服之

桂心 牡丹皮 芍藥 延胡索炒

沒藥別研 陳皮去白 各一兩 真蓬莪朮 鬼箭錢各二

紅花 當歸去尾 各一兩 乾漆炒 半兩 蘇木一錢

甘草 烏藥各一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分不拘時服

加味四物湯 治衝任虛損月水不行肌膚發熱如瘵狀

當歸 地黃 芍藥 川芎各一兩

柴胡半兩 黃芩一錢

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

茯苓補心湯澹療方 治婦人去血過多虛勞發熱

四物湯一兩半參蘇飲三兩和勻生薑五片煎八分

溫服

四物湯見前

參蘇湯見冒寒

次煎散 聖惠方 治少男室女骨蒸婦人血風攻注四肢心胃煩壅

鱉甲 醋炙

大黃 煨

常山

赤茯苓

柴胡

白芍藥

當歸

乾漆 炒烟

生地黄

石膏 碎

甘草 半兩

右咬咀每服一兩水二鍾小麥五十粒煎至一鍾去滓溫服食前有虛汗加麻黃根一兩治骨蒸熱黃瘦口臭肌熱盜汗

黃芪散 大全良方 治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心燥口乾不欲飲食

人參

黃芩

當歸 各半

柴胡 半兩

黃芪

地骨皮

赤茯苓

麥門冬

生地黄

赤芍藥 各一錢

右咬咀每服一兩水二鍾生姜五片煎至一鍾食前服麥門冬散 大全良方 治婦人客熱四肢煩悶夜痛飲食不下

麥門冬

前胡

赤茯苓 各一錢

赤芍藥

桑白皮

黃芪 各半

生地黄

甘草各五錢

右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片煎一鍾通口服

犀角散按本方治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

犀角屑

赤芍藥

地骨皮

紅花

甘草各五錢

柴胡 兩

黃耆 兩

麥門冬

人參

枳殼

赤茯苓 各七錢半

右咬咀每服五錢水二鍾生姜三片煎至一鍾去滓通

口服不拘時候一方有生地黄七錢半

地骨皮散大全良方治婦人血風氣弱虛發渴寒熱

柴胡

地骨皮 各一兩

桑白皮

枳殼

前胡

黃耆 各半

雪白茯苓

五加皮

人參

甘草

官桂

白芍藥 各五錢

右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至一鍾通口服

柴胡散大全良方治婦人寒熱躄瘦肢節疼痛口乾心煩

不欲飲食

北柴胡

黃耆

赤茯苓

白朮 各一兩

人參

地骨皮

枳殼 製

生地黄

桔梗

桑白皮

赤芍藥 各七錢半 鱉甲 醋炙 二兩

麥門冬 三兩

甘草 五錢

右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至七分溫服

小柴胡湯 大全良方

治婦人傷風七八日續得寒熱發

有時經水適斷此為熱入血室其血必結故如瘧狀

柴胡八錢 半夏二錢 人參 甘草

黃芩 生地黃各三錢 麥門冬二錢

右咬咀每服八錢水一鍾半姜五片棗二枚煎至八分

去滓溫服

柴胡飲子 宣明方 治一切骨蒸積熱口乾煩燥寒熱往來

肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病

柴胡 人參 黃芩 甘草

當歸 芍藥 大黃各一錢

喘嗽者加半夏桔梗五味各五分

右作一服水二鍾生姜三片煎至一鍾去渣溫服食後

柴胡四物湯 治婦人日久虛勞微有寒熱脉沉而芤

川芎 熟地黃 當歸 芍藥各半

柴胡八錢 人參 黃芩 甘草

半夏各三錢

右每服一兩水一盞半生姜三片煎八分溫服

○廣按婦人經病有月候不調者有月候不通者然不調不通之中有無發熱者有無發熱者此分而為四也然四者之中若細推之不調之中有趨前者有退

後者則趨前為熱退後為虛也不通之中有血滯者
有血枯者則血滯宜破血枯宜補也疼痛之中有常
時作痛者有經前經後作痛者則常時與經前作痛
為血積經後為血虛也發熱之中有常時發熱者有
經行發熱者則常時為血虛有積經行為血虛有熱
也此又分而為八焉大抵婦人經病內因憂思忿怒
外因飲冷形寒何則人之氣血周流忽因憂思忿怒
所觸則鬱結不行人之經前產後忽遇飲冷形寒則
惡露不盡此經候不調不通作痛發熱之所由也調
其氣而破其血開其鬱而補其虛涼其血而清其熱

治之有道也歟抑嘗論之氣行血行氣止血止故治
血病以行氣為先香附之類是也熱則流通寒則凝
結故治血病以熱藥為佐肉桂之類是也。

崩漏

九十三

丹溪心法

○血崩東垣有治法但不言熱其主在寒學者宜尋思之
急則治其標用白芷湯調百草霜末甚者用棕櫚灰
後用四物湯加炒乾姜調理因勞者用參芪帶升補藥
因寒者用乾姜因熱者黃芩崩過多者先用五靈

脂末一服當分寒熱蓋五靈脂能行能止 紫色或塊者
 熱以四物湯加黃連之類 婦人血崩用香附白芷丸服
 氣虛血虛者皆以四物湯加參芪 漏下乃熱而虛四
 物湯加黃連 崩中白帶用椒目末又用白芷石灰炒去
 灰為末茜草少許粥丸服 一方用生狗頭骨燒灰存性
 或酒調服或入藥服 一方五靈脂半生半炒為末酒調
 服 經血逆行或血腥或吐血或唾血用韭汁服効 夫
 婦人崩中者由臟腑傷損衝任二脉血氣俱虛故也二脉
 為經脉之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若氣血調適
 經下依時若勞傷過極臟腑俱傷衝任之氣虛不能約制

其經血故勿心然而下謂之崩中暴下治宜當大補氣血之
 藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自
 止矣

附諸方

膠艾湯和劑方治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不
 斷及妊娠調攝失宜胎氣不安或因損動漏血傷胎並宜
 服之

阿膠炒 芍藥 甘草炙各二兩 艾葉炒各二兩

熟乾地黄 白芍藥各四兩 當歸去芦炒二兩

右咬咀每服二錢水一盞酒半鍾煎至八分空心熱服

伏龍肝散和劑方治血氣勞傷衝任脉虛經血非時注下

或如豆汁或成血片或五色相雜臍腹冷痛經久不止

川芎三兩 肉桂去皮五錢 當歸去尾炒 乾姜炮七錢半

赤石脂一兩 艾葉炒三兩 熟地黄 甘草炙兩

麥門冬一兩 伏龍肝錫心土

右以咀每服四錢水一鍾棗二枚煎七分食前温服

神仙聚寶丹和劑方治婦人血海虛寒外乘風冷搏結不

散積聚成塊血氣攻注腹脇疼痛及經候不調崩中帶

下並宜服之

沒藥 琥珀各別研 辰砂別研 木香煨

乳香別研半 當歸洗焙取麝香別研

右研細合勻滴水為丸每一兩作十五丸每服一丸温

酒磨下如一切難產及產後敗血衝心惡露未盡並入

童子小便

艾煎丸 治崩傷淋瀝不已小腹滿痛常服益氣調經

食茱萸湯洗 當歸各七錢半 熟地黄 白芍藥各一兩半

石菖蒲炒 川芎 人參 熟艾四兩熱

作餅

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十九酒飲任下

鎮宮丸濟生方 治婦人崩漏不止或下五色或如豆汁或

狀若豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈目眩

代赭石煅醋淬禹餘糧煅醋淬

川芎研炒紅鹿茸去毛蒲黃炒

香附子醋煮各當歸去芦酒浸

右為末用艾煎醋汁打糯米糊丸如梧桐子每服七十

丸空心米飲下

指子仁湯濟生方治婦人憂思過度勞傷心經不能藏血

遂致崩中下血不止

鹿茸去毛指子仁炒各芎藭一兩

香附子炒去毛當歸一兩甘草炙半

川續斷一兩茯苓一兩小草一兩阿膠成

右吹咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分空心溫服

一方治婦人血崩屢驗

當歸 白芍藥 棕櫚 乾姜

右等分各燒存性為末醋湯調以有節朱筋左攪四十

九轉食前服

一方治月水不止

用阿膠炒枯為末用好酒空心調服艾湯亦可

一方

艾葉如雞阿膠半兩乾姜一錢

右為粗末用水五鍾先煮艾姜後入膠洋消分作二服

空心

鹿茸丸 大全良方 治衝任虛損以致經候過多又為風冷

所乘天脉微細甚者可灸關元百壯

鹿茸去毛 赤石脂 禹餘糧各一兩 艾葉

柏葉 附子炮去皮臍 熟地黄洗焙

當歸酒浸 續斷各二兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十九空心温酒下

○廣按此方用附子的係虛寒者方可然崩症多屬虛

熱其虛寒者容或有之或當老年崩久與夫寒冷所

乘不可一槩作虛熱論也

○已上數方補虛温寒之劑

凉血地黄湯按萃方 治婦人血崩是腎水真陰不能鎮守

包絡相火故血走而崩也

生地黄 當歸各五分 黃連 黃蘗

知母 藁本 川芎 升麻各二

柴胡 羌活 防風各三錢 黃芩

甘草炙 細辛 荊芥 蔓荊子各二

紅花少許

右咬咀作一服水二鍾煎至一鍾去滓通口服食前

金華散簡易方治婦人經血得熱崩漏不止

延胡索 當歸 瞿麥 牡丹皮

歲靈仙各七錢半 乾葛五錢 蒲黃五錢 石膏一兩

桂心三分

右為末每服二錢水一鍾姜三片煎七分食前溫服

黃芩湯簡易方治崩中下血今人多用止血補血之藥必

能見效此是陽乘陰則經水沸溢宜清之為愈

黃芩研為細末燒秤鍾淬酒調下三錢食前服

一方治婦人血崩不止

槐花一兩 棕毛灰五錢

右為末水二鍾鹽少許煎至七分去滓溫服

如神散聖惠方治婦人血崩不止赤白帶下

香附子 赤芍藥

右等分為末鹽一捻水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

當歸龍骨丸宣明方治月事失常經水過多及帶下淋瀝

無問久新赤白諸証并產後惡物不止或孕婦胎動不

安疼痛漏下及大人小兒下痢並宜服之

當歸 芍藥 黃連 染槐子

艾葉炒 茯苓各五錢 龍骨 黃柏各一兩

木香二錢半

右為末滴水丸如小豆大每服五十九丸食前米飲送下
解毒四物湯 治婦人經脈不住或如豆汁五色相雜面
色痿黃臍腹刺痛寒熱往來崩漏不止並宜服之

黃連

黃柏

黃芩

山梔子

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃錢一

用水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

柏黃散永類鈴方 療經血不止

黃芩

一兩一錢半

當歸

柏葉

蒲黃各一兩

生薑泮兩

艾葉

二錢五分

生地黃

六兩 伏龍肝二兩

右咬咀每服一兩水一鍾煎至一鍾去滓食前溫服

芥心丸

瑞竹

治婦人四十九歲已後天癸當住每月却行

或過多不止

黃芩

新枝條者二兩重以米醋浸七日多乾又浸又炙如此七次

右為末醋糊丸如梧子大每服七十九空心溫酒下日

三服

黃藥子散

宣明方

治月事不止煩渴悶乱心腹急痛肢體

困倦不美飲食

黃藥子

當歸

芍藥

生地黃

人參

白朮

知母

石膏錢一

川芎

桔梗

甘草

紫苑

柴胡

槐花子各二分半

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服食前

小薊湯 治崩中不止

小薊莖葉研取汁一鍾

生萊汁一盞白木半兩

右三件入水一鍾煎溫服

奇効四物湯聖惠方治血崩

四物湯

艾葉

阿膠炒

黃芩

右等分水二鍾生姜三片煎至一鍾去滓空心食前溫服

○廣按此方與膠艾湯少異但膠艾湯純於補虛而此

方補虛中又兼退熱也崩証虛而有執者用此方與黃藥子散最當

○已上數方涼血清熱之劑

如聖散經驗方治婦人血崩

棕櫚

烏梅各一分

乾姜一分

並燒過存性

右為細末每服二錢烏梅湯酒空心調下久患三服愈

下灰丸濟生方治崩中下血不止

黃絹灰

馬尾灰

藕節灰

艾葉灰

蒲黃灰

蓮蓬灰

油髮灰

棕櫚灰

赤松皮灰

綿灰各等分

右為末用醋者糯米糊丸如梧桐子每服一百丸米飲下

荊芥散 大全良方 治婦人崩中連日不止

用荊芥穗以燈盞多着燈心好麻油點燈就上燒荊芥焦色為末每服三錢童子小便調下

獨聖散 大全良方 治婦人血崩不止

用防風去苦義隨多少為末酒者麵清調下二錢空心日二服更以麩作糊酒投之極驗

當歸散 聖惠方 治婦人血崩不止

當歸 龍骨燒赤 香附子炒各一兩 棕毛灰五錢

右為末每服四錢米飲調空心服忌油膩猪魚雞等物
一方 大全良方

用烏梅燒灰為末烏梅湯調下
一方 大全良方

用棕櫚燒存性為末湯泡酒令淡調下三錢空心服
一方 大全良法

用棕櫚白礬煨為末酒調二錢服

必効散 保真集方 治婦人月經不調及崩漏不止

棕皮燒 木賊去節燒灰存性各二兩 射香一錢

右為末酒調二錢空心服

備金散 治婦人血崩不止

香附子四兩 當歸二錢 五靈脂一兩

右為細末每服五錢空心淡醋湯調下立效

蓮蓬散 經血不止

用蓮蓬燒灰存性為細末每服二錢調下

一方 治血崩

當歸 乾薑 烏梅 清木綿

棕櫚各等分

右並燒灰存性為末燒秤錘滓酒空心調服日三次

○已上數方止血住崩之劑

○廣按血屬陰也靜則循經榮內動則錯經妄行蓋今之七情過極則動五志之火五志之火尤甚則經血暴下失期而來久而不止謂之崩中如風動木搖火燃水沸類也治崩次第初用止血以塞其流中用清熱涼血以澄其源末用補血以還其舊若止塞其流而不澄其源則滔天之勢不能遏若止澄其源而不復其舊則孤子之陽無以立故本末勿遺前後罔紊方可以言治也

帶下 九十四

丹溪心法

帶下 赤屬血 白屬氣 主治燥濕為先 漏與帶

俱是胃中痰積流下。滲入膀胱。無人知此。只宜升提甚者

上必用吐以提其氣。下用二陳湯加蒼朮白朮。仍用丸子

一本作瓦龍子又云赤白帶下皆屬血。出於大腸小腸之分。肥

人多是濕痰。海石半夏南星炒栢蒼朮川芎椿皮。一方無

椿皮有青黛。瘦人白帶少。如有者多熱。以炒黃栢滑石

椿皮川芎海石。如無海石以蛤粉亦可。一方有青黛。作丸

子服。赤白帶下炒黃荆子為末酒調下二錢。或米湯亦

可。人治心痛羅先生法。或十棗湯或神佑丸。或玉濁散皆

可服。實者可行。虛者不可峻攻。血虛者加減四物湯

氣虛者參朮陳皮間與之。濕勝者用固腸丸。相火動

者於諸藥中少加黃栢。滑者加龍骨赤石脂。帶者加

葵花。葵花白者治白帶赤者治赤帶性燥者加黃連。痰氣帶下者蒼

朮香附滑石蛤粉。半夏茯苓丸服。寒月少加乾姜。臨機應

變。必須斷厚味。

入方

良姜 芍藥 黃栢各二錢俱

椿皮半兩

右為末。粥丸梧子大。每服四五十九。空心

又方 一婦人白帶兼風痛

半夏

茯苓

川芎

陳皮

甘草

蒼朮

黃柏酒炒

南星

牛膝酒洗

吹咀水煎空心服

治婦人上有頭風鼻流下有白帶

南星

蒼朮

栝皮炒

滑石

半夏

川芎

辛夷

牡蠣粉炒

酒淬分等

右吹咀水煎去粗食煎服

又方 治白帶

龜板炙

枳子各二兩

黃柏炒

白芍藥七錢

香附半兩

乾姜錢半

山茱萸

苦參

椿根皮各半 貝母三錢

右為末酒糊丸梧桐子大空心米湯下五十九丸

又方 治赤白帶下或時腹痛

龜板酒炙

黃柏炒

乾姜炒

枳子一錢

右為末酒糊丸梧子大每服七十九丸日服二次

又方 治婦人有孕白帶

蒼朮三錢

白芷二錢

黃連炒

黃芩炒

黃柏炒

白芍半錢

椿根皮炒

山茱萸半錢

世下

三才村金匱要方下

三六

三三六

右為末糊丸空心温酒下五十丸

治結痰白帶先以小胃丹半飢半飽津液下數丸候覺

積開却宜服補藥

白朮二兩 黃芩半兩 紅白葵花半錢 白芍七錢

右為末蒸餅丸空心煎四物湯三五丸

固腸丸 治濕氣下利大便血白帶去脾胃陳積之疾用

此以燥其濕亦不可單用須看病作湯使

椿根白皮性涼而燥 須炒用

右為末酒糊丸服

又方 椿根皮四兩 滑石二兩

右為末粥丸如梧子大空心白湯下一百丸

又方 治白帶因七情所傷而脉數者

匾栢酒蒸 黃栢炒各兩 香附醋炒 白芍

白朮各一兩 椿根皮炒各兩 白芷燒存性三錢 黃連炒

右為末粥丸梧子大每服七十丸食前米飲下

又方 治赤白帶濕勝而下者

白芍 滑石炒各一兩 枳殼炒 甘草各三錢

椿根皮炒一兩 乾姜炮二錢 地榆半兩 蒼朮鹽炒

右為末粥丸空心米飲下一百丸

附諸方

補宮丸 楊氏方 治婦人諸虛不足久不妊娠骨蒸形羸崩

中帶下並宜服之

鹿角霜 白茯苓 香白芷 白朮

烏賊魚骨 白薇 白芍藥 牡蠣煨

山藥 各等分

右為末 麩糊丸如梧桐子大服五十九空心米飲送下

內金鹿茸丸 楊氏方 治婦人勞傷血脈胞絡受寒小便白

濁晝夜無度臍腹疼痛腰膝無力

黃芪 鷄內金 牡蠣 鹿茸

遠志 肉苁蓉 五味子 龍骨

附子 桑螵蛸 各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九溫酒飲任下

當歸煎 濟生方 治婦人赤白帶下腹內疼痛不欲飲食日

漸羸瘦

當歸去芦 酒浸 赤芍藥 牡蠣火煨 取粉 熟芋酒浸 蒸焙

阿膠 白芍藥 黃斷酒浸 各一兩 地榆半兩

右為末醋糊丸如梧桐子每服五十九空心米飲下

卷柏丸 濟生方 治婦人室女腹臍冷熱相攻心腹疼痛赤

白帶下面色痿黃四肢羸之

黃芪 熟地黃洗各一兩半 鹿茸 卷柏醋炙

白石脂 煨醋淬 川芎 醋炙

艾葉 代赭石 醋煨 桑寄生 當歸 去其酒

地榆 各一 木香 不見 龍骨 各半 乾姜 七錢

右為末醋煮糯米糊丸如梧桐子每服七十九空心米

飲下

威喜丸 和劑方治婦人血汗夕冷白帶白濁白淫可書符

濕小便如米泔或無子息

白茯苓 去皮四兩 黃蠟 四兩 猪苓 錢半 去皮同茯苓

沸出日乾不用猪苓

右取茯苓為末溶蠟丸彈子大空心細嚼滿口生津徐

徐燕服已采醋及使性氣

白芷散 大全良方 治婦人赤白帶下

白芷 一兩 海螵蛸 二箇 胎髮 一箇

右為末空心酒調服二錢

麝香丸 御藥院方 治婦人陰中久冷或成白帶淋瀝不斷

久無子息

零陵香 藿香 各二錢 蛇床子 五錢 吳茱萸

枯礬 木香 各三錢 射香 二分 丁香

韶腦 半錢 不灰木 白芷 二錢 龍骨 五錢

右為末煉蜜為丸每兩作四十九每用一九綿裹納陰

帶下 心去附餘卷之三 三十九 二百六十四

中

大効拱辰丸秘方治婦人血海虛冷白帶時下臍腹刺痛
又服令人延年精神充實多子嗣

琥珀二錢 當歸酒浸 沉香 木香

官桂各不見火 人參 黃芪 鹿茸酥炙

浮香 沒藥各一兩 酸棗仁半兩 鹿角霜

乾姜 延胡索 栝子仁各半兩

右為細末煉蜜丸如龍眼大每服一九溫酒化下空心

暖宮妙應丸秘方治婦人赤白帶下

艾葉 龍骨 當歸 川芎

牡蠣 白芍藥 牡丹皮 茯苓

赤石脂 熟地黃

右等分為末麵糊丸如梧桐子大每服五十九空心艾醋湯下

艾煎丸經方治婦人諸疾腹痛赤白帶下

香附子淨 艾葉各一兩 蔓荊子 神麩

枳殼去穢 當歸各二兩 吳茱萸 蓬莪木各一兩

右用醋一大碗慢火者著附艾葉以醋盡為度棟去艾

葉入糯米糊捻作餅子自乾同前藥為末醋糊丸如梧

桐子大每服二三十丸食前米飲下醋湯亦可

戴人玉燭散

○已上數方辛溫去濕寒之劑

當歸

芍藥

川芎

熟艾

各錢

大黃 三錢

甘草 一錢半

右咬咀生姜三片煎服

十棗湯見脇痛類

神佑丸見中濕熱

○已上三方若寒除濕熱之劑

○廣按婦人赤白帶下之症多是怒氣傷肝夫肝屬木脾屬土肝邪乘脾土氣尅土則脾受傷而有濕濕而生熱熱則流通所以滑濁之物滲入膀胱從小便而出也古人作濕寒而用辛溫之藥治之者非而丹溪作濕熱而用苦寒之藥治之者是矣雖然古人曾用辛溫之藥治之而愈者殊不知用苦寒之藥是正治之法也用辛溫之藥是從治之法也蓋濕熱弗鬱於內肚腹疼痛赤白帶下非辛溫之藥從治而能開散之乎然濕熱未嘗弗鬱但止赤白帶下而無腹痛之症不若用苦寒之藥並治之為當也

帶下



丹溪心法附餘卷之二十一

婦人門


產前

九十五

丹溪心法

○產前當清熱養血。產婦因火動胎逆上作喘急者。急用條芩香附之類為末水調服。條芩水中取沉者為佳。隨胎乃氣虛血虛血熱。黃芩安胎乃上中二焦藥。能

休寧東山古庵方廣約之類集



降火下行。益母草即荒蔚子治產前產後諸病能行血養血難產可煎作膏地黃膏牛膝膏皆可用。懷妊愛物乃一臟之虛。假如肝臟虛其肝氣止能生胎無餘月也。人云不能養其肝。肝虛致愛酸物。產前安胎白朮黃芩為妙藥也。條芩安胎聖藥也。俗人不知以為寒而不敢用。反為溫熱之藥可養胎。殊不知產前宜清熱。令血循經而不妄行。故能養胎。胎熱將臨月以三補丸加炒香附炒白芍藥蒸餅丸服。抑熱以三補丸用。地黃膏丸。有孕八九箇月必用順氣。須用枳殼紫蘇梗。凡妊婦脉細勻易產。大浮緩火氣散難產。生產

如抱船過填一般

入方 固胎

地黃錢半

婦身

人參

白芍各一錢

白朮半錢

川芎五

陳皮錢一

黃芩錢半

甘草分三

黃連許以

黃栢許以

桑上牛兒藤七葉圖者

一本無芩

右咬咀每二錢入糯米二十粒煎服。血虛不安者用

阿膠 痛者用砂仁止痛安胎行氣故也

東胎散 第八箇月可服

炒黃芩

夏一兩春秋七錢半冬五錢

白朮

二兩不見火 陳皮三兩

三十一 三十一 三十一

茯苓七錢半

右為末粥丸如梧桐子大每服五六十丸食遠溫水下
避生散 又名束胎散

大腹皮三錢

人參

陳皮各半錢

白朮

芍藥各一錢

紫蘇半錢

甘草二錢

歸身尾錢

右作一服入青葱五葉黃楊腦七箇此即黃楊樹葉稍
兒也或加枳殼砂仁以水煎食後服於八九箇月服十
數貼甚得力夏月加黃芩冬不必加春加川芎 或有
別証以意消息于后

氣虛加參朮

氣實倍香附陳皮

血虛倍當歸加地

黃形實倍紫蘇 性急加黃連 有熱加黃芩 濕

痰加滑石半夏 食積加山查 食後易飢倍黃楊腦

有痰加半夏 腹痛加水香桂

又方 第九箇月服

黃芩一兩

酒炒不宜涼

白朮一兩

枳殼炒七錢

滑石七錢
便多者減此一日

右為末粥丸梧子大每服五十九空心熱湯下多則恐
損元氣氣實人宜服

又方 安胎

白朮上

黃芩上

神麩炒

右為末粥丸服 一本云用條苓一二兩為末每一錢
或半錢濃煎白朮湯調下每次用白朮五七錢煎湯

○惡阻從痰治 多用二陳湯

戴云惡阻者謂婦人有孕惡心阻其飲食者之也肥者
有痰瘦者有熱須用二陳湯

入方

白朮不炒

右為末水丸隨所好或湯或水下

○子腫

戴云子腫者謂婦人手足或頭面通身浮腫者是也

入方

山梔子炒

右為末米飲吞下或丸服

三因鯉魚湯 治妊娠腹大胎間有水氣

白朮五兩

茯苓兩

當歸

芍藥各二兩

右網剉以鯉魚一箇脩事如食法煮取汁去魚不用每
服四錢入魚汁一鍾半姜七片陳皮少許煎至七分去

粗空心服

○胎漏 氣虛 血虛 血熱 可服固孕之藥

戴云胎漏者謂婦人有胎而血漏下者

參朮飲 治妊娠轉胞

四物湯四錢加

人參八分

白朮八分

半夏五分

陳皮八分

甘草三分

右咬咀入生姜煎空心服

治胎動不安已有所見

艾葉

阿膠

當歸

川芎各三分

甘草兩

右每服五錢水煎次下膠令洋溫服

○難產氣血虛故也此蓋九月十月之際少不謹守者有之亦有氣血凝滯而不能轉運者臨月時竹服野天麻煎膏

白湯調下油蜜小便和極勻治難產

入方

砂仁中

香附醋煮

枳殼中

甘草下

右為末湯調下以香油蜜小便和勻各半鍾調益母草末

催生

白芷灰中

百草霜中

滑石上

右為末用芎歸煎湯調下或姜汁服亦可

天麻丸 易產

天麻脚連根採陰乾

益母草六月

三

五

十一

右為末不拘多少煉蜜丸如龍眼大臨產時溫酒或白湯化一丸能除產後百病

附論

王節齋曰婦人半產多在三四五月及七箇月除跌撲損傷不拘外若前次三四個月而墮則下次必如期復然蓋先於此時受傷故後至期必應乘其虛也遇有半產者產後須多服養氣血固胎元之藥以補其虛損下次有胎先於兩箇半月後即服同胎藥十數服以防三月之墮至四箇半月後再服八九服防過五月又至六箇半月後再服五七服以過七月及至九箇月內服丹溪

生散十數服可保無虞其有連墮數次胎元極服藥須多久則可以留方用四物湯加人參白朮茯苓甘草阿膠艾葉條芩多氣加香附縮砂有痛加芍藥半夏調理妊娠在於清熱養血條芩實黃芩為安胎聖藥清熱故也暑月宜加芎之養胎全在脾胃譬猶鍾懸於梁梁軟則鍾下墜折則墮矣故白朮補脾為安胎君藥若因氣惱致胎不安者宜用川芎陳皮茯苓甘草多加縮砂少佐木香以行氣

附脈理

脈訣舉要曰男女之別以左右取左疾為男右疾為女沉

實在左。浮大在右。右女左男。可以預判。離經六至。沉細而滑。陣痛連腰。胎即時脫。血瘀弦急。而大者生。虛小弱者。即是死形。半產漏下。華脉主之。弱即血耗。立見傾危。

附諸方

驗胎方 經脉不行已經三月者

用川芎為細末空心濃煎艾葉湯調下一錢覺腹內微動則有胎也否則疑經滯

○胎動不安

安胎散 治妊娠白高墜下或為重物所壓觸動胎氣

研為細末每服二錢熱酒調服艾益湯亦可

川芎散簡易方治妊婦從高墜下胎氣不和轉動不能腹臍疼痛

南川芎為末每服二錢溫酒調下

佛手散 大全良方治妊婦胎動不安血氣衝心欲絕者

當歸 蘇合 各一兩

每服四錢酒一鍾煎乾再入水一鍾煎二三沸溫服

膠艾湯 損動胎下血腹痛

艾葉 錢二 阿膠 錢三

右二味水煎服

膠艾湯濟生方治妊娠或因倒仆胎動不安腰腹疼痛

熟地黄洗 艾葉炒 白芍藥 川芎

黃芩去蘆 阿膠蛤粉炒 當歸去蘆 甘草炙各

右以酒每服四錢水一鍾姜五片棗一枚同煎去滓空心溫服

杜仲丸濟生方治妊娠三兩月胎動不安防其欲墮預宜服之

杜仲去皮剉姜汁炒去絲 川續斷酒浸各

右為末棗肉煮爛杵和為丸如梧桐子大每服三十九米飲下

安胎當歸湯六全良方療妊娠五月舉動驚愕胎動不安

下墜小腹痛引腰脇小便疼痛下血

當歸 阿膠 川芎 人參各

棗子二枚 艾一虎

右細切酒水各三升合煮至三升內膠令烊分二服腹中當安小便當煖也一方有甘草無艾棗

旋覆花湯六全良方療妊娠六七月間胎不安當處亦名

阻病

旋覆花兩 厚朴 白朮 枳殼

黃芩 茯苓各三兩 半夏炒一 芍藥

產前 卷之三十一 三四六

生薑酪二

右咬咀每服一兩水鍾半煎至一鍾去渣溫服食前忌
羊肉錫醋桃李雀肉

芍藥湯 大令良方 治妊娠八月中風寒有所犯解身覺

盡疼乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒
時時小便白如米泔或青黃寒慄腰背苦冷痛面
視茫茫

芍藥 兩

人參

當歸

甘草 各二

白木 兩

厚朴 二

薤白 切一

生薑 切四

右用水五升酒四升煮取三升分三服日再夜一忌海

藻菘菜桃李雀肉等物

二香散 聖惠方 療妊娠胎動不安氣不升降飲食不進

吐酸水起坐覺重宜服

香附子 兩

藿香葉

甘草 各二

右為細末每服二錢鹽沸湯調下

當歸湯 大全良方 治妊娠胎動盪心煩躁悶絕口乾橫生

倒產上衝下築迷悶唇口青黑手足厥冷產科名保安

飲

當歸

人參 各一

阿膠 炒一兩

甘草 二

右咬咀每服八錢水一鍾半連根葱白一莖煎至八分

去滓溫服 一方無甘草有川芎厚朴產後方有川芎

阿膠散 大全良方 治妊娠胎動腹中痞痛不思飲食

白茯苓

白朮

川芎

阿膠

當歸炒

陳皮各一兩

甘草二錢半

右咬咀每服八錢水一鍾半生薑二片棗二枚煎至八

分食前溫服

龍骨散 大全良方 因藥損胎下惡血不止

龍骨

當歸

地黃

艾葉

地榆

阿膠

芍藥

乾姜

蒲黃分五

牛角總三分

右為末食前米飲調一錢服

當歸散 大全良方 療妊娠被驚惱胎向下不安小腹

腰痛下血

當歸

川芎

阿膠

人參

艾葉四分

大棗二枚

茯苓錢一

右咬咀每服八錢生薑三片水一鍾半煎至八分

食前溫服

一方 治胎動出血產門痛

用黃連為末酒調一錢日三服

立聖散 胎動不安下血不止

用雞肝二具好酒一斤煮熟共酒食之大効

金匱當歸散 妊娠宜常服之

當歸

川芎

白芍

黃芩各一兩

白朮兩

右五味為末酒飲調服方寸匕日二次 或用酒糊為丸如梧桐子大每服五十九茶湯任下空心食前服日三次

此方養血清熱之劑也瘦人血少有熱胎動不安素曾半產者皆宜服之以清其源而後無患也

○廣按婦人有妊娠則碍脾運化遲而生濕濕而生熱

古人用白朮黃芩為安胎之聖藥蓋白朮補脾燥濕黃芩清熱故也况妊娠賴血培養此方又加當歸川芎白芍以補血尤為備也服此劑之後尤為易產所生男女兼無胎毒則痘疹稀少無病易育而聰明智慧不假言矣此端本澄源之事也累試累驗

安胎飲 永類鈴方治懷胎三四月至九月惡阻病者心中潰悶頭重目昏眩四肢沉重懈墮不欲動作惡聞食氣欲吃鹹酸睡多少起嘔逆不食或胎動不安非時轉動腹腸疼痛或時下血及妊娠一切病疾並皆治之

甘草炙

茯苓去皮

當歸去蘆

川芎

熟苧倍酒蒸

白木

黃耆去苗

白芍藥

半夏湯泡

阿膠蛤粉

地榆各等分

右咬咀每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分去滓溫

服不拘時候一方無半夏地榆有人參桑寄生一

方無白木黃耆半夏揄有艾是膠艾湯加白茯苓

安胎和氣飲濟生方治胎冷腹脹痛引兩脇小便頻數大

便虛滑

訶子去核煨

白木各一

陳皮去白

高良姜炒

木香不見

陳米炒

甘草各半

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎服忌食生冷之物

大聖散濟生方治妊娠心忪睡眾多驚腹脇膨脹坐臥不

寧

白茯苓去皮

川芎

水芩門冬心

當歸去酒浸

黃芪去蘆

木香不見

人參

甘草軟

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去滓溫服

芎藭補中湯濟生方治懷孕血氣虛弱不能衛養以致數

月而墮

乾姜炮

阿膠蛤粉

芎藭

五味子各一

黃芪去蘆

當歸去蘆

白木

赤芍藥各半

木香不見

人參

杜仲去皮

甘草各半

右吹咀每服八錢生薑三片棗二枚水一鍾半煎至八

分食前服

知母丸聖惠方治月日未足而似欲產腹痛者

用知母為末燒蜜丸如雞頭大每服一丸溫酒對下日

一服一方如梧桐子大每服二十九丸粥飲送下

槐子丸大全良方治妊娠月數未足而似欲產腹痛者

槐子

蒲黃各等

右為末用煉蜜丸如梧子大溫酒下三十九丸以痛止為

度

○胎漏

如聖湯濟生方治胎動腹痛或為漏胎

鯉魚皮

當歸去蘆酒浸

熟地黃酒蒸

白芍藥

川芎

阿膠蛤粉炒

川續斷酒浸

甘草炙各等分

右吹咀每服四錢水一鍾芎根少許姜五片同煎溫服

桑寄生散濟生方治胎漏經血妄行淋瀝不已

當歸去蘆酒浸

桑寄生

川續斷酒浸

川芎

白朮

香附子炒去毛

阿膠蛤粉炒

人參

茯苓去木各一兩

甘草炙五錢

右吹咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去粗不拘時

溫服

一黃散 拔萃方 治婦人胎漏下血

生地黄 熟地黄各等分

右為細末煎白朮枳殼湯調下二錢食前服

枳殼湯 拔萃方 治婦人胎漏下血及因事下血

枳殼去穢炒 黃芩各等分 白朮一兩

右為末水煎食前溫服二錢

秘傳當歸寄生湯 治姙娠胎漏非時下血

當歸 川芎 艾葉 白朮各一錢

人參 桑寄生 川續斷 熟地黄各二錢

用水二鍾煎至一鍾去滓空心溫服

厚朴散 無故卒下血

阿膠二兩蛤粉炒 生地黄半斤搗取汁

右以清酒三升將二味攪勻溫熱分三服飲之

一方 無故尿血

龍骨一兩 蒲黃半兩

右為末酒調每服二錢日三服

一方胎動不安或腰疼胞轉撞心下血不止

用石菖蒲根搗汁三升飲之

方用檳榔一兩為末葱白湯調下一錢

榆白皮散 簡易方 治姙孕漏胎去血恐其難產常宜服之

榆白皮

葵根

大麻仁去殼

瞿麥各一兩

木通兩

牛膝七錢半去苗酒浸焙

右咬咀每服四錢水一鍾煎八分溫服

地黃當歸湯 治胎痛

當歸兩

熟地黃兩

右為末每半兩水煎大全良方等分為末蜜丸名內補丸許學士云大率婦人妊娠唯在抑陽助陰蓋此等藥甚多然胎前藥唯惡群隊若陰陽交錯別生他病唯是枳殼散所以抑陽四物湯所以助陰故爾然枳殼散苦寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾以內補丸佐之則陽

不至強陰不至弱陰陽調停有益胎嗣此前人未嘗論及也愚詳陰陽調停不若不服為愈

○惡阻

半夏茯苓湯和劑方治妊娠惡阻惡聞食氣胃膈痰逆嘔吐

旋覆花

陳皮去白麩炒

桔梗

白芍藥

人參去蘆

甘草炙

川芎各半兩

半夏泡七次二錢半

赤茯苓

熟芩各七錢半

右咬咀每服四錢水一鍾姜四片煎七分空心熱服

茯苓丸和劑方治妊娠惡阻停飲憂聞食氣當與茯苓湯

兼服

赤茯苓去皮

人參去蘆

肉桂去皮

乾姜炮

半夏洗焙

陳皮各一兩

白朮

葛根

甘草多

枳實去白麩炒黃各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲下

竹茹湯和劑方治妊娠嘔吐頭疼眩暈

橘紅去白

甘草半錢

麥門冬去心

厚朴姜製

白茯苓各半兩

白朮一兩

右咬咀每服五錢水一鍾姜五片入竹茹一塊如彈子

大同煎至八分不拘時溫服

小地黃丸和劑方治妊娠惡心嘔吐清水腹痛不食

人參去蘆

乾姜炮各等分

右為末用生地黃汁丸如梧桐子大每服五十九白朮

湯下食前服

參橘散和劑方治妊娠三月惡阻吐逆不食或心虛煩悶

赤茯苓

橘皮去白各三兩

白朮

厚朴姜製

甘草炙各五錢

右咬咀每服四錢水一鍾姜七片竹茹少許煎七分去

滓溫服

白朮散簡易方治妊娠胎氣不和不進飲食

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮炒

紫蘇各一兩

白芷炒

人參各一兩

訶子

青皮去白

川芎各七錢半

甘草二錢

右咬咀每服四錢水一鍾姜三片煎七分不拘時服

旋覆半夏湯濟生方治姙娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多

臥少起

旋覆花

川芎

細辛洗去

人參

甘草各半兩

半夏湯洗七次

赤茯苓去皮

當歸去蘆酒浸

乾生姜

陳皮各一兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去粗溫服

人參半夏丸濟生方治姙娠惡阻醋心脰腹冷痛吐逆不

食

半夏

湯泡七次

人參

乾生姜

各半兩

右為末以生地黄汁浸蒸餅丸如梧桐子大每服四十

丸米飲下

白朮散大全良方治惡阻吐清水十餘日粥漿不入者

白朮一兩

人參五錢

丁香二錢

甘草一錢

右咬咀每服一兩生姜五片水二鍾煎至一鍾去滓溫

服食前

人參橘皮湯聖惠方治惡阻病嘔吐痰水

人參去蘆

橘皮

白朮

麥門冬

甘草各三錢

厚朴製

白茯苓各半兩

右咬咀每服一兩水二鍾姜三片竹茹彈大一塊煎至

一鍾去滓食前溫服集驗方無茯苓麥門冬有甘草

人參丁香散大全良方治妊娠惡阻胃寒吐逆翻胃吐食

及心腹刺痛

人參五錢

丁香

藿香各二錢半

右咬咀每服五錢水一鍾煎至八分去滓溫服無時

保生湯大全良方治婦人經候不調或不行身無病似病

脈滑大而六脈俱勻乃是孕婦之脈也精神如故惡聞

食氣或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切勿

作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加了香生薑煎服

人參

甘草各二錢半

白朮

香附子

烏藥

橘紅各五錢

右咬咀每服一兩水一鍾半生薑三片煎七分去滓溫

服不拘時或為末調服亦可

○子煩

竹葉湯簡易方治妊娠心驚膽怯終日煩悶證曰子煩

白茯苓四兩

防風

麥門冬去心

黃芩各三兩

右咬咀每服四錢水一鍾竹葉五片煎服不拘時

知母飲簡易方治妊娘心脾壅熱咽膈渴苦煩悶多驚

赤茯苓

黃芩

黃耆各三

知母

麥門冬

甘草各二

右咬咀每服四錢水一鍾入桑白皮煎熟再入竹瀝同

服

竹茹湯大全良方療妊娘煩躁或胎不動

淡青竹茹一兩

右用水一大升煮四合徐徐服盡為度

麥門冬散濟生方治妊娘心驚膽怯煩悶名曰子煩

麥門冬心法

防風

白茯苓各一人參兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片淡竹葉十片煎七分

溫服

歸涼接命散濟生方治妊娘面赤口苦心煩腹脹

川芎

芫根

白芍藥

麥門冬心法

當歸酒浸蘆

白木各一

糯米半

甘草錢五

右咬咀每服四錢水一鍾半煎至一鍾去粗溫服

麥門冬散聖惠方療妊娘心煩憤悶虛燥吐逆惡聞食氣

頭眩四肢沉重百節疼痛多臥少起

麥門冬

子芩

赤茯苓

柴胡

赤芍藥

陳皮

人參

桑寄生

桔梗

甘草

旋覆花

各半兩

生地黄

右咬咀每服八錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓食前溫服

柴胡散

聖惠方

治妊娠心煩頭目昏重不思飲食或嘔吐

柴胡

赤茯苓

麥門冬

各一兩

枇杷葉

人參

橘皮

甘草

各三錢

右咬咀每服八錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓溫服無時

人參散

聖惠方

治妊娠乾氣乘於心脾津液枯少煩躁

熱口舌乾渴

人參

麥門冬

赤茯苓

地骨皮

家葛根

黃芩

犀角

各七錢半

甘草

右咬咀每服八錢水一鍾半煎至八分去滓溫服

○子癇

羚羊角散

永類鈴方治妊娠中風頭項強直筋脉掣急言語蹇澁痰涎不利或時發搐不省人事名曰子癇

羚羊角

川獨活

酸棗仁

炒

五加皮

薏苡仁

防風

當歸

川芎

茯神

杏仁

木香

甘草

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分不拘時服

防風湯 大全良方 治妊娠中風卒倒心神悶亂口禁不能言四肢強直

防風

桑寄生

葛根各一

菊花

防已

細辛

秦艽

當歸

官桂

茯神

甘草

羚羊角各半

右吹咀每服八錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓

加竹瀝半合溫服不拘時候

葛根湯 聖惠方 療妊娠臨月因發風痙忽悶憤不識人吐

逆眩倒少醒復發名曰子癇

葛根

貝母

牡丹皮各

防風

防已

當歸

川芎

白茯苓

官桂

澤瀉

甘草各二

石膏

獨活

人參各三

右吹咀每服八錢水二鍾煎至八分去滓溫服無時

防風葛根湯 妊娠中風腰背強直時復反張

防風

葛根

川芎

生地黄各一

杏仁去皮

麻黃去節各桂心少

獨活

甘草

防已各一

右每服八錢水一鍾半煎八分不拘時溫服

一方 妊娠中風角弓反張口噤語澁調之風痙亦名

癰

麻黃去節

防風

獨活兩

桂心許

羚羊角

升麻

甘草

酸棗仁

秦艽各半兩

川芎

當歸

杏仁製各七錢

右每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分加竹瀝一合

溫服

●子腫

全生白朮散簡易方治姪娘面目虛浮肢體腫如水氣名

曰子腫

白朮兩

生姜皮

大腹皮

陳皮

白茯苓皮各半兩

右為末每服二錢米飲調下不拘時服

五皮散大全良方治胎水尋常脾虛腫滿

大腹皮

桑白皮

茯苓皮

生姜皮

陳皮分

右咬咀每服八錢水一鍾濃磨木香水一鍾同煎至八

分去滓不拘時溫服一方空心服

防已湯脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小便不利

防已七錢

木香二錢

赤茯苓

桑白皮

紫蘇莖葉各一兩

右每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分食前溫服
如大便不通加枳殼樞柳

●子氣

李氏天仙藤散治妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸
腫腿膝以來行步艱辛以至喘悶飲食不美狀似水氣
至於脚指間有黃水出者名曰子氣

天仙藤洗各 香附子炒 陳皮 甘草

烏藥各等

右為末每服三錢水一鍾半姜三片紫蘇三葉
片同煎服食前服日三次腫消止藥

腎著湯大全良方 治妊娠腰脚腫

茯苓 白朮各四錢 杏仁 甘草各三錢

●子淋 右呔咀每服八錢水二鍾煎至一鍾去滓通口食前服

安榮散濟生方 治妊娠小便澀少遂成淋瀝名曰子淋

麥門冬心法 通草 滑石各三錢 當歸去蘆酒浸
灯心 甘草各半兩 人參 細辛各一兩

右為細末煎麥門冬湯調下不拘時服

大腹皮散濟生方 治妊娠大小便赤澀

枳殼去白炒 大腹皮 甘草各錢 赤茯苓去皮三錢

右為末每服一錢濃煎葱白湯調下不拘時

冬葵子散濟生方治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈欲倒

冬葵子錢 赤茯苓去鐵

右為末每服二錢米飲調服不拘時如小便不通恐是轉胞加髮灰錢極妙

●轉胞

八味丸治妊娠小便不通名曰轉胞亦治子淋方見

全生茯苓散簡方治妊娠小便不通

赤茯苓

右以咀每服五錢水二鍾煎至一鍾空心溫服濟生方加髮灰少許同服極妙

●子懸

紫蘇飲濟生方治胎氣不和湊上心腹脹滿疼痛謂之子懸

大腹皮 川芎 白芍藥 陳皮去白

紫蘇葉 當歸去蘆酒浸各兩 人參 甘草各半兩

右以咀每服四錢水一鍾生薑五片葱白七寸煎至七分空心溫服

香朮散大全良方治妊娠五箇月已後每常胃腹間氣刺

滿痛或腸鳴以致嘔逆減食此由忿怒憂思過度飲食失節所致蔡元度寵人有子夫人怒欲逐之遂成此病醫官王師復處此方三服而愈

莪朮

煨一兩

丁香

錢五

甘草

半錢

右為細末每服一錢空心鹽湯調服覺胃中如物推下之狀

○廣按此方所言婦人忿怒憂思過度以致胃腹之間氣刺滿痛此言良是蓋婦人上有舅姑丈夫事觸物忤不能自決而憂思忿怒沉鬱于中丹溪云氣鬱便成火火載胎上榮衛不通則心腹之間脹滿痛俱作

也宜矣

●兒在腹中哭

經驗方

用多年空屋下鼠穴中土一塊令孕婦噙之即止

又方

經驗方

用川黃連濃煎令母哈之

●鬼胎

斬鬼丹 鬼胎如抱一瓮

吳茱萸

川烏炮

秦艽

柴胡

白殭蚕

等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸蜜酒送下取出

惡物愈

●風寒熱病

表虛六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項

強身熱惡風脉浮而弱太陽經病宜服

四物湯 兩 桂枝 兩 地骨皮 各七

表實六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊

惡寒太陽經病宜服

四物湯 兩 麻黃 兩 細辛 各半

風濕六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼

脉浮而瀋頭痛太陽標病也宜服

四物湯 兩 防風 兩 蒼朮 各七

升麻六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發

斑如錦文宜服

四物湯 兩 升麻 兩 連翹 各七

合湯 聖惠方 若妊娠傷寒胸脇滿痛而脉弦少陽

強宜服

柴胡 兩 黃芩 各七

大黃六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而

脉沉數陽本病也急下之宜服

四物湯 兩 人黃 錢五 桃仁 十箇 去皮

人參六合湯 聖惠方 若妊婦傷寒汗下後咳嗽不止者宜服

四物湯 兩四 人參 五味子 各五錢

厚朴六合湯 聖惠方 若妊婦傷寒汗下後虛痞脹滿者陽

明本虛宜服亦治咳嗽喘滿

四物湯 兩四 厚朴 枳實 各五錢

梔子六合湯 聖惠方 若妊婦傷寒汗下後不得眠者宜服

四物湯 兩四 梔子 黃芩 各五錢

石膏六合湯 聖惠方 若妊婦傷寒身熱大渴寒熱而煩脈

長而大者宜服

四物湯 兩四 石膏 知母 各五錢

茯苓六合湯 聖惠方 若妊婦傷寒小便不利太陽本病也

宜服

四物湯 兩四 茯苓 澤瀉 各五錢

琥珀六合湯 聖惠方 若妊婦傷寒太陽本病小便赤如血

狀者宜服

四物湯 兩四 琥珀 茯苓 各五錢

膠艾六合湯 聖惠方 若妊婦傷寒汗下後血漏不止胎氣

損者宜服

四物湯 兩四 阿膠 艾葉 各半兩

一方有甘草同上 一方加乾姜甘草薑

附子六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脉沉而遲少陰病也宜服

四物湯 附子附子皮臍 桂各半

四物大黃湯 聖惠方 若妊娠傷寒畜血証不宜墮胎藥下

宜服

四物湯 生地黄 大黃酒浸各五錢

芎蘇散 濟生方 治妊娠外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋心

胃煩悶

紫蘇葉 川芎 白芍藥 白朮

麥門冬法 陳皮法 乾葛各一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水 薑五片葱白二寸煎服

白朮散 拔萃方 治妊娠傷寒煩熱頭痛胎氣未安或時吐

逆不下食

白朮 橘紅 人參 前胡

川芎 麥門冬 赤茯苓各一兩 甘草

半夏湯泡七次姜汁炒各半兩

右咬咀每服四錢姜四片竹茹二錢半水煎去滓溫服

無時

升麻散 拔萃方 治妊娠傷寒頭痛身體熱

產前 法附餘卷之三 二十九 二二八十五法

升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃去節各兩

黃芩

大青各半兩

石膏兩

右為粗末每服四錢生姜四片竹葉五七片水同煎

芍藥湯按方治婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲下

脈沉者太陰也宜服此藥

芍藥

白朮各一兩

甘草

茯苓各五錢

黃耆兩

右剉細每服一兩水煎服

麻黃散聖惠方治妊娠五六月傷寒頭痛壯熱四肢煩疼

麻黃

桂心

柴胡

赤芍藥各一兩

甘草兩

右吹咀每服八錢生薑三片水一盞半煎至八分去滓

通口服

前胡湯大金良方治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節疼痛

石膏二錢二分

前胡六分

甜竹葉三分

黃芩

大青各五分

知母

梔子各四分

右吹咀每服八錢水一盞半葱白三寸煎至八分去滓

溫服不拘時外臺無甜竹葉

黃龍湯聖惠方治婦人妊娠寒熱頭痛嘔噦不欲食脇下

痛嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水

產前

法付徐卷之三

三十一

三三五

適來適斷病後勞復餘熱不解宜服

柴胡去蘆

黃芩

人參

甘草

各三錢七分半

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服無時

枳實散聖惠方治妊婦傷寒四日至六日以來加心腹脹

上氣渴不止飲食不多腰疼體重

枳實炒一兩

陳皮七錢半

麥門冬去心半兩

右咬咀每服一兩水一盞半生姜半錢葱白七寸煎至

八分溫服

麥門冬湯聖惠方治妊娘傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食

胎動不安

人參

石膏兩

前胡

黃芩

各七錢半

家葛根

麥門冬各五錢

右咬咀每服一兩水一盞生姜三片棗二枚竹茹一錢

半煎至一盞去滓溫服不拘時

秦光散 傷寒五六日不得汗口乾多飲水狂語嘔逆

秦光

柴胡

石膏

前胡

赤茯苓

甘草節

葛根

犀角屑

升麻各等分

右每服八錢水二盞姜三片竹茹三錢煎至八分溫服

●廣按此方云傷寒五六日不得汗口乾多飲水狂語

產前

法附錄卷之三十一

三十一

二百五十一

吐通此即溫熱病之證候也古方溫熱病皆謂之傷寒多不分也用者審之

薑黃解肌湯聖惠方治妊娠傷風自汗

人參

黃蘗

當歸

川芎

甘草各半兩

芍藥錢六

右咬咀每服八錢水二盞煎至八分去滓溫服不拘時

加蒼朮生地黄亦可

柴胡散

聖惠方

治妊娠熱病骨節煩痛頭痛壯熱若熱

治則類

柴胡

葛根

知母

梔子

甘草錢五

石膏兩三

大青

茯苓

升麻錢七

右咬咀每服八錢水一盞半葱白三寸煎至八分去滓

通口服不拘時候

一方有黃芩無茯苓

梔子仁飲子大全良方

治妊娠熱病斑出黑色小便如血

氣急絕胎欲落

梔子仁

升麻

石膏

地黄各二兩

黃芩

大青各一兩

豆豉九粒

救急方有杏仁無地黃石膏

右咬咀每服半兩水一盞葱白七寸煎至五分去滓溫

服無時 一方加青黛無毒日 又方以陳艾如雞子
大酒煮服救妊婦危困

大黃飲子 聖惠方 治妊婦熱病六七日熱入腹中大小便
秘澀煩熱

大黃微炒

石膏路一

知母

前胡

赤茯苓各二錢

梔子仁

甘草

黃芩路五

右咬咀每服八錢水一盞生地黃二錢半煎至七分去
滓食前溫服

柴胡石膏湯 聖惠方 治妊婦傷暑頭痛惡寒身熱煩燥悶
亂四肢疼痛項背拘急口乾舌燥宜服

柴胡兩

甘草兩

石膏兩

右咬咀每服八錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓
溫服無時若氣虛體冷加人參四兩
傷寒熱病護胎法

一方 用白藥子不拘多少為末以雞彈清調攤於紙上
如碗大貼臍下胎存處乾以溫水潤之

一方 以竈心土水調塗臍下乾又塗之就調服一錢
一方 壯熱甚并底泥敷心下令胎不傷

● 雜病

消風散 濟生方 治妊婦肝臟熱毒上攻太陽穴頭眩目暈

產前

治法附錄卷之三

三

二百一十八

腮項腫核膏膈涎壅

石膏煨

甘菊花去枝梗

防風去蘆

荊芥穗

川羌活去蘆

川芎

羚羊角鎊

大豆黃卷炒

當歸去蘆

白芷各一兩

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞入好茶半錢煎至八分去滓

食後溫服

天門冬飲子濟生方治妊娠肝經風熱上攻眼目世帶吊失

明

天門冬去心

知母

羌藟子各一兩

防風去蘆半兩

五味子

茯苓去皮

川羌活去蘆

人參各七錢半

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎至八分去滓食後

溫服

百合散濟生方治妊娠風雍咳嗽痰喘滿悶

百合蒸

紫苑洗

貝母去心

白芍藥

前胡蘆

赤茯苓去皮

桔梗去蘆炒各一兩

甘草炙五錢

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎至八分去粗不拘

時溫服

百合散聖惠方治妊娠咳嗽心膈不利煩滿不食

川百合

紫苑

麥門冬

桔梗

桑白皮各一兩

甘草半兩

竹茹一兩

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓入蜜半匙
再煎一二沸食後溫服

紫苑湯永類針方治妊娠咳嗽不止胎動不安

甘草 杏仁 桑白皮各二錢紫苑一兩

桔梗兩 天門冬去心各一兩

右咬咀每服八錢水一盞半竹茹一團煎至八分去滓
入蜜半匙再煎一二沸溫服

馬兜鈴散大全良方治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴 人參 甘草

貝母各五錢 陳皮 大腹皮 紫蘇

桑白皮各一兩 五味子七錢

右咬咀每服八錢生姜三片水一盞半煎至八分去滓
食後溫服

平安散濟生方治妊娠上氣喘急嘔吐不食腹脇脹痛

厚朴 生姜各二錢 乾姜炮 陳皮去白各一錢

川芎半錢 木香半錢 乾地黄洗一錢半 甘草炙四錢

右咬咀每服四錢水一盞入燒鹽一捻煎服不拘時

驅邪散濟生方治妊娠停食感冷發為瘧疾

高良姜炒 白朮 草果仁 橘紅

藿香葉 縮砂仁 白茯苓去皮各一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

柴胡散 治妊娠瘧疾

黃芩半錢

甘草錢

柴胡

生大黃錢二

右作一服水煎臨發日五更溫服取利為度如胎上逼

心可服枳殼散忌油麵辛酸之物

一方 治瘧疾發熱口乾渴飲無度

生地黃半兩

黃芩兩

麥門冬心法

人參

知母

乾葛各一兩

石膏兩二

甘草兩半

右每服一兩水一鍾半烏梅半箇煎至一鍾溫服

一方 治瘧疾

常山

石膏兩一

甘草錢

黃芩各半兩

烏梅七箇

右作二服每服酒水各一碗浸一宿平旦煎服

蒙姜黃連丸 濟生方 治妊娠下痢赤白穀道腫痛冷熱皆

可服之

乾姜炮

黃連去

縮砂仁炒

川芎

阿膠蛤粉

白朮各一兩

乳香三錢

枳殼去白麩

右為末用鹽梅三箇取肉入少醋糊同杵丸如梧桐子

大每服四十九白痢乾姜湯赤痢甘草湯下 赤白痢

乾姜甘草湯下

當歸芍藥湯 濟生方 治妊娠腹中疝痛下痢

白芍藥

白茯苓去皮

當歸酒浸

澤瀉

川芎各一兩

白木一兩

右為末每服三錢空心溫酒米飲任下

白木湯 治孕婦下痢膿血

白木

黃芩

當歸各四錢

用水二盞煎至一盞去粗食前溫服

大龍散 援萃方 治妊娠氣痛

艾葉末鹽炒一兩

茴香

川練子各一兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分食後服

白木湯 千金方 治妊娠卒心痛欲死不可忍者

白木三兩去黑心

赤芍藥二兩

黃芩一兩去黑心

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫

服忌桃李雀肉

當歸散 大全良方 治妊娠中惡心腹疝痛

當歸

丁香

川芎各三兩

青皮二兩

吳茱萸湯洗三去梗

右為末溫酒調一錢服無時

芎歸湯 援萃方 治妊娠先忽患中心腹痛如刀刺

川芎

人參

茯苓

官桂

吳茱萸

當歸各三兩

厚朴製

白芍藥各二兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候一方有桔梗無官桂

○廣按丹溪云凡心腹諸痛不可用參朮補氣其痛愈甚則此方與前白朮湯中皆犯藥禁未知果子否乎食公下氣湯大全良方治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下飲食四肢無力

羌活

赤芍藥

甘草

檳榔

青皮

八腹皮

陳皮

赤茯苓

半夏

桑白皮

官桂銜五

紫蘇兩

右咬咀每服八錢生姜五片棗一枚水一盞半煎至八分去滓食前溫服

勝金散

濟生方治妊娠脾胃氣冷小腹虛脹

吳茱萸

酒浸

陳皮法

生姜

乾姜炮

川芎

厚朴去皮

縮砂仁炒

甘草各等分

右為末每服二錢鹽湯調服不拘時

通氣散

大全良方治妊娠腰痛狀不可忍此藥神妙

破故紙不以多少瓦上炒令香熟

右為末嚼胡桃肉半箇空心溫酒調下一錢

消熱飲子聖惠方治妊婦時氣六七日熱甚大小便不利

最宜服之

川芒硝一兩 研細 葵子三兩

台為末每服五錢溫水調下無時一方水二大盞煎至一盞三分去滓不拘時溫服

一方 治孕婦大便秘澀大全良方

枳殼三兩 防風二兩 甘草二兩

右為末每服二錢白湯調下空心食前日三服

桑螵蛸散濟生方 治妊娠小便不禁

桑螵蛸二十箇炙為細末每服二錢空心米飲調下

白薇散濟生方 治妊娠遺尿不禁

白薇 白芍藥各等分

右為末每服三錢食前溫酒調服

●瘦胎

瘦胎枳殼散簡易方 治妊娠七八月常宜服滑胎易產

粉甘草一兩 商州枳殼五兩 去白半炙 麩炒赤

右為末每服一錢空心白湯點服一方加香附子尤佳

○廣按前人云枳殼散性苦寒若單服之恐有胎寒胎痛之疾以地黃當歸湯蜜丸佐之可也說見前

地黃當歸湯 補血養胎與枳殼散間服蓋枳殼散破氣

有餘而地黃當歸湯補血不足也方見前

救生散濟生方治胎氣本怯不宜瘦胎合服此藥安胎益氣易產

人參

訶子煨去核

白朮

神麩

陳皮各等分

右為末每服二錢水一盞煎至七分空心溫服

●催生

催生如聖散

黃葵花不以多少焙乾

右為末熟湯調下二錢神效 或有漏血胎臍乾澁難

產痛劇者併進三服良久腹中氣寬胎滑即時產下

如無花只以蜀葵子研爛小半合以酒調尤妙 亦

打撲傷損如胎死不下煎紅花溫酒調下

子四十九粒或三十粒歌曰黃金丙子三十粒細研酒

調能備急命若懸係在須臾即令眷屬不悲泣

催生如聖散濟生方

用黃蜀葵子為細末每服二錢熱酒調下熱湯亦可

催生神妙佛手散

大全良方

治婦人妊娠五七月因事築

磕着胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤欲絕用此

藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下

當歸錢六

川芎錢四

用水一盞半煎令泣欲乾頭酒一大盞止煎一沸去滓
溫服口噤灌之如人行五里再服不過二三服便生
催生如意散聖惠方臨產腰疼方可服

人參為末錢一

乳香錢一

辰砂分五

右將一處研臨產之時急用雞子清一箇調藥末再用
姜汁調開冷服如橫生倒產即時順子母平安
催生神效七寶散大全良方臨產腰痛方可服

玄胡索

沒藥

白礬

香白芷焙

姜黃焙

當歸

桂心各等分

右為細末每服三錢燒梨頭令紅淬酒調下臨陣疼
服一二服立產

催生如神散聖惠方治逆產橫生瘦胎兼產前產後虛損
月脉不調崩漏等証一名催生黑散子一名烏金散一
名二神散

百草霜

白芷蘇枳火

右等分研勻服二錢於臨產之時以童子小便并少米
醋打為膏沸湯調下集驗方用童子便酒各半盞煎沸
即調停熱服甚者不過再服

催生丹簡易方治產婦生理不順臨產艱難

十二月兔腦髓去膜研

乳香研如粉麝香細研

母丁香末錢一

右研勻用兔髓和丸如雞頭大陰乾油紙封貯每一丸研破後溫水服即時產下隨男左女右手握藥出是驗
催生鉛丹濟生方治橫逆難產

用黑鉛一錢將小銚子火上鎔接水銀一錢急攪結成砂子傾出以熟絹衣角紐作丸子如棗豆大臨產時麝香水吞下二丸立下

催生散 懷孕不曾行動舒伸忍痛曲身玄卧故子在腹中不能動轉致有橫逆難產甚則子死腹中

蛇退條

蟬退條

人退即男子頭髮一團如雞卵大

方 俱燒為末酒調下分作三服

方

用蛇退一條全者燒灰入麝香一字酒調二錢而東服如橫生逆產以餘相塗所出手足即順也

方

用草鞋鼻繩路上者洗淨燒灰末童便和酒調服一名千里馬

滑胎散 聖惠方 催生神效

益元散一兩方

蛇退一條燒灰存性

男子亂髮香油一兩化

蟬退全者五箇燒灰

穿山甲一片燒灰存性

右為細末用蠶水一碗和藥煎二沸入油頭髮拌勻冷定服之立下

●產難

無憂散濟生方治胎肥氣逆或人瘦血少胎弱臨產難產

當歸

川芎

白芍藥各一兩枳殼炒半

乳香錢三

木香

甘草各一錢血餘灰錢三

右為末每服二錢水盞煎至八分不拘時溫服

金液丸濟生方治胎氣太肥橫逆難產



飛生毛下火燒如脂

血餘灰無病女

公母羊糞燒灰各半錢

竈心土錢 硃砂別研

黑鉛二錢用銚子火上鎔投水銀半錢攪結成砂子傾出研令極細

右為末用粽子角為丸如菘豆大遇難產以倒流水吞

五九

來甦散 濟生方治臨產用力太過氣脉衰微精神困倦頭

眩目暈口噤面青髮直不省人事

木香

神麩炒

陳皮

麥蘖

黃芪去蘆

生薑切炒

阿膠

白芍錢

苧根錢

甘草錢

糯米半合

右用水三盞煎至一盞半幹開口灌之連進為妙
二退散 治產難

蛇退金餅 蚕退紙方圓

右各燒存性為細末酒調服

雲母散 橫生逆產

用雲母石研成粉每服一錢酒調下不拘時服

救生散 橫生逆產

用桂心為末童便酒調一錢服之神效

一方 治產難

用臘月兔頭一枚燒灰為末葱白湯調二錢立生 又

或吞雞子黃三箇并少苦酒服之立生 又或用赤小

豆二升水九升煮取一升汁入炙了明黃膠一兩同煎

少時一服五合 又用槐子十四枚即下 又方當歸

為末酒調方寸匕服之

一方 治難產三日不下

用伏龍肝細研每服一錢酒調服之

一方 治胞衣不下

取阜屋黑塵研為細末酒調方寸匕服之

黑龍丹 濟生方 治妊娠臨產難生或胎衣不下產後血暈

不省人事狀如中風血閉惡露不止腹中刺痛血滯浮

腫血入心經語言顛倒如見鬼神血風攪身熱頭痛
或類癰疾胎前產後一切危急狼狽垂死以此藥灌三
四丸無不救活者

五靈脂

當歸酒洗

生地黄

川芎

良姜各三兩

右剉入砂鍋內紙筋鹽泥固濟炭火煨通紅候火減冷
取出研細入後藥

百草霜三錢

乳香

生硫黃

琥珀

花葉石鎊二錢

右五味計一兩一錢細末同前藥和勻米醋煮麵糊為

丸如彈子大每要服用炭火煨藥通紅投入生姜自然
汁浸碎之以無灰酒併合童便頓服神效不可盡述
內灸散和劑方治婦人產前產後一切血疾血崩虛憊腹
脇疼痛氣逆嘔吐冷氣凝積塊硬刺痛泄下青白或下
五色腹中虛鳴氣滿堅脹瀝血腰痛口吐清水頻產血
衰顏色青黃勞傷劣弱月經不調下血墮胎血迷血暈
血癢時發疼痛頭自眩暈惡血上心悶絕昏迷惡露不
乾體虛多汗手足逆冷並宜服之

●死胎

香桂散 大全良方下死胎

生前

長材餘天三

四十五

二三百三十六

麝香五分 官桂錢二

右共和勻用温酒一盞調服須臾如手推下

官桂五錢 牡丹皮 川芎 萊子各一分

右為細末每服三錢煎葱白湯下

一字神散大全良方 治子死腹中胎不下胞破不生此方
累有效驗

鬼白不拘多少 黃色者去毛

右研為末以手指撚之如粉極細為度此藥不用羅每
服三錢用無灰酒一盞同煎至八分通口服立生如神

一方 死胎不出產婦面青指甲青舌青口臭

用朴硝為末每服二錢順流水調下甚者温童子小便
調服胎下母活亦治胎衣不下

霹靂奪命丹濟生方 治臨產驚然氣痿目翻口噤面黑唇

青沫出口中子母俱損兩臉微紅子死母活修合時勿
令婦妾雞犬見之

蛇退一條 瓦 金銀箔各七丁 香別研

髮灰錢一 馬鳴一錢 黑鉛二錢

水銀七分 半依 千里馬略上左脚踏草鞋一隻

右為末以獐猪心血丸如梧桐子大倒流水灌下二丸

如灌不下研開亦得

如聖膏大全良方治難產蒸治胞衣不下亦治死胎

用葶藶子七粒去殼細研成膏塗腳心胞衣即下速洗去不洗腸出却用此膏塗頂上腸即縮入如聖之妙一方用四十九粒

○廣按產前諸証皆因胎氣所致夫胎動胎漏皆下血而胎動有腹痛胎漏無腹痛為異爾故胎動宜行氣胎漏宜清熱也惡阻者惡心而阻隔飲食也子煩者煩躁而心忪也子癇者痰涎潮搐目吊口禁也子腫者面目赤汗液體腫滿也子氣者兩足浮腫也

子淋者小便澀少也轉胞者小便不通也子懸者心胃脹痛也蓋脾主運化水穀婦人有胎則脾運化水穀不利而生濕濕則生痰痰生熱熱生風也子腫子氣者濕也惡阻者痰也子煩子淋者熱也子癇者風也子懸者氣也轉胞者虛也濕則滲之痰則消之熱則清之風則平之氣則散之虛則補之何為而不愈哉外有風寒熱病雜病之條者用藥要去邪保胎之並行有催生難產死胎之目者治法有緩急輕重之少異業醫者其可忽乎

產後

九十六

○產後無得令虛。當大補氣血為先。雖有雜証。以未治之。一切病多是血虛。皆不可發表。產後不可用芍藥。以其酸寒。伐生發之氣故也。產後血暈。因虛火載血上行。漸漸暈來。方用鹿角燒灰出火毒。研極細末。好酒同童便灌下。一呷即醒。行血極快。又方以葶葉細切。盛於有嘴瓶中。以熱醋沃之。急封其口。速以嘴塞產婦鼻孔中。可愈。產後中風。切不可作風治。必大補氣血為主。然後治痰。當以左右手之脈。分其血氣多少而治。

產後中風。口眼喎斜。不可服小續命湯。產後水腫。必用大補氣血為主。以佐蒼朮茯苓。使水自利。產後大發熱。必用乾姜。輕者用茯苓淡滲其熱。一應寒苦。并發表之藥。皆不可用。產後發熱惡寒。皆屬血虛。左手脈不足。補血藥多於補氣藥。惡寒發熱腹痛者。當云惡血。脹滿者。不是。產後發熱。乳汁不通。及膨者。無子。當消。用麥蘖二兩炒研細末。清湯調下。作四服。有子者。用木通通草。豬蹄煎服。凡產後有痼疾。先固血氣。前條云產後大熱。必用乾姜。或曰用姜者何也。曰此熱非有餘之熱。乃陰虛生內熱。故以補陰藥大劑服。

又方 治產後惡露不盡小腹作痛

五靈脂中 香附上 一方加蛤粉下

右為末醋糊丸甚者入桃仁不去尖溫水服三十丸

獨行丸 治婦人產後血衝心痛及治男子血氣心腹痛

有孕者忌服

五靈脂不拘多少去土半炒半生

右為末水丸彈子大每一丸或酒或姜湯化下

參朮膏 治產後胞損成淋瀝証

人參二錢 白朮錢 桃仁去皮尖 陳皮錢二

黃芪半錢 茯苓錢 甘草錢半

右咬咀先用水煮猪羊胞熟湯二鍾入藥煎一鍾溫服

附諸賢論

王節齋曰凡婦人產後陰血虛陽無所依而浮散於外故多發熱治法用四物湯補陰血而以炙乾姜之苦溫從治收其浮散使歸依於陰然產後脾胃虛多有過服飲食傷滯而發熱者誤作血虛則不效矣但遇產後發熱者須審問用何飲食有無傷積胃膈飽悶噯氣惡食泄瀉等証只作傷食治之若發熱而飲食自調者方用補血正法

附諸方

花藥石散 治產後胎衣不下極有神效方見前跌撲損傷類

奪命丹 濟生方 治產後血入衣中脹滿衝心久而不下或

去血過多肺氣喘促謂之孤陽絕陰亦難治之証宜急

取鞋底炙熱小腹上下對之次進此藥

附子炮去皮牡丹皮去心 乾漆炒令煙盡

右為末用酸醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥丸如

梧桐子大每服五十九溫酒送下

一方 產後惡血衝心胞衣不下腹中血塊

用錦紋大黃一兩為末以好醋半升熬成膏丸如梧桐

子大以醋大半鍾化五丸服之須臾即下

一方 治產後生腸不收

用枳殼二兩去穰煎湯溫浸良久即入

一方 治婦人子宮不收

荊芥穗中 藿香葉中 臭椿皮上

右等分吹咀煎湯薰洗子宮即入

一方 治婦人子宮太痛不可忍

五倍子 白礬各等分

右為末溫湯泡洗乾糝亦可

一方 治下胎或產後血上沖心已死

用鬱金燒灰存性為末每服二錢米醋一呷調灌之立

活

芎歸湯和劑方治產後去血過多暈煩不省一切去血并宜服之

芎藭

當歸去蘆酒洗

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓不拘時執服
腹中刺痛加白芍藥 口乾煩渴加烏梅麥門冬 發
寒熱加乾姜白芍藥 水停心下微有嘔逆加茯苓生
姜 虛煩不得眠加人參竹葉 大便秘澀加生地黃
橘紅杏仁 小便不利加車前子 腹脇膨脹加厚朴
血崩不止加香附子 咳嗽痰多加紫苑半夏生薑

腰疼膝痛加牛膝 心下疼痛加玄胡索 惡血不下

腰腹重痛加牡丹皮

返魂丹 治生產一十六証 一名益母丸

野天麻一名益母草方梗四五月節間開紫花時採花葉子陰乾半斤

赤芍藥錢六 當歸錢七 木香錢五

右同為細末煉蜜丸如彈子大每服一九隨飲子下

○子死腹中冷痛小便流出腹脹四肢冷瓜甲青里童便酒和勻煎沸化下

○產後惡血不盡臍腹刺痛童便和酒化下

○產時面垢顏赤胎衣不下敗血自下如帶或橫生下

○產後鼻衄口乾舌黑童便酒下

○產後赤白帶下秦朮同糯米煎湯下

○廣按返魂丹功效不可具述其於產前清熱養血產後推陳致新無不可也有事之家理宜預備

黑神散和劑方治婦人產後惡露不盡胞衣不下血氣攻心眩暈等証

黑豆炒

熟地黄

當歸酒浸

肉桂去

乾姜炮

甘草炙

芍藥

蒲黃各四兩

濟生方去蒲黃加附子

右為末每服二錢熱酒調下入童子小便尤佳

○廣按敗血見熱則行見寒則凝理也此方姜桂俱用

已是熱矣而濟生又加以附子不無熱之太過乎世

俗好溫惡寒之弊於此見之也

里龍丹 治姪娘臨產臨生或胎衣不下產後血暈不省

人事及惡露不盡腹中刺痛血入心經語言恍惚並宜

服之方見產前

四味湯聖惠方療產後一切諸疾纔方分婉宜服

當歸

玄胡索

血竭

沒藥各五分

右共二錢為細末用童子小便半盞煎熟調通口服

如心膈煩加當歸五分 如氣悶喘急加玄胡索五分

如惡露不快加血竭五分

如心腹撮痛加沒藥五

神仙索金散

醫方大成

治婦人產後血暈血虛積血不散

寒熱往來胃膈不快氣喘不進飲食骨節疼痛生血風

瘡此藥逐惡血生新血止肚痛

當歸

川芎

赤芍藥

熟地黃

金藤

川牛膝

麻黃

玄胡索炒

官桂

神麴

荆芥

粉甘草

雄黑豆

各一兩

右為末每服二錢溫酒調下或當歸湯童子小便任下

不拘時候

一方治產後血暈心悶氣絕

用紅花一兩坏子者為末作二服酒二盞煎取一盞

服如口噤幹開口灌之

血竭破棺散

秘方

治婦人產後血閉血迷血暈血勞嗽血

男子傷力勞嗽吐血

乳香

血竭

箭頭砂錢一

右為末巴豆仁研沉共為膏磁器盛之如用丸如雞頭

大婦人狗膽調冷酒下男子止用冷酒下

清魂散

濟生方

治產後血暈昏不知人更宜先取乾漆或

漆器燒烟鼻中薰之類置醋炭房內次進此藥

澤蘭葉

人參去蘆一兩

荆芥穗兩

甘草錢八

川芎兩

右為末每服二錢熱湯溫酒各半盞調勻灌下

奪命散 大全良方

失志及產後百病

沒藥

血竭

右等分為末纔產下便用童便與細酒各半盞煎一二沸調下二錢良久再服其惡血自此下行更不衝上免生百病專治婦人方只用白湯調下

七珍散

大全良方論曰產後不語者何答曰人心有七孔

三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此即服此藥

川芎

人參

石菖蒲

各一兩

細辛錢一

防風

辰砂另研各

兩

生乾地黄兩一

一方加甘草半兩名八珍散

右為末每服一錢薄荷湯調下不拘時候

胡氏孤鳳散

大全良方

治產後閉口不語

用白礬研細熟水調下一錢

產後

卷之三十一

五十六

七音九折

○廣按產後不語有熱血迷塞心竅者有熱痰迷塞心竅者前方七珍散治熱血此方孤鳳散治熱痰也肥人多是熱痰瘦人多是熱血

卷荷散按粹方治產後血上冲心血刺血暈血氣腹痛惡

露不快並皆治之

初出卷荷 紅花

當歸

蒲黃紙炒

牡丹皮略一

右為細末每服三錢空心益酒送下二臘月用童子小便調下

大嚴蜜湯濟生方治產後血氣衝心時發疼痛甚者宜進

玄胡索湯方見經病類

熟地黄酒蒸 當歸酒浸

川獨活去蘆

白芍藥

細辛洗

吳茱萸炒

桂心不見

小草

乾姜略一

甘草略半

右咬咀每服四錢水一鍾不拘時煎服

當歸血竭丸聖惠方治婦人產後惡物不下結聚成塊心

胃痞悶及臍下堅痛

當歸炒

血竭

蓬朮

芍藥各一

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五六十丸溫酒送下或粥清下空心食前服

荷葉散 聖惠方 療產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

乾荷葉二兩 挑仁半兩去皮 劉寄奴

蒲黃各一

右吹咀每服四錢半童子小便一大盞生姜三片生地

黃一分煎至六分去粗熱服不拘時

失笑散 治產後心腹絞痛欲死者方見經病類

紫金丸 大全良方 治產後惡露不快腰痛小腹如刺時作

寒熱頭痛亦治久有瘀血月水不調羸瘦不思飲食

痔心痛與失笑散同

五靈脂水淘去石礞 真蒲黃

右以好米醋調五靈脂末慢火熬成膏子次以蒲黃水

搜和丸如櫻桃大每服一九水與童子小便各半

七分令藥化溫服少頃再一服惡露即下久有瘀血成

塊月信不利者並用酒磨下

一方 治產後血塊腹痛

荆芥炒 川當歸炒 乾地黄洗 芍藥各半

蒲黃二錢半 隔紙炒赤色

右同為細末每服三錢空心溫酒調服

地黃散 拔粹方 治產後惡物不盡腹中疝痛

生乾地黄 當歸炒各二兩 生姜半兩 細切如蠅頭大

右為細末姜酒調下二錢服不拘時

四神散和劑方治產後瘀血不消積聚不散作塊心腹切痛

當歸 乾姜炮 川芎 赤芍藥各等分

右為細末每服二錢溫酒調下

當歸養血丸和劑方治產後惡血不盡發熱身痛經閉者並皆治之

肉桂兩 當歸去蘆 牡丹皮 玄胡索

赤芍藥各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒

米飲下

天仙藤散聖惠方治產後腹痛不止及一切血氣腹痛

天仙藤炒焦

右為末每服二錢產後腹痛用炒姜小便和酒調下當患氣血用溫酒調下

玉燭散 治產後惡露不盡臍腹疼痛特寒熱

當歸 川芎 赤芍藥 熟地黃

黃 甘草 朴硝銕半

右作一服水二盞煎至一盞去滓食前溫服

○廣按諸方治敗血作痛皆是溫劑熱劑流通之理惟

此一方却是涼劑蓋為敗血凝滯發熱大便秘結者
設也非大便秘結者慎不可用

一方 治產後敗血不止

生乾地黄兩一

用石器內搗為細末每服二錢食前熱酒調服連進三

服

瑞蓮散 聖惠方 治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮一枚燒
灰存性

棕櫚燒灰
存性

當歸各一
兩

官桂兩

煨榔二枚

鯉魚鱗炒

川芎各一
兩

右為細末每服三錢煨生薑酒調如未止更進一服或

特血崩此藥可治進此三服即止

紅花散 產後血昏血崩月事不調遠年乾血氣

乾荷葉

牡丹皮

當歸

紅花

蒲黃炒各
等分

右為細末每服一錢酒調溫服 若胞衣不下以榆白

皮煎湯調服半兩立効

琥珀散 聖惠方 治產後經脉不調四肢煩疼飲食減少日

漸羸瘦

琥珀

牛膝

生地黄

當歸各一
兩

桃仁

赤芍藥各五
錢

右咬咀每服八錢水二盞生姜三片煎至八分去滓無
時溫服 一方加桂心半兩

調經散 濟生方治產後敗血停積五臟流入四肢令人浮

腫不可作水氣治之但調其經而腫自消又有去血過

多心虛易驚加生龍腦一握煎服

沒藥研 肉桂各一錢不見火 赤芍藥 細辛洗半錢

琥珀別研一錢 射香別研半錢 當歸去蘆酒浸各一兩

同芍藥甘草錢

右為末每服二錢生姜汁溫酒任意調下

趁痛散 濟生方治產後血滯筋脉拘攣腰背強直遍身疼

痛

當歸去蘆酒浸 官桂不見火 白朮 黃芪去蘆

獨活去蘆 生姜 川牛膝去蘆酒浸各半兩

甘草錢三 薤白半錢

右咬咀每服四錢水二盞煎服加桑寄生半兩尤佳

愈風散 聖惠方療產後中風不省人事口噤牙緊手足瘳

癱如角弓狀口吐涎沫亦治血暈四肢強直或築心聾

倒吐瀉欲死

荆芥穗焙 當歸身尾各等分

右為末每服三錢豆淋酒調下用童子小便亦可其効

如神口噤者斡開灌之或吹鼻中皆效一方用蜜丸
或麵糊丸如梧桐子大每服五十九空心米湯下
血風湯 產後諸風變急或痿弱無力

川芎上 芍藥中 當歸上 熟地黃上

秦艽中 羌活中 防風下 白芷中

白朮上 茯苓上

右為細末一半煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九
溫酒下一半末溫酒調下

交加散 濟生方治產後中風脇不得轉動

生地黃取汁 生薑取汁

右交互以汁浸渣一夕次日漬取盡汁各炒黃燥
酒調服不拘時

○已上諸方行血去邪之劑

四順理中丸 和劑方治新產血氣俱傷脾胃不調百日内

宜常服

甘草兩二 人參去蘆 乾姜炮 白朮各一

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心米飲下
千金散 治產後虛勞不能食

白朮 茯苓 黃芪各二 人參

川芎 芍藥 熟地黃 當歸各一

肉桂半兩

甘草炒半兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜五片棗三枚同煎至一盞空心溫服

人參當歸散和劑方治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱其証心腎煩滿吸吸短氣頭痛悶亂晡時轉甚與大病後虛煩相類急宜服之

乾地黄

人參去蘆

當歸去蘆

肉桂去粗皮

麥門冬去心各一兩

白芍藥二兩

右咬咀每服四錢水二盞先以粳米一合淡竹葉十片煎至一盞去米葉藥并棗三枚煎溫服血熱甚者加

生地黄

當歸黃耆湯和劑方治產後失血過多腰脚疼痛汗

當歸去蘆三兩

黃耆

白芍藥各二兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分去滓再煎增損四物湯濟生方治產後陰陽不和乍寒乍熱如有露未盡停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異

當歸去蘆

白芍藥

川芎

乾姜

人參各一兩

甘草炒半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎服不拘時

當歸羊肉湯濟生方治產後發熱自汗肢體疼痛名曰羸勞

當歸酒浸去蘆 人參錢七 黃芪去蘆一兩 生姜兩

右咬咀用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入前藥煎四盞去滓作六服早晚頻進

豬腰子粥濟生方治產後羸勞發熱

用豬腰子一箇去白膜切作柳葉片用鹽酒拌之先用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盆底用熟粥蓋之如你蠶生粥狀空心服之

熟地黄湯澹寮方治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食

無味

熟地黄酒浸蒸焙 人參去蘆 麥門冬去心

甘草炙半兩 桔槩根兩

右咬咀每服四錢水一盞半糯米一撮姜三片棗二枚煎八分不拘時服

人參湯永類鈐方治產後諸虛不足發熱盜汗

歸身 人參去蘆

右等分為末豬腰子一箇去膜切作片子以水三升糯米半合葱白二莖煮米熟取清汁一盞入藥二錢煎至八分不拘時服

大調經散 聖惠方 治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯
榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆氣未
平之所為也

大豆炒一兩半 茯苓一兩 琥珀錢

右為末每服三錢濃煎烏豆紫蘇湯調下

白茯苓散 聖惠方 治產後辱勞蓋因生產日淺久坐多語
運動用力遂致頭目四肢疼痛寒熱如瘡狀

白茯苓兩 當歸 川芎 桂心

白芍藥 黃耆 人參 熟地黄各半

右以咀先用水二盞入猪鬃一雙去脂膜細研生姜三

片棗子二箇同煎至一盞去取日姜棗入沒藥五分煮取
七分去滓食前分二服温服

佛手散 大全良方 治產後血虛方倦盜汗多困少力咳嗽
有痰

當歸 川芎 黃耆各一 柴胡

前胡各半

右以咀每服五錢水一大盞挑柳枝各三寸棗子烏梅
各一枚生姜三片煎至六分去滓温服如有痰去烏梅

黃龍湯 大全良方 治婦人寒熱頭痛嘿嘿不欲食脇下痛

嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞室寒熱如瘡并經水適

未適斷病後勞復餘熱不解

柴胡四分

黃芩

人參

甘草各一錢

右作一服用水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時

增損柴胡湯聖惠方治產後經水適斷感于異證手足搖
擗咬牙昏冒係屬上焦

柴胡八錢

黃芩四錢

人參三錢

甘草

石膏各四錢

知母錢

黃芪五錢

半夏三錢

右咬咀每服八錢生姜二片棗一枚水一盞半煎至八
分去滓溫服無時

增損柴胡湯濟生方治產後血羸發寒熱飲食少進腹脹

柴胡

人參

甘草

半夏

陳皮

川芎

白芍藥

右等分咬咀每服八錢水一盞半生姜五片棗二枚煎
至八分去滓不拘時通口服

三之一湯濟生方治產後虛勞雖日久而脉浮感疾

柴胡八錢

黃芩

人參

半夏洗

甘草炙

川芎

芍藥

熟地黃

當歸各三錢

右咬咀每服八錢水二盞生姜三片棗一枚煎至八分
去滓溫服

三聖散濟生方治產後日久虛勞針灸服藥俱不効者

川芎 當歸 熟地黄 白芍藥

白朮 白茯苓 黃芪各一兩 柴胡

人參各一兩 黃芩 半夏 甘草各六錢

右吹咀每服八錢水一盞半生姜三片棗一枚煎至八分去滓通口食前服一方無姜棗

○廣按已上五方小柴胡湯加減法也學者對證而用則中肯綮矣

○已上諸方補虛退熱之劑

芎藭理中丸 產後元氣虛弱臍腹疼痛泄瀉不止又治

男子脾胃虛弱又泄不止

人參兩 白朮兩 乾姜 甘草各五錢

肉苳藟七錢 粳米一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服四五十九空心米湯下酒煮麵糊為丸亦可

調中湯濟生方治產後腸胃虛怯冷氣乘之腹脇刺痛筒

泄不止

良姜炒 當歸去蘆 肉桂不見 白芍藥

附子炮去皮 川芎各一兩 甘草各 人參各半

右吹咀每服三錢水一盞煎服

白朮散 聖惠方 治產後霍亂吐瀉腹痛煩渴手足逆冷

白朮 橘皮 麥門冬 人參

乾姜 炮各 甘草 炙半

右吹咀每服八錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓服無時

枳實芍藥湯 聖惠方 治產後腹痛煩滿不得卧

枳實 煨存 芍藥

右吹咀等分每服八錢水一盞半煎至八分去滓温服無時一方為末服方寸匕日三服

抵聖湯 濟生方 治產後血氣傷于脾胃腹痛悶嘔逆惡

心

赤芍藥 半夏 澤蘭葉 陳皮 白

人參 各二 甘草 炙一

右吹咀每服四錢生薑七片煎服不拘時

睨皖丸 濟生方 治產後血氣虛弱飲食停積口乾煩悶心

下痞痛

高良姜 炮 薑黃 洗 華澄茄 陳皮 能

蓬朮 炮 人參 京三稜 炮各

右為末用蘿蔔慢火煮令極熟研爛將餘汁煮麩糊丸如梧桐子大每服五十九丸就用蘿蔔湯送下

○廣按已上六方皆治產後脾胃虛弱飲食過傷遂成諸疾而作也

旋覆湯和劑方 產後感冒風寒咳嗽喘滿痰涎壅盛鼻塞聲重

麻黃節

柴胡

杏仁去皮尖

五味子去梗

旋覆花

甘草炙

茯苓

赤芍藥

荆芥去梗

半夏各等分

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎七分溫服

芎烏散 治產後頭痛

天台烏藥 川芎麝

右為末各等分每服二錢或錢燒秤鍾淬酒服

一母散 聖惠方 治產後惡露上攻流入肺經咳嗽如傷風痰嗽用尋常傷風藥不效宜服

知母

貝母

白茯苓

人參各五錢

桃仁去皮尖

杏仁去皮尖

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

參蘇飲 聖惠方 治婦人產後血入於肺面赤發喘欲死者

人參一兩

蘇木二兩

右用水二碗煎蘇木一碗去滓調入參末隨時加減服

丁香散 聖惠方 治產後心煩咳噫不逆脾胃虛寒衛氣厥逆

白豆蔻

丁香 各五錢

伏龍肝 兩

右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再服

石蓮散 聖惠方 治氣欬噫又治吐逆心怔目暈可思飲食

石蓮子 半兩

白茯苓 兩

丁香 兩

右為細末每三錢米飲調下不拘時服

漢防已散 大全良方 治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫

漢防已

猪苓

枳殼

桑白皮 各兩

商陸

甘草 各半

右咬咀每服八錢水盞半生姜三片煎至八分去滓

溫服無時一方空心服

調道散 聖惠方 治婦人產前產後大便不通

當歸

川芎

防風

枳殼 各四錢製

甘草 錢二

右咬咀每服一兩用姜三片棗子一枚水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時忌動風物

麻仁丸 濟生方 治產後去血過多津液枯竭不能轉送大便閉澁

便閉澁

產後

心去付余卷之二十一

二十一

一百七十八

麻子仁上另研枳殼去白麩上人參中

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸温酒米飲任

橘杏丸 治產後體弱大便虛秘又方方系

一方 產後小便數及遺尿

龍骨兩 桑螵蛸半兩

右為細末米飲調下二錢空心服

漏蘆散濟生方治乳婦氣脉壅塞乳汁不行

漏蘆二兩 蛇蛻十 瓜蒌十箇急火

右為細末每服二錢温酒調下不拘時候仍吃熱羹助

之

猪蹄湯澹寮方治妳婦氣少力衰脉澁不行絕乳汁

猪蹄隻 通草兩

右將猪蹄淨洗依食法事治次用水一斗同通草浸煮

得四五升取汁飲之

玉露散大全良方治產後乳脉不行身體壯熱疼痛頭目

昏痛大便澀滯悉能治之凉膈壓熱下乳

人參 白茯苓 甘草各半 桔梗炒

川芎 白芷各一兩 當歸半錢 芍藥半錢

右吹咀每服四錢水一鍾半煎至七分去滓温服食後

如頭熱其大便秘加大黃二錢半

湧泉散 因氣乳汁少

瞿麥穗 麥門冬心法 王不留行 緊龍骨

川山甲 炮黃各等分

右為細末每服一錢熱酒調下先食猪蹄羹後服藥以

木梳左右乳上梳三十餘下日三服

皂角散 治乳汁不通及乳結硬疼痛

歌曰

婦人吹乳意如何

皂角燒灰拾分

熱酒一盃調八分

須臾

一方 治產後陰腫痛

用挑仁去皮尖細研四五次抹之

一方 治產後用力太過陰門突出

用四物湯煎熟入龍骨末少許空心連進二服用麻油

和湯薰洗

一方 治婦人陰冷

用吳茱萸入牛膽中令滿陰乾百日每取二十粒研碎

帛裹納陰中良久如火熱

○已上諸方調理雜證之劑

○廣按產後諸證其源有三曰血虛火動曰敗血妄行

曰飲食過傷何以明之氣屬陽也血屬陰也經曰陽虛生外寒陰虛生內熱蓋產後去血過多血虛火動而為煩躁發熱之類一也血猶水也水之就下性也孟子云今夫水搏而躍之可使過額激而行之可使出山非水之性也勢使之然也蓋產後虛火上載敗血妄行而為頭暈腹痛之類二也經云少火生氣壯火食氣東垣云火為元氣之賊火與元氣不兩立一勝則一負蓋產後火傷元氣脾胃虛弱若飲食過傷則為痞滿吐瀉之類三也治之之法血虛火動則補之敗血妄行則散之飲食過傷則消之何患乎不愈哉雖然之元氣有虛實疾病有淺深治察之難易又不可驟論也

子嗣

九十七 附諸虛 斷子法

丹溪心法

○若是肥盛婦人稟受甚厚。恣於酒食之人。經水不調。不能成胎。謂之軀脂滿溢。閉塞子宮。宜行濕燥痰。用星夏蒼朮。台芎。防風。羌活。滑石。或導痰湯之類。若是怯瘦性急之人。經水不調。不能成胎。謂之子宮乾澀。無血。不能攝受精氣。宜涼血降火。或四物加香附。黃芩。柴胡。養血養陰等藥可宜。東垣有六才地黃丸。以補婦人之

陰血不足無子服之者能使胎孕出誠效方

附脉理

脉訣舉要曰陰搏於下陽別於上血氣和調有子之象手
之少陰其脉動甚尺按不絕此為有孕少陰屬心心主
血脉腎為胞門脉應於尺或寸脉微關滑尺數往來流
利如雀之豕或診三部浮沉一止或平而虛當問月水
婦人有病而無邪脉此孕非病所以不月

附諸方

六味地黄丸見補損

女金丹韓飛霞方

白芍藥

川芎不見

藁本

赤石脂白亦

人參

白薇

桂心

牡丹皮

白芷

白朮

玄胡

白茯苓

沒藥各一兩

當歸二兩

甘草五錢

十五味除石脂沒藥另研外其餘皆以醇酒浸三日烘
乾為細末足殼一十五兩

香附子

十五兩以水醋浸三日
畧炒為細末足十五兩

右十六味和合重羅數過煉蜜丸如彈子大磁銀器封
收每取七丸空心雞未鳴時服一丸先以薄荷湯漱亦
灌漱咽喉後細嚼以溫酒或白湯送下鹹物乾果壓之

子同

法付金卷之三

二四

音五

服至四十九為一劑以癸水調平受胎為度胎中三日
一丸產後二日一丸百日止盡人事而不育焉天矣人
為鹵莽諉曰天命予每于世之乏嗣者惜焉

說洗丸和劑方治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墜

澤蘭葉一兩肉桂去皮五錢當歸洗川芎

石斛酒浸白芍藥牡丹皮熟地黃洗

延胡索各一兩白朮一兩乾姜炮半

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒下

烏雞丸 治婦人羸弱血虛有熱經水不調崩漏帶下骨

蒸等疾不能成胎

用白毛烏骨公雞一隻重二斤半許閉死去毛腸淨

用艾四兩青蒿四兩剉碎約一半在雞腸用酒罈一

隻納雞并餘艾蒿在內用童便和水灌令沒雞二寸

許煮絕乾取出去骨餘俱搗爛如薄餅狀焙乾研為

細末

商香附去毛淨一斤分作四分米泔水浸一分童便

浸一分醋浸一分酒浸一分春秋二夏一冬四日取

出晒乾

熟地黃四兩當歸洗酒浸白芍藥 遼人參

鱉甲醋浸炙生地黃懷慶者勿犯白朮

黃芪

川牛膝去蘆

柴胡

牡丹皮去心

知母

貝母各二兩

秦艽一兩

地骨皮

乾姜

玄胡索

黃連各一兩

川芎三兩

白茯苓去白二兩半

右并香附共為細末并雞末酒醋糊為丸如梧桐子大

每服五六十丸漸加至七八十丸温酒下或米飲下亦

得忌煎炒辛辣之物及葷菜

○補血新增

附諸方

當歸建中湯和劑方治婦人一切血氣不足虛損羸瘦

當歸去蘆四兩

肉桂去

甘草各二兩

白芍藥六兩

右吹咀每服三錢水一盞姜五片棗一枚同煎空心熱

服

人參養血丸和劑方治女人稟受素弱血氣虛損常服補

衝任調月候暖下元生血氣令人有子

烏梅肉三兩

熟乾地黃五兩當歸去蘆二兩

人參去蘆

赤芍藥

川芎

蒲黃炒各二兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服八十九温酒米飲

任下

六神湯御藥院方治血氣不足肌體煩熱四肢倦怠不進

飲食

當歸

地黃

芍藥

川芎

地骨皮

黃芪各一

右咬咀每服四錢水二盞煎七分空心溫服

補中丸聖惠方治婦人虛損諸疾宜常服

川芎

白芍藥

黃芪

當歸

人參

陳皮各五

白朮

地黃各一

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九溫水下

八珍散瑞竹堂方

調和榮衛理順陰陽滋血養氣進美飲

食

四物湯

四君子湯

右等分姜三片棗子一枚水二

盞煎至二盞去滓食前

溫服

滋血湯

御藥院方治婦人皮聚亡落心肺俱損血脈虛弱

月水過期益氣養血調進飲食

人參中

白茯苓

去皮川芎中

當歸上

白芍藥

山藥上

黃耆上

熟地黃上

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食前溫服不

拘時

滋血湯大全良方

滋養榮血補婦人諸虛治血海久冷

一

二

三

四

當歸 川芎 芍藥 人參

麥門冬 牡丹皮 阿膠各二兩 琥珀七錢半

酸棗仁炒 官桂 甘草各一兩 半夏一兩

右父咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至八分去滓通

口服食前日三服

烏雞煎丸 秘方治婦人百病虛勞血氣赤白帶下等証

當歸 黃芪各六兩 生地黃 香附子各四兩

茯苓三兩 人參 官桂 地骨皮各二兩

右用烏骨白雞一隻男用雌女用雄籠住將黃耆末和

炒麵丸雞頭子大喂雞服生膠吊死腸洗淨搗毛拖

碎骨入前藥雞腹內用酒醋各一瓶煮一宿取骨焙枯

研共為細末用汁打糊丸如梧桐子大每服五十九益

湯下

○斷子法用白麵麩一升無灰酒五升作糊煮至二升半

瀘去滓可分作三服候經至前一日晚次早五更及天

明各喫一服經即不一無不字行則終身無子矣

○廣按婦人無子之因或經不勻或血不足或有疾病

或交不時四者而已調其經而補其血去其病而節

其慾夫如是則經調血足無病而交有時豈有不妊

娠者乎雖然人之後嗣係乎天命亦或人事未之盡

子嗣

心法附錄卷之三 七十七 五

者可不究其心歟

諸病

九十八 新增

附諸方

加減四物湯 治婦人諸病

熟地黄

川芎

芍藥

當歸各等分

右以咀每服六錢用水一鍾半煎八分不拘時服

○骨蒸勞熱加地骨皮知母柴胡黃芩

○妊娠胎動不安下血不止加艾葉阿膠黃芪

○血臟虛冷崩中去血過多加阿膠艾葉

○血崩加生地黃蒲黃黃芩 一方加阿膠艾葉黃芩

○血虛腹疼微汗惡風加葶木官桂

○風虛眩暈加秦艽羌活

○氣虛無力加厚朴陳皮

○發熱心煩不得卧加黃連梔子

○虛寒脉微自汗氣短自利加乾姜附子

○中濕身重無力身涼微汗加白朮茯苓

○筋骨肢節疼及頭疼增寒加羌活防風藁本細辛

○臍中虛冷腹疼腰脊間痛加玄胡索川練子

○經水過多加黃芩白朮

○經水澁少加葵花紅花

○虛勞氣弱咳嗽喘滿加厚朴姜製枳實麩炒

○經水暴下加黃芩

○血積塊痛加蘇木三稜官桂乾漆炒

○赤白帶下加香附官桂

○血痢加阿膠艾葉黃連

○產後血痢腹痛加槐花黃連罌粟殼

○血熱相搏舌乾口渴加括蕒根麥門冬

○大渴引飲加知母石膏

○臟腑秘澁加大黃桃仁

○嘔吐加白朮人參藿香生姜

○虛寒滑泄加官桂附子炮

○虛煩不眠加竹葉人參酸棗仁

○目暴赤作翳疼加防風羌活防己酒浸龍膽草

加減四物湯大全良方治妊娘產前腹痛及治月事或多

或少或前或後胎氣不安產後血塊不散或亡血過多

或惡露不下宜服

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃各一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞毒滓食前溫服

○妊娘下血即入艾葉六七片阿膠末一錢同煎病勢

言源
甚大散藥不及以四味各半兩用水四盞煎至二盞
半去滓分四服食前熱服一日中令盡以止為度
○產乳服至三臘止

○如虛弱血藏不調至一月止

○因虛致熱熱與血搏口舌乾渴欲飲水者加天花粉
一兩麥門冬七錢半

○腹中刺痛亞露不下加當歸芍藥各二錢半

○血崩加生地黃蒲黃各一兩

○因熱生風加川芎一錢半柴胡五錢

○身熱脉躁頭昏項強加柴胡黃芩各半兩

○大便秘結加大黃半兩桃仁二錢半炒

○如大便滑泄加桂心熟附子各二錢半

○發寒熱加乾姜牡丹皮芍藥各二錢半

○嘔者加白朮人參各半兩

○腹脹加厚朴枳實各二錢半

○虛煩不得眠加竹葉人參各二錢半

○煩躁大渴加知母石膏各五錢

○水停心下微吐逆加猪苓茯苓防己各二錢半

○虛寒狀類傷寒加人參柴胡防風各七錢半

經驗加減四物湯醫方大成治婦人諸虛不足

當歸

酒浸宿胎身

熟地黃

白芍藥

川芎

各一兩

右咬咀劉為散看病證加減後藥煎服

○血氣不調加吳茱萸一兩甘草半兩

○胎動下血加熟艾一塊阿膠末一錢

○補下元加乾姜半兩甘草七錢

○血崩淋瀝不斷加炮附子一箇赤石脂一兩

○便血及帶下加荆芥地椒

○血氣滯腹內刺痛加桂

○產後傷風頭痛加石膏一兩甘草半兩

○血風勞加荆芥柴胡

○潮熱加前胡乾葛人參黃芩

○虛熱口乾加麥門冬半兩黃芩一兩

○嘔吐不止加藿香白朮半兩人參一錢

○產後虛憊血熱煩悶加生地黃

○產後腹脹加枳殼肉桂各三錢

○產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝

○產後寒熱往來加柴胡麥門冬各半兩

○經脉淋瀝不斷加乾瑞蓮房炒入藥

○血滯不通加紅花桃仁各二錢半

○產後悶亂加茯苓遠志各半兩

○虛而多汗加煨牡蠣麻黃根各半兩

○妊娠心腹煩加竹茹一塊

○如有敗血則用當歸近上節白芍藥以赤易熟地黃以生者易之

○大便閉加大黃桃仁各二錢半

八物湯聖惠方若經事欲行腹臍絞痛者血澁也宜服

四物湯四錢玄胡索苦練碎炒黑檳榔木香各一兩

○若經水過多別無証宜服黃芩六合湯

四物湯四兩黃芩白朮各一兩

○若經水澁少宜四物湯加葵花煎又加紅花血見愁

○若虛勞氣弱咳嗽喘滿服厚朴六合湯

四物湯四兩厚朴製一兩枳實炒五錢

○若經水暴下加黃芩一兩若腹痛者加黃連如夏六月不去黃芩

○若經水如黑豆汁者加黃芩黃連各一兩

○若經水少面色和者四物湯加熟地黃當歸各一兩

○若經水適來適斷或有往來寒熱者先服小柴胡湯以去其寒熱後以四物湯和之

○若婦人血積者四物湯內加小三稜桂廣茂乾漆各二兩

八物湯聖惠方若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜服四物湯四兩黃耆甘草茯苓白朮各一兩
○若赤白帶下宜服香桂六合湯

四物湯四兩桂香附子各五錢

○若虛熱病四物與參蘇飲相合名補心湯主之

○若四肢腫痛不能舉動四物蒼朮各半湯主之

○若治燥結四物湯與調胃承氣湯各半名玉燭散

○若流濕潤燥宜四物湯理中湯各半

○若大渴者加知母石膏

○若保胎無令人有子四物湯加磁砂四君子湯各半

名八珍湯

○若熱與血相搏口舌乾渴飲水加括蕒麥門冬

○若腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥

○若血崩者加生地黃蒲黃黃芩

○若臟秘結澁者加大黃桃仁

○若頭昏項强者加柴胡黃芩

○若滑瀉者加官桂附子

○若因熱生風者加川芎柴胡防風

○若嘔者加白朮人參生薑

○若發寒熱者加乾生薑牡丹皮芍藥柴胡

○若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防已

○若虛寒似傷寒者加人參柴胡防風

○若產婦諸證各隨六經以四物與仲景藥各半服之其効如神

○若婦人或因傷酒或因生產去血或虛勞五心煩熱者宜服四物二連湯

四物湯內用生地黄黃連胡黃連真者溫飲清服

○若虛煩不得睡加竹葉人參

○若婦人血虛心腹痞痛不可忍者去地黄加乾姜名四神湯

○若諸痛有濕者四物與白朮相半加天麻茯苓川山甲酒煎

○廣按婦人外感內傷一切疾病與丈夫同治惟月候孕產崩漏滯下數證與丈夫異治也夫婦人以血為海婦人伏於人者凡事不得專行每多憂思忿怒也醫書云氣行則血行氣止則血止蓋婦人憂思過度則氣結氣結而血亦結矣又云氣順則血順氣逆則血逆蓋婦人忿怒過度則氣逆氣逆而血亦逆矣氣血結逆於臟腑經絡之間所以婦人多腹脇諸痛內外煩熱也然疼痛煩熱二者不可不分疼痛者血滯

也煩熱者氣滯也血滯以辛溫之劑治之氣滯以辛
涼之劑治之氣血俱滯而疼痛煩熱齊作者又當以
辛平之劑治之大抵婦人血用事氣行則無病而古
人治婦人之病多用香附縮砂木香檳榔青皮枳殼
者行氣故也抑嘗論之凡治婦人之病先問月候緊
要以月候如期為安先期而不者血熱也過期而來
者血虛也或疼痛或發熱者氣血鬱結也凡婦人之
病多是血氣鬱結故治婦人之病以開鬱行氣為主
鬱開氣行而諸病自瘥矣煩熱是二意煩者內煩也
熱者外熱也

丹溪心法附餘卷之二十一終



丹溪心法附餘卷之二十二

休寧東山古卷方廣約之類集

小兒門上

小兒諸病

九十九

丹溪心法

○乳下小兒常多濕熱食積痰熱傷乳為病大槩肝與脾病多小兒易怒肝病最多大人亦然肝只是有餘腎只是不足



○小兒初生未經食乳急取甘草一寸火上炙熟細切置地上出火毒一時許用水一小盞熬至三分之一去滓用新綿蘸滴兒口中令嚥盡須臾吐痰及瘀血方與乳食年長知瘡無病

○小兒急慢驚風發熱口禁手心伏熱痰熱咳嗽喘喘此類証並用湧法吐之重劑瓜蒂散輕劑用苦參赤小豆末須緞葶汁調服之後用通聖散為末蜜丸服間以桑樹上牛兒陰乾焙末調服以平其氣驚有二証一者熱痰主急驚當吐瀉之一者脾虛乃為慢驚所以多死當養脾急驚只用降火下痰養血慢驚者先實脾土後散

風邪只用朱砂安神丸更於血藥中求之

○小兒驀然無故大叫作發者必死是火火發則虛其氣故也

入方里龍丸 治小兒急慢驚風

牛膽南星 一兩

青礞石 煅 硝等分 一兩

青黛 半兩 蕭薑 二錢 辰砂 三錢 殭蚕 半錢

蜈蚣 錢半 天竺黃 半兩

右為末其草前當用如雞頭大每服一二丸急驚而素密薄荷湯下慢驚前桔梗白朮湯下

治驚而而有熱者

人參五分

茯苓分

白芍藥酒炒一錢 白朮一錢

右以咀姜水煎夏月加黃連生甘草竹葉

通聖散見斑疹類

朱砂安神丸見驚悸類

瓜蒂散見疸類

○疝病或肚大筋青

胡黃連丸 治疝病腹大

胡黃連半錢去

果于積

阿魏一錢半醋浸

神麴二錢去

麴積

麴香四粒

炒黃連一錢去

熱積

右為末猪膽汁丸如黍米大每服二三十丸白朮湯送

下 又云胡黃連丸十二粒白朮湯下

五積丸 治小兒諸般疝積

丑頭末一兩

黃連半兩

陳皮一兩

青皮半兩

山查半兩

右炒焦黑色為末每用巴豆霜半錢煎藥末半錢宿蒸

餅丸麻子大小兒二歲十丸五更姜湯下至天明大便

泄為度溫粥補之未利再服三五丸

烏犀丸

丑頭末三兩

青皮三兩

史君子肉七錢半

白無莖半一錢

鶴虱五錢

蘆薈一錢燒紅

醋一錢 另研

苦練根皮五錢

右炒令焦黑色爲末麩丸麻子大每三五十九米飲送下食前量小兒大小加減

黃龍丸

三稜 三兩

黑角莪木

兩 青皮 一兩

山查肉 七錢

乾姜 七錢半

右用麩丸麻子大日晒乾食後姜湯下量兒大小加減

○烏犀黃龍間服食前服烏犀食後服黃龍

肥兒丸 治小兒疳積

蘆薈另研 胡黃連 三錢炒麩 四錢 黃連

白朮

山查 沙半

燕莢 炒二錢

右爲末蘆薈和勻猪膽汁丸粟米大每六十九食前米

飲下

疳黃食積

白朮

黃連

苦參

山查 等分

右爲末麩丸麻子大食後白湯下十五丸

食傷胃熱熏蒸

白朮 一兩

半夏 半兩

黃連 半兩

平胃散

右用粥丸食後白湯下二十九

○心法附錄曰小兒疳病者小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳

哺飲食一或失常不爲疳者鮮矣疳皆因乳食不調其

肥無節而作也或嬰幼缺乳粥飯太早耗傷形氣則疳之根生延及歲月五疳病成甚者胸陷喘噦乳食直瀉腫滿不利腹脇脹疼皮發紫瘡肌肉光紫與夫疳勞渴瀉面稿色天骨露齒張腹硬不食者皆危篤矣凡此等類虛扁復生難施其巧

○子熱

炒芍藥

香附

滑石一兩

甘草三錢

黃連二錢

右作四服水一盞半生姜三片煎乳母服

○風痰

南星

一兩切用白礬末半兩水泡一指厚浸晒乾研細入

白附子二兩

右為末飛白麵糊丸如芡實大每服一二十九姜蜜湯荷湯化下

白附丸

牛膽南星

一兩須用黃牯牛胆臘月粉南星親手修合風乾隔一年用牛胆須入二三次者佳

大陳半夏

研粉白南星一兩切作片用臘月雪水浸七日去水晒乾

枯白礬

二錢半

右為末宿蒸餅丸如桐子大用姜汁蜜湯送下有熱加薄荷葉

紫金丸 治小兒哮喘不止端午日修合

者丙

心身付余氏之三

五

三三三三

黑椒皮四十九粒浸透去泥次入 人言一錢 鵝管石一錢

右為末丸如黍米大朱砂為衣每一丸或二丸量兒大小空心冷茶清下當日已生冷葷腥熱物服藥病止後更服白附丸三五貼

○小兒腹痛多是飲食所傷宜

白木上 陳皮中 青皮中 山查中

神麴炒中 砂仁下 麥蘗中 甘草下

受寒痛者加藿香吳茱萸更有熱加黃芩水煎服

○小兒腹脹

蘿蔔子蒸 紫蘇 乾葛 陳皮等分

甘草減半

食減者加白木煎服

小兒好喫糝成腹脹疼用白酒麴末同黃連末為丸服之愈

又方 治小兒腹脹

茯苓皮 陳皮 赤小豆 蘿蔔子炒

木通各半錢 木香二分 甘草些少

右咬咀姜一片煎服

○小兒吐瀉黃疸

三稜中 莪木中 青皮中 陳皮上

者為

三稜中

下

三

神麴炒中 茯苓上 麥蘗下 黃連下

甘草下 白木上

存為末調服 傷乳食吐瀉加山查 時氣吐瀉加滑石 發熱加薄荷

○夏月小兒吐瀉用益元散錢氏五補五瀉之藥俱可用吐瀉腹痛吐乳調脾以平胃散入熟蜜加蘇合香丸名萬安膏用米湯化下

○夏月熱病六一散最妙

○小兒痢疾

黃連下 黃芩下 陳皮上 甘草中

右以水煎服 赤痢加紅花桃仁 白痢加滑石末

又方治小兒食積痢

炒神麴中 蒼朮中 滑石中 白芍上
黃芩中 白木上 甘草下 陳皮下

右咬咀水煎下保和丸 一方加茯苓

○小兒赤痢壯熱用藍青搗汁每服半匙與之妙

○小兒黑斑紅斑瘡痒癩疹並宜用防風通聖散為末調服

○小兒口糜

戴云謂滿口生瘡者便是

江茶二錢 粉草二錢

右為末敷之一方用黃丹一錢炒過傳之

又方

苦參一錢 黃丹一錢 五倍子二錢 青黛一錢

右等分為末敷之

又方

青黛二錢 芒硝一錢

右為末敷口中吐嚙俱宜

又方

黃柏二錢 細辛三分 青鹽五分

右等分為末噙之吐出延不過三日愈亦治大人

胎毒口瘡五倍子黃丹甘草江茶芒硝等分為末敷之

○龜胸

蒼朮中 酒栢中 酒芍藥上 陳皮上

防風中 威靈仙下 山查中 當歸上

痢後加生芋中水煎服

○小兒夜啼此是邪熱乘心

黃連一錢姜汁炒 甘草一分

右用竹葉二十片煎服 又方加入參二錢半作二服

入姜一片煎

又法夜啼不止潛取捕雞窠草一握置小兒身下

○小兒脫肛

戴云脫肛者大腸脫下之說

○脫囊即外腎腫大

戴云脫囊者陰囊腫大墜下不收上之說 或云潰爛
陰丸脫出

入方

木通中

甘草下

黃連炒中

當歸上

黃芩中

右以水煎服

又方

治脫肛

用東北方陳壁土泡湯先熏後洗

又方

治脫囊

紫蘇葉莖為末如爛乾傳如未破用香油調鵝翎掃
青荷葉包上

○小兒木舌

戴云木舌者舌腫硬不和軟也又重舌者亦是此類二
者皆是熱病

入方

百草霜下

芒硝下

滑石上

右爲末酒調傳之

重苦用好膽礬研細傳之

○咯血

戴云咯紅者即唾內有血非吐血與咳血同

入方

黑豆上

甘草中

陳皮中

右水煎食後服

○小兒尿血

甘草湯調益元散加升麻煎服尤妙

○小兒喫泥

入方

軟石膏中

黃芩中

陳皮中

茯苓上

白朮上

甘草下

右用水煎服

又方

膩粉一錢砂糖和丸如麻子大米飲下一丸瀉出土立

瘥

○小兒解顛乃是母氣虛熱多耳

戴云即初生小兒頭二骨未合而開者

入方

四君子與四物子母皆可服有熱加酒炒黃芩黃連
生甘草煎服外用帛束緊用白斂末傅之

○小兒吐蛇虫

以苦練根為君佐以二陳湯煎服

小兒冬月吐蛇多是胃寒胃虛所致錢氏白朮散加丁香

二粒

錢氏白朮散

藿香

白朮

木香

白茯苓

甘草

人參錢一

乾葛二錢

右四末每一錢至二錢水煎服

○小兒口噤

治法用搐鼻方

鬱金下

藜蘆中

瓜蒂下

右為末水調搐之

○小兒禿頭

用白炭燒紅碎長流水令熱洗之內又服酒製通聖

散除大黃而用酒炒入研為末再用酒拌乾每服一

錢水煎頻服 外又用胡荽子伏龍肝懸龍尾即梁

塵黃連白礬為末油調傅

又方

者病

心法附錄卷之二十一

十一

三百廿八

松樹厚皮燒灰二兩

黃丹水飛二兩

寒水石細研一兩

白礬枯

黃連

大黃各半兩

輕粉四盞或四分

白膠香熬飛石

右為末熬熱油調傅瘡上須先洗了瘡痂傅之佳

又方 治小兒癩頭并身癩等証

松皮燒灰

白膠香

枯礬

大黃

黃栢等分

右為末用熱油調敷

○小兒頭瘡

水銀等分

水銀等分

右研和勻洗淨傅瘡上

又方

川芎

酒片苓

酒芍藥

陳皮半兩

酒白朮

酒當歸一兩半

酒天麻

蒼朮

蒼耳七錢

酒栢

酒粉草四錢 防風三錢

右為末水盪起煎服日四五次服後睡片時

又方 單治頭瘡

松樹皮厚者燒灰二兩

白膠香熬沸候石上二兩

黃丹一兩

白礬火飛半兩

黃芩

黃連

大黃各三錢

蛇床子

寒水石三錢 白芷

無名異抄少許木香少許輕粉

右為極細末熬熟油調敷瘡上須洗淨瘡去痂傳之佳

又小兒瘡

猪牙皂角去胡椒些小 枯礬 輕粉

右為末樟腦燭油搽七日如嬰桃膿窠去椒

○小兒臍腫汁出

用枯白礬末付或黃栢為末付之 又小兒臍不乾

伏龍肝塗 或用枯礬煨過白龍骨等分付之

○小兒天火丹臍腹起者赤瘤不妨

蚯蚓泥炒調付

○小兒赤瘤 主執傷血

用生芋木通荆芥苦藥帶表之類外以芭蕉油塗患

處芒硝濃煎汁洗之 又方雞子清調伏龍肝傳之

○小兒耳後月蝕瘡

黃連 枯白礬等分

右為末傳之

○小兒鼻赤

雄黃中 黃丹上

右同為末無根水調傳之 又蒼耳葉酒蒸焙乾為末

調服最解食毒 又鼻下一道赤者名曰蠶以黃連末

傳之

辛夷膏 專治小兒鼻流清涕不止

辛夷葉

一兩洗淨焙乾

細辛

木通

白芷

各半兩

杏仁研如泥

木香半兩

右為細末次用杏仁泥羊骨髓猪脂各一兩同諸藥和

勻於瓦石器中熬成膏赤黃色為度於地上放冷入腦

麝各一錢拌勻塗額門上每用少許塗鼻中

○小兒變蒸莫胎毒散也

○乳兒瘡疾痞塊

川芎

生芩

白芍藥

一錢陳皮

半夏

炒芩

甘草

右作一服姜三片就煎下川山甲末半錢

○胎熱胎寒新增

附諸方

釀乳方楊氏方解胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便

不通不能進乳食

澤瀉

猪苓

赤茯苓

天花粉

茵陳

甘草

生地黃

右以咀每服二錢水一盞煎至半盞食後令乳母捏去

宿乳却服

台熟

心法付余

日

三三

胎毒
八法附錄卷之五十一
生地黄湯 楊氏方 治小兒生下遍體皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黃之候皆因母受熱而傳於胎也凡有此證乳母宜服此藥并略與些兒服

生乾地黄 當歸 赤芍藥 川芎
天花粉 各等分

右以咀每服五錢水一盞煎服

當歸散 楊氏方 治小兒胎中受寒生下再感外風面色青白四肢厥冷大便青黑及腹疼盤腸內吊病並皆治之
當歸剉微 黃耆蜜炙 細辛 黃芩

龍骨細研 桂心 赤芍藥各半兩

右為末每服以乳汁調下一字日三服看兒大小加減
釣藤膏 楊氏方 治內吊腹疼

沒藥 乳香各三錢 木香 姜黃各四錢

木鱉十箇

右先將後三味為細末同煎二味拌和煉蜜成劑收沙罐內量兒大小加減煎釣藤湯化下次服魏香散
魏香散 錢氏方

蓬莪朮 半兩 真阿魏 一錢

右先用溫水化阿魏浸蓬莪朮一晝夜焙乾為末每服

一字煎紫蘇米飲空心調下

胎寒傷氣痛楊氏方

方用沒藥乳香各少許研細用木香一塊於乳鉢內磨水半盞調乳香沒藥末煎數沸服之立效

苗香散宣明方治小兒盤腸氣痛

苗香炒

木香

黑附子

金鈴子

去核用皮

蘿蔔子炒

檳榔

破故紙炒

白豆蔻

煨各等分

右以咀每服二錢水盞半入鹽煎服

木香散經濟方治小兒盤腸氣痛不已面青手冷日夜啼

斗尿如米泔

川練子

二箇去皮核用已豆三十五粒去皮同炒令豆黃去豆不用

木香

黃史君子肉

延胡索

苗香各一錢

右同為末清米飲空心調下量兒大小服之

勻氣散 治氣滯不勻宿食不消心腹刺痛嘔吐惡心調

脾胃進飲食

丁香

檀香

木香

白豆蔻

各四錢

藿香

甘草各八錢

砂仁四錢

沉香三錢

陳皮四錢

右為細末用鹽湯調不拘時服

○癘風撮口新增

附諸方

宣風散 治初生小兒臍風撮口多啼不乳口出白沫

全蠲二十一箇頭尾全者去毒用好酒塗炙為末

麝香一字別

右同和為細末用半字金錢煎湯調服

辰砂殭蠶散 治小兒臍風撮口

辰砂

白殭蠶直者去絲嘴炒一錢

蛇蛻皮炒一錢

麝香別研

右為細末少許用蜜調傅唇口

治撮口張氏方治小兒斷臍為風濕所乘或尿在抱裙之內遂成臍風面赤喘急啼聲不出名曰撮口並皆治之

赤脚金銀蜈蚣一枚

搗稍四尾

姜蚕七箇

嬰麥半錢

右為末先將鵝翎管吹藥入鼻內使嚏噴啼哭為可醫後用薄荷湯調服之

定命散陳氏方治因剪臍傷於風濕致令唇青撮口

赤脚蜈蚣半條酒

川烏頭三箇射香少許

右為末和勻每服半字金錢薄荷湯調下

治撮口湯氏方

用白姜蚕為末蜜調塗口唇內即瘥白姜蚕要

治撮口聖惠方

撮口

法附錄卷之三

十一

二百七十

用牛黃一錢研竹瀝一合調勻滴入口中

方

取活蝎虎一箇江蘇名壁虎裝瓶內硃砂細末不拘多少亦

入瓶內封口食砂月餘取出其身赤色陰乾為細末每

服一二分酒下大効

方

用川山甲尾上甲三片羊油炙黃色蝎稍七箇共為極

細末用人乳汁調塗乳上令兒吮之用厚衣包裹須臾

小兒冷汗出愈

方

小兒落胎之時視其臍軟者無臍風即不須治臍硬直

者定有臍風速用簪尖於臍根傍刺破一二處入射香

末少許灸三炷後無臍風

又方 同前

珍珠四十九粒研極細

黃丹

血竭各五

白礬飛過

蛤粉

棗核兒飛虫青灰色棗子大頭上有兩角棗

上有之陰乾三枚無此味亦可

右六味為細末凡人家新生小兒綿裹臍帶離肚五六

寸處先用軟線繒住却於線外將臍咬斷片時去線待

血流盡用鵝翎管送藥一二分入臍大孔內近肚處臍有三孔一

孔以手指輕輕揉散艾灸臍頭三炷結作紇絡軟帛腰
裹切不可常時揭看待臍落去自無風矣此方萬不失
一 又云臍硬直者宜用此法臍軟者不必用此法

一方

兒初生七日若有臍風必自發出青筋一道行至肚却
生兩岔待行至心不治必死知者常視其青筋初發速
照青筋頭上灸三炷或行至生兩岔處亦照兩岔頭上
截灸六炷青筋自消兒必活矣

一方

小兒初生七日急患臍風撮口百無一活父母坐視其

死而無救良可憫哉一秘法極有神驗世罕知之凡兒
患此者齒齦之上有小泡子如粟米狀急以溫水蘸青
熟綿裹手指輕輕擦破即開口便安不用服藥

○鵝口口瘡新增

附諸方

保命散 治小兒鵝口

白礬一錢

馬牙硝五錢 朱砂水飛一錢

右為細末每用一字取白鵝糞以水攪取汁調塗舌上
頷頰內未用藥時先以手指纏亂頭髮揩舌上拭舌上
垢然後用藥傳之

拾金散 治小兒鵝口口瘡

雄黃三錢 鵬砂一錢 龍腦少許 甘草半錢

右為末乾摻患處或用蜜調搽

一方 小兒白屑滿舌狀如鵝口 葛氏方

用髮纏指頭蘸井花水拭口止如不脫濃煮粟米汁以綿纏筋頭拭之却用煨過黃丹摻之

一方 小兒初生舌下有膜如柘榴子連於舌根令兒言語不發

可摘斷之微有血無害如不止燒髮灰摻之 葛氏方

瀉心湯 錢氏方 治小兒口瘡

用黃連去蘆為末蜜水調服 洗心散 尤妙 方見火門

硃礬散 和劑方 治口瘡鵝口不能乳者

用硃砂細研白礬等分為末使亂髮纏指揩舌上令淨以藥付之

一方 治小兒口瘡

枯過白礬一錢半 黃丹一錢半 乳香

右件煉蜜為丸如皂子大臨卧噙化小兒用筋頭點

一方 治小兒心有客熱滿口生瘡 楊氏方

用天南星末醋調貼脚心又有用吳茱萸末米醋調塗亦可

又方

用巴豆一粒去殼搗爛黃丹少許和捏餅外用紙護貼
眉心立止

真黃散 治小兒走馬疳

雞胫黃皮不以多少油燈上燒存性研細末入黃柏
枯礬射香一字用米泔水攪口內貼

立効散 同前

青黛

黃柏末

白礬煨

五倍子各一錢

右為細末用米泔水攪口內貼

牙疳散

珍珠七箇

銅青一分

白礬煨三錢

千里沉石灰半錢

右為細末米泔水攪口貼

一方 治小兒牙疳

用白礬裝於五石厚子內合燒過為末貼之

○重舌木舌新增

附諸方

青液散 治嬰孩小兒鵝口重舌及口瘡

青黛一錢

龍腦一字

朴硝一錢

右為細末用蜜調鵝翎少許付上

一方 治小兒舌下生舌名曰重舌楊氏方

方

方

方

方

用針刺去惡血即愈

治小兒重舌千金方

用竹瀝清黃蘗無時點舌上亦有用真蒲黃塗亦可

一方治小兒舌腫塞口欲滿者

用紫雪一分竹瀝半合細研和勻頻置口中以盡為度

○胎驚夜啼新增

附諸方

方治小兒在胎中受驚故生未滿月而發驚楊氏方

用硃砂研細同牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口中入

射香當門子者尤妙

治胎驚風湯氏方

用全蝎頭尾全者以生薄苧葉裹之以綿扎定火上炙

燥研為末入射香硃砂少許麥門冬湯下

真珠散湯氏方治小兒客忤驚風痰熱心煩恍惚睡卧驚

跳特或咬牙啼叫不已小便赤澀或吐黃沫

真珠末

海螵蛸

滑石各一

茯苓

人參

白附子各二

甘草

全蝎各半錢

朱砂一錢

腦子

射香各半

金銀箔五片

右為末每服半錢燈心麥門冬煎湯入蜜少許調下

金箔鎮心丹治嬰孩小兒鎮心解熱退驚安神除煩燥

心法附錄卷之三十一 十一

止啼

全蝎縛用薄荷包

天麻煨

防風去芦

羌活去芦

牛黃

甘草各一錢射香

赤茯苓去皮犀角

右為細末煉蜜丸如皂角子大薄荷煎湯不拘時候服

治小兒夜啼

用蟬蛻二七枚全者去翅足為末入硃砂一字蜜調為丸使吮之

燈花散三因方治邪熱在心內燥夜啼

用燈花三兩顆石為末燈心煎湯調末口中以乳汁送

下日二服

龍齒散澹寮方治小兒夜啼不住

蟬蛻去翅足洗泥釣藤有釣子龍齒

茯苓去皮

人參各等分

右為末每服一錢水半鍾煎服不拘時

乳頭散湯氏方治夜啼不止腹中疼痛

黃耆

當歸

甘草炙

赤芍藥

木香各等分

右為末每挑少許着乳頭上使吮乳就服之

○變蒸發熱新增

論

去寸餘

二三

二百全

附諸方

惺惺散湯氏方治小兒變蒸發熱或咳嗽痰涎鼻塞聲重相似傷寒者此藥宜服

人參去芦半兩 白朮

白茯苓

甘草

白芍藥

天花粉

桔梗去芦各兩

細辛去錢半去葉只取根

右為末每服二錢水半盞姜一片薄許一匙煎服

神仙黑散子陳氏方治小兒變蒸與傷寒相似者當詳其証若上唇中心有白點子者為變蒸宜服此藥

麻黃去節

大黃

杏仁和皮各

右燒灰存性為末每服一字水半盞煎服抱男於溫暖

處連進之有微汗身涼即瘥

生犀散 骨蒸肌熱瘦悴頰赤口乾日晚潮熱夜有盜汗

五心煩熱

犀角剉末二錢

地骨皮

赤芍藥

柴胡

乾葛各一兩

甘草各二兩

右每服三錢水一鍾煎半鍾食遠溫服

○丹毒蘊熱新增

附諸方

四順青涼飲子和劑方治一切丹毒積熱壅滯咽喉腫閉方見火門

牛黃散和劑方治五種丹毒

麝香 桔梗去芦 天花粉 甘草

葛粉各等分

右為末每服一錢薄荷湯入蜜調下

白玉散錢氏方治赤遊丹腫

白芷一兩 寒水石二兩

右為末米醋調付患處或腫至外腎有破處只用水調

生料四物湯湯氏方治血熱生瘡遍身腫痒

生乾地黄 赤芍藥 川芎 當歸去芦此

風續加 各等分 黃芩減半

右吹咀每服三錢水一盞煎服

防已散湯氏方治小兒伏執毒之氣遍身赤腫入腹入

切防其殺人

漢防已半兩 朴硝 犀角 黃芩

黃耆 川升麻各二錢

右吹咀每服三錢水一鍾加竹葉同煎半鍾溫服

漏芦散湯氏方治五腫丹毒并諸瘡癬

漏芦 麻黃去根節 連翹 川升麻

川芒硝 黃芩各二錢 白欬七錢半 甘草二錢半

川大黃炒一兩

右咬咀每服二錢水一盞煎服不拘時

方 治丹毒發作恐其入腹一時無藥

急以針於紅點處刺出惡血使毒於此而散

方 治走馬火丹

用景天一名隕火草一名仙指留木拘多少搗爛取汁

塗之即効

土黃散 治赤流丹毒

先用小針刀子刺去流頭赤暈惡血毒汁次用

土硫一兩 大黃末一兩

右二件相合新汲水調拌勻用雞翎蘸藥時時塗

伏龍肝散 應驗方 治赤腫赤毒火毒走注

伏龍肝不拘多少用雞子清調敷赤腫處大効

升麻飲 經驗方 治小兒一切丹毒遍身壯熱煩渴

升麻 黃芩 大黃 各一錢 麥門冬 去心

葛根 朴硝

右為末和勻熟水調下半錢或咬咀作一服白水煎服

五福化毒丹 和劑方 治小兒蘊積熱毒驚惕狂燥頰赤咽

乾口舌生瘡夜臥不寧譫語煩渴頭面身體多生瘡癬

玄參 水洗 桔梗 各二錢 白茯苓 二錢 人參 去芦

牙硝 枯 青黛 各一錢 甘草 炙七分 射香 二釐

右為未煉蜜丸如雞頭大金銀箔為衣薄苛湯化下一
九

消毒犀角飲和劑方治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰
涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核腫壅毒聚遍身風疹瘡毒
赤癩及瘡癩已出未出不能快透並皆治察小兒疹痘
欲出已出熱尚未解急進此藥三四服快透消毒應手
神效

鼠粘子四錢 荆芥微炒

甘草各一錢 防風去芦半錢

一方加黃芩一錢

犀角鎊五分如無以升麻代之

石用水一鍾煎至半鍾溫服

牛黃丸聖惠方治小兒心經積熱兩頰紅如塗胭脂手足
常熱口乾燥

○上焦熱壅

牛黃一錢 天竺黃一錢 鬱金三錢 大梔子一錢

右除牛黃天竺黃二味另研外再同四味研極細煉蜜
為丸一周兒黃米大服三十九乳下三歲小兒菉豆大
服三十九薄荷湯下

道守赤散錢氏方治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩燥
悶亂傳流下部小便赤澀淋閉臍下滿痛

生地黃 木通 甘草各二錢 一方加黃芩二錢

右用水一鍾竹葉十片煎至半鍾溫服

大連翹飲活幼方治小兒心經邪熱心與小腸受盛乃水
竇之處常宜通利壅則結滑則脫熱則澁盛則淋平涼
心火三焦自明不得疾作而解證成而察者即急有之
矣一十五味加湯使用纔覺蘊熱客熱寒邪風邪冒入
肺經心將受之心不受觸傳于小腸或閉或澁或赤或
白淋瀝不通榮衛不順壅之作疾其發多端以至膈熱
眼目腫赤唇口白瘡津液不生嘔噎稠盛須在表裏俱
得其宜驚風悉能散之痰熱亦自消除連翹之功可謂
大矣

連翹

瞿麥穗

滑石

車前子

牛旁子

赤芍藥各八分山梔子

木通

川當歸

防風各四分黃芩一分柴胡

甘草各一錢荆芥穗二錢蟬退半錢

右用水一鍾半竹葉十片燈心十莖煎至一鍾服無時
天一丸韓飛霞方治小兒百病

燈心用十斤以米粉漿洗晒乾研末入水澄之浮者

赤白茯苓去皮兼用茯神滑石水飛過

猪苓去皮五兩澤瀉去鬚三兩人參一斤去渣瀉淨煉成膏

如錫糖可
以入藥

一方人參六兩白朮六兩甘草四兩同熬膏亦妙
 右燈心等五味各足分兩為細末以人參膏和成丸如
 圓眼大硃砂為衣貼金箔任病換引大段小兒生理本
 天一生水之妙凡治病以水道通利為捷徑也

○廣按小兒陰不能配陽血不能配氣故凡疾作皆屬
 火韓先生定此方清心而利小便正所以散火也凡
 小兒蘊熱丹毒驚風痰熱變蒸發熱之症用此最當
 而嘔吐瀉痢諸症無不治也

人參生犀散 鮮時氣寒壅咳嗽喘心忪驚悸臟腑或
 秘或瀉及一切風熱

前胡七錢 杏仁去尖桔梗各二錢 人參三錢
 甘草炙二錢

右每服三錢水一鍾前半鍾食後溫服

天竺黃散 涼膈退潮熱
 天竺黃七分大黃 蟬蛻各三分 白僵蚕去絲
 川羌活 全蝎去毒 甘草各五分

右為細末每服一錢麥門冬煎湯調下

辰砂湯 退虛熱和胃進飲食去心驚邪熱

白芍藥 人參 甘草炙各一錢
 硃砂五分 石蓮肉五錢 茯苓炙一錢

右為末次入硃砂研勻每服五分薄苛湯調服
甘露飲 鮮五毒治煩熱

寒水石 石膏 各一兩 甘草 半兩

右為末如餅諸毒氣用生姜自然汁調服傷寒時氣作
熱發征新汲水滴薑汁調服

瀉青丸 錢氏方治小兒肝經風熱目赤腫痛

當歸 龍膽草 川芎 山梔子

大黃 濕紙裹 羌活 防風 各二錢

右為末煉蜜丸如雞頭大竹葉沙糖湯化下一丸

二黃丸 全嬰方治小兒諸熱兼治身黃黃疸衄血便血

黃芩 黃連 去須 大黃 各一錢

右為末滴水為丸茶清下三五丸

地膚子湯 千金方治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通
欲便則澀痛不出出少瘀血須臾復出

地膚子 瞿麥 知母 黃芩

枳實 升麻 葵子 猪苓 各六分

海藻 橘皮 通草 各三分 大黃 一錢八分

右用水一盞煎至半盞去粗溫服

石葦散 活切方治小兒熱淋沙淋石淋

石葦 海金沙 木通 滑石 各一錢

右用水一盞煎至半盞去粗不拘時溫服

八正散 治小兒心經蘊熱臟腑秘結小便淋瀝方見火
梔子仁散湯氏方治小便不通心神煩熱

梔子仁 五分 豨莶根 冬葵根 各半 甘草 煖一錢

右為末每服二錢煎服

勻氣散 御藥院方 治小兒脾肺氣逆喘嗽面浮胃膈痞悶
小便不利

桑白皮 二兩 陳皮 兩半 桔梗 炒一兩 甘草 炙一兩
藿香葉 半兩 木通 四兩 赤茯苓 去皮一兩

右吹咀每服三錢水一盞姜二片煎半盞溫服

○中惡天吊 新增

附諸方

蘇合香丸 和劑方 治小兒卒中惡毒心腹刺痛方見氣滯
辟邪膏 楊氏方 治小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死凡

腹大而滿診其脉緊細而微者生緊大而浮則死急服
蘇合香丸再以皂角末搐鼻次服沉香降氣湯加人參
茯苓不愈進以辟邪膏無不效者客忤亦可服

降真香 白膠香 沉香 虎頭骨

鬼臼 龍膽草 人參 茯苓 各半兩

右為末入雄黃半兩射香一錢煉蜜為丸乳香湯化下

及令兒帶燒卧處尤妙

沉香降氣湯方見氣滯

九龍控涎散湯氏方治小兒蘊熱痰塞經絡頭目仰視名為天吊

滴乳香一錢別研天竺黃二錢半雄黃二錢別研鵝茶二錢

白礬一錢煨甘草二錢炙荆芥穗一錢炒

菡豆一百粒半生炒赤脚蜈蚣一條酒浸炙

右為末每服半錢至一錢煎人參薄荷湯下

釣藤散湯氏方治小兒天吊潮熱

釣藤 人參去芦犀角屑各半全蝎二錢半

甘草炙一分半天麻二錢半

右為末每服一錢煎至半盞溫服

牛黃膏 治小兒風癇迷悶抽掣涎潮

牛膽南星依前製全蝎去毒炒蟬蛻去足各二錢半

僵蚕去絲嘴炒白附子 防風 天麻煨各一錢半

右為細末蒸棗去皮核取肉研為丸如小豆大用荆芥

生薑同煎湯研化食遠服

斷癇丹楊天方治癇即愈而復作者

黃耆炙塗釣藤釣子 細辛去苗葉甘草炙各半兩

蛇退三寸酒蟬殼四箇去牛黃一字別研

右為末秦因為丸如蘇子大煎人參湯下一歲十九大

小如減用

細辛大黃湯湯氏方治風癩執癩

細辛去苗土 大黃炮 防風去芦各甘草半二錢

右吹咀每服二錢水半盞加犀角屑少許煎服

竹瀝膏湯氏方治小兒諸癩

白朮蜜炒二錢半 大附子法去皮犀角一錢未各厚朴甘草水

全蝎七箇每一箇用大葉薄荷裹湯

右為末取竹瀝為膏丸黑豆大母服用金錢薄荷湯化

下一丸隨兒大小加減

至寶丹錢氏方治諸癩急驚卒中客忤並宜服之

安息香約一兩半為末無灰一自飛過慮過沙石

琥珀研 硃砂 雄黃各一兩 銀箔五十片

龍腦 射香各二錢 牛黃研兩各 生烏犀角

生玳瑁研各一 金箔五十片一

右生犀玳瑁搗羅為細末入餘藥令勻將安息香膏以

重湯煮凝成和搜為劑如乾即入少熟蜜丸如梧桐子

大二歲服二丸人參湯化下大小量意加減

一方醫方集成治小兒癩癩及婦人心風諸疾

用茸遂末一錢褚心一箇取三管頭血三條和茸遂末

將猪心批作兩半以藥入在內用線纏定以皮紙包裹
水濕入文武火內煨熟不可過度除紙以藥細研辰砂
末一錢和勻分作四丸每服一丸猪心煎湯化下再服
別耳猪心煎湯化下再服

龍腦地黃膏宣明方治小兒急慢驚風痰涎上潮心胸天

吊驚纏喉風小兒胸膈不利一切熱毒大有神效如病
不愈與分肢散一服吐利得快常服此藥

川大黃別搗甘草各半兩雄黃水窩者一分

射香一錢別生腦子一錢

右五味各製了再入乳鉢內同研細煉蜜為膏油紙

如有前病煎薄許湯下旋丸如皂子太化下如小兒

人驚驚及心神恍惚煎金銀湯下一丸常服新汲水

大解暑毒如孕婦人常服永生男婦亦無礙

人陽毒傷寒加輕粉二匣龍腦許水化下一丸

小兒看年紀大小加減服立效

分肢散宣明方治小兒卒風大人眼喎斜風涎暴心驚

痛天吊走馬喉閉急驚一切風熱等疾

芭豆半兩不川大黃一兩朴硝半兩

右大黃為末後入芭豆霜朴硝一處細研用油紙包起

如有前患每服半錢熱茶下吐下頑涎立愈如小兒膏

喉驚吊等先服龍腦地黃膏一服次服此藥一字茶下
時上吐下瀉微瀉以吐利得快為効大人半錢小兒一
字看虛實加減只是一二服見効不宜頻服如吐瀉不
定以葱白湯立効

○急慢驚風新增

附諸方

牛黃清心丸 治小兒諸病狂亂驚癇痰涎壅塞精神昏
憤見中風

一方 治小兒口噤牙關不開諸藥不効者

用天南星末一錢麝香子少許研勻用紙蘸生姜自然汁

湛藥於左右大牙根上搽之便開

金箔鎮心丸 和劑方治風痰壅熱心神恍惚急驚搐搦

紫荷車

黑豆末煮
軟二錢半

山藥

一兩

甘草

五錢

牙硝

一錢半

人參

五錢

射香

研半

金箔

十二片
為衣

龍腦

一錢

茯苓

五錢

朱砂

研飛一

右為末煉蜜成劑每兩作五十九丸以金箔為衣每服一
丸薄許湯下常服安心止驚散邪涼膈

抱龍丸 抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍

木木生火謂生我者父母也肝為母心為子母安則子

安况心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰抱龍丸

理嬰孩諸驚四時瘟疫邪熱以致煩燥不寧痰嗽氣急
瘡疹欲出發搐並宜投此其藥性溫平不僭不燥常服
驅風化痰鎮心解熱和脾胃益精神

琥珀

人參

天竺黃

檀香

白茯苓

各七錢半

甘草

炙一兩

枳殼麩炒

枳實麩炒各五錢

辰砂

水飛二兩半

白山藥

炒八兩

牛膽南星炒五錢

金箔五十片

右各味為細末和勻取新汲水丸如芡實大陰乾用葱
白煎湯或薄荷湯痰壅嗽甚姜湯研化服

南星膏 治小兒精神不定恍惚不寧恐畏多哭常服去
風退熱消痰鎮心除百病

牛膽南星

臘月黃牛膽將南星研和汁盛膽內掛當風處乾用五錢炒

人參

白朮

山藥

白茯苓

茯神去木

羌活

甘草炙各三錢

白僵蚕去嘴炒

全蝎

去毒薄苧湯浸炙各三錢

辰砂

飛別研水射香一字

右為細末入辰砂射香研勻煉蜜丸如芡實大金箔為
衣薄荷湯調化食後服

天麻丸 湯氏方 治急驚風四肢拘急壯熱口噤

天麻

雄黃

烏蛇肉

蟬殼

乾蝎

射香細研

天竺黃

細研

桂心

天南星

白附子

膩粉

白芷

半夏湯泡七次
各一分

右為末煮棗肉丸如菘豆大每服三五丸薄荷酒送下
珍珠丸全嬰方治小兒急驚風發搐涎潮壯熱及痰嗽擁
塞肚腹脹硬

白附子一錢 滑石一錢 巴豆十五粒 輕粉一錢
天南星一錢

右為末麵糊丸如菘豆大三歲一二丸葱白湯送下
一方加蝎尾半錢炒

牛黃奪命散投萃方治小兒肺脹喘滿膏高氣急兩脇扇
動陷下作坑兩鼻竅張悶亂嗽渴聲啞不鳴痰涎潮塞

俗云馬脾風若不急治死在朝夕

白牽牛半生半熟 黑牽牛半生半熟 川大黃二兩
枳榔半兩 廣木香三錢

右為一處研作細末入輕粉少許每服二錢用蜜水或
漿水調下不拘時候微利為度

驅風膏全嬰方治小兒肝風筋脉拘急面赤目青眼驚搐
連刺及胎風

辰砂 蝎尾炒 當歸 草龍膽
川芎 山梔子 川大黃 羌活
防風去芦 甘草各一錢

右為末入射香少許煉沙糖丸如雞頭子大三歲一丸
薄苛竹葉蜜湯化下

瀉青丸聖惠方治小兒肝臟實熱手尋衣領乳捻物直
視不搖得心熱則搖身反折強直目連割或目內青或
臟腑發泄諸藥不止脾虛肝盛者見丹毒

○廣按已上二方皆瀉肝經風熱之劑也夫小兒肝常
有餘脾常不足故急驚風乃肝氣有餘宜用瀉青丸
之類瀉之慢驚風乃脾氣不足宜用醒脾散之類補
之

人効疎風散活幼方治嬰孩小兒驚熱痰風四證聚結於

胸臆之間令兒昏困沉重閉竅不通諸脉氣閉所以然
然欲食不食欲起不起倦伏不知其證候者但不經吐
利宜與服之立見甦省

錦文大黃 一錢半 鷄心栴榔 一錢半

黑牽牛 七分半炒 陳橘皮 去白一錢

右為末二歲兒服半錢蜜少許薄苛湯調下看大小加
減服之

紅綿散湯氏方治夾驚傷寒

麻黃 去節 全蝎 炒 甘草 炙 天麻

大黃 濕布裹 白附子 蘇木 炒各等

右為末每服一錢水半盞煎服

全蝎觀音散 治慢驚慢驚者因又吐瀉而脾胃先虛脾胃與肝母子也母虛亦令子寒二經俱虛則生疳涎頑涎者脾肺所出也涎則溢流在於咽喉如水雞之聲時復瘕瘕是也此方主之

全蝎去毒十日天麻煨

防風

白芷

黃芪蜜炙

甘草

茯苓各二錢人參二錢

白糯米姜汁去皮炒

右為細末用棗肉煎湯調勻不拘時候

四君子湯 治小兒慢驚慢脾風吐瀉不止

人參

白朮

茯苓

甘草

川烏去皮尖全蝎去毒各

右咬咀姜三片棗一枚水一鍾煎五分食前服

理中湯 治小兒吐瀉手足厥冷加附子名附子理中湯

回陽方見中寒

八仙散湯氏方治慢驚虛風

天麻

白附子

花蛇肉

防風去芦

南星炮

半夏麩

冬瓜子

全蝎各等分

右咬咀每服一錢水半盞姜棗薄切煎服加川烏尤妙

乳法湯氏方治慢驚嗜多驚驚帶凡面黃脉細者難治

女馬風

法付徐氏

卷之九

三百八毛

人參

木香

藿香

沉香

陳皮

神麩

麥蘖各等分 丁香減半

右咬咀每服四錢水一碗姜半片紫蘇十葉棗三枚砂
瓶內煮至半碗乳母食後捏妳汁服之即便卧霎時令
藥入乳之絡次令兒吮不可過飽亦良法也

吉州醒脾散 湯氏方

人參 上片

橘紅

甘草 炙

白朮

白茯苓

全蝎 各半兩

木香

半夏麩 各二錢半

白附子 炮

陳倉米 粒二百 南星 一箇

右為末每服一錢水半盞姜三片棗三枚煎服

木附湯 幼幼方 治慢脾風身弓髮直吐乳貪睡汗流不已

大附子 一箇

白朮 一兩

木香 半兩

肉豆蔻 一箇 麩 煨

甘草 半兩

右咬咀每服二錢水半盞姜三片棗三枚煎服

○廣按此方用附子不必疑蓋小兒慢驚風皆由吐瀉
後脾氣大虛時作瘦癯非若急驚搐搦之緊猛也此
方溫寒燥濕行氣健脾適合其宜

神效萬金丹

瑞竹堂方 治小兒慢驚風急驚風十無一失

硃砂 研細末 真輕粉 研細末

右二味各等分不以多少用青高內虫兒取出於淨磁

蓋內將硃砂輕粉以虫汁就成丸如黃米大量兒大小
加減服之半歲一歲小兒服一丸乳汁送下如取虫時
法止於七月初五日取蒿虫則靈驗
一方 治急慢驚風神效

硃砂一分 輕粉一分 姜蚕七箇炒全蝎三箇去毒炒

右為細末用人乳汁調服 詩曰七箇姜蚕三箇蝎一
粒硃砂一片雪不論急風與慢風用時須用生人血

天麻防風丸 和劑方治一切驚風壯熱痰盛驚怖

姜蚕自死者去絲嘴 天麻煨 防風

人參各一兩 干黃二錢研人 蝎去毒炒 朱砂

雄黃 射香各一錢 甘草炙二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三丸薄荷湯化下

大天南星丸 和劑方治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上
視

天南星牛膽製 硃砂三錢別研 腦子

人參 乳香各半兩 全蝎十四箇去毒炒 射香一錢半

牛黃 天麻 防風各二錢

右為末煉蜜丸如雞頭大每服一丸荆芥薄荷湯下

奪命散 湯氏方 治急慢驚風痰潮壅盛滯塞於咽喉間命
在須臾服此藥者無有不愈

青礞石一兩入沙鍋內同煅硝一兩用白炭火煅令通紅須消盡為灰候藥冷如金色取去研為末

右為末急驚風痰發熱者薄許自然汁入蜜調服慢驚脾虛者以青州白丸子再碾煎稀糊入熟蜜調下神效青州白丸子方見中風

抱龍丸 治痰嗽驚風時作潮熱

牛膽南星兩 天竺黃半兩 辰砂 雄黃各二錢

射香一錢別研

右為末煉蜜丸如芡實大甘草薄許湯化下一丸生疔膏切切方治急慢驚風

天麻二錢半 硃砂二錢 姜黃二錢

全蝎二十一枚 黑附子二錢 射香半字 蜈蚣一枚

南星一錢半 花蛇酒浸炙乾

右為末和勻煉蜜丸如雞頭大每服一丸金銀箔薄許湯化下

○廣按用附子者熱則流通痰火之理也

大青膏錢氏方

全蝎尾去毒生半錢 硃砂研一字 青黛研一錢

天麻一錢 天竺黃一字 白附子生一字 射香一字

烏梢蛇肉酒浸焙乾取末半錢

右為末蜜和成膏每服一九如皂角子大同牛黃膏溫
薄荷湯化一處服之五歲以上同甘露散服方見中暑
牛黃膏聖惠方治小兒驚風作熱涼膈鎮心除咳嗽止煩

熱

甘草末

二錢雄黃研一錢

川紺硝二錢 礬泉豆粉半兩

寒水石

別研一錢

片腦二錢 鬱金末一錢

右研勻煉蜜和成膏薄荷水化半皂角子大食後

石砂保命丹秘方

射香一錢

南星沙

白附子炮

硃砂各半兩

蛇含石

醋淬後用瓦焙

右件為末用端午粽尖為定用金箔點號若急驚薄許
湯下慢驚荆芥湯化下執驚薄荷湯下風驚荆芥湯下
備急丸應驗方治急慢驚風

右以五月五日取地龍數條用竹分分中截作兩段看
地龍跳得急者慢者各方一處研爛用硃砂末同研和
勻得所丸如小菘豆太急驚用急跳者慢驚用慢跳者
用金錢薄荷湯送下量大小加丸數如合藥後分明寫
記急慢各另包裹收貯

愈風丹

儒門事親方治大人小兒一切諸風

芍藥

川芎

白殭蚕炒

桔梗

細辛去葉 羌活各半兩 麻黃去節 防風去芦

白芷 天麻 全蝎各一兩 甘草三錢

天南星半兩 姜製 硃砂半兩 衣兩 為

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒任

下

全蝎散直指方治小兒驚風

人參 陳皮各一錢 全蝎炙三箇 甘草炙半錢

南星濕紙裹 煨

右咬咀每服一錢水半鍾紫蘇姜棗煎服有熱加防風

硃砂丸宣明方治小兒急慢驚風及風熱生涎咽喉不利

取驚積

硃砂 天南星 芭豆霜各半

右為末麵糊和丸黍粒大看病虛實大小每服二丸或

天吊戴上每服四五丸薄許水下立愈

珍珠丸宣明方治小兒虛中積熱驚癇等疾

芭豆霜 膩粉各二錢 滑石三錢 天南星

粉霜各二錢 半 蝎稍 續隨子去皮各二

右為末研令極細以糯粥為丸如黃米大小兒二歲以

下每服三丸至五丸十五歲每服五丸至十丸茶湯下

荆芥湯亦得量虛實加減

祛風羌活散 散風邪止驚搐退肌熱

羌活

粉草

天麻

茯苓

川芎 鑿二

荆芥 穗

白僵蚕 炒

白朮

白附子 炮 各指更二錢

防風 一錢

全蝎 半錢 去

硃砂 五分

天南星 炮 熟

右為細末薄荷湯調下

如傷風鼻塞流涕葱白湯下

喘嗽氣促桑白皮湯調下 若常服白湯亦可

真珠天麻丸 驚風痰執壅盛及撮口

南星 炮

天麻 炮

白附子 炮 各

巴豆霜 十七箇 去油

全蝎 炮

溫石 半錢

防風

半夏 姜汁炒 各一錢

右為細末麵糊丸如小豆大百草霜為衣每服五六十

丸淡姜湯下

至聖保命丹 胎驚吊腹目上視手足抽掣角弓反張痰

盛急慢驚風

全蝎 十四枚 去毒

防風 五錢

白附子 炮

南星 炮

蟬蛻 去土

僵蚕 直者各

天麻 五錢

硃砂

射香 各一錢

金箔 十片

右為末後入硃砂射香和勻以粳米飯為丸如茨實大

每服一丸金錢薄荷煎湯化下急者二丸

青珠丸 急慢驚風痰熱往來

驚風

心法附錄卷之三十一

四十四

三百五十五

天麻

半夏

南星

白附子

川烏各一錢

乾蝎頭尾全七枚

姜蚕七枚

青黛一錢

羌活二錢

硃砂一錢為衣

右用研入巴豆七粒去油研勻麵糊為丸如黍米大每服五丸金錢薄芎湯下如驚睡瀉得青色是驚積白色是疳積赤色是熱積

安神散 治搐搦

用全蝎四箇塘水浸一宿南星大者一箇開一穴入蝎在內以南星末蓋其口用麵裹火煨令赤色取出放地坑土宿去南星用蝎為末每服一字磨刀水調下

犀角散 虛風有涎胃氣弱或吐乳喉中作聲

酸棗仁

麥門冬去心人參

白附子

茯苓去皮各錢硃砂一錢

右為細末每服半錢磨犀角用湯下日二服此藥壓驚最熱安心定神

睡驚丸 和劑方治心蘊邪熱怔忡不安睡中驚啼風痰壅盛

茯苓去皮

鉄粉

蛇黃煨醋

南星炮

史君子去核各半兩

腦子半兩別研

右為末糯米糊丸如皂莢子大朱砂為衣薄芎湯調下

安神丹 御藥院方 治小兒心神不寧 因臥多驚 痰涎壅盛

硃砂

人參 各二錢半

乳香 各半兩

研 各

酸棗仁 炒去

遠志

去心二錢半

右為末 蜜丸如榛子大 金箔為衣 每服一丸 人參湯化下

寧眠散 御藥院方 治小兒風痰搐搦 夜臥多驚

天南星

炮製 人參 去芦

白附子

炮各半兩 乾蝎 生用 二十箇

乾赤頭蜈蚣

一條 酒浸 酥炙微黃

乳香

血竭 各二錢半

右為末 每服一字 用水酒少許 浸薄荷酒下

寧心膏 全嬰方 治小兒精神不定 恍惚不寧 恐畏多哭 如

人將捕眠 睡驚 鬱帶 服 鎮心除百病

人參 去芦

白朮

白茯苓 去皮 茯神

山藥

羌活

甘草 各一錢

硃砂 一錢

腦麝 各一

右為末 煉蜜丸如雞頭大 一歲一丸 薄荷湯化下

○五疳五軟 新增

附諸方

蘆薈丸 湯氏方 治脾胃積熱 遂成疳疾 宜服此藥

黃連 去鬚

龍膽草

燕薈 各一

兩 去皮 先炒黃

赤

右各件為末別入蘆薈末一錢半和勻飯飲丸如黍米
大隨大小加減空心米湯下

蟹甲散湯氏方治痺勞骨蒸

蟹甲九筋者湯湯浸洗用童子小便便後洗黃芪蜜炙白芍藥各一

生熟地黃當歸洗人參去芦各地骨皮兩

右吹咀每服二錢水半盞煎服不拘時

猪肚丸湯氏方治骨蒸癆癆肌體黃瘦

木香半兩宣黃連生地黃銀州柴胡

蟹甲九筋者湯湯浸洗次用童子小便便後洗青皮一

右為末猪肚一枚入藥於內麻繩纏定於沙鍋內懸炮

煮熟取出細研肚子為丸如麻子大米飲下大小加減
不拘時

八胡黃連丸湯氏方治驚痺腹脹虫動多睡肌體黃瘦五
心煩熱

胡黃連苦練子各一白蕪荑去皮半

乾蟾頭二錢半蘆薈二錢射香二

青黛半兩

右將前四味為末猪膽汁和為劑每一胡桃大入巴豆
仁一枚在內却用油單紙一層裹之蒸熟又入後四味
糊丸如麻子大每服十四五丸清米飲下食後卧時

日三服

龍膽丸和劑方治小兒疳發熱

龍膽草去

黃連

史君子去

青皮各一錢

右為末猪膽汁丸如蘿蔔子大每服二十九以意加減臨卧溫水下

胡黃連丸直指方治小兒熱疳

胡黃連

川黃連

各半朱砂二錢半石砂另研

右為末入猪膽內繫定虛懸於銚中煮一時又取出入薑薑青黛各二錢半去足蝦蟆灰二錢射香少許粳米飲丸如麻子大每服十九米飲湯下

薑薑丸陳氏方治小兒五疳

薑薑

蕪荑去皮

青黛各二錢半

真射香

少許

檳榔

宣連各二錢半

胡昔連兩

獾猪膽一箇

蟬殼二十箇筒

右為末猪膽丸如麻子大每服五十九飯飲吞下

肥兒丸和劑方治小兒疳病夫小兒疳病者多因闕乳喫食太早以致脾胃受傷虛而生濕濕而生熱濕熱太甚所以生虫日漸羸瘦腹大髮豎不能行步面黃口臭發熱面無精采此藥殺虫退熱進食

神麩炒

黃連各一兩

麥蘖炒

肉豆蔻煨

史君子肉

各半

檳榔

木香

各二錢

右為細末猪膽汁并麵糊為丸如粟米大每服四五十九用米湯送下食前服

禰丸子瑞竹室方治小兒陰陽不和臟腑怯弱乳食不消

心腹脹滿嘔逆氣急或腸鳴泄瀉頻併腹中冷痛食積乳癖疝氣痞結積聚腸胃或秘或痢頭面浮腫不思乳食及察五腫疳疾八種痢疾肌肉消瘦氣麓腹大神色昏憤情意不樂常服散冷熱氣調和臟腑進飲食生肌肉悅顏色功效非常不能盡述

蘿蔔子

一兩 陳皮

去白 青皮

去白 三稜炮

蓬朮

炮名

黑牽牛

生七錢半

胡椒

二錢

木香

分一錢半

右為末麩糊和丸如菽豆大空心用蘿蔔子煎湯送下或生姜湯亦可量兒大小加減丸數

○廣按此藥緊峻去病有功病退則已不可過服恐傷正氣

盧蓄丸和劑方治疳氣羸瘦面色痿黃腹脇脹滿頭髮作穗揉鼻咬甲好喫泥土利色無定寒熱往來自瀝口臭齒斷黑爛常服長肌肉退黃殺疳重進飲食

大皂角

乾蝦蟆配上等分同燒存性

青黛二錢

蘆薈

硃砂

射香錢一

右研勻湯浸蒸餅和丸如麻子大每三歲兒服二十九不計時米湯下量大小加減服

史君子丸和劑方治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹特作疴痛不進飲食漸致羸瘦並宜服之

史君子去破厚朴製

陳皮去白

川芎各二錢半

右為末煉蜜為丸如皂子大三歲一丸陳米飲化下

○廣按此方用藥平和可以久服

六神丸全嬰方治小兒疳氣消瘦臟腑怯弱泄瀉虛滑乳食減少飲食無度心腹脹滿

木香

丁香

肉苳蔻麩裹

訶子炮去

史君子炮去皮各半兩

蘆薈一兩

右為末棗肉和丸如菉豆大三歲三十九米湯下

○廣按疳本濕熱宜用苦寒藥今此方用苦溫藥何也殊不知疳久泄瀉虛滑則為濕寒宜用苦溫藥本草

云苦寒去濕熱苦溫去濕寒是也

大蘆薈丸發明治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連

黃連

蘆薈研

木香

白燕莢

雷丸

青皮去白

鶴虱微炒各

右為細末粟米飯和丸如菉豆大米湯送下二十九無

五年

去竹絲各五錢

五二

三首全七滄

時

鐵聖丸 治小兒疳病通用

蘆薈

五靈脂

好夜明砂焙砂仁

陳皮

青皮

莪木煨

木香

史君子煨黃連

蝦蟇日乾炙焦

右為末用雄豬膽二枚取汁和藥調勻為丸麻子大每

服十五丸米飲送下

大蘆薈丸 治諸疳

蘆薈

蕪荑

木香

青黛

檳榔

黃連炒各二

蟬殼四枚

胡黃連研

射香少許

右為末豬膽汁二枚取汁湯糕為丸麻子大每服二十丸米飲下

黃連丸 治疳疾

黃連研

蕪荑去

史君子去殼半兩

右為末用雄豬膽丸如菘豆大每服二十九米飲空心

送下

蘆薈丸 治疳殺虫

蘆薈半兩

史君子焙

三稜生

石榴皮焙

葶藶生各五分 苦練根焙

五錢

心去付余

五二

二百下

右為細末麵糊丸如蘿蔔子大每服五丸量大小加減
米飲送下疰熱麥門冬湯下

布袋丸 治諸疰疾面黃腹大飲食不潤肌膚

夜明沙揀淨 蕪荑炒去 史君子肥白者微炒

白茯苓去皮 白朮無油者 人參去芦 甘草

蘆薈細研各半兩

右為細末湯浸蒸餅和丸如彈子大每用一丸以生絹
袋盛之次用精猪肉二兩同藥一處煮候肉熟爛提取
藥於當風處懸掛將所煮肉并汁令小兒食之所懸之
藥第二日仍依前法煮食只待藥盡為度



六神丸 治諸疔

木香

黃連 去鬚

神麩

川練子肉

蘇莢

麥蘗 炒各等分

右為細末以雄豬膽蒸熟為丸如麻子大每服三四十
丸量大小加減米飲送下

肥兒丸 疳病蒸熱腹脇脹滿面色萎黃飲食遲化大小

便澀滯

麥蘗 炒

川黃連

大蘇莢

神麩 炒

胡黃連 各半兩

右為末以雄豬膽汁丸如麻子大每服二十九食前米



五十二 二百六十二

飲送下乳母忌食酒麵生冷

如聖丸 治熱疳瀉

胡黃連

川黃連

燕薊

史君子各兩

射香五分

乾蝦蟆五箇剉碎酒熬成膏

右為末以蝦蟆膏子丸如麻子大每服二十九人參湯

送下

肉棗丸 因疳而瘡侵入口鼻

用肉棗二枚去核入青礬如核大在內以火煨存性為

未入射香少許清油調塗

煮肝散 疳眼翳膜羞明不見物

夜明沙

蛤粉

穀精草各兩

右為末每服一錢五七歲以上二錢用雄豬肝如匙大

一片批開摻藥在內攤勻以麻紮定米泔水半碗煮肝

熟撈出肝傾湯碗內薰眼分肝作三次嚼食仍用肝湯

嚙下日三服不拘時如大人雀目空心服至夜便見物

如患日久不効日作二服見効

小葺丸 幼幼方治胎中受熱遍身筋軟

鹿茸

川牛膝

肉苁蓉

木瓜

杜仲

兔絲子

當歸

熟地黃

天麻

青鹽各等分

右為末用煉蜜為丸如菘豆大鹽湯溫酒化下皆可

羚羊角散幼幼方治小兒面紅唇白肌熱項軟

熟地黄酒浸 白茯苓 羚羊角 酸棗仁炒

虎脛骨酒炙 肉桂 防風 甘草各等分

右為末溫酒鹽湯化下皆可

羚羊角丸楊氏方治小兒五六歲骨氣虛筋脉弱不能行者

者

羚羊角屑 白茯苓去皮 防風去芦 虎脛骨塗醋炙黃

酸棗仁炒 生羊各半 黃芪 桂心

當歸炒各二錢半

右為末煉蜜丸如菘豆大食前以溫酒研破三五丸服

之一月漸漸即可行也

○吐瀉痢瘧新增

附諸方

觀音散和劑方治小兒外感風冷內傷飲食嘔逆吐瀉不

進乳食

石蓮肉炒去心二錢半 白匾豆一錢 茯苓一錢

人參一兩去芦 神麴炒二錢 白芷 綿黃芪

木香 甘草各一錢

全蝎觀音散和劑方治小兒外感風冷內傷飲食脾胃受



傷嘔逆吐瀉不進乳食又則漸漸羸瘦大抵脾虛則瀉
胃虛則吐脾胃俱虛吐瀉不已此藥大能溫養脾胃進
飲食及治吐瀉至虛并凡驚風

石蓮肉 人參去芦 白扁豆各一錢

全蝎炒 天麻 木香 甘草炙去

羌活 防風去芦 白芷 黃芪各半

神麩錢 白茯苓去皮七

右為末每二錢乳汁調服或吐咀每服五錢用水一盞
棗子煎服

人參白朮散錢氏方治小兒脾胃又虛嘔吐泄瀉頻併不
止津液枯竭發熱煩渴多燥但欲飲水乳食不進羸困
失治變成風癩不問陰陽虛實並宜服之

人參去芦 白朮 白茯苓去皮 木香

藿香去土 甘草各五 乾葛一錢

右吐咀用水一盞煎至半盞去滓溫服

異功散錢氏方溫中和氣治吐瀉不思食凡治小兒虛冷
病先於數服以正其氣

人參去芦 白朮 白茯苓去皮 甘草炙去

橘紅各一

右用水二盞生姜三片棗子一枚煎至七分去滓溫服

醒脾散集成治小兒吐瀉不止痰作驚風脾困昏沈默默不食

木香

天麻

人參去芦

白茯苓去皮

白朮

甘草炒

白殭蚕炒

白附子各半錢

全蝎二分半炒

右用水一盞生姜三片棗子一枚煎至七分去滓温服

辰砂益元散應驗方治小兒中暑吐瀉小便赤少夜卧不

寧心煩作渴常服寧心解熱

益元散兩辰砂半錢

右研勻每服五錢用燈心竹葉湯調服如嘔吐生姜湯

調服

黃連香薷飲全嬰方治小兒陰陽不順清濁相干霍亂吐

瀉體熱煩燥昏冒多渴

厚朴去皮姜製一錢五分

黃連二味與生姜汁拌作紫色七分

香薷三錢

右咬咀一服用水一盞酒半盞煎至七分去滓水中頓

冷服

一方加白蘆豆炒七分

黃龍丸全嬰方治小兒中暑吐瀉胃悶煩渴昏迷身熱有

痰

半夏

二兩米醋
半升煮乾

白茯苓

甘草各半兩

右為末生姜汁煮麵糊為丸如小豆大每服二十九煎
生姜灯心湯送下量大小加減丸數

五苓散全嬰方治大人小兒中暑伏熱煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤少心神恍惚

澤瀉錢一

白朮五錢

猪苓半錢

肉桂錢一

赤茯苓錢一

右為細末每服一錢熱湯調下不拘時服加辰砂名辰砂五苓散去辰砂加生料平胃散用蒼朮橘皮甘草厚朴二方共一處生姜棗子同煎名胃苓散

香朴飲子集成治小兒伏熱吐瀉虛煩悶亂如發驚壯

人參去芦

白茯苓去皮

甘草炙去

紫蘇

木瓜

澤瀉

香薷

半夏麩

白扁豆

陳皮去白

烏梅

厚朴各四分

右用水一盞煎至七分去滓溫服

玉露散一名甘露飲治小兒中暑昏迷煩渴不止心燥體

熱頭疼或伏熱吐瀉亦作傷風體熱煩渴

石膏

寒水石各一兩

甘草半兩

右為細末每服五錢灯心湯調下暑熱冷水下吐不止
生姜湯下

人參散 宣明方 治小兒虛熱煩渴因吐瀉煩渴不止

人參一兩 茯苓二兩 生犀 桔梗各二錢

甘草 乾葛各半兩

右為末每服用二大錢水一鍾加入灯心五莖同煎至六分温服無時煩渴者以新竹葉湯下量年紀加減服內救散 調氣進食止瀉嘔

木香 人參 白朮 茯苓

甘草 茯苓各等分 藿香減半

右為末每服一錢米飲調下

益黃散 錢氏方 治脾胃虛寒嘔吐不止或泄瀉腹痛並皆

治之

丁香四錢 訶子去核 青皮去白各一兩 甘草炙

陳皮去白二兩

右為末每服二錢水半盞煎食前服

藿香散 經劑方 治小兒吐哕嘔逆身熱面青不進乳食

藿香一錢 丁香 人參 白朮

茯苓 神麴 扁豆各半錢

右為末每服半錢白湯調下一方用紫蘇木瓜湯調下

硃沉煎 按萃方 治小兒嘔吐不止

硃砂二錢 沉香二錢 藿香二錢 滑石半兩

丁香十四箇

右為細末每服半錢用新汲水一盞芝蔴油點成花于炒藥在上須臾墜瀝去水却用別水送下

白豆蔻十四箇 木香二錢 縮砂仁四十箇 乾山藥一兩

肉豆蔻四箇 人參去芦 白朮 白茯苓

甘草炙各半兩

右為末每服一錢陳紫蘇木瓜湯調下一方煉蜜為

丸如芡實大一歲一丸米湯調下

訶子湯湯氏方治臍寒泄瀉

訶子炮取 人參去芦 白茯苓去皮 白朮各一兩

木香炮 陳皮去白 甘草炙 肉豆蔻各半兩

右為末每服二錢水一盞姜三片煎半盞溫服寒甚者

加附子

白朮丁香丸 水瀉脾虛飲食不進水穀不化

白朮不油者二錢半 半夏錢半湯七次 丁香半錢

右為細末用生姜自然汁煮糊為丸如梧桐子大十歲

上下可服二十五丸七八歲二十九五六歲十四五丸

二三歲十九丸週歲五七丸用姜湯或米湯無時送下

服不止日進二服新洩一服見効舊洩三服即止

乳豆丸應驗方治小兒傷冷泄瀉滑腸不禁面青腹痛

肉豆蔻麵裹煨 乳香二錢

右為末麵糊為丸如菽豆大米湯下三十九

紫霜丸 治宿滯不化胸腹痞滿泄瀉如痢當以藥推利

杏仁五十箇去皮尖別研 黛赭石火煨醋淬

芭豆去皮心膜油炒 赤石脂末

右研勻湯浸蒸餅丸如黍米大三歲以上服三丸以乳

汁或米飲下

玉餅子 吐瀉驚疳乳食不消肚脹潮熱咳嗽急慢驚風

及痢疾

半夏大者十箇 巴豆五十粒去殼另研 滑石

寒食麵各一兩

右為末滴水丸如菽豆大捏作餅每服五七餅或八九

餅或十一二餅姜湯送下看大小加減一方加輕粉

木香檳榔丸 治小兒初得痢疾赤白相雜裏急後重

方見痢疾

○廣按小兒痢疾皆因感寒停積飲食所致初得一二

日間元氣未虛宜用此丸與玉餅子分寒熱利之日

子既久涉虛宜用香連丸木香散之類和之繼用豆

蔻香連丸水煑木香丸之數服之

香連丸 治冷熱不調下痢赤白裏急後重 方見痢疾

胃風湯 治風冷乘虛客于腸胃水穀不化泄瀉不利腸

鳴疝痛或下如莖汁或頓下瘀血 方見胃風

木香散 經濟方 治諸般瀉痢日久不安並皆治之

白木 用麩 麥芽 木香 人參

當歸 陳紅麩 白木 各一錢 同 茯苓

神麩 甘草 青皮 各二

右為末每服半錢或二錢白湯調下一方用紫蘇木瓜

湯調下

豈菟香連丸和劑方治小兒乳食不節腸胃虛弱冷熱之

氣客於腸間下痢赤白腹內疝痛日夜頻併不欲飲食

黃連 微炒二分 肉菟 箇麩 木香 半 丁存 二錢

訶子 炮去核 半兩

右為細末粟米粥和丸黍米大每服三十九米湯下大

小加減丸數

水煮木香丸 治下痢赤白裏急後重

真人養臟湯 治冷熱不調下痢赤白或如濃血魚腦裏

急後重臍腹絞痛並皆治之 並見痢疾

木香散 湯氏方 治冷痢腹痛不食

木香 炮一錢半 厚朴 姜製 半兩 白木 一錢 龍骨

當歸淨洗焙乾姜炮

訶子肉各二錢半

右為末水半盞姜三片煎服隨大小加減

一方 治休息痢及痔瀉日久不能安者 湯氏方

用雞子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內溶以雞子拌和炒熟空心食之

赤石脂散 錢氏方 治因瀉痢後肛門不收

真赤石脂剗去

伏龍肝各等分

右為末每用半錢傅腸頭上頻用

又方 治瀉痢後脫肛

用陳槐花不拘多少為末陳米湯調下

養胃湯 治內傷生冷外感風寒增寒壯熱或發寒熱

方見瘧類

尊葉飲 張氏方 治發瘧寒多熱少或遍身浮腫者

厚朴

青皮去白

草菓

藿香

半夏麩

甘草炙

丁香皮

神麩炒

良姜各等分

右咬咀每服二錢水一盞姜三片棗一枚空心煎服

○廣按以上三方治小兒瘧疾寒多熱少無汗者

清脾湯 治因食傷脾停滯痰飲發為寒熱方見瘧類

常山飲 張氏方 治一切瘧疾

常山 一錢

人參

草果

知母

甘草

厚朴

姜汁製一宿
炒令黃色

貝母

半夏麴

茯苓

各五

右吹咀每服二錢水半盞姜三片棗一枚空心煎服忌

雞肉牛肉諸般毒食

○廣按已上二方治小兒瘧疾熱多寒少有汗者

鬼哭飲湯氏方治瘧疾久未愈者

常山

大腹皮

茯苓

蠶甲

醋炙

甘草 各

右為末用紙糊成餅七寸同煎發時服之咯吐出

不妨

露星飲湯氏方治久瘧成勞

秦艽 去芦

白朮

柴胡 去芦

茯苓 去皮

半夏麴

檳榔

黃芩

常山

甘草

官桂

各等分

右吹咀每服三錢酒醋各一盞姜三片煎露一宿次早

服

○感冒四氣新增

附諸方

蘇黃湯錢氏方治傷寒發熱咳嗽喘急

小成

法附錄卷之三十一

六十四

三百四十四

麻黃去根節剉

肉桂去粗皮

杏仁四錢去皮尖炒令黃色

右咬咀每服四錢水一盞煎服有汗不宜服

人參羌活散和劑方

羌活

白獨活

柴胡去葉

川芎

人參

甘草炙

白茯苓各一兩前胡

桔梗去芦

地骨皮

天麻酒浸焙去穰麩

右咬咀每服二錢水半盞姜一片薄荷各半兩煎服

服 瘡疹未發亦可服

鮮肌湯湯氏方治傷寒發熱心煩燥渴

麻黃去節半兩或用七錢半

人參

芍藥

獨活各半兩

川芎

前胡各二錢半

右咬咀每服二錢薄荷一葉姜一片水半盞煎服

七寶散湯氏方治感寒頭昏體熱小兒乳母同服

紫蘇葉

香附子炒去毛橘皮

甘草

桔梗

白芷

川芎各一兩

加麻黃半兩

右咬咀每二錢水一盞姜一片棗半枚煎服

參蘇飲和劑方治感冒發熱頭疼或因痰飲凝結為熱此

藥鮮肌退熱寬中快膈止嘔吐開胃進食

紫蘇葉

乾葛

半夏製

前胡去苗

小成

三行除疾之二

六十五

三百三十九

人參去苗

白茯苓各六分 枳殼去穢

甘草炙去

桔梗去芦

陳皮各四分

一方加木香少許

右用水一盞... 不換金正氣散

不換金正氣散和劑方治四時傷寒感冒風濕瘴疫時氣

頭疼壯熱或霍亂吐瀉臟腑虛寒下痢赤白並宜服之

厚朴製

藿香去土

甘草去皮

半夏製

蒼朮製

陳皮各八分

右用水一盞... 薑三片棗子一枚煎至半盞溫服

黃連香薷散治伏暑發渴或作瘧痢並宜服之方見中

紅綿散治夾驚傷寒方見驚風

金沸草散和劑方治風化痰除頭目昏痛項頸強急往來

寒熱肢體煩疼胸膈滿悶痰涎不利咳嗽喘滿涕唾稠

粘及時行寒疫壯熱惡風

旋覆花去梗

前胡各七分

荆芥錢一

麻黃七分

甘草炙

半夏製

赤芍藥各二分

右用水一盞... 薑三片棗子一枚煎至八分溫服

薄荷散湯氏方治熱極生風痰涎壅盛

薄荷葉兩半

羌活

全蝎

麻黃去節

甘草一錢二分

天竹黃

白附子炮

姜蚕各二分

外感

去府餘卷之三十一

下六

右為末每服一錢水半盞煎服加竹葉少許尤妙

華蓋散 治肺感寒邪咳嗽鼻塞聲重方見咳嗽

潤肺散和劑方治肺感風寒咳嗽喘急鼻流清涕

貝母麩炒

杏仁去皮麩炒

麻黃去根

人參各二兩

阿膠炒半兩

陳皮半錢

甘草一兩

桔梗兩半

右咬咀每服二錢水一盞食後煎服

人參散 經濟方治咳嗽發熱氣喘吐紅

人參

天花粉各等分

右為末每服半錢蜜水調下

百部丸 湯氏方治小兒感寒咳嗽

百部焙乾

麻黃去節各一錢半

杏仁四十箇去皮尖

微炒另研

右為末煉蜜丸如芡實大孰米化下

一方加松子肉五十粒同杏仁入沙糖為丸噉化尤妙

瀉肝散 錢氏方治肺氣壅盛咳嗽不已

桑白皮

地骨皮各一兩

甘草各二錢半

右為末每服四錢水一盞粳米同煎食後服

補肺散 錢氏方治肺氣不足咳嗽喘急

阿膠炒一兩半

牛蒡子

甘草各半錢

馬兜鈴半兩

杏仁七箇去皮尖

糯米四兩

內傷

去付餘卷之三

下

三三九

右為末每服四錢水一盞煎至六分食後服

流金丸全嬰方治小兒咳嗽痰盛

半夏製一錢

白礬錢二

美水石錢 石錢

雄黃錢一

右為末麵糊為丸菴豆大生姜湯下每服二十九大小

加減丸數

雄黃丸 治小兒諸般咳嗽鹽醋等哮兼治大人

雄黃錢五

半夏一兩

人言明者

明礬

巴豆另研各二錢

右用明礬火化開入信末同枯乾再研為末再炒成砂

同前藥為末和勻麵糊丸如粟米大每服三十九大小

加減臨睡桑白皮湯冷送下或冷茶湯下亦可

升麻葛根湯錢氏方治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢

體煩疼及瘡疹未發疑似之間並宜服之

升麻

白芍

甘草各一錢

葛根二錢

右用水一盞煎至半盞去粗稍熱服日二三服

柴胡升麻湯和劑方治時行溫疫壯熱惡風頭痛體疼口

燥咽乾心胃煩滿寒熱往來咳嗽痰盛涕唾稠粘

柴胡去苗

前胡去苗

乾葛

石膏

赤芍藥各七分

升麻二分

桑白皮微炒

黃芩各四分半

荆芥五分

右父咀作一服水一鍾半煎八分食後服

人參前胡湯湯氏方治小兒感冒發熱

前胡一錢四分柴胡去苗半夏湯泡黃芩

人參去芦桔梗去芦甘草各七分

右用水一盞生姜三片棗子一枚煎至半盞溫服

柴苓散湯氏方治腹中伏執候如溫狀

柴胡去苗麥門冬去心人參去芦赤茯苓去皮

甘草各一分黃芩去芦四分

右用水一盞入小麥二十粒青竹葉七片煎服

地骨皮散集成治虛熱潮作亦治傷寒壯熱

知母 柴胡去苗甘草炙法人參去芦

地骨皮去赤茯苓去皮半夏製各七分

右用水一盞生姜三片煎至半盞去滓溫服

加減建中湯湯氏方治傷寒發熱自汗虛煩

熟地黃 甘草炙人參各半兩黃耆各一兩

白芍藥三兩

右吹咀每服二錢水半盞煎服

田方導赤散救華方治小兒傷寒煩熱小便赤色大便禿

色面赤

為湯

云付余

三

一

八

生地黃

木通

甘草各等分

右為末每服四錢水一小鍾竹葉三五片同煎溫服

益黃散按萃方治小兒客熱在內不思乳食宜服導赤散

次服此藥方見小兒吐瀉

柴苓湯 治小兒傷寒煩熱小便赤色大便褐色面赤

柴胡去苗

半夏

人參

黃芩

甘草

白朮

茯苓

澤瀉

猪苓各五分

桂三分

右以咀水一盞生姜三片煎至半盞去粗溫服無時

三黃犀角散湯氏方治臟腑熱秘

犀角屑

大黃酒蒸

鈎藤

梔子仁

甘草

黃芩各半兩

右為末看兒大小加減熱湯調服

○廣按小兒多有鬱熱因外感風寒內傷乳食而鬱熱

發於外鼻塞者是因外感而發以麻黃湯人參羌活

湯以後之類治之鼻不塞者是因內傷而發宜升麻

葛根湯柴胡升麻湯以後之類治之

○虫虫痛疝氣

新增

附諸方

化蟲散

治嬰孩小兒蛔厥腹痛 幼幼方曰蛔厥多似

虫虫痛

小兒疝氣

二

三三百許

慢驚但唇口紫者是蛔厥 湯氏曰每月初五日巳前
蟲頭向上可取巳後可安

雷丸 三錢 史君子 去穢鶴虱 三錢 甘草

大黃 各三錢

右為細末用猪肉煮汁調空心服大者二錢小者一錢

檳榔遣虫散 治嬰孩蛔虫咬心吐涎疼痛惡哭不止

檳榔 炒存 鶴虱 貫衆 乾漆 炒存

蕪夷 川練子 史君子肉 雷丸

雄黃 黃丹 炒 錫灰 炒 不見木香 各二錢

巴豆 去皮心 輕粉 一錢

右為細末酒煮糊丸如黍米大五更早用猪肉葱油煎
將肉細嚼莫吞引虫頭向上吐去肉用猪肉汁調化虫
散送服檳榔丸至巳時取下虫積可進食五歲可服七
分十歲服一錢大人亦可服

化虫圓 和劑方治一切疳虫攻刺心腹疼痛不已叫哭合
眼

胡椒 炒 鶴虱 檳榔 苦楝皮 各五錢

白礬 枯一分 錢二分

右為末麵糊丸如麻子大量兒大小加減米飲下
靈蘇散 錢氏方治小兒虫咬心痛欲絕者

五靈脂末二

白礬大枯半錢

右為末每服二錢水一盞煎服不拘時當吐出虫即愈
安虫散錢氏方凡虫不可盡去宜安之

檳榔

胡粉炒黃

川練子去皮鶴虱

白礬枯過二錢半

右為末每服一錢温米飲調下

川練丸錢氏方治上中二焦虛或胃寒虫動作痛

乾漆

五錢作碎炒烟盡

雄黃二錢

巴豆霜一錢

右為末麵糊丸如黍米大看兒大小與服取東向石榴
根煎湯下痛者煎有子苦棟根湯下或蕪蕪湯下亦可

蕪蕪散錢氏方治諸虫作痛

白蕪蕪

去麩

乾漆

炒令烟盡各等分

右為末每服一錢米飲調下臨發時服

化虫丸湯氏方治因疳生虫五心煩熱

蕪蕪

黃連

神麴炒

麥蘖炒各等分

右為末麵糊丸如黍米大空心米飲下

三稜散湯氏方治積氣肚痛

縮砂仁

甘草炙

益智炒去

三稜

莪朮

青皮去穰炒各等分

右為末白湯點下

白毒

法付余卷之二十一

二十一

上

二五十五

治疝氣方 湯氏方

芫花 醋浸炒

木香

檳榔

三稜 炒各兩

附子 炮

茯苓 去皮

青皮 去白

全蝎

肉桂

石砂各二錢

右為末將硃砂浸洗去土頓在湯瓶上候成膏子和糠

醋打麵糊丸如棗豆大每服二十九空心温酒下未效

再服

一方

小兒心痛欲絕一時無藥可察急用艾灸足大拇指中

男左女右

小兒疝痛可灸足大拇指甲後以韭菜聚毛間名大敦

穴男左女右

○積聚癖塊 新增

附諸方

快膈消食丸 集成消食積

縮砂仁

橘皮

京三稜

莪朮

神麴

麥芽 各半兩

香附子 一兩 畧炒

右為末麵糊丸如麻仁大食後白湯下隨大小加減

紫霜丸 治乳哺失節宿滯不化胸膈痞滿嘔吐惡心便

利不調乳食減少又治傷寒傳裏大便酸臭乳食不消

右為細末蒸餅丸如黍米大用米飲送下食遠服

三稜散

三稜

莪朮

甘草

益智去殼

青皮

陳皮

神麴

麥芽各二錢

右為細末用白湯調化下不拘時候

七聖丸湯氏方消積滯調脾胃

芫花

先用醋浸一宿炒漸乾加入三稜莪朮同炒令赤色入陳皮川練同炒微焦取出用

蓬朮

陳皮去白

京三稜

川練取肉

青皮去白

杏仁去皮尖各等分

右件為細末入巴豆二十粒去油膜和白醋糊丸如粟

米大每歲常服二丸臨卧熟水送下常服宜去巴豆

六味三稜丸

五六箇月小兒未喫穀食有癖積者

莪朮煨

三稜煨

神麴炒

麥蘖炒

青皮

陳皮各等分

右為細末稀麵糊丸如黍豆大每服二十九白湯下

三稜煎丸

飲食過多痞悶疼痛食不消化久而成癖又

治婦人血積血塊乾血氣經閉

莪朮黑角者

三稜各一兩二味濕紙包煨

大黃去皮八兩

右為末先以大黃銀石器內好醋漬令平慢火熬微乾

入二味為丸如黍豆大每服十九至二十九食後溫白

湯送下虛實加減服大人如梧桐子大每服四十九
月蟾丸秘方治小兒脾癖癥瘕

木香

人參

黃耆

當歸

桔梗

黃連

三稜丸

蓬朮

鱉甲酥炙

夜明沙

綠礬

枳實

史君子

苦練根皮

訶子各一兩

蝦蟆燒存性七錢半

石件為末如菘豆大每服三四十九食前米飲下忌生
冷雜果子發脾之物大人癥瘕丸如梧桐子大空心服
減夜明沙蝦蟆黃連服五七十九

一方 治小兒癖積膏藥

用水紅花子炒二錢大黃朴硝山梔子

石灰各一錢

酒醱雞旦大一塊共搗和為膏用青綿布攤貼再用湯
瓶熱熨用手拍勒之三日後揭起肉黑如墨是其效也

一方 治小兒癖積丸藥

用三稜義朮阿魏蘆薈白朮陳皮各二錢水紅花子炒
三錢大黃三錢為細末棗肉搗為丸如菘豆大每服三
十九空心米飲下

甘遂散湯氏方治胸膈伏熱內停飲食以致臟腑不舒氣
結脹滿

甘遂淨令

青皮去白

黃芩

大黃炒各等分

右吹咀每服二錢水半盞煎服以利為度

取水方 湯氏方積水疝水並皆治之

其遂

青皮去白

陳皮去白

木香炮各兩

和印生用

右為末紫蘇木瓜湯點下忌服甘草

退腫消毒散 湯氏方治積水驚水或飲水過多停積於脾

或四肢腫而身熱宜用藥內消之其腫自退

蘿蔔子

赤小豆

甘草炙

陳皮各半兩

木香二錢半

右吹咀每服二錢水一小盞姜棗煎服

勻氣散 御藥院方治脾肺氣逆喘嗽面浮身腫

不利

桑白皮二兩

陳皮去白兩半

桔梗炒一兩

甘草炙

藿香葉兩半

木通四兩

赤茯苓去皮兩

右吹咀每服二錢水一小盞姜棗煎服

木香散 湯氏方治心經伏熱小便不通

木通一兩

牽牛半兩炒

滑石一兩

右為末灯心葱白水煎二錢不拘時服

○調理脾胃

附諸方

調劑

心法附錄卷之三

二

三百八十二

參苓白朮散 治小兒脾胃虛弱不進飲食方見調補脾胃

四君子湯 調脾胃進飲食見補損

溫脾散和劑方治脾胃不和腹脇虛脹不進飲食困倦無

力

訶子炮去

人參各半

白朮

木香

桔梗各半

茯苓

藿香

陳皮

黃芪各半

甘草二錢

右呔咀每服二錢水半盞姜棗煎服不拘時

丁香散和劑方治胃虛氣逆嘔乳不食

人參半兩

丁香

藿香葉各二錢半

右呔咀每服二錢水半盞煎熟入乳汁少許煎服

和中散和劑方治脾胃不和嘔逆惡心乳食不進

厚朴六兩

乾姜炮

甘草各二兩

白朮三兩

右呔咀每服四錢水一小盞姜二片煎空熱服

調中散湯氏方治脾胃不和

人參去芦

白茯苓去皮

木香

白朮

甘草炙

乾姜炮

藿香葉

宿砂仁

香附子炒去毛

丁香等分

右為末每服一錢姜棗煎湯下如肚疼以白湯點下

醒脾散湯氏方治小兒脾胃怯弱為風冷所乘體熱頭疼

調胃

卷之三十一

五十一

七三百七

霍亂

天南星二錢重

人參去芦

丁香四十

白茯苓

藿香葉

白朮

甘草各

右為末生薑冬瓜子煎服

加減觀音散湯氏方調理脾胃宜常服之

白朮炒

人參去芦

白蘆豆蒸

白茯苓皮去

麥蘖炒

黃芪縮水

甘草

乾山藥

神麴

香附子炮去毛

各等分

右為末每服一錢空心米湯調下

平胃散經濟方治吐逆頻併手足心熱不進飲食

紅麴

甘草錢一

白朮錢半

右為末每服半錢煎茶子米飲下

銀白散簡易方治小兒百病

霍香去土

天麻炒

糯米炒一方用糯

粟各半兩

姜炒

川升麻

甘草各二錢半

白附子半錢

木香濕紙裹煨

白朮以菜豆同炒

今香不用豆

山藥

黃紙炒

人參各一兩

白茯苓一兩

白蘆豆一兩

右為末隨証加減常服沸湯或米飲調下慢驚搐搦射

香飲飲下急驚定後吐不止陳米飲下夾驚傷寒

發搖薄苛葱白湯下 吐熱面赤乾葛金錢薄苛湯下
 天柱倒行步脚軟濃米飲下 疝氣腹急多渴百合湯
 下 飲食不知飽飢不生肌肉炒麥芽生姜煎湯下
 神氣脫墜言不正及吐瀉藿香湯下 暴瀉紫蘇木瓜
 湯下 白赤痢不進飲食米飲煎粟殼湯下 稟受
 怯弱每日服常服調理脾胃姜棗湯下 和劑云木
 香黃芪白附子姜棗糯米藿香加知母其味各等分
 瀉黃散按準方瀉脾熱白黃口不能吮乳
 藿香錢 山梔子二兩 甘草兩 石膏兩
 防風兩

右生用蜜酒微炒香為細末每服一錢至二錢水一盞
 同煎清汁服

聖功散 按準方 溫中和氣治吐瀉不思飲食凡小兒虛冷
 病先與數服以正其氣方見吐瀉痢瘧

進食散 進食神效

白扁豆 石蓮肉 去人參 各二錢
 神麩 甘草 白芷 茯苓 一錢
 黃芪 各一錢
 木香

右為細末每服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢用
 木半鍾生姜一片棗子半枚煎十數沸調末服之

惟方 卷之三十一 三十一

人參沉香散 治脾氣虛

人參

木香

白朮

沉香 各五錢

茯苓 二兩

甘草

白芷 各三錢

右為末每服一錢米飲調下嘔吐藿香湯下

小兒雜方新增

附諸方

小兒初生回氣法保生要方

小兒初生氣欲絕不能啼哭者必是難產或胃寒所致
急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶急燃大紙撚蘸油
點燈於臍帶上往來過帶薰燒之蓋臍帶連兒腹待火

氣由臍入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如
常方可浴洗浴洗了方斷臍帶

通小兒大小便法保生要方

小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水
先嗽了口吸咂兒前後心并臍下手足心共七處每一
處凡三五次嗽口吸咂取紅赤為度須臾自通不爾無
生益有此證知此法可得再生

燥臍法

嘗聞子在母腹中胞胎十月止於臍中與母通氣初降
生之時雖曰胎胞已破始於兒口鼻中接天地之氣而

雜方

法附錄

卷之三

三百五

呼吸之其臍中所通之氣猶未盡絕况收生之母不明
通氣之大理不知斷臍之細功粗心妄意以致斷臍之
初因所通之氣招風入內者有之其法去新生小兒綿裹
臍帶離肚五六寸處先用軟綿繒住却於線外將臍咬
斷片時去線待血流盡以手輕輕揉散艾灸臍頭三五
炷結作紇絡軟帛腰裹切不可常時揭着待臍根落去
自然無事一法小兒降生之後即將軟線貼臍根繒住
待第三日離肚二指將臍剪斷用生姜自然汁或香油
和麵裹臍四圍將臍頭鋪艾灸三炷謂之薰臍後不招
風

法醫百集成

射香

蜈蚣末

牛黃末

青黛末各
字七

薄荷半字

蝎尾去尾毒為末半錢

方作半字七

右為末熟棗內和成膏新綿上塗勻貼於額上四方可
出一指許火上炙火頻熨百日裏外小兒可用此塗并

浴法

浴體法錢氏方

天麻錢二

蝎尾毒去

硃砂各半

烏蝎肉酒浸

青黛

白礬各三

射香一字

右為末每用三錢水一碗桃枝一握同煎溫熱浴兒勿

雜方

法付餘卷之三

八

上三百二十八棟

浴背上

雄黃鮮毒丸 治小兒痰熱上攻發作纏喉風喉痺雙鵝

腫痛湯藥不下咽痛頰腫等証用此藥吐之

雄黃兩

巴豆去油十粒金一

右為末醋糊丸如黍米大熱茶清下七丸至十九吐出

頑涎即甦天効如口噤以物斡開灌之下咽無不活者

吐風散 治小兒急中風口噤不開不省人事

全蝎一箇

瓜蒂一箇

赤小豆三十粒

右為末一歲一字溫米飲調下未出再服

○廣按丹溪云小兒急慢驚風發熱口噤手心伏熱

熱咳嗽痰喘此類証並宜湧法吐之別此方可以通用

救生散

猪牙皂角炮天南星生 半夏生

荆芥穗

川烏

天麻

防風

疆蚕去嘴

細辛

全蝎去毒炒 草烏炮

薄荷各五分

雄黃五分

右為末入射香一字藥少許研勻用竹管盛藥吹入鼻中開闔再用生薑汁調藥搽牙根上

疎風散 治小兒五臟中風身體不能自收冒悶不知疼

痛口不能言筋脉拘急手足抽掣

防風 犀角 麻黃去節 人參

當歸 川芎 羌活 遠志去心

茯苓去木 甘草炙各

右次咀用水煎食前服未除病根不成痼疾

白餅子錢氏方治小兒停乳以致嘔吐泄瀉腹脹潮熱驚

痺喘嗽等証用此藥下之

巴豆二十四箇去皮用水 天南星炮 半夏湯炮七次

輕粉 滑石錢各一

右研勻巴豆後入衆藥以糯米飯為丸小豆大捻作餅

子煎葱湯下

○廣按人乳味甘戀膈易於停積所以小兒之病多繫

於此此方用南星半夏以豁痰飲用輕粉滑石以瀉

濕熱用巴豆以通利積滯推陳致新之妙用也

寶鑑三稜煎丸 治小兒飲食過多痞悶疼痛宿食不化

久而成癖

廣末黑角 荆三稜二味濕紙裹煨 大黃去皮八兩

右將大黃為末銀石器內以好醋浸令透慢火熬成膏

和二藥為丸麻子大或菘豆大每一二十九食後溫水

下

廣木化癖丸 治乳食不消心腹飽脹壯熱喘麤嘔吐痰

涎食癥乳癖

代赭石醋淬當歸炒 朱砂研 枳殼炒

廣木炮 荆三稜炮各兩 木香兩 射香

巴豆去油各二錢半

右為末研勻麵糊丸如麻子大每一歲兒二丸米飲下
○廣按巴上三方消導之劑也但有寒熱輕重之分宜

選用為妙

一方 治小兒外腎腫硬及陰瘡

用乾地龍為末先葱椒湯於避風處洗次用津唾調傅

其上

三白散 和劑方治小兒膀胱熱風濕相乘陰囊腫脹以致大小便不利皆治

白牽牛二兩 桑白皮 木通去節 白朮

陳皮各五錢

右為末每服二錢姜湯調下空心服

牡丹散 濟生方治小兒外腎偏墜

防風去芦 牡丹皮去木各等分

右為末每服二錢溫酒調服如不飲酒鹽湯點服亦可

疳瘡方

白礬煨

五倍子各一錢

右為末蠶水洗淨貼患處

金華散錢氏方治小兒一切濕瘡疥癬等瘡

苦參

黃連各半兩附黃丹一兩

輕粉一錢

右同研勻先以溫水洗然後貼之

一方湯氏方治濕癬瘡

用蛇床子為末先以雞根煎湯洗次用臘月猪脂調藥

傳之

羊蹄散 小兒頭癬久不瘥者

白礬半兩

羊蹄根兩

黃丹炒

右搗爛入米醋半盞調均候癬極痒搽之至疼即止隔

日洗去再搽

治大腸虛弱肛門脫下湯氏方

龍骨

訶子肉酪一 沒石子大者二枚

瞿粟殼去穢醋塗各二錢

右為末白湯點服仍用葱湯薰洗令軟欵欵以手托上

又用執一片燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊數層壓

定使熱氣上透不可過熱令病者臀坐布上如覺布溫

逐旋減之常得溫熱為度并常服前藥

治鼻衄湯氏方用生蘿蔔去葉搗汁仰顛滴入鼻中或血

佳方

心法附錄卷之三

八十六

七

二百六冊

妄行取汁飲之立効

白斂散湯氏方治小兒凍耳成瘡或癢或痛

黃蘗

白斂各等

右為末先以湯洗瘡後用生油調塗

生附散湯氏方治凍爛脚成瘡

用生附子為末麵水調貼之即愈

香鬻煎湯氏方治小兒白禿不生髮燥痛

陳香鬻二兩

胡粉一兩

猪脂半兩

右用水一大盞煎香鬻取汁三分去滓入胡粉猪脂相

和令勻塗令頭上日日頻用之

苦黃散湯氏方治小兒齒不生

大苦蘗

乾地黄各半兩

山薯蕷

當歸

芍藥

甘草各二分

右為末熟湯調服用搽齒脚

黃連散張子和方治頭瘡

川黃連

黃栢去粗皮

真輕粉

草决明各等

右為末用生小油調藥於瘡上塗立効

一方治小兒耳邊鼻下赤爛濕痒名曰蝕疽瘡幼幼方

黃丹

菽豆粉一錢

白礬一錢

右研細末付瘡上啣調亦可

雜考

小兒疳積

二

三

軟膏 治一切風熱及小兒頭瘡

巴豆 七箇

瀝青

黃蠟

香油 各五

膩粉 錢一

右先將瀝青香油黃蠟熬次入巴豆不住手攪候巴豆焦黑色去巴豆却入膩粉令勻放冷敷瘡上

大烏散 治小兒癰癤腫毒

南星

赤小豆

草烏

黃柏 各等

右為末生姜自然汁調貼患處或用米醋調尤佳

搨皮散 治嬰孩小兒鮮癩癧作疼痛

搨皮 去粗皮此樹在處處有即包藍樹葉木也

右不拘多少切碎用水煎溫湯頻洗

白芩散 治小兒瘰癧膿汁不乾

白芩

貝母

去心各五錢

輕粉 二錢

右為末先搨皮散洗過後用清油調傅

龍骨散 治小兒停耳

白礬

煨一錢

龍骨

煨一錢

黃丹

炒一錢

乾胭脂 半錢

射香 字一

右為末以綿杖子展却耳中膿水用藥末一字摻在耳中勿令風入

耳瘡方

黃連 土須

蛇床子 各一錢

輕粉 一字

右為末 鴉毛管吹藥入耳內

連珠散 治嬰孩小兒滿頭如癩瘡毒及手足身上陰器

膏囊痒則搗爛黃米汁淋瀉燥痛

黃連 五錢

蛇床子 錢五分

錢五分

五倍子 二錢

輕粉 五帖

右為末 先以荆芥葱煎湯洗拭乾後用清油調傅

金銀散 治嬰孩小兒肩間生瘡名煉銀瘡

煨金銀鍋 一箇

輕粉 五分

右為末 用麻油調傅

澤瀉散 治小兒鼻下兩膀瘡名痒爛

澤瀉

麝金

甘草炙

山梔子 各一

右為末 用甘草煎湯調食後服

地黃湯 治小兒鼻衄

川芎

生地黃

赤芍藥

當歸 各等

蒲黃 少許

右以咀 用水煎不拘時服

蒲黃散 治初生小兒大小便下血

生蒲黃

油頭髮 燒灰各一錢

右為末 用生地黃汁或米飲調乳食前服

佳方

法付余卷之三

二

一

立効散 治小兒瀉血

蒲黃

生地黄

生甘草

赤茯苓

去皮各等分

右咬咀用水煎入髮灰調勻食前服

聖惠方 治小兒龜胸

大黃煨三錢

天門冬去心

百合

木通

杏仁去皮尖 枳殼炒

桑白皮蜜炒 葶藶紙

朴硝各五錢

右為末煉蜜丸如芡實大用溫湯調化食後仍用灸兩乳前各一寸半上兩行三骨間六處各灸三壯春夏從下灸起秋冬從上灸起依法灸之

枳殼丸 治小兒龜胸

枳殼炒

防風去芦

獨活去芦

大黃煨

前胡去芦

當歸

麻黃去節各三錢

右為末麵糊丸如黍米大用米飲食後服仍用灸肺俞穴在三椎下兩傍各一寸半心俞穴五椎下兩傍各一寸半膈俞穴七椎下兩傍各一寸各灸三壯

芫黃散 治小兒齒遲

川芎

山藥

當歸

芍藥炒

甘草炙各二錢半

右為末用白湯調化食後服將乾藥末搽齒根

能方 治小兒齒遲 二三百字有

芎藭丸 治小兒語遲

人參 石菖蒲 麥門冬法 遠志法

川芎 當歸 乳香 朱砂絡二

右為末煉蜜丸如黍米大用米飲食遠服三十九

虎骨丸 治小兒行遲

虎脛骨酥油 生地黄 酒洗 白茯苓去皮 酸棗仁去殼

肉桂去粗皮 防風 當歸酒洗 川芎

牛膝酒洗去芦

右為末煉蜜丸如黍米大服三十九木瓜湯食前服

牡蠣散 治小兒盜汗

牡蠣錢二 黃芪錢二 生地黄兩一

右以咀分作三服水前不拘時

○廣按小兒如草頭之露水之泡用藥不可不謹也

夫小兒之病多因脾胃嬌嫩乳食傷積痰火結滯而

然其証不一且舉其尤者而言乳食傷胃則為嘔吐

乳食傷脾則為泄瀉吐瀉既久則成慢驚或為疳病

乳食停積則生濕痰痰則生火痰火交作則為急驚

或成喉痺痰火結滯則成癰吊或為喘嗽胎熱胎寒

者稟受有病也臍風撮口者胎元有毒也鵝口口瘡

者胃中有濕熱也重舌木舌者脾經有實火也胎驚

雜方 心去付余卷之三十一 九十一

夜啼者邪熱乘心也變蒸發熱者胎毒將散也丹毒者火行於外也蘊熱者火積於中也中惡者外邪乘也睡驚者內火動也痢者腹中食積也瘧者膈上痰結也夕發夕瘳者暈寢也內傷發熱者口苦舌乾也心痛者虫所齧也心痛者寒所鬱也積有常所有形之血也聚無定位無形之氣也胃者主納受也脾者主運化也脾胃壯實則四體安康脾胃虛弱則百病蜂起業童科者不可不調理脾胃為切要哉

丹溪心法附餘卷之二十三

休寧東山古庵方廣之類集


小兒門下

痘瘡一百

丹溪心法

○痘瘡分氣虛血虛用補 氣虛者人參白朮加解毒藥
血氣者四物湯中加解毒藥 酒炒黃芩黃連名解毒藥

丹溪心法附餘卷之二十三



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

凡痘瘡初出之時色白者使用大補氣血人參白朮黃芪
川芎升麻乾葛甘草木香丁香酒洗當歸白芍藥 若
大便瀉加訶子肉豆蔻 但見紅點便忌有根湯恐發
得未虛也

吐瀉食少為裏虛 不吐瀉能食為裏實裏實而補則結
離毒 陷伏倒靨為表虛灰白者亦表虛或用燒人屎
紅活綻凸為表實表實而更復用實表之藥則要潰
爛不結痂

吐瀉喘伏二者俱見為表裏俱虛
黑陷甚者亦用燒人屎密水調服 出子和方

痘瘡初出時或未見時有患者宜預服此藥多者令少重
者令輕方以絲瓜近蒂三寸連皮子燒灰存性為末沙
糖拌乾喫入硃砂末尤妙

痘瘡分人清濁就形氣上取勇怯

黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者酒炒黃芪酒紫草
人參

顏色正者如上治將欲成就却色淡者宜助血藥用當歸
川芎酒洗芍藥之類或加紅花

將成就之際却紫色者屬熱用涼藥解其毒升麻葛根黃
連黃芩桂枝連翹之類甚者犀角大解痘毒

爐灰色白靜者怯者作寒者

勇者燥者燥強者作熱者

痘瘡鼻粘子連翹山查甘草此四味始終必用之藥

全白色將靨時如豆殼者蓋因初起時飲水多其靨不齊俗呼倒靨不好但服實表之劑消息他大小便如大便秘通大便小便秘通小便

有初起煩躁譫語狂渴引飲若飲水則後來靨不齊急以涼藥解其標如益元散之類亦可服

痒塌者於形色脉上分虛實實則脉有力氣壯虛則脉無力氣怯輕者用淡蜜水調滑石末以羽潤瘡上

虛痒者以實表之劑加涼血藥

實痒如大便不通者以太

糞

更寒涼之藥少許與之下其結

疎則無毒密則有毒宜早以藥解之雖數十貼亦不妨無害

眼之患瘡乾者宜退火濕者用瀉濕退火只用輕劑荆芥升麻葛

根之類瀉濕乃肌表間濕宜用風藥白芷防風之類

如痘瘡傷眼必用山梔決明赤芍藥當歸尾黃連防風連翹升麻桔梗作小劑末調服如眼無光過百日後無氣復自明

痘癰多是實毒血熱成癰分上下用藥一日不可緩已成
膿必用涼藥為主赤芍甘草節連翹桔梗 上引用升麻
葛根 下引用枳榔牛膝助以貝母忍冬草白芷瓜
之類 大便燥用大黃發寒熱用黃芩黃柏
痘瘡黑屬血熱涼血為主 白屬氣虛補氣為主 中黑
陷而外白起得遲者則相兼而治
初起時自汗不妨蓋濕薰蒸而然故也
痘風分氣血虛實以日半守之多帶氣血不足 虛則黃
芪生血活血之劑助之畧佐以風藥 實則白芍為君
黃芩亦為君佐以白芷連翹續斷之類

若屬寒陳氏方亦可用

入方 解痘瘡毒

絲瓜

升麻

酒芍藥

生甘草

黑豆

山查

赤小豆

犀角等分

右吹咀每服三錢水一盞煎六分溫服

又方 治痘瘡已出未出皆可服

硃砂

右為細末蜜不調服多者可減少者可無

痘瘡敷藥

貝母

南星

殭蚕

天花粉

痘疹 八法附錄卷之三十三

白芷 寒水石 最多草烏 大黃

猪牙皂角 各等分

右為末醋調傅之

附諸方

○補虛

黃芪 紫草 人參 湯 治痘瘡裏虛黑陷 即前丹溪方

黃芪 酒炒 紫草 酒炒 人參 各等分

右為粗末每服五錢水一大盞煎六分加酒服

小異功散 治痘瘡裏毒吐瀉及和胃助氣 揚氏方

人參 茯苓 白朮 甘草

陳皮 木香 各等分

右為末每服五錢水一大盞姜棗同煎六分服

白朮散 治裏虛吐瀉煩渴除心身熱清神生津痘無顏色

首尾可服

人參 白朮 茯苓 甘草

木香 藿香 各七 乾葛 一錢 一方作乾姜 止泄瀉用

右為粗末水一大盞姜棗同煎至六分溫服

大補湯 實表裏補氣血治痘瘡陷伏不紅者

當歸 川芎 白芍藥 生地黃

人參 白朮 甘草 白茯苓

三十五

黃芪

官桂各等分

右取咀大小兒每服五錢小小兒三錢水煎服

痘疹治例

心法附錄曰小兒凡覺身熱証似傷寒若未經瘡痘起
未明且先與惺惺散參蘇飲或人參羌活散
熱甚者則與升麻葛根湯人參敗毒散

痘瘡已出則少與化毒湯

出不快者加味四聖散紫草飲子葉草木香湯紫草水
湯或快斑散絲瓜湯

出大甚者人參敗毒散犀角地黃湯

小便赤澀者大連翹湯甘露飲麥門冬五苓散

大便秘結內煩外熱者小柴胡湯加枳殼最當或少與四
順清涼飲

若咽喉痛者大如聖湯鼠粘子湯

喘滿氣壅者麻黃黃芩湯

胃腹脹滿者枳殼桔梗湯二陳加枳殼湯

煩渴者甘草散烏梅湯

若下利嘔逆者木香理中湯甘草乾姜湯

若陷入者加味四聖散更以胡荽酒薄傅其身厚傅其足
噴其衣服併以厚綿蓋之若猶未也獨聖散入射香陳

酒調劑或不用酒則木香煎湯若其瘡已黑乃可用錢氏宣風散加青皮主之

然而瘡疹用藥固有權度大小二便不可不通其有大便秘自利所下黃黑則毒氣已減不必多與湯劑但少用代毒湯可也或不用亦可若大小二便一或閉焉則腸胃壅塞脉絡凝滯毒氣無從而發泄眼閉聲啞肌肉鰓然不旋踵而告變矣

○發熱

惺惺散 治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱

白茯苓

細辛

桔梗

瓜蒌根

人參

甘草

白朮

川芎

右為末每二錢水煎入薄荷三葉同煎服

參蘇飲 治小兒時氣傷風傷寒發熱惡寒咳嗽未明痘

症是與不是疑似之間此藥甚為穩當

楊氏調解散即是此方

前胡

人參

紫蘇葉

乾葛

半夏

茯苓

枳殼

陳皮

甘草

桔梗

右吹咀姜棗煎微熱服

人參羌活散

神效

心丹附錄卷之三十三

一

又

羌活

獨活

柴胡

人參

川芎

枳殼

茯苓各三分

前胡

北槿

天麻

地骨皮

甘草各一分半

加麻黃薄芎葱白煎服

汗後尚熱宜服此去麻黃加

紫草如已見三五點如紫草陳皮赤芍使熱退瘡出

亦輕更調辰砂末半錢以制胎毒

消毒救苦散拔萃方治癰疹悉具消化便令不出如已出

稀者再不生癰

麻黃

羌活

防風各五分

川芎

藁本

葛根

蒼朮

酒黃芩

生黃芩

柴胡各二分

細辛

橘皮

紅花

蘇木

生地黄

酒黃柏

連翹各五分

黃連三分

生甘草一分

吳茱萸半分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞煎去粗熟服

三豆子湯 治天行豆瘡但覺有此證即服之

赤小豆

黑豆

葶豆各一兩

甘草節錢五

右淘淨水煮熟任意食豆飲湯七日自不瘡

惡實膏

用惡實子為末蜜調貼額門上免有患眼之疾

○熱甚者

神效

心丹附錄卷之三十三

一

又

三百九十四

升麻葛根湯 加山查大力子其瘡稀疎而易愈

川升麻 甘草 白芍藥各一錢 葛根半一錢

右咬咀作一服水一盞半煎八分溫服

人參敗毒散 方見前

涼膈散 治小兒瘡疹未出三焦積熱煩躁多渴及面赤

面熱頭昏咽燥喉咽腫痛口瘡便溺赤澁狂言譫妄睡

卧不安並宜服之

大黃 朴硝 甘草 梔子仁

黃芩 薄荷葉各兩 連翹四兩

右為末每服二錢竹葉五片蜜少水一盞煎六分溫

服

若瘡疹已出發熱作渴脉實則亂便實者亦宜服此便

不實者切不可服恐內虛而毒氣不能發外也

謹按瘡疹已發有寒熱溫涼不同形氣盛衰之異虛寒

者用異功散實熱者用涼膈散有起死迴生之效若以

實熱為虛寒用異功散虛寒為實熱用涼膈散死生在

反掌之間慎之慎之

○已出

化毒湯 治瘡痘已發以此消毒

紫草半兩 升麻 甘草各二錢半

此方見前

右劉散每服二錢粳米五十粒同煎服

○出不快者

四聖散簡易方治小兒瘡疹出不快透及倒靨一切惡候

紫草茸

木通去節

甘草

枳殼去白熱炒各等分

右吹咀每服二錢水一盞煎服

加味四聖散

紫草

木通

黃芪

川芎

木香等分

甘草炙

右為粗末水煎服 大便秘加枳殼

大便如常加糯米

一米百粒

楊氏曰糯米能解毒發瘡

紫草木香湯

治瘡出不快大便泄利

紫草

木香

茯苓

白朮等分

甘草多少許

入糯米煎服

楊氏云紫草能利大便白朮木香佐之

紫草木通湯

紫草

人參

木通

茯苓

糯米等分

甘草炙

右剉煎二錢溫服

內虛大便利者可入南木香紫

草

快斑散

本草綱目卷之六

痘疹

心法所會者之三

一

紫草

蟬殼

人參

白芍各二錢半

水通錢

甘草錢五分

右剉散煎二錢溫服

又方

紫草錢五分

陳皮錢二

黃芪錢二

赤芍錢五

右剉加糯米百粒煎三歲已上服三錢已下一錢服後

瘡徧勻四肢住服

絲瓜湯

絲瓜連皮燒存性為末湯調楊氏云發痘瘡最妙或

加甘草紫草

消毒散和劑方治毒飲壅遏壯熱心煩瘡疹難出未脫

透

牛蒡子炒六兩

荆芥穗兩一

甘草錢二

防風

升麻各兩半

右咬咀每服二錢水一盞煎服如大便利者不宜服

○出太甚者

人參敗毒散方見前

犀角地黄湯

犀角兩一

生芩兩二

芍藥七錢

牡丹皮兩一

右咬咀三歲兒三錢水煎

痘疹

法計餘卷之三

卷之三十三

稠密者

加味犀角消毒散

惡實四兩

甘草一兩

防風兩

荆芥穗兩

宜加山查酒黃芩酒洗紫草減食加人參

右為末煎紫草糯米芫荽湯調服食後臨卧日三

鼠粘子湯按方治癰疽已出稠密身表熱急與此藥以

防已後青乾黑陷

鼠粘子香炒

當歸身酒洗

甘草各一錢

柴胡

連翹

黃芩

黃耆各一錢半

地骨皮二錢

右為粗末每服二錢水煎去滓溫服空心藥進且休與

乳食

○小便赤澀者

大連翹湯

連翹

瞿麥

荆芥

木通

車前

當歸

防風

柴胡

赤芍

滑石

蟬蛻

甘草各一錢

黃芩

山梔子各半錢

右咬咀作一服用姜三片水一鍾煎五分不拘時服

甘露飲子

生芩

熟芩

天門冬心法

麥門冬心法

枇杷葉去毛

枳殼麩炒

黃芩

石斛

生薑

黃連去心

黃芩

石斛

山茵陳

甘草

各等分

右剉每二錢水一盞煎八分食後服

五苓散

加麥門冬煎服方見中暑

○大便閉結內煩外熱者

小柴胡湯

加枳殼同煎服方見傷寒類

四順清涼飲子

當歸 赤芍

大黃虛者煨實者生 甘草各等分

一方加陳皮粳米煎

○咽喉痛者

如聖飲子

桔梗

甘草生

鼠粘子炒二錢 麥門冬三錢

右為末竹葉同煎二三錢

一方加荊芥防風重者竹瀝同煎

鼠粘子湯

鼠粘子

炒四錢

荊芥穗

一錢

甘草

錢

防風

半錢

右為細末沸湯點服

去防風名消毒散

○喘滿氣壅者

麻黃黃芩湯

麻黃錢三

赤芍

黃芩各二錢半

桂枝各半錢

右咬咀作一服用姜三片水一鍾煎五分不拘時服

○膏腹脹滿者

桔梗枳殼湯

枳殼

桔梗各二兩

甘草炙半兩

右剉姜煎

二陳加枳殼湯

半夏

橘紅

茯苓

甘草

加枳殼各五分

右剉姜煎

○煩渴者

甘草湯

甘草

瓜蒌根等分

右為末每一錢煎服

烏梅湯

小黑豆

菴豆各一合

烏梅二箇

右咬咀新汲水一碗煎取清汁旋服

人參麥門冬散集驗方治發熱煩渴

麥門冬去心

人參去蘆

甘草炙

陳皮

白朮

厚朴姜製各半兩

瘦癯 八法所創卷之三十一 十四 癸
右咬咀每服二錢水一盞煎六分去粗溫服不拘時

○下利嘔逆者

木香理中湯

本方中加木香甘草乾姜 方見中寒

○陷入者

加味四聖散 方見前

胡蔓酒

以芫蔓煎酒薄傅其背厚傅其足噴其衣服併以厚

綿蓋之

獨聖散

牛旁子錢五分 白殭蚕半錢

右末入紫草三莖同煎連進三服 前條云獨聖散入

射香陳酒調劑如不用酒則水香煎湯調服

又方

穿山甲湯洗淨炒焦黃為末每服半錢入射香少許水

香煎湯調下或紫草煎湯入紅酒少許調下

○黑陷者

宣風散

枳椇二

陳皮

甘草各半

黑丑四兩半
生半兩

右為末每

錢量大小與服蜜湯調下

宣風散

宣風散

宣風散

宣風散

無價散

御藥院方

治癩瘡不出黑陷欲死者

人猫猪犬鴈晨燒

少許微將密水調

百者救生無一死

黃金萬錠也對消

右將前四物於臘日早晨日未出時則於銀鋪內用炭火煨令烟盡白色為度但是瘡發不快倒厝黑陷者及一切惡瘡每用一字蜜湯調服其効如神

一說人養用九歲以下無疾童子者猪猫犬糞用未破陽雄者先於重九日各置於淨處飼之以飯勿令雜食過旬日換盡腸之宿垢方收其糞陰乾候臘八日日未出時燒

百祥丸

紅芽大戟不以多少陰乾煨水煮極軟去骨日中暴乾復納元汁中者汁盡焙為末水丸如粟米大每服一二十九研赤多麻湯下

又湯氏方 治小兒痘疹黑陷者

羌活

有 川山甲 醋炒生人骨 煨存性各

射香

右四味為細末麻黃薄苛煎湯調一錢只用一服便起萬不失一

乳香散 治痘瘡既收心痛不可忍者餘毒歸心急則乳

香散服之

乳香半錢或一錢

右用水一盞煎服

一方加沒藥赤芍藥當歸同煎

○疔毒

四聖丹

治痘瘡中有長大紫黑色者為疔毒把住痘瘡不

起發急用簪尖挑破雖入此丹

珍珠三五粒 硫豆四粒

頭髮燒灰

右為細末用榆面粉膩調成膏子將兒在溫暖處安

存忌風寒穢氣尤用簪尖平擦

即時變為紅白色餘瘡皆起 又管見有疔痘者但挑

破出其黑血即愈或挑開用口吹去黑血或用綿裹指

甲指出黑血展去亦可蓋自疔痘破而毒氣得散也

愈後諸疾

五種化毒散 治疔痘餘毒未詳并上焦熱壅口齒

出血

甘草錢 射香半錢 人參

牙硝別研 青黛錢 甘草錢 射香半錢

右為末入青黛和勻煉蜜為丸如芙蓉實大金銀箔為衣

磨生犀水化下 齒血氣用生地黃汁化下

人參白朮散 錢氏方 治痘已屬身熱不退此藥清神生津

除煩止渴

人參 白朮 藿香葉 木香

甘草 白茯苓 乾葛

右咬咀每服三錢水一盞煎六分溫服不拘時

雄黃散 集驗方 治小兒因痘瘡牙齦生疳蝕瘡

右同研極細末量瘡大小乾糝其上

綿蜜散 陳氏方 治因豆瘡身體肢節上有疳蝕瘡膿水不

絕

用出蛾綿蜜不拘多少以生白礬槌碎置其內炭火

燒令礬汁盡取細研乾糝瘡上

穀精草散 陳氏方 治豆已屬眼目翳膜或聽澁多淚

穀精草 生蛤粉

右為末積猪肝一葉以竹刀批作片子糝藥在內用淨

繩縛定於磁瓦器內貯水慢火煮熟令兒食之

一方 治癩瘡入眼 張子和方

麩炒蒺藜炙甘草 羌活防風等分搗

每服二錢將水下 撲雲見日直到老

又方 張子和方

朱砂

腦子

水銀

麝香各分

右四味研為細末用水銀調滴耳中

一方 治小兒出瘡疹眼內有雲翳瑞竹堂方

輕粉

黃丹各等分

右為末竹筒吹入耳內左眼有翳吹右耳右眼有翳吹

左耳即退

麥湯散 治水痘 陳氏方

地骨皮妙半分

麻黃去節

甘草

各半分

人參一分

滑石半分

大黃紙裹

煨知母

羌活各一分

甜葶藶一分用紙隔妙

右為末每服半錢水一盞小麥七粒同煎十數沸服

○陳氏痘疹證治

凡小兒瘡疹未出已出之間有類傷寒之狀其瘡疹病證

自然憎寒狀熱身體疼痛大便黃稠此乃是正病也若

無他疾不宜服藥

凡療瘡疹先分表裏虛實若虛實不分則無所治如表裏

俱實者其瘡易出易靨也如表實裏虛者其瘡易出難

靨也

凡初覺豆瘡可用胡荽酒造房噴之以辟穢濁之氣則豆

瘡易收又急乾胭脂用蜜調塗兒兩眼眶則豆瘡不入

眼內

若痘疹已出未出之時或瀉渴或腹脹或氣促謂之裏虛速與十一味木香散治之以和五臟之氣

若痘疹已出未愈之間其瘡不光澤不起發根窠不紅謂之表虛也速與十二味異攻散治之以表六腑之氣

若瘡疹已出未愈之間其瘡不光澤不起發根窠不紅或腹脹或瀉渴或氣促是表裏俱虛也速與十二味異攻散送下七味豆蔻丸治之以助五臟六腑表裏之氣

若纔覺傷風身熱未明是與不是瘡疹便宜發散可服四味升麻葛根湯

若瘡疹始出一日至五七日之間雖身熱或腹脹是猶冷者或身熱泄渴者或身熱驚悸腹脹者或身熱汗出者皆不宜服升麻葛根湯已上四證宜服十一味木香散治之

若瘡疹始出一日至十日渾身壯熱大便黃稠是表裏俱實也其瘡必光澤起發肥滿易壓而不致損傷也

若痘疹已出發熱口乾煩渴不止者切不可飲冷水亦不可食蜜及红柿西瓜等冷物又不可妄投清涼飲消毒散等藥恐冷氣內攻濕損脾胃則腹脹喘悶寒戰咬牙則難治咬牙者齒橋也乃血氣不榮不可妄作熱治之

若痘瘡雖出不快皆言毒氣壅盛妄謂其熱以藥宣利解
散致令臟腑受冷榮衛澁滯則氣血不能衝貫皮膚肌
肉其瘡不得起發不得充滿不得結實不能成痂故多
痒塌煩躁喘渴而死皆因宣利解散之過也縱得其生
而必罕矣

若瀉水穀或瀉白色或瀉淡黃色者煎十一味木香散送
下七味肉豆蔻丸治之如瀉止住服不止者多服
若瀉頻多津液內耗血氣不榮其瘡雖是起發亦不能靨
也如身溫腹脹咬牙喘渴者難治綠水穀去多津液枯
竭而欲飲水不止者蕩散真氣故多死矣速與十一味

木香散救之

若四五日不大便者可用肥嫩猪腰一塊以淡白水浸火
煮軟熟取出切如豆大或皂子大與小兒食之令臟腑
滋潤使瘡痂易落百無滯碍切不可妄投宣藥恐內虛
瘡毒入於裏傷真氣

若六七日身壯熱不大便其脉緊盛與三味消毒散微得
利即住

若小兒神氣軟弱瘡疹自初出兩日至十三日當忌外
人恐有卒暴風寒穢惡之氣觸兒瘡疹

若身反發熱煩渴者宜服六味人參麥門冬散治之如不

愈者只服七味人參白朮散

若痘瘡欲靨已靨之間或不能靨腹脹煩渴者不可與水
蜜若飲者轉渴而死急煎十一味木香散救之

若痘瘡欲靨已靨之間頭溫足指冷或腹脹瀉渴氣促者
不可與水蜜若飲者即死急煎十二味異攻散救之

若十日至十一日當靨不靨其身不壯熱悶亂不寧卧則
哽氣煩渴咬牙急煎十二味異攻散更加木香當歸以
救陰陽表裏若與水蜜西瓜等冷物食之速死

若十二日十三日瘡痂已落其瘡癩猶黯或凹或凸肌肉
尚嫩不可澡浴亦不宜食多煖物又不宜食五辛五味

并有毒之物恐熱毒薰于肝膈眼目多生翳障若不依
此禁忌必為小兒終身之患用兩味救精草散治之

若痘瘡已靨其痂欲落不落煩渴不止切不可與水蜜西
瓜红柿等冷物食之若食之轉生焦渴或頭溫足冷或
腹脹或時瀉或咬牙以致難愈速與十一味木香散救
之即瘥

若身壯熱經日不除別無他證以六味柴胡麥門冬散治
之熱退佳服如不愈只服七味人參白朮散治之

若身壯熱大便堅實或口舌生瘡咽喉腫痛皆是瘡氣餘
毒未盡以四味射干鼠粘子湯治之如不愈者以七味

人參白朮散主之

若風熱咳嗽咽膈不利三味桔梗甘草防風湯治之如不愈者以七味人參白朮散主之

若涕唾稠粘身熱鼻乾大便如常小便黃赤以十六味人參清膈散治之如不愈只服七味人參白朮散立効

若痰實壯熱胸中煩悶大便堅實臥則喘急以五味前胡枳殼湯治之

凡瘡瘡首尾不宜與水喫少與冷熱湯則可若誤與之瘡靨之後其痂遲落或身生癰腫若鍼之成疔蝕瘡血水不絕甚則面黃唇白以致難愈者何也蓋脾胃屬土外

主身之肌肉祇緣飲水過多濕損脾胃搏於肌肉其脾胃飢肉虛則津液衰少津液衰少則榮衛澁滯榮衛澁滯氣血不能周流凝結不散故瘡痂遲落而生癰腫也若微作渴者以六味人參麥門冬散治之如不愈者只服七味人參白朮散治之

若身熱大渴以七味人參白朮散治之如不愈者只服十一味木香散治之

若腹脹渴者或瀉渴者或足指冷渴者或驚悸渴者或身溫渴者或身熱面眇白色渴者或寒戰渴不止者或氣急咬牙渴者或飲水轉渴不止者以上九證即非熱也

乃脾胃肌肉虛津液衰少故也宜服十一味木香散治之如不愈者更加丁香官桂多煎服丁香攻裏官桂發表其表裏俱實而瘡不致於瘁竭喘渴死矣若痘疹已醫未愈之間五臟未實肌肉尚虛血氣未得平復忽被風邪搏於膚腠之間則津液滯故成疔蝕瘡也宜用雄黃散綿繭散等藥治之久而不愈者潰骨傷筋以致殺人

九斑駁疹毒之病俗呼疹子是脾胃有熱也其脾胃蘊積熱毒或以時氣所作薰發於皮膚狀如蚊蚤所咬故赤斑通體也九發赤斑者十生一死發黑斑者十死一生

難治葛根麥門冬散生地黃散主之

○廣按丹溪斑疹豆瘡各立病目所治不同而陳氏瘡疹混同立論豈不誤哉夫豆瘡出於脾其間有熱燥者有寒濕者而斑疹出於心肺心肺屬陽多是風熱蕪痰而作宜於通聖散中消息之陳氏此篇却言斑疹乃是脾胃蘊積熱毒每因時氣所觸而作用葛根麥門冬散生地黃散治之方合病情可見瘡疹不可一途而治也明矣

凡豆瘡或悞抓成瘡膿血淋漓綠血氣衰肌肉虛故也切不可用新牛糞燒灰貼之其臭穢反觸其瘡宜用敗草

散治之仍服十一味木香散加丁香肉桂煎服

黃帝問曰飲有陰陽何也好飲冷者水雪不知寒好飲熱者沸湯不知熱岐伯對曰陽盛陰虛飲冷不知寒陰盛陽虛飲湯不知熱治之何如故陽盛則補陰虛用木香當歸每一兩藥共如一錢具攻散能除風寒濕痺調和陰陽滋養氣血使豆瘡易出易靨不致痒塌木香散性溫平能和表裏通行津液清上實下扶陰助陽之藥也蓋浴小兒腹脹瀉渴其効如神不能盡述大抵天地萬物遇春而生發至夏而長成乃陽氣薰蒸故得生長者也今瘡疹之病臟腑調和則血氣充實自然易出易靨

蓋因外常和煖內無冷氣之所由也

凡痘疹五不治一痒塌寒戰不止者二紫黑色喘渴不寧者三灰白色陷頂腹脹喘渴者四頭溫足冷悶亂飲水者五咬牙氣促泄瀉煩渴者皆難治

若痘瘡已出七日之間其瘡不光澤不起發根窠不紅痒塌抓搔謂之表虛也可隨證服藥蓋脾主身之肌肉肺主身之皮毛今豆瘡出是肌肉皮毛受其證也治法先當調和臟腑滋養血氣使脾不虛而肺不寒表裏沖和其瘡自然易出易靨也故經云表病裏和不治而自愈也

今將豆疹輕重開具于后

輕者 作三次出 大小不一等 頭面稀少

眼中無 根窠紅 肥滿光澤

重者 一齊并出 如蚕種 稠密

瀉瀉 灰白色 頭溫足冷

身溫腹脹

輕變重 犯房事 不思口 先曾瀉

飲冷水 餌涼藥

重變輕 避風寒 常和煖 大便稠

今將豆疹方開列于后

胡荽酒

以荽荑煎酒送房噴之以避穢濁之氣

胭脂膏

以乾胭脂用蜜調塗兒兩眼眶則豆疹不入眼內

升麻葛根湯 四味 方見前

木香散 十一味

木香 大腹皮 人參 去蘆 桂心

青皮 去穢 赤茯苓 去 前胡 去蘆 訶梨勒 去

半夏 姜製 丁香 甘草 各三

右咬咀每服二錢水一盞姜三片同煎空心溫服量兒

大小加減

一方去桂心丁香加桂枝藿香

異攻散 十二味

木香

當歸各三錢

官桂去粗皮

茯苓

白朮各二錢

人參

厚朴姜炒

肉豆蔻

丁香

陳皮各二錢半

半夏姜製

附子各錢半

右咬咀每服二錢水一盞姜五片肥棗二枚同煎空心

溫服量大小加減

一方去丁香附子加藿香乾姜

肉豆蔻九七味

木香

縮砂仁各三錢

白龍骨

訶子肉

肉豆蔻各半兩

赤白脂

枯白礬各七錢半

右為細末麵糊為丸如黍米大一歲服三五丸三歲

服百丸米飲湯下瀉甚者煎異攻散吞下瀉不止多服

或瀉水穀白色淡黃色木香散送下

消毒散

出後身壯熱不大便其脉緊盛用此微利

牛旁子炒兩

荆芥穗

甘草各一兩

右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減

人參麥門冬散六味

出後身反發熱煩渴者為見前

人參白朮散七味

出後身壯熱大渴嘔吐泄瀉方見前

痘疹 治所餘者之三 二

柴胡麥門冬散 六味 出後身壯熱經日不除

柴胡 甘草 人參 黑參 錢各二

龍膽草 錢 麥門冬 去心 三錢

右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減

射干鼠粘子湯 四味 壯熱便實口舌生瘡咽腫腫痛

鼠粘子 炒香 兩 甘草 炙 升麻 射干 各一

右每服二錢水一盞煎溫服量大小加減

桔梗甘草防風湯 三味 治風熱咳嗽咽膈不利

桔梗 甘草 防風 各等

右每服一錢水一盞煎溫服量大小加減

人參清膈散 十六味 治涕唾稠粘身熱鼻乾

人參 柴胡 當歸 芍藥

知母 桑白皮 白木 黃芪

紫苑 地骨皮 茯苓 甘草

桔梗 各一 黃芩 兩半 石膏 滑石 各半

右每服二錢水一盞煎溫服量大小加減

前胡枳殼湯 五味 疾實壯熱腦中煩悶大便堅實

前胡 枳殼 赤茯苓 大黃

甘草 炙各 半兩

右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減如身溫

卷之六 三十一 三百三十一

脉微并瀉者不可服

雄黃散

因痘瘡牙齦生疳蝕瘡

方見前

綿繭散

因痘瘡身體肢節上有疳蝕瘡膿水不絕者

方見前

敗草散

用蓋房多年爛草或蓋墻爛草亦可其草經霜

露感天地陰陽之氣善解瘡毒其功不能盡述取草不以多少晒乾或焙乾為末乾貼瘡上若渾身瘡破膿水不絕粘貼衣裳難以坐卧可用二三升攤於蓆上令兒坐卧其効如神仍服木香散加丁香官桂同煎服

韶粉散

痘瘡纔愈而毒氣尚未全散瘡痂雖落其癢猶

黷或凹凸內起當用此藥塗之

韶粉

輕粉

右和研勻入煉過猪肝油調和如膏薄付瘡上如痘瘡欲落不落當滅癢痕

又方

用羊髓骨髓一兩入輕粉一錢研成白膏以篋盒盛之陰瘡上如痘瘡痒甚俱搔成瘡及瘡痂欲落不落用上等白蜜塗之其痂落亦無恙不患癢痕

殺精草散

治熱毒薰於肝膈眼目多生翳障方見前

蒼朮散

治痘瘡入眼

蒼朮 乾葛各一兩 槐花 藜蘆

蛇蛻 防風 枸杞 白茯苓各三錢

黃芩 川芎各半兩 白菊花 木賊

甘草各二兩 蟬蛻四錢 乳香 沒藥各半錢

硬石膏兩半 穀精草三錢

右為末每服二錢白水煎食後服

菊花散 治瘡入眼

白菊花三兩 菘豆殼 蜜蒙花 旋覆花

穀精草 甘草各一兩

右為末每服二錢用乾柿一枚粟米泔一盞煎乾為度

取乾柿食後服之

蟬菊散 豆瘡入目或病後生翳障

蟬蛻淨洗 白菊花各等分

右為末每服二錢水一鍾入蜜少許同煎乳食後溫服

量兒大小加減

葛根麥門冬散 治小兒熱毒斑疹頭痛壯熱心神煩悶

葛根三錢 麥門冬三錢 人參去蘆二錢 石膏半兩

升麻二錢 甘草 茯苓各二錢 赤芍藥一錢

右每服二錢水一盞煎溫服看兒大小加減

生地黃散 治斑駁毒身熱口乾咳嗽心煩

痘疹

法附錄卷之三

三十七

劉思智

生地黃兩

麥門冬去心七錢

杏仁湯泡

款冬花錢

陳皮錢

甘草二錢

右每服三錢水一盞前服量兒大小加減

麥湯散 治水痘

方見前

○廣按瘡疹之源蓋由母妊娠之時飲食煎炒炙煨厚味醇酒兒在腹中浸漬食母血穢蘊而成毒伏於五臟之間及生之後或因外感風寒內傷生冷跌撲驚恐時氣流行觸動鬱火發於肌膚之間心臟之毒為癩肺之毒為疹肝臟之毒為水泡瘡脾臟之毒為膿泡瘡小兒稟厚毒氣血調勻表裏充實則易發易

壓暑或稟弱毒盛表裏虛氣血弱必須醫藥調治庶幾有生前輩明醫錢仲陽氏出究其病源是熱是燥故用辛涼之藥以清熱潤燥及陳文中氏出又見病源之中有寒濕者故用辛溫之劑以溫寒散濕此二先生兩得之後之宗錢氏者惟知辛涼之是務而寒濕者不宜宗陳氏者惟以辛溫之是從而熱燥者不可小兒罹此禍患可勝計哉苟能用二子之長而無二家之弊斯可也故丹溪朱先生曰痘瘡看氣血虛表裏虛用補又曰瘡乾者是火宜退火瘡濕者是濕宜瀉濕又曰爐灰白色靜者怯者作寒看勇者燥者

歟發者作熱看先生之言可謂活潑潑地矣以此觀之小兒痘瘡表裏充實者固不必於藥而虛中有寒濕者與夫虛中有熱燥者必須於藥也今將附方瀉虛及痘瘡治例具之於前使小兒痘瘡屬熱燥者宗之又以陳氏痘疹證治附之於後使小兒痘瘡屬寒濕者宗之後之業是科者必以補虛為主視其形色脉證寒濕熱燥及天時寒暄而分治之嬰孩之幸也又按王節齋論曰丹溪痘瘡治法最為明備近世通用陳文中木香異攻等方乃一偏之術若痘瘡陷伏淡白色及內瀉渴腹脹者此屬虛寒宜用陳文中方

若勇盛稠密紅紫色及大便燥結者此屬熱毒急宜涼血解毒自陳文中方盛行後屬虛寒者率得生屬熱毒者悉不救痘是胎毒古人治法只解毒然吐瀉裏虛則使毒氣不出及不能成就故陳文中之法亦千載妙訣補前人之未備者但溫補之法既行而解毒之旨遂隱故救得一邊又害了一邊必須詳究丹溪陳文中二法通用斯無弊也○痘瘡屬虛寒者直可延至十數日後方死屬毒盛轉紫色者不過七八日蓋痘是胎毒自內出外一二三日方出齊毒氣尚在內出至六日則當盡發於表七八九日成膿而結

痂矣若毒氣盛不能盡出過六日毒反內入臟腑故
須於六日以前毒氣該出之時急服涼血解毒之藥
以驅出之六日以後醫無及矣故其死最急若虛弱
毒氣少者只是氣血不足不能貫膿成就故綿延日
久而後死此虛實輕重之分也○痘瘡多者是毒氣
多便先宜解毒然多則恐氣血周貫不足故隨後亦
宜兼補藥以助成膿血

丹溪心法附餘卷之二十三終

丹溪心法附錄卷之十四

雜治門

論倒倉

百有

丹溪心法

○倒倉法治癱勞蠱癩等證推陳致新扶虛補損可吐可下用黃色肥牯牛腿精肉二十斤或十五斤順取長流急水於大鍋內煮候水耗少再添湯不可用冷水以肉

休寧東山古庵方廣



爛成根為度瀝去粗用肉湯再熬如琥珀色隔宿不食
晚飯大便秘者隔宿進神芩丸不秘者不用五更於密
室不通風處溫服一鍾伺臍間藥行又續續服至七八
鍾病人不欲服強再與之必身體皮毛皆痛方見吐下
寒月則重湯溫之病在上欲吐多者須緊服又不可太
緊恐其不納病在下欲利多者須踈服又不可太踈恐
其不達臨時消者忌太抵先見下方可使吐須極吐下伺
其上下積俱出畢血在大便中見如胡桃肉狀無臭氣則
止吐利後或渴不得與湯其小便必長取以飲病者名
曰輪迴酒與一二椀非惟可以止渴抑者可以滌滌餘

垢睡一二日覺饑甚乃與粥淡食之待三日後始與少
菜羹自養半月覺精神煥發形體輕健沉痾悉安矣
大槩中間飲至七八鍾時藥力經涉經絡骨節搜逐宿
垢正邪寧不抵牾素有急悶似痛非痛自有惡况此皆
好消息邪不勝正將就擒耳尤須寧耐忍受又於欲吐
未吐欲泄未泄交作皆有惱括意思皆須歡喜樂受一
以靜處之此等有六半日景象不先說知使方寸瞭然
鮮有不張皇者矣 未行此法前一月不可近婦人已
行此法半年不可近婦人五年不可喫牛肉性急好滯
不守禁忌者皆不可行此法倒倉全在初起三鍾慢飲

在命... 能行經隧中去

法曰腸胃為市以其無物不有而穀為最多故曰倉倉積穀之室也倒者傾去積糞而滌滯使之潔淨也然胃為受盛之官故五味入口即入於胃留毒不散積聚既久致傷沖和諸病生焉今用黃牯牛肉其性溫矣夫牛坤土也黃土之色也以順為德而效法乎健以為功者牡之用也肉者胃之樂也熟而為液無形之物也橫散入肉絡由腸胃而滲透肌膚毛竅爪甲無不入也積聚久則形質成依附腸胃回薄曲折處以為糟粕之窠白阻礙津液氣血熏蒸燔灼成病自非剖腸刮骨之神

妙孰能去之又豈合勺銖兩之在散所能窺犯其藩墻戶牖乎夫牛肉全重厚和順之性潤枯澤槁豈有損也其方出於西域之異人人於中年後行一二次亦却疾養壽之一助也

附諸方

饅頭膏韓飛霞方此方即倒倉古法傳自西域有人指予

投煎劑治痰而遂推廣之

黃牯牛一具黃純黃肥澤無病才一二歲者

右洗淨取四腿項脊去筋膜將精肉切成塊子大栗大秤三十斤或四五十斤於靜室以大銅鍋無則用新鐵

鍋加長流水煮之不時攪動另以一新鍋煮沸湯旋加常使水在內五六寸掠去浮沫直煮至肉爛如泥盡去渣却將肉汁以細布濾入小銅鍋用一色桑柴文武火候不住手攪不加熱水只以汁漸加如稀飴滴水不散色如琥珀其膏成矣此節火候最要用心否則壞矣大段每肉十一斤可煉膏一斤為度磁器盛之是名霞天膏也 用調前劑少斬多沸熱自然溶化 用和丸劑則每三分攪白麵一分同煮成糊或用煉蜜寒天久收若生蠟用重湯煮過熟天冷水窰之可留三日

○廣按治痰之藥用南星半夏者所以燥之也用橘紅

枳殼者所以散之也用茯苓猪苓者所以滲之也用黃芩黃連者所以降之也用巴豆附子者流通之義也用竹瀝瓜蒌者潤下之義也雖然實痰新痰之為病宜此而虛痰老痰之為病所不宜也夫老痰稠粘膠固於膏臆之間依附盤薄於腸胃之處苟非霞天膏之浸潤流動而能從上從下以出之乎夫用霞天膏以治痰積則不致虛損元氣所以為美也前條云倒倉法能治癰癆鼓噎夫癰癆鼓噎之症乃虛中有痰積也愚意治此四證於補虛藥中加霞天膏以去痰積必然安愈無入知此之妙訣也

論吐法

一百有三

丹溪心法

○凡藥能升動其氣者皆能吐。如防風山梔川芎桔梗
茅茶以生姜汁少許醋少許入壺汁搗服以鷲翎勾引
之。附子尖桔梗蘆人參蘆瓜蒂藜蘆砒不甚用艾葉
末茶此皆自吐之法不用手探但湯皆可吐吐時
先以布搭膊勒腰腹於不通風處行此法。一法用蘿
蔔子五合搗入漿水瀝過入清油白蜜少許旋半溫用
帛緊束肚皮然後服以鷲翎探吐其鷲翎平時用桐油

浸阜角水洗晒乾待用。又法用鰕帶殼半斤入薑蔥
姜等料物煮汁先喫鰕後飲汁以鷲翎勾引即吐必須
緊勒肚腹。又法苦參末赤小豆末各一錢壺汁調重
則宜用三錢吐法取逆流水。益元散吐濕痰。白湯
入鹽方可吐。人參蘆煎湯吐虛病凡吐先飲二椀隔
宿桔梗半兩陳皮二錢甘草二錢煎湯凡吐不止麝香
解藜蘆瓜蒂。葱白湯亦解瓜蒂。甘草總解諸藥白
水總解。

充按三法中惟湧刺為難用有輕重卷舒之機汗下則
一定法也故先生特註吐為詳者恐人不深造其理徒

倉皇顛倒反有害於病耳今總列諸法于此使臨病隨
機應變披卷瞭然不必搜檢而便於施治也

附諸方

獨聖散 治中風痰迷心竅顛狂煩亂人事昏沉痰涎壅

盛及治五癇心風等證

瓜蒂 不拘多少

右為細末每服一錢以蘆汁調下

二神散 治證同前

常山兩 葱管藜蘆兩

右為粗末每服二錢水一鍾煎七分食後溫服

三仙散 治證同前

防風去蘆 瓜蒂微火烘細切

葱管藜蘆兩

右為粗末每服三五錢以蘆水二鍾煎七八沸去粗將
粗又用蘆水一鍾煎至半鍾却將先二鍾藥汁合作一
處再熬五七沸去粗澄清放溫徐徐服之不必盡劑以

吐為度

四靈散 治證同前

瓜蒂錢一 人參蘆錢二 赤小豆 甘草各錢半

右為細末每服一二錢或半錢量情與之食後蘆

汁調下

五玄散 治證同前

豬牙卓角 不蛀者去 皮弦炙 綠礬 各一 明礬 二錢

赤小豆 一錢 葱管 藜蘆 各五錢

右為細末每服半錢或一二錢漿水調下如牙關緊閉

幹開灌之

六應散 治證同前

欒金 滑石 川芎 各等分

右為細末每服一二錢量虛實加減以薑汁調空心服

○凡服吐藥不消盡劑服藥後約人行十里未吐以溫

茶一鍾入香油數點投之良久以鷲翎喉內徐徐牽引

得吐即止未吐再投吐藥如服吐藥嘔吐不止者以麝香少許研水飲之即解

救急諸方 一百有三

丹溪心法

魚骨鯁用砂糖白炭皮末紫蘇葉滑石末和丸含口中津

液嚥下骨自隨下

葷毒用木香青皮等分作湯飲之

殺藥毒用五倍子二兩重研細用無灰酒調服毒在上即

吐在下即瀉解一切毒

用粉草五兩重細切微炒搗細量病人喫得多少酒取
無灰酒一處研去粗溫服須臾大吐瀉毒亦隨去雖十
分渴不可飲水飲水難救

解九里蜂用阜角鑽孔貼在蜂叮處就阜焚孔上用艾炙
三五壯即安

天蛇頭用落蘇即金絲草金銀花藤五葉紫萸天蒼麥
切碎用十分好醋濃煎先熏後洗

又方用人糞雄黃泥搗之置在患處即安

又方用撲蛇燒為灰存性地上出火毒研為細末用香
油調傅如洗只用井花水

天火帶用白鱗泥炒研細香油傅之

又方雉雞毛及鷲毛燒灰傅之

治蜈蚣全蝎傷方同九里蜂灸法

治一切蛇咬用金線重摟水磨必許傅咬處又為細末

酒調飲

又方柏樹葉魚腥草皺面草草決明一處研細傅咬處
佳

中牛馬肉毒方同解一切毒法

狗咬以紫蘇口嚼碎塗之

風狗咬取小兒胎髮炒新香附野菊花研細酒調服盡

醉

附諸方

救自縊法三因方

凡自縊高懸者徐徐抱住解繩不得截斷上下安被卧之以一人用脚踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使緩縱一人以手按據腦上數摩動之一人摩捋臂脛屈伸之若已強直但漸屈之并按其腹如此一時頃雖得氣從口出呼吸眼開仍引按不住須更以少桂湯及粥清灌令喉潤漸漸能嚥乃止更令兩人以管吹其兩耳此法最好無不活者自旦至暮雖冷亦可救自暮至旦陰

氣盛為難救爾

又法以一人兩手掩其口勿令透氣一人用手摩其頸痕兩時氣急則活

半夏散

三因方治屬寐卒死諸暴絕證

用半夏不拘多少湯洗七次為末每用少許吹入鼻中心頭溫者可治倉卒無藥急於人中穴及兩腳大拇指內離甲一瑾葉各灸三五壯即活

救凍死法

經驗方

四肢直口噤只有微氣者

用大釜炒灰煖以囊盛熨心上冷即換之日開氣出然後以粥清稍稍進之若不先溫其心便將火灸則冷氣

與火爭必死

孫真人救落水法醫方大成

急解死人衣帶灸臍中即活

救溺水法經驗方

凡人溺水者救上岸即將牛一頭却將溺水之人將肚橫覆在牛背上兩邊用人扶策徐徐牽牛而行以出腹中之水如醒以蘇合香丸之類或者薑擦牙若無牛以活人於長板凳上仰臥即令溺水人如前法將肚相抵活人身上水出即活蘇合香丸中風

治絞腸痧証 手足厥冷腹痛不可忍者醫方大成

以手旋溫水於病者膝灣內拍打有紫黑點處以針刺去惡黑紫血即愈

治骨鯁醫方大成

以野苧根洗淨搗爛如泥每用龍眼大如被雞骨所傷以雞羹化下如被魚骨所傷以魚汁湯化下

治一切骨鯁醫方大成

用金風花子嚼爛塗下無子用根亦可

治魚骨入喉百一選方

縮砂

甘草各等分

右為末以綿裹少許含之旋旋嚥津久之隨痰吐出

文

卷之三

一

三

金鈎釣食丸 治諸癩

用葦靈仙根不拘多少以好米醋浸一二日晒乾為末醋糊為丸如梧桐子大每服一九或二九茶半湯下如要吐轉用沙糖銅青為末半匙滴油一二點同茶湯調服即吐出原物如藥性未達令患人兩手伏地用清水一盆以鷲翎口中攪探即吐出於盆內

又方 治魚刺并骨鯁在喉內

用山查樹獨根向下者與玉簪花根同搗取自然汁用匙或竹筒盛汁送入口內不可著牙着牙皆化

太乙神丹 一名追毒丹 又名紫金丹

雄黃兩

文蛤一名五倍子兩

射香錢

紅芽大戟去皮洗淨焙乾一兩半

硃砂錢

山炭去皮洗淨焙二兩

千金子

一名續隨子去殼研去油取霜一兩

右除雄黃硃砂千金子射香另研外其餘三味為細末却入前四味再研勻以糯米糊和劑杵千餘下作餅子四十箇如錢大陰乾治一切醫所不療之疾毒藥毒瘡瘴氣狐狸鼠菴惡菌河鮪等毒咬死牛馬肉毒蛇大惡虫所傷中惡瘟疫傷寒結腦發狂纏喉諸風癰癭亦腫丹瘤生毒瘡薄荷汁入井花水磨服 大人中風諸瘤用

河磨服 小兒急慢驚風五疳八痢一餅作五服入薄
荷一葉開并花水磨服牙關緊者茶去即開 癰疽發
背疔腫一切無名瘡用并花水磨服及塗毒瘡未清者乾
痒立消 頭疼用酒入薄荷同研爛以紙花貼太陽穴
上立効 體實者一餅作一服體虛者一餅作三服凡
服此餅但得吐水一服其効尤速如不要行以米粥
補之 若用雄黃清毒孕婦不可服

解毒丹 三四方 治誤食諸毒草并百物毒投人於必死

板藍根 乾者具衆一兩 青黛 研 生甘草 各二

右為末蜜丸如梧桐子以青黛別為衣如稍覺精神恍

惚惡心即是誤中諸毒急取藥十五丸爛嚼新汲水下

青黛雄黃散 三因方 凡中毒及蛇虫咬傷即服此藥乃令

毒氣不得聚

上好青黛 雄黃 各等分

右為末新汲水調服二錢

礬茶散 濟生方 治中諸物毒

晉礬 建茶 各等分

右為末每服二錢新汲水調下得吐即効未吐再服

丹砂丸 濟生方 治蠱毒

雄黃 研 硃砂 研 各 藜蘆 研 麩白

巴豆去殼心膜油
各一錢半

右為末蜜丸如大豆每服三丸空心乾姜湯下當轉下惡物并蟲等如煩悶後以鴨為羹食之

雄麝散濟生方治五種蠱毒

雄黃末 麝香末各等分

右取生羊肺如指大以刀開內裹藥吞之

又方 治蠱毒

用升麻末三錢滾水調服

又方 治中毒下血者

用蝟皮燒為灰細研以水調下二錢日進三服立愈

又方 治五種蠱毒

以馬兜鈴根三兩搗碎分為三貼用一貼以水一大盞煎至五分去滓空心頓服當時吐蠱出未快再服之以快為度

○袖珍方云蠱之為毒醫書所載雖有數種而中土少見之今古相傳多是閩廣深山之人於端午日以蛇虺蜈蚣蟻蟻三物同器貯之聽其自相食啖俟一物獨存者則謂之毒欲害其人密斂其毒於酒食中啖之若中其毒者令人心腹絞痛如有虫咬吐下血皆如爛肉若不急治食入五臟即死然此毒中人有緩有急急者十

後日便死緩者待以歲月氣力羸敗食盡五臟而後死
 死則其毒流注於傍人亦成蠱注大抵驗試蠱毒之法
 令病人咳唾水中沉者是毒浮者非也或含一大豆其
 豆脹皮脫者蠱也豆不脹皮不脫又非也又以鵝皮至
 病人卧下勿令知覺病甚者是否則非也治療之法必
 須審而後行試而後可今人凡有積聚脹滿之病類乎
 蠱者便以為蠱尤為非也世說閩廣深山之人專有以
 蠱行毒於人者若欲知其姓名呼喚將云其病自愈又
 一說病者善能知原中毒是何物終身不服此物其毒
 亦不復作雖相傳如此俱未之見謹用載之以備搜覽

解砒毒 百一選方

漢椒九粒 黑豆樹四 烏梅二箇 甘草節二寸

右吹咀用水一碗煎至七分溫服

又方 百一選方 解砒毒

白扁豆 青黛 甘草各等 巴豆一錢去殼

右為極細末以沙糖一大塊水化開調一大盞飲之毒

隨利去却服五苓散之類五苓散見中暑類

中砒毒 醫方大成

以地漿調鉛粉服之立解豉汁又佳

解砒毒 經驗方

用早禾掉燒灰新汲水淋汁絹帛濾過分服一椀毒從利下即安

又方用芫水周豆粉吞之或草豆據水服皆可

解砒毒鼠莽毒醫方大成

用旋刺下羊血或雞鴨血熟服効 又有用烏柏根搗水亦好

解鼠莽草毒

用大黑江豆煮汁服之如欲試其驗先用鼠莽草葉以豆汁洗其根從此敗爛不復生矣

又方 解鼠莽毒

用枯過明礬同搗等好茶末少許新汲冷水調服人用之累効

解諸毒

用玉簪花根搗水服

又方 解諸毒醫方大成

用黃連甘草節水一椀煎服

治食河魷魚中毒醫方大成

一時用治倉卒無藥急以清油多灌之使毒物吐出為愈

中烏頭天雄附子毒醫方大成

用大豆汁解 遠志防風水肉倍糖能解

中巴豆毒 醫方大成

以黃連大豆豈蒲汁並解之

解砒毒及巴豆毒 經方

用藍根沙糖二味相和搗水服之或更入薄荷汁尤妙

治中諸藥毒百一選方

生甘草 黑豆 淡竹葉各等分

右吹吐用水一椀濃煎連服

解一切菌毒百一選方

掘新地窰以冷水於內攪之令澄清取飲之即解謂之

地漿

又方 解食野菌中毒

用甘草不拘多少以麻油一盞煎數沸冷服其毒即解

治毒蛇惡犬蜈蚣蝎螫咬傷

細辛 白芷各二錢 雄黃一錢 射香許少

右為細末以好酒調服一錢

治一切蛇虫作傷百一選方

用具母為末酒調令病者盡量飲之少頃酒自傷處為

水流出候水盡却以藥滓傅瘡上即愈

治蛇虺蜈蚣交傷百一選方

用艾於傷處灸三五壯拔去毒即愈

治蜈蚣諸毒虫所傷經驗方

用清油燈心點燈以傷處於煙上熏之其痛即愈

又方用雞糞塗之亦可

一方 治蛇傷

雄黃

五靈脂

貝母

香白芷

各等分

右為末每服二錢熱酒調服

又方用白礬以滾水泡洗其傷處

治惡蛇所傷秘方

用青木香不拘多少煎服其痛即止

治蜈蚣咬秘方

用香附子嚼搽患處立効

一方 治蜈蚣馬蝗腹痛即水蛭

用田中泥為丸水吞下其虫必隨吐瀉出

治狗咬百一選方

用杏仁去皮尖同馬蘭根研細先以葱湯洗然後以此塗傷處

治犬咬傷經驗方

用草麻子五十粒去殼以井花水研成膏先以鹽湯洗傷處後以此膏敷貼

一方用虎骨者傳之

一方治頭犬咬傷及經久復發者

雄黃黃明者五錢 射香五分

右研勻以酒調服二錢服後得睡為佳俟其自醒利下惡物再進一服即見効

定風散 治風狗咬傷

南星生 防風各等分

右為末先以口噙漿水洗淨傷處用綿拭乾以藥糝上更不發無膿易瘥

又方 治風狗咬傷 經驗方

此病雖為小可乃九死一生之病可急用斑貓七箇去翅足為末酒調服於小便盆內見衣沫似狗形者為効如無再服七次無狗形亦不再發也此方累試經驗

又方 治風狗咬傷 秘方

用斑貓七箇去翅以糯米一撮炒黃去米不用將斑貓研為細末麵糊丸如棗子大每服七丸溫酒下

又方 治頭犬所傷 醫方大成

用斑貓大者二十一隻去頭翅足用糯米一勺先將斑貓七隻入米內於微火上炒不令米赤去此斑貓別以七隻再於前米內炒令斑貓色變復去之又別用七隻

如前法炒以米出青烟為度去班貓不用以米研為粉
用冷水入清油少許空心調服須臾又再進一服以小
便利下惡毒為度如不利再進一服利後肚腹疼痛急
用冷水調青靛服之以解其毒否則有傷或
亦可不宜便食熱物

又方 治風犬傷經驗方

隨用蝦蟆後兩腿搗爛酒調服或醋亦可先於頭頂上
搽血髮三二根小便內見衣沫

又方 治風狗咬傷秘方

用葱白心四十九根搗爛如膏用生蜜一同調和用竹

筒兒盛放用紙封一七日如有人被傷用此膏貼傷處
瘡口上七日又用葱白皮封着如瘡口大再搽膏子貼
共二七日切忌諸般葷腥一百日外用消風散一錢用
熟健猪肉七片葱白七莖蜜一小匙和撲再入原煮猪
肉汁泡使葱白熟方可患人熟食小兒用肉七小片消
風散一錢蜜半匙煮服消風散方見頭風類

十危病方

一百有四 新增

附諸方

華陀十件危病方 經驗方

兩剉碎水四椀煎一椀灌服 又無升麻用皂角三錠
槌碎接水一盞灌服或吐或不吐即安
三吐血下血

其証皆因內損或因酒色勞損或心肺脉破血氣妄行
血如湧泉口鼻俱出須臾不救

側柏葉蒸乾

人參焙乾各

右二味為末每服二錢入飛羅麵二錢新水調和如稀
糊服 如無前藥用荆芥一握燒過蓋地上要出火毒
碾如粉陳米飲調下三錢不過二服 如無荆芥用釜
底墨研如粉服三錢米飲下連進三服

四中砒霜毒

其証煩躁如狂心腹攪痛頭旋欲吐不吐面口青黑四
肢逆冷命在須臾

用黑鉛四兩磨水一椀灌之 如無前藥青藍兩搥
研井水調一椀灌之 如無藍用清油二升許灌服
其毒即解 又無油掘地用水作漿濃吃一二椀土
用黃色者佳

五尸厥

其証奄然死去四肢逆冷不省人事腹中氣出如雷鳴

煇硝石

硫黃

煇硝石

硫黃

三十一

尺

三百五十四

右研如粉作三服每服用好陳酒一大盞煎覺瘧起
傾於盞內蓋着服如人行五里又一服不過三服即醒
煎灸百會穴四十九壯臍下氣海丹田三百壯身溫止
女無育藥用附子七錢重炮熟去皮酥為末分作二
服用酒三盞煎一盞服 又無附子用生姜自然汁半
盞酒一盞同煎令百沸併灌二服仍照前法

六中忤中惡鬼氣

其証暮夜或登廁或出郊野或遊冷屋或行人所不至
之地忽然眼見鬼物鼻口及着惡鬼氣驀然倒地四肢
逆冷兩手握拳鼻口出清血性命遂絕須臾不救此証

與尸厥同但腹不鳴心腹俱煖凡中惡驀然倒地切勿
移動其屍即令親戚衆人圍繞打鼓燒火或燒麝香安
息香蘇合香樟木之類直候醒記人事方可移歸

犀角錢五

麝香

硃砂各半

右為末每服二錢井水調下 如無前藥用雄黃末服

錢煎桃枝葉湯調灌 又無雄黃用故汗衣或觸衣

汗衣者着在身上多時又遭汗者佳觸衣者父着內衣
襯衣也婦用男衣男用婦衣燒存性服二錢百沸湯調
下

七脫陽

其証多因大吐大瀉之後四肢逆冷元氣不接不省人事或傷寒新瘧誤與婦人交其証小腹緊痛外腎搐縮面黑氣喘冷汗自出亦是陽証瀉更不救先以葱白數莖炒令熱熨臍下次用

附子一枚重一兩

白朮

乾姜各半兩

木香二錢半

右四味各研末用水二椀煎八分椀放冷灌服瀉更又進一服合滓併服如無前藥用桂皮二兩好酒二升煎一升分作二服灌之又無桂皮用葱白連鬚三七根剉沙盆內研細用酒五升煮至二升分作二服

灌之陽氣即回先用炒薑熨臍下氣海方令氣冷又無葱白用生姜二七片亦好依前法服

八鬼魘鬼打

其証初到客舍錯驛及久無人居冷房壁中覺鬼物魘打但其人喉嚨作聲便令人叫喚如不醒此乃鬼魘也
不收即死

半黃錢

雄黃錢

硃砂半錢

右研為末和勻每挑一錢床下燒次挑一錢酒調灌之如無前藥用桃柳枝東邊者各折七寸煎湯灌下又無桃柳枝用竈心土槌碎末服二錢并水調灌更挑

半指甲許吹入鼻中更用艾灸人中次并灸兩腳大拇
指內離甲一莖葉各灸七壯

九孕婦運生

其証孕婦欲產時遇腹痛不肯舒伸行動多曲腰眠臥
忍痛其兒在腹中不得轉動故腳先出謂之逆生須臾
不救子母俱亡

烏蛇退條 蟬退十四 血餘 胎髮

已上各燒灰服二錢酒調下併進二服仰臥霎時兒即
順生 如無前藥用槐子二七粒并并花水吞下 又
無槐子用小絹針於兒腳心刺三五針急用鹽少許塗

腳心刺處即時順生子母俱活

十胎衣不下惡血湊心

其証心頭迷悶胎衣上逆衝心須臾不治其母即亡

乾漆 五錢 大附子 一皮臍為末

已上用大黃末五錢酒醋熬乾即入前二味為丸梧桐
子大每服三十九淡醋湯吞下須臾又進二服胎衣立
下此藥可預先合下妙 如無前藥用赤小豆一升炒
過用水三升煮二升去豆取汁溫服其胎衣立下 又
無豆用婦人自己手足指甲燒灰酒調須臾又進一服
更令有力婦人抱起將竹筒於心上趕下妙

備用要方

一百有五 新增
出明醫雜著

附諸方

夏月傷暑發熱汗大泄無氣力脉厘細而遲此暑傷元氣也服後方

人參一錢

黃耆一錢

麥門冬一錢

黃連五分

黃柏三分

白朮一錢

白芍藥一錢

甘草五分

陳皮一錢

白茯苓一錢

香薷分

知母分

右用水一鍾半生姜三片煎七分食前溫服

夏秋暑熱因熱過飲食冷物茶水傷其內又過取涼風傷

其外以致惡寒發熱嘔膈飽悶飲食不進或兼嘔吐泄

瀉此內外俱傷寒冷也

人參一錢

白朮一錢

乾姜一錢

甘草五分

厚朴一錢

陳皮一錢

羌活一錢

枳實一錢

白茯苓一錢

右用水二盞生姜三片煎至八分食前溫服

夏暑若在途中常服以壯元氣清熱驅暑服之免中暑癘

亂泄瀉痢疾等證

人參一錢

麥門冬一錢

五味子十粒

白朮半錢

白芍藥一錢

甘草五分

知母一分

白茯苓一錢

白芍藥一錢

甘草五分

知母一分

白茯苓一錢

夏月傷暑發熱汗大泄無氣力脉厘細而遲此暑傷元氣也服後方

黃芩二分

陳皮七分

香薷七分

右用水一盞半生薑三片煎至七分食前溫服

人遇勞倦辛苦用力過多即服後方二三服免生內傷發

熱之病此方主於補氣

黃耆一錢半

人參一錢

甘草五分

麥門冬一錢

陳皮錢

白朮錢

五味子二十粒

勞倦甚加熟附子四五分煎法同上

人遇勞心思慮損傷精神頭目眩昏心虛氣短驚悸煩熱

即服後方補血為主

人參一錢

五味子十五粒

當歸酒浸一錢

麥門冬去心一錢

白芍藥一錢

山梔子五分

茯神去心一錢

酸棗仁一錢

生地黄酒洗五分

甘草五分

陳皮五分

川芎五分

右用水一盞半生薑三片煎至七分食前溫服

一百有六

新增

體氣

丹溪心法

○狐臭用明砂蜜陀僧明礬銅青白附子辰砂為末先以

皂角水洗二三次後傳上不過三次全好又方加黃

丹水銀用白梅肉為丸擦之又方飛黃丹蜜陀僧

礬以蒸餅蘸藥擦之

附諸方

田螺散 治體氣

用大田螺一枚水中養之俟靨開以巴豆一粒去殼將針挑巴豆放在內取去拭乾仰頓盞內夏月一宿冬月五七宿自然成水取搽腋下絕根 一方先用臘脂搽腋下其出狐臭之處黃色就將前說巴豆田螺去靨搽於狐臭之上絹帛勒緊其狐臭從大便出則絕根矣 一方用熟蒸餅一箇擘開作兩邊搽蜜陀僧細末一錢急夾在腋下畧睡少時候以冷棄之除根

汗癥

一百有七 新增

附諸方

一方 治汗癥紫白色者

右用白附子硫黃各等分為細末以茄蒂蘸醋粘末擦之

又方

用夏枯草濃煎水日洗數次

肥阜丸方 去白癥黑點白癬諸般瘡痕令人面色好

白芷 白附子 白殭蚕 白芨

白蒺藜 白斂 草烏 三柰

甘松 白丁香 杏仁 豆粉

猪牙皂角用醋一 肥皂去裏外皮筋并子

輕粉 蜜陀僧各半 孩兒茶三錢 樟腦兩

右先將淨肥皂肉搗爛用雞子清和晒去氣息將各藥

為末同肥皂雞清和為丸

一方 點疔塗瘤去痣

人言錢 雄黃錢 巴豆一箇 蟾酥二分

右為細末將瘡口用針撥開以藥點上如貼癩瘡去

蟾酥用輕粉

烏髭髮

一百有八 新增

附諸方

犀皮膏御藥院方 治髭髮乾燥能令潤澤

小麥麩斤 半夏湯洗 沉香兩 生姜一兩和皮

右用水一盞生姜一兩和皮細切同煎去滓取清汁入

腦射少許攪勻洗髭髮自然潤澤

洗髮菊花散

甘菊花 蔓荊子 乾栢葉 川芎

白芷 細辛苗 桑白皮去黃根

旱蓮 根莖花葉各一兩

右艾咀每用藥二兩漿水三椀煎至二椀去滓洗髮

三聖膏御藥院方治髮墮脫落能令再生

黑附子 蔓荊子 柏子仁 各半兩

右為末烏雞脂和搗研乾置瓦合內封固百日取出塗

在髮髮脫處三五日即生自然少壯不脫

烏雲散御藥院方治髮墮黃白不黑

膽礬 五倍子 百藥煎 青胡桃皮

酸石榴皮 訶子皮 木瓜皮 猪牙皂角

何首烏 細辛各等

右為末煉蜜丸如錢大常於木炭內培養勿得離灰如

要烏髭髮時用熱酒化開塗髭髮上好執酒亦可

方

生姜 半斤 生地黄 半斤各洗淨研

右用不蛀皂角十莖去黑皮并筋將煎藥汁蘸皂角慢

火炙黃用藥汁盡為度煎藥滓同入罐內用火煨存性

為末用鐵器盛藥末三錢湯調停一日臨睡將藥蘸汁

髭髮即黑

烏髮方

針以一分紫淨者用好醋浸過一七撈起晒乾
針石用好醋少許慢火炒砂三二遍起紫色為度

針石用好醋少許慢火炒砂三二遍起紫色為度

訶子皮

百藥煎

白皮

各五分

皂礬

三分

右各搗為末用好醋調勻如爛泥為度至晚調塗髮上
勻濟却用青菜葉預先用火烘軟包髮上再加油紙
包却用手帕或用絹包裹令緊勿令透風延過一夜至
清晨解脫用肥皂角洗去即黑極妙用核桃肉油潤之
如連肌肉黑了用無漿粉白布一擦即去
黑髮散延生至寶

官粉

真蛤粉

黃丹

蜜陀僧

各三分

石灰二錢

右為細末水調搽上如乾水洗去藥核桃油潤之

華山處士摘髮髮白日 每日辰時向東摘

正月

初四

十七

二月

初八

二十

三月

初八

初十

十二

四月初三

十六

十八

十九

五月

十一

十六

六月

初四

十四

十七

七月

初三

初四

十八

八月

十五

十九

二十

九月

初二

初四

十五

十月 初七 十二 二十二

十一月 十五 十七 二十

十二月 初七 十六 三十

旱蓮花 沒石子 荷葉

各等分先將猪鬃鐵銚內炒次將餘藥並炒令焦黑存性為末以柳枝自然汁調少許按白即蘸入藥以柳枝蘸藥妙不可言

烏鬚髮方

用大水蛭一箇放磁碗中餓一七將水蛭洗淨用白烏骨雄雞血以好清煙京墨磨濃傾尿胞內任水

飽將針刺破流出血汁搽鬚髮留根二分其汁浸漬入肉鬚髮一年茂黑不退且柔軟不損極妙

一方

五倍子炒黑色青綿布包裹 白礬枯三錢

銅末銀銅內粉成六分 訶子皮三分 石砂三分

細辛三分

右各為細末對和一處次用石榴皮一箇烏梅三箇細茶一撮水二盞煎至七分去渣用磁茶盞盛將前末藥汁納放鍋內重湯煮藥至皺面取起至晚間用抵子蘸藥刷上次早溫水洗臉鬚髮如漆

又方

五倍子

用粗揀在板上新砂得為菘豆大小塊吹去
稟用度用青布一塊水濕了包倍子稀粥提
時用細眼路良久冷定取出成餅子
純黑錢二分為極細米五倍子餅旋取為末
用三錢二分為極細米五倍子餅旋取為末
如都亦未放二

三日亦未放二

銅末五分

六分用打銅器淨上起薄被研為細末用水研
淨如畫匠淘顏色

白礬五分

硃砂四分

沒石子半

共為極細末用煮烏梅水調和如稠糊搽時臨晚先將
鬚髮用菘豆粉和水洗再用減水洗如無減水用淋灰
水洗只要洗去油膩仍將白鬚用礬水洗過然後搽前

藥勻遍方纔上色

○已上諸方外傳之劑

駐顏小丹煉方 韓飛霞方 此有古方主烏鬚不驗方外
衲報一煉法

茯神

四兩

赤石脂

紅閨五色者炒

辰砂

去木 牆壁鏡面精神

滴乳香

二兩 草研燈

川椒

二兩 淨先以炭燒黃土地通紅掃淨
置椒于上以瓦釜蓋之令為汗

右五味為細末以人乳和稀劑入鵝鴨彈殼內糊紙封
固加以絳袋令體緊婦人帶于腦乳之間四十九日
夕不離取出乾透則成否則壞再研用棗肉和丸如菘

方

卷之三

三

四百

豆大每日空心人乳送下或人參麥門冬湯代之卧時酒下亦可 凡心血不足怔忡健忘等疾皆宜

一方 前藥五味各一兩用雞彈二箇去清黃芩將辰砂乳香各裝一彈內用紙糊七層以青絹袋盛之令精壯婦人懷於肚上辰砂懷三十五日乳香懷四十九日取出各為細末棗肉為丸用庚申甲子之夜幽靜處脩合忌婦人雞犬見之每日清晨空心好酒服三十九至一月外加至四十九服至十次鬚髮自然發黑百日通

相發黑

日遐齡萬壽丹服食魂魄安養藥雞抱卵日期要週

全脩合宜深室一切人勿觀甲子庚申夜為尤不見天一返增六十二返百廿年服藥非凡骨壽同天地間秘之深秘之玄之又更玄

一秤金

熟地黄二兩 甘州枸杞 蓮蕊

槐角子去黑皮俱用酒浸晒乾各三兩 薄荷藥三兩一半入衣

沒石子兩 人參 木香各五錢

右為細末煉蜜為餅蟹棋子大每日空心嚼化一餅日進三餅久之鬚髮皆黑凡酒浸者春秋二日夏一日冬六日

七仙丹 此藥補心腎注容顏黑髮之聖藥

何首烏 甜瓜 補者丸 蒸九 人參 去蘆 二兩 生地黃 酒洗 二兩

熟地黃 酒洗 二兩 麥門冬 去心 二兩 天門冬 去皮 二兩

小茴香 色 二兩 秋冬用 白茯苓 去皮 二兩 春夏用

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九嚼爛好黃酒

送下鹽湯亦可或丸如梧子大每服五十九空心酒送

下亦可忌三白房事合時勿犯鐵器有奇効三白者葱

蒜與蘿蔔也

古菴心腎丸 補心腎烏髮 方見補損

○已上諸方內服之劑

駐容顏

一百有九 新增

附諸方

煮香湯 百一選方

木香 丁香 檀香 沉香

人參 甘草 各一 檳榔 錢 白茯苓 去皮 一兩

右為末每用二錢滾水服 此藥香能散氣不可久服

橙子湯 百一選方

橙子 兩 乾山藥 兩 鹽 炒 四兩 甘草 兩

鹽白梅 仁 四兩 打碎 去核

右先用五味一處爛研作餅子焙乾再碾為末百沸湯

調服

橄欖湯百一選方

百藥煎三兩甘草錢二檀香

白芷各五錢

右為細末沸湯點服

桂香湯百一選方

桂花磁罐成覆罐只畧蒸細研

乾姜錢二

甘草錢三

右為末同桂花拌勻入炒鹽少許磁器盛貯沸湯點服

洞庭湯百一選方

用薄皮黃柑子二斤於盆內薄去核留汁生姜去皮半斤甘草四兩益三兩炒神曲麥芽各四兩拌和罨一宿以橘汁盡為度取出焙乾碾為細末沸湯點服

楊梅煎醫方大成

取熟楊梅於瓦器內罨一宿即爛用絹袋搗出汁慢火熬成膏瓦罐貯每用入蜜少許沸湯點服

金櫻煎醫方大成能活血駐顏

霜時取金櫻子先擦去刺洗淨然後去穢搗爛用酒下取汁絹帛濾過慢火熬成膏後入檀香諸香在內瓦罐收貯沸湯點服酒調亦可

木瓜煎 醫方大成

用木瓜去穰子蒸過爛研如泥入鹽少許用瓦罐盛貯
每用入蜜少許沸湯點服

梅花湯 醫方大成

旋摘梅花半開者溶蠟封花口投蜜罐子過時用之以
匙挑花一二朵連蜜一匙沸湯斟服

集香湯 秘方

白豆蔻 剉一兩 縮砂 剉一兩 白檀 見火一兩 人參 一兩

胡椒 半兩 蘼乾 兩 甘草 剉三錢

右六味除檀香人參胡椒泡乾外將白豆蔻甘草白蓋

四兩相合盪一宿次日就慢火上鐵器內炒乾不可火

急恐作火氣與檀香三味共碾細用磁器收湯點服

分氣丸 秘方

糖毬子 御山 甘草 仁 香附 斜 藿藜 葉

甘松 各一兩

右為末炒麵糊丸如梧桐子大每服四五丸嚼茶清下

不拘時服

補真丹

蜜 半斤煉熟以 酥油 牛髓

杏仁 去皮 山藥 核桃仁 去皮

生真 卷之三十四 三十一 卷之三十四

馬方
白茯苓各四兩

先煉蜜酥并髓勻後下諸藥拌勻或丸或散空心湯點服之

白砂丹

茯苓三五斤去黑皮為細末須要堅實者其赤筋最損目亦宜去之

用水淘三五遍去筋膜用白砂蜜對分拌勻固封罈口鍋內懸煮一晝夜土埋三日去火毒白湯調服補虛補心

瓊玉膏

生地黄成煎一百六十斤取汁重羅濾過熟

人參二斤半去頭蘆取淨末二十八兩

白沙蜜十斤重湯煉熟去粗沫濾過入藥

白茯苓四斤去皮蒸爛去水去筋

右四味共入一處攪勻重羅濾過納磁罈內用蜜蠟打

成綿紙固封罈口七八層懸於大鍋內用桑柴火煮三

晝夜如水涸旋添熱水煮畢取出沉於井中水浸一晝

夜出火毒取出又煮一時出水氣如遇夏熱放陰涼所

在或埋地中其製時要靜處不聞雞犬婦人方妙藥成

先用些祭過天地方可自用每日用黃酒納藥一二匙

攪勻飲之不用酒白湯下日進二三服有能服過一料

者活百餘歲白髮變黑老返童顏妙不可言矣

地黃煎

生地黃不拘多少取煎

生麥門冬不拘多少取煎

右二煎入作一處瀝過入砂鍋內同熬一時四分入蜜

一分再熬一時取出納磁罐內收之亦照前服瓊玉膏

法服之

人參膏

治傷寒汗吐下後壞証及行倒倉法吐下後用此補之

韓飛霞曰人參煉膏固元氣於無何有之卿王道也又

肺虛嗽亦宜人參膏補之如肺虛兼有火邪者人參膏

與天門冬膏對服之妙

人參去蘆剉細如煎常藥法量水於銀石器內煎至一

半渣再煎兩度去渣通以所煎汁文武火熬稠而止諸

藥煎膏倣此

地黃膏

男婦血虛者用之

牛膝膏

男子腎虛及腰膝疼痛或痿弱者用之女人血虛及有

血病者用之

八仙茶韓飛霞方

粳米

黃粟米

赤小豆

黃豆

菜豆五者炒香 熟各一斤 細茶一斤 芝蔴淨五

花椒淨一斤 小茴香淨二斤 乾白姜兩 白鹽兩

已上十一味俱為極細末和合一處外用小麥麵炒黃

熟與前藥等分拌勻磁罐收之胡桃仁肉棗松子仁瓜

仁白砂糖之類隨意加入每用二三匙白湯點服

長松酒韓飛霞方

長松此酒中之聖藥產太行西北皮 黃芪酒製

熟地黃酒浸 生地黃酒浸 陳皮去白 枳殼去穢

當歸身錢五 白芍錢四 天門冬錢五 半夏姜製

厚朴姜製 甘菊花錢五 麥門冬錢三 砂仁錢三

木香錢三 人參錢四 蜀椒錢二 蘇合錢七

黃柏錢五 黃連錢三 小紅棗去核 胡桃仁去木

老米撮 蒼朮米泔浸去 燈草五寸長

一料分十劑絹袋盛之凡米五升造酒五罇煮一袋嘗

久用之

枸杞酒韓飛霞方 治火症酒性熱三藥制之

枸杞錢五 黃連錢五 菜豆錢

右作一劑絹袋盛之用米五升造酒五罇用前藥者嘗

久用之

固本酒古庵方

生地黃者竹刀切

麥門冬淡酒浸二日去心

熟地黃竹刀切

天門冬浸二日去心膜皮

川牛膝去蘆酒

甘州枸杞兩

遼人參四兩去蘆頭

川黃柏去粗皮剉酒

廣木香兩

縮砂仁兩

料分作十劑絹袋盛之每劑糯米一斗搗碎酒約在

罐中納藥於內煮熟嘗久用之每次飲一二盃或

三五盃為止

仙家酒 大能益心氣補腦髓治消渴力怯及風火症者

人尤宜

揀潔淨婦人乳每用一吸即以指塞鼻孔按唇貼齒而

漱乳與口津相和然後以鼻內引上吸使氣由明堂入

腦方可徐徐嚥下凡五七次為一度不漱而服者何異

飲酪止於胃腸爾

班龍宴韓飛霞方

養壯鹿一二隻每日煎人參一兩湯飲之渣和草料飼

之每用預夜減食次晨空心以布縛鹿於床首低尾高

用三稜針刺眼大背前毛孔名天池穴銀管三寸許挿

向鼻梁吮其血和以藥酒任意或入瑯散加沉香者著

盡量月可一鹿無恙若有暑刺鹿血乘熱和酒一醉亦

妙

小刀圭 此方所授與古方小異韓飛霞方

用黃牛犢一隻未知陰陽者肥嫩純黃色先期辨後開藥料至臘月初八日或本月戊巳日宰取血搏毛留皮碎切臟腑分寸不遺用長流水大鍋煮至半熟下後項藥肉以半斤為塊每肉十斤入

人參二兩 茯苓法皮二兩 綿黃芪刮淨五兩 良姜

肉桂去粗皮各半兩 陳皮去白三兩 甘草去皮一兩 花椒去目一兩

白鹽臨瀉對酌酒上二斗酌八分

右各件同牛肉煮文武火旋添熟水常以八分為節牛

肉爛如泥槌骨內之髓煎化入汁中漉去渣但存稠汁如稀飭待冷入蜜雍羶搗黃土坑埋齊雍口封固凡早食不拘何樣飲食如此每每調和人事勞苦并房慾之後以醇酒調服造酒至醇來之日如此甚佳

拾遺雜論 一百一十

丹溪心法

小便黃用黃柏澀者數者或加澤瀉又云小便不利黃柏知母為君茯苓澤瀉為使 若濕熱流注下焦小便赤黃煎以澀滯用黃柏澤瀉甚當 若稟受甚壯酒食過

度寡慾無慮之人小便澀滯不利莖中痛甚却不宜用
寒涼藥并滲利之藥只宜升麻柴胡羌活甘草稍服後
却用驚翎探而人嘔吐數十聲其小便自通 若是下
焦無血小便澀數而赤宜四物如黃栢知母牛膝甘草
稍

凡用引經藥正藥六兩引經藥只可用半兩

白蠟屬金稟收斂堅凝之氣外科之要藥生肌止血定痛
接骨續筋補虛與合歡樹皮同入長肌肉膏藥用之神
効

凡製玄明粉朴硝一斤蘿蔔一斤同煮蘿蔔熟為度取出

用白皮紙濾在磁器中露一宿收之冬月可製

凡治上升之氣大槩用香附黃連黃芩山梔

凡補中氣藥必多服而效遲却藥必速効如汗下之法

白芍藥酒浸炒與白朮同用則補脾與川芎同用則瀉肝

與參朮同用則補氣能治血虛腹痛餘腹痛皆不可用
凡面黑不可多服黃芪以其氣實而又補之也 面白

人不可多發散以其氣虛而又虧之也 面白人不可

飲酒耗血故也 氣實人因服黃芪過多喘者用三拗

湯以瀉其氣

用椒葉升起胃氣之後胃中滿悶舊有痰之故以二陳加

白朮香附炒神麩

二陳湯治濁加升提之藥能使大便潤而小便長

腰曲不能伸者針人中妙一作委中

惡寒久病亦可解鬱

中焦有食積與痰而生病者胃氣不虛卒不便死

人有病面皮上忽見紅點者多死

凡治病必先問平日起居飲食如何

氣屬陽無寒之理上升之氣覺惡寒者元則室承乃制故

也

人則氣浮於肺

凡治病必先固正氣

升降浮沉即春夏秋冬

升降浮沉即順之此必先藏歲氣毋伐天和

寒熱溫涼則逆之以寒治熱之法

凡看脉如得惡脉當覆手取如與正取同乃元氣絕必難

治矣如與正取不同者乃陰陽錯綜未必死

弦堅之脉雖是有積亦帶陰虛脉無水不軟之意脉緊指

者真氣大虛多死峻補氣無水參朮歸之類形脫者

必補氣參朮面白補氣肥人補氣

針法渾是瀉而無補妙在押死其血氣則不痛故下針隨

慶皆可

灸法有補瀉火若補火艾炷至肉若瀉火不要至肉便掃除之用口吹風主散

點三里穴隨意依古法點但跌陽脉不應即是穴蓋三里屬陽明經也

灸瘡不收口用黃連甘草節白芷黃丹香油煎膏貼

一婦人十九歲氣實多怒事不發一日忽大叫而欲厥至痰閉於上火起於下而上衝始用香附五錢生甘草三錢川芎七錢童便姜汁煎服又用青黛人中白香附末為丸稍愈不除後用火吐乃安吐後用導痰湯加姜炒

黃連香附生薑煎下龍會丸

金釵石斛每二錢洗淨生薑一片搗細末盪起煎沸去粗食前飲之補脾清肺甚妙

治赤遊風用二蚕沙炒研細用剪刀草根自然汁調勻先塗腹了却塗患處須留一面出處患處移動為效剪刀草根即野茨菇

酒風多搗用白朮半兩人參二錢半甘草三錢陳皮蒼朮天麻細切酒浸白芍一錢酒浸防風川芎二錢半若小便多加五味子右為細末作丸服亦可

醫論

一百一十一 新增

竹明醫論

或問仲景東垣河間丹溪諸書孰優學之宜何主曰宜專主內經而博觀乎四子斯無弊矣蓋醫之有內經猶儒道之六經無所不備四子之說則猶學庸語蓋為六經之階梯不可缺一者也四子之書初無優劣但各發明一義耳仲景見內經其傷寒而其變遷反覆之詳未備也故著論立方以盡其變後人宗之傳用既久漸失其真用以通治溫暑內傷諸症遂致誤人故河間出而始

發明治濕暑之法東垣出而始發明治內傷之法河間之論即內經五運六氣之旨東垣之說即內經飲食勞倦之義仲景非不知濕暑與內傷也特其著書未之及河間東垣之於傷寒則遵用仲景而莫敢違矣至於丹溪出而又集諸醫之大成發明陰虛發熱類乎外感內傷及濕熱相火為病甚多隨證著論亦不過闡內經之要旨補前賢之未備耳故曰外感法仲景內傷法東垣熱病用河間雜病丹溪一以貫之歸於內經斯醫道之大全矣

或問仲景處方藥品甚少及東垣用藥多至二十餘味丹

溪云予每治病用東垣之藥效仲景處方庶品味數少
則藥力專精丹溪何以不法東垣而效仲景耶曰明察
藥性莫如東垣蓋所謂聖於醫者也故在東垣則可
他人而效其多斯亂雜矣東垣如韓信將兵多多益善
丹溪不過能將十萬故不致效其多
或問人言東南氣熱可服寒藥西北氣寒須服溫藥然今
東南之俗胡椒姜桂人常食之不見生病而北京士夫
畏食胡椒辛熱之物何也曰東南雖熱然地卑多濕辛
熱食藥亦能劫濕西北雖寒然地高多燥辛熱食藥却
能助燥故耳治病用藥者亦識此意

凡治諸病時常審察有無飲食傷積但見胸膈飽悶或噯
氣噯酸腹痛腸泄惡食少食便問曾何飲食審知傷積
即便先調脾胃消導飲食然後用本病之藥或於本病
藥內加入消導飲食藥若不知審此則藥雖對證而不
效蓋人以脾胃為主脾胃自傷則不能運化藥味以成
功也亦有食後即藥或藥後即睡或服藥太多者謂之
傷藥要須識此吾妻常病胎滿忽日血大崩盡暈即服
小便而醒少頃復暈急煎服并芥隨醒隨暈服止血止
暈之藥不効忽然嘔吐予以其童便藥汁滿於胃膈也
即以手探吐之末後吐出米飯及糞米糲許詢問適方

午飯後着惱少頃即崩不止予悟曰因方飽食胃氣不行故崩甚血既大崩胃氣益虛而不能運化宜乎崩量不止而血藥無效也急宜調理脾胃遂用白朮五錢陳皮麥芽各二錢煎服之服未半而暈止再服而崩止遂專理脾胃服數十服胃氣始還然後加血藥服之而安若不審知食滯而專用血崩血暈之藥豈不悞哉書此以例其餘

飲食過傷變為異常急暴之證人多不識嘗有一壯年人忽得暴疾如中風口不能言目不識人四肢不舉無投蘇合香丸不效予偶過聞之因詢其由曰適方陪客飲

食後忽得此症遂教以煎生姜淡鹽湯多飲探吐之吐出飲食數椀即時病愈又一婦人先傷飲食損胃後夜飯早卧因事復起少穿衣服覺虛冷少頃忽得厥逆昏迷不省予曰此必有食也令煎姜鹽湯吐之吐出夜飯遂醒後服白朮陳皮半夏麥芽湯調理而愈大抵此等證多因飲食醉飽之後或感風寒或着氣惱而得飲食填塞胃氣不行內傷時重若誤作中風中氣証而用驅風解表行氣散氣之藥則胃氣重傷死在旦夕嘗見人有卒暴病多作中風中氣用藥湏臾不救莫知其由內經雖有暴病暴死之証但恐多有因於食者前輩不曾

醫部 卷之四 四十一
明言故人不識耳。今後遇有此等急證，須要審問明白。若方飲食醉飽，或屢傷飲食，重複受傷，但覺腦膈有食滯者，只作食治之。

南方人稱發熱為勞發。蓋謂勞苦而發熱，即東垣內傷之旨也。此病輕者一二發自愈，重者用東垣法補之，重甚者，可加熟附子。人若因勞力辛苦而發熱，切不可誤作外感，輕易發汗也。

內傷發熱，是陽氣自傷，不能升達降下，陰分而為內熱。乃陽虛也。故其脈大而無力，屬肺脾。

陰虛發熱，是陰血自傷，不能製火，陽氣升騰而為內熱。乃陽旺也。故其脈數而無力，屬心腎。經曰：脈大而無力為陽虛，脈數而無力為陰虛，無力為虛，有力為實。

傷寒發熱，是寒邪入衛，與陽氣交爭而為外熱。陽氣主外，為寒所傷而失其職，故為熱。其脈緊而有力，是外之寒邪傷衛也。治主外。

傷暑發熱，是火邪傷心，元氣耗散而邪熱入客於中，故發為熱。汗大泄無氣以動，其脈虛遲而無力，是外之熱邪傷榮也。治主內。

病有感有傷，有中感者在皮毛為輕，傷者無肌肉稍重。中者入臟腑最重。寒有感寒傷寒中寒，風有感風傷風中。

風暑有感暑傷暑中暑當分輕重表裏治各不同又如
中濕中氣中毒皆云中中者中也謂邪直入於中也故
為重病

凡傷寒時氣大病熱退之後先服參芪甘溫之藥一二服
以扶元氣隨後便服滋血生津潤燥之藥蓋大病後汗
液外耗水穀內竭必有小便赤澀大便秘結等證須識
此意預藥防之

丹溪云氣病則治氣血病則治血兼痰則行痰兼鬱則開
鬱斯言盡之矣近世治病多不知分氣血但見虛病便
用參芪屬氣虛者固宜矣若是血虛則助氣而反耗陰

血耶是謂血病治氣則血愈虛耗甚而至於氣俱虛者
也故治病用藥須要分別氣血明白不可混淆此第一
義也

凡泄瀉病慎服參芪等甘溫之藥則病不能愈而或變為
黃疸蓋泄屬濕甘溫之藥能生濕熱故反助病邪久則
濕熱甚而為疸矣惟用苦溫苦寒之藥以治之則愈苦
寒瀉濕熱苦溫除濕寒也泄止後脾胃虛弱方可用參
芪等藥以補之

凡酒色過度損傷肺腎真陰咳嗽吐血衄血咳血咯
血等症慎服參芪等甘溫之藥則病日增服之過多則

死不可治。蓋甘溫助氣。氣屬陽。陽旺則陰愈消。前項病證。乃陰血虛而陽火旺。宜服甘溫之藥。以生血降火。世人不識。往往服參芪以為補。予見服此而死者多矣。東垣丹溪治病多自製方。蓋二公深明本草藥性。洞究內經處方要法。故能自製自完。以衆局方盛行。人皆遵用。不敢輕率自為。局方論證治病。雖多差謬。丹溪曾論辨之。然方皆名醫所製。其君臣佐使輕重緩急大小多寡之法。則不差也。近因東垣丹溪之書大行。世醫見其不用古方也。率皆效顰治病。輒自製方。然藥性不明。處方之法莫究。鹵莽亂雜。反致無生。甚有變証多端。遂難識

治且夫藥之氣味厚薄不同。如五味子之味厚。故東垣方少者五六粒。多者十數粒。今世醫或用二三錢。夏膏味淡薄。故曰白虎湯用半兩。今世醫不敢多用。補上治上劑宜輕少。今不論上下。率用大劑。丸散湯液各有攸宜。今不論緩急。率用湯煎。如此類者多矣。今之醫者若非熟讀本草。深究內經。而輕自製方。鮮不惧人也。

或問今人有言東垣之法宜用於北。丹溪之法可行於南。如何曰。東垣北醫也。羅謙甫傳其法。以聞於江浙。丹溪南醫也。劉宗厚世其學。以鳴於陝西。果如其言。則本草內經皆神農黃帝岐伯之說。亦止宜施於北方耶。夫五

方所生異病。及治之異宜。內經異法方宜論五常正六論。已詳言之矣。又如北方多寒。南方多熱。江湖多濕。廣南多瘴。謂其得此氣多。故亦多生此病。非謂北病無熱。南病無寒也。至於治寒以熱。治熱以寒。則五方皆同。豈有南北之異邪。但人之臟腑。火各居二。天之六氣。熱居三分。又半。故天下之病。熱多而寒少。觀內經至真大論病機一篇。可見又濕熱相火致病甚多。自王太僕注文湮沒。以致局方偏用溫熱之藥。故丹溪出而闡內經之旨。辨局方之偏。論濕熱相火之病。以補前人之未備。後人不識。見其多用芩連梔柏等苦寒之藥。遂以為宜用於南。淺矣哉。

昔有人云。我但因病。則於膏前不特手寫死字。則百般思慮俱息。此心便得安靜。勝於服藥。此真無上妙方也。蓋病而不謹。則死必至。達此理者。必能清心克己。凡百謹慎。而病可獲痊。否則雖有良藥。無救也。世人遇病而猶恣情任性。以自戕賊者。是故不知畏死者矣。又有等明知畏死而怕人知覺。諱而不言。或病已重而猶強作輕淺態度。以欺人者。斯又知畏死而反以取死。亦可笑哉。

用藥亦大畏

一百一十二 新增

附乾坤生意

○君臣佐使

論曰上藥為君中藥為臣下藥為佐使為君者主養命無毒多服皆能去病但其勢力和緩不為倉卒之效歲月悠久必獲大益為臣者主養性無毒縱有微毒斟酌得宜療病之功稍深輕身之說頗緩佐使者主治病有毒除寒熱邪氣破積聚主攻擊毒烈之氣傾損中和不可常服病愈即止大抵養命之藥則多君養性之藥則多臣療病之藥則多佐使用藥之法如朝廷之制若多君少臣少佐使則氣力不可周也藥有君臣佐使以相宜攝合和宜用一君

二臣三佐五使又可一君三臣九佐使也猶依本性所使自有定主詳用此者益當為善又恐上品君中猶有品列譬如春秋諸侯雖並得稱王然猶宗周臣佐之中亦當如此凡合和之體不必偏用自隨人之聰明參而用之俱君臣佐使務要配諫得體毋相反者若單一味服之不論凡藥合三百六十五種應三百六十五度有單行者有相須者有相使者有相畏者有相殺者有相惡者有相反者藥單行者七十一種相須者一十二種相使者九十種相畏者七十一種相殺者三十六種相惡者六十種相反者十八種人參紫石英參丹參芍藥細辛並反藜蘆白芨白斂

半夏括萋貝母並反烏頭大戟芫花海藻其遂並反甘草

○藥性反治

治病之法莫不以寒療熱以熱療寒寒則通之通則寒之益所不勝損其勝氣平邪伏病反乃良也然疾勢有大小藥力有輕重聖賢制立方論必求其所自以伏其所主譬猶火也人間之火遇草燭得水而燔可以濕伏可以水滅疾之小者似之疾之大者則如神龍之火得濕反燭得水反燔寒與熱相拒熱與寒相違不可以常法治之故經有熱因寒用寒因熱用通因通用寒因寒用之法治熱者以豆豉浸酒此因熱用寒者也治寒者以蜜浸烏頭此因寒

用熱者也久痢通滑必當先去其積中滿實寒必當峻補其下經云塞積內凝久病泄瀉愈而復發連歷歲時以熱下之結散劑止此因通治通之法也下虛中滿之病補虛則滿甚於中宜導則虛弱轉甚故當踈啓其中峻補其下此因塞治塞之法也

○用藥增減

夫衆病積聚皆起於虛虛生百病積者五臟之所積聚者六腑之所聚宜可以去雍薑橘之屬通可以去滯通草防風之屬補可以去弱人參羊肉之屬瀉可以去閉葶藶大黃之屬重可以去怯磁器鐵粉之屬輕可以去實麻黃芎

根之屬澁可以去脫牡蠣龍骨之屬滑可以去著冬葵榆皮之屬燥可以去濕桑白皮赤小豆之屬濕可以去枯白石英紫石英之屬

○藥象主治五臟

肝苦急甘以緩之甘草肝欲散以辛者川芎補以辛者細辛瀉以酸者白芍藥

心苦緩酸以收之五味子心欲奠以鹹者芒硝補以鹹者澤瀉以甘者人參甘草黃耆

脾苦濕苦以燥之白朮脾欲緩以甘者甘草補以甘者人參瀉以苦者黃連

肺苦氣上逆苦以瀉之黃芩肺欲收以酸者白芍藥

酸者五味子瀉以辛者桑白皮

腎苦燥辛以潤之黃蘗知母腎欲堅以苦者知母補以苦者黃蘗瀉以鹹者澤瀉

○用藥身稍

凡根在土者甲半以上氣脉上行也以生苗者為根中半以下氣脉下行也以入土者為稍病在中焦者用身在上焦者用根在下焦者用稍蓋根升而稍降也大凡用藥以頭身而分為上中下病在人身半已上者天之陽也用頭在中焦者用身在人身半已下者地之陰也用稍述類象

形者也

○用藥左散

仲景云剉如麻豆大與咬咀同意夫咬咀者古之制也古者無鐵刃以口咬細今如麻豆為粗藥水煎之使藥清飲於腹中則易升易散也此所謂咬咀也今人以刃器剉如麻豆此咬咀之易成也若一槩為細末不分清濁矣經云清陽發腠理濁陰走五臟果何謂也又曰清陽實四肢濁陰歸六腑是也咬咀之藥取汁清易循行經絡故也若治至高之病加酒煎如去濕加生薑煎補元氣以大棗煎發散風寒以葱白煎去膈上病以蜜煎散者細末也不循經

絡止去膈上病及臟腑之病氣味厚者白湯煎之
者煎之和相服丸者治下部之疾其丸極大而丸且面治中焦者次之治上焦者極小也稠麩糊丸者取其遲化直至下焦或酒或醋丸者取其收散之意也犯半夏南星欲去濕者以生薑汁煮糊為丸制其毒也稀糊丸者取其易化也水浸炒何為丸者及滴水為丸者皆取易化也煉蜜為丸者取其遲化而氣循經絡也蠟丸者取其難化而旋旋取效也大抵湯者蕩也去大病者用之散者散也去急病者用之丸者緩也不能速去其病用藥舒緩而治之意也

○用藥分兩

為君者最多為臣者次之佐使者又次之藥之於證所主同者則各等分也主治病者為君佐君者為臣應臣者為佐使也非上中下三品之謂也

○古今方劑分兩

古今方劑銖分兩與今不同謂如咬咀者即今剉如麻豆大是也云一升者即今之大白盞是也云銖者六銖為一分即今之二錢半也二十四銖為一兩也云三兩者即今之一兩也云二兩者即今之六錢半也料例大者只合三之一是矣凡煎藥用銀石器微火煎不可太猛表汗下藥煎至八分對病藥煎至七分滋補藥煎至六分不可極熟亦不可猛火驟乾致傷藥力也

製方之法

一百一十三 新增

附湯液本草

大藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味各有所能不可不通也藥之氣味不比同時之物味皆鹹其氣皆寒之類是也凡同氣之物必有諸味同味之物必有諸氣互相氣味各有厚薄性用不等製其方者必且明其為用經曰味為陰味厚為純陰味薄為陰中之陽氣為陽氣厚為純

陽氣薄為陽中之陰然味厚則泄薄則通氣薄則發泄厚則發熱又曰辛甘發散為陽酸苦湧泄為陰淡味滲泄為陽凡此之味各有所能然辛能散結潤燥苦能燥濕堅軟鹹能軟堅酸能收緩收散甘能緩急淡能利竅故經曰肝若急急食甘以緩之心若緩急食酸以收之脾若濕急食苦以燥之肺若氣上逆急食若以泄之腎若燥急食辛以潤之開腠理致津液通其氣也肝欲散急食辛以散之心欲軟急食鹹以軟之脾欲緩急食甘以緩之肺欲收急食酸以收之腎欲堅急食苦以堅之凡此者是明其氣味之用也若用其味必明其氣之可否用其氣必明其味之所

宜識其病之標本臟腑寒熱虛實微甚緩急而用其藥之氣味隨其證而製其方也是故方有君臣佐使輕重緩急君臣大小又正逆從之制也主治病者為君佐君者為臣應者為使用此隨病之所宜而又贊成方而用之君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君二臣六偶之制也去咽嗑近者奇之遠者偶之汗者不奇下者不偶補上治上制之以緩補下治下制之以急急者氣味厚也緩者氣味薄也薄者少服而頻食厚者多服而頻食又當明五氣之鬱木鬱達之謂吐令條達也火鬱發之謂汗令疎散也土鬱奪之謂下無壅滯也金鬱泄之謂

解表泄小便也水鬱折之謂制其衝逆也通此五法乃治病之大要也

製造藥法

三百一十四 新編

議醫通纂要

○製香附法

香附主氣分之病香能竄苦能降推陳致新故諸書皆云益氣而俗有耗氣之訛女科之專藥也治本病畧炒蕪血以酒煮痰以姜汁虛以童便浸實以鹽水煮積以醋浸水煮婦人血用事氣行則無疾老人精枯血閉惟氣是資小

兒日充形乃曰固大凡有病則氣滯而餒故香附于氣分為君藥世所罕知佐以木香散滯洩肺以沉香無不升降以小茴香可行經絡而鹽炒則補腎間元氣香附為君參耆為臣甘草為佐治虛怯甚速佐以厚朴之類決壅積殺稜之類攻其甚者予嘗避諸香藥之熱而用檀香佐附流動諸氣極妙

○製當歸法

當歸主血分之病川產力剛可攻秦產力柔宜補凡用本病酒製而痰獨以姜汁浸透導血歸源之理熟地黄亦然血虛以人參石脂為佐血熱以生地黃條芩不絕生化之

源血積配以大黃婦形肥血化為痰二味姜汁浸佐以利
水道藥要之血藥不能合當歸故古方四物湯以為君芍
藥為臣地黃分生熟為佐芎為使可與要云

○製半夏法

痰分之病半夏為主脾主濕每惡濕濕生痰而寒又生濕
故半夏之辛燥濕也然必造而為麩以生姜自然汁生白
礬湯等分共和造麩楮葉包裹風乾然後入藥風痰以猪
牙阜角煮汁去渣煉膏如錫火痰黑色老痰膠以竹瀝或
荆歷入姜汁濕痰白色寒痰清以老姜煎濃湯加煨白
三分之一如半夏三兩煨過白礬一兩俱造麩如前法

又以霞天膏加白芥子三分之一姜汁礬湯竹瀝造麩治
痰積沉痾者日能使腐敗隨大小便出或散而為瘡此半
夏麩之妙也古方二陳湯以此為君世醫因辛反減至少
許而茯苓滲濕陳皮行氣甘草醒脾皆臣佐使而反多其
銖兩蓋不造麩之過觀法製半夏以姜礬制辛而能大醫
是也佐以南星治風痰以姜汁酒浸炒芥連及瓜蒌實香
油拌麩畧炒之類治火痰以麩炒枳殼枳實姜汁浸蒸海
粉之類治老痰以蒼朮白朮俱米泔姜汁浸炒甚至乾姜
烏頭皆治濕痰而常有脾洩者以肉豆蔻半夏麩加麩藥
作丸尤有奇効厚養之人酒後多此而苦濕為病者十常

八九也方書謂天下無逆流之水身中有倒上之痰氣亂血餘化而為痰故治痰以行氣調血為要天膏方見

○製黃連法

火分之病黃連為主五臟皆有火平則治病則亂方書有君火相火邪火龍火之論其實一氣而已故丹溪云氣有餘便是火分為一類凡治本病夏炒以從邪實火以朴硝湯假火酒虛火醋痰火姜汁俱浸透炒氣滯火以茱萸食積洩黃土血疾癥瘕痛乾漆俱水拌同炒去黃土漆下焦伏火以鹽水浸透焙目疾以人乳浸蒸或點或服生用為君佐官桂少許煎百沸入蜜空心服能使心腎交於頃刻

入五苓滑石大治夢遺以土姜酒蜜四炒者為君史君子為臣白芍藥酒煮為佐鹿木香為使治小兒五疳以茱萸炒者加木香等分生大黃倍之水丸治五痢以姜汁酒煮者為末和霞天膏治顛癩諸風眩暈瘡傷皆神效非彼但云瀉心火而與苓蘗諸苦藥例稱者比也

○造神麴法

六月六日謂諸神集會之辰故名神麴如過此日造者非神麴也 或用此日辨藥料至上寅日踏麴亦是

白虎即白麴

勾陳即蒼耳自

滕蛇即野葛自

青龍即青蒿自

玄武即杏仁四升去皮尖搗如泥

朱雀即赤小豆三升者軟熟搗如泥

右共修合三伏內用上寅日踏極實為度或甲寅戊寅庚寅日乃三奇也近時神麩只以麵蓼為之入藥多不効也一方加稀蓂草自然汁尤妙

○造海粉法

擇取紫口蛤蜊不計多少三月取以炭火銀罐內煨成粉收貯候至秋深待瓜萋熟時摘取連皮帶子搗爛如泥和勻乾濕得宜團如雞彈大用篾穿之懸透風處陰乾次年聽用入末藥丸藥研極細入湯藥不宜細

○廣按丹溪云海粉即海石熱痰能降濕痰能燥結痰

能軟頑痰能消正節齋本草云海石即海蛤因蛤蜊殼在泥沙日久風波淘灑圓淨如石故名海石其味苦鹹故能軟堅化痰今以蛤蜊瓜萋造法雖妙恐不如原物之味鹹也宜加朴硝方可

○煉蜜法

以白沙蜜一斤大磁碗盛重湯煮不住手攪文武火湯乾加水以蜜滴水不散為度大率蜜一斤煉成半斤罐封埋土七日凡和丸劑止以藥末一半入蜜舂萬餘杵乾糝以布包裹入甑蒸軟又加未盡之藥如此三次則丸劑可以久收不回潤 一法治蜜丸不回潤用火一盆水一盆將

蜜丸節盛先放火盆上烘溶即便放水盆上收乾如此數
番以乾為度磁罐盛之永不回潤切記不可烘焦了丸藥
此水煉蜜之法熱則流通寒則收凝之理

醫西畧

一百一十五

新增

附西川周氏論

血榮氣衛論

人之一身。所以得全其性命者。氣與血也。蓋氣取諸陽。血
取諸陰。人生之初。具此陰陽。則亦具此血氣。血氣者。其人
身之根本乎。血何以為榮。榮行脈中。滋榮之義也。氣何以

為衛。衛行脈外。護衛之義也。然則榮與衛。豈獨無所自來
哉。曰。人受穀於胃。胃為水穀之海。灌溉經絡。長養百骸。而
五臟六腑皆取其氣。故清者為榮。濁者為衛。榮衛二氣。周
流不息。一日一夜。脈行五十度。平旦以來。復會於氣口。所
謂陰陽相貫。如環之無端。則是二氣者。常相隨而不相離
也。夫惟血榮氣衛常相流通。則於人何病之有。一室礙焉。
百病由此而生矣。故氣之作恙。發而為怒。喜悲恐寒熱驚
思勞。聚而為積。痞癥瘕疝。上為頭旋。中為五膈。下為臍
間動氣。或喘促。或咳噫。聚則中滿。逆則足寒。凡此者。氣使
之然也。血之為患。其妄行則吐血。其衰涸則虛勞。蓄之在

上其人忘。若由之在下其人狂。逢寒則筋不榮而攣急。挾熱則毒內瘵而發黃。在小便者為淋痛。在大便者為腸風。其於婦人月事進退。漏下崩中。病猶不一。凡此者血使之然也。夫血譬則水也。氣譬則風也。風行水上。有血氣之多寡焉。蓋氣者血之帥也。氣行則血行。氣止則血止。氣溫則血滑。氣寒則血凝。氣有一息之不運。則血有一息之不行。病出於血。調其氣。猶可以道達。病原於氣。區區調血何加焉。故人之身。調氣為上。調血次之。是亦先陽後陰之義也。若夫血有敗瘀。滯泥乎諸經。則氣之道路未免有所壅遏。又當審所先而決去之。經所謂先去其血而後調之。又不可

不通其變矣。然而調氣之劑。以之調血而兩得。調血之劑。以之調氣而乖張。如木香如官桂如細辛如厚朴。以至烏藥香附莪朮三稜之類。治氣可也。治血亦可也。若以當歸地黃輩論之。施之血證無以逾此。然其性纏滯。於胃氣有虧焉。胃氣既虧。則五臟六腑之氣亦餒矣。善用藥者。其間劑量而佐助之。

○火濕分治

肥人氣虛生寒。寒生滋濕。生痰。瘦人血虛生熱。熱生火。火生燥。故肥人多寒。濕瘦人多熱。燥也。夫以人形分寒濕熱燥。此得之於外。然其中臟腑為病。亦有寒濕熱燥之殊。不

可不知玉璽金鑰曰肝臟由來同火治三焦包絡都無異脾胃常將濕處求肺與大腸同濕類腎與膀胱心小腸寒熱臨時旋商議惡寒表熱小膀胱濕發熱表寒心腎熾十二經最端的四經屬火四經濕四經有熱有寒時攻裏解表細消息裏熱表寒宜越竭表熱表寒宜汗釋濕同寒火同執寒熱到頭無兩說六分來大執寒寒熱中停真浪舌執寒格拒病機深尤害分承通制緊真數熱脉正邪標本治之真妙訣休治風休治燥治得大時風燥了當詳表時莫攻裏當攻裏時莫解表裏裏如或兩可攻後先內分多少治濕無過似決川此箇荃蹄最分曉

世醫爭奈難笑天

○辨真分治

大寒而之生也皆因外感內傷生火生濕濕而生熱火而生痰而者而已審其少壯新病是濕則以之是火則瀉之是濕而生熱則轉濕而蒸清熱是火而生痰則瀉火而蒸豁痰無餘蘊矣審其年老衰久病又當半攻半補焉如氣虛而有寒熱痰火則以四君子湯補氣而蒸燥濕清熱熱痰瀉火如血虛而有痰火濕熱則以四物湯補血而蒸瀉火豁痰清熱燥濕如此則補攻無施庶乎可也予故曰少壯新病攻邪在老衰久病補虛為先

古上二條
補入

○雜論

大抵人之生也十六歲為春十六歲為夏十六歲為秋十六歲為冬以至六十四歲以配六十四卦且如一年四季之內豈無陰晦精明以人身方之豈無疾病蓋人之一身血脉通貫如乾坤之旋轉江河之流注一有不通則滯而成病雖聖人亦不能免但常人則自致之所以有賴於藥之功也

○氣血偏勝而成疾藥者偏勝之氣以此之偏濟彼之偏而使之平此用藥之功也藥優於伐病而不優於養生而優於養生而不優於伐病



○治病之法先去病根然後可用收澁如澣衣然先去垢

膩然後可加粉飾也所以粟殼龍骨之藥不可輕用

○養病之人必得吾儒主一居敬之方仍知勿忘勿助之

戒則心火易平不忘生而狗欲疾不期愈而自愈矣

○聞之老壽者言人得元氣以生穀氣以養肉氣以輔肉

氣勝則滯穀氣穀氣勝則滯元氣元氣充行者壽此言深

得養生之要敢贅于此

○東坡先生云予於平時細察醫之工拙至於有疾必先

盡告以所患而後診視故中醫醫疾常愈吾病予求疾愈

而已豈以困醫為事哉今之人往往以脉試醫醫者亦不



醫問孟浪一診以自按其所長寧能免實實虛虛之禍哉
蓋脉理精微必盡得其所患庶幾可以意求

●察脉之法先須六部齊診看何部異於衆者便是此部

有病然後每部另診方可得其精微無病之人左手弱右
手強是血虛右手弱左手強是氣虛有病之人左手太右
手小是外感右手太左手小是內傷如邪氣盛脉大醫而
使之小正氣虛脉小醫而使之大者皆效也此條古
菴補入

○脉者暴也診脉者如暴外之人而欲知其暴內之事也
考之字韻可見矣

○宋景瀛先生云扁鵲華咤天下固不常有使有之而值

淺易之疾遇難語之人上之不足展吾術次之不能從吾
所欲為法宜針而責我以疑為病是實而究我以虛何以
成其功哉此言深足為任醫者勸敢併及之

○大凡治病當識本末假如嘔吐痰涎胃虛不食以致發
熱若與涼劑退熱則胃氣愈虛熱愈不退惟先以助胃止
吐為本其熱自退縱熱不退但得胃氣已正亦可旋與解
熱之劑又有傷寒發大熱屢經寒涼踈轉其熱仍前但用
和調胃氣自然無事

○大抵人之虛多是陰虛火動脾胃衰弱真陰者水也脾
胃者土也土雖喜燥然太燥則草木枯槁水雖喜潤然太

潤則草木濕爛。是以補脾胃及補腎之劑。務在潤燥得宜。隨病加減。

○諺有之曰人無根本水食為命。蓋脾胃屬土。土主納水穀。人之根本也。脾土雖曰惡濕。然太乾何以生物。是非惡濕惡太濕也。土能剋水。水大土崩。理之必然。甚而腫脹。蓋由於斯。醫用枳朮丸以理之。宜矣。然多服致燥。恐亡津液。用者審之。理中湯去朮加桂。治奔豚動氣者。可見矣。

○經曰形不足者溫之。以氣溫者養也。溫之者所以調其飲食。適其起居。澄心息慮。從容以待。其真氣之復常也。禮記所謂柔色以溫之。此溫字正與彼同。或以藥扶助之。亦

溫養也。東垣乃以溫為溫涼之溫。謂宜溫藥以補元氣。而為火邪。世人相循。而用熱藥流弊。尚未盡去也。請因此而後舉前人之說。以贅之。蓋欲申明其義也。

○溫藥之補元氣散火邪者。亦惟氣溫而味甘者斯可矣。蓋溫能益氣。甘以助脾而緩火。故元氣復而火邪息矣。

○東垣補中益氣湯中加炒麴生苓。名益胃升陽湯。血脈益氣。古聖人之法也。先補胃氣以助生發之氣。陽生陰長。諸甘藥為之。先務舉世皆以為補氣。殊不知其能生血。此陽生陰長之理。故先調胃氣。人之身內水穀為寶。氣虛血弱。又當求長。滋血虛以人參補之之法。陽旺則生陰氣旺。

則生血也

○經云腎氣動氣五臟六腑之本十二經脈之根呼吸之門生氣之原不可不知也

○凡腎虛血寒氣逆而脹。腎脹走痛。中腕痞滿。兩眼多淚。此寒泣血也。須用官桂當歸以溫其血。蓋寒傷榮。官桂當歸。溫血之上藥。古人所以致意於寒泣血者以此。然必察脈精而問病審。方可用之。若血熱輕用。為害匪輕。

○肝者脾之賊。木能勝土。古人慮之。經曰。肝腎氣虛。為病泄瀉。亦孰知腎者。所守司於下。而肝者。又門戶要束之具。束則不泄也。泄瀉而面色青慘者。受寒所致。竹葉湯主之。

○心為血之主。肝為血之藏。肺為氣之主。腎為氣之藏。誠哉是言也。學者惟知血之出於心。而不知血之納於肝。惟知氣之出於肺。而不知氣之納於腎。用藥摸稜。往往南轅而北轍矣。假如血痢作恙。以五苓門冬等劑行其心。以巴豆大黃等劑逐其積。而其痛獨存者。血之所藏無以養也。必佐以川芎或芎歸湯。則其痛止。假如喘嗽氣鳴。以薑橘枳椇蘇桂調其氣。以南星半夏細辛豁其痰。而終不下降者。氣之所藏無以收也。必佐以補骨脂或安腎丸。則其氣歸元。病有標本。治有先後。綱舉而目斯張矣。噫。此傳心喫緊之法也。耳目所接。敢不與衛生之家共之。

○氣血冲和萬病不生一有拂鬱諸病生焉故人身諸病多生於鬱鬱蒼木川芎總解諸鬱越鞠丸解諸鬱如婦人并多憂慮者必加去心貝母蓋貝母開膏中鬱結之氣詩所謂言採其蠶者是也

○退熱之法全在清心必用麥門冬燈草白朮茯苓蓋心者一身之主宰而萬事之本根萬令從心心不清則妄動而熱不退然熱又能傷血血滯則氣鬱而熱愈不退退熱之法所以又在調血法用川芎當歸若夫陽浮於外則當歛而降之法用參苓白朮散姜棗煎服

○痰在人身非血非氣生於脾土謂之津液周流運用血氣由之如道路然不可無者但濕盛痰多加以外感固滯於中斯為患耳故風寒客之煽以相火則上攻心目而為暗風痰厥暑濕乘之血氣相著則附於筋骨而為腫毒癰痰又有心風者何也蓋君火在心因怒發之相火助盛痰動于中恚氣上攻迷其心竅則為狂為癲所怒之事纏固於心輒自言談失其條序謂之心風與風何干也若痰不盛者則有感亦輕初在皮膚以傳經絡若是治療依時或汗或下由是解矣凡有惟證莫不由茲丹溪十病九痰之論豈欺我哉故智者覺其濕盛除以三陳之類亦非末病而治之理乎

○傷寒內實大熱通利之後已經得瘥且量進白粥兩三日未可遽與和胃之劑執氣得之又復作也經此旋以易簡溫膈湯入竹茹與之或二陳湯加前胡亦可矣二藥傷寒瘥後通用無執者只守本方世俗以四君子湯以青細循習用之不思內有白朮溫而閉氣往往因此而燥闕矣○寒疾人皆知用附子乾姜以溫氣而少知用肉桂當歸以溫血

○治瘧之法全在去水飲清瘀血惟水飲所以作寒熱惟瘀血所以增寒熱寒熱不歇有根惟癖為瘧之母惟瘀血為暑熱之毒有汗以扶正氣為主無汗以散邪氣為主

在陰分者須用紅花方用二陳湯加枳殼枳實猪苓澤瀉柴胡黃芩蒼朮神麩麥芽山查香附木通川芎荆芥有癖加三稜無汗加青皮紫蘇有汗泄瀉俱加白朮暑毒加香薷人壯氣實者加常山草果若無內熱而有裏寒者加肉桂乾姜

○禁口痢必先理胃膈而後可以及腸胃蓋痢久傷陰血虛火上攻於胃膈之間故也

○酒雖與水同體然傷於腸胃則升之不散降之不下者氣分無形之位蓋逐氣升降而半有消耗之矣今人酒則便少此其可驗故治法宜汗宜利小便東垣以

為無形之物固不可後人以傷飲食同治亦不可

○酒醉宜熱湯漱口蓋其毒在齒大醉則以熱湯於密室洗面數次梳頭數十梳即醒

○四君子湯用人參白朮茯苓甘草四味固補氣之要藥然人參動肺火吐血久嗽面黑氣實血虛陰虛之人忌之以沙參代之可也蓋人參味甘補五臟之陽沙參味苦補五臟之陰白朮補中燥濕動氣者不宜茯苓淡滲行水目病者不宜甘草緩中中滿者不宜須要識得監制

○四物湯用熟地黃當歸芍藥川芎四味固補血之要藥然地黃當歸戀膈引痰損胃氣芍藥酸寒血虛寒人禁用

古人云戒芍藥以避中寒誠不可忽川芎能散真氣久服令人暴亡亦須識得監制

○二陳湯用半夏陳皮茯苓甘草四味固治痰之要藥然半夏能燥陰血燥津液渴者禁用陳皮留白補胃和中去白消痰利氣有白朮則補脾胃無白朮則瀉脾胃有甘草則補肺無甘草則瀉脾亦須要識得監制

○三補丸用黃芩黃柏黃連三味固降火之要藥然黃連大已猪肉黃柏峻下黃芩大寒皆能損胃氣用之宜斟酌亦要識得監制

○補中益氣湯內用柴胡升麻固善然天傾西北地不滿

東藥。東南人陰易升。恐未為相宜。

○補陰丸必以地黃為主。然地黃見銅鐵服之令人腎消。男子損榮。女子損衛。且大忌菜蔬。甘能白人髮。

○枳朮丸用荷葉包飯為丸。恐不佳。蓋荷葉之味。若以荷葉煮粥。夏月則以米置荷筒中。數日取出。再以荷葉煮粥。更妙。蓋荷葉內虛中空。象震之體。震者動也。人感之則生少陽甲膽也。傳曰。履端於始。序則不愆。

○理中湯。腎氣動者。去朮加桂。考之本書。增補藥。只復云。動氣者。去朮加桂。以桂能泄奔豚也。腎惡燥。故去朮也。愚按。奔豚因土克水而致。去朮者。恐土旺克水。腎氣虛不能

安而愈動也。若止曰腎惡燥。故云去朮。則未明白耳。蓋奔豚者。腎之積也。其人素有腎積。因傷寒之邪。衝下焦。致其發動。所以如江豚之奔衝。或因汗吐之後。心氣虛而攻動。腎積也。多用桂者。以桂能泄奔豚。用茯苓者。以其能伐腎邪也。臍下有動氣。亦曰奔豚。若上下左右動氣者。難治也。若素無腎積之人。則正宜服朮。故枳朮丸為常用之藥也。

東垣丹溪治病何常。雖水。

仁齋直指傷寒證治。奔豚動氣類有云。動氣者。臟氣不調。築觸跳動。隨臟所主。而形見於臍之左右上下也。大抵真氣內虛。水結不散。氣與之搏。即發奔豚。以其走痛衝突。如

脈之奔。雖有發表攻裏之証。汗之下之。皆不可也。愚按仁齋不言當臍動氣者何耶。蓋胃為中州。以生津液。妄施汗下。必先動脾。是以不言而喻也。舉此動氣非閉証何以知之。然則調理傷寒。貴乎纖悉。問証動氣。通用理中湯去木加桂。蓋桂利小便泄奔豚故也。奔豚一名腎氣。白木燥腎閉氣。是以去之。本草云白木歛虛汗。可見其為收斂之藥也。

○氣不歸元破故紙為主白木亦可者以其能和胃胃和氣歸元但惟內邪盡去實是陽浮於外方可用此以斂。不然則白木能閉氣反成不美。

○甘草炙乾姜炮各等分每服三錢者治男女諸虛出血胃寒不能引氣歸元無以收約其血虛極而藥氣不歸元甚効也。

○補脾胃藥內必用心經藥蓋火能生土故也古方用益智仁是此意。

○腎氣痛用川椒引而歸經即安。

○外科藥內須去白木。白木能生膿。

○治病藥內多用辛苦甘之劑但能於三者中識得彼此相制氣味相資之法便是良醫也。

○凡人四時以胃氣為本。然治病必須先診六脈皆有胃

氣外證雖重。病亦可治。胃氣未絕。則藥力運行而輸散於皮毛經絡。故易治而生。胃氣既絕。則藥雖對証。不能使其運用以輸精於皮毛經絡。真臟獨見而藥不及矣。遂或不治之證也。東垣曰。脈貴有神。有神者。有胃氣之謂也。故諸經方論皆曰。有病早治療。不令邪氣深入。所以聖人治未病不治已病。正謂此也。

○凡藥內用苦寒如黃柏之類。必須以辛熱如姜桂之類佐之。所以藺室秘藏調中益氣湯後加減法云。如夏月有此證為太熱也。此病隨時為寒熱溫涼也。宜以黃連酒洗黃柏酒浸。知母酒浸。上各等分。右為細末。熱湯為丸。

如梧桐子大。每服一百丸。白湯送下。空心服。仍多飲熱湯。服畢少時。便以美食壓之。不令胃中停留。直至下元以瀉衝脈之邪也。觀此立法。皆是恐苦寒之藥泄其元氣。損其脾胃。脾胃虛則五臟六腑之氣皆餒。而火愈盛矣。所以山精膏。山藥。薏苡山精散。為最妙之藥也。

論藥

○粳米大能。和胃胃和則血氣自生。血氣足則調而能使真氣歸元。但不能治痰。和氣治病。宜以陳皮為主。以川芎補骨脂收其氣血之藏。用黃芩柴胡調行其熱血。他藥宜以類而推。然凡熱皆出於心。心血不可不清。麥門

冬不可缺也以燈草為引子

○柴胡治熱在半表半裏既下可汗又不可下非小柴胡一劑孰能內和而外解之

○升麻似落新婦根而彼亦解毒意者其一物乎

○獨活羌活療風宜用獨活蕪水宜用羌活

○栝忌取塚上者今取乾州者最佳則乾州栝茂大者皆是乾陵所出他處皆無大者但取其州土所宜子實氣味豐美可也

○胡黃連忌猪肉食之者漏精

○厚朴忌豆食之者動氣

○玄參犯銅餌之後噎入喉喪人目

○神麩者六神之麩也必六物備而後可以謂之神

○薄荷骨蒸熱勞用其汁與衆藥和為膏

○牛膽南星用南星為末入牛膽內臘月釀成

○當歸珍云頭止血身和血尾破血雷公云若要破血即使頭一節硬實處要止血即用尾若一特用不如不使易老云用頭則破血用尾則止血若全用一破一止則和血也如此紛紛不定大抵無大補血之功惟使氣血各歸其經聖人立當歸之名必因此矣

○桔梗與木梗真相似但木梗甚腥澁又與薺芫相亂而

梗有心老無心用須去頭上尖硬三分已來并兩畔附枝子

○人參夏月多服發心眩薺若能亂人參薺若雖似人參但其功專解百藥毒故味甚甜不苦人參味甘而微苦得其中和但恐賣人薺而淡之

○麥門冬遠志不去心令人煩遠志苗為小草

○肉蓯忌銅

○乾姜辛多用則耗散元氣是壯火食氣故也須以生甘草緩之

○蒼白二朮忌桃李雀蛤及三白青魚鮓菘菜胡荽

藥性之凡使勿用磁米頭大無味其熱水時人呼為磁是也若薺故仁仁小色青味甘性平有補人益血母能治惡瘡江左有一人患瘡如人面亦無他苦其人獻油酒中其不苦也以此物食之亦能食食多則覺臍內肉脹起有蓋醫者教以歷試諸藥金石草木之類悉試之無苦至貝母瘡乃聚眉閉口其人喜曰此藥可治也因以小葦筒毀其口數日成痂遂愈然不知何效也 貝母中有獨穎團不伴兩片無皺者誤服令人筋脉永不收

○芍藥有金木二芍不同然救病止宜用金芍金芍色

白多脂木芍色紫多脉

○茯苓搏令細於水盆中攪令獨浮者去之是茯苓筋若誤服之令人眼中瞳子白黑睛點小燕盲目甚忌之

○白芷斤採得後勿用四條作一處生者此名喪公藤熟勿用馬蘭並不入藥

○牛膝忌牛肉

○天門冬忌鯉魚

○茸草桔梗忌豬肉

○香附知母菖蒲皆忌鐵

○甘草忌食松菜食之令人病永不除

○山藥勿用平田生二三紀者或經十紀者山中生皮赤四面有鬚生者妙

○川芎大塊圓轉色白不油嚼之微辛甘者佳

○木香形如枯骨油重者良行中下二焦氣瀆用棋柳為使

○山梔子小而七稜者佳長大者亦可用但無力耳

○天南星無疑但市人多以由跋小者似南星殊不知南

○星素柔膩肌細炮之易裂差可辨爾

○滑石白者佳餘色殺人

○天花粉即瓜蒌根必以人乳汁蒸竹瀝晒過能去上焦

痰熱渴又能上嗽潤肺

秘方

○久嗽不已如百部為主則已

○久瀉不止加破故紙肉蓯山藥則止

○久汗不出加青皮紫蘇則出

○久患血證血不歸元及久服藥無效者以川芎為君則

效或服芎歸湯

○久患氣証氣不歸元及久服藥無效者以破故紙為君

則效或服安腎丸

芎歸湯

川芎一錢

當歸一錢

水二盞薑三片棗一枚中滿者不加棗煎至七分食前

熱服

安腎丸

破故紙上

懷香子上

乳香

要真者不得有真者則不用以沒藥代之中

台為末煉蜜為丸空心白湯送下四十九丸或以煎藥吞

之最妙

○肝氣不達用青皮以疎通肝氣

○身熱不退加黃芩即退或煎柴胡

○遺精不止

山藥兩

烏藥兩

益智仁兩

右為末蜜和丸空心白湯下四十九脾經濕熱脾精不收加蒼朮腎經濕熱腎精不收加黃柏

○敗膿不去加白芷則去

○經絡不通元脉不接孔竅不竦加木通以達

○腎火不除無根之火加玄參以除之

○火妄動夏日加滑石甘草重墜之物以鎮之益元散亦好

益元散

滑石兩

甘草半兩原方一兩今減去一半

右為末每服三匙白湯調下

○水脹不除用香薷則除蓋香薷治水有微上微下之功

○瘧疾久者須加白豆蔻以寒藥佐之蓋白豆蔻能消能磨流行三焦補上焦元氣馨香之氣味上行胃氣而疾自愈矣

○吐血大作無可奈何究其源有實火則以大黃下從大腸去蓋果是正氣虛而全無邪則當不吐

○治心漏方

胃前有孔常出血水謂之心漏此病醫書少載人多不知又能去腰痛

嫩鹿茸去毛酥

附子炮去 鹽花

右三味等分為末，棗肉為丸，每服三十九，空心酒服。

○治懸離方

此瘡在穀道外腎之間，醫書不載，人所罕知，初發甚小，狀如松子，漸大如蓮實。治醫若遲，則破，大小便皆從此出，不可治矣。服此有效。橫文大甘草，蘸潤水，文武火慢炙之，不可性急，炙至表裏濕潤透徹，每一兩用無灰酒二碗，煮至半碗，溫服，一日一服，至消盡為度。

半夏丸 治痰盛中惡欲吐血香

半夏一味切破

煎下

右為末，麩糊為丸，如梧桐子大，每服十九，至三十九，姜湯送下，量痰輕重加減用之。

治火眼方

臘月羯羊膽一枚

以蜂蜜灌滿，掛陰乾，用時取一粒，磁盞內水化開，點之。

○枳朮丸 用白朮，須以紫蘇薄荷黃芩肉桂湯煮過，東垣

加陳皮名橘皮枳朮丸，加橘半名橘半枳朮丸，加麩朮

名麩朮枳朮丸

○二陳湯 加枳殼桔梗名枳桔二陳湯，開胃膈去痰更效。

加苓連名苓連二陳湯，降熱痰更妙。

補陰丸方

黃柏三兩酒炒 天門冬去心二兩 牛膝去蘆二兩 菖蒲一兩

山藥四兩 麥門冬去心二兩 知母去毛酒炒 加甘草許

杜仲去粗皮炒 冬月加乾姜許

右為末天門冬煉膏為丸淡鹽湯下四十九

十全補陰丸

人參兩半 甘草四錢 破故紙兩 桂二錢

山梔四錢 麥門冬去心一兩 黃芩五錢 當歸錢

白朮三錢 苦參二錢 菖蒲五錢 酸棗仁三錢

牛膝去蘆一兩 山茱萸去核八錢 敗龜板酥炙五錢 五味子錢

川芎錢 陳皮錢 藥麝角錢

右為末煉蜜丸梧桐子大用淡鹽湯送下或加茴香乾姜

人參湯 治吐血咯血

新羅人參慢天煎服人參又能益血此方說見勞瘵類

桂枝酒 治打撲傷隊血漏閉身體疼痛

辣桂

右為末每服二錢溫酒下或末有藥倉卒且用米醋

小血亦散 治瘀血

白朮散 治脾胃虛弱

白木分八 蓮肉錢 蒼朮分二 山藥分八

神麩錢 陳皮錢 甘草分二

右為末白湯調下二匙或加葛蒲蒼朮主山嵐瘴氣

○加減參朮白木散 補脾胃進飲食

白木錢三 茯苓錢三 山藥分四 甘草錢一

蒼朮錢二 白扁豆錢七 陳皮錢七 麥門冬去心分八

右為末每服二匙食前白湯調下一方加葛蒲

○加減二陳湯 能治痰火氣三者

陳皮錢 蒼朮分八 茯苓錢一 甘草分二

白木分四 枳殼分七 枳實分八 桔梗錢

紫蘇分三 薄荷分二 香附分七 葛蒲錢

荊芥分六 木通分四 川芎錢 麥門冬分五

右用水二盞姜三片煎至八分服隨病加減藥味

○柔金丸 治脾與大腸為最解五臟結氣補少陰經血

用山梔子去皮炒焦黑為末麵糊為丸

○山精丸

用蒼朮米泔浸為末麵糊為丸或神麩糊為丸

○青金丸 治肺火降痰

用黃芩半粘半實炒黑色天門冬膏為丸

○調胃妙方

醫略
日間常用小茴香最妙。脾腎俱虛。破故紙肉苁蓉。米尤妙。脾氣雖強。而腎氣不足。故飲食下咽而六腑為之餐泄也。脾腎之氣交通。則水穀自然消化。

○降火妙方

用黃芩川芎芍藥調血。心火一調其熱自退。心平則血不妄行。

○降火滋陰妙方

故紙山梔清晨吞下一升。一提其氣歸臍。一降一嚥。水火相見。天與地隔八萬四千里。人心與腎隔八寸四分。黃庭界於二者之間。

○膏子藥補陰虛

天門冬去心 麥冬去心 知母

菖蒲各兩半

當歸身 白芍藥各一兩 白朮錢八

甘草兩

黃栢蜜炙

大約藥一兩。用水二大碗。煎至一碗。去渣。再熬成膏。食前白湯調服二匙。中滿者去甘草。

○浸酒方 熬膏亦用

黃栢 牛膝 玄參 沙參

白芍藥 蜜 山梔子 天門冬

黃芩 天花粉略 當歸一兩 山藥

菘豆各二
麥門冬半兩
甘草錢三

用好酒燒酒浸皆可或加白朮

○散鬱湯

茯苓 陳皮 錢一 蒼朮 白芍藥

川芎 山梔子各八分 枳殼 香附各七分

甘草二分

水二鍾姜三片煎七分食前執服隨病加減

○法曰鬱則胃執鬱散則上焦行下脘通水穀之陰自
滋沛身中之陰氣自生矣何陽盛而陰衰乎何陰虛生
內熱乎陰氣不復加沙參山梔黃柏一二貼後加白朮

當歸久服用陰虛生內熱方

○陰虛生內熱方

當歸 川芎 蒼朮 陳皮各八分

白朮 麥門冬 須用沙參各七分 梔子熱者炒

天花粉治痰 白芍或酒浸姜 玄參五

黃柏分三 甘草分二 或以山藥代參朮

水二鍾姜三片煎至七分食前執服久服去川芎冬月
加破故紙此方與下陰分生陽湯義相發明

○陰分生陽湯 此方與上陰虛生內熱方相為表裏

白朮分二 白芍分二 當歸錢 甘草分二

白朮分二 白芍分二 當歸錢 甘草分二

蒼朮分五 陳皮分八

或加參苓或以山藥代參苓姜棗煎服入蜜亦可加肉
果破故紙亦可冬日尤宜用故紙蓋以三焦者乃下焦
元氣生發之根蒂也

○升陽益胃養榮湯 可常服正平人用的

當歸全用補血一錢 山梔子分八

白芍能隨脾入分大 人參分七

甘草如食菘菜以蜜代之 木通以漸退 白朮各五分

水二盞姜三片帶皮米一撮棗二枚食前熱服

○蒼朮山梔大能除鬱因食冷物鬱火於脾胃者故屬脾

脾者土也熱伏地中此病多因血虛兩得之也又有胃
虛過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中華虛感之

○肉蓯補骨脂二物久月可服

○八物湯

白朮 山茱萸 牡丹皮各七分 白芍分五

當歸 山藥分一 杜仲分八 五味子分四

水二鍾姜帶皮三片棗二枚煎七分食前熱服

如遠志小蓯麥門冬生地黃牛膝

八味丸

白芍分一 黃柏分六 當歸分二 山藥分三 五錢

黃柏分六 當歸分二 山藥分三 五錢

山茱萸

牡丹皮 八五味子

杜仲

右為末煉蜜丸如梧桐子大加遠志小草麥門冬生地黃牛膝其生地黃牛膝方用酒浸搗為膏入藥

○濟務方

用花椒硫黃為末以換柳一箇用香油摩搽之一掃光神效

○醫界一書乃予師新添周汝鳴先生舊日所言而予私或雜記者中間皆切實理到之言人所當共理會因附於此若夫先生之全書與其獨得之妙則既非淺陋所能窺亦非草率所能悉記也 廣謹識

醫指

一百一十六

新增

附古葦方氏賦

竊謂

醫雖小道迺寄死生

最要變通不宜固執

明藥脉病治之理

藥性脉治

悉望聞問切之情

望色聞聲

藥推寒熱温凉平和之氣

其淡苦酸鹹之味升降浮沉

之性宣通瀉補之能

脈究浮沉遲數滑濇之形表裏寒熱實虛之應阿阿嫩之和弦鈞毛石之順

藥用君臣佐使主病之謂君最輔君之謂臣

脈分老幼瘦肥瘦者人脈大者人脈細

藥迺天地之精藥宜切病切病者用

脈者氣血之表脈貴有神神者有力

病有外感內傷風寒暑濕燥火之機

治用宣通瀉補滑澀燥重輕之劑

外感異乎內傷內傷乃有虛之症

寒證不同熱證傷寒傳經之邪為寒

外感宜瀉而內傷宜補

寒證可溫而熱證可清

補瀉得宜須臾病愈

溫清失度頃刻人亡

外感風寒宜分輕而解散外感風寒傳變不一

內傷飲食可調胃以消溶內傷飲食消導而已

胃陽主氣司納受陽常有餘

脾陰主血司運化陰常不足

胃乃六腑之本能納受水穀

脾為五臟之源能運化氣液

胃氣弱則百病生

脾陰足而萬邪息

調理胃脾為醫中之王道

節戒飲食迺却病之良方

病多寒冷鬱氣氣鬱發熱寒謂風寒外感晝夜發熱

或出七情動火火動生痰

有因行藏動靜以傷暑邪

或是出入兩水而中濕氣

亦有飲食失調而生濕熱

倘或房勞過度以動相火已上六條言病

制伏相火要滋養其真陰已下六條言治法

祛除濕熱煩燥補其脾胃

外濕宜表散內濕宜淡滲

陽暑可清熱陰暑可散寒

尋火尋痰分多分少而治

究表究裏或汗或下而施是風寒則汗之謂溫散也

痰因火動治火為先

火因氣生理氣為本

治火輕者可降重者從其性而升消

理氣微則宜調甚則宜其源而發散

實火可瀉或瀉表而或瀉裏指外

虛火宜補或補陰而或補陽指內

暴病之謂火

恆病之謂痰

寒熱濕燥風五痰有異

溫清燥潤散五治不同痰濕之燥痰熱之清痰風痰散之

有因火而生痰有因痰而生火

或鬱久而成病或病久而成鬱

金木水火土五鬱當分

泄折達發奪五法宜審金鬱泄之水鬱折之木鬱

鬱則生火生痰而成病

病則耗氣耗血以致虛

病有微甚

治有逆從

微則逆治以寒藥治熱

甚則從攻以熱藥治寒

病有本標急則治標緩則治本

法分攻補虛而用補實而用攻

少壯新邪專攻是則

老衰久病兼補為規

久病兼補虛而兼解鬱

陳徹或蕩滌而或消溶

積在胃腸可下而癒

塊居經絡宜消而痊

女人氣滯於血宜開血而行氣

男子陽多乎陰可補陰以配陽

從蓉山藥男子之佳珍補陰故也

香附縮砂女人之至寶行氣故也

氣病血病二者宜分

陽虛陰虛兩般勿紊

陽虛氣病晝重而夜輕自子至巳為晝

血病陰虛晝輕而夜重自午至亥為夜

陽虛生寒寒生濕濕生熱陽為氣為真火

陰虛生火火生燥燥生風陰為血為真水

陽盛陰虛則生火火逼血而錯經妄行

陰盛陽虛則生寒寒滯氣而周身浮腫

陽虛畏外寒陽氣虛不能衛外故畏外寒

陰虛生內熱陰血虛不能配氣故生內熱

補陽補氣用甘溫之品

滋陰滋血以苦寒之流

調氣貴用辛涼氣屬陽無形者也藥以散之
 和血必須辛熱血屬陰有形者也藥以閉之
 陽氣為陰血之引導

陰血迺陽氣之依歸

陽虛補陽而陰虛滋陰

氣病調氣而血病和血

陰陽兩虛惟補其陽陽生而陰長

氣血俱病只調其氣氣行而血隨

藏冰發冰以節陽氣之燔

滋水養水以制心火之亢

火降水升斯人無病

陰平陽秘我體長春

小兒純陽而無陰

老者多氣而少血

肥人氣虛有痰宜豁痰而補氣

瘦者血虛有火可瀉火以滋陰

膏粱無厭發癰疽熱燥所使

淡薄不堪生腫脹寒濕而然

北地從高宜清熱而潤燥

南方濟下可散濕以溫寒

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

卷之三 六 五

病機既明

用藥勿惑

麻黃湯發臘月寒傷榮

桂枝湯散冬天風傷衛

九味羌活湯發三時之表三時傷寒 春夏秋也

六神通解散理晚發之邪三月天行 謂之晚發

香蘇散十神湯參蘇飲發表調中平和之藥外 感內傷兼治

葛根湯解肌湯小柴胡和解半表

大柴胡三承氣攻熱邪傳裏

理中湯四逆湯散寒中陰經已上治外感

補中益氣湯治飽飢勞後

升陽順氣湯療怒恐憂思

調中益氣湯調胃脾失協

參朮調中湯治脾肺俱傷

升陽散火湯升散熱邪凡言熱者 指外熱也

升陽益胃湯分消濕氣已上治內傷

和解散金沸草散治特行寒疫

神木散定風餅子療暴中風邪

人參敗毒散升麻葛根湯解溫疫而身熱

陽毒升麻湯雄黃解毒丸散天行而咽疼

醫方類聚卷之三十一

宣明雙解散主溫熱始終之要藥

藿香正氣散治暑濕內外之良方

香薷飲清暑益氣湯人參白虎湯益原散縮脾飲能驅暑

虛暑氣

平胃散羌活勝濕湯升陽除濕湯五苓散木附湯善解外

內濕邪

生料五積散解濕溫寒治其不濕

防風通聖散清熱潤燥治其燥

搜風順氣丸神芎丸潤大照切燥症

黃連解毒湯三黃丸瀉三焦火邪撤內火也

當歸六黃湯瀉火滋陰

防風當歸飲補虛退熱

舟車丸三花神佑丸能除濕熱濕則熱則

秦艽湯羌活愈風湯善解燥風燥則生風

胃苓湯主傷暑泄瀉腹痛

柴苓湯治傷寒泄瀉身熱

桂苓白朮散療霍亂而口發渴

加減理中湯治吐瀉而咽不乾

蒼朮湯胃風湯治濕傷氣分白痢便膿

地黃湯芍藥湯主熱傷血分赤痢下血

萬安散七寶飲治瘧無汗而寒多熱少

清脾飲六和湯療瘧有汗而寒少熱多

華蓋散五拗湯主喘嗽因寒外襲

洗肺散貝母散治咳嗽由火内生 ○配上發表和中以風寒暑濕燥火

白虎湯瀉胃火有餘

八珍湯補脾陰不足

白朮和胃丸能養胃脾

寬中進食丸善滋形氣

治中湯枳朮丸和中丸大安丸保和丸健脾胃消食

香殼丸香稜丸積氣丹妙功丸消塊丸破積除癥

木香枳殼丸療食停久發黃

神妙列仙散治酒積陳成疸

木香枳朮丸化滯湯調氣進食

七轉靈應丹萬應丸取積追虫

丁香脾積丸妙應丸治心腹諸疼

大黃備急丸三陽散主卒暴百病

三稜消積丸治新傷生冷硬物內用巴豆

木香檳榔丸療久患氣食痞膨內用大黃

巴豆斬關去時新之冷積可仗

大黃破結推陳久之熱癥宜遵

氣病宜調氣用木香檳榔香附枳殼

血病宜和血以川芎當歸桃仁紅花

越鞠丸木香沉氣飲開鬱氣之無形

蟠葱散撞氣阿魏丸破積血之有質

神砂一粒丹療氣鬱而為心疼

神聖代針散治血積而作疝氣

獨活寄生湯開氣血結滯在腰

當歸拈痛湯散濕熱沉凝于足

控涎丹小胃丹治濕熱流注四肢作疼

金棗丹虎骨散療氣血佛鬱通體為病治氣上調胃消食并血濕熱鬱積

二陳湯以豁痰

三補丸而瀉火

六君湯豁痰補氣調胃

六物湯降火補血滋陰相物湯加黃

當歸龍會丸善降陰火兼治脇痛

人參養胃湯能開結痰併療久瘧

太平丸消化丸治痰嗽有功

左金丸香連丸除熱疼必効

洗心散洗肝散瀉心肝之火

滾痰丸化痰丸蠲熱燥之痰

四七湯黑錫丹開痰結心腦

清空膏涼膈散除火升頭膈

石膏羌活散祛風明目

川芎石膏湯瀉火定眩

川芎茶調散治風熱上攻頭目

葛花解醒湯療濕痰中滿胃腸

龍腦雞蘇丸除肺心虛煩

人參瀉肺湯散腦膈實火

犀角地黄湯桃仁承氣湯茯苓補心湯阿膠丸小建中湯

治火載血而上出

當歸承氣湯端竹蒲黃散當歸和血散聚金丸伏龍肝散

療陽逼陰而下行

紅花當歸散千金桃仁煎六合湯理經脉不通

涼血地黃湯解毒四物湯膠艾湯治崩漏不止

金匱當歸散清熱安胎而易產

丹溪天麻丸活血保產而無驚

女金丹烏雞丸調氣血令老婦姪娘

天一丸連翹飲瀉火濕主小兒百病

醒脾散玉餅子肥兒丸香稜丸治嬰孩脾氣不足而致痰

瀉青丸奎命散抱龍丸棋榔丸療童穉肝邪有餘而生災

金箔鎮心丸金箔鎮心丹安神定驚

五福化毒丹年角消毒飲清熱解毒

異攻散補痘瘡之虛寒

通聖散瀉癰疹之實熱

內疎黃連湯千金漏蘆湯主陽癰腫掀向外

內托復煎散淵然奪命丹治陰疽毒蘊于中

立馬回疔丹萬靈奪命丹療疔瘡而有殊功

神效太醫膏散腫潰堅湯治瘰癧而收實效

紫金丹治藥食衆毒兼癰疽疔腫

如聖散療風濕諸邪及癰瘰痛風

香殼丸芎歸丸療痔而清熱涼血

槐角丸烏玉丸治漏而散濕補虛

清心蓮子飲八正散治小便淋濁有虛實之分

道滯通幽湯三和散療大腸燥結有血氣之異

海藏五飲湯散五等之飲

開結枳實丸消諸般之痰

道痰湯三生丸豁痰踈風

千縷湯四磨湯下氣定喘

蘇子降氣湯消痰利氣

三因七氣湯解鬱開心

瓜蒂散稀涎散四靈散吐涎而祛風

蘇青丹星香湯滌痰湯豁痰而順氣

蘇合香丸烏藥順氣散勻氣散善開結氣

小省風湯青州白丸子搜風丸能散風痰

牛黃清心丸治諸痰熱而類風

諸小續命湯療直中風而在脉

三化湯主風入腑推陳潤燥

至寶丹治邪入臟散熱消風

至聖丹疎風清熱豁痰

心風丹潤燥祛風瀉火

換骨丹續命丹治風痰充塞經絡而為癱瘓

清燥湯健步丸療濕熱薰蒸筋骨而成痿痺

南星治風痰蒼朮治濕痰天花粉治熱痰海石治燥痰半

夏治寒痰

柴胡瀉肝火黃連瀉心火白芍藥瀉脾火黃芩瀉肺火黃

栝瀉腎火

天門麥門知母石膏竹茹童便玄明粉上清丸能散虛火

荆瀝竹瀝貝母瓜蒌薤白薑汁霞天膏二瀝湯善開虛痰

氣虛加以四君

血虛加以四物

已上治痰火氣風

四君補氣併益脾

四物補血兼滋腎

八物湯十全大補湯補氣血兩虛

固本丸古菴心腎丸滋心腎不足

錢氏白朮散參朮白朮散竹葉石膏湯補脾胃諸虛

丹溪補陰丸金匱腎氣丸三一腎氣丸滋真陰久損

崔氏八味丸補陰興陽

天王補心丹寧神定志

朱砂安神丸涼血清心

八味定志丸補虛開竅

茯苓丸萹蘆分清飲除濁止淋

固精丸固真太寶丸秘精收脫

保和湯知母茯苓湯黃芪驚甲湯止嗽寧肺

保真湯十味人參散人參養榮湯除熱補虛

一秤金七仙丹烏髮駐顏

瓊玉膏固本酒延年益壽 已上補氣血臟腑

依方加減存乎人要審病而合宜

用藥補瀉在於味須隨時而換氣

奇偶復七方須知七方者奇偶復

初中末三治要察初則緩急也

寒因熱用熱因寒用通因通用塞因塞用通因通用者通其積滯而下焦自開也高者抑之下者舉之外者發之內者奪之塞因塞用者塞其下流而上焦自然開竅也寒則堅凝熱則開行

風能勝濕濕能潤燥

辛能散結甘能緩中淡則利竅

苦以泄逆酸以收耗鹹以軟堅

升降浮沉則順之謂順其升降浮沉之性也

寒熱溫涼宜逆也謂以寒治熱以熱治寒也

病有淺深

治有難易

初感風寒乍傷飲食一藥可愈

舊存痼疾久患虛勞萬方難瘳

發霜之疾亟療

无妄之藥勿試

病若挾虛宜半攻而半補

醫稱多術或用灸而用針

針有劫病之功

灸獲回生之驗

針能去氣病而作痛

灸則消血癥以成形

臟寒虛奪者治以灸熯

脉病攣痺者療以針刺

血實蓄結腫熱者宜從砭石

氣滯者宜用灸

經絡不通病生於不仁者須覓醪醴

血氣凝泣病生於筋脉者可行熨藥

病慄悍者按而收之

乾霍亂者刮而行之

醫業十三科宜精一派

病情千萬變仔細推評

姑撮碎言以陳管見

後之學者庶達迷津

附諸方

麻黃湯見傷寒

九味羌活湯見傷寒

香蘇飲見傷寒

參蘇飲見傷寒

解肌湯見傷寒

大柴胡湯見傷寒

小承氣湯見傷寒

桂枝湯見傷寒

六神通解散見傷寒

十神湯見傷寒

葛根湯見傷寒

小柴胡湯見傷寒

調胃承氣湯見傷寒

大承氣湯見傷寒

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

理中湯見中寒

四逆湯見中寒

補中益氣湯見內傷

升陽順氣湯見諸氣

調中益氣湯見調胃

參朮調中湯見內傷

升陽散火湯見火類

升陽益胃湯見內傷

和解散見傷寒

金沸草散見傷風

神朮散見傷風

定風餅子見傷風

人參敗毒散見傷風

升麻葛根湯見傷寒

陽毒升麻湯見斑疹

桂枝解肌湯見傷寒

宣明雙解散見傷寒

藿香正氣散見傷寒

香薷飲見中暑

清暑薤白湯見中暑

人參白虎湯見中暑

升原散見中暑

縮脾飲見中暑

平胃散見中濕

羌活勝濕湯見中濕

升陽除濕湯見中濕

五苓散見傷寒

木防風湯見中濕

生料五積散見中寒

防風通聖散見中風

搜風順氣丸見中風

神芩丸見中濕

黃連解毒湯見傷寒

三黃丸見火類

當歸六黃湯見盜汗

防風當歸飲子見火類

舟車丸見中濕

三花神佑丸見中濕

大秦朮湯見中風

羌活愈風湯見中風

胃冷湯見泄瀉

柴苓湯見傷寒

桂苓白朮散見中暑

加減理中湯見霍亂

落米湯見痢疾

胃風湯見痢疾

地黃湯見痢疾

芍藥湯見痢疾

萬安散見瘧類

七寶散見瘧類

清脾飲見瘧類

六和湯見瘧類

華蓋散見咳嗽

五拗湯見咳嗽

洗肺散見咳嗽

貝母散見咳嗽

白虎湯見傷寒

八珍湯見調胃

白朮和胃丸見調胃

寬中進食丸見調胃

治中湯見調胃

枳朮丸見瘧類

大安丸見傷食

和中丸見調胃

保和丸見積聚

消化香殼丸見傷食

香稜丸見積聚

積氣丹見積聚

妙功丸見積聚

消塊丸見積聚

木香枳殼丸見積聚

神妙列仙散見傷食

木香枳朮丸見諸氣

木香化滯湯見諸氣

七轉靈應丹見積聚

萬應丸見積聚

丁香脾積丸見腹痛

妙應丸

大黃備急丸見傷食

三陽散

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

三稜消積丸見傷食

木香檳榔丸見鼓脹

越鞠丸見六鬱

木香流氣飲見諸氣

香葱散見諸氣

撞氣阿魏丸見諸氣

神砂一粒丹見疝痛

神聖代針散見疝痛

獨活寄生湯見腰痛

當歸拈痛湯見脚氣

控涎丹見痛風

小胃丹見痰類

金棗丹見痛風

虎骨散見痛風

二陳湯見痰類

三補丸見補損

六君子湯見調胃

六物湯見勞瘵

當歸龍薈丸見腦痛

人參養胃湯見傷食

太平丸見勞瘵

消化丸見勞瘵

左金丸見火類

香連丸見痢疾

洗心散見火類

洗肝散見眼目

冰痰丸見痰類

化痰丸見痰類

四七湯見痰類

黑錫丹見痰類

清室膏見頭痛

涼膈散見傷寒

石膏羌活散見眼目

川芎石膏湯見中風

川芎茶調散見傷風

葛花解酲湯見傷食

龍腦雞蘇丸見火類

人參瀉肺湯見火類

犀角地黃湯見吐血

桃仁承氣湯見吐血

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

茯苓補心湯見吐血

阿膠丸見吐血

小建中湯見吐血

當歸承氣湯見瀉血

瑞竹蒲黃散見瀉血

當歸和血散見下血

聚金丹見下血

伏龍肝散見下血

紅花當歸散見經病

千金桃仁煎見經病

六合湯見經病

涼血地黃湯見崩漏

解毒四物湯見崩漏

膠艾湯見崩漏

金匱當歸散見產前

丹溪天麻丸見產前

女金丹見子嗣

烏雞丸見子嗣

天一丸見小兒

連翹飲見小兒

醒脾散見小兒

玉餅子見小兒

肥兒丸見小兒

香稜丸見小兒

瀉青丸見小兒

奪命散見小兒

抱龍丸見小兒

換柳丸見小兒

金鎖鎮心丸見小兒

金箔鎮心丹見小兒

五福化毒丹見小兒

犀角消毒飲見小兒

異功散見痘瘡

通聖散見麻疹

內疎黃連湯見癰疽

千金漏蘆湯見癰疽

內托復煎散見癰疽

淵然奪命丹見癰疽

立馬回疔丹見疔瘡

萬靈奪命丹見疔瘡

神效大醫膏見疔瘰

散腫潰堅湯見疔瘰

紫金丹見救急

如聖丹見中風

香散丸見疔瘰

考歸丸見疔瘰

加味槐角丸見漏瘡

烏玉丸見漏瘡

清心蓮子飲見淋類

八正散見淋類

導滯通幽湯見燥結

三和散見燥結

海藏五飲湯見痰類

開結枳實丸見痰類

導痰湯見痰類

三生丸見中風

千緡湯見痰類

四磨湯見喘類

蘇子降氣湯見痰類

三因七氣湯見諸氣

火蒂散見傷寒

稀涎散見中風

四靈散見吐法

蘇青丹見中風

星香湯見中風

滌痰湯見中風

蘇合香丸見中風

烏藥順氣散見中風

勻氣散見中風

小省風湯見中風

青州白丸子見中風

搜風丸見中風

牛黃清心丸見中風

小續命丹見中風

三化湯見中風

至寶丹見中風

龍星丹見中風

愈風丹見中風

換骨丹見中風

續命丹見中風

清燥湯見痰類

健步丸見痿類

玄明粉見火類

上清丸見風熱

霞天膏見倒倉

竹瀝湯

四君子湯見補損

四物湯見補損

八物湯見補損

十全大補湯見補損

人參固本丸見補損

古菴心腎丸見補損

錢氏白朮散見傷寒

參苓白朮散見補損

竹葉石膏湯見補損

丹溪補陰丸見補損

金匱腎氣湯見補損

三一腎氣丸見補損

崔氏八味丸見補損

茯苓丸見赤白濁

草薢分清飲見赤白濁

固精丸見夢遺

固直大寶丸

保和湯見勞瘵

知母茯苓湯見肺痿

黃芪驚甲湯見勞瘵

保真湯見勞瘵

一味人參散

人參養榮湯

一秤金見烏髭

七仙丹見烏髭

瓊玉膏見駐顏

固本酒見駐顏

廣既類集此書以為醫道玄奧高深苟非指引門路何由而升堂入室哉於是不揣疎庸輒將平生管見及采各證良方為賦一篇綱目悉具名曰醫指蓋欲

初學先熟乎此而入醫不難矣吁知我者其惟此賦乎
蔡鑑醫指二書別有全本在廣家

附錄

故丹溪先生朱公石表辭

宋太史瀛撰

丹溪先生既卒宗屬失其所倚藉并邑失其所依憑嗜學之士失其所承事莫不彷徨遙慕至於酒涕瀛聞之中心尤摧咽不自勝蓋自加布于首輒相親於死杖間訂義質疑而求古人精神心術之所寓先生不以瀛為不肖以忘年交遇之必極言而無所隱故知先生之深者無喻於瀛也方欲聚厥事行為書以傳來世而先生之子文從子嗣記忽踏瀛門以先生從弟無忌所為狀請為表以勒諸墓上瀛何敢辭先生諱震亨字彥脩姓朱氏其先出於漢

附錄
劉忠恕
擢里令雲之後居平陵至晉永興中臨海太守沈始遷今
發之義烏子孫蟬聯多發聞於世郡志家乘載之為詳當
宋之季有東堂府君者諱長祐懿然君子人也蓋以六經
為教以弘其宗府君生某某生迪功即桂迪功生鄉貢進
士環先生之大父也父諱元母某氏先生受資爽朗讀書
即了大義為聲律之賦刻燭而成長老咸器之已而棄去
尚俠氣不肯出人下鄉之右族咸陵之必風怒雷激求直
于有司上下搔手相戒莫或輕犯時鄉先生文懿許公謙
道東陽八華山中公上承考亭朱子四傳之學授受分明
契證真切擔簦而從之者亡慮數百人先生歎曰丈夫所

學未務聞道而唯俠是尚不亦惑乎乃摳衣往事焉先生
之年蓋已三十六矣公為開明天命人心之秘內聖外王
之微先生聞之自悔昔之沉冥顛躓汗下如雨由是日有
所悟心窩融廓體膚如覺增長每宵挾冊坐至四鼓潛驗
默察必欲見諸實踐抑其踈豪歸於粹夷理欲之關誠偽
之限嚴辨確守不以一毫苟且自恕如是者數年而其學
堅定矣歲當賓興先生應書秋闈幸沾一命以驗其所施
再往再不利復歎曰不仕固無義然得失則有命焉苟推
一家之政以達於鄉黨州閭寧非是乎先是府君置祭田
三十餘畝合為一區嗣人遞司糴事以陳時薦然有恒祭

而無怛所生先乃即適意亭遺址建祠堂若干楹以奉先世神主歲時行事復考朱子家禮而損益其儀文少長咸在執事有恪深衣大帶以序就列宴私治比不愆於禮適意亭者府君所造以延徐文清公之地先生弗忍其廢改創祠堂之南俾諸子姪肄習其中包銀之令下州縣承之急如星火一里之間不下數十姓民莫敢與辨先生所居里僅上富氓二人郡守召先生自臨之曰此非常法君不愛頭乎先生笑曰守為官頭固當惜民不愛也此害將毒子孫必欲多及民願倍輸吾產當之守雖怒竟不能屈縣有暴丞好誣瀆鬼神欲備位宗祠以徼福懼先生莫已與

以言嘗之曰人之死生獄神實司之欲治其官孰敢于令先生曰吾受命于天何庸媚土偶為先死計耶且獄神無知則已使其有知當此儉歲民食糠覈不飽能振吾民者然後降之福耳卒罷其事賦役無藝胥使高下其手以為民奸先生集同里之人謂曰有田則科徭隨之君等入胥吏餌而護相傾非策之上也宜相率以義紮其力之朘贏而敷之衆翕然從每官書下相依如父子議事必先集若苛歛之至先生即以身前辭氣懇款上官多聽為之損裁縣大夫勸耕于鄉將有要於民先生憇其臨境邪幅菲履往迎于道左大夫驚曰先生何事乃尔耶先生曰民有役

于官禮固應尔大夫曰勸耕善乎先生曰私田不煩官勸第公田生青芻耳是時圭田賦重種戶移徙亡故先生以此為風大夫一咲而去鄉有蜀墅塘周圍凡三千六百步溉田至六千畝而歲堤壞而水竭數以旱告先生倡民與築置坊庸鑿為三竇時其淺深而舒洩之民食其利後十年山水暴至堤又壞先生命再從子漳力任其事以副其成縣令長或門決獄得失先生必盡心為之開道東陽郭氏父子三人霍毆小民以幾斃又貫鍼鱗腹逼使吞之事移義烏鞠問當共子父皆死先生曰原其故終之情亦一人可償尔二子從父之命一宜從末減若皆殺之乃已重乎

事上從先生議張甲行小徑中適李之荷任器采幾中甲目甲怒拳其耳而死甲乙皆貧人甲又有九十之親先生曰貫甲罪則廢法徇法甲必瘦死親無以養亦死乙死暴於道孰為藏之不若使竟其葬埋且慰其親徐來婦獄服中刑耳或曰甲或逃奈何先生曰若以誠待之必不尔也縣如先生言後會赦免細民有斬先生立木者先生訊之民弗服先生聞於縣將逮之人交讓民曰汝奈何犯仁人耶民曰計將安出人曰先生長者也急昇木還之當尔貧民從之先生果寘而不問先生客吳妙湛院尼刻木作人形以為厭蠱館客陳真得之欲發其事尼懼甚先生知之

以計給陳出碎其木刻陳婦怒且詈先生徐曰君乃士人
獲此聲於吳楚聞其非君利儻之金吾財可通用勿憂也
尼後輦金帛為謝先生叱而去方嶽重臣及庶訪使者聞
先生名無不願見既見無不欲交章薦之先生皆力辭
民瘼吏弊必再三感頌告之不啻親受其病者覃煥鄭公
持節浙東尤敬先生以尊客禮禮之衆或不樂競短其行
於公公笑曰朱聘君盛舉諸公之長而諸公顧反短之何
其量之懸隔耶皆慚不能退初先生壯齡時以母夫人病
脾頗習醫後益研礮之且曰吾既窮而在下澤不能至遠
其可遠者非醫將安務乎時方盛行陳師文裴宗元所定

天觀一百九十七方先生獨疑之曰用藥如持
輕而為前却古方新証安能相值乎於是尋師而訂其說
渡濤江走吳又走宛陵走建業皆不能得復回武林有以
羅司徒知悌為告者知悌字子敬宋寶祐中寺人精於醫
得金士劉完素之學而旁參於李杲張從正二家然此侶
甚先生誇焉十往返不能通先生志益堅日拱立於其門
大風雨不易或告羅曰此朱彥脩也君居江南而失此士
人將議君後矣羅遽脩容見之一見如故交為言學醫之
要必本於素問難經而濕熱相火為病最多入罕有知其
秘者兼之長沙之書詳於外感東垣之書詳於內傷兩盡

之治疾方與所憾區區陳襲之恩沈之且殺人先生聞之
以疑為之釋然學成而歸鄉之諸裔始皆大驚中而笑亂
耕卒乃大服相惟尊顯為弟子四方以疾迎候者無死
先生無不即往雖雨雪載途亦不為止僕之嘗謂先生
之曰疾者度刻如歲而欲自逸耶實人求藥無不與不
其饋其困既無告者不待其招仕藥往起之雖百里之遠
弗憚也江浙省臣往討賊寇深入庫池遂以病還錢塘將
北歸先生脉之曰二十日死使宿經三衢時召吾可使還
燕然亦不能生之也如期卒於姑蘇驛擗貴人以徵疾來
召危坐中庭列三品儀衛於左右先生脉已不言而出或

追問之先生曰三月後當為鬼猶有驕氣耶及死其家神
先生之醫載粟為壽先生辭之一少年病熱兩額火赤不
能自禁躁走于庭將蹈河先生曰此陰證也製附子湯飲
之服為之吐舌飲已其疾如失先生治病如神若此甚多
門人類証有書茲不詳載先生孤高如鶴挺然不群雙目
有小大輪日出明雖毅然之色不可凌犯而清明坦夷不
事表操精神充滿接物和粹人皆樂親炙之語言有精魄
金針鑠鑑使人側耳並聽有蹶然興起之意而於天人感
應談慶類至之說尤竭力戒厲反覆不厭故其教人也人
既易知昏明強弱皆獲其心老者則愛慈詳幼者則樂恭

順莫不皆知信忠之為美固未能一變至道去泰去甚有足觀者或有小過深掩密覆唯恐先生之知凡先生杖履所臨人隨而化浦陽鄭太和十世同居先生為之喜動顏面其家所講冠婚喪祭之禮每容於先生而後定蓋先生之學稽諸載籍一以躬行為本以一心同天地之大以耳目為禮樂之原積養之義內外一致夜寐即平書之為暗室即康衢之見汲汲孜孜耄而彌篤每見誇多鬪靡之士輒語之曰聖賢一言終身行之弗盡矣以為多至於括英摘豔之辭尤不樂顧且以吾道蝨賊目之及自為文率以理為宗非有關於綱常治化不輕論也居室垣墉敦尚儉

朴服御唯大布寬衣僅取蔽體藜羹糗飯安之如八珍或在豪大姓家當其肆筵設席水陸之羞交錯於前先生正襟默坐未嘗下者其清脩苦節能為人之所不能為而於世上所悅者澹然無所嗜惟欲聞人之善如恐失之隨聞隨錄用為世勸遇有不順軌則者必誨其改事有難處者又導之以其方晚年識見尤卓嘗自括蒼還道過永康謂人曰青田之民器悍值此法弛令垂之時必依險阻嘯聚為亂已而果然又嘗告親友曰吾足跡所及廣矣風俗澆漓甚垂髫之童亦能操狡謀罔上天怒已極必假手殲之盡力善以延其胤乎時方承平聞者咸笑先生之迂言示

於天下之亂空利無烟火動百餘里先生著書有宋論一卷格致餘論若干卷局方發揮若干卷傷寒論辨若干卷外科精要發揮若干卷本草衍義補遺若干卷風水問答若干卷凡七種微文奧義多發前人之所未發先生嘗曰義理精微禮樂制度五門師友論著已悉吾可以無言矣故其所述獨志於醫為多先生生於至元辛巳十一月二十八日卒于至正戊戌六月二十四日瀕卒無他言獨呼嗣泥謂曰醫學亦難矣汝謹識之言訖端坐而逝享年七十有八娶戚氏迨一書院山長象祖之女先三十五年卒子男二嗣衍玉以

女四適傳似翁蔣長源呂文忠張思忠孫男一梧女二一適丁榆一尚幼其年十一月日始葬先生于某山之原卒後之五月也先生所居曰丹溪學者尊之而不敢字故因其地稱之曰丹溪先生云夫自學術不明于天下凡聖賢防範人心維持世道之書往往割裂摭拾組織成章流為譁世取寵之其間有注意遺經似若可尚又膠於訓詁之間異同紛拏者如聚訟其視身心皆藐然若不相闕此其知識反出於不學庸人之下於戲秦漢以來則或然矣然而靈豸不鳴孽狐之妖弗息黃鍾不奏瓦缶之音日甚天開文運濂洛奮興遠明九聖之緒流者遏而止之膠者

附錄
釋而通之一期開廓其昏翳挽回其精明而後已至其相
傳唯考亭集厥大成而考亭之傳又唯金華之四賢續其
世胤之止如印印泥不差毫末此所以輝連景接而芳猶
允著也先生少負任俠之氣不少撓屈及聞道德性命之
說遽變之而為剛毅所以局量弘而任載重寤寐先哲唯
日不足民吾同胞之念湏臾莫忘雖其力或弗支苟遇惠
利少足以濡物必委蛇周旋求盡其心應接之際又因人
心感發之機而施仁義之訓觸類而長開物成化所謂風
雨霜露無非君子之教者要亦不可誣也致思於醫亦能
搜隱抉秘倡明南方之絕學嬰疾之家倚以為命先生一

布衣耳其澤物有如此者使其得位于朝以行其道則夫
明效大驗又將何如哉嗚呼先生已矣其山峙淵澄之色
井滌石貞之操與其不可傳者弗能即矣徒因其遺行而
誦言之見聞不博惡能得十一於千百之間哉雖然舍是
又無足以求先生者敢撫狀之槩叙而為之銘曰

濂洛有作性學復明考亭承之集厥大成化覃荆揚以及
閩粵時雨方行區萌畢達世胤之正實歸金華繇延四葉
益燁其葩碎諸上尊寘彼遠路隨其志分不爽其度有美
君子欲振其奇血氣方剛疇能悔予七尺之軀忍令顛越
壯齡已踰亟更其轍更之伊何穉筴有書負而東遊以祛

所疑非刻非厲易圖易究豈止惜陰夜亦為書昔離其量
今郭其脈始知人心與宇宙同出將用世時有不利幸惠
家邦庶享厥志勤我祠事以帥其宗况有書詩以陶以隴
以暢其施期壽夭物苟躬可捐我豈遑恤仁義之言繩繩
勿休昭朗道真釋除欲仇上帝有赫日注吾目天人之交
間不容粟聽者聳然如聞巨鑪有聲鏗錡無耳不聰旁溢
予醫亦紹絕躅開闡玄微功利尤博歛具豪英變為毅弘
所以百為度越于人沾沾世儒出入口耳競藻闢華柝門
殊執以經為戲此孰甚焉不有躬行其失曷鑄世塗方冥
正資揚燎夢夢者天使埋其耀精神上征定為長庚與造

化遊白光煒煒表德幽墟遵古之義僉曰允哉是詞無愧

丹溪翁傳

戴九靈良撰

丹溪翁者婺之義烏人也姓朱氏諱震亨字彥脩學者尊
之曰丹溪翁翁自幼好學日記千言稍長從鄉先生治經
為舉子業後聞許文懿公得朱子四傳之學講道八華山
後徃拜焉益聞道德性命之說宏深粹密遂為專門一日
文懿謂曰吾卧病久非精於醫者不能以起之子聰明異
常人其肯游藝於醫乎翁以母病脾於醫亦粗習及聞文
懿之言即慨然曰士苟精一藝以推及物之仁雖不仕於
時猶仕也乃悉焚棄向所習舉子業一於醫致力焉時方

盛行陳師文裴宗元所定大觀二百九十七方翁躬書爰
是習既而悟曰揅古方以治今病其勢不能以盡合苟將
起度量立規矩稱權衡必也素難諸經乎然吾鄉諸醫鮮
克知之者遂治裝出游求他師而叩之乃渡浙河走吳中
出宛陵抵南徐達建業皆無所遇及還武林忽有以其郡
羅氏告者羅名知悌字子敬世稱太無先生宋理宗朝寺
人學精於醫得金劉完素之再傳而旁通張從正李果二
家之說然性褊甚恃能厭事難得意翁往謁焉凡數往返
不與接已而求見愈篤羅乃進之曰子非朱彥脩乎時翁
已有醫名羅故知之翁既得見遂北面再拜以謁受其所

教羅遇翁亦甚懽即授以劉張李諸書為之敷揚三家之
旨而一斷於經且曰盡去而舊學非是也翁聞其言渙然
無少疑滯於胸臆居無何盡得其學以歸鄉之諸醫泥陳
裴之學者聞翁言即大驚而咲且排獨文懿喜曰吾疾其
遂瘳矣乎文懿得末疾醫不能療者餘餘年翁以其法治
之良驗於是諸醫之咲且排者始皆心服口譽數年之間
聲聞預著翁不自滿足益以三家之說推廣之謂劉張之
學其論臟腑氣化有六而於濕熱相火三氣致病為最多
遂以推陳致新瀉火之法療之此固高出前代矣然有陰
虛火動或陰陽兩虛濕熱自盛者又當消息而用之謂李

之論飲食勞倦內傷脾胃則胃腕之陽不能以升舉并及
心肺之氣陷入中焦而用補中益氣之劑治之此亦前人
之所無也然而天不足於西北地不滿於東南天陽也地
陰也西北之人陽氣易於降東南之人陰火易於升苟不
知此而徒守其法則氣之降者固可愈而於其升者亦從
而用之吾恐反增其病矣乃以三家之論去其短而用其
長又復參之以太極之理易禮記通書正蒙諸書之義貫
穿內經之言以尋其指歸而謂內經之言火蓋於太極動
而生陽五性感動之說有合其言陰道虛則又與禮記之
養陰意同因作相火及陽有餘陰不足二論以發揮之

論相火有曰陽動而變陰靜而合而水火木金土然火
有二焉曰君火曰相火君火者人火也相火者天火也火
內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形質
相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命
故謂之相天生物恒於動人有此生亦恒於動然其所以
恒於動者皆相火助之也見於天者出於龍雷則水之氣
出於海則水之氣也具於人者寄於肝腎二部肝屬木而
腎屬水也膽者肝之腑膀胱者腎之腑心胞絡者腎之配
三焦以焦言而下焦司肝腎之分皆陰而下者也天非此
火不能生人非此火不能以有生天之火雖出於木而皆

本乎地故雷非伏龍非蟄海非附於地則不能鳴而能飛
不能波也鳴也飛也波也動而為相火者也肝腎之陰悉
其相火入而同乎天也或曰相火天人所問東垣何以指
為元氣之賊又謂火與元氣不兩立一勝則一負然則如
之何而可使之無勝負乎曰周子曰神發知矣五性感動
而萬事出五者之性為物所感不能謂之動者即內經五
火也相火易動五性厥陽之火又從而扇之則妄動矣火
既妄動則前熬真陰陰虛則病陰絕則死君火之氣經以
暑與濕言之而相火之氣則以火言蓋表其暴悍酷烈有
甚於君火也故曰相火元氣之賊周子曰聖人定之以中

正仁義而主靜朱子亦曰必使道心常為之主而人心每
聽命焉此善處乎火者也人心聽命於道心而又能主之
以靜彼五火將寂然不動而相火者惟有扶助造化而為
生生不息之運用爾夫何元氣之賊哉或曰內經相火註
言少陰少陽矣未嘗言及厥陰太陽而吾子言之何也曰
是太陽少陰東垣嘗言之治以炒指取其味辛能瀉水中
之火熱人亦言膽與三焦肝與胞絡皆從火治此歷指龍
雷之火也余以天人之火皆生於地如上文所云者實廣
二公之意耳或曰內經言火者非一徃徃於六氣中見之
而言臟腑者未之有也二公豈他有所據耶曰經以百病

生於風寒者濕燥火之動而為變者岐伯歷指病機干
九條而為火者五此非相火為病之出於臟腑者乎考之
內經諸執持題則屬之火諸狂躁越則屬之火諸病附腫
痛酸驚駭則為之火又原病式曰諸風掉眩屬於肝火之
動也諸氣膈鬱病痿屬於肺火之升也諸濕腫滿屬於脾
火之勝也諸痛痒瘡瘍屬於心火之用也是皆火之為病
出於臟腑者然也噫以陳無擇之通敏猶以暖熾論君火
日用之火論相火是直後人之釐釐哉其論陽有餘陰不
足有曰人受天地之氣以生天之陽氣為氣地之陰氣為
血然氣常有餘而血常不足何為也天大也為陽而

運於地之外地居天之中為陰而天之太氣舉之日晝也
屬陽而運於月之外月缺也屬陰而晝日之光以為
也則是地之陰已不勝夫天之陽月之陰亦不敵於日之
陽天地日月尚然而况於人乎故人之生也男子十六歲
而精通女子十四歲而經行是有形之後猶有待於乳哺
水穀之養而後陰可與陽配成乎人而為人之父母古人
必近三十二十而後嫁娶者可見陰氣之難於成而古人
之善於保養也錢仲陽於腎有補而無瀉其知此意者乎
又按禮記註曰人惟五十然後養陰者有以如內經曰年
至四十陰氣自半而起居衰矣男子六十四歲而精絕女

子四十九歲而經斷夫以陰氣之成止為三十年之運用
而竟已先虧可不知所保養哉經曰陽者天也主外陰者
地也主內故陽道實陰道虛斯言豈欺我哉或曰遠取諸
天地日月近取諸男女之身曰有餘曰不足吾已知之矣
人在氣交之中今欲順陰陽之理而為攝養之法如之何
則可曰主閉藏者腎也司竦泄者肝也二臟皆有相火而
其系上屬於心心君火也為物所感則易於動心動則相
火翕然而隨聖賢教人收心養心其旨深矣天地以五行
更迭衰旺而成四時人之五臟六腑亦應之而衰旺四月
屬巳五月屬午為火太旺火為肺金之夫火旺則金衰六

月屬未為土太旺土為水之夫土旺則水衰况腎水嘗藉
肺金為母以補助其不足古人於夏月必獨宿而淡味兢
兢業業保養金水二臟正嫌火土之旺爾內經又曰冬不
藏精者春必病溫十月屬亥十一月屬子正火氣潛伏閉
藏以養其本然之真而為來春升動發生之本若於此時
不恣欲以自戕至春升之際根本壯實氣不輕浮尚何病
之可言哉於是翁之醫益聞四方以病恭迎者遂輻輳於
道翁咸往起之其所治病凡幾病之狀何如施何良方飲
何藥而愈自前至今驗者何人何縣里主名得諸見聞班
班可紀蒲江鄭義士病滯下一夕忽昏仆目上視洩注而

汗瀉翁診之脉大無倫即告曰此陰虛陽暴絕也蓋得之病後酒且內然吾能愈之急命治人參膏而且提炙其氣海頃之手動又頃而唇動及參膏成三飲之甦矣其後服參膏畫數斤病已天台周進士病惡寒雖暑亦必以綿蒙其首服附子數百增劇翁診之脉滑而數即告曰此熱甚而反寒也乃以辛涼之劑吐痰一升許而蒙首之綿減半仍用防風通聖飲之愈周固喜甚翁曰病愈後須淡食以養胃內觀以養神則水可生火可降否則附毒必發殊不可救彼不能然後告疽發背死浙省平章南征閩奧還病反胃醫以為可治翁診其脉告曰公之病不可言也即出

獨告其左右曰此病得之驚後而使內火木之邪相挾氣傷液亡腸胃枯損食雖入而不化五臟皆無所稟去此十日死果如言鄭義士家一少年秋初病熱口渴而妄語兩額火赤醫作大熱治翁診之脉弱而遲告曰此作勞後病溫惟服補劑自己今六脉皆搏手必涼藥所致竟以附子湯啜之應手而瘥浙東憲幕傅氏子病妄語時若有所見其家妖之翁切其脉告曰此病痰也然脉虛弦而沉數蓋得之當暑飲酸又大驚傳曰然嘗夏因勞而甚渴恣飲梅水一二升又連得驚數次遂病翁以治痰補虛之劑處之旬浹愈里人陳時叔病張腹如斗鑿用利藥轉加翁診之

脈數而瀯告曰此得之嗜酒嗜酒則血傷血傷則脾土之陰亦傷胃雖受穀不能以轉輸故陽升陰降而否矣陳曰某以嗜酒前後洩見血者有年翁用補血之劑投之驗權貴人以微疾來召見翁至坐堂中自如翁診其脈不與言而出使詰之則曰公病在死法中不出三月且如鬼錄顧猶有驕氣耶後果如期死一老人病日無見使來求治翁診其脈微甚為製人參膏飲之目明如常時後數日翁復至忽見一鑿在庭煉礞石問之則已服之矣翁愕然曰此病得之氣太虛今不救其虛而反用礞石不出此夜必死至夜參半氣奄奄不相屬而死一男子病小便不通醫治

以利藥益甚翁診為右寸頗弦滑曰此積痰病也積痰在肺肺為上焦而膀胱為下焦上焦閉則下焦塞譬如滴之器必上竅通而後下竅之水出焉方以法大吐之吐已病如失一婦人病不知人稍蘇即號叫數四而復昏翁診之肝脈弦數而且滑曰此怒思所為蓋得之怒而強酒也詰之則不得於夫每遇夜引滿自酌解其懷翁治以流痰降火之劑而加香附以散肝分之鬱立愈一女子病不食面比卧者且半載醫告術窮翁診之肝脈弦出左寸曰此思男子不得氣結於脾故耳叩之則許嫁夫入廣且五年翁謂其父曰是病惟怒可解蓋怒之氣擊而屬木故能衝

衝其土之結今第觸之使怒耳父以為不然翁入而掌其
面者三責以不當有外思女子號泣大怒怒已進食翁復
潛謂其父曰思氣雖解然必得喜則庶不再結乃詐以夫
不吉且父止歸後三月夫果歸而病不作一婦人產後有
物不上如衣裙鑿不能喻翁曰此子宮也氣血虛故隨子
而下即與昔氏當歸之劑而加升麻舉之仍用皮工之法
以五倍子作湯洗濯雖其皮少頃子宮上翁慰之曰三年
後可再生兒無憂也如之一貧婦寡居病瀕翁見之惻然
乃曰是疾也號難治者不守禁忌耳是婦貧而無厚味寡
而無欲庶幾可療也即自具藥療之病愈後復投四物湯

數百劑遂不發動翁之為鑿皆此類也蓋其遇病施治不
膠於古方而所療皆中然於諸家方論則靡所不通他人
靳靳守古翁則操縱取舍而卒與古合一時學者咸聲隨
影附翁教之亶亶忘疲一日門人趙良仁問太極之旨翁
以陰陽造化之精微與鑿道相出入者論之且曰吾於諸
生中未嘗論至於此今以吾子所問故偶及之是蓋以道
相告非徒以鑿言也趙出語人曰翁之鑿其殆橐籥於此
乎雖成之自金陵來見自以為精仲景學翁曰仲景之書
收拾於殘篇斷簡之餘然其間或文有不備或意有未盡
或編次之脫落或義例之乖舛吾每觀之不能以無疑因

略摘疑義數條以示羅尚未悟又遇治一疾翁以陰虛發熱而用益陰補血之劑療之不三日而愈羅乃歎曰以某之所見未免作傷寒治今翁治此猶以芎歸之性辛溫而非陰虛者所宜服又况汗下之悞乎翁春秋既高乃詢張翬等所請而著格致餘論局方發揮傷寒辨疑本草衍義補遺外科精要新論諸書學者多誦習而取則焉翁簡慤自良剛嚴介特執心以正立身以誠而孝友之行實本乎天質奉時祀也訂其禮文而敬泣之事母夫人也時其節宜以忠養之寧歎於己而必致豐於兄弟寧薄於己子而必施厚於兄弟之子非其友不友非其道不道好論古今

得失慨然有天下之憂世之名公卿多折節下之翁謂陳治道無所顧已然信語及榮利事則拂衣而起與人交一以三綱五紀為去就嘗曰天下有道則行有枝葉天下無道則辭有枝葉夫行本也辭從而生者也苟見枝葉之辭去本而未是務輒怒溢顏面若將浼焉翁之卓卓如是則鑿又特一事而已然翁講學行事之人方已具吾友宋太史瀛所為翁嘉談茲故不錄而竊錄其鑿之可傳者為翁傳庶使後之君子得以為互考焉

論曰昔漢嚴君平博學無不通賣卜成都人有邪惡非正之間則依著龜為陳其利害與人子言依於孝與人弟言

休於嗚與人臣言依於忠史稱其風聲氣節足以激貪而
厚俗翁在婺得道學之源委而混迹於繁或以鑿來見者
未嘗不以葆精毓神開其心至於一語一默一出處凡
有關於倫理者尤諄諄訓誨使人奮進感慨激厲之不暇
左丘明有云仁人之言其利溥哉信矣若翁者殆古所謂
直諫多聞之益友又可以醫師少之哉

隆慶壬申孟冬吉山東布政使司左布政使施篤臣重梓

布政司照磨劉子厚督刊

醫官時孟陽

陵西生孫學詩



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.