

續發スル者ニシテ左  
室肥大ニ於テハ心  
悸動旺盛シテ大音  
部左上下ニ於テハ  
右室肥大ニ於テハ  
心濁音部右方ニ擴  
大シ殆ント四角形  
ヲ爲ス

### 心悸動症

候  
心悸亢進シテ恰モ  
跳飛スルカ如ク屢  
々々心ノ縮張不整ト  
爲ル其他遠和、恐  
怖、呼吸促進等ノ  
感覺アリ往々強劇  
ノ眩暈ヲ發ス

現症療法ヲ行フ、即チ實菱答利斯、強壯藥ヲ用ツ

○實菱答利斯浸(二、〇)一五〇〇 單舍利別一五、〇

右每二時一食匙

○實菱答利斯丁幾一〇〇〇 右一日三回、二十滴

### ○心悸動 Palpitation.

〔原因〕心臟實質病、貧血、消化不良、萎黃病、比私的里、生殖器ノ諸患及ヒ交接、勤學、喫咽等ノ過度、茶、咖啡ノ多飲、多血質、鬱憂病、精神感動、頸部或ハ胸部ノ神經分佈區域内ニ於ケル腫瘍等ナリ

〔療法〕寒冷法ヲ施シ(屢發作スル時ハ常ニ氷嚢ヲ携帯スルヲ良トス)、氷片ヲ嚙下シ、清涼藥ヲ與ヘ、靜坐スル時ハ、前方ニ屈スル位置ヲ取ラシム

神經強壯藥(纈艸、葛私篤僂謨、定期發作アル時ハ、規尼涅、一日數回三滴)、亞砒酸加留謨液、大量ノ實菱答利斯、麻醉藥(莫兒比涅ノ皮下注射法、抱水格魯刺爾、貌羅謨化加留謨、別刺敦那ノ内服、別刺敦那軟膏(十倍ノモノ)ノ塗布ヲ施シ、貧血ニハ、鉄劑ヲ與フ

○葛私篤僂謨丁幾二、〇 纈艸丁幾一〇、〇 右一日數回、十滴

○鹽酸規尼涅〇、五 右頓服

○亞砒酸加留謨液二十滴 水一〇〇、〇 苦味丁幾三、〇

右一日三回、二日ニ分服ス

○實菱答利斯浸(二、〇)二二〇〇 單舍利別一五、〇 硝

酸加留謨五、〇 右每二時、一食匙

心臟神經痛症候  
夜間卒然甚シキ煩悶ヲ發シ胸廓壓塞セル感アリ兼テ心部ニ劇痛アリ其痛及ス預後多クハ其痛

○鹽酸莫兒比涅〇、一 水一〇〇 右一筒、皮下ニ注射ス

○抱水格魯刺爾二〇 貌羅謨化加留謨六〇 亞拉

○毘亞護謨漿 單舍利別各三〇〇 水一〇〇〇

右一日三回、二日ニ分服ス

○貌羅謨化加留謨八〇 水一五〇〇 單舍利別三〇〇

右每二時、一食匙

○別刺敦那越幾斯〇、二 乳糖一、五 右四包ニ分

チ一日四回、一包

○心臟神經痛 Angina pectoris.

(原因) 神經疾患ノ素因ヲ有スル者、感冒、喫烟過度、瓣膜閉不全、脂肪變質、脈管硬變、其它下腹臟器ノ諸病、弊私的里、痛風

等ノ反應症ト爲リテ來ルヲアリ

(姑息療法) 發作時ニハ、依的兒、嘔囉仿謨、亞硝酸亞密爾ノ吸入、鹽酸莫兒比涅ノ皮下注射、氷囊、誘導藥等ヲ用フ

○依的兒五、〇乃至一〇、〇 右布片ニ蘸シ嗅入ス、但シ半

麻醉ヲ起スヲ度トス

○嘔囉仿謨五、〇 右綿絮ニ浸シテ嗅入ス、但シ半麻

醉ヲ起スヲ以テ度トス

○亞硝酸亞密爾五滴 右嗅入料

○五十倍ノ鹽酸莫兒比涅水 右半筒ヲ、皮下ニ注射ス

全身療法ニハ、鐵、亞鉛、硝酸銀、亞砒酸、貌羅謨化加留謨、規尼涅、痛風藥、痛風ノ條ヲ見ヨ、誘導藥ニハ、沃度丁幾、發泡膏、芥子泥等ヲ施ス

- 酸化亞鉛 非沃斯越幾斯 纈艸越幾斯各二〇
- 蜀葵根末適宜 右四十九ト爲シ、一日三回、一九
- 酸化亞鉛一〇 白糖三〇 右混和十包ニ分チ一日三回、一包宛
- 林檎鐵丁幾二〇〇 右一日三回、二十滴
- 亞砒酸加留謨液五〇 林檎鐵丁幾二〇〇 右一日三回、十五滴
- 硝酸銀〇〇〇五 甘艸羔 甘艸末各適宜 右一九ト爲シ、一日二回、一九
- 貌羅謨化加留謨八〇 水二〇〇〇 苦味丁幾三〇 右每二時、一食匙
- 鹽酸規尼涅〇、五 右頓服(發作ノ定期アルモノ)

動脈瘤症候  
 上行大動脈或ハ大動脈弓ノ動脈瘤ニ  
 於テハ胸廓ノ上部ニ  
 隆起シテ心搏動ヲ呈  
 シ、聽シテ又之ヲ呈  
 シ、觸ルニ硬ク、痛  
 チ、知ス、打診ニ濁  
 音ヲ呈ス、四肢ノ動  
 脈ニ於テモ、同シク  
 打診ニ濁音ヲ呈ス、  
 ハ前ニ於テ、同シク  
 ノハ、上部ニ於テ、  
 痛止ム、全ク不長

感傳電氣(始息療法及ヒ根治法トシテ)及ヒ瓦爾華尼電氣(廣  
 キ接觸面ヲ有スル積極チ、胸骨部ニ置キ、消極ヲ頸椎ノ下部  
 ニ抵ラシムヘシ)ヲ施シ、或ハ交感神經及ヒ迷走神經ニ、瓦爾  
 華尼電氣ヲ傳送ス

○動脈瘤 Aneurysma.

體力ヲ維持シ、多血及ヒ心力増進ヲ防止スヘシ、壓抵法(エス  
 マルヒ氏ノ纏絡法等)醋酸鉛(一日ノ量〇、三乃至〇、五)ノ内服、  
 麥角越幾斯ノ注射ヲ施シ、此際最モ安靜ヲ要シ、食慾ヲ限制  
 ス又麻酔藥、寒冷法、實菱答利斯ハ、動脈系統ノ血壓ヲ亢進セ  
 シムルヲ以テ禁忌スヘシ、電氣分析法ヲ施ス、梅毒ニ基因ス  
 ルトキハ大量ノ沃度化加留謨ヲ投スヘシ

- 麥角越幾斯二〇 酒精 偏里設林各六〇 右

毛細管擴張  
症候  
毛細管擴張シテ大  
小ノ赤色斑チ呈シ  
之ヲ指壓スレハ蒼  
白ト爲ルモ指壓チ  
解ケハ忽チ赤色ト  
爲ル

半筒皮下ニ注射ス

○沃度化加留謨二〇乃至四〇 苦味丁幾四〇 水二〇

○〇〇 右毎二時一食匙

四肢ノ動脈瘤ニハ數時間強迫的ノ屈曲ヲ行フ

○毛細管擴張 Teleangiectasie.

小兒ニハ、小母斑ニイムアブラッテルヲ定置シ、母斑ヲ膿潰セ  
シムルニハ、三倍ノ吐酒石軟膏、或ハ腐蝕性古魯胃謨、或ハ發  
烟硝酸等ヲ撰用ス、或ハ小匣ニ十二箇ノ縫鍼ヲ置キ、其縫鍼  
ノ周圍形ハ、母斑ノ周圍ニ均シカラシメ、巴豆油ヲ以テ鍼尖  
ヲ濕潤シ、以テ皮膚ニ刺入スヘシ、其刺口ハ綿ヲ以テ被包ス、  
然ル時ハ能ク膿潰ヲ起ス者トス、又截除法ヲ行フコアリ、有  
莖腫瘍ニハ、彈力性結紮法、電氣鍼治法等ヲ行フ

○靜脈努張、靜脈腫 Varice. Phlebektasie.

靜脈腫症候  
靜脈ハ擴張シテ延  
展ニ成ルニ至ル  
狀ニ膨脹ス此ノ如  
ク擴張セル靜脈數  
多一局部ニ存在ス  
ルハ廣延性腫瘤  
ヲ生ス

壓抵法(絆瘡膏、糊泥繃帶、結紐脚衣)、脈管ノ減損法(鹽性ノ緩下  
藥等)麥角越幾斯、及ヒ亞爾箇保爾ノ注射等ヲ施ス而シテ此  
症ニハ、各種ノ手術的療法アリト雖モ、多クハ危險ノ症ヲ誘  
起スルノ恐レアルヲ以テ、濫リニ之ヲ行フコ勿レ

○人工加兒爾斯泉鹽一五〇 右毎朝微温湯ニ溶解シ、  
頓服ス

○硫酸麻偏涅叟謨一五〇 右頓服ス

○麥角越幾斯一〇 偏里設林 餹水各五〇 右

半筒皮下ニ注入ス

○バゼドー氏病 Morbus Basedowii.

(療法) 山中或ハ海濱ニ居住セシメ身體及ヒ精神ノ過勞ヲ

バゼドー氏  
病症候  
心悸亢進シ脈搏頻  
數ト爲リ甲状腺腫

起シ其部ヲ診ス  
ルニ脈搏動ヲ顯  
部ノ眼球ヲ突出  
ハシニ眼球ヲ突  
シテ眼球ヲ突出  
ニ至ル預後全ク  
真ナラス

禁シ、滋養性ノ食物ヲ與へ、鐵劑ヲ投シ、頸部ノ交感神經、及ヒ  
甲狀腺ニ、平流電氣ヲ施シ、又規尼涅、貌羅謨化加留謨、沃度劑  
麥角等ヲ用井ルヲアレヒ、其効著シカラス、月經困難ヲ有ス  
ル患者ニハ坐浴若クハ上腿内面ニ乾角ヲ施ス等ニ由テ之  
ヲ整治スヘシ、心悸亢進ニハ氷囊ヲ貼シ、實荳答利斯ヲ與フ、  
グレイフェ氏ハ眼球突出ニハ上眼瞼ニ沃度軟膏或ハ沃度  
丁幾ヲ塗附スルノ法ヲ賞用セリ、眼瞼眼球ヲ覆フ能ハザル  
ニ至レハ一日數回、温湯、温牛乳等ヲ以テ眼球ヲ濕スヘシ  
○硫酸「ヂュボアシ」〇、〇一 苦扁桃水二〇、〇  
右皮下注入用、四分一筒乃至半筒(四分一乃至半「ミリ」瓦  
ヲ與フ  
○ウエルホーフ氏斑點病 Morbus maculosus, Werlhofii.

ウエルホーフ氏斑點病

卒然或ハ食氣缺乏  
嘔吐、胃部壓重、眩  
暈、後熱等ヲ呈ス  
ル後、初メ下肢殊  
ニ下腿伸張面ノ皮  
下ニ腫針頭大ノ出  
血ヲ來シ、其間ニ  
豌豆大ノ者ヲ散發  
ス次テ他ノ諸部ニ  
之ヲ發シ、亦壓々諸  
粘膜ヨリ出血スル  
アリ預後通常長

(將息) 外傷、心悸亢進及ヒ血壓増進等ヲ防クヘシ  
(本病主治) ニハ、鐵酸、規那、硫酸ヲ配伍ス、過格魯兒化鐵液、麥角  
越幾斯、鉛糖、輕易ノ瀉下藥等ヲ與フ(峻下藥ハ之ヲ禁ス)、頑固  
ノ症ニ於テハ全身ノ皮膚ニ感傳電氣ヲ施スヲ可トス  
○稀硫酸 二五、〇 右每二時十滴宛、糖水ニ和シテ用ウ  
○規那煎 一〇、〇(一五、〇) 單舍利別 三〇、〇 稀硫酸  
五、〇 右每二時、一食匙  
○過格魯兒化鐵液 一〇、〇 右每二時乃至三時、二滴乃  
至五滴ヲ粘漿液ニ和シテ用ウ  
○麥角越幾斯 二〇 水 二〇、〇 單舍利別 二〇、〇  
右每二時一小兒匙  
○鉛糖 〇、〇五 白糖 〇、五 右一包ト爲シ、一日四回、

一包

○複方大黃越幾斯 Q、五

右一丸ト爲シ、頓服ス

〔現症療法〕 衄血ニハ、冷水ヲ鼻中ニ灌注シ、或ハ「タンボン」ヲ鼻中ニ挿入ス、胃出血ニハ、氷片ヲ與ヘ、胃部ニ氷囊ヲ貼ス、血尿ニハ、大量ノ鞣酸ヲ投ス、此際善ク身體ヲ安靜ニスヘシ、虛脫ノ徴アル者ニハ、興奮藥ヲ與フ

○鞣酸二、五

水一五〇〇

橙皮舍利別二五、〇

右

每三時、一食匙

失荷兒陪克及ヒ水腫ハ、全身病ノ部ヲ參考スヘシ

### 第四篇

## 神經系統諸病

### 第一節 腦及腦膜ノ諸病

#### ○腦貧血

Anaemie des Gehirns.

急性症ニ於テハ、初  
メ、恐怖、耳鳴、下  
花、惡心、乾嘔、等  
肢、軟弱ノ感覺等ヲ  
起シ、次テ、顔面蒼  
白、冷汗、此諸症ニ  
卒倒ス但シ此諸症  
ハ大抵速カニ消退  
ス、慢性症ニ於テハ  
心神不安、恐怖、ハ  
抱シ、能ク睡テ來シ  
動モス、眩暈、卒倒  
ス

〔原因〕 殊ニ全身ノ急性貧血、出血、生力沉衰(反應性ノ脈管麻痺、殊ニ内臟神經叢麻痺ノ續發症トノ、腸間膜脈管ニ血液ノ積聚)、心力衰弱、精神感動、飢勞、慢性下利(小兒ニハ頭水病)等ナリ

〔療法〕 全身貧血ニ基因スル者ハ、強壯藥(鐵劑、肝油等)ヲ與ヘ、麻拉利亞ニ由テ發スル者ハ、規尼涅、撒里矢爾酸那篤留謨ヲ投ス、乳兒ニ在テハ乳汁ニ注意スヘシ(若シ母乳不良ナルキハ、乳母ヲ要スヘシ)

起立ノ際ニ發スル卒倒症ニ於テハ直チニ水平ノ位置ヲ取ラシメ、冷水ヲ顔面ニ噴射シ、若シハ嗅引藥(安母尼亞水、醋酸等)ヲ嗅引セシム、或ハ興奮藥(安母尼亞劑、樟腦、酒類)ヲ與フ、飢

勞ヨリ來ル謔語ニハ、阿片ヲ與フ

○鹽酸規尼涅〇、五 右一日一回宛(數日間與フ)

○阿片〇、〇三 白糖一、五 右三包ニ分チ、一日三回、

一包宛

○舟暈

腦貧血ニシテ、迷走神經ノ分佈セル境

域ニ於テ其作用ノ變調ヲ起スモノ

Morbus nauticus.

〔預防〕甲板ノ中央ニ靜居シ、時トシテハ平臥ス、又閉目シテ

反對ナル運動ヲ想像スヘシ、乗船スル前ニ、滋養物ヲ喫シ、後

ニハ、少量ノ食物ヲ頻回ニ分食スヘシ、一盞ノ「シャンパン」酒、芳

香性ノ苦味藥等ヲ用ウ

○芳香丁幾六、〇 橙皮舍利別一五、〇 水一八〇、〇

右每二時、一食匙

舟暈症候  
胃部ニ種不快ノ  
感アリ、惡心、嘔  
吐、頭痛、眩暈等ヲ  
發シ、身體倦怠、些  
少ノ隨意運動ヲモ  
爲スニ難ク、食氣  
缺如シ、嘔氣ヲ食  
クモ忽チ嘔氣ヲ能  
クモ忽チ嘔氣ヲ能  
クモ忽チ嘔氣ヲ能  
クモ忽チ嘔氣ヲ能

惡心及ヒ嘔吐ヲ減少スルニハ、結麗阿曹篤、枸櫞汁、炭酸、呀囉  
仿謨(一回ニ五滴ヲ取リ、數回之ヲ與フ)抱水格魯刺爾、大量ノ  
規尼涅、亞硝酸亞密爾ノ吸入、胃部ニ誘導藥、頰部及ヒ頂部ノ  
寒捲、與奮性ノ嗅入藥、鹽酸莫兒比涅ノ皮下注射等ヲ施シ又  
大便ノ通利ヲ促スヘシ

○結麗阿曹篤二、五 醋酸依的兒五、〇 桂皮丁幾二、〇、

右每二時、五滴宛

○炭酸加榴謨四、〇 枸櫞汁適宜 水一五〇、〇 橙

皮舍利別三〇、〇 右每時、一食匙

○沸騰散 右一小兒匙ヲ取リ、水ニ和シ用ウ

○抱水格魯刺爾一、〇 亞拉昆亞謨漿 單舍利別

各二〇、〇 右二回ニ分服ス

腦充血症候  
實性充血ニ於テハ  
顔面灼熱、眼結膜  
潮紅、眩暈、頭痛、  
耳鳴、眼花、心悸亢  
進等ヲ發シ興奮性  
シト爲リ不眠ヲ來タ  
シ往々アリ虚言  
ヲ起スヲハ頭部  
充血ニ於テハ頭部  
壓重、耳鳴、眼花  
倦怠、嗜眠等ヲ發  
シ精神的操作ヲ嫌  
忌シ、皮膚青色ヲ  
呈ス

- 硫酸規尼涅一〇 右二回ニ分服ス
- 亞硝酸亞密爾 右二三滴ヲ取り、嗅入料トス
- 五十倍ノ鹽酸莫兒比涅水 右半筒、皮下ニ注射ス

○腦充血 Hyperaemie des Gehirns.

〔原因〕 實性ニ屬スル者ハ、酒精飲料ノ過用、藥品ノ誤用、心臟肥大、精神過勞、胃腑變常、月經閉止、及ヒ時トシテハ痔血ノ自歇、又多血家等ニシテ、虚性ニ屬スル者ハ、血液循環ノ障害、咽頭狹窄、咳嗽、腹部努力等ナリ

〔療法〕 一般及ヒ局部ノ放血ヲ行ヒ、氷嚢ヲ頭部ニ施シ瀉下藥、誘導藥、清涼藥等ヲ與フ(蟻針ヲ陰部及ヒ肛圍ニ施スコアリ)心病或ハ肺患ヨリ續發スル、虚性腦充血ニハ、實斐答利斯ヲ投ス、其他強壯藥ヲ與フ

日射病症候  
酷烈ノ炎熱ニ由テ  
劇シキ腦充血ヲ起  
シ卒倒スル症ヲ  
云フ

○日射病 Insolatio.

〔療法〕 患者ヲ、涼陰或ハ爽涼ナル室内ヘ移シ、先ツ少許ノ清

- 水蛭二十條 左右耳後ニ貼ス
- 甘汞 蒔刺巴各〇、五 右頓服
- 巴豆油一滴 白糖一、五 右三包ニ分チ、毎三時一包ヲ與ヘ、快通ヲ得ルヲ以テ、后服ヲ止ム
- 人工加兒爾斯泉鹽一五、〇 右毎朝、微温湯ニ溶解シ、頓服
- 芥子末六〇、〇乃至一〇〇、〇 右一回ノ脚浴量トス
- 鹽酸里母奈埵二〇〇、〇 右毎二時、一食匙
- 實斐答利斯浸(二〇)二〇〇、〇 單舍利別一五、〇 右毎二時、一食匙



水ヲ與へ、漸々其量ヲ増加ス、一時間毎トニ冷水ヲ頭部ニ灌  
漑シ且ツ水囊ヲ施シ、又水蛭ヲ耳後ニ貼シ(刺絡ハ禁スヘシ)、  
芥子泥、甘汞及ヒ蒺刺巴等ヲ與へ、清涼藥ヲ投ス

- 甘汞 蒺刺巴各〇.三 右頓服
- 鹽酸里母奈垚二〇〇.〇 右每二時、一食匙

○腦出血 Haemorrhagia intracerebralis et meningialis.

初メ腰々腦充血ノ  
症ハ俄然人事不省  
ト爲リ瞳孔ハ左右  
ト爲リ縮小ハ反  
散大シテ呼吸往々  
不整ニシテ呼吸帶  
死スル稀ニハ直ニ  
死スル稀ニハ直ニ  
醒大抵精神徐々ニ  
不遂ナシ己ニ半身  
不明或ハ呈シ言身  
其ス或ハ呈シ言身  
預後概語メテ來不

〔出血ノ療法〕腦充血ノ徵候著明ニシテ、橈骨動脈ノ緊張平  
常ナル時へ、少量ノ刺絡ヲ行フ、頭部ヲ高舉シ、芥子泥ヲ四肢  
ニ施シ、水囊ヲ頭上ニ置キ、最モ身體ヲ安靜ニスヘシ  
呼吸斷續シ、心力微弱ナルトハ、興奮藥ヲ與フ(即チ皮膚ヲ刺  
銜シ、麝香、安母尼亞劑、酒類等ヲ與へ、依的兒及ヒ樟腦ノ皮下  
注射、刺戟性ノ浣腸ヲ施スヘシ)

反應期(熱發、頭痛、腦炎)ニ於テハ、寒冷法ヲ施シ、劇症ニハ、水蛭  
瀉下藥、抱水格魯刺爾、阿片劑等ヲ用ウ

第二週ニ至レハ、沃度化加留謨、沃度化鐵ヲ用フ血液ノ吸收  
ヲ促スヘシ

半身不遂ニハ、數月ヲ經過スル後、電氣療法、微温浴等ヲ施用  
シ、硝酸斯篤里幾尼涅(一日一回〇.〇〇五)ノ皮下注射ヲ行フ

- 蘆薈越幾斯 複方大黃越幾斯各三.〇 甘艸羔
- 甘艸末各適宜 右三十九ト爲シ朝夕二九ヲ與フ
- 大黃浸(一〇.〇)HOC.〇 單舍利別一五.〇 右一日  
四回一食匙宛
- 抱水格魯刺爾一.〇 亞拉昆亞護謨漿 單舍利別  
各一五.〇 右頓服

急性單腦膜炎及流行性腦脊髓膜炎

急性單腦膜炎ニ於テハ惡寒次テ發熱、頭痛、嘔吐、便秘、知覺過敏等ヲ起シ、全身強直、言語、播瀉、全身強直、蓋明アリ音響ヲ厭シ、次テ無欲、嗜眠、昏睡ニ陥ル、脈博ハ初メ頻數、後チ緩徐ト爲ル、類於テハ卒然惡寒發熱シ、劇頭痛、嘔吐、便秘、頸部強直、脊

- 挖物兒氏散 〇、五 右頓服
- 沃度化加留謨 三、〇 水 二〇〇、〇 單舍利別 一五、〇 右一日四回一食匙宛
- 沃度化鐵丸 右一日數回一丸ヲ與フ

急性單純腦膜炎及流行性腦脊髓膜炎

Meningitis simplex. Meningitis cerebrospinalis epidemica.

〔療法〕 初起ニハ、蟻針ヲ乳頭突起ニ、吸角ヲ頂部ニ、水囊ヲ剃髮セル頭部ニ施ス、又頭部ニ沃度丁幾ヲ塗布ス、軀幹若クハ四肢ニ、水銀軟膏ヲ塗擦シ、發泡膏ヲ耳後ニ貼スルコトアリ、動物ノ腸管中ニ水片ヲ入レ、或ハ布片ニ水ヲ被包シテ、脊椎ノ縱線ニ沿テ安排シ、又水銀軟膏、發泡膏ヲ貼ス

峻下藥ヲ投シ、高熱ニハ、鹽酸規尼涅、撒里矢爾酸那篤留謨ヲ

部疼痛、脊強直、皮膚及ヒ筋知覺過敏ニ呈シ、腰々皮疹ヲ發ス、預後多クハ不良

與ヘ經久ノ精神激動及ヒ疼痛ノ爲メニ、消炎法ヲ施スモ、其効ヲ奏セサルキハ、阿片、鹽酸莫兒比涅ノ皮下注射(〇、〇一)、抱水格魯刺爾、貌羅謨化加留謨等ヲ與ヘ、心力沉衰ニハ、興奮藥(樟腦、葡萄酒、麝香、依的兒等)ヲ投シ、尿閉ヲ起ス者ハ、導尿管ノ插入ヲ要ス、后期ニ至テハ沃度化加留謨、溫浴ヲ用キ、又麻痺ニハ按摩及ヒ電氣ヲ稱用ス

- 甘汞 蒞刺巴各〇、五 右頓服
- 蘆薈越幾斯 蒞刺巴石礮各〇、〇五 右一九ト爲シ、三丸ヲ頓服ス
- 水銀軟膏 一五、〇 右頸部ノ塗擦料トス
- 鹽酸規尼涅 〇、五 右頓服
- 撒里矢爾酸那篤留謨 三、〇 右頓服



同上

○抱水格魯刺爾〇、一 亞拉昆亞護謨漿 單舍利別

各一〇、〇 右頓服ス(用量同上)

○抱水格魯刺爾〇、二 亞拉昆亞護謨漿三〇、〇 右

浣腸料(用量同上)

○先天腦水腫 Hydrocephalus congenitus.

先天腦水腫 症候 其確微ハ頭蓋増大シテ往々二倍乃至三倍ニ達シ顙門瀾大シ諸縫合哆開シ前額及ヒ顙部ハ隆起ス頭蓋骨變薄ス顔面ハ狭小ナリ而シテ精神ノ發育減退ス預後不良

〔療法〕 解凝劑沃度化加留謨、甘汞、醋酸加留謨等ヲ試用シ沃度丁幾、水銀軟膏ヲ塗布ス稀ニハ穿刺術ニ由テ水液ヲ排除スルコトアリ(絆創膏ノ繙片ヲ貼用シテ壓縮法ヲ行フコトアリ)

第二節 脊髓及脊髓膜諸病

○脊髓病ノ一般療法

〔甲〕 外用物

寒冷療法ニハ、寒濕壓抵法、氷囊、或ハ氷片ヲ動物ノ腸管ニ盛リ、脊椎ノ縱線ニ沿テ之ヲ安排ス、同時ニ局處放血法ヲ施スヘシ(急性炎ノ初起、充血、滲出、疼痛及ヒ痙攣、腹部充血及ヒ盲痔ニハ蟻針ヲ肛圍ニ施ス)

溫暖療法ハ、慢性炎ノ作用ヲ奮起シ、及ヒ慢性ノ滲出物ヲ吸収スルノ効アリ、殊ニ温度ニ因テ其効ヲ奏スルハ、浴治法トス、弱キ温泉(弱性)ノ溫暖浴、亞爾加里泉、硫黃浴、蒸氣浴、熱砂浴ハ温度ノ亢進スルニ從テ、興奮ノ作用ヲ助ケ温度ノ減少スルニ從テ、鎮靜ノ効能アリ、此浴法ハ重病ノ後ニ發スル、脊髓ノ衰憊、多淫、脊髓知覺過敏(中等ノ溫浴)、振盪ノ爲メニ發スル截癱(高度ノ溫浴)、脊髓炎、及ヒ脊髓軟化(低下ノ温度ヲ有スル溫泉)、滲出性ノ薄膜炎(稍溫暖ナル溫泉)、卒中(中等ノ溫浴)等ニ

對シテ撰用スル者トス

鹽浴ハ其中ニ含有スル鹽類ノ刺戟作用アルヲ以テ、稍、低溫ノ者ヲ施用スルヲ可トス、其効ノ著明ナルハ瓦斯ニ富メル鹽浴ナリ、此鹽浴ハ身體ノ榮養及ヒ各器官ノ機能ヲ増進シ、病的滲出物ヲ吸収スルノ効力アリ、殊ニ薄膜炎ニ續發スル麻痺、脊髓炎、小兒脊髓麻痺、脊髓勞、脊髓知覺過敏、脊髓衰弱等ニ應用ノ

炭酸ヲ含有スル鐵泉ハ、知覺不敏性及ヒ貧血性ノ人ニシテ官能變調ヲ有スルヲ著ルシキ者ニ用ウ

泥炭浴及ヒ泥浴ハ恰モ溫泉ノ如ク、大ニ鎮靜ノ効アリ、主トシテ脊髓知覺過敏、疼痛性脊髓勞、脊髓炎ニ續發スル硬直性截癱、脊髓側索硬結、脊髓ノ壓迫等ニ用ウ

冷水治法ハ、患者ノ衰弱甚シカラサル者ニ施ス、其用法ニ數般アリ、刺戟性ノ衰弱、實性及ヒ虛性ノ充血(實性ニハ刺戟性ノ浴法ヲ用ウ)、脊髓勞及ヒ慢性ノ脊髓炎等ヲ以テ其主治トス

海水浴ハ、甚クシキ刺戟性ヲ有シ、且ツ導熱ノ効アリ、故ニ輕症ノ脊髓勞、脊髓衰弱症、及ヒ之ニ類似セル諸症ニシテ未ダ衰憊ヲ見サル者ニ適當セリ

(電氣療法) 脊髓ニ瓦爾華尼電氣ヲ施ス、脊髓ノ縱線ニ發スル脊髓病ニハ、兩極ヲ脊椎骨ニ置キ、多少局發スル者ニハ、一極ハ體軀ノ前面ニ置クヘシ、刺戟性ノ症候ヲ呈シ、新鮮ナル實性症ヲ現ハスルハ、消極ヲ患部ニ置ク與奮ノ甚カラサル人ニシテ、知覺不敏及ヒ慢性ノ疾患、脊髓萎縮及ヒ脊髓硬結

アル者ニハ積極ヲ取用ス、多クハ電流ヲ上向セシム、脊髓ハ  
交感神経ニ瓦爾華尼電氣ヲ送ルニ由テ(消極ヲ項部ニ積極  
ヲ下顎角ニ置ク)間接ニ其作用ヲ受ケ、又皮膚ノ知覺神經ニ  
感傳電氣ヲ施スニ由テ、反射的ニ其作用ヲ受クル者ナリ(中  
樞ノ病因ヨリ來ラスシテ、只麻痺症ノミチ療スルノ法ハ、神  
經痛ヲ見ヨ)

〔誘導藥〕 炎症及ヒ滲出物、充血及ヒ刺戟症ヲ誘導スルニハ  
甚タ大ナル芥子泥、灼艾及ヒ烙鐵、沃度丁幾、鞣酸、鉛軟膏、補助  
藥トシテ刺戟性、芳香酒精性及ヒ麻醉性ノ摩擦法等ヲ脊椎  
及ヒ麻痺セル四肢ニ行フ

〔乙〕内服藥

番木鱉、古紐謨<sup>失</sup>鳩<sup>答</sup>(運動神經ノ外又直接ニ脊髓ノ反射性

感覺過敏ヲ減少ス)、クラーレ<sup>レ</sup>ハ、其効用古紐謨ニ同シ、加刺拔  
兒豆ハ、強直及ヒ番木鱉中毒、反射硬直等ニ與フ、麥角越幾斯  
ハ、實性充血及刺戟ノ症候ヲ有スル慢性炎ニ續發スル截癱  
ニ用ウ、別刺敦那ハ、其効用麥角ニ類似ス(脈管口径ヲ狹窄シ  
且ツ運動及ヒ知覺神經及ヒ筋ノ興奮ヲ減少ス)、硝酸銀ハ癩  
癩及ヒ脊髓勞ニ用キ、沃度化加留謨ハ慢性期ノ滲出性薄腦  
膜炎、癩麻質斯性脊髓炎、新生物、硬結及ヒ梅毒等ニ與フ、燐ハ  
汞毒ノ瘰癧、偏癱、癩麻質斯性ノ麻痺、脊髓勞及ヒ硫化炭素ノ  
中毒等ニ取用ス、貌羅謨化加留謨ハ反射性知覺過敏、反射性  
ノ勁直疼痛、遠心性神經痛、淫慾興起、不眠ニ用キ、砒石ハ震顛  
性不遂、規尼涅ハ脊髓神經衰弱、遠心性ノ神經痛及ヒ麻拉利  
亞ニ因スル脊髓病等ニ用ウ



○沃度化加留謨二〇 水二〇〇〇 苦味丁幾三〇

右每二時、一食匙

○硝酸斯篤里幾尼涅〇、一 水二〇〇 右一日一回

一筒ヲ注射ス

○亞砒酸加留謨液二十滴 水一〇〇〇 苦味丁幾三〇

右一日三回、二日ニ分服ス

○磷素〇、〇〇三 右一九ト爲シ、一日一二九宛

膀胱炎及ヒ痔瘡ヲ預防スヘシ

○脊髓勞 Tabes dorsalis.

初起ハ大抵下肢ニ  
掣電狀ノ神經痛、  
チ強シ又蟻行狀感  
覺、帶狀感覺、視力  
障害等ヲ呈ス而シテ  
後チ下肢軟弱ノ感  
覺アリ行歩踉蹌ト爲  
ルハ身軀動搖シテ

鹽温泉浴(大概一週間ニ三回ナリ、其温度ハ中等ナルヲ要ス、  
長浴スルコト勿レ)、水治法(二十五度乃至十五度ノ温ヲ有スル  
濕性摩擦法)、半身浴(三十度乃至二十二度)ヲ施シ、背部ニ灌水

卒倒ス行歩ハ難行  
狀ヲ爲ス筋力ハ初  
メ後ニハ漸ク  
顯著ト爲リ筋力及  
ヒ直腸麻痺、膀胱  
等ヲ來タス預後不  
良

スヘシ 弱キ瓦爾華尼電氣ヲ用井、其電流ヲ間斷スルコトナク、徐々ニ  
電極ヲ移轉スヘシ、其時間ハ、三乃至四分時ヲ以テ足レリト

内服ニハ、硝酸銀、麥角越幾斯、貌羅謨化加留謨、沃度化加留謨  
等ヲ與ヘ、其他強壯藥ヲ施ス可シ、視力障害ニハ硝酸斯篤里  
幾尼涅〇、〇〇五ヲ隔日ニ(顳額部ニ)注入ス、梅毒ニ基因スル  
者ニハ驅梅毒療法ヲ施スヘシ

○硝酸銀〇、〇一 右一九ト爲シ、二日三回、一丸

○麥角越幾斯〇、〇五 右一九ト爲シ、一日三回乃至六

回一丸ヲ與フ

○貌羅謨化加留謨六〇 水一八〇〇 單舍利別一五〇





内服藥ニハ硝酸銀、麥角越幾斯、沃度化加留謨其用法ハ脊髓  
勞ノ條下ヲ見ヨ等ヲ應用ス

吐涎過多ナル者ニハ、硫酸亞篤魯必涅ヲ與フ、後ニ胃脘消息  
子ヲ用キ、滋養物ヲ送入シ、或ハ滋養浣腸ヲ施ス

○硫酸亞篤魯必涅 〇、〇〇〇五 右一九ト爲シ、一日一  
丸乃至二丸ヲ與フ

### 第三節 神經諸病

#### ○神經炎 Neuritis

〔原因〕 創傷、異物、感冒、近接セル器官炎、新生物、急性ノ傳染病、  
天刑病、梅毒等ナリ

〔原因療法〕 急性性症ニハ、消炎法、麻醉藥ヲ與ヘ、身體ヲ安靜ニ  
ス、慢性性症ニハ誘導藥所患ノ神經上ニハ、直チニ之ヲ施ス勿レ、

神經痛症候  
一神經幹ノ行路ニ  
沿テ其末梢ニ向ヒ  
卒然劇痛ノ發作ヲ  
起シ他ノ神經ニ波  
及ス隨テ知覺過敏  
ト爲リ震顫、抽搐、  
運動困難ヲ來タス  
而シテ所謂痛點ヲ  
沿テ所謂痛點ヲ存  
スル者ナリ

瓦爾華尼電氣等ヲ用ウ、其他高度ノ温ヲ有スル温泉、泥炭浴  
及ヒ鹽浴、強劇ノ寒水治法ヲ行フ

#### ○頭痛 Cephalgia. Cephalaea.

〔原因〕 腦充血、本條ヲ參考スヘシ、或ハ腦炎、胃腸停滯、頭蓋ノ  
新生物或ハ其疾患、梅毒、癩麻質斯、額竇ノ加答兒、眼病、及ヒ耳  
病、比私的里、萎黃病、貧血病、刺戟性虛弱、尿毒症、放線性疼痛(齒  
痛、腸蟲等ナリ)

〔療法〕 氷囊ヲ頭部、及ヒ項部ニ施シ、額竇痛ニハ、蟻鉞ヲ鼻壁  
ニ施シ、安靜ヲ要シ、新鮮ナル空氣ヲ吸入ス

依的兒ノ内服、或ハ噴水瓶ヲ用キテ依的兒ノ噴霧ヲ局處ニ  
施ス、咖啡涅ニ嘔囉仿謨ヲ配合セシ者、阿魏、メグリン氏丸、脈  
管神經性頭痛ニハ、毎夕規尼涅ニ〇、〇五ノ實斐答利斯ヲ配

伍シテ與フ、鬱血症ニハ貌羅謨化加留謨、又誘導藥(例之ハ廣大ナル芥子泥ヲ背部ニ貼ス)、安母尼亞水(嗅入藥)、塗擦法トシテ、額部及ヒ項部ニ、一分ノ薄荷油ニ二乃至十分ノ酒精、噶囉仿謨或ハ油ヲ配伍セシ者、十倍ノ物拉篤里涅軟膏(神經痛性ノ疼痛)ヲ用キ、感傳電氣ヲ施ス(弱キ電流ヲ用ニ、濕潤セル手ヲ以テ電極トス、其時間ハ二乃至五分時ナリ)

○依的兒一〇〇 右一日三回、十五滴宛、粘漿液ニ和シテ用ウ  
○咖啡涅〇、六 ヲ取り、豫シメ蒸留水ニ〇 ヲ混和セル酒精七、五ノ中ニ微熱ヲ加ヘテ溶解シ、其冷却セル後、之ニ噶囉仿謨七、五ヲ加ヘ密栓セル硝子瓶ニ入レ、黒紙ヲ包纏シ與フ 右一日數回、十五乃至二十滴ヲ服ス

偏頭痛症候  
大抵頭及ヒ額面上  
部ノ偏側ニ限局ス  
ル疼痛ヲ起シ  
四方ニ波及ス患部  
ノ皮膚蒼白脈冷シ  
或ハ赤色灼熱ス涙

○阿魏一〇〇 茴香油六〇 酒精適宜 右百丸  
ト爲シ、一日三回二丸乃至十丸  
○酸化亞鉛 非沃斯越幾斯 纈艸越幾斯各二〇  
蜀葵根末適宜 右四十九ト爲シ、一日二三回、一丸  
(メグリン氏丸)  
○鹽酸規尼涅〇、五 實菱答利斯葉末〇、〇五  
右毎夕、頓服  
○貌羅謨化加留謨八、〇 苦味丁幾三、〇 水二〇〇〇  
右毎三時、一食匙  
○偏頭痛 Hemicrania. Migraine.  
體質ノ變常ヲ治療シ、鹽浴、海水浴、寒水治法等ヲ命シ、山嶺ノ空氣ヲ呼吸セシム

液唾液ノ分泌増加  
シ眼々嘔吐ヲ發シ  
光線及ヒ音響ノ感  
覺過敏ト爲ル預後  
多クハ其

發作時ニハ、暗室ニ靜居シ、氷嚢ヲ貼シ、咖啡涅、抱水格魯刺爾  
等ヲ與フ

○抱水格魯刺爾一〇、亞拉昆亞護謨漿、單舍利別

各一〇〇、右頓服

○咖啡涅〇〇五、白糖〇五、右一包ト爲シ、發作中

數回、一包ヲ服ス

痙攣性偏頭痛(發作中ハ、脈管口徑狹窄シ、瞳子擴張ス)ニハ亞  
硝酸亞密爾ノ嗅入ヲ命ス

○亞硝酸亞密爾二三滴、右嗅入料トス

麻痺性偏頭痛(脈管口徑擴張ス)ニハ、麥角越幾斯ヲ皮下注射  
或ハ内服(一日一〇ニ至ル)セシム、交感神經ニ瓦爾華尼電氣  
ヲ傳送ス(消極ハ胸鎖乳頭筋ノ内緣ニ置キ、積極ハ第一胸椎

骨ニ置ク)

○麥角越幾斯一〇、偏里設林、水各六〇、右一

筒、皮下ニ注射ス

○麥角越幾斯一〇、右二十九ト爲シ、一日十回、一丸

乃至二丸

其他原因療法、及ヒ姑息療法トシテ、左ノ諸藥ヲ試用スヘシ、  
規尼涅(〇、五乃至一、二ヲ、一回或ハ二三回、發作前或ハ發作中  
ニ與フ)貌羅謨化加留謨、亞砒酸、二〇ノ撒里矢爾酸那篤留謨  
(發作ノ初起ニ與フ)

○貌羅謨化加留謨八〇、水二〇〇〇、單舍利別一五〇

右每二時、一食匙

○亞砒酸加留謨液十二滴、水飴一〇〇〇

右混和、一



癆、動脈瘤、感冒(僕麻質斯)、麻拉利亞、痛風、梅毒、窒扶斯、鉛、銅、水銀等ノ中毒、及ヒ鼻粘膜ノ加答兒(三叉神經)、盲痔、便秘、蜜尿(膀胱痛風)等ナリ

[本病主治及ヒ現症療法] 生活ノ方法ヲ均整シ、坐骨神經痛ニハ、彈力牀ニ平臥セシム

電氣療法ハ、其神經ニ電流ノ到達スルヲ得ヘキ位置ノ末梢神經痛ニハ、感傳電氣ヲ施シ、其它中樞及ヒ深部ニ位スル神經痛(脊髓、腦及ヒ本幹神經痛)ニハ、瓦爾華尼電氣(積極ヲ神經ノ直上ニ、消極ヲ他ノ局處ニ置ク)ヲ施ス

寒冷法ニハ、氷片、依的兒ノ噴霧、點滴法、海水浴、寒水治法、炭酸(局處ニ取用ス)等ヲ用ウ

單純温泉、蒸氣浴及ヒ熱性空氣浴ヲ施シ、其它温砂浴(坐骨神

經痛)ヲ久用ス

神經性膀胱痛ニハ、重力牽離法、神經截斷、神經ノ牽引法等ヲ用ユルコアリ

麻醉藥ニハ、鹽酸莫兒比涅ノ皮下注射、或ハ亞篤魯必涅、貌羅謨化加留謨、抱水格魯刺爾ヲ内服セシメ、勿刺篤里涅、アコニナシ、呀囉仿謨ヲ皮部ニ取用ス

○鹽酸莫兒比涅、一 韶水一〇〇、右一筒、皮下ニ注射ス

○硫酸亞篤魯必涅〇〇〇五 甘艸羔 甘艸末各適宜

○右十九ト爲シ、一日一九乃至三九ヲ與フ

○貌羅謨化加留謨六〇 沃度化加留謨二〇 水二〇

○〇〇 苦味丁幾三〇 右每二時、一食匙

○ 勿刺篤里涅一〇〇 豚脂四〇〇 右軟膏ト爲シ、患部ニ塗擦ス

○ 勿刺篤里涅〇・五 嚼囉仿謨一〇・〇 酒精五〇・〇

右患部ニ塗布ス

○ アコニチン一〇・二 右適宜ノ酒精ニ溶解シ、之ニ官粉軟膏一〇・〇ヲ加フ 右患部ニ塗擦ス

○ 嚼囉仿謨 別刺敦那越幾斯 樟腦各一・〇 非沃斯油五〇・〇 右一日數回、患部ニ塗布ス

誘導藥(就中羯答利斯)ハ殊ニウツレー氏ノ稱贊スル所ナリ(又沃度丁幾ノ塗布)

○ 羯答利斯軟膏 適宜ノ大サ 右患部ニ貼ス

神經藥ニハ、亞砒酸、亞鉛、磷、鐵、規尼涅ニ少量ノ鹽酸莫兒比涅

ヲ配伍セシ者、斯篤里幾尼涅、沃度化加留謨、的列並底油、纈州葛私篤、樓謨ヲ用キ、三又神經痛ニハ、ゲルセミウム丁幾(每半時二十滴ヲ用ウ)ヲ可トス

○ 亞砒酸加留謨液五〇 林檎鐵丁幾二〇・〇

右一日三回、十五滴

○ 酸化亞鉛 曼陀羅華越幾斯 阿片越幾斯各一・〇

右六十九ト爲シ、一日數回、一丸

○ 磷素〇・〇〇一 右一丸ト爲シ、一日三回、一丸

○ 鹽酸規尼涅〇・五 鹽酸莫兒比涅〇・〇〇五 右一日一回、頓服

○ 硝酸斯篤里幾尼涅〇・〇五 稀酒精二五・〇 右一日二回、二十滴宛、而シテ漸次其量ヲ增加シ、五十滴ニ至

○沃度化加留謨 二〇〇 水 二〇〇〇 苦味丁 幾三〇

右每二時一食匙

○的列並底油 二〇乃至五〇 雞子黃 一箇 右一日三

次服用

○纈艸根浸(一〇〇)二〇〇〇 芳香丁 幾六〇 橙皮舍

利別 二〇〇 右每二時一食匙

○纈艸根末 一〇 葛私篤 幾二〇 右六包ヲ作

リ、一日三回、一宛

○痙攣、搐搦、運動過度 Spasmi. Convulsiones. Hy-

perkinesen.

〔原因〕 感冒、勞力過度、機械的、神經刺戟、貧血、充血、及ヒ神經中

樞ノ炎症、高熱、血液中毒物ノ存在(急性發疹、尿毒症、膽汁血病、金屬中毒、狂犬毒、斯篤里幾尼涅ナリ、反應症トノ生齒期、腸蟲、食物停滯、婦人生殖器病等ニ發ス其他比私的里、佝僂病等是レナリ

麻醉藥ハ、殊ニ鹽酸莫兒比涅ノ皮下注射若クハ筋間注射、或ハ亞篤魯必涅、抱水格魯刺爾、嗎囉仿謨、貌羅謨化加留謨、亞硝酸亞密爾ヲ用ウ

○鹽酸莫兒比涅 〇、一 餉水 一〇〇 右一筒、皮下ニ

注射ス

○硫酸亞篤魯必涅 〇、〇〇〇五 右一九ト爲シ一日一九

乃至二九

○抱水格魯刺爾 二、五 亞拉昆亞護謨漿 單舍利別



各三〇〇 右一日數回、一食匙

○ 嘔囉仿謨一〇 依的兒製纈艸丁幾一〇〇 右每

半時、十滴乃至二十滴ヲ與フ 水二〇〇〇 單舍利別一五〇

○ 貌羅謨化加留謨八〇 右每二時、一食匙

○ 亞硝酸亞密爾 右二三滴ヲ取リ、嗅入ス

神經藥ハ、殆ント之ニ應用ス可カラサル者ナシ 誘導法トシテハ、温浴ヲ施シ、浴中頭上ニ冷水ヲ灌漑スヘシ、慢性ノ搖蕩ニハ、烙鏡ヲ用ルアリ

電氣療法ニハ、下行電流ヲ神經或ハ筋上ニ施シ、或ハ電流ノ方位ヲ交換シ、或ハ積極ヲ持續シテ施用ス

○ 破傷風及牙關緊急 Tetanus und Trismus.

破傷風及牙關緊急症候 初メ咀嚼筋及ヒ項筋緊張シテテ直性痙攣ヲ發ス重症ニ於テハ全身ノ諸筋ニ之ヲ來タシ後弓反張、前弓反張、側弓反張等ヲ呈ス其痙攣ハ發作性ニ發作シ、輕微ノ動搖ニ由テ忽チ劇烈ニシテ、死ニ至ルノ際、或ハ死後トス預後大抵不長

創傷及ヒ神經ノ刺衝ヲ除キ、神經截斷法ヲ行ヒ、掟酸莫兒比涅ヲ局處ニ用キ、病室ヲ靜肅ニシ、諸般ノ刺戟ヲ防止ス

○ 掟酸莫兒比涅〇、二 筒宛、皮下ニ注射ス 右半筒乃至一

筒宛、皮下ニ注射ス 熱ノ高昇セル時ニハ、徐々ニ寒冷ト爲ス所ノ全身浴ヲ施シ、

動物ノ腸管ニ氷片ヲ入レ、脊髓ノ縱線ニ沿テ之ヲ貼シ、身體ニ寒濕纏絡法ヲ行フ、痙麻質斯性破傷風ニハ、發汗藥ヲ與フ

○ 掟酸必魯加兒必涅〇、二 乳糖〇、五 右頓服

○ 撒里矢爾酸那篤留謨三〇 右頓服

體力ヲ養成スルヲ勉メ、嚥下ノ困難ナル者ハ、滋養浣腸ヲ施

シテ、其營養ヲ維持ス

麻醉藥ニハ、抱水格魯刺爾、掟酸莫兒比涅、貌羅謨化加留謨、矢

毒、加刺拔兒豆、亞硝酸亞密爾、阿片等ヲ用ツ

○抱水格魯刺爾一〇、〇 水一五〇、〇 亞拉昆亞護謨

漿 單舍利別各三〇、〇 右每二時一食匙之ニ

○鹽酸莫兒比涅ヲ配伍スルヲアリ

○貌羅護化加留謨二〇、〇 單舍利別一五、〇 水一八〇、〇

右每二時一食匙

○矢毒〇、一 水一〇、〇 右半筒、皮下ニ注射ス

○加刺拔兒豆越幾斯〇、〇 乳糖〇、五 右一包ト

爲シ一日三回一包宛

○撒里矢爾酸比蘇斯知偏密涅〇、〇一乃至〇、〇三 水一〇、〇

右一筒、皮下ニ注射ス

○阿片〇、〇五 白糖〇、五 右十包ヲ作り、每二時一

包ヲ與フ

○亞硝酸亞密爾 右五滴ヲ取り、吸入ス

小兒急癇 *Eklampsia infantum.*

(原因療法) 生齒期、腦充血、熱病、食物刺戟、竄入セル外物、蛔蟲、

消化不良、乳母ノ精神感動等ヲ療スベシ

齒ノ刺戟ニハ、齒齦ヲ截開シ、或ハ嚼囉仿謨ヲ、齒齦ニ塗擦シ、

冷水ヲ灌漑シ、食物停滯ニハ、催吐藥、甘汞、昏睡ニハ、寒水灌漑

法、生力沉衰ニハ、興奮藥ヲ與フ、神經藥ノ浣腸(阿魏、瀨艸)ヲ施

シ内服ニハ、抱水格魯刺爾、瀨艸酸亞鉛、貌羅護化加留謨、沃度

化加留謨ヲ與フ

○硫酸銅〇、五 餽水五〇、〇 單舍利別二五、〇

右每十分時、一小兒匙ヲ與ヘ、吐ヲ得ルヲ以テ度トス

小兒急癇症候  
初メ不安ト爲リ、唇  
々々泣キ、夜間驚悸シ、  
食氣缺乏ス、或ハ卒  
然急變作テ來タ  
ス、其狀全ク癲癇  
作ニ異ナルヲナキ  
モ一回之ヲ發スレ  
ハ類回反復スル者  
ナリ、預後危險ニ屬

○硫酸銅〇、一、白糖、澱粉各〇、三、右五包ヲ作  
 リ每十分、一包ヲ與ヘ、吐ヲ得ルヲ度トス  
 ○甘汞〇、〇〇五乃至〇、〇三 乳糖〇、五 右一包ト爲  
 毎四時、一包ヲ與ヘ、數回ノ快通ヲ得ルヲ度トス  
 ○阿魏〇、五 右乳劑ト爲シ一二〇、〇ノ液ヲ作り、洗  
 腸トス  
 ○瀧腸料 右瀧腸料  
 ○瀧草酸亞鉛〇、二乃至〇、三 白糖五、〇 右十包ニ分  
 十毎二時一包ヲ與フ  
 ○抱水格魯刺爾〇、二乃至〇、六 亞拉昆亞護謨漿 單  
 舍利別各二、〇〇 右每三時一茶匙 入  
 ○貌羅謨化加留謨二、〇 水二二〇、〇 單舍利別一五、〇

妊婦急癇症候  
 妊婦中殊ニ分娩ノ  
 直前若クハ其際ニ  
 發スル急癇ニ其  
 發作ノ狀ハ小兒ノ  
 急癇發作ニ同シ預  
 後危險

右每二時、一小兒匙  
 ○沃度化加留謨一、〇 蒸餾水八〇、〇 桑實舍利別  
 二、〇〇 右混和毎一時一小兒匙  
 四歳以下ノ小兒ニハ、〇、〇〇〇一ノ硫酸亞篤魯魯必混テ、皮下  
 ニ注射シ、最モ幼穉ナル乳兒ニハ、結膜ニ點滴法ヲ行フヲ以  
 テ足レリトス、發作ノ初期ニハ、嘔囉仿謨ノ吸入法ヲ施ス  
 アリ

○妊婦急癇 尿毒症ノ條ヲ参考スヘシ *Eklampsia parturientium.*  
 (第一ノ療法) 抱水格魯刺爾ノ内服又ハ瀧腸、或ハ鹽酸莫兒  
 比涅ノ皮下注射、嘔囉仿謨ノ吸入法(昏睡ヲ起スヲ以テ度ト  
 シ、其間ニ産婦ヲシテ、分娩ヲ得セシム)、其它亞硝酸亞密爾ノ  
 吸入法、貌羅謨化加留謨ノ内服等ヲ撰用シ、水囊ヲ頭部ニ貼

ス  
 ○抱水格魯刺爾五、〇 水五〇、〇 單舍利別三〇、〇  
 右每一二時、一食匙但シ昏睡ヲ起スヲ度トス  
 ○抱水格魯刺爾二、〇 水二〇〇、〇 右混和浣腸料  
 ○搥酸莫兒比涅〇、〇五 水五、〇 右一筒宛、皮下ニ  
 注射ス  
 ○亞硝酸亞密爾三滴 右嗅入料トス  
 ○貌羅謨化加留謨一〇、〇 苦味丁幾三、〇 水一八〇、〇  
 右每二時、一食匙  
 [第二ノ療法] 分娩ヲ催進シ、刺絡法、又ハ蟻鍼ヲ施シ、芥子泥  
 ナ項部ニ貼ス  
 尿毒ノ之レカ原因ト爲リテ、稍、慢性症ニ陥ル者ハ、温浴ヲ施

往々一種ノ前兆チ  
 呈シ或ハ卒然人事  
 不省ト爲リ昏倒ス  
 大テ全身ノ強直性  
 痙攣ヲ發シ口唇緊  
 閉シ瞳孔散大シ光  
 線ニ反應セズ暫ク  
 シテ反拗性痙攣ト  
 爲リ口内ヨリ泡沫  
 ナク噴出シ内指リ  
 ナス此發作大抵一  
 時乃至十分ニ分  
 寛解シ然レニ預後  
 其初メテ醒スル後

癲癇 Epilepsie

シ、發汗藥ヲ與フ  
 ○搥酸必魯加兒必涅〇、〇二 白糖〇、五 右一日一  
 回、一包ヲ與フ  
 其原因中、最モ注目スヘキハ末梢的ノ神經刺衝(例之ハ瘡癩、  
 腫瘍、異物、頭蓋諸病、内臓ノ病的變質、飲酒過度、鉛毒、佝僂病、腺  
 病、梅毒、貧血、多血、手淫等)ナリ  
 新起ノ病ニハ、艾艸根、纈艸根、酸化亞鉛、硫酸亞篤魯必涅(皮下  
 注射ニハ、〇、〇〇一ヲ、初メニハ一回、後ニハ二回)ヲ與フ  
 ○纈草根末 艾艸根末各一、〇 右十二包ヲ作り、每  
 四時、一包ヲ與フ  
 ○酸化亞鉛五、〇 別刺敦那越幾斯二、〇 纈草越幾

○斯五、〇 額草根末適宜 右百九ト爲シ、一日二回、

二九

○酸化亞鉛三、〇 白糖四、〇 桂皮末一、〇 右二

十包ニ分テ、毎食後一時ヲ隔テ、一包ヲ與フ(小兒ニハ酸

化亞鉛一、〇ニ減スヘシ) 水二〇、〇 右一

○硫酸亞篤魯必涅〇、〇三乃至〇、〇五 水二〇、〇 右一

○多少經久性ノ者ニハ、硝酸銀、亞砒酸(一日五乃至十滴ノ亞砒

酸加留謨液)、碲銅礬、著明ニ刻期性ナル者ハ、規尼涅、梅毒ニハ、

沃度、近時最モ醫家ノ賞用スル主藥ハ、貌羅謨化加留謨、其前

徵ヲ呈スルキハ亞硝酸亞密爾ノ嗅入法ヲ可トス 右一

○硝酸銀一、〇 白礬土一〇、〇 偏里設林適宜

右百九ト爲シ、一日二回、一九、但シ漸次其量ヲ増加シ、一

日ノ量終ニ〇、二ニ至ル 水一八〇、〇 右一

○碲銅礬一、五 右二回、五滴 水二五、〇 右一

○鹽酸規尼涅〇、五 右願服 水一八〇、〇 右一

○沃度化加留謨二、〇 單舍利別一五、〇 右一

○右每二時、一食匙 水一八〇、〇 單舍利別一五、〇 右一

○貌羅謨化加留謨八、〇 水一八〇、〇 單舍利別一五、〇 右一

○右每二時、一食匙 七日間毎ニ、其量ヲ増加シテ、一日ノ量

一五、〇ニ至ル)

創痕切開、神經截斷、神經展延法等ヲ行フ 食糧ヲ減シ、  
平常大便ヲ秘結セシメサルニ注意ス、一定ノ方法ニ從テ、寒  
水浴法ヲ行フ

興奮性ノ飲食品ヲ限制シ、植物性ノ食品、及ヒ牛乳ヲ與ヘ、其起臥安靜ナルヲ要ス、其發作ヲ防禦セント欲スルコハ、少量ノ食鹽ヲ前徵期ニ與

○舞踏病

Chorea

其病因中、殊ニ注目スヘキハ卑濕ナル住屋、腸蟲、手淫、貧血、月經ノ初期、痲瘋質斯等ナリ、其經過、女子ニ在テハ、平均四十日男子ニ在テハ、平均七十乃至八十日ナリ、亞砒酸(一日三回、小兒ニハ五乃至八滴、大人ニハ八乃至十滴ノ亞砒酸加留謨液)大量ノ亞鉛劑、貌羅謨化加留謨、撒里矢爾酸比蘇斯知偏密涅(皮下注射)、鐵、アロピラミーン(一日大約一、〇ヲ用ウ)、斯篤里幾尼涅、確銅礬等ノ内服ヲ處方シ、重症ニハ、

舞踏病症候  
初メ顔面ノ筋手  
指等ニ搐搦ヲ發シ  
次テ手ハ斷ヘス内  
轉外轉ノ運動ヲ爲  
シ後ニハ諸隨意筋  
ノ搐搦ヲ初メ次第  
アル運動ヲ爲スナ  
得ス故ニ飲食、談  
話、書寫、歩行等ヲ  
預爲スルヲ能ハス  
預後長

抱水格魯刺爾ノ催眠量ヲ與フ(時トノハ、晝間ニモ與フ)、且ツ寬

ク副木ニ結紮ス

○酸化亞鉛一〇

白糖五〇

右十包ニ分チ、一日五

回、一包

○癩草酸亞鉛

亞拉昆亞謨適宜

右百九ト爲シ、一日三回、二三九

○貌羅謨化加留謨八〇

水一八〇〇

單舍利別一五〇

右每二時、一食匙

○撒里矢爾酸比蘇斯知偏密涅〇〇〇六

水四〇

右一筒、皮下ニ注射ス

○アロピラミトシ一〇

蒸餾水一五〇〇

別一五〇



○貌羅謨化樟腦〇、一 白糖〇、五 右一包ト爲

日四回一包

〔現症療法〕痙攣症ヲ發スルキハ、麻醉藥ヲ與フ之ヲ應用スルニハ、非常ノ注意ヲ要ス、是レ比私的里家ハ、其藥効ニ感受スルノ性、頗ル尋常ニ異ナルカ故ナリ、麻痺症ヲ起ス者ハ、電氣療法ヲ施ス

○貌羅謨化加留謨八〇、水一八〇、〇 單舍利別一五〇

右一時乃至二時、一食匙

○鹽酸莫兒比涅〇、〇五 水五〇、〇 右一筒、皮下ニ注射ス

○依的兒五〇、〇 硫酸莫兒比涅〇、〇六 苦扁桃水一〇、〇

橙皮水三〇、〇 右每半時、一茶匙(痙攣發作ノ緩解ス

アルヲ以テ度トス)

○依的兒製纈草丁幾六〇 舍電華謨阿片液三〇

○加拿陀葛私篤僕謨丁幾五〇 右一日三回、十五滴

乃至三十滴

○酒客譫妄 Delirium tremens.

多量ノ阿片、實菱答利斯、吐酒石等ヲ處方ス

○阿片〇、一 白糖〇、五 右頓服

○實菱答利斯浸(二、〇)一〇〇、〇 單舍利別一五〇

右每一時、一食匙

○實菱答利斯浸(二、〇)一〇〇、〇 阿片丁幾二、五 單舍利別一五〇

右每一時、一食匙

○吐酒石〇、三 水一〇〇、〇 右同上

酒客譫妄症  
睡眠全ク欠乏シ、手  
指顫振シ、斷ヘス、嘔  
語、殊ニ、驚吏ニ、追  
從セラル、或ハ、如キ  
妄想ヲ有シ、或ハ、鼠  
ノ天井ニ遊走スル  
ハ、酒客ニ於テ、外傷  
ヲ受ケ、或ハ、卒然食  
餌ヲ斷止スル等、食  
來ル預後不具



○吐酒石〇、二五 阿片丁幾五、〇 樟腦合劑一〇〇、〇

右每二時、一食匙

抱水格魯刺爾之ニ搥酸莫兒比涅ヲ伍用スルキハ其効最モ著ルシヲ酒ニ和シテ内服ス、貌羅謨化加留謨一、七五ヲ同量ノ實菱答利斯丁幾ニ伍シ、毎二時ニ與フ、寒水灌溉法ヲ施シ手枷ヲ施スヲ禁ス、亞爾箇保爾劑ハ熱アルノ際ニモ、全ク謝絶ス可カラズ

○抱水格魯刺爾二、〇 搥酸莫兒比涅〇、〇一 亞拉

毘亞護謨漿 單舍利別各一五、〇 右頓服

○抱水格魯刺爾二、〇 水 橙皮舍利別各一五、〇 五兩

右頓服

第五篇

泌尿器諸病

第一章 腎臟及腎盂諸病

○急性腎臟實質炎 Nephritis parenchymatosa acuta.

急性腎臟實質炎症候  
初メ腰々戰慄シ次  
テ体温昇騰シ惡心  
嘔吐、食氣缺乏、腎  
部疼痛等ヲ起シ而  
シテ尿量減少シ含  
尿ハ蛋白質ヲ含ミ  
其量大ニ減少シ間  
々尿閉スルヲアリ  
其量增加ス顯微  
鏡下ニ則柱、血球、  
膿球、上皮等ヲ見  
ル尿色ハ暗褐色時  
トシテ稀赤色ヲ呈  
ス預後多クハ長

〔原因〕特異ノ血液刺戟急性發疹病、殊ニ猩紅熱、實扶的里、再歸熱、丹毒、癰疽、及ヒ扶列屈沒涅等ナリ、感冒、火傷、痲瘋質斯、蜂窠織化膿、虎列刺、妊娠等ナリ、又往々疥癬ニ續發スルヲアリ  
〔療法〕蓐中ニ靜臥セシメ、消化器官ノ景況ニ從テ適宜ノ滋養物ヲ與フ(咖啡、茶等ヲ禁シ之ニ反シテ特ニ牛乳ヲ賞用ス)  
水腫ニハ、定期的ノ發汗法ヲ以テ久性ノ溫浴ハ、攝氏三十八度ヲ加シ漸次攝氏四十二度ニ達セシム、爾後毛布ヲ被シ中ニ在ナラシム、有害尿成分ノ貯蓄ヲ爲スカ故ニ之ヲ濃稠即チ溫浴ニ入ラシメ、爾後毛布ノ被衾中ニ於テ發汗セシム、或ハ(高

熱ノ時只濕布纏絡法ヲ持長セシム  
 耶僕蘭日葉或ハ必魯加兒必涅、醋酸加留謨ノ内服ヲ處方ス  
 ○耶僕蘭日葉三〇 右沸湯五〇〇ニ浸出濾過シテ  
 頓服ス、但シ一日一回  
 ○鹽酸必魯加兒必涅〇〇二ニ白糖〇五 右一包ト  
 爲シ、一日一回一包ヲ與フ  
 ○醋酸加留謨八〇 硝酸加留謨六〇 水二〇〇〇  
 苦味丁幾三〇 右每二時、一食匙  
 ○吐松實浸(二〇〇)二〇〇〇 醋酸加留謨八〇 苦味  
 丁幾四〇 右混和每二時、一食匙  
 便秘ニハ峻下劑ヲ與フ、熱發ニハ規尼涅、脈搏微細ナル者ハ  
 實芟答利斯、又恢復期ニ於テ貧血ノ稽留スルキハ強壯藥、鐵

慢性腎臟實質炎(腫脹腎)  
 初起多クハ徐々ニ  
 ノ皮下腫ヲ發シ  
 其甚キニ至テハ下  
 肢、陰囊等ノ皮膚  
 破裂スルアリ又  
 腹水稀ニ胸水等ヲ

劑、規那ヲ與フ  
 ○古魯聖篤越幾斯〇八 蘆薈三〇 大黃末二〇  
 右四十五丸ト爲シ、一日四九乃至六丸 一日三回一食  
 ○旃那葉浸(一五〇)一五〇〇 茴香五〇 單舍利別一  
 五〇 右每二時、一食匙  
 ○鹽酸規尼涅〇五 右オブラートニ包ミ、頓服ス  
 ○實芟答利斯浸(二〇)二〇〇〇 醋酸加留謨六〇 單  
 舍利別一五〇 右每二時、一食匙  
 ○慢性腎臟實質炎(腫脹腎) Nephritis parenchy-  
 matosa chronica.  
 (原因) 經久性化膿(骨病、梅毒、勞瘵)、濕氣及ヒ寒冷ノ持續性侵  
 襲、泥沼毒、稀ニハ猩紅熱、妊娠、感冒等ヨリ發スル急性症ヨリ

來タス尿量減少シ  
テ蛋白質ヲ含ミ其  
色濁シ褐色ヲ呈  
シ異増進ス顯微  
鏡下ニ則テ血球  
上皮、往々血球ヲ  
見ル而シテ急性症ト  
異ナル所ハ急性症  
ハ急劇ニ發起シ血  
球ヲ尿中ニ含ム  
多ク而シテ水腫ハ慢  
性症ニ比スレハ僅  
少ナリ預後大抵不

來ル  
〔療法〕 定規的ノ發汗法若クハ必魯加兒必涅、耶僕蘭日ノ内  
服前章ヲ參考スヘシ、利尿藥ニハ醋酸加留謨ヲ用キ、其他沃  
度化加留謨、的列並底油等ヲ投ス、食慾減損ニハ、鹽酸、百弗聖  
ヲ與ヘ、麻拉利亞ニ基因スル者ハ鐵、規尼涅ヲ投ス

- 醋酸加留謨 一〇〇
- 水 二〇〇
- 沃度化加留謨 二〇乃至三〇
- 的列並底油 八滴
- 百弗聖 三〇
- 稀鹽酸 一、五
- 水 二〇〇
- 單舍利別 二〇〇
- 苦味丁 幾四〇
- 水 二〇
- 右每二時、一食匙
- 右一膠囊ト爲シ、一日三回、一囊
- 單舍利

別 二〇〇 右每二時、一食匙

慢性腎臟組織間炎 (萎縮腎) Nephritis Interstitialis

〔原因〕 關節炎及ヒ鉛中毒(關節痠麻質斯、淋病、硝酸銀ノ連用  
等モ亦之カ原因トナルコトアリ)等ナリ

〔療法〕 其起臥ヲシテ安靜ナラシメ、勞動、酒精ノ飲料、茶等ヲ  
禁ス、之ニ反シテ肉類、牛乳、卵、菜蔬類ヲ與フ、毛製ノ襯衣、温浴  
ヲ命ス

- 沃度化加留謨 三〇乃至四〇
- 水 二〇〇
- 單舍利別
- 右每二時、一食匙

慢性腎臟組織  
間炎(萎縮腎)症候  
此病ニ於テハ尿量  
大ニ増加シ異重  
少シ而シテ尿中  
白質ヲ含ムモ其  
少ナシ顯微鏡下  
圓柱、上皮、膿球  
見ル水腫ハ僅微  
ハ缺如ス其他往々  
亢進、眩暈等ヲ強  
シ又口渴、食氣缺  
乏、消化不具、惡心  
ヲ來タシ身體羸瘦  
シ腰々視力ヲ障害  
ス預後多クハ不具

對症療法トシテ、刺絡、實菱答利斯、麻醉藥、鐵劑、刺戟劑等ヲ應  
用ス

○實菱答利斯浸(二〇)一五〇〇 硝酸加留謨六〇

單舍利別三〇〇 右每二時一食匙(心力ノ衰弱)

○鹽酸莫兒比涅〇〇一 白糖〇五 右一包ト爲シ、

臨臥頓服(不眠症)

○抱水格魯刺爾一〇 亞拉昆亞護謨漿 單舍利別

各一〇〇 右用法同上

嘔吐ニハ、沃度丁幾、極酸攝留謨、結麗阿曹篤等ヲ與フ

○沃度丁幾二〇〇 右一日數回、二三滴宛

○極酸攝留謨〇一二 白糖二〇 右四包ニ分テ、一

日四回、一包

○結麗阿曹篤四滴 橙皮水六〇〇 單舍利別一〇〇

右每二時一茶匙

○尿毒症 Uraemia. 單舍利別

水囊ヲ頭部ニ置キ、刺絡(二〇〇〇乃至三〇〇〇)ヲ施シ、又小

兒ニハ、頭部ニ蟻鍼ヲ貼ス、峻下藥、抱水格魯刺爾、鹽酸莫兒比

涅等ヲ與ヘ、發作間ニハ、溫浴ヲ取ラシメ、以テ尿ノ分泌ヲ催

進ス、又多量ニ水液ヲ引飲セシムヘシ

○旃那浸(一五〇)一五〇〇 硫酸那篤留謨 單舍利別

各一五〇 右混和每二時一食匙

○安息香酸〇五 樟腦〇〇三 白糖〇三 右一

包ト爲シ、每二時一包ヲ與フ

○抱水格魯刺爾二〇 亞拉昆亞護謨漿 單舍利別

尿毒症候  
急性ニ於テハ、劇  
痛及ヒ嘔吐ヲ發  
シ、昏睡ニ陥リ、  
反復スル嘔吐、  
作テハ、精神無  
於テハ、精神無  
嗜眠、身體弛緩  
固シ、呼吸困難  
ヲ發シ、嘔吐、  
陷ル往々死前ニ  
豫後不長





硝子蓋ノ水ニ溶解シ用ウ  
 ○炭酸加留謨四〇 薄荷水一五〇〇 橙皮舍利別五〇〇  
 ○〇〇 右毎二時、一食匙  
 ○炭酸那篤留謨〇・六 炭酸利丟謨〇・二五 炭酸水一〇〇〇  
 右一日數回ニ分服ス  
 磷酸安母尼亞麻偏涅矢亞、磷酸石灰、炭酸石灰等ヨリ成ル所ノ尿石ニハ、那篤倫ヲ含有セサル單純ノ炭酸水、植物酸、乳酸等ヲ與フ  
 ○枸橼酸五〇 水二五〇〇 橙皮舍利別五〇〇  
 右一日數回、二日ニ分服ス  
 ○酒石酸四〇 單舍利別三〇〇 水二〇〇〇  
 毎一二時、一食匙

腎痛症候  
 其候ハ卒然腎部  
 シニ勝烈ノ疼痛ヲ發  
 テ波及シ斷ヘス尿  
 意ヲ催ス屢々虛脱  
 症ヲ起シ或ハ瀉瀉  
 倒テハ多クハ長

○乳酸五〇 水二〇〇〇 單舍利別三〇〇 右毎二時、一食匙  
 「チヌチン」及ヒ碳酸石灰ヨリ成ル者ハ、攝生のノ全身療法ヲ施ス、即チ適當ノ生活法及ヒ運動ヲ行ヒ、多量ニ水液ヲ飲マシム(温湯「セルタルス」水)  
 碳酸石灰ノ溶解藥タル者ハ、酸性磷酸那篤留謨ナリ  
 腎痛ヲ起スルハ、麻醉藥ヲ與フ(卷末麻醉藥處方ノ章ヲ見ヨ)  
 ○腎痛 Colica renalis  
 腎臟部位ニ瀉血ヲ施シ、鹽酸莫兒比涅ヲ皮下ニ注射シ、阿片ヲ内服シ、抱水格魯刺爾、麻醉性琶布、嘔囉仿謨ノ吸入、持久ノ温浴等ヲ用ウ

其確微ハ尿中ニ血  
液ヲ混スル者ニシ  
血液少ナル者ハ  
尿ハ淡紅色ヲ呈シ  
其量多ナルハ赤  
色若クハ暗赤色ト  
爲ル而シテ尿中  
ニ固形物ヲ見シ  
ト相視シテ尿中  
ニ固形物ニ疼痛  
異常感覺ヲ來タス  
預後原因病ニ關ス

腎臟性血尿

其確微ハ尿中ニ血  
液ヲ混スル者ニシ  
血液少ナル者ハ  
尿ハ淡紅色ヲ呈シ  
其量多ナルハ赤  
色若クハ暗赤色ト  
爲ル而シテ尿中  
ニ固形物ヲ見シ  
ト相視シテ尿中  
ニ固形物ニ疼痛  
異常感覺ヲ來タス  
預後原因病ニ關ス

○ 鹽酸莫兒比涅 〇、一 水五、〇 右半筒乃至一筒

宛皮下ニ注射ス

○ 阿片 〇、〇三乃至〇、〇六 白糖 〇、五 右十包ヲ作り 每時一包(但シ痲痛ノ緩快スルヲ度トス)

○ 抱水格魯刺爾 六、〇 單舍利別 亞拉昆亞護謨漿 各五、〇、〇 右每二時、一食匙(右同上)

○ 腎臟性血尿 Haematuria renalis.

(原因) 充血ニ基因ス。血管ノ破裂(急性傳染病、間歇熱ノ惡寒期、出血素質、刺戟性利尿劑、心臟及ヒ肺病)ニ因スル鬱血、外傷、結石、癌等ナリ

腎臟部位ニ、氷ヲ貼シ、寒坐浴、寒冷灌腸法、誘導法ヲ施シ、鞣酸ニ醋酸鉛ヲ伍スル者、明礬、麥角越幾斯、過格魯兒化鐵液等ヲ

其確微ハ尿中ニ血  
液ヲ混スル者ニシ  
血液少ナル者ハ  
尿ハ淡紅色ヲ呈シ  
其量多ナルハ赤  
色若クハ暗赤色ト  
爲ル而シテ尿中  
ニ固形物ヲ見シ  
ト相視シテ尿中  
ニ固形物ニ疼痛  
異常感覺ヲ來タス  
預後原因病ニ關ス

與フ

○ 鞣酸 〇、〇六 醋酸鉛 〇、〇三 白糖 〇、五 右六包 三十ヲ作り、每二時、一包

○ 明礬 澱粉各〇、三 白糖 〇、五 右六包ヲ作り 每二時、一包

○ 麥角越幾斯 一、〇 鞣酸 二、〇 水 二〇〇、〇 單舍利別 三、〇、〇 右每時、一食匙

○ 麥角越幾斯 一、〇 阿片 〇、一 白糖 二、〇 右混

安和、五包ニ分チ、一日四回一包宛

○ 過格魯兒化鐵液 二、〇 桂皮水 二〇〇、〇 桂皮舍利別 二、〇、〇 右混和、每二時一食匙ヲ服ス

第二節 膀胱諸病



急性膀胱加答兒症候

往々惡寒戰慄ヲ以テ起リ体温昇騰ス而シテ膀胱部ニ壓痛、陰囊等ニ波及シ尿意頻數ニシテ尿道、陰囊等ニ波及ス尿意頻數ニシテ尿道、陰囊等ニ波及ス尿意頻數ニシテ尿道、陰囊等ニ波及ス

急性膀胱加答兒 Cystitis acuta.

原因 外傷、羯答利斯中毒、尿液積滯、感冒、酸酵不全ノ新釀麥酒、隣接諸部ノ炎症、淋疾等ナリ  
安靜ノ起臥、及ヒ嚴正ノ攝生法ヲ要シ(多量ノ食鹽、香味料等ヲ禁ス)、粘漿性煎劑、牛乳等ヲ與フ  
○ 蜀葵根煎(一〇、〇)一五〇、〇 單舍利別三〇、〇 右每二時、一食匙  
○ 沙列布煎(二、五)一五〇、〇 橙皮舍利別三〇、〇 右三十條ノ水蛭ヲ會陰部ニ貼ス、婦人ニハ陰唇ニ貼ス  
溫濯法、持久性ノ溫浴、阿片、古加乙涅、攪酸莫兒比涅(每三時〇、〇〇五)、別刺敦那、大麻、レソルチン等ヲ與フ

- 攪酸莫兒比涅 〇、〇二 白糖 二、〇 右四包ニ分チ 每三時、一包
- 別刺敦那越幾斯 〇、二 白糖 二、〇 右四包ニ分チ、一日四回、一包
- 印度大麻越幾斯 非沃斯越幾斯各〇、三 白糖 五、〇 右混和、十包ニ分チ、每三時一包
- 印度大麻丁幾 一〇、〇 右一日三回、十五滴
- 阿片丁幾 一、〇 水 一〇〇、〇 右洗腸料
- 阿片越幾斯 〇、〇三 柯々阿脂 二、〇 右坐藥トス
- 攪酸莫兒比涅 〇、〇五 柯々阿脂 適宜 右混和三箇ノ坐藥ト爲ス
- 攪酸古加乙涅 〇、一 柯々阿脂 適宜 右混和三箇

慢性膀胱加答兒症候

○乃至五箇ノ坐薬ト爲ス  
 ○挖沕兒氏散〇三 右一日三回、一包  
 ○レソルチン<sup>1</sup>、〇 水一五〇〇 橙皮舍利別三〇〇  
 右毎二時、一食匙  
 終期ニハ、鞣酸ヲ内服セシメ、ガムベシユ木ニ、〇チ一日ノ量トシテ與フ、導尿子(弾力性ノ者)ハ、只、必要ノ際ニ於テノミ應用ス可シ  
 ○鞣酸<sup>1</sup>、二 白糖五〇 右十包ニ分チ、毎二時一包宛  
 外方ニ、膿瘍ヲ形成スルキ(膀胱實質炎、膀胱外圍炎)ハ、注意シテ之ヲ切開スヘシ  
 ○慢性膀胱加答兒 Cystitis chronica.

諸症狀急性性症ニ比  
 スレハ輕微ナリ尿  
 ノ變化モ急性性症  
 如クナレモ其亞爾  
 加里性反應ヲ呈ス  
 加リ却テ多シトス  
 往々膀胱基シトス  
 張スルヲアリ預後  
 住ナルラス

〔原因〕 淋疾、腎孟炎、結石、痛風、痔疾、洩尿不全、尿道狹窄、攝護腺腫起、痿痺等ナリ  
 咖啡茶、酒、炭酸、脂肪性食物、不消化ノ菜蔬等ヲ禁忌ス、輕易ノ赤葡萄酒、牛乳等ハ妨ケナシ  
 初起ニハ、温坐浴ヲ行ハシメ、漸次寒冷坐浴ニ變移ス、亞爾加里泉ハ、尿ノ酸性反應ヲ呈スル間ノミ之ヲ用ウ、即チ石灰水、重炭酸那篤留謨等ヲ與フ、其尿亞爾加里性ナル者ニハ、之ニ反シテ、酸性飲料、磷酸、安息香酸等ヲ用ウヘシ、收斂薬ニハ鞣酸、烏華烏爾矢、骨湃波拔爾撒謨、的列並底油、レソルチン(急性症ヲ見ヨ)、撒里矢爾酸等ヲ應用ス

○鞣酸〇、二 白糖〇、五 右十包ヲ作り、毎二時一包宛

○烏華烏爾矢煎(一五〇)一五〇〇 單舍利別二〇〇  
 ○別刺敦那越幾斯〇二 右每二時、一食匙  
 ○骨湃波拔爾撒謨 的列並底油各二〇 煖性麻偏  
 涅矢亞適宜 右三十九ト爲シ、桂皮末ヲ衣トシ、一日  
 三回、三丸乃至五丸ヲ與フ  
 ○三百倍ノ撒矢里爾酸水五〇〇〇乃至一〇〇〇〇 右一日  
 數回ニ分服ス  
 全身變調ニハ、緩性鐵劑、規那酒等ヲ與フ  
 膀胱ヨリノ排洩ヲ充分ナラシメントチ要スヘシ、膀胱弛緩  
 スル者ハ、麥角越幾斯ヲ皮下注射劑ト爲シ、只必要ノ時及ヒ  
 持久性ノ症ニハ温湯、后チニ鞣酸(百倍)、明礬(二百倍)、皓礬(二百  
 倍)等ノ溶液ヲ以テ、膀胱内ヲ洗滌スヘシ、之ヲ行フニハヘガ

膀胱結石症

屢々利尿ノ際、卒然  
 尿ノ往々膀胱内ニ  
 ス物ノ時々尿ニ血液  
 ア混ス其確微ハ消  
 息子ヲ用非膀胱内  
 ニ於テ結石ヲ觸知  
 スル是レナリ

膀胱痙攣症

會陰部ニ發作性劇  
 痛ヲ起シ尿道ニ波  
 及ス其尿ノ排急迫  
 スル如シカハ或ハ  
 唯ク淋瀝スルノミ  
 ノ多量ノ尿ヲ排瀝  
 スルヲアリ

ル氏漏斗裝置ヲ「カテーテル」ニ附着シ、徐々ニ、藥液ヲ流入セ  
 シム、カテーテルヲ用ユルノ際、必ス防  
 腐法ヲ行フヲ忽ニスルヲ勿レ

○麥角越幾斯一〇 酒精 偏里設林各六〇 右  
 半筒乃至一筒ヲ注射ス

○膀胱結石 Cystolithiasis 本症ニ

腎結石ノ條ヲ參考ス可シ、小結石ハ、適當ノ注射法ニ由テ溶  
 解スルヲ得ヘシ、其稍、大ナル者ニ至テハ、碎石術又ハ截石  
 術ヲ要ス

○膀胱痙攣(痙攣性遺尿、痙攣性利尿困難) Cysto-  
 spasmus (Enuresis spastica. Dysuria spastica).

(原因) 膀胱病患、直腸、子宮ノ諸病、婦人生殖器官、骨髓及ヒ腦  
 ノ諸患、比私的里、精神病、感冒、多房等ナリ

全身浴湯、及ヒ温坐浴、温罨法、末期ニハ、寒冷浴ヲ命シ、阿片、別刺敦那ノ浣腸ヲ施ス

○阿片丁幾一〇、水一五〇〇、右灌腸料

○別刺敦那越幾斯〇、一、加密爾列浸二二〇〇、右

同上

麻醉藥ヲ内服、皮下注射、坐藥又ハ、臆球子ト爲シテ與ヘ、麻酔性蠟、ブーシーナ、毎日三三分時間、挿入放置スヘシ

○鹽酸莫兒比涅〇〇六、苦扁桃水七〇、額艸丁幾

三〇、右每十五分時、六滴乃至十滴ヲ與ヘ、痙攣發

作ノ消散スルヲ以テ、後服ヲ止ム、白糖二〇、右四包ニ分

○別刺敦那越幾斯〇、二、白糖二〇、右四包ニ分

五チ、一日四回ニ分服ス

膀胱麻痺症候

○貌羅謨化加留謨八〇、水一八〇〇、單舍利別一五〇

右每二時、一食匙、日三回、一火

○石松子七五、水一八〇〇、阿片丁幾二〇、單舍

利別一五〇、右每二時、一食匙、正午

○鹽酸莫兒比涅〇〇五、水五〇、右一筒皮下ニ注

射ス

○別刺敦那越幾斯〇、一、柯々阿脂二〇、右坐藥或

ハ、臆球子トス

○阿片越幾斯〇、一五、柯々阿脂二〇、右同上

攝生法ハ、膀胱加答兒ニ同シ、又規那、鐵劑ヲ與フ

○膀胱麻痺(膀胱壓出筋及ヒ括約筋ノ麻痺)Cys-

toplegia (Paralysis vesicae).

膀胱壓出筋ノ麻痺  
ニ於テ尿チ壓出  
スル勢力チ缺カ  
故ニ膀胱内ニ尿  
積チ生シテ膀胱  
大ニ擴張ス膀胱  
括約筋ノ麻痺ニ  
テハ尿ハ斷ヘス  
下ス預後原因ニ  
關ス

〔原因〕 神經中樞ノ疾患、比私的里性痿痹、窒扶斯、過度ノ膀胱擴張、膀胱疾患、老衰、多房等ナリ  
導尿子ヲ挿入シ、冷水注射法、寒冷灌腸、安母尼亞加樟腦擦劑、電氣療法等ヲ命シ、番木鱉或ハ麥角越幾斯ノ皮下注射ヲ施ス可シ

○樟腦一〇 阿列布油三〇〇 安母尼亞水八〇

右外用

○番木鱉越幾斯〇、一 羯答利斯丁幾一〇 葛蒲根

丁幾四〇 右一日三回、十滴乃至十五滴

○番木鱉越幾斯〇、〇、〇、〇 甘草羔 甘草末適宜

右一九ト爲シ、一日三回、一九

○麥角越幾斯二〇 稀酒精 偏里設林各六〇

遺尿症候

此病ハ主モ小兒  
時ニ見ル所ニ夜  
間睡眠中ニ一回  
至ニ回中ニ一回  
至ル者ナリ

右一日一回、半筒、皮下ニ注射ス

○遺尿 *Enuresis nocturna.*

〔原因〕 腸蟲、全身虛弱、膀胱頸部ノ刺戟亢盛ヲ兼テタル局處衰弱等ナリ

〔療法〕 晚餐ニハ液類ノ飲用ヲ禁シ、夜間ニ一二回喚起シテ、

泄尿セシムベシ、嚴ナル父母ノ往々其病兒ヲ呵責スルヲア

リ、是レ甚タ不可ナリ、之カ爲メニ、數日間停止スルヲアルモ

根治ヲ得ルヲナシ

藥餌ニハ、別刺敦那、抱水格魯刺爾、斯篤里幾尼涅、沃度化鐵舍

利別、羯答利斯丁幾等ヲ與フ

○別刺敦那葉末 別刺敦那越幾斯各〇、〇一乃至〇、〇二

○白糖〇、五 右一包ヲ作り、毎夜頓服ス(小兒ノ量)



○硫酸亞鉛 〇、二 水 一〇〇、〇 右同上

○硫酸亞鉛 〇、二 醋酸鉛 〇、五 水 一〇〇、〇 右

同上

○醋酸鉛 〇、五 水 五〇、〇 右同上

○硝酸銀 〇、〇五 水 五〇、〇 右黑瓶ニ盛リ與フ、右

同上

○硫酸銅 〇、〇五 水 五〇、〇 右同上

○皓礬 〇、〇五 水 五〇、〇 右同上

○鞣酸 二、〇 硫酸亞鉛 一、〇 水 二〇〇、〇 右同

上(慢性淋)

内服ニハ、骨湃波拔爾撒謨、華澄茄等ヲ與フ

○骨湃波拔爾撒謨 一五、〇 芳香丁 幾五、〇 右一日

三回、十五滴乃至二十滴

○骨湃波拔爾撒謨膠囊 五十箇 右一日三回、一乃至三

箇

○骨湃波拔爾撒謨 三〇、〇 亞拉昆亞護謨 五、〇ヲ以テ乳

劑ト爲シ、桂皮水 四〇、〇 甘艸羔 一〇、〇ヲ加フ 右一

日三回一茶匙

○華澄茄末 三〇、〇 右一日、四乃至五回ニ分服ス

○華澄茄 一五、〇 骨湃波拔爾撒謨 八、〇 蜂蜜適宜

右百二十九ト爲シ、初メハ一日三回、後ニハ四回、十九

續發性淋疾ニハ、尿道狹窄ノ外科的療法ヲ施ス

○副睪丸炎 Epididymitis.

初期ニハ、強力ノ消炎法ヲ施シ、鼠蹊部ニ水蛭ヲ貼シ、楔狀枕

候  
副睪丸炎症  
初メ鼠蹊部ニ疼痛  
ヲ發シ体温昇騰ス

副丸ハ腫起シテ  
如シ之ニ觸ル  
ハ感覺過敏ナリ  
ノ陰囊内ハ重  
感ヲ覺フ

ヲ陰囊下ニ置ク  
末期ニハ、沃度化加留謨ヲ内服セシメ、沃度化鉛、沃度、沃度仿  
謨、別刺敦那越幾斯、古魯胃謨等ヲ外用シ、又フリック氏綑帶ヲ  
施ス

○沃度化加留謨二〇 水二〇〇〇 苦味丁幾四〇

右毎二時、一食匙

○沃度化鉛二〇 單軟膏一五〇 右外用

○偏里設林三〇〇 沃度丁幾七〇乃至一五〇 右同

上

○沃度仿謨一〇 單軟膏一〇〇 右同上

○別刺敦那越幾斯二〇 華攝林二〇〇 右混和軟

膏ト爲シ、外用ニ供ス

攝護腺炎症

候  
攝護腺腫起シテ  
過敏ト爲リ通利  
ノ際ニ疼痛ヲ發ス  
尿道ヨリ膿液ヲ  
所ノ濃厚粘液ヲ  
泄ス往々閉塞ヲ  
スアリ而シテ其  
起ハ直腸ヨリ腫  
スルヲ得ヘシ

○攝護腺炎 Prostatitis.

安臥ヲ命シ、會陰部ニ温毯布ヲ貼シ、又蟻鍼ヲ施ス、麻醉性坐  
藥、鹽酸莫兒比涅ノ皮下注射ヲ應用シ、會陰ニ水銀軟膏ヲ塗  
擦シ、油性灌腸法ヲ行ヒ、亞爾加里性泉ヲ多量ニ飲用セシメ、  
又波動確著ナルキハ、直腸ヨリ之ヲ切開ス可シ

○阿片越幾斯〇〇三乃至〇一 柯々阿脂二〇 右坐

藥トス

○柯々阿脂二〇 別刺敦那越幾斯〇〇三 右同上

○柯々阿脂二〇 鹽酸莫兒比涅〇〇一 右同上

○鹽酸莫兒比涅〇一 餹水五〇 右半筒、皮下ニ

注射ス

○攝護腺肥大 Hypertrophia prostaticae.

攝護腺肥大症候



此病ハ大抵高齢ノ男子ニ發スル者ニモ子ニ發スル者ニモ往々尿淋腫肥大シテ閉尿起ス若クハ尿閉ヲ起スヲアリ而シテ其肥大ヲ鑑識スルニハ消息子ヲ用ユヘシ其法ハ外科書ニ就テ見ルヘシ

初起ニ於テハ、緩下劑、殊ニ加兒爾斯泉搗ヲ與フ、若シ其効ナキハ「カテーテル」ヲ使用ス可シ、麥角越幾斯、沃度丁幾等ノ織質注射法ヲ行ヒ、内服ニハ、沃度加留謨ヲ與フ

○人工加兒爾斯泉搗 一五、〇 右早晨、微温湯ニ溶解シ 頓服ス

○蓖麻子油 一五、〇 右頓服ス

○麥角越幾斯 一、〇 偏里設林 蒸餾水 各五、〇 右一筒宛、毎日注射ス

○沃度化加留謨 二、〇 水 二〇〇、〇 單舍利別 一五、〇 右每二時、一食匙

睪丸炎症候

副睪丸炎ノ如ク鼠蹊部及ヒ背下部ニ疼痛ヲ發シ体温昇騰ス睪丸ハ腫起セテ

○睪丸炎

梅毒性ニア Orchitis. 勉メテ身体ヲ安靜ニ保持シ陰囊ヲ高位ニ安置シ氷嚢ヲ貼

睪丸大乃至其以上ニ達シ之ヲ按スルニ假性波動ヲ呈シ且ツ知覺過敏ナリ預後大抵良

スヘシ又壓抵法ヲ施シ或ハ蓖麻子油一分古魯胃謨五分ヲ混和シタルモノヲ塗敷シテ壓抵法ニ代ユヘシ末期ニハ、強壯劑ヲ與フ若シ膿瘍ヲ生スルトキハ切開法ヲ行フ但シ患者高齢ニシテ生殖機能已ニ廢絶シタルモノニハ睪丸切除法ヲ施ス可トス

○遺精 Pollutiones nimiae.

〔原因〕 全身及ヒ腹部多血、淫慾亢盛、膀胱尿液充盈、過敏性虛弱、急性病回復期等ナリ 律彪林、貌羅謨化加留謨、亞砒酸加留謨液、樟腦、抱水格魯刺爾ヲ與ヘ、冷水療法ヲ行フ

○律彪林 〇、三 樟腦 〇、〇一 白糖 〇、七 右每夜

頓服

遺精症候

一週若クハ一箇月ニ一ニ回睡眠中ニ愉快ノ感覺ヲ以テ精液ヲ泄ラス

○ 貌羅謨化加留謨八、○ 水一八〇、○ 單舍利別一五、○

○ 右每二時、一食匙(漸次其量ヲ增加ス)

○ 亞砒酸加留謨 五滴乃至十滴 右臨臥頓服

○ 抱水格魯刺爾一、○ 單舍利別 亞拉昆亞謨漿 各一五、○ 右臨臥頓服

○ 精漏 Spermatorrhoe.

(原因) 過敏性虛弱、惡液質、曩時ノ手淫、泌尿生殖器ノ局處病、包莖、尿道狹窄等ナリ

強壯劑ヲ與ヘ、水治法、海水浴、運動、牛乳療法等ヲ命ス、又平流

電氣ヲ施用ス(一極ハ直腸ニ、他極ハ會陰ニ置ク) ○ 番木鱉、麥

角、貌羅謨化加留謨ヲ與フ、攝生法ヲ守リ、以テ便通ヲ調理シ、

又臨機ニ下劑ヲ要スルヲアリ

○ 番木鱉越幾斯五、○ 甘艸羔七、五 右百九ト爲

○ シ、初メニハ、一日一丸、漸次其量ヲ增加シテ、一日五丸ニ

至ル

○ 麥角越幾斯〇、四 右八九ト爲シ、一日四回ニ分服

○ 貌羅謨化加留謨六、○ 水一八〇、○ 單舍利別一五、○

右一日三回、二日ニ分服ス

第二節 兩性生殖器諸病

○ 軟性下疳 (擬梅毒性潰瘍) Ulcus molle.

腐蝕法ヲ反復スルヲ最佳トス(格魯兒化亞鉛、硝酸銀)

○ 硝酸銀小梃子 右潰瘍面ヲ腐蝕ス

○ 四倍ノ格魯兒化亞鉛水 右毛筆ヲ以テ潰瘍面ヲ

軟性下疳症

初メ病毒ニ感染セ  
ル部ニ痒癢ヲ發シ  
次テ水泡ヲ生シ  
ニ圓形ノ潰瘍ニ變  
ス其縁ノ底面  
ハ軟性下疳ニシテ  
ハ腫脹ス之ヲ觸ル  
ハ痛シクハ通常男  
子ニ在リハ龜頭及  
皮ノ包皮ノ頭

ニ附着スル部ニ發シ女子ニ在テハ小陰唇ノ内面及ヒ後連合部ニ生ス預後

腐蝕ス

末期ニハ之ヲ單性ノ潰瘍ト看做シ、一般ノ療法ニ從テ施治スヘシ、頑性潰瘍ト爲ル者ニハ、甘汞、赤降汞、沃度仿謨等ヲ撒布藥ト爲ス

蠶蝕性潰瘍ヲ爲ス者ニハ、肝油、強壯藥ヲ與ヘ、全體ヲ改良シ又疼痛ニハ陰部浴ヲ施シ、最モ微弱ノ感傳電氣ヲ用井、爾後硝酸亞酸化水銀一分ヲ、五十乃至六十分ノ脂肪ト、混和セル軟膏ヲ貼ス

○甘汞 澱粉 等分

右撒布藥トス

○赤降汞 一〇

白糖 一五〇

右同上

○沃度仿謨

澱粉 等分

右同上

○急性便毒

Bubo acutus.

急性便毒症候

是レ鼠蹊部淋巴腺ノ炎症ニシテ、大シテ疼痛ヲ發シ、往々周圍ノ結締組織ヲ呈ス若シ皮膚赤ニ陥ルキハ自ラ外生部ニ破潰シ潰瘍ヲ生ス

身體ヲ安靜ニシ、淡泊ノ食料ヲ用ウ、其未タ波動ヲ認メサル間ニ、消炎法ヲ施シ、或ハ沃度丁幾ヲ塗布ス、已ニ波動ヲ呈スルニ至レハ、温湿布ヲ貼シテ、十分ニ化膿セシメテ後之ヲ切開スヘシ、爾後ノ療法ハ、外科一般ノ通則ニ從フヘシ

○梅毒 Syphilis.

全身病ノ部ニ出ッ

第三節 婦人生殖器諸病

[甲] 子宮諸病

○月經閉止 Amenorrhoe.

(原因) 全身或ハ器質ノ發育不全、貧血、萎黃病、惡液性、代攝性又無出血性分泌、他ノ子宮諸病、神經遲鈍、感冒、精神感動、止瀉藥若シハ瀉下藥ノ連用等ナリ

月經閉止 此病ハ生殖機能アル年齢ノ間ニ毎月來スル者ヲ云フ

月經困難症  
候  
月經ニ先チ或ハ月  
經時中ニ下腹、腰  
骨部、腰部等ニ痛

〔療法〕 日常ノ榮養ヲ改良シテ、根治法ヲ行フヘシ、通經藥ハ只局處病及ヒ全身病ノ存在セサル時ニ於テノミ、之ヲ用ユルヲアリト雖モ例外ナリトス、其病況ニ由テ、子宮腔部或ハ股内面或ハ足踝ニ貼スルニ蟻鍼ヲ以テス、吸角ヲ貼スルモ亦可ナリ、其他脚湯、半身浴、芥子浴等ヲ施シ、微温湯ヲ子宮腔部ニ灌注シ、或ハ同部ニ沃度丁幾ヲ塗布シ、若クハ其部ノ亂切ヲ行フ

○ 蘆薈 〇 麥角各二〇 古魯聖篤越幾斯〇三 依

的兒製薩昆那油十滴 右三十九ト爲シ、一日三回、二

丸

○月經困難(子宮痙痛) Dysmenorrhoe.

卵巢病及ヒ子宮病ニ基因ス

痛、嘔吐、心  
往々胃、頭、眩暈  
等ヲ伴フ而シテ月經  
止ムルハ以上ノ諸  
症大抵消退ス

〔療法〕 預防法トシテ、經水ノ來ル一二日前ニ、子宮腔部ノ亂切法ヲ施スルハ、月經痛大ニ輕易トナルカ、若クハ全ク之ヲ覺エサルヲアリ、其痛ノ子宮病ニ因スル者ハ、外科的療法ヲ要ス(即チ腔部ノ切開法)又姑息法トシテ、子宮腔部或ハ股内面ニ蟻鍼ヲ貼シ又脚湯(王水)ヲ取ラセム、阿片、別刺敦那等ヲ灌腸劑、臙球又ハ坐藥トシ、迷朦藥、抱水格魯刺爾強壯藥、發汗藥等ヲ與ヘ、食鹽泉ヲ飲用セシム、又月經時ノ前日ニ於テ、麥角ヲ用ユレハ、良効ヲ見ルヲアリ

○ 阿片越幾斯〇〇三 柯々阿脂二〇 右臙球ト爲

シ、或ハ坐藥トス

○ 阿片丁幾二十滴 水二〇〇〇 右灌腸料トス

○ 別刺敦那幾斯〇二 柯々阿脂二〇 右臙球ト

爲シ或ハ坐藥トス

○別刺敦那越幾斯〇、一 加密爾列浸 二〇〇、〇 右

灌腸料トス

○呀囉仿謨三、五 非沃斯油三〇〇、〇 右下腹ニ塗布

ス

○抱水格魯刺爾二、〇 水一〇〇〇、〇 單舍利別三〇〇、〇

右一日三回、二日ニ分服ス

○麥角末三、〇 右三包ニ分テ、月經時ノ前日ニ於テ、三

時間内ニ分服ス

○月經過多 Menorrhagic.

〔原因〕急性諸病ノ初起、子宮實質弛緩、子宮纖維瘤、子宮息肉、

慢性子宮內膜炎、鬱血、肥滿、多房等ナリ

月經過多症

候  
一月經期中ニ滲ラ  
ス所ノ血量百瓦乃  
至二百瓦ヲ常トス  
若シ此量ヲ超ヘハ  
多ナルハ之ヲ月  
經過多ト稱ス

〔療法〕專ラ原因療法ヲ施シ慢性子宮內膜炎ニ因スル者ハ

銳匙ヲ以テ荒蕪セル粘膜ヲ爬除スルヲ良トス

對症療法トシテ麥角、醋酸鉛、吐根、實菱、答利斯、食鹽泉等ヲ與

ヘ、誘導法トシテ瀉下藥ヲ用ウ

○麥角越幾斯一、〇 右二十九ト爲シ、一日六丸乃至

八丸ヲ與フ

○麥角越幾斯 鞣酸各一、〇 水一五〇〇、〇 單舍利

別三〇〇、〇 右每二時、一食匙

○鉛糖〇、〇五 白糖〇、五 右一包ト爲シ、一日四回、

一包

○吐根末〇、〇五 桂皮末 明礬各〇、三 右一包

ト爲シ、每二時、一包

子宮出血  
月經時ノ外ニ於テ  
他ノ原因ヨリ出血  
スル症ヲ云フ

○實斐答利斯浸(二〇)一八〇〇 單舍利別二〇〇  
○右每二時、一食匙  
○實斐答利斯葉末〇〇三 麥角〇、五 白糖〇、五  
○右一包ト爲シ、毎二時、一包  
局處療法ニハ冷水灌腸法ヲ行ヒ、又灌漑器ヲ以テ頻ニ冷水  
ヲ腔部ニ灌注ス

○子宮出血 Metrorrhagie.

圓形氷片ヲ挿入シ、寒冷石炭酸水ノ灌注法ヲ施ス(之ヲ四十  
五度ニ熱スルキハ、其効用更ニ著ルシ)、危急ノ際ニハ、過格魯  
兒化鐵液ヲ一倍乃至三倍ノ水ニ稀釋シ用ウ此際生成スル  
所ノ凝塊ハ一  
二日後、五十倍ノ石炭酸水ニテ反卵膜ノ殘片アルキハ、子  
宮腔内ヲ注意觸摸シ、以テ之ヲ除却スヘシ、腹壁ヨリ子宮ヲ

急性子宮實  
質炎症候  
惡寒發熱シ次テ骨  
盤内ニ劇痛ヲ發シ  
起立、歩行等ニ由  
テ増加ス子宮ハ腫  
大シ之ヲ壓スレハ  
知覺大ニ過敏ナリ  
尿意頻數、裏急後  
重ヲ來タシ月經ハ  
閉止スト雖モ時ハ  
閉止多クハ長  
預後多クハ長

按撫シ又壓抵シ、腹動脈ノ壓抵法ヲ施シ、自己移血法ヲ行フ、  
栓塞子(綿球)T字帶ノ如キモ亦可ナリ、虛脱ニハ興奮劑ヲ與  
ヘ、又皮膚ヲ温覆シテ發汗スルニ至ラシム  
息肉等ハ或ハ之ヲ切除シ、或ハ之ヲ燒灼ス  
内服藥ハ前章ヲ見ルヘシ

○急性子宮實質炎 多クハ粘膜炎加  
答兒ト合併ス Metritis paren-

chymatosa acuta.

(原因) 月經閉止、感冒、精神感動、多房殊ニ月經時ニ於ケル者、  
傳染病殊ニ淋疾、器械的刺戟、壓抵器、消息子、外傷等ノ類等ナ  
リ  
(療法) 主トノ原因療法ヲ施シ、子宮腔部ノ瀉血法腹壁ニ大  
約二三十條ノ水蛭ヲ貼スルモ亦可ナリ)ヲ行ヒ、氷片ヲ貼シ、

麻醉性灌漑藥ヲ用井、微温全身浴、鹽性及ヒ油性瀉下藥等ヲ  
與ヘ、腰部ヲ高クシテ、安靜ニ仰臥セシメ、末期ニハ、ブリーヌ  
ニツツ氏温捲法ヲ施ス

○人工加兒爾斯泉鹽一五、〇 右微温湯ニ溶解シ、頓服

○硫酸麻偏涅叟謀一五、〇 右頓服

○蓖麻子油一五、〇 右頓服

○別刺敦那葉浸(二〇、〇)二〇〇、〇 苦扁桃水六〇、〇

右一回ニ二食匙ヲ取り、八〇〇、〇乃至一〇〇〇、〇ノ水  
ニ和シ、イェルリガトールヲ用井、腔内ヲ洗滌ス

刺戟性通經藥ヲ禁忌ス  
○慢性子宮實質炎 Meiritis parenchymatosa

慢性子宮實質炎候  
骨盤内壓重ノ感ヲ  
生シ、白帶下アリ尿

chronica

意頻迫、大便稀結  
等ヲ發シ、子宮ハ腫  
大シテ、球根狀ヲ爲  
厚シテ、或ハ壓ス  
ス、交接シ、或ハ壓  
レハ、子宮ノ知覺過  
敏ナリ、經時ニハ  
痛ヲ來タシ、後ニハ  
經閉ヲ起ス、預後ニ  
命ニ關セサルモ、經  
過緩ナリ

(原因) 血行障害(月經困難、中歇、或ハ頻回ノ妊娠ニ、子宮復位  
ノ障礙ヲ兼ヌル者)、治療ヲ怠レル急性子宮炎、子宮轉位及ヒ  
新生物、産后子宮収縮不全、墮胎、慢性子宮内膜炎、慢性心臟病、  
及ヒ肺諸病、其他屢、充血ヲ誘起スル諸病等ナリ

(療法) 一般ニ消炎法ヲ良トス、動作ヲ安靜ニシ、一週一二回  
子宮腔部ノ亂切法ヲ施シ(可及的子宮腔部ノ粘膜ニ於テ、微  
ニ切截シ、毎回大約一五、〇ノ血液ヲ流出セシムルヲ以テ足  
レリトス)亂切后、冷水ヲ腔内ニ灌漑セサルヲ良トス  
攝生法或ハ緩和下藥ニ由テ、膀胱及ヒ直腸ノ排泄ヲ順整ニ  
ス

○大黃末 複方大黃越幾斯各一、五 別刺敦那越幾

斯〇、一、五、〇 右三十九ト爲シ、一日二九乃至四九ヲ服ス

○大黃浸(五、〇)一五〇〇 單舍利別一五〇 時、一食匙

下腹ニ寒冷法ヲ行フハ、只炎症發作時若クハ子宮外膜炎ヲ併發スルキニ於テスルノミ  
併發スルキニ於テスルノミ  
プリースニツ氏温罨法及ヒ沃度罨法 沃度ニ加備四、〇ニ和シ、小海綿球子又ハ綿球ヲ以テ、終夜之ヲ施ス  
子宮灌漑法ヲ用井ルニハ、極メテ注意ス可シ、水勢ノ強弱宜シキヲ得、且ツ其水液ノ微温ナルヲ要ス、而ノ其温度ハ患者ノ之ニ耐ヘ得ルヤ否ヤニ從ヒ、漸ク冷シ或ハ漸ク温ムヘシ、坐浴ニ於ケルモ亦然リ  
○鑛泉治法 其病輕易ニノ經久性ナラス又曾テ貧血ニ罹ラス、

腸管ノ機能ニ障害アルキハ、亞爾加里性鹽泉ヲ稱用シ、痲疾ニノ、下腹機官ノ虛性充血ヲ兼ヌル者ハ、苦土性鹽泉、食鹽泉ヲ與ヘ、又貧血家ニハ、鐵泉ヲ稱用ス

〔浴法〕 炭酸泉及ヒ鹽泉ヲ可トシ、強壯ナル者ニハ、海浴ヲ稱用シ、柔弱過敏ノ者ニハ、微温ノ單純溫泉浴ヲ命ス、泥浴モ亦可ナリ  
患婦ノ稟賦、病況等ニ從ヒ、亦種々ノ飲用法及ヒ浴法ヲ併用スルヲ得ヘシ  
又時宜ニ依リ強壯藥、麻酔藥ヲ與フ、且ツ通利ヲ調理シ、利尿ニ注意スヘシ  
輒近子宮炎ノ極テ慢性ト爲ル者ニ於テハ、子宮腔部ノ切除法ヲ稱用ス



急性子宮内膜炎候

往々悪寒ヲ以テ始  
ムル體温ノ昇騰ヲ  
來タシ骨盤内ニ壓  
重ノ感アリ子宮ノ  
知覺ハ壓ニ由テ僅  
ニ過敏ナレバ消息  
子ヲ子宮腔ニ挿入  
スレハ最も甚シク  
宮腔部ハ赤色且ツ  
往々膿濁ヲ呈ス而  
ソ帶白色或ハ帶黃  
色ノ分泌物子宮口  
ヨリ漏出ス

慢性子宮内膜炎候

子宮口ヨリ水様ノ  
分泌物ヲ漏出シ腰  
々其量頗多ニシテ  
メニ消化不長ノ身  
體衰弱等ヲ將來ス  
ルヲアリ而シテ消  
息子ヲ子宮腔ニ挿  
入スレハ知覺過敏  
不妊ヲ發ス但月經

急性子宮内膜炎 Endometritis acuta.

〔原因〕月經時ノ感冒、多房、子宮粘膜炎ノ刺戟、淋毒、急性傳染病等ナリ

〔療法〕安靜ノ位置ヲ取ラセメ、大便ノ軟利ヲ促シ、下腹ニ温罨法或ハ冷罨法ヲ施ス、此症持久スルキハ、坐浴ヲ行ヒ、子宮腔部ニ水蛭ヲ貼シ、又微温湯ヲ以テ腔内ヲ洗滌ス、慢性ニ陥ラント欲スル者ニハ亦亂切法ヲ施シ、瀉血スルモ可ナリ、収斂藥ノ注射ハ、可及的行フテ勿レ

慢性子宮内膜炎(子宮体部ノ加答兒)

Endometritis chronica.

〔原因〕急性子宮内膜炎等關ニ附スル者、又腺病、萎黃病、結核、泌乳閉止、卵膜残留、及ヒ慢性子宮炎ノ諸因等ナリ

閉止ハ後來ノ經過  
ニ於テ顯ルル所ナ

〔療法〕主トノ原因療法及ヒ全身健全法ヲ施ス可シ、即チ強壯藥ヲ與ヘ、海水浴、鹽泉浴、鐵泉浴等ヲ命シ、便秘ニハ瀉下藥(蓖麻子油、大黃等)ヲ投ス

頑固症或ハ經久症ニハ、局處療法ヲ施スヘシ、即チ収斂藥ノ溶液ヲ以テ、腔内ヲ洗滌シ、硝酸銀小梃子ヲ以テ、子宮粘膜炎ヲ或ハ収斂藥ヲ子宮腔内ニ送入ス

収斂藥ヲ子宮腔内ニ送入スルニハ、ブラウン氏注射器、マ  
ルチン氏銃筒ヲ用キ、若シハ子宮消息子ノ尖端ニ三仙迷  
ノ處ヲ粗糙ト爲シ、之ニ脫脂綿片ヲ纏絡シテ、送入セント  
欲スル藥液ニ浸シ、徐々ニ子宮内ニ送ル、又管狀子宮鏡ヲ、  
腔内ニ挿入シテ、子宮外口部ヲ露出セシメ、収斂藥殊ニ十  
倍ノ硫酸銅溶液ヲ、鏡内ニ流入シ、然ル後尖端ニ綿片ヲ纏

絡セル消息子ヲ、子宮腔内ニ送入スヘシ

○石炭酸二〇〇、〇、鉛糖水二〇〇、〇、右一日一回、振盪

シテ二食匙ヲ取り、八〇〇、〇ノ水ニ和シ、腔内洗滌料ト

ス

○明礬一〇〇、〇、右毎日一茶匙ヲ取り、水六〇〇、〇ニ

溶解シ、一回ノ洗滌料ト爲ス

○明礬一〇〇、〇、皓礬二〇〇、〇、右用法同上

○鞣酸一〇〇、〇、右用法同上

○五十倍ノ石炭酸水五〇〇、〇、右一回ノ洗滌料トス

○十倍ノ硝酸銀水三〇、〇、右塗布料トス

其他銳匙ヲ以テ、子宮粘膜炎ノ荒蕪セル部ヲ爬除シ、而ノ後、  
ラウソノ氏ノ注射器ヲ用キテ、過格魯兒化鐵液(一、〇)若クハ沃

子宮頸内膜炎症候

子宮頸部ハ肥厚シ、  
赤色ヲ呈シ且ツ  
糜爛、潰瘍ヲ生ス  
常ニ白帶下アリ月  
經ハ時トノ尋常ナ  
リト雖モ多クハ過  
多ト爲ル而シテ子  
宮體部ニハ通常異狀  
ヲ呈セス

子宮頸内膜炎、子宮頸加答兒 Endometri-

itis cervicis.

度丁幾(一、〇)ヲ子宮腔内ニ注入シ、爾后直チニ稀薄石炭酸水

(五十倍)ヲ以テ、其腔内ヲ洗淨シ、數日間ハ其安臥ヲ命ス、之ニ

由テ屢、良効ヲ見ルコトアリ

(原因) 全ク子宮内膜炎ニ同シ、其他手淫ニ基因スル器械的

刺戟、又蹈縫器械ノ使用等ナリ、其他子宮頸外翻症ニ於テ、屢、

之ヲ見ル

(療法) 子宮内膜炎ニ同シ、子宮頸ノ甚シク腫大スルキハ、沃

度丁幾ヲ塗布シ、又同部ノ亂切法或ハ切斷ヲ施ス、其他分娩

后ノ兩側破裂ニ因スル子宮頸外翻症ニ於テハ、エンメット氏

ノ兩側裂痕縫合術ヲ行ヒ、良効ヲ収ムルコトアリ



罨法、坐浴(殊ニ槲皮坐浴ヲ良トス)等ヲ施シ、大便ヲ順利シ、沃度劑ヲ與ヘ、沃度仿謨軟膏ヲ「タンボン」ニ塗布シテ、膣上部ニ挿入ス

○沃度化加留謨二〇 水一八〇〇 單舍利別一五〇

右毎二時、一食匙

○沃度仿謨三〇 華攝林三〇〇 「トンカ」豆末適宜

右軟膏トス

○槲皮一五〇〇 右適宜ノ水ヲ以テ、煮テ其七分ヲ取

リ、之ヲ浴湯中ニ混和ス、一回ノ量

○ 葶熱 Febris puerperalis.

葶熱症候  
始メ戰慄シ次テ體  
温大ニ昇騰シ甚シ  
キ虛脱ヲ呈シ諸語  
ヲ發ス而シテ局處症  
狀トシテ子宮外膜  
炎、子宮周圍炎等  
ノ症候ヲ見ル預後

(預防法) 醫士及ヒ產婆ハ、凡テ產婦ノ子宮ニ觸レント欲スルキハ、先ツ其手指及ヒ所用ノ器械等ニ、防腐法ヲ施シ、極メ

テ清淨ニスヘシ、又腐敗物ニ觸接セシキ、例之ハ解剖ヲ施行セシキハ、數日間產婦ヲ内診スヘカラズ、産牀ニ臨ムキハ、必ス瓶ニ、撒里矢爾酸或ハ安息香酸ノ十倍酒精溶液ヲ盛リ、之ヲ携帶スヘシ、用ニ臨ミ、之ニ五〇〇〇ノ水ヲ加ヘテ用井、又三〇〇〇ノ石炭酸セシ者ヲ用ユルモ可ナリ、會陰破裂ニハ、澱粉及ヒ撒里矢爾酸ヲ混シ、撒布藥ト爲ス、其它難産若クハ、施術セル產婦ニハ、手術後石炭酸水ヲ以テ、能ク腔内ヲ洗淨スヘシ

○撒里矢爾酸一〇 澱粉一〇〇 右撒布藥トス

(療法) 子宮周圍炎ニシテ合併症ナキキハ、安靜ニ居ラシメ、ブリースニツ氏温罨法ヲ施シ、緩和下藥ヲ與フ、熱去ルノ後、滲出物ニ對シ、沃度化加留謨ヲ與フ、泥浴、鹽浴モ亦可ナリ

○蓖麻子油三〇〇 水五〇〇〇 右洗腸料

○沃度化加留謨二〇 水一八〇〇 苦味丁幾三〇

右每二時、一食匙

高熱ニハ、鹽酸規尼涅、撒里矢爾酸那篤留謨ヲ與フ、又實菱答  
利斯ヲ稱用スル者アリ、其他興奮藥(佳良ノ葡萄酒)ヲ投ヌ

○鹽酸規尼涅 〇、五乃至一、〇 右「オブライト」ニ包ミ、頓  
服

○撒里矢爾酸那篤留謨 〇、水五〇、〇 薄荷水二〇、〇

右二回ニ分服ス

○實菱答利斯浸(二、〇)二〇〇、〇 硝酸加留謨六、〇 單

舍利別二〇、〇 右每二時、一食匙

產瘴性潰瘍アレハ、硝酸銀ニテ腐蝕シ、後チ之ヲ温菴スルニ  
石炭酸水ヲ以テシ、又五十倍乃至三十倍ノ石炭酸水、或ハ三  
百倍ノ撒里矢爾酸水ヲ以テ、一日二三回若クハ數回、子宮腔

内ニ灌注シ、且ツ排膿管ヲ送入スヘシ  
連綿灌漑法ヲ用キ、子宮内ヲ洗滌ス

此子宮腔内ヲ連綿灌漑スルハ、現今獨逸ニテ專ラ稱用ス  
ル一新法ニシテ、其式ハ先ツ大ナル「イルリガトール」ヲ病室  
ニ具ヘ、其筒内ニ石炭酸水ト氷水トヲ混入シ、之ニ裝置セ  
ル護謨管ノ末端ニ、子宮内ヘ挿入シ得ベキ小管ヲ附シ、斷  
ヘス水液ヲ注滴スル是ナリ、而シテ之ニ用キル臥床ハ、患者  
ノ兩股ヲ開キタル當中ニ、一圓孔ヲ穿テ、其下ニ一ノ受器  
ヲ設ケ、洗滌シタル廢水ヲ受タルニ便ナラシム  
腹膜炎ヲ合併スル者ハ、阿片劑ヲ與ヘ、腹部ニ氷菴法ヲ施シ、  
虛脫ヲ呈スル者ハ、興奮藥ヲ投ス

〔乙〕 卵巢

卵巢炎症候  
卵巢部ニ當テ疼痛  
ヲ發シ其痛四方ニ  
波及ス双診ヲ行フ  
キハ子宮ノ側部ニ  
感覺過敏ニシテ  
大ナル圓形ノ腫瘍  
ヲ認ム預後其

○卵巢炎 Oophoritis.

〔原因〕 排卵ノ刺戟、淋毒及ヒ腹膜炎ノ波及等ナリ

〔療法〕 急性卵巢炎ニ於テハ、患部ノ腹壁ニ蟻鍼ヲ貼シ、爾后水囊ヲ置キ(時宜ニ由テ温罨法ヲ施ス)内服ニハ、麻酔藥、緩下藥、解凝藥等ヲ用キ、疼痛甚シキ者ハ、鹽酸莫兒比涅、別刺敦那越幾斯ノ坐藥ヲ投ス、慢性症ニハ、極テ安靜ヲ要シ、房事ヲ謹ミ、腸及ヒ膀胱ノ排泄ヲ調理シ、坐浴ヲ命シ、後水治法ヲ行ヒ、腔腔ニ沃度仿謨軟膏ノ(クンボン)ヲ挿入シ(子宮外膜炎ノ部ヲ見ヨ)、内服ニハ、沃度劑ヲ稱用ス

○阿片丁幾五、○ 苦味丁幾一〇〇 右一日三回、十  
五滴乃至二十滴

○旃那葉一五〇、○ 茴香五〇、○ 右沸湯一五〇、○ニ浸

卵巢囊腫症

初メ卵巢部ニ腫瘍  
ヲ生シ其腫漸次  
増大シテ往々全腹  
ヲ充盈スルニ至ル  
之ヲ打診スルニ濁  
音ヲ呈シ觸診上波  
動ヲ認ム而シテ尿  
頻數大ニシテ水腫  
往々下肢ノ水腫、  
呼吸促進等ヲ來ス  
預後不

○卵巢水腫及卵巢囊腫 Hydrops und Cystovarium.

對症療法トシテ、強壯藥、緩下藥ヲ與フ、沃度劑ヲ用ユルヲアリト雖、只、其増育ヲ遲慢ナラシメ、且ツ其困苦ヲ輕快スルニ過キス、穿刺術アルモ亦姑息法ニ屬ス、間、之ヲ沃度注射法ニ併用シテ、單一ノ囊腫ヲ快癒セシムルヲアリ

根治療法ハ、只外科的ノ截除法アルノミ故ニ時宜ニ由テ、可及的速ニ之ヲ行フヘシ

〔丙〕 腔腫

急性腔加答

兒症候  
腔粘膜ハ赤腫シテ  
其温度増加シ劇症  
ニ於テハ疼痛ヲ發  
ス手指ヲ挿入スル  
ニ感覺最モ過敏ナ  
リ分泌ハ初メ減少  
少シ後ニハ増加ス  
其他體温昇騰シ尿  
意頻數急後重等  
ヲ來タス

急性腔加答兒 Vaginitis catarrhalis acuta.

〔原因〕 淋毒傳染、創傷、過度、熱性及ヒ冷性注射、蛇蟲、壓抵器、急性發疹病等ナリ  
〔療法〕 主トシテ原因療法ヲ施シ、緩下藥ヲ用キ、淡泊ノ食料ヲ與ヘ、安靜ニ仰臥セシメ、微温湯ヲ以テ、一日二回、腔内ヲ洗滌シ、微温湯坐浴ヲ行フ  
炎勢退去スルノ後、一回或ハ數回硝酸銀、沃度丁幾ヲ以テ、腐蝕法ヲ施ス、後ニハ管狀子宮鏡ヲ腔内ニ挿入シ、子宮腔部ヲ露出セシメ、而シテ硫酸銅溶液(十倍ノモノ)或ハ木醋ヲ鏡内ニ注下シ、而シテ子宮鏡ヲ徐々ニ抽出ス、又一日一二回収斂藥ノ洗滌法ヲ行ヒ、夜間ハ、明礬軟膏(五分ヲ三十分ノ脂肪ト混和スルモノ)、或ハ單一ノ偏里設林、或ハ之ヲ鞣酸ト混和シタル

慢性腔加答

此病ノ主徵ハ白帶  
下ナリ往々其量頗  
多ニシテ屢々全身  
榮養ヲ障害ス若シ  
腔粘膜弛緩スルハ  
ハ僅ニ脱下シテ且  
迫性疼痛ヲ發シ且  
ツ陰門内ニ外物ヲ  
挾ムカ如キ感アリ

慢性腔加答兒 (腔白帶下) Vaginitis catarrhalis chronica.

者ヲ以テ蔗タセル栓塞ヲ之ヲ腔内ニ送入スルヲ患婦手自カヲ稱用ス鞣酸ヲ以テ腔球ヲ作り之ヲ用井ルモ亦可ナリ  
○明礬四〇 水三〇〇 右洗滌料  
○皓礬四〇 水三〇〇 右同上  
○鞣酸三〇 水三〇〇 右同上  
○撒里矢爾酸一〇 水三〇〇 右同上  
○鞣酸〇三 柯々阿脂三〇 右腔球ト爲シ、一日一箇、腔内ニ送入ス

〔原因〕 急性腔炎ノ全治セズシテ稽留スル者、或ハ萎黃病、隣接器官ノ充血病及ヒ器質病、又ハ器械的ノ刺戟等ニ基因ス

〔療法〕 強壯藥ヲ與ヘ、全身ノ榮養ヲ改良スヘシ  
注射法ヲ腔内ニ施シ、之ヲ淨滌シ、經久性ニ陥リタルハ、鞣  
酸、明礬、偏里設林等ヲ用ウ(前章ヲ見ヨ)

○腔痙攣(腔知覺過敏) Spasmus Vaginae (Vaginismus).

〔原因〕 生殖器ノ器質病、殊ニ不適當ナル過度ノ交接ニ基因  
スル外傷、腔口潰瘍、神經過敏、歇私的里等ナリ  
原因療法ヲ施シ、麻醉藥ヲ外用シ、温坐浴ヲ施シ、末期ニハ、乳  
色玻璃子宮鏡ヲ挿入シ、之ヲ放置スルヲ常ニ一時間許、而  
漸々腔ノ外口ヲ擴張スヘシ、呀囉仿謨麻醉法ヲ施シ、強テ之  
ヲ擴大スレハ、奏効尤モ速ナリトス  
○別刺敦那越幾斯〇〇五 柯々阿脂二〇 右球形  
ト爲シ、腔内ニ送入ス

腔痙攣症候  
通常腔口ノ知覺大  
ニ過敏ナルモ時  
ニ僅少ナルヲアリ  
而シテ之ニ觸ルレハ  
忽チ骨盤底ノ全  
於テハ骨盤底ノ全  
筋ニモ之ヲ來タス  
交接ヲ爲スニ能ハ  
私的精神沈鬱シテ  
全身ノ榮養ニ障害  
ヲ受ク

陰門搔癢症

陰門搔癢症候  
陰口、大陰唇等ニ  
屢々發作シ、其癢  
ニ夜間中及ヒ身  
體ノ動後ニ來ル  
シ、甚シキニ至  
テハ痒シク、甚  
クシテハ痒シク  
アリ

○別刺敦那越幾斯一〇 豚脂一〇〇 右外用(一日  
一回、腔ノ外口ニ塗布ス)  
○阿片越幾斯一〇 豚脂一〇〇 右同上  
別刺敦那浸ニ苦扁桃水ヲ混和セシ者(急性子宮實質炎ノ部  
ヲ見ヨ)ヲ注入シ、又極メテ頑固性ノ者ニハ同部ノ括約筋ノ  
切離法ヲ施スヲアリ

附錄

○陰門搔癢 Pruritus vulvae.

〔原因〕 各般ノ帶下症、子宮、腔、尿道、膀胱、腎臟等ノ器質病、手淫  
阿片、抱水格魯刺爾服用ノ習慣等ナリ  
根治療法ヲ施シ、一日二回、炭酸加榴謨ヲ加ヘタル、微温坐浴  
ヲ命ス



六十倍乃至二十倍乃至十倍ノ石炭酸水ヲ貼ス、明礬、稀薄過格魯兒化鐵液、木爹兒、嘒囉仿謨モ亦可ナリ

○明礬 皓礬各三〇 水三〇〇〇 右腔内洗浣

料トス

○木爹兒四〇 亞爾箇保爾三〇〇 右外用

○嘒囉仿謨三〇 甘扁桃油三〇〇 右外用

○乳房炎 Mastitis

諸般ノ機械的刺戟ヲ除去シ、其化膿前及ヒ化膿中ニ於テ、温罨法ヲ施シ、輕易ノ壓抵ヲ施ス(乳房ノ舉上)、其狀況ノ如何ニ論ナク、嚴ニ防腐法ヲ行テ、之ヲ切開シ、排膿管ヲ裝置スルヲ可トス

○乳頭創傷

乳房炎症候  
多クハ哺乳婦ニ發スル者ニシテ通常膿瘡ヲ將來ス

乳頭創傷症

候  
大抵授乳婦ニ發スル者ニシテ哺乳ノ際劇痛ヲ來タス

二十倍ノ石炭酸水ヲ、一日一二回塗布シ、其間ニハ三十倍ノ石炭酸水ヲ綿布ニ蘸シ、之ヲ覆フ、傍ラ又乳帽ヲ著ケ、或ハ哺乳後、必ス亞拉昆亞護謨末ヲ撒布ス

百露拔爾撒謨、蓖麻子油等ヲ塗布シ、硝酸銀腐蝕法ヲ施ス

○苦扁桃油六〇 亞拉昆亞護謨三〇 萬壽菊水五〇〇

百露拔爾撒謨一五 右乳劑ト爲シ、患部ニ塗布ス

○蓖麻子油一五 右一日數回患部ニ塗布ス

預防法トシテ、屢冷水、燒酒、鞣酸弱溶液等ヲ以テ洗滌ス

○鞣酸一〇乃至二〇 水一〇〇〇 右洗滌料ト爲ス

此病ニ於テ、乳汁ノ分泌ヲ制止スルノ目的ニハ、ローリヒ氏ノ山羊ニ施セル試驗ニ據レハ、抱水格魯刺爾、貌羅謨化加留

謨及ヒ亞篤魯必涅ハ、共ニ其効アルカ如シ、斯篤里幾尼涅實  
菱答利斯、咖啡涅、耶僕蘭日葉等ハ、却テ之ヲ増劇スルノ恐レ  
アリ

第七篇

運動器系諸病

○筋肉儂麻質斯、儂麻質斯性筋痛

Rheumatismus muscularis.

(療法) 誘導法(沃度丁幾、勿拉篤里涅、芥子泥、發泡膏、電氣等ノ  
外用)ヲ行フ又非沃斯油、別刺敦那越幾斯ヲ塗布ス  
○勿拉篤里涅一〇 豚脂五〇〇 右患部ノ塗擦料  
○非沃斯油二〇〇 呀囉仿謨五〇 右混和塗布料

筋肉儂麻質  
斯症候  
一筋若クハ數筋ニ  
儂麻質斯性疼痛ヲ  
發シ之ヲ稱ス四肢  
ノ運動障害セラレ  
若シ頸筋ノ侵サレ  
ハ、キハ頸ハ直立シ  
或ハ斜頸ト爲ル胸  
筋儂麻質斯ニ於テ  
ハ呼吸ニ障害ヲ來  
タス

○別刺敦那越幾斯二〇 單軟膏二〇〇 右混和軟  
膏ト爲シ、塗布ス

內服ニハ抱水格魯刺爾、沃度化加留謨ニ、搵酸莫兒比涅ヲ配  
伍セシ者、發汗藥等ヲ與フ

○抱水格魯刺爾一、五 亞拉昆亞護謨漿 單舍利別  
各三〇〇 右一日三回ニ分服ス

○沃度化加留謨二〇 搵酸莫兒比涅〇〇三 水一八  
〇〇 單舍利別一五〇 右每二時、一食匙

○搵酸必魯加兒必涅〇〇二 白糖〇五 右一日一  
次回、頓服ス

○撒里矢爾酸那篤留謨四〇 右一日四回ニ分服ス

初起新鮮ノ症ニハ、温浴、蒸氣浴等ヲ稱用ス、慢性症ニハ、一定ノ方法ヲ以テ、熱浴(間、之ニ加フルニ硫化加留謨ヲ以テス)ヲ應用シ、爾後毛絨ノ被巾ヲ覆ヒ、發汗ヲ促ス、沈痼性ノ症ニ至テハ、却テ冷水療法ヲ可トス

○急性儂麻質斯性多關節炎又急性關節儂麻質斯

Polyarthritis rheumatica acuta.

〔療法〕厚紙繃帶ヲ以テ、盡ク所患ノ關節ヲ固定シテ、其緊張ヲ減スルノ位置ヲ取ラシメ、氷嚢ヲ貼シ、且ツ沃度丁幾、呀囉仿謨軟膏等ヲ塗布シ、又百倍ノ石炭酸水ヲ一筒宛、皮下ニ注射ス、  
内服ニハ、撒里矢爾酸或ハ撒里矢爾酸那篤留謨ヲ最良トス、又安知歌貌林及ヒ「アンチピリン」ヲ稱用ス、而ノ古爾矢屈謨

急性儂麻質斯性關節炎  
初起ニハ戰慄或ハ惡寒、發熱、淋瀝、進、食氣缺乏、口渴、尿量減少等ヲ發シ、汗甚クハ數ノ一關節若クハ數關節同時ニ赤腫シ、波動ヲ認メ、劇痛ヲ發シ、其運動著シク障害セラレ、而シテ多ク之ニ腫ル、關節ハ膝、足、肩、肘、手、腕等ノ諸關節ナリト雖モ、又他ノ小關節ニモ之ヲ發ス

雙關節、枸橼酸、硝酸加留謨及ヒ那篤倫、沃度化加留謨、プロピ  
トルアミーン等ハ大抵其効少ナシ

○撒里矢爾酸 〇、五 至二右一包ト爲シ、毎二時、一包ヲ服

○撒里矢爾酸那篤留謨 四、〇 水一〇〇、〇 薄荷水三

〇〇、〇 至二右一日四回ニ分服ス

○撒里矢爾酸那篤留謨 八、〇 至二右八包ニ分チ、一日四

回、一包宛

○安知歌貌林 〇、二五 至二右一包ト爲シ、一日三回、一包ヲ

服ス

○「アンチピリン」二、五 至二右三包ニ分チ、一日三回、一包

ヲ服ス

○プロピールアミン二十滴 蒸餾水一五〇〇 橙

皮舍利別一五〇 右混和一日六回、一食匙

間歇ノ狀ヲ呈スル者ハ、規尼涅ヲ與フ、合併症ヲ禦クノ目的  
ヲ以テ、セナトール氏ハ、亞爾加里劑ヲ稱用セリ、重炭酸那篤  
留謨二〇〇乃至四〇〇ヲ一日ノ量トシテ、糖水ニ和シ内服  
セシメ、尿ニ中性反應ヲ呈スルマテ之ヲ持重シ、爾後漸ク少  
量ト爲ス、又安母尼亞水ヲ、一日數回、一滴與フ

○鹽酸規尼涅一〇 右オプラートニ包ミ、一日二回  
ニ、分服ス

最高熱ニハ、二十五度乃至二十度ノ冷浴、及ヒ氷水ノ澀漑法  
ヲ行フ、  
關節ノ強直ヲ殘ス者ハ、溫泉浴法、虛性運動及ヒ按摩法ヲ用

慢性癱瘓質  
斯性關節炎

其主徵ハ關節痛ニ  
シテ、自然若クハ唯壓  
迫、運動ノ際ニ之  
ヲ呈シ、屢々關節腫  
起シ、往々關節ヲ屈  
伸スルノ際、軋音  
ヲ發シ、後ニハ關節  
強直ヲ將來スルヲ  
アリ

慢性癱瘓質斯性關節炎 Arthritis rheuma-

tica chronica.

ウ。時トシテハ外科的ノ療法ヲ要スルコトアリ  
内服ニハ、沃度化加留謨及ヒ古爾矢屈謨ヲ阿片ニ伍シ用ウ  
○沃度化加留謨三〇 水一八〇〇 單舍利別一五〇

右一日三回、二日ニ分服ス 阿片丁幾二〇、  
○古爾矢屈謨丁幾二〇〇、  
阿片丁幾二〇、  
雙蘭菊丁

幾二〇、  
右一日三回、二十滴

外用ニハ、沃度丁幾、酒精性ノ塗擦諸液、沃度仿謨、的列並底等  
ヲ撰用シ、疼痛時ニハ、麻醉藥ヲ與フ

- 沃度仿謨一〇〇 豚脂一〇〇 右外用
- 呀囉仿謨三〇 阿列布油一五〇 右同上





風濕の前側風症  
發シ肋軟骨端ニ  
連珠狀ヲ呈シ胸骨  
ハ前方ニ突出シ胸  
鳩形ト爲ル頭狀ハ  
頭ノ頭蓋勞ヲ見ル  
預後長

食料、粘滑性飲料、旬葛利製葡萄酒ヲ用井、浴湯殊ニ鹽泉浴ヲ  
施シ、清淨乾燥ノ空氣ヲ呼吸セシメ、藁牀上ニ臥シ、頭部ニハ、  
環狀枕ヲ用ウ  
内用藥トシテハ、磷素、肝油、鐵、磷酸石灰等ヲ與フ(其它腸炎ノ  
章ヲ參考スヘシ)

○磷素 〇、〇一 肝油 一〇〇、〇 右混和シ、一日ノ量、一  
茶匙ヲ與フ

○肝油 五〇、〇 右一日二回、一茶匙乃至一食匙(小兒ノ量)  
○乳酸鐵 〇、五 白糖 二、〇 右混和十包ニ分チ、一日

三回一包宛(同上)  
○含糖炭酸鐵 一、〇 炭酸麻偏涅更謨 〇、五 白糖 一  
〇、〇 右混和、一日三回一小刀尖宛(同上)

○可溶性含糖鐵 三〇、〇 右一日三回、一小刀尖(小兒ノ

量)  
○磷酸加爾斐謨 二、〇 磷酸 三、五 水 一五〇、〇 單  
舍利別 三〇、〇 右一日三回、一食匙(小兒ノ量)

畸形療法ヲ必要ナリト認ムルハ、之ヲ施ス  
○骨軟化病 Osteomalacie.

從來此病ニハ、石灰、肝油、鐵、磷等ヲ與フルト雖モ、多クハ皆其  
効確實ナラス、故ニ唯健康上ノ狀態ヲ改良スルニ注意シ、且  
ツ患婦ニ向テ受胎毎トニ、其病勢ノ増進シテ、分娩ノ困難ナ  
ルノ旨ヲ論ス、ヘシ

○腰筋炎 Psoriasis.  
消炎法ヲ施シ、蟻鍼ヲ鼠蹊部ニ、吸角ヲ腰部ニ貼シ、水銀軟膏

骨軟化病症

初起ハ骨盤或ハ脊  
椎ニ發シ、次テ骨盤  
痛ヲ發シ、西洋骨  
ハ變形シテ、西  
牌ノ心臓圖ニ仿  
タリ、脊椎ハ屈  
下肢ハ屈曲シテ、  
歩ムニ全ク之ヲ  
能ハス預後長

腰筋炎症候  
体温少シク昇騰シ  
背即チ骨節ノ  
上部ニ疼痛ヲ發シ

上腿、陰囊等ニ波  
及ス下腿ハ下腹ニ  
向テ屈曲シ僅カニ  
内轉ス歩行スレハ  
大ニ痛アリ

假性筋肉肥  
大症候

其主徴ハ下肢殊ニ  
胫骨ノ容積漸次  
增加スルモ胸及ヒ  
上肢ノ諸筋却テ萎  
縮シ歩行ノ時ハ兩  
脚ヲ開キ大ニ減少  
而シテ力ヲ起スル  
トシハ兩手ヲ支柱  
ルニシテ始テ歩行  
ルカ其狀如シ預後  
不

ヲ塗擦シ、寒罷法ヲ施ス、但シ膿瘍ニ變スルキハ、之ヲ琶布ニ  
交換ス、又外科的療法ヲ要スルコトアリ

○進行性筋消削症 Atrophia muscularis progressiva.

脊髓病ノ篇ヲ參觀ス可シ

○假性筋肉肥大 Pseudohypertrophia musculorum.

遺傳素因ヲ有スルモノハ豫防法トシ筋ノ過勞ヲ禁スヘシ  
已ニ此病ヲ發起スルニ於テハ按摩法、醫療的體操術ヲ行ヒ、  
局處ニ感傳電氣及ヒ平流電氣ヲ施ス、又脊髓及ヒ交感神經  
ニ瓦爾華尼電氣ヲ通スルヲ稱用ス、食糧亦莫クシ

○旋毛蟲病 Trichinosis.

腸病ノ章ヲ參觀ス可シ

附錄 感冒

此病ハ熱ハ或ハ輕易ニ經過シ、或ハ強劇ナルモ只、少時ニ  
シテ快癒シ、其輕易ナル局處症トシ、毫モ關係ナキモノトス、  
發汗藥ヲ持重シ、殊ニ耶僕蘭日葉ヲ與フ、稀レニ對症療法ヲ  
施スコトアリ

○旬行熱、一日熱、儂麻質斯熱、加答兒熱

○林德頓 Febris herpetica, ephemera, rheumatica, catarrhalis.

此諸病ノ熱ハ或ハ輕易ニ經過シ、或ハ強劇ナルモ只、少時ニ  
シテ快癒シ、其輕易ナル局處症トシ、毫モ關係ナキモノトス、  
發汗藥ヲ持重シ、殊ニ耶僕蘭日葉ヲ與フ、稀レニ對症療法ヲ  
施スコトアリ

○民埜列里精二五、〇 接骨木花浸一五〇、〇 接骨木花

醋酸依的兒五、〇 右適宜ノ沸湯ニ浸出濾過シテ、

○耶僕蘭日葉二、〇 右適宜ノ沸湯ニ浸出濾過シテ、

五〇、〇ト爲シ、頓服ス

第八篇

全身病



萎黃病症候  
皮膚粘膜爪甲等  
呈シキ蒼白色チ  
於ケルモ呼吸促  
迫、心忪、力乏ニ  
疲勞ス心臓チ診  
スルニ無器的吹  
雜音チ聞ク又頸  
脈ニ腫鳴チ取  
ニ過多ト爲ルモ  
月經閉止スル種  
弊私的里樣症  
呈ス預後其狀チ

第一節 不傳染性全身病

萎黃病 Chlorose.

多量ノ鐵劑ヲ與フ(亦砒石劑ヲ與フルコアリ)  
強壯藥ヲ與ヘ、牛乳療法、適當ノ攝生法ヲ施シ、大便ノ順利ニ  
注意ス

○硫酸鐵 炭酸加留謨 純精酒石各一五〇  
達拉侃篤護謨適宜 右百九ト爲シ、一日六丸乃至十

五丸  
○還元鐵 硫酸規尼涅各一五 偏里設林適宜

右混和、三十九ト爲シ、一日三回一丸宛

○林檎鐵丁幾二〇〇 右一日三回、二十滴

○可溶性含糖鐵五〇 右一日數回ニ分服ス

白血病症候  
脾腫、淋巴腫大ニ  
腫大シ往々鎖骨、  
胸骨等ニ隆起チ生  
ス皮膚蒼白色チ呈  
シ、鼻、唇、口腔、  
後、胃、腸等ヨリ出  
血スルコトアリ血液  
ヲ檢スルニ白血球  
増加シ赤血球減少  
ス預後多クハ不長

白血病 Leukämie

(原因) 下腹充血、月經違常、精神ノ感動、梅毒、間歇熱、腸加答兒  
等ナリ

多量ノ規尼涅ヲ與ヘ、兼テ脾臟部ニ冷水灌漑法ヲ施ス、ビペ  
リン、砒石等モ亦効アリ

○鹽酸規尼涅〇、五 右「オブライト」ニ包ミ、一日一回

乃至二回、一包ヲ服ス

○亞砒酸加留謨液五〇 林檎鐵丁幾二〇〇 硫酸規

尼涅二〇〇 右一日三回、二十五滴



縛法ヲ反復ス  
 同時ニ、骨病及ヒ關節病、皮疹、粘膜加答兒、眼病、特ニ腺腫等ノ  
 局處療法ヲ併セ施スヘシ、又一週二回、一定ノ方法ニ隨テ、軟  
 石鹼ノ塗擦ヲ行フコトアリ、其法ハ晚暮一食匙強ノ軟石鹼ヲ  
 取り、體軀及ヒ兩脚ノ後面ニ塗擦シ、十分時ノ後復タ之ヲ洗  
 滌スルニ在リ(此法ハ腺病性眼病ニモ亦之ヲ稱用スル者アリ)

○矢荷兒陪克 Scorbut

預防法トシテ、新鮮ノ植物性食料、枸橼汁ヲ取り清淨ノ空氣  
 ナ呼吸シ、乾燥ノ居室、佳良ノ飲水ヲ撰用ス  
 (療法) 各種ノ新鮮植物汁、蔬菜、果物、葡萄酒、枸橼汁、酒石酸、衰  
 弱ヲ呈スル者ハ、規那、強壯藥、又蜜柑、金柑、橙實等ヲ、口中ニ含  
 マシメ、其津汁ヲ吸啜スルヲ可トス

初メ身體倦怠ヲ覺  
 ヘ事業ヲ操ルヲ厭  
 フ而シテ齒齦腫起シ  
 テ出血シ易ク其緣  
 ハ汚穢ノ青色ヲ帶  
 フ膿ヲ潰瘍チ生ス  
 齒牙自ラ搖動シ大  
 小ノ血斑チ現ハシ  
 重シクハ於テハ筋  
 肉、關節、骨質、体  
 アリ預後往々不長

矢荷兒陪克 症候

糖尿病症候

尿中ニ糖分ヲ含ミ  
 尿量大ニ増加シテ  
 四千瓦乃至一萬瓦  
 ニ達シ其色淡黃色  
 ニシテ異重増加ス  
 ノ多量ノ飲料ヲ取  
 ルモ口渴常ニ甚シ  
 ク安眠スルヲ得ス  
 多クハ食量著シク  
 増加スルモ身體甚  
 シク衰弱ス預後多  
 クハ凶

- 枸橼汁 三〇、〇 右一日、數回ニ分服ス
- 酒石酸 五、〇 白糖 三〇、〇 水 二〇〇、〇 右毎二  
時、一食匙
- 規那煎(一五、〇)ニ〇〇、〇 ハルレル氏酸 二、〇 單舎
- 利別 一五、〇 右同上

矢荷兒陪克性口炎本症ノ爲ニ及ヒ他ノ合併症(出血、出血性  
 胸膜炎、心臟外膜炎)ハ各、適當ノ治療ヲ要ス

○糖尿病 (蜜尿病) Diabetes mellitus.

(療法) 嚴ニ飲食法ヲ整正ナラシメ、糖質ニ變スヘキ食料、即  
 チ米、蕃薯、甘藷、小麥、柿、梨子、葡萄等ヲ食スルハ不可ナリ、然ル  
 ニ米ヲ以テ、主要ノ食料ニ供スル所ノ人體ニ於テ、全ク之ヲ  
 禁止スルハ、實際上頗ル困難ナルガ故ニ、稍之ヲ寛カニスヘ

此病ハ糖尿ノ如ク尿量ニ増加ス  
ト雖モ無色ニシテ  
量モ少ナク尿中  
ニ糖分ヲ含有セス  
且ツ榮養ノ障害著  
シカラズ而シテ尿  
頻數、煩渴ヲ發ス

之ニ反シテ獸肉、魚肉、卵、牡蠣、海老、豆腐、石花菜、<sup>カンナ</sup>綠色ノ蔬菜、  
菜豆、豌豆等ハ可ナリ、但シ一切之ヲ多食スルヲ禁ス  
藥餌トシテハ、阿片、石炭酸、撒里矢爾酸那篤留謨、砒石、沃度仿  
謨、加兒爾斯泉搥ヲ與フ、結尾療法ニハ強壯藥ヲ與フ、  
皮膚ヲ攝養シ、且ツ適宜ノ運動ヲ爲サシム

○阿片越幾斯〇、一五 甘艸末 各適宜  
右十九ト爲シ、一日四五丸

○石炭酸五、〇 龍膽越幾斯 龍膽末 各適宜  
右五十九ト爲シ、一日三回、二九乃至四九

○撒里矢爾酸那篤留謨四、〇乃至六、〇 右一日、數回ニ分  
服ス 水二〇、〇 右一日三回十

○亞砒酸加留謨液五、〇 水二〇、〇 右一日三回十

淡尿崩症候

此病ハ糖尿ノ如ク尿量ニ増加ス  
ト雖モ無色ニシテ  
量モ少ナク尿中  
ニ糖分ヲ含有セス  
且ツ榮養ノ障害著  
シカラズ而シテ尿  
頻數、煩渴ヲ發ス

二滴ヲ與ヘ、漸次其量ヲ増加セテ、一日ノ量百二十滴ニ  
至ル

○沃度仿謨一、五 龍膽越幾斯 龍膽末 各適宜  
右混和三十九ト爲シ、一日四回、一丸ヲ與フ

○淡尿崩(單尿崩) Diabetes insipidus.

原因療法トシテハ、驅梅法ヲ施ス、歇私的里、脊髓病等ヲ治ス  
ヘシ

鄭重ニ皮膚ヲ保護シ、渴アル者ニハ、氷片、微酸味ノ飲料等ヲ  
與フ、内用藥ニハ、阿片、麥角越幾斯、耶僕蘭日葉等モ亦タ可ナ  
リ

○阿片〇、〇一五 白糖〇、五 右十包ヲ作り、一日五  
回、一包

○麥角越幾斯二五 水三〇〇〇 右一日六回、一小

兒匙

○麥角越幾斯〇八 甘艸末適宜 右十六丸ト爲シ、

一日八回、一丸

○耶僕蘭日葉浸(二〇)五〇〇 右一日一回、頓服

平流電氣ヲ脊柱及ヒ腎臟部位ニ施ス

○澱粉病 肝、腎、脾、諸臟、淋、巴、腺、及ヒ腸結 Amyloid-

Krankheit.

(原因) 腺病、佝僂病、勞瘵、經久性ノ膿腫、癌腫、水銀中毒及ヒ間歇熱等ノ沉痾ニ陥リタル者、梅毒、痛風等ナリ

(治法) 可及的原因療法ヲ施ス(即チ本患アル肢節ヲ切斷シ、梅毒ヲ根治スル等ノ如シ)、其它、沃度化加留謨、沃度化鐵舍利

別、格魯兒化鐵安母紐謨ヲ用キ、消化シ易キ滋養料ヲ與ヘ、入浴ヲ命ス、水腫アル者ニハ、孕礪酒石ヲ與ヘ、發汗療法ヲ施ス

○沃度化加留謨二〇 水二〇〇〇 苦味丁幾三〇

右每二時、一食匙

○沃度化鐵舍利別一五〇 單舍利別五〇〇 右一

日三回、半食匙乃至一食匙

○格魯兒化鐵安母紐謨 龍膽越幾斯 大黃末各二、

右五十九ト爲シ、一日三回、二丸乃至三丸

○孕礪酒石二〇〇 海葱浸(二〇)二〇〇〇 單舍利別

二〇〇 右每一二時、一食匙

○脂肪增多症 Adiposis.

可及的蛋白質ニ富メル食物ヲ與ヘ、兼テ脂肪、澱粉、膠質等ノ

アヂソン氏  
病症候  
此病ノ主徴ハ甚シ  
キ貧血及ヒ衰弱ニ  
シテ兼テ神經障害ヲ  
來シ皮膚ニ暗色  
ノ色素沈着シ同時  
ニ副腎ノ疾患ヲ兼  
テナル者ナリ預後不  
良

食用ヲ限制ス、少量ノ咖啡及ヒ茶、弱キ葡萄酒ハ可ナリ、  
諸筋ノ動作ヲ勉メ、冷水浴ヲ行ヒ、芒硝ヲ含有スル鑛水ヲ飲  
用ス  
貧血性ノ素質アル者ニハ、鐵劑ヲ與フ(磷酸加爾叟謀ニ伍ス)  
○磷酸鐵ニ、○正磷酸加爾叟謀五、〇回ニ浦公英越幾斯適宜  
右六十九ト爲シ、一日二回、三九  
○アヂソン氏病 Morbus Addisoni.  
對症的ノ療法ヲ行フ、安靜ナル生活ヲ營ミ、佳良ノ飲食ヲ取  
ラシメ、心臟筋ニ對スル刺戟法ヲ施シ、鐵劑及ヒ規尼涅劑ヲ  
用ユ  
○鹽酸規尼涅 還元鐵各一、五 偏里設林適宜  
右三十九ト爲シ、一日三回、一九

○硫酸鐵一五、〇 煖製麻偏涅矢亞二、五 偏里設林適

宜 右九十九ト爲シ、一日二九乃至六九

○ウエルホッフ氏斑點病 Morbus macul. Verhoeffi.

血行器病ノ部ニ出ツ

○水腫(全身水腫及皮膚水腫) Hydrops

(原因) (一)血液ノ變性、及ヒ交流作用ノ變化 ○蛋白減少症、衰  
憊性諸病ノ後ニ發スル水血病、麻拉利亞、過多ノ刺絡、蛋白質  
消失(體液不調性水腫)等ナリ  
(二)蔓延性及ヒ局處性鬱血 ○調節機能ヲ失却セル心臟瓣膜  
病、心臟收縮力ノ衰弱、血管諸病、小循環、心臟及肺臟諸病、門脉  
系(肝臟病)、腎臟等ノ鬱血、腫瘍及ヒ滲出物ノ壓迫(所謂器械的  
水腫)ニシテ、多クハ第一原因ト合併ス(等ナリ)

其原因、依然トシテ去ラザル時ニハ次ノ諸法ヲ施スモ皆滲  
 出物ヲシテ一時除去セシムルニ過キス、  
 吸收藥ヲ與ヘ、殊ニ定法的ノ發汗療法ヲ行フ、即チ半時乃至  
 一時間入浴セシメテ後、之ニ熱湯ヲ注加シ漸々攝氏四十一  
 度ニ至ラシム、心臟衰弱、毛細氣管支炎、發熱、衰憊過甚ニハ、之  
 チ禁ス、又內用藥ニハ、利尿藥(殊ニ孕礪酒石、醋酸加倍謨)ヲ實  
 菱答利斯浸ニ配伍スル者、海葱、峻下藥等ヲ與フ  
 ○孕礪酒石一五〇〇 海葱浸(一、五)一五〇〇 橙皮舍利別  
 二五〇 右每二時、一食匙  
 ○實菱答利斯浸(一、五)一八〇〇 醋酸加倍謨六〇 單  
 舍利別一五〇 右同上  
 ○實菱答利斯末 海葱根末各二〇 龍膽越幾斯一、二

猩紅熱症候  
 惡寒或ハ戰慄ヲ以  
 テ起リ體溫昇騰シ  
 軟口蓋及ヒ咽頭炎  
 ナリ發シ二三日ヲ經  
 テ初メ頸部及ヒ胸  
 部ニ刺針頭大乃至

杜松實油〇、四 亞拉昆亞護謨適宜 右三十九ト  
 爲シ、一日三回乃至四回、一九  
 ○古魯聖篤越幾斯〇、八 蘆薈三、七 大黃末二、〇  
 右四十五丸ト爲シ、一日四九乃至六九  
 強壯藥ニハ規那、鐵劑等ヲ與ヘ、蛋白質ノ食物ヲ取ラシメ、一  
 般ノ生活法ヲ改良スヘシ  
 腹水ニハ、穿腹術ヲ行フコアリ  
**第二節 傳染性全身病**  
 (甲) 觸染性諸病(所謂急性發疹病)  
 ○大黃〇 猩紅熱 *Scarlatina* 〇、一〇〇〇  
 對症療法ニハ、病室ヲ清冷ニシ、空氣ノ流通ヲ佳良ナラシメ  
 清冽ノ水、或ハ一種ノ酸ヲ加ヘタル水ヲ與ヘ、灌腸法又ハ緩

米粒大ノ赤斑ヲ發シ一日ノ經過中ニ他ノ一部ニモ之ヲ呈ス此斑點相合ニスレハ皮膚一種ニ赤色トナル而シテ疹ハ四五日ヲ經テ退色シ體温下降シ遂ニ表皮脱落シテ治ス預後大抵長テ

下藥ニ由リ、大便ヲ順利スルヲ要ス(甘汞ヲ禁忌ス)

○鹽酸里母奈埜二〇〇、〇 右每二時、一食匙

○大黃末一五、〇 右水ヲ以テ煎熬濾過シテ、一〇〇、〇ノ液ヲ取ル 右浣腸料ト爲ス

○蓖麻子油一五、〇 右頓服

熱勢熾盛ナル時、或ハ神經症ヲ合併スル者ニハ、微温浴(攝氏三十度乃至三十二度)ヲ命シ、漸々ニ冷却シテ、二十五度乃至二十度ニ至ル、且ツ頻回之ヲ反復セシム、或ハ冷濕布ノ被包ヲ施ス、豚脂或ハ脂肪油ノ塗擦法(ハツツ氏ノ說ニ據レ、ハ、一、脂肪ニ和シ、毎二時乃チ行フ)アリ是レ皮膚ノ緊張ヲ緩和セシムルノ效アリト雖モ、病ノ治癒ヲ促ス者ニ非ラス、内服ニハ規尼涅、アノナヒリンチ與フ

麻疹症候  
初起ニハ惡寒或ハ戰慄ヲ以テ體温昇騰シ結膜、鼻及ヒ氣管枝加答兒ヲ發シ第三日乃至第五日ニ至テ顔面ヨリ漸次頭部、頸部及ヒ四肢ニ分界性平坦ノ疹ヲ發シ數

剝脫期中モ、亦慎テ臥牀ニ在ル可シ

咽頭炎アル者ニハ、寒罨法或ハブリースニツ氏ノ罨濕法ヲ施シ、含嗽料ヲ與ヘ、毛筆ヲ以テ咽頭ニ十五倍ノ硝酸銀溶液ヲ塗布ス、又貌羅謨化加留謨ヲ格魯兒水ニ伍スル者等ヲ與フ、總テ實扶的里亞ノ條ヲ參考スヘシ

○五十倍ノ格魯兒酸加留謨溶液二〇〇、〇 右含嗽料トス

急性腎炎ヲ合併スルキハ、其條下ヲ參考スヘシ

○麻疹 Morbilli

輕易ノ症ニハ、唯、粘滑性ノ飲料或ハ里母奈埜ヲ與ヘ、患者ノ居室ハ微暗廣潤ニシテ、空氣ノ暢通ニ便ナルヲ欲ス、且ツ室內ノ温ハ十五度乃至二十度ノ間ニ在ルヘシ、發疹若シ眼ニ



日チ經テ皮膚色  
シ熱及ヒ諸症輕快  
シ平均二週間ニ  
治癒ス預後流行性  
スニ關シテ一様ナラ

及フキハ、收斂性ノ冷罨法ヲ施ス  
便秘スル者ハ緩下藥ヲ與ヘ、下利アル者ハ、收斂藥(麻醉藥ヲ  
禁忌ス)、又寒冷纏絡法等ヲ要ス、咳嗽アレ者ハ甘味ノ粘滑飲  
料ヲ與ヘ、又苦扁桃水ヲ用キルコトアリ

○蓖麻子油 右一歳以上ノ小兒ニハ五、〇ヲ與フ

○甘汞〇、〇一 乳糖〇、五 右頓服(一二歳ノ小兒)

○次硝酸蒼鉛〇、〇一 重碳酸那篤留謨〇、三 右六

包ヲ作り、一日三回、一包(同上)

○硝酸銀〇、〇三 水六〇、〇 偏里設林一〇、〇 右

每二時、一茶匙(同上)

○蜀葵根煎(五、〇)一〇〇、〇 單舍利別一〇、〇 右每

二時、半食匙(同上)

風疹症候  
前兆及ヒ熱候ナク  
前發シ一ニ日ニ小  
疹ヲ消滅ス其癢ハ  
點麻疹ニ比スレハ

熱勢熾盛、或ハ肺病ヲ兼ヌル者ニハ、冷浴、寒冷纏絡法(奎扶斯  
ノ條ヲ參觀スヘシ)ヲ施シ、又撒里矢爾酸那篤留謨、規尼涅、ア  
ンチピリン等ヲ與フ  
○撒里矢爾酸那篤留謨 右一歳以上ノ小兒ニハ、一  
日一、〇若クハ稍、一、〇以上ヲ與フ  
皮疹ノ速ニ蒼白ト爲リテ、内部ノ炎症ヲ發スルキハ、少量ノ  
鹽酸必魯加兒必涅ヲ與フ(大抵一歳ノ小兒ニハ、〇、〇〇二乃  
至〇、〇〇三ヲ皮下注射劑トス)  
其它更ニ、毛細氣管支炎、假性格魯布及ヒ纖維性喉頭炎等ノ  
部ヲ參考スヘシ

○風疹 Rubellae.

風疹ハ素ト輕易ノ病ニシテ、意ニ介スルニ足ラス故ニ唯姑息

僅ニ小ナリ結膜炎  
ヲ映如ス氣道ノ加  
答兒ハ輕シ預後其

痘瘡(真痘)及假痘(症)

戰慄ヲ以テ体温大  
量昇騰シ劇頭痛眩  
暈ノ終リニ於テ第  
三日ノ終リニ於テ  
初日ノ終リニ於テ  
體部ニ扁平ナル  
疹疹ノ者ヲ見ル  
第五日ニ其疹點  
結節ヲ作シ第六日  
小水疱ヲ生シ漸ク  
増大シ生シ漸ク  
赤暈ヲ生シ漸ク  
身腫チ生シ漸ク  
痘ノ結節ヲ初メ  
後直ニ著シクハ  
昇騰ス假痘ニ於テ  
正ナリ其數モ亦不  
温ニ復シ又瀉後熱

對症療法ヲ施ス、輕症麻疹ノ如クスヘシ而シテ屢之ト同  
病ナリト看做スコアリ

○痘瘡(真痘)及假痘(症) Variola und Variolosis.

預防法ニハ、種痘ヲ施シ、數年ニ之ヲ反復スヘシ  
其病已ニ感染シタルキハ、對症療法ヲ行フニ過キス、即チ清  
涼ノ室ニ穩臥セシメ、里母奈埜ヲ與ヘ、氷片ヲ含マシメ、格魯  
兒酸加留謨溶液(五十倍ノ者)ノ含嗽ヲ命ス、頭部ノ充血アル  
者ハ、氷囊ヲ貼シ、聲門障害ノ爲メニ、呼吸困難ヲ起シタルキ  
ハ催吐藥ヲ與ヘ、時宜ニ由テ、氣管枝切開術ヲ行フコアリ、心  
臟麻痺ニハ、興奮藥ヲ投シ、熱勢ノ劇甚ナル者ニハ、撒里矢爾  
酸那篤留謨用ニ量ハ麻ヲ與フ  
○吐根浸(四、〇)六、〇〇  
單舍利別一〇、〇〇 右每十五

ハナシ  
不定ナリ預後真痘  
其

分時、一食匙(小兒ニハ一茶匙)

癩痕ヲ豫防スルニハ、水銀硬膏、水銀軟膏、偏里設林、石炭酸軟  
膏等ヲ塗布ス可シ

○石炭酸一、〇〇 豚脂一五、〇〇 右軟膏ト爲シ、塗擦料

○石炭酸五、〇〇 阿列布油 澱粉各四〇、〇〇 右混

和軟膏ト爲シ、塗擦料

其他ノ合併症アレハ、臨機ニ其治療ヲ要ス

ヘブラ氏ハ、發病後十日、或ハ十一日ニ至リ、膿胞將ニ膿液ヲ  
充填セントスルノ際ヨリシテ、毎日三乃至四時間ヲ持久ス  
ル温浴ニ入ラシメ、大ニ其効ヲ見タリ

水痘ハ、特ニ小兒ニ發スル者ニシテ、其發疹ノ狀痘瘡ニ  
類ス、然レモ全ク痘瘡及ヒ假痘ニ異ナレリ、其初期ニ於

間歇熱症候  
其主徵ハ間歇熱ノ  
發作ナリ即チ初熱ノ  
戰慄ヲ發シ冷チテ  
骨色ヲ呈シ體温リニ  
青ハ此際體温已  
關牙ノ昇降ス大ニ  
二大ニ昇降ス大ニ  
灼熱ノ感覺ヲ發シ  
皮膚赤色ヲ發シ  
濕引飲ス體温常  
淋瀝從テ此發作ハ  
ニ復ス此發作ハ每  
日、毎三日若クハ  
毎四日ニ起ル者ナ  
リ預後其

テハ、只清凉法ヲ行ヒ、水泡ヲ摩擦セサルニ注意スレハ  
即チ可ナリ

(乙) 麻拉利亞性諸病

○ 間歇熱 Febris intermittens.

内服ニハ、規尼涅之ニ伍スルニ、必魯加兒必涅ヲ以テスルモ  
亦可ナリ)ヲ與ヘ、若シ消化機能ニ障害アリテ之ニ堪フル  
能ハサレハ之ヲ浣腸料ニ供ス

其他、撒里矢爾酸那篤留謨、砒石、有加利葉、ビペリン等ヲ用ウ

○ 鹽酸規尼涅一〇、鹽酸必魯加兒必涅〇〇一

「オプラート」ニ包ミ、發作前五時間ヲ隔テ、頓服シ、其翌

日ヨリ、日々鹽酸規尼涅〇、五ヲ、一回頓服スルヲ、五六日

間ニ及フヘシ

○ 撒里矢爾酸那篤留謨三、〇 右「オプラート」ニ包ミ、

頓服シ、其翌日ヨリ日々一、五ヲ一日二回頓服スルヲ五

日乃至七日間ニ至ルヘシ

○ 亞砒酸加留謨液 水各五、〇 右一日三回、十滴

乃至十二滴

○ 有加利葉丁幾四五、〇 右一日三回、一茶匙

○「ビペリン」二、〇 白糖一、五 右一日、三回ニ分服ス

寒冷灌水法、及ヒ射水法ハ殊ニ發作前ニ於テ、之ヲ脾臟部ニ

施スチ可トス

惡寒期ニハ、温煖ナル毛布ヲ以テ、身體ヲ被包シ、湯婆ヲ牀中

ニ置キ劇キ嘔吐ヲ發スルキハ、沸騰散或ハ阿片丁幾數滴ヲ

與フ、虚脱ニ陥ラントスル者ニハ、興奮藥ヲ要ス

發熱期ニハ、總テ寒冷法ヲ施シ、冷水或ハ氷ヲ與フ、頭部ノ充  
血甚シキ者ハ、頭部ニ寒罨法ヲ施シ、極メテ稀レニハ、局處放  
血法ヲ行フコトアリ

○麻拉利亞惡液質 Malaria kachexie.

此病ニハ、鎮劑及ヒ規尼涅ヲ與フヘシ且ツ麻拉利亞地方ヲ  
避ケシメ滋養物(即チ牛乳、肉類、鷄卵)、規那酒等ヲ用ヒ適宜ノ  
運動ヲ命スヘシ

○硫酸規尼涅 硫酸鐵各二、五 龍膽越幾斯適宜

○右五十九ト爲シ甘草末ヲ衣トシ、一日三丸乃至六丸ヲ

與フ

○脚氣 Kake.

初期ニハ、專ラ安靜ヲ旨トシ、飲食攝生ヲ嚴守ス、其稍重症ノ

麻拉利亞惡液質候  
是レ麻拉利亞地方  
ニ住スル人ニ發ス  
ル者ニ初起ハ食  
氣缺損シ眩暈ヲ發  
シ大ニ疲勞倦怠シ  
貧血ヲ呈シ脾臟腫  
大ス

脚氣症候

乾性症ニ於テハ初  
期ニハ、脚部ニ腫  
脹アリ、同時間ニ  
下重倦

脚氣症候  
乾性症ニ於テハ初  
期ニハ、脚部ニ腫  
脹アリ、同時間ニ  
下重倦

者ニ在テハ、務メテ消化シ易キ食餌ヲ與ヘテ、惡心嘔吐等ノ  
催起セサルヲ要ス、就中牛乳ハ佳適ノ者トス  
輕症ニシテ、下肢倦怠、腓腸緊張シ(恰モ遠行セシキノ如ク)、且ツ  
下脚ノ知覺異常ヲ發シ、其心悸亢進ヲ呈セサル者ハ、重酒石  
酸加留謨、耶僕蘭日、麥角越幾斯等ヲ與ヘ、又必魯加兒必涅ト  
斯篤里幾尼涅ノ皮下注射法ヲ施シテ、速効ヲ得ルコトアリ、但  
シ痙攣症ノ増進セントスル者ハ、注射法ヲ施スヘカラス  
○重酒石酸加留謨一〇〇 苦味丁幾四〇 水二〇〇〇  
○右一日三回、二日ニ分服ス  
○重酒石酸加留謨一〇〇 番木鱉丁幾一、五乃至二〇  
○水二〇〇〇 右用法同上  
○麥角越幾斯一〇 甘草羔適宜 右十六丸ト爲

○シ、一日四回二丸

○耶僕蘭日葉浸(一〇、〇)二〇〇、〇 硝酸斯篤里幾尼涅

〇〇、〇 右一日三回、二日ニ分服ス

○鹽酸必魯加兒必涅〇、〇ニ 硝酸斯篤里幾尼涅〇、〇ニ

〇〇、〇 右一日一回、一筒、皮下ニ注射ス

下肢倦重、膝關節弛縱、腓腸攣痛、步行困難等アリテ、知覺異常漸ク小腹、上肢及ヒ口唇ニ延及シ、且ツ心悸亢進シテ、浮腫アル者ハ、鹽性瀉下藥ヲ投シ、實菱答利斯ニ硝酸加榴謨、醋酸加榴謨、重酒石酸加榴謨等ヲ配伍シテ與ヘ、又別刺敦那越幾斯若クハ多量ノ麥角越幾斯ヲ用キテ効ヲ奏スルコトアリ、或ハ發汗法ヲ行フテ良驗ヲ得ルコトアリ、唯心悸亢進ノミニノ爾餘ノ症狀顯著ナラサル者ハ、迷走神經ニ平流電氣ヲ施シ往

カ偉効ヲ見ル、但シ慢性ノ慢性脚氣ニシテ、心悸亢進セサル者ハ、發汗藥、利尿藥、瀉下藥等ヲ用キルコトナク、却テ健胃強壯藥及ヒ滋養ノ食餌ヲ與フルコト優レリトス

○實菱答利斯浸(一、〇乃至一、五)二〇〇、〇 醋酸加榴謨(六、〇乃至八、〇) 單舍利別(一、五) 右每二時、一食匙

○別刺敦那越幾斯〇、〇ニ 白糖三、〇 右六包ニ分

○麥角越幾斯一、五 甘草羔適宜 右二十九ト爲シ、一日五回、二丸

○鹽酸必魯加兒必涅〇、〇ニ 硝酸斯篤里幾尼涅〇、〇ニ

〇〇、〇 右每二時、一茶匙

〇〇、〇 稀鹽酸二、〇

〇硫酸麻偏涅叟謨四〇〇、〇 水二〇〇、〇

右一日三回二日ニ分服ス

○規那煎(八、〇)二〇〇〇 硫酸麻偏涅叟謨三〇〇

右一日三回二日ニ分服ス

○人工加兒爾斯泉搯一五〇

右每朝微温湯ニ溶解シ、

頓服

重症ニシテ心悸亢進、胸腔苦悶、呼吸促迫、顔面蒼白色ヲ呈スル者ハ、心臟部ニ氷囊ヲ置キ、或ハ胸背ニ芥子泥及ヒ乾角ヲ貼ス、或ハ項背ニ數箇ノ血角ヲ施シテ緩解ヲ得ルコトアリ、但シ嘔吐セサル者ハ、鹽性瀉下藥或ハ甘汞若シハ甘汞ト蒺刺巴チ投シ、其他實菱答利斯、酒精、樟腦等ヲ與ヘ、既ニ嘔吐ヲ發スル者ハ、屢香鼠料ノ灌腸法ヲ行ヒ、口内ニ氷片ヲ含マシメ、或ハ氷水ニ沃度丁幾數滴ヲ加ヘテ與ヘ、力メテ爾餘ノ飲料ヲ

節減シ、胃ノ刺戟ヲ避ケ、每一時乃至每三時、一回樟腦ノ皮下注射法ヲ行フテ心臟ノ麻痺ヲ防キ、時トシテ實菱答林ノ皮下注射法ヲ施シテ功ヲ奏スルコトアリ、又該症増惡シテ、患者苦惱ニ堪ヘス、輾轉反側スル者ハ、刺絡ヲ施シ二〇〇、〇乃至三〇〇、〇ノ血液ヲ放瀉シテ一時緩解ヲ得ルコトアリ、然レモ心機既ニ衰憊シテ甚シキ青色ヲ呈スルニ至テハ瀉血ハ却テ害アリトス

○硫酸麻偏涅叟謨四〇〇 水二〇〇〇 稀鹽酸一〇

右一日三回二日ニ分服

○人工加兒爾斯泉搯一五〇 右每朝微温湯ニ溶解シ、頓服

○甘汞 白糖各〇、五 右頓服

○甘汞 蒺刺巴各〇、五 右頓服

○實菱答利斯浸(二、〇)二〇〇、〇 赤葡萄酒五〇、〇 單

舍利別三〇、〇 右混和一日六回、二日ニ分服ス

○實菱答利斯浸(一、五乃至二、〇)二〇〇、〇 忽布滿氏鎮痛

液五、〇 單舍利別一五、〇 右每二時、一食匙

○樟腦一、〇 白糖五、〇 右十包ニ分テ、一日三包

乃至五包ヲ與フ

○樟腦二、〇 阿列布油二〇、〇 右一筒宛皮下ニ注

射ス

○「ボルト」酒六〇、〇 單舍利別一五、〇 右一日數回

分服ス 右皮下注射料、但

○加密爾列浸(三〇、〇)四〇〇、〇 右灌腸料

回復期ニ於テハ、極メテ消化シ易キ滋養物ヲ與フヘシ、乃チ  
 牛乳、鶏卵、肉溶液、肉羹汁、肉越幾斯、其他赤葡萄酒、「ボルト」酒、セ  
 リ酒、卵酒日本酒ニ蛋黃及等ヲ最良トス、而シテ隔日或ハ毎  
 日一回、温浴若クハ食鹽浴ヲ行ヒ、其脚力ヲ失却セサル者ハ、  
 適宜ニ散歩逍遙セシムヘシ、内服藥ハ、規那煎、鉄劑、亞砒酸、双  
 蘭菊、斯篤里幾尼涅等ヲ用キ、又沃度劑ヲ兼用シテ卓効アリ、  
 筋肉瘦削シテ痿痺甚シキ者ハ、斯篤里幾尼涅ノ皮下注射法  
 ナ行フヲ可トス、殊ニ平流及ヒ感傳電氣ハ、該症ニ對シテ最  
 モ必要トス、毎日浴后ニ之ヲ施シテ長續ヲ得ヘシ  
 ○規那煎(一〇、〇)二〇〇、〇 番木籃丁幾一、五乃至二、〇

稀鹽酸 一、五〇 單舍利別 一五、〇 右每二時、一食匙  
 ○規那煎 一〇、〇 一五〇、〇 赤葡萄酒 五〇、〇 稀鹽酸  
 二〇、〇 單舍利別 一五、〇 右混和、每二時一食匙  
 ○林檎鐵丁幾 二〇、〇 亞砒酸加留謀液 五、〇 右每  
 食後、二十滴  
 ○鐵飴煎 一〇〇、〇 乃至一五〇、〇 內服 右一日三回、二日二分服  
 ○枸橼酸鐵 鹽酸規尼涅 各〇、五 亞砒酸 〇、〇一  
 甘草羔適宜 右十二丸ト爲シ、每食后、二丸  
 ○雙蘭菊越幾斯 〇、二 甘草羔適宜 右十九ト爲  
 シ、朝夕一九ヲ與フ  
 ○硝酸斯篤里幾尼涅 〇、一 鹽水 二〇、〇 右一日一

亞細亞虎列刺症候  
 初起ハ屢々尋常ノ  
 下利ヲ以テ起リ其  
 度數一時間一二回  
 ニ達シ其量極テ多  
 シ漸ク米汁色ヲ多  
 呈シ便臭ナシ嘔吐  
 ナリ而シテ皮膚青  
 色、四肢厥冷、眼球  
 陷沒、肝腸腫痛、脈  
 搏細數、聲音嘶嘎  
 等ヲ來タシ尿量減  
 少或ハ全ク尿閉ス

一回一筒、左右ノ脚ヲ交換シテ皮下ニ注射ス  
 ○沃度化加留謀 二、〇 硫酸鐵 一、〇 桂皮水 二五、〇  
 右溶和濾過シテ之ニ硝酸斯篤里幾尼涅 〇、〇二及ヒ水飴  
 一五〇、〇ヲ加フ 右一日三回、一食匙乃至一食匙  
 半  
**(丙) 瘴毒性觸染性諸病**  
 ○亞細亞虎列刺 Cholera asiatica.  
 (甲) 虎列刺下利及ヒ類似虎列刺及ヒ眞性虎列刺初起(蛋白  
 尿アル者)  
 能ク患者ヲ温覆シ、稀薄ノ粘滑飲料、阿片、格魯兒水、規尼涅、發  
 汗藥(温煖ナル芳香性浸劑、咖啡ニ良好ノ燒酒ヲ和スル者、蒸  
 氣浴)等ヲ與フ若シ内服ニ堪ヘサルキハ、阿片、鞣酸等ノ浣腸



然レ幸ニ治ニ就  
ク者ニ於テハ吐  
爾止ミ尿量増加シ  
ルハ往々第五六日  
ニ至テ虎列刺委斐  
土症ニ陥リ即チ患  
者無慾、嗜睡ヲ發  
シ嘔吐シ尿量再ヒ  
減少シ体温昇騰、  
舌乾燥シ昏睡ニ陥  
ル預後不良

- ヲ施スヘシ
- 阿片〇、〇五 白糖〇、五 右一包ト爲シ、一日三回、一包
  - 阿片丁幾一〇、〇 右一日三回、十五滴
  - 阿片丁幾二、〇 纈草丁幾一〇、〇 吐根酒五、〇 薄荷油五滴 右每二時、二十滴
  - 格魯兒水二〇、〇 蜀葵根舍利別四〇、〇 右每十分時、一茶匙(此際時々、氷片ヲ含マシムヘシ)
  - 鹽酸規尼涅〇、三 右十包ヲ作り、一日三四回、一包
  - 接骨木花一五、〇 右茶劑料トス
  - 阿片丁幾一〇、〇 水一〇〇、〇 右浣腸料
  - 鞣酸〇、五 火酒一五、〇 水一〇〇、〇 右同上

(乙) 特徴的(米泔汁様)瀉瀉期

氷片、及ヒ寒冷炭酸水ニ、少量ノ新鮮枸橼汁ヲ和シタル者ヲ、每三分時乃至五分時ニ與フ、又十五乃至二十滴ノ阿片丁幾ヲ和スル灌腸ヲ行ハシメ、芥子泥ヲ貼シ、身體ヲ温ムルニ温湯縑帶法、氷片摩擦或ハ數多ノ湯婆ヲ以テシ、其它燒酒ヲ與ヘ、麥角越幾斯ノ皮下注射法(腸ノ毛細管ヲ收縮セシムルカ爲メ)ヲ行フ

○麥角越幾斯一、〇 偏里設林各六、〇 右

半筒乃至一筒、皮下ニ注入ス

腓腸筋ニ痙攣アル時ハ、足尖ヲ脛骨ノ前緣ニ向テ上方ニ壓迫ス、又鹽酸莫兒比涅ノ皮下注射及ヒ嚼囉仿謨摩擦法ヲ行フ

〔丙〕 假死期

主トシテ興奮藥ヲ與フ(即チ樟腦、依的兒、或ハ依的兒精)〇此  
三藥ハ特ニ皮下注射劑トシテ用ヰルヲ可トス、又煖熱セル  
亞爾箇保爾性飲料、炭酸安母紐謨等ヲ與ヘ、或ハ芥子浸ニ蘸  
シタル布帕ヲ以テ數時間繃帶ヲ施ス)〇  
抱水格魯刺爾溶液(十倍ノ者)ヲ以テ、皮下ニ注射スヘシ

〔丁〕 虎列刺泰裴士(昏睡狀ノ尿毒症)

強壯的對症療法、温煖芳香性藥草浴ヲ施シ、便秘ニハ大黃浸  
ヲ與フ

〇大黃浸(五、〇)一五〇、〇、重炭酸那篤留謨五、〇、單舍

利別一五、〇、右每二時、一食匙

其佗虎列刺ノ療法、頗ル多ナリト雖モ、一々茲ニ記載セズ只、ロート氏ノ舊ニ依ルノミ、(其藥  
方ノ詳細ヲ知ラント欲スレバ醫學士片山國嘉氏編纂ノ虎列刺藥方集ニ就テ見ルベシ)

〇赤痢 Dysenterie.

攝生法ヲ嚴守シ、後期ニハ粘滑飲料(沙列布煎、葡萄糖ヲ少量  
ノ葡萄酒及ヒ水ニ溶解シタル者)、肉溶液、肉羹汁ニ卵子ヲ加  
ヘタル者、微温ノ飲料等ヲ與フ

腹部ニ琶布ヲ貼用シ、炎勢甚シキハ、持重シテ氷片ヲ腹部  
ニ貼シ、氷水灌腸法ヲ反復シ兼テ阿片ヲ加ヘタルヘガル氏  
灌腸法ヲ施スコアリ、大人ニハ十乃至二十條ノ蟻鍼ヲ肛門  
ノ周圍ニ施ス

其初起ニ於テハ、特效藥ト稱スヘキ者二種アリ、即チ吐根<sup>〇</sup>及  
ヒ甘汞<sup>〇</sup>是レナリ、本邦ニ於テハ、最モ甘汞ヲ稱用ス、之ヲ定法  
的見ユニニ應用スル時ハ、速ニ治癒ヲ得ルヲ常トス、輕症及ヒ  
再發等ハ、次硝酸蒼鉛ノ大量(一日二、〇乃至四、〇)ヲ與ヘテ、効

赤痢症候  
初メ腹痛ヲ起シ、  
意ニ混スル精便ヲ  
量ニ排シ、其便少  
肉ノ臭氣ヲ帶フ而  
シ、通利ノ度ハ一  
晝夜ニ數回ニ達  
シ、常ニ裏急後重  
件ヲ食氣乏シ、身  
體衰弱シ、腹部ノ  
覺過敏ト爲リ、預  
クハ長ス

ヲ奏スルコアリ、又撒里矢爾酸(一日四回一、〇)蓖麻子油(一日二乃至四食匙)ヲ投ス

○甘汞〇、五 乳糖〇、五 右四包ヲ作り、一包ヲ與フ

ルノ後、直チニ蓖麻子油三〇、〇ヲ服セシメ、爾後毎三時

ニ一包ヲ與フルコ、三回ニ至ルヘシ

○吐根末一、〇乃至二、〇 右頓服ス(或ハ浸劑トシテ、與フ

ルコアリ)此際惡心嘔氣ヲ起スモ、只、安靜ニ身體ヲ保持

シ起立スヘカラス、且ツ二三時間ハ、飲料ヲ禁シ、爾後半

日ヲ經テ再ヒ前量ヲ服セシムヘシ

局處藥トシテハ、五百倍ノ硝酸銀水、百倍ノ鞣酸水、或ハ明礬

水、三百倍ノ撒里矢爾酸水等ヲ浣腸ス

漿液性赤痢ニハ、吐根ヲ最良トシ、慢性赤痢ニハ、最モ食養法

實扶的里亞 症候

初起ハ咽頭炎ノ淋  
巴腺腫起ス次ノ  
扁桃腺炎ニ次  
離ス沈着ス之ヲ  
々々潰瘍ヲ生シ  
困窮シ倦怠衰弱  
發シ体温少シク  
入シテ格布ノ多  
ハ不呈ス預後多ク

ニ注意シ次硝酸蒼鉛ヲ與フ

與奮藥ニハ、安母尼亞茴香精ヲ與ヘ、樟腦油ノ皮下注射ヲ施

シ、グロクニ溶解シタル者、アンシユ上葡萄酒、肉羹汁等ヲ

與フ

○實扶的里亞 Diphtheria

咽頭療法トシテハ、オヨルテ、ル氏ニ據テ、熱キ水蒸氣ヲ吸入セ

シメ、其法潤キ器ニ沸湯ヲ灌ヘ、漏斗ヲ患者ノ口ニ當テ、每半

至リ爾後ハ、毎二時或ハ毎四時ニ、之ヲ行フ可シ、或ハ蒸氣吸

入器ヲ以テ、食鹽或ハ格魯兒酸加留謨ノ二、プロセント溶液、

石炭酸一乃至二、プロセント溶液、石灰水(等分ノ水ヲ混和ス)

等ヲ吸入セシム、此際又每一時防腐性ノ含嗽劑及ヒ射入劑

ヲ施用スルヲ要ス、粗硬ノ毛筆ヲ以テ、塗布スルヲ禁ス、則チ

○三乃至○五「アロセント」ノ過滿俺酸加留謨液或ハ○、五「アロセント」ノ石炭酸液、或ハ○、五「アロセント」ノ知母爾液其溶解ニハ等分ノ水及ヒ酒精等ヲ以テス又初起ニ於テ硝酸銀溶液十倍、昇汞溶液千倍、等分ノ石炭酸ト亞爾簡保爾ノ混合液ヲ以テ、患部ヲ腐蝕スルコトアリ後鼻竅及ヒ鼻腔ノ所患ニ對スル療法ハ、圓錐狀注射器或ハウーベル氏ノ灌鼻器ヲ以テ石灰水ニ等分或ハ倍量ノ蒸餾水ヲ和セシ者或ハ五「アロセント」ノ過滿俺酸加留謨液或ハ石炭酸水ヲ、每一時乃至二時ニ鼻腔ヨリ注射シ務メテ患部ヲ清潔ニ保持シ、又其間時々一、五「アロセント」ノ食鹽溶液或ハ稀薄ノ加密爾列浸ヲ以テ注射チ行フヘシ喉頭實扶的里亞一、五「アロセント」溶液炭酸那篤留謨

及ヒ加留謨シ、プロセノ吸入チ、每十五分時乃至三十分時ニ反復シ、各十五分時間持重スベシ喉頭毛筆ヲ以テ、徐々ニ注意シテ、義膜ヲ除去シ、或ハ硫酸銅ヲ催吐藥トシテ與フ、已ムヲ得サレハ、氣管切開術ヲ行ヒ、石灰水ヲ管口ヨリ吸入セシム

○硫酸銅 〇、一 白糖 澱粉 各〇、五 右十包ヲ作

○リ、每十分時、一包ヲ與ヘ、吐ヲ得ルヲ以テ、後服ヲ止ム（小兒ノ量）

全身療法ニハ、解熱及ヒ強壯亢奮ヲ旨トスヘシ、強烈ノ酒類（良好ノ赤葡萄酒、ポルト酒等）、良好ノ燒酒所謂「コンニ」者（一日一〇、〇乃至三〇、〇ヲ三四歳ノ小兒ニ用ウ）チ舍利別ニ和シ與

特ニ世ニ稱用スル一療法アリ、即チ外用法ニハ、初起ニ於テ  
滲透セサル物質ヲ以テ作レル氷褌布ヲ可及的屢、深頸隅角  
ノ後ニ於テ頸部ニ固着ス。○其它炭酸利丟謨、貌羅謨、硼酸等  
ノ蒸氣吸入、粗製硫黃華ノ吹入、硼酸溶液ノ含嗽等ノ諸法ヲ  
應用ス。

○炭酸利丟謨二、五 水二〇〇、〇 右吸入料

○貌羅謨 貌羅謨化加留謨各〇、四 水二〇〇、〇

右同上 右含嗽料及ヒ吸入料

○硼酸四、〇 水二〇〇、〇 右含嗽料及ヒ吸入料

内服藥ニハ、格魯兒酸加留謨、鹽酸必魯加兒必涅、過格魯兒化  
鐵丁幾等ヲ與フ、又大約二「プロセント」ノ貌羅謨化加留謨溶  
液ヲ、初起ニハ每一時、後期ニハ每二時ニ、一食匙ヲ與フ、但シ

毎回一小兒匙ノ格魯兒水ヲ和シ用ウ(此法ハ元來、猩紅熱性  
實扶的里亞ニ應用セラル者ナリ)

○格魯兒酸加留謨二、〇 水一八〇、〇 單舍利別一五、〇

右每時一食匙

○鹽酸必魯加兒必涅〇、〇二 白糖〇、五 右十包ヲ

作り、一日數回、一包宛鹽酸必魯加兒必涅ノ量ハ、一歲以

上ノ小兒ニハ〇、〇〇二五歲以上ノ小兒ニハ〇、〇〇五

ナリ)

○過格魯兒化鐵丁幾一〇、〇 右每二時、十滴

○傳染性感胃 *Influenza*

寢牀ニ安臥セシメ、緩性ノ發汗法ヲ施ス、氣力衰憊スル者ハ、  
衝動性ノ祛痰藥ヲ與フ、規那及ヒ葡萄酒モ亦可ナリ、咳嗽ア

傳染性感胃  
症候  
通常初起ハ惡寒或  
ハ戰慄ヲ以テ体温  
ハ驟シク騰々前額痛  
ヲ發シ時トシテ精神  
恍惚、頭痛、痲痺





温器ヲ以テ、其減度ヲ測定シ得ルニ至ルヲ期スベシ、但シ劇法ハ、屢、反復スヘカラス、又浴中ニハ、亢奮藥ノ内服ヲ兼用スルヲ要ス

○直腸ニ於テ、體温ヲ檢スルヲ能ハサルキハ、腋窩ニ於テ迅速(凡ソ四分時)ニ測ルカ爲メ、左ノ方法ヲ供用ス、即チ體熱ニ由テ驗温器ノ水銀柱ヲ上昇セシムルニ非ラスシテ、初メ先ツ温湯中ニ於テ温メ(急ヲ要スルキニ於テハ、匙中ニ於テ火上ニ之ヲ熱ス)腋窩ニ挿ムニ臨ンテ、之ヲ下降セシムルノ法ナリ、此際只終始水銀柱ノ尖端ニ、注目スルヲ要ス、リーベルマイステル氏ニ據ルニ、平常ノ方法ヲ以テ、腋窩ニ於テ計測スルキハ、少ナクモ十五乃至三十分ヲ必要トス、是レ往々重病者ノ耐ヘサル

所ナリ

- (一) 全身寒冷洗拭法 甚シク冷水ヲ嫌忌スル者ニハ、代フル易ニ洗拭法ノ目的ヲ、每一時乃至三時ニ施シ、寒冷灌腸法ト交番ニ之ヲ用ウ
- (二) 寒濕布帕中ニ、患者ノ身體ヲ縋裹シ、更ニ毛布ヲ以テ、之ヲ覆ヒ、毎十分時許ニシテ、交換スルヲ四回ヨリ六回ニ至ル
- (三) 簡ノ臥牀ヲ併列シ、交換ノ用ニ供ス、若シ其體温攝氏四十四度ニ近ツクキハ、一日内頻回之ヲ反復スヘシ 此方法ハ、最緩ニシテ、小兒ノ外、亦煩躁、狂走、活潑ノ譫語アル者ニ、適當ス之ニ反シテ、洗拭法及ヒ灌水法ハ、昏睡ニ稱用セリ
- (四) 温煖ノ半身浴中ニ於テ、寒冷ノ灌水及ヒ摩擦ヲ施ス
- (五) 攝氏二十度ノ全身浴 殊ニ漸次ニ、其冷度ヲ進ムルキハ、真ノ寒冷浴ニ比スレハ患者之ニ堪ヘ易ク、且ツ其効驗モ



亦著明ナリ、但シ入浴ノ時間ハ、甚ク短小ナラサルヲ要ス(平均十分時入浴シ、浴中或ハ浴後ニ一盞ノ葡萄酒ヲ與フ)

第三、第四ノ療法ハ歐洲ニ於テ稱用スル所ナレド、本邦ニ之ヲ施スニハ最モ注意セサル可カラス、之ニ反シテ、第二ノ療法ハ、編者カ數年間東京大學醫學部ノ入院患者ニ實施シテ、常ニ良効ヲ見タルモノナリ

小兒ハ、攝氏三十五度ノ浴ヲ取ラシメ、頭上ヨリ灌シニ冷水ヲ以テシ、浴水ノ溫度、二十八度ニ冷却スルヲ以テ極度トス而シテ其時間ハ、五乃至十分時トシ、一日數回之ヲ反復ス可

脾臟部ノ寒冷射水法ハ、特ニ脾腫アル者ニ驗アリ

(各自ノ症候ニ對スル療法) 虛脫ニハ、與奮藥(亞爾箇保爾類、

樟腦、依的兒、麝香等)ヲ與フ

不眠、狂走ニハ、抱水格魯刺爾、又寒冷繃縛法ヲ持長ス

○抱水格魯刺爾四〇 鹽酸莫兒比涅〇〇五 蜀葵根

煎一五〇〇 甘草越幾斯一〇〇 右每二時、一食匙

ヲ與ヘ、安眠或ハ鎮靜ヲ得ルヲ度トス

譫語ニハ、多量ノ阿片、抱水格魯刺爾ヲ與フ

○阿片〇、一 白糖〇、五 右頓服ス

○抱水格魯刺爾一、五 亞拉昆亞護謨漿 單舍利別

各一五〇 右頓服ス

窒扶斯性肺患ニハ、亢奮藥、祛痰藥(攝涅瓦、安母尼亞茴香精、安息香ノ類)ヲ與フ

○攝涅瓦浸(八、〇)一八〇〇 安母尼亞茴香精四、〇 單

○舍利別一五〇〇 右每二時一食匙  
 ○安息香酸〇一 右每一二時一包  
 過多ノ下利ニハ、鞣酸、醋酸鉛、次硝酸蒼鉛(〇五每一時)、明礬、阿片等ヲ與フ  
 ○鞣酸一五 水一八〇〇 阿片丁幾一五  
 別一五〇 右每二時一食匙  
 ○鞣酸〇〇五 阿片〇〇二 白糖〇五 右十包ヲ  
 作り、毎二時一包  
 ○鉛糖〇〇三 阿片〇〇二 白糖〇五 右十包ヲ  
 作り、毎三時一包  
 ○明礬四〇 水一八〇〇 阿片丁幾一五 右每  
 二時一食匙

○阿片越幾斯〇〇五 甘草羔 甘草末各適宜

右一九ト爲シ、一日一二丸

腸出血ニハ、安靜ヲ主トシ、氷丸ヲ與ヘ、腹部ニ氷囊ヲ貼シ、阿片、鹽酸莫兒比涅、過格魯兒化鏡丁幾、麥角越幾斯等ヲ與フ、腸穿孔ニハ、全ク身體ヲ安靜ニシ、腹部ニ氷囊ヲ貼シ、鹽酸莫兒比涅〇〇一(一日二三回)或ハ多量ノ阿片〇〇五乃至〇一五ヲ投スヘシ  
 ○鉛糖 阿片各〇三 澱粉五〇 右混和十包ニ  
 分チ、一日四回、一包宛  
 ○阿片〇〇五 白糖〇五 右一包ト爲シ、一日一回  
 乃至二回、一包  
 ○麥角越幾斯 鞣酸各一五 阿片越幾斯〇三 甘草

草羔適宜

右混和二十九ト爲シ、毎二三時、一丸宛

○ 鹽酸莫兒比涅 〇〇一

白糖 〇.五

右三包ヲ作り、

一日三回一包

○ 過格魯兒化鐵丁幾一〇

桂皮水一五〇〇

單舍利

別二〇〇

右混和毎時一食匙

皺脹ニハ、腹部ニ寒捲法ヲ施シ、毎半時ニ交換シ、的列並底油

塗擦、寒冷瀉腸法、護謨腸管ノ送入等ヲ施ス

疹瘡ニハ、預防的ニ亞爾箇保爾或ハ火酒ヲ以テ洗滌シ、空氣

牀或ハ水牀ヲ用ウ、皮膚剝脫スルキハ、稀水、石炭酸水等ヲ以

テ洗ヒ、又古魯胃謨、鞣酸及ヒ單軟膏ヲ貼用ス

(口) 發疹室扶斯 Typhus exanthematicus.

攝生法ニハ、患者居室ノ空氣ヲ暢通モシ、清涼酸味ノ飲料

發疹室扶斯 症候

初メ倦怠、頭痛、結膜充血、鼻加答兒、咳嗽等アリ、次チ惡

寒或ハ戰慄ヲ以テ、熱ヲ發シ、脈搏ヲ以テ、進歩ス、熱度ハ、第五六日ニ至ル、來テ、全身紫斑ヲ生シ、數ノ疹、往々紫斑ニ變シ、其疹、精神恍惚、頭痛、重シク、經過ニ於テ、熱度ハ、第三日ノ初メニ、下降シ、諸症速ニ恢復ス、預後危險ニ屬ス

反歸熱症候

チ與フ、解熱法ニハ、規尼涅撒里矢爾酸ヲ與ヘ、水治法ヲ施ス (腸室扶斯ノ條ヲ參考ス可シ) 又充奮藥亞爾箇保爾類、樟腦等ヲ與フ (ハ) 反歸熱 Typhus recurrens. 室内ノ空氣ヲ清涼ニシ、身體ヲ安靜ニ保持ス、若シ食機動ケハ滋養物ヲ與フ 高熱アル者ハ、解熱法撒里矢爾酸那篤留謨、規尼涅、水治法、但馬室扶斯ノ條ヲ施シ、謔語ヲ發スレハ、注意シテ麻酔藥ヲ用井、虛脫ニ陥ル者ハ、興奮藥ヲ與フ、近年ニ至リ甘汞ヲ應用シテ其全經過ニ良効アリト稱スルモノアリ ○ 黃熱 米洲熱帶ノ海濱ニ固有ナル惡 Febris Flava. 此病ノ己ニ發起スルニ方ツテハ、醫藥ノ其効ヲ奏スル者少

通常第三第四ノ發  
作ヲ起スハ稀ナリ  
預後佳良

恐水病症候

初起ハ創傷部變性  
ノ膿液減少シ肉芽  
面赤色ヲ呈シ創  
再ヒ破潰ノ放線性  
疼痛ヲ發シ大ニ刺  
戟性ト爲ル次ニ液  
體ヲ飲用セルトス  
スレハ忽チ咽喉痙  
攣ノ苦悶煩燥  
知覺過敏精神錯  
亂譫言等ヲ發シ  
然ル後大ニ倦怠シ  
顔面虛脱性ト爲  
屬々嘔吐ス預後凶

且ツ本邦未ダ曾テ之ヲ見サレハ茲ニ詳説セズ通常初メ  
蓖麻子油、甘汞ヲ與ヘ後ニ阿片、鹽酸莫兒比涅、鐵等ヲ投ス

(丁) 動物毒性傳染病

○恐水病 狂犬毒 *Lysa*

咬傷部ヲ緊紮シ能ク其瘡口ヲ洗ヒ吸角ヲ以テ吸引シ鹽水  
ヲ以テ温濕シ直チニ烙鐵、石炭酸或ハ苛性加里ヲ以テ腐蝕  
ス此病ハ未タ充分之ヲ救療スルノ術アラス然レモ幸ニシ  
テ被傷者中實ニ之ヲ發スル者ハ百人中只、四十人ノミ且ツ  
咬傷部ヲ完全ニ腐蝕スルキハ大抵之ヲ免ル、ヲ得ヘシ近  
時バストヨール氏ハ狂犬毒菌接種法ヲ應用シテ其有効ナル  
ヲ稱道スレドモ本邦ニ於テハ未ク之ヲ適用確認シタルモ  
ノヲ見ザレバ茲ニ記セズ

馬疫症候

初メ毒ヲ受ケシ部  
ニ炎症、潰瘍或ハ  
水泡ヲ發シ淋巴管  
炎及ヒ淋巴腺腫起  
テ伴フ高熱、吐血  
筋及ヒ關節ノ痙攣  
ヲ發ス次ニ全体ニ  
結節ニ變スル斑點  
ヲ成シ其結節膿  
疹ト爲ル次テ眼瞼  
等大ニ腫起ス次テ  
鼻内ニ馬疫胞ヲ發  
シ鼻涕ノ排泄増盛  
シ血線ヲ混ス後ニ  
ハ皮下結締織、筋、  
口蓋、咽喉頭、氣  
管等ノ粘膜上ニ結  
節ヲ生シ患者頗ル  
虛脱ス預後全ク凶

炭疽熱癰症候

初メ所患部ニ赤斑  
ヲ發シ其中央ニ黒  
腫起シ帶紅青色ノ  
水泡ヲ生シ速ニ破  
潰乾燥ス周圍ニ紫

對症療法ニハ多量ノ規尼涅、麻醉藥、阿片、鹽酸莫兒比涅、呀囉  
仿謨、抱水格魯刺爾等ヲ與フ

○馬疫 *Malignus Mallemus humidus*

預防法ハ、病畜ヲ撲殺シ、嚴ニ消毒法ヲ施スニ在リ、病畜ニ觸  
ル、キハ、最モ注意スヘシ、己ニ其毒ヲ人體ニ傳ヘテ、發病セ  
シキハ、沃度化加留謨、砒石、規尼涅等ヲ用ウ、然レモ皆確効ナ  
シ、只、對症療法ヲ施スニ過キス

○炭疽熱癰 (脾脫疽) *Pustula maligna*

泡疹ハ、截除シ、又ハ腐蝕シ(腐蝕泥、烙鐵、石炭酸、硝酸)防腐綑帶  
ヲ施ス  
内服ニハ、多量ノ規尼涅、強壯藥等ヲ與フ、又石炭酸溶液ノ皮  
下注入法ヲ行フコトアリ