

傷寒緒論

傷寒緒論

傷寒、緒論序  
傷寒、緒論序

穆叔有云。太上有立德。其次有立功。其次有立言。此之謂不朽。信哉是言也。吾聞古之賢達。不居仕朝。即在醫卜之中。屈指往古名醫。如秦和之論六氣。越人倉公設為問難。歷歷垂之左史。未始無功德於後世也。若路玉張子者。可以希蹤往哲。配德前人。但素抱夷曠。若不屑於應酬。曾有客長揖而謁先生曰。吾觀今世之延醫治病者。皆耳食。皆目皮相。余為先生效曹邱生可乎。張子拒之。客又曰。今之習醫者。數招權顧金錢。事貴人。是其長技。臨時驗證。則先備一二語。以探之。製劑時。則以雜揉湯液投之。若先生者。能悟醫中最上源頭。復有余為曹邱生。何慮名之不揚。字內哉。張子撫手而嘯。遂謝客。後知握齧者。派窮困。則辱身下志。富貴則快意驕人。不足與談道。於是銳意精研靈素金匱諸篇。取趙以德喻嘉言之註。而復斧之。正其誤。去其繁。明其晦。補其缺。銓仲景傷寒六經之次。至於結胸痞斬溫熱諸篇。鑿然不混載。取往哲遺言。隸諸類證細謐。所以輔仲景之未逮。列為續緒二論。三復讀之。知天下未有之奇蘊於此矣。是書也。使智者目之。天穎迅發。愚者瞿然而悟。因者危坐正襟。洗心滌慮。好自用者。目眩而不曠。舌擣然而不下。洵為傷寒之大成。其德被於天下後世也溥矣。豈特有功於仲景而已哉。嘻。張子真不愧乎立言矣。

同邑李瑾譏

傷寒緒論目錄

卷上

總論  
傷風

溫病  
中濕

火疫  
水

大氣  
火

內傷  
虛

胃火  
脚氣

脾虛  
水

腎陽  
火

黃耳  
死證

陰毒  
熱病  
中暑

寒疫  
冬溫

中暑

卷下

脉法  
切法

察色

辨舌

宜禁

發熱

頭痛

頭重

頭脹

項強

惡風

惡寒

背惡寒

寒熱

如瘡

潮熱

無汗

自汗

盜汗

頭汗

手足腋股汗

煩熱

煩躁

懊憹

身體痛

拘急

心下滿

胸脇滿痛

痞

結胸

藏結

腹滿

腹痛

小腹滿痛

讒語

鄭聲

發狂

發班

發黃

不大便

自利

下利

便膿血

小便不利

小便難

小便自利

小便數

嘔吐

乾嘔

腸鳴

喘

噫氣

呃逆

欬嗽

短氣

氣逆

傷寒雜論

目錄

渴

漱水

効血

吐血

唾膿血

熱入血室

內闊筋惕

瘻癰

振

戰慄

畜血

動氣

怫鬱

戴陽

四逆

足冷

厥

踰臥

唇甲青

咽喉乾痛

失音不語

喉痺

頭眩

鬱胃

不仁

厥暉

心悸

驚惕

不得眠

多眠

蛇厥

藏厥

孤惑

百合

舌卷囊縮

陽縮

直視搖頭

遺尿

循衣撮空

絕汗

勞復

食復

女勞復

陰陽易

遺熱

發頑

喜睡

差後浮腫

雜方

刺灸穴法

雜方目錄

陽旦湯附陰旦湯

黃耆建中湯

再造散

香蘇散

芎蘇散參蘇散

神木湯

十神湯

升麻湯

葛根葱白湯增損葛根湯

連鬚葱白香豉湯

選奇湯

藿香正氣散

人參敗毒散倉廩湯

荆防敗毒散連翹敗毒散

普濟消毒飲

六神通解散

獨活散

達原飲

生犀飲

清熱解毒湯

人中黃丸

人中黃散

涼膈散

雙解散

黃連解毒湯

三黃石膏湯

導赤渴心湯

射干麻黃湯

金沸草散

姜蕤湯

桔梗根湯

防己黃耆湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

清暑益氣湯

羌活勝濕湯

補中益氣湯

生脈散

清暑益氣湯

羌活勝濕湯

十味香薷飲六和湯

苗連香薷飲

局方香薷飲

消暑丸

升麻葛甲湯

陽毒升麻湯

冷香飲子

漿水散

大順散

大順散

犀角黑參湯

犀角大青湯

橘皮竹茹湯

橘皮竹茹湯

赤茯苓湯

小續命湯

如聖飲

大羌活湯

羌活導滯湯

草庵苦酒湯

黃龍湯

厚朴七物湯

代抵當湯丸

金匱下瘀血湯

備急丸

大黃附子湯

二陳湯

橘皮半夏湯

導痰湯

平胃散

五積散

調中湯

調中飲

人參養胃湯

沈香降氣散

香殼散

當歸活血湯

犀角地黃湯

生地黃黃連湯

竹葉湯

四物湯

加減四物湯

增損四物湯

當歸補血湯

紫蘇飲

逍遙散

加味逍遙散

歸脾湯

加味歸脾湯

四君子湯

東垣升陽散火湯

火湯漱鬱節庵升陽散火湯

十全大補湯

大補湯十全大補湯

酸棗湯

參胡三白湯

人參三白湯

參胡芍藥湯

人參養榮湯

參胡溫膽湯

胆溫湯

酸棗湯

金匱腎氣丸

崔氏八味丸

六味地黃丸

附子理中湯

枳實理中湯

附子粳米湯

金匱大建中湯

益元湯

附子散

火燄散

羌活附子散

霹靂散

稀涎散

傷寒  
統論

目錄

皂莢丸

葶苈大棗瀉肺湯

桔梗湯

葶苈薏苡瀉肺湯

射干湯

大黃牡丹湯

赤小豆當歸散

黃連犀角散

百合地黃湯

逍遙湯

金液丹

黑錫丹

來復丹

養正丹

## 總論

長洲王雨張醫案集

余嘗考晉王叔和集仲景傷寒書。未嘗不廢書而三歎也。嗟夫。猶賴叔和為仲景之功臣。使無叔和之集。則傷寒書同於平病論之不傳矣。何能知有六經證治乎。即條辨尚論。亦無從而下手也。究予所編。各有未當。全鵝不揣。復取仲景原文。重分其例。取尚論及各家之註。參以己見。成續論矣。第殘逸已多。證治不備。擬搜諸家之論。以補之。雖其間互有發明。然未免多歧之惑。是不得不博採往哲之言。以綏輯之。惜乎歷代名賢。遞相祖述。未能一一標明。姑從證類次第。讀者毋以辭害義可也。謹叙六經傳變。合病併病。標本治法。及正傷寒。兩感。三陰。中寒。冬溫。寒疫。傷風。溫病。風溫時行。大頭溫疫。溫瘧。溫毒。陽毒。陰毒。熱病。中暑。濕溫。中濕。風濕。濕熱。痙病。內傷。虛煩。脚氣。霍亂。內癰。赤臍。黃耳。夾食。夾痰。夾水。夾血。夾氣。夾陰。冒雨。溺水。重耳。疰後等四十證。暨以審證死證。逐一辨論如左。

如六經證人悉知為足經。不知有手經證間出也。傷寒初受病時。頭項痛。腰脊強。惡寒。足太陽也。發熱面赤。惡風。手太陽也。目疼。鼻乾。不得卧。足陽明也。蒸熱而渴。手陽明也。胸脇滿痛。口苦。足少陽也。耳聾及痛。寒熱往來。手少陽也。腹滿自利而吐。足太陰也。口乾津不到咽。手太陰也。脈沉細。口燥渴。足少陰也。舌乾不得臥。手少陰也。耳聾。囊縮。不知人。足厥陰也。煩滿厥逆。手厥陰也。傷寒以冬月寒水主令。故受病必先巨陽。若夫非時暴寒。亦必隨時傷犯。與夫時行疫癘。隨其歲氣而犯虛經異治。疫雖以六氣為主。總不離陽明濕土。至於伏氣發溫。必先少陽證見。熱病多兼包絡三焦。皆熱邪自內達外。其治法可領悟矣。

按靈樞十二經脈轉注如環。豈有六經傳變。只傳足經。不傳手經之理。如太陽傳陽明。謂循經傳。太陽傳少陽。謂越經傳。太陽傳太陰。謂誤下傳。太陽傳少陰。謂表裏傳。太陽傳厥陰。謂首尾傳。因此經本虛邪。即傳之。本無定例也。故傷寒有六經之傳變。無藏府之傳次也。所以在太陽經有犯本者。有即入陽明之府。

者有傳至陽明之經而自經入府者。有傳至少陽之經而入陽明之府者。是以仲景有太陽陽明正陽陽明少陽陽明之別也。入府則邪有定著不復傳次也。非但入府不傳。即太陽之犯本少陽之入府。俱不復傳矣。是知三陽有傳變。有併合。三陰有傳經直入而無併合也。即有三陰經轉出三陽。或傳入府。俱不復氣向衰。正氣得復之候。並無厥陰復傳太陽之理。此昔人所未明言也。而傳足不傳手之說尤屬非理。王安道曰。傷寒不傳手經。此開卷之首疑。而諸家紛紛竟無定論。竊意只傳足經者。蓋以邪氣在經未入藏府而言。若入藏府。則不可謂之獨在足經矣。何以言之。夫手太陽者小腸也。手陽明者大腸也。邪氣入胃致有燥屎。大承氣湯下之。小腸上接胃。下接大腸。燥屎由大腸而出。二經得無與乎。手少陽者三焦也。邪在一身。三焦獨能安乎。手太陰者肺也。肺為清肅之藏。主氣升降。假如欬嗽氣逆。肺能保其清肅乎。手少陰者心也。手厥陰者心包也。表裏熱極。神狂志亂。豈有君相二火反泰然清靜者哉。東垣此事難知。曰。傷寒傳至五六日間。漸變神昏不語。或睡中獨語一二句。目赤唇焦。舌乾不飲水。稀粥與之則喫。不與則不思。六脈細數而不洪大。心下不痞。腹中不滿。大小便如常。或傳至十日以來。形貌如醉人狀。虛見神昏。不得已用承氣下之誤矣。不知此。熱邪傳手少陰心經也。導赤瀉心湯主之。與食則喫者。邪不在胃也。不與則不思。以其神昏也。既不在胃。誤與承氣下之必死。今傷寒溫熱傳變。多有此證。不可不察也。

至於合病併病。亦湏明辨。昔趙嗣真極意洗發。不過曰合病者。二陽經或三陽經同受病。病之不傳者也。併病者。一陽經先受病。又過一經。病之傳者也。以病之不傳者。概合病雖為定論。但未明言。合病多由冬時過溫。少陰不藏。溫氣乘虛先入於裏。然後更感寒氣。閉鬱於外。寒熱錯雜。遂至合病。其邪內攻。必自下利。不下利即上嘔。邪勢之充斥奔迫。從可識矣。其黃芩湯雖主太陽少陽合病。白虎湯雖主三陽合病。而實溫病熱病主方。慎不可以此誤治傷寒合病。設誤用之。必難救藥也。其傷寒合病。仲景自有桂枝加葛根湯。葛根加牛夏湯。葛根湯。麻黃湯等治法。觀仲景諸例。自可見矣。

併病者。先一陽經病未罷。又加一經。證見兩經聯貫為一也。嗣真云。太陽陽明併病。若併而未盡。是傳未

過尚有表證。若併之已盡。是謂傳過。當下之。按此雖曰併病。而實傳經也。或言本二經病。一經證先盡。歸併於一經者。為併病。此說似是而尤誤也。按仲景二陽併病。太陽初得病時。發其汗。汗先出不備。因轉屬陽明一條。此則太陽陽明併病也。至於二陽併病。太陽證罷。但發潮熱一條。雖曰二陽併病。又云太陽證罷。獨見陽明府證。所以用大承氣湯專治府實。而不復用併病例藥也。考仲景書合病併病證。或止言太陽。或止言陽明少陽者甚多。如太陽病桂枝證。醫反下之。利遂不止。脈促者。表未解也。喘而汗出者。葛根黃芩連湯主之。此非太陽陽明併病例藥乎。

又如標本治例。全要活法。所謂一病之標本者。如太陽中風桂枝證。先惡寒為本。後發熱為標。其陽明熱病曰虎謐。口燥心煩為本。背微惡寒為標。此治本不治標也。○又兩病之標本。如伏氣發溫。復感客邪。謐伏氣為本。客邪為標。治以涼膈必加葱豉。其內傷發熱。兼冒虛風證。內傷為本。虛風為標。治宜補中。略入羌防。此治本兼治標也。○又傳經之標本。本太陽病。初得病時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明。此太陽為本。陽明為標。治以葛根仍用麻黃。此治標必從本也。○又一經之標本。如太陽病頭痛發熱自汗。桂枝證為本病。後六七日不解。而煩渴飲水。邪入膀胱之本。五苓證為標病。此隨證治本治標也。○又一身之標本。如病人身大熱。反欲得近衣。以其人陽氣素虛。寒邪外鬱於表。熱在皮膚為標。寒在骨髓為本。宜小建中加黃耆。病人身大寒。反不欲近衣。以其人蓄熱素盛。寒鬱熱邪於內。寒在皮膚為標。熱在骨髓為本。宜桂枝湯加黃芩。此寒熱互見。標本合治不必如活人書。先後治例也。○又寒熱之標本者。如病人脈微而濶。夏月盛暑。欲著複衣。冬月盛寒。欲裸其身。盛熱欲著複衣者。陽微則惡寒也。宜附子理中加黃連。盛寒欲裸其身者。陰弱則發熱也。宜竹葉石膏加附子。此不從標本。從乎中治。仲景所謂醫病是也。○又先後之標本者。傷寒醫下之。續得下利清穀不止。身疼痛。急當救裏。後身疼痛。清便自調。急當救表。先受寒身疼痛為本病。後誤下之。續得下利清穀為標病。先四逆救裏治標。後桂枝救表治本也。標本之法。略舉數條為例。詳仲景證治諸法。餘可類推。

夫仲景治法不同。非極力精研。不能悟其間奧也。原夫傷寒之邪。其始也。必先太陽寒水之經。所以惡寒發熱。此為表之外證。故宜發汗。開腠理而通其熱。則愈。或有汗之而不愈者。必有所夾而致。或夾痰。或夾食。或夾水氣。或夾內傷。須辨脈證用藥。然必先撤外邪。稍兼清理痰氣。而後專理他證。若內外併治。邪必內入。所謂汗之不得其宜。而入三陽之本也。古云。發表未除。不可攻裏。上盛未除。不可攻下。真不易之定例也。○傷寒三陽證宜汗。失汗必致傳經。汗之不得其實。或入三陽之本。或傳三陰之經。若入三陽之本。此為表之裏證。當隨證分利和解。若入陽明之府。必大便燥結。潮熱。手足熱。大便。自汗。腹滿煩渴。當俟結定。方可攻裏。所謂下不厭遲也。若裏實燥渴。飲水過多。或下傍流之水者急下之。若傳三陰之經。必自下利。腹滿嗌乾。燥渴厥逆。舌卷囊縮。詳緩急下之。此雖曰三陰實陽證也。○大抵傷寒身熱者。為熱在表。引飲小便黃赤。為熱在裏。身熱引飲。小便黃赤。為表裏俱有熱。身涼不渴。小便清白。為表裏俱無熱。又曰。身拘急。表熱惡寒。脈浮緊。為邪熱在表。引飲譫妄。腹滿實痛。發熱便祕。脈沉緊。為邪熱在裏。胸脇痞滿。或嘔吐。往來寒熱。脈在肌肉。為邪熱在半表半裏。自利脈沉細。但熱而無頭痛。或燥渴多喜溫飲。自覺足寒。為少陰本虛。而扶陽邪。雖是陽證。而實夾陰。與陽虛自中陰寒不同。亦有陽證誤用寒藥。而變為虛寒者。又有汗下太過。致陽虛而惡寒者。皆始本陽邪。未傳寒中之證。並宜加溫經藥。不可拘於傷寒。皆為熱邪。禁用溫補之說。然究其根源。從陽經來者。溫經藥中。又不得不兼制陽藥。若峻用辛熱。則真陰立槁也。觀真武湯中。用芍藥茯苓。其義可見。○王安道云。傷寒傳變不常。或有循經而傳者。或有越經而傳者。或有傳二三經而止者。或有只在一經者。或有傳至三陽而止者。或有傳盡六經不罷者。有從陽經傳變而為熱證者。有直中陰經而成寒證者。有初入太陽。不作鬱熱而成真陰證者。有終熱始寒者。有始熱終寒者。全在脈與證別之。詳三陽之邪。則一於熱耳。至三陰經證之。或寒或熱者何也。夫仲景書本非全文。既遭叔和播亂之厄。成無已止。隨文註釋。竟不明言。何由為熱。何由為寒。之故。此非不欲言也。蓋止知傷寒。皆是傳經。故疑於六經所傳。俱為熱證。而熱無變寒之理。遂不敢別白耳。以寒為本藏之寒。歟。安得當熱邪。傳裏。

之時。反獨見寒而不見熱者。且所用之藥能不助傳經之熱乎。以寒為外寒。雖則在三陽已成熟矣。豈有傳至三陰而反為寒哉。成氏能潛心乎此。則必悟其所以然矣。○夫三陽之病。其寒邪之在太陽也。寒鬱其陽。陽不暢而成熱。陽雖人生之正氣。既鬱則為邪矣。用麻黃發表以逐其寒。則腠理通而鬱熱泄。故汗出而愈。苟或不汗不解。其熱不得外泄。則必入裏。故傳陽明傳少陽。而成入府也。夫三陰之病。或寒或熱者。何哉。蓋寒邪之傷人也。或有太陽經鬱熱。然後以次而傳至陰經者。或有太陽不傳陽明少陽。而便傳三陰經者。或有寒邪不從陽經而始。直傷陰經者。或有雖從太陽而始。不作鬱熱。即入少陰。而獨見少陰證者。或有始自太陽。即入少陰。而太陽不能無傷者。或有直傷陰經而寒變為熱。及始寒終熱者。其鬱熱傳陰。則為熱證。其直傷陰經。及從太陽即入少陰。則為寒證。其太陽不能無傷。則為脈沉而發熱。證其始寒而終熱者。則陰邪傳入陽分。為先寒後發熱證。此三陰之病。所以或寒或熱也。邪氣暴卒。本無定情。而傳變不常耳。若夫裏寒外熱之證。乃是寒邪入客於內。迫陽於外。或是虛陽之氣假作外熱之狀耳。非真熱邪所為也。觀仲景裏寒外熱之證。但以溫藥治裏。而不治外熱。則知所治之意矣。所以仲景治太陽要。虛汗之不愈。即用四逆湯溫之。如太陽病發熱頭痛。脈反沉。若不差。身體反痛。當救其裏。宜四逆湯是也。更有少陰表證宜汗者。如少陰病始得之。反發熱脈沉者。麻黃附子細辛湯主之。少陰病得之二三日。麻黃附子甘草湯微發汗。以二三日無裏證故微發汗也。趙嗣真云。太陽證之溫經。少陰證之發汗。皆證類之變。故長沙各言反者。以太陽發熱頭痛。脈當浮。今反沉。少陰脈沉。法當無熱。今反發熱。以其無頭痛。故為少陰。以其有頭痛。故為太陽。太陽脈當浮。今不能浮者。以裏虛久寒。正氣衰微所致。又身疼痛。故宜救裏。使正氣內強。迫邪外出。而乾薑生附亦能出汗也。少陰脈沉。無頭痛。當不發熱。今反發熱。知寒邪在表。鬱閉為熱。故用麻黃細辛以發其表邪之熱。附子以溫少陰之經。熟附配麻黃。發中有補。生附配乾薑。補中有發也。至第二證。言得之二三日。病氣尚淺。比之前證稍輕。又無裏證變見。故宜微發汗。所以去細辛加甘草。是汗劑之輕者也。活人書却去無證二字。改作常見少陰熱陽證者。如經云。心中煩不得眠。或

咽瘡聲不出者。或效而嘔渴。或口燥咽乾。或腹脹不大便是也。夫豈麻黃附子甘草湯所可治耶。○復有三陰轉屬胃府宜下者。如傷寒脈浮而緩。手足自溫。是為繫在太陰。太陰者身當發黃。若小便自利者不能發黃。至七八日大便鞭者為陽明也。又少陰病六七日。腹脹不大便者。急下之。宜大承氣湯。厥陰下利。讞語有燥屎者。小承氣湯下之是也。更有三陰轉出肌表宜汗者。如太陰病脈浮者可發汗。宜桂枝湯。少陰中風。陽微陰浮者。為欲愈厥陰病下利後身疼。清便自調者急當救表。宜桂枝湯。厥陰病嘔而發熱者。小柴胡湯。又有少陰變熱回陽者。如少陰病惡寒而踴。時時自煩。欲去衣被者可治。凡此皆陰盡復陽也。至於汗下誤施變害不測。東垣云。太陽始病當以汗解。若當汗不汗。則濕熱著表而發黃。發汗太過。經虛風襲而成瘻。不當汗而汗。迫血妄行而成衄。大便不可妄動。動早為犯禁。當汗誤下。則引邪入裏。而為痞結懊憹。協熱利。當下誤汗。則為亡陽厥竭讞語。小便不可輕利。利之為犯本。若渴而自汗多。雖小便不利。為陽明經熱。不可誤用五苓。蓋五苓為太陽裏證下藥。其功在於驅胃中溼熱而救津液。故仲景又有小便數大便鞭。不更衣十日無所苦。渴者宜五苓散之例。一以自汗多而渴為津液耗散。故禁利水傷津藥。一以小便數而渴為濕熱內盛。故宜驅熱利水藥。此當利不當利之別也。若當利不利。必就陽明燥火而成畜血發黃。不當利而利。必耗膀胱津液而成燥血發狂。此皆誤治之失也。○又按活人書云。傷寒陽明證宜下。少陰證宜瀉。夫陽明之經證身熱目疼。鼻乾頭痛。可宜下乎。少陰之傳經熱邪。可宜溫乎。況溫病熱病之少陰尤不可溫也。自奉議此說行。後世蒙害者不少矣。○又兩感證先救裏以四逆湯後救表以桂枝湯。長沙本云。先後發表攻裏未嘗言救裏也。今以攻為救。豈不相背。若用四逆湯。是以火濟火。而腹滿讞語囊縮等證。何由而除。兩感雖為死證。亦不當如是處治也。○至於直中二陰寒證。仲景在太陰則曰藏寒。以太陰居中。邪不能入。必因冷物受傷也。在少陰不曰中寒。即曰少陰病者。以少陰本寒水藏。若陰寒中藏。必死。今受病者少陰經耳。故處方皆用溫經。在厥陰乃曰中風。以風喜傷肝也。○凡六經中俱有中風。傷寒之辨。如太陽脈浮有汗為中風。浮緊無汗為傷寒。陽明善飢為中風。不能食為傷寒。少陽

耳聾協滿為中風。口苦咽乾為傷寒。若三陰風寒無變異形證。但以四肢煩疼為中風。手足寒厥為中寒耳。○凡傳經少陰熱證在本經失治。或治之未當。則復傳厥陰。熱深厥亦深。而咽疼者為喉痹。嘔者轉為吐。癰膿下利者轉為便膿血。甚者發熱厥逆。躁不得卧。仍是胃氣先絕而死矣。○凡虛寒壞證。多少陰厥陰。然少陰最忌發熱。發熱則恐。胃中真陽飛越厥陰。最喜發熱。發熱則陰盡復陽。但少陰發熱必大發躁。悶亂不安。誠為危候。若利止厥回。脈見陽微陰浮。又為欲愈之徵也。厥陰發熱則厥逆止。而漸溫。腹脹少緩而囊縱。吐利止而思食。方為陰盡復陽。若見煩熱消渴。脈數又為真陰灼爍之象矣。○又有少陰中風證。按盛起東云。凡初起但覺畏寒。飢不能食。欲吐不吐。腹瀉滿。大便祕。小便頻數及多。脈來弦細浮弱。按之無根。此為少陰本虛自中之風。慎不可以其腹滿不大便而誤下之。下之必不可救也。蓋寒則自利。腹痛。風則腹滿不大便。而按之不堅。寒則小便清利。風則小便頻數。寒則身冷厥逆。風則自覺煩熱而手足煩疼。寒則嘔逆不食。風則欲吐不吐。飢不能食。稍食則脹滿不禁。寒則脈來沉細。風則脈來浮弱。以風本陽邪上逆。與寒證陰邪下泄不同。即如中風之合病。則嘔傷寒之合病。則利是也。○傷寒外編云。病在三陽邪上逆。與寒證陰邪下泄不同。即如中風之合病。則嘔傷寒之合病。則利是也。○傷寒外編云。病在三陽。皆有下利腹痛厥逆躁渴。但屬於陽者。必先發熱頭痛。漸至唇乾舌燥。煩渴喜冷飲。面色光彩。語言清亮。手足溫煖爪甲紅潤。身輕易於轉側。呼吸出於自然。小便或赤或澀。脈來浮洪數大。此陽證也。至四五月後。傳進三陰。血分變出四肢厥冷。乍溫或燥結。或下利躁渴。潮熱自汗。蕭委揚手擲足。氣息喘急。小腹疼痛。不可按。舌上胎厚而黃黑。甚則芒刺燥熱。脈沉而滑。皆三陽傳變之熱證。其或身寒逆冷。神氣昏昏。脈來沉實附骨。乃火極似水。緣陽邪失於汗下所致。雖身冷而不欲近衣。雖神昏而氣色光潤。雖腹痛必脹滿。而喘急不可按。揉下利傍流清水。小便黃赤。大便或秘或黑。厥逆亦不過肘膝厥逆。即發熱厥逆。深熱亦深。此為陽極似陰。不可誤認為寒而溫之。○若發於陰者。始病不發熱。無頭痛。便自利。厥逆。腹痛。口不渴。身體沉重。難以轉側。嘔吐濁利。惡寒踴卧。戰慄吐沫。至足指冷厥逆。爪甲青黑。面如刀刮。顏色黯淡而不光。舌上雖黑而無胎。脈來沉遲細小。皆三陰自中之寒證。其或面赤戴陽。身有微熱。咽乾煩躁。脈來數

疾無倫。乃水極似火。因虛冷內盛。逼其浮陽發外也。又如始本陽證。服涼藥。攻熱太速。其人腎氣本虛。胃氣素弱。遂變陰寒。雖發熱而赤。欲引衣自覆。而手足必寒。或燥渴欲飲水。而不能嚥。或嘔噦而欬逆。或咽痛而鄭聲。時躁悶亂。欲坐卧泥水中。稍袒露即畏寒。莫禁腹痛可按。可接而不鞭滿下利。清穀白沫及淡黃水。小便清白。厥逆過肘膝而不復熱。舌上暮有黑胎。與灰色胎。胎雖老必極薄無津。而不燥裂無芒刺。脈多沉細。或浮大數疾。按之必虛軟無力。不敢擊於指下者。此為陰極似陽。不可誤認熱證而下之。此證急溫尚且十難救。一下之百不一生矣。○喻嘉言云。凡傷寒初起。發熱煎熬津液。鼻乾口渴。便祕。漸至發厥。不問知其為熱也。若陽證忽變陰厥。從古至今。無一也。蓋陰厥得之一起便直中陰經。唇青面白。遍身冷汗。便利不渴。身跨多睡醒。則人事了了。與傷寒傳經之熱邪轉入轉深。人事昏惑者。萬萬不同。如先犯居勞。而後傷寒。世醫無不為陰證。往往投以四逆等湯。促其暴亡。而諉之於陰極莫救。總由傳派不清耳。蓋房勞而病外感者。其勢不過比常較重。以陰虛陽往乘之。非陰盛無陽之比。汙下藥中。不過稍加甘溫。照顧元氣耳。且仲景明言。厥多熱少。則病進。熱多厥少。則病退。厥愈而熱過久者。必便膿血。發癰。厥應下而反汗之。必口傷爛赤。先厥後熱。利必自止。見厥復利。利止反汗出。咽痛者。其喉為痹。厥而能食。恐為除中。厥止思食。邪退欲愈。凡此之類。皆熱深厥深之旨。原未論及於厥陰也。至於陽分之病。而妄汗吐下。致汗多亡陽。吐利煩躁。四肢逆冷。皆因用藥差誤所致。非以四逆真武等湯挽之。則陽不能回。亦原不為陰證立方也。蓋傷寒發熱。發渴定然。陰分先虧。以其誤治。陽分比陰分更虧。不得已從權用。辛熱先救其陽。與純陰無陽。陰盛陽之證。相去天淵。不知治陰證以救陽為主。治傷寒以救陰為主。傷寒縱有陽虛當治。必者其人血肉充盛。陰分可受陽藥者。方可回陽。若面色黧黑。身如枯柴。一團冰火內燔者。則陰已先盡。何陽可回。而故助陽去陰乎。證治方云。若證未辨陰陽。且與四順九試之脚註。可見從前未透此。同縱有深心。無可奈何耳。至於元氣大虧。陰盛陽之證。庸醫往往反認陽證。遽施下藥。殺人多矣。今蟲工治傷寒。漫不辨其名證。一見發熱。其初槩用表藥。不論虛實。不分經絡。雜用三陽經藥。表之不愈。五

日間稍見胸腹滿悶。便以承氣下之。汗下不效。別無措手。委之天命。總由未得傷寒真訣耳。  
傷寒者。冬時嚴寒。感冒殺厲之氣而病也。交霜降節後。春分節前。病發熱頭痛者。皆謂之正傷寒。始風寒之在太陽經。必惡寒發熱。頭項痛。腰脊強。脈浮而緊。無汗不能食。為傷寒麻黃湯。若尺中遲弱者。為衛氣不充。當用黃耆建中為主。若陽虛不能作汗。或面色戴陽。足冷夾陰者。再造散。脈浮而緩。自汗能食者。為中風桂枝湯。脈浮緊而數。身疼不汗出。發熱煩躁。為風寒兩傷。大青龍湯。若脈浮緩自汗。身不疼。但重乍有輕時。無少陰證。或乾嘔。或欬。或渴。或利。或噎。或小便利。少腹滿。或喘。為心下有水氣。小青龍湯。太陽經表邪不已。或犯膀胱之本。或入陽明之府。或傳陽明之經。所謂犯本者。如太陽經發汗不解。誤用利水藥。熱結膀胱。小便難。煩渴引飲者。五苓散。若自汗多者。屬陽明。則又禁用五苓。恐重竭其津液也。如狂喜忘為畜血。桃核承氣代抵當選用。火迫劫汗。亡陽驚狂。起卧不安者。此火逆犯本也。救逆湯。如脈浮數而嘔吐者。必傳陽明經。其證身熱目疼。真乾不得卧。頭痛自汗而脈長。桂枝加葛根湯。有食必作脹悶。更加橘半枳朴。若自利者。葛根湯。嘔加半夏。稍遲必入陽明之府。其證日晡潮熱。手足繫繫自汗而脈滑。此屬胃實。俟其結定。用承氣輩攻之。如陽明不入府。邪氣在經未罷。必傳少陽。其證頭疼目眩耳聾口苦。脈弦腸痛。寒熱往來。小柴胡湯。蓋少陽居表裏之半。外有太陽之惡寒。內有胃府之惡熱。故往來寒熱。少陽與厥陰為表裏。少陽主邪欲入。而寒熱交爭。厥陰主邪欲出。故厥逆反覆也。少陽寒熱往來。六七日至十餘日。大便不行。腋下汗出。方可用大柴胡微利之。緣膽無出入。瀉土所以瀉木也。如八九日腋下無汗。為膽未實。誤用承氣下之。必犯少陽之本。則胸滿驚煩。小便不利。讒語。一身盡重。不可轉側者。柴胡龍骨牡蠣湯。至傳三陰。太陰則腹滿嗌乾。下利而脈沉細者。小建中和之。因誤下陽邪內陷而腹痛者。桂枝加芍藥湯。故也。若手足微微逆者。四逆散。若下利清水。心下鞭痛而讒語者。大氣承湯。又有元氣素虛。或汗下過劇。陽氣傷而成虛寒證者。不可執認傳經而禁絕溫補也。熱傳厥陰。則有下奪外解之分。若手足厥寒。脈細欲

藏府之內多成癰腫。凡此皆傷寒大病後餘邪為患也。  
絕或下利脈大而腸鳴者並用當歸四逆湯。若誤下而脈沉厥逆自利煩滿囊縮小承氣湯。若脈浮緩而  
囊不縮雖厥逆下利必自愈。乃陰盡復陽風從木化也可與小劑桂枝湯助其作汗而解。此六經證治大  
略耳。其他誤治變證詳繢論六經諸篇及細證例中此不復贅。○傷寒汗後熱不退仍頭項強痛而勢稍  
減者更宜汗之。若反劇煩擾者必有夾食夾痰或有宿病之故當推其源而治之。大凡汗後熱不退作危  
證斷之。若汗後熱愈其脈躁疾名陰陽交者死傷寒五六日裏證具而下之下後熱不退胸中堅滿不消  
或腹中疼痛不止脈尚數實者此為下未盡或下後一二日更煩熱喘滿者並可用小承氣湯復下之。若  
大下後身熱不退心中結痛懊憹頭汗施子政湯湧吐之。凡傳寒六日傳六經為一候七日當解。若不解  
再傳至十三日謂之過經不解二十餘日不解謂之再過經不解宜詳虛實輕重或和解或下奪之。若脈  
尺寸陷者大危若過經不解脈虛數人弱發熱口乾舌燥者此為虛證不可下以參胡三白或小柴胡增  
損主之。至於愈後餘熱不盡伏留藏府經脈之間致變他病不一如邪火伏於脾則變中滿不食伏於胃  
移熱於脾則變休息痢伏於心移熱於小腸則變淋血溺痛痛甚則小便不通多不可治伏於肝則變囊  
離陰腫伏於肺則變肺癰吐腥伏於腎則變羸瘦怯弱伏於脾腎之間則變癰卧不起久而成瘻伏於肝  
脾之分邪正交攻則變瘻瘍至若太陽少陽失汗則毒結顙頰之間謂之發頤陽明少陽失下則邪結於

若兩感於寒者。一日太陽與少陽俱病。則頭痛口乾煩滿而渴。易老用大羌活湯主之。此專在表也。二日陽明與太陰俱病。則腹滿身熱。不欲食。譏語黃連解毒湯主之。此意在和也。三日少陽與厥陰俱病。則耳聾囊縮。而厥雙解散主之。此重在裏也。至水漿不下。不知人事者。六日死。若三陰三陽。五藏六府。皆受病。則榮衛不行。藏府不通。而死矣。則知一藏一府受病。猶可治也。按兩感皆是熱邪亢極之證。朱氏妄言前經者。皆屬陽證。陰證本無熱邪。安得有傳變之理。即傷寒之病兩感者亦少。惟溫病。熱病居多。以溫熱咸。

從少陰發出太陽即是兩感之證。所以守真特立涼膈雙解白虎承氣等湯以兩解溫熱病表裏之熱毒也。非特溫熱病之有兩感也。凡下元虛人染患疫癟多有二日斃者。蓋疫癟之勢較傷寒更劇。所以死在三日也。傷寒例所言六日死者。是言傷寒之兩感也。三日死者。是言熱病疫病之兩感也。非特溫熱疫癟之有兩感也。即如冬溫之發於太陽少陰。故始咽痛而後自利。豈非兩感之證乎。

若陽氣素虛之人。始病無發熱頭疼。便惡寒踰卧。腹與少腹痛。自利厥逆脈沉者。為真中陰經寒證。太陰但有內寒而無外寒。病則胸膈滿。手足寒。躋上痛。下利清穀而不渴。必因內傷冷物所致。宜理中湯。甚則加附子。下利不止。宜四逆湯。少陰有寒。有風。寒則四肢厥冷。吐利而渴。渴不能飲。惡寒踰卧。身體疼。當臍下小腹痛。此腎藏真陽不足所致。宜四逆湯。口中和。背惡寒者。附子湯。發熱脈沉。麻黃附子細辛湯。風則但覺畏寒而不厥冷。自言腹滿而按之則濡。大便祕小便頻。欲吐不吐。臥而欲起。恍惚多驚。心懸若饑。稍食則痞脹不盈舌上灰黑。或淡紫帶青。脈來弦細浮弱。以風性上行。故其證頗似太陰。而實少陰中風之證。最難辨別。宜桂枝湯加乾薑。下虛甚者。面赤戴陽。急用桂枝人參湯加葱白生附。陰結不大便。脹滿不能食者。四逆湯下金液丹。誤用寬脹藥。必轉劇。若攻不必死。厥陰但有中風而無中寒。若其人胃氣素常虛寒者。則乾嘔吐涎沫頭痛。吳茱萸湯加桂枝。若腎氣素虛者。則厥冷自利少腹痛。四逆湯加肉桂。凡陰證多有陰極似陽。煩躁面赤。脈數疾無倫。躁過必畏寒。渴不能飲。此不獨真陽下虛而陰氣亦虛。不能內守。致虛陽擾亂而上泛外亡也。急宜通脈四逆白通。加豬膽汁及益元湯治之。蓋陰盛於裏。則燥煩。下虛則虛陽上泛。故面戴陽而煩渴。內無熱。故渴不能飲。陽虛陰亢。故身熱脈大而疾。但無力耳。陰證惡寒厥逆。為陰經受寒。雖陽氣微不至於劇。故止宜溫經。若陰極似陽者。為陽氣衰微不能制其浮火。宜兼溫補。冬則白通。脈四逆輩。夏則大順漿水冷香等。然總不離辛熱也。

若交一陽後。天令大寒。有卒然倒仆。昏不知人。手足逆冷。或口吐白沫。嘔逆清水。唇青面黑。口鼻氣息微冷者。為中寒。按丹溪曰。中寒者。倉卒受寒。其病即發而暴。蓋中寒之人。乘其腠理疎濶。一身受邪。難分經

絡無熱可散。溫補自解。此胃氣大虛不急治。去生甚遠。○戴元禮曰。中寒是身受肅殺之氣。口食爪果。冰水冷物。病者脈必沉細手足冷。息微身踴。雖身熱亦不渴。倦言語。此言夏月中寒。大順令香。或附子理中。浸冷服。若脈數飲水煩躁動搖者。皆是熱證。寒熱之異。若水火也。不可得而同治。誤則殺人。若在冬月中寒。法當溫散。輕則附子理中。甚則白通。通脈劇則霹靂火焰。庶可挽回。緩則不救。○中寒之色必青。唇口青。身冷。脈脫為入藏。即死。身寒汗自出為入府。即愈。經曰。血氣併走於上。則為太厥暴死。中寒脈散者死。尺脈遲滯沉細。寒在下焦。○經云。陰盛生內寒。因厥氣上逆。寒氣積於胸中而不渴。不渴則溫氣去。寒獨留。留則血凝。血凝則脈不通。其脈盛大以濇。故中寒。夫經既言陰盛生內寒矣。又言故中寒者。豈非內寒先生外寒後中之耶。經既言血凝則脈不通矣。又言其脈盛大以濇者。豈非以外寒中。故脈盛大。血脈閉。故脈濇耶。此中併有大疑。請先明之一者。人身衛外之陽最固。今不由三陽而直中少陰。蓋厥氣上逆。積於胸中。則胃寒。胃寒則口食寒物。鼻吸寒氣。皆得入胃。腎者。胃之闕也。外寒斬闕。直入少陰腎藏。故曰中寒也。此內經所隱而未言者也。一者。其脈盛大以濇。雖曰中寒。尚非卒病。卒病中寒。其脈必微。在傷寒證。惟少陰有微脉。他經則無。其太陽膀胱為少陰之府。緣見脈微惡寒。仲景早從少陰施治。而用附子乾薑。急用白通湯為主治。蓋薑附追復元陽。加葱白以散寒。加豬膽汁引入陰分。然恐藥力不勝。更以葱熨臍中。并灸氣海關元數十壯。取脈漸來。手足溫為效。必足破其堅凝。少緩須臾。必無及矣。○若其人真陽素擾。腠理素疏。陰盛於內。必逼其陽亡於外。魄汗淋漓。脊項強輒用薑附豬膽汁。即不可用葱及熨灼。恐助其散。令氣隨汗脫。而陽無由內返也。○用薑附以勝陰復陽。使既散之陽急復。不知此義者。加增藥味。反牽制其雄。入之勢必致迂緩無功也。○其次前藥中。即首加當歸肉桂。兼理其榮。以寒邪中入。先傷榮血故也。○其次前藥中。更加人參甘草。兼調其氣。不爾。恐薑附之猛。直將犯上無等矣。○用前

藥二三劑後覺其清陽在躬運動頗輕更加苦者白朮五味白芍陰陽平補不可歇手○用羣隊之藥以培陰護陽其人即素有熱痰陽出早已從陰而變寒至此無形之陰寒雖散而有形之寒痰阻塞較甚者無由遞轉為熱。薑附固可勿施其牛首竹瀝一切寒涼斷不可用若因其素有挾熱妄投寒劑則陰復用事陽即擾亂必墮前功也○用平補後嗣後總有頑痰留積經絡但宜甘寒助氣開通不宜辛辣助熱壅塞蓋辛辣始先不得已而用其毒陽既安堵即宜休養其陰切勿喜功生事轉生他患也

至於冬時反有非節之暖此屬春時陽氣發於冬時未至而至即為冬時不正之氣人感之而病者名曰冬溫冬溫雖發於冬時治法與傷寒大異蓋溫則氣泄寒則氣收二氣本相反也其證必心煩嘔逆咽痛身熱頭疼或欬嗽自汗或頭重面腫但始先咽痛後必下利陽脈浮滑陰脈濡弱與風溫不異但時令不同治之不得不為少異也按羅謙甫云冬溫一證雖闕不正之氣而實則氣虛故邪得以入於少陰其經上循喉下入腹故咽必痛或下利也治之宜用陽旦湯加桔梗姜桂或問冬溫何以竟入少陰而前所治亦非少陰之藥其故何也石頑曰大凡四時各有正令冬月當寒而反不寒則少陰之氣不藏而不正之氣得以入傷其經原非腎臟受病故但以桂枝湯中加黃芩一味專主驅散風熱不須更用他藥此仲景陽旦湯所由立也若有寒食停積或誤用寒涼藥食則寒邪外鬱溫邪中結冷食內伏更加入乾薑一味以溫散其中兼黃芩以涼解其外此仲景之陰旦又必所需若咽痛甚者則合甘草湯妙者合桔梗湯下利合茯苓甘草湯或陽旦加葛根茯苓不應則溫熱之氣併於陽明而溫熱也葛根黃芩黃連湯若先受冬溫更加嚴寒外遏則外證雖惡熱煩躁而仍畏寒欲近衣者陽旦湯加麻黃石膏以發之有冬溫誤認傷寒而與辛溫表藥熱邪益甚而胸腹滿悶醫者不察見其脹悶而屢用下藥大下後仍發熱無休止時脈反數者此陰血傷故也朝用獨參湯暮進六味丸此陰陽俱虛氣血俱弱故熱不得止息所以用六味必兼獨參湯以資陽生陰長之功若服後熱勢漸解飲食漸進神氣漸清脈息漸和者方可收功今世遇冬溫之證鮮能辨識概以傷寒法混治致變斑黃喉痺利膿血等證者皆由誤治所致也若誤用辛

溫發汗而發班成溫毒者。當用犀角升麻甘草等分煎服。或升麻葛根湯加犀角黑參。其則犀角黑參湯之類選用。然冬溫為病亦自不一。當隨所見證治之。凡冬溫溫毒大便泄瀉而譟語脈虛小手足冷者皆不治也。

若春夏秋三時感冒非時暴寒謂之寒疫。亦曰感冒。夾食則曰停食。感冒雖非行時疫氣以非其時而有其氣故謂之寒疫而實非疫也。其證發熱惡寒頭痛。骨節痛無汗或嘔逆惡心。其脈人迎多浮緊亦有弦數者。夾食則氣口緊盛亦有滑數者。若夾寒食則濁滯。夾風痰則浮滑而疾也。然又有人迎沉小絕不似外感者。見停食感冒之脈有人迎極短小氣口極弦細其人自言傷食受寒。服發散兼消導之藥一二劑脈反浮大則知未服藥時脈沉小皆為寒食鬱滯故也。大抵治非時感冒止宜辛平解散如參蘇飲芎蘇散香蘇散神木湯皆可選用。有食正氣散按證加減如見太陽羌活防風陽明葛根芩白少陽柴胡半夏若天氣未熱病勢頗盛不妨從權稍加桂皮佐羌活輩汗之。蓋冬溫之與寒疫俱是非時邪氣用藥亦不可拘於常候。猶冬溫之用辛涼寒疫之用辛溫也宜矣。即如溫病熱病而見脈緊暴寒黃芩白虎湯中未嘗不稍加桂枝五七分也。此證不必拘傷寒六經例治。大率春分以後則少陽風木主令。况春時之寒必兼之以嶺嶠之風。風傷少陽。少陽在內則太陽陽明在外。病則三經俱受。所以古人治寒疫之方咸不分三陽而治。但見某經證多則加用某經之藥為權衡耳。若治之不得其宜後變壞病則與傷寒無異也。蓋非時暴寒雖從時令傷犯然寒則大都不越太陽以寒氣而犯寒水之經從其類也。即如夏月暑寒之證多有頭痛骨節疼惡寒者此非太陽之證歟。

若夫天時寒暖偶因脫露謂之傷風。其證必欬嗽自汗清涕甚者亦發熱頭痛但治有時月之殊。春月風喜傷肝人迎脈多緩而帶弦必自汗惡風。宜芎蘇散加減。夏月肌肉本疎多傷陽明病則肌肉因閉氣口多見弦長而反無汗宜葛根葱白湯加減。兼暑消暑十全散。秋月微涼先鬱皮毛手太陰受邪人迎脈多平而氣口脈多細濇不可拘人迎以候外邪也。宜金沸草散加減。冬月則傷太陽必自汗脈浮緩宜桂枝

湯效甚而喘有水氣宜小青龍湯。蓋陽邪多從背受由背前而入於肺故必效。嗽生痰也。然傷風與傷熱證類相似。傷風則人迎浮大。效嗽自汗。鼻流清涕。痰必從喉中嗽出。發散則愈。傷熱則氣口軟大。效嗽自汗。但鼻乾痰結咽脣腫痛痰從上腭咯出為異不可發散。宜辛涼清肺為主。姜桂湯去麻黃川芎加前胡薄荷。傷風而復傷熱必加燥煩宜萎蕤湯倍羌活石膏。有酒客濕熱素盛痰飲結聚中外最易傷風。素問謂之漏風。其證身熱解惰汗出如浴。惡風少氣治以澤瀉。厚朴。每遇發時煎取一二劑後用黃耆白朮防風澤瀉茯苓之屬調理肥盛多濕熱者導痰湯加羌防最當。又有接內時偶感微風藏於腎經則內風與外風相召極易傷風。素問謂之內風。其證面附龐然。腫不能正偃。正偃則效。宜小青龍去麻黃加杏仁甚則加附子先去客邪次用真武湯治本然後更以腎氣丸調理又有素虛勞人更感風寒裏急腹痛悸動失精煩熱口燥者桂枝湯加龍骨牡蠣主之。至春分節後天令溫暖有人壯熱為病者乃溫病也。經云冬傷於寒發為溫病。又云太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病。言冬時伏氣隨時溫熱發出但所發之因不同有感非時暴寒而發者有飢飽勞役而發者有房室作力而發者所感之客邪既殊發出之經絡亦異所謂溫病之脈行在諸經不知何經之動也當隨其經證而治之。凡溫病之發必大渴煩擾脹滿口苦不惡寒反惡熱脈氣口反盛於人迎明係伏邪自內達表必先少陽經始若因客寒而發者宜小柴胡隨所見經證加減無客邪者黃芩湯主之。然溫病亦多傳變併合未有不及少陽者如太陽少陽合病黃芩湯少陽陽明合病承氣湯三陽合病大柴胡湯或雙解散加減。凡三陽表證煩熱口渴俱宜黃芩湯之類據此合病證治則傳變併病可例推矣。大抵治溫病熱病無正發汗之理。蓋其邪自內達外無表證明矣。若果證顯非時暴寒惡寒頭痛而脈浮緊者亦不可純用表藥。宜梔子豉湯或益元散加薄荷葱豉重則涼膈散去硝黃加葱豉探吐取汗最妙。蓋此怫鬱之熱乘春溫之氣而發雖有非時暴寒止宜辛平之劑發散若頭痛如破者為暴感風寒勢盛先宜葛

根葱白湯。撤其暴邪。然後用治溫病本藥。若額與眉棱俱痛。選奇湯。脈弦而兩額角傍痛。寒熱口苦。小柴胡去參半。加桔梗根。若表證不解。邪復入府者。雙解散。若汗下不解。脈轉洪大數盛。表裏皆實。譏妄狂越。此熱在三焦也。三黃石膏湯。凡溫病下後。熱不退下。證尚在再三下之。以熱退為度。若熱不止。而脈濇咽痛。胸滿多汗者。此熱傷血分也。草庵苦酒湯。探吐之。雖熱退。尚未全愈者。隨證調之。凡下之前後。或大汗將出。或大汗已出。或下後餘熱不止。而反大汗淋漓。此實熱雖去。而餘邪未盡。再與小劑黃芩湯。或解毒湯。調之。若下後渴雖減。而飢欲得食者。此伏邪初散。陰火乘虛擾亂也。凡溫熱下後。多此慎勿便與粥飲。得食必復。若汗下後。一切煩渴引飲。湏以水細細飲之。渴未止者。頻頻時與。不可過多。以成留飲不散也。設若不與飲之。則燥熱轉甚。危而死矣。○世所謂交陽者。非陰寒交熱以為陽熱也。乃怫熱畜之於裏。而鬱極乃發。則交傳出於表之陽分。是謂交陽而後作汗也。或怫鬱過極。而不能交出於表者。是鬱極不發。否極不泰。即正氣衰殘。陰氣先絕。陽氣後絕而死矣。大欲汗而脈忽沉伏者。陽氣並入于裏故也。交陽而躁亂昏冒者。裏熱鬱極。故氣亂則神昏而躁擾也。凡欲作汗。無問病之微甚。或已經新下者。或下證未全者。咸以涼膈散調之。甚者宜黃連解毒湯。或下後二三日。或未經下。腹滿煩渴。脈沉寔而有下證者。三一承氣湯下之。勢劇者。合黃連解毒湯。或已戰不快。或戰後汗出不快。或微戰數次。經大戰而汗不出者。乃并之不其。戰而病不去也。通宜三一承氣湯。或更合黃連解毒湯下之。以散怫熱而開鬱結也。所以戰汗頓開。先汗出而後利者。或利性但隨汗泄。則氣和而愈。竟不利者。亦有戰不快。交不過而死者。或不戰而汗出者。或但戰無汗而愈者。或不戰無汗而愈者。世俗未知。直以惡寒戰慄為陽虛陰盛。因而誤治者多矣。凡溫病發於三陰。脈微足冷者。多難治。內經所謂病溫虛甚。死是也。反溫病大熱。脈反細小。手足逆者。死證也。凡溫熱病初起。大熱目昏。讒語熱甚。脈小足冷。五六日而脈反躁急。嘔吐昏沉舌本焦黑。或失血。

躁熱脈大。或痙攣昏迷。或脈促結代。況小者皆死。溫病熱病。大熱不得汗者死。得汗後而反熱其脈躁盛者亦死也。凡溫病熱病。不當汗而誤汗之。狂言不能食。其脈躁盛者皆不可治也。

凡溫病之熱。咸從內而發於表。所謂最忌辛溫發汗。發汗多致不救也。仲景故云。太陽病發熱而渴者為溫病。若發汗已。身灼熱者。名曰風溫。風溫為病。脈陰陽俱浮。自汗出身重多眠。睡鼻息必譴。語言難出。若被下者。小便不利。直視失溲。若被火者。微發黃色。劇則如驚癇。時癲癇。若以火薰之。一逆尚引日。再逆促命期。此溫病誤汗而為風溫也。又傷寒例云。陽脈浮滑。陰脈濡弱。更遇於風。變為風溫。此溫病更遇於風之風溫也。以少陰伏邪。方將發出。太陽客邪。又從外襲。表邪新入。裏邪初出。故其脈輕則浮滑。重則濡弱。即上文陰陽俱浮之互辭。言伏於少陰之邪。熟悉從風木之令。而發出肌表。故其證一一盡顯。諸太陽少陰二經。又嘗見冬溫一證。每多誤汗而成溫毒。發斑者亦有誤施汗下。而變咽喉不利。唾膿血者。蓋冬溫亦屬太陽少陰證。緣誤治而併傷厥陰之經也。按風溫一證。仲景但言誤治之失。並不論及治法者。以其既經誤治。即欲挽回末由也。已喻嘉言。嘗謂風溫多死於三日者。謂其即是兩感。而更加變重耳。不但溫病之不可以傷寒。寒疫法治也。即冬溫亦不可以傷寒。例施也。因其發在冬時。故誤治尤多。所以仲景厥陰例中。有麻黃升麻湯一條。正以治冬溫之誤治。而變咽喉不利。唾膿血者。即此而推。可用麻黃升麻湯去麻黃。升麻。乾薑。白朮。而借治溫病。誤發其汗之風溫也。并可悟黃芩湯加桂枝石膏治溫病。更遇於風之風溫也。○再按風溫一證。仲景絕無方藥。而活人書治法頗多。參其所主之方。皆是治先傷熱而復感風。或已傷風而更受熱之證。近世亦曰風溫較伏氣所發者。雖死生輕重懸殊。而究治之理則一。似風痰結聚於肺。故汗下兩難。汗之則譴語煩熱。不得眠。善驚目亂。無精多汗。身重下之則小便難。大便利不止。尤不可用溫鍼。溫鍼則耳聾難言。止宜辛涼解熱。兼疏風利痰。然雖禁發汗。又不得不兼用表藥。但禁溫覆迫汗耳。若發熱頭眩。咽喉乾痛。舌強唇滿者。用姜蕤湯。無大熱而渴。用桔梗根湯。熱不解。用敗毒散。寒熱而渴。小柴胡加姜蕤桔梗。惡寒發熱。本方去參加桔梗石膏。渴者去半夏。加桔梗根。舉世皆以風熱咽

痛。瘡聲溫者為風溫雖治法不遠殊失風溫本旨矣。尚論以春月時令本溫且值風木用事。風溫二字不得分之為兩。凡病溫者。悉為風溫。是又矯揉太過矣。

夫春夏溫熱之邪能傳染者即時行疫癘也。吳又可曰。瘟疫之邪皆從口鼻而入。不在經絡。舍於伏春之內。去表不遠。附近於胃。乃表裏之分界。是即內經瘧論所謂橫連募原是也。凡人本氣充滿。邪不易入。適逢虧欠。因而乘之。感之淺者待有所觸而發。感之深者中而即病也。其始先陽氣鬱伏。票漂惡寒。甚則四肢厥逆。既而陽氣鬱發。中外皆熱。發即昏昏不爽。壯熱自汗。此邪伏於募原。即使汗之。熱不能解。必俟伏邪外發。表氣潛行於內。精氣自內達表。此時表裏相通。大汗淋漓。邪從外解。此名戰汗。當即脈靜身涼而愈。若伏邪未盡。必復發熱至伏邪已發。方有變證。其證或從外解。或從內陷。更有表裏先後不同。有先表而後裏者。有先裏而後表者。有但表而不裏者。有但裏而不表者。有表勝於裏者。有裏勝於表者。有表裏分傳者。此為九傳。從外解者。或發斑。或戰汗。狂汗。自汗。盜汗。從內陷者。胸膈痞悶。腹痛燥結。熱結傍流。協熱下利。或嘔吐惡心。讙語舌胎。當因證用治。疫脈不浮不沉。而數晝夜發熱。日晡益甚。頭疼身痛。宜用達原飲。以透達募原之邪氣。若見少陽陽明太陽隨經加柴胡葛根羌活為引。以提其邪出陽分也。然證有輕重不等。藥之多寡隨宜。務在活法。感之輕者。舌上白胎亦薄。熱亦不甚。脈亦不數。其不傳裏一二劑自解。稍重者必從汗解。如不能汗。邪氣盤錯於募原也。只以本方主之。感之重者。舌上胎如積粉。服藥後不從外解而從內陷。舌根先黃。漸至中央。此邪漸入胃也。前方加大黃下之。若脈長而洪數。大汗多渴。此邪氣適離募原。欲表未表。白虎湯證也。如舌上純黃色。兼見證裏。此邪已入胃。乃承氣湯證也。有二三日即離募原者。有半月十日不傳者。有初得之四五日。而淹淹懾懾。五六日後陡然勢張者。元氣勝者。毒易傳化。元氣薄者。邪不易化。即不易傳。如他病久虧。適逢時疫。能感不能化。妄望其傳。不傳則邪不去。淹縕日久。愈沉愈伏。設誤認虛證而進參耆。愈壅愈固。不死不休也。○疫邪為病。有從汗解者。有無汗竟傳入胃者。有自汗淋漓。熱渴反甚。終得戰汗方解者。有胃氣壅鬱。必從下乃得戰

汗而解者有汗解裏未和。越三五日復發者有發黃因下而班出者有竟從發班而愈者有裏證急雖有班非下不愈者此雖變傳不和亦為常也。又有局外之變。男子適逢接內或向來下元虛空邪熱乘虛陷於下焦氣遂不舒致小便祕塞小腹脹滿至夜發熱與導赤五苓不效得大承氣一服小便如注而愈女子經水通來通斷失血崩帶及心痛疝氣疫火喘急凡此皆非常變蓋因疫而發舊病但治其疫而舊病自己然大勞大慾大病久病後此為四損以正氣先虧邪氣自陷多不可救也○瘟疫發熱一二日舌上白胎如積粉早服達原飲一劑午後舌變黃色隨塊胸膈滿痛大渴煩躁此邪毒傳裏也前方加大黃下之煩渴少減熱去六七午後復加煩躁發熱通舌變黑生刺鼻如烟煤此邪毒混合三焦復淤到胃急投大承氣傍晚大下至夜半熱退次早胎刺如失此一日之間而有三變數日之法一日行之因其毒盛傳變亦速用藥不得不緊設用緩劑必死無救嘗見瘟疫二三日即死者皆此類也○瘟疫初起脈雖數未至洪大其邪尚盤結於募原宜達原飲誤用白虎既無破結之能但求清熱是揚湯止沸耳若邪已入胃非承氣不愈誤用白虎既無逐邪之能徒伐胃氣反抑邪毒致脈不行因而細小又認陽證陰脈益不敢下湯藥雜進愈投愈危當此急投承氣庶可救也○邪伏於募原表裏之間至其傳變或出表或入裏或表裏雙傳醫見有表復有裏乃引經論先解其表乃攻其裏此大謬也嘗見大劑麻黃一毫無汗轉加煩躁者何耶蓋發汗之理自內以達表今裏氣結滯陽氣不得敷布於外即四肢未免厥逆又安能氣液蒸蒸以達表譬之水注閉其後竅則前竅不得涓滴與發汗之義同凡見表裏分傳之證宜承氣湯先通其裏裏氣一通不待發散多有自汗而解裏證下後脈浮而微數身微熱神思不爽此邪熱浮於肌表裏無壅滯也雖無汗宜白虎湯邪從汗解若大下後或數下後脈空浮而數按之豁然如無宜白虎加人參湯覆蓋即汗解下後脈數而浮原當汗解遷延五六日脈證不改仍不得汗者以其反覆數下致周身血液枯涸故不得汗白虎加人參湯以助周身之血液鼓舞元氣間發腠理即得汗解也裏證脈沉而數當下之後脈浮當得汗解今不得汗後二三日脈復沉者募原餘邪復淤到胃也更宜下之更下後而脈再

浮者仍當汗解。宜白虎湯。裏證下後熱退身涼。越四五日復發熱者此非關飲食勞復乃募原尚有餘邪。隱匿因而發熱此必然之理不知者每每歸咎於病人誤也。宜再下之則愈。但當少與慎勿過劑以邪氣微也。○應下失下口燥舌乾而渴身反熱減四肢微厥欲得近火擁被此陽氣伏也既下厥回去火減被脈大而數古上生津不思水飲此裏邪去而鬱陽暴伸也。○瘟疫下後二三日或一二日舌上復生胎刺。邪未盡也再下之胎雖未去已無芒刺而軟然渴熱未除更下之熱渴減芒刺脫日後更復熱又生胎刺更宜下之。凡下不以數計。有是證即投是藥。醫人見理不透經厯未到中道生疑往往遇此證反致擔擋。但其中間有一日一下者有應連下二三日或三四日者有下二日間一日者其緩急之間有應用小柴胡湯去參半加桔梗根知母者有應用犀角地黃湯者至投承氣某日應多與某日應少與此非可以言傳也。但數下之證百人中之一二人而已。○瘟疫後脈證俱平大便二三旬不行時時作嘔此為下格之證蓋下不通必返於上宜調胃承氣熱服宿垢頓下嘔吐立止慎勿驟補少與參耆下焦復閉嘔吐仍作也。○凡客邪貴乎早治勿拘於下不厭遲之說若應下之證見其無結糞以為下之早而引初鞭後瘧液衰少多生燥結在經所謂不更衣十日無所苦。有何妨害。是知燥結不致損人毒邪之為殞命也。假令為例此誤也。不知承氣本為逐邪非專為結糞而設必俟結定血液為熱所搏變證迭起是猶養虎遺患也。況有平素多濕熱人瘧糞失下但蒸作極臭如敗醬糲泥臨死不結者假如經枯血燥之人或老人血滯下初起質實而煩數著急者與大黃下之此豈謂結糞而然哉。○疫邪傳裏遺熱下焦小便不利邪無輸泄經氣鬱滯其傳為癰。身目如金宜茵陳蒿湯若用茵陳五苓不惟不能退黃小便亦難得利此乃胃邪熱與痰飲結聚胸中也宜瓜蒂散吐之。○邪留血分裏氣壅閉非下之則斑不出斑出為毒邪外解。下班漸發更不可大下設有下證宜少與承氣緩緩下之若大下則中氣不振斑毒內陷則危宜用白芍當歸以和血升麻柴胡白芷以託邪。大劑穿山甲末以透毒名託裏舉斑湯如下後班出復大下斑毒隱

伏反見循衣撮空。脈微者。前方加人參一錢。得補發不出者死。凡發斑有汗出不微而熱不退者。宜白虎湯。斑出不透而熱不退者。宜舉斑湯。有斑汗並行而並不透者。二湯合用。○凡時疫日久失下。目利純眞。水晝夜十數行。口燥唇乾舌裂。此熱結傍流也。急與大承氣一服去其宿垢頓止。○凡失下以致循衣撮空。肉惕振戰。目不了了。邪熱愈盛。元神將脫。補之則邪毒愈甚。攻之則幾微欲絕不得已用陶氏苦龍湯治之。此證不下必死。故用此法庶幾回生於萬一也。得下後用生脈散加地黃當歸白芍。知母陳皮甘草調之。○如方食肉而適病致停積在胃。用大承氣湯連下。惟是臭水稀糞。其病不退。必加人參一錢在內。雖月餘所積之物。一服便下。○凡疫病有首尾能食者。此邪不傳胃。切勿絕其飲食。但不宜過食耳。有愈後十數日。微渴微熱。不思飲食。此微邪在胃。正氣衰竭。若強與之。即為食復。○凡舌胎自白而漸變黃。邪在募原。故曰。在胃則黃。胎老變沉。色白者不可下。黃者宜下。黑者急下。下後胎不脫。舌刺舌裂。舌短舌鞭舌卷。皆當下。白砂胎黑。鞭胎俱下。惟白潤滑澤者。邪尚在募原也。如別有下證。宜達原飲加大黃。若大汗。脈洪長而渴。未可下。宜白虎湯。汗更出。日赤咽乾。氣噴如火。小便赤黃。涓涓作痛。揚手擲足。脈沉而數。皆為裏熱之極。下之無疑。潮熱讒語。善太息。此胃實也。心下滿。心下高起如塊。心下脹痛。腹脹滿痛。按之愈甚。昏下。頭脹痛。下之立止。若初起未可下。小便祕。大便不通。氣結不舒。大便行。小便立解。有血液枯竭者。無表裏證。為虛燥。宜導法。○凡陽證似陰者。瘟疫與溫病。熱病傷寒。通有其陰。證似陽者。惟傷寒有之。在瘟疫必無此證也。陽證似陰。為外寒內熱。故小便赤澀。陰證似陽。為上熱下寒。故小便清白。但以小便赤白為據。萬不一失。○夫疫病四時皆有。但盛與不盛耳。盛行之際。沿門閭戶。病皆一般者。謂之時行大疫。人皆知之。不盛之時。人偶感之。不過發熱頭痛。與尋常感冒相似。即有傳染。不過左右服役之人。又烏能知其為疫也。病人無處追求。每每妄訴病原。醫家不善審察。未免隨情錯認誤引。東垣勞倦傷脾為例。壅邪轉熱。多致危殆。○喻嘉言曰。四時不正之氣。感之因而致病。初不為疫也。因病致死。病死屍氣混合。不正之氣。以故雞瘟死雞。猪瘟死猪。牛馬瘟死牛馬。推之於人。何獨不然。所以飢饉兵凶之際。疫病盛行。

大率春夏之交為甚。蓋溫暑濕熱之氣交互結蒸。人在其中無隙可避。病者當之。魄汗淋漓。一人病氣足充一室。況於連床並榻。沿門闥境。共釀之氣。蓋以出戶屍蟲。載道腐墮。燔柴掩席。委巷投溝。種種惡穢。上溷蒼天。清淨之氣下敗水土。物產之氣人受之者。親上親下。各從其類。有必然之勢。如世俗所謂大頭瘟者。頭面肥頤腫如瓜瓠者是也。所稱捻頸瘧者。喉痹失音。頸大腹脹如蝦蟆者是也。所稱爪谿瘧者。胸高脇起。嘔汁如血者是也。所稱楊梅瘧者。遍身紫塊忽然發如微瘡者是也。所稱疙瘩瘧者。發塊如瘤。遍身流走。一旦發夕死者是也。所稱絞腸瘧者。腸鳴乾嘔。水洩不通者是也。所稱軟脚瘧者。便泄泄白。足腫難移。即濕溫遍行者是也。小兒痧痘尤多已上疫證不明。證治咸委劫運良可傷悼。然而盛夏濕溫之證。即藏疫癟在內。一人受之。則為濕溫一方傳遍。則為疫癟。所以疫癟之發。每每盛於春夏者。以其熱暑濕三氣交蒸故也。蓋春主厥陰肝木。秋主陽明燥金。冬主太陽寒水。各行其政。惟春分以後。至秋分以前。少陽相火。少陰君火。太陰濕土。三氣合行其事。天本熱也。而益以日之暑。日本烈也。而載以地之濕。三氣交動。時分時合。其分也。以風動於中。勝濕解蒸。不覺其苦。其合也。天之熱氣下。地之濕氣上。人在是氣之中。無隙可避。故病之繁而且奇者。莫如夏月為最。以無形之熱。蒸動有形之濕。即無病之人感之。尚未免於為患。况素有濕熱或下元虛人。安得不患濕溫之證乎。是以濕溫之證最忌發汗。發汗則濕熱混合為一。而中氣盡傷。多成死證。惟宜分解。先扶中氣。使中氣徐領其表。其裏而上下盡消。故多愈也。至於疫證。則邪正混合。邪極勝。正極衰。轉眼立斃。若寒傷胃。溫補助邪。如人中黃丸之類。不為合法也。夫傷寒之邪。先行身之背。次行身之前。後行身之側。由外廊而入。瘟疫之邪。則直行中道。流布三焦。上焦為清陽。故清邪從之上入。下焦為濁陰。故濁邪從之下入。中焦為陰陽交界。凡清濁之邪。必有此區分。甚者三焦相混。上行極而下。下行極而上。傷寒邪中外廊。故一表即散。疫邪行在中道。故表之不能傷寒。邪入胃府。則腹滿便堅。故可攻下。疫邪布在中焦。散漫不收。下之復合。此與治傷寒表裏諸法有何涉哉。或問春夏蒸氣成疫。豈多溫獨非疫耶。蓋冬月過溫。腎氣不藏。感而成病。正與不藏精之春溫無異。計此時有春無父。三氣即得

交蒸成疫。然遇朔風驟發則蒸氣化為烏有矣。是以東南冬月患正傷寒者少。患冬溫及豆瘡者最多。西北則秋冬春皆患傷寒。殊無瘟疫痘瘡之患。此何以故。西北土地高燥。即春夏氣難上升。何況秋冬之凝滯。東南土地卑濕。為霧露之區。蛇龍之窟。其濕熱之氣得風播之。尚有可耐。旦暮無風。水中之魚。衣中之虱。且為飛揚。況於人乎。蒸氣中原雜諸機。益以病氣屍氣。無分老少。觸之即同一病狀矣。此時朔風了不可得。故其氣轉精轉暴。雖有薰風。但能速熱。不能解涼。世所謂解悶草財者。在兵荒反有注卯佈穢之事矣。○按吳又可所論。皆是尋常所有疫癘。喻嘉言所言。乃天地不正之大疫。不可彼此膠執也。夫瘟疫證類多端。豈可一律而論。若傷於氣。則頭項腫脹。傷於血。則肢體充瘡。傷於胃。則嘔吐如血。傷於腸。則水泄不通。至入藏則不知人。不得救藥則斃矣。大法以證為則。無以脈診。其傷之輕者。二三日尚能行動。至四五日後。忽然大熱。慎勿誤認傷寒。而與表藥發汗。不惟不解。其熱轉甚。而危殆矣。其初病惡寒。發熱頭痛。宜敗毒散。躁熱不得汗。通解散頭疼。如破十神湯。兼瘡癰脚膝疼。獨活散。此皆為表證多者立方也。若一病便壯熱無寒。多汗。神昏。嘔逆。痞滿等證。又當從涼膈雙解。三黃石膏。黃連解毒。兩解表裏法治之。古人以普濟消毒飲。治大頭瘡。荆防敗毒散。治捻頸瘡。生犀飲。治瓜瓠瘡。清熱解毒湯。下人中黃丸。併刺塊出血。治楊梅瘡。三棱鍼刺入委中三分。出血。及服人中黃散。治疣瘡。瘡瘍。倉朮白虎湯。治軟脚瘡。雙解散。探吐治絞腸瘡。此皆昔人已驗之方。足補仲景之未逮也。○凡時疫流行之際。小兒亦多傳染。傷寒例所謂小兒女子。益以滋甚。以小兒年幼筋骨柔脆。染時疫即驚搖發瘡。誤作驚治。必死。治稍遲亦死。其治與大人彷彿。但幼科專於痘疹驚瘡。而傷寒甚略。但知其不思飲食。不知其疫邪傳胃。但知其嘔渴漏泄。不知其協熱下利。凡此何暇致思其為疫證乎。

疫癟中一種大頭天行病。雖略見前。然不細陳。難於治療。此證乃濕熱在高頭之上。所以必多汙氣蒸初。覺憎寒壯熱。體重。面目腫甚。目不能閉。上喘咽喉不利。舌乾口燥。且普濟消毒飲不速治。十死八九。東垣云。身半已上天之氣也。邪熱客於三陽之間。上攻頭面為腫。切不可用降藥。陽明之邪。首大腫。少陽之邪。

出於耳前後甚至兩目不閉。面部赤腫以普濟消毒飲少少不住服。治法不宜太速。速則過其病所。上熱未除。中寒復生。必傷人命。宜用緩藥。徐少與為妙。額上面部城赤而腫或壯熱氣喘。口乾舌燥。或咽喉腫痛不利。其脈數大者。此屬陽明本方。加石膏。若內實熱甚者。加酒大黃下之。若發於耳之上下前後。併額角傍紅腫者。此屬少陽也。或寒熱往來。口苦咽乾。胸膈滿脹。本方加柴胡桔梗根。脈實便祕者。加酒大黃利之。若發於頭腦項下。併耳後赤腫者。此屬太陽也。荆防敗毒散。甚去參。加芩連。若三陽經俱受邪。併發於頭面耳鼻者。亦宜普濟消毒飲。大抵此證。以辛涼清輕之劑散其上盛之濕熱。則愈。節庵以普濟消毒飲。除去人參升麻白芷黑參馬勃僵蚕葛根而加入川芎羌活防風荆芥射干薑汁竹淮。名芩連消毒飲。藥雖稍異。而功效不殊。其用大黃。必須酒洗。如鳥在高巔。惟射以取之也。○又四時疫癘。天行大頭。並宜用人中黃散。輕者只用芩連甘草煎成稠膠。不效加用黏子芒硝微利之。不必大劑攻毒也。○蝦蟆癰。則兩頤頰下腫。小柴胡去參半。加羌防荆薄桔梗馬勃煎服。荆防敗毒散亦可。夏暑濕熱氣蒸。亦多發此。宜消暑十全散。加荆防馬勃一二劑可愈。

至於溫疫一證。乃溫病將發之時。或既發以後。更感時行疫氣。其證渾身壯熱。昏死不爽。遞相傳染。盛於春夏之間。以春時天令不正。則地之濁氣鬱蒸。發動冬時伏氣。其氣最毒。人在是氣之中。莫之知也。正氣虛者。感而受之。以正氣本虛。故陽脈濡弱。而邪傷血脉。則陰脈弦緊也。以其伏邪內動。相召外疫。正被邪侵。怫鬱煩擾。行運失常。壯熱作矣。表證見焉。及熱鬱腠理。不得外泄。侵入於裏。裏證見焉。設使正氣內充。邪氣何由而入。其感受之。因異於傷寒。異於溫熱。異於非時。感受寒疫。其治大約以驅寒為主。表藥間用。下藥必用。人中黃是君藥。昔人概用清熱解毒湯。下人中黃丸。統治諸疫皆效。其所用人參者。知其本氣不足。防邪入裏。所謂補漏兼施也。溫疫證多作渴。宜用小柴胡去半夏。加石膏知母。若躁熱不識人。輕則涼膈重則雙解。如大便泄瀉者。黃連解毒湯。若表裏俱熱。亦涼膈雙解。嘔血者。生犀飲。便實加大黃。便滑用黃土。虛加鹽水炒參。內外熱極。毒盛。三黃石膏。外熱甚用麻黃。內熱加大黃。餘如時行治法。大率溫疫。

脈來盛筋有力者發於陽也。尚可施治。脈來沉細少力者陽病見陰脈也。皆不可救。

若溫病七八日或十餘日前熱未除。重感於寒。忽然寒熱交作。變為溫瘡。後世方書以為壞證過經不詳。寒熱不除而變溫瘡。殊不知此本春時溫病之變證。非冬月傷寒之變證也。按傷寒例云。脈陰陽俱盛。重感於寒。變為溫瘡。其證胸脇滿煩渴而嘔。微惡寒者。治以小柴胡去參半加桔梗根石膏。無寒但熱。其脈如平。骨節煩渴時嘔者。用白虎湯加桂枝。慎不可用辛溫發散以助其瘧也。至於內經所言先熱後寒之溫瘡。乃得之冬中於風寒。氣藏於骨髓之中。至春陽氣大發。邪氣不能自出。因遇大暑。脛髓爛。肌肉消。腠理發泄。或有所用力。邪氣與汗共出。此病藏於腎。其氣先從內出之於外也。如是者陰虛而陽盛。陽盛則熱矣。表則氣復反入。入則陽虛。陽虛則寒矣。故先熱而後寒。名曰溫瘡。夫先熱後寒者。以先前伏邪乘春時陽氣而發出於陽明。故熱已後因本身之真陰內燐。則邪復反於少陰。故寒。治宜人參白虎湯。或有客邪。則加桂枝。更以金匱腎氣丸去附子倍桂枝作湯。渴則飲之。蓋從腎出外而大熱。則其內先已如焚。水火發雖非陰火。亦可畏也。故先用白虎退熱。俟其瘡勢外衰。復返於腎。而陰精與之相持。乃為寒。設不知壯水之主。以急救其陰。十數發後。則陰精竭矣。此則伏邪自發之溫瘡。與溫病後重感於寒之所變溫瘡。似異而實同。然皆不越少陰。併詳辨此以破二經異同之惑。

若冬時溫暖。人感乖戾之氣。至春始發。更遇天道過於驟熱。遂變溫毒。傷寒例云。陽脈洪數。陰脈寢大。更感溫熱變為溫毒。溫毒為病最重也。伏毒與時熱交併。表裏俱熱。故其脈浮沉俱盛。亦有冬溫誤用辛熱。或熱毒不得外解。而陷入於裏。裏有是證也。其證心下煩悶。嘔逆欬嗽甚則面赤。身體俱赤。狂亂躁渴。咽喉痛。狂言下利而發斑。最為危候。治宜大解熱毒為主。若斑如錦綻。身熱煩躁。而無燥結者。黃連解毒湯。若躁悶狂妄而無汙者。三黃石膏湯。自汗煩渴而發斑為胃熱。人參化斑湯。即人參湯。煩熱錯語不得眠。白虎湯。去附子倍桂枝。人參生地。柴胡。發斑熱毒勢甚。咽痛心煩。狂言悶亂。犀角黑參湯。雖大便不通。勿用下藥。惟宜犀角地黃湯。凡斑色紫者。為危候。黃連

解毒。合犀角地黃。若班色紫黑而平下。坑爛脈虛。小自利者。不治。其失於汗下。及溫熱時行。夾食陰斑。詳後發斑本例。

有陽熱亢極而成陽毒者。金匱云。陽毒之為病。面赤班如錦紋。咽喉痛。唾膿血。五日可治。七日不可治。升麻鼈甲湯主之。虛熱勢盛。毒不能化者。活人陽毒升麻湯。有一二日間便成陽毒者。有誤用辛熱發汗。或吐下未當。邪熱內陷。變成陽毒者。其證壯熱頭項痛。躁悶不安。或狂言罵詈。妄言妄見。或口唾膿血。面生錦紋。或舌卷焦黑。鼻如烟煤。或咽喉腫痛。下利黃赤。六脈洪大而數。人參白虎湯。咽喉痛者。犀角黑參升麻甘草等分煎服。若執毒大盛。時狂時瘧。口噤咬牙。藥不得下者。先用水一盃。用絹裹指蘸水清牙關。候牙關放寬。狂亂稍定。方與服藥。三黃石膏湯加減。脈洪大。黃連解毒湯。慎不可以其熱盛而誤下之。蓋此證之熱散漫於外。故以攻下為首禁也。夏月熱甚。狂躁悶亂不安。脈洪數者。用新汲水或黃連水漬青布四五尺。作數摺。略綏搭病人胸前。熱即易之。湏臾得睡。效睡即去之。

有陰熱亢極而成陰毒者。金匱云。陰毒之為病。面目青。身痛如被杖。咽喉痛。五日可治。七日不可治。升麻鼈甲湯去雄黃。蜀椒主之。活人用原方加桂枝。名陰毒甘草湯。復有陰寒極甚而成陰毒者。自是兩種不可混也。夫陰寒極甚。反大熱躁渴。四肢厥逆。脈沉細而疾。或尺部短而寸部大。額上手背冷汗不止。或先因房事而後者寒。或內傷生冷而犯房室。內既伏陰。復加外寒。積寒伏於下。微陽消於上。遂成陰盛格陽。陽氣上脫之候。五六日後。胸前手足發出淡紅小斑。為陰毒。雖盛夏禁用涼藥。宜附子理中湯。甚則身重眼睛疼。額上冷汗嘔噦呃逆。或爪甲青。或腹絞痛。或面赤足冷。厥逆躁渴。身發青黑斑。口鼻灰色。舌黑而卷。並與囊皆縮。六脈沉細而遲。或伏而不出。或疾至七八。至已上不可數者。急用葱餅於臍上熨之。隨用附子散。或人參三白湯。合四逆湯主之。熨之手足不和暖者。不治。○劉守真云。世俗所言陰毒。皆陽熱亢極。蓄熱深於內。身表有似陰寒。此特指仲景升麻鼈甲湯。去雄黃蜀椒陰熱亢極之證。若後世所謂陰寒。極甚之陰毒。必用回陽退陰之藥。內溫正氣。逼邪外出。庶或可愈。若服涼藥。則渴轉甚。躁轉急。必致虛陽。

暴脫而死也。○王安道曰：陰陽二毒與陰陽二證迥異。考仲景書雖有陰毒之名，然其所敘之證不過面目青、身痛如被杖、咽喉痛而已。並不言陰寒極甚之證，况其所治之方，不過升麻甘草當歸鼈甲而已。並不用大溫大熱之藥。是仲景所謂陰毒非陰寒之病，乃是感天地之惡毒，異氣入於陰經，故曰陰毒。後中遂以陰寒極甚之證參入仲景證中，却用附子散等溫藥以治，竊謂陰寒極甚之證或內傷冷物，或暴中陰寒，或過服寒藥所變，內外俱冷，固可名為陰毒。然終非仲景所言惡毒異氣中所之謂也。○趙以德曰：按古方書謂陽毒者，陽氣獨盛，陰氣暴衰，内外皆陽，故成陽毒。謂陰毒者，陰氣獨盛，陽氣暴衰，內外皆陰，故成陰毒。二者或傷寒初得，便為是證；或服藥後變而成之。陽毒蓋治以寒涼，陰毒盡治以溫熱藥劑，如冰炭之異，何乃仲景以一方治之乎？其曰：陰毒去雄黃蜀椒，則反去其溫熱者矣。豈非熱皆致毒，傷於陰陽二經乎？在陽經絡，則面赤斑如錦紋，唾膿血，在陰經絡，則面青身如被杖，此皆陰陽水火動靜之本象也。其曰：七日不可治者，陰陽之津氣血液皆消滅矣。傷寒七日猶得再經，而此加之以毒，至七日不惟消滅其陰，且火極亦自減矣。

然春夏之交，多有傷風寒疫時行，與溫病風溫溫疫溫瘧溫毒陽毒陰毒，文錯難辨。蓋傷風則發熱頭痛，鼻塞身重，欬嚏惡風自汗。寒疫則憎寒壯熱，頭痛骨節煩疼，雖發熱不渴。時行則里巷之中，病俱相類。溫病則煩熱口燥而渴，氣口脈盛，若稍見人迎浮緊，即有重感風寒矣。病溫復感風邪，而見自汗灼熱，欬嚏聲嘶者，風溫也。先後溫熱未除，復感時行瘟氣，即昏昏壯熱，遞相傳染者，溫疫也。溫病日久，更感於寒寒，熱如瘡者，溫瘡也。溫病更感溫熱，熱毒熾盛，而發斑者，溫毒也。發斑熱越狂走者，陽毒也。發斑而身如被杖，厥冷者，陰毒也。已上數證，多發於二三氣中，一一按證定名，庶無誤治之失。若夏至後，炎暑司令，相火用事，人有發熱身疼，不惡寒但惡熱而大渴者，為熱病。傷寒例云：凡傷寒而成溫熱者，先夏至日為溫病，後夏至日為熱病。蓋久伏之邪，隨時氣之暑熱而鬱發也。以邪非外來，故但惡熱而不惡寒，熱自內發，故只燥渴而引飲多，其邪既鬱為熱，不宜辛溫發汗，不得復言為寒。仲景仍以傷寒目之者，謂其初受病

時皆寒氣鬱伏所致耳。世言仲景無溫熱治法詳太陽陽明篇中多治溫熱不然。黃芩湯白虎湯亦何由而立也。惜乎殘缺未備。且混入傷寒六經例中。設若不審誤以白虎治傷寒立見其害。白虎為金神。夏熱見之而退。非盛暑熱病。內外熱極者不可用。氣虛人用之。往往成結胸。甚至不救。其性大寒傷肺。非傷寒藥也。故有立夏以前處暑以後不可妄用白虎之戒。夫傷寒之不可用。黃芩白虎猶溫熱之不可用桂枝麻黃大小青龍也。即治溫熱亦須無非時。暴寒者方可。但溫熱病亦有先見表證而後見裏證者。蓋怫鬱目內達外。熱鬱腠理之時。若不用辛涼解散。則邪不得外泄。遂還裏而成可攻之證。非如傷寒從表而始也。或有不悟此理。乃於春夏溫病熱病。而求浮緊之脈。不亦疎乎。夫溫病熱病之脈。或見浮緊者。乃重感不正之暴寒。寒邪束於外。熱邪結於內。故其脈外則細。內則洪盛也。又或不識脈形。但見弦脈。便呼為緊。而妄治之。蓋脈之盛而有力者。每每兼弦。豈可錯認為緊。而斷以為寒乎。夫溫疫熱病之脈。多在肌肉之分。而不甚浮。且右手反盛於左手者。誠由怫鬱在內故也。其左手盛或浮者。必有重感風寒。否則非溫病熱病。自是非時暴寒耳。然溫病之發。因暴寒者居多。熱病之發。兼暑渴者為甚。以伏邪乘天暑汗泄。從包絡三焦一齊發出三陽也。經云。三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口不仁而面垢。讖語遺尿。發汗則讖語下之。則額上生汙。手足厥冷。若目汙出。白虎湯主之。此雖言三陽合病。而實熱病。兼見渴證。如面垢遺尿。非中暎乎。以伏邪既乘暑熱。發出在表汗下俱禁。若始發之時。背微惡寒者。為肌表之真陽。不勝邪能。故加人參以固真氣也。按長沙所主白虎。及白虎加人參。凡八證皆主熱病煩渴而裏大熱。蓋伏氣之邪。目內不出。本非暴感風寒。故不宜發汗。又發熱於外。內邪不實。復不可下之。故宜此湯。及竹葉石膏黃連解毒選用。若大渴煩躁。背惡寒。脈洪用白虎湯。合黃連解毒。鷄血加生地丹皮。喘加桔梗根厚朴。惡熱煩悶腹滿舌黃黑。五六日不大便者。涼膈雙解三承氣湯選用。如或脈兼弦緊。必有重感客邪表證。其宜於天水散中加葛根石膏葱白香豉之類。其性雖寒。不礙發散也。若邪在半表半裏。古法用小柴胡。今用雙解散去麻黃。加柴胡。其功尤捷。脈弱者加人參。遠勝小柴胡也。每見世人治溫熱病誤下之。未為大害。誤汗

之變不可言。此足徵其熱之自內達外矣。其間有誤用攻裏而致變者。乃春夏暴寒所感之寒症。邪純在表。未入於裏故也。○凡治伏氣發溫復感客邪輕者。只宜小柴胡去參半。加橘皮桔梗根。葱白者。取熱病更加石膏知母。○一法溫病熱病。凡有客邪。不問無風兼寒。脈浮脈堅。惡風惡寒。可汗不可下者。通用雙解散去硝黃。加葱豉最妙。凡表證依法汗下不解。別有異證者。通用涼膈散以退其熱。無使熱盛危劇也。汗後餘熱未盡。用天水散或小柴胡加減。汗不解。下證未全者。白虎湯。汗後躁不得眠。微熱而渴者。五苓散去桂合天水。汗後不解。中外有熱。口乾煩渴。解毒涼膈天水。能調順陰陽。洗滌臟府。若純是裏證。脈盛而實不惡寒。但惡熱煩渴引飲。自汗讝語。不大便。咽乾腹滿。可下不可汗者。三一承氣湯下之。○一法不問風寒濕暑。或表裏證俱見。或內外諸邪所傷。有汗無舌。心腹滿痛。讝語煩躁。咽乾口燥。畜熱內盛。俱用調胃承氣合解毒下之。能瀉內外大熱。或熱結極深。而數下不利。不救成死證矣。急用大承氣湯。加甘遂末一錢。匙下之。凡裏證依法下之而不解。或大下後。或二三下後。熱勢尚盛。而不退者。寒涼諸藥不能退其熱。脈弱氣虛。不可更下。或諸溫熱內盛。小便亦濁。大便溏泄頻進。少腹急痛者。欲作利。如黃連解毒湯主之。下之太過。其熱不退。再三下之。熱愈甚。脈微氣虛。法無可生之理。至此下之亦死。不下亦死。但用涼膈合解毒調之。庶幾陽熱退除。陰脈漸生。亦有得生者。若表裏證俱見。欲汗之。而裏證已形。欲下之。而表病未解。祇宜小柴胡湯和之。○一法不問風寒暑濕。用涼膈散天水散合煎解之。或表熱多。裏熱少。天水一涼膈半。或裏熱多。表熱少。涼膈一天水半。表熱極盛。裏有微熱。身疼。頭痛。或眩或嘔。不可汗下者。天水涼膈合煎。甚者用大柴胡合大承氣湯主之。若更不解。不可復用。若寒峻攻。但宜和平之藥。宣散其表。和解其裏。用小柴胡涼膈散天水散和解之。或小柴胡合解毒湯。如服後熱未退者。大柴胡合解毒湯微下之。諸小柴胡證日久不解。表裏熱勢更甚。而心下急鬱鬱微煩者。或發熱汗出不解。心下痞。嘔吐不利。或陽明病多汗。或少陰病下利清水。心下痛。咽乾燥渴。或太陰病腹滿而痛。俱宜調胃承氣合黃連解毒下之外熱。勢盛者。雙解散為當。守真製雙解散。以攻熱病內外之熱邪。使表裏齊解。甚為得法。然有間不

解者猶未盡善也。子和演為吐法。即用煎藥煎一大盞。令飲其半。以探引出風痰。次服一半。使衣被覆蓋。必汗大出而解。世人只知桂枝麻黃發汗。不知涼藥亦能發汗也。熱病用熱藥。汗不出者。反益病。涼藥發之。百無一損。益元散加薄荷。便能發汗。更加葱豉尤捷。承氣用薑裏煎。借平甘發散之意。守真雙解。子和演為吐法。豈非涼藥亦能發汗乎。若誤用傷寒藥。致發斑黃者。當從下後斑黃例治之。夏月誤用辛溫及重複發汗。變證百出。往往發斑。驟語卽血。喘滿昏迷。訛諸證並見。皆熱極所致。則用藥不離黃連鮮毒湯加減。如汗下太過。脈微惡寒者。壞證也。又當從芍藥甘草湯調補其陰。中間稍加薑棗和之。慎不可輕用溫補也。倘不經汗下。而脈虛小手足厥者。必死也。○大抵溫病熱病。皆是熱鬱之氣。故多發於三陽。若發於三陰者。必難治。其脈若沉細或微弱。或虛大無力。為脈不應病。必死。然發於三陰者。必有所因。或因冷食傷脾。或因怒事傷腎。皆正氣先傷。熱毒乘虛而發。設用甘溫調補。益不助邪。轉熾若行苦寒峻攻。真元立致消亡。雖長沙河間復起。恐難為力矣。○凡溫病熱病。榮未交者可治。陰陽交者必死。夫所謂榮未交者。言榮分熱毒之色。未交過於衛分也。而類經誤擇為邪在衛。未交於榮。其氣不深。意謂熱病之邪亦如傷寒自表傳裏也。按內經刺熱篇云。太陽之脈色榮顴骨。榮未交曰今且得汗。待時而已。與厥陰脈爭見者。死期不過三日。其熱病內連腎。少陽之脈色榮前熱病也。榮未交曰今且得汗。待時而已。與少陰脈爭見者。死。舊擇殊悞。今特明之。夫太陽之脈浮脈也。色赤色也。其證初起。如以采飾。止顴骨一處。不交他處。為榮未交。熱勢尚淺。脈色相符。是猶可治。大凡溫病熱自內出。經氣先虛。雖發汗。多未得汗。故云。今且得汗。待時而已。雖有餘證未退。少需聽其自解。此真訣也。至於與厥陰脈爭見者。死期不過三日。言熱病大熱煩渴。反見陰脈陰色。色脈皆陰。故為爭見。當見赤紫滯晦。傳經勢重。已為主死。爭見青黑。剋賊十死不救矣。三日死者。以其熱毒復入於裏。三日傳盡三陰。陰精內竭。故惡毒之酉發見於外也。太陽厥陰爭見者。死。少陽少陰爭見。亦死。嘔連腎水在內。以少陰為厥陰母。水勢垂危。源流並竭故也。所謂陰陽支者。言陰陽交互。邪勝正負。毒邪亢盛。反逼正氣為汗也。按評熱病論云。黃帝問曰。有病溫者。汗出微復。

熱而脈躁疾。不為汗衰。狂言不能食。病名為何。岐伯對曰。病名陰陽交。交者死也。帝曰。愿聞其說。岐伯曰。人所以汗出者。皆生於穀。穀生於精。今邪氣交爭於骨肉而得病者。是邪却而精勝也。精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也。汗者精氣也。今汗出徹復熱者。是邪勝也。不能食者。精無俾也。病而留者。其壽可立而傾也。且夫熱病曰。汗出而脈尚躁盛者。死。今脈不與汗相應。此不勝其病也。其死明矣。狂言者。是失志失志者死。今見三死不見一生。雖愈必死也。此段論溫獨創穀氣之旨。穀氣為精氣勝乃為汗。身中之至寶也。故藏於精者。春不病。溫病溫皆冬。不藏精之故。所以熱毒亢極。腎水傷竭乃至狂言失志。精脫而死。以此故也有云二陽搏。其病溫死不治。不過十日死。二陽者。手足陽明也。雖未入陰。病溫至極。必至不治。稍延不過十日死。較三日死陰之屬少饒其期耳。○再按靈樞熱病云。熱病七日八日脈微小。病者。洩血口中乾。一日半而死。脈代者。一日死。熱病已得汗出。而脈尚躁喘。且復熱喘甚者死。熱病七日八日。脈不躁躁不散數。後三日中有汗。三日不汗。四日死。熱病不知所痛。耳聾不能自收。口乾陽熱甚。陰頗有寒者。熱在髓。死不可治。熱病已得汗。而脈尚躁盛。此陰脈之極也。死。其得汗而脈靜者生。熱病脈尚盛躁而不得汗者。此陽脈之極也。死。脈盛躁得汗靜者生。汗不出。大額發赤噦者死。泄而腹滿甚者死。目不明。熱不已者死。老人嬰兒熱而腹滿者死。汗不出。嘔下血者死。舌本爛熱不已者死。厥而効汗不出。出不足者死。髓熱者死。熱而經者死。腰折癰齒禁斷也。

夏月暑濕交蒸。人咸中暑。證與熱病相似。首宜以脈法辨之。夫熱病之脉必盛。中暑之脉必虛。蓋寒傷形而不傷氣。所以脈盛。暑傷氣而不傷形。所以脈虛。然又有弦細芤遲之脈者何也。夫人暑月必多汗。多汗則脈虛。此其常也。守真曰。熱為陽中之至陽。以熱傷氣則汗自出。病雖為熱。脈不能實。而反虛或弱也。若汗出。當風閉其汗孔。即風與汗濕留泊肌腠。脈故弦細。或虛風不作。鬱熱表虛。仍自汗出者。脈必芤遲也。統而言之。曰虛分而言之。曰弦細芤遲。其不以浮大之脈混入虛脈之中。稱為暑病之脈也。潔古以靜而得之為中暑。為陽中之陰。為暑傷陰證。動而得之為中熱。即謂之中暎為熱傷陽證。○仲景云。太陽中熱。

者渴是也。然亦多陽明證。其大汗出。微惡寒。發熱小便淋漓黃赤者。為太陽。其面赤。大汗。煩渴。喘急氣粗。前板齒燥。或嘔或泄者。為陽明。乃當炎暑之令。而受烈日之蒸。即無宿病之人。恒得之。脈必洪大。發熱煩渴重者。昏憒不省人事。有似熱病。但忽輕忽重為異耳。傷在太陽。五苓散減桂加香薷。陽明消暑丸。凡平人偶然中暎。身熱背惡寒。面垢自汗。大渴引飲。煩躁悶亂。痰逆惡心。胸膈不快。或吐瀉轉筋。小便祕滯者。此內外皆熱。即有昏憒困倦。指頭微寒。並宜五苓合益元。若手足搐搦者。暑風也。香薷飲加羌防。嘔加藿香陳皮。小便不利。加茯苓。豬苓澤瀉滑石。有痰加半夏生薑。口渴不用半夏。加桔梗根。渴利不止。加白朮轉筋加木瓜。若腹滿身重。難以轉側。口不仁而面垢。讝語遺尿者。此熱病兼暎也。白虎湯。若農夫田野及慣力役之人。過受燔灼。頭角額痛。發熱大渴引飲。脈洪汗大泄者。急作地漿水煎。倉朮白虎湯。即白虎湯加倉朮。未老人不宜用。寒者竹葉石膏湯。稍加熟附溫順之。又老年平昔陰虛多火。不可用溫者。白虎加人參竹葉為當。凡中暎雖勢甚。但一解即愈。不似中暑之必需補益也。○內經云。因於暑汗。煩則喘喝。靜則多言。此心包證也。然亦多兼入脾及他藏者。入脾則昏憒。入肝則眩暈。入肺則喘滿。入腎則消渴。乃鬱蒸之氣傷人元氣。惟精神虧乏之人。始中之也。脈來虛細。重者伏齒。若喘促逆冷。卒然昏暈。脈雖虛細。慎不可用溫補。此熱傷陰氣。故禁溫劑。凡溫熱藥。皆助陽耗陰也。如避暑深堂。起居不時。而汗出煩躁。面垢背微惡寒。手足微麻。甚則灑然毛聳。以腠理開則灑然寒。若腠理閉則熱而悶矣。乃包絡之火。不能勝時火。故反微惡寒也。或於陰涼處坐臥。表虛不任風寒。往往自認外感。求醫解表。若誤與表藥。重絕元氣。禍如反掌。惟宜清暑益氣湯。若果脈緊畏寒。有表亦者。消暑十全散。脾氣虛弱。汗出多而惡寒者。十味香薷飲。若暑熱之時。過傷飲食。泄瀉嘔吐霍亂者。六和湯。伏暑霍亂。腹痛泄瀉。身熱手足冷者。五苓散下來復丹。如脾胃虛損之人。上焦之氣不足。暑濕之氣鬱蒸。則四肢困倦。精神短少。兩脚痿軟。懶於動作。言語昏昧。嗜臥頭痛而重心胸。居悶骨節無力。氣促似喘非喘。其形濛濛如烟霧中。早晚之際。則發寒厥。日高之後。復發熱如火。乃陰陽氣血俱不足也。若四肢灼熱為陰虛發熱。或四肢冰冷為陽虛寒厥。以脾主四肢。故也。

暑益氣湯清燥湯選用。若自汗過多，風犯汗孔，則身體重痛，肢節麻聾煩渴，或渴或不渴，或小便黃濁。此風鬱汗濕與暑相搏也。宜六一散加葱豉兼鷺加神砂末，小便數合五苓。或去桂並煎服探吐令汗出，則愈。若遠行勞役，大熱而渴，則陽氣內伐，熱舍於腎，為水不勝火，發為骨痿。若逼迫觸熱勞形，發熱煩渴，口鼻氣促而喘。至日晡之際，病必少減。若認作陽明中暎，誤用白虎，旬日必死。此脾胃大虛，元氣不足也。總之脾胃一虛，病證百出。惟補中益氣，去升麻加麥冬五味，伏苓澤瀉黃連黃柏之類，補益中兼清解，而漸愈。不似中暎之即能平復也。○按暑暎二者的名雖不同，其為天熱外傷則一。在素虛者，自難禦之。即平人受傷者，亦必因勞役飢餓，而勞役飢餓則虛，虛則邪入而病。不虛則天令雖熱，亦無由以傷之。則知中暑中暎，固有陰陽虛實之殊，彼以動靜所得分之，何哉？即其所謂靜而得之者，避暑深室，患頭疼惡寒，肢體拘急等證，是亦感寒之類耳。蓋冬月脈浮緊為傷寒，浮緩為中風。夏月脈弦緊為傷風，弦緩為中暑。以表疏自汗，則脈緩表緻無汗，則脈緊耳。然中暑亦有無汗，而脈弦細。此雖中暑，必緣微涼所遏而然。其所以煩心肌膚火熱無汗，非暑邪也。身中陽氣受陰寒所遏而作也。其有涼亭水閣，過受涼快，為寒所襲而病，脈必弦緊。宜消暑十全散不可全用表藥。蓋暑月腠理易開，即杳需熱飲，便能出汗也。倘人迎脈弦，氣口脈大而欬嗽，鼻流清涕，目疼額與眉棱骨痛，選奇湯最效。有大暑用冷水淋浴而病者，金匱云：太陽中暎，身熱疼重，而脈微弱者，此以夏月傷冷水，水行皮中所致也。一物瓜蒂湯主之。以瓜蒂二七枚水煎頓服，少噴於無風處，大吐汗出而愈。虛人五苓散加葱豉探吐之。若冒暑伏熱，引飲過多，及恣啜瓜菓生冷，致脾胃受濕，而腹痛嘔瀉，水穀不分，脈來沉緊者，為內傷寒而病，宜大順散。若陽氣虛人，膏梁與冰果雜進，兼恣意房幃，致周身陽氣不得伸越，而脈沉細，或弦遲，面垢如塵，無汗惡寒，四肢厥逆，拘急，或霍亂嘔吐者，冷香飲子。若多汗喘促，吐利兼作，脈見微細欲絕，或虛浮欲散，此為緊病，非漿水散不救。若汗出浴臥當風，或冷水浸浴，或坐臥湿地而病，雖當暑月，非暑傷人，皆因暑而自致之病，當用溫散藥治之。若暑熱為病，不過清心利小便，解暑毒，補真氣而已。即有脈虛昏憒，手足厥冷，亦不得用熱藥也。世俗往往不明。

槩曰夏月陰氣在內。大順散為必用之藥。夫陰氣非寒氣也。蓋夏月陽氣發散在外。而陰氣在內耳。豈可視陰氣為寒。而用溫熱藥乎。陰果為寒。何以夏日則飲水乎。丹溪云。伏陰於內。陰子有虛之義。若作陰令看誤矣。火令之時。燐石流金。有何陰冷。孫真人令人夏月常服生脈散。非氣虛而何。古人大順散。非謂伏陰而用之。本治嚼冰飲冷所傷。若庸工槩用溫藥。治避暑深堂裏鬱其陽之證。恐不能解表。反增內煩也。其蒼朮白虎湯。黃連香薷飲。雖宜暑病。亦豈可視為通行之藥乎。○又酷暑道途中卒然暈仆。為暑風卒倒。此熱毒湧發。壅塞心包也。切不可用。令得冷則死。急以熱土熨臍中。仍使更溺於臍腹。并搗薑蒜絞汁灌之。立甦。若熱病因暑而發。治從熱病例。蓋伏杯必從少陰發出心包而入陽明。與陽明中暍不殊。總屬白虎證治。不必辨其是熱是暍也。

若其人素有脾濕復傷於暑。暑濕相搏。深入太陰。則發濕溫。以太陰主濕。名暑而入其中也。證若兩脰逆冷。腹滿。濕得暑而彰其寒也。支胸頭目痛苦。妄言壯熱。多汙。暑得濕而彰其熱也。其脈陽濡而弱。陰小而急。蓋濕傷於血。則必小急。暑傷於氣。則必濡弱也。羅謙甫云。濡弱見於陽部。濕氣搏暑也。小急見於陰部。暑氣蒸濕也。病在太陰陽明。不可發汗。汗之則不能言。且聲不知痛處。身青面色變。名曰重暍死。宜白虎湯加蒼朮。分解兩經混合之邪。如有寒熱。加桂枝。若濕氣勝。一身盡痛。發熱身黃。小便不利。大便反快。五苓散加茵陳。此乃熱入陰分。故見足冷脈弱。不可因其足冷脉弱。而誤用溫藥也。若內夾冷食。五苓散去猪苓澤瀉。加甘草乾薑。即木湯或五苓合甘草乾薑亦得。然夏月亦有中寒厥冷。宜溫者。必小便清白。知裏無熱。方可用溫。若是濕溫。小便必赤澀而少。即如厥陰熱厥。亦有唇青脈伏。當用竹葉石膏湯者。與此不異。此正內經亢則害。承乃制。火極反兼勝己之化也。王肯堂云。昔人治濕溫。遍身皆潤。而足冷至膝下。腹滿不省人事。六脈皆小弱而急。問其所服之藥。皆陰病藥也。此非受病重藥能重病耳。遂以五苓散合白虎湯。十餘劑少甦。更與清燥湯調理而愈。凡陰病厥冷。兩臂皆冷。今脰冷臂不冷。則非下厥上行。故知非陽微寒厥。而令用祛濕藥也。

春夏濕令大行人。感其氣則一身盡重而痛。脈來沉緩小便不利。大便反快。此名中濕。以其人素有溫濕。因復感濕令。故有是證。宜五苓散加減。淡滲為主。治濕之法不利小便。非其治也。凡夏月之濕。皆為熱濕。非如冬月之濕。為寒濕也。○濕家身煩熱可與麻黃加朮湯微汗之。即麻黃湯加白朮四兩慎不可以火攻之。攻之必喘滿煩驚。小便不利也。○濕熱內遏。則頭汗身黃。宜茵陳蒿湯合五苓散。然濕家非內實熱極發黃。不可議用下藥。即因陳蒿湯中用大黃。不可藉以導熱利濕。非用下也。濕家但頭汗出。項背強。欲得被覆向火。胸滿小便不利。舌上如胎者。此丹田有熱。胸中有寒也。宜黃連湯合解之。若誤下寒濕。則噦額上汗出。微喘小便利者死。陰陽上下俱脫也。又下之額上汗出而喘。小便反祕者亦死。經云。關格不通。不得尿。頭無汗者可治。有汗者死。若額汗而小便如常。手足自溫者。陽氣雖逆。陰氣猶不至於暴脫。白朮附子湯救之。若下之利不止。雖無額汗。喘逆。此陰氣下脫亦死也。○濕家雖身疼痛。不可發汗。汗之則痙。此為陽虛脈沉細者而言也。前云濕家身煩熱。可與麻黃加朮湯。是治暴感寒濕。陽氣未傷。脈見浮緊。故宜微汗以開泄之。若夫陽虛之人。衛氣先虧。不能固密肌腠。復加汗劑。傷榮勢必內擾。肝木而生虛風。所以垂戒不可發汗也。又有濕家身疼發熱面黃。脈大。自能飲食者。內藥鼻中則愈。以濁濕干犯清道。而見頭痛鼻塞。是不當以湯藥治其腸胃也。更有上盛之濕。下先受之之濕。濡瀉濁之濕。大筋軟短。小筋弛長之濕。因氣為腫之濕。五痔諸濕種種不同。詳述醫通。

若先傷濕。身疼而微傷風者。謂之風濕。經云。風濕相搏。一身盡痛。發熱而腫。不能轉側。惡風不欲去衣。額上微汗。大便難。小便利。日晡熱劇者。名風濕。此病傷於汗出當風。或久傷取冷所致。可與麻黃杏仁薏苡甘草湯溫服。法當微汗而解。不可大發汗。大汗則風去。濕不去也。自汗去麻黃。加桂枝羌活。脈浮身重汗出。惡風。防己黃耆湯。其脈浮虛而濁。不嘔不渴者。桂枝附子湯。若內不渴。外不熱。小便自利者。為津液不足。白朮附子湯。一服。覺身疼半日許。再服三服。都盡。其人如冒狀勿怪。即是朮附並走皮中。逐水氣不得除。故耳。若小便不利。惡風。不欲去衣。而身微腫者。甘草附子湯。風濕相搏。一身盡痛。而脈浮自汗。或頭重

鼻塞者先活勝濕湯。小便不利而微熱者五苓散或黃耆建中五苓散各半貼和服。又中水濕之蒸氣及汗出當風或中霧露或中山嵐瘴濕與風寒合者皆中於濕而合異氣也。宜除風濕先活湯微汗之。太陽病失汗或汗後不解。身黃發熱者先服麻黃連翹赤小豆湯後與梔子柏皮湯或問中濕風濕何以別之。曰山澤陰雨薰蒸之氣冒襲之者名為中濕此脾與腎受濕也其證一身盡痛如薰黃脈來沉緩治之以燥勝濕兼利小便若夫汗出當風濕氣鬱閉于腠理此膀胱與胃受濕也其證惡風不欲去衣肢節疼痛。脈來浮濶治之以風勝濕兼取微似汗此大法也。羅南謙云春夏之交人病如傷寒汗出體重肢節痛難以轉側小便不利此名風濕但多服五苓散小便通利即愈○喻嘉言曰風濕雖同傷太陽而有親上親下之不同內經謂風者百病之長其變無常者是也其中人也風則上先受之濕則下先受之俱從太陽膀胱經而入風傷其衛濕流關節風邪從陽而親上濕邪從陰而親下風邪無形而居內上下內外之間邪相搏擊故顯汗出惡風短氣發熱頭痛骨節煩疾身重微腫等證此固宜從汗解第汗法與常法不同用麻黃湯必加白朮或薏苡以去其濕用桂枝湯必去芍藥加白朮甚者加附子以溫其經其取汗又貴徐不貴驟驟則風去濕存徐則風濕俱去也其有不可發汗者緣風濕相搏多夾陽虛陽虛即不可汗但可用辛熱氣壯之藥扶陽逐濕而已凡見短氣雖為邪阻其正當慮胸中陽虛凡見汗出微喘雖為肺氣感邪當慮真陽欲脫明眼辨之必早也其濕流關節之痛脈見沉細者則非有外風與之相搏祇名濕痹濕痹者濕邪滯其身中之陽氣也利其小便則陽氣通行無碍而關節之痺并解矣設小便利已而關節之痺不解必其人陽氣為濕所持而不得外泄或但頭間有汗而身中無汗反欲得被蓋向火者又當微汗以通其陽也○經曰傷於濕者下先受之曰濕流關節言地之濕中人流入四肢百節也又曰濕上其為熱此則下受之濕襲入三陽胸背頭面之間從上焦之陽而變為濕熱也濕上其為熱其小便必不利以既上之濕難於下趨故云治濕不利小便非其治也然治上甚之濕熱不能發汗而利小便即為第二義矣若陽虛者小便色白不時淋滴而多汗正泉竭而陽欲出亡之象一切利水之藥

不可誤施以犯虛虛之戒。○復有一種燥證反似濕痹。以其證遍身煩疼。手足瘦弱無力。脈來細濶而微潤之劑。補養陰血。兼連柏以堅之。然須視其人之形瘦色赤。方為燥熱。若肥盛者。則為濕熱無疑也。

傷寒之兼濕熱者甚多。惜乎古所未詳。近亦罕講。丹溪雖大闡濕熱法門。然其所論皆外淫之濕。而未及本身之濕熱。如嘗讀仲景書。有論寒濕者。有論風濕者。以其兼外感之邪。故列之太陽例中。其但言濕者。則與痘暎同列。當知痘暎亦不離乎濕熱也。及觀痞論中。則治本身中濕熱之方。真在祇恨無人道破。以致蒙昧千秋也。蓋傷寒誤下。則有痞滿之變。然亦有不經攻下而痞者。皆由其人素有痰濕。因外邪觸動。所以逆上而滿。故仲景特立渴心湯諸法。正以祛逆上之濕熱也。羅謙甫云渴心湯諸方。取治濕熱最當。惟乾薑宜加斟酌。以熱則生火於中。恐反助濕熱為患。炮時須預熬黃連汁乘火淬之。此標本兼得之製也。又有脾濕肺燥之人。則陰中之火易於上升。上升則咽喉作痛。而乾薑須用貝母之潤。以代半夏之燥。煨薑之辛。以易乾薑之僭。更加薑汁竹沥。以行其滯。此在臨證之權宜耳。又有胸中寒。丹田熱者。黃連湯。或小陷胸合理中。其在感邪之初。未見痞滿之時。可用辛涼解表。然必兼理痰氣為要。至若停食感冒。更兼痰濕內盛。則當胸逆滿。氣道阻礙。津液固結。三四日間。便見舌胎芒刺。喘脹悶亂者。不急治。脹悶而死。速與涼膈散。加葶苈甘遂白芥子薑汁竹沥下奪之。庶可十全二三。但須明諭。用藥不可輕投。反招其謗。也在傷寒。則下不厭遲。獨此證切勿延緩。稍遲則胸腹堅如鐵石。下無及矣。况濕熱內盛之人。即延至十日半月。內終不結。但蒸作極粘膩臭穢之物。縱使得下。百不一生也。蓋此證外因感冒。內有痰食。故爾不得不下。以圖微幸。設無內外合邪。萬不可下也。下後熱退氣平。脈減小者。為易治。下後痞滿稍減。而熱不止者。頻與小陷胸加竹瀝薑汁。下後熱勢彌減。氣愈上逆。脈仍實強。反加躁亂者。為濕熱內滯。終難愈效。所以此證之脈。最忌滑實堅強。堅強則胃氣已竭。滑實則邪氣方張。在老人尤為不宜。若得軟大承和。堪調理。然雖合劑為效。甚艱。矧復粗工不察。每以寬膈理氣消寇之劑治之。則正氣愈耗。濕邪愈甚。有如

陰霾四塞六合皆昏矣。消丸不已繼以硝黃下之。蓋濕熱痰飲隨氣升降。或時腸胃胸脇。或時經絡肌腠。豈攻下所能除去者乎。與外感傳經熱結內傷飲食之邪絕然不同也。嘗見屢服硝黃脹滿愈甚。喘急不通而死者。有攻之驟脫熱去寒起逐至呃噦而死者。更有見其肢體重痛不能轉側而用羌防星半風藥者。蓋純是外感六淫之邪。可以汗解。此兼濕熱痰飲。其根本在胃。不惟汗之無益。且風藥性升。濕邪得之則乘風上湧。平地尚為波瀾。况元氣素有坎陷者乎。所以愈增逆滿。在所必至也。大抵蒼黑肥盛之氣及酒客輩。素與濕熱相依為命。其在氣血強盛之年。非惟不能為患。反能輔助作為。逮至中年以後。正氣向衰。漸難駕馭。其濕有時搏聚於腸胃之間。則胸中嘗覺痞滿不快。或不知饑餓。或腹滿腸鳴。或行動喘促。有時溢出乎軀殼之外。則遍身脹痛。或胸脇腿脰頰疼。或手足重著。寧病當此之時。雖無客邪。尚難調理。稍加外感。引動其泛濫之勢。則胸高喘滿。腹脹身疼。惡熱煩悶。嘔逆自利。無所不至矣。此非外邪勢重。然也。乃本身中素與元氣渾合之邪。一旦乘機。竊發同舟。皆敵國矣。復有素稟濕熱而扶陰虛者。在膏梁輩少壯時。每多患此。較之中年已後觸發者。更劇。又與尋常濕熱迥異。當推河間東垣類中風例治。庶或近之。其方藥詳醫通濕熱本門。茲不瑣述。蓋濕熱已是固疾難除。兼之下虛。攻擊將何所恃。若更加外感。即倉扁復生。難於圖治矣。

夏月多有感冒。非時寒氣傷風。中濕風濕溫熱暑熱病。最要辨晰。其傷風感寒已辨如上。但熱病則脈盛。身熱不惡寒。但惡熱而煩渴。中渴則脈洪大汗出。喘渴引飲。中暑則脈虛。背微惡寒。身拘急。濕溫則脈濡小急。汗多足冷。濕熱則形盛。喘脹中濕則一身疼重。而或發黃。風濕則關節腫痛。目汗惡風。不欲去衣為異耳。

濕家大發其汗。則致瘡。中風頭痛。常自汗出而嘔者。汗之必發瘡。新產血虛。汗出傷風。亦作瘡。故仲景有瘡家。雖身疼痛不可發汗之戒。皆發汗太過。經虛生風所致。其證頸項強急。頭熱面赤。目脹赤。足冷脛寒。頭搖背反。張口噤咬牙。手足掣搐。通用小續命湯。剛瘡為陽去附子。柔瘡為陰去麻黃。凡太陽病發熱惡

寒無汗。小便反多。氣上衝胸。口噤不語。其脈浮緊。目閉者。名剛痙。此為中風重感於寒。葛根湯主之。太陽證備。發熱不惡寒。身體強几几然。脈反沉遲。有汗目閉者。名柔痙。此為中風重於感濕。桂枝湯加桔梗根。二兩節薑通用。如聖飲加減主治。若汗多亡陽。下多亡陰。致筋脈失養不和。柔而成痙。無外邪可解者。惟宜補養氣血。十全大補人參養榮。大建中湯選用。至於新產血虛。金瘡失血過多。皆能成痙。惟脈虛小可治。若實大者。難愈。張仲景云。剛柔二痙並屬太陽。以太陽經行身之後。故頭項強急而反張也。痙病胸滿口噤。卧不著席。脚掣急必斷齒。若不大便者。可與大承氣湯。此論屬陽明矣。若往來寒熱。或左右一目牽斜。或左右一手搐搦。脈弦數者。少陽痙也。宜小柴胡加防風。其曰頭低視下。手足牽引。肘膝相搘。海藏指為陽明。此實三陰痙也。陰邪固宜攻下。然欲行大承氣。亦須察其內實脈況有力。乃可下之。又有結胸證。如柔痙狀者。此熱在胸中心下。必痛。宜大陷胸圓大下之。仲景如字最妙。如痙而非痙。不可以風藥誤治也。凡陰證脈沉細者。附子散白朮附子湯選用。服藥後汗出身和者吉。若脈來沉遲或緊細。而大便自利者。皆死證也。熱病發痙。腰折脣瘻。齒噤斷者。死。按痙為發汗太過。血不榮筋之候。故亡血新產瘡家虛家。易犯此證。無論陰陽。剛柔脈類總之。正衰邪盛。半難救療。大率痙證之屬三陰者。及陽證陰脈者。皆不可救。其證目正圓及戴眼者不治。所以仲景但論三陽治法。而不及三陰也。

春深長夏之時。多有勞力感寒。內傷之證。與外感證類相似。內傷亦發熱頭痛畏寒。惟門隙中賊風最惡之。若在大風處。反不惡也。畏寒得暖則解。雖寒熱間作而不齊。出言慚怯。口淡無味。腹中不和。手心大熱。而手背不熱。兩脅俱熱。蓋內傷自內達表。先少陽也。若外感風寒之證。頭疼發熱。無休止時。寒熱齊作。而驟發不止。寒雖近火不除。出言重濁。鼻中氣粗。一身盡熱。蓋外感自表入裏。先太陽也。然溫熱亦自內達表。先見少陽證。腋下熱而脇滿。驟然發熱。如火大渴煩躁。引飲頭面目舌俱赤。喘粗氣盛。絕不似內傷面目萎黃。唇舌淡白。短氣力怯等證也。內傷氣口脈虛大。外感人迎脈緊盛。溫熱則氣口脈洪盛為異耳。若內傷夾外感。則人迎緊盛。而氣口虛大。其證發熱惡寒。頭痛自汗。五心煩熱。遍身骨節俱疼。宜補中益氣。

加桂枝無汗加羌活。若陽氣不得下通而足冷者去升麻易葛根少加熟附子羌活外感多於內傷者黃耆建中湯加羌活若頭脹目疼眉棱骨痛加葱豉微汗之若兼停滯飲食則人迎氣口俱緊盛而滑脈嘔逆膈上痛治宜先撤外感兼溫氣豁癥然後消導慎不可使用峻利之劑有等負重作勞之人內傷飲食外感風寒且素多畜血者其證渾身壯熱頭疼骨節痛胸膈痞滿或痛六脈洪盛重按却無力或弦緊急強嘔逆不食或泄利或便祕以外感藥解表則正氣愈衰以溫補藥理脾則助邪轉盛並宜五積散加減但此輩多有食積瘀傷胃脘結滯者慎不可用白朮宜加桃仁當歸等藥六七日大便不行者大柴胡微利之若少腹痛而小便利者為血畜下焦核桃承氣代抵當丸選用下盡黑物然後調理○江應宿云大江以南溫暖之方正傷寒病者十無一二所以傷寒屬內傷者十居八九故丹溪王平溫散有卒中天地之寒氣有口傷生冷之寒物皆以溫養兼發散之法實本內經成敗倚伏生於動動而不息則變作及風雨寒暑不得虛邪不能獨傷人之旨也蓋凡外感寒者必先因動作煩勞不已內傷於氣狀後外邪得入故傷寒為病兼內傷者十常八九也○今人外感兼內傷者甚多用藥全要分別如外感重內傷輕則治外感藥宜用緩劑小劑及薑棗和中頻頻與服庶無大動正氣如外感輕內傷重則用藥全以內傷為主加入透表藥一二味而熟服以助藥勢則外感自散蓋內傷之人纔有此微外感即時發病非若壯盛之人必所感重而病乃發也設以頭暉發熱認為太陽證誤表其寒則內傷必轉增而危殆在所必至矣又或誤認傷寒而絕其食已虛益虛往往至於不救然外感之邪與正氣交爭必然神志昏亂內傷因正氣本虛必然神識清明至死不亂也

又諸虛煩熱與傷寒相似一虛一實不可不察其虛煩發熱亦惡風自汗心中溫溫欲吐憤憤無余但脈不浮緊頭不疼身不痛為異耳然虛火上炎亦微微頭痛時時閑熱但時發時止與外感不同蓋煩虛脈雖數大而按之必虛微無力當以甘溫補其中補中益氣少加炒黑黃柏以滋腎水兼進地黃丸可也大抵陰虛必生煩躁故叔和有云虛煩有熱不可攻恐令熱去則寒起此誠格言也發汗吐下後虛煩不得

卧若劇者必反覆顛倒心中懊惓者施子歟湯湧吐之又心中悸而煩者小建中湯先煩而悸者為熱先  
悸而煩者為虛也傷寒病後虛煩竹葉石膏湯為聖藥但不可施於嚴冬。若大寒之時可用十味溫膽湯  
代之誤用涼藥虛煩愈甚而躁渴脈愈大而虛者切不可與水急用五苓散加人參。名春澤湯若上盛下虛煩  
躁自利手足冷者竹葉石膏湯去石膏加熟附。名曉過經後熱不解或屢下熱不解脈虛數而煩者參胡  
三白湯或小柴胡加減虛煩不得眠或發熱痞悶脈虛而嘔者參胡溫胆湯汗吐下後表解無熱但虛煩  
不得眠者酸棗湯凡內傷虛煩脚氣痰飲食精等證雖有身熱頭痛俱不可發汗也。

至於脚氣為病亦令人頭痛發熱肢節疼痛甚則嘔逆便祕有似傷寒但初起於脚膝熱腫或屈弱不能  
動移為異耳然有寒濕濕熱之不同其兩胫煥黑而腫熱者為濕熱也黃白而腫冷者為寒濕也又有風  
寒濕熱之辨如脈浮為風緊為寒濡為濕數為熱總之風寒為標濕熱為本靈樞云身半以上者風中之  
也身半以下者濕中之也蓋由腎水虛憊風濕之氣乘虛而襲因有斯疾然婦人亦有病脚氣者必因胞  
絡血海虛邪乘七情所致以胞絡屬腎故與男子腎虛同類治法雖略有氣血之分而大意不殊但兼用  
開鬱藥無不效也昔人槩以小續命加減主治左關脈浮起于風去麻黃附子人參加羌獨活沉遲但緊  
起於寒去麻黃人參加薑汁脈數有力起於熱去麻黃附子人參加黃芩黃柏羌獨活脈沉濡弱起於濕  
去麻黃人參加草龍膽木瓜脚腫加木瓜橘柳大便實加大黃或東垣羌活導滯湯最妙然其證始則受  
濕復扶風寒暑濕而成初起不覺因他病乃發不專主在一氣亦不專主一經然此等必屬腎虛若用小  
續命湏隨證加減慎勿以麻黃輕試即使風能勝濕亦湏以羌防輩代之斷不可以中風傷寒法混治此  
證最忌溫補尤不可用藥湯重洗俟病熱稍去然後改用滋補腎經肝之藥更參醫通脚氣門治之

至霍亂證仲景與傷寒並類觀其所言傷寒四五日至陰經上轉入陰必利本嘔下利者不治則知霍亂  
不可輕治也蓋傷寒吐利與霍亂不同傷寒吐利為寒氣所傷雖吐利而不擗亂霍亂吐利是飲食所傷  
必暴煩躁擾而擗亂也又有內外不和加之頭痛發熱吐利是霍亂兼傷寒也此證雖屬脾胃亦主腎肝

有陰陽寒熱之不同。凡冬月外感寒氣，內傷冷物，鬱遏停滯不化，嘔逆泄瀉霍亂，脈沉細或伏者，屬太陰理中湯。臍上有篋，篋動氣者，去朮加桂苓。厥逆惡寒，加熟附子。脈雖沉而轉筋，煩燒發熱者，當作熱治。不可以其脈沉而誤認為寒也。大抵霍亂有一毫口渴轉筋者，即係熱證。惟四肢逆冷，下利清穀，惡寒不渴者，方為寒證也。熱多而渴者，五苓散。寒多不渴者，理中湯。渴不能飲，小便不利者，二湯合用。若吐逆下利，心腹卒痛者，為寒食內結，金匱大建中湯。嘔逆腹痛下利，而頭痛發熱者，為風氣內薄，小建中湯。轉筋反戾，為風木行痹，宜平胃散加木瓜。憎寒壯熱，頭痛眩暉，為風痰火攻，藿香正氣散。嘔逆頭疼，發熱背惡寒，煩躁面垢，而齒燥者，為風暑內薄，消暑十全散。嘔逆腹痛泄瀉，或寒熱如瘡，為暑食相兼，宜十味香薷飲加減。或六和湯之類。吐逆下利，煩渴引飲，為鬱熱留滯，五苓合益元散。夏秋之間，因伏暑而致霍亂，吐利煩躁，或腹痛自汗，六脈雖沉，手足雖冷，不可用熱藥。如果脈弱陽虛，腹痛喜得溫按，泄瀉不臭穢者，米復丹。又有吐瀉後，熱伏於內，則冰冷。六脈沉細，欲絕，湯藥不下，或發呃逆，此火氣奔上而然也。醫不能察，認作陰證，投以溫藥，愈服愈吐，當驗其口渴，以涼水與之，則不吐矣。後用香薷飲加黃連麥冬通草等藥服之。其脈漸出者生，凡冒暑之霍亂，吐瀉以治暑利水為主，避暑之霍亂，吐瀉以和中溫胃為主，不可不辨也。又如欲吐不吐，欲利不利，上下不通，腹滿痛而頭疼發熱者，桂枝大黃湯。此乾霍亂，多死。因邪氣壅塞，上下痞隔也。宜用法先探吐之，蓋邪在上焦，則吐下焦則利中佳。既吐且利，邪氣得以泄去也。若乾嘔霍亂，兼大小便不利，即是闕格證也。至於舌苔陽縮入腹者，不治。然霍亂為胃氣反逆，誤犯穀氣必死。非傷寒溫熱之比也。

傷寒邪熱，不散遊溢經絡，出入藏府，熱氣所過，則為癰膿。又厥逆脈數，其熱不罷者，此為熱氣有餘，必發癰膿。若邪熱遊於經絡，則發外毒，出入藏府，則為內癰。急當消散為主，稍遲則膿成難愈矣。經曰：火尅西方，金法當癰膿。其證欬而喘滿，咽燥不渴，多唾濁沫，時時振寒熱之所過，血為凝滯，蓄結癰膿，吐如米粥，始明可救。膿成則死。又欬逆上氣，時時唾濁，坐不得眠，早英丸主之。欬而胸滿，振寒，脈數，咽不渴，時時濁

睡腥臭。久久吐膿如米粥者。桔梗湯主之。肺癰不得眠。葶苈大棗湯主之。又肺癰胸滿脹。一身面目浮腫。鼻塞清涕出。不聞香臭。酸辛。效逆。遺尿。喘鳴。迫塞。先服小青龍湯一劑。乃進葶苈大棗湯。三日一服。可服至三四劑。大抵初起。慎不可用。保肺藥得補則助邪成膿也。所以宋人十六味桔梗湯。葶苈苡鴻肺湯。皆為合劑。瀉後膿盡方可用。異功生脈加歸者。斂之。排膿用金鯉湯。妊娠尤宜。以活鯉魚一尾。重四五兩者。去腸入貝母末一錢。在腹。白色重便。一盜隔水頓熟。去鱗骨。作二三次。并汁食之。七日當效。又肺癰初起。陳芥蠶汗吐之屢效。其脈初起不宜大數。瀉後最忌短濇。脈來緩滑面白者生。急疾面赤者死。又脈忽大忽小者死。痿軟如平人者死。忽然屈伸者死。真氣敗也。面白或黑或赤者死。聲啞啞者死。性急躁求速愈者不治。○若胃脘隱痛而手不可近。右闊沉細。人迎甚盛。則是熱聚。胃口而不行耳。經曰。熱聚於胃口而不行。胃脅為癰。胃脅屬陽明經。陽明氣逆則嘔。故膿不自放出。而從嘔出。嘔是膿之淤濁。薰蒸穀氣故嘔。若膿出則嘔自愈。夫癰之在胃脅上口者。則然。若過乎中。在脅之下者。膿則不從嘔出。而從大便出矣。所以今世概用涼膈散治之。若膿血自上而吐。當用射干湯深得其旨也。○孫真人云。腸癰為病。小腹重。強按之則痛。小便不利。膿壅滯也。用薏苡牡皮桃仁裏仁煎服以排之。若膿從大便出者。為真腸癰易治。若從臍中出者。為盤腸癰難治。經云。腸癰為病。不可驚驚。則腸斷而死。故患是證者。其坐臥轉側理宜徐緩。時少飲薄粥。及保元湯。固其元氣為主。準繩云。凡腸癰初起。發熱惡寒。腹中疼痛。人鮮能辨。因循不識。誤作服治。致毒攻內藏。煩躁口乾。時時驚悸。陰器腐爛臭敗。無膿每流污水。不可治也。昔有患腸癰發熱者。庸醫作傷寒治之。絕其飲食旬餘而斃。垂斃之日。下膿血數升。方知是癰。欲救之已無及矣。

赤脢者。胸脢亦而疼痛發熱。頭疼體痛。或胸脢赤腫發瘡者。屬少陽風熱。非正傷寒也。宜荆防敗毒去參加芩連犀角紫荆皮主之。若表證已退。大便燥結。涼膈散。若半表半裏。合小柴胡去參加枳桔。又宜稜鍼刺腫處出血。以瀉其熱毒。則易愈矣。

黃耳者。耳中策策痛。兩耳輪黃風入於腎也。卒然變惡寒發熱。脊強背直。如痙狀。此屬太陽類傷寒也。宜荆防敗毒去參。甚則小續命去附子。加白附蔓荆殼蠶天麻。更以苦參。或石膏碎補磨水滴耳中良。凡傷寒寒疫溫病熱病。多有夾食夾痰等證。若宿食傷脾。則氣口濁滯。不調傷胃。則滑晣流利。亦有遲滑及止促者。若宿食在上脘。并人迎亦滑盛。若宿滯已歸大府。則氣口雖浮大。而按之必濁也。若脈來滑盛。胸滿痞悶。嘔逆氣粗者。冬宜五積散。調中湯選用。餘時芍蘇正氣為主。中有二陳。使痰食無留滯之患。喘滿加厚朴杏仁。若解表藥中混用消導裏藥。必引邪內入。而成結胸下利等證也。然又不可純用升散表藥。若專一升散。則宿食上逆而咸。腹脹不通矣。故於解表藥中。兼理氣豁痰。使之流動。俟表邪解散。然後專力治內。庶無引賊破家之虞。所以芍蘇正氣為停食感冒之的方。若四五日脈來滑數。胸前熱甚者。宿食發熱也。調中飲加減。若脈來沉滑。雖寒食內結。其人胃氣不虛。尚可溫中消散。若夾食而氣口反濁滯伏結。或始雖浮大。而按之漸虛小。其證身熱足冷。或腹痛或頭痛。但胸膈滿悶。時或躁煩者。必其人元氣素虛。堅韌之物固結中宮。胃中陽氣不得下通。故但足冷而手不冷也。可用五積散去枳頭痛者。陽榔上鬱也。甘草乾薑湯加葱豉。以通其陽。腹痛者。陰氣下結也。枳實理中湯加熟附。以通其陰。若曾服過峻利藥。消導太過。致自利厥逆。痞滿不除者。桂枝人參湯。若曾誤下而熱邪內陷。愈加脹滿壯熱不止者。小陷胸合枳實理中。若過汗傷血。小便祕濇。枳實理中加歸芍。或真武湯中加當歸。○秘旨云。陰虛之人。傷寒與傷食皆難用藥。若陰虛傷寒。更兼傷食者。為不治之候。所以昔人從無治法。余嘗以小建中湯用肉桂桂附減地黃。加沉香砂仁調理自安。復有中氣虛者。更兼感冒停食。則以補中益氣用桂枝酒製黃耆內。酒製生芍藥內。以溫其中。厚朴汁製甘草內。以散其滯。更加枳桔砂仁以行其氣。熱除後。以八味丸除去。

以調其榮。砂仁汁製甘草內以行其滯。枳實汁製生白朮內以消其滿。熱服微汗為效。惟氣口脈大而按之濡滯或浮取小濶而久按愈覺有力。大便五六日不行。臍下按之痛者。此為大腸氣鬱而脈滯當用大承氣下之。○凡傷寒夾食既久。痰飲固結。有屢用承氣湯不効者。黃龍湯主之。內有人參助胃。以祛宿垢也。○溫病熱病時疫夾食。無論表裏證見日數多少。並宜涼膈散加消導藥最當。○傷寒夾食十常四五或先傷食而後感寒。或先受寒而後傷食。或病勢少間而強與飲食重復發熱。甚至譫語躁狂舌短自濫。變證百出。况復醫者不察病之表裏先後。標本虛實。或當先解表而反兼治其裏。或當急治本而反先治其標。橫行逆施。往往多致不救。可不慎歟。至於食積不化證類傷寒外證亦發熱惡寒。但頭不疼痛為異。且氣口脈必不和。而惡食吞酸嗳氣腹滿欲吐不吐。嘔逆痞悶。見此證者。即當以調中飲治之外。感勢感者。調中湯主之。

又夾痰積與夾食證類相似。更宜審諭。蓋痰者津液所化。由風傷於肺。濕傷於脾。肺氣不清。脾氣凝濁而成。無論風寒溫熱內傷等證。必增嘔逆眩暉。風寒夾痰則令人欬嗽氣逆。溫熱夾痰則令人昏眩痞悶。內傷夾痰則令人吐逆妨食。但外感風痰則寸口浮滑。發熱頭痛欬嗽自汗。宜金沸草散及苦蘇散。溫病熱病夾痰則闊脈滑盛。痞悶聲嘶。宜涼膈雙解。內傷氣虛夾痰則氣口脈滑而濡。欬吐涎飲。宜二陳湯。加生朮於虛人六君子加香砂。蓋白朮熟則補脾脈。膈生則豁痰散血。燥濕利水人多不知也。凡人中脫有停痰留飲。亦令憎寒發熱。惡風自汗。喘欬胸膈滿悶。氣上衝咽喉不得息。有似傷寒。但身不疼項不強為異。若涎多者。亦隱隱頭痛。清痰亦隱隱腹痛。然止發不以其時。目睛微定。眼胞上下如煤炭色是也。其脈左手和平。右關濡滑。或寸口伏匿。俱宜小柴胡去參加茯苓橘皮。或二陳湯隨證上下加引經藥。要以分尋出路為主。至於痰迷心竅如癡者。與傷寒陽明發狂相似。但口中時吐涎沫。胸腹按之不痛辨之宜加味導痰湯。加減氣上衝胸脈滑而遲者。為痰伏膈上。宜瓜蒂散。虛人則用稀涎散。探吐之。嘗見外感夾痰證脈不甚浮。不宜大發其汗。激動其痰。則嘔不能食。宜於理氣藥中合解散之劑。如香蘇散。正氣散之類。

氣順則痰化矣。痰飲證類實繁。姑就夾水證數條。血傷寒有闊涉者。辨論餘不贅及。夫夾食夾痰。長沙既無治法。前人亦未辨論。無怪後世治之不得其當。至如夾水。長沙方論具備。何今世無一人能用之者。蓋此水即肺之液也。風寒傷人。皮毛肺先受之。肺為金主。生水。肺既受傷。不能行其水液至腎。遂停留心下。為欬為喘。及乾嘔發熱等證。故以小青龍發散風寒。并潤肺經。停留之液必令作汗以泄之。故方中用麻黃細辛。以開發皮腠也。始失其治。乘所不勝。則傳少陽之分。而變心下痞。輒引脇下痛。乾嘔短氣等證。又處十棗湯以攻逐之。若更失治。本復傳土。則漬入胃。而成協熱利也。若水在少陽部分。不傳入胃。遊溢經絡。則藏府不受其邪。大熱得以差。可惟腰以下重。足胫浮腫。小便不利者。重則牡蠣澤鴻散。輕則五苓散。加防己主之。又少陰病。腹痛小便不利。四肢沉重疼痛。自下利者。此為有水氣。或欬或嘔者。真武湯主之。此又腎虛不能制邪水也。則知治水之法。不獨今世無人。在昔知者亦鮮矣。

傷寒之夾水既多。而夾血證復不少。然夾血與蓄血不同。其人素有內傷。跌撲停經血瘕。及暴怒傷肝。皆有瘀積。因傷寒溫疫等證。發動痼疾。謂之夾血。必有痛處定而不移。治宜察其部分。消息微甚。用藥又有跌撲打傷。一時不覺。過數日寒熱乃作。有似傷寒脈。當堅強。最忌細濤。腸痛少腹痛。手不可按。甚至昏迷不省。少頃復甦。乃瘀血上衝所致也。其人大便或祕或黑。輕則香穀散。重則代抵當丸。或桃核承氣湯。加炮川山甲一錢。最破瘀積。寒熱更加柴胡。當歸。在經絡當歸活血湯。在胃口。犀角地黃湯。加酒大黃。若更兼寒食停滯中脘。或腹中作痛者。枳實理中湯。重則加乾漆灰二三分。輕則加薑汁炒黑山楂內。又或脫衣鬪毆。兼感風寒。有表證者。必先解表邪。然後治血。如欲發汗。宜桂枝湯。芍藥散等。並加歸附桂心。甚則加延胡索。蓬术。不得行。麻黃青龍等湯。亦不得用。寒涼止血之劑。蓋血得熱則行。得寒則凝。瘀結不散。必發熱如狂。欬喘嘔逆。若發汗太過。誤觸瘀血。則或嘔或泄。或發呃逆。但活血。則嘔泄呃逆自止。然既發熱。則攻血藥中。必加乾漆。炒苗連。非此化熱。則血不得散也。若嘔泄之血。其色紅紫而散者。可治。色如敗血。而凝結成塊。多兼血水。此正氣已脫。邪不能留也。又或如污泥而粘膩不斷。其機異常者。此津氣已敗。與

濁腐同下也。至於當汗不汗。太陽之邪內結則為畜血。與夫邪氣在經而為衄血。熱邪在胃而為吐血。及諸失血家淋家。與婦人經水過來通斷。俱不可發汗。發汗則動血。又三陰無熱不可強責其汗。經曰。少陰病。但厥無汗而強發之必動其血。名下厥上竭。為難治。言血脫則陽氣竭於上。陰氣厥於下也。即用當歸四逆湯。多不可救。

又有奮力鬪毆之人。脫衣露體觸犯風寒。謂之夾氣傷寒。今人但知用理氣藥。不知兼有夾血夾食者。其證惡寒發熱。肌骨疼痛。胸膈脹閉。氣逆喘呼。若其脈浮緊。則宜輕劑發散。兼理氣寬胸。如局方香蘇散。最宜有食。則加枳殼厚朴。痰加半夏茯苓。感寒噯則加羌活桔梗。傷熱效則加姜桂薄荷。頭痛加川芎白芷。四時不正之氣。加藿香。甚則芍蘇散主之。若脈弦緊。或有伏結。為積血在內。當用破血利氣藥。如香殼散之類。有食不妨用溫中消導。如調中散。正氣散皆可。若但恚怒傷氣。只用小柴胡去參苓加橘皮枳殼。若脇下痛為鬱怒傷肝。當歸活血湯。少腹急痛為有瘀血結聚。桃核承氣或代抵當湯。又有暴怒鬱抑不得發泄。形厥如屍。不語如瘡者。宜用沉香降氣散。若但鬱悶不得發泄之人。偶感風寒。或發伏氣。或傷暑熱。或兼內傷。俱隨證用藥。但略兼開鬱理氣。不可行破血消導也。

復有房屋不謹之後。感冒風寒。及恣意乘涼觸犯風露。勞役傷精而病者。謂之夾陰。其證亦發熱頭痛。胸膈痞悶。若陰火上乘。則面赤而足胫逆冷。蓋陽病必頭痛。陰病必足冷。內經所謂陽病者上行極而下。陰病者下行極而上也。以其虛陽發外。故發熱煩渴。而躁亂不寧。真陽不能下通於陰分。故足不能熱而陽道痿縮也。按盛起東云。治熱湏辨真假。夫真熱則發熱惡寒。脈數有力。按之更實。躁煩口渴。大便燥。小便赤澀。或利臭積。發言壯厲。不欲近衣者是也。親乎表者。宜發散。親乎裏者。宜通泄。假熱亦發熱惡寒。而足必不熱。脈大而虛。按之微弱。身雖熾熱而不躁不渴。或見虛狂而頃之即止。終不及聲高喧罵者也。經曰。寒熱有真假。治法有逆從此之謂也。○外編云。次陰傷寒。乃太陽少陰二經同時受病。較之純陰證倍危。在傷寒寒疫。猶或可治。若溫病熱病時行疫癘。日不一生。謬云。傷寒偏死下虛人。以其外極亢熱。內極虛

寒溫經之藥。萬不可施以故必死。即傷寒夾陰治之。不得其宜終亦必亡而已。每見庸工治夾陰傷寒。用小柴胡和之。多致厥嘔噦而死者。以不勝黃芩之陰寒也。亦有見其足冷陽縮。用四逆湯溫之多。致煩躁血溢而死者。以不勝附子之雄悍也。宜小建中。黃者建中加減。○祕旨云。若脈來尺中遲弱無力。而足冷陽縮者。於黃者建中湯內用生附汁製入黃者。以溫衛氣。肉桂酒製入芍藥以調榮血。不應改用參製黃者。麻附細辛汁製甘草以汗之。若尺中弦數而多虛火。面赤戴陽者。於小建中湯內用人參汁製入甘草。以助胃氣。丹皮酒製入芍藥以降陰火。不應。加連附汁製黃者。及葱白香豉以攝之。若春夏感冒夾陰。通用黃者。建中湯加減。蓋陰虛之人。雖患表邪發熱。其中必夾陰象。所以尺脈必不能實。足胫必不能溫。用藥最為扼腕。較陽虛之可用溫補。迥乎不侔也。至於溫病熱病之夾陰。雖長沙復生。難於措指。惟暴感風寒夾陰。可用上法治之。內經云。脈實滿手足寒頭熱。春秋則生。冬夏則死。可見夾陰傷寒。病於嚴冬。熱病失陰。發於盛夏者。皆真陽憊極。邪氣亢甚。多死也。若夫感冒夾陰。其人陽氣雖虛。春秋本無大寒。傷犯邪氣原輕。猶可治之。非熱病大熱。手足寒之比也。其中暑夾陰。治法詳本例中。

至如遠行遇雨。則寒濕之氣先從汗孔襲入背俞。况雨氣通於腎。雖有發熱頭痛效逆等證。解表藥中。必先通少陰之經。而兼開發肺氣。故細辛羌活。在所必需。所以首推神木湯為主。又須隨時令寒暄。元氣盛衰。加減始為合劑。若冒雨而更加之以風。則風濕相搏。一身盡痛。當與除風濕羌活湯或小建中去芍藥加耆朮羌防濕龍陽明而發熱者。茯苓桂枝白朮甘湯。大抵此證。雖當盛暑。亦忌寒涼。若遇嚴冬。則稍加麻附。餓後則加白朮。飽後則加橘半。勞役傷氣而冒雨涉水。發熱喘效。則宜補中益氣。加細辛炮薑。若水寒之氣傷肺而喘效不止者。又以小青龍加減。陽虛者去麻黃。加附子白朮為主治也。若夫遭風溺水。最忌熟酒火烘。惟宜溫暖覆蓋。原其溺水之時。必多驚恐。心腎受傷。雖有發熱頭痛骨節疼痛等證。解表藥中。必兼通心腎。在冬月。麻黃附子細辛湯或小青龍加生附子三五分。蓋麻黃發汗通心。附子溫經通腎。細辛通徹表裏之邪。更宜稍加苓半。以開豁驚痰。若在夏月。則麻附皆所禁用。當以五

苓散加硃砂。熱服一半。探吐取汗。更服一半。蓋驚則氣亂。故宜去濕利水藥中加硃砂。或脈浮而見表證多者。五苓散合小柴胡各半貼。和解之。或五苓散合羌活勝濕湯各半貼。微汗之。至於暴怒悲號。投河躍井。雖有表證。當解。須香蘇散加撫芎木香烏藥理氣為要。跌傷加當歸桃仁桂枝。安有溺水而不驚不氣不受傷者。但當取其所勝治之。其有天時寒冷。兼扶冷食傷脾。與夫曾犯房室而遭風覆溺。及冒雨涉水傷腎。而病身熱足冷者。皆當參夾陰例治。

夫傷寒證類多端。且多抉見諸證。非刻意精別。用藥必致差誤。即如婦人傷寒。多兼經候胎產。調治更難。經行之時。雖有外感風寒必和解。中兼調血為主。如小柴胡合芎歸丹皮之類。否則邪傷衝任。而為熱入血室矣。○又辨脈法云。寸口脈弦而大。弦則為減。大則為芤。減則為寒。芤則為虛。寒虛相搏。此名為革婦人。則半產漏下。男子則亡血失精。此條傷寒論中不出方。而金匱半產漏下。主以旋覆花湯。用旋覆花。葱白。新絳三味。則其如意多從表邪起見。與男子虛勞失精之用。小建中。黃耆建中。桂枝加龍骨牡蠣等方同義。大抵虛勞失血。而見弦大之脈。皆是外感誤治而成。此云脈弦而大。按之減小者。謂之芤。明是表邪不解。裏血受傷之候。若更指下堅強。如按鼓皮。則謂之革。又為邪勝正衰。胃氣革除之候。而仲景毫不以虛為慮。仍用旋覆之解結。葱白之散邪。新染絳吊之入膀胱而和血。即如後世用一味防風丸治風入胞門之崩。與此方藥雖異。而理不殊也。○妊娠傷寒。首宜固胎順氣。雖見脈緊無汗。切不可用麻黃青龍。及一切解表猛烈。以風藥性升。皆犯胎氣也。其脈以緩滑流利為順。虛濶及躁急不調為逆。其解肌藥。惟桂枝湯無礙。金匱云。婦人得平脈。陰脈小弱。其人渴不能食。無寒熱。名妊娠桂枝湯主之。則知妊娠雖無表證。亦宜用此。以和榮衛也。鄭虛庵曰。妊娠傷風。無論時月及月分多少。俱宜嚴氏紫蘇飲。多加葱白安胎為要。欬嗽多者。金沸草散加減。妊娠傷寒輕者。浙浙惡寒。翕翕發熱。重則頭痛身疼。久而傷胎。亦宜紫蘇飲。或香蘇散。並加葱白。或臥至半產胎傷。多致不救也。妊娠而犯冬溫。溫熱疫癘。多致傷胎。若冬溫則陽旦湯。春溫則黃芩湯。熱病則白虎湯。時行疫癘。則達原飲。不惟善解熱毒。兼能護持胎氣。更無藉於升。

泥塗臍之法也。若實熱便祕急宜涼膈散承氣湯下之。庶免邪熱傷胎之患。惟大小便如常知裏無熱慎不可下之。妄下引邪入必致傷胎無疑。若下後熱不退白虎與承氣並用或前後而用若誤用參苓羃遏毒邪則胎愈不安也。倘見腰腹痛必墮無疑須預言之藥無及矣。若其脈數疾無倫喘脹嘔逆腹中重墜不能轉側當臍久按覺冷或有瘀塊下行但看舌色及爪甲青黑其胎已死也。急宜平胃散煎成調芒硝半兩許下之虛極不勝藥力者加人參兩許駕馭之若併唇面青黑而嘔噦不止口中有穢氣者子母俱死切勿用藥。

新產感冒發熱大為危候然有產時傷力或去血過多或惡露不行或早起勞動或飲食停滯及蒸乳一切發熱不可誤認外感妄施汗劑以其氣血大虧百病乘虛而入即使更受風寒亦宜調理氣血為主其脈以小弱滑利為吉緊實堅大為速數大散漫亦危更須問惡露行與不行小腹痛與不痛若痛者以行氣導血為先新產小腹結痛炒黑山楂肉三五錢炒黑砂糖兩許煎服瘀血即行其痛立止虛人加人參炙甘草炮薑茯苓澤蘭之類風寒則加桂枝二三服自效若小腹不疼頭痛身熱惡寒無汗或喘或效宜香蘇散有食小劑芎蘇參蘇隨氣血取用有瘀血兼行血藥值時行不正之氣遍身疼痛無汗敗毒散或香蘇散加葱白香豉金匱云產後中風數日不解頭痛惡寒有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽旦證續在者可與陽旦湯又曰產後中風發熱而面正赤喘而頭痛竹葉湯主之又云婦人在草蓐中自發露得風四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡湯鄭虛庵云凡產後傷寒切不可遂用小柴胡以有黃芩在內易停惡血傷人也產後雖犯時疫宜柴胡四物湯加減即小柴胡湯素問云孔子而病熱脈懸小手足溫則生寒則死此言傷寒也。孔子中風熱喘鳴肩息者脈實大而緩則生急則死此言傷風也通宜小建中加葱豉。孔子者言產後以乳哺子也張介賓類入小兒門大經產後傷風寒熱如瘡兼腹內拘急不能食宜小柴胡去黃芩加當歸紅花丹皮其則加炮薑茯苓去瘀為主雖有大熱不得用若寒產後虛羸寒熱有似外感食少腹脹方書俱用增損柴胡湯然不若柴胡桂枝湯去黃芩加川芎和其榮衛庶免倦勞之患○婦人血風

因大脫血而虛熱燥結。熱甚則風生。其證煩燥身熱循衣摸床撮空閉目不省人事。揚手擲足搖動不安。錯語神昏脈浮而虛或弦革者難治。宜生地黃黃連湯。脈實稍加酒大黃。○產後傷寒切不可過用表藥。多汗經虛每致發痙也。○凡胎前發熱理中合四物去白朮地黃加柴胡茯苓。產後發熱四君子入桂枝芍歸臨產發熱逍遙散加減。產後血虛最易發熱不可一概認為外感也。

今之醫者治病一見發熱便認外感。不論風寒榮衛及裏實便輒概用發散解不誤人。如裏發熱認作表發熱者其脉浮緊無汗為傷寒。浮緩有汗為中風。皆風寒外襲。表熱發也。其脈實而蒸蒸發熱六七日不大便者為裏實。發熱邪氣內傳而熱也。○有裏惡寒認作表惡寒者初起不熱但惡寒而體倦息微脈沉遲無力。此寒中三陰裏惡寒也。若初起惡寒而體重氣促脈陰陽俱緊為表惡寒始雖惡寒後必發熱也。○有冬溫認作傷寒者。冬溫因腎氣不藏不正之氣入傷太陽少陰二經始病多不惡寒。便心煩大發熱而渴必咽痛或下利。脈來左手弦數。傷寒則風寒外來始病必先惡寒而後發熱。始先不渴至三四日後熱耗津液方竭脈必人迎緊盛也。○有伏氣發溫認作感冒者。伏氣乃冬時伏藏之邪。自內達表必不惡寒而發熱。一熱即口燥咽乾而渴氣口脈洪大倍於人迎感冒是暴感非時寒氣始病雖發熱一二日內必不作煩渴人迎之脈必弦盛倍於氣口也。○有勞力感寒認作傷寒者。辛苦勞役之人頭疼惡寒身體倦怠而痛微渴自汙此因內傷血氣兼外感風寒人迎脈必弦緊氣口脈必虛弱兩尺必弦數所謂形作傷寒其脈不弦緊而弱是也。○有夾陰認作陰證者。夾陰則有頭疼發熱但足不熱或陽縮入腹陰證則無頭痛發熱也。○有冒感非時暴寒認作正傷寒者。冬月寒水主令故正傷寒中風必先太陽。若感非時風寒春多兼足少陽而寒熱秋多兼手太陰而欬嗽若暴寒熱甚亦必傷足太陽為多。蓋腎本寒水之經同氣相感也。○有動陰血認作鼻衄者。少陰無汗而強發之血隨藥動或從口鼻耳目而出名下厥上竭言陽隨血而上竭。陰在下而發厥也。若衄則太陽表邪失下汗下或汗下不解。邪鬱經中而致也。○有真中陰經真寒證認作傳經證者。陰證則先不發熱四五日或六七日後反發熱者。陰極生熱也。傳經陰證

則先發熱五六日後而變四逆厥冷熱極反兼寒化也亦有始本陽謠汗下太過而變虛寒反發熱煩躁者陰陽俱虛竭也○有獨語認作鄭聲者傷寒邪熱未解睡中自語名獨語精神昏憊也若汗下太過聲出咽中無力接續名鄭聲正氣虛奪也○有少陰發熱認作太陽發熱者少陰則脈沉無頭痛太陽則脈浮緊而頭痛也○有太陽無脈便認死證者傷寒六七日或十餘日脈伏而不起者此欲作戰汗而解也如大下後厥冷下利無脈是驟虛脈隨氣脫也與三陰厥冷無脈灸之不溫及服薑附脈不出皆死證也○有血證發黃認作濕熱發黃者血證則小便自利傷血而不傷氣也濕熱則小便不利氣病而血不病者為大結胸若按之方痛者為小結胸○有心下鞭痛下利清水而認為漏底者因熱邪傳裏燥屎內結小腹鞭痛讐語惡熱渴飲水漿而利乃下傍流純清臭水為熱結利若下利清穀腹痛善按者為內寒又夾食傷寒因本虛不化不結而自利或因誤用消導及攻下遂利不止者俗名漏底也○有如狂認作發狂者傷寒初起無熱狂言煩躁不安精采不與人相當此因熱結膀胱也又有當汗不汗五六日後小便利大便黑此畜血如狂也若陽明內實發狂必妄言讐語欲登高棄衣此為燥結失下而致也○有讐語認作狂言者讐語有虛有實熱入胃府水涸燥結者陽邪內實也可下之若火劫取汗讐語者神明擾亂也宜清之多汗亡陽讐語者陽神擾擾也宜和之下利純清水而讐語者陽邪暴虛有似陰寒也急下之若狂言不能食者是失志失志為腎絕必死勿治○有女勞復認作陰陽易者差後御女為女勞復此虛邪為患復犯虛虛之戒必死若不病人與病新差者文而得病者為陰陽易此熱毒雖乘虛入心少陰猶可一經證見前證不能兩經俱病也若先見一經證更變他經者又為傳經矣○有暑證認作感寒者暑證則熱傷心包微涼外鬱表之陽虛必背微惡寒而脈虛或弦細芤遲暑傷氣而不傷形也若暑證而脈反弦緊惡寒者此更感非時寒氣也若陽明中暎則煩躁口乾多汗前板齒燥而脈洪大當盡熱盛則脈

大證劇至夜稍涼則脈與證俱減可。此熱傷陽而不傷陰也。若壯熱煩渴引飲脈來洪盛氣口倍於人迎。晝夜診之無異者。此冬時伏藏之邪。至夏發為熱病也。○有囁而認作乾嘔者。囁為胃虛誤攻其熱或飲冷水所致其聲濁惡而長。乾嘔則似吐而無物出。胃中熱與穀氣相併及水逆痰氣所致非惡候也。○有短氣認作發喘者。呼吸短促而反感者。為短氣此失於汗下所致宜分表裏汗下之。若氣息虛微不續為少氣。此汗下太過所致宜生津兼和榮衛。若裏氣逆上張口擡肩者為發喘此因水飲傷肺所致宜疎表邪散水飲為首務。若夫真陽不歸而衝氣逆上者。又當從事桂附然多不能救也。○有蚊跡認作發斑者。發斑多見於胸腹先紅後赤。蚊跡多見於手足先紅後黃也。○有正陽陽明府證認作陽明經病者。府病是胃府受病則六七日不大便譟語發渴而脈實。經病是經絡受病則身熱目疼。鼻乾不得卧而脈長溫熱發於陽明則自府達經煩渴自壯汗熱目脈赤而脈洪大。○有溫瘧認作風瘧者。溫瘧則溫病熱邪未盡重感於寒而成發於春夏之交。其證多熱少寒。風瘧則多發於夏秋也。○有疫痢認作漏底者。蓋疫痢是冬時伏氣因春夏多雨火邪復為濕伏延至秋時真陽內入其邪內不能容外不得泄變為下痢甚證大發熱而下痢煩渴其脈必洪盛古人以敗毒散加陳倉木治之誤與攻積利水必死若漏底則因腎氣素虧或夾冷食而見外熱裏寒之證其脈必尺中微弱。當從夾陰例治亦有熱邪傳裏而下利穢積者。又當從傳經熱證治之。○有中濕認作風濕者。中濕則一身盡痛而重脈來沉緩或面黃頭痛鼻塞風濕則一身盡痛而腫闊節不利不能轉側惡風不欲去衣其脈浮虛而濇。○有燥證認作濕證者。燥證則肌膚枯槁血少不能榮養百脉而痿弱無力。濕辨則肢體浮腫經隧中為濕所襲而辨者不舉也。○有標本全不曉者即如厥逆若先發熱至五六日傳進陰經血分而厥則為陽厥若始先不發熱即惡寒踰卧而厥則為陰厥及諸病皆有假寒假熱要以邪實壯熱為本病本虛假熱為標熱也。○有雜證類傷寒者諸凡雜證發熱皆發於裏。夜甚於晝惟傷寒為表邪鬱發於外而晝夜俱熱也。已上諸證必須詳審明確方得用藥無誤。如未病素脾約終病忽便利未病先有固疾已病重添新病之類若不審諭益無誤治之。

失耶。

至於不治諸證亦湏胸次了然臨證始能決斷如傷寒病熱不退脈反沉細者死○發逆上氣脈散者死○三部堅盛汗出不解者死○陰陽尺寸俱虛熱不止者死○身熱喘粗脈躁疾者死○汗後餘熱不解未可言死脈如轉索者其日死○謾語微熱脈浮大手足溫者生厥逆脈沉細者死○陽病見陰脈者死○發少陰汗連厥陰血者厥竭而死○發左右動氣汗者死○大發風濕汗者死○發陰陽毒過六七日死○謾汗言亂目眩者死○濕家額上汗出微喘小便利而下利不止者死○闊格不得尿頭汗者死○不尿腹滿加噦者死○大發濕家汗成瘻者死○發少陽汗謾語者死○亡陽謾語脈短者死○直視謾語喘滿者死下利者亦死○吐下不解循衣摸床微喘直視脈濇者死○內傷瘀積蓄血如狂下如污泥者死○少陽證誤下身黃胸脇石鞭者死○陽明病心下鞶滿攻之利遂不止者死○發溫濕汗為重暎者死○兩感傷寒者死○汗出熱不解而脈躁疾為陰陽交者死○陰陽易熱極躁亂脈急疾無倫者死者死○大陰傷寒身熱足冷下虛邪盛不可溫者死○溫熱時行大發熱手足下體寒陽縮脈沉小虛散者死○溫病遍身紫赤者死○結胸證悉具煩躁者死○結胸脈浮大者下之死○狂言不能食者死○發厥肌冷而躁無時得安者死○如結胸狀舌上胎滑為藏結者死○脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者死○黑斑如果實屬者死○舌卷囊縮者死○少陰病下利脈弦長名曰負者死○目亂無神氣者死○少陰病吐利煩躁四逆者死○惡寒身踴而利足手厥冷者厥○脈不至不煩而躁者死○下利止而頭眩時時自盲者死○下利厥逆無脈服湯脈暴出者死脈不出者亦死○發熱下利厥逆躁不得臥厥不止者死汗出不止者亦死○下利厥冷煩躁無脈矣之不溫反微喘厥不還者死○下利脈反實者死○厥利本不能食今反能食為除中者死○傷寒七八日大發熱汗出如貫珠為氣衰者死○瓜甲青為陽衰者死○循衣摸牀為神亂者死○四肢振動唇吻反青為肝絕者死○體如煙薰直視搖頭為心絕者死○環口黧黑冷汗發黃為脾絕者死○汗出如油聲如算軒為肺絕者死○卵縮遺尿狂言目瞑

為賤絕者死○喘而不休為邪勝者死○水漿不下為胃絕者死○形體不仁為榮衛不行者死○乍靜乍亂為命絕者死○已上死證不可輕投湯劑若邪熱甚者靜候氣衰或有可生之理正氣衰者惟與漿飲庶幾元神將復經曰漿粥入胃泄注則虛者活身汗得利後則實者活此其候也要知傷寒證類百出貴在治法先後不誤則長沙復起不過如是余於暇日集諸家之要參以所歷辨論頗晰臨證庶無歧謬非敢云補長沙未逮聊以抒芻蕘之一得耳

### 脈法

世言傷寒脈類莫不宗節庵浮中沉三法而長沙一脈寢置久矣夫浮中沉之說固為捷訣然不能偏廢經論之綱領也傷寒脈法首言大浮數動滑為陽沉濇弱弦微為陰六經例又言尺寸俱弦者少陽受病也夫弦脈既曰屬陰而又為少陽者何也仲景意以弦脈為陰者兼見牢脈而言也沉濇者陰也兼以弱弦微之類安得不為陰乎六經例以尺寸俱弦者指單見一脈而言豈得不為陽乎以弦脈分陰陽二用之理其義微矣按脈訣以弦脈為陽動脈為陰仲景乃以動為陽脈蓋浮大者陽也兼之以動數滑之類安得不為陽乎又曰陽動則汗出陰動則發熱言浮而動者為陽沉而動者為陰故仲景之脈不可與俱證同語也且夫沉者陰也而又有屬陽者若沉而濇沉而遲沉而細小之類皆為陰也如沉而滑沉而數沉而實大之類皆為陽也浮者陽也而又有虛寒者若浮而滑浮而數浮而緊盛之類皆為陽也若浮而遲浮而虛浮而微弱之類皆虛寒陰證也夫浮而陽者宜發汗浮而虛者宜溫補沉而實者宜攻下沉而陰者宜溫經惟弦脈則隨浮沉以定陰陽以少陽主半表半裏故宜和解是以節庵主浮中沉三法即是此意蓋傷寒之邪自表達裏始雖太陽必先皮膚肌肉次入筋骨腸胃若溫病熱病之邪久伏少陰經中從少陽發出肌表在表之時不以涼解則邪復入裏而歸腸胃為實熱也此傷寒溫熱脈法之迥異說見總論中不暇更述姑以浮中沉三法論之

如尺寸俱浮為太陽浮緊而濇為寒邪在表浮緊不濇為表邪方盛浮緊而數為熱欲傳裏若浮而長為

傳併陽明或合病浮而弦為傳併少陽。要以脈中有力為有神。可用汗解。浮而緩者為中風。宜解肌浮而無力為陽虛。便當溫補不可發汗。若浮而尺中弱濶遲細足胫逆冷。皆內虛夾陰。豈可汗乎。若三陰經證始先脈沉。後變微浮者。為陰盡復陽欲愈之心。若春夏病發熱頭痛。而見浮緊浮緩之脈。不大作渴者。謂之寒疫。若脈雖浮緊。而始病便見大渴。腹中脹滿不和者。此即伏氣內發而加客邪外襲也。亦有時氣不正邪傷氣分脈浮者。此即時行之類也。

中脈者。陽明少陽二經脈也。尺寸俱長為陽明。長而有力為實。熱當解。肌長而浮者。尚兼太陽。宜發汗。長而數者。為熱盛。雖係表證。不可用辛溫發汗。止宜辛涼輕劑以解肌。若長而實大有力。大便祕結為胃實。可下之。溫病熱病及時行疫癘。始發多有此脈。切不可發汗。乃黃芩白虎之證也。尺寸俱弦者。少陽也。弦數為熱邪。傳裏之候。弦而有力為邪實。如大便祕結不行。宜大柴胡微利之。弦而浮兼太陽證。尚宜發汗。若弦而遲。弦而小。弦而微弱。皆內虛有寒。宜溫之。溫病熱病及時行脈弦脇痛。俱宜小柴胡去參半加枳橘。弦盛有力。加石膏知母。弦小無力。仍用人參。有嘔方可用半夏。即生薑亦當慎用也。然弦脈近乎緊脈。冬得之為傷寒。夏得之為傷風。以夏月風閉汗孔。當汗出而反無汗。是以脈弦有似乎緊也。又傷寒寸口緊盛而尺脈弦細浮數。此為陰氣素虛。慎不可用麻黃發汗。宜小建中和之。大抵弦脈雖居表裏之半。然表多於裏。只宜和解。不可攻下利小便也。

凡沉脈俱屬三陰。而有陰陽寒熱之別。尺寸俱沉為太陰。俱沉為少陰。俱沉弦為厥陰。若沉而滑。沉而疾。沉而實。皆以有力為實。熱為傳經。熱邪為陽證。分緩急攻下之。若沉而微沉而細。沉而弱。但以無力為虛寒。為直中陰經。或為壞證。詳微其溫理之。或始本太陽病。發熱頭痛。而脈反沉者。此雖曰太陽而實見少陰之脈。故用四逆湯溫之。若夫春夏溫病。熱病而見脈沉小微弱短濶者。此伏熱之毒。滯於少陰。不能發出陽分。所以身大熱而足不熱者。皆不救也。惟脈沉實。而見陽明府實證者。急用承氣下之。不可拘於陽病陰脈例也。若時行疫癘而見沉脈。為毒邪內伏。設無下證。必無生埋。大抵沉脈最為闕要。以決陰

陽寒熱用藥。生死在於織毫。得不仔細謹察乎。

夫脈沉細微緩。初起無頭痛。不發熱。便四肢厥冷。腹痛嘔吐泄瀉。踴臥沉默。不渴。人皆識為陰證矣。至於脈浮而大。但按之無力。發熱而戴陽渴欲漱水。而不能嚥。煩躁時欲坐卧泥水中。此為陰盛格陽。虛陽上膈之候。人皆不識。認作陽證。誤投寒藥。即死殊不知。陰證不分。發熱不發。脈之浮沉大小。但指下無力。重按全無者。便是伏陰急與薑附溫經回陽之藥。雖有發熱頭痛。表證雜出。只宜五積散一服通解。衣裏之寒切忌發泄。誤與發汗。則脈必緊數而發熱。誤用涼藥。則脈轉緊盛而躁渴愈急也。又有內外有熱。其脈沉伏。不數不洪。但指下沉濶而小急。此為伏熱不可誤認虛寒。以溫熱治之。是益其熱也。大法遲滯微弱。可溫浮盛。洪緊可汗。沉細滑實可下。虛細勿吐。遲弱勿下。滑實勿溫。貴在辨脈施治。可謂上工矣。

至於結促代伏。皆為傷寒死生閼據。并為詳識。夫脈來緩時一止。復來謂之結。此陰盛脉必有寒伏於中。故傷寒脈結。足冷腹中痛。宜大建中湯。又脈來數時一止。復來謂之促。此陽盛脉必有熱結於裏。傷寒溫熱。發斑發喝。皆有是脈。大抵皆宜內集。清理之後。其促漸退。則生。轉加則死。又脈來無力。動而中止。不能自還曰代。雜病見之必死。傷寒有寒邪。水飲停蓄。而正氣內虛。邪伏不解。故有脈結代心動悸者。主以灸甘草湯。至於伏脈。則有汗下溫解之殊。但初起頭痛發熱。或一手無脈。或兩手俱伏者。庸工便謂陽證。見陰脈之死候。殊不知此因寒邪不得發越。急用麻黃湯汗之。若初起發熱頭痛方除已後。厥逆無脈者。陽厥也。小承氣湯主之。若初起不發熱。無頭痛。便厥冷。吐利無脈者。宜中陰寒也。四逆湯溫之。若初起陽證至六七日或十餘日。但服表汗藥而未曾攻下。別無刑剋證候。昏冒不知人事。六脈俱伏。此欲作戰汗而解也。當與熱薑湯助其作汗。慎勿用藥。若誤與湯劑。反致變害也。

察色

望而知之謂之神。見其色而知其病也。故傷寒家尤以察色為首務。察其色澤。問其困苦。辨其聲音。更合

之以脈類無道情矣。夫肝青象木。脾土色黃。赤屬心火。肺白腎黑。皆見於面。青王肝藏風寒。青而黑者多寒痛。青而白者多虛風也。陰寒極甚。面與唇口青黑。甚則舌卷陽縮。及夾陰傷寒。少腹痛而面青。俱宜急溫者也。若夫厥陰熱厥。亦有唇面爪甲青紫而脈伏者。然細察之。其脈必附骨有力也。面亦多熱而有表裏虛實之殊。然亦有陰極似陽者。太陽證頭痛發熱喘而面赤者。為表證。若面色緣緣正赤。為陽氣怫鬱在表。汗出不徹故也。又熱病煩渴。面赤脈洪大。表裏俱熱也。陽明府實。潮熱汗多。面赤不大便者。裏證也。少陰病下利清穀。裏寒外熱。為陰盛格陽。夫陰傷寒。發熱頭痛。面赤足冷。脈沉細。或浮數無力。按之欲散。為虛陽上泛。壞病汗下過多。元氣耗散。微陽失守。皆面赤戴陽。並宜溫補下元。不可誤用寒藥。若午後面赤為陰火。不可作傷寒治。兩顏赤色如妝。為陰火亢極。雖愈必死也。面黃主濕。黃而明者。為濕熱黃而暗者。為寒濕。黃而帶赤白者。為欲愈。黃白不榮。而多蟹爪紋者。為蟲積。黃而赤者。為內傷蓄血。黃黑而槁者。為食積。黃而青黑者。脾胃衰極。為木勝土而水無制也。白主氣虛白而無神者。傷寒大病後。發汗過多。或脫血所致。黑主腎衰。傷寒顏帶黑青。為陰寒之色。若久病焦黑者。又為腎熱也。凡耳目口鼻黑氣枯死者。難愈。神庭黑氣如指者。陰晦之色。見於陽之正位。卒死兆也。面慘不光。傷寒也。面光不慘。傷風也。面如錦紋。陽毒也。面垢如油。喘促多汗。足陽明中喝也。面垢生塵。灑然毛聳。手少陰中暑也。大率面帶黃者。為脾土正色。病雖劇而可治。若青黑亦白異常。而無黃色相參者。皆非吉兆也。

凡察病者。目以開目。欲向明者。為陽。閉目不欲向明者。為陰。目疼屬陽。明表證。目亦為經絡熱感。目瞑澣水。鼻燥為陽。杯上感。欲解必衄。目黃而頭汗。將欲發黃。目不了了。為陽明府實。若睛不和者。少陰熱也。目眩為痰。因火運。眼胞微腫為有水。目下灰色為寒。飲目。白睛黃破發癰也。目直視不能瞬。或白睛黃。此誤發汗。將欲衄也。目無精光者。為腎氣素虛。目正圓者。瘦不治。凡目暗。目瞤。目陷。目反直視。戴眼反折。皆不治。下後目閉為陰血受傷。目反上瞪為陰氣上逆。

凡察病者鼻。若鼻頭色青。腹中冷痛者。死。蓋厥陰肝木之青色。挾腎水之寒感。上徵於鼻。下徵於腹。是為

暴病項之亡陽而卒死也。其謂鼻頭色微黑者有水氣見黑雖為腎陰之色。微黑且無腹痛但主水氣而非暴病也。若黃黑光亮而少腹脇痛或善忘如狂又為蓄血也。謂色黃者胸上有寒。穀氣不化而有痰積赤為火色。若非火令之時加於白色之上是火來尅金故死黑為勞為房勞以火發於腎水之中故不赤而反黑。其黑必枯燥不似水氣之黑而光澤。察血之黑黃光亮也赤為風者由熱生風風為陽邪故也。黃者便難以中焦熱燥腸胃不潤是以便難然必枯而不澤。若黃而鮮明者有留飲留飲以津液不行滯其穀氣化熱而致黃也。又乾燥鼻孔而脈浮數者將欲衄。鼻鼾語言難出者為風溫鼻鳴乾嘔者為傷風。鼻病為肺脾二經有風火。鼻柱散闊為肺氣虛而有濕鼻瘦枯黑為脾勞火旺無津。鼻上汗出如珠為心脾口動頭不止及人中反者皆死證也。

凡察病者唇以焦赤為脾燥熱赤腫為胃濕熱青黑為陰寒。唇寒面青頭痛發熱為少陽陽明之邪熱傳太陰厥陰唇口上下有瘡為狐惑。唇上燥裂為熱在肌肉鮮紅為陰虛火旺。淡白為氣虛。淡而四逸起白量為驟亡血。唇齒焦黑為燥屎衝膈雖急下之多不可救。若唇吻反青。琰口黧黑張口如魚出氣不復唇口動頭不止及人中反者皆死證也。

凡察病者口以口苦為少陽膽熱不從火化也。口甘為脾土濕熱而津液上乘稼牆作甘也。口淡為胃中虛熱胃為一身之主淡為五味之本也。口作酸為肝熱乘脾曲直作酸也。口作鹹為腎衰虛熱上乘口中常覺血腥為肺氣傷。口不和者不知味為內傷津液。口不仁者不和澤為外感客邪。口燥咽乾為熱傳少陰證煩渴欲飲水小便不利為太陽犯本水入即吐為水逆。渴欲飲水壯熱自汗為陽明府熱漱水不欲嚥。而目瞑鼻燥為蓄血漱水不欲嚥。而目赤厥寒為陰躁。口傷爛亦為陽厥口難言為血少。口噤咬牙癲癇為發經也。

腎敗也。若耳中策策痛而耳輪黃者為黃耳。類傷寒也。又重發汗。又手冒心而耳聾者陽虛也。與少陽經之耳聾迥別。

凡察舌上胎色另具辨舌論中。其有舌本強硬為癥。舌短囊不縮為宿食。舌脹大滿口為龍火燔灼。此最為急候。即宜砭之。舌深赤帶紫者為裏熱。舌色淡白為裏寒。舌枯萎者為心氣耗絕也。

凡察病者身以輕易轉側而熱者為陽。若肢體骨節疼痛為表證。以沉重難移動而寒者為陰。若腹痛自利厥逆。宜溫經。然中溫亦主身重痛。濕痹則身痛。關節不利。風濕則身痛而腫。骨節焮疼掣痛。不得屈伸。汗出惡風而不欲去衣。若少腹鞭痛。小便不利為溺濁。小便利者為畜血。腹痛自下衝上者火也。從上轉下。趨少腹者寒也。氣從少腹上衝者陰火也。從左脇上衝者肝火也。大抵足寒而厥者陽虛也。厥而發熱者。熱厥也。臂多青脈者脫血也。背熱手背熱者外感也。腹熱手心熱者內傷也。背微惡寒者陽微不能勝陰也。渾身惡寒。傷寒也。自汗身重。鼻鼾多睡。風溫也。肉瞞筋惕。汗下虛也。手足瘺癰虛而有風也。額上及手足冷汗陰毒也。身目俱黃疸病也。身如蟲行。表虛也。若頭傾視深循尺撮空。冷汗發黃。形體不仁。乍靜乍亂皆不治也。

凡察病者足以初起手足俱冷者為陰寒。宜四逆湯薑附溫之。初起但足冷手不冷。身體發熱。頭或痛或不痛。便是夾陰須用五積再造選用。不可用發汗攻下之劑。亦不可用小柴胡。以中有黃芩苦寒故也。若是內傷陽氣虛人。湏從東垣補中益氣去升麻柴胡加炮薑半夏桂枝溫中為務。又夏暑病濕溫人。必足冷手溫多汗妄言。宜蒼朮白虎合五苓散。不可誤認夾陰而用五積四逆。反助熱益病也。亦有兩手逆冷。而兩足熱厥如火者。此陰氣衰於下。陽氣衰於上。陰陽否隔之兆也。若初起於脚膝軟弱。或足胫赤熱腫痛。當從腳氣治之。

凡察病者聲以清朗如平日者吉。聲重鼻塞者傷風也。聲如壅中出者中濕也。言遲者風也。言驟者火也。聲瘡不出而效者水寒傷肺也。聲啞如破而效者客寒裏熱也。驟然聲瘡而咽痛如刺不腫不赤。不發熱。

二便清利者。陰寒也。驟然聲瘡而赤腫脹閉。或發熱便祕者。龍火也。喘逆煩亂譏語者。邪氣實也。鄭聲者。精氣奪也。少氣不足以息者。氣虛也。語言遲緩而懶怯者。內傷也。病人語聲寂然。喜驚呼者。骨節間病。此病在厥陰。陰主靜故也。語言喑啞然不徹者。心膈間病。此病在太陰。肺主氣故也。其聲啾啾然細而長者。頭中此病。病在巨陽。巨陽與少陰為表裏。腎在聲為呻。其聲起自下焦故也。已上諸證雖非盡屬外感。然傷寒家悉宜辨晰。庶無誤治之失。診病首宜識之。

### 辨舌

舌胎之名。始於長沙。以其邪氣結裏。若有所懷。故謂之胎。傷寒之邪在表。則胎不生。邪熱傳裏。則胎漸生。自白而黃。黃而黑。黑甚則燥裂矣。要以滑潤而白者為表邪。灰黑濕潤無胎者。為陰寒。灰黑薄滑者。為夾冷食。皆不可用寒涼攻下之劑。然中暑夾血。多有中心黑潤者。又不可拘於上說也。若黃黑灰色。而乾燥紋裂者。為熱極。萬無虛寒夾血之理。維屢經汗下。舌雖乾而有微薄胎。却無燥裂芒刺。此為津液耗亡。不可誤認實熱而攻之。攻之必致不救也。金鏡三十六治法。舉世宗之。又觀舌心法一百三十七圖。條分縷析。辨證最詳。其間論紅為瘧熱。紫為酒毒。黴醬色為夾食。藍為肝癥。純色廻出前人未備。所嫌舍本逐末。未免繁紊。使人無提綱挈領處。故余括其捷要。分條辨論於左。

如白胎者。邪傷氣分。肺主皮毛。故凡白胎猶帶表證。仲景以為胸中有寒。止宜和解。禁用攻下。攻下必致結痞。變證不測。若溫病熱病一發。便壯熱昏憤躁渴。舌正赤而有白滑胎。即當用白虎湯。汗之。時疫初起。舌上白胎如積粉者。達原飲解之。若傷寒邪入胃府。則白胎中黃。邪傳少陰。則白中變黑。若純色為一經。證邊與中間兩色俱傳。經證若從根至尖。直分兩路者。是合病與夾陰舌也。合病則白中兼兩路黃。夾陰則白中兼兩路黑潤及灰色也。從根至尖。橫分兩三截。胎色者。是併病舌也。故尖白根黃。尖白根黑及半邊胎滑者。雖證類不同。皆屬半表半裏。白胎多而滑。黃黑胎少者。表證多也。尚宜和解。黃黑胎多而白胎少。或生芒刺黑點乾燥者。裏證多也。必下無疑。雖中心黃黑而滑潤邊白者。此為表證未

盡傷寒則大柴胡兩解之。溫熱時疫則涼膈散或白虎合承氣攻下之。又傷寒壞病雖白而厚其燥裂者。此為邪耗津液宜小柴胡稍加芒硝微利之。純白滑胎為胃虛寒飲結聚膈上之候。每於十三四日過經致變不可泛視也。一種白厚胎如煮熟色到底不變者必裏挾寒物留滯不散致脈伏不出乃心脾氣絕肺氣受傷也。慎不可下。宜枳實理中湯。熟甚合小陷胸主之。至於能食自利而白胎滑者為藏結難治也。黃連湯連理湯備急丸選用間有得生者。

黃胎者陽明府實也。黃濕而滑者為熱未盛結尚未定不可便攻。攻之必初鞭後溏也。冬時宜確守此例。俟結定乃攻。不得已大柴胡微利之。若在夏月一見黃胎便宜攻下。以夏月伏陰在內多有下證最急而胎不燥者不可泥也。若黃而燥者為熱已盛峻下無疑。黃而生芒刺黑點者為熱勢極。黃而瓣裂者為胃液乾下證尤急也。諸黃胎皆屬胃熱分緩急輕重下之有種根黃而鞭尖白而中不甚乾亦不滑短縮不能伸出。識妄煩亂者此疫挾宿食占據中宮也。大承氣加生薑半夏主之。有舌色青紫而胎却黃厚甚則紋裂但覺口燥舌仍不乾者此陰證夾食也。脈或沉細而伏或虛大而濶按其心下或臍旁鞭痛而時失氣者急宜大承氣另煎生附子佐大黃下之。若脈虛大者黃龍湯下之。熱極煩躁者更加生地麥冬夏月尤宜。若冬時陰證夾食而舌上胎黃不燥者宜用附子理中合小承氣下之。大抵舌有積胎雖見陰象亦是虛中有實急當攻下無疑。但下法與尋常不同耳。又中宮有疫飲水血者舌多不燥不可因其不燥而延緩時日致誤也。凡溫病熱病稍見黃白胎無論燥潤即宜涼膈雙解時行疫癟稍見白胎即宜白虎達原若見黑黃無論乾濕大承氣胃急奪無疑。

黑胎者少陰腎色也。若五六日後熱傳少陰本乘火位亢極之火不為水衰反兼水化如火過炭黑是也。始因表證失汗致邪入裏而傳少陰下之則愈然有屢下熱不減胎不退者此必宿食留滯於中宮也。宜黃龍湯加炮薑川連有誤用汗下太過津液枯竭而胎燥黑者此為壞病須量人虛實為治虛者其胎必傳而潤生脈散合附子理中實者其胎必厚而乾生脈散合黃連解毒一則陰虛陽亢一則陽虛陰亢不

可不審。熱勢盛處則黑胎上生芒刺。及燥裂分隔辨者。須用青布蘸薄荷湯拭潤。更以薑片刮去芒刺。機起隔瓣。看刺下辨底色紅者可治。急下之。若俱黑者不治。又黑胎腐爛者為心腎俱絕。舌黑而卷縮者。肝絶。皆不可治。舌黑及灰或黃。而發泡生蟲腐爛。雖為濕熱。亦屬肝傷。俱為危候。又中間一路潤黑燥胎。兩邊或黃或白者。兩感舌也。邊黃則調胃承氣。邊白則大柴胡下之。若中間一路黑滑薄胎。兩邊白滑。此表裏俱虛。胃中雖有留結。急宜附子湯溫之。凡黑胎多凸。黑而乾燥。或芒刺辨裂。皆為實熱。急宜下奪。黑薄濕潤。或兼白滑者。皆為陰寒。急當溫經。退一種中黑而枯。或略有微刺。色雖黑而無積胎。舌形枯瘦而不甚赤。其證煩渴耳聾。身熱不止。大便五六日或十餘日不行。腹不鞭痛。按之不痛。神識不昏。晝夜不得睡。稍睡或呢喃一二句。或帶笑。或歎息。此為津枯血燥之候。急宜炙甘草湯。或生料六味丸。換生地合生脈散。加桂滋其化源。庶可或生。誤與承氣必死。誤與四逆必死。凡舌胎或半黃半黑。或半黃半白。或中燥邊滑。或尖乾根潤。皆為傳併之邪。寒熱不和之候。大抵尖黑。稍輕根黑至重。黃黑宜大承氣。無白者宜涼膈散。分緩急下之。若全黑為死。現舌不治。夏月熱病時。火邪火內外燔灼。胎黑易生。猶可攻治。冬月傷寒。舌胎全黑。決難救也。然中暑誤認外感而加溫覆。多致中黑邊極紅而潤。脈必虛大。急用白虎湯清之。虛者加人參竹葉。如更認誤傷寒而與熱藥。必致煩躁不救也。夏月中暑。多有黑舌。黑而中乾者。白虎湯無疑。黑而滑潤。或邊白者。必夾寒食。古法用大順散。然不若理中合小陷胸最當。若直中少陰真寒。始病不發熱。舌心便黑色。非由白黃變化。其舌雖黑而滑。舌亦瘦小。此真藏寒。必厥冷自利。嘔吐脈沉遲。四逆附子輩急溫之。稍緩則不可救。

灰黑舌者。足三陰互病。如以青黃和入黑中。則為灰色也。然有傳經直中之殊。蓋傳經熱邪。始自白胎而黃。黃而灰黑。或生芒刺。黑點紋裂乾燥。不拘在根在尖。俱宜攻下泄熱。有淡灰色中起深黑重暉者。乃溫病熱毒。急用涼膈雙解治之。熱毒內傳一次。見暉一重。傳二三次。見二三重也。若見三重者。不治。若直中三陰。始病無燥熱。便見灰色。舌潤無胎。更不變別色者。此內必夾寒食。及冷痰水飲。或蓄水如狂等證。當

隨證治之。又有感冒夾食。屢經汗下。消導二便已通。而舌上灰黑未退。或濕潤。或雖不濕。亦不乾燥者。不可因其濕而誤認為寒。妄投薑附。亦不可因其不潤而誤與硝黃。此因汗下過。傷津液。虛火上炎所致。其脈必虛微少力。治宜救陰為急。雖無心悸。脈代。當用炙甘草湯主之。內有生地阿膠麻仁麥冬之甘潤。可以滋陰潤燥。蓋陽邪亢盛。則用硝黃以救陰。陰血枯涸。則宜生地以滋陰。可不辨乎。

紅色者。心之正色也。若紅極為溫熱之毒。壅於心胃。及瘟疫熱毒內盛也。若濕者。不可便下。鮮毒湯或白虎湯。紅中有白胎者。更感非時之寒也。桂枝白虎湯。紅中夾兩路灰色胎者。溫熱而夾寒食也。涼膈散加消導藥一二味。紅中有黑胎者。熱毒入少陰也。大承氣合白虎湯。紅極有黃黑芒刺者。熱毒入府也。調胃承氣湯。紅極有紫黑斑及遍身發斑者。陽毒入心也。人參白虎湯。加犀角黃連。紅極而紋裂者。燥熱入肝也。大承氣加柴胡白芍。甚則加芩連。坑爛者。濕熱入脾也。小承氣加芩連半夏白朮者。火氣燔灼也。三黃石膏去麻黃。紫瘡者。火氣鬱伏也。解毒湯。紅星者。心包火炎也。涼膈散一種。柔嫩如新生。望之似潤。而燥涸殆甚者。為妄行汗下。津液竭也。多不治。急宜生脈散。合人參三白湯主之。舌痿不能動者。肝絕舌忽瘦。而長心絕不治。

紫色者。酒後傷寒也。世俗庸愚。往往受寒不服湯藥。用薑葱酒發汗。汗未當而酒毒藏於心包。多有此證。若純紫。或中間略帶白胎而潤者。宜葛根湯加石膏。若紫中有紅斑。或紫而乾。萬紫而短縮。俱宜涼膈散下之。若全紫而乾如煮熟肝者。死肝色也。其證必厥冷。脈必沉滑。此陽極似陰也。急用當歸四逆湯加酒大黃下之。然多不效。大抵深紫而赤者。是陽熱酒毒。宜用苦寒解毒。若淡紫而帶青滑者。是直中腎肝陰證。急宜吳茱萸湯四逆湯溫之。然亦有中心生薄青紫胎。或略帶灰黑。而不燥不濕。下證復急者。此熱邪傷於血分也。犀角地黃湯加酒大黃微利之。

癰腫色暗舌者。乃夾食傷寒也。食填太陰鬱遏。不得發越。久之。盦而成醬色也。其證腹滿時痛者。桂枝湯加枳朴橘半。痛甚加大黃。因冷食不消。加炮薑厚朴。甚則調胃承氣加炮薑下之。如胃氣絕脈結伏。唇帛

齒燥下利者死

藍胎舌者。肝藏純色也。傷寒日久。屢經汗下。失於調理。致胃傷極。心火無氣。脾土無依。則肺金不生。而肝木無制侮於脾土。故胎色如龍。或兼身生藍斑。乃心脾肺三藏氣絕於內也。必死。如微藍色而不甚深。或略見藍紋者。為木受金傷。藏氣未絕。脈不沉濇而微弦者。可治。小柴胡湯加炮薑肉桂主之。舌之證類雖繁。不外八種胎色。撮其大要。亦辨證之一助也。

宜禁

傷寒表證宜汗。裏證宜下。半裏宜和。膈熱宜瀉。陰寒宜溫。此大法也。然其人真氣素虛。或有宿食者。更宜斟酌。陶尚文云。陽病宜汗宜下。真氣衰。汗之亡陽。下之多脫。陰病宜溫宜補。真氣衰。則客熱便生。苟非宿詣。不無妄治之失。因彙宜禁諸法如左。

宜汗太陽脈浮緊盛。○人迎盛於氣口。○諸脈浮緊而數。○頭疼體痛。○腰痛背強。○項背強骨節痛。○身體拘急。○晝昏惡寒。翕翕惡熱。○煩熱不止。○煩躁喘嗽。○傷寒無汗。○中風自汗。○服發汗藥。解半日許。復煩。○衄血點滴不成流。熱不解。並宜發汗。又有脈沉可汗者。為身有熱也。設身不熱。豈敢汙乎。○禁汗脈虛無陽。○尺中脈遲。○諸脈沉細微弱。○吐血下血。及衄血如流。○口燥舌乾。○口苦咽乾。閉塞及痛。○風濕。○濕溫。○風溫。○中暑及暍。○當臍上下左右動氣。○心下悸動。○瘡家。○淋家。○小便淋瀝。○大便瀉利。○溫毒發斑。○內傷勞倦。○亡陽漏風。○少陽寒熱往來。○經水斷續崩漏。○熱入血室。○新產血虛。○房勞陰虛。○陽事痿縮。○夾陰陰虛。○足胫逆冷。○太陽犯本渴而小便不利。○膀胱虛寒。故而小便利。俱在禁汗例。

諸禁汗者。非直禁絕表藥也。但禁麻黃青龍等峻劑耳。如小建中黃者。建中在所必用。以意加減可也。汗後熱不止。必有所因。或因冷食不化。或因汗後強飲粥湯。或汗後更冒虛風。或動起不寧。或勞心慳怒。皆足以致熱也。○凡服麻黃重劑。不得汗。後必嘔血或衄。亦有下如豚肝而死者。以榮血受傷故也。

宜吐病在膈上○胸中懊憹痞悶○喉中有痰聲○三四日痰在胸中○脈大胸滿多痰○氣上衝咽喉○手足厥冷○脈乍結○痰氣在胸中○心煩滿而欲食不能食○胸中鬱鬱微煩而痛○欲使人按之反有痰泄○下利日十餘行○脈反遲而微滑○或乍緊或乍緩或寸口沉伏○或浮滑為宿痰○並宜瓜蒂散○傷寒頭痛久不愈○令人喪明○胸膈有宿痰也○瓜蒂散吐之○實寒結胸宜白散○類中風痰涎壅盛宜豨涎散○食厥脈滑○或上部有脈下部無脈而厥逆○胸中兀兀欲吐而按之痛○及乾霍亂心腹刺痛欲死○並宜薑鹽湯○探吐之○發汗吐下後虛煩不得眠○並宜桔子豉湯○病在膈上為裏之表證○故用吐法取汗○寒月宜置火於暖室○不透風處吐之。

禁吐脈微無陽○十口細弱○舊有微濘○病在少陽○耳聾目赤胸脇痛○少陰厥陰病乾嘔○元氣虛羸○氣血兩虛○房勞陰虛○勞倦內傷○吐血衄血○胎產崩漏○經水斷續○俱在禁吐例。

南人不可輕用湧吐○一吐尚可勝之○二吐便致昏困而礙北方質實之人○三吐不啻也。

吐後有頓快者○有徐快者○或反悶悶者○吐未盡也○或反熱者○不可下也○太抵三日後○無不快矣。

宜和寒熱○往來脈弦數○未下胸中脹滿○心煩喜嘔○耳聾脇痛○舌白胎滑○頭兩角痛○口苦咽乾○頭目眩暉○頭汗盜汗○默默不欲飲食○熱入血室○少陽半表半裏諸證○並宜和之。

禁和○太陽表證未除○陽明裏證已具○熱傳三陰腹滿○寒中三陰自利○夾食夾陰面戴陽○足脰冷○過汗經虛耳聾○尺中虛遲緊細俱在禁和例。

宜下○傷寒五六日○發熱頭痛○方除蒸蒸○發熱脈沉實滑數○有力○大便不通○六七日○熱蒸陽明○頭痛發熱○不大便○口噤咬牙○日晡潮熱○腹痛○喘急○鞕滿○能食不大便○潮熱譏語○發狂○煩躁○時悶亂○服小承氣轉失氣○燥屎逆攻○胸下鞕痛○下利脈數○或遲滑○有宿食○下利○三部脈皆平○心下鞕痛○潮熱○自活○譏語燥渴○不大便○潮熱○手足脰下汗出○汗下後微煩○小便數○大便難○大府燥結○則氣口脈洪大○按之反濶○小腹鞭滿而痛不可按○小便自利○大便黑○有瘀血○小便不利○大便乍難乍易○微喘

渴而不得眠○揚手擲足○揭去衣被○內實燥滿而發黃○少陰病口燥舌乾而渴邪熱內消胃水者急下之○自利純清水心下鞶滿不大便者急下之○腹脹鞶滿○遠臍鞶痛○不大便者急下之○陽明病汗多熱甚○恐胃汁乾急下之○腹滿鞶痛為土嘔急之下○大抵一切下證要以舌乾口燥大便不通再以手按臍腹胸脹滿而痛手不可近者急下之○然又有脈浮可下者大便難也○設大便不難豈敢下乎○禁下脈浮表證未解○尺中遲弱而足冷○六脈大而無力或虛細或乍大乍小○發熱頭痛未除○惡寒惡風○頭背項強腰痛拘急○手足腋下無汗○嘔吐未除○咽中閉塞○腹中時滿時減○腹脹可按可揉○當臍上下左右動氣○少陽寒熱嘔吐○陽明面白赤色○不轉失氣○失氣不臭○內傷勞力○陰虛勞倦○經水斷續○胎前崩漏○大便鞶而小便清○小便頻數而少○夾陰面赤戴陽○夾食胸中煩滿屢服消匙而脈沉手足微厥○心下痞滿○虛煩欲吐不吐○畏寒不能食俱在禁下例○凡禁下者慎不可用承氣等藥即有下證惟宜導法選用○若陰結宜四逆湯入人乳膽汁下金液丹○下後不解一日半日復熱或下未盡或下後熱邪不除或下後復結或因飲食起居或更冒虛風當詳審以治○服下藥不行者藥力不當病勢也更宜大劑下之若誤用承氣不得下後必愈脹以裏無熱結徒傷胃氣濕熱痰飲愈逆也以溫熱例治之○有屢用承氣不行改用溫理脾胃藥即行者○有下出稀糞色淡不黃不臭者急溫之下出純清水者死下出溏糞者防變溫熱時疫不在此例○下如汙泥者死下出血及血水者死下出鮮血有危下瘀血如膠黏漆黑其惡難近者死○下之不盡驟用補截復發孰識語妄亂脈躁不寧或多大忽小者皆不治。

宜溫初起不發熱無頭痛便惡寒脈沉嗜卧○少陰病脣上有寒飲乾嘔不吐○嘔吐不止○乾嘔吐涎沫○腹痛泄瀉嘔逆○戰慄踴卧○面如刀刮○四肢逆冷○夾陰中寒唇面爪甲青○胃虛欲逆○下利清穀不止○陽縮入腹○囊縮舌潤○厥冷過肘膝○小便清利○自利不渴○口中和背惡寒○畏寒身疼骨節痛皆直中陰經寒證

又裏寒外熱身反不惡寒而面戴陽脈虛大無力或數疾無倫為陰盛格陽○煩躁欲生臥泥水中○自利咽乾欲飲水而不能嚥皆假熱之證也。

又初起本陽證汗下太過亡陽脫泄或誤服寒藥後變惡寒厥逆虛汗泄瀉脈或沉細或伏絕或虛大為壞病○小便或利或不利而色不黃赤○筋惕肉瞤○亡陽汗不止而惡寒並宜從溫補例治禁溫本傷寒陽證六七日傳變入裏後變脈沉數煩躁不得卧寐○自利腹痛而時痛時止按之結鞕○咽痛心煩○小便短數赤澀○大便實○泄利下重○下利譏語厥逆不過肘膝厥過即復熱○喜冷飲○面深赤煩躁便祕譏語欲揭衣被揚手擲足皆屬傳經熱證俱在禁溫例。

凡服溫經回陽藥後其人微煩而渴脈來微數而不實堅身體安和靜卧者少與生脈散或清粥飲其渴自止慎勿誤用涼藥復助陰寒也若假寒證誤投薑附而大煩躁熱渴不盜者急與苦寒瀉熱無疑。

足太陽膀胱經禁下若下之太早則變證百出足陽明胃府禁發汗禁利小便犯之重損津液脈必代結足少陽膽經禁汗禁下禁利小便汗則犯太陽下則犯陽明利小便則使生發之氣陷入陰中太陽一禁陽明二禁少陽三禁此定禁也至三陰經則無定禁但非胃實乃禁下耳。

藥禁者津液內亡作渴禁用五苓淡滌汗多禁利小便多禁發汗咽痛禁發汗利小便大便反利禁梔子大便祕滯禁用燥藥吐多不得復吐而上氣壅滯大便不通只可宣散上氣禁利大便脈弦禁服平胃而虛脈緩禁服健中而實實。

### 刮法

凡看傷寒先觀兩目赤為陽毒黃為癰次看口舌有無胎狀再以三指平按心胸腸下小腹蓋心胸以候結胸痞滿宿食胃傷先曾誤下致痛而癰滿正中者為結胸癰大稍偏者為痞未經下滿痛為宿食攻後深按隱痛為胃傷脇下以候熱邪塞水畜血熱而痛者為少陽之邪寒而多噉為水飲停蓄按之痛而不輒其人善忘者為蓄血小腹以候燥結瘀血按之述脣癰痛為燥結雖痛而軟小便利者為蓄血也。

凡始病微惡寒發熱坐臥不安。胸煩欲嘔。善饑。脈弱陰陽未明者。慎勿輕用表藥。先與甘草乾薑湯加葱豉一劑。後顯陽證用表藥。顯陰證用溫藥。若陰證或夾陰誤用升散解表。必致陽縮入腹而死。

凡結胸痞滿。及心脇鞭滿。用生薑搗爛去汁。炒微乾。乘熱包熨患處。○凡結胸手不可按。大小便祕。屢下不通。急用灸法。以巴豆仁十粒研爛。入黃連末。白麵研勻作餅。填實脣中。用艾炷灸七壯。覺腹中鳴轉。大便利為效。○凡結胸手足厥逆者。用葱白十茎。生薑一兩。同搗作餅。烘熟置脣中。帛掩熨之。待氣入覓響。即與枳實理中湯加附子。○凡結胸證不拘早晚。用黃毛雞一隻。同生薑四兩。搗爛帛包。烘熟熨結。半日許。覺胸中熱乃止。更以熱手向下捺之。

凡痞滿不拘寒熱虛實遲早。便用熨法。以橘葉生薑葱頭共搗爛。加數皮半升。用紗絹包。烘熱熨痞滿處。至半日許。覺胸膈躁熱即止。更以熱手順下捺之。

凡傷寒發狂難制。以醋沃火炭。令醋氣衝鼻中即定。不定者。此神亂無主。雖下必死。若狂定。然後察其陽狂陰躁用藥。

凡傷寒衄血不止。用生耦汁。或茅根汁。蓋許服之。童便亦可。服後微覺寒顫即止。慎勿用冷水撲額。及濕紙搭天庭。真柱使瘀積經絡不散。致成痼疾也。

凡直中陰寒無脈。或吐瀉。脫元無脈。先將薑汁酒釀半盞。熟服。其脈漸來者可治。服後一時許。仍無脈。或暴出數疾無倫者。不治。若痛甚脈伏者。不在此例。

凡陰寒陰毒。四肢厥冷。爪甲唇青。六脈欲絕。不知人事。藥不得入者。將葱白搗餅。用麝香半夏皂角末一  
字。填入臍中。熨之。或用生薑切片貼上。艾火灸之。併灸闕元氣海數十壯。脈漸出微汗。可治。否則死。  
凡中寒卒倒。不得以火烘之。中暑卒倒。不得冷水灌清。若痰厥昏迷卒倒者。用牙皂末擦紙燒烟衝鼻中。  
有嚏可治。併用稀涎散水調探吐。俟醒用藥。

凡溫熱病燥渴不得汗。欲飲冷水者。下咽即得大汗而解。若傷寒感冒。強與之水。必變欬嘔噦。悖自利等。

證也。

證也。

凡乾霍亂不得吐者。用鹽兩許。置刀頭炭火燒紅淬水一升。攬服探吐之。若誤與粥飲即死。

凡腹痛未辨陰陽。痰食臭毒。先用薑鹽湯調生香附末三錢溫服。候勢稍定。然後渴脈證用藥。慎勿誤與鹽水。椒水致變嘔噦。下利水腫等證。甚至不救。

凡傷寒服藥轉吐出不納者。先將生薑汁少許。徐徐呷下。然後緩緩進藥。即不吐也。

凡胸腹攢痛。嘔吐涎沫而時緩時甚。面乍赤乍白。脈忽大忽小。甚則厥逆脈亂。此食滯中宮。蛇上入膈也。急用椒紅烏梅肉為散。以安其蛇。後隨厥治之。

凡破傷風及傷濕傷火。皆發熱頭痛。證類傷寒。甚則牙關緊急。不開藥不得入者。用蜈蚣一條。焙乾為末。掠牙吐涎立甦。然後驗證用藥。

凡大便不通。尺脈無力。胃弱津枯者。宜用導法。詳辨繕論陽明下篇導法下。老人枯燥閼結。不在此例。

凡小便不通。先以麝香半夏填臍中。以葱白田螺合搗成餅。封臍上。布縛良久即通。○又法用食鹽一字入臍。加葱餅於上。熨之即通。凡虛人津枯。及胞癰小便不通者。禁用上法。誤用之後必愈閼也。

凡呃逆不解。用硫黃乳香酒煎。鰓法及搗生薑查。拌艾炒熨期門及灸期門左穴。皆取溫散肝氣也。若二便不通者。禁用此法。

凡妊娠溫熱病及時疫。用青黛伏龍肝為末。和井底泥調塗臍至閼。元乾再易之。然不若用大承氣急下。奪其裏熱。庶免傷胎之患。

凡傷寒服承氣等下藥。以熱薑湯催令速行。外用鹽炒麩皮升許。乘熱包熨。則大便易通。若服之下咽即行而不結者。為元氣衰弱。防有下脫之虞。服之經日不行。為濕熱痰飲固結。急用薑湯催之。若服久不行。則胃中津液敗壞下之不止。必發呃逆而死。不下則脹滿而死也。若陰證腹痛。自利用吳茱萸炒熨良。凡傷寒下後。熱退。不可用參耆驥補。以餘邪得補。必復熾盛。即使虛人亦須俟正冀再行。然後祠之。

凡內傷誤服外感藥。脈轉緊盛者。補中益氣調之。誤服寒涼藥。脈緊疾者。理中湯溫之。

凡用附子熱藥。必須冷服。蓋陰極於下。陽浮於上。以冷折其上之虛陽。以熱治其下之沉寒也。

凡中附子毒。一身面目俱赤。狂熱失血者。犀角黃連甘草煎湯。入生菜菔汁服之。則解。

服麻黃汗出不止者。

溫粉撲之。方用龍骨牡蠣煅過。

同防風藁本為末。

和炒糯米粉。絹包撲之。其汗即止。

溫熱病誤汗不止。將病人髮披水盆中。用礬石膏黃連末生梗米粉撲之。

服瓜蒂吐不止者。一味麝香湯解之。

服大黃利不止者。虛人用人參乾薑陳皮甘草烏梅陳倉米煎服。或但用陳米烏梅黃土亦效。若過服承氣。吐利不止。如結胸狀。諸藥投下未安者。按法加益智仁末一錢。匙用前湯半劑調服。則吐利同效。

服桃核承氣代抵當湯。瘀血未盡。腹痛不止。炒黑山楂。炒焦黑糖。同伏龍肝煎服。久畜之。於一時不能即盡。桃核承氣加桂附溫以散之。虛人以桃核承氣加入參。補而逐之外。用芒硝砂熱熨之。若所下血如凝血。多兼血水。或如汙泥。神昏語亂者。不治。色紅紫者屬熱。色晦黯者屬寒。色鮮淡者屬虛。當隨證治之。