

全鑑論注
金匱要略注
圖穴圖

5

御纂醫宗金鑑卷十六

訂正傷寒論註目錄

平脈法篇

辨脈法篇

訂正仲景全書傷寒論註正誤存疑篇

仲景傷寒論篇可法但成於漢末傳寫多訛錯簡亦復不少如論中下利嘔逆用十棗湯峻劑攻之陽重衄血以麻黃湯發之發汗病解反惡寒病解之中多一不字心下痞按之濡濡字之上少一不字之類諸家遵經註解不得不穿鑿附會致令千古不可多得之書不能傳信於世良可惜也今加正誤一一列明每條凡小字傍右者原文也傍左者改正之文也居中者原文所有或移上或移下或他處移入及原文所無而補之者也字上加□刪去者也尤有整節外謬者二十五條訛不與脈符藥不與病合雖有是方世無其病即有其病難用是藥承訛襲證無濟寔用然其中尚有可採之句所以各篇不動經文強加註釋復錄原文附於卷末以誌闕疑云

太陽上篇正誤

桂枝湯方 桂枝三兩 生芍三兩 芎芢三兩 甘草二兩

生姜三兩 大棗十二枚 按桂枝湯方原文有去皮二字夫桂枝氣味辛甘全在於皮若

去皮是枯木矣如何有解肌發汗之功耶當刪之後仿此

若脈和其人大煩自重時內際黃者此欲解也按臉字當是臉字臉眼弦也作臉字非當改之

太陽中風不利嘔逆表解者乃可攻之其人熱汗出發熱有時頭痛心下痞軟滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也

棗湯主之按下利之下字當是不字若是下字豈有上嘔下利而用十棗湯峻劑攻之之理乎惟其大便不利痞軟滿痛始屬裏病小便不利

嘔逆短氣始屬飲病乃可峻攻發作之作字當是熱字始與太陽陽邪熱飲之義相合若無熱汗出乃少陰陰邪寒飲真武湯證也且作字與

上下句文義皆不相屬當改之○太陽病下之其脈微弱者不結胸者此為欲解也脈微弱者必結胸也脈微弱者必咽痛脈弦者必兩脇拘急脈

緩者頭痛未止脈沉緊者必欲嘔脈沉滑者協熱利脈浮滑者必下血按脈促當是脈浮始與不結胸為欲解之文義相屬脈浮當是脈促始進論中結胸胸滿同義脈緊當是脈細數脈細數當是脈緊始同論中一經本脈脈浮滑當是脉數滑浮滑是論中白虎湯證之脉數滑是

論中下腹血之脈均當改之

太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脈微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胸术者四日復下利此作協熱利也按四日復

下之之字當是利字上文利未止豈有復下之理乎當是之○太陽屬下之後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若汗出微惡寒去芍藥方

中加附子湯主之按微惡寒之上當有汗出二字若無汗出二字乃表未解也無加附子之理當補之○太陽病脈浮而動數滑則為風數則

為熱動則為痛則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遷脇內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣煩躁心中懊

懐陽氣內陷心下因賴則為結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘無汗則頭而還小便不利身必發黃也按數則為虛句衍文也當刪之○寒實結胸無熱証者與三物小陷胸湯白散亦可服按與三物小陷胸湯當是三物白散小陷胸湯四字當是猪苓桔梗貝母巴豆三物

其色皆白有三物白散之義溫而能攻與寒寢之理相合小陷胸湯乃桔梗黃連半夏之品豈可以治寒寢結胸之證耶亦可服三字亦行文也俱當刪之

太陽中篇正誤

發汗病因解反恐寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之按發汗病不解之不字衍文也發汗病不解則當惡寒病解惡寒始可謂虛當刪之○病發熱頭痛脈反沉者不差身體疼痛下利清穀當溫其裏宜四逆湯按身體疼痛之下當有下利清穀四字若無此四字則當溫其裏之文竟無着落矣未有表病而溫裏之理也閏後太陰篇中云傷寒醫下之續得下利清穀不止身痛者急當救裏而遂湯其義亦明遵經補之○傷寒苦汗若吐若下後七八日不解熱結在裏表裡俱熱時汗惡風大渴古上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加入參湯主之按傷寒之下當有若汗二字蓋汗較吐下傷津液為多也時時惡風當是時汗惡風若非汗字則時時惡風是表不解白虎湯在所禁也論中謂發熱無汗表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表証者白虎加入參湯主之細玩經文自知當補之改之○發汗已脈浮數小便不利煩渴者五苓散主之按脈浮數之下當有小便不利四字若無此四字則為陽明內熱口燥之煩渴是白虎湯證也惟其小便不利而煩渴斯為太陽水熱瘀結之煩渴始屬五苓散証若非小便不利而用五苓散則犯重竭津液之禁矣况太陽上篇類此證者數條惟水入即吐一條乃水不下行故無小便不利之文餘皆有小便不利四字今此四字必是傳寫之遺當補之○服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝湯去芍藥加茯苓白朮湯主之按桂當是去芍藥此方去桂將何以治仍頭項痛發熱無汗之表乎細玩其服此湯曰餘依桂枝湯煎服其義自見服桂枝湯已溫覆令一時許通身熱熱微似有汗此服桂枝湯法也若去桂則是白芍甘草茯苓白朮並無辛甘走榮衛之品而曰餘依桂枝湯法無所謂也且論中脈促胸滿汗出惡寒者用桂枝去芍藥加附子湯主之去芍藥者為胸滿也今証雖稍異而滿則同其為去芍藥可知當改之○傷寒醫以丸药大下之身熱不去微煩者施子桂湯主之○傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子乾姜湯當是施子豉湯施子豉湯斷無煩熱用乾姜結痛用香豉之理當移之○太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表証仍在當發其汗麻黃湯去服約已微除其人發煩目眼劇者必衄乃解所以然者陽氣重故也按張兼善曰麻黃湯主之五字不應在陽氣重之下原有衄乃解之後而用麻黃湯之理乎服約已之上並無所服何約之文將此五字移於其上文義始合愚易之○傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗苦頭痛者必衄宜桂枝湯按若頭痛之若字當是苦字古頭痛方為必衄証若是若字則凡頭痛皆能致衄矣當改之○心下痞按之不濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之按之瀉當是按之不濡若按之濡乃虛痞也補之不暇豈有用大黃瀉之理乎當補之

太陽下篇正誤

小青龍湯方加減法內若微利者去麻黃加羌活如雞子大熬令赤色按加羌活如雞子大此必傳寫之誤考本草羌活是羌活類也每用

之功力甚大此五分公今人丁行數十次竟有治偏頭之病利用雞子大之薑枝者當改加於方四兩傷寒下有水氣者用桂附發熱渴小青龍湯去服湯已渴者此寒去欲解也按小青龍湯去之六字當在發熱不渴之下始與服湯已渴者之文義相屬豈有果去欲解而更服小青龍湯之理乎當移之

陽明篇正誤

陽明病脈浮而緊必潮熱發作有時但浮者必自汗出按自汗是陽明証盜汗乃少陽証盜汗應是自汗當改之○陽明病脈遲汗出多發熱微惡寒者表未解也可發汗宣桂枝湯按汗出多之下當有發熱二字若無此二字脈遲汗出多微惡寒乃表陽虛桂枝附子湯証也豈有用桂枝湯發汗之理乎當補之○傷寒脈浮滑此以表有熱裏有熱白虎湯主之按裏有寒之寒字當是氣字若是寒字非白虎湯証也當改之○傷寒右吐右下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視脈滑者生濁者死微者但發熱語者大承氣湯主之若一服利止後服按脈弦者生之弦字當是滑字返為陰負之脈言有必生之理惟滑脈為陽始有生理况滑者通也濁者塞也凡物之理未有不以通為生而塞為死者當改之○太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復恐寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必硬不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之若小便不利渴者宜五苓散按但以法救之五苓散當是若小便不利五苓方與上文小便數及下文渴者之義相屬此條病勢不急救之文殊費無謂昔王三陽亦云此處五苓散難用不然經文渴者之下當有缺文當改之○梔子蘖皮湯方按此方之甘草當是茵陳蒿必傳寫之誤也○太陽病當惡寒發熱今自汗出不惡寒發熱關上脈細數者以醫吐之過也一二日吐之者腹中飢口不能食三四日吐之者不喜麻粥飲食冷食五六日吐之者朝食暮吐以醫吐之所以此為小逆甚欲食冷食之下當有五六日吐之者二字若無此一句則不喜麻粥飲食與朝食暮吐之文不相屬且以上文一二日三四日之文細玩之則可知必有五六日吐之一句由淺及深之義也當補之○寸口脈浮大而醫下之此為大逆浮則無血大則為寒寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲冷水令汗大出按水得寒氣冷必相搏其人必鶴按令汗大出四字當是衍文宜刪之○陽明病識語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也宜大承氣湯下之若能食者但輕耳按宜大承氣湯下之句應在必有燥屎五六枚之下始合若但輕即用大承氣湯下之殊失仲景慎重誤下之旨當移之○陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脹下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嘔一身及面目悉黃小便難有潮熱時時嘔耳前後脰刺之小差外不解病過十日脈續脉續者與小柴胡湯但浮無餘証者與麻黃湯若不承腹滿加噦者不治按續浮之浮字當是弦字始與小柴胡湯法之脈相合若是浮字則上之浮既宜小柴胡湯而下之浮又用麻黃湯不自相矛盾耶當改之○發汗後水藥不得入口為逆若更發汗必吐按必吐不止之下字衍文也當刪之

少陽篇正誤

得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足溫醫三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強小便難者與柴胡湯後必下重本渴而飲水嘔者柴胡湯不中與也食設者噦按食設者噦四字衍文也食噦嘔者有之從無食設噦者之証當刪之○傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不飲食大便硬脈沉細者此為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外証悉入在裏此為半在裏半在外也脈雖沉細不得為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解按脈細富是脈沉細觀本條下文脈沉亦在裏也之亦字自知當補之脈雖沉緊之緊字當是細字觀本條上文並無緊字如何說脈雖沉緊此雖字又何所謂耶當改之○傷寒發熱汗出不解心下痞硬嘔吐而不利者大柴胡湯主之按下利之下字當是不字若是下字豈有上吐下利而猶以大柴胡湯下之者乎當改之○太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡証仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈按許叔微曰大柴胡湯一方無大黃一方有大黃益大黃湯滌蘊軟傷寒中要藥王叔和云不用大黃恐不大便反溏腹微滿脅微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡証以嘔故知極吐下也按王肯堂曰溫溫當是嘔溫又云以嘔下疑有闕文當改之

大陰篇正誤

太陰之為病腹滿而吐食不下時腹自痛若下之必胸下結硬自利益甚按莫人駒曰自利益甚四字當在必胸下結硬之下若在吐食不下之下則是已吐食不下而自利益甚矣仲景復曰若下之無所謂也從而移之○傷寒本自寒按醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾姜黃連黃芩人參湯主之○經論中並無寒下之病亦無寒下之文玩本條下文寒格更逆吐下可知寒下之下字當是格字文義始屬註家皆釋冒寒下利不但文義不屬且與本論之药不合當改之

少陰篇正誤

少陰病飲食入口即吐心中按溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒肢遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒欲乾嘔者不可吐也當溫之宜四逆湯按溫溫當是嘔溫嘔乃吐飲之狀也當改之

厥陰篇正誤

傷寒厥而心下悸者以飲水多宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也按厥而心下悸者之下當有以飲水多四字若無此四字乃陰盛之厥悸非停水之厥悸矣何以即知是水而曰宜先治水耶當補之○傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時此為藏厥非趺厥也趺厥者其人當吐趺今病者靜而復時煩者此為藏寒趺上入其膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者趺聞食臭出其人當自止趺趺厥者烏梅丸主之又主久利按此烏梅丸主久利一症小高少校○傷寒五下

不結胸腹濡脈虛復厥者不可下此為亡血下之死按結胸二字當是大便二字不結胸腹濡脈虛復厥皆無可下之理今曰不可下何所謂也當改之○傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者皆不能食今反能食者恐為除中食以索餅若發熱者知胃氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後三日脈之其熱續在者期之旦日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日復發熱三日並前六日亦為九日與厥相應故期之旦日夜半愈後三日脈之而脈數其然不能者此為熱氣有餘必發瘧也按不發熱者之不字當是若字若是不字即是除中何以下接恐暴熱來出而復去之文耶當改之○傷寒脈遲六七日厥而下利而反與黃芩湯微其熱脈遲為寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必死按傷寒脈遲六七日之下當有厥而下利四字若無此四字則非除中証也況有此四字始與下文反與黃芩湯之義相屬當補之

合病併病篇正誤

三陽合病脈浮大頭關上但歎眠睡目合則汗按浮太上之上字當是弦字始合論中三陽合病之脈若是上字則經論中從無兩寸脈主三陽病之理當改之○三陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不微因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽証不罷者不可下之為逆如此可小發汗設面色綠綠正赤者陽氣怫鬱在表當解之按之若發汗不微不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不微故也更發汗則愈何以知汗出不微以脈濶故知也按重之二字當是以汗二字始與上下文義相屬當改之

壞病篇正誤

本太陽病不解轉入少陽者脇下鞕滿乾嘔不能食往来寒熱尚未吐下脈沉弦者與小柴胡湯若已吐下發汗溫鍼譜語柴胡証能此為壞病知犯何逆以法治之按脈沉弦當是脈沉弦若是沉弦是寒寒在胸當吐之証也惟脈沉弦方與上文之義相屬始可與小柴胡湯當改之○傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞悶脇下痛氣上冲咽喉晝冒經脈動陽者久而成痿按八九日心下痞悶脇下痛氣上冲咽喉三句與上下文義不屬註家皆因有此三句不得不支離蔓衍妄強解釋每見此病總因汗出過多大傷精液而成當用補氣補血益精壯骨之約經年始愈此三句必是錯亂當刪之○汗家重發汗心慌心亂小便已陰疼弱余糧丸按禹餘糧丸為治利之藥與此証不合與禹餘糧丸五字衍文也當刪之○形作傷寒其脉不弦弦而弱弱者必渴被火者必緩語弱者發熱脉浮解之當汗出愈按三弱字當俱是字若是弱字熱從何有不但文義不屬論中並無此說當改之

瘡濕渴病篇正誤

傷寒所致太陽病虛濕渴此三種宜應別論按傷寒所致四字甚無所謂當刪之
太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛症按反惡寒之反字衍文也剛症應惡寒非反也當刪之

霍亂篇正誤

亞寒脈微而復利利不亡陽也四逆加人參湯主之按利止亡血如何用大熱補藥利止應是利不止亡血應是亡陽當改之

辨可下篇正誤

問曰人病有宿食者何以別之師曰寸口脈浮而大按之反濶尺中亦大而濶故知有宿食當下之宜大承氣湯按尺中微字當是大字若是微字斷無可下之理當改之

平脈法正誤

假令脈來微去大故名反病在裏也脈來頭小本大當是脈來大去小上微頭小者當是上微小者為陰盛下微本大者當是下微小者為陽必始與上下之義相當當改之。○寸口衛氣盛名曰高榮氣盛名曰草高草相搏名曰綱衛氣弱名曰慄榮氣弱名曰損衛氣和名曰緩榮氣和名曰遲遲緩相搏名曰遲按名曰沉之沉字應是浊字竚下文可知當改之。○寸口脈緩而遲緩則陽氣長其色鮮其頑光其聲商毛髮長遲則陰氣盛骨髓生血滿肌肉緊按鮮陰陽相抱榮衛俱行則柔相得名曰強也按薄鮮硬二字不能同應是衍文當刪之。○北方腎脈其形何似師曰腎者水也名曰少陰其脈沉滑是腎脈也腎病自得沉滑而濡者愈也按東南西方皆有其文惟缺北方微經文補之。○問曰愈愈沉名曰滑何謂也師曰腎為純陰翁為正陽陰陽和合故令脈滑關尺自平陽明脈微沉飲食自可少陰脈微滑得者乘之浮名也此為陰定其人必股內汗出陰下濕也按滑者繁之浮名也此為陰定二句與上下之義不屬當是錯簡。○陽脈微陰脈弱者則血虛血虛則筋急也其脈弱者榮氣微也其脈弱而汗出如流珠者衛氣衰也按陽脈浮其脈浮之二浮字當是濡字若是浮字則與衛氣衰汗出如流珠之義不屬其脈沉之沉字當是濡字若是沉字則與血虛榮氣微之義不屬當改之。○師曰病家人來請云病人發熱煩極明日師到病人向壁卧此熱已去也設令脈不和處言已愈按不和應是自和若不和如何言愈當改之

辨脈法正誤

脈來緩時一止復來者名曰結脈來數時一止復來者名曰促陽盛則促陰盛則結此皆病脈脉按之來緩時一止復動者名曰結又脈來動而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也按脈按之來緩時一止復動者曰結陰也數語文義不順且前論促結之脈已明衍文也當刪之。○陽陰相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒者此三焦傷也若數脈見於關上上下無頭尾如豆大厥動按名曰動也按陽動則汗出二字當是發熱二字陰動則發熱二字當是汗出二字陽加於陰謂之汗過經移之。○脈陰陽俱緊主於吐利其脈獨不解緊去入安此為欲解若脈遲至六七日不欲食此為晚發水停故也為未解食自可者為欲解按緊去入安之入字當是人字人安謂不吐利也此為晚發水停故也二句與上下文義不屬應是衍文當改之。○脈浮而數字為風數為虛風為熱虛為寒

風虛相搏則酒淅惡寒也。此數為虛之虛字應是熱字。風為熱虛為寒。二句應是衍文。風虛相搏之虛字亦應是熱字當改之。○寸口諸微亡者。諸濡亡血。諸弱亡氣。諸緊為寒。諸乘寒者則為厥。諸冒不仁。以胃無穀氣脾濁不通口急不能言戰而慄也。按諸濡亡血當是諸濡衛虛。諸弱發熱當是諸弱榮虛。濡浮而無力候陽虛也。豈有亡血之理。弱沉而無力候陰虛也。豈止發熱而已。當改之。○師曰。病人脈微而濁者。此為醫所病也。大發其汗又數大下之。其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時。夏月盛熱欲著複衣。冬月盛寒欲裸其身。所以然者。陽微則惡寒。陰弱則發熱。此雖發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱。五月之時。陽氣在表。胃中虛冷。以陽氣內微不能勝熱故欲裸其身。又陰脈遲濁故知血亡也。按又陰遲脈濁故知血亡也。二句與上文義不屬衍文也。當刪之。○寸口脉弱而遲弱者。衛氣微遲者。禁中寒。榮為血寒。則發熱衛為氣氣微者心內飢而虛滿不能食也。按條末心內飢而虛滿不能食者。陽氣微弱者禁中寒。當是脾中寒。當是脾中寒上下文義始屬榮為血。且有血寒發熱之理。衛為氣微者皆不成文。今悉易之。當是陽氣微弱者。當是陽氣微弱者。當下利何以知之。若脈浮大者。氣實血虛也。今趺陽脈浮而濁。故知脾氣不足。胃氣虛也。以少陰脈沉而浮。纔見此為調脈。故稱如經也。若反滑而數者。故知當尿脹也。按若脈浮大者。氣寒血虛也。二句與上下文義不屬。當刪之。少陰脈弦而浮。宣可謂如經乎。當改沉滑二字。○趺陽脈伏而潛伏則吐逆水穀不入。濁則不得入。小便名曰關格。并水穀不化之化字。當是入字。若是化字。是能食也。何名曰格食。不得入當是不得小便。若有小便是水道通也。何名曰關。悉改之。○趺陽脈緊而浮浮為氣緊為寒。浮為腹滿。當為絞痛。浮緊相搏腸鳴而轉轉即氣動膈氣乃下少陰脈不出其陰腫大而痛也。按陰腫大而虛之虛字應改痛字細玩自知。

太陽上篇存疑

病在陽應以汗解之。反以冷水噀之。若灌之。其熱被却不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水反不渴者。服文蛤散。若不差者。與五苓散。身熱皮粟不解。欲引衣自覆者。若水以噀之。洗之益令熱被却不能出。當汗而不汗。則煩假令汗出。已腹中痛。與芍藥三兩。如上法。

太陽下篇存疑

太陽病二日反躁反熱其背而大汗出。大熱入胃。胃中水竭躁煩必發譖語。十餘日振慄自下利者。此為欲解也。故其汗從腰以下不得汗。欲小便不得反嘔。欲失溲足下惡風。大便短小。便當數而反不數。及多大便已。頭卓然而痛。其人足心必熱。穀氣下流故也。下之後復發汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜不嘔。不渴不渴無表証脈沉微。身無大熱者。乾姜附子湯主之。○發汗若下之病仍不解。煩躁者。伏苓四逆湯主之。

傷寒腹滿譖語寸口脈浮而緊。此肝乘肺也。名曰橫刺期門。傷寒發熱。當當惡寒者。大渴欲飲水。其腹必滿。自汗出。小便利。其病欲解。此肝乘脾也。名曰縱刺期門。

陽明篇存疑

病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解合熱則消數喜飢至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯若脈數不解而下不止必脇熱便腹血也○脈浮而芤浮為陽芤為陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絕○陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛○陽明病但頭眩不惡寒故能食而咳其人咽必痛若不欬者咽不痛

少陰篇存疑

少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

壞病篇存疑

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳痙急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾姜湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譴語者少與調胃承氣湯若重浮復加燒鍼者四逆湯主之問曰証象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脰拘急而譴語師言夜半手足當溫兩脚當伸後如師言何以知此答曰寸口脈浮而大浮為風大為虛風則生微熱虛則兩脰掣病形象桂枝因加附子參其問增桂令汗出附子溫經之陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明內結譴語煩亂更飲甘草乾姜湯夜半陽氣還兩足當熱脰尚微拘急重與芍藥甘草湯爾乃脰伸以承氣湯微濟則止其譴語故知病可愈傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者為難治麻黃升麻湯主之○傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譴語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之○微數之脈慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐寢血散脈中火氣雖微內攻有力任骨傷筋血難復也○脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而感病從腰以下必重而癆名火逆也○傷寒脈微醫以火逼劫之亡陽必驚狂起卧不安者桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯主之

瘧濕篇存疑

濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死

太陽中暍者身熱渴重而脈微弱此亦夏月傷冷水水行皮中所致也

辨不可汗病篇存疑

脈濡而弱弱反在關濡反在腕微反在上澑反在下微則陽氣不足濶則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩濶則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠○脈濡而弱弱反在關濡反在腕微反在上微反在下弦為陽運微為陰寒上實下虛欲得溫微弦為虛不可發汗發汗則聲亂咽嘶古萎聲不得前欬者則劇數吐涎沫咽中必乾小便不利心中飢煩時而發其形似瘧有寒無熱虛而寒栗欬而發干啞而渴中腹堅

脈濡而弱反在關濡反在頭微反在上濶反在下微則陽氣不足濶則無血厥而且寒陽微不可下下之則心下痞悞○脈濡而弱反在關濡反在頭弦反在上微反在下弦為陽運微為陰寒上實下虛意欲得溫微弦為虛虛者不可下也○脈濡而弱反在關濡反在頭浮反在上數反在下浮為陽虛數為無血浮為虛數生熱浮為虛自汗出而惡寒數為痛振而寒慄微弱在關胸下為急喘汗而不得呼吸吸之中痛在於脇振寒相搏形如瘧狀醫反下之故令脈數發熱狂走見鬼心下為痞小便淋漓少腹甚軟小便則尿血也○脈濡而緊濡則衛氣微緊則榮中寒陽微衝中風發熱而惡寒緊氣令微溫心內煩醫為有大熱解肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅寒裏俱虛竭卒起而頭眩各熱在皮膚快不得眠不知胃氣冷繁寒在關元技巧無所施及水溼其身客氣因時罷憊而振寒重被而覆之汗出而胃廟體惕而又振小便為微難寒氣因水發清穀不客間嘔變反腸出頭倒不得安手足為微逆身冷而內煩遲欲從後救安可復追還○脈浮而大浮為氣實太為血虛血虛為無陰孤陽獨下陰部者小便當亦而難胞中當虛今反小便利而大汗出法應衛家當微今反更實津液四射禁竭血盡乾煩而不得眠血薄肉消而成暴液醫復以毒藥攻其胃此為重虛客陽去有期必下如污泥而死○傷寒脈陰陽俱緊惡寒發熱則脈欲厥厥者脈初來大漸小更來漸大是其候也如此者惡寒甚者翕翕汗出喉中痛若小便難者為危殆○傷寒發熱口中動動氣出頭痛目黃衄不可制貪水者必嘔惡水者厥若下之咽中生瘡假令手足溫者必下重便腹血亦脈多睛不慧醫復發之咽中則傷若復下之則目閉食水者若下之其脈必厥其聲嚙咽喉塞若發汗則戰慄陰陽俱虛惡水者若下之則裡冷不嗜食大便完穀出若發汗則口中傷舌上白胎煩燥脈數實不大便六七日後必便血若發汗則小便自利也○微則為然然則吐涎下之則欬止而利因不休利不休則胸中如蟲齧粥入則出小便不利兩脅拘急喘息為難頭背相引脅則不仁極寒反汗出身冷若冰眼睛不慧語言不休而穀氣多入此為除中口雖欲言舌不得前○脈數者久數不止止則邪結正氣不能復正氣却結於藏故邪氣之與皮毛相得脈數者不可下下之必煩利不止○傷寒發熱頭痛微汗出發汗則不識人重之則喘不得小便心腹滿下之則短氣小便難頭痛背強加溫鍼則衄○下利脈大者虛也以強下之故也設脈浮革因而腸鳴者屬當歸四逆湯

陶隱居醫別錄合藥分劑法則

凡言剉如麻豆大者與㕮咀同意夫㕮咀古之制也古人無鐵刀以口咬細令如麻豆為粗藥煎之使藥水清飲於腸中則易升易散今人以力剉如麻豆大此㕮咀之易成也○古秤惟有銖兩而無名分則以十黍為一銖每鉢約合四分六銖為一分即今之二錢半也二十四銖為一兩去一厘之毫六銖為一分去一厘之毫分成一兩十六兩為一斤李果曰六銖為一分即今之二錢半也二十四銖為一兩今方家言分者非分兩之分謂諸藥動兩多少皆同爾多是丸散用之○丸散云刀圭云三兩即今之一兩云二兩即今之六錢半也

徑六分深入分內散藥物按抑之正爾微動令平滿李時珍曰古之一升即今之一合半也○凡方云巴豆若干枚者粒有大小當去心皮搗之以一分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩准一枚櫟實若干枚者去穰畢以一分准一枚橘皮一分准三枚棗大小三枚准一兩乾姜一累者以一兩為正○凡方云草夏一升者況畢稱五兩為正蜀椒一升三兩為正吳茱萸一升五兩為荳蔻絲子一升九兩為正桂圓子一升四兩為止蛇床子一升三兩半為止地膚子一升四兩為正其子各有虛實輕重不可秤准者取半升為正○凡方云用桂一尺者削去皮重半兩為止甘草一尺者二兩為正百合草一束者三兩為正云一把者一兩為正○凡煎湯藥初欲微火令小沸其水數依方多少大略藥二十兩用水一斗者煮取四升以此為准然利湯欲生少水而多取汁補湯欲熱多水而少取汁服湯宜小沸熱則易下冷則嘔涌○凡云分再服三服者要令熟冷相及并視人之強弱羸瘦病之輕重為之進退增減不必局於方說則活潑發地也○凡九藥云如細麻者即胡麻也不必扁扁略相稱爾秦東亦然云如大麻子者准三細麻也如胡豆者即青班豆也以二大麻准之如小豆者令赤小豆也以三大麻准之如大豆者以二小豆准之如梧桐子者以二大豆准之如彈丸及雞子黃者以四十梧子准之○凡方云蜜一斤者有七合猪膏一斤者有一升二合也

附二陽三陰經脈各圖



膀胱足太陽之脈起於目內眞上額交顛其直者從顛入絡腦還出別下項循肩髀內俠脊抵腰中入循督絡腎屬膀胱其直者從腰中下俠脊入腦中其支者從髀內左右別下貫脾俠脊內過脾樞循髀外從後廉下合膕中以下貫腨內出外踝之後循京骨至足跗入中指外間其支者下廉穴三寸而別下入中指外間其支者別跗上入大指間出

膽足少陽之脈起於目鏡胥上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出手少陽之後入次筋其支者從耳後入耳中出走耳前至目鏡胥後其支者別走督下入迎合

足少陽膽經圖

足太陰脾經圖

足少陰腎經圖

足厥陰肝經圖



足厥陰肝經

足太陰脾經圖



足太陰脾經

足少陰腎經圖



足少陰腎經



足少陽膽經

橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胸過季脇下合髀厭中以下循髀厭出膝外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指次指之間其支者別附上入大指之間循大指歧骨內出其端還貫爪甲出三毛

脾足太陰之脈起於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上膍內循胫骨後交出厥陰之前上膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中

腎足少陰之脈起于小指之下斜趨足心之湧泉穴出於然谷之下循內踝之後別入

跟中以上膍內出膍內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨挾古本其支者從肺出絡心注胸中

肝足厥陰之脈起於大指聚毛之上上循足跗上廉去內踝一寸上踝八十步交出太陰之後上膍內廉循股陰入毛中過陰器抵小腹俠胃屬肝絡脛上貫膈布腸循喉嚨之後上入頸頸連目系上出額與督脈會於顙其支者從目系下煩裏環唇內其支者復從肝別貫膈上注肺附傷寒刺灸等穴圖

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈按風池在頸後

風府

後者謂伏玉枕傍骨下髮際內大筋外陷中按引耳中是也足少陽

陽維之會宜刺三分

肌肉厚者可五分留七呼禁灸

風府一穴在項髮際上一寸大筋內

此陰陽門穴本經由此穴內行而挾胃屬肝

上入頭頸

還絡於筋也

上頭頸

會陽維者謂諸陽之總也刺之諸陽之氣得泄何患太陽之邪不去哉

太陽風池風府穴圖



太陽病頭痛至七日已上自愈者以行其經盡故也若欲作再經者針足陽明使經不傳則愈按仲景云鍼足陽明成註未明指其穴攷之龐氏總病論云補足陽明三里穴推其意得補則經氣實而不傳殊不知仲景之意針足陽明為逆而奪之以泄其經之熱使熱邪得泄不至再傳他經故曰愈也龐氏不明用鍼之理以泄為補恐誤矣又攷張氏續論云刺足陽明衝陽穴衝陽者即仲景所謂趺陽脈也有診法而不言刺張氏之言實本史氏傷寒論註不足法也三里二穴在膝眼下三寸脛骨外廉兩筋間宛宛中坐而豎膝低跗取之極重按之則跗上動脈即止是其穴也可刺五分留七呼

傷寒腹滿譫語舌口脈浮而躁此肝乘脾也名曰縱刺期門

傷寒發熱嘔吐惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫刺期門

婦人中風惡寒發熱經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸腋下滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之

陽明病下血嘔逆者此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之激然汗出則愈太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞硬者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則譫語脈弦五六日譫語不止當刺期門按圖經云期門一穴在不容傍一寸五分乳直下第二肋骨端近腹處是其穴也第二肋者從下數至第二肋也肋骨端著在軟肋骨末之端也刺四分肥人量之

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞硬者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則譫語脈弦五六日譫語不止當刺期門太陽少陽併病心下痞項強而眩者當刺大椎肺俞肝俞慎勿下之按圖經云督脈大椎穴在第一椎上陷中可刺五分留三呼泄五吸肺俞二穴在第三椎下兩傍相去各一寸五分可刺三分留七呼停氣即泄肥人可刺五分肝俞二穴在第九椎下兩旁相去各一寸五分可刺三分留六呼仲景太陽少陽併病乃合邪也故刺大椎肺俞肝俞亦合泄之法也

太陽刺風池風府穴圖



太陽刺風池風府穴圖



禹制



圖穴信交門陰灸太陰刺灸少陰刺灸高關穴圖



禹制
太衝
氣海
交信

卷十八

訂正仲景金匱要略註上之一

傷寒論論傷寒金匱要略論雜病乃仲景金匱要略論之。仲景未言當灸何穴常器之。當灸是足太陽高關二穴專灸背惡寒其穴在第七椎下兩傍相去各三寸。當中正坐取之可灸五壯。蓋以太陽為少陰之表故外灸高關以溫其表內用附子以溫其裏也。

少陰病得之二三日口中和其背惡寒者當灸附子湯主之。按當灸之仲景未言灸何穴。當器之。當灸是足太陽高關二穴專灸背惡寒其穴在第七椎下兩傍相去各三寸。當中正坐取之可灸五壯。蓋以太陽為少陰之表故外灸高關以溫其表內用附子以溫其裏也。

禹制

少陰病吐利手足不厥冷反發熱者不死脈不至灸少陰七壯。按灸少陰七壯仲景未言灸何穴。當灸之。當灸是足太陰太谿二穴經曰腎之原出於太谿其穴在內踝後踝骨動脈陷中。

少陰病下利便腹血者可刺。按可刺仲景未言可刺何穴。常器之云可刺足少陰鴻門交信郭壅曰可灸放鴻門二穴在鳩尾下一寸。鴻門兩傍各五分商者中治漏利腹血刺五分灸五壯。交信二穴在內踝上二寸少陰前太陰後廉筋骨間治漏利亦白刺四分留五呼灸三壯。兩說皆是。少陰病下利脈微濶而汗出必數更衣反少者當灸其上灸之。按灸之仲景未言當灸何穴。當品之。當灸太衝郭壅灸太谿此穴皆不治嘔而汗出裏急下利惟鴻門主治乾噫嘔吐裏急下利亦當灸鴻門為是。

傷寒六七日脈微手足厥冷煩躁父厥陰厥不還者死。按父厥陰仲景未言當灸何穴。常器之。奇灸太衝以太衝一穴為足厥陰之所注凡病診太衝脈可決人之生死其穴在足大指本節後一寸附間陷者中動脈應手足其穴也灸三壯。

傷寒脈促手足厥者可灸。按可灸之仲景未言當灸何穴。常器之云太衝穴前條手足厥逆灸太衝此條亦手足厥逆亦當灸太衝。

註釋但其文義古奧條千載惑篇錯簡頗多疑義闕文亦復不少承謬襲謬隨文蔓衍宜後人視為迂遠東諸高闕今於其次序之殘缺

者補之博採羣書詳加註釋俾一書並行於世庶後之業書者不為俗說所誤知仲景能治傷寒未嘗不能治雜證也

藏府經絡先後病脈証第一

夫人秉五常因風氣而生長風氣雖能生萬物亦能害萬物如水能浮舟亦能覆舟若五藏元真通暢人即安和客氣邪風中人多死千般疾難不越三條一者經絡受邪入藏府為內所因也二者四肢九竅血脉相傳壅塞不通為外皮膚所中也三者房室金刀蟲獸所傷以此詳之病由都盡若人能養慎不令邪風干忤經絡適中經絡未流傳藏府藏即醫治之四肢縱覽重滯即導引吐納鍼灸膏摩勿令九竅閉塞更能無犯王法禽獸災傷房室勿令竭乏服食節其冷熱苦酸辛寒不違形體有喪病則無由入其腠理腰者三焦通會元真之處為血氣所注理者是皮膚藏府之文理也按此篇乃一書之綱領前人誤編為次篇先後失序今冠於首以統大意註五常者五行也五行之氣風暑燥濕寒也五行之味酸苦甘辛鹹也夫人稟此而有其形則藏府日與氣味相通不曰五氣而曰風氣者該他氣而言也蓋風貫四氣猶仁貫四德故曰因風氣而生長也然風氣雖能生萬物亦能害萬物者也客氣邪風從其衝後而來主殺害萬物者也人在氣交之中其生其害猶水能浮舟亦能覆舟也天之五氣人得之則為五藏真元之氣若通暢相生雖有客氣邪風勿之能害人自安和如不通暢則為盜邪風乘隙而入中人多死然人致死之由雖有千般疢難大要不外三因一者中虛經絡受邪即入藏府此為內所因也二者中實雖感於邪藏府不受惟外病軀體四肢九竅血脉壅塞此為外所中也三者房室金刀蟲獸所傷非由中外虛實感召其邪是為不內外因也以此三者詳之千般疢難病由來盡若人能慎養形氣不令客氣邪風干忤經絡即苗中經絡未傳藏府遂醫治之自可愈也四肢九竅縱覽重滯尚未閉塞即導引吐納針灸按摩亦可愈也更能無犯王法禽獸災傷房室勿令竭乏服食節其冷熱五味各得其宜不使形氣有衰萬病疢難無由而入其腠理矣腰者一身空隙血氣往來之處三焦通會真元之道路也理者皮膚藏府内外井然不亂之條理也按正風者從八方應時而來相生和緩之正氣也邪風者從其衝後而來相剋衝烈之客氣也如時當東風而來西風也所謂後者以已過之時言也集註趙良曰人在氣交中秉地之剛柔以成五藏百骸之形秉天之陰陽以成一經之氣形氣合一神機發用駕行營氣出入內外同乎天度升降沉浮應夫四時主掌於身形之中謂之元真外感者客氣也靈樞曰虛邪不能獨傷必因身形之虛而後客之蓋天人之氣各有正不正人氣正則不受邪不正則邪乘之天氣正則助其生長不正則害之人氣不正者由七情動中服食不節房慾過度金刀蟲獸傷其氣血盡足以受病也天氣不正者由四時不和八風不常盡足以傷萬物也

問曰上工治未病何也師曰夫治未病者見肝之病知肝傳脾當先實脾四季脾王不受邪即勿補之中工不曉相傳見肝之病不解實脾惟治肝也夫肝之病補用酸助用焦苦並用甘味之藥調之酸入肝焦苦入心甘入脾脾能傷腎腎氣微弱則水不行水不行則心火氣盛心火氣盛則傷肺肺被傷則金氣不行金氣不行則肝氣盛肝氣盛則肝自愈此治肝補脾之要妙也肝虛則用此法實則不在用之經曰虛虛實實

如現在肝病此已然之病也肝病將來傳脾此未然之病也良醫知肝病傳脾見人病肝先審天時衰旺次審脾土虛實時旺脾實則知不受肝邪不須補脾直治已病之肝若時衰脾虛則知肝必傳脾先補未病之脾兼治已病之肝彼常醫不曉四時所勝五藏相傳之理見肝之病惟瀉已病之肝不知補未病之脾也上工不但知肝實必傳脾虛之病而且知肝虛不傳脾虛反受肺邪之病故知肝虛脾虛之病則用酸入肝以補已病之肝用焦苦入心以助不病之心用甘入脾以益不實之脾使火生土使土制水水弱則火旺火旺則制金金被制則木不受邪而肝病自愈矣此尤則善承乃制制則生化化生不病之理隔二隔三之治故曰此治肝補脾之要妙也然肝虛則用此法者若肝實則不用此法也中工不曉虛實者渴之是為虛虛寔者補之是為實實非其義也上工知其虛實補其不足損其有餘是其義也其餘四藏皆準此法傷字作制字看集註徐彬曰假如肝經之病肝木勝脾土知邪必傳脾經治宜實脾為先此脾未病而先實之所謂治未病也不要本藏之虛而憂相傳不已其病益深故先以實脾為急務也○程林曰經云因其輕而揚之因其重而減之因其衰而彰之所謂因者乘其機也治未病者謂治未病之藏府非治未病人也見肝之病當先寔脾使土旺則能勝水水不行則火盛而制金金不能干木肝自愈矣此治肝補脾治未病之法也○高世栻曰實脾專為制水使火盛金衰肝不受制則肝自愈其理甚精微故曰此治肝補脾之要妙也○問曰病人有氣色見於面部顧聞其說師曰鼻頭色青腹中痛苦冷者死一云腹中冷鼻頭色微黑者有水氣色黃者胸上有寒色白者亡血也設微亦非時者死其目正圓者座不治又色青為痛色黑為勞色赤為風色黃者便難色鮮明者有留飲氣色見於面部而知病之死生者以五氣入鼻藏於五藏其精外榮於面也色者青赤黃白黑也氣者五色之光華也氣色相得者有氣有色平人之色也即經云青如翠羽赤如雞冠黃如鱗黃白如豚膏黑如烏羽者生也氣色相失者色或淡濶氣或顯晦病人之色也即經云浮澤如外沉濁而內察其浮沉以知淺深察其天澤以觀成敗察其散搏以知新故視色上下以知病處色粗以明沉沉為甚不明不澤其病不甚也有色無氣者色枯不澤死人之色也即經云青如藍葉黃如黃土赤如衃血白如枯骨黑如良者死也鼻者明堂也明堂充澤則無病矣而曰見青色為腹中痛鼻苦冷甚者死黑色為水為勞黃色為上寒下熱小便難面目鮮明內有留飲色白為亡血色赤為熱為風若見於父為非其時者死目直視正圓不合如魚眼者瘦不治此氣色主病之大略也其詳皆載內經○師曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病語聲喧噏然不徹者心膈間病語聲啾啾然細而長者頭中病一作按頭中病之頭字當是腹字經中並無頭中病之文且文義不屬必是傳寫之誤註病人語聲寂然謂寂然不語也若惡人語是心病也喜驚呼者謂不惡人語且喜驚呼是知其病不在心而在外也故曰骨節間病也病人語聲喧噏然不徹者謂聲不響亮而不全徹也此有礙心中堅息引胸中上氣者歟息張口短氣者肺痿唾沫甚者一呼一吸也搖肩謂抬肩也心中堅謂胸中壅滿也呼吸之息動形抬肩胸中壅滿者喘病也呼吸引胸中之氣上逆喉中作聲梗氣者歟病也呼吸張口不能續息似喘而不抬肩者短氣病也益肺氣壅滿邪有餘喘也肺氣不續息正不足之短氣也然不足之喘亦有不續息者有餘之短氣亦有胸中壅滿者肺氣上逆者歟也咳時唾疾噏也若咳嗽

涎沫不已者非欬病也乃肺痿也○師曰吸而微數其病在中焦實也當下之即愈痿者不治在上焦者其吸促在下焦者其吸遠此皆難治呼吸動搖振振者不治按吸促之促字當是遠字吸遠之遠字當是促字方合病義必傳寫之謬註此承上文言喘分三焦有可治不可治之辨也喘肺病也肺主氣司呼吸故以呼吸氣促謂之喘也若呼吸氣均促是病在呼吸升降之氣也故知喘在中焦也呼之氣促吸之氣長病在呼出心與肺故知喘在上焦也呼之氣長吸之氣短病在吸入腎與小故知喘在下焦也喘之實者謂邪氣盛則寢也中實則必腹滿便難當下之可治也喘之虛者謂正氣奪則虛也中虛則必腹軟便甚不堪下難治也若喘而呼吸動搖振振不能擎身者則為形氣不相保勿論虛實不治也曰吸而微數數即促也促即短也遠即長也吸不言呼略詞也猶言呼吸均短呼短吸長吸短呼長也○師曰寸口脈動者因其王時而動假令肝王色青四時各隨其色肝色青而反色白非其時色脈皆當病註寸口者統言左右三部脈也脈動發乎四時命乎五藏然必因其王時而動則為平脉也假令肝旺於春隨其時色當青脈當遠此不病之色脈也若色反白脈反浮此非其時乃病之色脈也四時準此註集尤怡曰王時當時至而氣旺乃脈乘之而動其色亦應之如肝王於春脈弦而色青此其常也推之四時無不皆然若色當青而反白為非其時而有是色不特肝病為然即肺亦當病矣問曰有未至而至有至而不至有至而不去有至而太過何謂也師曰冬至之後甲子夜半少陽起少陽之時陽始生天得溫和以未得甲子天因溫和此為未至而至也以得甲子而天大寒不解此為至而不去也以得甲子而天溫如盛夏五六月時此為至而太過也註久至之後得甲子日夜半少陽之氣始生天漸溫和氣之常也若未得甲子天即溫和此為未至而至也氣未應而先至者是來氣有餘也已得甲子陽氣漸盛天未溫和此為至而不至也氣應至而不至者是來氣不足也若天大寒不解此為至而不去也氣應去而不去者是去氣太過也若天過溫如盛夏時此為至而太過也所謂僅候其時氣可與期餘皆倣此○師曰病人脈浮者在前其病在表浮者在後其病在裏腰痛背強不能行必短氣而極也註脈浮虛羸之候也關前之寸脈浮者病在表也關後之尺脈浮者病在裡也虛風在表故主腰痛背強不能行也云獨行厥陽何謂也師曰此為有陽無陰故稱厥陽設陰陽偕行順也陰陽獨行逆也厥逆也逆陽獨行此為有陽無陰故稱厥陽也註李東垣之氣也象建則亂於胸中故忽然猝仆名曰卒厥若舌青身冷為入藏即死如身和汗自出為入府即愈也寸脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏血氣入藏即死入府即愈此為卒厥何謂也師曰唇口青身冷為入藏即死如身和汗自出為入府即愈也寸脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏之十八字文理不順衍文也血氣入藏之血字當是厥字始與卒厥相合必傳寫之謬也註此詳申陽厥陰厥生死之義也厥氣者逆氣也即逆陽而陰之氣也象建則亂於胸中故忽然猝仆名曰卒厥若舌青身冷為入藏即死如身和汗自出為入府即愈也

即愈也註沈明宗曰邪氣入藏神明昏憯半倒無謂之卒厥若唇口青身冷神機不能出入藏氣亦絕所以死經曰血氣並走於上則為大厥暴厥是也若身和汗出乃邪氣入府不得出入一時卒倒非厥絕之比項時陽機外達邪氣隨之外洩故知入府即愈○問曰脈脫入藏即死入府即愈何謂也師曰非為一病百病皆然譬如浸淫瘡從口起流向四肢者可治從四肢流來入口者不可治病在外者可治入裏者即死註此詳申入藏即死入府即愈之義也卒厥之病多脈脫而不見脈脫不見而死者是正氣不反也脈脫不見而生者是邪氣閉而復通也非為厥氣一病自病入藏入府皆然也譬如浸淫瘡風等瘡從口起流向四肢可治從四肢流來入口者不可治也蓋以病向外者易治病入裏者難醫亦此義也註趙良曰脫者去也經脈乃藏府之隧道為邪氣所逼故絕氣脫去其脈而入于內五藏陰也六府陽也陰主死而陽主生所以入藏即死入府即愈而可治非惟藏府之陰陽為然也凡内外陰陽之邪毒出入表裏者皆然也○徐彬曰凡病邪能出陽為溼故生閉陰不出為深故死非止一病百病皆然復以浸淫瘡喻之若從口起而流向四肢者是邪從內發於外淺而不進故可治若從四肢起流入口者是邪由外入於內進而不淺此藏氣傷敗故不可治○問曰陽病十八何謂也師曰頭痛項悶脊背脚掣痛陽病十八何謂也師曰欬上氣喘噦咽腸鳴脹滿心痛拘急五藏病各有十八合為九十病人又有六微微有十人病合為一百八病五勞七傷六極婦人三十六病不在其中清邪居上濁邪居下大邪中表小邪中裏繫飪之邪從口入者宿食也五邪中人各有法度風中於前寒中於暮濕傷於下霧傷於上風令脈浮寒令脈急濡傷皮腠濕流關節食傷脾胃極寒傷經極熱傷絡按字典無繫字當是繫字繫音傾側水也復之積聚門繫氣之繫字亦誤註此章曰十八曰九十等文乃古醫書之文今不可改難以強釋五勞七傷等說亦詳在千金故不復註也頭痛項腰脊臂腳掣屬筋在外故為陽病也欬上氣喘噦咽腸鳴脹滿心痛拘急皆在內故為陰病也清邪居上謂霧邪本乎天也濁邪居下謂濕邪本乎地也六淫天邪故名曰大邪六淫傷外故曰中表也七情入邪故名小邪七情傷內故曰中裏也繫飪者飲食也飲食之邪從口而入食傷隔夜不化故名曰宿食也五邪謂風寒濕霧飲食也天五邪之中人莫不各以類而相從前者早也風中於早從陽類也寒中於暮從陰類也霧邪清轉故傷皮膚濕邪濁重致流關節飲食失節故傷脾胃極寒之食傷經以經屬寒也極熱之食傷絡以絡屬陽也○問曰病有急當救表者何謂也師曰病醫下之續得下利清穀不止身體疼痛者急當救裏後身體反痛消便自調者急當救表也註詳見傷寒論太陰篇內不復釋夫病痼疾加以卒病當先治其卒病後乃治其痼疾也註痼疾舊病也卒病新疾也當以舊病為本為緩新疾為標為急急則治標緩則治本故先治平病後治痼疾也註趙良曰痼疾病已沉痼非旦夕可取效者卒病謂卒然而來新感之病可取效者旦夕者乘其所入未深急去其邪不使稽留而為患也且痼疾之人正氣素虛邪氣尤易傳移瞻顧致令兩邪相合為患不淺故仲景立言於此使後學者知所先後也○沈明宗曰此有舊疾復感新邪當分先後治也痼疾者邪氣堅固難拔卒者邪氣驟至而易去也若病者素有痼疾而忽加卒病務當先治卒病不使邪氣相伴轉增痼疾但久病乃非朝夕可除須當緩圖所以後乃治其痼疾也註此明五藏各有所得而愈言以

情志相勝也即如怒傷肝得悲而愈此非勝怒也亦有得之時日而愈者經曰病在肝愈於夏是喜得子氣制其勝我者也夏不愈勝於秋是惡其勝我者得王氣也秋不死持於冬是喜得母氣以生我也起於春是自喜得其位而氣王也餘藏倣此病者云謂平素不愛食之物及當病之時而反暴思食是病邪藏氣之變故雖思食而食之必發熱也註程琳曰內經云肝色青宜食甘心色赤宜食酸肺色白宜食苦脾色黃宜食鹹腎色黑宜食辛此五藏得飲食而愈者肝病愈于丙丁起於甲乙心病愈於戊己起於丙丁脾病愈於庚辛起於戊己肺病愈於壬癸起於庚辛腎病愈於甲乙起於壬癸此五藏自得其位而愈者五藏所患心惡氣肺惡寒肝惡風脾惡濕腎惡燥各隨其所惡而不喜者為病也若病人素不食而暴食之則於陰長氣於陽必發熱也○夫諸病在藏欲攻之當隨其所得而攻之如渴者下當有小便不利四字必傳寫之遺也註藏者裏也凡諸病在裏有可攻之證雖欲攻之當隨其所得之輕重而攻之不可率意而攻之也如渴者小便不利先與指冷湯利其小便候小便利乃可攻也餘皆倣此謂他証或有未可遽攻者皆倣此也

瘧濕喝病脈證并治第二

病者身熱足寒頭項強急惡寒時頭熱面亦目赤獨頭動搖卒口噤背反張者瘧病也若發其汗者寒濕相搏其表益虛即惡寒其發其汗已汗六句與上文義不屬與後之十一條中為欲解脈故反伏弦者瘧句又義相屬宜分於彼註病人身熱惡寒太陽証也頭項強急面亦目赤陽明証也頭熱陽鬱於上也足寒陰凝於下也太陽之脈循背上頭陽明之筋上挾於口風寒客於二經則有頭搖口噤反張拘急之証矣此皆瘧病之形証故首揭之以為要領註李氏曰手三陽之筋結於頸項足陽明之筋上挾於口風寒乘虛入其筋則攣故牙關急而口噤夫瘧脈按之緊如弦直上下行註瘧之為病其狀勁急強直故其脈亦勁急強直按之緊勁急之象也如弦直行之象也脈經云瘧家其脈緊弦直上下者以瘧病屬太陽表也脈經所云其脈伏堅直上下者以瘧病屬陽明裏也蓋瘧家原屬一經故有太陽葛根湯汗之陽明大承氣湯下之治也伏堅沉實也直上下弦直也即沉實弦直之脈也

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧太陽病發熱汗出而不惡寒者名曰柔瘧按反惡寒之反字衍文也玩瘧病之條自知當惡寒也註瘧病既屬太陽當以太陽虛實例之故曰太陽病發熱無汗惡寒為實邪白剛瘧者強而有力也發熱汗出不惡寒為虛邪名曰柔瘧者強而無力也○太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口禁不得語欲作剛瘧葛根湯主之註此申明剛瘧在表以明其治也太陽病為頭項強痛發熱等證也無汗謂傷寒也太陽傷寒小便不當少今反少者是寒氣盛而收引也不當氣上衝胸今氣上衝胸是寒氣盛而上逆也不當口噤不得語今口噤不得語是寒氣盛牙關緊急而甚也以太陽傷寒而有此衝擊勁急之象是倣作剛瘧之病也麻黃湯能治太陽而不能治陽明故以葛根湯兼太陽陽明兩經之治為剛瘧無汗之正法也○瘧為病胸滿口噤卧不著席脚掣急必齶齒可與大承氣湯註此申瘧病入裏以明其治也瘧病而更胸滿裏氣壅也卧不著席反張甚也腳掣急甚也此皆陽明熱甚而其之象故

以大承氣湯直攻其熱非攻陽明之實也其曰可與非盡言其可與有慎重之意

大承氣湯方

大黃四兩酒洗

厚朴半斤去皮

枳實五枚

芒硝三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取一升去滓內芒

硝更上大微二沸分溫再服得下止服

太陽病其証備身體強有八八然脈反沉遲此為瘧枯萎桂枝湯主之註太陽病其証備謂頭痛項強發熱惡風寒其見也而更身體強有八八然俯仰不能自如之象瘧病也但脈見沉遲太陰之脈非太陽浮濶無汗則瘧者比故不與葛根湯而與枯萎桂枝湯和太陽之表清太陰之裏也

枯萎桂枝湯方

枯萎根二兩

桂枝三兩

芍藥三兩

甘草二兩

生姜三兩

大棗十二

右六味以水九升煮取三升分溫三服取

微汗汗不出食噴啜熱粥發之

太陽病發熱脈沉而細者名曰瘧為難治註發熱太陽病也脉沉細少陰脈也而名曰瘧者必有或剛或柔之証見也以太陽瘧証而見少陰之脈委實兼病也夫太陽之邪鬱於外致病發熱少陰之邪凝於內故脈沉細然瘧病而見弦緊之脈是為本脈即或沉遲尚為可治今沉而細邪入少陰陽氣已衰宜易治乎故曰難也

夫風病下之則痙攣發汗必拘急註發熱論痙攣外感風寒濕而為病也亦有因風邪為病不應下而下之傷液不應汗而汗之傷津以致津液枯燥筋失所養而病痙攣者故曰風病下之則痙攣發汗必拘急此不可以外感瘧病治之當以痙攣津液為務也

太陽病發汗太多因致痙註此承上文詳申發汗過多成痙之義也太陽病當發汗若發汗太過腠理大開表氣不固邪風乘虛而入因成痙者乃內虛所召入也宜以桂枝加附子湯主之固表溫經也由此推之凡病出汗過多新產金瘡破傷出血過多而變生此證者皆其類也暴腹脹大者為欲解脈如故反伏弦者痙註本門首條痙病也之下若發汗六句當移於此條之首文義始屬此條暴腹脹大者句衍文也當刪之註不但風病發汗過多則痙即寒濕相搏之病發汗過多亦痙也發汗過多其表益虛虛則必即寒甚也發寒濕汗後其脈不直緊如蛇之曲緩則為邪退不感寒病為欲解也若脈仍直緊不緩或不直緊反伏堅弦急者為邪不退成瘧病矣○瘧病有久瘡難治註瘧病宜灸如有久瘡若不發膿則為榮衛口危故曰難治○瘧家之為病一身盡皮發熱身色如熏黃也注濕家為病濕之人濕之為病或因外受濕氣則一身盡痛或因內生濕病則發熱身黃若內外同病則一身盡痛發熱身色如熏黃也○瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則痙發瘡未成法當汗散已經瀆後血氣被傷雖有身痛表證亦不可發汗恐汗出血液愈竭筋失所養因而成瘧或邪風乘之亦令痙也○瘧病有久瘡難治註瘧病宜灸如有久瘡若不發膿則為榮衛口危故曰難治○瘧家之為病一身盡皮發熱身色如熏黃也注濕家為病濕之所至即濕之所至即濕之所在即濕之所至即熱之所在而色如熏黃者熏火氣也濕為火氣所熏故發色黃帶黑而不亮也○濕家病身痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹

中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈註此承上條詳其義出其脈別其治也濕家病身寒發熱而嘯而喘此內生外受之濕病也外宜羌活勝濕湯內宜茵陳五苓散喘甚大陷胸丸若更頭痛鼻塞而煩其脈大証類傷寒但其人裏和能食知非傷寒不可發汗乃頭中寒濕之邪故頭痛鼻塞惟宜納藥鼻中取黃水從涕出而寒濕以泄病可愈也所納之藥如瓜蒂散之類註魏荔彤曰頭中為諸陽之首非寒濕能犯之地今頭中有寒濕則熱氣挾之上炎非寒濕外邪自能然也有濕熱則內為之主持也熱引濕邪上干清分鼻必為塞故用納鼻藥宣通清氣而病愈矣○濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗為宜慎不可以火攻之註濕家外証身痛甚者羌活勝濕湯內証發黃甚者茵陳五苓散若惟身煩痛而不發黃者則為外感寒濕與麻黃加朮湯發其汗寒濕兩解也慎不可用火攻之者謂不可以火劫大發其汗必致變也集註趙良曰濕與寒合令人身痛大法表實成熟則可發汗無執是陽氣尚微汗之恐虛其表是證雖不云熱而煩以生煩由熱也所以服藥不敢大發其汗且濕亦非暴汗可散用麻黃湯治寒加朮去濕使其微汗耳不可以火攻大攻則增其熱必有他變所以戒人慎之○喻昌曰麻黃加朮則雖發汗不至多汗而尤得麻黃並可以行表裏之濕不可以火攻者反增發熱也

麻黃加朮湯方

麻黃

去節三兩

桂枝

二兩

甘草

二兩

杏仁

七十個

白朮

四兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥共

二升半去沫溫服八合覆取微似汗按桂枝氣味辛平甘全在於皮若去皮是枯木矣如何有解肌發汗之功宜刪此二字後倣此

太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名溫痺溫痺之候小便不利大便反快但當利其小便註此承上條詳其義謂濕家身痛不可發汗當有利小便之法也

太陽病一身關節煩疼若脈浮細者濕在外也當汗之小便不利大便反快脈沉細者濕在內也當利之今濕氣淫於外故關節煩疼著而不行小便不利大便反快此名溫痺雖有身痛其脈不浮細故不可發汗設脈沉細故但當利小便若小便利濡渴止痺不愈身仍疼痛汗之可也註趙良曰痺病也因其關節煩疼脈沉而細則名曰溫痺也經云溫勝則濡濁小便不利大便反快者是濕氣內勝也但當先利小便以瀉腹中濕氣故曰治溫不利小便非其治也設小便利已而關節之痺不去又必自表治之○李克曰太陽經行身之表外邪皆得傷之故亦受濕氣也關節疼痛者濕留關節也濕氣蒸而生熱故煩也經曰沉潛水畜沉細為內濕脈痺者閉塞不通之謂即內經濕氣勝者為著痺之意今小便不利是濕盛於內也即內經濕勝則濡泄也利小便則濡舌而濡煩止矣○濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火右下之發則噦或胸滿小便不利古上如胎者以丹田有熱胸中有寒渴欲得水而不能飲則口燥煩也註濕家頭汗出者乃上濕下熱蒸而使然非陽明內實之熱蒸而上越之汗也背強者乃濕邪重著之強非風濕拘急之強也欲覆被向火者乃一時濕盛生寒非傷寒之惡寒也若悞以陽明內濕之熱上越之頭汗而遂下之則濕從寒化即乘虛入於上則肺氣逆而胸滿入於中則胃不和而為噦入於下則膀胱氣化不行為小便不利古上白滑如胎者蓋以誤下熱陷丹田有熱也寒聚於上胸中有寒也所以渴欲得水而不能飲由下有熱而生口燥煩而上有寒而不化生津液雖口燥舌乾而不能多飲也○濕家下之額上汗出微喘小便利者死下利不止者亦死註此承上條互詳誤下以明濕家頭汗之死証也夫誤下額汗微喘若小便不利是濕家額汗之喘未可言死也今小便反利則知非濕氣上溢乃上脫額

汗之喘故曰死不利不止亦知非濕去之利乃中脫直下之利故曰亦死註趙良曰此妄下之因而致逆逆則陽自上越陰自下脫其頭上不脫而陽之根猶在也下之雖大小便利設額上無汗與喘是陽氣不越而陰之根猶在也則非離決可以隨其証而治之○李璋西曰前云濕家當利小便以濕氣內瘀於小便原自不利宜用藥利之此下後裏虛小便自利者復脫而死不可一例概也病者一身盡及發熱日晡所盡痛然濕家病則重者不能轉側風濕痛則輕掣不可屈伸此痛之有別者也濕家發熱蒸養不分微甚風濕之熱日晡所必劇蓋以濕無來去而風有休作故名風濕原其由來或為汗出當風或為久傷取冷所致也可與麻黃杏仁薏苡甘草湯註病者一身盡痛之病人也濕家一身盡痛風濕亦一身盡疼發熱風濕在表也日晡由時也陽明王於申酉戌土惡濕今為風濕所干當其土時邪正相搏則反劇也汗亦濕類或汗當風而成風濕者或勞傷汗出入冷水者皆成風濕之病也○魏萬形曰濕家非風不成雖有寒亦附于風濕虛無寒不作雖有風亦附于寒此一定之理也

麻黃杏仁薏苡甘草湯方 麻黃去節半兩湯泡

甘草一兩

薏苡仁半兩

杏仁十枚去皮尖炒

右剉麻豆大每服四錢水一盞半煮八分去滓溫服

有微汗避風

風濕脈浮身重汗出惡風者防己黃耆湯主之註脈浮風也身重濕也寒濕則脈沉風濕則脈浮若浮而汗不出惡風者為實邪可與麻黃杏仁薏苡甘草湯汗之浮而汗出惡風者為虛邪故以防己白朮以去濕黃耆甘草以固表生薑大棗以和榮衛也集註趙良曰此証風濕皆從表受之其病在外故脈浮汗出凡身重有肌肉痠而重者有骨痿而重者此之身重乃風濕在皮毛之表故不作疼虛其衛氣而濕者為身重故以黃耆寃衛甘草佐之防己去濕白朮佐之然則風濕二邪獨無散風之藥何耶蓋汗多知其風已不留以表虛而風出入乎其間因之惡風惟寃其衛正氣壯則風自退此不治而治者也○尤怡曰風濕在表法當從汗而解乃汗不得發而自出表尚未解而已虛汗解之法不可守矣故不用麻黃出之皮毛之表而用防己驅之肌膚之裏服後如蟲行皮中及腰下如冰皆濕下行之徵也然非耆朮甘草焉能使衛陽復振而驅濕下行哉

防己黃耆湯方 防己一兩

甘草半兩

白朮七錢半兩

黃耆一兩一錢半兩

右剉麻豆大每抄五錢七生薑四片大棗一枚水盞半煎八分去滓

溫服良久再服

喘者加麻黃解

胃中不和者加芍藥

分三服

氣上衝者加桂枝

分三服

下有陳寒者加細辛

分三服

服後當如蟲行皮中

風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗之病不愈者何也蓋發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲汗出者風濕俱去也註風濕相搏一身盡痛法當從汗而解而汗亦不可失其宜也值雨淫濕盛之時若

發其汗使大出亦不能愈以風氣去濕氣在故不愈然治風濕者必候其天氣晴明發其汗使微微似欲汗出者則風濕皆去病斯愈矣

註徐

彬曰此言風濕當汗解而不可過也謂風濕相搏痺痛原當汗解但天陰雨則濕更甚可汗無疑而不愈何故益風性急可驅濕性滯當漸解汗大出則驟風去而濕不去故不愈若發之微則出之緩緩則風濕俱去矣然則濕在人身粘滯難去驟汗且不可而况驟下乎故前章曰下之死此但云不愈見用法不當而非誤下比也傷寒八九日風濕相搏身體煩疼不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濶者桂枝附子湯主之若大便堅小便自利者去桂枝加白朮湯主之註此承上條詳申脈証以明其治也謂此風濕之病雖得之傷寒八九日而不嘔不渴是無傷寒裏病之証也脈浮虛濶是無傷寒表病之脈也脈浮虛表虛風也濶者濕也身體煩痛非自利而不議下者其非邪熱入裏之鞭乃風燥濕去之鞭故仍以桂枝附子湯去桂枝者以大便堅小便自利而不嘔不渴也脈浮為風濶為濕以其脈近於虛故用桂枝附子湯溫經以散風濕小便利者大便鞭小便去之白朮能去肌濕不妨乎內故加之凡方後有如蟲如醉如冒等狀者皆藥勢將行使然○周揚俊曰傷寒至八九日亦已久矣既不傳經復不入府者因風濕持之也所現外証煩疼者風也不能轉側者濕也不嘔不渴者無裏証也其脈浮虛而濶正與相應然知後風濕之邪在肌肉而在筋節故以桂枝表之不發熱為陽氣素虛故以附子逐濕兩相綰合自不能留矣

桂枝附子湯方

桂枝四兩
去皮

附子三枚

炮去皮破八片

甘草二兩

炙

生薑三片

切

大棗十二枚

擘

右三味以水六升煮取二升去滓分溫三服

白朮附子湯方

白朮二兩
附子一枚半

炮去皮

生薑半切

甘草一兩

炙

大棗六枚

擘

右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服先一服覺

身痺半日許再服三服都盡其人如冒狀勿怪即是

木附并走皮中

逐水氣未除故耳

風濕相搏骨節及煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之註風濕相搏身體煩疼

重者不能轉側者濕勝風也今掣痛不可屈伸風勝濕也掣痛不可屈伸近之則痛劇汗出短氣惡風不欲去衣皆風邪壅盛也小便不利濕

內蓄也身微腫者濕外搏也以甘草附子湯微汗之祛風為主除濕次之也此上二條皆詳風濕之義以明風濕之治也

甘草附子湯方

甘草二兩
炙

附子二枚

炮去皮

桂枝四兩

去皮

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗則

解能食汗出復煩者服五合恐一升多者宜服六七合為妙解甘草附子湯即桂枝附子湯去薑棗加白朮也去薑棗者畏過散也加白

朮者燥中濕也日三服初服一升不得汗則仍服一升若得微汗則解解則能食解已徹也可止再服若汗出而復煩者是解未徹仍當服

也但不可服一升恐已經汗出而過汗也服五合可也如不解再服六七合為妙似此服法總是示人不可盡劑之意學者宜詳求之

太陽中熱者暍是也汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯主之註中暑熱病亦由太陽而入故曰太陽中熱者暍是也汗出惡寒者身熱而渴

也

頗似太陽溫熱之病但溫熱無惡寒以熱從裏生故雖汗出而不惡寒也中暘暑邪由表而入故汗出惡寒也究之於脈溫熱之浮浮而實中氣虛則惡寒熱蒸肌腠則身熱熱傷氣也究之於渴溫熱之渴初病不過欲飲中暘之渴初病即大引飲也溫熱則傳經變病不一中暘則不傳小愈即死也雖同為太陽經中之病而虛實施治自有不同用白虎加人參湯主之者蓋以益氣為主清暑熱次之也集李少曰熱傷氣氣泄則汗出白虎加人參湯方 知母六兩 石膏一斤 甘草二兩 粳米六合 人參三兩 右五味以水一升煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

太陽中暘發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細芤遲小便已洒洒然毛聳手足逆冷口開前板齒燥若發其汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚註此承上條互詳証脈不可妄行汗下也中暘本有汗若發熱無汗身重疼痛者雖証似傷寒然見弦細芤遲虛脈則非傷寒也且有小便已洒洒然惡寒毛聳之狀皆太陽膀胱表氣為暑所傷而畏也手足逆冷者暑傷氣氣不能達四肢則寒也小有勞身即發熱口開前板齒燥者勞則動熱暑熱益烈傷陰液也此皆中暘危証若以發熱無汗惡寒身痛誤為傷寒之表妄行發汗則表氣愈虛惡寒更甚也若以手足逆冷誤為陽虛妄加溫針則暑邪愈甚發熱更熾也若以壯熱齒乾渴為胃火而數下之則水源竭澁尿淋癃甚也凡此之証皆中暘妄行汗下溫針致變以白虎加人參湯主之或人參湯調辰砂一兩散可也註程林曰內經云先夏至為病溫後夏至為病暑久曰熱病者皆傷寒之類也以其太陽受病與傷寒相似亦令發熱惡寒身重而疼痛也經曰寒傷形暑傷氣氣傷則氣消而脈虛弱所以弦細芤遲也小便已毛聳者陽氣內陷不能衝外手足亦逆冷也勞動則擾乎陽故然其則口開口閉則前板齒燥也發汗虛其陽則惡寒甚溫針動火邪則發熱甚下之亡津液則淋甚也集○太陽中暘身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也一物瓜蒂湯主之註太陽中暘之証身熱而倦者暑也身熱疼重者濕也脈微弱者暑傷氣也以此証脈揆之乃因夏月中暑之人暴食風涼過飲冷水水氣雖輸行乎皮中不得汗瀉所致也此時即以香薷飲大順散汗之可立愈矣若稍緩水氣既不得外瀉勢必內攻於中而作喘腫脹矣喘則以葶苈大棗湯腫脹則以瓜蒂一物湯下之可也註周揚俊曰無形之熱傷其肺金則用白虎加人參湯有形之水傷其肺金則用瓜蒂湯各有所主也○李少曰中暘邪在表故身熱傷冷水故身疼中暑傷氣亂虛故脈微弱也瓜蒂治身面四肢浮腫散皮膚中水氣苦以泄之也

一物瓜蒂湯方 瓜蒂二十個 右剉以水一升煮取五合去滓頓服

卷十九

訂正仲景全書金匱要略註上之二

百合狐惑陰陽毒病脈証并治第三

論曰百合病者百脉一宗悉致其病也意欲食復不能食常默默然欲卧不能卧欲行不能行欲飲飲食或有美時或有不用聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便亦諸約不能治得藥則劇吐利如有神靈者身形如和其脈微數每渴時頭痛者六十日乃愈若渴時頭不痛者折然

者四十日愈若渴快然但頭眩者二十日愈其証或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微見者各隨証治之註百合百瓣一蒂如人百脈一宗命名取治皆此義也百合病者謂人百脈一宗患致其病也曰百脈即一脈也猶言百體一體也是益以周身言之也周身之脈分而言之曰百合而言之曰一故曰百脈一宗若曰百合之病總脈病也脈者謂十一經脈三百六十五絡脈也傷寒大病之後餘熱未解百脈未和或平素多思不斬情志不遂或偶觸驚疑卒臨景遇因而形神俱病故有如是之現証也百脈周於身脈病則身病故身形如和不和欲卧不能卧欲行不能行也百脈通於心脈病則心病故常默默也如寒無寒如熱無熱似外感而非外感也意欲食復不能食或有美時或聞食臭有不用時似裏病而非裏病也至脈數口苦小便亦者是鬱結之熱雖侵裏而其熱未甚也方其初病之時醫者不識誤為表裏之病以藥汗下之故劇吐利也雖劇吐利不變諸逆若有神靈身形如前之和而脈則比前微數故其勢即不能遽進不覺加甚而亦不能速愈也試以緩愈之期約略言之重者不過六十日輕者不過二十日輕重之間者不過四十日可愈也然愈必以每渴時頭痛不頭痛惡風不惡風快然不快然辨者以經脈之邪莫不以太陽而愈也頭痛惡風是其經之候也渴時快然是其府之徵也其証或未病而預見者其証指百合病証也預先見者是先有情志不遂偶觸驚疑而召病也或病二十日或一月纔見者是因傷寒病後而纔見也故曰各隨証治之也註百合病者是先有情志不遂偶觸驚疑而召病也或病二十日或一月纔見者是因傷寒病後而纔見也故曰各隨証治之也

李氏曰活人書云傷寒大病後血氣未得平復變成百合病全由脈一宗患致其病觀之當是心肺二經之病也如行卧飲食寒熱等証皆有莫可形容之狀在內經解你病似之觀篇中有如神靈者豈非以心藏神肺藏魄人生神魄失守斯有恍恍錯妄之情乎又曰內經云凡傷於寒則為病熱熱氣遺留不去伏於脈中則昏昏默默凡行卧飲食寒熱皆有一種虛煩不耐之像矣註徐彬曰內經所謂用陰和陽用陽和陰即意欲食復不能食走于肝腎故常默默流入脾胃故欲卧不能卧欲行不能行邪不在胃飲食或有美時壅抑胃氣則聞食臭流於胆則口苦流於膀胱則便亦以上諸証非一齊並見皆移易變動而見也

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之此亦為逆註此承上條以明其治也百合一病難分陰陽春裏故以百合等湯主之若病見於陰者以溫養陽之法救之見于陽者以涼養陰之法救之即下文見陽攻陰或攻陰之後表仍不解復發其汗者此為逆見陰攻陽或攻陽之後裏仍不解而復下之者此亦為逆也註徐彬曰內經所謂用陰和陽用陽和陰即是此義故諸治法皆以百合為主至病見於陽加一二味以和其陰病見於陰加一二味以和其陽○李氏曰百合病多端數條之法亦說不然○沈明宗曰此治百合病之總要法也微邪伏於榮衛流行而病表裏當分陰陽以施救治可也○百合病不經吐下發汗病形如初者百合地黃湯主之註百合一病不經吐下發汗病形如初者是謂其病遷延日久而不增減形証如首章之初也以百合地黃湯通其百脈涼其百脈中病勿過服恐過服生地黃大便常如漆也

百合地黃湯方

百合根

生地黃汁一升

右以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓內地黃汁煎取一升

并五合分溫再服中病勿更服大便常如漆雖經林曰百合花葉皆四向故能通達上下四旁其根亦聚辦合成故名百合用以醫百合病也有以夫○高世栻曰百合色白味甘平太陰之補劑也其花晝開夜合如氣之日行於陽夜行於陰司開闔以行榮衛和陰陽

百合病變發熱者百合滑石散主之註百合病如寒無寒如熱無熱本不發熱今變發熱者其內熱可知也故以百合滑石散主之使其微利熱從小便而除矣

百合滑石散方 百合一兩 滑石三兩

右為散飲服方可七日三服當微利則止服熱則除

集高世栻曰滑石亦名滑石又名滑石石

之脂膏也主治身熱渴消利小便

百合病一月不解變成渴者百合洗方主之註百合病本不渴今一月不解變成渴者外以百合湯浸洗其身通表渴熱內食煮餅勿以鹽豉不致引鹽而渴自止也

百合洗方 百合一升

右以水一斗清之一宿以洗身洗已食煮餅勿以鹽豉也

百合病渴不差者用後方主之註與百合洗身而渴不差者內熱盛而津液竭也桔梗根苦寒生津止渴牡蠣鹹寒引熱下行也

桔梗牡蠣散方 桔梗根牡蠣熬等分

右為細末飲服方寸匕日三服

百合病發汗後有百合知母湯主之註百合病不應汗而汗之不解者則致燥以百合知母湯主之者清而潤之也

百合知母湯方 百合七枚擘知母三兩切

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升知母取一升去滓復合和煎取

一升

五合分溫再服

百合病下之後有滑石代赭湯主之註百合病不應下而下之不解者則怯中以滑石代赭湯清而鎮之也

滑石代赭湯方 百合七枚擘滑石三兩碎

代赭石如彈丸大二枚碎綿裹

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升

煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石代赭水一升去滓後合和煎取

一升五合分溫再服

百合呎病吐之後者用後方主之注百合病不應吐而吐之不解者則虛中以百合雞子湯清而補之也

百合雞子湯方 百合七枚擘雞子黃一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升

煎五分溫服

狐惑之為病狀如傷寒默欲眠目不得閉卧起不安蝕於喉為感蝕於陰為狐不欲飲食惡聞食臭其面目乍黑乍赤乍白蝕於上部則聲

嘔甘草瀉心湯主之蝕於下部則咽乾苦參湯洗之蝕於肛者雄黃熏之

註狐惑牙疳下疳等證古名也近時惟以疳呼之下疳即狐也蝕

爛肛陰牙疳即感也蝕咽喉齦牙穿腮破唇每因傷寒病後餘毒與濕膿之為害也或生班疹之後或生癰瘍下利之後其為患亦同也狀如傷寒謂發熱憎寒也默默欲眠目不得閉謂其病或在陰亦或在陽故卧起俱不安也此病有蟲齶聞食臭而動動則令人煩心故不欲飲食

惡聞食臭也面目乍黑乍赤白亦由蟲動交亂胃中胃主面色無定也感蝕於上部之喉故先聲嘔毒在喉也孤蝕於下部之陰故先咽乾毒在陰也外治之法苦參湯雄黃散解毒殺蟲屬有理內用甘草瀉心湯必傷爲之誤也姑存之註程林曰靈樞經百蟲動則令悅心是以有卧起不安等項也李氏曰喉肛與前陰皆關竅所通津液滋潤之處故蟲每蝕於此

甘草瀉心湯方 甘草四兩 黃芩 人參 乾姜各二兩

黃連一兩

大棗十二枚 半夏半升

右七味水一斗煮取六升去滓再煎

溫服一升日三服

苦參湯方 苦參一升 水一斗煮取七升熏洗日三次

雄黃 右一味為末筒瓦一枚合之燒向肛重之

脈經云病人或從呼吸上蝕其咽或從下焦蝕其肛陰蝕上為感蝕下為孤感病者猪苓散主之

病者脈數無熱微煩默默但欲卧汗出初得之三四日目亦如鳩眼七八日目四眞黑若能食者膿已成也赤小豆當歸散主之註病者脉數謂病孤感之人脉數也數主瘡主熱今外無身熱而內有瘡氣瘡之熱在於陰故默默但欲卧也熱在於陽故微煩汗出也然其病初得之三四日目亦如鳩眼者是氣緣於血故首絡亦也七八日四眞皆黑者是熱於血腐故首絡黑也若不能食其毒尚伏諸裏若已能食其毒已化成膿故以赤小豆排癰腫當歸調癰血米漿和胃氣也註李氏曰經云脈數不止而熱不解則生惡瘡今膿成何處大率在喉與陰肛益積熱生蟲亦積熱成膿是亦惡瘡之類也

赤小豆當歸散方 赤小豆三升泛令
茅出曝乾當歸 右二味杵為散漿水服方寸匕日三服

陽毒之為病面亦班班如錦文咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治升麻葛根湯主之

陰毒之為病面目青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻葛根湯去雄黃蜀椒主之註陰陽平正氣也陰陽偏邪氣也陰陽變異氣也正氣者即四時令平之氣也中人為病徐而淺邪氣者即四時不和之氣也中人為病速而危異氣者非常災厲之氣也中人為病暴而死所以過五日不治以五藏相傳俱受邪也此氣通中人之陽則為陽毒通中人之陰則為陰毒非後人所論陰寒極陽熱極之陰毒陽毒也觀其所主之方要不過升麻甘草當歸葛甲蜀椒雄黃而並不用太寒太熱之藥則可知仲景所論陰毒陽毒非陰寒極陽熱極之謂也此二証即今世俗所謂痧証是也陽毒終屬陽邪故見面目青身痛如被杖之寒証二証俱咽喉痛者以此証乃邪從口鼻而下入咽喉故痛也按由此推之凡邪所過之處無不痛也故中此氣之人不止咽喉痛身痛甚至有心腹絞痛大滿大脹通身絡脈青紫暴出手足指甲色如嵌葉口噤牙緊心中忙亂死在旦夕者若謂必從皮毛而未有為病如是之速者也是必從口鼻而下入咽喉無疑况陰毒反去雄黃蜀椒必傳寫之謬故治是証者不必問其陰陽但利其尺澤委中手中十指脈絡暴出之處出血輕則用刮痧法隨即用紫金鱗或生或下或汗出而愈者不少若吐濁不止厥逆令汗脈微欲絕用炮附子炮川烏吳茱萸丁香生乾姜甘

草虛者加人參救之亦多得生注王履曰仲景雖有陰毒之名其敎証不過面目青身痛咽痛而已並不言陰寒極盛之說其升麻龍甲湯並不用太熱藥是知仲景所論陰毒者非陰寒之病乃感天地惡毒與氣入於陰經故曰陰毒耳後人謂陰寒極盛之証稱為陰毒引仲景所敎面目青身痛如被杖咽喉痛數語却用附子散正陽散等藥竊謂陰寒極盛之証固可名為陰毒然終非仲景所以著之意本後人所敎陰毒與仲景所敎陰毒自是兩般豈可混論蓋後人所敎陰毒只是內傷冷物或暴寒所中或過服寒涼藥或內外俱傷於寒而成耳非天地惡毒異氣所中者也○李芝曰趙獻可云此陰陽二毒是感天地疫癘非常之氣沿家傳染所謂時疫証也觀方內老小再服可見

升麻龍甲湯方

升麻二兩

當歸一兩

蜀椒炒去汗二兩

龍甲一片炙

甘草二兩

雄黃半兩研

右六味以水四升煮取一升頓服之

老小再服取汗

瘡病脈証并治第四

師曰瘡脉自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者下之差弦遲者可溫之弦緊者可發汗針灸也弦浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之按弦小緊者之字當是沉字則有可下之理弦緊者當是弦浮大者當是弦滑大者當是弦遲者當是弦滑大者則有可吐之理且不遺本文瘡脈自弦之意註瘡之為病寒熱也三陰三陽皆有之因其邪伏藏於半表半裏之間故屬少陽脈自弦也弦數者多熱弦遲者多寒謂發作之時多熱為陽盛多寒為陰盛也夫傷寒少陽病則有汗吐下三法之禁而瘡亦屬少陽何以有汗吐下三法之宜是益瘡屬雜病不可不知也初發脈弦兼沉緊者主平理也可下之兼遲者主平寒也可汗之兼滑大者主平飲也可吐之兼數者風發也即風熱之謂也可清之若久發不止則不可以此法治之當以飲食撙節調理消息止之益初病以治邪為急久病以養正為主也其他瘡瘍即內經所謂但熱不寒之瘧瘧也溫瘡即內經所言先傷於風後傷於寒熱多寒少之溫瘡也牝瘡即內經所言先傷於寒後傷於風寒多熱少之寒瘡也惟瘡母一証經所未載然論諸瘡未有詳於內經者也其文雖略有不同必是脫簡然所出治法亦未有過於仲景者也集注徐彬曰自者謂感有風寒而脈惟自弦也於是脈既有一定之象而兼數為熱兼遲為寒此其大綱也○尤怡曰瘡之舍固在半表半裏之間而人之臟則有偏多偏少之異故其病有熱多者有寒多者有表多而可汗可吐者當各隨其脈而施治也○周揚俊曰人之瘡証由外邪之入每伏於半表半裏而與陰爭則寒出而與陽爭則熱故寒就往來主少陽謂兼他經証則有之謂全不涉少陽則無是理也仲景曰瘡脈自弦止以脈之數遲小緊浮大滑不可定要必兼弦為少陽脈也夫邪犯少陽與衛氣併居衛氣晝行於陽夜行於陰故邪得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作若氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰氣內著陰與陽爭不得出是以間日而作也然則偏陰多寒偏陽多熱其為瘡為溫為北莫不自少陽而造其極補偏攻弊必從少陽之界使邪去而陰陽適歸於和而後愈也病瘡以月一日發當以十五日愈設不差當月盡解如其不差當云何師曰此結為瘕瘕名曰瘡母急治之宜蠻甲煎圓病瘡者以月計之如一日發者當以十五日愈以十五日更一氣也人受氣於天氣更則人身之氣亦更更氣旺則不受瘡邪致愈也設若不差當月盡解是

又更一旺氣也倘如更二氣不差此瘧邪不衰與病者氣血痰飲結為癥瘕名曰瘧母也當急治之宜用蠶甲煎丸攻之可也集程林曰五日

蠶甲煎圓方 蠶甲十二分 火

烏扇三分燒

黃芩三分

柴胡六分

鼠婦三分熬

乾姜三分

大黃三分

半夏一分

芍藥五分

桂枝三分 莖麌一分熬

赤硝十二分

蜣螂六分熬

桃仁一分

右二十三味為末取煅鐵下灰一斗清酒一斛五斗浸灰候酒盡一半

集徐彬曰藥用蠶甲煎者蠶甲入肝除邪養正合煅

竈灰所浸酒去假故以為君小柴胡湯桂枝湯大承氣湯為三陽主藥故以為臣但甘草味柔緩而減藥力枳實破氣而直下故去之外加乾姜阿膠助人參白朮溫養為佐藥必假血依經故以四蟲桃仁合半夏消血化痰凡積必由氣結氣利而積消故以烏扇菖蒲利肺氣合石葦瞿麥清邪熱而化氣散結血因邪聚則氣故以牡丹紫葳去血中伏火膈中實熱為使十全方去鼠婦赤硝而加海藻大戟以軟堅化水更妙

師曰陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧若但熱不寒者邪氣內藏於心外舍分肉之間令人消鑿肌肉

按此言

溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節痠煩時嘔白虎加桂枝湯主之按此言溫瘧其文脫簡內經詳不復釋

溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節痠煩時嘔白虎加桂枝湯主之

按此言溫瘧其文脫簡內經詳不復釋

白虎加桂枝湯方 知母六兩 甘草二兩 石膏一斤 稗米二合 桂枝三兩 右剉母五錢水一盞半煎至八分去滓溫服汗出愈

瘧多寒者名曰北瘧蜀漆散生之按此言北瘧其文脫簡內經詳不復釋

蜀漆散方

蜀漆洗去腥

雲母燒二日夜

龍骨等分

右三味杵為散未發前以燈水服半錢七溫瘧加蜀漆半分臨發時服一錢七分

集李延曰北瘧証多陰寒治宜助陽溫散為主雲母之根為陽起石下有雲母上多陰氣性溫氣升乃升陽氣之物龍骨屬陽能逐陰邪而起陽氣蜀漆乃常山之苗功能治瘧不用根而用苗者取其性多升發能透達陽氣於上之義也溫瘧蜀漆亦取其升散之功

中風歷節病脈証并治第五

風之為病當半身不遂或偏臂不遂者此為痲脈微而數中風便然甚風病內經論之詳矣但往往與脾合論後人惑之故仲景復言之曰為病當半身不遂即經所謂偏枯也或但兩臂不遂者非中風也即痲病也蓋脾為陰病脈多浮緩今脈微而數中然其脈微者正氣虛也數者邪氣勝也故病中風之人因虛而生風者未有不見微弱之脉者也因熱而生風者未有不見數急之脉者明宗曰此分中風與脾也風之為病非傷於衛即侵於榮故當半身不遂謂半身之氣傷而不用也若偏臂不遂此為痲病者閑也謂

而緊緊則為寒浮則為虛寒虛相搏邪在皮膚浮者血虛脈絡空虛邪邪小滿或左右或邪氣反襲正氣即急止氣引邪喝僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入於府即不識人邪入於藏吉則難言口吐涎按寸口脈浮而緊緊則為寒浮則為虛寒虛相搏邪在皮膚此五句與本條文義不屬當在後條之首後條寸口脈遲而緩遲則為寒緩則為寒緩則為虛榮緩則為一血衛緩則為中風邪氣中經此六句亦與本條文義不屬當在此條之首又氣相屬必是錯簡其中有浮者血虛一句必是衍文浮則為虛寒虛相搏一虛字當是傳寫之誤註中風虛邪之脉皆當浮緩以浮主風緩主虛也榮分見緩經絡之血亡也衛分見緩經絡之氣空也蓋邪風中人未有不因經絡血氣空虛而中也賊邪不滿留而不去在左則病左在右則病右淺則病經絡深則病藏府邪在於絡則為病肌膚麻木不仁也邪在於經則為病身肢偏重喝斜不遂也邪入於府則為病九竅閉不識人也邪入於藏則為病舌瘡難晨縫吐涎也○寸口脈遲而緩遲則為虛榮緩則為亡血衛緩則為中風邪氣中經則身庠而癰疼心氣不足邪氣入中則胸滿而氣短按寸口脈壅而緩遲則為寒二遲字當是浮字寒字當是風字始得文義了然且遲緩二脈不能並見必是傳寫之誤註上條發明虛邪賊風之為病此條發明榮衛風寒之為病也寸口脈浮而緊緊則為寒浮則為風風寒之邪相搏於表體於皮膚經絡則令人身庠而癰疼也若其人心氣不足謂心胸之氣不足而邪氣入心胸故令人胸滿而短氣也○寸口脈沉而弱沈即主骨弱即主筋沈即為腎弱即為肝汗出入水中治水傷心歷節黃汗出故曰歷節註寸口脈沈而弱肝腎之氣不足也蓋肝主筋腎主骨肝腎不足筋骨痿緩一為風寒溼邪所乘即病筋骨關節委脣之處夫人汗出時膜理開風尚易入況入水中浴焉得不致寒耶水傷心心主汗汗鬱成濕故風勝為歷節濕勝為黃汗出也注趙良曰腎主水骨與之合故脈沈者病在骨也肝藏血筋與之合血虛則脈弱故病在筋也心主汗汗出入水其汗為水所阻水汗相搏聚以成濕久變為熱濕熱相蒸是以歷節發出黃汗也○味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄泄則傷骨骨傷則痿名曰枯枯泄相搏名曰斷泄榮氣不通衛不獨行榮衛俱微三焦無所御四屬斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出胫令假熱便為歷節也病歷節不可屈伸及痛烏頭湯主之按名曰斷泄之泄字當是絕字始與下文相屬必是傳寫之謬註此詳申上條互發其義以明其治也歷節之病屬肝腎虛肝腎不足於內筋骨不榮於外客邪始得乘之而為是病也究其所以致虛之由不止一端也如飲食之味過傷日久亦為是病也味過於酸則傷肝肝傷則肋傷筋傷則緩不敢持名曰泄也味過於鹹則傷腎腎傷則骨傷骨傷則枯不能立名曰枯也枯泄相搏名曰斷絕斷絕者即禁氣不通衛不獨行榮衛俱虛三焦失所四維斷絕身體羸瘦也若獨足腫脹令寒勝凝於下也黃汗自出濕勝發於中也假令發熱則屬風便為歷節也病歷節者歷節皮膚不能屈伸也故主之以烏頭湯通榮行衛並驅風寒濕之邪也以蜜製烏頭亦緩毒濟耳注沈明宗曰金匱補云飲食內傷脾胃心肺肝腎致病名曰歷節然出脈証皆因飲酒濕壅內熱而招外邪合病謂飲酒汗出當風所致即邪之所湊其氣必虛是矣或外風而令內濕外寒而令內濕內寒而招外濕內熱而招外濕不可不曉又當分別風寒濕氣偏多偏少而處發表溫中行陽補虛散邪之法故治此當與靈素金匱合看則備右泛用成方則非此等關頭不可不曉

烏頭湯方 麻黃 苓藥 黃耆各三兩

甘草 川烏

五枚咬咀以蜜二升煎取一升即出烏頭

右五味㕮咀四味以水三升煮取一升去滓內蜜煎中更煎

之服七合不盡服之

諸肢節疼痛身體僵直脚腫如脫頭眩短氣溫溫欲吐桂枝芍藥知母湯主之。性溫溫當是嘔嘔。註歷節之証諸肢節疼痛也。身體僵直脚腫如脫即上條獨足腫大甚。言其腫之甚也。頭眩短氣陽氣虛也。嘔嘔欲吐寒亦盛也。而不用烏頭湯者。因無黃汗之濕勝也。用桂枝芍藥知母湯者。以壯陽氣散寒濕為急也。故方中桂枝芍藥倍於麻黃防風大加白朮附子其意專在溫行陽氣次在散寒濕也。多用生姜因其發吐更佐知母甘草者以其利過辛熱監制也。集注李氏曰此歷節病由氣血兩虛而致者也。風濕相搏四肢節節皆痛即歷節病也。身體僵直脚腫正衰也。腳腫如脫氣絕於下也。頭眩短氣氣虛於上也。嘔嘔欲吐氣逆於中也。此三焦氣血兩虛故是湯主祛風濕而溫氣血。

桂枝芍藥知母湯方 桂枝四兩 苓藥三兩

甘草一兩

麻黃二兩 生姜五兩

白朮五兩

知母四兩

防風二兩

附子二枚炮

右九味以水七升煮取二升溫服七合日三服

趺陽脈浮而滑滑則氣實浮則汁外出註趺陽胃脈也。穀氣胃氣也。浮則為風外薄滑則為胃實或風熱於肌腠之間故汗自出此發明黃汗亦因有風熱之義也。○少陰脈浮而弱弱則血不足浮則為風風血相搏即疼痛如掣註少陰心脈也。心主血心脈浮而弱弱則為血虛浮則為風邪風血相搏而交爭於經絡之間故疼痛牽引如掣也。此發明歷節亦有因血虛之義也。集注李氏曰風在血中則慄慄勁切無所不至為風血相搏益血主榮養筋骨者也。若風以燥之則血愈耗而筋骨失其所養故疼痛如掣。昔人曰治風先養血血生風自滅此其治也。○成人脈濶小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此皆飲酒汗出當風所致。註成人脈盛不應濶小盛人氣長不應氣短令盛人脈濶小短氣是形氣脉急不合也。審其証自汗出歷節疼不可屈伸詢其由得之於飲酒汗出當風也。此又發明歷節不止一端之義也。集注徐彬曰盛人肥人也肥人濕多脉得澀小此婢家也於是氣為濕所搏而短因風作使而自汗氣血為邪所滯而疼痛不可屈伸然肥人固多濕何以脉驟澀小豈非酒濕困之乎何以疼痛有加而汗出不已豈非濕而挾風乎脉証不同因風則一故曰此皆飲酒汗出當風所致。

血痹虛勞病脉并治第六

問曰血痹病從何得之。師曰夫尊榮人骨肉肌膚盛重因疲勞汗出卧不時動搖加被微風遂得之。但以脉自微濶存口闊上小緊宜鍼引陽氣令脉和緊去則愈。歷節屬傷氣也。氣傷痛故疼痛也。血痹屬傷血也。血痹肢麻木也。前以明邪氣聚於氣分此以明邪氣凝於血分故以血痹名之也。尊榮人謂膏梁之人。素食甘肥故骨弱肌膚盛重是以不任疲勞疲勞則汗出汗出則腠理開亦不勝久卧則不時動搖動搖即加被微風亦遂得以千之。此言膏梁之人外盛內虛雖微風小邪易為病也。然何以知病血痹也。但以身體不仁脈自微濶則知邪凝於血分也。寸口闊上緊亦風寒微邪應得之脉也。針能導引經絡取諸痹故宜針引氣血以瀉其邪令脈不濶而和緊去邪散血痹自通也。

注周揚俊曰天下惟尊榮人為形樂志苦形樂故肌膚感志苦故骨弱骨弱則不耐勞筋盛則氣小固稍有勞即汗出也汗出而陽氣虛雖微

風且得以襲之則血為之病故一見脈微則知其陽之不足一見脈濶則知其陰之多阻此血病之本脈也而其邪入之處則自形其小緊參為正氣拘抑之象緊為寒邪入中之微然仲景明言微風何以反得寒脈也蓋邪隨血脉上下阻滯津沫未有不涌者故病為緊脉也針以泄之引陽外出則邪去而正自伸也○血病陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風痺狀黃耆桂枝五物湯主之注此承上條互詳脉証以明其治也上條言一脉微濶寸口關上小緊此條言陰陽寸口關上俱微尺中亦小緊合而觀之可知血病之脉浮沉寸口關上尺中俱微俱濶俱小緊也微者虛也濶者帶也小緊者邪也故血病應有如是之証也血病外証亦身體頑麻不知痛痒故曰如風痺狀但不似風痺歷關節流走疼痛也主黃耆桂枝五物湯者調養榮衛為本法風散邪為末也集注周揚俊曰此申上條既瘳之後未能針引以愈遂令寸口微者今則陰陽俱微且寸關俱微矣且尺中小緊矣夫小緊既見於尺則邪之入也愈深而愈不得出何也正虛之後便是容邪之處也脈經內外謂之陰陽上下亦謂之陰陽今尺既小緊則微屬內外也明矣若言証以不仁極之則疫痛麻木每與我相阻其為不仁甚矣故以風毒象之非真風病也於是以上黃耆固衛力藥養陰桂枝調和榮衛扶實表裏驅邪外出佐以生姜宣胃大棗益脾為至當不易之治也

黃耆桂枝五物湯方

黃耆三兩

芍藥三兩

桂枝三兩

生姜六兩

大棗十二枚

右五味以水六升煮取二升溫服七合日三服方

夫男子平人脉大為勞極虛亦為勞注男子平人應得四時五藏平脈今六脈大而極虛非平人之脈也然大而無力勞役傷脾氣也極虛者內損腎陰精也此皆欲作虛勞之候故有如是之証也集注李氏曰平人者形如無病之人經云脈病人小病者是也勞則體疲於外氣耗於中脉大非氣盛也重按必空濡乃外有餘而內不足氣象脈極虛則精氣耗矣益大者勞脉之外暴者也極虛者勞脉之內衰者也○魏荔彤曰夫男子平人脉大為勞極虛亦為勞脈久者邪氣盛也極虛者精氣奪也以可揭虛勞之總而未嘗具大倚脈虛任何經是在主治者隨五勞七傷之故而論審之也○人年五十其病脉大者病伏背行若腸鳴馬刀依癰者皆為勞得之按若腸鳴三字與上下文不相屬必是錯簡依癰之癰字當是瘧字每經此証先勞後瘧者有之從未見勞瘧先後病也必是傳寫之謬註平人年二三十常得大脈者則多病若人年已五六十其脈亦大不即病勞者以氣血雖虛而火自微也火微故不病勞也雖不病勞然氣血榮衛虛病不行故為馬刀鼠瘡依癰也此發明脉大雖同為病不同之義也○勞之為病其脉浮大手足煩春夏劇秋冬瘧陰寒精自出酸削不能行按陰寒精自出之寒字當是虛字是傳寫之謬註此言浮大為勞以詳其証也手足煩即今之虛勞五心煩熱陰虛不能藏陽也陰虛精自出即今之虛勞遺精陰虛不能固守也酸削不能行即今之虛勞膝酸削瘦骨痿不能起於床也天春夏陽也陰虛不勝其陽故劇秋冬陰也陰虛得位自起故瘥集注徐彬曰脈大既為勞矣更加浮其証則手足煩益陰既不足而陽必盛也於是春夏助其陽則劇秋冬助其陰則瘧陰虛而氣暴於外也四肢者諸陽之本勞則陽耗陰削不能行矣○程林曰寒字作虛字看虛虛則氣不守而精自出矣李氏曰脈浮大者裡虛而氣暴於外也四肢者諸陽之本勞則陽耗陰

虛而生內熱故手足煩凡勞傷多屬陰虛當春夏火盛炎之際氣浮於外則裡愈盛故劇熱金水相生之候氣散於內則外不擾故瘥也。腎藏精精自出者腎水不藏也腎主膏故發削而不能行也○男子脈虛沉弦無實熱短氣裡急小便不利面色白時目瞑兼衄乃上焦勞使之然註此復申虛極為勞人詳其証之義也脈虛沉弦陰虛俱不足也無實熱是陰陽雖不足而不相乘也短氣面白時瞑兼衄乃上焦虛而血不榮也裏急小便不利少腹滿乃下焦虛而氣不行也凡此脈証皆因勞而病也故曰此為勞使之然○男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸脉浮者裡虛也按脈浮者裡虛也當是衍文注此復申虛勞面色白互詳其証之義也面色白不因衄者是血亡於外也今曰面色薄謂面色淺淡不華亦不足之色也故主津液不足之渴及吐衄亡血氣虛卒喘血虛卒悸也集李氏曰此節以亡血為主內經曰精明五色者氣之華也又云心之華在面其充在血脉勞則氣耗火動逼血妄行必致亡血蓋血主濡之血亡則精彩衰而面色薄津液去而煩且渴矣又勞者氣血俱耗肺主氣氣虛則悸卒者猝然見此病也○男子脉浮弱而濶為無子精氣清冷註男子之脉浮大而虛者為虛勞也浮弱而濶者則為精氣清冷故為無子也夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩落脉極虛芤道為清穀亡血失精脉得諸乳動微絰男子失精女子夢交桂枝龍骨牡蠣湯主之集程林曰腎主閉藏肝主疏泄失精則過於疏泄故少腹弦急也陰頭為宗筋之所聚真陽日虧故陰頭寒也目眩則精長髮落前血竭是以脉虛芤遲也虛主失精乳主亡血遲王下利清穀也○李氏曰肝主藏血腎主藏精血失精則肝謂腎陽不固精者也少陽弦急虛而寒也陰頭寒陽氣衰也目眩精氣虧也髮落血本竭也若診其脈極虛而芤遲者當知虛為勞乳則亡腎俱虛矣少腹者肝腎之部今少腹怠急以肝腎兩虧則裏氣虛而張急加弦也肝主筋則筋之所聚肝衰故陰氣寒也肝藏血開竅於目腎主骨骨之精為瞳子又腎之華在髮髮者血之餘此肝腎兩虛故目眩髮落也乳脉者浮沉有中間無似中空乳草故名乳脉此血亡之脉以脈者血之府血虛則脈亦虛也遲為在藏遲則為寒脈極虛芤遲則其証亦虛清穀者大便完穀不化也此虛勞在肝腎二經者也○男子平人脉虛弱細微者善溢汗也按此節脈証不合必有脫陷故不釋脈沉小遲名脫氣其人疾行則喘喝者手足逆寒腹滿盛則溏泄食不消化也註脈沉細遲則陽大虛故名脫氣脫氣者謂胸中大氣虛少不充氣息所用故疾行喘喝也陽虛則寒寒盛於外四末不溫故手足逆冷也寒盛於中故腹滿溏泄食不消化也注徐彬曰脈沉小遲其為陽衰元氣沉小遲三脈相併是陽氣全虧故名脫氣其體為空穀疾行則氣竭而喘喝四肢無陽而寒腹中無陽而滿甚則胃虛極而溏泄脾虛極而食不化也○李氏曰此脾肺腎三經俱病也肺主氣氣為陽沉小遲皆陽氣虛衰之脉故為脫氣疾行則喘喝以肺主出氣而腎主納氣為生氣之原呼吸之門若真元耗損則氣虛不能續息肺無所出腎無所納故喘喝此肺腎病也又脾主四肢者諸陽之本逆寒者陽虛不溫四末也腹滿者脾經入腹氣虛中滿也溏泄食不化者此脾虛不能運膚水穀多見驚瘧食泄之証也○脈弦而大強則為芤減則為虛芤則為虛寒相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精註詳見傷寒論辨脈法中不復釋○脈得諸乳動微緊者謂概

虛勞之諸脈而治之也非謂虛勞之證也惟主男子失精女子夢交之病也謂腎男女失精之病而用桂枝龍骨牡蠣湯謂陰陽和合營氣固精也

精液也注徐彬曰失精之家服復不苟得諸乳動微緊是男子以陰虛而挾火則失精女子以陰虛而挾火則夢交主以桂枝龍骨牡蠣湯

者並陰虛之人大概當助腎故以桂枝芍藥通陽固陰甘草姜棗和中龍骨牡蠣固精也

桂枝加龍骨牡蠣湯方

桂枝芍藥 生姜各三兩 甘草二兩 大棗十二枚 龍骨 牡蠣各三兩 右七味以水七升煮取三升分

溫三服

虛勞裡急悸衄腹中痛夢多精四肢瘦弱手足煩熱咽乾口燥小建中湯主註虛夢云云者舉虛勞之証而言也非謂虛勞之証止於此也故下文有諸不足之說也均主以小建中湯者欲小小建中意合下六節皆論虛勞各有所主之方也

小建中湯方

桂枝三兩 甘草三兩炙 大棗十二枚 芍藥六兩 生姜六兩 膜鈎一升 右六味以水七升煮取三升去滓內膜鈎

更上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

虛勞裡急諸不足黃耆建中湯主註所謂虛勞裡急諸不足者亦該上條諸不足證之謂也黃耆建中湯建立中外兩虛非單謂裡急一證之治也桂枝龍骨牡蠣湯即桂枝湯加龍骨牡蠣小建中湯即桂枝湯加膠鈎黃耆建中湯即桂枝湯加膠鈎黃耆因是而思仲景以桂枝湯出入加減無往不利如此何後世一見桂枝即為傷寒發汗之劑是但知仲景用桂枝湯治傷寒而不知仲景用桂枝湯治虛勞也若知桂枝湯治虛勞之義則得仲景心法矣蓋桂枝湯甘辛而溫之品也若啜粥溫覆取汗則發散榮衛以逐外邪即經曰辛甘發散為陽是以辛為主也若加龍骨牡蠣膠鈎黃耆則補固中外以治虛勞即經曰勞者溫之甘藥調之是以溫以甘為主也由此推之諸药之性味功能加減出入其妙無窮也魏荔彤曰氣虛甚加黃耆津枯甚加人參以治虛勞裡急此言裡急非單指裡急之謂也乃虛勞諸不足腹痛之謂也故名其方為建中正所以扶持其中氣使漸生陰陽達於榮衛布於肢體也○尤怡曰裏虛脈息腹中當引痛也諸不足者陰陽俱不足而肢慄喘喝失精亡血等証相因而至也急者緩之必以甘不足者補之必以溫而充虛塞空則黃耆尤有專長也

黃耆建中湯方

於小建中湯內加黃耆一兩半餘依上法右氣短胸滿者加生姜腹滿者去棗加茯苓一兩半及療肺虛損不足補氣加半夏三兩

虛勞腰痛少腹拘急小便不利者八味腎氣丸主之註虛勞之人腰痛腎氣虛而不化也主以八味腎氣丸溫補下焦腎與膀胱表裡之氣足而腰痛少腹拘急小便不利未有不愈者也註程林曰腰者腎之外候督筋腰痛腎與膀胱為表裡不得三焦之陽氣以決瀆則小便不利而少腹拘急矣與是方以益腎間之氣氣強則便溺行而少腹拘急亦愈矣○尤怡曰虛勞之人損傷少陰腎氣是以腰痛少腹拘急小便不利以八味腎氣丸補陰之虛可以生氣助陽之弱可以化水乃補下治下之良劑也

八味腎氣湯方見婦人雜病方

虛勞虛煩不得眠酸棗湯主之註因虛勞而煩是虛煩也因虛煩而不得眠是虛煩不得眠也故主以酸棗仁湯專治虛煩去則得眠也
李氏曰虛勞不得眠者血虛生內熱而陰氣不斂也內經云氣行於陽陽氣滿不得入於陰陰氣虛則目不得瞑酸棗湯養血虛而斂陰氣也
酸棗湯方 酸棗仁二升 甘草一兩 知母二兩 桔芩二兩 芳菊二兩 右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮取三分分溫三服

五勞虛極氣瘦腹滿不能飲食傷寒陽飲傷房室傷肌膚傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛大黃䗪蟲丸主之註因虛勞而煩是虛煩也因虛煩而不得眠是虛煩不得眠也故主以酸棗仁湯專治虛煩去則得眠也
按緩中虛補四字當在不能飲食之下註是傳寫之誤註五勞所傷久之令人極虛氣瘦腹中虛滿不能飲食宜緩中補虛如前之建中等方也原其所傷之道不止過勞傷氣房室傷精也即飲食傷胃飢過傷脾渴過傷腎憂恚傷心悲極傷肝過言傷肺皆令人經絡榮衛氣傷是以勞熱前數內有乾血故肌膚不潤甲錯如鱗也兩目不榮黯黑不明也似此乾血之証非緩中補虛之劑所能治故主以大黃䗪蟲丸攻熱下血俾瘀積去而虛勞可復也註程林曰此條單指內有乾血而言夫人或因七情或因飲食或因房勞皆令正氣內傷血脈凝積致有乾血積於中而延氣見於外也血積則不能以濡肌膚故肌膚甲錯不能榮於目則兩目黯黑與大黃䗪蟲丸以下乾血則邪除正王矣非大黃䗪蟲丸能緩中補虛也○尤怡曰內有乾血不去道足以留新血而淤滯不周故去之不可不早也此方潤以濡其乾血以動其瘀通去其閉而以地黃芍藥甘草和養其虛攻血而仍該失血也

大黃䗪蟲湯方 大黃十分蒸熟 黃芩二兩 甘草三兩 桃仁一升 杏仁一升 芳藥四兩 乾漆一兩 蟬蟲一升 水蛭百枚 蟻蟻半升 蟲蠍一升 乾地黃十兩 右十二味煉蜜爲丸小豆大酒飲服五丸日三服

虛勞諸不足風氣百疾薯蕷圓方主之註虛勞諸不足者謂五勞諸虛百損也上條以熱傷乾血爲言此條以風氣百疾立論熱傷其上之血分則病肺癰熱傷其下之血分則病乾血風中其外之氣分則病肺瘧中其內之氣分則病百疾主之以薯蕷丸散諸風邪補諸不足滋諸枯槁調諸榮衛故其藥溫潤共劑補散同方也註徐彬曰虛勞不足証多有兼風者此不可着急治風氣故仲景以四君四物養其氣參苓冬阿膠姜大棗補其脾胃而以桔梗杏仁開提肺氣桂枝行陽防風運脾神麪開鬱黃芩宣腎柴胡升少陽之氣白芍化入榮之風雖有風氣未嘗專治之謂正氣運而風氣自去也然以薯蕷名丸者取其不寒不熱不燥不滑脾腎兼宜故多用以爲君則諸藥相助以爲理耳

薯蕷圓方 薯蕷三十克 當歸一錢 桂枝一錢 神麪一錢 乾地黃一錢 豆蔻卷各一分 乾姜三分 白芍三分 防風六分 大棗百枚爲膏 右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大盛腹酒服一丸一百丸爲劑

肺痿肺癰欬嗽上氣病脈証並治第七

問曰現在上佳者因欬爲肺痿肺痿之病從何得之師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快樂下利重亡津液故得

之曰寸口脈數其人欬口中必有濁唾此者何師曰為肺痿病若口中辟辟燥熱即胸中陰陽消長反胃數此為肺痿欬唾膿血証熱在上焦不咳不病肺痿也因熱病咳則為肺痿肺熱致痿之由非止一端或從汗出或從嘔吐或從消渴小便數利或從便難又彼快樂下之重亡津液故令肺熱乾痿也肺熱乾痿則清肅之令不行水精四布失度脾氣雖散精液上歸於肺而肺不但不能自滋其乾亦不能內潤陳於藏府外輸精於皮毛也其津液留於胸中得熱煎熬變為涎沫侵肺作咳唾之不已故乾者自乾唾者自喫愈唾愈乾痿病成矣若口乾辟辟乾燥不吐濁唾涎沫每咳即胸中隱隱而痛脈數而滑不數而虛則非肺痿乃為肺痿久則癰成膿潰不嗜涎沫而必欬喫膿血矣○周揚俊曰喻昌云行動數武氣即喘鳴衝擊連聲瘧始一應金匱治法貴得其精意大要緩而圖之生胃津潤肺燥下逆氣開積痰止濁唾補真氣以通肺之小管散火熱以解肺之清肅如半身痿廢及手足痿軟治之得法亦能復起而肺近在胸中呼吸所關可不致力乎肺癰屬在有形之血血結宜驟攻肺痿屬在無形之氣氣傷宜徐理癰為實誤以肺痿治之是為實實廢為虛誤以肺癰治之是為虛虛此辨証用藥之大略也然兩手寸口之脉原為手太陰肺脉此云寸口脉數云滑數云數實云數虛皆指右三部統言非如氣口獨主右關之上也其人欬口中反有濁唾涎沫項之遍地者為肺痿欬而口中不乾燥也若欬而口中辟辟燥則是肺已結痿肺熱之毒出現於口欬聲上下觸動其癰胸中即隱隱而痛其脈必見滑數有力正邪氣方盛之徵也數虛數實之脉以之分別肺痿肺癰是則肺痿當補肺癰當瀉也可知矣又云纔見久欬先須防此兩証肺癰由五藏蘊宗之火胃中停蓄之熱上乘于肺肺受火熱熏灼為之凝痰為之暴逐成小癰所結之形漸長則肺日脹而脇骨日昂廻至欬聲頻併痰濁如膠發熱畏寒日晡尤甚紅鼻燥胸生甲錯始先即能辨其脈証屬表裏寒極力開提攻下無不愈者迨至血化為膿肺葉朽壞傾囊吐出始識其証十死不救嗟何及矣○沈明宗曰此肺痿肺癰之辨也心居上腎水不足心火刑金為熱在上焦肺陰日消氣逆則欬致肺痿然本經明其始病之因或從病後陰虛過汗傷液嘔吐傷津消渴血虛津竭或利小便數而傷陰或大便難反被快藥下利而重亡津液以致肺金枯燥虛數黃赤故寸口脉數其人欬微氣弱不振津液不佈化為濁唾涎沫而成肺痿若口中辟辟燥熱即胸中隱隱痛者乃風寒侵入肺中凝滯榮血為癰故脈滑數而欬吐膿血因無形虛熱致痿故脉數虛因有形氣血凝滯成癰故脈數實此明肺癰屬表肺痿屬虛也○脈數虛者為肺痿數實者為肺癰註此詳申上條肺痿肺癰之脈也肺痿得之於熱亡津液虛邪也故脈數而虛肺癰得之於熱毒蒸熾實邪也故脉數而實潘碩甫云痿與癰皆氣在上焦其脈皆數皆欬亡津液未有異也但痿屬肺氣虛而亡津雖有熱亦不列故不致燥固雖欬而口中有濁唾涎沫故脈雖數而虛也癰則氣壅血凝邪實而熱列故津液亡而更覺乾涸口中辟辟燥熱即胸中隱痛津液既涸脈應濁滯而反滑數者畜熱屬膀胱故數實也○尤怡曰痿者萎也如草木之萎而不榮為津亡而肺焦也癰者壅也如土之壅而不通為熱聚而肺瘍也故其脈有虛實不同而其數則一也○問曰病欬逆脈之何以知此為肺癰當有膿血吐之則死其脈何類師曰寸口脉微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛氣不入熱過於榮吸不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則咳口乾喘滿咽燥不渴時嘔濁沫時振寒熱之所遇血為之凝滯蓄結癰吐如米粥始明可救膿成則死按肺癰之上當有肺

痀二字不然本文論肺痀之義則無着落必是脫間脈微之三微字當是三浮字微字文義不屬必是傳寫之謬註病欬逆者何以知為肺痀肺癰也欬而不渴濁唾涎沫脈數而虛是以脈証知為肺痀也口中乾燥胸中隱痛脈數而實是以脈証知為肺癰也至於所以受病之由肺痀前已言之而肺癰則未嘗言也故又取所以致熱而病肺痀肺癰之由互為詳悉發明也寸口肺脈也肺脈當浮濶而短今浮而數是以知浮則為風數則為熱初病風熱外搏皮毛則榮衛受邪故汗出而惡寒也末傳風熱內舍於肺則榮衛分病肺痀者屬風熱傷于衛氣氣分有津液而無血津液為之濁故其為證欬而不吐膿血唾濁涎沫也病肺癰者屬風熱傷於榮血分有血而無津液血為之凝蓄故其為証咳而不唾涎沫吐膿血如米粥也其發熱汗出惡寒惡風欬而喘滿咽燥不渴呼氣不入吸氣不出則為瘡癰互相兼有必然之証也呼氣不入吸氣不出乃言其呼吸氣促難出難入非竟不出入也始明可救謂肺傷尚淺膿成則死謂肺已壞矣益示人圖治於早又特為肺癰而詳諱言之也○肺癰喘不得卧茅蘆大棗湯主之註此承上條以明急治之義也肺癰者謂口中辟辟乾燥胸中隱隱作痛脈數寔也而更加喘不得卧是邪壅肺甚為故以茅蘆大棗湯大苦大寒峻瀉肺邪恐稍遷延膿成則死矣

茅蘆大棗湯方

茅蘆熟令黃色搗大棗子十二枚

大棗十二枚

右先以水三升煮棗取二升去棗內茅蘆煮取一升煩服

注趙良曰此治肺癰

吃緊之方也肺中生癰不渴何待忍日久膿已成濁之無益日久肺氣已索濁之轉傷乘其血結而膿未成當急以瀉之之法奪之况喘不得卧不亦甚乎

肺癰胸滿服一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸平咳逆上氣喘鳴迫塞一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸平是邪外塞皮毛內壅肺氣比之喘不得卧殆尤甚焉亦以茅蘆大棗湯者因其膿未成故也方見上

欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴皆出濁唾腥臭久吐膿如米粥者為肺癰桔梗湯主之註欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久吐膿如米粥者此為肺癰証也肺癰尚未成膿實邪也故以茅蘆之劑瀉之今已潰後虛邪也故以桔梗之苦甘草之甘解肺毒排膿也此治已成肺癰輕而不死者之法也注高世栻曰吐如米粥者亦膿也何以上文云膿成則死若謂如米粥者非膿上文既曰蓄結癰膿吐如米粥此又云吐膿如米粥既吐膿矣何有始萌膿成之別也余曰上文先咳逆而呼吸不利後凝滯而血脉成膿陰陽血氣皆傷故膿成則死若上節言肺癰而氣機不利此節言肺癰而經絡不和病陽氣者不傷陰病血脈者不傷陽病可治也如但以始明可救膿成則死二語盡之是以解宮志也莫可乎

桔梗湯方

桔梗一兩

甘草二兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服則吐膿血也

肺痀以涎沫而不欬者其人不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能治下故也此為肺中冷必眩多涎唾甘草乾姜湯以溫之若服湯已渴者屬消渴並咳而不吐涎沫者肺燥欬也欬而吐涎沫者肺熱痿也若似肺痀而氣機不利此節言肺癰而經絡不和病陽氣者不傷陰病血脈者不傷陽病可治也如但以始明可救膿成則死二語盡之是以解宮志也莫可乎

肺中冷則其人必不渴過尿小便數頭眩多涎唾所以然者以上焦陽虛不能約制下焦陰水集之水泛上而嘔涎沫用甘草乾姜湯以溫散肺之寒飲也如服湯已渴者屬消渴謂始先不渴服溫藥即轉渴者不但非肺中熱亦非肺中冷乃胃中熱也則不當以屬肺中冷寒飲治之當以屬胃中熱消渴治之也

甘草乾姜湯方

甘草四兩炙

乾姜二兩炮

右㕮咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

欬而上氣喉中水雞聲氣射干麻黃湯主之註欬逆上氣謂欬則氣上衝逆也上條發明不欬而吐涎沫者非為肺痿是為肺冷也此條發明欬而不吐涎沫者亦非肺痿亦為肺冷也上條以不渴小便數多嘔涎沫為肺中冷故以乾姜佐甘草是以溫中為主也此條以氣上逆喉中有水雞聲為肺經寒故以生姜佐麻黃是以散外為主也病同冷飲而有在外在內之別方同辛溫而有主溫主散之異也水雞聲者謂水與氣相觸之聲在喉中連連不絕也

射干麻黃湯方

射干三兩 麻黃四兩

生姜四兩

細辛 紫苑 款冬花各三兩

五味子半升

大棗七枚

半夏半升

右九味以

水一斗二升

先煮麻黃兩沸去上沫內諸藥上煮取三升分溫三服

解程林曰

欬而上氣如水雞聲連連不絕者是湯主之內經曰肺苦氣上逆急食苦以瀉之射干紫苑之苦所以泄逆氣也以辛瀉之麻黃生姜細辛半夏款冬花之辛所以瀉風邪也以酸收之以酸補之五味子之酸以補不足虛則補其母大棗之甘所以補其母也

大逆上氣咽喉不利止逆下氣者參門冬湯主之按大逆上氣之大字當是火字文義病藥始屬必是傳寫之謬註欬而上氣咽喉有水雞聲而連連者是寒飲上逆也今欬而上氣咽喉無水雞聲而不利者是火氣上逆也不利者謂咽喉若有物相礙不爽利也主之以參門冬湯以止其火逆下其上氣也

參門冬湯方

參門冬七升 半夏一升

人參三兩

甘草二兩

粳米三合

大棗十二枚

右六味以水一斗二升煮取六升溫服

升日三夜一服

集解周揚俊曰

喻昌云

此胃中津液枯燥虛火上炎之証參門冬湯乃治本之良法也夫用降火之藥而火反升用寒涼之藥治而熱轉熾者不惟無益而反害之凡病有胃氣則生無胃氣即死胃氣者肺之母氣也本草有知母之名者謂肺藉其清涼而知清涼為肺

之母也有貝母之名者謂肺藉其諂濟實陰為肺之母也然屢施於火逆上氣咽喉不利之証而屢不應名不稱矣乃孰知仲景有此妙法於參門冬人參甘草粳米大補中氣大生津液隊中增入半夏之辛溫一味其利咽下氣非半夏之功實善用半夏之功為擅古今未有之奇矣

欬逆上氣時時嘔膈但坐不得眠皂莢圓主之註欬逆上氣喉中有水雞聲者是寒飲衝肺射干麻黃湯証也欬逆上氣咽喉不利者是火氣衝肺參門冬湯証也今欬逆上氣唯嘔膈痰沫多也但坐不得卧氣逆甚也此痰氣為病非寒飲亦非火氣主之以皂莢丸者宣導其痰通達其氣也佐棗膏甘以藥性剽悍緩其勢也註程林曰濁唾壅塞於肺則不得卧故時時嘔濁也皂莢味辛鹹辛能散氣能營壅滯

利數消風莫過於此故歟逆上氣時時唾濁坐不得卧者宜之然藥性慄悍佐東膏甘以緩其約勢○魏萬形曰歟逆上氣時時吐濁但坐不得眠則較重於喉中水雞聲者妄聲滯有伏外感之因唾濁則內傷之故但坐不得卧而肺癰之証將成矣是上焦有熱痰血包裏結聚成患不可不急為宣通其結果而後可津液徐生枯乾潤也皂莢丸主之皂莢驅風理脾正為其有除瘀降垢之能也歟逆上氣時時吐濁胸膈惡臭之痰血已結可不急為滌湯使之湔洗不留乎冬用皂莢潔浴以除垢臟即此理也用丸俾徐潤化自上而下而上部方清若用湯直瀉無餘不能治上部之膠凝矣古人立法誠善哉此為預治肺癰將成者主治也

皂莢丸方

皂莢八兩剉去皮用附火

右一味末之蜜丸倍大以棗膏和湯服三九日三夜不服

上氣面浮腫肩息其脉浮大不治又加利尤甚註上氣謂歟逆上氣也面浮腫謂面目浮腫也肩謂喘也其脈浮大不治又加利尤甚謂脈証兩虛已屬不治又加利則上喘下利陰陽兩脫脈証相反故曰尤甚也集徐彬曰此言肺癰之証元氣憊者為難治也謂肺癰由風則風性上行必先上氣若兼面浮腫肩息氣升不降也又脈浮大元氣不能復斂則補既不可汗又不可況內外皆逆氣非風之比可盡汗泄乎故云不治加利則陽從上脫陰從下脫故曰尤甚○尤怡曰上氣面浮腫肩息氣但升而不降失脈復浮大則陽有上越之機脈偏盛者偏絕也又加下利是陰復從下脫矣陰陽離決故當不治肩息搖肩也歟上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脈浮大者越婢加半夏湯主之註歟而上氣此為肺脹其証肩息而喘目突如脫之狀今脈浮大則可知浮則為風大則為實故以越婢加半夏湯主之外疏皮毛內降氣逆也集趙良曰然而上氣則其氣之有衝而不下可知矣其歟之相連而已可知矣此皆屬肺之脹使之也邪入於肺則氣壅氣壅則歟不喘不可得惟喘極故目如脫所以狀脹與喘之至也脈浮邪也兼大則邪寔而所以遺害於肺正未有已故必以辛熱發之亦兼以甘寒佐之使久合之邪漸然冰釋豈不快乎然久蓄之飲何由得泄故特加半夏於越婢湯中一定之法也○尤怡曰外邪內飲填塞肺中為脹為喘為歟而上氣越婢湯散邪之力多而蠲飲之力少故以半夏輔其未逮不用小青龍者以脈浮且大病屬陽熱故利辛寒不利辛熱也目如脫狀者目暗脹突如欲脫落之狀雖氣然也

越婢加半夏湯方

麻黃六兩

石膏半斤

生姜三兩

大棗十五枚

甘草二兩

半夏半斤

右六味以水六升先煮麻黃去上沫

諸藥煮取三升分溫三服

集李爻曰脾運水穀主為胃行津液職卑如婢也湯名越婢者取發越婢氣通行津液之義也今治肺脹則麻黃

散表邪石膏清內熱甘草大棗養正護邪半夏生姜散逆下氣也

上氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈註上氣歎逆喘而躁急者屬肺脹也乃風鬱於外水逆於中之候也故曰歟作風水當發其汗故曰發汗則愈也集徐彬曰有邪者尚可治也若上氣但喘而躁則喘為風之扇躁為風之煩其逆上之涎沫將挾風勢而為風水今便先泄於肌表水無風戰自然順趣而從下故曰可汗而愈○肺脹放而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水小青龍加石膏湯主之註此承上條互詳脉証以明其治也肺脹歟而上氣煩躁而喘脈浮是外傷風寒內有水氣主以小青龍湯發汗則愈加石膏者因多一煩躁証也集沈明宗曰

此互詳上條肺脹治法也。風寒之邪入於營衛，挾飲上逆，則熱而上氣也。煩躁而喘，肺氣壅逆，謂之肺脹。即肺癰未成之初也。○尤怡曰：此亦外邪內飲相搏之証。而兼煩躁，則挾有熱邪。朴桂藥中必用石膏如大青龍之例也。又此條見証與上條頗同，而心下寒飲則非溫藥不能開而去之。故不用越婢加半夏而用小青龍加石膏溫寒並進，水熱俱捐於法，尤為密矣。

小青龍加石膏湯方 麻黃 半兩 桂枝 細辛 甘草 乾姜各三兩 五味子 半夏升 石膏二兩 右九味以水一斗先煮麻黃去上半內諸藥，取三升強人服。升羸者減之，三服小兒服四合。

解李氏曰：心下有水，麻黃桂枝發汗以泄水於外，半夏乾姜細辛溫

中，散水於內，約五味子收逆氣以平肝，甘草益脾土以制水，加石膏以去煩躁，兼能解肌出汗也。

熱而脈浮者，厚朴麻黃湯主之。脈沉者，澤漆湯主之。註謂熱而不一氣也。脈浮者，風寒病也；主之厚朴麻黃以散外邪為主也。脈沉者，飲病裡也。主之澤漆湯以逐內飲為主也。解尤怡曰：此不詳見証，而但以脈之浮沉為辨，而異其治。按厚朴麻黃湯與小青龍加石膏湯大同，則散邪蠲飲之力居多，而厚朴半溫亦能助表。小參甘平五味，安正氣者也。澤漆湯以澤漆為主，而以白前、黃芩半夏佐之，則下趣之力輕猛，雖生姜桂枝之辛亦祇為下氣降逆之用而已。不能發表也。仲景之意，蓋以飲皆肺邪而脈浮者，氣多居表，故驅之使從外出為易；脈沉者，氣多居裏，故驅之使從下出為易，亦因勢利導之法也。

厚朴麻黃湯方

厚朴五兩 麻黃四兩

石膏如雞子大

杏仁半升 半夏半升 乾姜二兩

細辛二兩 小麥一升

右九味以水一斗二升先煮小麥熟，去滓內諸藥者，取三升溫服。一日三服。

澤漆湯方

半夏半升 紫參五兩

澤漆三升，以東流水五斗煮取一升五升

生姜五兩 白前五兩

甘草 黃芩 人參 桂枝各三兩

右九味以咀內澤漆汁中煮取五升溫服。五合至夜盡。

細辛乾姜五味子石膏同用，即前小青龍加石膏為解表行水之劑也。然土能制水，而地道壅塞，則水亦不行，故用厚朴疏散土之土，使脾氣健運，而水自下泄矣。杏仁下氣去逆，小參入心經，能通水氣以火能生土，助脾而共成決水之功也。又云：脈沉為水，以澤漆為君者，因其功專於消痰行水也。水性陰寒，桂枝行陽氣以導之，然所以停水者，以脾土衰，不能制水，而地道壅塞，則水亦不行，故用厚朴疏散土之土，使脾補肺順肺，同為制水利水之方也。黃芩苦以泄之，半夏生姜辛以散之也。○沈明宗曰：詳金匱咳嗽病本乎肺，則大綱有三者：熱、州肺金氣弱，不振，欬而唾沫為肺，痿二者，風傷衛分，則病欬上氣喘為肺脹。二者，邪傳營血，凝而不行為肺癰。然肺脹之中，又分風寒表裏，飲多風少，風多飲少之治，故寒而躁，肺浮者為心下有水，欲作風水，當以小青龍兩解表裏，加石膏以清風熱，日如脫狀，乃風寒多而飲少，以越婢驅風加半夏而下痰逆，風寒外束，火熱內鬱，喉中水雜聲者，射干麻黃湯宣通表裏之邪氣，壅逆津液不佈化而為涎，時時嘔濁，但坐不得眠者，是炎丸以驅風鬱之涎，若欬而肺浮者，氣以厚朴麻黃湯俾從表解，然而肺沉邪入於營，將成肺癰，以澤漆而破壅結火逆，上氣咽喉不利，是無外邪治當參門。冬湯清潤滋降，若見浮腫肩息，脈浮大而下利，真氣上浮下脫，則為不治。以上皆外邪兼內飲合病，微

卷二十

訂正仲景全書金匱要略註中之一

奔豚氣病脈証并治第八

師曰病有奔豚者吐腹驚怖有火邪此四部病皆從驚恐得之按篇中祇有奔豚一証而吐腹驚怖火邪皆間脫必有缺文○師曰奔豚病從少腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之註奔豚者腎病也以其病從少腹上衝咽喉有如豚竄奔突之狀故名之也發作則腎氣上乘於心而欲死作已則氣衰復還於腎而止故其病雖有微甚不同然必皆從驚恐得之蓋驚傷心恐傷腎兩藏交病也水能勝火腎上凌心故治法宜溫腎而補心也註張從政曰驚者為自不知故也恐者為自知也○周揚俊曰少陰脈循喉嚨因其所繫之經而上衝殊便也○發汗後燒針令其汗鍼處被寒核起而亦者必發奔豚氣從少腹上至心灸其核上各一壯與桂枝加桂湯主之註此條與傷寒論同傷寒論中無發汗後三字而有太陽傷寒者加溫針必驚也十一字當從傷寒論為是蓋明所以致驚之由非止一端即寒侵針處亦能為是病也

夫太陽傷寒者加溫針必驚也謂病傷寒之人卒然加以溫針其心必驚非謂溫針之後必生驚病也燒針即溫針也燒針取汗亦汗法也針處宜當避寒若不知謹外被寒襲火鬱脈中血不流行所以有結核腫亦之患也夫溫針取汗其法亦為迅烈矣既針而榮不奉行作解必其人素寒陰盛也故雖有溫針之火但發核亦又被寒侵故不但不解反召陰邪而加針之時心既驚虛所以腎水陰邪得上凌心陽而發奔豚也集周揚俊曰

奔豚者腎水陰邪之氣從少腹上衝於心若豚之奔也先灸核上各一壯者外祛其寒邪繼與桂枝加桂湯者內伐其腎邪也註周揚俊曰奔豚北方腎邪也燒針令汗縱不合法與少陰何與而作奔豚蓋太陽相表裏也針處被寒核起而亦吾知前此之邪未散而後此之邪復入惟桂能伐腎邪也所以用桂加入桂枝湯中一以外解風邪一以內泄陰氣也先灸核上者因寒而腫惟灸消之也

桂枝加桂湯方 桂枝五兩 生薑三兩 大棗十二枚 右五味以水七升微火煮取三升去滓溫服一升

奔豚氣上衝咽喉發作驚是奔豚之甚者也氣上衝胸腹痛往來寒熱是奔豚之微者也甚者以桂枝加桂湯從腎逐陰降逆也微者以奔豚湯從心調血散逆也

奔豚湯方 甘草 芳窮 當歸各二兩 半夏四兩 黃芩二兩

生葛五兩 生薑四兩 甘李根白皮一升 右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服

集沈明宗曰用芳歸白芍甘草調食厥陰少陽血氣之正而邪自外出以生葛黃芩半夏生姜佐李根解半表半裡之寒熱而逆可散蓋奔豚雖屬腎病然兼厥陰少陽之邪而發者有之仲景用此方明非僅寒邪一端致然也

奔豚後臍下悸者欲作奔豚使苓桂枝甘草大棗湯主之註發汗後心下悸者心陽虛本經自病也臍下悸者腎邪乘虛上干心病也奔豚者臍下氣動而上衝也欲作奔豚者有似奔豚之狀而將作未作也伏苓桂枝甘草大棗湯所以補火土而伐水邪也上條發明外感寒邪能病

奔豚此條更申明內有水氣亦能病奔豚也註徐彬曰仲景論証每合數條以盡其變。蓋奔豚由於驚又言其從少腹衝至咽喉又言其兼腹痛而往來寒熱又言其兼核起而無他病又言汗後脅下悸欲作奔豚而未成者其淺深瞭然用和解用伐腎用桂不用桂的治微妙奔豚一証病因証治無復別義苟不尊仲景立方之義則峻藥畏用乎劑宜放葷古方不冥於今哉○周揚俊曰汗本心之液發汗而脅下病悸者心氣虛而腎氣動也

茯苓桂枝甘草大棗湯方 茯苓半斤 桂枝四兩 甘草二兩 大棗十五枚

升去滓溫服一升日三服一作甘潤水法取水三升置大盆內以杓搗之數千遍水上有珠子五六千顆相逐取用之

解程林曰汗後臍下悸者陽氣虛而腎邪上逆也臍下為腎氣發源之地茯苓泄水以伐腎邪桂枝行陽以散逆氣甘草大棗溫助脾土以制腎水前用

甘潤水者搗之無力全無水性取其不助腎邪也

胸痺心痛短氣病脈証并治第九

師曰夫脈當取太過不及陽微陰弦即胸痺而痛所以然者責其極虛也今陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其陰弦故也註脈太過則病不及亦病故脈當取太過不及而候病也陽微寸口脈微也陽得陰脈為陽不及上焦陽虛也陰弦尺脉弦也陰得陰脈為陰太過下焦陰寒也凡陰寒之邪皆得以上乘陽虛之胸所以病胸痺心痛胸痺之病輕者即今之胸滿重者即今之胸痛也註李氏曰內經云胃無平者不可見太過不及則病見矣寸脈為陽以候上焦正應胸中部分若陽脈不及而微則為陽虛主病上焦故受病胸痺尺脈太過而弦則為陰盛知在下焦故上逆而為痛也○尤怡曰上焦為陽之位而微脈為虛之甚故曰責其極虛平人無寒熱短氣不足以息者實也註平人無病之人也無寒熱無表邪也平人無故而有短氣不足以息之証不可責其虛也此必邪在胸中煩而不通阻礙呼吸當責其寒也註李氏曰上節實其極虛此又云實同也經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病為寔是也然短氣與少氣有辨少氣者氣少不足以言內經云言而微終日乃復言者此奪氣是也短氣者氣短不能相續似喘非喘若有氣上衝故似喘而不搖肩似呻吟而無痛是也尤怡曰平人素無疾之

人也無寒熱無新邪也而乃短氣不足以息當是裏氣因邪而寔或痰或飲或食碍其升降之氣而然也○胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣寸口脈沉而遲關上小緊數桔梗薤白白酒湯主之註寸口脈沉而遲沉則為裡氣滯遲則為藏內寒主上焦藏寒氣滯也關上小緊而疾小為陽虛繁疾寔痛是主中焦氣急寒痛也胸背者心肺之宮城也陽氣一虛諸寔陰邪得以來之則胸背之名癰而不通暢者病滿重者病痛之必然也喘息欬唾短氣証之必有也主之以桔梗薤白白酒湯者用辛以開胸痹用溫以行陽氣也註趙良曰凡寒濁之邪滯於上焦則阻其上下往來之氣塞其前後陰陽之位遂令為喘息為欬唾為病為短氣也○程林曰胸中者心肺之分故作喘息咳嗽也諸陽受氣於胸而轉行於背氣壅不行則胸背為病而氣為短也

桔梗白白酒湯方 桔梗一枚搗 薤白半斤 白酒七升

右三味同煮取二升分溫再服

胸脾不得卧心痛微者枯萎薤白半夏湯主之註上條胸脾背痛而能卧以痛微而氣不逆也此條心痛微背不得卧是痛甚而氣上逆也故仍用前方大加半夏以降逆也解尤怡曰胸脾不得卧是胸中痛甚肺氣上而不下也心痛微背是風閉塞而前後不通故也其脾為尤甚所以然者有痰飲以為之援也

枯萎薤白半夏湯方
枯萎一枚搗
薤白二兩
半夏半升
白酒一斗

右四味同煮取四升溫服一升日三服

解魏荔彤曰用半夏集李氏曰緩急者或緩而痛暫止或急而痛復作

之苦以開鬱行氣痛甚則結甚故源薤白之濕用半夏之燥更能使膠膩之物隨湯而湯滌也日三服亦從上治者應深取頻服也心痛微背背痛微心烏頭赤石脂圓主之註上條心痛微背尚有休止之時故以枯萎薤白白酒加半夏湯平劑治之此條心痛微背痛微心是連連痛而不休則為陰寒邪甚浸淫乎陽故烏非薤白白酒之所能治也故以烏頭赤石脂圓主之方中烏附椒姜一派大辛大熱別無他顧峻逐陰邪而已解李氏曰心痛在內而微有則內而達於外矣背痛在外而微心則外而入於內矣故既有附子之溫而復又用烏頭之迅佐乾姜行陽太散其寒佐蜀椒下氣大開其鬱恐過於大散大開故復佐赤石脂入心以固澀而收陽氣也

赤石脂圓方
蜀椒一兩
烏頭一分泡

附子半兩地一

赤石脂一兩

乾姜一分

右五味末之蜜丸如梧子大先食服一丸

日三服不止稍加服

胸脾緩急者薏苡附子散主之註緩急者謂胸脾痛而時緩時急也當審其緩急而施治若緩而不急者以枯萎薤白白酒湯主之今時緩時急故以薏苡附子散急通脾氣以迅掃陰邪也

薏苡附子散方
薏苡仁十五兩
大附子一枚炮

右二味杵為散服方寸匕日三服

解李氏曰緩急者或緩而痛暫止或急而痛復作

也薏苡仁入肺利氣附子溫中行陽為散服則其效更速矣○魏荔彤曰薏苡少入魚膾附子溫中散邪為邪盛甚而陽微亦甚者立速胸脾胸中氣塞短氣從苓杏仁甘草湯主之橘枳姜湯亦主之註胸脾胸中急痛胸脾之重者也胸中氣塞胸脾之輕者也胸為氣海一有其隙若陽邪干之則化火性氣閉不病脾也若陰邪干之則化水水性聚合故令胸中氣塞短氣不足以息而為胸脾也水氣盛者則氣促主以茯苓杏仁甘草湯以利其水利氣順矣氣盛水者則痞塞主以橘枳生姜湯以開其氣氣開則脾通矣註沈明宗曰邪氣阻塞胸膈肺氣不得往來流利則胸中氣塞短氣方用杏仁使肺氣下通以從苓導引濕下行甘草和中俾邪去則脾開而氣不短矣然胸脾乃胸中氣塞上濕寒濁陰氣以挾外邪上逆所致橘枳生姜善於散邪下濁所以亦主之○魏荔彤曰此証乃邪寔而正不甚傷微而陰不甚盛益虛則氣必塞氣塞則必短氣前言之矣今開降其氣而諸証自除矣

茯苓杏仁甘草湯方
茯苓三兩

杏仁五十個

甘草一兩

三味以水一斗煮取五升溫服

一日三服不差更服

橘皮枳實生姜湯方
橘皮一斤

枳實三兩

生薑半斤

右三味以水五升煎取二升分溫再服

胸脾心中癰氣結在胸腹滿脹下連擔心枳實白桂枝湯主之人參湯亦主之註心中即心下也胸脾病心下痞氣悶而不通者虛也若

不在心下而氣結在胸中，滿脹下氣逆，撞心者是也。實者用枳實，薤白，桂枝湯主之。倍用枳朴者是以破氣降逆為主也。壅者用人參湯主之。即理中湯是以溫中補氣為主也。由此可知，有補法寔因塞用之義也。集解魏荔彤曰：胸牌自是陽微陰盛矣。心中痞氣結在胸正胸牌之病狀也。再運脅下之氣俱逆而搶心則腹飲水氣俱乘陰寒之邪動而上逆。胸胃之陽氣全難支拒矣。故用枳實、薤白、桂枝湯行陽開鬱溫中降氣，猶必先後着治以融和其氣味，俾緩緩蕩除其結聚之邪也。再感虛寒已甚，無敢恣為開破者。故人參湯亦主之。以溫補其陽使正氣旺而邪氣自消也。○尤怡曰：心中痞氣，氣輝而成痞也。脅下逆搶心氣逆不降，將為中之害也。用此二方者，一以去邪之寔，即以安正；一以養陽之虛，即以逐陰寔。在審其病之新久與氣之虛實而決之。

枳實薤白桂枝湯方

枳實四枚

厚朴四兩

薤白半斤

桂枝一兩

桔梗實一枚搗

右五味以水五升先煮桔梗厚朴取三升去滓

內諸藥煮數沸分溫三服。

人參湯方

人參一兩

甘草三兩

乾姜三兩

白朮各三兩

右四味以水八升煮取三升溫服一升日三服。

心中痞諸逆心懸痛，桂枝生姜枳實湯主之。註心中痞即上條心中痞氣也。諸逆氣上逆也。上條之逆不過撞心而不痛此條之逆則心懸而空痛如空中懸物動搖而痛也。用桂枝生姜枳實湯通陽破逆氣痛止痞開矣。註程林曰：諸逆如脅下逆搶心之類，邪氣獨留於上則心懸痛。○尤怡曰：諸逆該疾飲客氣而言心懸痛謂如懸物搖動而痛逆氣使然也。

桂枝生姜枳實湯方

桂枝三兩

生姜三兩

枳實五枚

右三味以水六升煮取三升分溫三服。

桂枝生姜枳實湯解

趙良曰：枳實生姜原以治氣塞況

於痞乎？故較前條稍減數分而使痞者下其氣以開之。懸痛屬飲者得生姜以散之既足建功矣。乃去橘皮而用桂枝者以所逆非一或通陽氣或破結氣或散寒氣皆能去病也。

腹滿寒疝宿食病脈証并治第十

趺陽脈微弦法當腹滿不滿者必便難兩胠疼痛此虛寒從下上也。當以溫藥服之。註趺陽胃脈也。當緩而和今見弦脈是肝脈也。肝脈見於脾部是木盛土虛也。法當腹滿今不腹滿者肝脈微弦不盛而脾不虛故脾未受病也。肝自舒則失其條達之性必本經自病故便難兩胠痛也。然非肝火實為此乃虛寒從下上也。當以溫藥服之。○腹滿時減復如故此為寒當與溫藥。按此篇無治虛寒腹滿之方。當以溫藥之下當有宣厚朴生姜甘草半夏人參湯主之。十四字必是脫間關傷寒論太陰篇自知。註此承上條互詳其証以明其治也。腹滿便難脾實病也。今腹滿而不便難脾虛病也。且腹滿有時而減有時復如不滿乃虛寒也。當與溫藥主之以厚朴生姜甘草半夏人參湯消滿散寒緩中降逆補虛乃治虛滿之法也。註魏荔彤曰：腹滿或服下約或服補藥有時減退未幾腹滿如故則不可作實與熱治也。○仲景明此為寒症寒從無下法惟有溫藥與服盛者以溫中補氣實者亦以溫中行氣為義。治氣寒腹滿第一善法也。

厚朴生姜甘草半夏人參湯方

厚朴半斤

生姜半斤

人參一兩

甘草三兩

半夏半斤

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服

一升日三服

腹滿不減減不足言當須下之宜大承氣湯註腹滿時減時滿虛滿也腹滿常常而滿虛滿也腹滿不減減不足言謂腹滿不減雖減不過稍減不足言減也虛滿當溫實滿當下故且大承氣湯下之此治寔滿之法也

集尤怡曰減不足言謂雖減而不足云減所以形其滿之至也故

宜大下所謂中滿者濁之於內也

大承氣湯方見前瘧病中

病有腹滿按之不痛為虛痛者為實可下之嘗黃木下者下之黃自去註前條腹滿以時滿時不減別虛實此條腹滿以痛不痛辨有餘不足也腹滿按之不痛為虛虛者脾虛也可溫之則當與厚朴生姜甘草半夏人參湯也按而痛者為實是者胃實也可下之當與大承氣湯胃是者舌胎必黃若木下者下之黃胎自去也

註趙良曰腹滿亦有屬寔寔則非虛寒也明矣豈概以溫藥治之乎故有試之之法在痛與不痛之

分虛實較然矣蓋胃寔必熱熱蒸必古黃下其是熱古黃不自己乎有此一辨并虛者愈審已

魏荔彤曰無形之虛氣作痞塞則按之無物

何獨之有倘淡有形之寔物為患如宿食在胃燥氣在少腹等是也按之有物阻礙於藏府之側焉有不痛者乎是於按之痛否以決其虛實

之法也○病者發黃躁而不渴胸中寒寔而利不止者死

按躁而不渴當是燥而不渴又始順胸中寒寔當是胃中寒寔若是胸中寒寔如

何曰下利不止者死必是傳寫之謬

註病者面色發黃若口燥而渴者熱寔也今發黃口燥不渴寔寔也寒寔者當不下利若下利是寒虛也

今下利不止乃寒虛氣下脫故死也

註程林曰發黃者脾胃病也見燥而渴者為熱不渴者為寒病人既發黃又兼下利不禁則脾氣衰絕

故死○李少白曰下利若燥而渴者為熱陽氣尚存猶為可治若燥而不渴胃中寒邪盛也若利不止則陰盛陽衰氣下脫矣故死

夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必衝不衝者心下則痞

註此承上條寒寔誤以寒藥下之之義也瘦人形氣虛弱難擗

外邪若繞臍痛必有風冷傷胃致令穀氣不行也繞臍疼痛雖屬寒邪但因風冷則為寒寔醫者當溫而行之今反以寒藥下之其風冷之邪

若上虛則氣上衝中虛則痞結心下理必然也

註尤怡曰瘦人藏虛氣弱風冷易入則穀氣留滯不行繞臍疼痛有似裏寔而寔為虛冷是

宜溫煥以助脾之行乃反下之穀出而風冷不順俱出正乃益虛邪乃無制勢必上衝若不衝者心下則痞○寸口脈弦者即腸下拘急而痛

其人當嘔惡寒也註此詳申首條兩胠疼痛屬寒之義也寸口脈弦即首條之弦也腸下拘急而痛即首條之弦也肝脈循腸裡寒主收引故腸下拘急

然必知其人有陽虛當惡寒之証始為肝寒而痛也即有腹滿亦當溫之可也

註程林曰弦肝脈陰也肝脈循腸裡寒主收引故腸下拘急

而痛以寒勝於內而陽氣不行於外故外亦當嘔而惡寒也○夫中寒家喜其人清涕出發熱色和者善嚏註中寒家謂素有中寒疾之人也前以時感辨腹滿之中寒又以惡寒辨腹痛之中寒此以喜久清涕出而以辨心胸之中寒也久者呵欠也夫人欲睡喜寔者陰引陽也睡覺寔者陽引陰也本中寒喜久者是陰盛引陽也年老人清涕出者是陽虛也若發熱色和者非為中寒也乃為外寒所搏雖有清涕出亦因善嚏而出也○中寒其人下利以裏虛也欲嚏不能此人肚中寒病

人腹中寒也蓋嘔嘔者雷氣之義也其人內陽外陰陽氣俱發而為嘔也今欲嘔不能嘔是陽欲出而復留陰氣盛也故知腹中寒也

集沈明

宗曰此脾經受寒現証也寒中太陰陰寒凝陽虛不因其人下利但通多不足故為裡虛益陽和則嘔而欲嘔不能乃陰寒凝滯於裡所以

肚中病也○腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐附子粳米湯主之註腹中切痛寒也腹中雷鳴氣也腹中寒氣故雷鳴切痛而胸脇逆滿者

腸胃之外寒氣為之也腹痛雷鳴嘔吐者腸胃之中寒氣為之也主之以附子粳米湯勝寒氣和內外此治腹中寒之法也

附子粳米湯方

附子一枚

大黃半升

半夏半升

甘草一兩

大棗十枚

粳米半升

右五味以水一升煮取米熟湯成去滓溫服一升每日三服

心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛不可觸近大建中湯主之註心胸中大寒痛謂腹中上連心胸大痛也而名

大寒痛者以有厥逆脈伏等大寒証之意也嘔逆不能飲食者是寒甚拒格於中也上衝皮起出見頭足者是寒甚聚聚於外也上下痛不可

觸近是內而藏府外而經絡痛之甚亦由寒之甚也主之以大建中湯薦椒乾姜大散寒邪入參膠餡大建中虛服後溫覆令有微汗則寒去

而痛止此治心胸中寒之法也

大建中湯方

蜀椒二合去汗

乾姜四兩

人參二兩

右三味以水四升煮取一升去滓內膠餡一升微火煎取一升半分溫再服如一

寒氣厥逆赤圓主之

按此條之文之方必有簡脫難以為後世法不釋

赤丸方

茯苓四兩

半夏四兩先一

方用桂

烏頭二兩炮

細辛一兩

右四味末之真朱為色煉丸九如麻子大先食酒飲下三丸日再夜一

服不知稍增之以知為度

腹滿可飲粥二升後更服當一日食糜溫覆之

寒氣厥逆赤圓主之

按此條之文之方必有簡脫難以為後世法不釋

厚朴三物湯方

厚朴三兩

大黃四兩

枳實五枚

右三味以水一斗二升先煮二味取五升內大黃煮取三升溫服一升以利為度

其脈數而緊乃弦狀如弓弦按之不移脈弦數者當下其寒脈緊大而遲者必心下堅脈大而緊者陽中有陰下之

按其脈數而緊乃弦狀如

弓弦按之不移脈弦數者之十九字當是衍文閱傷寒論辨脈法自知當下其寒之四字當依必心下堅之下文義始屬註脈緊大而遲者必

半堅緩乃寒寢也當下其寒脈大而緊者陽中有陰也大者陽實脉者寢也故可下之○脇下偏痛發熱其脈緊弦此寒也宜溫藥下之以

大黃附子湯按脇下偏痛之偏字當是滿字必是傳寫之誤註腹滿而痛脾實邪也脇下滿痛肝寢邪也發熱若脈數大胃熱寢邪也今脈緊

弦脾實實邪也當以溫藥下之故以大黃附子湯下其寒寢方中佐細辛者以散其肝邪此下肝脾寒寢之法也

註尤怡曰脇中滿痛而

脈緊弦寢成聚也雖有發熱亦是陽氣被鬱所致是以非溫不能已其寒非下不能去其結故曰宜以溫藥下之

大黃附子湯按脇下偏痛之偏字當是滿字必是傳寫之誤註腹滿而痛脾實邪也脇下滿痛肝寢邪也發熱若脈數大胃熱寢邪也今脈緊

弦脾實實邪也當以溫藥下之故以大黃附子湯下其寒寢方中佐細辛者以散其肝邪此下肝脾寒寢之法也

註尤怡曰脇中滿痛而

大黃附子湯方

大黃二兩

附子一枚

細辛二兩

右三味以水五升煮取二升分溫三服

服後如人行

病腹滿發熱十日脈浮而數飲食如故厚朴七物湯主之。註病腹滿裡証也發熱裡熱也然十日脈浮而數表熱猶未已也飲食如故胃然能消穀也因胃熱裏實表熱發熱故用厚朴七物湯表裡均解腹滿發熱兩除也此桂枝湯小承氣湯之複方也。註程林曰腹滿者內有實熱也。

十日脈尚浮而數浮為在表表熱邪未已故發熱數為在裏裏熱能消穀故飲食如故與此方蕩腹滿而除表熱表裏俱實當先解表乃可攻裏今表邪微而裏邪甚故用承氣桂枝二湯相合以和表裏如傷寒之用大柴胡此其義也。厚朴七物湯方 厚朴半斤 甘草三兩 大黃二兩 大棗十枚 加實五枚 桂枝二兩 生姜五兩

服八合日三服嘔者加半夏五合 下利去大黃 寒多者加生姜至半斤

按之心下滿痛者此為實也當下之宜大柴胡湯。按之心下滿痛之下當有有潮熱之三字若無此三字則不當與大柴胡湯必是傳寫之遺。註按之心下滿痛者潮熱此為表裏俱實當下之宜大柴胡湯兩解之此二治者下實滿之法也。

大柴胡湯方 柴胡半斤 黃芩三兩 芍藥兩 半夏半斤洗 杞實四枚炙 大黃二兩 大棗十二枚 生姜五兩

斗一升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服

腹痛脈弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則不欲食邪正相搏即為寒疝繞脇痛有發則白汗出手足厥冷其脈沉緊者大烏頭煎主之。按此條脈重出一條有証無脈其脈沉緊者之五字當在下條裡急之下然脈弦而緊是勁急之甚當屬疝病之重者其白汗之白字當是自字下條其脈沉緊是裡痛之脈當屬寒疝之輕者必是傳寫之謬。註疝病犯寒即發故謂之寒疝也其病發則繞脇少腹急痛惡寒汗出手足厥冷不欲飲食脈弦而緊主急主痛此寒疝應有之証脈也主之烏頭煎者是專以破邪治標為急虛實在所不論故曰強人服七合弱人服五合也。

烏頭煎方 烏頭去皮不咬咀

大者五枚熟

右以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令水氣盡取二升強人服七合弱人服五合不差明日更服不可一日再服

寒疝腹中痛及腸痛裡急者當歸生姜羊肉湯主之。按腸痛裏急之下當有上條其脈沉緊四字。註寒疝腹中痛及腸痛裡急脈見沉緊較之繞脇古痛輕矣且無寒汗出手足厥冷故不用烏頭煎之大溫大散而用當歸生姜羊肉湯養正為本散寒為次此治寒疝之利劑也。服烏頭煎病勢退者亦當與之。註李少白曰疝屬肝病肝藏血其經布脇肋腹脇并痛者血氣寒而凝澀也當歸通經活血生姜溫中散寒裡急者內虛也用羊肉補之內經云形不足者溫之以氣精不足者補之以味是也。○沈明安曰按此速衝脈為疝治當溫補也。肝木受邪乘脾則腹中痛本經之氣不舒故腸亦痛速及衝脈則裡急矣所以當歸補養衝任而散風寒羊肉溫補少衝之氣脾邪散而痛自止方後云痛而多嘔乃肝氣上逆臨胃故加橘木補之。

當歸生姜羊肉湯方 當歸三兩

生姜五兩

羊內一斤

右三味以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒多者加生姜成一斤痛多

而嘔者加橘皮一兩白朮一兩加生姜者亦加水五升煮取三升二合服之

寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能取效則急以烏頭煎加桂枝湯五合以解內外之寒也註徐彬曰起於寒疝腹痛而致逆冷手足不仁則陽氣太痺加以身疼痛榮衛俱不和更灸刺諸藥不能治是或攻其外或攻其內邪氣牽制不服也故以烏頭攻寒為主而合桂枝全湯以和榮衛所謂七分治裡三分治表也

烏頭桂枝湯方

烏頭

右一味

蜜三斤

煎減半去滓

以桂枝湯五合解之

令得一升初服二合

不知即服三合

又不知復加至五合其知

者如醉狀得吐者為中病

方解以桂枝湯五合解之者溶化也

令得一升謂以烏頭所煎之蜜五合加桂枝湯五合溶化令得一升也

不知又不效也其知者已效也

如醉狀外寒方散得吐者內寒已伸故為中病也

問曰人病有宿食何以別之

師曰寸口脈浮而大按之反濶尺中亦微而濶故知有宿食

大承氣湯主之

按寸中亦微而濶二字當據傷寒

論作大字是

註宿食病即今之傷食病也

謂食隔宿不化也

人病腹滿而痛何以別之

為宿食也寸口脈浮而大按之反濶謂按且大且濶且

有力也關上尺中亦然

大濶有力為寢而不利故知有宿食也

當已伸故為中病也

問曰人病有宿食何以別之

師曰寸口脈浮而大按之反濶

按寸中亦微而濶二字當據傷寒

論作大字是

註宿食病即今之傷食病也

謂食隔宿不化也

人病腹滿而痛何以別之

為宿食也寸口脈浮而大按之反濶謂按且大且濶且

有力也關上尺中亦然

大濶有力為寢而不利故知有宿食也

當已伸故為中病也

問曰人病有宿食何以別之

師曰寸口脈浮而大按之反濶

按寸中亦微而濶二字當據傷寒

論作大字是

註宿食病即今之傷食病也

謂食隔宿不化也

人病腹滿而痛何以別之

為宿食也寸口脈浮而大按之反濶謂按且大且濶且

有力也關上尺中亦然

大濶有力為寢而不利故知有宿食也

當已伸故為中病也

問曰人病有宿食何以別之

師曰寸口脈浮而大按之反濶

按寸中亦微而濶二字當據傷寒

論作大字是

註宿食病即今之傷食病也

謂食隔宿不化也

人病腹滿而痛何以別之

為宿食也寸口脈浮而大按之反濶謂按且大且濶且

有力也關上尺中亦然

大濶有力為寢而不利故知有宿食也

當已伸故為中病也

問曰人病有宿食何以別之

師曰寸口脈浮而大按之反濶

按寸中亦微而濶二字當據傷寒

論作大字是

註宿食病即今之傷食病也

謂食隔宿不化也

人病腹滿而痛何以別之

為宿食也寸口脈浮而大按之反濶謂按且大且濶且

有力也關上尺中亦然

大濶有力為寢而不利故知有宿食也

當已伸故為中病也

瓜蒂散方

瓜蒂一分

註根黃

赤小豆一分者

右二味杵為散以香豉七合煮取汁和散一錢七溫服之不吐者少加之以快吐為度而止亡血

脈緊如轉索無常者有宿食也

註轉索無常緊脈之狀也

若浮緊傷寒沉緊令病冷犯胃脘穀氣不行故曰有宿食也

脈緊頭痛風寒腹中

註云寸

腰脊不強故也然脈緊亦有辨浮而緊者為傷寒沉而緊者為傷食甲乙經曰人

緊甚傷於寒氣口緊甚傷於食則寒與食又以左右手為

辨己是以知腹中有宿食不化也

五藏風寒積聚病脈証治第十一

肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫脹。按身運而重當是頭運而身重冒而腫脹當是冒風而腫脹始與文義相合此必傳寫之謬可知。註肺主氣外合皮毛。肺中風邪風傷氣則津結不行故口燥風傷肺則氣逆上壅故喘咳頭運而身重者氣傷而力乏也。冒風而腫脹者皮傷風水也。註李少曰肺主氣風邪中之則氣壅而津液不行故口燥氣逆而呼吸不利故氣喘也。○肺中寒吐濁涕。註肺中寒邪胸中之陽氣不治則津液聚而不行故吐濁涎如涕也。註李少曰五液入肺為涕肺合皮毛開竅於鼻從皮毛而入於肺則肺竅不利而鼻塞涕唾濁涎壅不通吐出於口也。○肺死藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死。註肺中風寒之邪股若見浮之極虛按之弱如葱葉之空下無根者乃肺藏之死脈也。以下五藏俱言浮者是明外中之邪應得之脈也。註程林曰真肺脈至如以毛羽中人膚非浮之虛乎葱葉中空按之弱如葱葉下又無根則浮毛虛弱是無胃氣也此真藏已見致死。○肝中風者頭目瞤兩脇痛行常僵令人嗜甘。註肝主風外合於筋肝中風邪風勝則動故頭目瞤動肝之部肝受病故兩脇痛也。風傷筋故行常僵也。肝苦急故甘緩之故令人嗜甘也。集徐彬曰高顛之上惟風可到風性搖動兩臂不舉舌本燥喜太息胸中痛不得轉側食則吐而汗出也。按兩臂不舉舌本燥一句而汗出三字文義不屬必是錯簡不釋。註肝性條達氣行於胸側肝中寒邪故有氣抑不伸喜太息氣滯不行痛不得轉側也。肝苦急故曲如蛇行也。○肝者頭目瞤浮之弱按之如索不來或曲如蛇行者死。注肝中風寒之邪若脈見浮之極弱按之不弦是失其肝之本脈也。今按之如索不來曲如蛇行而考夫索曲蛇行去而不來非皆肝藏之死脈乎。註周揚俊曰按之如索則弦緊俱見脈有來去乃陰陽往復之理今曰不來但去是無胃氣也否則真氣將散出入口強勉有委而不前屈且難伸之狀故曲如蛇行也。○肝者其人常欲蹈其胸上先未苦時但欲飲熱旋覆花湯主之。其旋覆花湯主之六字與肝者之病不合當是衍文。註肝者為肝氣者而不行政胸痞塞不快也故其人常欲按摩其胸以疏通其氣也。其先未曾痞塞苦時但欲飲熱有乃寒氣為病也。集李少曰肝主疏泄者則氣得不伸常欲人蹈其胸上以舒其氣又以寒氣固結於中欲飲熱以勝其寒也。○心中風者翕翕發熱不能起心中飢食即嘔吐。注翕翕發熱中風之本証也不能起心中飢食即嘔吐文義不屬必是錯簡不釋。○心中寒者其人苦病心如破蒜狀劇者心痛微背痛微心譬如意蠶其脈浮者自吐乃愈。注其人病苦心如破蒜狀謂辛辣刺心之狀也。劇者心痛微背痛微心謂心背相應而痛也譬如蠶注謂似蟲之往来不已而痛也。此皆心中寒邪之証若其脈浮是心得本脈為寒邪上越之候故自吐則邪去乃愈也。集徐彬字當是沉字沉為腎脈文義相屬必是傳寫之謬。心傷者謂心傷病之人也因其人勞倦則擾真心心陽之盛於上故面赤也。上盛則下虛故下重而無力也。心中痛自煩發熱當脣跳其脈沉腎來心傷之所致也。註尤怡曰心傷者其人勞倦即頭面赤而下重心中痛而自煩熱當脣跳其脈弦為心藏傷所致也。按其脈弦之弦曰寒則為陰邪外束之則火內鬱故如破蒜狀其似辣而非痛也。劇則邪盛故外攻背痛內攻心痛微者相應也譬如蠶注狀其綿綿不息若脈浮是邪未結故自吐而愈。○心傷者其人勞倦即頭面赤而下重心中痛而自煩熱當脣跳其脈弦為心藏傷所致也。按其脈弦之弦上盛者其下必虛也。心中痛而自煩發熱者心虛失養而熱動於中也當脣跳者心動於上而腎動於下也。○邪哭使魂魄不安者血氣少也。

血氣少者屬於心心氣虛者其人則畏合目欲眠夢遂行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者為癲陽氣衰者為狂按陰氣衰者為癲之癲字當是狂字陽氣衰者為狂之狂字當是癲字內經曰重陰者癲重陽者狂必是傳寫之謬註邪火為心傷之人無故而渴也邪火則使人魂魄不安心之血氣少也血氣少而心虛則令人畏合目欲眠則夢遂行此是精神離散魂魄妄行也心之血陰也陰過衰則陽盛陽盛則為病狂之心之氣陽也陽過衰則陰盛陰盛則病癲也○心死藏浮之寢如九豆按之益躁疾者死註心中風寒之邪若脈見浮之極寢如九豆之狀按之益勁躁急亂動者乃心藏死脈也集李氏曰難經云心脈浮大而散若浮之實如麻豆按之益躁疾則真藏脈見胃氣全無故死內經云真氣短皆脾經証也注李氏曰風屬陽邪而氣躁泄形如醉人言其面赤而四肢軟也風氣內擾故腹中煩重皮目上下眼胞也○脾死藏浮之大堅按之如覆杯潔潔狀如搖者死註脾中風寒之邪若脉見浮之大堅失其和緩按之狀如覆杯高草明潔有力如搖者脾藏之死脈也集李氏曰脉弱以滑是有胃氣浮之大堅則胃氣絕真藏脉見矣覆杯則內空潔潔者空而無有之象也狀如搖者脈躁疾不寧氣將散也故死趺陽脈浮而濶浮則胃氣強滿則小便數浮濶相搏大便則堅其脾為約麻子仁丸主之按此條當在腹滿篇中便難之下必是錯簡在此註邪也集徐彬曰脾約病用凡不作湯者取其緩以開結不敢驟傷元氣也要知人至脾約皆因元氣不克津液不到所致耳○李氏曰趺陽胃脈也胃為水穀之海浮為陽脈胃氣強而能食小便數則津液亡故脉濶蓋脾主為胃行津液此以胃強脾弱約束津液不能四布但輸膀胱致小便數而大便堅也麻子仁丸通幽潤燥

麻子仁丸方 麻子仁二升 芒硝半斤 枳實一斤 大黃一斤 厚朴一尺 杏仁一升 右六味末之煉蜜為丸梧子大飲服十九日

三以知為度

腎着之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣裡冷濕久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘姜苓朮湯主之

按腎缺中風中寒一條必是脫簡註腎着謂腎為寒濕所傷者而不行之為病也腎受寒濕故體重腰冷如坐水中雖形如水腫之狀反不渴而小便自利非水也乃濕也飲食如故以病屬下焦腎而不屬中焦脾故也詢其所心得之之由身勞汗出衣裡冷濕久久傷之也是以腰下冷痛寒勝也腹重濕勝也如帶五千錢形容重者甚也甘姜苓朮湯補土以制水散寒以除濕也集尤怡曰其病不在腎之中藏而在腎之外府督治不在溫腎以散寒而在健土以勝水也

甘草乾姜後苓白朮湯方

甘草二兩

白朮二兩

乾姜四兩

茯苓四兩

右四味以水共煮取三升分溫三服腰中即溫

腎死藏浮

注尤怡

之堅按之亂如轉丸益下入尺中者死註腎中風寒之邪若見浮之極堅按之亂動有如轉丸及下入尺中通然亂動皆腎發藏之脈也註集程林曰堅藏死浮之堅與內經齊辟如彈石曰腎死同意皆毀之象也按之則亂如轉丸下入尺中者此陰陽離決之狀也故死以上真藏與內經互有異同總之脈無胃氣現於三部中脈象形容不一也○問曰三焦竭部上焦竭善噫何謂也師曰上焦受中焦氣未和不能消穀故能噫耳下焦竭即遺漏失便其氣不和不能自禁制不須治久則愈註三焦竭部者謂三焦因虛竭而不各歸其部不相為用也上焦受氣於中焦下焦生氣於中焦互相為用則為和也若中焦虛竭不能消化水穀氣不受則上焦不相為用而失和也失和則穀氣滯而不宣故善噫也下焦虛竭不能供升生之氣於中焦則失和也失和則腎氣獨沉自不能禁故前遺漏而後失便也不須治久則愈在善噫可也若遺漏失便本有不治能愈者不足錯間註程林曰竭虛也本經云三焦不歸其部上焦不歸者噫而酢吞中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺漏上焦胃上口也中焦脾也脾善噫脾不和則失便不須治久則愈在善噫可也若遺漏失便本有不治能愈者不足錯間註程林曰竭虛也本經云膀胱不約為遺漏因氣不和則溲便不約故遺失而不能自禁制也○師曰熱在上焦者因咳為肺痿氣在中焦者則為堅熱在下焦者則為熱在中焦者篇中所謂肺痿吐涎沫也熱在中焦者篇中所謂腹滿堅痛也熱在下焦者篇中所謂小腸淋瀝也其外大腸有寒者多清澈滲即下利濁瀉也有熱者便稠粘腸垢即下利膿血也小腸有寒者下重便血即結陰便血也有熱者熱流於大腸募於肛門必痔痔也註徐彬曰小腸為受盛之官與心為表裏而小腸也挾火以濟陰而陰小滯挾氣以化血而血歸經有寒則氣不上通而下重血無主氣而妄行矣直腸者大腸之頭也門為肛小腸有熱則大腸傳導其熱而氣結於肛門故痔者滯其內小腸之熱於此也○問曰病有積有聚有榮氣何謂也師曰積者藏病也終不移聚者府病也發作有時展轉痛移為可治榮氣者肠下痛按之則愈復發為榮氣諸積大法脈來細而附骨者乃積也寸口積在喉中關上積在脣旁上關上積在心下微下關積在少腹尺中積在氣衝脈出左積在左脈出右積在右脈出兩積在中穴各以其部處之見前篇榮解註病有積有聚有榮氣當別之也積者藏病無時不有不移其處也聚者府病發作有時展轉痛移為可治謂府病易治也榮氣者飲積脇下痛也按之則止不按復痛以水氣得按暫散故痛暫止也此即其証而言之然諸積大法尤當以証候之也脈來沉伏附骨而細者乃諸積之診也若見兩寸即在胸中也微下關積在少腹尺中也兩關積在脣傍也上關近寸積在心下也微下近尺積在小腹也尺中積在氣衝也脈出左積在左脈出右積在右脈兩出謂左右俱見積在中央也各以其部之處而診積之所在也註徐彬曰積者跡也病氣之屬陰者也藏屬陰兩陰相得故不移不移者有專痛之處而無遷改也聚則如市井之物偶聚而已病氣之屬陽者也病屬陽兩陽相比則非如陰之凝故寒氣感則發否則已所謂有時也既無定著則痛無常處故展轉痛移其根不深故比積為可治也○李氏曰積為藏病深入在裡故脈細而附骨也守關尺上下左右別積病之所在皆指細而附骨之部分即內經前以候前後以候後上寬上首胸喉中事也下寬下者分腹腰股膝腿足中事也

寸口

脈動

而弱動

即為驚

即為悸

即為慄

即為寒

即為熱

即為躁

即為急

即為緩

即為緩

即為急

徐彬曰驚為外邪襲心故其脈動守口動者脈來亂動也慄乃神不自主故其寸口脈弱者脈沉無力也邪之所襲因心之虛故驚慄並見○李延曰此寸口脈兼三部而言驚慄自外至者也驚則氣亂故脈動而不寧慄自內陽者也慄因中虛故脈弱而無力○師曰夫脈浮自晴黃鹹未嘗黃舌目睛慧了知衄今止訥浮脈主陽主表若目睛潔清主陽表病也目睛黃主血脈病也蓋以諸脈絡於目而血熱則赤血瘀則黃今日睛黃掌知其衄未止也若黃掌去目睛慧了知其衄已止故曰血今止也○又曰從春至夏衄者太陽從秋至冬衄者陽明故血陽絡傷之下血陰絡傷也太陽主外春夏主外故從春至夏衄血屬太陽也陽明主內秋冬主內故從秋至冬衄血屬陽明也註李延曰衄血出於鼻手太陽經上頸抵鼻目下為頸足太陽經從頸入絡腦鼻與腦通手陽明經挾鼻孔足陽明經起鼻交額中四經皆循鼻分故皆能致衄太陽行身之表經云太陽為開是春生夏長陽氣在外有開之義故春夏衄者太陽陽明行身之裡經云陽明為闔是秋斂冬藏陽氣在內有藏之義故秋冬衄者陽明尤怡曰少陽之脈不入鼻額故不主衄○衄家不可汗汗出必額上脢脈緊急直視不能睞不得眠註該吐血而言也衄血吐血之家陰已亡矣若發其汗汗出液竭諸脈失養則額角上陷中之脈為熱所灼擊且急也目直視目瞪不轉睛也不能睞目睞不合也亦為熱灼其脈引縮使然也不得眠陽氣不能行於陰也凡此之病皆陽盛陰微之危證故衄家慎奇汗也註趙良曰足太陽經主表上顙入額貫目睛衄則在上絡脈之血已脫若更發汗是重竭津液津液竭則脈枯故額上陷中脈緊而急牽引其目視不能合也無血陰虛故不得眠○病人面無血色無寒熱脈沉弦者衄脈浮弱手按之絕者下血煩歎者必吐血按脈沉當是脈沉文義始屬必是傳寫之誤註赤色血色也面無血色謂面白之人純白而無赤色也人有恐怖則面色脫白其狀驚駭人有愧心乍白乍紅其狀黃怯令無故而面無血色則可知非驚愧致氣亂血散也且無寒熱病又可知非虛損不生血少血也既非血散又非血少當詢之病人必有失血之故診之於脈必有吐衄下血之因衄吐屬陽故脈見浮弦按之必芤榮血空也下血屬陰脈見沉弱按之欲絕榮氣微也且脉色如斯而証兼煩歎是病在心肺故必吐血也

夫酒客數者必致吐血此因極飲過度所致也註徐彬曰此言吐血不必由於氣不攝血夫吐血咳逆上氣其脈數而有熱不得卧者死註吐血欬逆肺大傷也上氣肺無降也脈數有熱火燄肺金也不得卧者陽不入陰故曰死也亦不必由於陰火熾盛其有酒客而致欬則肺傷已極又為欬所擊動必致吐血故曰極飲過度所致則治之者當以清熱為主也註趙良曰脉數有熱陽獨勝也不能卧陰已絕也陰既絕陽豈能生耶故死若得卧者陰未絕未可言死○程林曰吐血欬逆上氣則肺被傷亡血不可發其表汗出則寒慄而振註凡失血之後血氣未復為亡血也皆不可發汗失血之初固屬陽熱亡血之後熱隨血去故雖消而氣逐血虛陽亦微矣若發其汗則陽氣衰微力不能支故身寒噤慄而振脈動也發陰虛之汗汗出則亡陰即發吐衄之汗也故見不得煦不

得脈一陰之病也發陽虛之汗汗出則亡陽即發亡血之汗也故見寒慄而振亡陽之病也註李東曰奪血者無汗以汗與血俱屬心液血亡

集

液竭無復餘液作汗也今又發表則陰虛更亡陽表間衛氣虛極故寒慄而振

吐血不止者柏葉湯主之註吐血之病熱傷陽絡當清其熱勞傷陽絡當理其損今以柏葉湯溫散之而治吐血不止者則必是熱伏陰分

用此宣發使熱行陽分血不為熱所迫則自止矣

柏葉湯方

柏葉

乾姜各三兩

艾三把

右三味以水五升取馬通汁一升合煮取一升分溫再服

集

程林曰神農經云柏葉主吐血

乾姜止唾血艾葉止吐血馬通者白馬尿也凡尿必達洞腸乃出故曰通亦微溫止吐血四味皆半溫行陽之品使血歸經逆行隧道而血

自止故吐血不止以柏葉湯主之註心氣不足二字當是有餘二字若是不足如何用此方治之必是傳寫之謬

註心氣有餘熱盛也熱盛而傷陽絡迫血妄行為吐為衄故以大黃黃連黃芩大苦大寒直瀉三焦之熱熱去而吐衄自止矣

心氣不足吐血衄血瀉心湯主之註心氣不足二字當是有餘二字若是不足如何用此方治之必是傳寫之謬

心氣不足

大黃二兩

黃連

黃芩各一兩

右三味以水三升煮取一升頓服之

病人胸滿唇青口燥但欲救水不欲咽無寒熱脈微大來遲腹不滿其人言我滿在胸不在腹也與上如是之証推之為有瘀血也

寢便脅滿煩熱者熱壅之胸滿也面目浮腫滿喘不得卧者停飲之胸滿也呼吸不快胸滿太息而稍寬者氣滯之胸滿也今病人無寒熱

他病惟胸滿唇青口燥救水不欲咽乃於此之胸滿也唇舌血華之處也血病不禁故唇青色變也熱在血分故口燥救水不欲咽也脈

微大來遲陰凝之症則當腹滿今腹不滿詢之其人言我滿在胸不在腹也與上如是之証推之為有瘀血也

病者如熱狀煩滿口乾渴而渴其脈反無熱此為陰伏是瘀血也當下之註此承上文互詳証脈以明其治也如熱狀即所謂心煩胸滿口乾

燥渴之熱証也其人當得數大之陽脈今反見沉伏之陰脈是為熱伏於陰乃瘀血也血瘀者當下之宜桃核承氣抵當湯丸之類也註李氏

曰血瘀內熱寢熱故外証但如熱狀而其脈不數疾反無熱也煩滿者血瘀經氣不舒燥渴者血瘀津液不布血屬陰瘀則脈伏於內故為陰

伏當下之以去瘀生新也○下血先便後血此遠血也黃土湯主之下血先血後便此近血也亦小豆當歸散主之註先便後血此遠血也謂

血在胃也即古之所謂結陰今之所謂便血也先血後便此近血也謂血在腸也即古之所謂腸澼為痔下血今之所謂藏毒腸風下血也一用黃土湯以治結陰之血從溫也一用亦小豆當歸散以治藏毒之血從清也註趙良曰腸胃陽明經也以下與胃居大腸之上若聚於胃

必先便後血去肛門遠故曰遠血若聚大腸去肛門近故曰近血故治遠血黃土湯主之治近血亦小豆當歸散主之

黃土湯方

甘草

乾地黃

白朮

附子炮

阿膠

黃芩各三兩

竈中黃土半斤

右七味以水八升煮取三升分溫二服

赤小豆當歸散方見孤感

寸口脈弦而大弦則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相擊此名曰革婦人則半產漏下男子則亡血失精註詳見傷寒辨脈篇內不

復輝

火邪者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之

按此方是治火逆驚狂者與首條之脈動驚病不合必是錯簡

桂枝救逆湯方

桂枝三兩

甘草二兩

生姜三兩

牡蠣五兩熟

龍骨四兩

大棗十二枚

蜀漆五兩

先去腥

右為末以水一斗三升先煮蜀漆減一升內諸藥煮取三升溫服一升

按此方是治寒水心下悸者與首條之脈弱悸病不合是錯簡

半夏麻黃丸主之

按此方是治寒水心下悸者與首條之脈弱悸病不合是錯簡

半夏麻黃丸主之

按此方是治寒水心下悸者與首條之脈弱悸病不合是錯簡

半夏麻黃丸方

半夏

麻黃等分

右二味末之煉蜜和丸小豆大飲服三丸日三服

病故胸中鬱鬱而痛不能食也欲使人按之
不但痛不能減而反有涎唾知邪在胸中盛
滿得按而上溢也經曰下利脈遲而滑者內
實也今下利日十餘行其脈反遲寸口惟滑
知寒實在上水不下輸膀胱而走大腸也故
但吐之利自止也

集註張璐曰痛不得食按之反有涎唾者知有寒
痰在胸中也下利脈遲寸口惟滑者爲膈上
實故吐之則利自止也

病手足逆冷脈乍結以客氣在胸中心下滿而煩
欲食不能食者病在胸中當吐之

註 病人手足厥冷脈乍結者以寒邪結氣結在
胸中陽氣不能四達也心下滿而煩者實結
則滿陽鬱則煩也欲食不能食者是客氣病
在胸中故當吐之也

集註 成無已曰此與爪蒂散證同彼云脈乍緊此
云脈乍結惟此有異緊系爲內實乍緊則邪在
胸中實而未深也結爲結實乍結則邪在胸

中結而未深也雖所治俱同但輕之重之不無別也

程知曰脈來緩時一止復來曰結結者痰氣
結滯之名此與瓜蒂散證同但彼云脈乍緊
則爲寒邪盛此云脈乍結則爲痰氣實也

張錫駒曰病人手足厥冷者氣機內結不能
外達於四肢也心下滿而煩者邪實則滿正
傷則煩也

魏荔彤曰脈乍結非脈之本然乃有形之邪

阻礙其胸中宗氣故榮衛之氣不能暢行非
同於氣血虛微不能流布之結也

宿食在上脘者當吐之

註胃有三脘宿食在上脘者痛在胸膈痛則欲

吐可吐不可下也在中脘者痛在心口痛欲
吐或不吐可吐可下也在下脘者痛在臍上
痛不欲吐不可吐可下也故曰宿食在上脘
者當吐之此詳凡在上者皆可吐也

註成無已曰宿食在中下脘則宜下宿食在上

脘則當吐內經曰其高者因而越之其下者
引而竭之

方有執曰上脘謂胃府之口也

張志聰曰胃爲水穀之海有上脘中脘下脘
之分上主納中主化今食在上脘不得腐化
故爲宿食當吐之

程應旄曰宗氣聚於胸中升降呼吸出焉清
陽之分豈容濁物留滯吐以宣之使無障礙
也若屬表邪傳入無形而有形則痞滿結胸

另有治法均非宜矣

辨不可吐病脈證篇

具見六經中

辨可下病脈證篇

大法秋宜下

註天至秋則氣降物至秋則成實實則宜下凡

邪在下者俱宜取法乎此義也

凡可下者用湯勝丸散中病便止不必盡劑也

註湯者盪也丸者緩也下藥貴速故凡服下藥

用湯所以勝丸也中病卽止不必盡劑者恐
盡劑反傷其正氣也

集註程應旄曰用湯勝丸貴活法也中病卽止示
節制也

下利三部脈皆平按之心下鞭者急下之宜大承

氣湯

註下利心下鞭者諸瀉心湯證也若寸關尺三
部脈平實有力雖下利仍宜攻其鞭也

集註方有執曰三部脈皆平血氣和可知矣心下

鞭實也所以急下之也

張錫駒曰本經云若自下利者脈當微厥今反和者此爲內實也宜下之

下利脈遲而滑者內實也利未欲止當下之宜大

承氣湯

註

脈遲不能兼滑惟浮取之遲沉取之滑則有之矣今下利脈遲而滑謂浮遲而沉滑也浮遲則外和沉滑則內實欲止內實之下利仍當下之使積去則利自止宜大承氣湯

集註

程應旄曰遲而滑滑在下而遲在上知爲物

阻之遲非寒陰之遲故但下其所阻則內實去而利自止矣

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脈浮而大按之反濇尺中亦微而濇故知有宿食當下之宜

大承氣湯

按尺中微字當是大字若是微字斷無當下之

理

註

寸口脈浮而大按之反濇謂按之且大且濇

且有力也關上尺中亦然大濇有力爲實而不利之診故知有宿食也當下之宜大承氣

湯

集註

程知曰滑爲有食結滯經宿則脈澁矣尺以

候內沉以候裏故宿食之脈按之反濇尺中亦大而澁也

下利不欲食者以有宿食故也當下之宜大承氣

湯

註

初下利不欲食者是傷食惡食故不欲食也

若久下利不欲食者是傷脾食後飽脹不欲食也今初下利卽不欲食故知有宿食也當下之宜大承氣湯無疑也

集註

程應旄曰傷食惡食故不欲食與不能食者自別下利有此更無別樣虛證知非三陰之下利而爲宿食之下利也故當下之

下利差至其年月日時復發者以病不盡故也當下之宜大承氣湯

註

下利差後至其年月日時而復發其利者此

宿食積病攻之不盡故也若其人形氣不衰飲食尚強當攻其未盡自不復發矣宜大承

氣湯

集註

方有執曰其期也謂周其一年之月日期也

註程應旄曰下利差後而餘邪之棲於腸胃廻折處者未盡是爲伏邪凡得其候而伏者仍應其候而伸下則搜而盡之矣

下利鹹反滑當有所去下乃愈宜大承氣湯

註此承上條互發其義以詳其鹹也下利鹹反

滑是證虛，齩實不相宜也。若其人形氣如常，飲食如故，乃有當去之積未去也。下之乃愈。

宜大承氣湯

集註

程應旄曰：滑爲實，故可行通因通用之法。

病腹中滿痛者，此爲實也。當下之。

註

腹中不滿而痛者，病或屬虛。若滿而痛，則爲

實矣。當下之。

集註

張璐曰：腹中既滿且痛，爲實結，無疑急須下

之。

程應旄曰病腹中滿痛雖在陰經亦可下不必其爲陽明矣

傷寒後脈沉沉者內實也下之解宜大柴胡湯

註傷寒後不解脈沉沉而有力者內實也宜以下解然其人必午後小有潮熱故取大柴胡兩解之也

脈雙弦而遲者必心下鞶脈大而緊者陽中有陰也可下之宜大承氣湯

註雙弦謂左關右關皆見弦脈也左關脈弦肝

本脈也右關脈弦木刑土也弦者飲也遲者
寒也心下鞭者是肝邪挾寒飲而傷胃故不
可下乃生薑瀉心湯證也若脈大按之緊是
陽有餘而陰亦實也乃有餘之鞭非胃傷者
比故可下之宜大承氣湯也

辨不可下病脈證篇

脈濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上濇反在
下微則陽氣不足濇則無血陽氣反微中風汗出
而反躁煩濇則無血厥而且寒陽微則不可下下

之則心下痞鞭

註

此卽前不可發汗之條所謂關脈浮濡沉弱寸脈微尺脈濤陽虛血少之診也汗旣不可下亦不可均爲陽虛故也若誤下之則寒虛內竭心下痞鞭必成太陰誤下下利之痞鞭矣

集
註

程應旄曰誤汗亡陽分之陽誤下亡陰分之陽無陽則陰獨而地氣得以上居故心下痞

顧

脈濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦爲陽運微爲陰寒上實下虛意欲得溫微弦爲虛虛者不可下也

註此亦前不可發汗之條所謂關脈浮濡沉弱寸脈弦尺脈微上實下虛之診也微弦爲虛既不可汗亦不可下下虛故也

集成無已曰虛家下之是爲重虛

脈濡而弱弱反在關濡反在巔浮反在上數反在下浮爲陽虛數爲無血浮爲虛數生熱浮爲虛自

汗出而惡寒數爲痛振而寒慄微弱在關胸下爲急喘汗而不得呼吸呼吸之中痛在於脇振寒相搏形如瘡狀醫反下之故令脈數發熱狂走見鬼心下爲痞小便淋漓少腹甚鞭小便則尿血也

註此謂關脈浮濡沉弱寸脈浮尺脈數也關濡弱爲中氣虛乏寸浮無力爲陽虛尺數無力爲血虛陽虛故汗自出而惡寒血虛故身痛振寒而慄中氣虛乏故胸膈氣急喘汗而不得呼吸呼吸之中痛引於脇也振寒相搏形

未罷之表盡陷於裏故令衄虛數無倫發熱
狂走見鬼心下爲痞少腹甚鞭小便淋漓尿
血也

集註張璐曰寸口浮濡而關弱尺數者以其人陽
氣本虛虛陽陷於陰分也若誤下傷血必致
狂走痞滿尿血也

魏荔彤曰前虛寒之忌下易知此虛而兼熱
之忌下難知故兩條相映互言以示禁也

脈濡而緊濡則衛氣微緊則營中寒陽微衛中風發熱而惡寒營緊衛氣冷微嘔心內煩醫爲有大熱解肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭卒起而頭眩客熱在皮膚悵怏不得眠不知胃氣冷緊寒在關元技巧無所施汲水灌其身客熱因時罷慄慄而振寒重被而覆之汗出而冒嶺體惕而又振小便爲微難寒氣因水發清穀不容間嘔變反腸出顛倒不得安手足爲微逆身冷而內煩遲欲從後救安可復追還

計

脈濡而緊謂浮濡而沉緊也濡則衛表微緊
則營裏寒外有發熱汗出惡寒之表內有微
嘔心煩之裏醫爲有熱解肌發汗表陽愈虛
而生煩躁裏寒更急心下痞軟表虛裏冷故
卒起頭眩悵快不眠若徒以客熱在膚不知
中寒在裏而以冷水灌身雖客熱因而時罷
但慄慄振寒不容不重被而覆之汗出必眩
惕振厥逆下利清穀煩躁不安而死以中外
之陽兩亡不能復還也

集註 張錫駒曰汗出而冒巔者汗出則陽氣外亡

頭昏冒而目不明故曰冒巔小便爲微難陽亡而氣不施化也清穀不容間下利清穀無間隙之時也嘔變者嘔出之味變也腸出者下利而廣腸脫出也

脈浮而大浮爲氣實大爲血虛血虛爲無陰孤陽獨下陰部者小便當赤而難胞中當虛今反小便利而大汗出法應衛家當微今反更實津液四射營竭血盡乾煩而不得眠血薄肉消而成暴液醫

復以毒藥攻其胃此爲重虛客陽去有期必下如

污泥而死

註

脈浮而大謂脈浮取有力按之大而無力乃

革脈象也浮爲氣實外急大爲血虛中空血

虛甚則亡陰陰亡則陽無偶也故曰孤陽獨

下陰部謂衛陽下就其陰小便當赤而難以下

胞中虛竭也若陽不下就其陰則小便反利

而大汗出是衛陽表虛邪陽內入無陰以化

故反更實致津液四射營竭血盡肉消胃乾

煩不得眠也醫不知此乃以中空暴液之陽
明誤爲胃實復以峻藥攻之則爲虛虛胃陽
之去可期必下汚穢如泥而死也

集註

程知曰此言氣實血虛之脈小便利而大汗
出者不可下也

程應旄曰無陰而孤陽獨下陰部倘得小便
赤而難則胞中不虛僅爲陽搏陽未離則陰
得滯而未散今反小便利而大汗出則衛氣
更微矣其反更實者非衛陽之實而客陽之

實也衛陽猶或抱陰客陽則專於攻陰故津液四射而爲小便利爲大汗出熱甚逼陰所以營竭血盡乾煩而不得眠血薄肉消而成暴液暴液云者點滴皆火氣煎熬而出也毒藥攻胃則土敗而四藏無生下如汚泥而死矣

傷寒脈陰陽俱緊惡寒發熱則脈欲厥厥者脈初來大漸漸小更來漸大是其候也如此者惡寒甚者翕翕汗出喉中痛若熱多者目赤脈多睛不慧

醫復發之咽中則傷若復下之則兩目閉寒多便
清穀熟多便膿血若熏之則身發黃若熨之則咽
燥若小便利者可救之若小便難者爲危殆

註

傷寒衄陰陽俱緊惡寒發熱太陽表證也則
衄欲厥謂浮緊之衄初大漸小知爲欲厥之
衄也初來大陽爲之也故發熱漸漸小陰爲
之也故發厥更大更熱更小更厥是其候也
如此者當以寒熱別其厥惡寒甚翕翕汗出
咽中痛是少陰寒厥也發熱多目赤衄多睛

不了了是陽明熱厥也寒甚熱多之厥而誤
發之則咽痛似傷而誤下之則兩目多閉凡
厥者必下利寒厥之利下利清穀也熱厥之
利下利膿血也此又以利辨厥之寒熱也若
以薰蒸取汗則發身黃濕熱合也若以火熨
取汗則咽燥火甚傷津也若小便利者則陰
未亡故可救之小便難者則陰已亡爲危殆
也

集註

程知曰言外傷於寒爲濕熱之病不可汗下

薰熨也

張璐曰嘔來厥者知厥逆之寒熱交勝也初來大者爲邪氣鼓動漸漸小爲正氣受傷更來漸漸大爲邪氣復進也蓋因其人正氣本虛不能主持隨邪氣進退故其嘔亦隨邪氣進退忽大忽小也小便利者津液未竭小便難者津液已絕爲危殆也

傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃齶不可制食水者必嘔惡水者厥若下之咽中生瘡假令手足

溫者必下重便膿血頭痛目黃者若下之則目閉
貪水者若下之其脈必厥其聲嬰咽喉塞若發汗
則戰慄陰陽俱虛惡水者若下之則裏冷不嗜食
大便完穀出若發汗則口中傷舌上白胎煩燥脈
數實不大便六七日後必便血若發汗則小便自
利也

註 傷寒發熱口中勃勃氣盛而出頭痛目黃將
欲作衄衄不可制以陽邪盛故衄之甚也貪
水者水與熱搏故嘔也惡水者裏陰寒盛故

厥也傷寒發熱口中出氣盛者若下之熱邪
入淺咽中生瘡入深下重膾血頭痛目黃者
若下之則兩目閉液傷乾濇也貪水者若下
之熱去水停故肢厥聲嚶咽喉塞也若發汗
過多亡陽故戰慄表裏俱虛也惡水者若下
之裏寒更甚故不嗜食下利完穀也若發汗
動其虛陽故口中瘡舌上白胎煩燥也若脈
數有力不大便而惡水熱在於陰故六七日
後必便血也若更發其汗陰陽俱虛故小便

自利也

集註

程知曰傷寒發熱熱在表也口中勃勃氣出

熱在裏也頭痛目黃衄不可制所感之寒與

所鬱之熱共蒸於上也此當以貪水惡水辨

之貪水者陰虛而熱勝水入而熱與之拒故

嘔也惡水者陽虛而寒勝水入而陽氣不任

故厥也蓋熱氣挾寒邪上蒸法當辨寒熱多

寡而用清解設不知而妄下之是強抑之而

邪不服必至咽瘡若手足溫而不厥者其熱

爲勝必以下而致便膿血也頭痛目黃者下之則熱內陷而目閉若貪水者陰虛爲寒下所抑其脈必厥其聲必如嬰兒鶴塞不揚也此而更發其汗則亡陽戰慄陽亦與陰俱虛矣若惡水者陽虛加之寒下則有裏冷不嗜食大便完穀出之變也此而更發其汗則虛陽外發必口爛舌白胎而煩燥也脈數實不大便者至六七日後當便血此當下之若更發其汗則非惟大便不行併小便亦爲之不

利矣

微則爲欬欬則吐涎下之則欬止而利因不休利
不休則胸中如蟲齧粥入則出小便不利兩脇拘
急喘息爲難頸背相引臂則不仁極寒反汗出身
冷若冰眼睛不慧語言不休而穀氣多入此爲除
中口雖欲言舌不得前

註

陽盛爲痰陽虛爲飲欬而齦微爲陽虛之欬
故欬則吐涎飲也若齦實下之可也今齦微
下之寒虛更甚故欬雖止而利因不休也胸

中如蟲齶是胃寒蟲動故粥入則出也下利
上吐中寒也小便不利停飲也兩脇拘急喘
息爲難頸背相引臂則不仁此皆中外寒飲
之證比之少陰停飲此無身痛彼無項背相
引臂則不仁也若極寒而甚則反汗出身冷
如冰目睛不慧語言不休而死也以如是之
證而穀氣多入此爲除中口雖欲言舌短難
伸亦死也

集註

張璐曰誤下之下利不止胃中空虛而反暴

食爲除中少陰虛寒而反冷汗爲外脫及口

雖欲言舌萎不能前等死證皆起誤下之害

如是

脈數者久數不止止則邪結正氣不能復正氣却
結於藏故邪氣浮之與皮毛相得脈數者不可下
下之必煩利不止

註

脈數者謂久數不止有熱之人也若脈數動
時一止熱仍不退是邪氣結正氣不能復正
氣結於藏邪氣浮於外故也脈雖數促不可

下也若誤下之則邪熱乘虛入裏必煩利不止也

脈浮大應發汗醫反下之此爲大逆

註脈浮大此爲表實之脈應發其汗若醫誤以大爲裏實而反下之此爲大逆也

集註程應旄曰脈大與脈浮而大差別盛實純在

表也雖有裏證仍宜從表發汗下之則爲大

逆

動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻乾頭

眩心悸也動氣在左不可下下之則腹內拘急食
不下動氣更劇雖有身熱臥則欲踴動氣在上不
可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲得
水自灌動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭
眩食則下清穀心下痞也

註 動氣在右肺失治矣下之則肺先虛津液內
竭故咽燥鼻乾頭眩心悸也動氣在左肝失
治矣下之則肝氣益急故食不下腹內拘急

動氣更劇表實未減裏虛益甚故雖有身熱

臥則欲蹠也動氣在上心失治矣下之則陰
液益傷心火更甚故掌心握熱煩熱汗出欲
得水澆卽有身上浮冷亦火盛格陰使然也
動氣在下腎失治矣下之則寒虛內甚而腹
脹滿故卒起頭眩心下痞滿食則下利清穀
也

集註程應旄曰動氣誤下是爲犯藏左右上下隨

其經氣而致逆故禁同汗例

咽中閉塞不可下下之則上輕下重水漿不下臥

則欲蹠身急痛下利日數十行

註

咽中閉塞燥乾腫痛者少陰陽邪也宜下之
今不燥乾不腫痛者少陰陰邪也不可下下
之則陽愈衰陰愈盛故曰上輕下重也水漿
不入臥欲蹠身急痛下利日數十行中外陽
虛也

集註

張璐曰言初病咽乾閉塞以其人少陰之真
陽素虧故汗下俱禁若下之則少陰虛寒諸
證蜂起矣

程應旄曰腎邪上逆故有咽中閉塞之證下之陽氣益虛陰氣益甚故有上輕下重等證諸外實者不可下下之則發微熱亡脈厥者當臍握熱

註

諸外實者裏必虛卽有不大便無所苦之裏亦不可下若下之外發之熱雖微內虛之寒則盛若無脈而厥當臍握熱始暖亦寒之甚也

集註

方有執曰諸外實指一切之邪在表而言也

發微熱邪入裏也無鹹陽內陷也

程知曰下之則表邪內陷外不熱而內發微
熱也其亡鹹而厥者則寒氣內深惟當臍一
握熱耳

太陽病有外證未解不可下下之爲逆

註此重出以申叮嚀告戒之意

集註程應旄曰未解較不解稍異勢雖欲下仍須
俟之

病欲吐者不可下嘔多雖有陽明證不可攻之

註 欲吐者邪在膈上可吐之證也嘔多者邪在少陽可和之證也雖具裏證戒人不可先攻下也

夫病陽多者熱下之則鞭

註 陽病裏熱多者宜乎下表熱多者宜乎汗若表裏熱多當兩解也若單下之表不解則裏虛表熱內陷因作鞭也

集 註 張璐曰陽熱證多卽有陽明證見亦屬經證不可下也不當下而誤下之則陽邪乘虛內

不可下也不當下而誤下之則陽邪乘虛內

陷不作結胸則爲痞鞭也

程應旄曰陽病謂表裏熱俱多下之則胃中水竭其鞭也非轉屬陽明之鞭也

無陽陰强大便鞭者下之必清穀腹滿

註

亡陽陰盛燥而無熱雖大便鞭者此乃不大便無所苦之鞭也下之則中寒猶盛故必利清穀腹滿矣

集註

成無己曰無陽者亡津液也陰多者寒多也大便鞭則爲陰結下之虛胃陰寒內甚故清

穀腹滿

方有執曰陰以寒言強猶言多也清穀陰不能化也腹滿陰寒凝滯而內脹也

傷寒發熱頭痛微汗出發汗則不識人熏之則喘不得小便心腹滿下之則短氣小便難頭痛背强加溫鍼則可

註

傷寒發熱頭痛背強微汗出若不惡寒非溫病卽邪傳陽明也若誤發汗不成風溫外熱如灼必成陽明熱甚神昏不識人也以火熏

如灼必成陽明熱甚神昏不識人也以火熏

溫鍼劫之火氣入裏壅塞於胞則喘於腹則
滿也火傷衛分津液則不得小便火傷營分
血脈則必作衄也若下之則中氣傷故氣短
津液傷故小便難也

集註 程應旄曰此證近於溫有熱無寒汗下溫鍼
均在所禁也

下利脈大者虛也以強下之故也設脈浮革因爾
腸鳴者屬當歸四逆湯

註 下利脈大裏虛也以其不當下而強下之故

也設鹹浮革者謂鹹浮大按之空虛表急裏虛因爾腸鳴屬當歸四逆湯和其表而溫其裏也

集成註

成無己曰浮爲虛革爲寒寒虛相搏則腸鳴與當歸四逆湯

音切

漓林知切嘶先齊切萎於危切悵丑亮切快於亮切勃蒲沒切

嚙於更魚結切嚙乙角切握乙角切

御纂醫宗全錄卷十六

訂正仲景全書傷寒論註

平脈法

平脈者平人不病之脈也如四時平脈五藏平脈陰陽同等平脈之類是也人病則脈不得其平矣如四時太過不及陰陽藏府相乘相侮及百病相錯生死不平之脈之類是也平者又準之謂也言診者誠能以諸平脈準諸不平之脈則凡太過不及之差呼吸尺寸

之乖莫不了然於心手之間而無少差謬然後可以傷寒之脈準諸壞病亦可以諸壞病之脈準之傷寒誠所謂一以貫之而無餘者已

問曰脈有三部陰陽相乘營衛血氣在人體躬呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作効象形容春弦秋浮冬沉夏洪察色觀脈大小不同一時之間變無經常尺寸參差或短或長上下乖錯或存或亡病輒改易進退低昂心迷意惑動

失紀綱願爲具陳令得分明師曰子之所問道之
根源脈有三部尺寸及關營衛流行不失衡鉉腎
沉心洪肺浮肝弦此自經常不失銖分出入升降
漏刻周旋水下二刻一周循環當復寸口虛實見
焉變化相乘陰陽相干風則浮虛寒則牢堅沉潛
水瀦支飲急弦動則爲痛數則熱煩設有不應知
變所緣三部不同病各異端太過可怪不及亦然
邪不空見終必有奸審察表裏三焦別焉知其所
舍消息診看料度藏府獨見若神爲子條記傳與

賢人

註

此總敘平脈之根源借問答以示其法也脈者血之府氣血流行之動會也三部者寸爲上部關爲中部尺爲下部也三部旣定陰陽屬焉上部爲陽下部爲陰陰陽平則相易陰陽偏則相乘相易則和相乘則病人之體躬衛統氣而行脈外營統血而行脈中故凡呼吸出入上下於中莫不因息以遊布於四體隨津液而流通於周身故隨時動作而効象

夫脈之形容也察色察五藏之色也肝青心赤肺白腎黑脾黃各以其色合乎藏然四藏又皆以黃色爲主他色爲兼以土寄旺於四季也觀脈觀五藏之脈也肝弦心洪肺浮腎沉脾緩各以其脈主乎藏然四藏又皆以緩脈爲本蓋人以胃氣爲本也其間色或參差相錯脈或大小相乖一時之間變無常經病輒改易或存或亡無定象也師曰子之所問脈爲醫道之根源當以平旦復會於寸口之

時診之而虛實見焉寸口脈浮無力爲虛爲風牢堅有力爲實爲寒脈沉爲水滯脈弦爲支飲脈動爲痛脈數爲熱設或病脈不應則於其三部太過不及陰陽變化相乘之理消息診看料度藏府則順逆吉凶自然獨見若神也

師曰呼吸者脈之頭也

註人一呼脈再動一吸脈再動呼吸定息脈四動乃平人不病之緩脈也聞以太息故五動

亦爲平齶非呼吸不能定其三氣指血也以
從此始故曰呼吸者齶之頭也

集註

方有執曰呼者氣之出齶之來也吸者氣之入齶之去也頭頭緒也齶隨氣之出入來去名狀雖多呼吸則其源頭也然齶有二此以尺寸之齶言若以周身言之則循環無端渾然不斷無頭尾之可言學者當識之也

初持脈來疾去遲此出疾入遲名曰內虛外實也初持脈來遲去疾此出遲入疾名曰內實外虛也

註此初持脈以來去疾遲而診表裏虛實法也

來脈出來陽也故以候表去脈入去陰也故

以候裏疾脈數疾有餘也故以候實遲脈徐

遲不足也故以候虛言脈若出來疾入去遲

爲表實裏虛故名曰內虛外實也脈若出來

遲入去疾爲表虛裏實故名曰內實外虛也

集

方有執曰來者自骨肉之分而出於皮膚之

際氣之升而上也去者自皮膚之際而還於

骨肉之間氣之降而下也出呼而來也入吸

而去了也經曰來者爲陽去者爲陰疾爲陽太過也遲爲陰不及也內虛外實者陰不及而陽太過也內實外虛者陰太過而陽不及也故來去出入者脈之大關鍵也內外虛實者病之大綱領也知內外之陰陽而辨其孰爲虛孰爲實者診家之切要也

假令脈來微去大故名反病在裏也脈來頭小本大故名覆病在表也上微頭小者則汗出下微本大者則爲關格不通不得尿頭無汗者可治有汗

者死

按

脈來頭小本大者當是脈來大去小上微頭
小者當是上微小者爲陰盛下微本大者當
是下微小者爲陽盛始與上下之義相屬

註

上以脈之來去疾遲候內外虛實之診此以
脈之來去大小診表裏盛衰之病脈上來微
小下去反大反之象也故名曰反脈上來益
大下去微小覆之象也故名曰覆反者病在
裏爲陰盛覆者病在表爲陽盛陽盛則病格

陰盛則病關陰陽盛極不相交通則病關格
頭無汗者陽未離陰故可治有汗則陽已上
脫故曰死也

寸口衛氣盛名曰高營氣盛名曰章高章相搏名
曰綱衛氣弱名曰懈營氣弱名曰卑懈卑相搏名
曰損衛氣和名曰緩營氣和名曰遲遲緩相搏名
曰沉

按

名曰沉之沉字當是強字玩下文自知

此詳上條脈之來去盛衰之狀也寸口通指

註

寸關尺而言也衛主氣爲陽以候表營主血爲陰以候裏脈隨指有力上來衛氣盛也謂之高脈隨指有力下去營氣盛也謂之章高者長盛也章者分明也高章相合名曰綱綱者以營衛俱有餘有總攬之意也脈隨指無力上來衛氣弱也謂之慄脈隨指無力下去營氣弱也謂之卑慄者恍惚也卑者縮下也慄卑相合名曰損損者以營衛俱不足有消縮之意也若高章慄卑之脈與不疾不徐緩

遲之輒同見則爲盛者不過弱者不衰皆名
和輒强者卽下文所著是也

寸口脈緩而遲緩則陽氣長其色鮮其顏光其聲
商毛髮長遲則陰氣盛骨髓生血滿肌肉緊薄鮮
鞭陰陽相抱營衛俱行剛柔相得名曰強也

按薄鮮鞭三字不成句應是衍文當刪之

註此承上條以釋強字之義言凡人稟陽氣盛

則得高章之盛稟陰氣盛則得慄卑之弱此

平人之常若能兼見緩遲平輒斯爲陰陽相

抱營衛相和始名曰強強者卽色鮮顏光血
滿肉緊之謂也

集註

方有執曰緩以候胃遲以候脾陽氣長者言

胃氣有餘也顏色聲音毛髮皆陽也鮮麗也

光輝也商清也長美也形容胃陽之有餘也

陰氣盛者言脾氣充足也骨髓生血脈滿肌

肉緊骨髓血肉皆陰也形容脾陰之充足也

相抱言和洽也俱行言周流也相搏言合一

也極言二氣得其和平皆由脾胃盈餘之所

致必如此則其人之健弱而強壯可知故曰
強也

師曰脈肥人責浮瘦人責沉肥人當沉今反浮瘦
人當浮今反沉故責之

註上條以脈之盛衰候人之強弱此條以脈之
浮沉分人之皮脈肉筋骨以候五藏之診
法也心肺俱浮肝腎俱沉以皮之浮脈之浮
而別心肺之浮也以筋之沉骨之沉而別肝
腎之沉也脾主肌肉在浮沉之間故候中也

肥人肌膚厚脈當沉瘦人肌膚薄脈當浮今
肥人脈反浮瘦人脈反沉故當責其病在何
藏也

集註 方有執曰責求也肥人當沉者肌膚厚其脈
深也故求其病於浮瘦人當浮者肌膚薄其
脈淺也故求其病於沉

問曰經說脈有三菽六菽重者何謂也師曰脈人
以指按之如三菽之重者肺氣也如六菽之重者
心氣也如九菽之重者脾氣也如十二菽之重者

脈氣也按之至骨者腎氣也假令下利寸口關上
尺中悉不見脈然尺中時一小見脈再舉頭者腎
氣也若見損脈來至爲難治

註

此承上條詳言皮脈肉筋骨各有所主以候
五藏之病也菽豆也約畧輕重言之非謂有
其形也難經曰如三菽之重與皮毛相得者
肺部也六菽之重與血脈相得者心部也九
菽之重與肌肉相等者脾部也十二菽之重
與筋平者肝部也按之至骨舉之來疾者腎

部也各隨所主之部以候藏氣也至於寸口
關上尺中亦各有所主之位以候藏氣左寸
心也右寸肺也左關肝也右關脾也尺中腎
也今特舉腎藏之部例之以槩其餘也假令
下利而甚元氣暴奪於中寸口關上尺中全
不見脈法當死其不死者必是尺中時有一
小見之脈也再舉頭者謂一呼再起頭一吸
再起頭合爲四至也夫尺中時一小見之脈
四至則是腎間生氣之源未絕卽下利未止

尙爲易治若一息二至名曰損脈是氣衰無

胃故爲難治也

集註

程知曰難經三菽六菽之說蓋言下指輕重

有差等以候五藏之氣也又云下利寸口關

上尺中悉不見脈者是胃之陽氣已絕也難

經以損脈爲陽氣下脫之脈故曰損脈至爲

難治也

寸口脈浮爲在表沉爲在裏數爲在府遲爲在藏
假令脈遲此爲在藏也

註

寸口通指三部言也此以浮沉遲數候人表
裏藏府之診法也浮者皮膚取而得之脈也
浮主表故曰浮爲在表沉者筋骨取而得之
脈也沉主裏故曰沉爲在裏數者一息六至
之脈也數主陽府屬陽故曰數爲在府遲者
一息三至之脈也遲主陰藏屬陰故曰遲爲
在藏假令診其人脈遲此爲病在藏舉一遲
脈以例其餘也

集註程知曰軀殼之外營衛爲表軀殼之內藏府

爲裏故以浮沉別之諸陽雖皆屬府諸陰雖
有數而入藏遲而入府者熟讀經文自知也
張璐曰此以浮沉遲數定表裏藏府而全重
於遲爲在藏句故重申以明之設脈見浮遲
雖有表證祇以小建中和之終非麻黃青龍
所宜以藏氣本虛也

陽脈浮大而濡陰脈浮大而濡陰脈與陽脈同等
者名曰緩也

註

此以陰陽同等發明平人和緩之脈也陽脈浮大而濡陰脈浮大而濡謂浮中沉陰陽同等也名曰緩者謂和緩之脈也然緩脈有二義和緩之緩脈有力濡柔不大不小以形狀之緩驗二氣之和也至數之緩脈來四至從容不徐不疾以至數之緩驗胃氣之和也

集註

方有執曰緩有二義此以相兼言蓋謂氣血和平也

程知曰緩有和緩之義寬緩之義與浮大相

類不與遲相類故經謂之浮大而濡不曰浮
大而遲也蓋脈之遲數以至數言緩急以形
狀言耳

張璐曰脈雖浮大而濡按之仍不絕者爲緩
若按之卽無是虛脈非緩脈也

問曰東方肝脈其形何似師曰肝者木也名厥陰
其脈微弦濡弱而長是肝脈也肝病自得濡弱者
愈也假令得純弦脈者死何以知之以其脈如弦
直此是肝藏傷故知死也

註

此已下四時五藏平脈病脈死脈之診法也
東方屬木主春令風在天爲風在地爲木在
人爲肝故曰肝者木也名足厥陰經其脈當
弦若得微弦濡弱而長此弦而有胃是肝平
脈也病自易愈也若得微弦而長而少濡弱
和緩爲弦多胃少肝病脈也若得純弦而直
無濡弱和緩爲但弦無胃是肝死脈也下三
藏雖無純洪純浮純沉之文省文也當倣此

謂也

魏芳彤曰微弦不甚弦且帶濡弱如短促亦非木之本性又必兼長脈是象木之柔和而修長此肝之本脈肝脈見此肝藏平脈如有微疾亦易愈也假令純弦如樹木將枯枝幹乾硬故知死也

問曰二月得毛浮脈何以處言至秋當死師曰二月之時脈當濡弱反得毛浮者故知至秋死二月肝用事肝脈屬木脈應濡弱反得毛浮脈者是肺

脈也肺屬金金來尅木故知至秋死他皆倣此

註二月春令也毛浮秋脈也春得秋脈何以斷

言至秋當死蓋春肝木旺秋肺金旺二月肝

旺之時尙得毛浮肺脈其衰可知至秋金氣

愈旺金乘木木愈受尅則絕故知至秋當死

也餘藏皆倣此

集註

方有執曰此以四時脈氣屬五行生尅應病
以主吉凶生死之理揭一以例其餘所以示
人持診之要法也

南方心脈其形何似師曰心者火也名少陰其脈

洪大而長是心脈也心病自得洪大者愈也

註

南方屬火主夏令熱在天爲火在地爲熱在

人爲心故曰心者火也名手少陰經其脈當

洪若得洪大和緩此洪而有胃是心平脈也

雖有心病自易愈也若得洪大而少和緩此

洪多胃少是心病脈也若得洪大而無和緩

此但洪無胃是心死脈也

註

方有執曰其脈洪大而長應萬物盛長之象

也

立夏得洪大脈是其本位其人病身體苦疼重者須發其汗若明日身不疼不重者不須發汗若汗濺濺自出者明日便解矣何以言之立夏得洪大脈是其時脈故使然也四時倣此

註

凡四時之病當以四時之脈期之期之者期其愈不愈也立夏之日得洪大脈是其本位應得之脈其人病身體苦疼重者須發其汗若明日身不疼不重雖脈仍洪大必非邪脈

乃時衄也不須再汗謂已解也設若本日汗
濺濺然自出者此解兆已見雖衄洪大不須
發汗明日便自解矣何以言之立夏得洪大
衄是得其時衄故也四時倣此

集註方有執曰此言衄得應時而王則病有當解
之時舉夏以例其餘示人推倣之意

程知曰春弦夏洪秋毛冬石當其時得之則
爲平衄雖外感寒邪但微汗出自愈耳重則
治之輕則不必治也內經曰衄得四時之順

者此也

程應旄曰洪大爲夏令之脈亦爲邪盛之脈
有病則從邪無病則從令解不解不須另辨
西方肺脈其形何似師曰肺者金也名太陰其脈
毛浮也肺病自得此脈若得緩遲者皆愈若得數
者則劇何以知之數者南方火火尅西方金法當
癰腫爲難治也

註 西方屬金主秋令燥在天爲燥在地爲金在
人爲肺故曰肺者金也名乎太陰經其脈當

浮若得毛浮緩遲此浮而有胃是肺平脈也
雖有肺病自易愈也若得毛浮而少緩遲此
浮多胃少是肺病脈也若得毛浮而無緩遲
此但浮無胃是肺死脈也若得毛浮而數則
爲病劇何以知之數者南方火也火尅西方
金法當發癰腫而難治也

集註方有執曰肺主皮毛上爲華蓋故脈毛浮緩
遲者脾土之脈也兼得緩遲爲愈者肺金得
土爲逢生也法當癰膿者金逢火化也

北方腎脈其形何似師曰腎者水也名曰少陰其脈沉滑是腎脈也腎病自得沉滑而濡者愈也

按東南西方皆有其文惟缺北方倣經文補之

註北方屬水主冬令寒在天爲寒在地爲水在人爲腎故曰腎者水也名足少陰經其脈當沉若得沉滑而濡此沉而有胃是腎平脈也雖有腎病自易愈也若得沉滑而少濡和此爲沉多胃少是腎病脈也若得沉而無滑濡此但沉無胃是腎死脈也

問曰翕奄沉名曰渭何謂也師曰沉爲純陰翕爲正陽陰陽和合故令脈滑關尺自平陽明脈微沉食飲自可少陰脈微滑滑者緊之浮名也此爲陰實其人必股內汗出陰下濕也

按滑者緊之浮名也此爲陰實二句與上下之義不屬當是錯簡

註此冬月之平脈也若陽明關脈微沉而不滑是失正陽爲胃不和故其人食飲僅自可也若少陰尺脈微滑而不濡是失純陰爲腎不

和故其人汗出陰下濕也

問曰脈有相乘有縱有橫有逆有順何謂也師曰水行乘火金行乘木名曰縱火行乘水木行乘金名曰橫木行乘金火行乘木名曰逆金行乘水木行乘火名曰順也

註

此以人之五脈候人五臟不平之診法也人之五藏法天五行肝木心火脾土肺金腎水此相屬也木生火火生土土生金金生水水生木此相生也木尅土土尅水水尅火火尅

金金尅木此相尅也相生者生相尅者死人
之藏氣亦然故其脈有相乘有縱有橫有逆
有順也水乘火金乘木乘其所勝是相尅也
名曰縱火乘水木乘金乘所不勝是反侮也
名曰橫水乘金火乘木子乘其母是倒施也
名曰逆金乘木木乘火母乘其子是相生也
名曰順五藏之脈肝弦心洪脾緩肺浮腎沉
五藏各見本脈自無病也若見他脈以此推
之縱者病甚橫者病微逆者病虛順者病實

也

集註

方有執曰乘猶乘舟車之乘縱直也橫者縱之對順從也逆者順之反

程知曰非其時而得之則爲相乘縱橫爲患最重順逆猶無大害也

問曰何以知乘府何以知乘藏師曰諸陽浮數爲乘府諸陰遲濇爲乘藏也

註

上條發明五藏相乘縱橫順逆之脈此條發明陰陽相乘各從其類之診府陽也浮數陽

集註

類而相乘也其陰邪乘陽陽邪乘陰府邪乘藏藏邪乘府各以脈證錯綜叅之可類推矣方有執曰浮數陽也以陽部而見陽脈故知乘府也遲濇陰也以陰部而見陰脈故知乘藏也

問曰濡弱何以反適十一頭師曰五藏六府相乘故令十一

註此承上條發明五藏六府不平相乘之脈也

適者至也頭者數也凡人若見濡弱之脈而
相乘者是因我虛而彼乘及之也越人祇曰
一脈輒爲十變何以至十一數也越人遺包
絡三焦故十也今五藏六府相乘故十一也
然陰乘陽陽乘陰府乘藏藏乘府錯而綜之
豈止十二耶

集註

程知曰此總揭脈之大要言脈得濡弱則可
以和適五藏六府也經曰呼吸者脈之頭濡
弱者軟和以滑內經謂之有胃氣也五藏六

之類惟諸相乘中有軟和以滑之意則爲易
愈故濡弱可以和適十一藏脈氣也

問曰病有灑淅惡寒而復發者何答曰陰脈不足陽往從之陽脈不足陰往乘之曰何謂陽不足答曰假令寸口脈微名曰陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒也曰何謂陰不足答曰尺脈弱名曰陰不足陽氣下陷於陰中則發熱也

註此以寸尺發明陰陽相乘爲病之脈也若脈

緊無汗灑淅惡寒發熱者是傷寒也脈緩有
 汗灑淅惡寒發熱者是中風也今寸脈微灑
 淅惡寒者是陽不足陰氣上乘入於陽中也
 尺脈弱發熱者是陰不足陽氣下陷入於陰
 中也此內傷不足陰陽相乘有休止之惡寒
 發熱非外感有餘風寒中傷營衛無休止之
 惡寒發熱也

集註

方有執曰陽先乎陰以陷人也故曰從諱之
 也陰隨於陽以上入也故曰乘傷之也惡寒

者陽不足以勝陽而從陽之化也

程知曰此辨陰陽相乘之脈也往來則陰陽之氣更盛更虛陰併則寒陽併則熱矣凡瘧與往來寒熱之脈皆然也

問曰脈有陽結陰結者何以別之答曰其脈浮而數能食不大便者此爲實名曰陽結也期十七日當劇其脈沉而遲不能食身體重大便反輕名曰陰結也期十四日當劇

註 上條以脈之寸尺微弱辨陰陽不足此條以

脈之浮沉有力別陰陽結實爲病之診法也

脈浮大而數藹藹如車蓋者陽結實脈也脈

沉石而遲纍纍如循長竿者陰結實脈也夫

脈既可以別陰陽之結實又不可不以陰結

陽結之證而合陰結陽結之脈相參看也陽

結證身輕能食陽能消穀也不大便期十七

日當劇者陽體終燥故遲三日也陰結證身

重不能食陰不能消穀也不大便期十四日

當劇者陰體終濡故早三日也劇者謂不大便裏急下重且滿且痛不可再待時日宜早圖之也故或潤竅以導之更堅以下之不致臨期燥屎巨鞭穀道難出痛苦萬狀也凡病後傷液多有此證閱歷深者自知之也

集註

程應旄曰不曰病有而曰脈有二氣所稟有偏勝也陽結者偏於陽而無陰以生液陰結者偏於陰而無陽以化液皆於脈之浮而數沉而遲辨之也

陽脈浮陰脈弱者則血虛虛則筋急也其脈沉者營氣微也其脈浮而汗出如流珠者衛氣衰也

按陽脈浮其脈浮之二浮字當是濡字若是浮

字則與衛衰汗出如流珠之義不屬其脈沉之沉字當是弱字若是沉字則與血虛營氣微之義不屬

註

此以浮沉別陰陽不足爲病之診法也陽脈濡浮而無力脈也陰脈弱沉而無力脈也其

脈弱者營氣微也營微則血虛故不止於發

熱而且筋急也其鰥濡者衛氣衰也衛衰則

表不固故不止於惡寒而且汗出如流珠也

集註方有執曰沉以候裏榮行脈中故衰微可知

浮以候表衛行脈外汗出如流珠則表不固

故衰憊可知

脈藹藹如車蓋者名曰陽結也

註

藹藹如車蓋形容脈之浮大有力卽前陽結

浮數之脈也因其有力而盛故名曰陽結也

集註

程應旄曰脈藹藹如車蓋者形容其浮數中

有擁上之象

脈累累如循長竿者名曰陰結也

註

累累如循長竿者形容脈之沉石有力卽前
陰結沉遲之脈也因其有力而盛故名曰陰

結也

集註

程知曰累累如循長竿直引强硬之貌爲陰

氣固結陽不得而和之前言陰結陽結蓋指

便輒一證言之此則專言脈象也

脈譬如羹上肥者陽氣微也

言 賈賈如羹上肥者形容脈之浮而無力卽前衛氣衰之濡脈故曰陽氣微也

脈綿綿如瀉漆之絕者亡其血也

註綿綿如瀉漆之絕者形容脈之沉而無力卽

前營氣微之弱脈故曰亡其血也

集註成無已曰綿綿者連綿而輒也如瀉漆之絕

者前大而後細也

脈縈縈如蜘蛛絲者陽氣衰也

註縈縈如蜘蛛絲者形容脈之細小難於尋按

而浮中沉似有似無卽前陽不足之微脈故曰陽氣衰也

集註

方有執曰縈縈如蜘蛛絲牽惹旁旋微細欲絕之狀

師曰寸脈下不至關爲陽絕尺脈上不至關爲陰絕此皆不治決死也若計其餘命生死之期期以月節尅之也

註

此已上發明平脈已下皆死候之脈也寸關尺三部脈之上下以候陰陽五藏升降也寸

位乎上候心肺之陽主升升極而降降不至
關是爲孤陽故曰寸脈下不至關爲陽絕也
尺位乎下候肝腎之陰主降降極而升升不
至關是爲獨陰故曰尺脈上不至關爲陰絕
也關位乎中以候脾界乎寸尺所以升降出
入者也今上下不至關是升降出入息矣故
曰此皆不治決死也若陰陽已離胃氣未絕
尚可計餘命之期期以月節尅之如經曰陰
勝則陽絕能夏不能冬陽勝則陰絕能冬不

能夏肝死於秋心死於冬脾死於春肺死於
夏腎死於長夏之類是也推之於日於時亦
然

又未知何藏陰陽前絕若陽氣前絕陰氣後竭者
其人死身色必青陰氣前絕陽氣後竭者其人死
身色必赤腋下溫心下熱也

註 經曰人有兩死而無兩生有兩死者謂陰陽
皆可死也無兩生者謂陰陽不能獨生也故

陽先絕陰後竭死則身青而冷陰先絕陽後

竭死則身赤而溫也

集註

成無已曰陽主熱而色赤陰主寒而色青其人死已身色青則陰未離乎體故知陰氣後竭也身色赤腋下溫心下熱則陽未離乎體故知陽氣後竭也

程知曰陽氣前絕寒病陰氣前絕熱病也寒熱之治法一悞雖死尚有徵驗誠可畏也

師曰癰病人不病名曰行尸以無王氣卒眩仆不識人者短命則死人病癰不病名曰內虛以無穀

神雖困無苦

註

脈者人之根本也脈病人不病者謂外形不
病而見真藏病脈其內本已絕雖生猶死不
過尸居餘氣耳故曰行尸也餘氣者未盡五
藏生旺之餘氣也若旺氣一退卽卒然眩仆
不識人而死矣若良工早察於旺氣未退之
先而圖之未必無所補也人病脈不病謂外
形羸瘦似病其脈自和以根本尚固不過穀
氣不充名曰內虛非行尸可比雖困無害胃

氣復穀氣充自然安矣穀神卽穀氣也

集註方有執曰周氏云形體之中覺見憔悴精神

昏憒食不忻美而齦得四時之從無過不及
之偏是人病齦不病也形體安和而齦息乍
大乍小或至或損弦緊浮滑沉濇不一殘賊
冲和之氣是齦息不與形相應乃齦病人不
病也

張錫駒曰穀神乃水穀所化之神人賴此以
資生也內虛食少穀氣不充卽無穀神矣故

曰無害若無本然之胃神安得謂之無害耶
又未知何藏先受其災若汗出髮潤喘不休者此
爲肺先絕也

註

此申上條不知何藏先絕而詳言其證也肺
主皮毛肺絕汗出不流故髮潤也肺主氣肺
絕張口氣出不能復還也故曰爲肺先絕也

集註

成無己曰肺爲氣之主爲津液之帥汗出髮
潤者津脫也喘不休者氣脫也

脈浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下形體不

仁乍靜乍亂此爲命絕也

註

身汗如油液外亡也喘而不休氣上脫也水

漿不下胃氣絕也形體不仁營衛敗也乍靜

乍亂精神散也此皆命絕之候由此推之脈

雖浮洪必然無根是爲真藏孤陽飛越之診
也

集註

王肯堂曰火之將滅也必明脈來浮洪涌盛
此將去人體之兆也然又必兼下二證始
可斷其命絕

陽反獨留形體如烟熏直視搖頭者此心絕也

註

心絕陰盡惟陽獨留故身體大熱形如烟熏
從火化也心藏神直視神去也頭屬陽陽無
所依故搖頭也

集
註

成無巳曰心竚俠咽系目直視者心經絕也
頭爲諸陽之會搖頭者陰絕而陽無根也

脣吻
註

脣吻反青四肢摵習者此爲肝絕也

也四肢汗出摵摵不已此爲肝絕也

註集成無已曰唇吻者脾之候肝色青肝絕則真

色見於所勝之部也四肢者脾所主肝主筋
肝絕則筋脈引急發於所勝也

裏要方有執曰口脣邊曰吻四肢手足也
黧汗出貌習鳥數飛也言手足顫搖如鳥之
習飛奮振而已也

環口黧黑柔汗發黃者此爲脾絕也

註脾之華在脣四白環口黧黑其華萎矣冷汗
陰黃皆脾絕也

集註 方有執曰口爲脾之竅 黧黑者熏黃 黑暗土敗之色也 柔汗俗謂冷汗是也

張錫駒曰脾主四白環口 黎黑土敗而水侮

也 柔汗者柔軟而膩 脾之真液黃者脾之真

色真液洩而真色見故爲脾絕也

洩便遺失狂言目反直視者此爲腎絕也

註 腎司二便 洩便遺失腎絕也 腎藏精與志 在

言直視精志俱敗也

註 方有執曰洩便遺溺也 腎司闔闢泄生邪主微

集註 方有執曰洩便遺溺也 腎司闔闢泄生邪主微故

二便皆無禁約也經曰腎藏志狂言者是失志矣失志者死腎主骨骨之精爲瞳子目反直視者骨之精不上榮於瞳子而不能轉也問曰上工望而知之中工問而知之下工脈而知之願聞其說師曰病家人請云病人苦發熱身體疼病人自臥師到診其脈沉而遲者知其差也何以知之若表有病者脈當浮大今脈反沉遲故知愈也

註

此下皆詳望問而知之之類也望謂觀其形

之盛衰色之深淺問謂詢其情之苦欲病之根因脈謂診其脈之陰陽合乎形色也設病人來請告以病者苦發熱身體疼師到病人自臥診其脈沉而遲知其差也何以知之表有病脈當浮大今反沉遲而無表脈且無表證故知愈也

集註張錫駒曰有問發熱身疼脈反沉遲是陽病

舌然嘗臥之狀問其有熱除身輕之意而後而見陰脈何以說得愈也答曰是必望其有

合脈以斷其愈也

假令病人云腹內卒痛病人自坐師到脈之浮而大者知其差也何以知之若裏有病者脈當沉而細今脈浮大故知愈也

註 痘家人來請告以病者腹內卒痛醫師到病人自坐無苦容診其脈浮而大知其差也何以言之裏有病脈當沉細今反浮大而無裏脈且無裏證故知愈也

師曰病家人來請云病人發熱煩極明日師到病

人向壁臥此熱已去也設令脈不和處言已愈

按不和當是自和若不和如何言愈

註此申上二條之義也病家人來言病者發熱

煩極師未卽去明日到病人向壁靜臥此熱

已去因知其差假令脈不和緩不可言愈必

和緩而始可斷其已愈也推之腹痛亦然此

篇首所云設有不應消息診看消息者謂今

日之望異於昨日之間聞也

假令向壁臥聞師到不驚起而盼視若三言三止

齶之嘸唾者此詐病也假令齶自和處言此病大重當須服吐下藥鍼灸數十百處乃愈

註此設治詐病之法也蓋仲景不欲人售其欺亦不欲醫爲其欺而妄治也醫者玩此而揣摩之則彼不敢欺而我不妄治矣

集註程知曰彼以詐病我以詐治非良工不能具是巧也

師持齶病人欠者無病也齶之呻者病也言遲者風也搖頭言者裏痛也行遲者表強也坐而伏者

短氣也坐而下一脚者腰痛也裏實護腹如懷卵物者心痛也

註陰陽相引故欠欠者先引氣入而後呵之故

謂之呵欠陰陽不相引則病相引則和故曰

欠者無病也診脈時有呻吟病苦之聲故曰

呻者病也言遲者語言蹇濶故曰言遲者風

也搖頭言者痛極艱於發聲搖頭以意示緩

故曰搖頭言者裏痛也行遲者風病筋絡不

利故曰行遲者表強也坐而伏者氣不能接

故曰坐而伏者短氣也凡腰痛者皆不能坐卽畧坐非伸足依倚不可故曰坐而下一脚者腰痛也凡心痛者皆僵僂護其痛處故曰裏寶護腹如懷卵物者心痛也

集註

方有執曰舌強則言遲經絡牽急則舌強筋攣則經絡拘急肝屬木其合筋其主風頭屬陽裏屬陰頭搖者陰不與陽和也短氣者裏不足也此條八者皆望而知之之事也

張志聰曰師持脈者猶言師但持脈而不問

也八條皆察人之神情得人之病機所謂望而知之者

問曰人恐怖者其脈何狀師曰脈形如循絲纍纍然其面白脫色也

詳

人病恐怖者陽神不足也陽不足則恐神不足則怖恐則血隨氣下故面白脫色不潤澤也怖則氣隨神亂故脈形如循絲纍纍然而亂也

集方有執曰恐怖惶懼也循理治也絲言細也

累累聯絡貌脫色猶言失色也蓋內氣餒者則外色奪所以有卒然之變也

程應旄曰此示人察色合脈之法恐則氣下神被奪矣故脈細而且不定面色白而且脫也

問曰人不飲其脈何類師曰脈自濇脣口乾燥也註津液少則脈濇脣口因以乾燥此因不飲而然非由此而不飲也

集註程應旄曰不飲如與人營氣至二三日湯水

不沾脣之類肺失游溢精氣故脈濁而脣口乾燥也

問曰人愧者其脈何類師曰脈浮而面色乍白乍赤

註 愧者羞也羞則神色蕩而不定故脈浮而面色乍白乍赤也此皆察色合脈以意消息而知之之類也

集註 程應旄曰以上數條不論有病無病凡人有所負於中輒復形之色與脈也於此推之以

所負於中輒復形之色與脈也於此推之以

意消息則諸病之情無不可卽外以徵內矣
問曰嘔有災怪何謂也師曰假令人病嘔得太陽
與形證相應因爲作湯比還送湯如食頃病人乃
大吐若下利腹中痛師曰我前來不見此證今乃
變異是名災怪又問曰何緣作此吐利答曰或有
舊時服藥今乃發作故名災怪耳

註嘔有災怪謂因藥而變災怪也假令人病太
陽病得太陽嘔嘔證相應因爲作太陽病湯
藥與服之比還如食頃病人乃大吐下利腹

中痛師問曰我先來不見此證今乃災變怪
異緣何作此吐利病者答曰或有舊時服藥
今乃發作故爲此災怪耳望問固醫家之事
亦須病人毫無隱諱方能盡醫所長仲景爲
病家服藥未告於醫醫失問先服何藥故出
此條以示戒耳

集註成無已曰醫以脈證與藥相對而反變異爲

其災可怪故名病太陽

張志聰曰脈得太陽與形證相應者如太陽

病脈浮頭項強痛難忍故此脈與形證相應
也或有舊時服藥今乃發作者言送湯如食
頃所投之藥未週於經必舊時服藥之故也

辨脈法

辨者別也辨脈者辨別諸脈之名也法者諸
脈部位至數形狀相類相反別之各有其法
也脈名者如浮沉遲數滑濇諸脈之名是也
部位者如浮中沉上下之部位是也至數者
如遲三至數六至之至數是也形狀者如滑

流滯滯之形狀是也相類者如弦與緊滑與動之類是也相反者如浮與沉虛與實之反是也皮膚取而得之謂之浮筋骨取而得之謂之沉此以脈之上下部位而得名也是則凡脈因部位而得名皆統乎浮沉矣如浮而無力謂之濡沉而無力謂之弱浮而極有力謂之革沉而極有力謂之牢浮中沉俱有力按之且大謂之實浮中沉俱無力按之且大謂之虛浮中沉極無力按之且小似有似無

謂之微浮沉中沉極無力按之且大渙散不收
謂之散浮沉有力中取無力謂之芤按之至
骨推尋始得謂之伏此皆以部位兼形狀相
反而得名者也一息三至謂之遲一息六至
謂之數此以脈之至數而得名者也是則凡
脈因至數而得名者皆統乎遲數矣如一息
四至謂之緩一息七至謂之疾數時一止謂
之促緩時一止謂之結至數不乖動而中止
不能自還須臾復動謂之代此皆以至數兼

相類而得名者也流利如珠謂之滑進退艱難滯濇謂之濇此以脈之形狀而得名也是則凡脈因形狀而得名者皆統乎滑濇矣如脈形粗大謂之大脈形細小謂之小來去迢迢謂之長來去縮縮謂之短來去衰謂之洪其形如豆動搖不移謂之動狀類弓弦按之端直且勁謂之弦較弦則粗按之左右彈指謂之緊此皆以形狀兼相類相反而得名者也此辨脈之大槩也診者於此能詳審而

擴充之則進乎法矣今以浮沉遲數滑濇六
脈別之以爲綱以大小虛實諸脈辨之以爲
目務使陰陽標本虛實寒熱心中有據指下
無差庶心手相得而辨證處方自無錯謬矣
問曰脈有陰陽何謂也答曰凡脈大浮數動滑此
名陽也脈沉濇弱弦微此名陰也凡陰病見陽脈
者生陽病見陰脈者死

註

此以脈之陰陽辨病之陰陽生死法也浮大
數動滑五者比之諸脈爲有餘陽道有餘故

曰陽也沉濇弱弦微五者比之諸脈爲不及
陰道不及故曰陰也陰病謂陰寒病也見陽
脉主脈謂見陽熱脈也陽熱脈卽浮大數動滑類
也以陰病得陰脈證脈相應死難必也陰病
問曰若得陽脈猶冬盡春生萬物雖未卽生然日
進生機故曰生也陽病謂陽熱病也見陰脈
謂見陰寒脈也陰寒脈卽沉濇弱弦微類也
以陽病得陽脈證脈相應生可卜也陽病若
得陰脈如暑去秋來萬物雖未卽死然日趨

死候故曰死也蓋天人無二理春夏爲陽秋冬爲陰

爲陰陽主生陰主殺故也

集註

方有執曰陰陽者通臟腑血氣表裏虛實風寒寒熱而總言之也

程知曰陰病見陽脈而主生者邪氣自裏之表欲汗而解也陽病見陰脈而主死者邪氣自表入裏正虛邪盛也故正氣實者多見陽脈正氣虛者多見陰脈

脈來緩時一止復來者名曰結脈來數時一止復

來者名曰促陽盛則促陰盛則結此皆病脈

註

緩四至脈也緩時一止復來者名曰結脈數

六至脈也數時一止復來者名曰促脈陽盛

則促陰盛則結陰陽偏勝則病故曰此皆病

脈也

脈按之來緩時一止復來者名曰結又脈來動而
中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脈來
動而中止不能自還因而復動者名曰代陰也得
此脈者必難治

此

脈按之來緩時一止至名曰結陰也數語文

義不順且前論促結之脈已明當是衍文

註

脈來至數不乖而中止不能自還因而復動
名曰代乃一藏無氣求他藏以代續之故也
凡病得此代脈者必爲難治蓋以促結之止
如急行而蹶雖然中止卽能自還非代脈之
止可比也

陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷
惡寒者此三焦傷也若數脈見於關上上下無頭

尾如豆大厥厥動搖者名曰動也

按素問曰陽加於陰謂之汗陽加於陽豈有汗出之理陽動則汗出二字當是發熱二字陰動則發熱二字當是汗出二字

註

動者躁動也謂陰陽互相鼓擊而不寧也動陽脈也寸爲陽陽乘擊於陽故陽動發熱也尺爲陰陰乘擊於陰故陰動汗出也關界乎陰陽則陰陽互相乘擊故發熱汗出同見也此爲動而有力陽盛之候若按之不鼓是爲

陽衰之診則必形冷而不發熱汗出而必惡
寒非搏擊陽盛之動乃擾亂陽虛之動也由
三焦之陽氣傷則不能外溫肉分故有是證
也動脈之狀頗似數脈惟上下無頭尾如豆
大厥厥動搖故名曰動也厥厥者謂似有根
之搖動動而不移非若滑脈之流動動而不
居也

集註方有執曰陰陽相搏之陰陽以二氣言陽動
陰動之陰陽以部位言下言動脈之定位與

其形狀厥厥舉發貌

程知曰陽升陰降交通上下往來於尺寸之間則冲和安靜惟陽欲升而陰不足以和之使降則兩相搏擊其脈必數而厥厥搖動見於關上也

脈浮而緊者名曰弦也弦者狀如弓弦按之不移也脈緊者如轉索無常也

註

乃謂浮而勁緊弦之狀也弦緊相類惟恐人

將弦作緊將緊作弦故並舉相形以別之也
弦者狀如弓弦按之不移卽所謂端直也緊
者如轉索無常卽所謂不端直也端直則不
能如轉索轉索則不能似端直其爲勁急則
同所以相類也

集註

方有執曰此明弦緊之辨按之不移言如弦
之張於弓一定而不可動移也轉索無常言
左右旋轉而不可拘也

程知曰緊爲寒邪方盛直細中有轉動急疾

之意故謂如轉索也

張錫駒曰弦緊之分在移與不移耳

脈弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛寒虛相搏此名爲革婦人則半產漏下男子則亡血失精

註

脈形粗大有力謂之大浮沉有力中取無力狀如葱管謂之芤沉而且大按之勁急有力謂之牢浮而且大舉之勁急有力謂之革革者以鼓革而得名外急中空之象也弦則

脈者以鼓革而得名外急中空之象也弦則

爲勁減其中取之實中空象也此以弦減芤虛二脈
形容革脈也女子得之半產漏下男子得之
亡血失精寒虛相搏故也

集註

程知曰言弦而虛大之脈也弦則爲減謂陽
氣減少而寒也大則爲芤謂似革中空而虛
也虛寒相搏則精血漏失故有革象也

問曰脈有殘賊何謂也師曰脈有弦緊浮滑沉濇
此六脈名曰殘賊能爲諸脈作病也

註

此下皆殘賊爲病之診也相乘之脈爲正氣
虛隨我所虛而乘及之之謂也殘賊之脈爲
邪氣實恃彼之強而虐及之之謂也此六脈
者名曰殘賊殘則明傷賊則暗襲脈中有此
當屬實邪不論何部但本脈中兼見此脈輒
防邪至也

註

集方有執曰諸脈謂各部之脈也作起也言六
者若見於各部之脈中則皆能於其部生起

病端

張錫駒曰殘傷殘賊賊害也言此六者之齦足以暗傷人之經齦血氣如賊之害人而不覺故曰能爲諸齦作病也

寸口齦陰陽俱緊者法當清邪中於上焦濁邪中於下焦清邪中上名曰潔也濁邪中下名曰渾也陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故使邪中於陰也陽中於邪必發熱頭痛項強頸攣腰痛脛酸所謂陽中霧露之氣故曰清邪中上濁邪中下陰氣爲慄足膝逆冷便溺妄出表氣微虛裏氣

微急三焦相溷內外不通上焦怫鬱藏氣相熏口爛食斷也中焦不治胃氣上衝脾氣不轉胃中爲濁營衛不通血凝不流若衛氣前通者小便赤黃與熱相搏因熱作使遊於經絡出入藏府熱氣所過則爲癰膿若陰氣前通者陽氣厥微陰無所使客氣入內嘵而出之聲嗌咽塞寒厥相追爲熱所擁血凝自下狀如豚肝陰陽俱厥脾氣孤弱五液注下下焦不闔清便下重令便數難臍築湫痛命

緊則霧露之邪中於土焦沉鹹緊則寒邪中
於下焦上焦指太陽也下焦指少陰也霧露
之邪曰潔曰清清邪中上發熱頭痛項強頸
攣腰疼脛酸者霧露之邪中於太陽表也寒
邪曰渾曰濁濁邪中下陰氣爲慄足脛逆冷
便溺妄出者寒邪中於少陰裏也經曰虛邪
不能獨傷人必因身形之虛而後客之也蓋
因其人表氣虛裏氣不固清濁之邪中傷上

下三焦相溷表裏不通以致上焦清氣不宣

邪氣怫鬱與藏相熏口爛食斷中焦不治胃

氣主下而反上衝脾氣主運而反不轉中焦

皆濁營衛不通血凝不流行也若正能勝邪

衛氣先通其人必先小便赤黃熱傷之經必

血凝肉腐而外發爲癰膿也若營氣先通其

人必先嘔嘔咽塞熱擁於裏之血凝者自下

狀如豚肝也若正不勝邪陰陽俱逆營衛不

通脾氣孤弱不能散精五夜主下下焦不鬱

裏急墮癟閑便數卷全將難全也

集註

沈亮宸曰傷寒之證轉熱卽佳故少陰厥陰
皆以發熱而愈而凡下膿血與癰膿皆非死
證若陰陽俱厥厥者必利故五液注下下焦
不闇命將難全也

方有執曰清指風濁指寒曰潔曰渾以天地
之偏氣言也陰中於邪已下至濁邪中下一
節是釋上文陰卽下焦陽卽上焦也陰氣爲
慄已下至血凝不流是言證若衛氣前通已

下言變癰膿之故若陰氣前通已下言變膿
血利之故衛氣卽陽氣營氣卽陰氣乃承上
營衛不通而言而清濁之所以爲病在其中
矣陰陽俱厥已下言證併於裏而加重故曰
命將難全也

脈陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥踴臥足冷鼻
中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微
發熱手足溫者此爲欲解或到八日已上反大發
熱者此爲難治設使惡寒者必欲嘔也腹內痛者

必欲利也

註

此承上條互詳其證戒人臨此陰陽混淆之病慎勿妄治也此條之踰臥足冷卽上條之濁邪中下也此條之鼻涕舌胎卽上條之清邪中上也此條之唇口乾燥卽上條之口爛蝕斷也此條之反大發熱卽上條之癰膿下血也此條之腹中痛卽上條之下重湫痛也此條之惡寒卽上條之必內慄也脈陰陽俱緊傷寒脈也口中氣出唇口乾燥胃經熱也

踰臥足冷少陰寒也鼻中涕出表傷風也舌
上胎滑裏無熱也似此表裏陰陽寒熱虛實
雜揉未定之病慎勿妄治則當審其孰輕孰
重孰緩孰急先後施治可也到七日已來其
人微發熱手足漸溫者此陰退陽復爲欲解
也若到八日已上反大發熱者乃邪盛正衰
此爲難治也設使惡寒知尚在表若嘔必欲
入裏也腹內痛者知邪已入裏內攻必欲下
利也

註

方有執曰微發熱邪退也大發熱邪盛也惡

寒尚在表也腹內痛已入裏也

嘔陰陽俱緊至於吐利其嘔獨不解緊去入安此爲欲解若嘔遲至六七日不欲食此爲晚發水停故也爲未解食自可者爲欲解

按緊去入安之入字當是人字人安謂不吐利也必是傳寫之訛此爲晚發水停故也二句與上下文義不屬當是衍文

註此發明嘔陰陽俱緊內外寒甚至於吐利解

不解之義也吐利後脈仍緊爲邪未盡不解
也緊去脈緩爲邪盡人安欲解也若緊去脈
遲至六七日不欲食者則胃未和爲未解也
若欲食者則胃已和雖脈遲亦爲欲解也

註

集成無已曰脈陰陽俱緊爲寒氣甚於上下至
於吐利之後緊脈不罷者爲其脈獨不解緊
去則人安爲欲解也

寸口脈浮而大浮爲虛大爲實在尺爲關在寸爲
格關則不得小便格則吐逆

平颶以颶內外候關格此以颶尺寸候關格
於此推之凡陰陽盛極皆病關格而不必定
在內外尺寸也寸口颶浮而大浮爲正氣虛
大爲邪氣實在尺則陰邪實關閉正氣不能
宣名曰關關則不得小便也在寸則陽邪實
格拒正氣不能化名曰格格則吐逆也

集

註張錫駒曰浮大之颶在於尺則爲關陰陰氣

不能施化故不得小便浮大之颶在於寸則
爲格陽陽氣不能宣通故吐逆

脈浮而滑浮爲陽滑爲實陽實相搏其脈數疾衛氣失度浮滑之脈數疾發熱汗出者此爲不治

註

浮爲陽滑爲實陽實相搏其脈行於脈外者數且疾矣衛氣行疾營氣行遲營衛不相輔而行故曰失度浮滑數疾有餘之脈見發熱無汗有餘之證脈證相合則爲可治若見發熱汗出不足之證脈證不合不治明矣

註

集成無已曰浮滑數疾之脈發熱汗出解者邪氣退也若不解者正氣脫也必不可治經曰

鄭陰陽俱盛大汗出不解者死

脈浮而數浮爲風數爲虛風爲熱虛爲寒風虛相搏則灑淅惡寒也

按數爲虛之虛字當是熱字風爲熱虛爲寒二句當是衍文風虛相搏之虛字亦當是熱字

註風寒在表則脈浮緊風熱在表則脈浮數表受風邪故灑淅惡寒也

諸脈浮數當發熱而灑淅惡寒若有痛處飲食如常者蓄積有膿也

註 諸脈浮數謂寸關尺六脈俱浮數也浮則爲風數則爲熱風熱遏鬱於表則當發熱而灑淅惡寒也若有隱痛之處飲食如常者非表邪之診乃內癰蓄積有膿之診於此知浮數之脈不可槩爲風熱也

集註

王肯堂曰人身有焮腫痛楚處未有不自覺者此條所言必是內癰故曰蓄積有膿也如

胃脘癰肺癰腸癰皆各有辨而胃癰之脈人迎反盛未有不悞以爲傷寒者故宜察之

程應旄曰脈證似傷寒若不於若有痛處飲食如常之證參酌而悞以辛溫發散助其陽熱否則悞以寒涼徹熱遏住邪氣滋害深矣張璐曰若有焮腫爲熱壅經絡若無腫處必邪留藏府隨內外而發癰膿也

脈浮而大浮爲風虛大爲氣強風氣相搏必成癰疹身體爲痒痒者名泄風久久爲痴癩

六脈俱浮而大浮爲風虛大爲氣强强者熱也風熱相搏必成癰疹也身體爲痒痒者肌

註

虛熱氣外薄故也名爲泄風若久不愈則成

癔癩癲癩疥癬癰癩之類是也

集註成無己曰癔癩者癥風也眉少髮稀身有乾瘡而腥臭經云鷦風成癥是也

朱震亨曰經云諸痒爲虛血燥不榮肌腠所以痒也

方有執曰經云外在腠理則爲泄風

寸口諸微亡陽諸濡亡血諸弱發熱諸緊爲寒諸乘寒者則爲厥鬱冒不仁以胃無穀氣脾濇不通

急不能言戰而慄也

按濡浮而無力候陽虛也豈有亡血之理弱沉

而無力候陰虛也豈止發熱而已諸濡亡血

當是諸濡衛虛諸弱發熱當是諸弱營虛

註寸口者指寸關尺三部而言也諸微謂凡病

見微蹶皆亡陽也諸濡謂凡病見濡蹶皆衛

虛也諸弱謂凡病見弱蹶皆營虛也諸緊謂

凡病見緊蹶皆爲寒也諸乘寒者謂諸微濡

弱蹶亡陽營衛不足之人一病卽見殘賊緊

蹶則爲寒乘病厥也厥於中者鬱冒昏迷不知痛痒厥於經者戰慄口噤不能言語以平日胃虛損穀脾虛不運中虛不勝外邪也

集註程知曰諸乘寒者則以陽極虛而陰寒直乘

之也故爲厥逆其所以昏冒不知人強直而無覺者則以胃無穀氣脾不流通故使口噤不能言外戰內慄而厥也

問曰曾爲人所難緊蹶從何而來師曰假令亡汗若吐以肺裏寒故令蹶緊也假令欬者坐飲冷水

註

此詳申上條諸亡陽營衛不足之人而見緊

脈之義也曾爲人所難問緊脈爲寒實之診

虛冷亦見緊脈是從何而來也師曰假令其

人亡汗表虛若吐胸虛下利裏虛寒邪乘虛

爲病或外感寒邪或內飲冷水或中寒陰化

皆令脈緊也若與浮同見無汗則爲傷寒實

邪有汗則爲亡陽虛邪與沉同見腹痛不便

則爲中寒實邪腹痛下利則爲中寒虛邪由

此推之凡諸實脈從虛化者卽未可謂之實矣

集註

程應旄曰緊則爲寒稱曰乘脈今復列之殘賊何義曰虛則爲人乘實則乘人凡脈皆然不獨緊也

寸口脈微尺脈緊其人虛損多汗知陰常在絕不見陽也

註

上條以浮沉見微緊此條以寸尺見微緊皆陰盛陽亡之診故曰知陰常在絕不見陽也

祇曰虛損多汗者各言之也

集註

程知曰言寸微尺緊爲虛損多汗之證也寸

微弱爲亡陽尺緊疾爲陰勝陰勝於內陽絕於外故爲虛損多汗

師曰病人脈微弱濇者此爲醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲着複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表

胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲着複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脈遲濇故知血亡也

按又陰脈遲濇故知血亡也二句與上文義不屬非有闕文卽是衍文

註

病人脈微而濇詢之爲醫大發其汗又數大下之所以致此病也其人亡血畧辭也謂亡其血氣也氣亡則陽微陽微則惡寒血亡則陰弱陰弱則發熱陽微陰弱故病當惡寒後

乃發熱也輕者邪不留連遇所不勝則愈
重者無休止時卽遇所不勝尤甚也然惡寒
雖遇夏月盛熱欲着複衣所以然者五月之
時陽氣在外胃中虛冷大發其汗令陽氣微
故不勝寒也發熱雖遇冬月盛寒欲裸其身
所以然者十一月之時陽氣在內胃中煩熱
又數下之令陰氣弱故不能勝熱也此卽論
中所謂寒在骨髓寒在皮膚寒在骨髓熱在
皮膚沉痼寒熱之病也

集註 王肯堂曰非必遇夏乃寒遇冬乃熱也此但

立其例論其理耳

寸口脈微而緩微者衛氣踈踈則其膚空緩則胃氣實實則穀消而水化也穀入於胃脈道乃行水入於經其血乃成榮盛則其膚必踈三焦絕經名曰血崩

註

寸口脈微而緩微者衛氣踈踈則其表空虛也緩者胃氣實實則消化水穀也穀入於胃脈道之氣乃行水入於經脈絡之血乃成今

榮愈盛而衛愈踈血愈多而氣愈少氣血失其經常之道故曰三焦絕經氣不能制血血不能歸經故血妄行而崩也

集註

成無己曰衛氣者溫分肉肥腠理衛氣既踈皮膚不得溫肥則空虛也經曰緩者胃氣有餘有餘爲實故云緩者胃氣實內經曰食入於胃滯精於脈是穀入於胃脈道乃行也鍼經曰飲而液滲於絡合和於血是水入於經其血乃成也經常也三焦者氣之道路衛氣

疎則氣不循常度故三焦絕其常度也

方有執曰疎言不能固護實猶言強也穀入於胃至其血乃成乃承上文穀消而水化也陰血大下而曰崩者言其不能止靜如山壞之勢也

寸口脈微而濇微者衛氣不行濇者榮氣不逮榮衛不能相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則煩疼口難言衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而酢呑中焦不歸者不能消穀

引食下焦不歸者則遺洟

註

凡經脈內外榮衛也藏府內外三焦也故經
曰榮行脈中衛行脈外上焦心肺主之中焦
脾胃主之下焦肝腎主之分而言之榮也衛
也三焦也合而言之皆本乎一氣之流行隨
其所在而得名也脈微而濇榮衛不足不足
則榮衛不能相將而行三焦無所仰賴故身
體周痺不仁榮氣不足故身煩疼口難言語
衛氣不足故惡寒數欠也上焦司降降者清

中之濁下焦司升者濁中之清中焦司降清者令其上升濁者令其下降今榮衛不相將而行三焦無所仰賴故不能各歸其部而失其職矣上焦不歸則濁氣不降噫氣而吞酸中焦不歸則升降相違故不能消穀引食下焦不歸則清氣不升故不能約束而遺洩也

寸口脈微而濇微者衛氣衰濇者榮氣不足衛氣衰面色黃榮氣不足面色青榮爲根衛爲葉榮衛

俱微則根葉枯槁而寒慄欬逆唾腥吐沫汎也

註此詳申榮衛上焦之證也面色黃青榮衛不

足之色也惡寒而慄欬嗽唾腥吐痰涎沫肺損之證也肺主皮毛皮毛者榮衛之所居故肺損則皮聚而毛落榮衛枯槁也

集註

成無己曰榮行脈中爲根衛行脈外爲葉根

葉俱微則陰陽之氣衰也

寸口脈弱而遲弱者衛氣微遲者營中寒營爲血血寒則發熱衛爲氣氣微者心內饑饑而虛滿不

能食也

按條末心內饑饑而虛滿不能食句此是論脾胃不關營衛故弱者衛氣微當是陽氣微遲者營中寒當是脾中寒上下文義始屬營爲血血寒則發熱豈有血寒發熱之理乎衛爲氣氣微者當是陽氣微脾中寒者心內饑閼下條言胃氣有餘自知

註

此詳申營衛中焦之證也緩以候胃遲以候

脾胃主納穀脾主化穀故能食者胃也能化

者脾也今陽微中寒

胃俱病所以心內雖

饑饑而虛滿不能食也

集註方有執曰饑而虛滿者切主化穀衛陽衰微

不化穀故虛滿而不能食也

寸口脈弱而緩弱者陽氣不足緩者胃氣有餘噫
而吞酸食卒不下氣墮於膈上也

註此又詳申中焦之證也寸口脈弱而緩弱者

陽氣不足緩者胃氣有餘不足則脾失健運
有餘則胃强能食此胃强脾弱所以雖能食

而不能消化也故使吞酸而噫食卒不化氣
填脹悶於膈中也

集註方有執曰陽氣以胃中之陽氣言不足則不能化穀胃氣以胃中之穀氣言有餘言有宿食也有宿食則鬱而生熱故噫飽而吞酸此蓋以飲食之內傷者言也

趺陽脈遲而緩胃氣如經也趺陽脈浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所爲也營衛內陷其數先微脈反但浮其人必大便鞶氣噫而

除何以言之本以數脈動脾其數先微故知脾氣不治大便鞭氣噫而除今脈反浮其數改微邪氣獨留心中則饑邪熱不殺穀潮熱發渴數脈當遲緩脈因前後度數如法病者則饑數脈不時則生惡瘡也

註此已下辨趺陽之脈少陰之脈也趺陽一名衝陽在脚背上去陷骨三寸脈動處乃是陽明胃經之動脈也少陰一名太谿在足內踝後跟骨上脈動處乃足少陰腎經之動脈也

趺陽少陰乃古診法越人以十二經雖皆有動脈獨取寸口以決死生者以寸口乃脈之大要會也然此法不行久矣設有危急之病寸口脈不見診此以決死生可也若在平時總不如以關脈爲趺陽尺脈爲少陰更爲愈也如趺陽胃脈遲而和緩是胃氣不病如經脈也今趺陽脈浮而數按之無力浮以候府浮而無力則爲傷胃沉以候藏數而無力則爲傷脾詢之病者特爲醫下之所爲以致營

衛之氣內陷其先數衄變微爲脾弱也浮衄
仍浮反甚爲胃強也胃強則邪氣獨留故大
便鞭潮熱發渴也脾弱則脾氣不運故邪熱
不能殺穀雖饑不食氣噫而快也醫者前後
施治如法而浮數之衄自當遲緩如經則饑
欲食病者愈也若施治失宜數衄終始不退
則生惡瘡也

集註方有執曰惡瘡與屎膿雖不同其爲血熱則
皆然也

程知曰此言趺陽脈遲緩妄下則有浮數之變也

趺陽脈浮而濇少陰脈如經者其病在脾法當下利何以知之若脈浮大者氣實血虛也今趺陽脈浮而濇故知脾氣不足胃氣虛也以少陰脈弦而浮纔見此爲調脈故稱如經也若反滑而數者故知當屎膿也

按若脈浮大者氣實血虛也二句與上文義不屬當是衍文少陰脈弦而浮豈可謂如經乎

當改沉而滑字

註脾腎皆病下利今趺陽胃脈浮濇少陰腎脈
如常是病在脾不在腎也何以知之浮爲陽
以候胃濇爲陰以候脾浮與濇合故知脾氣
不足胃氣虛也以少陰脈見沉而滑故稱如
經也若沉滑而數者是陽邪傷陰故知當屎
膿血也

集註程知曰水穀之下利屬於脾胃而膿血之下
利屬於腎此可診趺陽太谿而辨之也

趺陽齦伏而濇伏則吐逆水穀不化濇則食不得

入名曰關格

按水穀不化之化字當是入字若是化字是能

食也何名曰格食不得入當是不得小便若

有小便是水道通也何名曰關必是傳寫之

誤

註前論以浮沉尺寸候關格此以趺陽候關格

之診法也趺陽者胃齦也齦伏而濇伏則尺

寸之陰陽停升降也濇則三焦之元氣不流

通也不升降流通故上則吐逆下則不得小便病名曰關格也

趺陽脈滑而緊滑者胃氣實緊者脾氣強持實擊
強痛還自傷以手把刃坐作瘡也

註

趺陽之脈以候脾胃當和緩今反滑而緊者以滑爲胃氣實緊爲脾氣強滑緊並見如持實以擊強故主急痛痛還自傷脾胃也以手把刃而成瘡者猶之操刃自割而貽其害也

集
註

方有執曰滑爲食故在胃則主穀氣實緊爲寒故在脾則主邪氣強持實擊強言胃實脾強兩相搏擊而爲病譬如以手把刃而自傷蓋謂非由藏府而傳變也

趺陽脈沉而數沉爲實數消穀緊者病難治

註

胃脈沉而數沉主裏數主熱沉數爲裏實熱則能消穀凡裏病得此脈者皆易治也若不沉數而沉緊沉緊爲裏寒則爲殘傷胃氣之

診故曰難治也

集註

方有執曰沉以候裏故在脾胃爲土實穀氣

實也數爲熱陽也緊爲寒陰也言趺陽主脾
胃脾胃主殺殺氣實吉脈見數而陽熱勝陽
能化穀雖病不足爲害若脈得緊而陰寒勝
陰不化穀故爲難治

程知曰言趺陽沉數爲消穀之病也沉爲實
沉主裏也數消穀數爲熱也緊盛爲邪勝故
爲難治也

趺陽脈大而緊者當卽下利爲難治

註下利者不論寒熱皆中虛之病故亟宜小宜緩爲病亟相宜則易治也今趺陽胃亟大而緊爲病虛亟實則不相宜故爲難治也

集註成無己曰大爲虛緊爲寒胃中虛寒當卽下利下利亟亦微小今反大緊邪盛也故曰難治經曰下利亟大者爲未止

張璐曰趺陽亟緊爲寒邪傷胃故必下利下利亟大爲邪盛故難治也

趺陽亟微而緊緊則爲寒微則爲虛微緊相搏則

爲短氣

註 氓見浮微而沉緊虛寒之証也 跌陽胃脈似

有似無爲陽虛重按似緊爲中寒胃陽虛寒

則氣短矣緊脈主痛而不痛者以緊兼微雖

緊不勁故不痛也

集註 程知曰言跌陽微緊則中氣虛寒爲短氣之

證也

趺陽脈不出脾不上下身冷膚鞭

註

趺陽脈伏不出則中焦陽虛脾胃不能上下

輸布衛氣不行故病通身膚冷而鞭也

集註程知曰身冷者衛氣不溫也膚鞭者營血不

濡也

趺陽脈浮而芤浮者衛氣衰芤者榮氣傷其身體瘦肌肉甲錯浮芤相搏宗氣衰微四屬斷絕

註

胃脈浮芤浮者胃脈衰芤者營氣傷衛氣衰故身體瘦也營氣傷故肌肉甲錯也浮芤相

搏日久而宗氣衰微生氣少矣四屬斷絕謂

皮肉脂髓四者俱竭故一身枯瘦失滋養矣

集註

程應旄曰衛以營爲根營以衛爲護而營衛之統於宗氣者又以趺陽胃爲根也

趺陽脈緊而浮浮爲氣緊爲寒浮爲腹滿緊爲絞痛浮緊相搏腸鳴而轉轉卽氣動膈氣乃下少陰脈不出其陰腫大而虛也

按陰腫大而虛之虛字當是痛字細玩可知

註

外感六脈浮緊寒氣在外故骨節煩痛內傷胃脈浮緊寒氣在內故腹滿絞痛寒氣相搏腸鳴而轉轉則膈中寒氣下趨洞泄也若少

陰脈浮不出則下焦陽虛寒氣聚於陰器不得發泄故病疝陰腫大而痛也

集註 方有執曰趺陽之土敗而少陰所以無制也

少陰負趺陽者爲順也

註

此少陰負趺陽大旨蓋少陰腎屬水趺陽胃

屬土雜病惡土尅水而傷寒少陰病惟恐土

不能制水水一泛溢則嘔吐下利無所不至

若趺陽脈和胃土有權則水有制而少陰負

則爲順矣順者土不爲水侮也

集方有執曰萬物資生於上而百骸藉養於胃
註

水土平成物阜人安非天下之至順乎古今
謂趺陽有脈者不死有以哉

汪琥曰趺陽脈圖經原名衝陽脈在足跗中
指端上行五寸去陷谷穴三寸足陽明脈之所過也爲原故一名會原診法病重者切之
以決死生傷寒以胃氣爲本趺陽之脈不衰
知胃氣尚在病雖危猶可治也

少陰脈弱而濡弱者微煩濇者厥逆

少陰脈弱而濇弱者腎陰虛故微煩也濇者

脈道滯故肢冷也

集註方有執曰弱爲虛損不足脈陰虛生內熱所

以煩然屬虛煩故雖煩亦微也濇爲少血而

不滑不能上與陽相順接所以厥而逆冷也

程知曰言腎脈微濇之病也少陰腎動脈也

在足內踝後跟骨上陷中也

少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胸膈

宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相

動令身不仁此爲尸厥當刺期門巨闕

註

少陰脈不至是腎氣衰微精血少也腎者陰中藏陽者也腎陰虛竭不能藏陽陽氣上奔迫促胸膈宗氣反爲所阻聚而不行血結心下陽氣旣奔於上極必退下退下則陰股間熱與陰相動所必然也雖令知覺冥身不仁而不死此爲尸厥也當刺期門以通結血刺巨闕以行宗氣庶厥回而復甦也

音切

輒 陟涉 慄 音 垅 荚 音 叔 藠 於 蓋 匹滅 繫 於 營
切 切 慄 音 垅 荸 音 叔 藠 於 蓋 匹滅 繫 於 營

卵 盧管 潵 胡困 斷 魚斤 嘘 音 帝 泊 子由 疹 之 忍
切 切 潵 胡困 斷 魚斤 嘘 音 帝 泊 子由 疹 之 忍

癥 音 加 癲 力代