

高憲雲外科

外科醫鏡治驗目錄

魚尾毒耳根毒托腮痰毒盤頸癰耳疳耳癰

以上諸症看法

以上諸症治法

以上諸症治驗

張某年十九歲蟠頸癰

一陳姓年三十歲魚尾毒

一劉姓男子年二十五六魚尾毒

一白姓小孩魚尾毒

一駱姓年四十外雙魚尾毒

一馬姓年四十二三魚尾毒

一黑姓童年五歲痰毒

一高童年八歲托腮

一花姓週歲女孩耳根毒

一滿姓童年七歲耳疳

一張小孩魚尾毒

劉姓童十二三歲雙魚尾毒

一陸姓婦年五十外鬚疽

前署霸州徐贊廷太夫人鬚疽

陳理堂耳疔

業師唐靜研夫子耳輪療泡

一周姓童耳疳

史大令次公子耳根毒

骨槽風

骨槽風

骨槽風治法

骨槽風治驗

一男二十五骨槽風

一馬姓婦年三十五六骨槽風

一男子年二十四五骨槽風

一陸姓婦年三十外左項腫

一男子年四十外左項結腫

口舌脣齒牙齦

骨槽風看法

一蘇姓年四十上下骨槽風

一張右年三十二牙齒腫痛

張戟門觀察之大少夫人骨槽風

一男子年三十上下右項腫

一男子右項結腫

口舌脣齒牙齦

口舌脣齒牙齦治驗

一某小孩三歲痧後走馬

一週歲小孩瀉後走馬疳

同事侯俊甫義女兩週歲走馬牙疳

一男子牙疳

一婦人牙癰

一男子年六旬外牙癰

一小兒雪口疳

一小兒糜口疳

張戟門觀察之五公子牙疳

一男子脣風

一男子舔脣疳

一婦人牙齦

一婦人年三十外爛牙疳

舌疳

舌疳

舌疳治驗

一瞿姓年三十外舌疳

一男子年近不惑舌疳

一男子年四十外舌疳

魚尾毒耳根毒托腮痰毒盤頸癰耳疳耳癰

魚尾毒生在腦後髮角或左或右初起形如雞卵白者屬風溫風濕紅者屬風熱客于膀胱耳根毒在耳根結壅初起亦如鷄卵色紅係風熱客于少陽托腮毒痰生腮間或頰車骨下亦係風溫或風痰風熱屬少陽陽明兩經初起大如桃李漸大如茄以上數症小兒生者最多初起色白荆防敗毒散色紅羚羊角散外可敷金黃散或篋黃散白蜜調敷盤頸癰頸項左右均可生初起形如雞鴨卵紅腫高大七八日成膿當形寒發熱時用荆防敗毒散汗之用如意金黃散白蜜調敷其受病有風溫風痰風濕有肝火如目珠紅赤發熱不退可用羚羊角散若耳疳耳竅流膿疼痛發熱形寒發熱此肝腎鬱熱羚羊角散龍膽瀉肝湯梔子清肝湯量病情身體用之

魚尾毒耳根毒托腮痰毒盤頸癰耳疔耳疳耳癰看法

以上諸症總宜堅腫活動易起易發十日內成膿者爲順若根盤散漫起發頗慢

成膿在十四日以外爲逆流膿時先稠粘黃白相兼次花紅再次紅水者爲順流
膿時膿如豆汁或似蛋清日久黃水不乾者爲逆

治法

初起不外散風清熱化濕消痰順氣通絡冀其消化如過十日不能消化當用托
裏潰堅外敷如意散冲和膏鹿角散均酌量而用若勢已成膿用刀用火針亦看
事做事出膿後用八寶提毒或八將散或地字藥亦酌量而用內服藥八珍湯或
香貝養榮臨時酌進倘潰後四圍餘腫不消可用冲和膏黃酒調敷出膿後疼痛
可用乳香定痛散日晡潮熱可用秦艽青蒿湯胃口不佳可用胃愛丸改作煎劑

治驗

張某年十九歲患蟠頸癰起旬餘即就予治見其前頸喉管旁腫起蔓延後項膀
胱筋脈綿長八寸許寬三寸許皮色微紅按之石硬不時疼痛脈數身熱消固
不易成亦尙需時日當用冲和膏蜜水調敷內服和解之劑方用

元參五錢

杭白芍三錢

柴胡錢五

浙貝母三錢

連翹三錢

製半夏三錢

南花粉三錢

桔梗錢五

竹茹三錢

甘草錢五

忍冬藤五錢

此方連服兩劑身熱已去腫硬依然診得脈象似見滑數萬不能消敷藥照舊改方用

炙山甲二錢

川芎一錢

忍冬藤四錢

角刺二錢

花粉四錢

白芷二錢

當歸二錢

陳皮一錢

桔梗二錢

甘草一錢

牽牛三枚

此方連服兩劑病勢平平膿頭尙未透露遂照前方加黃芪五錢連服兩劑膿頭亦露兩處一在喉管旁一在天柱骨旁當將兩處刺破膿出碗許瘡口用八將紙捻膏罩內服方用

生口芪四錢

葳靈仙二錢

當歸二錢

南花粉四錢

銀花四錢

川芎一錢

白芷二錢

桔梗二錢

杭芍四錢

柴胡一錢

甘草一錢

此方連服三劑瘡口已流清水遂不用紙捻僅摻八將散面膏罩乃病者不慎
口腹誤食海味致瘡口疼痛腫勢如前而且大發寒熱二便閉結飲食不思于
是邀予診治見病人形神困頓兩手時覺抽掣予訝曰此病何忽大變令人不
解從旁細詢始知夫婦行房白天誤食海味晚上陸受寒涼乃有此變故躊思
至再如何措手勉擬加味補中益氣以冀挽回方用

野黨參五錢

杭白芍五錢

煨天麻七分

土炒白朮錢五

紫蘇葉錢五

荆芥炭三錢

生黃芪五錢

整廣皮七分

白歸身二錢

柴胡錢五

炙甘草一錢

升麻五分

此方服後一身大汗諸病若失胃氣不醒且瘡口轉流稠膿仍用八將紙捻改
方用

鉗石斛 四錢

花 粉 三 錢

整廣皮 七 分

西洋參 二 錢

忍冬藤 三 錢

陽春砂仁 打後下七分

乾寸冬 三 錢

藿 香 錢 五

甘 草 一 錢

炒稻芽 錢 五

藕 兩 片

此方連服四劑瘡口仍流清水腫勢滿消仍以八將散摻瘡口止不服藥後約十餘日纔能完功

此病本可早好患者不善調攝當功虧一簣時幾敗垂成思之令人戰慄

陳姓男年三十歲春間患魚尾毒起十餘日始邀予治見右髮角漫腫色白大如寸碟寒熱往來飲食不進疼痛夜劇診得兩手浮沉皆緩而無力知係氣虧風濕蘊遏之故尋思病者正在年力方剛氣何以如此之弱詢病家曾服何藥可將前服過之方逐一示我於是病家搜羅殆徧所服之方計有七八紙非仙方活命飲即神授衛生湯方中最傷氣者盜沉三錢陳皮五錢末後一方略有見識方用黃芪一錢五陳皮一錢沉香八分雖無大功亦無大過予告病家曰此

外
和

天津華新印刷局代印

病氣分方劑不能使毒外發病家唯唯瘡頭貼八將散膏內服

生口芪

兩五錢

川芎

錢五

當歸

三錢

野黨參

兩五錢

白芷

錢五

川芎

錢五

炙山甲

錢五

桔梗

三錢

炙乳沒

各錢五

整廣皮

五分

甘草

錢五

方畢病家詢予曰此方劑頗大廣皮僅用五分未免太少予答曰廣皮不可多用少用順氣多用破氣且從前廣皮服太多矣致瘡頭深伏不能高起病家點頭稱是此方服一劑次日復邀予診見瘡頭並未起發大都藥力未到遂照前方倍進次日又邀予診脈象稍見滑數瘡頭依然如昨予詫曰如此大劑何腫勢仍前不高令人不解病家告予曰昨日先生走後舍親某見先生方分兩太大遂改黃芪黨參各一兩今日先生看病狀究竟如何予答曰昨日果服此方今日可以刺破今若此須多遲三兩天病人聞之請先生開方當如何便如何再不信他人話於是擬方用

生口芪 四兩

當 彙 一兩 桔 梗 二錢

野黨參 四兩

川 芎 二錢

炙姜蠶 三錢

炙山甲 二錢 白芷 二錢

甘草 三錢

方寫畢囑病家曰此方趕服一劑明日當可刺破若再游移添減祇可另請高明予無能爲力病家曰決弗游移明日務請先生惠臨此方服後病人安睡一宵次早又邀予診見病人喜笑自若閱瘡頭業見高聳遂用刀刺破膿出桃紅約有腕許瘡口插八將散紙捻內服

生口芪 一兩

當 彙 二錢 川 芎 一錢

野黨參 一兩 忍冬藤 四錢

桔 梗 錢五

土炒白朮 二錢 橘 葉 一錢

甘 草 錢五

此方連服兩劑瘡口膿已見少四圍堅腫未消遂改用

正號鹿角膠 三錢

炙山甲 錢五

浙貝母 三錢

生口芪 七錢

丹 參 五錢

南花粉 三錢

野黨參 七錢

當 彙 錢五

橘 葉 錢五

甘 草 錢五

此方連服三劑四圍堅腫已化膿水已無瘡口擦地字藥膏罩內服

野黨參 五錢 大生地 砂仁一錢拌炒三錢

當歸 錢五

土炒白朮 錢五

川芎 七分 桔梗 錢五 白茯神 三錢

杭白芍 三錢

甘草 一錢

煨姜兩片 紅棗兩枚炙焦

此方連服三劑瘡口已斂正氣復元完好如初矣

此病若不遇予不定如何結局

一劉姓男子年二十五六夏令患魚尾毒起半月餘始就予治見其右髮角漫腫色白根盤不大寸許見方按之中空知係氣血虧毒不外發詢病人曾否延醫治過答曰並未治過問其從前患何病症答曰素患失血春間必犯計初起至今已五整年矣于是外貼陽和膏內服活絡和血之品方用

秦艽 錢五

丹參 三錢

橘絡 七分

當歸 二錢

煨天麻 七分

絲瓜絡 一段

杭白芍 三錢

夜交藤 三錢

生口芪

錢五

甘草

七分

此方連服兩劑無聲無臭遂改方

生口芪

五錢

當歸

二錢

川芎

錢五

炙山甲

錢五

丹參

三錢

赤芍

錢五

角刺

錢五

秦艽

三錢

川斷

三錢

白芷

錢五

甘草

錢五

此方連服兩劑瘡頭似有膿意然膿根極深約有寸許未便刺破遂照前方加黃芪五錢正號鹿角膠二錢連服三劑瘡頭纔覺引手當用刀刺破膿出不多宛如蛋清約一酒盃始悟此病挾痰瘡口用八寶提毒紙捻內服

製半夏

四錢

正號鹿角膠

二錢

桔梗

二錢

白茯神

四錢

生口芪

四錢

當歸

二錢

陳皮

一錢

炒白芥子

二錢

甘草

一錢

此方連服三劑餘腫已消瘡口已流清水止不服藥惟摻八寶提毒于瘡口數日完功

一白姓小孩左髮角患魚尾毒起五天即就予治見其根盤大如鴨卵色紅捫之

灼手身熱脈數不能消化外敷金不換內服

柴 胡一錢 川 芎一錢 當 歸 錢五 忍冬藤三錢

浙貝母三錢

白芷一錢 連翹三錢 桔梗一錢 甘草一錢

甘草一錢

此方連服兩劑膿頭已熱當即刺破膿出兩盅用地字藥紙捻插入膏罩日易三四次一星期已完好如初

一駱姓男子年四十外春間患雙魚尾毒起二十餘天始就予治見其兩髮角漫腫如桃堅硬如石病在少陽太陽兩經按之不疼入暮寒熱如瘡熱退後汗出如雨形容枯槁胃納不佳外用沖和膏蜜水調敷內服

柴 胡 錢五 川 芎 錢五 桔梗 錢五 淡 茅三錢

羌 活 五 分 製川朴 錢五 製半夏 三 錢 橘 葉 錢五

青 蒿 五 錢 甘 草 錢五 姜 兩 片 紅 藉 兩 枚

此方連服兩劑寒熱已無虛汗較前尤甚且口渴脣乾遂改方用

生黃芪 八錢

川芎 一錢

南花粉 四錢

浮小麥 八錢

蝦牡蠣 八錢

乾寸冬 四錢

柴胡 一錢

橘葉 一錢

竹葉 二錢

棉花子十四粒

紅棗兩枚

此方連服兩劑虛汗雖減尙未淨而瘡頭漫腫如前又改方法

生黃芪 一兩

浙貝母 四錢

元參 六錢

浮小麥 一兩

炙山甲 二錢

炙姜蠶 四錢

蝦牡蠣 八錢

整廣皮 一錢

川芎 一錢

棉花子十四粒

紅棗兩枚

此方連服三劑虛汗已無瘡頭漸見高起稍覺疼痛然氣血內傷不易釀膿再

改方用

生口芪 兩五錢

當歸 二錢

炒丹參 四錢

野黨參 一兩

上肉桂丸 六分 藥汁送下

白芷 二錢

土炒白朮 三錢

赤芍 二錢

川芎 一錢

白茯神 三錢

甘草 一錢

夜交藤 四錢

桔 梗 二 錢

此方連服兩劑瘡頭引手遂用刀刺破左邊膿出不少用八將紙捻插入瘡口
內服

生口芪 兩五錢 白歸身 四錢 川 莖 一錢 土炒小於朮 二錢

炙姜蠶 四錢 柴 胡 一錢 野黨參 兩五錢 桔 梗 二 錢

甘 草 一錢 夜交藤 八錢

此方連服兩劑右邊亦用刀刺破膿出與前同藥捻亦與前同內改方用

生口芪 一兩 野黨參 一兩 土炒白朮 四錢 當歸身 四錢 紫 草 四 錢

川 莖 一錢 杭白芍 四錢 銀 胡 一錢 甘 草 一錢

此方連服四劑精神復舊兩瘡口俱流清水止不服藥惟摻入寶提毒紙膏罩
不數日平復如初

馬姓年四十二三患魚尾毒一載有餘總不收口邀予診治見其兩髮角瘡疤痕累

累面色痿黃日晡潮熱舌乾乏液詢知病初起在左髮角蔓延右邊起兩月餘始破膿出清稀從未延醫治過惟向藥肆買提毒散生肌散摻之此處收功他處又起年餘來潰破十數次從前眠食如常現在夜不安臥稍一合眼即大汗淋漓飲食無味四肢乏力種種虛象病勢如此不易挽回回思魚尾毒乃些些小症何至如此兇惡乃告病家曰病本小症決不至死然病久正傷不敢准有把握予惟盡心設法以俟轉機于是瘡口摻八將散紙膏罩內服

生黃芪皮 七錢

浮小麥 五錢

青蒿 三錢

鮮石斛 三錢

蝦牡蠣 五錢

地骨皮 三錢

西洋參 三錢

合歡花 錢五

乾寸冬 三錢

甘草 一錢

棉花子十四粒

紅棗兩枚

此方連服兩劑潮熱已退虛汗已無晚上亦能安臥惟肚腹疔痛劇自汗遂改方用

生黃芪 六錢

上肉桂丸 六分藥汁送下 餅 糖 二錢

杭白芍 四錢

杭白芍 四錢

甘草一錢 姜兩片 紅棗兩枚

此方服一劑腹痛已好外瘍膿頭漸向下套遂用刀刺破流出花膿不少病者精神大有起色飲食加增瘍口插八將散紙捻內服

野黨參四錢

大生地砂仁拌炒六錢

杭白芍四錢

土炒白朮二錢

川芎一錢

桔梗一錢

白茯神四錢

當歸二錢

炙甘草一錢

姜兩片

紅枚兩枚

此方連服十餘劑瘍口已流清水不用紙捻惟捲八將散紙膏罩內不服藥又十餘日完好如初

一黑姓小兒年五歲夏天患痰毒兩處起五天即就予治見其左右兩耳根後結毒兩處大如桃杏按之堅硬身熱脈數勢將造膿瘍頭貼八將散膏內服用

生黃芪二錢

川芎一錢

當歸錢五

炙山甲八分

柴胡八分

白芷七分

角刺一錢

桔梗一錢

甘草一錢

銀花二錢

自穿蠶繭兩枚

此方連服兩劑又就予治按之兩處膿頭均熟遂用刀分別刺破膿出花紅不少當插八將紙捻膏罩內服

生黃芪

錢五

當歸

錢五

連翹

三錢

柴胡

七分

赤芍

錢五

桔梗

七分

川芎

五分

忍冬藤

三錢

甘草

一錢

此方連服兩劑瘡口膿水無多不用紙捻用八將散摻于瘡口數日完功
一高童年八歲夏間右頷患托腮根盤大如雞卵堅結異常微寒微熱色不變起
十餘日始就予治予覩此情形外貼化堅膏內服

炙姜蠶

三錢

元參

五錢

葛根

錢五

炒大力子

三錢

白芷

錢五

桔梗

錢五

浙貝母

三錢

升麻

五分

甘草

一錢

此方連服兩劑根盤見消寒熱已去遂仿前方加減連服五劑而消
一花姓女孩年週歲夏天患耳根毒頗重就予診時已八九日矣見其根盤大如

手掌前連耳門後牽髮角紫紅光亮當用刀刺破膿出茶碗許腫勢旋消形神頗輕瘡口亦插八將紙捻內服方用

生黃芪七錢 當歸三錢 黑梔皮三錢 柴胡錢五桑葉三錢
杭白芍五錢 竹茹五錢 白芷錢五甘草錢五

右水煎母女同服

此方服兩劑瘡口已流清水收功在即乃小孩夜受寒涼鼻塞聲重乾嗰音嘶遂改方用

紫蘇葉一錢 浮萍草一錢 野黨參二錢 杏仁一錢
桔梗七分 白茯苓錢五 前胡一錢 製半夏一錢
陳皮六分 甘草一錢 姜兩片

此方服一劑欬嗰聲重鼻塞均愈又轉泄瀉日夜十數次專邀予診見其形神委頓迥不如昨指絞已透氣關非尋常泄瀉可比此脾土大傷恐釀慢驚風症

遂改方大健脾土用

土炒於朮二錢

山藥四錢

炒扁豆三錢

芡實四錢

炒薏仁米四錢

澤瀉錢五

茯苓三錢

紫蔻仁一錢

車前子布包三錢

上肉桂面冲三分

甘草七分

姜兩片

此方連服兩劑泄瀉已愈形神仍不見強且不甚吮乳遂囑其父買八珍糕餵服或開水泡服不必服藥嗣五六日後因病女之兄大腿流注邀予診治見前病女已跳躍如常瘡口早已平復

一滿姓童年七歲患耳疳邀予診治見兩耳竅膿水淋漓半係血湯耳輪四圍焮腫疼痛呼號晝夜不已詢知自襁褓時啼哭熱淚流入竅門頻年不愈忽輕忽重此次誤食海魚並蝦蟹等物是以發之甚重耳竅用棉花沾乾吹耳疳散四圍用如意散麻油調敷內服方用

夏枯草二錢

甘菊二錢

桑葉三錢

柴胡一錢

連翹二錢

元參三錢 胡連錢五 黑梔皮二錢 甘草一錢 竹葉二錢

此方連服兩劑疼痛見減瘍腫已消惟添少腹擗痛似痢非痢日夜五六次小溲短赤遂改方用

吳萸二分炒川連一錢 製川朴一錢 炮姜炭五分 椰炭錢五

南查炭二錢 杭白芍三分 甘草一錢 神柟炭二錢 煙木香八分

此方連服兩劑腹痛除痢疾止耳疳亦大見功效病家謂予曰先生能將耳疳除根否予曰除根固不易府上深信予治便有法想病家復問此病究因何故予曰先天不足病家點首稱是堅請立方予勉從其請方用

大熟地五錢 柏杞果三錢 黃菊花錢五 製首烏三錢 潼沙苑三錢

杭白芍三錢 桑椹子三錢 甜玉竹三錢 丹皮錢五 九節菖蒲七分

此方服十劑後病家復邀予診見耳疳已霍然無恙第兩耳失聰渾如木偶病家雖甚喜歡總嫌美中不足堅請予設法予曰不難囑速買台射一分將香灌

入葱管葱管上邊留節長僅寸許下邊用棉花塞住紅衣線輕輕紮之塞入耳竅線頭留在外邊囑間日一換六七換後必能全愈內服方照前方弗更再服十劑後即照方十劑配丸藥緩緩圖功如是年餘湯藥約百餘劑丸藥配六七料蓋病家急於奏效兩路夾攻竟能如願以償耳疳從此不發聽聞與平人無異

張姓小孩左耳後患魚尾毒六日就予診治按之堅硬脹數且滑勢將造膿外貼三黃散膏內進

角刺錢五連翹三錢赤芍二錢桔梗一錢忍冬花三錢
甘草一錢白芷八分瓜蔞根二錢白穿蠶繭一枚

此服兩劑用刀刺潰流膿杯許升丹紙捻插入日兩易內去角刺又服一劑不數日已流清水瘡口稍摻升丹紙膏罩之又兩日收功

此本小病毋須載入因近時患此症甚多醫者每執左爲天疽右爲銳毒雜藥

亂投每有誤事故略錄一二俾學者有所攷鏡夫果天疽銳毒即偏腦疽之極重者豈可並論

劉姓小孩十二三歲兩耳後各患魚尾毒一枚始起寒熱交加就予診治予用荆防敗毒散加姜蠶貝母金銀花服兩劑勢將造膿改用角刺黃芪桔梗白芷連翹花粉甘草等服一劑後瘡頭高聳同時刺潰出膿兩杯仍用前方去角刺加乳沒各五分銀花等服之亦用升丹拈紙捻插入日兩易如此四五日膿淨第流清水遂去捻用升丹少許摻瘡口二三日收功

鬚疽陸姓婦年五十外左鬚生疽形同蜂房發熱疼痛第七日邀予診治見瘡頭平塌並不高聳用手擠之僅流紫血告病人曰此係膽與三焦相火內熾須耐心靜養方可無虞外摻青九一丹內服菊花柴胡杭白芍細生地炒山梔丹皮桑葉連翹甘草等兩服後瘡口漸有膿意改用疽藥摻之內服仍照昨方如此六七日腐肉漸淨新肉已生重用青九一丹摻之內服

菊花炭 三錢

元 參 三錢

桑 葉 三錢

山 梔 錢五

丹 皮 錢五

當 歸 錢五

勾 簓 三錢

甘 草 一錢

此症始終清膽與三焦相火未服一毫補托十數日告痊要知清之即寓補之意也

前署霸州徐贊延之母秋間鬚上生疽起五六日即邀予治見其患處長二寸許寬六七分色兼紫黯惟流黃水無膿發熱疼痛夜甚瘡口摻疽藥內服桑葉菊花柴胡丹皮當歸川芎黃芩山梔甘草服兩劑紫黯色轉紅活瘡口仍摻疽藥內服亦照昨方又兩劑瘡頭腐肉漸去改摻青九一丹以玉紅膏罩之如此又八九日纔能結痂起至落痂幾及一月

陳理堂春間患耳疔先請里中楊某治之服表解藥痛勢轉劇乃邀予治見其耳竅腫塞難容一線竅外露出疔頭如棗豆大一粒碰之鮮血迸流身熱灼手此

係肝腎鬱火用羚羊片元參桑葉川連黃柏山梔膽草蘆薈甘草黛拌燈心兩劑痛止熱去再宗前方進退兩劑而愈耳竅始終不可吹藥蓋耳竅有開無闔萬不可吹藥也

按腎開竅于耳肝寄之此病責在肝腎治法一定道理

業師唐靜研夫子秋間忽耳輪邊上驟起潦泡流黃水疼痛刺心發熱不食命輿相邀予即往看夫子神色燥煩懶與人譚坐榻床上惟呼疼鬧難受予用方

羚羊片

二錢

蘆

薈錢五

龍膽草

二錢

黃芩

三錢

炒山梔

三錢

菊

花五錢

桑

葉三錢

細生地

四錢

杭白芍

三錢

甘

草錢五

竹

葉三錢

外用敷藥

上青黛

五分

黃柏

三分

煅中白

三分

梅片

一分

菊

花炭五分

共研細末香油調上次日即愈此病責重肝膽內服外敷均從此着意

周姓小孩夏令患耳疳第流黃水向藥肆買面藥吹之即腫痛連及耳門前後各結一核發熱日夜呼號第五日就予診視詢其原委切囑萬不可以藥肆藥吹之見其指紋直透命關且兩結核隱露青紫知其毒已內陷辭不能治其父哀求至再免用清心牛黃丸與服次日即斃

凡外症見紫青色均不能治惟蜒蚰毒雖青紫無妨緣其病之本色不可執一史大令之次公子冬間耳根忽結核瘻第三日邀予診治見根盤大如鴨卵色微紅內服羚羊片勾藤丹皮桑葉象貝桔梗炒山梔元參連翹甘草外敷

月 黃

三分

腰 黃

五分

台 射

一分

銀 碗

二分

蟬

二分

梅 片

一分

共研細末白蜜調敷四五日即消

骨槽風

骨槽風症大都初患牙癰或穿腮癰本風熱侵於腮頤骨骱當紅腫疼痛時患者喜喝涼水或喜吸涼風醫者亦喜用涼藥遂致氣血冰凝內風與外風勾結內風

欲出不出外風欲入不入日久內外潰穿膿出腥穢經年累月不痊致內生多骨者有之日晡潮熱牙關牽強妨於開合飲食少思漸成瘍瘻者有之

看法

骨槽風初起牙關不緊牙齦腫外腮不腫即腫亦高聳起居便利疼痛有時容易成膿出膿後膿不臭穢外腫旋消者順初起牙關緊急寒熱往來外腮腫並不高皮色不變成膿不易疼痛夜劇出膿後膿極腥穢日晡潮熱飲食不思面色枯白者逆

治法

初起牙關不緊疼痛有時外腮不腫或外腮焮腫可用輕清化解如牛蒡薄荷姜蠶連翹桔梗山梔桑葉菊花甘草等散其浮邪外用如意散葱蜜調敷如初起牙關發緊皮色不變寒熱往來可用葛根白芷細辛防風升麻如不奏功用陽和湯減半進之服此方後牙關鬆利滿身鬆快可連服三五劑或十數劑如果形勢

見消卽連服四五十劑以愈爲度如瘡已潰破可用地字藥紙捻插入若內外潰破可用乳沒血竭當歸紅花細辛姜蠶台射等各等分內吹外摻如潰久不痊內生多骨可用推車散摻之或草麻子明雄射香三味研爛塗之多骨自脫潰後服藥當以八珍散爲主加細辛姜蠶搜剔骨縫風邪

治驗

一男子年二十五歲秋間患骨槽風起月餘卽就予治見其牙關發緊形寒身熱
頰車連腮漫腫色白不疼惟覺痠楚外用冲和膏乾醋敷內服

細辛五分	葛根錢五	秦艽三錢	炙姜蠶三錢
白芷錢五	桔梗三錢	薄荷葉後下一錢	升麻五分
荆芥穗三錢	甘草一錢	葱白三寸引	

此方連服兩劑牙關鬆利寒熱已無遂改與陽和湯減半與服方用

大熟地 麻黃三分同打五錢

炒白芥子錢五

炮姜炭三分

正號鹿角膠 錢五 炙姜蠶 三錢

桔梗 錢五

細辛 三分

上肉桂丸 藥汁送下 五分

白芷 錢五

甘草 一錢

此方連服四劑牙關較前更加鬆利遂照前方倍進服後毫無變故遂改方
大熟地 麻黃五分同打一兩 上肉桂丸 藥汁送下一錢

炙姜蠶 五錢

正號鹿角膠 三錢

炮姜炭 五分

甘草 錢五

炒白芥子 三錢

細辛 五分

此方連服十劑病人已覺全愈第腮頰根盤尙未去囑其再服十劑無後患矣
病人深信予言遂照服兩月病人專誠到寓謝曰僕病不遇先生雖不致喪命
難免吃一場大虧

按此病本風濕化痰侵于骨骱若不用溫藥焉能祛其病根

蘇姓年四十上下患骨槽風已兩載多夏令來醫院就予診治見其右頰車骨上
至耳根下及腮頰如覆掌一條有數孔膿水頻流其味臭穢不堪囑其遠站天

蓬外不然他病人皆掩鼻遠離予親詣天蓬外爲其反覆按摩細視知其內有多骨然瘡口數孔均如豆大無法取之外摻青九一丹以玉紅膏攤紙罩之內服

細辛五分

炙殭蠶三錢

防風錢五

白芷錢五

骨碎補三錢

黃芪五錢

黨參五錢

炒白朮錢五

此補正搜風法連服五劑毫無動靜改用

鹿角膠三錢

麻黃五分

大熟地五錢

肉桂一錢

炮姜一錢

細辛五分

炙殭蠶五錢

白芥子三錢

連服五六劑亦無動靜嗣用

草薢子二十一粒

明雄黃錢五

真台射二分

共打爛塗在瘡口紙膏罩之內服

細辛五分

炙殭蠶三錢

白芷錢五

黨參五錢

黃芪三錢

鹿角霜三錢

炮姜一錢

炒白朮錢五

白芥子三錢

桂枝錢五

此方連服三劑頰車骨上脫下多骨長三寸半寬寸半厚六七分一塊於是改服

黨參五錢

炙芪五錢

細辛五分

炒白朮二錢

當歸二錢

茯神三錢

甘草錢五

此方連服四劑瘡口已收斂完好惟較左頰略癟耳

按此症係頰車癰毒潰後經風臭膿結成多骨非真骨槽風也所以每方必用
細辛二分殭蠶三錢搜剔骨縫風邪也

馬姓婦人年三十五六患骨槽風二年多來就予治見其左頰車骨漫瘡一條如
大羹匙一只覆於頰上色白牙關不能開合飲食艱苦異常此風痰凝結陰症
也

外用 白芥子 肉桂 干姜 生半夏等研碎醋調敷上內服 豬角膠
麻黃 炮姜 白芥子 肉桂 大熟地 細辛 防風 炙殭蠶 白芷連
服五六劑牙關稍覺活動又用前方服五六劑牙關較前更好惟連服溫劑喉
間稍痛囑停弗服外貼陽和解凝膏嗣照前方間日一服約三十多劑其病若
失

按此病始終一方卒能奏功所以立方用藥貴有主見

張右年三十二歲夏間牙齒腫痛請里中某醫治之服清胃湯牙頓愈嗣後屢
發屢服前方輒效如是一二年忽冬間牙發痛極腫甚外腮及頰車一帶浮腫
不堪始邀予治見其腮頰腫而微紅兩目合縫詢其從前所服何藥乃將前方
與視並照從前牙發此方一服輒效今愈服愈劇予曰彼一時此一時也身體
強弱與前不同致病原委與前不同所以前效今不效也病家曰先生此係何
病予曰就從前病情而論確係風熱因過服寒涼風邪遏而不發致有今日凡

風邪總須透解或疎化予乃用 桑葉 菊花 牛蒡 荆芥穗 薄荷 桔

梗 炒山梔 連翹 甘草等服後腫勢稍減又兩劑而消

按此症若再服寒涼外腮頰車定必結瘡成瘍潰後自不小心或經風邪必成骨槽風症再臭膿不淨結成多骨由小而大類多如此故曰醫之用藥如將之用兵若果醫理精通聞一知十一使之將兵斷不致束手無策徒喚奈何也此說未免自誇若在軍營閱歷十年斯可矣否則恐亦無益

一男子年二十四五右腮患骨槽風症來醫院就診見外腮有兩孔膿水頻流並不甚腫據述始患牙癰經人醫治愈後忽外腮浮腫嗣裏外潰破日久牙癰與外腮似同一氣牙上流膿外腮稍好牙不流膿外腮較重有時外流膿裏不流膿有時裏流膿外不流膿有時同流膿有時同不流膿如此三四年受累無窮予曰此病不可着急容予慢慢設法初次外用貝甲散摻瘡口以膏貼之內服細辛白芷防風炙姜蠶粉葛骨碎補等先散陽明浮風兩劑毫無動靜外改摻

青九一丹內服仍用前方如此六七日膿水漸多且浮瘡患者以爲病勢變重似甚着急予曰此風邪漸欲外出乃吉兆外仍用青九一丹內改用陽和湯加細辛白芷防風姜蠶骨碎補等如此六七服腫已消膿已少仍用前陽和湯方加黃芪黨參助正逐邪三四服諸病全愈惟瘡口膿水總未淨予意曰久必生多骨乃用蟻蠅虫乾姜明雄黃台射等研面用米飯打和做成條插入瘡口如此十數日瘡口出米大多骨三四塊不三四日即收功從此永無患矣

按此病雖無性命之憂却有終身之累彼深信予治予得以施其技倘若朝秦暮楚那得脫累

張載門觀察之大兒媳乃冀州牛靄如州尊之令媛三四月間女住母家時右耳後頰車骨側患風溫痰毒其時適懷孕四五月藥本難投欲邀予往治適醫院忙碌未能赴召遂邀冀州某醫治之不免雜藥紛投寒熱互進遂致潰破膿水頻流瘡亦不化至七月初間返津乃邀予診見其腫處根盤並不大恍如雞卵

瘡口有兩孔膿亦不多牙關不能開合皮色不變此過用寒涼外敷內服本小病業變爲骨槽風症非服陽和不能奏功好在分娩不遠當告以分娩後方可設法遂外上青九一丹內不服藥間日一閱約十數次雖不加患亦不見功至中秋後一日分娩次日即邀予診予曰現在毋須服藥最穩當生化湯服一二劑又遲七八日予曰此時可進陽和湯矣主家深信不疑連三服瘡口脫出多骨一塊如鵝毛管樣又兩劑瘡消膿淨已收口矣

按此戟門觀察深信予言方可如期奏績設游移莫定昨李今張雖無妨礙斷不能如此之速

一陸姓婦年三十外春間左項忽然燉腫寒熱頻隨第三日乃邀予診見其仰臥床上不能動轉俯仰詢之喉間亦痛紅腫牽及肩膊此風熱症外用如意散用芙蓉葉打汁調敷內服荆芥牛蒡子桔梗象貝紫馬勃連翹炙姜蠶薄荷甘草煎服後略得微汗次日又邀予治仍用昨方連三劑紅腫已減大半惟瘡頭有

洋錢大紅腫不退且按之微微引手知欲造膿遂用透膿散加桔梗銀花服之
次日刺破外用升丹捻紙上之不數日收功

一男子年約三十上下春間右項焮腫寒熱交加遂就予治見其結核根盤並不
甚大惟腫勢蔓延連及肩胛胸膺一帶有似赤遊風之象外用尿磚內磚磨水
筆掃外用大青葉連翹象貝牛蒡子馬勃桔梗忍冬花甘草等兩劑毫無動靜
腫勢蔓延稍停仍用尿磚再磨再掃改服普濟消毒飲服後諸病悉減不用敷
掃僅用元參花粉桔梗射干馬勃貝母甘草竹葉煎服即消

一男子年四十外夏間左項忽結腫色白不能轉側俯仰形寒身熱來就予治外
用金黃散葱汁調敷內服

荆芥穗二錢

桔梗一錢

象貝切三錢

羌獨活各七分

炙姜蠶三錢

炒牛蒡子研三錢

前柴胡各一錢

連翹三錢

甘草一錢

兩劑消釋

一男子秋間右項結瘡始起即就予治見其根盤大如手掌推之活動形寒形熱
予用金黃散菊葉汁調敷內服荆防敗毒散加炙姜蠶服兩劑發熱已去堅瘡
不消再用方加牛蒡子兩劑根盤反日漸散大且加寒熱勢將造膿乃用角刺
連翹當歸桔梗牛蒡子象貝母花粉白芷甘草等兩劑頭已高尖用火針刺破
外用升丹捻內進

黃

芪 三錢

瓜

萎 根 三錢

象

貝 母 三錢

連

翹 二錢

桔

梗 七分

橘

紅 五分

白

芷 八分

甘

草 六分

此方服兩劑膿淨腫消僅流清水仍摻升丹罩紙膏不數日結痂而愈
按以上數症均生項間輕名頸癰重名蟠頸癰均陽症易成易愈

口舌唇齒牙齦

舌爲心苗口屬土唇上脾下胃齒骨之餘然五臟六腑均系焉均有虛火實火之
分風火風寒之別如走馬疳係痧痘後或瘡瘍後餘邪未淨而成最爲凶險先

由牙齦腐爛漸次腮頤浮腫色變紫黑隨即瀉開如走馬之速故名至爛牙疳
係胃熱牙癰係風熱亦有兼胃熱者齒痛有風痛火痛有虫蛀痛唇瘡唇風均
係脾胃風熱糜口疳雪口疳小兒多患此症有吮大人熱乳有裹紮太熱肺胃
受熱逼而成各按其因而治之又有餌唇疳係風濕侵脾胃而成初覺嘴唇乾
燥頻以舌舐故名又有齒衄牙縫無端流血成盆盈碗亦有起如爛牙疳大都
心胃火熾甚使然爛牙疳牙齦腐爛亦係胃熱此兩病婦女殊多

治驗

一小孩三歲患走馬疳就予看時偏左牙齦腐爛味極臭穢腮頤浮腫連及眼胞
皆然詢之一月前曾患痧症內熱脈沉數便閉溺赤外上金棗散內服

生軍二錢

犀角剉末冲服五分

枯芩錢五

石膏三錢

連翹三錢

炒山梔二錢

肥知母一錢

金銀花三錢

甘草一錢

鮮葷根一兩

此方服一劑毫無動靜大小解均無想藥未能照服之故詢之果然因小孩哭鬧僅服一匙故無效乃改方

犀角片 剉末兌服五分

大黃二錢

生石羔 用薄荷葉五分同打四錢

細川連 去蘆切四錢

丹皮錢五

連翹二錢

車前子布色三錢

金銀花二錢

甘草一錢

枯芩錢五

鮮葷根一兩

此方囑服一劑必須慢慢灌下明日大解熱退還可救否則不可挽回矣次日又來就診大小便已通內熱已解腮頤浮腫漸消碎腐處臭味稍減仍吹金瘞散內改方

生石羔三錢

瓜蔞根二錢

連翹二錢

肥知母一錢

金銀花錢五

枯芩一錢

丹皮錢五

人中黃五分

葷根一兩

竹葉十片

此方連服兩劑牙齦碎爛已長新肉臭味頓除內不服藥改吹犀黃散二三日霍然

按此走馬疳重症幸腮頤未發紫黑尙可挽回如已紫黑毒入心則無能爲矣
一小兒纔一週初患水瀉瀉止牙齦碎腐初僅荳大全不介意乃父向予告知病
情討吹藥予給青吹藥越日又來討藥言不見效且嘴唇浮腫予告之曰恐患
走馬疳上緊醫治遲則蔓延不可收拾彼頗不信仍討藥而去越兩日始將小
孩抱來就診見其唇及腮頤俱浮腫不堪按之木硬且色均紫黯神疲面白身
熱啼哭不休予告其父曰病已晚矣無法挽回可另請別位看看其父堅請設
法不得已勉用金瘞散吹破爛內服

犀角片 五分

枯黃芩 錢五

瓜蔞根 三錢

生石羔 四錢

肥知母

錢五

丹皮 二錢

連翹 三錢

炒山梔 三錢

忍冬花

二錢

人中黃 一錢

鮮葦根 一兩

菉豆衣 錢五

此方服一劑次早又來就治見其神色病情似乎輕減然船小噠重正不敵邪
奈何仍吹金瘞散內改方一一煎湯羹粥一煎服內服方

犀角片 先煎五分

瓜蔞根 三錢

丹皮 錢五

細川連 四錢

忍冬藤 三錢

知母 錢五

連翹 二錢

人中黃 一錢

桔梗 一錢

鮮葷根 一兩

煎粥方

別直人參 三錢

雲茯苓 四錢

土炒白朮 二錢

炙草 一錢

紅棗 五枚

松香絲拌炒稻芽 二錢

土炒白朮 二錢

炙草 一錢

右水兩碗煎好去渣入香稻米一撮熬成稀粥接補胃氣此即金鑑人參茯苓粥方一面吃粥前湯藥勻作三四次慢慢灌下次日又來就診神色固好腮頤浮腫已漸消腐爛亦不延開斯時上脣已爛去一半仍吃茯苓粥仍吹金瘡散內改方

鮮葷根 六錢

帶心大麥冬 三錢

紫馬勃 布包 一錢

煅石羔 二錢

瓜蔞根 三錢

人中黃 八分

丹皮 錢五

桔梗 八分

忍冬藤 二錢

荳豆衣 錢五

此方囑服兩劑越日又來就診諸病已去惟嘴脣爛去一條不能完善爛處改上犀黃散數日全愈後見已成豁嘴僅深三四分闊二分

按此名走馬疳乃死裏逃生活稍大意萬無生望

同事候俊甫之義女兩週歲始由上牙齦碎腐味稍臭穢繼延上脣浮腫亦漸

腐爛色紫黯身熱灼手邀予往診見病情如此且大解不通外吹金棗散內服

生軍 二錢 石羔 三錢 肥知母 錢五 黃芩 錢五

連翹 二錢 金銀花 三錢 桔梗 八分 炒山梔 二錢

甘草 一錢 鮮葷根 一兩

此方服一劑大解已通身熱亦退惟不思納穀晝夜號哭腫勢不消仍吹金棗

散內服

煅石羔 四錢 元參 三錢 金銀花 二錢 瓜蔞根 二錢 丹皮 錢五

連翹二錢 人中黃一錢 鮮葷根五錢 竹葉十片

此方服一劑腫勢不消反身熱如熾杳不思納胃氣已傷予欲備人參茯苓粥接補胃氣彼家以爲女孩不必費如許周折嗣越兩三日而歿按此亦走馬疳症

一男子素患牙痛痛甚腮間發腫即不痛矣是年春季牙痛經月腮間腫甚痛仍不停就予診治見其腮腫色紅且微寒微熱牙痛處齦腫如棋子大者兩三處刺之惟血無膿以青吹口藥上之內服

生石羔

薄荷五分同打四錢

丹皮二錢

枯芩二錢

細生地

四錢

連翹三錢

炒山梔三錢

粉葛根一錢

桔梗一錢

甘草一錢

此方連服兩劑諸病霍然

按此牙癰症係風熱內侵

一婦人素患牙痛發時晝夜呼號腮頤浮腫人亦寒熱有三四日愈者有六七日

愈者從未經治一年夏季發甚重不但疼痛呼號兩三日杳不納穀就予診治見牙齦痛處已有頭如桃核刺之流膿少許外抹青吹藥內服

煅石羔 三錢 枯黃芩 錢五 丹皮 錢五 桔梗 八分 連翹 三錢

炒山梔 三錢 瓜蔞根 三錢 甘草 一錢 鮮葷根 一兩

此方服兩劑諸病霍然 按此亦牙齦症

一男子年六十外常患牙齦初起年二三發厥後年四五發已三十多年矣發時牙齦脹痛三四日自潰稍流膿血次日即愈習慣自然全不介意此次發之甚重牙齦雖潰破而腫不消疼不止且時寒時熱就予診治細視瘡痛處似乎如桃核大高起按之石硬似係多骨反覆躡思如謂多骨剛潰兩三日斷無如此之易謂非多骨然病狀如此殊屬不解乃從高腫處用刀刺開距自破瘡口四五分捫之果係多骨但推搖不動祇得服藥數劑看其光景如何再行設法方

用

生黃芪 防風一錢 拌炒三錢 炒白朮二錢

白茯神四錢 骨碎補四錢

炙升麻五分 地骨皮二錢 激黨參四錢

歸身三錢 甘草一錢

大熟地 砂仁拌炒六錢

姜兩片

紅棗三枚

此方囑服四劑又就予診其突出之多骨已覺活動隨即取出其根尙沾住牙齦
下時稍有血流外上犀黃散內服

骨碎補六錢 生黃芪 防風一錢 拌炒三錢

製首烏三錢 金石斛三錢

枸杞果三錢 炙姜蠶二錢 大麥冬四錢

大熟地 砂仁拌炒七錢

細辛二分 象牙屑三錢

此方三劑諸病霍然年餘遇此人于途詢其病狀答多骨落後至今未發此症亦係牙癰又名牙漏世人病狀變化多端僅恃幾部醫書奚濟

按此病係腎虛齒縫不密風邪裏襲兼有胃熱而成

一小兒患雪口疳下唇舌上遍起白點如雪故名剛滿月患此不能吮乳急邀予

治見此病狀詢有雪水否曰無乃用薔薇花根少許洗淨泡水乘溫以青布沾水裏指上擦之擦後用冰硼散吹之稍停可吮乳矣

此雪口疳頂好用三九天雪水擦之

此病屬胎熱亦有吮熱乳而得者須仔細辨之

一小兒三歲患糜口疳嘴脣舌尖破碎如粟粒有數十處不能吮乳身熱灼手口乾脣焦便閉邀予診治見其病情係肺胃積熱用涼膈散內服外吹冰硼散

枯黃芩

錢五

連翹

三錢

生石羔

三錢

薄荷葉

後下五分

炒山梔

二錢

元明粉

冲一錢生軍二錢

甘草

一錢

竹葉

一片

此方服一劑瀉兩次次早邀予見其病情均減仍吹冰硼散內改方

丹皮

錢五

枯黃芩

錢五

金銀花

二錢

鮮蘆根

五錢

煅石羔

三錢

連翹

二錢

肥知母

錢五

甘草

一錢

竹葉

五片

此方服兩劑諸病霍然

此名糜口疳糜者爛也即稱爛口疳亦可係肺胃積熱而成

張戟門觀察之五公子始自牙齦碎腐繼嘴脣裏面及舌尖亦碎腐幾處味極臭穢邀予診治見其身熱脈沉外吹青吹藥內服涼隔散

生

軍二錢

黃芩錢五

連翹二錢

元明粉冲一錢

薄荷葉

後入七分

石羔四錢

甘草一錢

炒山梔三錢

竹葉十片

葷

根五錢

連翹錢五

桔梗一錢

瓜蔞根二錢

丹皮

二錢

象貝母錢五

知母錢五

黃芩錢五

甘草

七分

竹葉十片

按此亦名糜口疳服涼隔散效驗異常

一男子上脣浮瘡木痛微癢七八日不痊就予診治用

荆芥穗

二錢

防風二錢

爪蔞根三錢

葛根錢五

桔梗錢五

蘇薄荷葉後入一錢

白芷一錢

甘草一錢

鮮芫荽三錢

此方服一劑次日又來就治見腫勢已消其半照此方又服一劑而愈

按此名脣風係風侵脾肺兩經與疔疽大有分別

又一男子兩嘴脣始覺乾燥頻以舌飪初不介意漸至兩脣裂縫稍覺疼痛舌飪潤稍解經一二月亦無大害就予診治乃用

川五倍子五分 石羔一錢 白芷五分

右研細末用人乳汁調上睡臥片時落去再上再睡如此六七日即愈

按此名飪脣疳係風濕侵脾胃而成

又一婦人年二十四五始患爛牙疳繼則牙縫流血初尙可殆後日甚一日血流去數碗人已困憊始邀予診見其病情如此頗費躊躇嗣想得一法兩方並進一輔正氣一涼心胃之血輔正方

黨參五錢

生黃芪七錢

炒白朮三錢

炙草三錢

茯苓四錢

歸身五錢

紅棗五枚

此方煎三大碗當茶一日飲盡

鮮葷根一兩

枯芩四錢

丹皮三錢

連翹四錢

細川連一錢

肥知母二錢

酒軍五錢

瓜蔞根四錢

甘草二錢

生石羔七錢

竹葉二十片

此方服一劑次早又邀予治見神色較昨稍好藥後大解兩次牙縫血已不流
仍用前輔正方煎好當茶此方改易

丹皮二錢

連翹三錢

忍冬花三錢

知母二錢

煅石羔四錢

炒山梔三錢

瓜蔞根四錢

甘草一錢

鮮葷根一兩

此方服一劑又邀予診見已愈八九精神有頗起色囑照此方再服一劑輔正

方弗服此名牙衄係心肺胃熱極迫血妄行

按此病不用輔正徒服涼藥恐胃氣敗壞不能醒復用意在此

一婦人年三十外患爛牙疳匝月自買桐油抹之又以大薊炭抹之均無效就予

診治乃用金棗散少許抹之內服

鮮葦根一兩 丹皮二錢 肥知母二錢 酒三錢 石羔四錢
連翹三錢 瓜蔞根三錢 黃芩二錢 甘草錢五

此方連服三劑而愈

舌疳

夫舌爲心苗心爲君主之官不易受病亦不能受病或其人平日肝火鴟張拂意則與人揪鬬撕打無所不爲久久肝傷累及其子蓋肝爲心母母傷累子理固然也又有恆遇拂意事抑鬱傷肝累及其子者又有平素阨塞忽遇意外之榮一旦喜開心花無幾又遭困阨順境轉爲逆途悲歡離合紛至沓來心爲君主能受如許折磨故成爲舌疳敗症初起亦似痰核如棋子大在舌左右或正中經年累月逐漸腫大恍如巉岩稜峋雜凸不能飲食言語從此將死生付諸度外怡情自適

或可苟延歲月但患此病者平日性多好勝且極高傲心亦狹窄諸事想不開所以百無一生較婦人乳岩尤甚多則二三年少則一半年古人雖有數方亦不過盡人事而已

治驗

一瞿姓男子年三十外患舌瘡起已五月邀予診治見其舌短縮不能伸出口外半截舌腫按之腫處巉凸稜峋與潰破乳岩無異惟未潰破托予友介紹包治予搖首曰實無法想堅欲求方免擬逍遙散加減

當歸三錢 炒白朮錢五 枯芩錢五 杭芍二錢 柴胡七分
甘草七分 丹皮錢五 炒山梔錢五 橘葉五片 姜兩片

此方囑服數劑後看光景如何再議嗣後未邀視亦未就診越數月友人告予曰此病果死矣並告予方服數劑杳不見功乃請擇大傘者治之用烙鐵曰烙一次初烙數次稍好再烙無效向藥肆配藥搽之初亦有效嗣搽無效聞某處

有好藥無不星夜往來初總擦效再擦總不效延至上月杪而歿

一男子年近不惑患舌疳數月托予友介紹邀之診治見其舌尖至舌根如假山石一塊在口中固知爲舌疳設非口中不識爲何物不能掉動言語日晡潮熱形容瘦削日惟灌藕粉或稀粥湯而已伏枕叩首求予援手之意予一再思維無可着手直告病家曰此病無法醫治另請高明不要延誤其妻子堅懇至再祇得勉用

煅中白 二分

青 苔 炙 二 分

塘雞屎 炙 二 分

呢 片 一分

共研細末擦舌上內服香貝養榮湯

川貝母 二錢

炒白朮 錢五

大生地 四錢

醋香附 枝 錢 五 當

歸 二 錢

柴 胡 七 分

潞黨參 三錢

茯 神 三 錢

陳 皮 七 分

杭白芍 三 錢

桔 梗 一 錢

炙 草 一 錢

蓮子心 五 分

此方囑服三劑又邀予治見其神色差勝而病狀毫無動靜又勉擬一方

硃茯神 三錢

川鬱金 錢五

杭白芍 三錢

柴胡 七分

潞黨參 三錢

當歸 二錢

連翹 錢五

醋香附 打錢五

丹皮 錢五

甘草 半生半炙一錢

青橘葉 五片

此方服三劑又邀予治詢其病狀如何來人曰依然如故予堅不肯往嗣聞不匝月而歿

一男子年四十外患舌瘡剛起兩月即就予治見其舌腫堅硬如石雖掉動不靈尙可免強言語乃外用

青苔 二分

塘雞屎 瓦上炙二分

黃柏末 三分

煅人中白 三分

杭白芍 五分

梅片 一分

共研細末磁瓶收貯日擦二三次去後杳無音信竟不知其所終

按此病在醫院遇之無暇詢其姓名住址然病在初起予意謂還可設法執料彼一去不返好歹不得其究竟至今猶未去懷

外科醫鏡治驗目錄

傷寒熱病瘧疫瘧疹瘧痧後發頤

發頤看法

發頤治法

發頤應用四方

姜蠶牛蒡飲

犀角解瘧湯

發頤治驗

一侯童方週歲痧後發頤

晏藹餘年三十七八瘧痧發頤

李姓兩童九七歲瘧痧發頤

紀童年十五歲瘧疹發頤

蜒蝣毒

透膿托裏湯

黃芪托毒湯

一張童年十三四歲瘧疹發頤

言俊翁大公子瘧痧發頤

一紀童年八歲瘧疹後發頤

蜒蚰毒

蜒蚰毒看法

蜒蚰毒治法

蜒蚰毒備用八方

銀翹散

大四妙湯

加味八珍湯

大解毒湯

犀角黃連湯
燕泥散

加味四妙湯

解毒十全補湯

蜒蚰毒治驗

一張姓年五十繞項蜒蚰毒

一房姓年六十外右手臂腕蜒蚰毒

韓姓婦年五十歲胸乳蜒蚰毒

陳吳氏年二十外產後左膊近腋蜒蚰毒

一何姓年二十六歲左足蜒蚰毒

一邊姓年三十歲右足蜒蚰毒

一男子年三十外右手蜒蚰毒

傷寒熱病瘧疫瘧疹瘧痧後發頤

發頤一症內外諸書並未述其利害所論亦略而不詳內外諸醫亦未鄭重其事
所治都敷衍塞責並不辨病果伊誰病家更不辨醫之賢否症之重輕皆謂瘧毒
攻心瘧邪內陷必死無疑從不歸咎醫家惟怨命而已每年患此枉死者不知凡
幾予甚惜之予於此道已四十餘載每年見此症數十數百不等通計不下一二
千矣憶初入手時見此症亦茫然無措百中難活一二嗣遇見此症必晝夜籌思
何以古今毫無善法忽一夜夢見亡父笑告曰此病並不難治祇要辨明虛實表
裏四字牢記弗忘厥後悉心攻察漸有心得十中可救五六近年十中可救八九
蓋此症原感四時不正之氣從口鼻而入病在肺胃兩經毒留肌腠之間每發在
腮頷頸一帶初不介意及外現結核根盤堅硬已不能消化若漫腫無根還可
消釋

發頤看法

初起腮頷結腫大如鵝卵小似核桃易起易成身熱忽輕忽重成膿刺破膿出花黃旋即熱退身涼飲食能進日漸輕減者順初起腮頷漫腫似有核似無核難起難成身熱日夜不退甚至譫語神昏或便泄或溺短成膿潰破蔓延一片長有數寸或潰爛一條膿出清稀口燥舌乾飲食不進者險剛破未破瘡色紫黯或滿現青紫乾壳無膿者危

治法

初起腮頷結腫大如鵝卵核桃身熱忽輕忽重者內服姜蠶牛蒡飲外敷金不換或如意散蜜水調敷兩劑後身熱不淨堅腫如前不能消化者當用透膿散兩劑後瘡頭按之引手業已成膿當用刀刺破瘡口用八將散紙捻如膿出花黃正氣尚好不必服藥若初起漫腫亦無堅核身熱日夜不退甚至譫語神昏者內服犀角解瘡湯外敷二味拔毒散或硬煤面香油調敷如潰破蔓延一片長有數寸僅流清水外用紅玉膏攤紙貼之內服銀花露代茶或黃芪托毒湯助氣敗毒若剛

破未破瘡色紫黯或青紫乾壳無膿廬扁復生亦難爲力

發願應用四方

一 姜蠶牛蒡飲

炙姜蠶三錢 元 參三錢 桔 梗一錢五炒牛蒡子三錢浙貝母三錢
甘 草一錢五蟬 衣一錢五升 麻五分 蘆根五錢

二 透膿托裏湯

炙山甲一錢五白 芝一錢五川 莎一錢 角 刺一錢五當 歸一錢五
升 麻五分 生口芪五錢 銀花五錢 甘 草一錢

三 犀角解瘟湯

烏犀尖一錢摩冲 鮮生地七錢 丹 皮二錢 羚羊尖一錢摩冲
連翹五錢 大青葉二錢 銀花五錢 公英三錢
甘草一錢 蘆根五錢 竹葉十片

四 黃芪托毒湯

生口芪五錢 紫草一錢五分 粉四錢 白芷一錢五分 草二錢
連翹四錢 當歸二錢 銀花四錢 甘草二錢

以上四方不過備臨時採擇非必有是病定用是方也閱者諒之

治驗

侯童方週歲中秋節下始患瘡瘍點未透齊旋患發頤卽邀予治見其瘍點四肢頗密胸背甚稀繞項約有數十粒左腮蔓延額角浮腫光亮狀似遊火身熱灼手神識昏蒙勢頗危殆當用二味拔毒散白菜洗淨打爛搣汁調敷額角腮頬一帶內服姜蠶牛蒡飲次日復邀予診見其胸背瘍點較昨稠密身熱神昏與昨無異外改用煤面童便調上內服改方用

烏犀尖一錢五分 壓冲 連翹七錢 羚羊片三錢 燈草一束先煎
鮮生地七錢 桑葉五錢 甘菊五錢 元參七錢 銀花七錢

雙鈎藤 七錢後下

甘草 一錢五分 竹葉 二十片

右水煎乳母代服八成病童服二成

此方服一劑神識已清身熱已退額角亮光已泯然無迹週身痧點漸隱惟左腮較前堅硬大如饅恐難消化外貼發散膏內服清營和解之劑方用

炙姜蠶 三錢 鮮生地 五錢 銀花 五錢 浙貝母 三錢 丹皮 一錢五
地丁草 三錢 元參 五錢 公英 三錢 桔梗 一錢 五甘草 一錢五
右水煎分三四次服

此方服一劑左腮堅硬如昨入暮微有內熱照常吮乳細思此病成之不易化之綦難外遂貼八將散膏內服

生口芪 三錢 炙姜蠶 三錢 粉葛根 一錢 炙山甲 一錢
白芷 一錢 當歸 一錢五 角刺 一錢 川芎 一錢
桔梗 一錢 茜草 二錢 甘草 一錢

此方囑連服兩劑越日又邀予診見左腮腫處皮色微亮按之微微引手知已有膿遂用刀刺破瘡口插八將紙捻內服

生口芪三錢

花粉三錢

白芷一錢

銀花三錢

炙姜蠶三錢

甘草一錢

連翹三錢

川芎七分

此方服一劑次日復邀予診見右腮又覺堅腫左邊腫硬俱消瘡口無多膿水精神反不如前身熱自汗左腮照昨上藥捻右腮用蟾酥錠醋摩塗之內改服方用

生口芪皮三錢

炙姜蠶一錢五

蟬衣一錢

防風二錢

桑葉一錢五

茜草一錢五

炒牛蒡子錢半

元參三錢

甘草一錢

浙貝母三錢

蘆根三錢

此方連服兩劑諸病悉去右腮業已有膿亦用刀刺破瘡口插八將紙捻左腮先破處已流清水僅摻八將散面紙膏罩內不服藥嗣後連診四五次完好如

初

一張姓童年十三四歲年終患瘡疹疹後發頤病已垂危始邀予治予甫入門見他醫二人一乘輿而走一寫方未畢見病人滿身曝皮疹已泯然無迹惟咽關堵塞湯水難下右項漫腫色黯不華飲食不進二便不通身熱夜重時有譖語神識昏蒙診得脈象左弦數右滑數肝火有餘邪熱未淨右項敷金不換涼茶調喉間吹喉症必效散內服清瘡解毒之劑方用

羚羊片二錢燈草一束先煎 大青葉二錢 川軍六錢後下

桔梗三錢 銀花六錢 馬勃二錢布包

元參八錢 赤芍四錢 甘草二錢

連翹六錢

此方服一劑病勢如昨毫無增減二便亦未通利遂照原方加元明粉二錢沖木通二錢燈草三十寸竹葉三十片此方連服兩劑二便已通神識清爽咽關能進飲食右項漫腫欲潰不潰色仍紫黯診得兩手脈象已見虛軟不似前之

滑數此瘡邪雖退正氣已傷於是改方用

生口芪

五錢

當歸

三錢

川芎

一錢

野黨參

五錢

紫草

一錢五

白芷

一錢五銀

花

五錢

連翹

三錢

桔梗

一錢五甘

草

一錢五

寫畢囑病家曰公郎病勢雖退正氣大傷今日不能再服前藥此方已大大改動病家將予方詳閱一過默然不語予即告辭不便多說次日復邀予診已除夕早晨入病房見病人不似昨之清爽委頓不堪予頓足謂其父曰此子休矣無生望矣然昨日病狀頗好今日不應如此之壞真令人不解便向病家索閱昨方細閱見方上並無號碼始知未服予方急詢曰昨日果服何藥於是乃父詳陳顛末謂前數日悉服君方昨日見先生忽改方針似覺游移不定嗣某醫到此閱君方亦不甚贊成遂仿前服君方略爲更動以爲與先生方無甚出入不意出此變故總得求先生搭救言畢淒然淚下蓋張君本三子此子居長其二三子已於前數日患瘡疹相繼逝世故言之悲從中來予聞之亦代爲酸鼻

乃慨然告之曰事已至此別無良法祇有溫補元陽或可希冀萬一服後病果轉機不必喜歡病如不好無須煩惱說畢便擬方於左

黃毛鹿茸面四分沖

當歸身四錢 大山人參二錢另燉免服

製附片一錢

紫草二錢 上肉桂八分切片後下

生口芪八錢

茜草四錢 土炒小於朮二錢

炙甘草二錢 忍冬藤

湯代水二兩煎

此方服一劑元旦早八點張君到寓歡然謂予曰昨方服後如服仍丹一般精神頓振右項腫處頻冒熱氣如蒸籠然大有轉機矣午後務請先臨敝寓於是午一點先到張宅見病人精神頗好枕邊擋稀飯病人側首自執羹匙挽服見予至頻點首謂予曰先生來了計自看診六七天病人初次啓口予亦喜不自勝先診脈脈象和緩診畢看瘡見右項腫處色已轉紅擠之無膿瘡頭似欲潰爛用紅玉膏攤紙滿貼腫處內服方用

正號鹿角膠三錢

土炒白朮三錢

生口芪一兩五錢

紫草三錢

上肉桂 七分切片後下

野黨參 一兩五錢

當歸 三錢

忍冬藤 一兩五錢 炙甘草 一錢五錢

茜草 三錢

此方連服兩劑右項潰爛處脫爛肉一塊大如手掌於是瘡口摻九一丹外以玉紅膏攤紙貼之內服改方用

生口芪 六錢 當歸 二錢 白芷 一錢 野黨參 六錢

白茯苓 四錢 花粉 三錢 土炒白朮 二錢 忍冬藤 四錢

桔梗 一錢 整廣皮 六分 甘草 一錢

此方連服五劑瘡口腐肉已淨滿生肉牙外貼用玉紅鉛粉松香三膏稍攏人字生肌調和攤紙貼之內服照此方略爲更動連服二十餘劑至二月中始完好如初現已成巍然丈夫矣

此病倘不遇予不知如何結局縱遇予病家游移不定或親友參雜或醫藥亂投必至不起其殆有此巍然丈夫乎

一晏藹餘年三十八秋初先患瘧痧繼患喉痛未患發頤初見瘧痧時即邀予治
見其四肢胸前痧點密佈形寒身熱苔白脈浮形神狼狽詢悉日夜水瀉數十
次小便不通再四躊躇無法措手病人見予執筆遲遲不肯立方乃大聲曰先
生寫紅替我亦照服何得遲疑予告曰足下之病有兩難此病宜發汗尊體素
日陰虛陰虛不能發汗者一也水瀉宜溫化瘧痧不能溫化者又其一也有此
兩難所以遲遲不易立方者也病人催促至再不得已勉擬一方兩面兼顧方
用

炒大力子 三錢 桔梗一錢五分 赤荳四錢 薄荷葉一錢後下
炙姜蠶 三錢 車前子一兩布包 蟬衣一錢 土炒白朮二錢
豬苓四錢 上肉桂丸七分藥汁送下 澤瀉二錢
甘草一錢 姜兩片

此方服一劑泄瀉已止小便已通身熱如昨惟瘧痧較昨更密繞頸項如小米

粒者難以數計喉間作痛湯水難進改方用

炒牛蒡子三錢 元參五錢 馬勃一錢五布包炙姜蠶三錢

連翹三錢 大青葉一錢五

甘草一錢五 鮮芫荽一根 蘆根七錢

蟬衣一錢五 桔梗一錢五

此方服一劑諸病未減發燒尤重脈象七至有奇舌絳少液且譫語神昏目珠
發赤手足時覺抽掣勢甚危殆又改方用

羚羊片一錢五同燈草一束先煎

甘菊三錢 烏犀尖一錢摩冲

元參五錢

細川連一錢五

淡芩三錢

連翹五錢

銀花五錢

甘草一錢

鮮生地七錢

鮮竹葉十片

方寫畢適謁餘同差某某兩君見予立方不發一言予走後便告乃弟捷餘曰
此方太涼決不可服閱前方用肉桂此方用黃連犀角前後如出兩手豈前日
今日兩入患病耶幸乃弟捷餘不爲浮言所動竟服予方次日病情輕減並將

昨日友人之言詳細告之予深服捷餘卓見非他人可及乃改方用

銀花五錢

勾藤五錢後下連翹三錢

甘菊三錢

元參五錢

川連一錢五桑葉三錢

鮮生地五錢

丹皮一錢五

甘草一錢五蘆根五錢

方寫畢捷餘詢予曰昨今兩方顯有軒輊豈今與昨又不同耶予曰醫之用藥如將之用兵今既病情輕減方亦應當輕減語云窮寇莫追予方即本此意請照服決無錯誤此方連服兩劑瘧癥已退喉痛亦除惟左頸漫腫如饅疼痛難受腫處敷金不換蜜水調內服方用

炒大力子三錢葛根一錢五

炙姜蠶三錢浙貝母三錢

升麻五分銀花三錢

茜草三錢桔梗一錢五

連翹三錢甘草一錢

蘆根五錢

此方連服兩劑頸腫並不見消疼痛益劇勢難消釋遂改服黃芪托毒湯連兩

劑瘡頭顯露膿意遂用刀刺破插八將紙捻內服

生口芪四錢 花粉三錢 桔梗一錢 五野黨參四錢 白芷一錢

浙貝母三錢 忍冬藤四錢 連翹三錢 甘草一錢

此方連服兩劑瘡頭已流清水止不服藥惟用八將散摻於瘡口數日收功此病極難治倘捷餘信而不堅必不服予方病人雖信予治奈神識昏蒙不能言語其不入枉死城者幾希

言俊翁大公子年十六歲春間先患瘧疹喉痛次患發頤初起一二日即邀予治見其瘧疹密佈頭面尤多咽痛不重腮頷浮腫身熱晚劇渴欲涼飲舌苔灰膩溲黃便閉兩日不進穀食脈數無倫兩手一樣病勢弗善腫處敷金不換蜜水調內服辛涼輕解

炙姜蠶三錢

炒牛蒡子三錢

大青葉一錢五

元參五錢

連翹五錢

薄荷葉一錢後下

桔梗一錢五

銀花三錢

馬勃一錢五布包甘草一錢

蘆根五錢

此方服一劑病勢如昨未減亦未加重惟兩目白睛紅絲徧繞外敷照昨內服改方

羚羊片一錢同燈草一束先煎

元參五錢

甘菊三錢

銀花三錢

黑山梔一錢五

桑葉三錢

大青葉一錢五

甘草一錢

川軍三錢

連翹三錢

蘆根五錢

此方服一劑身熱較輕兩目紅絲已退瘡疹有透而漸退者有隱而外發者頭面依然不少咽却不疼腮頷浮腫見消根盤漸移後項大如饅色不變改貼發散膏內服方用

茜草三錢元參五錢板藍根一錢五葛根一錢五銀花三錢

連翹三錢浙貝母三錢桔梗一錢五甘草一錢

此方連服兩劑瘡疹悉退身熱已無後項腫塊依舊不消大致不能消釋遂又

改方

炙姜蠶 三錢 銀花五錢 知母三錢 炙山甲一錢 桔梗一錢五
花粉三錢 角刺一錢 元參五錢 甘草一錢

此方亦服兩劑後項腫塊不潰不消頗有淹繩之象不得已改進托裏透膿法
方用

生黃芪 五錢 炙山甲 一錢 桔梗二錢 柴胡一錢
角刺一錢五當歸二錢 川芎七分 白芷二錢
銀花四錢 甘草一錢 自穿蠶繭一枚

此方連服兩劑後項始有膿意照前方倍黃芪連兩劑瘡頭引指遂用刀刺破
膿出不少插八將散紙捻內服方用

生口芪四錢 柴胡一錢 杭白芍四錢 野黨參四錢 橘葉一錢
丹參四錢 當歸二錢 銀花四錢 甘草一錢

此方連服四五劑瘡口已流清水止不服藥惟用八將散摻瘡口膏罩旬日告愈厥後患者不善調攝不慎口腹前頸又破兩口數日告痊

李姓兩童長九歲次七歲夏令同時先患瘡疤次發頤初起先服西藥邀予診時已第九日矣見兩童瘡疤均已打回長者左項漫腫如茄按之堅硬知難消化腫處貼發散膏次者兩頷漫腫根盤不大僅如寸碟按之灼手知係熱邪未化外敷金不換蜜水調且喜兩童均不發熱頑笑自若然長童業將成膿於是先爲立方用

炙山甲一錢 川芎一錢 白芷一錢 角刺一錢 柴胡一錢
花粉四錢 生口芪三錢 當歸二錢 甘草一錢 次童立方用
桑葉三錢 金銀花三錢 連翹三錢 甘菊三錢 炙姜蠶三錢
淡芩一錢五浙貝母三錢 大青葉一錢五甘草一錢五

以上兩方各服一劑均覺平平遂照前方各又服一劑復邀予診長童左項業

已有膿遂用刀刺破膿出不多當用八將紙捻插入瘡口膏罩內服方用

生口芪 三錢 川芎 一錢 桔梗 一錢 五當 歸一錢 忍冬藤 三錢
元參 三錢 柴胡 一錢 連翹 三錢 甘草 一錢

復診次童兩頷漫腫似見消釋外仍用金不換蜜水調敷內服改方用

知母 二錢 角刺 一錢 製半夏 一錢 五浙貝母 三錢 銀花 三錢
白芨 一錢 五炙山甲 一錢 南花粉 三錢 炙乳香 一錢

以上兩方均各服兩劑長童瘡口已流清水止不服藥惟用八將散摻於瘡口數日即痊次童服藥後兩頷腫塊已消惟莖頭亮腫小溲不利此夜受涼風所致當改方用

荆芥穗 一錢 五 紫蘇葉 一錢 五 澤瀉 一錢 五 防風 一錢
白芷 一錢 車前子 三錢 布包 羌活 七分 獨活 一錢
桂枝 一錢 六一散 三錢 布包 姜兩片

此方服一劑莖頭亮腫已消囑弗服藥越日遺紀飛招務請速往問紀因何如此着急紀稱不知於是隨紀卽往見次童面目浮腫眼胞下狀似臥蠶再閱手足俱腫莖頭腎囊亮若晶球診脈似有似無不能辦其遲速病勢如此頗難措手勉擬加味五皮飲方用

陳皮一錢 澤瀉二錢 通草一錢 桑皮二錢 茯苓皮四錢

猪苓三錢 大腹皮二錢 姜皮一錢 甘草一錢

此方囑服兩劑服後杳無動靜病家不勝着急飛輿相招予入門見病情與前日彷彿甚爲詫異轉思前方不效無乃病重藥輕乎詢知病童平日脾胃素壯愛吃燒餅麵食食畢愛喝涼茶涼水予恍然此必濕邪盤踞中州加之疹後餘邪未淨內外夾攻致有此患遂執筆寫方用逐水飲加味

甘遂一錢 澤瀉一錢五分 車前子三錢布包 炒二丑二錢
桂枝一錢 通草七分 忍冬藤一兩

此方服後連拉帶溺足有十數次次日諸病若失復飛輿相招見病童不似昨日肥胖喜笑自若然大瀉後正氣必傷須扶養正氣爲是遂用

野黨參 三錢

白茯苓 三錢

芡 實 五錢

土炒白朮 錢半

土炒山藥 三錢

澤 濉 一錢

製川朴 一錢

炒薏仁米 三錢

紫蔻仁 五分

整廣皮 五分

姜 兩片

紅 棗 兩枚

此方連服兩劑諸病全愈元氣已復惟脾胃不似前之強壯飲食甚少囑向藥肆買八珍糕常服連買二三斤吃完復舊如初

紀童年八歲初冬出瘧疹隱而復現者四次厥後後項發頤即邀予治見其腫處大如手掌色白不變亦不疼痛第後項不能轉動形神困頓飲食不香詢知起病至今足有兩月延醫服藥日漸加劇細閱前方非沉香佛手即橘葉青皮予不解前醫因何用此其父母同曰此孩平日愛生氣起病之初與他童爭吵而得予聞之付之一笑不暇詳問細思此病本屬無妨過服破氣藥正氣大傷必

得大補正氣方有轉機於是執筆定方用

生箭芪一兩

當歸四錢

茜草四錢

野黨參一兩

川芎一錢

桔梗二錢

土炒小於朮三錢

忍冬藤六錢

甘草二錢

藿香一錢

砂仁五分打後下

此方連服兩劑精神稍好腫處與前無異予詫曰此童僅八歲能受大劑補托

今病若此成化均無把握不得已再仿前方更變服後看其如何方用

正號鹿角膠一錢五分土炒小於朮三錢炙山甲一錢五

上肉桂面三分沖

野黨參一兩五當歸一錢五

紫草一錢五

橘葉五分

桔梗一錢

炙姜蠶三錢

甘草一錢五

此方連服兩劑後項腫處始見高聳按之引手知已有膿遂用刀刺破瘡口插
八將紙捻膏罩內服用

生口芪七錢

忍冬藤三錢

茜草一錢五

野黨參五錢

當歸一錢五分 桔梗七分 土炒白朮錢半 川芎七分

甘草一錢 正號鹿角膠一錢

此方連進五劑瘡口已流清水遂不用紙捻惟摻八將散膏罩日易三四次旬日完功

紀童年十五歲秋間瘡癰愈後發頤邀予診時已穿殮衣置於板上見其面色枯白兩顴額角紅一陣青一陣手足時或抽搐詢知病已月餘前數日業已下地昨日稍感涼風頓患驚厥昨掌燈時至今午已驚厥十數次午前見病更危險故穿殮衣擱於空屋現在比午前輕減然生死存亡付諸度外先生有無法想一援手否予想此病斷不至死診脈六至有餘想必內熱未清涼風外襲內外勾結致有此驚駭告其父曰生死固不敢必然脈象有根看府上福氣何如於是發頤處敷金不換蜜水調內服方用

羚羊片一錢五同燈草一束先煎

雙鈎藤六錢後下 天竺黃一錢五

川貝母 三錢

京膽星 一錢五

薄荷 一錢後下

全蝎 兩只

元參 五錢

桑葉 五錢

連翹 五錢

甘草 一錢

此方服一劑次日病情大減昨午後至今午後僅抽搐兩次且時候不大也能略進飲食脈象尙夠六至內熱依然未淨遂改方用

烏犀尖 七分摩冲

天竺黃 二錢

羚羊角 一錢摩冲

鮮生地 六錢

川貝母 二錢

雙鈎藤 六錢後下

元參 四錢

甘草 一錢

此方服一劑抽搐已定內熱已清惟發頤稍覺高腫捫之覺痛知難消化遂改

用

生口芪 五錢

當歸 二錢

川芎

一錢

炙山甲

二錢

白芷

二錢

赤芍 二錢

刺角 二錢

炙姜蠶

三錢

忍冬藤

四錢

甘草

一錢五

此方連服兩劑膿頭已露遂用刀刺破膿出盡許瘡口插八將紙捻膏罩內服

方用

生口芪 五錢

桔梗一錢五

花粉三錢

當歸一錢五

忍冬藤 五錢

甘草一錢

白芷一錢五

連翹三錢

此方連服三劑瘡口已流清水止不服藥瘡口僅摻八將散膏罩不旬日完好如初

蜒蚰毒

蜒蚰毒一症諸書並未載及幼聞故鄉父老時稱之不但言之逐逐而且治法昭昭及長謂既有是稱必有是症醫書定然有之嗣閱古今內外諸書徧查無着始疑巷語尙談不足憑信繼而返躬自責謂天下事無奇不有古今書亦無奇不有搜羅未廣眼界不寬胡必少見多怪耶總之是症不論何經何部大概四肢居多初起一小紫泡痛癢相兼四圍上下漸變青紫人則身熱灼手譖語神昏與瘟疫傷寒髮鬚瘡口僅流血水日漸腐爛不數日全行瀉開甚至有二三寸寬六七寸

長不等穢味難聞與死人肉無異爛肉脫後熱勢方解常有因茲喪命者良由心火鬱結或三焦血熱稽留分肉之間或濕火盤踞經隧之內或瘧邪後毒火不散皆成斯患

看法

初起瘡色紫紅根盤不大四圍焮腫色淡紅界限分清發熱有時熱退後照常飲食動轉便利七日內潰爛腐肉易脫者順初起瘡頭不大色紫黯根盤散漫好肉與瘡界限不清身熱日夜不退譖語神昏飲食不進轉動艱苦十日外始覺潰爛腐肉難脫者險初起神識昏蒙不知痛苦至十四日外始知難受及至潰爛有六七寸寬長有尺許按之空壳無膿無血腐亦不脫毒已內陷此病危險已極名爲敗症百中難救一二

治法

初起剛露紫泡四圍焮腫當頭用銀針挑破四圍用硬煤面香油調敷內服銀翹

散將潰腐肉欲脫用利剪慢慢剪去瘡口摻燕泥散如欲爛不爛腐肉不脫用二妙羔攤紙貼之如腐肉已淨瘡口摻九一丹以玉紅膏攤紙貼之內服大四妙湯此指順症而言若險症初起瘡色紫黯根盤散漫瘡與好肉界限不清晝夜發燒神昏譖語飲食不進脈數無倫二便閉結初覺亦服銀翹散次服犀角黃連湯外敷燕泥散腐肉將脫服加味四妙湯外用玉紅羔攤紙貼之腐肉脫淨內服加味八珍湯外用玉紅鉛粉松香攢和攤紙貼之敗症初見用大解毒湯並服護心散一二劑後稍有轉機腐肉欲脫未脫用利剪剪之瘡口用胡桐淚研面香油調上油紙罩之內服大四妙湯或解毒十全大補湯以盡人事而已

蜒蟠毒備用八方

- | | | | |
|---------|---------|---------|-----------|
| 銀花 五錢 | 連翹 五錢 | 薄荷 一錢五分 | 下桔 梗 一錢五分 |
| 炒牛蒡子 五錢 | 馬勃 一錢五分 | 布包元 | 參 五錢 |
| 甘草 一錢五 | | | 茜草 三錢 |

燕泥散

朝北燕窠泥一兩

黃柏面三錢

上青黛二錢

黃連面三錢

兒茶面三錢

冰片五分

右共研細面香油調上乾摻亦可

大四妙湯

生箭芪一兩

當歸一兩

銀花一兩

甘草五錢

犀角黃連湯

烏犀角二錢

連翹八錢

青黛二錢布包

丹皮四錢

胆草二錢

銀花二兩

細川連四錢

加味八珍湯

忍冬藤八錢

當歸四錢

野黨參四錢

茜草四錢

川芎二錢

白朮二錢米泔水泡

鮮生地一兩

外
醫

天津華新印刷局代印

赤芍四錢

白茯苓四錢

甘草二錢

加味四妙湯

紫草二錢

生口芪八錢

忍冬藤八錢

茜草四錢

當歸三錢

甘草二錢

公英八錢

大解毒湯

元參八兩

銀花四兩

地丁草二兩

製附片二錢

上肉桂一錢

甘草三錢

連翹二兩

解毒十全大補湯

生口芪一兩

當歸一兩

土炒赤芍四錢

忍冬藤一兩

野黨參一兩

製附片二錢

大生地八錢

公英一兩

白朮四錢

甘草二錢

治驗

張姓年五十秋初繞項患蛇蟠毒剛起一二天即邀予治見其左缺盆繞過右缺

盆環過肩胛蔓延天柱骨長有一尺五六寸寬僅三寸紫黯一條稍津血水身
熱灼手詢知兩整日昏迷不醒飲食不進二便不通惟昏沉睡診得兩手脈
象數而有力兩寸尤甚此係邪熱蓄於肺胃上犯心君當以清解毒邪從外達
速速潰腐乃佳外敷擬用燕泥散奈燕窠泥一時難覓祇可從權用如意散香
油調敷內服方用

烏犀尖 二錢 摩冲 銀花 七錢

丹皮 三錢

細川連 三錢

元參 七錢 公英 七錢

桔梗 三錢

連翹 七錢

人中黃 三錢 燈草 三十寸

鮮竹葉 二十片

此方服一劑次日復邀予診燕窠泥業已覓到遂照方配一料香油調上病情
與昨無異內服亦照原方第三日復邀予診病人神識稍清略進飲食二便業
已通利惟覺頭目昏暈瘡上血水頗多大有潰腐之勢診兩手脈象依然數而
有神邪毒尙未外達照前方略爲加減

烏犀片一錢五分先煎鮮生地七錢

連翹五錢

雅川連三錢

丹皮三錢

淡芩三錢

銀花七錢

元參七錢

人中黃三錢

燈草三十寸

竹葉二十片

此方連服兩劑諸病悉除瘡口潰爛長有尺許腐肉欲脫當用利剪剪下重約十二二兩瘡口用紅玉膏攏燕泥散攪和攤棉紙貼之內服清心托毒之劑方用

細川連三錢

當歸三錢

丹皮二錢

生口芪七錢

連翹五錢

白芷一錢

忍冬藤七錢

元參五錢

公英五錢

桔梗三錢

花粉三錢

甘草三錢

鮮竹葉二十斤

此方連服兩劑瘡口餘腐脫淨已生新肉外用紅玉鉛粉松香三羔攏和攤紙貼之內服加味八珍湯連十四五劑瘡口已斂如指大遂改摻人字生肌紙膏罩之旬日完功

何姓年二十六歲鐵廠營業夏初左足患蜒蟠毒起半月餘始邀予治見其左足跗環兩踝上延腓腨長有尺許寬六七寸青紫焮赤頻流血水辨不清瘡頭何處病人精神甚好詢知六七夜未曾合眼晝夜疼痛且喜飲食尚好二便通利身熱不大退後微汗病勢雖兇尙可施治流血水處用燕泥散香油調敷焮赤未破處用四黃散如意散兩攏香油調敷內服利濕敗毒之劑方用

東地龍 四錢

忍冬藤 八錢

川草薢 八錢

茵陳草 八錢

連翹 六錢

赤荳 四錢

澤瀉 二錢

公英 六錢

防風 二錢

長牛夕 四錢

黃柏 二錢

甘草 二錢

此方連服兩劑動靜毫無予甚詫異轉思病勢如此徒用利濕敗毒無濟必得大補氣血方有轉機遂改用加味四妙湯倍重並加茵陳獨活東地龍黃柏等連四劑瘡始大潰腐肉逐漸剪去其臭味令人掩鼻內服仍照前方進退外上用紅玉松香兩膏摻和攤紙貼之又十餘日腐肉始纔剪淨左足指至腓腨長

尺許僅贋筋脈而已於是外用松香鉛粉玉紅三膏攏和攤紙貼之用洋布裹
之內服方用

生口芪二兩

土炒白朮一兩

當歸八錢

野黨參二兩

忍冬藤二兩

白芷二錢

茯苓六錢

丹參八錢

生地八錢

長牛夕四錢

川芎二錢

甘草二錢

此方連服四十餘劑始不服藥外摻人字生肌散用油紙攤松香鉛粉玉紅三
膏貼上用布紮之計起至落痂約二百餘天始能下地

房姓六十外夏令右手臂腕患蜒螭毒起四五天即就予治見右臂腕青紫焮
腫形神困頓診脈洪大重按則無此本源已絕辭不能治病人子再三哀懇不
得已爲其立方用

鮮生地七錢 地丁草五錢 茵草三錢 銀花七錢 公英五錢
桔梗三錢 連翹五錢 川連三錢 甘草三錢

此方服一劑次日又邀予診見病人坐炕上低首不語見予至略一回首即婆然淚下予即安慰一番弗自煩惱見腕臂患處與昨無異病人自言今日輕減細診脈象仍前洪大無根無法施治然病人面前不敢稍露難色惟曰容我慢慢設法遂外用如意散香油調上內服用

羚羊片二錢同燈草一束先煎

銀花七錢

細川連三錢

公英五錢

桔梗三錢

連翹五錢

人中黃三錢

茜草五錢

竹葉二十片

鮮生地七錢

此方未服次日復邀予診見予方貼在壁上且有他醫方並貼一處無非清瘟解毒寥寥七八味而已予詢昨日果服誰方予心中早已瞭亮其間必有緣故欲不立方病人苦苦哀懇立方恐未必服正在躊躇適病家至戚某君見予揚言務請先生設法予當病人不便明言惟告以昨日未服予方某君乃大聲罵其大兒謂此子混賬昨日先生走後即持方向藥肆抓藥未抓先算需洋兩元

四角其大兒聞藥肆言即默然不語另請某醫某醫細閱病狀並診脈謂些些小病決無妨礙故未服先生藥耳當此之時其大兒並不在座其戚復曰今早余看視病人舉家詳細告我始知如此病症究竟能否挽救先生明以告我予矚告其戚曰此病脈已無根決無生望立方服藥不過聊盡人事而已其戚乃蹙眉曰今若此務請先生定方生死有命決不歸咎先生於是情不可却祇得勉擬一方於右

烏犀片

二錢

鮮生地

八錢

銀花

四錢

羚羊片

二錢

丹皮

二錢

茜草

四錢

元參

四錢

公英

四錢

連翹

四錢

甘草

二錢

竹葉

二錢

此方服一劑次早即邀予診治並促予速往予即隨去見病家大小笑容可掬乃問曰今日如何僉曰今日大好入病房見病人亦笑容可掬予誠不解究係何故遂閱臂腕已乾壳無膿無血此乃死象何病人如此病家如此轉思迴光

返照今晚必不能過遂告病家曰速備後事予斷今晚必死何得空歡喜於是病家目瞪口呆予亦就此告別次早探詢果於昨晚病故

邊姓男年三十歲春末夏初右足患蜒蚰毒起念餘日始邀予治見左足跗面上至踝骨內外焮赤腫痛色如重棗拇指旁流血水痛極晝夜呼號診其脈沉數幸飲食尚好予此時不敢遽斷爲蜒蚰毒症大都濕邪留滯分肉之間始有此

患外用金不換香油調上內服方用

炙山甲二錢 炙乳沒各錢 半長牛夕二錢 角刺二錢 防風二錢
銀花四錢 歸尾二錢 白芷二錢 連翹四錢 澤瀉二錢
陳皮一錢 甘草二錢 黃酒一盞兌服

此方連服兩劑拇指血水更多足跗踝骨裏外漸覺青紫始斷爲蜒蚰毒遂外用燕泥散香油調上內服方用

生口芪七錢

炙山甲二錢

長牛夕三錢

銀花七錢

當歸三錢

角刺一錢五

白芷二錢

川芎一錢五

炙乳沒各一錢五

甘草二錢

茜草三錢

陳皮一錢五

黃酒一盅兌服

此方連服兩劑足跗青紫者漸見腐爛外仍敷燕泥散內改方

生黃芪一兩 茜草四錢

長牛夕二錢

野黨參一兩

忍冬藤一兩

陳皮一錢 土炒白朮四錢

當歸四錢

東地龍四錢

甘草二錢

此方連服兩劑足跗拇指腐肉漸脫踝骨內外剛露青紫外敷燕泥散內照前方連兩劑踝骨青紫尙未潰爛因夜冒涼風欬嗽痰稀脈浮緊苔白寒熱戰慄計起病至今已將匝月從未發燒此初次寒熱也祇可先理新邪暫用表解遂

改用

川桂枝一錢五

紫蘇葉二錢

炒枳殼一錢

柴胡二錢

野黨參四錢

前胡二錢

淡芩三錢

整廣皮一錢

製半夏三錢

甘草一錢

姜兩片

此方服一劑寒熱輕減大半欬嗽依然未減而且自汗淋漓脈浮緊稍和舌苔忽變灰膩因思原有濕邪此次外感涼風內外勾結法當標本兼圖方用

野黨參一兩

柴胡一錢五

製半夏三錢

荆芥炭三錢

葛根一錢五

橘紅一錢

前胡一錢半

土炒白朮三錢

茯苓三錢

甘草一錢

姜兩片

此方連服兩劑寒熱已無欬嗽較輕尙未之淨自汗仍有遂改方用

生黃芪皮七錢

杏仁泥三錢

防風七分

浮小麥五錢

製半夏三錢

甘草一錢

陳皮七分

白茯苓三錢

棉花子七粒

紅棗兩枚

此方連服兩劑欬嗽已愈自汗已除惟渾身酸懶懶於動彈日間嗜睡夜不成寐而踝骨腐爛已逐漸箝去爛肉不少足跗拇指已長新肉遂用松香鉛粉玉

紅三羔攏和攤紙貼之踝骨用燕泥散香油調敷內服方用

生棗仁一兩

製半夏四錢

夜交藤四錢

炒棗仁一兩

合歡花二錢

秫米六錢

此方服一劑夜已安眠渾身酸懶較好止不服藥踝骨內外爛肉已淨亦用三羔攏和攤紙貼足跗拇指上下一律如此三日滿擬收功在即不料陡生他病病人因氣惱昏厥不醒人事醒後胸即發堵疼痛不能近手即邀予治見其面色發滯形神困頓診脈沉滑內必有痰遂用控涎丹姜湯送五分服後瀉一遍吐一遍胸前仍不爽利遂改服加減千金葷莖湯方用

葷根一兩

桃仁泥二錢

陳皮一錢

冬瓜子六錢

炒瓜蔞仁四錢

桔梗一錢五

生苡仁米六錢

此方服一劑大見輕減遂照前方再服一劑病已全愈瘡口仍貼三羔內改服黃芪黨參兩膏攏和開水沖服三四錢日三次如是者月餘瘡口均斂忽咳嗽

痰中帶血又邀予治予診其脈象虛數遂用咳血方用

炙詞子皮 錢半

海浮石 三錢

川貝母 一錢五

炒瓜蔞仁 三錢

炒山梔 一錢半

藕 節 三錢

上青黛 七分布包

此方連服兩劑欬嗽已愈又邀予診予勸其不必服藥惟囑保養而已

韓姓婦年五十歲初秋臍內連胸乳患蜒蟠毒起匝月始邀予治見其右臍靠胸乳腋下迴亘尺許紫黯不華稍有血水辨不清頭在何處病人面色滋潤毫無病容詢知病起一月有餘初起臍內乳旁各起黍米大紫泡一顆微癢不疼並無寒熱飲食如常以爲風毒粟瘡毫不介意至第九日纔覺微有寒熱遂邀某某內外兩科診視一月日漸加重毫不奏功昨日舍親某提及先生高明今早專誠邀請是否有無妨礙予告以此病名蜒蟠毒外科諸書並未載及病勢極重弗以泛常視之幸飲食尚好可以施治從旁有至親某誚詰此病因何而起予告曰肝火鬱結加之濕邪爲患又詰當用何法治之予曰解鬱疎肝利濕化

毒舍此別無他法於是外用燕泥散香油調上內服方用

當歸三錢 黑山梔三錢 白茯苓三錢 柴胡一錢 五橘 葉一錢五
忍冬藤七錢 杭白芍五錢 防風一錢 五甘 草一錢 五連 翹五錢

此方服一劑毫無動靜囑照原方再服一劑仍無動靜第三日又邀予診見病人行動照舊問病情今日如何答曰與前無異惟日來小溲不暢餘無他苦細察膚內胸乳稍覺活動遂改方用

上琥珀八分研冲 鮮生地八錢 防風二錢 扁蓄草四錢
杭白芍六錢 淡芩四錢 柴胡二錢 當歸二錢
黑山梔二錢 連翹四錢 甘草二錢

此方囑連服兩劑小溲已暢復邀予診見病人躺在炕上勢甚狼狽問何以今日如此病家答曰前服三劑雖不見功並無他患昨服第四劑後晚上大發寒熱今日膚臂胸乳均紅腫疼痛予急告曰此大吉之兆不算壞處病家轉詢予

曰今早一家見病人如此莫不惶急萬分先生謂大吉之兆有說乎予曰此病壞在不疼今已疼痛紅腫陰轉爲陽豈非吉兆病家疑信參半今日病勢如此可保性命腫處滿敷如意散香油調內服方用

生口芪一兩五

當歸一兩

赤芍三錢

野黨參一兩五

茜草四錢

柴胡一錢五

忍冬藤一兩五

連翹六錢

川芎一錢五

甘草三錢

炙乳沒各錢半

方寫畢囑病家照方連服兩劑必有佳音病家見予方分兩如此之大未免懷疑予急告之曰若不急服此方性命實不能保病人隱聞實不能保四字急大聲告旁人曰快將高先生方抓來我立刻要吃吃藥死了不與你們相干於是病家急遣人抓藥服兩劑後越日復來邀請予急往診治見病人面目頓改舊觀滿露病容急看膿內已脫爛肉一塊如手掌胸前亦如之於是改用玉紅松香兩羔攤紙貼之內服方用

生口芪二兩 全當歸一兩 柴胡二錢 野黨參二兩 土炒白朮一兩

花粉四錢 製香附二錢 忍冬藤一兩 甘草二錢

此方連服兩劑瘡口滿見新肉四圍餘腫已消病家亦甚喜歡惟夜臥不安睡

沉則盜汗如洗外改用松香鉛粉玉紅三羔攪和攤紙貼之內服改方用

生黃芪皮二兩 大熟地八錢 煅牡蠣七錢 麻黃根二錢 當歸三錢

防風一錢 五大生地六錢 忍冬藤七錢 合歡花三錢 浮小麥一兩

此方連服兩劑盜汗已無夜亦穩臥忽嘰口渴脣乾恣飲無度再改方用

西洋參四錢 銀花四錢 丹皮二錢 瓜蔞根四錢 鮮生地四錢

鮮石斛四錢 乾寸冬六錢 元參四錢 甘草二錢

此方連服兩劑口渴脣乾均好亦不恣飲又變溏泄溺赤胃納不香又改方用

土炒白朮二錢 藿香一錢 製川朴一錢 赤苓三錢

紫蔻仁五分 陳皮七分 炒扁豆二錢 澤瀉一錢五

車前子三錢布包

懷山藥四錢

蓮子肉二錢

姜兩片

此方連服五劑諸病悉除胃氣已好瘡口已斂僅如指大兩處用生肌八寶散
摻之紙膏罩之十數日完好如初

一男子年三十外身長六尺有奇人亦結實異常夏令右手患蜒蟠毒勢殊兇惡
就醫院看時右肩及臂腕均焮腫牽及胸乳一帶隱隱紅腫正頭在臂裏心肺
部分色紫黯其餘自肩至臂腕均青紫相兼脈數大無倫目珠紅赤身熱灼手
大解多日不通旁觀無不咋舌謂此病焉有生理予亦躊躇至再乃外用青九
一丹摻於破處紙膏罩其餘綿亘亦無處上藥內服

犀角片一錢五先煎細川連一錢五

連翹六錢

鮮生地七錢洗打

枯芩四錢

生軍八錢後入

金銀花六錢

元明粉四錢沖

丹皮四錢

甘草三錢

竹葉三十片

木通一錢五分

此方服一劑身熱病情如昨大解亦未通外仍上前藥內改方

犀角片 二錢先煎

連翹 七錢

木通三錢

大黃一兩二錢

開水泡擠汁冲

元明粉五錢冲服

忍冬藤六錢

鮮生地二兩洗打

元參八錢

枯芩六錢

菊花四錢

甘草四錢

竹葉三十片

黛燈心三分

菊花四錢

此方服一劑僅大解兩次熱較減目珠紅色亦退惟肩臂青腫處均欲瀉開血水淋漓外上青九一丹用玉紅膏攤油紙上罩之內改方

犀角片一錢先煎

丹皮三錢

桑葉三錢

細川連七分

枯芩三錢

池菊花四錢

連翹四錢

炒山梔四錢

人中黃一錢五

忍冬藤一兩煎湯代水

此方服兩劑內病毫無惟臂膊血水淋漓不斷腫雖消而餘波未淨腐肉將脫未脫外仍上青九一丹稍和升丹摻之玉紅膏攤紙罩之內改方

生口芪六錢

川桂枝七分

炒白朮三錢

白芷一錢五片

姜黃五分

川芎一錢 五瓜蔥根四錢 白歸身四錢 連翹四錢 甘草一錢五

夜交藤五錢 桑枝一兩

此方連服兩劑腐肉將脫者用剪剪去稍手重鮮血逆流蓋是處全係脈絡血
最多照此方又兩劑腐肉已淨新肉已生用白九一丹摻之玉紅羔罩內仍以
此方略爲加減服兩劑嗣不服藥潰處仍上白九一丹玉紅羔到結痂未更他
藥又月餘收功

此病真險初用大黃八錢腹中僅小痛一陣二次用大黃一兩二錢僅大解兩
次稍膽小能進如許大劑乎此症在富貴人患之萬不能好見予之方早魂飛
天外誰敢姑試服之

陳吳氏年二十外新產不及匝月左脇近腋處起小紫血泡擦破第流血水瘡口
四圍青紫如手掌大邀予診視見其面紅耳赤身熱口渴潰破處口雖不大而
四圍青紫如此大非善象加之產後殊難着手外用

朝北燕窠泥二錢 兒茶一錢 黃柏七分 真青黛一錢

輕粉一錢 梅片一分 右共研細末用香油調上內服

川桂枝七分 連翹三錢 忍冬藤三錢 片姜黃五分

土炒枯芩二錢 瓜蔞根三錢 姜汁炒細川連七分 姜汁炒山梔二錢

甘草一錢 竹葉十片

此方連服兩劑身熱已去腫處青紫業已腐開仍上前藥內改方

川桂枝五分 片姜黃五分 全當歸三錢酒炒 連翹一錢五

瓜蔞根二錢 川芎八分 白芷七分 甘草七分

桑枝五錢酒炒 夜交藤五錢

此方服兩劑腐肉已淨新肉已生仍摻前藥不數日完功

此病與前病大小輕重判若天淵所以用藥亦有分寸