

諸症辨疑

一



明

吳球撰

諸症辨疑

中醫古籍出版社



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学 1951

中醫古籍出版社

據中國中醫研究院圖書館藏
明刻本影印



前　　言

中醫藥學是個偉大的寶庫，其中的珍善本書籍是寶庫中一枚璀璨的明珠。隨着中醫藥事業不斷發展和逐步走向世界，中醫珍善本書籍日益受到國內外學術界的青睞。中國中醫研究院圖書館素以富藏中醫珍善本書籍而聞名于世，為充分發揮我們館藏的作用，更好的滿足中醫藥界臨床、科研、教學工作的需要，我館將陸續輯印以《中國中醫研究院圖書館藏善本》為題的系列叢書。包括歷代有價值的中醫理論及臨證各科方劑、本草、醫案、醫話和醫史等諸方面的論著。

為保存原貌和便于參考，本叢書一律影印出版，相信本叢書的學術價值及實用價值會對大家有所幫助。

卷頭豐。西晉齊東晉，迄曰丁丑，歷李朝宋。本草圖目。問其能。

朴昔吳寇。宋茭山。朴昔（今江西）人。時中醫家醫學。少嘗得醫
書。發張氏藏書，悉刻。乃鑄銅函封鑄。再鑄銅函。主氏又取刻。最奇。

「醫聖特發」。舉。金匱要略。朴。魏文帝。馬融。陳承。蕭何。蕭何。

內容摘要

一九九四年四月
館長 胡國臣

中國中醫研究院圖書館



內容提要

「諸症辨疑」是一部臨症研究著作，涉及諸風、傷寒、溫病、諸氣、癲癇、婦產、廣嗣等五十余種病症。每症先論病源、病機，次論治法捷徑，再論治病主方及加減，最后是個人驗案。作者吳球，字茭山，括蒼（今江西）人，明中葉著名醫家。少嘗研習經書，精于醫業，博學慕古，著述頗豐。可惜喪亂流離，多已亡佚，僅李時珍《本草綱目》間引其論。

現影印中國中醫研究院圖書館所藏明刻本，為海內外僅存孤本。書后所附吳氏家傳秘方及其祖傳方藥炮制法還是醫藥工作者和業醫者不可多得之珍品。

編者

一九九四年三月



新刊京本校訛大字諸症辨疑目錄

卷一

風論

傷寒治法捷徑 傷寒要畧

辨大論

濕論

卷二

氣論

痰論

瘡論

或問瘡症

咳嗽

泄瀉附霍亂

氣血口熱分治

論補陰丸用敗龜板

或問遺精血濁淋漓遺尿辨

論虎潛丸

論遺精得法論 滋陰降火湯論

卷三

失血

三消

治宋子英消中得効錄

噎膈

積聚

眼目

瘻癰相類用藥不同論

諸痛治療

黃疸

眩暉怔忡

癲癇

治府學辛掌教得効錄

氣升論

治疝得要論

春宣作下法悞人說

治安人項尚器得効錄

膏粱藜藿治不同論

內傷作外感悞人論

內傷不辨悞人論

內傷厭藥論

庸医好毀同道匹夫非理責醫二者可戒

戒浩飲論

瘡瘍癰毒與喉脾用藥不同論



南京中医药大学图书馆版权所有
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE LIBRARY

天疱瘡

夏月中寒

冬天伤暑

治虛陽口瘡得法論

辨用硝黃巴豆悞人論

辨心痛脾疼治不同論

治溢飲得効錄

製鹿膠霜法

倒倉一法不出丹溪先生心要

不服水土說

解疑律五條

其三疑医

其四疑藥

其五疑物

卷四

婦人調經論

安胎難產

子享論

產後治要論

延齡育子法

小便氣結與熱不同論

赤白帶

徑疑作痢悞人論

血瘕作胎解惑論

小兒治法捷徑

卷之三

表自序

卷之三

而歸補腎不若補脾胃
下清氣下陷濁氣不降乃生
氣陷入中焦當用補中益氣使
抵飢飽失時酗酒大傷脾胃遇
者先以消導次以暖胃香砂青陳
善飲食既通何病之有今觀明
用香燥助火消陰之劑只宜枳木
有旨引以愚膚見枳木乃王道之
必隨効枳木調理於未病之先不
成積聚腫脹安能不用霸若有陰
脾胃之藥固難而變通加減之法

飲食二者之間其理最明予以三家



南京中医药大学图书馆版权所有
1951



南京中医药大学图书馆版权所有

陳皮 乾山藥

右件各以法製度為末蒸棗肉為丸如

口食前清米飲送下

食療養脾法

葛根四兩

糯米

一升五合俱各炒令香熟

厚麥麴炒

家蓮子去心微炒五合

白朮

二兩片者無法
有法者微炒

右件各依法炒令香熟除麵俱和一處用石磨匕羅過每日清晨一次用兩許以姜蜜湯調下但宜食前此法最能養脾胃潤食止嘔吐

小虛胃弱而倦怠者加入人參一兩乾山藥二兩共米亦如前數炒但不用麵及白朮

○風論

風無定法而善行數變故曰風也。諸風掉眩口眼喎斜手足瘓痙不仁皆屬厥陰風木用事肝之氣也。其病多端難以枚舉蓋風者有中。有傷。有出。有入。中者中入經絡傷者客入皮膚先賢治法故多而主治不一者何也。予觀古方從汗散此言風邪從表而入當汗自表而風出。及發明詩曰中風者非外來風邪。本氣病也。凡人年逾四旬氣衰者多有此疾。壯歲之際無有也。由是觀之此言風邪從內而出故禁不宜汗下。其間用一法者孰是孰非至是嚴仲和二法俱不偏廢論曰人之榮衛虛廢理魄外邪乘虛而入矣。治法從三因而治因外感者當先調氣然後治風因內傷者先貪氣不當治風故病或有因風成虛者或有因不同故云治風先順氣氣順則風消。

考風華勝治以辛涼今世俗何以

正所謂火盛制金不能平木此謂之自悞耳。又東垣河間州人也。言諸子出始發明入經入絡。汗下調燮火氣溫痰中氣夾食裏症。發風。暴傷胃氣不省人事。人以中風呼之。以中風治之以致悞。如此之証當審諸子治法。若外感手足寒熱當從古方通聖丸。寒治等湯治療。若內傷元氣血虛口眼喎斜宜以八珍順氣歸陰丸。貞故此為治法之折衷也。且東垣河間丹溪汝言諸子與先賢治法不同者何也。故東垣以氣論之。河間以火論之。丹溪以溫痰論之。汝言以飲食論之。四子之論類乎中風非真中風也。及云西北氣寒風中者誠有之矣。東南氣溫有風。若非風也。人本中氣不足。故溫生痰。痰生熱。熱生風也。此言一發後人疑以東南人無中風其然乎否乎。曰是病有或因火動而成者。有或因氣鬱而致者。有或溫痰而動者。有或夾食而中者。故諸子患後人全作中風悞人。

故發四論。開後學未至之心。闡先賢不彰之說。其立為言。至精切矣。何疑。東南人無中風之語哉。四子之論既出。其道昭然。則真中風病亦彰矣。故諸子火氣令痰有所本也。

中風者。人本氣血兩虛。或有形盛氣衰。或指節不時麻木。或手足間或痠痺。或頭眩眼吊。或虛跳癲於半身。或週身有如虫行此中風之兆也。人未知竟。不謹調護者多。或內傷勞佚。或外感風寒。或因火氣溫痰夾食而動。此正氣不足邪氣有餘。亦為真中風也。而丹溪獨謂東南人無中風。此言恐為未備。西北多寒。東南多熱。此天道之自然。予每見東南人亦有中寒者。由是觀之。則風之中人不必拘於地之南北也。明矣。蓋人之虛實不同。天時更異。不一所以風無定法之一言。誠後學繩準耳。故中風者。氣虛血少。百骸肢節而缺榮運。一得中風而偏枯者多。由之

枯朽不能。自濡故名曰半肢。予治中風嘗以東垣中氣不足之言為先。然後以火食溫痰論之。其發明論曰：中風者非外來風邪。誠哉是言。後之用藥不可偏執。一見庶無悞也。

○主方

防風

羌活

枳殼

桔梗

川芎

大錢

白芍

芍藥

甘草

白芍

七分

陳皮

半夏

白芍

荆芥

各五分

水二鐘

姜三片

煎七分

食遠服

相耳煎

服藥無汗而拘急者加麻黃

葛根

白芷

頭疼

加白芷細辛

○氣虛

有汗加人參黃耆

各五分

○血虛無加生地黃

川歸身

各五分

○口乾有熱加黃芩

柴胡

葛根

各五分

○四肢惡寒加桂枝

○風痰加膽星

一錢

○胸中多痰不利滿歸加竹瀝姜汁

○抽

搐加天麻姜桑炒去頭足各八分

加味芍氣散

邵南溪方

人參

木瓜

志願各三分

天麻

白朮

香白芷

烏藥

陳皮

青皮各五分

加半夏

枳殼各三分

沉香

本家不用沉香木香

水一鐘姜三片棗二枚煎七分食遠服

通聖散 治風熱諸症

防風

川芎

桔梗

芍藥

黃芩

薄荷

當歸

荆芥

滑石

石膏

白朮

連翹

梔子

麻黃

大黃

芒硝各等分

甘草減半

水二鐘姜三片煎服如大便泄瀉去硝黃

續命煮散

治血虛中風

防風

羌活

川歸身

人參

半夏

細辛

葛根

芍藥

川芎

肉桂

荆芥

遠志

熟地黃各等分

甘草減半

汗多加黃耆一錢

水一鐘姜三片棗一枚煎服
烏藥順氣散 治中寒風氣作疼癱瘓等症

烏藥

陳皮

枳殼

桔梗

麻黃

川芎

乾姜各等分

甘草減半

水一鐘姜葱三枝煎服

千金保命丹

治諸風痰癥不能語話健忘恍惚頭目眩暈胸

中痰塞心志不定驚恐憂惱虛煩少睡狂顛昏亂小兒驚癇
抽搐大人暗風等症

硃砂二錢

真硃一錢

牛膽南星三錢

甘草

麻黃去根

白附子

炮

雄黃

薄荷各一錢半

防風

琥珀

金消

牛黃各一錢

姜黃炒

犀角刮

冬青去心

枳壳

桔梗地骨皮

神曲炒

茯神去木

白术

遠志去心

人參柴胡

三錢

天麻二錢

膽礬

一錢七分水片少許

麝香少許

毫車

天竹黃七錢

黃芩

荆芥各七錢

蟬蛻一錢七分

川芎

猪牙皂角

各一錢

右為細末煉蜜為丸如圓眼大每服一丸薄可煎湯化下不拘時服或用蟬包丸好藏久

傷寒治法捷徑

傷寒為人之大病生死如反掌間要靈機聽聲察色參運化熟究陰陽察天道於四時辨人脉而分表裏陰陽繫濶名曰傷寒二經併病謂之兩感順之則為正邪逆之則為疫癘發於三陽身熱頭疼耳聾少睡發於三陰渴亦津少囊權在陽分當按蹠發汗在陰

分宜滲利其便下之早成結胸班痞汗之多恍惚亡陽亦可治無汗之發執掌反湯治有汗之惡寒脉遲而緊當和少微脉浮而數參以薰之於水附微有熱用清飢汗少便難宜利水兩寸脉數少腹投入小便清尺脉亦然薰之於附湯胸中癥結宜合附湯乾呕加之於附湯胸中懊憹風寒之汗後脉浮宜白虎煩燥無特人令仰惡口渴口清易餘熱未除怔忡用溫膽高燥屎氣移入大腸明譜語登高低當薰之於附湯或自利以調之或鬱熱以水灌入裏而瀉則用附湯灌熱未除湏當水陽厥極深能毒易慎勿疑陰施附湯傳經已盡神昏腫內或譜言此是裏虛邪熱蓄前方切莫改殊分已信顯仁貞解毒脉沉肢冷回互湯陰陽交易因慾內傷陰陽虛煩渴神昏無定居或起或倒不竟重六脉不勻弦細微發汗行涼渴轉加還陽退陰庶不

蓋陰陽兩陽剛柔痺和時法風足可誇抑且諸症有方惟傷寒
科有法爭細考之方即法也法即方也傷寒不離乎四氣雜症不
遠乎七情此確論也滑氏曰傷寒例言有溫疫而無溫溫叔和言
有溫溫而無溫疫此亦異耳故仲景以天時而論叔和以病體而
言其理明矣劉張之學尚有參差韓趙之言豈無間斷仲景言傷
寒本寒字而反治熱河潤云傷寒本熱字而反治寒二意不同者
何也按本經曰春傷於風夏必飧泄夏傷於暑秋必瘧痢秋傷於
溫冬病傷寒冬感於寒春必病溫然辛苦之人春夏必有溫病今
人春夏溫病皆曰傷寒此俗論也故仲景以寒溫而立言則行辛
溫河潤以溫暑而立法則行辛涼二意不同而各發明一義耳譬
如處州山川也地卑嵐氣溫熱每行辛涼之藥多効且如連境山
北金華動輒使用附子姜桂以為常事相去百里之外地土尚不

相同况南人北人乎曰近年以來亦不全矣經云六分分來一分
寒故寒少而熱多也若用附子姜桂湏宜子細庶不夭折人命傷
寒治法有限天時變異無窮難泥一法而盡傷寒惟在人自治耳
予思二公治法俱不可廢春夏則用河潤方兼行仲景法秋冬則
用仲景法而兼行河潤方又當與天時地土真賦相參豈有不中
其病耶予考劉張之學及愚膚見纂成捷徑以便醫家取用故曰
小補云耳

麻黃散

發散傷寒無汗發熱者

麻黃

甘草

或半

杏仁

各等分

葱白

三莖

水二鐘姜三片煎服

桂枝湯

治傷寒有汗惡寒者

桂枝

芍藥

各半分

水二鐘姜三片煎服

下神湯

治傷寒感冒頭熱身熱肺痛等症

川芎

甘草減半

麻黃

升麻

白芷

芍藥

香附

陳皮

紫蘇

乾葛

水二鐘姜三片前服

十味芎蘇散

發散四時傷寒

川芎

紫蘇

乾葛

桔梗

柴胡

茯苓

半夏各半分

甘草減半

水二鐘

姜三片前服

參蘇飲

治四時傷寒感冒風寒頭疼發熱咳嗽痰飲等症

人參

茯苓

枳殼

半夏

前胡

桔梗

紫蘇

乾葛

陳皮各半分

甘草減半

水二鐘姜三片葱三枝煎服氣盛加木香

雙解散

治傷寒溫暑熱病在表頭疼身熱肢痺疼痛邪熱有

餘服此得汗而愈

防風

川芎

羌活

荆芥

甘草

葛半

薄荷

石膏

滑石

連翹

白朮

枳殼

黃梔

桔梗

前胡

麻黃

芍藥各等分

○水二鐘姜三片葱三莖煎至一鐘

去粗熱服○汗後身靜內熱去麻黃荊芥羌活姜葱之類六

日大腑燥結入大黃朴硝煎服

當歸飲子

治傷寒病後餘熱不退或日腑潮熱等症

當歸

白朮

柴胡

黃芩

防風

炙甘草

芍藥

滑石各等分

虛寒加淡竹葉麥門冬

水二盞姜三片燈心七枝煎服
清肌羌活散專治傷寒客熱咳嗽涕唾稠濃發熱頭疼

人參

茯苓

川芎

枳殼

桔梗

前胡

柴胡

羌活

甘草或半

黃芩

乾葛各等分

水二鐘姜三片煎服

涼膈散

解熱涼心肺清臟腑

連翹

梔子

黃芩

薄荷

甘草

大黃

朴硝

等分

○水二鐘姜三片灯心煎服

小柴胡湯

治傷寒熱不解脉數有力

黃連

黃柏

黃芩

黃芩各等分

○水二鐘姜三片煎服

小陷胸湯

治傷寒結胸痰嗽不出

黃連

瓜萎

半夏

枳實各等分

○水二鐘姜一片煎服

竹茹湯

治痰火乾嘔

竹茹

一塊

生姜

陳皮

柿蒂絡芽

○水二鐘姜三片煎服

豆豉湯

治傷寒懊憹欬

七欲吐

豆豉

二錢

○水二鐘姜一片煎服

桔子

一錢

生薑

陳皮

柿蒂絡芽

○水二鐘姜三片煎服

白虎湯

治傷寒汗後脉浮燥熱不解

知母
半錢

石膏
五錢

甘草
七分

粳米
一撮

水二鐘姜三片煎服

人參竹葉石膏湯

治傷寒病後虛煩燥渴

人參
各五分

石膏
四錢

半夏
七分

麥門冬
八錢

竹葉
七張

粳米
一撮

水二鐘姜一斤煎服

本虛寒而燥者入附子名附瀉湯

溫瀉湯

治傷寒一切病後虛煩不得睡則兼治心膽虛怯

半夏
泡

竹葉
七張

枳實
一枚

陳皮
杏仁
各等分

北草
半錢

水二鐘姜煎服

承氣湯

治傷寒雜症內熱鬱結腹脹六七日不大便肚疼死

胎毒並皆治之

厚朴

枳實

朴硝

大黃各等分

○水二鍾姜一片煎服

大業胡湯

桔梗

赤芍藥

黃芩

大黃半夏各等分

水二鍾姜

三片煎服

身肺喉痛不可服

調中湯

治傷寒自利

黃芩

甘草

茯苓

台芎白朮利者去之

桔梗

乾葛

大黃

鵝者去之各等分

○水二鍾姜三片煎服

紫參湯

分理陰陽

治鴻解熱

柴胡

葛根

半夏

甘草減半

人參

茯苓

白朮

猶芩

澤瀉

各等分

○水二鍾姜三片煎服

天水散

治內熱利水道清暑氣止煩渴

滑石

六錢

甘草

一錢

右為細末并花水調服心熱恍惚入硃砂二錢名辰砂益元散
四逆湯 治陰症傷寒太陰自利身冷脉沉

附子

乾姜各二錢

甘草一錢

水二鐘姜二片煎服

燒裯散

治陰交陽易

婦人裯褶燒灰以水調服小便利為度

大陷胸湯

治大結胸按之痛不可近者

大黃

一兩半芒硝一兩入鐵五分

甘遂二分半為末

右利作二服水二鐘煎大黃至一鐘去粗入硝煎一沸次入甘遂末溫服得快利止後服

鵝右散

治傷寒發狂踰牆上屋

黃連

寒水石各等分

右為細末每服二錢濃煎甘草湯候冷調下

大承氣湯

治胃實譯語五六日不大便腹脹煩渴少食舌乾脣

厚朴

一兩
大黃
芒硝各五錢

枳實五箇

水二鐘半先煎

厚朴枳實至一鐘入大黃煎七分去和入硝煎

一二沸溫服

以利為度未利再服

熨腑法

治陰証身靜而重語言無聲氣少難以喘急目睛不

了了口鼻氣冷

水不入大小便不禁面上惡寒有如刀刮先

用此法後服回陽之藥

用葱

一束以繩扎如餅大切去根葉留葱白長二十先以火

灸一回令熱勿至灼入以熱著腑及腑下外面以熨斗盛

火熨之令熱氣透入腹中更作三四餅壞則易之候病人漸

甦手足溫有汗乃服

因逆湯治四時傷寒發汗後經中餘熱未解

和解散

治四時傷寒發汗後經中餘熱未解

柴胡 桔梗 枳殼炒 前胡 芎草或半 茶芩 半夏

黃芩 乾葛 薄苛 連翹 方藥 川芎各等分

水一鐘姜二片煎服煩燥加麥門冬淡竹葉

理中湯 治正氣不足中寒口禁四肢厥冷停痰冷氣

乾姜 人參 白朮各等分 炙甘草或半 水一鐘姜三片

藿香正氣散 治傷寒頭疼增寒壯熱或溫氣霍亂泄瀉常服

除山嵐瘴氣

桔梗 大腹皮 蒼蘋 茶芩 白芷 蕃香 陳皮

半夏麪 白朮 茯朴姜汁炒各等分 芎草或半

木三鐘姜棗煎服

小青龍湯 治傷寒表症不鮮水氣乾嘔發熱肺受寒邪咳

痰飲

乾姜泡

細辛

去葉

麻黃

肉桂

甘草

減半

芍藥

半夏

五味子

各等分

水煎服

○傷寒要略

先賢所論傷寒從外而入內傷從內而出及東垣謂東南氣溫內傷者多外感者少而西北氣寒水冰地烈內傷者少外感者多又云東南外傷者十白中一二耳如此一言又起後人之惑予細考之東垣立言以西北病傷寒東南患溫暑所以因其地以理言之大槩也故東南之人士薄胃虛不禁勞苦西北之人水深土厚故耐寒溫蓋東垣發明後學治病必分地土溫涼稟賦厚薄不可渾同一治粗率悞人凡諸感冒發熱不可便以行涼發汗人之虛實不同苦樂各異因欲內傷雜症發熱亦有六經傳變若專以傷寒一科汗下治癒豈不訛哉論云仲景之下著述紛然未見其的然以

言言辨易
為後學準繩耳然自霜降之後春分已前發從太陽鬱熱以次而傳陰經其間亦有太陽或不傳陽明或少陽不由陽經直入陰經或首尾止傳一經或二陽三陽而為之合病或太陽陽明共受之為之併病或陰陽俱病而為之兩感陰變陽生陽變陰死所謂寒大病反掌生死而世醫不可不慎也冬月傷寒不發寒毒藏伏經絡至春变为溫病至夏变为暑病所以寒因熱發熱因寒發有等傷寒非其時得其氣暴寒勞苦而成病者人皆称四時傷寒者此溫病也又有天時溫濕疫癥熱病沿門闊境傳染相類大同小異醫者正心戒慾當行河潤溫暑之法護勤者必多其間飲食劳苦所傷宗衛氣虛邪集身熱頭疼輕則微散外邪然後補養正氣審察虛實庶無悞也

○辨大論

人稟五行各一惟火居二火有君相之分心為正火焦曰龍雷故
目一火君不主令相火代之其性寄於肝腎之內附於脾肺之間
凡諸經動者皆屬於火故謂之五火所以相火易起虛無守位觸
經而發感物而動變化無常五火相扇其害甚大其死甚速燔熾
臟腑燒燬真陰而死期迫矣蓋火之性善行數音變起於肝謂之
風火主於脾謂之廢火入於氣為無根之火動於腎為消陰伏火
存於心肺入於血分為有餘之火散於各經為浮遊之火故火者
化也莫測其機凡火為病有虛有實其治有補有瀉有餘中不足
有不足中有多火在虛無法宜和解清之溫之皆可以辨明症治
假如邪入經絡積熱臟腑久而成鬱此為有餘之火宜以苦寒瀉
火辛甘之劑汗而散之其飲食內傷七情六慾氣盛似火或為有
餘中不足當以苦甘之劑涼而和之陰虛火動骨蒸潮熱此為不

足中有餘當以甘苦之劑滋陰降火暑傷於氣氣虛潮熱此為不足之火宜以甘溫補劑溫養其火其熱自退經云君火正治相火反攻此之謂也

升陽散火湯

升陽氣散鬱火治肢熱心煩冷物抑遏陽氣

升麻

葛根

羌活

白芍藥

柴胡

防風

人參

薄荷

生甘草

熟甘草各等分

○水

一鐘葱白姜煎服

涼膈散

方出傷寒門

治諸般鬱熱退六經火

東垣升陽降火湯

治肌熱煩悶面赤食少喘咳有痰右關脉

或緩或數溫熱等症

羌活

炙甘草

黃芪

荳木

升麻

柴胡

人參

黃芩

黃連

酒炒

石膏

蜜丸不用

水二鐘煎服

黃連解毒湯

治臟腑熱六經有餘之火

方出傷寒門

瀉白散

治肺經積熱大腸經熱

桑白皮

真地骨皮 生甘草各半

咸半

右各等分爲末服

導赤散

治心小腸經熱

生地黃

木通 甘草各等分

入竹葉麥門冬水煎服

瀉青丸

治肺經熱止升眼赤翳

當歸

龍膽草 川芎 山梔

防風 大黃 羌活各等分

右爲末蜜丸如雞頭子大含化三丸

瀉黃丸

治脾熱

藿香

七錢

山梔一兩

石膏八錢炒 甘草一兩

防風

三兩

○右爲末蜜丸

大金花丸

解諸熱臟毒伏火

黃柏

黃連

黃芩

梔子

大黃

便秘用

右為末水丸如梧桐子大每服六七十九丸任下

硃砂涼膈丸

治上焦虛熱咽膈有氣如烟捨上

黃連

梔子

人參

腦子少許

茯苓

硃砂

右為末蜜丸硃砂衣梧桐子大五十九水下

上清丸

治心肺有熱上焦痰火咳嗽

龍腦二分另

硼砂三錢另

鷄膝薄荷末一兩

川芎末

五錢

甘草

桔梗各二錢末

右為細末煉蜜丸如小圓眼大每服一丸臨卧含化或食後以

清茶嚥之

清臟潤燥丸

專治熱毒臟燥老人血少陽臟便難此藥鮮

卷益潤腸

川連

川歸

郁李仁

桂

大黃

枳殼

連翹

川芎



芍藥

麻仁去殼

黃芩堅實者

薄荷各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服六七十丸食前茶清下

五苓散

治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤澁如心神恍惚加辰砂名辰砂五苓散

澤瀉

白朮

肉桂
炮半

茯苓

猪苓各等分

右為細末每服二錢熟湯調下

香薷飲

治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並皆治之

一方加黃連姜汁炒黃色名黃連香薷飲如有按筋加姜活眼

白扁豆

微炒

厚朴
姜汁製

甘草

香薷各等分白朮煎

十味香薷飲

治內傷不足調理陰陽溫熱泄瀉夏月服之養

陰辟暑

人參

杏仁

陳皮

白朮

白茯苓

白扁豆

黃芪



木瓜、厚朴

製汁炒

甘草各等分

右剉白水煎服

桂苓甘露飲

桂

人參、藿香

茯苓、白朮

甘草、厚朴

澤漆

石膏

滑石、寒水石

木香少許

右各等分爲細末每服三錢白湯調下

清暑益氣湯

養胃却暑進食夏月服之壯人精神

方出脾胃門

六和湯

治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱交

作痰喘咳嗽胃脘痞悶傷寒陰陽不分冒暑伏熱荆疾中酒煩

渴畏食並皆治之

宿砂

半夏

洗

杏仁

人參

赤茯苓

藿香

扁豆

香薷

厚朴

姜絲

木瓜

甘草

如茶等分

右水二鐘姜五斤紅棗一枚煎服

薄荷煎

治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛

薄荷一斤取頭末二兩半

川芎半兩取末二錢

砂仁半兩取末二錢

甘草半兩取末二錢半

右為細末入腦子和勻煉蜜成劑任意嚥嚼

和剂方無腦子有桔梗

三真丸 治男婦三焦積熱咽喉腫痛心膈煩燥小便赤澀大

便秘結酒毒等患

黃連

黃芩

大黃
梗各二錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四五十丸熱水吞下

一方入龍腦麝香為末宜夜含化

万病解毒丸

何良壁方

治臟腑熱毒傷寒熱病後發結

不鮮糞亦傷毒瘡發丹酒積臓毒大腑熱結或食熟死猪羊
牛馬風狗所傷禽虫之類諸毒狂熱等症

山慈姑

山豆根 大黃 荆芥

各一錢

文蛤

四半

辰砂

桔梗 繢斷子 芫草 黃芩

全蝎

黃連

寒水石

金線重樓

連翹 升麻 青黛

各五分

全蝎

十箇

雄黃

朋砂 大戟

七分半

川芎

各三分

麝香

一分半

腦子

七分 滾哥 滑石

各四分

右為細末麵糊為丸如棗核大○臓腑熱毒疔草湯磨下○病
後內熱亦用前湯○上焦風熱滾哥湯○瘡毒甘草湯○食死
羊牛馬甘草湯入姜汁少許磨下○頭疼身熱日久口渴酒
灯心湯風狗所傷木通湯○小腸氣青木香湯磨下

樟弓丸

治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫或有瘡疥咽喉腫

利小便開濁一切風熱之症並宜服之

黃芩

一兩

牽牛

生取頭末各四兩

滑石

各四兩

大黃

黃連

薄荷

川芎

各半兩

右為細末滴水丸如梧桐子大每服五十丸溫水下

○濕論

濕之為氣在天為雨露在地為水泉在人臟為腎故名曰濕是天地間陰陽蒸潤之氣也凡四時之濕皆有惟夏秋適旺人之虛弱故濕之中人入皮膚為頑痺入氣血為倦怠入肺為喘滿入脾為湿痰腫脹入肝為脇滿而肢節不利入腎則腰疼膝痛身如板杖脚如沙墜入腑則麻木不仁入臟屈伸不能而肢節強硬得病之由或暴雨湿地山澤蒸氣遠行涉水汙出衣裡冷則浸漬人皆不知九是一症病之未覺醫之未明或因風火勞役所干或為去

七情四氣所發感於寒為寒濕薰於風為風濕動於火為濕熱逆於氣為濕氣皆可以辨明分狀治療之法風濕則當勝散之寒濕則當溫燥之溫熱宜以清涼之溫氣當以順利之亦不可輕易下并用峻劑其脉多沉緩而微其症多水重而急惰凡諸病中兼乎湿而世人不知治者有关後之醫者宜慎辨之丹溪以湿熱必火為病又多而治湿尤如决川其言信矣

治湿中和湯

治寒湿身重腹滿小便不利如坐水中

蒼术浸紙

白朮

甘草減半

陳皮

赤茯苓

厚朴姜汁紙

乾姜

附子等分

水二鐘

姜一片

心一撮服

清湿湯

治夏秋湿熱腰背脊痛身重怠惰身如板交脚如沙

降

黃柏微炒

蒼术浸紙

善活

白朮

陳皮

薏苡仁

防風	白芍	梔子炒	川芎	澤瀉
神曲炒	紅花炒	甘草各等分	水一鐘姜三片黃一枚服	白茯苓
暎風散濕湯				
獨活	防風	蔓荊子	羌活	川芎
有熱加酒炒黃芩○如身痺無汗加麻黃荆芥○水姜煎眼			防已	蒼朮各等分
羌活續斷湯				
溫偏枯腰膝疼痛脚重行步不順				
羌活各等分	防風	細辛	白芷	杜仲炒
川芎各等分				牛膝酒洗
水三鐘姜三斤煎服				

或問風濕作痛。古人每用獨活寄生湯。取効甚速。近來用之少效。

而何也。曰：古人立方用尊主病者為君，所以用桑寄生川獨活。乃去風勝溫之主藥也。近桑寄生收採難得，世俗皆採桃梅榆松寄生代用，種雖相類，其氣不同。蓋桃榆性熱，傷氣損血，故不効者也。過賣獨活皆用土帰性燥耗血，不効者二也。主病之藥二者缺焉，故效鮮矣。予因其用，故立其名曰：羌活。續断湯治病亦效，蓋羌活獨活一種也。節密者獨活，稀者羌活，豈有異也？當明載之，以便擇用。此方因無真寄生，世俗每用土獨活，有悞病家，所以另立名焉。使後人用藥，庶無差失也。

新刊京本校訛大字諸証辨疑一卷

終

新刊京本校訛大字諸症辯疑二卷

○氣論

自太極生陰陽陰陽生五行五行生萬物得其清而正者爲人得其濁而偏者爲物而人身實備禹物五行之理故一氣周流於其身以養百脉衝其包元發爲諸症古今雖有治法療七情而無結散之分用藥難以應手愚謂喜樂恐驚耗散正氣怒憂思悲鬱結邪氣結者行之散者益之此治七情之要法也喜樂恐驚屬心膽腎過則爲怔忡健忘失志不足之症當以歸神養血妙香七氣寬中等散治之怒憂思悲肝脾肺絡過則爲往癟噎膈脹脹疼痛有餘之症苟或飲食所傷寒冷所感嘔逆搶心癲脹刺痛甚則結爲有形積塊宜用鍼灸散分氣四七換氣九消導之訣云冷則成氣

今人堅執此理每用香燥之劑殊不知亢則害承鬱又氣盛似火
亢氣有餘即是火也法宜清涼之以辛溫為君耳苦為佐上焦氣
熱酒炒芩連下焦氣熱盐炒梔柏所以酒升而盐則導下抑且肺
為氣主胃為氣元清肺理氣最為治病之要今世俗多有祛火氣
無補法不審肺脾有餘不足卒手便行霸道往往有悞故氣實
之為當氣虛豈不增其病哉嘗治虛氣用參耆獲効者多鄙意以
為深得其理所以耗散者養其氣當行王道之法果是有餘積氣
量行開鬱霸道然後養胃健脾特未不苟取一時之効以悞人也
但審人氣虛虛實角察為最

主方

寬中散

枳殼炒 桔梗 芫草 紫草
水一鐘半 姜三片 煎服

桔梗
紫草
紫草
半夏
芍藥
各等分

腹塞腹滿加紫蘇葉菖皮大腹皮厚朴香附子少○氣盛少食
加麥芽砂仁山楂○氣急胸膈不利或咳嗽加炒瓜蒌仁桑白
皮○冷氣胃脘作痛加青皮陳皮去白芷胡索木香○鬱氣作
痛胸膈加香附子重便浸炒撫芎○氣盛久鬱上下膈間遊走
作痛吞酸刺心嘈雜加細辛山梔仁炒黑色○氣鬱胸中心下
滿閉加川連姜汁炒神曲炒○氣病感寒作喘加蘇子麻黃杏
仁炒荆芥穗○病後氣腫加大腹皮五加皮萊菔子炒入
妙香散治怔忡安神養不足心氣

麝香少另研 木香 山藥 茯神去木 薤白 蔡志
人參 桔梗 半夏少 石砂另研各半分

右為細末每服二錢棗湯調下
口氣湯 治七情不足之氣

人參

茯苓

川芎

肉桂

當歸

白芍

白朮

白朮

水二鐘

姜三片

棗一枚

前服

四七湯

厚朴

姜汁炒

散抑鬱祛氣

紫蘇葉

半夏

茯苓

各分

水二鐘

姜三片

前服

分氣飲

療心氣消氣腫治虛脹散瘀膏

木通

羌活

陳皮

青皮

半夏

大腹皮

茯苓

芍藥

甘草

桂心

紫蘇

桑白皮

各等分

木香少許

水二鐘

姜三片

灯心二十根

前服枳耳煎

蟠葱散

治心肝氣疼冷噎吞酸

丁皮

砂仁

三稜

蓬莪术

延胡索

蒼朮

桂皮

枳榔

青皮

茯苓

甘草

乾姜

半夏

各等分



水三鐘姜二片煎服

小湯氣加荷香川練子

急丸

治心脾有餘氣痛臟腑積滯

巴豆

大黃

乾姜各等分

右為細末煉蜜丸如棗豆大每服三丸溫水送下

木香枳榔丸

快膈寬腸下積利氣

牽牛

頭末二兩

大黃三兩

木香

枳榔

陳皮

黃連

枳殼炒

義术

黃柏

青皮

香附各一兩

右為細末作丸如梧桐子大每服五十丸姜湯送下

僵氣阿魏丸

治冷氣噎膈作痛嘔吐酸水冷積心氣肚疼

茴香炒

炒

無烹

青皮

陳皮去白各一兩

丁皮

胡椒

甘草炒

炒木炮

白芷

肉桂

縮砂各五錢

生羌四

兩切片鹽淹一宿炒冷紫色

阿魏二錢半

浸醋打糊

右為細末阿魏同醋打糊為丸如梧桐子大瓦砂衣每服十九粒姜湯送下或加至三十丸

局方蘇合香丸

定志丸

治心氣不足恍惚怔忡

人參 白茯神

去木各三兩

遠志

去心 九節菖蒲

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大以硃砂為衣每服二十九粒酸棗仁湯送下

○痰論

涎者脾胃津液結為痰者病名也人皆有之貴乎順行則無倒上之理氣虛虛弱或因飲食所傷或因七情六淫所擾故氣壅聚諸云肥人痰多瘦人亦有之何也蓋脾統血行氣之經氣血俱盛何痰之有過思飲食損傷經絡脾血既虛孤氣獨盛溫因

氣滯故多痰也遊濫各經無所不至痰氣既盛客必勝主或傖於脾之大終之氣則倏然仆地者此痰厥也升於肺者則喘急咳嗽迷於心則怔忡恍惚走於肝則眩暈不仁脇肋脹痛閔於腎不哈而多痰滯留於胃脘則嘔瀉而作寒熱注於胸則咽膈不利眉棱骨痛入於腸漉上有聲散於胸背則挾觸一點疼痛或寒或手或背脾一邊散則有聲聚則不利皆痰所致也初則為稀薄痰涎溫痰其淡之味皆寒痰之名也久則為稠濃老痰痰火鹹苦腥臊之氣皆熱痰之名也治法當順氣為先實脾為本氣順則津液流通脾實則收約痰飲此先聖之格言治痰之要法以二陳湯參蘇飲化痰丸治痰之標也以滾痰丸滌痰湯白丸子八味丸治痰之本也但審人氣虛虛實今熱用藥若以耗氣之劑太多肺脾氣虛寒愈盛矣後之治痰者不可不知

主方

半夏湯泡七次 陳皮去白 桔子各一錢去皮

甘草

枳實炒 白朮各五分○水二鐘姜三片煎服相互通煎

溫寒身重倦怠加蒼朮五分○寒痰氣喘去白朮加杏仁炒茶

黃細辛紫蘇各五分○風痰加南星姜薑皂角○痰盛加竹茹

姜汁○熱痰加黃芩黃連各五分○胃脘痰火以軟石膏一錢○

痰結吐不出 菱仁五分○血痰加黃芩天門冬知母竹瀝

半鐘姜汁少許○芍藥炒各一錢○胸中鬱痰加香附米朴硝

各一錢○氣虛加人參倍白朮○胸中老痰加貝母一錢海粉

五分

清氣化痰丸

消飲化停痰理脾順氣開鬱寬胸

青皮

陳皮

香附子

蘇子各二兩

山楂

麥芽

神龜

白芥子

茯苓

杏仁各一兩

南星

四兩切

半夏

四兩切

皂角二兩

生姜

四兩切

白芩

二兩

自南星起共五味用白水煮南星無白點為度焙乾去皂角入前藥為末以竹瀝碗許姜汁半碗打糊為丸如梧桐子大每服七十丸淡姜湯送下

八味丸

補腎溫中治下虛水溢不咳多吐痰唾

牡丹皮

茯苓

澤鴻

山茱萸

去核

山藥

附子

炒

桂皮各一兩

熟地黃

二兩

右為細末練蜜為丸如梧桐子大每服二十丸至五十丸溫酒

送下

滾痰丸

破癥結利痰氣

大黃

酒蒸

青礞石硝煅壹兩

沉香五錢

桔芩各五錢

八兩

水糊丸如梧桐子大三十丸温水下食远服

如聖丹

何良璧方

治久新痰喘咳嗽○用黃熟瓜萎三五箇連

皮子

明礬

三分搗和成團餅用錢穿掛經風處陰乾研極細

用姜汁糊丸如梧桐子大五十丸淡姜湯送下

清金化痰丸

治上熱酒毒痰火鬱結咯痰胸膈不利之症此

方治有餘痰火內傷久嗽不可服之

上好青黛

瓜萎仁

去微
蜜便浸

連翹酒滌

貝母去心滌

片黃芩

香附米

蜜
便浸

海粉各一兩

風化硝五錢

右為細末蜜丸如龍眼大每服一丸含化以茶清嚥之

哮喘丸

銅綠五錢

專治哮喘寒氣神驗

明信石

一錢

右為末以米醋打糊為丸如棗豆大每服三四丸冷水吞下

熟食

五虎湯

治喘急痰氣

麻黃七分

杏仁去皮尖一錢

甘草四分

細茶炒八分

白石膏一錢五分

○白水煎服

造海粉法

摘取芥口蛤蜊不計多少三月取以炭火煅成粉收貯之候秋
深待瓜叢熟時摘取連皮并子搗爛如泥和勻乾濕得所團如
鷄子大穿之懸透風熱陰乾次年聽用人藥研極細入湯不宜
細

○痰氣餘論

痰因氣化氣動痰行痰氣既盛為病不淺故痰者因火而動氣者
因鬱而成此痰氣之始沒故痰之為病者最多諸書所載有所不

蓋瘧火初作為外感發熱久則為內傷寒潮熱為腫塊結核
為麻痺不仁或如熱湯淋於背上或如冷物噎於胸中小遺如同
來泔糞後尤若魚凍眼亦腫或頭風心陡然而顛倒目中時出
星耳內蟬鳴水嚙或走注而酸疼或膚脅而赤腫千狀萬態不可
以枚舉也但脉沉弦細滑大小不匀皆瘧氣為病也世俗多不明
見脉理類風則治風見熱則退熱痛者則止疼虛則補血皆率妄
之治良可悼矣蓋瘧火類外感或頭疼發熱但熱有間斷耳脉雖
弦數但有不匀耳或書輒夜重或為內傷類乎虛弱潮熱往來咳嗽
醫以參耆柴胡五味子黃柏滋陰退熱之剖殊不知寒補之藥
極滯痰氣反迂綿而愈劇也又有氣虛益飲留於四肢脛節疼痛
醫作風治以疎風寬利耗氣之藥則氣愈虛而瘧愈作允今後雖
症類乎外感內傷不能辨狀胸膈不利飲食減常面色如故其脉

沈弦細滑大小不匀當行灸氣之藥無不獲效予曾經歷當錄之而告同志以增見識耳

○瘧論

疫意風暑不正之邪也近山則山嵐近海則瘴氣古方雖有瘴寒溫食牝牡之分而世醫混治者不一古云是脾寒丹溪論痰飲內經獨言風諸書偏載暑原病多端亦皆有見病机云胸內多痰夏傷於暑秋感於溫故發於瘧也法當清之今人每用脾寒燥劑而无祛暑之藥其不相投也甚矣瘧者先傷於暑次感於溫遇寒食而衝動暑則為本溫則為標原因暑少溫多今用藥暑多溫少反助其熱故延綿也殊不知寒中多熱匕內多寒今用燥劑治其標而未治其本何以得痊接本經曰瘧脉自弦匕數者多熱弦遲者多寒弦短者傷食弦滑者多痰弘而緊者宜下浮大者宜吐弦遲

者宜溫此治瘧之大法其病扭多寒溫煩心少睡者屬心名曰溫瘧但寒多少熱腰疼足冷者屬腎名曰寒瘧先寒而後大熱咳嗽者屬肺名曰痺瘧熱長寒短効脉掀縮者屬肝名曰風瘧寒熱相停嘔吐痰味者屬脾名曰食瘧發於三陽者多熱而發於晝發於三陰寒多熱少而發於夜故陰陽者牝牡之瘧也治療之法溫瘧則用柴苓湯寒瘧則用桂附二陳湯痺瘧則用參蘇飲風瘧則用烏藥順氣散食瘧則用清脾飲食少則用養胃湯發於三陽宜采胃祛邪三陰宜調脾截七情內傷善食汗多則用四獸飲陰瘧則用升提陽分然後方行截補之藥清而不愈則以七宝飲醫甲烏梅丸斷瘧飲瘧愈之後陰陽兩虛要遺咳嗽不善保養遂成瘧瘧瘧中惟忌用心過度勞役憂心最為難治若能清心养身節食避風如此調治無不愈矣

主方

柴胡

茯苓

白术各一錢

陳皮半夏

黃芩

參

陰方除之。

水一鐘

姜二片

煎服

○飲食不思加

麥芽青皮

山楂各五分

○若陽分汗多加人參

黃芪各七分

去乾噶

○陰

分加酒炒芍藥一錢

川當歸

身川芎

生地黃各八分

○或用升

麻四分撮之

○寒痰停飲加

草果仁

○痰盛加貝母知母炒

○截瘧加青皮常山

梔榔貝母各一錢

○久瘧邪微潮熱加四君

子去桂附之藥四物同用

紫芩湯

治溫瘧熱多寒少口燥煩心少睡

方出傷寒門

桂附二陳湯

治寒瘧但寒多腰痠足冷

附子

炮

半夏陳皮

茯苓

一斤草

減半

肉桂各半分

水一鐘半

姜三斤棗一枚煎服



卷之三

參蘇飲

治癲瘡先寒而後大熱咳嗽者方出傷寒內

烏藥順氣散

方出風門加紫胡黃芩各一錢治風瘡熱長寒短動

脉抽搐者

清脾飲

治食瘡嘔吐痰沫寒熱相停者

厚朴製

黃芩

白朮

青皮

半夏湯泡

甘草

減半

茯苓

草果

柴胡各半分

水二鐘姜三片棗一枚煎服

七寶飲

截瘡

恒山

一錢五分酒炒

陳皮

厚朴製

草果

枳榔

青皮

各一錢

甘草

五分

水二鐘

姜三片

烏梅一箇

四獸飲

治五臟氣虛喜怒不節陰陽偏勝結聚涎飲發為瘡

一疾

人參

五錢

茯苓

白朮

各一兩

半夏

陳皮

草果

人參

大棗

生姜

各一兩

烏梅

半兩

右剉用鹽水拌勺掩一時以皮紙裹之灰火煨令香熟取出焙乾分作十貼以白水煎服

二十四味斷瘧飲

治久瘧

恒山

酒炒

草果

枳榔

枳殼

陳皮

青皮

川芎

白芷

柴胡

黃芩

荆芥

白朮

人參

紫蘇

蒼朮

桂皮

半夏

良姜

茯苓

知母

酒炒

甘草

乾葛

烏梅

杏仁

各等分

○水二鐘

姜三片

棗一枚

煎七分

食前服

粗再煎

發日早服為佳

忌猪羊鷄半月

鬼哭丹

治諸般瘧疾

荳豆

一兩

信石

明者四錢



石研極細以蒸餅為丸如棗豆大每服三丸以臨發日早五更
以新汲水朝東送忌油麪生冷葷腥

鱗甲烏梅丸

治久瘡不愈者

鱗甲一片醋炙酥

川恒山二兩葛屑炒褐色

烏梅肉五錢

人參七錢

知母酒炒

貝母

枳榔各一兩半青皮去粗

陳皮去白各一兩

草果仁八錢

右為細末酒糊丸如梧桐子大每服七十丸酒下或滾湯亦可

浸酒丸治久瘡服諸藥不効者

浸酒丸

治久瘡服諸藥不効者

常山炒

蒼术浸炒各一兩

草果

青皮

陳皮

貝母

甘草各五錢

鱗甲一片炙

烏梅炭四錢

久瘡加人參

正錢

右剉製用老酒半盞入瓶中浸藥每早食前服一二盞

忌過怒勞佚冷食

病瘡飲

專治久瘡無汗。寒熱潮熱及小兒癩瘡。

地骨皮

川常山炒

桂皮

鱉甲炒

麻黃

當歸

白芍藥

龍膽草

人參

知母炒

貝母

茯苓各等分

水一罐半

姜三片

棗一枚

煎服

○或問瘡症

或問子曰瘡者脾寒也。多起於傷食。子答之曰非也。蓋瘡發於秋後者最多。然四時俱有飲食。何獨秋後而傷食者多耶。大抵夏傷於暑。秋感於溫。遇寒食而衝動。安得獨謂傷食乎。

○痢論

痢因有積。夏傷於暑。秋飲水而發本溫熱之所成也。故溫熱先傷。

於氣分者下痢則白痛墜數至圊而不去名曰氣痢溫熱先傷於血分者下痢則赤痛而急迫裡急後重名曰血痢受病既久氣血俱傷故纏墜而赤白兼下脾胃氣陷或經年曰故名曰休息痢治法熱赤者清之當以芩連芍藥大黃朴硝通利之次則去硝黃川歸枳殼甘草清解之痛而身熱者以柴胡索川芎活散之冷白氣痢者溫之以乾姜換卿枳殼木香寬利之次則澤瀉炒梔子活石茯苓車前木通利水之其或長夏多兩人受濕病故痛而腰重便難脚如沙墜蓋風復能勝濕以蒼朮恙活防已祛散之久痢腸胃氣陷虛墜者以升麻川芎等升提之脾腎氣虛以參芪歸木補之久下痢脉沉細者其繁大者凶治法通利之後腹內口清二便流利以百中散善臢湯固澁之此治痢之大法也

○主方

川連

茯苓

枳殼炒各一錢

甘草

澤鴻

木香絲五分

白芍
飛炒一錢五分

青皮

枳榔各七分

水三鍾姜三片煎服

初感積滯溫熱正熾下之以大黃朴硝各一錢

血痢加黃芩

炒川芎

川歸六分

○肚痛加澤蘭葉延胡索各八分

○赤

白薑下加川芎桃仁骨石炒川歸尾陳皮乾姜炒各五分

○白

向久者胃虛加白朮黃耆茯苓各一錢

去枳榔枳殼黃連一錢

○赤

痢久弱下後未愈去芩連加川歸白芍藥炒白朮熟地川芎阿

膠珠各一錢

○溫勝小水少加木通澤瀉茯苓炒山梔五分下

○痢久滑泄腹中已清二便流利加罌粟殼阿膠

後二便流利惟後重不去者此氣陷於下也以升麻川芎提之

香連丸

治痢下赤白膿血相雜裏急後重

川連四兩剉碎

吳茱萸三刃同川連水拌勻令氣透二个

待然後以銅鍋炒川連紫色去茱萸

木香一两

右二味為細末以醋糊丸如梧桐子大每服二十五丸清米湯送下或香薷湯亦好務在五更空腹服効○肚疼甚者加乳香沒藥各五钱

百中散

瞿麥殼三兩以水浸少煖撈起去筋膜却用好白蜜拌炒

黃色

川厚朴去粗皮切碎以姜汁拌勻炒令香透然後秤

三兩同瞿麥殼為細末每服一茶匙或一茶匙以米湯少加蜜調下

真人養臟湯 治痢冷熱不調下痢赤白或如膿血後重疼痛
酒毒脾泄

人參

白术

白芍藥炒

當歸

肉豆蔻

煨去油

太香

詞子煨

甘草

嬰粟殼

蜜炙

桂

半分

水

二鍾姜

三片煎

溫服

臟寒

加附子一錢

椿樹皮丸

治諸血痢

以椿樹年遠皮厚者取來以長流水中漂二日如無大皮樹
小樹根上皮亦如前水中漂四日擣起日乾研為末打糊為
丸如梧桐子大每服七十丸清米湯食前送下

木香枳榔丸

治痢疾數至圊而不去繙墜刮痛名曰氣痢丸

痢先服三服去其積滯然後治痢方出氣門

人參敗毒散

方出傷寒門加倉米一撮名倉廩湯治傷寒下

痢熱毒衝心嘔惡身熱脉大禁口等症

○咳嗽

乾出天氣其卦屬金人肺屬之故居人身之上以應於天坤出地
氣其卦屬土人胃屬之以應於地天有風雨晦明人有清濁痰氣
其咳嗽二者備矣此二者從胃而出一有所傷則清氣必陷而濁
氣必升使榮衛流布正氣不足肺主身之皮毛外邪侵之肺氣不
收故為之咳嗽按本巫云咳嗽有二誰作一也咳者有疾无声本
傷乎血嗽者有声無疾本動乎氣声疾俱發氣血俱傷為之咳嗽
清晨本曰痰火午後皆曰陰虛夜間或有食積餘例以春風夏暑
秋溫冬寒各以正治毋執一途又當隨其部巫相應浮緊虛寒沉
數实熱洪滑則多痰皆曰外感以上宜祛邪降火參蘇飲清肺飲
陷胸湯慎勿行補庶不延綿其弦濶少血肺氣散而不收當以人
參五味飲肺紫苑湯忌用耗氣之藥腐氣口吐濁涎脉敗有力名
曰肺癰當以桔梗湯辟七燥咳胸中隱七而厥脉弱無力名曰肺

宜用薏苡仁散大抵肺癰當涼其血肺渴宜養其氣凡此數條
實為治嗽之要法也

主方

杏仁

去皮尖

甘草

桑白皮炙

半夏炒各等分

茯苓

一錢

桔梗

枳殼各八分炒

○水二鐘

姜三片煎

傷風致咳鼻流清涕加防風

羌活薄荷荆芥紫蘇各等分

肺受

火邪痰壅上熱口乾加黃芩

一錢

貢連七分

痰結吐難出加瓜

萎七分

○肺受溫痰身重加蒼朮

防己山梔

炒各五分寒喘痰

嗽加麻黃七分惡寒多汗加桂枝

防風

○傷風積熱鼻塞聲重

身熱頭疼加川芎前胡柴胡羌活各

一錢

○風痰加南星竹瀝

半盞姜汁少許痰氣咳嗽加蘇子貝母各

一錢

○日晡咳者火

勝於肺加五味子七粒

知母炒

一錢

五倍子七分

○火嗽氣虛

半盞

姜汁少許

痰氣咳嗽加蘇子貝母各

一錢

○日晡咳者火

勝於肺加五味子七粒

知母炒

一錢

五倍子七分

○火嗽氣虛

血少加人參黃耆當歸身欬冬花紫苑○午後陰虛咳嗽者宜
加知母川柏俱蜜水煎四分

川歸 生地竹瀝姜汁

天門冬

貝母各等分

嗽若有血宜加清氣涼血之劑

參蘇飲

方出傷寒門

專治男婦肺受風熱咳嗽胸膈閉悶等症

陷胸湯

方出傷寒門

專治鬱熱咳嗽痰吐不出

人參五味子飲

專治虛弱潮熱咳嗽紅痰

人參

五味子十粒

桑白皮蜜水炒

白朮 黃耆

白茯苓

地骨皮

熟地黃

柴胡

當歸身 前胡

陳皮炮

甘草

枳殼炒

桔梗各等分

水二鐘姜三片前服煩渴加烏梅半箇有熱加青蒿知母各七
薏苡仁散 治肺痰咳嗽

黃芩仁

百部

黃氏
煮湯

麥門冬

五味子
十粒

川歸身

白芍藥

黃芩
薄酒炒

人參

桑白皮
各等分

水二鐘姜三片煎服

紫苑湯

治久嗽

紫苑

粟殼
蜜炒

甘草

知母
炒

人參

紫蘇

橘紅

半夏

薄荷

烏梅
一個去核

杏仁
炒

五味子
十粒

右各等分水二鐘姜三片煎服

桔梗湯

治肺癰咳嗽膿血

桔梗

貝母

當歸

瓜萎仁

防風

甘草

百合

枳殼

薏苡仁

荳蔻

桑

水二鐘姜二片煎服

口乾燥熱加黃

太極先生王闢散

治久年咳嗽風

枯礬

官桂各一錢半

款花

洗二錢半

甘草一錢二分

桑白

右為細末每服三五分使患者睡冷
咳嗽數聲其藥累驗

上清丸

治上焦肺熱咳嗽方出火門

烟筒葉舜用方

治遠年近日咳嗽冷嗽寒喘並効

款花

五分

艾草二錢

爪姜仁

雄黃各一錢

木鼈子

三个

○右為細末以紙裹四五寸長裝藥入內燒烟徐

徐吸入喉內

提金散

治久嗽不已經驗方

鳴尾粟殼

二兩水潤去筋膜

烏梅洗去核取肉七個

甘草

陳皮各四錢

好蘇州酒可二兩



右件晒乾為細末蜜丸如雞子大每服卧時含一丸化為度

泄瀉附霍亂

泄瀉者該云走腹也大腸為傳送之官脾胃為水穀之海或為飲食所傷或為暑溫所感脾胃停滯以致閼塞清濁不分故為之瀉瀉傷於暑溫者脉弦而數煩渴下必帶沫或如曉中瀉水作聲傷於寒溫者痛而急迫其脉紫細沉滑下必青黑傷於食者下必臭類抱壞雞子或喰氣作酸及年高脾腎氣虛清晨瀉胸中多痰亦能致瀉子觀東垣治瀉每行風藥多獲其效訣云溫多成丘世正所謂風能勝溫也治療之法暑溫者以薷苓湯寒

湯蔻附丸食者感應丸痰者倍木

二東

四神丸七

中一窟之水用

若今人湯藥治脾虛泄瀉也其

所傷霍亂吐瀉轉筋之症宜用六和正氣等
以參苓白朮散調理最得其宜余嘗治瀉每行升摩序
効者多矣

主方

白朮
茯苓
陳皮
甘草
澤瀉
車前子
各等分

水二鐘姜三片煎服○水溫瀉加蒼朮○傷食停飲加麥芽神
曲砂仁小水赤少加猪苓木通如梔子○口乾加干葛麥門冬
酒積腸中溫熱暴下加黃連芩朮○黃疸加茵陳炒梔子木通
冷瀉作疼加木香砂仁山楂如乾姜○胃氣下陷加人參黃芩
升麻川芎○勝溫加防風白芷羌活○夏月加香薷厚朴○又

下滑泄不禁加肉豆蔻去油石脂
煨木香○清晨溏瀉加破故紙炒茴香炒肉豆蔻霜各等分

胃苓湯

專治男婦暑溫停飲泄瀉不服水土等症

茯苓

白朮

陳皮炮

甘草減半

厚朴裂

蒼朮

猪苓

澤瀉各等分

○水二鐘

姜三片煎服

倍朮二陳湯

治溫痰流注泄瀉

半夏

白朮倍用

陳皮

甘草減半

茯苓各等分

水

二鐘姜三片煎服

薷苓湯

專治暑月泄瀉欲成痢疾

黃連

厚朴各用姜汁炒

扁豆炒

香薷

猪苓

澤瀉

白朮

茯苓各等分

水二鐘

姜三片煎服

參芩白朮散

專治老人小兒脾胃虛弱久瀉少進飲食

人參減半

白术

茯苓

甘草減半

蓮子

薏苡仁

砂仁

扁豆炒

桔梗炒

山藥各等分

右為末每眼二錢

棗仁湯調下

固腸斷下丸

治虛寒久瀉活泄

肉豆蔻霜

白术炒

荳子煨

白龍骨煨

川歸身

各一兩

粟殼炒

乾姜煨各五錢

木香三錢煨

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十或七十丸清米飲送下

一方加香附一兩

治腎虛滑泄不禁去木香粟殼

四神丸

治脾腎氣虛清晨溏瀉

肉豆蔻二兩煨

茴香一兩

破故紙四兩炒

木香五錢

不見火

右為末生姜煮裹肉為丸如梧桐子大每服六七十丸米湯下

止驚散

治霍亂吐瀉方 出傷寒門

來復丹

治正氣不足暑溫霍亂吐瀉

硝石

流黃各五錢先器內用柳枝搥慢火炒如法

五靈脂

青皮

陳皮各五錢

玄精石三錢

右各研和勻醋糊為丸如豆大每服三十丸不拘時用清米湯或淡姜湯送下

六和湯

治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉暑天瀉利寒熱交作小便赤澁方見火門

寇附丸

治元氣不足臟寒泄瀉

肉豆蔻

四兩蜜煨不香不見火二兩

乾姜

附子一兩

白茯苓四分

右爲細末姜汁糊爲丸如梧桐子大每服五六十丸食前蓮子

感應丸

丁香 木香 不見火各二兩半

百草霜

巴豆 七至八個

以鐵吉油取霜

杏仁

一百四十個去皮尖

肉豆蔻二十

箇麵包煨去油取霜

乾姜炮一兩

右除巴豆杏仁百草霜二味餘四味搗如細末與前三味同研極細入後蠟

黃蠟二兩許

將蠟熔作汁以重綿濾去渣入酒半升於銀

器或銀鍊內煮蠟熔數沸其蠟自浮然後拌和前藥末作丸量人大小虛實用之腫脹

腫者風溫火營之所成也古方有十水之分本溫熱之所致故溫熟者如水之行地无所不至願士提防之而無妄溢之患矣人身

以脾為主以腎為根亦人身之水土也脾土旺則善食而食於腹
肉腎水強而動作不衰倦或因飲食所傷或因七情六欲所感使
熱溫積於中焦故腫滿之患作矣今人不分陰陽虛實牽手使行
利藥蓋腫種不同難以一槩而論故陽水為病者在上風溫之所
成陰水為病在下寒溫之所致所以面風足水也治法風從汗散
水向便通正謂上下分消其濕也故腫有虛實藥有王霸且如南
人北人不服水土而腫者宜用胃苓湯或因飲食所傷而腫者宜
以消導散或因氣鬱溫熱而腫者宜用清熱分氣飲或腹遇仙丹
木香枳榔丸或因瘡洗逼毒歸內而腫者當消風敗毒散此數條
為有餘之症治法當發汗利二便或因火濕利後而腫者宜以白
朮散或因瘍後久瘡服藥過度而腫者宜用四苓五皮飲或因產
後敗血而腫未宜以分氣補心湯已上皆為不足之症宜分氣養

脾七實自能攝養腎水其腫自消今人治腫者每行利藥腫消氣下乃云得鴻之力殊不知脾胃愈鴻愈虛古云氣虛中滿利之雖腫氣漸下隨消隨起病人心燥易警夜醫暑須求速効仍行利藥腫不消矣所以臍突背平唇黑雖有扁鵲不能瘳也噫醫殺之也

○主方

五加皮

大腹皮

枳殼

青皮

茯苓

防已

各等分

木香少許

水二鐘姜三片煎服

○小便不通加赤芍通利

心車前子琥珀末○上部三陽有手足腫風溫宜汗加麻黃附

芥蕊白○足部三陰腰腹宜下加黑豆根甘草麥芽花○溫中

伏熱加炒梔子制蒼朮○蓋腫脹朝寬暮急血虛宜用四物中

行溫利氣寬急氣虛加入參白朮蒼朮陳皮宣淡口靜心

斷厚味

本香枳榔丸 方出氣門

專治氣腫滿脹

調腹遇仙丹

專治停積腹脇脹滿水腫氣滯等症

黑豆

二兩 茵陳

七錢

枳榔

義木

萊頭子

炒各一兩

青皮

五錢

皂角

木香

各三錢

湯送下

分氣補心湯

專治病後心氣鬱結四肢浮腫上氣喘急

大腹皮

青皮

木通

川芎

白芍

桔梗

白朮

木香

香附子

甘草

減半

細辛

前胡

等分

水一鐘

姜三片

棗一枚

煎服

四苓五皮湯

治病後虛腫不服水上者

茯苓皮

五加皮

大腹皮

地骨皮

桑白皮

生姜皮

生姜皮

白木

澤鴻

猪苓

蒼木製

木通

青皮各等分

水二鐘

灯心草十四枝煎服。

如氣脹加木香磨之。

不貪飲

食加砂仁麥芽○

心下滿悶加柏榔青皮

敗毒散

治瘡洗過

毒歸內而腫

荆芥

防風

連翹

金銀花

枳殼

升麻

羌活

川獨活

桔梗

乾葛

薄荷

山梔

木通

黃芩

川芎

甘草各等分

○水二鐘

姜二片煎服。

上腫則

加葱三個

下腫則加

火心一擇

沉香琥珀丸

治水腫一切急難症

小便不通者

琥珀

杏仁去皮尖

蘇子

赤茯苓

澤鴻各半兩

蓆簾灰

郁李仁去皮

沉香各一兩半

陳皮去白

防已各七錢半

右為木煉蜜丸如梧桐子大以麝香為衣每服二十丸加至五十丸空心以雞子炒煎湯或火心湯送下如人虛用人參湯最妙量虛實加減

○虛損

虛損者形精不足或勞役傷寒或久瘧產難病後不能衛生逆於陰陽施於過度遂成五勞六極之病悉以致目視無光腦枯髓減精神困憊盜汗自汗男子則遺精白濁女子則崩漏帶下陽火愈剛陰血消爍所以潮熱伴來失血咳嗽等症作矣古方雖有補形溫氣之殊今人不分峻治之道經云形不足溫之以氣精不足補之以味故溫之以氣脉沉無力躄冷沉吟以附子鹿耳諸香燥熱為君姜桂辛溫為佐此為峻治霸道也脉微氣短以參耆朮木甘草為君甘辛酸苦為佐此為溫氣王道也形弱血虛腰

膝無力。脉濇而微，則當補之。以味以鹿角膠肉桂。容甘溫為君。牛膝杜仲黃精耳。苦為佐。此為峻治霸道也。潮熱往來，脉弦而爲以地黃山歸門。冬五味耳。辛為君。弓木知母黃柏。辛苦為佐。此為治正道也。其間形削氣多跌。腫瘡泄血紅。猝喘古今為不治之病也。今人不察。血虛氣盛之山妄施燥熱之劑。殊不知寒極傷氣。熱極傷形。結成癥後之憂。因察目前之劫。良可悲哉。

○氣血汗熱分治

余觀病後氣血兩虛，遂成勞怯。潮熱往來，盜汗自汗，或無汗燥熱。世俗便以紫胡地骨皮，往往不効。其病愈劇。故男子血虛有汗潮熱者，以人參養榮湯。氣虛有汗潮熱者，以補中益氣湯。血虛無汗潮熱者，以扶苓補心湯。氣虛無汗潮熱者，以人參清肌散。女子血虛有汗潮熱者，以八物湯。氣虛無汗潮熱者，以人參紫胡散。血虛

無汗潮熱者以茯苓補心湯氣血兩虛無汗朝熱者以消遺散其
咳嗽咯血以人參五味子散骨蒸者以五蒸湯清骨散已上皆治
勞熱之聖藥也

人參養榮湯

治男子歸人血虛短氣發弱有汗潮熱等症

人參

白朮

茯苓

甘草

川歸

黃芪

肉桂

陳皮

白芍藥

桂枝

遠志

去心

五味子

熟地黃

各等分

水二鐘姜三片前服

補中益氣湯方出附胃門

治內傷氣虛潮熱

人參柴胡散

治男子婦人氣虛無汗潮熱

白朮

葛根

半夏

柴胡

白朮

人参

赤芍藥

當歸

葛根

減半

水二鐘

姜三片

棗一枚

右各等分

水二鐘

姜三片

棗一枚

煎服



茯苓補心湯

治男婦血虛面白無顏色無汗咳嗽潮熱等症

人參 茯苓

陳皮 桔梗

枳殼 前胡 川芎

地黃

川歸

芍藥

甘草 減半

半夏

紫蘇

乾菖各等分

水二鐘

姜三片棗一枚

煎服

八物湯

治男婦血少氣虛煩熱多汗等症

人參

白朮

茯苓

甘草 炙微半

川歸身

熟地黃

白芍藥

川芎各等分

一方有砂仁

○水二鐘姜三片棗一枚煎服

逍遙散

方出扁人門

治婦人氣血兩虛無汗潮熱

五蒸湯

治男婦諸虛煩熱

姜等分

炙甘草

減半

人參 黃芩 知母

地黃 粉葛 石膏

粳米

麥門冬去心各等分

○水二鐘小麥一撮煎服

汗骨散

治男婦骨蒸勞熱此藥最能劫熱

生地黃

人參

防風

熟地黃

銀柴胡

薄荷

秦艽

赤茯苓

胡黃連各等分

水二鐘姜三片煎服

知母散

治男婦心肺虛熱煩燥有汗陰虛蒸發

甘草

黃芪蜜炙

白芍藥炒

黃芩

白茯苓

麥門冬

去心

生地黃

人參

桔梗

知母

淡竹葉各等分

水二鐘姜一片小麥一撮煎服

六味地黃丸

治腎氣虛久新憔悴寢汗潮熱五臟傷損瘦弱

虛煩蒸發下血

乾山藥

山茱萸去核各一兩二錢

熟地黃

三兩

澤鴻

牡丹皮

白茯苓各八錢



右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七十丸清米湯空心送下

安神丸

治病後血少邪熱未盡不睡心神不安

川歸身

炙甘草 生地黃各一錢五分

大砂砂

黃連

各三錢

右為細末蒸餅為丸如粟米大每服三十丸食後服

寶鑑云凡人無病服補藥如壁間安柱予辨之曰非柱地乃牕也
牕間安柱壁則俞復壁間安牕壁穿壞也古人年四旬以上方可
服固本補腎等藥今人未至三十遂用芙蓉肉桂附子鹿茸漆精
補髓興陽之劑况少年慾心正熾不能保養者多人身運動莫過
血氣血氣壯則淫慾動淫慾動則氣血虛氣血虛則形神憔悴矣
今人服藥欲求其生如此反取其死古云補腎莫若補脾此之謂
也吾嘗治內傷虛弱每以六味地黃丸兼柴胡丸坎離丸其者逐元

腰隨年增減此四方不熱不寒治虛弱活變无穷矣

還元丹

專治男子肝腎氣虛腰膝无力目眩耳鳴形體憔

悴溏濁等症

牛膝炒

杜仲炒去絲遠志去心各一双五味子補骨脂炒

山藥各二兩

五味子

瑣陽酥炙

枸杞子炒

茯神

去木

山茱萸去核

巴戟去心各一兩

菖蒲五錢

熟地黃三兩蒸搗為膏

右為細末煉蜜為丸同入地黃膏丸如梧桐子大每服七十九早晨秋石湯或棗湯淡鹽湯送下亦可

滋補養榮丸

專治男婦氣血兩虛精神短少脾胃不足此

藥大壯補氣養血

遠志去心

白芍藥酒炒

黃耆

白朮各一兩半

人參

熟地黃

五味子

川歸身酒洗

山藥

各一兩

生地黃

五分

陳皮

八分洗

茯苓

一兩

山茱萸

去核四分

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸清米湯送下
如咳嗽保肺宜加大門冬知母貝母炒熟花茶旋丸○如遺精

加左骨各四分

吹離丸

治上盛下虛陰虛火動此藥與前還元丹早晚間

服最能滋陰降火

知母二兩薄酒炒褐色

川柏二兩蜜炙

右為細末以山藥末打糊為丸如梧桐子大辰砂五錢為衣
每服五十丸臨卧蓮子湯送下○若陰虛火動以生地黃二
兩蒸膏搗爛為丸

節齋補陰丸

黃柏

知母各酒炒

敗龜板

酥炙透各三兩

熟地黃

五兩蒸忌鐵

瑣陽酥炙乾

枸杞子

五味子各一兩

白芍藥炒

天門冬各二兩

乾姜三錢

右為末煉蜜入猪龍三條和藥搗極勻如梧桐子大每服

七十九鹽湯下

王屏風散

治腠理不密易感風寒盜汗自汗等症

防風

黃耆炙

白朮各半分

水二鐘姜三片食後服或為末沸湯調多服取効

保肺丸

人參

具母

知母各酒炒

紫苑

杏仁去皮尖微炒

款冬花

天門冬

去心各五錢

桑白皮

各五錢

甘草二錢

黃芩

五錢

五味子四錢

川歸身五錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九食後清米飲下

○或問遺精白濁淋瀝遺尿辨

或問遺精白濁淋瀝遺尿四者何由而作也予答之曰心藏神
腎藏精心腎者精神之根蒂也允男子思慮過度則水火不交
快情恣慾而精元失守尿前尿後凝而澄下故名曰白濁蓋人
胞脉絡而貫於心賊火一動則盜出精濁所以心動者神疲神
遊者精散因晝之所思故有夜之所夢也今人每用牡蠣螵蛸
菟絲澁精等藥隨止隨發惟知固腎不知治心殊不知神不歸
舍而精元无主安能自守哉心血既虧相火必旺所以中焦溫
熱淫氣不清溢上則為之痰涎滲下則為之白濁其疾多因濕
熱有甚譬如井中取水至清一烹之為白湯則澄之有脚豈非
濕熱渾濁者乎故土燥水濁土堅水清治法宜抑火養心安脾

腎則水火相交其流自清矣且淋有五自屬虛實七者清利水虛者滋陰養竅不利自安瀝者滴瀝之謂或尿血至中痛不可忍內以養陰外以炒鹽煎湯洗之病自安矣曰尿前行房過則淋尿后行房過則遺故有遺尿之患腎氣獨降當以升提縮泉絕慾方能拔去病根否則為終身滴瀝之患矣

養心湯

治用心過度心熱遺精恍惚多夢或驚而不寐

人參

山藥

麥門冬

去心

茯神

去木

酸棗仁

川歸身

酒洗

鷄頭實

白芍藥

石蓮

遠志

去心

子芩

酒洗如久遺者去之

蓮花鬚各半分

如遺久氣陷加

川芎升麻

○氣虛加黃芪白朮

○血虛加川

歸身淮熟地黃○水二鍾姜三片來一枚煎服

小火分清飲

治遺精白濁

茯苓

芡實

土石蓮

益智炒

草薢

山藥各等分

甘草減半

尿色赤加麥門冬澤鴻黃芩。小便頻數多加烏藥石菖蒲。

清心蓮子飲

專治心熱夢遺赤濁虛熱淋

人參

石蓮子

麥門冬去心

車前子

黃芪

耳草

白茯苓

黃芩

地骨皮各等分

水鍾半姜二片煎服

玉闕丸

治男子諸虛思慮過度心神不安不寐多驚遺精

白濁累用經驗

人參

六錢

酸棗仁去核

牡蛎

煅

五倍子

枯礬二

龍骨

各五錢

茯神去木一錢

遠志去心一錢

朱半

右為末蒸熟肉為丸如梧桐子大每服五六十九麥門冬湯或蓮子湯食前送下

琥珀散

治熱淋尿黃頻數血淋

真琥珀

三錢

滑石

二升

粉草末

一錢五分

海金沙

五錢

○右為末每服二錢
灯心湯送下

八正散

專治赤濁熱淋

滑石

木通

車前子

甘草稍

大黃酒則去之

瞿麥

山梔

扁蓄各等分

水二錢姜三片灯心二十枝煎服

縮泉丸

治遺尿失禁

智益去皮加炒

烏藥

各四兩

右為末以山藥末六兩打糊為丸如梧桐子大每服七十丸
空心清米飲送下○如房勞所傷加破故紙四兩炒

神芎湯

治遺尿督氣下陷至門不閉不時漏精此藥外提

腎水歸源曾驗

升麻 川芎 人參 柏杞子

甘草炙

遠志去心

各半錢

水煎服

白朮

黃芪 川歸身 地骨皮 破故紙炒

桂仲炒

白朮

蓮入蓮花煎亦可

經驗方

治血淋

楊柳頭

七個

慈竹心

七個

厥草根

三錢

茆根

一束

苦蕡菜根

淡竹葉根

各一撮

二鍾灯心

三十根煎服

陰陽養壽丹

補陰血養陽氣壯筋骨久服延年紫河車二

具

紫河車一名混沌皮即胞衣本草古方不分男女今

世俗女病用男匕病用女胎但取初產者為佳其次壯力

婦人之胎取之亦有道理洗净布絞乾蒸熟搗爛為糊加入後項藥末同搗為丸

人參

川歸身酒洗

杜仲炒

黃耆

白朮各二兩

炙甘草

五錢

淮牛膝

兩仙蠅

右為細末同紫河車搗千餘下為丸如梧桐子大每服六七十丸早晨清米湯或酒送下如水火偏勝加知母川柏硝一有虛熱加生地黃一兩

吾父杏林翁常云凡虛損中諸症務要得紫河車取效甚速入血藥中則補血入氣藥中則養氣去熱藥中則退熱又治顛癇健忘怔忡失志之患及恍惚驚怖入心神不守多言不定此藥大能安心養血定神又治骨蒸傳屍數種虛勞邪熱滋陰補陽乃養壽之聖也予用此藥累驗故併錄于後

○論補陰丸用敗龜板

先賢用敗龜板補陰最得其理蓋因龜能養陰故人用之論曰
鵝以养陽氣而升於上龜能养陰氣而運於下龜壞得板氣性
存焉故借其性氣導引諸藥達其本源用者驗矣今人每以黃
龜卦板用之尤益蓋卦板皆鄉人生採煮爛取肉食之板以貨
人煮過氣脫性何存焉入藥用之故少効也嘗考敗龜板出靈
山諸谷因風墜自敗者最佳其池中田中礎中伏氣自敗者次
之家养老金井溝中打壞者又次之按古人用藥或有用其氣味
者或有用其性氣者因其所施故不同焉例如諸香羌活細辛
皂角之類用其氣也大黃七味甘草熟黃之類用其味也虎澤
龜板之類用其性也蜈蚣蛇蝎班貓之類用其毒也今後板
修合擇用得宜不然則悞人也

○論虎潛丸

古人立虎潛丸方中用虎胫骨一味其理幽雅蓋虎者陰也虎嘯則風生風者陽也以其骨能追風定痛此陰出陽藏之義也况虎一身筋節力氣皆出于足胫中以其性氣藏焉故人取此用之所以名曰虎潛今人用別骨者非虎潛之義也幸者鑒之煎鹿角霜丸 養心暖下元滻精補腎

鹿角一付水浸三五日刮去塵垢繖皮剉作三十長入藥器內以牛乳浸一宿如乳少再添但浸角上為度密用油紙封固然後鍋內用麥三五升或一斗填於四畔留瓶口不住火蒸一晝夜水耗旋添熱湯頻看角骨爛如麵即住火取出用篩漉乾乃焙每料用角研六兩

山藥 茯苓

山茱萸

去核各

兩

附子

一兩煨



右為細末蒸棗肉和丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽酒

送下

威喜丸 治白濁

黃蠟

白茯苓各四兩切塊以茯苓同入銚器煮至十全

沸取出酒煎

右研茯苓為細末用蠟搜勺為丸如彈子大空心細嚼一丸
蒲口生津徐七嚥下以小便清為度仍忌荅蟬

白龍骨

五倍子

妙

赤石脂

牡砺

穀

餘糧石

各等分

右為末水糊為丸如梧桐子大每服三十丸米湯下

○治遺精得法論

予嘗治一男子因病後用心過度遂成夢遺之患多痰瘦削
醫以清心蓮子飲久服無效延余診脉緊濶知冷藥利水之劑

太過致使腎冷精遺而腎氣獨降服此病愈則矣子以示提之
法升坎水而洛於離火降肺氣而養血滋陰久利便自瘳
填補精血不逾月其患瘳矣予思夢遺有三難作一途而治有
因用心精熟而世者有因多服門冬茯苓車前子知母黃柏冷
利之劑而流泄者有心遺玉門不閉腎氣獨降而泄者治療之
法積熟者當清心降火冷利者溫補下元腎氣獨降者當以升
提腎水使水火自交而坎離定位矣李者可以知乎

滋陰降火湯論

近來小男童女多患方寒或失血咳嗽或寒潮熱世俗治療
盡以參耆麻杏桑白皮熱以紫胡薄荷火以大
連梔子麥用半夏南星少食砂仁麥蘖失血扁柏榆如此皆
治其標而不治其本也此等之症皆勞心失血之所致醫者堅

可以參耆桂附補陽火而耗其陰也陰虛火旺以枳殼杏仁桑白皮而瀉其肺又損至高之氣也陰血既盛氣盛似火此乃內傷無犯之規其間安用芩蓮梔子及本病朝熱以柴胡薄荷而作有邪之熱豈不訛矣脾陰既虧寒火必盛安可以半夏陳皮勝溫南星之劑而治耶火旺不食焉可以香砂麥芽而治其火思慮煩傷經絡失血停胸亦非扁柏棕灰所可治也古云因火成疾者十有八九不因火動致疾者百無二三故陽火虛物之陰虛內熱火空則發故曰虛火有形之物也精血津液漏而不實故曰真陰所以陰常不足陽常有餘故補陰一說自此至壯由壯至老不可缺焉予每用一方名曰滋陰降火湯又附加減法并參出抑火有三難一治有濕有滯有滋火如此三則近道矣太運施子者瀉火之藥瀉其有餘知母黃柏

之藥也。補其不足，大麥二門冬，生熟二地黃，茯神川芎，助陰血滋陰。入藥也，川芎芍藥，推陳致新，乃行血之藥也。非甘草白术，難以約脾。非陳皮青皮，無以嚮導。以遠志酸棗仁，以收卷其心。用柴胡芍藥而伐其木。如瓜萎具母而消此痰。用阿膠五味而安此數。用石蓮子實治此痰，遺以秦艽養血而退此熱。惟歸根萬汁而能止此血。此數味滋陰降火之聖藥也。曰滋其陰，久自除其血。其病自除。其言信矣。其間果是氣虛血少，當入參耆。此方惟寒溫痰氣禁用。餘者，但能靜心淡口，使內外之大不起服之無不獲效良可知矣。

沙参芩火湯

川芎身肉洗

地黃京血用生補血用熟

天門冬

白芍藥薄荷炒

白朮各一錢

蜜酒安心

炙甘草

卷之三

陳皮
各五分

葛根加瓜萎貝母各六分○咳嗽加五味子阿膠各七分
遺加元寶土石蓮各七分○有熱加秦艽一錢地骨皮
咯血加茜根茜花玄參各一錢○氣虛血少加大參

分