

五味黃昏嗽多者火氣浮於肺不宜用涼劑五味五
倍歛而降之早晨嗽多者胃中有食積至此時火氣
流入肺中宜知母地骨降之有濕痰嗽者嗽動便有
痰聲痰出嗽止是也治法用二陳湯加南星貝母竹
瀝海石海粉青黛瓜蒌仁痰因火動逆上作嗽者先
治火宜芩連梔栝後治痰用前藥通用清氣化痰丸
有陰虛嗽者其氣自下而上多重於夜分是也治宜
四物合二陳順而下之加炒梔栝尤佳有勞嗽者盜

汗出兼痰多作寒熱乾嗽聲啞。痰中有血絲紅點是也。治法主補陰清金四物湯。咳而痰中帶紅點者四物加知栢五味人參麥冬桑皮地骨皮陰虛勞嗽通用百部款冬紫苑百合沙參麥冬五味知栢芩芍生地內熱骨蒸加丹皮地骨皮。又有肺脹嗽者動則喘氣急息重是也。肺因火傷遂成鬱遏脹滿。治主收斂用訶子爲君。佐以海粉香附青黛杏仁之類。咳嗽左不得眠者肝脹宜小柴胡加青皮白芍芎歸入嗽藥。

右不得眠者肺脹宜桔梗瓜蒌黃芩甘草少入青皮
白芍以上二証皆難治嗽而脇痛者宜用青皮疏肝
氣有因久嗽成肺癰肺痿者則雲門中府作痛吐咯
膿血臭穢不可近是也治癰用丹溪桔梗湯治痿宜
養血養氣養肺清金用丹溪海藏紫苑散知母茯苓
湯大抵咳嗽有痰居多故治嗽者當以治痰爲先治
痰者宜以順氣爲主故以南星半夏勝其痰而嗽自
愈枳壳橘紅利其氣而痰飲自除凡諸嗽者須分新

久用藥如肺虛受嗽加五味欬冬紫苑兜鈴之類補
之若肺實有火邪者宜桑皮花粉片苓杏仁桔梗枳
壳之類瀉之夏月嗽而發寒熱者謂之熱嗽小柴胡
加石膏知母冬月嗽而發寒熱者謂之寒嗽小青龍
加杏仁凡嗽春是春升之氣夏是火炎於上秋是濕
熱傷肺冬是風寒從外來用藥發散之後必以半夏
等藥逐去其痰庶不再作又有感寒表未解延入久
嗽終必以解表而嗽愈也

一傷風寒咳嗽七日內必大嗽七日後必生清痰痰稠吐出則嗽方愈的係風寒方可用三拗湯加桔梗紫蘇
一產婦傷風咳嗽治宜驅風散邪帶表四物湯如風邪已盡即行大補久久成勞難治
一勞嗽上嗽下瀉用嗽藥嗽止則瀉甚服香連丸則瀉止復嗽肺與大腸為表裏此臟腑俱病不可兼治者死

一久嗽肉脫者用嗽藥多不効補中健脾則嗽止此
虛則補其母以脾主肌肉病有本而標之之意也然
病多不救經曰大肉已脫九候雖調尤死是也
一新嗽易愈久嗽難愈所以難愈者由病邪傳變而
而入痰也

一陰虛火動發而爲痺音啞者不治

一嗽而大便泄者難治

一嗽而發熱不止難治

一肺癰作痛。肺痿不痛。痿甚而癰稍輕也。俱難治。

一傷寒有水結胸嗽者。宜小青龍。小半夏茯苓湯。嗽

脉宜浮滑。忌弦數細澹。

關上脉微爲欬。肺脉微急爲欬而唾血。

脉弦澹而欬爲少血。脉緊者爲肺寒。雙弦者寒。

脉浮而緊者爲虛寒。脉浮而緩者傷風。脉細

者濕。脉數者熱。脉沉數爲實熱。脉弦爲水。

偏弦爲飲。脉沉爲留飲。脉洪滑多痰。小欬脉浮。

直者生。脉浮濡者生。脉堅者死。沉小伏匿者

死。欬而羸瘦脉堅大者死。欬而脫形發熱脉小

堅急者死。暴泄者死。暴瀉者死。暴下者死。暴

凡肌瘦脫形熱不去欬嘔腹脹且瀉脉弦急者皆死

証也。凡利者急。凡瀉者急。凡下者急。凡

凡宜利者急。凡宜瀉者急。凡宜下者急。凡

凡宜利者急。凡宜瀉者急。凡宜下者急。凡

凡宜利者急。凡宜瀉者急。凡宜下者急。凡

咳嗽方

一陳湯

見中風

三拗湯

治風寒嗽亦治水結胸嗽

麻黃

甘草

杏仁

風寒加知母脉浮大有熱

加苓姜的係風寒方可服餘者不可輕用

咳嗽遇冬則發方此寒包熱之症解表熱自除

枳壳

桔梗

一錢

麻黃

防風

甘草

陳皮

去白

蘓葉

木通

黃芩

各五分

如嚴冬加杏仁五分去

黃芩

四物湯 見中風

清氣化痰丸 見痰 治痰嗽

小柴胡湯 見瘟 治肝脹加青皮白芍芎歸入嗽

藥

瓊玉膏 治乾咳嗽

生地 四兩 白茯苓 十三兩 人參 六兩 白蜜 二觔

右四味共熬成膏磁器盛貯空心白湯下數匙

補肺湯

治肺虛咳嗽

人參

黃芪

五味

紫苑

各一兩

熟地

各五錢

圓眼肉

四錢

水煎服

潤肺湯

治嗽而失聲

訶子

五味

五倍

黃芩

甘草

人參清肺散

治痰嗽咽乾聲不出

人參

陳皮

一錢五分

半夏

桔梗

茯苓

桑皮

知母

枳壳

杏仁

黃連

款花

一錢

麥冬

甘草五分 五味十粒 貝母一錢五分 地骨皮五分 姜三片

陰虛勞嗽通為一治。但治法有淺深之不同耳。

桔梗湯 治肺癰咳膿咳血咽乾多渴二便赤澀。

桔梗 貝母 當歸 瓜蒌 枳壳 桑皮

以仁 防已各一兩 甘草節 百合各五錢 黃芪一兩五錢

杏仁五錢

加姜五片大便秘加大黃小便秘加水通

海藏紫苑散 治嗽中有血虛勞肺痿。

人參

茯苓

桔梗

各一錢

貝母

知母

一錢五分

紫苑

阿膠

甘草

五味

十粒

蓮肉

四枚

知母茯苓湯

治咳嗽不已往來潮熱自汗肺痿

茯苓

甘草

兩

人參

薄荷

半夏

柴胡

白朮

欬花

桔梗

麥冬

知母

黃芩

五錢

川芎

二錢

阿膠

一錢

五味

廿粒

加姜三片煎服

小青龍湯

治水結胸乾嘔發熱而嗽

麻黃 防風 半夏二錢 細辛 乾姜 甘草

桂枝一錢五分 五味一錢

溫肺湯 治肺感風寒嗽吐痰

陳皮 半夏 五味 乾姜 桂心 杏仁

細辛 阿膠 炙甘草二分

右加姜三片棗二枚溫服此方冬月寒令之時

觸冒風邪而未鬱熱者極効如久嗽鬱熱者切

不可用

芥子散

治小兒咳嗽

或丸亦可

白芥子

五錢

橘紅

二錢五分

枯苓

青黛

二錢

胆星

酒炙

杏仁

二錢五分

麻黃

一錢

蘓梗

貝母

一錢五分

右末水為丸 硃砂為衣

秘傳三仙丹

治男婦久嗽不止者三服立効

栢枝

槐子

生礬

各等分

右末麩糊為丸 梧子大每服百丸 臨卧温茶下

一云冷茶下

傷風咳嗽驗方

陳皮

前胡

半夏

茯苓

麥冬

桑白皮

甘草

蕪梗

枳壳

杏仁

桔梗

氣急加荀子

久嗽方

用鷄蛋皮紫苑二味為末清晨空心服之

哮喘証 十四

肺爲五臟華蓋。主持諸氣。肺氣受傷。呼吸之息。不得
宣通。則哮喘之病生焉。哮以聲響言。喘以氣息言。喘
促喉中如水鷄聲者。謂之哮。氣促而連續不能以息
者。謂之喘。喘症有虛有實。未有不由痰火內鬱。風寒
外來而致之者。風寒外來而喘者。此外感有餘之症。
脉多浮大。藥宜解表。而喘自除。九味羌活加減。有風
痰上逆作喘者。喘動便有痰聲。脉多浮滑。治先降氣。

氣降則痰自清。二陳加痰藥。有火炎上而喘者。乍進乍退。得食則減。食已復發。此胃中有實火。膈上有稠痰。有餘之喘也。脈洪數疾。二陳加芩連梔子。不可作胃虛妄投。燥熱藥。有陰虛者。自臍上火起。上逆而喘。脈弦數細。四物加梔栝黃芩。有氣上逆而喘者。蘓子降氣湯。有氣虛及病久者。脈軟弱無力。宜補中益氣。六君子湯。或五味子湯。加白朮。或生脈散。加阿膠。有氣實。因服補藥而喘者。三拗湯。有水逆作喘者。脈沉。

潛宜小青龍半夏湯但氣虛發喘者必自汗出陰虛
發喘者疾行則喘甚靜坐則喘息此秘驗也凡人喘
未發時以扶正氣爲主已發則攻邪爲主哮喘專
主於痰實者宜用吐法亦有虛而不可吐者治哮喘必
使薄滋味不可純用寒涼藥必兼散表用青州白朮
子有效
外有短氣不足以息者似喘但有虛有實不可作喘
治虛者六君子加五味麥冬實者痰氣阻礙導痰丸

腎氣不能攝精者補腎丸

金匱要畧云短氣不足

以息者實也此言痰實內經曰言而微終日復言者

此氣奪也是主虛言凡喘病上喘下泄者死上喘

而小便利者死喘病危篤鼻出冷氣者此肺絕也

死汗出如油喘而不休此六陽氣脫也死兩寸

脈下陷者死喘急脈滑而浮者生濇而數者死

脈宜浮遲不宜急疾脈數有熱喘咳吐血上氣不

得卧者死上氣面浮腫肩息脈浮大不治又加利

哮喘方

附短氣

九味羌活湯

見蘊

治外感風寒作喘

二陳湯

見中風

治火喘痰喘

四物湯

見中風

治陰虛發喘

蘇子降氣湯

治氣逆而喘

蘇子

半夏曲

五錢

桂

五分

陳皮

三錢

當歸

前胡

甘草

厚朴

二錢

加姜棗水煎服

六君子湯

見中風

治氣虛而喘

三拗湯

見嗽

治氣實悞補因而發喘

小青龍湯

見嗽

治水逆喘

小半夏湯

治同

半夏

四錢

茯苓

三錢

入姜汁同煎溫服

五味子湯

治肺虛作喘而脉大

五味子

五錢

人參

麥冬

杏仁

去皮

陳皮

去白

生姜 二錢

喘病每年遇寒即發者此為常病不可峻攻須以
疏風解表主之

生脉散

見暑

治久病氣虛作喘

青州白丸子

治哮及濕痰作喘

半夏

七兩

南星

白附子

三兩

川烏

去皮臍
五錢

右為末以絹袋盛之用井花水浸數日擺渣末
出以手揉再擺渣盡為度置磁盆中日晒夜露

春五夏三秋七冬十日夜去水晒乾候如玉餅
研細以占米打清粥為丸菘豆大初服五丸加
至十丸十五丸姜湯送下不拘時服如癱瘓風
濕酒下小兒驚風薄荷湯下三五丸

導痰丸

見中風

治痰阻短氣

補腎丸

治腎虛短氣

磁石

兔絲子

五味子

熟地

枸杞

石斛

楮實子

覆盆子

肉蓯蓉

車前子

二兩

沉香

青益

右為細牙煉蜜為丸梧子大每服七十九空

白湯下

定喘湯

治肺虛感寒氣逆膈熱作哮喘

白菓

二十枚
炒黃

黃芩

杏仁

一錢
五分

桑皮

藕子

半夏

二錢

麻黃

甘草

一錢

款冬

加姜三片水煎服

小兒哮喘方

哮喘

用鷄子一個打破小口入蝸牛二條在內以紙封
口煨熟蝸牛化盡為丸每服十數丸即愈

治哮喘神驗方

天麻

桔梗

防風

半夏

枳壳

各七錢

硃砂

二錢

雄黃

礞石

火煉存性二錢

胆星

一兩

巴豆霜

去油五分

右末清水丸粟米大小兒每用三分大人七分

姜湯下忌諸葷肥膩

方考叔曰膈有膠固之痰外有非時之感內有壅

寒之氣然後令人哮喘。溫之汗之吐之皆良法也。若逡巡調理則虛喘宜之。人苟羸瘦氣弱則宜灸其背腧。

麻黃湯

見傷寒

肺部原有風痰背腧復感寒邪

而成哮喘者此方主之。背腧者背間之腧穴主輸臟腑者也。一受風寒則臟腑爲寒邪所閉不得宣越故作哮喘。麻黃之辛能開腠散寒。杏仁微辛入

肺利氣甘草甘平調中發散

見中風

瓜蒂散

凡病人氣塞不通者以大豆煎

湯調下五分三進而三吐之

附子理中湯脾肺虛寒痰涎壅塞少有動作喘嗽頻

促脈來遲細者此方主之

人參

甘草

炙

附子

炮

乾姜

炒

白朮

炒

錢

此証為虛而脈為寒也虛則宜補參朮甘草所以
補虛寒則宜溫乾姜附子所以溫寒

久喘良方

用青皮一枚劈開入江子一個將綿絮定火上燒
盡烟爲度存性研末生姜汁和酒一大盞服之

久喘者肺有頑痰結氣青皮破氣江子攻痰然其
性悍厲善於走下耳未可以療上部也燒灰存性

則大毒已去所存者幾希爾新燒火性炎上可使
成功於膈佐之以姜汁則頑痰易利行之以酒則
無所不之姜酒既行二物善降火喘之患可愈于

哮喘

哮喘

以○不○之○美○爾○謂○行○二○以○善○利○火○則○之○想○何○愈○下
 如○此○於○亂○卦○之○以○美○長○限○爾○慈○是○保○行○之○以○西○限
 頃○大○義○已○去○退○林○肯○然○命○爾○懷○熱○火○卦○炎○土○何○對
 出○早○爾○善○尔○夫○不○耳○未○何○以○熱○土○滑○止○熱○火○并○卦
 人○端○者○相○有○既○來○詠○餘○青○史○如○疾○五○千○爽○然○然○其
 盡○爾○為○與○并○卦○形○末○至○美○者○味○西○一○大○日○明○之
 用○青○史○一○林○復○開○人○五○千○一○師○能○輸○裝○式○火○生○執

火○端○夏○衣
 不○則○宜○滿○乾○要○附○子○所○以○温○寒

瘧証 十五

瘧者。虐也。寒熱令人難當。故以瘧名。內經曰。瘧之始發也。陽氣并於陰。則陽虛而陰盛。外無氣。故先寒慄也。陰氣逆極。則復出之。陽陽與陰復并之於外。則陰虛而陽實。故先熱而後渴。又曰。衛氣者。晝行於陽。夜行於陰。邪氣得陽而外出。得陰而內薄。內外相搏。是以日作。其間日而作者。邪氣之舍深。內薄於陰。陽氣屬陰。邪內著。陰與陽爭。而不得出。是以間日而作。

也。故先傷於寒，後傷於風，則先寒而後熱，名曰寒瘧。
先傷於風，後傷於寒，則先熱而後寒，名曰溫瘧。其但
熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足
熱而欲嘔，名曰痺瘧。此內經言得瘧之由，臨發之故。
昭然詳悉，然此特指外寒二証言之。後世嗜欲日滋，
故於風寒之外，又有暑瘧、有痰瘧、有熱瘧、有食瘧、有
虛瘧、有濕瘧、有痰瘧、有牝瘧、暑瘧者，脈虛身熱，面垢
背惡寒，多汗，清暑益氣湯。人參香薷飲、天水散、痰

瘧者發時便見痰聲或咳嗽或湧喘三陳湯內獸飲
加黃芩柴胡貝母蘓子等藥熱瘧者熱而不寒頻
渴頻飲煩躁如狂黃連解毒三黃石膏小柴胡去人
參加白虎湯食瘧者見食卽惡中焦鬱悶不舒必
從飲食得來橘半枳朮丸太安丸或大安丸作湯加
人參黃芩柴胡最當虛瘧者倦怠嗜卧不喜食嘔
吐自汗補中益氣倍柴胡調中益氣倍白朮濕瘧
者寒熱身重骨節煩痛腫滿自汗善嘔因汗出復浴

濕舍皮膚。羗活勝濕湯。羗活蒼朮柴胡五苓散。瘰癧者老瘰也。或經數月。或歷數年。或氣血太虛。或痰飲阻隔。或瘰母痞塊。虛者補之。痰者化之。痞塊者鱉甲散加補藥以消之。木牛瘰者寒多不熱。但慄戚振慄病。以時作。此則多感陰濕。陽不能制陰也。河間蒼朮湯漿水散主之。其先寒後熱者。則用加減清脾飲。先熱後寒者。則用柴胡加減姜桂湯。痺瘰者。卽熱瘰也。治亦同法。其前瘰症。有夜發及薄暮發者。此病

在陰分必用血藥漸漸趨到陽分然後愈丹溪云
汗要有汗散邪爲主帶補有汗要無汗扶正氣爲主
帶散瘧渴用生地麥冬花粉牛膝知栢乾葛生甘草
甚則加石膏一錢又曰痧瘧三日一發陰經受病也
其症難愈必先與蒼朮陳皮白芍等劑佐以本經引
用之藥若得汗而體虛必須重補俟汗通身過委中
方是佳兆東垣曰夏月天氣上行秋月天氣下行治
者當順天道如先寒後熱太陽陽明合病白虎湯加

桂此天氣上行宜用之。若天氣下行則不宜瀉肺宜瀉命門相火則可矣。二公之言至理存焉。學者宜詳味之。
委中即脚腠內

要畧曰瘧脉自弦。弦數多熱。弦遲多寒。弦而小緊者下之。差弦遲者宜溫。弦緊者宜發汗。針灸浮大者可吐之。弦數者風發也。以飲食消息止之。脉經云瘧脉自弦。微則爲虛。代散則死。

瘧症附別

瘧症先熱後寒者何也。瘧之寒熱皆由冬月外中風寒邪氣淪於肌膚藏於骨髓。至夏秋暑熱腦髓銷灼。腠理開通邪氣因汗而出。出則陰虛陽盛故大熱也。邪氣復入則陽虛陰實故大寒也。其先寒後熱者何也。邪氣搏於陰中榮氣虛則衛氣入。衛氣入則腠理空踈陽陷陰中故肌肉爲之先寒也。邪正交爭則體戰慄而寒。然邪終不勝正故衛氣挾榮氣邪氣復居腠理陰從陽出。由是混擾而成大熱也。終則三氣各

居其位○俄然汗出○而瘧解矣○卽亢則害○承乃制之義也○其痺瘧但熱而不寒者○原感邪氣藏於皮膚分肉之間○內不入於陰中○陽氣獨發故也○瘧瘧者○榮衛俱病○中氣極虛○故難愈○瘧疾一日一發○二三日一發者○平人衛氣晝行陽二十五度○夜行陰二十五度○受邪輕○則正氣未虛○而行稍緩○日與邪氣會遇○遇卽作矣○受邪甚○則正氣傷○瀆而行遲○二三日始得一會○故間日發也○一發卽汗出○爲中虛○宜補并發○終日尤無汗○

為邪實宜解表

附似瘧數症

虛損勞瘵每日午後惡寒發熱至晚亦得微汗而解者脉必虛濡而數不大弦為辨耳治宜滋陰藥傷寒太陽病八九日如瘧狀陽明病日晡發熱似瘧少陽病往來寒熱似瘧婦人熱入血室其血結寒熱如瘧傷食脚氣皆發寒熱似瘧各隨本經病治不可紊同瘧醫戴氏曰寒熱發作有期者瘧也無期者雜病也

不可不辨。此外又有氣血兩虛症。其初發作似瘧。初
間隔二三日一發。漸二日一發。一日一發。劇則一日
二三發。此病方書不載。亦無治法。病者多不救。惟內
經上列之。

帝曰：大熱後惡寒發熱，有如瘧狀。或一日一發，或間
數日一發。其故何也？岐伯曰：勝復之氣會遇之時有
多少也。陰氣多而陽氣少，則其發日遠。陽氣多而陰
氣少，則其發日近。此勝復相搏，盛衰之節。瘧亦同法。

瘧方

加減清脾飲

治先寒後熱熱多寒少者太陰証也

陳皮

半夏

茯苓

甘草

白朮

青皮

厚朴

草薺

知母

黃芩

柴胡

姜三片水鍾半煎服

單瘧同此治法去厚朴加石膏一錢五分

加減柴胡姜桂湯

治先熱後寒寒多熱少或獨寒

不熱者

柴胡

桂枝

三分

黃芩

花粉

牡蠣

甘草

乾姜

蒼朮

川芎

姜三片棗一枚煎服

四獸飲

治氣虛涎飲結聚者

陳皮

半夏

茯苓

甘草

人參

白朮

草菓

烏梅

姜三片棗三枚塩少許煎服

有汗要

式

人參 白木 八分 黃芪 一錢 歸身 棗仁 七分

黃芩 陳皮 六分 柴胡 四分 升麻 甘草 五味

棗三枚煎服

無汗要有汗方

石膏 一錢 柴胡 葛根 一錢 蒼朮 川芎 二分

黃芩 知母 青皮 七分 升麻 甘草 三分

姜三片水鍾半煎服

又方 治虛癘 抄痰火兼作

人參 知母 白朮 茯苓 甘草 白芍

柴胡 黃芩 青皮 常山 檳榔 陳皮

甘草 澤瀉

治瘧夜發方

柴胡 人參 黃芩 五分 甘草 二分 青皮 麥冬

川芎 七分 半夏 當歸 八分 何首烏 一錢 生地 五分

姜三片 棗三枚 水鍾半煎服

瘧熱瘧方 但熱不寒或大熱不渴夏秋多病此

知母 花粉 葛根 七分 黃栢 生地 柴胡

牛膝 五分 麥冬 八分 石膏 一錢 二分

加粳米三錢水鍾半煎服

截瘡通用方

常山 一錢 五分 檳榔 一錢 烏梅 一個 母丁香 五分

知母 七分

用好酒一盞入藥煎成露一宿次早服下永不

發

又截瘡方

丁香

檳榔

陳皮

常山

各等分一錢煎法同上不可竈上煎久瘡間

日或二日三日一作者人虛不可用劫法

補中益氣湯加減

治久瘡

人參

黃芪

白朮

當歸

升麻

陳皮

青皮

烏梅

柴胡

甘草

姜三片棗二枚水煎服

又治久瘧方

何首烏

四錢

青皮

一錢

水酒各半煎服

又治久瘧方

白朮

土炒
八兩

橘紅

八錢

右研末粥糊為丸每服三錢

治虛瘧神方

人參白朮與黃芪

白芍青皮及陳皮

栳榔草菓烏梅貝

虛瘧一貼似神醫

治久瘧二三日一發或下半日發者此方神驗

柴胡 知母 二錢 當歸 陳皮 一錢

如陰虛加首烏一錢未發先二時熱服

桂枝黃芩湯 治瘧服藥寒熱轉大者太陽陽明少

陽三陽合病也此方主之

桂枝 炙甘草 五分 黃芩 半夏 海人參 一錢

柴胡 三錢 石膏 二錢 知母 八分

姜三片水二鍾煎一鐘食遠服

人參養胃湯 治瘧寒多熱少者必須先服此藥

人參 厚朴 姜製 陳皮 各一錢 蒼朮 米泔浸炒 茯苓

半夏 泡七分 草果 藿香 炙甘草 各一錢

姜三片紅棗一枚水三鍾煎一鍾不拘時服

小柴胡湯 見瘧 治瘧熱多寒少或單熱頭痛胸

滿咽乾此條為少陽証也

濟生清脾湯 治痺瘧脈來弦數或熱不寒或熱多

寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮 厚朴製 白朮 半夏泡 黃芩 草果

柴胡 茯苓一錢 炙甘草五分

姜三片水二鍾煎八分食遠服

鯨甲飲 治久瘧不愈脇下痞滿腹中結塊名瘧母

鯨甲醋炙 白朮 草果 檳榔 厚朴製 川芎

白芍 橘紅 炙甘草一錢 黃芪一錢五分

姜七片棗二枚水二鍾煎八分食遠服

麻黃羌活湯發時頭痛。無脊強脈浮者名爲寒

瘧。此方主之。

麻黃 羌活 防風 各三錢

此條爲太陽証也。太陽之寒水所化。故機要名爲寒瘧。麻黃羌活太陽經之汗藥也。故以爲君。防風爲諸風之卒徒。故以爲佐。甘草和諸藥而兼解散。故以爲使。是方乃攻實之劑。若臨証用藥。血虛者宜加四物。氣虛者宜加參朮。全在活法。不可執也。

白芷湯。發時目痛鼻乾口渴自汗不得眠。脉長有

熱無寒。或熱多寒少者。名曰熱瘧。此方主之。

白芷 三錢 知母 五錢 石膏 五錢

此條為陽明証也。以其熱多。故機要名為熱瘧。白

芷所以解陽明之經。石膏所以清陽明之府。知母

所以養陽明之陰。虛者宜加人參。質實便燥者不

宜此方。用大柴胡湯下之。再以本方調理。

麻黃杏仁甘草石膏湯

傷寒例云。若脉陰陽俱

重感于寒者變為溫瘧先熱後寒此方主之

麻黃

四兩

杏仁

五十枚

甘草

二兩

石膏

半觔

脈陰陽俱盛者舊有熱也。重感于寒者新有寒也。

凡瘧寒熱相搏邪正分爭併于表則陽實而陰虛。

陰虛生內熱陽實生外熱。中外皆熱故煩渴而身

熱惡熱莫任也。併于裏則陰實而陽虛陽虛生外

寒陰實生內寒。中外皆寒故鼓頷而戰慄惡寒莫

任也。若其邪正分爭併之未盡則寒熱交集鼓頷

戰慄煩渴身熱併至矣。此常瘧寒熱之理也。溫瘧先熱後寒者。以其先有舊熱而後傷寒也。麻黃杏仁可以解重感之寒。甘草石膏可以解舊有之熱。仲景主白虎湯加桂枝湯亦良。

二玄道人截瘧方

柴胡湯加防已 三分 秦艽 二錢

香薷湯。發時獨熱無寒者。名曰瘧。瘧當責之暑。宜此方。

香薷

一兩

白扁豆

厚朴作姜汁炒

炙甘草

五錢

茯神

一兩

暑陽邪也。內經曰：脈虛身熱，得之傷暑。又曰：因於暑，汗煩則喘渴，靜則多言。體若燔炭，故獨熱無寒之瘧，責其因於暑也。香薷味薄而氣清，能解表裏之暑。扁豆味甘而性平，能解腸胃之暑。厚朴苦辛，破暑飲也。甘草性平，解暑毒也。易曰：火就燥，暑邪中人，先就於心。茯神之用，所以寧心也。或問風亦

陽邪也。痺瘧何以不責之風。不知風為少陽。又為厥陰。在六氣猶未純陽。若治辛熱固不可用風藥。如辛涼發散之劑。用之木為不可也。

七棗湯 發時獨寒無熱。脈遲者宜此方。

附子 一枚 鹽水 煮去皮臍 大棗 七枚 擘

牝陰也。王冰曰。益火之原。以消陰翳。故獨寒無熱之瘧。責之寒也。用附子之辛以主之。佐以大棗取其能和附熱。且引之入至陰耳。

蜀漆散 治牝瘧病原於頑痰癥瘕者此方主之

蜀漆 燒去
雲母 煨二
龍骨 煨
各等分

牝陰也無陽之名頑痰乃至陰所化癥瘕乃凝結之陰故令人有寒而無熱蜀漆雲母龍骨既經燒煉則味澁而辛熱味澁可以固既脫之陽辛熱可以消固結之陰仲景治火劫亡陽之証於桂枝湯去芍藥加蜀漆龍骨葦名曰救逆湯是三物之為純陽可知雲母燒二日夜則寒性亦去而純陽矣

宜仲景之用之也

柴胡去半夏加栝萎根湯 瘧疾微勞不任經年不

差前後復發者名曰勞瘧此方主之

柴胡

八兩

人參

黃芩

甘草

三兩

生姜

二兩

大棗

十二枚

栝萎根

四兩

任事之勞責之筋力筋屬肝少陽胆則其府也柴

胡黃芩可以清少陽之邪熱栝萎根可以生液養

筋人參甘草可以補虛祛勞大棗生姜可以調榮

養胃又曰參草姜棗胃家藥也散精於肝滯氣於筋惟胃能之故用此方以調勞瘡

柴平湯

發時一身盡痛手足沉重寒多熱少脈濡

者名曰溫瘧此方主之

柴胡

人參

半夏

陳皮

黃芩

甘草

厚朴

蒼朮

生姜

大棗

上件皆濕証也故用小柴胡以和解表裏平胃散以健脾制濕合二方而名曰柴平湯

解湯 此治瘧通劑時行之瘧長幼相似者治之

神良

麻黃 柴胡 澤瀉 各三錢

病有三在在表在裏在半表半裏也人在氣交之中鼻受無形之氣藏於分肉之間邪正分爭併於表則在表併於裏則在裏未有所併在半表半裏此方麻黃之辛能散表邪由汗而泄澤瀉之鹹能引裏邪由溺而泄柴胡之溫能令半表半裏之邪

山中以解。然此方但可瀉實耳。虛者猶當辨其氣。

血而補之。

太無神水散

見濕

因感山嵐瘴氣發時乍寒乍

熱身重者治之。

截瘧七寶飲。瘧三四發後寸口脈來弦滑浮大者

此方吐之。若脈來沉澁細微者不可用。

常山 厚朴 青皮 陳皮 甘草 檳榔

草果 各等分

先期用水酒各一鍾煎熟以絲綿裹之露一宿
於當發之日早晨空心溫服之

五神丸塞鼻法 凡瘡一歲之中長幼相似者名曰
疫瘧。疫氣無形由鼻而入故亦就鼻而塞之露其
一宿亦圍師必缺之道也。

東方青黛五錢麝香二分

西方白礬五錢白芷二錢

南方官桂五錢硃砂一錢

北方委壳巴豆四十九粒黑豆三十六粒

中央硫黃五錢雄黃一錢上件各依方位於五

月一日以磁盆虔誠安置香火神前至五日午時

取研爲末用五家粽角爲丸梧子大陰乾收用疾

發之日清晨以綿包一丸塞鼻中男左女右用之

神良不渴不飲水冬月感寒及夏月多食生冷瓜

者此寒也治宜理中丸甚者加附子肉傷換外感

寒壯熱者治宜五積散痰畏食者治宜三陳湯下

用酒水各一鍾煎熟以絲綿裹之露一宿

之日早晨空心溫服之

輒見... 凡癰一歲之中長幼相似者各

癸文日青是以錄此一水塞鼻中畏或女木瓜

如... 未用正寒終前為水卦于大創並外用

凡一日以蠶盆裏結安置香火帳前至正日子

中火麻黃正蠶蠟黃一錢或土科谷於式尚於正

此文老黃巴豆四十水蠶黑豆三十六錢

霍亂

十六

霍者揮霍眩暈亂者心神撩亂其証外有所感內有所傷陰陽乖隔以致心腹疼痛嘔吐下利憎寒壯熱頭痛眩暈治法當分寒熱在渴與不渴而辨之渴而多飲水者此熱與暑也治宜五苓益元香薷桂苓甘露飲不渴不飲水冬月感寒及夏月多食生冷瓜果者此寒也治宜理中丸甚者加附子內傷挾外感憎寒壯熱者治宜五積散痰褻食者治宜二陳湯下保

和丸邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則吐瀉兼作此濕霍亂易治以所傷之物盡出故也乾霍亂者欲吐不得吐欲瀉不得瀉心腹疼痛所傷之物不得出擁悶正氣乖隔陰陽其死甚速急用吐法救之治霍亂通用六和湯藿香正氣散轉筋屬血熱四物加酒芩紅花蒼朮木瓜南星若轉筋入腹及通身轉筋者不治上吐下利躁擾煩亂者方可謂之霍亂若止嘔吐而利不煩亂者經止謂吐利非霍亂也霍

亂慎勿與穀食。雖米湯一呷下咽卽死。必待吐瀉止。
過半日饑甚。方可與稀粥少食。以漸將息邪也。
脉微而澁。或代而散。或隱而伏。或大而虛。
脉右關滑爲霍亂吐瀉。引脉結促代。皆不可斷以死。
脉大者生。脉微弱漸遲者死。脉洪者爲熱。脉
弦者爲飲。氣口脉弦滑。膈間有宿食。留飲宜順其
性。以鹽湯探吐之。

木香

澤瀉

寒水石

石膏

一冊

卷二 霍亂

三

和九邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則吐
 對以盛焉將吐之易治以所傷之物盡出故也乾
 茹者為燥不寐口積莖散亂間有餘食留於宜則其
 根大者生則和燄與漸變者或死和者皆為熱法利
 和者關散為毒瀉也高者利下以升者不可瀉以取
 和燄而盡紅茹并而燄小茹烈而升茹大而熱身
 燄半日燄甚寸口與肺脈少食以補其息謂之霍亂
 霍亂心與脾食難米者一肥不肥鳴及必壽也高上

霍亂方

五苓散

見濕

治熱多欲飲水者。此陽邪也。

益元散

香薷飲

俱見暑

桂苓甘露飲

治夏月引飲過多。濕熱為患。小便不

利

滑石

二兩

桂心

人參

黃芪

茯苓

白朮

甘草

葛根

澤瀉

寒水石

石膏

一兩

木香

錢

理中丸 治寒犯太陰腹滿吐瀉霍亂寒多不飲水

人參 白朮 乾姜 炙甘草 各等分

為末蜜丸鷄黃大每服一丸沸湯和下

五積散 治外感內傷憎寒壯熱

麻黃 白芷 陳皮 厚朴 桔梗 枳壳

川芎 茯苓 當歸 蒼朮 肉桂 芍藥

甘草 半夏 乾姜

各等分姜棗葱白煎服

二陳湯

見痰

保和湯

見內傷

治傷食吐利

六和湯

治霍亂吐瀉不止轉筋

後方加生薑三片 棗三枚 煎服

白朮

甘草

半夏

杏仁

砂仁

人參

五分

赤茯苓

藿香

扁豆

木瓜

厚朴

二錢

香薷

冬去

藿香正氣散

見中風

治內傷外感霍亂

四物湯

見中風

治霍亂轉筋

本方加酒苓紅花蒼朮南星

回生散 治中氣不和吐瀉霍亂

陳皮

藿香

各五錢

救乾霍亂方

用鮮生姜煎濃汁加炒鹽滴桐油數點頻頻灌下
二三碗用鵝毛揀喉使吐如不吐急用瓜蒂散吐
之若終不吐用脩急丸通之庶幾可生若怠緩姑
息立亡可待

冷香飲子

夏月飲食雜以水菓寒冰之物食之胸

腹大痛霍亂者此方主之。

草果仁 三兩
附子 一兩
橘紅 一兩
甘草 五錢

姜煎冷服

肉食得寒。冰水菓而冷。寒。冰水菓。因肉食而滯。由是填塞。至陰乖隔。而成霍亂。草果辛溫。善消肉食。附子辛熱。能散沉寒。橘紅之辛。可調中氣。甘草之溫。堪以益脾。必冷服也。假其冷以從治。內經所謂必伏其所主。而先其所因也。

華陀危病方 夏月過食水菓填塞至陰抑遏肝氣

霍亂轉筋者此方主之

吳茱萸 木瓜 食塩 各一錢

水菓得食塩則收斂而不爲患肝氣得吳茱則疏利而不爲抑轉筋得木瓜則筋舒而不復痛

三因吐法 治乾霍亂欲吐不得吐欲瀉不得瀉令人暴死急以此方撥吐之

燒塩 十兩 熱飲 十五升 三飲而三吐之

鹽○鹹○物○也○多○則○苦○矣○鹹○能○軟○堅○故○可○以○開○宿○食○頑
痰○苦○能○湧○泄○故○按○之○則○易○吐○矣○此○法○起○死○回○生○幸
勿○輕○忽○

穀○滯○以○緩○行○闕○門○為○小○腸○下○口○水○殺○自○此○法○別○分○機

為○濁○入○大○腸○分○水○為○清○入○膀○胱○若○水○穢○不○分○清○濁○不

別○則○皆○入○大○腸○而○成○泄○瀉○此○泄○瀉○之○由○也○經○云○濕○勝

則○濡○泄○又○曰○暴○注○下○迫○皆○屬○於○熱○又○曰○諸○病○所○出○水

液○澄○微○清○冷○皆○屬○於○寒○不○有○夏○月○受○暑○而○為○泄○瀉○者

泄瀉 十七

按人之身。貴門爲胃。上口。水穀自此入於胃。幽門爲胃下口。水穀滓穢自此入於小腸。小腸一十六折。水穀賴以緩行。闌門爲小腸下口。水穀自此泌別分穢。爲濁入大腸。分水爲清入膀胱。若水穢不分。清濁不別。則皆入大腸而成泄瀉。此泄瀉之由也。經云。濕勝則濡泄。又曰。暴注下迫。皆屬於熱。又曰。諸病所出水液澄澈。清冷。皆屬於寒。又有夏月受暑而爲暑瀉者。

亦熱之類也。戴云：凡瀉水腹不痛者濕也，完穀不化者氣虛也，腹痛水瀉腸鳴痛一陣瀉一陣者火也，或瀉或不瀉或多或少者痰也，腹痛甚而瀉瀉後痛減者食也，泄瀉亦是急症，但暴瀉爲輕，久瀉爲重，暴瀉元氣未衰濕者散之，羌活勝濕湯，五苓散，火者清之，香連丸，清六丸，寒者溫之，理中丸，或加附子，虛者實之，錢氏白朮散，參苓白朮散，痰者化之，清氣化痰丸，食者消之，保和丸，枳實導滯丸，辨之精治之，當其效。

易見。故暴瀉爲輕也。若夫久瀉。上亡津液。下損脾胃。補之則熱。增虛之則脹。劇分利之則虛甚。甚則成脾泄。五更定瀉。數次。衰老虛弱之人。多致不救。故久瀉爲重也。遇斯病者。須急治之。凡治瀉。多用丸藥。并用散藥。以實脾胃。土實則能制水。故也。蒸餅爲丸。服丸泄瀉。脈緩微小者。生。浮大急疾者。死。與痢同者。因經曰。脈細皮寒。少氣泄利。前後飲食不入者。死。泄瀉水多者。必用五苓散。

水多者必用五苓。若腹不痛者，濕重完穀不化。
 因。惡曰。和。雖。史。寒。少。尿。無。汗。前。功。應。食。不。入。皆。水。邪。
 其。州。高。祖。幾。遺。小。者。坐。到。大。急。決。皆。取。與。麻。同。骨。
 始。藥。以。實。鞮。土。土。實。則。指。肺。水。以。此。入。瀉。為。重。暴。瀉。
 為。重。也。數。復。決。者。陰。虛。也。之。武。宜。高。參。用。以。藥。并。用。
 此。正。更。宜。高。瀉。火。寒。者。盡。除。之。人。多。姪。不。效。則。入。煎。
 劑。之。以。煎。散。盡。之。以。煎。陳。谷。味。之。以。煎。盡。其。其。以。煎。
 煎。以。煎。暴。煎。為。神。也。若。夫。人。高。土。年。事。衰。不。能。辨。胃。

泄瀉方

渴有六俱宜少加五苓散利小便

濕瀉散之見濕 羌活勝濕湯見濕 五苓散見濕

火瀉清之 香連丸見刺

天水散一料加紅麴五錢為末湯浸蒸餅為丸服

寒瀉溫之 理中丸加附子見霍亂

虛瀉實之 錢氏白朮 參苓白朮 補中益氣俱

見內傷

痰瀉化之

二陳湯

見中風

清氣化痰丸

見痰

食瀉消之

保和湯

枳實導滯丸

見內傷

和湯

見霍亂加消藥

治痛瀉方

白朮

炒

白芍

炒二

陳皮

一錢二分

防風

一錢

戊巳丸

治胃經受熱泄瀉不止糞色黃黑肛門斂

澁乃熱瀉也

黃連

十兩

吳茱萸

白芍

各二兩

麩糊丸 梧子 大米湯下 三十九

胃苓湯 治夏秋脾胃傷冷 水穀不分 泄瀉不止 純

瀉水者 小便赤澁 此濕勝泄瀉

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 白朮 茯苓

猪苓 澤瀉 桂

姜棗煎 空心服

木附丸 或湯亦可

白朮 二錢 甘草 一錢 附子 五分

姜三棗三空心服

桂苓甘露飲

見霍亂

治夏月暑瀉

香薷飲

見暑

治全

五味散

治腎虛子後泄瀉

腎主二便開竅于三

陰受時于亥子腎臟虛故令子後泄瀉

五味子

炒二兩

吳茱萸

五錢

右為末每服陳米湯下二錢

神散

治脾腎二臟俱虛泄瀉不止

破故紙

炒四兩

肉豆蔻

煨二兩

右為末用棗肉四兩九枚姜四兩切片同棗煮爛

去姜取棗肉研膏入藥為丸梧子大空心塩湯

下五十九

白芍黃芩湯

治協熱下利

黃芩二錢

白芍一錢

甘草八分

水煎温服

製白朮散治脾泄

白朮一觔米泔水浸軟咀片分作四分每分四兩
一分用白薤仁同炒一分用廣陳皮同炒一分用
破故紙同炒一分用五味子同炒俱如式炒以乾
燥爲度揀去同炒之藥止用白朮一味研極末用
陳倉米或蓮子粉打糊爲丸梧子大空心米飲下
二三十丸

雄猪肚丸

治脾泄。

土白朮四兩蓮肉一觔去心雄猪肚一具不下水

者先將白朮同陳土炒過同蓮肉研爲末

加

大小洗淨裝藥入內以線縫之文武火

爛搗

爲丸中樣大每空心或上午米湯送下二三錢亦

治婦人崩漏有效以脾能統血故也又方去白

朮用黃連花粉各四兩蓮肉半觔如前法製入猪

肚煮爛搗爲丸能治消渴止渴生津極效

白朮茯苓湯治脾胃虛弱不能尅制水穀濕盛作

痛

白朮 土炒 白茯苓 去皮 各七錢五分

益黃散 胃寒瀉泄 脉遲者 此方主之

丁香 麩煨 木香 青皮 炒 陳皮 訶子 麩裹微煨

腸胃熱則大便燥結 腸胃寒則洞泄不禁 大都然也 脉遲則驗其為寒矣 是方也 二香之辛熱 所以溫中 二皮之辛利 所以快脾 訶子之固澀 所以止瀉

訶黎勒散 腸胃虛寒 滑泄腹痛者 此方主之

訶子仁

肉豆蔻

麩煨

青皮

四兩

附子

五錢

肉桂

五錢

虛寒者中氣虛而生內寒也滑泄者土虛不足以

防水也腹痛者濕淫而木氣抑也寒者溫之故用

附子肉桂滑者澁之故用訶仁肉蔻抑者疏之故

用青皮

漿水散

水瀉澄徹清冷者此方主之

半夏

裝一兩

甘草

炙

附子

乾姜

肉桂

五錢

泄瀉

良姜 二錢五分 每服三錢

水液澄徹清冷皆屬于寒寒者溫之故多用辛溫

之劑半夏炙草可使健脾脾健則能防水乾姜附

子可使回陽陽回則氣上升良姜肉桂可使化氣

氣化則能泌別清濁而大便時亦寒者服之好

劉草憲痛瀉要方 痛瀉不止者此方主之

白朮 炒三兩 白芍 炒 防風 二兩 陳皮 炒兩

瀉責之脾痛責之肝肝責之實脾責之虛脾虛肝

實故令痛瀉。煨木所以健脾。炒葱所以瀉肝。故原所以醒脾防風。所以散肝不責之於食者。以食痛得瀉便減。今瀉而痛不止。故責之土。敗木賊也。

椒附丸 腎臟虛寒滑瀉者此方主之。

椒紅

桑螵蛸

炙

龍骨

煨存性

山萸

炒

鹿茸

酒蒸焙

附子

炮

虛者腎虛不足也。寒者命門火衰也。腎主二便。虛寒則不能禁固。故令大便滑瀉。味厚為陰中之陰。

故用山萸鹿茸以益腎家之陰。辛熱爲陽中之陽。故用椒紅附子以壯命門之火。味澁可以固脫。故用鰾蛻龍骨以治滑瀉之脫。

木香豆蔻丸

脾泄不止

肉豆蔻

青

棗肉爲丸。梧子大。每下二十九。

丸。土。煎。水。煎。出。

青木香能伐肝。肉豆蔻能溫中。棗肉能健脾。久泄脾虛中氣必寒。肝木乘其虛而剋制之。此方之用。

宜其取効

補中益氣湯去當歸

見內傷

滑瀉痞悶者此方

主之

青州白丸子

見哮喘

積痰滑瀉不止者此方主

之

王脈經又曰沉小流連者生洪急疾者死仲景

世傳十法今最其人要藥之君林來大者為未止脈

數者自愈後脈在者消脈在者令

用椒... 附子... 以... 命... 內之... 火... 味... 滋... 潤... 固... 脫... 液

文... 豆... 菟... 丸... 脾... 泄... 不... 止

青... 附... 白... 朮... 子

貝製劑

蘇... 爽... 散... 不... 止... 昔... 此... 六... 十

生... 文... 肉... 為... 丸... 每... 子... 大... 每... 下... 二... 十... 九

蘇... 中... 益... 煖... 湯... 去... 當... 歸

貝內製

中... 散... 蘇... 爽... 散... 昔... 此... 六... 十

宜... 其... 煎... 必... 寒... 肝... 木... 乘... 其... 虛... 而... 勉... 制... 之... 此... 在... 之... 點

痢証

痢者利也。積滯暴下，莫能止息。邪熱上行，莫能流通。老幼虛弱之人，多致不救。症亦危重矣。內經曰：腸澼便血，身熱則死，身寒則生。腸澼下白沫，脈沉則死，脈浮則生。脈經又曰：沉小流連者生，洪急疾者死。仲景治痢十法，今撮其大要言之。凡痢脈大者爲未止，脈微弱小數者令自愈。微熱而有渴，脈弱而有汗者令自愈。脈滑而數者有積食也，當下之。下利腹堅者當

下○之○下○利○譏○語○有○燥○屎○者○當○下○之○下○後○心○中○堅○痛○者○
當○溫○之○下○利○脈○遲○緊○痛○未○止○者○當○溫○之○其○至○重○者○手○
足○厥○冷○無○脈○灸○之○不○溫○脈○不○還○反○微○喘○者○死○故○金○匱○
要○畧○云○六○腑○氣○絕○於○外○者○爲○手○足○寒○五○臟○氣○絕○於○內○
者○爲○下○利○不○禁○劉○河○間○曰○痢○疾○行○血○則○便○膿○自○愈○調○
氣○則○後○重○自○除○此○兩○言○者○爲○治○痢○之○要○旨○機○要○亦○曰○
後○重○則○宜○下○腹○痛○則○宜○和○身○重○則○除○濕○脈○弦○則○去○風○
膿○稠○粘○以○重○藥○竭○之○身○冷○自○汗○以○熱○藥○溫○之○風○邪○

外來宜汗之。驚澹爲痢宜溫之。小便澁者分利之。盛
者和之。去者送之。過者止之。丹溪曰痢疾須分表裏。
在表者必惡寒發熱身首俱痛宜以小柴胡去人參。
加黃芩白芍和之。在裏者必後重窘迫腹痛急墜宜
承氣湯下之。亦當審虛實腹痛者由肺金之氣鬱在
大腸之間以苦梗開之下痢血痢久不愈者屬陰虛。
四物爲主。大孔痛一日清之一日溫之久病身冷脈
沉小者宜溫之。暴病身熱脈浮洪者宜清之。先水瀉

後膿血。此脾傳腎。賊邪難愈。先膿血。後水瀉。此腎傳脾。微邪易愈。倦怠嗜卧。食飲少進。宜參歸陳朮等藥。補之。虛回而痢自止。氣行血和。積少。但虛坐努。責在亡血。以當歸身尾爲君。白芍生地桃仁佐之。陳皮和之。血生自安。此丹溪治痢十法。名言。淡有益於蒼生者。學者須詳究而善用之。戴氏曰。痢雖有赤白二色。終無寒熱之分。通作濕熱處治。但分新舊虛實與赤白帶同治。予觀痢疾。大抵由食積火熱爲多。其次暑

熱其次風寒其次七情內傷善治者須求其因而爲
之辨別區治禁口痢有二症虛與熱是也熱塞胃
口正氣衰憊莫能與爭故滴水不進古人有用人參
三錢酒炒黃連三錢酒炒石蓮肉一錢頻頻少飲飲
而或吐又少飲之若得些須入胃胃氣卽回而食少
進矣愚謂熱勝則川連當用四錢人參當用二錢虛
勝則人參當用四錢川連當用二錢蓋變通之道也
此症亦有人參不能用一分者以陰太虛而邪陽太

盛也。故身熱脈大。又云熱不爲下衰。皆反之也。其不
治症唇紅若塗硃者。口瘡綻裂。脈洪急搏手者。身大
熱久不退者。下如魚腦者。下如陳腐色者。下純血者。
下如屋漏水者。下如紅莧汁者。大孔如竹筒者。喘而
不休。大汗不止者。脈不回。身不溫者。四肢厥冷者。皆
不救也。大孔病者。熱流於下也。暴病身熱。脈大無汗。
元氣未衰也。當清之久。病身冷。脈微有汗。元氣已衰
也。當溫之。清用苓連梔栝選用之。加四物并氣藥。

溫用姜桂苓朮當歸等虛甚者加入參附子酌而用之。暴病當下如虛弱不堪重劑宜用五苓祛其火暴之性。或木香枳榔丸香連丸少加大黃丸隨其虛實而用之。脫肛亦分久暴暴者苓連四物加升提藥久而氣虛者宜入物加粟壳訶子數分其外法用陳壁土加酸石榴皮明礬少許濃煎湯先薰後洗再用川五倍畧炒研爲細末敷肛上托而上之一日二三。無妨久痢不愈當觀氣虛血虛并內有流連之熱或

有穢血之停。審而辨之。氣虛四君子。少加歸芍等血。
虛四物。少加參朮。粟壳訶子等。審無熱。加肉豆蔻。其
流連之熱。用二入丹。血穢用四物。加桃仁紅花乳香。
沒藥。不可一途而治。又久痢發熱不止者。屬陰虛。用
寒涼藥。必兼溫藥。升藥始痢。宜下。久痢宜補。至於傷
寒二陽合病。皆下痢。其治又不同。太陽陽明合病。自
下痢者。宜發汗。太陽少陽合病。自下痢者。宜和解。陽
明少陽合病。自下痢者。宜攻裏。

脉經云。腸澼下膿。血脉沉小流連者生。洪大數身熱者死。又曰。腸澼筋攣。脉小細安靜者生。浮大而緊者死。

白芍 木香 煨榔 黃芩 歸尾 陳皮 山查 神效

三味肉用大黃去酒下之然亦有虛而不可下

赤白痢証方

赤白痢通用常効方

黃連

黃芩

歸尾

陳皮

山查

神麩

白芍

穀芽

木香

檳榔

赤白痢三日內用大黃芒硝下之然亦有虛而不可下

者宜酌用之

白痢方

蒼朮

白朮

茯苓

陳皮

甘草

黃芩

枳壳 神麩

各等分痛甚加檳榔七分木香三分氣行則痛

止

赤痢方

黃連

黃栢

地榆

丹皮

赤芍

歸尾

生地

甘草

痛甚加檳榔五分陳皮八分

下痢口渴不止小便不利方

滑石 梔子 甘草 生地 車前 麥冬

黃栢 知母 澤瀉 燈心 三分

水煎服

治痢者虛弱調血清氣常用効方

人參 當歸 白芍 扁豆 陳皮 七分 白朮

茯苓 八分 甘草 黃連 石蓮肉 神麩 五分

黃栢 三分

治久痢打飽發熱脉大丹溪云久痢發熱屬陰虛

血藥中加升藥此藥服過而驗者久痢必用黃栢
以痢屬腎故也。

當歸 白朮 八分 川芎 茯苓 人參 七分

白芍 一錢 黃連 柴胡 升麻 知母 五分

生地 黃栢 四分 甘草 三分

水煎一服卽効熱退飢止

治痢五六日打飢方 痢疾發由木挾相火宜冲

清道

茯苓 白芍 桂蒂 七分 人參 四分 白朮 五分

歸尾 陳皮 五分 甘草 黃連 黃柏 蓮心

青皮 箬穗 三分

加味香連丸

黃連 十兩 木香 二兩 檳榔 枳壳 陳皮 一兩

右黃連用吳萸熬酒拌浸透再炒褐黃色木香
不見火其前藥為末醋糊為丸梧子大每下二

錢

戴人木香檳榔丸

木香 檳榔 青皮 廣木 枳壳 黃栢

黃連 大黃 五末 香附 二兩

右水為丸每下五六十丸

立効丹 痢疾初發服之立効

黃連 檳榔 五錢 木香 巴豆 五分 江右豆豉 兩

研末水丸 硃砂為衣 強人下十五丸 弱人下十

丸

納臍膏

用田螺搗爛加麝香少許納臍中引火下行

立効散

黃連

四兩吳萸炒

陳枳壳

三兩麩炒

右為末治痢初起空心下二錢

倉連煎治禁口痢

赤用黃連七錢倉米三錢白用倉米七錢黃連

三錢赤白相兼連米各五錢

茶煎

赤用茶四錢姜二錢白用姜四錢茶三錢

四物湯加槐花黃連御米壳等分治下痢純血

又方治血痢

苦參炒焦爲末瀉水丸梧子大米湯下五六十九

大補丸 治血痢

黃耆一兩蜜炙老黃色爲末空心溫米湯下三錢

又方 治濕熱痢下瘥

黃連

烏梅肉

各四兩

又禁為末蜜丸梧子大米湯下三十九

又方

白芍 黃栢 各五錢

熟為丸治同前

禁口痢

石蓮肉晒乾為末每服二錢陳倉米飲調下便覺

思食仍以日照東方陳壁土炒真橘皮為末姜棗

畧煎清湯送下以助之

又方

川連八兩咬咀用生姜四兩切片同川連炒待姜
焦黃色去姜用炒黃連爲細末同陳米飯搗爛爲
丸梧子大每服六七十丸赤痢陳米飲下白痢陳
皮湯下赤白兼者米飲陳皮湯兼用

又禁口痢正方法

人參 三錢

川連

姜炒
二錢

廣陳皮

土炒
一錢

石蓮肉

一錢
五分

水煎時與服之如吐又服大効

休息痢神効方

當歸 烏梅 川連

等分爲末以生蒜汁裹手丸梧子大每服姜製

厚朴湯下三四十九

駐車方 治一切下痢

阿膠 一兩五錢蛤粉炒成珠爲末再用醋三合熬成膏 川連 二兩 乾姜 五錢

當歸 一兩五錢

為末以阿膠化開為丸梧子大食前米湯送下

三四十丸

仙梅丸 治痢疾發熱發渴

細茶 一兩 烏梅 五錢

為末蜜丸彈子大每服滾水送下一丸

桃仁承氣湯 見瘧 治汚血而推蕩之

四物湯 見中風 治痢疾血虛

八物湯 見中風 治痢氣血兩虛

通玄丹。治久痢流連之火不退。服諸藥不効者。服之立効。

黃連 八兩 白芍 當歸 生地 烏梅 各五錢

右為末。用雄猪肚一個。去油淨。以上藥末入肚內。用線縫之。將韭菜二觔。上下蓋之。入鍋內蒸。湯乾。又添以肚極爛為度。取肚并藥入石臼搗。為丸。梧子大。每服六七十九。姜湯吞。即行茶清。下即止。能行能止。故名通玄。治積聚。清晨姜湯。

下稍行一二次卽除用溫粥補之

小兒痢疾單方

用薺菜根嫩荷葉燒灰存性砂糖爲丸每服三四粒炒米湯下

凡痢初起不得用參朮五七日後酌虛實用之痢後多用飲食以致遍身浮腫者以大安丸服一二劑卽退

昔曹魯公痢血百餘日國醫無能療治陳應之取鹽

梅一個去核。研合蠟茶。加醋湯沃服之一。啜而瘥。
昔大丞相莊肅公患痢。陳應之曰。此挾水穀。當用三
物逐去。卽愈。

胡黃連 烏梅 灶心土

各等分爲末。臘茶清調下。食前服。隨愈。

一人患痢。純血大塊而下。發飢聲。聞屋外。胃脉將絕。

張大醫治之而愈。方用 丁香 三個 柿蒂 二十個

煎湯又用 六安茶 一錢 烏梅 二個 生姜 一片 煎

湯以二湯替換服又用炒麥麩熨丹田猶不止
再用人參官桂十分去五次日再加附子而愈

清六九 治血痢

滑石 六兩 甘草 一兩 紅麴 五錢

甘草湯為丸

患痢大都責於濕熱熱傷血則下赤滑石能清六
府之熱甘草能調六府之氣紅麴能和六府之血

溫六九 治白痢

滑石

六兩

甘草

一兩

乾姜

五錢

姜汁為丸

熱傷於氣則下白滑石寒而淡寒能

六府之熱

淡能利六府之濕甘草得天地冲和

氣故性平

而調六府乾姜得天地正義之氣故入氣而辟濕

邪又曰乾姜性温可使從治經曰在所以所利是故

用之

敗毒散

見瘧

痢疾表熱裏虛者此方主之

辨寒

皮膚受外感之邪則表實而裏虛表實故發熱裏
虛故痢不禁此方可以解表而補裏理氣而破滯
雖不為治痢而設善用之則取之左右逢其源矣
清暑益氣湯 見暑 痢疾已愈中氣虛弱而暑令
尚在者用之 見中風
十餘大補湯 見中風 痢疾已愈而血大虛者用
之

撲黃丸 治瀉痢初起及腹痛諸証

錦紋大黃

三觔切片入砂仁末一兩同酒拌炒

大厚朴

一觔去皮切片姜汁拌炒

廣木香

三兩不見火

共末水跌丸每服枳殼湯下三錢

烏龍丸

痢疾無論新久服之神効

用上好新巴豆不拘多少剝殼去衣將新銀礮盛之外用火煉無烟過性取起乳鉢爲末忌用銅鐵器每末一錢用真土黃蠟一錢先將蠟溶化再入藥末拌勻爲丸如菜子大空心大人十九丸小兒五

養生司命

卷四

花溪老人虞

搏天民輯

錢塘徐開先振公校

靜觀居士程

林雲來閱

海昌陳葵則子奇訂

嘔吐十九

有聲有物謂之嘔。有物無聲謂之吐。嘔吐俱屬於胃。

治法當分上中下三焦。上焦在胃上口。吐者皆從於

氣。其脉浮而洪。其症食已即吐。渴欲飲水。大便燥結。

氣上冲胸而作痛。治當降氣和中。用和中桔梗湯。

中焦在中脘吐者皆從於積食與氣相假爲積而痛
其脉浮而長其症或先痛而後吐或先吐而後痛治
法當用毒藥去其積木香檳榔行其氣用保和丸
下焦在臍下吐者皆從於寒其脉沉而遲其症朝食
暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法當通
其秘塞溫其寒氣令大便漸通復以中焦藥和之溫
劑如吳萸乾姜肉果砂仁之類外有胃熱胃寒胃
虛痰氣之不同胃熱吐者得食卽吐脉數或緊口苦

舌乾煩躁由於火氣上炎。二陳加姜炒苓連。胃寒
吐者脉弦而遲。逆冷不食。大小便自利。二陳加丁香
砂仁生姜。胃虛吐者久病氣虛。胃虛衰弱脉微。開
穀食卽嘔噦。六君子加藿香厚朴。痰氣吐者清痰
留飲鬱滯。上中二焦。二陳加竹瀝姜汁枳實。嘔吐
通用大小半夏茯苓湯。傷寒凡見嘔噦。切不可用承
氣湯以逆之故也。
有聲無物謂之噦。少陽主之也。以少陽多氣少血之

經也

有物無聲謂之吐。太陽主之也。以太陽多血少氣之

經也。

有聲無物謂之嘔。陽明主之也。以陽明多氣多血之

經也。

脉經曰：嘔而脉弱，小便復利，身有微熱，厥者難治。

扶陽脉浮者，胃氣虛，寒氣在上，噎氣在下，二氣相爭。

但出而不入，其入即嘔而不得食，恐怖即死，寬緩即

瘵

脉陽緊陰數其人食已則吐○陽浮而數亦為吐○寸口
脉緊而芤緊則為寒○芤則為虛○虛寒相搏○脉為陰結
其人則噎○關上脉數其人則吐○

脉弦者虛也○胃氣無餘○朝食暮吐○暮食朝吐○變為反
胃○寒在於上○醫反下之○今脉反弦○故名曰虛○

寸口脉微而數微則無氣○無氣則榮虛○榮虛則血不
足○血不足則胸中冷○故吐○

嘔吐方

和中桔梗湯

治上焦氣熱上冲食已暴吐脉浮而

洪宜先和中

桔梗

白木

一錢五分

陳皮

枳實

茯苓

半夏

厚朴

右水煎熟去渣取清汁調木香散二錢

木香散

木香

檳榔

等分爲末前湯調服

保和湯

見內傷

二陳湯

六君子湯

俱見中風

茯苓半夏湯

治脾胃虛弱身重有痰惡心欲吐當

先實其脾土

白朮

茯苓

半夏

神麩

一錢

橘紅

天麻

七分

麥芽

一錢二分

加姜五片水煎熱服

香安胃散

治胃氣虛弱不能飲食時時嘔吐惡

心

藿香

人參

陳皮

丁香

五分

藿香平胃散

治內傷飲食壅塞太陰嘔吐不止

藿香

厚朴

陳皮

一錢

砂仁

神麩

七分

炙甘草

三分

蒼朮

二分

加姜三片棗二枚煎服

胃苓湯

見泄瀉

治脾胃傷冷嘔吐

加味二陳湯 治胃中有熱膈上有痰令人嘔吐木

方加黃連生薑各等分

又方通用治嘔吐

陳皮 半夏 茯苓 藿香 砂仁 川連 姜炒

檳榔 枳殼 丁香 木香 蘇合 大蘇合 木香

氣弱加白朮 暑加扁豆 以此吐胃虛加人參

寒加吳萸少許

此方治胃中不和飲食不化

膈噎証

內經曰三陽結謂之膈以大小腸膀胱熱結也小腸熱結則血脈燥大腸熱結則不能固膀胱熱結則津液涸三陽既結則前後不通下既不通則反而上行此膈噎之病所由起也先哲論膈噎反胃大率由於血液俱耗胃脘枯槁分上中下三焦或咽喉窒塞水飲可下食不能下其槁在吸門或食稍下則胃脘當心而痛須臾吐出其槁在賁門此上焦之噎也名之

曰噎。其或食物可下，良久復出，其稿在幽門，此中
焦之膈也。名之曰膈。其或朝食暮吐，暮食朝吐，其
稿在闌門，大小腸之間，此下焦之膈也。名之曰反胃。
然名雖不同，病出一體。原其得病之由，有氣虛有血
虛。有痰有七情拂鬱及大怒，肝火冲逆而成者。氣虛
脈緩而無力，四君子血虛脈緩而無力，四物并加行
痰順氣潤燥之劑。痰者寸關脈必沉而滑，或伏而大
二陳加竹瀝姜汁，拂鬱惱怒氣結滯者寸關脈沉而

瀉或緊宜用開導之劑。桔梗和中七氣湯進之。所謂
朝食暮吐。暮食朝吐者。此出胃能容受。脾不能傳送。
或下竅不通。逆而上行故也。宜潤腸丸。通利大便。大
法通用童便。韭汁。竹瀝。姜汁。牛羊乳。薄滋味。不可聽
方士。概用香燥熱藥。丹溪專以牛羊乳潤燥養血爲
主。竹瀝童便。姜汁爲佐。有至理存焉。醫案宜玩。

膈有五

憂

恚

氣

寒

熱

噎有五

氣

憂

勞

食

思

糞如羊屎者不治。年高者不治。

氣血俱虛者則口中多出沫沫大出者不治。

寸口脉緊而芤緊則爲寒芤則爲虛虛寒相搏脉爲

陰結而遲其人則噎關上脉數其人則吐。脉弦者

虛也。胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐變於反胃寒在

於。醫反下之令脉反弦故名曰虛。

跌。脉浮而澁浮則虛澁則傷脾脾傷則不磨朝食

暮。暮食朝吐宿穀不化名曰反胃脉緊而澁其病

難治

脉澁而小者血不足。治脉大而弱者氣不足。

物湯

治血虛而噎

陳湯

治痰而噎

櫻和申湯

治拂鬱而噎

氣湯

治氣膈而噎

乾姜

任心 黃芩 半夏 甘草 橘皮

膈噎方

四君子湯

見中風

治氣虛而噎

四物湯

見中風

治血虛而噎

二陳湯

見痰

治痰而噎

桔梗和中湯

見嘔

治拂鬱而噎

七氣湯

治氣膈噎

乾姜

桂心

黃芩

半夏

生地

白芍

二兩

桔梗

三兩

枳實

五錢

人參

一兩

吳萸 五合

二兩 蘇枳

三兩 枳實

正錢 人參

一兩

人參利膈丸。治膈噎胸中不利大便燥結痰嗽喘

滿脾胃壅滯推陳致新治膈氣之聖藥

木香 七錢 檳榔 五分 人參 當歸 甘草 藿香

枳實 大黃 厚朴 各一兩

右末水滴丸梧子大每服溫水下五十九

又方

經藉桑葉燒灰一升筲箕盛滾水淋汁一罐白

紙濾過入鉄銚內燉火熬膏以匙挑起將滾水泡
化紙濾再熬如此九次又用蕎麥梗燒灰一升亦
如前法泡濾火熬九次各以新礮盛之用時若七
八十歲老者只用二分桑膏半分蕎膏半分硃砂
半分礮砂半分其爲末入火酒半盞熱水鍋中頓
後化服之打下涎痰一桶卽能食但只食粥不可用
飯及硬物三四十歲年壯者每用一分其藥四分

服下

贈又與此三四十歲平壯者我服一公其藥四公
外服之其不取藥一劑時宜食臥只食粥不可用
半公服過半公其為末入火配半蓋蒸水隨中更
入十歲者皆只服二公桑膏半公蒼膏半公國極
破前去成藥水蒸止水谷以雜藥蓋之用執者以
外蒸藥再蒸破此水又用蒼麥野熟天一并水
煎熟散入殼內熱火蒸膏以與蒸成藥水

乾逆

二十一

內經曰。歲金太過。飢逆。金鬱亦發。飢逆。活人書及千金方。明理論。皆以噦卽飢逆。殊不知噦者聲大而遠。可聞。飢逆者聲短而近。方聞噦者。出聲也。噦出其氣。噦聲盡。然後吸。飢逆者。入聲也。氣抑不出。吸聲盡。然後呼也。况噦出於胃。而逆由於肺。惡可比而同之乎。故易老云。火熱奔急上行。而肺金不納。致聲不盡出。東垣以少陽多氣少血。故乾嘔爲噦。二公言噦言飢。

甚明何惑之有。丹溪云：諸逆冲上皆屬於火。以木挾
相火直冲清道。故此症屬火爲多。自今觀之。然亦有
數者之不同焉。有飲食過急。痰氣阻滯。氣不得升降
者。亦有痰結胸臆。火充於下而不得升越者。亦有傷
寒汗吐下太過。以致中氣大虛者。亦有陽明內實而
失下者。亦有渴而飲水過多。而成水結胸者。亦有痢
疾大下之後。胃氣或虛。而陰火乘虛上冲清道者。治
法宜各審其虛實寒熱。毋誤以治噦實証混淆妄治。

數症中惟傷寒痢疾二証胃氣虛衰至爲危重。差之
毫釐。危在旦夕。更宜謹慎。

脉浮而緩者易治。弦急而按之不鼓者難治。脉結
或促或微皆可治。脉代者危。右關脉弦者木乘
土位難治。

... 月 ... 天 ... 地 ... 人 ... 物 ... 皆 ... 有 ... 其 ... 理 ... 然 ... 亦 ... 有 ... 其 ... 理 ... 然 ... 亦 ... 有 ... 其 ... 理 ...

... 而 ... 不 ... 得 ... 升 ... 是 ... 者 ... 亦 ... 有 ... 其 ... 理 ... 然 ... 亦 ... 有 ... 其 ... 理 ...

... 亦 ... 有 ... 其 ... 理 ... 然 ... 亦 ... 有 ... 其 ... 理 ... 然 ... 亦 ... 有 ... 其 ... 理 ...

... 亦 ... 有 ... 其 ... 理 ... 然 ... 亦 ... 有 ... 其 ... 理 ... 然 ... 亦 ... 有 ... 其 ... 理 ...

乾逆方

治飲食為痰所遏不得下行方。

枳實 陳皮 半夏 山楂 一錢 赤茯苓 八分

砂仁 藟子 香附 五分 神麩 七分 南木香 二分

加姜三片煎服

治痰結胸臆火熱上冲不得升越方。

半夏 一錢 陳皮 貝母 赤茯苓 八分 片苓 七分

桔梗 七分 蘓子 黃連 五分 甘草 白薏仁 三分

枳殼 五分

加姜三片煎服

治傷寒汗吐下太過致胃氣虛衰方

人參 黃芪 一錢 白朮 當歸 八分 升麻 五分

黃栢 香附 煎陳皮 五分 柴胡 甘草

飢不止者加柿蒂一錢姜三棗二煎服

治傷寒陽明內實失下方

大承氣調胃承氣二方選用加炒蓮心一錢姜三片煎服

小陷胸方 治飲水過多成水結胸

黃連 一錢二分
半夏 一錢六分
瓜蒌仁 六錢五分

小青龍湯 只嗽 去麻黃

治痢久胃虛發乾方

人參 陳皮 七分
白朮 白芍 柿蒂 箬穗 一錢

茯苓 八分
青皮 黃栢 五分
川歸 四分
甘草 三分

加姜三片棗二枚煎服

一方用人參白朮煎湯下大補丸一錢二分

大補丸

見火

又驗方

陳皮

白芍

黃栢

丁香

柿蒂

蓮子心

半夏

箬蒂

甘草
木黑枳實

黃連

半夏

小蘗

正合

八寶丹

木賊
木賊
木賊

卷四

四

耳身

吞吐酸証 二十二

大抵酸者俱肝水之氣而吞與吐不同吞酸者酸水攪出喉嚨而復自吞下俗謂醋心是也濕熱鬱於腸胃之間乃寒包熱証也治法遵河間解表之義用防風羌活炒黃連山梔二朮陳皮半夏少加吳茱萸爲向導吐酸者吐出酸水如醋挾痰居多乃津液爲火所鑠不化血而化痰痰鬱水亦鬱自成酸矣一遇上升之氣則痰與酸水並出蓋未有酸而無痰者也

治法當宗丹溪三陳湯加山梔姜炒黃連二木之類。亦少加吳茱萸引經。凡治酸必少加吳茱萸。蓋因其性而折之也。通用加味平胃散。老病人久患吞酸。則津液耗散。漸成膈噎。又有老人胃氣虛弱。口吐酸水。不止者。以大君子補之。其吐自愈。此挾虛之症也。脉弦而滑。兩手或浮而弦。或浮而滑。或沉而遲。或緊而洪。或洪而數。或洪而遲。胸中有寒。飲洪數者。痰熱在膈間。時吐酸水。欲成反胃也。

吞吐酸方

二陳湯

見濕

平胃散

見濕

治宿食不化吞酸呃臭右關脉滑

本方加神麩麥芽姜棗同煎名加味平胃散

六君子湯

見中風

藿香安胃散

見嘔吐

吳茱萸丸

治胃中濕熱抑遏肝火令人吞酸

吳萸

黃芩

陳皮

五錢

黃連

一兩

蒼朮

七錢

吳萸天水散 治濕熱吞酸

六一散加吳萸七錢

交驗方

陳皮 蒼朮 川連 半夏 茯苓 甘草

白芍 神麴 吳萸 炒山梔

嘈雜愛氣証 二十三

嘈雜者俗謂之心嘈是也。其証乃由火動其痰。有餘之候也。老人嘈雜不止。則膈噎之漸也。治法宜南星半夏之類。消痰片苓炒梔子。姜炒黃連。知母石膏三補丸等。以降火。二朮白芍茯苓薏苡之類。以健脛行濕。壯其本源。更加慎口節慾。無不効者。有愛氣者。卽俗攪氣是也。與訕逆不同。其症有氣虛有痰火一屬不足一屬有餘。治痰火宜二陳加白朮炒苓連梔貝。

少加栝榔、葡萄子、枳實、厚朴、木香以降氣。治氣虛宜四君子。加梔子、黃連、神麩、半夏、砂仁亦少加降氣藥。通

用三聖丸。右寸關脈緊而滑。兩寸弦滑。胸中有噎飲。寸脈

橫者。膈上有橫積也。右關弦急甚者。木乘土也。欲

作反胃難治。胃氣不化。腹脹。大便不通。此皆胃氣不和。欲

御醫秘傳

嘈雜噯氣方

加味三聖丸 治嘈雜吐酸痞滿屢効

白朮 二兩 黃連 一兩 陳皮 白芍 半夏麴 七錢

右末老米糊為丸

噯氣効方 有氣虛有痰火

白朮 二兩 茯苓 一兩 半夏麴 一兩 黃連 九錢 火盛者加用

陳皮 扁豆 貝母 神麴 各一兩 藟子 八錢

枳實 七錢 木香 砂仁 各五錢

右末老米為丸若胃脘上下有塊加三稜莪朮

以消其堅

痰火越鞠丸

治痰因火動令人嘈雜

海石

胆星

梔子

青黛

香附

瓜蒌仁

蒼朮 木撫芎

加味三補丸

治鬱火嘈雜

黃芩

黃連

黃栢

香附

蒼朮

陳加黃連梔子湯

治嘈雜

痞滿 二十四

內經曰太陰所致爲積飲痞膈痞者否也不通之意
其証由陰伏陽蓄氣血不運而成位於心下填滿痞
塞皆土之爲害也痞滿之症不一有陰症下蚤而痞
者由下後裏虛邪氣乘虛而入於心之分野仲景用
黃連瀉心湯瀉心下之土邪有傷寒下多則亡陰而
痞者用四物湯加參苓白朮升麻柴胡少佐以陳皮
枳殼之類疏之有飲食壅塞胸中而作痞者用保和

九○枳○實○導○滯○丸○二○陳○湯○加○神○麴○山○查○麥○芽○有○濕○熱○太
甚○土○來○心○下○而○痞○者○三○黃○瀉○心○湯○加○芩○連○瓜○蒔○二○陳
有○大○病○後○脾○胃○虛○極○清○濁○不○分○而○痞○悶○者○補○中○益○氣
湯○陳○皮○枳○米○丸○木○香○枳○米○丸○凡○治○痞○滿○須○用○芩○連○枳
實○之○苦○以○瀉○之○厚○朴○生○姜○半○夏○之○辛○以○散○之○人○參○白
朮○之○甘○溫○以○補○之○茯苓○澤○瀉○之○鹹○淡○以○滲○之○又○當○詳
脈○症○虛○實○實○用○厚○朴○枳○實○虛○用○白○芍○陳○皮○參○朮○與○脹
滿○之○病○不○同○脹○滿○內○脹○而○外○有○形○痞○症○內○覺○痞○悶○而

痞滿方

三黃瀉心湯

治心下痞按之濡其脈關上浮者可

脈惡寒者不可服

大黃 五錢

黃連

黃芩

各三分

四物加參苓湯

保和丸

枳實導滯丸

木香枳朮丸

枳朮丸

補中益氣湯

上方並見內傷

三陳湯

見中風

厚朴温中湯 治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛時作時

止

厚朴 陳皮 乾生姜 一錢 茯苓 草豆蔻

甘草 木香 五分

和實消痞丸 治心下虛痞惡食懶倦右關脈弦

乾生姜 炙甘草 神麩 二錢 猪苓 一錢 澤瀉 五分

厚朴 砂仁 三錢 半夏 陳皮 人參 四錢

枳實 五錢 黃連 黃芩 姜黃 白朮 一兩

右末蒸餅丸梧子大空心白湯下五六十九

木香化滯湯 治氣機鬱結腹皮裏微痛心下痞滿

不思飲食此氣痞也

木香 桂姜 陳皮 六分 柴胡 七分 歸稍

枳實 四分 半夏 一錢 五分 紅花 二分 草豆蔻

炙甘草 二錢

黃芩利膈丸 治胸中熱利膈上痰

生黃芩 炒黃芩 一兩 半夏 黃連 澤瀉

荀子 五錢

南星

枳殼

陳皮 三錢

白朮 二錢

白礬

皂角

一錢

姜汁老米糊為丸 梔子太白湯下 未七十丸

又驗方

半夏

陳皮

枳芩

川連

枳實

白朮

厚朴

荀子

神麩

姜三片未久加枳櫛小便不利加澤瀉木通湯

于錫萬應化痞膏

乳香

礞砂

天竺黃

輕粉

沿藥

兒茶

何魏

蘆薈

大土鱉

五錢

百草霜

一兩五錢

葶麻仁

三兩

蜈蚣

七錢
土炒

川山甲

土炒
一兩

右為末用松香一匊水煮過布濾去渣土中埋

七日取出和前藥共錘萬餘下錘頭常用真麻

油塗之錘成膏極勻如綿入礮中用蠟封口大

凡用三錢小者減半蒸化用絹攤上看塊大小

貼之如起泡暫時揭去二三日又貼久用痞塊

此城濃血從大便出其効如神

八用三錢小香或半茶匙用酒煎服

此藥之驗人齊蘇色收服不效者

此藥之驗人齊蘇色收服不效者

此藥之驗人齊蘇色收服不效者

此藥之驗人齊蘇色收服不效者

此藥之驗人齊蘇色收服不效者

此藥之驗人齊蘇色收服不效者

天竺黃 野苧 以藥 鼠屎

腫脹証二十五

論曰。腫者肌肉之腫也。脹者腹中之脹也。蓋腫屬脾。而脹屬肝。腫輕而脹重也。如單脹而不腫。則肝邪橫行。木專尅土。蠱斯成矣。不易治也。惟腫脹兼有之。則陽氣猶行。十可救五。但在分類而酌處之。予以腫脹之症。治在中宮。故有痰裹食積。以致清氣不升。濁氣不降。而成之者。有痰裹汚血。以致榮衛不從。逆於肉裏。而成之者。有濕熱相生。隧道阻塞。而成之者。有燥

熱沖擊秘結不行而成之者。此四者皆有餘之症也。有服寒涼太過。飲食頻傷。以致中氣虛衰。鬱遏不運而成之者。有痢疾之後。正氣衰憊。邪熱不息。以致通身浮腫。肉硬而成之者。又有始則爲氣。終則爲水。小便不利。水液游行。脾莫能制。而爲水腫者。此三者皆不足之症也。故有餘者清之。消之。降之。不足者補之。益之。毋混治也。大抵此症初起易治。以正未虛而邪未旺也。久遂難痊。以邪已熾而正已衰也。賈洛陽以

病腫不治必爲錮疾。雖有虛扁亦莫能爲言。此症之至惡也。故仲景治腫之大法。腰以上腫者可發汗。腰以下腫者可利小便。開鬼門。潔淨府。蓋氣從汗散。水向便通也。丹溪亦曰。由心腹而散四肢者吉。由四肢而入心腹者危。男從下而上。女從上而下。皆難治也。丹溪又有陽水之說。不過燥熱爲之。陰水之說。不過濕熱爲之也。腫脹之症候。不旣悉諸此乎。大小便不

治腫脹大法

食積腫脹。凡見病者肚腹脹大通身浮腫。卽尋中
脘有微塊。按之微痛。或喘急咳嗽。飲食不快。小便不
通。大便或溇或秘。此痰裹食積滯中宮也。卽用大順
丸。和中湯消積化痰順氣。以攻治之。數劑知半月一
月愈矣。此症醫書俱未言及。予經歷已多。十愈八九。
故立此方以救世耳。大抵腫症爲食積而成。食滯中
焦。故清濁不分。漸成脹滿。世之醫者得此說而存之。
百發百中。活人多矣。

濕熱腫脹

濕熱者中焦濕生乎熱熱生乎濕濕熱

相生隧道壅塞遂成腫脹治宜清熱燥濕健脾尤所

以固本也清中湯治之如浮腫太甚肚腹脹急小便

不行喘急難息宜服增味五皮飲加減分消丸

痰氣腫脹凡中焦有稠痰氣爲痰阻遂成鬱熱痰

熱相搏日積月累阻滯飲食中氣不得上通榮衛不

得疏暢漸成腫脹上見喘急小便不利始則爲氣終

則爲水通身水泡病斯危矣治之不可不蚤宜服導

痰流氣充飲木疏氣薄黃矣故不可不審宜辨藥

鍼經曰其脉大堅以瀉者脹也

脉經曰其脉虛則內脹遲而滑者脹脉盛而緊

者脹虛而緊瀉者脹或弦而遲或浮而數皆脹

也

丹溪曰水腫脉多沉伏病陽水兼陽証脉必沉數

病陰水兼陰証脉必沉遲脉沉而滑為風水脉

浮而遲弦而緊皆為腫也水病腹大如鼓脉實者

生○虛○者○死○洪○大○者○生○微○細○者○死○腹○脹○便○血○脉○大○時
絕○劇○脉○小○疾○者○死○中○惡○腹○大○四○肢○滿○脉○大○而○緩○者
生○浮○而○緊○者○死○緊○而○榮○衛○俱○絕○面○浮○腫○者○死○下○脉
絕○口○張○足○腫○者○死

腫証餘論挾水腫說

吾人所以得全其性命者水與穀而已水則腎主之
穀則脾主之胃與脾合氣胃為水穀之海脾為運化
之司今脾胃兩虛不能傳化則不能制水故腎水泛

濫反得以浸漬脾土於是三焦停滯經絡壅塞水浸於脾胃注於肌肉而發腫矣其狀眼胞上下微起肢體重著咳嗽怔忡股間清冷小便澀黃皮薄而光手按成窟手舉卽滿此水腫之病也然腫有五証風腫者皮粗麻木不仁走注疼痛四君子加升麻蒼木防風羌活氣腫者皮厚四肢瘦弱腹脇膨脹六君子加小香水通血腫者皮間有血縷赤痕四物加桃仁紅花婦人懷孕亦有氣遏水道而虛腫者此但順氣安

脾既產而腫自消。水有十有心水脾水肝水肺水腎
水膽水大腸水風水皮水裏水石水之不同。丹溪亦
云。水腫脈必沉伏。病陽水兼陽症脈必沉數。其証煩
滿。小便赤澁。大便閉結。治用五皮五苓。重者疏鑿。飲
子病陰水兼陰症脈必沉遲。其症不煩滿。大便澹小
便少而不赤澁。治用實脾飲。木香流氣飲。腰以上腫
及身有熱者。水氣在表。可發汗。腰以下腫者。當利小
便。上下分消其濕。此治水之良法也。丹溪曰。水病以

白腫脹方

大順丸 治痰暴食積腫脹

白朮 赤茯苓 神麩 半夏麩 一兩 葡萄子 七錢

山查肉 二兩 連翹 陳皮 砂仁 五錢 菝木 四錢

老米糊為丸 每服一錢二分 小兒減半 方

去菝木砂仁

和中湯

白朮 半夏 八分 陳皮 神麩 七分 桑皮 連翹

白腫脹

茴子 五分
赤茯苓 一錢
茯苓 一錢
山查肉 一錢
菘木 三

白蔻仁 二分

加姜三片 氣虛加人參五分 氣滯加香附五

分有熱加黃芩五分 喘急加蘇子五分

消積化痰湯

山查 二錢
赤茯苓 半夏 一錢
酒麴 茴子

大黑枳實 五分
陳皮 一分
砂仁 三分
連翹 六分

白朮 八分

加姜水煎

大安丸

見內傷

逐穢化痰丸 治痰暴汚血腫脹

桃仁 糯米

紅花

陳皮

貝母

半夏麩

香附 山查

白朮

五靈脂

各一兩

姜汁麩糊丸

清中湯

治濕熱相生腫脹

蒼朮

白朮

山查

赤茯苓

錢一半夏

海金砂

分

陳皮 黃芩 黃連 澤瀉 連翹 厚朴

滑石 一錢五分

加味五皮飲 治浮腫太甚 肚腹腫急 小便不利 喘

急難息

赤茯苓 一錢 桑白皮 二分 陳皮 八分 大腹皮

山查肉 一錢 生姜皮 五分 小梔子 七分

姜棗煎服 或下大順丸亦可

鼓腹遇仙丹 壯實者宜服 虛弱者不可輕用

高牽牛

頭末四兩
半炒半生

白槓榔

一兩
茵陳

蓬朮

三稜 皂角

各五錢

木醋糊為丸梧子太五更冷茶下三錢行後隨以

水溫粥啖之不可食他物

加減分消丸 治中滿鼓脹氣脹水脹

人參 茯苓

白朮

山查肉

枳實

黃連

蒼朮

厚朴

三錢

澤瀉

厚朴

三錢

錢四

炙甘草

一錢

姜黃

砂仁

陳皮

乾姜

二錢

黃芩 五錢

水浸蒸餅為丸淡姜湯下三錢

導痰流氣飲治痰氣腫脹

白朮 半夏 赤茯苓 一錢 陳皮 八分 黃芩 六分

枳實 藟子 貝母 五分 香附 甘草 三分 砂仁 二分

木香 蘇合 蘇合子 太在夏令茶下三錢

三姜棗煎服虛加人參五分

導痰流氣丸

半夏

白朮

茵陳

蘇木

白朮

茯苓

一兩

陳皮

枳實

山查

七錢

貝母

八錢

葡萄子

連翹

砂仁

片苓

五錢

花粉

香附

烏藥

四錢

木香

三錢

半夏

一兩

酒浸蒸餅為丸。蘿蔔湯下一錢二分。

九味羌活湯

見瘟

治水腫。腰以上有病者。此方

微汗之。

四物湯

見中風

治血腫。本方加桃仁紅花。

四君子湯

見中風

腫脹

三五

五

五皮飲

即前方亦治水腫但前名加味五皮飲

疏鑿飲子

治水氣遍身浮腫喘呼氣急煩渴大小

便不利

澤瀉

赤小豆

商陸

羌活

水通

秦艽

茯苓皮

大腹皮

椒目

檳榔

各等分加姜三片

五苓散

見鹽

治下身水腫

木香流氣

見苓

刺艾

麻黃

山查

貝母

木香 檳榔 青皮 半夏 茯苓 枳殼

桔梗 當歸 白芍 防風 川芎 蘓葉

枳實 黃芪 烏藥 大腹皮 陳皮 甘草

加姜棗煎服

嚴氏實脾散

治水氣肌膚浮腫。口不消。大小便不

秘澁。此陰水也。

厚朴 白朮 附子 茯苓 大腹皮 木香

水瓜 乾姜 甘草 草果仁

木各等分水煎服

保和丸

見內傷

治水肿聖藥

蘇合香丸

銀天寶明道

命水原此藥輕重不可不識大小

藥要東煎用

其其子之

命藥

大則以

則以

以此

其其

當備

自其

均風

川苦

蘇藥

木香

海欒

青虫

半夏

升芩

海慈

鼓証 二十六

鼓証者以中空外急有似於鼓故名曰鼓。單腹脹滿。四肢百體咸無腫形。與通身水腫者。火不相類也。蓋水腫者邪氣協陽氣遊行一身。邪氣去而爲汗。爲溺。則正氣復而爲血。爲氣矣。鼓証則邪毒專攻臟腑。陽氣滯而不行。蓋浮腫者輕。而腹脹者重也。或云鼓証一也。何東垣之論主寒。河間之論主火。丹溪之論主脾虛。道豈二乎哉。予曰皆是也。其原皆出內經。但內

經會其全而三子各言其一也。經云：臟寒生滿病。又云：腹滿臍脹，支膈，肢勝，下厥，上冒，過在足，太陰陽明。乃寒濕鬱遏也。愚謂寒鬱日久，則陽氣漸微，陰氣獨盛，人身之氣熱則流通，寒則凝結，凝結則脹滿生焉。故東垣以辛熱散之，以苦溫泄之，淡滲利之，上下分消其寒濕。此東垣之論，所以不可廢也。經云：諸腹脹大，皆屬於熱。故原病式云：腹脹六鼓之如鼓，氣爲陽。陽爲熱，氣盛則如是也。世言脾虛不能制水者，似是。

而實非也。愚謂萬物熱盛則豐隆，寒盛則斂縮。邪陽
猛烈元氣從之，二陽搏擊於其中，日新月盛安得不
成鼓也。此河間之論，所以不可廢也。經云：諸濕腫滿
皆屬脾土。故丹溪以脾具坤靜之德，而有乾健之運。
苟脾土之陰受傷，轉輸之官失職，遂成脹滿。經云：鼓
脹是也。愚謂人之一身，脾土爲本。脾不健旺，則清氣
不升，濁氣不降。經云：濁氣在上，則生脹。脹此鼓脹之
所由來也。若中焦無陽，邪宜行大補，所謂氣虛不補。

氣何由行是也。又清肺金滋腎水制肝養脾皆至理。
攸守。配丹溪論所以不可廢也。雖然三子之論固合。
經旨。抑有說焉。東垣言鼓証屬寒者多屬熱者少。唯
人受入益之邪。邪熱入腑。宜行承氣。餘皆寒証。愚則
以屬熱者多屬寒者少。東南之人濕熱為病。十居八
九。此可驗矣。西北之人嚴寒為病。固多。而未必皆成
鼓也。以寒主收斂。而未必皆成脹大者也。此以理論
之。而知其熱多而寒少也。河間之論熱固然。但其中

有燥熱有濕熱若不區別禍如反掌燥熱爲病則大便秘結小便秘澁身熱腹痛悶亂不寧一受參芪則脹滿不數日而成其爲害也速而烈濕熱爲病則大便頻澇小便清少脉濡體倦嗜卧減食其爲患也緩而淡故治燥熱者清熱之中少加潤澤治濕熱者滲利之中少加溫散故曰燥者潤之濕者燥之各求其屬以合中道斯稱良工矣丹溪扶脾補氣之說域中稱爲確論但審其果係飲食所傷頻仍不已上無痰

氣之阻中無邪陽之器斯可用大補之法。否則有痰者兼清痰有火者兼降火庶清補兼施益莫大焉。此外又有七情之傷脾如怒傷肝肝剋脾脾氣不正必脹於胃名曰勝剋怒乘肺肺氣不傳必脹於大腸名曰乘剋者是也。又有勞倦之損脾如人有所遠行形氣衰少穀氣不旺熱氣薰於胸中者是也。又有血積之遏脾或注於胸膈或滯於胃中或鬱於少腹皆能抑遏清氣不能上升濁氣不能下降俗名血鼓是也。

鼓証重疾。每見模糊施治。但執丹溪扶脾補氣之說。而終始不變。損人滋甚。愚故不憚其煩。而精詳究之。博雅君子。幸精研焉。

鼓不治。症唇黑則傷肝。缺盤盈平則傷心。臍突則傷脾。足平則傷腎。背平則傷肺。此五者必不可療之症也。

治鼓脹大法

蠱脹起於脾虛氣損。治之當以大補之劑。以培其根。

本少加消導以祛其積順氣以通其滯有挾熱者加
清涼藥以蕩其邪使清氣上升濁氣下降清者出頭
而人四肢濁者化微汗而行便溺腹日消而神日
旺病斯愈矣如單用大補而佐使不明則反成壅滯
而脹愈甚矣大抵此症脾雖損而無熱以擾之則一
補脾而獲愈熱雖有而脾未損則一清熱而奏功如
二者俱有則治彼妨此治蠱之所以難也予曾見休
邑一人脾氣消損猶能飲食第腹痛而恭辰予審知

則邪陽自退。脹漸消矣。劉河間所謂養血益陰。其熱
自退。此不治之治也。且養血非獨用血藥。此其理也。脾氣虛
脾。脾氣血藥安得而滯之乎。此補血之理也。脾氣虛
損。脹大日加者。急服老師丸藥方。如實熱作脹。內有
積塊。堅硬如石。但脾胃未傷。宜清熱行氣。用東垣廣
茂。潰堅湯。加減。人瘦熱甚。服此方甚効。又用東垣中
滿。分消丸。鼓証多有服人參而反增劇。遂致不救。此
証甚多。茲其故何哉。按參入手太陰肺經。肺有邪熱。

若得參而火愈甚。故脹急日加。筋青臍出。危篤立見。
 經云。肺出氣。腎納氣。邪火挾氣而出。脾胃先受之。以
 脾胃舊有積氣。今得新邪。宜脹滿之益甚也。故脹症
 必服人參。人參必肺無熱。方可服。有熱則不能服。參
 不救之症也。

腫脹蠱脹不同論

腫蠱二証本不相同。至於用藥亦甚懸絕。腫脹者中
 官有食積。有濕熱。有稠痰阻滯。中官以致清氣不升。

濁氣不降。衆衛不得疏暢。水道不得條通。氣遂妄行。不循故道。水又妄漬。不得成溺。氣水相搏。腫脹不自是而生乎。然而脾胃元氣猶未衰憊也。特爲中官有積病。故遍身浮腫。耳而元氣猶能旁通四達。苟能祛其食積。或清其濕熱。或治其痰氣。內邪一行。外腫隨散。効之臻也。亦甚捷矣。乃若蠱証者。先因脾氣傷損。頻仍久。則漸成衰憊。胃雖少納。脾不運化。兼有積熱。留注於脾胃。橫行於中焦。所謂正者衰。邪者旺。清濁

不分遂成脹滿此則陽氣爲邪氣所遏不能周流一
身而邪氣單攻腹中者也脹極則臍中突出青筋暴
起糞滑溺赤喘急食阻此大不足之症也斯時將大
補脾之正氣歟然正氣未受補而邪熱先熾脹猶故
矣將清熱以伐邪歟然邪未退聽而正愈虛弱脹益
增矣將補伐兼施歟然著者未見而損者愈損矣雖
有虛扁將安施乎故得此症者或脾雖損而真氣猶
存且無流連之邪熱或腹稍脹而邪熱未熾尙有可

爲之真機。卽當大補真元。爲主兼消導清肺。次之氣不運者。行氣痰積滯者。行痰中和調養。則庶乎有可救者矣。或謂水腫固爲可治。然亦有多不治者。如賈洛陽所謂病腫不治。必爲錮疾。雖有盧扁亦莫能爲。則知腫之危惡。非他病比也。今何視之易耶。予謂此病已至危篤。咸莫能療。豈獨腫脹然哉。故內經云。過時者不治。予所謂可治者。亦指治之早者言之也。若積久不治。或治不中節。至於滑泄唇黑。臍突肉硬。缺

鼓証方

鼓症効驗方

治脾胃虛損脹大日加者急宜服此

白朮

赤茯苓

以仁

錢半

人參

一錢二分

蒼朮

八分

枳實

厚朴

川連

五分

陳皮

七分

藟子

四分

白薤仁

二分冬月用

臨服磨木香一分搗加麥冬痰加半夏無熱去

黃連

驗用丸方

卷四 鼓証

人參 白朮 兩半 枳實 山楂 陳皮 五錢

茯苓 一兩 薔子 三錢 白薤仁 四錢

蒸餅為丸

加減瀆堅湯

治中滿腹脹。內有積塊。堅硬如石。坐

卧不寧。二便赤澀。上氣喘促。通身虛腫。

陳皮 白朮 茯苓 一錢 半夏 七分 黃芩 黃連

當歸 五分 厚朴 四分 廣茂 柴胡 澤瀉 神麴

青皮 三分 益智 草薺 升麻 紅花 甘草 二分

吳萸

能補

能補

能補

能補

能補

姜三片

能補

能補

能補

能補

能補

中滿分消丸 照東垣原方即前丸方中去荀子山

查蒼木加知母

葶藶木香散

治濕熱太甚水腫浮脹小便赤澀大

便澹瀉此藥下水濕消腫脹止瀉利小便

葶藶子

茯苓

猪苓

白木

木通

木通

木香

三分

澤瀉

甘草

五錢

滑石

三錢

桂

三分

又方香治鼓脹

白芍 錢半

陳皮

枳實

黃連

荀子

厚朴

分七

蕪子

香附

一錢

又方治氣蟲

青皮

陳皮

枳殼

枳實

厚朴

荀子

苦以瀉之

砂仁

木香

香附

藿香

紫蘓

散以辛

木通

葶蘆

赤茯苓

猪苓

澤瀉

淡以參之

烏藥

順氣

檳榔墜氣

牛膝

消脚腫

半夏

消痰

莪朮

消積

煎服間服黑牽牛丸瀉五六次

通症散

六戟取膀胱水

甘遂取肝水

麻黃取膚水

阿梅取腹水

葫巴取腎水

葶藶取心水

芫花取遍身水

細辛取氣水

防已取胃水

檳榔取血水

海蛤取肺水

黑丑取遍身水

桑皮取腸水

陳皮去白取牙水

右為細末每姜湯下一錢或二三錢量人虛實

加減忌搯百日

加減濟生腎氣丸

治脾腎虛弱腰重脚腫小便不

利或肚腹膨脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱証

其効如神乃補命門相火以生脾土之劑也

熟地

酒拌搗碎四兩

茯苓

三兩

丹皮

一兩

山萸

山藥

澤瀉

牛膝

二兩

肉桂

附子

五錢

車前子

一兩

蜜丸梧子大空心白湯下七八十九

治血蠱方

開通黑藥水

桃仁 紅花 香附 莪朮 蘓木 青皮

白芷 歸尾 茯苓皮 赤芍 姜黃 丹皮

枳實 川芎 玄胡八分 劉寄奴三錢

右十六味水二鍾煎一鍾止可二帖或四帖不

可多服

胃兩黃胖方

皂礬二兩炒 灰麩半升炒

褐色

二味和勻黑砂糖為丸米飲下

消脹丸

木香 黑丑 藷子 炒 檳榔

各等分爲末水糊丸每服白湯下三十丸

腹虛脹驗方

人參 白朮 茯苓 陳皮 澤瀉 木香

干夏 青皮

姜三片棗二枚煎服

煎方

白朮 茯苓 砂仁 半夏 厚朴 猪苓
澤瀉 片苓 姜黃 陳皮 蒼朮 大腹皮
姜棗煎服虛加人參

治水鼓方

先用甘遂一錢或七八分看人虛實爲末入灰麩
做成麩條炒煮與食候小便下水淨再用附子理
中丸後用濟生腎氣丸如水未下淨又用甘遂法
復用補藥入血

又方 治婦人血鼓

一四物湯加蘓木紅花以馬鞭草為主用三錢

如血鼓者以黃芩與黃連小麥平水煎再用酒半升

去腥甘散一錢如以八分香人鼠寶為末入煎

諸大散下

姜棗煎服或人參

藥法... 姜黃... 芎藭... 蘇木... 大頭丸

金匱要略卷之四終... 半... 厚朴... 蘇散

蒼生司命 卷五

花溪老人虞

搏天民

錢塘徐開先振公校

靜觀居士程

林雲來閱

海昌陳彛則子詩訂

積聚痞塊癥痕弦瘳腸脾石痕

二十

血之所積名曰積。取辭積久而發之義也。積有五。皆五臟所生。陰氣也。陰脉沉而伏。其症始發。有常處。其痛不離其部。上下有終始。左右有定處。皆痰飲食積死血所爲也。

氣之所聚名曰聚。聚散不常之義也。聚有六。皆六腑所成。陽氣也。陽脈浮而動。其始終無根本。痛發無定位。上下無皆止。積與聚屬脾。俱係氣病。痞者否也。猶易所謂天地不交之否。濁氣在上。凝結而成也。然病塊有癥瘕。瘕癥之不同。癥者徵也。因物而成。質有塊。可徵。卽積聚成塊。不能移動者也。瘕者假也。假物而成。形或上下。或左或右。移易能動者也。癥瘕屬肝部。俱係血病。

痲痺者懸掛偏僻之意也。但痞與痲痺乃胸膈間之
候。積與聚爲肚腹之候。俱在上中二焦主病。故多見
於男子。瘕與瘕獨見臍下。是爲下焦之疾。故常得於
婦人。外有腸脾石瘕二証。亦自婦人得之。
腸者大腸也。臍者延也。大腸以傳道爲事。乃肺之府。
肺主衛氣。氣溫則泄。氣寒則凝。今寒氣客於大腸。故
衛氣不榮而結瘕在內。其始發也大如鷄卵。至其成
如懷子狀。久久按之則堅。推之則移。氣病而血未病。

也故月事未斷猶以時下是其候也

石痕生於胞中寒氣客於子門夫膀胱爲津液之府
氣化則能出矣今寒氣客於子門則氣塞不通惡血
當瀉不瀉日以益大狀如懷子結硬如石故名石痕
此氣先病而血亦後病故月事不來也

丹溪曰痞塊者在中爲痰飲在右爲食積在左爲死
血又曰凡積塊不可端用下藥徒損真氣病亦不去
當消導使之銕化塊去須大補大抵脾胃乃聚痞塊

之根宜以大補脾胃爲主脾胃之氣一旺則邪氣自消故潔古有養正積自除之說辟之滿座皆君子其中有小入自無容地而去斯言信也治法痰宜二陳加瓦礫子食積保和丸死血用破血行血順氣藥通用大七氣湯貼藥用三聖膏琥珀膏難經所載五積見証及東垣五積丸宜參究

五積見症

肝之積名曰肥氣在左脇下如覆盂有頭足久不愈

令人發欬逆痰瘧連歲不已

心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下久不愈

令人煩心

脾之積名曰痞氣在胃脘右側覆大如盤久不愈令

人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚

肺之積名曰息奔在右脇下大如覆杯久不愈令人

洒淅寒熱喘咳發肺癰

腎之積名曰奔豚在小腹上至心下若豚狀或上或

下無時久不愈令人喘逆骨痿少氣

凡痞塊在皮裏膜外須用補氣藥及香附開之兼

陳湯先須斷厚味為要

凡婦人腹中有塊多屬死血

凡水香檳榔去氣積神麩麥芽去酒積虫蛭水蛭去

血積蒙石巴豆去食積牽牛甘遂去水積雄黃膩粉

去涎積礞砂水銀去肉積各從其類也

脉經曰脉來細而附骨者積也在寸口積在胸中微

出寸口積在喉中在關上積在臍傍出關上積在心
下微在關積在小腸尺微積在氣衝脉出在右積在
右脉出在左積在左脉兩出積在中央各以其部處
之也。脉來小沉而實若脾胃中有積聚不下食食
則吐。肺積脉浮而平按之辟易。心積脉沉而芤
上下無常處。肝積脉弦而細。腎積脉沉而急。
脉沉重而中散者因寒食成積。脉左轉而沉重者
積在胸中。脉右轉出不至寸口者內有肉癥也。

積聚方

肥氣丸 治肝積

黃連 七錢 厚朴 五錢 柴胡 一兩 川椒 四錢 廣木 三錢

人參 昆布 三錢 炙甘草 三錢 皂角 錢半 茯苓 錢半

巴霜 乾姜 五分

右除茯苓皂角巴霜另研末外諸藥共研成細末入前藥和勻蜜丸梧子大初服二九日加一丸二日加二丸漸加至大便微澀再又從二丸

式二日即二式漸味至大勇變部再又終二式

末人前藥味已過式淋干大時服二式日味一

古制芬芬身血山深長極末快滿藥其和列聯

巴簾 神姜

五水

人參 貝母

五水

炙甘草

三錢

厚朴

茯苓

三錢

黃連

小錢

厚朴

五錢

柴胡

一兩

川椒

四錢

熟地

三錢

瓜蒌水

白胡椒

食成積 脈左轉而沉重者

寶珠衣

脈右轉出不至寸口者肉有肉癥也

藥食大 尚明錄

寧火辟于大烟收土去刺黃虫斷不

古制四露昆册籍身其而為米劫人四露味食

孫豆蕪

二公

菊

一公

菊姜

菖蘇

四露

川露

正公

黃

兩半

草甘

正公

黃

三公

卦

其

丹

尚

此法顯之風而財故越至大半四

加起服之周而復始減至大半即勿服

伏梁丸 治心積

黃連 兩半 厚朴 五錢 黃芩 三錢 桂枝 丹參

茯苓 一錢 乾姜 菖蒲 巴霜 川烏 五分

紅豆蔻 二分

右除巴霜另研餘俱共研為末旋入巴霜和勻
蜜丸梧子大服如上法淡黃連湯下

痞氣丸 治脾積

黃連 八錢
厚朴 四錢
萊菔 三錢
黃芩 二錢
陳

乾姜 砂仁 錢半
人參 茯苓
澤瀉 一錢
川烏

川椒 五分
桂皮 巴霜 四分
白朮 二分

右研末服法俱如前淡甘草湯下

息奔丸 治肺積

黃連 一兩 厚朴 八錢
青皮 五錢
川烏 白豆蔻

桔槔 陳皮 三棱 天冬 人參 二錢
乾姜

白朮 川椒 紫苑 錢半
巴霜 五分

右研末服法亦如前淡姜湯下

以上四方如欲冬月服加厚朴減黃連四分之

奔豚丸 治腎積

黃連 五錢 苦練 三錢 茯苓 澤瀉 菖蒲 二錢

玄胡 錢半 全蝎 附子 獨活 一錢 厚朴 七分

川烏 丁香 巴霜 五分 肉桂 一分

右研末服法亦如前淡薑湯下

導氣枳殼丸 治氣結不散 心胸痞痛 逆氣上攻

枳殼 木通 青皮 陳皮 桑皮 薤子

白丑 黑丑 三稜 莪朮 茴香

右等分爲末 姜汁麩糊丸 梧子大 橘皮湯下 三

十九

血塊丸 治婦人血塊如盤 有孕難服 峻藥

香附 四兩 桃仁 白朮 一兩 海石 二兩

右末 神麩糊丸

卷之五 續集

積塊丸 治血積

礞石 三棱 莪朮 香附 以上 桃仁 紅花

五靈脂

米糊為丸白木湯下

三因散聚湯 治聚氣在六腑隨其上下發作有時

令人心腹痞痛攻刺腰脇小腹腹脹二便不利

半夏 枳殼 川歸 四分 陳皮 杏仁 桂心

茯苓 一錢 甘草 附子 川芎 五分 枳殼 厚朴

吳萸 錢半 大黃 一錢 大便秘即法之

姜三片煎服

二陳湯

見中風

保和丸

見內傷

大七氣湯

三稜

莪朮

青皮

陳皮

藿香

枳梗

肉桂

益智

香附

甘草

姜三片煎服

續聚

小温中湯 治食積成痞塊 面色痿黃 肌膚虛腫 飲

食無味

香附

四兩

蒼朮

半夏

二兩

青皮

陳皮

黃連

針砂

一兩

白朮

苦參

五錢

神麴糊為丸

又方

針砂

香附

山查

神麴

二兩

黃連

兩半

山梔

厚朴

蒼朮

半夏

一兩

白芩

五錢

一方加入參炒白朮二兩五錢有帶參用白朮用
苦參不用黃連。

三聖膏 貼積塊

用末化石灰半觔爲末瓦上炒黃提出候熱稍減
入大黃末二兩炒熟仍提出入桂心末五錢畧炒
以米醋熬成膏厚紙攤患處。

癰疽膏

大黃

桂朮

一兩

共為末大蒜搗膏和貼

香積丸 治五積六聚氣塊

三稜 檳榔 六兩 青皮 陳皮 莪朮 枳實

枳殼 葡萄子 香附 三兩 黃連 神麩 麥芽

鱉甲 牛膝 桃仁 礪砂 砂仁 歸尾

木香 炙甘草 一兩 山查 四兩

末醋糊丸白湯下三四十九

大溫中丸

一名大消痞丸

治法同小溫中

黃連 黃芩 六錢 姜黃 白朮 枳實 五錢

半夏 四錢 人參 陳皮 澤瀉 甘草 砂仁

乾姜 炒麴 二錢 川椒 猪苓 三錢

右為末炊餅為丸 血脈衰少不能榮於五臟六

驗方 損損於肌肉肌肉消瘦會食不為肌膚四損損

砂仁 青皮 陳皮 三棱 草果 赤茯苓 起於

半夏 蒼朮 枳殼 神麴 氣損其心者調其榮

其 姜三片煎服如大便不潤加荀子木香其中損

集三式煎雖吸大耐不聞成營干木香

半夏 蒼朮 淋瀝 輻輳

如石 青火 刺火 三火 草果 表效 實

鐵也

古無末炮槍為北

薄姜 炒鱉 二鱉 川地 四兩 龍岑 三鱉

半夏 四鱉 人參 刺火 戰齒 甘草 燻干

黃連 黃芩 姜黃 白木 財寶 五鱉

卷五 書樂

虛損成勞証

二十八

勞者傷也。因傷而成勞者也。經云：陰虛生內熱，難經曰：至脈從下上，損脈從上下也。一損損於皮毛，皮聚而毛落；二損損於血脈，血脈衰少，不能榮於五臟六腑；三損損於肌肉，肌肉消瘦，飲食不爲肌膚；四損損於筋，筋緩不能自收持；五損損於骨，骨痿不能起於床。然治損之法：損其肺者益其氣，損其心者調其榮，損其脾者調其飲食，適其寒溫，損其肝者緩其中，損

其腎者益其精。劉河間曰：心肺損而色斂，腎肝損而形痿。但機要所言感寒則損陽，損自上而下；感熱則損陰，損自下而上。獨以寒熱言之，恐未盡虛損之理。而不及難經之諒且博也。大抵勞病根因各自不同。酒傷肺，色傷腎，思慮傷心，勞倦飲食傷脾，忿怒傷肝。此五者皆能致勞也。大約酒色成勞者多耳。或謂六腑豈無成勞者乎？予曰：傷臟者多，六腑間亦有之。

肺勞

肺如華蓋其氣輕清既不受寒亦不受熱然酒性本
熱多飲則肺受火邪薰蒸日久以致鬱遏不清脹大
不飲或喘或咳漸至音啞骨蒸寒熱皮毛焦乾如之
何其可救也

欬冬花

紫苑

百部

五味

沙參

天冬

麥冬
萎蕤

腎勞

人之五火皆賴腎水制之色慾過度則腎水虛虛則

熱矣○腎○脉○貫○肝○膈○入○肺○中○循○喉○嚨○系○舌○本○所○以○腎○虛
 之○人○先○動○腎○火○延○入○肝○膈○遂○挾○相○火○便○入○肺○中○始○則
 咳○嗽○久○則○發○熱○盜○汗○遺○精○骨○痠○肉○脫○甚○至○傷○脾○瀉○泄
 作○而○危○殆○矣

熟地

枸杞

五味

肉桂

天冬

麥冬

心勞

心者○血之原○榮衛發動之所始也○心不妄役○則真血
 日生○惟勞心焦思日久不置○則思慮過度○由是心血

目耗肝無所乘。臟腑無所潤。筋脉無所養。榮氣不行。邪熱隨作。經所謂陰虛生內熱者是也。熱甚剋金。金衰身瘦。日見銷鑠。而危亡待矣。此症不得志者多。加之。

人參 茯苓 栢子仁 麥冬 遠志 菖蒲

丹參 龍齒

脾勞

元氣靜則神藏。動則消亡。若勞倦過甚。飲食不節。三

者皆使脾之元氣受傷不能舒發以致飲食不化泄瀉頻作血氣不生肌肉不長况脾者肺之母脾氣衰憊則肺失所資津液不生日成枯涸咳嗽殊甚而勞斯成不可救矣

蓮子

薏苡

山藥

扁豆

白朮

茯苓

人參 石斛

肝勞

大怒則血耗於上令人暴絕名曰煎厥故多怒之人

肝火屢動而所藏之血隨火上逆大吐不止稍久則并臟腑臚中之血盡吐不留所謂相火一動則五火相煽而動火動則血隨之真血去多身成空廓以致金不制木木火凌肺經所謂侮其所不勝者也如是則發熱咳嗽脇痛喘急而勞日劇矣由此觀之勞病同名根因不一治者當究其始末明在何經不可模

胡泛治也

熟地

川芎

白芍

當歸

黃芩

銀柴胡

阿膠 童便

五勞見症

肺勞者咳嗽喘急。衄血嗽血。皮膚枯槁。鼻塞聲沉。時吐痰沫。脉微虛而澁數。腎勞者足脛酸疼。腰背拘急。遺精白濁。面色黧黑。耳輪焦枯。脉沉細數。心勞者心神驚惕。怔忡盜汗。自汗心煩。熱悶口舌生瘡。咯血面赤。脉洪而數。

脾勞者面色痿黃唇口焦燥飲食無味腹痛腸鳴瀉利四肢倦怠脉虛濡而數

肝勞者面青頰赤多怒虛陽不斂夢與鬼交甚則那

縮筋急脉弦而數五勞之脉必帶虛數所以難治

脉經曰脉來軟者為虛緩者為虛微者為虛

弱者為虛弦者為中虛脉來細而微者血氣俱

虛脉小者血氣俱少要畧曰脉扎者為血虛

脉沉小遲者脫氣又曰血虛脉大如葱管又曰

脉大而芤者脫氣

治勞要法

勞症有陰虛有陽虛有陰陽兩虛在精察而酌之勿
 令悞也凡氣皆陽也凡精血皆陰也陽虛者四君子
 陰虛者四物加知栢陰陽兩虛者合而用之此定理
 也如陽虛而悞用補陰之劑則吐逆痞悶瀉泄之症
 生焉其人懈倦陰虛而悞用補陽之劑則盜汗嗽熱
 夢遺之症成焉其人煩躁今世之醫者凡見人有自

汗倦怠嗜卧飲食少進皆用補中益氣十全大補固
當矣。至於陰虛而倦怠食少瘦弱盜汗亦每用之。甚
者明見其吐血發熱咳嗽尤用之不置是促之亡也。
殊不知陰既虛而猶補陽則陽愈亢而陰愈虛諸病
悉加將何望其有生耶。脾胃弱者知栢勿用。

陰虛久服補陽論

陰虛補陰理也。今悞補陽已非理矣。况久服乎。久服
則大助陽邪燥灼真陰真陰漸亡則陽邪益熾真元

之氣無所附麗乃成飛越或吐血發熱或二便燥閉
不通或筋骨悉痛或精神恍惚或五臟絕於內而利
不禁勻水不入死矣

論勞病可治症

勞病失血發熱咳嗽夢遺盜汗皆陰虛也而卒有可
治者皆脾胃太盛飲食多進致然大哉坤土乎萬物
賴之以養者此也血氣賴之以生者此也蓋脾土一
旺則飲食自調精血漸生雖有邪熱藥得以制之消

之久則邪日退而正日復此病之所以可起也若脾胃一弱則養血生精清肺之藥不無出入加減用之而脾胃日愈壞矣將見元氣下陷雖資腎而腎不生精雖養心而心不生血雖清肺而肺不生液蓋元氣一虧不能鼓舞乎諸經而生新陰補舊損也真陰不生則邪火日熾所謂不能壯水之主以制陽光也治何益哉予恒治十數人皆脾胃壯健元陽不虧伐相火之邪滋真水之正隨手輒効咸以是也故以告同

志

論真火動者病不可治

凡病真火動者皆不可治。豈獨腎哉。人之有腎猶木之有根。水之有源。制陽光。健筋骨。生精神。其所係亦重矣。愚者不知其重。而御內太過。腎室空虛。遂生內熱。挾相火而貫肝膈。入肺中。循喉嚨。系舌本。此咳嗽吐血。潮熱之所由來也。若傷損之輕。知覺之早。調養之專。猶可冀其生也。若至傷損之甚。重失血之頻。仍

邪火之日熾此真火之動於腎也不治

肺如華蓋其位高其氣清其體浮形寒飲冷先傷之

至於邪火尅金則傷之重矣故嗜飲之人肺先受熱

胃者火邪逐日薰蒸或成肺脹則咳嗽喘急或成癰

痿則音啞無聲皮毛乾枯癯瘦骨立此真火之動於

肺也不治

肝者將軍之官其性暴其動速無病則藏血有病則

逆血故經云大怒則令人煎厥暴絕使血苑於上蓋

大怒之人先動其肝。肝性猛烈氣卽逆上。血隨氣逆。大吐不止。肝室空虛。內火愈熾。心雖生血。肝不復納。心血雖臨不移時輒去矣。此真火之動於肝也不治。心者君主之官。神明出焉。心火亢極。形質焦枯。兼相火薰蒸。日隆月熾。忽爾大痛。唇青甲黑。朝發夕死。百無救一。此真火之動於心也不治。脾者倉廩之官。五味出焉。故飲食入胃。賴以運化。脾火暴盛。血液枯絕。胃雖能納。脾失轉運。泄瀉無度。補

則愈甚。清則濡甚。脉細而數。肌瘦骨立。此真火之動於脾也。不治。

治氣虛

世有真頭痛者。火炎水滅也。有真腹痛者。陽亢陰亡也。皆真火之動也。經曰。暴病暴死。皆屬於火。其此之謂歟。然亦有屬寒者。急溫之。猶可活也。

斗全火補湯

治氣血俱虛

以上五方並見中風

腎勞方

大格之人先動其肝。肝性猛烈。氣即逆上。血隨氣。天吐不止。肝空虛。內火愈熾。心雖生血。肝不復。心無難。不移時。去矣。此真火之。於肝也不。

開。然亦。有。氣。寒。者。愈。盛。之。陰。回。而。此。以。質。焦。枯。兼。

山。皆。真。火。之。燼。也。曰。暴。疾。暴。死。皆。氣。火。其。此。之。

山。有。真。氣。而。無。火。者。木。也。山。有。真。氣。而。無。火。者。木。也。

山。有。真。氣。而。無。火。者。木。也。山。有。真。氣。而。無。火。者。木。也。

山。有。真。氣。而。無。火。者。木。也。山。有。真。氣。而。無。火。者。木。也。

勞病方

四君子湯

治氣虛

四物湯

治血虛

八物湯

治氣血俱虛

六君子湯

治氣血挾痰

十全大補湯

治氣血俱虛而挾寒暑者

以上五方並見中風

腎勞方

虛損

當歸 川芎 熟地 知母 黃柏 五味

天冬 麥冬 杜仲 肉桂 白芍

加竹瀝童便薑汁

心勞方

當歸 川芎 白芍 熟地 茯神 附子

蓮心 遠志 菖蒲 硃砂

肝勞方

當歸 川芎 白芍 熟地 沙參 麥冬

五味 知母 貝母 桔梗 桑皮 滑波

款冬 紫苑 兜鈴 百合 百部

加童便竹瀝姜汁

脾勞方

人參 白朮 茯苓 甘草 白芍 蓮肉

以仁 山藥 猪苓 澤瀉 扁豆

肺勞方 治肺勞短氣皮毛枯澁津液不通氣力損

乏脉來遲緩

人參 黃芪 白朮 桂心 附子 姜棗

右方名黃芪湯合前五勞藥味參酌用之治虛勞以不傷胃氣爲主

二母散 治肺勞有熱不能服補氣之劑者

知母 貝母

等分爲末白湯下二錢

六味地黃丸 治腎勞妄藥凡腎經虛損新久憔悴

盜汗發熱五臟齊損瘦弱虛煩骨蒸痿弱下血咯

血○

熟地 八兩

山藥

山萸 四兩

茯苓

丹皮

澤瀉 三兩

右末蜜丸 梧子大白湯下五六十九忌蘿蔔

人參固本丸

治肺勞虛熱

人參 一兩

天冬

麥冬

生地

熟地 二兩

右末蜜丸淡塩湯下五六十九忌蘿蔔

崔氏八味丸

治腎經水火俱虛

虛損

三

集

熟地 山藥 山萸 四兩 丹皮 茯苓 澤瀉 兩

附子 肉桂 五錢

大補陰丸 降陰火補腎水

熟地 龜板 六兩 黃柏 知母 四兩

雄猪脊髓和蜜為丸淡塩湯下

補陰丸 一名虎潛丸

黃柏 八兩 龜板 四兩 知母 熟地 三兩 白芍

陳皮 半兩 二兩 頤陽 當歸 兩半 虎脛骨 一兩

右末酒煮羊肉丸淡鹽湯下冬月加乾姜五錢

加味虎潛丸

人參 黃芪 白芍 黃柏 川歸 山藥 一兩

鎖陽 枸杞 脛骨 龜板 鬼絲 杜仲

故紙 五味 七錢五分 牛膝 二兩 熟地 四兩

煉蜜和猪脊髓元梧子大淡鹽湯下五七十九丸

滋陰大補丸 補陰和陽 生血益精潤肌膚強筋骨

熟地 二兩 牛膝 山藥 兩半 杜仲 巴戟 山萸

虛損 三

肉苁蓉 五味 茯苓 茴香 遠志 一兩

枸杞 石菖蒲 五錢

右藥紅棗肉和蜜丸淡鹽湯下非虛寒者少服

與上虎潛丸間服更妙

補腎丸

黃柏 龜板 杜仲 牛膝 陳皮 二兩 乾姜 五錢

冬月加五味子姜汁糊丸空心白湯下

龜鹿二仙膠

鹿角 十觔
龜板 五觔
枸杞 三十
人參 十五
兩

如法熬膏初服酒化一錢五分加至三錢空

服

安神丸 治憂愁思慮傷心驚悸善忘夜不安卧

黃連 一兩
硃砂 一兩
當歸
生地
炙甘草 五錢

右末米糊丸

歸脾湯 治飲食過飽傷脾面黃善困

人參 黃芪 白朮 茯苓 圓眼肉 棗仁 二錢

虛損

遠志 一錢

當歸

木香

炙甘草

五分

人參養榮湯

治失血脈虛

人參

黃芪

陳皮

白芍

當歸

甘草

茯苓

五味

遠志

白朮

桂心

熟地

犀角地黃湯

治勞心動火吐血衄血

生地

生犀角

白芍

丹皮

右水煎服

天王補心丹

見火症

治勞慮傷心

補中益氣湯

見內傷

治勞倦傷脾

此藥者... 補中益氣... 治勞倦傷脾... 凡大凡... 補中益氣湯... 治勞倦傷脾... 凡大凡... 補中益氣湯... 治勞倦傷脾...

藥在... 補中益氣... 治勞倦傷脾... 凡大凡... 補中益氣湯... 治勞倦傷脾... 凡大凡... 補中益氣湯... 治勞倦傷脾...

補中益氣... 治勞倦傷脾... 凡大凡... 補中益氣湯... 治勞倦傷脾... 凡大凡... 補中益氣湯... 治勞倦傷脾...

補中益氣... 治勞倦傷脾... 凡大凡... 補中益氣湯... 治勞倦傷脾... 凡大凡... 補中益氣湯... 治勞倦傷脾...

遠志 一 當歸 木香 炙甘草

人參 黃連 厚朴 白朮 茯苓 白芍 丹皮 桂枝 熟地

茯苓 五味 遠志 白朮 桂枝 熟地

生地 生犀角 白芍 丹皮

石木 煎服 治勞心動火吐血衄血

漸中學康

見內

白芍 丹皮

眩暈者目花黑暗旋倒也其狀頭眩目閉身轉耳聾
如立舟車之上丹溪曰無痰不作眩此証屬痰居多
痰在上火在下火炎上而動其痰故作眩暈經曰諸
風掉眩皆屬肝木故治眩暈藥中當加制肝藥為佐
使然有氣虛血虛挾痰而眩暈者有傷風傷寒挾痰
而眩暈者有痰厥眩暈者有因嘔吐衄瀉崩漏便血
並產後失血過多而眩暈者有火動其痰作眩暈者

眩暈

宜各推類治之氣虛四君子人參益氣量加菊花川
 芎天麻血虛四物加貝母天麻秦艽陳皮甘草傷風
 寒荊芥穗防風薄荷天麻白芷川芎南星白附子
 牛身痲瘋加減白朮半夏天麻湯茶煎散諸失血過
 多者大補陰血自愈吐血即眩暈者胸中有死血迷
 閉心竅而然是宜行血清心自安產後眩暈即要畧
 謂新產婦有三症二日病鬱胃是也初昏倒不知人
 急燒舊漆器薰鼻竅即甦隨進十全大補倍參芪血

脫益氣陽生陰長之義也。火動其痰者，二陳加黃芩。
羌活蒼朮，挾氣虛者，亦以治痰為主。加補氣降火藥。
人肥白而作眩者，治宜清痰降火為先，而兼補氣之。
劑。人瘦黑而作眩者，治宜滋陰降火為要，而兼抑肝。
之劑。此治眩運之大旨也。

左手脉數熱多

脉澁而芤有死血

右手脉實有

痰積

脉虛大必是久病

左手人迎脉緩而浮大

者屬風

眩運方

四君子

見中風

治氣虛眩運

人參益氣湯

人參

生甘草

柴胡

一分

黃芪

炙甘草

五分

升麻

四分

五味

十粒

白芍

七分

四物湯

見中風

治血虛眩運

白朮 半夏 天麻湯

治痰厥眩運

白朮

神效

黃柏

茯苓

澤瀉

天麻

黃芪 人參 蒼朮 麥冬 半夏 五分

乾姜 三分

此全大補 見中風 治產後眩暈

川歸湯 治失血過多眩暈

川歸 川芎 各等分 加人參

此方治眩暈不可當者用大黃酒炒為末茶清調服
即愈虛弱人不可輕用

頭痛証 三十

頭者身之元首一有痛楚無論標本宜先治之但

絡有三陰三陽之不同見症有血虛氣虛之不一

又有風寒有暑熱有痰火痰厥有內傷有傷寒有

頭痛有眉稜骨痛有真頭痛症各不同治之者宜又

推類求之太陽頭痛惡風寒脈浮緊痛在巔頂兩額

角宜川芎羌獨活麻黃藥本土之少陽頭痛往來

寒熱筋弦痛連耳根宜小柴胡注之陽明頭痛發

熱自汗脈浮長大痛連月背刺齒牙身甚振石布白
芷主之。太陰頭痛有痰體重腹痛脈沉頭重蒼朮
半夏南星主之。少陰頭痛三陰三陽經不流行而
足寒氣逆脈沉細宜麻黃附子細辛主之。厥陰頭
痛吐痰沫厥冷脈浮緩痛引目系吳萸湯主之。此六
經頭痛兼挾外邪也。氣虛頭痛耳鳴九竅不利勝
胃之所生也。痛在清晨治宜補中益氣倍參。或川芎
藥本。血虛頭痛者自魚尾上攻頭痛多在日晚治

宜四物倍芍歸加正辛。氣血兩虛者調中益氣加

川芎蔓荊細辛。痰厥頭痛眩運白朮半夏天麻湯。

風濕熱頭痛。清空膏。風寒感冒頭痛。防風羌活。

藁本白芷。內傷頭痛。乍痛乍止。補中益氣加川芎。

蒼朮山查神麩。傷寒頭痛而不止。治見傷寒門。

偏頭痛者。頭半邊痛是也。在左屬風。及血虛。風用荆。

芥薄荷。血虛。芍歸栢芍。在右屬痰。與熱痰。用蒼朮半。

夏熱。用酒炒芩連。有肩稜骨痛。不可忍者。此屬風。

熱與痰用選奇湯。若真頭痛者，甚則腦盡痛，手足
冷至節，此火炎水滅也，死不治。凡治頭痛，通用茶
煎散茶調散。二陳湯治頭痛，皆用風藥者，以高巖之
上惟風藥可到故也。頭痛須用川芎，如不愈，各用別
經藥。

太陽川芎

湯明白芷

少陽柴胡

太陰蒼朮

少陰細辛

厥陰吳萸

巔頂痛宜葉本防風酒炒柴胡升麻

內經曰寸口脉中短者頭痛也

脉經曰陽弦則頭痛

又曰寸

口脉浮中風發熱頭

痛

脉緊頭痛是傷寒

脉緊上寸口者傷風頭痛

脉訣云頭痛短滑應須平浮滑風痰皆易除

Vertical text on the right side of the page, possibly a title or a specific section header.

其考元... 康... 國... 民... 年... 德... 皇... 帝... 乙... 卯... 年... 春... 月... 朔... 日... 庚... 子... 時... 祭... 天... 壇... 禮... 畢... 遣... 百... 官... 詣... 太... 廟... 行... 禮... 禮... 畢... 遣... 百... 官... 詣... 太... 廟... 行... 禮... 禮... 畢... 遣... 百... 官... 詣... 太... 廟... 行... 禮...

○... 禮... 畢... 遣... 百... 官... 詣... 太... 廟... 行... 禮... 禮... 畢... 遣... 百... 官... 詣... 太... 廟... 行... 禮... 禮... 畢... 遣... 百... 官... 詣... 太... 廟... 行... 禮...

○... 禮... 畢... 遣... 百... 官... 詣... 太... 廟... 行... 禮... 禮... 畢... 遣... 百... 官... 詣... 太... 廟... 行... 禮... 禮... 畢... 遣... 百... 官... 詣... 太... 廟... 行... 禮...

○... 禮... 畢... 遣... 百... 官... 詣... 太... 廟... 行... 禮... 禮... 畢... 遣... 百... 官... 詣... 太... 廟... 行... 禮... 禮... 畢... 遣... 百... 官... 詣... 太... 廟... 行... 禮...

頭痛方

小柴胡湯

見瘟

治少陽頭痛

麻黃附子湯

治少陰頭

吳茱萸湯

吳茱萸 生薑

五錢

人參

二錢五分

加大棗水煎

補中益氣湯

見內傷

治氣虛內傷頭痛

本方倍黃芪加川芎藜本

四物湯

見中風

治血虛頭痛

本方倍歸芎加白芷細辛

調中益氣湯

見內傷

治氣血兩虛頭痛

本方加川芎蔓荊子細辛

白朮半夏天麻湯

見眩暈

治痰結頭痛

清空膏

治偏正頭痛

治風濕熱頭痛上塞頭目

發腦痛不止者除血虛頭痛不治

川芎

五錢

柴胡

七錢

黃連

防風

羌活

炙甘草 兩半
片苓 三兩半
生半炒

右末入杯內茶調如膏白酒臨卧送下

避毒湯 治肩稜骨痛

羌活 二錢
防風 二錢
甘草 一錢
片苓 一錢
冬炒川

水煎食後服

茶調散 治諸風上攻頭目昏痛鼻塞聲重

薄荷 四兩
荆芥 二兩
川芎 二兩
羌活 一兩
白芷

炙甘草 一兩
細辛 五錢
防風 二錢
五分

右末食後茶清調下二錢五分

安神湯 治頭旋眼黑

生甘草

炙甘草

二錢

防風

二錢五分

柴胡

升麻

生地

酒浸

知母

酒浸 五錢

酒栢

羌活

一兩

黃芪

二兩

共用水煎熟加入蔓荆子五分川芎三分再煎

臨卧時熱服

徹清膏

蔓荆子

藁木

一錢

細辛

一分

薄荷

川芎

三分

生甘草 炙甘草 五分

石為末茶清調下二錢

茶煎散

川芎 一錢 薄荷 白芷 細辛 羌活 荆芥

藁本 辛夷 防風 五分 甘草 五分

加細茶一撮同煎服

瓜蒌 荖 豨 同 煎 煎 煎

藥木

辛夷

川風

正合

甘草

正合

川芎

一 煎 煎

白芷

煎 煎

煎 煎

煎 煎

茶煎

法 煎 煎 煎 煎 煎 煎

生甘草

炙甘草

正合

胃脘心痛証 三十一

胃脘痛俗呼為心痛。古方名為脾疼。蓋胃之上。即名
賁門。賁門與心相連。故經所謂胃脘當心而痛是也。
其症由積痰食積鬱於中。七情九氣觸於內。以致清
陽不升。濁陰不降。而肝木之邪。得以乘機侵侮。而為
病也。然其病不一。有真心痛者。客寒觸犯心君。或汚
血冲心。手足青黑過節。腕者。且發夕死。其餘有痰有
火。有死血。有客寒。犯胃有虛痛。有實痛。有食積痛。有

蟲痛。治火用牛黃丸定痛神効。煎藥用葶連梔子。

末藥。或用白蒺藜作散服。治痰用玄明粉水調服。

或用搽面粉生炒各半。俱量人虛實用。二錢湯用。

二陳加枳實片。芩山梔木香少許。死血在胃脘宜。

桃仁承氣加玄胡紅花歸尾。先用葶汁頻飲之。治。

客寒犯胃用草豆蔻丸。劫止如神。或藶合香丸湯藥。

用姜砂仁木香。虛痛以物柱按痛處則痛止者是。

也。宜理中湯二陳湯加和血藥。久病元氣虛弱肢體。

怯薄脉弱手欲按者六君子加砂仁香附 實痲因

氣怒飲食卒痛便閉心胸高起手不可按是也二陳

加行氣消食藥 蠱痛者必面上有白斑唇紅能食

時作時止二陳加苦練根煎服 丹溪曰治心痛當

分新久若明知身受寒氣口食寒物於初病之時當

用溫散溫利之劑若稍久而成鬱鬱則成熱若用溫

劑寧不助痛添病乎故古方多用山梔爲君熱藥爲

之向導則邪易伏病易退此病雖日久不食不死若

痛纔止卽恣口腹痛必再作此確論也

火脉浮散痰脉滑實死血脉濇寒脉沉遲

虛脉軟弱細小實脉敦實而滑痛甚脉伏蟲

脉沉弱而弦面上有白斑唇紅能食時作時止或吐

涎沫

要畧曰陽微陰弦則胸痺而痛責其虛也

今陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其脉陰菽故

也胸痺之病喘急咳嚔胸痺痛短氣寸口脉沉而

胃脘心痛方

用効煎方 治火痛痰痛

山梔一錢 陳皮 赤茯苓 貝母 青皮 香附

玄胡 川芎 白厚朴 五分 草薢仁 二分

有死血加丹皮桃仁 有猛痰加胆星半夏

牛黃丸 治火定痛

白牽牛 醋大黃 一兩

之味為末水丸黍米大如人二錢弱入七分稍

行自愈

白蒺藜散 治火痛

白蒺藜一兩 桃柳條同炒研末 酒調下三錢

又方 治痰痛

玄明粉一錢 白湯下

桃仁承氣湯

見瘟

治死血在胃脘作痛

本方加桃仁紅花歸尾先用葶汁頻叩之

草豆蔻丸 治客寒犯胃作痛

薤仁

一兩

橘紅

人參

殭蚕

黃芪

益智

一錢

甘草

生炙

歸身

青皮

六錢

澤瀉

小便利者減半

半夏

一兩

桃仁

七粒

麥芽

兩半

神麩

柴胡

腸不痛者減半

姜黃

四錢

吳茱

一錢

右除桃仁另研餘共為末蒸餅九梧子大白湯

下一二服不可多用

二陳湯

見中風

治飲食兼怒卒痛便閉心胸高

起手不可按

本方加行氣消食藥

方 治蟲痛 二陳加苦練根煎服

失笑散 治心氣痛并治小腸氣痛

蒲黃 五靈脂

等分先以醋二杯煎成膏再入水一鍾煎食前

熱服心膈大痛攻走腰背發厥嘔逆諸藥不効

者就吐中以鷓鴣翎撲之去痰碗許而痛即止

黃丸子 治心痛極驗并治裏急後重作痢亦効

木香

檳榔

茯苓

五錢

三棱

莪朮

甘草

錢四

陳皮 黃連 黃芩 六錢 黃柏 枳殼 三錢

青皮 大黃 牽牛 一兩 白芨 七錢 香附 八錢

右未水丸 萊豆大量人虛實多寡用之

泰山奪命還魂丹 治心氣虛痛極驗

黃芩 黃連 枳殼 石膏 當歸 熟地

木香 生地 薄荷 菊花 半夏 製 黃柏

兔絲 酒炒 桂皮 桔梗 甘草 陳皮 蔓荊 一兩

白茯苓 柴胡 小茴 炒 殭蚕 炒 人參 白芍 炒

知母

杜仲

二兩

羌活

防風

二兩半

蛤蚧

一對

白朮

藁本

川芎

麻黃

天麻

獨活

兩半

全蝎

骨皮

細辛

一兩

為末蜜丸彈子大金箔為衣每服一九因病用

湯下

中風癱瘓酒化下

經水不調紅花酒下

一身筋骨疼熱醋下

痰喘噎食木香酒下

心氣痛熱醋下

寒嗽吐痰冬花酒下

頭風痛茶清下

喘逆氣急桑皮湯下

風虫牙痛花椒湯下

嘔吐生姜湯下

驚癇吐沫温酒下

跌打桃仁湯下

赤白痢烏梅湯下

血淋黃胆車前湯下

浮腫肚脹東皮湯下

耳鳴氣閉茱萸湯下

胎前產後香附酒下

小腸疝氣茴香酒下

腰背疼牛膝湯下

遺精白濁茯苓湯下

目昏暗菊花湯下

瘧疾桃枝湯下

腸風下血槐花湯下

雙鵝喉閉薄荷湯下

痞塊積聚木香湯下

大小便閉大黃湯下

盜汗不眠浮麥湯下

筋骨痛威靈仙湯下

脫肛痔漏片苓湯下

胸膈脹滿紫蘓湯下

泄瀉燈草湯下

傷風發熱葱白湯下

血崩藕節湯下

無名腫毒金銀花湯下

腹痛証 三十一

丹溪曰腹痛有寒有火熱有死血有食積有濕痰有
虛有實 夫寒痛者常痛而無增減是也陳無已曰
陰寒為邪則腹痛而兼吐利治宜理中加吳萸玄胡
世者入桂附 火熱痛者時痛時止原病式曰熱鬱
六內則腹滿堅結而痛不可例言為寒也脈洪者黃
芍藥湯便秘脈大者宜下調胃承氣湯脩急丸
死血痛者痛有常處而不移陳無已曰邪氣聚於下

卷五 腹痛

別集

焦津液不通。氣血不行。或溺或血。留滯於下。是生脹。滿。小便利者。宜川芎。白芍。歸尾。桃仁。紅花。跌打瘀血。宜桃仁。承氣。若小便不利者。則爲溺澁之症。非畜血也。食積痛者。痛甚。便欲大便。便後則痛減。脉弦。宜溫散之。保和丸。加行氣利氣藥。以食得寒。則滯得熱。則行也。或用吐法。濕痰痛者。凡痛二便不利。脉滑。以痰因氣滯而聚。阻碍道路。氣不得宣通。故痛。治宜導痰開鬱。二陳湯。實痛者。腹脹滿。手不可按。元氣

實者宜推蕩之大承氣湯。虛痛者以手按之則痛。

止戴人云其人本體原弱或大病後氣血兩虛不可。

拘於諸痛不可用參芪之語急投溫補重劑四君子。

理中加順氣藥汗多倍加參芪炒白芍。治腹痛必。

用溫散藥以其鬱結不行阻塞不運故也凡人臍下。

忽大痛人中黑色者多死不治。

凡存胃脘下痛者多屬食積。臍痛者屬火。臍左右。

少腹痛者多屬死血。少腹痛者屬寒。當以部位辨之。

白芍藥惟治血虛腹痛餘不治。今考古方治腹痛用
白芍四錢。生甘草二錢甚効。又考白芍不惟治血虛
而能大行氣。腹痛者榮氣不從逆於肉裏。今得白芍
行其榮氣。而又以甘草之甘緩和其逆氣。此不治之
治。乃所以深治之也。大抵痛隨利減。故有選臍大痛
勢急欲死。百藥不効。後用大承氣連下二次。方止。確
黃或各用至五錢以上。方効。然此法亦不得已而用。
未可視爲常例也。亦有寒痛者。多在少腹。宜吳萸湯。

甚者椒附及炒鹽葱熨之

脉經曰脉細小緊急病速進在中腹中刺痛陰弦

則腹痛脉急小腹痛尺脉緊臍下痛尺脉伏

小腹痛癢疝尺脉實小腹痛當利之心腹痛不

得息脉細小遲者生脉大而疾者死黃腹痛脉反浮

大而長者死

見雜說

治虛寒腹痛

本方加吳茱萸玄胡甚者加桂枝

治大痛

大而尋常

息氣小變

氣大而尋常

小氣

只氣實小

氣小

氣

氣急小

氣氣

氣

氣曰氣小氣急氣

氣

氣

氣

腹痛方

用効治腹痛方

白芍

二錢五分

甘草

一錢

青皮

陳皮

砂仁

玄胡

山楂

七分

烏藥

五分

脇痛加柴胡五分

熱加黃芩五分

理中湯

見霍亂

治虛寒腹痛

本方加吳萸玄胡甚者加桂附

黃芩芍藥湯

治火痛脉洪

調胃承氣湯 見見瘟

治火痛脉大便秘

脩急丸 見內傷

治全上

桃仁承氣湯 見身瘟

治死血痛

保和丸 見內傷

治食積痛

本方加行氣利氣藥

二陳湯 見中風

治濕痰痛

本方加導痰開鬱藥

大承氣 見瘟

治實痛腹脹滿手不

六君子湯

見中風

治虛痛以手按之則痛止

四逆湯

見濕

治少腹痛

有寒濕有濕熱有痰

承氣湯

見溫

治速臍痛

虛痛有定處

重○大○便○黑○小○便○黃○赤○者○屬○死○血○往○來○走○痛○者○屬○

積○冷○身○重○如○帶○五○斤○錢○或○過○陰○寒○即○作○疝○

解○者○屬○寒○濕○痛○而○或○作○或○止○者○屬○濕○熱○

虛○者○麻○大○宜○補○之○煨○腎○丸○知○柏○杜○仲○柳○柏○山○萸○薤○

...

卷五

情急丸

見內傷

治全上

保和丸

見內傷

治食積

本方加行氣利氣藥

辰泉散

見傷

的雙劑

四逆散

見傷

治心氣

六桂汗湯

見中風

白朮散以平味甘四散

低階腰痛証三十三

丹溪曰腰痛有腎虛有瘀血有寒濕有濕熱有痰積

有挫閃痛而不可已者屬腎虛痛有定處日輕夜

重○大○便○黑○小○便○黃○赤○者○屬○死○血○往○來○走○痛○者○屬○瘀

積○腰○冷○身○重○如○帶○五○千○錢○或○遇○陰○寒○即○作○晴○爨○即

解○者○屬○寒○濕○痛○而○或○作○或○止○者○屬○濕○熱○治○法○腎

虛○者○脉○大○宜○補○之○煨○腎○丸○知○柏○杜○仲○朮○杞○山○萸○菟○絲

子○瘀○血○者○脉○澹○宜○逐○之○四○物○加○桃○仁○紅○花○菴○朮○乳

腰痛

香沒藥。濕熱者脉緩宜分利之。滲濕湯。蒼朮湯。加

杜仲。黃栢。川芎。痰積者脉伏滯宜開導之。二陳湯。

加蒼朮。南星。竹瀝。杜仲。挫閃者宜行之。用如神湯。

寒濕痛即腎着痛。治宜滲濕。無用温散。腎着湯。

經曰。動搖不能。腎將憊矣。故腰痛雖有五症。其原皆

本於腎虛。蓋腰者腎之府。人身之大關節。諸經皆貫

於腎而絡於腰。故腎經一虛而腰痛諸病作矣。正經

所謂邪之所湊。氣必虛是也。諸腰痛不宜用補氣藥。

亦不可峻用寒涼藥。

腰痛之脉皆沉。弦沉弦緊者爲寒。沉弦而浮者爲風。沉弦而濡細者爲濕。沉弦而實者爲挫閃。丹溪曰：脉必沉而弦。沉爲滯，弦爲虛。濇者是瘀血，緩者是濕滑者，伏者是痰，大者是腎虛也。

開卷之三陳俊

亦吳... 卷五

其對曰... 卷五

此亦... 卷五

聖諭文... 卷五

衣不... 卷五

腰痛方

煨腎丸

治腎虛痛不止

杜仲三錢炒去絲為末用猪腰一具薄切六七斤
入藥在內濕紙包裹漫火煨熟空心常酒下三鍾

送下

補腎丸

見勞

治腎虛腰痛

四物湯

見中風

治瘀血痛

加桃仁紅花蘓木乳香沒藥

卷五
滲濕湯

治寒濕所傷身體重着如坐水中

蒼朮

白朮

茯苓

甘草

乾姜

橘紅

丁香

加姜棗煎服

蒼朮湯

治濕腰腿疼痛

防風

蒼朮

黃柏

柴胡

二陳湯

見中風

治痰積痛厥伏瀉

本方加蒼朮南星杜仲竹瀝

如神湯

治挫閃腰痛

川芎

肉桂

大胡

丹皮

桃仁

腎着湯

治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便

便利

乾姜

炮

茯苓

一錢

甘草

炙

白朮

抄

一錢

立安散

治腰痛不止緩弱冷痺行步無力空心服

蒼朮

防風

知母

澤瀉

黃芩

生地

猪苓

當歸

五分

甘草

炙

茵陳

羌活

八分

卷五 腰痛

年

集

不利者去生地

摩腰丹

治年老虛人腰痛

附子尖

烏頭尖

南星

二錢五分

雄黃

一錢

獐腦

丁香

乾姜

吳萸

一錢五分

硃砂

麝香

三分

右末蜜丸如龍眼大每用一九姜汁化開如粥

厚火上煨熟置掌中摩腰上俟藥盡粘腰上再

烘熱帛包縛定隨卽覺熱如火日易一次

獨活寄生湯

治腎虛氣弱為風濕所乘流注腰膝

導牽掣痛不得屈伸或弱冷痺行步無力

獨活 桑寄生 細辛 牛膝 秦艽 茯苓

白芍 桂心 防風 人參 熟地 川歸

杜仲 甘草 各五分

如無桑寄生以續斷代下利者去地黃水煎空

心服

當歸拈痛湯 治濕熱為病腰瀉上牽肩背肢節皆

痛胸膈不利

白朮酒炒 人參 升麻 苦參酒炒 乾葛

蒼朮五分 防風 知母酒炒 澤瀉 黃芩酒炒

猪苓 當歸六分 炙甘草一錢 茵陳 羌活以分

一 方加生黃芩五分

青娥丸 治腎虛腰痛

破故紙酒浸片 川草薢童便浸 黃芩酒炒 知母酒炒

杜仲姜鹽汁炒去絲 牛膝酒各 核桃肉去皮

共蜜為丸

脇痛証

三十四

胸脇者肝膽二經往來之道路也。故木氣受傷，常在於胸中。肝氣實盛，痛在兩脇。然脇痛之病，有數証焉。一、歲木太過，肝氣旺盛，兩脇充滿，莫能舒泄，壅脹為痛。一、勢急難支，此肝火之盛為之也。一、稀涎宿痰，留注兩脇，或僻一脇，綿綿隱痛，或作或止。一、有嘔惡，則吊動掣痛。久則形腫，色赤，堅硬不移。若以腫毒治之，增劇。此痰氣之結為之也。一、心火生血，肝納血，肝有熱則妄。

行注於脇則脇痛或紫黑或結塊上部抵當湯中部
桃仁承氣湯皆稱捷効此汚血之積爲之也又歲
金肅烈制木太過致肝氣鬱而不伸兩脇痛而不止
此須抑金扶木瀉白散合阿膠四物湯瀉有餘而補
不足使兩氣和平則痛自止此肝氣被鬱爲之也
又有傷寒往來寒熱胸脇痛耳聾此雖屬少陽然膽
者肝之府痛甚則肝氣亦受損傷惟小柴胡少加牡
蠣胆草則二經皆平矣此傷寒之虛熱爲之也又

有飲食填塞太陰肝氣被壓然肝者將軍之官其性
猛烈不受壓制上冲之則胃脘痛橫行之則兩脇痛
惟消食順氣少兼溫散則食下而肝氣自舒脇痛自
止有醫言脇下一條杠心作痛者食積也夫飲食入
胃安得出脇而為杠起以食積偏墜一邊而近脇作
痛故醫云然孰信哉信以理而已矣又有控閃跌
撲一症或氣鬱或血積亦作脇痛若以涼藥治之則
痛益甚須用行血行氣之劑而兼溫藥以散之輒効

又有陽虛陰虛二症皆屬之不足非可以有餘者
例治也有陰虛火動咳喘不吊動兩脇而痛者有肝氣
橫行兩脇而大痛者此但火爲之用蘆薈丸二痛皆
止但勞症本病莫之能療其肝氣虛並元氣弱而
痛者若以用氣實盛治之立禍惟四物少加炒鹽以
補肝四君子少加柴苓以補氣則虛回而痛自止矣
凡此皆身經親歷而驗之非敢泛論以悞人也
脉雙弦者肝氣有餘兩脇作痛

脇痛方

當歸龍薈丸

瀉肝火太盛之要藥因內有濕熱

脇痛甚伐肝木之氣實者

當歸

龍胆草

山梔

黃連

大黃

蘆薈

青黛

五錢

木香

二錢五分

麝香

五分另研

右末神麩糊為丸梧子大每服二十丸姜湯下

一方加青皮一兩柴胡五錢

加減小柴胡合龍胆瀉肝湯

治肝火盛脇痛

柴胡 一錢
白芍 一錢
半夏 半錢
黃芩 一分
人參 一分
青皮 一分

歸稍 一分
車前 五分
胆草 三分
枝子 四分
甘草 三分

姜一片煎服仍下龍薈丸一二次

又用効方 治肝木太盛脇痛不止

白芍 一錢
青皮 一分
柴胡 一分
牡蠣 一分
陳皮 七分

胆草 四分
蘆子 一分
通草 五分
黃連 一分
厚朴 三分

甘草 二分

伐肝養血潤燥湯 治火盛脇痛血衰溺赤便秘

白芍 歸稍 桃仁 一錢 青皮 柴胡 八分

郁李仁 生地 七分 山梔 胆草 川連

通草 五分

祛痰散腫降火開鬱方 治痰注脇下形高色赤

半夏 白芥子 松節 一錢 陳皮 黃芩

歸身 七分 海粉 六分 胆星 香附 赤茯苓

川連 羌活 五分 薄荷 四分

加童便竹瀝冲服

抵當湯 治肝血脇痛

桃仁承氣湯 見瘟 治全上

瀉白散合阿膠四物湯 見火 治肝氣被鬱脇痛

小柴胡湯 見瘟 治傷寒寒熱外來耳聾胸脇痛

本方加牡蠣胆草

保和丸 見內傷 治食積脇痛

四物湯加炒鹽補肝 治元氣虛弱脇痛

四君子湯加柴胡茯苓以補氣 治全上

推氣散 治右脇痛甚脹滿不食

姜黃 枳殼 桂心 五錢 甘草 二錢

右末姜湯下煎服亦可

枳芎散 治左脇痛

枳實 川芎 五錢 炙甘草 一分

右末姜湯下二錢

驗方

柴胡 半夏 片苓 甘草 白芍 青皮

茯苓 陳皮 左痛加胆草 右痛加荀子

姜三片煎服

麻黃 瓜蒂 正陰 羌活 甘草 正陰

麻黃 瓜蒂 正陰

茯苓 陳皮 煎服

姜黃 麻黃 麻心 正陰 甘草 二錢

麻黃 瓜蒂 正陰 煎服

背痛証

三十五

經曰背者胸之府背曲肩垂府將壞矣是知背乃太陽膀胱經所主夾背四脉直下其位高其氣清凡病犯背者咸稱重病若發背若對口瘡若肩背大痛輕者可救重者難治除外科所屬者姑置勿論而背痛之症亦有五焉按經云諸陽受氣於胸中而轉行於背若三陽之火盛而潛行於背則背大痛難忍始發者卽以當歸粘痛合蔥手降氣加減用之則升清降

濁而火可散濕亦流矣如痛積日久氣血日衰邪着
不出恒見其危者衆矣人有寒氣積於胸中而爲心
痛徹背背痛徹心仲景用烏頭赤石脂丸以溫散之
所謂溫中散表皆不遠熱是也又有痰涎流滯在背
或隱隱酸痛或一點揪痛或上下左右更換而痛甚
氣滯則痰亦滯氣行則痰亦行故濕痰宜燥結痰宜
潤皆以順氣爲先氣順痰行痛自息矣人有腎氣不
循故道逆而上行臟病必傷於腑背重而痛如有所

負○而○然○必○用○滋○腎○丸○或○四○物○加○知○母○黃○柏○杜○仲○牛○膝
以○壯○水○之○主○水○足○則○又○循○故○道○而○病○痊○矣○又○有○病○後
虛○損○元○氣○不○充○以○入○之○又○有○汗○多○亡○陽○汗○過○多○則○心
液○損○耗○陽○不○足○故○致○痛○也○二○者○皆○當○溫○補○不○可○用○疎
利○之○藥○愈○疎○則○愈○痛○此○理○至○微○不○可○不○慎○

除之藥氣則散於微而止其毒不消其本

其毒其固本只為藥氣也一法其毒散而不死則

以時元遠本亦以人之氣其法其毒散而不死則

以非本之主本只明大陰其毒散而不死則

其毒散而不死則

背痛方

治背痛神驗方

羌活 秦艽

赤茯苓 片苓

陳皮

半夏

八分

防風 烏藥

薤子

五分

加姜三片煎服

當歸 枯痛湯合 蕪子 降氣湯

治肩背痛濕熱甚

人參 白朮

苦參

秦艽

四分

知母

黃芩

羌活

當歸

薤子

五分

葛根

蕪子

茵陳

蒼朮 三分
升麻 二分

水煎服看症再加減

火盛背痛方 如其人素弱必兼滋補

人參 茯苓 當歸 川芎 羌活 秦艽

片苓 知母 菖子 蘇子

加姜棗煎服

烏頭赤石脂丸 治心痛徹背背痛徹心

蜀椒 烏頭 附子 乾姜 赤石脂

右末蜜丸梧子大食先服二三丸

痰涎流滯在背作痛方

半夏 赤茯苓 一錢 羌活 海粉 八分 陳皮 前胡

片苓 花粉 七分 草薺 香附 藟子 五分

生甘草 三分

加姜棗煎服

治腎氣熱盛不循故道逆上太陽作背痛方

知母 滑石 錢 杜仲 八分 熟地 白芍 當歸

背痛

黃柏 牛膝 北分

石斛 甘草稍 五分 在 一分

蘓子 三分

加淡竹葉十

養榮益元湯

氣虛損及汗多亡陽背痛

人參 白朮

芪 當歸 棗仁 麥冬 八分

茯神 七分 川

麻黃根 五分 升麻 五分 五味 十粒

加龍眼肉

蒼生司命卷之五終