


欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷二



詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

備急千金要方卷二

唐孫思邈撰

宋林億等校正

婦人方

卷子第一

論方法

序

曰夫婦人之別有方者以其胎妊生產崩傷之異故
是以婦人之病比之男子尤倍難療經言婦人者衆

腰所集而與濕居十四日上陰氣浮溢百想經心內傷

五藏外損姿顏月水去留前後交互瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不可具論生熟二臟虛實交錯惡血內漏氣脉損竭或飲食無度損傷非一或瘡痍未愈便合陰陽或便利於懸廁之上風從下入便成十二痼疾所以婦人別立方也若是四時節氣為病虛實冷熱為患者故與丈夫同也惟懷胎妊而挾病者避其毒藥耳其雜病與丈夫同則散在諸卷中可得而知也然而女人嗜慾多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎嫉妬憂恚

染著堅牢情不自抑所以為疾根深療之難瘥故養生
之家特須教子女學習此三卷婦人方令其精曉即于
倉卒之秋何憂畏也夫四德者女子立身之樞機產育
者婦人性命之長務若不通明于此則何以免于夭枉
者哉故傳母之徒亦不可不學常宜繕寫一本懷挾隨
身以防不虞也

論曰人之情性皆願賢已而疾不及人至於學問則隨
情逐物墮於事業詎肯專一推求至理莫不虛棄光陰

沒齒無益夫婚姻養育者人倫之本王化之基聖人設教備論厥旨後生莫能精曉臨事之日惛爾若愚是則徒願賢已而疾不及人之謬也所實不達賢已之趣而妄徇虛聲以終無用今具述求子之法以貽後嗣同志之士或可覽焉

論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德合并本命不在子休廢死墓中者則求子必得若其本命五行相尅及與刑殺衝破并在子休廢死墓中者則

求子了不可得慎無措意縱或得者於後終亦累人若其相生并遇福德者仍須依法如方避諸禁忌則所誕

兒子盡善盡美難以具陳

禁忌法受胎時日推王相貴宿日法在二十七卷中

論曰凡人無子當為夫妻俱有五勞七傷虛羸百病所致故有絕嗣之患夫治之之法男服七子散女服紫石門冬圓及坐藥盪胞湯無不有子也

七子散治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不足方

五味子

鍾乳粉

牡荆子

菟絲子

車前子

菥蓂子

石斛

乾地黃

薯蕷

杜仲

鹿茸

遠志各八銖

附子

蛇床子

芎藭各六銖

山茱萸

天雄

人參

茯苓

黃耆

牛膝

各五銖

桂心

十銖

蓴蓉

十一銖

巴戟天

十二銖

右二十四味治下篩酒服方寸匕日二不知增至二匕以知為度禁如藥法不能酒者蜜和圓服亦得一方加覆盆子八銖求子法一依後房中篇

朴硝盪胞湯治婦人立身已來全不產及斷緒久不產

三十年者方

朴硝

牡丹

當歸

大黃

桃仁

生用各三銖

細辛

厚朴

桔梗

人參

赤芍藥

茯苓

桂心

甘草

牛膝

橘皮

各二銖

附子

六銖

虫蟲

水蛭

各十枚

右十八味㕮咀以清酒五升水五升合煮取三升分

四服日三夜一每服相去三時更服如常覆被取少
汗汗不出冬日著火籠之必下積血及冷赤膿如赤
小豆汁本為婦人子宮內有此惡物使然或天陰脣
下痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣
力弱大困不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪
可食酢飯冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得
藥力若能忍服盡大好一日後仍著導藥千金翼方不用桔梗

甘草

野道候

野道者是無主之蠱也人有畜事蠱以毒害人為惡既積乃至死滅絕其蠱則無所依止浮游田野道路之間有犯害人者其病發猶是蠱之狀但以其於田野道路得之故以謂之野道

射工候

江南有射工毒蟲一名短狐一名蜮常在山澗水內此蟲口內有橫骨狀如角弓其蟲形正黑狀如肉蠻生齒

蠶蟻候

陶隱居云蠶蟲方家亦不能的辯正云是蝘蜓子或云是小烏蟲尾有兩歧者然皆恐非也疑即是𧇵𧇵尾歧而曲上故周詩云彼都人士拳髮如蠶

蜈蚣蟻候

此則百足蟲也雖復有毒而不甚蟻人人誤觸之者故時有中其毒

蜞蜍著人候

石斛

辛夷

各二兩

人參

桑寄生

續斷

細辛

厚朴

乾薑

食茱萸

牡丹

牛膝

各三
十銖

柏子仁

一兩

薯蕷

烏賊骨

甘草

各一
兩半

右二十六味為末蜜和丸如梧桐子大酒服十九日
三漸增至三十九以腹中熱為度不禁房室夫行不
在不可服禁如藥法比來服者不至盡劑即有娠
白薇圓主令婦人有子方

白薇

細辛

防風

人參

秦椒

白歛

一云
白芷

桂心

牛膝

秦艽

蕪荑

沙參

芍藥

五味子

白僵蠶

牡丹

蛴螬

乾漆

柏子仁

乾薑

卷柏

附子

芎藭

各三
十銖

桃仁

紫石英

各一
兩半

鍾乳

乾地黃

白石英

各三
兩

鼠婦

半
兩半

水蛭

蟻蟲

各十
枚

吳茱萸

十八
銖

麻布叩幘頭一尺燒

右三十二味為末蜜和丸如梧桐子大酒服十五丸
日再稍加至三十丸當有所去小覺有異即停服
又方治久無子或斷緒上熱下冷百病皆治之方

白薇

乾地黃

乾薑

車前子

蜀椒

各十
八銖

紫石英

藁本

石膏

菴藴子

卷柏

各三
十銖

澤蘭

赤石脂

白龍骨

遠志

麥門冬

茯苓

太乙餘糧

各二兩

當歸

芎藭

蛇牀子

各一兩

覆盆子

桃仁

人參

各一兩半

桂心

蒲黃

各二兩半

細辛

三兩

橘皮

半兩

右二十八味為末蜜和丸如梧子大酒服十五丸日再漸增以知為度亦可至五十九慎猪雞生冷酢滑魚蒜驢馬牛肉等覺有娠即停三月正擇食時可食牛肝及心至四月五月不須但不可故殺令子短壽

遇得者大良

金城大守白薇圓治月水不利閉塞絕產十八年服此

藥二十八日有子方

白薇

細辛各三
十銖

人參

杜衡

古今錄驗
用牡蠣

牡蒙

厚朴

半夏

白僵蠶

當歸

紫菀各十
八銖

牛膝

沙參

乾薑

秦艽各半
兩

蜀椒

附子

防風各一
兩半

右十七味為末蜜和丸如梧子大先食服三丸不知
稍增至四五丸此藥不可長服覺有娠即止用之大

驗

崔氏有桔梗丹參十八銖

論曰古者求子多用慶雲散承澤圓今代人絕不用此
雖未試驗其法可重故述之

慶雲散治丈夫陽氣不足不能施化施化無成方

覆盆子

五味子

各一升

菟絲子

二升

天雄

一兩

石斛

白朮

各三兩

桑寄生

四兩

天門冬

九兩

紫石英二兩

右九味治下篩酒服方寸匕先食服日三素不耐冷者去寄生加細辛四兩陽氣不少而無子者去石斛加擯榔十五枚

承澤圓治婦人下焦三十六疾不孕絕產方

梅核仁

辛夷

各一升

葛上亭長

七枚洩疏

三兩

藁本一兩

澤蘭子

五合

右六味為末蜜和丸如大豆先食服二丸日三不知

稍增若腹中無堅癖積聚者去亭長加通草一兩惡
甘草和藥先以苦酒搜散乃納少蜜和為丸

大黃圓治帶下百病無子服藥十日下血二十日下長
蟲及青黃汁三十日病除五十日肥白方

大黃

破如米豆
熬令黑

柴胡

朴硝

乾薑

各一升

芎藭

蜀椒

二兩

茯苓

如雞子
大一枚

右七味為末蜜和丸如梧桐子大先食服七丸米飲
下加至十九以知為度五日微下

吉祥圓治女人積年不孕方

天麻

柳絮

牡丹

茯苓

乾地黃

桂心

各一兩

五味子

桃花

白术

芎藭

各二兩

覆盆子

一斗一百枝

菟絲子

楮實子

各一升

右十四味為末蜜和丸如豆大每服空心飲苦酒下
五丸日中一服晚一服

消石大黃圓治十二瘕癖及婦人帶下絕產無子并服

寒食藥而腹中有癬者當先服大丸下之乃服寒食藥

大丸不下水穀但下病耳不至令人虛極方見第十一

卷中

秦椒圓治婦人絕產生來未產盪滌腑臟使玉門受子
精

秦椒

天雄各十
八銖

玄參

白斂

亂婦

白芷

人參

黃耆

桔梗

露蜂房

白僵蠶

桃仁

蟾螬

白薇

細辛

蕪荑

各一
兩

牡蒙

沙參

防風

甘草

牡丹皮

牛膝

卷柏

五味子

芍藥

桂心

大黃

石斛

白朮

各三
十銖

柏子仁

茯苓

當歸

乾薑

各一
兩半

澤蘭

乾地黃

芍藥

各一
兩十八銖

乾漆

白石英

紫石英

附子

各二
兩

鍾乳

二兩
半

水蛭

七十
枚

蠶蟲

一百
枚

麻布叩複頭燒

七尺

右四十四味為末蜜丸如梧子大酒服十九日再稍
加至二十丸若有所去如豆汁鼻涕此是病出覺有
異即停

灸法

婦人絕子灸然谷五十壯在內踝前直下一寸婦人絕
嗣不生胞門閉塞灸關元三十壯報之

婦人妊娠不成若墮落腹痛漏見赤灸胞門五十壯在

關元左邊二寸是也右邊二寸名子戶

婦人絕嗣不生灸氣門穴在關元傍三寸各百壯

婦人子藏閉塞不受精疼灸胞門五十壯

婦人絕嗣不生漏赤白灸泉門十壯三報穴在橫骨當

陰上際

論曰陰陽調和二氣相感陽施陰化是以有娠而三陰所會則多生女但妊娠二月名曰始膏精氣成于胞裏至于三月名曰始胎血脉不流象形而變未有定儀見

物而化是時男女未分故未滿三月者可服藥方術轉之令生男也

丹參圓治婦人始覺有娠養胎并轉女為男方

丹參

續斷

芍藥

白膠

白朮

柏子仁

甘草各二兩

人參

芎藭

乾薑各三
一
十
銖

吳茱萸

橘皮

當歸

各一兩
十八
銖

白芷

冠纓燒灰各一
兩

乾地黃

一
兩
半

蕪荑

十八
銖

大卯

一
具

東門上雄雞頭

一枚

右十九味為末蜜和丸如梧子大酒服十九日再稍
加至二十九丸

又方取原蠶屎一作矢一枚井花水服之日三

又方取弓弩弦一枚絳囊盛帶婦人左臂一法以繫腰
下滿百日去之

又方取雄黃一兩絳囊盛帶之要女者帶雌黃

又方以斧一柄於產婦卧牀下置之仍繫必向下勿令
人知如不信者待雞抱卵時依此置於窠下一窠兒

子盡為雄也

妊娠惡阻第二

論方

論曰何以知婦人妊娠脉平而虛者乳子法也經云陰搏陽別謂之有子此是血氣調和陽施陰化也診其手少陰脉動甚者妊子也少陰心脉也心主血脉又腎名胞門子戶尺中腎脉也尺中之脉按之不絕法妊娠也三部脉沉浮正等按之無絕者有娠也

妊娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也妊娠四月

欲知男女者左疾為男右疾為女左右俱疾為產二子
又法左手沉實為男右手浮大為女左手俱沉實猥
生二男俱浮大猥生二女尺脉若左偏大為男右偏大
為女左右俱大產二子大者如實狀又法左手尺中浮
大者男右手尺中沉細者女若來而斷絕者月水不利
又法左右尺俱浮為產二男不然女作男生俱沉為產
二女不爾男作女生又法得太陰脉為男得太陽脉為
女太陰脉沉太陽脉浮又遣妊娠人面南行還復呼之

左迴首者是男右迴首者是女又看上圓時夫從後急呼之左迴首是男右迴首是女又婦人妊娠其夫左乳房有核是男右乳房有核是女

妊娠欲知將產者懷妊離經其脉浮設腹痛引腰脊為今出也但離經者不病也又法欲生其脉離經夜半覺痛日中則生也

論曰凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有淡水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其

人月水尚來顏色肌膚如常但苦沉重憤悶不欲食飲
又不知其患所在脉理順時平和則是欲有妊也如此
經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤
頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲噉鹹
酸果實多卧少起世謂惡食其至三四月日已上皆大
劇吐逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬于藏藏氣
不宣通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也血脉不通經絡否
溢則四肢沉重挾風則頭目眩也覺如此候者便宜服

半夏茯苓湯數劑後將茯苓丸淡水消除便欲食也既得食力體強氣盛力足養胎母便健矣古今治阻病方有十數首不問虛實冷熱長少殆死者活于此方

半夏茯苓湯治妊娠阻病心中憒悶空煩吐逆惡聞食氣頭眩體重四肢百節疼痛沉重多卧少起惡寒汗出

疲極黃瘦方

半夏

生薑

各三
十
銖

乾地黃

茯苓

各十
八
銖

橘皮

旋復花

細辛

人參

芍藥

芍藥

桔梗

甘草

各十
二銖

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服若病阻
積月日不得治及服藥冷熱失候病變客熱煩渴口
生瘡者去橘皮細辛加前胡知母各十二銖若變冷
下痢者去乾地黃入桂心十二銖若食少胃中虛生
熱大便閉塞小便赤少者宜加大黃十八銖去地黃
加黃芩六銖餘依方服一劑得下後消息看氣力令
熱增損方調定更服一劑湯便急服茯苓丸令能食

便強健也忌生冷醋滑油膩菘菜海藻

茯苓圓治妊娠阻病患心中煩悶頭眩重憎聞飲食氣
便嘔逆吐悶顛倒四肢垂弱不自勝持服之即效要先
服半夏茯苓湯兩劑後可服此方

茯苓

人參

桂心

熬

半夏

橘皮

各一
兩

白朮

葛根

甘草

枳實

各二
兩

右十味為末蜜和為丸如梧子飲服二十九漸加至

三十九日三

肘後不用乾薑半夏橘皮白术葛根只五味又云妊娠忌桂故禁

治妊娠惡阻嘔吐不下食方

青竹茹

橘皮各十
八銖

茯苓

生薑各一
兩

半夏

三十
銖

作

右五味㕮咀以水六升煮取二升半分三服不瘥頻

橘皮湯治妊娠嘔吐不下食方

橘皮

竹茹

人參

白术

各十
八銖

生薑

一兩

厚朴

十二錢

右六味㕮咀以水七升煮取二升半分三服不瘥重作

養胎第三

論 方

禁忌

逐月養胎

論曰舊說凡受胎三月逐物變化稟質未定故妊娠三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德大師觀禮樂鍾鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書古今歲誠居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟

調心神和情性節嗜慾庶事清淨生子皆良長壽忠孝仁義聰慧無疾斯蓋文王胎教者也

論曰兒在胎日月未滿陰陽未備腑臟骨節皆未成足故自初迄于將產飲食居處皆有禁忌

妊娠食羊肝令子多厄食山羊肉令子多病

妊娠食驢馬肉令子延月食騾肉產難

妊娠食兔肉犬肉令子無音聲并缺脣

妊娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡

妊娠食雞肉糯米令子多寸白蟲

妊娠食椹并鴨子令子倒出心寒

妊娠食雀肉并豆醬令子滿面多點黓黑子

妊娠食雀肉飲酒令子心淫情亂不畏羞恥

妊娠食鼈令子短項

妊娠食水漿絕胎

妊娠勿向非常地大小便必半產殺人

徐之才逐月養胎方

妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥母食腥辛是謂才正

妊娠一月足厥陰脉養不可針灸其經足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之時血行否澀不為力事寢必安靜無令恐畏

妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服

烏雌雞湯方

烏雌雞一隻

治如食法

茯苓

阿膠

各二兩

吳茱萸

升

麥門冬

五合

人參

芍藥

白朮

各三兩

甘草

生薑

各一兩

右十味㕮咀以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥煎取三升內酒三升并膠烊盡取三升放溫每服

一升日三

補胎湯若曾傷一月胎者當預服此方

細辛

一兩

防風

二兩

乾地黃

白朮

各三兩

生薑

兩

吳茱萸

大麥

各五合

烏梅

右八味㕮咀以水七升煮取二升半分三服先食服
寒多者倍細辛茱萸熱多渴者去之加栝萎根二兩
若有所思去大麥加柏子仁三合一方有人參一兩
妊娠二月名始膏無食辛臊居必靜處男子勿勞百
節皆痛是為胎始結

妊娠二月足少陽脉養不可針灸其經足少陽內屬
于膽主精二月之時兒精成于胞裏當慎護驚動也

妊娠二月始陰陽路經有寒多壞不成有熱即萎悴
中風寒有所動搖心滿脅下懸急腰背強痛卒有所
下乍寒乍熱宜服

艾葉湯方

艾葉

丹參

當歸

麻黃

各二兩

人參

阿膠

各三兩

甘草

四分

生薑

六兩

大棗

十二枚

右九味㕮咀以酒三升水一斗煮減半去滓內膠煎

取三升分三服一方用烏雌雞一隻宿肥者治如食
法割頭取血內三升酒中相和次以水一斗二升先
煮取汁去雞內藥煎取三升內血酒并膠煎取三升
分溫三服

黃連湯若曾傷二月胎者當預服此方

黃連

人參

各一兩

吳茱萸

五合

生薑

三兩

生地黃

五兩一方
用阿膠

右五味㕮咀以酢漿七升煮取三升分四服日三夜

一十日一修合若頗覺不安加烏梅一升加烏梅者
不用漿直取水耳一方用當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲
生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧
玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也

妊娠三月手心主脉養不可針灸其經手心主內屬
于心無悲哀思慮驚動

妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤即

黃卒驚恐憂愁嗔怒喜頰仆動于經脉腹滿繞脅苦
痛或腰背卒有所下

雄雞湯方

雄雞一隻

治如食法

黃芩

白朮

生薑

各一兩

麥門冬

五合

芍藥

四兩

大棗

十二枚擘

甘草

人參

茯苓

阿膠

各二兩

右十一味㕮咀以水一斗三升煮雞減半出雞內藥
煮取半內清酒三升并膠煎取三升分三服一日令

盡當溫卧一方用當歸芍藥各二兩不用黃芩生薑
茯神湯若曾傷三月胎者當預服此方

茯神

丹參

龍骨

各一兩

阿膠

當歸

甘草

人參

各二兩

大棗

二十枚

赤小豆

二十枚

右九味㕮咀以酢漿一斗煮取三升分四服先食服
七日後服一劑腰痛者加桑寄生二兩深師有薤白
二兩麻子一升

升

妊娠四月始受水精以成血脉食宜稻粳羹宜魚雁
是謂盛血氣以通耳目而行經絡

妊娠四月手少陽脉養不可針灸其經手少陽內輸
三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲
食

妊娠四月有寒心下慍慍欲嘔胃膈滿不欲食有熱
小便難數數如淋狀脅下苦急卒風寒頸項強痛寒
熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胷心煩

不得安卒有所下

菊花湯方

菊花

雞子一枚

大麥門冬一升

大棗十二枚

人參一兩

甘草

當歸各二兩

麻黃

阿膠

各三兩

半夏

四兩

生薑

五兩

右十味㕮咀以水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取三升分三服溫卧當汗以粉粉之護風寒四五日一方用烏雌雞一隻煮水煎藥

調中湯若曾傷四月胎者當預服此方

白芍藥

生薑

各四兩

厚朴

枳實

生李根白皮

白朮

柴胡

各三兩

續斷

芎藭

甘草

各一兩

當歸

一兩半

烏梅

一升

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜

一八日後復服一劑

妊娠五月始受火精以成其氣卧必晏起沐浴浣衣

深其居處厚其衣服朝吸天光以避寒殃其食稻麥
其羹牛羊和以茱萸調以五味是謂養氣以定五臟
妊娠五月足太陰脉養不可針灸其經足太陰內輸
于脾五月之時兒四肢皆成無大饑無甚飽無食乾
燥無自炙熱無太勞倦

妊娠五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小
便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶
頓欲仆卒有所下

阿膠湯主之之方

阿膠

四兩

人參

一兩

生薑

六兩

當歸

芍藥

甘草

黃芩

各二兩

旋復花

二合

吳茱萸

七合

麥門冬

一升

右十味㕮咀以水九升煮藥減半內清酒三升并膠
微火煎取三升半分四服日三夜一先食服便愈不
瘥再服一方用烏雌雞一隻割取咽血內酒中以水
煮雞以煎藥減半內酒并膠煎取三升半分四服

安中湯曾傷五月胎者當預服此方

黃芩

一兩

當歸

芎藭

乾地黃

人參

各二兩

甘草

芍藥

各三兩

生薑

六兩

麥門冬

一升

五味子

大麻仁

各五合

大棗

二十枚

右十二味㕮咀以水七升清酒五升煮取三升半分
四服日三夜一七日復服一劑

妊娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜處
出遊于野數觀走犬及視走馬食宜鷺鳥猛獸之肉

是謂變腠理紓筋以養其力以堅背膂

妊娠六月足陽明脈養不可針灸其經足陽明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美無太飽

妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼宜服

麥門冬湯方

麥門冬一
人參

甘草

黃芩各二
兩

乾地黃三兩 阿膠四兩

生薑六兩

大棗十五枚

右八味以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三升分三服中間進糜粥一方用烏雌雞一隻煮水以

煎藥

柴胡湯若曾傷六月胎者當預服此方

柴胡四兩

從蓉一兩

白朮

芍藥一作紫葳
六兩

甘草

麥門冬

芎藭各二兩

生薑六兩

乾地黃五兩

大棗三十枚

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一
中間進糜粥勿食生冷及堅硬之物七日更服一劑
妊娠七月始受木精以成其骨勞身搖肢無使定止
動作屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒常食稻梗
以密腠理是謂養骨而堅齒

妊娠七月手太陰脉養不可針灸其經手太陰內屬
于肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭
無薄衣無洗浴無寒飲

妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背強

葱白湯主之之方

葱白長三四寸
十四莖

半夏
麥門冬各一斗

旋復花二合

黃芩一兩

人參一兩半

甘草

當歸

黃耆各三兩

阿膠四兩

生薑八兩

右十一味㕮咀以水八升煮減半內清酒三升及膠煎取四升每服一升日三夜一溫卧當汗出若不出

者加麻黃一兩煮服如前法若秋後勿強瀆汗一方
以黃雌雞一隻割咽取血內酒中煮雞取汁以煎藥
杏仁湯若曾傷七月胎者當預服此方

杏仁

甘草各二
兩

紫菀一
兩

鍾乳

乾薑

各三
兩

麥門冬

吳茱萸半
斗

粳米五
合

五味子

合

右九味㕮咀以水八升煮取三升半分四服日三夜
一中間進食七日服一劑一方用白雞一隻煮汁煎

藥

妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極
是謂密腠理而光澤顏色

妊娠八月手陽明脈養不可針灸其經手陽明內屬
于大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無
輒失食無忍大起

妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎
動不安常苦頭眩痛繞脅下寒時時小便白如米汁

或青或黃或使寒慄腰背苦冷而痛目睭睭

芍藥湯主之之方

芍藥

四兩

生薑

四兩

厚朴

二兩

甘草

當歸

白朮

人參

各三兩

薤白

切一升

右八味㕮咀以水五升清酒四升合煮取三升分三服日再夜一一方用烏雌雞煮汁以煎藥
葵子湯若曾傷八月胎者當預服此方

葵子

二升

甘草

厚朴

各二兩

白朮

柴胡各三兩

芍藥四兩

生薑六兩

大棗二十枚

右八味㕮咀以水九升煮取三升分三服日三凡十
日一劑一方用烏雌雞一隻煮水以前藥

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備
飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮致才力

妊娠九月足少陰脉養不可針灸其經足少陰內屬
于腎腎主續縷九月之時兒脉續縷皆成無處濕冷

無著炙衣

妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背痛

不可轉側短氣

半夏湯方

半夏

麥門冬

吳茱萸

當歸

阿膠

各三兩

乾薑

一兩

大棗

十二枚

右七味㕮咀以水九升煮取三升去滓內白蜜八合
微火上溫服四服病即止一方用烏雌雞一隻煮汁

煎藥

猪腎湯若曾傷九月胎者當預服此方

猪腎一具

茯苓

桑寄生

乾薑

乾地黃

芍藥各三兩

白术四兩

附子中者一枚

大豆三合

麥門冬一升

右十味㕮咀以水一斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取
三升半分四服日三夜一凡十日更一劑

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣于丹田故
使關節人神皆備但俟時而生

妊娠一月始胎二月始膏三月始胞四月形體成五
月能動六月筋骨立七月毛髮生八月臟腑具九月
穀氣入胃十月諸神備日滿即產矣宜服滑胎藥八
月即服

丹參膏養胎臨月服令滑而易產方

丹參

半斤

芎藭

當歸

各二兩

蜀椒五合有熟者以大麻仁五合代

右四味㕮咀以清酒溲濕停一宿以成煎猪膏四升

微火煎膏色赤如血膏成新布絞去滓每日取如棗
許內酒中服之不可逆服至臨月乃可服舊用常驗
甘草散令易生母無疾病未生一月日預服過三十日
行步動作如故兒生墮地皆不自覺方

甘草

一兩

黃芩

一用茯苓

乾薑

吳茱萸

大豆黃卷

麻子仁

桂心

大麥蘖

各三兩一
方用粳米

右八味治下篩酒服方寸匕日三煖水服亦得

千金圓主養胎治產難顛倒胞不出服一丸傷毀不下
產餘病汙不出煩滿不止氣逆滿以酒服一丸一名保
生丸

甘草 貝母 秦椒 大豆黃卷

乾薑

桂心

黃芩

粳米

一作
糯米

石斛

石膏

各六
銖

當歸

十二
銖

麻子

三
合

右十二味為末蜜和丸如彈子大每服一丸日三用

棗湯下一方用消黃一兩

蒸大黃圓治妊娠養胎令易產方

大黃

三十
銖蒸

枳實

芎藭

白朮

杏仁

各十
八銖

芍藥

乾薑

厚朴

各十
二銖

吳茱萸

一兩

右九味為末蜜丸如梧桐子大空腹酒下二丸日三不知稍加之

滑胎令易產方

阿膠

八兩

滑石


三兩

車前子

一升

右三味治下篩飲服方寸匕日再至生月乃服藥利

九竅不可先服



備急千金要方卷二

總校官中書
臣朱鈴

校對官庶吉士
臣嚴福

謄錄監生
臣蔣錦城