

彼等ノ皮膚疾患ニ非常ノ素因ヲ有スルヲ疑フ可カラズ外界ノ刺撃作用與テ力アリ彼等ノ皮膚ハ柔軟ナリ菲薄ナリ實ニ其表皮ハ毀傷シ易ク外界ノ諸害ハ直チニ之ニ乗ズベキ機會ヲ有スルナリ由是觀之モ小兒ニ最モ多ク見ルモノハ濕疹ノ如キ表皮性疾病ノ傾向アルハ了解シ易キ所タリ彼等ノ表皮ハ抵抗力微弱ナリ從テ容易ニ剝離ス又皮脂腺ノ作用旺盛ニシテ從テ多量ノ輸血アルヲ以テ或障害ニ遇ヘハ忽チ容易ニ腫脹ヲ來タシ發赤シ遂ニ炎衝ヲ惹起スルニ至ルベシ加之ナラズ彼等ノ生活狀態ハ已ニ外部誘因ノ動機タルモノ多々アリ

口圍ハ常ニ流涎或ハ母乳ノ爲メニ濕潤シ肛圍ハ屎尿ノ爲メニ汗穢刺戟セラル、トアリ尙又其保育ノ如何ニ因テ障害アリ例之ハ父母ノ更ラニ放任シテ清潔ニナサザル者モ之ニ反シテ餘リ清潔ニナスコトモ共ニ皮膚疾患ノ誘因タルヲ喋々ヲ要セズ放任的保育ノ下ニアル小兒ハ屎尿ノ爲メニ表皮濕潤シテ空中浮動ノ么微物ハ此好培養地ニ附着シテ直チニ障害ヲ惹起シ又或父母ハ奇麗好キノ餘リ過度ニ入浴セシ

メ過度ニ石鹼ニテ洗ヒ過度ニ拂拭スル如キヲ以テ等ク柔軟感應シ易キ皮膚ハ其障害ヲ蒙リ皮膚ノ脂肪ヲ減少シ爲ニ諸障害ヲ惹起スルヲ明ケン

尙疾患ヲ遲延シ蔓延セシメ又複雑ナラシムル有力ナル外界刺戟ハ即チ搔抓トス是レ必シモ搔痒ナクモ無意識ニ小兒ハ好テ搔抓シタル部位ヨリ濕疹、毛囊炎、癩ノ如キヲ惹起セシムルヲアリ

其他尙小兒ニ於テハ消化器系統ノ故障ハ最モ皮膚病ノ主因タルガ如シ一定不變ノ食物ノ爲メ消化器障害ヲ來タシ其轉歸ハ皮膚疾患トナルヲアリ例之バ病的ニ變化セル排泄物ノ爲メニ間擦性濕疹ヲ起コシ又有毒物質ハ消化器系統ヨリ血中ニ吸收セラレ遂ニ皮膚ニ感染セシメ又神経系ヲ侵カシ反射的ニ皮膚疾患ヲ惹起スル如キモノ多少アルベシ

其他腺病性ノ小兒ハ皮膚疾患ニ罹ルヲ多キハ亦明瞭ナル事實ナリ此ノ如ク列舉シ來タレバ實ニ内外ノ誘因タルモノ頗ル多岐ナルヲ以

テ須ラク實地家タルモノ諸種ノ方面ヨリ細心注意觀察ヲ密ニシテ其治療ニ力ヲ盡シテ少ナクモ蔓延ヲ防禦スルノ策ヲ講ズルコト小兒ニ對スル大義務ナリ何ゾ内行或ハ體毒ノ如キ感念ヲ以テ之ヲ處スベケンヤ然レモ余ハ所謂内行ナルモノナキト云フニアラズ例ヘバ或藥劑ヲ以テ痒疹ノ如キヲ處センカ往々腎臟炎ヲ起コスコトアリ又小兒ノ頭瘡(一般ニ云ヒ)ノ如キ大人ニ施コスト同一處置ヲ以テシテ往々急劇ニ分泌ヲ止メ腦症狀ヲ起コスガ如キモノハ即チ之レ狹義ノ内行タリ此ノ如キコソ治療法ノ當否如何ニ關スルモノナリ是レ即チ其治療法ノ殊ニ考量ヲ要スル所以ナリ

急性亞急性ニハ殊ニ注意シテ其炎衝ノ増悪セザルコトヲ務ムベシ水及ビ石鹼ヲ用ユルキハ充分其症狀ヲ精査シタル後ナルベシ寧ロ使用セザルヲ良トス皮膚ノ清洗劑ニハ左法ヲ用ユベシ

一、油劑

二、三%硼酸水

三、〇・五%レゾルチン水

此等溶液ハ已ニ又甚シキ炎衝症狀ヲ去ルニ効アリ普通冷罨法或ハ蒸罨トシテ使用ス冷罨法ナルキハ常ニ四五分間毎ニ交換スルヲ要ス顔面ニ蒸罨ヲ施コスハ稍困難ナリ冷罨法ハ哺乳兒ノ如キ普通其睡眠中ニ應用スベシ此等溶液ノ療法ハ紅斑性水疱性及ビ濕潤性濕疹ニ良ロシ此溶液療法ヲ止ムル間ハ常ニ撒布藥ヲ用ユベク前章間擦性濕疹ニ述ベシ藥劑ノ如シ

水疱性紅斑性濕疹ニハ此濕潤罨帶若クハ撒布藥ノ代用ニ緩和ナル左ノ坭膏良効アリトス

亞鉛華

澱粉

ワゼリン

ラノリン

右外用

各五・〇

亞鉛華

等分

阿列布油

又「サルケル」酸ヲ加味スルコトアリ然レ常ニ〇・五―一・〇%ヲ超ユ可ラズ
又「イヒチオール」ヲ製劑セザルヲ可トス往々好テ用ユル人アルモ奏効
敢テ見ルベキモノナシ

又刺戟減退、搔痒制止作用ト同時ニ旺盛ナル炎衝症狀ニ對シテ効アル
ハ「ツメノール」ナリ唯其色ノ不快ヲ感ズルノミ普通二―一〇%ノ割合
ニ調劑スベシ

軟膏トシテハ左ノ如シ

五―一〇%硼酸軟膏

〇・五%サルチル酸軟膏

又「ナフトリ」ヲ用ユル人アリ

サルチル酸

〇・一

亞鉛華

澱粉

各五・〇

ラノリン

ナフトリン

又急性亞急性ノ時ハ脂肪ノ往々害アルコトアリ軟膏ノミナラズ坭膏ス
ラ甚ダ緩和ナルモノタルニ關セズ却テ炎衝ヲ増悪セシムルコトアルハ
往々實驗スル所ナリ故ニ此際ハ此等脂肪類ヲ止メ濕潤療法及ビ撒布
療法ヲ施コスベシ殊ニ此兩者ヲ混合シタルモノ妙効アルコトアリ即チ
撒布藥ト或溶液及ビ「グリセリン」トノ混劑ナリ此ヲ充分混和シテ患部
ニ塗布セバ水分蒸發シテ獨リ撒布藥ハ患部ニ糊着スルコト單ニ撒布シ
タルノ比ニアラズ而シテ其蒸發スルキハ一種清涼ヲ覺ハ從テ搔痒ヲ止
ムルナリ其混劑左ノ如シ

亞鉛華

滑石

澱粉

各一〇・〇

グリセリン	一〇〇〇
鉛糖水	六〇〇〇
右外用	
亞鉛華	各二〇〇〇
澱粉	
グリセリン	一〇〇〇
醋酸礬土水	二〇〇〇
蒸溜水	八〇〇〇
右外用	
亞鉛華	
滑石	各二五〇〇
鉛糖水	
グリセリン	

此等混劑ニ左ノ如ク諸藥ヲ調和スルコトアリ

イヒチオール	〇・二五—一%ノ割合
ツメノール	一—二〇%ノ割合
レゾルチン	〇・五—一・〇%ノ割合

上記諸法ニ因テ普通ハ乾燥シテ落屑期ニ赴クモノナリ
 唯濕潤性ノモノハ此法ニテモ目的ヲ達シ得ザルコトアリテ常ニ痲皮形
 成剝脱シテ反覆休止セサルコトアリ此ノ如キ場合ニハ間擦性ニ述ベタ
 ル如ク止ナク硝酸銀酒精ニテ腐蝕セシムルノ外ナシ即チ痲皮ヲ除キ
 濕潤面ヲ拂拭シテ塗布スベシ其刺戟ノ爲ニ甚シキ發汗アルベシ尙必
 要ナレバ再度塗布スベシ或ハ此溶液ニ漬シタル綿ニテ暫時壓迫シ置
 クモ可ナリ而シテ後緩和ナル坭膏ヲ塗布スルカ或ハ軟膏ヲ塗布シ置ク
 ベシ或ハ上記撒布藥ヲ用ユベシ此ノ如ク隔日此腐蝕法ヲ施コスベシ
 濕疹一タビ慢性ニ移行シ或ハ病初ヨリ慢性ノモノナレバ其療法ハ全
 ク別種ノモノタリ其狀態モ種々ニシテ結痲形成ヲ伴ヘル濕潤ノモノ
 アリ或ハ痲皮ナキモノアリ又往々唯發赤シタル濕潤ナキ皮膚ニ脂漏

性脂肪性痂皮ヲ作ルコトアリ最モ屬々見ル所ノモノハ落屑性濕疹ニシテ多クハ急性濕疹ノ末期タルモノナリ
 濕潤性慢性濕疹ハ先ツ之ヲ乾燥セシメザル可ラザルコト急性濕疹ニ異ナラズ唯慢性ニテハ硝酸銀ヲ以テ腐蝕スルコトモ何等ノ危険ナク容易ニ決行シ得ルノ利アリ
 又搨法及ビ撒布劑ノ如キハ殆ト應用少ナクウキルソノ軟膏ニ類似ノ軟膏ヲ用ユ

テール

硫黃華

各一〇・〇

加里石鹼

白降汞

五・〇

ワゼリン

三〇・〇

此軟膏ハ頗ル卓効アリ先ヅ皮膚ヲ腐蝕シ同時ニ乾燥シ表皮ヲ剝離シテ爲ニ滑澤健在ノ治癒セル皮膚タラシムルニアリ厚ク患部ニ塗布シ

テ成ベク綿帶ヲ施コスベシ朝夕二回塗布シテ四日乃至八日間持長シテ其間決シテ皮膚ヲ洗滌シ或ハ拂拭スベカラズ唯其以前ノ軟膏ヲ拭ヒ去ルノミニ止メ次テ「ツメノール」ヲ調和シタル緩和坭膏ヲ代用シ二三日ヲ經テ初メテ皮膚ヲ洗滌スベシ然ルニ此軟膏ハ刺戟アルヲ以テ濕潤性ノモノニハ醫師タルモノ毎日其結果ヲ精査シツ、若シ惡徵ヲ認メ甚シキ刺戟アルヤ否ヤ直ニ中止スベシ若シ奏効シテ此方法ニテ皮膚乾燥セバ初メテ石鹼ニテ洗滌シ同時ニ其皮膚脆弱ヲ防グ爲メ〇・五%「サルチル」酸軟膏或ハ此軟膏ニ一―三%ノ割合ニ硫黃華ヲ加ヘタルモノヲ以テ塗布スベシ

乾燥セル慢性濕疹モ同上軟膏ニテ可ナリ輕症ナレバ坭膏軟膏共ニ少量ノ硫黃及ビ「テール」五―一〇%ニテ可ナリ其緩和ナルモノ左ノ如シ

木テール

各二・〇

加里石鹼

カゼーニイ軟膏

三〇・〇

「テール」軟膏ノ「テール」調合率ハ其炎衝ノ強弱ニ反比例スルモノナリ大抵一—二%ヲ程度トス極慢性乾燥ノモノニハ左ヲ處方ス

木テール

酒精

エーテル

各一〇〇

此「テール」劑ハ塗布後直チニ發散乾燥スルヲ以テ其後ニ坭膏ヲ塗布スベシ

乾燥シテ癢痒甚シキ哺乳兒ノ顔面ノ濕疹ニハ左方効アリ

沒食子酸

ガゼニ—軟膏

〇・一—〇・二

二〇〇〇

此軟膏ハ「テール」軟膏ト同様良ク指ニテ塗擦スベシ

又左方モ試用ノ價値アリ

白降汞

黃降汞

一—五%

〇・五—一%

「ナフタリン」ヲ「ラノリン」ノ代用ニ緩和坭膏ニ混入スルコトアリ

最モ考量スベキコトハ患兒ノ入浴ニシテ殊ニ急性ノキ然リトス顔面頭
部ノ濕疹ニハ患部ニ坭膏或ハ軟膏ヲ塗布シテ入浴セシメ以テ石鹼或
ハ湯ノ刺戟ヲ豫防シ得レト軀幹等ノ疾患ノ場合ニハ其乾燥マデ石鹼
及ビ入浴ヲ禁セザル可ラズ然レ又其症狀減退ノキハ入浴モ度々ナラ
ザル限リ増悪ヲ來タスコトナシ然レ之レ充分經驗セル専門醫家ニ依テ
初テ決行シ得ベキコトナリ故ニ寧ロ入浴ノ許可ハ出來得ベキ限リ延期
セシメ其理由ヲ懇説スルヲ利ナリトス
慢性濕疹ニハ二三日毎ニ入浴スルハ差支ナキノミナラズ硬固トナリ
シ皮膚ハ加里石鹼ヲ使用スルモ妨ゲナシ小兒モ毎三日入浴セシムレ
バ足レリ入浴後ハ靜カニ拂拭ンテ藥劑ヲ塗布スベシ急性慢性ノ移行
症ニテハ適宜其症狀ニ因テ入浴ヲ試用セシムルノミ
顔面頭部等ハ坭膏ヲ便利トス綳帶ヲ施コスノ煩ナシ唯頭部ナレバ頭
巾ヲ以テシ顔面ナレバ假面ヲ用ヒザル可ラズ而シテ綳帶交換膏藥類貼
布ハ醫師自ラ行フベシ藥料ヲ患家ニ渡タスハ治療日數ヲ高ムルト時

ニ病症増悪ノ嫌アルコトハ常ニ經驗スル所ナレバナリ

膿疱疹 Impetigo

膿疱疹ヲ別テ三トス即チ傳染性膿疱疹尋常性膿疱疹及ビ單純性膿疱疹トス

傳染性膿疱疹 Impetigo contagiosa

傳染性膿疱疹

本症ハ一千八百六十四年チルプリー、フオックス氏ノ始メテ唱道セシ疾病ナリ

本症ハ熱ヲ伴ヒ或ハ無熱 *Fieberlos* ニテ薄キ被膜 *Decke* ヲ有スル水泡急劇ニ發生シ而シテ忽チ膿疱ニ變ズ其水泡ハ融合 *Confluenz* セズ普通獨立 *isoliert* スル者ナリ但シ顔面ノ者ハ融合ノ傾キ多シ而シテ膿疱ハ自然 *Spontane* ニ破レ *serpilsen* 膿汁ハ凝固シテ甚タシキ *intensive* 黄色ノ結痂ヲ作ル其痂皮ハ恰モ糊着セル觀アリ之ヲフオックス氏ハ此症ニ特有 *Charakteristisch* ナリト云ヘリ皮膚ハ多クノ場合ニハ稍發赤セルモノナリ膿

疱ハ時ニ小中心臍 *Kerncentrale Delle* ヲ呈スルコトアリ周圍 *Umgebung* ノ皮膚ハ異狀ナキヲ普通 *normal* トス一二日後ニハ痂皮剝脱シテ更ラニ痕跡ヲ止メズ或ハ唯赤斑ヲ遺コスノミ癢痒ハ殆トナキヲ普通トス罹病スル者ハ小兒ヲ多シトス

日本ニ於テ膿疱疹ニ關シ臨床的及細菌的ヨリ土肥博士ハ之ヲ分類セラレタリフオックス氏ノ記載ニ依レバ傳染性ト尋常性トノ臨床上ノ區別判然タラズ混同ヲ來タスコト多シ吾人ハ土肥氏ノ記載ヲ以テ本症ヲ明瞭ニ記憶スルコトヲ得ベシ
即チ別テ二トス

- (一) 白色葡萄狀菌性膿疱疹即チ傳染性膿疱疹
- (二) 連鎖狀菌性膿疱疹即チ尋常性膿疱疹

白色葡萄狀菌性膿疱疹 *Impetigo staphylogenes albus* (傳染性膿疱疹) ハ漿液性或ハ漿液膿性ノ小水泡或ハ水泡ニシテ決シテ成書記載ノ如キ蠟樣ノ厚キ痂皮ヲ形成セズ其水泡内容ハ乾固シテ薄キ白色若

尋常性膿疱疹

クハ鮮黄色ノ皮膜様薄痂ヲ形成シ水疱ハ時ニ鶏卵大以上ニ達スルコアリ此ノ如キモノハ多ク其中央ニ於テ水疱膜上ヨリシテ黄色乃至白色ノ點ヲ透見スルコトヲ得ベシ是レ即チ毛囊ニ一致シタル所ニシテ之レ即チ細菌侵入門ナルコトヲ想像セシム

連鎖状菌性膿疱疹 *Impetigo streptogenes* (尋常性膿疱疹 *impetigo Vulgaris*)ハ成書ニ記載シ圖譜等ニ於テ見ル所ノ厚キ黄色痂皮ヲ形成スルモノニシテ之レフオクス氏ノ特有ナリト云ヘル傳染性膿疱疹ノ症状ニ一致スルノ症候ナリ常ニ其水疱ヨリハ連鎖状菌ヲ認ム又稀ニハ黄色葡萄状菌ヲ認ムルコトアリ

左ニ一表ヲ製シ記憶ニ便ナラシムベシ

區別	水疱	痂皮ノ性状	水疱周圍ノ状況	経過	流行季	罹病者
病性	白色葡萄	初メ透明ナリ後混濁スルモ皆水疱ノ下部	水疱被膜ハ薄キ白色ノ膜様物或ハ痂皮トシテ輕度ナリ	赤暈ヲ認メザルチ普通トス	平均四五日ナリ	夏期チ多シトス流行性ナリチ健カス
菌性膿疱疹	初メハ紅斑ニシテ其中央ニ小水疱或ハ膿疱ヲ發生ス	内容乾燥スルコト直チニ深黄ニシテ厚キ痂皮ヲ形成ス	多ク炎性發赤アリ	稍長ク一週間チ要ス	散發性ニシテ毎季ニ發生ス	大人ニモ來ルナリ

部位ハ顔面及ビ手背ニ著シ粘膜ニ來タルコト最モ稀有ナリ *sehr selten* 而シテ流行性 *epidemisch* タルコト往々アルヲ以テ此注意ヲ忘ル可カラス

單純性膿疱疹 *Impetigo Simplex*

本症ハボックハルト氏ノ唱道セルモノニテ化膿菌ノ爲ニ稍々多發スル帽針頭大乃至豌豆大ニシテ往々毳毛ノ貫通スル膿症ノ發生ヲ云フ原發疹ハ粟粒大ニシテ往々「むく毛」ヨリ貫通セラル、尖圭ノ炎衝發赤アル結節ニシテ迅速ニ其巔頂ニ膿點ヲ生ズ又速カニ増大シテ扁豆大ノ緊張セル膿疱トナル其周圍ニハ僅少ノ赤暈アリ數日後ハ其内容ハ蒸發シテ乾固シ黄色乃至褐色ニテ固着セル結痂トナリ一二日後ニ脱落シテ癢痕等ヲ遺サズ

部位ハ身體ノ何處ニモ發生スレモ好發スルハ四肢ニシテ手指、大腿、下腿ニシテ足ニ發生スルコトハ稀有ナリ
 發生ノ動機ハ表皮ノ小損傷、ひく毛、汗口、皮脂腺口等ニ侵入スル菌ノ爲ニ起ル處ノ膿瘍ニ外ナラズ故ニ濕潤ノ衣服發汗ノ甚シキ水中ニ長ク浸タリシコト、藥劑ノ塗擦後、諸種ノ悪法施行後ノ如キ畢竟表皮ヲ軟弱濕爛セシムルコト、或ハ諸他皮膚病中殊ニ疥癬、痒疹、濕疹、瘙痒症、其他機械的ノ表皮損傷ハ皆本症誘發ノ基トナルベシ

類症鑑別

第一痘瘡ハ潜伏期 *Incubationszeit* アリ水泡ノ周圍ニ炎症様狀ノ甚シキモノナリ又其結痂ノ時間永ク此ノ際劇シキ瘙痒アリ且ツ中心臍著明 *Delle deutlich* ニシテ全身症狀甚シ
 第二「エ、ク、チ、エ、ト、マ」ナレバ各個ノ膿疱ハ融合シテ一面ニ痂皮ヲ作ルコト多シ其他瘙痒アリ何處カニ原發疹 *Primäre Efflorescenz* ヲ認ムルニ因テ鑑別シ得ベシ

亞鉛華坭膏

治療法

亞鉛華坭膏

亞鉛華

澱粉

ワゼリン

各二五〇

五〇〇

硼酸坭膏

或ハ五% 硼酸坭膏

硼酸

亞鉛華

澱粉

ワゼリン

各二五〇

五〇〇

或ハ黃降汞軟膏 其作用ハ緩和ナルヲ以テ殊ニ小兒ニ用ユルニ便利ナリ

或又千倍昇汞水ヲ以テ洗滌スルコト一日二三回ナルベシ是又奏効アリ又全身ニ來タリシ者ハ全身昇汞浴ヲ行フベシ

其他硫黃イヒチヤール「レゾルチン」等ノ軟膏ノ如キ頭部ニ貼布スルニ宜ロシ然レバ結痂ハ剝脱シテ癩痕ヲ遺サス治癒ニ就ク「確實ナリ」著者ハ殆ト常ニ硼酸軟膏ノミヲ用ユ勿論「リント」ニ延ベテ貼布ス小兒ノ顔面ノ如キハ假面ヲ用ヒザレバ効ナシ但シ分泌盛ナルモノニハ必ズ二―三回交換スル「コ」ヲ忘ル可ラズ

匍行疹狀膿疱疹 Impetigo herpetiformis

膿毒性匍行疹

本症ハ「ハブラ氏」ノ命名セルモノナリ「ノイマン氏 Neumann」ハ膿毒性匍行疹 *Herpes pyemicus* ノ名ヲ下セリ
本症ハ多ク妊婦ニ來タリ又産褥中 *Puerperium* ニ罹ル所ノ疾病ナリ帽針頭大ニシテ陰股部ニ環狀集合性 *Gruppenformig* ニ配列セル膿疱ハ遞次ニ發生シテ結痂ヲ形成ス此痂皮ヲ剝離セハ表皮ハ剝脱ス又時ニ稀有ナレモ増殖性ノ名アリ「アウスビツ氏 Auspitz」ハ増殖性匍行疹 *Herpes recidivans* ト云ヘリ此ノ如ク周圍ニ蔓延シテ全身ヲ侵カスニ至リ全皮膚

増殖性匍行疹

表面ハ發赤腫脹シ膿疱或ハ結痂ヲ以テ被ハレ處々ニ皸裂ヲ生ズ潰瘍或ハ癩痕ヲ遺コサズ膿疱發生ノ際戰慄アリ又患者ハ早ク脱カスル「コ」ヲ特兆トス

部位ハ初メ陰股部腹部鼠蹊部腋窩 *Achselhöhle* 大腿内側 *Innere Flächend. Oberschenkel* トス口中及ビ齒齦 *Zahnfleisch* ニ白斑 *Plaques* ヲ生ズ發病ノ際ハ戰慄ヲ伴ヒ後ニハ弛張性熱型ヲ呈シ敗血症狀ヲ以テ遂ニ斃ル者ナリ

類症鑑別

第一輪狀天疱瘡 *Pemphigus circinatus* ノ原發疹ハ水疱ニシテ且ツ紅斑アル部ニ水疱發生ス彼レモ亦紅斑ヲ發スレモ其部位ニ膿疱ヲ發生スル「コ」ナシ

第二虹彩狀匍行疹 *Herpes iris* ハ多形紅斑 *Erythema multiforme* ノ一症狀ニ外ナラズ初メヨリ水疱ニシテ膿疱タル「コ」ナシ

第三匍行疹狀皮膚炎 *Dermatitis herpetiformis* ハ其發疹多形ナルト水疱ナルト癢痒アルト多ク幼年ノ者ヲ侵ストニ因テ區別シ得ベシ

治療法

此診断ヲ下セバ滋養強壯ヲ第一義トシ産婦ニハ早産ヲ爲サシメ其他對症療法ヲ施コシツ、體力ヲ維持スベシ局所ニハウラルフ氏ハ浴法ヲ實用セリ以テ痂皮ヲ剝離シ後澱粉或ハ亞鉛華坭膏ヲ貼用スベシ

種痘狀疱疹 *Hydroa Vacciniforme*

本病ハ素因アル人ニ春季最モ多ク被覆セザル部位顔面殊ニ鼻頰部耳等ニ發赤結節及ビ水泡形成ヲ來タスモノニシテ其原發疹ハ粟粒大乃至蠶豆大ノ硬靱ニシテ蠟色ノ小結節ナリ數日ヲ經レバ其中央ニ固着ノ痂皮ヲ形成ス此ノ如キ周圍ニ又新タニ黃色乃至褐色ノ痂皮ヲ中心ニ戴ク所ノ小結節或ハ小水泡ヲ生シ容易ニ膿疱トナル而シテ全部固着ノ痂皮ニテ被ハル此痂皮ハ二週以内ニ脱落ス其跡ニ痘瘡様ノ癩痕ヲ遺コス時トシテ手ヲ侵スコアリ
春季ニ發病シ殊ニ日光々線ノ強キ直射ニ遭遇シタル後ニ起リ夏季ニ

至リ一層劇シキ症狀ヲ以テ秋季ニ至リ漸次病勢減弱シ冬季ニ到レバ全ク癩痕形成ニ終ルヲ例トス
診断 日光々線ニ暴露スル所ノミ即チ顔面ノミヲ侵スコハ膿疱ノ中央結痂アルヲ春季ニ發生スルヲ等トス
治療法 ハ顔面ニ一定ノ赤色乃至黃色ノ被包ヲ着セシメ機溼液ヲ塗布セシムシ

大水疱性皮膚炎 *Dermatitis bullosa*

此症ニ數フベキ者ハ左ノ三ナリ

- (1) 水泡熱 *Febris bullosa*
- (2) 大人ノ急性天疱瘡 *Pemphigus acutus bei Erwachsenen*
- (3) 汗疱 *Dysidrosis, Fox (Chirotopompholix Hutchinson)*

水泡熱 *Febris bullosa*

(1) 水泡熱ハ小兒ニ多クシテ熱性 *Fieberhaft* ノ前驅期 *Prodromalstadium* アリ

テ水疱ノ多數發生シ非常ニ搔痒アリ而シテ忽チ治癒シ通常二三週
*Wochen*ニ經過ス熱ハ水疱發生ト共ニ消失ス流行性ニ來ルコアリ故ニ
傳染性 *Contagiosus*ト見做セリ

大人急性天疱瘡 *Pemphigus acutus bei Erwachsenen*

(2) 急性天疱瘡甚ダ稀有ナリ前驅症ナク或ハ發熱ニ伴ヒ今迄健全
ナル皮膚ニ忽チ水疱ヲ發生シ而シテ消退發生常ナク諸部ニ反覆發生
ス熱及ビ水疱發生セバ二―四週中ニ消退シテ痕跡ヲ止メザルモノナ
リ無熱ノ者ハ其水疱ノ消退一層速カナリ
ウシナ氏ハ急性天疱瘡ヲ三別シテ急性良性無熱天疱瘡ト急性惡性有
熱天疱瘡及ビ慢性天疱瘡トセリ

汗疱 *Dysidrosis*

(3) 汗疱トハ急性ナル劇シキ搔痒ヲ伴ヒ手掌足趾 *Handteller, Fusssole* 指
趾 *Fingern, Zehen* 等ノ皮膚ニ發生スル水疱症ナリ本邦ニテ所謂水蟲ト

云フ者モ亦之ニ屬スルモノ多シ多クハ多汗ノ人ニ來タリ再發ハ夏期
ニ多シ水疱破潰セザレバ二週後ニ乾燥スルモ往々續發シテ頑固ノ經
過ヲ取ルコアリ部位ヨリシテハチンソン氏 *Hutchinson* ハ手ノ水疱 *Clethr*
Pompholix ト名ツケタリ然レ獨リ手ノミニアラズ故ニ適當ノ名稱タラ
ズ(1) 及ビ(2)ハ自然ニ經過スル者ニシテ本症ハ實地醫ノ常ニ遭遇スル
病ニシテ實ニ頑固治癒シ難キ症ナリ即チ一タビ治癒シタル表皮下ニ
水疱ヲ再發スルコト恰モ狼瘡結節ノ癩痕内ニ再發スルガ如キ觀アリ故
ニ其經過長キハ數年ニ亘リ又治療ヲ困難ナラシムル所以ナリトス

治療法

- (1) (2)ハ無刺戟ナル「ウキルソン」硼酸軟膏等ヲ貼布シ或ハ溫浴等ヲ施コ
セバ可ナリ
- (3)ハ先ヅ局部ヲ軟化 *erweichen* スルヲ好トスピツク氏硬膏或ハ蒸罨法
或ハ「テール」塗布等ヲ宜ロシトス又純「テール」ヲ塗布シタル上ニ「ピツク」
硬膏ヲ貼布スルハ東京大學皮膚科ニテ普通行フ處方ナリ

又十倍レゾルチンテールヲ與へ或ハ左方ヲ試ムベシ

レゾルチン

二・〇

阿列布油

二・〇

硫黃華

一・〇

安息香酸丁幾

一五・〇

右塗布料トス

著者汗疱ヲ實驗スルハ多ク暮春ヨリ夏季ニ亘リシ時ニシテ病理的ニハ未ダ肝腺トノ關係ヲ説明シ得サルモ發汗シ或ハ「むれ」ルハ本症誘發ノ動機タルカ如シ例ハ夏季足袋ヲ用ヒルガ如シ即チ發汗障害ニ關係アルコトハ事實ナリ余ハ常ニ朝夕二回硼酸水ノ局所浴ヲ十五分間行ヒ甚シキ糜爛ナキハ「土肥氏」塗布シテ一時之布綑帶セシメ濕疹様アルキハ「ラノリン」坭膏等ヲ塗布シテ一時之ヲ治癒セシメタル後同法ヲ行フヲ常トス此療法ヲ實驗上有効ノモノト信ズ

乾癬 Psoriasis

此症ハ遞次續發スル再發性ノ疾病ニシテ乾燥セル銀白色ノ光澤アル鱗屑ヲ特兆トス其部ノ皮膚ハ限界明劃ニシテ多クハ圓形ニ發赤シテ隆起セリ其原發疹 *Primärfloreszenz* ハ赤色或ハ褐色ノ帽針頭大 *Stechha-delkopfgross* ノ丘疹ナルガ漸次周圍ニ輪狀 *Ringformig* ニ廣大シ而シテ細クシテ *schmale* 赤キ縁暈 *Saum* ヲ見ルニシテ鱗ハ凸面 *Convex* ヲ呈ス鱗屑ヲ剝離セバ點狀ニ出血スル底 *Punktförmig blutende Basis* アリ治癒 *heilen* スルハ中心 *Centrum* ヲ以テ面細クシテ *Raad* 赤色稀薄トナルハ症狀ノ停止 *Stillstand* ヲ示スモノナリ而シテ搔痒ハ全クナキヲ普通トス形狀或ハ蔓延狀態 *Ausbreitungsform* ヲ以テ左ノ種類ヲ區別ス

點狀乾癬 *Psoriasis punctata* トハ小ナル帽針頭大ノ初期發疹ヲ云フ
 滴狀乾癬 *Psoriasis guttata* トハ點滴ノ大サニ至リシ者ヲ云フ
 貨大乾癬 *Psoriasis imbutata* トハ貨幣大ノモノヲ云フ

圓狀乾癬

圓狀乾癬 *P. figurata* トハ地圖狀ニ蔓延スルモノヲ云フ

迂廻乾癬

迂廻乾癬 *P. gyrata* トハ其形ノ迂廻セルモノヲ云フ

環狀乾癬

環狀乾癬 *P. annularis* 中心已ニ治癒シテ病症周圍ニ尙進行シツ、アル

蛇行性乾癬

モノヲ云フ
蛇行性乾癬 *P. serpiginosa* 多發疹ノ融合スルガ爲メ其形狀蜿蜒蛇行ノ如

疣贅狀乾癬

疣贅狀乾癬 *P. verrucosa* トハ頑固ニシテ永ク存在シ殊ニ下腿ニ多發ス

全身乾癬

キ者ヲ云フ
全身乾癬 *P. unicoloris* ハ時々剝脫性皮膚炎 *Dermatitis exfoliativa* ノ狀ヲ呈

惡寒

惡寒 *Præsen* ヲ伴フアリ

部位

身體ノ伸展側ヲ侵シ殊ニ肘及ビ膝蓋ヲ其固有占位トス萬一屈側ノ侵

サル

サル、場合アリト雖モ之レ極メテ輕度ナリ軀幹、頭部ハ往々罹病スル

ノミヲ侵ス

ノミヲ侵スコアリ此場合ニハ角質 *Hornschicht* ノ肥厚 *Verdickung* ヲ來タ

シ

シ皰裂 *Rhagaden* ヲ生ス此時ハ手掌、足、趾ノ梅毒疹ト鑑別ヲ慎マサル可

ラス

ラス

頭部乾癬

頭部乾癬 *Isoriasis capilliti* ニテモ髮ハ健全ニシテ侵サレズ兎角名ヅクベ

キ程ノ變化ナシ

キ程ノ變化ナシ

爪ノ乾癬

爪ノ乾癬 ナレバ先ヅ爪弧 *Lunula* ニ小點ヲ發シ裂痕トナリ又小溝ヲ

作り混濁シ

作り混濁シ遂ニ剝落スルモノナリ

年齢ハ

年齢ハ六歳前ニ發生スルハ稀ナリ六歳後二十歳間ヲ多シトス而シテ

生涯全ク

生涯全ク持續スルコアリ爪或ハ其他ニテ搔抓セル部ニ乾癬ヲ發生ス

ルコアリ

ルコアリ即チ外傷ニ誘因スルコアリ乾癬患者ハ皆強健ノ者ナリ合併

症トシテ

症トシテ「エクチエーマ」ノ稀ニ來タルコアリ之レ多クハ療法ノ不適當

ヨリ惹起

ヨリ惹起セルモノナリ

診斷上

診斷上ハ注目點ハ鮮明 *well* 銀色光輝 *silberscent* アル厚クシテ大ニ且ツ

炎症性皮膚病

炎症性皮膚病

一八九

一八九

乾燥セル鱗屑ハ限局發赤セル皮膚上ニアリ鱗屑ヲ剝離セバ點狀出血ヲ來タシ又搔痒ナク濕潤セズ好ムデ伸展側ヲ侵カシ慢性經過ヲ取ル者ナルガ故ニ診斷容易ナリ

類症鑑別

第一慢性「エ、ク、チ、エ、ー、マ」ハ發疹ノ限界明割 *sharp* ナラズ多ク濕潤セリ鱗屑ヲ被ムル場合ニテモ其色灰白色ナリ又甚シキ搔痒アリ屈側ニ好テ來タル
第二瀰蔓性脂漏 *Seborrhea diffusa* ハ汚穢灰白色ノ脂肪性鱗屑ナリ頭部ニ來タレバ髮ハ脱毛ス特有ノ搔痒アリ
第三紅斑性瘡痕 *Lupus erythematosus* ハ灰白色ニシテ周圍ニ固着セル脂漏アリ深ク乳頭ニ侵入ス又中心性萎縮 *Central Atrophie* アリ顔面ニ好ムテ來タル
第四紅色苔癬 *Lichen ruber* ハ多形性蠟樣光澤 *Wachsartig glanzende* アル中心臍ヲ有スル原發々疹ニシテ中火ニ鱗屑アリ鱗屑剝離ニ因テ出血ナ

シ
第五紅斑性白癬寄生性匂行疹 *Herpes tonsurans maculosus* ハ急性ノ疾病ニシテ糠枇狀鱗屑アリ部位ハ好ムテ頸部トス劇シキ搔痒アリ
第六落屑性皮膚梅毒疹 *Syphilis cutanea squamosa* ハ銅色ノ浸潤アリ且ツ他ニ梅毒症狀ヲ認ムベシ
第七手掌足皸梅毒性乾癬 *Psoriasis syphilitica palmaris et plantaris* ハ境界弧線狀ニシテ鱗屑アリ赤褐色ノ浸潤セル邊緣ヲ有ス驅梅毒療法ニ因テ反應 *Reaction* ヲ示スベシ

治療法

内服トシテ亞砒酸ヲ用ヒ沃度加里ヲ漸次增量シテ一〇・〇一日量トス「イセチノール」モ亦試ムベキ價値アリ非常ニ蔓延シタル者ハ殊ニ内服ヲ第一着トスベシ
外用トシテ先ツ炎症症狀或ハ「エ、ク、チ、エ、ー、マ」等ヲ治療シ鱗屑ハ加里石鹼或ハ綠石鹼ニテ除去スベシ而シテ之ニ對スル妙藥トシテハ「グリザ

クリザロピン
トラウマチチン

ロビン Chrysarobin 焦性没食子酸 Pyrogallussäure テール 白降汞トス殊ニ
左方ヲ賞用ス

クリザロピン

トラウマチチン

トラムマチチン

一〇〇
一〇〇

或ハ又一〇%クリザロピン軟膏ニテモ可ナリ唯塗布スル際ハ其發疹
ノミニ塗り健康部ヲ避クベシ之レ皮膚炎ヲ起セバナリ又褌衣ヲ汚染
シテ容易ニ脱セザルコトヲ忘ル可カラズ若シ皮膚炎ヲ起セバ直チニ
Sofort 塗布ヲ中止スベシ又夕結膜炎ヲ起スヲ以テ頭部頸部顔面等ハ
之ヲ用ヒザルヲ宜シトス

著者皮膚科ニテ下肢ノ乾癬ニクリザロピントラウマチ、ンヲ塗布
シ甚シキ皮膚炎ヲ起コセシ者ヲ實驗セリ

没食子酸

ワゼリン

二〇〇
二〇〇

或ハ

没食子酸

シエルラツク

一〇〇
五〇

無水酒精

一五〇

其他テール丁幾テール酒精或ハウキルキンソン軟膏等トス此ヲ用ユ
ルキハ尿ノ蛋白ニ注意セザル可ラズ又此テール劑ハ時トシテ松屬毒
疱疹 acycpica ヲ起コス

ナフトール軟膏

白降汞ハ顔面及頭部ニ用ユルニ便ナリ
蔓延シタル乾癬ニハ一處方ニ定限セズ左ノ如クスルヲ宜トス毎日入
浴シ石鹼ニテ洗滌シ後テール丁幾ヲ塗りシ儘半時間或一時間再ビ入
浴シ之ヲ乾カシテクリザロピントラウマチチンヲ患部ニ塗布スベシ
其他ナフトール軟膏モ試ミテ可ナリ

「ナフトール軟膏 Naphtholsalbe

「ナフトール」

五・一〇〇

綠石鹼

三〇・〇

ワゼリン

六〇・〇

右外用

ヘブラ氏紅色糠秕疹 *Pityriasis rubra-Hebra*

或ハ慢性剝脫性皮膚炎 *Dermatitis exfoliativa chronica*

此症ハ初メニ稍全身症狀 *Allgemeiner schleimungen* ヲ以テ體ノ一部ニ發疹シ忽チニシテ全身ニ蔓延スル所ノ發赤 *Rötung* ヲ來タシ其皮膚ニ觸ルレバ熱ツシ然レモ浸潤ハ全ク缺如ス而シテ其皮膚ハ多クハ大板様ノ落屑ヲ起シ來ル其他ニ何等異常發疹等ナシ頭髮脫落 *Defluvium Capillorum* ヲ來タシ又爪ノ變性ヲ來タシ光澤ヲ失ヒ萎縮ス鱗屑ハ再生スルヲ速カニシテ又多量ナリ患者更衣ノ際ナド其近傍ノ床上ハ落屑ニテ滿サル、程ナリ皮膚ハ乾燥シテ且ツ緊張ス故ニ患者ハ皮膚ガ狭小トナリシガ如キ感 *Gefühl* ノリ瘙痒ハ普通僅少 *Serius* ナレモ時ニ又甚タ

シキヲアリ「エクチエー」マ「腫裂」淺在 *oberflächlich* ノ淋巴腺腫大ヲ伴發ス初期ニハ全身症狀著明ナラザル *unbedeutend* モ漸次時日ト共ニ増進シ脫力 *Entkräftung*、麻瘦 *Consumption* シテ遂ニ死亡 *sterben* ス然レモ死亡ノ直接原因 *Directe Todesursache* ハ肺—腸結核ヲ見ルヲ多シトス此疾病ハ實ニ稀有ニシテ甚タ慢性ノ經過ヲ取ルモノナリ
唯瀕莖性發赤ノミニシテ他ニ何等ノ發疹ナク落屑ノ甚シキヲ特兆トス

類症鑑別

- 第一、全身乾癬 *Psoriasis universalis* ヲ精査セバ乾癬特有ノ獨立セル發疹ヲ何レカニ認ムベク且ツ鱗屑ノ色澤ヲ以テモ鑑別容易ナリ
- 第二、葉狀天疱瘡 *Pemphigus foliaceus* ハ水疱アリ汚穢脂肪性ノ痂皮必ズ糜爛セルカ或ハ分泌物多キ肉芽 *granulierende* 性ノ底上ニアリ
- 第三、全身「エクチエー」 *Eks. universalis* ハ濕潤シ水疱或ハ結痂等アリ

治療法

水楊酸硫黄
スタ

急性剝脱性皮

強壯滋養、*Kräftige Ernährung*ニ就テ特ニ注意スベシ
内服薬トシテ亞砒酸規尼涅肝油等ナリ

外用トシテハ温浴或ハ「アエール」浴ヲ行フベシ「アール」酒精ヲ塗布シ三十分間浴中ニアルベシ而シテ浴後水楊酸硫黄坭膏ヲ貼用ス常ニ皮膚ニハ塗脂スルヲ可トス *enfetten* 又ベニ「エ氏」ハ糠糝浴ニ五〇〇—一〇〇〇礬砂ヲ加ハタル者ヲ賞用セリ

水楊酸

一〇〇

硫黄華

五〇〇

ワゼリン

亞鉛華

一〇〇〇

澱粉

又「イヒチロール」ノ卓効ヲ奏セシ例アリ殊ニ二%ノ「イヒチロール」蒸器法ヲ宜ロシトス

尙爰ニ附記スベキ同症状ニテ豫後佳良ナル一層稀有ナル症アリ急性

皮炎再發性
紅熱様皮膚炎

剝脱性皮膚炎、*Dermatitis exfoliativa acuta* 又再發性紅熱様皮膚炎、*Derm. Scarlatiformis Recidiva* ト云フ其症狀熱性ニ來タリ前驅症後ニ赤斑ヲ發シ忽チ全身ニ瀰蔓スルヲ猶紅熱ノ如ク一二日後板狀ニ落屑ス三週ニテ治癒スナリ其名ヲ記憶セバ可ナラン

赤色苔癬 *Lichen ruber*

苔癬 *Lichen* ナル字意ハ背テウイラン氏凡テノ丘疹 *Papel* ヲ指名セリ然ルニ「ヘブラ氏」ハ之ニ次ノ定義ヲ下セリ原發ノ形狀ノ儘ニシテ終始敢テ水疱或ハ膿疱等ニ變化セザル結節 *Knötchen* ヲ云フト

- 紅色苔癬ヲ分ツテ左ノ二トス
- (1) 扁平紅色苔癬 *L. ruber planus*
- (2) 尖圭紅色苔癬 *L. ruber acuminatus*

而シテ明了ナル區別ハ中々困難ニシテ同一患者ニ同時ニ兩症ヲ發生シ得ルヲアリ又其移行症狀モ種々アリ

扁平赤色苔癬 Wilson ノ普通形狀ハ扁平ニシテ中心稍陷没シ多角形 Polygonale ニシテ粟粒大 Insektenross ヨリ豌豆大ニ達シテ蠟様一光澤ヲ有スル蒼白或ハ褐赤色ヲ呈スル結節ナリ此結節ノ周圍ニハ細キ赤キ邊暈ヲ有ス而シテ結節中央ニ小鱗屑ヲ被ムルコト往々アリ結節ハ各個孤立セズ常ニ環狀ニ象眼様 Mosaikartig 或ハ線條 Strichenartig ニ集簇シ皮膚乳頭ニ相當シテ配列スルモノナリ身體大部ニ發生セバ結節融合シ皮膚ハ肥硬シテ褐赤色トナリ恰モ獸革ニ觸ルノ感アリ機械的刺戟ニ因テ發疹ヲ惹起セシムルコトアリ痒痒ハ普通甚シ部位ハ初メ四肢ノ屈側肘窩膝脛及ヒ龜頭 Glans penis ヲ侵カシ次テ軀幹トス其蔓延狀態ハ時ニ對等 Symmetrisch ナルヲアリ手掌足趾ニ來タレバ角質ノ甚シキ肥硬ヲ遺コス

疾病ノ進行ハ徐々ニシテ癩痕 Narbe ヲ殘コシ或ハ其痕ナク且ツ色素沈着 Pigmentierung ハ長ク消失セザルモノナリ

類症鑑別

第一、丘疹性「エ、ク、チ、エ、ト、マ」 炎症々狀アリ而シテ水疱或ハ膿疱ニ移行ス *Uebergehen* 濕潤アリ又決シテ蠟様ノ光澤ナシ

第二、點狀乾癬 隆起少ナク銀白色鱗屑アリ鱗屑剝離ニテ點狀出血アリ疹ハ多ク圓形ナリ痒痒僅少ニシテ伸展側ニ來タルコト多シ

第三、梅毒性丘疹 其色銅色ニシテ又陷没ナク痒痒ナシ驅梅毒療法ニ反應ヲ呈スベク其他梅毒症狀アリ

第四、腺病性苔癬 *Lichen scrophulosorum* 丸キ丘疹性ノ隆起ナリ部位多ク軀幹 *Rumpf* ニシテ痒痒ナク其他體質ヲ檢セバ腺病性ナルコトヲ認ムベシ

尖圭赤色苔癬 ハ赤キ播種性ニ發生スル圓錐狀 *Konisch* ノ結節ニシテ肥厚シ光澤アル表皮ヲ其巔頂 *Spitze* ニ戴クモノナリ故ニ皮膚ヲ輕擦セバ一種鱗ノ如キ觸感アリ此ノ如キ發疹漸次 *zunehmend* 増生シテ互ニ融合シテ圓板ヲ作り全身 *universell* ニ蔓延シ遂ニハ爪マデヲ侵カシ爪ハ裂痕ヲ呈シ混濁ス

部位ハ、軀幹及關節屈側 Gelenkbeuge ヲ好ムデ侵カス

類症鑑別

- 第一、扁平苔癬トハ其形状ヨリ容易ナリ
- 第二、毛囊性赤色糠秕疹 Pityriasis rubra pilaris 毛囊ニ一致セル赤キ浸潤性丘疹ナリ

治療法

刺戟原因タル毛織物、織物ノ衣服 Wolle, lederne Kleidung ハ避クベシ
 内服ニハ亞砒酸ヲ良シトス皮下注射ハ一層妙ナリ然シ數週持續後ニ
 初メテ効能ヲ示スナリ通常六週後ニ奏効ヲ認ム
 外用ニハウンナ氏ノ昇汞石炭酸軟膏ヲ最モ有効トセリ

昇汞石炭酸軟膏

昇汞石炭酸軟膏 Sublimatcarbolsalbe

昇汞 〇・二

石炭酸 四・〇

ワゼリン 九〇・〇

「ライヌチコー」Leisikowノ改正セル方左ノ如シ

亞鉛華 二五・〇

ワゾーゲン 二二五・〇

石炭酸 一〇〇

昇汞 〇・三—一・〇—二・〇

右軟膏

其他鉛匙ニテ搔抓シ或ハ壞疽ニ導キ脱落セシムルニアリ

毛囊性赤色糠秕疹 Pityriasis rubra Pilaris.

本症ハ佛國學派ノ唱道セルモノニシテ尖圭赤色苔癬ト區別シテ一種
 ノ疾患ト見做セリ尖圭赤色苔癬ハ其浸潤コソ原發ニシテ角質増殖ハ
 續發ナルモ之ニ反シテ本症ハ毛囊ノ角質増殖ヲ以テ始マリ浸潤ハ續
 發的ニ來ルナリ又尖圭赤色苔癬ハ全身ニ蔓延セシキハ死亡ノ轉歸ヲ
 取ルヲアルモ本症ハ豫後佳良ナリ

初メ毛莖ニ一致シタル角質ノ増殖ヲ來シテ其巔頂ニ白色ノ鱗屑ヲ被
ムリ其發疹周圍ハ僅カニ發赤ヲ呈ス病症進行スルルハ遂ニ一ノ斑面
ニ融合シテ限界明瞭ナル白色鱗屑ニテ被ワル、實ニ尖圭赤色苔癬ノ
融合セル者ノ外觀ト異ナルヲナシ而シテ此小結節ハ増加ノ全身ハ赤色
粗糙ノ落屑アル浸潤面ヲ呈ス但シ無毛部即チ手掌足蹠ニハ發疹セズ
診斷 病初ノ原發疹ハ毛莖ニ一致スル隆起ノ小結節ニシテ發赤ヲ
缺如スルヲ特有ナリ

治療法 内服ニハ亞砒酸劑ナリ

外用トシテハ上記ノ昇汞石炭酸軟膏又一〇—二〇%水楊酸軟膏石鹼
浴又炎衝症狀劇シキハ「サルチル」酸垢膏ヲ良シトス

ウダール氏慢性單純苔癬 Lichen Simplex chronicus Vidal

ナイセル氏ハ痒疹苔癬様皮膚炎、*Dermatitis helioides Pruricus* ト名ケタリ
ヘブラ氏カホジ―氏ノイマン氏等ハ之ヲ濕疹中ニ數ヘタリシモ現今
ハ此ヨリ分離シテ痒疹ト濕疹トノ中間疾患ト認定セラル

痒疹性苔癬様
皮膚炎

本症ハ硬靱ナル粟粒乃至扁豆大ナル表在ノ結節ニシテ新ラシキ發疹
ハ時ニ帶赤黄色ノアアレモ多クハ帶黄褐色ナリ又劇シキ痒疹アリ新
シキ結節ハ圓形ニシテ時ニ蠟様ノ光澤ヲ呈スルヲ以テ往々扁平赤色
苔癬ト誤認スルヲアリ又搔抓ノ爲メ血痂ヲ附着スルヲアリ發疹ハ限
局シテ二錢貨大乃至手掌大ノ病竈トナリ其面ニ該結節ハ播種狀ニ發
疹ス蔓延スルヲ周圍ヨリス病勢甚シク進ムルハ結節間ノ皮膚モ肥硬
シテ苔癬様トナルヲ以テ一見「さめ」肌ノ甚シキヲ見ルガ如シ

好發部位ハ項部、軀幹、大腿、前膊ノ内面ニ圓形乃至橢圓形ノ病竈ヲ呈シ
發疹症狀ニ變化ヲ來タサズノ徐々ニ増大ス濕疹様ノ濕潤、痂皮形成等
ハ稀有ノヲタリ又病症一進一退シテ結節、痒疹等モ一時消失或ハ輕快
スルヲアリ

診斷 好發部位ト限局セル圓形乃至橢圓形ノ肥硬セル皮膚ノ「さめ」
肌ノ如キ特異ノ結節形成ト經過及搔痒劇甚等ヲ綜合セバ敢テ困難ナ
ラズ

治療法 濕疹殊ニ慢性或ハ亞急性ノモノト同様ニナスベシ朝夕「テ
ール」浴ヲ行ハシメテ後軟膏等ヲ塗布スル「ア」ヲ有効ナリトス

初生兒剝脫性皮膚炎 *Dermatitis exfoliativa infantum*

此症ハ一千八百七十八年「リテルスヘイン」*Rittershaus*ノ初メテ記載セル
者ナリ

生後一週後ノ乳兒ノ口角ヨリ潮蔓性ナル紅斑ヲ發シ皮膚乾燥シ且裂
痕ヲ生シ小サキ鱗屑ヲ起コス次デ滲出液ノ爲メニ表皮、*Epidermis*ハ高
ク膨隆ス遂ニハ表皮剝離シ又結痂ヲ形成スル「ア」リ口中ニ往々淺在
ノ潰瘍 *Geschwüre*ヲ認ムル「ア」リ續發症 *Nachkrankheiten* トシテ癩 *Fryn-*
kel「エ」ク「チ」エ「マ」ノ發スル「ア」リ
部位ハ上肢殊ニ手ヲ多シトス肘及ビ足之ニ次グ稀有ノ疾病ナルモ亦
流行性 *epidemisch*ナル「ア」リ一週間ニテ轉歸ヲ取り續發症ナキモ過半
ハ死亡スルモノナリ

類症鑑別

第一、小兒紅斑、*Erythema neonatorum* 生後直チニ存在シ滲出物ナク消失ス
ルナリ
第二、天疱瘡、ハ水疱ヲ作り其水疱各個間ノ皮膚ハ健全ナリ而シテ續
生スルモノナリ
第三、潮蔓性「エ」ク「チ」エ「マ」 濕潤小水疱癢痒アリ
第四、丹毒、ハ灼熱疼痛且ツ緊張セル皮膚ニテ發赤部ノ境界明劃ニシ
テ高熱アリ

治療法

適當ナル營養ヲ第一トシ乳母或ハ母ノ乳ヲ與ヘ皮膚ハ塗肪 *enfetten*
或ハ散布 *Pudern* シ又温浴 *Warme Bader* ヲ爲サシムベシ痂皮ヲ作りシ
者ハ其除去法ヲ爲スベシ

頭部乳頭狀皮膚炎 *Dermatitis papillaris capillitii*

痤瘡性蟹足腫
項部蟹足腫
項部鞏皮様毛
機炎

此症ハ一千八百六十九年カボシー氏 Koposi 初メテ記述セル者ニシテ
バザン氏 Bazin ハ之ヲ痤瘡性蟹足腫 Acne-Keloid ト云ヒウンナ氏 Unna
ハ項部蟹足腫 Nacken-Keloid ト云ヒエールマン氏 Erlenmeyer ハ項部鞏皮様
毛囊炎 Folliculitis nuda Seleroticans ト名ケタリ殆ンド常ニ項部 Nacken ノ髮
際部ニ大小不定ニシテ肥硬セル表皮ヨリ被ハル、所ノ腫瘍 Geschwülste
ヲ呈ス其表面ニ多數ノ皺溝アリ恰モ多數ノ結節蟹足腫様ニ集合セル
ノ觀アリ而シテ特兆ハ毛ガ往々三四本宛其結節ノ爲メ一束トナリ一毛
口ヨリ發生スルヲ認ム毛瘡ニ見ル如キ膿疱アリ又痂皮アリ然レ膿疱
中ニ毛髮ハ貫通シ居ラズ出血スルハ是ヲ切ルキニ認ムルノミ
類症鑑別
第一、毛瘡ハ其結節ノ中央ヲ毛髮ノ貫通スルヲ特兆トシ又初メヨリ膿
疱ヲ作り抜毛容易ナル者ナリ
第二、瘡瘡ハ融合スルヲ稀有ニシテ又蟹足腫狀ノ腫瘤ヲ形成スルヲナ
シ毛ノ結束モナシ

治療法

單一ニシテ腫瘍各個ヲ切除スベシ若シ不可能ナレバ水銀硬膏ヲ貼用
スベシ然レバ吸收シテ治癒スルコアリ
瘡瘡様結節ハ務メテピツク硬膏ヲ貼用シ置クベシ
又左ノ處方ヲ以テ塗擦ヲ試ムベシ

レゾルチン

五〇

綠石鹼

五〇〇

右塗擦料

皮脂腺ノ分泌障害及ビ單純炎症

Secretionsstörungen und einfache Entzündungsprocessen
der Talgdrüsen

脂漏 Seborrhoe, Schmeerfluss

脂漏トハ皮脂腺ノ分泌増加セルヲ云フモノニシテ分泌物 Secret の性

質 Beschaffenheit に因テ左ノ如ク區別セリ

- (イ) 油性脂漏 *Seborrhea oleosa* トハ分泌物油様ニシテ一種ノ光澤アル者ヲ云ヒ
- (ロ) 乾性或ハ糠枇性脂漏 *Seborrhea sicca od furfuracea od pityrioides* トハ分泌物乾燥シテ灰白色ナル落屑ヲ有スル皮膚ヲ云フ

脂漏ハ初生兒ニハ生理的 *Physiologisch* ニアリ病的 *Pathologisch* トシテハ先天性疾患タリ然レモ普通後天性 *Erworben* ニシテ頭部、顔面、胸部、肩胛骨間、包皮其他ニ多ク見ルモノナリ此中質地ニ必要ナルハ頭部及顔面脂漏ナリ

頭部脂漏

頭部脂漏 *Seborrhea capillaris*

大人及ビ小兒濕疹條下ニ詳説セリニモ來タル多少脂肪性汚穢黃色鱗屑ニシテ初メ限局セルモ後彌蔓シ毛髮ハ初メ脂様ノ光澤アリ常ニ清潔ニ梳ラザレバ容易ニ粘着ス而シテ病症持長セバ毛髮光澤ヲ失ヒ漸次糠枇性禿髮 *Alopecia pityrioides* トナル時ニハ脫毛部ニ篩狀ノ小孔ヲ認ムルコトアリ是レ皮脂腺ノ擴張セル腺口ナリ又所謂糠枇頭 *Seborrhea*

糠枇性禿髮

顔面脂漏

Sicca ニシテ爲メニ往々壯年者ノ脫毛スルヲ見ル
 顔面脂漏 *Seborrhea faciei*

好ムデ來タルハ鼻、頤及ビ前額部ナリ皮膚ハ脂肪^{アツク}アリ光澤アリ時ニ又充血性 *hyperamisch* ナリ皮脂腺 *Talgdrüsen* 口ハ擴大セリ瘰癧 *Acne* 面皰 *Comedo* 酒渣鼻 *Acne rosacea* ハ往々合併スルコトアリ而シテ此顔面脂漏ハ普通春期發動 *Pubertät* ニ伴發ス殊ニ淺黒キ人ヲ屢々侵カスモノナリ而シテ多少ノ瘙痒ヲ伴フヲ常トス

充血性脂漏

其充血著明ナル脂漏ハ充血性脂漏 *Seborrhea congestiva* ト云ヒ貧血ノ娘 *Mädchen* 及ビ男子モ侵カサル而シテ多少小鱗屑ノ伴フキハ顔面糠枇症 *Pityriasis faciei* ト云ヒ又一局部ニ限ラズシテ全身ニ來タルコトアリ而シテ衰弱シタル者或ハ大病後此形ヲ來タスコトアリ此症狀ヲ衰弱性糠枇疹 *Pityriasis labescentium* ト云フ殊ニ此全身脂漏者ハ初生兒ニ來タルコトヲ特有ナ

衰弱性糠枇疹

リトス之レ寧ロ脂肪性魚鱗癬 *Ichthyosis sebacea* ト云フヲ適當トス其ノ

脂肪性魚鱗癬

他脂漏性「エクサチエーマ」ニ關シテハ上段「エクサチエーマ」ノ條下ニ説述セ

類症鑑別

第一、エクトチエトマハ浸潤水疱結痂等アリ
 第二、紅斑性狼瘡ハ限局セリ而シテ脂漏性痂皮固着シテ毛囊ニ突起状ヲ
 ナシ侵入セリ又皮膚ニ中心縮萎縮アリ癩痕アリテ其面平滑ナリ
 第三、乾癬ハ限局シ光澤アル鱗屑アリ頭髮脱落ナン何處カニ乾癬ノ原
 發疹ヲ認ムベシ

治療法

第一着 Vorleben ニ内服特ニ婦人ハ婦人科病 *ganzheologische Leiden* ヲ治シ
 便秘 *Opstipation* アレハ常ニ之ヲ整正セザル可カラズ
 局部ハ皮脂ノ附着ヲ除キ分泌ヲ制止スルヲ目的トス第一適應法 *Cyste*
Indication ハ綠石鹼加里石鹼精其他軟膏類ヲ用ヒ第二適當ナルハ硫黃
 「レゾルチン」水楊酸酒精其他トス頭面部脂漏ヲ處置スル方法左ノ如シ初
 メ毎日一二回後チ一週一二回綠石鹼ト温水ニテ洗滌シ毎夕五%ノ水

楊酸ヲ調和シタル者或ハ單純ノ二—一〇%ノ硫黃或ハ「レゾルチン」軟
 膏ヲ塗擦スベシ此塗擦ハ髪ニ施コス者ニアラズ能ク皮膚ニ摩リ込マ
 ザル可カラズ或ハ又左方ヲ處シテ翌日之ヲ拭ヒ取リ一〇%硫黃軟膏
 ヲ塗擦スルヲ可トス

水楊酸 五・〇

阿列布油 一〇〇・〇

蓖麻子油 一〇〇・〇

ベルガモット油 六滴(或ハ蓋薇油一滴)

而シテ夜間塗擦後頭巾ノ類ヲ戴ケバ尙妙ナリ此ノ如クシテ鱗屑脂漏
 輕減セルヲ認定セバ水楊酸ヲ去リ唯單純ナル硫黃劑ヲ用ヒ或ハ左ノ
 「レゾルチン」精(頭髮精)ニ改ム

レゾルチン 二〇・五〇

蓖麻子油 一〇〇・〇

酒精 九〇・〇

頭髮精

單寧精

ペーリュウバルサム

〇・五

又左ノ單寧精 Tanninspiritus ヲ用ユ

單寧酸

一〇〇〇

アルコール

八〇〇〇

安息香酸

五〇〇

而シテ婦人等ハ日中上記ノ水劑ヲ塗り夜間ハ硫黄軟膏ヲ塗擦スベシ
而シテ四日目位ニ一回綠石鹼或ハ加里石鹼ニテ充分軟膏ヲ洗滌シ後
乾拭再ビ反覆同處置ヲスベシ

註著者ハ五歳ノ男子頭部ノ頑固ニシテ且ツ蔓延セシ油性脂漏

ニ一〇％硫黄軟膏ニ五％ノ割合ニレゾルチンヲ加ヘタル者ヲ

ニケ月間持長シ始メテ奏効セルヲ實驗セリ

顔面脂漏ヲ處スルハ左ノ如クスベシ

毎夕石鹼ニテ洗滌シ後チ五・一〇％硫黄軟膏或ハ左ノ硫黄泥膏ヲ夜

間塗布スヘシ

硫黄泥膏

硫黄泥膏 Schwefelpasta

沈降硫黄

四〇〇

ワゼリン

二〇〇〇

亞鉛華

各一〇〇〇

澱粉

而シテ日中ハ「レゾルチン」精ヲ塗ルベシ

使用スル石鹼及ビ酒精ヲ餘計ニ塗ルヲ要セズ若シ甚タシク炎症ヲ呈

シ來タレバ之ヲ廢スルヲ勿論ナリ

其他左方ヲ試ムベシ

抱水クロラール

五〇〇

蒸餾水

五〇〇〇

酒精

四〇〇〇

或ハ

「イヒチヤール」五・一〇％ノ軟膏或ハ溶液トシテ用ユ

然レモ如何ナル藥劑モ須ラク持長シテ月餘ヲ耐ユル者ト思フベシ然レバ簡便ナル硫黃軟膏ニテ治療スルヲ疑ヒナシ

皮脂過少症 *Asteatosis cutis*

此症ハ皮脂分泌ノ過少ナル爲メ皮膚ノ乾燥ヲ來タシ粗糙トナリ鱗ニ觸ル、ノ成アリ而シテ落屑ヲ起シ往々皸裂ヲ生ズ殊ニ手及ビ顔面ニ多ク稀レニ全身性ニ來タルヲアリ老人或ハ虛弱家等ニ來タリ下婢洗濯屋諸種職工等多ク罹病スルヲ常トス

治療法

先ヅ原因タル諸障害ヲ除キ軟膏類ヲ澤山塗布スベシ「グリセリン」ヲ素人ハ往々用ユル者アレモ濃厚ナル者ハ乾燥セル皮膚ニハ却テ害アリ日中ハベルツ水ヲ塗布セシメ夜間ハ「ウキルソ」軟膏或ハ水楊酸軟膏等ヲ塗布シテ綳帶ヲ施コサシムベシ

尋常性痤瘡 *Acne simplex, vulgaris*

此症ハ油性脂漏ニ罹リシモイニ多ク認ムル所ニシテ皮脂腺口ニ空氣中ノ汚物附着シ爲メニ腺口閉塞シテ豌豆大ニ達スル所ノ發赤且ツ加壓 *Drick* ニテ稍疼痛アル結節トナル此結節即チ座瘡ナリ此中央ニ黒點アリ是ヲ點狀痤瘡 *Acne punctata* ト云ヒ黃色膿様トナリ或ハ眞ノ膿胞トナル是ヲ膿疱性痤瘡 *Acne pustulosa* ト云ヒ時トシテ甚シキ炎症性浸潤ヲ呈スルヲ硬固性痤瘡 *Acne indurata* ト云フ又其孤立シ散播シ或ハ融合スルヤ否ニ因テ播種狀痤瘡 *Acne disseminata* 融合性痤瘡 *Acne conflans* ト名ヅク然レモ通常諸形症同時ニ發生シ又面皰ト混生ス而シテ實ニ此痤瘡ノ多クハ此面皰アル爲メニ發生スル者ナリ春氣發動ノ片殊ニ淺黒キ人ニ多シトス頗ル慢性頑固ノ症ナリ而シテ長ク存在スルハ皮膚ハ暗褐色ヲ呈ス稀レニ痤瘡ノ膿胞後ニ色素斑 *Pigmentflecke* ヲ遺コスコトアリ色素性痤瘡 *Acne pigmentosa* ト云フ

色素性痤瘡

播種狀痤瘡
融合性痤瘡

硬固性痤瘡

膿疱性痤瘡

點狀痤瘡

悪液性瘰癧
腺病性膿疱疹

部位、皮脂腺ノ存スル處ハ何レヲ間ハズ發生スル者ナレモ殊ニ顔面前額及ビ背部ヲ最モ多トス時ニ瘰癧膿疱中ニジモン氏ノ所謂毛囊蟲 *Acarus folliculorum* ヲ見ルコアリ
其他悪液性瘰癧 *A. chloaetorum* 或ハ一名腺病性膿疱疹 *Scrophulderma pustulosum* ナル者アリ腹部及ビ背部ニ發生シ弛緩 *Schaffe* セル結節ニシテ其頂點ニ小膿疱アリ膿疱乾燥シ結痂ヲ生ジ其下ニ小潰瘍ヲ形成スルモノアリ之ハ結核疹ノ一種ト見做サレアリ結核條下ニ詳説スベシ
診斷上ニハ顔面及背部ニ多ク而シテ面皰ヲ伴ヒ黒點或ハ膿疱ヲ有スルヲ特兆トス

類症鑑別

第一、痘瘡 *Variola* 之レハ全身症狀アリ且ツ中心性臍アリ
第二、膿疱性梅毒疹之レ甚シキ浸潤ト銅色アリ全身ニ發生ス手掌足蹠ニモ亦來タルコアリ其他梅毒症狀アリ

治療法

務メテ其原因ヲ求メ之ヲ除カザル可カラズ例ハバ消化不良 *Dyspepsie* 便秘生殖器異常或ハ沃度臭素劑服用等ナリ此二藥ノ爲メニ發生スルヲ即チ沃度臭素瘰癧 *Brom-jodacne* ト名ヅク
食物トシテハ油脂肪及ビ肉類殊ニ牛肉豚肉ハ少量ヲ用ユベシ
内服、ハ「イヒチオール」ヲ可トス
イヒチオール 各二〇〇
蒸餾水 右一日三回十―二十滴宛食後服用
或ハ又
イヒチオール 一二〇
甘草越幾斯 適宜
右爲九十九每日三回二―三粒食後服用
而シテ一日二〇迄高ムルコヲ得
外用、ニハ先ヅ面皰ヲ除キ膿疱アレバ加壓或ハ尖刃ニテ開口排出ス

ナフトール硫黄軟膏

ベシ毎日大理石石鹼或ハ細砂又輕石ノ如キ者ニテ摩擦シ其皮脂腺口ノ閉塞汚物ヲ除去スルモ可ナリ乾燥セバ一〇%硫黄軟膏或ハ坭膏ヲ塗ルベシ頑固ナル者ハ「ナフトール」硫黄軟膏或ハ「アルカリ」性硫黄混劑又ハ硫黄石鹼精ヲ用ユベシ

(1) ナフトール硫黄軟膏

ナフトール

四・〇

硫黄華

二〇・〇

綠石鹼

各一〇・〇

ワゼリン

(2) アルカリ性硫黄混劑 *Alkalische Schwefelmischung*

硫黄

グリセリン

酒精

エーテル

各五・〇

炭酸加里

(3) 硫黄石鹼精 *Schwefelstoffspritus*

硫黄

一〇・〇

加里石鹼精

四〇・〇

此等ヲ塗布セバ灼熱ヲ起コセテ終夜忍耐スベシ而シテ日中ハ「コールドクリーム」或ハ「ラノリンクリーム」ヲ塗り後散布藥ヲ撒布シ置クベシ

コールドクリ

コールドクリーム *English. Cold Crème*

椰子油

一〇・〇

薔薇油

〇・一

ラノリンクリーム *Lanolincreme*

ラノリン

一〇〇・〇

固形パラフィン

二五・〇

バニリン

〇・一

薔薇油

一滴

ラノリンクリ

而ノ月餘毎夕硫黃石鹼ニテ洗滌スルヲ怠ル可カラズ
尙次方ヲ試ミテ可ナリ一〇—三〇%「イヒチヤール」液、軟膏、坭膏、又沃度
「グリセリン」ヲ毎日二回刺戟ヲ來タス迄用ユベシ

沃度末

各五〇

沃度加里

一〇〇

グリセリン

一〇〇

又水銀硬膏ハ、硬固性、瘡、ニ用ヒテ効アリ、又我皮膚科教室ニテハ、クム
メルフェルド氏洗滌水 *Kummerfeld'sche Waschwasser* ヲ用ユ

クムメルフェルド洗滌水

硫黃華

一二〇

カンフル

一〇

アラビアゴム

六〇

薔薇水

一〇〇

石灰水

一〇〇

クムメルフェ
ルド氏洗滌水

化粧粉

此洗滌水ヲ放置セバ沈澱ス日中ハ此清澄ノ液ヲ塗布シ夜間ハ其沈澱
物ヲ塗布スベシ

日中婦人等ニテ希望セバ化粧料 *Schminke* トシテ軟膏或ハ粉料ヲ與フ
ベシ

化粧粉 *Schminkepulver* ハ純粹ノ骨石劑若クハ之ニ亞鉛華、硝蒼、炭酸、マグネ
シア等ヲ加ヘシ者ナリ又硬度ヲ附セントセバ、柯々阿酪五—一〇%ヲ
加フベシ赤味ヲ附スルハ一—二%「カルミン」ヲ加フベシ之ヲ單ニ皮膚
ニ塗擦スルモ可ナレモ先ヅ塗脂シタル後ニ塗ルニ若カズ其塗油ニハ
「ラノリンクリーム」ヲ宜シトス例セバ左ノ如シ

(1) 赤色化粧粉 *rothes Schminkepulver*

カルミン

〇・五

滑石

五〇〇

右塗油後塗擦

(2) 白色化粧粉 *weisses Schminkepulver*

化粧膏

亞鉛華	二〇・〇
滑石	三五・〇
炭酸マグネシア	三・〇
右同上	

(3) 白粉 *weisse Pulver*

亞鉛華	二〇・〇
滑石	三五・〇
炭酸マグネシア	三・〇
右同上	

化粧膏 *Schminke*

(1) 赤色化粧膏 *rohes Schminke*

カルタミン	一・〇
滑石	一・〇
スヘルマチオン	一〇・〇

甘扁桃油	二〇・〇
------	------

(2) 化粧膏

次硝酸蒼鉛	一〇・〇
滑石	五・〇
ベルガモット油	一・〇
單軟膏	三〇・〇

此化粧膏ハ脂肪ノ多キ皮膚ニハ用ヒザルヲ可トス

著者ハ朝夕二回加里石鹼塗擦温湯ニテ洗滌後左方ヲ塗布セシム
實際ニ於テハ患者ハ軟膏塗布ヲ不便トスルモノ多シ故ニ溶液ヲ
與フル工風ヲ要ス婦人ハ殊ニ然リ

イヒチオール	五・〇
--------	-----

硫黃華	二・五
-----	-----

硼砂	〇・五
----	-----

グリセリン	二五・〇
-------	------

酒精

二五〇

臭素劑性痤瘡 Bromakne

臭素鹽類服用ノタメ所謂藥疹ヲ發シ紅斑ヲ來タスアリ然レ皮膚科トシテ特ニ注意スベキハ之ニ因スル痤瘡トス癩癧アル患兒其他ノ疾病ノタメ持續シテ臭素劑ヲ服用セバ好デ頭部、上下肢、前額、鼻、肩胛部等ニ尋常性痤瘡ト等シキ結節或ハ潰瘍ヲ生ズ顔部ハ粟粒大ヨリ胡桃大ニ達スルモノナリ其色赤色乃至褐赤色ニシテ膿疱トナルモノアリ而シテ後色素沈着又ハ癍痕ヲ遺コス

結節ハ服藥中止後ハ普通三週以內ニ消失ス然レ尙發疹連續セバ集簇性ニ發生シテ炎衝性トナリ皆融合シテ一部膿疱ニテ滿チタル一斑面ニ變化ス其水泡乾燥後ハ一圓貨大ノ結節肉芽性ヲ呈スル疼痛性或ハ無痛性ノ結節トナリ恰モ膿ヲ吸入セル海綿ノ如キ外觀ヲ呈ス此ノ如キ潰瘍ヲ見ルハ下肢殊ニ下腿及ビ顔面ニ多シトス

又腫瘍ハ肥厚ニ多少黒褐色ノ結痂ヲ有スルコトアリ之ヲ剝離セバ不正ニシテ硬キ汚穢ノ潰瘍ヲ見ルベシ時トシテ又「コムヂエローム」乳嘴樣増殖ヲ來タスモノアリ

診斷 疑ハシキハ服藥ヲ中止セシムベシ

類症鑑別

第一 結節性紅斑ハ必ず疼痛アリ又膿胞ナシ又潰瘍ヲ呈セズ

第二 多形滲出性紅斑ハ水泡アルモ集簇性ナラズ多少搔痒アリ又部位ハ殆ト四肢ニ限ル

第三 蕁麻疹ハ其經過速カニ且ツ搔痒甚シ

治療法

ハ其服藥ヲ中止シ局部ニハ硼酸軟膏ノ如キ無刺戟性ノモノヲ貼布シ肥厚セル結節ニハピツク氏硬膏ヲ貼布スベシ又「デルマトール」軟膏「アイロール」等モ可ナリ

酒渣鼻 Acne rosacea, Kupferhne

鼻瘤

此症ハ鼻、頬稀レニハ、頤及ビ前額等ノ皮膚ニ鮮紅或ハ暗赤色、紫紅色或ハ蒼白ナル色ヲ以テ、潮蔓性肥硬或ハ結節ヲ來タスモノナリ、皮膚ノ擴張セル毛細血管ハ多少肉眼ニテ目撃シ得ベシ、脂漏ハ必ず伴フモノナリ、膿疱モ往々伴發シ居レルコトアリ、便宜上分ツテ動脈性ト靜脈性トス、動脈性ハ鮮紅ニシテ皮膚滑澤ナリ、靜脈性ハ紫紅色ニシテ肥硬シ多クハ膿疱性、硬固性瘰癧ヲ伴發セリ而シテ高度ニ達セバ有莖或ハ高低ナル軟キ結節トナリ或ハ瘤トナル是レ鼻瘤、*Kniophlyna* ナリ然レモ動脈性靜脈性ヲ劃然ト區別シ得ズ其間ニ幾多ノ移行症狀アリト知ルベシ、疾患ハ遅々トシテ發赤ヲ以テ初マリ病初ハ唯食後或ハ温度變換等ノ際ニ著明トナルモノナルモ漸次進行シテ平常モ發赤スルニ至ルモノナリ

類症鑑別

第一鼻瘤トナリシ者ハ唯鼻硬腫、*Rinoskleroma* ト誤診スルコトアレドモ鼻

硬腫ハ非常ニ堅ク又必ず鼻腔内ヨリ發病スル所ノ滑澤光輝アル腫瘍ナリ

第二、狼瘡ナレバ狼瘡性結節及ビ癩痕潰瘍等アルヲ以テ容易ナリ

第三、紅斑性狼瘡ハ中心ニ癩痕性萎縮アリ又病竈境界明劃ナリ

治療法

先ヅ内臓病、婦人科病ヲ診シ又飲酒ヲ禁ズベシ

内服、イヒチオールヲ上記ノ如ク溶液或ハ丸劑トシテ與フ

外用、動脈性ナラバ夜間 *Nachts* 一〇%硫黃劑或ハ五—一〇%イヒチオール液、軟膏、*コロチウム*ヲ用ヒ口中 *am Tage* ハ「*コルドクリーム*」散

布藥等ヲ用ヒ炎衝アレバ水楊酸坭膏ヲ用ユベシ、靜脈性ニハ二〇—五

〇%イヒチオール或ハ剝離膏 *Schulpastra* ヲ用ヒ皮膚肥硬甚シケレバ水

銀硬膏或ハ沃度「グリセリン」ヲ良トス、鼻瘤ノ結節ハ外科的ニ切除 *Ex-*

stirpium スベシ、動脈靜脈兩性ヲ論ビズ、縱横ニ亂切 *Scarification* ヲ爲シ過ク

ロール酸鐵ヲ塗布シテ脈管ヲ收縮セシムベシ、尙電氣燒灼 *garranocautisch*

ロール酸鐵ヲ塗布シテ脈管ヲ收縮セシムベシ、尙電氣燒灼 *garranocautisch*

烙白金 *Pyrogenin* ニテ血管ヲ挫滅スルモ宜シ又左方モ推賞 *empfehlen* スベシ

昇汞 〇・一

グリセリン 一〇・〇

コロニン水 一〇・〇

薔薇水 七〇・〇

右塗布

食物中脂肪多キ牛乳、牛肉類或ハ酒類等ヲ禁ズベシ

痘瘡様瘰癧 *Aene varioliformis*

此症ハ頭部、額部及ビ前額髮際稀ニハ項部、顔面、頸部及ビ胸部ニ發スル扁平 *flach* ニシテ集簇狀 *gruppenweise* ニ配列セル褐赤色 *braunroth* ノ結節ニシテ遂ニ膿疱トナル者ナリ膿疹乾燥セハ中心陥没 *einsinken* セル結節ヲ作り治癒後 *Heilung* ニ癩痕ヲ殘コス此中心陥没ノ痘瘡ニ似タルヲ

以テ命名セシ所以ナリ此症ヲ見ルコト稀レナリ三、四十歳ノ者ヲ侵カスコト多シ

類症鑑別

第一、痘瘡ハ部位一定セズ且ツ全身症狀アリ

第二、膿疱性梅毒疹甚シキ邊縁浸潤 *Starke Randinfiltration* アリ其他梅毒症狀アリ

治療法

一〇%硫黄軟膏或ハ五—一〇%レゾルチン軟膏ヲ用ユ或ハ單ニ硼酸軟膏ヲ用ユ

又此症ニ似タレドモ全身ニ散發シ癩痕及ビ癩痕形成ヲ起ス痘瘡ニ似タル發疹アリベック氏ハ *Böck* 壞疽性瘰癧 *Aene necrotica* ト云ヘリ今日ハ是レ亦結核疹タルコトニ認定セラレツ、アリ

又カボジ—氏ハ頭部顔面其他ニ發生スル急性蕁麻疹様ニシテ非常ノ搔痒アリ之ヲ搔抓シテ必ズ癩痕ヲ殘コスモノヲ蕁麻疹様瘰癧ト

環疽性瘰癧

蕁麻疹様瘰癧

one irritata ト云ハリ

尋常性毛瘡或ハ非寄生性毛瘡 *Sycosis vulgaris*
od. non parasitaria

土肥博士ハ
瘡ノ譯語程カ
ナラズ毛瘡ト
改譯セラレタ
リ

本症ハ化膿球菌ニ因ル毛囊ノ炎症ニシテ必ず毛ガ其中央ヲ貫通スル所ノ小膿疱ニシテ此膿疱ハ散在 *Zerstreut* セルコアリ或ハ集簇シ又融合スル者アリ其周圍 *Umgebung* ニハ炎症浸潤全ク存セザルカ或ハ存スルキモ極メテ僅少ナリ稀レニ結節形成ヲ認ムルコアリ毛囊盡ク化膿セバ毛ハ弛緩シテ遂ニ脱落ス病症蔓延ハ徐々 *langsam* タリ而シテ再發シ易キ者ナリ *recidiv* 又「エクチエーマ」ヲ周圍ニ惹起スルヲ多シトス部位鬚髯眉毛ニシテ頭部ニ發生スルハ實ニ稀有ナリトス普通上唇部ニ發病スル者ヲ多シトス毛ノ貫通 *durchbohren* スル小膿疱ニシテ普通上唇鬚髯ニ發病シ經過 *Verlauf* ノ徐々ナルコニテ明カナリ

類症鑑別

第一、寄生性毛瘡 *Sycosis parasitaria* 是レ急性ノ疾患ニシテ再發 *Recidiv* ナシ頭部等ニ同時ニ白癬(寄生性)匂行疹ヲ認ムルコ屢々アリ深部ノ浸潤甚シク結節及ビ化膿 *Eiternagen* アリ觸接傳染性ナリ第二、結節性梅毒疹 *Syphilis cutanea nodosa* 疼痛アリ銅色ニシテ浸潤アリ潰瘍ヲ形成ス又水銀及ビ沃度劑ニ反應ヲ呈シ且ツ其他梅毒症狀アリ第三、毛瘡樣「エクチエーマ」 *Eks. Sycosiforme* 此膿疱ハ皆毛ニ一致セズ且ツ發痒アリ發赤アリ

治療法

鼻加答兒ハ「エクチエーマ」ノ原因タルコアルヲ以テ之ヲ治セザル可カラズ毛ハ短ク剪去シ痂皮アレバ軟化シテ之ヲ取り毛抜ニテ拔毛シ後「レゾルチン」「ピック」硬膏水楊酸坭膏或ハ「ナフトール」坭膏又硫黃「タンニン」坭膏「イチヒオール」坭膏等ヲ塗布スベシ

單寧酸

五〇

硫黃タンニン坭膏

著者此處方ニ
ヲ入院患者ニ
テ實驗シ奏効
メタリ

硫黃華 一〇〇〇

ワゼリン 五〇〇

亞鉛華 各一七・五

澱粉 各一七・五

又ウキルキンソンヲ塗布シ皮膚ヲ全ク剝離セシムベシ

又土肥教授ハ左方ヲ處シ奏効ノ著明ナルヲ示教セラレタリ

赤降汞 二〇〇

亞鉛華 各二五〇

澱粉 各二五〇

豚脂 五〇〇

著者ハ一〇%イヒチオール軟膏ヲ慣用ス又甚シキ浸潤ヲ伴ヘル如キモノニハ朝夕二回五百倍リゾール液ノ温湯ニテ蒸罨法ヲ行ハシメ日中ハ土肥氏釜硫膏ヲ塗布シ夜間イヒチオール軟膏或ハ「ラノリン」軟膏ヲ塗布シテ綑帶ヲ行ハシメ奏効ヲ實驗セルト多シ

又近來頭部及鬚髯部ノ毛瘡ニシテ數年來爲ニ苦惱セル者ニ諸種ノ審法軟膏等ヲ用ユルモ更ニ奏効ナキヲ以テ試ニ朝夕二回加里石鹼精ニテ洗滌後カムフル「丁幾」イヒチオール等分ノモノヲ塗布シ鬚髯部ハ加壓的ノ綑帶ヲ施コサシメ膿疱ハ皆拔毛セシメテ反覆持長シタルニ最モ確實ノ奏効ヲ得タルモノアリ爾來此ノ如キ毛癢性ノ膿疱ニテ再發性ノ者ニハ此法ノミヲ實施シツ、アリテ頗ル價值アルトテ確認セリ毛瘡ノ治療ハ洋ノ東西ヲ問ハズ頑固ノモノトセラレアリ讀者諸君ノ實驗試用ヲ希望ス

火傷及ビ凍傷 *Verbrennungen und Erfrierungen*

火傷 *Combustio-Verbrennung* ハ其症狀ヲ三等ニ區別セリ然レトモ之レ其溫度ノ高低ニアラズ其熱ノ持續時間ノ長短如何ニ關シテナリ而シテ火傷凍傷ハ共ニ慢性皮膚炎ニ外ナラズ
(r) 紅斑期 *Stadium erythematosum* 皮膚赤ク腫脹シ疼痛アリ暫時ニシテ色

素沈着ヲ遺コシテ諸症消退 *Verschwinden* ス普通ハ第二期ト合併スル者ナリ

(2) 水泡期 *St. bullosum* 腫脹甚シク大ナル弛緩性水泡ニシテ透明 *Klar* ナル膠様粘稠性ノ内容ヲ有シ發赤セル皮膚面上ニアリ内容吸收セラレ或ハ水泡破潰結痂シテ治癒ニ就クモノナリ疼痛劇甚外氣ニ觸ル、殊ニ然リトス

(3) 壞疽期 *St. necroticum* 固着セル *festhaften* 白黄黑色ノ濕潤或ハ乾固炭化セル痂塊ヲ生ジ水泡ヲ混生スルコアリ境界線 *Demarkationslinie* 出來テ脱落 *Abstossen* ス其痂塊 *Schorf* ノ深キト廣キトニ從ヒ後チニ多少牽引性ノ癢痕ヲ殘コス者ナリ

診斷及類症鑑別ハ記載ヲ要セズシテ明カナリ

治療法

必要ノ場合ニハ豫後ノ危険ヲ注意シテ興奮劑 *Erethantia* ヲ與ヘ食鹽水皮下注射ヲ行フベシ

外用 第一第二期ノ火傷ナレバ外氣ニ觸レシメザルヲ主眼トシ水泡内容ヲ出シ皮膚ヲ〇・九%食鹽水或ハ三%硼酸水ニテ清潔ニナシ或ハ左方ヲ處ス

石灰水

各二〇・〇

亞麻仁油

〇・〇四或ハ薄荷二・〇

チモール

又石灰亞鉛華軟膏ヲ用ユ

亞麻仁油

各一〇・〇

石灰水

亞鉛華

白蠟

〇〇・五

チモール

或又重輕症ニ沃度 *ホルム* 劑ヲ用キ屢々中毒症ヲ起スヲ以テ寧ロ用キザルニ如カズ *クレヲリン* *Crolin* *ライロフエン* *Europhen* 或ハ硝蒼 *デ*

ルマトールヲ用ユベシ
其他ノ藥品ハ「コロヂニウム」ト「ラウマチン」冷器法、ブロー氏器法或
ハ硼酸軟膏等トス

近時一%ピクリン酸器法ノ卓効アルヲ唱道スル者多シ

凍傷 *Congestio-Erythema* 已ニ知ル如ク身體末梢部ニ來タリ或ハ貧血ノ
者且ツ坐位ヲ取ル者睡眠者等ヲ好ムデ侵カスモノナリ亦三等ニ區別
セリ

(1) 紅斑期 即チ血管收縮 *Vasoconstriction* ノ爲メニ貧血ヲ起シタル後血
管擴張 *Vasodilatation* 來タリ發赤鬱血 *Stauung* 及ビ浮腫發生ス此ノ如キ
病症限局ノ部位ニ發生セバ爰ニ凍瘡 *Frostbeulen-Periories* ヲ發ス

凍瘡 *Periories* ハ已ニ秋季ニ於テ罹病スル者アリ紫色ヲ帶ビタル浮
腫性ニ扁平隆起セル結節ニシテ其中央部蒼白色ヲ呈スルヲアリ表皮
ハ菲薄トナリ搔痒及ビ疼痛アリ夏期ハ多ク消退シ冬季ハ再ビ發生ス
其好發部位ハ手足ナリ患者ノ苦惱ハ夜間殊ニ海中ニ温マリシキ搔痒

凍瘡

凍瘡性潰瘍

疼痛灼熱ヲ覺ユルニアリ其續發症トシテ膿潰或ハ血管擴張ヲ惹起ス
ルヲアリ搔抓ノ爲メ血液性内容アル水疱ヲ發生スルヲアリ而テ破潰
シテ凍瘡性潰瘍 *Pernio Ulcerans* ヲ生ズ顔面ハ寒冷 *Kälte* ニ長ク侵カサレ
タル人ニハ血管擴張 *Gefassverweirung* 即チ紫赤色ヲ呈ス *Rosacea* 手足モ
冬季ニ *Winter* 潮溼性ニ加壓シテ消退スル處ノ帶紫色ノ發赤浮腫アリ
テ常ニ冷ユル感覺ヲ有ス之レ殊ニ貧血性ノ處女ニ多ク見ル所ナリ
(2) 水疱期 透明或ハ血液性 *hamorrhagisch* 内容 *Inhalt* ヲ有シ其間深入ノ
膿潰ヲ來タスヲアリ
(3) 壞疽期 帶紫色ニシテ冷タク感覺全ク缺如ス稀ニハ水疱ヲ作ルモ
ノアリ

治療法

豫防法 *Prophylax* ハ貧血ヲ防ギ暖衣ヲ着シ諸種ノ壓迫ヲ避クベシ小兒
ニ於テハ其體質ヲ強壯ニスルニアリ又腺病等ヲ治療スベシ鐵劑亞砒
酸沃度鐵肝油規尼涅等ヲ與フベシ

局所豫防法トシテハ手足ノ如キハ温保シ緊迫或ハ濕潤セザルコヲ務
 メ凍傷ノ習慣アルモノハ胡桃葉煎汁ニテ微温湯ヲ行ハシメ或又局所
 浴ヲ爲ツシム
 急性凍傷ハ注意シテ雪或ハ冷水ヲ以テ摩擦シ漸ク知覺等恢復シテ後
 チ室内ニ入レ漸次温ムル方針ヲ取ルベシ
 局所ノ處置ハ四肢ナレバ其部ニ提舉 Suspension 法ヲ施スコト必要 Wch-tig
 ナリ凍瘡ニハ一〇%イヒチオールコロヂエーム一〇%カムフルラノ
 リン或又足部ニハ一〇%沃度丁幾コロヂエームテルペンチンコロヂ
 エームヲ塗布シ又ルゴール氏液ヲ塗布スルモ可ナリ又我教室ニテハ
 簡便ナルヲ以テ屢々ビツク硬膏ヲ貼用セリ
 或ハ左方ヲ處セリ

- 沃度丁幾 二・〇
- 石炭酸 一・〇
- 單寧酸 二・〇

或又

ラノリン

三〇・〇

苛性加里

〇・五

グリスリン

各三〇・〇

酒精

蒸餾水

一〇〇・〇

右浴後ノ塗布料トス

或又

カムフル

一・〇

白蠟

四〇・〇

亞麻仁油

八〇・〇

ベリユバルサム

一・五

右塗布料

又

テルベンチン油 各五〇
 カムフル 各五〇
 ウキルソン軟膏 二〇〇
 右貼布料

又

硝酸銀 〇・一—一・〇
 ペリユーバルサム 一・〇—三・〇
 單軟膏 五〇〇
 右塗布料

唯瀰蔓性腫脹及ビ發赤ニハ極ク熱キ局所浴ヲ少時間宛反覆施行シ又按摩等ヲ試ムベシ

瘡 *Furunkel-Blutschwar*

本症ハ急性ノ皮脂腺及ビ肝腺毛囊ノ周圍ニ起ル結締織ノ炎症ニシテ

白色黄色醜膿菌ノ侵入ニ由來ス其中心組織ハ壞疽ニ陥キル者ナリ即チ毛囊周圍蜂窠織炎 *Perifolliculäre Pilegnone*ニ外ナラズ限局セル五厘貨大以上ノ隆起セル疼痛アル浸潤ニシテ皮膚發赤シ漸次尖銳 *Spitzig*トナリ中央黄色ヲ呈ス此所ヨリ數日後ニ膿ヲ排泄シ遂ニ壞疽セル組織栓 *Necrotische Geruchspyros*ヲ出シテ速カニ治療ニ就ク者ナリ瘡ハ孤立シ *einseln* 或ハ多數 *Multipel*ニ發生ス而シテ瘡ノ持續的發生スルトキハ瘡症 *Furunkulosis*ト云フ

部位ハ項 *Nacken* 背脊 *Gesäss* 腋窩 *Achselhöhle* 及ビ外聽道 *äußere Gehörgang* トス然レモ皮脂腺及ビ毛髮ノアル部位ニハ發生シ得ルコトハ勿論ナリ

硬固ナル限局疼痛性ニシテ多ク尖頂ニ膿ヲ有スル浸潤ニシテ即チ其頂點ニ黄色點アルヲ以テ類症鑑別ヲ要セズ明カナリ

治療法

其原因ヲ知り之ヲ治スルヲ必要ナリ糖尿症或ハ小兒ノ下痢等 *Diarrhö*

oenヲ診スベシ

豫防法ニハ身體清潔ニナシ務メテ入浴スベシ
 内服ニハウンナ氏ハ硫酸カルシウム〇〇一ヲ賞用セリ
 外用ニハ水銀硬膏貼用或ハ切開ニテ治癒ス多發 *multiple* ノ瘡ニハ昇汞
 浴 *Sublimabader* 〇・五—一〇〇或ハ赤葡萄酒色ノ程度ニ過滿俺酸加里ヲ
 加ヘタル浴ヲ可トス又タ初期ニハ二%ノ石炭酸ヲ浸潤ノ中點ニ注射
Injection スルモ宜ロシ我教室ニ於テハ最モ簡便又タ奏効確實ナルハ
 ビツク氏硬膏ヲ持續貼布スルニアリトセリ
 近來ハ大ニビール氏鬱血療法ヲ推賞セラル、ニ至レリ

著者ハ瘡ノ當初ニハ「ビツク」硬膏ヲ貼用セバ其大部分ハ吸收シテ
 治癒スルコトハ已ニ軍隊ニ於テ實驗證明セシ所ナリ故ニ毛囊炎ヲ
 認メバ先ヅ直チニ「ビツク」軟膏ヲ使用シ効ナキキハ「ビール」氏鬱血
 療法或ハ外科的ノ方法ヲ執ルヲ可トスル者ナリ

小兒瘡症或多發性瘡 *Frunkulose; Multiple Frunkel*

本症ハ主トシテ小兒ニ實驗スルモノニシテ大ニ小兒ノ發育ニ關係ヲ
 及ボシ又好デ虛弱ノ哺乳兒ヲ侵カスノ傾キアリ瘡ノ本性ハ上述ノ如
 キ組織壞疽ヲ伴ヘル限局セル毛囊周圍ノ炎衝ナレモ此小兒ノ瘡症ハ
 全ク其趣ヲ異ニシ一言之ヲ蔽ヘバ淺在ノ皮膚膿瘍 *Abscess* ヲ意味スル
 モノナリ故ニ必シモ毛囊ニ一致セズ又壞疽組織片ヲモ有セザルモノ
 ナリ
 初メハ一ノ小結節ニシテ發赤隆起シ忽チ軟化シテ一二日後ハ已ニ破
 潰シテ比較的多量ノ膿汁ヲ排泄ス其膿瘍ノ大サハ豌豆大ヨリ胡桃大
 以上ニ達スルモノナリ而シテ排膿後ハ其膿瘍壁ハ互ニ癒着シテ治癒ス
 然レ本症全治セルニアラズ更ラニ同様ノ結節ヲ遞次新生シテ頗ル小
 兒ノ衰弱ヲ惹起スルモノナリ
 部位ハ一定セズ然レ多クハ頭部頸部ノ皮膚ニ見ルコト最多シ

時トシテハ全身状態ニ影響スルヲ甚シク痲症自己ノ爲ニ鬼籍ニ登ルモノナキニアラズ

此病原菌ハ熱發セズ又膿毒症或ハ敗血症ヲ起コサバルヲ普通トス然レ小兒ハ不安トナリ哺乳セズ睡眠ヲ障害セラレテ衰弱ニ陥ルナリ然レ他ニ内科的疾患ナキハ普通快癒スルモノナレレ此病原菌ハ已ニ胃腸等ニ占居シテ爲メニ腐敗醱酵等ヲ起コスモノ、如ク通常胃腸症ヲ伴フヲ多シ而シテ其毒素ハ血液中ニ入り皮膚ニ達スルモノナラン又嘔吐或ハ排泄物外因トナリ皮膚ハ直接是ヨリ感染スルヲアリ又他方面ヨリノ感染例之ハ淋巴管中耳等ニ病原菌アリテ來タルヲアリ或ハ麻疹ノ如キ傳染病ノ治癒後ニ本症ニ罹ルヲアリ

又搔痒性皮膚ノ爲メ搔抓シタル爪ヨリ病原菌ヲ侵入セシムルヲアリ

治療法 其原因ヨリシテ根治的ナラザル可ラザルハ明瞭ナリ即チ第一消化器病ヲ治シ膿瘍ハ切開シ搔痒性疾患ヲ處置スルヲ勿論ナリ故ニ先ヅ二三日間ハ甘汞ヲ與ヘ後一二週間ハ「ザロール」等ヲ持長スベシ

外科的ニハ凡テノ膿瘍ヲ切開消毒スベシ父母ハ最モ此外科的治療ヲ忌避シ姑息療法ヲ希望スルヲ常ナレモ必ず懇諭シテ切開スルヲ要ス然レ爰ニ普通外科的ト異ナル注意ノ點アリ即チ大手術ト同様ニ膿瘍周囲ノ消毒等餘リ劇シク行フベカラズ偏陳或ハ酒精ニテ皮膚ヲ拂拭シ昇汞水ヲ漬シタル綿ニテ再ビ拭ヒ尖刃ニテ之ヲ刺開セバ充分ナリ決シテ切開モ大ナルヲ要セズ排膿後モ偏陳或ハ五〇%「アルコール」五%「クレヲソート」等ニテ叮嚀ニ拂拭スベシ而シテ輕ク繃帶ヲ施コスベシ其他一日一―二回五―一〇〇「クレヲリン」ヲ注加シタル浴湯ニ入浴セシムベシ或ハ〇・二五昇汞液一・%過滿俺酸加里液等ノ入浴モ良シ此ノ如ク内外疾患ニ注意シ清潔ニ保持セバ遂ニ數週ヲ經テ治療強壯ニ發育スベシ

瘍 Garbunkel Anthrax

瘍ハ臨床上ニモ病理組織上ニモ瘡ノ多數ガ密生シタルガ如キ觀アリ
 硬固ニシテ丹毒様ニ發赤シ劇痛アリテ周圍ニ蔓延スル浸潤ニシテ其
 潤浸ハ潮蔓性ニ健康部ニ移行スルモノナリ此浸潤ノ中央ニ多數ノ膿
 點 *Eite punkte* 及ビ膿疱アリテ膿汁ヲ泄ラス皮膚ハ薄クシテ漸次開孔シ
 遂ニ壞疽ニ陥リ膿汁及ビ壞疽組織片ヲ多量 *Grosse Menge* ニ排泄ス *ent-*
lassen 而シテ其跡ハ良好ナル肉芽性深蝕 *tiefgreifende* ノ潰瘍トナリ遂ニ
 線狀ノ癩痕ヲ形成ス脾、脫疽、菌、傳染ニ因スル、瘍ナレバ初メ赤クシテ浸
 潤甚シキ丘疹ニシテ漸次漿液出血性トナリ水疱黑色トナリ遂ニ變形
 シ是ガ破潰セバ其周圍ニ新タニ此ノ如キ水疱ヲ發生シテ浸潤ハ非常
 ニ速カニ周圍ニ進行スル者ナリ
 全身症狀ハ病症ト平行シテ輕重アルヲ普通トス又高熱戰慄ヲ伴ヒ重
 症ヲ示スコアリ
 部位ハ項、背、頰、唇、頸部等ヲ多トス
 診斷及ビ類症鑑別モ敢テ必要ナラズ病初ハ瘡ト往々誤ルコアルモ暫

時ニシテ上記ノ特徴ヲ示スヲ以テ容易ナリ

治療法

病初ハ水銀劑ト共ニ溫浴法ヲ施コスヲ可トス最モビール氏爵血療法
 又外科的療法ニ因テ處置スルヲ宜ロシトス

**第二章 皮膚血行障害 Circulationsstörungen der Haut
 紅斑 Erythem**

單純紅斑
 猩紅熱樣紅斑
 初生兒紅斑
 外傷性紅斑

單純紅斑 *Erythema simplex* トハ浮腫ナキ者ヲ云ヒ小斑點ノ者ハ特ニ名
 ケテ蔷薇疹 *Rosola* ト云フ紅斑點密生セルルハ猩紅熱樣紅斑 *Erythema*
scalatiforme ト云フ初生兒ノ全身ニアル赤味ハ初生兒紅斑 *Eryth. neonat-*
orum ト名ツケ漸次黃色ニ移行スル生理的ノ者ナリ
 壓 *Druck* 撞突 *Stoss* 摩擦 *Reibung* 等ニテ限局シタル外傷性紅斑 *Eryth.*
traumaticum ヲ生ズルコアリ
 太陽及ビ電氣光線 *Elektrische Licht* ノ越紫光線 *Ultravioletten Strahlen* ノ働

精神的紅斑
飛散性紅斑

中毒性紅斑

内臟病性紅斑

ニ因テ起ル者ヲ太陽紅斑 *Eryth. solare* ト云ヒ往々「エクチエーマ」及ビ水疱形成ニ移行スルモノナリ

精神感動 *Psychische Erregung* ニ因テ忽チ發シ忽チ消退スル皮膚發赤ハ精神的紅斑 *Eryth. psychicum* ト云ヒ又飛散性紅斑 *Eryth. fugax* ト云ヒ通常顔面ニ來タルヲ多シトス

其他直接外部刺戟或ハ血行ニテ來タル紅斑アリ即チ皮膚刺戟劑及ビ規尼涅「アンチピリン」「ベルバルサム」等ノ藥疹是ナリ之ヲ中毒性紅斑 *Eryth. venens* ト云フ

諸種内臟器病或ハ傳染病經過中發赤スルヲ内臟病性紅斑 *Eryth. morbis internis* ト云フ

單純紅斑ハ揮散性 *flichtig* ナルト炎症々狀ノ缺乏シ *fallen* 及ビ落屑ナク又加壓ニテ消退スルヲ特兆トス

紅斑性肢痛症 *Erythromelalgie*

本症ハ千八百七十二年ミツチエル氏ノ初メテ唱道セルモノニシテ手足指趾ノ如ク末梢ノ皮膚ニ疼痛并ニ發赤ヲ來スヲ特有トス其疼痛ハ劇甚ニシテ殊ニ夜間増劇ス漸次皮膚ノ變色ヲ呈シ發赤ト腫脹ヲ以テ非常ニ慢性ノ經過ヲ取ルモノナリ發作性ニ發病ス

特發スルヲアリ又中樞神經ノ疾患ニ併發スルヲ寧ロ今日ハ一般ニ獨立ノ疾患ニアラズシテ血管榮養神經ノ一症候トシテ諸種ノ神經性疾患ノキニ實驗スルモノナリト認識セララル

診斷 發作性ニ起ル疼痛及ビ皮膚ノ變色ニシテ其發作休止間ハ全ク普通ノ外觀ヲ呈スルヲ最モ他ノ疾患ト鑑別ノ主要點ナリ

治療法 全然對症療法ニノ安靜ト患肢ヲ高舉スルヲ或ハ氷罨法ヲ行フ電氣感傳及平流共ニ療法又内服トシテハ神經藥ノ諸種或ハ沃度加里等トス止ヲ得ザレバ神經切除ヲ行フノミ

多形滲出性紅斑 *Erythema exudativum multiforme*

環狀紅斑
迂廻狀紅斑
圓樣紅斑
丘疹性紅斑
水疱性紅斑
蕁麻疹性紅斑
虹彩膜狀匍行疹
小水疱性紅斑
結節性紅斑

此症ハ急性ニ殆ント常ニ上下肢殊ニ手背足背ニ多少密生シテ豌豆大ニ隆起スル赤色ノ無痛性ノ斑ナリ指壓ニテ其色消退ス周圍ハ鮮紅色ニシテ中央ハ暗赤色トナル下腿ニ生ゼシ者ハ殊ニ暗赤色ナリ全身ニ蔓延スルコトハ稀レナリ亞急性ノ發病モ亦然リ中心治癒シテ周圍ニ蔓延スル者ハ環狀紅斑又迂廻狀紅斑又圓樣紅斑ト名ツク *Eryth. annulare*, *Gyrtatum-figuratum* 斑點小ニシク隆起セバ丘疹性紅斑 *Eryth. papulatum* ト云フ斑上ニ水泡ヲ形成セバ水疱性紅斑 *Eryth. bullosum* ト云フ是レ最モ稀有ナリ又搔痒甚シキヲ蕁麻疹性紅斑 *Eryth. urticatus* ト云フ此症ノ特種トシテ二種アリ虹彩膜狀匍行疹 *Herpes iris od. circinatus* 或ハ小水疱滲出性紅斑 *Eryth. ex sud. vesiculosus* トモ云フ而シテ此一症ト見做スベキモノニテ特異ナル症候ヲ具フルモノハ結節性紅斑 *Eryth. nodosum* ナリ

虹彩膜狀匍行疹 *Herpes iris*

虹彩膜狀匍行疹トハ發赤セル中心ヲ繞リテ多數ノ水疱求心性ニ *Con-*

centricis 配列シテ環狀ヲ作ルモノナリ而シテ普通隆起セル紅斑ノ同時ニ發生シ居ルコト及ビ手背ニ水疱環狀ニ占居スルコトニテ此症タルヲ知ルベシ而シテ此水疱ハ速カニ乾固スル者ナリ

結節性紅斑 *Erythem nodosum*

結節性紅斑 *Eryth. nodosum* モ亦多滲出性紅斑ノ一症ト見做サルベシ然レ人ニヨリ別種ノ疾患ト見做ス者アリ此症ハ全身症狀往々甚シク熱發及ビ關節痛ヲ以テ多ク下腿 *Unterschenkel* ニ瘤 *Boule* ヲ生シ恰モ打撲瘤 *Contusionbule* ニ似テ多少圓形ニ隆起シ加壓疼痛アリ其色多ク紫紅色ニテ加壓ニテ消退セス其大サハ手拳大ニ達スル者アリ浮腫性邊暈 *Oedematische Hof* ニテ取圍メリ多クハ少壯ノ衰弱セル人ヲ侵カス下腿ノ外ニハ軀幹顔面及ビ粘膜ヲ襲フコトアリ多形滲出性紅斑ト併發スルコト多シ此症ハ輕度ノ全身症アリ普通數日間ニテ治癒スルモ又新タニ續發スルヲ以テ經過長シ多クハ幼年者ヲ侵ス又秋季ニ多ク發生ス粘膜ニ

丘疹性隆起ヲ來タスコアリ稀有ナレモ合併症トシテ皮膚出血關節炎
Celenkentründungen 漿液膜ノ炎症等ヲ起ス
 多形滲出性紅斑ハ隆起セル赤色ニシテ加壓ニテ消失ス急性ナル發生
 及ビ迅速ノ消退ト手足背ノ部位等ヲ以テ容易ナリ

類症鑑別

- 第一、「エ、ク、チ、エ、ー、マ」ハ濕潤落屑或ハ結痂形成等アリ
- 第二、天疱瘡 大ナル散在性ノ弛緩水疱ナリ
- 第三、蕁麻疹 發疹多クハ蒼白色ニシテ痒痒甚シ
- 第四、痒疹 *Pruriga* 皮膚ニ小結節アリ痒痒横痃 *Prurigoherden* アリ痒痒劇
 甚ナルト慢性ニ幼年ヨリ發病スルヲ常トス
- 第五、丘疹性梅毒疹 銅色ニシテ加壓消失セズ手掌足蹠ヲ侵カシ其他
 梅毒症狀アリ
- 第六、水疱性白癬寄生性匍行疹 顔面頸部ヲ多シトス中心性落屑アリ
 痒痒甚シ

清涼膏

治療法

對症療法

symptomatisch ニシテ熱アレバ下熱劑ヲ與ヘ局所ニハ清涼

膏 *Kühlsalbe* ヲ貼用スベシ

全身療法ハ沃度加里規尼涅水楊酸曹達或ハ麥角等ヲ與フベシ

局所ニハ「イヒチオール」ハ最モ効アリ又頑固ナル症ニハ硫黃焦性沒食

子酸「クリザロビン」ヲ可トス

「イヒチオール」ハ輕症ノ者ハ亞鉛華「イヒチオール」軟膏トシ重症ニシテ

浮腫甚シキ者ハ二〇—五〇%ノ「イヒチオール」コロヂユームトシテ用

清涼膏

ユ或ハ左ノ清涼膏ヲ處スベシ

無水ヲノリン 五・〇

安息香酸亞鉛 一〇・〇

醋酸鉛水 一五・〇

無水ヲノリン 五・〇

ウキルソン氏軟膏 一〇・〇

石灰水 一五〇
或ハ結節性紅斑ニハピツク氏硬膏等モ可ナリ

蕁麻疹 Urticaria-Nesseln

本症ハ小發疹ノ集合發生セル者ナリ一發疹 *Quaddel* ノ直徑ハ殆ド五厘
 貨大以上ニシテ皮膚隆起シ其色澤白色陶器ノ如ク稀レニハ赤色ノ者
 アリ急性ニ發生シテ落屑ナク速カニ消失ス瘙痒ハ必發症候ナリ時ニ
 丘疹ヲ形成ス故ニ丘疹性蕁麻疹 *Urticaria papulosa* 又蕁麻疹性苔癬 *Lichen*
urticatus ト云ヒ稀レニ水疱形成ヲナス之ヲ大小水疱性蕁麻疹 *Urticaria*
vesiculosa & bullosa ト云フ又其色形大小等ニ因テ區別セバ次ノ如シ即チ
 白色蕁麻疹陶器色蕁麻疹赤色蕁麻疹巨大蕁麻疹環狀蕁麻疹迂廻狀蕁
 麻疹圓狀蕁麻疹 *Urticaria alba-porcellanea-rubra-Rosemicaria-gyrata et figura-*
ta ト云フ其經過ヨリシテハ急性慢性ヲ別ツ急性トハ一時性 *Vorüber-*
gehend ニノ屢々再發スルヲ云ヒ慢性トハ年々發作シ往々全身ニ蔓延

丘疹性蕁麻疹
 (蕁麻疹性苔癬)
 水疱性蕁麻疹
 白色蕁麻疹
 陶器色蕁麻疹
 赤色蕁麻疹
 巨大蕁麻疹
 環狀蕁麻疹
 迂廻狀蕁麻疹
 圓狀蕁麻疹

間歇性蕁麻疹
 人工蕁麻疹

持久性蕁麻疹

シ頑固ニシテ容易ニ治シ難キモノヲ云フ間歇性蕁麻疹 *Urt. intermittens*
 トハ「マラリア」ノ假面ヲ呈スルモノヲ云フ又發疹素因アル者ハ人工蕁
 麻疹 *Urt. facticia* ト云ヒ容易ニ刺戟等ニテ發疹セシムルヲ得ル者ナ
 リ粘膜ニ伴發スルハ唯巨大蕁麻疹ノキ浮腫性腫脹トノ現ハル、ノミ
 又持久性蕁麻疹 *Urt. Persians* ナルモノアリ其發疹容易ニ消退セズ搔抓
 ノ爲メ却テ隆起肥厚ヲ呈スルモノヲ云フ尙此他ニ稀有ノ蕁麻疹ニテ
 左症アリ

色素性蕁麻疹 *Urticaria pigmentosa* トハゼングステル氏 *Sengster* ノ稱

ヘシ所ニシテ各個發疹ハ甚ダ永ク存在シ或ハ同所ニ反覆 *wiederholen* 發
 生 *aufbreiten* シテ褐赤色ノ色素ヲ殘コス者ナリ通常幼年ノ者ヲ侵カスト
 雖凡間々大人ニモ來ルヲアリ
 部位ハ軀幹次ニ四肢稀ニ顔面ニ來タルモノナリ
 此色素性蕁麻疹診斷ハ色素沈着斑ト共ニ發疹ノ存在スルヲ之レ本症
 ノ確證タリ永キ經過中ニハ腫脹シ且ツ其表面發赤ス瘙痒ハ時ニ缺如

スルコアリ而シテ色素沈着ハ輕度ニ皮膚面ヨリ隆起ス又精神感動例之ハ笑ヒ啼キ *Lachen, Weinen* 或ハ劇動等ニテ發赤腫脹ヲ起來スルコアリ此點ニ注意スベシ凡テ蕁麻疹ニ罹ル人ニ固有ナルコト *Eigenhämorrhie* ハ蕁麻(いらぐさ)ノ如キ者ニテ局部刺戟ヲ與フレバ容易ニ發疹ヲ來タスコナリ

著者曰本症ニ關シ同僚遠山學士三例ヲ報告シテ其詳細ヲ皮膚科學會雜誌ニ載セラレタリ之ヲ分テ色素性蕁麻疹出血性色素性蕁麻疹色素形成ヲ伴フ蕁麻疹トナセリ

小兒ノ一、二歳ニ來タル者ハ特ニ丘疹性蕁麻疹 *Urticarpapulura* ニシテ往々痒疹ノ前驅トナリ大人ニハ天疱瘡ノ下地タルコアリ

何ヲ以テモ説明シ得ザル痒疹ハ已ニ蕁麻疹ノ豫診ヲ喚起セシム人工ニテ容易ニ蕁麻疹ヲ發生セシメ得ルヤ否ヤヲ常ニ試ムベシ又發疹ノ發現消退共ニ急速ナルト痒疹ノ甚シキトヲ視バ明瞭ニ診斷シ得ベシ

類症鑑別

ノ必要ハ多形滲出性紅斑ナレバ此ハ常ニ周圍赤色中央

暗赤色ニシテ痒疹僅少ニ其部位ハ殆ド常ニ手背タレバナリ

治療法

先ヅ其痒疹ヲ除キ去ルコト第一ナリ原因ニモ内外アリ蝨蟲ノ爲ノカ消化器障害ノ爲メカ或ハ嗜好品又藥劑等ニテ來タルコアリ故ニ其原因ヲ精査確定シテ夫レニ對スル療法ヲ行フコト第一義ナリ普通ハ左方ヲ處スベシ

温泉療法或ハ旅行等ハ慢性頑固ノ症ニ卓効ヲ奏スルコアリ

内服 急性ノ場合ニハ水楊酸曹達三・一六・〇一日量トシテ内服セシメ或ハ「アンチピリン」一・三・〇ヲ與ヘ又亞砒酸沃度加里或ハ「アトロヒチ」丸ヲ與フベシ

硫酸アトロヒチ

〇・〇一

甘草越幾斯及ヒ末

適宜

右爲二十九毎日一—三回一二九宛食後服用

痒疹ヲ制スルニハ

薄荷 三・一五・〇
酒精 一〇〇・〇

或又三%石炭酸酒精モ可ナリヴィグイダール氏ハ左方ヲ賞用ス

抱水「コロラール」 三・〇

杏仁水 五〇・〇

蒸餾水 二〇〇・〇

小兒蕁麻疹 Urticaria der Kleinen Kindern

小兒モ半歳ニ達スレバ漸ク僅カニ物心附キ時ニ乳以外ノモノヲ口ニ
スルコアリ齒牙ハ發生期ニ近ク種痘ヲ行フ等ノコアルヲ以テ皮膚ニ
モ亦從テ種々ノモノヲ發現ス殊ニ大人ト趣ヲ異ニセル本症ヲ惹起ス
ルコ屢々ナリ本症ハ小兒ニテハ半歳ヨリ四歳位迄ヲ最モ多シトス大
人ニテハ普通白色ニシテ紅色蕁麻疹ハ稀ナレモ小兒ハ却テ陶器色様
ノ隆起ハ稀有ニシテ殆ト普通ニ紅色ノモノトス

水疱性蕁麻疹

小兒蕁麻疹トシテ特有ナル點ハ丘疹ナリ結節性滲出物ニシテ扁豆大
乃至豌豆大ノ硬キ圓錐形ニシテ稍著明ナル色澤アル結節ナリ其尖頂
ニ極小ナル水疱ヲ戴クコアリ周圍ノ皮膚ハ續發症ナキハ普通ナリ
此ノ如キ丘疹全身ニ散發ス四肢ニハ殊ニ外側ニ多シ唯決シテ發生セ
ザルハ顔面ハミナリ往々手及指ニノミ限局スルコアリ此際ノ如キ診
斷困難ナリ其發疹ノ多少モ種々ニシテ時トシテ少數ナルコアリ又全
身ニ潮蔓發生スルコアリ大人ノ蕁麻疹ノ如キニアラズト雖モ消散ハ
速カナリ又丘疹ト蕁麻疹ト同時ニ存在スルコアリ
丘疹性蕁麻疹ハ搔痒甚ダシク小兒ハ盛ニ搔抓シテ止マザルガ故ニ其
結果搔抓性濕疹上皮剝脫或ハ膿疱瘡ヲ起シ遂ニハ潰瘍等ヲ惹起スル
コアリ

此丘疹ノ尖頂ニ小水疱ナラズシテ大水疱ヲ形成スル場合アリ大水疱
性蕁麻疹ト云フ *Urt. bullorum*
色素性蕁麻疹ハ比較的稀有ノ症ナリ此蕁麻疹ノ形ハ大人ト等シク定

形性ノ蕁麻疹ニシテ色ハ褐色ニテ其特有トスル所ハ容易ニ消散セズ二三週間モ依然存在スルコアリ而シテ其消散後ニ著シキ暗黒色ノ色素沈着ヲ殘シテ年餘モ尙認識シ得ベシ尙往々其部位ハ長ク刺戟アリテ器械的ニ摩擦或ハ壓迫搔抓等ニテ蕁麻疹ノ隆起ヲ惹起セシメ得ルコトヲ特徴トス

診断 ハ普通容易ナリ然レバ發疹僅少ニシテ診断困難ノ所ハ皮膚ヲ人工的ニ刺戟セバ直チニ反應シテ其部ハ腫脹隆起ス
小兒蕁麻疹ノ原因ハ胃腸ニ於ケルコト明カニシテ胃腸内ニ蕁麻疹ヲ發生スベキ物質入りシヤ或又異常ナル消化症狀ノ結果蕁麻疹ヲ起スベキ物質ヲ產生セルヤ孰レニモセヨ如何ナル食物ノ障害ナリシヤ又消化ハ如何ニ異常ナリヤヲ確定スルコト頗ル難事ナレバ小兒ハ往々未ダ慣用セザル食物ノ爲メニ本症ヲ惹起スルコトアルハ事實ナリ又小兒ハ蚤蚊等ノ爲メニ本症ヲ容易ニ起コスノ特異性アルモノナリ
經過ハ普通三四日ニテ消散スルモノナレバ慢性否再發性ノモノハ年

餘ニ亘リ殊ニ小兒ニ多キモノナルヲ以テ再發性ノモノハ一層注意ヲ要ス生命及治療ニハ顧慮スベキコトナシト雖モ搔痒ノ爲メ小兒ハ睡眠不充足ニシテ刺戟シ易ク且ツ神經性トナルモノナリ
又痒疹ノ前驅期タルコトアリ故ニ其豫後ニモ注意スルヲ要ス

治療法 其原因ニ關スルコト勿論ナレバ第一ノ疑義ハ小兒ハ如何ナル有様ニテ保育シツ、アルヤ小兒ハ如何ナル食物等ヲ攝取スルヤ此疾患ハ飲食物ヲ變換シタル後ニ發生セシモノナルヤ否ヲ質スコト必要ナリ而シテ急性ノモノハ大凡其原因ヲ知ルコトヲ得ベク以テ治療ヲ定ムベシ然レバ慢性ニシテ自體中毒ニ因スル大キモノニアツテハ頗ル困難ナリ先ツ何々ヲ食セシヤ其消化狀態ハ如何ナリシヤ等ヲ精査シ兼テ食物ヲ正規的ニシ食物ノ分量ヲ規定シ年齢ニ因テハ乳ノ如キモ一定シ湯茶間食菓物類ノ量ヲモ制限スベシ内服ニハ腸ノ制腐目的ニ甘汞ヲ投ジ「ザロール」ノ少量〇〇五—〇一ヲ一回量トシ持長セシメ又外因タルモノナキ様注意ヲ拂ヒタル後外用藥トシ搔痒制止藥ヲ與フベシ

一%ザルチン酸酒精
 一—五%薄荷精
 一〇—二〇%プロモコール軟膏
 唯小兒ニハ石炭酸ハ搔痒制止作用ノ効顯著ナリト雖凡使用セザルヲ可トス
 續發セル搔抓濕疹其他潰瘍等ハ各其法ニ因テ處置スベシ

急性限局性浮腫 *Oedema cutis circumscriptum acutum*

此症ハ多ク急劇ニ身體ノ何レヲ問ハズ梅實 *Pflaumen* 乃至手拳大 *Faust* *Gross* ニ限局セル腫脹ナリ學者ニ因テハ之ヲ蕁麻疹ノ變症ト見做ス者アリ腫脹ハ概シテ同位置ニ反覆發生ス其ノ大サ二—一〇センチ直徑 *Durchmesser* ヲ有ス其色ハ敢テ健皮ト異ナラズ或ハ蒼白ナルヲアリ患者ハ皮膚緊脾ノ感アリ時トシテ搔痒アリ其發疹消失ハ迅速ナル比較的の酒客 *Potator* ノ之ニ罹ル者多シ

治療法

規尼涅アンチピリン等ノ内服ヲ可トシ其局部ニハ水楊酸石鹼或ハピツク氏硬膏ヲ貼付シ或ハ罨法又清涼膏ヲ貼布スベシ
 著者ハ本症ニ關シ已ニ皮膚科學會ニ報告セリ後近時醫學博士長野純藏氏モ亦本症ニ關シ精査ナル研究ヲ遂ゲシ論文ヲ公表セラレタリ清國及ビ臺灣等ニハ殊ニ多キ症ナルモノ、如シ

先天性表皮水疱症 *Epidemolysis bullosa hereditaria*

Köhner

本症ハ稀有ニシテ發疹等ノ前驅ナク直ニ水疱ヲ形成ス其内容ハ透明ノ漿液ナリ而シテ比較的 *slatic* 兄弟等ヲ侵カスト多ク機械的 *mechanisch* ノ刺戟ニテ水疱ヲ形成スル先天傾向 *angeborene Neigung zur Blasenbildung* ヲ有スル者ナリ故ニ「ゾボン」釣足駄ノ鼻緒帶等ノ摩擦ニテ生シ又指ニテ摩擦スルモ亦然リ化學的作用ニテハ發生セズ殊ニ輕少ノ加壓ニテ

生ズ時ニハ手足ニ限リ發生スルコアリ發汗過多症 Hyperhidrosis 又皮膚爪等ノ消則ヲ合併スルコアリ皮膚ハ菲薄トナリ光澤ヲ有ス殊ニ脛骨前面等ヲ見レバ最モ著シ

必ズ多少ノ加壓ニテ生ジ自然ニ發生スルコナシ又炎衝々狀ナク瘙痒ナク比較的緊張セル水疱ナリ以テ類症鑑別ヲ要セズ

治療法

皮膚ニ塗油スレバ比較的良好ナリ其他亞砒酸内服或ハ注射ヲ試ムベシ然レモ奏効ヲ認ムヘキ者ナク唯適應療法ヲ行フノミ

駐本症患著皮膚病科ニ入院セシモノニ就テ土肥教授ノ下ニ於テ井澤量治氏研究シテ皮膚科學會雜誌ニ報告セラレタリ

藥疹 Arzeneikanthema

藥疹トハ内服或ハ皮下注射ニテ或ル一種ノ發疹ヲ來タスヲ云フナリ而シテ其發生病理ハ須臾ク措テ論ゼザルモ之ヲ要スルニ各人特異性アリ

idiosyncrasy アリテ其用量ノ多少ニ關セズ發疹ヲ來タス者ナリ其發疹ノ種類形狀ハ藥料ニ因テ差アレモ左ノ状態ヲ爲スト見做セバ庶幾ラン紅斑ノミノ者アリ蕁麻疹様ノコナリ水腫様腫脹トナリ又大、小水疱性トナリ皮膚溢血紫斑將又色素沈着ヲ殘コスモノモアリ、限局性ノコアリ瀰漫性ノコアリ、發熱嘔吐、惡心等ヲ伴フコアリ藥物ノ多數ハ治療用ト否トヲ問ハズ發疹ヲ來タス者多ク「レヴィン」氏 Levin ハ四百二種ノ藥料中二百四種ノ皮膚ニ變化ヲ起スモノアルヲ數ヘタリ實ニ五〇七%ニ相當ス豈ニ驚カザル可ンヤ今普通使用ノ藥劑ヲ發疹形狀ノ下ニ綜合セバ左ノ如シ

藥疹一覽小表

蕁麻疹様發疹

亞砒酸 水楊酸 「アンチピリン」 苦扁桃 吐酒石 水楊酸「ナト
リエーム」 砒石 臭素劑 規尼涅 實麥答利斯

瘡、

石炭酸 肝油 阿片 「モルヒネ」 珊瑚尼涅 臭素劑 沃度劑

猩紅熱様發赤、

規尼涅 「ザロール」 「ズルボナール」 水劑(内服) 水楊酸「ナトリユ

ム」 砒石

紫斑、

規尼涅 「ダロール」 「ズルボナール」 「フェナチエチン」 水楊酸 水

楊酸「ナトリユーム」 「クロ、ホルム」 沃度劑

落屑、

規尼涅

大水泡、

「ズルボナール」 「アンチピリン」 砒石 水楊酸 水楊酸「ナトリユ

ム」 規尼涅 沃度劑

小水泡、

砒石 安息香酸 安息香酸「ナトリユーム」 水楊酸 吐酒石 臭素

劑 規尼涅 肝油 沃度劑 珊瑚尼涅

丹毒狀發疹、

沃劑 「ヨードチリン」

天疱瘡様、

「フェナチエチン」 「アンチピリン」

溢血斑、

「フェナチエチン」

紅斑、

水楊酸 「アンチピリン」 「ミグレニン」 單寧酸 「サルピリン」 硝

酸銀 砒石 安息香酸 安息香酸「ナトリユーム」 石炭酸 水楊

酸 水楊酸「ナトリユーム」 吐酒石 「アトロヒネ」 「ベラドンナ」

臭素劑 抱水「クロラール」 規尼涅 「コバイオバルサム」 實莖答

利斯 沃度劑 沃度「ホルム」 吐根 水銀 「ホミカ」劑 「ストリキ

膿疱疹
ニトネ 阿片 「モルヒネ」

硝酸 水楊酸 水楊酸「ナトリウム」吐酒石 砒石 沃度劑

臭素劑

濕疹様發疹 水楊酸 「ナトリウム」 「アンチピリン」

丘疹

「アトロヒチ」 「ベラドンナ」 臭素劑

濕疹狀發疹

水銀 石炭酸

發疹ハ藥用廢止ト共ニ消退治癒スルカ或ハ藥劑ノ種類ニ因テハ試驗的ニ服用セシメテ再發或ハ症狀増進スルヲ以テ確證トナスベシ

註著者ハ大學外來入院患者ニ付キ「アンチピリン」疹ノ多數例ヲ土肥教授ノ下ニ研究シ其一其二ヲ以テ皮膚病學雜誌ニ記述

報告セリ

治療法

藥劑ノ服用ヲ止ムベシ臭素劑ノ瘡瘡ハ更ラニ硫黃劑或ハ水銀硬膏等ヲ貼布スベシ

蜀黍紅斑 Pellagra

此症ハ伊太利亞、西班牙、ウングアルン等ニアル風土病ニシテ其名ノ如ク蜀黍ヲ常食或ハ過食スルヨリ起ル者ナリ頭痛 *Kopfschmerz* 眩暈 *Schwin-del* 胃腸障害 *gastro-intestinale Störungen* 等前驅症タリ發生ノ部位ハ露出セル手足等ニシテ紅斑(第一期)ヲ來タシ後チ輕度ノ落屑アリ數月ニテ諸症消失シテ何等ノ痕跡ヲ殘サズ然シテ翌年春季ニ同症狀ヲ發シ下痢嘔吐等ヲ來タス(第二期)トス逐年諸症増悪シテ鬱憂、貧眠、四肢震顫等アリ(第三期)トス遂ニ此第三期ニ於テ精神障害ヲ來タシ痴愚トナリ斃ル經過ハ十年乃至十五年トス

治療法

滋養的食品ヲ與ヘ鐵劑冷水療法等ヲ爲サシムルノミ第三期ノキ注意シテ看護セバ治癒ニ趣クヲアリ

局所假死及ビ對等壞疽 *Locale Asphyxie u symme-*

trische Gangän

此症ハレノー氏 *Ryannd* 一千八百六十二年初メテ記載セル者ニシテレノー氏病トモ名ク初メ假死ヲ來タシ續テ壞疽ヲ起コス者ナリ輕症ハ指趾鼻端等ニ局所失神 *Localesyncope* ヲ起シ小血管ハ痙攣 *Krampf* 性ニ收縮 *Contraction* シテ皮膚褐色トナリ冷タク暫時ニシテ症狀減退スルカ或ハ漸次ニ局所假死ノ狀ヲ呈シ後蒼白ハ黑色變ジ周圍ニ輕度ノ水腫ヲ起シ遂ニ壞疽ニ陥ルナリ而シテ對等性ニ來タル者ナリ乾燥性火傷ト異ナルハ他ニ原因 *Ursache* ヲ見出サ、ルコナリ

診斷

先ヅ心臟疾患ノ有無及ビ血管系疾病ヲ精査シテ異常ヲ見出ザレバ之

レ此疾病ナリ

治療法

一般強壯療法ヲ行フベシ假死ニハ按摩 *Massage* 及ビ乾燥温ニテ温ムルヲ可トス壞疽ハ外科的療法ニ讓ルベシ

紫斑 *Purpura*

紫斑トハ皮下溢血ノ意味ニ外ナラズ而シテ此出血ニ伴ヒ急性ニ發熱シ身體倦怠且大小ノ出血アリ病初ハ殆ド常ニ下肢ヲ犯カシ又病狀劇甚ナリ

(1) 儂麻質斯性紫斑 *P. rheumatica* ナルモノナリ健康ナル者ノ下肢或

ハ下腿ニ「レンス」豆大ヨリ豌豆大ナル出血アリテ同時ニ關節痛ヲ諸關節ニ起シ若カノミナラズ腫脹ヲ來タシ血尿或ハ蛋白尿ヲ起ス者アリ
(2) 單純性紫斑 *P. simplex* ハ(1)ノ全身症狀少ナク出血モ些少ナルヲ單純性紫斑ト云フニ過ギズ

儂麻質斯性紫斑

單純性紫斑

(1)(2) 共に發疹多ク迅速ノ經過ヲ取ルモノナレバ時ニ又徐々ナルコアリ齒齦及粘膜ハ何等變化ナキモノナリ春秋ノ二季ニ多ク發ス多形滲出性紅斑ト合併發病スルコアリ

診斷 出血性紫斑トノ鑑別ハ其好發部位ノ四肢殊ニ下肢ニシテ同時ニ健麻質斯様疼痛及ビ關節腫脹ト粘膜ノ侵サレザルコニアリ

(3) **出血性斑紫** ハ全身症狀ノ高度ニシテ非常ノ出血ヲ云フ一名グ

出血性紫斑
(ワエルホビ
ト氏紫斑)

エルホビト氏紫斑 *Norbisnaculosis Werloffi* ト云フ

此紫斑ハ好發部位ナク皮膚及ビ粘膜ノ不規則ノ出血ナリ又無熱ニシテ關節腫脹若クハ健麻質斯様疼痛ナシ

紫斑ノ普通經過ハ數週ナリグエルホビト氏病ハ再發殊ニ多シ同時ニ

内臓出血或ハ心臟疾患ヲ起スコアルヲ以テ危險トス散在性ニ發病シ

流行性ニ來タルコナシ

皮下溢血ナルヲ以テ診斷最モ容易ナリ

診斷 健麻質斯様疼痛及關節腫脹ナク熱モ殆ド稀有ナリ出血ハ軀幹

及四肢ニ不規則ニ來タリ又融合シ或ハ大ナル出血ナリ粘膜ニモ必ズ出血アリ

治療法

生活法及ビ滋養ニ注意シ身體ヲ安靜 *Körperliche Ruhe* ニシ病初ハ臥床

ニ就カシメ精神 *geistige* 慰安睡眠 *Schlaf* ヲ満足ニナスベシ食物 *Nahrung*

ハ刺激性ヲ避ケ牛乳等ヲ與フベシ酒精劑ハ脈搏充實ノ者ニハ禁忌

Contraindication ナリ反對ノ者ニハ與フベシ

内服ニハ麥角一—二〇一日量トシ服用セシメ其他「カムフル」エーテル」

ノ大量等ヲ與ヘテ對症療法ヲ行フベシ

第三章 皮膚進行性營養障害 *Progressive*

Ernährungsstörungen der Haut

魚鱗癬 *Ichthyosis, Fischschuppenkrankheiten*

此症ハ元來先天性 *angeboren* ナリ然レモ常ニ *stets* 一二歳ニ於テ發見ス

單純性魚鱗癬

毛囊苔癬(毛
鱗角質増殖
症)蛇皮様魚
鱗癬

癩猪様魚鱗癬

甲狀魚鱗癬

雲母様魚鱗癬

ル者ニシテ初メニ殆ド四肢ノ伸展側ニ發生シ皮膚ハ粗糙ニシテ乾燥
シ皮野明割トナリ落屑著シ之ヲ單純性魚鱗癬 *Ichthyosis simplex* ト云フ
又毛囊ニ一致シテ小結節ヲ爲シ其尖端ニ鱗屑ヲ被ムル者アリ此結節
ヲ毛囊苔癬 *Lichen pilaris* ト云フ然レモ毛囊角質増殖症 *Keratosi pilaris* ト
云フ方穩當ナラン又蛇皮ノ如ク鱗屑厚層ナルヲ蛇皮様魚鱗癬ト *Ich-*
thyosis serpentina 云フ高度ニシテ角質乳嘴或ハ尖圭突起ニテ厚キ角質
板トナリ此ヲ癩スレバ一種ノ雜音 *Gratch* ヲ發スル者ヲ癩猪様魚鱗
癬 *Ichthy. hystrix* ト云ヒ又限局セル肥厚ノ苔ヲ有スルヲ甲狀魚鱗癬 *Ich-*
thy. Scutulata-Schoulenitz ト云フ時トシテ雲母様 *Pernullerartig* 光澤ヲ有スル
ヲ雲母様魚鱗癬 *Ichthy. nuda* ト云フ普通鱗屑ノ色ハ暗褐色或ハ灰白黒
色ナリ鱗屑剝離 *Ablosung* スルル多少力ヲ要スレモ爲メニ出血等ヲ來
サズ汗分泌 *Schweisssecretion* ハ減弱 *Herabsetzen* スルヲ常トス痒疹及ビエウ
チエーマトナル傾向アリ

部位 四肢及ビ軀幹ノ伸展側ヲ侵カス最モ多ク頭部ニ於テハ唯糠

限局性魚鱗癬

胎兒魚鱗癬

疵疹ノミノコアリ顔面ハ常ニ侵サル、コナク屈側及ビ手掌足趾モ亦
然リ唯手掌足趾ノミノコハ先天性手掌足趾表皮増殖症 *Keratoma pal-*
marie et plantare hereditarium ト云フ

其蔓延ノ状態ハ對等ニシテ潮蔓性ナレドモ時トシテ又限局性魚鱗癬
Ichthy. localis アリ又神經経路ニ沿フテ蔓延スルコアリ奇トスベシ
又子宮内或ハ胎兒魚鱗癬 *intrauterine od. foetale Ichthyosis* アリ是レ稀レニ
俗間ニテ鱗ヲ有セル小兒生レタリトテ見世物的トナル者ナリ
病症ハ春氣發動頃迄増進スルモ此ニ至テ病症停止スルヲ常トス然レ
モ其形状ハ更ラニ退行セザルモノナリ

重症或ハ著明ノ症状ヲ呈スルルハ診斷容易ナリ輕症ニテモ乾燥セル
鱗屑及ビ皮溝著明トナリ發病早年ナルヲ以テ本症タルヲ知ルコヲ得

治療法

第一ニ角質肥厚ノ鱗屑ヲ除去スルヲ務メザル可カラズ温浴ハ最モ奏
効アルモノナリ限局セル者ハ油劑綠石鹼ビツク氏硬膏ヲ可トスウシ

ナ氏ハ硫黄及ビ「イヒチオール」ヲカボジイ氏及ビヨゼーフ氏ハ「ナフト
ール」及ビ「レゾルチン」ヲツサ氏ハ水楊酸ヲ賞用セリ其他左方ヲ處ス

βナフトール 五・〇

酒精 適宜ニ溶解シ

ワゼリン 一〇〇・〇

或又

レゾルチン 二・〇

グリセリン軟膏 一〇〇・〇

或又

安息香酸豚脂 三〇・〇

グリセリン 二・〇

ワゼリン 一五・〇

又

ラノリン 五〇・〇

グリセリン 五〇・〇

硫黄華 五・〇

水楊酸 一—二・〇

然レモ全然治癒スルハ少ナシ唯輕快スルノミ

毛囊角質増殖症 Keratosis pilaris 一名

毛囊苔癬 Lichen pilaris

本症ハ素因アル者ニシテ春氣發動期ニ發病スル所ノ毳毛ノ毛囊ニ限
局セル相對性ニ結節狀ノ集簇セル角化セルモノナリ上肢及ビ下肢ハ
伸展側ニ來タリ上方ヨリ下方ニ行クニ從ヒ其發疹モ漸次輕減ノ傾キ
アリ皮膚ハ粗糙ニシテ不平ニ恰モ鏡ノ如ク多數簇生セル毛囊ニ一致
セル粟粒大ノ稍隆起セル又尖圭ナル結節ニシテ爪ニテ之ヲ剝離セバ
全ク脆キ角化セル表皮ニシテ其剝離セル跡ニ毳毛ハ丸マリテ隠レア
リ之ニ反シ尖圭ナラズシテ扁平ナル表皮ノ隆起物ニシテ其中央ニハ

白色毛囊角化症

赤色毛囊角化症

黒點トナリテ丸マリシ毳毛ノ透見セラレ、場合アリ此結節ノ着色ヨリシテ臨床上白色及ビ赤色ヲ區別ス白色毛囊角化症トハ上記ノ如キ普通ノ皮膚ト變化ナキ結節ヲ云ヒ上膊頂部大腿等ニシテ殊ニ漸次周圍ニ移行スル薄紫色或ハ「チアノーゼ」ノ外觀ヲ呈スル結節ナルコアリ之ヲ赤色毛囊角化症ト云フ

本症ハ小兒ニハ決シテ實驗セズ婦人ハ殊ニ侵サル、ト多キガ如シ頑固ノ經過ヲ取ルモノナリ然シ年ヲ經レバ自然消失スルコアリ

診斷 本症ハ其結節ハ浸潤ニアラズ苔癬ナルモノハ一般ニ集合性ニ發疹スルノ性質アリ又一ノ斑面ヲ形成スルノ傾キアレハ本症ニナシ尖圭赤色苔癬ハ鱗屑ヲ被ムルモノナリ

治療法 魚鱗屑ト同シク洗滌及ビ塗脂法ニ依ルノミ洗滌ニ可ナルハ機械的及化學的ニ作用スル所ノ硫黃砂石鹼ヲ可トシ又肝油亞砒酸劑ヲ内服ニ與フベシ

胼胝腫 Callus, Tylosis

胼胝 *Schwielen* トハ角質 *Hornschicht* ノ増加 *Zunahme* ニ因スル皮膚ノ肥厚ニシテ其肥厚ハ漸次健皮ニ移行シ明割ノ境界ナシ胼胝ノ處ニハ皮溝 *Hautfurchen* ハ消失シ知覺 *Sensibilität* 減弱ス故ニ容易ニ皸裂ヲ生ズ肥厚セル角質中ニ炎症ヲ起コシテ爲ニ全胼胝ノ脱落ヲ來スコアリ

部位 ハ手掌足趾等ニ多シ

治療法

原因ヲ去ルコト必要ナリ角質ヲ除去スルニハ温浴及ビ石鹼洗滌ヲ可トス若シ効ナケレバ二〇%ノ水楊酸軟膏或ハ一〇%水楊酸コロヂユーム又二〇%ピツク硬膏ヲ宜シトス尙其上ヲ油紙ニテ被覆セバ可ナリ著者曰ク健康皮膚ニハ適宜ノ軟膏ヲ塗布シテ其腐蝕ヲ豫防シ而シテ二〇%ノ加里鹼汁ヲ綿ニ漬タシテ十數分間載セ置カシメ後一〇%サルチン酸コロヂユームヲ塗布セシム之ヲ反覆セシメ大畧皆其目的ヲ達シ得タリ

先天性手掌足蹠角化症 *Keratoma palmare et Plantare hereditarium*

本症ハ先天性ニシテ産後直チニ手掌足蹠ニ局限セル魚鱗癬狀ノ肥硬ヲ來スモノナリ
生後一週以内ニ時トシテ瀰蔓性ニ時トシテ又散在性ニ表皮ノ肥硬ヲ起シ滑澤ニシテ周圍ニ漸次移行シ其邊緣ニハ赤色暈ヲ呈ス又非常ニ肥硬隆起シテ不平凸凹ノ面ヲ呈スルヲアリ此肥硬ノ時ニ減退スルヲアレモ再ビ増悪スルヲ常トス或又前膊下腿ノ側方ニ移行蔓延スルヲアリ而シテ下肢ハ概シテ上肢ノモノヨリ症候著明ナリ

診断 上記ノ部位ト表皮ノ肥硬ト及ビ先天性ニ來ルヲ以テ容易ナリ
治療法 鶏眼、胼胝、魚鱗癬等ニ於ケルト差ナシ

鶏眼 *Clavus, Hühnerauge*

鶏眼ハ局限セル疼痛アル角質肥厚ナリ外見白色ニシテ其中央ニ青色

點アリ此點ニ相當シテ真皮中ニ角質増殖ヲ爲シ恰モ釘ノ如ク突起狀ニ侵入スルナリ故ニ此點ヲ推セバ疼痛アリ

部位 骨突隆部ニ多シ指趾 *Nähen* 及ビ足蹠トス

治療法

加壓ヲ除クベシ鶏眼除去ニハ一〇%水楊酸コロヂエームヲ特效藥トス又左方ヲ可トス

水楊酸 一〇〇

印度大麻越幾斯 〇・一

コロヂエーム 一〇〇〇

此ヲ毎日層ヲ重テテ自然ニ落チル迄厚ク塗ルベシ又單純水楊酸ヲ厚ク散布シ之ヲ絆創膏ヲ以テ固定スルモ可ナリ

註著者ハ兵卒ノ該症ヲバ數例治療セリ常ニ先ツ出血ナキ程ニ

圓錐形ニ皮膚肥厚ヲ切除シ其内ニ水楊酸ヲ壓シ入レ絆創膏ニテ被蓋シ放置スルヲ三四日ニシテ奏効再發セザルヲ實驗

セリ輕症ノ者ハ「サルチル」酸コロヂエーム効アルモ陳舊ニシテ其角質突起大ナルモノハ到底外科的手術ニ頼ルノ外ナシ

疣贅 *Verruca, Warze*

年齢ノ如何ヲ問ハズ發生スル者ニシテ硬固ニシテ多少隆起シ或ハ色素ヲ沈着スルアリ多クハ蠶豆大ニ達スル乳嘴ナリ稀ニハ融合シテ廣大ナル腫瘍トナリ其表面滑澤ナルヲアリ或ハ裂痕ヲ見ルヲアリ此裂痕 *Zerklüftung* 甚シケレバ恰モ是レ太キ毛ノ刷毛ノ如キ觀ヲ呈ス色ハ多様ニシテ一定セズ別ニ原因ナクシテ急ニ多數ヲ發シ又暫時ニシテ痕跡ヲ止メズ消失スルモノナリ時ニハ年餘存在スルヲアリ又此部位ハ惡性腫瘍ノ發病基底ヲ作為スルヲアリ
老人ニハ黑色乳嘴トナリ背部ニ多發スルヲアリ *Verr. senilis-seborrhoica*
部位 殊ニ手ニ多ク發生スルモ就中手背及ビ指ヲ多シトス之ニ亞テ軀幹顔面頭部等トス

治療法

内服 ハ亞砒酸及ビ苛性マクネシア〇・五—一〇ヲ一日量トス

外用 藥中ニテハ瘰癧痕等ヲ殘サ、ル者ヲ撰バザル可カラズ最良ナルハ電氣分解法 *Elektrolyse* ニシテ消極ニ針ヲ附シ腫瘍基底部分ニ平行シテ諸所ニ刺穿シテ三十秒ヨリ二分間—四「ミリアムペール」ノ電力ヲ働カスベシ

又銳匙或ハ剪ニテ切除シ過コロール「鐵」ニテ腐蝕スベシ又十倍昇汞コロヂエーム「發烟硝酸」醋酸鹽二〇—四〇%水楊酸軟膏或ハ純水楊酸ヲ八日間持長散布シ綑帶ヲ施コシ置クヘシ水銀硬膏等トス我皮膚科教室ニ於テハ一〇%水楊酸コロヂエーム或ハ純結晶石炭酸ニテ腐蝕後ピツク氏硬膏ヲ貼布シ奏効確實ヲ認ム

著者余ハ常ニ發烟硝酸ヲ杉箸棒ノ尖端ニ附シテ腐蝕シ後チ過コロール「鐵」ヲ同様處置ニテ成ベク其基底部分ヲ腐蝕シ乾固セルモノヲ除去シツ、毎日之ヲ行ヘバ蠶豆大ノモノモ大凡數回ニテ基底

ヨリ脱落スルヲ屢々ナリ

幼年扁平疣贅 *Verruca planae juveniles*

此症ハ唯幼年ノ者ヲ侵カシ多數密集セル扁平ニシテ僅カニ皮膚表面ニ隆起セル所ノ黄褐色或ハ褐赤色ノ小乳頭ニシテ部位ハ顔面手殊ニ指背ヲ侵カス

治療法

亞砒酸内服ニテ治癒ス

黑色表皮腫 *Akantosis nigrikans* 一名

黑色角化症 *Keratosis nigricans* 又

乳頭兼色素性營養障害 *Dystrophie papillaire*

et Pigmentaire

本症ハ甚シキ色素沈着ヲ來タス所ノ表皮及ビ乳頭ノ増殖ニシテ且ツ固有ノ部位ニ斑面性トナリ殆ト皆内臓癌腫ニ惱ム者ニ實驗スルモノ

タリ頂部及ビ頸部腋窩肘窩臍ノ周圍陰部手足ノ皮膚ハ初メ斑紋様ニ暗褐色且ツ粗糙トナリ漸次皮野ハ隆起シ皮溝ハ深クナリ凸凹不平ノ外觀ヲ呈シテ粗糙且ツ硬靱ナリ遂ニ其病竈ノ中心部ノ色ハ愈々濃厚トナリ殆ト黑色ヲ呈シ皮膚ハ疣狀乃至乳頭狀若クハ「コムデローム」様ノ増殖ヲ來シ多數ノ乳頭腫ヲ形成スルニ至ル
粘膜ニモ同様ノ症狀ヲ呈スレモ色ハ黑色ナラズシテ赤色ノ軟カキ乳頭ヲ形成ス殊ニ口腔肛門ヲ多シトス

手掌足蹠ハ胼胝狀ニ肥硬シテ皮野皮溝ハ著明トナル

頭部ハ乾性落屑及ビ脱毛ヲ來スモノナリ

本症ハ時トシテ皮膚炎及ビ甚シキ搔痒ヲ伴フコアリ經過ハ徐々ニシテ多ク婦人ノ罹病ヲ認ム年齢ハ老年トス

診断 *ダリール氏病*トハ其斑面性ニ發病スルコト及ビ結節狀ノ發疹

ナラザルコト且ツ甚シキ色素ト角質増殖ノ少ナキコトニ依テ鑑別ス

治療法 乳頭腫ハ外科的ニ切除シ其他ハ唯對症療法アルノミ

ダリール氏毛囊角化症 Keratosis follicularis Vegetans, Darier

本症ハ昔テ「ブソロスベルモーション」Psorospermosisトテ原生虫ニ因スル疾患ト見做サレタルモ寧ロ隆起性毛囊角化症ト云フノ穩當ナルベシ遺傳素因アル者ノ皮脂腺多數ナル部位ニ局限シテ且ツ毛囊ニ一致セル角質増殖ナリ其結節ハ乳嘴狀ニ増殖スル傾向ヲ有スルモノナリ原發疹ハ帽針頭大乃至扁豆大ナル角化セル乾燥セル若クハ脂肪性ノ物質ヨリ成ル結節ニシテ其物質ハ稍々固着シ之ヲ剝離セバ其下面ニ圓錐形ノ突起ヲ有ス之レ皮脂腺ニ突入セル所ノ者ナリ此結節ハ帶黃褐色ニシテ播種性ニ漸次發生シ時ニ増大シテ恰モ水晶ノ結晶ヲ見ルガ如ク不平ノ鏽樣ノ硬キ粗糙面ヲ呈シ又脂肪樣落屑ヲ被ムルコアリ長ク存在スルキハ此ノ如キ斑面ハ時ニ大ナル乳嘴乃至乳頭狀ノ乾燥且ツ脂漏セル角質ヨリ被ハル、軟カキコ或ハ硬靱ニシテ皸裂シ惡臭ノ脂漏性物質ヲ分泌スルニ至ル時ニハ又全ク發疹時ト變化ナク經過

スルモノアリ
部位ニ從テ其症狀ニ差違アリ左ノ如シ
頭部ニテハ上記ノ如キ結節ニシテ唯僅カニ乳嘴狀ニ増殖シ或ハ高度ノ乾性脂漏ノミノコアリ
顔面ニテハ潮蔓性帶黃褐色ノ色素沈着及ビ上記ノ結節アリ殊ニ鼻々唇溝頰ニハ脂肪性ノ落屑アリ
軀幹ニテハ肩胛腋窩胸骨部臍ノ周圍薦骨部等ニテ殊ニ薦骨部ニテハ「コムデローム」樣斑面ヲ呈ス陰部肛圍ニハ往々多數且ツ増大發生ス四肢ニテハ乾燥ノ結節及ビ硬キ斑面トナリ而シテ屈伸兩側ヲ侵カシ手背足背ニテハ疣狀ニ手掌足蹠ハ胼胝樣ニ肥厚シ爪ハ光澤ヲ失ヒ脆弱トナル
頰部口蓋ノ粘膜ハ灰白色ナル密生結節アリ粘膜ハ發赤シ其表面ハ粗糙且ツ不平ナリ
一般症狀ハ何等變化ナシ時トシテ可ナリノ瘙痒アリ

主トシテ男子ヲ侵カスヲ多シ幼年ヨリ春氣發動期マデニ發病シテ一生ヲ經過スル者アリ又消退スルキ煉化石様ノ色素ヲ遺コスヲアリ
診斷 脂漏性濕疹ノ好發部位ニ類似ヲナシ春氣發動ノ時ニ多發シ結節狀ノ多クハ毛囊ニ一致セル角質増殖ニシテ特有ノ色澤ト落屑脂肪様ノ性質ヲ帶ブルヲ等ニ依ル

類症鑑別

第一毛囊性魚鱗癬ハ先天性ニ初生兒ニ來タル

第二 黑色表皮腫ハ類似ノ點アルモ暗黑色ノ又甚シキ乳頭狀ニ増殖セル發疹ナリ

治療法

魚鱗癬ト同ク療法ハ多ク奏効セズ然レ入浴ヲ行ヒ又硫黃石鹼テール石鹼ヲ使用シ又塗脂療法ヲ行フベシ時ニ輕快スルヲアリ甚シキ増殖ニシテ部位ノ關係之ヲ許セバ外科的ノ切除ヨリ他ナシ

汗口角化症 Porokeratose

本症ハミベリー氏ノ記載セル稀有ノ疾患ニシテ限局セル汗腺口ノ突起狀角化ニシテ遠心性ニ其腺口ノ周圍ニ蔓延セル小サキ斑面性角化症ヲ云フ

何等變化ナキ皮膚ニ小ナル淡褐色圓錐形ノ隆起ヲ呈シ其巔頂ニ角質栓ヲ戴キテ之ヲ剝離スレバ小サキ噴火口狀ノ開口ヲ認ム之レ肝腺ノ排出口ニ相當スル所ナリ遠心性ノ蔓延増大ト中心ノ陷凹ノ爲ニ圓錐形ノ角質ハ漸次小ニシテ僅カニ隆起セル扁平ノ斑面トナル稀ニハ中心ノ乳嘴狀ニ角質増殖スルヲアリ斑面ハ漸ク爪大ニ達スルノミ多クハ小兒ニ發シ十有餘年ノ經過ニテ發育スルモノモ自然ニ又消失スルヲアリ
好發部位トシテハ前膊ノ伸展側手背足背指背ニシテ稀ニ頭部及ヒ陰部又口腔粘膜ニ發スルヲアリ

治療法

諸法皆奏効確實ナラズ切除或ハ電氣燒灼等ノ法ニ頼ルノ他ナシ

被角血管腫 *Angiokeratom-Mibelli*

此症ハ稀有ニ手及ビ足ニ發生スル小乳嘴狀ノ表皮隆起ニシテ此下ニ擴張セル血管或ハ點狀皮膚出血ヲ認ムル者ナリ故ニ灰白色或ハ褐色ノ表皮肥厚ノ下ニ赤色ヲ認ムベシ多クハ凍瘡或ハ假死ノ部ヨリ發生スル腫瘍ナリ

部位 手背足背ヲ多トス

治療法

烙白金或ハ電氣分解法ヲ以テ目的ヲ達スベク後其原因ノ療法ヲ施コヌベシ

註此報告ハ東京醫學會雜誌ニ醫學士樫田龜一郎君ノ報告アリ著者近來遠山學士ト共ニ陰囊ニ發生セル者ヲ實驗セリ

毛髮增生症 *Hypertricosis*

更ラニ變化ナキ毛髮ニシテ異常ナル部位ニ發生スルモノヲ云フ之ニ

先天ト後天ノ別アリバルテルス氏ハ左ノ如ク區別セリ

(一) 異性發生 *Heterogene* 婦人ニシテ男子固有ノ部位ニ毛ヲ發生セル者ヲ云フ

(二) 異常時發育 *Heterochronie* 普通ノ時期ナラザルニ發生スル者

(三) 變位發生 *Heterotopie* 無毛部ニ發生スル者ニシテ之ヲ全身性ト局所性トニ別ツ

異性發生

異性發生 婦人ニ男子ト同形ノ髯ヲ同時ニ發生スルコトアリ而シテ月經

閉止期 *Chinaderium* ニ多シ部位ハ顔部ニ發生スル者多シトス又乳房間

或ハ乳ニ發生スル者アリ陰毛ノ臍部迄直線狀ニ發生スル者アリ

異常時發育

異常時發育 小兒ニシテ非常ニ早ク毛髮ノ發育スルコトアリ

變位發生

變位發生 中ニ左ノ二種アリ

局所性毛髮增生症

(1) 局所性毛髮增生症 *Hypertichosis Nutropica localis* トハ神經性異常アル

所或ハ證明スベキ變化ナクシテ胸部肩胛骨薦骨ニ發生ス是レ多ク遺

後天性毛髮増生症

全身性毛髮増生症

傳性ナリ又癩痕ノ周圍ニ限局性毛髮發生 *Haarwuchs* アリ又永時綳帶ヲ施コセシ者ハ綳帶下ニ往々見ルコアリ之ヲ後天性毛髮増生症 *Hypotrichia acquisita* ト云フ

(2) 全身性毛髮増生症 *Hypertrich. universalis* ハ遺傳的 *Hereditäre* 疾病トシテ一家族ニ來タルコアリ犬男山男等 *Hund-Waldmenschen* ト云フハ是ナル此ノ如キ者ニハ常ニ齒ノ缺損 *Zahndefect* ヲ見ル者ヲ多シトス

治療法

根治的 *Radical* ニ除去スルハ電氣分解法ナリ消極 *Kathode* ヲ毛毳球 *Haarbalg* ニ挿入スベシ十五秒或ハ半分間一—二ミリアムペールノ強サヲ用ユベシ而シテ後抜毛スベシ又左方ヲ處スモ可ナリ

硫酸バリウム 五〇〇

澱粉

亞鉛華 各二〇〇

右脱毛藥トス

フレンク氏脱毛藥

又フレンク氏脱毛藥ハ左ノ如シ

雄黃 *opernent* 一分

苛性加里 八分

澱粉 二—十分

又左方アリ

硫酸カルシウム 二〇〇

グリスリン軟膏 各一〇〇

澱粉 各一〇〇

右一二ミリメートル厚ニ載セ十分—三十分後洗滌スベシ

爪ノ肥大症 *Hypertrophie der Nägel-Onychauxis*

爪甲ノ肥大ニハ二様ノ意味アリ長サ及ビ厚サノ肥大之ナリ厚サヲ増ス者ハ異常ニ發育シテ彎曲シ甚シキハ螺線狀ノ如ク彎曲紆廻スル者アリ之ヲ爪甲彎曲症 *Onychogryphosis* ト云ヒ普通ノ性質ヲ失ヒテ粗糙ト

ナリ光澤ナク *glaukos* 縦横ノ裂溝 *Furthen* ヲ生ズ爪床ハ隆起シ乳頭發育良ク血管擴張ヲ伴ヘリ

爪甲肥大症ハ先天性ノヲアリ或ハ他ノ皮膚病例之バ乾癬紅色苔癬象皮膚癩病梅毒等ニ續發スルヲアリ又神經骨關節疾患ヨリ由來スルヲアリ外傷 *Trauma* モ原因タルヲアリ異常發育ノ爪ハ爪甲周圍炎 *Paronychia* ヲ起シテ爪甲箱頓炎ノ症狀ヲ呈スルヲアリ然レモ爪甲周圍炎ハ又異常加壓ノ爲メニ通常ノ爪ニモ發病スルヲアリ例之バ不適當ナル靴或ハ各趾ノ互ニ層重加壓スル場合等然リ此症ハ爪壁腫脹シ疼痛性潰瘍トナリ爪甲縁ハ多少爪床内ニ侵入スルモノナリ

治療法

原因ヲ除クヲ計ルベシ爪甲箱頓症 *Onychia incarnata* ハ唯加壓原因タル爪甲縁ヲ少シク高メ此下ニ綿ノ小楔ヲ挿入シ絆創膏ヲ以テ爪壁ト爪甲ト成ベク離隔スル様ニ纏絡スベシ潰瘍ヲ作レバ其楔タル綿ヲ二%硝酸銀酒精液ヲ以テ時々浸タスベシ而シテ毎二日新タニ厚キ楔ト交換

スベシ其他苛性加里四〇%ヲ温メ爪ヲ濕タシ一二分後ニ爪甲ヲ搔抓スベシ又爪甲半部或ハ爪壁ヲ切除スベシ

我皮膚科教室ニテハ苛性加里ニテ軟化シタル後爪甲搔抓後一―五%昇汞「*ヨロジウム*」ヲ塗布スルカ或ハ單ニビツク氏硬膏ヲ貼用ス

色素性乾皮症 *Xeroderma pigmentosus*

此症ハ一千八百七十年カボジ―氏ノ初メテ記載セシ者ナリ幼年ノ者多クハ一二歳ノ者ニ來タリ顔面及ビ手ノ如キ裸體部ニ多數ノ色素斑ヲ發生ス時ニハ密生シ時ニハ散在セリ其色ハ初メ褐色ニシテ後暗褐色ヨリ黒色トナルニ至ル其大サハ夏日斑 *Ephelides* 雀斑 *Lentiginos* 位ナリ各斑ノ間ノ皮膚ハ健在ナルアリ或癥痕様ナルアリ又菲薄トナリ白色トナリ處々ニ血管擴張ヲ認ムベキヲアリ或ハ又乳嘴狀ノ小腫瘍ヲ見ルヲアリ時ヲ經テ皮膚萎縮シ *Schrunpfen* 乾燥シ羊紙ノ如ク裂ケ易ク「*エクチエーマ*」様トナリ又潰瘍狀トナル此間ニ色素ハ漸次増加ス時

ニ結膜乾皮症 Xerosis conjunctivae ヲ起來スルコアリ本症ノ悪性ナル者ハ多數ノ黒色癌或ハ黒色肉腫ノ發生ニ資スルコ之レナリ又血管腫ノ合併症タルコアリ

部位 初メハ顔面ニシテ次ニ耳頸肩胛部腋窩手等ナリ稀ニ軀幹ニ來タルコアリ

幼年ニ發病スルコ皮膚消削ノ漸次進行シ且色素ノ形色及ビ特有ナルヲ以テ診斷シ得ベシ

類症鑑別

第一癩病ナレバ消削セル皮膚部ニハ必ズ知覺異常アリ

第二癩皮症 Schroderna ハ初期誤診スル恐レアレモ此症ノ緊張短縮セル皮膚ハ堅剛ニシテ凍結セル如シ此ノ如キ皮膚ノ堅剛ハ乾皮症ニ見ザル所ナリ

治療法

對症療法ノミ初期ニハ亞砒酸ノ内服或ハ皮下注射ヲ試ムベシ後ニハ

外科的ニ除去スルノ一法アルノミ

著者曰ク嘗テ東京大學ニ於テ三十二年頃診斷セル者約八九年ヲ經テ再來當時左上眼險ニ梅實大ノ腫瘍ヲ發生シ入院治療セルモノアリ其組織的肉腫ナラン

色素增殖症 Hypertrophi der Pigmentes.

色素増加ニ先天後天ノ別アリ其先天性ニ屬スベキ者左ノ如シ

母斑 Naevus

母斑トハ先天性ノ者ニシテ其色素ニ因スルハ色素性母斑 *Vaevus pigmentosus* ト云ヒ又血管擴張ニ由來スルハ血管性母斑 *Naev. vasculosis* ト名ヅク而シテ其色素性母斑ヲ別ツテ單純母斑ト疣狀母斑トス唯母斑ト云フハ其皮膚表面ヨリ隆起セザル者ニシテ疣狀母斑トハ色素ト乳嘴形成ト伴發セル者ヲ云フナリ若シ何レノ母斑ニテモ毛髮發生セ

色素性母斑
血管性母斑
疣狀母斑

有毛母斑	母斑 <i>Nevus piliferus</i> ト云ヒ而シテ多ク神經経路ニ沿フヲ以テ神經母斑 <i>Nevus neuromatous</i> トモ云ヘリ
神經母斑	單純母斑 先天性褐色或ハ黒褐色ノ斑ニシテ其表面滑澤ナリ大小種々アリ皮膚表面ト同高ニアリ <i>Gleiches Niveau</i> 稀レニ有毛ノヲアリ
單純母斑	疣狀母斑 褐色或ハ黒色ニシテ多少ノ毛髮發生アリ毛ノ少ナキ程其表皮ハ肥厚セルモノナリ時トシテ一個或ハ多クノ神經ニ沿フテ配列スルヲアリ殊ニ胎生期ニ裂痕アリシ部位ニ發生スル者ヲ多シトス即チ裂痕母斑 <i> fissurale Nevus-Virchow</i> ト名ヅケ頸部或ハ顎部ニ多シトス
裂痕母斑	其他瀰蔓性ノ廣大ナル獸皮ニ似タル母斑ヲ見ルハ興味アリ
又色素性母斑ヲ左ノ五種ニ別ツ人アリ	
黒色母斑	<i>N. Spitz</i> 普通ノあざニシテ色素ノ變化アルノ外皮膚ニ何等變狀ナシ大小不同ナレモ形ハ多クハ圓形ナリ其色モ褐色乃至暗褐色ナリ時トシテ小斑或ハ帶狀ニ配列シテ恰モ皮膚ノ神經分佈ニ相當スルモノアリ之ヲ列序性母斑 <i>Systematisirten Naevi</i> ト云フ
列序性母斑	

軟性母斑	軟性母斑或ハ乳嘴トハ所謂ほくら(黒子)ニシテ初生兒ニ多ク扁平圓錐形ノ隆起ニシテ時ヲ經テ成長シ軟カキ滑澤ニシテ色素ヲ沈着シ或ハ無色ノ乳嘴トナル
硬性兼混合母斑(混 合母斑)	硬性兼混合母斑ハ扁豆大乃至手掌大ニ達スル硬キ母斑ニシテ着色ナキモノアリ又黒褐色ノモノアリ大ナルモノハ角質輝裂シテ隆起ス
獸皮性母斑	有毛母斑トハ色素沈着ト同時ニ非常ノ毛ノ發生ヲ伴フモノナリ其毛ハ殊ニ太クシテ暗黒色ヲ帶ブ
獸皮性母斑	獸皮性母斑トハ犬男山男ノ類ニシテ毛密生シ其皮膚乳嘴様ニシテ滑澤ナラズ
血管性母斑	血管性母斑ハ其形狀種々ニシテ點狀ノモノアリ多クハ其周圍ニ毛細管擴張ノ波及スルヲ認ムベシ又滑澤ナル大小種々ノモノアリ皮膚多クハ軟カク柔軟ニシテ肥厚ナシ時トシテ表面不正毳毛ヲ發生スルヲアリ母斑ノ境界ハ不正鋸齒狀ヲ普通トス又腫瘍狀又痔狀ニ有辨ノ扁平腫瘍ニ隆起スルヲアリ頭部及ビ顔面ニ好發ス

類症鑑別 記載ヲ俟タズシテ明カナリ

治療法

小ナル者ハ切除ヲ最モ簡便トス又電氣分解法 *Elektrolyse* ヲ宜トス時トシテ此法ニ因テ唯毛ヲ脱落セシムレバ乳嘴モ自然ニ消退スルヲアリ一〇%昇汞「コロヂユーム」ヲ屢々塗布スベシ又銳匙 *Scharfer Löffel* 搔抓モ可ナリ

後天性ノ色素増殖症ハ左ノ如シ而シテ全身性ト限局性トアリ

全身性色素増殖 *Uniersellen Hyperpigmentation* ハ「アヂソン」病及ビ惡液質

性黒皮 *Melanoderma cachecticorum* ノ二者ナリ「アヂソン」病ハ全身皮膚灰白

或ハ青銅色ニシテ口粘膜モ亦侵サル時トシテ白斑 *Vitigo* ノ散在發生

スルヲアリ

限局性色素増殖 *Unschriebenen Hyperpigmentationen* ヲ別ツテ雀斑 *Lentigo* 夏

日斑 *Ephelis* 肝斑 *Chloasma* ノ三トス

雀斑 *Lentigo*

此症ハ俗稱「そばかす」ニシテ恐ラク先天性ノ者ニシテ生後ニ漸次發生スル者ノ如シ帽針頭大ヨリ「レンス」豆大ニシテ黄色乃至黒褐色ノ者アリ皮膚軟カク滑澤ナリ顔面手及ビ其他體部ニ發生スルモノナリ

治療法 ハ母斑ト同意味ナリトス

夏日斑 *Ephelis*

本症ハ先天性素因アル者ニ太陽ノ光線作用與テ力アルモノナラン褐色或黃褐色ニシテ不正ニ稍鋸齒狀 *Nachig* ヲ爲ス所ノ小斑ニシテ好テ鼻頰眼險頸部及手等殆ト唯衣服ニ被ハレザル所ニ發シ其數ハ個人ニ因テ差アリ冬季消退シテ夏季再發ス赭色赤毛ヲ有スル婦人ニ多ク見ル者ナリ稀レニハ六歳前ニ發スルヲアリ此發生ノ主働 *Hauptfactor* ハ光線作用ニ相違ナケレハ先天性素因ノ關係モ與テ力アルベシ

治療法 ハ顔面ニ赤色黄色乃至綠色ノ布片ヲ以テ被ヒ一〇%規尼涅軟膏ヲ塗布シテ太陽光線ヲ防グベシ
 局部ニハ先ヅ上皮剝離ヲ務ムルノ法ヲ處スルヲ目的トス例セバ稀薄ナル鹽酸醋酸枸橼酸或ハ密柑ノ皮ニテ摩擦スルモ可ナリ亞爾加里礬砂加里石鹼水銀軟膏殊ニ昇汞等ヲ應用ス
 ヘブラ氏夏日斑膏アリ左ノ如シ

白降汞 二・五—五・〇

次硝酸蒼鉛

單軟膏 五〇・〇

初メ石鹼ニテ能ク洗滌シ後右軟膏ヲ夜間塗擦シ其上ニ撒布藥ヲ撒布シ置クベシ

或又

昇汞 〇・一—〇・三

安息香酸 一五・〇

杏仁水 三〇〇・〇

又

昇汞 〇・一五—〇・三

クロールアンモニア

杏仁水 一二〇・〇

又一%昇汞水モアリ

肝斑 Chloasma

黄色及ビ褐色ノ限局セル「レンヌ」大以上ノ斑ナリ皮膚表面ハ普通ニシテ鱗屑等ヲ見ズ其部位蔓延持續等ハ其原因ニ關スルナリ此原因ヲ知ルヲ治療上必要ナルヲ以テ左ニ述ベントス

原因ニ内外ノ別アリ

肝斑外因 (1)太陽肝斑 *Chloasma solare* ハ化學的ノ太陽越紫光線 *Ultravioletten* ヨリ原因ス (2)中毒性肝斑 *Chloasma toxicum* ハ芥子 *Senf* 發疱膏 *Bla-*

太陽肝斑
 中毒性肝斑

外傷性肝斑

sunblaser 沃度クソザロビンノ貼用ニ因ル(3)外傷性肝斑 *Chlramnatim*

子宮性肝斑

ハ皮膚ノ刺戟加壓等ノ爲メニ發生ス

亞砒酸色素沈着症

肝斑内因 (1)子宮性肝斑 *Chlramnatim* ハ妊娠中或ハ婦人科疾患ノ時發生スル者ニシテ好ムデ前額上唇及ヒ頰ニ對等ニ來タルヲ多トス(2)肺結核患者其他胃疾患等ナリ(3)亞砒酸性色素沈着症 *Arsenmelanose* 亞砒酸服用後全身ハ潮蘆性暗褐色時ニハ黑色ノ色素ヲ來タヌ者ナリ

類症鑑別

第一癩風ハ常ニ鱗屑アルヲ以テ鑑別容易ナリ

第二色素性乾皮症ハ色斑ノ間ノ皮膚ニ消削アルヲ以テ知ルヲ得ベシ

第三固定安知必林疹ハ其斑發生前ニ瘙痒發赤ヲ其部ニ由來セルヲ以テ鑑別スベシ

治療法

太陽肝斑ニハ規尼涅ノ内服ヲ宜ロシトス色素厚キキハ綠石鹼ヲ毎日

三回塗布シ又加里石鹼或ハ白降汞ヲ各晚塗布スベシ一%ノ昇汞酒精ヲ以テ約四時間罨法ヲ施コシ表皮ニ水泡形成ヲ起コサシムルハ甚ダ効アリ又結晶石炭酸ヲ以テ腐蝕スルモ可ナリ乳酸グリセリン等分ノ者モ試ムベシ又ウオルフ氏ハ三格魯兒醋酸ヲ賞用ス又剝離膏ウキルキンソン氏軟膏カボジ一氏軟膏ヲ貼用シテ効アルヲアリ試ムベキモノナリ

象皮病 *Elephantiasis*

此症ハ發生徐々ニシテ局所循環障害殊ニ淋巴管ノ障害ニ伴ツテ起ル者ニシテ再發ノ丹毒淋巴管炎靜脈炎等ノ爲メニ浮腫ヲ起シ後潮蘆性ナル肥硬トナリ其部ノ太サヲ増シ其以前ノ形狀ヲ全ク消失スルニ至ル皮膚ハ多ク滑澤ニシテ擴張セル淋巴管靜脈管蛇行シ或ハ「エクチエー」様トナリテ輝裂潰瘍或ハ色素ヲ沈着ス此ノ如キヲ滑澤象皮病 *Elephantiasis laticosa* ト云ヒ乳嘴狀突隆ノ發生セルヲ疣狀或ハ乳頭狀象皮病 *Elephantiasis verrucosa*

滑澤象皮病
乳頭狀象皮病

od. papillaris ト云フ而シテ象皮病患者ノ皮膚ハ緊張シテ捻ミ上グルト
出來ズ時日ヲ經レバ遂ニ骨肥大ヲ來タシ眞皮及ビ皮下組織ノ肥硬ト
共ニ一層其大サヲ高ムル者ナリ若シ擴張セル靜脈瘤様 Varicis ノ淋巴
管破潰セバ所謂淋巴漏 Lymphorrhoe トナル小兒ハ象皮病ニ罹ルト甚ダ
稀ナリ熱帶地方ニ多ク發生スル疾病ナリ

部位 下肢及ビ足ニ最モ多ク發生シ之ニ次デ陰囊 Scrotum 陰莖 Penis
大小陰唇 Labia major & minor ニ來タリ上肢及ビ耳ニ來タルト極メテ稀
有ナリ

治療法

豫防的ニハ諸種ノ爵血エクチエーマ潰瘍痕瘡其他ヲ治スルニアリ若
シ下肢ニ來タリシ象皮病ニシテ初期ナレバ高位ヲ取ラシメ護謨或ハ
「フランネル」帶ニテ壓迫綑帶 Compression ヲ施コスベシ高度ノ者ハ外科
的療法ニスルノミ

第四章 皮膚腫瘍 Geschwulste der Haut

纖維腫 Fibrom

皮膚纖維腫ニ單發性ト多發性トアリ甲ハ後天性ニ發スルコアルモ乙
ハ先天性ナリ而シテ又限局性ノ者ヲ其軟キト硬キニ因テ區別ス硬性
ハ限局明割ナル硬キ結節性腫瘍ニシテ其表面ハ健康皮膚ヲ以テ被ハ
ル時ニ腔胴性ニ變化シ又兆骨 Verknöchern シ石灰化シ Verkalken 或ハ脂
肪又ハ粘液浮腫 Myxödem ニ變性スルコアリ稀レニハ肉腫様又瘤腫様
ニ變化スルコアリ軟性ノ者ヲ軟屬性纖維腫トス

軟屬性纖維腫 Fibroma molluscum

本症ハ軟カキ有莖 Gestalt 或ハ廣キ基底ヲ有スル常針頭乃至小兒頭大
ニ達スル腫瘍ナリ其莖 Stiel ハ唯一纖維ナルコアリ此ノ如キヲ其形ヨ
リ振子様纖維腫 Molluscum pedatum ト云フ腫瘍上ノ皮膚ハ普通ナルモ

振子様纖維腫

皮膚腫瘍

軟肉纖維腫
母斑
神經母斑

時ニハ血管ノ擴張ヲ認ムルコトアリ又開大セル諸腺口ヲ往々目撃シ得ルコトアリ唯一個發生スルコトアリ又千ヲ以テ數フルガ如ク多發スルコトアリ神經經路ニ沿フテ發生シ先天性ナレバ軟肉纖維腫様母斑 *Nevus molluskiformis* ト云ヒ神經母斑 *Neuromatosis* ノ中ニ數フ小ハ自カラ消失スルコトアルモ大腫瘍ナレバ表面潰瘍トナルコト多シ其軟ナルト數ノ多キトヲ以テ容易ニ診斷シ得ベシ傳染性軟肉腫 *Molluscum contagiosum* ハ中央ニ小孔アリ硝子様内容物ヲ壓出シ得ルニ因テ鑑別シ得ラル

治療法

硬性多發纖維腫ハ亞砒酸ノ皮下注射ヲ試ムベシ其他外科的治療ニ委スルノ外ナシ

蟹足腫或ハ癩痕腫 Keloid

蟹足腫ニ眞偽ノ二種アリ癩痕組織ヨリ發生スルヲ偽性 *falsch* トシ特發

偽性蟹足腫

眞性蟹足腫

眞性蟹足腫

スルヲ眞性 *Wahr* トス兩氏ノ差違ハ組織學上ニ存シ肉眼的ニ區別シ易カラザルコトアリ然レモ腫瘍ノ發生如何ナルヤヲ知ルコト必要ナリ偽性蟹足腫 *Falsche Keloid* ハ多クハ顔面軀幹ニ來リ又稀ニ四肢ニ發生ス其大サ榛實大ニシテ半球形或ハ扁平ノ形アル年齡ニ一定ノ關係ナシ本病ハ患者ノ素因ニ基クモノニシテ一家族中多數ニ罹病スル者アルヲ見レバ恐ラク遺傳スルガ如シ眞性蟹足腫 *Wahre Keloid* ハ健康ノ皮膚ヨリ發生シ扁平ナリ而シテ其大サハ偽性ニ比シ小ニシテ多數發生スルヲ常トス且ツ多クハ對等性ニ來タル者ナリ

蟹足腫ハ癩痕ニ似タル扁平或ハ結瘤狀ノ肥硬シタル腫瘍ニテ其色白色或ハ稍紅色ニシテ加壓ニ因テ疼痛アリ其周圍ニ向ツテ突起 *Ausläufer* 出スコト恰モ蟹足ノ如キヲ以テ此名アリ單發スルコトアリ又多發スルコトアリ年齡ノ如何ヲ問ハズ其發育スルヤ徐々ニシテ一定ノ大サニ達セバ病症停止ス稀有ノ場合ナレモ消退スルコトアリ本病ハ殊ニ再發

ノ傾向ヲ有スル者ナリ、暗褐色ノ人種ニ多ク發生スト云フ
部位 ハ胸部最も多ク、軀幹背及四肢等稀ナリ

肥硬セル癩痕様ノ外觀ヲ呈シ、扁平或ハ線狀ニシテ疼痛アリ、多發シ且軟部ニ發生スルヲ以テ單純ノ癩痕肥大ト容易ニ鑑別シ得ベシ

治療法

亂切ヲ施コシ、次ニ水銀硬膏ヲ貼布シ、或ハ二〇—五〇%「レゾルチン」硬膏及ビ壓迫ヲ加フベシ、電氣燒灼モ時々効ヲ奏スルヲアリ、切除、烙白金等ニテ處置スルモ多クハ再發ス

乳嘴腫、尖圭コムデローム Papillom, Condylomata

acuminata

此腫瘍ハ纖維腫ノ一種ト見做シテ可ナリ、疣贅ト此腫瘍ヲ區別スルハ困難ナリ、乳嘴腫ハ其形狀ノ花椰菜ノ如キヲ特別トス、其表面ニ毛細管アリ、此模型ハ尖圭コムデロームナリ

尖圭コムデローム Condylomata acuminata

此ハ普通ノ皮膚ニ迅速發育シ、其形尖銳ニシテ分枝セル Veruicula 腫瘍ナリ、恰モ鶏冠或ハ覆盆子ノ如キ觀ヲ呈シ、其表面ハ常ニ濕潤セリ

部位 ハ殆ド唯陰部ニシテ、龜頭陰唇及ビ臀部トス

治療法

第一義ハ其濕潤スル原因ヲ去リ、常ニ乾燥セシムルヲアリ、而シテ最も根治的ハ切除ノ一法ノミ

著者曰、余ハ尖圭コムデロームニハ常ニ發煙硝酸ヲ杉箸ノ尖端ニ附シタルモノニシテ腐蝕スルヲ常トス、二三回ニテ小ナルモノハ脱落ス

覆盆子腫 Frambösie

此腫瘍ハ「ジャワ」島ニ於テ實驗スル者ニシテ、其本性ニ關シテハ未ダ説明シ能ハズ、唯熱帶地方ニ固有ノ疾患ニシテ、梅毒或ハ腺病其他ト直接

ノ關係ナシト云フ點ノミ確定セラレタリ發熱ヲ伴ヒ往々顔面ニ發生スル乳嘴狀ニシテ厚サ一―五ミリメートルノ黃色ノ痂皮ヲ被ムル所ノ腺様物トナリ或ハ小サキ硬結ノ腫瘍ナリ殊ニ小兒ヲ侵カシ觸接性ヲ有シ多クハ六―十ヶ月間ニ治愈ニ就ク者ナリ

治療法

第一滋養強壯ヲ目的トシ身體ノ攝生ヲ務ムベシ局所ニハ次硝酸蒼鉛ヲ用ユレバ發疹ハ乾固剝脫ス

筋腫 Myom

皮膚ノ筋腫ハ實ニ稀有ナルモノニシテ平滑筋纖維ヨリスル平滑筋腫 *Leiomyom* ニシテ舉毛筋 *Arrector pilorum* ヨリ發生ス小サキ肥硬セル赤色腫瘍ニシテ多クハ多數ヲ軀幹ニ生ジ而シテ自然治愈ニ赴クコトアリ 確診ヲ爲サントセバ顯微鏡的ナラザル可カラズ

治療法

亞砒酸療法ヲ試ムベシ

黃色腫 Xanthom

白斑様腫

此名ハスミト氏ガ命名セシ者ニテウキルソン氏ハ「キサシテラスマ」*Xanthelasma* ト云ヒアデツソン氏ハ「白斑様腫」*Xanthoidea* ト名ケタリ

皮膚ニ來タルニ二種アリ扁平黃色腫 X. planum ト結節黃色腫 X. tuberosum 是ナリ

扁平黃色腫

扁平、黃色、腫 ハ扁平ナル淡黃色或ハ黃褐色ノ線狀或ハ點狀ノ隆起ニシテ之ニ觸ルレバ恰モ絨毛ノ如キ感アリ疼痛ハ缺如セリ皮膚ニ落屑ナク又皮膚ト癒着ナキヲ以テ捻ミ上グルコトヲ得ベシ單發スルコトアリ多發スルコトアリ而シテ往々對等性ニ來タルコトアリ

部位 ハ眼瞼、眼眥 *Angularis-Winkel* ヲ最モ多シトシ又鼻頂部、粘膜、口

氣管、食道等ニモ來タル

結節黃色腫

結節、黃色、腫 ハ突兀タル小腫瘍ニシテ融合シテハ大腫瘍トナルコトアリ

リ其色黄色ニシテ其他ノ状態ハ扁平黄色腫ト異ナル所ナシ
部位 關節屈側、足、手、頭皮其他トス

黄色腫ハ發育徐々ニシテ一定ノ大サニ達スレバ發育停止 Stationair 自然治癒ヲ見ルハ頗ル稀有ナリ

其色及ビ其他皮膚ノ性状ニ因テ容易ナリ

治療法

外科的ニ委スルノ他ナシステルン氏ハ一〇%昇汞、コロヂエームヲ用ヒ、グアイルハ一鹽化醋酸ヲ用ヒ目的ヲ達セリト云フ

肉腫 Sarcom

肉腫ノ皮膚ニ來タルト屢々ニシテ原發性 Primary ナルアリ又内臓ノ肉腫ニ續發 Secondary スルトアリカボシー氏ハ實地上ヨリ左ノ三種ヲ區別セリ

(1) 非色素性肉腫 nicht pigmentierte Sarcom ハ單發スルトアリ又多發ス

ルトアリ肥硬弾力 elastisch 性ヲ有シ其表面ハ平滑光澤ヲ有スル小腫瘍ナリ多發原發性肉腫ニシテ非色素性ノ者ハ多クハ初メ手及ビ足部ニ發シ求心性 Centripetal ニ蔓延スルモノナリ

(2) 特發多發性色素肉腫 Das idiopathische multiple Pigmentsarcom ハ手足

ニ發生スル鮮紅色ノ結節ニテ間質出血ノ爲メニ遂ニ黒色トナリ灼熱及ビ緊張ノ感アリ此結節吸收セラレバ其跡ニ暗黒色癍痕性消削ヲ殘コス歲月ヲ經テ此ノ如キ結節ハ諸部ニ發生シ終ニハ内臓ニモ亦發育スルニ至ル

(3) 黒色肉腫 Das melanotische Sarcom ハ迅速ニ發育スル多少暗褐色ヲ呈

スル肥硬弾力性ノ腫瘍ニシテ潰瘍トナルトアリ然レモ自カラ消退治癒ニ就クトナシ此肉腫ハ往々母斑及ビ皮膚乳嘴ヨリ發生ス
確診ヲ下サントセバ組織的検査ニ依ラザル可カラズ唯往々誤診スルハ護謨腫様症狀ナリ然レモ此者ハ發生迅速ニシテ忽チ潰瘍トナル傾向ヲ有スルモノナリ

類症鑑別

第一、狼瘡ハ其部位及ビ經過ノ慢性潰瘍肉芽ノ増殖アル等ニ因テ明カナリ

第二、黄色腫ハ其色及ビ皮膚癒着ナキニ因テ鑑別シ得

治療法

豫防法ハ母斑或ハ皮膚乳嚢ヲ除去スルニアリ非色素性ノ者ニハ亞砒酸内服或ハ注射ヲ試ミテ好成績ヲ得ルコトアリ然レモ成ベク早期ニ外科的切除ヲ行フニ若カズ

粟粒腫 *Milium-Aene miliaria*

粟粒腫ハ名稱ノ如ク其大サ粟粒ニ等シキ圓形ノ結節ニシテ皮膚ニ炎症々狀ナシ多クハ眼瞼頰部唇縁陰唇及ビ瘰癧周圍等ニ發生スル者ナリ其色ハ黄色ニシテ光澤アリ時トシテ豌豆大ニ達スル腫瘍トナリ透明ニシテ水疱ノ如キ外觀ヲ呈ス又膠様 *Gelatinos* ノ内容ヲ有スル者ヲ

ワグネル氏ハ糊様粟粒腫 *Colloidumilium* ト稱セリ粟粒腫結節ノ内容ハ脂肪及ビ葱ノ如ク層重セル處ノ壓迫セラレタル扁平ノ角質細胞 *Hornschel* トヨリ構成セラル、者ナリ粟粒腫ハ恐ラク皮脂腺口ノ萎縮ノ爲メニ分泌物蓄積シ其ノ結果トシテ皮脂腺ノ擴大セル者ナラン其部位及ビ其内容ヲ壓出シテ肉眼的ニ診斷スル事ヲ得ベシ

類症鑑別

第一、傳染性軟屬腫 *Molluscum contagiosum* ハ中央ニ小孔アリ硝子様軟屬

腫小體 *Molluscumkörperchen* アリ

第二、黄色腫ハ壓出スルモ内容ヲ出スコトナシ

治療法

務メテ其内容ヲ搾出セバ可ナリ其部廣クシテ行フ能ハザレバ綠石鹼或ハ加里石鹼ヲ塗布シ之ヲ強ク摩擦シ後「ビツク」硬膏ヲ貼用シテ毎二日ニ石鹼塗擦ヲ行フベシ

腺腫 Adenom

皮膚ニ來タル腺腫ハ皮脂腺及ビ汗腺ヨリ發生スル者ナレモ極メテ稀有ナリ

皮脂腺腫

皮脂腺腫 *Adenoma sebaceum* ハ通常豌豆大ノ肥硬セル結節ニシテ皮膚

表面ヨリ隆起シ其形半圓或ハ稍尖圭ヲ有スルヲアリ其色臙皮ト同ジキヲアリ又黄赤色ノヲアリ單發スルヲアリ多發スルヲアリ而シテ其發生ニ先天後天ノ別アリ

汗腺々腫

汗腺々腫 *Hydradenom* ハ柔軟ナル限局性小腫瘍ニシテ殊ニ顔面ニ發

生ス帽針頭乃至豌豆大ナル扁平白色或ハ蒼白黄色ノ結節ナリ顯微鏡的ニアラザレバ確診シ得ズ

治療法

切除若クハ烙白金或ハ腐蝕劑ヲ以テ小腫瘍ナレバ脱落セシムルノミ

傳染性軟屬腫 *Molluscum contagiosum*

軟性表皮腫

疣贅性軟屬腫

此名ハバテマン氏ノ撰ビシ所ニシテヒルヒョウ氏ハ軟性表皮腫 *Epithelioma molluscum* ト云ヒカボジ一氏ハ疣贅性軟屬腫 *Molluscum verrucosum* ト云ヒバチン氏ハ痘疹性瘰癧 *Aene var. uliformis* ト命名セリ

此腫瘍ハ皮膚表面ニ隆起シ豌豆大ニ達スル發育最モ遅々タルモノナリ被覆スル皮膚ハ普通或ハ稍黄帶灰白ノ色澤ヲ呈シ時ニ其基部ニ輕度ノ發赤ヲ發スヲアリ其中央ニ多クハ點狀ノ小孔アリテ加壓セバ此孔ヨリ硝子様物質ヲ排出ス是レ所謂軟屬腫小體 *Molluscumkerperchen* ニシテ橢圓ニシテ光澤アリ本病ハ時トシテ一家族ノ多數ヲ犯カスヲアリ其傳染性ナルヲ疑ヒナク接種實驗 *Injferperiment* ハ陽性 *Positiv* ノ成績ヲ示セリト云フ

部位 顔面殊ニ眼ノ附近ニ多ク又頭部頸部及ビ陰部等ニシテ往々多數ヲ發生スルヲアリ

皮膚普通ニシテ變化ナキヲ其他炎症々狀ノ缺乏中央ノ小孔及ビ軟屬腫小體ヲ特兆トス

類症鑑別

第一粟粒腫ハ白色或ハ帶黄色ノ外觀ヲ呈シ且透明ナリ其表面ニ小孔ナシ皮脂様内容物アルヲ以テ知ルベシ
 第二軟屬纖維腫ハ中央ニ開口 *Oeffnung* ナク又壓出スベキ *Ausdrückbar* 内容物等ナキニ因ル

治療法

其内容物ヲ壓出セバ治癒ス尙後ニビツク氏硬膏ヲ貼布シ置クベシ
 著者ハ背部胸部及ビ手ニ多發セル本症二例ヲ實驗セリ常ニ大ナルモノハ内容物ヲ壓出シテビツク氏硬膏ヲ貼布シ内容ノ壓出シ難キ多數ノ小腫瘍ニハ一〇%「サルチル」酸「コロヂーム」ヲ塗布シテ全治セシメタリ

癌腫 Carcinom-Krebs

皮膚癌ハ轉移性 *Metastase* ニ因テ續發シ又癌腫ニ罹ル部位ヨリ連續性

Continuitas ニ來タリ又全ク原發スルコアリ

原發性皮膚癌ハ其狀態ニ三様アリ即チ潰瘍性癌腫、癌結節及ビ扁平湖、癌浸潤是ナリ

(1) 癌潰瘍或ハ扁平癌 *Ulcus rodens, das Krebsgeschwür, Carcinoid* ハ皮膚癌中最モ屢々見ル所ノ者ニシテ扁平不正形ニシテ潰瘍ノ邊緣ハ細小ニシテ穿鑿狀ヲ爲シ邊緣及ビ潰瘍底ハ軟骨様ニ硬タク結痂ヲ以テ被ハル、コアリ潰瘍面ハ滑澤或ハ顆粒狀 *Körnig* ヲナシ鮮紅色或ハ暗赤色ナルコアリ徐々ニ蔓延シテ底止スル所ナシ淋巴腺腫脹ハ最モ末期ニ來タルコアリ或ハ之ヲ來サザルコアリ又疼痛ヲ訴ヘズ若シ癌腫ノ高度浸潤ノ上ニ若シ潰瘍隆起シ來タレバ是ヲ隆起扁平癌 *Ulcus rodens elevatum* ト云フ

隆起扁平癌

(2) 結節癌ハ結節狀或ハ乳頭狀ノ腫瘍ニシテ又花椰菜ノ如キ觀ヲ呈スルコアリ潰瘍ヲ續發スルコアリ潰瘍ハ速カニ深部ヲ侵蝕シ忽チ近隣ノ淋巴腺腫脹ヲ惹起シ悪性腫瘍ノ轉歸ヲ取ルモノナリ

(3) 扁平浸潤癌 ハ所謂「バケット氏」エクチエーマ「Paget'sche Eczema」トシテ乳房ニ發生シ乳嚙及ビ乳房ハ「エクチエーマ」狀トナリ濕潤シ痂皮ヲ形成シ皮膚ハ爲メニ硬結ス此硬結ハ即チ是レ癌腫ナリ

部位 皮膚癌ハ殊ニ唇、鼻翼、眼瞼、耳、乳房、陰莖及臀部トス

經過ハ種々ニシテ一定セザルモ多少一時性 Vorübergehend ノ癥痕形成或ハ硬化性萎縮 Sclerotische Schrumpfung ニ因テ病症停止ヲ爲スアリ母斑乳嚙腫、下腿潰瘍、狼瘡癥痕、粉瘤腫等皆癌發生ノ基トナルモノナリ老年者ノ多ク侵カサル、ハ勿論ナリ

潰瘍ヲ形成シタルルハ診斷困難ナリ然レモ硬剛ニシテ軟骨様ナル邊緣ト比較的徐々ノ發育ハ診斷上ノ着目點タリ

類症鑑別

梅毒ノ邊緣浸潤ハ癌ノ如ク硬剛ナラズ經過モ亦速カナリ且ツ梅毒ノ他症候アリ

治療法

最乘療法ハ固ヨリ手術的 Operative ナレモ又扁平癌ニハ濃厚度ノ「レゾルチン」或ハ沒食子酸軟膏ヲ推奨ス、ラツサル氏ハ近頃再ビ亞砒酸ノ有効ナルヲ唱道セリ是レ亦輕々ニ看過スベカラザルコトナラン

血管腫 Angiom

血液性血管腫

血管腫トハ其組織主トシテ新生 Neubilden ノ脈管ヨリ成ルヲ云ヒ其脈管ノ血管ナルヤ或ハ水脈管ナルヤニ從フテ血液性血管腫 Angioma sanguinum ト、乳糜性血管腫 A. lymphangioma トニ區別ス

單純血管腫 (血管擴張症)

(一) 血液性血管腫ニ二種アリ單純性 A. simplex ト腔洞性 A. cavernosum トス

(イ) 單純血管腫或ハ血管擴張症 A. simplex-Teleangectasie ハ限局セル赤色或ハ青紅色ニシテ加壓セバ蒼白 erblassen トナリ皮膚ト同表面或ハ皮膚面ヨリ突隆セル斑ナリ突隆母斑 Naevus prominens ト云フ其斑中ニ肉眼ニテ視得ベキ擴張セル血管縱横ニ走行ス此斑若シ滲透性ニ紅色ヲ呈スルルハ火傷性母斑 Naevus flammeus-Friernalト名ク多クハ先天

火傷性母斑

腔胴性血管腫

性ニシテ生後病症停止スル者ナリ又迅速ニ延大スル者アリ稀有ノ一ナレモ血管萎縮 *Obiteration* セバ自カラ消失ス又時トシテ此部ニ炎症等ヲ起コシテ彼ヲ消退セシムルコアリ本症ハ象皮病肉腫凍瘡等ト併發スルコアリ即チ表皮血管腫ノ凍瘡後ニ來タルヲ以テ知ルベシ

部位 ハ顔面頸部トシ稀レニハ軀幹四肢ニ來タリ又近接ノ粘膜ヲ侵カスコアリ

(ロ) 腔胴性血管腫ハ波動ヲ呈シ *F fluctuation* 時ニ又搏動性 *creta* ニシテ壓縮シ得ベキ *Comprimibar* 大小不定ノ腫瘍ニシテ多クハ後天性ニシテ周圍ノ皮膚ト明劃ノ限界ヲ有スルコアリ又否ラザルコアリ

上記ノ特兆ニテ誤診スルコナシ

治療法

美貌上最モ最好ノ成績 *gute cosmetische Resultat* ヲ得ルハ第一期癒合ヲ營ムベキ切除 *Excision* ナリシ然レ之レ唯一部位ノキノミ實行シ得ベシ又電氣分解法モ奏効顯著ナリ淺表ノ小血管擴張症ニハ一〇%昇汞コロ

ヂユームヲ最良トス即チ毎日厚重塗布シ遂ニ其自然ノ剝脱ヲ來タスニ至ルベシ然レバ膿性ノ創面 *Wunde* ヲ呈スレモ此創面ハ善ク治癒ニ赴クモノナリ大ナル者及ビ腔胴性ノ者ニ至ツテハ電氣燒灼或ハ烙白金ヲ以テ持久破壊ヲ務ムルヨリ他ナシ

註血管擴張症ニ電氣分解法ヲ用ヒテ頗ル効アリシハ我同僚鈴木學士ノ皮膚病科ニ於ケル數多ノ實驗ナリ五六分間三・四ミリアンペールノ強サヲ用ユ

(二) 乳糜性血管腫 モ亦分ツテ二種トス單純淋巴管腫及ビ腔胴性淋巴管腫是ナリ其他多發結節性淋巴管腫 *Lymphangioma tuberosum multiplex* ナル者ヲカボジ一氏ハ記載セリ本症ハ時トシテ幼年ニ時トシテ老年ニ發生シ「レンス」豆大ノ結節ニシテ赤褐色ヲ呈シ表面平滑ナリ皮膚表面ヨリ僅カニ隆起ス通常鎖骨以下腰部トノ間ニ蔓延發生スル者ナリ指壓ニ因テ蒼白トナル頗ル梅毒性丘疹ニ酷似スル者ナリ

(イ) 單純淋巴管腫 *Lymphangioma Simplex* ハ乳嘴狀ノ小腫瘍ニシテ細小囊

單純淋巴管腫

大舌症

狀 *Cystoid* ノ水疱集合シテ形成セル者ナリ故ニ是ヲ穿刺 *Anstechen* セバ
乳糜様液體ヲ泄ラス
(口)腔、咽、性、淋、巴、管、腫、 *Lymphangioma* *Cavernosum* ハ殆ド皆先天性疾患ニシ
テ殊ニ顔面ニ發生シ唇舌部ハ著シキ肥厚ヲ來タヌ大唇、大舌症是ナリ
Macroglossic, *Macroglossie*

治療法

上記ノ諸法ニ則トルナリ最モ外科的ヲ良トス

脂肪腫 *Lipom*

皮膚脂肪腫ハ限局性ノ者多シ而シテ孤立性ノ者アリ多發性ノ者アリ
孤立性ハ他ノ症候ナク發育徐々ニシテ一定ノ大サニ達セバ發育停止
ス麻實大乃至小兒頭大ノ者アリ大ナル者ヲ觸診セバ必ず數個ノ瓣ヨ
リ構成セラル、ヲ知ルベシ又有莖懸垂スル者アリ

部位 ハ頸部及ビ項部ニ多ク背部臀部之レニ亞グ軀幹頭部顔面等ニ

モ稀レニ發生スルヲアリ

診斷

無痛性ニシテ軟ナリ且稍大ナル者ニ至ツテハ必ず瓣狀構成ナルヲ知
ルベシ細小ノ者ニ至ツテ組織的檢査ヲ要ス

治療法

外科的ニ出來得ル限り切除スルノミ

多發丘疹性毛囊表皮腫 *Trichoepithelioma papulatum*

multiplex 又囊腫腺腫様表皮腫 *Epithelioma Adenoides*

cyathum

本症ハ稀有ノ症ニシテ帽針頭大乃至豌豆大ノ扁平ニシテ、光澤ヲ有シ、
稍々硬靱ナリ皮膚ト何等ノ變化ナク顔面ニ好發シ或ハ播種性或ハ集
合ス春氣發動期ノ頃發生シテ病症停止ス消退スルヲナシ良性腫瘍ナ
リ

診断 皮脂腺腫トノ區別ハ實際ニハ臨床上ヨリハ困難ナルヲアリ
組織的検査ヲ要ス

皮膚白血症 *Leukämia cutis*

悪性皮膚淋巴腺腫

本症ハ肥硬セル豌豆大或ハ蠶豆大ノ皮膚腫瘍ニシテ褐色ニシテ瓣狀ナ
リ往々對等性ニ發生ス其他此疾病ニハ潮溼性變化アリ即チ皮膚ハ肥
硬シ赤色ニシテ一部光澤ヲ有シテ平滑ナリ且ツ濕潤シ或ハ鱗屑アリ
時ニ多數ノ結節ヲ發生スルモノアリ之ヲカボジー氏ハ悪性皮膚淋巴
腺腫ト云ヘリ *Lymphodermia perniciosa*

假性皮膚白血症 *Pseudoleukämia*

本症ハ細小ナル淺表或ハ皮下組織中ニ存スル硬固無痛ノ結節ニシテ
其被覆スル所ノ皮膚ハ普通ノ者ナリ若シ淺表ニ占位セバ皮膚ハ蠟色
ニ透見ス又ヨゼーフ氏ハ痒疹類似ノ症狀ヲ本症ニ見タリト云フ

結節性濕疹
多發性覆盆子
狀乳頭腫

治療法

原因療法ニテ亞砒酸ヲ最良トス又「テール」塗布「ナフトール」コカイン軟
膏モ可ナリ

菌狀皮膚息肉症 *Mycosis fungoides* 或ハ *Granuloma*

fungoides-Alibert

本症ヲウキルソン氏ハ「結節性」エ「ク」チ「エ」マ「」 *Eczema tuberculatum* ト云ヒ
ケブチル氏ハ多發性覆盆子狀乳頭腫 *Multiple beerscheuanartige Papillarge-
schwülste* ト云ヘリ

本症ヲ摸範的ニ三期ニ分ツ第一期ヲ「エ」ク「チ」エ「マ」期 *St. eburneatum* ト
云ヒ第二期ヲ「苔」癬狀期 *St. lichenoideus* 第三期ヲ菌狀期 *St. mycoticum* ト云フ
初メ永キ間ハ敢テ皮膚癢痒症或ハ單純ナル紅斑ハ「エ」ク「チ」エ「マ」症狀
ト何等區別スル所ナシ第二期即チ「苔」癬狀期ニハ扁平ニシテ不正或ハ
孤線ヨリ境サルル赤色或蒼白ニシテ癢痒甚シキ肥硬ノ浸潤トナリ濕
潤シ且ツ鱗屑アリ若シ此浸潤吸收セラレバ其部ハ色素沈着ヲ殘コ

シテ消失スレモ又他部ニハ新タニ發疹ヲ起コシ搔抓スルヲ以テ皮膚ハ搔抓症候ヲ起シ爲メニ皮膚ハ一定ノ外觀ヲ呈セズ此ノ如キ有様ニテ永ク持續シタル後第三期菌狀期トナリ浸潤ノ上ニ乳頭狀ニシテ有莖性或ハ廣底ニテ附着セル密柑大ノ腫瘍菌狀ニ發生シ時トシテ表皮ニ被ハレ時トシテ表皮剝離シ分泌盛ニシテ時ニ厚キ痂皮ヲ作ルヲアリ一菌狀腫瘍吸收セラレ、モ他ニ又發生ス此ニ至ツテハ全身症狀ヲ起コシ來タリ患者ハ惡疫質トナリ遂ニ死亡ス本症ハ年齢ヲ問ハズ部位ニ關セズ發生ス然レモ極メテ稀有ノ症ナリ例外トシテハ初メヨリ直チニ第三期ヲ以テ發病スルモノアリ原因ハ不明ナレモ恐ラク么微體ノ爲メナラン

搔痒ノ甚シキヲ多數ノ搔抓症候アルヲ又浸潤アル「エクチエー」狀ノ種々ノ形狀同時ニ發生シ又消失スル等一定セザル症狀ハ以テ菌狀發生前ニテモ本症ヲ想像シ得ベシ梅毒ハ著シキ搔痒ナリ浸潤ス銅色アリ且水銀及沃度劑ニテ反應アルヲ以テ鑑別シ得ベシ

治療法

内服トシテ亞砒酸ヲ與フルハ最モ効アルベシ
外用トシテハ一〇%焦性沒食子酸軟膏一〇—二〇%レゾルチン軟膏ヲ可トシ菌狀物ニハ沃度丁幾ヲ塗布スベシ或ハ又銳匙搔抓ヲ賞用ス

風土病性瘤 *Endemische Beule-Orientbeule*

本病ハ特ニ東洋ニ來タル風土病ニシテ明劃ナル境界ヲ有シ帽針頭大ニシテ初メ赤色ニ後蒼白トナル斑點ニシテ遂ニ突兀鱗屑ヲ有スル乳嘴狀腫物トナル十二ヶ月乃至十八ヶ月間ニ破壊シテ潰瘍トナリ線狀癩痕 *Strahlige Varbe* ヲ以テ治癒ス疼痛搔痒共ニ缺如ス唯罹病スル者ハ約十五歳マデトシ二回罹病スルヲナシ此疾病ハ觸接性ナリ原因ハ么微體ノ爲メナルヤ飲料水ノ爲メナルヤ不明ナリ

類症鑑別

第一梅毒ハ經過速ニシテ疼痛アリ春氣發動後ニ發病ス沃度及ビ水銀

劑ニ反應アリ
 第二癩病ハ結節ヲ伴ヒ皮膚滑澤ニシテ知覺異常アリ又容易ニ治療セズ
治療法
 對症療法ノ他ナシ

第五章皮膚退行性營養障害 *Regressive Ernährungsstörungen der Haut*

眞皮萎縮 *Atrophia cutis*

皮膚ノ萎縮ハ諸種皮膚病ノ結果トシテ來タルハ乾皮症、癩皮症ニ於ケルガ如キモ今爰ニ述ブルハ特發性皮膚萎縮 *idiopathische Hautrophie* ノミナリ而シテ之ヲ限局性ト瀰蔓性トニ別ツ

限局性皮膚萎縮トハ蒼白ニシテ周圍ノ皮膚ヨリ低凹セル小斑或ハ索條ヲ云フ而シテ五厘貨大乃至五十錢貨大ヨリ數センチ米突ノ長サヲ有スル者ハ線狀或ハ斑狀皮膚萎縮症 *Maculae et striae atrophicae* ト云

線狀(斑狀)皮膚萎縮

限局性皮膚萎縮

特發性皮膚萎縮

神經性萎縮症

老人皮膚萎縮症

フ頸部四肢ニ多ク下肢殊ニ大小轉子等ニ生ジ婦人ニ多クシユルツ氏ハ婦人ノ大腿ニ發生スル者ニ其縱軸ニ沿ヒ其幅廣クシテ男子ハ横行 *querlauf* ノ者多シト云ヘリ又本症ハ恰モ妊娠白線 *Striae gravidarum* ノ腹部ニ發生スル狀態ニ比スベシト云ヘリ「ワイルソン」ハ之ヲ偽性癩痕 *falsche Narbe* ト稱セリ又神經性萎縮症 *A. neurotica* ナル者普通神經徑路ニ相當シテ營養障害ノ原因ヨリシ又帶狀皰行疹及ビ神經創傷後等ニ來タルコトアリ又瀰蔓性ニ移行スル處ノ症トシテ老人皮膚萎縮症 *A. Senilis* ナル者アリ
 老人皮膚萎縮症ハ老年ニ至リ皮膚弛緩シ皺ヲ生ジ菲薄トナリ褐色ヲ呈シ乾燥シテ落屑 *Pityriasis* ヲ起コス者ナリ是レ畢竟一ハ液分ノ減弱ト一ハ皮膚ノ變症性狀ニ因ル者ニシテ病的ノ意味ヲ附セントスルハ皮膚癢痒症ヲ伴フキノミナリ
(二)瀰蔓性皮膚萎縮症 ハ先天性ナルアリ或ハ後天性ニ發生スルコトアリ

單純乾皮症

(イ) 先天性ハカボジー氏ノ記載セル單純乾皮症、*Xeroderma simplex* ニシテ皮膚ハ恰モ雁皮紙ノ如ク足蹠ヨリ上腿ノ中央部ニ至ルマデ萎縮シ稀ニハ手掌ヨリ上膊ノ侵カサル、*T*アリ皮膚緊張稍短シテ之ヲ捫ミ得ズ色素減少シ表皮菲薄トナル者ナリ而シテ此狀態ハ敢テ進行セズ其儘ニ停止ス

(ロ) 後天性ノ者ハ稀有ニシテ四肢末梢ヨリ軀幹ニ進行シ管ニ表皮ノミナラズ眞皮殊ニ脂肪組織モ亦侵カサル、*T*以テ皮膚ハ甚シク皺ヲ生ズ

治療法

唯姑息療法 *Palliativ* ニシテ無刺戟性 *indifferent* 軟膏ヲ充分ニ塗布シ常ニ按摩ヲ行フベシ他ニ良法ナシ

毛髮萎縮症 *Atrophie der Haare*

先天ト後天ノ別アリ而シテ先天性ニ全身性ト局所性トアリ

(ア) 先天全身性毛髮萎縮ハ殊ニ稀有ニシテ一家中多數ノ者本症ニ襲ハ

ル、*T*アリ而シテ齒ノ缺損並ビニ爪ノ畸形 *Misbildung* ヲ伴フ者ナリ

(イ) 先天局所性毛髮萎縮ハ病症進退セズ毛髮發生ナキ代リニ唯表皮鱗屑ノ産出甚シク塊ヲ爲シテ集積ス

後天性ノ者左ノ如シ是ニ禿髮 *Alopecia* ノ名稱ヲ附ス

他皮膚病ノ結果トシテ起ル禿髮ハ寄生性皮膚症ナル密生性匂行疹白癬黃癬毛瘡等ニ來タリ又紅斑性狼瘡紅色苔癬乾癬「エクチエーマ」尋常性狼瘡丹毒及ビ凡テノ癩痕形成ヲ爲ス疾患ニ伴發スル T アリ此ニ屬スル者ニテ糠枇様禿髮 *A. pityrioides* アリ是レ頭部脂漏病ノ結果ニシテカボジー氏等ノ研究ニ因レバ眉毛及ビ鬚ニ來タルノミト云ヘリ「ミツヘルソン」ハ全身性ヲ實驗セルノ報告アリ診斷ハ毛髮脱落ト共ニ多量ノ落屑アルヲ以テ明瞭ナリ

(イ) 老人禿髮症 *A. senilis* ハ高年ニ及ムデ生理的ニ頭髮ノ脱落スルヲ云フ初メ顛頂ヨリ前時ニ蔓延シ側部ハ最モ遅ク侵カサル全ク脱落スル前驅トシテ屢々産毛ノ發生スル期アリ皮膚ハ初期ニハ普通ナ

老人禿髮症

壯年禿髮症

レ後チ菲薄トナリ萎縮シ光澤ヲ呈シ緊張ス
(ロ) 壯年禿髮症、*A. praecox* 或ハ *praecox* 壯年ノ者ニ來タル禿髮ニシテ已ニ三十歳或ハ尙以前ニ脫毛スル者アリ時トノ禿皮上ニ多量ノ脂肪及ビ汗分泌ヲ見ルコトアリ此原因ハ遺傳及ビ頭部脂漏アリト見做スベシ

結節裂毛症 *Trichorrhexis nodosa*

此症ハカボジ一氏ノ命名セル者ニシテ毛髮ノ表鞘部ニ於テ毛幹ニ肥硬ヲ來タシ一見虱卵ニ似タル灰白色ノ結節ニシテ一毛ニ數個ノ結節ヲ見ルコトアリ之ヲ蟲眼鏡等ニテ熟視セバ實ニ此ノ結節ハ毛髮ノ分裂ナルヲ以テ一見恰モ散布筆ヲ相對シテ互ニ挿入セルノ觀アリ故ニ若シ其部ニ於テ斷折セバ跡ニ刷毛狀ノ末端ヲ殘コス好ムデ來タル部位ハ鬚髯ナリ
拔毛シテ精査セバ診斷容易ナリ殊ニルーペ(蟲眼鏡)ヲ以テセバ其分裂セル毛ノ纖維ヲ確認シ得ベシ

治療法

夜間充分ニ塗脂セバ足レリ必ズ石鹼ヲ以テ洗滌スベカラズ或ハ左方

ヲ處スベシ

蓖麻子油

一〇〇〇

酒精

五〇〇〇

薔薇油

一二滴

紡錘狀毛髮症 *Pili monileformis, Spindelhaare*

本症ハ根部ヨリ末端ニ至ルノ間膨隆セル處ト狹窄セル部ト交互錯雜シテ恰モ珊瑚樹幹ノ如キ外觀ヲ呈ス其膨隆セルハ空氣ノ侵入セルモノニシテ狹窄セル所ハ毛髓及ビ毛鞘ノ缺乏ニ基ヅクモノナリ本症ハ先天性ナルアリ後天性ノコトアリ之レ毛根ノ異常ニ因スル者ナリ

鑑別 結節裂毛症ハ一部分膨隆セル箇所アルモ本症ノ如ク連珠様ナルコトナシ又蟲眼鏡ニテ檢スレバ名ノ如ク膨隆ノ箇所ハ裂毛ニ因スルコトヲ知ルベシ

皮膚色素ノ萎縮症 Atrophie des Hautpigmentes

皮膚ノ色素萎縮ハ皮膚ニ白色ノ外觀ヲ呈ス即チ *Leukopathie* ト云フ先天性ナルヲ白皮症 *Albinismus* ト云ヒ後天性ナルヲ白斑 *Vitigo* ト云フ白皮症ニ全身性ト限局性 *Partiell* トアリ

全身性白皮症

(1) 全身性白皮症 *Albinismus universalis* ハ皮膚ハ勿論光彩膜脈絡膜網膜皆白色トナリ眼ハ赤色ニ透見シ羞明 *Lichtscheu* アリ往々眼球震盪症 *Nystagmus* アリ頭髮モ亦白色ニシテ著シク細少トナリ絹糸様光澤アリ

限局性白皮症

(2) 限局性白皮症 *Albinismus partialis* ハ限局セル白皮症ニシテ時トシテ神經経路ニ從フコアリ此局所ニ發生スル毛髮ハ色素ナシ然レ此白毛ハ先天性ニ色素健存ノ普通ノ皮膚ニ發生スルコアリ之ハ限局性白毛症 *Pilositas circumscripta* ト云フ

限局性白毛症

カボジ―氏ハ本病状態ヲ色素性母斑 *Pigmentmal* ノ裏面ナリト説明セルハ最モ適當ナリ

白斑 *Vitigo*

白斑ハ十歳ヨリ三十歳ノ間ニ生ズル者ニシテ往々對等性ニ來タル白斑ノ周圍ニハ色素常ニ増加ス故ニ症狀甚シク白斑蔓延セルルハ其白斑ハ寧ろ疾患部ニアラズシテ健康皮膚部ハ却テ色素異常増殖ト誤診サルコアリ毛髮モ亦白色トナルコアリ其他皮膚ニハ何等ノ異常ヲ認メズ

對症的白斑

其他癩病性白斑梅毒性白斑 *Leukoderma syphiliticum* 等ノ對症的白斑 *Symp-tomatiche Pigmentatrophie* アリ

梅毒性白斑

梅毒性白斑ハ多ク頂部及ビ背部ニ來タリ形狀多クハ圓形ニシテ斑紋ノ状態ハ斑馬ニ酷似セリ而シテ丘疹吸收後ニ發生スル者ヲ多シトス土肥教授ハ海水浴後ニ白斑ヲ生ゼル者數多ヲ實驗セラレ恐ラク一種ノ太陽光線ノ作用ニ因ルナラント説示セラル

治療法

奏効確實ナル者殆トナシ然レ最モ効アルベキ者トシテ我皮膚科教室ニ於テハ左方ヲ處ス

イヒチオール 三〇〇
 焦性沒食子酸 一・五—二・〇
 酒精 三〇〇〇

右一日一—二回塗布料

著者曰本症ハ美貌上ノ關係ヨリ患者ノ大ニ煩悶スルモノアリテ醫師モ亦其治療法ニ就キ苦心シテ妙効ナキモノナリ余ハ近時或婦人ノ前額髮際部ニ二錢貨大ノ本症アル者ニ向テ左方ヲ處シ比較的其著色ノ持續シテ美貌上ノ缺損ヲ補ヒ得タリ其處方左ノ如シ

イヒチオール 三〇〇
 酒精 三〇〇〇
 硝酸銀 〇・三
 過格兒爾鐵 〇・二
 グリセリン 一〇〇〇

右一日一回塗布トス(個人ノ色素ノ厚薄ニ從ヒ過格兒爾鐵ノ量ヲ變化ス此量ニテハ寧ロ淺黒キ婦人ニ適スベシ)

毛髮色素ノ萎縮症 Atrophie des Haarpigments

白髮 Canities

白髮トハ高年ニ至ツテ生理的ニ來タル症候ニシテ病的ニテハ重症後或ハ精神感動癩癩患者等ニ突然 *Polich* 發生スルコトアリ時ニハ再ビ以前ノ如キ色澤ヲ回復スル者アリ局所性白皮症 *Poliosis* トシテ先天性ニ來タリ又後天性ニ白斑部ニ發生スルコトアリ白髮ノ生ズル所ノ皮膚ハ必シモ白斑ナラズ時トノ或神經領域ノミニ限り白髮ヲ生ズルコトアリ而シテ神經痛 *Neuralgie* [「ヒステリー」] *Hysterie* ノキ發生スルコトアリ毛髮色變 *Farbwechsel der Haare* ヲ往々目撃スルコトアリ赭髮トナルハ亞爾加里及ビ石鹼ヲ多量ニ使用スル者或ハ脱脂ヲ屢々行ヒタル者或又精神感動後ニハ往々變色ヲ來タスコトアリ

治療法

バシキス氏ノ方法ハ初メ石鹼水ニテ清洗シ次ニ温水ヲ以テ洗滌シ乾燥シタル後沒食子酸一〇蒸溜水五〇〇ノ者ヲ齒磨楊子ニテ毛根ヨリ末端ニ向ヒ好ク塗擦スベシ其乾燥ヲ待チテ同様ニ硝酸銀二〇蒸溜水一六〇アムモニアノ二三滴ヲ加ヘタル者ヲ塗擦ス而シモニ斑點ヲ生ゼバ沃度加里一〇〇蒸溜水二〇〇ヲ以テ此ヲ除去スベシ三四週間此法ヲ反覆施行スルヲ宜ロシトス又複雑ヲ避ケントセバ時トシテ一〇—二〇%硝酸銀水ヲ八日乃至十四日間塗布スベシ
 ベルナチク氏ノ方法ハ次硝酸蒼鉛或ハ次鹽酸蒼鉛ト亞爾加里或ハ硫黃劑トヲ併用セバ褐色或ハ暗褐色ヲ呈スト云フ

爪ノ萎縮症 Atrophie der Nagel

爪ノ萎縮症ハ先天性ニ來タルヲアリ後天性ナルヲアリ外傷化學的作
 用爪床炎内科病腺病肺結核梅毒神經異常其他諸種ノ皮膚病ニ因テ萎縮ヲ來タスヲアリ爪ハ裂痕ヲ生シ裂溝ヲ作り色澤ヲ失ヒ脆弱トナリ

爪白斑

缺損シ易ク途ニハ脱落ス疾患當初ニハ綳帶或ハ絆創膏 *Hefplastik* ニテ固定スベシ爪白斑 *Leukopatia unguium* ハ爪ノ實質ニ發生スル斑點或ハ斑線ニシテ爪ノ發育スルニ從ヒ爪端ニ轉位漸進シテ消失ス其原因ハ爪母 *Matrix* ニ存スルナリモリソン氏ハ毛ニ於ケルト同理ニシテ之レ空氣侵入ノ爲メニ白斑ヲ生ズル者ナリト説ケリ

紅斑性狼瘡 Lupus erythematosus

先天性脂漏症 *Schoria congenita* ト云ヒフオルクマン氏ハ脂漏性狼瘡 *Lupus seborrhoeicus* ト云ヒウンナ氏ハ遠心性固定紅斑 *Urythema centrifugum* ト云ヒリカボシ
 一氏ニ從ヒ臨床的ニ二種ヲ區別ス一ヲ圓板狀紅斑性狼瘡 *L. c. discoides*
 一ヲ播種狀紅斑性狼瘡 *L. c. disseminatus od aggregatus* ト云フ

本症ハ初メ限局セル紅斑及ビ血管擴張ト共ニ多クハ皮脂線ノ分泌ヲ伴ヒ終ニ皮膚ニ癩痕様萎縮ヲ來タス者ナリ
 (1) 圓板狀紅斑性狼瘡ハ普通ニ見ル所ノ者ニシテ初メ赤色ニシテ多ク

ハ稍隆起セル小發疹ナリ而シテ其發赤ハ周圍ニ蔓延シツ、中心部ハ蒼白トナリ萎縮シテ陷凹シ脂漏性ノ苦ヲ被ムル此痂皮ハ固着スル者ニシテ此ヲ剝離セバ其痂皮下面ニ釘ノ如キ突起アリテ是レ往々開大セル毛囊ニ突入スルヲアルヲ認ムベシ病症進行セル者ハ症竈廣クシテ稍隆起シ赤色ニシテ指壓ニ因テ蒼白トナル所ノ邊縁ヲ有シ萎縮性ノ白色癩痕狀ノ中心ヲ有ス而シテ脂漏性若ハ皮脂腺ノナキ所ニ見ザルハ勿論ナリ故ニ此ノ如キ部位例之バ手掌ニ發生セルキハ皮膚乾燥シ角質狀紅斑性狼瘡 *L. e. cornus* ト云ヒ或ハ炎衝性ニ浮腫ス病竈廣大トナルハ一ニ周圍ニ廣ガルト一ハ隣接病竈ノ互ニ融合スルトニ因ル經過ハ頗ル長クシテ十五年乃至二十年ニ亘ル者アリ其邊縁ノ赤色薄クナルハ病症ノ停止 *Siltsand* ヲ示スモノナリ疼痛、癢、全身症狀等ナシ多ク侵カサル、者ハ貧血性ノ二十歳乃至四十歳ノ婦人ナリ

部位

殊ニ鼻、頰部、耳輪、有毛頭部ニシテ病症ハ初メ鼻ヨリ起リ兩頰ヲ襲ヒテ

角質狀紅斑性狼瘡

其形狀恰モ蝶 *Schmetterlingsform* ノ如シ鼻、眼、眼、耳、頭皮、指、趾トシ軀幹ニ發生スルハ實ニ稀有トス

(2) 播種狀紅斑性狼瘡ハ唯稀レニ見ルノミニシテ急性或ハ亞急性 *Sub-acute* ニ來タリ初メノ症狀ハ全ク圓板狀紅斑性狼瘡ニ異ナルヲナク全身ニ發生シ其數唯夥多ナルノミ時トシテ發疹ノ際高熱アリ關節痛アリ頭痛殊ニ劇甚ナリ而シテ病竈ハ圓板狀ノ如ク周圍ニ増大スルヲナシ又顔面ニ持長瀰蔓性發赤ヲ來タシ丹毒様ノヲアリ重症ハ漿液性或ハ出血性水疱ヲ發疹ノ際ニ來タスヲアリ此ノ如クシテ普通ハ此發疹再發シ甚シキ全身症狀ヲ起シテ死亡スルモノナリ

發疹ノ中心ハ白色癩痕様ノ外觀ヲ呈シ固着セル脂漏性被苔アリ赤色ニシテ稍隆起セル邊縁アルヲ以テ診斷ス

バステル氏ハ本病ヲ二様形トセリ毛囊性 *Typhus follicularis* ト血管性 *Typhus vascularis* トシ毛囊形トハ表皮増殖症狀主ニシテ第二形ハ炎症々狀ヲ專ラナルモノトセリ

類症鑑別

第一、尋常性狼瘡 *Lupus vulgaris* ハ狼瘡固有ノ結節アリテ此ガ破潰 *Zerfall* シ又潰瘍ヲ形成ス幼年ニ多ク且ツ脂漏ナシ

第二、酒渣鼻ハ血管擴張シ瘰癧膿疱 *Acne pustul* アリ癩痕小ニシテ蔓延ハ瀰蔓性ナリ

第三、慢性「エ、ク、チ、エ、ー、マ」ハ濕潤アリ丘疹水疱アリ結痂アリ瀰蔓性蔓延ト癩痕ヲ形成セズシテ治癒ス

第四、無毛部白癬寄生性匂行疹ハ經過速ニシテ剝落シ易キ鱗屑アリ癩痕ヲ結バズ且ツ甚シキ瘙痒アリ

第五、尋常性乾癬ハ銀白色鱗屑アリ此ヲ剝離セバ出血ス癩痕ヲ作ラズ

頭部ニ來タリシハモ頭髮脫落ナシ伸展側ヲ侵カスヲ特兆トス

第六、梅毒疹ハ浸潤アリ銅色ニシテ指壓ヲ加フルモ褪色セズ發疹多形ニシテ經過迅速ナリ

治療法

貧血ナル者ハ之ヲ治シ内科病ノ有無ヲ注意スベシ

局所ニハ刺激性藥劑ヲ用ユルハ注意スベシ時ニハ却テ病症ヲ増悪セシムルヲアレバナリ脂漏性ノ痂皮ハ石鹼或ハ加里石鹼精ニテ洗滌スベシ乳酸ハ好成績ヲ示スヲアリ

乳酸

各五〇〇

蒸餾水

右塗布

「イヒチオール」
「ル」漆類

「イヒチオール」一〇—二〇%軟膏或ハ溶液又ハ「フィルムニス」假漆ヲ用ユ

イヒチオール

四〇〇〇

澱粉

四〇〇〇

可溶性アルブミン

一—一・五

蒸餾水

一〇〇〇〇

右「イヒチオール」漆劑ト云フ澱粉ヲ水ニテ能ク攪拌シタル後是ヲ以テ「イヒチオール」調和精擦シ僅カニ温メツ、用意セル蛋

白溶液ヲ加フベシ
而シテ此等藥劑ヲ用ユルニ當テハ邊緣ヲ亂切シ置クヲ可トス又沃度
グリン或ハ水銀硬膏ヲ宜シトス

沃度末

沃度加里

グリセリン

各五〇

一〇〇

最モ強キハ一〇%沒食子酸軟膏トス熔白金ヲ用ヒ燒灼シ後沃度ホル
ム末ヲ撒布スルモ可ナリ又電氣燒灼或ハ二十倍昇汞コロヂエームヲ
層重塗布シ或ハ剝離膏ヲ試ムルモ可ナラン

著者曰沃度丁幾塗布ニテ全治セルコトハ東京大學皮膚科井上學
士ノ報告及ビ余ノ該患者ニ就テ實驗セル所ナリ

鞏皮症 Sclerodermie

カボジ一氏ハ期ヲ分ツテ隆起期 *Sodium cleatum* ト萎縮期 *St. atrophicum*

トセリ局所障害或ハ全身症狀ナク「ブリキ」様ニ硬固ナル斑點或ハ線ト
シテ皮膚面ヨリ隆起シ或ハ又陷凹シ光澤アリ其色紅色或ハ褐赤色又
赤銅色或ハ綠色ノ光輝ヲ有シ而シテ蓋微色ノ邊暈アリテ之ヲ圍ム時
トシテ限局セル部位ヲ侵カシ時トシテ病竈融合シ又蔓延シテ全身性
トナルコトアリ時ヲ經レバ皮膚緊張シ裂痕皸裂及ビ色素沈着ヲ生ズ指
ハ屈曲シ鞏皮指 *Sclerodactylie* トナリ顔面皮膚ハ剛強トナリ移動セズ恰
モ化石セルガ如キ觀ヲ呈ス末期ニ至レバ觸神 *Tastempfindung* 及ビ汗分
泌ハ減弱シ皮膚温モ亦下降ス而シテ疼痛ハ皆無ナリ經過ハ種々ニシテ
病症増進セザル者ハ治愈ニ赴クコトアリ或ハ皮膚ハ漸々萎縮シテ菲薄
トナリ癩痕トナル全身性ノ者ハ遂ニ衰弱ノ爲メ死ニ陥ルモノトス
部位 好ムデ上半身ヲ侵カシ其他ノ部位ハ一定スル所ナシ粘膜モ亦
鞏皮症ニ陥キルコトアリ
皮膚ハ硬剛 *Starr* ニシテ且ツ厥冷ナリ末期ニ至レバ萎縮ヲ來シ又特有
光澤アルヲ以テ診斷シ得ベシ

類症鑑別

第一、色素性乾皮症ハ初ヨリ萎縮ナク且ツ常ニ増進ス初メ雀斑ノ如クシテ發病スル者多シ
 第二、癩病ハ結節アリ斑紋アリ其部位ニ知覺異常アリ
 第三、粘液浮腫 Myxoedem ハ瀰蔓性肥硬ノ皮膚ニシテ硬固ノ浸潤ナシ
 第四、蟹足腫ハ瀰蔓性ナラズ且ツ硬固ナラズ疼痛アリ殊ニ軀幹ニ發生ス

治療法

温浴蒸氣浴 Dampfbäder 按摩或ハ油劑脂劑ノ塗擦ヲ最モ可トシ又鹽湯海水浴鐵浴 Sals-Ser-Eisenbäder モ効アリ内服トシテハ亞砒酸或ハ水楊酸曹達ヲ試ミ其他強壯劑ヲ與フベシ

小兒鞏皮症 Sclerema neonatorum

本症ハ上記鞏皮症トハ全然區別スベキモノニシテ誕生即日或ハ稀レ

ニ生後一ヶ月内ニ體温下降ヲ以テ足及ビ下腿ニ硬固ナル水腫様肥硬ヲ來タシ數日間ニ全身ニ蔓延スルモノナリ初メ浮腫起リ次デ皮膚緊張シ光澤ヲ呈シ白色或ハ赤色或ハ汚穢褐色ニシテ強剛トナリ此ニ觸ルレバ冷タシ此浮腫ハ消退スルモ皮膚ハ硬固トナリ皴皸ヲ生ズ顔面皮膚ハ老人ノ如キ外觀ヲ呈シテ且ツ移動セズ又哺乳スルコト能ハズ遂ニ惡疫質ニ陷イリ死亡スル者ナリ多クハ貧民ノ初生兒ヲ侵カスゾルトマン氏ハ血液及ビ水分ノ損失ノ爲メニ血液ハ濃厚トナリ凝固 *Blutverdickung* スル故ナリト説明セリ

治療法

滋養物酒精類襪袍ニ纏絡シ或ハ按摩 *Frottieren* 等ヲ施コスベシ

第六章 神經性皮膚症 Neuritische Dermatosen

匍行疹 Herpes

匍行疹 *Herpes* トハ急性ニ發生スル小結節ニシテ忽チ小水疱ニ變ジ且

ツ集簇性或ハ環狀ニ配列シ暫時ニシテ分泌物ハ乾燥シ結痂ヲ以テ治癒ニ赴クモノヲ云フ尙旬行疹ハ普通多クハ神經ノ經路ニ沿ヒ發生スルモノトス

帶狀旬行疹 Herpes zoster

帶狀旬行疹ハ多ク發赤セル皮膚ノ表面ニ上記ノ旬行疹集簇發生シ神經經路ニ沿フ時トシテハ發熱ノ前驅 Prodrom 症アリ殆ド常ニ神經痛ヲ前發ス而シテ發疹後疼痛ハ緩解スルヲ常トス其部位ニハ知覺過敏或ハ又痛覺鈍麻ノ存スルコトアリ自覺症ハ灼熱或ハ瘙癢ナリ水疱ノ乾固スルハ混濁シテヨリ普通四日乃至八日間トス遞次發疹スルコト屢々ナレモ固有ノ再發ハ稀有ナリ表皮剝離シ Erosion 潰瘍 Geschwür トナルハ之レ刺戟性膏藥或ハ衣服ノ摩擦等ニ因ル者ナリ例外 Anstaltine トシテハ水疱ノ内容出血性ノコトアリ出血性帶狀旬行疹 H. s. haemorrhagica ト云フ局部神經ニハ一時性ノ麻痺 Lähmung ヲ來タシ其他營養障害ニ因ス

出血性帶狀旬行疹

壞疽性帶狀旬行疹

水疱性帶狀旬行疹

顔面帶狀旬行疹
眼珠帶狀旬行疹

後頭頸部帶狀旬行疹

ル諸症ヲ發スルコトアリ最モ稀有ナルハ壞疽ヲ來タスコトナリ壞疽性帶狀旬行疹 H. s. gangraenosis ト云フ又大ナル水疱ヲ形成スルヲ水疱性帶狀旬行疹 H. s. bullosum ト云フ本症ノ發生ハ普通ハ一側ヲ多シトス春秋ノ二季ニ發病スル多シ其部位ニ從ヒ左ノ名稱ヲ附ス
(イ) 顔面帶狀旬行疹 H. s. Facialis ハ三叉神經領域ニ來タリ殊ニ必要ナルハ眼珠帶狀旬行疹 H. s. ophthalmicus ニシテ角膜潰瘍眼珠炎腦膜炎等ヲ起スコトアリ
(ロ) 後頭頸部帶狀旬行疹 H. s. occipito-celli (ハ) 頸鎖骨下帶狀旬行疹 H. s. cervico-subclavicularis (ニ) 頸膊帶狀旬行疹 H. s. cervicobrachialis ト云ヒ (ホ) 胸部帶狀旬行疹 H. s. pectoralis ト云フガ如ク其部位ニ因テ名アリ此胸部ノ發疹ハ最モ多ク肋骨 Rippen ニ平行シ脊椎ヨリ胸骨中央線 Medianlinie ニ至ル者ナル稀ニハ此境界ヲ越ヘテ一ニノ水疱發生スルコトアリ是レ一二ノ神經小枝ノ他側ニ侵入セル者ニ隨半スルガ爲ナリ
神經痛及ビ集簇性水疱ノ蔓延狀態ニ因テ明カナリ

治療法

神經アレバ規尼涅〇・五―二・〇ヲ一回頓服セシメ「アンチピリン」二・〇ヲ一回量トシ其他「フェナチエチン」二・〇―一回量「アンチフェブリン」〇・三―〇・五一回量トシテ與ヘ又亞砒酸内服等トス

局所ニハ綳帶ヲ施コシ散布藥ヲ與ヘ「クロ、ホルム」ヲ塗り又二〇％薄荷油〇・五―二・〇％「コカイン」軟膏五―一〇％格魯刺兒軟膏又簡便ナルハ五％硼酸軟膏又ハ巻法等トス

著者ハ三十七八年戰役中ニ於テ左下腿ニ水疱性兼出血性匍行疹ヲ實驗シ皮膚科雜誌ニ於テ報告セリ

口唇匍行疹 Herpes labialis

本症ハ帽針頭大ノ小水疱ノ集簇ニシテ口唇部ノ粘膜ト外皮ノ移行部ニ發生ス時トシテ頰部鼻頰部ノ侵サル、トアリ本症ニハ神經症狀少ナク唯發疹當時ニ牽引様疼痛アリ又他ノ匍行疹ノ如ク一側性ナラズシテ往々他側ヲ侵カス者多シ流行性腦膜炎及ビ肺炎ニ來タルトハ事

實ナリ一―二日ニシテ乾燥ス

治療法

硼酸或ハ「ウキルソ」軟膏ヲ貼附セバ足レリ

陰部匍行疹 Herpes proenitalis

本症モ亦諸他障害ヲ訴ヘズ且前記口唇匍行疹ノ如ク他側ニ越ヘテ侵襲スルト多シ男子ニハ輕度ノ灼熱及搔痒ヲ以テ包皮外面ハ龜頭冠狀溝 *Sulcus coronarius glandis* ニ一個或ハ多數ヲ發生スルトアリ一―二日間ニ水疱乾固ス又健康男子ニ故ナク來タリ或ハ交接 *Coinis* 後ニ發生スルトアリ婦人ニハ大陰唇ニ來タルト最モ多シ又月經ノ結果トシテ來タルトアリ恐ラク神經官能障害 *Functionstörungen* ナラン

治療法

硼酸末或ハ亞鉛華末其他「デルマトール」等ヲ散布シ表皮剝脫ニハ諸種ノ無刺戟性軟膏ヲ貼布セバ容易ニ治癒ス

著者ハ本症ニシテ交接後一年數回反覆再發スル者ヲ實驗セリ

又何等ノ原因或ハ誘因ナクシテ發生スルコトアリ本症ヲ以テ花柳病性ノ疾患トシ杞憂ヲ抱ク患者多ク醫師ニシテモ交接後ノ發生者ニ向テハ往々其診斷ヲ誤マル者アルガ如シ注意スベシ

痒疹 Prurigo-juckflechte

本症ハ最モ古來ヨリ已知ノ疾病ニシテヒボクラテスモ已ニ業ニ之ヲ稱ヘタリ然レモ古ヘハ痒疹症ノ一症候ト見做セシガヘブラ氏ニ至リ痒疹症 Pruritus トハ全ク異ナルコトヲ明ラカニセリ

本症ハ常ニ二三歳ヨリ初マル疾患ニノ劇甚ナル痒疹ヲ伴フレンス豆大ノ皮膚下ニアル小結節ナリ之ヲ痒疹結節 Prurigo-knoten ト云ヒ之ヲ本症ノ特徴トス其他ノ皮膚症候ハ凡テ皆續發症タルニ過ギズ常ニ鼠蹊腺或ハ腋窩腺ノ腫脹アリ痒疹横痃 Prurigo-honnen ト云ヒ大ナルハ爲卵大ニ達シ已ニ視診スルコトヲ得ベク決シテ化膿スルコトナシ本症ハ痒疹甚シキガ故ニ搔爬スルヲ以テ表皮剝脱シエクチエマヲ起シ或ハ皮膚肥硬シ又浸潤アリ皮膚ニ暗褐色ノ色素ヲ沈着セシム此等ノ症狀ハ皆痒

丘疹性痒疹
(尋常性痒疹)
對

疹ノ輕重ニ正比シテ難易アリ搔抓セバ痒疹結節破レテ漿液ヲ泄ラス

部位 特有ナルハ上下肢ノ伸展側或ハ背部ニシテ殊ニ病初ハ下腿ニ發スルヲ常トス肘窩膝窩ハ如何ナル重症ノルモ侵カサレズ從ツテ搔抓状態 *Kratzaffection* 浸潤及ビ色素沈着等ナクシテ滑澤ナリ本症ノ發病當初ハ丘疹性痒疹或ハ蕁麻疹様苔癬 *Urticaria papulosa* od. *Lichen urtica* ニト區別シ能ハザルコトアリ此疾患ハ高年迄持續スルコトアリ然レモ三十歳以上ニ見ルハ頗ル稀レナリ其病症ノ輕重ニ因テ便宜上區別スルモ完全ナルモノニアラズ又時季ニ因テ發作ノ増劇スルモノアリ故ニ又冬夏ノ二季ヲ區別ス又重症 *Prurigo agria* ト輕症 *P. mitis* トヲ別ツ歐洲ニ於テハ冬期ヲ多シトス

註著者ハ大學皮膚病科ニ於テ該患者ヲ調査シ日本ニ於ケル痒疹ハ夏期ニ多キヲ認メタリ著者ト同意見ヲ有スル者多シ

皮膚ヲ指腹ニテ靜カニ按診セバ皮膚下ノ結節ヲ觸知シ得ベシ硬結セル腺腫脹アリ體ノ伸展側ヲ犯カシ膝窩肘窩ニ變化ナク且ツ幼年ニ發

生スルヲ以テ診斷容易ナリ

類症鑑別

第一、慢性「エクチエーマ」ハ所謂痒疹ノ如キ結節ナシ又關節屈側面ヲ好シテ侵カスモノナリ

第二、瘙痒症ハ唯搔抓續發症アルモ瘙痒ノミニシテ痒疹結節ナク部位一定セズ

第三、疥癬ハ蟲道 *Milbengang* アリ脂間、肘窩、腋窩、陰莖、大腿内股等主トシテ屈側面或ハ加壓ノ存スル所ニ發生ス

第四、魚鱗癬ハ伸展側ニ生ズレモ瘙痒ナシ且ツ上肢ノ方先ヅ侵サル

治療法

全身状態ヲ注意シ新鮮ノ空氣轉地療養或ハ海濱ノ居住及ビ消化ヲ順正ニナシ精神ヲ他方ニ轉散セシムル等ヲ可トス
患者小兒ナレバ殊ニ看護シテ搔抓セザラシムベシ續發症狀トシテ膿疱疹様トナリ益々患者ヲ不安ナラシムレバナリ

カボジ軟膏

内服トシテハ「アンチピリン」五・〇單舍利別二五・〇ヲ毎夕一二茶匙持續服用スベシ又麥角〇・二—二・〇或ハ臭劔一—六・〇一日量トシテ與フ亞砒酸丸或ハ又「ピロカルピン」ヲ發汗療法ニ因テ良効ヲ收ムルコトアリ即チ毎日〇・〇〇二—〇・〇二ヲ皮下注射ス我皮膚科ニ於テハ續發症狀甚ダシカラザル者ニハ五—一〇%ノカボジ軟膏或ハウキルキンソン氏軟膏ヲ貼用ス

「カボジ軟膏」

β「ナフトール」

五—一〇〇

滑石

一〇〇

綠石鹼

三〇〇

「ワゼリン」

七〇〇

若シ膿疱狀、エクチエーマ様ヲ呈スルハ無刺戟ノウキルソン或ハ硼酸軟膏又左ノ「ラノリン」膏ノ類ヲ貼附シ此症狀消退後ニ前方ニ處スベシ

水楊酸

二・〇

亞鉛華

五〇・〇

澱粉

五〇・〇

「ラノリン」

一〇〇・〇

更ラニ必要ナルヲ以テ重テ小兒痒疹ヲ詳説セシ

小兒痒疹 Prurigo der Kleinen Kindern

本症ハ殆ト小兒特殊ノ疾患ニシテ往々蕁麻疹ノ前驅タルコアルハ上章記述セルガ如シ全ク其潜伏期タルコアリ大サハ扁平太ニシテ普通健康皮膚ヨリ隆起セル皮下結節ニシテ時トシテハ圓錐形ニ時トシテハ皮膚ヨリ隆起シテ静カニ皮膚ヲ觸診スレバ之ヲ知覺シ得ベシ而シテ此疾患發生スルヤ暫時ニシテ痒疹ノ爲メ搔抓シ其結果結節ハ頗ル硬固ノ性質ヲ帶ビテ容易ニ觸知シ得ルニ至ルナリ又發生部位ハ最も固有ニシテ診斷上ノ價値アルモノナリ即チ顔面ニ來タルコナク四肢

ノ伸展側ヲ侵カシ屈側ニ認ムルコト始トナシ然レモ其續發症タル濕疹ノ如キハ屈側及ビ顔面ニ移行蔓延スルハ勿論ナリ此際ニテモ尙ホ膝關節肘關節ノ侵サレズシテ暗褐色ニ浸潤セル且ツ搔抓シタル皮膚ト明カニ識別スルコトヲ得ベシ軀幹ニハ時トシテ甚シク或ハ又僅少ノ發疹ヲ認ムルコトアリ尙必要症候ハ痒疹、横痃、是ナリ無痛性ニシテ長ク存在セル所ノ腺腫脹ニシテ化膿ヲ來タスコトナシ殊ニ鼠蹊腋窩ノ腺ヲ侵カスコト多シ

上記ノ如キ特有症候モ時ニ其爪痕ト續發濕疹及ビ上皮剝脫等ノ爲ニ診斷シ得ザルコトアリ

本症ハ實ニ間歇性慢性ノ疾患ニシテ症狀全ク消退セザル時ニモ殆ト全治セシヤヲ疑フ程輕快スルコトアリ其外見上ノ症狀ニテ重症、輕症ヲ別ツ常ニ年餘ニ亘リ甚シキハ壯年以上ニテ本症ヲ認ムルコトアリ然レモ全身状態ハ輕症ノ者モ往々甚シク害セラル、コトアリ患兒ノ苦痛トスル處ハ堪ユ可ラザル痒疹ノ爲メ睡眠不安トナルニアリ是レ痒疹ノ