

醫方類聚卷之一百八十七

折傷門二

和劑局方

折傷

大嶽活血丹治男子婦人外傷內損狗咬蟲傷驢撲馬墜手足傷折壹切疼痛腹中瘀血刺脇築心及左癱右緩走疰疼痛癰腫痔漏婦人冷氣入腹血脉不通產後敗血灌注四肢吹妳腫痛血氣撮痛並宜服之



頁
冬
二

亂髮皂角水淨洗二斤煎乾用清麻油二斤入鍋內炒頻以手撚香脆亂如餅
 苔即止不栗契謂栗三類共一毬其中
 可令炒過栗契扁薄者是去殼薄切乾
 大黑豆以濕布揩去塵皂角刺燒通紅米
 焙花桑枝取如臂大者以炭火燒候煙盡
 乾半斤細墨半斤塗墨上候盡用薄紙裹以黃泥固濟
 燉乾以火五七斤煨令通赤放地上益蓋
 出火氣兩飯久一兩塗墨○增註乳香化塗
 墨上車麻仁三兩塗墨和劑別研塗墨乳香
 灸乾和劑別研塗墨乳香化塗
 四兩入米醋一硃砂光淨者貳兩
 梳炙令香熟

右六味為末入乳香膏內和杵三阡下圓

如彈子大如乳香膏少更入醋煮麵糊痛
 甚日每服壹圓輕可者服半圓用無灰酒
 壹盞乳香壹豆大先磨香盡次磨藥盡煎
 三五沸臨臥溫服以痛處就床臥如欲出
 汗以衣被蓋仍用藥塗損處忌壹切動風
 物應婦人諸疾服者用當歸末壹錢依法
 煎服有孕者莫服三因方得
 沒藥降聖丹治打撲閃筋斷骨折攣急疼
 痛不能伸屈及榮衛虛弱外受遊風內傷經

絡筋骨緩縱皮肉刺痛肩背拘急身體倦怠
四肢少力

川烏頭生去皮臍骨碎補熅去毛自然銅火煨醋

研為末水飛過焙白芍藥乳香別當歸

乾○壹本拾二次洗沒藥別研各生乾地黄川芎各一

右並生用為末以生薑自然汁與蜜等分

煉熟和圓每壹兩作四圓每服壹圓搥碎

水酒各半盞入蘇木少許同煎至八分去

蘇木熱服空心食前醫方大成集腋

珍方永類鈐方同

接骨散治從高墜下馬逐傷折筋斷骨碎痛

不可忍接骨續筋止痛活血

鵬砂壹錢常歸去蘆定粉各壹錢

右為末每服二錢角生易簡煎蘇木湯調

服訖後時時喫蘇木湯醫方大成南北經

同餘方驗方袖珍方永類

導滯散治施圓端効方重物壓逆或從高墜

下作熱五內吐血下血出不禁止或瘀血在

內胃腹脹滿喘麤氣短得效方兼能

當歸 大黃 各等分。諸方炒。

右炒為末每二錢溫酒調下不計時候澹

方同端效方日進二服加麝香尤妙衛

補損當歸散療墜馬落車被打傷腕折臂呼

叫不絕服此藥呼吸之間不復大痛服三日

筋骨即當相連神効

澤蘭 炒青 附子 炮去皮臍壹分。當歸 炒

分 蜀椒 炒去汗 甘草 炙 桂心 三分。永

桂 芎藭 炒 分

右為細末每服二錢溫酒調下日三服忌

海藻菘菜生葱猪肉冷水醫方大成集成

珍方承類 鈐方同

大全本草

陳藏器本草云赤銅屑主折傷能鐸人骨及

六畜有損者取細研酒中溫服之直入骨

損處六畜死後取骨視之猶有鐸痕赤銅

為佳熟銅不堪

朝野僉載云定州人崔務墜馬折足醫者令

取銅末和酒服之遂痊平及亡後十餘年
改葬視其脛骨折處有銅束之

泉水主人忽被墜損腸出以冷水噴之令身
噤腸自入也

圖經曰韋宙獨行方主踠折瘀血單用菴藺
壹物煮汁服之亦末服令人亦打撲損亦
多用此法飲散皆通其効最速服食方不
見用者

廣利方治瘀血不散變成癰癘生菴藺萬取

汁壹升服之

以蘇合香散

外臺秘要治折傷內損有瘀血每天陰則痛
兼治產婦諸疾神方三月採益母草壹名
負擔壹名夏枯草洗擇令淨於箔下攤暴
令水乾別用拔斷可長五寸已來勿用刀
卽置鍋中以水二碩以來令草上水深二
三寸煎煮候益母爛水三分減二漉出草
取五六斗汁瀉入盆中漚之半日已來以
篩濾取清汁盆中漚漚盡乘之其清汁於

小釜中慢火煎取壹斗以來如稀餈每取梨許大煖酒和服之曰再服以和羹粥並可如遠行不能稀煎去卽更煉可丸得每服之七日內則疼痛漸瘳七日平復或有產婦惡露不盡及血暈壹二服差其藥治風益心力無忌

宋元嘉中劉愷爲青州射壹驢旣剖五藏以天名精塞之蹶然而起愷怪而拔草使倒如此者三情蜜錄以種之主折傷多愈因

名劉愷卓陳藏器以謂此草旣有鹿活之名雅與驢事相會當便是壹物不疑矣故并於此見之

救急方續斷筋法取旋菑草根淨洗去土擣量瘡大小傅之日壹二易之乃差止

瘡藥主折傷內損血瘀生膚止痛主產後血病治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦擣碎傅傷折處

圖經曰正元廣利方療因傷損血瘀不散者

取牡丹皮八分合蚩虫二十壹枚熬過同
擣篩每日溫酒和散方寸匕服血當化爲
水下

別本注云刀斧折傷能止血痛白藥乾末傅
之

百壹方若被打擊瘀血在腹內久不消時發
動者取桔梗末熟水下刀圭

外臺秘要治墜下瘀血在腹肚取蒲灰二錢
酒服

折傷木土傷折筋骨疼痛散血補血產後血
悶止痛酒水煮濃汁飲之

得始玉木土傷拆跌筋骨生肌破血止痛酒
水煮濃汁飲之

經驗後方治折傷水獺壹箇川罐子內塩泥

固濟放乾燒灰細末以黃米煮粥於傷折

處以水獺壹錢末粥上摻便用帛子裏繫

立止疼痛

葛氏方被壓柞墮舟船車轆馬踏牛觸胃腹

破陷四肢摧折氣悶欲絕以烏雞壹隻合
毛杵壹千二百杵好苦酒壹升相和得所
以新布搗病上取藥塗布以乾易覺寒振
欲吐不可輒去藥須臾復上壹雞少則再
作作

牡鼠療踈折續筋骨擣傅之三日壹易
斗門方治打傷瘡用老鼠壹箇自死臍月者
和腸肚劈剉油半斤煎令焦黑用罐收之
使時以鷄翎惹油傅於瘡上即乾立差

葛氏方治折傷以梅實五斤去核飴五升合
煮稍稍食之漸漸白消

食療云飴糖主打損瘀血熬令焦和酒服之
能下惡血

孫真人治多年損傷不差熬白瓜子末温酒
服之

勝金方治搥撲損肌膚青腫方茄子留花種
三遍黃極大者切作片如壹指厚新瓦上焙
乾爲末欲臥酒調二錢匕壹夜消盡無痕

跡也

三因方

折傷吐血證治

病者因墜閃肭致傷五臟損裂出血停留中
腕臟熱則吐鮮血臟寒則吐瘀血如豆羹汁
此名內傷治之各有方

加味芎藭湯治打撲傷損敗血流入胃腕嘔
吐黑血或如豆羹汁

川芎 當歸 白芍藥 百合 荆芥
水浸半日

穗各等分

右為剉散每服四錢水壹盞酒半盞玉機

水酒同煎七分去滓不以時服得效方醫

成南北經驗方曲珍方同

折傷瘀血證治

病者有所墜墮惡血留內或因大怒肝血并
濕停蓄不散兩脇疼痛脚善癩骨節時腫氣
上不上皆由瘀血在內治之各有方
雞鳴散治從高墜下及木石所壓凡是傷損

血瘀凝積氣絕欲死并久積瘀血煩躁疼痛
叫呼不得並以此藥利去瘀血即愈此藥推
陳致新治折傷神效

大黃一兩 杏仁三七粒
酒蒸 去皮尖

右何細酒壹盃煎至六分盃裂去滓鷄鳴

時服次日

醫方大成 承類鈐方 次日

取下

瘀血即愈

竹易方同 若便覺氣絕不能言取藥

不及急擘口開以熱小便灌之

醫方集成 南北經驗

方袖珍方同 鈐方以熱童便 灌甕加芎歸芍藥酒煎更妙

接骨散治跌撲脚手脛骨脆折

水蛭不拘 多少

右於新瓦上熬令香熟勿令太過為末每

服壹錢熱酒調仍入麝香半錢服折處不

可手觸藥行良久覽痛折處漸痒如蟻嚼

之遂要人捻揉骨折處相接即用杉木夾

縛兩三日去之骨全矣

是齋醫方

治打撲傷損孫盈仲方糯米粥熱攤布帛上

擣芭蕉根放粥上乘熱裏患處經驗良方同雖

時下甚痛即便無事

治打撲傷損骨折此藥專接骨護國長老用

在傳

夜合樹俗謂之萌葛即合歡也去蘆皮取

白皮剉碎炒令黃微黑色肆兩芥菜子炒

壹兩

右為細末酒調醫方大成酒調二錢澄清臨夜服蘆滓

瘡上扎縛之神驗越州人謂之烏顯樹

○大成云又方用葱白砂糖二味桐等爛

研傅之痛立止仍無痕痕醫方集成南北經驗方補珍方

承類鈔方衛生易簡方與大成同

治閃胸著蘇干之蓮幹傳經驗良方治閃胸腰痛不能轉側

米醋糟和平胃散罨患處易簡方同

接骨散治打撲傷損折濠梁靈泉清隱寺僧

傳半兩古文錢不拘多少以鐵線貫之用

鐵匣盛以炭火煨通紅盪盛好酒米醋各

半升鐵鈴開匣取古文錢於酒醋中淬再

煨再淬候甍落盡如酒醋少再添候古文
錢淬盡澄去酒醋以溫水淘洗如此三次
淘洗數多尤妙火毒不盡令人患啞既淨
焙乾研極細入乳香沒藥水蛭得効方等
分同爲細末每服半字或壹字生薑自然
汁先調藥次用溫酒浸平服若不傷折卽
時嘔出若損折則藥徑下纏繳如金絲如
弓上之筋神驗初服忌酒三日劉諒縣尉
傳王丞相在東府時施壹接骨藥云用半

兩錢極有効驗恐卽是此方也

又接骨散方半兩古老錢用火煨醋內淬數
過入沒藥乳香等分壹處研別以麝香少
許每服壹字用淡薑湯調服不拘時候

治壹切墜壓癩撲傷損至重困者無名異小
石塊子外黃中黑在處有之大治縣能山
英州南山皆有取三五塊研細以生葱細
剝入溫酒中調藥服訖溫酒半盞投之傷
在頭去枕臥餘皆就所傷臥吳內翰初得

川方姪女尸限上損腦痛呼試令服之痛立止又嘗膏墜馬壹失脚損腰至重服十餘塊飲酒壹二升其病皆愈後以救人無不效

又方飲小便或灌之或以酒和小便服蜀醫徐懋云屢起死

膏字散治壹切打撲傷損筋傷骨折宗子趙叔恭名公資以善鍾鐵著名其父宰岷縣曰因與族人聚飲超化寺醉亡酒墜懸崖之下

亟視之昏不醒入手臂已折尋歸得此二藥治之遂愈其後運鍾如故叔恭嘗知大寧監云韓希道知府傳

五靈脂別研川烏頭去皮臍生用沒藥別研草烏頭

去皮臍生用地龍各半兩麝香別研

朱砂三分白膠香壹兩後四味

右為細末每服壹字温酒調下元如梧桐

又子大加減自少至多服之亦可若腰以下損食後服腰以下損食前服覺麻為驗未

麻加藥麻甚即減

又鸞膠散方用黃狗頭膏筒去毛以紙筋泥固濟用火燒候煙過取出放冷去泥為末先用糯米糝成軟飯看所患大小攤在紙上厚壹指以狗頭末壹分桂末貳分煨了牡蠣末三分和勻摻在上乘稍熱裏貼了次用杪木版子夾縛如痒不得抓只用手輕輕拍五七日愈能散瘀血甚妙或只用氈髮坐子裏亦可

治打撲損腫痛不止生薑自然汁米醋牛皮

膠同熬溶入馬屁勃末不以多少攪勻如

膏藥以紙花攤傅腫處下機改痛即止以

多傅為妙紹興倅廳二人吏用之得効

治骨折銅末調酒服之

夷堅志云長安石史君神授折傷方得効方

治手足折傷可服可敷半日後痛止手足堅牢立愈經驗良方治打撲傷損筋骨

當歸洗淨焙鈎粉各半鵬砂貳錢

右同研令細濃煎蘇枋汁調服一大匕得効

方壹 大錢 若損在腰以上先食淡麪得効方半淡粥 盃然後服藥在腰以下即先服後食仍頻
 頻呷蘇枋汁別作糯米粥入藥末拌和攤
 紙上或絹上封裏傷處如骨碎則用竹木
 夾定以紙或衣物包之其妙如神內輪之
 子梓為豫州倉官嘗以治壹庾人婁度下
 黑血數升而安

治傷筋動骨打撲傷損明州陸駐泊

生硫黃二兩 官桂二兩 生薑約四兩許 麪壹

右同拌和研碎帶濕罨在損處其熱如火
 外用帛縛定一日壹次換晝夜貼六七日

即愈硫黃桂能發散薑麪能和筋脉活血

治打撲傷損墳姪云三兄在四明嘗因雪中
 擲損蹠手白骨以此傳之即不痛尋遂復舊

胡孫薑不以 生薑半

右同搗爛以罨損處用片帛包乾即易之
 雖不能速效然終有驗也

又法治閃出白骨既拽入之後即以壹色衝

黃土以成蒲生薑不曾摩開者同擣成泥
罨損處甚妙寧彥說

治打撲傷損福州長樂縣壹盜囚被笞捶身
無全膚以情告獄吏求買胡孫薑爛研取
汁以酒煎或調服留滓以傅瘡不數日平
復如故陳世德云○經驗良方治打撲傷
損筋骨右胡孫姜石上生補損樟樹上生
者通氣皆去皮毛切片微炒常用煮酒罨
壹日後飲能補損行氣
福州長樂縣壹

盜囚被笞捶身無全膚告獄吏求買胡孫
姜研爛取汁以酒煎或調服留滓以傅損
處不數日平復
如治風損半用石上半
用樟樹上者

治搥損及抓破等

軟石膏

服令通紅地上出輕粉一錢

有用清麻油調傅止痛不作痕

打撲搥傷損右用石榴葉細研罨損處

瑣碎錄同

又方治血聚皮不破者蘿蔔葉研細罨以絹

帛包縛得效方

治打撲傷損筋斷骨折接骨定疼黑神散華宮使傅續添

黃牛脛骨帶髓者

不以前後脚用炭火燒煙盡為度取出用米醋

浸於地上

真定器

炭火煨紅米醋淬十遍以麩為度

右二味各碾為細末以黃牛脛骨末七分

定器末三分拌令勻如是撲損用好米醋

調麵入藥末打如稠糊敷貼損處上以紙

三重封貼如是骨折於紙上更用竹片封

扎絹帛纏縛不得換動初撲損先以熱

酒調下二錢其妙傷在腰上食前傷在腰

下食後以進二服

又方如聖膏同

良薑 吳茱萸

金毛狗背皮

木鼈子

去殼

白膠香

別敗龜殼

醋蘸

牛膝

當歸

各半

右為細末入麵同藥末酒熬成膏子敷貼

用紙七重封繫定筋骨自然相連七日膏

換酒麵皆不可多用以麵熟為度熬過恐

失藥力

接骨忘拐元定痛如神同

乳香研沒藥研虎脛骨酥炙當歸干川椒

去敗龜殼酒蒸赤芍藥干雀李根取皮川芎

極大自然銅淬全手碎水干去

右各三錢為細末鎔黃蠟約度多少同元

如彈子大每服壹粒用好酒青盞銀石器

內煎以東南柳枝攪散帶熱服大段膏禱

者服壹粒些小閃胸服半粒對其求只

又方同外酒煎藥干川椒去敗龜殼干金

又當歸干赤芍藥干川椒去敗龜殼干金

藤干碎補干川芎生乳香研虎骨慢

炮沒藥自然銅火服通和醋淬三次

出右藥分為細末煉外黃蠟元加彈子大每

打眼壹元筋傷骨折用無灰酒半升入藥以

敲東南柳枝攪勻煎三五沸空心熱服五

散半以上不過十服旬日如舊五十以下不

打過五服減水亦研末醋馬煎功少

真神仙秘方

瑣碎錄 上小盤十張 以白蠟 凡不

端午日午時用菹葉和存灰擣成餅曬乾能

治癩損刀傷瘡口并蜂蠆蜈蚣之毒藥以

凡癩撲或打傷昏悶生蜜二錢酒半盞童子

小便壹盞調灌大小便通即醒

癩撲有傷口嚼燈心卷之血即止

又方用生紫蘇剉爛盒之瘡口自合 事林廣記同

又方用松節煎酒喫 事林廣記同

又方以魚膠燒灰存性用壹錢末酒調下空

心服之如無魚膠牛膠亦可

又以冬青葉晒乾為末糝傷處血自止或細

嚼罨之 凡百瘡

又方傷損急以薑汁和酒等分拌生麵貼之

打撲傷損以陳槐花不拘多少入血竭同為

末末乾糝即血止 事林廣記同 亦能止痛無血竭

亦得 亦得

打撲傷損用苧麻根研細米醋馬屁勃生麵

同研罨傷處

治傷損瘡以頭髮燒為末入輕粉油調傅

又寒食日水浸糯米逐日換水至小滿漉出

吐噉乾炒黃碾末水調療折撲傷及諸瘡腫

又運化玄 樞同

又端午日取百草頭壹斤薤五斤或韭尤佳

水洗淨石臼中舂極細拌礬石灰圓之為

刀瘡藥

折傷止痛芡蓼子炒搗末每服二錢熱酒調

下立愈

打撲傷損以桑白皮搗汁搽之立愈

搨撲或刃傷多搥白梅禽瘡山兔破傷風

閃挫傷方用樟樹枝葉濃煎湯先薰後洗

直指方

桂枝酒治打撲傷墜瘀血溷悶身體疼痛

未粹桂

右為末每二錢溫酒調下或用粹桂壹分

大黃當歸各半分每三錢生姜紫蘇煎服

取下黑物即安或未有藥倉卒且服米醋
壹小盞亦散瘀血

朱砂圓治打撲驚忤血入心竅不能語言

朱砂為細末

右以雄猪心生血和圓麻子大日乾每服

七圓石苜蒲煎湯下棗湯亦可

跌破出血方烏賊魚骨細末傅亦治湯火傷

爛

管見大全良方

小兒擗撲傷折狗咬金瘡證治

男子婦人內傷外損狗咬蟲傷驢撲墜馬手

足傷折壹切疼痛腹中瘀血刺脇築心者宜

服太嶽活血丹

居家必用

金絲膏治閃肭并寒濕疼痛壹切腫毒並宜

敷貼

紅芷一様木鱉仁一様革麻子拾介竹茹

柳條一様虎口退節一節乳香別沒藥

別研白膠香六兩揀明淨者桐油夏一兩
兩半冬陳暗者不可用二兩
二兩

右件前藥入桐油煎黃色撈去藥絲子重
金濾淨下白膠香盡煎勻下乳香沒藥攪勻
用新井花小青盆將藥傾於水中拔千余
遍如銀絲為度柳條正法比左手第壹指
稍不用過節只虎口長是也草麻不必去
殼木鱉亦然每个作兩三塊
必用全書

諸傷折方

鬼代丹治打著不痛

無名異研自然銅醋淬沒藥研乳香研地

龍去木鼈子去殼各等分

右為細末煉蜜為丸如彈子大溫酒下壹

丸打不痛宜明論必用之書經驗

開花仙家接骨藥

無名異兩甜瓜子壹兩乳香沒藥各一二

右為細末每服五錢熱酒調通口服小兒

三錢服藥訖以紙攤黃米粥於上糝左顧
牡蠣末裏傷處竹篾夾之必用之書同

朱氏集驗方

續骨膏治打撲傷損骨折

黃栢 半夏 桂枝

右為末生薑自然汁調塗腫痛處其功全
在生薑如藥乾頻上薑汁為佳

當歸散治打撲傷損

當歸 沒藥各一兩 芍藥 木香 川白芷

川烏各半兩 川芎 生地黃各三錢 爵金貳錢

右為末空心酒調每服二錢如未愈加川

牛膝紅花蘇木各半兩調服

神仙接骨丹

黃丹飛過 蜜陀僧飛過 自然銅各肆兩 辰砂 血

竭 乳香 沒藥各一兩 黃蠟 白礬飛過 臍

月猪脂各拾三兩

存件新銅子先下脂鎔濾去筋膜次下蠟
成油去鍋於冷處次下蜜陀僧黃丹自然

銅末更慢火煎滴水中不散爲度便出鍋於冷處下諸藥用柳木篦子攪勻入瓷器中不住手攪至凝丸如彈子大候極冷收入通油新瓷合內永不敗壞若壹切折傷不問內外輕重雖已無氣但心頭尚暖者分壹彈作十五元熱葱酒吞如已絕不能吞卽以熱葱酒磨腫但下喉卽自省人識痛病人痛亦定仍取十丸入少油火炙軟攤在帛上貼痛傷處如傷損處大用二丸

以上此藥不沾粘肉卽以尋常膠黏膏藥平胃膏治打撲傷損不問皮破與暗傷悉能治之平胃散以冷水調塗則愈入昔有壹士夫與壹同官交甚密書柬往來止以壹小彈子逕傳入宅是日偶失去銀盞遂以其事執之小廳而同官以小廳根之不覺打碎小廳子右手破骨出遇壹道人教以前藥遂愈安城劉克昭傳用之果有效雙鳥散治諸傷百損如被打破傷損久後時

時疼痛雖新被傷縱不破皮而內損者尤宜服此

川烏 草烏 略炮 各三錢 當歸 白芍藥 蘇

木 大黃 生乾地黃 紅麴 炒各 麝香

許少 下 變 轉 入 字 是 日 周 夫 之 驗 靈 效 以

右為細末用酒煮壹瓦瓶放冷服如覺麻痺無害但二鳥頭生用有力恐太猛所以用溫火略炮

單方治打損撲金瘡悶絕蒲黃末以熱酒灌

又方淋過灰淨水調塗半寸收醋傾地土擦

泥塗生大黃末酒塗並能見効 得効 方同

又方生地黄以米醋調傅瘡上 土立立

又方用冷水麻油各壹半打和如卵黃用雞

毛拂之 木 醋 二 錢 用 雞 米 油

治損折傷等疾陳充國方

自然銅 醋 木 鱉 油 去 草 烏 川 烏

右件四味為末以醋煮麵糊為膏熱塗損

處時時更易痛盛以火熨之 食 醋 煎 取 餅

黑神散治傷損大吐血或因酒食飽低頭掬
損吐血至多并血妄行口鼻俱出但聲未失
無有不效

百草霜 蚌粉

右等分爲末每服二錢 得効方一二錢 用糯米飲

調下側柏枝研汁尤效速鼻衄搗壹字皮

破灸瘡出血舌上出血並乾糝上立止

黃芪湯治病諸如前

枳實 參拾箇 炒爲末 黃芪 貳兩 甘草 半兩 紅棗 參拾箇 同枳實

末壽爛慢 火焙焦黃

右爲末用米飲調二錢食後服

宣明論

定痛丸治打撲損傷筋骨疼痛如骨損者先

整骨用竹夾定然後用好酒下麻黃參錢然

後服藥大效

蒲菴根 白皮乾 半兩 乳香 一分 川椒 當歸 沒

藥 赤芍藥 川芎 自然銅 已上各 半兩

右爲末鎔臈爲丸如彈子大細嚼酒下壹

丸

神聖餅子治壹切打撲傷損金石刀刃血出不止者神驗此藥上無膿退痂便愈

烏魚骨

一兩五月五日
前先用准備下

青蘗草

一握約一
虎口人手

惟團圓
是也

蒿苳菜

一握

韭菜

一石

石灰

兩

右以五月五日未出本人不語將取叁味同杵爛次後下餘藥味杵得所搏作餅子嚙乾用時旋刮敷之

御藥院方

聖靈丹治壹切打撲傷損及折傷疼痛不可忍者並皆治之

乳香

五錢○神効名
方三錢另研

烏梅

去核五個○名
方細切焙乾為

末 蒿苳子

一大盞炒黃取二兩捌錢○白
名方二兩捌錢炒黃搗為末

米

一捻○玉機微義云秘
藏作粟名方別使細末

右為細衣煉蜜為丸如彈子大每服壹丸

細嚼熱酒下喫壹服時不痛如痛再服

寶鑑拔○名方右再入乳鉢內研數百下

煉蜜為丸如果大細嚼熱湯下病在上食

後在下食前

乳香消毒散治壹切傷折蹉跌炊腫疼痛不可忍者

乳香研別沒藥研別白欽研別白芍藥各一兩當歸一兩

白芥子各半兩黃栢別研三兩滑石二兩黃丹三錢

加血竭半兩

右為細末入別研者膏處再令研勻每用

新水調如稠膏攤在紙花子上貼患處

虎杖散治折傷血瘀不散

虎杖剉二兩赤芍藥剉一兩

右二味擣羅為細末每服三錢匕溫酒調

下不拘時候

沒藥乳香散治打撲傷損疼痛不可忍

白朮剉五兩當歸切焙甘草剉炒白芷沒藥

別研各二兩○醫桂去粗皮乳香別研各一兩

右件擣羅為細末入研藥再研令勻每服

二錢溫酒壹盞調下不拘時候醫方集成南北經驗

方袖珍力永類白進二三服

蒲黃散治因墜墮內損血結不行

蒲黃當歸赤芍藥桂去粗皮各一兩

右件搗羅為細末每用二錢溫酒調下不

拘時候

接骨丹治從高墜墮傷損疼痛

當歸切焙甘草剉炒沒藥別研桂去粗皮

乳香半兩澤蘭兩自然銅火燒紅醋淬

右為細末入研者藥再研令勻水麪糊和

左如梧桐子大每服三十丸溫酒送下不

拘時候日進三服

當歸血竭散治傷損筋骨疼痛不可忍宜服

止痛

騏驎竭別研沒藥別研當歸 赤芍藥 桂各

兩白芷二兩

右六味為細末每服二錢川溫酒調下不

拘時候

桃人散治被壓窄損瘀血在腹中疔痛不散

心胃短氣大小便不通

荆芥兩半 大黃兩半 蒲黃兩 芎藭 桂木

通當歸兩各一 桃人四十枚湯浸 去皮尖麩炒

右件為細末每服二錢用溫酒調下不拘

時候微利為度

淋瀝桂附散治因傷損後筋骨疼痛

桂皮去麤 附子生 白礬 細辛去苗 白芷

各壹兩 五加皮剉 桑葉各二兩

右件搗篩為散每劑用二兩入葱白連根

十莖水壹斗煎壹沸逐方淋瀝立効

接骨烏金散

半兩錢壹百足陌醋淬 錦文水蛭半兩炒

使不利 南乳香三錢 自然銅醋淬碎 麝香一錢

右為細末每服半錢生薑自然汁溫酒少

許同調服之如損在腰上食後服腰下食

前服如筋骨無傷藥即吐出無忌此藥神

驗不可盡述

松節散治閃撲筋骨腫痛

松節 桑白皮 蠶沙 香附子 朴消

已上各等分

右為麤末每用藥壹兩水壹碗半煎至壹碗熱漑痛處

乳香丸治腎虛骨節疼痛兼打撲傷折從高墜下跌撲傷損反治寒濕搏於骨節之間疼痛有時並皆治之

蒼木五兩去黑皮炒澤烏頭三兩生去皮臍乳香兩天仙子炒自然銅七遍黑牽牛炒官桂去麤皮味各二兩二錢半

右件為細末水麪糊和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸食前空心溫酒送下

大紅膏治從高下墮落馬傷損瘀血結滯筋脈攣急肌肉腫硬疼痛不可忍者並皆治之

常歸兩赤芍藥兩天台烏藥兩小油半斤已上三味浸油七日七夜沒藥兩乳香兩琥珀兩石件藥先將歷青以銀石器內慢火熬鐵篋子攪化開為度時用看硬軟旋旋入浸

藥油硬軟停當次入別研藥三味攪勻用
絲濾在淨水盆內以手持拔如錫白色次
入黃丹再持拔令勻盛在磁盒內每用熱
鐵篋子攤在厚軟紙上貼於患處

止痛貼膏治因傷損筋脉時發疼痛遇寒
則甚

桂心 附子生去皮 乳香研 川椒小椒亦可 吳茱

萸 白及各一兩 生姜汁五合 酒五合

右件藥為細末先將姜汁并酒同煎取七

合每用放溫汁調藥如膏詳所患大小攤

絹帛上敷貼痛處上川軟絹帛裏護

鯨鯉甲骨貼燭膏治閃肭疼痛

鯨鯉甲塗醋炙 桂去蟲 當歸切焙 生地

黃汁一匙秤 附子生去皮 生姜汁

右七味除汁外擣為細末將地黃汁生姜

汁各半和勻暖熱調藥如膏攤於軟紙上

乘熱敷貼患處用絲繫護每日壹換

沒藥膏治筋骨閃肭疼痛

沒藥研乳香研虎骨酥炙各半兩吳茱萸 白

芥子白及白歛 米粉各一兩生薑汁

酒各五兩

右件八味為細末將生薑汁并酒同煎七

合旋入藥末調勻乘熱攤於紙上敷貼痛

處壹日壹換用縣裏護

金絲膏治筋骨損傷時發疼痛不已

通明松脂四兩良姜一兩礞石八錢乳香三錢木

鼈子大者四箇去殼礞為末川烏頭三箇杏仁大者

一百箇剉如小油斤出藥煎煎

右件先將小油煎熱烏頭杏仁煎熬焦

黃色為度取出以絲濾去滓極淨再用銀

石器內慢火鎔松脂化開然後下良姜乳

香木鱉子等末不住手攪勻旋旋入烏頭

杏仁油看硬軟得所再用絲濾在器盒內

貯放如用攤紙花子上貼患處

定痛沒藥散按摩導引令血氣復行

乳香一錢沒藥一錢當歸一錢芍藥一錢地龍一錢細

辛 羌活各一錢 蛤粉兩一 黃丹二錢半 蒲黃三錢

右為細末每用乾捻在痛處用手擦摩捻

十餘遍然後上大紅膏

大紅膏

歷青一兩 黃丹一拾兩 乳香二兩 油不以多少

右作藥先用歷青以銀器內慢火熬開鐵

篋子攪覷時月看硬軟施旋入油硬軟恰

好次下乳香攪勻用絲濾過次入黃丹再

攪勻盛在瓷盆子內每用藥時燂過熱鐵

篋子攤在厚軟紙上

雙靈膏治一切筋骨肌肉疼痛

良姜一兩 白芥子半兩

右為細末每用藥二錢半頭白麩半兩水

調成膏攤在紙花干止貼患處

定痛沒藥散治壹切打撲傷損筋骨疼痛前

宜服之

蒼朮一斤刮去黑皮 桂去麤皮 熟乾地黄焙沒

藥 甘草炙 蒲黃各一兩

右為細末每服二錢溫酒壹盞調下不拘時候日進二服

至聖黑龍膏

米粉 一斤緊者妙用砂 銅炒勿令黑焦 甘松 兩半 香白芷 兩半

滑石 三兩 黃藥 二兩 黃丹 四兩

右為細末每用滴水調成黑強膏子攤在皺紙條兒上可於內損疼痛處敷貼每日壹換

至聖黑龍膏治壹切筋骨損傷疼痛

米粉 四兩於銀器內炒成墜子褐色放令研為細末後入二味乳香研

沒藥 研細各半兩

右三味研極細每用以好酒或醋調如膏攤在紙花子上貼患處

加血竭大紅膏

當歸 剉 木鱉子 剉 天台烏藥 剉 赤芍藥 剉

壹小油 四兩已上四味用佛小油 乳香 研二

歷青 壹兩 黃丹 羅過壹 加血竭 別研

沒藥 壹兩 琥珀 杵碎 研

右件乳香歷青鐵鍋內以慢火熬令消盡
 為度時月看硬軟旋旋入前項浸藥油加
 減用之候硬軟停當以絲濾在水盆內持
 拔白色旋入黃丹再持拔顏色勻於磁盒
 子內存放每用鐵錐子攤在厚軟紙上貼
 患處

神效膏治損撲著筋骨疼痛

小椒二兩炒乳香捌錢
黃色別研

右為細末用好醋打麵糊調藥塗在痛處

上用紙貼之

大紅膏方

乳香壹兩當歸各二兩琥珀壹兩香白芷中沒藥

白芍藥壹兩白及壹兩白斂各壹兩歷青壹十兩黃

丹壹兩小油四兩絲子壹兩木炭三斤定磁碗二隻

右上八味為細末同歷青壹處放在碗內

用文武火熬以歷青溶開次下小油徐徐

下之看覷硬軟得所用絲濾在木盒內放

溫次下丹熬成膏若用時攤於紙上用之

得効方

通治

擲撲刀傷接骨方服

臘月猪脂

五兩

黃蠟

半斤以

鈇丹羅自然銅

四兩

密陀僧

四兩

朱砂

壹兩

研

右用新鑄鼎先鎔脂次下蠟於冷處下密

陀僧鈇丹自然銅緩火再煎入水中不散

更出鼎於冷處下諸藥用柳篋攪勻瀉入

窰器內不任手攢至凝圓如彈子大且用

箠皮之類襯之極冷方收 凡傷碎骨者

木石壓碎骨者先用此藥火化開糊骨上

然後夾定用此藥服之須作小圓如梧桐

子大每服十圓葱酒調下或傷損深者搥

成條入孔中淺者用油單為膏藥貼之甚

者燈心裹木夾之加藥力散再覺痛筋壹

服痛即止又痛甚者貼之即止

又方二十五味服治擲撲損傷骨碎骨折更

斷刺痛不問輕重悉能治之大效

香白芷醋炒紫金皮醋炒劉寄奴 川當歸

煨鹽赤芍藥 白芍藥米泔炒黑牽牛泔生

地黃鹽水炒川芎米水浸川牛膝茶水炒乳香可加

減沒藥可加破故紙醋炒木通去節自然銅骨不

碎折不用木香茶水藿香木賊官桂

則好時用獨活半夏五錢水炒骨碎

減可加羌活獨活半夏無痰不用骨碎

補草烏醋炒川烏火烘孕婦則

或加土當歸熟地黃鹽水炒杜牛膝茶水炒土

芎米水尤妙

金刀傷剉出臼者去自然銅骨碎骨折者

用之然須於此方內且去自然銅臨欲好

時却入用之早服成他疾

右先擇出自然銅官桂沒藥乳香不炒者

其餘藥或炒或火焙或日曬乾皆可然後

入不炒四味同研為末用蜜糊圓如彈子

大用黃丹為衣或被擲撲傷損金刀箭鏃

不問輕重每服壹圓如被刃傷全斷損內

重者以薄芎湯或木瓜湯薑湯燈心湯吞

下皆可或擷碎骨及折骨用自然銅其他
下用如骨折碎刺痛不止加乳香沒藥白
芷川芎各五錢入諸藥中生薑酒下或不
作圓為末亦可功效如神

又方服治擷撲接骨刀傷

川當歸淨別搗鈎粉半兩鵬砂貳錢

右為末每服貳錢濃煎蘇木汁調下若損
在腰上先喫淡麵半碗了服藥若在腰以
下先服藥後喫淡麵仍下住呷蘇木汁更

以糯米為粉入藥末三錢拌和攤在紙上
或絹上封裹損處如骨碎更須用竹木夾
自定以紙或衣包之

清心藥方

降真香醋炒蘇木鹽水炒枳殼水浸

藿香清油炒丁香鹽水炒紫金皮茶炒

丁香半出炒木通去節山梔子酒炒大黃酒炒連子

肉酒煮沉香大人當歸濕紙煨川芎煨羌

活獨活花藥石醋煨烏豆燈心赤

芍藥各等分

右為末或大小腸不通服此亦可用五膈寬中散同服立效或惡血汚心或煩悶暴死每服二錢薄芍湯或燈心湯調下或童子小便尤好為散水煎服亦可如痰血口中出加半夏

自然銅散治打擗折骨損斷正骨科中經驗方也

乳香米泔沒藥人蘇水降真香川烏皮

尖松明節自然銅火浸米醋碎地竜去土

清油炒真血竭參龍骨生用土狗拾故油末本草各浸焙為

右為末每服五錢用無灰酒調下如病在上食後服病在下空心服服之自頂心尋病至下雨手再周遍壹身下及兩足遇病處則颯颯有聲患人自覺藥力習習往來又方自然銅累累然相綴如亂絲者最佳一兩重右研細小飛過同常歸沒藥各半錢和勻

每服三錢酒調頻服仍以手摩痛處澹寮方又

云衍義云有人養折翅雁飼以自然銅後遂飛去

鷄鳴散凡墜壓死者急安好處以手袖揅其

口鼻上壹食頃眼開先與熱小便若初覺

氣絕不能言急摩開口以熱小便灌之打

撲悶絕亦用先以此利去瘀血不暇詳述

活血丹治患者血脈不和筋急行步不可服

之寬筋

乾地黃酒煮貳兩當歸煨白芍藥續斷炒麩水

白朮煨川芎醋炒各壹兩

右為末麵糊圓梧子大每服三十圓溫酒

下金剛丸

當歸散救急療墜馬落車被打傷腕折臂呼

味不絕服此呼吸之間不復大痛五日筋骨

相連

當歸炒令香桂心去汗各芍

藥陸分附子炮去皮臍澤蘭炒各壹兩日

右為末酒服二三錢日三服如小兒被奔

車馬所損傷其膝皮肉決見骨節絕死少
蘇啼不可聽聞服之便睡十數日便行走
其神驗如此忌海藻菘菜生葱猪肉冷水

內損

大紫金皮散治打撲傷折內損肺肝嘔血不
止或瘀血停積於內心腹脹悶

紫金滕皮

醫方大成

降真香

續斷

補骨

脂無名異

燒紅酒

琥珀

別蒲黃

牛膝

酒浸當歸

洗焙

桃人

去皮炒

大黃

紙裏

朴消

別研各

存為末每服二錢濃煎蘇木當歸酒調并

進三服

補珍方利即安

醫方集成南

○外

科集驗方整骨續筋牛肌止痛內傷肝肺

嘔血不止或在心腹脹痛四肢無力左右

半身風癢並宜服之紫金藤皮兩

續斷

五兩要

骨碎補

二兩

無名異

七琥珀

二兩

牛膝

三兩

當歸

二兩蒲黃

壹兩

大黃

壹兩

朴消

濾過
七次

右作為末用蘇木煎酒調日進三服即効
沒藥散治打撲內損筋骨疼痛

沒藥 乳香 芍藥 川芎 川椒

目當歸各半
者當歸兩
自然銅二錢半
炭火燒

右為末用黃蠟二兩溶開入藥末不住手

攪勻圓如彈子大每服壹圓用好酒煎開

乘熱服之隨痛處卧霎時連進有効

打撲傷損

木香勻氣散 醫方大成集成有見經驗治從

高墜下或打撲傷損腰脇心腹作痛加紅麩

末少許童子小便同酒調空心熱服如無紅

麩紅酒亦可 方見諸症門

麝香散治從高墜目及打撲損傷

麝香 水蛭 兩

在用水蛭剉碎煨至烟出研為末入麝再

研勻每服酒調壹錢匕當平黃血未効再

服其應如神 後生錄方同 又治拆傷用水蛭熱

酒調壹錢食須食頃方知痛更進壹服痛

止便將折骨藥封直至安平方去未

平胃散治打撲傷損不問爪破與暗傷悉能

治之用冷水調塗則愈方見大方科脾胃門

救急方療墜馬落車傷腕折臂

當歸炒桂心見甘草炙蜀椒炒出汗各川

芍藥兩附子炮澤蘭炒各壹兩

右為末每用酒服二錢立效忌海藻菘菜

生葱冷水等

洗心散治傷損瘀血凝滯大痛大便亦痛方見

大方科積熱門

墜馬方細研銅末服之頓愈

蘇合香圓治從高墜下挾驚悸血氣錯亂昏

迷不省急服太効方見大方科諸氣門

刀斧棒杖傷膏油

單方治打撲傷金瘡問絕右用蒲黃不以多

少為末熱酒灌下

消煩

四聖散治傷重煩悶欲死者用此打血利大

小便未通者服此散下

單花藥石散見前方黑神散見前方大聖散不蒲黃

散已上二方並見婦人科當歸煨牛膝川芎米水炒

白芷醋炒蘇木大黃各半連子肉酒煮半兩

右為末和圓童子小便調服或木通湯亦

可惡血立下

傅藥

活血散治打撲傷損手足右用菜豆粉新鐵

銚內經驗良方新瓦或鐵銚炒令真紫色新

汲水調合成膏厚傅損處須教徧滿貼以

紙花將杉木皮壹片縛定其効如神詹察方醫

方大成集成南北經驗方袖珍方永類錄方壽域神方衛生易簡方同

治傷損用生骨碎補研爛取汁以酒煎服深

傳傷處數日平復及被笞捶無身全膚用

之大效

地黃膏治打撲傷損臂白脫出及壹切癰腫

未破令內消用生地黃研如膏木香為末

以地黃攤紙上糝木香末壹層又再攤地

黃貼上明旦痛即止效

減痕方治打撲有痕傷瘀血流注半夏為末

調塗傷處壹宿不見痕

又方治瘀血流注紫黑或傷眼上血紫黑大

黃為末用薑汁調塗壹夜壹次上藥壹宿

黑者紫二宿紫者即白矣

退腫

蒼木散治打撲損傷皮不破浮腫者及角血

川此退之

紫金皮或蒼木猪牙皂角鹽醋炒雞脚風

外葉平骨碎補各等分

右為末糊水調糊腫處

紫金皮散治壹切打撲損傷金刃箭鏃浮腫

用此效

紫金皮醋炒大南星或半夏或黃栢或草烏

炮川烏炮川芎茶冰炒麻當歸或杜當歸

烏藥或川白芷鹽水炒被故紙或劉寄奴

川牛膝 桑白皮 各等分

右為末生薑薄苴汁兼水調糊腫處或傷處皮熱甚加黃柏皮生地黄五錢有瘡口川者勿封其口四畔川此糊之

紫金麻藥 常山 附子 黃連 黃芩 金匱 龍骨 牡蠣

草烏散治損傷骨節不歸窠者用此麻之然

後用手整頓 各等分

猪牙皂角 木鼈子 紫金皮 白芷

半夏 烏藥 川芎 杜當歸 川烏 各五

兩 舶上茴香 坐拏 酒煎熟 草烏 各壹兩 木香

錢叁

傷重刺痛及近不得者更加坐拏草烏各五錢手慢陀羅花五錢入藥

右並無服製為末諸骨碎骨折出臼者每服二錢好紅酒調下麻倒不識痛處或用刀割開或用剪去骨鋒者以手整頓骨節歸元端正用夾夾定然後醫治或箭鏃入骨不出亦可用此麻之或用鐵鉗拽出或用鑿鑿開取出後用塩湯或塩水與服立

醒

斷筋

小香膠散白膠香末傅之

又方金沸草根插汁塗筋封之可相續

止痛

乳香散治打撲傷損痛不可忍者

白朮炒 當歸炒 粉草 川白芷 沒藥別研

交趾桂 明乳香別研

右為末入別研藥令勻每服二錢酒調不

無以時服

應痛圓治折傷後為四氣所侵手足疼痛

生蒼朮半斤 破故紙半斤 舶上茴香大兩

骨碎補半斤 穿山甲去膜桑灰炒 生草

烏半斤 如麥大

右除草烏半斤用生薑醫方集成南北經

生葱壹斤連皮生薑壹斤驗方袖珍方承類

淹兩宿焙乾連前藥同焙為末酒煮下糊

圓梧桐子大每服五十九鈞方三 加或米

飲下忌熱物片時少麻無妨醫方大

尋痛圓止痛清心行氣活血如神成回

草烏去皮尖乳香火沒藥火五靈脂各三

生麝香少

右為末酒糊丸如指頭大朱砂五錢研為

衣每服壹丸薄苛生薑研汁磨化痛止草

澹軒方外

撲傷治

無名異末治身傷碎研生葱合和良温酒調

開先服藥別投數盞醉為鄉

撲傷胡孫薑易研先將萍水酒同煎留萍盒

木付損傷處數比之間可脆然明謝謝

木石槓傷處

人遭木石槓肌膚死血凝同腫迹粗隔歲紫

蘇多取葉細按擦腫即消除

接骨

骨傷細研生銅屑酒調壹字解相接更煎糯

飲調礪末塗裏仍將抄板來

撲傷

傷損須求雙鯽鮮先將壹鯽帶鱗研盒塗損處絲包定杪板合之夾直眠壹鯽燒灰余去膽酒調細末二三錢果然接骨并除痛數日之間便十全

槓傷頭面破

水磨橄欖成膏之頭面傷痕俾即便痛痒切開馬屁勃火邊熟灸殿周員同煎滑散盒接骨

火燒醋淬古文鏡汶藥乳香等分研列入麝

香少姜汁酒調壹字經霜纏

衛生寶鑑

打撲損傷從高墜下

繆刺論云人有所墜惡血留內腹中痛腹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脉下傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之前血脉出血刺足附上動脉不巳刺三毛上各壹疔

當歸導滯散

玉機微義名當歸導氣散

治打撲損傷落馬

墜車瘀血大便不通洪袖珍方腫暗青疼痛昏悶畜血內壅欲死

川大黃壹兩當歸三錢○拔粹方袖珍方麝香少許

右為末入麝香研勻每服三錢熱酒壹觥

調下補珍方又云和劑方食前內瘀血云

或骨節傷折疼痛不可忍以定痛接骨紫

金丹治之○煙霞聖效左石件為細末每

服三錢至四錢五錢醋煮大盞煎取三五

沸溫服食前大小便下黑血為驗累經效

復元活血湯拔粹方袖珍方治從高墜下惡

血留於脇下疼痛不可忍

大黃一兩柴胡五錢芫蕪根玉錢微義二錢川山甲

炮○拔粹方袖珍方當歸各三錢○紅花甘

草各二錢桃仁湯泡去皮大便如泥五

右除桃仁為咬咀每服壹兩重水二觥半

酒半觥同煎至七分下桃仁泥再煎壹兩

沸去粗大溫服食前以利為度利後痛不

沸去粗大溫服食前以利為度利後痛不

盡者當服乳香應痛散 黃帝鍼經云有
 所墜墮惡血留內若有所大怒氣上而不
 下行於脇下則傷肝肝膽之經俱行於脇
 下經屬厥陰少陽以柴胡為引用為君以
 當歸和血脈又急者痛也甘草緩其急亦
 能生新血甘生血陽生陰長故也為臣川
 山甲芩蘘根桃仁紅花破血潤血為佐大
 黃酒製以蕩滌敗血為使氣味相合使氣
 血各有所歸痛自去矣○拔粹方在件除

桃仁外判如麻豆大每假壹樽水壹盞半
袖珍方酒半盞同煎至七分袖珍方去滓
一盞大溫服之食前以利為度得利痛或不盡
 服乳香神應散

神效接骨丹治打撲傷損傷筋折骨及寒濕
 脚氣腿疼或膏切惡瘡疼痛不止皆可服之

乳香 沒藥 白膠香 蜜陀僧 各四兩 各州研
 紅豆 香白芷 大豆 貫芎 赤芍藥
 自然銅 火煨醋淬 如銀為度 當歸 洗三 次焙 苡子仁 冰

蛭各四兩

右先以自然銅火燒紅醋淬燒如銀為度
 用四兩入前十二味藥各等分同為末以
 黃蠟為丸如彈子大每服壹丸以黃米酒
 壹觥煎開和粗溫服年少者只壹服年老
 者加添服病在上食後在下食前此藥內
 去自然蛭水蛭瓜子加桂花川練子茴香
 為細末酒麵丸如桐子大每服十五丸酸
 石榴湯送下食前日進二服治小腸氣如

神壹切臍腹疼痛並皆治之此藥男子婦
 人老幼皆可服神效不可具悉

紫金丹治打撲損傷及傷折疼痛不可忍拔
方治落馬墜車打撲損傷瘀血大便不通共
腫暗香疼痛昏悶畜血內壅欲死玉機微義
定痛接骨

川烏炮各壹兩 草烏炮各壹兩 五靈脂微義去土 木鼈子去殼
 黑牽牛生骨碎補 葳靈仙 金毛狗脊
 自然銅醋碎七次 防風各五錢○拔粹方微禹
 餘糧醋淬七次○拔粹方微義四兩 地龍去土 烏藥 青皮

去茴香炒各五錢○拔粹乳香微義沒藥

白娘子微義紅麝香各二錢陳皮去白五錢○拔粹方

微義半錢右為末醋糊丸如桐子大每服十九至貳

十九溫酒送下病在上食後在下食前

乳香神應散治從高墜下疼痛不可忍及腹

中疼痛

獨科栗子雄黑豆桑白皮乳香

沒藥各一兩破故紙炒三兩

右為末每服五錢醋壹盞於沙石器內煎

至六分入麝香少許溫服拔粹方同玉機

當歸一兩水蛭炒半兩

拔粹方

接骨丹治撲傷損皮骨者

蘇木一錢極定粉一錢南鵬砂別半兩錢燒

醋碎為末各一錢

右為末同骨作壹服煎當歸酒調三二服

痛止勿服高

痛止勿服高

痛止勿服高

痛止勿服高

痛止勿服高

巴戟湯治從高墜下及打撲內損昏冒嗜睡不能飲食此謂血閉及藏府不通

巴戟去心兩 當歸 地黃 芍藥 川芎各

兩 大黃兩 右為籠末水煎以利為度

接骨丹敷貼藥

天南星兩 木鼈子三 沒藥兩 官桂兩 乳香兩

右為細末生薑壹斤去皮爛研取自然汁

入米醋少許白麵為糊同調攤紙上貼傷處以懸繫之用篦了篦定麻索子纏

破血散痛湯治乘高損傷墜馬惡血流於脇下痛甚不能轉側玉機微義破血散乘馬損下其痛苦楚不能轉側

羌活 防風 中桂各一錢 柴胡 連翹各

錢 當歸稍 麝香少 蘇木一錢 水蛭炒

烟盡別研○ 微義二錢 右件分為二服每服酒二大盞水壹大盞

右件分為二服每服酒二大盞水壹大盞

右件分為二服每服酒二大盞水壹大盞

右件分為二服每服酒二大盞水壹大盞

右件分為二服每服酒二大盞水壹大盞

右件分為二服每服酒二大盞水壹大盞

右件分為二服每服酒二大盞水壹大盞

右件分為二服每服酒二大盞水壹大盞

右件分為二服每服酒二大盞水壹大盞

右件分為二服每服酒二大盞水壹大盞

微義水煎去滓調蛭麝二味熱服○微義酒一盞
 右件分作二服每服二大盞酒水青盞除水蛭射香外另研如泥煎餘藥壹大盞去滓上火合稍熱調二味飢服之

接骨散

金半兩錢壹文繞紅醋蘸淨如無古老錢代
 木當歸藿香葉各一錢
 水水蛭炒錢同糯米血竭一錢
 火虎骨酥炙錢一錢 餘二介微炒焦即見孩兒胎

頭也

土乳香 麝香 沒藥各壹錢

右為細末別裹若損折甚者每服三錢輕者每服二錢半如有損折者除蛭錢服藥時令病人先飲好酒三五盞服後更飲二三盞次用紙裹以繩穿板子縛之

治破傷見血酒壹碗煎服半兩當歸蠟二錢合來槌碎酒同煎直須軟爛連相喫一切傷瘡保萬全

益智湯

乾生姜四兩杏仁壹斤白麵叁斤甘草七兩

鹽三兩炒益智仁參兩京三稜壹兩青皮陳

皮各貳兩蓬莪茂兩壹兩

右為極細末白湯點服

醫方大成

折傷

本事方治打撲內損筋骨疼痛

沒藥 乳香 芍藥 川芎 川椒去子及閉

口當歸各半兩自然銅三錢半炭火燒○承類鈐力醋淬半兩

右為末用黃蠟二兩溶開入藥末不住手攪勻圓如彈子大每服壹圓用好酒煎開

乘熱服之隨痛處卧霎時連進有效醫方集成

南北經驗方袖珍方同

治打損接骨方

接骨木半兩乳香半錢赤芍藥 川當歸 川

芎自然銅各壹兩

右為末用黃蠟四兩溶藥末攪勻候溫衆

手圓如竜眼大如止打傷筋骨及閃柄疼
痛者用藥壹圓好舊酒壹盞蒸浸化藥承熱
服之若碎折筋骨先用此藥貼之然後服
食醫方集成南北經
驗方袖珍方同

百一選方救急療墜馬落車傷腕折臂

當歸炒 桂心袖珍方炙永 甘草炙 蜀椒去

各七 川芎半 附子炮 澤蘭炒各

右為末酒服二三錢立效忌海藻菘菜生

葱冷水等物醫方集成南北經
驗方補珍方同

仁齋直指方茴香酒治打墜肢體凝滯瘀血

腰脇疼痛

破故紙炒 茴香炒 桂各等

右為末每服立錢食前熱酒調服醫方集
成南北

經方補
珍方同

經驗方治打擗折骨損斷服此藥自頂心尋
病至下兩手同遍壹身遇受病處則颯颯有
聲覺藥力習習往來則愈矣○經驗良方治
打擗折骨損斷嘉定有專賣此藥每服膏貫

足其藥服之自頂心尋病至下兩手再周遍
 壹身下及兩足遇病處則颯颯有聲患人自
 覺藥力習習往來由是起家衣食裕足子傳
 父業仰給于此後以健訟繫囹圄道友救
 之得免于戾感之莫報願獻此方乃炷香曰
 此父母重誓不許傳授然無以廣好生之心
 道友曉之曰救人疾苦父母當享其報安有
 違誓止累祖宗遂傳此方

乳香 玉機微 義三錢 沒藥 蘇木 降真香 川

烏 去皮尖 ○松明節 改義三錢 自然銅 火煨醋
各一兩 ○承類玲 地竜 半兩 水蛭 油炒
方醋淬水飛過 竜骨 半兩 土狗 拾个 油浸
 血蝎 三錢 ○鈴 竜骨 半兩 土狗 拾个 油浸
本草名 蜈蚣 方四錢 蜈蚣 方四錢 蜈蚣 方四錢

右為末每服五錢無灰酒調下病在上食
 後服病在下食前服 醫方集成南北經
 經驗方治打撲傷損 衛生易簡方傷重便覺
 用胡孫薑研爛取汁以酒煎服滓傳傷處

醫方集成南北經
 驗方熱珍方同

經驗方走馬散治折傷接骨

栢葉生少荷葉生皂角生多骨碎補去毛

分

右為末於折傷處揣定位入元位以薑汁

調藥如糊攤在紙上貼骨斷處用杉木片

子夾定以繩縛之莫令搖動三五日後開

看以溫葱湯洗之後再貼藥復夾七日如

痛甚加沒藥醫方集成南北經驗方○經

驗良方治接骨詩曰青栢乾荷葉此藥最

為強皂葉併碎補止痛絕為良栢葉生少

荷葉生皂葉生多骨碎補去毛右已上各壹

兩為末於著跌處揣定骨入元位以杉木

片子量大小以紙襯於杉木內生姜汁調

藥如糊攤就紙上貼骨斷處以繩縛定夾

外更以熟絹纏之莫令骨動三日或七日

開看以葱湯洗不可令水大熱若骨無動

再貼藥復夾七日除換藥貼如痛甚如沒

藥少許貼

南北經驗方

折傷

秘方治打撲傷損落馬墜車一切疼痛

乳香 沒藥 川芎 白芷 芍藥 甘

草 牡丹皮 生地黃

各半兩

右為細末每服二錢溫酒并童子小便調

下不拘時候服

袖珍方同

秘方治抹傷損

痛牛易簡方傷重便覺氣絕不能言取藥不及

南星 白芷 半夏 白及 黃柏皮

赤小豆 各半兩

右為細末姜汁付患處蜜糖亦好 袖珍方同

張子和方接骨散并治惡瘡

金頭蜈蚣 乙介 金色自然銅 半兩燒紅醋碎研為細末用

乳香 二錢研為細末用 銅錢 重半兩者取三文或五文燒紅醋研碎細

金絲水蛭 一錢半每介作三截瓦上煨去氣道為度

右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛

如見出膿先用粗藥末少許小油少半匙

同打勻再入少半匙再打勻又入前藥接

骨散半錢再都用銀釵子打成膏子用雞翎掃在瘡腫處立止痛大明壹宿自破便效如打破骨頭并損傷可用前項接骨散半錢加馬兜苓末半錢同好酒壹大盞熱調連滓溫服如骨折損立接定不疼如不折了喫了藥立便止住疼痛此方累經效驗不可具述

袖珍方同

袖珍方

折傷

治諸般打撲傷損以破血出痛不可忍右赤

石脂研末付之效

又方用路邊籬上婆婆針帶兒搗水化服立

效渣罨瘡口上

永類鈴方

和劑五積散疎風須氣五勞七傷及傷損頭

疼傷風發汗姜葱煎熱服下元有傷可加

木通回香蘇木烏藥何首烏弱者無汗亦

可三四服傷重昏問不省酒調蘇合香元

壯者熱童便更佳和劑七氣湯亦勻氣
彭氏勻氣散治同上證

茴香 青皮 製厚朴 杜烏藥 白芷

各半 陳皮 麥芽 前胡 桔梗 蒼朮

粉草 杏仁 各壹兩

咬咀姜棗煎○理傷續斷方勻氣散凡傷

重先下此藥調氣然後服損藥茴香青皮

厚朴 製 白芷 烏藥 杏仁 去皮尖 各半兩 陳皮 麥藥

前胡 桔梗 蒼朮 粉草 各壹兩 右為末每服二

錢水壹盞姜棗煎至八分空心服

郡氏用和劑烏藥順氣散每服加蘇木桃仁

生香附子并貼水敗荷末壹錢重水蛭壹

分炒茴香壹分水煎服停血脹加毛蛇藤

根生研自然汁酒湯各半侵服若心頭緊

痛通氣通血壯盛人槐花散槐花黃黃連

各半兩熟枳殼生大黃各三錢黃芩三錢

蒲朴消蘇木各壹錢咬咀錢作二服燈心百

葉濾後加清油壹平錢又姜蜜小便酒又

空心服即通

諸傷損血氣併心不省

白芷壹兩 大黃壹兩 木通各半 山梔十 百草霜

二錢 煎醋湯調壹分 水煎服

右細末每三錢蘇木湯下血作潮熱大艾

煎醋湯調壹分 水煎服

諸傷氣血膨脹大便不通腹肚築痛

雄黃壹錢 膩粉各二錢 巴豆十粒 五粒去油生

存真蒲黃壹錢 煎在八分生油 燒

右為末飯元菘豆大每十元冷茶下過壹
時未通用水邊烏柏根研汁吞十五元即
通

諸傷小便不通

朱芩二 滑石二 車前子各半 天花粉三錢 海

金沙二錢 右細末麥門冬煎湯大小便俱不通生大

黃末三錢當歸尾二錢紅花二錢蘇木三

錢熟枳殼半兩煎熟入大黃末加童便酒

錢熟枳殼半兩煎熟入大黃末加童便酒

煎有潮熱除酒用水

濟生奪命散治從高墜下木石壓損及刀刃傷痕血凝滯心腹脹痛大小便不通欲死

紅蛭二石灰煨火炒令乾黃色天黃 黑牽牛頭

末各二兩

右細末每二錢熱酒調下約行四五里再

以熱酒調牽牛末二錢催之即下惡血或

塊以盡為度

邵氏用水蛭茴香各壹兩先以茴香三錢同

水蛭炒去茴香又以茴香七錢微炒共為

末用水煎蘇木加酒和調烏藥順氣散壹

貼作三服又壹法礪砂水蛭竹膜絲頭四

味將砂炒蛭去砂用蛭為末竹絲燒灰和

勻酒調服

和劑花藥石散治證同上方見金匱

邵氏驅通之法打撲傷損得三五日水食不

入口者用生猪肉二大錢口中嚼爛或用

刀打爛即以溫水洗去血水又再搗爛用

陰陽湯打和却用半錢多入碗中以雞毛送入喉內閉口以陰陽湯灌下之其食虫聞此肉香竇開瘀血尋上貪食胸中自然開解却用通藥此損血凝聚心間其虫食血飽病人心膈悶他物虫不來探故用此活法

敷貼藥

三因集胡氏奪命散又名玉真散治打撲金刃傷及破傷風濕如痲者至危至効

南星各等分 防風各等分

右細末瘡口破傷風依上敷貼瘡口仍以溫酒調服壹錢牙關緊急角弓反張或死而心尚溫者熱童使調下壹錢鬪歐內傷墜壓並酒和童便調連進三服甦南星為經防風所制服之不麻追出黃水盡為度○
湯洗去 經驗良方天南星皮臍 防風去 右等分為末如破以藥敷貼瘡口上後以生姜自然汁少許溫酒調下壹錢如牙關緊急角

弓反張用藥二錢童子小便調下傷重但
 心頭溫以童子小便調二錢灌下併三服
 可活
 瑞竹堂方治前證又用黃蠟壹塊熱酒化開
 服立效與玉真散對連川神效
 邵氏貼諸傷損 生獨活一兩 草烏三錢 南星半兩
 紫荆皮 粉葛尖尾 黃橙葉又名木臘
 葉能散血麥菜生者佳藍菜能往痛此以
 味倍用不拘等介細末如打損傷有大紫

赤色未破肉可加良姜山桂皮生薑自然
 汁調貼無姜水亦可若紫黑色已退除姜
 桂姜汁却用後藥煎湯泡洗上爛前藥以
 葱汁茶清調放溫貼或有痛可用餅酒麩
 調不用姜痛腫即除仍喫藥消之若傷損
 跌蹠骨痠痛仍加前姜桂生熱貼之藥氣
 透骨痛止

桃紅散貼損折筋骨腫痛

草烏三個去皮見血者不可用 飛羅麵半兩 國丹二錢 貝母

兩天南星半兩

在細末生姜自然汁調貼加作潮熱茶清調貼加皮破見血者去草烏恐壞皮肉若輕者血聚以雜白藥研罨患處帛縛之骨斷者可用肥株去皮弦子膜以童便煮生姜二味打爛入飛羅麪加入前獨活八味打和用紙布絹片却用前後正副夾須子細整頓其骨緊縛後看上下腫痛消者方可換藥腫痛未退不可換藥仍服住痛藥

且貼了此肥株壹番使如鐵針牢了宜斟酌日子有有無動作方可換藥

諸傷至重似不透膜者以海味中鹹白蝶揀大片色白而有紅絲者成片鋪在傷處以帛札之血即止如膏脂出不傷肉膜者即剃去患人頭心髮不令患人知以熱熨斗於頂上壹熨膏脂自人以桑白皮線縫合用血結草木蠟葉磁石為木乾揅之即合彭氏黑龍散治諸撲傷損筋骨碎斷差爻生

田先煎葱湯藥水淋洗整拔平正看熱冷
 用姜汁或地黃汁調或紙或帛隨大小裹
 貼有破留口別用欵藥如骨斷碎斟酌夾
 縛三日一次淋洗換藥不可去夾以待骨
 續如刀箭獸齒成瘡壞爛探盪腫痛用姜
 汁和水調貼有破留口川山甲六兩丁皮六兩
 當歸二兩百草霜枇杷葉略用些子細末姜
 汁和水調貼○理傷續斷方黑龍散貼治
 跌撲傷撲筋骨碎斷差久出曰先煎葱湯

或藥汁淋洗拔伸整擦令骨相續平正後
 却用生姜汁或生地黃汁和水調稀却將
 熟帛或皮紙量損處大小薄攤於上貼之
 次以木皮約如指人片踈排令周匝將小
 繩三度縛之要緊三日守次再如前淋洗
 換藥貼裏不可去夾須護母令搖動候骨
 生牢穩方去夾則復如故若被刀箭傷虫
 獸傷嚼成瘡穰爛肌肉不生跌磕腫痛並
 用姜汁和水調貼有破則留以風流散

填塗川山甲六兩妙黃丁香皮六兩土當歸

或燒存性二百草霜散血入枇杷葉根去毛入半兩

根右焙碾為細末姜汁水調或研地黃汁

調用

經驗傷損打撲傷筋骨 胡孫姜即骨碎補

不上生者補損樟樹上生者通氣 治風

損各用壹半研爛取汁以酒煎或調服留

滓敷傷處製法去皮毛切片微炒常用煮

酒嘗七日後飲之

打撲有痕傷瘀血流注半夏末水調塗傷處

壹宿不見痕經驗良方同作潮熱者大黃末姜

汁調塗壹夜壹次上藥宿黑者紫二宿紫

者白矣

指爪甲傷擊裂用澹火煨熱葱葉剝去皮取

其中葱涎涕罨損處仍陸續煨易熱者痛

止而安經驗良方同續筋金沸草根研和滓汁

以筋相對塗而封之即續蜀兒逃走多刻

其筋用之驗

傷損皮肉破及刀刃傷急用未經水葱白細切炒極熱裹傷處血止痛定或用晚蠶蛾為末和石灰罨傷處住痛止血合口

腎脇諸骨傷斷黃雲膏 木菖蒲炒常用 紅內

消如腫加生者五兩即何首烏 白芷生用風加壹兩 赤芍生二兩痛

亦加獨活 常用生三兩 為末熱酒調塗

諸損敷貼 當歸三兩 白芷三兩 肉桂半兩 薰陸香

沒藥各壹兩 為末姜汁調白芷壹味自佳

歐陽氏貼損 白芷 赤芍 南星 天花

粉 木蠟葉 金牡丹皮少許為末姜汁調貼

乾糝藥 乾糝 黃丹 各壹兩 為末傷經久者

彭氏風流散 石膏拾壹兩泥固濟火煨 白朮飛上兩 枇

杷葉少許 松脂 黃丹各壹兩 為末傷經久者

藥水洗後用瘡干用油調敷新破傷忌風

濕 邵氏破傷血不止 真血竭三錢或用番降節中油代亦可

五倍子壹兩 陳紫蘇葉三錢 白芷半兩 海金沙壹兩

五倍子壹兩 陳紫蘇葉三錢 白芷半兩 海金沙壹兩

細末搽之軍前急救不可著水至效

淋洗藥

彭氏用 生葱切 京芥 杜當歸等分煎沸湯

放溫洗或加連翹防風白芷黃連湯風

邵氏用 南蓼 杜獨活 藁本 黃柏生

姜煎洗如有口除薑蓼損而青腫用此

味若肉冷痺痛骨斷而腫不可洗傷口有

膿水別用合口藥如前風流散

涼血消腫 千金草即涼 山桂皮 藁本

石南藤 皂角 連根葱煎水洗

御藥院淋瀝頑荆散治諸墜壓傷折筋骨瘀

血結痛淋洗宜避風方見聖

又方桑白皮 赤芍 白芷 烏藥 左纏

藤 臭橘葉金瘡去烏藥加京芥防風如

臭加霍香如毒加烏柏葉或柏根皮黃桑

葉如有膿去京芥加五倍子白芷黃連

風損藥

邵氏諸風損傷折

乾薑

洗壹兩 薑蠶二兩 生水洗 木鱉殼二兩 杜

獨活

兩 藁本二兩 乳香半兩 水浸 沒藥二兩 別研

藁本

撫芎 制枳殼 赤芍 破故紙

炒續斷

油浸 黑牽牛 炒 穿山甲 二兩 炒 各白

芫

肉桂 獨活 良薑 淨 細辛 當歸

酒川牛膝

酒浸焙 草烏 三兩 半 羌活 兩 骨

碎補

炒去毛 蒼朮 炒 半 海桐皮 酒浸炒 附

子川烏

炮各一介 後二 味看虛實加

右末每藥末一斤用麵二兩酒水煮糊元

梧子大每二十元壯實者加二十五元有

臂胛頭痛生葱薑酒細嚼吞下兩脇腰腿

疼痛茴香薑酒空心下脚膝痛腫木瓜薑

酒下四五月加京芥春月去破故紙夏月

去牽牛

治損接骨活血住痛虛弱及經久未安

附子

八錢 澤蘭 兩 川椒 去目 及第二重 甘

草

兩 當歸 川芎 獨活 各半 白芷 壹兩 川

烏

錢 烏

右細末細嚼生薑酒調如刀傷不甲酒骨
斷皮不被加乳沒浸酒調體弱傷損氣痛
茴香薑酒調看虛實每服加少草烏末
腦上有傷頭痛不止

京芥 川芎 各半兩 白芷 壹兩 葶澄茄 二錢

右為末熱酒調

諸損傷草藥捷徑

毛蛇藤有血瘀多加 壹兩 打破太青根 半兩 化

氣矮樟根 半兩 熟骨草 半兩 柞茹 七寸長 住痛

多加紫金藤又名山甘草用 壹兩 可加姜 三兩

拌牛膝根 兩半 消血瘀加用過路蜈蚣即過

墻楓 壹兩 左纏接骨草 壹兩 松園 一兩

右生研酒浸開去滓加童便溫服體弱溫

熱服有瘀血在內用麻油葱同酒後入以

滓盒傷處皮破血出者不用貼

凡傷重用姜半斤墻壹口酒水各半用前藥

搗爛先用猪蹄筒骨熬汁加前藥同煎至

半壘日夜服盡偃卧安此法是戈法打損

遍身難貼邊喫邊搽尤妙
諸傷損筋折骨先用趁痛散住痛

川獨活 川五靈脂 乳香別研 白芷北

茴香各壹兩 防風 百草霜 沒藥各半兩 淨

生地黄二兩半 當歸二兩 杜白芷三兩 桔梗三兩 草

烏二錢 透去皮尖焙 赤芍二兩

右為末每壹大錢煨葱頭酒或炒松節姜

酒調下

接骨散諸傷筋折 腫痛服之住痛消腫

白芍二兩 故紙炒壹兩 自然銅醋淬 沒藥別研 羊脛

骨炭各壹兩 白茯苓 汁碎補 去毛各兩 川烏

炮木鱉去殼并油 虎骨隨多少 醋隨多少

右細末每壹大錢依前湯使調下燒羊脛

炭法四五月收麻羊糞用茆旨層又加糞

壹層盡意燒之存性合了烟令作炭先以

姜汁童便候炭成將入汁內淬晒乾為末

筋骨散治新舊損除痛壯筋骨可常用賣

生地黄 赤芍 當歸 石南藤各二兩 杜

白芷 骨碎補 炒去毛 五靈脂 肉桂

山桂皮 京芥穗 各壹兩 桔梗 四兩 川烏 炮草

烏 製各半兩 雄黑豆 煮去皮 右為末姜汁和酒調婦人風損痺痛煨葱

酒調 接骨續筋住痛生血 周竹心傳甚神秘之

內加玉真散二味

又勝諸方

乳香 沒藥 自然銅 醋淬七次 南木香 生

地黃 熟地黃 川羌活 當歸 川獨

活 川芎 南星 防風 松嫩心 去毛粉

草 側柏葉 醋煮加倍用 草烏 數个制去皮尖

介 柘木 塘火中煨存性作炭前藥各等

右細末生姜自然汁調下或蜜元彈大生

姜汁和酒嚼下

應痛乳香圓治諸損

乳香 沒藥 信朱 別研各半兩 白膠香 壹兩

香 草烏 制四錢 石南藤 二兩 骨碎 炒去毛 桔梗

香 草烏 制四錢 石南藤 二兩 骨碎 炒去毛 桔梗

香 草烏 制四錢 石南藤 二兩 骨碎 炒去毛 桔梗

香 草烏 制四錢 石南藤 二兩 骨碎 炒去毛 桔梗

香 草烏 制四錢 石南藤 二兩 骨碎 炒去毛 桔梗

香 草烏 制四錢 石南藤 二兩 骨碎 炒去毛 桔梗

香 草烏 制四錢 石南藤 二兩 骨碎 炒去毛 桔梗

白芍藥各二兩熟地黃壹兩京芥穗壹兩暗松節

燒過存川烏二錢計木半兩白乳香壹兩

右細末醋糊元梧子大每三十元煨葱或

葱或松節酒

神仙透骨丹骨斷八分加用此藥

當歸四兩獨活二兩乳香白交香半兩溶

生熟地黃各壹兩自然銅醋淬半兩側柏葉四兩酒蒸

焙肉桂半兩石南藤二兩

右細末糯米糊彈大國丹為衣每壹元炒

松節或番降節酒下看損上下服亦可梧

子大元每三十元前藥加松條松節好土

京芥桔梗各二兩脚氣入骨痛木瓜浸

酒黑豆炒烟起浸酒

彭氏活血丹治打撲傷損折骨碎筋瘀血腫

痛煩悶風痰癱癲頑痺婦人而風產後敗血

浮腫血氣疔痛風勞發動四肢痠疼孕婦勿

服

青桑灰壹斤好醋殺骨碎補制南星姜汁

宿赤白芍藥兼焙牛膝洗川烏炮雄黑豆各
 兩六自然銅鑿木鱉子肉切和麪炒淨細
 錢壹兩沒藥四乳香去錢並白膠香三血
 辛焙六錢或番錫降節代
 右為末糯米粉醋煮糊元杵千下集手元
 緩則發裂人丸重六錢濕中丸三錢濕候
 乾以漆擦手上將刃三九椰漆為衣收用
 每半元無灰酒磨化漸煎三五沸溫服無
 時以紗葛袋收掛淨處經久不壞

小紅圓治諸傷勞損痿折筋骨風濕攣拳壯
 筋骨活經絡生氣血

川烏 何首烏 蒼朮 蛇床子 五靈

脂 白膠香 赤小豆 牛膝 當歸各

淨壹兩 乳香二錢

右酒糊元菜豆大每三五十元酒下

大紅元治証同上不問新舊經年諸傷損孕
 婦勿服

赤白芍藥兼用一斤何首烏壹斤川烏壹斤七

南星壹斤 常歸十兩 骨碎補姜制 牛膝拾兩

北細辛兩 青桑灰三斤 赤小豆二升 自然

銅二兩 醋淨

右細末醋糊元梧子大信州朱為衣每二

十壹元溫酒下○理傷續斷方治撲損傷

折骨碎筋斷疼痛痺冷內外俱損瘀血留

滯外腫內痛肢節痛倦應諸損痛不問年

深日近並宜服之常服補損堅筋固骨滋

血生力神驗不可具述每服三十九溫酒

醋湯任下不拘時候孕婦莫服赤斂壹斤

即何首烏焙乾 川烏壹斤七兩 天南星壹斤

焙炒 藥壹斤 土當歸十兩 骨碎補壹

斤姜制 牛膝十兩 細辛八兩 赤

小豆二升 自然銅四兩 青桑炭五

斤煨醋淨缺此壹味亦可其 石斂星 芍藥

歸補膝辛 七味並用當土者同餘藥羅為

細末醋煮麵糊為丸如梧子大朱為衣每

服三十九溫酒下醋湯亦可損在上食後

服在下空心服傷重不拘時服或與小紅
丸互用亦可

黑神元治證同上

白欽壹斤白及四兩當歸四兩白芍六兩南星六兩川

烏三兩骨碎補兩制牛膝九兩白草霜兩赤小

豆一升

不為末醋糊元梧子大湯使同上壹方加

細辛或白鮮皮○理傷續斷方黑井子治

打撲傷損驢馬跌墜骨斷筋碎百節疼痛

瘀血不散浮腫結毒壹切風疾四肢疼痛

筋痿力乏渾身倦怠手足緩弱行步不前

婦人諸般血風勞損並宜服之每服二十

丸三十九用煨葱酒或茶任下孕婦莫服

白欽壹斤焙白及四兩焙南星六兩焙芍

藥十兩焙土當歸四兩焙骨碎補八兩焙

川烏三兩焙牛膝六兩焙百草霜十兩赤

小豆壹斤右除星芍歸補膝豆用土產者

草霜釜上取同為末醋糊為丸如梧子大

每服三貳十九

當歸散治諸風損折傷或作癱疽或因損中風癱癱或勞役所損

澤蘭 當歸 牛膝 續斷 各十

白芷 川芎 肉桂 細辛 各五

甘草 各四 川烏 川椒 各三 白楊皮 或三兩

用

右為末酒調下○理傷續斷方治打撲傷損皮肉破碎筋骨寸斷痰壅滯結腫不散

或作癱疽疼痛至甚因損後中風手足痿痺不能舉動筋骨縫縱攣縮不舒及勞役

所損肩背四肢疼痛並宜服之此藥大能

續筋接骨尅日收效澤蘭十兩川當歸十

兩芍藥五兩白芷五兩川芎五兩肉桂五兩去

川續斷兩牛膝十兩川烏五兩川椒三兩桔梗

四甘草兩白楊皮不用細辛五兩已上右

為極細末每服二錢熱酒調下不拘時候

乳香散治證同上

乾姜 肉桂各三兩 牛膝 羌活 川芎

杜細辛 姜黃 芍藥 草烏 川烏

各四兩 骨碎補 當歸 蒼朮 木鱉肉各六兩

沒藥五兩 何首烏十四兩 桔梗拾兩 乳香半兩 赤

小豆壹斤 白芷三兩 海桐三兩 用亦可

右為末酒調○理傷續斷方治跌撲傷損

皮肉破綻筋骨寸斷敗血壅滯結腫爛壞

疼痛至甚或勞役所損背肩四肢疼痛損

後中風手足痿痺不能舉動筋骨乖縱攣

縮不舒大能續筋接骨卓有奇驗常服結

血止痛生力每服二錢溫湯調下不拘時

候肉桂三兩 乾姜三兩 牛膝四兩 羌活四兩 白芷二兩

川芎四兩 細辛四兩 姜黃四兩 碎補六兩 當歸六兩 芍

藥四兩 草烏四兩 川烏四兩 蒼朮六兩 桔梗拾兩 赤小

豆壹斤 乳香半斤 沒藥五兩 何首烏拾四兩 木鱉六兩

去殼麩炒乳沒別研一右焙碾為末續入

乳沒末和湯使調服如前

鱉甲散治五勞七傷四時傷寒壯熱骨節煩

疼痰嗽嵐瘴心腹積氣壹切風疰婦人血風
產前產後諸疾並治

鱉甲醋浸炙 肉桂 紫菀 川芎 白芷

秦艽 姜活 當歸 乾姜 陳皮各四兩

烏藥 五味子 芍藥 柴胡各七兩 蒼朮

川烏四拾个炮 桔梗二斤半揀淨

右細末每二錢姜二片烏梅半个煎熟服

傷寒加葱白勞損加酒

黑虎丹治諸損男女頭風手足麻痺

川烏 木鱉肉各壹斤 地竜淨洗去土拾兩 黑豆

半斤○理傷 五靈脂二兩○續斷方如續斷方半斤 松墨二兩醋炒

右為末以五靈脂同麵糊為元一元至五

元溫酒薄荷茶皆可下○續斷方右四味

為末五靈脂醋研碎煮麵糊為丸竜眼大

每壹丸或二丸細嚼酒下薄荷茶亦可不

拘時

何首烏元寬筋治風損

何首烏拾斤生黑豆半斤同煎○理傷續斷方黑豆半升同蒸熟 薄荷

二拾青木香 牛膝各五兩○續二兩皂角壹斤燒存性○續斷方二斤一牽牛拾兩炒川斤燒存性一斤蜜炙用 烏二兩炮

右酒糊元續斷方如梧子大葱湯薄荷茶下三十

元續斷方此下云不拘時下

歐陽氏治諸損紅黑二散

當歸 川芎 白芷 陳皮 赤芍 全牡

丹皮 茴香 柳桂各壹兩嫩松香蒸過去毛杜

當歸各四兩生地黃二兩研細末草烏酒醋自然

銅酒醋淬各壹兩蒼朮 良姜 骨碎補制各二兩杜

獨活四兩柘木炭 松香加倍作黑末二藥各

作末隨病重輕打和茴香湯或姜葱酒調

常合和劑石南元兼服

又方草烏 細辛 羌活 獨活 白芷

牛膝 白膠香 五靈脂 川芎 甘草

藁本 回香 藿香各二兩石南藤 木瓜

自然銅 骨碎補 當歸 乾姜 肉桂

等分

石細末酒調通用如傷重去石南藤加杜
 當歸脚傷重加木瓜手傷重加木鱉子腰
 傷重加回香牽牛夏月減姜桂加百藥煎
 石南藤
 秋擔接骨散

姜黃 蒲黃 骨碎補炒 無名異煨 生地

黃 生薑各自然汁膏兩

右為末酒調外用生癩蝦蟇壹介研如泥
 敷貼

集驗打傷腫痛無名異細末熱酒服趕下手
 末血皆散失

四炒散治打破跌損肉傷

骨碎補制 生薑 乳香 當歸

搗酒熱服接骨加自然銅

本草打傷只以骨碎補末和黃米粥裏傷處
 打跌骨斷只白及壹味為末酒調服神效其
 功不減自然銅與古五銖錢
 直指打跌血滯腰脇疼

故芷 茵香 各等 粹桂 分

右為末 熱酒調 興古正 粒送

集驗 揀要 治諸風 損傷折 踈風順氣 勻血佳 痛

當歸 壹兩 川芎 兩壹 白芷 兩壹 杜烏藥 木瓜

牛膝 各壹兩 京芥 牡丹皮 淨陳皮 淨

細辛 玄胡索 炒 川續斷 茴香 炒 破故

紙 炒 石菖蒲 洗 浙木 穿山甲 蚌粉炒 交

趾桂 七錢 桃仁 炒去皮 粉草 壹兩 五加皮 二兩 酒浸

或加 丁皮 檳榔 枳殼 制各壹兩

右 咬咀 姜煎 酒浸 乳沒 各半兩 加入 或加

老松節 炒烏豆 老姜 煮酒服

集要 治諸損元子 藥健筋骨 生氣血 養百脉

踈風 順風 升降 陰陽 虛弱 常宜

長條 川牛膝 宜瓜 天麻 菴蓉 膏

歸 川續斷 酒浸 何首烏 酒蒸 杜烏藥 白

芷 五加皮 酒浸 狗脊 制 淮烏 姜葱炒 骨碎 補

去毛 川獨活 各二兩 大川烏 附子 各一兩 炮乳

香 沒藥 研別 嫩茸 酥炙 自然銅 醋淬 川芎 各壹兩

兔絲子 淨淘 杜仲 四兩 蒼朮 半生半熟

四全蝎 炒 破故芷 三兩 虎骨 酥炙 北五味

威靈仙 水洗 京 芍藥 川山甲 蚌

粉 炒 茴香 炒 淨 細辛 龜板 酥炙各壹兩半

右細末酒糊元常服即補下元藥

破傷水方糯米末 三之二 甘草末 三之一 用沙

糖調搽腫處先自腫赤盡處搽起至瘡口

水皆自瘡口出即安

治諸傷瘀血不散五六月收野苧蘇葉搗爛

金瘡上如瘀血在腹用順流水槌爛服即

通血皆化水以死猪血試之可驗秋月恐

無葉早收

傷紫眼 紫金皮小便浸壹七晒作末眼青

腫黑紫色用生地黄姜汁調不腫用葱汁

閃腰痛 神麴 火煨 酒淬温服或米醋和平

胃散罨痛處或杜仲及蒔蘿末酒調

諸傷瘡封口住痛 白芷 五倍子 炒 赤

精石脂佳烏賊骨生血封口須研極細末不燃
 及作痛不止此藥治諸般惡氣及脚上
 開賺瘡蛇頭指痛壹方加乳香雄黃白芷壹
 黑散為末搽主風黃萎骨節不伸川清油
 蒸熟去滓用鷄毛洗瘡口却用上藥搽于
 用油調塗治穢氣加國丹 肌桃花
 散國丹白芷滑石兼上藥味通用瘡口水
 不乾枯白凡川山甲先灰炒焦更加鼈鱗
 搽白芷壹味瘡中聖藥外聖藥

經驗秘方

諸物傷

應痛乳香圓治男子婦人打撲損傷腰脚疼
 痛手足頑麻膝勞背冷四肢無力下元虛冷
 小便較多上喘咳嗽不思飲食心腹閉悶壹
 切諸氣酒腫食黃膨脹令疼每服七丸無灰
 酒溫熱送下鹽湯亦可病上食後病下食前
 日進二服

自然銅灰火燒紅好醋內燻 鹿茸用炭於淨地上

燒紅去炭用米醋噴於火地上即將鹿茸
 茸放在上頭用磁器蓋合冷定取出
 一兩去川烏頭用慢火燒出皮天南星
 川烏皮一兩去虎骨好醋於砂鍋內煮過半兩錢
 般製虎骨濃六七遍取出空乾
 火燒七遍好胡桃去皮設用穰壹兩甘草
 米醋燕七遍胡椒切皮設用穰壹兩乾
 壹兩去甜瓜子壹兩炒沒藥乳香龍
 皮用穰甜瓜子黃色沒藥乳香龍
 骨川椒 葫蘆巴 破故紙 香附子
 香白芷 五靈脂 浮萍草 血蝎 雄
 黃 茴香 乾川練子以上各壹兩
 右件依法製度噉乾碾為細末用好醋糊

為丸如梧桐子大每服七丸無灰酒送下
 藥丸子於葫蘆內盛頓不用噉如臨丸時
 丸了盛於磁器內用油少許却別用壹器
 合定往來撞之令油滾於丸子上次將丸
 子入葫蘆內陰乾隨病用度

接骨散高卅壹疋布治顛撲傷折止痛如神

廣茂 京三稜 黃蘗 黃芩 龍骨

烏魚骨去皮白及 當歸 骨碎補 木鱉

子去殼不去油乳香二錢沒藥二錢加黃丹三錢

錢作敷貼藥

右為細末每服三錢熱酒調下以汗出痛

止為效加黃丹醃醋調貼傷處破即乾糝

此係阿里平章方汪院使屢用經驗簡奇方同

墜馬擗撲傷損江浙省掾游壽卿傳

木賊 橘皮 麻黃 各三錢 甘草 五錢

前件為細末温酒調服病上食後病下食

前

擗撲傷損瘀血留經絡腸胃間遂成宿疾用

大黃經驗良方用大老黃 茄種切作薄片子瓦上炙

焦為末熱酒送下良方二錢日二服雖十餘年積血亦蕩去矣

○衛生易簡方治搥撲傷損肌膚青腫用

茄種通黃極大者切片如指厚新瓦上焙

乾為末臨卧酒調二錢匕服壹夜消盡無

痕跡也

折骨

螳螂鈴如不乾用粟殼糠炒 苦葫蘆子 乳香少許

右三味為細末煉蜜為丸桐子大每服三

五九酒下病上食後病下食前日三服

傷折肢體陸悅道常用大效

骨碎補壹味 火炙去毛

右為細末酒調二錢日進三服病上食後

病下食前以多飲酒為妙五日即可 簡奇方同

接骨丹叔固丞相施此屢効

自然銅 二兩火燒醋蘸七次 白芍藥 半兩 血竭 三錢 甜

瓜子 半兩 炒黃木鱉 丁 五個或三個 淨水蛭 二錢

或三錢 胡桃仁 五錢 去皮油甚 淨 當歸 五錢 半兩錢 三兩

石灰炒 胡桃仁皮油淨 當歸 錢 半兩錢 兩

介燒紅醋 血餘灰 三錢 沒藥 半兩 乳香 半兩 閃

右為細末每服滿壹銅錢好酒調下唯可

食壹服如左邊損折用紙炒黑豆壹顆嚼

試之如能嚼破者則髓不斷不能者髓必

斷矣然服之神効

接骨散阿里平章傳

廣茂 三稜 炮黃柏 黃芩 竜骨 烏

魚骨 去皮 白及 三骨碎補 木鱉子 去殼不

當歸 各一兩 乳香 沒藥 各三錢

右為細末每服三錢熱酒調下汗出痛止
 為度加黃丹三錢醋調敷貼患處濕則乾
 糝比受杖壹服斷訖速貼再壹服大效
 凡傷折息服自然藥取赤銅屑細研溫酒
 服一二錢其骨自相接又木賊三兩麻黃
 去節壹兩甘草三分為末每服五錢熱酒
 調下先整骨了飲之令醉簡奇方同
 治閃拗手足疼痛生薑搗爛和麵炒熱傅之
 加葱白炒尤佳急救仙方同 ○壽域神方治閃

挫用生薑葱白爛搗和麵炒熱罨之衛生易簡

方同

從高墜下瘀血冲心欲死豆豉急救仙方用

一大盞

水兩椀煎三沸去滓服若復覺氣絕不能

言取藥不及急擊開口灌以熱水仙方以熱小便

灌之

經驗良方

閃胸

治壹切諸氣閃胸腰脚不能轉側

杜仲二兩去粗皮剉碎生薑自然汁浸一宿慢火炒蔣蘿壹兩微炒

右為細末每服貳錢溫酒調服 閃肭氣

痛陳皮湯下 心氣脾疼煨姜湯下 婦

人血氣艾醋湯下 小腸氣炒茴香湯下

治閃肭腰痛不能轉側右用神曲壹塊如拳

大燒通紅酒二大盞淬酒中覺酒溫便飲盡

仰卧少頃取效

打撲傷折

治打撲傷損筋骨

自然銅一錢火煨醋淬為末又用水飛過當歸 沒藥各半

右酒調服仍以手摩痛處

又方黃蘗壹斤半夏斤半

右為細末每用半兩生薑自然汁調塗損

處如折斷用絹帛封縛次用杉板扎定藥

乾頻上姜汁潤之

治瘀血流注紫黑或傷眼上血黑紫大黃末

用姜汁調塗壹夜壹次上藥上藥壹宿黑

治瘀血流注紫黑或傷眼上血黑紫大黃末

者紫二宿紫者即白矣
立應金絲膏治傷筋動骨損痛閃肭風毒惡
瘡風濕筋寒諸病難盡述其妙里友黃南隔
久廣用之尤為效驗

當歸尾 香白芷 杏仁去皮尖 草烏生剉用

猪牙皂角不蛀者去皮 葱連鬚葉肥者拾莖白

膠香明者八兩 瀝青明者八兩即 黃蠟明者一兩

香沒藥各半兩別研為末

右用清油七兩將藥六味依前法熬濾却

入膠香滴清攪勻下黃蠟又攪勻無烟方

下乳香沒藥半文

傷折二兩 糯米清

烏頭散治壹切折傷墜車墮馬折骨者先服

此然後用手法整療

川當歸二錢 草烏炮去皮尖三錢 白芷〇半

右為末溫酒調下二錢略麻後却整療揣

接

神驗膏治打撲傷損筋動骨不問手足腰背
並治之末備所論不二錢初和時盛熱攤

糯米粉壹飛羅麵壹馬屁字壹梳即灰菰○吳氏集驗

方一玫瑰如一碗大砂一右三味拌和於生布上篩下用生姜自然

汁半椀調却入後藥

牛皮膠二兩酸米醋壹梳

右先用醋熬牛皮膠化便入前所調三味

藥不住手攪成膏子以磁器盛之每遇磕

損以藥膏攤於紙上貼上傷處却用杉木

片夾定用厚衣服裹之勿令冷三兩日一

換若只傷筋骨貼上如火若筋損骨碎貼

上而痛如蟲行為妙初折傷者只三次効

白膏子治接骨右用牡蠣少許為末用糯米

粥調之塗其上却以杉木板夾之即愈

治墜馬失足或為物所壓痛極不可忍右先

用香白芷末和降真末等分童子小便和

酒溫調每服二錢外却以澤蘭葉當歸末

楠爛微炒盒傷處止痛

治打撲傷損右用生地黄芩根去皮或芩燒灰亦可杵爛半酒半童便濾藥汁調小便酒灌之

又方用金罌子葉細嚼哈之血止

治打傷刀傷血出不止用生葱炒熱罨傷處或用荷葉或用紫蘇葉或用血竭草並炒熱罨傷瘡處

治擗撲傷損或至折筋骨出者須要揣接骨

歸元位

五銖錢 十介火 乳香 各半 沒藥 兩

右為細末每服壹錢入麝香少許空心溫酒調下以食壓之

治擗撲傷損細研藕汁和酒飲亦效打撲出血悶絕用小便灌之火傷悶絕冷小便灌之

醫方類聚卷之一百八十七

新藥方

林澤山血調藥用小野藟之火粉調藥小
赤藤藥身身藤藤藤甘味酸潤亦效

補藥下以介類之

補藥下以介類之

補藥下以介類之

補藥下以介類之

補藥下以介類之

