

備急千金要方卷第二十四

解毒并
鞞治

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院上護軍賜緋魚袋員外郎億等校鑒

解食毒第一

解百藥毒第二

解五石毒第三

蠱毒第四

胡臭漏腋第五

脫肛第六

癰瘤第七

癩病第八

陰瘡
如精瘡附

解食毒第一

論三十九首

金澤文庫

論曰凡人跋涉山川不諳水土人畜飲啖誤中於毒素不知方多遭其斃豈非枉橫也然而大聖又設其法以救養之正

爲食生嗜藥忽而不學一朝逢遇便自甘心竟不識其所以
今述神農黃帝解毒方法好事情者可少留意焉

治諸食中毒方

飲黃龍湯及犀角汁無不治也飲馬尿亦良

治食百物中毒方

掘廁傍地深一尺以水滿坑中取廁籌七枚燒令煙以投
坑中乃取水汁飲四五升即愈急者不可得但掘地著水即
取飲之

又方 含貝子一枚須臾吐食物差

又方 服生韭汁數升

治飲食中毒煩懾方

苦參三兩咬咀以酒二升半煮取一升頓服之取吐愈

治食六畜肉中毒方

各取六畜乾屎末水服之佳若是自死六畜肉毒水服黃蘖
末方寸匕須更復與佳

又方 燒小豆一升末服三方寸匕神良

又方 水服龜底黃土方寸匕

治食生肉中毒方

掘地深三尺取下土三升以水五升煮土五六沸取上清飲
一升立愈

治食牛肉中毒方

狼牙灰水服方寸匕良一作猪牙

又方 温湯服豬脂良

又方 水煮甘草汁飲之

治食牛馬肉中毒方

飲人乳汁良

治食馬肉血洞下欲死方

豉粒二百

杏人枝二十

右二味咬咀蒸之五升米下飯熟擣之再服令盡

又方 蘆根汁飲以浴即解

治食狗肉不消心中堅或腹脹口乾大渴急發熱狂言妄語
或洞下方

杏人一升合皮研以沸湯三升和絞取汁分三服狗肉皆
完片出即靜良驗

治食猪肉中毒方

燒豬屎末服方寸匕犬屎亦佳

治食百獸肝中毒方

頓服豬脂一斤佳亦治陳肉毒

治生食馬肝毒殺人方

牡鼠屎二七枚兩頭尖者是以水研飲之不差更作

治食野菜馬肝肉諸脯肉毒方

取頭垢如棗核大吞之起死人

又方 燒狗屎灰水和絞取汁飲之立愈

又方 燒猪骨末之水服方寸匕日三服

治漏脯毒方

張文仲云茅室漏
水沾脯爲漏脯

擣韭汁服之良大豆汁亦得

治鬱肉濕脯毒方

張文仲云肉閉在密器中經宿者爲鬱肉

燒狗屎末水服方寸匕凡生肉熟肉皆不用深藏密蓋不泄氣皆殺人又肉汁在器中密蓋氣不泄者亦殺人

治脯在黍米中毒方

麴一兩以水一升鹽兩撮煮服之良

治中射罔脯毒方

末貝子水服如豆佳不差又服食餅臙中毒亦同用之
人以雉肉作餅臙因食皆吐下治之方

服犀角末方寸匕得靜甚良

凡食鵝鴨肉成病脣滿面亦不下食者治之方

服秫米泔良

治食魚中毒方

煮橘皮停極冷飲之立驗

肘後方去治食魚
中毒面腫煩亂者

治食魚中毒面腫煩亂及食鱸魚中毒欲死者方

剉蘆根春取汁多飲良并治蟹毒亦可取蘆葦茸汁飲之愈
治食魚鱠及生肉住脣膈中不化吐之不出便成癥瘕方

厚朴

三兩

大黃

二兩

右一味咬咀以酒二升煮取一升盡服立消人強者加大
黃用酒三升煮取二升再服之

治食魚鱠不消方

大黃切

三兩

朴消

兩

右二味以酒二升煮取一升頓服之

仲景方有橘皮

附後方云治食猪肉

一兩

遇冷不消必成癥下之方亦無橘皮

又方

春馬鞭草飲汁一升即消去也生薑亦良

附後方云治

諸吐藥

又方

鮀魚皮燒灰水服之無完皮壞刀裝取之一名鮀魚皮

古今錄驗

云治魚傷毒

又方 燒魚皮灰水服方寸匕

又方

燒魚鱠水服方寸匕食諸鮀魚中毒亦用之

治食蟹中毒方

冬瓜汁服二升亦可食冬瓜

治食諸菜中毒方

甘草

貝齒

胡粉

右三種各等分治下篩以水和服方寸匕小兒尿乳汁共
服二升亦好

治食山中樹菌毒方

人屎汁服一升良

解百藥毒第二

論一
首十二首

解毒三十八條

論曰甘草解百藥毒此實如湯沃雪有同神妙有人中烏頭
巴豆毒甘草入腹即定中藜蘆毒葱湯下咽便愈中野葛毒
土漿飲訖即止如此之事其驗如反掌要使人皆知之然人
皆不肯學誠可歎息方稱大豆汁解百藥毒余每試之大懸
絕不及甘草又能加之爲甘豆湯其驗尤奇有人服玉壺丸

治嘔不能已百藥與之不止藍汁入口即定如此之事皆須
知之此則成規更不須試練也解毒方中條例極多若不指
出一二學者不可卒知餘方例爾

百藥毒

甘草

薺莧

大豆汁

藍汁及實汁根汁

石藥毒

白鴨屎 人參汁

雄黃毒

防已

礬石毒

大豆汁 白鵝膏

金銀毒

服水銀數兩即出 鴨血及屎汁

雞子汁及屎白燒豬脂和服水淋雞屎汁煮葱汁

鐵粉毒

礞石

防葵毒

葵根汁

桔梗毒

白粥

甘遂毒

大豆汁

芫花毒

防已 防風

甘草

桂汁

大戟毒

菖蒲汁

野葛毒

雞子清

葛根汁

甘草汁

鴨頭熱血

猪膏

雞屎

人屎

藜蘆毒

雄黃

煮葱汁

溫湯

烏頭天雄

附子毒

大豆汁

遠志

防風

棗肉

飴糖

射罔毒

藍汁

大小豆汁

竹瀝

大麻子汁

六畜血

貝齒屑

蚯蚓屎

藕莢汁

半夏毒

生薑汁及煮乾薑汁

躡躅毒

梔子汁

茛菪毒

薺莞

甘草

犀角

蟹汁

升麻

狼毒毒

杏人

藍汁

白斂

鹽汁

木占斯

巴豆毒

煮黃連汁

大豆汁

生霍汁

肘後云
小豆霍

菖蒲汁

煮寒水石汁

蜀椒毒

葵子汁

桂汁

豉汁

人尿

冷水

土漿

蒜

雞毛燒吸煙及水調服

雞子毒

淳醋

斑猫元青毒

猪膏

大豆汁

戎盐

蓝汁

鹽湯煮猪膏

巴豆

馬刀毒

清水

杏人毒

藍子汁

野芋毒

土漿

人糞汁

諸菌毒

掘地作坑以水沃中攬之令濁澄清飲之名地漿
解一切毒藥發不問草石始覺惡即服此方

生麥門冬

葱白

豉

右三味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

解諸毒雞腸草散方

雞腸草

三分

薜荔

升麻

各四分

芍藥

當歸

甘草

各一分

藍子

合

全土

右八味治下篩水服方寸匕多飲水爲佳若爲蜂蛇等衆
毒蟲所螫以針刺螫上血出著藥如小豆許於瘡中令濕
差爲射罔箭所中削竹如釵服長一尺五寸以綿纏繞水
沾令濕取藥內瘡中隨瘡深淺令至底止有好血出即休
若服藥有毒水服方寸匕毒解痛止愈

解毒藥散方

薜荔

藍

并花二分

右二味七月七日取藍陰干擣篩水和服方寸匕日三

又方 中毒者取秦蠶毛三七枚燒灰服
解一切毒方

母猪屎水和服之又水三升三合和米粉飲之
解鴉毒及一切毒藥不止煩渴方

甘草 蜜各四分 梁米粉半升

右三味以水五升煮甘草取二升去滓歇大熱內粉湯中
攬令勻調內白蜜更煎令熟如薄粥適寒溫飲一升佳
治食荳菪悶亂如卒中風或似熱盛狂病服藥即劇方

飲甘草汁藍青汁即愈

治野葛毒以死口噤者方

取青竹去兩節即柱兩脇脣上內冷水注之暖即易之須臾
口開即服藥立活惟須數易水

治鉤吻毒困欲死面青口噤逆冷身痺方

附後方云鉤吻葉黃食
片相似而所生之傍無

他草又莖有毛
候食之殺人

薺蕘八兩咬咀以水六升煮取三升冷如人體服五合日三夜二凡煮薺蕘惟令濃佳

又方 煮桂汁飲之

又方 啫葱涕葱涕治諸毒

治腹中有鐵方

白折炭刮取末并花水服三錢不過再服

服藥過劑悶亂者方

吞雞子黃 飲藍汁 水和胡粉 地漿

蘘荷汁 糜米瀋 豉汁 乾薑

黃連 餡糖 水和葛粉

解五石毒第二

論三首 方三十五首
證二十八條

論曰人不服石庶事不佳惡瘡疥癬溫疫瘧疾年年常患

寢食不安興居常惡非止已事不康生子難育所以石在身
中萬事休泰要不可服五石也人年三十已上可服石藥若
素肥充亦勿妄服四十已上必須服之五十已上三年可服
一劑六十已上二年可服一劑七十已上一年可服一劑

又曰人年五十已上精華消歇服石猶得其力六十已上轉
惡服石難得力所以常須服石令人手足溫暖骨髓充實能
消生冷舉措輕便復耐寒暑不著諸病是以大須服凡石皆
熟煉用之凡石之發當必惡寒頭痛心悶發作有時狀如溫
瘡但有此兆無過取冷水淋之得寒乃止一切冷食惟酒須
溫其諸解法備如後說其發背疽腫方在第三十二卷中

又曰凡服石人甚不得雜食口味雖百品具陳終不用重食
其肉諸雜既重必有相賊聚積不消遂動諸石如法持心將
攝得所石藥爲益善不可加余年三十八九嘗服五六兩乳

自是以來深深體悉至於將息節度頗識其性養生之士宜留意詳焉然其乳石必須土地清白光潤羅紋鳥翮一切皆成乃可入服其非土地者慎勿服之多皆殺人甚於鴉毒紫石白石極須外內映徹光淨皎然非此亦不可服寒石五石更生散方舊說此藥方上古名賢無此漢末有何俟者行用自皇甫士安已降有進餌者無不發背解體而取顛覆余自有識性已來親見朝野仕人遭者不一所以寧食野葛不服五石明其大大猛毒不可不慎也有識者遇此方即須焚之勿久留也今但錄主對以防先服者其方以從煙滅不復須存爲含生害也

鍾乳對木又對栝樓其治主肺上通頭胷木動鍾乳胷塞短氣鍾乳動木頭痛目疼又鍾乳雖不對海蛤海蛤能動鍾乳鍾乳動則目疼短氣有時木動鍾乳直頭痛胷塞然鍾乳與

術爲患不過此也雖所患不同其治一矣發動之始要有所由
始覺體中有異與上患相應便速服此葱白豉湯方

葱白伴

豉升

甘草

人參

各三兩外臺用
吳茱萸二升

右四味㕮咀先以水一斗五升煮葱白作湯澄取八升內藥
煮取三升分三服便使人按摩搖動口中嚼物然後
仰卧覆以暖衣汗出去衣服湯熱歇即便冷濤飯燥脯而
已若服此不解復服甘草湯方

甘草

三兩

桂心

二兩

豉升

葱白伴

右四味合服如上法若服此已解肺家猶有客熱餘氣復
服桂心湯方

桂心

麥門冬、葛根

人參

甘草、葛根

葱白伴

豉升

右六味合服如前法

此方與次後散發身躰生瘡

麥門冬湯方用重分兩小匙

身躰生瘡

流黃對防風又對細辛其治主脾胃通主腰脚防風動流黃
煩熱脚疼腰痛或嗔忿無常或下利不禁防風細辛能動流
黃而流黃不能動彼始覺發便服杜仲湯方

杜仲兩

枳實

甘草

李核人絡二

梔子人絡十四

香豉半

右六味合服如上法若不解復服大麥奴湯方

大麥奴兩

甘草

人參

芸消

桂心絡三

麥門冬半

右六味合服如上法若服此已解脾胃猶有餘熱氣或冷
復服人參湯方

人參

乾薑

甘草

當歸絡一

附子一枚

右五味合服如上法

白石英對附子其治主胃通主脾胃附子動白石英煩熱腹

脹白石英動附子嘔逆不得食或口噤不開或言語難手脚
疼痛如覺發宜服生麥門冬湯方

生麥門冬四兩

甘草

麻黃各二兩

豉半升

右四味合服如上法不解更服大黃湯方

大黃三兩

豉半升

甘草二兩

梔子人梅三十枚

若煩加細辛五兩

右五味合服如上法頻頻服之得下便止不下服盡若熱
勢未除視瞻高而患渴復服栝樓根湯方

栝樓根

大麥奴各四兩

甘草二兩

葱白伴

豉半升

右五味合服如上法稍稍一兩合服之隱約得一升許便
可食少糜動口若已解胃中有餘熱復服芒消湯方

芒消

桂心各一兩

通草

甘草各三兩

白术

兩

李核人

三斤

大棗

廿枚

紫石英對人參其治主心肝通主腰脚人參動紫石英

外臺細

辨人參心急而痛或驚悸不得眠日恍惚忘誤失性發狂昏

昏欲眠或憒憒喜嗔或差或劇乍寒乍熱或耳聾耳目闇又

防風雖不對紫石英紫石英猶動防風

巢源外臺云防風雖不對紫石英而能動紫石英爲

藥中亦有人參緣防風動人參轉相發動令人亦心痛煩熱

頭項強始覺服此人參湯方

外臺麻黃湯

人參

白术

各三

甘草

外臺

桂心

各二

細辛

兩

豉升

三

右六味合服如上法若嗔盛加大黃黃芩梔子各三兩若忘誤狂發猶未除服麥門冬湯方

外吉室此方治舉石發

生麥門冬

半斤

甘草

三

人參

一

豉升

葱白

半斤

右五味合服如上法溫牀暖覆牀下著火口中嚼物使偏身汗一日便解若心有餘熱氣更服人參湯方

人參

防風

甘草 各三兩

桂心 二兩

生薑

白朮 各一兩

右六味合服如上法

赤石脂對桔梗其治主心通至胷背桔梗動石脂心痛寒嗽手腳逆冷心中煩悶赤石脂動桔梗頭痛目赤身體壯熱始覺發宜溫清酒飲之隨能否須酒勢行則解亦可服大麥麪方大麥熬令汗出燥止勿令大焦春去皮細擣絳篩以冷水和服之 千金翼去皮淨淘蒸熟暴乾熬令香乃未之

礬石無所偏對其治主胃發則令人心急口噤骨節疼強或節節生瘡始覺發即服葱白豉湯方 外臺云服麥門冬湯

葱白半

豉半

甘草 二兩

右三味以水六升煮取二升半分三服

若散發身體卒生瘡宜服生麥門冬湯方

生麥門冬兩

甘草三兩

桂心二兩

人參半兩

葱白二升

豉半升

右六味服如解鍾乳湯法

术對鍾乳木發則頭痛目疼或舉身壯熱解如鍾乳法
附子對白石英亦對赤石脂附子發則區逆手腳疼體強骨
節痛或項強面目滿腫發則飲酒服麪自愈若不愈與白石
英同解

人參對紫石英人參發則煩熱頭項強解與紫石英同

桔梗對赤石脂又對茯苓又對牡蠣桔梗發則頭痛目赤身
體壯熱解與赤石脂同茯苓發則壯熱煩悶宜服大黃黃芩

湯方

大黃 黃芩 桔子人略三

豉升

葱白切一

右五味㕮咀以水六升煮取二升半分三服

牡蠣發則四肢壯熱心腹煩悶極渴解與赤石脂同乾薑無所偏對

海蛤對栝樓海蛤先發則手足煩熱栝樓先發則噤寒清涕出宜服栝樓根湯方

栝樓根

甘草略一

大黃兩

桔子人枚十四

右四味合服如解鍾乳法

石流黃發通身熱兼腰膝痛

白石英發先腹脹後發熱

紫石英發乍寒乍熱

赤石脂發遍身發熱兼口噤

牡蠣發頭痛而煩滿熱

海蛤發心中發熱

茯苓發直頭痛

桔梗發頭面熱

石流黃與石桔梗牡蠣茯苓此五物發宜浴白石英亦可小浴其餘皆不宜浴譽石發宜用生熟湯茯苓發熱多攻頭即以冷水洗身漬之

浴法初熱先用暖水後用冷水浴時慎不可洗頭垂沐可以二三升灌之凡藥宜浴便得解即佳不差可餘治之赤石脂紫石英發宜飲酒得酒即解凡藥發或有宜冷或有宜飲酒不可一槩也

又一法云寒食散發動者云草藥氣力易盡石性沈滯獨主胃中故令數發欲服之時以絹袋盛散一匕著四合酒中

塞其口一宿之後飲盡之其酒用多少將御節度自如舊法此則藥石之勢俱用石不住胃中何由而發事甚驗也治食宿飯陳臭肉及羹宿菜發者宜服梔子豉湯方

梔子

三十七枚

香豉

三升

甘草

三兩

右三味㕮咀以水八升煎取三升分三服亦可加入參葱白

失食發宜服葱白豉湯飲酒過醉發亦宜服葱白豉湯方

葱白

一升

豉

半升

乾薑

五兩

甘草

二兩

右四味㕮咀以水七升煮取三升分三服服湯不解宜服理中湯方

人參

甘草

白朮

三兩

乾薑

二兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升半分三服

瞋怒太過發宜服人參湯方

人參 枳實 甘草

分各九

桔梗根 乾薑

白朮 分六

右六味咬咀以水九升煮取三升分三服若短氣者稍稍

數飲

千金翼云主散發氣逆心腹絞痛不得氣息命在轉燭者

情色過多發宜服黃耆湯

方本闕

將令太過發則多壯熱以冷水洗浴然後用生熟湯五六石灌之已食少暖食飲少熱酒行步自勞

將熱太過發則多心悶時時食少令食若夏月大熱之時散發動多起於渴飲多所致水和少麩服之不差復作以差爲度若大小便秘塞不通或淋瀝溺血陰中疼痛此是熱氣所致熨之即愈

熨法前以冷物熨少腹已又以熱物熨之又以冷物熨之若小便數此亦是取冷所爲暖將理自愈

若藥發下利者乾服或即斷能多益佳

凡服散之後忽身體浮腫多是取冷過所致宜服檳榔湯方

檳榔三十枚搗碎以水八升煮取二升分再服

咬咀其皮以湯七升煮取三升去滓內子未為再服

千金翼云子搗作末下篩

凡散發瘡腫方

蔓菁子熬

杏仁

黃連

胡粉一兩

水銀二兩

右五味別擣蔓菁子杏仁如膏以豬脂合研令水銀滅以塗上日三夜一

散發赤腫者當以膏摩之方

生地黃五兩

大黃兩

杏仁四兩

生商陸三兩

右四味切醋漬宿猪膏一升煎商陸令黑去滓摩之日

散發生細瘡方

黃連 芒消 酥五

右二味咬咀以水八升煮黃連取四升去滓內芒消令烊
漬布取帖瘡上數數易之多少皆著之

散發瘡痛不可忍方

冷石三兩下篩粉瘡上日五六度即燥痛須臾定

治服散忽發動方

乾薑五兩咬咀以水五升煮取三升去滓內蜜一合和絞
頓服之不差重作

解散除熱鴨通湯方

白鴨通

五升沸湯二斗半淋之澄清取二斗汁

麻黃八兩

豉半升

冷石二兩

甘草五兩

石膏三兩

梔子人故二十

右六味㕮咀以鴨通汁煮六升去滓內豉三沸分服五合
若覺躊躇小便快閑其間若熟猶盛小便赤促服之不限
五合宜小勞之漸進食不可令食少但勿便多耳
解散治盛熱實大小便赤方

升麻

大黃

黃連

甘草

黃蘖

芍藥

兩

白鴨通飴

黃芩

兩

梔子

人

樹

竹葉

切

豉

升

右十一味㕮咀以水三斗先煮鴨通竹葉取一斗二升去
滓澄清取一斗內藥煮取三升分三服若上氣者加杏仁
五合腹滿加石膏三兩

下散法主藥發熱困方

千金翼云凡散數發熱無賴下去之又云諸丹及金石等同用之

黍米一升作糜以成煎猪脂一斤和之令調宿不食空腹
食之令飽晚當下藥神良不盡熟發更含服之

又方

肥猪肉伍

葱白

薤白半

右三味治如食法合煮之宿不食頓服之令盡不盡明日更服

壓藥發動數數患熱困下之方

猪腎脂具不令中水以火炙之承取汁適寒溫一服三
合一日夜五六服多至五六升二日藥稍稍隨大便下出

又方

作肥猪肉臚一升調如常法平旦空肚頓服令盡少時腹
中雷鳴鳴定藥下隨下以器盛取用水濤之得石不盡更
作如前服之

蟲毒第四論一首

論曰蠱毒千品種種不同或下鮮血或好卧闇室不欲光明

或心性反常乍嗔乍喜或四肢沈重百節酸疼如此種種狀
白說不可盡亦有得之三年乃死急者一月或百日即死其
死時皆於九孔中或於脇下肉中出去所以出門常須帶雄
黃麝香神丹諸大辟惡藥則百蟲貓鬼狐狸老物精魅永不
敢著人養生之家大須慮此俗亦有灸法初中蠱於心下捺
便大炷灸一百壯并主猫鬼亦灸得愈又當足小指尖上灸
三壯當有物出酒上得者有酒出飯上得者有飯出肉菜上
得者有肉菜出即愈神驗皆於灸瘡上出

凡中蠱毒令人心腹絞切痛如有物齒或吐下血皆如爛肉
若不即治蝕人五藏盡乃死矣欲驗之法當令病人唾水沈
者是蠱不沈者非蠱也

凡人患積年時復大便黑如漆或堅或薄或微赤者皆是蠱也
凡人忽患下血以斷下方治更增劇者此是中蠱也

凡卒患血痢或赤或黑無有多少此皆是蠱毒庵臘醫以斷
痢藥處之此大非也

世有拙醫見患蠱脹者徧身腫滿四肢如故小便不甚澀以
水病治之延日服水藥經五十餘日望得痊愈日復增加奄
至墮歿如此者不一學者當細尋方意消息用之萬不失一
醫方千卷不盡其理所以不可一一備述云耳

凡人中蠱有人行蠱毒以病人者若服藥知蠱主姓名當使
呼喚將去若欲知蠱主姓名者以敗鼓皮燒作末以飲服方寸
匕須臾自呼蠱主姓名可語令去則愈又有以蛇涎合作蠱
藥著飲食中使人得瘕病此一種積年乃死療之各自有藥江
南山間人有此不可不信之

太上五蠱丸治百蠱吐血傷中心腹結氣堅塞咽喉語聲不
出短氣欲死飲食不下吐逆上氣去來無常狀如鬼祟身體

浮腫心悶煩疼寒戰夢與鬼交狐狸作魅卒得心痛上又肩
脇痛如刀刺經年累歲著牀不起悉主之方

雄黃

椒目

巴豆

莽草

芫花

真朱

外臺用木香

鬼臼

礬石

藜蘆

斑猫

三十枚

蜈蚣

二枚

獺肝

一分

附子

五分

右十三味末之蜜和更擣三千杵丸如小豆先食飲服一
丸餘密封勿泄藥氣十九爲一劑如不中病後日增一丸
以下痢爲度當下蠱種種狀見不可具述下後七日將息
服一劑三十年百病盡除忌五辛

太一追命丸治百病若中惡氣心腹脹滿不得喘息心痛積
聚臚脹疝瘕宿食不消吐逆嘔嘔寒熱瘞瘞毒婦金產後
餘疾方

蜈蚣

丹砂

附子

礬石

一作礬石

雄黃

藜蘆

鬼臼

巴豆

分

右八味末之蜜丸如麻子一服二丸日一服傷寒一二日服一丸當汗出綿裹兩丸塞兩耳中下利服一丸一丸塞下部蠱毒服二丸在外膏和摩病上在膈上吐膈下痢有瘡一丸塗之毒自出產後餘疾服一丸耳聾綿裹塞耳

治人得藥雜蠱方

斑蝥

六枚

桂心

大指

金月

下土

如彈丸大

藜蘆

大指

右四味治下篩水服一錢匕下蟲蛇蝦蟆蟻毒俱出

治蠱注四肢浮腫肌膚消索欬逆腹大如水狀死後轉易家

人一名蠱脹方

小品名雄黃丸
一名萬病丸

雄黃

巴豆

莽草

鬼臼

蜈蚣

一枚

右五味末之蜜和擣三千杵密封勿泄氣勿宿食旦服如小豆一丸一炊不知更加一丸當先下清水次下蟲長

數寸及下蛇又下蝦雞子或白如膏下後作葱豉粥補之百種暖將息

治中蠱毒腹內堅如石面目青黃小便淋瀝病變無常處方

肘後古今錄驗方俱云用鐵精烏雞肝和丸如梧子以酒服三丸日再甚者不過十日千金用後方疑千金誤

羖羊皮

犀角

芍藥

黃連

牡丹

梔子人一枚

襄荷半兩

右七味㕮咀以水九升煮取三升分三服

葛氏崔氏同無芍藥牡丹梔子用苦杏仁

參升麻當歸

犀角丸治蠱毒百病腹暴痛飛尸惡氣腫方

犀角屑 羚羊角屑

鬼臼屑

桂心末

錢七

天雄

莽草

真朱

雄黃

各一

貝子

燒五枚

蜈蚣

伍節

射罔

如雞子黃大一枚

巴豆

枚五十

麝香

二分

右十三味末之合擣蜜丸如小豆服一丸日二含咽不知少增之卒得腹滿蜚尸服如大豆許二丸若惡氣腫以苦酒和塗之縫袋子盛藥繫左臂辟不祥鬼疰蠱毒可以備急治蠱毒方

茜根

蘘荷根

各三兩

右二味㕮咀以水四升煮取二升頓服

肘後方云治中蠱吐血或下血皆如爛肝者自知

蠱主
姓名

又方

槲樹北陰白皮

桃根皮

各五兩

亂髮灰

一方

生麻子汁

五升

蝟皮灰

右五味先煮槲皮桃根取濃汁一升和麻子汁髮灰等令勻患人少食旦服大升一升須臾著盆水以雞翎搘吐水中如牛涎續胎及諸蟲並出

治蠱毒方

槲樹北陰白皮一大握長五寸水三升煮取一升空腹服
即吐蟲出亦治中蠱下血

又方 蜈蚣灰水服方寸匕亦出蟲

又方

五月五日桃白皮

必效方去以東引者火烘之

大戟

分四

班猫

分一

右三味治下篩量空腹以水一雞子許服八捻用二指相著
如開頓服之若指頭相離取藥太多恐損人矣用後方云服藥
更一服必效方云服半寸匕其毒即出不出更二服
李饒州云若以酒中得則以酒服以食中得以飲服之

蛇毒入菜果中食之令人得病名曰蛇蠱方

大豆末以酒漬絞取汁服半升

治諸熱毒或蠱毒臯中及口中吐血醫所不治方

取人屎尖七枚燒作火色置水中研之頓服即愈亦解百
毒時氣熱病之毒服已溫覆取汗勿輕此方極神驗

治蠱吐下血方

檉皮

廣五寸尺

蘆荻根

五寸如足大指小品方用薑薇根

右二味咬咀以水二升煮取一升頓服極下蠱

治中蠱下血日數十行方

巴豆

二十七

藜蘆

元青

附子

礬石硝

右五味末之別治巴豆合篩和相得以綿裹藥末如大豆內
下部中日三差

又方

苦瓠一枚以水二升煮取一升稍稍服之當下蠱及吐蝦

蠍蟻斗之狀一月後乃盡

范汪方云苦瓠毒當臨時量用之附方云用苦酒一升煮

治下血狀如雞肝腹中攬痛難忍者方

茜根

升麻

犀角各三兩

桔梗

黃芩

黃芩各一兩

地榆

白蘞荷各四兩

右八味咬咀以水九升煮取二升半分三服此蠱利血用之

又方

桔梗

犀角

右二味各等分爲末酒服方寸匕日三不能自服絞口與之藥下心中當煩須臾自靜有頃下服至七日止可食猪脾藏自補養治蠱下血如雞肝日夜不解欲死者皆可用之治腸蠱先下赤後下黃白沫連年不差方

牛膝一兩搗碎切之以淳清酒一升漬宿旦空腹服之再服便愈

北地太守酒主萬病蠱毒風氣寒熱方

烏頭

甘草

芎藭

黃芩

桂心

藜蘆

附子

各四兩

白斂

桔梗

半夏

柏子仁

前胡

麥門冬

各六兩

右十三味七月麴十斤秫米一斛如醞酒法咬咀藥以絹袋盛之沈於瓮底酒熟去糟還取藥滓青布袋盛之沈著酒底泥頭秋七日夏五日冬十日空肚服一合日三以知爲度藥有毒故以青布盛之服勿中止二十日大有病出其狀如漆五十日病悉愈有婦人年五十被病連年腹中積聚冷熱不調時時切痛達臍絞急上氣脣滿二十餘年服藥二七日所下三四升即愈又有女人病偏枯絕產服二十日吐黑物大如刀帶長三尺許即愈其年生子又有女人小得癲病服十八日出血二升半愈有人被杖崩血內瘀卧著九年服藥十三日出黑血二三升愈有人耳聾十七年服藥三十五日聰中出血三升耳中出黃水五升便愈

右方玄惠平二年北地太守臣光上然此偏主蠱毒有人
中蠱毒者服無不愈極難差不過三七日所有效莫不備
出曾有一女人年四十餘偏枯羸瘦不能起長卧牀枕耳聾
一無所聞兩手不收已經三年余爲合之遂得平復如舊有
人中蠱毒而先患風服茵芋酒傷多吐出蠱數十枚遂愈
何況此酒而不下蠱也嘉其功效有異常方故具述焉

胡臭漏腋第五

論十五首

論曰有天生胡臭有爲人所染臭者天生臭者難治爲人所
染者易治然須三年醋傅礬石散勿止并服五香丸乃可得
差勿言一度傳藥即差止可傳藥時暫得一差耳五香丸在
第六卷中凡胡臭入通忌食共臺五辛治之終身不差

治胡臭方

辛夷

芎藭

細辛

杜蘅

藁本

絡

右五味咬咀以淳苦酒漬之一宿煎取汁傳之欲傳取臨
卧時以差爲度

石灰散主胡臭方

石灰

外

青木香

楓香

一作沈香

薰陸香

丁香

各二兩

橘皮

陽起石

各三兩

礬石

四兩

右八味治下節以綿作篆子分麧如指長四寸展取藥使著
篆上以絹袋盛著腋下先以布揩令痛然後灸之

又方

青木香

附子

白灰

附一兩

礬石

兩半

右四味爲散著粉中常粉之

附後無
礬石

又方

赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布裹熨腋下令復易

又方

槲葉切三升以水五升煮取一升用洗腋下即以白苦瓠
燒令煙出熏之數數作

又方

辛夷 細辛 芎芻 青木香各四分

右四味治下篩熏竟粉之

又方

馬齒菜一束檣碎以蜜和作團以絹袋盛之以泥紙裏厚
半寸暴干以火燒熟破取更以少許蜜和使熱勿令冷先
以生布揩之夾藥腋下藥痛久忍之不能然後以手中
勒兩臂

又方

牛脂 胡粉各等

右二味煎令可丸塗腋下一宿即愈不過三劑

附後方去
槲以塗

又方 伏龍肝作泥傳之

又方 三年苦酢和石灰傳之

治漏腋腋下及足心手掌陰下股裏常如汗濕臭者六物傳方

乾狗杞根

乾薑微根

附後作畜根

甘草各半兩

商陸根

胡粉

渭石脂

右件藥治下篩以苦酒少少和塗當微汁出易衣復更塗之不過三著便愈或一歲復發發復塗之

又方

水銀

胡粉

外臺作粉霜

右二味以面脂研和塗之大良驗

又方

銀屑一升

作銅屑

石灰三升

右二味合和絹囊盛汗出粉之妙

又方 正旦以尿洗腋下神妙

文方

黃礬石燒令汁尽治末絹袋盛粉之即差

脫肛第六

方十三首
灸法三首

肛門主肺肺熱應肛門熱則閉塞大行不通腫縮生瘡兒通方
白蜜三升煎令燥冷水中調可得爲丸長六七寸許內肛
門中到身向上頭面下少時取烊斯須即通洞泄

肛門主大腸大腸寒應肛門寒則洞瀉肛門滯出猪肝散方

猪肝

所
金
燥
熬

黃連

阿膠

芎藭

各二
兩

烏梅肉

五
兩

艾葉

一
兩

右六味治下篩溫清酒一升服方寸匕半日再若不能酒

與清白米飲亦得

治肛門滯出壁土散方

故屋東壁土碎升

皂莢

三挺各長一尺三寸

右二味擣土爲散搗粉肛頭出處取皂莢炙暖更遞熨取入則止

又方 灸故麻履底按令入頻按令入永差

又方

故敗麻履底

敝鼈頭一枚

右二味燒鼈頭擣爲散傅肛門滯出頭將履底按入即不出矣

治肛出方

磁石四兩

桂心一尺

蝟皮一枚

右三味治下篩飲服方寸匕日一服即縮慎舉重及急帶

衣斷房室周年乃佳

附後方去治女人陰脫出外用鼈頭一枚爲四味

又方 女萎一升以器中燒坐上熏之即入

治脫肛方

蒲黃二兩以豬脂和傅肛上內之二三愈

治腸隨肛出轉廣不可入方

生栝樓根取粉以豬脂爲膏溫塗隨手抑按自得縮入

治積冷利脫肛方

枳實一枚石上磨令滑澤鑽安柄蜜塗炙令煖熨之冷更易之取縮入止

又方 鐵精粉內上按令入即愈

治脫肛歷年不愈方

生鐵三斤以水一斗煮取五升出鐵以汁洗日再

又方

用死鼈頭一枚燒令煙縮治作屑以傅肛門上進以手按之病寒冷脫肛出灸臍中隨年壯

脫肛歷年不愈灸橫骨百壯

又灸龜尾七壯龜尾即後窮骨是也

癰瘤第七方十三首
灸法十一首
證一條

治石癰氣癰勞癰主癰疽癰等方

海藻

龍膽

海蛤

通草

昆布

礬石

一作
礬石

松蘿

各三
分

麥麴

四
分

半夏

二
分

右九味治下篩酒服方寸匕日三禁食魚猪肉五辛生菜諸難消之物十日知二十日愈

五癰丸方

取鹿膾以佳酒浸令沒炙乾內酒中更炙令香含咽計味盡更易盡十具愈

又方

小麥麪升

特生礬石兩

海藻一

右三味以三年米醋漬小麥麪暴乾各擣爲散合和服一
方寸匕日四五服藥含極乃咽之禁薑五辛猪魚生菜大
吹大讀誦大叫詎等

又方

昆布

松蘿

海藻各二兩

桂心

海蛤

通草

白斂各二兩

右七味治下篩酒服方寸匕日三

又方

海藻

海蛤各三兩

昆布

半夏

細辛

土瓜根

松蘿各一兩

通草

白斂

龍膽各二兩

右十味治下篩酒服方寸匕日再不得作重用力

又方

昆布二兩洗切如指大醋漬含咽汁盡愈

又方

海藻一斤小品三兩

小麥麪升一

右二味以三年醋一升溲麪末暴乾往反醋盡合擣為散酒服方寸匕日三忌努力崔氏云療三十年癰瘤

又方

菖蒲二兩

海蛤

白斂

續斷

海藻

松蘿

桂心

蜀椒

半夏

到掛草

神麴一兩

羊蠶面百枚

右十二味治下篩以羊牛髓脂爲丸如梧子日服三丸

癰上氣短氣炎肺輸百壯

癰上氣脣滿炎雲門五十壯

癰惡氣炎天府五十壯

灸金翼云又百壯

癰勞氣炎衝陽隨年壯

癰灸天瞿三百壯橫三間寸灸之

癰氣面腫灸通天五十壯

癰灸中封隨年壯在兩足趺上曲尺宛宛中
諸癰灸肩髃左右相對宛宛處男左十八壯右十七壯女右
十八壯左十七壯或再三取差止

又灸風池百壯俠項兩邊

又灸兩耳後髮際一百壯

又灸頭衝一作頸衝頭衝在伸兩手直向前令臂著頭對鼻所注

處灸之各隨年壯一千金翼去一名臂膚

凡肉瘤勿治治則殺人慎之肘後方去不得針灸

陷腫散治二三十年癰瘤及骨瘤脂瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤
或息肉大如杼杼升斗十年不差致有漏潰令人骨消肉盡
或堅或軟或潰令人驚悸寤寐不安身體瘦縮愈而復發方

烏賊骨

石流黃各一

白石英

紫石英

鍾乳各二

丹參三分

琥珀

附子

胡鷺屎

大黃

乾薑各四

右十一味治下篩以韋囊盛勿泄氣若瘡濕即傳若瘡乾
豬脂和傅日三四以乾爲度若汁不盡者至五劑十劑止
藥令人不痛若不消加芒消二兩佳

治癰瘤方

海藻

乾薑各二

昆布

桂心

逆流水柳鬚各一

一兩

羊麝陰乾

七枚

右六味末之蜜丸如小彈子大含一丸咽津

又方

礬石

芎藭

當歸

大黃

黃連

芍藥

白斂

黃芩各二

吳茱萸一分

右九味治下篩雞子黃和之塗細故布上隨瘤大小厚薄
帖之乾則易著藥熟常作膿脂細細從孔中出也探却膿
血盡著生肉膏若膿不盡復起如故

生肉膏主癰瘤潰漏及金瘡百瘡方

當歸

附子

甘草

白芷

芎藭各一錢

白芍兩

生地黃

右七味㕮咀以豬脂三升半煎白芷黃去滓稍以傳之三
又方

以狗屎蝦雞子傳之去膿水如前方說傳生肉膏取差方
在第二十二卷

陰癩第八

論二首

方二十七首

論曰癩有四種有腸癩邠脹氣癩水癩腸癩邠脹難差氣
癩水癩針灸易治

治癩丸方

桃人五瓣

桂心

澤瀉

蒺藜子

地膚子

防風

防葵

橘皮

茯苓

五味子

芍藥兩

細辛

牡丹皮

海藻一

狐陰一

蜘蛛五瓣

右十六味末之蜜和服十九如梧子稍稍加至三十九

又方

取楊柳枝脚指大長三尺二十枚水煮令極熟以故布及腫掩腫處取熟柳枝更互柱之如此取差

治癩疝偏大氣上作脹不能動方

牡丹皮

防風一

右二味下篩酒服方寸匕日三

精後方云小品方用桂心鼓鐵等分爲五味小兒一丸

十日愈嬰兒以乳汁和大豆許與之

治卒癩以蒲橫度口如廣折之一倍增之布著少腹大橫文
令度中央上當臍勿使偏僻灸度頭及中央合二處隨年壯
好自養勿舉重大語怒言大笑又牽陰頭正上灸莖頭所極
又牽下向穀道又灸所極又牽向左右髀直行灸莖所極各
隨年壯又灸足厥陰在左灸右在右灸左三壯在足大指本
節間

卯偏大上入腹灸三陰交在內踝上八寸隨年壯

卯偏大癩病灸肩井在肩解臂接處隨年壯

男癩灸手季指端七壯病在右可灸左手者灸右

男陰卯偏大癩病灸關元百壯

男陰卯偏大癩病灸玉泉百壯報之穴在屈骨下陰以其處卑
多不灸之及泉陰穴亦在其外

男陰卯偏大癩病灸泉陰百壯三報在橫骨邊

癩病陰卒腫者令並足合兩拇指令爪相並以一艾灸兩爪端方角處一丸令頓上兩爪角各令半丸上爪指佳七壯愈

男陰疝大癩病灸足太陽五十壯三報之

又灸足太陰五十壯在內踝上二夫

男陰疝大癩病灸大敦在足大指三毛中隨年壯

又灸足大拇指內側去端一寸赤白肉際隨年壯雙灸之

又灸橫骨兩邊二七壯俠莖是

陰癩灸足大指下理中十壯隨腫邊灸之

肘後方云灸足大指第
二節下橫文正中央五
壯

壯
大指本三壯

男兒癩先將兒至碓頭祝之曰坐汝令兒某甲陰囊癩故灸汝三七二十一枚灸訖便牽小兒令雀頭下向著囊縫當陰頭灸縫上七壯即消已驗艾炷猾簪頭許

大凡男癩當騎碓軸以莖伸置軸上齊陰莖頭前灸軸木上

隨年壯

論曰有人自少至長陰下常有乾癬者宜依癬方主之有五勞七傷而得陰下癢濕搔之黃汁出者宜用補丸散主之仍須傳藥治之亦有患妬精瘡者以妬精方治之夫妬精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門內並似甘瘡作曰齊食之大痛甘即不痛也

凡虛熱石熱當路門冷濕傷肌熱聚在裏變成熱及水病腫滿腹大氣急大小便不利腫如皮紙盛沓光晃如老蠶色陰莖堅腫爲瘡水出此皆腎熱虛損強取風陰濕傷脾胃故也治之法內宜依方服諸利小便藥外以此蒺藜子湯洗四肢竟以葱白膏傳之別以猪蹄湯洗莖上蒺藜子湯方

蒺藜子

赤小豆一升

菘菜子半升

巴豆

一枚合皮殼

葱心青皮升

葫蘆五

右六味㕮咀以水二斗煮取八升以淋洗腫處

猪蹄湯治服石發熱因勞損熱盛當風露卧莖腫方

猪蹄

生一
双

荸薺子

五

蒺藜子

碎一
升

黃蘖

兩

蒴藋

三
升

右五味㕮咀以水一斗煮取三升冷浴陰莖日三

葱白膏方

葱白

菘菜子

荸薺子

蒴藋根

丹參

蒺藜子

猪膏

伍

右七味㕮咀煎如煎膏法去滓用之

治男子陰腫大如升斗核痛人所不能療者方

雄黃

研一
兩

礬石

研二
兩

甘草

切一
尺

右三味以水五升煮減半洗之

礬驗方無礬

治陰腫皮癢方

熬桃人令香爲末酒服方寸匕日三

有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼痛即癟作夜

不得眠方

取生椒擇之令淨以布帛裹著丸囊令厚半寸須臾熱氣通日再易之取消差止

又方 擣莧菜根傳之

又方

煮大薊根汁服一升日三不過三劑愈

又方

酢和熟灰熨之

又方

金月下土雞子白和傳之

又方

醋和麪熨之

又方

末車前子飲服之

陰腫痛灸大敦三壯

治卒陰痛如刺汗出如雨方

小蒜

韭根

楊柳根絡

右三味合燒以酒灌之及熱以氣蒸之即愈

治陰痛方

甘草

石蜜

右二味等分爲末和乳塗之

治妬精瘡方

用銀釵綿裹以臘月猪脂熏黃火上煖以釵烙瘡上令熟
取乾槐枝燒滷塗之

又方

麝香

黃礬

青礬

右三味等分爲末小便後傅上不過三度

治陰蝕瘡方

蒲黃升一

水銀兩二

右二味研之令成粉傅之即愈差止小便後即傅之

又方

以肥豬肉五斤水三斗煮肉令極爛去肉以湯令極熱便
以清瘡中冷即愈

又方

狼牙兩把切以水五升煮取一升溫洗之日五度

治陰蝕生瘡或癰方

雄黃

礬石各三

麝香半

右三味治下篩爲粉粉瘡上即差

治陰惡瘡方

蜜煎甘草末塗之

葛氏云比見有人患莖頭腫坎下瘡欲斷者以豬肉湯潰洗之并用黃蘖膏未塗之

治男女陰瘡方

石流黃末以傳瘡上

治男女陰癢生瘡方

嚼胡麻傳之佳

治陰下生瘡洗湯方

地榆

黃蘖各八兩

右二味咬咀以水一斗五升煮取六升去滓適冷暖用洗
瘡日再只煮黃蘖汁洗之亦佳

備急千金要方卷第二十四

備急千金要方卷第二十五 備急

朝奉郎太常卿充秘閣校理判閩行檢院正護軍賜緋魚袋巨林億等校正

卒死第一

溺

凍

醉酒附

渴

蛇毒第二

虎

蠍

蜂

貓鬼

蠻蠻

射工

沙虱

被打第三

從高墮下

水毒

著漆附

竹木刺

火瘡第四

灸

金瘡

卒死第一

方九十四首

灸法十首

卒死無脉無他形候陰陽俱竭故也治之方

牽牛臨臯上三百息牛舐必差牛不肯舐著鹽汁塗
面上即牛肯舐

又方

牛馬矢絞取汁飲之無新者水和乾者亦得射後方
乾者

此扁鵲法之

又方 灸熨斗熨兩脇下

備急方云
又治戶厥

卒死針間使各百餘息

又灸鼻下人中一名鬼客廳

肘後方云
又治尸厥

治魘死不自覺箸方

慎燈火勿令人手動牽牛臨其上即覺若卒不能語

取東門上雞頭末之以酒服

治卒魘死方

擣韭汁灌鼻孔中劇者灌兩耳

張仲景云
灌口中

治鬼魘不悟方

末伏龍肝吹鼻中

又方

末皂莢如大豆許吹鼻中嚏則氣通起死人

集驗方云
治中惡

辟魘方

雄黃如棗大係左腋下令人終身不厭

張文仲去男左女右

厭灸兩足大指叢毛中各二七壯

肘後方去華佗法又救卒死中惡

治中惡方

葱心黃刺臯孔中血出愈

肘後方去入七八寸無苦使目中血出佳崔氏去男左女右

又方 大豆二七粒末雞子黃并酒相和頓服

又方 使人尿其面上愈

肘後方去鵲法

治中惡并蠱毒方

冷水和伏龍肝如雞子大服之必吐

又方 温二升豬肪頓服之

又方 車軒脂如雞子大酒服之

中惡灸胃管五十壯愈

治卒忤方

此病即今人所謂中惡者與卒死鬼擊亦相類爲治皆參取而用之

鹽八合以水三升煮取一升半分二服得吐即愈

備急

方去治
鬼擊後方去治鬼用若小便不通筆頭七枚燒作灰末水和服之

即通

又方

犢子屎半盞酒三升煮服之亦治霍亂附後方去治鬼用大牛亦可用

又方

臘月野狐腸燒末以水服方寸匕死鼠灰亦佳

又方

書墨末之水服一錢匕

卒忤死

灸手十指爪下各三壯餘治同上方

備急方去治卒死而張目反折者

又灸人中三壯又灸肩井百壯又灸間使七壯又灸巨闕百壯還魂湯主卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺或已死絞口噤不開去齒下湯湯入口不下者分病人髮左右捉踏肩引之藥下復增取盡一升須臾立蘇方

麻黃三兩

桂心二兩

甘草一兩

杏仁七十粒

右四味㕮咀以水八升煮取三升分三服

肘後方去張仲景方無桂心用三味

卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絕方

雄黃粉酒服一刀圭日三血化爲水

鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀胃腸腹內絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻口血出或下血一名鬼排治之方

雞屎白如棗大

青花麻一把

右二味以酒七升煮取三升熱服須更發汗若不汗熨斗盛火炙兩脇下使熱汗出愈

又方

艾如雞子大三枚以水五升煮取一升頓服之

又方 吹酢少許鼻中

鬼擊灸人中一壯立愈不差更灸

又灸臍上一寸七壯及兩踵白肉際取差又灸臍下一寸

三壯

夫五絕者一曰自縊二曰墻壁厭達三曰溺水四曰麁寐五
曰產乳絕悉治之方

取半夏一兩細下篩吹一大豆許內鼻中即活心下
溫者一日亦可治

治自縊死方

凡救自縊死者極須按定其心勿截繩徐徐抱解之心
下尚溫者以鼈脣覆口鼻兩人吹其兩耳

又方

強卧以物塞兩耳竹筒內口中使兩人痛吹之塞口
傍無令氣得出半日死人即噫噫即勿吹也

又方 捣皂莢細辛屑如胡豆大吹兩鼻中

又方 藍青汁灌之

又方 刺雞冠血出滴著口中即活男雌女雄

又方

雞屎白如棗大酒半盞和灌口及鼻中佳

又方 葱葉吹皂莢末兩鼻中逆出更吹

又方

梁上塵如大豆各一小竹筒中四人各捉一箇同
時吹兩耳兩鼻即活

又方 雞血塗喉下

又方

尿鼻口眼耳中并捉頭髮一撮如筆管大掣之立活
自縊死灸四肢大節陷大指本文名曰地神各七壯

治熱渴方

取道上熱塵土以壅心上少冷即易氣通止

又方

仰卧喝人以热土壅脐上令人尿之脐中温即愈

又方

可飲熱湯亦可內少乾薑橘皮甘草煮飲之稍稍咽勿頓使飽但以熱土及熬灰土壅上佳

又方

濃煮蓼蕡取汁三升飲之即愈不差更灌

又方

地黃汁一盞服之

又方

水半升和麪一大抄服之

又方

張死人口令通以緩湯徐徐灌口中小卒死人頭令
湯入腹須臾即蘇

又方

灌地漿水一盞即愈

又方

使人噓其心令緩易人爲之

又方 抱狗子若雞著心上熨之

又方 屋上南畔瓦熱熨心令易之

治落水死方

以竈中灰布地令厚五寸以竈側著灰上令死人伏於竈上使頭小垂下抄鹽二方寸匕內竹管中吹下孔中即當吐水水下因去竈下死人著灰中壅身使出鼻口即活

又方

掘地作坑熬數斛灰內坑中下死人覆灰濕徹即易之勿令大熱燭人灰冷更易半日即活

又方

取大竈傾之死人伏其上令死人口臨竈口然葦火二七把燒竈中當死人心下令煙出小入死人鼻口

中臯口中水出盡則活火盡復益之常以手候死人
身及甑勿令甚熱當令火氣能使死人心下足得暖卒
無甑者於岸側削地如甑空下如竈燒令煖以死人
著上亦可用車轂爲之勿令隱其腹令死人低頭水
得出并炒灰數斛令暖以粉身濕更易溫者

又方 但埋死人煖灰中頭足俱沒惟開七孔

又方

倒懸死人以好酒灌臯中又灌下部又酢灌臯亦得
又方 綿裹皂莢內下部中須臾水出

又方

裏石灰內下部中水出盡則活

又方

倒懸解去衣去臍中垢極吹兩耳起乃止

又方

熬沙覆死人面上下有沙但出臯口耳沙冷濕即易

又方

竈中灰二石埋死人從頭至足出七孔即可

又方

屈兩脚著生人兩肩上死人背向生人背即負持走
行吐出水便活

落水死解死人衣灸臍中凡落水經一宿猶可活

治冬月落水凍四肢直口噤尚有微氣者方

以大器中熬灰使煖盛以囊薄其心上冷即易心煖
氣通目得轉口乃開可溫尿粥稍稍吞之即活若不
先溫其心便持火炙身冷氣與火爭即死

治凍爛瘡方

猪後懸蹄以夜半時燒之研細篩以猪脂和傅亦治
小兒

治入水手足腫痛方

生胡麻擣薄之

治酒醉中酒恐爛五藏方

以湯著槽中漬之冷復易夏亦用湯

又法

凡醉不得安卧不動必湏使人搖轉不住特忌當風
席地及水洗飲水交接

又方 捣茆根汁飲二升

治飲酒頭痛方

竹筍五兩以水八升煮取五升去滓令冷內破雞子
五枚攬勻更煮三沸飲二升使盡差

治飲酒腹滿不消方

煮鹽湯以竹筒灌大孔中

治飲酒中毒方

煮大豆三沸飲汁三升

又方 酒漬乾椹汁服之

治病酒方

豉 茄白

右二味以水四升煮取二升頓服之

治飲酒房勞虛受熱積日不食四月中熱飲酒不已酒入血脉心氣虛令人錯謬失常方

芍藥

桔梗根

人參

白薇

枳實

知母

略二

甘草

兩

生地黃

八兩

酸棗仁

半升

茯神

三兩

外臺

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分爲三服

治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡方

大麻仁

黃芩

二兩用黃芩後

右二味末之蜜和丸含之

千金翼用黃芩二兩

治酒醉不醒方

葛根汁一斗二升飲之取醒止後方去治大醉
日煩毒不堪

飲酒令人不醉方

柏子人

麻子人各二兩

右二味治下篩爲一服進酒三倍

又方

葛花

小豆花

各等分

右二味合爲末服三方寸匕飲時仍進葛根汁芹汁及枇杷葉飲竝能倍酒

又方 九月九日菊花末臨飲服方寸匕

又方 小豆花葉陰乾百日末服之

又方 五月五日取井中倒生草枝陰乾末酒服之

飲酒令無酒氣方

乾葛蔓菁根二七枚三偏蒸末兩分酒後水服之

治惡酒健噴方

空井中倒生草燒灰服之勿令知

又方 取其人牀上塵和酒飲之

斷酒方

酒七升著餅中熟朱砂半兩著酒中急塞餅口安著
猪圈中任猪搖動經十日取酒服飲尽

又方

臘月鼠頭灰

柳花

右二味等分爲末黃昏時酒服一桮

又方 正月一日酒五升淋碓頭擣一下取飲之

又方

故籜中菜耳子七枚燒作灰黃昏時煖一杯酒呪言

與病狂人飲也勿令知之後不喜飲酒也

又方 白猪乳汁一升飲之永不飲酒

又方 刮馬汗和酒烏飲終身不飲

又方 虎屎中骨燒末和酒烏飲

又方 麷鷄屎灰水服方寸匕永斷

又方 取毛鷹一過吐毛水煮去毛頓服

又方 故紡車絃燒灰和酒烏服

又方 驢駒衣燒灰酒飲方寸匕

又方 自死蠍螬乾擣末和酒烏飲永世聞酒名即嘔神驗

又方 酒客吐中肉七枚陰乾燒末服之

又方 酒漬汗靴替一宿旦空腹烏即吐不喜見酒

又方 白狗乳汁酒服之

又方 腻月馬腦和酒服之

蛇毒第二

論六首 綱法三首

方一百三十三首

治因熱逐涼睡熟有蛇入口中挽不出方

以刀破蛇尾內生椒三兩枚裹著須臾即出

肘後方
云艾灸

蛇尾即出若無火以刀周匝割之
尾截令皮斷乃捋皮倒脣即治蛇

治蛇入人口并七孔中者方

割母猪尾頭瀝血著口中即出

又方

以患人手中指等截三歲大猪尾以器盛血傍蛇寫

血口中拔出之

治卒爲蛇繞不解方

以熱湯淋之無湯令人尿之

治蛇蠍蟻方

服小蒜汁滓薄上膚

後方云
蝮蛇蟻

又方 熟擣葵取汁服之

治蛇毒方

人屎厚塗帛裹即消

治蛇毒方

消蠟注瘡上不差更消注之

又方 以母猪耳中垢傅之

肘後方云牛耳中垢亦宜用

治蝮蛇毒方

令婦人尿瘡上

又方 令婦人騎度三過又令坐上

又方 末薑薄之乾復易

又方 以射罔塗腫上血出即愈

又方 生麻楮葉合擣以水絞去滓瀆之

治衆蛇毒方

雄黃

乾薑
附等

右二味爲末和射罔著竹筒中帶行有急用之

又方 雄黃末傅瘡上日一

又方 用銅青傅瘡上

又方 捣大蒜和胡粉傅之

又方 雞屎二七枚燒作灰投酒服之

又方

以麪圍上令童男尿著中燒鐵令赤投中冷復燒著

二三度更差

又方 口嚼大豆葉塗之良

又方 猪脂和鹿角灰塗之

又方 鹽四兩水一斗煮十沸沸定以湯浸冷易之

又方 捣紫覓取汁飲一升以滓封瘡以少水灌之

又方 梳中垢如指大長一寸取和傳之

又方 灸梳汗出熨之

又方 取合口椒葫荽苗等分擣傅之無不差

又方 男子陰間毛二七枚含之有汁即咽却秘方

衆蛇螫灸上三七壯無艾以火頭稱瘡孔大小執之

入山草辟衆蛇方

乾薑 麝射香 雄黃

右三味等分鹿髓擣以小絳袋盛帶之男左女右蛇毒塗瘡

集驗方云如無麝香以射罔和帶之
急方云以蜜和爲膏傳敷處良

又方 常燒羖羊角使煙出蛇則去矣

治蛇螫入瘡已愈餘毒在肉中淫淫痛癢方

大蒜 小蒜各一

右三味合擣之熱湯淋以斗灌瘡大良

治蛇骨刺人毒痛方

鐵精如大豆內管中吹內瘡中良

又方 燒死鼠末傳之

治虎咬瘡方

煮葛根令濃以洗之十徧飲汁及擣爲散以葛根汁
服方寸匕日五甚者夜二

治虎齒瘡方

青布急卷爲繩止二物燒一頭燃內竹筒中注瘡口
熏瘡妙

又方 蒸鐵令濃洗瘡

又方 嚼栗子塗之良

辟虎法

凡入山燒水牛羖羊角虎狼蛇皆走

論曰凡見一切毒蟻之物必不得起惡心向之亦不得殺之
若輒殺之於後必遭蟻治亦難差慎之慎之

治蟻毒方

凡蟻有雌雄雄者痛止在一處雌者痛牽諸處若是
雄者用井底泥塗之溫則易雌者用當瓦屋溝下泥
傳之若值無雨可用新汲水從屋上淋下取泥

又方

取齒中殘飯傳之又猪脂封之又射罔封之又硇砂
和水塗上立愈

治蟻螯方

若著手足以冷水潰之水微暖則易之著餘處者冷
水浸故布擣之小暖則易

又方 生烏頭末唾和傳之

治蜂螫蟲毒方

取瓦子摩其上唾二七遍置瓦子故處

治蜂螫蟲方

蜜

五合

蠟

二兩

豬脂

五畝

右三味和煎如膏候冷以塗之

又方 燒牛屎灰苦酒和塗之

又方 燒蜂房末膏和塗之附後方云先煮蜂房洗之又燒塗之

又方 酥脂塗之立愈

又方 淳酢沃地取起泥塗之

又方 止齒垢塗之

又方 嚼鹽塗之

又方 尿泥塗之

又方 以人尿新者洗之

又方 反手捻地上土傅之

論曰凡蠼螋蟲尿人影著處便令人病瘡其狀身中忽有處
瘳痛如芒刺亦如刺蟲所赦後起細痞癟作聚如茱萸子狀
熱劇者連起竟腰脇胷也治之法初得之摩犀角塗之止其
毒治如火丹法余以武德中六月得此疾經五六日覺心悶
不佳以他法治不愈又有人教盡地作蠼螋形以刀子細細
盡取蠼螋腹中土就中以唾和成泥塗之再塗即愈將知天
下萬物相感莫曉其由矣

治蠼螋尿方

羖羊羨燒灰臘月猪脂和封之

又方 捣豉封之

又方 醉和胡粉塗之

治蠅蠍尿瘡方

燒鹿角爲末以苦酒和傅瘡上已有汁者燒道傍弊
蒲蓆傳之

又方

槐白皮半斤切以苦酒二升漬半日刮去瘡處以洗
日五六遍末赤小豆以苦酒和傅之燥復易小兒以
水和

又方 酒大麥以傅之日三

又方 以猪脂糞巢中土和傅之

又方 熟嚼蘿蔴葉以水和塗燥復易之

又方 馬鞭草熟擣以傅之燥則易之

又方 取吳茱萸東行根下土酢和塗之

治三種射工蟲毒方

論曰江南有射工毒蟲一名短狐一名蜮其蟲形如甲蟲蠹
云正黑狀如大飛生

有一長角在口前如弩檣臨其角端曲如上弩以氣爲矢因水勢以射人人或聞其在水中鉢鉢作聲要須得水沒其口便射人此蟲畏鵝鵝能食之其初始證候先惡寒噤瘻寒熱筋急仍似傷寒亦如中尸便不能語朝旦小蘇晡夕輒劇寒熱悶亂是其證始得三四日當急治之治之稍遲者七日皆死初未有瘻但惡寒噤瘻其成瘻似蠅蠅屎亦似癰疽瘻射工中瘻有三種其一種瘻正黑如臘子皮周邊悉赤或衣犯之如有芒刺痛其一種作瘻久久穿或晡間寒熱其一種如火灼熛起此者最急數日殺人備急方云有四種其一種突起如蠅治射工中人寒熱或發瘻偏在一處有異於常方

取鬼臼葉一把內苦酒漬之熟擣絞取汁服一升日三

又方

犀角二兩

升麻三兩

烏扇根二兩

右三味咬咀以水四升煮取一升半去滓分再服相去一
炊頃盡更作

又方

取生吳茱萸莖葉一握斷去前後取握中熟擣以水
二升煮取七合頓服之

又方

取葫切帖瘡灸七壯

又方

取蜈蚣大者一枚火炙之治末和苦酒以傅瘡上

又方

赤莧菜擣絞取汁一服一升日四五服

又方

白雞屎取白頭者三枚湯和塗中毒處

治射工中人已有瘡者方

取芥子擣令熟苦酒和厚塗瘡上半日痛便止

又方

取狼牙葉冬取根擣之令熟薄所中處又飲四五回計

治射工中三種瘡方

烏扇根兩

升麻二

右二味㕮咀以水三升煮得一升適寒溫盡服之漚薄瘡上
治江南毒氣惡核射工暴腫生瘡五香散方

甲香

犀角

鼈甲

薰陸香

升麻

烏翫

丁香

青木香

沈香

黃連

甘草

牡蠣

羚羊角

黃芩

各四
吳茱萸

黃蘖

六分

右十六味治下篩中射工毒及諸毒皆水服方寸匕日三
以雞子白和塗腫上乾易之并以水和少許洗之

野葛膏主射工惡核卒中惡毒方

野葛升

茵芋

躄躅

附子

丹砂

各一
兩

巴豆

烏頭

蜀椒

各五

雄黃

大黃

各一
兩

右十味治下篩不中水猪膏三斤煎三上三下去滓內丹
砂雄黃末攬至凝以棗核大摩痛上勿近眼凡合名膏皆
不用六畜產婦女人小兒雞犬見之惟須清淨矣

治沙虱毒方

斑貓二枚熬一枚末服之又燒一枚令烟絕末著瘡中

又方

大蒜十枚止一物合皮安熱炭中炮令熱去皮刀斷
頭熱挂所著毒處

又方

麝香

大蒜

右二味和擣以羊脂和著小筒中帶欲用取傅瘡上

又方

雄黃

朱砂

恒山

右三味等分五月五日日中時童子合之用傅瘡上

山水中陰濕草木上石蛭著人則穿齦人肌膚行人肉中浸

淫墳起如蟲行道治之方

凡行山路草木中常以臘月猪膏和鹽塗脚脰及足指間跌上及著鞋鞚蛭不得著人也已著者灸斷其道即愈

治水毒方

論曰凡山水有毒蟲人涉水中人似射工而無物其診法初得之惡寒微似頭痛目眩疼心中煩懊四肢振慄腰背百節皆強兩膝痛或翕翕而熱但欲睡旦醒暮劇手足逆冷至肘膝二三日腹中生蟲食人下部肛中有瘡不痛不癢令人不覺不急治過六七日下部出膿潰蟲上食人五藏熱盛毒煩下利不禁八九日良醫不能治矣覺得之急早視其下部若有瘡正赤如截肉者陽毒最急若瘡如鯉魚齒者爲陰毒猶小緩要皆殺人不過二十日也欲知是中水與非者當作五

六升湯以小蒜五升㕮咀投湯中消息勿令大熱去滓以浴之是水毒身體當發赤斑無異者非也當以他病治也

治中水毒方

取梅若桃葉擣絞取汁三升許或乾以少水絞取汁飲之小兒不能飲以汁傅乳頭與喫

又方

擣荳耳汁服一升又以綿裹杖沾汁導下部日二過即差

又方

蓼一把擣以酒和絞取汁一升服之不過三服外臺府後作蓼葉又方 藍一把擣水解以塗浴面目身體令徧

又方

擣蛇苺根末水飲之并導下部生者用汁凡夏月行

常多齋此藥屑入水以方寸匕投水上流無所畏又

辟射工凡洗浴以少許投水盆中即無復毒

治人忽中水毒手足指冷或至肘膝者方

浮萍草燒乾末之酒服方寸匕

又方 吳茱萸升

生薑切一
升半

犀角

升麻

橘皮
升二

烏梅
枝十四

右六味㕮咀以水七升煮取二升分二服

治貓鬼野道病歌哭不自白方

五月五日自死赤蛇燒作灰以井花水服方寸匕日一針灸方在第十四卷中

又方 腦月死貓兒頭灰水服一錢匕日二

治貓鬼眼見貓狸及耳雜有所聞方

相思子 草麻子 巴豆
格一

朱砂末

蠟銖四

右五味合擣作丸先取麻子許大含之即以灰圍患人前
頭著一斗灰火吐藥火中沸即畫火上作十字其猫鬼竝
皆死矣

治蜘蛛咬人方

人尿傳又油淀傳又炮薑貼之又猢猻屎傳之
又方 烏麻油和胡粉如泥塗上乾則易之

治馬齧人及踰人作瘡毒腫熱痛方

馬鞭梢長二寸

鼠屎二七枚

右二味合燒末以猪膏和塗之立愈

外臺方云治瘡爛經久不愈者肘後

燒方云用馬鞭皮末和金

治馬齧人陰夕脫出方

推內之以桑皮細作線縫之破烏雞取肝細剉以封
之且忍勿小便即愈

治犬馬齶及馬骨刺傷人及馬血入舊瘡中方

取灰汁熱漬瘡常令汁器有火數易汁勿令爛人肉
三數日漬之有腫者炙石熨之日二消止

治馬血入瘡中方

服人糞如雞子復以糞傅瘡上

又方 取婦人月水傅之神良

治剥死馬馬骨傷人毒攻欲死方

便取馬腸中屎以塗之大良燉灰服方云取其屎

治馬汗馬毛入人瘡中腫痛欲死方

以水漬瘡數易水便愈又以石灰傅之

又方 飲法酒法醋時愈

又方 燒雞毛翎末以酒服方寸匕

又方 以沸湯令得所浸洗之取差

論曰凡春末夏初犬多發狂必誠小弱持杖以預防之防而不免者莫出於灸百日之中一日不闕者方得免難若初見瘡差痛定即言平復者此最可畏大禍即至死在旦夕凡狂犬咬人著訖即令人狂精神已別何以得知但看灸時一度火下即覺心中醒然惺惺了了方知咬已即狂是以深須知此此病至重世皆輕之不以為意坐之死者每年常有吾初學醫未以為業有人遭此將以問吾吾了不知報答以是經吾手而死者不一自此銳意學之一解已來治者皆愈方知世無良醫枉死者半此言非虛故將來學者非止此法餘二一方皆須沈思留心作意慇懃學之乃得通曉莫以粗解一兩種法即謂知訖極自誤也聊因方末申此三言不盡意耳

又曰凡猘犬咬人七日輒應一發三七日不發則脫也要過

百日乃得免耳每到七日輒當擣韭汁飲之一二升又當終身禁食犬肉蠶蠅膿食此則發死不可救矣瘡未愈之間禁食生魚及諸肥膩冷食但於飯下蒸魚及於肥器中食便發矣不宜飲酒能過一年乃佳

集驗方云若重發者生食蠶膾人絕良亦可燒多食之不必令其人

知初得齧便爲之則後不發也

獵犬齧人方

擣地榆絞取汁塗瘡無生者可取乾者以水煮汁飲之亦可末之服方寸匕日三兼傅之過百日止

又方

頭髮

猾皮

右二味各等分燒灰水和飲一杯口噤者折齒內藥

又方

擣韭絞取汁飲一升日三瘡愈止亦治愈後復發者

又方

以豆醬清塗之日三四

又方

刮虎牙若骨服方守七服

小品方云刮狼牙或虎骨末

已發狂如獵犬者服之即愈

治猘犬毒方

燒虎骨傳瘡及熨又微熬杏人擣研取汁服之良又
取燈盞殘油灌瘡口此皆禁酒猪肉魚生菜
又方 用韭根故梳二枚以水二升煮取一升頓服

又方 蝦蟇灰粥飲服之

又方

桃東南枝白皮一握水二升煮取一升分二服吐出
大子

又方 服良苦子七枚日一

又方 取猘犬腦傳上後不復發

又方 梅子末酒服之

治狂犬齧人方

蛇脯一枚炙去頭搗末服五分匕日三

又方 青布浸汁服三升

又方 飲驢尿一二升

又方 捣良薑根和鹽傅日三

凡猘犬所齧齒未盡其惡血毒者灸上一百壯已後當日灸一壯若不血出刺出其血百日灸乃止禁飲酒猪大肉治凡犬齧齒人方

熬杏人五合令黑碎研成膏傅之

又方 取竈中熟灰以粉瘡中帛裹繫之

又方 以沸湯和灰壅瘡上

又方 燒犬尾末傅瘡日三

又方 燒自死蛇一枚令焦末內瘡孔中

又方 以頭垢少少內瘡中

又方 鼠屎臘月猪膏和傅之

外臺方云用鼠一
膏煎傅之

又方 火炙蠅以灌瘡中

又方

飲生薑汁一升

小品方云治狂犬咬

韭汁亦佳

外臺方云亦治已差後復發者

又方

以熱牛屎塗之佳

又方

以苦酒和灰塗瘡中

又方

水洗瘡任血出勿止之水洗不住取血自止以綿裹

之差

治小兒狗齧方

月一日以水一升灌之勿令狗主打狗若月盡日三
升水灌之

治猪齧方

松脂煉作餅子貼上

又方 屋漏中泥塗上

被打第三論

論一
方九十三首

論曰凡被打損血闊搶心氣絕不能言可璧開口尿中令下咽即醒又墮落車馬及車輶木打已死者以死人安著以手袖掩其口鼻眼上壹食頃活眼開與熱小便貳升

治被打擊頭眼青腫方

灸肥豬肉令熱揜上

後方云治血聚皮膚間不消散者

又方 灸豬肝貼之

又方 新熟羊肉封之

又方 大豆黃末水和塗之

又方 墻上朽骨唾於石上研摩塗之乾即易

治從高墮落傷折疾痛煩躁啼叫不得卧方

取鼠屎燒末以猪膏和塗痛止即急裹之

後方云又裹骨破碎

治從高墮下及爲木石所迮或因落馬凡傷損血瘀凝積氣絕欲死無不治之方

取淨土五升蒸令溜分半以故布數重裹之以熨病上勿令大熱恐破肉冷則易之取痛止即已凡有損傷皆以此法治之神效已死不能言者亦活三十年者亦差

治墮車馬間馬鞍及諸物隱體肉斷方

以酢和麪塗之

當歸散治落馬墮車諸傷腕折臂腳痛不止方

當歸

桂心

蜀椒

附子

澤蘭

分

芍藥

分

甘草

分

右七味並熬令香治下篩酒服方寸匕日三凡是傷損皆服之十日愈小兒亦同

救急方云治墮馬落車被打傷腕拆臂叫喚痛聲不絕服此散呼吸

三之間不復大痛十
日筋骨相連

黃耆散治腕折方

黃耆

芍藥各三

當歸

乾地黃

附子

續斷

桂心

乾薑

通草

各二兩

大黃一兩

蜀椒合

烏頭畔

右十二味治下節先食酒服五分匕日三

無金翼

大黃

治折骨斷筋方

乾地黃

當歸

羌活

苦參各二分

右四味治下節酒服方寸匕日三

治腕折骨損痛不可忍者方

以大麻根及葉擣取汁飲一升無生麻煮乾麻汁服

亦主墜瘻打瘀血心腹滿短氣

治被傷筋絕方

取蟹頭中腦及足中髓熬之內瘡中筋即續生

治腕折四肢骨碎及筋傷蹉跌方

生地黃不限多少熟擣用薄所損傷處

肘後方去小品方爛擣熬

之以裹傷處以竹編夾裏令遍縛令急勿令轉動一日可十易三日差若血聚在折處以刀子破去血

治四肢骨碎筋傷蹉跌方

以水二升漬鼓三升取汁服之

又方

酒服鹿角散方寸匕日三

肘後方治從高墮下若爲重物所頓逢得瘀血者

又方 犊腦

兩 胡桃脂

髮灰

胡粉

各半

右四味擣和調如膏傅生布裹之

又方 筋骨傷初破時以熱馬屎傅之無瘢

又方

大豆二升水五升煮取二升以淳酒六七升合和豆

汁服之一日盡如湯沃雪

附後方去胎墮近藥無大豆用小豆微

治頭破腦出中風口噤方

大豆二斗熬去腥勿使太熟擣末熟蒸之氣徧合覲
下盆中以酒一斗淋之溫服一升覆取汗傳杏人膏
瘡上

治被傷風入四體角弓反張口噤不能言或產婦墮胎凡得
此者用紫湯大重者不過五劑方在第八卷中

治被打傷破腹中有瘀血方

蒲黃

升

當歸

桂心

略二

右三味治下篩以酒服方寸匕日三夜一

又方

劉寄奴

延胡索

骨碎補

略一

右三味咬咀以水二升煎取七合復內酒及小便各一合

熱溫頓服

又方

生地黃汁三升酒一升半煮取二升七合分三服

方治從高墮下瘀血脹心面青短氣欲死者服

又方 未茛菪子傅瘡上

又方

麌蟲

二兩

蟻蟲

五枚

水蛭

十枚

桃人

五十枚

桂心

二兩

大黃

五兩

右六味㕮咀以酒水合五升煮取三升分五服

治被打腹中瘀血并治婦人瘀血消之爲水白馬蹄散方

白馬蹄燒令煙盡擣篩酒服方寸匕日三夜一

治有瘀血者其人喜忘不欲聞人聲胷中氣塞短氣方

甘草

一兩

茯苓

二兩

杏仁

五十枚

右三味㕮咀以水二升煮取九合分二服

治被毆擊損傷聚血腹滿煩悶方

豉一升以水三升煮三沸分再服不差重作更取麻子煮如政法不差更作豉如上法

治丈夫從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡傷經崩中皆主之方

阿膠 艾葉 乾薑 酥二兩 芎藥三兩

右四味㕮咀以水八升煮取三升去滓內膠令消分二服
羸人三服兼治女人產後崩傷下血過多虛喘腹中絞痛
下血不止者服之悉愈

治男子傷絕或從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡傷經者大膠艾湯方

阿膠兩 乾地黃 芎藥六兩 艾葉

甘草

當歸

芎藭各二兩

乾薑一兩

右八味㕮咀以水八升煮取三升去滓內膠令烊分再服
羸人三服此湯治婦人產後崩傷下血過多虛喘欲死腹
中激痛下血不止者神良

治墮馬落車及樹崩血腹滿短氣方

大豆五升以水一斗煮取二升去豆一服令盡剉者
不過三作

治腹中瘀血痛在腹中不出滿痛短氣大小便不通方

荆芥

半分

䗪蟲

一枚十

大黃

芎藭

各三兩

蒲黃

五兩

當歸

桂心

甘草

各二兩

桃人

一枚三十

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

桃人湯治從高墮下落大木車馬脅腹中有血不得氣息方

桃人

一枚十四

大黃

消石

甘草

一兩

蒲黃半兩 大棗一枚

右六味咬咀以水三升煮取一升絞去滓適寒溫盡服之
當下下不止瀆麻汁一杯飲之即止

治墮落瘀血桃人湯方

桃人五十枚

大黃四兩

芸消三兩

桂心

當歸

甘草二兩

蟇蟲

水蛭各二枚

右八味咬咀以水八升煮取三升絞去滓適寒溫服一升
日三服

深師方無芸消

治療血湯方

大黃五兩

桃人五十枚

蟇蟲

麋蟲

水蛭各三十五枚

桂心二兩

右六味咬咀以酒水各五升合煎得三升適寒溫飲一升

日三服

竹皮湯治爲兵杖所加木石所迮血在脣背及脇中痛不得氣息方

青竹刮取箠雞子大二枚

亂髮雞子大一枚

右二味於炭火炙令焦燥合擣之下篩以酒一升煮之三沸止一服盡之三服愈

治腕折瘀血方

大黃

如指節
大一枚

桃人

四十枚

亂髮

一握

右三味以布方廣四寸以繞亂髮燒之咬咀大黃桃人以

酒三升煮取一升盡服之血盡出

肘後云仲景方用大黃

三兩紺帛子如手大灰

單布方一尺灰桃人肆拾玖枚

亂髮如雞子大灰久用炒

敗蒲席一握長三寸切甘草一枚如指大以童子小便量

次下大黃分溫爲三服別剉敗

多少煎湯成內酒一大盞次下大黃立

蒲席半領煎湯以浴衣被密覆服藥須通利數行痛楚立

勿沾利及浴水赤

也

又方

大黃

六兩

桂心

二兩

桃人

六十

右三味㕮咀以酒六升煮取三升分三服當下血差

治從高墮下有瘀血方

蒲黃

八兩

附子

一兩

右二味爲末酒服方寸匕日三不知增之以意消息

從高墮下崩中方

當歸

大黃

各二分

右二味治下篩酒服方寸匕日三

治墮落車馬心腹積血唾吐無數方

乾藕根末以酒服方寸匕日三如無取新者擣汁服

治腕折瘀血蒲黃散方

蒲黃

一升

當歸

二兩

右二味治下篩先食酒服方寸匕日三

治腕折瘀血方

童蟲一枚

牡丹一兩

右二味治下篩酒服方寸匕血化爲水

備急方去治久宿血在諸骨節及外

不去者二味等分

又方 薑藺草汁飲之亦可服子

又方

凡被打及產後惡血及一切血皆煮續骨木汁三升飲之

治杖瘡方

石灰六斗 新豬血一斗

右二味和爲丸熟燒之破更丸燒三徧止末傳之

又方 服小便良

又方 釜月下土細末油和塗羊皮上卧之

治竹木刺在皮中不出方

羊屎燥者燒作灰和猪脂塗刺上若不出重塗方言
不覺刺出時一云用乾羊屎末

治久刺不出方

服王不留行即出兼取根末貼之

治刺在人肉中不出方

煮山瞿麥汁飲之日三差止

又方

用牛膝根莖生者併擣以薄之即出瘡雖已合猶出也

又方 温小便潰之

又方 嚼豉塗之

又方 嚼白梅以塗之

肘後方
用烏梅

又方 白茅根燒末以膏和塗之亦治瘡因風致腫

又方 燒鹿角末以水和塗之立出久者不過一夕

治竹木刺不出方

薔薇灰水服方寸匕日三十日刺出

又方 燒鑿鑿柄灰酒服二寸匕

又方 酸棗核燒末服之

又方 頭垢塗之即出

治惡刺方

苦瓠開口內小兒尿煮兩三沸浸病上

又方 萆薢根水煮浸之冷復易神方

又方 濃煮大豆汁漬取差

又方 李葉棗葉擣絞取汁點之即效

治惡刺并狐尿刺方

以烏父驢尿漬之

又方 白馬屎溫漬之

凡因瘡而腫痛劇者數日死或中風寒或中水或中狐尿刺治之方

燒黍穰若牛馬屎若生桑條取得多煙之物燒熏汁出愈

又方 熟蠅內瘡中新瘡亦善

又方

以鳩公英草摘取根莖白汁塗之惟多塗爲佳差止
余以貞觀五年七月十五日夜左手中指皆觸着庭
樹至曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡目高大色
如熟小豆色嘗聞長者之論有些治方試復爲之手
下則愈痛亦即除瘡亦即差不過十日尋得平復此
大神効故疏之蜀人名耳瓣菜關中名苟乳

治瘡中水腫方

炭白灰胡粉等分脂和塗瘡孔上水出痛即止

治卒刺手足中水毒方

擣韭及藍青置上以火炙熱徹即愈

治瘡因風致腫方

櫟木根皮一斤濃煮內鹽一把漬之

治破傷風腫方

厚塗杏仁膏然麻燭遙炙之

凡因瘡而腫痛者皆中水及中風寒所作其腫入腹則殺人
治之方

溫桑灰汁漬令復溫之常令熱神秘

治刺傷中風水方

刮箭羽下漆塗之

又方 燒魚目灰傳之

又方 服黑牛熱屎一服二升三服即止

又方 耆韭熟搗之

又方 蟬一兩熱炙熨薄裏上令水出愈

凡八月九月中刺手足犯惡露腫殺人不可輕也治之方
生桑枝三枚內塘灰中推引之令極熱研斷正以頭
柱瘡口上熱盡即易之盡三枚則瘡自爛仍取薤白
擣綿裹著熱灰中使極熱去綿取薤白薄瘡上以布
帛急裹之若有腫者便取之用薤白第一佳

治漆瘡方

生柳葉三斤以水一斗五升細切煮得七升適寒溫

洗之日三

附方云者

妙

又方 以磨石下滓泥塗之取差止大驗

又方 蓮葉燥者一斤以水一斗煮取五升洗瘡上日再

又方 貫衆治末以塗上乾以油和之即愈

又方 羊乳汁塗之

又方 甘消五兩湯浸以洗之

又方 磬石著湯中令消洗之

又方 七姑草擣封之敷急方云七姑
和訖消塗之

又方 取猪膏塗之

又方 宜取猪肉爵穄穀塗之

又方

濃煮鼠杳葉以洗塗上亦可擣葉取汁以塗之

火瘡第四論

二首

方七十三首

論曰凡火燒損慎以冷水洗之火瘡得冷熱氣更深轉入骨壞人筋骨難差初被火燒急更向火炙雖大痛強忍之一食

久即不痛神驗治火燒悶絕不識人以新尿冷飲之及冷水
和蜜飲之口噤絞開與之然後治之方

梔子

枚十

白斂

黃芩

略五

右三味咬咀以水五升油一升合煎令水氣歇去滓冷之
以淋瘡令溜去火熱毒則肌得寬也作二日任意用膏傳
湯散治之

治火瘡敗壞方

柏白皮

生地黃

蛇銜

黃芩

梔子仁

苦竹葉

略一

右六味咬咀以羊髓半升煎之三上三下去滓塗瘡上差正

治火爛瘡膏方

柏白皮

兩四

竹葉

甘草

略二

右三味咬咀以猪脂一斤半煎三上三下去滓冷以傳之

集驗方用生
地黃四兩

又方 榆白皮嚼熟塗之

治火燒瘡方

死鼠頭一枚臘月猪膏煎令消盡以傳乾即傳差不作癥神効亦治小兒火瘡

又方 丹參無多少以羊脂猪髓腦煎

治火瘡敗壞方

柏白皮切以臘月猪膏合淹相得煮四五沸色變去

滓傅瘡上

後方云白皮

治火瘡方

末熬油麻和梔子人塗之惟厚爲佳已成瘡者燒白

糖灰粉之即燥立差

治一切湯火所傷方

初著即以女人精汁塗之差

治湯沃人肉爛壞方

杏人 附子

格二 甘草一兩

羊脂

五兩

松脂

雞子大

右五味咬咀以不中水猪膏五兩煎塗之

灸及湯火所損晝夜啼呼止痛減瘢方

羊脂

松脂

格二

猪膏

蠟一斤

右四味取松脂破銚中切脂嚼蠟著松明上少傾微火燒諸物皆消以盃承汁傳松明是肥松木節也

治灸瘡方

甘草

當歸

一格

胡麻

粉臺用

羊脂

六分

右四味咬咀以猪膏五合煎去滓傳之

又方 凡灸瘡不差日別灸上六七壯自差

又方 松脂

五兩

蠟

三

右二味合煎塗紙貼之日三

又方 塗車軒脂

又方

石灰一兩細末絳篩猪脂和相得微火上煎數沸以
煙湯先洗瘡訖以布裹灰熨瘡上三過便以藥貼瘡
上炙之又擣薤傳之

治灸瘡痛腫急方

擣龜下黃土以水和煮令熱漬之

治灸瘡薤白膏生肉止痛方

薤白

兩

羊髓

斤

當歸

兩

白芷

兩

右四味㕮咀合煎以白芷色黃藥成去滓取傳之日三

灸瘡膿壞不差方

臘月猪脂

薤白

壹握

胡粉

壹兩

右三味先煎薤白令黃去之綿裹石灰一兩煎數沸去之
入胡粉內膏中令調塗故布貼之曰三

又方 白蜜

一兩

烏賊骨

一兩

右二味相和塗之

治灸瘡中風冷腫痛方

但向火炙之瘡得熱則瘡快至痛止日六七炙愈

治針灸瘡血出不止方

燒人屎灰以傅之

又方 死蟻娘末豬脂塗之

論曰治金瘡者無大小冬夏及始初傷血出便以石灰厚傅
裏之既止痛又速愈無石灰亦可用若瘡甚深未宜速合
者內少滑石令瘡不時合也凡金瘡出血其人必渴當忍之
敢燥食并肥脂之物以止渴慎勿鹹食若多飲粥及漿犯即

血動溢出殺人又忌嗔怒大言笑思想陰陽行動作勞多
食酸鹹飲酒熱羹羨臚輩瘡差後猶爾出百日半年乃可
復常也治金瘡大散方

五月五日平旦使四人出四方各於五里內採一方
草木莖葉每種各半把勿令漏脫一事日正午時細
切碓擣并石灰極令爛熟一石草斷一斗石灰先鑿
大實中桑樹令可受藥取藥內孔中實築令堅仍以
桑樹皮蔽之以麻擣石灰極密泥之令不泄氣又以
桑皮纏之使牢至九月九日午時取出陰乾百日藥
成擣之日暴令乾更擣絳篩貯之凡一切金瘡傷折
出血登時以藥封裹治使牢勿令動轉不過十日即
差不腫不膿不畏風若傷後數日始得藥須煖水洗
之令血出即傅之此藥大驗平生無事宜多合之以

備倉卒金瘡之要無出於此雖突厥質汗黃末未
能及之

用百草心五
月五日作七月七日出

治金瘡方

燒乾梅作炭擣末之傳一宿即差亦治被打傷

又方 磔石末傳之止痛斷血

又方 桑白汁塗桑白皮裹或石灰封之妙

又方 麻葉三斤以水三升熟煮取二升半爲一服

又方 飲麻子汁數升

小品方治
毒箭所傷

又方 蚬蚓屎以水服方寸匕日三

又方 杏人石灰細末猪脂和封亦主犬馬金瘡止痛大良

地黃膏治金瘡火瘡灸瘡不能差方

生地黃

切壹升擣絞
取汁三合

薰陸香

松脂各貳

貳伍合

羊腎脂

煎

烏麻油

貳

杏人

蠟

各貳兩

石鹽

壹兩研
如粉

右八味先下蠟微火令消次內羊脂令消次下油次下松脂令消令下杏人次下薰陸次下地黃汁次下石鹽以微火煎之令地黃汁水氣盡以綿濾停疑一切諸瘡初傷皆傳之日三夜二慎生瘡猪肉雞魚此膏治瘡法先食惡肉不著痂先從內差乃至平復無痂不畏風不膿大大要妙治金瘡血出不止方

煮桑根十沸服一升即止

又方 柳絮封之

又方 捣車前汁傳之血即絕連根收用亦效
又方 以人精塗之

又方 飲人尿三升愈

又方 以蜘蛛幕貼之血即止

治驚瘡血出不止方

取葱葉炙取汁塗瘡上即止若爲婦人所敵者取婦人中衣火炙令熱以熨瘡上

又方

取豉三升漬熱湯食頃絞去滓內蒲黃三合頓服之及作紫湯方在產婦中

又方

蒲黃一斤

當歸二兩

右二味治下篩酒服方寸匕日二服

治金瘡腹中瘀血二物湯方

大麻子半升

大葱白一枚十

右使數人各擣令熟著九升水煮取一升半頓服之若血出不盡腹中有膿血更合服當吐膿血耳

治金瘡出血多虛竭內補散方

蓴蓉

甘草

芍藥

四兩
蜀椒三兩

乾薑二兩

當歸

芎藭

桂心

黃芩

人參

厚朴

吳茱萸 白及

斛桑白皮

黃耆

右十四味治下篩以酒服方寸匕日三

又方

當歸

兩

芍藥

分五

乾薑

分三

辛夷

分五

甘草

二分

右五味治下篩酒服方寸匕日三夜一

治金瘡內漏方

還自取瘡中血著杯中水和服愈

又方

七月七日麻勃

兩一

蒲黃

兩二

右二味酒服一錢匕日五夜二

治金瘡內漏血不出方

牡丹皮爲散水服三指撮立尿出血

治金瘡內塞散方

黃耆

當歸

芎藭

白芷

乾薑

黃芩

芍藥

續斷略二

附子一

細辛兩

鹿茸三

兩

治金瘡煩滿方

右十一味治下篩先食酒服五分匕日三稍增至方寸匕
黑服方寸匕日三

治金瘡苦痛方

楊木白皮熬令燥末之服方寸匕日三又末傳瘡中愈

凡金瘡若刺瘡瘡痛不可忍百治不差者方

葱一把以水三升煮數沸潰洗瘡止痛良

治金瘡煩痛大便不利方

大黃

黃芩

右二味等分末之蜜和先食服如梧桐子十九日三治金瘡破腹腸突出欲令入方

取人屎乾之以粉腸即入矣

治金瘡中筋骨續斷散方

續斷五兩

乾地黃 細辛

蛇銜

地榆兩

當歸

芎藭

芍藥

蕤蓉

三兩人參

甘草

附子各一兩

乾薑

蜀椒

桂心一兩半

右十五味治下篩酒服一方寸匕日三

治被傷腸出不斷者方

爛而草土著腸者欲

作大麥粥取汁洗腸推內之常研米粥飲之三十日

稍稍作強糜百日後乃可差耳

治金瘡腸出方

磁石

滑石

鐵精三兩

右三味末粉腸上後用磁石米飲服方寸匕日五夜二腸

即入

治金瘡血不止令唾之法

呪曰某甲今日不良爲其所傷上告天皇下告地王
清血莫出濁血莫揚良藥百裹不如熟唾日二七痛
唾之即止

又法

我按先師本法男師在左女師在右上白東王公下
白酉王母北斗七星黃姑織女請制水之法清旦明
呪不痕不膿不疼不痛羅肺得肺羅肝得肝羅肉得
肉不住軀姥儂夫自來小兒爲日不吉不良某甲爲
刀斧槊箭削熊虎湯火所傷三唾三呵平復如故急急
如律令此法不復須度受但存念稽急歌誦之非止

治百毒所傷亦治癰疽隨所患轉後語呼之良驗一

切瘡毒竚皆用之

治金瘡矢在肉中不出方

白斂 半夏

右二味等分治下篩酒服方寸匕日三淺瘡十日出深瘡二十日出終不住肉中

治箭鏃及諸刀刃在咽喉胷膈諸隱處不出者方

牡丹皮

分

白鹽

作白斂 分肘後

右二味治下篩以酒服方寸匕日三出

又方 取栝樓汁塗箭瘡上即出

又方 酒服瞿麥方寸匕日三差

治卒爲弓弩矢所中不出或肉中有聚血方

取女人月經布燒作灰屑酒服之

治卒被毒矢方

擣藍汁一升飲之并薄瘡上若無藍取青布漬絞汁
飲之并淋瘡中鏹不出擣死鼠肝塗之鼠腦亦得

又方 内鹽臍中灸之

又方 煎地黃汁作丸服之百日矢當出

又方 煮蘆根汁飲三升

又方 多飲葛根汁并治一切金瘡

治中射罔箭方

藍子合

升麻八兩

甘草

王不留行各四兩

右四味治下篩冷水服二方寸匕日三夜二又以水和塗
瘡乾易之

治毒箭所中方

末雄黃傳之當沸汁出愈